LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Special Book Fund
1910

September 1899

R. W. Gibson: invt

Definieren. 1. I. 94.

90.

PRIMAE LINEAE

FLORAE HERBIPOLENSIS

QUAS

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

SPECIMINIS LOCO INAUGURALIS

U T

S U M M O S

IN UNIVERSA ARTE MEDICA

HONORES ADIPISCATUR,

PLACIDO ERUDITORUM EXAMINI

SUBMITTIT

AD DIEM IV. FEBRUARII MDCCCIX.

JOANNES FRIDERICUS LEHMANN

PALAEO-STETTINO-POMERANUS.

HERBIPOLI,

Formis F. E. Nitribitt, Typographi academici,

1000 517
, 642

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

P A T R I O P T I M O

A D C I N E R E S U S Q U E S U M M A P I E T A T E

C O L E N D O

J O A N N I
C H R I S T O P H O R O
L E H M A N N

M E D I C I N A E D O C T O R I , R E G I B O R U S S O R U M
A C O N S I L I I S I N T I M I S C O L L E G I I M E D I C I
P P O V I N C I A L I S P O M E R A N I A E , M E D I C I N A E
A N A T O M E S Q U E G Y M N A S I I P A L A E O -
S T E T T I N E N S I S P R O F E S S O R I ;

OCT 15 1910

OMNIBUS SUI
PROFESSORIBUS
DE SE OPTIME MERITIS
HASCE
STUDIORUM PRIMITIAS
UT EXIGUUM PIETATIS AC AMORIS
DOCUMENTUM
D. D. D.

Joannes Fridericus Lehmann.

P R A E F A M E N.

Diu cum circumspexissem materiam, quae in specimen inaugurale idonea esset, nihil mihi dignius, quod publici juris fieret, visum est, quam stirpium, quas regio Herbipolitana producit, quasque ipse aestate anni praecedentis legeram, enumeratio, cui florescentiae tempus locumque natalem addidi. Cum enim nullum quod sciam, hucusque existit opus typis exscriptum, quo rei herbariae cultoribus via in exquirendis regionis nostrae plantis muniretur; plantarum indigenarum enumerationem gratam illis fore persuasum mihi fuit. Sunt vero, nisi sexu distinctas quas profero, cum Cryp-

togamiam, ut optavi, per unicum et dimidium annum excolere nondum satis licuit, etiamsi hujusce classis numerus non sit exiguus in montibus, sylvis, vineis paludibusque nostris.

Regiones, quas potissimum perscrutavi, sunt sylvae Waldskugel, Irtenbergensis, Gramschatzensis, Veitshöchheimensis; nemora ad Randersacker versus Eibelstadt, Gerbrunn, Wellriether-Hof, Lengfeld, Versbach, Ober-Dürrbach cet. cet.; agri vineaeque hisce adfines; prata ad ripas Moeni a Sommerhausen ad Veitshöchheim usque, ad Homburg, Lengfurth et ad monasterium Triefenstein; palus satis extensa inter monasteria Dettelbach et Schwarzach, pluresque regiones urbi nostrae proximae, uberrimam scrutanti largientes messem.

Dominum Doctorem Roth^de, quem de re herbaria in Germania optime meritum quivis certe agnoscat, contendere quidem scio, floram nostram, collatam cum Suevofortensi et Werthemensi, multis egere plantis, qui vero error ignoscendus mihi videtur, cum ille regiones nostras non satis forsā perquisiverit, in quibus tanta reperitur vegetabilium copia, ne ullum, quocum herbationes institui, cui non satisfacum sit,

domi revertentem vidi; praeterea autem fines Magni Ducatus Wirceburgensis non ita a natura ab illis separati sunt, ne permultas plantas, quas Cl. Dr. Ro^dh^e illis annumerat, nostrae florum annumerandas censeamus. Sunt quidem, quas proximas non reperimus; decedamus vero paulo longinquius ab urbe nostra, et majorem, aestate exacta, rariorum plantarum copiam, quam ullo loco reperiemus, de quibus cum amicis comitantibus ipse saepissime certior sum redditus. Ne nimium dixisse videar, rogo atque peto permigrantes mecum agros, sylvas, nemora, paludes, nos semper rariorum stirpium plures collegisse, ipsi testentur. Quo ergo jure provinciae nostrae stirpium penuria addicatur, nullo modo accuratius evolvere possum.

Longe autem absum, plantas circa Suevofortum et Werthemium sponte nascentes enarrare, cum mihi nec locus permigrandi hasce regiones fuit, nec hasce enumerare proposui: sed sufficiat, illas, quas duce Cl. Doctore Wolff Suevofortensi, Franconiae rariores carpsi, nominare, ut, qui eas ipse legere cupiat, facilius invenire queat. Sunt nempe hae sequentes:

Bromus giganteus.

| *Poa Paradoxa* Wolfii.

Aira canescens.

| *Schoenus nigricans.*

Elymus europaeus.
Veronica longifol. Schrad.
Campanula latifolia.
Cynoglossum scorpioides.
Pulmonaria mollis Wolfii.
Primula farinosa.
Atbamantha Libanotis.
Laserpitium lanifolium.
Linum austriacum.
Allium senescens.
 — — vineale.
Juncus niger Wolfii.
Rumex nemoloparbum.
Tyrola umbellata.
Stellaria nemorum.
Euphorbia palustris.
Tbalictrum minus.
Spiraea filipendula.
Digitalis ocbroleuca.
Rhinanthus crista galli.
 — — angustifolia Wolfii.
 — — montana Wolfii.
 — — serotina Wolfii.

Lotus siliquosus.
Lathyrus^h *birsutus.*
 — — palustris.
Ononis arvensis.
Trifolium ocbroleucum.
Nymphaea alba.
Prunella laciniata.
Lotus angustifolius.
Ononis antiquorum.
Scorzonera hispanica.
 — — Febriana.
Cnicus tuberosus.
Arnica montana.
Hieracium sylvaticum.
Gnaphalium montanum.
Hyoseris minima.
Hypochoeris glabra.
Limosella tenuifolia.
Orchis palustris.
 — — comosa Scopol.
Ophrys Monorchis.
Epipactis palustris.
Parietaria officinalis. etc.

Cum mihi autem Florae nostrae ubertatem exponere statutum cum animo et deliberatum habeo; grata tamen mente fatendum censeo, me regionum longinquiorum cognitionem Viris Praeclaris, Domino Doctori atque Physiologiae Professore Ignatio Döllinger, et a Consiliis medicorum Magni Ducis Domino Doctori Philippo Josepho Horsch, de me maxime meritis, potissimum debere; ab illo nempe, quocum saepius excursions botanicas instituere licuit, ad proxima non solum, sed ad remotiora etiam loca ductus, ab hoc ad perquirendas, quas ipse juvenis perquisivit, regiones, plantarum copiam producentes, exhortatus, uberrimis saepissime florae opibus donatus reversus sum.

Plantas paludes incolentes non multas hucusque proferre quidem possum, agrorum sylvarumque autem cultores eo plures inveniemus. Proximae nempe paludes, quas scio, sunt ad monasteria Dettelbach et Schwarzach, minores in parte occidentali sylvae Zellenensis, quae cum Irtenbergensi jungitur; sunt quidem prata paludosa ante urbis portas nonnulla, e. g. ad viam, quae ducit ad Unter-Dürrbach, ad Veitshöchheim, ad Wellriether-Hof, cet., producunt vero prae-

)()(

sertim Caricum graminumque copiam, quas loco, quo decet, alligavi, praeterea Ranunculi species nonnullas, Caltham palustrem, Cardaminem pratensem, pluresque alias. Praeter hasce plures quidem adsunt paludes, quas vero longinquitatis causa perscrutare non licuit.

Priusquam enumerationem stirpium ipsam aggrediar, monendum censeo: me a Cl. Linnaei systemate aberrasse, normamque, quam Cl. Persoon in Plantarum Synopsi posuit, elegisse, cum illam plantarum adumbrationi magis convenientem putabam.

Plantas rariores Florae nostrae asterisco notavi, quibus autem ab amicis allatas annumero. — Characteres genericos et específicos omisi, ne toties scripta iterum iterumque describerem, neque opusculum, idque inutiliter, in molem accresceret; eadem fuit causa, cur graminum caricum paucarumque aliarum synonyma tantum alligavi.

Hisce praemissis memineris quaeso, unicae aestatis labore vegetabilium circa Wirceburgum sponte nascentium enumerationem nequaquam perfectam fieri potuisse, cum nisi a me ipso collecta (paucis exceptis) et examinata notaverim; primae tantum sunt Florae lineae, quas botanophilis trado, quasque novis a me nondum notatis augeri cupio.

Classis I. Monandria.

Monogynia.

- 1 *Hippuris vulgaris*. Jun. Jul. in fossis munimenti
urbis aqua repletis inter Pleichacher- et
Neuen-Thor frequens.

Digynia.

- 2 *Callitriche verna*; in fossa sub ponte, qui ducit
aus dem Pleichacher - Thore. Maj. Jun.
frequens cum
3 *intermedia*; ibidem, Maj. Jun.

Classis II. Diandria.

Monogynia.

- 4 *Ligustrum vulgare*; ad sepes versus Höchberg,
Hexenbruch, in sylvā prope Zell copiose,
ad Gerbrunn cet. copiose Jun. Jul.
5 *Syringa vulgaris*; ad sepes der Aumühle et pago-
rum freq. Maj.
*6 *Veronica spicaria*; in montibus herbidis der Walds-
kugel, Schenkenschloß passim, Jul.

- 7 *Veronica officinalis*; in sylvis, sepibus nemoribus-
que ubique, Jun.
- 8 *serpyllifolia*; Gramschatzer Wald, optime locis
apricis herbidis; in pratis vor dem Bur-
karder Thore.
- 9 *Beccabunga*; in rivulis, fossis ubique ante por-
tas, Maj. Jun.
- *10 *Anagallis*; rarior cum priori, vor dem Plei-
chacher Thore, Maj. Jun.
- *11 *scutellata*; in fossis stagnantibus pratorum non
procul a Moeno versus Veitshöchheim, in
palude ad Dettelbach et Schwarzach rar.
Maj. Jun.
- 12 *latifolia*, Schrad.; in nemorosis ad Versbach, in
versuris freq. Maj. (*Veronica Teucrium* Linn.)
- 13 *prostrata*; in versuris versus Waldskugel, passim
Maj., Schenkenschloß, Jun.
- 14 *montana*; locis umbrosis der Waldskugel; ra-
rissime, Jul.
- 15 *Chamaedrys*; in pomariis, ad sepes ubique. Maj:
Jun.
- 16 *agrestis*; in agris cultis, requiescentibus, ad se-
pes, in urbis circumvallatione frequens,
Apr. Maj.
- *17 *praecox*; ad muros hortorum zwischen dem
Neuen- und Pleichacher Thore, rara, in ur-
bis circumvallatione rarior sed speciosior.
Apr.
- 18 *arvensis*; ubique ad sepes satis copiose, Maj.
- 19 *bederaefolia*; ubique vulgaris, Apr.
- 20 *triphyllus*; in agris, ruderatis, hortorumque re-
jectamentis copiosissima, Apr. Maj.]
- *21 *verna*; in arvis prope Gerbrunn, rarior. Maj.
- 22 *Lycopus europaeus*; ad ripas Moeni, ad muros
vinearum prope Homburg haud procul a
Moeno ad pedem montis Calmuth, Jul.

- 23 *Salvia pratensis*; in pratis, urbis circumvaliatione,
Maj. Jun.
*24 *Fraxinus excelsior*; in sylva Gramschatzensi
haud frequens, in sylva ad Zell, April.
Maj.

Digynia.

- 25 *Antoxanthum odoratum*; in montosis sylvaticis
ubique, Apr. Maj.

Classis III. Triandria.

Monogynia.

- 26 *Valeriana dioica*; in prato paludoso ad Wellrie-
ther-Hof frequens, Maj
27 *officinalis*; in nemoribus umbrosis humidis, in
dumetis versus dem Zeller Wald ubique
frequens, Jun. Jul.
28 *Fedia oluoria*; (*Valeriana* Willd spec. plant. I. p.
182.) in versuris, copiose ad Cosbach, Maj.
*29 *dentata*; (*Valeriana* Willd spec. plant. I. p. 183.)
inter segetes ad Rimpf, in sylvaticis ad
Gerbrunn, passim, Maj.
*30 *Polycnemum arvense*; inter segetes in agris ad
Rothenkreuz versus Oberdürrbach; rarior.
Jul.
*31 *Iris pumila*; in moeniis ad Sommerhausen prope
portam, quae tendit Wirceburgum; rara.
Maj.
*32 *germanica*; in rupibus vineisque arcis Marien-
berg, copiose. Maj.
33 *pseudacorus*; in fossis pratorum ante portam
Burcardi, ad ripas rivuli molaris ad Mayn-
brunn. Maj. Jun.

- 34 *Scirpus palustris*; in fossis et pascuis inundatis
ubique. Maj.
- 35 *caespitosus*; in uliginosis vallis ad Unterdür-
bach ducentis, haud frequens; Jun. (spicis
plerumque viviparis occurrit).
- *36 *aeicularis*; ad marginem paludis inter Lettel-
bach et Schwarzach, raro. Jun. Jul.
- 37 *lacustris*; ad ripas Moeni prope Lengfurth et
Trieffenstein.
- 38 *maritimus*; in fossis paludosis vor dem Plei-
chacher Thore, ad ripas insulae inferioris
contra nosocomium. Jun. Jul.
- 39 *sylvaticus*; in nemore ad Maynbrunn loco pa-
ludoso et ad ripas rivuli ibidem. Jun. Jul.

Digynia.

- 40 *Eriophorum angustifolium*; in pratis humidis ad
Wellriether Hof frequens, in pratis palu-
dosis ad Dettelbach et Schwarzach. Apr.
Maj. (*Erioph. polystachion* Pollich Palat. nr.
52. excl. syn.)
- 41 *latifolium*; ibidem frequens. Maj. (*Eriophorum*
polystachium Willd spec. plant. 1. p. 312. —
Leers Fl. Herborn. n. 37.)
- 42 *Alopecurus pratensis*; in pratis, pascuis ubique.
Maj. Jun.
- 43 *geniculatus*; in uliginosis vor dem Pleichacher
Thore frequens. Maj. Jun. (Occurrit radi-
cibus bulbosis. *Alopec. bulbosus* Hoffm. Fl.
Germ. ed. 2. p. 28.)
- 44 *Leersia oryzoides*; in prato sylvestri humido ad
viam versus Gramschatz latere dextro.
Sept. raro. (*Phalaris oryzoides* Lin. spec.
plant. ed. 2. p. 81.)

- 46 *Phleum pratense* α. (Schr. Fl. Germ. 1. p. 182.)
in pratis siccioribus ubique. Jun.
- * — — β. (Schr. Fl. Germ. 1. p. 183.)
in apricis ad vias der Walddskugel frequens,
Jun. (*Pbleum nodosum* Willd spec. plant. 1.
p. 355. — Hoffm. Fl. Germ. ed. 2. p. 33.)
- 47 *Boehmeri*; in collibus apricis der Walddskugel,
nemoris Wellriether Hof proximi, in vineis
ad Gerbrunn satis frequens. Jun. Jul. (*Pha-*
laris pbleoides Willd spec. pl. 1. p. 328. excl.
plur. syn. — *Pbleum phalaroides*, Koel. gram.
p. 52. — *Pbleum Boehmeri*, Schr. Flor.
Germ. 1. p. 186.)
- 48 *Milium effusum*; in nemoribus sylvisque Waldd-
skugel, ad Gramschaz, Versbach, Mayn-
brunn, Zell. Maj. Jun.
- 49 *Trichodium caninum*; β. Schr. in pascuis ad
Unter-Dürrbach, nemorosis ad Versbach,
Wellriether Hof copiose. Jul. (*Agrostis ca-*
nina, Willd spec. plant. 1. p. 367.)
- 50 *Agrostis spica venti*; inter segetes frequens. Jun.
Jul.
- 51 *vulgaris*; in ruinis des Schenkenschlosses,
pascuis des Hexenbruchs, ad ripas Moeni,
in insula nosocomio proxima freq. Jun.
Jul. (*Agrostis pumila* Willd. spec. plant. 1.
p. 371. — Pollich Palat. n. 75. — *Agrostis*
divaricata Hoffm. Fl. Germ. ed. 2 p. 36, et
tenella ejusd. l. c. p. 36. — *Agv. stolonifera*
Leers Fl. Herborn. n. 53. — *Agrostis vul-*
garis α. β. γ. Schr. Fl. Germ. 1.
206 —.)
- 52 *alba*; ad ripas Moeni, in insulis urbi proxi-
mis, in pratis der Aumühle, vor dem
Burkarder Thor, Höchberg et alibi co-
piose (Willd. spec. plant. 1. p. 371. —

Leers Fl. Herb. n. 55. — Pollich Palat. n. 74. — *Agrostis capillaris* Leers Fl. Herb. n. 54. — *Agrostis stolonifera*, Ehrh. et alior. Fl. Germ. autorum. — *Agrostis vinealis*, Willd. spec. plant. 1 p. 369. — *Agrostis gigantea*, Roth Fl. Germ. T. II. P. I. p. 83. — *Agrostis compressa*, Willd. spec. plant. 1. p. 368. — Icon. ad Leers Fl. Herb. l.c. tab. 4 fig. 3. — Schrad. Fl. Germ. 1. p. 209. *Agrostis alba* α. β. γ.)

52 *Arundo epigeios*; in insula Moeni inferiore nosocomio opposita frequens; Jun. Jul. (*Calamagrostis epigeios* Koel. Gram. p. 110.) Schrad. Fl. Germ. 1 p. 211. et ic. t. 4. f. 1.

*54 *Calamagrostis*; in uliginosis nemorosis sylvae Gramschatzensis raro, in montibus nemorosis ad Rimpar unico loco. Jun. Jul. Aug. (Schrad. Fl. Germ. 1. p. 214. — Ejusd. ic. ad Fl. Germ. t. 4. f. 4. — *Calamagrostis lanceolata* Roth. Fl. Germ. T. II. P. I. p. 90.)

*55 *sylvatica*; in nemoribus ad Versbach et Maynbrunn raro; (*Agrostis arundinacea* Willd. spec. plant. 1. p. 364 — *Arundo sylvatica* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 218. — *Calamagrostis arundinacea* Roth. Fl. Germ. T. II. P. I. p. 89.) Jun. Jul.

56 *Phragmites*; in fossis pratorum ad Wellriether Hof, ad ripas Moeni versus Heydingsfeld. Jul. Aug.

*57 *Stipa capillata*; in arenosis monasterii Himmelsporten ab amicissimo Voit lecta mihi tradita. Jun. Jul.

58 *Panicum verticillatum*; in agris, vineis frequens. Jun. Jul.

- 59 *viride*; in agris, ad vias versus Lengfurth. Jul.
- *60 *Crus galli*; ad fimeta viae, quae ducit ad Gerbrunn, ad Heydingsfeld. Jul. Aug.
- 61 *Holcus avenaceus*; in insula Moeni ad nosocomium, in pratis portae Burcardi. (*Avena elatior*, Willd. spec. plant. 1. p. 443. Host gram. austr. II. p. 36. — Leers Fl. Herb. n. 88. — Polich Palat. n. 122. — *Holcus avenaceus* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 247.)
- *62 *mollis*; in nemorosis ad Versbach rarior. Jul.
- 63 *lanatus*; ad muros ante Pleichacher Thor, in sylvaticis, pratis frequens. Jun. Jul.
- 64 *Aira cristata*; in pratis nemorosis, in versuris ad vias versus Waldskugel. (*Poa cristata* Willd. spec. plant. 1. p. 402. — Host Gram. austr. II. p. 54; Ejusd. Ic. t. 75. — Leers Fl. Herb. n. 73. — Pollich Palat. n. 96. — *Aira cristata* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 255.) Jun.
- *65 *Aira aquatica*; in palude ad Dettelbach et Schwarzach frequens. Jun. (*Poa airoides* Koel gram. p. 194. — *Molinia aquatica* Wib. Werthem. p. 116. — *Aira aquatica* Schrad. Fl. germ. 1. p. 256.
- 66 *caespitosa*; in pratis, nemorosis ad Gramschatz, Gerbrunn, Zell, Versbach. Jun. Jul.
- 67 *flexuosa*; in sylva ad Gramschatz locis excisis frequens. Jun.
- *68 *caryophyllea*; in arenosis ad Gerbrunn rarior. Maj.
- *69 *Melica ciliata*; in saxosis, in vineis et rupibus arcis Marienberg copiose. Maj.
- 70 *nutans*; in nemorosis et ad sylvarum margines ubique. Maj. Jun.

- 71 *Melica uniflora*; in sylva Waldskugel passim; copiosior in sylva Gramschatzensi. Maj. (*Melica nuzans* Pollich Palat. n. 84.)
- *72 *caerulea* β. *major*; in sylva Irtenbergensi haud procul a domicilio venatoris, in nemorosis ad Versbach, per quae itur ad Rimpar, passim. Jul.
- 73 *Poa aquatica*; ad ripas Moeni, insulae superioris campo jaculatorio proximae. Jul.
- 74 *fluitans*; ad fossas, in uliginosis ubique per totam aetatem. (*Festuca fluitans*, Willd. spec. plant. 1. p. 426. — Host gram. austr. II. p. 55; Ejusd. Ic. t. 77. — Leers Fl. Herborn. n. 80. — Pollich Palat. n. 107. — *Poa fluitans* Schrad Fl. Germ. 1. p. 280. — Koel Gram. p. 204.)
- 75 *distans*; in via versus Heydingsfeld ante portam Burcardi, aestate. (*Poa salina* Pollich Palat. n. 92. — *Poa distans* Schrad Fl. Germ. 1. p. 282. — Host gram. austr. II. p. 46; Ejusd. Ic. t. 63. — Willd. spec. plant. 1. p. 401.)
- *76 *dura*; ad ripam trans Moenum arenosam non procul a loco, in quo lintea insolantur. Maj. (*Cynosurus durus* Willd. spec. plant. 1. p. 413. — Pollich Palat. n. 100; Ejusd. Ic. t. 1. f. 1. — *Poa dura* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 284. — Host gram. austr. II. p. 53; Ejusd. Ic. t. 75.)
- 77 *bulbosa*; ad muros vinearum ubique frequens. Maj. (Floribus viviparis raro occurrit.)
- *78 *sudetica*; rarissime in prato sylvatico, in quo *Leersia oryzoides* nascitur versus Gramschatz. Jun. (*Poa rubens* Koel. gram. p. 160. — Willd. spec. plant. 1. p. 389. —

Poa sudetica Schrad. Flor. German. 1. p. 295)

- 79 *Poa trivialis*; ubique in pratis, pascuis. (*Poa dubia* Leers Fl. Herb. n. 69; Ejusq. Ic. t. 6. f. 5. — *Poa pratensis* Pollich Palat. n. 90. — *Poa trivialis* Schrad. Fl. Germ. p. 296. — Host gram. austr. II. p. 45; Ejusd. Ic. t. 62.
- 80 *pratensis*; in pratis ad Zell, Unter-Dürrbach, versus Heydingsfeld vulgaris. Aestate. (*Poa trivialis* Roth. Fl. Germ. T. II. P. I. p. 112. — *Poa angustifolia* Leers Fl. Herb. n. 67. — Pollich Palat. n. 89. — Willd. spec. plant. 1. p. 387. — *Poa pratensis* Schrad. Fl. Germ. 1 p. 298. — Willd. spec. plant. 1. p. 388. — Host gram. austr. II. p. 44; Ejusd. Ic. t. 61.
- *81 *nemoralis*; in nemorosis sylvaticis umbrosis, Waldskugel ad Gerbrunn cet. passim. Jun. Jul.
- 82 *compressa*; in muris, ruderalis, frequens. Jun.
- 83 *annua*; in pratis, cultis, ad vias ubique, per totam aetatem.
- 84 *Briza media*; in nemorosis, ad dumeta ubique. Maj.
- 85 *Dactylis glomerata*; ubique in pratis, pomariis, sylvis. Jun.
- *86 *Cynosurus cristatus*; in pratis trans Moenum prope Kitzingen. Jun.
- 87 *Festuca tenuifolia*; in sylva prope Maynbrunn passim. Maj. Jun.
- 86 *ovina*; in saxosis vinearum versus Dürrbach, dem Hexenbruch, Schenkenschloß vulgaris. Maj.
- *87 *glauca*; in pascuis siccis ad viam versus Veitshöchheim frequens. Maj. Jun. Jul. (*Festu-*

ca duriuscula Florae Wetter. n. 130. secundum specimen a Doctore J. Gaertner mecum communicatum — *Festuca dura* Host Gram. Austr. II. p. 62.; Ejusd. Ic. t. 87.

*88 *myurus*; raro in muro propugnaculi contra Moeni impetum proximo dem Krahn. Jun.

*89 *rubra*; in saxosis vinearum ad Unterdürrbach, per quae semita ad Schenkenschloß ducit; raro. Jun.

90 *duriuscula*; in nemorosis ad Gramschatz, Intenberger Wald, in insula Moeni inferiore copiose. Jun. (Willd spec. plant. 1. p. 421. — Host gram. austr. II. p. 59.; Ejusd. Ic. t. 83. — Schrad. Fl. Germ. 1. p. 328. — Leers Fl. Herb. n. 75.; Ejusd. Ic. t. 8. f. 2. — *Festuca heterophylla*, Willd. spec. pl. 1. p. 421. — *Festuca dumetorum*, Willd. l. c. p. 422. — Koel. gram. p. 256.)

91 *pratensis*; in sepibus, dumetis, pratis. Jun. *Festuca elatior*, Host gram. austr. II. p. 57.; Ejusd. Ic. t. 79. — Leers Fl. Herb. n. 79; Ej. Ic. l. c. t. 8. f. 6. — *Bromus elatior*, Koel. gram. p. 214. — *Poa curvata*, Ejusd. p. 207. — *Festuca pratensis* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 332.)

92 *elatior*; in pratis ad ripas Moeni. ad vias. Jun. (*Bromus limoreus* Willd. spec. plant. 1. p. 433. — Host gram. austr. I. p. 7.; Ejusd. Ic. t. 8. — *Bromus arundinaceus*, Koel. gram. p. 217. — *Festuca elatior* Schrad. Fl. Germ. l. c. p. 333.)

*93 *loliacea*; in pratis humidis ad Triefenstein, rara. Jun. (*Poa loliacea* Koel. gram. p. 207. — *Festuca fluitans* Leers Fl. Herb. nr. 80.

variet. — *Festuca foliacea* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 341.

- 94 *pinnata* in collibus ad sepes versus Höchberg et Zeller Wald, copiose et alibi. Jun. (*Bromus pinnatus*, Willd. spec. plant. 1. p. 438. — Host gram. aust. I. p. 18.; Ejusd. Ic. 1. c. t. 22. — Leers Fl. Herb. n. 87.; Ejusd. Ic. t. 10. f. 3. — Pollich Palat. n. 117. — *Triticum bromoides*, Wibel Werthem. p. 104. — *Festuca pinnata*, Schrad. Germ. 1. p. 342. — *Triticum pinnatum*, C. Sprengel. Fl. Hal. p. 45.)

- 95 *gracilis*; in nemorosis der Waldskugel, Gramschatzer Wald et alibi. Jun. (*Bromus gracilis* Willd. spec. plant. 1. p. 438. — *Bromus sylvaticus* Host gram. austr. I. p. 17.; Ejusd. Ic. 1. c. t. 21. — Pollich Palat. n. 118. — *Triticum sylvaticum*, C. Sprengel Fl. Hal. p. 44. — *Triticum teretiflorum*, Wibel. Werthem. p. 104. — *Festuca gracilis* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 343.)

- 96 *Bromus secalinus*; inter segetes ubique. Jun. Jul.

- 97 *mollis*; in pascuis, maris ante Pleichacher Thor. ad vias in vineis alibique haud infrequens. Maj. Jun.

- *98 *commutatus*; in agris requietitiis inter Versbach et Maynbrunn satis frequens. Jun. (*Bromus multiflorus* autorum. — *Bromus commutatus* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 353.

- 99 *arvensis*; ad vias versus Veitshöchheim, Aumühle, Gerbrunn, inter segetes, ubique copiose. Jun. (*Bromus versicolor* Pollich Palat. n. 109. — *Bromus arvensis* Willd. spec. plant. 1. p. 454. excl. syn. Pollich et Weigel. — Schrad Fl. Germ. 1. 556. — Host gram. austr. I. p. 12; ejusd. Ic.

l. c. t. 14. — Leers Fl. Herb. n. 84; ejusd. Ic. t. 11. fig. 5. — *Bromus multiflorus* Weig. Obs. p. 2.)

- *100 *erectus*; in circumvallatione urbis non procul ab officina coriaria, quam possedit Dom. Buchler. Jun. (*Bromus montanus* Fl. Wetter. n. 147. fide speciminis, quod a Doctore J. Gaertner accepi. — *Bromuspseud-arvensis* Koel. gram. p. 241. — *Bromus agrestis* Host gram. austr. I. p. 9; ejusd. Ic. l. c. t. 10. — *Bromus arvensis* Pollich Palat. n. 115. excl. synonym. — *Bromus erectus* Schrad. Fl. Germ. 1. p. 357.)
- 101 *inermis*; ad vias, in ruderatis, dumetis passim. Jun.
- 102 *asper*; in sylva Gramschatzensi haud frequens. (*Bromus montanus* Pollich Palat. n. 116. — Koel. gram. p. 210. — *Bromus asper* Willd. spec. plant. 1. p. 432. excl. syn. Pollich. — Koel. gram. p. 230. — Host gram. austr. I. p. 6; Ejusd. Ic. l. c. t. 7. — Schrad. Fl. Germ. 1. p. 360. —)
- *103 *giganteus*; locis humidis sylvae Gramschatzens. Jun. Jul. (rarior).
- 104 *rectorum*; in muris, tectis vd vias vor dem Pleichacher Thore ubique. Maj. Jun.
- 105 *sterilis*; cum antecedente simul et in dumetis, ad sepes ubique. Mai. Jun.
- 106 *Avena orientalis*; seritur in pluribus pagorum agris, occurrit et inter segetes aestivas.
- 107 *fatua*; inter segetes aestivas ubique. Jun. Jul.
- 108 *strigosa*; inter segetes, praesertim inter Hordeum et Avenam. Jun. Jul.
- 109 *flavescens*; in pascuis versus Biebelrieth, Randersacker, in pratis ad Heydingsfeld. Jun. Jul.

- *110 *Avena pubescens*; in nemorosis ad Lengfeld parce.
Maj. Jun.
- 111 *pratensis*; in pascua sterili versus Veitshöchheim passim. Maj. (*Avena bromoides*, Willd. spec. plant. 1. p. 453. — Koel. gram. p. 291. — *Avena pratensis* Willd. l. c. p. 451. Host gram. austr. II. p. 279.; Ejusd. Ic. l. c. t. 51. — Leers Fl. Herb. n. 92. — Pollich Palat. n. 124. — Schrad. Fl. Germ. 1. p. 385.)
- 112 *Secale cereale*; sponte ad vias, in insula Moeni inferiore cet. Maj. Jun.
- 113 *Triticum caninum*; (α) vaginis scabris, ad muros vinearum arcis Marienberg et alibi; (β) vaginis glabris ubique in nemoribus, pratis, ad sepes. Jun. (*Elymus caninus*, Willd. spec. plant. 1. p. 469. — Leers Fl. Herb. n. 96.; Ejusd. Ic. l. c. t. 12. fig. 4. II. — Pollich Palat. n. 131. — *Trit. canin.* Host gram. austr. p. 20.; Ejusd. Ic. l. c. t. 25. — C. Sprengel. Fl. Hal. p. 45. — Schrad. Fl. Germ. 1. p. 389.)
- 114 *repens*; (α) flosculis acuminatis, in cultis, ruderatis, ad sepes ubique. Maj. Jun. Jul.
- 115 *aestivum*; sponte occurrit ad vias. Jul.
- 115 *bibervum*; seritur in agris, sponte in agris requiescentibus copiose. Jul.
- 117 *Lolium perenne*; (α *vulgare* Host, et β *tenue* Willd.) α , ubique ad vias, in vineis, pratis, pascuis; β , locis humidis umbrosis sylvae Gramschatzensis. Jun.
- 118 *temulensum*; inter segetes passim. Jun. Jul.
- 119 *Hordeum murinum*; ad muros vinearum viae versus Veitshöchheim, in ruderatis alibi, ad sepes frequens. Maj. Jun.

- 120 *pratense*; in pratis, pascuis, ad vias. Jun. Jul.
(*Hordeum secalinum*, Willd. spec. plant. 1.
p. 475. — Host gram. austr. I. p. 26.;
Ejusd. Ic. 1. c. t. 33. — C. Sprengel. Fl.
Hal. p. 46. — *Horaeum pratense* Schrad.
Fl. Germ. 1. p. 405.)

Trigynia.

- 121 *Holosteum umbellatum*; in urbis circumvallatione,
in muris, ruderatis ubique. Mart.
April.

Classis IV. Tetrandria.

Monogynia.

- 122 *Scabiosa succisa*; in pratis versus Randersacker,
ad Veitshöchheim. Jul. Aug. (Occurrit et
species prolifera in nemorosis ad Randersacker.)
- 123 *arvensis*; in pratis, ad vias ubique frequens.
Jun.
- *124 *germanica* Wolffii; in pratis vor dem Burkar-
der Thore cum antecedente simul, rarior.
Jun. (Differt ab antecedente caule erecto
glaberrimo ad foliorum angulos leviter
pubescente; foliis omnibus pinnatifidis, ra-
dicalibus et caulinis inferioribus decussive-
pinnatis, pinnis pinnatifidis, superioribus
pinnatifidis pinnis lineari-integerrimis, om-
nibus pubescentibus; a sequente discrepat
magnitudine non solum, sed loco etiam
natali, nostra enim est planta bipedalis et
altior, et in pratis siccioribus nominatis tan-
tum occurrit.)

- 125 *Scabiosa columbaria*; in montosis herbidis, Waldskugel, ad Versbach. Jul. Aug. (Floribus ochroleucis nondum legi.)
- 126 *Asperula odorata*; in nemorosis der Waldskugel freq. Maj.
- 127 *arvensis*; in arvis montosis ad Veitshöchheim, copiose. Maj.
- *128 *tinctoria*; in monte Calmuth, rara. Jun.
- 129 *cynanchica*; in apricis arenosis ad Dettelbach, in versuris, saxosis ubique. Jun. Jul.
- 130 *Galium palustre*; in palude ad Dettelbach. Jun. Jul.
- 131 *uliginosum*; ibidem et in uliginosis sylvae Gramschatzensis, der Waldskugel, passim. Jun. Jul.
- 132 *scabrum*; in nemoribus montosis ad Versbach, Maynbrunn. Jun.
- 133 *glabrum*; in sylva Gramschatzensi, in apricis des Hexenbruchs. Jun.
- *134 *erectum*; in pascuis des Hexenbruchs, raro. Jun.^f
- *135 *glaucum*; ad muros vinearum versus Veitshöchheim, in saxosis montis Stein. Maj. Jun.
- 136 *verum*; in pratis, dumetis, versuris vulgaris. Jun. Jul.
- 137 *Mollugo*; in sepibus, ad vias vulgaris. Jun.
- 138 *sylvaticum*; in sylvis, nemoribus ubique frequens. Jun. Jul.
- 139 *Bocconi*; auf dem Hexenbruch, in sylva Gramschatzensi, in nemorosis ad Versbach versus Maynbrunn. Jun.
- 140 *spurium*; inter segetes passim. Jun.^f
- 141 *Aparine*; ubique ad sepes, in dumetis, ad vias. Jun.

- 142 *Plantago major*; ad vias, sepes, in pratis, pascuis ubique. Aestate.
- 143 *media*; in pratis, pascuis, ad sepes. Eodem tempore.
- 144 *lanceolata*; cum antecedentibus; iisdem locis.
- 145 *Sanguisorba officinalis*; in pratis ad Zell passim. Jul.
- 146 *Cornus sanguinea*; in sepibus, nemorosis ubique. Apr. Maj.
- 147 *Alchemilla vulgaris*; in sylva Irtenbergensi freq. in versuris ad Waldskugel. Jun.
- 148 *aphanes*; in agris, inter segetes versus Rimpar. Jun. (*Alchemilla aphanes*, Willd. spec. plant. 2. p. 699. — Flor. Wetter. n. 216. — *Aphanes arvensis* Pollich Palat. n. 169.)
- 149 *Bifolium cordatum*; in nemoribus umbrosis, Maj. freq. (*Convallaria bifolia*, Willd. spec. plant. T. 2. P. 1. p. 164. et aliorum autorum. — *Bifolium cordatum* Fl. Wetter. n. 217.)

Digynia.

- 150 *Cuscuta europaea*; in muris circumvallationis proximis dem Pleichacher Thore. Jun.

Tetragynia.

- *151 *Potamogeton natans*; in piscinis, quae sunt inter urbis munimenta, in stagno ad Gramschatz. Jun. Jul.
- *152 *perfoliatum*; in rivulo Werre ad Arnstein. Jul. (raro.)
- 153 *lucens*; in stagno ad Gramschatz. Jul.
- 154 *pectinatum*; in Moeno ad Winterhausen. Jun. (raro, nondum florentem legi.)

- 155 *Potamogeton crispum*; in rivulo molario ad
Maynbrunn. Iun. Iul.
156 *Sagina procumbens*; in sylva Gramschatzensi locis
excisis humidioribus. Iun.

Classis V. Pentandria.

Monogynia.

- 157 *Myosotis palustris*; in fossis stagnantibus, in
uliginosis ubique. Maj. Iun. (*Myosotis*
scorpioides palustris Linn.)
158 *collina*; (α major) in agris arvis, collibus apri-
cis; (β minor) in agris sabulosis ad Ger-
brunn frequens. Maj. Jun. (*Myosotis ar-*
vensis Linn. — *Myosotis collina* Ehrh.)
159 *sylvatica*; in umbrosis sylvae Gramschatzensis,
Irtenbergensis. Iun. Iul.
160 *lappula*; in versuris, ruderatis versus Heidings-
feld, in muris versus Veitshöchheim. Iun.
Iul. freq.
161 *Lithospermum arvense*; in agris, arvis, inter
segetes. Aestate.
*162 *purpureo-caeruleum*; in nemorosis ad Veits-
höchheim passim. Maj.
163 *Anchusa officinalis*; in ruderatis ubique. Maj.
Jun.
*164 *angustifolia*; in sterilibus sabulosis ad Dettel-
bach et Schwarzenau, in insula Moeni no-
socomio insanabilium opposita. Maj. Iun.
165 *Cynoglossum officinale*; ad vias, in ruderatis,
pascuis montanis. Maj.
166 *Pulmonaria angustifolia*; in nemorosis apricis
vinearum ad Gerbrunn frequens, in ne-
morosis ad Randersacker. Apr. Maj.

- 167 *Symphytum officinale*; in fossis, quae ad muni-
endam urbem serviunt am Neuen Thore.
in prato paludoso ad Veitshöchheim. Maj.
Iun. (Flores luteo-albi vel purpurascens.)
- *168 *Borago officinalis*; ad sepes horti cujusdam zwi-
schen dem Pleichacher und Neuen-Thore,
in ruderalis vor dem Burkarder - Thore.
Iun.
- 169 *Echium vulgare*; in arvis, ad sepes, in insula
Moeni inferiore, ubique frequens. Iun.
- 170 *Anagallis arvensis*; (*An. phoenicea et Anag. coerulea Hoffm.*) in agris, arvis, pomariis, vineis
vulgaris. Aestate.
- 171 *Lycopsis arvensis*; in agris sabulosis ad Ger-
brunn, in insula Moeni inferiore, passim.
Maj. Iun.
- *172 *pulla*: in agris inter segetes ad Lengfurth. Iun.
(Duo tantum specimina inveni, nec plura
summo exarare potui studio in omnibus
agris adfinibus.)
- 173 *Lysimachia vulgaris*; in insula inferiore, locis
humidis sylvae Gramschatzensis. Iun.
- *174 *nemorum*; locis humidis nemoris ad Versbach.
Iun.; raro.
- 175 *nummularia*; in fossis exsiccatis, in udis vor
dem Burkarder Thore. Iun.
- 176 *Primula elatior*; in parte occidentali humida syl-
vae ad Zell, qua tendit ad Irtenberger
(Flores speciosi, pallide flavi, inodori);
Höchberg, Waldskugel, frequens. April.
Maj.
- 177 *officinalis*; in pratis, nemoribus vulgaris. Apr.
Maj.
- 178 **Androsace elongata*; in ⁸agris sabulosis ad
Gerbrunn sub Pruno-Cerasis frequens. Maj.

- *179 *Hottonia palustris*; in fossis stagnantibus paludis ad Dettelbach et Schwarzenau; passim. Maj. Jun.
- 180 *Menyanthes trifoliata*; ibid. copiosissime. Maj.
- 181 *Verbascum lychnitis*; in campis aridis, ad sepes, in insula inferiore Moeni. Jun.
- 182 *album*; (Moench Method. p. 447. — Flor. Wetter. n. 278.) cum antecedente simul iisdem locis, ad muros vinearum in via ad Veitshöchheim. Jun. Jul.
- 183 *nigrum*; in versuris, nemorosis montanis ad Gerbrunn, Lengfeld, copiose. Jun. Jul.
- 184 *blattaria*; cum antecedentibus simul eodem tempore et loco.
- 185 *Chironia centaurium*; in pascuis, nemorosis abunde. Jul. (*Gentiana Centaurium*. Linn.)
- *186 *pulchella*; in lacu siccefacto retro Gramschatz proximo viae, quae ducit ad Arnstein. Jul. rarissima. (*Chironia Centaurium* β , Willd.)
- 187 *Datura stramonium*; in fimetis vor dem Sander-Thore am Ehhaltenhause, in insula inferiore Moeni. Jul.
- 188 *Hyoscyamus niger*; in pagis, ruderatis, ad vias vulgaris. Aestate.
- 189 *Atropa Belladonna*; Waldskugel, Irtenberger Wald. Jun.
- 190 *Physalis Alkekengi*; in vineis ad Ober - Dürrbach ad Nosocomium Julianaeum pertinentibus frequens. Jun. Jul.
- 191 *Solanum Dulcamara*; in dumetis der unteren Mayn-Insel. Jun.
- 192 *nigrum*; ad sepes, in ruderatis, fimetis, in agris vulgare. Jun.
- *193 *Vinca minor*; ad sepes vinearum zwischen der Aumühle und dem Rennweger - Thore. Apr. Maj. (raro.)

- 194 *Campanula rotundifolia*; in pascuis, nemoribus, collinis, copiose. Maj. Jun.
- 195 *Rapunculus*; in pratis, in campis herbidis. Maj. Jun.
- 196 *renuifolia*; in versuris, ad muros vinearum passim.
- 197 *patula*; ad margines nemorum ad Gerbrunn, Wellriether Hof, Lengfeld, passim; Irtensberger Wald. Jul.
- 198 *persicifolia*; in nemoribus montosis et dumetis frequens. Jun.
- 199 *glomerata*; in nemoribus montosis ad Wellriether Hof copiose, in saxosis sterilibus vinearum. Jul.
- 200 *rapunculoides*; in sepibus versus Veitshöchheim et alibi vulgaris. Jun. Jul.
- 201 *Trachelium*; in nemoribus et dumetis der Waldskugel, ad Gerbrunn et alibi frequens. Jun.
- *202 *Speculum*; inter segetes ad Gerbrunn copiose. Jun. Jul.
- 203 *Phyteuma spicatum*; in nemoribus ubique. Jun.
- 204a *Rhamnus catharticus*; in nemoribus ad Randersacker, Lengfeld, Gerbrunn, passim. Maj.
- 204b *Rhamnus frangula*; in nemore ad Gerbrunn, Versbach. Maj.
- 205 *Evonymus europaeus*; in insula inferiore frequens. Maj. Jun.
- 206 *Ribes rubrum*; in sepibus et sylva ad Veitshöchheim rarius. Apr. Maj.
- 207 *Uva crisa*; in sepibus. Apr. Maj.
- 208 *Lonicera Xylosium*; in nemoribus et sepibus. Maj.
- *209 *Impatiens noli tangere*; in umbrosis ad ca-

tarrhactam prope Triefenstein, raro. Jul. Aug.

210 *Hedera Helix*; in muris nosocomii insanabilium, in muris monasterii Zell, in nemorosis ad arborum radices. Sept.

211 *Vitis vinifera*; ubique in vineis. (Plures varietates nondum perscrutavi.) Jun. Jul.

212 *Thesium linophyllum*; ad margines sylvarum ad Zell, Gramschatz, Gerbrunn et alibi. Maj. Jun.

213 *Viola hirta*; in pascuis, dumetis vulgaris ad Zell et alibi. Mart. Apr.

214 *odorata*; in pascuis, dumetis, versuris, auf dem Walle. Mart. Apr.

215 *canina*; in nemorosis montanis der Waldskugel frequens. Apr. Maj.

*216 *mirabilis*; in umbrosis humidis, im Versbacher Wald, Waldskugel. Maj.

217 *tricolor*; in agris sterilibus, hortorum rejectamentis. Apr. Maj.

218 *arvensis*; in agris sterilibus, versuris, montibus ubique. Aestate.

Digynia.

219 *Asclepias Vincetoxicum*; in nemorosis der Waldskugel, Veitshöchheim, in saxosis des Hexenbruchs. Maj.

220 *Gentiana Amarella*; in saxosis inter vineas gegen den Zeller Wald et alibi frequens. Aug. Sept.

*221 *campestris*; habitat nahe am Schenken- schloß; cum antecedente promiscue, sed rarius. Sept.

222 *ciliata*; frequens auf dem Glacis vor dem

Zeller Thore am Wege nach Höchberg.
Sept. Oct.

- 223 *Atriplex rosea*; in ruderatis vor dem Burkarder Thore. Jul. passim.
- 224 *parula*; in rejectamentis hortorum, ad vias, in pagis frequens. Aug. Sept.
- 225 *Chenopodium bonus Henricus*; in pagis ad vias frequens. Aestate.
- 226 *viride*; in ruderatis vor dem Pleichacher Thore. Jun.
- 227 *album*; ibid. cum antecedente.
- 228 *glaucum*; iisdem locis eodem tempore.
- 229 *murale*; in ruderatis et finetis vor dem Sander Thore in via ad Heydingsfeld.
- 230 *rubrum*; in ruderatis vor dem Burkarder Thore. Jul.
- *231 *olidum*; cum prioribus simul eodem tempore rarior.
- 232 *Herniaria glabra*; in campis arenosis editioribus ad Veitshöchheim. Maj. Jun.
- 233 *Ulmus campestris*; auf den Stadtwällen und Promenaden. Apr.
- 134 *effusa*; ibidem eodem tempore.

Umbellatae.

- 235 *Eryngium campestre*; in campis aridis, in versuris ad vias. Jul.
- 236 *Sanicula europaea*; in nemoribus et sylvis ubique. Maj.
- 237 *Bupleurum rotundifolium*; inter segetes am Wege gegen die Waldskugel frequens. Jun.
- 138 *falcatum*; in saxosis, ad sepes, ad rupes arcis Marienberg copiose, in nemoribus montosis. Jun. Jul.
- 239 *Daucus Carota*; in pratis, versuris, ad vias. Jun. Jul.

- *240 *Conium maculatum*; in sylva Irtenbergensi ad
sepimentum nahe am Jägerhause, raro.
Jun. Jul.
- *241 *Selinum carvisfolia*; in nemorosis humidiori-
bus sylvae Gramschatzensis. Jun. Jul.
passim.
- *242 *Cervaria*; ad nemoris margines, in vineis ad
Gerbrunn, ad Versbach, haud frequens.
Jun. Jul. (*Athamanta Cervaria* Lin.)
- *243 *Athamanta Oreoselinum*; in sepibus et dume-
tis viae versus Gerbrunn. Jul. rara. (*Atha-
manta Oreoselinum* Lin: *Selinum* aliorum.)
- 244 *Peucedanum Silaus*; in pratis bey der Au-
mühle, in pomariis ibid. Jul.
- 245 *officinale*; in nemore montoso supra vineas ad
Gerbrunn satis frequens. Jun. Jul.
- 246 *Heracleum Spondylium*; in nemoribus et pra-
tis frequens. Jun. Jul.
- 247 *Sium angustifolium*; ad scaturiginem in vineis ad
Gerbrunn. Jun.
- 248 *Falcaria*; inter segetes frequens, ad margines
sylvae ad Veitshöchheim. Jun. Jul.
- *249 *Oenanthe fistulosa*; in palude inter Dettelbach
et Schwarzenau, ad Himmelsporten rarior.
Maj. Jun.
- 250 *Phellandrium aquaticum*; in stagno ad Ger-
brunn, satis frequens. Jul.
- 251 *Tordylium Anubrisus*; im Gramschatzer Walde,
Waldskugel, Stadt-Walle, in sepibus. Jul.
- 252 *Angelica sylvestris*; in pratis sylvaticis des Gram-
schatzer Waldes; Waldskugel. Jun.
- 253 *Scandix Pecten*; inter segetes aestivas ad viam
versus Waldskugel. Jun.
- 254 *cercifolium*; ad sepes hortorum zwischen dem
Pleichacher- und Neuen-Thore. Mai.

- 255 *Scandix Anthriscus*; ad sepes hospitii ad Schwarzenau. Maj. Jun. (*Caucalis Scandicina* Hoffm.)
- 256 *Chaerophyllum sylvestre*; in pratis et pomariis vulgare. Maj.
- 257 *remulum*; in sepibus et dumetis am Eselswege versus sylvam Zellensem. Jun.
- 258 *bulbosum*; in dumetis humidis insulae inferioris, in uliginosis vor dem Pleichacher Thore.
- 259 *Pastinaca sativa*; in pratis et pascuis ubique, in insula Moeni inferiore. Jul.
- 260 *Carum Carvi*; in pratis ubique. Maj. Jun.
- 261 *Pimpinella saxifraga*; auf dem Hexenbruch. Jun.
- 262 *nigra*; ibid. et Gramschatzer Wald. Jun.
- 263 *magna*; im Gramschatzer Walde, in nemorosis ad Gerbrunn. Jun.
- *264 *intermedia* (mihi); in insulae inferioris salicetis. Jun. (medium inter *Pimp. magnam*, cui maxime affinis, et *dissectam* tenere videtur.)
- 265 *dissecta*; in montosis sylvaticis ad Veitshöchheim, Waldskugel, et alibi. Jun.
- *266 *dioica*; in pascuo sterili versus Veitshöchheim, in saxosis ad viam versus Gerbrunn. Maj.
- 267 *Aegopodium Podagraria*; in dumetis, nemorosis, im Gramschatzer und Zeller Walde. Jun. Jul.

Trigynia.

- 268 *Viburnum Iantana*; in nemorosis ad Versbach, in sepibus am Eselswege versus sylvam Zellensem. Maj.
- 269 *Sambucus nigra*; in sepibus ad pagos vulgaris. Jun. Jul.
- 272 *Elulus*; inter segetes ad Arnstein, in rupetibus ad Triefenstein. Jun. Jul.

Tetragynia.

- 272 *Statice Armeria*; in collibus ad Versbach, in insula inferiore. Aestate.
- 273 *Linum catharticum*; Gramschatzer Wald, Hexenbruch, in pratis, versuris. Aestate.
- *274 *tenuifolium*; vulgatissimum auf dem Hexenbruch, in montosis aridis vor dem Neuen-Thore versus Rimpar. Jun.

Hexagynia.

- *275 *Drosera rotundifolia*; in palude ad Dettelbach et Schwarzenau. Iun. Iul. satis copiose.

Classis VI. Hexandria.

Monogynia.

- *276 *Berberis vulgaris*; in via versus Altertheim, raro. Maj.
- *277 *Peplis portula*; in uliginosis sylvae Gramschatzensis. Iun. raro.
- 278 *Allium arenarium*; in parte meridionali arcis Marienberg. Iun.
- 279 *rotundum*; ad vinearum margines hinter dem Zellischen Chaussée-Hause, iisdem locis ad Retzstadt. Iun.
- *280 *sphaerocephalum*; ad muros vinearum versus Veitshöchheim in sepibus. Iul.
- 281 *vineale*?? in vineis versus Veitshöchheim, im Stein? Iun.
- 282 *oleraceum*; in sepibus, dumetis satis frequens. Iul.
- 283 *ursinum*; Waldskugel passim, im Gramschatzer Walde copiose. Maj.

- *284 *Lilium Martagon*; rarissime in nemorosis
ad Randersacker. Maj. Iun.
- 285 *Tulipa sylvestris*; in vineis vor dem Neuen
Thore, in pratis ibidem et an der Au-
mühle frequens. Maj.
- 286 *Ornithogalum luteum*; auf dem Walle prope fabri-
cam coriariam Buchleri. Apr.
- 287 *minimum*; ibid. et in agris, pascuis vulgaris.
Mart. Apr.
- *288 *umbellatum*; in vineis rechts von der Chaussée
nach Randersacker, in vineis versus Ger-
brunn. Maj.
- *289 *nutans*; in pomario et pratis proximis dem
neuen Thore, in den Festungswerken vor
dem Burcarder Thore nahe an dem Canal.
Maj.
- 290 *Scilla bifolia*; in sylva Zellensi copiosissime.
Mart. Apr.
- 291 *Phalangium ramosum*; in nemorosis montosis
des Calmuths, Waldskugel, Gramschatzer
Wald. Iun. Iul.
- *292 *Liligo*; in montis Calmuth pineto. Iun.
Iul. raro.
- 293 *Asparagus officinalis*; in insula inferiore copiose.
Iun. Iul.
- 294 *Convallaria majalis*; in sylvis et nemoribus
ubique. Maj.
- 295 *polygonatum*; Waldskugel, Gramschatzer Wald.
Maj.
- 296 *multiflora*; cum antecedente simul iisdem locis.
- *297 *Hyacinthus botryoides*; in vineis et agris ver-
sus Versbach; copiose. Maj.
- 298 *racemosus*; in nemoribus ad Gerbrunn, Well-
riether Hof et Lengfeld. Maj.
- 299 *Acorus Calamus*; ad ripas Moeni passim. Maj.
Iun.

- 300 *Juncus conglomeratus*; ad fossarum margines, in uliginosis. Iun.
- 301 *effusus*; in inundatis, uliginosis frequens. Iun.
- 302 *glaucus*; ad margines fossarum, in udis ad Moenum. Iun. Iul.
- 303 *filiformis*; in paludosis ad Dettelbach freq. Iun.
- 304 *squarrosus*; in caespitosis versus Heydingsfeld. Iun.
- 305 *bufonius*; in pascuis humidioribus, ad ripas insulae inferioris. Iun.
- 306 *adscendens*; ad insulam inferiorem. Iun. Iul.
(*Juncus obtusiflorus* Hoffm.)
- 307 *vernalis*; in nemorosis der Waldskugel, dem Zeller Walde. Mart. Apr.
- 308 *pilosus*; ibidem. Apr. Maj.
- 309 *bulbosus*; in pratis ad Dettelbach et Schwarzenau copiose, ad insulae inferioris ripas, locis humidioribus. Iun.
- *310 *albidus*; in nemoribus montosis haud frequens. Iun. Iul.

Trigynia.

- 311 *Rumex crispus*; ad fossas, vias, in insula inferiore. Iun. Iul.
- 312 *conglomeratus*; ad fossas, in paludosis vor dem Pleichacher Thore. Iun.
- *313 *maritimus*; in inundatis uliginosis vor dem Pleichacher Thore. Iun. rarior.
- 314 *sanguineus*; ad viam ad pedem arcis Marienberg. Iun. Iul.
- 315 *acutus*; in pratis ubique. Iun.
- 316 *acetosa*; in pratis, pascuis, Stadt-Walle, vulgaris. Maj. Iun.

- 317 *Rumex acetosella*; in campis aridis, ad vias, in insula inferiore. Maj.
 *318 *scutatus glaucus*; in muris horti des unteren Wirthshauses ad Gerbrunn. Maj. Jun.
 319 *Colchicum autumnale*; in pratis ubique frequens. Aug. Sept.

Polygynia.

- 320 *Alisma Plantago*; in fossis, aquis stagnantibus ubique. Jun. Jul.
 *321 *ranunculoides*; in palude ad Dettelbach et Schwarzenau. Jun. Jul. raro.

Classis VII. Heptandria.

Monogynia.

- 322 *Aesculus Hippocastanum*; in via ad Veitshöchheim et in pagis. Maj.

Classis VIII. Octandria.

Monogynia.

- 323 *Oenothera biennis*; in insula inferiore et alibi haud frequens. Jun.
 324 *Epilobium angustifolium*; in ruderatis viae ad Höchberg, in sylva ad Veitshöchheim. Jun.
 325 *birsutum*; ad ripas Moeni ad Homburg, Triefenstein frequens. Jul.
 325 *parviflorum*; in humidis nemoribus, Waldskugel, Lengfeld, ad ripas Moeni ad Homburg, ad muros vinearum ibid. Jul.
 327 *montanum*; in nemoribus passim. Jun.

- *328 *Epilobium tetragonum*; in lacu siccefacto ad Gramschatz. Jun. Jul.
- 329 *roseum*; ad fossas pratorum. Jun. Jul.
- 329 *palustre*; in uliginosis sylvae Gramschatzen-
sis. Jul.
- 331 *Vaccinium Myrtillus*; in sylva ad Veitshöch-
heim; raro. Maj. Jun.
- 332 *Erica vulgaris*; in pascuis sterilibus. Jul. Aug.
- 333 *Daphne Mezereum*; in nemorosis ad Zell, Walds-
kugel, Versbach, Veitshöchheim; frequens.
Mart. Apr.
- 334 *Acer pseudoplatanus*; in nemoribus hinc inde. Maj.
- 335 *campestre*; in nemoribus, ad sepes satis fre-
quens. Maj.
- *336 *Stellera Passerina*; semel legi ad Zell inter sege-
tes. Jul.

Trigynia

- 337 *Polygonum bistorta*; in pratis humidis hinter
Lengfeld? Maj.
- 338 *lapathifolium*; ad catarrhactam et ad fossas ad
Triefenstein, in humidis vor dem Plei-
chacher Thore. Jul.
- 339 *aquaticum*; in den Festungsgräben, in stagno
ad Gramschatz. Maj. Jun.
- 340 *Hydropiper*; in lacu siccefacto ad Gramschatz,
in humidis alibi. Jul.
- 341 *Persicaria*; ad fossas, vias, in insulis frequens.
Jul.
- 342 *aviculare*; in agris, ruderatis vulgaris. Jul. Aug.
- 343 *Convolvulus*; in insula inferiore, in agris. Jun.
Jul.

Tetragynia.

- 244 *Paris quadrifolia*; in nemoribus umbrosissimis ad

Versbach, Walldskugel, Veitshöchheim cet.
Maj.

Classis IX. Enneandria.

Hexagynia.

- 344 *Butomus umbellatus*; ad ripas Moeni, bey
Stein. Jul.

Classis X. Decandria.

Monogynia

- *346 *Dictamnus fraxinella*; ad margines sylvae ad
Veitshöchheim raro, nemoris ad Ger-
brunn über den Weinbergen, copiosius.
Maj. (*Dictamnus albus*; Lin.)
347 *Monotropa Hypopitbys*; ad radices pinuum am
Wege von Rimpf nach Gramschatz, in
pineto haud procul vom Schenkenschloß
frequens. Iun. Jul.
348 *Pyrola rotundifolia*; in nemorosis Irtenbergensi-
bus, nicht weit vom Jägerhause. Jun.
*349 *secunda*; in nemorosis umbrosis ad Altert-
heim raro. Jun.

Digynia.

- 350 *Saxifraga viduatioides*; ad sepes gegen die Mo-
schee, in saxosis. Apr. Maj.
351 *granulata*; in pratis siccioribus ad Unter-Dürr-
bach, in collibus apricis ad Gerbrunn vul-
garis. Maj.
352 *Gypsophila muralis*; in lacu siccefatto ad Gram-
schatz. Jul.

- 353 *Saponaria officinalis*; ubique ad sepes, in pratis, dumetis, insula utraque copiose. Jun.
- 354 *Vaccaria*; inter segetes, praesertim aestivas. Jun. Jul.
- 355 *Dianthus Carthusianorum*; in campis. versuris, ad vias vulgatissimus. Aestate.
- 356 *prolifer*; ubique frequens ad muros vinearum, in apricis. Jun.
- 357 *superbus*; in nemorosis der Walidskugel, Veitshöchheim. Jul. Aug.
- 358 *Scleranthus perennis*; in campis elatis sabulosis ad Veitshöchheim. Jun. Jul.

Trigynia.

- 359 *Cucubalus Behen*; in versuris, pratis. Jun.
- 360 *Oites*; in versuris an der Chaussée zur Heydingsfelder Fähre, in versuris alibi, satis frequens. Jun. Jul.
- 361 *Silene nutans*; in saxosis ubique, in nemoribus montosis. Maj.
- *362 *noctiflora*; inter segetes ad Rimpfpar haud frequens. Jun.
- 363 *Stellaria media*; in cultis et ruderalis ubique frequens per totum annum. (*Alsine*, Linn.)
- 364a *graminea*; in dumetis ad Versbach, Gerbrunn. Maj. Jun.
- 364b *holostea*; in nemorosis frequens. Maj. Jun.
- *365 *palustris*; in uliginosis sylvae Gramschatzensis rara. Jul.
- 366 *Arenaria trinervia*; in humidis sylvae Gramschatzensis, der Walidskugel frequens. Maj. Jun.
- 367 *serpyllifolia*; in agris inter segetes copiose. Aestate.

- *368 *Arenaria tenuifolia*; in agris elatis versus Ober-
Dürnbach, rara. Jun.
369 *rubra*; in arvis arenosis hinc inde. Iun. Iul.

Pentagynia.

- 370 *Sedum telephium*; in montosis siccis, ad sepes
frequens. Iul. Aug.
371 *reflexum*; in sterilibus versus Veitshöchheim,
in saxosis ad Gerbrunn. Iul.
372 *album*; in rupestribus arcis Marienberg co-
piose. Iun.
373 *acre*; in muris. collibus aridis, ad vias, vul-
gatissimum. Iun. Iul.
374 *sexangulare*; in Festungswerken vor dem Zeller
Thore, auf den Brustwehren an den Fe-
stungsgräben nahe am Pleichacher Thore.
Iun.
375 *Oxalis acetosella*; in nemoribus umbrosis ubique.
Apr.
376 *Agrostema Githago*; inter segetes vulgaris. Iun.
377 *Lychnis flos Cuculi*; in pratis vulgaris.
378 *sylvestris*; in pratis nemorosis haud frequens.
Maj. Iun. (*Lychnis dioica flore rubro* Linn.)
379 *pratensis*; in insula inferiore, in pratis ad
Dettelbach. Maj. Iun. (*Lychnis dioica flore*
albo. Linn.)
380 *Cerastium vulgatum*; in campo sterili ad viam
versus Veitshöchheim. Maj. Iun.
381 *viscosum*; in dumetis et ad vinearum muros
vor dem Neuen- und Pleichacher - Thore.
Maj.
*382 *semidecandrum*; in sterilibus saxosis rechts am
Feldwege nach Gerbrunn; raro. Maj.
383 *arvense*; ad vias, in versuris, ad fossas ubique.
Apr. Maj.

- 384 *Cerastium aquaticum*; in lacu exsiccato ad Gramschatz. Iun. Iul.
 385 *Spergula arvensis*; inter segetes ad Remlingen, in insula inferiore. Iun. Iul.
 *386 *nodosa*; in humidis sylvae Gramschatzensis. Iun. raro.

Classis XI. Dodecandria.

Monogynia.

- 387 *Asarum europaeum*; in nemoribus ubique. Mart. Apr.
 388 *Lythrum salicaria*; ad ripas Moeni, in insulis, ad Gramschatz. Iun. Iul.

Digynia.

- 389 *Agrimonia eupatoria*; in saxosis des Hexenbruchs, ad vias ubique. Iun. Iul.

Trigynia.

- 390 *Reseda luteola*; auf dem Hofe der Schweizerey, in insula inferiore, ad vias, passim. Iun.
 391 *lutea*; in insula inferiore, ad vias, frequentius. Iun.
 392 *Euphorbia Peplus*; in cultis oleraceis. Iul. Aug.
 393 *exigua*; inter segetes, in versuris ad Esleben. Iul.
 *394 *verrucosa*; in pratis vor dem Burkarder Thore, in pascuis ad Zell, am Fahrwege nach Unter-Dürrbach. Maj.
 *395 *dulcis*; in saxosis des Hexenbruchs. Maj. (num nostra vera *dulcis* Lin. sit, exploratum mihi nondum est; collata enim cum

- specimine in alpinis Salisburgensibus collecto, multum ab illo differt foliis involuclis subseratis pubescentibus, radice articulata stricta non vero bulbosa; est forsitan varietas β Florae austriacae.)
- 396 *Euphorbia helioscopia*; in agris auf dem Glacis vulgaris. Iul. Aug.
- 397 *platyphyllos*; ad margines agrorum cultorum viae publicae proximos ad Esleben. Iun. Iul.
- 398 *sylvatica*; in sylvaticis ad Zell, Gramschatz, Veitshöchheim, frequens. Maj. Iun.
- 399 *Eula*; in insula inferiore frequens, ad ripas Moeni ad Sommerhausen, in pratis Moeno adjacentibus rarius: Maj. Iun.
- 400 *Gerardiana*; in versuris hinter Gerbrunn gegen die Nürnberger Chaussée, et alibi locis arenosis. Maj. Iun.
- 401 *Cyparissias*; in collibus herbidis, montanis sylvaticis, ad vias vulgaris. Maj. Iun. et Sept.

Dodecagynia.

- 402 *Sempervivum tectorum*; in muris et tectis pagorum. Iun. Iul.

Classis XII. Icosandria.

Monogynia.

- 403 *Philadelphus coronarius*; hinc inde ad sepes pagorum. Maj. Iun.
- 404 *Prunus Cerasus*; ad Gerbrunn vulgaris. Apr. Maj.
- 405 *avium*; in nemorosis vd Gerbrunn, Versbach, Lengfeld. Apr. Maj.

- 406 *Prunus insititia*; iisdem locis cum priore eodem tempore.
 407 *domestica*; in pomariis ubique. Maj.
 408 *spinosa*; ad sepes, dumeta, vias. Apr. Maj.
 409 *Pyrus communis*; in agris, sylvis, ad vias. Apr. Maj.
 410 *Malus*; in pomariis vulgaris. Maj.
 *411 *Cydonia Cydonia*; sinistrorsum a ponte, per quem via ad Unter-Dürrbach ducitur (unicus arbusculus. *Pyrus Cydonia* Linn.). Maj.

Digynia.

- 412 *Crataegus Oxyacantha*; in sepibus, dumetis ubique. Maj.
 413 *Monozyua*; in sepibus vor dem Burkarder Thore. Maj.
 414a *Sorbus aucuparia*; in nemoribus ubique. Maj.
 415b *terminalis*; in nemorosis ad Maynbrunn. (*Crataegus* Willd.)

Pentagynia.

- *415 *Spiraea Aruncus*; in nemorosis montosis des Gramschatzer Waldes, rarissime. Maj.
 416 *ulmaria*; in pratis humidis ubique, an den äussern Festungswerken vor dem Pleichacher Thore. Iun.

Polygynia.

- 147 *Tormentilla erecta*; in der Waldskugel. Maj.
 418 *Rosa arvensis*; in sylva ad Zell. Iun.
 *419 *spinossissima*; ad margines agrorum in versuris, inter Versbach et Rimpär, rara. Jun.
 420 *pumila*; ibidem et eodem tempore frequens.

- 421 *collina*; auf dem Hexenbruch. Jün.
 422 *rubiginosa*; in dumetis, collibus frequens. Jun.
 423 *canina*; in sepibus, dumetis, rupestribus arcis
 Marienberg. Maj. Jun.
 424 *alba*; in rupestribus arcis Marienberg. Maj.
 Jun.
 425 *Rubus Idaeus*; in nemoribus ad Lengfeld, Well-
 riether-Hof, Waldskugel, Veitshöchheim.
 Maj. Jun.
 426 *caesius*; in dumetis, agris frequens. Maj.
 427 *fruticosus*; ad vias, in vineis vulgaris. Maj.
 *428 *saxatilis*; in sylva ad Veitshöchheim, passim
 in der Waldskugel. Maj.
 429 *Fragaria vesca*; in nemorosis copiose, ad vias.
 Maj.
 *430 *collina*; in pascuo sterili cum *Festuca glauca*
 versus Veitshöchheim, haud frequens. Jun.
 431 *Potentilla anserina*; ad vias, aggeres fossarum,
 in pascuis ubique. Aestate.
 432 *supina*; in stagnis exsiccatis vor dem Plei-
 chacher Thore.
 *433 *hirta*; in muris vinearum haud procul ab
 arce Marienberg, in rupestribus ipsis fre-
 quens. Maj. Jun.
 434 *argentea*; ad viam versus Veitshöchheim fre-
 quens. Maj. Jun.
 435 *verna*; in pascuis, apricis, in montibus vul-
 garis. Apr.
 *436 *subacaulis*; in pascuo sterili versus Veitshöch-
 heim. Maj. Jun. rara.
 437 *opaca*; ad muros vinearum, in pascuis elatis.
 Apr. Maj.
 438 *reprens*; in versuris, fossis siccis, ad vias fre-
 quens. Jun.
 439 *Genum urbanum*; ad sepes vulgaris. Maj.

- *440 *Comarum palustre*; in palude ad Dettelbach et Schwarzenau, in stagno partis occidentalis sylvae Zellensis, passim. Maj. Jun.

Classis XIII. Polyandria.

Monogynia.

- *441 *Actaea spicata*; ad marginem nemoris ad Maynbrunn prato proximum in dumetis, in sylva ad Veitshöchheim. Majo, haud frequens.
- 442 *Chelidonium majus*; in dumetis, ad muros vulgare. Maj.
- 344 *Papaver Argemone*; auf dem Stadt-Walle, in insula inferiore nosocomio insanabilium opposita, inter segetes. Iun.
- 444 *Rhoeas*; in agris, inter segetes; copiose. Maj.
- 445 *dubium*; auf dem Stadt-Walle nahe an der Buchlerischen Lederfabrike. Maj.
- *446 *Nymphaea lutea*; ad ripas Moeni. Iun. Iul. raro.
- 447 *Tilia grandifolia*; auf der unteren Promenade, in pagis, Exercierplatz. Iun.
- 448 *parvifolia*; ad pagos, in sylvis. Iun.
- *449 *Helianthemum apeninum Smirbii*; in pascua sterili ad viam, quae ducit ad Veitshöchheim, frequens quidem, sed rarissimus Germaniae incola. Maj. (*Cistus* Willd.)
- 450 *vulgare*; in pascuis montanis, apricis vulgare. Maj. Iul.

Trigynia.

- 451 *Delphinium Consolida*; in agris et arvis frequens. Iul.

Pentagynia.

- 452 *Aquilegia vulgaris*; in pratis vor dem Burkar-
der Thore, copiose. Maj. Iun.
- 453 *Hypericum perforatum*; in sepibus, dumetis,
campis herbidis, in insula inferiore noso-
comio insanabilium proxima. Iun. Iul.
- 454 *humifusum*; loci natalis non recordor. Iun. Iul.
- 455 *montanum*; in sylva Irtenbergensi, Waldsku-
gel. Iun.
- 456 *hirsutum*; iisdem locis et eodem tempore.
- *457 *pulchrum*; in nemorosis der Waldskugel. Iun.
Iul. rarius.
- 458 *quadrangulare*; an der Werre bey Arnstein.
Iun. Iul.
- 459 *Nigella arvensis*; in agris ad Rimpar, in versuris
ad Esleben. Iul.

Polygynia.

- 460 *Anemone pulsatilla*; in montibus, saxosis ubi-
que. Apr. Maj.
- 461 *nemorosa*; in nemoribus ad Versbach, Ger-
brunn Zell et in ceteris copiose. Apr. Maj.
- 462 *sylvestris*; in nemorosis prope Gerbrunn, in sa-
xosis, ad Versbach et alibi satis frequens.
Maj.
- *463 *ranunculoides*; in nemorosis ad Gerbrunn, der
Waldskugel, ad Lengfeld, rarior. Maj.
- 464 *Clematis Vitalba*; in dumetis et sepibus vor dem
Zeller Thore copiose. Iun. Iul.
- 465 *erecta*; in saxosis vinearum versus Zell, in
pratis versus Randersacker, in nemorosis
oberhalb Veitshöchheim. Maj. Iun.
- *466 *Thalictrum minus*; in pineto montis Calmuth
ad Homburg. Jun.

- 467 *Thalictrum flavum*; in pratis ad Randersacker,
in insula inferiore, in monte Calmuth. Jun.
- 468 *Adonis aestivalis miniata*; in agris oberhalb Höch-
berg copiose. Maj.
- 469 — — *citrina*; iisdem locis et eodem tem-
pore.
- 470 *Ranunculus flammula*; in paludosis ad Dettel-
bach et Schwarzenau. Maj. Jun.
- 471 *reprens*; ibidem et in uliginosis vor dem Plei-
chacher Thore. Maj.
- 472 *Ficaria*; in dumetis, nemoribus humidis, in
aggeribus des Aumühlen - Baches. April.
Maj.
- 473 *auricomus*; in pratis siccioribus et pomariis
ubique frequens. Maj.
- 474 *sceleratus*; in uliginosis et fossis vor dem Plei-
chacher Thore. Maj.
- 475 *bulbosus*; auf dem Stadt-Walle, in pratis, po-
mariis vulgaris. Maj.
- 476 *polyanthemus*; iisdem locis et eodem tempore.
- 477 *reprens*; auf dem Stadt-Walle, in cultis et ag-
ris ubique. Aestate.
- 478 *acris*; in pratis et pascuis vulgaris. Maj. Jun.
- *479 *lanuginosus*; in nemorosis der Waldskugel et
alibi haud frequens. Maj.
- 480 *arvensis*; in agris, vineis copiose. Maj. Jun.
- 481 *aconitifolius*; in nemorosis der Waldskugel, ad
Maynbrunn, copiosissime. Maj.
- *482 *platanifolius?* in nemorosis ad Maynbrunn,
locis umbrosis humidioribus, ad rivuli
marginem, haud frequens. Maj.
- 483 *fluvialis*; ad ripas Moeni vulgaris. Maj.
- 484 *heterophyllus*; in stagno ad Gerbrunn. Maj.
- 485 *Helleborus foetidus*; in sylva ad Zell, in pas-
cuis et in horto monasterii, in versuris

ad Remlingen , in montis Calmuth parte septentrionali. Apr.

486 *Caltha palustris*; in pratis humidis ad Wellriether Hof, Lengfeld et alibi copiose. Maj.

Classis XIV. Didynamia.

Gymnospermia.

487 *Ajuga pyramidalis*; ad margines sylvae Gramschatzensis. Jun. Jul.

488 *genevensis*; in nemoribus, ad muros arcis vulgaris. Maj.

489 *repans*; in pratis, pascuis vulgaris. Maj.

*490 *chamaepitys*; in versuris ad viam versus Veits-
höchheim non frequens. Maj.

491 *Teucrium Botrys*; in saxosis sterilibus ubique. Jul.

*492 *Scorodonia*; ad catarrhactam inter lapidicinam monasterii Triefenstein. Jul.

493 *Chamaedrys*; in saxosis, ad muros vinearum, frequentissime. Jun.

494 *montanum*; in apricis montis Calmuth ad Hom-
burg copiose. Iun.

*495 *Nepeta Catbaria*; in ruderatis ad Biebelrieth raro. Jun. Jul.

496 *Mentha sylvestris*; ad ripas Moeni, in humidis vor dem Pleichacher Thore satis frequens. Jul.

*497 *gracissima*; in uliginosis vor dem Pleichacher Thore. Jul.

498 *aquatica*; in aquosis vulgaris. Jul. Aug.

499 *sativa*; ad ripas Moeni, ad fossarum margi-
nes haud frequens. Jul. Aug.

500 *arvensis*; in agris post messem ubique. Sept.

- 501 *Glechoma hederacea*; in pomariis, cultis, rud-
eratis vulgaris. Vere.
- 502 *Lamium maculatum*; in sepibus, dumetis ubi-
que. Aestate.
- 503 *album*; iisdem locis et eodem tempore.
- 504 *purpureum*; ad sepes, in pomariis vulgare.
Apr. Maj.
- 505 *amplexicaule*; auf dem Stadtwalle, in pomariis,
cultis frequens. Vere.
- 506 *Galeobdolon vulgare*; (Persoon Synops. 2 p.
122.) in nemorosis der Waldskugel fre-
quens (*Leonurus Galeobdolon* Willd. spec.
Plant. T. 3. P. 1. p. 115. — *Galeopsis*
Galeobdolon Lin.) Maj.
- 507 *Galeopsis cannabina*; in lacu siccefacto ad Gram-
schatz. Jul.
- 508 *Tetralix*; ad scaturigines nicht weit vom Zel-
lischen Chausseehause.
- 509 *Ladanum*; in agris inter segetes, post messem
abunde.
- 510 *Betonica officinalis*; in nemoribus apricis co-
piose. Jul.
- 511 *Stachys sylvatica*; in dumetis, im Zeller-Walde.
Jun.
- 512 *palustris*; ad ripas Moeni ad Triefenstein. Jul.
- 513 *recta*; in saxosis, ad vias, margines sylvarum
abunde. Jun. Jul.
- 514 *germanica*; in versuris gegen die Waldskugel.
Jul.
- 515 *Ballota nigra*; in ruderatis, sepibus vulgaris.
Aestate.
- 516 *Marrubium vulgare*; in ruderatis, ad vias vor
dem Pleichacher Thore. Jun. Jul.
- 517 *Origanum vulgare*; in nemorosis montosis ubi-
que. Jul.

- 518 *Clinopodium vulgare*; in dumetis nemorosis sylvae Gramschatzensis passim. Iul.
- 519a *Thymus serpyllum*; in aridis apricis abunde, ad vias. Iul.
- 519b *citriodorus Wolfii*; cum priori simul. Iul.
- *520 *ciliatus Wibelii*; (floribus capitatis, caulibus repentibus radicanibus, foliis ovalibus ciliatis,) in montis Calmuth aridis apricis. Iul.
- *521 *Melittis Melissophyllum*; in sylva Gramschatzensi unico loco quatuor legi specimina. Maj. (eodem loco *Cypripedium Calceolus* satis frequens nascitur.)
- 522 *Leonurus cardiaca*; in ruderalis, ad pagos passim. Iul.
- 523 *Scutellaria galericulata*; ad muros vinearum ripis Moeni proximos ad Homburg, in lacu siccefato ad Gramschatz. Iul.
- 524 *Prunella vulgaris*; in pascuis, nemorosis ad Wellriether Hof et aliis locis. Iun. Iul.
- 525 *grandiflora*; in collibus, saxosis abunde. Iun. Iul.

Angiospermia.

- 526 *Orobanche major*; in monte Calmuth, Waldskugel. Jun.
- *527 *caerulea*; in arenosis ad monasterium Himnelpforten legit mecumque communicavit amicissimus Voit. Jun. raro.
- 528 *Verbena officinalis*; in ruderalis ad viam versus Veitshöchheim. Jun.
- 529 *Rhinanthus crista galli*; in prato montano humido hinter Maynbrunn. Maj.
- *530 *angustifolia Wolfii*; in eodem prato sed rarior. Jun.

- 531 *Rhin. major Elrbardi*; ibidem simul cum priori.
- 532 *Euphrasia officinalis*; in pratis et pascuis. Jul.
- *533 *stricta Wolfii*; in nemorosis ad Wellriether Hof. (*Discrepat ab antecedente caule altiori. foliis magis acuminatis, calyce cylindrico subquinquefido*) Jul. rarissima.
- 534 *Odonites*; in pascuis et agris satis frequens. Jul.
- 535 *lutea*; in montosis siccis rechts von der Chaussée im letzten Fichten-Aufschlag bey Bischofsheim an der Tauber. Jul. Aug.
- 536 *Melampyrum cristatum*; in nemorosis ed Versbach et Gerbrunn. Jun. (Copiose occurrit floribus ochroleucis.)
- 537 *arvense*; inter segetes, in arvis, versuris frequentissime. Jun.
- 538 *sylvaticum*; in sylva Gramschatzensi, ad Gerbrunn. Maj. Jun.
- *539 *Pedicularis palustris*; in palude ad Dettelbach et Schwarzenau. Jun. rara.
- 540 *sylvatica*; eodem loco et tempore.
- 541 *Limosella aquatica*; eodem loco ad marginem paludis Jul. frequens.
- 542 *Scrophularia nodosa*; in nemoribus et sylvis haud frequens. Maj.
- 543 *aquatica*; an den äußern Festungsgräben der Stadt vor dem Pleichacher Thore et in humidis alibi. Jun. Jul.
- 544 *Antirrhinum majus*; an den Festungswerken copiose. Jul. ad Sept. et Oct.
- 545 *Orontium vulgare*; (Persoon) inter segetes ad Rofsbrunn, Remlingen, Rimpar. Jul. (*Antirrhinum Orontium* Linn.)
- 546 *Linaria vulgaris*; (C. Sprengel Fl. Hal. p. 179.) in versuris apricis, campis herbidis. vulgaris. Aestate. (*Antirrhinum Linaria* Linn.)

- 547 *arvensis*; (l. c. Fl. Hal.) ad vias, in versuris, montibus siccis, vineis vulgaris. Jun. Jul. (*Antirrhinum* Linn.)
- *548 *Elatine*; (l. c. Fl. Hal.) in arvis ad Rofsbrunn, Altertheim passim. Jun. Jul. (*Antirrhinum* Linn.)

Classis XV. Tetradynamia.

Siliculosae.

- 549 *Myagrum perenne*; in campis aridis ad Arnstein. Jun.
- 550 *Rapistrum paniculatum* (Persoon Synops. p. 185.); in ruderalis, versuris, ad vias ubique. (*Myagrum paniculatum* Linn.) Jun.
- *551 *Isatis tinctoria*; in muris vinearum, et munitis ubis et arcis Marienberg, copiose. Maj. Jun.
- 552 *Draba verna*; in agris sterilibus, montosis, auf dem Stadt-Walle. Apr.
- 553 *Iberis amara*; in agris editioribus ad pedem montis Calmuth, ad Remlingen, Altertheim satis frequens. Jun.
- *554 *nudicaulis*; in arenosis ad Kitzingen rara. Maj.
- 555 *Lepidium ruderale*; ad vias, in ruderalis ubique. Jun.
- 556 *sativum*; ad sepes vor dem Sander - Thore. Maj. (an sponte?)
- 557 *Alyssum montanum*; in agris editioribus sabulosis oberhalb Veitshöchheim. Maj.
- 558 *calycinum*; in collibus apricis vulgare. Maj.
- 559 *incanum*; in rupibus, saxosis. Mai.
- 560 *campestre*; in campis aridis ad Veitshöchheim. Maj.
- 561 *Camelina sativa*; (Persoon Synops. p. 191.); ad

mtiros arcis Marienberg. Maj. (*Magnum sativum* Willd. Spec. Plant. III. p. 408.)

*562 *Camelina dentata*; (Persoon l. c.) ad ripam sinistram insulae superioris dem Schützenplatze gegenüber. Jun. (primum ab amico Custer Helveto detecta, tunc a me ipso lecta, *Myagrum* Willd. l. c.); rarissime.

563 *Thlaspi arvense*; in vineis, agris ubique. Maj.

564 *campestre*; in vineis an der Festung, ad muros vinearum am Wege nach Veitshöchheim, frequens. Apr. Maj.

565 *bursa pastoris*; in hortis, cultis, agris ubique per totum fere annum.

566 *perfoliatum*; in sepibus, dumetis frequens. Apr. Maj.

Siliquosae.

567 *Raphanus Raphanistrum*; in insula inferiore floribus sulphureis, albis in agris sabulosis ad Gerbrunn. Aestate.

568 *Cardamine pratensis*; in pratis, pascuis vulgaris. Maj.

*569 *amara*; in prato montano humido ad Maynbrunn cum Rhinantho Crista galli. Maj. non frequens.

570 *Sisymbrium Nasturtium*; ad rivulos copiose. Aestate ad autumnum usque.

572 *vulgare* (*sylvestre* Linn.); in fossis siccis, locis udis, ubique. Jun. Jul.

*572 *tenuifolium*; in muris ad Arnstein passim Iun.

573 *Sophia*; in ruderatis, muris vulgatissimum. Maj.

*574 *Eckartsbergense*; ad muros vinearum versus Veitshöchheim frequens. Apr. Maj. (*Sisymbrium multicaule* Hoffm.)

- 575 *Erysimum officinale*; in ruderatis, ad vias ubique. Maj. ad Jul.
- 576 *barbarea*; ad ripas Moeni vor dem Burkarder Thore, in uliginosis zwischen dem Pleichacher- und Neuen-Thore.
- 577 *Alliaria*; ad vias, sepes, in pomariis vulgare. Apr. Maj.
- *578 *repandum*; in ruderatis vor dem Pleichacher- und Neuen Thore, in agris versus Wellriether Hof, satis frequens. Maj.
- 579 *bieracifolium*; ad muros arcis Marienberg frequens. Maj. Jun.
- *580 *oderaum*; in muris urbis Kitzingen, haud frequens Jun.
- 581 *Cheiranthus erysimoides*; in insula inferiore. Maj. Iun.
- 582 *Arabis italica*; in agris sabulosis ad Gerbrunn, frequens. Maj. Iun.
- 583 *Turritis glabra*; in nemorosis ad Lengfeld. Maj. Iun.
- 584 *Brassica orientalis*; inter segetes, praesertim inter trifolium arvense in agris ad Höchberg versus Waldskugel. Maj.
- 585 *Sinapis arvensis*; inter segetes. Maj. Iun.
- 586 *nigra*; in ruderatis, arvis, salicetis ad ripam Moeni vor dem Burkarder Thore.

Classis XVI. Monadelphica.

Pentandria.

- 587 *Erodium cicutarium*; auf dem Walle, in cultis, hortis, ad vias frequens per totam aestatem.
- 588 *pimpinellifolium*; in collibus aridis, in agris. Mart.

Decandria.

- 589 *Geranium sanguineum*; in vineis versus Veits-
höchheim frequens, in nemorosis ad Well-
riether Hof et alibi. Maj. Jun.
- 599 *sylvaticum*; im Gramschatzer Walde, nahe am
Wege nach Gramschatz. Maj. Jun.
- 591 *palustre*; in locis humidis sylvae Gramscha-
tzensis. Maj.
- 592 *pratense*; in pratis siccioribus ubique. Jun.
Jul.
- 593 *molle*; in ruderatis, ad sepes vulgare. Maj. Jun.
- 594 *dissectum*; ad sepes gegen die Waldskugel.
Maj.
- 595 *pusillum*; ad sepimenta vor dem Neuen- Tho-
re, in cultis arvis frequens. Maj. — Jul.
- 599 *rotundifolium*; in cultis, agris, versuris vulga-
re. Maj. Jun.
- 597 *robertianum*; in ruderatis, sepibus frequens.
Maj. Jun.

Polyandria.

- 598 *Althaea officinalis*; nahe am Kanale vor dem
Neuen-Thore. Jul.
- 599 *Malva rotundifolia*; ad sepes, in ruderatis ubique.
Maj. Jun.
- 600 *sylvestris*; ad sepes vinearum hinter Rothen-
dorf am Wege nach der Kapelle. Maj. Jun.
- 601 *Alcea*; in insula inferiore nosocomio opposi-
ta. Maj. Jun.

Classis XVII. Diadelphia.

Hexandria.

602 *Fumaria officinalis*; in cultis, hortis ubique.
Apr. — Jun.

*603 *parviflora*; in agris ad Rimpär, Maynbrunn.
Maj. Jun.

Octandria.

604 *Polygala vulgaris*; in nemorosis, pascuis montosis vulgaris. [Maj. Jun.

Decandria.

605 *Genista tinctoria*; in sylvaticis montosis ad Randersacker, Gerbrunn, Veitshöchheim. Jun.

606 *germanica*; in sylvaticis ad Veitshöchheim, frequens. Maj. Jun.

607 *Anthyllis vulneraria*; in apricis ad Randersacker et Versbach, copiose. Maj. Jun.

608 *Ononis spinosa*; ad vias, in versuris, collibus vulgarissima. Jun. Jul.

609 *arvensis*; iisdem locis et alibi eodem tempore, sed paulo rarius.

610 *Orobus vernus*; in nemoribus ubique frequens.
Jun. Jul.

611 *tuberosus latifolius*; in nemorosis ad Versbach, Wellriether Hof, Lengfeld. Maj.

612 *tuberosus tenuifolius*; iisdem locis. Maj. Jun.

613 *niger*; in nemorosis montosis ad Veitshöchheim, Versbach. Jun.

614 *Pisum arvense*; occurrit inter *Pisum sativum*.
Jun.

615 *sativum*; seritur in agris, sponte quasi occurrit inter segetes aestivas. Jun.

- 616 *Lathyrus tuberosus*; in insula superiore am Badeplatze, in insulae inferioris sabulosis ripis, frequens. Jun. Jul.
- 617 *pratensis*; in pratis siccioribus, dumetis vulgaris. Jun.
- *618 *sylvestris*; in montosis, pascuis editioribus des Hexenbrüches, passim. Jun.
- *619 *latifolius*; in sylvaticis subhumidis des Gramschatzer Waldes. Jun. rarissime.
- 620 *Vicia pisiformis*; in sylva Gramschatzensi, in nemorosis ad Versbach et Zell, copiose. Jun.
- 621 *sylvatica*; in nemoribus montosis ad Zell, Gramschatz, Versbach, Maynbrunn. Iun.
- 622 *Cracca*; in dumetis, nemorosis, inter segetes, in pratis vulgaris. Iun.
- 623 *sativa*; in agris seritur, sponte quasi inter segetes. Iun.
- *624 *angustifolia*; inter segetes in agris sabulosis ad Gerbrunn, Veitshöchheim passim. Iun.
- 625 *sepium*; in pratis, dumetis, nemorosis frequens. Maj. Iun.
- *626 *Ervum tetraspermum*; in insula inferiore, im Irtenberger Walde, rarius. Iun. Iul.
- 627 *hirsutum*; Irtenberger Wald, inter segetes. Iun. Iul.
- 628 *Lens*; in agris frequentissime colitur. Maj. Iun.
- 629 *Astragalus glycyphyllos*; Gramschatzer Wald, ad Versbach et Zell. Iul.
- 630 *Cicer*; in nemorosis ad Versbach, in via ad Rossbrunn prope magnum pontem. Jun.
- 631 *Trifolium officinale*; in pratis, in insula inferiore, ad ripas Moeni, in sepibus fre-

- quens. Iun. Iul. (variat flore luteo et albo.)
- 632 *Trifolium hybridum*; in pratis, pascuis, inter
Trifolium pratense passim. Iun. Iul.
- 633 *repens*; in campis, pratis ubique. Aestate.
- 634 *rubens*; in nemorosis ad Versbach, Gramschatz,
Rimpar, Gerbrunn frequens. Iul.
- 635 *pratense*; in agris seritur, sponte in pratis,
versuris frequens. Maj. Iun.
- 636 *alpestre*; in sylva Gramschatzensi. Iun.
- 637 *montanum*; in nemoribus montanis, agris,
collibus apricis herbicis vulgare. Maj. Iun.
- 638 *arvense*; inter segetes abunde post messem.
Iul. Aug.
- 639 *agrarium*; in pratis siccis, agris, vulgare.
Maj. Iul.
- 640 *fragiferum*; in inundatis, uliginosis zwischen
dem Pleichacher und Neuen Thore.
Aestate.
- 641 *procumbens*; in insulis Moeni, pratis. Iun.
- *642 *aurum*; in sylva Irtenbergensi, rarius. Iun.
- 643 *filiforme*; in nemorosis et pratis ad Zell.
- 644 *Lotus corniculatus*; in pratis ubique. Maj.
- 645 *uliginosus*; iisdem locis, in nemorosis ad Leng-
feld. Maj. Iun.
- 646 *Hedysarum Onobrychis*; auf dem Stadtwalle
nahe am Neuen Thore, in collibus fre-
quens. Maj. Iun. Aug.
- 647 *Coronilla varia*; in agris, versuris ubique. Jun.
- *648 *coronata*; in monte Calmuth frequens, in
sylva ad Veitshöchheim. Jun.
- 649 *Hippocrepis comosa*; in collibus apricis, ver-
suris gegen die Waldskugel. Maj.
- (5) *Medicago sativa*; in agris, campis, pratis mon-
tosis. Jun.

- 651 *Medicago falcata*; in versuris, ad arcem Marienberg, in monte Stein, pratis. Jun. (Floribus occurrit variegatis.)
- 652 *lupulina*; in pratis siccioribus ubique. Maj.
- *653 *minima*; auf den äußersten Festungswerken zwischen dem Neuen und Pleichacher Thore. Jun. Jul.

Classis XVIII. Syngenesia.

*Aequalis. * Semiflosculi.*

- 654 *Lapsana communis*; im Gramschatzer Wald, in nemorosis ad Gerbrunn. Jun.
- 655 *Prenanthes muralis*; in sylva Irtenbergensi, hand procul vom Jägerhause. Iun.
- 656 *Hieracium pilosella*; in collibus apricis, versuris, pratis siccioribus ubique. Aestate.
- 657 *dubium*; ad marginem nemoris zwischen Versbach und Maynbrunn, ad muros vinearum am Wege nach Veitshöchheim. Maj. Jun.
- 658 *auricula*; in pratis paludi proximis hinter Dettelbach copiose. Maj. Iun.
- 659 *praemorsum*; in sylvaticis ad Veitshöchheim, Versbach, Gerbrunn. Maj. Iun.
- *660 *Florentinum*; eodem loco cum Hier. dubio ad Versbach et Maynbrunn. in muris passim. Maj. Iun.
- 661 *cymosum*; in rupibus arcis Marienberg et in vineis ibidem. Iun.
- 662 *murorum*; ad muros vinearum, in nemorosis ubique. Iun. β : *H. m. pilosissimum*; in saxosis des Hexenbruchs. Iun.

- 663 *Hieracium sabaudum*; in nemorosis ubique.
Iun. Iul.
- 664 *umbellatum*; ad margines sylvae Gramschatzensis, Irtenbergensis et alibi in pascuis.
Iun. Iul.
- 665 *Sonchus arvensis*; inter segetes, in arvis satis frequens. Iun.
- 666 *oleraceus*; in cultis, hortis ubique. Iun. Aug.
- *667 *Crepis foetida*; in pascuis siccis zwischen dem Pleichacher und Neuen Thore. Iun.
- *668 *lectorum*; in agris arenosis hinter Dettelbach.
Maj. Iun.
- 669 *biennis*; in pratis siccioribus ubique frequens.
Maj. Iun.
- 670 *Chondrilla juncea*; in ruderatis, ad vinearum muros versus Veitshöchheim frequens.
Iul. Aug.
- 671 *Lactuca scariola*; in ruderatis, saxosis, sepibus ubique frequens. Iul.
- *672 *saligna*; ad muros vinearum versus Höchberg.
Iul. Aug.
- 673 *Leontodon Taraxacum*; in pomariis, cultis, aggeribus fossarum, pratis, auf dem Stadt-Walle freq. per totum fere annum.
- 674 *Apargia autumnalis*; in pratis, pascuis vulgaris.
Jul. Sept. (*Leontodon autumnale* Linn.)
- 675 *bispida*; in pratis, pascuis satis frequens. Jul.
Aug. (*Leontodon* Linn.)
- 676 *Tragopogon pratense*; in pratis, versuris, ad vias ubique. Jul.
- *677 *majus*; in vineis ad Gerbrunn et Randersacker, raro. Jul.
- 678 *Scorzonera laciniata*; in versuris, ad vinearum

muros vor dem Burkarder Thore versus Heydingsfeld, vor dem Pleichacher Thore versus Veitshöchheim. Jun. Aug. (*Scorzonera biennis Wolfii?*)

679 *Picris hieracioides*; in pratis, versuris, dumetis, ad vinearum muros. Jun. Jul.

680 *Thrincia hirta*; in vinearum margines auf dem Stein passim. Jul. (*Leontodon hirtum* Linn.)

*681a *Hypochoeris maculata*; in sylvaticis et nemorosis ad Veitshöchheim et Versbach. Jun.

681b *radicata*; in versuris, in lacu siccefacto ad Gramschatz. Jun.

682 *Cichorium Intybus*; ad vias ubique. Jul.

** *Capitati.*

683 *Onopordon Acanthium*; in ruderatis, pagis, sepibus ubique. Jul. Aug.

684 *Carduus nutans*; ad vias, in sterilibus, in lapidicina ad Triefenstein. Jul.

685 *crispus*; in ruderatis, sepibus, dumetis, saxosis, ad vias. Jul. Aug.

*685 * * *; in nemorosis excisis haud procul vom Jägerhause, im Irtenberger Walde, rechts an der Chaussée, passim. Jul.

*687 *cyanoides*; in insula inferiore nosocomio insanabilium opposita. Jul.

688 *Cnicus lanceolatus*; in ruderatis, ad vias. Aestate.

*689 *eriophorus*; ad pedem vinearum ad Gerbrunn, an der alten Nürnberger Chaussée. Jul. Aug.

690 *oleraceus*; in pratis siccis et humidis ubique. Iun. Iul.

- 691 *Cnicus palustris*; in pratis paludosis ad Dettelbach et Schwarzenau. Iul. Aug.
 692 *arvensis*; in agris inter segetes, ad vias. Iul.
 (*Serratula arvensis* Lin.)
 693 *acaulis*; in pratis, pascuis, versuris vulgaris. Iul.
 694 *Serratula tinctoria*; in nemorosis ad Wellriether Hof, Gerbrunn. Iul.
 695 *Arctium Lappa*; in ruderalis, dumetis, nemorosis frequens. Iul.
 696 *Bardana*; iisdem locis eodemque tempore, rarius.
 697 *Carlina vulgaris*; in montosis asperis frequens. Iul. Sept.

*** *Discoidei.*

- 698 *Bidens tripartita*; ad fossas, in inundatis ad ripas Moeni. Iul.
 *699 *Chrysocoma Linosyris*; am Schenkenschloß. Iul.
 700 *Eupatorium cannabinum*; in piscinis, paludosis horti Magni Ducis ad Veitshöchheim. Iul.

Superflua.

- 701 *Artemisia Absinthium*; in ruderalis passim, ad muros der Festungswerke vor dem Sander-Thore. Iul.
 702 *vulgaris*; in ruderalis, ad vias, muros vinearum, der Festung ubique. Iul. Aug.
 703 *Tanacetum vulgare*; ad ripas Moeni bey der Bleiche, ubique frequens. Iul. Aug.
 *704 *Gnaphalium arenarium*; in arenosis ad Dettelbach, ad Gerbrunn, raro. Iun. Iul.

705. *Gnaphalium dioicum*; ad vias in der Waldskugel,
in nemorosis editioribus zwischen Vers-
bach et Rimpf. Maj.
- 706 *rectum*; in sylvaticis ubique. Iul.
- 707 *uliginosum*; in inundatis vor dem Pleichacher
Thore. Iun. Iul.
- 708 *arvense*; in campis sterilibus ad Gerbrunn.
Iul. (*Filago*, Persoon Synops.)
- 709 *montanum*; in montosis sterilibus hinter der
Kapelle, ad Heydingsfeld, et alibi. Iul.
(*Filago*, Persoon Synops.)
- 710 *Conyza squarrosa*; in asperis montosis vinearum,
sylvaticis ubique. Iul.
- 711 *Erigeron canadense*; in insula inferiore, in ru-
deratis, in horto Magni Ducis ad Veits-
heim. Iul.
- 712 *acre*; in montibus calcareis ubique, ad vias,
in ruderalis passim. Iul.
- 713 *Solidago Virgaurea*; in nemorosis montosis vul-
garis. Iul. Aug.
- 714 *Tussilago Farfara*; in glareosis ubique. Mart.
Apr.
- 715 *hybrida*; in aggeribus des Mühlengrabens an
der Chaussée nach Bamberg, nicht weit
von der Aumühle. Mart. Apr.
- 716 *Senecio vulgaris*; per totum fere annum in cul-
tis, incultis, ruderalis.
- 717 *viscosus*; auf dem Stein passim. Iul.
- *718 *sylvaticus*; in nemorensis caeduis ad Gerbrunn.
Versbach, haud frequens. Iun. Iul.
- *719 *tenuifolius*; in saxosis vinearum vor dem Zel-
ler Thore. Aug.
- 720 *Jacobaea*; in campis, pratis, versuris frequens.
Iun. Iul.

- *721 *Senecio erucaefolius*; in saxosis ad viam versus Veitshöchheim, in horto Magni Ducis ibidem, rarius. Jul.
- 722 *saracenicus*; in nemoribus bey Lengfeld, Versbach, Gramschatzer Wald, frequens. Jul. Aug.
- 723 *Aster Amellus*; in montibus ubique frequens, praesertim vor dem Zeller Thore. Jul. Aug.
- 724 *Cineraria integrifolia*; in nemorosis ad Lengfeld, Wellriether-Hof, Gerbrunn, Veitshöchheim. Maj.
- 725 *Inula britannica*; in saxosis ad viam versus Veitshöchheim. Jul.
- 726 *dysenterica*; ad ripas Moeni bey der Bleiche frequens. Jul.
- 727 *Pulicaria*; in inundatis vor dem Pleichacher Thore, passim. Jul.
- 728 *salicina*; im Zeller Walde passim, in nemorosis ad Versbach copiosius. Jun.
- 729 *birta*; im Zeller Walde, in monte Calmuth. Jun. Jul.
- *730 *Doronicum Pardalianches*; rarissime in sylva ad Veitshöchheim. Jun. (*Duo tantum collegi exemplaria.*)
- 731 *Bellis perennis*; in pratis, pascuis, versuris, a primo vere ad autumnum usque.
- 732 *Chrysanthemum Leucanthemum*; in pratis, pascuis, inter segetes, in muris fere ubique. Maj. — Jul.
- 733 *Pyrethrum corymbosum*; in sylvaticis montosis ad Versbach, Rimpär, Veitshöchheim, copiose. (*Chrysanthemum corymbosum* Lin.) Jun.

- *734 *Pyrethrum Parthenium*; am inneren Walle bey'm Pleichacher Thore; legere vero propter fossam interpositam non licuit. Jun. (*Matricaria Parthenium* Linn.)
- 735 *inodorum*; in ruderatis ubique frequens. Jun. Jul. (*Chrysanthemum inodorum* Linn.)
- 736 *Matricaria Coanmomilla*; inter segetes. Jul.
- *737 *Anthemis Cotula*: in arvis, ruderatis passim. Maj. — Jul.
- 738 *arvensis*; inter segetes copiose. Iun. Iul.
- 739 *tinctoria*; in muris, sepibus, dumetis, apricis ubique. Maj. — Iul.
- 740 *Achillea Ptarmica*; in insulis Moeni. Iul.
- 741 *nobilis*; in muris vinearum, ad vias. Iun.
- 742 *millefolium*; in pratis, pascuis, ad sepes vulgaris. Iul. Aug.
- *743 *setacea*; in rupestribus arcis Marienberg. Iun. Iul.
- *744 *Buphthalmum salicifolium*; in saxosis ad Gerbrunn, satis frequens.

Frustranea.

- 745 *Centaurea Cyanus*; inter segetes ubique. Iun. Iul.
- 746 *scabiosa*; in nemoribus, vineis, ruderatis, in insula inferiore. Iun. Iul.
- 746 *Facea*; in pratis, pascuis ubique. Maj. — Iul.
- NB. Ni fallor, *Centauria Phrygia* vineas incolit nostras.

Necessaria.

- *748 *Calendula arvensis*; inter segetes zwischen Rothen Kreuz et Ober - Dürrbach tria legi specimina. Jul.

- 749 *officinalis*; in hortis et cultis oleraceis. Jul.
Sept.

Classis XIX. Gynandria.

Monandria.

- 750 *Orchis bifolia*; in nemoribus plerisque. Maj.
Jun.
- 751 *Morio*; in ericetis des Gramschatzer Waldes
versus Sulzhoff frequens. Maj.
- 752 *mascula*; in nemorosis montosis frequens.
Maj.
- *753 *ustulata*; in pratis sylvaticis des Gramscha-
tzer Waldes, rarior. Iun.
- 754 *fusca*; in sylvaticis ad Veitshöchheim, Mayn-
brunn, Zell. Maj.
- 755 *militaris*; in pratis siccioribus ad Maynbrunn.
Maj.
- 756 *variegata*?? ad marginem sylvae ad Veitshöch-
heim. Maj.
- *757 *bircina*; in monte Calmuth ab amicissimo
Voit collecta mecumque communicata.
Jun. (*Satyrium bircinum* Linn.)
- 758 *latifolia*; in pratis ad Wellriether Hof et alibi
frequens. Maj. Jun.
- 759 *maculata*; im Gramschatzer Walde hinter Rim-
par locis depressis humidis. Maj. Jun.
- 760 *conopsea*; in pascuis editioribus des Hexen-
bruchs, ad margines sylvarum. Jun.
- *761 *Ophrys Myodes*; in nemorosis ad Wellriether
Hof et Lengfurt, passim. Jun.
- 762 *Monorchis*; ad margines der Waldskugel, haud
frequens. Jun. Jul. (*Satyrium Monorchis*,
Persoon Synops.)

- *765 *Ophrys apifera*; rarissime in montibus calcareis ad Zell auf der Morgenseite nahe am Eingange in den Wald. Jun. (Tria inventa exemplaria.)
- 764 *Epipactis latifolia*; in nemoribus ubique satis frequens. Jun. Jul. (*Serapias latifolia* Linn.)
- 765 *pallens*; in sylvaticis montosis der Waldskugel, des Gramschatzer Waldes. Iun. Jul. (*S. grandiflora* Linn.)
- 766 *rubra*; iisdem locis et eodem tempore.
- 767 *nidus avis*; ad radices fagorum der Waldskugel, des Gramschatzer Waldes. Maj. (*Ophrys* Linn.)
- *768 *ovata*; in nemorosis ad Wellriether Hof, raro. Maj. (*Ophrys* Linn.)

Diandria.

- *769 *Cypripedium Calceolus*; in der Waldskugel legit Ill. Döllinger, ego in sylva Gramschatzensi. Iun.

Hexandria.

- 770 *Aristolochia Clematitis*; in vineis an der Festung Marienberg frequens. Iun.

Classis XX. Monoecia.

Monandria.

- 771a *Chara vulgaris*; in rivulo am Wege nach der Waldskugel.

Diandria.

- 771 b *Lemna trisulca*; in aquis stagnantibus vor dem Pleichacher Thore. Iul.
- 772 *minor*; ibidem cum antecedente. Iul. Aug.
- 773 *gibba*; in den Festungsgräben am Neuen Thore.

Triandria.

- 774 *Carex Davalliana*; in prato paludoso ad Wellriether Hof. Maj. (*Carex scabra* Hoppe; *Carex dioica* Host gram. austr. I. p. 52. T. 41.; *Car. Davalliana*, Smith, Willdenow Spec. Plant. Hoffm. Fl. Germ.)
- 775 *intermedia*; ad fossas vor dem Burkarder Thore. (*Carex arenaria* Leers Fl. Herb. n. 706. Tab. 14. Fig. 2. — *Carex spicata* Pollich Palat. 2. p. 562. — *C. intermedia* Host gram. austr. I p. 38. T. 50.) Maj.
- 776 *Schreberi*; in pascuis siccis zwischen dem Pleichacher und neuen Thore. (Host Gram. austr. I. p. 36. T. 46. — *Carex praecox* Schreb. spicileg. p. 65. Willd. Prodr. Fl. Berol. n. 88.) ad aggeres fossarum versus Randersacker. Apr. Maj.
- 777 *ovalis*; ad fossas viae publicae per sylvam Irtenbergensem. Maj. (*C. leporina* Leers Fl. Herb. n. 707. T. 14. Fig. 6. — *C. ovalis* Host. gram. austr. I. p. 39. T. 51.)
- 778 *vulpina*; in pratis paludosis ad Veitshöchheim ad fossas. Maj. Jun.
- *779 *divulsa*; in fossa am Wege nach der Heßdingsfelder Fähre rechts von der Chausée.

Maj. raro. (Host gram. austr. I. p. 42. T. 55.)

780 *Carex muricata*; ad ripas insulae inferioris, ad margines fossarum nemoris ad Maynbrunn, in pratis udis ubique. Maj. *C. canescens* Leers Fl. Herb. n. 712. T. 14. f. 3. — *C. muricata* Host gram. austr. I. p. 41. T. 54.)

781 *stellulata*; in pratis ad Veitshöchheim, in paludosis des Gramschatzer Waldes. Maj. (*C. muricata* Leers Fl. Herb. n. 709 T. 14. f. 8. — *C. echinata* Roth Fl. germ. I. 395. II. 431. — *C. Leersii* Willd. Prodr. n. 95. — *C. stellulata* Host gram. austr. I. p. 41. T. 55.)

*782 *remota*; in umbrosis humidis des Gramschatzer Waldes. Maj. Jun. haud frequens. (Host gram. austr. I. p. 40. T. 52.)

783 *paradoxa*; in palude ad Dettelbach et Schwarzenau. Jun. (*C. canescens* Host gram. austr. I. p. 43. T. 57.)

784 *paniculata*; in pratis udis ad Wellriether Hof, an Festungsgräben vor dem Pleichacher Thore. Maj. (Host gram. austr. I. p. 44. T. 53.)

785 *digitata*; in der Waldskugel, im Gramschatzer, Irtenberger und Zeller Walde. Apr. Maj. (Host gram. austr. I. p. 46. T. 60.)

786 *montana*; in nemoribus montanis ubique. Apr. Maj. (*C. collina* C. Sprengel Fl. Hal. p. 251. — *C. montana* Host gram. austr. I. p. 50. T. 66.)

787 *praecox*; im Zeller Walde, in der Waldskugel.

Apr. (*C. filiformis* Leers Fl. Herb. n. 718.
T. 16. f. 5. — *C. praecox* Host gram. austr.
I. p. 51. T. 68.)

- *788 *Carex romentosa*; in pratis ad Wellriether Hof. Maj.
(Host gram. austr. I. p. 61. T. 82.)
- 789 *flava*; in pratis paludosis des Gramschatzer
Waldes. Apr. Maj. (Host gram. austr.
I. p. 48. T. 63.)
- 790 *Oederi*; in palude ad Dettelbach et Schwar-
zenau. Maj. (Host gram. austr. I. p. 49.
65.)
- 791 *distans*; in pratis ad Wellriether Hof. Maj.
- 792 *umbrosa*; in nemorosis des Zeller Waldes, der
Waldskugel. Apr. (*C. longifolia* Wolfii. —
C. umbrosa Host gram. austr. I. p. 52.
T. 69.)
- 793 *panicca*; in pratis ad Wellriether Hof, ad Un-
terdürrbach. Maj. (Host gram. austr. I.
p. 59. T. 79.)
- 794 *caespitosa*; in pratis fere omnibus; (Host gram.
austr. I. p. 67. T. 91.) Maj. Iun.
- 795 *sylvatica*; in nemorosis der Waldskugel; (*Car.*
drymeia Willd. Spec. plant. IV. p. 269. —
C. capillaris Leers Fl. Herb. n. 720. t. 15. F.
2. — *C. paucula*, Pollich Palat. 2. n. 896. —
C. sylvatica, Host gram. austr. I. p. 62.
T. 84.) Maj. Iun.
- 796 *flacca*; in pratis ad Wellriether Hof, ad ripas
Moeni et alibi frequens. Maj. (*C. glauca*,
Pollich Palat. 2. n. 894. — *C. limosa* Leers
Fl. Herb. n. 719. T. 15. f. 3. — *C. recurva*
Willd. Spec. Plant. IV. p. 298. — *C. flac-*
ca Host gram. austr. p. 66. T. 90.)

- 797 *Carex acuta*; ad ripas Moeni, in prato paludoso ad Veitshöchheim. Maj. (Host gram. austr. I. p. 70. T. 95.)
- 798 *paludosa*; in pratis ad Wellriether Hof, ad ripas Moeni, in palude inter sylvam Zellensem et Irtenbergensem. Maj. (Host gram. austr. I. p. 68. T. 92.)
- 799 *riparia*; in fossis pratorum ad Veitshöchheim, ad ripas Moeni (*C. crassa* Host gram. austr. I. p. 68. T. 95.) Maj. Iun.
- 800 *vesicaria*; in pratis paludosis ad Veitshöchheim. Maj. (*C. inflata* Roth Fl. Germ. II. 466. — *C. vesicaria* Host I. p. 62. T. 98.)
- 801 *hirta*; in pratis siccioribus bey der Aumühle, ad Unter-Dürrbach, in pratis udis ad Wellriether Hof. Apr. Maj. (Host gram. austr. I. p. 71. T. 96.)
- 802 *Typha latifolia*; in stagno ad Gerbrunn. Jul.
- *803 *Sparganium ramosum*; in stagno ad Gramschatz. Iul. raro.
- 804 *simplex*; ibidem et in paludis Dettelbacensis fossis. Iun. Iul.

Tetrandria.

- 805 *Alnus glutinosa*; am Mühlenbach bey der Aumühle, in pratis. Mart.
- 806 *Urtica urens*; in cultis, ruderatis, ad sepes ubique. Iun. Iul.
- 807 *dioica*; in ruderatis, sepibus vulgatissima. Iun. Iul.
- 808 *Morus alba*; an der Chaussée nach Randersacker, am Exercierplatz. Jun.
- 809 *nigra*; eodem loco cum antecedente. Iun.

Pentandria.

- *810 *Xanthium strumarium*; in pratis vor dem Burkarder Thore versus Heydingsfeld.

Polyandria.

- 811 *Ceratophyllum demersum*; in den Festungsgräben vor dem Pleichacher Thore. Maj.
- 812 *Myriophyllum spicatum*; in fossis pratorum ad Lengfeld. Iun. *horti*
- 813 *verticillatum*; in piscina maxima (Magni Ducis ad Veitshöchheim, frequens. Iul.
- *814 *Sagittaria sagittaeifolia*; ad ripas Moeni hinter Zell. Iun. Iul.
- 815 *Poterium sanguisorba*; in montibus, saxosis, pratis siccioribus. Maj. Jun.
- 816 *Quercus Robur*; in sylvis, nemoribus. Jun.
- 817 *pedunculata*; in sylvis, nemoribus. Jun.
- 818 *Corylus Avellana*; in nemoribus, sylvis, sepibus et dumetis vulgaris. Mart.
- 819 *Fagus sylvatica*; in sylvis, nemoribus ubique. Maj. Jun.
- 820 *Betula alba*; in nemoribus ubique. Apr.
- *821 *odorata*; in nemore hinter Gramschatz am Wege nach Arnstein, raro. Apr. (Ab antecedente discrepat virgis annotinis undique pubescentibus, foliis odorem gratum redolentibus moschatum.)
- 822 *Carpinus Betulus*; in nemoribus, sylvis ubique. Maj.
- 823 *Juglans regia*; in pagis frequens. Maj. Jun.
- 824 *Platanus occidentalis*; am Wege nach der Kapelle. Maj.

- *825 *Arum maculatum*; in umbrosis der Waldskugel
versus Höchberg, raro. Maj.

Monadelphica.

- 826 *Pinus sylvestris*; in sylvis. Maj.
827 *Abies*; in sylvis. Maj.
828 *Bryonia dioica*; ad sepes vor dem Neuen Thore,
ad Gramschatz. Jun.

Classis XXI. Dioecia.

- 829 *Viscum album*; Parasiticum in Pyro communi in
agris versus Remlingen. Mart.
*830 *Salix Mouandra*; ad ripas Moeni, in insula superiore,
rara. Mart.
831 *Amygdalina*; in insulis ad ripas Moeni. Maj.
832 *triandra*; in pratis ad Wellriether Hof. Maj.
833 *caprea*; in nemoribus ubique. Apr.
834 *aurita*; in sepibus ad Rofsbrunn. Maj.
835 *purpurea*; in insula inferiore. Apr. Maj.
836 *alba*; ubique ad vias, in pratis. Apr.
837 *viminalis*; in insula inferiore. Apr. Maj.
838 *Cannabis sativa*; in insula inferiore, inter segetes
passim. Jun.
839 *Humulus Lupulus*; in sepibus, dumetis satis frequens.
Jul.
840 *Populus tremula*; in nemoribus et sylvis vulgaris.
Apr.
841 *nigra*; in den Festungswerken und Alleen
um die Stadt. Apr.

842 *Populus canescens*; im Hofgarten. Apr.

*843 *Mercurialis perennis*; in umbrosis der Waldskugel. raro. Apr.

844 *annua*; in hortis, ruderatis frequens.

845 *Juniperus communis*; in sylvis, nemoribus arenosis. Apr.

Addenda.

**Gladiolus communis*; im Walde über Margetshöchheim, raro. Maj.

Scabiosa columbaria floribus ochroleucis; am Schenkenschlosse ab Ill. Döllinger lecta. Jul.

**Gentiana cruciata*; auf dem Hexenbruche. Jul.

Pyrola minor; in umbrosis bey dem Schenkenschlosse. in pinetis ad Altertheim. Jun.

— — *umbellata*; in nemorosis bey Kürnach.

Spiraea Aruncus; in nemorosis montosis bey dem Schwamberge copiose.

Geum rivale; ad Veitshöchheim satis frequens. Maj.

NB. Hasce plantas ipse nondum quidem legi, sed ab Ill. Döllinger locis nominatis lectae sunt.

Sherardia arvensis; in agris versus Waldskugel. Maj.

Sessleria coerulea; auf dem Stein. Apr. Maj.

Jasione montana; in apricis ad Gerbrunn. Jun. Jul.

Lactuca perennis; in rupestribus der Festung Marienberg, in vicinis am Calmuth. Maj. Jun.