QK314

.K6

1846

SYNOPSIS

DER

DEUTSCHEN

UND

SCHWEIZER FLORA,

enthaltend

die genauer bekannten phanerogamischen Gewächse,
so wie die cryptogamischen Gefäss-Pflanzen,

welche in

Deutschland, der Schweiz, in Preussen und Istrien

wild wachsen und derjenigen, welche zum Gebranche der
Menschen in grösserer Menge gebauet werden,

nach dem DeCandollischen Systeme geordnet, mit einer
vorangehenden Uebersicht der Gattungen nach den
Classen und Ordnungen des Linneischen
Systemes,

bearbeitet von

D. WILH. DAN. JOS. KOCH,

Ritter des schwedischen Polarsternordens, königl. bayer. Geh. Hofrathe, ordentl.
Professor der Medicin u. Botanik auf der Universität Erlangen, Director des bot.
Gartens daselbst, Mitglieder der königl. Academie der Wissenschaften zu München,
der königl. schwedischen zu Stockholm, zu Upsala, der kaiserl. Leopold. Carol.,
der medicinisch-botan. Gesellschaft zu London, der botan. Gesellschaft zu
Regensburg und anderer gelehrten Gesellschaften.

Zweite Auflage.

ERSTER THEIL.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Leipzig 1846.

Verlag von Gebhardt & Reiland.

+OK314

K6

1246

Vorwort zur ersten Auflage.

Deutschland und die Schweiz *) verbreiten sich über Länder, welche mit politischen Grenzen umzogen, aber nicht von der Natur mit Gebirgsketten, Meeren, oder einer andern hervortretenden Begrenzung von den benachbarten Ländern geschieden sind. Denn der übrigen Uebergänge zu geschweigen, so geht Oestreich allmählig in Ungarn, die untere Rheingegend in Holland über. Manchfaltige Lagen erzeugen auf diesen verschiedenen Ländern auch manchfaltige kleinere Floren; aber abgesehen von diesen, so lassen sich vorzüglich drei wesentlich verschiedene grosse Floren unterscheiden. Die Flora des mittlern Europa steigt vom Fusse der Alpen zur Ostsee und zur Nordsee hinab. Die Alpenflora, auf dem Juragebirge beginnend, bewohnt die Alpenkette, welche von diesem Gebirge an bis Ungarn, von Abend gegen Morgen, mit ungeheuren Felsenmassen, deren höchste Scheitel ewiger Schnee deckt, den südlichen Theil des Florengebietes einnimmt, und mit ihren südlichen Abhängen Oberitalien und im östreichischen Litterale das

*) Die Landkarten: „Deutschland, entworfen und gezeichnet von C. F. Weiland, Weimar 1833,“ und „Die Schweiz oder Helvetische Eidgenossenschaft“ entworfen und gezeichnet von C. F. Weiland, Weimar 1831,“ stellen das Florengebiet dar. Es ist das Elsass zur genauen Verbindung dieser beiden Länder noch hinzugekommen.

adriatische Meer berührt. Sie prangt mit den seltensten Pflanzenarten; aber was davon den südlichen Abhängen und was den nördlichen ausschliesslich eigen ist, das ist noch nicht ermittelt worden. Istrien, die Gegend um Fiume und die Inseln Cherso, Osero und Veglia, welche Länderstriche seit langer Zeit der Deutschen Flora zugezählt zu werden pflegen, ernähren eine dritte Flora, eine südlichere nämlich, grossen Theiles aus Pflanzen der mittelländischen gebildet. Ob sich nun gleich was von den Alpengewächsen der Flora des mittlern Europa oder was der Flora jenseits der Alpen angehört, in meinem Buche nicht aufzählen lässt, so kann man doch, was Istrien, der Gegend von Fiume und den benannten Inseln eigenthümlich ist, und was, so viel wir wissen, ausser diesen Länderstrichen nicht wächst, davon deutlich scheiden; ich habe diese Arten am Rande mit dem Buchstaben J. bezeichnet, wodurch man sie leicht vor den anderen erkennen wird. Da ich nun weiter der Ansicht war, dass es nicht unangenehm seyn werde, wenn man diejenigen Pflanzen, welche in der Schweiz zu Hause sind, aber in Deutschland bisher vermisst wurden, und welche Deutschland ernährt, in der Schweiz aber noch nicht aufgefunden wurden, leicht überblicken könne, so habe ich jene an dem Rande mit dem Buchstaben S., diese mit dem Buchstaben D. bezeichnet; welche ich nicht bezeichnet habe, kommen sowohl in der Schweiz als in Deutschland vor. Zu Deutschland wurde das Elsass hinzugezogen, weil es die Schweiz mit der mittlern Rheingegend verbindet. Auch Ost- und Westpreussen, mit Deutschland auf das Innigste verschwistert, wurde zum Florengebiete hinzugezogen. Unter denselben Breitegraden und in gleicher geographischer Höhe gelegen, können diese beiden Länderstriche, wie man leicht einsehen wird, nur wenige Arten aufweisen, welche in Deutschland nicht wachsen; sie sind mit dem Buchstaben P. bezeichnet.

Auch diejenigen Pflanzen habe ich aufgenommen, welche der Mensch zu seinem Nutzen im Grossen anbauet. Mehrere Arten derselben sind den Botanikern weniger bekannt, als diejenigen, welche bloss zur Zierde unserer Gärten dienen.

Ich habe nur mir genau bekannte Pflanzen aufgenommen, oder solche, welche ich zwar sahe, jedoch nicht hinlänglich untersuchen konnte, die ich aber einer weitern Untersuchung empfehlen zu müssen glaubte. Mehrere mit gar leichtfertiger Hand aufgestellte Arten, so wie alle, welche ich nicht kenne, habe ich geflissentlich weggelassen; ich wollte nicht das Gewisse mit dem Ungewissen verwirren.

Die Standorte habe ich aus den speziellen Floren und aus meinem Herbarium genommen, und jederzeit bei ihrer Aufzählung die geographische Verbreitung der Art und die Striche, denen sie folgt, vor Augen gehabt.

Von Synonymen, auch der vorzüglichsten Autoren, nahm ich nur solche auf, welche zu irgend einer Aufklärung der Species beitragen, oder welche einen verschiedenen Namen einer und derselben Species darbieten.

Die Deutsche Ausgabe der Synopsis, welche ich hier den Deutschen Botanikern vorlege, ist eine genaue Uebersetzung der Lateinischen, nur war ich genöthigt, wegen des grössern Umfanges der Deutschen Sprache, im Vergleiche mit der Lateinischen, nicht blos alle Zahlen bei den Citaten wegzulassen, sondern auch vielerlei Abkürzungen anzubringen, um das Werk nicht weiter, als das Lateinische auszudehnen. Die Zahlen wird man jedoch wenig vermissen und in die Abkürzungen, welche ich hier unten erläutere, wird man sich bald finden, wie die kleinere Röhling's Flora zu ihrer Zeit gezeigt hat.

Erlangen, im October 1837.

Koch.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Wie in der vorigen, so wurden auch in dieser Ausgabe der Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora nur Arten aufgenommen, welche ich selbst gesehen und genau untersucht habe. An den Namen der Pflanzen selbst und an der ganzen Anordnung wurde so wenig als möglich geändert, denn es erschienen bereits Special-Flora, welche diese Synopsis zur Grundlage wählten, und mehrere botanische Vereine richteten bereits ihre Pflanzen-Cataloge darnach ein. In dieser Beziehung hätten mehrfache Veränderungen der Namen oder der systematischen Anordnung zu grossen Unbequemlichkeiten geführt. Das Werk wurde verfasst, um die Kenntniss der Arten zu erleichtern und zu befördern und wird dieses Ziel erreicht, so glaubt der Verfasser das, was er sich vorgenommen hatte, mit dem erwünschten Erfolge bekrönt zu sehen.

Erlangen, im October 1845.

Koch.

Verzeichniss der Abkürzungen.

- A. = Alpen. VorA. = Voralpen.
 AK. = Alpenkette; dch. d. g. AK. = durch die ganze Alpenkette.
 ATriften = Alpentriften.
 AussenK. = Aussenkelch (besser als Nebenkelch). NebenB. = Neben-Blatt.
 = Blatt oder Blätter. Bstiel = Blattstiel.
 BZipfel = Blattzipfel.
 b. am Ende eines Stadt- oder Dorfnamens = burg. z. B. Würzb. = Würzburg.
 Bl. = Blume oder Blumen. Blh. = Blumenblatt. Blkr. = Blumenkrone. Blkr.Lippe = Lippe der Blumenkrone. Blkr.Röhre = Röhre der Blumenkrone. Blkr.Saum = Saum der Blumenkrone u. s. w.
 Bl. u. F. = Bluff u. Fingerhuth compendium Florae germanicae.
 Bsch. = Blattscheide.
 Bstiel = Blattstiel oder Blattstiele.
 Bth. = Blüthe oder Blüthen. Bthstiel = Blütenstiel. Bthstielch = Blütenstielen. Bthköpfchen = Blütenköpfchen. Bth-schweif = Blüthenschweif. Bthzeit = Blüthezeit u. s. w.
 bth. am Ende eines Wortes oder einer Zahl = blüthig.
 C. = Canton, eine Provinz der Schweiz.
 D. = Deutschland.
 D. fl. = Deutschlands Flora von Mertens und Koch.
 DC. = DeCandolls Werke.
 dch. = durch.
 DeckB. = Deckblätter.
 Expl. = Exemplar oder Exemplare.
 f. am Ende eines Wortes = förmig.
 Fl. d. oder Fl. dan. = Flora danica.
 Fl. d. wett. = Flora der Wetterau von Gärtner u. s. w.
 Fruchtb. = Fruchtboden.
 Fruchtkn. = Fruchtknoten.
 Fruchtk. = Fruchtkelch.
 gesp. = gespalten.
 geth. = getheilt.
 Gf. = Griffel.
 h. am Ende eines Wortes = haarig.
 HK. = Hauptkelch, der gemeinschaftliche Kelch der Compositen.
 Host. a. = Hosts flora austriaca.
 J. = Jacquins Werke. J. a. = Jacquinii flora austriaca. J. h. v. = Jacquinii hortus vindobonensis. J. ic. rar. = Jacquinii icones plantarum rariorum.
 K. = Kelch oder Kelche. KB. = Kelchblättchen. KRöhre = Kelchröhre. KZähne = Kelchzähne u. s. w.
 KeimB. = Keimblatt.
 L. = Linnés Schriften. L. sp. pl. = Linnaei species plantarum u. s. w.
 lanzettl. = lanzettig, lanzettlich, lanzettförmig.
 MB. = Marshall v. Bieberstein. M. B. t. c. = Flora taurico-caucasica von Marshall v. Bieberstein.
 N. = Narbe.

VIII

- N. ab Esenb. gen. = Nees von Esenbeck genera plantarum flöae germanicae.
O. = Ort oder Orte. WaldO. = Waldorte.
od. = oder.
P. = Perigon.
Pfl = Pflanze.
R. = Rispe.
R. et S. = Roemer et Schultes systema vegetabilium.
S. = der Same oder die Samen. Sträger = Samenträger.
Sch. = Scheide.
Schot. = Schote. Schötch. = Schötchen.
Schw. = Schweiz.
Schwarzw. = Schwarzwald.
sp. am Ende eines Wortes oder einer Zahl = spaltig.
st. am Ende eines Wortes oder einer Zahl = ständig.
St. = Stengel. StB. = Stengelblatt. HauptSt. = Hauptstengel. NebenSt. = Nebestengel.
Stbf. = Staubfaden oder in der Mehrzahl Staubfäden.
Stbg. = Staubgefäß oder in der Mehrzahl Staubgefäße.
Stbk. = Staubkölbchen.
Sm. = Smiths Schriften.
St. h. = Sturm Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur, Heft.
stw. = stellenweise. stw. dch. d. Geb. oder stw. d. d. G. = stellenweise durch das Gebiet.
Sud. oder Sudet. = Sudeten, Riesengebirg.
th. am Ende eines Wortes oder einer Zahl = theilig.
Tr. = Traube.
trag. = tragend.
untersch. = unterscheidet oder unterschieden.
v. = von.
var. = varirt, ändert ab.
Variet. = Varietät.
Vog. = Vogesen.
W. = Wurzel. WB. = Wurzelblatt.
Zpfl = Zipfel.
zs. = zusammen zsneigend = zusammenneigend u. s. w.
Einige andere Abkürzungen ergeben sich von selbst.

Noch bemerke ich über den Gebrauch von den Worten *scaber* und *Corymbus* folgendes. Das Wort *scaber*, welches eine Oberfläche anzeigt, die sich durch spitze oder stumpfe Knötchen oder kurze steife Härchen rauh anfühlt, wurde bisher mit *scharf* übersetzt. Scharf aber ist ein geschliffenes Messer und rauh ist ein grobkörniger Sandstein. Das Scharfe verletzt mit der Kante, das Rauhe mit der Oberfläche. Deswegen übersetzte ich *scaber* mit *rauh*, *scabrusculus* mit *etwas rauh*, *scaberrimus* mit *sehr rauh*. *Scaberrimus* und *asper* sind nicht verschieden und letzteres Wort in der botanischen Terminologie ganz überflüssig. — Für das Wort *Corymbus*, welches einen flachen Strauss bedeutet, dessen Stiele nicht aus einem Punkte entspringen, habe ich das Wort *Ebenstrauss*, ein ebener, flacher Strauss, eingeführt. Der *Corymbus* hat mit der Dolde gar nichts und der *Corymbus compositus* auch mit der Traube nichts gemein, man betrachte den *Corymbus compositus* der *Achillea Millefolium*. Das Wort *Doldentraube* könnte man für den Blütenstand der *Cruciferae* gebrauchen, für die Worte *flores racemoso-corymbosi*.

Anordnung der Gattungen der Flora von Deutschland und der Schweiz nach dem Linneischen Sexualsysteme.

CLASSEN.

- I. EINMAENNIGE, MONANDRIA; 1 freies Stbg. in einer Zwitterbthe.
- II. ZWEIMAENNIGE, DIANDRIA; 2 freie Stbg. in einer Zwitterbthe.
- III. DREIMAENNIGE, TRIANDRIA; 3 freie Stbg. in einer Zwitterbthe.
- IV. VIERMAENNIGE, TETRANDRIA; 4 freie, nicht zweimächtige Stbg. in einer Zwitterbthe.
- V. FUEFMAENNIGE, PENTANDRIA; 5 freie Stbg. in einer Zwitterbthe.
- VI. SECHSMAENNIGE, HEXANDRIA; 6 freie, nicht 4mächtige Stbg. in einer Zwitterbthe.
- VII. SIEBENMAENNIGE, HEPTANDRIA; 7 freie Stbg. in einer Zwitterbthe.
- VIII. ACHTMAENNIGE, OCTANDRIA; 8 freie Stbg. in einer Zwitterbthe.
- IX. NEUNMAENNIGE, ENNEANDRIA; 9 freie Stbg. in einer Zwitterbthe.
- X. ZEHNMAENNIGE, DECANDRIA; 10 freie Stbg. in einer Zwitterbthe.
- XI. ZWOELFMAENNIGE, DODECANDRIA; 12, 16, 18 freie Stbg. in einer Zwitterbthe.
- XII. ZWANZIGMAENNIGE, ICOSANDRIA; 20 u. mehre freie Stbg. auf dem K. eingefügt in einer Zwitterbthe.
- XIII. VIELMAENNIGE, POLYANDRIA; 20 u. mehre freie Stbg. auf dem Fruchtb. eingefügt in einer Zwitterbthe.

- XIV. ZWEIMAECHTIGE, DIDYNAMIA:** 4 freie zweimächtige Stbg., nämlich 2 gleichf. längere, u. 2 kürzere, in einer Zwitterbthe.
- XV. VIERMAECHTIGE, TETRADYNAMIA:** 6 freie, 4mächtige Stbg., nämlich 2 gleichf. kürzer u. entfernter in einer Zwitterbthe.
- XVI. EINBRUEDRIGE, MONADELPHIA:** die Stbf. alle unter sich zsgewachsen, in einer Zwitterbthe.
- XVII. ZWEIBRUEDRIGE, DIADELPHIA:** die Stbf. in 2 gleiche Bündel zsgewachsen, od. 9 zsgewachsene u. ein zehnter freier in einer Zwitterbthe.
- XVIII. VIELBRUEDRIGE, POLYADELPHIA:** die Stbf. in 3 od. mehrere Bündel zsgewachsen, in einer Zwitterbthe.
- XIX. VEREINTKOELBIGE, SYNGENESIA:** die Stbk. in eine Walze zsgewachsen in Bthen, welche mit einem gemeinschaftlichen K., einem Hauptk., umgeben sind u. eine zsgesetzte Blüthe bilden.
- XX. WEIBERMAENNIGE, GYNANDRIA:** die Stbg. an den Stempel angewachsen in einer Zwitterbthe.
- XXI. EINHAEUSIGE, MONOECIA:** Bth. eingeschlechtig, männliche und weibliche auf derselben Pflanze.
- XXII. ZWEIHAEUSIGE, DIOECIA:** Bth. eingeschlechtig, die männlichen auf einer, und die weiblichen auf einer andern Pflanze derselben Art.
- XXIII. VIELEHIGE, POLYGAMIA:** eingeschlechtige Bthen mit Zwitterbthen gemischt.
- XXIV. VERBORGENEHIGE, CRYPTOGAMIA:** die Stbg. fehlend; (nur bei den Moosen deutn längliche, fächerige, mit einer brückeligen Masse angefüllte Schläuchchen die männlichen Geschlechtsorgane an. Bei den übrigen kryptogamischen Pflanzen findet man nichts Aehnliches.)

ORDNUNGEN.

Die **ORDNUNGEN** der Klassen werden von der ersten bis zur dreizehnten Klasse nach der Anzahl der Fruchtkn., u., wenn ein einzelner Fruchtkn. vorhanden ist, nach der Anzahl der Gf., wenn aber die Gf. fehlen, nach der Anzahl der Narben gebildet. Die Einweibige (*Monogynia*), hat 1 Fruchtkn., mit 1 Gf. oder 1 Narbe bekrönt; die Zweiweibige (*Digynia*), hat 2 Fruchtkn., od. 1, mit 2 Gf., od. wenn die Gf. fehlen, mit 2 Narben versehen; die Vielweibige (*Polygynia*), viele Fruchtkn., od. 1 Fruchtkn. mit vielen Gf. od. Narben. Die Ordnungen der folgenden Klassen werden bei der Aufzählung der Gattungen erklärt od. sie sind an und für sich klar.

GATTUNGEN.

I. Cl. EINMAENNIGE, MONANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

HIPPURIS. Perigon aus einem schwachen, den Fruchtkn. krönenden, Rande bestehend.

893 - CENTRANTHUS. Saum des K. zuletzt zu einer Fruchtkrone entwickelt. Blkr. 1blättrig, bespornt.

Zu dieser Ordn.: *Salicornia*. Arten von *Corispermum*.

ZWEIWEIBIGE, DIGYNIA.

Zu dieser Ordn.: *Callitriche*. *Blitum*. *Festuca Myurus*, *Pseudomyurus u. sciuroides*. *Psilurus*.

II. Cl. ZWEIMAENNIGE, DIANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

A. Bth. unvollst., unterst.

805 - RUPPIA. Perig. fehlend. Nüsse 4.

SALICORNIA. Perig. ungeth., dch. eine Ritze geöffnet, in die Aushöhlung einer Spindel eingesenkt.

808 - LEMNA. P. zsgedrückt, ungeth., od. am Rande fein gekerbt.

Zu dieser Unterabtheilg.: die blumenblattlosen *Fraxinus*. Mehrere Arten v. *Scirpus u. Rhynchospora*, u. *Cladium*. — Die zweimännigen Gräser enthält die *Triandria digynia*.

B. Bth. vollständig, oberst.

225 - CIRCAEA. Blkr. 2blättrig.

C. Bth. vollst., unterst., 1früchtig, regelmässig.

a. Scheidewand des Fruchtkn. in dem grössern Durchmesser desselben.

570 - JASMINUM. Blkr. Saum 5-8sp.

LIGUSTRUM. Blkr. Saum 4sp. Beere.

PHILLYREA. Blkr. Saum 4sp. Steinfrucht mit zerbrechlicher Schale.

OLEA. Blkr. Saum 4sp. Steinfrucht mit knöcherner Schale.

SYRINGA. Blkr. Saum 4sp. Kapselfrucht.

b. Scheidewand des Fruchtkn. in dem kleinern Durchmesser desselben.

FRAXINUS. Blkr. Saum 4th., od. die Blkr. fehlend.

D. Bth. vollst., unterst., 1früchtig, unregelmässig.

992 - PINGUICULA. Fruchtkn. 1fächerig. K. 5sp.

- UTRICULARIA.** Fruchtkn. 1fächerig. K. 2blättrig.
WULFENIA. Fruchtkn. 2fächerig. Stbk. nierenf., in ein Scheibchen aufspringend.
GRATIOLA. Fruchtkn. 2fächerig. Stbk. 2ritzig. N. 2plattig.
PAEDEROTA. Fruchtkn. 2fächerig. Stbk. 2ritzig. N. ungeth. Kapsel geschnäbelt-zugespitzt.
VERONICA. Fruchtkn. 2fächerig. Stbk. 2ritzig. N. ungeth. Kapsel ausgerandet.

E. Bth. vollst., unterst., 4früchtig.

- LYCOPUS.** Stbk. 2fächerig. 2ritzig.
ROSMARINUS. Stbk. 1fächerig. Stbf. mit einem rückwärtsgerichteten Zahne.
SALVIA. Stbk. 1fächerig. Stbf. zahnlos. Connectiv fädlich.
 Zu dieser Classe: *Lepidium ruderales*. Arten von *Corispermum* und *Blitum*.

III. Cl. DREIMAENNIGE, TRIANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

A. Bth. vollst., oberst.

- VALERIANA.** K. Saum zuletzt zu einem Pappus entwickelt. Blkr. an der Basis höckerig.
VALERIANELLA. K. Saum gezähnt, seltner unmerklich.

B. Bth. vollst., unterst.

- MONTIA.** K. 2blättrig. Blkr. an einer Seite bis zur Basis gespalten, mit 3lappigem Saume.

C. Bth. unvollst., Perig. blumenkronenartig.

- IRIS.** Perig. Saum 6th., mit abwechselnd zurückgebohenen Zpfln.
TRICHONEMA. Perig. Saum 6th., abstehend, regelmässig. N. mit sehr schmalen zurückgekrümmten Zpfln.
CROCUS. Perig. Saum 6th., glockig, regelmässig. Zpfl. der N. aufwärts verbreitert.
GLADIOLUS. Perig. Saum 6th., unregelmässig, fast 2lippig. Stbg. aufstrebend.

D. Bth. unvollst., Perig. kelchartig.

- POLYCNUM.** P. 6blättrig, mit 2-3 DeckB. gestützt.

E. Bth. unvollst., balgartig.

a. Aehrchen 2reihig.

- CYPERUS.** Bälge zahlreich, die untern, 1-2 kleiner, leer.
SCHOENUS. Bälge 6-9, die 2-3 untern leer.

b. Aehrchen v. allen Seiten dachig. Die 3-4 untern Bälge kleiner u. unfruchtbar.

- CLADIUM.** Nuss bespitzt dch die bleibende, ungegliederte Basis des Cf.

RIHYNCHOSPORA. Nuss bespitzt dch die bleibende, gegliederte Basis des Gf.

c. Aehrchen v. allen Seiten dachig. Die untern Bälge grösser, od. gleichgross, 1-2 derselben unfruchtbar.

HELEOCHARIS. Borsten eingeschlossen. Nuss bespitzt dch die bleibende, gegliederte Basis des Gf.

FIMBRISTYLIS. Borsten eingeschlossen od. fehlend. Nuss bespitzt. Der Gf. zsgedrückt, oberhalb der Basis gegliedert.

SCIRPUS. Borsten eingeschlossen od. fehlend. Nuss bespitzt dch die bleibende, ungliederte Basis des Gf.

ERIOPHORUM. Borsten hervortretend, viel länger, als die Bälge.

Zu dieser Ordn.: *einige Gräser.* *Asperula tinctoria.*

ZWEIWEIBIGE, DIGYNIA.

Bth. balgartig. Gräser.

A. Aehrchen in die Aushöhlungen einer Spindel eingesenkt.

PSILURUS. Balg 1klappig, (an der endst. Bth. 2klappig,) viel kürzer als die Bthe.

LEPTURUS. Balg 1-2klappig, die eingesenkte Bthe bedeckend.

B. Aehrchen alle auf den Zähnen einer Spindel sitzend, keine gestielt.

NARDUS. Balg fehlend.

LOLIUM. Balg der seitenst. Aehrchen 1klappig, der endst. 2klappig.

HORDEUM. Aehrchen an den Gelenken der Spindel zu 3, 1bth.

ELYMUS. Aehrchen an den Gelenken der Spindel zu 3, 2-vielbth.

GAUDINIA. Aehrchen einzeln; Bth. auf dem Rücken begrannt, Granne gekniet.

AEGILOPS. Aehrchen einzeln; Bth. an der Spitze 2-4zählig; Zähne oft begrannt.

TRITICUM. Aehrchen einzeln; Bth. aus der Spitze begrannt od. grannenlos. Klappen eyf. od. ey-lanzettf.

SECALE. Aehrchen einzeln, Bth. aus der Spitze begrannt; Klappen pfriemlich.

C. Aehrchen an den Gelenken einer Aehre od. gegliederten Ripse gezweiet, das eine sitzend, das andere gestielt.

ERIANTHUS. Aehrchen sämtlich zwittrig u. alle lineal.

ANDROPOGON. Die sitzenden Aehrchen zwittrig, die gestielten männlich, alle lineal.

SORGHUM. Die sitzenden Aehrchen zwittrig, ey- od. ey-lanzettf., an der Spitze 3zählig; die gestielten männlich.

HETEROPOGON. Die untern sitzenden Aehrchen u. die gestielten sämtlich männlich; die sitzenden obern dch Fehlschlagen weiblich.

D. Aehrchen länger- od. kürzer, manchmal auch sehr kurz-gestielt, 1bth., od. 1bth. mit einem Ansatz zu einer zweiten obern od. zu zweien untern Bth.

a. Aehrchen vom Rücken her zsgedrückt.

PANICUM. Balg 3klappig; die untere Klappe kleiner, oft sehr klein; Hülle fehlend.

SETARIA. Balg 3 klappig, die untere Klappe kleiner, od. sehr klein. Borstenf. Hüllen unter den Aehrchen.

TRAGUS. Balg 2klappig, die untere Klappe sehr klein, häutig; die obere lederig, dornig; Bth. häutig.

MILIUM. Balg 2klappig, grösser, als die knorpelige, grannenlose Bthe.

PIPTATHERUM. Balg 2klappig, grösser, als die knorpelige begrannete Bthe; Granne abfällig.

b. Aehrchen v. der Seite her zsgedrückt; Balg fehlend.

LEERSIA. Bälglein die Karyopse einschliessend.

COLEANTHUS. Bälglein kürzer, als die Karyopse.

c. Aehrchen v. der Seite her zsgedrückt; Balg. 2klappig; Bthe an ihrer Basis mit 2 schuppenf. od. spelzigen Ansätzen zu untern Bthen.

PHALARIS. Bth. an der Basis mit 2 grannenlosen Schuppen.

ANTHONANTHUM. Bth. an der Basis mit 2 begranneten Spelzen, die grösser, als die Bth. selbst sind.

d. Aehrchen v. der Seite her zsgedrückt od. stielrund; Balg 2klappig, 1bth., od. 1bth. mit einem Ansatz zu einer obern Bthe.

α. N. fädlich, aus der Spitze des Aehrchens hervorgestreckt.

ALOPECURUS. Bälglein 1spelzig.

CHAMAGROSTIS. Klappen kiello. Bälglein 2spelzig.

PHLEUM. Klappen gekielt, fast gleich, länger, als das 2spelzige Bälglein.

CRYPsis. Klappen gekielt, kürzer, als die Bthe, die untere kürzer; Spelzen fast gleich, die obere ein wenig kürzer.

SPARTINA. Klappen gekielt, die untere kürzer, als die Bthe; Spelzen ungleich, die obere länger.

β. N. auf einem verlängerten Gf. sitzend, sprengwedelf., unter der Spitze der Bthe hervortretend.

CYNODON. Klappen schmal, abstehend. Die obere Spelze lineal., dch eine Furche ausgehöhlt, die untere v. der Seite her zsgedrückt, im Umrisse eyf., papierartig.

IMPERATA. Klappen ein 3spelziges, dünnhäutiges Bälglein einschliessend. Die Gf. v. der Basis bis zur Mitte zsgewachsen.

γ. N. federig, an der Basis des Aehrchens hervortretend.

Die Gf. kurz od. fehlend.

LAGURUS. Klappen pfriemlich, in eine Granne verschmälert.

Die untere Spelze mit 2 endst. u. einer rückenst. geknieten Granne.

POLYPOGON. Klappen aus der stumpfen od. etwas ausgerandeten Spitze begrannt. Spelzen häutig.

AGROSTIS. Klappen spitz, die untere grösser. Spelzen häutig, kahl od. an der Basis mit sehr kurzen Haaren umgeben.

APERA. Klappen spitz, die untere kleiner. Spelzen häutig, an der Basis kahl, od. mit sehr kurzen Haaren umgeben.

CALAMAGROSTIS. Klappen spitz, die untere grösser. Spelzen an der Basis mit Haaren umgeben, die länger, als der Querdurchmesser der Spelze sind.

AMMOPHILA. Klappen spitz, die untere kleiner. Spelzen an der Basis mit Haaren umgeben, die länger, als der Querdurchmesser der Spelze sind.

LASIAGROSTIS. Klappen spitz, die untere grösser. Die untere Spelze auf dem Rücken mit verlängerten Haaren besetzt. Granne bleibend, unter der Spitze eingefügt.

STIPA. Klappen spitz, od. aus der Spitze begrannt. Spelzen knorpelig, die untere walzlich-zsgerollt; Granne stark, an der Basis gegliedert, bleibend, aus der Spitze der Spelze hervorgehend.

GASTRIDIVM. Klappen spitz, sehr zsgedrückt, an der Basis fast kugelig-gedunsen. Spelzen häutig.

E. Aehrchen länger- oder kürzer-, manchmal sehr kurzgestielt, 2-vielbth.; seltner die untern geschlechtslos od. männlich, die oberste aber oft verkümmert.

a. N. fädlich, aus der Spitze des Aehrchens lang - hervorgestreckt.

SESLERIA. Die untere Spelze ganzrandig u. stachelspitzig od. begrannt, od. an der Spitze 3-5zählig, die Zähne stachelspitzig od. begrannt.

ECHINARIA. Die untere Spelze handf.-5sp.; Zpfl. lanzettl.-pfriemlich.

b. N. sprengwedelf., unter der Spitze der Bth. hervortretend.

ARUNDO. Aehrchen vielbth.; Bth. sämmtl. zwitterig, auf dem Rücken mit verlängerten Haaren besetzt.

PHRAGMITES. Aehrchen vielbth.; die untere Bthe männlich od. geschlechtslos, nackt, die übrigen zwitterig, mit verlängerten, v. der Achse entspringenden Haaren umhüllt.

HIEROCHLOA. Aehrchen 3bth., die 2 untern Bth. männlich, 3männig; die obere zwitterig, 2 männig, (kahl.)

c. N. federig, an der Basis der Bth. hervortretend.

LAMARCKIA. Die geschlechtslosen Aehrchen vielbth., mit abgerundet-stumpfen Spelzen; die zwitterigen 1bth., mit einem Ansatz zu einer zweiten Bthe.

ARRHENATHERUM. Aehrchen 2bth., die untere Bthe männlich, begrannt; die obere zwitterig, grannenlos.

HOLCUS. Aehrchen 2bth.; die untere Bthe zwitterig; grannenlos; die obere männlich, begrannt.

- CORYNEPHORUS.** Aehrchen 2 bth.: Bthe zwittrig. Die untere Spelze an der Spitze ganzrandig; an der Basis begrannt; Granne oberwärts keulig, in der Mitte mit einem Ringe umgeben.
- AIRA.** Aehrchen 2bth.: Bth. zwittrig. Die untere Spelze an der Spitze abgeschnitten, 1zählig, an der Basis od. auf dem Rücken begrannt; Granne an der Basis gedreht, in ein Knie gebogen od. fast gerade.
- AVENA.** Aehrchen 2-vielbth.: Bth. zwittrig. Die untere Spelze an der Spitze 2sp. od. 2grännig, auf dem Rücken mit einer an der Basis gedrehten Granne.
- DANTHONIA.** Aehrchen 2-vielbth.: Bth. zwittrig. Die untere Spelze an der Spitze 2sp., in der Spalte begrannt, mit einer an der Basis flachen und gewundenen Granne.
- TRIODIA.** Aehrchen 2-vielbth.: Bth. zwittrig. Die untere Spelze an der Spitze 3zählig, der mittlere Zahn stachelspitzf. etwas flach.
- MELICA.** Aehrchen 2-mehrbth.: Bth. grannenlos, die untere od. die 2 untern zwittrig, vollkommen, die zweite od. dritte unähnlich, unvollkommen u. noch 1-2 unvollkommene einschließend.
- KOELERIA.** Aehrchen 2-mehrbth.: Bth. lanzettl., zsgedrückt-gekielt. Die untere Spelze an der ungeth. od. 2sp. Spitze stachelspitzig od. begrannt; Granne borstlich, gerade.
- DACTYLIS.** Aehrchen 3-mehrbth.: Bth. eyf., auf dem Rücken zsgedrückt-gekielt, nach der innern Seite gekrümmt. Die untere Spelze ungleichseitig, an der ungeth. od. 2sp. Spitze stachelspitzig od. begrannt; Granne borstlich, gerade.
- POA.** Aehrchen 2-vielbth.: Bth. eyf., od. lanzettf., auf dem Rücken zsgedrückt-gekielt, grannenlos, mit den Gelenken der Achse abfällig.
- ERAGROSTIS.** Aehrchen 2-vielbth.: Bth. eyf. od. lanzettf., auf dem Rücken zsgedrückt-gekielt, grannenlos, die obere Spelze so wie die Achse bleibend.
- GLYCERIA.** Aehrchen 2-vielbth.: Bth. länglich, stumpf, auf dem Rücken halbwalzlich, einwärts fast bauchig, grannenlos.
- MOLINIA.** Aehrchen 2-vielbth.: Bth. aus einwärts bauchiger Basis kegelf., auf dem Rücken halbwalzlich, grannenlos od. an der Spitze begrannt; Granne gerade.
- BRIZA.** Aehrchen 2-vielbth.: die untere Spelze an der Basis herzf.-geöhret.
- FESTUCA.** Aehrchen 2-vielbth.: Bth. lanzettl., od. lanzettl.-pfeimlich, auf dem Rücken stielrund, begrannt od. grannenlos. Die obere Spelze am Rande fein-gewimpert. Gf. od. N. auf der Spitze des Fruchtkn. eingefügt. Hülle fehlend.
- CYNOSURUS.** Die einzelnen Aehrchen an der Basis mit einer, aus zahlreichen, 2reihigen Klappen gebildeten, Hülle gestützt; sonst alles, wie bei Festuca.
- BRACHYPODIUM.** Die obere Spelze am Rande kammf.-borstig; sonst alles, wie bei Festuca.

BROMUS. Aehrenchen vielblh. Bth. lanzettl. - od. ey-lanzettf., begrannt od. grannenlos. Gf. od. N. oberhalb der Mitte des Fruchtkn. auf dessen vorderer Seite eingefügt.

Zu dieser Ordnung: *Arten von Corispermum und Blitum.*

DREI- und VIERWEIBIGE.

POLYCARPUM. K. 5theilig mit gekielten Zpfln. Kapsel 3klappig, 1fächerig, vielsamig.

Zur Trigynia: *Holosteum, Tillaea.* Zur Tetragynia: *Elatine.*

IV. Cl. VIERMAENNIGE, TETRANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

A. Bth. vollständig.

a. Besonderer K. doppelt; der innere zuletzt an die Frucht angewachsen. Blkr. 1blättrig.

KNAUTIA. Fruchtb. rauhh.

DIPSACUS. Fruchtb. spreug. Der äussere K. vielzählig. Die äusseren Hüllblättchen länger, u. länger als die Spreuen.

CEPHALARIA. Hülle dichtdachig, die äussern Blättchen kürzer; sonst alles, wie bei Dipsacus.

SUCCISA. Fruchtb. spreug. Der äussere K. 4 lappig; Lappen krautig.

SCABIOSA. Fruchtb. spreug. Der äussere K. glockig od. radf., trockenhäutig.

b. K. einfach. Blkr. 1blättrig, unterst.

GLOBULARIA. Blkr. unregelmässig. 3-5sp.

PLANTAGO. Blkr. Saum regelmässig, 4th., zurückgebrochen. N. fädlich, verlängert. Kapsel rundum aufspringend.

CENTUNCULUS. Blkr. Saum regelmässig, 4th., abstehend.

N. kopfig. Kapsel rundum aufspringend.

CICENDIA. Blkr. Saum regelmässig, 4th., abstehend od. zsneigend. N. kopfig. Kapsel der Länge nach aufspringend.

c. K. einfach, der Saum oft verwischt. Blkr. 1blättrig, oberst.

CRUCIANELLA. Blkr. trichterf. mit einwärts - gekrümmten, zsneigenden Zpfln. K. Saum unmerklich.

ASPERULA. Blkr. trichterf. od. glockig, mit abstehenden Zpfln. K. Saum unmerklich.

SHERARDIA. Blkr. trichterf. mit abstehenden Zpfln. K. Saum gezähnt.

GALIUM. Blkr. flach od. radf.; Frucht trocken, zweiknöpfig.

RUBIA. Blkr. flach od. radf.; Frucht saftig, zweiknöpfig.

VAILLANTIA. Blkr. flach od. radf.; Frucht 3hörig.

d. Blkr. vielblättrig, unterst.

EPIMEDIUM. K. 4blättrig. Blkr. 4blättrig. Nebenkrone 1blättrig.

e. Blkr. vielblättrig, oberst.

CORNUS. K. 4sp. Blkr. 4blättrig. Steinfrucht.

TRAPA. K. 4sp. Blkr. 4blättrig. Dornige Nuss.

B. Bth. unvollst.

a. Unterst.

MAIANTHEMUM. P. blumenkronenartig, 4th., flach od. zurückgebogen.

CAMPHOROSMA. P. 4 zählig, die 2 gegenst. Zähne grösser. Stbg. in die Basis des P. eingefügt.

ALCHEMILLA. P. kelchartig, mit 8 sp. Saume. Stbg. auf einem, den Schlund verengernden Ringe eingefügt.

SANGUISORBA. P. kelchartig, farbig, mit 4sp. Saume. Stbg. auf einem den Schlund verschliessenden Ringe eingefügt.

PARIETARIA. P. glockig. Stbg. auf dem Grunde des P. eingefügt. Bth. vielchig.

ELAEAGNUS. P. glockig, an der Basis in eine Röhre gezogen. Stbg. dem Saume des P. eingefügt. Bth. vielchig.

b. Bth. oberst.

ISNARDIA. P. oberst., 4sp., bleibend.

Zur Monogynia: *Gentiana tenella* u. die übrigen 4sp. Gentianen. Arten von *Eronymus* u. *Thesium*, *Cardamine hirsuta*.

ZWEIWEIBIGE, DIGYNIA.

HYPECOUM. K. 2blättrig, hinfällig. Blkr. 4blättrig.

BUFFONIA. K. 4blättrig, bleibend. Blkr. 4blättrig. Kapsel 2 klappig, 2samig.

VIERWEIBIGE, TETRAGYNIA.

ILEX. K. 4zählig. Blkr. 4th. Gf. fehlend. Fruchtkn. 4fächerig.

RADIOLA. K. 4 sp., mit 2-3sp. Zpfln. Blkr. 4blättrig. Fruchtkn. 8fächerig.

TILLAEA. K. 3-4th. Blkr. 3-4blättrig. Kapseln 3-4, zweisamig.

BULLIARDA. K. 4th. Blkr. 4blättrig. Kapseln 4, vielsamig.

POTAMOGETON. P. 4th. Steinfrüchte 4, sitzend.

Zur Tetragynia: *Sagina*, *Moenchia*, *Cuscuta*. Mehrere Gentianen.

V. CL. FUENFMAENNIGE, PENTANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

I. Bth. vollst., Iblättrig, unterst.

A. Nüsse 4, 1samig, od. 2, jede 2samig.

a. Fruchtkn. I., mit 4 Näthen, bei der Reife aber in 4, an der Basis flache, Nüsse zerfallend.

HELIOTROPIUM. Blkr. trichterf., Schlund offen, Saum faltig.

b. Nüsse 4, mit dem Rücken an den bleibenden Gf. angewachsen.

ASPERUGO. Nüsse zsgedrückt, mit der schmälern Seite an den Gef. angewachsen. Fruchtkn. flach-zsgedrückt.**ECHINOSPERMUM.** Nüsse 3eckig, am Rande weichstachelig.**CYNOGLOSSUM.** Nüsse platt-gedrückt, weichstachelig.**OMPHALODES.** Nüsse platt-gedrückt, mit einem häutigen, an der Spitze zsgezogen u. einwärtsgebognen Rande umzogen.

c. Nüsse 4, der unterweibigen Scheibe eingefügt, an der Basis mit einem gedunsenen, gerieften Ringe versehen u. innerhalb des Ringes ausgehöhlt.

BORAGO. Blkr. radf.; Deckklappen kurz, ausgerandet.**ANCHUSA.** Blkr. trichterf.; Röhre gerade; Schlund dch stumpfe Deckklappen verengert.**LYCOPSIS.** Blkr. trichterf.; Röhre einwärtsgebrochen- gekrümmt; Schlund dch stumpfe Deckklappen verengert.**NONNEA.** Blkr. trichterf.; Schlund offen, bärtig od. mit kleinen haarigen Deckklappen besetzt.**SYMPHYTUM.** Blkr. walzlich-glockig; Deckklappen 5, pfriemlich, in einen Kegel zsneigend.

d. Nüsse 4, der unterweibigen Scheibe eingefügt, an der Basis nicht ausgehöhlt.

ONOSMA. Blkr. walzlich-glockig. Deckklappen fehlend. Stbk. pfeiff., an der Basis zshängend. Nüsse 4, einsamig.**CERNTHE.** Blkr. walzlich-glockig. Deckklappen fehlend. Stbk. pfeiff., an der Basis zshängend. Nüsse 2, jede zweisamig.**ECHIUM.** Blkr. glockig od. allmählig erweitert. Deckklappen fehlend. Stbk. oval, frei.**PULMONARIA.** Blkr. trichterf., im Schlunde behaart. Deckklappen fehlend. K. 5sp.**LITHOSPERMUM.** Blkr. trichterf.; Schlund dch 5 behaarte Falten etwas verengert. K. 5zählig.**MYOSOTIS.** Blkr. Schlund dch kahle Deckklappen verengert. Nüsse unberandet.**ERITRICHIUM.** Blkr. Schlund dch kahle Deckklappen verengert. Nüsse mit einem hervorspringenden Rande umgeben.

B. Kapsel 1fächerig, 1samig.

PLUMBAGO. Blkr. trichterf.

B*

C. Kapsel 1fächerig, mit einem freien mittelpunkt. Samenträger.

a. Blkr. Zpfl. am Ende der Röhre zurückgeknickt.

504 CYCLAMEN. Blkr. Röhre glockig; Zpfl. des Saumes zurückgeknickt.

b. Blkr. trichterf. od. tellerf. K. 5sp. od. 5 zählig.

505 ANDROSACE. Blkr. Röhre eyf., an der Spitze verengert. Stbg. frei.

506 PRIMULA. Blkr. Röhre walzlich od. keulig. Stbg. frei; Eychen sehr viele.

507 ARETIA. Blkr. Röhre keulig. Stbg. frei. Eychen 3.

508 CORTUSA. Blkr. Röhre kurz, walzlich. Stbg. am Grunde dch. einen Ring verbunden.

c. Blkr. trichterf. od. tellerf. K. 5th.

509 LYSIMACHIA. Blkr. radf., 5th.; Kapsel 5klappig.

510 ANAGALLIS. Blkr. radf., 5th.; Kapsel ringsum aufspringend.

511 HOTTONIA. Blkr. tellerf.; Röhre walzlich; Saum flach, 5th.

512 SOLDANELLA. Blkr. trichterf.; Röhre kurz; Saum in zahlreiche Zpfl. gespalten.

D. Fruchtkn. 1 fächerig; Samenträger 2, wandst.

513 MENYANTHES. Blkr. trichterf. N. ungeth.

514 LIMNANTHEMUM. Blkr. radf. N. 2th.

E. Kapsel 2-5fächerig.

515 ERYTHRAEA. Blkr. trichterf. od. tellerf. Stbk. nach dem Verblühen schraubenf.-gedreht.

516 POLEMONIUM. Blkr. radf. N. 3.

517 CONVULVULUS. Blkr. trichterf.-glockig, faltig, 5kantig. Fächer des Fruchtkn. 2eyig.

518 DATURA. Blkr. trichterf., faltig, 5kantig. K. abfällig, mit einer bleibenden, ringsum abgesprungenen Basis.

519 NICOTIANA. Blkr. trichterf., faltig, 5kantig. K. bleibend. Fächer des Fruchtkn. vieleig.

520 HYOSCYAMUS. Blkr. trichterf. Kapsel bauchig, in einen Hals verschmälert, mit einem Deckelchen aufspringend.

521 SCOPOLINA. Blkr. röhrig-glockig. Kapsel ringsum aufspringend.

522 VERBASCUM. Blkr. radf.; Stbk. auf die verbreiterte Spitze der Stbf. quer aufgewachsen.

AZALEA. Blkr. glockig. Stbg. vor eine unterweibige Scheibe, nicht aber in der Blkr. eingefügt.

F. Frucht aus 2 Balgkapseln bestehend. Fruchtkn. 2, mit einem den beiden gemeinschaftlichen Gf.

523 VINCA. Blkr. tellerf., mit schief-abgeschnittenen Zpfln, im Schlunde nackt.

524 NERIUM. Blkr. trichterf., mit schief-abgestutzten Zpfln u. einer geschlitzten Krone im Schlunde.

G. Frucht eine Beere.

LYCIUM. Blkr. trichterf. Fruchtrager K. klein, an die Basis der Beere angedrückt.

ATROPA. Blkr. glockig. Beere auf einem grossen Fruchtk. sitzend.

PHYSALIS. Blkr. radf. Stbk. der Länge nach aufspringend.

SOLANUM. Blkr. radf. Stbk. an der Spitze mit 2 Oeffnungen aufspringend.

II. Bth. vollst., 1blättrig, oberst.

A. Kapselfrucht.

SAMOLUS. Stbg. 10, von diesen 5 fruchtbar. Fruchtkn. 1fächerig.

LOBELIA. Stbk. verwachsen. Blkr. auf einer Seite der Länge nach gespalten.

JASIONE. Blkr. Zpfl. lineal., verwachsen, zuletzt von der Basis an sich lösend. Stbf. pfriemlich. Stbk. zshängend.

PHYTEUMA. Blkr. Zpfl. lineal., verwachsen, zuletzt v. der Basis an sich lösend. Stbf. an der Basis verbreitert. Stbk. frei.

CAMPANULA. Blkr. 5lappig od. 5sp., oft glockig, die oberweibige Scheibe flach. Kapsel kreiself., mit 3-5 Löchern aufspringend.

ADENOPHORA. Die oberweibige Scheibe um den Gf. in Gestalt eines Röhrchens erhöht; sonst alles, wie bei Campanula.

SPECULARIA. Blkr. radf. Kapsel lineal.-länglich, prismatisch, mit Seitenritzen aufspringend.

WAHLENBERGIA. Blkr. glockig od. trichterf., Kapsel an der Spitze in 3-5 scheidewandtragende Klappen aufspringend.

EDRAJANTHUS. Blkr. glockig. Kapsel 2-3fächerig, an der Spitze innerhalb des K. unregelmässig aufspringend.

B. Beerenfrucht.

LONICERA. Blkr. unregelmässig. Beere 2-3fächerig.

III. Bth. vollst., vielblättrig, unterst.

a. Bth. unregelmässig.

IMPATIENS. K. 3blättrig, das unpaarige Blatt viel grösser, gespornt. Blkr. 3blättrig.

VIOLA. K. 5blättrig. Blkr. 5blättrig.

b. Bth. regelmässig.

AMPELOPSIS. Blb. 5, dem Fruchtb. eingefügt, von der Spitze zur Basis auseinander tretend.

VITIS. Blb. 5, dem Fruchtb. eingefügt, an der Spitze zshängend u. wie eine Haube an der Basis sich ablösend.

EVONYMUS. Blb. 4-5, dem K. eingefügt. Stbg. 4-5, mit den Blb. abwechselnd, einer drüsigen Scheibe eingesetzt.

RHAMNUS. Blb. 4-5, dem K. eingefügt. Stbg. vor die Blb. gestellt, beim männlichen Geschlecht oft sehr klein od. fehlend. Steinfrucht mit mehreren knorpeligen Steinen.

ZIZYPHIUS. Steinfrucht saftig, flügellos; der Stein 2-3fächerig; sonst alles, wie bei Rhamnus.

PALIURUS. Steinfrucht trocken, mit einem kreisrunden Flügel umzogen; der Stein 2-3fächerig; sonst alles, wie bei Rhamnus.

IV. Bth. vollst., vielblättrig, oberst.

RIBES. Blb. u. Stbg. dem Ksaume eingefügt. Blb. benagelt.

315 HEDERA. Blb. u. Stbg. vor eine oberweibige Scheibe eingefügt. Blb. mit breiter Basis sitzend.

V. Bth. unvollst., unterst.

a. Stbg. 10, von diesen 5 unfruchtbar.

317- HERNIARIA. P. 5th., mit flach-concaven Zpfln. Hautfrucht ohne Ansatz zu einem Deckelchen.

318 PARONYCHIA. P. 5th., mit flach-concaven Zpfln. Hautfrucht mit einem angewachsenen Deckelchen. N. ungeth.

319 ILLECEBRUM. P. 5th., mit verdickten, v. der Seite her zsgedrückten Zpfln, deren innere Oberfläche schmal ist.

b. Stbg. 5.

320 GLAUX. P. glockig, 5lappig, farbig. Fruchtkn. 5fächerig.

321 CERATONIA. K. 5th. Blkr. fehlend. Hülse vielsamig.

VI. Bth. unvollst., oberst.

322- THESIIUM. P. bleibend. Stbg. dem P. eingefügt, von einem Haarbüschel eingeschlossen.

Zur Monogynia: *Rubia*. *Crucianella*. Arten v. *Polygonum* u. *Gentiana*.

ZWEIWEIBIGE, DIGYNIA.

I. Bth. unvollständig.

ULMUS. P. 4-5zählig. Fruchtkn. 2fächerig. Nuss dch Fehlschlagen 1fächerig, mit einem Flügel umzogen

CELTIS. P. 5-6th. Steinfrüchte mit einem knöchernen, 1samigen Steine.

CORISPERMUM. P. fehlend, od. in 2 durchsichtigen Schüppchen vorhanden. Nuss mit einem Flügel umzogen.

BETA. P. 5sp., an der Basis in ein, den Fruchtkn. einschliessendes Röhrchen zsggezogen.

SALSOLA. P. 5th., zuletzt auf dem Rücken mit einem quergestellten Anhängsel. Keim schraubenf.

KOCHIA. P. 5th., zuletzt auf dem Rücken mit einem Flügel od. einer Querfalte bezeichnet. Keim ringf.

SCHIOBERIA. P. 5th., ohne Anhängsel. Keim schraubenf.

CHENOPODIUM. P. 5th., ohne Anhängsel. Keim ringf. S. alle wagerecht.

BLITUM. P. 3-5th., ohne Anhängsel. S. alle aufrecht, od. wagerechte darunter gemischt

II. Bth. vollst., 1blättrig, unterst.

- a. Fruchtkn. 2, mit einem einzigen seitenst. Samenträger.
Eine den zwei Fruchtkn. gemeinschaftliche N.

70 - CYNANCHUM. Krone der Stbg. 1blättrig, 5lappig.

25 - APOCYNUM. Fünf spitze Zähne in der Röhre der Blkr.

- b. Fruchtkn. 1, mit 2 gegenst. Samenträgern.

4 - SWERTIA. Blkr.Zpfl. an der Basis mit 2, am Umfange fransigen, Honiggruben versehen.

26 - LOMATOGONIUM. Blkr.Zpfl. ohne Honiggrube. Gf. fehlend. N. kurz, auf den Klappenrändern mit Papillen hinabziehend

5 - GENTIANA. Blkr.Zpfl. ohne Honiggruben Gf. 2, od. 1 mit 2 N.

- c. Fruchtkn. 1. Eychen wenige, auf dem Grunde des Fruchtkn. eingefügt.

25 - CUSCUTA. Blkr. 4-5sp. Kapsel ringsum aufspringend.

III. Bth. 5blättrig, oberst. (Umbelliferen.) — 225

- a. Bth. in einem Köpfchen oder in einer einfachen Dolde.

26 - HYDROCOTYLE. Blb. ungeth., spitz. Frucht v. der Seite her flach-zsgedrückt, beiderseits auf dem Mittelfelde mit 2 bogigen Riefen.

8 - ERYNGIUM. Blb. aufrecht, zsneigend, v. der Mitte an in ein Läppchen v. der Länge des Blb. eingeknickt. Früchtchen riefenlos, beschuppt oder mit Knöthen besetzt.

27 - ASTRANTIA. Früchtchen mit 5 erhabenen, faltig-gezähnten Riefen. Blb. wie die Eryngium.

27 - HACQUETIA. Früchtchen glatt, mit 5 fädlichen, inwendig von einem Kanale durchbohrten Riefen. Blb. wie bei Eryngium.

B. Dolde zsgesetzt.

- A. Eyweiss vorne flach od. convex. Hauptriefen 5, fädlich; Nebenriefen fehlend. Frucht v. der Seite her deutlich zsgedrückt.

- a. Blb. ganz.

35 - BUPLEURUM. Blb. an der Spitze abgeschnitten, eingerollt.

7 - HELOSCIADIUM. Blb. in einem Stern ausgebreitet, spitz oder stumpflich, aber mit einem kleinen, geraden od. einwärtsgebogenen Spitzchen.

10 - APIUM. Blb. in einen Stern ausgebreitet, rundlich, mit einem dicht eingerollten Spitzchen.

30 - TRINIA. Blb. d. r männlichen Bth. lanzettl., einwärtsgebogen. Riefen des Früchtchens v. einem Kanale durchbohrt.

30 - PETROSELINUM. Blb. rundlich, einwärtsgekrümmt, ganz, in ein einwärtsgebogenes Läppchen verschmälert. Thälchen Istriemig.

- b. Blb. verkehrtherzf., mit einem kleinen, einwärtsgebogenen Läppchen. KRand unmerklich.

37 - AMMI. Blb. unregelmässig.

33 - AEGOPODIUM. Blb. regelmässig Striemen fehlend.

- SISON. Blb. regelmässig. Striemen keulig.
 BUNICUM. Blb. regelmässig. Gf. zurückgebogen. Frucht länglich, mit 3striemigen Thälchen. Striemen fädlich.
 CARUM. Blb. regelmässig. Gf. zurückgebogen. Frucht länglich, mit 1striemigen Thälchen; Striemen fädlich.
 PIMPINELLA. Blb. regelmässig. Gf. haarfein, abstehend. Frucht 2knotig; Thälchen 3striemig; Striemen fädlich.

c. Blb. verkehrtherzf., mit einem kleinen einwärtsgebogenen Läppchen. K. 5zähmig.

aa. Thälchen 1striemig.

CICUTA. Eyweiss im Querdurchschnitte kreisrund. Frucht zweiknotig.

PTYCHOTIS. Eyweiss vorne flach. Läppchen der Blb. v. einer Querfalte ausgehend.

FALCARIA. Eyweiss vorne flach; Läppchen aus der Ausrandung der Blb. hervortretend.

bb. Thälchen 3striemig.

BERULA. Striemen mit dem rindigen Fruchtgehäuse bedeckt.

SIUM. Striemen oberflächlich.

B. Eyweiss vorne flach od. convex. Hauptriefen 5, fädlich, od. geflügelt; Nebenriefen fehlend. Frucht auf dem Querschnitte stielrund, od. vom Rücken her zsgedrückt, aber nicht linsenf. zsgedrückt.

a. Same frei in der Höhle des Fruchtgehäuses.

CRITHMUM. Riefen geflügelt, die seitenst. kaum breiter.

ARCHANGELICA. Die seitenst. Riefen in einen Flügel, von der doppelten Breite der Rückenriefen verbreitert.

b. Same nur in den Thälchen an das Fruchtgehäuse angewachsen.

OSTERICUM. Riefen hohl.

c. Same überall an das Fruchtgehäuse angewachsen. Blb. ganz, spitz od. zugespitzt.

MEUM. Riefen geschärft, gleich.

ANGELICA. Die seitenst. Riefen einen Flügel, v. der doppelten Breite der rückenst. bildend.

d. Same an das Fruchtgehäuse angewachsen. Blb. aufrecht, v. der Mitte an in ein Läppchen v. der Länge des Blblattes eingeknickt.

SANICULA. Frucht mit hakigen Stacheln dicht-bedeckt.

e. Same an das Fruchtgehäuse angewachsen. Blb. rundlich, ganz, eingerollt.

FOENICULUM. Läppchen fast 4eckig, gestutzt.

f Same an das Fruchthäuse angewachsen. Blb. rundlich, verkehrtherzf. od. verkehrtherzf., mit einem einwärtsgebogenen Läppchen.

aa. Thälchen striemenlos.

g GAYA. Riefen geflügelt.

bb. Thälchen Istriemig. KRand unmerklich.

h LEVISTICUM. Die seitenst. Flügel der Frucht noch einmal so breit, als die rückenst. Riefen. Blb. rundlich, einwärts gekrümmt, in ein Läppchen verschmälert.

SELINUM. Die seitenst. Flügel der Frucht noch einmal so breit, als die rückenst. Riefen. Blb. verkehrtherzf.

i AETHUSA. Riefen dick, erhaben, scharf-gekielt, die seitenst. ein wenig breiter.

j CNIDIUM. Riefen geflügelt, fast häutig, gleich.

cc. Thälchen Istriemig. KRand gezähnt.

k OENANTHE. Gf. aufrecht. Fruchträger angewachsen.

l SESELI. Gf. zurückgebogen. Fruchträger frei. KZähne 3eckig. (Thälchen 1-3striemig.)

LIBANOTIS. Gf. zurückgebogen. Fruchträger frei. KZähne pfriemlich, verlängert.

dd. Thälchen 3striemig. (Hieher gehören einige Arten von Seseli.)

m CONIOSELINUM. Riefen geflügelt, die randst. Flügel noch einmal so breit, als die rückenst.

ATHAMANTA. Riefen fast gleich, Gf. aufrecht.

n TROCHISCANTHES. Riefen fast gleich, Gf. zurückgebogen. Blb. lang-benagelt, spatelig, mit einem kurzen einwärts gekrümmten Läppchen.

o LIGUSTICUM. Riefen fast gleich. Gf. zurückgebogen. Blb. verkehrtherzf.

p SILAUS. Riefen fast gleich. Gf. zurückgebogen. Blb. mit breiter Basis sitzend.

q C. Eyweiss vorne flach od. convex. Hauptriefen fädlich; Nebenriefen fehlend. Frucht vom Rücken her flach- od. linsenf.-zsgedrückt, mit einem geflügelten, spitzen od. verdickten Rande umzogen.

a. Striemen in grosser Menge, das ganze Eyweiss dicht bedeckend.

r 2-FERULAGO. Die Rückenstriemen von dem Fruchthäuse bedeckt.

b. Striemen oberflächlich, 1-2 in jedem Thälchen.

aa Riefen sehr fein, die 3 rückenst. gleichweit-abstehend, die seitenst. entfernt, den verbreiterten Rand berührend od. von diesem bedeckt.

s 3-TORDYLIUM. Blb. verkehrtherzf.; Striemen fädlich. Frucht-rand verdickt.

HERACLEUM. Blb. verkehrtherzf. Striemen keulig. Frucht-
rand abgeflacht.

PASTINACA. Blb. eingerollt. Striemen fädlich.

bb. Riefen fädlich, gleichweit-abstehend.

ANETHUM. Blb. abgeschnitten, dicht-eingerollt.

IMPERATORIA. Blb. verkehrtherzf. KRand unmerklich.

PEUCEDANUM. Blb. verkehrtherzf. od. rundlich in ein Lappchen
verengert, flach od. etwas einwärtsgekrümmt. Die Fugenstriemen
oberflächlich.

TOMMASINIA. Blb. eingerollt, ausserdem wie Peucedanum.

THYSSELINUM. Die Fugenstriemen vom Fruchtgehäuse bedeckt;
sonst alles, wie bei Peucedanum.

D. Eyweiss vorne flach. Frucht vom Rücken her mehr od.
weniger zsgedrückt. Hauptriefen 5; Nebenriefen 4.

SILER. Früchtchen mit erhabenen, fädlichen Riefen; die 4 Neben-
riefen weniger hervortretend.

LASERPITUM. Früchtchen mit fädlichen Hauptriefen; die Neben-
riefen geflügelt, die Flügel ungeth.

DAUCUS. Früchtchen mit fädlichen, borstigen Hauptriefen; Neben-
riefen 1reihig-stachelig.

ORLAYA. Früchtchen mit fädlichen, borstigen Hauptriefen; Neben-
riefen 2-3reihig-stachelig.

E. Eyweiss eingerollt od. vorne mit einer tiefen Furche ein-
geschnitten.

a. Früchtchen stachelig.

CAUCALIS. Früchtchen mit 4, 1-3reihig-stacheligen Riefen.

TURGENIA. Früchtchen mit 7, 2-3reihig-stacheligen Riefen.

TORILIS. Früchtchen auf dem Rücken dicht-stachelig, mit 3 da-
zwischen liegenden Reihen v. Börstchen.

b. Früchtchen nicht stachelig, aber manchmal mit börstchen-
tragenden Knötchen bestreut. Riefen plattgedrückt, stumpf,
nicht gekerbt, bisweilen fehlend.

ECHINOPHORA. Riefen 5, plattgedrückt, wellig-gerillt.

Frucht in dem hohlen Fruchtb. eingeschlossen, nur mit dem
Schnabel hervortretend.

ANTHRISCUS. Früchtchen riefenlos; Schnabel 5riefig.

SCANDIX. Früchtchen mit 5 stumpfen Riefen. Frucht sehr lang-
geschnäbelt.

CHAEROPHYLLUM. Früchtchen mit 5 stumpfen Riefen, Frucht
schnabellos, Gf. fädlich

PHYSOCAULUS. N. auf der Spitze des Stempelpolsters sitzend.
Gf. fast ganz fehlend. Ausserdem wie Chaerophyllum.

c. Früchtchen nicht stachelig. Riefen spitz od. geflügelt,
nicht gekerbt.

MALABAILA. Same am Rande eingerollt, frei in der Höhle des
Fruchtgehäuses.

MYRRHIS. Same eingerollt. Riefen hohl.

BIASOLETTIA. Same an das Fruchtgehäuse angewachsen, vorne
mit einer tiefen Furche eingeschnitten. Blb. verkehrteyf.

391 - MOLOPOSPERMUM. Same an das Fruchthäuse angewachsen, 4 seitig, auf der auf der Fuge liegenden Kante dch eine tiefe Furche eingeschnitten. Blb. lanzettl., lang zugespitzt.

SMYRNIUM. Same an das Fruchthäuse angewachsen, eingerollt. Blb. lanzettl., zugespitzt.

d. Früchtchen nicht stachelig; Riefen erhaben, gekerbt.

22 - CONIUM. Riefen 5, hervortretend, wellig - gekerbt, inwendig nicht hohl.

PLEUROSPERMUM. Riefen 5, hohl.

E. Eyweiss od. Same auf dem Rücken halbkugelig convex, vorne concav.

CORIANDRUM. Frucht kugelig, mit 10 südlichen Riefen, u. eben so vielen dazwischen liegenden schlingeligen.

BIFORA. Frucht 2knotig; Früchtchen kugelig - bauchig, mit 5 eingedrückten, schwachen Rillen. Fuge mit 2 Oefnungen.

Zur Digynia: *Herniaria*, *Polycnemum*, *Zizyphus*.

DREIWEIBIGE, TRIGYNIA.

a. Bth. vollst., unterst.

14 - RHUS. K. 5th. Steinfrucht mit einer Isamigen Nuss.

170 - STAPHYLEA. K. 5th. Kapseln 2-3, aufgeblasen, an der Basis zsgewachsen. Samen knöchern.

711 - TAMARIX. K. 5th. Gf. 3, abstehend, in die N. verbreitert.

Kapsel 1fächerig. Samen mit einem sitzenden Schopfe.

295 - CORRIGIOLA. K. 5th. N. 3, sitzend. Kapsel Isamig, nicht aufspringend.

218 - TELEPHIUM. K. 5th. Gf. südlich. Kapsel 3klappig, an der Basis 3fächerig. Samen mehrere.

24 - DRYPIS. K. röhrig, 5zählig, Kapsel ringsum aufspringend.

b. Bth. vollst., oberst.

311 - VIBURNUM. Blkr. radf. od. röhrig. Beere Isamig.

317 - SAMBUCUS. Blkr. radf., zuletzt rückwärtsgebogen. Beere 3samig.

Zur Trigynia: *Paliurus*.

VIERWEIBIGE, TETRAGYNIA.

PARNASSIA. Nebenkronen 5blättrig, drüsig - fransig.

FÜNFWEIBIGE, PENTAGYNIA.

SIBBALDIA. Fruchtkn. 5, frei. K. 10sp.

CRASSULA. Fruchtkn. 5, an der Basis verwachsen. K. 5sp.

LINUM. Fruchtkn. 1, 10fächerig.

DROSER. Fruchtkn. 1, 1fächerig, mehreyig. K. 5sp.

STATICE. Fruchtkn. 1, 1eig. K. mit einem trockenhäutigen Saume.

Zur Pentagynia: Arten v. *Cerastium* u. *Spergula*.

VIELWEIBIGE, POLYGYNIA.

Zu dieser Ordnung: *Myosurus*.

VI. CL. SECHSMAENNIGE, HEXANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

I. Bth. vollst.

BERBERIS. K. 6blättrig, unterst.

PEPLIS. K. 12zählig, unterst. Bth. schnell abfallend.

LOBANTHUS. K.: ein etwas hervortretender oberständiger Rand.

II. Perig. blumenkronenartig, oberst.

STERNBERGIA. P. trichterf., mit 6th. Saume. Stbf. in die Spitze der Röhre eingefügt, gerade.

AGAVE. P. trichterf., 6th., an der Basis röhrig. Stbg. in die Röhre eingefügt, vor der Bthezeit einwärtsgebogen.

LEUCOJUM. P. glockig, bis zur Basis 6th., mit gleichen Zpfln.

GALANTHUS. P. glockig, bis zur Basis 6th., die innern Zpfl kürzer, ausgerandet.

NARCISSUS. P. tellerf. Stbg. nebst der glockigen Nebenkrone dem Schlunde eingefügt.

III. P. blumenkronenartig, 6zählig od. 6sp., unterst.

HEMEROCALLIS. P. trichterf. Stbg. abwärts geneigt.

CONVALLARIA. P. glockig od. röhrig, halb 6sp. od. 6zählig. Beerenfrucht.

ENDYMION. P. glockig, 6sp. Kapsel Frucht.

MUSCARI. P. kugelig od. walzlich, an der Mündung verengert, mit einem sehr kurzen, 6zähligen Saume.

IV. P. blumenkronenartig, 6blättrig, unterst.

A. Cf. an der Spitze 3sp.

ASPARAGUS. P. an der Basis in ein mit dem Bthstiele gegliedertes Stielchen zsggezogen.

FRITILLARIA. B. des P. an der Basis mit einer Honiggrube versehen.

ERYTHRONIUM. Die 3 untern B. des P. an der Basis 2schwielig.

BULBOCODIUM. B. des P. lang-benagelt; Nägel in eine Röhre zneigend, an der Spitze dch. seitenst. Zähne verbunden.

B. Gf. an der Spitze ungeth. od. fehlend. N. stumpf od. 3lappig.

a. Stbk. aufrecht. (mit ihrer Basis auf die Spitze des Stbf. gestellt.)

38. **STREPTOPUS.** Die drei äussern B. des P. an der Basis sackartig-konkav. Gf. fädlich. Beerenfrucht.

4. **GAGEA.** B. des P. an der Basis gleich. Gf. fädlich. Kapselfrucht.

42. **TULIPA.** B. des P. an der Basis glatt. Stbg. dem Fruchtboden eingefügt. Gf. fehlend.

b. Stbk. aufliegend. B. des P. an der Basis mit einem Honigbehälter versehen.

43. **LILIUM.** B. des P. an der Basis mit einer honigtragenden Längenfurche.

44. **LLOYDIA.** B. des P. an der Basis mit einer honigtragenden Querspalte.

c. Stbk. aufliegend. Honigbehälter fehlend. P. an der Basis in ein mit dem Bthstiel gegliedertes Stielchen zsggezogen.

45. **ASPHODELUS.** Fruchtkn. mit den an der Basis verbreiterten Stbg. bedeckt.

45. **ANTHERICUM.** Fruchtkn. nicht bedeckt; Stbg. pfriemlich.

d. Stbk. aufliegend. Honigbehälter fehlend. P. an der Basis nicht in ein gegliedertes Stielchen zsggezogen.

52. **ALLIUM.** Dolde vor der Blthezeit mit einer Blumenscheide bedeckt.

6. **NARTHECIUM.** Blumenscheide fehlend. Stbf. bärtig. Gf. 3seitig.

6. **PARADISIA.** Bl. Scheide fehlend. Stbf. kahl, auf dem ein wenig erhabenen Fruchtb. eingefügt. Gf. 3seitig.

7. **ORNITHOGALUM.** Bl. Scheide fehlend. Stbg. dem Fruchtb. vor den PBlättern eingefügt. Gf. 3seitig.

SCILLA. Bl. Scheide fehlend. Stbg. auf der Basis der Blb. eingefügt. Gf. 3seitig.

V. P. kelchartig. (durchsichtig od. trockenhäutig.)

JUNCUS. Gf. mit 3 fädlichen N.; Kapsel vielsamig.

LUZULA. Gf. mit 3 fädlichen N.; Kapsel 3samig.

ACORUS. Gf. fehlend. N. stumpf, sitzend.

Zur Monogyn.: *Elaeagnus. Lythrum Hyssopifolia.*

ZWEIWEIBIGE, DIGYNIA.

OXYRIA. P. 4blättrig.

Zur Digyn.: *Celtis.*

DREIWEIBIGE, TRIGYNIA.

a. P. 1blättrig.

COLCHICUM. P. trichterf., mit verlängerter Röhre.

b. P. 6blättrig.

VERATRUM. Stbk. quer in ein Schlüsselchen aufspringend.

Fruchtkn. 3, in den Gf. verschmälert, an der Basis verwachsen.

TOFIELDIA. Stbk. der Länge nach aufspringend. Fruchtk. 3,

in den Gf. verschmälert, bis zur Mitte verwachsen.

SCHEUCHZERIA. Fruchtkn. 3. Gf. fehlend. N. auf der Spitze

der Fruchtkn. auswärts schief-aufgewachsen.

TRIGLOCHIN. Fruchtkn. 3-6, zuletzt v. der Basis an sich ab-

lösend; Gf. fehlend. N. federig.

24 RUMEX. Fruchtkn. 1. Gf. 3. N. federig.

Zur Trigyn.: *Elatine hexandra*.

SECHS - VIELWEIBIGE, HEXA - POLYGYNIA.

ALISMA. K. 3blättrig. Blkr. 3blättrig.

Zu dieser Ordnung *Triglochlin maritimum*.

VII. CL. SIEBENMAENNIGE, HEPTANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

TRIENTALIS. K. 7sp. Blkr. 7th. Stbg. der Blkr. eingefügt.

AESCULUS. K. 5zählig. Blb. 5, ungleich.

VIII. CL. ACHTMAENNIGE, OCTANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

A. Bth. vollständig, 5blättrig.

ACER. K. 5th. Blkr. 5blättrig. Frucht 2flügelig.

B. Bth. vollständig, 4blättrig.

244 OENOTHERA. KSaum 4th. Blb. 4, dem K. eingefügt. S.

nackt.

208 EPILOBIUM. KSaum 4th. Blb. 4, dem K. eingefügt. S.

schopfig.

68 RUTA. K. 4th., bleibend. Blb. 4, dem Fruchtb. eingefügt.

Honiggruben 8, in die unterweibige Scheibe eingegraben.

C. Bth. vollständig, 1blättrig, unterst.

CHLORA. K. Ssp. Blkr. tellerf., Ssp. Stbg. der Blkr. Röhre

eingefügt.

DIOSPYROS. K. 4sp. Blkr. 4sp. Bth. vielchig.

262 CALLUNA. K. 4blättrig. Blkr.Saum 4sp. Scheidewände an

das Samensäulchen angewachsen, den Näthen gegenst.

262 ERICA. K. 4blättrig. Blkr.Saum 4 sp. Scheidewände in die

Mitte der Klappen angewachsen.

D. Bth. vollständig, 1blättrig, oberst.

560 VACCINIUM. K. 4zählig, oberst. Stbg. am Rande der ober-

weibigen Scheibe eingefügt.

E. Bth. unvollständig, unterst.

DAPHNE. P. mit 4sp. Saume abfällig. Stbg. der Röhre eingefügt. N. 1.

PASSERINA. P. mit 4sp. Saume bleibend, verwelkend. Stbg. der Röhre eingefügt. N. 1.

POLYGONUM. P. 4-5th., bleibend. N. 2-3.

Zur Monogyn: *Monotropa*.

ZWEI-DREIWEIBIGE, DI-TRIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM. P. 4sp., halb oberst. Stbg. der oberweibigen Scheibe eingefügt. Kapsel vielsamig.

Zu dieser Ordnung: *Möhringia*. *Ulmus effusa*. Arten von *Polygonum*.

VIERWEIBIGE, TETRAGYNIA.

39 PARIS. K. 4blättrig. Blb. 4, schmaler, als die KB.

ADOXA. K. an der endst. Bth. 2sp., an den seitenst. 3sp. Die endst. Blkr. 4sp., die seitenst. 5sp.

5- ELATINE. K. 2-4sp. Blkr. 3-4blättrig.

IX. CL. NEUNMAENNIGE, ENNEANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

LAURUS. P. 4th. Die seitenst. Bth. 9männig, die endst. 12männig. Stbk. mit Klappen aufspringend.

SECHSWEIBIGE, HEXAGYNIA.

BUTOMUS. P. blumenkronenartig, 6blättrig. Kapseln 6, unterwärts zsgewachsen.

X. CL. ZEHNMAENNIGE, DECANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

A. Blkr. 5blättrig, selten 4blättrig.

DICTAMNUS. K. 5blättrig, abfällig. Fruchtkn. 5lappig, auf einem kurzen Fruchträger sitzend.

TRIBULUS. K. 4-5blättrig, abfällig. Drüsen 2, an der Basis der, mit den Blb. abwechselnden, Stbg.

MONOTROPA. K. 5blättrig. Blb. glockig zsgestellt, an der Basis höckerig. Drüsen 5, unterweibig.

LEDUM. K. 5zählig, bleibend. Stbg. am Rande der unterweibigen, gekerbten Scheibe eingefügt.

PYROLA. K. 5sp., bleibend. Unterweibige Drüsen fehlend. Stbk. mit 2 Löchern aufspringend,

CERCIS. K. glockig. Blkr. schmetterlingsf.

B. Blkr. 1blättrig.

RHODODENDRON. K. 5th. Blkr. trichter- od. radf. Die Scheide wände aus den einwärtsgebogenen Klappenrändern gebildet.

ANDROMEDA. K. 5 sp. Blkr. glockig, cyl. od. fast kugelig. Die Scheidewände auf der Mitte der Klappen angeheftet.

571- ARBUTUS. Beere 4-5fächerig; Fächer 4-5samig; sonst alles, wie bei Andromeda.

551- ARCTOSTAPHYLOS. Steinfrucht 5steinig; Steine 1samig; sonst alles, wie bei Andromeda.

Zur Monogyn: *Ruta*. *Chrysosplenium*. *Erodium* *Geranium*.

ZWEIWEIBIGE. DIGYNIA.

SAXIFRAGA. K. 5zählig od. 5th. Kapsel 2schnäbelig, mit einem Loche aufspringend.

ZAHNBRUCKNERA. Blb. von derselben Substanz wie die KZähne, alles andere wie bei Saxifraga.

107- GYPSOPHILA. K. 5zählig, an der Basis nackt. Blb. aus dem Nagel allmählich verbreitert. Kapsel 4klappig. S. nierenf.-kugelig.

22- TUNICA. K. 5zählig, an der Basis mit Schuppen gestützt. Blb. aus dem Nagel allmählich verbreitert. Kapsel 4klappig. S. schildf.

102- DIANTHUS. K. 5 zählig, an der Basis mit Schuppen gestützt. Blb. plötzlich in dem Nagel zsgezogen. Kapsel 4klappig. S. schildf.

115- SAPONARIA. K. 5 zählig, an der Basis nackt. Blb. plötzlich in den Nagel zsgezogen. Kapsel 4klappig. S. nierenf.-kugelig.

SCLERANTHUS. K. 5zählig. Blb. fehlend. Hautfrucht 1samig, in dem Grunde des bleibenden K.

Zur Digyn: *Moechringia*.

DREIWEIBIGE, TRIGYNIA.

A. K. 1blättrig.

110- CUCUBALUS. K. 5zählig. Blb. 5. Beere 1fächerig.

111- SILENE. K. 5zählig. Blb. 5. Kapsel an der Basis 3fächerig.

B. K. 5blättrig, (selten 4blättrig.) Blb. 3, selten 4.

112- CHERLERIA. Blb. ungeth. od. fehlend. Drüsen 2., lineal.-verlängert, an die Basis der äusseren Stbf. angewachsen. Kapsel 3klappig.

110- ALSINE. Blb. ungeth. od. seicht-angerandet. Die äusseren Stbf. an der Basis dch 2 kleine Drüsen gestützt. S. nierenf., flügellos. Kapsel 3 klappig.

111- LEPIGONUM. Blb. ungetheilt. Die äusseren Stbf. an der Basis dch 2 kleine Drüsen gestützt. S. 3eckig od. rundl.-verkehrt-cyl., flügellos od. mit einem Flügel umzogen. Kapsel 3klappig.

112- FACCHINIA. Blb. ungeth. Die äusseren Stbf. an der Basis von 2 kleinen Drüsen gestützt. S. nierenf., mit einer Krone von spreuartigen Haaren bewimpert. Kapsel 3klappig.

- HALIANTHUS.** Blb. ungeth. Die äusseren Stbf. an der Basis
 dch 2 eyf. Drüsen gestützt. S. eyf., auf dem Rücken höckerig-
 konvex, an der gegenüberliegenden Seite mit einer längl. Grube
 versehen. Kapsel 3klappig.
- MOEHRINGIA.** Blb. ungeth. od. seicht - ausgerandet. Kapsel
 4-6klappig. S. mit einem Anhängsel.
- ARENARIA.** Blb. ungeth. od. seicht - ausgerandet. Kapsel 6klappig.
 S. ohne Anhängsel, nierenf.
- HOLOSTEUM.** Blb. gezähnt. Kapsel 6klappig. S. schildf.
- STELLARIA.** Blb. tief-ausgerandet od. 2th. Kapsel 6klappig.

VIERWEIBIGE, TETRAGYNIA.

- MOENCHIA.** K. 4blättrig. Blb. 4, ungeth. Kapsel 8klappig.
 Zu dieser Ordnung: *Arten von Sagina.*

FUENFWEIBIGE, PENTAGYNIA.

- SAGINA.** K. 4-5blättrig. Blb. 4-5, ungeth. Kapsel 4-5klappig.
 S. nierenf., flügellos.
- SPERGULA.** K. 5blättrig. Blb. 5, ungeth. Kapsel 5klappig. S.
 kreisrund mit einem Flügel umgeben.
- MALACHUM.** K. 5blättrig. Blb. 5, 2sp. Kapsel 5klappig; Klap-
 pen 2sp.
- CERASTIUM.** K. 5blättrig. Blb. 5, ausgerandet od. 2sp. Kapsel
 an der Spitze 10klappig.
- OXALIS.** K. 5blättrig. Blb. 5. Stbg. an der Basis zsgewachsen.
 Kapsel an den Kanten aufspringend.
- SEDUM.** K. 5th. Blb. 5. Fruchtkn. 5, an der Basis zsge-
 wachsen.
- UMBILICUS.** K. 5th. Blkr. 1blättrig, 5sp. Fruchtkn. 5.
- LYCHNIS.** K. 5zählig. Blb. 5. Kapsel mit 5 od. 10 Zähnen auf-
 springend. N. an der inneren Seite mit Papillen besetzt, ausser-
 dem kahl.
- AGROSTEMMA.** K. 5zählig. Blb. 5. Kapsel 1. N. an der inne-
 ren Seite mit Papillen besetzt, ausserdem überall behaart.

Zur Pentagynia: *Moenchia.*

ZEHNWEIBIGE, DECAGYNIA.

- PHYTOLACCA.** P. 5blättrig. Beere oberst.

XI. Cl. ZWOELFMAENNIGE, DODE- CANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

ASARUM. P. 3sp., oberst.

PORTULACA. K. 2sp. Blkr. 5blättrig.

LYTHRUM. K. röhrig, 12zählig. Blkr. 6blättrig.

ZWEIWEIBIGE, DIGYNIA.

AGRIMONIA. K. unter dem Saume mit zahlreichen, hakigen Dornen.

AREMONIA. K. unter dem Saume mit 5 Zähnen versehen, die sich bei der Reife verlängern und in gerade, an den Saum angepasste Dornen verwandeln.

DREIWEIBIGE, TRIGYNIA.

RESEDA. Blb. unregelmässig. Kapsel an der Spitze offen.

ZWOELFWEIBIGE, DODECAGYNIA.

306. SEMPERVIVUM. Blb. 6 od. 12 und mehrere, mit der Basis der Stbg. in eine 1blättrige Blkr. zsgewachsen.

Zur Dodecandria: *Laurus*.

XII. Cl. ZWANZIGMAENNIGE, ICO- SANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

A. Bth. vollständig, oberst.

CACTUS. Blb. zahlreich. N. vielsp.

PHILADELPHUS. Blb. 4-5. Gf. 4sp.

293. MYRTUS. Blb. 5. G. 1; N. einfach. KZpfl in der Knospenlage dachig.

280. PUNICA. Blb. 5. Gf. 1; N. einfach. KZpfl in der Knospenlage klappig.

B. Bth. vollständig, unterst.

AMYGDALUS. Steinfrucht saftlos, bei der Reife unregelmässig-zerreissend.

PERSICA. Steinfrucht saftig, nicht aufspringend. Stein mit Furchen unregelmässig-durchzogen u. mit Löchern durchbohrt.

PRUNUS. Steinfrucht saftig, nicht aufspringend. Stein glatt od. unregelmässig mit Furchen durchzogen, aber ohne Löcher.

ZWEI - FUENFWEIBIGE, DI - PENTAGYNIA.

A. Bth. vollständig, oberst.

CRATAEGUS. Steinfrucht 1-5steinig, mit einer Scheibe, welche schmaler, als die Steinfrucht ist, endigend. Steine in das Fleisch eingesenkt.

MESPILUS. Steinfrucht 5steinig, mit einer verbreiterten Scheibe, welche fast die Breite der Steinfrucht hat, endigend. Steine in das Fleisch eingesenkt.

COTONEASTER. Steinfrucht 3-5steinig. Steine an den fleischigen K. angewachsen, an der Spitze nackt u. frei, unter sich zshängend, aber nicht in das Fleisch eingesenkt.

PYRUS. Kernfrucht 2-5fächerig; Fächer mit einer knorpeligen Haut bekleidet, 2samig.

CYDONIA. Kernfrucht 2-5fächerig; Fächer mit einer knorpeligen Haut bekleidet, vielsamig.

ARONIA. Die Fächer der Beere durch eine unvollständige Scheidewand 2sp.

SORBUS. Die Fächer der Beere ungetheilt.

B. Bth. vollständig, unterst.

SPIRAEA. K. 5sp. Kapseln mehre, 2-6 samig.

VIELWEIBIGE, POLYGYNIA.

A. K. 5-9sp., mit einreihigen Zpfln.

ROSA. Nüsse sehr viele, v. d. KRöhre, welche zuletzt eine falsche Beere darstellt, eingeschlossen.

RUBUS. Steinfrüchte sehr viele, auf einen kegelf. Fruchtb. eingefügt, in eine falsche Beere zsgewachsen.

DRYAS. Nüsse sehr viele, auf einen halbkugeligen Fruchtb. eingefügt, in einen bleibenden, federigen Gf. endigend.

B. K. 8-10sp., mit 2reihigen Zpfln, davon die äussern anhängself.

GEUM. Nüsse mit bleibendem Gf. begrannt.

FRAGARIA. Nüsse grannenlos, auf einen saftigen, meist abfälligen, Fruchtb. eingefügt.

COMARUM. Nüsse grannenlos, auf einen fleischig-schwammigen, sich vergrößernden Fruchtb. eingefügt.

POTENTILLA. Nüsse grannenlos, auf einen saftlosen Fruchtb. eingefügt. Blb. 5, selten 4.

Zur Polygyn: Arten von *Spiraea*.

XIII. CL. VIELMAENNIGE, POLYANDRIA.

EINWEIBIGE, MONOGYNIA.

A. Blkr. 4blättrig.

CHELIDONIUM. K. 2blättrig. Eychen an 2, zwischen den Klappen gelegene Samenträger angeheftet.

GLAUCIUM. K. 2blättrig. Eychen am Rande einer vollst. Scheidewand angeheftet.

PAPAVER. K. 2blättrig. Eychen an 4 od. mehrere unvollständ. Scheidewände angeheftet.

CAPPARIS. K. 4blättrig. Stbk. aufliegend, drehbar.

ACTAEA. K. 4blättrig. Stbk. an die verbreiterte Spitze der Stbf. angewachsen.

B. Blkr. 5blättrig.

TILIA. KB. in der Knospenlage klappig.

CISTUS. Die 3 innern KB. in der Knospenlage zsggerollt. Kapsel 5-10klappig.

HELIANTHEMUM. Die 3 innern KB. in der Knospenlage zsggerollt. Kapsel 3klappig.

C. Blkr. vielblättrig.

NYMPHAEA. Blb. ohne Honigbehälter.

NUPHAR. Blb. auf dem Rücken mit einem Honigbehälter.

ZWEI - VIELWEIBIGE, DI - POLYGYNIA.

A. Fruchtkn. mehr-vieleyig. Kapsel einwärts aufspringend.

a. Bth. unregelmässig.

DELPHINIUM. K. blumenkronenartig, das obere KB. gespornt.

ACONITUM. K. blumenkronenartig, das obere KB. gewölbt.

b. Bth. regelmässig, 4blättrig.

CIMICIFUGA. K. nebst der Blkr. hinfällig.

c. Bth. regelmässig, 5-mehrblättrig. K. krautig. Blb. grösser als der K., flach.

PAEONIA. Blb. 5 od. mehrere, ohne Honigbehälter.

d. Bth. regelmässig, 5-vielblättrig. K. blumenkronenf. Blb. honigbehälterf. od. fehlend.

AQUILEGIA. Blb. trichterf., abwärts gespornt.

NIGELLA. Platte der Blb. 2sp., an der Basis eine, mit einer Schuppe bedeckte, Honiggrube tragend.

TROLLIUS. Platte der Blb. lineal, an der Basis eine entblösste Honiggrube tragend.

HELLEBORUS. Platte der Blkr. röhrig. KB. bleibend.

ERANTHIS. Platte der Blb. röhrig. KB. abfällig. Fruchtkn. gestielt.

ISOPYRUM. Platte der Blb. an der Basis kappenf. KB. abfällig. Fruchtkn. ohne Stiel.

CALTHA. Blb. fehlend.

B. Fruchtkn. 1eyig. Früchtchen nussartig, nicht aufspringend.

a. K. in der Knospenlage dachig. Blkr. 5 - mehrblättrig.

ADONIS. Blb. ohne Honiggrube.

RANUNCULUS. Nagel der Blb. kürzer, als die Platte, od. sehr kurz, mit einer Honiggrube versehen. Fruchtkn. 1fächerig.

MYOSURUS. Nagel der Blb. fädlich, länger als die Platte, mit einer Honiggrube versehen. Fruchtkn. 1fächerig.

CERATOCEPHALUS. Nagel der Blb. mit einer Honiggrube versehen. Früchtchen mit 2 unfrucht. Fächern.

b. K. in der Knospenlage dachig, blumenkronenartig. Blkr. fehlend.

ANEMONE. Fruchtb. der Frucht vergrößert, kegel- od. halbkugelf.

THALICTRUM. Fruchtb. der Frucht ein kleines Scheibchen darstellend.

c. K. in der Knospenlage klappig, od. am Rande einwärtsgefaltet, blumenkronenartig.

CLEMATIS. Blb. fehlend.

ATRAGENE. Blb. sehr viele, kleiner, als der K.

XIV. CL. ZWEIMAECHTIGE, DIDYNAMIA.

NACKTSAMIGE, GYMNOSPERMIA.

Eigentlich Vierfrüchtige, nämlich Fruchtkn. 4, 1eyig. Gf. 1, aus der Mitte der Fruchtkn. hervortretend. Nüsse 4, od. Steinfrüchte 4, in dem Grunde des K.

I. Stbk.Säckchen mit einer Klappe aufspringend.

GALEOPSIS. Stbg. unter der Oberlippe gleichlaufend.

II. Stbk. nierenf., 1fächerig, mit einer halbkreisf. Spalte aufspringend, nach Ausstreuung des Bthstaubes eine kreisrunde, flache Scheibe darstellend.

OCYUM. Obere Blkr.Lippe 4sp., untere ungeth.

LAVANDULA. Obere Blkr.Lippe 2sp., untere 3sp.

III. Stbk.Säckchen gerade, gleichlaufend od. auseinanderfahrend, jedes mit einer Längenspalte aufspringend od. mit den Spitzen aufeinanderstehend und mit einer einzigen, den beiden Säckchen gemeinschaftlichen Längenspalte aufspringend.

A. Blkr.Röhre inwendig, an der Einfügung der Stbg. mit einem unterbrochenen Ringe v. Haaren besetzt. Gf. nebst den Stbg. eingeschlossen.

MARRUBIUM. Nüsse an der flachen, 3eckigen Spitze abgeschnitten.

SIDERITIS. Nüsse an der Spitze abgerundet.

B. Blkr.Röhre inwendig, unterhalb der Einfügung der Stbg. mit einem ununterbrochenen Ringe v. Haaren besetzt. Der Gf., aus dem Blkr.Schlund hervortretend, auch bei eingeschlossenen Stbg.

a. Stbg. v. einander entfernt, unter der Oberlippe der Blkr. bogig - zsneigend.

HORMINUM. K. 2lippig.

b. Stbg. genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend. K. 2lippig.

PRUNELLA. Der fruchttrag. K. zsgedrückt - geschlossen.

PRASIUM. Der fruchttragende K. geöffnet.

c. Stbg. genähert, gleichlaufend. K. 5zählig. Obere Blkr.-Lippe flach, sehr klein.

AJUGA. Obere Blkr.Lippe sehr kurz, 2lappig; untere 3sp., viel grösser.

d. Stbg. genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend. K. 5zählig. Obere Blkr.Lippe gewölbt od. konkav.

LAMIUM. Die seitenst. Zpfl der untern Blkr.Lippe sehr klein, zahnf. od. fehlend.

GALEOBDOLOX. Zpfl der untern Blkr.Lippe alle spitz.

STACHYS. Zpfl der untern Blkr.Lippe stumpf. Nüsse oberwärts abgerundet. Stbg. nach dem Verblühen zsgedreht, auswärts gebogen.

BALLOTA. Zpfl der untern Blkr.Lippe stumpf. Nüsse oberwärts abgerundet. Stbg. nach dem Verblühen gerade.

PHLOMIS. Zpfl der untern Blkr. Lippe stumpf. Nüsse dch ein flaches, 3eckiges, berandetes Ende abgeschnitten od. an der Spitze gezähnt. Die Stbg. unter der angewachsenen Basis in ein Anhängsel auslaufend.

LEONURUS. Zpfl der untern Blkr.-Lippe stumpf. Nüsse dch ein flaches, 3eckiges, berandetes Ende abgeschnitten. Stbg. an der Basis ohne Anhängsel.

C. Blkr.Röhre lawendig nackt, nämlich ohne Haarring.

a. Stbg. genähert. Obere Blkr.Lippe fehlend od. eigentlich 2th., aber die Zpfl auf den Rand der Unterlippe vorgerückt.

TEUCRIUM. K. 5zählig od. 2lippig.

b. Stbg. genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend, diese flach, ausgerandet.

NEPETA. Untere Blkr.Lippe sehr konkav. Stbk. nicht in ein Kreuz gestellt.

GLECHOMA. Untere Blkr.Lippe flach. Stbk. in ein Kreuz gestellt K. walzlich, 5zählig.

MELITTIS. Untere Blkr.Lippe flach. Stbk. in ein Kreuz gestellt. K. glockig, lappig.

c. Stbg. genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend, diese konkav od. gewölbt.

SCUTELLARIA. K. 2lippig, Lippen ungeth.

DRACOCEPHALUM. K. 2lippig, Lippen gezähnt.

BETONICA. K. 5zählig Nüsse an der Spitze zsgedrückt, abgerundet.

CHAITURUS. K. 5zählig. Nüsse deh ein flaches, 3eckiges, be-
randetes Ende abgeschnitten.

d. Stbg. v. einander entfernt, oberwärts auseinander tretend,
aber gerade.

PULEGIUM. Stbk.Säckchen gleichlaufend. Blkr. trichterf., 4sp.,
Zpfl aufrecht-abstehend, der obere ungeth. K. 2lippig. Schlund
mit einem Haarring geschlossen.

MENTHA. Stbk.Säckchen gleichlaufend. Blkr. trichterf., 4sp.,
Zpfl aufrecht-abstehend, der obere ausgerandet. K. 5sp.

ELSHOLTIA. Stbk.Säckchen auseinanderfahrend. Blkr. fast gleich,
4sp., der obere Zpfl gerade, etwas konkav, ausgerandet, die
untern abstehend.

HYSSOPUS. Stbk.Säckchen auseinanderfahrend. Obere Blkr.
Lippe flach, 2sp., untere 3sp., der mittlere Zpfl verkehrt-
herzf.

e. Stbg. v. einander entfernt, unter der Oberlippe bogig-
zsneigend.

MELISSA. K. 2lippig, auf der obern Seite flach.

IV. Stbk.Säckchen an ein 3eckiges Connectiv zu beiden
Seiten angewachsen.

THYMUS. K. vollkommen-2lippig. Stbg. von einander entfernt,
gerade, oberwärts auseinander tretend.

CALAMINTHA. K. vollkommen-2lippig. Stbg. v. einander ent-
fernt, oberwärts bogig-zsneigend. Hülle fehlend.

- CLINOPODIUM.** Hülle aus borstlichen Blättchen zsgesetzt, unter die Bth.Quirle gestellt; sonst alles, wie bei Calamintha.
MICROMERIA. K. undeutlich-2lippig, 13-15rillig. Stbg. aufstrebend, gewöhnlich paarweise genähert.
SATUREJA. K. 5zählig, 10rillig. Stbg. v. einander entfernt, oberwärts bogig-zsneigend.
ORIGANUM. K. 5zählig od. schief-gespalten, 10rillig. Stbg. v. einander entfernt, gerade, oberwärts auseinander tretend.

BEDECKTSAMIGE, ANGIOSPERMIA.

Eigentlich Einfrüchtige, nämlich nur eine einzelne Frucht auf dem Fruchtb.

I. Stbk.Säckchen an der Basis mit einem Dörnchen versehen.

A. Fruchtkn. 1fächerig, vieleiyig, mit wandst. Samenträgern.

LATHRAEA. Blkr. nach dem Verblühen mit ihrer Basis abfällig.

OROBANCHE. Blkr. nach dem Verblühen abfällig, mit Zurücklassung einer ringsum abgesprungenen Basis.

B. Fruchtkn. 2fächerig, 4 - vieleiyig, bei der Frucht 1 - viel-samig.

a. K. 5zählig.

TOZZIA. K. röhrig. Obere Blkr.Lippe 2sp., untere 3sp. Zpfl fast gleich.

PEDICULARIS. K. oft aufgeblasen. Obere Blkr.Lippe helmig, zsgedrückt.

b. K. 4zählig.

RHINANTHUS. S. mit einem kreisrunden Flügel umzogen.

BARTSIA. S. auf der einen Seite flügelig-verbreitert.

TRIXAGO. S. rippig, Rippen flügellos. Kapsel in einen Schnabel verschmälert.

EUPHRASIA. S. rippig, Rippen flügellos. Kapsel sehr stumpf, ganz od. ausgerandet.

MELAMPYRUM. S. glatt, flügellos.

II Stbk. grannenlos.

A. Fruchtkn. 1fächerig; Samenträger frei, vieleiyig.

LINDERNIA. Blkr. 2lippig. K. 5sp.

LIMOSELLA. Blkr. fast gleich. K. 5zählig.

B. Fruchtk. 2fächerig.

ACANTHUS. Blkr. 1lippig.

SCROPHULARIA. Blkr. 2lippig fast kugelig. Stbk. auf die verbreiterte Spitze des Stbf. quer-aufgewachsen.

ANTIRRHINUM. Blkr. 2lippig, an der Basis höckerig; Unterlippe mit einem höckerigen Gaumen. Kapsel mit Löchern aufspringend.

LINARIA. Blkr. 2lippig, an der Basis bespornt; Unterlippe mit einem höckerigen Gaumen. Kapsel mit Klappen aufspringend.

DIGITALIS. Blkr. aus kurzer Röhre glockig od. röhrig-glockig; Saum schief, der obere Zpfl ausgerandet.

ANARRHINUM. Blkr. Röhre walzlich; Saum flach, schief. Scheidewand der Kapsel einfach.

ERINUS. Die 2 obern Zpfl der trichterf. Blkr. schmaler; Röhre an der Spitze schlank. Scheidewand aus den eingebogenen Klappenrändern gebildet.

C. Fruchtkn. 3fächerig.

LINNAEA. Bth. oberst.

D. Fruchtkn. 4fächerig; Fächer 1eig.

VERBENA. K. 5sp.; Frucht in 4 Nüsse zerfallend.

VITEX. K. 5zählig, Nuss 4samig.

XV. CL. VIERMAECHTIGE, TETRA-DYNAMIA.

SCHOETCHENFRUECHTIGE, SILICULOSA,

Die Frucht im Verhältniss ihrer Länge breit und kurz.

I. Das Schötchen gedunsen, hart und nussartig, nicht aufspringend, manchmal doch Verschwinden der Scheidewand 1fächerig.

A. Schötchen aus einem einzigen Gliede bestehend.

- **NESLIA.** Schötchen kugelig, mit einem aufgesetzten Gf., 1fächerig, 1samig.

- **CALEPINA.** Schötchen rundlich-eyf., kurz zugespitzt, 1fächerig, 1samig.

- **EUCLIDIUM.** Schötchen rundlich, in den Gf. zugespitzt, mit 2 nebeneinander stehenden, 1samigen Fächern.

- **BUNIAS.** Schötchen eyf. od. länglich, mit 2 übereinander gestellten od. 2 Paar übereinander gestellten 1samigen Fächern.

- **MYAGRUM.** Schötchen birnf., 3fächerig, die 2 obern Fächer nebeneinander gestellt, leer.

B. Schötchen 2gliederig, die Glieder bei der Reife sich quer trennend.

RAPISTRUM. Das untere Glied stielchenf., das obere eyf. od. rundlich; Nabelstrang sehr kurz.

CRAMBE. Das untere Glied stielchenf., das obere kugelig. Nabelstrang sehr lang.

CAKILE. Beide Gelenke des Schötchens 2schneidig, das obere dolchf.

II. Das Schötchen v. der Seite zsgedrückt, mit einem hervorragenden od. geflügelten Kiele der Klappen od. das Schötchen v. der Seite flach zsgedrückt.

A. Schötchen nicht aufspringend od. zuletzt in 2, die S. jedoch nicht ausstreuende, Klappen sich trennend.

ISATIS. Schötchen flach, Isamig; Scheidewand durchbohrt.

BISCUTELLA. Schötchen flach, an der Basis und Spitze ausgerandet, 2schildig, mit einem geflügelten Rande umzogen.

SENEBIERA. Schötchen v. der Seite zsgedrückt, od. fast 2knotig, ohne geflügelten Rand.

B. Schötchen aufspringend u. die S. ausstreuend.

a. Stbg. mit einem Anhängsel od. Flügel.

TEESDALIA. Stbf. an der Basis mit einem blblattf. Anhängsel.

AETHIONEMA. Die längern Stbf. geflügelt, Flügel an der Spitze oft 2zählig.

b. Stbg. weder mit einem Anhängsel, noch Flügel versehen.

LEPIDIUM. Fächer Isamig. Bbl. gleich.

IBERIS. Fächer Isamig. Bbl. strahlend.

THLASPI. Fächer 2- mehrsamig. Klappen, besonders an der Spitze geflügelt.

HUTCHINSIA. Fächer 2samig. Klappen flügellos.

CAPSELLA. Fächer vielsamig. Klappen flügellos.

III. Das Schötchen fast kugelig, mit einer Scheidewand von der Breite des Schötchens selbst, oder das Schötchen vom Rücken her zsgedrückt u. gedunsen, od. vom Rücken her flach-zsgedrückt.

A. Schötchen nicht aufspringend.

PELTARIA. Stbf. zahnlos.

CLYPEOLA. Stbf. mit einem Zahne versehen.

B. Schötchen aufspringend. Stbf. mit einem flügelf. Zahne od. an der Basis mit einer schwieligen Hervorragung.

ALYSSUM. Fächer 1-4eyig.

FARSETIA. Fächer mit 6 od. mehrn Eychen. Klappen flach od. konvex.

VESICARIA. Fächer mit 6 od. mehrn Eychen. Klappen halbkugelig-gedunsen.

D. Schötchen aufspringend. Stbf. zahnlos.

CAMELINA. Schötchen birnf. Scheidewand nach Abspringen der Klappen des Gf. beraubt.

LUNARIA. Schötchen auf einem fädlichen, verlängerten Fruchtträger sitzend, flach zsgedrückt. Nabelstränge an die Scheidewand angewachsen.

PETROCALLIS. Schötchen flach-zsgedrückt od. ein wenig konvex. Fruchträger fehlend. Fächer 2samig. Nabelstränge ganz an die Scheidewand angewachsen.

7- DRABA. Schötchen flach-zsgedrückt od. ein wenig konvex. Fächer vieleig. Nabelstränge frei.

9- LOBULARIA. Schötchen flach-zsgedrückt. Fächer 1samig.

SUBULARIA. Schötchen vom Rücken ein wenig zsgedrückt.

COCHLEARIA. Schötchen sehr gedunsen od. fast kugelig. Klappen mit einem Rückennerven versehen. Gf. auf der Scheidewand bleibend.

Zu den Siliculosen: *Arten von Nasturtium.*

SCHOTENFRUECHTIGE, SILIQUOSA.

Frucht schmal u. im Verhältniss ihrer Breite lang.

I. N. aus 2 aufrechten, aneinander liegenden Plättchen gebildet.

HESPERIS. Plättchen der N. auf dem Rücken nicht verdickt.

MATTHIOLA. Plättchen der N. auf dem Rücken verdickt, od. daselbst in ein Horn vorgezogen od. der Gf. zu beiden Seiten mit einem Horn versehen.

II. N. stumpf od. ausgerandet, od. auch 2lappig aber mit stumpfen Lappen.

A. Schote nicht aufspringend.

RAPHANUS. Schote walzlich od. perlenschnurf., nicht aufspringend, aber bei der Reife manchmal sich quer in Glieder trennend.

B. Schote in 2 Klappen aufspringend.

a. Klappen nervenlos od. nur an der Basis mit einem schwachen Nerven versehen.

DENTARIA. S. in jedem Fache 1reihig. KeimB. am Rande beiderseits zsgefaltet.

CARDAMINE. S. in jedem Fache 1reihig. KeimB. flach.

NASTURTIIUM. S. in jedem Fache 2reihig od. unregelmässig gereiht.

b. Klappen 1-3-5nervig, (bei einigen Arten von Arabis ist nur ein schwacher Nerve, aber es sind sehr viele Längsrillen vorhanden.)

aa. KeimB. flach, aneinanderliegend.

TURRITIS. S. in jedem der Fächer 2reihig.

CHEIRANTHUS. S. in jedem der Fächer 1reihig. N. 2sp., mit zurückgekrümmten Lappen.

BARBAREA. S. in jedem Fache 1reihig. N. stumpf od. ausgerandet. Schote fast stielrund od. 4seitig.

ARABIS. S. in jedem Fache 1reihig. N. stumpf od. ausgerandet. Schote zsgedrückt.

bb. KeimB. flach, aufeinander liegend.

BRAYA. S. in jedem Fache 2reihig. Schote stielrund. Rückennerve der Klappen fein.

SYRENIA. S. in jedem Fache 2reihig. Schote 4seitig, die Klappen einnervig.

HUGUENINIA. S. in jedem Fache 1reihig. Schote 2schneidig, die Klappen einnervig.

SISYMBRIUM. S. in jedem Fache 1reihig. Schote mit konvexen, 3nervigen Klappen.

MALCOLMIA. S. in jedem Fache 1reihig. Schote stielrund, mit einer kegelf. N. endigend.

cc. KeimB. aufeinander liegend, tief-rinnig od. rinnig-gefaltet.

DILOTAXIS. S. in jedem Fache 2reihig, oval od. länglich, ein wenig zsgedrückt.

ERUCA. S. in jedem Fache 2reihig, kugelig. Klappen einnervig.

ERUCASTRUM. S. in jedem Fache 1reihig, oval od. länglich, ein wenig zsgedrückt.

BRASSICA. S. in jedem Fache 1reihig, kugelig. Klappen einnervig.

SINAPIS. S. in jedem Fache 1reihig, kugelig. Klappen 3 od. 5nervig.

XVI. CL. EINBRUEDRIGE, MONADELPHIA.

ZEHNMAENNIGE, DECANDRIA.

MYRICARIA. Schopf der S. gestielt.

GERANIUM. Grannen der Klappen bei der Reife kreisf.-zurückgerollt.

ERODIUM. Grannen der Klappen bei der Reife schraubenf.-zsgedreht.

VIELMAENNIGE, POLYANDRIA.

ABUTILON. K. einfach.

LAVATERA. Der äussere K 3sp.

ALTHAEA. Der äussere K. 6-9sp.

MALVA. Der äussere K. 3blättrig.

HIBISCUS. Der äussere K. vielblättrig.

Zur Monadelphia: *Radiola*, *Linum*, Arten v. *Lysimachia*. — *Oxalis*, *Polygala*, *Spartium*, *Sarothamnus*, *Genista*, *Cytisus*, *Ulex*, *Lupinus*, *Ononis*, *Anthyllis*, *Galega*.

XVII. CL. ZWEIBRUEDRIGE, DIADELPHIA.

SECHSMAENNIGE, HEXANDRIA.

FUMARIA. Stbf. 2, jeder mit 3 Stbk. Fruchtkn. 1eyig.

CORDALIS. Stbf. 2, jeder mit 3 Stbk. Fruchtkn. mehreyig.

ACHTMAENNIGE, OCTANDRIA.

POLYGALA. Stbf. 2, an der Basis in einen Körper verwachsen;
Stbk. auf jedem Stbf. 4.

ZEHNMAENNIGE, DECANDRIA.

Papilionaceae - I. Stbg. 1brüderig.A. Flügel an der Basis oberwärts zierlich runzelig - gefaltet.
K. deutlich lippig.

ULEX. K. bis an die Basis 2th. - lippig.

SPARTIUM. K. 1lippig, oberwärts gespalten; Lippe an der Spitze
fein gezähnt.SAROTHAMNUS. K. 2lippig. Kiel stumpf. Gf. kreisf. - zsgerollt,
oberwärts verbreitert, an der innern Seite flach.GENISTA. K. 2lippig. Kiel stumpf. Gf. aufstrebend. N. ein-
wärts abschüssig.CYTISUS. K. 2lippig. Kiel stumpf. Gf. aufstrebend. N. aus-
wärts abschüssig.

LUPINUS. K. 2lippig. Kiel geschnäbelt - zugespitzt.

B. Flügel nicht gefaltet. K. 5zähmig od. etwas 2lippig.

ONONIS. K. 5sp., bleibend, der fruchtttrag. offen.

ANTHYLLIS. K. 5zähmig, verwelkend, der fruchtttrag. geschlossen,
Stbf. oberwärts verbreitert.GALEGA. K. 5zähmig, verwelkend, der fruchtttrag. offen. Stbf.
pfriemlich.II. Stbg. 2brüderig. Hülse nicht in Glieder zerfallend.
Gf. kahl.

A. Kiel geschnäbelt.

LOTUS. Hülse stielrund od. zsgedrückt, mit zsgedrehten Klappen
aufspringend.

TETRAGONOLOBUS. Hülse 4flügelig.

SECURIGERA. Hülse flach - zsgedrückt, mit verdickten Rändern,
nicht aufspringend.B. Kiel ungeschnäbelt, einfach - spitz od. stumpf, od. stumpf mit
einem aufgesetzten Spitzchen.a. Die Säule der Stbg. mehr od. weniger an die Blb. ge-
wachsen.

TRIFOLIUM. Blkr. verwelkend, bleibend.

b. Säule der Stbg. nicht an die Blb. gewachsen. Kiel 2blättrig.
GLYCRRHIZA. Hülse lederig, zsgedrückt.

c. Säule der Stbg. nicht an die Blb. gewachsen. Kiel 1blättrig.

aa. Hülse der Länge nach mehr od. weniger 2fächerig.

215- ASTRAGALUS. Kiel ohne Spitze.

213 OXYTROPIS. Kiel stumpf, unter der Spitze mit einer Stachelspitze versehen.

bb. Hülse 1fächerig, sehr aufgeblasen.

210- PHACA. Hülse vielsamig. S. abgerundet.

212- CICER. Hülse 2samig. S. runzelig, spitz.

cc. Hülse 1fächerig, nicht aufgeblasen.

DORYCNium. Flügel quer-bauschig-aufgeblasen.

214- BONEANIA. Flügel gleichmässig-konvex, mit einem vorne be-
randeten Längs-Eindrucke bezeichnet.

MELILOTUS. Flügel gleichmässig-konvex, ohne Eindruck. Fruchtkn.
gerade. Hülse kurz, 1—3samig.

TRIGONELLA. Flügel gleichmässig-konvex, ohne Eindruck. Fruchtkn.
gerade. Hülse lineal., vielsamig.

MEDICAGO. Flügel gleichmässig-konvex, ohne Eindruck. Fruchtkn.
aufwärts-gekrümmt, an dem Fahne anliegend. Hülse gewunden.

211- ONOBRYSIS. Hülse knöchern, verkehrt-cyf., an der unteren
Nath flügelig-gekielt, ohne Zähne od. gezähnt-kämmig, isamig.

III. Stbg. 2brüderig. Hülse nicht in Glieder zerfallend. Gf.
behaart.

A. Gf. auf der obern, (innern) Seite behaart.

237- ERVUM. Aus Arten von Lathyrus und Vicia zsgesetzt.

233- LATHYRUS. Gf. oberseits flach, v. gleicher Breite od. nach oben
verbreitert, gerade od. mit einwärts gekrümmter Spitze endigend.
Die Spitze der B. gewöhnlich mit Wickelranken.

237- OROBUS. Wickelranken an der Spitze der B. fehlend; sonst
alles, wie bei Lathyrus.

233- PISUM. Gf. 3kantig, an der Basis oberseits gekielt, unterseits
rinnig.

B. Gf. v. der Basis an gewimpert.

216- COLUTEA. Gf. halbstielrund, v. der Basis an gewimpert, an der
Spitze hakig. N. in der Biegung des Hakens.

C. Gf. durchaus flaumig od. unterhalb der Spitze auf der
äussern Seite bärtig.

217- VICIA. Gf. gerade aufstrebend.

214- PHASEOLUS. Gf. nebst den Stbg. u. dem Kiele schraubenf.-
gedreht.

IV. Hülse quer in Glieder zerfallend.

a. Kiel ungeschnäbelt.

218- HEDYSARUM. Stbg. pfriemlich.

219- ORNITHOPUS. Stbg. oberwärts verbreitert.

b. Kiel geschnäbelt.

- 22 HIPPOCREPIS. Hülse an der obern Nath buchtig-ausgeschnitten
u. lappig.
20 SCORPIURUS. Hülse schraubenf.-zurückgerollt, an den Gelenken
zsgezogen.
20 CORONILLA. Hülse gerade od. gekrümmt, an den Gelenken
zsgezogen.

XVIII. Cl. VIELBRUEDRIGE, POLYA- DELPHIA.

- 4 ANDROSAEMUM. Frucht eine Beere.
4 HYPERICUM. Frucht eine Kapsel.

XIX. Cl. VEREINTKOELBIGE, SYNGE- NESIA.

GLEICHFOERMIGE VIELEHE, POLYGAMIA AEQUALIS.

Bth. alle zwitтерig.

Zungenblüthige. Bth. alle zungenf.

I. Pappus federig.

1. Fruchtb. spreuig.

- HYPOCHOERIS. Spreuen abfällig.

2. Fruchtkn. nackt u. kahl, od. auf dem Rande der Höfchen
fransig.

A. HK. einfach; Blättchen gleichlang u. gleichgestaltet.

- 8 UROSPERMUM. Federchen des Pappus frei.
8 TRAGOPOGON. Federchen des Pappus in einander gewebt.

B. HK. dachig od. aussenkelchig.

a. Die Federchen des Pappus verwebt.

- SCORZONERA. Die an der Basis der Achene befindliche, den
Fruchtnabel umgebende Schwiele sehr kurz.
2 PODOSPERMUM. Die an der Basis der Achene befindliche, den
Fruchtnabel umgebende Schwiele verlängert, dicker, als die
selbst.

b. Die Federchen des Pappus frei.

- 2 THRINCIA. Pappus der randst. Achenen kronenf.
9 PICRIS. Pappus gleichförmig, hinfällig.
3 LEONTODON. Pappus gleichförmig, bleibend. Achene nach
oben allmählig verschmälert.

HELMINTHIA. Papp. gleichförmig, bleibend. Achene an der Spitze abgerundet-stumpf, mit einem fädlichen Schnabel.

II. Die Strahlen des Pappus sehr rauh, die äussern haarf., die innersten an der Basis verbreitert u. daselbst zottig.

503 GALASIA. Achenen schnabellos.

III. Pappus einfach.

A. Fruchtb. spreuig. Die randst. Achenen einwärts 3kielig od. 3flügelig; Spreuen borstlich.

504 PTEROTHEKA. Spreuen borstlich.

B. Fruchtb. nackt, oder am Rande der Höfchen fein-wimperig od. etwas wabig.

a. Papp. der Achenen am Rande kronenf., der im Mittelfelde spreuig od. borstig.

490 HYOSERIS. Die randst. Achenen u. die innersten des Mittelfeldes ziemlich stielrund; die dazwischen liegenden geflügelt-zsgedrückt. HEDYPNOIS. Alle Achenen ziemlich stielrund.

b. Papp. aller Achenen aus Spreuen od. flachen Haaren gebildet.

496 CICHORIUM. Spreuen des Pappus kurz, lanzettl. od. länglich.

c. Papp. aller Achenen aus haarf. Strahlen gebildet.

aa. Achenen verschieden-gestaltet.

214 ZACYNTHA. Die randst. Achenen auf dem Rücken sehr höckerig, von den Blättchen des wulstigen HK. dicht-umschlossen, mit einem seitenst. Pappus.

bb. Achenen geschnäbelt; Schnabel an der Basis mit Schuppen od. mit einem Ringe umgeben.

505 CHONDRILLA. Bth. 2reihig.

504 WILLEMETIA. Bth. vielreihig. Krönchen an der Basis des Schnabels feingekerbt.

505 TARAXACUM. Bth. vielreihig. Krönchen aus weichstacheligen Schuppen gebildet.

cc. Achenen schnabellos od. nach der Spitze verschmälert, od. auch geschnäbelt, der Schnabel aber an der Basis ohne Ring u. Schuppen.

I. Achenen flach-zsgedrückt.

508 LACTUCA. Achenen flach-zsgedrückt, in einen fädl. Schnabel zugespitzt.

509 SONCHUS. Achenen flach-zsgedrückt, schnabellos.

512 MULGEDIUM. Achenen schnabellos od. in einen kurzen Schnabel zugespitzt. Pappus mit einem aus kurzen Borstchen bestehenden Krönchen umgeben.

2. Achenen 4seitig.

PICRIDIMUM. Achenen 4furchig, an den Kanten tiefgekerbt.

3. Achenen fast walzlich od. stielrund.

PRENANTHES. Achenen schnabellos. Köpfchen 3—5blüthig.

CREPIS. Achenen schnabellos od. geschnabelt. Köpfchen vielblüthig. Pappus weich, nicht zerbrechlich; die Strahlen haarf.

SOYERIA. Achenen schnabellos. Köpfchen vielblüthig. Pappus nicht zerbrechlich; die Strahlen borstl., an der Basis dicker.

THIERACIUM. Achenen schnabellos. Köpfchen vielblüthig. Pappus zerbrechlich; die Strahlen haarf.

IV. Pappus fehlend od. aus einem kurzen Krönchen od. aus 2 Borsten gebildet.

a. Fruchtb. spreuig; Achenen v. der Spreue eingehüllt u. an dieselbe gewachsen.

SCOLYMUS. Statt des Pappus ein gekerbter Rand od. 2 Borsten.

b. Fruchtb. nackt.

RHAGADIOLUS. Der fruchtttragende HK. abstehend. Achenen ohne Pappus, die randst. eingerollt, stehen bleibend.

ARNOSERIS. Der fruchtttragende HK. kugelig zsneigend. Achenen abfällig, 10riefig; Riefen abwechselnd mehr hervorragend. Pappus aus einem sehr kurzen 5seitigen Krönchen bestehend.

LAPSANA. Der fruchtttragende HK. unverändert, mit aufrechten Blättchen. Achenen 20riefig, in einen verwischten Rand endigend.

APOSERIS. Achenen 5riefig, sonst wie Lapsana.

Kopfbüthige. Bth. alle röhrig.

I. Fruchtb. nackt.

ADENOSTYLES. HK. einfach, die äussern Schuppen kürzer, einen undeutlichen Aussenkelch bildend. Schenkel des von der Basis an kurz-flaumig-rauhen Gf. verlängert.

EUPATORIUM. HK. dachig. Schenkel des Gf. verlängert, von der Basis an flaumlich.

LINOSYRIS. HK. dachig. Schenkel des Gf. lanzettl., verschmälert-spitz.

II. Fruchtb. tief-wabig.

ONOPORDUM. Papp. an der Basis in einen Ring verwachsen, abfällig.

III Fruchtb. spreuig; Spreuen an der Spitze gespalten, od. spreuig-horstlich.

A. Strahlen des Pappus ästig, in einen Ring, od. mehrere in Büschel zsgewachsen..

CARLINA. Strahlen des Pappus ästig; Aeste federig.

STAEHELINA. Strahlen des Pappus ästig; Aeste einfach, haarfein, fiederig-gestellt u. v. einander entfernt.

B. Strahlen des Pappus federig od. haarig, zu einem Ring zsgewachsen u. mit dem Ringe abfallend.

CARDUUS. Pappus haarig.

CIRSIUM. Pappus federig. Blättchen des HK. in einen Dorn od. eine Stachelspitze zugespitzt. Stbf. frei.

CYNARA. Pappus federig. Blättchen des HK. ausgerandet, mit einer Stachelspitze od. mit einem Dorne in der Ausrandung. Stbf. frei.

SILYBUM. Pappus federig. Stbf. 1brüderig.

TYRIMNUS. Pappus haarig. Stbf. 1brüderig.

C. Der haarige Pappus einem Knopfe aufgewachsen und mit diesem abfallend

JURINEA. Achenen 4seitig.

D. Pappus aus abfälligen Börstchen gebildet.

LAPPA. Blättchen des HK. in eine hakige, sehr spitze Stachelspitze endigend.

E. Pappus bleibend.

SAUSSUREA. Pappus federig.

SERRATULA. Pappus haarig, die innerste Reihe der Haare länger

KENTROPHYLLUM. Pappus haarig, die innerste Reihe der Haare sehr kurz, zsneigend. Achenen 4seitig.

F. Pappus fehlend.

CARTHAMUS. Achenen ohne Pappus, 4seitig. Der Nabel der Frucht seitenst.

Zur Polygamia aequalis: *Arten von Artemisia, Santolina, Helichrysum, Bidens ohne Strahl, Centaurea u. Serratula.*

UEBERFLUESSIGE VIELEHE. POLYGAMA SUPERFLUA.

Die randst. Bth. weiblich, zungenf. od. röhrig; die des Mittelfeldes zwitтерig, fruchtbar, immer röhrig.

I. Pappus haarig. Fruchtb. nackt Die randst. Bth. nicht zungenf., (bei Petasites ein wenig zungenf.)

A. HK. einfach, mit einem schwachen Aussenkelche.

- 5 HOMOGYNE. Die randst. Bth. weiblich, 1reihig.
 60 PETASITES. Die randst. Bth. weiblich, in den männlichen Köpfchen 1reihig, in den weiblichen mehrreihig.

B. HK. dachig; die äussern Blättchen allmählig kürzer.

a. Blättchen des HK. krautig od. nur am Rande trockenhäutig.

- 7 FILAGO. Die äussern weibl. Bth. zwischen die Blättchen des HK. gestellt.

b. HK. trockenhäutig.

- 5 HELICHRYSUM. Weibliche Bth. 1reihig, wenige.

- 2 GNAPHALIUM. Weibl. Bth. mehrreihig. Köpfchen bei einigen 2häusig.

Zu dieser Abtheilung: *Arten der Gattungen Inula, Senecio u. Cineraria.*

II. Papp. haarig. Fruchtb. nackt. Die randst. Bth. zungenf.

A. HK. dachig. Blättchen vielreihig.

a. Stbk. geschwänzt.

- 8 PULICARIA. Papp. haarig, die äussere Haarreihe kurz, in ein Krönchen verwachsen.

- 5 INULA. Papp. haarig, gleichgestaltet.

b. Stbk. ungeschwänzt.

- 11 ERIGERON. Weibl. Bth. mehrreihig.

- 8 ASTER. Weibl. Bth. 1reihig. Die Randbth. verschiedenfarbig, fruchtbar.

- 4 GALATELLA. Weibl. Bth. 1reihig. Die Randbth. verschiedenfarbig, unfruchtbar.

- 13 SOLIDAGO. Weibl. Bth. 1reihig. Die Randbth. gleichfarbig, fruchtbar.

B. HK. gleich, aus 1-3reihigen u. gleichlangen Blättchen gebildet od. die äussern einen Aussenkelch bildend.

a. Papp. verschiedengestaltet.

- 1 STENACTIS. Papp. der randst. Bth. einfach, in kurzen Börstchen bestehend; der des Mittelfeldes doppelt, der äussere aus kurzen Börstchen, der innere aus verlängerten Haaren gebildet.

b. Papp. gleichgestaltet, haarig; an den randst. Achenen manchmal fehlend. Weibl. Bth. 1reihig.

aa. HK. halbkugelig od. ziemlich flach.

- 10 BELLIDIASTRUM. Schenkel des Gf. verschmälert-spitz.

- 43 DORONICUM. Schenkel des Gf. kopfig-abgeschnitten. Die randst. Achenen ohne Pappus.

ARONICUM. Schenkel des Gf. kopfig abgeschnitten. Alle Achenen mit Pappus.

bb. HK. walzlich.

LIGULARIA. Schenkel des Gf. fädlich, halbstielrund.

ARNICA. Schenkel des Gf. oberwärts verdickt, mit einer kegelf. Spitze endigend.

SENECIO. Schenkel des Gf. kopfig, abgeschnitten-stumpf. HK. mit einem Aussenkelche.

CINERARIA. Schenkel des Gf. kopfig, abgeschnitten-stumpf. HK. einfach.

c. Papp. gleichgestaltet, haarig. Weibl. Blüthe mehrreihig.

TUSSILAGO. HK. mit einem schwachen Aussenkelche.

III. Papp. nicht haarig; Fruchtb. nackt.

A. HK. aus 2reihigen, gleichlangen Blättchen gebildet.

BELLIS. Pappus fehlend.

B. HK. dachig, vielreihig.

a. Achenen geschnäbelt.

CARPESIUM. Randbth. mehrreihig.

b. Achenen schnabellos. Die randst. Bth. fädlich od. fehlend.

COTULA. Die Achenen am Rande des Köpfchens blattig-flach.

TANACETUM. Achenen kantig-gerillt, die oberweibige Scheibe v. der Breite der Achenen.

ARTEMISIA. Achenen verkehrteyf., flügellos, die oberweibige Scheibe klein.

c. Achenen schnabellos. Die randst. Bthen zungenf., od. glockig-röhrig u. den Bthen des Mittelfeldes gleichgestaltet.

MATRICARIA. Achenen flügellos. Fruchtb. kegel-walzenf.

CHIRYSANTHEMUM. Achenen flügellos. Fruchtb. konvex.

PINARDIA. Achenen des Randes 3flügelig; Flügel mit einer Stachelspitze endigend.

IV. Papp. nicht haarig. Fruchtb. spreuig.

A. HK. 1reihig, einfach.

GALINSOGA. Papp. spreuig; Spreuen federig-fransig.

B. HK. dachig. Gf. an der Spitze verdickt, mit eyf., kurzen, aufrechten Schenkeln.

XERANTHEMUM. Papp. bleibend.

C. HK. vielreihig, dachig. Gf. an der Spitze nicht verdickt; Schenkel fädlich, zurückgekrümmt.

a. Stbk. ungeschwänzt.

- 431-SANTOLINA. Bth. alle röhrig; die Röhre zsgedrückt, 2flügelig, an der Basis abwärts mit einem Anhang versehen.
 431-ACHILLEA. Die randst. Bth. zungenf., mit rundlich-eyf. Saame. Die Bth. des Mittelfeldes mit flach-zsgedrückter, zweiflügeliger Röhre; Achenen ohne Flügel.
 436-ANTHEMIS. Die randst. Bth. zungenf., mit länglichem Saame; Bth. des Mittelfeldes wie bei Achillea; Achenen flügellos.
 439-ANACYCLUS. Die randst. Bth. zungenf., mit länglichem Saame; Bth. des Mittelfeldes wie bei Achillea; Achenen geflügelt.

b. Stbk. geschwänzt.

- 15-PALLENIS, Achenen der randst. Bth. flach-zsgedrückt.
 15-ASTERISCUS. Die randst. Achenen 3seitig. Die Blkr. des Mittelfeldes an der Basis ihrer Röhre verdickt.
 4-BUPHTHALMUM. Die randst. Achenen 3seitig. Blkr. des Mittelfeldes an der Basis verschmälert.
 16-TELEKIA. Alle Achenen stielrund, vielrillig.

FRUCHTLOSE VIELEHE, POLYGAMIA FRUSTRANEA.

Die randst. Bthen weiblich, aber doch Fehlschlagen des Gf. u. der N. geschlechtslos, die des Mittelfeldes zwittrig u. fruchtbar.

a. Fruchtb. spreuig-borstlich.

- CENTAUREA. Pappus haarig od. fehlend. Achenen mit einem seitlichen Fruchtnabel.
 8-CRUPINA. Pappus haarig. Achenen mit einem endst. Fruchtnabel.

b. Fruchtb. schuppig-spreuig. Jede einzelne Bth. mit einer einzigen Spreue gestützt.

- 20-HELIIANTHUS. Pappus aus 2—4 abfälligen Schuppen bestehend.
 20-BIDENS. Pappus aus 2 steifen rückwärts-stacheligen Borsten bestehend.

Zur Polygamia frustranea: *Galatella*, Arten von *Anthemis*, *Anacyclus* u. *Exemplare* von *Tyrimnus* u. *Xeranthemum*.

NOTHWENDIGE VIELEHE, POLYGAMIA NECESSARIA.

Die randst. Bth. weiblich u. fruchtbar, die des Mittelfeldes zwittrig, aber unfruchtbar, u. keine S. tragend.

- 43-CALENDULA. HK. 2reihig; Blättchen gleichlang; Achenen verschieden gestaltet.

MICROPUS. HK. Ireilbig, 5—9blättrig; Blättchen die fruchtb. Bth. einwickelnd. Männl. Bth. 5sp.

EVAX. HK. 1—2 reihig; weiblich Bth. vielreihig, doch die Spreuen getrennt; die männlichen 4sp.

Zur Polygamia necessaria: Arten von *Petasites* u. *Carpesium*.

ABGESONDERTE VIELEHE, POLYGAMIA SEGREGATA.

Köpfchen 1-mehrblütig, in einen gemeinschaftl. Kopf zsgestellt.

ECHINOPS. Köpfchen 1blütig, in einen gemeinschaftl. kugeligen Kopf zsgestellt.

XX. CL. WEIBERMAENNIGE, GYNANDRIA.

EINMAENNIGE, MONADRIA.

I. Stbk. ganz angewachsen.

A. Honiglippe gespornt.

a. Fruchtkn. gewunden. Stbk.Fächer gleichlaufend, aneinanderliegend.

ORCHIS. Stbk.Fächer doch ein 2fächeriges Beutelchen verbunden. Die Pollenmassen zwei getrennten Haltern eingefügt. Honiglippe abstehend, nicht gewunden.

ANACAMPTIS. Stbk.Fächer doch ein 1fächeriges Beutelchen verbunden. Die Pollenmassen einem gemeinschaftlichen Halter eingefügt. Honiglippe abstehend, nicht gewunden.

HIMANTOGLOSSUM. Die Stbk. wie bei Anacamptis, aber die Honiglippe gewunden.

GYMNADENIA. Stbk.Fächer an der Basis ohne Beutelchen. Honiglippe abstehend.

b. Fruchtkn. gewunden. Stbk.Fächer unterwärts doch die Bucht des ausgeschnittenen Schnäbelchens getrennt.

PLATANThERA. Sporn verlängert, fädlich.

PERISTYLUS. Sporn kurz, sackf.

c. Fruchtkn. nicht gewunden.

NIGRITELLA. P. fast glockig, umgestürzt.

B Honiglippe spornlos, 2gliederig.

SERAPIAS. Honiglippe 3lappig, der mittlere Lappen gekniet-zurückgebrochen.

C. Honiglippe spornlos, ununterbrochen.

OPHIRYS. P. abstehend. 2 getrennte Beutelchen.

23. CHAMAEORCHIS. P. helmig. 2 getrennte Beutelchen.
 23. ACERAS. P. helmig. Stbk.Fächer an der Basis dch ein ein-
 facheriges Beutelchen verbunden. Ein gemeinschaftlicher Halter.
 23. HERMINIUM. P. glockig; Zpfl. u. Honiglippe aufrecht. Beutelchen
 fehlend.

II. Stbk. frei.

A. Honiglippe gespornt.

5. EPIPOGIUM. Sporn aufgeblasen, aufrecht.
 5. LIMODORUM. Sporn pfriemlich, hinabsteigend.

B. Honiglippe spornlos, 2gliederig.

5. CEPHALANTHERA. Fruchtkn. stiellos, gewunden.
 6. EPIPACTIS. Fruchtkn. gestielt, nicht gewunden.

C. Honiglippe sporulos, nicht gegliedert.

28. CORALLORRHIZA. Honiglippe an der Basis mit den seitenst.
 PZpfln verbunden u. daselbst einen kurzen, angewachsenen
 Sporn vorstellend.
 28. STURMIA. P. absteigend. Honiglippe aufrecht, hinterst. Stbk.
 endst., abfällig.
 29. MALAXIS. P. ganz absteigend. Honiglippe aufrecht, hinterst.
 Stbk. endst., bleibend.
 7. NEOTTIA. P. glockig, fast helmig. Stbk. endst., sitzend, bleibend.
 7. LISTERA. P. in einen Helm zsneigend. Befruchtungssäule hinten
 mit einem eyf. Fortsatze endigend, der das bleibende Stbk. an
 der Basis od. Spitze trägt.
 SPIRANTHES. P. rachig. Honiglippe eingeschlossen. Stbk.
 sitzend.
 GOODYERA. P. rachig. Honiglippe eingeschlossen. Stbk. ge-
 stielt.

ZWEIMAENNIGE, DIANDRIA.

- CYPRIPIEDUM. Honiglippe bauchig-aufgeblasen.

SECHSMAENNIGE, HEXANDRIA.

- ARISTOLOCHIA. P. blumenkronenartig, röhrig, an der Spitze in
 eine Zunge verbreitert.

XXI. Cl. EINHAEUSIGE, MONOECIA.

EINMAENNIGE, MONANDRIA.

4. EUPHORBIA. Eigenhülle glockig, 9-10zähig; 4-5Zähne v. einer
 fleischigen u. honigtragenden Scheibe bedeckt.
 7. ARUM. Frucht eine Beere. Bl.Scheide kappenf. Kolben an der
 Spitze nackt.

- CALLA.** Frucht eine Beere. Bl.Scheide flach. Kolben überall v. Bthen bedeckt.
ZOSTERA. Früchte nussartig, unter ihrer Spitze an den lineal. Kolben angeheftet; Bl.Scheide in ein B. endigend.
NAJAS. Steinfrucht saftlos, 1samig. Bl.Scheide fehlend.
CALLITRICHE. Steinfrucht saftlos, in 4 Früchtchen sich trennend.
ZANICHELLIA. Früchtchen nussartig, mehre, gestielt.

ZWEIMAENNIGE, DIANDRIA.

- PINUS.** Zapfen aus verholzenden Schuppen bestehend. S. geflügelt, der Flügel zuweilen sehr schmal.

DREIMAENNIGE, TRIANDRIA.

- TYPHA.** Männliche u. weibl. Aehre walzlich, männliche obenstehend. Fruchtkn. mit Borsten umgeben.
SPARGANIUM. Aehren kugelig, die männlichen die obern. Bth. dch spreuige u. mehrblättrige P. getrennt.
CAREX. Balg 1klappig. Fruchtkn. v. einer flaschenf. Eigenhülle eingeschlossen.
ELYNA. Aehrchen 2bth., mit einem DeckB. bedeckt; die untere Bth. männl., die obere weiblich. Balg 1klappig. Eigenhülle fehlend.
KOBRESIA. Aehrchen mit einem DeckB. bedeckt; die untern der Aehren weibl., 1balgig, 1bth., mit einem gestielten Ansätze zu einer zweiten Bth., der sich seltner zu einer männl. Bth. entwickelt; die obern männl., ohne Balg, aus 3, auf einem Stielchen sitzenden Stbg. bestehend.
ZEA. Weibl. Bth. mit Scheiden eingehüllt. Karyopsen rundlich-nierenf., in dicht genäherten Reihen einer gemeinschaftl. Achse eingefügt.
FICUS. Bth. v. einem fleischigen, an der Spitze benabelten, inwendig hohlen Fruchtb. eingeschlossen.

VIERMAENNIGE, TETRANDRIA.

a. Bth. vollst.

- LITTORELLA.** Blkr.Röhre der männl. Bthe walzlich, mit 4th. Saume.

- BUXUS.** Männlich. Blkr. 2-, weibl. 3-4blättrig. Kapsel 3schnäbelig.

b. Bth. unvollst. Männl. u. weibl. Bth. mit einem P.

- EUROTIA.** Weibl. P. krugf., an der Spitze 2zählig.

- URTICA.** Weibl. P. 2th. N. sitzend, kopfig-pinsel.

- MORUS.** Weibl. P. 4blättrig. N. 2, fädlich.

c. Bth. unvollst., in Kätzchen. Weibl. od. männl. P. fehlend.

- CUPRESSUS.** Weibch. Eychen krugf. Männch. Stbk. 4, 1fächerig an die Kätzchen-Schuppe gewachsen; P. fehlend.

ALNUS. Männch. P. 3, 4sp., auf dem Stielchen der Kätzchen-Schuppe sitzend. Weibch. P. fehlend.

FUENF - VIELMAENNIGE. PENTANDRIA - POLYANDRIA.

a. Bth. vollst., nicht kätzchentragend.

MYRIOPHYLLUM. Männch. Blb. 4, hinfällig. Weibch. K. oberst., 4blättrig. Blb. sehr klein.

SAGITTARIA. K. 3th. Blb. 3. Weibch. Früchtchen sehr viele, auf einem kugeligen Fruchtb. sitzend.

b. Weibl. Bth. vollst.; die männl. unvollst. in Kätzchen.

JUGLANS. Männch. P. 2-6th. Weibch. K. oberst., 4zählig; Blb. 4., krautig.

c. Bth. unvollst., nicht in Kätzchen.

AMARANTHUS. P. 3-5blättrig. Kapsel ringsum aufspringend.

21- ATRIPLEX. Männch. P. 5blättrig. Weibch. P. 2sp. od. 2th. Hautfrucht. S. mit einer krustigen Samenhaut.

21- HALIMUS. Männch. P. 5blättrig. Weibch. P. 2sp. od. 2th. Hautfrucht. Samenhaut dünnhäutig.

THELIGONUM. P. 2sp. Männch. Stbg. 12. Weibch. Nuss lederig.

CERATOPHYLLUM. Männch. P. vielblättrig. Stbk. sitzend. Weibch. Nuss mit einem Dorn endigend.

XANTHIUM. Männch. Hülle vielblättrig. P. 5zählig. Weibch. Hülle 1blättrig, 2fächerig, 2blüthig. Falsche Frucht aus der erhärteten Hülle gebildet.

d. Bth. unvollst., die männl. in Kätzchen. Stbg. auf einem P. eingefügt.

58- FAGUS. Hülle 4sp., 2bth., bleibend. Männl. Kätzchen kugelig.

CASTANEA. Hülle 4sp., 2-3bth., bleibend. Männl. Kätzchen verlängert; Bth. geknäuel.

QUERCUS. Hülle 1bth., ungeth., bei der Reife sich in ein, die Frucht unterwärts umgebendes Becherchen verwandelnd, bleibend.

e. Bth. unvollst., die männl. od. die männnl. u. weibl. in Kätzchen. Die Stbg. auf den Kätzchenschuppen eingefügt.

7- CORYLUS. Nuss mit einer 2sp., eingeschnittenen, bleibenden Hülle umgeben.

CARPINUS. Nuss mit einer blattigen, halbirtten Hülle umgeben, mit dem bleibenden K. gekrönt.

OSTRYA. Nuss v. einer krugf., kapselartigen, aufgeblasenen Hülle eingeschlossen.

83- BETULA. Nuss mit einem Flügel umzogen, bei der Reife mit den Kätzchenschuppen abfällig. Hülle fehlend.

EINBRUEDRIGE, MONADELPHIA.

CYTINUS. Männch. Die Säule der Stbf. an der Spitze mit 8 an gewachsenen Stbk. Weibch. Fruchtkn. unterst.

VIELBRUEDERIGE, POLYADELPHIA.

Stbg. 5, davon 4, paarweise zsgewachsen, der 5. frei. Stbk. frei od. zsgewachsen.

- 990 - CUCURBITA. Männch. Stbk. zsgewachsen. Weibch. Beere berindet. S. mit einem gedunsenen Rande umzogen.
 296 - CUCUMIS. Männch. Stbk. zsgewachsen. Weibch. Beere berindet, vielsamig. S. mit einem spitzen Rande.
 297 - BRYONIA. Männch. Stbk. frei. Weibch. Beere 3-6samig. S. mit einem stumpfen, nicht gedunsenen Rande.
 298 - ECBALLION. Männch. Stbk. frei. Weibch. Beere vielsamig, sich am Bthstiel lostrennend u. dch. eine grundst. Oeffnung die S. elastisch herauswerfend. S. mit einem stumpfen, nicht gedunsenen Rande.

XXII. CL. ZWEIHAEFUSIGE, DIOECIA.

ZWEIMAENNIGE, DIANDRIA.

SALIX. P. fehlend. Drüsen 1 od. 2, an der Basis der Geschlechtsorgane.

DREIMAENNIGE, TRIANDRIA.

- OSYRIS. P. oberst., 3sp.
 357 - EMPETRUM. K. 3blättrig. Blkr. 3blättrig. Weibl. Bth. unterst.
 UDORA. K. 3th. Blkr. 3blättrig. Weibl. Bth. oberst.

VIERMAENNIGE, TETRANDRIA.

HIPPOPHAE. Männch. P. 2th. Weibch. P. röhrig, an der Spitze 2sp. N. 1, verlängert.

- 358 - VISCUM. Blkr. 4th. Männch. K. fehlend. Stbk. auf die Bth. aufgewachsen. Weibch. K.: in einem oberst. Rande bestehend. Gf. fehlend. N. stumpf, sitzend.

- 720 - SPINACIA. Männch. P. 4th. Weibch. P. 2-3sp. Gf. 4.
 740 - MYRICA. Bth. in Kätzchen. Männch. Stbg. 4, auf der Basis der Kätzchenschuppe eingefügt. P. fehlend. Weibch. P. aus 4 Schüppchen gebildet.

FUENFMAENNIGE, PENTANDRIA.

359 - CANNABIS. Männch. P. 5th. Weibch. P. 1blättrig, auf der einen Seite der Länge nach gespalten.

360 - HUMULUS. Männch. P. 5th. Weibch. P. schuppenf., innerhalb der Schuppen eines Zapfens.

- PISTACIA. Männch. P. 5sp. Weibch. P. 3-4sp. N. 4. Steinfrucht.
 JUNIPERUS. Männl. Bth. in Kätzchen. Stbk. an der Basis der Schuppen angewachsen; 1fächerig. Weibl. Bth. endst. zu 3, Eychen nackt. Falsche Steinfrucht.
 TAXUS. Männl. Bth. in Kätzchen. Stbk. an schildf. Schuppen unterseits angewachsen, 1fächerig. Weibl. Bth. endst., einzeln. Eychen nackt. Falsche Steinfrucht.

SECHSMAENNIGE, HEXANDRIA.

- SMILAX. P. 6th., unterst.
 TAMUS. P. 6th., oberst.

ACHTMAENNIGE, OCTANDRIA

- POPULUS. P. ganz, der Kätzchen-Schuppe eingefügt. Fruchtkn. 1.
 RHODIOLA. K. 4th. Männch. Blkr. 4blättrig. Weibch. Blkr. fehlend, od. klein. Fruchtkn. 4.

NEUNMAENNIGE, ENNEANDRIA.

- MERCURIALIS. P. 3th. Männch. Stbg. 9-12. Weibch. Gf. kurz: N. 2, verlängert.
 HYDROCHARIS. K. 3th., der des Weibchens oberst. Blkr. 3blättrig.

ZWOELFMAENNIGE, DODECANDRIA.

- STRATIOTES. K. 3th., der des Weibchens oberst. Blkr. 3blättrig. NebenStbg. (unfruchtbare,) 20-30; fruchtbare Stbg. bei dem Männchen 12.

EINBRUEDERIGE, MONADELPHIA.

- EPHEDRA. Hülle 2sp., aus 2 zsgewachsenen Schuppen gebildet. Männch. Stbg. an der Basis zsgewachsen, an der Spitze frei. Weibch. Eychen krugf.
 RUSCUS. P. bis zur Basis 6th. Stbf. in ein eyf. Röhrchen zsgewachsen, die 3 Stbk. auf ihrer Spitze tragend.

XXIII. CL. VIELEHIGE, POLYGAMIA.

Die Gattungen dieser Classe sind in die vorhergehenden Classen, welche der Zwitterblüthe entsprechen, vertheilt.

Tabellarische Uebersicht derjenigen Ordnungen des natürlichen Systems, welche zu unserer Flora gehören.

I. Classe. RINGFASERIGE PHANEROGAMISCHE GEFAESSPFLANZEN.

I. Unterabtheilg. BLUETHEN VOLLSTAENDIG, VIELBLAETTRIG, UNTERSTAENDIG.

A. Fruchtkn. mehrere, getrennt, jeder einen Gf. tragend; od. mehrere in eine lappige Frucht mehr od. weniger zsgewachsen, u. jeder Lappen einen Gf. tragend; oder ein einzelner Fruchtkn., mit einem einzigen seitenst. Samenträger.

I. Blkr. regelmässig.

a. KB. frei, an der Basis nicht zsgewachsen. Stbg. unterweibig.

BERBERIDEEN. Stbk. Fächer von der Basis gegen die Spitze mit einer Klappe aufspringend.

RANUNCULACEEN. Stbk. mit 2 Längspalten aufspringend.

b. KB. in einen 1blättrigen K. mehr od. weniger zsgewachsen.

CRASSULACEEN. Stbg. so viel, als Blb. od. noch einmal so viel, dem K. eingefügt.

ROSACEEN. Stbg. 20 und mehr, dem K. eingefügt.

II. Blkr. unregelmässig.

RESEDACEEN. K. bleibend. Stbg. 12 - 24.

PAPILIONACEEN. K. abfällig od. verwelkend. Stbg. 10. Keim gekrümmt.

CAESALPINIEEN. K. abfällig od. verwelkend. Stbg. 10. Keim gerade.

B. Ein einziger Fruchtkn.; Samenträger 2 od. mehr, an die Wand od. an die Scheidewände desselben, aber nicht an eine mittelpunktst. Achse angewachsen.

I. Blkr. regelmässig, 4blättrig.

PAPAVERACEEN. K. 2blättrig.

CRUCIFEREN. K. 4blättrig. Stbg. 6, 4mächtig.

CAPPARIDEEN. K. 4blättrig. Stbg. sehr viele od. 6, aber nicht 4mächtig.

II. Blkr. regelmässig, 5blättrig.

— CISTINEEN. K. 5blättrig, die 3 innern Blättchen in der Knospenlage zsgedreht.

— DROSERACEEN. K. 5blättrig, die Blättchen in der Knospenlage dachig. S. kahl.

TAMARISCINEEN. K. 5theilig. S. schopfig.

III. Blkr. regelmässig. Blb. zahlreich.

— NYMPHAEACEEN. Blb. zahlreich, allmählig in die Stbg. übergehend.

IV. Blkr. unregelmässig.

— FUMARIACEEN. K. 2blättrig od. fehlend. Stbg. 6, in 2 Bündel verwachsen.

— VIOLARIEEN. K. 5blättrig. Stbg. 5, frei od. mit den Stbk. ein wenig zshängend.

C. Fruchtkn. 1, mit mittelpunktst. Samenträgern.

I. K. in der Knospenlage klappig od. von einander entfernte Zähne tragend.

MALVACEEN. Stbg. in eine Röhre zsgewachsen.

TILIACEEN. Stbg. frei od. vielbrüderig, unterweibig.

RHAMNEEN. Stbg. dem K. eingefügt, vor die Blb. gestellt.

LYTHRARIEEN. Stbg. der KRöhre eingefügt, mit den Blb. abwechselnd od. noch einmal so viele.

II. K. in der Knospenlage dachig. Blkr. unregelmässig.

BALSAMINEEN. K. 2blättrig.

HIPPOCASTANEEN. K. 5zählig.

III. K. in der Knospenlage dachig, 1blättrig, gezähnt. Blkr. regelmässig.

AMYGDALAEEN. Stbg. dem KSchlunde eingefügt.

SILENEEN. Stbg. unterweibig, od. einem gestielten Fruchtb. eingefügt.

IV. K. in der Knospenlage dachig, tief- getheilt od. mehrblättrig. Blkr. regelmässig.

a. Fruchtkn. 1fächerig.

TEREBINTHACEEN. Fruchtkn. 1eyig.

PORTULACEEN. Fruchtkn. vieleig. K. 2blättrig.

ALSINEEN. Fruchtkn. vieleig. K. 3-5blättrig. B. nebenblattlos.

PARONYCHIEEN. Fruchtkn. vieleig. K. 3-5blättrig. B. nebenblättrig.

b. Fruchtkn. mehrfächerig. Stbg. vielbrüderig.

HYPERICINEEN. Stbg. vielbrüderig.

c. Fruchtkn. mehrfächerig. Stbg. an der Basis 1brüderig.

LINEEN. Fruchtkn. 8-10fächerig.

OXALIDEEN. Fruchtkn. 5fächerig; Fächer mehreyig.

GERANIACEEN. Fruchtkn. 5fächerig; Fächer 2eyig, bei der reifen Frucht 1samig.

d. Fruchtkn. mehrfächerig. Stbg. frei. Gf. 1.

ACERINEEN. Stbg. 8. Blb. 5. Frucht nussartig, 2-3flügelig, in 2-3 Früchtchen zerfallend.

EMPETREEN. Stbg. 6. Bl. 3. Gf. 1.

AMPELIDEEN. Stbg. 4-5, vor die Blb. gestellt.

CELASTRINEEN. Stbg. 4-5, mit den Blb. abwechselnd, der unterweibigen, auf die Basis des K. angewachsenen Scheibe eingefügt. Basis des K. bei der Frucht bleibend.

RUTACEEN. Stbg. 5, 8, 10. Der unterweibigen, nicht an den K. angewachsenen Scheibe eingefügt. Blb. 5 od. 4. B. nebenblättrig.

ZYGOPHYLLEEN. Stbg. 10. Unterweibige Scheibe gekerbt, nicht an den K. angewachsen, od. einzelne Drüsen. Blb. 5. B. nebenblättrig.

MONOTROPEEN. Stbg. 10, abwechselnd aus der Bucht der unterweibigen Drüsen hervorgehend. Blattlose, statt der B. mit Schuppen bekleidete Pflanzen.

PYROLACEEN. Stbg. 10. Fruchtkn. ohne Scheibe und Drüsen. Blb. 5.

e. Fruchtkn. mehrfächerig. Stbg. frei. Gf. mehrere.

ELATINEEN. Blb. 3, 4, 5, unterweibig. Stbg. so viele, als Blb. od. noch einmal so viele. Gf. 3-5.

II. Unterabtheilg. BLUETHEN VOLLSTAENDIG, VIELBLAETTRIG. OBERSTAENDIG.

A. Fruchtkn. 1fächerig.

310 - CACTEEN. Stbg. zahlreich.

311 - GROSSULARIEEN. Stbg. 5, mit den Blb. abwechselnd.

B. Fruchtkn. mehrfächerig; Fächer übereinanderliegend, doch eine Querwand getrennt, u. deswegen 2reilig, 3 untere, 5 obere. S. der obern Fächer an die v. der Wand entspringenen Fortsätze angeheftet.

312 - GRANATEEN. K. in der Knospenlage klappig, fleischig.

C. Fruchtkn. 2 - mehrfächerig, mit mittelpunktst. Samenträgern

I. Stbg. 4mal so viele, als Blb., u. mehrere.

POMACEEN. B. nebenblättrig.

MYRTACEEN. B. nebenblattlos, mit einer, neben dem Rande hinlaufenden Ader bezeichnet. S. eyweisslos.

PHILADELPHIEN. B. nebenblattlos ohne randst. Ader. S. eyweisshaltig.

II. Stbg. so viele, als Blb. u. mit diesen abwechselnd, od. noch einmal so viele.

UMBELLIFEREN. Blb. in der Knospenlage eingerollt. Gf. 2, v. einer oberweibigen, 2sp. Scheibe ausgehend.

ARALIACEEN. Blb. in der Knospenlage klappig. Beerenfrucht.

CORNEEN. Blb. in der Knospenlage klappig. Steinfrucht.

ONAGRARIEEN. Blb. in der Knospenlage dachig. Gf. 1.

SAXIFRAGEEN. Blb. in der Knospenlage dachig. Gf. 2, od. mehrere.

HALORAGEEN. Blb. in der Knospenlage dachig. Gf. fehlend
N. mehrere.

III. Stbg. so viele, als Blb. u. diesen gegenst.

LORANTHACEEN. Stbg. an die Basis der Blb. angewachsen od. ganz auf die Blb. aufgewachsen.

III. Unterabtheilg. BLUETHEN VOLLSTAENDIG, EINBLAETTRIG, OBERSTAENDIG.

A. Stbg. vor eine oberweibige, gekerbte Scheibe eingefügt.

VACCINIEEN. Stbg. nicht an die Blkr. angewachsen.

B. Stbg. in dem Grunde der Blkr. auf dem Fruchtkn. eingefügt.

CUCURBITACEEN. Stbg. 5, 3brüderig.

LOBELIACEEN. Stbg. 5, Stbf. frei. Blkr. unregelmässig.

CAMPANULACEEN. Stbg. 5, Stbf. frei. Blkr. regelmässig.

C. Stbg. der Blkr.Röhre od. zwischen den Zpfln derselben eingefügt.

COMPOSITEN. Stbk. in eine Walze zsgewachsen. Blkr.Zpfl. in der Knospenlage klappig.

STELLATEN. Stbg. frei. Blkr.Zpfl in der Knospenlage klappig.

DIPSACEEN. Stbg. frei. Blkr.Zpfl in der Knospenlage dachig.
K. doppelt.

VALERIANEEN. Stbg. frei. Blkr.Zpfl in der Knospenlage dachig.
K. einfach. Fruchtkn. 1eyig.

CAPRIFOLIACEEN. Stbg. frei. Blkr.Zpfl in der Knospenlage dachig. K. einfach. Fächer 2eyig.

IV. Unterabtheilg. BLUETHEN VOLLSTAENDIG, EINBLAETTRIG, UNTERSTAENDIG.

- A. Fruchtkn. 4, 1eyig, auf einer unterweibigen Scheibe sitzend.
Gf. 1, mittelst der Scheibe mit den Fruchtkn. zshängend.

BORAGINEEN. Stbg. 5, mit den Blkr.Zpfln abwechselnd.

LABIATEN. Stbg. 4, zweimächtig, od. 2.

- B. Fruchtkn. 1, 1fächerig, 1eyig.

PLUMBAGINEEN. K. faltig. Stbg. 5.

GLOBULARIEEN. K. 5sp. Stbg. 4.

- C. Fruchtkn. einer, 1fächerig, vieleyig; Samenträger mittelpunktst., frei, walzlich.

PRIMULACEEN. Blkr. regelmässig. Stbg. 4-5, den Blkr.Zpfln gegenst.

LENTIBULARIEEN. Blkr. unregelmässig, 2lippig. Stbg. 2.

- D. Fruchtkn. 1. Samenträger mittelpunktst., frei, etwas geflügelt.

PLANTAGINEEN. Blkr. 1sp., trockenhäutig.

- E. Fruchtkn. einer, 2- mehrfächerig; Samenträger mittelpunktst.; od. 1fächerig, mit wandst. Samenträgern; od. 2 Fruchtkn., jeder mit einem wandst. Samenträger.

- I. Stbg. unterweibig, unter einer fleischigen Scheibe eingefügt, an der Blkr. nicht od. nur ein wenig anhängend, frei.

ERICINEEN.

- II. Stbg. der Blkr. eingefügt, zsgewachsen.

POLYGALEEN. Stbf. in 2 Bündel zsgewachsen, an der Basis 1brüderig. Stbk. 8, 1fächerig.

- III. Stbg. der Blkr. eingefügt, frei.

- a. Stbg. 2. Blkr. regelmässig.

JASMINEEN. Fächer 1eyig; Eychen aufrecht.

OLEACEEN. Fächer 2eyig; Eychen hängend.

- b. Stbg. 2, od. 4 zweimächtige. Blkr. unregelmässig od. ungleich.

OROBANCHEEN. Fruchtkn. einfächerig; Samenträger 2, gegenst., vieleyig.

RHINANTHACEEN. Fruchtkn. 2fächerig; Stbk. an der Basis mit 2 Stachelspitzchen.

ANTIRRHINEEN. Fruchtkn. 2fächerig. Stbk. grannenlos. S. eyweisslos.

ACANTHACEEN. Fruchtkn. 2fächerig. Stbk. grannenlos. S. eyweissaltig.

VERBENACEEN. Fruchtkn. 4fächerig; Fächer 1eyig. Die Frucht eine Steinfrucht od. in 4 Nüsse zerfallend.

c. Stb. 5, od. 4 nicht 2mächtige. Fächer 1-2eyig.

EBENACEEN. Stbg. noch einmal so viel, als Blkr.Zpfl u. mehre.

AQUIFOLIACEEN. Stbg. so viele, als Blkr.Zpfl. u. mit diesen abwechselnd. Blkr. 4-5th.

CONVOLVULACEEN. Stbg. in der Röhre der 5lappigen Blkr. eingefügt, so viel, als Lappen.

d. Stbg. 5, od. 4 nicht 2mächtige. Fächer vieleyig.

VERBASCEEN. Stbk. auf die verbreiterte Spitze der Stbf. quer- od. schief-aufgewachsen.

POLEMONIACEEN. Stbk. aufrecht. Fruchtkn. 3fächerig.

GENTIANEEN. Stbk. aufrecht. Fruchtkn. 1-2fächerig. Blkr. verwelkend.

SOLANEEN. Stbk. aufrecht. Blkr. abfällig, in der Knospenlage faltig. Fruchtkn. einer, 2- od. 4fächerig.

APOCYNEEN. Stbk. aufrecht, auf der N. liegend. Blkr. in der Knospenlage dachig, abfällig. Fruchtkn. 2fächerig od. 2 Fruchtkn. mit einer gemeinschaftl. Narbe. Bthstaub staubartig.

ASCLEPIADEEN. Stbk. aufrecht, auf der N. liegend. Blkr. in der Knospenlage dachig, abfällig. Fruchtkn. 2fächerig od. 2 Fruchtkn. mit einer gemeinschaftl. N. Bthstaub in Massen zusammengeslossen, welche den 5 Fortsätzen der N. anhängen.

V. Unterabtheilg. BLUETHEN UNVOLLSTAENDIG, P. EINFACH OD. FEHLEND.

A. Bth. oberständig, nicht in Kätzchen.

CYTINEEN. Bth. 1geschlechtig. Stbk. an eine mittelpunktst. Säule angeheftet. Fruchtkn. vieleyig.

ARISTOLOCHIEEN. Stbg. auf dem Fruchtkn. eingefügt od. die Stbk. an die N. angewachsen. Fruchtkn. vieleyig.

HIPPURIDEEN. Stbg. 1, auf dem Fruchtkn. eingefügt. Fruchtkn. 1eyig.

SANTALACEEN. Stbg. auf der Basis der PZpfl eingefügt. Fruchtkn. 1fächerig, 2-4eyig.

B. Bth. unterständig, nicht in Kätzchen.

I. Frucht in mehrere Früchtchen zerfallend.

CALLITRICHINEEN. Frucht bei der Reife in 4 Früchtchen zerfallend; Achse fehlend; N. ungetheilt.

EUPHORBIACEEN. Früchtchen 3, seltner 2 od. mehr, an eine mittelpunktst. Achse angeheftet; N. getheilt.

II. Frucht nicht aufspringend.

a. B. nebenblättrig.

POLYGONEEN. Nebenblätter zwischen dem Stengel u. Blattstiele, scheidig.

SANGUISORBEEN. Nebenblätter an den Bstiel angewachsen.

URTICEEN. Nebenblätter frei, hinfällig.

- b. B. nebenblattlos. Bth. 1häusig, die weiblichen ohne Perigon.

AMBROSIACEEN. Falsche, aus einer vergrößerten, erhärteten Hülle entstandene Frucht.

CERATOPHYLLEEN. Wahre Nuss. Keimblätter 4, quirlig.

- c. B. nebenblattlos. Bth. zwittrig od. vielhig. Keim gerade.

LAURINEEN. Stbk.Fächer mit Klappen aufspringend.

THYMELEEN. Stbk.Fächer mit Ritzen aufspringend. Wahre Frucht.

ELAEAGNEEN. Stbk.Fächer mit Ritzen aufspringend. Falsche, aus der fleischigen PRöhre entstandene Steinfrucht.

- d. B. nebenblattlos. Bth. zwittrig od. vielhig. Keim ringf., gekrümmt od. schraubenf.

SCLERANTHEEN. S. an der Spitze eines verlängerten, aus dem Grunde der Hautfrucht aufstrebenden Samenstranges herabhängend.

CHENOPODEEN. S. auf dem Grunde der Hautfrucht angeheftet. Stbg. an der Basis des P. eingefügt u. dessen Zpfln gegenst.

AMARANTHACEEN. S. auf dem Grunde der Hautfrucht angeheftet. Stbg. unterweibig.

PHYTOLACCEEN. Wahre Beere, 1-mehrfächerig Stbg. so viele, als Pabschnitte u. mit diesen abwechselnd od. noch einmal so viele, od. zahlreiche.

- C. Die männl. Bth. immer in Kätzchen, die weiblichen oft einzeln od. mehrere zsgestellt.

- a. Fruchtkn. unterst., 1-vielfächerig; Fächer 2eyig; Eychen hängend.

CUPULIFEREN. Nuss mit einer Hülle umgeben.

- b. Fruchtkn. unterst., 1eyig; Eychen aufrecht.

JUGLANDEEN. Steinfrucht nackt, (ohne Hülle.) Blkr. 4blättrig, krantig, (bei der weibl. Bth. von Juglans; bei der weibl. Bth. der ausländischen Carya aber fehlend)

- c. Fruchtkn. oberst. od. dch das zuletzt angewachsene P. halboberst., od. die S. nackt.

SALICINEEN. Fruchtkn. vieleig.

BETULINEEN. Fruchtkn. 2fächerig; Fächer 1eyig.

MYRICEEN. Fruchtkn. 1fächerig, 1eyig. N. 2. verlängert.

CONIFEREN. S. nackt, in eine beerenf. Fruchthülle, od. in einen Zapfen eingeschlossen.

II. Classe. ZERSTREUTFASERIGE PHANEROGAMISCHE GEFAESSPFLANZEN.

A. Fruchtkn. mehre, getrennt, od. an der Basis zsgewachsen od. völlig zsgewachsen u. erst bei der Reife v. der mittelpunktst. Achse sich trennend; jeder griffeltragend od. mit einer sitzenden N. endigend.

a. Fruchtkn. 1-2eyig.

ALISMACEEN. K. 3blättrig. Blk. 3blättrig.

JUNCAGINEEN. P. 6blättrig, fast blumenkronenartig od. krautig.

POTAMEEN. P. 4th. od. fehlend.

b. Fruchtkn. vieleiyig.

BUTOMEEN. Samenträger die ganze Wand des Fruchtkn. einnehmend.

COLCHICACEEN. Samenträger an der innern Nath angeheftet.

B. Fruchtkn. einer, unterständig.

ORCHIDEEN. Stbg. mit dem Gf. verwachsen.

HYDROCHARIDEEN. Stbg. frei. K. 3blättrig. Blkr. 3blättrig.

IRIDEEN. Stbg. 3, frei od. 1brüderig. P. blumenkronenartig.

AMARYLLIDEEN. Stbg. 6, frei. P. blumenkronenartig. Kapsel-
frucht.

DIOSCOREEN. Stbg. 6, frei. P. blumenkronenartig. Beeren-
frucht.

C. Fruchtkn. einer, oberst.; Bth. nicht balgartig.

a. P. blumenkronenartig, 6blättrig.

LILIACEEN. Frucht trocken, aufspringend.

ASPARAGEEN. Frucht saftig, nicht aufspringend.

b. P. häutig od. wenigstens am Rande trockenhäutig,
einen 6blättrigen K. darstellend.

JUNCACEEN. P. 6blättrig, kelchf., am Rande trockenhäutig.
Bth. zwittrig.

ARIDEEN. P. 6blättrig, häutig, an der Spitze krautig od.
fehlend. Bth. auf einem Kolben eingesetzt, zwittrig od. 1ge-
schlechtig.

TYPHACEEN. P. aus Borsten od. häutigen Schuppen gebildet.
Bth. 1häusig, sehr gedrungen-ählig. Aehren walzlich od. ku-
gelig, die obern männlich.

NAJADEEN. P. fehlend. Bth. zerstreut.

LEMNACEEN. P. schlauchf., ungeth.

E*

LXVIII

D. Fruchtkn. einer, oberst. Bth. balgartig, aus einem Kelchbalge und Blumenbalge, (Balg u. Bälglein,) gebildet. Beide Bälge 1-2klappig.

CYPERACEEN. Stbk. an der Spitze ungeth. BScheiden nicht gespalten.

GRAMINEEN. Stbk. an der Basis u. Spitze gespalten. BScheiden gespalten.

Gefäßpflanzen.

Pflanzen aus Zellgewebe und Gefäßen gebaut, mit Spaltöffnungen begabt und mit wahren Blättern versehen.

I. Classe. EXOGENEN (Ringfaserige) oder DICOTYLEDONEN (Zweikeimblättrige).

St. bestehend aus Rinde, einem von Markfortsätzen durchstrahlten Holzringe u. aus dem v. d. Holzring eingeschlossenen Marke. Bei strauch- u. baumartigen Pflanzen ist d. Stamm aus mehren concentrischen, v. d. Rinde umzogenen Holzlagen gebildet. Die Blüthen sind mit Zeugungswerkzeugen versehen. Die Stbk. sind jedes aus zwei Säckchen zusammengesetzt, die mit Blumenstaub angefüllt, und jedes mit einer Längennaht bezeichnet sind, manchmal mit ihren Spitzen in ein einziges zusammenfliessen, und dann ein mit einer Quernahat versehenes Stbk. darstellen. Keim mit zwei gegenst. Keimbl., seltner mit mehren in einen Quirl gestellten, sehr selten fehlen sie bei blätterlosen Pflanzen.

I. Unterclasse, THALAMIFLOREN (Fruchtbodenblüthige).

Blb. mehrere, getrennt und nebst d. Stbg. auf d. Fruchtboden und nicht auf d. K. eingefügt.

E. Ordnung. RANUNCULACEEN, Juss. gen. 231. DC syst. I p. 127.

K. 3-6blättrig. Blb. 3, mehrere, oft verkleinert u. honigbehälterf., seltner fehlend. Stbg. unterweibig, frei, zahlreich;

Stbk. angewachsen, mit ein. doppelten Ritze aufspringend. Fruchtkn. mehrere, jeder 1 Gf. tragend; oder in ein. einzigen gelappten verwachsen, mit Gf. tragenden Lappen: od. ein einzelner Fruchtkn. mit ein. einseitigen Samenträger. Früchtch. 1-viel-samig. S. der innern Naht angeheftet. Keim sehr klein, in ein. Grübchen d. Eiweisses. B. an d. Basis in eine halbumfassende Sch. oft erweitert, ohne Nebenblätter.

1. Gruppe, *CLEMATIDEEN*. DC. syst. I. p. 131. Knospenlage des K. klappig od. einwärts-gefaltet. *Stbk. lineal., auswärts aufspringend.* Früchtch. Isamig, nicht aufspringend; B. gegenst.; W. faserig. S. hängend.

1. *CLÉMATIS* (Linn.) Walldrebe. — K. blumenblattig, 4-5 blättrig; in d. Knospenlage klappig od. einwärts gefaltet. Blkr. fehlt. Früchtch. nussartig, Isamig.

1. Rotte. *FLAMMULA*. DC. syst. I. p. 133. Hälfte fehlend. Schweife d. Früchtchen lang, bärtig.

§ 1. Krautige, aufrechte.

1. *C. INTEGRIFOLIA*. (L.) Ganzblättrige W. — St. aufrecht; *B. eyf.-lancettl. od. eyf., spitz, ganzrandig*, kahl, auf d. Adern unterseits flaumh.; Bth. überhängend; KB. länglich, spitz. 4. Auf feuchten Wiesen, (längs d. Donau in Oestr., auch bei Passau; um Duino u. Aquileja) Jun. Jul. *C. inclinata* Scop. J. a. t. 363. Bth. violett, am Rande auswendig filzig.

2. *C. RECTA* (L.) Steife W. — St. aufrecht; *B. gefiedert*; Blättch. eyf., zugespitzt; KB. länglich, stumpf, kahl, am Rande auswendig flaumh. 4. Auf trocknen Wiesen, rauhen büschigen O., (in d. südl. Schw., in Krain, v. da deh. Oestr. u. d. Donau hinauf bis Regensb., deh. Böhm., u. im Flussgebiete d. Elbe bis Barby; im Mainthale v. Würzburg. bis Frankfurt.) Jun. Jul. *C. erecta* All. St. h. S. Bth. weiss.

§ 2. Strauchartige, kletternde.

3. *C. FLAMMULA* (L.) Scharfe W. — St. kletternd; *B. doppelt-gefiedert*; Blättch. eyf., länglich od. linealisch, ganzrandig, ungeth. od. 2-3sp.; KB. länglich, stumpf, unterseits am Rande filzig. 6. An felsigen O., liegend, im Gebüsch kletternd, (im Oesterreichischen Littoral u. in Istrien: nicht in d. Schw. v. Salis M.) Jun. Jul. *C. cespitosa* Scop. Bth. weiss. Var.:

β. *maritima*, Blättch. lineal. *C. maritima* Lam. u. Var. γ. Blättch. rundlich *C. fragrans* Ten.

4. *C. VITALBA* (L.) Gemeine W. — St. kletternd; *B. gefiedert*; Blättch. eyf., zugespitzt, ganzrandig, grob-gesägt, od. etwas gelappt, a. d. Basis meist herzf.; KB. länglich, auf beiden Seiten filzig. 6. An Zäunen u. im Gebüsch, (d. Ebenen u. niedrigeren Gebirge deh. g. D. u. d. Schw., nicht in Schles.) Jun. Jul. *C. sepium* Lam. — J. a. t. 308. Bth. weiss. Var.: B. an d. Basis eyf. u. nicht herzf.; *C. scandens* Borkh.

II. Rotte VITICELLA. DC. a a. O. Hülle fehlend. Schweife d. Früchtch. kurz, bartlos.

5. C. VITICELLA. (L.) Italienische W. — St. kletternd; B. gefiedert; Fieder 3zählig od. 5zählig-fiederig; Blättch. eyf., ganzrandig, ungeth., od. 2-3lappig; KB. 3eckig-verkehrteyf., stumpf mit einem abwärts gebogenen Spitzchen; *Gf. kahl.* b. Im Gebüsch u. an Zäunen, (im Oestr. Littorale, Triest, Aequileja, Istr.) Mai.-Aug. Bth. satt-violett, od. roth.

2. ATRAGÉNE (L.) Alpenrebe. — K. blumenblattig, 4-5blättrig, in d. Knospenlage einwärts-gefaltet, Blb. zahlreich, viel kleiner als d. K. Früchtch. nussartig, Isamig.

I. A. ALPINA (L.) Alpenrebe — B. doppelt-3zählig, Blättch. gesägt, ungeth., Blb. spatelig, stumpf. b. Auf felsigen O. d. VorA., u. in d. Waldregion d. A., (dch d. g. AK. bis Oestr.) Jul. Aug. St. h. 20. A. austriaca Scop. Clemat. alpina Lam. Bth. violett u. selten weiss nach Gaud. Var. Blättch. lanzettl. und eyf.

Von der Atragene Wenderothii Schlechtend. (Linnæa XI. p. 648), welche in der Schweiz wachsen soll, sah ich noch kein Exemplar, auch erwähnt ihrer kein Botaniker der Schweiz.

II. Gruppe. ANEMONEEN. DC. syst. I. p. 168. Knospenlage des K. u. d. Blkr. dachig. Blb. fehlend od. flach, ohne Schuppe od. Honiggrübchen. Stbk. auswärts aufspringend. S. hängend.

3. THALÍCTRUM (L.) Wiesenraute. — K. fast blumenblattig, 4-5blättrig, in d. Knospenlage dachig. Blkr. fehlt. Früchtch. nussartig, Isamig, auf ein. kleinen, scheibenf. Fruchtb. eingefügt.

I. Rotte TRIPTERIUM. DC. Früchtch. 3kantig, Kanten geflügelt, übrigens glatt u. nicht gestreift, mit einem Stielchen über den Fruchtboden emporgehoben.

1. T. AQUILEGIFOLIUM (L.) Akeleiblättrige W. — Verästlig, d. Bstieles. mit Nebenblättch.; R. fast ebensträussig; *Früchte 3kantig, glatt.* 4. Auf Wiesen, in Wäldern u. Hainen höher gelegener Ebenen, Gebirge, u. VorA.-Regionen, (in d. Schw. u. v. dch. Oberschwaben, Tyrol, Bayern, d. Oestr. Prov., dch. Böhm., Schles. u. Sachs. nach d. Fichtelgeb. u. Thüring., bei Werthheim; in Ostpreussen.) Mai. Jun. St. h. 44. Bth. blass-grasgrün an d. Spitze so wie d. Stbf. lila. Var.: B. auf beid. Seiten meergrün u. Stbf. weiss, u.

β. St. violett, übrigens bereift, Bth. auswendig violett: T. atropurpureum Jacq.

II. Rotte. EUTHALICTRUM. DC. Früchtch. längsfurchig.

§. 1. Früchtch. in ein kurzes Stielchen verschmälert, an d. Spitze mit d. Narbe hakig gebogen.

2. T. ALPINUM (L.) Alpen-W. — St. ganz einfach, fast nackt; *Tr. endst., einfach; fruchttrag. Bthstielch. zurückgekrümmt.* 4. An feuchten O. d. höchsten A., (Tyrol auf d. Seiseralpe, Kärnthen an d. Spitze d. Malnitzer Tauern.) Jun. Jul. St. h. 51. Bth. grasgrün oft purpurn überlaufen. Var. seltner mit einem 2ten kleinem seitenst. Träubchen.

D,

§. 2. Früchtch. sitzend, an d. Spitze gerade.

* R. dem Umfang nach pyramidenförmig od. eiförmig; Bth. zerstreut, od. an d. Spitze d. Aestchen doldig, aber nicht dicht büschelig.

1. Bstiele dreizählig, zsgesetzt, nämlich die untersten Seitenzweige fast von gleicher Länge wie der mittleren.

3. *T. FOETIDUM* (L.) Stinkende W. — St. schwachgerieft u. nebst d. B. v. *abstehenden, einfachen, u. drüsentrag. Haaren* flaumh., besondere Bstiele schwachkantig; Oehrchen der BSch. kurz, ganzrandig; Blättch. rundlich, od. verkehrteiförmig, 3zählig od. 3sp. u. gezähnt; R. abstehend, locker; Bth. u. Stbg. überhangend; N. länglich-eiförmig, franzig-gezähnt; mit *hinterwärts aneinander geschlagenen Seiten*. 2. Auf Felsen d. Athäler, (im Wallis, in d. Thale Saas u. S. Nikolas u. in Graubünden; in Tyrol im Ötztal, bei S. Ivan in Böhmen.) Jul. Aug. Charakterisirt sich v. d. folgenden dch. d. schwachkantigen oft vollkommen runden Aeste d. Bstiele, u. dch. die obersten fast haardünnen Aestchen, dch. kleinere Blättch. u. dch. N., deren Seiten während d. Aufblühens hinterwärts aneinander liegen, u. dch. die Haare. *T. acutilobum* DC. syst. ist eine Variet. mit spitzeren Bzipseln. Variirt ferner:

β. *glabrum* ganz kahl. Sammelte Zuccarini mit den behaarten Exempl. im Ötztal. *T. alpestre* Gaud.?

4. *T. SYLVATICUM*. (Koch Zusätze zu D. Fl. ined.) St. an d. Gelenken gerade, schwach bereift, die Glieder bisweilen schlängelgig; *besondere Bstiele zsgedrückt-stielrund, schwach-kantig*; Blättchen rundlich, dreizählig oder dreispaltig und fünfzählig, unterseits graugrün, kahl; *Oehrchen d. Bscheiden kurz, abgerundet*, zurückgerollt-abstehend; Nebenblättchen fehlend; Aeste abstehend; Bth. zerstreut, fast doldig, *nebst d. Stbg. niederhangend*. 2. Dammerde d. Wälder, (in d. Rheinpfalz bei Kaiserslautern, in Schlesien, im Odergebiet d. Mittelmark u. wahrscheinlich noch anderwärts.) Blüht fast um einen Monat später wie die folgende Art. *T. minus* δ. *strictum* Koch Syn. ed. I. *T. minus* Pollich, wie der angegebene Standort „bei der Eselsferth“ beweist. *T. saxatile* Schlecht. zum Theil; wächst nicht an steinigem O. sondern auf fettem Waldboden. — *T. saxatile* Reichenb. ic. ist wegen der aufrechten Bth. eine andere Art; die Bth. bei unserer sind stets hängend und nie aufgerichtet. Man erkennt die Art lebend sehr leicht an ihrer in fruchtbarem Waldboden weit kriechenden W. u. an den zsgedrückt-stielrunden, schwachkantigen Aesten des Bstieles.

5. *T. MINUS* (L.) Kleinere W. — St. gerieft, etwas bereift; an den Gelenken eingeknickt - hin u. her gebogen; *besondere Bstiele durch hervortretende Linien kantig*. Blättch. rundlich od. keilförmig-verkehrteiförmig, 3zählig od. 3sp. u. 5zählig, unterseits graugrün, kahl od. drüsig-flaumig; *Oehrchen d. BSch. kurz, abgerundet*, gezähnt, *etwas abstehend*; Nebenblättch. fehlend; mittlere Aeste d. R. fast wagerecht spreizend; Bth. zerstreut, fast doldig u. nebst d. *Stbg. niederhangend*. 2. Auf Wiesen, Hügeln, uncultivirten O., (dch. D. u. d. Schw., doch nicht überall) Mai, Jun. Smith. fl. brit. Th. montanum Wallr. *T. majus* J. a. t.

420. ein grosses Explar. KB. grünlich od. purpurn leicht überlaufen. Variet:

a. virens. St. glänzend; B. schwach-bereift. T. montanum *a. virens* Wallr. a. a. O.

β. roridum. St. u. B. bereift; T. minus DC. syst. I. 178. T. montanum roridum Wallr. a. a. O.

γ. glandulosum. St. Bstiele. u. Blättch. unterseits od. auf beiden Seiten mit sehr kurz gestielten Drüsen bestreut; T. pubescens Schleich., DC. syst.; T. montanum glandulosum Wallr.

6. T. MAJUS (Jacq. fl. austr. V. p. 9. t. 430.) St. Grosse W. gerieft, nicht bereift, fast schnurgerade, *besondere Bstiele durch hervortretende Linien kantig*, die untersten sehr weit abstehend; Blättchen rundlich oder keilf. verkehrt-eyf., 3zählig od. 3sp. u. 5zählig, unterseits bleicher, etwas graugrün, kahl; *Oehrchen der Bsch. kurz*, die untern abgerundet, etwas abstehend; Nebenblättchen fehlend; Aeste der R. etwas abstehend; *Bth. zerstreut, fast doldig und nebst d. Stbg. niederhängend*. 4. Wiesen u. Ackerränder. (In der Schweiz, in Oestreich, Böhmen, Schlesien, Brandenburg, Thüringen). Mai. Jun. T. majus Smith fl. brit., DC. syst., T. elatum der deutsch. Auctor. ausser Jacq. T. elatum Gaud. helv. nach d. Synon. Schleichers. T. ambiguum Schleich. aus dem Thale Binn. (T. ambiguum des Willd. Herbars ist eine verschiedene Art aus Russland.) T. minus *ε. dumosum* Koch Syn. ed. I. — T. majus Jacq. führe ich als besondere Art auf, obgleich Jacquin T. majus u. T. minus Linn. nicht getrennt hat. Es unterscheidet sich durch höheren geraderen St., durch Abgehen der Aestchen des Bstiels unter e. rechten Winkel und geringeres Abstehen der Aestchen d. R. In d. Herbarien ist es schwer von T. minus zu unterscheiden. Die Variet. mit längeren u. dünneren Bthstielen ist T. capillare Reichenb. ic.; aus den Samen dieses, mir von Buck überschickten, erwuchs T. majus.

7. T. JACQUINIANUM (Koch.) St. gerieft, ganz kahl, glänzend, unbereift; *besondere Bstiele durch hervortretende Linien kantig*; Blättch. rundlich, verkehrt-eyf., 3sp., 5-9zählig, grün, unterseits bleicher; *Oehrchen d. Bsch. verbreitert, abgerundet, wagerecht abstehend, zuletzt zurückgerollt*; *d. erste Verzweigung d. Bstiele oft mit Nebenblättchen*; Aeste d. R. etwas abstehend u. nebst d. besonderen Bstielen etwas schlängel. *Bth. zerstreut u. nebst d. Stbgf. niederhängend*. 4. Hügel u. trockene Wiesen (in Oestreich, Schlesien, Thüringen). Jun. Jul., blüht fast um ein. ganzen Monat später als T. minus L. — T. minus Jacq. austr. — Unterscheidet sich von T. minus L. durch den glänzenden, wenig gerieften St., d. grosse R. mit kleinen zahlreichen gleichvertheilten Bl., die schlängelichen unten beblätterten Aestchen d. R., die Nebenblättchen in der ersten Verzweigung d. Bstiele, d. grüne Farbe d. B. u. d. kleinen Früchtchen. — Von T. Jacquinianum unterscheidet sich T. flexuosum Reichenb. (T. minus saxatile Gaud. fl. helv. nach Exemplaren v. Berg Saleve, T. saxatile DC. herbar., nach Gaud.) durch die Abwesenheit d. Neben-

blättchen. Wir besitzen es jetzt lebend im bot. Garten, doch konnte ich es noch nicht genauer beobachten. *T. flexuosum* Bernhardsi, von welchem ich durch die Güte des Autors Exemplare erhielt, hat deutliche Nebenblättchen.

8. *T. ELATUM* (Jacq.) Hohe W. — St. gefurcht, bereift: Blättch. rundlich od. verkehrteylf., bis 7zählig, graugrün und matt: Oehrchen d. B. Sch. kurz, abgerundet, gezähnel, etwas abstehend; Nebenblättch. fehlend: R. ausgebreitet: Aeste abstehend, steif: Bth. fast doldig u. quirlig; *Bthstielch.* Bth. u. Stbg. gerade-hervorgestreckt; W. faserig. 4. Auf Hügeln, (bei Fiume, Noé.) Jun. Jul. Habitus, graugrüne Farbe u. d. Gestalt d. B. fast wie *T. minus*, aber die Aeste sind tief gefurcht, Bthstiele dicker, fast sämmtl. doldig, u. immer aufrecht, od. gerade hervorgestreckt; d. Stbg. nicht hängend ausser zuletzt, wenn sie vertrocknen. J.

Thalictrum medium Jacq. wächst nicht in Oestreich; die Hostische Pflanze dieses Namens gehört nach Exemplaren, welche Dolliner an den von Host bezeichneten O. gesammelt hat, zu *T. angustifolium*. *T. medium* Jacq. steht gleichsam in d. Mitte zwischen *T. minus* u. *T. flavum*; von jenem unterscheidet es sich durch das Fehlen der graugrünen Farbe, die grösseren a. den St. angedrückten Oehrchen, die kleineren gelbl. Bth., die während des Blühens aufgerichteten Stbg. und die nur halb so grossen Früchtchen; von letzterem durch den breit-dreieckigen Umfang d. B., die nicht längl. Oehrchen d. oberen B., den weniger tief gerieften St., die nicht dichtgedrängten Bth. und die kurz-be-spitzten Stbk.

2. Bstiele federartig zsgesetzt; die untersten Seiten-Aeste deutlich kürzer als der mittlere.

9. *T. SIMPLEX* (L.) Einfache W. — St. gefurcht; Blättch. länglich-keüf., 3sp. u. ungeth., länglich, matt; Oehrchen d. obern B. eyf.-länglich, zugespitzt, gezähnel; R. länglich-pyramidenf.; Aeste traubig; Bth. zerstreut, nickend; W. kriechend. 4. Auf kräuterreichen Hügeln, auch an sumpfigen O. (Harz, Hampe; Holstein, Nolte; Schw. im Wallis, sowohl auf Flächen, als auch auf d. A.) Jun. Jul. *T. minus*, fl. dan. t. 244.

10. *T. GALIODES* (Nestler.) Labkrautartige W. — St. gefurcht; Blättch. spiegelnd, lineal, ungeth., die endst. oft 3sp.; Oehrchen d. obern B. eyf.-länglich, zugespitzt, gezähnel; R. länglich-pyramidenf.; Aeste traubig; Bth. zerstreut, nickend; W. kriechend. 4. Auf Wiesen u. Heiden, (Graubünden, sodann auf d. Rhein-fläche, bei Basel, in d. Rheinpfalz, in Oberschwaben, Oberbayern, Kärnthen, Steyermark, Oestrich, Böhm.) Jul. *T. angustifolium* Poll. u. zum Theil Linnés gleichnamige Pfl. Von *T. simplex* blösch. d. schmälern glänzenden Blättchen verschieden.

** Ripse fast ebensträussig. Bth. an d. Spitze d. Aeste u. Aestchen gedrängt, Früchte daselbst in dichten Büscheln.

1. Bstiele dreizählig zsgesetzt.

11. *T. ANGUSTIFOLIUM* (Jacq.) Schmalblättrige W. — St. gefurcht; Blättch. länglich-keilf., od. lineal., ungeth. u. 3sp., glänzend, unterseits *bleicher, feinlaunig*; Ohrchen d. obern BSch. *eyf., zugespitzt* ohne Nebenblättch., R. fast *ebensträussig*; Bth. an d. Spitze der Aestchen *gehäuft* u. *nebst d. Stbg. aufrecht*; W. *faserig*. 4. Auf feuchten Wiesen. (Basel; sodann von Oberbayern dch. Salzbg, Tyrol nach Oestr., Böhm., Schles., Sachsen bis Halle; Cant. Tessin.) Jun. Jul. *T. Baulini* Spreng. *T. Bauhinianum* Wallr. *T. angustif.* L. z. Theil. *T. nigricans* Gaud. Scheiden u. Bstiel der untern B. fast immer *launh.* Var.:

a. stenophyllum. Blättch. d. unt. B. lineal, zugespitzt, d. obern fast *fadenf.* *T. angustif. stenophyllum* W. u. G. siles. 2. 157.

β. heterophyllum. Blättch. d. unt. B. länglich, d. obern lineal., sämmtl. ungeth., od. die endst. 3sp.: *T. angustif. heterophyllum* W. u. G. siles. 2. 157. *T. nigricans* DC. (nicht Jacq.) *T. Morisoni* Gmel. nach c. Exemplar v. angegebenen StandO.

γ. laserpitiiifolium. Blättch. sämmtl. länglich, die d. obern B. ein wenig schmaler, sämmtl. ungeth. od. die endst. 3sp.: *T. lucidum* DC. *T. laserpitiiif.* Willd. (*T. lucidum* L. scheint zu *T. medium* zu gehören.)

2. Bstiele fiederartig zgesetzt.

12. *T. FLAVUM* (L.) Gelbe W. — St. gefurcht; Blättchen verkehrt, eyf.-keilf., ganz od. 3sp., unterseits *bleicher*, die d. obern B. lineal.; Ohrchen d. BSch. länglich-eyf. zugespitzt, *breiter als d. Breite der Sch.*; d. untern Verästlgn. d. Bstieles mit Nebenblättch.; R. fast *ebensträussig*; Bth. an der Spitze der Aestchen *gehäuft* und *nebst d. Stbg. aufrecht*; W. *kriechend*. 2. Auf feuchten Wiesen, (in allen Provinzen, jedoch nicht überall.) Jun. Jul. *T. nigricans* J. a. 3. t. 241. *T. anonymon* Wallr. — *T. heterophyllum* Lej. ist Variet. mit schmälern weniger gezahnten B. — Bth. wie bei den vorhergehend. schmaler, weisslich mit gelben spitzelosen Stbk. B. im Umrisse fast längl.-3eckig.

13. *T. RUFINERVE* (Lej. u. Curtois.) Rothnervige W. — St. gefurcht, glänzend; Blättch. unterseits *meergrün*, die d. unt. B. verkehrteyf., 3sp., die d. obern länglich-lineal., ungeth., 3zählig; Ohrchen d. obern BSch. *eyf., zugespitzt, ohne Nebenblättch.*; Aeste d. R. *gleichhoch* und *gleichlaufend-aufrecht*; Bth. an d. Spitze d. Aestchen *gehäuft* u. *nebst d. Stgf. aufrecht*; W. *faserig*. 4. Bei Blisten in dem Gebiete der Fl. v. Spaa Lejeune! Jun. Jul. St. bis 5 F. hoch, glänzend, nebst d. B. sehr kahl, oft purpurn. B., auch die obern, dem Umrisse nach *breit-3eckig*, unterseits *meergrün*, bereift. D.

14. *T. EXALTATUM* (Gaud. helv. 3. p. 515. 1828.) St. gefurcht, glänzend; Blättchen unterseits sowie die Sch. mit sitzenden sehr kleinen Drüsen bestreut, lanzettl. ganz od. keilig u. 2 od. 3sp.; Ohrchen d. Sch. *kurz, rundl., schmaler als d. Durchmesser der Sch.*, die obersten spitz; Nebenblättchen meist fehlend; Aeste

der ebensträussigen R. abstehend: *Bth. a. d. Spitze d. Aestchen gehäuft u. nebst d. Stbgf. aufrecht*; W. kriechend. 4. An Flussufern d. südl. Schw. (zwischen Gebüsch an d. sandigen Ufer der Adda bei Morben im Veltlin u. bei Mendrisio C. Tessin, v. Salis, Marschlin.) Jul. Aug. Früchtchen fast kugelig, ob immer? S.

4. ANEMONE (L.) Windröschen. — K. blumenblattig. 3-mehrblättrig, in d. Knospenlage dachig. Blkr. fehlt. Früchtchen nussartig. Isamig, auf einem verdickten halbkugelf. od. kegelf. Fruchtb. eingefügt.

1. Rotte. HEPATICA. B. d. Hülle 3zählig, sitzend, ungetheilt, kleiner als d. Bth. derselben sehr genähert, einen K. darstellend. (Der zellig-behaarte Fruchtb. ist bei *Anemone baldensis* u. *sylvestris* nicht weniger deutlich)

1. A. HEPATICA (L.) Dreilappiges W. — B. 3lappig, ganzrandig. 4. In Hainen u. Laubwäldern niederer Gebirge u. d. Vor-ÄRegionen, (dch. d. g. Gebiet, aber nicht allenthalben.) März. Apr. *Hepatica triloba* DC. St. h. 7. Bth. blau, seltner rosenroth u. weiss.

II. Rotte. PULSATILLA. HüllB. 3zählig, sitzend, gefingert-vielth., an d. Basis in eine Sch. verwachsen. Früchtch. in ein langes, bärtiges Schweifchen ged. hnt. Gestielte Drüsen bei sehr vielen zw. den KB. u. Stbg.

2. A. VERNALIS (L.) FrühlingsW. — HüllB. sitzend, gefingert-vielth., WB. gefiedert. Blättch. eyf., 3sp.; Zpfl. ganz, 2-3zählig; Zähne od. Läppchen eyf.; Früchtch. u. der vielmal, als dieses, längere Schweif rauhh. 4. Auf d. Weiden sowohl d. niedrigeren, als d. höchsten A. bis z. ewigen Schnee; auch auf niedrigeren Gebirgen, (Böhm., Schles., Sachs., Brandenb., Pommern, Preussen; auch in d. Rheinpfalz.) Apr. Mai. St. h. 24. *Pulsatilla vernalis* Mill. Bth. weiss, auswendig mehr od. weniger violett überlaufen.

3. A. HALLERI (Allion.) Haller's W. — HüllB. sitzend, fingerig-vielth.; WB. zottig, gefiedert, 2paarig; Zpfl. lineal-lanzettl., ganz od. 2-3zählig od. 2-3spaltig; Bth. aufrecht; Früchtch. u. d. vielmal längere Schweif rauhh. 4. Auf d. A. u. niedrigeren O. (südl. Schw., Steyermark, Oestr. Boehm.) Apr. Mai, in d. A. Jul. Aug. *A. Halleri et Hackelii* Koch Synops. ed. I. *A. Halleri* Allion. ped. t. 80. f. 2. schlechte Abbildg. Bth. lila, bei *A. Hackelii* Tausch dunkelviolett.

4. A. PULSATILLA (L.) Violette W. — HüllB. sitzend, fingerig-vielsp.; WB. 3fach-fiedersp.; Zpfl. lineal., verschmälert-spitz; Bth. zieml. aufrecht; KB. noch einmal so lang als die Stbgf., an d. Basis glorlig, endlich v. d. Mitte an zurückgebogen-abstehend, spitz, od. stumpf mit einem Spitzchen; Früchtch. u. ihr vielmal, als sie, längerer Schweif rauhh. 4. Auf sonnigen Hügeln u. Heiden, (dch. d. g. Gebiet, doch nicht aller O.) Apr. *Pulsatilla vulgaris* Mill. St. h. 7 u. 46., die Richtg. der KB. in beid. Abbildgn. schlecht. *Anemone Pulsatilla a. praecox* Gand. *A. acutipetala* Schleich. u. *A. tenuifolia* Schl. Bth. anfangs satt-violett zuletzt bläulich. Var.

β. *Bogenhardiana* mit dunkler violetten Bth.: *Pulsatilla Bogenhardiana* Reichenb. ic. P. media Bogenh. in d. bot. Z. Die Pfl. möchte noch weiter zu untersuchen sein, denn die Blüten beobachtete ich bei der gewöhnl. Pfl. nickend, selbst überhängend und die Stbk. länger u. kürzer. Eine sehr schöne Variet. mit vielzähl. KB. übersandte mir Bogenhard.

5. A. MONTANA (Hoppe bei St. h. 46.) Berg-W. — HüllB. sitzend, fingerig-vielth., WB. 3fach, fiedersp., Zpf. lineal., spitz; Bth. überhängend. KB. gerade, mit d. Spitze auswärts gebogen, noch einmal so lang als d. Stbgf., anfangs glockig, zuletzt abstehend. Früchtch. u. ihr vielmal, als sie, längerer Schweif rauhh. 4. Auf sonnigen Hügeln, (im Oestr. Littorale bei Triest u. im südl. Tyrol bei Botzen.) Apr. Mai. Anem. *Pulsatilla nutans* Gand. Schwarz-violette Bth. charakt. sie sogleich v. den vorhergehenden. Fortgesetzte Beobachtungen zeigten mir, dass d. Länge d. Stbk. sehr veränderlich ist. Aber eben so sicher ist meine Beobachtung, dass sich d. KB. sternf. ausbreiten, jedoch nur bei heiterm Himmel. Die Bth. dieser, so wie die d. vorhergehenden Pfl. erscheinen bald mit den Blättern gleichzeitig, bald später.

6. A. PRATENSIS (L.) Wiesen-W. — HüllB. sitzend, fingerig-vielth.; WB. 3fach-fiedersp.; Zpf. lineal; Bth. niederhängend; KB. glockig-zsschliessend, an d. Spitze zurückgerollt; Stbgf. fast so lang als d. KB. Früchtch. u. ihr vielmal, als sie, längerer Schweif rauhh. 4. Auf Sandhügeln u. Heiden, (in Böhm., Schles., Sachsen u. v. Thüringer Walde bis an d. Ostsee u. bis Ostpreussen, v. Thüringer Walde südlicher bis jetzt nicht beobachtet.) Apr. *Pulsatilla pratensis* Mill. St. h. 46. Bth. schwarz-violett, KB. immer aufrecht u. in d. Form ein. Glocke gestellt mit zurückgerollter Spitze. Stbg. fast so lang als d. glockige Theil d. Bth. D.

7. A. PATENS (L.) Ausgebreitetes W. — HüllB. sitzend, fingerig-vielth., WB. 3zählig; Blättch. meist 3th.; Zpf. länglich an d. Spitze eingeschnitten-2-3zählig od. vielsp. mit lineal. Zipfelchen; Bth. ziemlich aufrecht; KB. abstehend-glockig, an d. Spitze aufrecht. 4. Auf uncult. O., sonnigen Hügeln, Heiden, (dch. Preussen bis nach Frankf. a. d. O. nach Schles., u. d. Lausitz u. n. Böhm., westlicher nicht weiter, nur noch in d. Gegend v. München als einzeln. Punkt.) Apr. *Pulsatilla patens* Mill. St. h. 52. Bth. blau-violett u. (nach d. Fl. altaica) auch rosenroth od. gelblich, selten weiss. Das mittlere Blättch. sitzend od. gestielt, mit oft $\frac{1}{2}$ Zoll langem Stiele. Var. mit vielsp. Blättch. A. *Wolfgangiana* Bess. Rehb. ic. t. 351. D.

III. Rotte. ANEMONANTHEA. DC. HüllB. sitzend, ganz, od. fingerig-eingeschnitten, v. d. Bth. entfernt. Gl. an d. Frucht wenig verändert, u. nicht in ein. Schweif verlängert.

8. A. HORTENSIS (L.) Garten-W. HüllB. sitzend, länglich, ungeth., od. an d. Spitze 3sp.; WB. 5theilig; Zpf. 3sp., gezähnt u. eingeschnitten, an d. Basis keilf., die seitenst. zssfliegend; Bth. einzeln; KB. meist zu 12; lanzettl.; Früchtch. wollig, fast so

lang. als d. Gf. 2. Im Gebüsch u. auf Wachholderfeldern, (im C. Waadt u. Wallis selten; in Istrien u. um Fiume.) Febr. März. A. stellata Lam. St. h. 46. Bth. rosenroth. S u. J.

9. A. NARCISSIFLORA (L.) Narzissenblüthiges W. — HüllB. sitzend, eingeschnitten: WB 5th.; Zpf. am Rande übereinand. gelegt, 3sp. u. eingeschnitten mit lineal. Zipfelchen: Bth. doldig; KB. meist zu 5, elliptisch; Früchtch. kahl. 2. Auf Wiesen u. A.-Weiden, seltner in d. VorA., (in d. Schw. gemein u. v. da dch. d. g. AK., sodann in d. Sudeten.) Mai-Jul. J. a. t. 159. Bth. weiss.

IV. Rotte. PREGNANTUIS, DC. HüllB. 3zählig, auf ein. kurzen, erweiterten Bstiele sitzend. v. d. Gestalt der WB. wie in d. folgd. Rotte. Früchtch. in einen langen, bärtigen Schweif gedehnt, wie in d. 2ten Rotte.

10. A. ALPINA (L.) Alpen W. — WB. 3zählig, doppelt zsgesetzt, Zpf. eingeschnitten u. HüllB. 3zählig, kurzgestielt, gleichgestaltet; Bth. einzeln; KB. meist zu 6; Früchtch. u. d. vielmal, als sie, längere Schweif rauh. 2. Auf Weiden, kiesigen u. steinigen O. d. A. u. VorA., (dch. d. g. AK.; auch in d. Sudeten auf d. Brocken u. Hoheneck in d. Vogesen.) Mai-Jul. Bth. weiss. St. h. 51. J. a. t. 85. Var.: Bth. grösser u. kleiner, KB. breiter u. schmaler; B. mehr od. weniger eingeschnitten u. rauh. u.

β. sulphurea, Bth. schwefelgelb; A. sulphurea L. A. apifolia Wulf.

Eine kleinere Var. mit schmälern KB. ist Pulsatilla alba Reib.; u. ein. grössere Var. mit breiteren, weissen, od. hellgelben KB., mit längeren, eingeschnitten-gesägten Blfiederchen: Pulsatilla Burseriana Reib., Anemone myrrhidifolia Vill.

V. Rotte. ANEMONE. HüllB. 3zählig, gestielt; WB. wenn sie da sind, gleichgestaltet. Gf. an d. Frucht wenig verändert, u. nicht in ein. Schweif verlängert. Die wurzelst. B. fehlen oft.

11. A. BALDENSIS (L.) Baldisches W. — HüllB. den WB. gleichgestaltet, kurzgestielt; WB. 2-3zählig, Blättch. 3th.; Zpf. 3zählig; Bth. einzeln; KB. meist zu 9, elliptisch-länglich, unterseits zottig; Früchtch. wollig, fast so lang als d. kahle Gf. 2. Auf d. AWiesen u. steinigen, kiesigen O. d. höchsten A., (dch. d. g. AK.) Jul. Aug. St. h. 14. A. fragifera Wulf. A. alpina Scop. Bth. weiss, auswendig oft violett überlaufen.

12. A. SYLVESTRIS (L.) Wildes W. — HüllB. d. WB. gleichgestaltet, gestielt; WB. 5th.; Zpf. fast rautenf., 3sp., ungleich-gesägt; Bth. einzeln; KB. meist zu 5, eyf., unterseits zottig. Früchtch. filzig; Gf. kahl, sehr kurz. 2. Auf sonnigen Hügeln, in büschigen Gebirgen auf Kalk- und Leimboden. Mai, Jun. Bth. weiss.

13. A. NEMOROSA (L.) Busch-W. — HüllB. 3zählig, gestielt; Bstiel. fast halb so lang als d. B.; Blättch. eingeschnitten-gesägt, das mittlere 3sp., an d. Basis keilig, die seitenst. 2sp., an d. Basis schieff-eyf.; Bth. einzeln; KB. meist zu 6, länglich, stumpf, auf beiden Seiten kahl; Früchtch. flaumh., so lang als d. Gf. 2. In Wäldern, Hainen, Waldwiesen d. Ebenen u. Berge. März. Apr. St. h. 14. Bth. weiss, auswendig oft rosenroth, seltner

ganz rosenroth od. purpurn. WB. fehlen meistens, wie bei den zwei folgenden.

14. *A. RANUNCULOIDES* (L.) Ranunkelartiges W. — *Hüllb.* 3zählig, gestielt, *Bstiel*, vielmal kürzer als die B., Blättch. eingeschnitten-gesägt, das mittlere 3sp., an d. Basis keilf., die seitenst. 2sp., an d. Basis etwas schief; Bth. meist zu 2; KB. oval, leicht ausgerandet, *unterswärts flaumh.*; Früchtch. flaumh., fast so lang als d. Gf. 4. In Hainen, Wäldern, u. auf Waldwiesen, (dch. d. g. Gebiet, aber nicht allenthalben.) Mai. St. h. 7. Bth. nebst d. Stbg. gelb.

15. *A. TRIFOLIA* (L.) Dreiblättriges W. — *Hüllb.* 3zählig, gestielt; *Blättch.* breit-lanzettl., zugespitzt, *ungeth.*, gesägt, an d. Basis ganzrandig; Bth. einzeln; KB. meist zu 6, oval-länglich auf beiden Seiten kahl. 4. In Wäldern u. büschigen O., bis z. d. A. hinaufsteigend, (im südl. Tyrol, Krain u. Kärnthen.) Apr. in den Alpen später. St. h. 14. D.

5. *ADONIS* (Linn.) Adonis. — K. 5blättrig. Blb. flach, od. konkav, ohne Nagel- u. Honiggrübchen. Früchtch. nussartig, 1samig.

I. Rotte. *ADONIS*, DC. syst. 4. 221. Früchtch. mit ein. aufrechten od. aufstrebenden Gf. W. jährig.

1. *A. AUTUMNALIS* (L.) Herbst-A. — K. kahl, abstehend, v. den halbkugelig-zsschliessenden Blb. entfernt; Früchtch. zahnlos, in d. *geraden Schnabel* auslaufend ☉. Zw. Saaten d. südlicheren Gegenden, (bei Pola in Istrien, in d. südl. Schw., in Wallis bei Leitron, Contei u. s. w., in d. nördl. Schw. u. in D. hin u. wieder dch. verschleppte Samen.) Mai-Herbst. Bth. bluthroth, an d. Basis schwarz. Expl. wild bei Pola gesammelt, theilte mir Tommasini mit.

2. *A. AESTIVALIS* (L.) Sommer-A. — K. kahl, an die ausgebreiteten Blb. angedrückt; Früchtch. an d. obern Rande 2zählig mit ein. spitzen Zahn an d. Basis; *Schnabel aufstrebend, gleichfarbig*. ☉. Zw. Saaten auf Kalk- u. Lehm Boden. Jun. Jul. *A. miniata* J. a. t. 354. („KB. sehr kahl“ Jacq. a. a. O.) *A. flava* Schlecht. *A. maculata* Wallr. *A. ambigua* Gaud. *A. aestiv.* Rb. ic. fig. 490-94. Diese Art ist nach der schönen Abbildg. von Camerarius, vergl. epit. 648, die Linnäische *Adonis aestivalis*. Bth. mennigroth, mit ein. schwarzen Flecken a. d. Basis bezeichnet od. einfarbig. Var.:

β. *pallida*. Bth. strohgelb.: *A. citrina* Hoffm. *A. flava* Vill. cat. du jard. Strassb. K. immer kahl, od. schwach mit 1 od. 2 Haaren gegen d. Basis bewimpert.

3. *A. FLAMMEA* (Jacq.) Brennendrothe A. — K. rauhh., an die ausgebreiteten Blb. angedrückt; Früchtch. an ihrem obern Rande vor dem *aufstrebenden*, an der Spitze *brandigen Schnabel* mit einem abgerundeten Zahne ☉. Zw. Saaten, (in der südl. Schw., auf d. Rheinfläche, im Nahethal, in Oestr., Thüringen, Braunschw.) Jun. Jul. Reichb. ic. f. 493. 496. *A. anomala* Wallr. *A. aestivalis* Gaud. Bth. mennigroth, an d. Basis mit u. ohne schwarzen Flecken. Var.:

β. pallida. Bth. strohgelb: *A. citrina* DC.?

II. Rotte. *CONSILIGO*. Früchtch. mit ein. abwärts hakenf. Gf. W. perennirend.

4. *A. VERNALIS* (L.) Frühlings-A. — K. flammh.; Früchtch. etwas kugelig-verkehrtcyf., runzlig, flammh., vor d. Spitze geschnäbelt; fruchttrag. Bstiele aufrecht; *die wurzelst. B. schuppenf.*, die stengelst. sitzend mit schmal-lineal. Bzipfeln. 4. An sonnigen uncultiv. O. auf Kalkboden, (in Wallis, im Elsass, i. d. Rheinthal v. Dürkheim bis Bingen; Oberbayern, Böhm., Thüringen, Frankf. a. d. O.) Apr. Mai. St. h. 56. *A. apennina* J. a. I. 27. Bth. hellgelb. Var. mit kahlen und an d. Basis härtig-flammh. B. — *A. apennina* L. untersch. sich dch. die kurzen, lanzettl. Bzipfel, die sehr kahlen KB. u. die eyf.-elliptisch. od. verkehrt-eyf. Blb.; *A. pyrenaica* durch eyf., glatte, an d. Basis quer-herandete, an d. Spitze in einen zsgedrückten, eingerollten Schnabel auslaufende Früchtch. u. langgestielte WB.

III. Gruppe. *RANUNCULEEN*. DC. Knospenlage des K. u. der Blkr. dachig; Blb. an d. Basis dch. eine Schuppe vergrößert, od. mit ein. honiggrubigen Oeffnung versehen.

6. *MYOSURUS* (L.) Mäuseschwanz, — K. 5blättrig, KB. an d. Basis abwärts in ein. Sporn gezogen. Blb. 5, mit ein. fadenf. Nagel; Platte mit ein. an d. Basis etwas röhrenf. Honiggrübchen. Früchtch. nussartig, 1samig.

1. *M. MINIMUS* (L.) ☉, auf Aeckern u. vorzügl. an im Winter überschwemmten O. Mai, Jun. St. h. 11. *Ranunculus myosurus* Afzel. Blb. weisslich.

7. *CERATOCEPHALUS* (Moench.) Hornköpfchen. — K. 5blättrig. Blb. mit ein. honiggrubigen Nagel. Früchtch. nussartig, 1samig mit 2 leeren Fächern.

1. *C. FALCATUS* (Pers.) Sichelsamiges H. — Früchtch. auf d. Rücken zw. den Höckern *rinnig*. Schnabelgebogen. ☉. Auf Brachfeldern u. Aeckern, (Oestrich. bei Wien; bei Ulm zw. d. Donau u. Ihm häufig) März. *C. spicatus* Mch. *Ranunculus falcatus* L. spec. J. t. 48. *R. testiculatus* Crantz. Bth. gelb. D.

2. *C. ORTHOCERAS* (DeCand) Geradhörniges H. — Früchtch. auf d. Rücken *hahnenkammf.*, Kamm, fast 4eckig, Schnabel fast gerade. ☉. Auf trocknen Hügeln, (Böhm. bei Prag Fieber!) *C. falcatus* Fieb. bei St. h. 56. März. Apr. D.

8. *RANUNCULUS* (L.) Hahnenfuss. — K. 3-5blättrig. Nagel d. Blb. mit einem nackten, od. mit einer Schuppe versehenen Honiggrübchen. Früchtch. nussartig, 1samig.

I. Rotte. *BATRACHIUM*. DC. Bth. weiss mit ein. hellgelben Nagel. Honiggrübchen weder v. ein. Schuppe bedeckt, noch mit ein. hervortretenden Rande versehen. Früchtch. quer gestreift runzlig, oberwärts u. unterwärts schwach bekielt, übrigens unberandet. Wasserpflanzen untergetaucht od. schwimmend.

1. *R. HEDERACEUS* (L.) Epheublättriger H. — *B. sämmtl. gleichf., nierenf., stumpf-5lappig*; Früchtch. etwas gedunsen, querrunzig, unberandet, kahl, an d. Ende kurz hespitzt. 4. In reinen Quellen u. Bächen mit kaltem Quellwasser (im Rheinthale u. d. Nebenthälern v. Basel bis in d. Niederlande ab. selten, sodann in Hessen u. dch. Niedersachsen bis Oldenburg u. Holstein; östl. nicht vorkommend.) Mai-Sommer. St. h. 67.

2. *R. AQUATILIS* (L.) Wasser-H. — *Untergetauchte B. borstlich-vielsp., gestielt; Zpfl. nach allen Seiten abstehend; die schwimmenden nierenf., lappig; St. stumpfkantig; Blb. verkehrt-eyf.; Stbg. länger als d. Köpfch. der Fruchtkn.*; Früchtch. etwas gedunsen, quer-runzig, unberandet, steifh., an dem Ende kurz bespitzt. 4. In stehenden Wassern u. Bächen. Jun.-Aug. *R. heterophyllus* Wigg. Bthknopf eyf.-kugelig. N. sitzend ohne Gf., auf d. Fruchtknoten aufliegend. Variirt:

α. peltatus: Schwimmende B. herzf.-rundlich bis über d. Mitte 3sp., d. Seitenzpfl. 2- od. 5lappig, der mittlere Lappen mit 3, die seitlichen mit 2 Kerben; *R. aquatilis β. peltatus* DC. *R. peltatus* Schrank. St. h. 67.

β. truncatus: dieselbe Var., aber die B. an d. Basis gestutzt, nicht herzf. St. h. 67.

γ. quinquelobus: Schwimmend. B. 5lappig, Lapp. nicht gekerbt.

δ. succulentus: kommt an ausgetrockneten O. ausserhalb d. Wassers wachsend vor; St. kurz, aufstrebend, dicht-beblättert; B. sämmtl. vielsp.; Zipfelchen fadenf. dicker, saftig.

3. *R. PETIVERI* (Koch). Petivers H. — *Die untergetauchten B. borstlich-vielsp., gestielt; Zpfl. nach allen Seiten abstechend; d. oberen schwimmenden dreigeth.* od. tief dreisp.; *Zpfl. dreieckig-verkehrt-eyf., zwei-dreisp. gekerbt od. gezähnt, die unteren schwimmenden oft dreizählig; Blättchen länglicher gestielt, verkehrt-eyf., fächerf; St. stumpfkantig; Blb. verkehrt-eyf.; Stbgf. länger als das Köpfchen des Fruchtkn.*; Früchtchen gedunsen, querverunzelt, unberandet, rauh od. kahl, a. d. Ende kurzbespitzt. 4. In stehenden Wassern u. Bächen. Jun. Aug. Exempl. ohne schwimmende B. sind kaum v. d. vorigen zu unterscheiden. Var:

α. minor, die unteren schwimmenden B. sind seltener dreizählig. *R. Petiveri* Koch bei St. h. 82. t. 7. *R. tripartitus* Nolte novit. *R. tripartitus β. obtusiflorus* DC.

β. major, d. unteren schwimmenden B. oft dreizählig, dabei eines od. d. andere B. zuweilen in haarf. Zpfl. zerschlitzt. *R. aquatilis δ. tripartitus* Koch Synops. ed. 1. St. h. 67. *R. triphyllus* Wallr. in d. Linnaea.

R. tripartitus DC. syst. *α micranthus* mag den Namen des *R. tripartitus* beibehalten; er ist der Variet. *α* des *R. aquatilis* ähnlich, hat aber dreimal kleinere B., kleinere Bth., spitzliche Blb. und zeichnet sich besonders durch dichter gerunzelte und abge-

rundet-stumpfe Früchtchen aus; im deutschen Gebiete ward er noch nicht aufgefunden.

4. *R. PAUCISTAMINEUS* (Tausch pl. select. Boh.) *B. sämmtlich untergetaucht, borstlich-vielsp.*, gestielt; Zpfl. nach allen Seiten abstehend; Blb. verkehrt-eyf.; *Stbgf. meist 12*, länger als das Köpfchen der Fruchtkn.; Früchtchen etwas gedunsen, quer-runzlig, unberandet, meist ein wenig steifhaar., a. d. Ende kurzbespitzt; Fruchtb. fast kugelig. 4. Stehende Wasser u. Bäche, (bei Lissa in Boehmen u. bei Kaiserslautern in d. Rheinpfalz) Jun. Jul. *R. aquatilis* ε , *pantothrix* Koch Syn. ed. I. St. h. 67. Der Fruchtb. ist borstlich-behaart, wie in der ganzen Abtheilung, *R. hederaceus* ausgenommen.

An d. äussersten Grenze der Flora Frankreich's, wo diese in die deutsche übergeht, bei Saarburg in Lothringen ward eine neue Art des *R. aquatilis* aufgefunden, die man vielleicht auch bei uns treffen könnte.

5. *R. BAUDOTH* (Godron ess. sur les Renoncles etc.) Baudot's H. *Die untergetauchten B. borstl.-vielsp.*, gestielt; Zpfl. nach allen Seiten abstehend, die schwimmenden dreitheilig, mit fächerf. eingeschnitten-3—4zähligen Zpfln.; Blb. verkehrt-eyf.; *Stbgf. länger als d. Köpfchen d. Fruchtkn.*; *Früchtchen* etwas gedunsen, quer-runzlig, kahl, *ungefähr 100* in einem Köpfchen; *Fruchtb.* behaart, *eg-kegelf.* 4. In stehendem Wasser (Saarburg in Lothringen). Jun. Jul.

6. *R. DIVARICATUS* (Schranck.) Spreitzender H. — *B. sämmtl. untergetaucht, borstl.-vielsp.*; Zpfl. *in eine kreisrunde Fläche auseinander tretend*; St. stumpfkantig; Blb. 5 verkehrt-eyf.; *Stbg. länger als d. Köpfch. d. Fruchtkn.*; Früchtch. etwas gedunsen, querrunzlig, unberandet, steilh., an d. Ende kurzbespitzt. 4. In stehenden Wassern. Jun.-Aug. St. h. 67. *R. circinatus* Sibth. *R. rigidus* Hoffm. *R. stagnatilis* Wallr. *R. aquatilis* β . L. *R. pantothrix* α . DC. *B. klein*, mit in eine 4-9 Linien im Durchmesser betragende Fläche ausgebreiteten Zpfl., sitzend, starrer, ausser d. Wasser nicht in einen Pinsel zstretend; Bthknopf niedergedrückt-kugelig; Gf. kurz, in eine gerade N. sich endigend; dadurch untersch. sich dieser von den vorhergehenden.

7. *R. FLUITANS* (Lamark.) Fluthender H. — *B. sämmtl. untergetaucht, borstl.-vielsp.*; Zpfl. *verlängert*, gleichlaufend, gerade-hervorgestreckt; St. stielrund; Blb. 9-12 länglich-keilig; *Stbg. kürzer als d. Köpfchen der Fruchtkn.*; Früchtch. etwas gedunsen, querrunzlig, unberandet, kahl, an d. Ende bespitzt. 4. In Flüssen u. Bächen, selten in ruhigen Wassern. Jun.-Aug. St. h. 67. *R. fluviatilis* δ . L. *R. pantothrix* γ . DC. *R. pencedanoides* Desf. Var. sehr selten: SchwimmB. halb-3sp., gestutzt, quer-breiter.

H. Rote HECATONIA. Bth. weiss, seltner gelb. Honiggrübchen am Rande nackt, od. am Rande in eine Röhre od. oberwärts in eine oft 2sp. Schuppe vorgezogen; Röhre od. Schuppe von ein. dünnen Substanz, häutig, u. nicht dicklich u. fleischig. Früchtch. ober u. unterwärts mit einem feinen, in ein. Schnabel auslaufenden Kiel durchzogen; Seiten glatt od. mit unregelmässig-ineinander-fliessenden Runzeln bezeichnet.

* B. äderig, Bth. weiss.

8. *R. RUTAEFOLIUS* (L.) Rautenblättriger H. — *WB. doppelt-gefiedert, Fiederchen 3th.-vielsp., Lämpchen lineal.*; St. 1-3 blüthig; K. kahl; Blb. verkehrteyf., ganzrandig, od. ungleich-gekerbt; Früchtch. schräg-eyf., netzig-runzlig, unberandet; Schnabel kurz gebogen. 4. An kiesigen grasreichen O. der höchsten A. bis zu d. ewigen Schnee, (im Wallis u. Graubünden, Tyrol, Salzburg u. Kärnthen.) Jul. Aug. St. h. 19. *Callianthemum rutaefolium* Meyer. *C. coriandrifolium* Reichb. Blb. 5-12 verkehrteyf., schneeweiss, Honiggrübchen ohne Schuppe.

9. *R. ANEMONOIDES* (Zahlbruckner.) Zahlbruckners H. — *WB. 2-3zählig, Blättch. 3th.-vielsp., Lämpchen lineal.*; St. 1-2blättrig; K. kahl; Blb. lineal-länglich, an d. Spitze stumpf-ungleich-gekerbt; Früchtch. . . . 4. In Nadelwäldern d. VorA. auf Stein-, Kies- u. Kalkboden, (bei Wildalpen in Obersteyermark, Angelis! bei Maria-Zell, Zechent; zw. Schwarzau u. Hohenberg, u. an Abhängen d. Schneebergs in Unteröstr., Host.) März. Apr. St. h. 46. *Callianthemum rutaefolium* Reichb. *WB. 3zählig-doppelt* zsgesetzt, so breit als lang; das unt. stengelst. viel kleiner, das obere meist aus 2, 3-5 Lämpchen gebildet, od. auf eine Schuppe zurückgeführt. Blb. 9'' lang, 2 breit. D.

10. *R. GLACIALIS* (L.) Gletscher-H. — *WB. 3zählig; Blättch. gestielt, 3th.-vielsp. mit lanzettl. stumpflichen Lämpchen*; St. 1-3 blüthig; K. sehr rauhh.; Blb. verkehrteyf., seicht ausgerandet; Früchtch. schräg-eyf., kahl, unberandet; Schnabel gerade. 4. Auf d. höchsten GranitA., an steinig-kiesigen O. bis zu d. ewigen Schnee u. Gletschern, (dch. d. g. AK.) Jul. Aug. St. h. 19. KB. v. schwarzbraunen Haaren rauhh.; Blb. weiss od. rosenroth mit grasgrüner Basis. Honiggrübchen oberwärts in eine, oft 2sp. Schuppe sich endigend, u. nicht dch. dieselbe bedeckt.

11. *R. SEGUIERI* (Vill.) Segnier's H. — *WB. u. stengelst. B. handf.-vielsp., im Umriss herz.-rundlich mit zugespitzten Lämpchen*; St. 1-3blüthig; K. kahl; Blb. verkehrteyf., abgerundet; Früchtch. schräg-eyf., konvex, unberandet, netzig-runzlig, mit ein. dünnen hackigen Schnabel. 4. An kiesigen O. d. höchsten A., (auf d. Stov in Krain, Kirschbaumer- u. Seiseralpe in Tyrol) Jun. Jul. St. h. 19. *R. Columnae* All. Blb. schneeweiss. Honiggrübchen wie bei dem vorhergehenden. D.

12. *R. ALPESTRIS* (L.) Alpen-H. — *WB. herz.-rundlich, 3 u. 5sp; Zpfl. verkehrteyf., vorne eingeschnitten-gekerbt*; St. 1 blüthig, meist 1 blättrig; das stengelst. B. 3sp. mit lineal. od. ungeth. Zpfn.; Bthstiel gefurcht; K. kahl; Blb. verkehrteyf. od. 3lappig; Früchtch. verkehrteyf., konvex, glatt, unberandet; Schnabel gerade, an d. Spitze hakig. 4. An kiesigen, etwas feuchten O., sowohl d. VorA., als A. bis z. ewigen Schnee, auf Kalkboden, (dch. d. g. AK.) Jun. Jul. St. h. 19. Bth. schneeweiss; Honiggrübchen mit einem gelblichen Hofe umgeben, ohne Schuppe. B. herz.-kreisrund, nicht tief gespalten; Zpfl. sich berührend, od. fast ge-

theilt mit ziemlich entfernten Zpfln.; od. an d. Basis fast gestutzt u. nicht herzf.

13. *R. TRAUNFELLNERI* (Hoppe) Traunfellner's H. — *WB.* 3th., im Umriss nierenf., der mittl. Zpfl. 3sp., die seitlichen tief-2sp., Zipflch. wiederum 2sp., Läppch. lanzettl.; St. 1blüthig, meist 1blättrig; das StB. lineal., ungeth.; K. kahl; Bthstiel gefurcht; Blb. verkehrt-herzf. oder 3lappig, Früchtch. . . . 4. An steinigem O. d. A., (Kärnthen, Krain, Tyrol, Schweiz.) St. h. 46. Dem Vorhergehenden sehr ähnlich, ab. immer einzeln wachsend, u. niemals in Haufen, B. matt u. nicht glänzend, tief-geth., Läppchen lanzettl., entfernt. D.

14. *R. CRENATUS* (W. K.) Gekerbter H. — *WB.* rundl. u. nierenf., ganz od. vorn 3lappig, gekerbt, die hintern Kerben kleiner St. meist 1blüthig u. meist 1blättr.; das StB. lineal. ungeth.; Bthstiel gefurcht; K. kahl; Blb. verkehrteyf., geschweift-gekerbt; Früchtch. konvex, glatt, unberandet; Schnabel mit breiter Spitze, etwas hakig. 4. An felsigen, nassen O. d. GranitA., (Steiermark auf d. Rottenmanner Tauern, d. Hengst, Bösenstein, Hochhördn u. a. zu diesem Granitgebirge gehör. Alpen, niemals auf Kalk, Angelis!) Aug. St. h. 46. *R. vaginatus* Sommerr. Durch die fast immer ganzen B. u. die hintern allmählig kleinern u. gegen d. Spitze des B. gerichteten Kerben wird er leicht v. d. *R. alpestris* unterschieden. D.

15. *R. ACONITIFOLIUS* (L.) Eisenhutblättr. H. — *W.* u. *StB.* handf.-3-7th.: Zpfl. 3sp., zugespitzt, eingeschnitten-gesägt; St. vielbth.; Früchtch. verkehrteyf., höckerig-konvex, äderig-runzlig, unberandet; Schnabel dünn, hakig. 4. In Gebirgswäldern, in d. VorA. u. A. bis z. ewigen Schnee, (dch. d. g. AK., sodann in d. Gebirgen v. Oestr. an dch. Böhm. in d. mittl. u. südlichen D.) Mai-Aug. — Auf den A. kleiner, St. 3-5blüth.: *R. aconitifolius* L.; auf niedrigeren Bergen wird die Pflanze

β. höher, St. vielblüth., Bzipfl. länger-zugespitzt: *R. platani-folius* L. Bth. bei beiden Var. schneeweiss; Honiggrübchen am oberen Rande in eine oft sehr vergrösserte Schuppe vorgezogen. K. abfällig.

** *B. nervig*, Bth. weiss.

16. *R. PARNASSIFOLIUS* (A.) Parnassienblättr. H. — *WB.* herzfeyf., nervig, ganzrandig, Nerven d. obern Fläche nebst d. St. u. Bthstielen wollig; Früchtch. . . . 4. An kiesigen O. d. höchsten A., (Schw., A. im Waadt u. d. Wallis, Graubünden, Glarus, u. in Tyrol auf der Kirschbaumer A. bei Lienz.) Jun. Jul. St. h. 19. Bth. schneeweiss, od. schwach-rosenroth, Honiggrübchen mit einer häutigen Schuppe umzogen u. nicht verdeckt.

17. *R. PYRENAEUS* (L.) Pyrenäischer H. — *B.* lanzettl., nervig, ganzrandig; St. 1-3blüth.; Bthstiele an d. Spitze wollig; Früchtch. verkehrteyf., konvex, glatt, unberandet, Schnabel dünn, hakig; Wurzelfasern stielrund, verschmälert. 4. An sehr hohen feuchten O. der A., (d. Schw., Tyrol u. Kärnthen.) Jun. Jul. St.

h. 19. Bth. weiss; Honiggrübch. v. einer häutigen Schuppe umzogen u. nicht bedeckt. B. meist lineal.-lanzettl. Varirt:

β. *bupleurifolius*, DC. syst. I. 243. B. lanzettl., St. 1blüth.: R. *bupleurifolius* Lap. pyr. 314. Jacq. misc. t. 18. f. 1. ic.

γ. *plantagineus*, DC. I. c. B. breit-lanzettl.; St. mehrblüth.: R. *plantagineus* All. ped. t. 76. f. 1. (u. nicht Pers.)

Ranunculus lacernus Bellard. act. taur. t. 8., wurde einmal in d. Schw. gesammelt, neulich aber nicht wiedergefunden; scheint ein Bastard v. R. *aconitifolius* u. *pyrenaeus* zu sein. St. bis zu 1½ F. hoch, vielblüth., wie bei jenem; B. nervig, wie bei d. R. *pyrenaeus*, ab. keilf. gegen d. Spitze erweitert u. daselbst 3sp. mit unregelmässig gezähnten Zpfln.

*** B. nervig. Bth. gelb.

IS. R. GRAMINEUS (L.) Grasblättr. H. — B. lineal.-lanzettl., nervig, ganzrandig, nebst d. St. u. Bthstielen sehr kahl; St. 1 u. mehrblüth.; Früchtch. schräg-verkehrteyf., zsgedrückt, faltig u. etwas gestreift, bekielt, kurz bespitzt; Wfasern gegen d. Spitze verdickt, etwas keulenf. 4. Auf sonnigen Hügeln, (im wärmern Wallis, ein. Zierde d. Gegend, Gaud.) Mai. Jun. Bth. sattgelb. S.

III. Rote. RANUNCULUS. Bth. hell- od. goldgelb. Das Honiggrübchen deckt an d. Basis des Bth. eine fleischigte, aufwärts schauende Schuppe, welche, ob sie gleich bisweilen klein ist, doch d. Grube verdeckt. Früchtch. berandet: d. Rand umgürtet auf beiden Seiten einen, manchmal mit Höckerchen besetzten Hof; seltner ist d. ganze Früchtch. mit Höckerchen u. Dörnchen bedeckt.

§. 1. B. ungeth. W. faserig.

19. R. FLAMMULA (L.) Brennender H. — B. elliptisch, lanzettl. od. lineal.; St. aufrecht od. aufstrebend, od. mit geraden Gliedern, niedergestreckt, an d. Gelenken oft wurzelnd, vielblüth.; Früchtch. verkehrteyf.; glatt, schwach-berandet, mit einem kurzen, stumpflichen Spitzchen endigend. 4. Auf feuchten Wiesen, an Ufern u. Pfützen überall. Jun.-Herbst. St. h. 81. 82.

20. R. REPTANS (L. sp. pl. I. 773.) B. lineal. od. lineal.-lanzettl.; St. fühl. a. d. Gelenken wurzelnd, d. Glieder mit einem aufwärtsgerichteten Bogen gekrümmt; die untere BSch. der Gelenke meist blattlos, Aeste meist 1blüth.; Früchtch. verkehrteyf., glatt, schwach-berandet, mit einem geraden, am Ende zurückgekrümmten Spitzchen. 4. Auf sandigen u. felsigen O. an d. Rändern d. Teiche u. den Ufern d. Seen in d. Schweiz (am Genfer-, Neuf-, chateller-, Murtensee u. am sumpfigen Ufer d. Rhone.) Jun.-Herbst. St. h. 81. 82. mit unvollk. Frucht. Exempl. mit ausgebildeten Früchten, welche ich durch Prof. Lindblom erhielt, überzeugten mich, dass diese Pfl. eine gute Art sei. S.

21. R. OPHIOGLOSSIFOLIUS (Vill.) Schlangenzungenblättr. H. — B. längl.-elliptisch, d. unt. herzf.-eyf.; St. aufrecht, vielblüth.; Früchtch. schräg-eyf., berandet, kurz-geschnäbelt, auf beid. Seiten knötig-rauh. ☉. In Sümpfen u. Pfützen, (im Littorale, bei Aquileja, Brignoli, auf d. Insel Veglia, Noé.) Mai. Jun. St. h. 59. R. *ophioglossoides* Willd. R. *cordifolius* Bast. R. *fistulosus* Brign. R. *uliginosus* Willd. R. *cochlearifolius* Hornem. D.

22. *R. LINGUA* (L.) Grosser H. — B. verlängert-lanzettl., zugespitzt; St. steif-aufrecht, vielblüth., an d. Basis quirlig-bewurzelt, ausläufertreibend; Früchtch. zsgedrückt, berandet, glatt; *Schnabel* breit, kurz-schwertf. 4. An Rändern stehender Wasser u. Flüsse u. im Wasser selbst. Jul. Aug. St. h. 81. 82. Var. kahl, u. mehr od. weniger mit angedrückten Haaren bedeckt.

§. 2. B. ungeth. od. etwas lappig; W. vielknollig; aus verdickten Fasern gebildet.

23. *R. FICARIA* (L.) Freiwurzeliger H. — St. beblättert; B. *rundl.-herzf.*, die *unt. geschweift*, die *obern eckig*; K. meist 3blättr. 4. Auf Wiesen, an Zäunen, in Wäldern u. Hainen; an feuchten O. Apr. Mai. *Ficaria ranunculoides* Roth. *Ficaria verna* Huds. St. h. 11.

24. *R. THORA* (L. var. *a.*) Giftiger H. — *WB. fehlen*, das untere *stengelst.* sitzend od. kurzgestielt, *rundlich-nierenf.*, gekerbt; das folgende *verkehrteyf.*, vorne eingeschnitten, das blüthst. lanzettl.; St. 1 od. 2blüth. 4. In Gebirgswäldern u. auf Weiden d. VorA., u. A. (Tufferberg in Untersteiermark, auf d. Bergen an d. Save in Krain, auf d. westl. A. d. Schw.; im Juragebirge, auf d. Thoiry häufig.) Mai. Jun. St. h. 59. *R. scutatus* WK.

25. *R. HYBRIDUS* (Biria.) Bastard-H. — *Das WB. einzeln*, langgestielt, *quer-breiter. etwas nierenf.*, vorne fast gestutzt, *eingeschnitten-lappig*, der mittl. Lappen eyf.-zugespitzt; das StB. dem wurzelst. gleichgestaltet, die blüthst. lanzettl.; St. 1-3blüth. 4. An kiesigen, steinigen O. d. KalkA., (auf d. A. v. Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark u. Oestrich.) Mai. Jun. *R. Thora* J. a. t. 442. St. h. 19. *R. Thora* β L. *R. Pseudo-Thora* Host. *R. Ptora* Reichenb. fl. ex. p. 722. Bei fetteren Expl. ist ein 2tes eingeschnitten-gelapptes stengelst. B. vorhanden. D.

§. 3. B. getheilt od. zsgesetzt; W. vielknollig.

26. *R. ILLYRICUS* (L.) Ilirischer H. — B. *nebst d. St. seidig-wollig*. WB. 3zählig, Blättch. lineal.-lanzettl., ungeth. od. 2-3th.; Bstiele rund; K. zurückgeschlagen. 4. Auf Weiden, Feldern, uncultiv. O., (in d. Littorale u. dch. Oestrich. nach Böhm., u. im Elbthal bis Stassfurth, hin u. wieder; auch in Schles.) Mai. Jun. St. h. 46. *R. tomentosus* Moench. *R. sericeus* Willd. D.

§. 4. B. zsgesetzt od. tief gelappt u. gespalten; W. faserig; (bei d. *R. bulbosus* ist d. Basis des St. knollenartig verdickt.) Früchtch. glatt.

* Bstiel stielrund. u. nicht gefurcht.

27. *R. AURICOMES* (L.) Goldgelber H. — WB. herzf.-kreisrund u. nierenf., gekerbt, ungeth. 3- od. viersp.; *Bstiele an d. Basis scheitdig*; StB. fingerig-geth.; Zpfl. lineal. od. lanzettl., spreitzend; St. vielblüthig; Bstiele rund; *Früchtch.* bauchig, schmal-berandet, *sammth.*; Schnabel fast v. d. Basis an hakig. 4. In Hainen, auf Wahlwiesen, an Zäunen u. Gebusch; an zieml.-feuchten O. gemein. Apr. Mai. Fl. dan. t. 665. *R. auricomus* St. h. 59. u. R.

cassubicus St. h. 59. *R. polymorphus* All. *R. vernus* Spenn. Die ersten Frühlingsblüth. meist verstümmelt; indem d. meist. Blb. fehlen; d. späteren vollständig.

28. *R. CASSUBICUS* (L.) Kassubischer H. — Wurzelst. *Sch. häufig. blattlos*; das WB. einzeln, herzf.-kreisrund. od. nierenf.-gekerbt, ganz, seltner etwas gelappt od. 3sp.; Bstiel mit blattlosen Sch. an d. Basis umgeben; die Stengelst. B. gefingert, Zpfl. längl.-lanzettl., spreitzend; St. vielblüthig; Bthstiele rund; *Früchtch.* bauchig, schmal-berandet, *sammth.*, Schnabel ziemlich gerade, an der Spitze hakig. 4. In schattigen Wäldern, (bisher blos in Schles., hinter Arnoldmühl, bei Leuthen, Ohlau, Leobschütz u. Oberglogau.) Mai; früher als der vorige. Man beobachtete seltner 2-3 WB.; meist ist ein einziges mit an d. Basis kaum scheidigem Bstiele, aber blattlose Sch. sind mehr da; bei d. *R. auricomus* hingegen seltner eine einzige, wenn ein Blatt verkümmert. *R. auricomus* ϵ *fallax* Wimm. et Grab. gehört hierher u. nicht zu *R. auricomus*. D.

29. *R. MONTANUS* (Willd.) Berg-H. — WB. handf.-getheilt, Zpfl. verkehrteyf., 3sp., stumpflich-gezähnt; *das unt. stengelst. 5 th. Zpfl. längl.-lineal., handf.-spreitzend*, das obere 3sp.; St. 1-4 blüth.; *Bthstiele rund*; *Früchtch.* berandet, auf beid. Seiten konvex, Schnabel etwas gekrümmt, vielmal kürzer als d. *Früchtch*; *Fruchtboden borstig.* 4. Auf d. A. u. VorA. u. in niedrigeren Gegenden a. Fusse d. A. Apr.; an höhern O. später; Jun. Jul. St. h. 19. *R. nivalis* J. a. t. 325. 326. — Unterscheidet sich v. *R. auricomus* dch. den wagrechten Wurzelstock, die sämmtl.-geth. WB., kahlen *Früchtch.* u. borstigen *Fruchtb.*; v. *R. acris* dch. die W., den niederen, meist 1blüthigen St., die stumpflichen Bzpfelchen, den borstigen u. nicht kahlen *Fruchtb.* u. die konvexeren *Früchtch.* Var.:

β . *major*: WB. mit mehreren Läppch. eingeschnitten, die mittl. Zpfl. des unt. stengelst. länger, an d. Spitze 3- u. mehrzählig; *R. pyrenaicus* Gouan. *R. Gouani* Willd.

Ob sich d. *R. carinthiacus* Hoppe bei Sturm. h. 46., *R. gracilis* Schleich., *R. tenuifolius* Schleich. 1821. von *R. montanus* unterscheidet, ist weiter zu untersuchen. Die Bläppch. sind spitzer, die Lappen entfernter, schmaler.

30. *R. VILLARSII* (DeCand.) Villars-H. — WB. handf.-geth., Zpfl. verkehrteyf., 3sp., spitz-gezähnt, das stengelst. *einzeln. od. zu mehreren, fingerig-geth., Zpfl. lineal.*; St. 1—mehrbüthig; *Bthstiele rund*; *Fruchtb. borstig*; *Früchtch.* linsenf. zsgedrückt, berandet, Schnabel hakig. 4. An grasreichen O. d. Voralpen und auf d. A., (Auf d. M. Nanas, Slavnik u. M. Maggiore in Krain, u. auf d. südl. A. d. Schw.) Jun. *R. lapponicus* Vill. *R. oreophilus* M. Bieb. *R. Hornschuchii* Hoppe bei St. h. 46. nach einem monströsen Expl. abgebildet. Von *R. acris* unterschieden dch. die borstigen *Fruchtb.*; v. *R. montanus* dch. die spitzen Bzähne u. die nicht spreitzenden, sondern mässig-abstehenden Zpfl. der stengelst. B.

31. *R. ACRIS* (L.) Scharfer H. — Wb. handf.-geth., Zpfl. fast rautenf., eingeschnitten-spitz-gezähnt; StB. gleichgestaltet, die

obern 3th. mit lineal. Zpfln.: St. vielblüthig; *Bthstiele* rund; Früchtch. linsenf.-zsgedrückt, berandet, *Schnabel* etwas gekrümmt, *vielm. kürzer*, als d. Früchtch.; *Fruchtbod.* kahl. 4. Auf Wiesen der Ebenen u. Berge u. auf denen der A. bis z. ewigen Schnee. Mai-Jul. St. h. 46. — An trocknen bergigen O. ist d. Pflanze kleiner u. d. B. sind weniger-eingeschnitten: R. Steveni Andrz.

32. R. LANUGINOSUS (L.) Wolliger H. — WB. handf.-geth., Zpfl. breit-verkehrteyf., 3sp.-eingeschnitten, spitz-gezähnt; StB. gleichgestaltet, die öbern 3th. mit lingl.-lanzettl. Zpfln., Bstiele von abstehenden Haaren rauh, K. abstehend; St. vielblüth.; *Bthstiele* rund; Früchtch. linsenf.-zsgedrückt, berandet, *Schnabel* an d. Basis breit, an d. Spitze eingerollt, *fast halb so lang*, als d. Früchtch.; *Frchth.* kahl. 4. In Laubwäldern d. Gebirge u. Ebenen. Mai-Jul. St. h. 46.

33. R. VELUTINUS. (Tenore ind. sem. hort. reg. neap. 1825. syll. p. 272). Sammtartiges H. — WB. handf.-getheilt; Zpfl. verkehrteyf., 3sp.-eingeschnitten-gezähnt, die oberen stengelst. 3th. mit lineal. Zpfl.; *Bstiele* rauh., *Haare* weit abstehend; St. vielblth.; *Bthstiele* rund; K. zurückgeschlagen; Früchtchen linsenf.-zsgedrückt, berandet, glatt, *Schnabel* gerade, *viel kürzer* als das Früchtchen; *Fruchtb.* etwas haarig. 4. Triften u. unbebaute O. (südl. Istrien auf den dabei liegenden Inseln) Mai, Jun. J.

** Bithiel gefurcht.

34. R. POLYANTHEMOS (L.) Reichblüthiger H. — WB. handf.-geth., Zpfl. 3sp. od. 3th., eingeschnitten, Abschnitten fast lineal; *Bthstiele* gefurcht; Früchtch. linsenf.-zsgedrückt, berandet, *Schnabel* hakig, *Frchthod.* borstig. 4. Auf Waldwiesen u. in Wäldern, zieml. selten. Mai-Jul. St. h. 82. Schnabel d. Früchtch. kurz, breit, a. d. Spitze hakig; Haare d. Stengels u. d. Bstiele bald sehr abstehend, bald angedrückt, wie bei mehreren andern.

35. R. NEMOROSUS. (DC.) Hain-H. — WB. handf.-geth., Zpfl. verkehrteyf., 3sp., gezähnt; *Bthstiele* gefurcht; Früchtch. linsenf.-zsgedrückt, berandet, *Schnabel* an d. Spitze eingerollt; *Frchth.* borstig. 4. In Gebirgswäldern, auf d. VorA. u. A. Mai. Jun. St. h. 46. R. Breynius Crantz. R. aureus Rb. ic. f. 262. Die grössern Expl. stellen d. R. polyanthemus Schleicher, d. kleinern der Alpen desselben den R. aureus dar. Ich fürchte, d. ganze Art ist eine blosser Var. des R. polyanthemus, wofür Fries sie hält.

36. R. REPENS (L.) Kriechender H. — WB. 3zähl. u. doppelt-3zähl. Blüth. 3sp., eingeschnitten-gezähnt; Bthstiele gefurcht; K. abstehend; Früchtch. linsenf.-zsgedrückt, berandet, *fein-eingestochen-punktirt*; Anläufer kriechend. 4. Auf Wiesen, etwas feuchten Aekern, in Wäldern, überall. Mai-Jul. St. h. 46. Var.: kahl u. rauh. wie folgender.

37. R. BULBOSUS (L.) Zwiebelwurzeliger H. — WB. 3zählig u. doppelt-3zählig. Blüth. 3sp., eingeschnitten-gezähnt; Bthstiele

gefurcht: *K. zurückgeschlagen*; *Früchtch.* linsenf. - zsgedrückt, berandet, *glatt*; St. an d. Basis knollenf. 2. Auf Weiden, Feldern, an Wäldersäumen, überall. Mai-Jul. St. h. 46.

§. 5 B. zsgesetzt, od. tief-gelappt; W. faserig; *Früchtch.* runzlich, od. mit Knötchen od. Dörnchen besetzt.

38. *R. PHILONOTIS* (Ehrhart.) Raubb. II. — W.B. 3zählig od. doppelt-3zählig, *Blättch.* 3sp., eingeschnitten-gezähnt; Bthstiele gefurcht: *K. zurückgeschlagen*; *Früchtch.* linsenf.-zsgedrückt, berandet, *vor d. Rande mit einer Reihe Knötchen* versehen od. auf d. Mittelfelde damit besetzt. ☉. Unt. d. Saat, in Weinbergen, auf Kalk- u. Lettenboden, an Sümpfen u. Gräben. Mai-Aug. St. h. 82. *R. hirsutus* Curt. *R. sardous* Crantz. *R. pallidior* Vill. *R. agrarius* All. Kleine Expl.: *R. parvulus* L. mant. Var.

β. *subglaber*. fast kahl: *R. intermedius* Poir. *R. pumilus* Thuill. nicht Poir. Der *R. verrucosus* von Tommasini bei Triest gesammelt, unterscheidet sich nicht von *R. Philonotis*, auch der St. ist unten nicht zwiebelig-angeschwollen u. die allenthalben mit Knötchen besetzten Früchtchen kommen auch bei der gewöhnlichen Pfl. vor. *R. verrucosus* Sternb. in d. bot. Zeitg. mit einem an d. Basis zwiebeligen St. kenne ich nicht.

39. *R. SCELERATUS* (L.) Blasenziehender II. — Die untern B. handf.-getheilt, eingeschnitten-gekerbt, die obern 3sp., Zpfl. lineal.; *K. zurückgeschlagen*; *das Fruchtköpfchen länglich-ährenf.*; *Früchtch. unbekielt*, am Rande mit ein. eingegrabenen Linie umzogen, in d. Mitte auf beiden Seiten *feinrunzig* ☉. In Gräben, Sümpfen, an Ufern d. Flüsse u. Seen. Jun.-Herbst. St. h. 82.

40. *R. ARVENSIS* (L.) Acker-II. — W.B. 3sp., gezähnt, *StB. 3zählig*, *Blättch.* gestielt, 3-vielsp., Zpfl. keilf., vorne gezähnt, die obern lineal.; *Früchtch. flach-zsgedrückt, geschnäbelt, dornig, knötig*, od. *netzig*, mit ein. hervorspringenden gekielten auf beid. Seiten dornigen od. gezähnten Rande. ☉. Auf Aeckern u. cultivirten O. überall. Mai-Jul. St. h. 82. t. II. Var. α. mit dornigen Früchtch. u.

β. *tuberculatus*: Früchtch. auf beid. Seiten mit hervorspringenden, stumpfen Knötchen, u. am Rande mit stumpfen Zähnen besetzt: St. h. 82. t. II. *R. tuberculatus* DeCand.

γ. *inermis*: Früchtch. auf beiden Seiten mit hervorspringenden, ineinanderfließenden Adern besetzt u. ganz wehrlos: Rand nur ein wenig hervorspringend u. ohne Zähne. St. h. 82. t. II. Eine sehr seltne Var.: beobachtete bisher an einem einzigen O. in d. Nähe v. Bonn II. Fr. N. v. Esenbeck.

41. *R. MURICATUS* (L.) Stachelsamiger II. — *Die untern B. rundlich* u. nierenf. 3lappig, ungleich-grob-gekerbt, die obern, 3sp. an d. Basis keilig; Bthstiele d. Blättern gegenst.; *K. abstehend*; *Früchtch. geschnäbelt, flach, knötig-dornig*, mit einem glatten, geschärften Rande umzogen. ☉. An niedrig gelegnen O. u. am Meeresufer, (Friaul, Fiume u. südl. Tyrol.) Mai-Jul. St. h. 82. D.

42. *R. PARVIFLORUS* (L.) Kleinblüthiger H. — *B. herzf.-rundlich*, 3sp., lappig-gekerbt, die obern 5lappig, die obersten länglich, ungeth. od. 3lappig: Bthstiele d. Blättern gegenst.: *K. zurückgeschlagen*; *Früchtch.* geschnäbelt, linsenf. *zsgedrückt*, *dornig* mit einem glatten, geschärften Rande umzogen. ☉. An uncultiv. etwas feuchten O. u. in Weinbergen, (bei Monfalcone, in Istrien.) St. h. 82.

IV. Gruppe. *HELLEBOREEN* DeC. syst. I. 306. Knospelage des K. u. d. Blkr. dachig. Blb. mannigfaltig od. fehlend. Stbk. auswärts aufspringend. Früchtch. kapselig, einwärts aufspringend, mehrsamig.

9. *CALTHA* (L.) Dotterblume. — K. blumenblattig, 5 blättrig. Blkr. fehlt. Kapseln 5 bis 10, vielsamig.

1. *C. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-D. — St. aufstehend: *B. herzf.-kreisrund*, klein-gekerbt. 4. Auf Wiesen u. in feuchten Hainen, an Ufern, Gräben. Apr.-Jun. St. h. 8.

10. *TROLLIUS* (L.) Trollblume. — K. blumenblattig, 5 u. mehr blättrig, abfällig. Blb. kleiner als d. KB., honigbehälterf., benagelt: Platte lineal, flach, an d. Basis mit einem unbedeckten Honiggrübchen. Kapseln mehrere, sitzend, vielsamig.

1. *T. EUROPAEUS* (L.) Europäische T. — 10-15 KB. fast in eine Kugel zsschliessend: Blb. so lang, als die Stbgf. od. ein wenig kürzer: *B. 5th.*, Zpfl. rautenf., 3sp., eingeschnitten u. gesägt. 4. Auf feuchten Wiesen, in Gebirgsgegenden u. d. VorA. (dch. d. g. AK.: im übrig. D. zerstreut, nicht an allen O.) Mai. Jul. St. h. 5. Bth. citrongelb; Blb. dottergelb. Var.:

β. humilior, kleiner, 1-2blüth.: *T. minimus* Wender. Diese Var. kommt vor mit kurzgestielter Bth., die von d. letzten StB. fast eingehüllt ist: *T. humilis* Crantz. — *T. medius* Wender, *T. napellifolius* Roep., dem *T. caucasicus* verwandt, wurde im Bezirk unserer Flora noch nicht aufgefunden.

II. *ERANTHUS* (Salisbury.) Winterling. — K. blumenblattig, 5-8blättrig, abfällig. Blb. kleiner, als die KB., honigbehälterf., lang-benagelt: Platte röhrig, ungleich-2lippig: untere Lippe sehr kurz. Kapseln mehrere, auf dem Fruchtbod. lang-gestielt.

1. *E. HYEMALIS* (Salisbury.) Sternblüthiger W. — KB. 5-8, länglich, 4. In schattigen Hainen d. Ebenen u. VorA. selten, (Oestrich, Oberbaden bei Lörrach, Westphalen bei Havisebek, Fl. v. Spa bei Jalhay; in d. Schw. im C. Bern, bei Morgues, C. Waadt, bei Bex; Elsass, Landsberg bei Barr.) Febr. Merz. J. a. t. 202. *Helleborus hyemalis* L. *Koellea hyemalis* Bria.

12. *HELLEBORUS* (L.) Niesswurz. — K. blumenblattig, 3blättrig, bleibend. Blb. kleiner, als die KB., honigbehälterf., benagelt: Platte röhrig, 2lippig. Kapseln auf dem Fruchtbod. sitzend.

* Schaft an d. Basis der Bthstiele mit ganzen Deckblättern.

1. II. *NIGER* (L.) Schwarze N. — WB. fussl.: *Schaft mit 2-3 Deckblättern*, 1-2 blüthig. *Deckb. oval*. 4. In schattigen Wäl-

dern d. niedrigeren Gebirge u. in d. VorA, (Oestrich., Krain, Oberbayern, Salzbg., Böhm., Schles. C. Tessin.) Dezbr.-März. J. a. t. 201. St. h. 3. Zwischen H. niger u. H. altifolius d. Autoren finde ich keine scharfe Grenze.

** St. blattlos, Aeste an d. Basis mit getheilten B. gestützt.

2. H. VIRIDIS (L.) Grüne N. — St. nackt, an seinen Verzweigungen beblättert; B. fussf., Blättch. der WB. zurückgekrümmt, rinnig-gebogen, verlängert-lanzettl., spitz, ungleich-tief-gesägt, kahl od. etwas flaumh., unters. runzlig-geädert, *Adern hervorspringend*; *N. aufrecht*. 4. In Wäldern d. niedrigeren Gebirge, vorzügl. an steinigen u. kiesigen O., (im südl. D. u. d. Schw.; im mittl. D. hin und wieder.) März. Apr. J. a. t. 106. Geruch d. grasgrünen Bth. schwächer, als bei dem folgenden.

3. H. ODORUS (Waldst. u. Kit.) Duftende N. — St. nackt, an seinen Verästlgn. beblättert; B. fussf., Blättch. der WB. flach, breitlanzettl., zugespitzt, klein- fast gleich-gesägt, kahl od. unterseits kurz- u. runzlig-ädert: *Adern vorspringend*; *N. wagrecht-zurückgekrümmt*. 4. In gebirgigen Wäldern, (bei Salzbg., Hoppe.) März. Apr. Reichenb. ic. f. 4721. Var.:

β. atrorubens, Bth. aussen mit einem violetten Anstriche:
H. atrorubens Waldst. u. Kit. (Steyerm.) D.

4. H. DUMETORUM (Waldst. u. Kit.) Hecken-N. — St. nackt, an sein. Verästlgn. beblättert; B. fussf.: Blättch. der WB. lanzettl. klein- ziemlich gleich-gesägt, kahl; die Hauptadern unterseits etwas hervorspringend, *die Nebenadern eingesenkt*. 4. In Hecken, (bei Triest im innern Krain und Steyerm.) März. Apr. Reichenb. ic. f. 4719. Ob die hier aufgestellten Kennzeichen dieser u. d. zwei vorhergehenden Arten beständig sind, ist noch zu bestätigen. D.

*** St. beblättert; Aeste u. Bthstiele an d. Basis mit DeckB. gestützt.

5. H. FOETIDUS (L.) Stinkende N. — St. vielblüth., *beblättert*; die unt. B. fussf. mit 7 u. 9 Blättch., die obern 3 sp. kleiner als der verbreiterte Bstiel; *DeckB. d. Aeste u. Bthstiele oval*. 4. An steinigen O., an Rainen u. Wegen der Ebenen u. niedrigeren Gebirge, auf Kalk- u. Lehm Boden: (vom südl. Tyrol dch. d. Schw., d. westl. Theil v. Schwaben u. d. g. Rheinthal bis nach d. Niederlanden; im Mainthale bis Würzb.) März. Apr. Bth. grasgrün mit ein. schmalen Purpurrande umzogen.

13. ISÓPYRUM (L.) Muschelblümchen. — K. blumenblattig, 3 blättrig, abfällig. Blb. kleiner, als die KB., honigbehälterf., kürzenagelt: Platte offen, an d. Basis kappenf.-zsggezogen od. fast 2lippig. Kapseln auf d. Frchtbod. sitzend.

I. I. THALICTROIDES (L.) Wiesenrautiges M. — W. kriechend, Fasern hüschelig; Blb. stumpf. 4. In Wäldern und schattigen Hainen, (im Littorale bei Triest u. dch. Krain, Steyerm. Oestrich., Böhmen, Mähren, nach Schlesien; bei Königsberg in Preussen, bei Genf.) März-Mai. J. a. t. 105. Bth. weiss.

14. *NIGELLA* (L.) Schwarzkümmel. — K. blumenblattig, 5 blättrig. Blb. kleiner, als die KB., honigbehälterf., benagelt: Platte an d. Basis mit einem, von ein. Schuppe gedeckten, Honigrübchen. Kapseln 5-10, verwachsen.

1. *N. ARVENSIS* (L.) Acker-Sch. — Stbk. begrannt, Granne halb so lang, als das Stbk.: *Kapseln* glatt, auf d. Rücken 3nervig, v. d. Basis bis z. Mitte zsgewachsen, *Bth.Hülle* fehlend; S. 3 kantig, feinkörnig-rauhlich. ☉. Unt. d. Saat. auf Kalk- u. Lehmboden. Jul.-Sept. Schk. l. 146. KB. weiss, vorne bläulich, unterseits grüngestreift u. netzig; Blb. bunt.

2. *N. DAMASCENA* (L.) Türkischer Sch. — Stbk. grannenlos; *Kapseln* glatt, v. d. Basis bis z. Spitze verwachsen; *Bth. behüllt*; S. 3kantig, querrunzlig. ☉. Unt. d. Saat., (Istrien, Fiume, ausserdem zufällig auf Schutthaufen.) Mai-Jul. KB. hellblau, an d. Spitze u. an d. Adern unterseits grün. Blb. schwach-grünbläulich, mit 2 satt-grünen Drüsen. J.

3. *N. SATIVA* (L.) Gemeiner Sch. — Stbk. grannenlos; *Kaps.* drüsig-rauh, auf d. Rücken 1nervig, v. d. Basis bis z. Spitze verwachsen; *Bth.Hülle* fehlend; S. 3kantig, querrunzlig. ☉. Wird auf Aeckern bei Erfurt gebaut, u. wächst daselbst unt. d. Saat. Jun. Jul. KB. weisslich, Blb. bunt. Cultiv.

15. *AQUILEGIA* (L.) Akelei. — K. blumenblattig, 5blättrig, Blb. trichterf., mit d. Rande ihres schiefen Saumes angeheftet, unterwärts in einen hohlen Sporn vorgezogen. Kaps. 5, getrennt.

1. *A. VULGARIS* (L.) Gemeine A. — *Sporne* an d. Spitze hakig, Platte sehr stumpf, ausgerandet; Stbg. ein wenig länger, als d. Platte: KB. länglich-eyf., B. doppelt 3zählig, *Blättch.* 3lappig, gekerbt, Kerben eyf., abgerundet. 4. In Wäldern u. auf Waldwiesen, (dch. d. g. Gebiet.) Jun. Jul. Kommt vor mit schmierig-haarigem, einfach-haarigem, und seltener ganz kahlem St., mit blauen, fleischfarben und weissen Bth., mit Gf., welche länger, od. kürzer sind, wie die Stbf., und mit etwas breiteren, stumpfl. KB.: *A. platysepala* Rehb. fl. exc. mit Ausschluss des Synonyms von DC.; ferner: *degener.* eine Monstrosität mit gefüllten, grünlichen, aufrechten Bth., mit flachen etwas sackigen Blb.: und in den Gärten 1. *corniculata*, mit gefüllter Bl., deren Sporne nach unten verlängert sind: 2. *inversa*, mit gefüllter Bl., deren Sporne nach aufwärts gerichtet erscheinen, 3. *stellata*, mit gefüllter Bl., deren Blb. flach und ohne Sporne sind. — Die *A. viscosa* W. u. K. pl. rar. h. 2. S. 181. t. 169., (Gouan's gleichnamige Pflanze kann man nach der rohen Abbildung, an der die Bth. fehlen, nicht enträthseln) ist von der schmierigen Variet. der *A. viscosa* gänzlich verschieden, dagegen der *A. pyrenaica* sehr ähnlich, sogar eben so schlank und niedrig, unterscheidet sich jedoch durch die eingebogenen Sporne, vorzüglich aber durch die gestutzte, leicht ausgerandete, aber an der Spitze nicht abgerundete Platte der Blb. Ich besitze sie aus den Pyrenäen.

2. A. HAENKEANA (Koch.) Haenke's A. — *Sporne an d. Spitze hakig*, länger als d. gestutzt-stumpfe Platte; Stbg. *etwas länger*, als d. Platte; KB. länglich-eyf.; B. doppelt-3zählig, *Blättch. bis über d. Mitte 3 sp., eingeschnitten-gekerbt*, Kerben eyf., od. länglich, stumpf. 4. In den VorA. u. A., (an Felsen d. Ortenburger A. bei Spital in Oberkärnthen, Haenke; an sonnigen Stellen längs d. Savestrom bei Laibach, Graf!) Jun. Jul. Aquilegia alpina Haenke in J. collect. 2. p. 39. nicht Sternb. u. nicht Linnés. A. Sternbergiana Reichenb. Vielleicht Var. von A. vulgaris mit tiefer-eingeschnittenen B. Bth. blau. D.

3. A. ATRATA (Koch.) Geschwärzte A. — *Sporne an d. Spitze hakig*, länger, als d. gestutzt- sehr stumpfe, mit einer kleinen vorspringenden Spitze versehene Platte; Stbg. $1\frac{1}{2}$ mal länger als d. Platte; KB. länglich-eyf.; B. doppelt-3zählig; Blättch. halb 3 sp., gekerbt, Kerben eyf., stumpf. 4. In d. A. u. VorA., (Schw. u. durch d. ganze Alpenkette.) Jun. Jul. Bth. schwarzviolett, halb so gross, als wie bei d. A. vulgaris, Stbg. lang aus d. Bth. hervorgestreckt, Blättch. kleiner, tiefer-eingeschnitten u. gekerbt; Platte d. Blb. nicht seicht ausgerandet, sondern am Ende auf beid. Seiten geschweift, u. daher in d. Mitte mit ein. undeutlich. Spitzchen: die innern unterweibigen Schuppen kaum wellig. Uebrigens ist die Pfl. wohl auch nur Varietät v. A. vulgaris u. desfalls noch weiter zu beobachten. Hierher: A. vulgaris atroviolacea Avé-Lallemant., A. nigricans Rb. fl. exc. p. 748, nicht Baumgarten. Letztere ist dch gabelsp. St. u. gerade Bthstiele verschieden u. wahrscheinlich in der A. vulgaris Degener zu finden.

4. A. ALPINA (L.) Alpen-A. — *Sporne ziemlich gerade od. gebogen, (nicht hakig)* so lang, od. etwas länger, als die gestutzte Platte; Stbg. kürzer, als d. Platte; KB. breit-eyf.; B. doppelt-3zählig, Blättch. tief-3 sp., eingeschnitten od. gekerbt, Kerben länglich, stumpf. 4. An rauhen, felsigen O. d. A., (d. Schw. im südwestl. Theile d. C. Waadt, Glarus, Graubünden u. St. Gallen.) Jul. Aug. Bth. freudigblau, sehr ansehnlich. A. montana Sternb. S.

5. A. PYRENAICA (DeCand.!) Pyrenäische A. — *Sporne an d. Spitze gerade; Platte abgerundet*, so lang als d. Sporn u. die Stbg. od. ein wenig länger; KB. länglich-eyf.; B. Ifach od. doppelt-3zählig, wenig-kerbig, Kerben abgerundet. 4. An felsigen, gebirgigen O., (Krain im Thale d. Liepina u. auf d. Kru bei Rabl u. Tarvis, im ganzen südl. Tyrol bis in das Thal zw. d. Schlehern u. d. A. von Fassa; Schw. am Comersee.) Jun. Jul. A. alpina Lam. Sternb. Bth. blau, fast um d. Hälfte kleiner, als bei d. A. vulgaris.

16. DELPHINIUM (L.) Rittersporn. — K. blumenblattig 5-blättrig: das obere Blatt gespornt. Blkr. honigbehälterf., 4blättrig: die 2 obern Blätter bespornt, Sporne eingeschlossen, od. alle Blb. in ein gesporntes zsgewachsen. Kapseln 1, 3, 5, viel-samig.

1. Rotte. CONSOLIDA. Fruchtkn. 1. Blb. in eines verwachsen.

1. D. CONSOLIDA (L.) Feld-R. — *Blkr. 1blättrig*; St. sperrig-ästig; Tr. armblüthig; Bthstielch. länger, als das DeckB.; Kapsel kahl. ☉. Unt. d. Saat. u. auf Brachfeldern; Jun. - Aug. Fl. dan. t. 683. Bth. azurblau. — D. Ajacis auf d. Auswürfen d. Gärten hie und da vorkommend, ab. nirgends im Bezirk unserer Fl. wild, unterscheidet sich: St. steif, wenig ästig, Aeste aufrecht, Tr. vielblüth., Bthstielch. viel kürzer, DeckB. länger, als d. Bthstielch., Kapseln flaumh.

2. D. PANICULATUM (Host. fl. a.2. p. 65.) Rispiger R. — *Blkr. einblüttrig*; St. sehr ästig, rispig; Tr. armbth.; Bthstielchen viel länger, als d. DeckB.; Kapsel kahl. ☉. Aecker (Insel Osero, Noë) Jun. Jul. Ganz ähnlich dem D. divaricatum Ledeb., nur sind die Früchtchen bei letzterem angedrückt-flaumig, bei diesem kahl. Vielleicht eine Variet. desselben.

11. Rotte. DELPHINASTRUM. Blb. 4: die 2 obern an d. Basis bespornt; die 2 untern in d. Mitte bärtig. Kapseln fast cylindrisch.

3. D. ELATUM (L.) Hoher R. — *Blkr. 4blättrig*, der Saum d. untern Blb. 2sp., bärtig; B. handf.-ösp. Zpfl. 3sp., eingeschnitten-gesägt, *Bstiele an der Basis nicht scheidig*; Bthstielch. oberwärts mit 2 lineal. Deckblättchen. 4. An kräuterreichen O., an Bächen in d. VorA., (im Riesengebirge, in Mähren u. Steyermark; in d. Aelener Bergen C. Waadt.) Jun. Jul. Schk. t. 166. D. intermedium Ait. Bth. azurblau. Var. kahl, flaumh. u. rauh.; mit grössern u. kleinern Bth.; mit einem schmälern, dickern, geraden u. gekrümmten Sporn, ferner:

α. B. im Umriss herzf.-rundlich, die hintern Zpfl. sich nähernd, u. 1. die Bthstielchen u. Fruchtkn. kahl: D. intermedium DC. D. Clusianum Host.; 2. Tr. flaumh., Kapseln etwas haarig: D. alpinum W. u. K.; 3 Tr. u. Fruchtkn. dicht flaumh.; D. montanum DC. D. elatum All.; 4. Tr. rauh.; D. hirsutum Roth. Beitr. p. 5. Bth. sehr gross: D. speciosum M. B.

β. B., auch die untern, im Umriss nierenf., die hintern Zpfl. spreizend: D. palmatifidum DC. Bz. pfl. vorne wenig gezähnt, die der obern B. ganzrandig.

γ. B. der Varietät β., aber an der Basis keilig-vorgezogen: D. cuneatum Stev. D. hybridum des Linn. Herbariums nach DC.

δ. die B. an d. Basis u. die Zpfl. am Rande monströs-gezogen: D. urceolatum Jacq. Aus den S. der Var. γ. und δ. zog ich die Var. α. und β. mit unzähligen anderen Abänderungen.

4. D. HYBRIDUM (Willd.) Bastard-R. — *Blkr. 4blättrig*, der Saum d. untern Blb. 2sp., bärtig; B. 3zählig-vielth., Zpfl. lineal., *Bstiele unterwärts scheidig-verbreitert*; Bthstielch. in d. Mitte mit 2 lineal. Deckblättch. 4. An steinig, waldigen O., (im Walde v. Lipizza bei Triest u. mehreren Stellen des Karstes.) Jun. Jul. D. hybridum M. Bieb. D. fissum WK. Samen bei dieser Art 3kantig, ungleich-runzlig; bei D. elatum mit dachigen Plättchen bedekt.

III. Rotte, STAPHYSAGRIA. Rbh. 4; die 2 obern kurz bespornt; die 2 untern bartlos. Kapseln eif., bauchig.

5. D. STAPHYSAGRIA (L.) *Scharfer R. — *Blkr. 4blättrig*, Rbh. an d. Basis zsgewachsen, *bartlos*; B. handf.-ösp., Zpfl. ganz od. 3sp.; Bthstielch. an d. Basis mit 3 Deckblättern. ☉. Am Meerufer in Istrien. Jun. Jul.

17. ACONITUM (L.) Eisenhut. — K. blumenblattig, 5blättrig, das obere B. (die Haube) gewölbt. Rbh 5; die 2 obern kaputzenf., honigbehälterig, lang benagelt; die übrigen klein, lineal., auch fehlend. Kapseln 3-5, viel-samig.

1. A. ANTHORA (L.) Feinblättriger E. — Die Honigbehälter auf einem gebogenen Nagel wagerecht-nickend; Sporn kreisf. zurückgerollt, an d. obern Seite seiner Basis *rechtwinkelig-einwärtsgebrochen*. 4. Auf felsigen O. der A., (auf d. Jura, d. Graubündener A., Krain u. Oestr., Slavnik u. M. Maggiore im Litt.) Aug. Sept. J. a. t. 382. Variirt mit sehr schmalen Bzpfn: A. Jacquinii Rb.; mit lanzettl. Bzpfn: A. nemorosum Rb. M. Bieberst. u. A. DeCandollii Rb.; mit lineal., sichelf. Bzpfn: A. euphorium Rb.; und klaffender Haube. — Bth. hellgelb.

2. A. NAEPELLUS (L.) Wahrer E. — Die *Honigbehälter* auf ein. gebogenen Nagel *wagerecht-nickend*; Sporn etwas zurückgekrümmt; Bth. *traubig*, die *jüngern Fruchtlch. spreitzend*; S. scharf-3kantig, auf d. Rücken stumpf-faltig-runzlig. 4. An Büschen u. an feuchten O. gebirgiger Gegenden u. auf nassen Weiden d. A., (dch. d. g. AK.: in Böhm., Schles., auf d. Vogelberge in Hessen, u. in d. Eifel bei Prüm.) Jun.-Aug. Bth. violett, selten bläulich u. weiss.

Reichenb. unterschied u. stellte auf folgende Arten: 1. Bthstiele aufrecht, Stbf. kahl; 1. Sporn sehr kurz, zugerundet, u. nicht aufwärts verbreitert od. gekrümmt: A. Koelleaenum Rb.; 2. Sporn aufwärts gekrümmt od. aufwärts verbreitert, Haube klaffend: A. Hoppeaenum Rb.; Haube aufliegend, halbkreisf.: A. angustifolium Bernh. Rb.; Haube aufliegend, höher gewölbt: A. acutum Rb. — II. Bthstielch. aufrecht, kahl, Stbf. haarig; 1. Sporn sehr kurz, wie bei A. Koelleaenum, aber dch. d. sehr haarigen Stbf. verschieden: A. tauricum Wulf. Rb.; 2. Sporn zurückgekrümmt, Haube aufliegend: A. amoenum Rb.; Sporn aufwärtsgekrümmt, Haube klaffend: A. laxum Rb. III. Bthstielch. aufrecht, kraus-flaumh.; 1. Sporn sehr kurz, wie bei d. A. Koelleaenum: A. formosum Rb.; 2. Sporn aufwärtsgebogen od. verbreitert, Haube klaffend: A. Napellus Dodonaei Rb.; Haube aufliegend: halbkreisf., Bthstielch. verlängert: A. pyramidale Mill. Rb.; Bthstielch. kürzer, als d. Bth.: A. Bernhardianum Rb.; Haube aufliegend, höher gewölbt, Bzpf. sehr schmal: A. multifidum Koch. Rb. IV. Bthstielch. kraus-flaumh., steif-abstehend; 1. Sporn sehr kurz, abgerundet: A. strictum Bernh. Rb.; 2. Sporn köpfig od. aufwärtsgekrümmt, Haube niedrig, vorne etwas abstehend: A. autumnale Rb.; Haube halbkreisf., aufliegend: A. neubergense Rb. (A. neomontanum Wulf.) A. eminens Koch. unterscheidet sich v. diesem durch das längere Lippchen d. Honigbehälters. V. Bthstielch.

flaumh., Haare gerade, abstehend: *A. acuminatum* Rb., dieser in d. Schw.

3. *A. STOEERKEANUM* (Reichb.) Störk's E. — Die *Honigbehälter*, auf einem oberwärts gebogenen Nagel, *schief-geneigt*; Sporn hakig; die *jüngern Früchtch. einwärts gekrümmt, zsschliessend*; S. scharf-3kantig, auf d. Rücken geschärf-runzlig-faltig. 4. An gebirgigen, waldigen O., der VorA., (Berner A. Salzbg., Unterharz, Thüringen.) Jun.-Aug. *A. intermedium* DC. *A. neomontanum* Willd. *A. Napellus* Stoerk. St. h. 6. *A. Cammarum* L.? (nach d. Meinung v. Fries, aber weder die StandO. noch d. Synonyme stimmen überein.) — Bth. violett od. weiss, od. violett-bunt. Stbf. haarig. — Reichb. unterscheidet, 1. *A. palmatifidum*. Stbf. kahl, 2. *A. exaltatum*, Stbg. haarig, R. pyramidenf., Haube höher.

4. *A. VARIEGATUM* (L.) Bunter E. — Die *Honigbehälter aufrecht*, od. schief-geneigt auf einem aufrechten Nagel; Sporn hakig; Tr. an d. Basis ästig, endlich rispig; jüngere Früchtchen parallel; S. scharf-3kantig, quer-gefaltet, Rückenfallen geflügelt, häutig, wellig. 4. In d. Thälern d. A. u. VorA. u. auf höhern gebirgigen O., (dch. d. g. AK.; sodann in Böh., Schles., im Erzgebirge, Thüringen u. Franken.) Jul. Aug. Bthstielch. kahl, sehr selten kraus-flaumh. Bth. violett, blau, weiss u. weiss- u. blau-bunt; hierzu: *A. Cammarum* J. a. t. 3. *A. Bernhardianum* Wallr. — Reichb. unterschied: *A. Cammarum* Rb. mit gerader Haube; *A. nasutum* Fisch., mit an d. Spitze ein wenig vorwärts geneigter Haube, abwärts gebogenem Schnabel; *A. rostratum* Bernh., mit vorwärts gekrümmter Haube, geradem Schnabel; *A. rostratum album* Rb., *A. album* Ait., mit verbreiterten, wenig eingeschnittenen Bzpfkn, weisser Bth.; *A. variegatum* Rb. mit vorwärts gekrümmter Haube, aufwärts zurückgebogenem Schnabel. B. wie bei dem vorhergehenden u. blauen od. weiss u. blau bunten Bth. — Bthstielch. kahl, sehr selten kraus-flaumh.

5. *A. PANICULATUM* (Lam.) Rispiger E. — Die *Honigbehälter* auf ein. gekrümmten Nagel *nickend*; Sporn zurückgekrümmt; Bth. traubig, *endlich sperrig-rispig*; jüngere Früchtch. spreitzend; S. scharf-3kantig, quer-gefaltet, Rückenfallen geflügelt, häutig, wellig. 4. An etwas feuchten O. d. A., (in d. südl. Schw., Salzbg., Kärnthen, Steyermark, Krain.) Jul. Aug. Bth. violett, R. immer flaumh., Haare gerade, wagerecht-abstehend. *A. cernuum* Wulf. *A. flexicaule* Hoppe u. Hornsch. — Reichb. unterscheidet: *A. cernuum* mit halbkugeliger, gewölbter Haube; *A. molle* mit höher gewölbter Haube, kurzem Schnabel, u. *A. paniculatum* (*A. hebegynum* DC.) mit schmälere Haube, längern Schnabel.

6. *A. LYCOCTONUM* (L.) Wolfs-E. — Die *Honigbehälter aufrecht*; Sporn *südlich, zirkelf.-zsgewölbt*; S. überall faltig-runzlig, stumpf-3kantig mit scharfem Kiele; B. handf. 4. An waldigen u. buschigen, gebirgigen O. u. in d. VorA., (in d. AK. überall, in d. übrigen Gebirgen hin u. wieder.) Jun. Jul. Variirt: St. u. Bth. fast kahl, od. v. krausen Härchen flaumh., od. mit geraden Haaren

bedeckt; *B.* 7-11 sp., Zpfl. 3sp., Läppch. 2-3zählig; u. Zpfl. doppelt-3sp., eingeschnitten-gezähnt, diess das *A. pyrenaicum* DeC., *A. Lamarckii* Rb.: Bthstielch. kurz u. verlängert, Bth. schwefelgelb, weisslich, roth (bei Ungarisch. Expl.) bläulich u. violett. Reichb. untersch.: *A. Thelyphonum* mit aufwärts allmählich schmalerer Haube; *A. Vulparia* mit in d. Mitte schmalerer Haube; *A. Myoctonum* mit senkrechter Kaputze d. Honigbehälters, an d. Spitze einwärtsgekrümmtem Nagel; *A. pallidum* mit abgekürztem, nur ein. halben Kreis umschreibenden Sporne.

V. Gruppe. Uneigentliche *RANUNCULACEEN*. Stbk. einwärts aufspringend.

18. *ACTAEA* (L.) Christophskrant. — K. 4blättrig, hinfällig. Blkr. 4blättrig, Blb. an d. Basis nackt. Früchtch. 1, beerenartig, 1fächerig; S. auf d. einen Seite der Wand an eine Längslinie angeheftet.

1. *A. SPICATA* (L.) Achrentragendes Chr. — Beeren rundlich-oval; Blb. so lang, als die Stbg., Tr. eyf.; *B.* 3zählig-doppelt-gefiedert, Blättch. eyf. od. länglich, eingeschnitten-gesägt. 4. In Hainen u. schattigen Wäldern. Mai. Jun. St. h. 2f. Bth. weiss.

19. *CIMICIFUGA* (L.) Wanzenkrant. — K. 4blättrig, hinfällig. Blkr. 4blättrig, Blb. an d. Basis mit einer Honiggrube. Früchtch. trocken, kapselig, an der innern Naht aufspringend.

1. *C. FOETIDA* (L.) Stinkendes W. — Fruchtkn. meist zu 4, flaumh., sehr kurz gestielt; *B.* 3zählig-doppelt-gefiedert, Blättch. eyf.-länglich, ungleich-doppelt-gesägt. 4. In Hainen, (Mähren bei d. Orte Sloun, Schott, u. bergiges Weichselufer bei Graudenz, Buek.) Jul. Aug. Lam. illust. t. 487. *Actaea cimicifuga* L. DC. D.

20. *PAEONIA* (L.) Päonie. — K. 5blättrig, ungleich, oft blattartig, bleibend. Blb. 5, mehrere. Fruchtkn. 2, 3. N. zungenf. Kapseln 1fächerig, einwärts aufspringend.

1. *P. CORALLINA* (Retz obs. p. 34.) Corallenfrüchtige *P.* — St. ganz einfach, 1 bth.; Früchtchen meist 5, wagerecht abstehend; *B.* doppelt 3zählig, unterseits weisslich lauchgrün; Blättchen elliptisch-längl. od. elliptisch, ganz, das endst. an der Basis keilig; W Fasern rübenf., gegliedert-ästig, sitzend od. kurzgestielt. 4. Im Waldgesträch felsiger O. (auf d. Müllersberge am Kugelbache bei Reichenhall im Salzb.) Apr. Mai. *P. officinalis* β. L. sp. Var. mit unterseits kahlen u. flaumigen *B.* — *P. Russi* ist verschieden durch grasgrüne, glänzende, unterseits nicht grauliche Blättchen, das mittlere ist eyf., fast herzf. u. nur wenig in d. Bstiel verlängert; *P. albiflora* aber durch d. ästigen St.

2. *P. PEREGRINA* (Mill. dict. n. 3. DC. syst.) 2. 390. Gemeine *P.* — St. ganz einfach, 1 bth.; Früchtchen 2 od. 3 von d. Basis an fast wagerecht abstehend; *B.* doppelt-3zählig unterseits weisslich-lauchgrün; Blättchen 2-3 sp., Fetzen ganz, 2 od. 3 sp.; W Fasern zu längl. Knollen verdickt, meist lang-gestielt. 4. An waldigen O. (im Litt. auf d. Karst, auch im Innerkrain; C. Tessin auf d. M. generoso; C. Bern bei Schwarzenegg unweit

Thun, verwildert nach Shuttleworth). Mai. Jun. *P. officinalis* u. *peregrina* D. fl., Gaud. helv. Var. mit B., welche sowie die Bst. unten dicht flaumig u. fast glatt sind, die BZpfl lineal-lanzettl. rinnig u. zurückgekrümmt, lanzettl. u. verlängert, breiter u. flacher, die Fruchtkn. filzig, etwas od. ganz glatt. Synonyme sind: *P. rosea* Host. fl. a., *P. bannatica* Roch. (deren W. genau gebildet ist, wie bei *P. peregrina*. Von dem Autor empfing ich Exempl. mit unterseits flaumigen u. glatten B.) *P. pubens* Sims. stellt eine Variet. mit lanzettl.-verlängerten BZpfln. u. *P. paradoxa* Anders. eine solche mit breiteren, a. d. Spitze kürzer gelappten BZipfeln dar. Var. ferner:

β . Früchtchen schwach-flaumig. *P. humilis* Retz. γ . Früchtchen ganz kahl. *P. peregrina* β . DC. syst. *P. paradoxa* β . *leio-carpa* DC. prodr.

Die *Paeonia officinalis* Retz. DC. *P. (festiva* Tausch) giebt sich zu erkennen durch die unterseits bleicheren, einigermaßen glänzenden, aber nicht weissl.-lauchgrünen u. matten B., durch die aufrechten, nur a. d. Spitze auswärts gerichteten Früchtchen; sie ward aber in unserer Flora noch nicht gefunden.

Ich gewann aus d. S. *Paeonia peregrina* ein Exemplar, welches gegenwärtig im hiesigen Garten steht u. Bthen von der dunkel-purpurnen Farbe der *P. festiva* Tausch, (*P. officinalis* d. Gärten) trägt, die aber nicht gefüllt sind. Nach d. Beobachtungen von Facchini ist d. *P. festiva* nur ein stets unfruchtbarer Abkömmling der *P. peregrina*, denn nach d. Verblühen vergrößern sich zwar d. Früchtchen, erzeugen aber keine vollkommenen S., weshalb jene auch nicht auseinander treten: überdies fand er Exemplare d. *P. peregrina* mit matter u. sattlauchgrüner oder mit blos blasser und glänzender Unterseite der B. So schwinden alle Abgrenzungen zw. der *P. festiva* u. *peregrina*. Jene blüht in unseren Gärten stets mit gefüllten Bth. zwar später als d. *P. peregrina* mit ihren nicht gefüllten Bth., aber sie verhält sich darin gerade so wie die *P. albiflora*, deren Variet. mit gefüllter Bl. auch später blüht als d. Stammpl. mit ihren einfachen Bl.

II. Ordng. BERBERIDEEN. Vent. tabl. 3. 83.

KB. 3-4-6, in doppelter Reihe abwechselnd gestellt. Blb. so viel, als KB., und diesen gegenst., seltner an d. Zahl doppelt. Drüsen od. ein Nebenkronblatt an d. Basis der Blb. Stbg. unterweibig, frei, den Blb. gegenst.; Stbk. angewachsen: *Fächer mit ein. Klappe v. d. Basis bis z. Spitze elastisch aufspringend*. Fruchtkn. 1, 1fächerig; STräger auf der einen Seite der Wand. S. 1-3, gegen d. Basis des STrägers angeheftet. Keim gerade, in der Achse liegend, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. od. Blättch. begrannt-gesägt.

1. **BERBERIS** (L.) Sauerdorn. — K. 6blättrig. Blb. 6, inwendig an d. Basis doppelt-drüsig. Beere 2samig.

1. **B. VULGARIS** (L.) Gemeiner S. — Dornen 3th.; B. büsch-

lig verkehrteyf., gewimpert-gesägt; Tr. vielblüthig, niederhängend, Blb. ganz od. leicht ausgerandet. b. In Gebüsch an gebirgigen, waldigen O. Mai. Jun. Schk. t. 99. Bth. hellgelb.

2. EPIMEDIUM (L.) Sockenblume. — K. 4blättrig, hinfällig. Blb. 4. Nebenkronblätter 4, auf den Blb. liegend, becherf., an d. Grunde stumpf, mit d. Rande der Mündung an den Fruchtb. geheftet. Kapsel schotenf., vielsamig.

1. E. ALPINUM (L.) Alpen-S. — WB. fehlend, das stengelst. doppelt-3zählig. 4. An schattigen O. u. in Gebüsch. (Krain, Görz, südl. Tyrol, auch bei Danzig „aber an diesem O. wohl ursprünglich nicht wild“) Apr. Mai. St. h. 44. Bth. blutroth, Honigbehälter hellgelb. D.

III Ordng. NYMPHAEACEEN. DC. prop. medic. ed. 2. p. 119.

K. 4-6blättrig. Bkr. regelmässig; Blb. zahlreich, allmählig in die Stg. übergehend. Stbg. zahlreich, unterweibig, od. dem den Fruchtkn. überziehenden Blüthenboden eingefügt; Stbk. angewachsen. Fruchtkn. mehrfächerig, Fächer vieleig, Eychen an d. Wände d. Fächer angeheftet. Narben so viel, als Fächer. Keim ausserhalb d. Eyweisses gegen d. Basis des S. gelegen, in ein Säckchen eingeschlossen.

1. NYMPHAEA (L. Smith.) Seerose. — K. 4blättrig; Blb. zahlreich, ohne Honiggrübchen. N. vielstrahlig.

1. N. ALBA (L.) Weisse S. — B. rundlich, tief-herzf., ganzrandig, Lappen der Basis, wegen d. geradelinigten Bucht schiefeyf.; Fruchtkn. bis gegen d. Spitze mit Stbg. besetzt; N. 12-20 strahlig. 4. In stehenden u. langsam fliessenden Wassern. Jun. Aug. St. h. 30. N. gelb; Blb. schneeweiss. Variirt mit um d. Hälfte kleiner Bth.: N. alba β. minor DC.

2. N. BIRADIATA (Sommerauer.) Doppelstrahlige S. — B. rundlich, tief-herzf., etwas geschweift, Lappen der Basis fast gleichseitig-eyförmig, wegen der, mit gekrümmten Rändern, auswärts offenen Bucht; Fruchtkn. bis gegen d. Spitze mit Stbg. bedeckt; N. 5-10strahlig. 4. In stehenden Wassern, (im Triebener See des Peltentales in Obersteyermark, im Zellersee im Salz.) Jul. Aug. Blb. schneeweiss, N. in d. Mitte mit ein. kreisrunden, gezähnten, blutrothen, mit 3 Zähnen in die einzelnen gelben Strahlen auslaufenden Flecken, daher gleichsam doppelstrahlig; bei d. getrockneten Pflanze ist die blutrothe Farbe in die violette verändert.

3. N. CANDIDA (Presl.) Rein-weiße S. — B. rundlich, tief-herzf., etwas geschweift, Lappen der Basis fast gleichseitig-eyf., wegen der, mit gekrümmten Rändern auswärts offenen Bucht, Fruchtkn. entblösst, glatt, nur an d. Basis mit Stbg. besetzt; N. 8strahlig. 4. In stehenden Wassern, (Böhmen, Presl.) Jul. Aug. „Fruchtkn. eyf.-kegelf., glatt, nur am untersten Drittheil seiner Höhe mit Blb. u. den hier entspringenden Stbg. bedeckt.“

2. NUPHAR (Smith.) Teichrose. — K. 5blättrig. Blb. zahl-

reich, mit Honiggrübchen auf d. Rücken. *N.* ganzrandig, geschweift od. sternf.-gezähnt.

1. *N. LUTEUM* (Smith.) Gelbe T. — K. 5blättrig; *N.* flach, tief-genabelt, *ganzrandig*, kaum geschweift, 10-20strahlig, Strahlen vor d. Rande verschwindend; Stbk. länglich-lineal.; B. oval, auf $\frac{1}{3}$ herzf.-eingeschnitten, Lappen genähert. 2. In stehenden u. langsam fließenden Wassern. Jun.-Aug. St. h. 30. *Nymphaea lutea* L. sp. Bth. gelb, wie bei allen. Varirt: Bth. um d. Hälfte kleiner, übrigens nicht verschieden; u. B.- u. Bth.-Stiele seidig-flaumb. — Das *N. sericeum* Lang., in d. Flamm mit dieser Varietät übereinstimmend, unterscheidet sich deutlich dch. d. 10-15zählige N., u. dch. die in diese Zähne u. in d. Rand selbst auslaufenden Strahlen. — *N. intermedium* Ledeb., hat eine seicht-eingedrückte, u. nicht tief-genabelte N.

2. *N. PUMILUM* (Smith.) Kleine T. — K. 5blättrig; *N. sternf. spitz-gezähnt* od. eingeschnitten, meist 10strahlig, zuletzt halbkugelig mit in den Rand auslaufenden Strahlen; Stbk. fast 4eckig um d. Hälfte länger, als breit; B. fast oval, tief-herzf., Lappen meist auseinandertretend. 2. In stehenden u. langsam fließenden Wassern, (in Mecklenburg u. Schlesien, Salzburg., Zürich am Hohen-Rhonen.) Jun.-Aug. Rb. ic. 2. t. 119. *Nymphaea pumila* Hoffm. d. fl. *N. minima* Sm. engl. bot. *N. calmiiana* Hook scot. nicht Pursh.

3. *N. SPENNERIANUM* (Gaud.) Spenner's T. — K. 5blättrig; *N. sternf. spitz-gezähnt* od. eingeschnitten, meist 10strahlig, zuletzt halbkugelig, Strahlen in den Rand auslaufend; Stbk. lineal.-länglich, fast 4mal länger, als breit; B. fast oval, tief-herzf., Lappen meist auseinandertretend. 2. In stehenden Wassern, (im Feldsee des Schwarzwaldes u. d. Seen auf den Vogesen.) Jun.-Aug. *N. minima* Spenn. bot. ztg. 10. 1. 114. t. 1. 2. D.

IV Ordng. PAPAVERACEEN. DC. syst. c. p. 103.

K. 2blättrig. Blkr. regelmässig, 4blättrig. Stbg. unterweibig 4, od. zahlreich, frei. Fruchtkn. frei: die Stträger zwischenkluppig, gegenst., od. an d. Scheidewände angewachsen. Keim sehr klein, gerade, in der Basis des Eyweisses gelagert, Würzelchen gegen d. Nabel gerichtet. Kräuter meist milchend mit einem weissen od. safrangelben Saft.

1. *PAPAVER* (L.) Mohn. — K. 2blättrig, hinfällig. Bbl. 4. Stbg. zahlreich. Gf. fehlend. N. 4-20strahlig. Kapsel unvollkommen 4-20fächerig, mit Oeffnungen (kurzen Kläppchen) unter der N. aufspringend.

§. 1. Kapsel steifh.

1. *P. ALPINUM* (L.) Alpen-M. — Stbf. pfriemlich; Kapsel verkehrteyf., steifh.; Schaft 1blüthig; B. meist doppelt-gefiedert. 2. An kiesigen u. steinigen O. der höchsten KalkA. Jul. Aug. Bth. angenehmriechend. Varirt: B. fast 1fach u. doppelt-gefiedert,

steifh. u. kahl, Blättch. schmaler, fast lineal. u. breiter, fast elliptisch, Borsten an d. Schaft angedrückt u. abstehend, u.:

α. *albiflorum*, Bth. weiss, an d. Basis schwefelgelb: *P. alpinum* J. a. t. 83. DC. *P. Burseri* Crantz. (A. v. Oestr., Steyermark, Krain, Salzburg, Tyrol, Oberinntal u. Wallis.)

β. *flaviflorum*. Bth. schön citronengelb, an d. Basis schwefelgelb od. blassgrün, getrocknet pomeranzengelb: *P. alpinum* Hoppe bei St. h. 17. *P. pyrenaicum* α. *luteum* DC. *P. aurantiacum* Lois. Auf d. KalkA. Kärnth., Krain, Tyrol u. Salzburg. Aus d. S. erzog ich Exmpl. mit weissen u. gelben Bth., u. ein sehr schönes mit weissen u. mit einem breiten rosenrothen Rande umzogenen Bth., allein obgleich ich diese lebend u. noch viele andere getrocknete verglichen, vermochte ich doch keine scharfen Grenzen zw. *P. alpinum*, *P. Burseri* u. *P. pyrenaicum* aufzufinden. (Dieses findet sich in Kaernten, Krain, Tyrol u. Salzburg; Wormser Joch; Schw. Bernina.)

2. *P. ARGEMONE* (L.) Acker-M. — *Stbf. oberwärts verbreitert; Kapsel* verlängert-keulenf. v. zerstreuten, aufrechten Borsten steifh.; St. beblättert, mehrblüthig. ☉. Unter d. Saat., auf Feldern, an sandigen O. Mai-Jul. *P. clavigerum* Lam. Fl. dan. t. 867. — B. weniger eingeschnitten: *P. arvense* Borkhaus: d. Steinblüthig: *P. maritimum* With. nach Sm. — Variet, jedoch selten, kahl:

β. *glabrum*: der obere Theil des St. mit B., K. u. Kapsel sehr kahl, St. unterwärts u. die Mittelrippe der untern B. unten mit wenigen zerstreuten Haaren.

3. *P. HYBRIDUM* (L.) Bastard-M. — *Stbf. oberwärts verbreitert; Kapsel* rundlich, von weit abstehenden, gebogenen Borsten steifh.; St. beblättert, mehrbl. ☉. Unter d. Saat. selten, (Mainz, Darmstadt, Neuwied, Dissibodenberg an d. Nahe, Colmar u. Ruffach, Erfurt, Halle, Magdeburg, Barby, Mecklenburg bei Malchin) Mai-Jul. D.

§. Kapsel kahl.

4. *P. RHOEAS* (L.) Klatsch-M. — *Stbf. pfriemenf.; Kapsel* kurz-verkehrteyf., an d. Basis abgerundet, kahl, *Läppch. der N. mit ihrem Rande sich deckend*; St. steifh., mehrblüthig; B. gefiedert, u. doppelt-gefiedert, Zpfl. länglich-lanzettl., eingeschnitten-gezähnt. ☉. An kultiv. O., auf Sandfeldern u. kiesigen Ufern. Mai-Jul. St. h. 17. — *P. intermedium* Becker! ist nicht verschieden, u. besteht aus grössern Expl. mit fast 1 fach-gefiederten B. Variet:

β. Haare der Bthstiele angedrückt: *P. Rhoëas* β. *strigosum* Bönningh.

γ. St. niedriger, v. d. Basis an in aufstrebende, mit den B. sehr steifh. Aeste getheilt; Bth. bleicher: *P. Roubiaei* Vig. nach einem bei Montpellier am Meeresstrand gefundenen u. von Delille bestimmten Expl.

δ. *Papaver trilobum* Wallr. sched. crit. B. elliptisch, ungeheilt u. 3lappig, Lappen ganzrandig, der mittlere grösser, etwas gezähnt; ward nur einmal beobachtet, bleibt daher noch zweifelhaft.

5. *P. RUBIUM* (L.) Zweifelhafter M. — *Stbf. pfriemlich; Kapsel* keulenf., gegen d. Basis allmählig verschmälert, kahl; *Kerben d. N. getrennt*; St. steifh., mehrblüthig; B. doppelt fiedersp., Zpfl.

lineal., entfernt-gezähnt. ☉ An cultivirten O. auf Feldern mit *P. Rhoeas*. Mai. Jul. J. a. t. 25, eine Form mit weissen Bth. — Var.:

β. *glabrum*; ganz kahl, B. unterseits mit sparsam aufgestreuten, etwas abstehenden Borstchen, an d. Spitze d. Bthstiele u. d. K. mit einigen angedrückten Borstchen. *P. laevigatum* MB. Rchb. ic. f. 533. (ein kleines Expl.)

6. *P. SOMNIFERUM* (L.) Garten M. — *Stbf. oberwärts verbreitet*; Kapsel fast kugelig, kahl; B. länglich, ungleich gezähnt, die obere ganz, mit herzf. Basis stengelumfassend, die untere buchtig, an d. Basis verschmälert. ☉ Gebauet. Jul. Aug. Var.: Bth. weiss; *P. officinale* Gmel.: und rosenroth mit ein. schwarz-violetten Flecken a. d. Basis; *P. somniferum* Gmel., bei beiden Variat. sind d. Löcher unter d. N. bald offen, bald geschlossen. Nach meiner Ansicht ist d. *P. setigerum* DC. das ursprünglich wilde *P. somniferum*. Cultiv.

2. *GLAUCIUM* (Tournef.) Hornmohn. — K. 2blättrig, hinfällig. Blb. 4. Stbg. zahlreich. Kapsel schotenf., 2klappig; Klappen v. d. Spitze gegen d. Basis aufspringend. S. in die zwischen den Klappen liegende, schwammige Scheidewand eingedrückt.

1. *G. LUTEUM* (Scop.) Gelber H. — Die oberen B. mit tief-herzf. Basis stengelumfassend, lappig-fiedersp., im Umriss rundlich-herzf.; *Schoten knötig-rauh*. ☉ An sandigen O. u. auf Hügelu., im Littorale, Untersteyern., Mecklenbg. am Meeresufer, Thüringen. Schw. am Neufchateller See u. am Montorge in Wallis). Jun. Jul. Fl. d. a. t. 585. *Chelidonium glaucium* L. *Glaucium flavum* Crantz. Bth. schön citrongelb. Var. in Gärten mit rothgelben, an d. Basis gelben Bth., übrigens aber nicht verschieden. *G. fulvum* Sm.?

2. *G. CORNICULATUM* (Curtis) Rother H. — Die oberen B. mit abgeschnittener Basis sitzend, fiedersp., im Umriss länglich-eyf.; *Schoten borstig-steifh*. ☉ Unter d. Saat., (Oestr., Böhm., Thüring., Rheinpfalz.) *G. phoeniceum* Gärtner. *Chelidonium corniculatum* L. Reichenb. ic. f. 4471. u. *G. rubrum* f. 4470. Blb. roth an d. Basis mit ein. schwarzen Flecken. Var., der kohlschwarze Flecken v. ein. weissen Saum umzogen: *G. tricolor* Bernh. Rb. ic. f. 376.

3. *CHELIDONIUM* (L.) Schöllkraut. — K. 2blättrig hinfällig. Blb. 4. Stbg. zahlreich. Kapsel schotenf., 2klappig; Klappen v. d. Basis gegen d. Spitze aufspringend. S. an 2. zw. d. Klappen liegende, eine durchbrochene Scheidewand darstellende, Samenträger angeheftet.

1. *C. MAJUS* (L.) Gemeines S. — Bthstiele doldig; K. fast kahl; *Stbf. oberwärts breiter*. 4. An schattigen, felsigen O., auf Schutthaufen, an Mauern und Wegen. Mai-Aug. Reichenb. ic. f. 4466. Bth. gelb. Var.:

β. *laciniatum*. Die Blättch. od. die Blieder länger gestielt, bis über d. Mitte fiedersp., Zpfl. länglich, eingeschnitten-gekerbt; das endst. Blättch. 5-7 th.; Blb. oft eingeschnitten-gekerbt, (Baden-Baden, Carlsruhe, bei Baireuth, Eisleben, Frankfurt a. d. O.) *C. laciniatum* Mill. DC. *C. quercifolium* Willemet. Die andere

Variet., das *Ch. Flaciniatum* β . *fumareaefolium* DC. habe ich noch nicht gesehen.

4. **HYPECOUM** (L.) Lappenblume. — K. 2blättrig, hinfällig. Blb. 4. Stbg. 4. Kapsel schotenf., quer in 1samige Glieder zerfallend.

1. *H. PENDULUM* (L. sp. 181.) Hängende L. Die 2 äusseren Blb. elliptisch-längl., ganz, die innern halbdreisp., der mittlere Lappen rundlich, gestielt, länger als die seitenst. länglichen. ☉. Aecker, unter *Daucus Carota*, (bisher blos zw. Gönnsheim und Ellerstadt in d. Rheinpfalz, C. H. Schultz) Jun. Jul. Lobel. advers. Bth. gelb, die Seitenlappen d. inneren Blb. innen fast goldgelb und wie d. Stbf. rothbraun punctirt. Schultz.

Hypocoum littorale (Wulf. in Jacq. collect.) wächst nicht in Deutschland sondern in Dalmatien.

V. Ordng. FUMARIACEEN. DC. syst. 2. p. 105.

K. 2blättrig. Blkr. unregelmässig. Blb. 4, frei od. zsgewachsen. Stbg. unterweibig 6, in 2 gegenst., vor den äussern Blb. gelegene Bündel verwachsen, seltner frei; die seitenst. Stbk. jedes Bündels 1 fächerig. Fruchtkn. 1 fächerig, 1 u. mehr eyig; Samenträger wandst. Keim an der Basis d. Eyweisses; Würzelchen gegen d. Nabel gerichtet. Kräuter mit wässerigem Saft.

1. **CORYDALIS** (DeC.) Hohlwurz. — K. 2blättrig od. fehlend. Blb. 4. das obere an d. Basis gespornt. Stbg. 2brüderig. Schoten 2 klappig, zsgedrückt, vielsamig.

1. Rotte. **BULBOCAPNOS** Bernhardt in d. *Linnaea* 7. p. 604. W. knollig. St. meist 2blättrig in eine Bth. Tr. endigend. Das einzelnstehende Keim B. zu einem einzigen Saamenblatte entwickelt.

1. *C. CAVA* (Schweigg. u. Koert.) Hohle H. — W. knollig, auf allen Seiten mit Wfasern besetzt, hohl, zuletzt vielstengelig. St. 2blättrig, ohne Schuppe an d. Basis; B. doppelt-3zählig, eingeschnitten; fruchtttragende Tr. aufrecht, DeckB. ganz; Bthstielen 3 mal kürzer, als d. Kapsel; 4. In Hainen u. am Gebüsch der Wiesen. Apr. Mai. *Fumaria cava* Mill. *F. bulbosa* α . L. *Coryd. tuberosa* DC. St. h. II. Bth. trübpurpurn od. weiss, wie bei den folgenden.

2. *C. SOLIDA* (Smith.) Unausgehöhlte H. — W. knollig, nicht ausgehöhlt, am untersten Ende mit Fasern besetzt; B. doppelt-3zählig, eingeschnitten, der untere Bstiel blattlos, schuppenf.; DeckB. fingerig-geth.; Frucht Tr. verlängert, aufrecht, Früchte entfernt; Bthstielen. so lang, als d. Kapsel 4. In Hainen u. an Gebüsch. Apr., früher als d. vorhergehende. *Fumaria solida* Smith., Ehrh. *F. bulbosa* γ . L. *F. Halleri* Wild. *Coryd. digitata* Pers. *C. bulbosa* DC. syst. Gf. während dem Blühen a. d. Basis in einem rechten Winkel zurückgeknickt.

3. *C. FABACEA* (Pers.) Bohnenartige H. — W. knollig, nicht hohl, am untersten Ende mit Fasern besetzt; B. doppelt-3zählig, eingeschnitten, der untere Bstiel blattlos, schuppenf.; Frucht Tr. gedrungen, überhangend; DeckB. ganz; Bthstielen. 3 mal kürzer, als d. Kapsel 4. In Hainen, am Gebüsch d. Wiesen, (von West-

phalen dch. d. nördl. D. bis Preussen, sodann dch. Schles., Böhm., südlicher dch. Thüring. bis Baireuth u. Nürnberg, u. nun erst wieder in d. A. der Schw. u. v. Salzbg.) Apr. Mai. *Fumaria fabacea* Retz. *F. intermedia* Ehrh. *F. intermedia* Merat. Gaud. *F. bulbosa* β. L. Schk. t. 194. Aus d. Winkel des blattlosen Bstielles oft ein Aestchen, wie bei der folgenden Art. Gf. während d. Blthe v. d. Spitze des Fruchtkn. ohne Winkel aufsteigend.

4. *C. PUMILA* (Host. fl. a. 2. p. 304.) Niedrige Hohlw. — W. knollig, nicht hohl, am untern Ende mit Fasern besetzt; B. doppelt 3zählig, eingeschnitten; *d. untere Bstiel blattlos, schuppenf.; DeckB. fingerig-getheilt*; Frucht Tr. gedrunken, überhangend; Bthstielen dreimal kürzer als d. Kapsel. 4. *C. Lobelii* Tausch. Mit d. vorhergehenden bin u. wieder (Oestreich, Steyerm., Böhm. Niedersachs.) Blüht früher als d. vorige. Exemplare davon mit 2 Spornen fand Hornung.

II. Rotte. CAPNOIDES. Bernh. l. c. W. ästig-faserig. St. ästig, beblättert. Tr. blattgegenständig. Keimb. 2 entgegengesetzt. Gf. bleibend.

5. *C. LUTEA* (DeC.) Gelbe II. — W. ästig faserig; B. dreizählig-dreifachfiederig in das Lauchgrüne spielend; Blättchen ganz und 3sp., die endst. breit-verkehrteyf.; *Bstiele oberseits flach, unberandet*; *DeckB. länglich, haarspitzig*, gezähnel; Schoten länglich; *S. glänzend, sehr fein-körnig-runzelig, mit abstehendem, körnig-lappigem, gezähneltem Anhängsel*. 4. In Felsenspalten u. auf Mauern, (in Süd-Tyrol, im C. Tessin an vielen O.; an alten Mauern d. Schlosses Idstein in Nassau; bei Linz am Rheine, bei Trier) *C. capnoides* β. *lutea* DC. *Fumaria lutea* L. St. h. 62. *Borkhausenia lutea*. Fl. d. wett. Blkr. citrongelb, an d. Spitze sattgelb.

6. *C. OCHROLEUCA* (Koch.) Gelblichweisse II. — W. ästig-faserig; B. 3zählig-dreifachfiederig, in das Lauchgrüne spielend; Blättchen ganz u. 3sp., die endst. verkehrteyf.-keilig; *Bstiele zu beiden Seiten mit einem hervorstehenden Bande versehen*; *DeckB. länglich, haarspitzig*, gezähnel; *S. fast glanzlos, körnig-rauh, mit angedrücktem, fast ganzrandigem Anhängsel*. 4. In Felsenspalten u. an felsigen O. der südl. Gegenden, (Triest Istrien, Fiume.) Jul.-Sept. *Fum. capnoides* Scop. *Coryd. capnoides* α. DC. *C. acaulis* β. Reichenb. icon. f. 4458. *C. ochroleuca*. St. h. 62. Bth. weisslichgelb, an d. Spitze gelb. — *Fum. capnoides* L. unterscheidet sich: *DeckB. blattartig*, eingeschnitten, die untern viel länger, als das Bthstielen; d. Sporn schmaler, länger. Vergl. d. Abbildg. bei St. h. 62. D.

7. *C. ACAULIS* (Pers. syn. 2. 270.) Stengellose II. — W. ästig-faserig; B. dreizählig-doppeltfiederig, od. fiederig, *weisslich-graugrün*; Blättchen ganz u. 3-5 sp., die endst. breit-verkehrteyf.; *Bstiele oberseits flach, unberandet*; *DeckB. längl. haarspitzig*, gezähnel; Schoten länglich, 2-mal kürzer als d. Bthstielen; *S. fast glanzlos, körnig-rauh, mit angedrücktem fast ganzrandigem Anhängsel*. 4. Felsen u. Mauerspalt (im südl. Istrien, häufig an d. Stadtmauer v. Pola) Mai-Jul. *Fumaria acaulis* Wulf.

in Jacq. coll. St. h. 24. Bth. schneeweiss mit grünem Kiele a. d. Spitzen der Blb. u. der KB., letztere oft mit purpurnen Pünktchen. St. bald sehr kurz, bald 3-4 Zoll lang. Unterscheidet sich sehr deutlich von *C. ochroleuca* durch d. Farbe d. Bth., d. Länge d. Bthstiele u. die weisslich-graugrünen, saftigen, etwas steifen, spröden Blättchen. Der drüsige Anhang des oberen Stbf. erscheint bei dieser Pfl. wie bei d. beiden vorhergehenden bald mehr, bald minder gekrümmt u. hakig.

8. *C. CAPNÖIDES* (L. sp. p. 984.) Weisse H. — W. *ästig-faserig*; B. 3zählig; Blättchen 3theilig od. 3sp., eingeschnitten; unterstes DeckB. von d. Gestalt eines StB., länger als d. Bthstielchen; *Sporn fast von d. Länge d. Bl.*; S. sehr glatt ☉. An steinigten aber fetten O. an der oberen Grenze der Cerealien u. noch höher hinauf im südl. Tyrol (im Pusterthal, im obern Teferacken, Facchini) Jun.-Jul. St. h. 62. Bth. gelblich-weiss.

III. Rotte. *CORYDALIS*. Bernhardi l. c. Gf. abfällig, übrigens wie d. vorige Rotte.

9. *C. CLAVICULATA* (Pers. syn. 2. 270.) Rankige H. — W. einfach; B. doppelt-gefiedert, Blättch. ganz, der Fieder 3- od. 5 zählig-fussf.-gestellt, *Bstiele* in Wickelranken endigend; DeckB. länglich, zugespitzt, gezähnt, länger, als das Bthstielch. ☉. In Hainnen u. Schlagwaldungen d. nördl. D., (v. Westphalen dch. Oldenbg. u. Bremen bis nach Holstein.) Jun.-Sept. Bth. klein, weisslich. D.

2. *FUMARIA*. (L.) Erdranch. — K. 2blättrig. Blb. 4: das obere an d. Basis gespornt. Stbg. 2brüderig. Schötch. nicht aufspringend, nussartig, 1samig.

1. *F. CAPREOLATA* (L.) Rankender E. — KB. *halb so lang, als die Blkr.*; Schötchen rundlich, sehr stumpf; die fruchtrag. Tr. locker; Bzpfl. länglich u. oval ☉. An Zäunen u. auf Schutthäufen, selten u. zerstreut, (Hamburg, Holstein, Magdb. bei Barby, Nürnberg, Oberbaden, Istrien, südl. Schw.) Jun.-Herbst. St. h. 62. Bth. weiss od. gelblichweiss, auf d. Rücken manchmal purpurn, an d. Spitze schwarzpurpurn. Variirt mit um die Hälfte kleinern Bth., mit zurückgekrümmten od. aufrecht-abstehenden Bthstielchen u. gezähnten u. ganzrandigen KB.

2. *F. PETTERI* (Reichb. ic. f. 4455 b.) Petter's E. — KB. *dreimal kürzer als d. Bl.*, breiter als d. Bthstielchen; *Schötchen; eyf. stumpf.*; die fruchtragenden Tr. locker; BZpfl. längl. u. längl.-verkehrt. ☉. Auf Mauern bei Hamburg. Sonder. Im Sommer. Von der Gestalt der *F. capreolata*, hat aber Bth. wie die grössere Variet. der *F. officinalis*, von der sie wieder verschieden ist durch die Schötchen, welche nicht in d. Queere breiter u. vorne abgestutzt, sondern eyf. und nur stumpfl., ausserdem auch glatter und nicht so runzelig sind wie bei *F. officinalis*. Die Pfl. aus der Gegend von Hamburg ist viel grösser, wie die aus Dalmatien und sieht neben letzterer aus, wie *F. officinalis major* neben *F. officinalis minor*.

3. *F. OFFICINALIS* (L.) Gemeiner E. — *KB.* 3mal kürzer, als die *Blkr.*, breiter als das *Bthstielch.*; *Schötk.* rundlich, querebreiter, vorne gestutzt, etwas ausgerandet; die fruchtttrag. *Tr.* locker; *Bzpf.* länglich-lineal. ☉. An cultiv. u. unfruchtbaren sandigen O. Mai-Sept. St. h. 2 u. 62. *Bth.* an d. Spitze schwarzpurpurn, wie bei allen, übrigens rosenroth. *Var.*: *Bth.* halb so gross, Krant gesättigter-meergrün. „*Fum. media* Lois. ist von *F. officinalis* nicht verschieden, aber DC. hat sie unrichtig mit *F. agraria* Lag. verbunden, welche eine gute Art ist.“ Edm. Boissier in brieflichen Mittheilungen.

4. *F. VALLANTH* (Lois.) Vaillant's E. — *KB.* schmüler, als das *Bthstielchen*, vielmal kürzer, als die *Blkr.*; *Schötk.* kreisrund, abgerundet-stumpf; die fruchtttrag. *Tr.* locker; *Bzpf.* lineal. ☉. An cultivirten O., auf Feldern: auf Kalkboden u. auf solchen wahrscheinlich deh. d. g. Gebiet, aber mit d. kleinblüthigen Variet. von *F. off.* verwechselt. Jun.-Sept. St. h. 62. Aehnlich der kleinern Variet. v. *F. off.*, ab. leicht zu unterscheiden durch *KB.*, welche schmüler, als das *Bthstielchen*, sind, u. sehr kleine, nur mit Hülfe der Lupe erkennbare, Schüppchen darstellen.

5. *F. PARVIFLORA* (Lam.) Kleinblüthiger E. — *KB.* 6mal kürzer, als die *Blkr.*, so breit als diese, *Schötk.* eyf-rundlich, vorne spitzlich; die fruchtttrag. *Tr.* locker; *Bzpf.* lineal. ☉. Auf cultiv. O., (am Mittel- u. Unterrheine, von Mainz bis Frankfurt u. Friedberg, auf d. linken Rheinufer bis Crenznach u. Meissenheim, d. Rhein abwärts bis Köln u. Aachen; in d. Schw. hin u. wieder; in Istrien, auf Osero.) Jun.-Sept. St. h. 62. *F. tenuifolia* Fl. wett, *Bth.* weiss. Die *KB.* sind bei allen Arten, da sie bald abfallen, an noch nicht vollkommen entfalteten *Bth.* zu untersuchen.

VI Ordng. CRUCIFEREN. Juss. gen. 257.

K. 4blättrig. *Blkr.* 4blättrig. *Stbfy.* unterweibig, 6, viermächtig; die 4 längern den, den Samenträgern entsprechenden *KB.*, die 2 kürzern, entferntern den, den Klappen entsprechenden gegenübergestellt. Fruchtkn. frei, 1-2fächerig, 2-mehreyig; mit schmalen, zwischenklappigen Samenträgern. *S.* eyweisslos. Keim gekrümmt, das Würz. auf die KeimB. zurückgebogen. *B.* meist wechselt.

1. Unterordng. *SILIQUOSEN*. SCHOTENFRÜCHTIGE. Schote lineal., od. lineal.-lanzettlich, 2klappig, aufspringend.

1. Gruppe. *ARABIDEEN*. od. schotenfrüchtige, seitenwurzliche. KeimB. der Scheidewand parallel, aneinanderliegend; das Würz. seitlich auf d. Spalte der KeimB. liegend. *S.* zusammengedrückt.

1. *MATTHIOLA* (Brown.) Matthiöle. — Schote lineal., stielrund od. zsgedrückt. *N.* mit 2 Platten: Platten aufrecht, aneinanderliegend, auf den Rücken bucklich od. gehörnt, u. zuletzt etwas abstehend. (Unterscheidet sich von allen durch d. *N.* mit 2, an-

einander liegenden Platten, ausgenommen *Hesperis*, deren Narbenplatten jedoch flach sind, u. deren KeimB. aufeinander liegen.

1. *M. VARIA* (DC.) Verschiedenfarbige *M.* — St. aufrecht, nackt, an d. Basis meist 1blättrig; B. lineal., stumpf, ganzrandig; nach d. Basis schmaler, daselbst scheidig-erweitert; Bth. fast stielloß; Blb. länglich-verkehrt-eyf., wellig; Schoten zsgedrückt, 2. An glimmerig-kiesigen O., (in d. subalpinen Thälern von Oberwallis Gaud.; nicht in Krain: auf Felsen am Garda-See im südl. Tyrol, u. zwar auf tyrolischem Gebiete. Facchini) Bbl. schön purpurn. Mai. Jun. St. h. 22. *Cheiranthus varius* Sibth. Ch. tristis Suffr. S.

2. *M. SINUATA* (Rob. Brown. h. kew. ed. 2. v. 4. p. 120.) Buchtige *M.* — St. aufrecht, d. Aeste abstehend, B. lanzettl., stumpf, filzig, d. untern buchtig od. geschweift-gezähnt; Bthstielchen fast so lang als d. K., Platte d. Blb. verkehrt-eyf. ☉. Sandige u. steinige O. am adriatischen Meere. (im Litt. auf Felsen unter d. Schlosse Duino, Tommasini) Apr. Mai. *Cheiranthus sinuatus* L. Bbl. purpurn.

2. *CHEIRANTHUS* (DC. L.) Lack. — Schote lineal., mit einem auf d. Rücken d. Klappe hervortretenden Längsnerven, 4 kantig od. zsgedrückt-4kantig. N. tief 2lappig, Lappen zurückgekrümmt. S. in jedem Fache einreihig. KeimB. aneinander liegend. Von *Arabis* und *Barbarea* unterscheidet sie sich dch die N., von *Turritis* u. *Braya* ausserdem dch d. einreihigen S.; von *Nasturtium* dch diese Merkmale u. die mit einem Nerven versehenen Klappen; von *Cardamine* u. *Dentaria* dch dieses letzte Kennzeichen.

1. *C. CHEIRI* (L.) Gemeiner L. — B. lanzettl., spitz, ganzrandig, von einfachen zerstreuten Haaren angedrückthaarig, die untern beiderseits 1-2zähmig, Zähne spitz; Schoten zsgedrückt, 2. Auf allen alten Mauern u. Kirchen längs d. Rheins v. Basel bis Wesel, aber nicht viel weiter, als eine Stunde landeinwärts u. bei Aachen; in d. südl. Schw. Mai. Jun. St. h. 45. Bth. sattgelb; an der cultiv. Pflanze oft pomeranzengelb. Ch. fruticulosus L. Mant. ist die wilde, Ch. *Cheiri* die kultivirte Pflanze.

3. *NASTURTIIUM* (Brown.) Brunnenkresse. — Schote lineal. od. elliptisch: Klappen konvex od. ziemlich flach, nervenlos, od. an d. Basis mit dem schwachen Ansätze zu einem Mittelnerven. S. in jedem Fache ungleich 2reihig. KeimB. aneinanderliegend. — Diese Gattung ist mit *A Armoracia* eng verbunden, und geht dch Zwischenarten in sie über.

§. 1. *CARDAMINUM*. DC. syst. 2. 187. Bbl. weiss.

1. *N. OFFICINALIS* (R. Brown.) Gebräuchliche B. — Schot. lineal., fast so lang, als das Bthstielchen; B. gefiedert, die obern 3-7paarig, die untern 3zählig, die Blättch. geschweift, die seitenst. *elliptisch*, das endst. eyf, an d. Basis fast herzf. 2. An Quellen, Bächen u. Teichen mit reinem Wasser, (dch d. g. Gebiet; in Schles. u. Böhm. aber noch nicht beobachtet.) Jun.-Sept. St. h. 43. *Sisymbrium Nasturtium* L. Bth. weiss. Var. ausser

d. Wasser an feuchten O., sehr klein, Blättch. kurzgestielt: *Nasturtium microphyllum* Rb.

β. *siifolium*. Blättchen aus herzförm. Basis lanzettl.-verschnälert. *N. siifolium* Reichenb. ic. f. 1132. Exemplare von Hübner bei Mokritz in der Gegend v. Dresden gesammelt zeigen deutlich den Uebergang in die gew. Form. In tiefen u. stehenden Wassern hier u. da. Jul.-Sept. Bth. weiss. D.

§. 2. *BRACHYLOBOS*. DC. l. c. Blb. blassgelb.

2. *N. AUSTRIACUM* (Crantz.) Oestreichische B. — *Schötch. kugelig, kaum so lang als d. Gf., vielmal kürzer als d. Bthstielchen*; B. lanzettl.-spatelig, gezähnelte od. gesägt mit tief-herzförm. geöhreter Basis sitzend, d. unteren in d. Bthstiel verschmälert, zuweilen eingeschnitten; St. aufrecht; Blb. länger als d. K. — 4. An feuchten, sumpligen O. an Ufern, (In Steyeru., Oestr., in Böhm., im Thale der Wltawa u. Elbe, u. bis n. Dresden hinab; in Schles. in d. Thale d. Oder.) Jun. Jul. *Myagrum austriacum* J. a. t. 111. *M. Crantzii* Vitm. *Camelina austriaca* Pers. Bth. gelb. D.

3. *N. AMPHIBIUM* (Rob. Brown. h. kew. ed. 2. v. 4. p. 110.) Verschiedenblättrige B. — *Schötchen eyf., fast kugelig od. elliptisch, 2-3mal kürzer als d. Bthstielchen*; B. längl. od. lanzettl., nach d. Basis verschmälert, gezähnelte od. gesägt, an d. Basis mit od. ohne Ohrchen, die unteren kammf. od. leyerf. eingeschnitten; *St. a. d. Basis wurzelnd, Ausläufer treibend u. im Wasser aufgeblasen-röhrig*; Blb. länger als d. K. 4. In Gräben, stehenden Wassern, an Flussufern. Mai-Jul. *Sisymbrium amphibium* L. spec. *S. aquaticum* Pollich palat. *S. Roripa* Scop. carn. *Myagrum aquaticum* Lam. enc. *Brachyolobus amphibius* All. ped. Die B. haben bald Ohrchen, bald keine u. d. Schötchen sind bei diesen beiden Variet. bald eyf.- fast kugelig, an d. Basis und Spitze stumpf, bald mehr längl., an den beiden Enden spitzer, darum trenne ich *Nasturtium aquaticum* Wallr. und *N. riparium* Wallr. nicht als besondere Arten. Var. ausserdem:

α. *riparium* Tausch; St. aufrecht, härter, weniger röhrig, sämtliche B. ungetheilt od. d. untersten kammf. od. leyerf. eingeschnitten. Dieses an d. ausgetrockneten Rändern stehender Wasser.

β. *aquaticum* Tausch; St. mit d. Basis kriechend u. Ausläufer treibend, oft niedergebogen, aufgeblasen-röhrig, sehr dünnwandig u. leicht zszudrücken, B. lanzettl., nach d. Basis verschmälert, die untersten leyerf. od. fiedersp.-eingeschnitten. *N. amphibium indivisum*. St. h. 13. Dies steht im Wasser aufrecht oder ist aufstrebend.

γ. *submersum* Tausch; St. wie bei dem vorigen aber mehr od. weniger schwimmend.

4. *N. ARMORACIOIDES* (Tausch bot. Zeitg. 23. 2. 707.) Meerrettigartige B. — *Schötchen elliptisch, kaum noch einmal so lang als der Gf., 2-3mal kürzer als d. Bthstielchen*; B. unter-

seits von sehr kurzen Härchen etwas rauhh., verkehrteyf.-spatelig, ungleich eingeschnitten-gezähnt, mit tief-herzf.-geöhrelter Basis sitzend, unterste in d. Bstiel verschmälert; St. aufrecht; Blb. länger als d. K. 4. Wiesen, feuchte O. (an d. Moldau u. Elbe in Böhmen). Jun. Jul. Scheint eine Form von der ungetheilt-blättrigen Variet. des N. terrestre Tausch mit unterseits etwas rauhen B.

5. N. TERRESTRE (Tausch l. c. p. 711.) Erd.-B. — *Schötchen elliptisch, kaum noch einmal so lang als d. Gf., 2-3mal kürzer als d. Bthstielchen, B. kuhl, verkehrteyf., eingeschnitten-gezähnt od. leyerf.-fiedersp. n. gezähnt, a. d. Basis deutlich od. schwach geöhrelt; St. aufrecht; Blb. länger als d. K. 4. Wiesen u. feuchte O. Jun.-Jul. Var.:*

α. *integrifolium* Tausch; B. ungetheilt, eingeschnitten-gezähnt. (In d. 1. Ausgabe d. Synopsis mit N. austriacum verwechselt.)

β. *pinnatifidum* Tausch; B. leyerf.-fiedersp., gezähnt. — Diese Art unterscheidet sich von dem schwedischen N. anceps durch halb so lange Schötchen; ob sie eine ächte Art oder nur Variet. von N. anceps ist, müssen weitere Beobachtungen zeigen.

6. N. ANCEPS (DC. prodr. l. p. 157.) Zweischneidige B. — *Schötchen lineal od. lineal-lanzettl.; meist halb so lang als das Bthstielchen; B. leyerf.-fiedersp., gezähnt, d. oberen verkehrteyf. eingeschnitten-gezähnt oder fiedersp., mit gezähnten Fiedern; St. aufrecht; Blb. länger als d. K. 4. An feuchten O. (Schlesien, Böhmen, Sachsen.) Jun. Jul. N. anceps Reichenb. ic. f. 4364, nicht St. h. 15., welches zu d. Abarten von N. sylvestre gehört. N. barbaraeoides Tausch. Sisymbrium anceps Wahlenb. fl. suec. nach einem Exemplare von diesem selbst durch meinen Freund Hornschuch erhalten.*

7. N. SYLVESTRE (Rob. Brown.) Wald-B. — *Schötchen lineal, so lang als das Bthstielchen od. ein wenig länger od. kürzer, B. sämmtlich tief-fiedersp. od. gefiedert, Fieder längl.-lanzettl., gezähnt od. gefiedert, die d. oberen B. lineal; St. sehr ästig, ausgebreitet; Blb. länger als d. K. 4. Feuchte Wiesen u. an Wegen in d. Wiesen. Jun. Jul. N. sylvestre Reichenb. fl. exsic. n. 682. ist genau unsere Pflanze. Kommt vor mit kurzen, gezähnten B.: N. sylvestre Reichenb. ic. f. 4368.; mit grösseren längeren Schoten, N. rivulare Reichenb. ic. f. 711 n. 4365; mit Schötchen, welche kürzer als d. Bthstiel; N. Morisoni Tausch. Var. ausserdem mit längerem und ganz kurzem Gf., nämlich mit fast aufsitzen N.*

8. N. PALUSTRE (DC.) Sumpf-B. — *Schot. länglich, gedunsen, ungefähr so lang, als d. Bthstielch., die untern B. leierf., die obern tief-fiedersp.: Zpfl. länglich, gezähnt; Blb. so lang, als der K. ☉. An feuchten O. Jun.-Sept. St. h. 43. — N. terrestre Brown. Sisymbrium palustre Leyss. St. h. 43. Bth. unansehnlich.*

9. N. LIPPICENSE (DC.) Lippizer B. — *Schot. lineal., ungefähr so lang, als das Bthstielch.; die ersten wurzelst. B. lang-*

gestielt, oval, *einfach*, od. am Bstiele geöhrt, die untern stengelst. leierf., *die oberen tief-fiedersp.*; Zpfl. *lineal.*, *ganzrandig.* 4. An rauen sonnigen O. (im südl. Krain u. im Littorale.) Mai-Jun. J. ic. rar. t. 305. N. Wulfenianum Host. *Sisymbrium lippicense* Wulf. D.

10. N. PYRENAICUM (Brown.) Pyrenäische B. — *Schötk.* eyf. od. länglich, *3mal kürzer als das Bthstielch.*; die ersten wurzelst. B. langgestielt, oval, einfach, od. am Bstiel geöhrt, die untern stengelst. leierf., *die oberen tief-fiedersp.*; Zpfl. *lineal.*, *ganzrandig.* 4. An sandigen O. der A. u. VorA.-Thäler. u. auf Bergwiesen (Oberwallis bis in d. Vischerthal, Graubünden, C. Tessin, bei Basel; im Elsass; im Badischen auf Wiesen zw. Emmendingen u. Freiburg häufig.) Mai-Jun. St. h. 45. *Sisymbrium pyrenaicum* L. Var. mit gezähnten Fiedern der obern B.

4. BARBARÉA (R. Brown.) Barbaree. — Schot. lineal., stielrund; Klappen konvex, mit einem etwas hervortretenden Längennerven. N. stumpf, ganz od. ausgerandet. S. in jedem Fache freihlig. KeimB. aneinanderliegend. Von Erysimum unterschieden dch die aneinander liegenden KeimB., v. *Sisymbrium* dch dieses Merkmal, und dch den einzigen Nerven auf d. Klappen.

1. B. VULGARIS (R. Brown.) Gemeine B. — Die unt. B. leierf., d. Endlappen sehr gross rundlich, od. eyf., an d. Basis etwas herzf., d. Seitenlappen A paarig, d. oberste Paar von d. Breite des Querdurchmessers des Endlappens, d. *obern B. ungeth.*, verkehrt-eyf., gezähnt; die Tr. während d. Aufblühens gedrunken, d. *jüngere Schot. schräg-aufrecht.* ☉. An feuchten O. Apr.-Jun. St. (h. 43. *Erysimum Barbarea* L. Blb. noch 1mal so lang, als der K.)

Var. flaunig; St. u. B. mit kurzen Borstchen besetzt, die B. durch dieselben weitläufig bewimpert. B. *hirsuta* Weihe.

2. B. ARCUATA (Rh.) Gehogenschotige B. — Die unt. B. leierf., mit ein. sehr grossen rundlichen, od. eyf. an d. Basis etwas herzf. Endlappen, d. Seitenlappen A paarig, das oberste Paar von d. Breite d. Querdurchmessers d. Endlappens, *die oberen B. ungetheilt*, verkehrt-eyf., gezähnt, die Tr. während d. Aufblühens locker, die jüngern Schot. auf dem fast horizontalen Bthstielchen aufstrebend, *nach allen Seiten abstehend*, bei d. Reife ziemlich gerade ☉. Mit dem erstern im g. Gebiete, ab. nicht überall. Apr.-Jun. Reichenb. ic. f. 4357. B. *vulgaris* β. D. fl. 4. 666. B. *taurica* DC. Die getrocknete Pfl. wird schwieriger, die lebende leichter von der vorhergehenden unterschieden; Stamm niedriger, Tr. viel lockerer, d. Bth., auch die obern, sind deutlich auseinander gestellt u. fast goldgelb, das Horn vor der Spitze d. KB. ein wenig länger, u. an d. Bthknöpfen mehr abstehend, N. grösser, u. die Schoten nach allen Seiten abstehend, auch an den Aesten.

3 B. STRICTA (Andrzejowsei.) Steife B. — Die untern B. leierf., mit ein. sehr grossen länglich-eyf. Endlappen, u. 2-3 Paar sehr *kleinen Seitenlappen*, die mittleren B. an d. Basis leierf.-eingeschnitten, *die obersten ungeth.*, verkehrt-eyf., geschweift-gezähnt; Blb. länglich-keilf., um $\frac{1}{3}$ länger als d. K. ☉. An feuchten

O., (Steyerm., v. Unterrheine dch Westphalen u. d. nördl. D. bis Frankfurt a. d. O. u. nach Sachs., Schles. u. Böhm., u. südl. bis nach Franken.) Apr.-Mai. St. h. 43., unt. d. Namen B. vulgaris. B. iberica DC. B. parviflora Fries. D.

4. B. PRAECOX (Brown.) Frühlühende B. — Die untern B. gefiedert, 5-Spaarig, mit allmählig aufwärts grössern Paaren, das letzte von d. Breite des rundlichen, fast herzf. Endlappens, die *obern B. tief-fiedersp. mit lineal-ganzrandigen Fiedern* u. einer lineal.-länglichen Endfieder. ☉. An feuchten O., an Ufern, (Nathethal, Rheinthall von Coblenz bis Aachen u. v. da nach Westphalen; bei Frankf. an. d. O.; Holstein; auch in Oestreich; im Unterelsass. Für d. Schwz. zweifelhaft.) Apr.-Mai. St. h. 66. Schot. sehr lang u. dicker als bei den vorhergehenden.

5. TURRITIS (L.) Thurmkrant. — Schot. lineal.: Klappen ziemlich konvex mit ein. starken Längsnerven. N. stumpf, ganz od. seicht ausgerandet. S. in jedem Fache 2reihig. KeimB. aneinanderliegend. (Von Arabis unterscheidet sie sich: dch d. 2reihigen S., v. Nasturtium dch den Nerven der Klappen.

1. T. GLABRA (A.) Kahles Th. — WB. gezähnt, von 3gabligen Haaren rauh, die stengelst. kahl, mit herz-pfeiff. Basis stengelumfassend; Schot. steif aufrecht, 6mal länger als d. Bthstielchen. ☉. Auf sonnigen Rainen u. auf bergigen, rauen, steinigen O. Jun.-Jul. St. h. 43. Bth. gelblich-weiss.

6. ARABIS (L.) Gänsekrant. — Schot. lineal.: Klappen flach od. etwas konvex, mit ein. stärkern od. schwächern Längsnerven, od. statt eines solchen mit sehr vielen Längsäderchen bezeichnet; N. stumpf, ganz od. seicht ausgerandet. S. in jedem Fache 1reihig, KeimB. aneinanderliegend.

1. Rotte. ALOMATIUM. DC. syst. 2. 214. Samen flügellos, od. mit einem häutigen schmälern gegen d. Spitze manchmal verbreiterten Flügel umzogen.

§. 1. Die stengelst. B. an d. Basis herz.-stengelumfassend.

1. A. BRASSICAEFORMIS (Wallroth.) Kohlförmiges G. — B. kahl, ganzrandig, die wurzelst. länglich od. rundlich, in ein. Bstiel zugeschweift, die stengelst. länglich-lanzettlich mit *tiefherz-pfeiff. Basis stengelumfassend*; Schot. auf einem abstehenden Bthstielchen ziemlich aufrecht, Klappen etwas konvex, mit einem starken Nerven bezeichnet; S. flügellos. 4. Auf steinigen Gebirgen zw. Gebüsch. (Obere Vogesen-Gebirge; zwischen d. Donnersberge in d. Rheinpfalz u. d. Mosel u. von da dch Nassau u. Hessen nach Thüringen, Böhm., Steyerm. In d. Schw. nur an ein. Stelle im C. Waadt.) Mai.-Jun. Rb. ic. 2. f. 333. Brassica alpina L. Turritis Brassica Leers. T. pauciflora Presl. Bth. weiss.

2. A. ALPINA (L.) Alpen-G. — B. v. ästigen Härchen rauh, etwas ins Graue fallend, die untern länglich-verkehrteyf., in ein. Bstiel verschmälert, die obern eyf., mit *tief-herzf. Basis stengelumfassend*; St. etwas zottig; Schot. abstehend, flach, etwas holperig, am Rande ein wenig verdickt, Klappen fast nervenlos; S. mit ein. häutigen schmalen Rande umzogen, *Stämmchen verlängert*, niedergestreckt. 4. In Felsenspalten u. im Gerölle d. VorA.

u. A. mit d. Flüssen in d. Ebenen herabsteigend. (Schweiz u. durch d. ganze Alpenkette; bei Muggendorf im bayreuth. Gebirge, auf dem Pilsk in Schles.) St. h. 12. A. incana Mönch., nicht Roth. *Turritis verna* Lam. Bth. weiss od. milchweiss. Var.:

β. *crispata*. Stengelb. stärker gezähnt, zw. d. Zähnen wellig. A. *crispata* Willd.

3. A. *VERNA* (Brown.) Frühlings-G. — B. nebst d. St. von ästigen Härchen steifh., gezähnt-gesägt, die WB. verkehrt-eyf., in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. eyf., sitzend, mit etwas herzf. Basis umfassend; Tr. meist 6blütig; *Bthstielch. kürzer als der K.*; Schot. auf d. verdickten Bthstielen kurz abstehend, lineal., längs netzig-äderig mit einem schwachen Nerven; S. flügellos. ☉. Auf Feldern u. steinigten Hügeln d. südl. Gegenden, (bei Pola in Istrien.) Apr.-Mai. Reichenb. ic. f. 4321. *Hesperis verna* L. *Turritis purpurea* Lam. Bth. schön violett. J.

4. A. *AURICULATA* (Lam.) Ohrchentrages G. — B. u. St. v. ästigen Härchen rauh. WB. länglich in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. eyf.-länglich, gezähnt, mit tief-herz-pfeilf. Basis sitzend; Tr. zuletzt verlängert, schlängelig; Schot. ziemlich entfernt, abstehend, zsgedrückt, fast 3nervig, kaum breiter als das *Bthstielch.*; S. mit ein. gesättigteren Linie eingefasst, flügellos; Stämmchen fehlend. ☉. Auf trocknen bergigen Hügeln, auf Kalkboden. (Wallis auf d. Saleve; Elsass; in d. Rheinpfalz, bei Spa, in Thüring., Böh., Mähren u. Oestr.) Apr. Mai. Bth. weiss. St. h. 43. *Arabis recta* Vill. A. *aspera* All. A. *patula* Wallr. A. *incana* Roth, nicht Willd. u. nicht Moench. *Turritis patula* Ehrh. Bth. weiss. Var.:

β. *puberula*. Schot. u. Tr. mit kleinen Härchen besetzt; A. *patula* β. Wallr.

5. A. *SAXATILIS* (Allioni.) Stein-G. — B. u. St. v. ästigen Härchen rauh, fast zottig, WB. länglich in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. eyf. od. länglich, schwach-gezähnt, mit tief-herz-pfeilf. Basis sitzend; Tr. armblütig, fast steif; Schot. etwas entfernt, abstehend, zsgedrückt, fast 3nervig, 3mal breiter als das *Bthstielch.*; S. schmal-geflügelt; Stämmchen fehlend. ☉. Auf felsigen Stellen d. A., (Walliser u. Aelener A., auf d. Saleve, Jura bei Solothurn.) Jul. A. *nova* Vill. Die Variet. β. in DC. syst. war Gaudin unbekannt; und ich selbst habe sie noch nicht gesehen.

6. A. *GERARDI* (Besser.) Gerard's G. — St. v. ästigen, angedrückten Haaren rauh; B. länglich, gezähnt, mit ästigen Härchen bestreut, d. wurzelt. in ein Bstiel verschmälert, die stengelst. von d. Basis bis z. Mitte an den St. angedrückt, mit tief-herz-pfeilf. Basis sitzend, die Ohrchen abwärts an dem St. anliegend; Schot. aufrecht, schmal-lineal., zsgedrückt, fein-holperig, fast nervenlos; S. schmal-geflügelt, netzig punktirt. ☉. Auf Wiesen u. an Wegrändern, (bei Trier; Mähren, Sachsen; auf d. Rheinfläche zw. Worms u. Mainz; in Schles. auch angegeben in Böh. u. Westphalen.) Mai. Jun. *Turritis Gerardi* Bess. *Arabis*

sagittata Wimm. u. Gr. A. planisiliqua Rehb. ic. f. 4343., kein passender Name, weil d. Schoten weit h öckeriger sind wie bei allen andern. Turritis nemorensis Wolf. in Hoffm., D. fl., „wegen d. angedrückten Haare des St.“ Sie unterscheidet sich von A. hirsuta: B. von d. Basis bis z. Mitte an den St. angedrückt, oberwärts abstehend, Oehrchen abwärts an den St. angedrückt und hinten sich mit d. Rändern berührend; Schot. länger, schmaler, $\frac{1}{4}$ Linie breit, fein-holperig mit einem sehr feinen Nerven bezeichnet; S. unter d. Glase zart netzig punktiert.

7. A. SAGITTATA (DC. fl. fr. suppl. p. 592.) Pfeilförmiges G. — St. unterwärts rauhhaarig von einfachen und ästigen, abstehenden oder hinabgebogenen Haaren, oberwärts ziemlich kahl; Blätter länglich, gezähnelte, mit ästigen Härchen bestreut, die wurzelst. in die Blätterstiele verschmälert, die stengelst. aufrecht-abstehend, mit tief-herz-pfeilf. Basis sitzend; Oehrchen abstehend; Schoten aufrecht, schmal-lineal, zsgedrückt, d. Mittelnerv fein, zuletzt fast verschwindend; S. schmal-geflügelt, fein-punktiert. ☉ Steinige Hügel u. felsiges Gebirge. (Muggendorf im bayreuth. Gebirge, Unterharz, Krain.) Reichenb. ic. f. 4343. b. A. longisiliqua Wallr. sched., wegen der abstehenden B. Oehrchen. A. hirsuta β . longisiliqua Koch. Synops. ed. I. A. planisiliqua Pers. syn. nach DC. Turritis sagittata Bert. amoen. it. Von letzterer habe ich ein vom Autor selbst herstammendes Exemplar verglichen.

8. A. HIRSUTA (Scop.) Rauh. G. — St. unterwärts v. abstehenden Haaren rauh.; B. länglich, gezähnelte, mit ästigen Härchen bestreut, die wurzelst. in einen Bstiel verschmälert, die stengelst. aufrecht-etwas abstehend, mit gestutzt-gehörter od. herzf. Basis sitzend; die Oehrchen vom St. abstehend; Schot. aufrecht, schmal-lineal., zsgedrückt, längsäderig, mit einem etwas hervortretenden Nerven; S. nicht punktiert, an d. Spitze etwas geflügelt. ☉ u. 4. Auf Wiesen, Hügeln u. zw. Gebüsch an Bergen. Mai. Jun. Reichb. ic. f. 4342. gute Abbildg. St. h. 45. unrichtig. Turritis hirsuta L. Wahlenb., nach Schwedischen Exempl. A. contracta Spenn. Turritis Razi Presl, nicht Vill. St. B. an kleinen Expl. a. d. Basis nur abgestumpft, nicht herzf.; Bth. weiss. Var.:

β . *glaberrima*; A. hirsuta γ . *glaberrima* Wahlenb. Der Variet. α . sehr ähnlich, doch ganz kahl, od. nur mit kurzen Haaren an d. Rande d. B. (aus dem Kessel im Gesenke d. Sudeten, auch anderwärts, aber sehr selten.)

A. glastifolia Rb. ic. f. 4343. c. mit ungeflügelten S. kenne ich nicht.

§. 2. Die stengelst. B. sitzend, u. manchmal halbstengelumfassend, aber an d. Basis nicht herzf.

9. A. CILIATA (R. Brown.) Gewimpertes G. — St. kahl oder unterwärts v. abstehenden Haaren rauh.; B. länglich, gezähnelte, od. ganzrandig, mit ästigen Härchen bewimpert od. bestreut, die wurzelst. in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. aufrecht, etwas abstehend, sitzend, an d. Basis abgerundet; Schot. ziemlich abstehend, schmal-lineal., zsgedrückt, längsäderig mit einem etwas

hervortretenden Nerven; S. v. einer gesättigteren Linie umzogen, *flügellos*, unpunktirt. ☉. In Felsenspalten u. an steinigen Orten d. A. u. VorA., (dch. d. g. AK.) Jun. Jul. Bth. weiss. Der Name dieser Art ist nicht passend, da sie oft mit Härchen überall bedeckt erscheint, doch wollte ich ihn nicht abändern. Sie kommt vor:

a. glabrata; St. kahl, B. kahl, nur am Rande mit einfachen od. ästigen Haaren besetzt: A. ciliata Brown. DC. Gaud. Rchb. ic. f. 4338. Turritis ciliata Schleich.! T. rupestris Hoppe. T. alpina L.

β. hirsuta; St. rauhh.; B. von ästigen Härchen kurz- u. rauh, übrigens dch. kein Merkmal unterschieden. Der A. hirsuta sehr ähnlich, unterscheidet sich davon: St. niedriger, B. an der Basis abgerundet, sitzend u. niemals gestutzt od. geöhrt; Schot. abstehend; Bth. kleiner, Blh. breiter, verkehrteyf.; S. oval-rundlich, mit einer dunkeln Linie umzogen u. nicht geflügelt. Hierher: Turritis alpestris Schleich.! Rchb. ic. f. 4338., Turritis ciliata Wahlenb., Arabis hirsuta I. sessilifolia Gaud. nach dem Citate aus Wahlenberg u. A. hirsuta II. incana Gand. mit Ausschluss der Syn. — scheint A. hirsuta DC. syst. 2. 223? zu sein.

10. A. MURALIS. (Bertoloni.) Mauer-G. — St. unterwärts v. abstehenden Haaren rauhh.; B. v. ästigen Härchen rauh u. in d. Graue fallend, die wurzelst. länglich-verkehrteyf., etwas spatelf., stumpf-gezähnt, in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. länglich, aufrecht, *sitzend*; Schot. an die Spindel angedrückt, lineal., zsgedrückt, längsgeriebt, mit einem schwachen Nerven; S. mit einem häutigen Flügel umzogen. 4. Auf Mauern und Felsen, (in der Schw.: im Wallis u. am Genfersee; Saleve; bei Vevay, Carouge.) Mai. Bth. weiss. Rchb. ic. f. 4339. Arabis incana Willd., nicht Roth. Turritis minor u. humilis Schleich. T. hirsuta c. minor Vill. Die ähnliche A. collina Ten. unterscheidet sich: die stengelst. B. etwas abstehend, Bth. noch einmal so gross, Schot. flacher, mit einem hervortretenden Rande umzogen, Gl. schmal, länger, S. scharf-berandet u. undentlich geflügelt. Die A. pubescens Desf. untersch. sich durch kleinere Bth. u. sehr kurz gestielte Schot. S.

11. A. STRICTA (Huds.) Steifes G. — St. kahl, an der Basis steifh.; B. glänzend, mit einfachen od. gabligen Borsten bewimpert oder bestreut, die wurzelst. länglich-verkehrteyf., stumpf-fast buchtig-gezähnt, in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. länglich, etwas abstehend, *sitzend*; Tr. 5-6 blüthig; Schot. auf einem etwas kurzen, abstehenden Bthstielchen, ziemlich aufrecht, lineal., zsgedrückt, längsäderig, mit einem hervortretenden Nerven; S. scharf-berandet, an d. Spitze geflügelt. 4. Auf sonnigen Kalkfelsen, (in d. Schw. auf d. Saleve, u. d. Thoiry.) Mai. St. h. 45. ein verkümmertes Exempl. A. hirta Lam. Turritis Rari Vill. Bth. auswendig u. vor d. Entfaltung strohgelb, getrocknet hellgelblich. S.

12. A. SERPYLLIFOLIA (Vill.) Quendelblättriges G. — St. schlängelg u. nebst d. B. v. ästigen Härchen rauh u. grau, B. länglicheyf., ganzrandig od. etwas gezähnt, die wurzelst. in d. Bstiel

vershmälert, die stengelst. etwas abstehend, *sitzend*; Schot. auf einem kurzen, abstehenden Bthstielchen aufrecht, schmal-lineal, zsgedrückt, längsäderig, mit einem etwas hervortretenden Nerven; S. mit einer dunkler gefärbten Linie umzogen, flügellos. ☉. Auf felsigen O. der Schweizer Kalkberge u. KalkA., (im C. Waadt auf d. Gebirgen v. Aelen, dem Pannerosaz, Bavonnaz u. a.) Jun. Jul. Rchb. ic. f. 4336. Bth. weiss. S.

13. A. PROCURRENS (Waldst. u. Kit.) Fortlaufendes G. — B. in ein Stachelspitzchen kurz-zugeschweift, ganzrandig, kahl, am Rande von 2 th., angedrückten Haaren rauh, die wurzelst. verkehrteyf. in einen Bstiel vershmälert, die stengelst. länglich, sitzend; Schot. abstehend, lineal., mit einem hervortretenden Nerven; Gf. so lang, als der halbe Querdurchmesser der Schot.; die Stämmchen ausläuferartig, kriechend. 4. Auf etwas beschatteten Gestein, (in Krain.) Apr. Mai. St. h. 45. A. praecox Willd. nach Link. Bth. weiss. D.

14. A. VOCHINENSIS (Spreng.) Vocheiner G. — B. stumpf, kurz-bespitzt, ganzrandig, kahl, am Rande v. 2 th. angedrückten Haaren rauh, die wurzelst. in d. Bstiel verhmälert, d. stengelst. länglich, sitzend; Schot. abstehend, lineal., mit einem hervortretenden Nerven bezeichnet; Gf. so lang als d. Breite der Schot.; die Stämmchen ausläuferartig, kriechend. 4. Auf Alpentriften, (in Krain u. Oberkärnthlen.) Jul. Draba arabiformis Hohenwart. D. mollis Scop.? die Beschreibung passt nicht ganz. D. mollis St. h. 28. Subularia alpina Willd., die Pfl. des Scopoli. Sehr ähnlich der vorhergehenden u. nur verschieden: B. stumpf, mit einem Spitzchen, Schot. kürzer, u. Gf. länger. Vielleicht Varietät derselben. D.

15. A. PETRAEA (Lamarck.) Stein - G. — St. kahl; WB. gestielt, länglich-verkehrteyf., ganzrandig, od. hinten gezähnt, mit meistens 3 Zähnen od. Läppchen auf jeder Seite, od. leyerf., kahl, od. von 2-3 gabligen Haaren rauh., die stengelst. länglich-lineal., nach d. Basis vershmälert, ganzrandig, sitzend, kahl; Schot. abstehend, schmal-lineal., fast flach, mit einem sehr feinen Längennerven. 4. Auf Felsen u. in Felsenspalten, (Steiermark, Oestr., Böhm., Mähr., bayreuth. Gebirg; Weltenburg a. d. Donau, Thüringen.) Arabis hispida L. fil. suppl., Smith. brit. A. Crantziana Ehrh. herb. St. h. 45. Cardamine petraea L. spec. Flor. dan. t. 386. C. hastulata Engl. bot. t. 469. C. feroensis Fl. dan. t. 1392. Bth. weiss, seltner blass rosenroth. Var.:

a. *glabrata*; B. an d. Basis gezähnt, od. daselbst buchtig, kahl, od. sparsamer mit Haaren bestreut.

ß. *hirta*; B. ganzrandig, od. an d. Basis mit 2-3 kleinen Zähnen auf beiden Seiten besetzt u. mit kürzeren gabligen Haaren dichter bedeckt.

16. A. ARENOSA (Scopoli.) St. von einfachen Haaren rauh.; B. mit ästigen Härchen bestreut, die wurzelst. gestielt, leyerf.-schrotsägenartig, mit 6-9 Läppchen auf jeder Seite, die stengelst. nach d. Basis vershmälert, kurz gestielt, d. obern ganzran-

dig; Schot. absteheud-lineal., fast flach, mit einem sehr feinen Längennerven. ☉. Auf Sandfeldern, in Felsenspalten u. an steinigem O. der Gebirge u. A., (deh. d. g. Gebiet, aber streckenweise, an vielen O. gar nicht.) Jun. Jul. St. h. 43. *Sisymbrium arenosum*. L. spec., nicht Fl. succ. Bth. lila, seltner weiss.

17. *A. HALLERI* (L.) Haller's G. — B. ganzrandig od. etwas gezähnt, *gestielt*, die wurzelst. herzf.-rundlich, od. eyf., auf einem nackten od. mit Auhängseln versehenen Bstiele, die untern stengelst. eyf., die obern lanzettl. 4. An grasigen, felsigen O. der A., in d. Kiese d. Gebirgsbäche, auf d. VorA.-u. Bergwiesen, (Krain, Steyermark u. Kärnthen; in d. Sudeten, Schles., Sachs., O. Lausitz; Harz; von da gegen Westphalen; C. Tessin, Veldin.) Jun. Jul. *Cardamine stolonifera* Scop. Abarten sind: 1) *A. Halleri* DC., St. h. 43., mit einem eyf. Endlappen der B.; 2) *A. stolonifera* DC., Hornem., St. h. 43., mit einem herzf. Endlappen; 3) *A. ovirensis* Wulf., J. ic. rar. t. 125. WB. kreisrund, kein Auhängsel am Bstiel; 4) *Cardamine diversifolia* Sternb., St. h. 20, WB. länglich-eyf.; 5) *A. tenella* Host., kleiner, mit ästigen Härchen bestreut. Bth. aller Abarten weiss, seltner rosenroth.

II. Rotte. LOMASPORA. DC. syst. 2. 234. Die S. mit einem breiten häutigen Flügel umzogen.

18. *A. TURRITA* (L.) Thurmartiges G. — B. mit ästigen Härchen bestreut, gezähnt, die wurzelst. elliptisch, in einen Bstiel verschmälert, die stengelst. länglich, mit tief-herzf. Basis stengel-umfassend; Bthstielchen ungefähr so lang, als der K.; Schot. auf einem aufrechten Bthstielchen abwärts gekrümmt, flach, in d. Mitte holperig, am Rande verdickt; S. mit einem häutigen breiten Flügel umzogen. ☉. In Felsenspalten u. an steinigem, waldigen O. (in Öestr.; Steyerm., Littorale, im südl. Tyrol; Wallis, C. Tessin, Graubünden, Jura bei Basel, im Höllenthal d. Schwarzwaldes, am Donnersberge, Nahegebirg, in d. Rheinpfalz.) Mai. Jun. St. h. 45. *A. umbrosa* Crantz. *A. ochroleuca* Lam. *Turrita major* Wallr. Bth. weiss, od. gelblichweiss.

19. *A. PUMILA* (Jacq.) Niedriges G. — B. ganzrandig oder etwas gezähnt, glänzend, nebst dem 2-3 blättrigen St. v. ästigen u. einfachen Härchen zerstreut-haarig, die wurzelst. in eine Rosette ausgebreitet, verkehrt-eyf., in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. eyf.-länglich, sitzend; S. mit einem breiten häutigen Flügel umzogen. 4. In Felsenspalten u. d. Kiese d. A. u. VorA., (deh. d. g. AK.) Jun. Jul. Bth. weiss. Jacq. a. t. 281. *A. scabra* All. *A. nutans* Mönch. St. h. 20. Var. dichter mit Härchen besetzt u. fast kahl, nur d. WB. am Rande gewimpert; u. v. schlankern Habitus:

β. *laxa*. Tr. locker, nickend, auch oft noch mit d. reifen Schot. nickend; *A. ciliaris* Willd.!

20. *A. BELLIDIFOLIA* (Jacq.) Masliebenblättriges G. — B. ganzrandig od. etwas gezähnt, glänzend, kahl, die wurzelst. in eine Rosette ausgebreitet, verkehrt-eyf., in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. eyf. od. länglich, halbstengelumfassend; die St. reichblättrig, kahl; Schot. aufrecht, flach, in d. Mitte holperig, am

Rande etwas verdickt; *S.* mit einem *breiten* häutigen *Flügel* umzogen. 4. Auf ziemlich feuchten Triften der A. u. VorA., (dch. d. g. AK.) Jun. Jul. J. a. t. 280. St. h. 20. Bth. weiss.

21. A. CAERULEA (Haenke.) *B. glänzend., kahl*, mit einfachen Haaren bewimpert, die wurzelst. aufrecht, verkehrt-eyf., in einen langen Bstiel verschmälert, *vorue 3 od. 5 zählig*, die stengelst. länglich, sitzend; St. v. einfachen Haaren flaumig, 2-3 blättrig; Schot. aufrecht, flach, in d. Mitte holperig, am Rande etwas verdickt; *S.* mit einem *breiten* häutigen *Flügel* umzogen. 4. Auf d. höchsten A., vorzüglich im Kiese nahe an den Eismassen u. dem ewigen Schnee, (dch. d. g. AK.) Jul. Aug. St. h. 20. Bth. blassblau.

5. CARDAMINE (L.) Schaumkraut. — Schot. lineal., oder lanzettl. - lineal., Klappen flach, od. an d. Basis mit einem schwachen Ansatz zu einem Nerven. *S.* in jed. Fache 1 reihig. Keimb. aneinanderliegend, flach. (Bth. aller Arten weiss, ausser d. C. pratensis.)

I. Rotte. CARDAMINE. Stränge des *S.* dünne u. schmal.

§. 1. B. fast alle ungeth.

1. C. ASARIFOLIA (L.) Haselwurzblättriges Sch. — B. kahl, gestielt, *herzf. - kreisrund*, geschweift - gezähnt; St. aufstrebend, beblättert. 4. Im Kiese u. an d. Ufern d. Waldbäche in d. VorA., (im südl. Tyrol, im Tridentinischen.) Jun. - Aug. D.

2. C. ALPINA (Wild.) Alpen - Sch. — *WB. ungeth., rauten-eyf.*, abgerundet-stumpf, ohne Spitzchen, langgestielt, *die stengelst. ganz od. fast 3 lappig, od. an d. Basis mit einem Oehrchen*, kurz - gestielt. 4. An felsigen, bewässerten O. d. höchsten A., (Schwz. u. dch. d. g. AK.) Jul. Aug. St. h. 28. C. bellidifolia β . alpina DC. Arabis bellidifolia Scop. A. bellidioides Lam. Die auf den A. Scandnaviens einheimische C. bellidifolia L. ist verschieden: das Pflänzchen ist niedriger, u. d. B. sind kleiner, als bei d. kleinsten Exempl. der C. alpina, bei ihrer Kleinheit aber breit-eyf., fast herzf., an d. Basis selbst am breitesten u. an der Spitze stets mit einem hervorspringenden Spitzchen versehen; die Schot. sind bei gleicher Breite um $\frac{1}{3}$ länger u. nach beiden Enden mehr verschmälert. Der Gf. so lang als d. Schote breit ist.

§. 2. B. meist 3 zählig od. fiederig.

3. C. RESEDIFOLIA (L.) Resedablättriges Sch. — *Die ersten WB. eyf., stumpf, langgestielt*, die folgend. 3 th., od. *nebst d. St.B. gefiedert 2 - 3 paarig*; die Blättch. länglich - keilf., stumpf, ganzrandig, das ungepaarte grösser; fruchttrag. Tr. abgekürzt, gedrunken; Schot. u. Bthstielchen aufrecht. 4. In d. mittlern Region d. GranitA., (dch. d. g. AK., in d. Sudeten.) Jul. Aug. St. h. 28. C. heterophylla Host.

4. C. PARVIFLORA (L.) Kleinblüthiges Sch. — B. *sämmtlich gefiedert*, fast gleichf., *vielpaarig*; Blättch. ganzrandig, nach der Basis verschmälert, sitzend, an den untern länglich, an den obern lineal., das Endblättch. beinahe gleichgross; *Bstiele ohne Oehr-*

chen; FruchtTr. verlängert; *Schot. auf d. sehr weit abstehenden Bthstielch. aufrecht.* ☉. An feuchten grasigen O. u. an Teichrändern, (in Schles., Mähr., im Odergebiete bis Frankf. a. d. O.; in Holstein.) Jun. Jul. St. h. 45. Bth. klein. D.

5. *C. IMPATIENS* (L.) Spring-Sch. — B. *sämmtlich gefiedert, vielpaarig.* Blättch. der untern B. eyf., 3—5sp., gestielt, die obern länglich-lanzettl., an d. hintern Rande gezähnt, sitzend, das Endblättchen grösser; Bstiele der stengelst. B. *pfeilf.-geöhrt.* ☉. In d. Gebirgswäldern d. VorA. u. an den Flussufern der Ebenen. Mai-Jul. St. h. 45. Bth. sehr klein, bei uns meist ohne Blb.

6. *C. SYLVATICA* (Link.) Wald-Sch. — B. *sämmtl. gefiedert; Blättch. der untern B. rundlich-eyf.,* geschweift, od. gezähnt, gestielt, das endständige grösser, der obern B. länglich od. lineal., Bstiele ohne Ohrchen; *Blb. noch 1mal so lang, als der K., länglich-verkehrt-eyf.,* in d. Nagel allmählig verschmälert; *Schot. auf d. etwas abstehenden Bthstielch. ziemlich aufrecht; Gf. so lang als d. Breite d. Schot.,* St. kantig. ☉. An waldigen O. hie u. da. Apr.-Jun. St. h. 45. *C. hirsuta* β. D. fl. 4. 605. Wimm. u. Grab. *C. hirsuta* β. *syvestris* Fries. „St. hin u. her gebogen, stärker beblättert; Blättchen d. StB. breiter u. oft gezähnt; Schot. kaum d. Ebenstrauss überragend. Stbf. immer 6.“ Trevir. Kommt vor: ohne od. auch mit verkümmerten Blb., letztere ist *C. hirsuta* var. *clandestina* Fries. Fl. dan. t. 735.

7. *C. HIRSUTA* (L.) Vielstengliches Sch. — B. *sämmtl. gefiedert; Blättchen der untern rundlich-eyf.,* geschweift od. gezähnt, gestielt, das Endblättch. grösser, die obern länglich oder lineal.; Bstiele ohne Ohrchen; *Blb. noch 1mal so lang, als der K., länglich-verkehrt-eyf.,* in d. Nagel allmählig verschmälert; *Schot. u. Bthstielch. aufrecht; Gf. kürzer als die Breite der Schot.;* St. kantig ☉. Auf feuchten Waldwiesen, bebauten O. u. Weinbergen, (dch. d. g. Gebiet, ab. nicht überall, an d. Mosel in zahlloser Menge.) Apr.-Jun. St. h. 45. *C. hirsuta* α. D. fl. 4. 604. *C. multicaulis* Hoppe. *C. intermedia* Hornem. fl. dan. t. 1762. *C. hirsuta* α. *campestris* Fries. *C. hirsuta* β. *micrantha* Gaud. *C. umbrosa* Andrz. „St. ziemlich steif, armblättrig, die obern Schot. d. Ebenstrauss weit überschreitend; Stbg. stets 4.“ Trevir. in Briefen.

8. *C. PRATENSIS* (L.) Wiesen-Sch. — B. *sämmtl. gefiedert; Blättch. der wurzelst. rundlich-eyf.,* geschweift od. gezähnt, gestielt, das Endblättch. grösser, fast nierenf.; die der *stengelst. lineal., ganzrandig;* Bstiele ohne Ohrchen; *Blb. 3mal so lang, als d. K., verkehrt-eyf.;* Stbg. um die Hälfte kürzer, als die Blkr.; St. stielrund, oberwärts schwach gerillt. 4. Auf Wiesen u. grasigen, waldigen O. Apr. Mai. St. h. 8. Var. mit an d. Basis Ausläufer treibendem St. u.

β. *dentata*, St. höher, Blättchen der unt. StB. eckig-gezähnt; *C. pratensis* β. *dentata* Rb. bei St. h. 45. *C. sylvatica* Bess. *C. dentata* Schult. Bth. bei α. u. β. lila, selten weiss. Stbk. gelb.

9. *C. AMARA* (L.) Bitteres Sch. — B. *sämmtl. gefiedert; Blättch. der untern B. rundlich-eyf.,* der obern länglich, *alle eckig-ge-*

zähnt., das Endblättch. grösser; *Blb.* 3 mal so lang, als der *K.*, *verkehrt-eyf.*; *Stbg.* fast so lang, als d. *Blkr.*; *St.* kantig-gefurcht. 4. An Quellen, in Gräben mit reinem Wasser und auf feuchten, waldig. O. Apr. Mai. *St.* h. 45. *St.* Ausläufer treibend. *Stbk.* violett. Schote endigt sich mit einem langen, dünnen *Gf.* *St.* unterwärts mit zerstreuten Haaren besät. *Var.*:

β. hirta, *St.* steifh.: *Bthstielchen* kahl: *C. amara β. hirta* Wimm. u. Grab. *C. amara γ. umbrosa* DC., *γ. pubescens* Lej. u. Court. *C. umbrosa* Lej. fl. de spa. *C. Libertiana* Lej. rev. *C. sylvatica* Hartm. scand. Hoffm. D. fl. *C. hirsuta* Fl. dan. t. 148.

γ. subalpina, *St.* n. *Bthstielchen* kurz.; *B.* aus 15, 17. u. d. obern aus 13 Blättch. zsgesetzt: *C. amara γ. umbrosa* Wimm. und Grab. *C. Opicii* Presl., nach einem von Kosteletzky erhaltenen Exempl. An sumpfigen O. der VorA. u. Sudeten, (in Schles. u. Böhm. auf d. Schneeberge, am Ochsenstalle d. Altvaters, am Peterstein.) Eine sehr merkwürdige Variet., die jedoch dch Zwischenformen in d. Variet. *α.* übergeht, wie die mitgetheilten Exemplare zeigen.

II. Rotte. CHELIDONIA. Nabelstränge mehr od. weniger verbreitert. (Diese Rotte unterscheidet sich v. *Pteroneurum* dch den stumpfen, zugerundeten u. nicht geschärften Rand der Scheidewand; aber die bei verschiedenen Arten mehr od. weniger verbreiterten Nabelstränge bieten kein hinreichendes Gattungskennzeichen dar. Sollte man nicht d. Gatt. *Pteroneurum* mit der vorliegenden Rotte verbinden?)

10. *C. MARITIMA* (Portenschl.) Meer-Sch. — *B.* 3zählig oder gefiedert; *Blättch.* gleichf., gestielt, eyf., 3sp. od. fiederig-5sp., an d. Basis verschmälert; Lappen stumpf, kurzgespitzt; Schot. lanzettl.-lineal.; *Gf.* lineal., zsgedrückt; *St.* ausgebreitet sehr ästig. ☉. Am Meerstrande, (auf d. Insel Osero, Biasoletto.) Mai. Jun. Portensch. en. t. 12. Rchb. ic. f. 4311. Die *C. graeca* L. unterscheidet sich dch eine breitere Schote, welche allmählig in einen breitgeflügelten Schnabel ausläuft. J.

11. *C. THALICTROIDES* (All. ped. n. 951. t. 57. f. 1. rohe Abbild.) Wiesenrautenblättriges Sch. — *B.* 3zählig od. gefiedert; *Blättch.* gleichf., gestielt, eyf., 3sp.; Lappen stumpf, kurz-zugespitzt; Schot. lineal., auf d. abstehenden *Bthstielchen* aufrecht; *Gf.* lineal., zsgedrückt; *St.* ästig, schwach. ☉. An rauen, etwas feuchten waldigen O., (auf d. Gipfel d. M. Maggiore in Istrien, Biasoletto; auf d. Insel Osero auf d. Berge Osero, Noé!) Mai. *C. thalictroides* All. nach einem Expl. von Colla in d. piemont. A. gesammelt. *C. Plumieri* Vill. *C. petiolaris* DC. syst., nach einem Exempl. von Steven in v. Martius Sammlung. *C. maritima* var. Rchb. ic. f. 4310. *Pteroneurum bipinnatum* Rchb. fl. exc. p. 676., nach einem Exempl. von Tommasini in d. Engpasse Urolia zw. Almissa u. Mascarsa in Dalmatien gefunden.

12. *C. TRIFOLIA* (L.) Dreiblättriges Sch. — *B.* 3zählig; *Blättch.* kurzgestielt, rautenf.-rundlich, geschweift-gekerbt; *St.* einblättrig od. nackt; Ausläufer kriechend. 4. In feuchten Wäldern d. Gebirge u. VorA., (in Tyrol u. v. da dch Kärnthen, Krain, Salzburg,

Steyerm., Oestr. nach Böhm. u. Schles.; für d. Schw. zweifelhaft.)
 Mai. Jun. J. a. t. 27. St. h. 28. D.

6. DENTARIA (L.) Zahnwurz. — Schot lanzettl.-lineal.; Klappen flach, nervenlos, oder mit einem schwachen Anfang zu einem Nerven gegen d. Basis. S. in jedem Fache 1 reihig. KeimB. aneinanderliegend, gestielt, am Rande auf beiden Seiten der Länge nach einwärts gefaltet. Bei D. bulbifera ist von 2 flachen KeimB. nur eines an der Spitze etwas einwärts gebogen.

§. 1. B. gefingert.

1. D. ENNEAPHYLLOS (L.) Neunblättrige Z. — St. 3blättrig; B. in einen Quirl gestellt, 3zählig, Blättch. ungleich-gesägt, Stbg. so lang als die Blkr. 4. In Laubwäldern, u. an grasreichen O. zw. Gebüsch, in Gebirgswäldern der VorA. u. in d. Waldregion d. A., (in d. Salzburgisch., Steyerm., Oestr., Böhm., Mähr., Schles., O.Lausitz, Sachsen, Fichtelgebirg.) Apr. Mai. J. a. t. 316. St. h. 48. Bth. durchaus gelblichweiss od. weisslich. Jacq. Bisweilen Drüsen in d. BWinkeln. D.

2. D. GLANDULOSA (Waldst. u. Kit.) Drüsentragende Zahnwurz. — St. 3blättrig; B. in einen Quirl gestellt, 3zählig, Blättch. zugespitzt mit sehr spitzem Ende, ungleich-gesägt; Stbg. halb so lang als die Blkr. 4. In Gebirgswäldern, (Schles. bei Hultheim, Schillersdorf.) Apr. Mai. St. h. 45. Bth. purpurn. Drüsen in den BWinkeln. D.

3. D. TRIFOLIA (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 148. t. 139.) Dreiblättrige Z. — St. 2—5blättrig, B. wechselst., gestielt, 3zählig; Blättchen entfernt-stumpf-gesägt, zugespitzt, d. Spitze selbst stumpf. 4. Schattige Thäler (in d. Teufelsgraben bei Cilli in Untersteyerm., Zechenter.) Apr. Mai. DC. syst. Bth. blendendweiss. D.

4. D. DIGITATA (Lamarck.) Fingerblättrige Z. — St. 3-4blättrig; B. wechselst., gestielt, 5zählig, die obern 3zählig, Blättch. zugespitzt mit sehr spitzem Ende, ungleich-gesägt, die äussern kleiner. 4. In Gebirgs- u. VorA.-Wäldern, (in Steyerm., Krain, Tyrol und Salzbg.) Mai-Jul. St. h. 48. D. pentaphyllos Scop. L. sp. pl. var. β. u. γ. Bth. rosenroth.

§. 2. B. gefiedert.

5. D. POLYPHYLLA (Waldst. u. Kit. pl. r. hung. t. 160.) Vielblättrige Z. — St. 2-4blättrig; B. in einen Quirl gestellt oder wechselst., gestielt, sämmtlich gefiedert; Blättch. lanzettl., lang-zugespitzt, gesägt. 4. In fetten schattigen Wäldern, (in d. Schw., selten in der Clus, häufig aber in einem Buchwalde bei Valzaina unweit Marschlins. v. Salis; bei Matt im C. Glarus, Heer; in einem Wäldchen beinahe oben auf dem Schnabelhorn im C. Zürich, Fockel. Marschl.) Apr. D. polyphylla Gaud. fl. helv. D. ochroleuca Gaud. in Ebel. man. Bth. blassgelblichweiss, später gelblich; W. K. S.

6. *D. PINNATA* (Lamarck.) Fiederblättrige Z. — St. 3-5blättrig; *B. wechselst.*, gestielt, *sämmtl. gefiedert*; *Blättch.* lanzettl., *spitz*, gesägt. 2. In Gebirgs- u. VorA.-Wäldern, (in der Schw., besond. in d. Jura; Oberelsass bei Rappoltsweiler; Unterelsass bei Barr; Oberbaden bei Candern, u. am Schoenberg bei Freiburg; Steyerm. bei Cilli.) Apr. Mai. St. h. 48. D. heptaphyllos Vill. delph. Bth. weiss, od. schwach lila, getrocknet nicht gelblich-weiss.

7. *D. BULBIFERA* (L.) Zwiebeltragende Z. — St. vielblättrig; *B. wechselst.*, *die untern gefiedert, die obern ungeth.*; die Blattwinkel zwiebeltragend. 2. In Gebirgswäldern in fetter Dammerde, (in d. östl. Schw., u. v. da längs d. A. bis Oestr. u. dch Böhm. u. Schles., O.Lausitz u. Sachsen; im Moselgebirg u. am Unter-rhine bis n. d. Niederlanden u. d. Harze, u. wieder im äussersten Nord. v. D., in Pommern u. Holstein.) Apr. Mai. St. h. 48. Bth. blass-rosenroth od. weisslich.

II. Gruppe. *SISYMBRIEEN* od. schotenfrüchtige, rückenwurzliche. KeimB. aufeinanderliegend, flach, der Scheidewand mit dem Rande zugewendet, das Würzelchen auf dem Rücken des einen Keimblattes.

7. *HÉSPERIS* (L.) Nachtviole. — Schot. lineal. N. mit 2 Platten: Platten aufrecht, aneinanderliegend, auf d. Rücken flach. KeimB. aufeinanderliegend, flach. — Diese Gattung unterscheidet sich von allen Gattungen dieser Gruppe dch die flachen aufrecht-aneinanderliegenden Platten der Narbe.

1. *H. MATRONALIS* (L.) Gemeine N. — Bthstielchen so lang, u. länger als der K.; *Bth. verkehrt-eyf.*, *sehr stumpf*, meist mit einem Spitzchen; *Schot.* auf den abstehenden Bthstielchen aufrecht, kahl, *stielrund*, holperig; *B. ey-lanzettl.*, zugespitzt, gezähnt; St. glatt od. dch *ästige Härchen* flaumig. ☉. 2. Auf feuchten Wiesen, in Gebüsch u. an Zäunen, (in Oestr., Steyerm. u. Mähr., v. da dch Böhm. nach Sachs. bis z. Harze u. n. den Westphäl. Gebirgen, aber immer nur an einzelnen Stellen; sodann in Oldenb. u. Mecklenbg.; in d. Schw. selten.) Mai. Jun. J. a. t. 347. Bth. lila. Hieher gehört auch *Hesperis inodora* L. sp., welche mit der wilden *H. matronalis* ganz dieselbe ist, die Bth. sind nicht geruchlos, sondern am Abende duftend. Var. niedriger, wie *Matthiola incana*, u. diese Variet. mit gefüllten weissen und lilafarbigten Blüthen ist eine wahre Zierde der Gärten.

2. *H. RUNCINATA* (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 220. t. 200) Zackige N. — Bthstielchen so lang als der K. od. länger; *Bth. verkehrt-eyf.*, *sehr stumpf*, meist mit einem Spitzchen; *Schoten* auf den abstehenden Bthstielchen aufrecht, od. hinabgebogen, *ziemlich stielrund*, holperig; *B. ey-lanzettl.* zugespitzt, gezähnt, die untersten leyerf.; St. aufrecht, von *einfachen u. drüsigen Haaren* flaumig. ☉. Waldige O., (bei Wien, Dolliner.) Mai. Juni. *H. bituminosa* Savi nach DC. — Der vorigen, bei der ich auch oft die untersten *B. leyerf.* sah, sehr ähnlich, unter-

scheidet sie sich nur durch ihren flaumigen Ueberzug aus einfachen drüsentragenden Haaren bestehend. Vielleicht Variet.? D.

3. *H. TRISTIS* (L.) Eigentliche N. — Bthstielch. so lang, als der K. u. länger: *Bth. lineal.-lanzettl.*, stumpf; Schot. mit d. Bthstielchen weit abstehend, *kahl, zsgedrückt*, in d. Mitte holperig; Klappen nur halb so breit, als d. Scheidewand; *B. ey-lanzettl.*, zugespitzt, ganzrandig, od. schwach gezähnt. ☉. Auf Hügeln, unbebauten O., Ackerrändern, (in Unteröstr. u. Mähr.) Mai. Jacq. a. t. 102. Bth. schmutzig-grün, aber näher betrachtet mit einem Netze von violetten Adern zierlich bemalt. D.

4. *H. LACINIATA* (Allioni.) Geschlitzte N. — Bthstielch. kürzer, als der K.: *Bth. länglich-verkehrteyf.*; *Schot. drüsig-flaumh.*; *B. gezähnt*, die untern an d. Basis buchtig-fiedersp. ☉. An felsigen O., (auf d. Insel Veglia!) Apr. Mai. Rbch. ic. f. 4375. J.

5. *MALCOLMIA* (R. Brown.) Malkolmie. — Schot. lineal., stielrund, am Ende mit einer kegelf. (aus 2 verwachsenen Platten gebildeten) Narbe. Keimb. aufeinanderliegend, flach.

1. *M. MARITIMA* (Brown.) Meer-M. — St. aufrecht, ästig; *B. elliptisch*, stumpf, ganz, an d. Basis verschmälert, mit ange-drückten 2-4 th. Härchen bedeckt; Bthstielchen meist kürzer, als der K.; Schot. flaumbaarig, an d. Ende lang zugespitzt. ☉. Auf dem Sandufer d. Meeres, (bei Fiume!) März. Apr. Cheiranthus maritimus L. Bth. purpurroth. J.

9. *SISYMBRIUM* (L.) Rauke. — Schot. lineal.: Klappen konvex, mit 3 Längsnerven. N. stumpf, ganz, od. ausgerandet. S. in jedem Fache 1reihig. Keimb. aufeinanderliegend, flach.

1. Rotte. VELARUM. DC. syst. 2. p. 459. Schot. gegen d. Spitze verschmälert, pfriemf. Bth. gelb.

1. *S. OFFICINALE* (Scop.) Gebräuchliche R. — *B. schrotsägen-artig-fiederth.*, Zpfl. 2-3paarig, länglich, gezähnt, der endständige sehr gross, spontanf.; *Schot. mit d. Bthstielchen an die Spindel angedrückt*, lineal.-pfriemlich, flaumh. ☉. An Wegen, auf Schutthaufen, u. Feldern. Jun.-Aug. Erysimum officinale L. St. h. 5. Chamaepium officinale Wallr.

II. Rotte. IRIO. DC. l. c. Schot. stielrund. S. länglich od. fast eyf. Bth. gelb od. weisslichgelb.

2. *S. AUSTRIACUM* (Jacq.) Oestreichische R. — *B. schrotsägenf.-fiederth. vielpaarig u. nebst d. St. kahl*, od. ein wenig borstig; Zpfl. vielpaarig aus einer breitem Basis 3eckig-spitz od. lanzettl. verschmälert, der endständ. grösser, an den obern B. verlängert; K. etwas abstehend; *Schot. genähert*, auf dem aufstrebenden od. gewundenen Bthstielchen etwas abstehend oder abwärts geneigt, die jüngern kürzer, als d. konvexe Strauss. ☉. Auf steinigten, rauhen Hügeln, (Unteröstr.; Mähr.; Weldenburg Flor. Regensb.; Württemberg bei Ludwigsthal u. Tuttlingen; Thüringen bei Bibra, Eckartsberge; Hannover auf d. Hohenstein; Franken bei Würzb.;

Hammerstein b. Neuwied; Fl. v. Spa; Schw. a. d. Saleve, im C. Genf u. d. Getroz im C. Wallis.) Mai. Jun. Rh. ic. 4410. 4411. *S. eckartsbergense* Willd. *S. multisiliquosum* Hoffm. *S. erysimifolium* Pourr. DC. *S. acutangulum* Tilleri Gaud. u. *S. acutangulum hyoseridifolium* Gaud., eine kleinere Form mit kleinern Bth. *Sinapis maritima* All. — Schot. in sehr grosser Menge, dicht genähert; Bth. gelb; Bthstielchen viel dünner, als die Schot. — Var. mit grössern u. kleinern Bth., mit aufrechten, etwas abstehenden, und auf einem gewundenen Stielchen, herabgebeugten Schot. u.

β. contortum; Schot. zerstreut-borstig; *S. contortum* Willd. *S. taraxacifolium* DC.; an Expl. aus d. Pyrenäen sind aber weder die Bth. kleiner, noch die K. aufrechter, als bei der gewöhnlichen Pflanze.

γ. acutangulum; Schot. um d. Hälfte kürzer, auf bogigem Stielchen an die Spindel gelehnt; *Sisymb. acutangulum* DC. Rchb. ic. f. 4412. *S. pyrenaicum* Vill. *Sinapis pyrenaica* L. J. h. vind. 3. p. 50. t. 97. Im Garten geht sie in d. Variet. *α.* über; wie schon Jacquin. beobachtete.

3. *S. LOESELII* (L.) Lösel's R. — B. schrotsägenf.-fiederth., die unt. sammt d. St. steifh.; Zpfl. gezähnt, an d. Basis ohne Oehrchen, an den untern B. länglich, die endst. zssfliessend, an den obern lanzettl., der endst. sehr gross, spontonf.; K. abstehend; Schot. aufstrebend, etwas gekrümmt, *noch 1mal so lang, als der abstehende Bthstielchen, die jüngern kürzer als d. konvexe Strauss*. ☉. Auf Schutthaufen, Mauern, alten Kirchen, u. rauhen Hügeln, (Unteröstr., dch Mähr., Böhm., Sachs., Thüring. u. Magdeburg; in d. Rheinthale v. Worms bis Coblenz; in Ostpreussen.) Jun. Jul. J. a. t. 314. *Leptocarpaea Loeselii* DC. Bei Untersuchung vieler Samen fand ich zwar ein schräges Würzelch., aber immer auf den Keimb. aufliegend, u. niemals die Spalte der Keimb. deckend. Die S. sah ich an wilden Pflanzen immer in eine Reihe geordnet, an cultivirten aber sind sie manchmal an d. Basis d. Schot. unregelmässig 2reihig. Bth. gelb; Bthstielchen schlank; Schot. ziemlich entfernt.

4. *S. IRIO* (L.) Langblättrige R. — B. schrotsägenf.-fiederth.; Zpfl. gezähnt, ohne Oehrchen, die der untern B. länglich, der endst. eckig, an den obern lanzettl., der endst. verlängert-spontonf.; K. etwas abstehend; *Schot. 4mal so lang, als das Bthstielch.*, abstehend, *die jüngern über d. flachen Strauss hinausragend*. ☉. An Wegen, Äckerrändern, u. auf bebauten Feldern, (in Unteröstr.; Suhl im thüringer Wald; die übrigen StandO. in D. halte ich für zweifelhaft; an d. Kirchhofsmauer in d. Dorfe Visp im C. Wallis.) Mai-Jul. J. a. t. 322. Bth. dottergelb; Bthstielch. schlank.

5. *S. COLUMNAE* (L.) Columna's R. — B. schrotsägenf.-fiederth.; Zpfl. gezähnt, *an d. Basis gehört*, mit einem aufgerichteten Oehrchen, an den untern B. eyf.-länglich, der endst. eckig,

an den obern lanzettl., der endst. verlängert - spoutenf.; K. aufrecht, *geschlossen*; Schot. vielmal länger, als d. Bthstielch., abstehend. ☉. An Wegen, Schutthaufen, unbebauten O., (Steyerm., Unteröstr., Mähr. u. in Böhlm.) Jun. Jul. Rehb. ic. f. 4107. Bth. blass - schwefelgelb; Schot. mit dem dicken Bthstielch. abstehend, entfernt, glatt, selten flaumig. Var.:

β. *hebecarpa*, Schoten flaumig. Linne's Beschreibung des *Sis. altissimum* in d. spec. pl. u. hort. ups. „fast lineale Blättchen, weit absteheuder K., daher die Verwandtschaft mit *Sinapis*“ passt viel besser auf *Sis. pannonicum*, als auf irgend eine Variet. von *S. Columnae*, obgleich eine solche unter d. Namen des *S. altissimum* im Herbar. Linne's aufbewahrt wird.

6. *PANNONICUM* (Jacq.) Ungarische R. — Die untern B. schrotsügenf. - fiederth., Zpfl. gezähnt, *an der Basis geföhrt*, mit einem aufstrebenden Oehrchen, die obern gefiedert, Fieder schmal - lineal der endst. gleichf.; K. *sehr abstehend*; Bthstielch. u. Schot. abstehend, fast gleich dick. ☉. An Wegen, auf Brachäckern, an Ackerrändern, (Unteröstr., Mähr. u. Böhlm., bei Frankf. an d. O. auf d. Reinfläche bei Strassburg u. bei Mannheim; Thorn in Preussen; in d. Schw. bei Iserabloz, im Thale Annivier.) Mai. Jun. J. ic. r. t. 123. *S. Sinapeos* Retz. *S. sinapistrum* Crantz. Bth. gelblich - weiss.

7. *S. SOPHIA* (L.) Feinblättrige R. — B. *dreifach gefiedert*, Fiederchen an den untern B. schmal - lanzettl., an den obern lineal; Bthstielch. noch 1 mal so lang, als der K.; Blb. so lang, als d. K. u. kürzer. ☉. Auf Sandfeldern, Aeckern, an Wegen, Mauern. Mai - Herbst. Fl. dan. t. 528. *S. parviflorum* Lam.

III. Rotte. *NORTA* DeC. Schot. stielrund. S. lineal, verlängert. Bth. gelb.

8. *S. STRICTISSIMUM* (L.) Steifstengelige R. — B. länglich - lanzettl., *ungeth.*, zugespitzt, gezähnt, *flaumig von einfachen* Haaren; K. zuletzt wagerecht abstehend; Schot. mässig abstehend. 4. Im Gebüsch, an Flussufern, feuchten O., (Mähr., Böhlm., an der Elbe bis Dresden; am Maine v. Würzburg. bis Hanau; am Neckar bei Heidelberg; Aachen; in Steyermark; in Kärnthen; in Unteröstr.; Oberinntal; in der südl. Schw.) Jun. Jul. J. a. t. 194. Bth. gelb.

IV. Rotte. *ALLIARIA*. Gen. n. 52. DC. syst. 2. 488. Schot. stielrund. S. länglich, längsgestreift. Bth. weiss.

9. *S. ALLIARIA* (Scop.) Knoblauch's R. — B. *ungeth.*, *die untern nierenf.*, grob - geschweift - gekerbt, die obern herzf. - eyf., spitz-gezähnt, Schot. abstehend, vielmal länger, als das Bthstielch. ☉. In Gebüsch, an Wegen u. Waldsäumen. Apr. Mai. Fl. dan. t. 933. *Erysimum Alliaria* L. *Hesperis Alliaria* Lam. *Alliaria officinalis* Andrzej., DC. Ist ein wahres *Sisymbrium* wegen der stielrunden Schot. u. d. 3nervigen Klappen.

V. Rotte. *ARABIDOPSIS*. DC. syst. 2. 480. Schot. lineal. S. nicht gestreift. Bth. weiss.

10. *S. THALIANUM* (Gaud.) Thal's R. — *B. länglich-lanzettl.* ungeth., stumpflich, entfernt gezähnt, v. 2-3 *gabelichen Haaren* flaumh., die wurzelst. in einen Bthstiel verschmälert; K. aufrecht; Schot. auf d. abstehenden Bthstiellch. aufstrebend. ☉. Auf Feldern u. gebautem Lande. Apr. Mai, u. wiederum im Herbst. *Arabis Thaliana* L. St. h. II. *Conringia Thaliana* Rb. Var.:

β. *B.* an d. Basis buchtig-gezähnt: *A. Thaliana* β. *hispida* Waldenb. *S. arnosum* L. fl. succ. ed. 2. p. 223. Diese Variet. fand man im Bereich unserer Flora noch nicht.

10. *HUGUENINIA* (Rb.) Hugueninie. — Schot. lineal. 2 schneidig. Klappen convex, mit einem einzigen Rückennerven. N. stumpf. S. in jedem Fache einreihig. KeimB. aufeinanderliegend, flach. (Bei mehreren Arten v. *Sisymbrium* kommt eine mit einem Mittelnerven dchzogene Scheidewand vor; doch unterscheidet sich diese Gattung v. *Sisymbrium* dch. d. einzigen Nerven, v. *Erysimum* dch. d. nicht vierkantige Schote, v. *Braya* u. *Syrenia* durch die 1 reihigen Samen.

1. *H. TANACETIFOLIA* (Rb.) Rainfarnblättrige H. — *B. geliedert*, mit lanzettl., eingeschnitten-gesägten Fiedern, die äussersten zstliessend; Schot. auf d. aufrechten Bthstiellch. aufstrebend. 4. An sonnigen O. der südl. SchweizerA., (auf d. Walliser Seite der Penninen.) Jul. Bth. gelb. Rbh. ic. f. 4415. *Sisymbrium tanacetifolium* L. sp. Schot. an meinem Exempl. noch 1mal so lang, als d. Bthstiel.; Rbh. fl. g. exs. n. 1385 ohne Frucht. S.

11. *BRAYA* (Sternberg u. Hoppe.) Braye. — Schot. lineal., stielrund, oder etwas zsgedrückt; Klappen konvex, mit einem einzigen Rückennerven. N. stumpf. S. in jedem Fache 2 reihig. KeimB. aufeinanderliegend, flach. (Unterscheidet sich v. *Sisymbrium* dch. d. 2 reihigen S. u. aufeinanderliegenden KeimB.; von *Syrenia* dch. d. nicht 4 kantige Schote.

1. *B. ALPINA* (Sternb. u. Hoppe.) Alpen-B. — *B. lineal.-lanzettl., ungeth.*, ganzrandig od. entfernt wenig-gezähnt, die wurzelst. langgestielt; die fruchttrag. Traube eyf., zsgedrängt. 4. Auf d. höchsten GranitA., (bisher blos in d. Gamsgrube u. Leiter bei Heiligenblut in Kärnthen. u. a. d. Südseite des Solsteines in Tyr.) Jul. St. h. 43. Bth. weiss, getrocknet violett. D.

2. *B. PINNATIFIDA* (*Sisymbrium* DC. fl. fr. 4. 667.) Fiedersp. B. — Die stengelst. *B. buchtig-fiedersp.*, Zpfl. länglich-lineal., ganzrandig, der endst. grösser, die untern B. fast leyerf., die wurzelst. verkehrt-eyf., gezähnt; Bthtr. verlängert, *ohne DeckB.*; Schot. auf d. abstehenden Bthstiellch. aufstrebend. 4. An sonnigen, felsigen O. der südl. höchsten Schweitzer-GranitA., (auf d. Fouly, St. Bernhard u. a.) Jul. Aug. Rbh. ic. f. 4404. *Sisymbrium dentatum* All. *S. bursifolium* Vill. t. 39., nicht Linn.

3. *B. SUPINA* (*Sisymbrium*.) Niedrige B. — *B. buchtig-fiedersp.*, Zpfl. länglich-lineal., etwas gezähnt, der endst. grösser;

Bthtr. verlängert, mit blattartigen Deckblättern; Schot. mit einem kurzen Bthstielch. etwas abstehend, kurzhaarig - flaumig. ☉. An kiesigen u. sandigen feuchten O. der Ebenen, (bisher blos im Jura thale am See v. Joux; sodann im Lauterthale des unt. Elsasses.) Jul., Aug. Rchb. ic. f. 4402.

12. ERYSIMUM (L.) Hederich. — Schot. lineal., mit einem einzelnen hervortretenden Klappennerven, 4 kantig, od. zsgedrückt-4 kantig. N. stumpf, ganz oder ausgerandet. S. in jedem Fache 1 reihig. KeimB. aufeinanderliegend, flach.

1. Rotte, ERYSIMASTRUM. DC. syst. 1. 494. Bth. hell - od. goldgelb. Die stengelst. B. sitzend, länglich. od. lineal, (an d. Basis nicht herzf.)

1. E. CHEIRANTHOIDES (L.) Lackartiger H. — B. länglich - lanzettl. nach beiden Enden verschmälert, geschweift - gezähnt, od. gezähnt, mit *gleichf.* 3 sp. Haaren bestreut u. etwas rauh; Bthstielch. 2 od. 3 mal so lang, als der K., u. *fast halb so lang, als die Schot.*; Schot. 4 kantig, v. d. Seite etwas zsgedrückt, mit entfernten Härchen bestreut, fast kahl. ☉. Auf Aeckern, Feldern, auf d. Kiese d. Bäche, u. an Wegen. Jun. - Herbst. J. a. t. 23. Cheiranthus sylvestris Lam. — Ch. sapigerus Willd. prod., ist eine monströse Form. Var.: α. B. geschweift u.

β. *dentatum*, B. fast buchtig - gezähnt. E. micranthum Buek in briefl. Mittheilungen.

2. E. VIRGATUM (Roth.) Ruthenf. H. — B. ganzrandig, mit *gleichf.* 3 sp. Haaren bestreut u. etwas rauh, die untern länglich-lineal., stumpf, in d. Bstiel verschmälert, die obern lineal. - lanzettl., spitz; Bthstielch. meist so lang, als der K.; Schot. aufrecht, 4 kantig, v. d. Seite etwas zsgedrückt, flaumh. - rauh; Platte der Blb. keilig - verkehrt - eyf. ☉. Auf sonnigen Hügeln u. büschigen Bergabhängen, (in Mähr., Böhm. u. v. da nach Sachs. und Thüring.; auch bei Frankf. an d. O.; Charlottenb., M. Mark; bei Mainz, St. Goar; im Gebiete d. Flora v. Spa u. im O. Wallis bei Sitten.) Jun. Jul. E. longisiliquosum Rchb. ic. f. 4389., DC. syst. E. altissimum Lej.! DC. — E. durum Presl. Rb. ic. f. 279: Abänderg. mit sehr kurzen Gf.; E. virgatum Schleich.! Abänderg. mit kürzern Schot. u. E. longisiliquosum Schleich.! Abänderg. mit noch einmal so langen Schot.

3. E. STRICTUM (Fl. der Wetterau.) Habichtskrautblättriger H. — B. länglich - lanzettl., *geschweift - gezähnt, mit gleichf.* 3 sp. Haaren bestreut u. etwas rauh, die untern stumpf, kurzstachelspitzig, in d. Bstiel verschmälert, die obern sitzend, kurz zugespitzt; Bthstielch. meist so lang, als d. K.; Schot. 4 kantig, v. d. Seite etwas zsgedrückt, flaumh. - rauh, *gleichfarbig*; Platte der Blb. keilig - verkehrt - eyf. ☉. Auf Mauern, Ruinen, an Ufern (Steyerm., Unteröstr.; im Ödergebiete, dch. Schles. bis Frankf.; im Elbgebiete dch. Böhm. bis Magdebg.; im Maingebiete v. Erlangen bis Mainz; Unterrhein bei Linz; im Engadin, im Jura.) Jun. Jul. Rchb. ic. 1. f. 24 - 26. u. 2. f. 278., Abänderg. mit kleinen Bth. E. strictum Host., nicht DeCand. E. hieracifolium L. fl.

succ., aber nicht der Linneischen Sammlung. *E. hieracif.* Ehrh., Rchb. ic. f. 24-26 u. f. 4388. *E. virgatum* DC., nicht Roth. *E. virgatum juranum* Gaud. *Cheiranthus turritoides* Lam.

4. *E. ODORATUM* (Ehrh.!) Wohlriechender H. — B. länglich-lanzettl. *geschweift-gezähnt od. etwas buchtig gezähnt mit gleichf. 3 sp. Haaren bestreut u. etwas rauh*, die untern stumpf, kurz-stachelspitzig, in d. Bstiel verschmälert, die obern sitzend, zugespitzt; Bthstielch. halb so lang, als d. K.; *Schot. 4kantig*, v. d. Seite zsgedrückt, *grau, mit kahleren grünen Kanten*; Platte der Blb. rundlich. ☉. Auf Kalkgebirgen, (in d. Donauthale bei Pappenheim, Regensbg. u. wahrscheinlich v. da bis Oestr., Wien, Triest, Fiume, Krain, Steyerm., Mähr., in Böhm., Thüring., in d. Bairenther Gebirgen; Würzb., Frankf. a. M.; für d. Schw. zweifelhaft.) Jun. Jul. *E. hieracifolium* J. a. t. 73. (nicht L.) *E. strictum* DC. (nicht der Wetterau. Flor.) *E. pannonicum* Crantz. *E. cheiriflorum* Wallr. *Cheiranthus erysimoides* L. (die Linn. Pflanze im Hort. ups. beschrieben, ist zweijährig u. grösser als *E. cheiranthoides*; *Erys. lanceolatum* DC., wozu DCand. die Linn. Art zieht, ist eine perennirende u. viel niedrigere Pflanze.) *E. lanceolatum* Rchb. ic. f. 4393 b. Gaud. helv. *Cheiranthus firmus* Schleich., (nach einem Exempl. v. Autor; zu einer andern Zeit sandte er unter demselben Namen ein Exempl. d. *E. helveticum*.) Bth. sehr schön citron- od. schwefelgelb, am Abend besond. einen starken Honiggeruch verbreitend. Var. mit abstehenden und mit auf den abstehenden Bthstielchen aufrechten, der Spindel parallelen Schoten; ferner; D.

α. denticulatum, B. geschweift-gezähnt, oft fast ganzrandig.

β. dentatum, B. tief- od. buchtig-gezähnt, auf dieselbe Weise, wie bei *E. cheiranthoides*, *E. crepidifolium* u. *E. repandum*; hierher geh. *E. odoratum* Ehrh., DC. Syst., Rchb. ic. f. 165. *E. strictum β. odoratum* DC. prodr., u. mit tief-buchtig-gezähnten B.: *E. carniolicum* Dollin., Rchb. ic. f. 4386.

5. *E. REPANDUM* (L.) Angeschweiffter H. — B. lanzettl.-zugespitzt, etwas buchtig od. geschweift gezähnt, od. ganzrandig, an d. Spitze zurückgebogen, v. einfachen *) u. 3 sp. Haaren etwas rauh; Bthstielch. halb so lang, als der K.; *Schot. stumpf-4kantig, fast stielrund, kaum dicker, als das verdickte, wagrecht-abstehende Bthstielch.*, oberwärts in die gestutzte N. verschmälert. ☉. Auf Feldern, (Steyerm., Unteröstr. u. v. da dch. Mähr., Böhm. u. Thüring. bis Göttingen; auch bei Würzburg.) Jun. - Jul. J. a. t. 22. *E. ramosissimum* Crantz. D.

6. *E. CREPIDIFOLIUM* (Rb. ic. 1. f. 13.) Pipaublättriger H. — B. lanzettl., buchtig od. geschweift-gezähnt od. ganzrandig, an d. Spitze zurückgebogen, v. einfachen od. 3 sp. Haaren etwas rauh, die untern stumpf, kurz-stachelspitzig, in d. Bstiel verschmälert;

*) Die Haare sind auf beiden Seiten verschmälert, und in der Mitte fest aufgewachsen, in der That aber 2theilig und angedrückt; doch scheint es mir passender, sie einfache zu nennen.

die obern spitz, sitzend, *Bthstielch.* um das 2 od. 3 fache kürzer, als der K.; Schot. stumpf-4kantig, vom Rücken ein wenig zsgedrückt, gleichfarbig, mit dem Gf. u. einer kopfigen N. bekrönt. ☉. Auf Kalkfelsen, (Steyerm., Böh., Thüring., Baireuth, Ansbach auf d. Hesselberg, Rheinpfalz.) Mai. Jun. *E. hieracifolium* des Linneischen Herbariums, sodann Pollich's u. DC. *E. Cheiranthus* Presl! *E. pallens* Wallr. *E. odoratum* K. u. Z., nach getrockneten Exempl. bestimmt. *Cheiranthus hieracifolius* Lam. Bth. hell-schwefelgelb, geruchlos. K. an d. Basis 2 höckerig. Schot. gleichfarbig. D.

7. *E. CANESCENS* (Roth.) Graublättriger H. — B. lineal.-lanzettl., ganzrandig od. entfernt-gezähnt, an d. Spitze zurückgebogen, v. fast lauter einfachen Haaren etwas rauh, die untern kurz-stachelspitzig, in d. Bstiel verschmälert, die obern lineal., spitz: sterile Aestchen in d. BWinkeln; *Bthstielch.* so lang, als der Kelch; Schot. abstehend, genau vierkantig, grau, mit kahlern, grünen Kanten. ☉. An sonnigen unbebauten O., (in Unteröstr., Mähr., u. im C. Wallis.) Jun. Jul. *E. diffusum* Ehrh. *Cheiranthus alpinus* J. a. t. 75., aber kaum Linne's. Ch. Boccone All. St. v. der Basis an in d. Bwinkeln mit einem Blätterbüschel od. mit einem sterilen Aestchen versehen. Unterscheidet sich von der Variet. *integrifolia* des *Erysimum crepidifolium* d. f.: *Bthstielch.* so lang, als der K., KB. an d. Basis nicht höckerig; Schot. genau 4kantig, od. sogar etwas v. d. Seite zsgedrückt, grau, Kanten grün.

8. *E. RHAETICUM* (DC. syst. 2. 503.) Rhaetischer H. — B. lineal.-lanzettl., spitz, ganzrandig od. entfernt-gezähnt, v. einfachen Haaren etwas rauh, d. untern in d. Bstiel verschmälert; sterile Aestchen in d. BWinkeln; *Bthstielchen* um das 2 od. 3 fache kürzer als d. K., Schoten rechtwinkelig-vierkantig, grünlich-grau; N. ausgerandet. 4. Steinige Berge, (im C. Tessin, Veldlin, im südl. Tyrol.) Mai. Rehb. ic. t. 4397. *E. pallens* Koch Synops. ed. 1. var. *a* zum Theil. *Cheiranthus rhaeticus* Schleich. Kommt mit *E. canescens* überein durch die Büschel von kleineren B., oder die kurzen sterilen Aestchen in den Winkeln der StB.; unterscheidet sich aber durch grössere Bth., die während der Bthe 3 mal kürzeren *Bthstielchen* als der an seiner Basis zweisackige K., *E. helveticum* Gaud. hat keine Büschel in d. BWinkeln. u. hat etwas breitere Schoten. Die Länge des Gf. ist veränderlich.

9. *E. CHEIRANTUS* (Pers. syn. 2. 199.) Lanzettblättriger H. — B. lineal.-lanzettl., ganzrandig, od. entfernt-gezähnt, von einfachen Haaren etwas rauh, die untern in d. Bstiel verschmälert; BWinkel nackt; *Bthstielch.* um das 2 od. 3 fache kürzer, als d. K.; Schoten 4kantig, flaumh. od. grau; Gf. so lang, als die Schot. breit. 4. Auf rauen Gebirgen, in VorA.-Regionen bis zu d. höchsten A. emporsteigend, (im Littorale u. dch. Krain u. Kärnthen bis zum Glockner; in Steyermark u. v. da nach Unteröstr., in der Gegend v. Wien.) Mai. Jun. *E. murale* Desf. DC. *E. lanceolatum* R. Brown. h. kew., nach d. schönen Abbild. in Jacq. fl. a. *Cheiranthus erysimoides* J. austr. t. 74., nicht Linn.

Ch. alpinus Lam. *E. pumilum* Gaud. nach d. Beschreibg. d. Gfs. (Schleicher schickte mir unter d. Namen des *Ch. pumilus* kleine Exempl. des *E. helveticum*.) — Eine perennirende vielköpfige W., unfruchtbare Blätterbüschel, welche schon während des Aufblühens um die fruchtbaren Stengel sich vorfinden, stark kriechende Bth., kurze Bthstielchen, der an d. Basis zweihöckerige Kelch u. d. kurze Gf. geben diese Art zu erkennen. *E. canescens* hat Bthstielchen so lang, als d. K., od. nur etwas kürzere, und einen an d. Basis undeutlich höckerigen K. u. BBüschel od. sterile Aestchen in d. BWinkeln. Die Benennung Persoons habe ich vorangestellt, weil der Name *E. lanceolatum* R. Brown zweifelhaft geworden.

10. *E. HELVETICUM* (DC. fl. fr. 4. 658 excl. syn. Jacq.) Schweizerischer H. — B. lineal.-lanzettl., ganzrandig, od. entfernt-gezähnt, etwas rauh v. einfachen Haaren, die unt. in einen Bstiel verschmälert; BWinkel nackt; Bthstielchen um das 2 od. 3fache kürzer, als der K.; Schot. kantig, flaumh. od. grau; Gf. 2-3 mal so lang, als die Schote breit ist, Narbe ausgerandet. 4. Auf rauhen Gebirgen, VorA. u. A. (im Wallis). Mai. Jun. *E. helveticum* Gaud. *E. pallens* Koch Synops. ed. 1. var. α. zum Theil. *Cheiranthus pallens* Hall. fil. in Schleich cat. *Ch. helveticus* und *Ch. pumilus* Schleich. cat., „*Ch. pumilus* ist bloß eine Zwergform des *Erysimum helveticum* aus d. A.“ Dr. Lagger in brieflichen Mittheilungen, aber *E. pumilum* Gaud. fl. helv. gehört wegen seines sehr kurzen Gf. zur vorigen Art. — Sehr ähnlich dem *E. Cheiranthus* und nur dch den verlängerten Gf. verschieden; vielleicht Variet.?

11. *E. OCHROLEUCUM* (DC. fl. fr. 2. 658, excl. var. β.) Gelblich-weisser H. — B. lineal.-lanzettl., od. lanzettl., ganzrandig oder entfernt-gezähnt, etwas rauh von einfachen Haaren, d. unteren in d. Bstiel verschmälert; d. BWinkel nackt; Bthstielchen um das 2 od. 3fache kürzer, als der K.; Schoten zsgedrückt-4 kantig; Gf. 3 mal so lang, als die Breite der angedrückt-flaumhaarigen od. gräulichen Schote; N. 2 knötig-2 lappig. 4. Steinige O. (auf d. Jura in der Schw.) Jun.-Aug., nach Gaud. fl. helv. Rchb. ic. f. 4396. *Cheiranthus ochroleucus* Hall. fil. in Schleich. cat., DC. syst. *Cheiranthus decumbens* Schleich. in Willd. en. h. berol. Die Stämmchen im Alter verlängert und niederliegend. Blb. gelblichweiss, oft die grössten der ganzen Gattung, während dem Blühen anfangs schön zitrongelb, dann strohgelb, daher d. unteren Bth. strohgelb, die oberen zitrongelb; hieran erkennt man diese Art vor allen übrigen auf d. ersten Blick, so lang sie in der Bthe steht.

12. *E. SUFFRUTICOSUM* (Spreng.) Halbstrauchiger H. — B. länglich-lanzettl., kurz-stachelspitzig, etwas rauh v. fast lauter einfachen Haaren; Bthstielch. so lang, als der K., die fruchttrag. vielmal kürzer, als die Schot.; Schote 4 kantig, v. d. Seite etwas zsgedrückt, filzig-grau, mit grünen Kanten. ☉. An Wegrändern (bisher bloß zw. Verviers u. Limburg!) Mai. Jun. Rchb. ic. f.

4391. *E. suffruticosum* DC. *E. virgatum* Lej. ! nicht Roth. *Cheiranthus helveticus* J. hort. vind. 3. 1. 9, nicht Willd. Bth. dottergelb. Der St. erhärtet unterwärts schnell, u. wird holzig, doch ist d. Pflanze wirklich nur 2jährig u. nicht strauchartig. Gay hält diese Pfl. für *Cheiranthus fruticosus*, aber sie ist zweijährig und nicht strauchig; die Klappen d. Schoten sind auf d. inneren Seite filzig, wie richtig Gay zuerst bemerkte. D.

II Rotte. *CORINGIA*. DC. syst. 2. 507. Die stengelst. B. an d. Basis tief herzf., stengelumfassend. Bth. weiss od. gelblich. (*Erysimum austriacum* gehört wegen d. 3 nervigen Klappen der Schot. eigentlich zur Gattung *Sisymbrium*.)

13. *E. ORIENTALE* (R. Brown.) Morgenländischer H. — Die stengelst. B. herzf., stengelumfassend; Schot. abstehend; Klappen 1 nervig. ☉. Auf Aeckern, auf Letten- und Kalkboden. Mai-Aug. J. a. t. 282. *E. perfoliatum* Crantz. DC. *E. campestre* Scop. *Brassica orientalis* L. *Contingia orientalis* Andr. *Gorinkia orientalis* Presl. Bth. weiss od. gelblich-weiss.

14. *E. AUSTRIACUM* (Baumg.) Oestreichischer H. — Die stengelst. B. herzf., stengelumfassend, Schot. aufrecht; Klappen 3 nervig. ☉. u. ☉. Auf Aeckern, (bisher blos in Unteröstr.) Mai-Jun. *Brassica austriaca* J. a. t. 283. Bth. hell-gelb. D.

13. *SYRENIA* (Andrzejowski.) Fadengriffel. — Schot. lineal., mit einem einzelnen hervortretenden Klappennerven; 4 kantig od. zsgedrückt-4 kantig. N. stumpf, ganz od. ausgerandet. S. in jed. Fache 2 reihig. (Unterscheidet sich dch d. 2 reihigen S. von *Erysimum*.)

I. *S. ANGUSTIFOLIA* (Rb.) Schmalblättriger F. — Schot. viel länger, als der Gl.: Bth. fast sitzend; B. lineal., ganzrandig. ☉. An sandigen O., (bisher blos in Unteröstr., nach Host.) Jun.-Aug. Waldst. u. Kit. t. 98. *Erysimum angustifolium* Ehrh. *Cheiranthus virgatus* Poir. Ch. canis Pill. und Mitterb. *Syrenia* Ehrharti Andr. Bth. citrongelb.

III. Gruppe. *BRASSICEEN* od. schotenfrüchtige, rückenwurzelige, mit rinnig-gefalteten KeimB. Diese aufeinanderliegend rinniggefaltet, od. um das Würzleh. herumgerollt.

14. *BRASSICA* (L.) Kohl. — Schot. lineal. od. länglich; Klappen konvex, mit einem geraden Rückennerven, aber ohne Seitennerven, oder auf den Seiten nur mit Adern durchzogen, welche in einen undeutlichen Seitennerven zsfließen. S. kugelig, in jed. Fache 1 reihig. KeimB. aufeinanderliegend, rinnig-gefaltet.

I. *B. OLERACEA* (L.) Garten K. — B. meergrün, die untern leierf., gestielt, die obern länglich, sitzend; Tr. schon vor dem Aufblühen verlängert u. locker; K. aufrecht, geschlossen; Stbg. sämmtl. aufrecht. ☉. Wird in vielen Variet. gebant. Mai-Jun. Bth. gelblichweiss, seltner weiss. B. sehr kahl. Spenner hat in seiner Flor. trib. diese und die folgenden beiden Arten unter seiner Gattung *Napus* sehr genau auseinander gesetzt.

2. *B. RAPA* (L.) Rüben - K. — WB. grasgrün, StB. meergrün, die unt. leierf., die obern *eyf.*, zugespitzt, mit tief-herzf. Basis stengelumfassend; *Tr.* während d. Aufblühens flach; die geöffneten Bth. höher als die gedrängten Bthknöpfe; K. zuletzt wagrecht abstehend; die kürzern Stbg. abstehend - aufstrebend. ☉. u. ☉. Wird in mehrern Variet. gebaut; die Variet. ☉. ist wild unter der Saat. Auf Aeckern, welche mit der Variet. *γ.* bebaut waren, kommt sie im darauffolgenden Jahre aus später keimenden S. hie und da häufig, gleichsam wildwachsend hervor, mit einer W., die kaum so dick als d. St., u. ist dann *B. campestris* Koch D. fl. u. Synops. ed. 1. Die *B. campestris* Lin. ist jährig und bildet folgende Variet.:

α. var. campestris; jährig, W. schwach u. klein. *B. campestris* L. fl. suc. Sie wird auch unter d. Namen Sommerrübenreps angebaut, Metzger Kohlart: *B. Rapa oleifera annua*; *B. praecox* Kit. nach DC. Beschreibung, aber unter der Sommersaat wachsend, ist sie sehr weit *praecox*. In einzelnen Gegenden unserer Flora ist sie sehr weit verbreitet, findet sich aber in anderen gar nicht. Var. ferner:

β. oleifera biennis; wie d. vorige, aber mit etwas grösseren Schoten u. Samen. *B. Rapa C. oleifera* DC. syst. Winterrübenreps. Durch sorgfältige Pflege verwandelte Metzger diese Variet. in die gewöhnliche längliche weisse Rübe.

γ. rapifera; W. dick, fleischig, wohlschmeckend, rund, längl. grösser, kleiner. u. s. w. *B. Rapa rapifera* Metzger. Weisse Rübe.

3. *B. NAPUS* (L.) Reps - K. — B. meergrün, die unt. leierf., die obern länglich, hinten etwas schmaler, aber mit verbreiteter, herzf. Basis halbstengelumfassend; *Tr. locker*, schon während d. Aufblühens verlängert; K. zuletzt halboffen; die kürzeren Stbg. abstehend, aufstrebend. Schot. abstehend. ☉. u. ☉. Wird gebaut. Apr. Mai. Bth. schön citrongelb. *B. Napus* L., mit Ausnahme d. Synonyme *Bauhins* u. *Dodonaeus*, die zu einer Variet. v. *B. Rapa* gehören. „Die wurzelt. B. leierf., kahl, die stengelst. stengelumfassend, herzf. - länglich“ Linne am angef. O. Diese Worte bezeichnen d. hier aufgeführte Pflanze, u. nicht eine Variet. v. *B. Rapa*. — Es werden 3 Variet. gebaut:

α. oleifera annua; W. dünn, jährig: Sommerkohlreps Metzger. *B. campestris oleifera praecox* DC.

β. oleifera biennis; W. dünn, 2jährig. 2jähriger Winterkohlreps, *B. Napus oleifera* (*biennis*) DC., grüner Winterkohlreps Metzger. Eine Abändrg davon mit krausen B. ist nach Metzger: *B. campestris pabularia* DC., Schnittkohl.

γ. esculenta; W. fleischig, dick, essbar: Erdkohlrabe, Dorschen, *B. Napus β. esculenta* DC. *B. Napus rapifera* Metzger. Von dieser scheint mir nicht verschieden: *B. oleracea* *z.* *Napo-brassica* L.

4. *B. NIGRA* (Koch.) Schwarzer K. — B. sämmtl. gestielt, die untern leierf., gezähnt, der Endzipfel sehr gross, gelappt, die

obern lanzettl., ganzrandig: K. wagrecht-abstehend; *Schot. an die Spindel angedrückt*. ☉. Im Gebüsche u. Kiese d. Flüsse, auch an behauten O., (in grosser Menge am Ufer d. Neckars v. Tübingen bis Heidelberg u. am Main v. Würzburg bis Mainz, Moselufer bei Trier, südl. Tyr., ausserd. hin u. wied. in D. u. der Schw. unt. d. Saat. u. in Weinbergen.) Jun. Jul. *Sinapis nigra* L. sp. Rehb. ic. f. 4427. Bth. gelb.

15. *SINAPIS* (Lin.) Senf. — Schot. lineal od. länglich: Klappen konvex, mit 3 oder 5 geraden, starken Nerven. S. in jedem Fache 1 reihig, kugelig. Keimb. aufeinanderliegend, rinnig-gefaltet. (Ausser den geraden Seitennerven auf d. Klappen d. Schote findet man zw. *Sinapis* u. *Brassica* keinen andern Unterschied.)

1. *S. ARVENSIS* (L.) Feld-S. — Schot. walzlich, holperig: Klappen 3nervig, mit hervortretenden Nerven: Schnabel so lang, als d. Schote, od. kürzer, 2 schneidig; K. wagrecht-abstehend; B. eyf., ungleich-gezähnt, die untern an der Basis geöhrt, od. etwas leierf. ☉. Unter d. Saat u. auf Feldern. Jun. Jul. *Napus Agri-sinapis* Spenn. Bth. gelb. Var. mit kahler Schote u.

β. rückwärts steifhaariger Schote: *S. orientalis* Murr.

2. *S. ALBA* (L.) Weisses S. — Schot. walzlich, holperig: Klappen 5nervig, mit hervortretenden Nerven; Schnabel so lang, als die Schot., oder kürzer, zsgedrückt; K. wagrecht-abstehend; B. gefiedert; Fieder grob-ungleich-gezähnt, etwas gelappt, die obere 3 zstliessend. ☉. Unter d. Saat., aber nicht überall. Jun. Jul. St. h. 8. *Napus Leucosinapis* Spenn.

3. *S. CHEIRANTHUS* (Koch.) Lackblüthiger S. — Schot. walzlich, etwas holperig, Klappen 3nervig: Nerven hervortretend; K. aufrecht, geschlossen; B. sämmtl. tief-fiedersp. od. gefiedert, Fieder länglich, ungleich-gezähnt, die der oberen B. lineal., ganzrandig. ☉. Auf Sand- u. Kiesfeldern u. an steinigten, schroffen Bergabhängen, (auf d. Rheinfläche v. Basel deh. Elsass, stellenweise, über Mannheim u. Dürkheim, deh. d. Gebirg v. Kaiserslautern, und deh. d. Glahn-, Nahe- und Moselgebirg bis in d. Luxemburgische, am Rheine bis unter Coblenz.) Jun.-Aug. Abbildg. bot. ztg. 5. I. t. 3, sehr gut. *Sinapis recurvata* All. (Schot. zu dick.) *S. Tournefortii* All., (nach DC. nicht verschieden) *Brassica Cheiranthus* Vill. DC. *B. montana* DC., dieselbe, nach d. Verfasser. *B. cheiranthiflora* DC., Nees v. Esenb. b. ztg. 5. I. ISI, gleichfalls nicht verschieden. *B. Erucastrum* Poll. *Raphanus Cheiranthiflorus* Willd. *Sisymbrium monense* Gmel. bad.

16. *ERUCASTRUM* (Schimper u. Spenner.) Rempfe — Schot. lineal: Klappen konvex, mit einem einzigen Nerven. S. in jed. Fache 1 reihig, eyf. od. länglich, zsgedrückt. Keimb. aufeinanderliegend, rinnig-gefaltet.

1. *E. OBTUSANGULUM* (Reich.) Stumpfkantige R. — B. tief-fiedersp.; Zpfl. länglich-ungleich-eckig-gezähnt, an d. Basis deh. eine gerundete Bucht gesondert; Tr. ohne DeckB.; KB. wagrecht-abstehend; die längern Stbg. oberwärts von d. Stempel abgebogen;

Schot. abstehead. 2. An sonnigen O., an Mauern, Schutthaufen, (in d. Schw. im C. Wallis, Genf, Waad, Neuchatell, Basel, sodann im Rheinthale d. Schw. u. am Bodensee, bei Strassburg u. auf ein. Rheininsel bei Neunburg im Oberbadischen.) Jun. Jul. St. h. 66. Bth. schön, hellcitrongelb. *Sisymbrium obtusangulum* Schleich. DC. *S. Erucastrum* Vill. *Brassica Erucastrum* a. Gaud. *Sinapis hispanica* Lam. — Gaudin vermuthet, dass die *Brassica Erucastrum* L. u. DC. zu einer d. Abänderungen d. *Brassica* (*Sinapis*) *Cheiranthus* gehöre.

2. E. POLLICHII (Schimp. u. Spenn.) Pollich's R. — B. tief-fiedersp.; Zpfl. länglich, ungleich-stumpf-gezähnt, an d. Basis dch. eine gerundete Bucht gesondert; *Tr. unterwärts mit DeckB.*; *KB. aufrecht-abstehead*; längere Stbg. an d. Stempel angepresst; *Schot. abstehead.* 2. Auf Aeckern, Brachfeldern, Schutthaufen u. Mauern, (am Genfersee u. im ganzen Rheingebiete v. Oberelsass u. v. Freiburg im Breisgau an bis Wesel u. Spa. Trier; Halle; Unterösterreich.) Apr. bis in d. Herbst. St. h. 66. E. Pollichii Sch. u. Sp. E. inodorum Rb. *Sisymbrium Erucastrum* Poll. S. *Erucastrum* var. B. Vill. Delph. B. S. hirtum Host. a. *Eruca Erucastrum* β. ochroleuca Gaud. Bth. gelblichweiss, fast grünlich, schwachgeädert.

3. E. INCANUM. (Koch.) Filzgraue R. — B. leierf., kurz., die obere lineal-lanzettl.; *Schot. an d. Spindel angedrückt*, holperig. ☉. Auf steinigen Hügeln u. Schutthaufen, (bei Basel u. Mühlhausen, Rheininseln bei Neuenburg in Oberbaden; in d. Geb. der Fl. v. Spa hat sie sich verloren.) Mai-Jul. Bth. hellgelb. J. h. vind. t. 169. *Sinapis incana* L. *Hirschfeldia adpressa* Mönch. *Schot. kahl u. kurz.*, aber mit kahlem Schnabel. S.

17. DIPLÔTÁXIS (DeC.) Doppelsame. — *Schot. lineal od. lanzettl.-lineal.*: Klappen konvex, mit ein. einzigen Nerven. S. in jed. Fache 2reihig, oval od. länglich, zsgedrückt. Keimb. aufeinanderliegend, rinnig-gefaltet.

1. D. TENUIFOLIA (DeC.) Schmalblättriger D. — St. ästig, blättrig, an d. Basis halbstrauchig; B. völlig kahl, buchtig-gezähnt, ungeth., od. 1fach- u. doppelt-fiedersp.; Zpfl. lineal., entfernt-gezähnt; *Bthstielch. noch 1mal so lang, als d. Bth.*; *Blb. rundlich-verkehrteyf.*, in ein. kurzen Nagel zsggezogen. 2. Auf unbauten Hügeln, an Wegen u. auf Mauern, (auf d. Rheinfläche v. Basel bis Wesel u. Spa; in Mähr., Steyer., Böh., Oestr., Krain, Südtirol u. südl. Schw.) Jun.-Herbst. St. h. 68. Bth. citrongelb; abgeblüht lederbraun, wie bei den folgenden. *Sisymbrium tenuifolium* L. *Sinapis tenuifolia* Brown. *Brassica muralis* Huds. Var.: B. fiedersp. u. doppeltfiedersp. St. h. 66. u.

β. *integrifolia*; B. ganz, länglich od. lanzettl., grob-gezähnt, mit lanzettl. Zähnen. St. h. 68.

2. D. MURALIS (DeC.) St. krautig, nur an d. Basis beblättert; B. zerstreut-behaart, buchtig-gezähnt u. fiedersp.; Zpfl. eyf., od. länglich, gezähnt, der endst. verkehrt-eyf., eckig-gezähnt; *Bth-*

stielch. so lang, als d. Bth.; Blb. rundlich-verkehrteyf. in ein. kurzen Nagel gezogen. ☉ Auf Aeckern und bebauten O., (im C. Waad; sodann auf d. Rheinfläche v. Oberelsass u. d. Breisgau bis n. Spa, u. im Moselthale, doch nicht überall; im Litt. südl. Tyrol; Steyerm. u. v. da n. Oestr., Mähr. u. Böhm.; bei Stralsund.) Mai-Herbst. St. h. 68. *Sisymbrium murale* L. S. *Erucastrum Gouan.* nicht Vill. u. nicht Poll. Var. sehr selten mit fast doppeltfiedersp. B.

3. D. *VIMINEA* (DeC.) Ruthenästiger D. — St. krautig, nur an d. untersten Basis beblättert; B. buchtig-leierf.; Zpfl. eyf., geschweift-gezähnt, der endst. oval; *Bthstielch. kürzer, als d. eben geöffnete Bth.; Blb. länglich-verkehrteyf., keilig, allmählig in den Nagel verschmälert.* ☉ Auf Aeckern und Weinbergen, (um Werthheim in Franken u. um Hochheim bei Mainz.) Jun. Jul. St. h. 68. D. *brevicaulis* Bl. u. F. *Sisymbrium vimineum* L. S. *pumilum* Lam. S. *brevicaule* Wib. D.

18. *ERUCA* (DeC.) Runke. — Schot. lineal. od. länglich: Klappen konvex, mit ein. einzigen hervortretenden Rückennerven. S. in jed. Fache 2reibig, kugelig. KeimB. aufeinanderliegend, rinnig gefaltet.

1. E. *SATIVA* (Lam.) Angebaute R. — B. leierf.-fiederth.; Zpfl. gezähnt, spitz; St. rauhh.: *Bthstielch. kürzer, als der abfällige K.* ☉ An Wegen u. auf Schutthäufen, (im C. Wallis; in südl. Gegenden auch angebaut.) Mai. Jun. Reichenb. ic. f. 4421. *Brassica Eruca* L. sp. *Sinapis Eruca* Röhl. d. Fl. Bth. milchweiss od. gelblichweiss, mit braun-violetten Adern bemalt. S.

II. Unterordng. *LATISEPTEN. BREITWANDIGE.* Schötch. 2klappig, aufspringend, (gedunsen, länglich, oval, od. kugelig, od. v. Rücken her zsgedrückt, od. v. Rücken her flach); Scheidewand so breit, als der grössere Querdurchmesser d. Schötch. od. an sehr gedunsenen nur ein wenig schmaler.

IV. Gruppe. *ALYSSINEEN.* Breitwandige, seitenwurzelige. KeimB. aneinanderliegend.

19. *VESICARIA* (Lam.) Blasenschötchen. — Schötch. mit sehr konvexen Klappen, kugelig od. oval-kugelig. Scheidewand parallel. Stbg., vorzügl. die kürzeren, an d. Basis durch ein. stumpfen Zahn verdickt. KeimB. aneinanderliegend.

1. V. *UTRICULATA* (Lam.) Schläuchiges B. — Schötch. kahl; B. länglich, ganzrandig, *kahl*, die unt. bewimpert, fast spatelf. 4. od. 5. An felsigen O. am Fusse d. A., (im unt. Theile d. C. Wallis, häufig an d. Giesbache Trient, wo er in die Rhone fällt; bei Bonn an den Godesberger Ruinen.) Apr.-Jun. St. h. 48. Bth. gelb. *Alyssum utriculatum* L. S.

2. V. *SINUATA* (Poir.) Buchtig-blättriges B. — Schötch. kahl; B. *weich-filzig*, die der Stämmchen länglich-lanzettl., nach d. Basis verschmälert, buchtig-gezähnt, od. fast ganzrandig. 4. od. 5.

Auf Felsen u. steinigem O., (bei Fiume u. auf d. Insel Osero u. Cherso.) Mai. Jun. St. h. 68. Bth. gelb. *Alyssum sinuatum* L. J.

20. ALYSSUM (L.) Steinkraut. — Schötk. rundlich, od. oval, v. Rücken her zsgedrückt od. flach; 1-4 S. in jed. Fache; Stbf. gezähnt, mit ein. flügl. Anhängsel; od. an d. Basis inwendig dch ein. stumpfen Zahn verdickt; od. die kürzern auf jeder Seite mit ein. pfriemlichen Zähnen gestützt. KeimB. aneinanderliegend.

I. Rotte. AURINIA Meyer. Stbf. an d. Basis inwendig mit ein. stumpfen Zahne, gleich ein. Schwiele, der besonders an d. kürzern bemerklich ist. Fächer d. Schötk. mit 2-4 Eychen. Bth. gelb.

1. A. PETRAEUM (Arduin. specim. alt. p. 30. t. 14.) Flügelloses St. — St. krantig, ästig; *Trauben rispig, d. fruchttrag. verlängert; Platte der Bth. halb 2sp.*, mit einer spitzen Bucht; Stbf. an d. Basis inwendig mit ein. stumpfen Zähnen; Schötk. kahl, breitelliptisch, in d. Mitte aufgeblasen, am Rande plattgedrückt; Fächer 2eyig; die wurzelst. B. länglich-verkehrteyf., in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. lanzettl., sitzend. ☉. An sonnigen, rauhen O., (im innern Krain u. Steyerm. bei Peggau.) Mai. Jun. A. edentulum W. et Kit. pl. r. h. St. h. 48. Vergl. Tommas. bot. Ztg. 22. 2. 497. A. Gemonense L. mant. D.

2. A. MEDIUM (Host. a. 2. p. 244.) Mittleres St. — Stämmchen strauchartig; d. jährigen St. einfach od. ästig; die fruchttrag. Tr. verlängert; Blb. seicht-ausgerandet; Stbf. an d. Basis inwendig mit ein. stumpfen Zähnen; Schötk. kahl, oval, od. rundlich, in d. Mitte aufgeblasen, am Rande plattgedrückt; *Fächer 4eyig*; B. d. Stämmchen länglich, in d. Bstiel verschmälert, sehr weich-filzig. 4. h. Auf Kalkgebirgen, (bei Ponteba, in Oberkärnten; im Wocheiner- u. Kankerthal, in Krain; auf Osero.) A. gemonense D. fl. St. h. 66. D.

3. A. SAXATILE (L.) Gebirgs-St. — Stämmchen strauchartig; die jährigen St. an d. Spitze traubig-ästig; *die Tr. rispig, auch d. fruchttrag. noch kurz*; Blb. breitausgerandet; Stbf. an d. Basis inwendig mit ein. stumpfen Zähnen; Schötk. kahl, oval od. verkehrt-eyf., flach, in d. Mitte konvex; Fächer 2eyig, B. der Stämmchen länglich, in d. Bstiel verschmälert, sehr weichfilzig. 4. h. Auf Kalkgebirgen; (in Unteröstr., in Böhm., Schles., Sachs., in d. Baireuther Gebirgen bei Muggendorf.) Apr. Mai. St. h. 66. D.

II. Rotte. ODONTARRHENA Meyer. Die längern Stbf. v. der Basis bis über d. Mitte hinaus mit ein. geflügelten Rande, die kürzern an d. Basis mit ein. flügl. Anhängsel. Fächer d. Schötk. mit 1 Eychen; S. an ein. freien Nabelstrange herabhängend.

4. A. ALPESTRE (L.) Alpen-St. — St. krautig, aufstrebend, an d. Basis etwas strauchartig, an d. Spitze traubig-ästig; *Tr. flachrispig*; Blb. gestutzt; die längern Stbf. geflügelt, die kürzern an d. Basis mit ein. flügeligen Anhängsel; Schötk. v. sehr dichtgestellten angedrückten Sternhärchen grau; S. oval, auf der ein. Seite *sehr schmal geflügelt*; B. grau, verkehrt-eyf., od. länglich, nach d. Basis verschmälert. 4. Auf d. VorA. u. Alp., (auf d. Stock,

im Nikolaithale d. C. Wallis.) Jul. Aug. St. h. 66. Var. *a*. St. 2-3 Zoll lang; B. kürzer verkehrt-eyf. u.

β. majus (d. grössere,) St. 5-6 Zoll lang; B. schmaler im Verhältniss ihrer Länge; A. alpestre *β*. D. fl. St. h. 66, mit Ausschluss der fig. 1. L., welche den S. des A. argenteum darstellt. A. tortuosum WK., DC. A. serpyllifolium MB.

γ. clatius (d. höhere,) St. 6-9 Zoll lang; B. spatelig; A. alpestre *β*. argenteum Gaud., mit Ausschluss der Syn. (Im Val Tonnache u. Chatillon d. C. Wallis: auf d. Schaufelsen bei Stetten am kalten Markt in Baden.)

5. A. ARGENTEUM (Vitman.) Silberblättriges St. — St. krautig, aufstrebend, an der Basis etwas strauchartig, an der Spitze traubig-ästig; *Tr.* in einem flachen Strausse; Blb. gestutzt; die längern Stbg. geflügelt, die kürzern an der Basis mit einem geflügelten Anhängsel; Schötch. rundlich u. oval, v. zerstreuten Sternhäarchen etwas rauh; S. kreisrund, mit einem breiten Flügel umzogen; B. verkehrt-eyf., od. lanzettl., unterseits grau. 4. Auf sonnigen Bergen, (bei Verviers im Gebiete d. Fl. von Spa.) Mai. Jun. St. h. 48 u. h. 66, t. 4, fig. L., der Same. D. fl. 4. 581. Das A. argenteum DC., A. murale W. K. u. DC., A. murale MB., A. obtusifolium Stev. sind nicht verschieden und A. Bertolonii Desv. ist dieselbe Pflanze, nach Bertoloni selbst.

III. Rotte. Alyssum Meyer. Die längern Stbg. geflügelt od. zahelos; die kürzern mit ein flüglf. Anhängsel versehen od. dch. Zähnen gestützt. Fächer der Schötchen 2eyig; S. an einem mit seiner Basis an die Scheidewand angewachsenen Nabelstrang hängend.

§. 1. Blh. gelb.

6. A. MONTANUM (L.) Berg-St. — St. krautig, niedergestreckt oder aufstrebend, zuletzt an der Basis etwas strauchartig; *Tr.* endst., einzeln, fruchttrag. verlängert; Blb. stumpf, od. gestutzt; die längern Stbg. geflügelt, die kürzern an der Basis mit einem geflügelten Anhängsel; Schötch. oval oder rundlich, von dichtgestellten angedrückten Sternhäarchen grau; B. grau, lanzettl., die unt. verkehrt-eyf. 4. In Felsenspalten, an sonnigen, gebirgigen O. u. auf Sandfeldern, (in der Schw. hin und wieder; in dem Rheingebiete von Basel an; im Gebiete des Maines u. der Mosel; im Donaugebiete von Regensburg bis Unteröstr.; im Littorale; in Böhm., Schles., Sachs., Thüring.) Mai. Jun. St. h. 66. Var., die unt. B. verkehrt-eyf.: A. arenarium Lois, St. 66; u. B. schmaler, sämmtl. lanzettl.: A. arenarium Gmel. bad.

7. A. WULFENIANUM (Bernhardi.) Wulfen's St. — St. krautig, niedergestreckt od. aufstrebend, zuletzt an der Basis etwas strauchartig; *Tr.* endst., einzeln; Blb. ganz, oder gestutzt; die längern Stbg. geflügelt, die kürzern an der Basis mit geflügeltem Anhängsel; Schötch. oval, mit Sternhäarchen bestreut, zuletzt kahl; B. lanzettl. u. verkehrt-eyf., mit Sternhäarchen bestreut. 4. Auf Alpen, (Kärnthen u. Krain.) Jul. Aug. Var., B., breiter, St. h. 48.; und schmaler, Rb. ic. 1. f. 12. A. alpestre Wulf. 10.

§. 2. Bth. bleichgelb, zuletzt weiss.

8. *A. CALYGINUM* (L.) Kelchfrüchtiges St. — St. aufstrebend, krautig; Tr. endst.; *K. bleibend*; *Stbf. sämmtl. zahllos*, die kürzern auf beiden Seiten mit einem borstlichen Zahn gestützt; *Schötch.* kreisrund, von sehr kurzen angedrückten Sternhärchen grau; *B.* grau, lanzettl., an der Basis verschmälert, die untersten verkehrt-eyf. ☉. Auf Feldern, sonnigen Hügeln. Mai. Jun. St. h. 48. *Alyssum campestre* MB. *Adyseton calycinum* Scop.

9. *A. CAMPESTRE* (L.) Feld-St. — St. aufstrebend, krautig; Tr. endst.; *K.* abfällig; die längern *Stbf.* schmal-geflügelt, die kürzern an der Basis mit einem geflügelten Anhängsel; *Schötch.* kreisrund, von einem sternhaarigen od. einfachen etwas abstehenden Flaume *kurzh.*; *B.* grau, lanzettl., nach der Basis verschmälert, die unt. verkehrt-eyf. ☉. Auf Feldern, (im Gebiet der Fl. v. Spa, Lej.!) Mai. Jun. St. h. 66. Var.:

α. hirtum, Haare der Schötchen alle sternf. u. kurz. *A. campestre* d. Aut.

β. micropetalum Fisch., DC. syst., nach Expl. vom Caucasus; die Haare der Schötchen alle sternf., längere u. kürzere untereinander.

γ. hirsutum MB. t. c., die sternf. Haare der Schötchen kurz, mit längeren, einfachen vermischt. *A. Draba* Wild. en. h. b. Die Länge des Gf. ist veränderl. wie bei vielen dieser Klasse.

10. *A. MINIMUM* (Willd.) Kleinstes St. — St. aufstrebend, krautig; Tr. endst.; *K.* abfällig; *die längern Stbf. zahllos*, *die kürzern geflügelt*, u. auf beiden Seiten mit einer kleinen Borste gestützt; *Schötch.* kreisrund, *kahl*; *B.* grau, lanzettl., die untersten verkehrt-eyf. ☉. Auf Sandplätzen u. uncultiv. Hügeln, (Unteröstr., früher auch im C. Wallis, aber nicht wieder gefunden.) Var. mit feingewimperten Schötchen. Jun. Jul. St. h. 48.

21. *LOBULARIA* (Desvaux.) Lobularie. — Schötch. wie bei *Alyssum*. Stbg. ungeflügelt, ungezähnt. Fruchträger fehlend.

1. *L. MARITIMA* (Desv.) Meerstrand's-L. — 4. Am Meeresufer (bei Finne, Bartling; Triest, Kütz. Jun. Jul. *Alyssum maritimum* Lam. dict. St. h. 48. *Clypeola maritima* L. mant. Bth. weiss.

22. *FARSETIA* (Brown.) Farsetie. — Schötch. u. Bth. wie bei *Alyssum*, aber die Fächer der Schötch. 6- u. mehreyig. (Die Blb. bei *Berteroa* DeC. sind nicht mehr getheilt, als bei dem *Alyssum edentulum*.)

1. *F. INCANA* (R. Brown.) Graue F. — St. krautig, aufrecht, od. aufstrebend; Blb. 2sp.; die längern Stbg. an der Basis geflügelt, die kürzern gezähnt; *Schötch.* elliptisch, konvex-zsgedrückt, flaumh.; *B.* lanzettl., die unt. in d. Bstiel verschmälert. ☉. Auf sonnigen Hügeln, an Wegen, Ackerrändern, (in allen Provinzen D., aber doch an manchen O. gar nicht, u. für die Schw. zweifelhaft.) Jun.-Herbst. *Berteroa incana* DC. *Alyssum incanum* L.

St. h. 48. Bth. weiss. Var. an feuchten, schattigen O. mit zerstreutem Flaum u. daher mit mehr grasgrünen Kraute; *Berteroa viridis* Tausch., Reichb. Die Länge des Gf. ist im Verhältniss zu der der Schötch. sehr veränderlich.

2. F. CLYPEATA (R. Brown h. hew. ed. 2. v. 4. p. 96.) Schildförmige F. — St. krautig, aufrecht od. aufstrebend; *Bth. abgerundet-stumpf, ungetheilt*; die längeren Stbg. bis zur Mitte geflügelt, die kürzeren zahlos; *Schötchen* elliptisch, *flach*, filzig; B. lanzettl., die untern in den Bstiel verschmälert. ☉. An sonnigen, trockenen, öden O., (Alle Laste, östlich von Trient in der Nähe des Tersina-Baches, Facchini.) Apr. Mai. *Alyssum clypeatum* L. spec. *Lunaria canescens* Willd. en. h. herol. Bth. gelb.

23. LUNARIA (L.) Mondviole. — Schötch. rundlich od. länglich, vom Rücken her flach-zsgedrückt, auf einem fadenf. Fruchtträger sitzend, aufspringend; Nabelstränge von dem Rand der Fächer ausgehend, an die Scheidewand angewachsen. Stbg. ungezähnt. Keimb. aneinanderliegend.

1. L. REDIVIVA (L.) Spitzfrüchtige M. — *Schötch.* elliptisch-lanzettl., an beiden Enden spitz; S. nierenf., noch 1mal so breit, als lang. 4. In Gebirgs- u. VorA.-Wäldern, (dch die g. AK., u. auch in den übrigen höhern Gebirgen hin und wieder.) Mai. Jun. St. h. 48. L. perennis Gmel.

2. L. BIENNIS (Moench.) Stumpffrüchtige M. — *Schötch.* breit-oval, an beiden Enden stumpf; S. herzf.-rundlich, so breit, als lang. ☉. In Wäldern u. an buschigen, felsigen O., (im Gebiete der Fl. v. Spa, Lejeune!; bei Durlach, Gmel.; letzterer Standort, so wie die für die Schw. angegebenen, etwas zweifelhaft.) Apr. Mai. St. h. 48. L. annua L.

24. CLYPEOLA (L.) Schildkraut. — Schötch. kreisrund, v. Rücken her flach-zsgedrückt, mit einem platten Rande unuzogen, nicht aufspringend, 1fächerig. 1samig. Stbf. geflügelt-gezähnt.

1. C. JONTHLASPI (L.) Liegendes Sch. — St. liegend od. aufstrebend. ☉. Am Meerufer, (im östr. Littorale, Host; Fiume, Noë; Sitten im Wallis, Tomas.) Apr. Mai. Col. ecphr. t. 284. *Fosselina Jonthlaspi* All. Bth. sehr klein, gelb, zuletzt weiss. Var. mit Schötch., welche am Rande kurz, gewimpert und am Rande ganz kahl sind. D.

25. PELTARIA (L.) Scheibenkraut. — Schötch. kreisrund, vom Rücken her flach-zsgedrückt, mit einem südlichen, rundlich-hervortretenden Rande unuzogen, nicht aufspringend, 1fächerig, 2-3eyig. Stbf. zahlos.

1. P. ALLIACEA (L.) Knoblauchduftendes Sch. — Die stengelst. B. mit tief-herzf. Basis stengelumfassend; Schötch. flach, netzig-geädert. 4. An felsigen, etwas feuchten Ufern der Waldbäche, (von Steyermark nach Unteröstr., Istrien u. Fiume.) Mai-Jul. St. h. 48. Bth. weiss. D.

26. **PETROCALLIS** (R. Brown.) Steinschmüchel. — Schötch. elliptisch, vom Rücken her zsgedrückt; Klappen ziemlich konvex; Fächer 2samig. Nabelstränge von der Spitze des Faches ausgehend, ganz an die Scheidewand angewachsen. Stf. Zahnlos. Fruchträger fehlend. KeimB. aneinanderliegend.

1. **P. PYRENAICA** (Brown.) 4. Auf d. Gipfeln der höchsten A., in Felsenspalten u. zw. Steinen, (dch d. g. AK.) Jun. Jul. St. h. 65. *Draba pyrenaica* L. *D. rubra* Crantz. *Zizia pyrenaica* Roth. Bth. rosenroth, od. schwach-violett.

27. **DRABA** (Lin.) Hungerblümchen. — Schötch. länglich, oder elliptisch, vom Rücken her zsgedrückt, flach, oder ziemlich gedunsen von etwas konvexen Klappen. Stbf. Zahnlos. Nabelstränge frei. KeimB. aneinanderliegend.

1. Rotte. Aizorsis. DC. syst. 2. 332. W. stark, vielköpfig. Stämmchen sehr viele, unterwärts mit den vertrockneten B. der vorigen Jahre bedeckt, an der Spitze mit ein. Blätter-Rosette bekrönt, u. meistens einen polstr. Rasen bildend. St. oder Schaft nackt. B. starr, u. mit starren Borsten kammf.-gewimpert. Bth. gelb.

1. **D. AIZOIDES** (L.) Immergrünes H. — Schaft blattlos, kahl; B. starr, lineal., spitzlich, kahl, mit steifen Borsten kammf.-bewimpert; Stbg. so lang, als die Blkr.; Gf. fast so lang, als der Querdurchmesser der Schötch. 4. An felsigen O. u. in Felsenspalten der niedrigen Berge u. VorA.-Regionen; bis in die höchsten A. hinaufsteigend. Merz-Mai; in den Alpen später. Bth. gelb, fast goldgelb. Var.: Schötch. kahl od. borstig-rauh, oder nur am Rand borstig-bewimpert, lanzettl., elliptisch, oder fast rundlich.

a. alpina; kleiner, Schötchen 2-3 Linien lang; Bthstielch. so lang, als das Schötch.: *D. aizoides* St. h. 60. Auf den höchsten A.

β. affinis; grösser, Bth. noch 1mal so gross; Schötch. bis zu 6 Linien lang; Bthstielch. länger, doch nicht länger, als die Schötch.: *D. affinis* Host. St. h. 60. Auf VorA.

γ. montana; grösser u. kleiner; Bthstielch. 2 od. 3mal so lang, als das Schötch.: *D. aizoides* St. h. 20. *D. elongata* Host., wegen der längern Bthstielch. so benannt, denn die Pflanze ist oft kaum 3 Zoll hoch. St. h. 60. Auf niedrigeren Kalkgebirgen, (auf d. Jurakalk v. d. Schw. u. d. Oberelsass an dch Württemberg u. längs dem Donaugebirge bis Regensburg u. von da (dch die Gebirge der Oberpfalz?) in die Baireuther Gebirge.) — *Draba Aizoon* Wahlenberg., *D. lasiocarpa* Rochel. getr. Pfl., St. h. 60., ist eine wirklich verschiedene Art: der Habitus ist verschieden, die B. sind lanzettl., die Wimpern stärker, die Bth. um die Hälfte kleiner, blass-schwefelgelb, Stbf. bleich-grünlichgelb, oberwärts mehr verschmälert u. nur ein wenig länger als der K. An der trocknen Pflanze sind die KB. oft schwärzlich-grasgrün u. d. Blb. in d. Weissliche verfärbt.

2. **D. ZAHLBRUCKNERI** (Host.) Zahlbruckner's H. — Schaft blattlos, kahl; B. starr, lineal., spitzlich, kahl, mit steifen Borsten kammf.-bewimpert; Stbg. so lang, als d. Blkr.; Gf. kürzer,

als der Querdurchmesser des Schötlch. 4. Auf den höchsten Granit A. Jun. Jul. St. h. 60. D. glacialis Hoppe u. Koch bot. ztg., nicht Adams. D. Hoppeana Rb. bei Mösl. Die kleinern Expl. der D. aizoides sehr ähnlich, unterscheidet sich nur: der St. armblüthig, die Bthstiellch. kürzer als das Schötlch., der Gf. kurz. Scheint eine Variet. der Draba aizoides, dch den höchsten Standort erzeugt.

3. D. SAUTERI (Hoppe.) Sauter's H. — Schaft blattlos, kahl; B. starr, lanzettl. nach der Basis verschmälert, kahl, mit steifen Borsten bewimpert; Stbg. halb so lang, als die Blkr.; Gf. kürzer, als der Querdurchmesser des Schötlch. 4. Auf den höchsten Kalk A., (in Salzbg. auf dem Watzmann u. Tennengebirge, Kammerlinghorn und Hundstüd; in Obersteiermark auf dem hohen Schwab.) Jun. Jul. St. h. 60. Var.:

β. Spitzellii mit einem von absteigenden Haaren flaumh. Schafte. D. Spitzellii Hopp. bei St. h. 60. Auf den A. bei Lofer, unter der ursprünglichen Art, aber sehr selten, v. Spitzel. D.

H. Rotte. LEUCODRABA. DC. syst. 2. 342. W. stark, vielköpfig. Stämmchen sehr viele, unterwärts mit den vertrockneten B. der vorigen Jahre bedeckt, an der Spitze mit einer Blätter-Rosette bekrönt u. meist polstrige Rasen bildend. St. oder Schafte nackt. B. weicher, sehr oft mit Sternhärchen bestreut. Bth. weiss.

4. D. TOMENTOSA (Wahlenb.) Filziges H. — Schaft meist 2blättrig, u. nebst d. Bthstiellch. v. Sternhärchen flaumig; B. der Stämmchen elliptisch, nach d. Basis verschmälert, v. Sternhärchen filzig, hinten v. einfachen Haaren wimperig; Schötlch. oval oder länglich, mit 1fachen Haaren bewimpert; Gf. sehr kurz 4. Auf den höchsten A. etwas selten, (Schw., Tyrol, Oberbayern, Salzbg. u. Kärnthen.) Jul. St. h. 60. Gf. so lang, als breit.

5. D. STELLATA (Jacq.) Sternhaariges H. — Schaft meist 2blättrig, oberwärts sammt den Bthstiellch. kahl; B. der Stämmchen lanzettl. oder elliptisch, nach der Basis verschmälert, v. Sternhärchen etwas grau; hinten mit 1fachen Haaren bewimpert; Schötlch. oval, kahl; Gf. fast so lang, als der Querdurchmesser der Schötlch. 4. Auf nackten Felsen der Kalk A., (Schneeberg u. Pyrgas in Oestr.; auf dem Scheiblegger Hochhalm u. Kalbling in Obersteiermark.) Jun. Jul. D. stellata Saut. St. h. 60. D. hirta J. a. 3. t. 432. D. austriaca Crantz. D. saxatilis Koch bot. ztg. Wird von der vorhergehenden Art dch die langen Gf. u. von den 4 folgenden Arten dch die noch 1mal so grossen, viel ansehnlicheren Bth. auf den ersten Blick unterschieden.

6. D. FRIGIDA (Sauter.) Kaltes H. — Schaft meist 2blättrig u. nebst den Bthstiellch. mit ästigen Härchen locker bestreut; B. der Stämmchen lanzettl. oder elliptisch, nach der Basis verschmälert, v. Sternhärchen etwas filzig, hinten mit 1fachen Haaren bewimpert; Schötlch. länglich, kahl; Gf. kurz oder fast fehlend. 4. Auf den Felsen höherer A., (in der Schw. u. von da dch Tyrol nach Salzbg. Steyermark u. Kärnthen.) Jul. St. h. 60. D. stellata Koch bot. ztg. DC. syst. D. dubia Sut. Var.:

β. mit gewimperten Schötch. (Gamsgrube in Kärnthen.)

γ. mit von einem zarten, von ästigen Härchen gebildeten Flaume überzogenen Schötch. : *D. stellata* β. *hebecarpa* DC. Wurde bis jetzt ausser den Pyrenäen noch nicht beobachtet. — *D. nivalis* Liljebl. *D. Liljebladii* Walm., *D. muricella* Wahlbg. in Lappland und den nordischen A. einheimisch, wird leicht von der *D. frigida* dch den Filz, welcher an dem Schaft, den Bthstielch. und K. sehr kurz, viel kürzer ist, als der Dchmesser des Schafts unterschieden.

7. *D. TRAUNSTEINERI* (Hoppe in St. h. 65.) Traunsteiner's H. — St. meist 2 blättrig, *oben nebst d. Bthstielchen kahl*; B. der Stämmchen lanzettl. od. elliptisch, nach d. Basis hin verschmälert, *von Sternhärchen filzig*, hinten von einfachen Haaren bewimpert; *Schötchen lanzettl.*, nach beiden Enden gleichverschmälert; *Gf. noch einmal so lang als breit.* 2 Auf Felsen der höheren A., (Tyrol auf d. Horn bei Kitzbühel u. d. Loferalpen.) Jul. Schötchen kahl. Var. aber auch:

β. *hebecarpa*. Schötchen flaumig.

8. *D. JOHANNIS* (Host.) Johannis - H. — Schaft meist 2 blättrig, *oberwärts nebst d. Bthstielch. kahl*; B. der Stämmchen lanzettl., nach d. Basis verschmälert, *mit Sternhärchen bestreut, hinten mit einfachen Haaren bewimpert*; Schötch. lanzettl., an beiden Enden gleich verschmälert, kahl; Gf. sehr kurz, fast fehlend. 2. Auf d. höchsten GranitA., (Schw., Tyrol, Salzbg. u. Kärnthen.) Jul. Aug. Grössere Expl. sind: *D. Johannis* Hoppe bei St. h. 60; kleinere Exempl. sind: *D. carinthiaca* Hoppe bei St. 4. 65. Rb. ic. 567-569. *D. nivalis* DC, Gaud, Rb. ic. f. 1045-1047, nicht Liljebl. Var.:

β. *glabrata*, B. dch geschwundenen Flaum kahl und nur am Rande von den zurückgebliebenen Härchen bewimpert, und zwar hinten mit 1fachen Haaren, vorne mit kurzen ästigen Härchen bewachsen: *D. Hoppeana* Rudolphi bei Rb. fl. exc. p. 666. *D. Hoppii* Trachsel bot. ztg. St. h. 65.

Draba hirta Gaud., unterscheidet sich nach authentischen v. mir untersuchten Exempl. v. *D. carinthiaca* nicht. Aber die schwedische Pfl. dieses Namens ist dch die aufrechten, mit der Spindel parallelen und oft an diese angedrückten Schötch. und durch den nicht selten $\frac{1}{2}$ Fuss langen und höhern, nach Wahlenberg's Beobachtung, vor dem Aufblühen nickenden Schaft deutlich verschieden.

9. *D. WAHLENBERGH* (Hartman. scand. fl. ed. 2. 177.) Wahlenberg's H. — St. blattlos od. 1-2 blättrig; B. nebst d. *Bthstielchen kahl*; B. der Stämmchen lanzettl., nach der Basis verschmälert, *ganz kahl, oder mit längeren, einfachen oder gabeligen Haaren bewimpert und ausserdem kahl, oder noch mit sternf. Flaum bestreut*; Schötchen längl.-lanzettl. oder lanzettl., an beiden Enden fast gleichf. verschmälert, kahl; Gf. sehr kurz, fast fehlend.

lend. 4. Steinige O. der höchsten Alpen in der Nähe des ewigen Schnees, (Schwz u. drch d. g. AK.) Jul. Lindbl. in Linnaea 13. 324. Neuere Beobachtungen von Traunsteiner, Lindblom u. Ulyss. Sal. Marschlins nach briefl. Mittheilungen kommen darin überein, dass die nachfolgenden Arten als Varietäten einer einzigen zusammenzustellen seyen.

a. Variet. homotricha Lindbl., B. kahl, mit einfachen Borstchen fast kammf. - bewimpert, übrigens kahl, oder mit einfachen Haaren bestreut. *D. fladnizensis* Wulf. in Jacq. misc., Koch. Synops. ed. I., St. h. 63. *D. helvetica* Schleich., DC. syst. *D. sclerophylla* Gaud. helv. *D. androsacea* Wahlenb. lapp. *D. ciliaris* Wulf. helv., nicht L. *D. nivalis* Sering., nicht Liljebl. *D. lactea* Adams. bei DC. syst. (nach Lindbl.)

β. heterotricha Lindbl., B. mit einfachen oder gabeligen Borstchen bewimpert, übrigens die äusseren der Rosetten meist glatt, die inneren aber mit kurzen Sternhärchen bestreut. *D. lapponica*. Willd. herb., DC. syst., Koch Synops. ed. I., St. h. 63., Wahlenb. fl. suec. *D. fladnizensis* Gaud. helv. nicht Wulf.

γ. glabrata, B. allenthalben kahl. *D. laevigata* Hoppe, Koch Syn. ed. I., *D. fl.*, St. h. 63.

10. *D. CILIATA* (Scopoli.) Gewimpertes II. — Schaft 2-3 blättrig; B. etwas lederig, kahl, am Rande knorpelig - gezähnt, und borstig gewimpert, die der Rosetten verkehrteyf., kurz - zugespitzt, die am Schaft länglich; Schöt. lineal., nebst den Bthstielen und dem Schaft ganz kahl. 4. An steinigten, felsigen O., Abhängen (Krain auf der Nord- und Ostseite des Berges Nanas, zwischen Prewald und der Hieronymus - Kapelle hat sie sich verloren, auf der Einsattelung des M. maggiore, Tommasini.) Mai. Jun. St. h. 60. *D. androsacea* Willd. *D. fladnizensis* DC.? Hinsichtlich der Gattung ist diese Pflanze noch zweifelhaft, und nach der reifen Frucht genauer zu bestimmen; bei den unreifen ist die Schöt. lineal, die Samen scheinen 1 reihig, und die Klappen sind mit einem starken Rückennerven versehen; deswegen möchte sie zu der Gattung *Arabis* zu bringen sein. **D.**

III. Rotte. **HOLARGES.** DC. syst. 2. 348. W. 1fach, jährlich oder wenigstens nicht von langer Dauer. Die unfruchtbaren Blätterbüschel fehlen, oder sind in geringer Zahl vorhanden. St. beblättert, an stämmigeren Exempl. ästig. Bth. weiss oder gelblich, mit ganzen oder ausgerandeten Blb.

11. *D. MURALIS* (L.) Mauer - II. — St. beblättert; StB. eyf., stengelumfassend; Bthstielen. wagerecht - abstehend, noch einmal so lang, als das kahle Schötch.; W. einfach. ☉. Auf steinigem Boden der Gebirge und mit Gebüsch bewachsener Abhänge, an beschatteten Mauern, (im Rheingebiete von Basel bis nach den Niederlanden, zwar gesellschaftl., aber doch stellenw. und oft in weiten Entfernungen; eben so in Thüring., Schles., Böhm. und Mähr.) Mai. Jun. St. h. 6. *D. nemorosa* Allion. Bth. weiss. — Die in Ungarn vorkommende *D. nemoralis* Ehrh. unterscheidet sich dch gelbliche Bth. und dch Blüthenstielen, welche vielmal länger als die flaumh. Schötchen sind.

12. *D. INCANA* (L.) Graues II. — *St. vielblättrig*; B. ganzrandig oder gezähnt, die wurzelst. dicht-rosettig, lanzettl., die obern stengelst. eyf: *Blb. mehr als noch einmal so lang, als der K.*; Schötch. länger als das Stielch., *schief* gedrehet, kahl od. flaumig. 4. Auf rauhen, steinigen Orten, (Schwz am Fusse des Ganterisch in der Gegend von Rügisberg, Albula in Graubünden.) Mai. Jun. Kommt vor: *a. legitima* Lindbl. mit kahlen Schötchen. Rchb. ic. 8. f. 1028-32. St. h. 60. *D. contorta* Ehrh. beitr. Dauert wegen vorhandener nicht blühender Wurzelrosetten oft mehrere Jahre. Bth. weiss.

β. hebecarpa mit flaumigen Schötch.: *D. confusa* Ehrh. beitr.

13. *D. THOMASH* (Koch.) Thoms's - II. — *St. vielblättrig*; B. ganzrandig oder gezähnt, die wurzelst. rosettig, lanzettl., die obern stengelst. längl. - lanzettl.: *Blb. anderthalbmal so lang, als d. K.*; Schötch. länger als das Bthstielch., *flach*, flaumh. ☉. Auf rauhen Stellen, (im Schlehergeb. des südl. Tyrols; in St. Nicolai- und Saastale im Cant. Wallis.) Mai Jun. *D. confusa*, *D. fl.*, St. h. 60. Rb. ic. 8. f. 1033. DC. syst. nicht Ehrh. Bth. weiss. St. oft von der W. an ästig; nicht blühende Wurzelrosetten fehlend, Flaum kürzer, Bth. um die Hälfte kleiner, als bei der vorhergehenden.

IV. Rotte. *EROPHILA* DC. W. einfach, jährig. WB. rosettig. Schäfte nackt. Blb. weiss, halbzweispaltig.

14. *D. VERA* (L.) Frühes II. — Schäfte blattlos, oberhalb nebst den Bthstielch. kahl; WB. lanzettl., spitz, nach der Basis verschmälert; Schötch. lanzettl. - längl. oder rundl., kürzer als die Bthstielch.; Gf. sehr kurz; *Platte der Blb. halbzeisp.* ☉. An offenen Orten, sowohl auf cultiv. als uncultiv. Boden, überall. März. Apr. *Erophila vulgaris* DC. Var.:

β. Schötch. rundlich: *Draba spathulata* Lang, Hopp. in St. h. 60. *Erophila praecox* Rb. fl. exc., auch Stev.? Die von H. Lang benannte Pflanze hat lange Bthstielch., wie gewöhnlich, die Stevenische nach DC. Beschreibung hat dieselben nur so lang, als die Schötch. — *Erophila americana* DC. ist eine Form mit lanzettl. Schötchen, auch bei uns nicht selten; ich verglich Exempl. aus Amerika. Gf. meist sehr kurz, oft fehlend, u. d. N. sitzend.

28. *COCHLEARIA* (L. gen. 803.) Löffelkraut. — Schötch. im Umriss rundlich oder elliptisch, dch. die sehr konvexen Klappen gedunsen oder kugelig; Gf. auf der Zwischenwand bleibend; Stbf. zahnlos. Keimb. aneinanderliegend, zuweilen schief. (Schötch. bald von der Seite, bald von dem Rücken ein wenig zsgedrückt.) Bth. sämmtl. Arten weiss.

I. Rotte. Schötchen mit einem mehr oder weniger vorspringenden Längsnerv auf den Klappen. S. fein-knötig rauh. Stbf. nicht winkelig gebrochen.

I. C. *OFFICINALIS* (L.) Gebräuchliches L. — Die WB. *gestielt, breit-eyf.*, dch. einen seichten Ausschnitt *etwas herzf.*, die stengelst. eyf., gezähnt, *die obern mit tief-herzf. Basis umfassend.*

☉. Am Meeresufer und an Salzquellen. (Secküste der Nord- und Ostsee; im Binnenlande: Soden bei Frankf. a. M.; Aachen; Dissen in Westph.; Hohenstein und Velden im Baireuthischen; Klevers in Oberschwaben, Burghausen in Oberbayern; mehrere O. im Würtemb.; Basel und Bex in der Schw.; Moosbrunn bei Wien.) Mai. Jun. Fl. dan. t. 135. Schötch. kugelig, von der Seite etwas zusammengedrückt. Var. wie alle mit grösseren und kleineren Bth. und

β. Schötch. elliptisch, noch einmal so lang, als breit, Bthstielch. so lang, als das Schötch., oder etwas länger.

2. C. PYRENAICA (DC.) WB. gestielt, fast alle nierenf. und quer breiter, doch eine tiefe Bucht herzf., die stengelst. wenige, gezähnt, das oberste sitzend. ☉ (In feuchten O. auf der grünen Au bei Marienzell in Steyermark.) Jun. C. groenlandica Host. a., nicht Linn. Der C. officinalis sehr ähnlich, und nur verschieden doch beinahe lauter nierenf. B. Die Schötchen sind nicht verschieden, auch an den Exempl. aus den Pyrenäen, welche mit den aus Steyermark vollkommen übereinstimmen. Nolte hält sie für eine Variet. der C. officinalis. Seine Untersuchungen lehrten ausserdem, dass die C. groenlandica zusammengesetzt ist aus kleinen Exempl. der C. officinalis und aus kleinen, ganzrandigen der C. danica, wozu auch die C. danica β. integrifolia DC. syst. gehört.

3. C. DANICA (L.) Dänisches L. — B. sämmtl. gestielt, die wurzelst. herzf., die stengelst. 3 oder 5 lappig, die obere ey-spiesf., in den kurzen Bstiel zugeschweift. ☉. Am Seestrande, (Holstein und Oldenburg.) Mai. Jun. Fl. d. t. 100.

4. C. ANGLICA (L.) Englisches L. — WB. gestielt, eyf.-länglich, oder eyf., an der Basis abgerundet, oder in den Bstiel vorgezogen, die stengelst. länglich, gezähnt und ganzrandig, die obere mit tief-herzf. Basis stengelumfassend. ☉. Am Seestrande, (Bremen, Holstein, Mecklenbg.) Mai-Jun. Unterscheidet sich von C. officinalis: B. an der Basis abgerundet, oder in den Bstiel vorgezogen, Schötch. mehr, als noch 1 mal so gross.

II. Rotte. Schötchen mit einem Nerv an der Basis der Klappen; S. glatt. Die längeren Stbf. in der Mitte rechtwinkelig gebrochen. Kerner a Medicus.

5. C. SAXATILIS (Lamarck. enc. 2. p. 165.) Felsen-II. — WB. in den Bstiel verschmälert, längl., stumpf, ganzrandig oder gezähnt, etwas rauh von angedrückten Härchen, StB. lineal-längl., ganzrandig; Tr. deckblattlos; längere Stbf. in der Mitte rechtwinkelig gebrochen. 4. Steinige und felsige A.Gegenden; mit den Flüssen in die A.Thäler herabsteigend. Jun. Aug. Myagrum saxatile L. sp., Jacq. a. t. 128. Kerner a saxatilis Rehb. in Moesl. hdb., Koch D. fl. und Synops. ed. 1. Kerner a myagroides Medicus; Alyssum alpinum Scop. carn., A. myagroides All. ped., A. rupestre Willd. en. h. berol. Camelina saxatilis Pers. syn. Var.:

β. auriculata. StB. an der Basis geöhret: C. auriculata Lam. enc. Myagrum alpinum Lap. abr., Myagrum auriculatum DC. fl.

fr. suppl. *Kernera auriculata* Rchb. l. c. Die Varietäten α und β sah ich auf einer und derselben Wurzel.

III Rotte. Schötchen ohne Nerv auf den Klappen. S. anfänglich mit kleinen Spitzchen besetzt, später fein-knötig-rauh. Stbf. nicht gebrochen. Tr. mit DeckB. *Rhizobotrya* Tausch.

6. *C. BREVICAULIS* (Facchini in Briefen.) Kurzstieliges L. — B. in den Bstiel verschmälert, längl., stumpf, ganzrandig, oder beiderseits 1-2 zahnig, etwas rauh von angedrückten Härchen; Tr. deckblättrig; Stbf. nicht gebrochen. 4. Steinige O., (Alpe Neva seconda in Primiero und Alpe Camerloi in Fassa im südl. Tyrol, Facchini.) Jul. Aug. *Rhizobotrya alpina* Tausch. Facchini nannte die Pflanze *brevicaulis*, weil ein beblätterter St. vorhanden ist und die Tr. nicht unmittelbar auf der W. aufsitzt.

IV. Rotte. Schötchen ohne Nerv auf den Klappen. S. glatt. Stbf. nicht gebrochen. Tr. ohne DeckB. *Armoracia* Fl. d. wett.

7. *C. ARMORACIA*, (L. spec. 904.) Meerrettig L. — WB. längl., herzf., oder eyf.-längl., gekerbt, die unteren StB. kümmtig-fiedersp., die oberen eyf.-lanzettl., gekerbt-gesägt, die obersten lineal., fast ganzrandig. 4. An Flussufern und feuchten Hecken, (vielleicht an den meisten O. blos verwildert.) Jun. Jul. Schk. t. 181. *C. rusticana* Lam. fl. fr. *Armoracia rusticana* Fl. d. wett., Koch D. fl. und Synops. ed. I. *Raphanis magna* Moench. meth.

V. Gruppe. *CAMELINEEN*, oder Breitwandige, rückenwurzelige.

31. *CAMELINA* (Crantz, DC.) Leindotter. — Schötch. gedunsen, birnf. oder keilf.: Klappen sehr konvex, an der Spitze in einen lineal., an den Gf. unterwärts angepassten Fortsatz gezogen; die Scheidewand nach abgeworfenen Klappen ohne Gf., der nun an dem Fortsatze der einen Klappe hängt. KeimB. aufeinanderliegend.

1. *C. SATIVA* (Crantz.) Gebaueter L. — Schötch. birnf.; die mittleren StB. längl.-lanzettl., ganzrandig oder gezähnt, an der Basis pfeilf. ☉. Auf Feldern, Aeckern, sandigen O. Jun. Jul. St. h. 4. *Myagrum sativum* L. Var.:

α . *pilosa* DC. behaart: *C. silvestris* Fries. Diese Variet. ist, wenn die Schötch. um die Hälfte kleiner sind: *C. sylvestris* Wallr. Durch den Anbau geht diese Pflanze über in die Variet. β . Fries novit. mant. I. p. 13. Es finden sich auf ein und demselben Felde untereinander Exempl. mit grösseren und um die Hälfte kleineren Schötchen. Die *C. microcarpa* Andr. bei Bess. en. pl. vollh., DC. syst., hat mehr birnf. Schötchen und scheint dadurch ein wenig abzuweichen nach einem von Besser empfangenen Expl.; an diesem ist übrigens der Klappennerv wie bei den übrigen Varietäten.

β . *subglabra*, fast kahl: *C. sativa* β . *glabrata* DC. *C. sativa* var. β . Fries.

2. *C. DENTATA* (Pers.) Gezählter L. — Schötlch. birnf.; die mittlern StB. lineal.-länglich, *buchtig-gezöhnt* oder *fiedersp.*, *hinten verschmälert*, aber an der pfeiff. Basis wiederum verbreitert. ☉. Auf Aeckern unter dem Lein. Jun. Jul. *C. pinnatifida* Hornem. *Myagrum pinnatifidum* Ehrh. *M. dentatum* Willd. *M. Bauhini* Gmel. *M. sativum* γ. L. Samen noch 1mal so gross, als bei dem vorhergehenden.

VI. Gruppe. *SUBULARIEEN*, oder Breitwandige, einge-
knickt-keimblättrige. KeimB. in der Mitte zurückgeschlagen oder 2schenkelig; sie erheben sich nämlich in der Richtung des Würzelchens, wie bei dem geraden Keim, dann aber schlagen sie sich gegen das Würzelch. zurück, während einer auf dem andern liegt.

32. *SUBULARIA* (L.) Pfriemenkresse. — Schötlch. oval-länglich, gedunsen, von der Seite etwas zsgedrückt; Klappen in der Mitte in einen stumpfen Kiel gefaltet, nervenlos; Fächer mehreyig. KeimB. lineal., in der Mitte zurückgeschlagen.

1. *S. AQUATICA* (L.) Sumpf-P. — ☉. In Fischteichen unter dem Wasser und im Sommer bei vertrocknetem Wasser am Rande der Fischteiche, (in Holstein, Wittenberg, Braunsch., im Bischoffsweyer bei Erlangen.) Jun. Jul. Unter dem Wasser blüht sie heimlich mit geschlossenen Bth., ausser dem Wasser entfalten sich die kleinen weissen Blb. D.

III. Unterordng. *ANGUSTISEPTEN*, SCHMALWANDIGE. Schötlch. 2klappig, aufspringend, von der Seite zsgedrückt, Klappen kahnf., auf dem Rücken gekielt oder geflügelt. Scheidewand schmal, lineal. oder lanzettl., an beiden Enden verschmälert.

VII. Gruppe. *THLASPIDEEN*, oder Schmalwandige, seitenwurzelige.

33. *THLASPI* (L.) Täschelkrant. — Schötlch. von der Seite her zsgedrückt, oval oder verkehrt-eyf., neben dem Gf. mehr od. weniger ausgerandet; Fächer 2- mehreyig; Klappen kahnf., auf dem Rücken geflügelt. Stbf. zahlos. Blb. gleich. oder wenig ungleich. KeimB. aneinanderliegend. — Bth. aller Arten, mit Ausnahme der beiden letzten, weiss.

1. *T. ARVENSE* (L.) Feld-T. — Die fruchtrag. Tr. verlängert; StB. länglich, mit pfeiff. Basis sitzend; Fächer des Fruchtknotens vieleiyg; St. oberwärts ästig; *S. bogig-runzelig*. ☉. Auf cultiv. Lande an Wegen, Schutthaufen. Mai-Herbst. Fl. dan. 793. N. fast sitzend.

2. *T. ALLIACEUM* (L.) Knoblauchduftendes T. — Die fruchtrag. Tr. verlängert; StB. länglich, mit pfeiff. Basis sitzend; Fächer des Fruchtkn. vieleiyg; St. oberwärts ästig; *S. grübig-netzig*. ☉. Auf Aeckern, (bei Berchtesgaden im Salzburg.; im östreich. Friaul; in Holstein; um Aachen.) Mai. Jun. J. ic. rar. t. 121. St. h. 65. N. fast sitzend. D.

3. *T. PERFOLIATUM* (L.) Durchwachsenes T. — Die fruchttrag. Tr. verlängert; StB. herzf., sitzend; *Fächer* des Fruchtkn. 4 eyig; *St. ästig*; S. glatt. ☉. Auf Aeckern, a. Kalk- und Lettenboden. April, Mai. St. h. 63. — Kleine Exempl. sind: *T. alpestre* Gmel. — N. fast sitzend.

4. *T. ALPESTRE* (L.) Felsen-T. — Die fruchttrag. Tr. verlängert; StB. eyf. - herzf., sitzend; *W. vielköpfig*; Stämmchen kurz, rasenartig zsgedrängt; St. einfach; Fruchtkn. 8 - 16 eyig; Schötch. 3 kantig-verkehrtherzf., nach der Basis verschmälert; *der Flügel der Klappen vorne so breit, als die Höhle des Faches*; *Gf. so lang als die Bucht der Ausrandung*; S. glatt. 4. An gebirgigen, steinigen, buschigen O., in Felsenspalten, (im Jura, Wallis, Oberelsass; in der Rheinpfalz auf dem Donnersberge; in Nassau bei Herborn; bei Aachen; bei Leipzig, Halle; bei Dresden; in Böhm.) Apr. Mai. St. h. 62. *T. caerulescens* Presl. *T. montanum* Pollich Leers. *T. praecox* Fl. d. spa. *T. calaminare* und *alpestre* Comp. fl. belg. Stbk. zuerst gelb, bald purpurn, zuletzt schwarz. Stbg. meist so lang, als die Blb., seltner ein wenig kürzer.

5. *T. PRAECOX* (Wulfen.) Frühblühendes T. — Die fruchttrag. Tr. verlängert; StB. länglich - herzf., sitzend; *W. vielköpfig*, Stämmchen kurz, rasenartig zsgedrängt; St. einfach; Fruchtkn. 8 - 10 eyig; Schötch. verkehrtherzf., nach der Basis verschmälert; *der Flügel der Klappen vorne so breit, als die Höhle des Faches*; *Gf. hervorgestreckt, über die Lappen des Schötchens hinausragend*; S. glatt. 4. Auf Hügeln und gebirgigen O., auf Kalkboden, (im Littorale, von Friaul bis Fiume.) März. Apr. St. h. 65. *T. montanum* β . *praecox* DC. syst. *T. montanum* Scop. Die ganze Pflanze meergrün, K. purpurn. Gf. lang. D.

6. *T. MONTANUM* (L.) Berg-T. — Die fruchttrag. Tr. verlängert; StB. herzf., sitzend; *W. vielköpfig*, Stämmchen verlängert, ausläuferartig; St. einfach; *Fruchtkn. 4 eyig*; Schötch. rundlich-verkehrtherzf., an der Basis abgerundet. 4. An gebirgigen, felsigen, buschigen O. auf Kalkboden, (im Jura und mit dem Jurakalk dch Schwaben, Franken und das Baireuthische; in den Thüringischen Gebirgen; in Sachs., Böhm., Mähr. und Schles.; überall nur an einzelnen Stellen, aber daselbst gesellschaftl.) Apr. Mai. 4. St. h. 65. Gf. lang.

7. *T. ALPINUM* (Jacq.) Alpen-T. — Die fruchttrag. Tr. verlängert; StB. herzf., sitzend; *W. vielköpfig*, Stämmch. verlängert, ausläuferartig; St. einfach; Fruchtkn. 8 - 16 eyig; Schötch. länglich-verkehrtherzf., nach der Basis verschmälert; *der Flügel der Klappen halb so breit, als die Höhle des Faches*. 4. Auf A. Weiden, (des C. Wallis und in Kärnthen, Steyermark und Oestr.) Apr. Mai, auf den höhern A. später. St. h. 65. gut, h. 51 weniger tren. *T. montanum* var. β . DC. *T. sylvium* Gaud.; dies ist sicherlich nicht verschieden. *T. alpinum* Schleich., nach Exemplaren von ihm selbst.

8. *T. ROTUNDFOLIUM* (Gaud.) Rundblättriges T. — Die fruchttrag. Tr. doldenf., verkürzt; die obern StB. sitzend, an der

Basis mit umfassenden Ohrchen; W. vielköpfig; St. einfach; Fruchtkn. sechseyig; Schötch. länglich-verkehrteyf., sehr stumpf oder seicht ausgerandet, der Randflügel schmal. 4. Zw. dem losen Gestein und im Kiese der höchsten KalkA., vorzüglich an den Gletschern, (Schwz. u. dreh d. g. AK.) Jul. Aug. *Iberis rotundifolia* Moench., Rh. Griffel gerade hervorgestreckt, lang. Bth. hellviolett, sehr selten weiss. Die Schötchen an meinen Expl. 6eyig und oft 6samig. Var.:

β. corymbosum, Gaud. helv., Ohrchen der Basis zugespitzt, Bth. dunkel-violett; Gf. länger. *Hutchinsia corymbosa* Gay in bot. ztg. Diese auf den höchsten Walliser A. (Refel und Flühe bei Zermatten.)

9. *T. CEPEAEFOLIUM* (Koch.) Fettblättriges T. — *Die fruchttrag. Tr. doldenf., verkürzt*; die obere StB. sitzend, an der Basis öhrchenlos; W. vielköpfig; St. einfach; Fruchtkn. 8-12eyig; Schötch. länglich-verkehrteyf., gestutzt, seicht ausgerandet, der Randflügel schmal. 4. Auf den A., (bisher blos in Kärnthen im Rabelthal an den Galmeigruben unter der Vitriolwand.) Anfangs Mai, gleich nach dem ersten Schmelzen des Schnees. *Iberis cepeae-folia* Wulf. in Jacq. misc. p. 2 t. 28., DC. *Nocca cepeae-folia* Rh.? (die B. nämlich werden spitz-öhrig genannt.) Bth. hellviolett. D.

34. *TEESDALIA* (R. Brown.) Teesdalie. — Schötch. von der Seite zsgedrückt, rundlich oder oval; Fächer 2eyig; Klappen kahnf., auf dem Rücken flügelig-gekielt. Die längern Stbf. an der Basis mit einem blumenblattartigen Anhängsel. KeimB. aneinanderliegend. — Bth. weiss.

1. *T. NUDICAULIS* (R. Brown.) Nacktstengelige T. — Blb. ungleich. O. Auf Aeckern und Feldern, und auf den unfruchtbaren O. der Wälder und Haiden, auf Sandboden. Apr. Mai und die Neben-St. bis in den Sommer. *Teesdalia Iberis* DC. *Iberis nudicaulis* L. St. h. II. *Guepinia nudicaulis* Bast. *Lepidium scapiferum* Wallr. Die mit Neben-St. versehene Pflanze befindet sich in einem mehrentwickelten Zustande und ist keine Variet.

35. *IBERIS* (L.) Bauernsenf. — Schötch. von der Seite her zsgedrückt, oval oder verkehrteyf.; Fächer 1samig; Klappen kahnf., auf dem Rücken flügelig-gekielt. Stbf. zahnlos. Blb. sehr ungleich, die der äussern Bth. strahlend. KeimB. aneinanderliegend.

1. *I. SAXATILIS* (L.) Felsen-B. — *Strauchig*; B. zersrent, lineal., ganzrandig, nach der Basis schmaler, etwas fleischig, spitz oder stachelspitzig, die untern stumpf; die fruchttrag. Sträusse etwas traubig; Schötch. oval, gestutzt-ausgerandet; *Lappen stumpf*. 2. An felsigen O., in Felsenspalten, (bisher blos auf dem, im Canton Solothurn gelegnen Theile des Juragebirges, aber daselbst in Menge.) Jun. Gaud. Column. ceph. t. 277. f. 1. Bth. weiss. S.

2. *I. UMBELLATA* (L.) Doldentragender B. — Krantig; B. lanzettl., zugespitzt, ganzrandig, die untern schwach-gezähnt; Frucht-Tr. eyf.; d. Schötchen mit den aufrechten Bthstielen dicht auf-

einanderliegend; Schötch. doldig-gehäuft, oval, 2 sp.; *Lappen* eyf., in eine pfriemliche Spitze *zugeschweift*, so lang, als das *Fach*, gerade-hervorgestreckt. ☉. An uncultiv., felsigen O., (bisher bloß im östr. Littorale; in der Schw. zweifelhaft.) Jun. Bth. fleischfarbig.

3. I. INTERMEDIA (Guersent im bull. philom. n. 82. t. 21.) Spreitzender B. — Krautig; B. des ersten Jahres lanzettl., beiderseits 1-2 zählig, des zweiten Jahres lineal.-lanzettl., spitz, ganzrandig; FruchtTr. längl.; *Schötchen mit dem Bstielchen abstehend*, ausgerandet-2 lappig, *Lappen zugespitzt, viel kürzer, als das Fach*, geradehervorgestreckt. ☉. An gebirgigen O., (bei Boppard am Rheine und im östreich. Littorale.) Jun. Jul. I. amara Scop. Bth. weiss; Aeste spreitzend, wie bei der I. linifolia, welche sich dch Schötch., die in einen kurzen, doldenf. Strauss zsgedrängt sind, dch spreitzende Lappen derselben und schmalere B. unterscheidet. D.

4. I. AMARA (L.) Bitterer B. — Krautig; B. länglich, stumpf, in einen Bstiel keilig-verschmälert, vorne *beiderseits 2-3 zählig*, Zähne eyf., stumpf; Schötch. traubig, fast kreisrund, mit einer Kerbe ausgerandet, *Lappen 3 eckig, spitz, geradehervorgestreckt*. ☉. Auf Aeckern und Brachfeldern, auf Kalkboden, (in der südl. Schw., sodann von Basel dch das Rheinthale bis Bingen; bei Spa; im Mainthale von Würzburg bis Wertheim; Moselthal, Trier; in Thüring. bei Halle; in Krain und im Littorale.) Jun.-Herbst. Bth. milchweiss. Var: Bth. grösser und kleiner, die fruchttrag. Tr. länger und kürzer, und

β. kleiner, B. schmaler, K. violett und die Blb. in das Violette spielend, und St. purpurn: I. ruficaulis Lej. I. amara β. comp. fl. belg. Kommt unter der gemeinen Pflanze vor.

5. I. PINNATA (L.) Gefiederter B. — Krautig; StB. lineal., stumpf; Schötch. doldig-gehäuft, oval, vorne mit einer breiten Bucht gestutzt, *Lappen 3 eckig, spitz, spreitzend*. ☉. An felsigen kalkigen O., (bei Triest und Wien; für die Schw. etwas zweifelhaft.) Jun. Jul.

36. BISCUTELLA (L.) Brillenschote. — Schötchen von der Seite her flach-zsgedrückt, an der Basis und Spitze ausgerandet, oder an der Spitze in den Gf. zugespitzt, 2 fächerig: Fächer 1 samig; Klappen kreisrund, 2 Schilde darstellend, die sich zwar von der Scheidewand trennen, aber den Samen eingeschlossen halten. Keimb. aneinanderliegend. — Bth. gelb.

1. B. MISPIDA (DC.) Steifh. B. — K. 2 spornig, *Sporne walzlich*; Schötch. an der Basis und Spitze ausgerandet; St. steifh. ☉. An sonnigen O., (bisher bloß auf der Insel Veglia.) Jun. Jul. J.

2. B. LAEVIGATA (L.) Gemeine B. — K. an der Basis spornlos; Schötch. an der Basis und Spitze ausgerandet; WB. länglich in den Bstiel verschmälert, gezähnt und ganzrandig, StB. länglich, mit abgerundeter, halbstengelumfassender Basis sitzend, die obern

lineal. 4. Ueberall in den VorA. u. A. bis z. ewigen Schnee hinauf, auch auf d. niedrigeren Bergen u. Ebenen, (dch d. g. AK. u. in d. Flächen um Strasbg. v. Oberschwaben, Oberbayern bis nach Oestr.; in den Gebirgen bei Creuznach an der Nahe, Ahrthal, in Thüring. bis Magdebg. Sachs., Schles., Mähr. u. Böhme.) Jul. Aug. J. a. t. 339. *B. alpestris* W. K. *B. ambigua* Wallr. Var.: WB. breiter, fast verkehrteyf., u. lineal.-länglich, ganzrandig, gezähnt, buchtig-gezähnt, mit schwächeren u. stärkeren Borstchen bestreut, u. kahl. Die letzte Variet. ist:

β. *glabra*, die kahle: *B. laevigata* β. *glabra* Gaud., u. *B. lucida* DC., wenn die *B.* glänzend sind. Var. ferner:

γ. *scabra*, die rauhe; Früchte von feinen Knötchen rau: *B. saxatilis* Schleich., DC., Rb. ic. f. 810. *B. longifolia* Vill. *B. subspatulata* Sut. *B. didyma* Scop.

δ. *macrocarpa*, die grossfrüchtige; Früchte noch 1mal so gross, glatt od. rauh.

ε. *hispidissima*, die steifhaarige: *B.* v. stärkeren Borstchen steif: *B. ambigua* DC., Rb. ic. f. 839. (Die grob-gezähnten *B.* u. deutlicheren Oehrchen an der Basis d. StB. werden an der gewöhnlichen Form nicht selten auch gefunden.)

Die Schötch. der gewöhnlichen Pflanze, ob sie gleich breiter sind, als lang, kommen gegen die Basis doch auch verschmälert vor: *B. obcordata*. Rb. ic. f. 836.

VII. Gruppe. *LEPIDINEEN*, oder Schmalwandige, rückenwurzelige.

37. *LEPIDIUM* (L.) Kresse. — Schötch. von der Seite her zsgedrückt, länglich, rundl. od. eyf.; Fächer 1samig; Klappen kahnf., auf d. Rücken gekielt, od. geflügelt. Stbf. zahlos. Blb. gleich. KeimB. aufeinanderliegend, flach. Bth. weiss.

I. Rotte. *CARDARIA*. Schötch. eyf.-herzf., Klappen etwas gedunsen, Gf. fadenf.

1. *L. DRABA* (L.) Stielumfassende K. — Schötch. herzf., flügellos, dch die aufgedunsenen Klappen fast 2knötig; Gf. so lang, als die Scheidewand: *B.* länglich, geschweift-gezähnt, die wurzelt. in d. Bstiel verschmälert, die stengelst. mit Pfeilf. Basis stengelumfassend. 4. Auf Weiden, an Wegen, Rainen, (Steyerm., Oestr. Mähr. u. Böhme., Schles., Sachs. bis Thüring.; auf der Rheinfläche im Unterelsass, u. v. Speyer bis Westphalen, bei Frankf.; überall blos an einzelnen Stellen, daselbst aber gesellschaftl.) Mai. Jun. St. h. 68. *Cochlearia Draba* L. J. a. t. 315. *Cardaria Draba* Desv. *Cardiolepis dentata* Wallr. *Draba ruderalis* Baumg.

II. Rotte. *CARDAMOM*. Schötch. fast kreisrund. od. oval, ausgerandet. Gf. fast fehlend. KeimB. 3th.

2. *L. SATIVUM* (L.) Garten-K. — Schötch. rundlich-oval, geflügelt, stumpf, ausgerandet, an die Spindel angeedrückt; die intern *B.* gestielt, unregelmässig-eingeschnitten, gelappt, gefiedert od. doppeltgefiedert, die obern sitzend, lineal., ungeth., ☉. Wird

zu Salat cultivirt, u. kommt hie u. da auf Schutthaufen vor. Jun. Jul. Var.:

β. crispum; B. am Rande kraus; L. sativum *β. crispum* L. St. h. 9.

γ. latifolium; Lappen der B. breiter, oder die untern B. ganz; L. sativum latifolium DC. C. Bauh. prod. p. 104. Abbild. Cultiv.

III. Rotte. LEPID. Schöteh. oval od. fast kreisrund, geflügelt, ausgerandet; Gf. deutlich. Habitus eines Thlaspi.

3. L. CAMPESTRE (R. Brown.) Feld-K. — *Schöteh. blätterig-punktirt*, eyf., von der Mitte an breit-geflügelt, am Ende abgerundet u. ausgerandet; B. grau-flaunig, die wurzelst. länglich, in den Bstiel verschmälert, an d. Basis buchtig-zählig, die stengelst. gezähnel, an der Basis pfeiff., stengelumfassend. ☉. Auf Brachfeldern, an cultiv. O., auf Kalk- u. Lettenboden. Jun. Jul. Rchb. ic. f. 4214. Thlaspi campestre L. Iberis campestris Wallr.

IV. Rotte. DILEPTUM. Schöteh. oval oder rundlich, ausgerandet, an der Spitze schmal geflügelt; KeimB. ganz; Gf. fast fehlend.

4. L. PERFOLIATUM (L.) Durchwachsene K. — *Schöteh. rundlich-elliptisch*, an der Spitze schmal-geflügelt, ausgerandet; die untern B. gestielt, gefiedert, Fieder vielsp., die obern sitzend, ungeth., tief herzf., stengelumfassend. ☉. Auf Wiesen, an Acker- u. Wegrändern, (bisher blos in Unteröstr.) Mai. Jun. J. a. t. 346. St. h. 68. D.

5. L. RUDERALE (L.) Stink-K. — *Schöteh. abstehend, rundlich-oval, stumpf*, an der Spitze schmal-geflügelt, ausgerandet; die untern B. gestielt, gefiedert und doppeltgefiedert, die obern sitzend, lineal., ungeth.; Bth. 2männig, blumenblattlos. ☉. An Wegen, Mauern, um Dörfer u. auf öden Strassen, (in der Schw. u. in allen D. Provinzen hin und wieder.) Jun.-Aug. St. h. 68. Nasturtium ruderale Scop. Senkenbergia ruderalis Fl. wett.

V. Rotte. LEPIDIASTRUM Schöteh. eyf. od. rundlich, kaum ausgerandet, flügellos; KeimB. ganz; Gf. fast fehlend.

6. L. GRAMINIFOLIUM (L.) Grasblättrige K. — *Schöteh. eyf., spitz*, mit einem kurzen Gf. bekrönt; WB. länglich od. spatelig, in den Bstiel verschmälert, gesägt, od. an d. Basis fiedersp., die obern stengelst., lineal., ungeth. ☉. Auf uncultiv. Hügeln, an Mauern, Wegen, (Rheinfläche u. dch die Gebirge der Nahe und Mosel bis nach den Niederlanden; u. dch Oberhessen nach Westphalen; Littorale; im südl. Tyrol; u. d. C. Wallis.) Jun. Herbst. St. h. 68. Lep. graminifolium L. L. Iberis Pollich., DC. Beständig sah ich 6 vollkommne Stbg., bei L. Iberis L. sind die Bth. 2männig. — L. Pollichii Roth. L. incisum Roth., kommt nicht in D., sondern in Sibirien u. am Caucasus vor.

7. L. LATIFOLIUM (L.) Breitblättrige K. — *Schöteh. rundlich*, seicht-ausgerandet, laumh.; B. ungeth., gekerbt-gesägt, die wurzelst. eyf., stumpf, langgestielt, die obern aus einer eyf. Basis lauzettl. 4. Auf d. A., am Seestrande u. an d. Salinen, (im C. Waad

auf d. Prapioz, Panerossaz; C. Freiburg: Hohenegen bei Engen in Oberschwaben; u. hin u. wieder auf den Ebenen, am Seestrande von Holstein u. Meklenbg, u. an den Salinen von Soden). Jun. Jul

38. HUTCHINSIA (R. Brown.) Hutchinsie. — Schötch. von der Seite her zsgedrückt, länglich od. rundlich, ganz od. etwas ausgerandet; Fächer zweisamig; Klappen kahnf., auf dem Rücken flügellos. Stbf. zahnlos. KeimB. aufeinanderliegend, flach, (bei der H. petraea ist der Keim schräg-seitenwurzelig.) Bth. weiss.

1. H. ALPINA (R. Brown.) Alpen-H. — B. gefiedert; *St. einfach, nackt; Frucht Tr. lang, locker*; Blb. noch 1mal so lang, als d. K.; Schötch. länglich, an beiden Enden spitz, mit einem kurzen Gf. endigend. 2. An kiesigen feuchten O. u. an d. Bächen der A., auf Kalkboden: mit d. Flüssen in die Ebenen herabsteigend; (deh d. g. AK.) Apr. Mai, auf höheren Bergen Jul. Aug. *Lepidium alpinum* L. J. a. t. 137. St. h. 20. L. Halleri Crantz. *Nocca alpina* Rb.

2. H. BREVICAULIS (Hoppe bei St. h. 65.) Kurzstengelige H. — B. gefiedert; *St. einfach, nackt; Frucht Tr. gedrungen, dolden-traubig*; Blb. noch 1mal so lang, als d. K.; Schötch. länglich-verkehrteyf., stumpf; N. sitzend. 2. An kiesigen, nassen O. und an Bächen der höhern GranitA., (in Kärnthen, Salzbg, Tyrol.) Jul. Aug. *Nocca brevicaulis* Rb. D.

3. H. PETRAEA (R. Brown.) Stein-H. — B. gefiedert; *St. ästig, beblüthert*; Blb. wenig länger, als der K.; Schötch. elliptisch, stumpf. ☉. Auf Felsen u. in deren Spalten, auf trocknen, sonnigen Hügeln, auf Kalkboden, (im Littorale, Oestr., Steyerm., Salzbg, Thüring., Oberelsass bei Ruffach, Rheinpfalz blos bei Callstadt, in der Schw. hin u. wieder.) Apr. Mai St. h. 65. *Lepidium petraeum* L. L. Linnaei Crantz. *Teesdalia petraea* Rb. *Capsella petraea* Fries herb. norm.

39. CAPSELLA (Medikus, DC.) Hirtentäschel. — Schötch. von der Seite her zsgedrückt, schief-3eckig, od. länglich, ganz od. mit einer seichten Bucht ausgerandet; Fächer vielsamig; Klappen kahnf., auf dem Rücken flügellos. Stbg. zahnlos. KeimB. aufeinanderliegend, flach. Bth. weiss.

× 1. C. BURSA PASTORIS (Mönch.) Gemeines H. — B. schrotsägenf.-fiedersp., Zpfl eyf.-3eckig, spitz, etwas gezähnt, die obern stengelst. ungeth.; *Schötch. 3eckig-verkehrterzf.* ☉. Auf Feldern, an cultiv. O., an Wegen überall. Blühet fast das ganze Jahr. St. h. 66. *Thlaspi Bursa pastoris* L. Var.:

α. *integrifolia*, (v. Schlechtend.) Bth. normal, B. ganz.

β. *sinuata*, Bth. normal, B. buchtig-gezähnt.

γ. *pinnatifida*. Bth. normal, B. fiedersp.

δ. *coranopifolia*, (DC.) B. fiedersp., Zpfl vorne eingeschnitten.

ε. *apetala*, Bth. blumenblattlos, 10männig, Blb. in Stbg. verwandelt; bisweilen ist ein u. das andere Blb. der Verwandlung nicht unterlegen.

2. *C. PROCUMBENS* (Fries.) Niederliegendes II. — B. tief-fiedersp., Zpfl ganzrandig, lanzettl., od. elliptisch, der endst. grösser, die obern stengelst. B. fast ganz; *Tr. verlängert*, reichblüthig; *Schötkh. oval*, länglich, stumpf od. etwas gestutzt. ☉. Auf nassen, salzhaltigen Triften, (an den Salinen von Frankenhausen, bei Bernburg u. Strassfurth, zw. Naumbg u. Anleben; in der Schw. im C. Freiburg.) Mai. *Capsella elliptica* Meyer. D. fl. 4. 522. St. h. 66. *Hutchinsia procumbens* Desv. *Lepidium procumbens* L. *Thlaspi procumbens* Wallr. *Noccaea procumbens* Rb. Var.:

α. *pinnata*; B. sämmtlich gefiedert.

β. *heterophylla*; die untern B. gefiedert, die obern lanzettl., ganzrandig od. etwas gezähnt.

γ. *integrifolia*; B. sämmtl. ungeth., od. die untern mit einem einzigen vorspringenden Zahne od. mit 2 versehen. Variet. γ. *integrifolia* DC. C. *elliptica* var. *integrifolia* St. h. 66.

3. *C. PAUCIFLORA* (Koch.) Armblüthiges II. — B. ganzrandig, länglich, in d. Bstiel verschmälert, die untern 3sp.-etwas leierf., die obersten lanzettl.; *Tr. 3-4blüthig, fast doldig*; *Schötkh. rundlich*, stumpf od. etwas gestutzt. ☉. In der Nähe der A. (Voralpen) (Am Udai im Fassathal des südl. Tyrols.) St. h. 66. Der Variet. *integrifolia* der vorhergehenden Art ähnlich, aber dch folg. verschieden: *Tr. kurz*, nur 3-blüthig, fast doldig, Spindel viel dünner u. die Stielch. an d. Frucht länger, St. viel ästiger, Aeste gabelsp. u. von der Basis an mit, den B. gegenüber gestellten, Träubchen besetzt.

40. *AETHIONÉMA* (R. Brown.) Steintäschel. — *Schötkh.* von der Seite her zsgedrückt, oval od. rundlich: 2-mehrsamig; Klappen kahnl., auf dem Rücken geflügelt. Stbf. zahnlos. Blb. gleich od. wenig ungleich. KeimB. aufeinanderliegend, flach.

I. *A. SAXATILE* (R. Brown.) Gemeines St. — B. lineal.-länglich, sehr kurzgestielt, die untersten oval: die fruchtttrag. *Tr. verlängert*; Bthstielch. so lang, als die *Schötkh.* 4. An kiesigen u. steinigen O. d. KalkA. in d. Ebenen hinabsteigend, (südl. bis an das Adriatische Meer u. nach Südtyrol, in die südl. Schw.; östl. bis Wien; nördl. in die Ebenen mit den AWässern.) Mai. Jun. J. a. t. 236. *Thlaspi saxatile* L. *T. peregrinum* Scop. nach den angegeb. StandO. — *Thlaspi peregrinum* L., ist eine zweifelhafte Pflanze. — *Aethionema gracile* DC., bei dem Scopolis Thl. *peregrinum* zweifelnd angeführt wird, untersch. sich dch den Gf., der die Länge der Lappen des *Schötkh.* hat; ist wohl nur Variet.

IX. Gruppe. *BRACHYCARPEEN*, od. Schmalwandige, einknicktkeimblättrige.

41. *SENEBIERA* (Pers.) Senebiere. — *Schötkh.* von der Seite her zsgedrückt, an der Spitze ganz u. fast nierenf., od. an der Basis u. Spitze ausgerandet u. fast 2knötig, nicht aufspringend, 2fächerig; Fächer 1samig. KeimB. aufeinanderliegend, in der Mitte zurückgeknickt. (Bei der *Senebiera didyma* zerfällt das *Schötkh.* zwar in 2 Klappen, welche aber die Samen eingeschlossen behalten.

1. *S. CORONOPUS* (Poiret.) Kurztraubige S. — B. tief-fiedersp., Zpfl ganz, od. vorne eingeschnitten; Bthstielch. kürzer als die Bth.: *Schötlch.* fast nierenf., zsgedrückt, mit einem pyramidalisch. *Gf. gekrönt.* netzig-runzelig, am Rande fast strahlig-gestreift u. gezähnt. ☉. Auf Triften von niedrigem Grase, an Gräben u. etwas feuchten Wegen; (in d. ganzen Gebiete, aber nicht überall.) Jul. Aug. St. h. 68. *Cochlearia Coronopus* L. Schk. t. 181. *Coronopus Ruellii* All. *C. depressus* Moench. *C. vulgaris* Desf.

2. *S. DIDYMA* (Persoon.) Zweiknötige S. — B. tief-fiedersp., Zpfl ganz, od. vorne eingeschnitten; Bthstielch. länger, als die Bth.: *Schötlch.* 2knötig, zsgedrückt, an der Basis u. Spitze ausge randet; netzig-runzelig: *Gf. fehlend.* ☉. An Ufern u. cultiv. O., (am Ufer der Elbe bei Altona, Sternschanze bei Hamburg, u. auf gebautem Lande bei Bern: ohne Zweifel eingewandert.) Jul. Aug. *Senebiera pinnatifida* DC. *Lepidium didymum* L. St. h. 68. *Lep. anglicum* Huds. *Coronopus didymus* Smith. *C. pinnatus* Hornem.

IV. Unterordng. *NUCAMENTACEEN* DC. (NUSSARTIGE.) Schötlch. nicht aufspringend, durch Schwinden der Scheidewand manchmal 1fächerig.

X. Gruppe. *EUCLIDIEEN*, od. Nussartige, seitenwurzelige.

42. *EUCLIDIUM* (R. Brown.) Schnabelschötlchen. — Schötlch. fast kreisrund, in d. *Gf.* zugespitzt, nicht aufspringend, 2fächerig: Fächer 1samig. KeimB. aneinanderliegend.

1. *E. SYRIACUM* (R. Brown.) Syrisches Sch. — Schötlch. kurz-, rauh, *Gf.* kegelf.; StB. gestielt, lanzettl. ☉. An Wegen u. Acker-rändern, (bisher mit Sicherheit blos um Wien.) Mai. *Anastatica syriaca* L. J. a. t. 6. *Myagrum rostratum* Scop. *Bunias syriaca* Gärtn. *Ornithorhynchium syriacum* Röhl.

XI. Gruppe. *ISATIDEEN*, od. Nussartige, rückenwurzelige.

43. *ISATIS* (L.) Waid. — Schötlch. von der Seite her flach-zsgedrückt, nicht aufspringend, wegen d. durchbrochenen Scheidewand 1fächerig, 1samig. KeimB. aufeinanderliegend, etwas rinnig.

1. *I. TINCTORIA* (L.) Färber-W. — Schötlch. länglich, sehr stumpf, oder ausgerandet, nach der Basis verschmälert, ☉. Auf sonnigen Hügeln, felsigen Abhängen, auf Mauern, an Wegen, auf Kalk- u. Lettenboden, (in d. Rheingegend von Basel bis Neuwied, d. Main hinauf bis nach Würzburg; bei Regensburg; in Oestr., Steyermark: v. Hanover del Thüring. u. Sachsen u. Böhmen u. Mährl.; südl. Schw.) Mai. Jun. St. h. 3. Var.:

a. vulgaris; Schötlch. lineal-keilig, gestutzt od. ausgerandet.

β. campestris; Schötlch. lineal-keilig, an der Spitze abgerundet: *I. campestris* Stev. bei DC.

γ. praecox; Schötlch. oval od. verkehrtoval, vorne bald gestutzt, bald abgerundet, an der Basis manchmal gestutzt: *I. praecox* Kit. DC. Bei den aufgezählten Variet. sind die WB. oft rauhh., u.

der St. nebst den B. mit entfernten Haaren bestreut. *Isatis Villarsii* Gaud. helv. ist nach Briefen von Charpentier zweifelhaft, nach Griesebach in der bot. ztg. ist sie eine Variet. der *I. alpina* All. Ob sie aber in der Schw. wächst, ist noch nicht ermittelt.

41. **MYÁGRUM** (L.) Hohldotter. — Schötlch. verkehrtherzf., 2 knötig, nicht aufspringend, 3 fächerig: das untere Fach 1samig, die 2 obern nebeneinanderliegenden leer. KeimB. aufeinanderliegend, rinnig. (Diese Gattung hält, wegen der hinlänglich tief-rinnig-gebogenen KeimB., zwischen der Gruppe mit rückenwurzelligen u. rinniggefalteten KeimB. die Mitte.) — Bth. weiss.

I. **M. PERFOLIATUM** (L.) Pfeilblättriger H. — ☉. Unter den Saat., (Littorale: Moosbrunn bei Wien: im Württembergisch. bei Tübingen, Esslingen, Stuttgart, Ditzingen: auf der Rheinfläche bei Mainz, Heidelberg, aber sehr selten: Spa: in der Schw. bei Solothurn u. im unt. Wallis.) Mai, Jun. Schk. t. 178. *Myagrum littorale* Scop.

45. **NESLIA** (Desvauz.) Neslie. — Schötlch. fast kugelig, mit dem Gf. gekrönt, nicht aufspringend, 1fächerig, 1samig. KeimB. aufeinanderliegend, flach.

I. **N. PANICULATA** (Desv.) ☉. Unter d. Saat. u. auf Brachfeldern, auf Letten- u. Kalkboden (im ganzen Gebiet, aber nicht überall.) Jun. Jul. Fl. dan. 204. Bth. gelb. *Myagrum paniculatum* L. *Vogelia paniculata* Hornem. *V. sagittata* Medik., Fl. d. wett. *Alyssum paniculatum* Willd. *Rapistrum paniculatum* Gärtn. Wallr.

XII. Gruppe. **ZILLEEN**, od. Nussartige, rückenwurzelige mit rinniggefalteten KeimB.

46. **CALEPÍNA** (Desvauz.) Calepine. — Schötlch. eyf., gedunsen, an d. Spitze in einen kurzen, dicken Gf. zugespitzt, nicht aufspringend, 1fächerig, 1samig. KeimB. aufeinanderliegend, wellig-zsgekrümmt.

I. **C. CORVINI** (Desv.) Corvins C. — Auf Brachäckern u. Feldern, (am Unterrheine, auf dem ganzen Maientfeld zw. Mayen, Coblenz u. Andernach u. unweit Sinzing an der Ahr: in der Schw. nur bei Branson.) Mai, Jun. St. h. 68. *Laelia cochlearioides* Pers. *Crambe Corvini* All. *Myagrum rugosum* Vill. prosp. *M. erucaeifolium* Vill. Delph. *Cochlearia auriculata* Lam.

XIII. Gruppe. **BUNIADEEN**, oder Nussartige, rückenwurzelige mit eingerollten KeimB. KeimB. aufeinanderliegend, zirkelf.-eingerollt.

47. **BÚNIAS** (L.) Zackenschote. — Schötlch. gedunsen-eyf., stielrund od. 4kantig, nicht aufspringend, 2fächerig, mit übereinandergestellten Fächern: od. 4fächerig, mit paarweise übereinandergestellten Fächern. Fächer 1samig. KeimB. aufeinanderliegend, zirkelf. eingerollt. (Bth. gelb.)

I. Rotte. *ERUCAGO* Tournef. DC. Schötch. 4kantig, 4fächerig.

1. *B. ERUCAGO* (L.) Senfblättrige Z. — Schötch. 4kantig, Kanten *geflügelt*, gezähnt. ☉. Unter d. Saat, (Schw.: zw. Lausanne u. Vevay, bei Chexbres in Menge; im Wallis; im Littorale, in Oestr., Salzbg.) Jun. Jul. J. a. t. 340. *Erucago runcinata* Hornem. *E. glandulosa* Röhl. *Myagrum clavatum* Lam. *B. schrot-slägenf.*, varirt aber:

β. integrifolia; *B. ganz*: *B. aspera* Retz. *Erucago aspera* Hornem.

II. Rotte. *LAELIA* Adans. DC. Schötchen nicht kantig, 2fächerig.

2. *B. ORIENTALIS* (L.) Orientalische Z. — Schötch. schräg-eyf., *flügellos*. ☉. Auf trocknen Bergwiesen, an grasreichen O., (bei Lübeck u. Warnemünde; bei Limburg.) Jun. Jul. *Laelia orientalis* Desv., Rbch. ic. f. 4162. *Myagrum taraxacifolium* Lam.

V. Unterordng. *LOMENTACEEN* DC. (GLIEDERHÜLSIGE) Schot. od. Schötch. quer in Isamige Glieder sich trennend.

XIV. Gruppe. *CAKILINEEN* od. Gliederhülsige, seitenwurzelige.

48. *CÁKILE* (Tournef. DC.) Meersenf. — Schötch. 2schneidig, 2gliederig: Glieder nicht aufspringend, 1fächerig, 1samig; das untere verkehrteyf., das obere schwertf. od. eyf. KeimB. aneinanderliegend.

I. *C. MARITIMA* (Scop.) Gewöhnlicher M. — Das obere Glied des Schötch. schwertf. ☉. Am Seestrande, (an der Nord- u. Ostsee; am mittelländ. Meere.) Jul.-Oct. *C. Serapionis* Gärtn. *Bunias Cakile* L. Bth. hell-violett. Var.:

β. ganzblättrig; *B. länglich*, an der Basis verschmälert, unregelmässig-stumpf-gezähnt: *Cakile maritima β. sinuatifolia* DC. *C. aegyptiaca* Willd. *C. latifolia* Poir.

XV. Gruppe. *RAPHANEEN*, oder Gliederhülsige, rückenwurzelige mit rinniggefalteten KeimB.

49. *RAPÍSTRUM* (Boerhave. DC.) Repsdotter. — Schötch. 2gliederig: Glieder 1samig, nicht aufspringend; das untere stiel-förmig, das obere kugelig, in den Gf. zugespitzt. S. an einen kurzen Nabelstrang befestigt. KeimB. rinnig-gefaltet. — Bth. gelb.

1. *R. PERENNE* (All.) Mehrjähriger R. — Gf. kurz-kegelf., kürzer, als das obere Glied des Schötch.; *B. fiedersp.*, *Zpfl länglich*, winkelig-gezähnt. 4. Auf Aeckern, an Wegen. (Steyern. u. Mähr., Oestr. u. von da deh Böh., Sachs., Thüring. bis Barby.) Jun. Jul. J. a. 414. *R. diffusum* Crantz. *Myagrum perenne* L. D.

2. *R. RUGOSUM* (All.) Runzeliger R. — Gf. fädlich, so lang, od. länger, als das obere Glied des Schötch.; *B. leyerf.*, kurz-gezähnt, der Endzpfl sehr gross, eyf. ☉. Auf Aeckern u. Brachfeldern, (in der südl. Schw., auf der Rheinfläche von Basel bis

Mainz u. Bingen; im östr. Littorale). Jun. Jul. Rehb. ic. f. 4168. et 71. *Myagrum rugosum* L. *Cakile rugosa* P'Herit., Gaud.

50. CRÄMBE (L.) Meerkohl. — Schötch. 2 gliederig, in 2 nicht aufspringende, Isamige Glieder sich trennend: das untere Glied stiel förmig, unfruchtbar, das obere kugelig, Isamig, Samen an einem langen, fädlichen, aus dem Grunde des Faches aufstrebenden Nabelstrange hängend. KeimB. rinniggefaltet. Bth. weiss.

1. C. MARITIMA (L.) Gemeiner M. — Die längern Stbf. an der Spitze gabelig; Schötch. griffellos; B. rundlich, *buchtig, wellig, gezähnt, hechtblau* u. nebst dem St. kahl. 4. Am Seestrande, (Holstein, Mecklenb.) Mai. Jun. St. h. 18. D.

2. C. TATARIA (J. ic. rar. t. 119.) Russischer M. — Die längern Stbf. an der Spitze gabelig; Schötch. griffellos; die jüngern B. steifh., die ältern nebst dem St. fast kahl; WB. *doppeltzgesetzt, Fiederch. länglich*, gezähnt od. eingeschnitten. 4. An cultiv. O. u. auf Wiesen, (Mähren, um Hartau bei Aufsitz u. um Charlottenfeld im Brünnner Kr.) Apr. Mai. C. tatarica Willd. C. laciniata Lam. D.

51. RÁPHANUS. (B.) Rettig. — Schot. lineal., od. länglich od. fast kegelf., glatt u. nicht theilbar, od. perlschnurf., u. in Glieder querüber zerfallend, mehrsamig. KeimB. rinniggefaltet.

1. R. SATIVUS (L.) Garten-R. — Schot. *stielrund*, zugespitzt, kaum länger, als das Bthstielch. ☉. Wird in vielen Variet. gebaut. Mai. Jun. Bth. schwach-violett, Adern gesättigter. Cultiv.

2. R. RAPHANISTRUM (L.) Acker-R. — Schot. perlschnurf., *bei der Reife gerieft*, länger als der Gf.; B. einfach-leierf. ☉. Auf Aeckern überall. Jun. Jul. Schk. handb. t. 188. Rapistrum arvense All. Raphanistrum Lampsana Gärtn. R. innocuum Medik. R. arvense Wallr. Var.:

α. Bth. weiss, mit violetten Adern zierlich bemalt. R. arvense Rbch. fl. g. exsicc. sammt d. folgenden Variet.

β. Bth. gelblich-weiss, violett-aderig.

γ. Bth. schwefelgelb, mit gelben, u. nicht violetten, Adern bezeichnet. R. segetum Rbch. fl. g. exsicc. Diese letzte Variet. lässt sich v. Sinapis arvensis sogleich dch den aufrechten u. geschlossenen K. unterscheiden.

VII. Ordng. CAPPARIDEEN. Juss. gen. 242.

K. 4blättrig. Blkr 4blättrig. Stbg. *unterweibig*, 6 nicht 4mächtige; od. *zahlreich*. Fruchtkn. frei, Ifächerig, oft auf einem stielchenf., verlängerten Fruchträger sitzend; STräger 2, *seitenst.*, an den aufspringenden Früchten zwischenklappig. S. eyweisslos. Keim gekrümmt. Wahre NebenB. fehlend; Dornen, wenn sie da sind, nebenblättrig.

1. **CAPPARIS** (L.) Kappernstrauch. — K. 4th. Blb. 4. Fruchträger schlank. Stbg. zahlreich. Beere rindig, durch den Fruchträger gestielt.

1. **C. SPINOSA** (L.) Dorniger K. — Bthstiele einzeln, 1blüthig; *B. rundlich, stumpf od. ausgerandet*; NebenB. dornig, gebogen. ♀. In Felsenspalten und auf Mauern, (um Duino: Rovigno in Istrien; am Comersee.) Jun. Jul. Bth. weiss od. sehr schwach-rosenroth. Var.:

β. St. unbewehrt: *C. spinosa* γ. Lam. u. nach Spreng.: *C. rupestris* Sibth. u. Sm.

2. **C. OVATA** (Desfont.) Eyf. K. — Bthstiele einzeln, 1blüthig; *B. eyf., spitz*; NebenB. dornig, gebogen. ♀. Auf Felsen u. Mauern, (bei Botzen in Tyrol.) Jun. Jul. *C. Fontanesii* DC. *C. spinosa* β. 1. Scheint durch Zwischenformen in die vorhergehende überzugehen, auch scheint mir *C. herbacea* Willd., *C. ovata* MBiebst., nicht verschieden.

VIII. Ordng. CISTINEEN. Dunal in DC. prod. l.p. 263. Cisti DC. fl. fr. 4. p. 811.

K. 5blättrig: die äussern KB. kleiner, bisweilen fehlend; die 3 innern in der Knospenlage *zsgedreht*. Blb. 5, *hinfällig*, in der Knospenlage *zsgedreht*, aber in einer den KB. entgegenlaufenden Richtung. Stbg. unterweibig, zahlreich. Fruchtkn. frei. Kapsel 1-vielsamig; bei fehlenden u. unvollständigen Scheidewänden einfächerig, die Klappen in d. Mitte samentragend, od. bei vollständigen Scheidewänden mehrfächerig, u. die STräger mittelpunktst. Keim innerhalb des Eyweisses schraubenf. od. gekrümmt.

1. **CISTUS** (L.) Cistrose. — K. 5blättrig, die 2 äussern KB. ungleich, od. fehlend. Blb. 5, *hinfällig*. Stbg. zahlreich. Kapsel 5-10klappig, Klappen in der Mitte die Scheidewände tragend.

1. Rotte. **LEDONIA** DC. pr. 1. 263. N. fast sitzend.

1. **C. MONSPELIENSIS** (L.) Französische C. — *B. lineal-lanzettl.*, sitzend, 3nervig, netzig-runzelig, auf beiden Seiten klebrig-flaumig; Tr. einerseitswendig; *N. fast sitzend*. ♀. An rauen, sonnigen O., (Istrien.) Mai-Jun. Bth. weiss.

2. **C. SALVIFOLIUS** (A.) Salbeiblättrige C. — *B. an der Basis abgerundet, eyf., stumpf, kurzh.-rauh, unterseits etwas filzig*; Bthstiele einzeln, 1-2blüthig, od. an der Spitze der Aestchen fast doldig; *N. fast sitzend*. ♀. An rauen O., (im Littor. bei Triest, Istrien u. d. Inseln, auch bei Chiavenna, ehemals zu Graubünden gehörig.) Mai-Jun. J. coll. 2. t. 8. Bth. weiss.

II. Rotte. **ERYTHROCISTUS** DC. l. c. Gf. stielrund so lang, als d. Stbg. od. länger.

3. *C. CRETICUS* (L.) Cretische C. — B. in den Bstiel verschmälert, eyf., stumpf, filzig-kurzh., wellig, aderig-runzelig; Bthstiele so lang, als der zottige K., die endst. einzeln oder fast doldig; *Gf. so lang, als die Stbg.* ♀. An gebirgigen, kalkigen O., (auf der Insel Osero und Cherso.) Jun. Jul. J. ic. rar. t. 95. C. villosus Wulf. Bth. purpurn. J.

2. *HELIANTHEMUM* (Tournef. DC.) Sonnenröschen. — K. 5 blättrig: die äussern KB. ungleich oder fehlend. Blb. 5, hinfällig. Stbg. zahlreich. Kapsel 3klappig, Klappen in der Mitte auf einer unvollständigen Scheidewand, oder auf einem vorspringenden Nerven samentragend.

1. Rotte. *THELERARIA* DC. pt. 1 270. Stbk. an der Spitze nicht ausgerandet, nach Ausstreuung des Bthstaubes spitz. N. fast sitzend.

1. *H. GUTTATUM* (Miller.) Getüpfeltes S. — Krautig; B. gegenst., lanzettl., kurzh., 3nervig, die untern verkehrteyf., nebenblattlos, die obern wechselst., nebenblättrig; Tr. deckblattlos, K. auf den fruchtrag., sehr abstehenden Bthstielen, gerade hervorgestreckt; N. fast sitzend. ○. An sandigen O. und sonnigen Hügeln, (Insel Norderney; Tencherl bei Wittenberg; in der Lausitz.) Jun.-Aug. Schk. I. 143. Bth. citrongelb, mit einem bluthrothen Flecken an der Basis bezeichnet, oder ungefleckt. Var. ausserdem:

β. Blb. gezähnt und mit einem Flecken bezeichnet: *Cistus serratus* Cav.

γ. Blb. gezähnt, ungefleckt: *Cistus serratus* Desf. C. plantaginens Willd. D.

II. Rotte. *PSEUDOCISTUS* DC. I. c. Stbk. an der Basis und Spitze ausgerandet. Gf. länger, als die N. NebenB. fehlend.

2. *H. FUMANA* (Mill.) Dünnblättriges S. — Nebenblattlos, halbstrauchig, niederliegend, mit aufstrebenden Aesten; B. zerstreut, lineal., fein stachelspitzig, etwas rauh, schwach wimperig; Bthstiele seitenst., einzeln, die fruchtrag. zurückgekrümmt; *Gf. 3 mal so lang, als der Fruchtkn.* ♀. Auf sonnigen Hügeln und an kiesigen O., (auf der Rheinfläche von Schwetzingen und Dürkheim bis Mainz; in Thüringen; Oestr.; Krain; südl. Tyrol; und südl. Schw. und Graubünden.) Jun. Jul. J. a. t. 252. Bth. goldgelb. Kommt in einer grössern und kleinern Variet. vor.

3. *H. OELANDICUM* (Wahlenb.) Oelandisches S. — Nebenblattlos, halbstrauchig, niederliegend, mit aufstrebenden Aesten; B. gegenst., lineal-länglich und oval, mit büscheligen Haaren am Rande oder auf beiden Seiten bestrent, oder unterseits filzig; Tr. deckblättrig; *Gf. so lang, als der Fruchtkn.*; K. auf den fruchtrag. weitabstehenden Bthstielen, aufstrebend, ♀. Kiesige O. auf d. VorA. und A. bis zum ewigen Schnee hinauf, (Schw. und dch d. g. AK.; die Variet γ. auch um Halle in Thüring.; in Franken bei Mergentheim, und in der Umgegend.) Mai-Aug. Bth. citrongelb. Var.: B. breiter und schmaler, Bth. grösser und um die Hälfte kleiner, und überdies:

α. *glabrum*; B. kahl, am Rande u. der Mittelrippe unterseits sparsam büschelig-haarig, Haare angedrückt; Bstiele gewimpert

St. oberwärts nebst den Bthstielch. etwas flaumh.: *H. oelandicum* Rb. ic. 1. f. 1. *H. oelandicum* α . Wahlenb. *H. oeland.* β . Gaud. β . *hirtum*; B. auf beiden Seiten büschelig-haarig, St. oberwärts nebst den Bthstielch. grau: *Helianth. alpestre* Rb. ic. 1. f. 2. DC. *H. oelandicum* α . Gaud., β . *ciliatum* Wahlenb. *Cistus Segueri* Crantz, letzteres breitblättrige Abänderung.

γ . *tomentosum*; B. unterseits grau oder schneeweiss-filzig; übrigens nicht haarig, oder zugleich auch kurzh.: *Cistus canus* J. a. t. 277. *C. vinealis* Willd. *C. marifolius* Sm., nicht DC. *C. hirsutus* Huds. *C. anglicus* L. *Helianth. oelandicum* γ . *canescens* Wahlenb.

III. Rotte. *HELIANTHEMUM* DC. l. c. Söbk. an der Basis und Spitze ausgerandet. Gf. länger als die N. B. mit Nebenblättern.

4. *H. SALICIFOLIUM* (Persoon.) Weidenblättriges S. — *Mit Nebenblättern versehen*, krautig, etwas ausgebreitet; B. gegenst., elliptisch, kurzh.: Tr. mit Deckblättern: *K. auf dem fruchtttrag. weitabstehenden Bthstielch. aufstrebend*; *Gf. kürzer als der Fruchtkn.* ☉. An sonnigen O, (Istrien; im untern Wallis bei Branson.) Apr. Mai. *Cistus salicifolius* L. Var. nach Bernhardi (in d. bot. ztg.) S.

α . *erythrospermum*, Flaum durchaus gleich, Blb. gefleckt, S. röthlich. *H. punctatum* Willd. en. h. b., *H. intermedium* und *H. denticulatum* Thib. bei DC. pr. *H. sanguineum* Host. fl. a., nicht Lagasc.

β . *ochrospermum*, Flaum am oberen Theile des Stengels, den Bthstielen und dem K. weiter abstehend, Blb. nicht gefleckt, S. bräunlichgelb. *H. salicifolium* Pers. syn.

5. *H. VULGARE* (Gärtner.) Gemeines S. — *Mit Nebenblättern versehen*, halbsträuchig, aufstrebend; B. oval oder lineal.-länglich, wimperig, kurzh. oder unterseits filzig, am Rande etwas umgerollt; Tr. mit Deckblättern: die fruchtttrag. Bthstielch. gewunden-herabgebogen; *Gf. 2 oder 3 mal so lang. als der Fruchtkn.*; die innern KB. stumpf, mit einem aufgesetzten Spitzchen. h. Auf Heiden, Weiden, trockenen Wiesen, an Waldsäumen, der Ebenen und Berge, und bis in die A. und zum ewigen Schnee hinauf. Jun. Aug. Bth. citrongelb. *Helianthemum Chamaecistus* Mill. *Cistus Helianthemum* L. St. meist mit angedrücktem Flaum bedeckt, seltener von abstehenden Haaren rauhh. Der Ueberzug der B. sehr veränderlich. Var.:

α . *tomentosum*; B. unterseits grau- oder weiss-filzig, oben mit einfachen oder sternf. Härchen bestreut: *Helianthemum vulgare* DC. Gaud.

β . *hirsutum*; B. unterseits wegen entferntgestellter Haare grün, übrigens, wie bei der Variet. α ; *H. obscurum* Pers. *H. vulgare* β . *obscurum* Wahlenb. *Cistus hirsutus* Lej.

γ . *glabrum*; B. kahl, nur am Rande und der Mittelrippe unterseits gewimpert, freudig-grün. Diese Variet. wächst auf den höchsten A. und ist niedriger, als die vorhergehenden: *Cistus serpyllifolius* Crantz., Abänderung mit breiteren B.; und *C. helianthemoides* Cr., mit schmälere B. — (*C. serpyllifolius* L. ist nach

der blossen Diagnose nicht auszumitteln.) — Von *Helianth. oelandicum* lässt sich diese Variet. dch die NebenB. sogleich unterscheiden.

δ. *grandiflorum*; der vorhergehenden ähnlich, aber grösser; B. grasgrün, mit büscheligen, abstehenden Haaren bestreut; Bth. gross, manchmal 1 Zoll breit, an der Spitze des St. einzeln, oder 3, 5 an der kurzen Tr.: *H. grandiflorum* DC. *Cistus grandiflorus* Scop. Diese Variet. kommt auch mit unterseits weiss-filzigen B. vor: *Cistus tomentosus* Scop. Smith.

Der K. ist bei diesen Variet. bald kahl und auf den Nerven ein wenig kurzh.; bald von Sternhärchen flaumh., auf den Nerven borstig, seltner ohne Borsten und bald auf der ganzen Oberfläche mit etwas abstehenden Haaren besetzt und kurzh.

ε. *albiflorum*; Bth. weiss: *H. apenninum* Schleich., nach einem übersandten Expl. *Cistus apenninus* L. sp 745. „B. oben grün, kurzh., unterseits grau.“ L. a. a. O. Tabern. kh. Ausgabe von C. Bauh. p. 1474. f. 3. (in der südl. Schw. und auf der Ockelheimer Spitze bei Mainz.) Ausser der Farbe der Bth. finde ich keinen Unterschied. *Hel. apenninum* DC. gehört vielleicht zur nächsten Variet.

ς. *leptopetalum*; Blb. lanzettl.; ist eine Variet. mit misgestaltet-verkleinerten Blb., die sich jedoch aus den Samen fortpflanzt, wie viele andere Variet.: *Hel. surrejanum* Mill. *Cistus surrejanus* L.

6. *H. POLIFOLIUM* (*Cistus* L.) Poleiblättriges S. — Mit Nebenblättern versehen, halbstrauchig, niedergestreckt oder aufstrebend; B. lineal-länglich, oben etwas grau, unterseits filzig, am Rande zurückgerollt; Tr. mit DeckB.; die fruchttrag. Bthstielch. gewunden-herabgebogen; Gf. 2 oder 3 mal so lang, als der Fruchtkn., die innern KB. sehr stumpf. b. Auf sonnigen Kalkhügeln, (bei Locarno im C. Tessin; zw. Mainz und Bingen auf der Ockelheimer Spitze; bei Würzburg; bei Botzen in Südtirol.) Jun.-Aug. *Hel. apenninum* Gaud. Bth. weiss, Nägel blassgelb. Bernhardi fand keines der hier angegebenen Merkmale, durch die ich *H. polifolium* von *H. vulgare* unterschied, beständig, deshalb ist er der Ansicht, es müsse *H. polifolium* mit seinen Varietäten bloß als Variet. zu *H. vulgare* gezogen werden, wogegen ich nichts einzuwenden habe. Die bemerkenswerthesten Abarten von *H. polifolium* sind:

α. *oblongifolium*; B. längl. od. länglich-lineal., weniger zurückgerollt; *Cistus polifolius* L. Dill. elth. f. 172. *C. pulverulentus* Lej. Die engl. Exempl. stimmen genau mit den deutschen überein.

β. *angustifolium*; B. lineal., sehr zurückgerollt, unterseits gleichsam 2 furchig; *Cistus pilosus* L. var. α. *Cistus quartus* Clus. hist. 1. 74. *C. linearis* Lej.

γ. *roseum*; Bth. rosenroth. Aus dem S. derselben Pflanze entstehen Expl. mit weissen und rosenrothen Bth.: *C. mutabilis* J. ic. rar. ist die dch Cultur vergrösserte Pflanze.

IX. Ordng. VIOLARIEEN. DC. fl. fr. 4. p. 801.

K. 5 blättrig. *Blkr.* unregelmässig oder ungleich, 5 blättrig. *Stbg.* 5, auf einer unterweibigen Scheibe eingefügt. *Stbk.* an der innern Seite der un der Spitze in eine vertrocknete Haut endigenden *Stbf.* angewachsen, an den Fruchtkn. angedrückt, frei oder zshängend. Fruchtkn. 1 fächerig; *STräger* 3, wandst. *Gf.* 1. Eyweiss fleischig. Keim gerade. Würzelch. nach den Nabel gerichtet. *B.* mit Neben*B.*

1. **VIOLA** (L.) Veilchen. — *K.* 5 blättrig; *KB.* an der Basis in ein Auhängsel vorgezogen. *Blb.* ungleich, das untere abwärts in einen hohlen Sporn vorgezogen. *Stbg.* verbreitert, in eine Walze zsgestellt, und nicht wirklich verwachsen: die 2 untern an der Basis mit zwei spornförmigen Auhängseln.

1. Rotte. **NOXIMUM** Gingins in DC. prod. 1. p. 291. Die 2 mittlern *Blb.* seitlich abstehend, sehr oft gegen die Basis hin bärtig; das unpaarige immer bartlos. *Gf.* gerade, oder wenig geneigt, an der Basis verschmälert. Wurzelstock schräg oder kriechend. Die spätern *Bth.* blumenblattlos.

§. 1. *N.* in ein schiefes Scheibchen ausgebreitet oder an der Spitze schiefgestutzt. Die fruchtrag. *Bthstiele* aufrecht, an der Spitze hakig. Kapsel nickend. *B.* nach dem Verblühen viel grösser. Stengellose Pflanzen.

1. **V. PINNATA** (L.) Vieltheiliges V. — Stengellos; *B.* im Umriss rundlich, *vielth.* Zpfl. 2-3 zählig. 2. Auf Triften der A., (in den penninischen A. des C. Wallis und Graubünden; in Tyrol auf der Seiser A., den Lienzer A.; Kärnthen bei H. Blnt: Krain auf dem Nanas) Jun. Jul. *Rb.* ic. 1. f. 81. 85. *Bth.* blass-violett. *N.* fast 3 seitig.

2. **V. PALUSTRIS** (L.) Sumpf-V. — Stengellos; *B.* sämmtlich *niereukerzf.*, kahl; *KB.* stumpf; *NebenB.* eyf., zugespitzt, kurzfransig-gezähnelte oder ganzrandig, *frei*; fruchtttragende *Bthstiele* aufrecht; Kapsel nickend. 2. Im Sumpfmooße, torfigen Wiesen sowohl der Ebenen als der Berge, und bis in die höchsten Alpen hinauf. Mai Jun. *Blb.* blass-lila, das unpaarige mit violetten Adern. St. h. 11.

3. **V. EPIPSILA** (Ledebour. ap. Fries. nov. fl. succ. mant. alt. p. 51.) Torf-V. — Stengellos; *B.* kahl, das unterste fast niereuf, *das zweite eyherzf.*; *KB.* stumpf; *NebenB.* eyf., zugespitzt, kurzfransig-gezähnelte, oder ganzrandig, *frei*; fruchtttragende *Bthstiele* aufrecht mit hängender Kapsel. 2. In grasreichen Sümpfen und sumpfigen WaldO., (Salzburg, Hoppe.) Mai. Jun. Rehb. ic. f. 105. Fries herb. norm. *V. palustris* *p.* Fries novit. *Blb.* blan, nicht geädert, eyf. Diese Art konnte ich lebend noch nicht beobachten.

4. **V. ULIGINOSA** (Schrader.) Moor-V. — Stengellos; *B.* herzf., kahl; *Bstiel* geflügelt; *NebenB.* lanzettl., drüsigg-gezähnelte, *bis über die Mitte an den Bstiel angewachsen*; fruchtttragende *Bthstiele*

unverändert. Kapsel nickend. 4. In schwammigen Sümpfen, (auf dem Laibacher Moose in Krain; Oppeln in Schlesien; Glossen in der Lausitz; Bockwitz bei Leipzig; Wiehe in Thüringen.) März. Apr. Rb. ic. I. f. 107. *V. nitens* Host. *V. scaturiginosa* Wallr. D.

§. 2. N. in ein herabgebogenes Schnäbelchen verschmälert. Fruchtragende Bthstiele auf die Erde niedergestreckt, an der Spitze gerade. B. nach dem Verblühen viel grösser.

5. *V. HIRTA* (L. spec. 1324.) Rauhes *V.* — *Stengellos*; *Ausläufer fehlend*, die seitenständigen Stämmchen zuletzt in kurze Ausläufer verwandelt; *B.* eyf. oder länglich-eyf., die inneren *späteren tief-herzf.*; untere Neben*B.* eyf., obere lanzettl., alle spitz, oder an der Spitze selbst stumpf, *nebst den Fransen am Rande kahl*, Fransen kürzer als der Querdurchmesser des Nebenblattes; *KB.* stumpf; fruchtragende Bthstiele niederliegend; *Kapsel kugelig, flaumig*. 2. Wiesen, trockne Triften, an Gesträuch. Apr. Mai. St. h. 11. Bth. geruchlos, meist blass-violett, etwas ins Röthliche spielend; kommen aber auch dunkler gefärbt vor. Die ersten *B.* oft kurz-eyf. und mit einer seichten Ausbiegung offen-herzf., die spätern aber immer längl.-eyf. und mit tiefer Ausbiegung herzf.

Expl. dieser Unterabtheilung sind in den Herbarien schwer zu unterscheiden und können nur genau bestimmt werden, wenn sie ganz vollständig sind u. mit den Bth., den späteren *B.* und den Früchten gesammelt wurden. Diese späteren *B.*, die hauptsächlich den unterscheidenden Charakter ausmachen, bilden sich erst nach der Bthe aus.

6. *V. COLLINA* (Besser, en. pl. voll. p. 10. n. 243.) Hügel-*V.* — *Stengellos*; *Ausläufer fehlend*, oder die seitenständigen Stämmchen zuletzt in kurze Ausläufer verwandelt; *B.* breit-eyf., *tief-herzf.*; Neben*B.* lanzettl., verschmälert-haarspitzig, fransig, *am Rande nebst den Fransen fein-rauhh.*, die mittleren Fransen von der Länge des Querdurchmessers des Neben*B.*; *KB.* stumpf; fruchtragende Bthstielen niederliegend; *Kapsel kugelig, flaumig*. 4. Haine und an Hecken. (Schwz; Regensburg; bayerisches Gebirg und wahrscheinlich längs dem Fusse d. g. AK.) Apr. Mai. *V. umbrosa* Hoppe, nicht Fries. Rchb. ic. f. 4497, mit den Frühlings*B.* u. f. 4493 mit den Sommer*B.* unter dem Namen *V. hirta* var. *umbricola*. Von der ähnlichen *V. hirta* unterscheidet sie sich dch lang verschmälerte Neben*B.* mit zahlreicheren Fransen; die Fransen sind verlängert, meist schwach drüsentragend, und sowie das Nebenblatt selbst mit kurzen Haaren bewimpert. Bth. blassblau, wohlriechend. Die Sommer*B.* fast grauflaumig.

7. *V. SCIAPHILA* (Koch.) Schattenliebendes *V.* — *Stengellos*; *Ausläufer fehlend*; *B.* breit-eyf., *dch einen breiten offenen Ausschnitt herzf.*; Neben*B.* spitz, fransig, nebst den Fransen am Rande kahl, die innern an der Spitze feinwimperig, Fransen kürzer als der Querdurchmesser des Neben*B.*; *KB.* stumpf; fruchtragende Bthstielchen niederliegend; *Kapsel länglich-eyf., kahl*. 4. Schattige O. der Berge und VorA., (Schwz, v. Salis. Marschlins, Salzburg, Sauter.) Apr. Mai. *V. umbrosa* Sauter, nicht Hoppe, nicht

Fries. Fruchtkn. ganz kahl, wodurch sie sogleich erkannt wird. Kapseln oval-länglich. B. breit-eyf., mit einem breiten offenen Ausschnitte herzf., SommerB. etwas kahl, während sie bei *V. collina* gerade rauhhaarer erscheinen, als die FrühlingsB. Bth. violett mit weissem Schlunde. Stets ohne Ausläufer. Bth. wohlriechend; v. Salis. Marschlin, welcher diese Art zuerst genauer unterschied und mich mit Expl. davon beschenkte.

S. *V. AMBIGUA* (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 208. t. 290.) Zweifelhaftes *V.* — *Stengellos; Ausläufer fehlend; B. durch einen breiten, offenen Ausschnitt herzf.;* die äusseren eyf., die inneren länglich-eyf.; NebenB. lanzettl., verschmälert-liaarspitzig, fransig, am Rande kahl, oder an der Spitze feinwimperig, Fransen ungleich, die längeren von der Länge des Querdurchmessers der NebenB.; KB. stumpf; fruchtragende Bthstiele niederliegend; *Kapsel eyf., flaumh.* 4. Triften, (Wallis, Thomas.) Apr. Mai. Ich kenne diese Pfl., die ich nicht lebend und nicht mit SommerB. untersuchen konnte, nicht genau: übrigens scheinen die Expl. aus der Schwyz mit denen aus Ungarn übereinzustimmen. — Verschieden von *V. sciaphila* durch die flaumigen Fruchtkn. und die innern längl.-eyf. B.: von *V. hirta* durch den breiten, nicht tiefen und schmalen, herzf. Ausschnitt an der Blattbasis, auch an der der innern B. und durch die schmälern, mehr verschmälerten NebenB.; von *V. collina* durch dasselbe Merkmal, sparsameren Flaum, am Rande kahle NebenB. und wie aus der Abbildung sichtbar ist, eyrunde Kapsel. — *V. campestris* MB. scheint nach Expl. von Besser aus Podolien zu *V. ambigua* zu gehören.

9. *V. ODORATA* (L. spec. 1324.) Wohlriechendes *V.* — *Stengellos; Ausläufer verlängert; B. breit-eyf., tief-herzf., die der Sommerausläufer nieren-herzf.; NebenB. eylanzettl., spitz, am Rande nebst den Fransen kahl,* an der Spitze fein wimperig, Fransen viel kürzer, als der Querdurchmesser der NebenB.; KB. stumpf; fruchtragende Bthstiele niederliegend; Kapseln kugelig, flaumh. 4. Am Rande von Hainen, Hecken, Gestrüchen, Bächen. März. April. St. h. 11. Bth. dunkel-violett, das unpaarige Bth. an der Basis hellviolett mit sattvioletten in das violette Mittelfeld auflaufenden Adern. Die äusseren NebenB. eyf., die innern lanzettl., weniger gefranst, die Fransen kurz, deutlich drüsig. Var. mit gefüllten, blass-lila und weissen Bth.

Viola alba Besser (primit fl. galic.) bildet eine gute Art, von der weissblühenden Variet. der *V. odorata* deutlich verschieden, im Gebiete unserer Flora aber noch nicht aufgefunden. In den Kalkgebirgen Lothringens entdeckte sie Suard und beschenkte mich mit lebenden Expl. Sie unterscheidet sich von *V. odorata* durch Folgendes: Die B. sind fast 3 eckig-herzf., auffallend zugespitzt, zwar mit einem tiefen, jedoch breiten und offenen Ausschnitt an der Basis versehen; die B. der Sommerausläufer sind fast dreieckig, plötzlich zugespitzt, die Seitenwinkel abgerundet. Die Sommerausläufer blühen zugleich mit der Mutterpfl., während die Ausläufer von *V. odorata*, welche nach dem Verblühen entstehen, erst im folgenden Jahre Blüthen hervorbringen. Besser.

10. *V. SCAVIS* (M. B. fl. taur. canc. 2. p. 164.) Liebliches *V.* — *Stengellos; Ausläufer treibend; B. breit-eyf., tief-herzf., die der Sommerausläufer nierenherzf.; NebenB. lanzettl., zugespitzt, an der Spitze nebst den Fransen flaumig-wimperig, halb so lang, als d. Querdurchmesser des NebenB.; KB. stumpf; fruchtrtragende Bthstielchen niederliegend; Kapseln kugelig, flaumh. 4. An den abhängigen Ufern der Oder, (bei Frankfurt a. d. O. Buek.) März. April. Blühend erkennt man sie leicht an den zwar violetten, aber bleichern mehr ins Blaue spielenden Blh.; die oberen sind von der Basis auf ein Drittel weiss, die 3 unteren von der Basis bis zur Mitte weiss, das unterste mit dunkelvioletten Adern verziert wie bei *V. odorata*. Die Fransen der NebenB. tragen eine wenig bemerkliche Drüse. Lebende Expl. vom erwähnten Standorte finden sich im hiesigen Garten.*

§. 3. N. in ein herabgebogenes Schnäbelchen verschmälert. Fruchtrtrag. Bthstiele unverändert aufrecht, an d. obern Ende sowie die Kapsel nickend. Die Sommerpflanze der des Frühlings meist unähnlich; diese einfach, Bth. mit Blumenblättern, u. nebst d. B. langgestielt, die NebenB. grösser; jene, die Sommerpflanze, ästig, Bth. blumenblattlos, B. an d. Aesten kurz-gestielt. NebenB. klein.

11. *V. ARENARIA* (DC.) Sand-V. — *Die St. niederliegend, aufstrebend, v. sehr kurzem Flaum graugrünlich od. kahl; B. herzf.-stumpf, klein-gekerbt, die untern nieren-herzf., die NebenB. eyf.-länglich, gefranst-gesägt, mehrmal kürzer, als der Bstiel; KB. länglich-lanzettl., spitz; Kapsel eyf., spitzlich. 4. Auf Sandfeldern, u. in trocken Nadelwäldern, auch an gebirgigen O., (häufig auf d. Rheinfläche, übrig. dch ganz D., aber nicht aller O.; Schw. bei Bern, in Graubünden u. Wallis.) Mai. Jun. V. Allionii Pio. Rb. ic. f. 142-146. V. glauca MB. V. rupestris Schm. V. hirta var. aprica Spreng. V. livida Kit. Rb. ic. f. 147-149, diese letzte grösser, B. unterseits schmutzig-purpurnlich. V. Krockeri R. u. S. Bth. blau. Var. mit längerem, etwas bogigem Sporn: V. rupestris Rehb. ic. f. 141. Die V. arenaria u. die 2 folgenden Arten stellte ich als solche auf, da sie von d. meisten Botanikern dafür anerkannt werden.*

12. *V. SILVESTRIS* (Lam.) Wald-V. — *Die St. niederliegend, u. aufstrebend, kahl od. etwas flaumh.; B. deutlich herzf. u. eyf., oder fast nierenf., kurz zugespitzt, die untern stumpf; Bstiele flügellos; die mittlern stengelst. NebenB. lanzettl., nach vorne verschmälert, gefranst-gesägt, mehrmal kürzer als der Bstiel; KB. lanzettl.-zugespitzt; Kapsel spitz. 4. In Hainen, Wäldern, Gebüsch u. Zäunen. Apr. Mai. Bth. blässer-blau, mehr od. weniger in das Violette spielend. Rbch. ic. f. 200, 201. V. canina ϵ . D. fl. 2. 263. St. h. 11. V. canina β . sylvatica Fries. Der Name v. sylvatica ist allerdings passender, aber ich wollte den überall angenommen nicht umändern. V. canina DC. u. mehrer Autoren; Sporn oft violett. Var.: β . Riviniana, Bth. grösser, blässer, Sporn oft abgebleicht, weisslich. V. Riviniana Rb. ic. f. 202. Zwischen V. Riviniana u. V. sylvestris kommen so viele Zwischenformen vor, dass ich keine bestimmten Unterschiede angeben kann; ich vermuthete sogar, dass aus ihnen die V. canina hervorgehe, wenn sie an sonnigen O. wachsen.*

13. *V. CANINA* (L.) Hunds-V. — *Die St. niederliegend u. aufstrebend*, kahl od. etwas flaumh.; *B. aus einer herzf. Basis länglich-eyf.*, spitzlich (nicht zugespitzt.) die untern stumpf, *Bstiele* flügellos; die *mittlern* stengelst. *NebenB.* länglich-lanzettl., gefranst-gesägt, *mehrmal kürzer als der Bstiel*; *K.* eyf.-lanzettl., verschmälert-spitz; Kapsel gestutzt-stumpf, bespitzt; Sporn fast doppelt so lang, als die Anhängsel des K., stumpf. 4. Auf Heiden, an trocknen O., Waldrändern. Mai. Jun. *V. canina* *a.* *β.* *γ.* *D.* *fl.* *V. pumila* *β.* *ericetorum* DC. *V. flavicornis* Sm. engl. bot. Eine grössere Variet. ist: *V. canina lucorum* Rehb. ic. f. 151. 153; eine kleinere Variet.: Rehb. l. c. fig. 150-153, *V. ericetorum* Schrad. Eine aufrechte Variet. mit schmälern u. längeren *B.* an feuchten sandigen O. wachsend, ist: *V. canina* *β.* *Ruppil* *D.* *fl.*, *V. canina* *γ.* Bertol. *fl. ital.*, [*V. canina* *γ.* *montana* Fries. — *Bth.* satter-violett, Sporn weiss, in d. Gelbliche spielend. *B.* gegen d. Spitze allmählig schmaler, aber mit etwas auswärts, nicht einwärts, geschweiften Rändern, deswegen nicht zugespitzt. — *V. Ruppil* Rb. ic. f. 205. 206, scheint wegen des langen u. stumpfen Sporns eine Abänderung der *V. canina*. Sie wird von Bertoloni bei *V. canina* var. *Ruppil* citirt.

Der *Viola canina* sehr ähnlich ist die *V. lactea* Smith *fl. brit.* (nach Expl. aus England selbst in meinem Herbar. und nach der guten Abbildung in Engl. bot. t. 415) aber sie unterscheidet sich durch die an d. Basis eyf. od. abgestutzten, aber nicht herzf. *B.*, durch die schmälern *Blb.* u. ändert sich nicht durch die Aussaat; von *V. stagnina* ist sie sehr verschieden. Eine Synonym ist *V. lancifolia* Thore chlor. d. land., Rehb. ic. f. 204 (sehr treu.) Vergl. über diese Pfl. noch Bertoloni's Untersuchungen, *fl. ital.* v. 2, p. 701. Im Bereiche unserer Flora ward sie noch nicht gefunden; ein fruchttragendes Expl., früher von Wallroth an Mertens gegeben, ist zweifelhaft.

14. *V. SCHULTZII* (Billot in Schultz *fl. gall. et germ. exsicc.* cent. I. p. 4. n. 7. et *introduc.* cent. 3 et 4. p. 4.) Schultzens *V.* — *St. aufrecht*, kahl; *B. herzf.-eyf.* vorne etwas zugespitzt-verschmälert; *Bstiel* oberwärts geflügelt; die stengelst. *NebenB.* längl.-lanzettl., blattig, tief-gezähnt, die mittleren halb so lang als der *Bstiel*, die oberen gerade so lang wie dieser; *KB.* spitz; *der Sporn doppelt u. dreimal so lang als die Anhängsel des K., zugespitzt, an d. Spitze aufwärts-gekrümmt* u. zweispitzig. 4. In sumpfigen Torfwiesen, (im Elsass bei Hagenua, im Moraste bei Laibach) Apr. Mai. *V. Ruppil* Rehb. *fl. g. exs.*, *Bth.* vor dem Aufblühen gelblich, der Sporn grün, später erstere schneeweiss, letzterer gelblich“ Schultz l. c. Von den übrigen verschieden dch den langen, zugespitzten, an der Spitze aufwärts gekrümmten Sporn.

15. *V. STAGNINA* (Kitaibel.) Gräben-V. — *Die St. aufrecht*, kahl; *B. aus einer herzf. Basis länglich-lanzettl.*, *Bstiel* oberwärts etwas geflügelt; die *mittlern* stengelst. *NebenB.* lanzettl., zugespitzt, gefranst-gesägt, *halb so lang, als der Bstiel*; *KB.* spitz; Sporn ungefähr so lang, als die Anhängsel des K. 4. In Gräben u. ausgetrockneten Sümpfen, an Bächen u. überschwemmten

Wiesen. Mai. Jun. *V. lactea* Rchb. ic. I. f. 208, (ausgeschlossen fig. c. d. e. f.) f. 4507. *V. montana* Rb. ic. I. f. 207. *V. persicifolia* Hartm., Fries, Schweigg. u. Kört. Abart mit grösseren NebenB.: *V. Billotii* Schultz fl. gall. et germ. exsicc. Bth. weiss etwas in das Lilä spielend. Der Name *V. persicifolia* ist sehr zweideutig und zuerst nach der Diagnose von Ruppian angenommen. Ruppian fand seine Pfl. auf den Sumpfwiesen „bei Leipzig nicht weit von der Funkenburg, daselbst wächst aber nach Rchb. u. Peterm. *Viola elatior* Fries; ausserdem war die *V. persicifolia* von Schkuhr, welche einerlei ist mit *V. elatior*, viel früher schon benannt, als die von Schweigg. u. Kört.

16. *V. STRICTA* (Hornemann fl. dan. t. 1812) Steifes *V.* — *Die St. aufrecht*, kahl; *B. herzfeyf.*, vorne etwas zugespitzt-verschmälert, Bstiel oberwärts geflügelt; die Stengelst. NebenB. länglich-lanzettl., blattig, fransig-gezähnt, die mittlern halb so lang, als der Bstiel, die oberen so lang, als derselbe; KB. spitz, der Sporn ein wenig länger, als die Anhängsel der KB., stumpf. 4. In Hainen, (im Biederitzer Busche bei Magdeburg; Stettin; Schles.) Mai. Jun. *V. nemoralis* Kütz. *V. lancifolia* Bess. en. pl. volh. *V. Ruppianii* Koch. Synops. ed. I. (*V. Ruppianii* All. ped. nach Bertol. geh. z. d. Abarten von *V. canina*.) Bth. gross hellblau. Dch die *B.* nähert sich die Pfl. mehr der *V. canina*, dch die blattigen NebenB. aber mehr der *V. stagnina*, sie ist jedoch stämmiger, als beide. Sie untersch. sich von jener durch folgs: Bstiele oberwärts deutlich-geflügelt, die mittlern u. obern Stengelst. NebenB. gross, blattig, die mittlern von der halben, die obern von der ganzen Länge des Bstieles; der Sporn kurz, grasgrün, u. nicht weisslich-gelblich, die Ränder der Kapsel platt, der Oberfläche gleich, u. nicht vorspringend. *Viola stagnina* untersch. sich dch schmälere, länglich-lanzettl., blass-grüne B., u. milchweisse Bth.; *V. Schultzii* dch den langen, zugespitzten, an der Spitze aufwärts gekrümmten Sporn.

17. *V. PRATENSIS* (Mertens u. Koch.) Wiesen-*V.* — *Die St. aufrecht u. nebst den B. ganz kahl*; *B.* aus einer eyf. Basis lanzettl., in den geflügelten Bstiel zugeschweift, od. an der Basis keilig; die mittlern Stengelst. NebenB. blattig, länglich-lanzettl., eingeschnitten-gezähnt, länger als der Bstiel; KB. spitz; Sporn so lang, als die Anhängsel des K. 4. Auf Wiesen, seltner in Hainen, (auf der Rheinfläche; in Thüringen; Sachsen; bei Magdebg, zw. Stassfurth u. Bernbg, bei Artern; in Böhmen.) Mai. Jun. *V. lactea* K. u. Z. cat. pl. pal. Fries. Roth. en. *V. persicifolia* Roth. tent. *V. Ruppianii* Presl. Rb. I. t. 99. fig. c. d. e. f. mit Ausschluss der Hauptfigur, fig. 4507. b. Bth. immer blau, sehr selten, u. bloss als Variet., weiss.

18. *V. ELATIOR* (Fries.) Höheres *V.* — *Die St. aufrecht, oberwärts nebst den B. flaumh.*; *B.* aus einer seicht-herzf. Basis lanzettl., Bstiel geflügelt, die mittlern Stengelst. NebenB. blattig, länglich-lanzettl., eingeschnitten-gezähnt, länger als der Bstiel; KB. spitz; Sporn so lang, als die Anhängsel des K. od. etwas länger. 4. In Hainen u. auf etwas feuchten Wiesen, (auf d. Rhein-

fläche; von Regensburg u. Wien dch Böhmen nach Mähr., Schles., Sachs. u. Thüring., Westph.) Mai-Jul. *V. persicifolia* D. fl. 2. 259. Rb. ic. t. 100.

19. *V. MIRABILIS* (L.) Verschiedenblüthiges *V.* — Die *St.* aufrecht, einzellig behaart, die Bstiele am Kiele haarig; *B.* breit-herzf., kurz zugespitzt, klein-gekerbt, die untern fast nierenf.; Neben*B.* länglich-lanzettl., zugespitzt, die obern mit kurzen Borstchen gewimpert, übrigens ganzrandig, od. etwas gezähnelte; die mit Blkronen versehenen *Bth.* wurzelständig. 2. In Gebirgswäldern, (im grössten Theile von D., fehlt aber in der mittlern u. untern Rheingegend, in Hessen u. Westphal.; in d. Schwz selten.) Apr. Mai. J. a. t. 19. *Bth.* bleich-röthlich od. lila.

III. Rotte. *DISCRIDIUM* Ging. l. c. Die 4 obern *Bth.* aufwärts gerichtet, und aufwärts dachig. Gf. an d. Basis herabgekrümmt u. dann in einen Wirtel gebogen sich erhebend, oberwärts keulig-verdickt; *N.* flach, fast 2lappig. *Bth.* alle vollkommen. Wurzelstock kriechend.

20. *V. BIFLORA* (L.) Zweiblüthiges *V.* — Der *St.* schwach, meist 2blättrig, 2blüthig; *B. nierenf.*, sehr stumpf, gekerbt; die Neben*B.* eyf., ganzrandig; *KB.* spitz. 2. An nassen waldigen O. der A., auch d. höchsten, (dch d. g. AK., u. die dieselbe begleitenden Berge, in Oberschwaben, Oberbayern; v. Jura in die höhern Vogesen; Schles. u. Mähr. Gebirg; Lausitz.) Mai-Aug. *Bth.* citron-gelb, braun-gestreift; das untere *Bth.* bis über die Mitte dottergelb.

III. Rotte. *MELANUM* DC. Die 4 obern *Bth.* aufwärts gerichtet u. aufwärts dachig. Gf. aufstehend, oberwärts keulig; *N.* gross, krugf., auf beiden Seiten mit einem Haarbüschel u. unterwärts mit einem Lippchen versehen.

21. *V. TRICOLOR* (L.) Dreifarbiges *V.* — *B.* gekerbt, die untern ey-herzf.; die Neben*B.* leierf.-fiedersp., der mittlere *Zpfl.* gekerbt; Sporn fast noch 1mal so lang, als die Anhängsel des K.; *W.* einfach, die *St.* aufstehend, ästig. ☉. Auf Aeckern unter der Saat, auf unfruchtbaren Feldern, (die Variet. *β.* überall, die Var. *α.* nicht in allen Gegenden, wird aber allenthalben in vielen Farbenspielen cultivirt.) Mai-Octb. Var.:

α. vulgaris; *Blkr.* grösser, als der K., 8-10 Linien im Durchmesser, violett und blau, weiss und gelb varirend, aber die gelbe Farbe nimmt nur allein die Basis des unpaarigen *Bth.* ein. *St.* h. II.

β. arvensis; *V. arvensis* Murray u. der Ant. *Blkr.* so lang, als der K. od. kürzer, weiss, die obern *Bth.* hell-violett gefärbt. Untersch. sich vorzüglich dch die Farbe der *Bth.*; denn die Variet. *α.* kommt auch mit einer kürzern *Blkr.* als der K. vor.

γ. saxatilis; *Blkr.* wie bei d. Variet. *α.*, aber ganz gelb; *V. saxatilis* Schm. Auf d. A. u. in den Sudeten. Gelbe u. violette bunte *Bth.* findet man nicht selten an demselben Expl.

δ. hannatica; mehrere der untern *B.* an der Basis herzf., *Blkr.* wie bei der Variet. *α.*, aber nicht länger als der K.; *V. hannatica* Kit.

Am Seestraude ist die Pfl. fleischig; Variet. *syrtica* Flörke; an sandigen, unfruchtbar. O. bleibt sie klein u. einfach u. der mitt-

tere Zpfl der NebenB. ist bei den meisten B. dem B. selbst ähnlich; *V. Kitaibeliana* R. u. S.

22. *V. ROTHOMAGENSIS* (Desf.) Rauh. B. — B. gekerbt, die untern ey-herzf.; die NebenB. fiedersp., der mittlere Zpfl. breiter, ganzrandig; Sporn fast noch 1mal so lang, als die Anhängsel des K.; W. einfach; die St. hingestreckt, sehr ästig. ☉. An cultiv. O., (auf Feldern im Gebiete der Flora von Spa.) Mai-Orth. Ganz von steifen, abstehenden Haaren kurz.; ich stellte diese Pfl. nach der Autorität Anderer als eigene Art auf, sie scheint aber nur Variet. der vorhergehenden. D.

23. *V. LUTEA* (Smith.) Hochgelbes V. — B. gekerbt, die untern ey-herzf., die obern lanzettl.; die NebenB. fingerig-vielth., Zpfl lineal., der mittlere breiter; Sporn so lang, als die Anhängsel des K. od. ein wenig länger; Stämmchen kriechend, südlich, die St. einfach. 4. Auf den VorA. u. A., (mittlere Schwyz; auf den Vogesen; Steyerm.; Schlesien u. Mähr. Gebirge; die Variet. γ . in niedrigeren Gegenden im Gebiete der Flora von Spa u. Aachen.) Mai. Jun. V. *lutea* Huds. ed. 1. V. *grandiflora* Huds. ed. 2. Die Bth. variiren gelb, gelb mit oberen violetten Bth., ganzviolett, u. ausserdem:

α . *grandiflora*; niedriger, Bth. gross, Blb. länger-benagelt, sehr gestutzt, das unpaarige bisweilen tief ausgeschnitten; V. *grandiflora* Vill. Cat. d. Strass. Gart., nicht Linne. Rb. ic. 2. f. 302.

β . *sudetica*; höher, Bth. gross, Blb. oft geschweift-gekerbt; V. *sudetica* Willd.

γ . *multicaulis*; Bth. nicht grösser, als bei der gewöhl. V. tricolor.

Die V. *angustifolia* Schleicher's! vergl. D. fl. 2. p. 274, halte ich jetzt für eine rauh. Variet. der V. *lutea*.

24. *V. HETEROPHYLLA* (Bertol. fl. it. 2. 716.) Verschiedenblättriges V. — B. gekerbt, die untern eyf., od. länglich, die obern lanzettl.-lineal.; die NebenB. fingerig-vielth., Zpfl lineal., der mittlere nur ein wenig breiter; Sporn länger, als die Anhängsel des K., halb so lang, als die Blkr.; Stämmchen kriechend, südlich; die St. einfach. 4. In Felsenspalten, (südl. Tyrol, Faechin.; nach Host auch auf den östr. A.) Jul. Aug. Bth. blau, Blb. an d. Basis mit einem breiten, satter-violetten Flecken, und einem weissen u. goldgelben Nabel in demselben. Die Schweizer Expl. stimmen mit den Ungarischen genau überein: zwischen V. *declinata* u. V. *lutea* sind aber die Grenzen schwer zu ziehen. Var.:

α . *Bertolinii*; die oberen B. lineal, sehr schmal, gegen die Basis jedoch noch verschmälert; V. *Bertolonii* Pio viol. V. *gracilis* Biv. mant. nicht fl. graec. V. *valderia* Rbch. fl. exc., nicht All.

β . *gracilis*, die oberen B. lanzettl., gekerbt; V. *gracilis* fl. graec. prodr. V. *declinata* W. Kit. p. r. h. Gaud. helv. Bertol. l. c.

25. *V. CALCARATA* (L.) Gesporntes V. — B. gekerbt, eyf., od. die obern länglich od. lanzettl.; die NebenB. ganz od. 3sp.-gezähnt, u. fast fiedersp.; Sporn so lang, als die Blb.; Stämmchen krie-

to
July 17

chend, fädlich; die St. ganz einfach. 4. Auf ATriften, (in der Schw. auf vielen A.; im Jura; auf d. Wormser Joch; seltner in D.; auf dem Linkerskopf in d. baier. A.; die Variet. β . auf d. Krainer A.) Jul. Aug. Var.: der St. länger u. sehr kurz, Bth. grösser u. kleiner; violett u.

β . *flava*, gelb: V. *Zoysii* Wulf. St. h. 22.

26. V. *CENISIA* (L.) Ganzblättriges V. — B. *ganzrandig*, die untern eyf., die obern öfters länglich; die obern NebenB. spatelf., an der Basis ganz od. daselbst auf beiden Seiten 1-2zählig oder 2-4theilig mit spatelf. Zipfeln: *Sporn so lang als die KB.*; Stämmchen kriechend, fädlich; 4. An steinig. O. u. in Felsenspalten der höhern A., (auf den Bergen im südl. Tyrol nach Host; in der südwestl. Schw. auf dem Enzeindaz u. s. w., im Wallis auf dem Fouly u. a.) Jul. Aug. Bth. satt-blau. Die Variet. mit getheilten NebenB. und mehr längl. oberen B. ist:

β . *valderia* Allion. ped. DC. fl. fr.

27. V. *COMOLLIA* (Massara prodr. della fl. Valtell. p. 203.) Comolli's V. — B. *ganzrandig*, ein wenig geschweift, rundl. und oval; die oberen NebenB. spatelig, ungeth.: *Sporn ein wenig länger als die Anhängsel d. KB.*; Stämmchen fädlich, kriechend. 4. Gebirge (im Veltlin). Entdeckt von Doct. Massara, u. mir mitgetheilt von Ulyss. v. Sal. Marschlins. Von V. *cenisia* hauptsächlich verschieden durch den kurzen Sporn und die meist bewimperten KB.

28. V. *ALPINA* (J. u. 3. p. 24. t. 242.) Alpen-V. — B. gekerbt, rundlich-eyf., *alle wurzelt.*; die NebenB. länglich, bis über ihre Mitte an d. Bstiel gewachsen, an d. Spitze 2sp.; Stämmchen sehr kurz; die St. fehlend. 4. Auf d. höchsten A., (auf den östr. u. steyerm. A., auf dem Schneeberge bei Wien, Hohenschwab, Veitscher A.) Jul. Aug. St. h. 30. Bth. satt-blau. D.

X Ordnung. RESEDACEEN. DC. theor. 211.

K. 4-5-6th., bleibend. Blkr. unregelmässig. Blb. so viel, als Zpfl. des K., u. mit diesen abwechselnd. Stbg. 10-24, dem oberwärts in eine Honigschuppe verbreiterten Fruchträger eingefügt. Fruchtkn. 1, 1fächerig, an der Spitze offen, 3-6lappig, Lappen mit einem kurzen, kegelf. Gf. endigend, Stträger wandst., 3-6, an die Nähte gewachsen; od. mehrere Fruchtkn., (4-6, jeder mit einem Gf. endigend u. 1fächerig, einwärts aufspringend. Keim gekrümmt. Eyweiss meist fehlend. Würzeleh. nahe am Nabel gelegen. B. wechselst.

1. RESEDA (L.) Reseda. — Blb. ganz od. mannigfaltig gespalten. Stbg. 10-24. Kapsel 3-6kantig, an der Spitze offen, mit

3-6 Gf. endigend, 1fächerig: STräger wandst., mit den Gf. abwechselnd.

Rotte. RESEDASTRUM Dub. bot. g. 1. 68. KB. u. Blb. 6. N. 3.

1. R. PHYTEUMA (L.) Stumpfblättrige R. — B. stumpf, *die mittlern stengelst. vorne 3sp.*; Bthstielch. so lang, als der K.; K. 6th., Zpfl länglich, bei der Frucht vergrössert; Kapsel länglich-keulig, stumpf-kantig; St. ausgebreitet. ☉. Auf Brachäckern, in Weinbergen, an Wegen, (in Unteröstr. u. im Littor.; in d. südl. Schw. nur bei Genf am Rhoneufer.) Jun-Aug. J. a. t. 132. Blb. weisslich. — Die ähnliche kultivierte R. odorata L. untersch. sich dch folgds: Bthstielch. noch 1mal so lang, als der K., K. bei d. Frucht kaum vergrössert, Zpfl des K. zuletzt zurückgebogen, Bth. kleiner, Kapsel kürzer, hauchiger; u. dch den sehr lieblichen den Weinrebenblüthen ähnlichen Geruch.

2. R. LUTEA (L.) Gelbe R. — B. im Umriss 3eckig, *die mittlern stengelst. doppeltfiedersp.*, die oberen 3sp.; Bthstielch. so lang, als der K.; K. 6th., Zpfl lineal.; St. ausgebreitet. ☉. Auf steinigten, felsigen Hügeln, an Wegen, a. cultiv. O., in Weinbergen, auf Kalkboden, (in d. westl. Schw. von Unterwallis an u. dch d. ganze Rheinfläche bis nach Westphal.; im Mainthale bis Würzburg; dch Schwab., Bayern, d. östr. Kreis, nach Böhm. u. Thüring. u. bis Braunschweig, sodann an einigen Punkten an d. Ostsee.) Jul. Aug. J. a. t. 353. R. ochracea Mönch. nach Wenderoth. Blb. grüngelblich.

11. Rotte. LUTEOLA DC. KB. 4. Blb. u. Gf. eben so viele.

3. R. LUTEOLA (L.) B. verlängert-lanzettl., kahl, an der Basis *12zählig*; K. 4th.; St. aufrecht. ☉. Auf Feldern, an Mauern, Wegen, (durch das ganze Gebiet, aber nicht in Schles.) Jul. Aug. Schk. t. 129. Blb. gelblich-weiss.

XI. Ordng. DROSERACEEN. DC. theor. 214.

K. 5blättrig, in der Knospentlage dachig. Blkr. regelmässig, 5blättrig. Stbg. 5 u. mehrere, unterweibig, frei. Stbk. endst. Fruchtkn. frei, 1-3fächerig; STräger wandst.; Gf. mehrere, oft geth. od. mehrere N. Keim gerade, in der Achse des Eyweisses, Würzelch. gegen den Nabel gerichtet. Die jüngern B. zirkelf. von der Spitze nach der Basis eingerollt.

1. DRÓSERA (L.) Sonnentau. — K. tief-5sp. Blb. 5. Stbg. 5. Gf. 3-5, 2th. Kapsel 1fächerig, an der Spitze 3-5klappig; STräger wandst. Bth. weiss.

1. D. ROTUNDIFOLIA (L.) Rundblättriger S. — B. kreisrund Schaft aufrecht, 3mal so lang, als die B. 4., nach der würtemb

Fl. ☉. u. ☉., wie die folgenden. In Sümpfen u. mit Sphagnum angefüllten Torfmooren. Jul. Aug.

2. *D. LONGIFOLIA* (L. Hayn.) Langblättriger S. — *B. lineal-keilig*; Schaft aufrecht, 3mal so lang, als die B. 4. An schlammigen O. u. Torfmooren, (fast deh das ganze Gebiet.) Jul. Aug. *D. anglica* Hudson. D. fl. 2. 501. Var:

a vulgaris, B. lineal-keilig, u.

β. obovata B. verkehrteyf-keilig od. verkehrteyf.; *D. obovata* M. et K. d. fl. Koch Synops. ed. 1. Rchb. ic. f. 4526. *D. rotundifolio-anglica* Schied. pl. hybrid. Diese in d. Alpen, Vogenen u. in Pommern. Die ausgerandete od. ungetheilte N. scheint nur eine Variet. zu bezeichnen.

D. INTERMEDIA (Hayne.) Mittelst. S. — B. verkehrteyf-keilig; Schaft an der Basis hogig od. niederliegend *aufstrebend*, wenig länger, als die B. 4. In tiefen Sümpfen, (ebenfalls deh das ganze Gebiet.) Jul. Aug. *D. longifolia* Smith. *D. longifolia* L. zum Theil: vgl. Fries. nov. fl. succ. ed. 2. p. 82.

2. *PARNASSIA* (L.) Parnassie. — K. 5blättrig. Bkr. 5blättrig. Nebenkronblätter 5, borstig-gewimpert, drüsentrag. Stbg. 5. Gf. fehlend; N. 1. sitzend. Kapsel 1fächerig, an der Spitze 4klappig, Klappen in der Mitte unvollständige Scheidewände tragend: Stträger an die Scheidewände angeheftet.

1. *P. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-P. — Nebenkronblätter mit 9-13 Borsten, Blb. kurz-benagelt; WB. herzf., das stengelst. stengelumfassend. 4. Auf Wiesen u. an feuchten O. der Ebenen u. Berge, bis zum ewigen Schnee der A. Jul. Aug. St. h. 13. Blb. weiss mit wässerigen Adern, Nebenkronblätter gelb-grünlich.

XII. Ördng. POLYGALEEN. Juss. annal. mus. 14. p. 386.

K. 5blättrig, KB. in der Knospenlage dachig: die 2 innern grösser, oft blumenblattig, Bkr. unregelmässig. Blb. 3-4, unterweibig, mit der Röhre der Stbg. mehr od. weniger verwachsen. Stbg. unterwärts 4brüderig, an der Spitze in 2 gegenst., gleiche Bündel getheilt. Stbk. 8. 1fächerig, mit einem Loche aufspringend. Fruchtkn. 1-2fächerig, die Scheidewand auf der Mitte der Klappen. Fächer 1eyig, Eychen hängend, oft an der Basis mit einem Samennantel versehen.

1. *POLYGALA* (L.) Kreuzblume. — K. 5blättrig, bleibend, die 2 innern KB. sehr gross, flügel. Bkr. 3-5blättrig, an die Stbg. angewachsen, das untere Blb. kielf. Kapsel zsgedrückt. S. an der Basis mit einem 4zähligen Mantel umgeben, an der Spitze nackt.

1. Rott. *POLYGALON* DC. prod. 1. 326. Der Kumm, das Auhängsel der Bkr., vielsp. Stbf. bis an die Spitze in 2 Bündel verwachsen.

1. *P. MAIOR* (J. a. t. 413.) Grössere K. — Blkr. mit vielspaltigem Anhängsel, die endst. Tr. vielblüthig; die Flügel elliptisch, 3nervig, d. Nerven an der Spitze mit einer schiefen Ader ineinanderfliessend, die Seitennerven auswendig aderig, die Adern ästig, netzig-verbunden; *Stiel des Fruchtkn. während des Aufblühens 3 od. 4mal so lang, als der Fruchtkn.* 4. Auf trocknen Wiesen und kräuterreichen Hügeln, (bisher blos in Unteröstr. u. Mähren.) Mai. Jun. Bth. $\frac{1}{2}$ Zoll lang, rosenroth. D.

2. *P. NICAENSIS* (Risso, nach Original-Expl.) Nicäische K. — Bth. mit vielsp. Anhängsel; endst. Tr. vielblüthig; die Flügel rundl. eyf., 3nervig, *die Nerven an der Spitze mit einer schiefen Ader ineinanderfliessend*, die Seitennerven auswendig aderig, *die Adern ästig, netzig-verbunden*; der Stiel des Fruchtkn. während des Aufblühens so lang, als der Fruchtkn.; die seitenst. DeckB. so lang, als das Bthstielch.; B. lanzettl., die untersten elliptisch, kürzer. 4. Grasige Hügel (bei Triest, u. wahrscheinlich im ganzen Litt.) Mai. Jun. *P. amblyptera* β . *pubescens* Rchb. fl. exc. mit Ausschluss des Synon. von Rochel. *P. buxifolia* β . Rch. ic. f. 51. Unterscheidet sich von *P. vulgaris*: Tr. an der Spitze schopfig, Bth. grösser, Flügel stumpfer, breit-, fast etwas rundl. eyf., DeckB. längl., die seitenst. an der eben aufgeblühten Pfl. so lang als der Bthstiel, das mittlere oft so lang als die unteren KB.; von *P. comosa*: die fruchttragende Tr. locker, die Kapsel 3mal kürzer als die Flügel, die Flügel noch einmal so gross u. deren Seitenadern ästiger u. netzig-zusammenfliessend.

3. *P. VULGARIS* (L.) Gemeine K. — Blkr. mit vielspaltigem Anhängsel, die endst. Tr. vielblüthig; die Flügel elliptisch-verkehrt-eyf., 3nervig, *die Nerven an der Spitze mit einer schiefen Ader ineinanderfliessend*, die Seitennerven auswendig aderig, *die Adern ästig, netzig-verbunden*; *Stiel des Fruchtkn. während des Aufblühens von der Länge des Fruchtkn.* od. kürzer als derselbe, die seitenst. DeckB. halb so lang, als das Bthstielch.; B. lanzettl., spitz, die untersten elliptisch, kürzer. 4. Auf trocknen Wiesen und uncultiv. O. der Ebenen, Berge u. VorA. Mai. Jun. Rb. ic. f. 52, 53. Bth. blau, rosenroth u. weiss; die Breite der Flügel auch sehr veränderlich. Eine Variet.

β . *P. oxyptera* Rb. ic. f. 46, 49., hat schmälere Flügel, als die Kapsel; *P. multicaulis* Tausch. Die Variet.

γ . *alpestris*, ist niedriger u. hat kurze, dichte Tr.: *P. vulgaris densiflora* Tausch, (in den Sudeten; in den Salzbg. A.)

4. *P. COMOSA* (Schk. 2. t. 294.) Schopfige K. — Blkr. mit vielspaltigem Anhängsel, die endst. Tr. vielblüthig; die Flügel elliptisch-verkehrt-eyf., 3nervig, *Nerven an der Spitze doch eine schiefe Ader ineinanderfliessend*, die Seitennerven auswendig aderig, *die Adern ästig, wenig netzig verbunden*; *Stiel des Fruchtkn. während des Aufblühens fast von der Länge des Fruchtkn.*, od. kürzer; die seitenst. Deck-B. so lang, als das Bthstielch.; B. lineal-lanzettl., die untersten elliptisch, kürzer. 4. Mit der vorhergehenden an demselben O. Mai. Jun. Rb. ic. f. 54-56. Bth. rosen-

roth, seltner blau u. weiss. Die St. oft aufrecht; kommen aber auch ganz niederliegend vor. Die seitenst. DeckB. so lang, als das Bthstiellch., u. vor dem Aufblühen länger, als d. Bthknopf; daher die Tr. an der Spitze schopfig.

P. monspeliaca, welche in D. u. d. Schw. noch nicht gefunden wurde, untersch. sich dch folgds: die Seitennerven der Flügel sind auswendig u. der mittlere auf beiden Seiten aderig, an der Spitze aber nicht ineinanderfliessend; die B. aus breiterer Basis allmählich verschmälert, sehr spitz.

5. *P. DEPRESSA* (Wenderoth.) Niedergedrückte K. — Blkr. mit vielspaltigem Anhängsel, *Tr. meist 5blüthig, zuletzt seitenst.*; die Flügel elliptisch-verkehrteyf., 3nervig, *die Nerven an der Spitze durch eine schiefe Ader ineinanderfliessend*, die Seitennerven auswendig aderig, *die Adern ästig, netzig-verbunden*; die seitenst. DeckB. halb so lang als d. Bthstiellchen. B. lanzettl., spitz, die untern elliptisch, die mittlern fast gegenst. 4. Auf torfhaltigen Wiesen, sowohl der Ebenen, als der Berge, (von Schwaben u. dch das Rheingebiet bis Westphalen, u. Holstein. Mai. Jun. *P. serpyllacea* Weihe. *P. vulgaris depressa* Fries nov. fl. s. mant. Die Tr. armblüthig, zuletzt seitenst., indem ein od. das andere Aestchen aus d. Winkel der obern B. hervorsprosst; die St. niedergestreckt, dünn, fädlich, oft sehr ästig; Kraut geschmacklos. D.

6. *P. CALCAREA*. (F. W. Schultz bot. Ztg. 1837. 2. 732.) Kalk-K. — Blkr. mit vielspaltigem Anhängsel, die endst. Tr. vielblüthig; Flügel eyf., 3nervig, *der mittlere Nerve fast von der Mitte an aderig-ästig*, die Seitennerven auswendig aderig, *die Adern ästig, vielfach netzig-verbunden*; *Stämmchen sehr verlängert*; B. derselben *verkehrt-eyf.*, stumpf, die obersten davon sehr gross, die an den im Sommer getriebenen Stengeln lanzettl.-lineal. 4. Auf Hügeln, trockenen, unbauten Kalkgebirgen und trockenen Torfwiesen, (bisher blos in der Rheinpfalz bei Zweibrücken.) Apr. bis Juni. *P. calcarea* Schultz. fl. gall. et germ. exs. *P. amara* Rchb. fl. g. exs. n. 709. *P. Buxi minoris folio*. Vaillant. bot. par. — Verschieden von *P. amara* dch die grösseren nicht regelmässig rosettigen B. d. Stämmchen, dch schmale, lineale, od. lineal-lanzettl. B. der im Sommer getriebenen St., dch länger ausdauernde DeckB., dch mehrfacher zsfliessende Adern, u. dch das Fehlen des bitteren Geschmacks.

7. *P. AMARA* (L.) Bittere K. — Bth. mit einem vielspaltigen Anhängsel, die endst. Tr. vielblüthig; die Flügel längl., verkehrt-eyf., 3nervig, Nerven an der Spitze kaum ineinanderfliessend, *die Seitennerven aussen aderig, die Adern spärlich-ästig, nicht netzig verbunden*; B. d. Stämmchen *mässig verlängert, verkehrt-eyf.*, stumpf, die obersten davon rosettig, sehr gross, die an den im Sommer getriebenen St. längl.-keilig. 4. Auf feuchten, torfhaltigen Wiesen der Ebenen, Berge u. der A., auch der höchsten u. bis zum ewigen Schnee. Jun.-Aug. Die W. der jüngern Pflanze schwach, fädlich, der alten dicker, holzig, gewunden. Kommt vor:

α. genuina; Bth. grösser, die Flügel oft länger, als die Kapsel, die WB. sehr gross, in eine Rosette zsgedrängt: P. amara J. a. t. 412. P. amarella Crantz. Rb. ic. f. 43. 44. Die Bth. dieser Variet. sind meist satt-blau. Kommt vorzügl. auf den VorA. vor.

β. amblyptera; Bth. u. B. wie bei d. Variet. α, aber die Flügel breiter, fast so breit, als die Kapsel: P. amblyptera var. α. Rb. nach lichten v. Lucas in Thüring. gesammelten u. v. seinem Freunde Hornung mitgetheilten Expl. P. buxifolia Rb. ic. f. 50, (nicht 51.)

γ. alpestris; niedriger, die B., auch die obern, elliptisch. Die WB. fehlen oft, (nicht immer). P. alpestris Rb. ic. f. 45, nach einem vom Autor erhaltenen Expl. Auf den höheren A.

δ. austriaca; Bth. kleiner, die Flügel oft kürzer, als d. Kapsel. Bth. weisslich oder bläulich, seltner satt-blau. Ich fand sie oft sehr bitter, u. niemals geschmacklos: P. myrtifolia Fries. Aendert, wie alle, sogar auf einer u. derselben W., mit einer mehr zugerundeten Kapsel: P. austriaca Rb. ic. f. 42; u. mit einer mehr keiligen: P. uliginosa Rb. ic. f. 40. 41.

II. Rotte. CHAMAEBUXUS DC. l. c. Kamm der Blkr. 4lappig. Stbl. frei, an der Basis nur Ibrüderig.

8. P. CHAMAEBUXUS (L.) Buchsbaumblättrige K. — Kamm der Blkr. 4lappig; Bthstiele blattwinkel- u. endst., meist 3blüthig; die St. sträuchig, ästig, aufstrebend; B. lanzettl. od. elliptisch, stachelspitzig. b. Auf Haiden u. in Wäldern der Ebenen u. niedrigeren Gebirge, der VorA. u. d. A, auch der höchsten, (v. Böhm. n. Mähr., dch Oestr. u. d. g. AK. bis in die Schwz, nördl. in Oberschwab. und bis Regensburg; vereinzelt bei Nürnberg.) Apr.-Jun. St. h. 13. J. a. t. 233. Bth. gelb.

XIII. Ordng. SILENEEN. DC. prod. l. p. 351. Caryophyllearum gen. Juss. g. 299.

K. 1blättrig, an d. Spitze 5-6zähmig, Zähne in d. Knospenlage dachig. Blb. ebensoviel als Zähne des K., mit diesen abwechselnd, mit den Stbg. auf einem mehr od. weniger deutlichen u. verlängerten Fruchträger eingefügt. Stbg. noch 1mal so viel, als Blb., abwechselnd an die Nägel der Blb. angewachsen; od. so viel, als Blb., und mit diesen abwechselnd. Fruchtkn. frei, v. der Basis bis über d. Mitte 2-5fächerig, od. an d. Basis nur unendlich-fächerig, vieleiyig, STräger im Mittelpunkte u. wenigstens oberwärts frei. Gf. 2, 5, getrennt. Kapsel mit 4, 6, 10 Zähnen aufspringend; od. eine etwas fleischige, nicht aufspringende Fruchthülle. S. eyweisshaltig; Keim ringförmig am Rande des S.; Würzelchen gegen d. Nabel gerichtet. B. gegenst., nebenblattlos.

1. GYPSOPHILA (L.) Gypskraut. — K. 5zähmig, od. 5sp., an der Basis nackt. Blkr. 5blättrig; Blb. nach der Basis all-

mählig keilig-verschmälert. Stbg. 10. Gf. 2. Kapsel 1flüchrig, an der Spitze 4klappig. S. nierenf.-kugelig. Blb. weiss od. hell-rosenroth.

1. *G. REPENS* (L.) Kriechendes G. — Die St. aus einer niedergestreckten Basis aufrecht, *oberwärts locker-ebensträussig u. nebst den Aesten kahl*; die K. kreiself.-glockig, halb 5sp., Zpfl eyf.-länglich, stumpf, gerade; Stbg. u. Gf. kürzer, als die Blbkr.; B. lineal., nach beiden Enden verschmälert. 4. An kiesigen Abhängen d. A., auf Kalkboden, mit d. Flüssen u. Giesblächen in die Ebenen herabsteigend, (in d. ganzen AK.: vereinzelt am Harze bei Walkenried.) Jun.-Aug. J. a. app. t. 407. *G. prostrata* All., nicht Linn.

2. *G. FASTIGIATA* (L.) Doldiges G. — Die St. aus einer aufstrebenden Basis aufrecht, *an dem Gipfel gedrungen-ebensträussig, oberwärts nebst den Aesten schmierig-flaumig*; die K. glockig, halb 5sp., Zpfl eyf., abgerundet-stumpf, gerade; Gf. u. d. Stbg. länger, als die Blbkr.; B. lineal., nach beiden Enden verschmälert. 4. An gebirgigen O. u. auf Sandfeldern. (in Mähren u. v. da dch Böhm., Schles., die Lausitz, Sachs., Berlin, Thüringen bis nach Hannover; vereinzelt bei Mainz u. bei Unadingen im Oberbadisch.; selten in den Graubündner A.) Jun. Aug. Rupp. fl. jen. t. 1. f. 2. *G. arenaria* WK.

3. *G. PANICULATA* (L.) Rispißes G. — Die St. v. d. Basis an sehr ästig, rispiß, unterwärts kurz h., Rispe weitläufig, locker, kahl; die K. beckenf.-glockig, tief-5sp., Zpfl rundlich-eyf., sehr stumpf, gerade, mit einem vor der Spitze verschwindenden Rückenstreifen; B. lanzettl., sehr spitz, meist 3nervig. 4. Auf sandigen, steinigen Hügeln, (Wagram u. Türkenschanze bei Wien, in Mähren am Czeizer See.) Jul. J. a. app. t. 1. Die Ungarischen u. Mährischen Expl. stimmen ganz mit d. Sibirischen überein. Rispe ganz kahl, wie sie in d. Fl. altaica 2. 127 beschrieben wird; auch Linne erwähnt nichts von einem Flaume der Rispe. Rb. beschreibt die Rispe der *G. paniculata* drüsig; vgl. fl. ex. 1. 802. D.

4. *G. ACUTIFOLIA* (Fischer.) Spitzblättriges G. — Die St. v. d. Basis an sehr ästig, rispiß, kahl, Rispe locker, weitläufig, Aestchen nebst d. Bthstielen schmierig-flaumig; die K. glockig, halb 5sp., Zpfl länglich, zugespitzt, an d. Spitze zurückgekrümmt; Stbg. u. Gf. kürzer als die Blbkr.; B. lanzettl., sehr spitz, meist 3nervig. 4. Auf Sandfeldern, (in den an Ungarn grenzenden Gegenden Unterösterreichs.) Jul. Aug. D.

5. *G. MURALIS* (L.) Mauer-G. — Der St. aufrecht, fast gabelsp., ästig-rispiß, an d. Basis etwas rauh; die Bth. zerstreut; die K. kreiself.-5zählig, Zähne abgerundet-stumpf; die Blb. gekerbt od. ausgerandet; B. lineal., nach beiden Enden verschmälert. 4. Auf Aeckern, Feldern, an O., welche im Sommer austrocknen. Jul. Aug. St. h. 1. Die Blb. hell-purpurn, Adern satter. *G. serotina* Hayne ist nicht verschieden; die Blb. werden auf einer u. derselben W. ausgerandet u. gekerbt gefunden.

2. TUNICA (Scopoli mit Abänderung.) Felsnelke. — K. 5zäh-
nig, an der Basis mit Schuppen gestützt. Blb. 5, nach der Basis
allmählig keilig-verschmälert. Kapsel 1fächerig, an d. Spitze 4klap-
pig. S. schildf., auf d. einen Seite etwas konvex, auf d. andern
konkav, mit einem hervorspringenden länglichen Kiele. (Diese
Gattung untersch. sich v. Gypsophila dch die Schuppen u. Samen
des Dianthus, v. Dianthus dch die allmählig verschmälerten u. den
Schlund nicht schliessenden Blb. der Gypsophila.)

1. T. SAXIFRAGA (Scop.) Steinbrechende F. — Die St. nach
allen Seiten hingebreitet, oberwärts ästig; die K. glockig, stumpf-
5zählig; B. lineal., spitz, am Rande rauh, an der Basis häutig-
berandet, an den St. angedrückt. 4. Auf steinigen Hügeln, trocknen
Kiesfeldern, an Wegen, (in d. südwestl. Schwz, Veltlin, am Genfer-
see; im südl. Tyrol, Krain, Littor.; sodann vom Bodensee dch
Oberschwaben, Bayern bis Regensburg, die Donau hinab bis Wien;
in Böhmen; vereinzelt bei Jena u. Hannover.) Jul. Aug. Gypso-
phila saxifraga L., nach der Diagnose, den Synonymen u. d. Va-
terlande; Barr. ic. t. 998. — Smith überträgt die Gypsophila saxi-
fraga Linnes auf eine andere, in Griechenland einheimische, jäh-
rige Pflanze, die weder mit den in den Spec. plant. angeführten
Synonymen, noch mit d. Vaterlande, noch mit d. Dauer überein-
stimmt, u. behauptet, unsere Pflanze sei ein u. dieselbe mit
Gypsophila rigida, welcher Linne 2blüthige Bthstiele zuschreibt.
Die unsrige, welche zerstreute, 1blüthige Bthstiele hat, ist ohne
Zweifel die Tunica saxifraga des Scopoli u. mag diesen Namen
behalten.

3. DIANTHUS (L.) Nelke. — K. 5zählig, an der Basis mit
Schuppen gestützt. Blb. 5, gegen den Schlund in einen lineal.
Nagel zsggezogen. Stbg. 10. Gf. 2. Kapsel 1fächerig, an d. Spitze
4klappig. S. schildf., auf der einen Seite etwas konvex, auf der
andern konkav u. v. einem hervorspringenden Kiele durchzogen.

1. Rotte. ARMERIASTRUM Ser. in DC. prodr. 1. 355. Bth. köpfig od. etwas
gehäuft. Blb. gezähnt od. fast ganzrandig. Bth. fleischfarbig od. purpurn.

1. D. PROLIFER (L.) Sprossende N. — Die Bth. gehäuft-köpfig;
die 6 Hüllschuppen durchscheinend-häutig, rauschend, elliptisch,
die 2 äussern um die Hälfte kürzer, stachelspitzig, die innersten
sehr stumpf, länger, als die K.; die Kelchschuppen d. Hüllschuppen
gleichgestaltet, den K. einwickelnd; der St. kahl; die S. glatt. ☉.
Auf Sandfeldern, sonnigen Hügeln. Jul. Aug. Tunica prolifera
Scop. — Einen D. diminutus L., welcher durch eine unrichtige
Beobachtung entstanden ist, giebt es nicht.

2. D. VELUTINUS (Gussone.) Flaumh. N. — Die Bth. gehäuft-
köpfig; die 6 Hüllschuppen durchscheinend-häutig, rauschend,
elliptisch, die 2 äussern um die Hälfte kürzer, stachelspitzig, die
innersten sehr stumpf, länger, als die K.; die Kelchschuppen den
Hüllschuppen gleichgestaltet, den K. einwickelnd; die mittlern
Glieder des St. zottig; die S. kurzstachelig. ☉. Auf unfrucht-
baren, sonnigen Hügeln, (bei Triest v. F. Meyer gesammelt, in d.
Sammlung Alex. Brauns befindl.) D.

3. D. ARMERIA (L.) Rauhe N. — Die Bth. gebüschelt; die Kelchschuppen u. DeckB. lanzettl.-pfriemlich, krautig, ungefähr so lang, als die Röhre, *rauhh.*; B. lineal, nach vorne verschmälert, an der Spitze stumpflich u. nebst dem St. flaumh. ☉. An waldigen O., an Zäunen, hie u. da. Jul. Aug. D. hirtus Lam. Schk. t. 121. St. h. 23.

4. D. BARBATUS (L.) Bart-N. — Die Bth. büschelig-gehäuft; d. Kelchschuppen krautig. eyf., begrannt; Granne pfriemlich, so lang, als die Röhre; die äussern DeckB. lineal.-lanzettl., *sehr spitz, zurückgebogen-abstehend*; B. kurzgestielt, lanzettl., 4. Auf den Wiesen der A. u. Berge (Veldin, Kärnth., Krain, Steyerm.) Jul. Aug. D.

5. D. CARTHUSIANORUM (L.) Karthäuser-N. — Die Bth. in *ein endst., meist 6 blüthiges Köpfchen* gehäuft; Kelchschuppen lederig, *braun, rauschend*, verkehrteyf., sehr stumpf, begrannt; Granne pfriemlich, länger, als die halbe Röhre; Hüllschuppen fast eben so gestaltet; *Platte der Blb. so lang als ihr Nagel*; B. sämmtlich lineal; *die Sch. länger, als die 4fache Breite des B.* 4. Auf trocknen, bergigen Wiesen, bis in die A. hinaufsteigend. Jul. Aug. St. h. 27. Rb. ic. 7. f. 732. u. D. vaginatus Rb. ic. 7. f. 731.

× 6. D. ATRORUBENS (All.) Braunkelchige N. — Die Bth. in *ein endst., 12-30 blüthiges Köpfchen* dicht zsgesballt; Kelchschuppen lederig, *braun, rauschend*, verkehrteyf., sehr stumpf, begrannt; Granne pfriemlich, länger als die halbe Röhre; Hüllschuppen fast eben so gestaltet; *Platte der Blb. halb so lang als ihr Nagel*; B. sämmtl. lineal.; *die Sch. länger, als die 4fache Breite d. B.* 4. Auf grasigen Triften der niedrigen Gebirge u. A., (in d. C. Wallis u. Uri auf ATriften, im südl. Tyrol u. im östr Littor.) Jun. Jul. D. atrorubens All., nach den von den Herren Balbis u. Colla so benannten Expl; u. die Worte der Beschreibung: „die Schuppen transparent, weisslich-roth“ bezeichnen schon hinlänglich diese Art. D. atrorubens Gaud. Jacq. ic. rar. t. 467 ein dch Kultus vergrössertes Expl. D. Carthusianorum *β.* atrorubens DC. D. vaginatus Vill. D. diutinus Rb. ic. 6. f. 729. (kleines Expl., die Blb. wenig gekerbt,) nicht Kit. Var. mit Grannen der Hüllschuppen, die so lang sind, als das Köpfchen, oder fast um die Hälfte kürzer. Wie bei vielen Pflanzen giebt es auch hier kleine u. wenigblthige Expl.

D. atrorubens MBieberst., Rb. ic. 6. f. 735., D. capitatus DC., wurde noch nicht im Bezirk unserer Fl. gesammelt, er wird leicht erkannt: Die Hüllschuppen sind grünlich-weiss, hechtblaubereift, das oberste Paar der B. ist an der Basis lanzettl.-verbreitert, u. die Sch. derselben sind bauchig.

D. diutinus Kit., in den Gegenden unserer Fl. noch nicht beobachtet, ist nach Expl. v. d. berühmten Autor einerlei mit D. polymorphus MBieberst., u. dch die abgerundet-stumpfen Zähne des K. sehr ausgezeichnet.

7. *D. LIBURNICUS* (Bartling) Illyrische N. — Die Bth. in ein endst., meist 6blüthiges Köpfchen gehäuft; Kelchschuppen lederig, bleichgrün, geglättet, länglich, in eine krautige, lanzettl.-pfriemliche Spitze, ungefähr v. der Länge der Röhre, endigend; Hüllschuppen fast eben so gestaltet; B. sämmtl. lineal.-lanzettl., od. lineal.; die Sch. länger als die doppelte Breite des B. 4. Auf felsigen Hügeln. (im Littor.; im Walde v. Lippiza und bei Fiume.) Jul. Von d. Expl. des *D. Seguierii*, deren Bth. dicht-gehäuft erscheinen, untersch. er sich dch den 4 kantigen St. u. die längern BSch. Variet.:

? *β. B. meergrün: D. Balbisii* Ser. in DC. prodr. *D. glaucophyllus* Hornem. *D. collinus* Balb., nach ein. v. Colla an seinen Freund Martius gesandten Expl. D.

8. *D. SEGUERII* (Villars.) Seguer's N. — Der St. oberwärts 2sp.; Bth. gezwielet od. büschelig-gehäuft od. rispig; Kelchschuppen eyf., begrannt; Granne krautig, so lang, als die Röhre, od. 2 od. 3 mal kürzer; DeckB. lanzettl.; B. lineal.-lanzettl., verschmälert-zugespitzt, meist 5 nervig; die Sch. ungefähr so lang, als die Breite des B.; Blb. verkehrteyf., gezähnt. 4. Auf grasreichen, buschigen Hügeln, (C. Wallis u. Tessin; Tyrol, Steyerm.; in Bayern bei München u. Regensbg.; in Böhm. u. Mähr.; in Sachsen.) Jun.-Aug. *D. collinus* Gand. *D. Carthusianorum* All.; Bertolon! *D. asper* Willd. So sehr er auch varirt, so ist doch d. Köpfchen, so gar wenn es dicht gehäuft ist, niemals von Hüllschuppen ganz umgeben;

α. asper; Kelchschuppen etwas abstehend: *D. Seguierii* Wulf. *D. asper* Rb. ic. f. 7441. *D. scaber* Schleich., u. eine mehr breitblättrige Form: *D. Courtoisii* Rb., *D. asper* Lej., der aber im Bezirk der Fl. v. Spa nicht wild vorkommt, vergl. comp. fl. belgic. 1. p. 81. Eine ähnliche Form von der folg. Variet. sammelte ich in der Nähe v. Rgensbg.

β. sylvaticus; Kelchschuppen aufrecht od. angedrückt: *D. sylvaticus* Hoppe bei St. h. 28. *D. Seguierii* Rb. ic. f. 740.

γ. collinus; die Bth. in ein dichter Büssel gedrängt: *D. collinus* WKit., Rb. ic. f. 739. Andere Abänderungen sind: *D. montanus* MB., Rb. ic. 5. f. 607. *D. Fischeri* Spreng. Der *D. alpestris* Balb. u. *D. geminiflorus* Lois! besteht in kleineren, 2-3 blüth. Expl.

δ. controversus; Blb. bis über d. dritten Theil eingeschnitten-gezähnt, Zähne lanzettl.-pfriemlich: *D. Sternbergii* Schleich! *D. controversus* Gaud. mit Anschluss der Synon. Hoppe's. Diese merkwürdige Variet. zog ich selbst aus d. Samen d. *D. sylvaticus*.

11. Rotte. *CARYOPHYLLUM* Ser. in DC. pr. l. c. Die Bth. einzeln od. rispig. *§. 1.* Blb. gezähnt od. fast ganzrandig.

9. *D. NEGLECTUS* (Lois.) Steifblättrige N. — Der St. 1blüthig; Kelchschuppen eyf., mit einer pfriemlichen, straffen Granne, so lang, als die Röhre od. länger; B. lineal., starr, v. der Mitte an verschmälert-spitz, am Rande rauh, unterseits 3nervig; Blb. gekerbt. 4. Auf d. höchsten A. der Schwz, sehr selten, (auf den Umbrail in Graubünden u. auf den Glarner A. gegen Graubünden

zu.) Jul. D. glacialis DC. prodr., Gaud. D. alpinus DC. fl. franc. 8.
D. tener Balb.

10. D. ALPINUS (L.) Alpen N. — Der St. *tblüthig*; Kelchschuppen lanzettl., begrannt; Granne lineal-pfriemlich, krautig, ungefähr so lang, als die Röhre; B. lanzettl.-lineal., *stumpf*, nach d. Basis verschmälert, 1nervig; Bbl. gekerbt, *noch 1mal so lang*, als der K. 4. Auf d. A. u. VorA., (Unteröstr. u. Steyermark.) J. a. t. 52. St. h. 51. Bth. oben fleischfarbig, mit einem purpurn u. weissgefleckten Ringe am Schlunde, unterseits grünlich-weiss. Der St. 2-3 Zoll hoch. D.

11. D. GLACIALIS (Hänke.) Eis-N. — Der St. *tblüthig*; Kelchschuppen lanzettl., begrannt; Granne lineal.-pfriemlich, krautig, länger als die Röhre; B. lineal., *stumpf*, 1nervig, nach d. Basis verschmälert; Bbl. gekerbt, *anderthalbmal so lang, als der K.* 4. Auf den höchsten GranitA. (Granbünden u. Glarus; Tyrol; Salzburg; Kärnthen, Steyerm.) Jul. Aug. D. alpinus St. h. 28. Unterschieden von der vorhergehenden dch die dicht-rasigen Stengel, meist längern Grannen u. kürzere, 1farbige Bbl.; ob nur Varietät? Die St. 2-3 Zoll hoch, oft fast fehlend.

12. D. DELTOIDES (L.) Deltafleckige N. — Die Bth. *einzeln*; Kelchschuppen meist zu 2, elliptisch, begrannt, mit der pfriemlichen Granne um die Hälfte kürzer, als der K.; B. lineal.-lanzettl., die untern *stumpf*, nach d. Basis verschmälert; die St. *flaumig-rauh*; Bbl. verkehrt-eyf., gezähnt. 4. Auf Wiesen u. trocknen Triften, an Waldrändern, (dch d. g. Geb., aber nicht überall; in d. Schwz nur im Engadin.) Jun.-Sept. Rb. ic. 6. f. 713. D. supinus Lam. — Var.: die Kelchschuppen allmählich verschmälert u. länger, oder abgebrochen-begrannt u. kürzer, nicht $\frac{1}{3}$ so lang, als der K.; die Bbl. länglich u. getrennt od. verkehrteyf. u. aneinanderstehend. Bth. rosenroth, mit einem purpurnen Ring an d. Schlunde bezeichnet. Variirt ferner:

β . *glaucus*; B. meergrün, Bth. hell-rosenroth od. weiss, mit einem purpurnen Ringe; D. glaucus L., Rb. ic. 6. f. 748. D. deltoides β . Sm.

13. D. CILIATUS (Gussone. pl. rar. p. 168. 1826.) Gewimperte N. — St. aufrecht. 3-vielblüthig; Bth. wechselst., die obern genähert, sehr kurz-gestielt, angedrückt, die untern gestielt, entfernt, etwas traubig; Schuppen des K. *längl.-eyf., zugespitzt-verschmälert, fast dornig-stachelspitzig, am Rande durchscheinend, trocken-häutig*, 2-3mal kürzer als d. Röhre des K.; B. lineal., spitz, rinnig, am Rande fast wimperig-rauh; Bbl. etwas spitz, *lanzettl.-länglich od. elliptisch, ganzrandig od. schwach gezähnt*. 4. Auf Felsen am Meeresufer, (in der Gegend der Torre d'Orlando, [Rolands-Thurm] eine halbe Stunde von Pola entfernt, Tommasini.) Jul. Dianthus ciliatus Tenor. syllog. nach Expl. vom Autor selbst. D. litoralis Host. a. D. racemosus Vis. in bot. ztg. nach authent. Expl.

14. SYLVESTRIS (Wulfen.) Wilde N. — Der St. 1-3blüthig; die Bth. *einzeln*: Kelchschuppen angedrückt, *breit-eyf., abgestutzt-stumpf, kurz-begrannt*, 4mal kürzer, als die Röhre; B. grasgrün, lineal., spitz, am Rande *rauh*; Bbl. verkehrteyf., gekerbt,

bartlos; *Wurzelstämmchen sehr kurz*. 4. An felsigen trocknen O., (im Littor.; Krain; Steyerm., Kärnthen; Südtirol; Südschwz. u. von da bis auf d. A. hinauf, aber nicht diesseits der AK.) Jul. Aug. D. Caryophyllus ϵ . inodorus L. D. virgineus Host. (mit den Synonymen des D. virgineus J. und des D. sylvestris Wulf., welche er nicht einmal als Variet. trennt.) Bth. geruchlos. Var.: B. gras- und meergrün, K., wie auch bei andern vorkommt, kürzer und länger, breiter und schmaler; Blb. hell-fleischfarbig oder satt-rosenroth, gekerbt oder fast ganzrandig, und ausserdem a. der St. höher 2, 3 und mehrblüthig: D. virgineus J. a. app. t. 15. — D. Scheuchzeri und D. caryophylloides Rb. sind Modificationen dieser Varietät.

β . *humilior*, niedriger, einblüthig: D. sylvestris Wulf. bei J. ic. rar. t. 82., St. h. 28. — Auf den höhern A. manchmal fast stengellos; diese

γ . *subcaulis* hat das Ansehen des D. glacialis, dazu gehört: D. frigidus bot. ztg. 1824. p. 283.

D. virgineus L., DC.! um Montpellier wild wachsend, unterscheidet sich: die Stämmchen sind verlängert, niedergestreckt; B. von der Basis an allmählich verschmälert; K. um die Hälfte kleiner; Schuppen eyf., mit einem breitem Hautrande und einer längern, dünnern Stachelspitze.

15. D. CARYOPHYLLUS (L.) Garten-N. — Die Bth. einzeln; *Kelchschuppen angedrückt, fast rautenf., mit einem Spitzchen*, 4 mal kürzer, als die Röhre; B. lineal, spitz, meergrün, *am Rande glatt*, an der Basis etwas raub; Blb. verkehrteyf., gekerbt, bartlos; *Stämmchen verlängert, niederliegend, sehr ästig*. 4. Wird überall der Zierde wegen cultivirt, und kommt hie und da auf Mauern, gleichsam wild vor. Jul. Aug. Bth. mit einem sehr angenehmen Geruche begabt, und mit der Färbung in das Unendliche variirend. + Mey
Linn

16. D. CAESIUS (Smith.) Blaugraue N. — Der St. meist 1blüthig; *Kelchschuppen angedrückt, eyf., stumpf, kurz zugespitzt* od. begrannt, 4 mal kürzer, als die Röhre; B. lineal., stumpflich, meergrün, *am Rande rauh*; Blb. verkehrteyf., gekerbt, bärtig; die Stämmchen niederliegend, wurzelnd, sehr ästig, dicht-rasig. 4. In Felsenspalten, (sehr zerstreut in Mähr., Schles., Böhmen und im Elbgebiete bis Barby; Thüring; in den baireuth. Gebirgen; Oberbayern; Oberschwaben; im Jura; dem Nahe- und Rhein-Gebirg bis Coblenz; den Ardennen.) Mai. Jun. St. h. 34. D. glaucus Huds. D. virgineus β . L. Bth. fleischfarbig. Var., wie der D. sylvestris, mit einem schmälern, breitem, längern und kürzern K. Eine Variet. mit gefüllten Bth. wird überall unter dem Namen Pfingstnelke in Gärten gezogen.

§. Die Blb. tief fingerig- oder fiedersp.-eingeschnitten.

17. D. PLUMARIUS (L.) Feder-N. — Die St. 2-5 blüthig, Bth. einzeln; *Kelchschuppen rundlich-eyf., kurz-stachelspitzig*, 4 mal kürzer, als die Röhre; B. lineal.-pfriemlich, meergrün, *am Rande rauh*; *Blb. bis zur Mitte fingerig-vielsp., mit einem ganzen, verkehrteyf. Mittelfelde*; Stämmchen niederliegend, wurzelnd, sehr + Fuchs
Linn

ästig, dicht-rasig. 4. An felsigen O., auf Hügeln und Sandfeldern, (in Unteröstr., Steyerm. und Mähr. in der Nähe von Wien.) Jul. Aug., später als *D. caesius*. *D. moschatus* Meyer. *D. odoratus* Vest. — Bth. rosenroth oder weiss, am Schlunde oft gefleckt; selten bartlos: *D. hortensis* Schrad. Var. ausserdem, wie der *D. sylvestris* und *caesius*, mit kürzerem und längerem K. und mit gefüllten Blumen, welche Varietät in den Gärten häufig angebaut wird. — Der ähnliche *D. serotinus* WK. p. r. h. ist eine verschiedene Art.

18. *D. ARENARIUS* (L.) Sand-N. — *Die St. meist 1blüthig*; Kelchschuppen eyf., stumpf, kurz-bespitzt, 4 mal kürzer, als die Röhre; B. lineal.-pfriemlich, grasgrün, am Rande rauh: *Blb. fiedersp.-vielth., mit einem ganzen und länglichen Mittelfelde*; *Stämmchen niederliegend*, wurzelnd, sehr ästig, dicht-rasig. 4. Auf Sandfeldern, (von Königsberg dch Preussen und Pommern bis Schles. und Niederlausitz.) Jul.-Septb. Rb. ic. 2. f. 259. Bth. wohlriechend, Platte an der Basis mit einem grünen Flecken, und mit weisslichen oder purpurnen Haaren bestrent. — Der in D. noch nicht beobachtete *D. gallicus* Pers., *D. arenarius* Thore, untersch. sich dch folgendes: d. B. sind meergrün, die untern stumpf, das Mittelfeld der bartlosen Blb. ist verkehrteyf., wie bei dem *D. plumarius*; von diesem unterscheidet er sich dch stumpfe B., 1blüthigen St. und stets bartlose Bth. D.

19. *D. SUPERBUS* (L.) Pracht-N. — *Der St. meist einzeln, 2-mehrblüthig*; Bth. zerstreut; Kelchschuppen eyf., zugespitzt-begrannt, 3 mal kürzer, als die Röhre: B. grasgrün, lineal.-lanzettl., zugespitzt, die untern stumpflich; *Blb. fiedersp.-vielth., mit einem ganzen länglichen Mittelfelde*. ☉. 4. Auf feuchten, sumpfigen Wiesen, (dch das ganze Gebiet hin und wieder.) Jul. Aug. Blb. hellrosenroth oder lila, an der Basis oft grasgrün und mit purpurnen Haaren gebartet. Bth. sehr wohlriechend.

20. *D. MONSPESSULANUS* (L.) Vorgebirgs-N. — Die Bth. gezweiet und fast gehäuft; *Kelchschuppen eyf., begrannt*, mit einer krautigen, pfriemlichen Granne halb so lang, als die Röhre; B. lineal., verschmälert zulaufend und sehr spitz; *Blb. bis zur Mitte fingerig-vielth., mit einem ganzen verkehrteyfförmigen Mittelfelde*; W. mehrstengelig, die St. aus liegender Basis aufstrebend. 4. Auf felsigen, waldigen Hügeln. (im Littor. und bis auf die Krainer, Steyerm. und Kärnthner A., wo die Pflanze in die Variet. γ . übergeht; im südl. Tyrol. Tessin und im Jura.) Jul. Aug. Bth. fleischfarbig oder weiss. *D. monspeliacus* L. im syst. nat. ohne Zweifel dch einen Schreibfehler. *D. erubescens* Trev. *D. acuminatus* Tausch. Var.:

β . *plumosus*; Blb. bartlos: *D. plumosus* Spreng. *D. Waldsteinii* Sternbg. nach einem Expl. vom berühmten Autor selbst. γ . *alpicola*; der St. niedrig, 1blüthig, dch den Standort auf den höhern A.: *D. alpestris* Hoppe bei St. h. 28., (Bth. unrichtig gezeichnet und colorirt.) *D. alpestris* Sternbg. *Tunica arenaria* Scop.

4. *SAPONARIA* (L.) Seifenkraut. — K. 5zählig, an der Basis nackt. Blb. 5, am Schlunde in einen lineal. Nagel zsggezogen. Stbg. 10. Gf. 2. Kapsel 1fächerig, an der Spitze 4zählig. S. nierenf.-kugelig.

I. Rotte. *VACCARIA* DC. prod. I. 365. K. geflügelt-kantig; Bth. locker ebensträussig.

I. S. *VACCARIA* (L.) Kuh-S. — Die Bth. locker-ebensträussig; die K. *geflügelt-kantig*; Blb. klein-gekerbt, nackt; der St. aufrecht, ganz kahl; B. lanzettl., an der Basis zsggewachsen. ☉. Auf Aeckern der Ebenen und niedrigeren Gebirge, auf Kalk- und Lettenboden, (im g. Gebiet; im nördl. seltner, fehlt in Preussen.) Jun. Jul. S. *rubra* Lam. *Gypsophila Vaccaria* Sm. *Vaccaria vulgaris* Host. V. *pyramidata* Fl. d. Wett. Bth. fleischfarbig.

II. Rotte. *BOOTIA* Necker DC. l. c. K. stielrund; Bth. ebensträussig-gehäuft.

2. S. *OFFICINALIS* (L.) Gebräuchliches S. — Die Bth. *büschelig-ebensträussig*; K. *walzlich, kahl*; Blb. gestutzt, bekrönt; der St. aufrecht; B. länglich-elliptisch. 4. Im Kiese der Bäche und Flüsse, an Zäunen und Gebüsch der Ebenen und niedrigeren Gebirge. Jul. Aug. St. h. 6. *Bootia vulgaris* Necker. Bth. hellfleischfarbig.

3. S. *OCYMOIDES* (L.) Rundblättriges S. — Kurzbl.; Bth. *ebensträussig-rispig*; K. *walzlich, zottig*; Blb. stumpf, oder seichtausgerandet, bekrönt; die St. niedergestreckt; B. lanzettl., oder elliptisch, die untern in den Bstiel verschmälert, verkehrteyf. 4. Auf sandigen Hügeln, und in den VorA., (in Kärnth., Tyrol und in der südöstl. Schw.) Apr. - Aug. J. a. app. t. 23. St. h. 59. Bth. roseuroth.

4. S. *LUTEA* (L.) Gelbes S. — Bth. *ebensträussig-köpfig*; K. fast walzlich, *rauhh.*; Blb. stumpf, bekrönt; die St. aufrecht; B. *lineal.*, die wurzelst. ganz kahl. 4. Auf den höchsten A., (d. südl. Schw. sehr selten, doch auf der mittäglichen Seite des Monte Rosa, am Fusse desselben über dem Thale Tornanche und etwas über den Alpenhütten, am Breuil genannt, häufig.) Jul. Aug. Gand. St. h. 29. Blb. schwefelgelb; Nägel und Stbg. schwarz-violett. S.

5. *CUCÚBALUS* (L. Gärtner.) Taubenkropf. — K. 5zählig, nackt. Blb. 5, benagelt. Stbg. 10. Gf. 3. Beere 1fächerig. S. nierenf.

I. C. *BACCIFERUS* (L.) Beerentragender T. — 4. In Gebüsch und Wäldern der Ebenen, an etwas feuchten O., an Ufern unter den Weiden, (dch das ganze Gebiet, aber nur hin und wieder, an vielen O. gar nicht.) Jul. Aug. C. *baccifer* Gärtn. C. *horizontalis* Mönch. *Silene baccifera* Roth. *Scribaea baccifera* Fl. d. Wett. *Lychnanthus scandens* Gmel. *Lychnis baccifera* Scop.

6. *SILENE* (L.) Leimkraut. — K. 5zählig, nackt. Blb. 5, benagelt. Stbg. 10. Gf. 3. Kapsel an der Basis 3fächerig, an der Spitze 6klappig. S. nierenf.

1. Rotte. *VISCAGO*. Bthstand traubig oder ährenf.; Bth. abwechselnd in einseitswendige oder zweizeilige, meist gezweigte Tr., oder in auf dieselbe Weise gebaute Ähren geordnet, mit einer einzelnen Bth. in der Gabelspalte.

1. *S. GALLICA* (L.) Französisches L. — *Die Tr. endst.*, meist *gepaart*, klebrig-flaumig; *Bth. wechselst.*; K. röhrig, rauhh., der fruchtrag. eyf., mit dem Bthstielchen abstehend oder zurückgeschlagen, Zähne des K. lanzettl.-pfriemlich; *Blb. verkehrteyf.*, *ungeth.*, ganzrandig, gezähnelte oder ausgerandet; B. länglich, die untern verkehrteyf. ☉. Unter den Saat. an kiesigen, sandigen O., (dch das Gebiet, hm und wieder.) Jun. Jul. Bth. fleischfarbig oder weisslich. Fruchträger sehr kurz, viel kürzer, als die Kapsel. Var.:

β. *quinquevulnera*; Blb. im Mittelfelde bluthroth, am Rande röthlichweiss, oder weisslich; *S. quinquevulnera* L. Blb. oft, wie bei der Hauptart ganzrandig, klein-gekerbt und verkehrtherzf., und die Früchte an den fetteren Expl. ebenso wagerecht-abstehend.

γ. *anglica*, der St. ästiger, ausgebreiteter: *S. anglica* L. Die Blb. werden bei Linne ganzrandig, bei DC. verkehrtherzf. genannt; sind wenigstens häufig auch klein-gekerbt und ganz, und die Früchte wegen sich gewöhnlich nicht mehr zurück, als bei den übrigen Varietäten.

Zwischen den aufgezählten Formen dieser Art und zw. der *S. sylvestris* Rb. suchte ich bis jetzt vergeblich einen Unterschied; auch ist *S. cerastoides* DC., nach einem Expl. von dem Autor selbst, nicht verschieden. Allein die gleichnamige Pflanze Linne's ist nach meiner Ansicht in der *S. coarctata* Lagasc. zu suchen. Diese untersch. sich deutlich: der fruchtrag. K. ist kürzer gestielt, immer aufrecht, unterwärts fast kugelig-bauchig, oberwärts in einen Schnabel zsgesogen, Kapsel fast kugelig-eyf., der Schnabel kurz, die Zähne der Kapsel immer aufrecht, bemerklich kürzer, als der K., die Blb. tief-2sp., mit lineal. Zipfeln; ob diese im Bezirk unserer Fl. schon aufgefunden wurde, ist mir unbekannt.

2. *S. VESPERTINA* (Retzius.) Abendblüthiges L. — *Die Tr. endst.*, meist *gepaart*, gewöhnlich 3blüthig; *Bth. wechselst.*; K. röhrig und etwas kenlig, 10 streifig, aderlos, angedrückt-flaumig, während des Aufblühens auf einem aufrechten Bthstielch. nickend, die fruchtrag. keulenf., aufrecht; Zähne des K. eyf., spitzlich; Blb. bis über die Mitte 2sp., spitz-bekränzt; B. verkehrteyf. oder lanzettl., nach der Basis verschmälert. ☉. Am Seestrande an sandigen O., (bei Triest.) Mai. Jun. *S. bipartita* Desf. *S. colorata* Poir. — Bth. fleischroth; Fruchträger so lang, als die Kapsel. D.

3. *S. DICHOTOMA* (Ehrhart.) Gabelsp. L. — *Die Tr. endst.*, *gepaart*, vielblüthig; *Bth. wechselst.*; K. röhrig, etwas bauchig, 10streifig, aderlos, rauhh., während des Aufblühens *nebst den sehr kurzen Bthstielch. nickend*, die fruchtrag. eyf.-länglich, aufrecht; Zähne des K. eyf., spitz; Blb. bis über die Mitte 2sp., gestutzt-bekränzt; B. elliptisch-lanzettl., zugespitzt, die untersten spatelig. ☉ Auf Aeckern und an Wegen, (bisher blos zw.

Wien und der ungarischen Grenze.) Mai. Jun. S. membranacea Poir. Bth. weiss. Fruchträger kurz, 3mal kürzer als die Kapsel. D.

11. Rote. OTITES. Bthstand rispig oder traubig rispig. Bth. in eine pyramidalische und breitere, oder traubige und schönere R. zsgestellt, welche aus gegenst. gabelsp. -geth., einen Bthstiel in der Gabelspalte tragenden Aesten, seltner aus wiederholt gabelsp. gebauet ist. Die R. wird zu einer quirligen Tr. wenn die Aeste sich verkürzen oder ganz fehlen; und zu einer einfachen Tr. wenn sich die erste Bth. der Aeste allein entfaltet.

4. S. viscosa (Persoon.) Klebriges L. — Klebrig-zottig; die Tr. quirlig; Bthstiele gegenst., 1-3blüthig; K. walzlich, in der Mitte ein wenig bauchig, Zähne stumpf; Bbl. 2sp., nackt; B. wellig. ☉ An Wegen, Zäunen, auf sandigen Triften. (bisher mit Gewissheit bloss in Böhmen und Mähr.) Jun. Jul. Cucubalus viscosus L. Bth. weiss. D.

5. S. italica (Persoon.) Italisches L. — Flaumig; die R. aufrecht, locker; die Aeste derselben gegenst., 3gabelig-verzweigt, klebrig-beringelt, 3-vielblüthig; Bth. gerade-vorgestreckt; K. keulig, Zähne stumpf; Bbl. 2sp., nackt; B. an der Basis gewimpert, die untern spatelig-lanzettl., in den Bstiel hinablaufend. 4. Auf steinigem, sonnigen Hügeln, (bei Triest, Fiume und in Istrien, C. Tessin.) Jun. Jul. Rb. ic. f. 465. Cucubalus italicus L. C. silenoides Vill. Viscago clavata Mönch. — Bth. oben weiss, unterseits mit hellvioletten, bleigrauen oder grasgrünen Adern bemalt. Var. wie viele andere Arten dieser Gattung, mit kleinern Bth. und kürzerm Fruchträger, der nicht ganz so lang, als die Kapsel ist: S. viscosa Schlecht. S. insubrica Gaud.; und mit dichter-flaumigen, fast grauen B.: S. pilosa Spreng. Rb. ic. 3 f. 426. Cucub. mollissimus WK. Die B. kommen manchmal, auch bei der gewöhnlichen Form, wellig vor.

6. S. nemoralis (Waldst. und Kit.) Hain-L. — Flaumig; R. aufrecht, beinahe geknüpft; die Aeste derselben gegenst., 3gabelig-verzweigt, klebrig-beringelt, 3-vielblüthig; Bth. geradeher-vorgestreckt; K. keulig, Zähne stumpf; Bbl. 2sp., nackt; B. an der Basis bärtig-gewimpert, die untern rundlich-elliptisch, in den Bstiel hinablaufend. 4. An waldigen O., (Mähr., Schles., Böhm., Sachs., nach Host in Steyerm., Krain und d. Litt.) Jun. Jul. Rb. ic. 3 f. 416. Dem Vorhergehenden sehr ähnlich, unterscheidet sich dch folgs: die wurzelst. und untern stengelst. B. breiter, die obern am Rande nach der Basis wollig-bärtig, die R. kürzer dichter und die Fruchträger auffallend länger, als die Kapsel. D.

7. S. nutans (L.) Nickendes L. — Flaumig, oberwärts drüsig-klebrig; R. einerseitswendig, während des Aufblühens einwärts-geknickt-überhängend, Aeste derselben gegenst., 3gabelig-verzweigt, 3-7blüthig; K. röhrig, etwas keulig, Zähne spitz; Bbl. 2sp., bekränzt; die untern B. lanzettl.-elliptisch, in den Bstiel hinablaufend; Zähne der Kapsel zurückgerollt. 4. Auf kräuterreichen Hügeln, felsigen Gebirgsabhängen, trockenen Wiesen, den Ebenen, niedern Gebirgen und Alpen. Jun. Jul. Bth. weiss, unterseits manchmal mit bleigrauen oder grünen Streifen bezeichnet. Fruchträger kaum den dritten Theil so lang, als die Kapsel. Var.:

β. infracta, einwärtsgeknickt, kahl, B. nur an der Basis gewimpert: *S. nutans β. infracta* Wahlenb. carp. *S. infracta* WK. Der aus botanischen Gärten erhaltene Same lieferte kahle und haarige, der *S. nutans* sehr ähnliche Expl., und ich konnte ausser der Kahlheit zw. *S. nutans* und *infracta* keinen Unterschied finden.

γ. livida, Blb. unterseits bleigrau-grün; sie ist nach Facchini's Beobachtungen eine reine Variet. von *S. nutans*.

S. S. CHLORANTHA (Ehrhart.) Grünblumiges L. — Kahl; die *Tr. einseitswendig*, *Aeste gegenst.*, 1-3blüthig; *Bth. während des Aufblühens überhangend*; K. röhrig, etwas keulig, Zähne stumpf; Blb. 2sp., bekränzt; die untern B. lineal.-lanzettl., in den Bstiel verschmälert; der St. fast nackt. 4. Auf sandigen, grasreichen Hügeln, in Nadelwäldern, den Ebenen und niederen Gebirgen, (im Odergebiete, nämlich in Schles., und dreh die Niederlausitz und Brandenbg nach Vorpommern.) Jul. Aug. *Cucubalus chloranthus* Willd. Bth. gelblich-grün. Fruchträger 4mal kürzer, als die Kapsel. D.

9. *S. TATARICA* (Persoon.) Tatarisches L. — Die *Tr. einseitswendig*, *aufrecht*, *Aeste gegenst.*, 1-3blüthig; *Bth. während des Aufblühens auf einem aufrechten Bthstiele nickend*; K. röhrig, etwas keulig, Zähne spitz; Blb. 2sp., nackt; B. lineal.-lanzettl., an der Basis verschmälert; der St. *deh die genäherten Gelenke dicht-beblättert*. 4. An sandigen O., (bisher blos in der Neu-mark, aber in sehr grosser Menge längs dem Ufer der Oder und der Warthe.) Jul. Aug. *Cucubalus tataricus* L. Kapsel 4mal so lang, als der Fruchträger.

10. *S. OTITES* (Smith.) Ohrlöffel-L. — Aeste der R. gegenst., quirlig-traubig, die Quirl reichblüthig, Bth. geradehervorgestreckt; K. röhrig-glockig und nebst d. R. kahl, Zähne stumpf; Blb. lineal., ungeth., nackt; B. verkehrteylanzettl. 4. Auf uncultiv. Hügeln, sandigen Feldern, an Wegrändern, (von Krain deh Orstr., Böhm., Schles., Sachs., nach Thüring., bis an den Harz und das östliche Westphalen; sodann im Lüneburgischen, in Mecklenbg und in Ostpreussen; auf der Rheinfläche stellenweise, vom Oberelsass und von Oberbaden an bis Mainz; im Mainthale bis Würzburg; bei Regensburg; in der südl. Schw.) Mai-Jul. Fl. dan. t. 518. *Cucubalus Otites* L. *C. parviflorus* Lam. Bth. klein, grünlich; die Pflanze vielhebig-zweihäusig. Fruchträger kaum vorhanden. *Cucubalus parviflorus* Ehrh., untersch. sich deh die flaum.-rauhe R.

III. *Rotte. Atrocos.* Bthstand ehensträussig od. ehensträussig-rispig; der St. gabelsp. geh., mit einem einzelnen, deckblattlosen Bthstiele in der Gabelspalte, und endst., 2deckblättrigen Bthstielen, in so fern aus dem Astwinkel dieser Deckbl. nicht weiter ein Aestchen hervortritt. (Die R. erscheint ehensträussig, wenn sich die Aeste und Aestchen verlängern; sie wird zu einem flachen Büschel deh sehr abgekürzte Aeste und Aestchen; und der St. wird 3blüthig, wenn er sich nur 1mal theilt. Von den 3 Bthstielen dieses 3blüthigen St. ist der mittlere nackt, die seitenst. mit 2 Deckbl. versehen; wenn einer von diesen 3 Bthstielen fehlt, so ist der eine von den beiden vorhandenen kürzer und nackt, der andere länger und hat 2 Deckbl., und wenn die 2 seitenst. Bthstiele verschwinden, entsteht ein 1blüthiger St.)

§. 1. K. aufgeblasen, nervig-vielstreifig, (20 30streifig) und netzig-aderig.

11. *S. INFLATA* (Smith.) Blasiges L. — Die B. endst., gabelsp.; Bth. gabel- und endst.; *K. eyf., aufgeblasen, vielstreifig, netzaderig, kahl*, Zähne eyf., spitz; Platten der Blb. 2th., an der Basis 2 höckerig; B. elliptisch oder lanzettl., zugespitzt. 4. Auf trocknen Wiesen, uncultiv. Hügeln, an buschigen, felsigen O., überall. Jul. Aug. Schk. t. 121. *Cucubalus Behen* L. *Silene Cucubalus* Wib. *C. glaucus* W. Link. Bth. weiss, zuletzt, nachdem der Saum sich schiel gestellt, fast unregelmässig; die Pflanze vielähig-2häusig. Fruchtträger kurz, halb so lang, als die Kapsel. Var.: *B. kahl, kahl und gewimpert, kurz- und rauh.*; auf den Alpen mit grösseren Bth. und reichblüthigem St.: *C. Antelopum* Vest.

β. angustifolia, B. lineal. od. lineal.-lanzettl.; kommt manchmal mit kaum $\frac{1}{2}$ halbe Linie breiten B. vor: *S. inflata β.* D. fl. 3. 236, an steinigen O., (zw. Imbach und den alten Kobaltgruben am Donnersberge in der Rheinpfalz; im Salzburgisch. bei Lofer.)

γ. alpina, B. längl. oder elliptisch, St. niederliegend, 1-3thig. *S. uniflora* var. *β.* und *γ.* DC. fl. fr., nach Expl. vom Autor. *S. maritima* Host. a., nicht With. *Cucubalus alpinus* Lam. dict., Allion. ped., (auf dem hohen Briel in Oestr., Brittinger.)

S. maritima With. bot. arrang., Smith engl. fl., *S. uniflora* Roth. catal., ist eine von *S. inflata* wahrhaft verschiedene Art, aber im Bereiche unserer Fl. noch nicht aufgefunden; sie unterscheidet sich drch immergrüne, niedergestreckte Stämmchen, der Saum der Blb. ist noch einmal so gross, an der Basis augenfällig bekränzt, die Zipfel breit-verkehrteyf., vorn fast so breit als lang, die Kapsel, nach Smith, bauchig, beinahe rundl., d. S., nach Roth, noch einmal so gross.

12. *S. PUMILIO* (Wulfen.) Niedriges L. — Die Bth. endst., einzeln; *K. aufgeblasen, länglich-glockig, vielstreifig, netzaderig, rauh.*, Zähne derselben eyf., stumpf; Platten der Blb. ungeth., randschweifig, borstlich-bekränzt; B. lineal., stumpflich, nach der Basis verschmälert. 4. An felsigen, etwas feuchten O. der GranitA., (Tyrol, Salzbg., Kärnth., Steyer.) Jun. Jul. St. h. 22. *Cucubalus Pumilio* L. *Lychnis Pumilio* Scop. Die rosenrothen Bth. gehören zu den grössten der Gattung, und scheinen in einen kaum 1 Zoll hohen Rasen eingesenkt und der Bthstiele zu entbehren. Fruchtkn. fast sitzend.

§. 2. *K. eyf.*, nach der Basis nicht verschmälert, nervig-vielstreifig (30streifig.) Streifen dicht-genähert, nicht netzig. (Die benabelte Basis kommt auch bei der folgend. Rote vor.)

13. *S. CONICA* (L.) Kegelfrüchtiges L. — Der St. grau-flaumig, oberwärts gabelsp.; Bth. gabel- und endst.; *K. 30streifig*, an der Basis benabelt, Zähne derselben pfriemlich, sehr spitz; Blb. lineal-lanzettl. ☉. Auf sandigen Feldern, (auf dem Rheingebiete von Strasbg bis Trier und Limbg und bis Westphal.; im östr. Littor.) Jun. Jul. J. a. t. 233. Bth. rosenroth. Fruchtträger, wie bei dem folgend., sehr kurz.

14. *S. CONOIDEA* (L.) Kugelfrüchtiges L. — Der St. drüsig-flaumig, oberwärts gabelsp.; Bth. gabel- und endst.; *K. 30 streifig*, an der Basis benabet, Zähne desselben pfriemlich, sehr spitz; Blb.

+ Liege
Early 15

ungeth. fein-gekerbt; *Kapsel platt-kugelig*, lang-geschnäbelt; *B.* länglich-lanzettl. ☉. Auf Aeckern unter der Saat, (Luxembg.) Jun. Jul. Moris. s. 3. t. 36. f. 6. *Bth.* rosenroth. *D.*

§. 3. *K.* länglich oder länglich-keulig. 10 nervig.

15. *S. NOCTIFLORA* (L.) Nachtblühendes L. — *Der St.* oberwärts *gabersp.*, und *nebst den Bthstielen und K. klebrig-zottig*, *Bth.* gabel- und endst.; *K.* etwas bauchig-röhrig, 10streifig, aderig, die fruchtttrag. elliptisch, Zähne desselben pfriemlich-fädlich; *Bth. tief-2sp.*, bekränzt; *B.* länglich, spitz, die obersten aus einer lanzettl. Basis schmal-zulaufend, die untersten verkehrteyf. ☉. Unter der Saat, vorzüglich auf Letten- und Kalkboden. Jul.-Septembr. St. h. 3. *Bth.* bleich-fleischroth. Fruchträger Smalkürzer, als die Kapsel.

16. *S. VALLESIA* (L.) Rasigstengeliges L. — *Die St.* rasig, niederliegend, 1-3blüthig; *B. und K. drüsig-rauh*; *Bth.* endst.; *K.* röhrig, 10streifig, oberwärts aderig, die fruchtttrag. keulig, Zähne des *K.* länglich; *Bth. 2sp.*, bekränzt; *B.* lanzettl., spitz, die stengelst. sitzend, die wurzelst. in den Bstiel verschmälert. 4. An hohen, unfruchtbaren O. der SchweizerA. sehr selten, (auf dem grossen St. Bernhard; unter dem M. Rosa, eine Stunde von Breuil, nahe bei einer Kapelle auf der linken Seite; zwischen Courmayeur und Allée-Blanche.) Jul. Gaud. Allion. ped. t. 23. f. 2, ein 7blüthiges, vielleicht deh. die Cultur vergrössertes Exempl. *Bth.* oben schwach-rosenroth, unterseits blutroth, mit rothen Adern. Fruchträger so lang, als die Kapsel. oder länger.

17. *S. ARMERIA* (L.) Garten-L. — *Völlig-kahl, die obern Glieder des St. klebrig-beringelt*; die R. endst., büschelig-gedungen, reichblüthig; *K.* röhrig-keulig, 10streifig. Zähne des *K.* eyf., stumpf; *Bth. ungeth.*, ausgerandet, spitz-bekränzt; *B.* eyf. ☉. An felsigen O., zw. Gebüsch und an sandigen O., (in der südl. Schw.; südl. Tyrol, Kärnth, Littorale; Rheinpfalz bei dem kalten Bach zu Pirmasenz und Annweiler, Nahe- und Rhein-Gebirge, von Creuznach bis Coblenz; Höxter in Westphalen; Geb. der Boile am Harz.) Jul. Aug. St. h. 21. *Bth.* rosenroth. Fruchträger so lang, als die Kapsel, oder länger.

18. *S. LIXICOLA* (Gmelin.) Flachs-L. — *Der St.* oberwärts *gabersp.*, ebensträussig-rispig; und *nebst den Bthstielen und K. von sehr kurzem Flaume etwas rauh*; *Bth.* gabel- und endst.; *K.* röhrig, 10streifig, die fruchtttrag. eyf.-keulig, zw. den Streifen aderig, Zähne des *K.* eyf., stumpf; *Bth. ungeth.*, ausgerandet, bekränzt; *B.* lineal.-lanzettl., die untersten verkehrteyf. ☉. Auf den Aeckern unter dem Lein, (im Württembergischen und nördlich bis Werthheim und Wassertrüdingen und Lentersheim. und östlich deh. Schwaben bis hinter München.) Jun. Jul. S. cranthema Wibel. in brieflichen Mittheilungen. und S. linacola Wib. nach Spreng., welcher diese mit *S. stricta* vereint. Letztere bezeichnet aber nach der Beschreibung Linne's eine ganz andere Art, die nach meiner Meinung in der *S. reticulata* Desf. zu finden ist. *Bth.* blass-fleischroth. Fruchträger halb so lang, als die Kapsel.

19. *S. ANNULATA* (Thore essay d'une chloris du dep. des Landes p. 173., nach Expl. vom Verf.) Ring-L. — *St. oberwärts gabelspaltig*, ebensträussig-rispig, *nebst den Bthstielen und K. kahl*; Bth. gabel- und endst.; K. keulig-röhrig, 10streifig, der fruchttragende eyf.-keulig, zwischen den Striefen aderlos; KZähne eyf., spitz; *Blb. 2sp.*, bekränzt; *B. lineal.*-lanzettl., *die unteren verkehrt eyf.*-lanzettl. oder *verkehrteyf.* ☉. Unter der Saat, (Untersteyerm. und neue Aufschüttung bei Triest.) Jun. Jul. *S. rubella* Wulf. in Roem. Arch. Blb. klein, purpurn. Fruchtträger 5-6 mal kürzer, als die eyf. Kapsel. Aehnlich der *S. linicola*, unterscheidet sich aber durch die Kahlheit, viel längere Bthstielen, purpurne Blb., zwischen den Streifen aderlosen K. und die anderen in der Beschreibung angegebenen Merkmale. *Silene rubella*, mit welcher Lois. und DC. diese verbinden, ist ganz verschieden.

20. *S. SEDOIDES* (J. coll. supp. p. 112. t. 14. f. 1.) Fetthennen-L. — *Der St. gabelsp. und nebst den Bthstielen und K. drüsig-kurzh.*; Bth. gabel- und endst.; K. röhrig, 10streifig, die fruchttrag. länglich-keulig, Zähne des K. eyf., stumpf; *Blb. ungeth.*, ausgerandet, *bekränzt*; B. stumpf, die untersten verkehrteyf., in den Bstiel verschmälert, die obern länglich und lanzettl., sitzend. ☉. An sonnigen, felsigen O., (auf der Insel Osero.) Jun. Jul. *S. sedoides* DC.! fl. fr. suppl. p. 605. Bth. rosenroth., unterseits bleich. Die Bthstiele nach dem Verblühen abstehend, mit einem schräg aufrechten K. Fruchtträger 4mal kürzer, als die Kapsel. J.

21. *S. SAXIFRAGA* (L.) Steinbrech-L. — *Die St. rasig, v. sehr kurzem Flaum etwas rauh*; Bthstiele endst., einzeln oder *gepaart*; K. keulig, 10streifig, aderlos, *kahl*, Zähne des K. eyf., stumpf; *Blb. tief-2sp.*, bekränzt; *B. lineal.*, nach der Basis verschmälert. 4. An gebirgigen O. der VorA. und A., (in der südl. Schw.; im südl. Tyrol; Kärnthen; Krain; Steyerm.) Bth. oberseits weiss, unterseits röthlich oder gelblich-grün. Zw. den von Rochel an den Bädern des Herkules gesammelten Expl. der *S. petraea* und zw. mehrern deutschen Expl. der *S. saxifraga* kann ich die von den Autoren aufgestellten wesentlichen Merkmale nicht entdecken. Die Kapseln an den Expl. von Rochel sind oval, an den deutschen oval-länglich und der Fruchtträger bei einer jeden so lang, als die Kapsel, oder ein wenig länger.

§. 4 K. kreiself.-glockig, kurz. S. am Rande kammf.-gewimpert.

22. *S. QUADRIFIDA* (L.) Vierzähliges L. — *Die St. rasig, gabelsp.*, die obern Glieder und die Bthstiele klebrig-beringelt; Bth. gabel- und endst., oder an dem 1blüthigen St. einzeln; K. kreiself., 10streifig, Zähne desselben eyf., stumpf; *Blb. verkehrteyf.*, 4zählig, bekränzt; Kapsel oval, ungefähr so lang, als der K.; *S. kammf.-gewimpert*; *B. lineal.*, *die untersten spatelig*. 4. An felsigen, etwas feuchten O. der A., (dch d. g. AK.) Jun. Jul. Bth. milchweiss. Auf den höhern A. ist die Pflanze kleiner: *S. pusilla* WK. An den nassen O. der GranitA. grösser, Blb. ein wenig breiter, mit den Rändern zsstossend, manchmal rosenroth:

β. pudibunda; *S. pudibunda* Hoffmannsegg bei Rb. ic. 9. f. 1177. Die Kapsel ist bei allen diesen Variet. bald kürzer, bald ein wenig länger, als der K: Fruchträger 3 oder 4 mal kürzer, als die Kapsel. Gf. immer 3.

23. *S. ALPESTRIS* (J. a. I. t. 96.) Alpen-L. — Die St. rasig, gabelsp. und daselbst nebst den obern Gelenken und Bthstielen klebrig beringelt; Bth. gabel- und endst.; K. kreiself., 10streifig, Zähne desselben eyf., stumpf; Blb. verkehrteyf., 4zählig, bekränzt; Kapsel länglich, noch 1mal so lang, als der K.; *S. kammf.-gewimpert*; *B. lanzettl.* 4. An Waldrändern und an nassen O. der VorA., (in Unteröstr. gemein; ferner in Kärnthen, Krain und Tyrol.) Jul. Aug. *S. viscida* Spreng. nach Rb. Dem vorhergehenden ähnlich, aber stärker, B. lanzettl., gegen 3 Linien breit, Bth. noch 1mal so gross, 5-6 Linien breit, Kapsel fast noch 1mal so lang, als der K., und der K. bei allen, wenigstens bei den von mir gesehenen Expl. mit kurzen, drüsentrag. Haaren bestreut. D.

§. 5. K. glockig oder kreiself.-glockig, kurz. S. am Rande ohne Kamm, u. so wie bei den übrigen Arten dieser Gattung, mit Ausnahme der im vorhergehenden §. enthaltenen, beschaffen.

24. *S. RUPESTRIS* (L.) Felsen-L. — Die St. gabelsp., völlig kahl; Bth. gabel- und endst.; K. kreiself., 10riefig, Zähne desselben eyf., stumpf; Blb. verkehrtherzf., bekränzt; *B. eyf.*, spitz, sitzend, die untern lanzettl., in der Basis verschmälert. 4. An trocknen felsigen O. der A. und VorA., (in den Vogesen und in der westl. und südl. Schw., sodann dch Tyrol nach Kärnth., Salzburg und Steyermark.) Jul. Aug. St. h. 22. Bth. milchweiss od. rosenroth.

25. *S. ACAULIS* (L.) Fast stielloses L. — Die St. einen sehr gedrungenen Rasen bildend und nebst den Bthstielen und K. kahl; Bth. endst., einzeln; K. glockig, 10riefig, aderlos, Zähne desselben eyf., stumpf oder ausgerandet; Blb. verkehrteyf., seicht ausgerandet, bekränzt; *B. lineal-pfriemlich.* 4. An felsigen, befeuchteten O. der niedrigeren und in den höchsten A. und bis über die Schneelinie hinaus. (dch d. g. AK.) Jun.-Aug. Eine vielehlig-3häusige Pflanze. Blb. satt-rosenroth; Kapsel länglich, noch 1mal so lang, als der K. Var.:

β. exscapa. Bth. blass-rosenroth, Kapsel oval, nur ein wenig länger als der K.: *S. exscapa* All.

7. *LYCHNIS* (DC.) Lichtnelke. — K. 5zählig, nackt. Blb. 5, henagelt. Stbg. 10. Gf. 5. N. einwärts mit Papillen besetzt, ausserdem kahl; Kapsel halb-5fächerig oder 1fächerig, an der Spitze mit 5 oder 10 Zähnen aufspringend.

1. Rotte. *Viscago* DC. fl. fr. 4. p. 761. Kapsel halb-5fächerig.

1. *L. VISCARIA* (L.) Klebrige L. — Blb. ungeth., bekränzt; der St. kahl, oberwärts unter den Gelenken klebrig; B. lanzettl., kahl, an der Basis gewimpert; Bth. traubig-rispig, fast quirlig. 4. Auf kräuterreichen, trockenen Hügeln und buschigen Bergabhängen. Mai. Jun. *Viscaria purpurea* Wimm. fl. v. Schles. Bth. freudig-purpurn.

2. *L. ALPINA* (L.) Alpen-L. — Blb. halb-2sp., nackt; *der St. kahl, nicht klebrig*; B. lanzettl., kahl, an der Basis gewimpert; Bth. dicht-doldig-köpfig. 4. Auf den höchsten GranitA. bis zum ewigen Schnee, (KalserA. in Kärnth.; in Tyrol an der Grenze von Graubünden: Graubünden, Veltlin und im Wallis auf den Fluelen über dem Lenker Bad und andern hohen A. daselbst.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 63. Bth. fleischroth.

II. Rotte. *LYCHNIS* DC. a. a. O. *Agrostemma* Alex. Braun in der bot. ztg. Kapsel 1 fächerig, mit 5 Zähnen aufspringend.

3. *L. FLOS CUCULI* (L.) Kukuks-L. — *Blb. bis über die Mitte 4sp.*, Zpfl lineal., handf.-auseinanderstehend; die StB. lineal.-lanzettl. 4. Auf fruchtbaren Wiesen und an waldigen, feuchten O. Mai-Jul. Fl. dan. t. 590. Bth. fleischroth, seltner weiss.

4. *L. CORONARIA* (Lamarck.) Gekrönte L. — Blb. ungeth., bekränzt; B. *nebst dem St. dicht-filzig*; Bthstiele mehrfach länger, als der K. ☉. An felsigen, gebirgigen, waldigen O., (in der südl. Schw.; im südl. Tyrol; diesscits der A., sehr selten; im Buhler Thale von Oberbaden; bei Neustadt an d. Haardt auf der Spitze des Kapellenberges; auf der Katze bei Gelnhausen) Jun. Jul. *Agrostemma coronaria* L. A. *Flos Jovis* Pollich. Bth. ansehnlich, purpurn.

5. *L. FLOS JOVIS* (Lamarck.) Schirmtraubige L. — Blb. beinahe halb-2sp., bekränzt; *der St. und die B. wollig-filzig*; Bthstiele kürzer, als der K. 4. Auf Bergwiesen und an sonnigen Gebirgsabhängen. (in dem Wallis und den Rhätischen A.; im südl. Tyrol.) Jun. Jul. *Agrostemma Flos Jovis* L. Bth. fleischroth.

III. Rotte. *Melandrium* Röhl. D. fl. Kapsel 1 fächerig, mit 10 Zähnen aufspringend.

6. *L. VESPERTINA* (Sibthorp.) Abend-L. — Blb. halb-2sp., bekränzt; der St. unterwärts zottig; die obern B. ey-lanzettf., verschmälert-zugespitzt und *nebst den Bthstielen und K. drüsig-kurz.*; Kapsel ey-kegelf., mit vorgestreckten Zähnen; Bth 2 häusig. ☉. als Variet. mit gefüllten Bth. aber mehrjährig. Auf uncultiv. Hügeln, trocknen Wiesen, an Acker- und Wegrändern. Jun.-Aug. St. h. 23. L. *dioica* β. L. L. *pratensis* Spreng. L. *alba* Miller. L. *arvensis* Schk. t. 124. *Melandrium pratense* Röhl. Bth. weiss, sehr selten röthlich, am Abend offen und angenehm riechend.

7. *L. DIURNA* (Sibthorp.) Tags-L. — Blb. halb-2sp., bekränzt; der St. nebst den B., Bthstielen u. K. zottig, mit einfachen Haaren; die obern B. eyf., plötzlich-zugespitzt; Kapsel rundlich-eyf., mit zurückgerollten Zähnen; Bth. 2 häusig. 4. Im Gebüsch und an waldigen feuchten O., an Bächen und Flüssen; häufig auf den Wiesen der VorA. Mai. Jun., früher als die vorhergehende. St. h. 23. L. *sylvestris* Hoppe. L. *dioica* α. L. *Melandrium sylvestre* Röhl. Bth. geruchlos, am Tage offen, schön-purpurn, sehr selten weiss.

8. AGROSTEMMA. (L. gen. 579., mit Ausnahme der Arten.) Rade. — K. 5 zählig, nackt, Zähne blattig, verlängert; Blb. 5, benagelt; Stbgf. 10; Gf. 5; N. einwärts mit Papillen besetzt und ausserdem überall haarig. Kapsel 1fächerig, an der Spitze mit 5 Zähnen aufspringend (Githago Desf. atl. Alex. Braun in der bot. ztg.)

1. A. GITHAGO (L. spec. 624.) Korn-Rade. — Blb. gestutzt; *KZüpfel noch einmal so lang als der Saum der Blb.* ☉. Unter der Saat überall. Jun. Jul. St. h. 3. Lychnis Agrostemma Spreng. Lychnis Githago Lam. dict. Githago segetum, Desf. atl. Bth. purpurn, selten weiss. A. nicaeensis Willd. unterscheidet sich durch KZüpfel, welche 3mal länger als der Saum der Blb. sind, und dch kleinere weisse oder blasse Bthen.

9. DRYPIS (L. gen. n. 381.) Kronenkraut. — K. 5spaltig. Blb. 5. Stbg. 5. Gf. 3. Kapsel rundum aufspringend, 1samig.

1. D. SPINOSA (L. sp. 390.) 4. Auf steinigten Orten im wärmern Krain und auf sandigen Plätzen am Meeresufer im Littorale. Jun. Jul. Schk. 1. 86.

XIV. Ordng. ALSINEEN. DC. fl. fr. 4. p. 766. Gattungen der Caryophylleen bei Juss. g. 299.

K. 4-5blüttrig, in der Knospenlage dachig. Blb. ebenso viel, als KB., mit diesen abwechselnd. Stbg. 10, oder weniger, frei auf einem aus Drüsen gebildeten, mehr oder weniger kelchstündigen und deutlichen Ringe eingefügt. Fruchtkn. frei, 1fächerig, mehr-vieleiyig; der Sträger mittelpunktst., frei. Gf. 2-5, getrennt. Kapsel in Zähne oder Klappen, mehr oder weniger tief aufspringend. S. eyweisshaltig. Keim ringf.; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. gegenst., nebenblattlos (sehr selten mit rauschenden NebenB. versehen.

1. BUFFONIA (L.) Buffonie. — K. 4blättrig. Blb. 4, ganz. Stbg. 4. Gf. 2. Kapsel zsgedrückt, 2klappig, 2samig.

1. B. TENUIFOLIA (L.) Dünablättrige B. — Nerven des K. gerade, gleichlaufend; Knötchen der S. warzenf., stumpf. 4. nach DC.; Gaud. An kiesigen O. (im untern Wallis, auf den Gypshügeln unter Sidlers und auf den Kiesplätzen bei Luzerne und St. Severin.) Jul. Gaud. Bth. weiss, Blb. kürzer, als der K. S.

2. SAGINA (L. gen. 176, erweitert nach der Berichtigung von Wimmer fl. von Schles.) Mastkraut. — K. 4-5blättrig. Blb. 4, 5, ganz. Stbg. 4, 5, 10. Fruchtkn. vieleiyig. Gf. 4. Kapsel 4-5klappig. (Bth. weiss.) B. an der Basis scheidig zsgewachsen ohne NebenB.

1. Rotte. Saginella. KB. 4. Blb. 4. Stbl. 4. Gf. 4. Kapsel 4klappig.

1. S. CILIATA (Fries.) Gewimpertes M. — Der St. ausgebreitet; Bth. lineal., begrannt; an der Basis gewimpert; Btheile 4zäh-

lig; die abgeblühten Bthstiele an der Spitze hakig, die fruchttrag. aufrecht; die 2 äussern KB. zugespitzt-stachelspitzig. ☉. Auf Aeckern und Brachfeldern selten, (am Mittelrheine auf dem Rochusberge bei Bingen; im Luxemburgischen; Westphalen; in Mecklenbg bei Neubrandenbg; bei Leipzig.) Jun. Jul. Blb. sehr klein. Var.:

β. B. an der Basis mit sehr wenigen Wimpern: S. depressa Schultz.

2. S. PROCUMBENS (L.) Niederliegendes M. — Die St. niederlegend, an der Basis wurzelnd; Aeste aufstrebend; B. lineal., stachelspitzig, ganz kahl; Bthentheile 4 zählig; die abgeblühten Bthstiele an der Spitze hakig, die fruchttrag. aufrecht; KB. stumpf, grannenlos. ☉. Auf Aeckern, Triften, grasigen, etwas feuchten O. Mai-Herbst. St. h. 30. Blb. stumpf. 3 oder 4 mal so kurz, als der K.

3. S. BRYOIDES (Fröhlich! bei Rb.) Moosartiges M. — Die St. kriechend; B. lineal., stachelspitzig, schwach-gezähnt, fein-gezwimpert; Bthentheile 4 zählig; Bthstiele aufstrebend, die abgeblühten an der Spitze hakig, die fruchttrag. aufrecht; KB. stumpf, grannenlos. ☉. Auf den VorA. auf faulem Holze wachsend, (Tyrol im Thale Syn bei Steeg.) KB. stumpf. Blb. eyf., spitz, um die Hälfte kürzer und schmaler, als der K., von Fröhlich. D.

4. APETALA (L.) Kleinblumiges M. — Der St. aufrecht, von der Basis an ästig, die seitenst. Aeste aufstrebend; B. lineal., begrannt, an der Basis gewimpert; Bthentheile 4 zählig; die abgeblühten Bthstiele immer aufrecht, kaum einwärts-geneigt; KB. stumpf, die 2 äussern sehr kurz-stachelspitzig, Stachelspitzchen einwärts-gekrümmt. ☉. Auf Aeckern, Feldern und Triften, (dch das ganze Gebiet, aber nicht aller O.) Mai. Jun. Blb. lanzettl., sehr klein, vielmal kürzer, als der K.

5. S. STRICTA (Fries.) Steifes M. — Der St. von der Basis an ästig und nebst den Aesten aufrecht; B. lineal., kurz bespitzt, kahl; Bthentheile 4 zählig; die abgeblühten Bstiele immer aufrecht; KB. stumpf. ☉. Am Seestrande, (an der nördl. und südl. Seeküste.) Mai-Aug. S. maritima D. fl. 1. 866. Blb. fehlend. D.

H. Rotte. SPERGELLA Rb. KB. 5. Blb. 5. Stbf. 10. Gf. 5. Kapsel 5 klappig. *)

6. S. SAXATILIS (Wimmer Fl. v. Schles. p. 76.) Felsen-Sp. — B. lineal., kurzstachelspitzig; Bthentheile 5 zählig, nebst dem St.

*) Die nebenblattlosen Spergulae vereinige ich nun nach dem Beispiele von Wimmer mit dem Genus Sagina; aber das Genus Spergula wollte ich blos seiner NebenB. wegen nicht in die Ordnung der Portulaceen versetzen. Die mit Nebenblättern versehenen Spergula und Alsinearten (Lepigonum) sind von der Regel abweichende Pflanzen, dergleichen man fast bei allen natürlichen Ordnungen findet. Aus demselben Grunde möchte ich die mit Nebenblättern versehenen Helianthemumarten, weder als Gattung noch als Ordnung von den nebenblattlosen trennen. Die Alsineen kann man nach einem gewissen ge-

und Bthstielen kahl; die abgeblühten Bthstiele nickend, die fruchttrag. aufrecht; Bth. kürzer, als der K. 4. An felsigen, moosigen und entblössten feuchten O. der A. und VorA., (dch d. g. AK. hin und wieder; auf dem Feldberge und Belchen des Schwarz-

meinschaftlichen Habitus nicht abtheilen, und alle bisher aufgestellten Gattungen derselben sind durchaus künstliche. Das beste Kennzeichen einer Abtheilung giebt nach meiner Ansicht die, seltner varirende, Zahl der Klappen der Kapsel. Die Gattungen, welche unser Bezirk enthält, sind in folgender Tabelle dargestellt:

I. Klappen so viel, als Griffel.

a) Kapsel 2 klappig.

1. BUFFONIA.

b) Kapsel 3 klappig.

2. CHERLERIA. Kapsel 3 klappig; Drüschchen 2, lineal-verlängert, an der Basis der äusseren Stbf. angewachsen.

3. ALSINE. Kapsel 3 klappig; äussere Stbf. an der Basis mit 2 kurzen Drüschchen gestützt. S. nierenf., flügellos.

4. LEPIGONUM. Kapsel 3 klappig; äussere Stbf. an der Basis mit 2 kurzen Drüschchen gestützt. S. 3eckig- oder rundlich-verkehrteyf., flügellos, oder mit einem Flügel umgeben.

5. HALIANTHUS. Kapsel 3 klappig; äussere Stbf. an der Basis mit 2 kurzen Drüschchen gestützt. S. verkehrt eyf., auf dem Rücken konvex-angeschwollen auf der gegenüberliegenden Seite, durch ein langl. Grübchen, konkav.

c) Kapsel 5 oder 4 klappig.

6. SAGINA. Kapsel 4-5 klappig. S. nierenf., flügellos.

7. SPERGULA. Kapsel 5 klappig. S. kreisrund, am Rande mit einem Flügel umgeben.

II. Klappen doppelt so viel, als Griffel.

a) Kapsel 6 klappig

8. HOLOSTEUM. Kapsel 6 klappig. Bth. ganzrandig, gezähnt. S. schildf., vorn etwas konvex und durch eine Furche vertieft, hinten konkav und mit einem vorragenden Kiele versehen.

9. ARENARIA. Kapsel 6 klappig. Bth. ganz, oder leicht-ausgeschnitten. S. nierenf., ohne Anhangsel.

10. MOEHRINGIA. Kapsel 6 klappig. Bth. ganz; S. nierenf., mit einem Anhangsel.

11. STELLARIA. Kapsel 6 klappig. Bth. 2 sp. oder 2 theilig.

b) Kapsel 10 oder 8 klappig.

12. MOENCHIA. Kapsel 8-10 klappig. Bth. ganz, oder leicht ausgeschnitten.

13. CEREAETIUM. Kapsel 8-10 klappig, Klappen gleichmässig getrennt. Bth. 2 sp. oder spi z- ausgerandet.

14. MALACHIUM. Kapsel 10 klappig, Klappen paarweise mehr zshängend, Bth. 2 theilig.

waldes; Schles. Gebirg.) Jul. Aug. *Spergula saginoides* L. sp. Koch Synops. ed. 1. D. fl. 3. 363, mit Ausschluss der Var. β . Engl. bot. t. 2105. *Spergella saginoides* Rb. Unterscheidet sich von der sehr ähnlichen *Sagina procumbens* auf den ersten Blick dch die längern Bthstiele und fünffache Zahl der Bthentheile, und bei näherer Betrachtung dch folgendes: die KB. länglich-eyf., immer aufrecht, an die Kapsel dicht angedrückt, und mehr konkav; die Blb. nur ein wenig kürzer, als der K.; der Gf. während des Aufblühens aufrecht oder aufstrebend; die Kapsel bemerklich länger, als der K.; die Klappen lanzettl. Bei der *Sagina procumbens* sind die KB. breit-eyf., nach dem Verblühen an der Spitze etwas abstehend, und bei der reifen Kapsel von dieser entfernt und weit abstehend; der Gf. während der Bthezeit zurückgekrümmt, und die Kapsel kaum länger, als der K., mit eyf. Klappen.

7. *S. SUBULATA* (Wimmer Fl. von Schles. p. 76.) Pfriemlicher Sp. — *B.* lineal., zugespitzt, begrannt, an der Basis zusammenge wachsen, am Rande, nebst dem obern Theile des St. und den Bthstielen etwas behaart; Bthentheile 5zählig; die abgeblühten Bthstiele ziemlich nickend, die fruchtrag. aufrecht; *Blb. so lang, als der K.* 4. Auf Sandfeldern, (Oestreich auf dem Schoberstein: Oppeln in Schlesien; bei Dötlingen, Ganterkese und Immer im Oldenburgischen; in Holstein selten; Thüringen bei Teichröde; Baden auf dem Kaltenbrunn und der Herrenwiese; Veltlin an der Adda.) Jul. Aug. *Spergula subulata* Swartz act. Holn. *S. saginoides* β . D. fl. 3. 364. *Spergella subulata* Rb.

8. *S. GLABRA* (Koch.) Kahler Sp. — *B.* lineal.-fädl., kurz-stachelspitzig; Bthentheile 5zählig; Bthstiele vor dem Aufblühen überhangend, die fruchtragenden aufrecht; *Blb. noch etmal so lang, als der K.*; *St.* niedergestreckt, kriechend. 4. A. Triften (im südl. Tyrol, in dem Thale zw. Terragnolo und Colsanto östl. von Roveredo, Facchini.) Jul. Aug. *Spergula glabra* Willd. spec. *S. saginoides* All. ped.

9. *S. NODOSA* (E. Meyer Elench. pl. boruss. p. 29.) Knotiger Sp. — *B.* lineal.-fädl., kurz-stachelspitzig, gegenst., die obern gebüschelt; Bthentheile 5zählig; die blühenden und abgeblühten Bthstiele aufrecht; *Blb. länger, als der K.* 4. An sandigen, feuchten, schlammigen, torfhaltigen O., (dch das ganze Gebiet, aber nicht aller O.) Jul. Aug. *Spergula nodosa* L. spec. Koch Synops. ed. 1. Schk. t. 125. *Spergella nodosa* Rb. Ganz kahl, var. aber: β . *pubescens*; der St., Bthstiele, Basis des K. und Rand der B. mit kleinen drüsentrag. Haaren besetzt: *S. glandulosa* Bess.

3. SPERGULA. (L. gen. n. 586.) Spark. — K. 5blättrig. Blb. 5., ganz. Stbf. 5, 10. Fruchtkn. vieleiyg. Gf. 5. Kapsel 5klappig. S. kreisrund, am Rande mit einem Flügel umgeben. (Bth. weiss. B. an der Basis frei, nebenblättrig.)

1. *S. ARVENSIS* (L.) Acker-Sp. — *B.* lineal.-pfriemlich, gebüschelt-quirlich, unbegrannt, oberseits konvex, unterseits mit einer Furche dchzogen; Bthstiele nach dem Verblühen herabgeschlagen;

S. kugelig-linsenf., von feinen Körnchen etwas rauh oder von kurzen Härchen feinwarzig, mit einem schmalen, glatten Flügelrande umzogen. ☉. Auf Aeckern und Feldern. Jun. Jul. Var.:

α. *sativa*; S. sammtschwarz, kahl, von sehr feinen Punkten rauh; S. *sativa* von Bönningh. Rh. ic. 6. f. 704.

β. *vulgaris*; S. mit weisslichen, zuletzt bräunlichen Wärrchen besetzt; S. *vulgaris* von Bönningh. Rh. ic. 6. f. 705.

γ. *maxima*; S. 3 mal so gross, übrigens den S. der Variet. β. ähnlich; die Pflanze höher; S. *maxima* Weihe bei von Bönningh. Rh. ic. 6. f. 706. Diese Variet. kommt im nördl. D. vor. „*Spergula laricina* Wulf. in Jacq. collect., nicht Lin., ist eine Variet. d. *Spergula arvensis* mit klebrig-flaumigen B. und St. nach Expl. in Wulfens Herbar.“ Unger in Briefen.

2. S. PENTANDRA (L.) Fünfmänniger Sp. — B. lineal.-pfriemlich, gebüschelt-quirlig, grannenlos, fast stielrund, *unterseits glatt*, (nicht mit einer Furche dehzogen,) *an der Basis frei*, nebenblättrig; Bthstiele nach dem Verblühen zurückgeschlagen; S. flachsgedrückt, glatt, mit einem verbreiterten strahlig-gerieften Flügelrande umzogen, vor dem Rande mit feinen Blättchen besetzt. ☉. Auf Feldern und sandigen Heiden, (dch d. g. Gebiet hin und wieder, in der Schwz nur bei Basel.) Apr. Mai. St. h. 12. *Alsine marginata* Schreb. *Arenaria media* Pollich. palat. Var. kahl und drüsig-flaumig.

4. LEPIGONUM (Wahlberg fl. gothob. p. 45; Abtheilung Lepigonum der Gattung *Arenaria* Fries in der fl. Halland. p. 159. *Lepidogonum* Wimm. Schles. Fl. p. 78.) — K. 5 blättrig. Blb. 5., ganz. Stbf. 10., die äusseren an der Basis mit 2 kurzen Drüsen gestützt. Fruchtkn. vieleiig. Gl. 5. Kapsel 5 klappig. S. 3 eckig- oder rundlich-verkehrtef., flügellos, oder mit einem häutigen Flügel umgeben. (B. an der Basis frei, nebenblättrig.)

1. L. SEGETALE (D. fl. suppl.) Saaten-L. — B. fädlich, stachelspitzig; *der St. aufrecht*, sehr ästig; *Aeste an der Spitze eingeknickt-überhangend*; Bthstiele gabelst., nach dem Verblühen herabgeschlagen; KB. weiss, rauschend, mit einem krautigen Rückenerven; Blb. kürzer, als der K. ☉. Unter der Saat, (Linz am Rheine, in Luxembg., Westphal., Hannover und Hessen, in der Lausitz.) Jun. Jul. *Alsine segetalis* L. spec., Koch Synops. ed. 1. *Arenaria segetalis* Lam. DC.

2. L. RUBRUM (Wahlenb.) Rothblühende L. — B. lineal.-fädlich, stachelspitzig, etwas fleischig, auf beiden Seiten flach; die St. gestreckt und aufstrebend, ästig; *Aeste traubig*; Bthstiele nach dem Verblühen herabgeschlagen; KB. lanzettl., stumpf, *nerventlos, am Rande häutig*; S. keilig, beinahe 3 eckig, feinrunzelig, *flügellos*. ☉. An sandigen O. der Ebenen, Berge und A. Mai-Septbr. *Alsine rubra* Wahlenb. ups., Koch Synops. ed. 1. *Arenaria rubra* var. α. *campestris* L. *Stipularia rubra* Haw. Bth. rosenroth.

3. L. MEDIUM (Wahlenberg) Mittleres L. — B. lineal.-fädlich, fast grannenlos, fleischig, unterseits konvex, die St. ge-

streckt und aufstrebend, ästig: *Aeste traubig*; Bthstiele nach dem Verblühen herabgeschlagen; KB. lanzettl., stumpf, *nerrenlos, am Rande häutig*; S. verkehrt-eyf., zsgedrückt, schwach runzelig, *sämmtlich flügellos oder nur sehr wenige geflügelt*. ☉. Am Meeresufer und an salzhaltigen O. Jul. Aug. *Alsine marina* α. D. fl. *Arenaria marina* Roth tent., Smith brit., Engl. bot., *A. rubra* β. *marina* L. spec. *Spergularia salina* Presl cech. „Bib. an der Spitze dunkelrosenroth“ Böckler, bot. ztg.

4. L. MARGINATUM (D. fl. suppl.) — B. lineal.-fädl., fast grannenlos, fleischig, halbwalzenf.; St. gestreckt und aufstrebend, ästig; *Aeste traubig*; Bthstiele nach dem Verblühen hinabgeschlagen; KB. lanzettl., stumpf, *nerrenlos, am Rande häutig*; S. rundl.-verkehrt-eyf., zsgedrückt, schwach runzelig, *alle mit einem Flügel umzogen*. ☉. Jul. Aug. Am Meeresufer mit dem vorigen, aber weit seltener. *Lepigonum marinum* Wahlbg. fl. gothob. *Alsine marina* Wahlenberg fl. succ. D. fl. var. β. *Arenaria marginata* DC. fl. fr. A. media L. spec. mit Ausschluss sämmtl. Synonyme. *A. marina* β. Smith brit. Der Name *Arenaria marina* oder *Lepigonum marinum* ist durch verschiedene Verwendung jetzt zweideutig geworden.

5. HALIANTHUS. (Fries fl. halland. 75.) — K. 5 blättrig. Bib. 5, ganz. Stbf. 10., die äussern mit 2 eyf. Drüsen gestützt. Fruchtknot. vieleig. Gf. 3. Kapsel 3 klappig. S. verkehrt-eyf., auf dem Rücken konvex angeschwollen, auf der entgegengesetzten Seite drch eine längl. Furche konkav. (Wegen der Honkenya Willd. spec. pl., welche DC. in seinen Prodr. als Gattung aufnahm, habe ich den unserer Pfl. von dem seel. Ehrhart gegebenen Namen nachgesetzt.)

1. H. PEPLOIDES (Fries fl. halland. 75.) Dickblättrige M. — B. sitzend, eyf., spitz, kahl, *1nervig*, fleischig; die St. gabelsp., niederliegend; Bth. einzeln, gabel- und blattwinkelst.; KB. eyf., stumpf, *1nervig*; Bbl. verkehrt-eyf., länger, als der K. 4. Am See-Strande, (der Nord- und Ostsee und am adriat. Meere.) Jun. Jul. *Alsine peploides* Wahlenb. succ. *Arenaria peploides* L. Fl. dan. t. 624. *Honkenya peploides* Ehrh. *Adenarium Rafin.* Die Drüsen an der Basis der Stbg. sind zwar grösser, aber nicht anders beschaffen, als bei den übrigen Arten von *Alsine*. D.

6. FACCHINIA (Reichenb. ic. fl. germ. et. helv. v. 5. p. 29. t. 260.) Facchinie. — S. mit einmans sprengen Haaren zsgesetzten Kranze umgeben, das Uebrige wie bei *Alsine*.

1. F. LANCEOLATA (Mert. und Koch.) Lanzettblättrige F. — B. aus einer abgerundeten Basis lanzettl., spitz, flach, *unterseits mehrnervig, kurz-gewimpert*; Stämmchen rasig, gestreckt; die St. aufstrebend; Bthstiele endst., 1-3 blüthig; KB. lanzettl., spitz, meist 5nervig, ohngefähr so lang, als die Bbl. 4. In Felsenspalt, der höchsten A. (Variet. α. auf den Krainer A., Scop.; β. auf der Seiser A.; im Veldlin.) Jul. Aug. *Alsine lanceolata* M. et K. Var.: α. *lava*, lockerer; Glieder des St. fast so lang, als die B.; B. abstehend, in den Winkeln der untern befinden sich Büschel von

kleineren B.; Bthstiele länger, zuweilen fast 1 Zoll lang: *Arenaria lanceolata* All. *Stellaria rupestris* Scop.

β. *condensata*, gedrungener; Glieder des St. sehr kurz, von der zsgewachsenen Basis der B. bedeckt, die oberen nur ein wenig länger; die B. oft dicht-ziegeldachig, wie bei der *Saxifraga oppositifolia*: *Arenaria cherlerioides* Vill. *A. lanceolata* β. *cherlerioides* DC.

7. ALSINE (Wahlenberg.) Miere. — K. 5- seltener 4blättrig. Blb. 5, seltner 4, ganz, oder leicht-ausgerandet. Stbg. 10, oder weniger; die äusseren Stbf. an der Basis dreh 2 kurze Drüsen gestützt. Fruchtkn. vieleiig; Gf. 3. Kapsel 3klappig. S. nierenf., flügellos, ohne Anhängsel.

§. 1 B. elliptisch, lanzettl. oder längl.

1. A. ARETIODES (Mert. und Koch.) Aretienartige M. — B. länglich-lanzettl., stumpf, kurz-stachelspitzig, oberseits tief-rinnig, unterseits konvex, 3nervig, ganz kahl, dachig sich deckend; Stämmchen gedrunge-rasig; Bth. einzeln, endst., sitzend, 4blättrig, 8männig. 4. In Felsenspalten der höchsten A., (in Tyrol; Krain; Kärnth; Salzbg.; Obersteiermark.) Jun. Jul. *Arenaria aretioides* Portenschlag. *Siebera cherlerioides* Hoppe. *Sommerauera quadrifida* Hoppe. *Cherleria octandra* Sieb. Ch. *imbricata* Ser. bei DC. Unterscheidet sich von den Alsinen nur durch den Mangel des fünften Blüthentheiles. Kapsel 3klappig, vieleiig, wie bei den Alsinen. Gf beobachtete ich immer 3. Die unreif. S. kurz-weitstachelig, reif sah ich sie noch nicht.

§. 2 B. schmal, lineal. oder pfriemlich, 1nervig oder nervenlos, auch im getrockneten Zustande.

2. A. STRICTA (Wahlenb.) Schlanke M. — B. fädlich, halbstielrund, nervenlos; Stämmchen gestreckt, rasig; die blühenden St. aufrecht, oberwärts nackt; Bthstiele endst., meist zu 3, sehr lang; KB. eyf.-lanzettl., spitzlich, nervenlos, im trocknen Zustande 3nervig; Blb. länglich-oval, an der Basis verschmälert, ungefähr so lang, als der K. 4. An torfhaltigen aber trockneren O., (Oberbayern: Deininger Moos, Tegernsee, Wurmsee, Starnberger See; Salzburg: Schonramer Torfmoor; in der Schw. auf den Gebirgen des Jura.) Jun.-Aug. *Spergula stricta* Swartz. *Sabulina stricta* Rb. *Arenaria uliginosa* Schl. Gaud.

3. A. BIFLORA (Wahlenb. fl. lapp. p. 128.) Zweiblumige M. — B. schmal-lineal., unbewehrt, nervenlos, unterseits etwas konvex; Stämmchen gestreckt, rasig; Aestchen 1-2 bthig; KB. lineal., kappenf. zsggezogen u. sehr stumpf, 3nervig; Blb. länglich., keilf. sowie die Kapsel anderthalb mal so lang wie der K. 4. Auf den höchsten A. an Abhängen am ewigen Schnee, (Schw., Gletscher des Panerosaz bei Bex und auf d. Fouly, Thomas) *Stellaria biflora* L. spec., *Sabulina biflora* Rchb. fl. exc., S. *obtus* Rchb. fl. germ. exs. *Arenaria obtusa* All. ped. gehört nach meiner Meinung zu *Möhringia muscosa*.) *Arenaria sphagnoides* Thom. cat. — St. 2-3 Zoll hoch, meist einbth., flaumig. „Bth. wenig aufgeschlossen, selbst

in der vollkommenen Blüthezeit, trichterf., KB. nach oben hin mehr abstehend“ Wahlenb. Von *Möhringia muscosa* unterscheidet sie sich bedeutend durch den aufrechten K., die lineal.-keilf., nicht sternf. ausgebreiteten Blb. und die kleinen, braun-punktirten S., die bei jener viel grösser, kohlschwarz und glatt sind.

4. *A. LARICIFOLIA* (Wahlenb.) Lerchentannenblättrige M. — *B.* lineal.-pfriemlich, *nervulos*; Stämmchen rasig; die blüthentrag. St. aufstrebend, 1-vielblüthig; *KB.* lineal.-länglich, *abgerundet-stumpf*, 3nervig; Blb. keilf., noch 1 mal so lang, als der K. 2. Auf dünnen Triften der höhern A., (in der westl. und südl. Schw.; in Tyrol, Krain; Steyeru.; Oestr.; Mähren.) Jul. Aug. *Arenaria laricifolia* L. *A. rostrata* Kit., Rochel. *A. macrocarpa* Hornem. Var.: Blüthstiele und der St. oberwärts mit drüsenlosen Haaren besetzt; und

β. *glandulosa*; mit drüsigen Haaren daselbst bedeckt: *A. laricifolia* β. DC. *A. liniflora* L.

§. 3. *B.* schmal, lineal. oder pfriemlich, 3nervig, wenigstens im getrockneten Zustande.

5. *A. AUSTRIACA* (Mert. und Koch.) Oestr. M. — *B.* schmal-lineal., 3nervig, *aderlos*; Stämmchen niedergestreckt, sehr ästig; die St. aufrecht, 2 blüthig, oberwärts nackt; *Blüthstiele* *endst., gepaart, sehr lang*; KB. lanzettl., spitz, 3nervig, am Rande häutig, kürzer, als die Kapsel; *Blb. länglich, an der Spitze gezähnet oder gestutzt, an der Basis keilf., beinahe noch 1 mal so lang, als der K. 2.* Auf den höhern A., (Südtirol, Kärnthen, Krain, Steyeru., Oestr.) Jul. Aug. *Arenaria austriaca* J. a. t. 270. St. h. 24. *Sabulina austriaca* Rb. *Stellaria biflora* Wulf. bei J. collect. 1. 251. t. 17. (diese letzte ist eine Modification mit tiefer-angerandeten Blb.) *Arenaria grandiflora* L. sp. 603. ? St. seltner 3 blüth. D.

6. *A. VILLARSII* (Mert. und Koch.) Villar's M. — *B.* schmal lineal., 3nervig, *entfernt-äderig*; Stämmchen gestreckt, sehr ästig; die St. aufrecht, meist 3-7 blüthig; *Blüthstiele* flaumig; KB. lanzettl., spitz, 3nervig, am Rande häutig, länger, als die Kapsel; *Blb. länglich, stumpf oder gestutzt, an der Basis keilf., beinahe noch 1 mal so lang, als der K. 2.* Auf den höhern A., (in der südwestl. Schw. am M. Rosa über dem Tornanche Thale und den benachbarten A.; in Kärnth.) Jul. Aug. *Arenaria Villarsii* Balb. nach einem vom Autor an Mertens gesandten Exemplare. *A. austriaca* All. *A. austriaca* β. DC. nach der Beschreibung, mit Ausschluss der Syn. Jacq. *Sabulina Villarsii* Rb. Von der sehr ähnlichen *Alsine austriaca* unterscheidet sie sich durch d. Flaumhaare, durch den an grösseren Expl. bis 7 blüthigen St. und grössere Krümmungen der Seitenerven a. d. KB. Die *B.* aber sind nicht immer äderig. Var.:

β. *villosula*; ganz mit abstehenden, etwas klebrigen Haaren bestreut: *A. Villarsii* β. D. fl. u. Gaud.

7. *A. VERNA* (Bartling.) Frühlings-M. — *B.* lineal.-pfriemlich, 3nervig; Stämmchen rasig; die blühenden St. aufstrebend

oder aufrecht, 1-vielblüthig: *KB. cyf., kurz-benagelt, an der Basis beinahe herzf.* 2. An grasreichen, steinigen O. der A. und VorA. (dch d. g. AK.; auf den Sudeten und auf dem Harze; ausserdem zerstreut dch D.) Jul-Aug. *Arenaria verna* L. J. a. t. 404. St. h. 26. *A. cespitosa* Ehrh. *A. saxatilis* Roth. *Sabulina cespitosa* und *verna* Rb. Var.: *Blb.* so lang als der K. oder kürzer, und mit fast rispigen St. und

β. alpina; die St. niedriger, armblüthig und mit grösseren Bth.: *A. liniflora* J. a. t. 445. *A. Gerardi* Willd. *A. striata* Roth. *Alsine saxatilis* Wahlenb. helv. *A. Gerardi* Wahlenb. carp. *A. propinqua* R. Br. *Sabulina Gerardi* Rb.

8. *A. SEDOIDES* (Fröhlich.) Fetthennenähnliche M. — *B. lanzettl.-lineal., 3nervig.* ganz kahl: die St. sehr ästig, Aeste aufrecht, rasig, gleichhoch; Bthstiele endst., ohngefähr so lang, als der K., einzeln oder gepaart: *KB. cyf., spitz, 3nervig, am Rande häutig*; *Blb. cyf., an der Basis abgerundet, kurz-benagelt, länger, als der K.* 2. Auf den höchsten A., (im Algau.) *Sagina decandra* Rb. ic. 7. f. 875., aber die *Blb.* unrichtig mit einer verschmälerten Basis abgebildet, welche genau, wie bei der *Alsine verna* gebauet sind. Sie unterscheidet sich von dieser: dch den Habitus der *Characteria sedoides*, kürzere B. und sehr kurze Bthstiele. Die Zahl der Gf. und Kapselklappen ist veränderlich: unter den 9 Bth. an dem von Herrn v. Fröhlich erhaltenen Expl. fand ich eine mit 3 Gf. und 3 Klappen und eine andere mit 5 Gf. und 5 Klappen. Die *Arenaria quadrivalvis* R. Br. ist nach der Beschreibung eine ganz andere Art. D.

9. *A. RECURVA* (Wahlenb.) Krummblättrige M. — *B. lineal-pfriemlich, 3nervig*; Stämmchen rasig; die blühenden St. aufstrebend, 1-vielblüthig: *KB. cyf.-lanzettl., am Rande häutig, die äussern 5-7nervig*; *Blb. ungefähr so lang, als der K., oval, nach der Basis schmaler.* 2. An sonnigen O. der höchsten A., (Schw. auf dem Gotthard, Bernhard, Isenstock, Furca: Tyrol auf dem Timpeljoch und der Lienzer A.; Kärnthen.) Jul. Aug. *Arenaria recurva* All. J. coll. 1 t. 16. f. 1. *A. striata* L.? *Sabulina recurva* Rb.

10. *A. SETACEA* (Mert. und Koch.) Borstige M. — *B. pfriemlich-borstlich, 3nervig*; Stämmchen rasig; die blühenden St. aufstrebend, oberwärts rispig; Bthstiele sämmtl. länger, als der K.: *KB. cyf., spitz, kreibeweiss-fast knorpelig, mit einem krautigen, 1nervigen Rückenstreifen*; *Blb. oval, wenig länger, als der K.* 2. An felsigen O., (bei St. Ivan in Böhmen; in Mähren: am Schlosse Markenstein in Oestr.; Baiern; im Donauthale von Weltenburg bis Abach, Altmühlthal zw. Kellheim und Essing, Nabthal zw. Kal Münz und Triedendorf.) Jul. Aug. *Arenaria setacea* Thuill. *A. heteromalla* Pers. *A. saxatilis* Lois. und, wie mir scheint, auch L. *A. frutescens* Kit. *Sabulina setacea* Rb. Vaill. par. t. 2. f. 5 — Im botan. Garten zu Upsala ward im J. 1776 die *Arenaria graminifolia* MB. unter dem Namen *A. saxatilis* gezogen, nach einem Expl. im Herbar. von Buek. D.

11. *A. ROSTRATA* (Koch.) Geschnäbelte M. — *B.* pfriemlich-horstlich, 3 nervig; Stämmchen rasig; die blühenden St. aufstrebend; Aeste büschelig-ebensträussig; Bthstielchen so lang und kürzer, als der K., das unterste länger: *KB. lanzettl., sehr spitz, weiss*, mit einem krautigen 1 nervigen Rückenstreifen: *Blb. länglich, ungefähr so lang, als der K.* 4. In Felsenspalten der A., (auf d. Stöcke und bei Zermatten im Wallis, am Furca im Gombs, bei Bornio.) Jul. Aug. *Sabulina rostrata* Rb. *Arenaria rostrata* Pers. *A. fastigiata* Smith, mit Ausschluss der Syn. Jacquin's und Scopoli's, (nach Hooker) *A. mucronata* DC. Gaud. *Alsine mucronata* Gouan, nach Hooker, welcher ein ächtes Expl. aus dem Herbarium Gouan's besitzt. — Von unserer Art (die mit 10 Stbg. versehen ist) unterscheidet sich d. *A. mucronata* in Sibth. flor. graec.; ob auch die Linne's, welche angeblich in der Schwz einheimisch ist? S.

12. *A. JACQUINI* (Koch.) Büschelblüthige M. — *B.* pfriemlich-horstlich, an der Basis 3 nervig; die St. aus einer aufstrebenden Basis aufrecht, schnurgerade, oberwärts ästig; Bth. büschelig-ebensträussig; Bthstielchen kürzer, als das DeckB.: *KB. ungleich, lanzettl. - pfriemlich, sehr spitz, weiss - knorpelig*, mit einem krautigen, 1 nervigen Rückenstreif: *Blb. 3 mal kürzer, als der K.* ☉. Auf trocknen Hügeln und sandigen Feldern, (Mähren, Oestreich, Kärnth., Steyer., Oberbayern, Tyrol, C. Wallis und am Genfersee: sodann auf der Rheinfläche im Oberelsass und von Dürkheim und Darmstadt bis Mainz und Ingelheim.) Jul. Aug. *KB.* sehr ungleich. *Arenaria fasciculata* J. austr. t. 182. *Alsine fasciculata* M. und K. D. fl. 3. 288. *Sabulina fastigiata* Rb. (aber nicht *Arenaria fastigiata* Smith, welche nach Hooker zu der vorhergehenden Art gehört.) — *A. fasciculata* Gouan und Sibth. sind mir unbekannt. — Var.:

β. pubescens; flaumig; Bthstiele, Bthstielchen und die K. mit drüsentrag., abstehenden Haaren bestreut.

13. *A. TENUIFOLIA* (Wahlenb.) Feinblättrige M. — *B.* pfriemlich, 3 nervig; die St. gabelsp.; Bth. büschelig; Bthstielch. mehrmal länger, als der K.: *KB. lanzettl. - pfriemlich, 3 nervig, am Rande häutig*; *Blb. oval, an der Basis schmaler, kürzer, als der K.* ☉. Auf Aeckern, Feldern, an gebirgigen O., (im ganzen Gebiete, doch nicht überall.) Jun.-Aug. *Arenaria tenuifolia* L. *Sabulina tenuifolia* Rb. *Alsinella viscosa* Hartm. Vaill. t. 3. f. 1. Variirt: Bth. und Kapseln grösser und um die Hälfte kleiner, wie *Arenaria serpyllifolia* und andere, und

β. viscosa, klebrig; oberwärts mit drüsentrag., abstehenden Haaren besetzt: *Alsine viscosa* Schreb. *Sabulina viscosa* Rb. Diese letztere mit längeren Kapseln, als der K., und jene, d. Variet. *α.* mit kürzeren Kapseln, als derselbe, sammelte ich selbst am Rhein, und ich konnte daselbst an der lebenden Pflanze keine andern und beständigen Merkmale, wodurch man sie als Arten unterscheiden könnte, entdecken. Von *A. verna* und den verwandten Arten auf den ersten Blick zu unterscheiden dreht das Fehlen der sterilen Stengel.

8. *CHERLERIA* (L.) Cherlerie. — K. 5 blätterig. Blb. fehlend, seltner 5. Stbg. 10; die äussern, den KB. gegenständigen, an der Basis mit 2 lineal.-längl. Drüsen gestützt und mit diesen verwachsen. Fruchtkn. vieleig. Gf. 3. Kapsel 3klappig.

1. *C. SEDOIDES* (L.) Fetthennenähnliche Ch. — 2. An ziemlich feuchten Felsen der höhern A., (Schw. und dch d. g. AK.) Jul. Aug. J. t. 284. Bei dem Pflänzchen fehlen zwar meist die Blb., sind aber auch in einem sehr kleinen Ansätze nicht selten vorhanden, aber sehr selten kommen sie grösser, so lang als der K. und weiss, vor. Var. also wie *Alsine aretioides*:

a. mit Blth. ohne Blb.

β. mit Blth., welche mit einer Blkrone versehen sind. Die Blb. weiss, so lang als der K. oder kürzer und stbförmig und grün. — „Die Pfl. erscheint vielehig - 2 häusig, wie *Stellaria graminea* in ihrer lang- und kurzgriffeligen Form.“ v. Salis Marsch-
lins in brieflichen Mittheilungen.

9. *MOEHRINGIA* (L.) Möhringie. — K. 4-5 blätterig. Blb. 4, 5, ganz oder seicht ausgerandet. Stbg. 8, 10. Fruchtkn. vieleig. Gf. 2, 3. Kapsel 4-6klappig. S. am Nabel mit einem mantelf. Anhängsel. (Bth. aller weiss; S. ganz glatt, glänzend.)

1. *M. MUSCOSA* (L.) Gemeine M. — B. fädlich, spitz, halbstielrund, nervenlos, kahl, grasgrün; die St. rasig, gestreckt; Bthstiele endst., 2-7 blüthig; KB. eyf.-lanzettf., spitz, 1nervig, Bth. 8 männig, 4 blättrig; Blb. länger, als der K. 4. An etwas feuchten, schattigen Felsen der VorA., (dch die ganze AK.; in Mähren) Jun.-Aug. J. a. t. 449. Kommt, wiewohl seltner, mit 5 blättrigen, 10 männigen Bth. vor.

2. *M. PONAE* (Fenzl.) Fleischigblättrige M. — B. lineal., stielrund, stumpf, kurzstachelspitzig, nervenlos, fleischig, kahl, meergrün; die St. rasig, gestreckt; Bthstiele endst., meist 2 blüthig; KB. ey-lanzettf., stumpf, 3nervig; Bth. 10 männig, 5 blättrig; Blb. länger, als der K. 4. An steilen Felsen der Thäler und Berge, (in Südttyrol.) Mai, Jun. *Arenaria bavarica* L. spec. B. 3mal so dick, als bei der vorhergehenden, St. sehr zerbrechlich. *Sabulina Ponae* Reichenb. D.

3. *M. POLYGONOIDES* (Mert. und Koch.) Knöterigartige M. — B. lineal.-fädlich, nach der Basis verschmälert, etwas fleischig, nervenlos; die St. rasig, gestreckt; Bthstiele seitenst., 1-mehr blüthig; KB. ey-lanzettf., stumpf, im getrockneten Zustande 3nervig; Blb. länger, als der K. 4. Auf felsigen Weiden, und unter dem Gerölle der höhern A., (dch die g. AK.) Jun. Jul. *Arenaria polygonoides* Wulfen bei J. coll. I. 241. t. 15. A. obtusa All. ped. *Stellaria ciliata* Scop. *Cerastium filifolium* Vest. nach Zahlbruckn. *Sabulina polygonioides*. Rb.

4. *M. VILLOSA* (Fenzl.) Zottige M. — B. lanzettl.-lineal., spitz, nach der Basis verschmälert, nervenlos. die untersten viel kleiner, elliptisch, in den Bstiel, welcher kürzer ist, als die B., zugezogen, nebst dem St. überall flaumig; die St. rasig, aufstrebend;

Bthstiele endst., 1-3 blüthig; Bthstielen nach dem Verblühen zurückgeschlagen; KB. lanzettl., spitz, nervenlos; Blb. länger, als der K. 4. An gebirgigen O. und in den A., (am Poresen über Zarz in Oberkrain.) Jun. - Aug. *Arenaria villosa* Wulf. D. fl. 3. 269. Die reifen S. sah ich noch nicht. Kommt vor:

α. St., B., Bthstiele u. K. überall flaumh.

β. *glabrescens*, ganz kahl, Freyer in Rbch. fl. g. exs.

5. *M. DIVERSIFOLIA* (Dolliner in der bot. ztg. 22. 1. 2.) Verschiedenblättrige M. — *B. lineal.-lanzettl.*, spitz, an der Basis in einen Bstiel verschmälert, *die untersten eyf.*, spitz, gestielt; *der Bstiel 3-4 mal länger* als das B.; Bthstiele endst., 1-3 bthig nach dem Verblühen gerade vorgestreckt; KB. eyf., einnervig, die äusseren spitz, die inneren stumpf; Blb. so lang als der K. 4. An beschatteten Kalkfelsen, (längs der Save in Unterkrain, in der Gegend von Roschach in Untersteyerm., nach schriftlicher Angabe, Dolliner; im Gemsgraben bei Stainz, ebenfalls in Untersteyerm., Zechenter) Jun. Jul.? Diese Art verbindet die vorige mit der folgenden.

6. *M. TRINERVIA* (Clairville.) Dreinervige M. — *B. sämmtlich eyf.*, spitz, *3-5nervig*, die untern gestielt, Bstiel so lang, als das B.; der St. ästig; KB. spitz, 3nervig, Nerven genähert, der mittlere stärker kielig; Blb. kürzer, als der K. ☉. In Gebüsch und in etwas feuchten Wäldern. Mai. Jun. *Arenaria trinervia* L. A. trinervis Smith. Schk. t. 122.

10. *ARENARIA* (L.) Sandkraut. — K. 5 blättrig. Blb. 5, ganz oder seicht ausgerandet. Stbg. 10. Fruchtkn. vieleig. Gf. 3. Kapsel 6 klappig. S. ohne mantelförmiges Anhängsel. (Bth. weiss.)

1. *A. MARCHLINII* (Koch D. fl. suppl. ined.) Marchlin's S. — *B. eyf.*, *zugespitzt, sitzend*, die untersten in einen kurzen Bstiel zsggezogen; St. aufsteigend, gabelig-rispig; Bth. gabel- und BWinkeleständig; KB. eyf.-lanzettl., haarspitzig-verschmälert, 3nervig, *anderthalbmal so lang als die Blb.*; *der häutige Rand der inneren um die Hälfte schmaler als der krautige Theil des KB.*; Blb. eyf. ☉. Auf den höchsten A. in der Nähe der Gletscher, (Schwz: auf d. Splügen, Getroz, über Zermatten, über St. Moritz im Engadin; Tyrol, Wormser Joch, Salennferner.) Jul. Aug. *A. serpyllifolia* var. *β. alpina* Gaud. helv. mit d. Synonym der *A. viscida* Hall. fil., welches aber Hegetschweiler in der Schw. Fl. zu *Arenaria serpyllifolia* var. *viscida* zieht, die in d. Ebenen wächst. Kapsel längl., nicht so bauchig wie bei der folgenden. Klebrige Flaumhaare bemerkte v. Salis Marchlins nie; die ganze Pfl. ist mit kurzen Borstchen bedeckt.

2. *A. SERPYLLIFOLIA* (L.) Quendelblättriges S. — *B. eyf.*, *zugespitzt, sitzend*, die untersten in einen kurzen Bstiel zsggezogen; die St. aufstrebend, gabelsp., rispig; Bth. zerstreut, einzeln in den Gabeln und Blattwinkeln; KB. lanzettl., zugespitzt, 3nervig, *anderthalbmal so lang, als die Bthkr.*, der trockenhäutige Rand der inneren so breit, als der krautige Theil; Blb. oval, nach der Ba-

sis verchmälert. ☉. Auf Feldern, vorzüglich im sandigen O.; bis in die A. hinaufsteigend. Jul. Aug. Kapsel unten bauchig. Var.:

β. *glutinosa*: kleiner, aufrecht oder aufstrebend, oberwärts mit drüsentrag. Haaren bedeckt: *A. viscida* Lois. und Hall. fil. nach Hegetschw.

γ. *tennifol.*: der St. und Bthstiele halb so dick, K., Blh. und Kapsel um die Hälfte kleiner, übrigens die Pflanze kahl oder drüsig-haarig. Sie verhält sich zur *Arenaria serpyllifolia*, wie die *Alsine viscida* zur *A. tennifolia*.

Arenaria gothica Fries nov. fl. succ. mant. wurde im Gebiete unserer Fl. noch nicht gefunden, sie bildet gleichsam eine Mittelform zw. *A. serpyllifolia* und *A. ciliata*. Sie hat die W., die Tracht und d. B. von *A. serpyllifolia*, die Bth. aber von *A. ciliata*.

3. *A. CILIATA* (L.) Gewimpertes S. — *B. ey- oder lanzettf., spitzlich, in einen kurzen Bstiel herablaufend*, an der Basis borstig-gewimpert: die St. rasig, aufstrebend; Bth. endst., fast rispig oder einzeln: KB. im trocknen Zustande nervig: *Blb. länger, als der K., eyf., kurz-benagelt*. 2. An felsigen und kiesigen O. der A. (deh d. g. AK.) Jul. Aug. Var.:

α. *B. meist breiter, im trocknen Zustande mehr nervig-aderig* und die St. an der Spitze 3-7 blüthig: *A. ciliata* Wulf. bei J. coll. I. t. 16. f. 2.

β. *frigida*: *B. meist schmaler, im trocknen Zustande weniger nervig*, und die St. 1-2 blüthig: *A. multicaulis* L. Wulf. bei J. coll. I. t. 17. f. 1. Nicht vielstengelig als die Variet. α. Uebrigens zweifelt selbst Wulfen, der beide lebend beobachtete und durch eine weitläufige Beschreibung aufzuklären suchte, an ihrem Unterschiede als Art; vgl. J. I. c. p. 216.

4. *A. BIFLORA* (L.) Zweiblumiges S. — *B. rundlich, stumpf, kurzgestielt, an der Basis borstig-gewimpert*; Stämmchen gestreckt ausläuferartig: *die blüthentrag. Aestchen seitenst., sehr kurz, dicht-beblüthert, an der Spitze 1-2 blüthig*; KB. schwach-1nervig; *Blb. länger, als der K., oval, nach der Basis verschmälert*. 2. An felsigen, feuchten O., und an Bächen der höhern A. (Schw., Tyrol, Salzbg, Kärnth., Steyerm.) Jul. Aug. J. ic. rar. t. 83.

5. *A. GRANDIFLORA* (Allione.) Grossblumiges S. — *B. lanzettl.-pfriemlich; begrannt, am Rande verdickt*, unterseits 1nervig, mit einem starken Nerven: Stämmchen rasig: die St. aufstrebend, 1-3 blüthig: KB. ey-lanzettf., zugespitzt, begrannt, 1nervig: *Blb. länglich-verkehrteyf., noch 1 mal so lang, als der K.* 2. Auf felsigen, gebirgigen Wiesen. (in der westl. Schw. auf dem Chasseron, Saleve und Suchet; in Mähren auf den Polauer Bergen; in Krain hinter Görz; bei Wien.) Mai-Jul. *A. juniperina* Vill. *Stellaria aculeata* Scop.

11. *HOLOSTEUM* (L.) Spurre. — *K. 3blättrig. Blb. 5, gezähnt. Stbg. 5 oder 3, 4. Fruchtkn. vieleiyg. Gl. 3. Kapsel an der Spitze 6klappig. S. schildf., auf der einen Seite etwas konvex und mit einer Furche vertieft, auf der anderen konkav und mit einem vorragenden Kiele durchzogen.*

1. *H. UMBELLATUM* (L.) Doldenblüthige Sp. — Bth. doldig. ☉. Auf Feldern und an bebauten O. der Ebenen und niedrigeren Berge. März - Mai. Schk. t. 20. *Alsine umbellata* DC. Bth. weiss, seltener rosenroth.

12. *STELLARIA* (L.) Sternmiere. — K. 5 blätterig. Blb. 5, 2 sp. oder 2 th. Stbg. 10. Fruchtkn. vieleiig. Gf. 3. Kapsel 6 klappig. — Bth. aller weiss.

I. Rotte. *Dichodon* Bartling. Kapsel an der Spitze in Zähne aufspringend; Samensäulchen lineal, verlängert.

1. *S. VISCIDA* (M. v. Bieberst.) Klebrige St. — *Der St. stielrund*, gerillt, oberwärts gabelig - rispig, vielblüthig; *Bthstielch.*, *K. und Blätterrund klebrig - flaumig*; *B. lineal.*, die untern gestielt, fast spatelig; Blb. länger, als der K. ☉. Auf trocknen Trüften, (in Schles., Mähr. und Oberbaden.) Mai. Jun. St. h. 63. *Cerastium anomalum* W. und Kit. D.

2. *S. CERASTOIDES* (L.) Hornkrautähnliche St. — *Der St. stielrund*, gestreckt, an der Spitze aufstrebend, und mit einer herabziehenden Haarlinie besetzt, 3 bis vielblüthig; *Bthstiele flaumig*, nach dem Verblühen herabgeschlagen; *B. sitzend, länglich - lanzettl.*, spitzlich, kahl, die untern stumpf, an der Basis verschmälert, die obersten beinahe eif., spitz; Blb. länger, als der K. 4. An feuchten O. und an den Bächen in den höhern A., (dch d. g. AK.) Jul. Aug. St. h. 64. *S. multicaulis* Willd. *Cerastium refractum* All. *C. trigynum* Vill. *C. stellarioides* Hartm.

II. Rotte. *HYLEBIA*. Kapsel bis zur Mitte und darüber in Klappen aufspringend; Samensäulchen lineal, verlängert.

3. *S. NEMORUM* (L.) Wald - St. — *Der St. aufstrebend, oberwärts zottig*; *B. gestielt, herzf., zugespitzt*, die an den Aesten sitzend; R. gabelsp.; KB. lanzettl.; Blb. tief - 2sp., noch 1 mal so lang, als der K.; Kapsel länglich, länger, als der K. 4. In feuchten Hainen und an Bächen in gebirgigen Gegenden und in den VorA.: auch auf den Ebenen des nördl. D. Mai - Jul. St. h. 63. Die *S. latifolia* Pers., nicht DC., besteht in grösseren Expl. mit längern, weniger deutlich herzf. B. X
Moutan
July 77

III. Rotte. *STELLARIA*. Kapsel bis zur Mitte und darüber in Klappen aufspringend, an der Basis abgerundet oder wenig verschmälert; Samensäulchen sehr kurz.

4. *S. MEDIA* (Vill.) Gemeinste St. — *Der St. aufstrebend, gabelsp., einzellig - behaart*; *B. eif., kurz - zugespitzt, gestielt, die oberen sitzend*; Bth. gabel- und endst.; Blb. so lang, als der K. u. kürzer, 2 th.; Kapsel länglich, länger als d. K. ☉. An cultiv. O., auf Schutthaufen, an Wegen, Gräben, überall. Blühet fast das ganze Jahr. St. h. 1. *Alsine media* L. spec. St. h. 1. Var. auf fettem, feuchtem Boden; X
1822
July 77

β. *major*, grösser; Bth. 10 männig; *S. neglecta* Weihe bei Bl. und Fingerh. *S. umbrosa* Opitz bei Rehb. fl. g. exs.

5. *S. BULBOSA* (Wulfen.) Zwiebeltrag. St. — *Der St. aufrecht, einfach, oder 1 bis 2 mal gabelsp., meist 3 blüthig*; *B. elliptisch,*

spitz, in einen kurzen Bstiel verschmälert; *Bthstiele nach dem Verblühen bogtg-zurückgekrümmt*; *Wurzelstock wagerecht, fädlich, mit Rübchen besetzt*. 4. In schattigen Hainen, am Fusse bejahrter Eichen, (bei Laibach in Krain und Tanzelsdorf in Steyerm.) Apr.-Mai. J. ic. rar t. 468. St. h. 59. *Stellaria dichotoma* Scop.

6. S. HOLOSTEA (L.) Grossblumige St. — Der St. aufstrebend, 4 kantig; B. sitzend, lanzettl., *lang-zugespitzt, am Rande und auf dem Kiele rauh*; der Ebenstrauss gabelig; *die DeckB. krautig*; KB. nervenlos; Blb. halb-2sp., noch 1mal so lang, als der K.; Kapsel kugelig, so lang, als der K. 4. An grasreichen O. der Wälder, an Zäunen u. Gebüsch, (dch d. ganze Gebiet; in d. Schw. seltner.) Apr. Mai. Schk. t. 122.

7. S. GLAUCA (Withering.) Meergrüne St. — Der St. aufrecht, schwach, 4eckig, u. *nebst den sitzenden, lineal.-lanzettl., spitzen B. ganz kahl*; Ebenstrauss gabelig; *die DeckB. trockenhäutig, am Rande kahl*; KB. 3nervig; Bib. 2th., länger, als der K.; Kapsel länglich-eyf., so lang, als der K. 4. Auf feuchten Wiesen, an Sümpfen u. Fischteichen, (in D. fast überall; in d. Schw. sehr selten u. bisher blos im C. Basel.) Jun. Jul. St. h. 63. S. graminea β. L. S. palustris Retz. Var. stark-meergrün u. grasgrün, mit grössern u. kleinern Bth., Blb. so lang, als der K., u. mit 1-2blüthigen u. 6-9blüthigen St. De Variet. mit grasgrünen B. u. 1-2blüthigem St.: S. Dilleniana Moench. Roth. S. flaccida Peterm. fl. Lips.

8. S. GRAMINEA (L.) Grasartige St. — Der St. ausgebreitet, 4eckig, *kahl*; B. sitzend, lanzettl., *spitz, kahl, an der Basis wimperig*; Ebenstrauss gabelig, *die DeckB. trockenhäutig, am Rande gewimpert*; KB. 3nervig; Blb. 2th., so lang, als der K.; Kapsel länglich, länger, als der K. 4. Auf Wiesen, Heiden, Feldern. Mai-Jul. St. h. 63. S. arvensis Hoppe. Kommt mit kleinern u. noch 1mal so grossen Bth. vor, u. diese Varietäten deuten nach Schummel's Beobachtung ein vielehig-2häussiges Geschlecht an; vgl. Fl. sil. I. 417.

9. S. FRIESEANA (Seringe bei DC.) Rauhhläutrige St. — Der St. ausgebreitet, 4eckig, *oberwärts rauh*; B. sitzend, lanzettl.-lineal, *spitz, nach der Basis verschmälert, am Rande u. auf der Mittelrippe rauh*; R. gabelig, fast ebensträussig; *die DeckB. trockenhäutig*; KB. nervenlos, getrocknet an der Basis 3nervig, der Mittelnerve auslaufend; Blb. 2th., so lang, als der K.; Kapsel eyf.-länglich, länger, als der K. 4. An grassreichen O., (bisher blos im Gesenke der Sudeten! u. nach Nolte im Lauenburgischen.) Jul.-Septbr. S. longifolia Fries. D. fl. 3. 256. St. h. 63. Das v. d. Autor selbst herstammende, in d. Willdenowischen Sammlung aufbewahrte Expl. der S. longifolia Mühlenberg bildet sicherlich eine eigne, sowohl v. d. S. graminea, als v. d. S. Frieseana verschiedene Art.

IV ROTTE. LARBREA St. Hilaire mem. plac. lib. 81. Kapsel bis an die Mitte u. darüber in 6 Klappen aufspringend, an der Basis verschmälert, deswegen die Basis des K. trichterf. (Nicht allein die Gattung LARBREA u. Honkeneya sind den Pflanzen mit kelchständigen Staubgefässen zuzuzählen, sondern die ganze Ordnung der Alsineen. Bei allen ist die kelchständige, Stbg. u. Drüsen tragende, Scheibe

vorhanden, in deren Mitte der Fruchtkn. mit einer kleinen Basis angeheftet ist; sie wird aber vom untern Theile des Fruchtkn., dem sie genau angepasst ist, meist so bedeckt, dass sie nur nach Wegnahme des Fruchtkn. in die Augen fällt. Die Basis des Fruchtkn. erscheint bei der *S. uliginosa* mehr verschmälert, als z. B. bei der *S. graminea*, aber der Bau der perigynischen Schelbe ist bei beiden Pflanzen einer u. derselbe.

10. *S. ULIGINOSA* (Murray.) Schlamm-St. — Der St. ausgebreitet, 4eckig, kahl; B. sitzend, länglich-lanzettl., kahl, an der Basis gewimpert; R. gabelig; die DeckB. trockenhäutig, am Rande kahl; KB. 3nervig; Blb. 2th. kürzer, als der K.; Kapsel eyf., ungefähr so lang, als derselbe. ☉. Auf sumpfigen Wiesen, an Ufern, Gräben, Quellen. Jun. Jul. *S. graminea* γ. L. *S. Alsine* Reichard. St. h. 1. *S. aquatica* Poll. *S. Dilleniana* Leers. *S. fontana* Wulf. *S. hypericifolia* Wigg. *Larbrea aquatica* St. Hil. DC. Var. grösser u. kleiner u. mit gesättigter-grünen B.

11. *S. CRASSIFOLIA* (Ehrh.) Dickblättrige St. — Der St. ausgebreitet od. aufrecht, 4eckig, kahl, zuletzt oberwärts rispig; B. sitzend, länglich-lanzettl., ganz kahl; Bthstiele einzeln, gabelst; die DeckB. krautig; KB. nervenlos, getrocknet an der Basis 3nervig; Blb. 2th. u. nebst der Kapsel länger, als der K. 4? Auf feuchten Wiesen auf torfhaltigem Boden, (v. Westphal. dch Hannover nach Brandenbg, u. d. Lausitz u. nach Oldenbg, Holstein, Mecklenbg u. Pommern) Jul. Aug. St. h. 63. *S. dichotoma* Wigg. — KB. bei der getrockneten Pflanze oft fast 3nervig. Ob sich von dieser die *S. elodes* MB. (in Briefen an Besser) hinlänglich unterscheidet, ist an ihren Standorten weiter zu untersuchen. D.

13. *MOENCHIA* (Ehrh.) Mönchie. — K. 4-5blättrig. Blb. 4-5, ganz od. gestutzt. Stbg. 4 od. 8-10. Fruchtkn. vieleiyg. Gf. 4-5. Kapsel an der Spitze 8-10 klappig. — Bth. weiss.

1. *M. ERECTA* (Fl. d. wett.) Aufrechte M. — Der St. meist 2blüthig; Blb. um ein Drittel kürzer als der K.; Gf. zurückgekrümmt, während des Blühens um die Hälfte kürzer als der Fruchtkn.; Bth. 5männig. ☉. Auf Triften u. Heiden, (hin u. wieder dch d. g. Gebiet) Apr. Mai. Vaill. par. t. 3. f. 2. *Moenchia quaternella* Ehrh. *M. glauca* Pers. *Sagina erecta* L. *Alsinella erecta* Moench. Die *Moenchia octandra*, in Süd-Europa einheimisch, hat einen höheren, vielblüthigen St. u. 5männige Bth.

2. *M. MANTICA* (Bartling cat. sem. h. Gött.) Mantische M. — Der St. gabelig, 3- vielbthig; Blb. doppelt so lang als der K.; Gf. gerade, während des Blühens doppelt so lang als der Fruchtkn.; Bth. 8-10männig. ☉. An kräuterreichen O., (Krain u. südl. Tyrol; C. Tessin u. im Veltlin.) Mai. Jun. *Cerastium manticum* L. *Stellaria mantica* DC. Gaud. St. h. 63. D. fl. 3. 358. *Malachium manticum* Rch. fl. exc., Koch Synops. ed. 1.

14. *MALACHIUM*. (Fries fl. halland. p. 77.) Weichkraut. — K 5sp. Blb. 5, 2theilig, Stbg. 10. Fruchtkn. vieleiyg. Gf. 5. Kapsel 5klappig, Klappen 2sp.

1. *M. AQUATICUM* (Fries.) Wasser-W. — Die St. gestreckt u. kletternd, an der Basis wurzelnd; *B. herzf.-eyf.*, zugespitzt, sitzend, die der unfruchtbaren St. gestielt; Bstiel ungefähr so lang, als das B.; R. gabelig, spreitzend, drüsig-haarig; die DeckB. krautig; Blb. 2th. 4. An feuchtem Gebüsch, Ufern u. Gräben. Jun.-Aug. *Cerastium aquaticum* D. fl. 3. 331. St. h. 63. *Stellaria aquatica* Scop. *Larhrea aquatica* Ser. bei DC., nicht St. Hilalre.

15. *CERASTIUM* (L.) Hornkraut. — K. 5blättrig. Blb. 5, 2sp. od. mit einer spitzen Kerbe ausgerandet. Stbg. 10. Fruchtkn. vieleiyg. Gl. 5. Kapsel an der Spitze 10klappig. — (Bth. weiss. Bei *Cerastium tetrandrum* fehlt der fünfte Bththeil.)

1. Rotte. *ORTHODON* Ser. bei Dt. prod. 1. 415. Kapsel an der Spitze mehr od. weniger aufwärts gekrümmt; Zähne gerade, am Rande zurückgerollt.

§. 1. W. einfach, jährig od. 2jährig; die St. aufrecht od. aufstrebend, seltner an der Basis wurzelnd; perennirende Stämmchen fehlend.

Blb. so lang, als der K., od. kürzer, als derselbe.

1. *C. GLOMERATUM* (Thuillier.) Geknäueltes H. — Der St. aufrecht od. aufstrebend; B. rundlich u. oval, die untern in den Bstiel verschmälert; Aeste der R. geknäuel; *die DeckB. sämmtl. krautig u. nebst den K. an der Spitze bärtig; die fruchtttrag. Bthstielchen so lang, als der K. u. kürzer*; Blb. ungefähr so lang, als der K. ☉. Auf Aeckern u. cultiv. etwas feuchten O. an Ufern u. Gräben. Mai-Aug. St. h. 63. C. ovale Pers. C. vulgatum des Linn. Herbariums u. Smith. C. viscosum Fries. Gand. C. rotundifolium Denkschr. d. regensb. Ges. Aeste an der blühenden Pflanze immer geknäuel. Var.:

β. *glandulosum*, Haare sämmtlich drüsenlos.

γ. *apetalum*, Blb. fehlend; C. *apetalum* Dumort.

2. *C. BRACHYPETALUM* (Desportes.) Kurzblumiges H. — Der St. aufrecht od. aufstrebend; B. länglich u. oval, die untern in den Bstiel verschmälert; die obren Aestchen der R. gehäuft; *die DeckB. sämmtl. krautig u. nebst den K. an der Spitze bärtig; die fruchtttrag. Bthstielchen 2 od. 3mal so lang, als der K.*; Blb. ungefähr so lang, als der K., od. kürzer, als derselbe. ☉. Auf grasigen Hügeln, gebirgigen. uncultiv. O., (zerstreut dch d. g. Gebiet.) Mai. Jun. C. viscosum Pollich. C. barbulatum Wahlenb. C. strigosum Fries. Var., wie alle verwandten, mit drüsenlosen Haaren am obren Theile des St., der Bthstielchen u. K. u.

β. *glandulosum* mit drüsigen Haaren an den benannten Theilen.

Die hier aufgeführte Pflanze ist das *Cerastium brachypetalum* Loiseleur's, De Candolle's u. aller franz. Botaniker seit langen Jahren, deshalb behielt ich den Namen bei, obgleich er nicht ganz passend ist.

3. *C. SEMIDECANDRUM* (L.) Kleines H. — Der St. aufrecht od. aufstrebend; B. länglich u. oval, die untern in einen Bstiel verschmälert; die obren Aestchen der R. gehäuft; *die DeckB. sämmtl. nebst den KB. halb-trockenhäutig, an der Spitze kahl,*

ausgebissen-gezähnel; die fruchttrag. Bthstielchen 2 oder 3mal länger, als der K., herabgebogen; Blb. fast so lang, als d. K., od. kürzer, als derselbe. ☉. Auf Brachäckern, Haiden, sonnigen Hügeln. März-Mai. St. h. 63. C. viscidum Lnk. C. viscosum Pers. C. pellucidum Chaub. Var.:

β. *glandulosum*, drüsig, sehr klebrig; C. glutinosum Fries.

γ. *glaberrimum*, die Haare an der ganzen Pflanze gänzlich fehlend; C. macilentum Aspegren Bleck. Rb. ic. fig. 379. 380. Bisher bloß bei Güstrow in Mecklenburg, John.

4. GLUTINOSUM (Fries fl. halland. 51.) Niedriges H. — *Der St. aufrecht od. aufstrebend*; B. länglich und oval, die untern in einen Bstiel verschmälert; die obern Aestchen der R. gehäuft; *die DeckB. krautig, die obern nebst den K. am Rande trockenhäutig, an der Spitze kahl, mit einem krautigen, beinahe auslaufenden Streifen*; die fruchttrag. Bthstielchen 2 od. 3mal länger, als der K., wagrecht-abstehend ☉. Auf Brachäckern, trocknen Weiden, (zerstreut dch d. ganze Gebiet.) Apr. Mai. Cerast. pumilum St. h. 63. C. Grenieri Schultz fl. gall. et. g. exs. C. semidecandrum Pers. C. ovale Bess. Var.:

α. *obscurum*, dunkel-grün; obere DeckB. mit sehr schmalem trocken-häutigem Rande. C. Grenieri α. Schultz. C. obscurum Chaub. in St. Am. fl. agen. Den trockenhäutigen Rand fand ich allemal.

β. *pallens*, blasser grün; die oberen DeckB. breiter-trockenhäutig-berandet. C. Grenieri β. Schultz.

Der Variet. α. des C. glutinosum sehr ähnlich ist d. C. litigiosum De Lens. in Lois. fl. gall. Schultz fl. gall. et. g., nur sind die Bthstiele etwas länger u. die Blb. anderthalbmal so lang als der K. Im Gebiete unserer Fl. wurde es noch nicht gefunden.

Das Cerastium tetrandrum Curt. (Sagina cerastoides Engl. bot. St. h. 64. Esmarchia cerastoides Rb.) welches auf den, in der Nachbarschaft von Holstein gelegenen, Inseln Manoe u. Lyst v. Nolte aufgefunden wurde, untersch. sich v. dem ähnlichen C. glutinosum dch folgds: B. schmaler, länglich-lineal., die untern in einen langen Bstiel verschmälert, fast spatelig; die DeckB. aber breiter, eyf., ganz krautig; die R. zuletzt ganz aufgelöst in weitläufig gabelspaltige Aeste, u. der fünfte Bththeil fehlend. Manchmal kommt es nach Smith's Beobachtung mit 5blättrigen, 10männigen, 5weibigen Bth., wie die übrigen Cerastien, vor, ist aber doch durch die angegebenen Kennzeichen hinlänglich unterschieden.

5. C. TRIVIALE (Link.) Grosses H. — *Die St. aufstrebend, die seitenst. an der Basis wurzelnd*; B. länglich od. eyf., die untersten in einen Bstiel verschmälert; die obern Aeste der R. gehäuft; *die DeckB. nebst den K. am Rande trocken-häutig, an der Spitze kahl*; die fruchttrag. Bthstielchen 2 od. 3mal so lang, als der K.; *Blb. ungefähr so lang, als der K.* ☉ u. ☉. Auf Aeckern u. cultiv. etwas feuchten O., auf Wiesen, an Ufern. Mai-Herbst. St. h. 63. C. vulgatum Wahlenb. C. viscosum des Linn. Herbariums. — Blb. so lang, als der K., od. ein wenig länger. Var.:

β. *glandulosum*; Haare der Bthstiele u. des K. drüsig-klebrig: C. viscosum β. glandulosum v. Bönningh.

γ. *holosteoides*; B. u. der St. bis zur R. kahl, dieser mit einer herablaufenden Haarlinie bezeichnet: C. vulgatum β. holosteoides Fries.

δ. *alpinum*; St. h. 63. B. breiter, oval, Bth. ein wenig grösser. Diese Variet. untersch. sich v. C. alpinum doch folgds: die R. vielblüthig, die obern Aestchen gehäuft; die Haare straffer, kürzer; der St. höher, die unfruchtbaren Rosetten fehlend u. die Blb. so lang, als der K. od. nur etwas länger.

** Blb. noch 1mal so lang, als der K.

6. C. CAMPANULATUM (Viv.) Glockiges H. — Die St. aufrecht od. aufstrebend, nicht wurzelnd; B. länglich, die untersten, in den Bstiel verschmälerten, fast spatelig; die R. reichblüthig, zuletzt zerstreutblüthig; die untern DeckB. krautig, die obern schmal-trockenhäutig-berandet; die fruchtr. Bthstielen 2mal länger, als der K.; Blb. noch 1mal so lang, als der K. ☉ u. ☉. Auf Aeckern u. kräuterreichen Hügeln, (im Wallis, nach Schleich. u. Rb.) Apr. Mai. C. praecox Tenor. Die Bth. sind im Grunde weiter offen, als bei den verwandten Arten, aber doch eigentlich nicht glockig zu nennen; von der Mitte an sind sie auswärtsgerichtet. S.

7. C. SYLVATICUM (Waldst. u. Kit.) Wald-H. — Die St. aufstrebend, die seitenst. an der Basis wurzelnd; die untersten B. eyf., spitz, in einen Bstiel plötzlich zugezogen, die mittleren länglich, die obern lanzettl., verschmälert-zugespitzt; die R. reichblüthig, zuletzt zerstreutblüthig, die untern DeckB. krautig, die obern schmal-trockenhäutig-berandet; die fruchtr. Bthstielen verlängert; Blb. noch 1mal so lang, als der K. ☉. In etwas feuchten Wäldern, (bis jetzt blos in der Gegend von Mauerbach bei Wien, D. Rohde; bei Triest, Biasoletto, bei Marburg in Steyerm., Maly.) Jun. Jul. D.

§. 2. Die W. vielköpfig, Stämmchen, obgleich schlank, doch perennirend, u. jährlich blüthentragende u. unfruchtbare St. treibend.

8. C. LATIFOLIUM (L.) Breitblättriges H. — Die Stämmchen rasig, gestreckt; die St. aufstrebend, die nicht blühenden dicht rasig, die blüthentrag. ziemlich aufrecht, 1-3blüthig; B. elliptisch od. lanzettl.; die DeckB. krautig; die Bthstielen nach dem Verblühen eingeknickt; Blb. fast noch 1mal so lang, als der K. 4. Auf den höheren sowohl Granit- als KalkA., (doch d. g. AK.) Jul. Aug. St. h. 24. Die nicht blühenden Stämmchen so lang, als die blühenden, nicht rosettig; Haare des St. u. der B. dicklich, deutlich gegliedert, drüsentragend, mit wenigen längeren, 1fachen untermischt. Var. B. in das Meergrüne ziehend u.

β. *glabriusculum*; der St. unterwärts u. die B. auf beiden Seiten kahl, diese nur am Rande gewimpert. St. h. 64.

γ. *grandifolium*; B. breit-eyf., spitz, sehr genähert; das Bthstielen kurz, kaum länger, als die Bth. St. h. 64; die Blb. nach einem getrockneten Expl. nicht gut abgebildet; sie sind genau

so tief-2lappig, wie bei der Hauptart. *C. latif. γ, intermedium* Gaud. *C. flexuosum* Hegetschw.

δ. glaciale; der St. kurz, B. elliptisch-länglich: *C. glaciale* Gaud. *C. latifolium δ, subacaule* Gaud. *C. uniflorum* Mur. *C. glaciale* St. h. 64, die Abbildung stellt ein wenig höhere Expl. dar, die mir v. Seringe unter diesem Namen gesandt wurden.

ε. pedunculatum; der St. kurz, B. lanzettl.: *C. pedunculatum* Gaud. *C. filiforme* Schleich. St. h. 64. Abbildung nach den vom Autor selbst erhaltenen Expl. — Die unter *δ, u. ε.* aufgeführten Formen sind kaum Variet. zu nennen, da sie sich nur dch die mindere Höhe von den breit- u. schmalblättrigen Formen der Hauptart unterscheiden.

9. *C. ALPINUM* (L.) Alpen-H. — *Die Stämmchen kriechend*; die nicht blühenden St. rosettig, die blühenden aufstrebend, 1-5 blüthig; B. elliptisch od. lanzettl., die *DeckB. krautig, an der Spitze schmal-trockenhäutig*; *Bthstiele nach dem Verblühen schief-abstehend*; Blb. fast noch 1mal so lang, als der K. 2. Auf den A. u. VorA., seltner mit den Flüssen herabsteigend, (dch d. g. AK., mit der Isar bis München, auf d. Gipfel d. Babia Gora in Schles.) Mai-Aug. St. h. 64. *Centunculus alpinus* Scop. Untersch. sich v. *C. arvense* dch die rosettigen nicht blühenden Stämmchen, den arnblüthigen St., die nach dem Verblühen eingeknickten Bthstiele, den an die Blbkr. angedrückten K. und die längern Haare; v. *C. latifolium* dch die rosettigen Stämmchen, die längern Haare u. die obern, häutig-berandeten DeckB. Var.:

β. glanduliferum; der St. oberwärts nebst den Bthstielen mit drüsentrag. Haaren bedeckt.

γ. lanatum; mit wolligen Haaren dicht bedeckt u. v. weitem grau: *C. lanatum* Lam. St. h. 64. *C. alpinum* Wulf. bei J. Diese Variet. kommt vor:

δ. glutinosum; der St. oberwärts nebst den Bthstielen von drüsentrag. Haaren sehr klebrig: *C. Soleirolii* Ser.

In Schweden kommt es fast ganz kahl vor: *C. alpinum β. glabratum* Wahlenb. *C. glabratum* Hartm. St. h. 64.

10. *C. OVATUM* (Hoppe.) Eyrundblättriges H. — *Die Stämmchen gestreckt, am Grunde wurzelnd*; die St. rasig, die blühenden aufstrebend, 6-9blüthig; die untern B. lanzettl., die obern aus eyf. Basis verschmälert-spitz, die *Deck-B. mit einem trocken-häutigen, breiten, kahlen, an der Basis etwas wimperigen Rande*; *Bthstiele kurzsch.-flaumig, nach dem Verblühen schief-abstehend*. Blb. noch 1mal so lang, als der K. 2. Auf dem Bachkiese der höhern A., (in Kärnthen u. Steyermark.) Jun.-Aug. St. h. 64. *C. carinthiacum* Vest. D.

11. *C. ARVENSE* (L.) Acker-H. — *Die Stämmchen gestreckt, an der Basis wurzelnd*; die St. aufstrebend, die nicht blühenden dicht-rasig, die blühenden aufrecht, 7-15blüthig; B. lineal.-lanzettl. od. lineal.; die *DeckB. breit-trockenhäutig-berandet*; *Bthstiele kurzsch.-flaumig, nach dem Verblühen aufrecht mit nickendem K.*; Blb. noch 1mal so lang, als der K. 2. Auf Feldern, sonnigen Hügeln, an Weg- u. Ackerrändern; in d. VorA.

u. in d. höchsten A. hinaufsteigend. Apr. Mai, in den A. später. St. h. 8. Var. mit schmälern, schmal-linealen, u. breitem, seltner fast ovalen, aufrechten, abstehenden u. zurückgebogenen B., u. drüsigen u. drüsenlosen, wagerecht abstehenden u. zurückgebogenen Haaren der Bthstiele, u.

β. strictum, der St. u. B. kahl, letztere an der Basis gewimpert; *C. strictum* Haenke bei J. coll. 2. p. 66. St. h. 64. (*C. strictum* L. scheint nach d. Beschreibung zur *Arenaria grandiflora* All. zu gehören.) Auch trenne ich nicht mehr:

γ. suffruticosum, B. aufrecht, steifer: die DeckB. mit einem trockenhäutigen, breitem Rande umzogen, u. nur an der Basis gewimpert, oder am Rande fast ganz kahl: *C. suffruticosum* L. St. h. 64. *C. laricifolium* Vill. Dieses im südl. Tyrol. Nach Rb. ist *C. suffruticosum* L. zu d. kahlen Variet. des *C. grandiflorum* zu ziehen.

12. *C. REPENS* (L.) Kriechendes H. — Die Stämmchen gestreckt, an der Basis wurzelnd; die St. aufstrebend u. nebst den B. filzig, die nicht blühenden dicht-rasig, die blühenden aufrecht, 7-15blüthig; B. lineal-lanzettl. od. lineal.; die DeckB. breit-trockenhäutig-berandet; Bthstiele wollig-filzig; nach dem Verblühen aufrecht mit nickendem K.; Blb. noch 1mal so lang, als der K.; Kapselzähne vorgestreckt, am Rande zurückgebogen. 4. An sonnigen O. u. auf Mauern, (bei Lüttich, im C. Waadt u. Wallis an mehreren O.; ob bloß verwildert?) Apr. Mai. St. h. 64. *C. tomentosum* Lej. DC. Diese Pflanze ist nach d. Synonymen, das von Vaillant ausgeschlossen, das wahre *C. repens* Linne's; und von diesem unterscheidet sich *C. tomentosum* Lin. (wenigstens die Variet. *α.* oder die Hauptart.) das *C. repens* MB., *C. Biebersteinii* DC., was auch Smith für das wahre *C. tomentosum* L. erklärte, dch. breitere B. u. vorzüglich dch. zurückgerollte Kapselzähne, weswegen dasselbe zur folgenden Rotte zu rechnen ist. Vgl. die sehr gute Abbildung bei St. h. 64.

11. Rotte. *STREPHODON* Ser. bei DC. prod. I. 414. Kapsel gerade, mit zirkelf.-zurückgerollten Zähnen.

13. *C. GRANDIFLORUM* (Waldst. u. Kit) Grossblüthiges H. — Die Stämmchen gestreckt, an d. Basis wurzelnd; die St. aufstrebend, knotig-gegliedert, die nicht blühenden dicht-rasig, die blühenden aufrecht, 7-15blüthig; B. schmal-lineal., etwas fleischig, unterseits konvex, getrocknet am Rande zurückgeschlagen; Zähne der geraden Kapsel zirkelf.-zurückgerollt. 4. Auf den A., (auf dem hohen Schwab in Obersteiermark, nach Müller; Rb. fl. exc. p. 799.) Jul. Aug. Var. filzig. St. h. 64. u.

β. glabrum, kahl; Bthstiele kraus-flaumig u. die Haare an d. Basis der B. schlängelnd, nicht steif: *C. grandiflorum β. bannaticum* Rochel. St. h. 64. (die filzige u. kahle Variet.) D.

XV. Ordng. ELATINEEN. Cambessedes in mem. mus. 1. 225.

K. 3, 4, 5 sp. od. th., in der Knospenlage dachig. Blb. so viel, als KB., mit diesen abwechselnd, unterweibig. Stbg. so viel,

als Blb., od. noch 1mal so viel, frei, *unterweibig*. *Fruchtkn.* frei, 3, 4, 5fächerig; die Klappen die Zwischenwände tragend; Fächer mehreyig. *Gf.* so viel, als Fächer. Kapselfrucht; STräger mitelpunktst. S. zahlreich, eyweisslos. Keim gerade od. mit dem S. gekrümmt; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. *B. nebenblattlos*.

1. ELATINE (L.) Tünnel, — K. 3, 4 th. Blb. 3, 4. Stbg. 3, 4, 6, 8. *Gf.* 3, 4. Kapsel 3, 4fächerig, vielsamig. S. fadenf., stielrund, ziemlich gerade od. hufeisenf. gekrümmt.

1. E. HYDROPIPER (L. mit Anschluss des Syn. Vaillants u. der Variet. β .) Pfefferfrüchtiger T. — B. gegenst., kürzer als der Bstiel; Bth. sitzend od. sehr kurz-gestielt, 4blättrig, 8männig; S. halbzirkelf. - gekrümmt. $\odot$. An überschwemmten, feuchten O., an den Ufern der Flüsse, Fischteiche u. Seen, (hin u. wieder.) Jun.-Aug. Schk. t. 109. b. E. Schkuhriana Drev. und Hayn. „Bth. völlig sitzend,“ Wahlenb. fl. succ. K. 4sp.

2. E. TRIANDRA (Schk. t. 109. b.) Dreimänniger T. — B. gegenst., länger, als der Bstiel; Bth. sitzend, 3blättrig, 3männig; S. seicht-gekrümmt. $\odot$. Am Rande d. Sümpfe u. Fischteiche, (Niesky in der Lausitz, Wittenberg, Karlsruhe u. Regensburg; Pöls bei Grätz.) Jun.-Aug. D. fl. 3. 68. St. h. 3. K. 2sp.

3. E. HEXANDRA (DC.) Sechsmänniger T. — B. gegenst., länger, als der Bstiel; Bth. gestielt, Bthstiel so lang, als die Frucht od. länger; Bth. 3blättrig, 6männig; St. seicht-gekrümmt. $\odot$. An ähnlichen O., (hin u. wieder.) Jun.-Aug. E. tripetala Smith. E. Hydropiper L. var. β . K. 3sp.

E. *major*. A. Braun. D. fl. 3. 69, die im Bezirk unserer Fl., so viel ich weiss, noch nicht beobachtet wurde, untersch. sich dch 4blättrige, 8männige, gestielte Bth; Bthstiele von der dreifachen Länge der Frucht u. dch die B. u. S. der E. hexandra. E. Hydropiper DC., Schk. t. 109. a., Vaill. par. t. 2. f. 2.

4. E. ALISNASTRUM (L.) Wirteliger T. — B. quirlig. $\odot$?. In Seen, Fischteichen, Sümpfen, (hin u. wieder.) Jul. Aug. — E. alata der Fl. sedinensis gehört zu den Callitrichen.

XVI. Ordng. LINEEN. DC. theor. ed. I. p. 217. prod. I. p. 423.

K. 4, 5blättrig, bleibend, in der Knospenlage dachig. Blbkr. regelmässig. Blb. unterweibig, so viel, als KB., in der Knospenlage gewunden, zuweilen mit den Nägeln unter sich u. mit den Stbg. zshängend. Stbg. 5, mit den Blb. abwechselnd, unterweibig, an der Basis in einen Ring zsgewachsen, mit dazwischen gescho-

benen, den Blb. gegenst. Zähnen (Ansätzen zu innern Stbg.). Stbk. mit 2 Ritzen aufspringend. *Der Fruchtkn. dch 4, 5 vollst., aus einer doppelten Haut gebildete, u. 4, 5 unvollst. Scheidewände, 8, 10 fächerig; Fächer 1eelig; Eychen hängend; Sträger mittelpunktst. Gf. 4, 5. S. eyweisslos, Keim gerade, Würzelchen nach den Nabel gerichtet. B. nebenblattlos.*

1. LINUM (L.) Flachs. — K. 5blättrig. Blbkr. 5blättrig. Stbg. 5. Kapsel 10fächerig.

§. 1. KB. am Rande drüsig-gewimpert.

* Blb. gelb.

1. L. GALLICUM (L.) Französischer F. — KB. lanzettl., drüsig-gewimpert, in eine am Rande etwas rauhe Spitze zugespitzt-verschmälert, *underthalbmal so lang, als die Kapsel; Aestchen der R. ganz kahl; B. lineal.-lanzettl., am Rande etwas rauh; die fruchtrag. Bthstiele so lang, als der K. und länger. ☉. Auf Brachäckern u. uncultiv. O. der südl. Gegenden, (Triest, Fiume.) Jun. Jul. Gerard. gallopr. t. 16. f. 1. L. aureum WK. D.*

2. L. CORYMBULOSUM (Rb.) Ebensträussiger F. — KB. lanzettl., drüsig-gewimpert, in eine am Rande rauhe Spitze zugespitzt-verschmälert, *noch 1mal so lang, als die Kapsel; die blattwinkelst. Aestchen an der Basis einwärts-flaumig; B. lineal.-lanzettl., am Rande rauh; die fruchtrag. Bthstielchen so lang, als der K. u. länger. ☉. Auf trocknen, cultiv. Hügeln der südl. Gegend. (Triest, Fiume.) Jun. Jul. D. fl. 2. 498. L. aureum DC., mit Ausschluss der Syn. von Scop. D.*

3. L. STRICTUM (L.) Steifer F. — KB. lanzettl., drüsig-gewimpert, in eine am Rande rauhe Spitze zugespitzt-verschmälert, *noch 1mal so lang, als die Kapsel; B. lineal.-lanzettl., am Rande sehr rauh; die fruchtrag. Bthstielch. viel kürzer, als der K. ☉. An der Küste des Adriat. Meeres, (Istrien.) Jun. Jul. J.*

4. L. NODIFLORUM (L. sp. 401.) Knotenblüthiger F. — KB. verlängert-lineal.; an der Spitze kurz zugespitzt, begrannt, am Rande feingesägt-rauh, *drüsenlos, 2-3mal länger, als die Kapsel; B. am Rande sehr rauh, die unteren verkehrteyf.-lanzettl., sehr stumpf, die oberen lanzettl.-spitz; fruchtragende Bthstiele viel kürzer, als der K. ☉. Auf Aeckern, am Rande der Weinberge auf Thonboden, (Littorale auf dem Stramare zw. Zaule u. Muggia bei Triest, u. dch ganz Istrien, Tommas., auf der Insel Cherso, Noë.) Jun. Jul. L. liburnicum Scop. carn.*

5. L. MARITIMUM (L.) Seestrands-F. — KB. eyf., kurz-zugespitzt, drüsig-gewimpert, v. der Länge der Kapsel; *B. kahl, 3nervig, die untern gegenst., elliptisch, die oberen wechselst., lanzettl.; die fruchtrag. Bthstiele mehrmals länger, als der K. 4. An der Küste des Adriat. Meeres, (bei Triest.) Aug. Sept. J. h. vind. 2. t. 154. D.*

6. *L. FLAVUM* (L.) Gelber F. — *KB.* lanzettl., zugespitzt, drüsig-gewimpert; länger als die Kapsel; *B.* kahl, 3nervig, am Rande glatt, an der Basis beiderseits von einer Drüse gestützt, die oberen lanzettl., spitz, die unteren verkehrtey-lanzettl., kurz-zugespitzt; die *St.* oberwärts scharf-kantig. 4. Auf Bergwiesen u. trocknen, sonnigen Hügeln, (Krain u. dch Steyermark nach Oestr., Mähren u. Böhm.; sodann bei Ulm.) Jun. Jul. J. a. t. 214. St. h. 26. Bib. an der Basis zshängend, gelb, mit dottergelben Streifen. *L. campanulatum* MB. *L. tauricum* Willd. Var. 1) mit Stbg. so lang, als der K. u. mit Gf. viel länger, als der K. u. die Stbg.; u. 2) mit Stbg. fast noch 1mal so lang, als der K. u. mit Gf. von der Länge des K. — *L. campanulatum* L., das im südl. Frankreich wächst, untersch. sich dch längere, allmählig verschmälerte, am Rande glatte u. nicht drüsig-gewimperte *KB.* D.

* Bib. blau, rosenroth od. weisslich.

7. *L. HIRSUTUM* (L.) Rauh. F. — *KB.* lanzettl., zugespitzt, länger, als die Kapsel; *B.* ey-lanzettl. od. lanzettl., 5nervig u. nebst den K. zottig, letztere nebst den Deck*B.* drüsig-gewimpert; die *St.* filzig-zottig. 4. Auf Wiesen, u. uncultiv. Hügeln. (Steyerm., Mähren, Unteröstr.) Jun. Jul. J. a. t. 31. Bth. lila, an der Basis weisslich. D.

8. *L. VISCOSUM* (L.) Klebriger F. — *KB.* lanzettl., zugespitzt länger, als die Kapsel; *B.* lanzettl., 3-5nervig, zottig, die oberen, die Deck*B.* u. K. drüsig-gewimpert, fast kahl; der *St.* von weit abstehenden Haaren zottig. 4. Auf Wiesen, Gebirgs-Haiden, (Oberbayern, Salzbg. Südtirol, Kärnth., Krain bis nach Oestr.) Jun. Jul. *L. sylvestre* Scop. carn. Bth. hell-rosenroth, an der Basis mit violetten Adern. Var. mit Gf. länger, als die Stbg. u. kürzer, als diese. D.

9. *L. TENUIFOLIUM* (L.) Dünablättriger F. — *KB.* elliptisch, an der Spitze pfriemlich, drüsig-gewimpert, ein wenig länger, als die Kapsel; *B.* lineal, zugespitzt, am Rande wimperig-rauh u. nebst den *St.* kahl. 4. Auf Hügeln u. an gebirgigen, trocknen, steinigen O., auf Kalkboden, (in d. Schwz u. im mittleren u. südl. D., jedoch nicht überall.) Jun. Jul. J. a. t. 215. Bth. hell-rosenroth-lila.

§. *KB.* am Rande drüsenlos.

* *B.* wechselst. u. zerstreut od. nur die untersten gegenst.

10. *L. NARBONENSE* (L.) Languedockischer F. — *KB.* lanzettl., zugespitzt, drüsenlos, noch 1mal so lang, als die Kapsel; *B.* lineal-lanzettl., kahl, am Rande etwas rauh; die *St.* zahlreich. 4. Auf Bergwiesen u. an kräuterreichen O., (Krain u. im Littor.) Jun. Jul. *L. laeve* Rbch. fl. exc., nicht Scop. Bth. himmelblau. D.

11. *L. ANGUSTIFOLIUM* (Hudson.) Schmalblättriger F. — *KB.* eyf., zugespitzt, drüsenlos, fast so lang, als die Kapsel, die innern schwach-wimperig; *B.* lineal-lanzettl., kahl; die *St.* zahlreich, ausgebreitet. 4. Auf steinigen Hügeln u. Weiden, (im südl. Krain, Littor. u. Istrien.) Jun. Jul. *L. tenuifolium* var. *L.* Bth. blau. D.

12. *L. USITATISSIMUM* (L.) Gewöhnlicher F. — *KB. eyf.*, zugespitzt, klein-gewimpert, drüsenlos, fast so lang, als die Kapsel; B. lanzettl., kahl; der St. einzeln, aufrecht. ☉. Unter der Saat hie und da, gleichsam wild: überall aber cultivirt. Jul. Aug. St. h. 26. Bth. blau. Var.:

α. vulgare (Schübl. und Mart.) höher; B., Bth. und Kapseln kleiner, Kapseln geschlossen, die S. dunkler gefärbt. Bei den Landleuten: Schliesslein, Dreschlein.

β. crepitans (Schübl. und Mart.) niedriger und ästiger; B., Bth. und Kapseln grösser; Kapselklappen elastisch-aufspringend; die, übrigens früher reifenden S. blässer. Bei den Landleuten: Springlein, Klanglein. Cultiv.

13. *L. PERENNE* (L. spec. 397.) Ausdauernder F. — *KB. eyf.*, am Rande drüsenlos und kahl, die innern sehr stumpf; Bth. breit-verkehrt-eyf., mit dem ganzen Seitenrande sich deckend, der Nagel längl.-3 eckig; die Kapsel eyf.-etwas kugelig, noch einmal so lang als der K.; die blüthen- und fruchtrag. Bthstiele steif-aufrecht; B. lineal-lanzettl., kahl; St. zahlreich. 4. Auf sonnigen Hügeln, Brachfeldern und in sandigen Wäldern, (auf der Rheinfläche zw. Benzheim und Darmstadt, und in der Gegend von Frankf. am M. hinter dem Schwengelsbrunnen am Wege, der nach der kleinen Saustiege führt, links im Walde.) Jun. Jul. L. austriacum Pollich u. Fl. d. wett. Bth. hell-blau, mit starkem Honiggeruch. St. 2-3 Fuss hoch. Die Bth. sind oft am Nagel zu beiden Seiten mit einem kleinen Zähnchen beöhret. Das Glied des Bthenstiels unter dem Kelch, ist ungefähr noch einmal so lang, als breit. D.

14. *L. APINUM* (Jacq. L.) Alpen-F. — *KB. eyf.*, am Rande drüsenlos und kahl, die innern sehr stumpf; Bth. verkehrt-eyf., von der Mitte an auseinander-tretend, der Nagel längl.-3 eckig; die Kapsel oval, um ein Drittel länger als der K.; die blüthen- und fruchtragenden Bthstiele aufrecht; B. lineal.-lanzettl., kahl; St. zahlreich. 4. Triften der A. und VorA., die Variet. *β.* auf trockenen Weiden und Wiesen der Ebenen. (Die Variet. *α.* zerstreut deh die AK., an manchen O. häufig, die Var. *β.* bei München und Regensburg; beide in der westl. Schw.) Jun. Jul. L. alpinum L. sp. — Die Bth. am Nagel kaum mit einer kleinen Kerbe versehen. Das Glied des Bthenstiels unter dem K. ungefähr 4 mal so lang als breit. Bth. geruchlos. — Verschieden vom vorigen durch niedrigeren Wuchs, schmälere, von der Mitte an auseinander-tretende, dunkler blaue Bth., und die eyf. Kapsel. Var.:

α. genuinum. St. fingerlang bis halbfusshoch, oft niederliegend; L. alpinum Jacq. austr. L. alpinum *β.* Bertol. fl. ital. In den höhern A.

β. montanum, St. schuhhoch oder noch höher, aufstrebend oder aufrecht; L. montanum Schleich. catal.; Gaud. helv.; DC. Prodr.; Linum bavaricum F. W. Schultz in der bot. ztg.; L. perenne All. ped., Bertol. fl. it.; L. laeve Scop. carn. „K. ganz und gar nicht verschmälert.“ Scop.

15. *L. AUTRIACUM* (L.) Oestr. F. — *KB. eyf.*, am Rande drüsenlos und kahl, etwas kürzer, als die Kapsel, die inneren sehr stumpf; Blb. rundl.-verkehrt-eyf., mit dem ganzen Seitenrande sich deckend, der Nagel 3 eckig, so breit als lang; Kapsel kugelig; die abgeblühten Bthenstiele bogenf. nach einer Seite hinabhängend; B. lineal-lanzettl., kahl; St. zahlreich. 2. Auf Haiden, an Wegen, Hügeln, (Krain, Littor., Oestreich, Mähr., Böhm.) Jun. Jul. Jacq. austr. t. 418. Var., wie seine Verwandten und zwar oft auf ein und derselben W. mit unpunctirten und mit an der Spitze, und auf der ganzen Fläche durchscheinend-punctirten B. Vor den übrigen leicht zu erkennen durch die azurblauen Bth. und die nach dem Verblühen hinabhängenden Blthstiele; aber unvollständige Expl. dieser und der beiden vorigen Arten in Herbarien sind kaum zu bestimmen.

** B. sämmtlich gegenst.

16. *L. CATHARTICUM* (L.) Purgier-F. — *KB. elliptisch*, zugespitzt, drüsig-gewimpert, ungefähr so lang, als die Kapsel; B. kabl, am Rande etwas rauh, die untern verkehrteyf., die obern lanzettl., sämmtl. gegenst. ☉. Auf Wiesen und Triften. Jul. Aug. B. weiss. Schk. t. 87.

2. *RADIOLA* (Gmel.) Zwergflachs. — K. 4 sp., Zpfl 2-3 sp. Stbg. 4. Kapsel 8 fächerig.

1. *L. LINOIDES* (Gmel.) Tausendkörniger Z. — An sandigen feuchten O. Jul. Aug. R. millegrana Smith. D. fl. p. 869. *Linum Radiola* L. Vaill. par. t. 4. f. 6. Bth. weiss.

XVII Ordng. MALVACEEN. Brown. cong. p. 8. Malvaceen 1, 2, 3. Juss. gen. 271.

K. 3, 4, 5 sp., die Zpfl in der Knospenlage klappig; oft doppelt: der äussere mehrfach-geth. oder aus abgesonderten KB. gebildet. Blbkr. regelmässig: Blb. so viel, als Zpfl des K., wenn aber der K. doppelt ist, so viele als Zpfl des innern K. und mit diesen abwechselnd, in der Knospenlage schraubenf. gewunden, oft an die Röhre der Stbg. angewachsen. Stbg. von bestimmter Anzahl oder unbestimmt: Stbf. in eine Röhre verwachsen; StbK. 1 fächerig, mit einer Querspalte aufspringend. Unterweibige Scheibe fehlend. Der Fruchtkn. mehr-vielfächerig, bisweilen gelappt: Fächer 1-mehreyig; STräger mittelpunktst. Eyweiss fehlend oder wenig. Keim gerade: die Keimb. ineinander gewunden; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. wechselst., nebenblättrig.

1. *MALVA* (L.) Malve. — K. doppelt: der äussere 3blättrig, der innere 5 sp. Gf. sehr viele, unterwärts zsgewachsen. Kapsel kreisrund, vielfächerig; Scheidewände aus den einwärtsgebogenen

Klappenrändern gebildet, Fächer 1 samig. S. an die mittelpunktst. Achse angeheftet. Die bei der Reife abgetrennten Klappen abgesonderte Früchtchen darstellend.

1. Rotte. BISMALVA Medicus. Bth. blattwinkelst. und einzeln, oft auch endst. und hier mehre gehäuft. B. tief gespalten oder getheilt.

1. M. ALCEA (L.) Sigmar-M. — Der St. aufrecht; die wurzelst. B. herzf. - rundlich, gelappt, *die stengelst. handf. - 5 th., Zpfl fast rautenf., 3 sp., eingeschnitten - gezähnt oder fiedersp.; Bthstielchen nebst den K. filzig-rauhh., Haare büschelig; Klappen kahl, fein - quer - runzelig, auf dem Rücken gekielt, am Rande abgerundet.* 4. Auf sonnigen Hügeln, an Zäunen, Wegen, hie und da. Jul. Aug. Bth. rosenroth; Kraut geruchlos. Var.:

β. *multidentata*, Bzippf häufiger gezähnt: M. italica Pollini, nach Moretti's Bestimmung; (bei Bozen, von Elsmann und auf der Rheinfläche von mir selbst gesammelt.)

β. *fastigiata*, B. weniger eingeschnitten, *die obern stengelst., 3 sp., die mittlern 5 sp., Zpfl längl., ungleich - gezähnt.* M. fastigiata Cavanill. diss., D. fl. M. Morenii Pollin. ver. nach Host. fl. a. M. decumbens Host. fl. a. (aber der St. aufrecht, nicht liegend.) M. Bismalva Bernhards nach Lej. fl. d. spa. Die Zucht aus dem Samen lehrt, dass Malva fastigiata eine blosse Variet. von M. Alcea ist. D.

2. M. MOSCHATA (L.) Bisam-M. — Der St. aufrecht; die wurzelst. B. herzf. - rundlich, gelappt, *die stengelst. 5 th., Zpfl fiedersp., eingeschnitten oder doppeltfiedersp.; Bthstielchen nebst den K. rauhh., Haare meist einfach; Klappen dicht-rauhh., glatt, am Rande zugerundet.* 4. Auf uncultiv. Hügeln, gebirgigen steinigen O., Triften, an Zäunen, Wegen, (zerstreut in der Schw. und in dem ganzen Rheingebiete; dch das Elsass nämlich, die Rheinpfalz, die Moselgegend bis an die Maas; auf dem rechten Ufer dch Baden und auch dch Württemberg, nach Hessen und Westphal.; in Thüringen von Halle bis Magdeburg; Regensburg, Oberschwaben, Krain.) Jul - Herbst. Bth. wie die der Vorhergehenden.

II Rotte. FASCICULATAE DC. prod. I. 432. Bth. blattwinkelst., büschelig. B. lappig.

3. M. SYLVESTRIS (L.) Wilde M. — Der St. aufrecht oder aufstrebend; Bstiele nebst den Bthstielen rauhh.; B. 5 - 7 lappig; *Bthstiele gehäuft, nach dem Verblühen aufrecht; Bth. viel länger, als der K., tief ausgerandet, am Nagel dicht gehärtet; die äusseren KB. elliptisch - länglich; die Klappen berandet, grubig - runzelig.* ☉. An Dörfern, Zäunen, auf Schutthaufen. Jul. Aug. Bth. rosenroth mit Purparstreifen. — Malva mauritiana L., welche hie und da sich aus Gärten auf Schutthaufen verpflanzt, untersch. sich dch folgendes: Bth. gesättigter, fast bluthroth; Bth. breiter, weniger tief - ausgerandet; Bstiele kahl und nur auf der obern Oberfläche flaumig; Bthstiele kahl, kaum so lang, als die entfaltete Bth.; Früchte deutlicher - runzelig und der St. stärker, steifer.

4. M. NICAENSIS (All. fl. pedem. 2. p. 40.) Nizzäische M. — St. niederliegend, aufstrebend; B. herzf. - rundlich., 5 - 7 lappig; *Bthstiele gehäuft, nach dem Verblühen aufrecht; Bth. noch ein-*

mal so lang als der K., tief- ausgerandet, am Nagel schwach behärtet, grubig- runzelig. ☉. An Wegen, auf Schutt, (im südl. Istrien hin und wieder, gemein bei Pola, Tommas.) Jul. Aug. Cananill. diss. 2. t. 25. f. 1.

5. *M. VULGARIS* (Fries nov. ed. 2. p. 219.) Gemeine M. — Der St. gestreckt, aufstrebend; B. herzf. - rundlich, 5-7 lappig; *Bthstiele gehäuft, nach dem Verblühen abwärts geneigt*, mit aufrechtem K.; Bbl. 2- oder 3 mal so lang, als der K., tief- ausgerandet; die äusseren KB. lineal- lanzettl.; *Klappen am Rande abgerundet, glatt* oder schwach- runzelig. ☉. An cultiv. O., Wegen, auf Schutthaufen. Jun.-Herbst. Blbkr. hell- rosenroth. Schkr. t. 192. Rb. ic. 1. p. 20. f. 37. *M. vulgaris* Fries. *M. neglecta* Wallr. Diese aller Orten ganz gemeine Pflanze ist die Malva mit dem runden Blatte des C. Bauhin, und die *M. rotundifolia* aller Autoren und Apotheken und zwar bis auf die neuesten Zeiten. Mir scheint es daher unpassend, diesen Namen auf eine, wenig, und in neuern Zeiten erst von der gemeinen Pflanze unterschiedene Art überzutragen; aber ich habe doch den Namen *M. vulgaris* vorangestellt, weil man kaum mehr weiss, welchen Begriff man mit dem Namen *Malva rotundifolia* verbinden soll.

6. *M. BOREALIS* (Wallmann bei Liljebl. sv. fl.) Nördliche M. — Der St. gestreckt, aufstrebend; B. herzf. - rundlich, 5-7 lappig; *Bthstiele gehäuft, nach dem Verblühen abwärts geneigt*, mit aufrechtem K.; Bbl. so lang, als der K., schwach ausgerandet; die äusseren KB. lineal- lanzettl.; *Klappen berandet, grubig- runzelig*. ☉. An cultiv. O., Wegen, auf Schutthaufen, (von Westphalen dch das nördliche D. bis Preussen; sodann in Schles. und Thüringen.) Jun. - Herbst. Blbkr. hell- rosenroth. Rb. ic. 1. p. 21. f. 38. *M. parviflora* Huds., nicht Linne's, *M. pusilla* Wither. *M. Henningii* Goldb. *M. rotundifolia* Fries. nov.

2. *ALTHAEA* (L.) Eibisch. — K. doppelt: der äussere 6-9sp.; der innere 5 sp. Gf. viele, unterwärts zsgewachsen. Kapsel wie bei der Gattung Malva.

II Rotte. *ALTHAEASTRUM* DC. pr. 1. p. 536. Klappen auf dem Rücken konvex, mit abgerundeten Rändern, (nicht rinnig).

1. *A. OFFICINALIS* (L.) Gebräuchlicher E. — *B. auf beiden Seiten weich- filzig*, ungleich- gekerbt, herzf- oder eyf., *die untern 5 lappig, die obern 3 lappig*; Bthstiele blattwinkelst., reichblüthig, viel kürzer, als das B. 4. Auf feuchten Wiesen, vorzüglich an salzhaltigen O., am Seestrande und an Salinen, (im nördl. D. v. Westphalen an bis Mecklenbg; bei Berlin; Niederlausitz, Sachs., Thüringen; bei Dürkheim in der Rheinpfalz; bei Soden im Nassauischen; in Oestr., Steyeru. und Krain; in der Schwz hin und wieder.) Jul. Aug. Schk. t. 192. Bth. weiss, in das Rosenrothe spielend.

2. *A. CANNABINA* (L.) Hanfblättriger E. — *B. filzig- rauh*, ungleich- gesägt- gezähnt, die untern handf., *die obern fingerig, die obersten 3 zählig*; Blthstiel länger, als das B, 1-2 blüthig; die innern Zpfl des K. eyf., zugespitzt. 4 An etwas feuchten Zäu-

nen, Gräben und auf Wiesen, (in Unteröstr.; im Littorale bei Monfalcone, Duino und Fiume.) Jul. Aug. J. a. t. 101. Blb. rosenroth, mit einem purpurnen Nagel. D.

3. A. HIRSUTA (L.) Rauh. E. — B. gekerbt, von wagerecht-abstehenden Haaren steifh., die untern nierenf., 5 lappig, die mittleren handf., die oberen tief-3 sp.; Bthstiele 1 blüthig, länger, als das B.; Zpfl des K. verlängert-lanzettl. ☉. Auf Aeckern und Weinbergen auf Kalk- und Lettenboden, (in den C. Wallis und Waadt; im Oberelsass; Oberbaden; Würtemberg bis Wertheim; Rheinpfalz; sodann in Unteröstr. und d. Littor.) Jul. Aug. Cav. diss. 2. t. 29. f. 1. Malva setigera Spenn. Bth. lila od. rosenroth.

III. Rotte. ALCEA DC. L. gen. 840. Klappen mit tief rinnigem Rücken und hervortretenden scharfen Rändern.

4. A. PALLIDA (W. und Kit.) Bleicher E. — Der St. nebst den B. rauh., die Haare büschelig; B. gekerbt, die untern herzf-rundlich, 5 lappig, die obern 3 lappig; Bthstiele einblüthig, einzeln oder mehre, blattwinkelst., die oberen kürzer, als der K., in einer lockern Aehre; der äussere K. ungefähr so lang, als der innere; Blb. ausgerandet-2 lappig, länger, als breit. ☉. An Wegen, auf Aeckern, Hügeln, (bisher allein bei Soos in der Gegend v. Wien.) Jul. Aug. Blb. lila, an der Basis schwefelgelb. Untersch. sich von A. rosea, die überall in den Gärten cultiv. wird, dch folgs: der St. niedriger und nebst den B. zwar rauhhaariger, aber mit einem aus weicheren Haaren bestehenden Ueberzuge: der äussere K. fast so lang, als der innere; Blb. schmaler, von einander abstehend und mit einer tiefern Bucht ausgerandet; bei der A. rosea ist der innere K. bedeutend länger, als der äussere, und die Blb. sind breiter, als lang, berühren sich mit ihren Rändern und sind viel weniger ausgerandet. D.

3. LAVATÉRA (A.) Lavatere. — K. doppelt; der äussere 3 sp.; der innere 5 sp. Gf. viele, unterwärts zsgewachsen. Kapsel wie bei der Gattung Malva.

1. L. THURINGIACA (L.) Thüringische L. — Der St. krautig, filzig; B. dünn-filzig, die untern eckig-gelappt, die obern 3 lappig, der mittlere Lappen länger; Bthstiele einzeln, länger, als der Bstiel; Blb. 2 lappig. 4. Auf uncult. Hügeln in Weinbergen, an Wegen, (im Littor., in Unteröstr., Mähr., Böhm., Schles., Sachsen und Thüringen; Höxter in Westphalen.) Jul. Aug. J. a. t. 311. Bth. blass-rosenroth. D.

4. HIBISCUS (L.) Ibis. — K. doppelt: der äussere vielth.; der innere 5 sp. Gf. 5, unterwärts zsgewachsen. Kapsel 5fächerig.

1. H. TRIONUM (L.) Stunden-I. — B. gezähnt, die untern fast ungeth., die oberen 3 th., Zpfl lanzettl., der mittlere sehr lang; K. aufgeblasen, häutig, nervig-aderig. ☉. Auf cultiv. O. und an Wegen, (in Mähr., Unteröstr., Steyer. und im Littor.) Jul. Aug. Ketmia Trionum Scop. Cav. diss. 3. t. 64. f. 1. D.

Hibiscus pentacarpos L. ward in neuerer Zeit nicht mehr gefunden, dürfte nach Tommasini's Meinung in dem Gebiete von Friaul zu suchen sein und gehört somit nicht mehr in unsere Fl. *H. syriacus* ist eine Zierpflanze Krain's und kommt daselbst nicht wild vor.

5. **ABUTILON** (Tournef. 25. Gärtn. fruct. 2. p. 251.) K. einfach, 1 blättrig, 5 th. Gf. mehrere, an der Basis verwachsen. Kapseln mehrere, kreisf. gestellt, mehrsamig.

1. *A. AVICENNAE* (Gaertn. l. c.) B. rundl.-herzf., zugespitzt, gekerbt, filzig; Bstiele kürzer als der Bstiel; Kapseln ungefähr 15, abgestutzt, 2 schnäbelig, rauh. ☉. An feuchten O. der Insel Veglin. Noë. Jul. Aug. *Sida Abutilon* L. spec.

XVIII. Ordng. TILIACEEN. Juss. gen. p. 290. sect. 2. excl. gener. DC. prod. 1. p. 503.

K. 4 - 5 blättrig, in der Knospenlage klappig. Blkr. regelmässig. Blb. so viel, als KB. und mit diesen abwechselnd. Stbg. unterweibig, zahlreich, (seltner von bestimmter Anzahl,) frei oder (bei ausländischen Arten) vielbrüderig, das mittlere Stbg. der Stbf. Büschel in ein, den Blb. gegenst., NebenkronB. verändert. Stbk. 2 fächerig, mit einer doppelten Ritze aufspringend. Der Fruchtkn. einer, 4 - 10 fächerig; Fächer 2 - mehreyig; STräger mitelpunktst. S. eyweisshaltig; Keim gerade, in der Achse liegend; die Keimb. blättrig. B. wechselst., nebenblättrig.

1. **TILIA** (L.) Linde. — K. 5 blättrig, abfällig. Blb. 5. Stbg. zahlreich, frei, oder (bei ausländischen Arten) vielbrüderig, mit 5 Bündeln, jeder ein, den Blb. gegenst., NebenkronB. einschliessend. Der Fruchtkn. 5 fächerig, Fächer 2 eyig. Gf. 1. Die Nuss durch Fehlschlagen 1 fächerig, 1 - 2 samig.

1. *T. GRANDIFOLIA* (Ehrh.) Grossblättrige L. — B. schief-rundlich - herzf., zugespitzt, *unterseits kurzh.*, und in den Achseln der Adern gebärtet; die Ebensträusse 2 - 3 blüthig; die NebenkronB. fehlend; die Lappen der N. aufrecht. *h.* In Laubwäldern, auf hartem Gesteine, seltner auf Sandsteingebirgen; in die VorA. hinaufsteigend. (v. Spitzel.) Jun. Jul. *T. platyphyllos* Scop. *T. europaea* β , δ , ϵ , L. *T. cordifolia* Bess. *T. pauciflora* Hayn. Es giebt Variet. mit unterseits beinahe kahlen B.

2. *T. PARVIFOLIA* (Ehrh.) Kleinblättrige L. — B. schief-rundlich - herzf., zugespitzt, *auf beiden Seiten kahl*, unterseits meergrün und in den Achseln der Adern gebärtet; die Ebensträusse vielblüthig; die NebenkronB. fehlend; die Lappen der N. zuletzt wagerecht - auseinanderfahrend; Kapsel undeutlich 4 - 5 kantig. *h.* In Laubwäldern mit der vorhergehenden, jedoch nicht in die VorA. hinaufsteigend. Jul., später als die vorhergehende. *T. ulmifolia* Scop. *T. microphylla* Willd. *T. cordata* Mill. *T. europaea* γ . L.

Nach fortgesetzten Beobachtungen muss ich *Tilia vulgaris*

Hayne für eine blosse Variet. der *T. parvifolia* und zwar für eine mit grösseren B. und oft weniger blüthenreichen Ebensträuschen erklären; aber durch Zwischenformen gehen beide allenthalben in eine Art, in die *T. parvifolia* über. Ich stelle daher aus den Endformen 2 Variet. auf:

α polyantha, Bthstrauss 7-11 blthig, Bthen kleiner, Bthstiele und Bstiele oft röthlich überlaufen, B. kleiner und die Flaumh. in den Winkeln der Adern auf der unteren Seite, dunkler-braun; *T. parvifolia* Hayne.

β. intermedia, Blthtraube 5-7 blthig, Blthen etwas grösser, Blthstiele und Bstiele grün, B. grösser, die Flaumh. in den Winkeln der Adern der unteren Seite blässer: *T. vulgaris* Hayne., *T. europaea* Smith., *T. intermedia* DC. prodr. Die längern oder kürzern Blüthenstiele, die tiefer oder seichter-herzf. Blätter, die abstehende Wolle oder das anliegende Flaumhaar der Fruchtknoten kommen bei beiden Variet. vor und liefern keine ständigen Merkmale.

In der Fl. von Oestreich stellte Host viele Arten auf, die aber im Grunde nur wenig auffallende Modificationen unserer 2 Arten darbieten. Zu *T. grandiflora* gehören: *T. vitifolia*, *T. corylifolia*, *T. grandifolia* Hostii, *T. corallina* Hostii, *T. mutabilis*, *T. latebracteata*, *T. praecox*, *T. pyramidalis*, *T. intermedia* Hostii, *T. tenuifolia* et *T. obliqua*; zu *T. parvifolia* gehören: *T. europaea* Hostii und *T. parviflora* Hostii. Alex. Braun in Brief.

XIX. Ordng. HYPERICINEEN. DC. fl. fr 4. 860.

K. 4-5 blättrig oder 4-5 th., bleibend, in der Knospenlage dachig, mit ungleichen Zpfln. Blkr. regelmässig, welkend. *Blb.* 4, 5, unterweibig, in der Knospenlage gewunden. *Stbg.* zahlreich, vielbrüderig, in 3, 5 Büschel an der Basis wenigstens zsgewachsen, (seltner und zwar bei ausländischen,) frei. *Stbk.* drehbar. Der Fruchtkn. frei, mehrfächerig: Fächer vieleig, die STräger mittelpunktst. oder an die einwärtsgebogenen Ränder der Klappen angeheftet. Gf. mehrere, seltner in 1 verwachsen. S. eyweisslos. Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. oft durchscheinend-punktirt.

1. ANDROSAEMUM (All.) Grundheil. — K. 5 th. Blkr. 5 blättrig. Beere 1 fächerig.

1. A. OFFICINALE (All.) Gebräuchliches G. — 2. An feuchten O., (in der südl. Schw. C. Tessin; und in Südttyrol.) Jun. Jul. A. vulgare Gärtn. *Hypericum Androsaemum* L. Tabern. kräuterb. 1143. Bth. gelb.

2. HYPERICUM (L.) Hartheu. — K. 5 blättrig oder 5 th. Blkr. 5 blättrig. Gf. (bei unsern Arten) drei. Kapsel 3 fächerig. — Bth. aller hell- oder goldgelb.

I. Rotte. PERFORARIA DC. Prodr. Stbf. an der Basis in 3 Büschel zsgewachsen. Keine unterweibigen Schuppen. Kapsel 3 fächerig.

* KB. ganzrandig, am Rande weder fransig, noch drüsig-gewimpert.

1. H. PERFORATUM (L.) Gemeines H. — *Der St. aufrecht, 2 schneidig*; B. oval-länglich, durchscheinend-punktirt; Bth. ebensträussig; KB. lanzettl., sehr spitz, ganzrandig, noch einmal so lang als der Fruchtkn.; Stbf. 50-60. 4. Auf trocknen Wiesen, Haiden, Hügeln; bis in die niedrigeren A. hinaufsteigend. Jul. Aug. St. h. 18. Var.:

γ. latifolium, B. breiter, 1 Zoll lang, $\frac{1}{2}$ Zoll breit; KB. breiter, lanzettförmig; H. perforatum β . Gaud. helv. Unterscheidet sich von H. quadrangulum durch die zweischneidigen St. und die KB., welche während des Blühens noch einmal so lang als der Fruchtkn. sind. Vielleicht gehört hieher auch H. commutatum Nolte nov. fl. hols. und H. medium Peterm. fl. Lips.

2. H. VERONENSE (Schränk) Veronesische H. — *St. aufrecht oder aufstrebend, 2 schneidig*; B. lineal.-längl., durchscheinend-punktirt; Bth. rispig, R. eyf.; KB. lanzettl., spitz, ganzrandig, so lang als der Fruchtkn.; Stbf. 50-60. 4. An sonnigen, trocknen O. (Istrien, südl. Tyrol; C. Waadt.) Jul. Aug.

3. H. HUMIFUSUM (L.) Gestrecktes H. — *Die St. gestreckt, fast 2 schneidig, fädlich*; B. oval-länglich, durchscheinend-punktirt; KB. länglich, stumpf, stachelspitzig, ganzrandig, noch einmal so lang als der Fruchtkn.; Stbf. 15-20. 4. Auf Haiden, Triften. Jun.-Herbst. Fl. dan. t. 141. Auf Aeckern oft niedriger, ziemlich aufrecht, armbüthig, 2 jährig, und die Bth. hie und da 4 blättrig; H. humifusum β . Liottardi Vill.

4. H. QUADRANGULARE (L.) Vierkantiges H. — *Der St. aufrecht, 4 kantig*; B. oval, zerstreut-durchscheinend-punktirt oder unpunktirt; KB. elliptisch, stumpf, ganzrandig, fast so lang als der Fruchtkn. 4. Auf Waldtriften, an Gräben und Ufern. Jul. Aug. H. delphinense Vill. H. maculatum Crantz. H. dubium Leers. H. Leersii Gmel.

5. H. TETRAPTERUM (Fries.) Vierflügeliges H. — *Der St. aufrecht, 4 kantig*; Kanten etwas geflügelt; B. oval, dicht-durchscheinend-punktirt; KB. lanzettl., zugespitzt, ganzrandig. 4. Auf feuchten Wiesen, an Gräben, Ufern. Jul. Aug. H. quadrangulare Smith und fast aller Autoren. H. quadrialatum Wahlenb.

** KB. am Rande drüsig-kleingesägt, oder gefranst.

6. H. BARBATUM (J. a. 3. p. 33. t. 259.) Bärtiges H. — *Der St. aufrecht, stielrund*; B. längl.-lanzettl., nach vorne verschmälert, unterseits graugrün, am Rande etwas entfernt, und oft auf dem Mittelfelde zerstreut-schwarz-punktirt, mit keinen, oder wenigen durchscheinenden Punkten; DeckB. schmal-lanzettl. und nebst den KB. borstlich-gefranst; die Fransen 2- und mehrmal länger als der Querdurchmesser des DeckB., an der Spitze schwach-keulig; S. der Länge nach wellig-gestreift. 4. Auf

Waldwiesen zw. Gesträuch, (bei Mauerbach unweit Wien; bei Marburg in Steyeru.) Mai. Jun.

7. *H. RICHERI* (Vill. delph. 3. 501. t. 44.) Richer's H. — St. aufrecht, oberwärts 2schneidig; B. eyf., unterseits netzig-aderig, am Rande dicht- und klein-kohlschwarz-punktirt, auf dem Mittelfelde ohne durchscheinende Punkte; DeckB. eyf., nebst den KB. dicht-ungleich-borstlich-fransig; *Fransen* an der Spitze schwach-keulig, *die längeren so lang, als der Querdurchmesser des DeckB.*; *S. der Länge nach wellig-gestreift*. 4. Auf den A., (höchste Gipfel des Jura; Schneeberg in Krain.) Jul. Aug. *H. fimbriatum* Lam. enc. Var.:

β. androsaemifolium; St. liegend, B. und Bth. grösser: *H. androsaemifolium* Vill. delph. *H. alpinum* Waldst. und Kit. tab. 265? Diese Var. habe ich noch nicht gesehen.

H. ciliatum Lam. dict. DC. prodr., welches in den südlicheren Gegenden unserer Fl. vielleicht vorkommen möchte, unterscheidet sich von *H. barbatum* und *H. Richeri* dch zwar sehr kurzgestielte, aber doch auf einem deutlichen Bstiele sitzende B.; die B. von *H. barbatum* und *H. Richeri* sind an der Basis mit der B.Substanz an den St. angewachsen u. ist gar kein Bstiel vorhanden; der St. von jenem hat 2 erhabene Linien, bei *H. barbatum* ist er ganz rund. Von *H. elegans* vorzüglich verschieden dch die wellig-gestreiften S.

8. *H. ELEGANS* (Stephan. bei Willd.) Zierliches H. — Der St. aufrecht, fast 2schneidig; B. aus herzf. Basis lanzettl.- oder eyf., am Rande kohl-schwarz- auf dem Mittelfelde durchscheinend-punktirt; KB. lanzettl., spitz, gefranst, *Fransen kürzer als der Querdurchmesser der KB., an der Spitze fein drüsig*; S. fein punktirt. 4. An gebirgigen, sonnigen O., (in den Weinbergen von Bennstädt und Kölme bei Halle; Schwellenburg bei Erfurt: Tosmarberg bei Hildesheim; bei Czeiz in Mähren.) Jun. Jul. *H. Kohl-ianum* Spreng. fl. hal. t. 9. D.

9. *H. PULCHRUM* (L.) Rauh. H. — Der St. aufrecht, stielrund, kahl; B. herz-eyf., sitzend, kahl, unten graugrün, durchscheinend-punktirt; KB. *verkehrt-eyf., sehr stumpf, drüsig-gewimpert, die Drüsen* sehr kurz gestielt; S. sehr fein punktirt. 4. In Gebirgswäldern und auf Haiden, (von Basel dch das Elsass bis nach den Niederlanden und auf dem rechten Rheinufer dch Würtemberg, Baden, Hessen, nach Thüringen und dem Harze und bis Westphal. und Niedersachsen, bei Leipzig und Czeitsch.) Jul.-Septbr. Rb. ic. 3. f. 447.

10. *H. MONTANUM* (L.) Berg-H. — Der St. aufrecht, stielrund, kahl; B. herz-eyf., sitzend, kahl, oben graugrün, durchscheinend-punktirt; KB. lanzettl., spitz, *drüsig-gewimpert, die Drüsen kugelig gestielt*; S. sehr fein punktirt. 4. In Wäldern und Gebüsch. Jun.-Aug. Fl. dan. t. 173. Var.:

β. scabrum; B. unterseits rauh.

11. *H. HIRSUTUM* (L.) Rauh. H. — Der St. aufrecht, stielrund; B. eyf. oder länglich, *kurzgestielt*, durchscheinend-punktirt und

nebst dem St. rauhh.; KB. lanzettl., drüsig-gewimpert, die Drüsen sehr kurzgestielt; S. sammtig 4. In Wäldern u. auf unkultiv. buschigen Hügeln. Jun.-Aug. Fl. dan. t. 802.

12. H. CORIS (L.) Corisähnliches H. — Die St. halbstrauchig; B. zu 3 oder 4, lineal., stumpf, durchscheinend-punktirt, am Rande zurückgerollt; KB. drüsig-gewimpert. ♀. An felsigen O. der A., (auf dem Berge Wiggis im C. Glarus, Gaud.) Jul. Aug. S.

H. Rotte. ELODES. Stbf. bis über die Mitte von der Basis aus in drei Bündel verwachsen; Bündel 5 männig. Unterweibige Schuppen 3, mit den Bündeln der Stbf. wechselständig; Kapsel wegen der nur wenig eingebogenen Ränder der Klappen 1-fächerig.

13. H. ELODES (L.) Sumpf-H. — Die St. niederliegend oder aufstrebend, an der Basis wurzelnd; B. ründlich-eyf., sitzend, durchscheinend-punktirt und *nebst dem St. rauhh.*; KB. eyf., drüsig-gewimpert, die Drüsen gestielt; die R. armblüthig, zuletzt seitenst. oder BWinkelst.; S. der Länge nach gefurcht. 4. Auf sumpfigen, torfhaltigen Wiesen, (in d. Markwalde zw. Messel und Roth bei Frankf. am M.; am Niederrheine von Bonn bis Westphalen und Hannover.) Ang. Sept. Schk. t. 213. *Elodes palustris* Spach. ann. d. sc. nat.

XX. Ördng. ACERINEEN. DC. theor. ed. 2. p. 244. *Acera* Juss. gen. 50, mit Ausschluss der sect. 1 und 3.

K. 4, 5, 9 th., in der Knospenlage dachig. Blb. ebensoviel, rings um die drüsige Scheibe eingefügt, mit den Zipfeln des K. abwechselnd, seltner fehlend. Stbg. in einer unterweibigen Scheibe eingefügt, 8, selten 5-12. *Der Fruchtkn. 2 lappig, 2 fächerig, Fächer 2 eyig. Gf. 1. N. 2. Frucht 2 flügelig, in 2, nicht aufspringende, nussartige Früchtchen sich trennend.* Eyweiss fehlend. Keim gekrümmt, mit zsgerollten Keimb. Bäume mit gegenst. B.

1. ACER (L.) Ahorn. — Bth. vielehig. K. 5 th. Blkr. 5 blättrig. Stbg. oft 8, bei den männlichen Bth. auffallend länger.

I. A. PSEUDOPLATANUS (L.) Weisser A. — B. handf.-5 lappig, *unterseits matt* und meergrün, Lappen zugespitzt, ungleich-gekerbt-gesägt; die Tr. *hängend*, verlängert, an der Basis zsgesetzt; die Fruchtkn. zottig, Flügel etwas abstehend; Stbg. der männlichen Bth. noch 1 mal so lang, als die Blkr. ♀. In Gebirgswäldern, auf die VorA. hinaufsteigend. Mai. Jun. Bth. grasgrün; Früchte zuletzt kahl.

2. OPULIFOLIUM (Vill.) Schneeballenblättriger A. — B. handf.-5 lappig, *unterseits matt*, meergrün, Lappen stumpf, gekerbt-gezähnt; *Ebensträusse bald überhängend*; die Fruchtkn. ziemlich kahl, Flügel etwas abstehend; Stbg. der männl. Bth. noch 1 mal so lang, als die Blkr. ♀. In Wäldern der Vorberge und am Fusse der A.,

(im C. Wallis und Waadt.) März. Apr. Bth. aus dem Grasgrünen in das Gelbliche spielend. Die jüngern B. unterseits flaumig oder filzig, die älteren daselbst kahl. A. Opalus Ait. A. Opulus DC. prodr. A. italum Lauth. A. rotundifolium Lam. Var.:

β. tomentosum; B. auch die ausgewachsenen, unterseits filzig; A. obtusatum Kit. bei Willd. A. neapolitanum Ten. S.

3. A. PLATANOIDES (L.) Spitzer A. — *B. handf.-lappig, buchtig-3-5 zählig. Zähne verschmälert-haarspitzig*; Ebensträusse aufrecht, an der Basis nebst den jüngern B. zerstreut-drüsig; die Fruchtkn. kahl; die Flügel weitauseinanderfahrend; Stbg. der männlichen Bth. von der Länge des K. *h.* In den Wäldern der niedrigeren Gebirge, nicht in die VorA. hinaufsteigend. Apr. Mai. Schk. t. 351. Bth. aus dem Grasgrünen in das Gelbliche spielend. Eine monströse, in den Gärten kultivierte Varietät mit an der Basis keiligen, unregelmässig-eingeschnittenen B., ist: A. laciniatum Du Roi.

4. A. CAMPESTRE (L.) Feld-A. — *B. handf.-5lappig, Zpfl ganzrandig*, länglich, der mittlere stumpf-3lappig; Ebensträusse aufrecht; KB. nebst den Blb. lineal., zottig; Stbg. der männlichen Bth. so lang, als die Blkr.; *die Flügel wagerecht-auseinanderfahrend. h.* In Gebüsch und Wäldern der niedrigeren Gegenden. Mai. Bth. dunkelgrün. Var. mit zugespitzten, an der Spitze selbst aber abgerundeten Lappen der Blätter (A. austriacum Tratt.) und mit kahlen Früchten.

5. A. MONSPESSULANUM (L.) Französischer A. — *B. handf.-3lappig, Lappen stumpf, ganzrandig* oder etwas geschweift; Ebensträusse hangend; KB. nebst den Blb. verkehrtef., kahl; Stbg. der männlichen Bth. noch 1mal so lang, als die Blkr.; *die Flügel vorwärtsgerichtet, etwas abstehend. h.* An gebirgigen, rauhen, felsigen O., (am Mittelrheine zw. der Mosel und Nahe in den Gebirgen dieser Flüsse, und auf dem Donnersberge sehr gemein, sodann im Littor.) Apr. A. trilobatum Lam. Bth. aus dem Grünen in das Gelbliche spielend.

XXI. Ordng. HIPPOCASTANEEN. DC. theor. ed. 2. p. 244. prod. 1. 597.

K. 5 zählig, in der Kuospenlage dachig. *Blkr. unregelmässig, 4, 5 blättrig, unter einer unterweibigen Scheibe eingefügt. Stbg. 7, 8, auf der Scheibe eingefügt, frei*, ungleich. Der Fruchtkn. frei, 3 fächerig, Fächer 2 eyig, Eychen aufrecht, Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend. Kapsel 2-4 samig. *S. mit einem breiten Nabel an der Basis*, eyweisslos. Keim gekrümmt; die Keimb. zsgewachsen, mit einer Spalte an der Basis, aus welcher während des Keimens das Federchen hervortritt. B. gegenst., nebenblattlos.

1. AESCULUS (L. mit Anschluss von Arten.) Rosskastanie. — K. glockig. Blb. 4, 5, ausgebreitet. Stbg. abwärts geneigt, aufstrebend.

1. A. HIPPOCASTANUM (L.) Gewöhnliche R. — Die Kapseln igelstachelig; Bth 5 blättrig. b. Ueberall kultivirt, aus Asien stammend.

XXII. Ordng. AMPELIDEEN. Humb. Bonpl. u. Kunth. nov. gen. 5. p. 223. Vites Juss. gen. 267.

K. klein, am Rande ganz oder etwas gezähnt. Blb. 4-5, mit den Zähnen des K. abwechselnd, an einer drüsigen Scheibe auswendig eingefügt. Stbg. so viel, als Blb., vor den Blb. auf der Scheibe eingefügt. Der Fruchtkn. frei, viereyig, Eychen aufrecht. Gf. 1; N. einfach. Eine Beere. S. eyweisslos; Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. — Kletternde Pflanzen.

1. VITIS (L.) Weinstock. — K. schwach-5 zählig. Blb. 5, an der Spitze zshängend, und gleich einer Mooshaube an der Basis sich ablösend. Stbg. 5. Der Fruchtkn. 2 fächerig, 4 eyig. Eine Beere.

1. V. VINIFERA (L.) Edler Weinstock. — B. herzf.-rundlich, 5 lappig, grobgezähnt. b. In wärmeren Gegenden kultiv., und in den Wäldern an der Donau und dem Rheine hie und da einheimisch geworden, vielleicht als Ueberbleibsel von Kolonien, die in alten Zeiten im Kriege zerstört wurden, und jetzt, wenigstens an den Ufern des Rheines, mit Laubwäldern überdeckt sind; hieher: V. sylvestris Gmel. — Nach meiner Ansicht ist von V. vinifera dch die Kultur entsprungen: V. laciniosa L. mit 5 zähligen B. und vielsp. Blättchen.

2. AMPELOPSIS. (Michaux fl. bor. am. 1. 159.) Zaunrebe. — K. fast ganz; Blb. 5, von der Spitze gegen die Basis auseinander-tretend, an der Spitze nicht zshängend. Stbf. 3. Gf. 1. N. kopff. Fruchtkn. 4 eyig.

1 A. HEDERACEA (Michaux l. c.) Epheuartige Zaunrebe. — B. 3-5 zählig, kahl; Blättchen gestielt, eyf. oder längl., zugespitzt, stachelspitzig-gesägt. b. Unter Gebüsch, (südl. Tyrol, verwildert wie Vitis vinifera, aber seltener, Facchini.) Jul. Ang. Hedera quinquefolia, L. spec., Vitis hederacea Willd. spec. Bth. grün.

XXIII. Ordng. GERANIACEEN. DC. fl. fr. 4. p. 838. prodr. 1. 637. Gerania Juss. gen. 268.

K. 5 blättrig, bleibend, in der Knospenlage dachig, das obere KB. bei den etwas unregelmässigen Bth. (ausländischer Arten) an der Basis in einen hohlen, dicht an den Bthstiel gewachsenen

Sporn vorgezogen. Blb. 5, mit den KB. abwechselnd, gleich und unterweibig; oder ungleich und d. K. angefügt oder mit diesem verwachsen. Stbg. an der Basis meist 1 brüderig, noch 1mal so viel, als Blb., bisweilen einige unfruchtbar. Der Fruchtkn. aus 5 Früchtchen gebildet, 5 fächerig, geschnäbelt: Fächer 2 eyig, Eychen hangend; Schnabel aus der verlängerten Achse und den an die Achse angewachsenen Gfn. zsgesetzt, mit 5 N. bekrönt. Nabelstränge an der Achse und nicht an den Klappen angewachsen. *Die reifen Früchtchen 1samig; die Klappen, von der Basis bis zur Spitze mit dem Gf. abspringend, schliessen den von der Achse losgetrennten S. ein.* Eyweiss fehlend. Keim gekrümmt, mit zsgerollt- oder schlängelig-gefalteten Keimb. Die untern B. meist gegenst., die obern wechselst. und dem Bthstiele gegenüber gestellt.

1. GERANIUM (L. mit Ausschluss v. Arten) Storchschnabel. — K. 5 blättrig, ohne Honigröhrchen. Blkr. 5 blättrig. Stbg. 10, an der Basis kurz-1 brüderig; abwechselnd grösser und an der Basis von einer Honigdrüse gestützt. Die Gfanne der Klappen inwendig kahl, zuletzt von der Basis bis zur Spitze der Achse elastisch abspringend, sich zirkelf.-zurückrollend. (Sämmtliche Stbf. der folgenden Arten sind mit Stbk. versehen, mit Ausnahme des G. pusillum.

1. Rotte. BATRACHIUM. Die Wurzel ein abgebrochenes, schiefes oder wagrechtes, mit langen Fasern in der Erde befestigtes, im Alter gedrehtes und knotiges, vielköpfiges Rhizom; Köpfe schuppig, nämlich mit den Ueberbleibseln der Bstiele und NebenB. der vorigen Jahre bedeckt.

* Klappen querrunzelig oder querfaltig.

1. G. MACRORHIZUM (L.) Grosswurzelicher St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielchen nach dem Verblühen aufrecht; *Blb. spatelig, benagelt, Nagel so lang, als der K.; Stbg. abwärts geneigt*; Klappen kahl, quer-runzelig; B. handf.-7 sp., eingeschnitten-gezähnt; der St. aufrecht, gabelsp. 4. An gebirgigen, felsigen O. der A., (bei Idria! in Krain; auf den Plekner A. in Oberkärnthen; in Südtirol; auf dem Feldberge in Oberbaden.) Apr.-Jun. J. ic. rar. t. 134. Blkr. bluthroth oder satt-rosenroth. D.

2. G. PHAEUM (L.) Braunblühender St. — Bthstiele 2 blüthig; *Blkr. flach, etwas zurückgebogen*; Blb. rundlich-verkehrteyf., ungleich-gekerbt, kurz-benagelt, an der Basis bärtig, ein wenig länger, als der stachelspitzige K.; Stbg. bis zur Mitte steifh.-gewimpert; Klappen haarig, vorne quer-faltig; B. handf.-7 sp., eingeschnitten-gezähnt. 4. In den Wäldern und Wiesen der Gebirge und VorA., (in der Schwz und von da deh Oberbaden, Würtemb., und längs der AK. bis Unteröstr.; von da durch Mähren, Böhm., nach Schles., Sachs. und Thüringen; in dem Unterharz, nach Westphalen; im Limburgischen.) Mai. Jun. Schk. t. 190. Bth. schwarz-violett. Var.:

β. *lividum*; Bth. schmutzig-lila, oft mit einem schmutzig-gelb-violetten Flecken an der Basis: G. lividum L'Herit. (in d. Schwz.)

** Klappen glatt, weder runzelig, noch faltig übrighens kahl oder haarig.

3. *G. NODOSUM* (L.) Knotiger St. — Bthstiele 2 blüthig; *Bthstielchen nach dem Verblühen aufrecht*; Blb. verkehrtherzf., noch 1mal so lang, als der langbegrante K.; Klappen glatt, flaumig; die wurzelst. B. handf.-5 sp., die stengelst. 3 sp.; *Zpfl eyf., zugespitzt, gesägt*. 2. An rauhen, waldigen O., (Krain und Littor.; im Isonzothale bei Görz, bei Adelsberg, auf dem Berge Krim bei Laibach, am Nanas, bei Lugano C. Tessin, Mendrisio im Veltlin; Dessenberg, C. Bern.) Jun. Jul. Bth. hell-rosenroth. D.

4. *G. SYLVATICUM* (L.) Wald-St. — Bthstiele 2 blüthig; *Bthstielchen nach dem Verblühen aufrecht*; Blb. verkehrteyf., noch 1mal so lang, als der begrante K.; Klappen glatt und nebst dem Schnabel haarig, Haare weit abgehend, drüsentrag.; S. sehr fein-punktirt; B. handf.-7 sp., eingeschnitten-gezähnt; der St. aufrecht, oberwärts drüsig-haarig. 2. In Wäldern u. auf waldigen Bergwiesen, (dch das ganze Gebiet stellenweise.) Jun. Jul. Cav. diss. t. 85. f. 2. Blb. purpur-violett, oberhalb des Nagels härtig. Stbf. lanzettl., haarig, an der Spitze kahl. Var. mit breiteren, weniger eingeschnittenen, stumpfgezähnten, und tief-eingeschnittenen, fast fiedersp. Bzpfn, und spitzen Zähnen.

5. *G. PRATENSE* (L.) Wiesen-St. — Bthstiele 2 blüthig; *Bthstielchen nach dem Verblühen nach der Erde zurückgeschlagen*; die Kelche in derselben Richtung; Blb. verkehrteyf., noch 1mal so lang, als d. langbegrante K.; Klappen glatt u. nebst dem Schnabel haarig, Haare weit abgehend, drüsentrag.; S. sehr fein-punktirt; B. handf.-7th., eingeschnitten; der St. aufrecht, oberwärts drüsig-haarig. 2. Auf Wiesen, an Ufern und feuchtem Gebüsch, (dch das ganze Gebiet stellenweise.) Jul. Aug. Schk. I. 190. 6. Blb. blau, oberhalb des Nagels kahl und nur am Rande gewimpert. Stbf. fädlich, an der Basis eyf., und mit einigen Haaren bestrent.

6. *G. ACONITIFOLIUM* (L'Herit.) Eisenhutblättriger St. — Bthstiel 2 blüthig; *Bthstielchen nach dem Verblühen aufrecht*; Blb. verkehrteyf., noch 1mal so lang, als der begrante K.; Klappen glatt, und nebst dem Schnabel angedrückt-flaumh., Haare sehr kurz, drüsenlos; S. sehr fein-punktirt; B. handf.-7th., eingeschnitten-gezähnt; der St. aufrecht, oberwärts flaumh., Haare drüsenlos. 2. Auf den A., (selten auf den Walliser A., im Saasthale, auf dem Fouly und Catogne; Oberinntal bei Mauritius.) Jun.-Aug. G. rivulare Vill. delph. t. 40. Bth. weiss mit purpurnen Adern. S.

7. *G. PALUSTRE* (L.) Sumpf-St. — Bthstiele 2 blüthig; *Bthstielchen nach dem Verblühen abwärts geneigt* mit aufrechtem Kelche; Blb. verkehrteyf., noch 1mal so lang, als der begrante K.; Klappen glatt, mit abstehenden, drüsenlosen Haaren bestrent; S. sehr fein-punktirt; B. handf.-5 sp., eingeschnitten-gezähnt; der St. ausgebreitet, nebst den Bthstielen oberwärts rauhh., Haare drüsenlos, rückwärtsgekehrt. 2. Auf sumpfigen Wiesen und an Wiesengebüsch, (dch das ganze Gebiet stellenweise.) Jul. Aug. Cav. Blb. purpurn.

8. *G. SANGUINEUM* (L.) Bluthrother St. — *Bthstiele* 1-2 blüthig, nach dem Verblühen etwas abwärts-geneigt; *Blb.* verkehrteyf., ausgerandet, noch 1mal so lang, als der begrannnte K.; *Klappen* glatt, oberwärts haarig, Haare zerstreut, borstlich; *S.* sehr fein-punktirt; *B.* im Umriß nierenf., 7 th., *Zpfl* 3-vielsp., *Zpflchen* lineal.; der *St.* ausgebreitet und nebst den *Bthstielen* rauhh., Haare wagerecht abstehend, drüsenlos. 4. Auf sonnigen, rauhen Hügeln, (dch das ganze Gebiet stellenweise.) Jun.-Herbst. Tabern. kb. 126. f. 2. Bth. purpurn.

II. Rote *BATRACHOIDES*. Die W. spindelf., stark, hinabsteigend, einfach od'r ästig, im Alter vielköpfig, Köpfe schuppig, nämlich von den Rückbleibseln der Bstiele und NebenB. der vorhergegangenen Jahre bedeckt; kein abgebissenes mit verlängerten Fasern in der Erde befestigtes Rhizom.

9. *G. ARGENTEUM* (L.) Silberblättriger St. — *Grau-seidenhaarig*; stengellos mit wurzelst. 2 blüth. Bthstielen, oder stengel-treibend mit mehrblthigen St.; *Blb.* verkehrteyf., leicht-ausgerandet, länger, als der stachelspitzige K.; *Klappen* glatt, *seidenhaarig*; *B.* 5-7 th., *Zpfl* tief-3 sp., *Zpflchen* lineal. 4. Auf den höheren A., (in Krain. auf dem Liesez; auf der Einsattelung des Gipfels der A. Zherna Perst, Graf; des Krn. Tommas.; auf den A. von Tyrol.) Jul. Aug. J. ic. rar. t. 346. Bth. fleischroth. D.

10. *G. SIBIRICUM* (L. spec. 937.) Sibirischer St. — *Bthstiele* 1 blüthig, nach dem Verblühen abwärts-geneigt; *Blb.* verkehrteyf., leicht ausgerandet, so lang, als der begrannnte K.; *Klappen* glatt, *flaumig*; *S.* sehr schwach-punktirt; *B.* handf.-3 theilig, *Zpfl* rauteuf.-länglich, spitz, grob-eingeschnitten-gesägt; *St.* ausgebreitet, nebst den Bthstielen rauhh., die Haare wagrecht- oder abwärts-gerichtet. 4. An steinigen, unkultivirten O., (bisher hlos bei Bruchsal im Badischen, Dr. Schmidt in Carlsruhe, nach dessen Zeugniß sich die Pflanze wie eine wildwachsende verhält, auch dort in Gärten nicht vorkommt.) Jul. Aug. Jacqu. h. vind. 1. t. 19. *Blb.* weisslich oder blass rosenfarben mit purpurnen Adern.

11. *G. PYRENAICUM* (L.) Pyrenäischer St. — *Bthstiele* 2 blüthig; *Bthstielchen* nach dem Verblühen abwärts-geneigt; *Blb.* verkehrte-herzf., 2 sp., noch 1mal so lang, als der stachelspitzige K., oberhalb des Nagels beiderseits dicht-bärtig; *Klappen* glatt, angedrückt-flaumh.; *S.* glatt; *B.* im Umrisse nierenf., 7-9 sp., *Zpfl* der unteren vorne eingeschnitten, stumpf-gekerbt; der *St.* aufrecht und nebst den B. flaumig und etwas zottig. 4. Auf Waldwiesen und in Wäldern der niedrigeren Gegenden und VorA., (in der Schwz., Elsass, Oberbaden und Würtemb.; Sachs., Thüringen, Lausitz, in Schles. und Böhm., Steyeru.; bei Frankf. am M.; Zweibrücken; nach Host's Flora nicht in Oestr.) Jul.-Herbst. *St.* h. 5. *G.* umbrosum WK. *G.* molle Fl. d. wett. Bth. purpurn, in das Violette spielend. Wenn es auf fettem Boden wächst, liegt der *St.* darnieder. In noch nicht aufgeblühten Blüthenknöpfen fand ich immer 10 Stbk., bei der geöffneten Bth. aber fallen die der äussern Stbk. bald ab.

III. Rotte. COLUMBINUM. W. jährig, spindelf., aber schlank, hinabsteigend, einfach oder ästig faserig, meist vielstengelig.

§. 1. Klappen glatt, aber dabei oft haarig; S. glatt.

12. G. PUSILLUM (L.) Kleiner St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielen nach dem Verblühen abwärts geneigt; *Blb. länglich-verkehrtherzf.*, so lang, als der kurz begrante K. oder ein wenig länger; *Nägel fein-gewimpert*; *Klappen glatt, angedrückt-flaumig.* ☉. Auf Schutthaufen, an Wegen, Zäunen. Jul.-Herbst. G. rotundifolium Pollich. Fries. G. malvacifolium Scop. Fl. d. wett; G. parviflorum Curt. Stimmt in vielen Merkmalen mit dem G. pyrenaicum überein, ist aber viel kleiner, niederliegend, der St. ist mit abstehenden, drüsentrag., sehr kurzen Haaren besetzt und nicht mit Zotten bestreut, die Bth. sind 4 mal kleiner, die Blb. länglich-verkehrtherzf., auseinander gestellt, die Nägel ohne Bärtchen und in den Bthknöpfen findet man niemals mehr als 5 Stbk.

13. G. BOHEMICUM (L.) Böhmischer St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielen nach dem Verblühen aufrecht, etwas abstehend; *Blb. verkehrtherzf.*, an der Basis und am vordern Rande gewimpert; *Klappen glatt, haarig*; Haare abstehend, drüsentrag.; B. handf.-5 sp., Zpfl spitz, eingeschnitten-gezähnt; der St. ausgebreitet und nebst den Bthstielen drüsig-haarig und zottig. ☉. In Tannenwäldern der A. (auf dem nördl. Alpenzuge des untern Walis sehr selten, über Morcles, auf d. Herbignon und auf dem Fouly; Lausitz, in der Ritschner Haide zw. Niesky und Muskau.) Jun. Jul. Dill. hort. elth. f. 169. Blb. blau mit 5 violetten Adern.

§. 2. Klappen glatt, aber oft haarig; S. wabenartig-punktirt.

14. G. DISSECTUM (L.) Zerschnittener St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielen nach dem Verblühen abwärts geneigt; *Blb. verkehrtherzf.*, so lang, als der begrante K.; *Klappen glatt* und nebst dem Schnabel *haarig*, Haare abstehend, drüsentrag.; *S. wabenartig-punktirt*; B. 5-7 th., Zpfl der unteren vielsp., der oberen 3 sp., Zpflchen lineal.; der St. ausgebreitet, kurz. ☉. Auf Aeckern unter der Saat. Mai-Jul. Blb. purpurn, oberhalb des Nagels beiderseits bärtig.

15. G. COLUMBINUM (L.) Tauben-St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielen nach dem Verblühen abwärts geneigt; *Blb. verkehrtherzf.*, so lang, als der lang-begrante K.; *Klappen kahl*; *S. wabenartig-punktirt*; B. 5-7 th., Zpfl der unteren vielsp., der oberen 3 sp., Zpflchen lineal.; der St. ausgebreitet und nebst den Bthstielen flaumh., Haare abwärts angedrückt. ☉. Auf Aeckern, im Gebüsch, an steinig. O. Jun. Jul. Blb. so lang, als die Granne des K., rosenroth, mit 3 dunkleren Lini. an der Basis bärtig.

16. G. ROTUNDIFOLIUM (L.) Rundblättriger St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielen nach dem Verblühen abwärts geneigt; *Blb. länglich-keilig, ungeth.*, ein wenig länger, als der kurz begrante K.; *Klappen glatt, flaumh.*, Haare abstehend; *S. wabenartig-punktirt*; B. im Umriss nierenf., die unteren 7 sp., vorne stumpf-eingeschnitten-gekerbt; der St. ausgebreitet, weich-flaumig. ☉. In

Weinbergen und auf Aeckern und an steinigen O. buschiger Berge, (in der Schwz. und deh das Elsass, das Württembergische, die Rheinfläche und Hessen bis nach den Niederlanden und Westphalen; Unterharz; südl. Tyrol, im Littor., Krain, Oestr., Sachsen, bei Berlin.) Jun.-Herbst. *G. viscidulum* Fries. *G. malvacum* Wahlenb. Linne unterschied in seiner Spec. plant. diese Art und *G. pusillum* sehr deutlich, indem er dieser „ganze, stumpfe, fleischrothe“ dem *G. pusillum* „2 sp., blaue Blb.“ zuschreibt.

§. 3. Klappen runzelig.

17. *G. MOLLE* (L.) Weicher St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielchen nach dem Verblühen abwärts geneigt; *Blb. verkehrtherzf., länger, als der kurz-stachelspitzige K.*, an der Basis feingewimpert; *Klappen querrunzelig, kahl*; S. glatt; B. 7-9 sp., im Umriss nierenf., Zpfl der unteren vorne eingeschnitten, stumpf-gerkerbt; der St. ausgebreitet, weich-flaumig und zottig. ☉. An Wegen, Ackerrändern. Mai-Aug. *G. pusillum* Fl. d. wett. Bth. purpurn.

18. *G. LUCIDUM* (L.) Spiegelruder St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielchen nach dem Verblühen abwärts geneigt; *Blb. verkehrteyf., ungeth., länger, als der querrunzelige, pyramidenf. K.*; *Klappen netzig-runzelig* und kleingekerbt-gestreift, oberwärts flaumig; S. glatt; B. im Umriss nierenf., 5-7 sp., eingeschnitten-stumpf-gerkerbt; der St. aufrecht. ☉. In felsigen, schattigen Wäldern der niedrigeren Gebirge und VorA., (Krain, Oestr.; von Thüring. deh Hannover, Hessen, die Wetterau nach der Rheinpfalz, nach den Nahe- und Moselgebirgen, an einzelnen Stellen, aber gesellsch.; südl. Schwz.) Mai-Aug. Bth. purpurn.

19. *G. DIVARICATUM* (Erh.) Spreitzender St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielchen nach dem Verblühen abwärts geneigt; *Blb. verkehrtherzf., so lang, als der begrannte K.*; *Klappen querrunzelig, kurz.*; S. glatt; B. handf.-5 sp., Zpfl rautenf., grob-eingeschnitten-gezähnt, *die obersten 3 sp., der eine Seitenlappen länger.* ☉. In Weinbergen und an gebirgigen O. (bei Bischwitz an der Weide in Schles.; am Schlossberge in Schwarzenberg im sächs. Erzgebirge; in den Thälern der südl. Akette von Wallis sehr selten; im Dorfe Vercoren unter Anniviers und am Rauda im Nikolaitale; bei Frankf. an der O.) Jul.-Aug. *G. Winterli* Roth. *G. bohemicum* Krock. Bth. hellrosenroth, mit dunkleren Adern.

20. *G. ROBERTIANUM* (L.) Rupprecht's St. — Bthstiele 2 blüthig; Bthstielchen nach dem Verblühen etwas abwärts geneigt; *Blb. verkehrteyf., ungeth., länger, als der begrannte K.*; *Klappen netzig-runzelig*; S. glatt; B. 3- oder 5 zählig. *Blättchen gestielt, 3 sp., fiedersp.-eingeschnitten*; der St. aufrecht. ☉. In schattigen Wäldern, auf Felsen, an etwas feuchten Zäunen. Jun.-Herbst. Bth. rosenroth, mit 3 weisslichen Streifen. — Das *Geranium purpureum* Vill., *G. robertianum* ♂. *purpureum* Gaud. ist nach diesem Schriftsteller kleiner, die B. sind weniger geschnitzt und die Klappen runzeliger. Ist mir unbekannt.

2. **ERODIUM** (L'Heritier. DC.) Reiherschnabel. — K. 5blättrig, ohne Honigröhre. Blkr. 5blättrig. Stbg. 10, kurz-Ibrüderig; die den 5 Blb. gegenst. Stbf. breiter, unfruchtbar; die den 5 Blb. wechselst. schmaler, fruchtbar, jene an der Basis mit einer Honigdrüse gestützt. Grannen der Klappen inwendig bärtig, zuletzt schraubenf.-gewunden.

1. **E. CICUTARIUM** (L'Heritier.) Schierlingsblättriger R. — Bthstiele vielblüthig; Blb. ungleich; B. gefiedert, Blättchen fast bis zum Mittelnerven fiedersp., Zpfl gezähnt; *Stbg. kahl, die fruchtbaren an der Basis rundlich-verbreitert.* ☉. Auf Aeckern, an kultiv. O., Sandfeldern. Apr. u. dch d. ganzen Sommer. Schk. t. 140. *Geranium cicutarium* L. *G. chaerophyllum* Cavan. Roth, (nicht *G. cicutarium* Roth. tent.) Bth. purpurn, mit 3 dunkleren Nerven. Var.:

α. immaculatum, Bth. ungeteilt: *E. cicutarium α.* Smith.

β. maculatum, die 2 grösseren Blb. an der Basis mit einem gelblichen, braun-punktirten Flecken bemalt: *E. cicutarium γ.* Smith. Var. ausserdem mehr od. weniger rauhh. od. am Stengel mit abstehenden, am obern Theil desselben u. an den Bthstielen klebrigen Haaren, od. daselbst mit kurzen, gekrümmten, drüsenlosen Haaren besetzt. Die jüngere Pflanze ist fast stengellos aber keine Variet. — An allen Variet. sah ich den Schnabel der Frucht mit angedrückten Haaren bedeckt u. d. Keimb. immer 3lappig od. fiedersp.-5lappig. Eine andere, diesem verwandte Art, mit kahlem Schnabel u. ungeth. Keimb., das *G. cicutarium* Roth., Cavanill. diss. 2. 226. t. 93. f. 1 ist mir gänzlich unbekannt.

2. **E. MOSCHATUM** (L'Heritier.) Bisamduftender R. — Bthstiele vielblüthig; Blb. ungleich; B. gefiedert, Blättchen ungleich-doppelt-gesägt, fast klein gelappt; *Stbg. kahl, die fruchtbaren an der Basis verbreitert, 2zählig.* ☉. Auf Aeckern u. an Wegen, (in der südl. Schwz hin u. wieder; in D. sehr zerstreut, Obersteyern., bei Kitzbichel in Salzbg, bei Münster in Westphalen; Lausigk in Sachsen; Istrien.) Mai-Jul. St. h. 5. *Geranium moschatum* L. Unterscheidet sich v. dem vorhergehenden dch folgds: die Einschnitte der Blättchen dringen nicht bis zur Mitte der Blattfläche u. die Stbg. sind an der Basis nicht allein verbreitert, sondern auch beiderseits mit einem Zahne versehen.

3. **E. CICONIUM** (Willd.) Langschnabeliger R. — Bthstiele 3-5blüthig; B. im Umrisse eyf. od. herablaufend-gefiedert, Fieder fiedersp. u. nebst der Spindel gezähnt; *die fruchtbaren Stbg. v. der Basis bis zur Mitte lanzettl. u. gewimpert, oberhalb der Mitte fädlich, kahl.* ☉. An kräuterreichen O. der mittelländ. Flora, (im Littor. gemein; in Istrien; für d. Schwz zweifelhaft.) Mai-Jul. J. h. vind. 1. t. 18. *Geranium ciconium* L. Blb. hellblau, mit 3 dunkleren Adern.

4. **E. MALACOIDES** (Willd.) Herzf. blättriger R. — Bthstiele vielblüthig; B. u. Bstiele drüsig-flaumig; B. herzf., stumpf, gezähnt; *Stbg. kahl, sämmtl. lanzettl.* ☉. Auf Schutthaufen, an Wegen,

Mauern, (im Littor.; in Istrien; Cherso; Veglia.) Jun. Jul. Cav. diss. t. 91. f. 1. *Geranium malacoides*. L. spes. D.

XXIV. Ordng. BALSAMINEEN. A. Richard dict. class. 2. pag. 173. DC. prodr. 1. 685. J. Roeper de floribus et affinitatibus Balsaminearum. Basil. 1830.

K. 5blättrig, unregelmässig, abfällig, in der Knospenlage dachig; die 2 dem unpaarigen Blb. nahestehenden KB. meist fehlend; das unpaarige viel grösser, gespornt. Blkr. 3blättrig, das obere Blb. symmetrisch, die 2 seitenst. 2 sp., unsymmetrisch, aus 2 zsgewachsenen gebildet; (Blkr. 5blättrig, die seitenst. Blb. paarweise zsgewachsen.) Stbg. 5, unterweibig, den Fruchtkn. dicht umschliessend; Stbk. 2 fächerig, mehr od. weniger zsgewachsen, mit Längsritzen aufspringend. *Der Fruchtkn. 5fächerig*, Fächer mehreyig. Eychen hängend; STräger mittelpunktst. Kapsel 5klappig, elastisch aufspringend. S. eyweisslos. Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Saftige, zarte Kräuter: - B. nebenblattlos. (Die 2 oberen KB., die gewöhnlich fehlen, beobachtete ich öfters bei der gefüllten Variet. d. *Balsamina hortensis*, auch fand ich sie mit Spornen versehen.)

1. IMPATIENS (L.) Springkraut. — Die 5 N. in eine verwachsen. Kapsel verlängert, Klappen v. d. Basis gegen die Spitze einwärts (u. nicht auswärts) zurückgerollt, die eine od. andere schraubenf. gewunden.

1. I. NOLI TANGERE (L.) Empfindliches S. — Bthstiele 3-4blüthig, kürzer, als das B., unter diesem abstehend; Bth. hängend, der Sporn an der Spitze zurückgebogen; B. eyf., grobgezähnt; die Gelenke des St. geschwollen. ☉. In Hainen u. feuchtem Gebüsch. Jul. Aug. St. h. 5. Bth. citrongelb, mit blutrothen Punkten am Schlunde u. dem untersten KB., das bei dieser Art sehr gross u. blumenblättrig ist.

XXV. Ordng. OXALIDEEN. DC. prod. 1. p. 689.

K. 5blättrig od. 5th., bleibend, in der Knospenlage dachig. Blkr. unregelmässig. Blb. 5, unterweibig, bisweilen an der Basis zshängend, in der Knospenlage schraubenf.-gewunden. *Stbg. 10*, an der Basis oft 1brüderig, die inneren, den Blb. gegenständigen, länger. Stbk. mit 2 Ritzen aufspringend, nicht angewachsen. *Fruchtkn. 1, frei, 5fächerig; Fächer mehreyig*; STräger mittelpunktst. Cf. 5. Kapsel 5-10klappig. S. in einem fleischigen, v.

der Spitze elastisch aufspringenden Mantel eingeschlossen, eyweiss-haltig. Keim gerade, umgekehrt, Würzelch. v. d. Nabel entfernt.

1. *O. OXALIS* (L.) Sauerklee. — K. 5blättrig. Blb. 5. Stbg. 10; Stbf. an der Basis kurz-blüdrig, die 5 äussern kürzer. Gf. 5. Kapsel länglich.

1. *O. ACETOSELLA* (L.) Gemeiner S. — *Stengellos*; Wurzelstock kriechend, gezähnt; B. 3zählig, Blättchen verkehrtherzf., flaumig; Schaft länger, als die B., über der Mitte mit 2 DeckB.; Blb. länglich-verkehrteyf., leicht-ausgerandet. 4. In Hainen u. in feuchten Gebüschen. Apr. Mai. *Oxys acetosella* Scop. Blb. weiss od. rosenroth, mit purpurnen Adern u. mit einem gelben Flecken oberhalb der Basis zierlich bemalt, fast 4mal so lang, als der K.; die innern Stbg. noch 1mal so lang, als der K. Var.:

β. parviflora, kleiblüthig, Blkr. nur noch 1mal so lang, als der K., Stbg. 5, so lang, als der K., 5 fast verschwunden: *O. Acetosella* *δ. parviflora* DC. *O. parviflora* Lej.

2. *O. STRICTA* (L.) Steifer S. — Der St. einzeln, aufrecht, zerstreut, flaumig; B. 3zählig, *nebenblattlos*, Blättchen verkehrtherzf.; Bthstiele 2-5blüthig, ohngefähr so lang, als das B.; die fruchtttrag. Bthstielchen aufrecht-abstehend; Wurzelläufer etwas fleischig, ausdauernd. Zweijährig; sie pflanzt sich durch etwas fleischige Wurzelläufer v. der Dicke einer Rabenfeder fort, welche den Winter hindurch ausdauern, im folgenden Jahre eine neue Pflanze hervortreiben, mit der fruchtttrag. aber jedesmal absterben, während sich neue für das künftige Jahr erzeugt haben. Soll aus dem nördl. Amerika herkommen, kommt aber nun in unsern Gärten unter dem Gemüse nur zu häufig vor. Jun.-Oct. *O. corniculata* St. h. 1. Bth. gelb.

3. *O. CORNICULATA* (L.) Gebörnter S. — Die St. ausgebreitet, flaumig, an der Basis wurzelnd; B. 3zählig, Blättch. verkehrtherzf.; *NebenB. länglich, an den Bstiel angewachsen*; Bthstiele 2-5blüthig, kürzer, als das B.; die fruchtttrag. Bthstielchen zurückgeschlagen; W. ästig-faserig; Ausläufer fehlend. ☉. An kultiv. O., (v. Lüttichschen dch die Gegenden d. Unterrheins nach Westphal. u. Niedersachsen bis Holstein u. Hannov.; bei Carlsruh, Leipzig; in der südl. Schwyz u. im Littor.) Jun.-Oct. Bth. gelb.

XXVI. Ordng. ZYGOPHYLLEEN. Brown. gen. rem. p. 13. DC. prodr. I. p. 703.

K. 5blättrig, in der Knospenlage dachig. Blkr. regelmässig. Blb. 5, dem Fruchtb. eingefügt. Stbg. 10, frei, unterweibig. Fruchtkn. 1, 5fächerig, Fächer 1-mehreyig. od. mit übereinandergelegten Querwänden versehen; STräger mittelpunktst.; *Eychen wagrecht od. hängend*. Die unterweibige Scheibe gekerbt, od.

statt ihrer gesonderte Drüsen. Keim gerade, Würzelch. von dem Nabel entfernt. *B. gegenst., nebenblättrig, nicht punktiert.*

• 1. **TRIBULUS** (L.) Burzeldorn. — K. 5blättrig, abfällig; Blb. 5; Gf. sehr kurz; N. halbkugelig, 5 strahlig, (wie bei *Papaver*.) Unterweibige Drüsen zw. den äussern Stbg. u. dem Fruchtkn. Früchtch. 4, nussartig, zw. den S. querwandig, vor der Reife zshängend u. eine Kapsel darstellend.

1. **T. TERRESTRIS** (L.) Gemeiner B. — B. 6paarig, Blättchen fast gleich; Bthstiele kürzer, als der Bstiel; Früchtchen 2-4dornig. ☉. An Wegen, in Weinbergen u. an cultiv. O., (bei (Fiume; in Istrien.) Jun.-Herbst. Schk. t. 113. Bth. gelb. J.

XXVII. Ordng. RUTACEEN. Juss. gen. 296, mit Ausschluss der sect. 1. DC. prodr. 4. p. 709.

K. 3-5 sp. od. 3-5 th., in der Knospenlage dachig. Blkr. regelmässig od. etwas ungleich. Blb. soviel, als Kelchzpfl, mit diesen abwechselnd, vor einer drüsigen Scheibe eingefügt. Stbg. auf die Scheibe eingefügt, so viel, als Kelchzpfl, od. noch 1mal so viel, *Fruchtkn. lappig: Lappen u. Fächer soviel, als Kelchzpfl; Fächer 2-4eyig; STräger mittelpunktst. Gf. 1*, aus der Mitte der Lappen des Fruchtknoten hervorgehend, N. einfach. Die Fächer der Kapsel einwärts aufspringend. S. eyweisshaltig; Keim innerhalb des Eyweisses; Würzelchen v. Nabel entfernt. *B. mit durchscheinenden Punkten bestreut.*

1. Unterordng. Wahre *RUTACEEN*. Die Innenhaut der Kapsel trennt sich nicht vom Fleische.

1. **RUTA** (L.) Raute. — K. bleibend, 4, seltner 3-5 th. Blb. eben so viel, benagelt, konkav. Stbg. noch 1mal so viel, als Blb., unter der Scheibe, die den Fruchtkn. trägt, eingefügt, gerade. Honiggrübchen auf der Scheibe so viel, als Stbg. Fruchtkn. mit so viel Furchen u. oberwärts Lappen, als KB. Bth. bei allen gelb.

1. **R. GRAVEOLENS** (L. var. *γ.*) Gemeine Garten-R. — *Lappen der Kapsel stumpf*; Blb. gezähnt od. ganzrandig, plötzlich in den Nagel zsgezogen; B. beinahe 3fach-gefiedert, gestielt, im Umriss fast 3eckig, Fieder nach oben zu an Grösse abnehmend; *Blättchen oval-länglich, die endst. verkehrteyf.* 4. Auf steinigen Hügeln, sie scheint ursprünglich exotisch, jetzt aber ist sie an d. angeführten O. ganz einheimisch, (im südl. Tyrol! im Werthale am Badenstein in Hessen; in d. transalpinischen Schwz.) Jnn. Jul. D. fl. 3. 86., var. *α.* Schk. t. 113.

2. **R. DIVARICATA** (Tenore.) Spreitzende R. — *Lappen der Kapsel stumpf*; Blb. gezähnt od. ganzrandig, plötzlich in den Nagel zsgezogen; B. beinahe 3fach-gefiedert, gestielt, im Umriss

fast 3eckig, Fieder nach oben zu an Grösse abnehmend; *Blättchen länglich-lineal. od. lineal., die endst. der untern B. verlängert-verkehrteyf.* 4. Auf steinigem, sonnigen Hügeln u. Wiesen, (im Littor.; bei Triest nicht selten.) Jun. Jul. R. crithmifolia Moric. bei DC. Rb. ic. 8. 1060., Expl. mit schmälern Blättchen; R. divaricata DC., Expl. mit breiteren Blättchen. R. graveolens a. L. — Sie wird zuweilen mit dem Namen R. montana belegt, die man in D. noch nicht fand u. die Gaudin zweifelhaft als eine Schweizerpflanze aufstellt. Die echte R. montana ist nicht schwer zu untersch.: die B. sind im Umriss länglich-verkehrteyf., (die Fieder nehmen nämlich mehr gegen die Basis des Blattes, als gegen die Spitze desselben ab,) u. die Blb. sind nach der Basis verschmälert u. nicht plötzlich in einen Nagel zsggezogen.

3. R. BRACTEOSA (DC.) Deckblättrige R. — *Lappen der Kapsel zugespitzt*; Blb. fransig, plötzlich in den Nagel zsggezogen; Bthstielchen ganz kahl; B. fast sitzend, beinahe 3fachgefiedert, Fieder nach der Basis u. Spitze des B. abnehmend, die untersten fast Nebenblätter darstellend, Blättchen lineal-länglich. 4. An felsigen, sonnigen O., Mauern, (bei Rovigno in Istrien, bei Fiume u. auf d. Inseln Veglia u. Osero.) Jun. Jul. Rb. ic. 8. f. 1063. Die DeckB. gross. — Die R. angustifolia Pers. untersch. sich dch die dicken Bstiele, die in der Mitte fast so dick, als der St. sind, den schlängeligen, oberwärts nackten St., die kleinen DeckB., welche kaum länger als der Durchmesser des von ihnen gestützten Aestchens sind, u. die flaumigen Bthstielchen u. Aestchen. J.

4. R. PATAVINA (L. spec. 549) Patavinische R. — Die Lappen der Kapsel stumpf; Blb. ganzrandig, kurzbenagelt; Bthstielchen u. K. zottig; B. sitzend, 3zählig, Blättchen lineal. od. lanzettl., nach der Basis verschmälert, die untersten einfach. 4. Auf unfruchtbaren, steinigem Aeckern, (zw. Pavenzo u. Fontane in Istrien, Tommas.) Jun. Pseudo-Ruta Mich. gen. t. 19.

II. Unterordng. *DIOSMEEN*. A. Juss. mem. rutac. p. 83. Fächerhaut der Kapsel elastisch abspringend.

2. DICTAMNUS (L.) Diptam. — K. abfällig, 5th. Blb. ebensoviel, benagelt, etwas ungleich. Stbg. 10, abwärtsgeneigt. Der Fruchtkn. auf einem kurzen, dicken Fruchtträger emporgehoben.

1. D. FRAXINELLA (Pers.) Eschenblättriger D. — *Blb. elliptisch-lanzettl., spitz, die seitenst. etwas stumpf*; Fruchtkn. kürzer, als sein Stiel; B. länglich-elliptisch, kleingesägt. 4. In gebirgigen Wäldern, (im mittlern u. südl. D. u. in d. Schwz hin u. wieder; im nördl. selten.) Mai. Jun. D. fl. 3. 84. Dictamnus albus L. spec. St. h. 6. Bth. rosenroth, mit purpur nicht hinlänglich benenn Adern. Den weissblühenden (D. albus Link.) habe ich noch obachtet. Var:

β. *obtusiflorus*, die Blättchen der B. viermal kleiner, auch die Bth. kleiner, Blb. breit-elliptisch: D. obtusiflorus Koch Synops. ed. 1. Nach Vergleichung mehrerer Exempl. von verschiedener Form, überzeugte ich mich, dass D. obtusiflorus nur eine Variet. von D. Fraxinella ist.

II. Unterklasse. CALYCIFLOREN (Kelchblüthige).

K. vereintblättrig, KB. nämlich mehr od. weniger unter sich verwachsen. Blb. u. Stbg. einer auf die Basis des K. aufgewachsenen Scheibe eingefügt, od. der an den Fruchtkn. angewachsene K. die Blb. u. Stbg. od. die 1blättrige Blkr. tragend.

XXVIII. Ordng. CELASTRINEEN. R. Brown. gen. rem. p. 22. DC. prodr. 2. p. 2.

K. 4-5sp., od. 4-5th., in der Knospenlage dachig. Blkr. regelmässig. Blb. so viel, als Kelchzpfl. an dem Rande einer unterweibigen Scheibe eingefügt, Knospenlage dachig. Stbg. so viel, als KB. u. diesen wechselt., am Rande der Scheibe od. auf der Scheibe selbst eingefügt. Der Fruchtkn. frei, 2-4fächerig, Fächer 1-mehreyig, Eychen aufrecht; Sträger mittelpunktst. Eyweiss fehlend, od. fleischig. Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

I. Gruppe. **STAPHILEACEEN.** DC. l. c. S. knöchern, am Nabel gestutzt, mantellos. Eyweiss fehlend od. schwach. Die Keimb. dick. B. zsgesetzt.

1. **STAPHYLÉA** (L.) Pimpernuss. — K. 5th., gefärbt, an der Basis inwendig mit der Scheibe bedeckt. Blb. 5. Stbg. 5, rings um die Scheibe eingefügt. Der Fruchtkn. 2-3lappig. Kapsel 2-3fächerig, einwärts aufspringend; Fächer armsamig.

1. **S. PINNATA** (L.) Gemeine P. — B. gefiedert. Blättchen 5-7, länglich-lanzettl., ganz kahl, gesägt; Bth. traubig; Kapseln häutig, aufgeblasen. *h.* In Gebirgswäldern, (v. Oberbaden an längs d. AK. bis Oestr., sodann in Krain u. Tyrol: im nördl. D. hin u. wieder, aber blos verwildert.) Mai, Jun. Schk. t. 84. Bth. weisslich.

II. Gruppe. **EVONYMEEN.** DC. l. c. p. 3. S. bemantelt, am Nabel nicht gestutzt. Keim in der Achse des fleischigen Eyweisses. B. einfach.

2. **EVONYMUS** (L.) Spindelbaum. — K. flach, 4-5sp., an der Basis von einer schildf. Scheibe bedeckt. Blb. 4-5, am Rande der Scheibe eingefügt. Stbg. 4-5, in die Scheibe selbst eingesenkt. Gf. 1. Kapsel 3-5fächerig, 3-5kantig, Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend. S. in den Fächern einzeln, mit einem saftigen Mantel bis zur Mitte od. ganz umhüllt.

1. **E. EUROPAEUS** (L. var. *a.*) Gemeiner Sp. — Blb. länglich; Aeste 4eckig, glatt; B. elliptisch-lanzettl., klein-gesägt, kahl; Kapseln meist 4lappig, stumpf/kantig, glatt, flügellos; der Mantel den ganzen S. einhüllend. *h.* In Wäldern u. Gebüsch. Mai, Jun.

St. h. 27. *E. vulgaris* Scop. Bth. hellgrün. Kapsel rosenroth, Mantel pomeranzengelb, S. weiss.

2. *E. VERRUCOSUS* (Scop.) Warziger Sp. — Blb. rundlich; *Aeste stielrund, warzig*; B. elliptisch, klein-gesägt, kahl; Kapsel meist 4 lappig, stumpfkantig, glatt, flügellos; Mantel den halben S. bedeckend. $\frac{1}{2}$. In Gebirgswäldern, (v. Triest an dch Krain, Steyermark, Oestr., Mähr., Böhm., Schles. nach Preussen.) Mai. Jun. J. a. t. 49. Bth. hellbrunn, nämlich grün u. mit kleinen blutrothen Punkten bestreut. Kapsel gelblich, Samenmantel blutroth, S. kohlschwarz. D.

3. *E. LATIFOLIUS* (Scop.) Breitblättriger Sp. — Blb. rundlich; *Aeste stielrund, etwas zsgedrückt; glatt*; B. länglich-elliptisch, klein-gesägt, kahl; *Kapseln* meist 5 lappig, *geflügelt-kantig*. $\frac{1}{2}$. In Gebirgswäldern, (in d. Schwz selten; v. da dch Oberschwaben längs der AK. bis Oestr., u. eben so längs der südl. Seite der A.) Mai. Jun. J. a. t. 289. Fruchstiele blutroth. Kapseln purpurn, Samenmantel pomeranzengelb.

XXIX. Ordng. RHAMNEEN. R. Brown. gen. rem. p. 22. DC. prod. 2. p. 19.

K. 4-5 sp., Zpfl in der Knospenlage klappig, abfällig; Röhre bleibend; dem Fruchtkn. mehr od. weniger anhängend. Blb. den Kelchzpfln wechselst., oft schuppenf. *Stbg. so viel, als Blb. u. diesen gegenst.* Der Fruchtkn. v. einer drüsigen Scheibe umzogen, 2-4 fächerig: Fächer 1eyig, Eychen aufrecht. Gf. 1, mit 2-4 N., bisweilen bis zur Basis geth. Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

1. *ZIZYPHIUS* (Tournef. Gärtn.) Judendorn. — K. flach, 5 sp., abfällig, rundum abspringend, mit bleibender, der Frucht anhängender Basis. Blb. u. Stbg. vor die fleischige Scheibe eingefügt. Gf. 2-3. Steinfrucht saftig, flügellos; die Steine nicht aufspringend, 2-3 fächerig, Fächer 1samig. S. eingedrückt, ohne Furche. — Bth. grün-gelblich.

1. *Z. VULGARIS* (Lam.) Gemeiner J. — B. eyf., ausgerandet, gezähnt u. nebst den Aestchen kahl; Stacheln gezweiet, der eine zurückgebogen, od. fehlend; Steinfrüchte eyf.-länglich. $\frac{1}{2}$. Aus Syrien stammend, wird im südl. Tyrol u. im östr. Littor. kultivirt, u. kommt daselbst verwildert im Gebüsch vor. Jun.-Aug. *Z. sativa* Desf. *Z. Juiuba* Mill. *Rhamnus Zizyphus* L. D.

2. *PALIURUS* (Tournef.) Stehdorn. — K., Blkr., S. u. alles wie bei *Zizyphus*, aber die Frucht trocken, mit einem kreisrunden Flügel umzogen.

1. *P. ACULEATUS* (Lam.) Stacheliger St. — Aestchen flaumig B. eyf., kurz-zugespitzt, 3nervig; Flügel der Frucht klein-gekerbt

h. An unkultiv., felsigen, unfruchtb. O., (südl. Tyrol, Krain u. Littor.; C. Tessin.) Jun.-Aug. P. australis Gärtn. D. fl. 2. 245. Zizyphus Paliurus Willd. Rhamnus Paliurus L. D.

3. RHAMNUS (L.) Wegdorn. — K. 4-5 sp., abfällig, rundum abspringend, mit einer bleibenden, breitem od. schmälern Basis: Röhre glockig od. kreiself.; Saum abstehend od. zurückgebogen. Blb. u. Stbg. dem Rande der Röhre eingefügt. Gf. ungetheilt, od. 2-4sp. Steinfrucht (Apfelfrucht?) 2-4steinig, saftig od. fast trocken; Steine knorpelig, der Länge nach aufspringend. S. mit einer tiefen Furche durchzogen.

1. Rotte. CERVISPINA Dill. DC. prodr. 2, 24. Aeste gegenst.; ein Dorn an dem diesjährigen Aestch. endst., später gabelst. B. gegenst., an den Seiten der Aeste büschelig, zu beiden Seiten der Mittelrippe mit 3, meist zuneigenden Hauptadern. Bth. vielblüthig - 2häusig, 4blättrig, 4männig, fast büschelig an den Seitenästchen, grün od. gelblich. Gf. 2-3sp.

1. CATHARTICA (L.) Gemeiner W. — Dornen end- u. gabelst.; B. rundlich-oval, klein-gesägt, an der Basis fast herzf., *Bstiel 2 od. 3 mal so lang, als die NebenB.*; Steinfrucht auf der bleibenden ziemlich konvexen Basis des K. sitzend; *Ritze der S. *) geschlossen* an der Basis, u. Spitze knorpelig-berandet. h. In Wäldern u. Gebüsch. Mai, Jun. Schk. t. 46. Die S. mit einer Längsnath bezeichnet, welche geschlossen an der Basis, u. Spitze knorpelig berandet ist u. nicht am ganzen Rande, sondern nur an der Spitze, innerhalb der knorpeligen Ränder, klappt. Die Pflanze var. flaumig u. kahl.

2. R. TINCTORIA (Waldst. u. Kit.) Maler-W. — Dornen end- u. gabelst.; B. elliptisch, klein-gesägt, *Bstiel v. der Länge der NebenB.*; *Steinfrucht auf der bleibenden, halbkugeligen, kantigen Basis des K. sitzend*; die Ritze der S. klaffend, mit einem knorpeligen Rande umzogen. h. An rauhen O., an Zäunen, (in dem an Ungarn grenzenden Theile v. Unteröstr.) Mai. Viel kleiner, als die vorhergehende Art u. den folgenden ähnlich, sehr ästig, Aeste spreitzend. Rinde der Aeste gelblich-ashgrau; Gf. bis über die Mitte gespalten. Frucht stachelspitzig: der Stachel, aus der bleibenden Basis des Gf. entstanden, ist dadurch merkwürdig, dass er aus der saftigen Substanz der Frucht selbst gebildet ist. Ritze der S. klaffend, überall knorpelig-berandet. D.

3. R. INFECTORIA (L.) Färbender W. — Dornen end- u. gabelst.; B. elliptisch od. rundlich, klein gesägt, *Bstiel meist v. der Länge der NebenB.*; *Steinfrüchte auf der bleibenden, ganz flachen Basis des K. sitzend*; *Ritze der S. geschlossen, an der Basis u. Spitze knorpelig-berandet.* An felsigen O., (Istrien; Fiume.) Mai. Ein sehr ästiger Strauch, mit braun-ashgrauer Rinde, Gf. bis über die Mitte gespalten. — Die in der Flora Deutschl., 3. Bd. VII. Seite, erwähnten Tyroler Expl. gehören zu der breitblättrigen Abart des R. saxatilis. D.

*) Die S. sieht man erst nach Wegnahme der Schale.

4. *R. SAXATILIS* (L.) Stein-W. — Dornen end- u. gabelst.; B. elliptisch od. lanzettl., kleingesägt, Bstiel v. der Länge der NebenB.; *Steinfrüchte auf der bleibenden flachen, ziemlich konvexen Basis des K. sitzend; Ritze der S. klaffend*, mit einem knorpeligen Rande umzogen. ♀. An felsigen, sonnigen O., (v. Oberschwaben nach Oberbayern, sodann v. d. südl. Schwz dch Graubünden, Tyrol in d. Littor. u. dch Krain nach Oestr. u. Steyerm.) Mai. Jun. J. a. t. 53. Ein niedriger, sehr ästiger, oft liegender Strauch; die Blb. des weiblichen Strauches sind an den um München gesammelten Expl. allerdings vorhanden, aber sehr klein, borstlich u. den Stbf. (ohne Kölbchen) ähnlich.

II. Rotte. *RHAMNUS*. Aeste wechselst., wehrlos. B. abfällig, mit geraden, schief-gleichlaufenden Adern. Bth. vielehig-2häusig, 4blättrig, an d. Basis der Aestchen in den Winkeln von deckblätterf., hinfalligen B., u. in d. Winkeln der unteren B. des Aestchens. Gf. 2-3sp.

5. *R. ALPINA* (L.) Alpen-W. — Wehrlos; Bth. 2häusig, 4männig; B. elliptisch, zugespitzt, an der Basis stumpf od. fast herzf., klein-gesägt, *am Mittelnerven beiderseits meist 12* schiefe gerade Adern; *Gf. 3sp.*; der St. ausgebreitet u. aufrecht. ♀. Auf d. VorA., (in d. Schwz, Steyerm. u. dch Tyrol nach Kärnth., Krain.) Mai. Jun. St. h. 51. B. am Mittelnerven beiderseits mit 12-20 Adern.

6. *R. PUMILA* (L.) Niedriger W. — Wehrlos; Bth. 2häusig, 4männig; B. elliptisch od. rundlich, klein-gesägt, *am Mittelnerven beiderseits 6*, schiefe, etwas bogige Adern; *Gf. 3sp.*; der St. nebst den Aesten gestreckt. ♀. An d. Felsen der A., an denen er sehr fest anhängt, (Schwz, Tyrol, bayer. A., Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyerm.) Apr.-Jun.

III. Rotte. *ALATERNUS* Tournef. DC. prodr. 2 p. 23. Aeste wechselst., wehrlos. B. mehrjährig, hart, lederartig. Bth. vielehig-2häusig, 4-5blättrig, in den Winkeln der B. befindlich. Gf. 2-3sp.

7. *R. ALATERNUS* (L.) Lederblättriger W. — Wehrlos; B. eyf., elliptisch od. lanzettl., *entfernt-gezähnel-gesägt, ganz kahl, lederig, mehrjährig*; die Tr. blattwinkelst., kurz; Bth. 2häusig. ♀. An rauhen, felsigen O., (Istrien.) Clus. hist. 1. p. 50. f. 2. Variet. mit lanzettl. B.: *R. Clusii* Willd. Clus. a. a. O. fig. 1.. J.

IV. Rotte. *FRANGULA* Tournef. DC. prodr. 2 p. 26. Aeste wechselst., wehrlos. B. abfällig, mit geraden, schief-gleichlaufenden Adern. Bth. zwittrig, 5blättrig, 5männig. Gf. ungeth.; N. köpfig.

8. *R. RUPESTRIS* (Scop.) Felsen-W. — Wehrlos; B. oval od. rundlich, stumpf, an der Basis abgerundet od. fast herzf., *gekerbt-gesägt, Sägezähne knorpelig-berandet*; Bth. zwittrig, 5männig; N. ungeth.; der St. aufstrebend. ♀. An rauhen, felsigen O., (Krain u. im Littor.) Jun. Jul. *R. pumilus* Wulf. bei J. collect. 2. p. 141. t. 11. *R. Wulfenii* bot. Ztg. 6. 1. 174. *Frangula Wulfenii* Rb. K. an der innern Oberfläche nebst den Blb. weiss. Scopoli sagt: „die B. am Rande etwas knorpelig, weisslich, schwach-gekerbt; sämmtl. Bth. zwittrig. Blb. u. Stbg. weiss.“ D.

9. R. FRANGULA (L.) Glatter W. — Wehrlos: *B.* elliptisch, zugespitzt, *ganzrandig*; *Bth.* zwittrig, 5männig; *Bthstiele* nebst den *K.* kahl od. angedrückt-flaumig; die *N.* ungeth.; der *St.* aufrecht. *h.* In Wäldern u. im Gebüsch. Mai. Jun. Schk. t. 46. *Frangula vulgaris* Rb. *K.* an der innern Oberfläche nebst den *Blb.* weisslich.

XXX. Ordng. TEREINTHACEEN. Trib. 1. u. 2. DC. prodr. 2. p. 62 u. 66.

Bth. meist 1geschlechtig. *K.* klein, bleibend, 5- (od. auch 3, 4 u. 7) sp. *Blb.* so viel, als Kelchabschnitte, dem *K.* eingefügt, in der Knospenlage klappig. *Stbg.* so viel, als *Blb.*, diesen wechselst, od. noch einmal so viel od. mehrere, frei u. *vor die den Fruchtkn. umziehende Scheibe eingefügt*, od. an der Basis zsgewachsen bei fehlender Scheibe. *Fruchtkn. 1eyig.* *N.* 1, od. mehrere einfach. Frucht nicht aufspringend. Keim gekrümmt. *B.* wechselst., nebenblattlos, unpunktirt.

I. Gruppe. **ANACARDIEEN.** Die Keim*B.* dick; Würzelchen auf dem Rücken der Keim*B.* liegend, (rückenwurzelig.)

1. PISTACIA (L.) Pistacie. — *Bth.* 2häusig, blumenblattlos. Männchen: *K.* 5sp. *Stbg.* 5, *Stbk.* fast sitzend, 4eckig. Weibchen: *K.* 3-4sp. *Fruchtkn.* 1fächerig. *N.* 3, dicklich. Steinfrucht 1samig. *S.* an den Grund des Faches angeheftet.

1. P. TEREINTHUS (L.) Terpentin-P. — *B.* *unpaarig-gefiedert*, Blättchen meist zu 7, eyf. -länglich od. lanzettl., spitz, stachelspitzig. *h.* An rauhen O. d. südl. Gegenden, (Littor. bei Triest; im südl. Tyrol, bei Botzen.) Apr. Mai. D.

2. P. LENTISCUS (L.) Mastix-P. — *B.* *abgebrochen-gefiedert*, Blättchen zu 8, lanzettl., *Bstiel* geflügelt. *h.* An felsigen O. d. südl. Gegenden, (Istrien; Osero). Apr. Mai. J.

II. Gruppe. **SUMACHINEEN.** DC. prodr. I. p. 68. Die Keim*B.* blattig, das Würzelchen auf der Fuge derselben einwärtsgebogen, (seitenwurzelig.)

2. RHUS (L.) Sumach. — *Bth.* zwittrig, od. vielehig, od. 2häusig. *K.* 5sp. *Blb.* 5. *Stbg.* vor die nebenweibige Scheibe eingefügt. *Fruchtkn.* 1fächerig. *Gf.* 3, kurz; od. 3, sitzende *N.* Steinfrucht trocken, 1, selten 3samig. *S.* eyweisslos, umgekehrt, an einem aus dem Grunde entspringenden Nabelstrange aufgehängt.

1. R. COTINUS (L.) Perücken-S. — *B.* verkehrteyf. *h.* An gebirgigen, felsigen O. d. südl. Geg., (in d. südl. Schwyz, d. südl. Tyrol, Krain, d. Littor. u. Oestr.) Mai. J. a. t. 210. *Cotinus Coggyria* Scop.

2. R. TOXICODENDRUM (L. sp. 381.) Giftbaum; S. — *B.* 3zählig, Blättchen kantig-gezähnt. *h.* An steinigen O. bei Jungbunzlau in Böhm. wildwachsend, Sekera. D.

XXXI. Ordng. PAPILIONACEEN. L. ord. nat. 32.
DC. prod. 2. p. 94. Gattungen von Leguminosen bei Juss. 315.

K. 5zählig od. 2lippig, abfällig, od. verwelkend. Blkr. unregelmässig, schmetterlingsförmig, tief unten im K. eingefügt, 5 blättrig. Blb. nebenweibig, frei, seltner unter sich u. mit den Stbg. verwachsen, die 2 untern meist in einen Kiel zsgeflossen. Stbg. 10, bei den Blb. eingefügt, 1brüderig oder 2brüderig, nämlich 9 zsgewachsen, das 10. frei. Der Fruchtkn. frei, mit einem seitenst. Sträger. S. eyweisslos. Keim seitenwurzelig. B. wechselst., nebenblättrig.

I Gruppe. LOTEEN. DC. prodr. 1. 115. Hülse 1fächerig, od. mit Einwärtsbiegung einer der Näthe 2fächerig. Die Keimb. ziemlich flach, während des Keimens in B., mit Spaltöffnungen besetzt, verwandelt.

1. Untergruppe. GENISTEEN. Stbg. 1brüderig. Flügel der Blkr. am oberen Rande zierlich-faltig-runzelig. K. ungleich-lippig. (Die Stbk. sind bei den meisten Gattungen dieser Untergruppe abwechselnd augenscheinlich ungleich, aber man muss sie, um sie besser zu beobachten, an noch nicht geöffneten Bth. untersuchen.)

1. ULEX (L.) Hecksame. — K. bis zur Basis getheilt-lippig, die obere Lippe 2- die untere 3zählig. Stbg. 1brüderig. Hülse 2klappig, 1fächerig, gedunsen, mehreyig, armsamig.

1. U. EUROPAEUS. (L.) Europäischer II. — B. lineal., in eine stechende Stachelspitze zugespitzt, die blüthenständigen so lang, als der Bthstiel, die unter dem K. befindlichen Deckblättchen viel breiter, als d. Bthstiel. ♀. Auf Feldern u. sandigen Haiden, (Holstein u. Mecklenbg, Hambg, Bremen u. Verden, Hanov. hin- u. w., Lansitz in Sachs.; Elsass, bei Zweibrücken in d. Rheinpfalz; südl. Schwz.) Mai. Jun. Schk. t. 196. — Aeste u. Aestchen gefurcht, mit einer stechenden Spitze endigend, an der Basis mit einem, einem Aestchen ähnlichen, aber flachern u. im trocknen Zustande fast rinnigen B. gestützt, daher die paarigen Dornen. B. der wurzelst. Aeste lanzettl., breiter, nach der Basis verschmälert, oft auch 3zählig. — Bei U. nanus Sm. sind die B. von der Basis an verschmälert, u. die unter dem K. befindlichen, sehr kleinen Deckblättchen nicht breiter, als der Bthstiel. Bei U. provincialis Loisel. sind die B. auch pfriemlich, aber viel kürzer, als das Aestchen u. der Bthstiel.

2. SPARTIUM (L. mit Ausschluss von Arten.) Pfriemen. — K. oberwärts gespalten, 1lippig; Lippe an der Spitze, rauschend u. klein-5zählig. Stbg. 1brüderig. Gf. pfriemlich, bartlos. N. länglich, schwammig, unter der Spitze des Gf. einwärts der Länge nach angewachsen. Kiel 2blättrig. (Von der hier aufgestellten Art nahm L. den Charakter der Gattung Spartium; vgl. gen. pl. 858.)

1. S. JUNCEUM. (L.) Binsenartiger Pf. — ♀. An gebirgigen O.

am Adriat. Meere, (Littor., häufig bei Triest, Tommas.; Steyerm., Maly.) Mai. Jun. *Spartianthus junceus* Link. D.

3. **SAROTHAMNUS** (Wimmer.) Besenstrauch. — K. 2lippig, Lippen rauschend, die obere 2- die untere 3zählig. Stbg. 1brüderig. Der Gf. sehr lang, kreisförmig-zsgerollt, oberwärts verdickt, u. an der innern Seite flach. N. endst., klein, köpfig.

X 1. **S. VULGARIS** (Wimm. Fl. von Schles. ed. 2. p. 148) Gemeiner B. — *h.* In Wäldern u. Haiden, zumal an sandigen O., (stellenw. dch d. Geb.; Schweiz nur im C. Freiburg.) Mai. Jun. *S. scoparius* Koch synops. ed. 1. D. fl. *Spartium scoparium* L. spec. Schkhr. t. 196. Den auch in der II. Ausg. der Fl. Schles. beibehaltenen Trivialnamen habe ich aufgenommen.

4. **GENISTA** (L.) Ginster. — K. 2lippig. Stbg. 1brüderig. Gf. pfriemlich, aufstrebend. N. endst., schief, einwärts abschüssig. Kiel stumpf.

1. Rotte. **COROTHAMNUS**. Die Oberlippe des K. kurz 2zählig. Die Bth. an dem St. u. den Aesten seitenst., einzeln, gepaart od. zu mehreren, mit einem Blätterbüschel aus derselben Knospe hervorbrechend.

1. **G. DIFFUSA** (Willd.) Ausgebreiteter G. — Die St. wehrlos u. nebst den länglich-lanzettl. B. kahl, diese am Rande etwas bewimpert; die *Bthstiele seitenst.*, einzeln u. mehre, von einem Blätterbüschel umgeben, 3mal so lang, als der K.; *K. nebst der Blkr. kahl.* *h.* Auf trocknen Wiesen u. abhängigen grasigen O., (Untersteyermark u. Krain; bei Triest!) Mai. Jun. St. h. 49. *Spartium decumbens* J. ic. rar. t. 555. *Genista humifusa* Wulf. bei Jacq, nicht L.'s, welche sich nach Lamarck dch sehr kurze Bthstiele unterscheidet; auch nicht die von Villars u. DC., welche auf beiden Seiten rauh. B. hat. D.

2. **G. HALLERI** (Reynier.) Haller's G. — Die St. wehrlos; B. länglich-lanzettl., unterseits u. am Rande nebst *den Aesten, Bthstielen u. K. rauh.*, Haare abstehend; die *Bthstiele seitenst.*, einzeln u. mehre, von einem Blätterbüschel umgeben, 3mal so lang, als der K.; Blkr. kahl. *h.* An gebirgigen, felsigen O., (westl. Schwz., selten.) Mai-Jul. *G. prostrata* Lam. *G. pedunculata* L'Herit., nach DC. *G. decumbens* Willd. herbar. n. 13170. fol. 2 u. spec. pl. nach den Synon. S.

3. **G. PROCUMBENS** (WK.) Liegender G. — Die St. wehrlos; B. länglich-lanzettl., *unterseits u. am Rande nebst den Aesten u. K. angedrückt-haarig*; die *Bthstiele seitenst.*, einzeln u. mehre, v. einem Blätterbüschel umgeben, 3mal so lang, als der K.; *Blkr. kahl.* *h.* An felsigen, sonnigen O., (in Mähren, Unteröstr.) Apr.-Jun. Untersch. sich v. der ähnlichen *G. pilosa* sogleich dch die langen Bthstiele u. noch 1mal so grossen Bth. D.

II Rotte. Wahre **GENSTEN**. Die obere Kelchlippe bis auf d. Basis 2theilig.

a. Ohne Dornen. Die Bth. am St. u. den Aesten seitenst., einzeln, gepaart, od. zu mehreren, mit einem Blätterbüschel aus ein u. derselben Knospe hervortretend.

4. **G. PILOSA** (L.) Haariger G. — Die St. liegend u. aufstre-

bend; *B.* länglich-lanzettl., unterseits nebst den Aesten, Bthstielen u. K. angedrückt-haarig; *die Bthstiele seitenst.*, einzeln u. mehre, v. einem Blätterbüschel umgeben, so lang, als der K.; *Fahne u. Kiel seidenhaarig.* ♀. Auf gebirgigen, waldigen Haiden, (im ganzen Gebiete, doch nicht überall, nicht in Böhm.; in d. Schwz nur auf d. Jura.) Mai. Jun. J. a. t. 208. *G. decumbens* Willd. herbar. n. 13170. fol. l. u. sp. pl. mit Ausschluss der Syn.

b. Ohne Dornen. Bth. traubig. *B.* nicht nebenblättrig.

5. *G. SERICEA* (Wulfen bei J.) Seidenhaariger *G.* — *Die St.* wehrlos; *B.* lanzettl., unterseits nebst den Aestchen angedrückt-haarig, Neben*B.* fehlend; *die Tr. endst.*, *armblüthig*; Bthstielen u. K. zottig; *Fahne u. K. seidenhaarig.* ♀. In Felsenspalten u. an gebirgigen, rauhen O., (im Littor., um Triest gemein.) Jun. Jul. J. ic. rar. t. 556. D.

c. Ohne Dornen. Bth. traubig. *B.* nebenblättrig.

6. *G. SCARIOSA* (Viviani ann. bot.) Rauschender *G.* — *Die St.* wehrlos u. *nebst den lanzettl. B. kahl*; Aeste geflügelt-3kantig; Neben*B.* bleibend, pfriemlich, endlich dornig; Bth. traubig; *Blkr. ganz kahl.* ♀. An felsigen, gebirgigen O., (Untersteiermark, Krain bei Gottschee!) Jun. *G. jannensis* Viv. cat. *G. genuensis* Pers. *G. triquetra* Wk. *G. triangularis* Willd. — *Die G. anxantica* Tenor. fl. neap. hat elliptische stumpfl., am Rande nicht durchscheinende *B.*, u. 8 Linien lange Bth. D.

7. *G. TINGTORIA* (L.) Färber-*G.* — *Die St.* wehrlos, stielrund, erhöht-gestreift, kahl, oberwärts angedrückt-flaumig; *B. lanzettl. od. elliptisch, am Rande flaumig*; Neben*B.* pfriemlich, sehr klein; Bth. traubig, *nebst der Blkr. u. den Hülsen kahl*; Kiel von der Länge der Fahne. ♀. Auf trocknen Wiesen, Triften u. an waldigen O. Jun. Jul. Var.: *Die B. breiter od. schmaler, und der St., die B. beiderseits, die Bthstielen u. K. flaumh., die Haare aufrecht*: *G. pubescens* Lang. — *Genista sibirica* L. untersch. sich dch folgds: *die B. fast lineal., die der Aestchen sehr schmal u. wie die ganze Pflanze völlig kahl*; Bth. kleiner. Ob sie in Istrien vorkomme, bezweifle ich sehr.

8. *G. ELATIOR* (Koch.) Höherer *G.* — *Stämme aufrecht, oberwärts ästig; Aeste stielrund, gleichf.-gerieft*, oben etwas kantig, wehrlos, kahl, gegen d. Spitze zu flaumig; *B. lanzettl., od. elliptisch, am Rande flaumig*; Neben*B.* pfriemlich, sehr klein; Bth. traubig; *Bl. u. Hülsen kahl*; Schiffchen v. d. Länge d. Fahne. ♀. Auf trocknen Wiesen im Littorale. Jun. Jul. *G. virgata* Willd. berl. Baumz., (nicht *G. virgata* DC. prodr., welches dieselbe Pfl. ist, wie *Spartium virgatum* Ait. u. *Cytisus tener* Jacq.,) *G. sibirica* Reichenb. fl. exc.

9. *G. OVATA* (Waldst. u. Kit.) Eyrundblättriger *G.* — *Die St.* wehrlos, stielrund, erhöht-gestreift u. *nebst den B. rauhh., Haare abstehend*; *B. lanzettl., elliptisch, od. eyf.*, Neben*B.* pfriemlich, sehr klein; Bth. traubig; *Blkr. kahl*; Kiel v. der Länge der Fahne; *Hülsen dicht rauhh.* ♀. Auf trocknen Hügeln, (im C. Waadt, selten C. Tessin, um Roveredo in Untersteierm.) Jun. Jul. —

G. nervata Kit., nach einem Expl. v. dem Autor selbst in der Sammlung der Münchener Akad. untersch. sich v. *G. ovata* nur dch die längern. u. weniger dichten Haare der B. u. des St. Die B. sind elliptisch-lanzettl. u. nicht mehr 3nervig, als bei letzterer, der Fruchtkn. ist weiss-seidenhaarig, u. nicht kahl.

d. Dornige. Trauben an der Spitze des St. mehrere. Die Aestchen beblättert, die St. blattlos.

10. *G. GERMANICA* (L.) Deutscher *G.* — Die St. dornig, unterwärts blattlos, oberwärts ästig; *Aestchen* beblättert, *rauhh.*, die blüthentrag. wehrlos; B. lanzettl. oder elliptisch; Bth. traubig; DeckB. pfriemlich, 2mal kürzer, als das Bthstielchen. *h.* An waldigen O. Mai. Jun. *Voglera spinosa* Fl. wett. St. h. 12. — Var.: *β. inermis*, ganz ohne Dornen; von niedrigem Wuchse am Flusse Isonzo, Biasoletto, von höherem bei Erlangen.

11. *G. ANGLICA* (L.) Englischer *G.* — Die St. dornig, unterwärts blattlos, oberwärts ästig; *Aestchen* beblättert, *kahl*, die blüthentrag. wehrlos; B. lanzettl. od. elliptisch; Bth. traubig; DeckB. blattig, länger, als die Bthstielchen. *h.* Auf feuchten, torfhaltigen Mäiden, (v. d. Niederlanden dch Westphalen, Hannover, Braunschweig, die Lausitz bis Holstein u. Mecklenbg; auch in Schles.) Mai. Jun. Fl. dan. 619. D.

*** Dornige. Die St. mit einer einzelnen Bthtraube endigend, v. der Basis an beblättert.

12. *G. SYLVESTRIS* (Scopoli.) Wilder *G.* — Die St. rasig, einfach, v. der Basis an beblättert, mit einer einzelnen Bthtraube endigend, gerillt, *angedrückt-haarig*, *Dornen* zsgesetzt, aufrecht-abstehend, biegsam, *fein-gerieft*; B. lanzettl. die der Dornen sehr schmal, nebst dem K. u. Kiele flaumig. *h.* An felsigen, sonnigen O., (südl. Steyerm., Krain u. d. Littor.) Mai. Jun. St. h. 49. *G. hispanica* Wulfen bei Jacq. ic. rar. 3. 557. Die *G. hispanica* L. hat blattlose St. u. beblätterte Aestchen u. gehört zur vorhergehenden Rotte. D.

13. *G. ARCUATA* (Koch.) Bogiger *G.* — Die St. rasig, einfach, von der Basis an beblättert, mit einer einzelnen Bthtraube endigend, kantig-gerieft, *oberwärts* sowie die Spindel *seidenhaarig-grau*, *Dornen* zsgesetzt, abstehend, bogig, etwas biegsam, *4kantig*; B. lineal., die der Dornen sehr schmal, nebst den K., der Fahne und dem Kiele seidenhaarig; Zähne des K. so lang wie die Röhre desselben. *h.* An rauen O., (bei Triest.) Mai. Jun. Untersch. sich von der ähnlichen *G. sylvestris*, ausser den aufgezählten Merkmalen, dch die halb so grossen, satter gelben Bth. D.

14. *G. DALMATICA* (Bartling.) Dalmatischer *G.* — Die St. rasig, einfach, v. der Basis an beblättert, mit einer einzelnen Bthtraube endigend, kantig-rieffig, *rauhh.*, *Haare abstehend*, *Dornen* zsgesetzt, abstehend, steif, *4kantig*; B. lineal.-lanzettl., die der Dornen sehr schmal; K. etwas *rauhh.*; Spitze der Fahne u. der Kiel flaumig; DeckB. lineal.; Zähne des K. noch einmal so lang als die Röhre desselben. *h.* An felsigen, trocknen O., (auf d. Insel

Cherso u. Osero.) Jun. Jul. — Die *G. hirsuta* Vahl. untersch. sich dch folgds: sie ist stärker; Dornen vielstreifig; B. lanzettl.; DeckB. viel breiter, lanzettl., langzugespitzt; Aehre dichter, rauhaariger, die ganze Fahne nebst dem Kiele rauhh. Die *G. hispanica* L. hat mehr zsgesetzte, an den blüthentrag. Aesten weiche u. unschädliche Dornen, länglich-lanzettl. B., beinahe köpfige Bth. u. eine Fahne v. der Länge des Kieles, od. kaum kürzer. Von *G. germanica* u. *anglica* untersch. sich letztere ausser andern Merkmalen dch die oberwärts dornigen, blüthetragenden Aeste. Die *Genista arcuata* u. *G. dalmatica* unterscheiden sich von der *G. sylvestris* durch ihren sparrigen Habitus u. die fast rechtwinkelig abstehenden Aeste, deren Dorne wieder rechtwinkelig abstehen. Ich habe diese Arten gesondert aufgeführt, damit sie weiter beobachtet werden möchten. Tommasini hält sie für blosse Varieten der *G. sylvestris*. J.

5. CYTISUS (L.) Bohnenbaum. — K. 2lippig. Stbg. 1brüderig. Gf. pfriemlich, aufstrebend; N. schief, auswärts abschüssig. Kiel stumpf.

1. Rotte. LABURNUM DC. Kelchröhre kurz, mit einem einzelnen Deckblättchen an der Basis, od. deckblattlos. N. mit verlängerten Warzen gewimpert. Nabelstrang an der Spitze nicht verdickt. Bth. gelb.

a. Bthen in nackten Tr.

1. C. LABURNUM (L.) Gemeiner B. — *Angedrückt-haarig; die Tr. seitenst., reichblüthig, hängend; Blättchen elliptisch, oben kahl; Hülsen seidenhaarig, die obere Nath mit einer rechtwinkelligen Kante bekielt.* ♀. In Wäldern der Berge und VorA., (Krain, südl. Steyerm., Oestr.; auf der Saleve in der Schwz!) Apr. Mai. Take Aug.

2. C. ALPINUS (Mill.) Alpen-B. — *Kahl; die Tr. seitenst., reichblüthig, hängend; Blättchen elliptisch, am Rande nebst den Tr. etwas flaumb., Haare abstehend; Hülsen kahl, die obere Nath geflügelt-bekielt.* ♀. In Wäldern d. Gebirge u. VorA., (in der südwestl. Schwz., in Tyrol u. Krain.) Mai. Jun. Schk t. 203.

3. C. RAMENTACEUS (Sieber bot. Ztg. 5. p. 242.) Spreuschuppiger B. — Bthtr. eyf.-aufrecht; Bthstielchen u. K. flaumig; K. *röhrig-glockig*, dessen obere Lippe bis zur Basis 2th., Zpfl eyf., stumpf; Blkr. kahl, das *Schiffchen flaumig*; die verkehrt-eyf. Blättchen u. die Hülsen kahl. ♀. In den Waldgegenden des Littorale (zw. Duino u. Monfalkone, Freyer.) Mai. *Cytisus Weldenii* Visian. bot. Ztg. Die auf dem Blattkissen bleibenden Nebenblätter, welche sowie d. Kissen selbst später eine schwarzbraune Farbe annehmen, u. welche die Knospen bedecken, nannte der verstorbene Sieber *ramenta*, (was soviel als hinfallige Nebenblätter bezeichnet,) woher dann dieser gänzlich unpassende Name der Pfl. entstand, den ich jedoch nicht ändern wollte. Die Bthstielchen haben in ihrer Mitte ein DeckB. u. zwar kein kleines, aber ein hinfalliges. D.

4. C. NIGRICANS (L.) Schwärzlicher B. — *Angedrückt-haarig; die Tr. endst., reichblüthig, aufrecht; Blättchen verkehrteyf. u.*

länglich, oben kahl; K. deckblattlos. *h.* Auf Haiden u. in trocknen, felsigen Wäldern, (v. Schles. dch Böhmen, Mähr., d. Lausitz, Sachs., Bayern u. Oberschwaben bis in d. Schwz u. dch d. ganze übrige, v. da aus südlicher gelegene, Gebiet.) Jun. Jul. St. h. 12.

h. Bth. seltenst., mit dem Büchel der B. aus derselben Knospe hervortretend.

5. *C. GLABRESCENS* (Sartorelli degli Alberi indig. ai Boschi dell' Ital. super. p. 282. Milan. 1816.). Kahler werdender B. — *Bth. seltenst.* gebüschelt; *Bthstiele* 4- u. *mehrmal länger als der K.*; K. kurzglockig, an der Basis mit einem linealen Deckblättchen gestützt; St. ausgebreitet, wehrlos; B., Bthstiele u. Bstiele unterseits angedrückt-behaart. *h.* Raue Gebirgsgegenden, (auf d. Gipfel des Berges Calbege im C. Tessin, Dr. Lagger, von D. Diry entdeckt, auf dem Corni di Canzo, den Gaud. zur Schwz zog.) *C. emerifolius* Rbch. fl. exc. S.

III. Rotte. *PHYLLOCYTISUS*. Kelchröhre kurz, mit 3 Deckblättern. N. etwas gewimpert. Nabelstrang an der Spitze keulig-verdickt.

6. *C. SESSIFOLIUS* (L.) Stiellosblättriger B. — Kahl; die Tr. meist 6 blüthig, aufrecht; *K. mit 3 Deckblättern*; Blättchen verkehrteyf., die der oberen B. fast rautenf. *h.* In Wäldern u. auf Haiden, (südl. Tyrol; im Oberbadisch. zw. Constanx u. Rudolfszell; Ville neuve am Genfersee.) Mai. Jun. Tabern. kräuth. 1506. f. 2.

III. Rotte. *CALYCOTOME* Link. in Schrad. Journ. K. schlauchf., kurz-2lippig, während des Aufblühens der Bl. in der Mitte zerreissend, wobei der obere mützenf. Theil abfällt, während der untere rundum abgesprungen stehen bleibt.

7. *C. SPINOSUS* (Lam. dict. 2. 247.) Dorniger B. — *Bth. seiteständig*, gebüschelt; Bthstiele unter dem K. mit einem 3sp. DeckB. versehen; St. gefurcht; Aeste zu Dornen erhärtend, pfrieml.; *K. während des Aufblühens rundum abspringend*, sowie die untere Seite der B. angedrückt-flaumh.; Hülsen kahl od. seidigflaumh. *h.* An unkultiv. O. in Istrien, (auf der Insel Osero, an einem O. Urano genannt, Biasol.) Mai. Juni. *Spartium spinosum* L. spec. — *Cytisus lanigerus* DC. fl. fr., *Spartium lanigerum* Desf. atl., *S. villosum* Poir. it., scheinen mir nur eine Variet. von *C. spinosus* zu bilden, deren Schoten mit längeren, abstehenden Flaumhaaren dicht überzogen sind; andere Arten dieser Gattung variiren auf dieselbe Weise. J.

IV. Rotte. *TUBOCYTISUS* DC. Kelchröhre lang. Lippen kürzer, als die Röhre. N. gewimpert. Nabelstrang am Nabel in einen kreisrunden Mantel verbreitert. (Die meisten Arten dieser Rotte sind noch nicht hinlänglich aufgeklärt u. begrenzt u. deswegen an ihren Standorten weiter zu beobachten.) Bth. gelb, mit Ausnahme des *C. purpureus*.

* Wehrlose Sträucher.

8. *C. AUSTRIACUS* (L.) Oestreichischer B. — *Bth. endst., doldig-köpfig*; die äussern Bthstiele mit Deckblättchen; Aeste aufrecht u. nebst d. längl. K. rauhh.; *B. grau von angedrückten Haaren*. *h.* An waldigen, rauhen O., (Oestr. u. Böhmen, Mähr.) Jul. Aug. J. a. t. 21. St. h. 59. *Cytisus* V. Clus. Fahne auf dem Rücken angedrückt-haarig. — *C. canescens* Presl., ist nach

einem v. H. Prof. Kosteletsky erhaltenen Exempl. nicht verschieden u. *C. leucanthus* WK. stellt nach H. Prof. Tausch's Ansicht eine weissblüthige Variet. dar.

D.

9. *C. CAPITATUS* (Jacq.) Köpfiger B. — *Bth. endst., doldig-köpfig*, zahlreich; die äussern Bthstiele mit Deckblättchen; *Aeste steif, aufrecht-abstehend*, gleichhoch; Aestchen nebst den B. u. d. längl. K. rauh., Haare abstehend. *h.* In sonnigen Wäldern, (in Böhm. u. v. dch Bayern u. Tyrol bis in d. südl. Schwz., u. v. diesem Striche an bis an d. adriat. Meer.) Jun. St. h. 59. *Cytisi V. species altera* Clus. hist. p. 96. Fahne mit der Zeit in der Mitte rothbraun, wie bei der folgenden Art. Var. mit auf d. Rücken rauh. u. kahler Fahne.

10. *C. SUPINUS* (L. var. *a.* nach dem Synon. aus Clus.) Niedriger B. — *Bth. endst., zu 2 u. 4 doldig*; Bthstiele mit Deckblättchen; *der St. sehr ästig u. nebst den Aesten gestreckt*, Aestchen aufstrebend u. nebst den B. locker-behaart, Haare abstehend; d. längl. K. fast kahl. *h.* Auf Haiden, an Waldrändern, (in d. Gegend von Wien!) Mai. Reichenb. fl. exc. p. 524. *Cytisi VII. species altera* Clus. hist. p. 97. Blättchen verkehrteyf., 2 od. 3 mal kleiner, als bei dem vorhergehenden, wovon er sich überdies dch den sehr ästigen St., die armblüthigen Köpfchen, kleineren Bth. u. fast kahlen K. unterscheidet. Der *C. supinus* DC (von den Piemontesischen SeeA.!) gehört vielleicht zur folgenden Art.

D.

11. *C. PROSTRATUS* (Scop.) Gestreckter B. — *Bth. an den jährigen Aestchen seitenst.*, zu 2 od. 3, gestielt; Bthstiele ohne Deckblättchen, noch einmal so kurz als d. K., *an den heurigen Aestchen endst., doldig* u. später. die äussern Bthstiele derselben unter dem Kelche mit Deckblättchen; die St. nebst den Aesten liegend; Aestchen aufstrebend, nebst den B. u. d. längl. K. rauh., Haare abstehend. *h.* An gebirgigen, rauhen O., (in Krain u. im südl. Tyrol.) Die seitenst. Bth. erscheinen im Mai, die endst. nach 4 Wochen im Jun. Diese Art ist nach Illadnik's Beobachtung der wahre *C. prostratus* Scop., v. welchem sich der *C. bisflorens* Host., nach v. Fenzl erhaltenen Expl. nicht untersch., ausser dch die Richtung der Haare, die am St. etwas weniger abstehen, an den B. aber angedrückt erscheinen. Dem *C. capitatus* sehr ähnlich untersch. sich dch die sammt den Aesten ausgebreitet-liegenden St. u. vorzügl. dch die Stellung der Bth. Var.:

β. ciliatus, Fruchtkn. nebst den Hülsen kahl, nur am Rande rauh: *C. ciliatus* Wahlb. nach Rochel's Expl. in der Sammlg seines Freundes Schultes.

Der *Cytisus supinus* Bert. ist dem *C. prostratus* sehr ähnlich, untersch. sich aber dch kurzgestielte Bth., und dch Bthstielen, welche alle mit einem Deckblättchen gestützt sind, wie ich mich nach einem, v. dem Autor selbst erhaltenen Expl. überzeugte.

D.

12. *C. HIRSUTUS* (L.) Rauh. B. — *Bth. sämmtl. seitenst.*, zu 2 od. 3, ziemlich kurz-gestielt; Bthstielen ohne Deckblättchen

die St. aufrecht u. aufstrebend; *Aestchen nebst den B. u. längl. K. rauh.*, *Haare abstehend.* β . An gebirgigen, felsigen O., (Lugano in der südl. Schwz., in Krain; im Littor., in Böhm.) Mai. Jun. *C. hirsutus* Scop., Host. *C. polytrichus* MB. *C. falcatus* WK. *C. virgatus* Vest. Die Blkr. mit der Zeit bräunlich. Hülsen, wie bei den vorhergehenden dieser Rotte, rauh., variiren aber beiderseits kahl.

β . *ciliatus*, der Fruchtkn. nebst den Hülsen kahl, am Rande wimperig-rauh. Hierher gehört das v. Kitaibel selbst der Königl. Akademie zu München geschenkte u. daselbst aufbewahrte Expl. des *C. falcatus*, aber in der Beschreibung (pl. rar. hung. 3. p. 265.) werden die Hülsen rauh. genannt.

Der *Cytisus elongatus* W. K. untersch. sich v. *C. hirsutus* dch die aufrechten u. angedrückten Haare der Aeste u. die fest angedrückten der B.; v. dem folgend. *C. biflorus* aber dch den v. etwas abstehenden Haaren rauh. K., den aufrechten St. u. die zurückgekrümmten Aeste. Aber der *biflorus* „richtet sich auch im Garten auf, erhebt sich zu einem hohen, weit flaumigern Strauch, mit einem anderthalb Zoll dickem Stamme u. mit verlängerten, zurückgekrümmten, von unten an dicht mit Bth. besetzten Aesten“ Jacq. Ist vielleicht deswegen der *C. elongatus* eine Variet. des *C. biflorus* mit etwas abstehenden Haaren am K.?

13. *C. RATISBONENSIS* (Schäffer bot. exped. Titclk.) Regensburger B. — Bth. meist gezweiet, kurz-gesielt, sämmtl. *seitenst.*; die St. nebst den Aesten gestreckt; *Aestchen nebst den B. u. den längl. K. seidenh.*, *Haare angedrückt.* β . Auf kräuterreichen Hügeln, Bergwiesen, (v. Augsb. u. Regensb. dch Bayern nach Oestr., Böhm., Mähren, Schles.) Apr. Mai. *C. biflorus* L'Herit. stirp. *C. supinus* J. a t. 20. St. h. 59. *C. supinus* β . L. *Cytisus* VII. Clus. Var.:

β . *minor*, mit kleineren, kürzer gestielten Bth. u. mit B., die während der Bthzeit um die Hälfte kürzer, als die Bth. sind: *C. supinus* β . Wahlenb. *C. biflorus* W. K. *C. cinereus* Host. D.

14. *C. PURPUREUS* (Scop.). Purpurnblüthiger B. — Bth. meist gezweiet, *seitenst.*, Bthstielehen kürzer als d. längl. K.; die St. aufstrebend, *Aestchen nebst den B. u. K. kahl od. zerstreut haarig*; Rand des K. nebst den Nägeln der Blb. gewimpert; *Hülsen kahl.* β . An gebirgigen O., (Krain, Littor., Kärnth., südl. Tyrol.) April bis Jun. St. h. 24. Bth. purpurn, S. schwarz. D.

** Sträucher, deren Aeste in Dornen übergehen.

15. *C. SPINESCENS* (Sieber nach Spreng) Dornästiger B. — Bth. einzeln, *seitenst.*; die St. sehr ästig; Aeste dornspitzig, pfriemlich, *Aestchen nebst den B., K. u. Hülsen silberweiss-seidenh.* β . An gebirgigen, felsigen O., (auf d. Insel Cherso.) *C. argyreus* Rb. *C. ramosissimus* Tenore nach einem Expl. v. Autor selbst.

Var: β . *ciliatus*; Fruchtkn., u. Hülsen kahl, am Rande wimperig-rauh. J.

V. Rotte, *ASTEROCYTISUS*. K. tief-2lippig. Keine NebenB. B. gegenst. Bstiele bleibend. N. dch verlängerte Papillen wimperig.

16. *C. RADIATUS* (D. fl. 5. III.) Strahliger B. — Angedrückt-behaart; Köpfchen endst., gestielt, meist 4blthig; Deckblättchen eyf.; *Fuhne tief-ausgerandet*, schwach-behaart, Schiffchen dicht-seidig; Flügel kürzer als das Schiffchen; *B. gegenst.*, kurzgestielt, Blättchen lineal. $\frac{1}{2}$. In den gebirgigen Gegenden der Voralpen, (Krain, südl. Tyrol, U.Steyern.; im Wallis bei Sitten, Lens und Saviege) Mai. Jun. *Spartium radiatum* L. spec. *Genista radiata* Scop. carn., Column. ephr. ic. 294.

17. *C. HOLOPETALUS* (Fleischmann.) Ganzblättriger B. — Angedrückt-behaart; Köpfchen endst., gestielt, meist 4blthig; Deckblättchen lineal-pfriemlich; *Fuhne abgerundet-stumpf*, nebst dem Schiffchen dicht-seidig; Flügel so lang, als das Schiffchen; *B. gegenst.*, kurz-gestielt, 3 zählig, Blättchen lineal. $\frac{1}{2}$. Gebirge und VorA., (Zhaun im Innerkrain.) Mai. Jun. *Genista holopetala* Rbch. fl. germ. exsicc.

VI. Rotte. *SALZWEDELIA* Fl. d. Wett. K. tief-2lippig. Keine Nebenblättchen. B. wechselst., nebst den Bstielen abfällig. N. dch verlängerte Papillen wimperig.

18. *C. SAGITTALIS* (*Genista sagittalis* L.) Geflügelter B. — *Die St. geflügelt-2schneidig, gegliedert*; die Tr. endst., fast köpfig; B. einfach. $\frac{1}{2}$. An waldigen O., auf trocknen Wiesen, (in d. Schwz und im mittleren und südlichen D., doch nicht überall.) Jacq. a. t. 209. *Genista sagittalis* L. spec. *Salzwedelia sagittalis*, Fl. d. Wett.

VII. Rotte. *LOTOIDES* DC. K. tief-2lippig. Nebenblättchen krautig. N. mit längl., aber wenig bemerklichen Papillen besetzt.

19. *C. ARGENTEUS* (L.) Silberglänzender B. — Seidenartig; *Köpfchen gestielt*, meist 3 blüthig, endlich seitenst.; B. 3 zählig, wechselst. 4. An gebirgigen, rauhen O., (Krain und im Littor., auf d. Monte Spaccato.) Apr. Mai. St. h. 59.

6. *LUPINUS* (L.) Lupine. — K. 2lippig. Stbg. 1brüderig. Gf. pfriemlich, aufstrebend. N. köpfig. Kiel geschnäbelt. Hülse lederig, schwammig-querwandig. (Die Stbk. sehr ungleich.)

1. *L. HIRSUTUS* (L.) Rauhh. L. — St. krautig, nebst den Bstielen rauhh., Haare lang, weit-abstehend; Bth. wechselst., oder halbquirlig, 3 ständig; Deckb. lineal.; K. mit Deckblättchen; die obere Lippe des K. 2 th., die untere halb 3 sp.; *Blättchen* länglich- oder *verkehrteyf-keilig*, beiderseits rauhh. O. Unter der Saat, (Istrien) Mai. Jun. Bth. blau. J.

2. *L. ANGUSTIFOLIUS* (L.) Schmalblättrige L. — St. angedrückt-haarig; Bth. wechselst.; DeckB. eyf.; K. mit Deckblättchen; die obere Lippe des K. 2 th., die untere fast 3 sp.; *Blättchen lineal.*, unterseits angedrückthaarig; K. länger, als die halbe Blkr. O. Unter der Saat, (im C. Wallis bei Assens und einigen andern O.) Mai. Jun. Bth. blau. S.

II. Untergruppe. *ANTHYLLIDEEN*. Stbg. 1brüderig. Die Flügel der Blkr. nicht runzelig-gefaltet. Kelch dch fast gleiche

Kelchzipfel 5 zählig oder doch ungleiche fast 2 lippig. (Stbf. bei Ononis und Anthyllis oberwärts breiter.)*)

7. ONÓNIS (L.) Hauhechel. — K. 5 sp., bleibend, der fruchttrag. offen. Stbg. 1 brüderig. Kiel in einen pfriemlichen Schnabel zugespitzt. Hülse gedunsen. (B. aller 3 zählig.)

I. Rotte. Hülse nebst dem Stiele aufrecht, eyf.

1. O. SPINOSA (L.) Dornige H. — Die St. aufrecht und aufstrebend, freihig-zottig und zertrent-drüsig; Aeste unterbrochen-traubig, dornig, Dornen meist zu 2; Bth. blattwinkelst., einzeln; Bthstiele kürzer, als der K.; Blättchen oval-länglich und nebst den NebenB. gezähnel, ziemlich kahl; Hülsen eyf., aufrecht, von der Länge des K. und länger; S. knötig-rauh. 4. Auf Triften, unfruchtbaren Feldern, an Wegen, (stellenweise häufig, aber nicht überall im Gebiete.) Jun. Jul. O. spinosa DC., mit Ausnahme d. var. γ . O. arvensis β . Smith. O. campestris Koch und Ziz. O. spinosa β . L. spec. St. h. 72. Die Ononis antiquorum L. untersch. sich doch grössere Kahlheit, kleinere Bth. und vorzüglich doch glatte und nicht knötig-rauhe S.; diese kann wohl noch im östr. Littor. aufgefunden werden.

2. O. REPENS (L.) Kriechende H. — Die St. liegend, an der Basis wurzelnd. zottig; Aeste aufstrebend, locker-traubig, an der Spitze dornig; Bth. blattwinkelst., einzeln; Bthstiele kürzer, als der K.; Blättchen oval und nebst den NebenB. gezähnel, drüsig-haarig; Hülsen aufrecht, eyf., kürzer, als der K.; S. knötig-rauh. 4. Auf Aeckern, Triften, trocknen Wiesen, überall. Jun. Jul. O. repens Rb. St. h. 72. O. arvensis Smith var. γ . O. procurrens Wallr. — Eine Variet. ohne Dornen: O. arvensis α . inermis Sm. O. mitis Gmel. Bth. rosenroth.

3. O. HIRCINA (Jacq) Stinkende H. — Die St. aufrecht und aufstrebend, wehrlos, zottig; Bth. blattwinkelst., gezweiet, an der Spitze der Aeste dicht ährig; Bthstiele kürzer, als der K.; Blättchen oval und nebst den NebenB. gezähnel, drüsig-haarig; Hülsen aufrecht, eyf., kürzer als der K.; S. knötig-rauh. 4. Auf Wiesen, an Strassen, (von Holstein doch Mecklenbg, Pommern nach Schles., der Lausitz, sodann doch Gallizien nach Ungarn und Steyerin.; in Oestr., Tyrol; irrig im Badischen angegeben; C. Tessin und Wallis.) Jun. Jul. St. h. 72. O. altissima Lam. O. arvensis L. im Syst. nat. O. foetens All. O. spinosa α . mitis L. spec. pl. Bth. rosenroth. D.

4. O. COLUMNAE (All.) Berg-H. — Die St. aufstrebend, flaumig; Bth. blattwinkelst., sitzend; Blkr. kürzer, als der K.; Blättchen verkehrteyf., gezähnel, drüsig-haarig; die NebenB. lanzettl., zugespitzt, scharf-gezähnel; Hülsen aufrecht, eyf., beinahe so lang, als der zottige K. 4. An Bergabhängen, sonnigen O., (in Oestr., im südl. Tyrol; im Wallis, Tessin) Mai. Jun. O. parviflora

*) Galega mit 1 brüderigen Stbg. ist in der 3. Untergruppe enthalten.

Lam., nicht Thunb. *O. subocculta* Vill. *O. minutissima* J. fl. aust. t. 240, nicht L. Bth. gelb.

II. Rotte. Hülse auf einem aufrechten oder abstehenden Bthstiele, hängend, lineal., gedunsen.

5. *O. NATRIX* (Lam.) Gelbe II. — Drüsig-zottig; die St. aufstrebend; *Bthstiele 1 blüthig, begrannt*, in eine Traube zusammengestellt, *länger, als das B.*; Blkr. länger, als der K.; Blättchen länglich, gezähnt; die NebenB. zugespitzt, ganzrandig; *Hülsen lineal.*, gedunsen, *hängend*. 4. An sonnigen O., Wegen, bis zu den A. hinaufsteigend, (in Krain, südl. Tyrol, Wallis.) Jun. Jul. St. h. 72. Blkr. gelb, auswendig mit bluthrothen Streifen, deren auch L. erwähnt. Dagegen stellt DC. eine Variet. mit gleichfarbigen Bth. unter dem Namen *O. Natrix* und eine andere mit roth-gestreiften Bth. unter dem Namen *O. pinguis* L. auf.

6. *O. ROTUNDIFOLIA* (L.) Rundblättrige H. — Drüsig-zottig; die St. aufrecht und aufstrebend; *Bthstiele blattwinkelst.*, begrannt, *2-3 blüthig*, zuletzt länger, als das B.; Blättchen fast kreisf., gezähnt; *Hülsen lineal.-länglich*, gedunsen, *hängend*. 4. Auf den VorA., (auf den Lienzer A., Ob. Innthal, Graubünden; im Wallis.) Mai. Jun. J. austr. app. t. 49. St. h. 72. Bth. rosenroth.

7. *O. RECLINATA* (L. spec. 1011.) Nickende II. — Die St. aufstrebend, zottig, der mittlere aufrecht; *Bthstiele 1 blüthig, gran-nenlos, kürzer, als das B.*, so lang, als die nickende Blüthe; Blumkr. kürzer, als der K.; B. keilig- oder rundl.-verkehrt, drüsig-haarig, an der Spitze nebst den NebenB. gezähnt; *Hülsen hängend*, lineal., gedunsen, stielrund, ein wenig länger als der K. ☉. An sonnigen O. (Istrien.) Mai-Jun. *O. mollis* Lagasc. n. spec. nach DC. *O. pilosa* Bartl. *O. Cherleri* Koch Synops ed. 1. DC. prodr., nicht Linn. Bth. rosenroth. — *O. Cherleri* Linn. spec. bezeichnet nach der Beschreibung eine ganz andere Pflanze, wie Bartling richtig bemerkt. J.

8. *ANTHYLLIS* (L.) Wundklee. — K. 5 zählig, der fruchttrag. stempelnd, geschlossen, oft aufgeblasen. Stbg. 1 brüderig. Kiel stumpf oder kurz zugespitzt. Hülse vom K. eingeschlossen.

I. *A. VULNERARIA* (L.) Gemeiner W. — Krautig; B. gefiedert, *Blättchen ungleich*; Köpfchen behüllt; Hülle fingerig-getheilt; *K. bauchig, mit schiefer Mündung, KZähne viel kürzer, als die Röhre*, die oberen eyf.; Fahne halb so lang, als ihr Nagel. 4. Trockene Wiesen, beraste Hügel, und in den A. und VorA. bis zum ewigen Schnee hinauf Mai. Jun. St. h. 49. Var. niedriger, höher, gestreckt, aufstrebend, mit abstehenden oder anliegenden Haaren besetzt, mit grösseren oder kleineren Köpfchen und:

α. vulgaris, Bth. gelb oder goldgelb, St. nackt oder 1-2 blätterig; sie steigt so bis in die A. hinauf, ist aber auch daselbst der gewöhnlichen Pfl. ganz ähnlich und bildet keine eigene Variet. Hieher geh. *A. Vulneraria* und *A. alpestris* Hegetschw. Fl. d. Schw.

β. maritima, Bth. wie bei der vorigen; die Pfl. aber höher, 1—1½ Fuss hoch, dichter mit Haaren besetzt, hat oft 2-3 Aeste,

an deren Ende die Köpfchen stehen. *A. maritima* Schweigg. in Hagen Chlor. boruss. Am Meeresstrande in NordD.

β. rubriflora, Fahne, Rand der Flügel und das Schiffchen blutroth. St. h. 49. DC. prodr. 2. 170. *A. Dillenii* Schult. im Herbarium von Balbis. Diese jenseits der A. und in der Rheinpfalz.

δ. polyphylla, der vorigen sehr ähnlich, aber die Bth. gelblich-weiss mit blutrother Spitze des Schiffchens. *A. Vulneraria polyphylla* DC. prodr. Diese in U.Oestreich und um Fiume. — *A. affinis* Britinger unterscheidet sich von dieser Variet. nur dch einen fast nackten St. — Zwischen allen diesen Varietäten lassen sich keine bestimmten Grenzen ziehen, u. an den Hülsen, auch den reifen konnte ich keinen Unterschied finden.

2. *A. MONTANA* (L. spec. 1014.) BergW. — Krautig; B. gefiedert, Blättchen gleich; Köpfchen behüllt; Hülle fingerig-getheilt; K. röhrig, die Zähne lineal-pfrieml., gleichlang, so lang, als die KRöhre; Fahne noch einmal so lang als ihr Nagel. 4. Gebirgige, felsige, beraste O. (Oestr., Steyerm., Krain, südl. Tyrol und südwestl. Schweiz.) Mai. Jun. St. h. 49.

III Untergruppe. *TRIFOLIEEN*. Stbg. 2 brüderig. B. 3zählig. Hülse 1 fächerig.

9. *MEDICAGO* (L.) Schneckenklee. — K. 5 sp. oder 5zählig, Kiel stumpf. Stbg. 2 brüderig; Stbf. nicht mit den Blb. verwachsen. Flügel gleichmässig konvex, am oberen Rande nicht eingedrückt. Fruchtkn. von der Basis an nach oben hin gekrümmt, an der Fahne anliegend. Gf. kahl. Hülse 1 fächerig, sichel- oder schneckenf., 1-vielsamig.

I. Rotte. *FALCAGO* Rchb fl. exc. Hülsen zsgedrückt, sichelf. oder schneckenf.-gewunden und im Mittelpunkte offen.

§. 1. Hülsen wehrlos.

1. *M. SATIVA* (L.) Gebaueter S. — Die Tr. reichblüthig, länglich; Hülsen wehrlos, schneckenf.-gewunden, meist mit 3 Windungen, schwach-netzig-aderig, angedrückt-flaumig; Bthstielchen kürzer als der K., nach dem Verblühen aufrecht; die NebenB. eyf.-lanzettl., pfriemlich-zugespitzt, die unteren gezähnt; Blättchen ausgerandet, stachelspitzig, an der Spitze gezähnt, die der unteren B. länglich-verkehrteyf., die der oberen lineal-keilig. 4. Auf Wiesen, (die Pflanze stammt ursprünglich, wie man sagt, aus Spanien, ist aber jetzt an vielen O., auch weit von denjenigen Stellen, wo sie gebauet wird, wirklich einheimisch.) Jul.-Herbst. Schk. t. 212. Bth. violett oder bläulich. Var.

β. versicolor. Bth. hellgelb, während der Blüthezeit in das Grüne, und später in das Blass-violette übergehend: *M. sativa β.* Spenn. fl.frib. *M. media* Pers. Synops.

2. *M. FALCATA* (L.) Sichel-S. — Die Tr. reichblüthig, kurz, oft fast köpfig; Hülsen wehrlos, sichelf. oder einmal zsgedreht, netzig-aderig, flaumig oder abstehend-drüsigen-haarig; Bthstiele

kürzer, als der K., nach dem Verblühen aufrecht; die NebenB. eyf.-lanzettl., pfriemlich-zugespitzt, die unteren gezähnt; Blättchen stachelspitzig, nach der Spitze gezähnt, die der unteren B. länglich- die der oberen lineal-keilig. 4. Auf trockenen Wiesen, sonnigen Hügeln, an Wegen. Jun.-Herbst. Schk. t. 212.

Var. mit gelblichweisen, gelben und safrangelben Bth. und *β. versicolor*, Bth. anfangs gelb, dann grasgrün, zuletzt violett: Wallr. sched. p. 398. *M. falcata β. hybrida* Gaud. fl. helv.

γ. major, die St. verlängert, liegend mit grösseren, mehr gezähnten NebenB. und grösseren Bth. *M. procumbens* Bess. *M. intermedia* Schult. Die Haare der Schote meist angedrückt, zuweilen abstehend und zugleich drüsentragend; diess ist dann:

δ. glandulosa: *M. falcata* d. D. fl., *M. glomerata* Balb. elench., DC. prodr., Koch Synops. ed. 1., *M. annularis* Bess. in Herbar. — Sie verhält sich zu *M. falcata* wie *M. Willdenowiana* zu *M. lupulina*.

3. *M. PROSTRATA* (Jacq. hort. vind. 1. t. 89.) Gestreckter S. — Die Tr. 5-10 blüthig, abgekürzt; Hülsen wehrlos, dreimal gewunden, schwach-aderig, etwas flaumig oder kahl; *Bthstiele* noch 1 mal so lang, als der K., nach dem Verblühen zurückgeschlagen; die NebenB. eyf.-lanzettl., pfriemlich-zugespitzt, gezähnt; Blättchen ausgerandet, stachelspitzig, die der untern B. keilig, an der Spitze etwas gezähnt, die der oberen lineal-keilig, ganzrandig. 4. An sonnigen O., an Wegen, (Triest und Fiume häufig, Mähr.) Jun. Aug. D.

4. *M. MARINA* (L.) Meerstrands-S. — Bthstiele 5-10 blüthig, so lang als das B.; Hülsen schneckenf., wollig-filzig, ründlich, in der Mitte offen, meist 3 mal gewunden, auf der Oberfläche netzaderig, am Rande stumpf, wehrlos oder entfernt-dornentrag., Dornen kurz, kegelf.-pfriemlich; die NebenB. eyf., stumpf-gezähnt; Blättchen verkehrteyf., vorne gezähnt, nebst den Bstielen und dem St. dicht wollig-filzig. 4. Am sandigen Strande des Meeres, (bei Monfalcone.) Mai. Jun. D.

11. Rotte. *HYMENOCARPUS* DC. prodr. 2. 171. Hülsen nierenf., blattig-flach, im Mittelpunkte nicht geschlossen, am Rande nicht gezähnt, oder gezähneltdörnig.

5. *M. RADIATA* (L.) Strahliger S. — Bthstiele meist 2 blüthig, so lang als das B.; Hülsen nierenf., flach-zsgedrückt, strahlig-aderig, kahl, der vordere Rand dörnig, der hintere fransig-zersetz; S. quer-rnnzelig; die NebenB. an der Basis gezähnt, Blättchen rauten-eyf. ☉. Auf Feldern und Aeckern, (Istrien.) Jul. Aug. Bth. gelb. *M. lunata* Rb. J.

III. Rotte. *SPIROCARPUS* DC. l. c. Hülsen schneckenf.-gewunden, mit einer und mehren Windungen, im Mittelpunkte geschlossen. (Bth. an allen gelb.)

§. 1. Hülsen wehrlos, mit anderthalb oder mehreren Windungen versehen, welche gegen den Rand hin auseinander treten und nicht dichtaufeinander liegen; ihre Oberfläche aderig. Bei *Medicago orbicularis* decken sich die Windungen von der Basis und von der Spitze her mit ihren einwärtsgebogenen Rändern. (Zu dieser Abtheilung gehören ausser den beschriebenen noch *M. obscura* und *M. Helix*.)

6. *M. LUPULINA* (L.) Hopfen-S. — Achren reichblüthig, gedrungen, Bthstiele fast so lang als das B.; Hülsen wehrlos,

nierenf., gedunsen, an der Spitze gewunden, der Länge nach bogig-aderig, kahl oder angedrückt-flaumig oder zerstreut-drüsig-haarig, mit gegliederten abstehenden Haaren; die NebenB. eyf., fast ganzrandig; Blättchen verkehrteyf., leicht ausgerandet, vorne gezähelt. ☉. Auf Wiesen, an grasreichen und kultiv. O. Mai-Herbst. Schk. 212. Bth. gelb. Var.:

α. *vulgaris*, Hülsen kahl oder angedrückt-flaumig.

β. *Willdenowiana*, Hülsen drüsig-haarig. Haare abstehtend, gegliedert: M. Willdenowii Bönningh., nicht Merat's, welche sich nur durch die schwach-gezähnelten, oder ganzrandigen NebenB. von der gewöhnlichen Pflanze unterscheidet und kaum den Namen einer Variet. verdient. *Medicago corymbifera* Schm., *Linnaea* 4. 74. ist eine monströse Bildung, wie man sie bei *Trifolium pratense* häufig, bei *Medicago falcata* seltener antrifft.

7. M. SCUTELLATA (Allioni.) Schildfrüchtiger S. — *Bthstiele 1-3 blüthig*, kürzer, als das B.; *Hülsen wehrlos*, schneckenf., unterwärts *konvex*, oberwärts *flach*; die Windungen meist zu 6, beckenf., concentrisch-zsgerollt, schief-netzig-aderig, ganzrandig; die NebenB. eyf., gezähnt; Blättchen elliptisch, geschärft-gezähelt, unterseits nebst dem St. drüsig-haarig, die unteren verkehrteyf. ☉. Auf Hügeln, kultiv. O., (bei Fiume.) Mai. Jun. M. polymorpha β. L. J.

8. M. ORBICULARIS (Allione.) Rundfrüchtiger S. — *Bthst. 1-3 blüthig*, kürzer, als das B.; *Hülsen wehrlos*, schneckenf., kreisrund, linsenf.-plattgedrückt, beiderseits etwas *konvex*; die Windungen meist zu 6, etwas häutig, ganzrandig, mit dem eingebogenen Rande dicht-aufliegend, quer-aderig, die Adern nach dem Rande dicker; NebenB. tief-borstlich-fiedersp.; Blättchen geschärft-kleingesägt und nebst dem St. kahl, die oberen verkehrteyf., die unteren verkehrtherzf. ☉. An kultiv. O., Wegen, (im Littor., an sonnigen Abhängen gegen das Meer.) Mai. Jun. M. polymorpha α. L. D.

9. M. MARGINATA (Willd.) Berandeter S. — *Bthstiele 1-3 blüthig*, kürzer, als das B.; *Hülsen wehrlos*, schneckenf., kreisrund, plattgedrückt, beiderseits *flach*, die Windungen meist zu 6, etwas häutig, ganzrandig, am Rande von einander entfernt, quer-aderig, Adern nach dem Rand dicker; die NebenB. tief-borstlich-fiedersp.; Blättchen geschärft-kleingesägt und nebst dem St. kahl, die der unteren verkehrtherzf. ☉. An kultiv. O., Wegen, (bei Fiume.) Mai. Jun. Von der sehr ähnlichen M. orbicularis unterschieden durch die kleineren Hülsen und flachen, am Rande von einander stehenden, nicht mit den Rändern auf der Oberfläche aufliegenden Windungen.

5. 2. Hülsen wehrlos, oder mit kurzen Knötchen besetzt. Windungen dick, dicht auf einander liegend; der stumpfe oder abgestutzte Rand oft bekielt. (Zu der Abtheilung gehören ausser den beschriebenen die M. elegans und M. turbinata.)

10. M. TUBERCLATA (Willd. spec. pl. 3. 1410.) Knötiger Sch. — *Bthstiele 1-3 blüthig*, so lang, oder kürzer als das B.; *Hülsen schneckenf.*, fast walzlich, *aderlos*, kahl, die Windungen zu 3-5,

dick, *dicht aufeinanderliegend*, auf der Mitte des Randes bekielt, zu beiden Seiten des Kieles mit Knötchen besetzt, die an der jungen Hülse kurze Dornen, an der reifen stumpfe Zizen darstellen; NebenB. eyf., borstlich-gezähnt; Blättchen verkehrt-eyf., gezähnt; Bthstielchen und Stengel oberwärts flaumig. ☉. Unter der Saat, (Torre d'Orlando und Valle Lovrina bei Rovigno in Istrien, Tommas.) Mai. Jun.

3. Hülsen dornig, Dornen an der Basis fast stielrund und nicht mit einer merklichen Furche bezeichnet, auf den Rand der Windungen selbst aufgesetzt; die Windungen meist dicht aufeinanderliegend. (Hierher gehören ausser den hier beschriebenen die *M. Murex*, *M. aculeata*, *M. cylindrica*, *M. sphaerocarpa*, mit dicht aufliegenden und *M. muricata* mit spitzen und nicht dicht aufliegenden Rändern der Windungen.)

11. *M. TRIBULOIDES* (Lam.) Burzeldornähnlicher S. — Bthstiele 1-2 blüthig, kürzer, als das B.; *Fahne fast noch einmal so lang, als das Schiffchen*; Hülsen dornig, schneckenf., walzlich, *fast aderlos, zerstreut-haarig*; Windungen meist 5, dick, *dicht aufliegend*, in der Mitte des sehr stumpfen, dornentrag. Randes bekielt, Dornen aus ey-kegelf. Basis stielrund - pfriemlich, 2 zeilig-abstehend, zurückgebogen oder angedrückt; die NebenB. eyf., borstlich-gezähnt; Blättchen verkehrteyf., gezähnt; Bthstiele nebst dem St. oberwärts flaumh., Haare etwas abstehend. ☉. Am sandigen Meeresufer und an cultiv. O., (bei Fiume; in Istrien im Valle Bendon und auf der Insel Brioni; verwildert im Gebiete d. Fl. v. Spa.) Mai. Jun. Die Hülsen müssen bei dieser und den folgend. Arten im vollkommen reifen Zustande untersucht werden; denn im unreifen Zustande täuschen die dünneren, entfernten Windungen und die viel schlankeren Dornen sehr leicht.

α. *genuina*; Dornen stark, 2 zeilig-auf- und abwärtsgekrümmt, Hülsen grösser. Willd. herbar. ! n. 14333.

β. *Hornemanniana*; dieselbe, aber die Hülsen halb so gross: *M. pubescens* Hornem. *M. Hornemanniana* DC.

γ. *rigidula*; Früchte von der Grösse der Variet. α, die Dornen dick, gerade, zwar abstehend, aber doch wenig auseinanderfahrend, und nicht bogig-zurückgekrümmt. *M. rigidula* Willd. herbar. ! n. 14336.

δ. *truncatula*; Früchte halb so gross, als bei der Variet. α, Dornen an der Basis dick, 2 zeilig-auf- und abwärts, nicht bloss zurückgebogen, sondern an die Hülse dicht angedrückt. Diese ist *M. truncatula* Gärtn., *M. tentaculata* Willd. Kommt auch mit noch einmal so grossen Früchten vor, von der Grösse der Variet. α. D.

12. *M. LITTORALIS* (Rohde.) Meer-S. — Bthstiele 1-4 blüthig, begrannt, ohngefähr so lang, als das B.; *Fahne so lang, als das Schiffchen*; Hülsen dornig, schneckenf., walzlich, *an der Basis und Spitze spärlich-aderig, kahl, die Windungen meist zu 5, dicklich, dicht-aufliegend*, der Rand abgerundet-stumpf, dornentrag., in der Mitte bekielt, die Dornen entfernt, aus stielrunder Basis pfriemlich, abstehend oder zurückgebogen; die NebenB. eyf.-borstlich-gezähnt; Blättchen 3 eckig-verkehrtherzf., an der Spitze gezähnt, nebst den Bthstielen und dem St. flaumh., Haare

etwas abstehehd. ☉. An sandigen O. am Meere, (Triest.) Mai. Jun. Var. mit grösseren und kleineren Früchten: bei jenem sind die Früchte noch 1 mal, bei diesem 4 mal kleiner, als bei dem vorhergehenden, von dem er sich ausserdem dch die mit dem Schiffchen gleichlange Fahne, schlankere, entfernte Dornen und verkehrtherzf. Blättchen unterscheidet. D.

13. *M. GERARDI* (Waldst. und Kit.) Gerard's S. — Bthstiele 1-3 blüthig, ohngefähr so lang, als das B.; *Hülsen dornig*, schneckenf., eyf.-walzlich, *filzig-flaumig*, *aderlos*, *Windungen* meist zu 6, *dick*, *aufliiegend*, mit abgerundetem, stumpfen, kiellösen, dornentrag. Rande, Dornen ziemlich entfernt, aus stielrunder, beiderseits mit einer schwachen Furche bezeichneter Basis kegelf.-pfriemlich, abstehehd., an der Spitze etwas hakig; die *NebenB.* eyf., *borstlich-gezähnt*; Blättchen verkehrtherzf., vorne gezähnt, nebst den Bthstielen und dem St. flaumh., Haare ziemlich abstehehd. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O., (an sonnigen Abhängen der Hügel gegen das Meer hin bei Triest nicht selten; bei Fiume; im Gebiete der Fl. von Spa.) Mai. Jun. *M. rigida* Lam. dict.; *M. polymorpha* z. *rigidula* L. sp. Var. mit grösseren platt-walzlischen Früchten: *M. villosa* DC., *M. rigidula* Thuill. par. und:

β. cylindrica mit fast um die Hälfte kleineren, aber längeren, walzlischen Früchten: *M. villosa β. DC.*, *M. hirsuta* Thuill. par. D.

§. 4. Hülsen dornig, Dornen an der Basis zsgedrückt und beiderseits mit einer deutlichen Furche abzogen, daher gleichsam 2schenkelig, Windungen meist locker aufliegend oder abstehehd.

a. Die Oberfläche der Windungen glatt oder wenigstens nach dem Rande glatt; der hintere Schenkel der Dornen aus dem Rande selbst entspringend. (Hieher gehören ausser den hier beschriebenen die *M. Tenoreana* Ser., *M. cancellata* Ten., nicht Bieberst.)

14. *M. DISCIFORMIS* (DC.) Scheibenf. S. — Bthstiele 1-2 blüthig, länger, als das B.; Hülsen schneckenf., platt-walzlich, kahl; *die Windungen* zu 5, aufliegend, glatt, am Rande stumpf, *die oberste wehrlos*, *die übrigen 2 zeilig-dornentrag.*, Dornen pfriemlich, geradehervorgestreckt, etwas bogig, an der Spitze nicht hakig, auf beiden Seiten durch eine Furche ausgehöhlt; die *NebenB.* eyf., kurz-gezähnt; Blättchen verkehrteyf., spitz-gezähnt, nebst den Bthstielen und dem St. zottig-flaumig von einfachen Haaren und an der Spitze des St. vermisch mit drüsentragenden. ☉. An kultiv. O. und Wegen, (auf der Insel Osero.) Mai. Jun. Windungen im Mittelpunkte schief-aderig, übrigens ganz glatt. J.

b. Die Oberfläche der Windungen aderig; der hintere Schenkel der Dornen aus dem Rande selbst entspringend.

15. *M. MACULATA* (Willd.) Gefleckter S. — Bthstiele 1-2 blüthig, 2 oder 3 mal kürzer, als das B.; die Hülsen dornig, schneckenf., platt-rundlich, kahl, *die Windungen* zu 5, ziemlich locker-aufliiegend, *schief-aderig*, *der Rand breit*, *4kielig*, *2 zeilig-dornentrag.*, Dornen pfriemlich, *bogig-zurückgekrümmt*, an der Spitze nicht hakig, auf beiden Seiten dch eine Furche ausgehöhlt;

die NebenB. eyf., eingeschnitten-gezähnt, Zähne lanzettl.-pfriemlich; Blättchen breit verkehrteyf. kurz-gezähnelte, die unteren verkehrtherzf., Bstiele nebst den Bthstielen zerstreut-haarig, Haare gegliedert. ☉. An kultiv. O., Wegen, (in Istrien häufig; Fiume, Noë; bei Strasbg im Elsass; im Gebiete der Fl. von Spa.) Mai. Jun. *M. polymorpha* *η. arabica* L., *M. arabica* All. ped. D.

c. Die Oberfläche der Windungen glatt oder mit einfachen, bogenf. Adern besetzt; der hintere Schenkel der Dornen aus einer erhöhten, mit dem Rande gleichlaufenden und vom Rande entfernten Linie entspringend.

16. *M. MINIMA* (Lam.) Kleinster S. — Bthstiele 1-5 blüthig, länger oder kürzer, als das B.; Hülsen dornig, schneckenf., fast kugelig, spärlich-haarig, die Windungen zu 5, locker-aufliegend, *aderlos*, der Rand schmal, stumpf, 2zeilig-dornentrag., Dornen abstehtend, pfriemlich, gerade, an der Spitze hakig, auf beiden Seiten doch eine Furche ausgehöhlt; die NebenB. eyf., kurz-gezähnelte, nebst den Bstielen, Bthstielen und dem St. flaumig. ☉. An sonnigen, trocknen, grasreichen O., (doch das ganze Gebiet stellenweise.) Mai. Jun. *M. hirsuta* All. *M. rigidula* Roth. tent. *M. polymorpha* *μ minima* L. Schk. t. 212. a. Var. mit aufrechtem und niederliegendem St., und

β. mollissima, der St. nebst den B. grau-zottig, Haare einfach: *M. mollissima* Spreng. *M. graeca* Hornem. (wenn die NebenB. gezähnelte sind.)

γ. viscida, der St. nebst den B. klebrig-flaumh., Haare drüsentrag. — Ausserdem varirt die Frucht mit Dornen, welche länger, als der Dchmesser derselben sind: *M. minima* *γ. longiseta* DC., und, obschon selten, mit Dornen, welche um die Hälfte kürzer sind, als der Dchmesser der Frucht.

d. Oberfläche der Windungen netzig-aderig; der hintere Schenkel der Dornen aus einer erhöhten, mit dem Rande gleichlaufenden und vom Rande entfernten Linie entspringend. (Hierher gehören ausser den hier beschriebenen die *M. caspica*, *M. arenaria*, *M. laciniata*, *M. lappacea*, *M. nigra* Willd. (wovon *M. pentacycla* DC. *M. Hystrix* Ten. Synon. sind.) und *M. catalonica*.)

17. *M. APICULATA* (Willd.) Bespitzter S. — Bthstiele reichblüthig, kürzer, als das B.; die Hülsen schneckenf., kahl, die Windungen zu 2 oder 3, am Rande abstehtend, auf der Oberfläche quer-grubig-aderig, der Rand stumpf, 2zeilig-dornentrag., Dornen auseinanderfahrend, sehr kurz, kürzer, als der halbe Dchmesser der Hülse, ziemlich gerade, auf beiden Seiten eingedrückt; die NebenB. fiedersp.-gezähnt, Zähne borstlich; Blättchen verkehrtherzf., die d. Zweige verkehrt-eyf., alle stumpf-gezähnelte; nebst den Bthstielen und dem St. kahl. ☉. Unter der Saat (im Elsass, Hessen, Thüringen und im Gebiete der Fl. von Spa; Istrien.) Mai. Jun. Die Bthstiele lang, doch kürzer, als das B. Var.:

β. confinis, die Dörnchen zu Knötchen verkürzt, welche nicht länger, als breit sind: *M. confinis* Koch in Briefen an Freunde.

18. *M. DENTICULATA* (Willd.) Gezähnelter S. — Bthstiele reichblüthig, ohngefähr so lang, als das B.; Hülsen schneckenf., kahl, die Windungen zu 2 oder 3, am Rande abstehtend, auf der Oberfläche quer-grubig-aderig, der Rand stumpf, 2zeilig-dornen-

trag., Dornen auseinanderfahrend, pfriemlich, an der Spitze hakig, halb so lang, als der Dchmesser der Hülse, auf beiden Seiten eingedrückt; die NebenB. fiedersp.-gezähnt, Zähne borstlich; Blättchen verkehrteyf., die d. Zweige verkehrtherzf.; sämmtlich stumpf-gezähnt, nebst den Bthstielen und dem St. kahl. ☉ Unter der Saat. (Rheinfläche von Oberbaden bis nach den Niederlanden hin und wieder; Thüringen; Istrien.) Mai. Jun. Var:

β. *lappacea*, Früchtchen noch einmal so gross. *M. lappacea* DC. fl. fr. D.

19. *M. TEREPELLUM* (Willd.) Bohrerförmiger S. — Bthstiele 2-5 blüthig, kürzer, als das B.; Hülsen schneckenf., walzlich, kahl, die Windungen zu 5, abstehend, auf der Oberfläche schief-grubig-aderig, der Rand stumpf, 2 zeilig-dornentrag., Dornen kurz, sehr spreitzend, fast angedrückt, an der Basis beiderseits eingedrückt; die NebenB. fiedersp.-gezähnt, die Zähne borstlich; Blättchen verkehrteyf., gestutzt, die astst. verkehrtherzf. ☉ Auf Schutthaufen und an kultiv. O., (im Gebiete der Fl. von Spa dch spanische Wolle eingebracht.) Mai. Jun. *M. aculeata* Gärtn. *M. muricata* Lej. *M. conica* Schkhr. t. 212. 6. Var: D.

β. *catalonica*, Hülsen halb so gross; die Dornen mehr auseinanderfahrend, und mehr angedrückt: *M. catalonica* Schrank hort. monac.

γ. Die Oberfläche der Windungen netzig-aderig; aus diesem Netze zieht eine schiefe, dickere Ader in den hinteren Schenkel der Dornen. (Ausser der hier beschriebenen gehören hierher: *M. Echinus*, *M. ciliaris* und *M. granatensis*.)

20. *M. CARSTIENSIS* (Jacq. ic. rar. 1. t. 156.) Karster S. — Bthstiele mehrblüthig, ohngefähr so lang, als das B.; Hülsen schneckenf., eyf.-walzlich, kahl, die Windungen meist zu 5, am Rande abstehend, strahlig-aderig, in der Mitte netzig, der Rand seicht-rinnig, 2 zeilig-dornentrag., Dornen borstlich-pfrieml., auseinanderfahrend, gerade; die NebenB. spitz-gezähnt; Blättchen verkehrteyf., gestutzt. 4. An gebirgigen, rauhen, schattigen O., (in Krain; auf d. Karst; im Littor.; Untersteyermark, Kärnth.) Mai. Jun. D.

10. *TRIGONELLA* (L.) Hornklee. — K. 5 sp. oder 5 zählig. Kiel stumpf. Stbg. 2 brüderig. Stbf. nicht mit den Blb. verwachsen. Flügel gleichmässig convex, am oberen Rande ohne Eindruck. Fruchtkn. bis zum Gf. gerade. Gf. kahl. Hülse 1 fächerig, lineal. oder länglich-lineal., zsgedrückt, 6-vielsamig.

1. Rotte. *FOENUM GRAECUM* DC. prodr. 2. p. 182. Bth. einzeln oder gezweiet. Hülsen etwas sichelf. und abwärts gebogen.

1. T. *FOENUM GRAECUM* (L.) Gemeiner H. — Bth. einzeln oder gezweiet, fast sitzend; Hülsen lineal., etwas sichelf., längs-aderig-gestreift, dch den verlängerten Gf. geschnäbelt, kahl, meist 20eyig; Blättchen länglich-keilig, vorne gezähnt; der St. spärlich-ästig und nebst den Aesten aufrecht. ☉ Unter der Saat, (Mähren auf den schwarzen Feldern, R. et M.: bei Mühlheim im Oberbadischen unter dem Getreide nicht selten, dch Anbau verwildert; um Erfurt eben so, wird auch daselbst im Grossen kultiv.) Jun. Jul. Schk. t. 211. St. h. 15. Kultiv.

2. T. GLADIATA (Stev.) Säbelf. II. — *Bth. einzeln*, fast sitzend; *Hülsen* lineal., sichelf., längsaderig-gestreift, mit dem verlängerten Gf. geschnäbelt, *flaumig*, *meist 10 eyig*; Blättchen verkehrteyf., geschärft-kleingesägt; der St. aufrecht, an der Basis ästig, Aeste gestreckt. ☉. An sonnigen, steinigen O., (auf der Insel Veglia!) Jun. Jun. T. prostrata DC. T. Foenum graecum β. L. J.

II. Rotte. BUCERAS DC. l. c. Bth. traubig-doldig, Dolden sitzend oder gestielt. Hülsen lineal., gerade oder sichelf. und aufwärts gebogen.

3. T. MONSPELIACA (L.) Französischer II. — *Bth. 6 oder mehr, doldig-gehäuft und nebst den Dolden sitzend*, der gemeinschaftliche Bthstiel sehr kurz, stachelspitzig; Hülsen abwärts geneigt, lineal., gebogen, schief-aderig, flaumig; Blättchen rauten-verkehrteyf., spitz-gezähnt; die St. liegend. ☉. An sonnigen O., Wegen, (in Böhm. bei Leitmeriz! Oestr. zw. Himberg und Moosbrunn; bei Triest zweifelhaft; in Istrien! in dem mittleren Wallis bei Sitten und um Fouly.) Jun. Jul.

III. Rotte. FALCATULA DC. l. c. p. 184. Bth. traubig, die Tr. gestielt. Hülsen lineal. oder länglich-lineal., sichelf. und aufwärts gebogen.

4. T. CORNICULATA (L.) Gekrümmter II. — *Die Tr. gestielt*, Bthstiel länger, als das B., stachelspitzig; Hülsen abwärts geneigt, lineal., gebogen, quer-aderig, kahl; die unteren NebenB. gezähnt, Blättchen verkehrteyf., stachelspitzig-gezähnt; der St. aufrecht. ☉. An kultiv. O., Wegen, (um Fiume sehr gemein.) Bei, an dem Standorte gesammelten, kleinern Expl. erscheinen die NebenB. kaum gezähnt, bei grösseren aber sehr stark-gezähnt, fast fiedersp. Letztere ist vielleicht die Trigonella elatior Smith., sie ist aber nach meiner Meinung eine blosse Variet. J.

II. MELILOTUS (Tournef. Lam.) Honigklee. — K. 5 zählig. Kiel stumpf. Stbg. 2 brüderig. Stbf. nicht mit den Bbl. verwachsen. Flügel gleichmässig konvex, am oberen Rande ohne Eindruck. Der Fruchtkn. bis zum Gf. gerade. Der Gf. kahl. Hülse fast kugelig oder länglich, 1-4 samig.

I. Rotte. COELORYTIS. DC. prodr. Bth. hangend. Hülsen netzig-runzelig.

1. M. DENTATA (Pers. synops. 2. 348.) Gezählter H. — *Die Tr. gedrungen, zuletzt verlängert; Bthstielchen halb so lang, als der K., Flügel kürzer, als die Fahne, länger, als der Kiel; Hülsen eyf., spitzlich, netzig-runzelig, an der obern Nath zsgedrückt, kahl; die NebenB. aus verbreiteter, eingeschnitten-gezählter Basis pfriemlich; Blättchen länglich-lanzettl., stumpf, geschärft-ungleich-fast dörnig-gesägt.* ☉, im Garten wenigstens, und nicht mehrjährig. Auf Wiesen und an Wegen, (in Böhm., Schles., Mähr., Thüringen; auf der Rheinfläche bei Basel und zw. Mainz und Oppenheim.) Jul.-Septbr. Trifolium dentatum W. u. K. T. Mel. dentata St. h. 15. — Trifolium Kochianum Hayne, (nicht DC.) ist dieselbe Pflanze. Bth. klein.

2. M. MACRORRHIZA (Pers. Synops. 2. 348) Langwurzel. H. — *Die Tr. ziemlich locker, zuletzt verlängert; Bthstielchen halb so*

lang, als der K.; Flügel und Kiel so lang, als die Fahne; *Hülsen eyf., kurz zugespitzt, netzig-runzelig, an der oberen Nath zsgedrückt, flaumig; die NebenB. pfriemlich-borstlich, ganzrandig; Blättchen geschärft-gesägt, etwas gestutzt, die der untern B. verkehrteyf., die der oberen länglich-lineal.* ☉. Auf Wiesen, an Ufern und Gräben. Jul.-Septbr. *M. officinalis* Willd. en. h. berol., Koch Synops. ed. 1. *Trifolium Mel. officinalis* γ. L. Die reifen Hülsen schwarz. Bth. gelb. Var.:

α. genuina: B. geschärft-gesägt, Fahne braun-gestreift. *Trifolium macrorrhizum* W. und K. *T. altissimum* Lois. nach einem Expl. vom dem Autor selbst. *Trif. Mel. altissimum*. Gmel. *Melil. officinalis* und *macrorrhiza* DC. Eine 2 und nicht mehrjährige Pflanze.

β. palustris: B. schwach-gesägt, Fahne kaum gestreift. *Trif. palustre* W. und K.; geht dch Mittelformen in die Variet. *α.* über.

3. *M. ALBA* (Desrousseaux in Lamarck Dict. 4. 63.) Weisser H. — Die Tr. locker, zuletzt verlängert; Bthstielchen halb so lang, als der K.; *Flügel ohngefähr so lang, als der Kiel, kürzer, als die Fahne; Hülsen eyf., stumpf, stachelspitzig, netzig-runzelig, an der obern Nath stumpf-gekielt, kahl; die NebenB. pfriemlich-borstlich, ganzrandig; Blättchen gesägt, stumpf, die der untern B. verkehrteyf., die der oberen länglich-lanzettl.* ☉. An Wegen, unkultiv. O. Jul.-Septbr. Rbch fl. exc., D. fl. *M. vulgaris* Willd. en. h. b., Koch Synops. ed. 1. *M. leucantha* Koch in DC. fl. fr. *Trif. Mel. officinalis* β. L. St. h. 15. t. 2. f. k. *Trif. album* Lois. Bth. immer weiss, Hülsen zuletzt schwarzbraun, der St. aufrecht. — Ich bin mit Reichenbach vollkommen überzeugt, dass diese Art die wahre *M. alba* Desr. bei Lam. darstellt; übrigens halte ich die gleichnamige, in Sibirien einheimische Pfl. für nicht verschieden von der unsrigen. Aber, nachdem nun *M. alba* wieder in ihre alten Rechte eingesetzt worden, muss ein Gleiches auch mit *M. officinalis* Desr., von der jene unterschieden wurde, geschehen, und, wie ich meine, um so mehr und nothwendiger, da diese, und nicht Willdenow's gleichnamige Pfl., die ächte officinelle Art ist.

4. *M. OFFICINALIS* (Desrousseaux in Lam. dict. 4. p. 63.) Officiner H. — Die Tr. locker, verlängert; Bthstielchen kürzer, als der K.; *Flügel ohngefähr so lang, als die Fahne, länger, als der Kiel; Hülsen eyf., stumpf, stachelspitzig, quer-runzelig-faltig, etwas netzig, an der obern Nath stumpf-gekielt, kahl; die NebenB. pfriemlich-borstlich, ganzrandig; Blättchen gesägt, stumpf, die untern verkehrteyf., die obern lanzettl.* ☉. An Wegen, Ackerrändern, auch unter der Saat. Jul. Septb. *M. officinalis* Desf. fl. atlant., Loisel. Fl. gall., *Mel. Petitpierreana* Rbch fl. exc., Koch Synops. ed. 1., *M. diffusa* Koch in DC. fl. fr. ohne das von DC. beigefügte Synonym., *M. arvensis* Wallr. sched. *Trifolium Petitpierreanum* Hayne in Schrad. n. Journ., *T. Mel. officinalis* var. *α.* L. spec. nach den Synon. St. h. 15. Hülsen gelb-braun, St. aufstrebend, Aeste ausgebreitet. Bth. gelb. Var.:

β. mit weissen Bl. *M. Petitpierreana* Willd. en. h. berol.

5. *M. PARVIFLORA* (Desf.) Kleinblüthiger H. — Die *Tr. gedrun-*^X
genen, zuletzt verlängert; Bthstielchen halb so lang, als der K.; *Rm*
Flügel von der Länge des Kieles, kürzer, als die Fahne; *Hülsen*^{Ge}
fast kugelig, sehr stumpf, netzig-runzelig; die NebenB. an der
Basis schwach-gezähnt; Blättchen etwas gestutzt, vorne gezähnt,
die der unteren B. verkehrteyf., die der oberen länglich-keilig. ☉.
An kultiv. O., Wegen, (im Littor. bei Triest; bei Fiume.) Jun.
Jul. Trif. Mel. indica δ . L. Bth. gelb.

6. *M. GRACILIS* (De Cand. fl. fr. suppl. p. 563.) Schlanker H. —
Die *Tr. locker*; Bthstielchen halb so lang, als der K.; Flügel und
Schiffchen so lang, als die Fahne; *Hülsen kugelig, zugespitzt-ge-*
schnübelt, grubig-runzelig; NebenB. aus breiterer Basis pfrieml.;
Blättchen vorne gezähnt, längl.-verkehrteyf. ☉. An kultiv. O.
der Insel Sansego bei Istrien, Tommasini. Mai. Jun. Bth. gelb.

II. Rotte. *GYRORYTIS*. Bth. hangend. Hülsen genau bogig-runzelig.

7. *M. SULCATA* (Desf. fl. atlant. 2. p. 193.) Gerinnter H. —
Die *Tr. zuletzt verlängert, locker*; Bthstiele halb so lang, als der
K.; Fahne so lang, als das Schiffchen, länger, als die Flügel; *Hül-*
sen rundl., sehr stumpf, gleichlaufend-bogig-gerieft; die unteren
NebenB. an der Basis gezähnt; die Blättchen fast gestutzt,
geschärft-gezähnt, an den unteren B. verkehrteyf., an den oberen
länglich-keilig. ☉. An kultiv. O. (Triest selten, Tommas.) Jun.
Jul. *M. mauritanica* Willd. en. h. berol., *Trifolium Mel. indica* γ .
Linn. spec.

III Rotte. *GRAMMOCARPUS* Sering. Rotte I der Gattung *Trigonella* in DC. prodr.
Bth. aufrecht. Hülsen der Länge nach aderig-gestreift.

8. *M. CAERULEA* (Lam.) Blauer H. — Die blüthen- und frucht-
trag. *Tr. gedrunen, rundlich und oval*; Bth. aufrecht; Flügel län-
ger, als der Kiel, kürzer, als die Fahne; *Hülsen länglich-eyf., ge-*
schnübelt, längs-aderig-gestreift; die NebenB. eyf.-pfriemlich,
die der unteren B. an der Basis verbreitert; Blättchen länglich-
lantzettl., geschärft-gesägt. ☉. Auf Wiesen, (in Krain und zwar in
der Wochein.) Jun. Jul. Trif. Mel. caerulea L. St. h. 15. *Tri-*
gonella caerulea Sering. in DC. prodr. Bth. blau. D.

12. *TRIFOLIUM* (L.) Klee. — K. 5 sp. oder 5 zählig. Blkr.
verwelkend, bleibend. Kiel stumpf. Stbg. 2 brüderig, mit den
Blb. mehr oder weniger verwachsen; Stbf. oberwärts wenig ver-
breitert. Der Gf. kahl. Hülse eyf., 1-2 samig, seltner länglich,
3-4 samig, in den K. oder in die verwelkende Blkr. eingeschlos-
sen, schlauchartig, kaum aufspringend.

I. Rotte. *LAGOPUS*. Bth. sitzend, in eine rundliche oder längliche Aehre zge-
stellt. Der Schlund des K. innen mit einer erhöhten schwieligen und oft behaar-
ten Linie oder mit einem Ringe von Haaren besetzt, nach dem Verblühen meist
geschlossen. Fruchtkn. 2 eyig. Hülse von der Röhre des K. eingeschlossen, 1 sa-
mig, aus einer zarten häutigen Substanz bestehend, mit einem etwas dickhäutigen
Deckelchen versehen, aber meist unregelmässig, und nicht in die Quere aufsprin-
gend. Gf. an der Spitze hakig. Keine DeckB.

I. *T. PALLIDUM* (WK.) Blasser K. — *Aehren rundlich, einzeln,*^f
an der Basis behüllt; K. 10 nervig, flaumig, ein wenig länger,
als die halbe Blkr., Zähne fädlich, gewimpert, die des frucht-

trag. K. aufrecht, die 4 oberen anderthalbmal so lang, als ihre Röhre, Schlund dch einen schwieligen Ring zsgeschnürt; *die NebenB. eyf., abgebrochen-begrannt*; Blättchen eyf., etwas gestutzt, klein-gesägt, nebst den Bstielen und dem St. zottig. *Haare abstehend.* ☉. Auf Wiesen und an Wegen, (auf der Insel Osero, neue Anschüttung bei Triest, Tommas.) Mai. Jun. Bth. weiss oder rosenroth-angelogen. Zalnbasis des fruchttrag. K. bei dieser Art mehr verbreitert und 5nervig, bei T. pratense nur 3nervig.

2. T. PRATENSE (L.) Wiesen-K. — *Aehren kugelig, zuletzt eyf., meist gezeiet, an der Basis behüllt; K. 10nervig, flaumig, kürzer, als die Hälfte der Blkr., Zähne fädlich, gewimpert, die des fruchttrag. K. aufrecht*, die 4 oberen so lang, als ihre Röhre, Schlund dch einen schwieligen Ring zsgeschnürt; *die NebenB. eyf., abgebrochen-begrannt*, Blättchen oval, fast ganzrandig, flaumig. *Haare anliegend*; die St. aufstrebend. ☉. Auf Wiesen. Mai-Sept. St. h. 15. Bth. purpurn. Var. mit gestutzten, fast verkehrtherzf., WB. (dies ist T. heterophyllum Lej., wenn die B. 4 mal kleiner sind;) mit länglichen obern B., mit obern Zähnen des K., die ein wenig kürzer, als die Röhre sind, mit weissen Bth. Das T. sativum Rb., (d. Namen T. sativum finde ich in der deutschen Ausgabe von Miller's Gärtnerlex. nicht,) T. pratense sativum Schreb. und Hoppe in St. h. 15, T. pensylvanicum Willd. ist dch die Cultur auf fettem Boden grösser und ein wenig ästiger, der St. ist oft, aber nicht immer röhrig und die Köpfchen sind manchmal gestielt. Ausserdem fand ich nie den geringsten Unterschied zw. der angebauten und wildwachsenden Pfl.

β. *nivale*, niedriger, Köpfchen dicker, Bth. schmutzig-weiss od. gelblich-weiss, seltner in das Röthliche spielend. Auf den höchsten A. Dazu: T. pratense alpinum Hoppe bei St. h. 32. T. nivale Sieb. T. expansum β. Rb. Mit d. T. expansum, von dem ich noch kein deutsches Expl. sah, möchte ich diese Variet., die genau in den NebenB. und Blättchen mit T. pratense übereinstimmt, nicht vereinigen. Das T. expansum Kit. hat, nach einem Expl. v. dem Autor selbst, einen ästigeren St., längere, längliche, gleichbreite, und an ihrem freien Theile allmählig 3eckig-pfriemliche und dasebst krautige NebenB., nach allen Seiten hingebreitete, ästigere St., immer einzelne Aehren, Flügel so lang, als der Kiel (die bei T. pratense länger sind) und etwas abstehende Haare an dem St., den B. und NebenB. — Das T. microphyllum Desv., wenigstens was Lej. als solches an seinen Freund Hornung gesandt hat, gehöret zur gewöhnlichen Form des T. pratense und untersch. sich nur dch halb so grosse Blättchen.

3. T. MEDIUM (L.) Mittlere K. — *Aehren kugelig, einzeln, an der Basis nackt; K. 10nervig, kahl, kürzer, als die Hälfte der Blkr., Zähne fädlich, gewimpert, die des fruchttrag. K. aufrecht*, die oberen 4 ohngefähr so lang, als ihre Röhre, Schlund dch einen schwieligen Ring zsgeschnürt; der freie Theil der *NebenB. lanzettl., verschmälert-spitz*; Blättchen elliptisch, sehr feingezähnt; die St. ästig, aufstrebend. 4. Auf Gebirgswiesen, an grasreichen, bergigen O., in Wäldern. Jun. Jul. St. h. 15. T. flexuosum J. aust. t. 386. Bth. purpurn.

4. *T. ALPESTRE* (L.) Wald-K. — *Aehren kugelig, gezei-*
an der Basis behüllt; K. 20 nervig, zottig, Zähne fädlich, ge-
wimpert, die des fruchttrag. K. aufrecht, die 4 oberen ohngefähr
so lang, als ihre Röhre oder kürzer, der unterste die Basis der
Flügel erreichend, Schlund dch einen schwieligen Ring zsgeschnürt;
der freie Theil der NebenB. lanzettl.-pfriemlich; Blättchen läng-
lich-lanzettl., sehr fein-gezähnt; die St. aufrecht, ganz einfach,
flaumig. 4. An gebirgigen, felsigen, buschigen O., bis in d. VorA.
hinaufsteigend. Jun.-Aug. St. h. 15. J. a. t. 386. Bth. purpurn.

5. *T. RUBENS* (L.) Röthlicher K. — *Aehren länglich-walzlich,*
meist gezei, an der Basis oft behüllt; K. 20 nervig, kahl, Zähne
pfriemlich, gewimpert, die 4 oberen 2 oder 3 mal kürzer, als
ihre Röhre, der unterste die Basis der Flügel erreichend, Schlund
dch einen schwieligen Ring zsgeschnürt; der freie Theil der Ne-
benB. lanzettl., zugespitzt, entfernt-kleingesägt und nebst dem
aufrechten St. ganz kahl. 4. An gebirgigen, felsigen, waldigen O.,
(dch das ganze Gebiet stellenweise.) Jun. Jul. Die Pflanze meist
ganz kahl, Aehre sehr rauhh. Var. seltner: NebenB., Bstiele und
d. Mittelnerve d. jüngeren B. gewimpert. St. h. 15. Bth. purpurn.

6. *T. NORICUM* (Wulf. bei Röm.) Norischer K. — *Aehre ku-*
gelig, einzeln, nickend, an der Basis behüllt; K. 10 nervig, rauhh.,
kürzer, als die Hälfte der Blkr., Zähne fast gleich, lineal-
pfriemlich, ohngefähr so lang, als ihre Röhre, Schlund dch ein-
en schwieligen Ring zsgeschnürt; der freie Theil der NebenB.
3eckig-eyf., zugespitzt, kürzer, als der angewachsene Theil; die
NebenB. nebst den Bstielen, B. und dem einfachen, aufrechten St.
zottig, Haare absteht; Blättchen länglich-lanzettl., ganzrandig.
4. Auf den höchsten A., (Kärnthen, Steyerm., Krain, auf d. Fendo
in Südtirol; für die Schw. zweifelhaft.) Jul. St. h. 16. Bth. weiss.

7. *T. PANNONICUM* (Jacq. observ. 2. p. 21. t. 42.) Pannonischer
 K. — *Aehre länglich-oval, einzeln, gestielt, an der Basis nackt;*
K. 10 nervig, zottig; Zähne lanzettf.-pfrieml., so lang, als die
KRöhre, der untere noch einmal so lang, $\frac{1}{3}$ der Flügel erreichend,
an dem fruchttragenden K. aufrecht, Schlund dch einen schwie-
ligen Ring zsgeschnürt; der freie Theil der NebenB. lanzettl.-
pfriemlich, in der Mitte des St. so lang, als die Bstiele; Blätt-
chen längl.-lanzettl., ganzrandig, behaart, stumpf, an den untern
B. ausgerandet; St. steif-aufrecht, nebst den NebenB. und Bstielen
rauhh. 4. Auf Wiesen, (Unterkrain, auf dem Gerjanzberg in den
Uskokan, an der Grenze von Croatien, Freyer.) Jul. Aug. L. mant.
St. h. 15. Bth. weiss.

8. *T. OCHROLEUCUM* (Lin. Syst. natur 3. 233.) Gelbblichweisser
 K. — *Aehre kugelig, zuletzt oval, oft behüllt; K. 10 nervig, von*
abstehenden Haaren rauhh., Zähne lanzettl.-pfrieml., 3 nervig,
der untere so lang, als die KRöhre, die 4 oberen halb so lang,
der FruchtK. länglich, die Zähne hervorgestreckt, der untere
hinabgebogen, Schlund durch einen schwieligen Ring zsgeschnürt;
Blkr. noch einmal so lang, als der K.; der freie Theil der Ne-
benB. lanzettl.-pfriemlich, zugespitzt; Blättchen elliptisch-längl.,

ganzrandig, behaart, an den unteren B. ausgerandet; St. aus einer aufstrebenden Basis aufrecht, rauhh., oberwärts fast blattlos. 2. Auf trocknen Wiesen und WaldO., (fast dch das ganze Gebiet, wiewohl nicht überall.) Jun. Jul. St. h. 15. Bth. gelblichweiss.

9. *T. ALEXANDRINUM* (L. spec. 1085.) Alexandrinischer K. — *Aehren zuletzt längl.-oval, gestielt, oft behüllt; K. 10nervig, von weichen, aufrechten Haaren flaumig, die Zähne lanzettl.-pfrieml., Fruchtk. glockig, häutig, die Zähne hervorgestreckt, etwas sichelf., der untere nach oben aufstrebend, etwas länger, der Schlund mit einem vorspringenden behaarten Ring versehen; Fahne noch einmal so lang, als das Schiffchen; der freie Theil der NebenB. lanzettl.-pfriemlich; Blättchen längl.-lanzettl., schwach gezähnel; der St. aufrecht, ästig. ☉. Auf Wiesen und thonigen Aeckern, (zw. dem Hügel Pantaleone und Zaule unweit Triest, Tommas.) Jun. Jul. Blkr. weiss. Verschieden von dem folgenden dch die verlängerte Fahne, den eyf.-glockigen K., den zw. den Riefen häutigen Fruchtk., den schwieligen Ring des Schlundes, welcher weit schwächer und mit langen Flaumhaaren besetzt ist, und dch die aufgerichteten, fast sichelf., weichen, nicht stechenden Zähne des Fruchtk.*

10. *T. MARITIMUM* (Huds. fl. angl. ed. 1. p. 284.) Meer-K. — *Aehren zuletzt oval, an der Basis nackt; K. 10nervig; Röhre des Fruchtk. kahl, verkehrtkegelf., unter den Zähnen schwielig-aufgetrieben, Zähne lanzettl., schwach-3nervig, behaart, halb-abstehend, der untere etwas länger, hinabgebogen, an den untersten Bthen verlängert, Schlund von einem schwieligen kurz-flaumigen Ringe verengert; Fahne anderthalbmal so lang, als das Schiffchen; der freie Theil der NebenB. lanzettl.-pfrieml.; Blättchen längl. oder lanzettl.-keilig, fast ganzrandig; St. ästig. ☉. Feuchte Wiesen am Meere, (bei Rovigno in Istrien, Tommas.) Jun. Jul. Smith. fl. brit. T. irregulare Pourr. act. toul. nach DC. T. rigidum Savi fl. pis. Blkr. weiss oder blass-röthlich. — Das sehr ähnliche *T. squarrosum* Savi bot. etrusc., nach einem vom Autor selbst bestimmten und im Herbarium von Zuccarini befindlichen Expl., unterscheidet sich dch folgende Merkmale: Köpfchen und Bthen grösser, Blättchen breiter, Fruchtk. krugig-eyf., nämlich mit nach oben etwas verengertem Halse, oberwärts bärtig-rauhh. von abstehenden auf Knötchen sitzenden Haaren, die Zähne breiter-zugespitzt, abstehend, der untere noch einmal so lang, breit-lanzettl., lang-zugespitzt, niedergebogen. Von dieser Pfl. Savi's ist wieder verschieden *T. squarrosum* M. B. nach authentischen Expl. durch die hervorstechende Behaarung der ganzen Pfl. und die lineal.-pfrieml. KZähne, deren unterster zwar noch einmal so lang, wie die übrigen, aber schmal und pfriemlich ist. Dies scheint die gleichnamige Art bei Linne zu sein und stimmt weit mehr mit Morison's Abbildung als jene. — Von diesen allen zeichnet sich *T. albidum* Retz. sehr leicht aus dch seinen 20nervigen K.*

11. *S. STELLATUM* (L.) Stern-K. — *Aehren kugelig, zuletzt eyf., einzeln, an der Basis nackt; K. 10streifig, borstig-rauhh.,*

der fruchttrog mit einem schwieligen Ring und filzigen Haaren geschlossen, *Zähne aus einer eyf. Basis verschmälert, sehr spitz, gleich, länger, als die Blkr., die des fruchttrog. K. sternf.-abstehend, 3nervig, netzig-aderig*; die NebenB. häutig, eyf., spitzlich, gezähnel; *Blättchen verkehrtherzf.*, vorne gezähnel und nebst dem St. zottig; die St. aufstrebend. ☉. Auf trocknen Wiesen und Brachäckern, (im Littor. bei Duino und in der Gegend des Isonzo; Istrien, auf Osero.) Jun Jul. St. h. 16. Bth. weisslich-fleischroth. D.

12. *T. INCARNATUM* (L.) Fleischrother K. — *Aehren eyf., zuletzt walzlich, einzeln, an der Basis nackt*; K. 10 nervig, rauhh., *Zähne fast gleich, lanzettl.-pfriemlich, sehr spitz, ein wenig länger, als ihre Röhre, kürzer, als die Blkr., die des fruchttrog. K. abstehend, meist 3nervig*, Schlund offen, am Rande behaart; der freie Theil der NebenB. eyf., stumpf oder spitzlich, gezähnel; *Blättchen verkehrteyf.*, gestutzt und nebst den St. zottig; der St. aufrecht. ☉. Auf Wiesen und an Wegen, (im Littor. bei Triest, Duino und andern O.; in der südl. Schw.) Jun. Jul. St. h. 16. Bth. satt-purpurroth, seltner fleischroth oder weiss; letzterer ist *T. Molinieri* Balbis nach Hornem. Der Schlund des K. ist schwachhaarig.

13. *T. ANGUSTIFOLIUM* (L.) Schmalblättriger K. — *Aehren walzlich, zuletzt verlängert, einzeln, an der Basis nackt*; K. 10 streifig, borstig-rauhh., der fruchttrog. dch einen schwieligen Ring geschlossen, *Zähne pfriemlich, sehr spitz, der unterste länger, als die Blkr., die übrigen ein wenig kürzer, die des fruchttrog. K. abstehend, nervig*; der freie Theil der NebenB. lanzettl.-pfriemlich; *Blättchen lineal. und nebst dem St. zottig*; der St. aufrecht. ☉. An kräuterreichen, sonnigen O., (im Littor. bei Triest; Görz; Istrien, Fiume) Jun. Jul. St. h. 16.

14. *T. LAPPACEUM* (L.) Kletten - K. — *Aehren kugelig, einzeln, an der Basis nackt*; K. 20 nervig, kahl, *Zähne so lang, als die Blkr. oder ein wenig kürzer, borstig-haarig, endlich an der Basis 3eckig-verbreitert, netzig-aderig*, der unterste ein wenig länger, Schlund des fruchttrog. K. mit einem Ringe zsneigender Haare geschlossen; der freie Theil der NebenB. eyf., lanzettl.-pfriemlich-zugespitzt und an der Spitze nebst den B. haarig; *Blättchen verkehrteyf.*, schwach-gezähnel; der St. ästig, ausgebreitet. ☉. An sonnigen, buschigen O. und Wegen, (bei Fiume und auf der Insel Osero, Istrien.) J.

15. *T. CHERLERI* (L.) Cherler's K. — *Aehren kugelig, einzeln, an der Basis behüllt*; K. 20 nervig, rauhh., *Zähne fast gleich, fädlich, sehr rauhh., so lang, als die Blkr. und länger*, die des fruchttrog. K. aufrecht, Schlund von dichten Haaren geschlossen; der freie Theil der NebenB. eyf., zugespitzt, nebst den B. und St. zottig; *Blättchen verkehrtherzf.*, vorne schwach-kleingesägt; die St. aufstrebend. ☉. Auf trocknen Hügeln und an Wegen, (auf der Insel Osero, wärmeres Istrien.) Mai. Jun. Moris s. 2. t. 13. f. 11. J.

16. *T. ARVENSE* (L.) Acker-K. — *Aehren einzeln, sehr zottig, zuletzt walzlich, an der Basis nackt*; K. 10 nervig, *Zähne*

pfriemlich-borstlich, länger, als die Blkr., etwas abstehend, nervenlos, Schlund schwach-haarig, mit der verwelkenden Blkr. geschlossen; d. freie Theil der oberen NebenB. eyf., zugespitzt, der untern pfrieml.; der St. ästig, ausgebreitet u. nebst den B. zottig; Blättchen lineal.-länglich, schwach-gezähnel. ☉. Auf Aeckern u. Brachäckern. Jul.-Septbr. St. h. 16. Var.:

β. *strictius*: St. schlanker, weniger hin- u. hergebogen, Aeste in spitzeren Winkeln abgehend, die unteren Neben-B. schmaler, ihr freier Theil länger u. der K. um $\frac{1}{3}$ länger. T. Britteri Weißenweber. T. *gracile* fl. germ. exsicc., nicht Thuill.

17. T. BOCCONI (Savi botanicon etrusc. 4. p. 21.) Boccon's-K. — *Aehren eyf., zuletzt längl.-walzenf., end- u. seitenst., an der Basis behüllt; K. flaumig, Zähne lanzettl.-pfrieml., stachelspitzig, an die Bl. angedrückt, gerade*, Röhre des fruchttrag. nicht bauchig, Schlund von den vertrockneten Bl. u. einem Haaringe geschlossen; der freie Theil der NebenB. lanzettl.-pfrieml., allmählig verschmälert; Blättchen vorne gezähnel, längl.-keilförmig, an den untersten B. verkehrtherzf., die Aederchen derselben gleichdick, gegen den Rand hin ziemlich gerade. ☉. Im Gebüsch, (auf d. Insel Brioni, Tommas.) Jun. Jul. Boccon. mus. t. 101. Bth. rosenroth.

18. T. STRIATUM (L.) Gestreifter K. — *Aehren eyf., zuletzt fast walzlich, an der Basis behüllt, endst. u. an der Spitze von kurzen Aestchen seitenst.; K. rauh., Zähne lanzettl.-pfriemlich, stachelspitzig, abstehend, gerade, Röhre des fruchttrag. bauchig-angeschwollen*, Schlund dch. einen knorpeligen Ring zsgeschnürt; der freie Theil der NebenB. eyf., haarspitzig; Blättchen vorne kleingesägt, an den unteren B. verkehrteyf. od. verkehrtherzf., an den oberen längl.-keilig, Aederchen gleichdick, am Rande ziemlich gerade. ☉. An grasreichen u. unkultiv. sonnig. O., (sehr zerstreut dch. d. g. Gebiet: in Mecklenbg, Hannover, Unterharz, Thüringen, Böhmen, Sachsen, Westphalen, Hessen, im Rheingebiete, in Krain u. d. südl. Schwz.) Jun. Jul. Var.:

α. Zähne des K. kürzer, als die Blkr. T. striatum St. h. 16.

β. Zähne des K. länger, als die Blkr. T. scabrum Schreb. bei St. h. 16., nach kultiv. Expl. abgebildet, welche noch in Schreber's Herbarium aufbewahrt werden. — T. tenuiflorum Tenor., v. d. Autor selbst in v. Fröhlich's Herbarium, gehört nicht zu dieser, sondern zu der vorhergehenden Variet. α.

× 19. T. SCABRUM (L.) Rauher K. — *Aehren eyf., seitenst- u. endst., einzeln, an der Basis behüllt; K. länger, als die Blkr., flaumig, der fruchttrag. walzlich, Zähne lanzettl., starr, zuletzt bogig-abstehend, 1nervig, Nerve verdickt*, Schlund zsgeschnürt; der freie Theil der NebenB. eyf., haarspitzig; Blättchen länglich-keilig u. verkehrt-eyf., klein-gesägt, Aederchen an dem Rande verdickt, bogig. ☉. An grasreichen, trocknen O., (sehr zerstreut: Cernay im Elsass, Oberbaden, um Halle, Görz, Triest, Fiume, in Istrien, häufiger in der südwestl. Schwz bei St. Tryphon, Nyon, Aelen u. a. O.) Mai. Jun. Barrel. f. 870.

20. T. SAXATILE (Allioni.) Felsen-K. — *Aehren rundlich, einzeln, end- u. seitenst., an der Basis behüllt; K. 10nervig,*

sehr rauhh., der fruchttrag. eyf., Schlund v. Haaren geschlossen, Zähne aufrecht, pfriemlich, ohngefähr so lang, als die Blkr.; der freie Theil der NebenB. eyf., zugespitzt; *Blättchen fast aderlos, tief-ausgerandet, vorne stumpf-gezähnelte*, die der untern B. verkehrteyf., die der oberen länglich-keilig. 4. Aufkiesigen O. neben d. Gleischern der höchsten A., (in Wallis auf d. Matterhorn, auf d. Stock im Nikolaithele, auf dem Splügen.) Jul. Aug. S.

II. Rotte. TRICHOCEPHALUM. Fruchtbare Bth. in dem Köpfchen wenige, fast sitzend, nach dem Verblühen zurückgebogen; K. am Schlunde inwendig kahl u. offen; die unfruchtbaren Bth. später heranwachsend, kugelig-zsgehäuft, die fruchttragenden, nicht aufgeblasenen K. bedeckend. Hülse lsamig, schieffeyförmig. Gf. an der Spitze backig. Keine DeckB.

21. T. SUBTERRANEUM (L.) Unterirdischer K. — Die fruchtbaren Bth. 2-5, doldig, aufrecht, nach dem Verblühen zurückgebogen; K. kahl, Zähne fädlich, kürzer, als die Blkr., fast gleich, rauhh.; *die unfruchtbaren Bth. später, zuletzt ein kugeliges Köpfchen bildend, die fruchtbaren bedeckend*; die NebenB. eyf., zugespitzt; der St. gestreckt, ansäuerartig u. nebst den B. rauhh., Blättchen verkehrtherzf. ○. An grasreichen O., (Istrien; Insel Osero.) Apr. Mai. Bth. weiss, Fahne rosenroth. J.

III. Rotte. FRAGIFERA. Bth. in einem Köpfchen od. einer rundlichen Aehre sitzend. Schlund des K. inwendig kahl u. offen; Rücken des K. mit den 2 oberen Zähnen nach dem Verblühen sehr vergrößert, aufgeblasen, häutig, mit einem Adernetze geziert. Hülse fast rund. Gf. a. d. Spitze aufrecht.

22. T. FRAGIFERUM (L.) Erdbeer-K. — Die Köpfchen zuletzt kugelig; Bthstiele blattwinkelst., länger als das B.; *Hülle vielth., so lang, als der K.; die fruchttrag. K. auf dem Rücken kugelig-aufgeblasen*, netzig, haarig, die 2 obern Zähne gerade hervorgestreckt; der St. kriechend. 4. Auf etwas feuchten Triften, (stellenweise dch das g. Gebiet.) Jun. - Herbst. St. h. 16. Bth. fleischroth.

23. T. RESUPINATUM (L.) Verkehrtblumiger K. — Die Köpfchen zuletzt kugelig; Bthstiele blattwinkelst., so lang, als das B. od. ein wenig länger; Hülle 10-12 lappig, sehr kurz, v. d. Länge der Bthstielchen; *die fruchttrag. K. auf dem Rücken kugelig-aufgeblasen, netzig, haarig, die 2 obern Zähne gerade hervorgestreckt*; der St. liegend od. aufstrebend. ○. An grasreichen O. des Seestrandes, (Istrien, Osero.) Jun. Jul. St. h. 16. Bth. rosenroth, umgekehrt. J.

24. T. TOMENTOSUM (L.) Filziger K. — Die Köpfchen zuletzt kugelig; Bthstiele blattwinkelst., kürzer, als das B.; Hülle 10-12 lappig, sehr kurz, v. d. Länge der Bthstielchen; *die fruchttrag. K. auf dem Rücken kugelig-aufgeblasen, netzig, filzig-haarig, die 2 oberen Zähne kurz, fast ganz mit Filz verdeckt*; der St. gestreckt. ○. An grasreichen O., (Istrien.) Mai. Jun. J.

IV. Rotte. VESICASTRUM DC. prodr. 2. 202. Bth. in rundlichen oder ovalen Aehren, sitzend. Der Schlund des K. inwendig nackt; die Röhre nach dem Verblühen gleichf. mehr od. weniger aufgeblasen, zwischen den 2 oberen Zähnen gespalten; Zähne gleich. Blkr. bleibend, gleich anfangs sowie d. K. trockenhäutig u. vielrißig.

25. *T. MULTISTRIATUM* (Koch.) Vielstriefiger K. — Aehre oval, an der Basis nackt; *K. 24nervig, deckblütterig, kahl*; Fruchtk. eyf., etwas aufgeblasen, Zähne aus einer 3 eckigen Basis borstl., von der halben Länge der Blkrone, Schlund nackt; *DeckB. eyf., so lang als die KRöhre*; Blb. zugespitzt, vielnervig, schon zur Bthezeit trockenhäutig; der freie Theil der NebenB. lanzettl.-pfriemlich; Blättchen verkehrteyf. od. längl., geschärft-gesägt, aderrig-gerieft, die Adern etwas verdickt. ☉. Nahe am Meere, (auf der neuen Anschüttung bei Triest, wahrscheinlich durch eingebrachten S. angesiedelt. Tommas) Aug. Bth. weiss, nach dem Verblühen bräunlich. Aehnlich dem *T. vesiculosum* Savi, unterscheidet sich aber hinreichend dch die kleineren Köpfchen, die weissen Bl., die eyf., dichtgerieften und zwischen den einander sehr genäherten Riefen kaum netzigen Fruchtk.; bei jenem ist der Fruchtk. kugelig-aufgeblasen und zw. den entfernter stehenden Riefen von Querriefen ganz deutlich netzig.

V. Rotte. *LUPINASTER* DC. prod. 2. p. 207. Bth. in einem Köpfchen, länger oder kürzer gestielt. Schlund des K. inwendig nackt, nämlich kahl und offen und nicht mit einem erhöhten und nicht mit einem flaumhaarigen Ringe zsgeschnürt; der unterste KZahn merklich länger, als die übrigen. Blkr. nach der Blüthezeit rauschend, Fahne zsgefaltet; der Fruchtkn. im K. gestielt. Hülse längl., an der oberen Nath aufspringend. Gf. nicht hackig. Bth. mit kleinen DeckB. gestützt.

26. *T. ALPINUM* (Alpen-K. — Stengellos; *Bthstiele wurzelst.; Bth. gestielt, locker-doldig*, nach dem Verblühen abwärtsgebogen; K. kürzer, als die Blkr., kahl, im Schlunde nackt. Zähne lanzettl.-pfriemlich, der unterste länger; der freie Theil der NebenB. lanzettl., pfriemlich-zugespitzt, nebst den B. und Bthstielen kahl; *Blättchen lineal-lanzettl.*, schwach-kleingesägt. 4. Auf den höheren A., (südl. Tyrols und der Schw.) Jun.-Aug. Bth. sehr gross, ansehnlich, purpurn, selten weiss. St. h. 15.

VI. Rotte. *TRIFOLIASTRUM* DC. prodr. 2. 198. Bth. in Köpfchen oder runden Aehren, länger oder kürzer gestielt. Schlund des K. inwendig nackt, Zähne gleich, oder die 2 oberen länger. Röhre nicht aufgeblasen. Blkr. nach der Bthzeit bleibend, rauschend. Fahne zsgefaltet. Hülse 2-4samig. Gf. nicht hackig. Bth. dreh kleine DeckB. gestützt.

27. *T. MONTANUM* (L.) Berg-K. — Aehren rundlich, zuletzt oval, an der Basis nackt; *Bthstielchen sehr kurz, 2 oder 3 mal kürzer, als die Röhre des K.*, nach dem Verblühen herabgebogen; K. halb so lang, als die Blkr., etwas zottig, im Schlunde nackt, Zähne fast gleich, lanzettl.-pfriemlich, gerade; der freie Theil der NebenB. eyf., zugespitzt; *Blättchen elliptisch, geschärft-kleingesägt*, unterseits nebst dem St. haarig, *am Rande dicht äderig, Aederchen verdickt*; die *St. aufrecht oder aufstrebend*. 4. An Wiesen, vorzüglich der Berge. Mai-Jul. St. h. 15. Bth. weiss.

28. *T. GLOMERATUM* (L. spec. 1084.) Geknäuelter K. — Kahl, Aehren endst. und seitenst., sitzend, die fruchttragenden kugelig; Bthstielchen sehr kurz, kürzer, als das sehr kurze DeckB.; K. kahl, im Schlunde nackt, *Zähne gleichf., eyf., zugespitzt, an der Basis herzf.*, sehr abstehend, etwas zurückgekrümmt; NebenB. trockenhäutig, deren freier Theil eyf., lang zugespitzt; Blättchen

verkehrteyf., geschärft-gezähnel; St. ausgebreitet. ☉. An unkultiv. O. und Wegen. (Istrien, auf der Insel Brioni, Tommas.) Jun. Jul. Engl. bot. t. 1063.

29. *T. PARVIFLORUM* (Ehrh.) Kleinblumiger K. — Aehren rundlich; *Bthstielchen sehr kurz, viel kürzer, als die Röhre des K., nach dem Verblühen herabgebogen*; K. ein wenig länger, als die Blkr., etwas haarig, im Schlunde nackt, der fruchtrag. auf der unteren Seite bis an die Basis gespalten, Zähne des K. lanzettl., aufwärtsgebogen, die 2 oberen länger; der freie Theil der NebenB. rauschend, eyf., haarspitzig; Blättchen verkehrteyf., geschärft-gesägt, Adern etwas verdickt; die St. ausgebreitet. ☉. Auf Hügeln und an sonnigen O., in D. sehr selten, (bisher blos in der Flora von Halle, bei Kröllwitz, im Hohlwege rechts vom Niederher Gottesacker.) Jun. Bth. weisslich. *T. strictum* Schreb. bei St. h. 15., *T. strictum* L. nach der Beschreibung; das Syn. aus Micheli aber gehört zu *T. strictum* W. und K., welcher sich dch sehr breite, stachelspitzig-gezähnelte NebenB. und andere Merkmale unterscheidet. D.

30. *T. SUFFOCATUM* (L.) Sand-K. — Aehren blattwinkelst., sitzend, genähert, rundlich und nebst dem St. an die Erde angedrückt; *Bth. sitzend, aufrecht*; der Kelch noch einmal so lang, als die Blkr., kahl, im Schlunde nackt, d. fruchtrag. eyf., Zähne lanzettl., sichelf., abwärts gekrümmt, die 2 oberen länger; die NebenB. eyf., haarspitzig, die Aehre umhüllend; Blättchen verkehrtherzf., vorne geschärft-kleingesägt; die St. gestreckt, sehr kurz. ☉. An sonnigen O., (im südl. Istrien.) Apr. Mai. J. h. vind. l. t. 60. J.

31. *T. REPENS* (L.) Kriechender K. — Köpfchen rundlich; *Bthstiele blattwinkelst., länger, als das B.; Bthstielchen nach dem Verblühen herabgebogen*, die innern so lang, als die Röhre des K.; K. kahl, im Schlunde nackt, halb so lang, als die Blkr., Zähne lanzettl., die 2 oberen länger; Rand der Hülsen gleich; *die St. gestreckt, wurzelnd*; die NebenB. rauschend, abgebrochen - haarspitzig; Blättchen verkehrteyf., klein-gesägt. 2. Auf Wiesen, Triften, an kultiv. O. Mai-Herbst. St. h. 15. Bth. weiss, die jüngeren oft in das Fleischrothe spielend. Variet. mit flaumigen Bthstielen.

Trifolium prostratum Biasoletto, *T. Biasolettianum*, Steud. und Hochstett., ist klein, die Köpfchen sind kleiner, u. die Flügel der Bth., im Vergleich zum Nagel, ein wenig kürzer, aber ausser diesen Merkmalen, suchte ich andere zur Trennung als Art vergeblich. Die Hülsen sah ich noch nicht.

32. *T. PALLESCENS* (Schreb. bei St. h. 15.) Verbleichender K. — Köpfchen rundlich; *Bthstiele blattwinkelst., länger, als das B.; Bthstielchen nach dem Verblühen herabgebogen, die inneren so lang, als die Röhre des K.*; K. kahl, im Schlunde nackt, 3 mal kürzer als die Blkr., Zähne ey-lanzettf., die 2 oberen länger; *die St. rasig, liegend, aufstrebend*; der freie Theil der NebenB. ey-lanzettf., allmählig-gespitzt; Blättchen verkehrteyf., kleingesägt und nebst dem St. kahl. 2. Auf den Triften der höchsten A., (Krain, Kärnthen, Salzburg, Tyrol.) Jul.-Sept. Bth. gelblich-weise, (*Trif. cespitosum* St. h. 32., nicht Reyn.) *T. glareosum* Schleich.

Das *T. pallescens* unterscheidet sich von *T. repens* dch folgds: die St. nicht wurzelnd, die oberen NebenB. nicht abgebrochen-haarspitzig, und die Blkr. 3 mal so lang, als der K. D.

33. *T. CAESPITOSUM* (Reynier in Höpfner's Mag.) Rasigstengeliger K. — Köpfchen rundlich; Bthstiele blattwinkelst., länger, als das B.; *Bthstielchen viel kürzer, als der K, so lang, als die Deckblättchen, nach dem Verblühen nicht herabgebogen*; K. kahl, im Schlunde nackt, länger, als die halbe Blkr., Zähne lanzettl., zugespitzt, die 2 oberen ein wenig länger; *die St. rasig, aufstrebend*; die NebenB. ey-lanzettf., zugespitzt; Blättchen verkehrteyf., kleingesägt und nebst dem St. kahl. 4. Auf Triften und an kiesigen O. der A. und VorA., (Tyrol, im Bockbache d. Lechthales bei Füssen; in d. Schw. gemein.) Jul. Aug. Die fruchttrag. Köpfchen erscheinen wegen der schwellenden K. kugelig, wodurch sich die untern Bth. abwärts richten, aber die oberen Bth. krümmen sich keineswegs zurück.

34. *T. NIGRESCENS* (Viviani.) Schwärzlicher K. — Köpfchen rundlich; Bthstiele blattwinkelst., länger, als das B.; Bthstielchen nach dem Verblühen herabgebogen, die inneren so lang, als die Röhre des K.; K. kahl, im Schlunde nackt, halb so lang, als die Blkr., Zähne ey-lanzettf., die 2 oberen länger; *Hülsen am untern Rande deutlich-gekerbt*; die St. aufstrebend; die oberen NebenB. etwas gestutzt, abgebrochen-haarspitzig; Blättchen verkehrteyf., von der Mitte bis zur Basis ganzrandig, vorne kleingesägt. ☉. Auf Wiesen, an Wegen, (in Istrien, Müller, Biasoletto.) Mai-Jun. *T. hybridum* Savi. DC. (nicht L.) *T. polyanthemum* Tenore nach DC. Michel gen. t. 25. f. 6. Wird dch den untern, zwisch. den S. deutlich szgezogenen und dadurch gekerbten Rand der Hülsen leicht unterschieden. Bth. weiss. J.

35. *T. HYBRIDUM* (L. mit Ausschluss der meisten Syn.) Bastard-K. — Köpfchen rundlich, gedrungen; Bthstiele blattwinkelst., zuletzt noch 1 mal so lang, als das B.; *Bthstielchen nach dem Verblühen herabgebogen, die inneren 2 oder 3 mal so lang, als die Röhre des K.*; K. kahl, im Schlunde nackt, halb so lang, als die Blkr., Zähne pfriemlich, die 2 oberen länger; *die St. aufrecht oder aufstrebend, ganz kahl, rüdrig, weich*; die NebenB. eyf., in eine sehr feine Spitze verschmälert; *Blättchen rautenf.-elliptisch*, stumpf, klein-gesägt, *am Rande ungefähr 20 Adern*. 4. Auf fruchtbaren, feuchten Wiesen, Mai-Herbst. Pollich palat., St. h. 15., Roth. tent. fl. germ., sowie aller deutschen und schwedischen Autoren; *T. hybridum* var. *α*. L. spec., *T. Michelianum* Gaud. helv. (nicht DC.) *T. elegans* Rehb. fl. germ. exsicc., Mich. gen. t. 25. f. 5. Der St. weich und leicht szzudrücken. Die unteren Blättchen verkehrteyf. Bthen anfangs weiss, dann rosenfarb. und schnell hinabgebogen; wenn das Köpfchen die Bthen bis zu seiner Mitte geöffnet hat, so ist dasselbe oberwärts weiss, unterwärts rosenroth und gewinnt dadurch ein äusserst zierliches Ansehen. Diese Pflanze ist das eigentliche *T. hybridum* Lin. fl. suec., wie sich das aus der Beschreibung, aus dem Zeichen 4, und nach Exemplaren,

welche bei Upsala gesammelt und mir von Wahlenb. mitgetheilt wurden, ergiebt. *T. hybridum* Savi wächst weder in D. diesseits der A., noch in Schweden.

36. *T. ELEGANS* (Savi.) Zierlicher K. — Köpfchen rundlich, gedrunken; Bthstiele blattwinkelst., 2mal so lang, als das B.; *Bthstielen nach dem Verblühen herabgebogen, die inneren 3mal so lang, als die Röhre des K.*; K. kahl, im Schlunde nackt, halb so lang, als die Blkr., Zähne pfriemlich, die 2 oberen länger; *die St. in einem Kreise niedergestreckt, an der Spitze aufstrebend, oberwärts flaumig, nicht hohl, hart*; die NebenB. ey-lanzettl., in eine sehr feine Spitze verschmälert; *Blättchen verkehrteyf.*, geschärft-doppelt-kleingesägt, mit *ungefähr 40 Adern* am Rande. 4. Auf Hügeln, in Kalkgebirgen zw. Gebüsch und an Waldrändern, (bei Zweibrücken in der Rheinpfalz, bei Triest; ein Expl. aus U. Oestreich habe ich noch nicht gesehen). Jun. Jul. Schultz fl. gall. et germ. exsicc., Vaill. par. t. 22. f. 1. nach einem Expl. aus der Gegend von Paris, welches mir Gay mitgetheilt hat. Diese Art ist die eigentliche Pfl. von Savi, wovon ich mich nun dch ein vom Autor selbst bestimmtes, in der Sammlung von meinem Freunde Zuccarini aufbewahrtes Expl. überzeugt habe. Die lebende Pflanze verdanke ich der Güte des Dr. F. W. Schultz, sie ist von der vorhergehenden Art allerdings verschieden. Die St. liegen in einen Kreis ausgebreitet, sind an die Erde angedrückt, und streben nur mit den Spitzen aufwärts; in fruchtbarem Boden werden sie 2 Fuss lang und von der Basis an ästig, mit ebenfalls niedergestreckten Ästen, ausserdem sind sie von fester Substanz, hart und nicht leicht zszudrücken. Die Blättchen, auch die oberen, sind verkehrteyf., die Adern und Aederchen am Rande stehen dicht beisammen, sind zahlreicher und am getrockneten B. noch deutlicher. Die Köpfchen sind kleiner und dichter, da zu gleicher Zeit eine grössere Anzahl von Blüthen sich öffnet, doch haben sie kein so zierliches Ansehen, wie die der vorigen Art. Die Bth. sind etwas kleiner und schon beim Beginnen des Blühens röthlich.

Trifolium Michelianum Savi untersch. sich nach Expl. von Savi selbst bestimmt von den 2 vorhergehenden dch viele Merkmale, als: der St. dicker, vielstreifig, bei der getrockneten Pflanze weich und biegsam, bei der lebenden weit röhrig; Bstiele der stengelst. B. lang, so lang, als der Bthstiel oder länger; Blättchen verkehrteyf., gestutzt-ausgerandet, von der breiten Spitze nach der Basis verschmälert; die NebenB. eyf., kurz, 3eckig-zugespitzt; Köpfchen locker; Bthstielen sehr lang, viel länger, als die Röhre des K.; Zähne des K. pfriemlich-borstlich, lang, länger, als die halbe Blkr. Möchte an sumpfigen Stellen im Littor. oder Istrien zu suchen sein. — Das *T. angulatum* WK, welches sich vielleicht auch in Istrien finden liesse, ist dem *T. Michelianum* sehr ähnlich, untersch. sich jedoch dch folgds: alle Theile sind um die Hälfte kleiner; der St. schwach; die NebenB. aus eyf. Basis lanzettl.-verschmälert; Bthstielen nicht so sehr lang, Zähne des K. während der Blüthezeit nur ein wenig kürzer, als die Blumenkrone und die Fahne sehr spitz; bei *T. Michelianum* ist sie an der Spitze stumpf. D.

VII. Rotte. *CHRONOSEMIUM* DC. prodr. 2. p. 204. Bth in einem Köpfchen od. einer Aehre, länger oder kürzer gestielt. Schlund des K. inwendig nackt, Zähne meist gleich, oder die 2 oberen kürzer. Blkr. nach der Blüthezeit bleibend, rauh-scheid. Hülse in dem K. länger- oder kürzer gestielt.

a. Fahne von der Basis an eyf.-gewölbt, gefurcht. Flügel gerade hervorgestreckt. Hülse halb so lang, als die Fahne.

37. *T. SPADICEUM* (L.) Kastanienbrauner K. — *Köpfchen endst.*, einzeln und gezweigt, gestielt, gedrungen, *zuletzt wälzlich*; Bth-stielchen nach dem Verblühen herabgebogen; K. kahl, im Schlunde nackt, Zähne haarig, die oberen 2 kürzer; *die Fahne von der Basis an gewölbt, gefurcht*; *die Flügel gerade-hervorgestreckt*; Gf. 4mal kürzer, als die Hülse; die NebenB. sämmtlich länglich-lanzettl.; Blättchen gleichlang-gestielt. ☉. Auf nassen, torfhaltigen Wiesen der niedrigeren Gegenden, VorA. und A., (dch das ganze Gebiet diesseits der AK., aber stellenweise; in den A. hin und wieder.) Jul. Aug. St. h. 16. Bth. zuerst goldgelb, aber bald satt-kastanienbraun. Stiel der Hülse ein Viertel so lang, als dieselbe.

38. *T. BADIUM* (Schreber bei St. h. 16.) Lederbrauner K. — *Köpfchen endst.*, einzeln oder gezweigt, *gedrungen, kugelig*, zuletzt oval-rundl., die unteren *Bthstielchen* hinabgebogen; K. kahl, im Schlunde nackt, die 2 oberen Zähne kürzer; *die Fahne von der Basis an gewölbt, gefurcht*; *die Flügel gerade-hervorgestreckt*; Gf. 4mal kürzer, als die Hülse; die NebenB. länglich-lanzettl., die oberen beinahe eyf.; Blättchen sämmtlich fast sitzend. ☉. Auf etwas feuchten Alpentriften, (Steiermark, Kärnthen, Salzbg, Tyrol; gemein in der Schw.) Jul. Aug. *T. spadiceum* Vill. Bth. zuerst goldgelb, hernach hellbraun. Stiel der Hülse $\frac{1}{4}$ so lang, als dieselbe.

b. Fahne hinten asgedrückt, vorne löffelf. erweitert und gewölbt. Flügel an den Seiten auseinander tretend. Hülse halb so gross, als die Fahne.

39. *T. AGRAGRIUM* (L.) Goldfarbener K. — *Köpfchen seitenst.*, gestielt, *gedrungen, rundlich und oval*; Bth. zuletzt herabgebogen; K. kahl, am Schlunde nackt, die 2 oberen Zähne kürzer; *die Fahne löffelf., gefurcht*; *die Flügel auseinander tretend*; Gf. ohngefähr so lang, als die Hülse; die NebenB. länglich-lanzettl., an der Basis gleichbreit; Blättchen sämmtl. fast sitzend. 4. Auf Bergwiesen, und an Waldrändern, (stellenweise.) Jun. Jul. St. h. 16. *T. aureum* Poll. *T. campestre* Gmel., nicht Schreb. Bth. zuerst goldgelb, hernach hellbraun. Stiel der Hülse fast so lang, als sie selbst, wie bei den folgenden; Gf., ohne Hinzurechnung des Stieles, von der Länge der Hülse oder nur ein wenig kürzer. Die NebenB. an der Basis nicht verbreitert, und nicht eyf.

40. *T. PROCUMBENS* (L.) Liegender K. — *Köpfchen seitenst.*, gestielt, *gedrungen, rundlich und oval, meist 40 blüthig*; Bth. zuletzt herabgebogen; K. kahl, im Schlunde nackt, Zähne an der Spitze etwas haarig, die 2 oberen kürzer; *die Fahne löffelf., gefurcht*; *die Flügel auseinander tretend*; Gf. 4mal kürzer, als die Hülse; die NebenB. eyf.; das mittlere Blättchen länger-gestielt. ☉. Auf Aeckern, Feldern, Wiesen, an Wegen, Rainen. Mai-Herbst. *T. agrarium* Poll. Var.:

α. majus, der Hauptstengel aufrecht, Aeste abstehend, Köpfchen grösser, gesättigter gelb, Bthstiele so lang, als die B. oder nicht viel länger. *T. campestre* Schreb. *T. agrarium* Gmel.

β. minus, Köpfchen kleiner, Bth. schwefelgelb, Bthstiele oft noch 1 mal so lang, als das B. und die St. meist liegend; aber alle diese Merkmale sind sehr veränderlich, und überall beobachtet man Uebergänge zur Variet. *α*: *T. procumbens* Schreb. bei St. h. 16. *T. pseudo-procumbens* Gmel.

41. *T. PATENS* (Schreb. bei St. h 16.) Abstegender K. — *Köpfchen seitenst.*, gestielt, *locker*, während der Blüthezeit *halbkugelig*; Bth. zuletzt herabgebogen; K. kahl, im Schlunde nackt, Zähne an der Spitze etwas haarig, die 2 oberen kürzer; *die Fahne löffelf.*, *gefurcht*; *die Flügel auseinander tretend*; *Gf. von der Länge der Hülse*; *die NebenB. eyf.*, *an der Basis deutlich herzf.*; Blättchen fast gleich-gestielt. ☉. An grasreichen O., (in Unterkrain, Steyerm., bei Triest, bei Görz, Graubünden, Veltlin, im C. Tessin der Schw.) Jun.-Aug. *T. parisiense* DC. *T. aureum* Thuill., nicht Poll. *T. chrysanthum* Gaud. Bth. goldgelb. Die Sturmische Abbildung ist nach einem durch Alter abgebleichten getrockneten Expl. colorirt.

c. Fahne fast glatt, kaum bemerklich gefurcht, zsgefaltet. Flügel gerade hervorgestreckt. Hülse nur ein wenig kürzer, als die Fahne.

42. *T. FILIFORME* (L.) Fadenf. K. — *Köpfchen seitenst.*, gestielt, *locker*, *meist 10 blüthig*; Bth. zuletzt herabgebogen; K. kahl, im Schlunde nackt, Zähne an der Spitze etwas haarig, die 2 oberen kürzer; *die Fahne zsgefaltet*, *fast glatt*; *die Flügel gerade hervorgestreckt*; *Gf. 4 mal kürzer, als die Hülse*; *die NebenB. eyf.*. ☉. Auf Wiesen, Aeckern, Feldern. Mai-Herbst. St. h. 16. *T. procumbens* Poll. Gmel. *T. minus* Smith. Exemplare mit 2—3 Zoll hohem St., 3-8blüthigen Köpfchen und sehr feinen Bthstielen sind: *T. filiforme β. minimum* Gaud. helv., *T. procumbens β.* Gmel. bad.

43. *T. MICRANTHUM* (Vivian. fl. lybio. p. 45. t. 19. f. 3.) Kleinblüthiger K. — Köpfchen seitenst., gestielt, *locker*, 2-6 blüthig, Bthen zuletzt entfernt, hinabgebogen; K. kahl, am Schlunde nackt, Zähne an der Spitze ein wenig behaart, die 2 oberen kürzer; *die Fahne zsgefaltet*, *glatt*; *die Flügel gerade hervorgestreckt*; *Gf. 4 mal kürzer, als die Hülse*; *NebenB. länglich*, *an der Basis nicht breiter*. ☉. Auf Wiesen, (bei Pola und in d. Valle Bendon zw. Pola und Fasana in Istrien, Tommas.) Mai. Jun., *T. filiforme* Smith. fl. brit., u. Engl. fl., Savi bot. etrusc., Dillen in Ray. syn. t. 14. f. 4. Die NebenB. an der vordern Seite der Basis nicht abgerundet-erweitert und eyf. wie beim Vorhergehenden, sondern an der Basis gerade so breit, wie in der Mitte. J.

13. *DORYCNIUM* (Tournef.) Backenklee. — K. 5zählig, fast 2lippig; die 2 oberen Zähne breiter. Flügel vorne zshängend, in der Mitte mit einem aufgeblasenen, länglichen, querlaufenden Bausch; Kiel stumpf. Sbf. zwei-brüderig. Gf. kahl; N. kopfig. Hülse 2klappig, 1fächerig, wenigeyig, gedunsen, länger als der K.

1. *D. SUFFRUTICOSUM* (Vill.) Halbstrauchiger B. — *Blättchen lineal. - keilig, fast seidenh. - zottig*, Haare anliegend; Köpfchen meist 12 blüthig; Hülsen kugelig. 4. Auf Triften und an gebirgigen O. (auf den Isaraueu bei München, in Graubünden, im südl. Tyrol und im Littor.; in Krain und Istrien.) Mai, Jun. *D. monspeliense* Willd. *D. pentaphyllum* Rb. mit Ausschluss von Villar's Synonyme. Bth. weiss, Fahne auswendig an der Basis rosenroth, Kiel an der Spitze schwarz-violett. Linne vereinigte unter seinem *Lotus Dorycnium*, und Scopoli unter seinem *Dorycnium Pentaphyllum* diese und die folg. Art.

2. *D. HERBACEUM* (Vill.) Krautiger B. — *Blättchen länglich-keilig, zerstreut-haarig, Haare absteehend*; Köpfchen meist 20 blüthig; Hülsen kugelig. 4. Auf sonnigen Bergtriften, (im Cant. Tessin; im südl. Tyrol; in Istrien; Unteröstr.) Jun, Jul. *D. sabaudum* Rb. fl. exc. *D. intermedium* Ledebour. Reichenbach fl. exsicc. n. 767.

11. *BONJEANIA* (Rb.) Bonjeanie. — K. 5 zählig. Flügel unter sich frei, am obern Rande ausser dem hohlen Zahne der Basis mit einem vorwärts herandeten Längsrande; Kiel gerade hervorgestreckt, nicht geschnäbelt. Stbl. nicht an die Blb. angewachsen. Gf. kahl, N. kopfig. Hülse 2 klappig, länglich oder lineal., lederig, (Hülse, wie bei *Lotus corniculatus* und anderen, doch papierartige Querwändchen getheilt.)

1. *B. HIRSUTA* (Rb.) Rauhh. B. — Hülsen länglich, gedunsen. 4. An felsigen, unfruchtbaren O. (Istrien, Osero, Cherso, Fiume; südl. Tyrol.) Mai, Jun. *Lotus hirsutus* L. *Dorycnium hirsutum* DC. Blk., von der Grösse des *Lotus corniculatus*, weisslich-rosenroth, Kiel an der Spitze schwarz-violett; die ganze Pflanze filzig-rauhh. Var.:

β. *incana*, Haare mehr anliegend, dicht-filzig; *Lotus tomentosus* Rohde bei Schrad. L. *sericeus* DC. hort. monsp. D.

15. *LOTUS* (L.) Schotenklee. — K. 5 sp. oder 5 zählig. Die Flügel ausser dem Eindrucke auf dem an der Basis gelegenen Zahne nicht eingedrückt, am oberen Rande zsstossend; Kiel aufstrebend, geschnäbelt. Stbg. 2 brüderig. Gf. kahl, allmählig verschmälert; N. stumpf. Hülse 2 klappig, lineal., gerade oder gekrümmt, flügellos, fächerig, oder doch Querwändchen getheilt, vieleilig, in 2 sich zusammendrehende Klappen aufspringend.

I. Rotte. *LOTEA* Medik. DC. pr. 2. p. 209. Hülse zsgedrückt.

1. *L. ORNITHOPODIODES* (L.) Vogelfussartiger S. — Flaumig; die St. ausgebreitet; Blättchen rauten-verkehrteyf.; Köpfchen gestielt, 3-5 blüthig; die DeckB. noch 1 mal so lang, als der K.; Hülsen lineal., gekrümmt, zsgedrückt, holperig, fast gliederhülsig, kahl. ☉. An kräuterreichen und unkultiv. O., (südl. Istrien, Osero.) Apr. - Jun. Schk. t. 211. J.

II. Rotte. *ELOTUS* DC. prod. 2. p. 210. Hülse stielrand.

2. *L. CYTISOIDES* (L.) Geiskleeartiger S. — Ausgebreitet, *grau*; Haare *angedrückt*; Köpfchen meist 5 blüthig; Blättchen verkehrteyf.; Bthstiele noch einmal so lang, als d. B.; Zähne des K. *länglich-lanzettl., spitz, die 2 seitenst. kürzer*; Hülsen stielrund, lineal., etwas gekrümmt. 4. An unfruchtbaren O. am Adriat. Meer, (auf den Inseln um Istrien, auf Osero.) J.

3. *L. CORNICULATUS* (L.) Gemeiner S. — Liegend, kahl oder rauh., Haare abstehend; Bthstiele 4-5mal länger, als d. B.; Köpfchen meist 5 blüthig; Zähne des K. *aus 3 eckiger Basis pfriemlich, fast gleich*, so lang, als die Röhre, vor dem Aufblühen *zsschliessend*; der Flügel *breit-verkehrteyf.*; Kiel *fast rautenf., rechtwinkelig-aufsteigend*; Hülsen lineal., stielrund, gerade. 4. Auf Triften, Wiesen, an Waldrändern. Mai-Herbst. *L. arvensis* Schk. t. 211. Bth. gelb, auswendig oft blutroth, selten ganz blutroth. Blättchen und NebenB. verkehrteyf. Var:

α. vulgaris, kahl oder zerstreut-haarig.

β. ciliatus, Blättchen und K. von langen Haaren wimperig. Eine Abart mit viel längeren K.Zähnen fand Tommasini im Littorale. Zu dieser scheint zu gehören: *L. corniculatus C. villosus* Ten. syll. fl. neap., von dem sich *L. ciliatus* Ten. prodr. nach der Beschreibung bedeutend unterscheidet.

γ. hirsutus, allenthalben rauh. *L. villosus* Thuill. par.

4. *L. TENUIFOLIUS* (Rehb. fl. exc. p. 506.) Schmalblättriger S. — Liegend, kahl oder etwas behaart von abstehenden Haaren; Bthstiele 4-5mal länger, als das B.; Köpfchen meist 5 blüthig; KZähne *aus einer 3 eckigen Basis pfriemlich, vor dem Aufblühen zsnetzend*; Flügel *längl., verkehrteyf.*; Schiffchen *etwas rautenf., rechtwinkelig aufsteigend*; Hülsen lineal., stielrund, gerade. 4. Auf Wiesen, besonders an salzhaltigen O., (zerstreut dch d. ganze Gebiet.) Mai-Herbst. *L. corniculatus γ. tenuifolius L. spec.* (nach dem Herbarium von C. Bauhin. vergl. Hagenb. fl. basil.) *L. corniculatus γ. tenuifolius* Pollich. palat., var. *δ.* Koch Synops. ed. 1., *L. tenuis* Kit. in Willd. en. h. berol., *L. decumbens* Forster in Smith. engl. fl., Engl. bot. t. 2615. Der St. eng-röhrig, Blättchen und NebenB. lineal. oder lineal-verkehrteyf. Die Flügel bemerklich schmaler wie bei *L. corniculatus* „und schon durch dieses einzige Merkmal ist der *L. tenuifolius* sogleich vom vorigen zu unterscheiden“ Peterm. fl. lips. Ich fand es auch so bei getrockneten Expl.

5. *L. ULIGINOSUS* (Schkuhr. t. 211.) Sumpf-S. — Ziemlich aufrecht, kahl oder etwas haarig, Haare abstehend; Köpfchen meist 12 blüthig, langgestielt; Zähne des K. *aus 3 eckiger Basis pfriemlich, fast gleich*, halb so lang, als die Blkr., vor dem Aufblühen *zurückgebogen*; Kiel *aus einer eyf. Basis allmählig in einen Schnabel verschmälert*; Hülsen lineal., stielrund, gerade. 4. In Gräben und sumpfigen Wiesen. Jul. Aug. *L. major* Smith engl. fl., Koch Synops. ed. 1. *L. vindicatus* v. Bönningh. cat. sem. h. monast. (*L. major* Scop. carn. scheint nach der Beschreibung zu einer andern Pflanze zu gehören.) Untersch. sich von dem *L. corniculatus* dch folg.: der St. höher, deutlich röhrig, die Köpfchen reich-

blüthiger, die Zähne des K. vor dem Aufblühen auswärtsgebogen, die Fahne eyf., nicht rundlich, die Flügel den schmälern, nicht plötzlich in einen Schnabel verschmälerten, Kiel bei der lebenden Pflanze ganz bedeckend, (der Kiel tritt abwärts zwischen den Flügeln bei *L. corniculatus* hervor,) die Hülse fast um die Hälfte schmaler, die S. zahlreicher und um die Hälfte kleiner. Die längern Stbf. sind nicht verschieden; sie sind sowohl bei dieser, als bei den vorhergehenden Arten an der Spitze sehr verbreitert.

6. *L. ANGUSTISSIMUS* (L. spec. 1090.) Ganz schmaler S. — Liegend oder aufstrebend, rauh. von abstehenden Haaren; *Bth. einzeln oder gezeiet*; *Bthstiele 2 mal so lang, als das B.*; KZähne wimperig, aus einer breiten Basis fädl.; KRöhre nach der Basis kreiself. verschmälert, etwas kürzer, als die Zähne; Hülsen gerade, sehr schlank, 5-6 mal länger, als der K. ☉. Auf Wiesen am Meere, (südl. Istrien, in dem Valle Bendon zw. Fasana und Pola, Tommas.) Jun. Jul. D. fl., *L. diffusus* Smith fl. brit., Engl. bot. t. 925. J.

7. *L. EDULIS* (L. spec. 1090.) Essbarer S. — St. ausgebreitet oder aufstrebend, rauh. von abstehenden Haaren; *Bth. einzeln oder gezeiet*; *Bthstiele noch einmal so lang, als das B.*; KZähne lanzettl., rauh., 3 mal länger, als die Röhre; Hülsen längl., gedunsen, gebogen, 2-3 mal länger, als der K. ☉. An unkultiv. O. der Insel Sansego in Istrien, Tommasini. Mai. Jun. *Krockeria oligoceros* Moench. meth. J.

16. *TETRAGONÓLOBUS* (Scopoli.) Spargelerbse. — K. 5 sp. oder 5 zählig. Die Flügel am obern Rande zsschliessend; Kiel geschnäbelt, aufstrebend. Stbg. 2 brüderig. Gf. kahl, oberwärts verdickt, mit einer verschmälerten, rinnigen oder fast 2 lippigen hohlen N. endigend. Hülse mit 4, blattigen Flügeln berandet.

1. *T. PURPUREUS* (Moench.) Purpurblüthige S. — *Bth. einzeln, oder gezeiet*; *Bthstiel von der Länge des B.*; *die Flügel der Hülsen wellig, von der Breite der Hülse.* ☉. Jul. Aug. Zum Küchengebrauche angebaut. *Lotus tetragonolobus* L. Kultiv.

2. *T. SILIQUOSUS* (Roth.) Schotentrug. S. — *Bth. einzeln*; *Bthstiele 2 oder 3 mal so lang, als das B.*; *die Flügel der Hülsen gerade, 4 mal schmaler, als die Hülse.* 4. Auf feuchten Wiesen und Triften, (doch das ganze Gebiet, jedoch nicht allenthalben.) Mai. Jun. *L. siliquosus* L. Var.:

β. *maritimus*, kahler, B. fast fleischig; *Lotus maritimus* L. An feuchten, salzhaltigen O.

IV. Untergruppe. *GALEGEEN*. Stbg. 2 brüderig. B. unpaarig-gefiedert. Hülse 1 fächerig, ohne eingedrückte Nath. (Bei *Galega* sind die Stbg. fast 1 brüderig, der zehnte ist nämlich bis zur Mitte mit den übrigen verwachsen.)

GLYCYRRHIZA (L.) Süssholz. — K. 2 lippig, die 2 oberen Zähne bis zur Mitte verwachsen. Kiel 2 blättrig, spitz. Stbg. 2 brüderig; Stbf. fadenf., nach oben ein wenig verschmälert. Gf. kahl,

verschnälert-fädlich; N. stumpf, schief. Hülse 2 klappig, eyf. oder länglich, zsgedrückt, 1 fächerig, 1 - 4 samig.

1. *G. GLABRA* (L.) Gemeines S. — Blättchen eyf., etwas gestutzt, unterseits klebrig; die NebenB. fehlend; Aehren gestielt, kürzer als das B.; Bth. von einander stehend; Hülsen kahl, 3 - 4 samig. 4. Wird im Grossen bei Bamberg kultivirt, und kommt daselbst verwildert vor. Jun. Kultiv.

18. *GALEGA* (L.) Geisraute. — K. glockig, 5 zählig, verwelkend. Kiel stumpf, 1 blättrig. Stbg. 1 brüderig, das zehnte bis zur Mitte verwachsen; Stbf. pfriemlich. Gf. kahl, fädlich. N. punktf. Hülse 2 klappig, lineal., ziemlich stielrund, holperig, schief gestreift.

1. *G. OFFICINALIS* (L.) Gebräuchliche G. — Blättchen lanzettl., stachelspitzig, kahl; die NebenB. breit-lanzettl., Tr. länger, als das B. 4. Auf sumptigen Wiesen, an Ufern, in Gräben, (v. Schles. dch Böhmi., Mähr. nach Oestr., Steyerm., Krain; am Elbufer von Böhmi. nach Dresden; an die Oder bis Frankf; im südl. Tyrol; in Graubünden.) Jul. Aug. St. h. 6.

19. *COLÚTEA* (L.) Blasenstrauch. — K. 5 zählig, die oberen Zähne kürzer. Fahne ausgebreitet, 2 schwielig. Kiel in einen kurzen, gestutzten Schnabel endigend. Stbg. 2 brüderig; Stbf. fädlich. Gf. auf der inneren Seite flach, von der Basis gegen die Spitze beiderseits der Länge nach dicht bewimpert, an der Spitze hakig, in der Biegung die eyf. N. tragend. Hülse auf einem stieff. Fruchtträger, kahlf., aufgeblasen, rauschend.

1. *C. ARBORESCENS* (L.) Baumartiger B. — Blättchen elliptisch, ^x gestutzt, die Höcker der Fahne abgekürzt; *Hülsen geschlossen.* 7. Auf Hügeln und Bergen unter dem Gesträuch, (südl. Schw., Graubünden, Oberelsass, Oberbaden, Regensburg, südl. Tyrol, Lüttor. und Istrien.) Mai. Jun. *C. hirsuta* Roth. tent. Duham arb. 1. t. 22.

2. *C. ORIENTALIS* (Du Roi harbk. Baumz. 1. 159.) Orientalischer B. — Blättchen verkehrteyf., gestutzt, bläulich-grün; die Höcker der Fahne stumpf, sehr klein; *Hülsen an der Spitze klaffend.* 7. Auf Hügeln, in Weinbergen, (bei Rulsdorf, Hoenstädt, im Gebiete der Fl. von Halle häufig.) Jun. Lam. ill. t. 624. f. 3. Angepflanzt und verwildert nach von Schlechtendal. D.

V. Untergruppe. *ASTRAGALEEN*. DC. prodr. 2. 273. Stbg. 2 brüderig. B. unpaarig-gefiedert. Hülse durch die untere, (nicht samentrag.) einwärtsgebogene Nath, 2 fächerig oder halb 2 fächerig; oder an der oberen Nath eingedrückt.

20. *PHACA* (L.) Berglinse. — K. 5 zählig, die 2 oberen Zähne entfernter. Kiel stumpf, grannenlos. Stbg. 2 brüderig, Stbf. fädlich. Gf. pfriemlich, kahl; N. stumpf. Hülse in dem K. länger oder kürzer gestielt, aufgeblasen, 1 fächerig, die obere samentrag. Nath oft eingedrückt. Die untere Nath bei der 2. Rotte inwendig in eine unvollkommene Scheidewand zsgesaltet.

I. Rotte. *CENANTRUM*. Hülsen vollkommen 1fächerig ohne Scheidewand auf beiden Näthen. Aechte Phaca Arten.

1. *P. FRIGIDA* (D.) Kalte B. — *Der St. aufrecht, sehr einfach; die NebenB. oval, blattig, B. 4-5 paarig*, Blättchen eyf. länglich; Kiel etwas kürzer, als die Fahne; Hülsen länglich, kurzhaarig-blaunig, Fruchträger länger, als der K. 2. Auf Triften der höheren A., (dch d. g. AK.) Jul. Aug. J. a. t. 166. St. h. 49. *Ph. alpina* L. *Ph. ochreata* Crantz. *Colutea frigida* Poir. Bth. gelblich - weiss.

2. *P. ALPINA* (Jacq. ic. rar. t. 151.) Alpen - B. — *Der St. aufrecht, ästig; die NebenB. lineal. - lanzettl., B. 9-12 paarig*, Blättchen oval-länglich; Kiel etwas kürzer, als die Fahne; Hülsen halbeyf., die jüngeren kurz, die älteren ziemlich kahl, Fruchträger länger, als der K. 2. Auf felsigen O. der A. (in d. A. der südl. Schw., von Tyrol und Kärnthen, Salzbg.) Jul. Aug. St. h. 24. *Colutea alpina* Lam. Bth. gelb.

II Rotte. *HEMIPHRAGMIUM*. Hülse auf der unteren (nicht samen trag.) Nath inwendig mit einem schmalen, der Länge nach verlaufenden Flügel versehen, welcher eine unvollkommene Scheidewand darstellt. (Diese Rotte enthält ächte *Astragalus* - Arten.)

3. *P. AUSTRALIS* (L.) Südliche B. — *Der St. ausgebreitet; die NebenB. eyf., B. meist 5 paarig*, Blättchen länglich-lanzettl. und oval; *die Flügel ausgerandet oder 2 sp*; *Kiel viel kürzer, als die Fahne*; Hülsen elliptisch-länglich, kahl; Fruchträger länger, als der K. 2. Auf Triften und an kiesigen O. der höheren GranitA., (in der Schw., Tyrol, Salzbg. und Kärnthen.) Jul. Aug. J. misc. 2. t. 3. St. h. 49. *Ph. Halleri* Vill. *Colutea australis* Lam. Bth. weiss oder selten gelblichweiss, Kiel schwarzviolett. Var. graunauh. und fast kahl. Letzteres ist *Phaca glabra* Clarion. in bullet. philom., DC. prodr., vergl. Hegetschw. fl. d. Schw.

4. *P. ASTRAGALINA* (DC.) Tragantartige B. — *Der St. liegend; die NebenB. eyf., B. 8-12 paarig*, Blättchen länglich-lanzettl. und oval; die Flügel ganz, kürzer, als der Kiel; Kiel beinahe so lang, als die Fahne; Hülsen länglich, rauhh., Fruchträger länger, als der K. 2. Auf Triften der A., (in der Schw., Tyrol, Kärnthen, Salzbg.) Jul. Aug. *Phaca minima* All. pedem. *Astragalus alpinus* L. St. h. 19. Bth. wohlriechend; Fahne bläulich, mit dunkleren Adern, Flügel weiss, kürzer, als der Kiel, Kiel vorne schönviolett. — Von dieser untersch. sich die sehr ähnliche, in Norwegen und Lappland einheimische *Phaca oroboides* DC., *Astragalus oroboides* Hornem., Wahlenb., *A. leontinus* Wahlenb., nicht Wulfen, dch folgds; beträchtlich grösser; Bthstiele noch 1mal so lang, als der Kiel, und die Fruchträger der eyf. Hülsen viel kürzer, als der K. (Sie ist jetzt auch im Gebiete unserer Fl. von Dr. Sauter entdeckt worden und zwar auf dem Rothkogel in Steyermark; sie wird im dritten Bande nachgetragen.) — *Astragalus leontinus* Wulfen, hat auf dem fast nickenden Köpfchen sitzende Bth., einen Kiel, viel kürzer, als die Fahne; Flügel länger, als der Kiel, und sitzende, aufrechte Hülsen; der ähnliche *A. montanus* L. hat einen stachelspitzigen Kiel und gehört zur Gattung *Oxytropis*.

21. OXYTROPIS (DC.) Spitzkiel. — K. 5 zählig. Kiel vorne, unterhalb dem stumpfen Ende in eine gerade grannenartige Spitze endigend. Stbg. 2brüderig, Stbf. fädlich. Gf. pfriemlich, kahl; N. stumpf. Hülse aufgeblasen oder walzlich, 2fächerig oder beinahe 2fächerig, die obere Nath eingedrückt, oder inwendig mehr oder weniger zsgefaltet; aber die Scheidewand auf der unteren Nath fehlend. (Oxytropis untersch. sich von der ersten Rotte der Gattung Phaca dch die Spitze des Kiels.)

§. 1. Die obere Nath der Hülse ist inwendig in einen Flügel zsgefaltet zu einer unvollständigen Scheidewand, welche an ihrem Rande die S. trägt; die untere Nath ist ebenfalls geflügelt und berührt mit ihrem Rande den Flügel der obern, was eine vollständige Scheidewand vorstellt.

1. O. HALLERI (Bunge suppl. alt. in fl. altaic.) Haller's S. — Stengellos, zottig-seidenh.; *Bthstiele* aufrecht, länger, als das B., und *nebst den K. rauhh.-wollig*; Aehren kopfig, eyf.; die DeckB. ohngefähr so lang, als der K.; *Hülsen aufrecht, in dem K. sitzend, eyf., aufgeblasen, zugespitzt, 2 fächerig.* 2. An kiesigen O. der A. und VorA., (in d. Wallis, in Tyrol und Oberkärnthen.) Mai-Jul. *Astragalus uralensis*. Wulf. in Jacq. misc. t. 150. J. ic. rar. 1. t. 135. *Phaca uralensis* Wahlenb. fl. carpath.; die Pflanze v. Ural ist von der europäischen verschieden. Bth. schön-lila. Dch den seidenh.-wolligen Ueberzug, die aufrechten Bthstiele u. d. vollkommen-2fächerigen Hülsen deutlich von den blaublühenden Varietäten der O. campestris verschieden. Var.: stärker wollig-zottig: *Astragalus velutinus* Sieber.

II. Rott's. Die obere Nath der Hülse inwendig in einen Flügel gefaltet, die untere aber flügellos, weshalb die Hülse halb-2fächerig erscheint.

a. Stengellose. NebenB. am Bstiele angewachsen.

2. O. CAMPESTRIS (DC.) Feld-S. — Stengellos, zerstreut-haarig oder etwas zottig; B. meist 12paarig, Blättchen lanzettl., spitz; *Bthstiele* niederliegend, länger, als das B. und *nebst den K. haarig, Haare aufrecht, beinahe angedrückt*; Aehren kopfig, eyf., die DeckB. so lang, als der K. und kürzer; *Hülsen aufrecht, in dem K. sitzend, eyf., aufgeblasen, zugespitzt, halb 2 fächerig.* 2. An kiesigen, sonnigen O. am Fusse der A. und auf den A. bis zum ewigen Schnee, (in der Schw. und von da dch Tyrol, Salzburg, Kärnthen und Steyermark.) Jul. Aug. *Phaca campestris* Wahlenb. helv. *Astragalus campestris* L. St. h. 19. Bth. gelblichweiss oder hellgelblich, mit einem dunkel-violetten Flecken vor der Spitze des Kieles. Var.:

β. sordida; Blkr. schmutzig-gelblich, Fahne bis zur Mitte mit einem grünen und violetten Anstriche, Kiel beiderseits mit einem schwarz-violetten Flecken: *Oxytropis sordida* Gaud. *Phaca campestris β. sordida* Wahlenb. succ. *Astragalus sordidus* Willd. A. uralensis L. succ., nicht Willd. und Jacq. A. tyrolensis Sieb.

γ. caerulea; Blkr. blau, Fahne in der Mitte mit einem grünlich-gelben, blaugestreiften Flecken; im Fuscherthale der Salzburger A. in der Höhe von 5-7000 Fuss überall, A. sordidus von Spitzel, welcher diesseits der Tauernkette nur diese, jenseits nur die Varietät mit gelben Bth. sah.

3. **O. FOETIDA** (DC.) Stinkende S. — *Stengellos, etwas haarig und dch sitzende Drüsen klebrig*; B. meist 20 paarig, Blättchen lineal.-lanzettl.; Bthstiele so lang, als das B., oberwärts dicht-haarig; Aehren kopfig, arnblüthig; die DeckB. kürzer, als der K.; *Hülsen aufrecht, in dem K. sitzend*, länglich, aufgeblasen, halb 2fächerig. 4. An kiesigen O. der höchsten A., (in der Schw., über Zermatten auf den A. am Matterhorn, auf d. Staffel im Nicolaithale, und andern O. der südl. AKette im Wallis.) Jul. Aug. *Astragalus foetidus* Vill. t. 45. A. *Halleri* All. Bth. gelblich. S.

b. Stengelige, die NebenB. nur mit der Basis an den Bstiel angewachsen, od. eigentlich dem B. Kissen eingefügt und nicht angewachsen.

4. **O. PILOSA** (DC.) Haarige S. — *Stengelig, aufrecht, zottig*; Blättchen der unteren B. länglich, der oberen lanzettl.; Bthstiele blattwinkelst., länger, als das B.; Aehren eyf.-länglich; *Hülsen aufrecht, lineal.*, fast stielrund, zottig. 4. An sandigen und felsigen O., auf trocknen Hügeln, (in der südl. Schw., Tyrol bis nach Oestr., von da dch Mähr., Böhmen, nach Sachs., Thüringen, und vereinzelt bei Nohrheim an der Nahe in der Rheinpfalz, bei Berlin und Frankfurt a. d. O., Stettin.) Jun. Jul. St. h. 49. *Astragalus pilosus* L. J. a. t. 51. Bth. gelb.

III. rotte Hülsen 1fächerig, die obere Nath zwar eingedrückt, aber keineswegs in eine Scheidewand zsgefaltet, d. untere ebenfalls flügellos.

5. **O. LAPPONICA** (Gaud.) Lappländisches S. — Beinahe stengelig, aufstrebend, haarig; Blättchen fast lanzettl., spitz; *Bthstiele zuletzt noch 1mal so lang, als das B.*; Tr. abgekürzt, 6-12 blüthig; Fahne anderthalbmal so lang, als der Kiel; *Hülsen hängend, lineal-walzlich*. Fruchträger halb so lang, als die Röhre des K. 4. (Auf den Walliser A. bei Zermatten und Tesch im Nicolaithale, auch bei Nufenen, Gaud., auf d. Grirs, Lager, d. Bagnier A., Leresche.) Jul. *Phaca lapponica* Wahlenb. helv. P. *montana* Wahlenb. lapp. *Astragalus valesiacus* Thom. Bth. hellröthlich, getrocknet blau. S.

6. **O. MONTANA** (DC.) Berg-S. — Beinahe stengellos, *haarig oder ziemlich kuhl*; Blättchen eyf. oder länglich, spitz; *Bthstiele von der Länge der B.*; Tr. abgekürzt, 6-12 blüthig; Fahne anderthalbmal so lang, als der Kiel; Hülsen aufrecht, oval-länglich, *Fruchträger so lang, als die Röhre des K.* 4. Auf den Triften der A., (dch d. g. AK.) Jul. Aug. St. h. 49. *Astragalus montanus* L. J. a. t. 167. *Phaca montana* Crantz. Wahlenb. helv. Bth. rosenroth., getrocknet bläulich.

7. **O. CYANEA** (Bieberst.) Blaue S. — Beinahe stengellos, *grau-haarig*; Blättchen eyf. oder länglich, spitz; *Bthstiele von der Länge der B.*; Tr. abgekürzt, 6-12 blüthig; Fahne 2mal länger, als der Kiel; Hülsen aufrecht, länglich, *Fruchträger halb so lang, als die Röhre des K.* 4. Auf den Triften der A., (sehr selten, und zwar bis jetzt nur im Nikolaithale über dem Dorfe Zermatten.) Jul. Aug. Der vorhergehenden sehr ähnlich, aber mit abstehenden Haaren dichtbedeckt, und daher grau-kurz, und ausser

dem dch die, im Vergleich zum Kiel, längere Fahne und die im Kelche kurzgestielten Hülsen verschieden. S.

S. O. TRIFLORA (Hoppe bei St. h. 49.) Stengellos, etwas haarig; Blättchen eyf. oder länglich, spitz; *Bthstiele von der Länge der B.*; Tr. 3 blüthig; Fahne 2mal länger, als der Kiel; Hülsen aufrecht, länglich, Fruchträger halb so lang, als die Röhre des K. 4. Auf kiesigen, felsigen O. der A., (auf d. Tauern und der Fleiss bei Heiligenblut; auf d. Krainer A.) Jul. Aug. St. h. 49. D.

22. ASTRÁGALUS (L.) Tragant. — K. 5 zählig, Kiel stumpf, grannenlos. Stbg. 2brüderig. Stbf. fädlich. Hülse der Länge nach 2 fächerig, die untere Nath inwendig in eine vollkommene oder unvollkommene Scheidewand verbreitert.

I. Rotte GLYCRRHIZA. Die NebenB. nur mit der Basis an den Bstiel hängend oder ganz frei.

1. Reihe. Rothblühende. Bth. roth.

§. 1. Die NebenB. unter sich zsgewachsen, und so ein einzelnes, dem B. gegenst. NebenB. darstellend.

1. A. LEONTINUS (Wulfen.) Tyroler T. — *Hingebreitet, behaart, die Haare angedrückt, mit ihrer Mitte angeheftet*; die NebenB. zsgewachsen, blattgegenst.; B. 6 - 9 paarig, Blättchen länglich-eyf., stumpf oder schwach ausgerandet; *Aehren kopfig, eyf. oder längl., Bthstiele länger, als das B.*; Fahne eyf., ausgerandet, anderthalbmal so lang, als die Flügel; *Hülsen aufrecht, oval-länglich, in dem K. sitzend, rauhh.* 4. An felsigen O. der A., (in Krain; Lienzer Alp. u. Windau alpe in Tyrol, Böchaner und Schwarzgulling Gebirg in Steyerm.; in der Schw. im Thale St. Nicola, Bagnes und Anniviers.) Jul. Aug. J. ic. rar. t. 154. St. h. 24. Bth. hellblau. Zur Blüthezeit auf den ersten Blick der Oxytropis montana ähnlich, aber dch die wie bei Cheiranthus Cheiri mit ihrer Mitte angewachsenen Haare, die zsgewachsenen NebenB., und den Mangel der Stachelspitze am Kiele sogleich zu unterscheiden, auch sind die Hülsen unähnlich.

2. A. PURPUREUS (Lamarck. dict. 1. 314.) Purpurrother T. — Liegend, aufstrebend, behaart von einfachen oder 2thligen Haaren; NebenB. zsgewachsen, dem B. gegenst.; B. 10 - 12 paarig, *Blättchen eyf.-lanzettl., an der Spitze 2 zählig- ausgerandet*, Zähne spitzlich; Aehren kopfig; Bthstiele länger, als das B.; Fahne eyf., tief-ausgerandet, $1\frac{1}{2}$ mal so lang, als die Flügel; *Fruchtkn. kurzgestielt, der Stiel von der Länge des sechsten Theiles des Fruchtkn.*; *Hülsen aufrecht, rundl., eyf., an der Basis herzf., rauhh.* 4. An kiesigen und steinigen O. der A., (auf d. Schlehern im südl. Tyrol, Andr. Saunter.) Jul. Aug. Bth. purpur-violett. Haare abstehend, oder anliegend. Dieser Astragalus purpureus und der ähnliche A. hypoglottis haben fast rundl.-eyf., an der Basis herzf. Hülsen, einen gestielten Fruchtkn., dessen Stiel bei letzterem der Hälfte der Länge des Fruchtkn., bei ersterem nur dem sechsten Theile derselben gleichkommt; die eben so ähnlichen A. leontinus und A. Onobrychis unterscheiden sich dch im K. auf-

sitzende Hülsen und der letztere noch überdies dch die Fahne, welche 3mal länger ist als der Flügel. D.

3. *A. HYPOGLOTTIS* (L. mant.) Wiesen-T. — Hingebreitet, haarig, die Haare anliegend; die oberen NebenB. zsgewachsen, blattgegenst.; B. 8-10 paarig, Blättchen lanzettl., die der unteren B. eyf., ausgerandet; Aehren kopfig, eyf. oder längl. eyf.; Bthstiele länger, als das B.; Fahne eyf., tiefausgerandet, anderthalbmal so lang, als die Flügel; *der Fruchtkn. und die Hülsen an der Basis herzf., der Stiel halb so lang, als der Fruchtkn.; Hülsen aufrecht, rundl. eyf., rauh.* 4. Auf Triften und trocknen Wiesen. (in Mähren, von da dch Böhmen nach Thüringen, ferner bei Frankf. an d. O. und Stettin, und auf der Rheinfläche bei Strassburg und von Mannheim bis Mainz.) Mai, Jun. *A. epiglottis* L. s. nat., mit Ausschluss der Syn. *A. arenarius* Pall., Fl. dan. t. 614., Gmel. bad. *A. danicus* Retz. *A. Onobrychis* Pollich. *A. microphyllus* Willd.; (das fruchttragende, von Foerke gesammelte und in d. spec. plant. beschriebene Expl. befindet sich noch in dem Willdenow. Herbarium. Der *Astragalus microphyllus* L. aber, eine sibirische Pflanze, ist dch den aufrechten St., die pfriemlichen, sehr kleinen NebenB., wagerechten Bth. und kahlen K. zweifelsohne verschieden.) *Oxytropis montana* Spreng. fl. hal. ed. I. t. 207. Bth. violett. D.

4. *A. ONOBRUCHIS* (L.) Langfahziger T. — Hingebreitet oder aufrecht, haarig, Haare anliegend; die oberen NebenB. zsgewachsen, blattgegenst.; B. 8-12 paarig, Blättchen lanzettl., die der untersten B. eyf., ausgerandet; Aehren kopfig, länglich-eyf.; Bthstiele länger, als das B.; Fahne lineal-länglich, gestutzt, 3mal so lang, als die Flügel; *der Fruchtkn. und die Hülsen sitzend; Hülsen aufrecht, eyf., zugespitzt, rauh.* 4. Auf Wiesen und trocknen Triften, in die A. hinaufsteigend, (in der südl. Schw., Tyrol, Krain, Unteröstr., Mähr.) Jun. Jul. J. a. t. 70. Var. Fahne mit einem Spitzchen auf d. gestutzten Ende, und mit schmälern, an den oberen B. linealen Blättchen. Bth. bläulich-purpurn.

5. *A. ARENARIUS* (L.) Sand-T. — Hingebreitet, von angedrückten Haaren seidig-grau; die oberen NebenB. zsgewachsen, blattgegenst.; B. 3-4 paarig, Blättchen lineal., stumpf; Tr. 4-8 blüthig, Bthstiele ein wenig kürzer, als das B.; Bthstielchen länger, als das DeckB.; Hülsen lineal-länglich, grau-haarig, *Fruchtträger so lang, als die Röhre des K.* 4. Auf Feldern und in sandigen Fichtenwäldern, (von Böhmen und Schles. dch die Lausitz nach Thüringen, Brandenbg. Pommern und das südl. Mecklenbg und nach Preussen; vereinzelt bei Nürnberg.) Jun. Jul. St. h. 19. Bth. fleischroth. Var. mit oben fast kahlen Blättchen. D.

§. 2. Die NebenB. frei, aber bei *A. austriacus*, *A. sulcatus* und *A. sesameus* die untersten, wenigstens an den sterilen St. zu einem einzigen zsgewachsen.

6. *A. AUSTRIACUS* (Jacqu. en. stirp. vind. p. 130. und 263.) Oestreichischer T. — Ausgebreitete, kahl; die NebenB. eyf., frei; B. 7-10 paarig, Blättchen lineal., ausgerandet, die der untersten B. verkehrteyf.; Tr. gestielt, länger, als das B., locker; die DeckB. kürzer, als das Bthstielchen; *die Flügel 2 sp.; Hülsen*

hängend, lineal, beinahe 3 eckig, flaumig, in dem K. sitzend. 2. Auf Hügeln, Feldern, Wiesen, (Krain, Unteröstr., Mähr. und Böhmen.) Jul. Aug. L. spec. 1070. A. dichopterus Pall. Bth. bläulich, Kiel strohgelb, an der Spitze mit einem violetten Flecken. D.

7. A. SULCATUS (L.) Gefurchter T. — *Aufrecht, kahl; die NebenB. aus verbreiteter Basis lanzettl.; B. 7-10 paarig; Blättchen lineal.-lanzettl.; Tr. gestielt, länger, als das B., locker; die DeckB. länger, als die Bthstielchen; Flügel ganz; Hülsen aufrecht, lineal., beinahe 3 kantig, in dem K. kurzgestielt, ziemlich kahl. 2. An kräuterreichen, feuchten O., Seen und Sümpfen, (in Unteröstr.) Jun. Jul. J. h. vind. 3. t. 40. Bth. hellviolett, mit dunkleren Linien. D.*

8. A. ARGENTEUS (Bertolon., nach Visian. in der bot. ztg.) Silberglänzender T. — *Ausgebreitet, weisslich-grau, mit angedrückten, im Mittelpunkte angehefteten Haaren; die St. einfach; die NebenB. cyl., frei; B. 5-7 paarig; Blättchen lineal. und lanzettl., die der unteren B. oft oval; Tr. gestielt, länger, als das B., locker; die DeckB. länger, als das sehr kurze Bthstielchen; Haare des K. angedrückt; Hülsen noch 1mal so lang, als der K., lineal., gerade, beinahe 3 kantig, grau. 2. An sonnigen, felsigen O., (auf den Inseln Cherso, Osero und Veglia.) Mai. A. Mülleri Stend. und Hochst.! A. virgatus Rb. fl. exc. A. subulatus Koch. bot. ztg. (Nach blühenden Expl., aber ohne Frucht bestimmt.) In der Bildung der Hülsen allerdings dem A. virgatus sehr ähnlich, aber in dem Habitus doch sehr verschieden. Die St. an der Basis liegend, dann aufrecht, einfach, an der Spitze mit einer einzelnen, mässig vielblüthigen Aehre, die Haare des K. und der Hülsen angedrückt. Bei A. virgatus ist der St. aufrecht, oberwärts in mehrere, verlängerte, ruthenförmige, sehr reichblüthige Aeste getheilt, und die Aehren sind wegen der weissen, abstehenden Haare des K. und der Spindel rauhh.; vielleicht aber doch nur Variet. des letztern? Ohne die Hülsen ist er dem A. subulatus und A. corniculatus ähnlicher; jener untersch. sich jedoch doch etwas längere Bthstielchen, von der Länge des DeckB. oder länger, und die etwas gebogenen ziemlich, aufrechten Hülsen, von der dreifachen Länge des K.; dieser untersch. sich doch wenige, fast doldige Bth., ein wenig längere Bthstielchen, abstehende Haare des K. und etwas gebogene Hülsen, von der dreifachen Länge des K., die nach Biebersteins Beobachtung zuletzt weit abstehen. — Bth. blau. J.*

9. A. VESICARIUS (L.) Aufgeblasener T. — *Ausgebreitet, grau, mit angedrückten, im Mittelpunkte angehefteten Haaren; die NebenB. lanzettl.-pfriemlich, frei; B. 5-7 paarig, Blättchen länglich oder elliptisch; Aehren fast kopfig; Bthstiele länger, als das B.; K. von schwarzem, angedrücktem Flaume und weissen, etwas abstehenden Haaren rauhh., die fruchttrag. aufgeblasen; Hülsen länglich, ein wenig länger, als der K., rauhh., in dem K. sitzend, halb 2 fächerig. 2. Auf trocknen Kalkgebirgen, (auf dem Berge Nanas in Innerkrain, auf den A., Zhaun, auf d. Monte Spaccato und am Karste bei Triest, Graubünden zw. Glurens und Prat.)*

Mai. Jun. A. albidus WK. A. glaucus MB. A. dealbatus Pall.
Bth. violett, seltner weiss, v. Sal. Marschlin. D.

10. A. SESAMEUS (L.) Sesamfrüchtiger T. — Ausgebreitet, zottig; die NebenB. aus eyf. Basis lanzettl.; B. 9-10 paarig, Blättchen elliptisch-länglich; *Köpfchen blattwinkelst., sitzend* oder kurz-gestielt; *Hülsen sternf.-köpfig*, lanzettl., auf dem Rücken mit einer Furche ausgehöhlt. ☉. An d'ürren O., (im südl. Istrien.) Mai. Jun. An der kultiv. Pflanze sind die Köpfchen oft kurz-gestielt. Bth. bläulich. Riv. t. 105. J.

11. Reihe. Gelblichweiss e. Bth. gelblich oder gelb.

§. 1. Die NebenB. in ein einziges blattgegenst. zsgewachsen.

11. A. CICER (L.) Kicherartiger T. — Ausgebreitet, haarig, Haare anliegend; die oberen NebenB. zsgewachsen, blattgegenst.; B. 8-12 paarig, Blättchen länglich-lanzettl. und oval; Aehren köpfig, eyf.; Bthstiele länger oder kürzer, als das B.; Fahne eyf., ausgerandet, anderthalbmal länger, als die Flügel; *der Stiel des Fruchtkn. 6mal kürzer, als dieser; Hülsen aufrecht, rundlich, aufgeblasen, in dem K. beinahe sitzend, rauhh.* 2. Auf Wiesen, bergigen Triften und sandigen Hügeln, (fast doch das ganze Gebiet aber stellenweise.) Jun. Jul. J. a. t. 251. St. h. 49. Bth. gelblichweiss. A. microphyllus Schübl und Mart. und d. übrigen Deutschen Autoren ist dieselbe Pflanze und kaum als Varietät zu trennen.

§. 2. Die NebenB. frei, aber bei A. glycyphyllos, und A. hamosus, die untersten, wenigstens an den sterilen St., zu einem einzigen zsgewachsen.

12. A. HAMOSUS (L.) Hakenfrüchtiger T. — Liegend, flaumig, Haare angedrückt; B. meist 12 paarig, Blättchen keilig oder verkehrteyf., ausgerandet, oben kahl; *Aehren meist 6 blüthig, locker*, Bthstiele so lang, als das B. und kürzer; *Hülsen stielrund, abstechend, in einen Haken gekrümmt*, an der Spitze pfriemlich, auf dem Rücken mit einer Furche durchzogen, die jüngeren flaumig. ☉. An kräutierreichen O., (Istrien, Veglia.) Mai. Jun. J.

13. A. GLYCYPHYLLOS (L.) Süssholzblättriger T. — Liegend, fast kahl; die NebenB. oval, stachelspitzig oder zugespitzt; B. 5-6 paarig, Blättchen eyf.; Bthstiele kürzer, als das B.; *Aehren eyf.-länglich; Hülsen lineal.*, fast 3kantig, an der unteren Nath tiefeingedrückt, *gebogen, kahl, aufrecht, zuletzt zsschliessend.* 2. An waldigen O. und auf Bergwiesen. Jun. Jul. Fl. dan. 1108. Bth. gelblichweiss, zuletzt rauchgrau.

14. A. DEPRESSUS (L.) Niedergedrückter T. — Liegend oder fast stengellos; *die NebenB. eyf., häutig, 3mal so breit, als der St., laug-gewimpert*; B. 9-11 paarig, Blättchen rundlich-verkehrteyf., sehr stumpf oder ausgerandet, oberseits kahl, unterseits angedrückt-flaumig, etwas grau; Bthstiele kürzer, als das B.; *Hülsen lineal.*, fast stielrund, gerade, *abstechend, etwas herabgebogen*, endlich kahl. 2. An rauhen, sonnigen O., (in der südl. Schw. auf d. Alpen von Wallis und Aelen.) Mai. Jun. Bth. gelblichweiss, Kiel

an der Spitze beiderseits mit einem violetten Flecken. *A. leucophaeus* Smith scheint mir nur doch die zuletzt bleich und schmutziggelblichfarbigen Bth. verschieden. S.

15. *A. ASPER* (Jacq.) Rauher T. — *Aufrecht, steif, flaumh-
rauh, Haare ungedrückt, in der Mitte angeheftet*; die NebenB. lanzettl.; B. 12-15 paarig, Blättchen lanzettl. und lineal.; *Aehren verlängert, gedrungen*; *Bth. aufrecht*; Bthstiele doppelt- oder 3mal länger, als das B; Hülsen länglich-lineal., flaumig, an die Spindel angedrückt. 4. Auf Wiesen und an kräuterreichen O., (Unteröstr.) Mai. Jun. *A. chloranthus* Pall. Bth. hellgelb. D.

II. Rotte. TRAGACANTHAE. Die NebenB. fast bis zu ihrer Mitte an den Bstiel angewachsen. Bstiele bleibend, Dornen darstellend.

16. *A. ARISTATUS* (L'Heritier.) Begrannter T. — *Zottig; Bstiele bleibend, an der Spitze dornig*, 6-10 paarig, Blättchen länglich, stachelspitzig; Bthstiele blattwinkelst., viel kürzer, als das B., 5-8 blüthig; Zähne des K. borstlich-pfriemlich, so lang, als der Kiel; Hülsen kürzer, als der K., eyf., zottig, 1 fächerig. 4. Auf den südlicheren Schweizer A. nicht selten, (im C. Waadt und Wallis.) Mai. Jun. *A. sempervirens* Lam. *Phaca Tragacantha* All. S.

III. Rotte. PONOCHREATI. Die NebenB. fast bis zu ihrer Mitte an den Bstiel angewachsen. Bstiele nicht dornig und nicht bleibend.

17. *A. EXSCAPUS* (L.) Schaftloser T. — *Stengellos, sehr zottig*; die NebenB. an den Bstiel angewachsen; B. 12-15 paarig, Blättchen eyf.; *Bth. auf der Wurzel gehäuft*; der gemeinschaftliche Bthstiel sehr kurz; Bthstielchen ohngefähr so lang, als die Röhre des K.; Zähne des K. pfriemlich; Blkr. kahl; *Hülsen eyf., zugespitzt-stachelspitzig, zottig*. 4. Auf Wiesen und in Sandwäldern der niedrigeren Gegenden und VorA., (in dem C. Wallis; bei Glurns in Tyrol; am See von Czeiz in Mähren; im Mittelgebirge, bei Prag in Böhmen; bei Frankenhausen, Halle und einigen anderen O. in Thüringen.) Mai. Jun.

18. *A. MONSPESSULANUS* (L.) Französischer T. — *Fast stengellos, grau-flaumig, oder beinahe kahl*; die NebenB. an den Bstiel angewachsen; B. 12-20 paarig, Blättchen ey-lanzettf.; Bthstiele länger als das B.; Zähne des K. lineal.; *Hülsen lineal., fast stielrund, mit der Spitze aufwärts-gerichtet, gebogen, 12-20 eyig, angewachsen fast kahl*. 4. An grasreichen, bergigen O., (südl. Tyrol bei Bochetto, Schweiz bei Chur, im Domleschger Thale in Graubünden, bis 3000' bei Aelen, im untern Wallis.) April. Mai. St. h. 49. (unvollkommene Abbild., weil die Hülsen fehlen.) Camerar. epit. p. 929. die bleibenden Bstiele und Hülsen sehr gut gezeichnet. Bth. dunkel-purpurn.

19. *A. WULFENII* (Koch) Wulfen's T. — *Fast stengellos, grau-flaumig oder fast kahl*; NebenB. an den Bstiel angewachsen; B. 12-20 paarig; Blättchen eyf.- od. lanzettf.; Bthst. fast so lang als das B.; Zähne des K. lineal.; *Hülsen lineal-längl., oberwärts gebogen, mit abwärts-gerichteter Spitze, 24-30 eyig, etwas grau von angedrückten Haaren*. 4. An steinigem O. und Triften (un

Triest und auf den Inseln Istriens.) Mai. *A. incanus* Wulf. in Jacq. coll., *A. incurvus* Rehb. fl. exc. ob auch Desf.? Desfontain's Pil. hat 3 mal kürzere Hülsen, und in jedem Fache 4 S. *A. incanus* Linn. ist mehrfach von der vorliegenden Art verschieden. — Den *Astragalus alopecuroides* habe ich absichtlich, da er nicht in der Schwz., sondern in Savoyen wächst, weggelassen. D.

H. Gruppe. *HEDYSAREEN*. DC. prodr. 2. p. 507. Hülse in Fächer oder Glieder quer abgetheilt und oft in Glieder zerfallend. Die Keimb. ziemlich flach, während des Keimens in, mit Spaltöffnungen begabte, B. verwandelt.

I. Untergruppe. *CORONILLEEN*. DC. prodr. 2. p. 308. Bth. doldig. Hülsen stielrund oder zsgedrückt.

23. *SCORPIURUS* (L.) Skorpionskraut. — K. kurz, glockig, 5 zählig, durch die 2 oberen bis über die Mitte zsgewachsenen Zähne fast 2 lippig. Kiel zugespitzt-geschnäbelt. Stbg. 2 brüderig, Stbf. abwechselnd an der Spitze in ein Scheibchen verbreitert. Hülse verlängert, zirkelf.-zurückgerollt, längsgefurcht, aus 3 - 6 einsamigen Gliedern bestehend.

I. S. *SUBVILLOSA* (L.) Feinstacheliges S. — Die inneren Rippen der kahlen Hülse glatt, die äusseren 6 - 8 steifliche, etwas gedrungene, an der Spitze beinahe hakige Dornen tragend. ☉. An Wegen und Ackerrändern, (Istrien, Insel St. Andrea u. Veglia.) Mai. Jun. Schk. t. 208. J.

24. *CORONILLA* (L.) Kronwicke. — K. kurz, glockig, 5 zählig, durch die 2 oberen bis über die Mitte zsgewachsenen Zähne fast 2 lippig. Kiel zugespitzt-geschnäbelt. Stbg. 2 brüderig, die längern Stbf. oberwärts verbreitert. Hülse verlängert, gerade od. gebogen, ziemlich stielrund oder 4 kantig oder fast 4 flügelig, an den, manchmal fein-geringelten Gelenken zsggezogen; Glieder 1 samig.

I. Rotte. *EMERUS* Tournef. inst. t. 418. Nägel der Bth. 3 mal so lang, als der K.; Hülse nicht leicht in Glieder zerfallend, fast stielrund, gestreift.

I. C. *EMERUS* (L.) Strauchige K. — Strauchig, aufrecht; die NebenB. frei, lanzettl.; Blättchen 7 - 9, verkehrteyf.; Bthstiele meist 3 blüthig; *Nägel der Bth. 3 mal so lang, als der K.*; Hülsen ziemlich stielrund. b. In Gebüsch, auf buschigen Hügeln und bergigen O., bis in die VorA. hinaufsteigend, (in der Schw., im Oberelsass, Oberbadischen, del Vorarlberg, Tyrol, bis Oestr. und bis an das Adriat. Meer.) Mai. Jun.

II. Rotte. *CORONILLA* Tournef. inst. t. 419. Nägel der Bth. ohngefahr so lang, als der K. Hülse leicht in Glieder zerfallend, 4 kantig od. 4 flügelig.

* Bth. gelb.

2. C. *VAGINALIS* (Lam) Scheidenblättrige K. — Halbstrauchig, gestreckt; *die NebenB. eif., in ein einziges eif., ausgerandetes, blattgegenst. zsgewachsen, von der Grösse der Blättchen*; B. 3-6 paarig, Blättchen verkehrteyf., das unterste Paar von der Basis

des Bstieles entfernt; Dolden 6-10 blüthig; Bthstielchen so lang als die Röhre des K.; Hülsen 4 flügelig. 2. Auf Berg- und Alpen-
triften, (dch d. g. AK. bis nach Oestr., und von da dch Böhmen
und Thüringen.) Mai-Jul. C. minima J. a. t. 271. und der meisten
Autoren. St. h. 49.

3. C. MINIMA (L. spec. 1048.) Ganz kleine K. — Halbstrauchig,
ausgebreitet; die *NebenB. klein, in ein einziges blattgegenst. zsgewachsen*; B. 3-4 paarig, Blättchen länglich-keilig oder verkehrt-
eyf., das unterste Paar die Basis des Bstieles einnehmend; Dolden
5-8 blüthig; Bthstielchen so lang, als die Röhre des K. oder
etwas länger; die untern Zähne des K. dreieckig, den vierten
Theil der Röhre lang; Hülsen 4kantig. 6. Auf sonnigen Hügeln
der Schw. sehr selten, (bisher blos bei Varona und Siders im
mittleren Wallis.) Jul. Aug. Lin. spec. pl. an dem angeführten
Orte und in der mant. 2. 444. DC. fl. fr. C. minima α. Lam. dict.,
Gaud. helv. C. coronata minor Rehb. ic. f. 66. Blättchen verkehrt-
eyf. Var.:

β. *lotoides*, Koch, D. fl. in der Anmerkung zu C. vaginalis.
Blättchen längl. keilf. C. coronata DC. fl. fr., Gaud. helv., Koch
syn. edit. I., Rehb. ic. I. f. 67. C. minima β. Lam. dict. Neuerlich
verglichene Exemplare haben mir die Ueberzeugung gegeben, dass
die von mir als C. lotoides aufgestellte Art eine blosse Varietät
der C. minima ist. S.

4. C. MONTANA (Scopoli.) Berg-K. — Krautig, aufrecht; die
unteren *NebenB. klein, in ein einziges blattgegenst. zsgewachsen*, die oberen getrennt; B. meist 5 paarig, Blättchen
oval und verkehrt-eyf., das unterste Paar die Basis des Bstieles
einnehmend; Dolden 15-20 blüthig; Bthstielchen 3mal so lang,
als die Röhre des K.; Hülsen zsgedrückt-4 kantig, gerade. 4.
Auf Kalkgebirgen, (bei Chur und auf dem Jura und d. Jurakalk
der Schw., und von da mit diesem Gebirge in d. schwäbische Alp
und bis Regensbg.; in Thüringen, Hessen bei Wildungen; in der
Gegend von Würzburg; ferner in Unteröstr. u. von da dch Steyer- u.
Krain nach dem Littor.) Jun. St. h. 49. C. coronata J. austr. t. 95.,
auch L. nach den Synonymen.

5. C. SCORPIOIDES. (Koch.) Krautige K. — Krautig; die *Ne-
benB. klein, in ein einziges blattgegenst. zsgewachsen*; B. 3 zählig,
sitzend, das unpaarige sehr gross; Hülsen gebogen, 4 kantig, ge-
streift. ☉. In Weinbergen, auf Brachäckern und unter der Saat,
(im östr. Littor.; ziemlich häufig bei Triest.) Mai. Jun. Ornitho-
pus scorpioides L. Rivin. t. 95. Arthrolobium scorpioides DC.
prodr. Hat alle Merkmale einer Coronilla. D.

** Bth. purpurn oder weiss.

6. C. CRETICA (L.) Cretische K. — Krautig, aufstrebend; die
NebenB. lanzettl., frei; B. 6-8 paarig, Blättchen länglich-verkehrt-
eyf., gestutzt; Bthstiele kürzer, als das B.; Dolden 3-6 blüthig;
Bthstielchen so lang, als der K.; Hülsen 4kantig. ☉. An kräuter-
reichen O., Wegen, (Istrien, Osero, Fiume.) Mai. Jun. J. h. vind.

1. t. 35. Bth. weisslich, Fahne mit purpurnen Streifen, Kiel schwarz-purpurn. *C. parviflora* Moench, nicht Willd. J.

7. *C. VARIA* (L.) Bunte K. — Krautig, liegend; die NebenB. lanzettl., frei; B. meist 10 paarig, Blättchen länglich-verkehrteyf., stumpf; Bthstiele länger, als das B.: Dolden meist 20 blüthig; Bthenstielchen 3mal so lang, als die Röhre des K.; Hülsen 4 kantig. 4. Auf sonnigen Hügeln, Feldern, trocknen Wiesen, (im Gebiete stellenweise.) Jun. Jul. St. h. 49. Fahne rosenroth, die Flügel nebst dem Kiele weiss, dieser an der Spitze schwarz-purpurn. W. weit kriechend.

25. *ORNITHOPUS* (L.) Vogelfuss. — K. verlängert, röhrig, 5 zählig, die 2 oberen Zähne an der Basis zsgewachsen. Kiel abgerundet-stumpf. Stbg. 2 brüderig; Stbf. abwechselnd oberwärts verbreitert. Hülse verlängert, ziemlich gerade, oder gebogen, zsgedrückt, an den Gelenken beiderseits zsggezogen, Glieder 1 samig. (Untersch. sich von *Coronilla* dch den langen, röhrigen K., zugrundeten Kiel, und die zsgedrückte und nicht 4 kantige Hülse. *Ornithopus ebracteatus* bildet dch d. stielrunden, an den Gelenken nicht zsggezogenen Hülsen eine eigene Gattung, *Arthrolobium*; *O. repandus* ist in die Gattung *Hippocrepis* und zwar neben *H. glauca* einzureihen; *O. durus* ist mir unbekannt.

1. *O. PERPUSILLUS* (L.) Liegender V. — Bthstiele länger, als das B.; Zähne des K. eyf., 3mal kürzer, als die Röhre, Schnabel der Hülse so lang, als ein Glied derselben. O. Auf Sandfeldern, (von Basel dch die ganze Rheinfläche bis nach Westphalen, und von da das ganze nördl. D. bis Preussen, Sachs. und Schles.; einzeln in Schwaben und Bayern.) Mai. Jun. Schk. t. 206. Fahne weisslich; Kiel gelblich. *Ornithopus intermedius* Roth von dem Autor selbst, ist dieselbe, auf fruchtbarem Boden ein wenig vergrösserte Pflanze. — *O. sativus Broter*, *O. roseus Dufour* ist eine andere, echte Art, die sich dch folg. untersch.: die Zähne des K. pfriemlich, so lang, als die Röhre; der Schnabel halb so lang, als die Hülse, die Blkr. 3mal grösser.

26. *HIPPOCREPIS* (L.) Hufeisenklee. — K. kurz, glockig, 5 zählig und, da die 2 oberen Zähne bis zur Mitte zsgewachsen sind, fast 2 lippig. Kiel zugespitzt-geschnäbelt. Stbg. 2 brüderig; Stbf. abwechselnd an der Spitze verbreitert. Hülse verlängert, zsgedrückt, gegliedert, an der oberen Nath buchtig-ausgeschnitten und gelappt. S. gekrümmt oder zirkelförmig gebogen.

5. Hülsen buchtig; nämlich die Glieder nur gekrümmt und dadurch breitoffene Buchten bildend.

1. *H. COMOSA* (L.) Zopff. H. — Die St. krautig, ausgebreitet; Bthstiele länger, als das B., an der Spitze doldentrag.; Hülsen etwas gebogen, Glieder gekrümmt, rauh, Gelenke eingedrückt, kahl. 4. An sonnigen, gebirgigen O. und auf trocknen Wiesen, vorzüglich auf Kalkboden, bis in die höchsten A., (dch d. g. AK. gemein, auch auf den Gebirgen des mittleren D. stellenweise.) Mai-Jul. J. a. t. 431. Bth. gelb.

§. 2. Hülsen kreisrund- ausgeschnitten, nämlich mit Gliedern, die gegen die Spitze verbreitert, rundliche, schmal-geöffnete Buchten bilden.

2. *H. UNISILQUOSA* (L.) Einfrüchtiger H. — *Bth.* blattwinkelst., *einzel*n, sehr kurz-gestiel; Hülsen auf dem mittleren Theile der Glieder weichstachelig-rauh. ☉. An sonnigen, steinigen O., (Istrien.) Mai. Jun. *Bth.* gelb. J.

27. *SECURIGERA* (DC.) Beilwicke. — K. kurz, glockig, 5zäh-
nig, und, da die 2 oberen Zähne bis über die Mitte zsgewachsen
sind, fast 2lippig. Kiel zugespitzt-geschnäbelt. Stbg. 2 brüderig;
Stbf. abwechselnd an der Spitze verbreitert. Hülse verlängert,
flachzgedrückt, an beiden Rändern etwas vorspringend, zwischen
den Samen mit Eindrücken bezeichnet, nicht in Glieder zerfallend.

1. *S. CORONILLA* (DC.) Gelbe B. — Auf Aeckern, (Istrien,
Fiume, Veglia.) Mai. Jun. *Coronilla Securidaca* L. *Securidaca*
lutea Mill. S. legitima Gärt. *Bth.* zu 3-6, doldig, gelb. J.

II. Untergruppe. *EUHEDYSAREEN*. DC. prodr. 2. p. 313.
Bth. traubig. Hülsen zsgedrückt.

28. *HEDYSARUM* (L. mit Ausschluss v. Arten.) Hahnenkopf. —
K. 5 sp., Zpfl fast gleich. Kiel schief-abgeschnitten, länger, als
die Flügel. Stbg. 2 brüderig; Stbf. pfriemlich. Hülse gegliedert,
an beiden Näthen gekerbt; Glieder mehrere, zsgedrückt, 1 samig,
rundlich.

1. *H. OBSCURUM* (L.) Gebirgs-H. — Der St. aufrecht; B. 5-9 paar-
rig; Blättchen eyf.-länglich oder elliptisch; die NebenB. in ein
blattgegenst., 2 sp. zsgewachsen; die DeckB. länger, als die Bth-
stielchen; Hülsen hängend. 4. Auf bewässerten Triften der A. und
an den Seiten der Giessbäche, (dch d. g. AK. von der Schw. bis
Oestr; auf den Sudeten und Mähr. Gebirg.) Jul. Aug. *H. alpinum*
J. a. t. 168. St. h. 19. *H. controversum* Crantz. *Bth.* ansehn-
lich, purpurn.

29. *ONÓBRYCHIS* (Tournef.) Esparsette. — K. 5 sp., Zpfl
fast gleich. Kiel schief-abgeschnitten, länger, als die Flügel. Stbg.
2 brüderig; Stbf. pfriemlich. Hülse 1 gliederig, zsgedrückt, nicht
aufspringend, 1 samig, grubig-netzig, der obere samentrag. Rand
dicker, gerade, der untere dünner, gekrümmt, kammförmig, oft ge-
zähnt, dornig oder lappig.

1. *O. SATIVA* (Lam.) Angebaute E. — Der St. aufstrebend; X
die Flügel kürzer, als der K.; Kiel länger, als die Fahne oder ein
wenig kürzer, als diese; Hülsen am vordern Rande gekielt, auf
dem Mittelfelde erhaben-netzig, am Rande und auf dem Mittelfelde
dornig-gezähnt, *Zähne halb so lang, als der Kamm der Hülse*,
die mittleren Maschen des Netzes grösser. 4. Auf Hügeln und
Bergwiesen, auf Kalkboden, (dch das mittlere und südl. D. und
die Schw.) Mai-Jul. *O. viciaefolia* Scop. *Hedysarum Onobry-*
chis L. J. a. t. 352. St. h. 19. Var.:

β. montana, die St. mehr ausgebreitet, Blättchen kürzer, breiter; *O. montana* DC. Auf Alpenwiesen, auch auf den Kalkhügeln der Rheinfläche. Die von der Länge der Fahne und des Kieles hergenommenen Merkmale habe ich bei den Variet. *α* und *β* sehr unbeständig und nicht selten in einer und derselben Tr. veränderlich gefunden.

2. *O. ARENARIA* (DC.) Sand-E. — Der St. aufstrebend; die Flügel kürzer, als der K.; Kiel länger, als die Fahne oder ein wenig kürzer, als diese; Hülsen am vorderen Rande gekielt, auf dem Mittelfelde erhaben-netzig, am Rande und dem Mittelfelde dornig-gezähnt, *die mittlern Zähne des Randes pfriemlich, so lang, als der Kamm der Hülse, die mittlern Maschen des Netzes grösser.* 2. An gebirgigen, sonnigen, kalkhaltigen O., (im östr. Littor., Triest; in der südl. Schw.) *O. supina* Gaud. *O. carnea* Schleich. *Hedysarum arenarium* Kit. bei Willd. *H. pallidum* Schleich. nach einem Expl. von dem Autor selbst. *H. angustifolium* Thom.

Von *Onobrychis arenaria* untersch. sich: 1. *O. gracilis* Besser. dch die 4mal kleinern Hülsen, dch eine einzige grosse Masche in der Mitte des Netzes, um welche die übrigen gleichsam strahlen. 2. *O. supina* DC., *Hedysarum supinum* Vill., dch die gestreckten, viel niedrigeren St., den nur die Hälfte der Fahne erreichenden Kiel, die sämmtlich pfriemlichen Dornen der Hülse, welche die Breite des Kammes der Hülse übertreffen. 3. *O. saxatilis* DC., *Hedysarum saxatile* Vill., dch einen kurzen St., längere Flügel, als der K., und wehrlose Hülsen. — *O. petrea* Desv., *Hedysarum petraeum* Bieberst., hat auch längere Flügel, als der K., aber die Pflanze ist aufrecht und die Früchte sind dornig, wie bei *O. sativa*.

III. Gruppe. *VICIEEN*. Bronn. diss. p. 133. DC. prodr. 2. 353. Hülse 1 fächerig oder dch weiche, aus einem lockern, schäumigen Zellgewebe gebildete, Querwände getheilt. Die Keimb. dick, mehlig, während des Keimens unverändert, nicht über die Erde hervortretend. B., mit Ausnahme von *Cicer*, abgebrochen-gefiedert, der gemeinschaftliche Bstiel in ein Borsichen oder eine Wickelranke endigend; die wurzelst. fehlend oder auf Schuppen zurückgeführt.

30. *CICER* (L.) Kicher. — K. 5 sp., Zpfl zugespitzt, die 2-4 oberen auf der Fahne liegend. Stbg. 2 brüderig; Stbf. an der Spitze verbreitert. Gf. kahl. Hülse aufgeblasen, häutig, 1 fächerig, 2 klappig, 2 samig. S. kantig-gefaltet, zugespitzt.

1. *C. ARIETINUM* (L.) Gemeine K. — B. sämmtl. unpaar.-gefiedert; Blättchen oval. ☉. Wird in südlichen Provinzen kultiv. und kommt daselbst unter der Saat vor. Jun. Jul. Schkhr. t. 202. Die von Rb. getrennten *C. physodes* und *sativum* sah ich noch nicht. Kultiv.

31. *VICIA* (L.) Wicke. — K. 5 sp. oder 5 zählig. Stbg. 2 brüderig; Stbf. pfriemlich. Gf. fädlich, oberwärts überall haarig, od. auf der unteren Seite, die der untern Nath entspricht, bärtig und zugleich kahl oder haarig. Hülse 2 klappig, 1 fächerig, 2- vielsamig.

Nabel des S. oval oder lineal., vor der Reife mit einem eben so gestalteten Mantel bedeckt. (B. abgebrochen-geliedert.)

1. Rotte. Gf. rundum gleichförmig behaart, an der untern Seite nicht bärtig.

1. V. PISIFORMIS (L.) Erbsenartige W. — Die Tr. reichblüthig, kürzer, als das B.; B. meist 5 paarig; *Blättchen* eyf., stumpf, aderig, *die untersten an dem St. anstehend, die halbpfeilf., gezähnten NebenB. verbergend; Gf. von der Mitte an gleichf.-behaart.* 4. In Hainen und besonders Bergwäldern; in die VorA. hinaufsteigend. Mai. Jun. St. h. 31. *Ervum pisiforme* Peterm. fl. lips. Bth. gelblich-weiss.

2. V. SYLVATICA (L.) Wald-W. — Die Tr. reichblüthig, länger, als das B.; B. meist 8 paarig; *Blättchen* eyf., stumpf, aderig; *die NebenB. halbmondf., eingeschnitten-vielzähntig, Zähne borstlich-haarspitzig; Gf. von der Mitte an gleichf.-behaart; Hülsen lineal.-länglich.* 4. In Bergwäldern, (dch das ganze Gebiet stellenweise.) Jul. Aug. St. h. 31. *Ervum sylvaticum* Peterm. fl. lips. *Wiggersia sylvatica* Fl. d. wett. Bth. weisslich, Fahne mit bläulichen Adern schön-bemalt. Nabel $\frac{2}{3}$ von dem Umriss des S. einnehmend.

3. V. CASSUBICA (L.) Kassubische W. — Die Tr. reichblüthig, kürzer, als das B., Bthstielen so lang, als die Röhre des K.; B. vielpaarig, mit einer 3 sp. zugerollten Wickelranke endigend; *Blättchen* eyf.-länglich und lanzettl., stumpf, aderig; *die NebenB. halbspiessf., ganzrandig; Gf. oberwärts überall flaumig; Hülsen fast rautenf.; W. kriechend.* 4. In Wäldern vorzügl. gebirgigen O., (stellenweise dch das ganze Gebiet.) Jun. Jul. St. h. 31. *Ervum cassubicum* Peterm. fl. lips. V. multiflora Pollich. V. Gerardi J. a. t. 229., nicht DC. V. militans Crantz. Bth. violett. Nabel den dritten Theil des S. umgebend. W. lang und weit kriechend, die St. meist einzeln.

4. V. OROBUS (DC.) Walderbsen-W. — Die Tr. reichblüthig, zuletzt länger, als das B.; B. vielpaarig, *mit einer einfachen, stachelspitzef. Ranke endigend; Blättchen* eyf.-länglich und lanzettl., stumpf, aderig; *die NebenB. halbspiessf., an der Basis etwas gezähnt; Gf. oberwärts überall flaumig; Hülsen lineal.-länglich; W. vielköpfig.* 4. Diese sehr seltene Pflanze entdeckte D. Braun und später erhielt ich sie von H. Anton Hoffmann; sie wächst am Fusse des Winterberges bei Orb im Spessart auf Wiesen und neben Gebüsch. Mai. Jun. V. cassubica Fl. dan. t. 98. V. cassubica β . Sering. bei DC. *Orobis sylvaticus* L. spec. Bth. weiss, Fahne mit violetten Adern schön-bemalt, Flügel mit 1 oder 2 Streifen bezeichnet, Kiel an der Spitze hell violett. Nabel fast von der Länge des meist länglichen S. Die W. ästig, vielköpfig, ohne kriechende Ausläufer. Eine Wicke und kein Orobis. D.

II. Rotte. Aechte VICIEN. Gf. an der untern Seite gegen die Spitze hin bärtig, ausserdem kahl, oder zugleich oberwärts rundum zottig.

§. 1. Bthstieler verlängert, reichblüthig, länger oder auch kürzer, als das stützende B.

5. *V. DUMETORUM* (A.) Hecken-W. — Die Tr. meist 6 blüthig, ohngefähr so lang, als das B.; B. meist 5 paarig; Blättchen eyf., stumpf, aderig, die untersten vom St. entfernt; die *NebenB.* halbmondff., *eingeschnitten-vielzählig*, Zähne haarspitzig; *Gf.* rundum behaart, hinten aber mit längeren Haaren *bürtig*. 4. In Hainen vorzüglich der Berge und VorA., (stellenweise im ganzen Gebiete, doch in einzelnen Provinzen selten.) Jul. Aug. St. h. 31. Bth. roth-violett, mit dunkleren Adern.

6 *V. CRACCA* (L.) Vogel-W. — Die Tr. reichblüthig, gedrun- gen, so lang, als das B. und länger; B. meist 10 paarig; *Blätt- chen* länglich und lanzettl., *nervig-aderig*, angedrückt-flaumig; die *NebenB.* halbspiessf., ganzrandig; *die Platte der Fahne von der Länge des Nagels*; die oberen Zähne des K. aus breiter Basis plötzlich pfriemlich, sehr kurz; Hülsen lineal.-länglich; *Stielchen der Hülse kürzer, als die Röhre des K.* 4. Auf Wiesen, an Ufern. Jun.-Aug. St. h. 31. Stielchen der Hülse nicht so lang, als der untere Theil des K. Var. mit breitem, fast ovalen, stumpfen, und schmalen, fast lineal., spitzen Blättchen, zu letzterer: *V. Kitaibeliana* Rb. fl. g. exsicc. n. 768., mit Ausschluss der Syn. von *Kitaib.*

7. *V. GERARDI* (DC. prodr. 2. p. 357.) Gerard's W. — Tr. reichblüthig, gedrun- gen, so lang, oder kürzer, als das B.; obere B. meist 15 paarig; *Blättchen* länglich oder lanzettl., *nervig-ade- rig, abste- hend-behaart*; *NebenB.* halb-spiessf., ganzrandig; *Platte der Fahne von der Länge des Nagels*; obere Zähne des K. aus breiter Basis plötzlich pfriemlich, sehr kurz; Hülsen lineal.-längl.; *Stiel der Hülsen länger als die Röhre des K.* 4. An unbebauten O., zw. Gebüsch und in Hainen, (in d. Valle Orlich bei Triest, bei Grächen zw. dem Saas- und Nicolaithale im Wallis.) Jun. Jul. *V. Cracca* var. II. Gaud. helv. *V. Cracca* β. Koch Synops ed. 1. *V. incana* Vill. delph. *V. gallo-provincialis* Poirer enc. Gerard fl. gallo-provinc. t. 19. Die *V. polyphylla* Desfont. ist, nach briefl. Notizen von Gay, der vorliegenden zwar ähnlich, unterscheidet sich aber doch durch viel längere Tr. als das B., auch längere Zipfel der *NebenB.*, deren unterer fast so lang ist, wie der obere; ferner nach der Beschreibung Desfontaine's in der fl. atlant. durch 8-10 paarige B. und grössere, blässere Bthen.

8. *V. TENUIFOLIA* (Roth.) Schmalblättrige W. — Die Tr. reich- blüthig, gedrun- gen, länger, als das B.; B. meist 10 paarig; *Blätt- chen* lanzettl., *nervig-aderig*, unterseits abste- hend-haarig; die *NebenB.* halbspiessf., ganzrandig; *die Platte der Fahne noch 1 mal so lang, als ihr Nagel*; die oberen Zähne des K. aus breiter Ba- sis plötzlich pfriemlich, sehr kurz; Hülsen lineal.-länglich; Stiel der Hülse kürzer, als die Röhre des K. 4. Auf Wiesen und Wald- tristen, (stellenweise dch das ganze Gebiet) Jun.-Aug. St. h. 31. Die Fahne ist bei dieser Abbildung entweder schlecht gezeichnet, oder die ganze Abbildung auf die schmalblättrige Abänderung der *Vicia Cracca* zu beziehen. *V. tenuifolia* untersch. sich v. *V. Cracca* dch die verlängerte Fahne, die von der Stelle an, wo der Mittel- nerven sich in Nebennerven theilt, noch 1 mal so lang, als ihr Na-

gel ist und doch die abstehenden Haare der B. Die Flügel sind meist auffallend blässer als die Fahne.

9. *V. VILLOSA* (Roth.) Zottige W. — Die Tr. reichblüthig, gedrunken, von der Länge des B. und länger; Bthstielen so lang, als die halbe Röhre des K.; B. meist Spaarig; *Blättchen* lanzettl., *nervig-aderig*, abstehernd-flaumig oder zottig; die NebenB. halbspiessf., ganzrandig; *die Platte der Fahne halb so lang, als ihr Nagel*; Hülsen elliptisch - fast rautenf.; Nabel Smal kürzer, als der Umriß des S. ☉. Unter der Saat, (von Holstein nach das ganze nördl. D. nach Preuss., der Lausitz und Schles., Mähr., Oestr., Steyeru.; bei Würzburg, in Graubünden, Wallis.) Mai.-Jul. St. h. 3l. *V. polyphylla* WK., nicht Desf. Bth. dunkler- oder heller violett, Flügel weisslich oder wenigstens blässer. Var:

β. glabrescens; der St. fast kahl; *Blättchen* ziemlich kahl od. weniger haarig, Haare mehr angedrückt: *V. polyphylla* Koch in der bot. Zeitg., nicht Desf. *V. varia* Host. fl. a. Diese vorzüglich in Franken und Bayern. Hierher: *V. tenuifolia* Tenor. nach einem Expl. von dem Autor selbst und *V. Cracca* Bertol. im Herbarium A. Braun's. Diese ist vorzugsweise in Franken und Bayern heimisch. — *V. Pseudocracca* Bertol. wurde im Bezirk unserer Fl. noch nicht beobachtet; sie untersch. sich von unserer Variet. *β.* doch folg.: die Fiederchen nur 3-4paarig; die NebenB. halb so lang und im Verhältniss ihrer Länge noch einmal so breit; Bth. grösser, oft 3-4 an einer Tr., zuerst aufrecht, dann wagerecht-abstehernd, oder herabgebogen, entfernt, lila mit gelblichweissen Flügeln; die Hülsen lineal-länglich, um die Hälfte schmaler und der Nabel des S. etwas kürzer. D.

10. *V. ONOBRYCHIOIDES* (L.) Hahnenkopffartige W. — Die Tr. 6-12blüthig, länger, als das B.; *Bth. entfernt, wagerecht-abstehernd*, Bthstielen $\frac{1}{3}$ so lang, als die Röhre des K.; B. 6-8paarig; *Blättchen* lanzettl. und lineal., *nervig*, unterseits flaumig; die NebenB. halbspiessf., etwas gezähnt; Hülsen lineal-länglich; *Nabel* $\frac{1}{3}$ des S. *umgebend*. 4. oder ☉. Unter der Saat, (im untern Wallis, in Istrien.) Mai.-Jul. St. h. 3l. Bth. violett, so gross wie bei der *V. angustifolia*. S.

§. 3. Bthstiele kurz-traubig, 4-6blüthig, kürzer, als die Bth. oder kaum länger, als dieselben. S. länglich, den Nabel an der schmälern Seite tragend. *Faba* DC. fl. fr. 4. 598.

11. *V. FABA* (L.) Sau-W. — Die Tr. *blattwinkelst., 2-4blüthig, sehr kurz*; B. *mit einer Stachelspitze endigend*, die obern 2-3paarig; *Blättchen* elliptisch, *stumpf*; Fahne kahl; Zähne des K. ungleich, die 3 untern lanzettl., die 2 obern kürzer, *zusneigend*; Hülsen fast stielrund, lederig, fläuml. ☉. Wird in mehreren Variet. gebauet. Jun. Jul. St. h. 32. Bth. weiss, mit schwarzem Flecke auf den Flügeln. Kultiv.

§. 4. Bthstiele 1-2blüthig, oder 4-6blüthig und kurz-traubig; Bthstiele od Tr. kürzer, als die Bth. Die S. kugelig oder länglich, den Nabel nicht an der schmälern Seite tragend. Bei *Vicia bithynica* ist der Bthstiel bisweilen etwas länger als die Bth.

12. *V. NARBONENSIS* (L.) Französische W. — Die Tr. blattwinkelst., 2-4blüthig, sehr kurz; die oberen B. 2paarig; Blättchen oval, stumpf, etwas gezähnt und ganzrandig; Fahne kahl; Zähne des K. ey-lanzettf., ungleich, die obern halb so lang; Hülsen zsgedrückt, am Rande weichstachelig-bewimpert, kahl oder haarig mit an der Basis zwiebeligen Haaren. ☉. An kultiv. O. (im östr. Littor., bei Triest, Fiume.) Mai. Jun. Var:

a. integrifolia, Blättchen ganzrandig oder nur vorne ein wenig gesägt.

β. serratifolia, Blättchen von der Basis an gesägt. *V. serratifolia* Jacq. fl. a. app. t. 8. St. h. 32. D.

13. *V. BITHYNICA* (L.) Bithynische W. — Bthstiele blattwinkelst., 1-2blüthig, halb so lang, als das B. oder länger; B. mit einer Wickelranke endigend, die oberen 2paarig; Blättchen elliptisch und lanzettf., an beiden Enden spitzig; Fahne kahl; Zähne des K. lanzettl.-pfriemlich, fast gleich, geradehervorgestreckt, so lang, als ihre Röhre; Hülsen lineal.-länglich, zottig. ☉. An grasreichen O., Ackerrändern, (bei Triest, Fiume.) Mai. Jun. J. h. vind. 2. t. 117. St. h. 32. *Lathyrus bithynicus* Lam. *L. turgidus* Lam. *L. tumidus* Willd. Bth. purpurn. Ist eine echte Vicia und kein Lathyrus. D.

14. *V. OROBOIDES*. (Wulf. bei Jacq.) Breitblättrige W. — Die Tr. 3-6blüthig, sehr kurz; B. mit einer Stachelspitze endigend, 2paarig; Blättchen eyf., zugespitzt; Fahne kahl; Zähne des K. lanzettl.-pfriemlich, abstehehd-zurückgekrümmt; Hülsen lineal., kahl. 4. In Wäldern der Berge und VorA., (Steyerm., Krain und Kärnthn.) Jun. Jul. St. h. 31. *Orob. Clusii* Spreng. *O. vicioides* DC. Diese Pflanze hat zwar das Ansehen eines *Orob.*, ist aber eine echte Vicia. Bth. bleichgelb. D.

15. *V. SEPIUM* (L.) Zaun-W. — Die Tr. blattwinkelst., meist 6blüthig, sehr kurz; B. mit einer Wickelranke endigend, meist 3paarig; Blättchen oval und länglich, stumpf; Fahne kahl; Zähne des K. aus breiterer Basis pfriemlich, ungleich, die 2 obern zsnieugend; Hülsen lineal.-länglich, kahl. 4. In Hainen, an Büschen, Zäunen. Apr.-Jun. St. h. 31. *Wiggersia sepium* Fl. wett. Bth. hell- und etwas schmutzig-violett, Fahne mit dunklern Adern. Var.:

a. vulgaris, Blättchen eyf., die der untersten B. rundlich.

β. angustifolia, Blättchen eyf.-länglich oder eyf.-lanzettf.: *V. montana* von Fröhlich in briefl. Mittheilungen.

γ. ochroleuca, Bth. blass-gelb, mit Ausnahme eines Fleckens vor der Spitze des Schiffchens: *V. sepium β. ochroleuca* Bast. suppl. n. S., DC. fl. fr. Eine andere sehr seltene Variet. mit gelblichweissen Bth., deren Fahne mit purpurnen Adern bemalt ist, sandte mir Bogenhard.

16. *V. PANNONICA* (Jacq. fl. aust. t. 31.) Ungarische W. — Die Tr. blattwinkelst., 2-4blüthig, sehr kurz; B. 5-8paarig, Blättchen länglich und verkehrteyf., stumpf oder gestutzt; Fahne haarig; Zähne des K. pfriemlich-borstlich, ohngefähr so lang, als ihre Röhre; Hülsen abwärts-gebogen, länglich, rauhb., Haare einfach. ☉.

Auf Aeckern, (Oestr., Istrien.) Mai-Jul. St. h. 31. Bth. weisslich, Fahne auf dem Rücken bräunlich, vorne braungestreift. Var.:

β . *purpurascens*, Bth. purpurlich, die Fahne dunkler aderig. *V. pannonica* var. β . Willd. spec. *V. purpurascens* DC. *V. striata* Bieberst. *V. uncinata* Rb., aber keineswegs *Vicioides uncinata* Moench., welche „dch nicht bezeichnete NebenB., paarige, fast sitzende, aufrechte Bth., glatte K., Kelchzähne fast von der Länge der Blkr. und lineal., etwas zottige Hülsen“ sehr verschieden ist. D.

17. *V. HYBRIDA* (L.) Bastard-W. — *Bth. blattwinkelst., einzeln, kurz-gestielt*; B. mit einer Wickelranke endigend, 5-7paarig; Blättchen länglich und verkehrteyf., gestutzt; *Fahne haarig*; Zähne des K. pfriemlich, ungleich, geradehervorgestreckt; Hülsen abwärtsgebogen, elliptisch-länglich, rauhh., Haare auf einem kleinen Knötchen sitzend. ☉. An kultiv. und kräuterreichen O., (Triest, Fiume, südl. Schw., aber hier selten.) Mai. Jun. Bth. gelblich-weiss. Var. mit kurzen, verkehrtherzf. Blättchen (St. h. 32.) und β . Blättchen länglich, kaum gestutzt.

18. *V. LUTEA* (L.) Gelbe W. — *Bth. blattwinkelst., einzeln* und gezweiet, kurzgestielt; B. 5-8paarig; Blättchen lineal. und länglich, stumpf; *Fahne kahl*; Zähne des K. lanzettl., zugespitzt, ungleich, die 2 oberen um die Hälfte kürzer, zneigend, der unterste länger, als die Röhre; *Hülsen* abwärtsgebogen, elliptisch-länglich, *rauhh.*, *Haare* auf einem grossen Knötchen sitzend. ☉. Unter der Saat, (in der südl. Schw. selten; auf der Rheinfläche bei Strassburg, zwischen Darmstadt und Frankf., bei Fechlheim und Offenbach und a. O. d. Fl. der Wetterau; am Unterrheine auf dem Meyenfelde bei Andernach, Neuwied, Braubach, im Gebiete der Fl. von Spa.) Jun. Jul. St. h. 31. *Wiggersia lutea* Fl. wett. Bth. hellgelb. Eine sehr schöne Variet. mit rosenrother Fahne und Flügel, und Purpurstreifen auf jener zog ich aus d. S. der gelbblühenden Art. Var. ferner:

β . *hirta*, der St. dicker, aufrechter; die ganze Pflanze mehr steifh., Bth. manchmal, nicht immer, bleicher: *V. hirta* Balb. nach Pers. synops. und nach einem Expl. vom Autor selbst herstammend. *V. lutea* β . *pallidiflora* DC. prodr.

19. *V. GRANDIFLORA* (Scop.) Grossblumige W. — *Bth. blattwinkelst., einzeln* und gezweiet, kurzgestielt; *Fahne kahl, noch 1mal so lang, als die Flügel*; *Zähne des K. lanzettl.-pfriemlich, halb so lang, als ihre Röhre, fast gleich, gerade hervorgestreckt*; Hülsen absteehend, lineal.-länglich, fläumlich oder kalil. ☉. Auf Aeckern und an grasreichen O., (bei Triest, Istrien, Fiume!) Mai Jun. Bth. hellgelb, Fahne auf dem Rücken nach der Basis olivenbraun. Der Nabel nimmt $\frac{2}{3}$ des ganzen S., bei der *V. lutea* nur $\frac{1}{6}$ ein. Var.:

a. *Scopoliana*, Blättchen kurz, verkehrtherzf. Scop. t. 42. St. h. 32.

β . *Kitaibeliana*, Blättchen mit Ausnahme der untersten B., länglich-keilig: *V. sordida* WK. t. 133. St. h. 31.

β . *Biebersteiniana*, Blättchen der oberen B. lineal.: *V. Bie-*

bersteinii Bess. *V. sordida* M. Bieberst. In dem Garten ganz bestimmt jährig und nicht perennirend. D.

20. *V. SATIVA* (L. var. *a.*) Futter - W. — *Bth. blattwinkelst., meist gezwielet*, kurzgestielt; B. meist 7 paarig; Blättchen verkehrteyf. oder länglich-verkehrteyf., sämmtlich ausgerandet-gestutzt; Fahne kahl; *Zähne des K. lanzettl.-pfriemlich, ohngefähr so lang, als ihre Röhre, gerade hervorgestreckt; Hülsen aufrecht, länglich, flaumig; S. kugelig-etwas zusammengedrückt.* ☉ Auf Aeckern unter der Saat in den südlicheren Gegenden, ausserdem überall angebaut. Mai. Jun. *V. sativa a.* obovata Ser. bei DC. *V. sativa* St. h. 31. Eine mehr oder weniger zottige Pflanze. Fahne blau, Flügel purpurn. Hülsen lederbraun.

21. *V. ANGUSTIFOLIA* (Roth.) Schmalblättrige W. — *Bth. blattwinkelst., meist gezwielet*, kurzgestielt; B. meist 5 paarig; Blättchen der untern B. verkehrteyf., ausgerandet-gestutzt od. abgeschnitten; Fahne kahl; *Zähne des K. lanzettl.-pfriemlich, ohngefähr so lang, als ihre Röhre, gerade hervorgestreckt; Hülsen abstehend, lineal., bei der Reife kahl; S. kugelig.* ☉ Auf Aeckern u. Brachäckern. Mai. Jun. Bth. purpurn. Die reifen Hülsen schwarz. B. 4-5 paarig, bei üppigern Expl. 6-7 paarig. Var.:

a. segetalis, Blättchen der obern B. lanzettl.-lineal.: *V. sativa* β. Ser. bei DC. *V. segetalis* Thuill. St. h. 32. *V. angustifolia* Forster. *V. lughanensis* Schleich. im Herbar. v. Balb. nach DC.

β. Bobartii, Blättchen der obern B. lineal.: *V. Bobartii* Forst. *V. angustifolia* Smith, Roth. St. h. 31. *V. sativa* δ. Ser. bei DC. *V. lughanensis* Schl. nach DC. Herbarium. Spielt mit lichtbraunen, braungefleckten und schwarzen S. Selten kommt sie vor mit 3-4 blattwinkelst. Bth., von denen die eine stiellos ist, die übrigen auf einem verlängerten Bthstiele stehen.

22. *V. CORDATA* (Wulfen nach Hoppe bei St. h. 32.) Herzblättrige W. — *Bth. blattwinkelst., meist gezwielet*, kurzgestielt; B. meist 7 paarig; *Blättchen der untern B. verkehrtherzf., die der obern lineal.-keilig, 2lappig-ausgerandet; Fahne kahl; Zähne des K. lanzettl.-pfriemlich, gerade hervorgestreckt; Hülsen lineal.* ☉ Unter der Saat, (im Littor. und Krain.) St. h. 32. Untersch. sich dch die tief ausgerandeten, an der Spitze gleichsam 2lappigen Blättchen. Frucht und S. mir unbekannt. D.

23. *V. PEREGRINA* (L.) Fremde W. — *Bth. blattwinkelst., einzeln*, kurzgestielt; B. 4-7 paarig; Blättchen lineal., gestutzt; *Fahne kahl; Zähne des K. lanzettl. zugespitzt, fast gleich, die 4 oberen aufwärts gekrümmt; Hülsen herabgeschlagen, länglich, flaumlich.* ☉ Unter der Saat und an kultivirten O., (Istrien, Fiume, Veglia, Untersteyern.) Mai. Jun. St. h. 32. Nabel oval, halb so lang, als bei *V. angustifolia*. J.

24. *V. LATHYROIDES* (L.) Blatterhsenartige W. — *Bth. blattwinkelst., einzeln, fast sitzend; B. 2-3 paarig mit einer Stachelspitze, die oberen mit einer Ranke endigend; Blättchen verkehrteyf., gestutzt; Zähne des K. pfriemlich, gerade, fast gleich;*

Hülsen lineal., kahl; *S. cubisch, körnig-rauh*. ☉. Auf Triften, mit niedrigem Grase bedeckten Hügeln und trocknen Wiesen, stellenweise im g. Gebiete.) Apr. Mai. Bth. klein. St. h. 31.

32. ERVUM (L.) Linse. — K. 5 sp. od. 5zähmig. Stbg. 2hrüderig; Stbf. pfriemlich. Gf. fädlich, auf der obern Seite rundum gleichmässig behaart; Hülse 1fächerig, 1-vielsamig. Nabel des S. wie bei Vicia. B. abgebrochen-geliedert. Ueber die II. Rotte vergl. die Anmerkung *)

I. Rotte. ERVILIAE. Gf. oberwärts rundum auf gleiche Weise behaart. Mit dieser Rotte ist die I. der Gattung Vicia zu verbinden.

1. E. HIRSUTUM (L. spec. 1039.) Rauhh. W. — *Bthstiele 2-6 blüthig, ohngefähr so lang, als das B.*; die oberen B. mit einer Wickelranke endigend, *meist 6paarig*; Blättchen lineal., stumpf oder gestutzt; die untern NebenB. lanzettl., halbspiessf., Zähne des K. so lang, als ihre Röhre; *Hülsen länglich, 2samig, flau-mig*. ☉. Auf Aeckern, in Gärten, an sandigen Ufern. Jun. Jul. St. h. 32. Vicia hirsuta Koch Synops. ed. 1. Bth. bläulich-weiss.

2. E. TETRASPERMUM (L. spec. 1039.) Viersamige W. — *Bthstiele 1blüthig, grauenulos, ohngefähr so lang, als das B.*; die oberen B. mit einer Wickelranke endigend, 3-4paarig; Blättchen lineal., stumpf; die NebenB. halbspiessf.; Zähne des K. kürzer, als ihre Röhre; *Hülsen lineal., 4samig, kahl*. ☉. Auf Aeckern, kultiv. Orten, Sandfeldern. Jun. Jul. St. h. 32. Vicia tetrasperma Mönch meth., Koch Synops. ed. I. V. gemella Crantz. Fahne lila, blau-gestreift, die Flügel nebst dem Kiele weiss, der letztere mit einem violetten Flecken.

3. E. GRACILE (DC. cat. hort. monsp.) Schlanke W. — *Bthstiele*

*) Die Gattungen Vicia, Ervum, Lathyrus und Orobus sind durch feste charakteristische Merkmale noch nicht streng geschieden. Der Griffel ist nicht bei allen Arten der Gattung Lathyrus oben breiter und bekommt nicht bei allen eine schiefe Stellung, und eben so unterscheidet sich Orobus weder durch die Bildung des Gf. noch durch ein anderes Kennzeichen von Lathyrus. Bei vielen Arten von Vicia ist der Gf. rundum mit Haaren besetzt, hat aber keine Spur von einem Barte unter der Spitze der untern Seite. Wollten wir nun diese Arten durch entsprechende Kennzeichen begrenzen, so müsste man die II. Rotte von Vicia und die II. Rotte von Ervum unter das Genus: Ervum vereinigen, was bereits Petermann in der Fl. von Leipzig gethan hat; ferner müsste die I. Rotte von Ervum zu Lathyrus gezogen und endlich alle Arten von Orobus der Gattung Lathyrus, von der sich jene Gattung durch keinen Character unterscheidet, einverleibt werden, wie dieses auch schon von Wimmer in der 2. Auflage der Fl. von Schlesien geschehen ist. Eine solche Zusammenstellung möchte aber von unseren Botanikern noch nicht beifällig aufgenommen werden, daher wollte ich auch die Arten unserer Fl. nicht nach der angeführten Weise ordnen, sondern lieber die bisher gebräuchlichen Gattungen beibehalten. Die Hauptkennzeichen der verbesserten Gattungen möchten folgende seyn:

- I. VICIA. Gf. unter der Spitze an der äussern Seite bärtig, übrigens kahl, oder rundum mit kurzen Haaren besetzt. (II. Rotte von Vicia.)
- II. ERVUM. Gf. oben rundum gleichmässig haarig (I. Rotte von Vicia, II. Rotte von Ervum.). Bei Ervum hirsutum sind nur sehr wenige Haare an der Spitze des Gf., aber sie fehlen doch nicht ganz.
- III. LATHYRUS. Gf. oberwärts abgeplattet und auf der inneren Seite von der N. an abwärts haarig (I. Rotte von Ervum und alle Arten von Lathyrus und Orobus.)

1—4blüthig, begrannt, zuletzt noch 1mal so lang, als das B; die oberen B. 3-4paarig; Blättchen lineal, spitz; die NebenB. halbspiessf.; Zähne des K. kürzer, als ihre Röhre; *Hülsen lineal., 6samig, kahl.* ☉. Auf Aeckern und an kultivirten Orten, (Mühlhausen im Elsass, auf der Rheinfläche zw. Speyer und Mainz, Osnabrück; bei Weissensee in Thüringen, Ins. Brioni u. Osero.) Jun. Jul. E. tenuifolium Lagasc. E. tenuissimum Pers. E. longifolium Tenor. Vicia gracilis Lois. fl. gall., Koch Synops. ed. 1. Bth. fast noch 1mal so gross, als bei der vorhergehenden, Nabel des S. aber um die Hälfte kürzer und oval. D.

4. E. MONANTHOS (L. spec. 1040.) Einblüth. W. — Bthstiele 1blüthig, ohngefähr so lang, als das B.; B. meist 7paarig; Blättchen lineal., stumpf oder gestutzt; die NebenB. ungleichförmig, das eine lineal., ganz, sitzend, das andere halbmondf., borstlich-gezähnt, gestielt; Zähne des K. länger, als ihre Röhre; Hülsen breit-länglich, meist 3samig. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O., (auf dem Meienfelde bei Andernach und um Coblenz häufig; ausserdem hin und wieder, wo die Pflanze kultivirt wird.) Jun. Jul. St. h. 32. Vicia monantha Koch Synops. ed. 1. V. articulata Willd. en., (nicht V. monantha Willd.) V. multifida Wallr. Lathyrus monanthos Willd. spec. Bth. fast 3mal so gross, als bei den vorhergehenden, S. linsenf.-zsgedrückt, gross. D.

5. E. ERVILIA (L. spec. 1040.) Linsenartige W. — Bthstiele 2blüthig, kürzer, als das B.; B. meist 10paarig, mit einer Stachelspitze endigend; Blättchen länglich, gestutzt; die NebenB. gleich, halbspiessf., borstlich-gezähnt; Zähne des K. pfriemlich, länger, als ihre Röhre; *Hülsen lineal-länglich, buchtig-holperig, fast perlschnurf.* ☉. Auf Aeckern unter der Saat, (Istrien; bei Mühlheim am Oberrheine; zw. d. Glan, d. Rhein u. d. Nahe, Werthheim, in der Schw., wo die Pflanze kultiv. wird.) Jun. Jul. V. Ervilia Willd. spec., Koch Synops. ed. 1. St. h. 32. Bth. weisslich, Fahne violett-gestreift; S. eckig-kugelig.

II. Rotte. Gf. an der oberen Seite flach, und gegen die Spitze hin der Länge nach behaart, auf der unteren Seite kahl. Diese Rotte enthält Arten der Gattung Lathyrus.

6. E. LENS (L.) Gemeine Linse. — Bthstiele 1-2blüthig, ohngefähr so lang, als das B., begrannt; die oberen B. mit einer Wickelranke endigend, meist 6paarig; die NebenB. lanzettl., ganzrandig; K. so lang, als die Blkr.; *Hülsen* fast rautenf., 2samig, kahl. ☉. Wird kultiv. und kommt hie und da gleichsam wild vor. Jun. Jul. St. h. 32. Cicer Lens Willd. Kultiv.

7. E. NIGRICANS (M. Biberst.) Schwärzliche L. — Bthstiele 1-2blüthig, länger, als das B., begrannt; B. mit einer Stachelspitze endigend, die obere 3paarig; die NebenB. halbspiessf., gezähnelt; K. so lang, als die Blkr.; *Hülsen* fast rautenf., 2samig, kahl. ☉. An unfruchtbaren O., (Istrien,) Apr. Mai. E. uniflorum Ten. fl. neap. E. soloniense L. spec. nach der Beschreibung in den Amoen. acad.

8. **E. LENTICULA** (Schreb. bei St. h. 32.) Grannenlose L. — Bthstiele 1blüthig, länger, als das B., grannenlos; B. mit einer Stachelspitze endigend, die oben in eine Ranke auslaufenden 3paarig; die NebenB. halbspiessf., ganzrandig; K. kürzer, als die Blkr.; *Hülsen* fast rautenf., 2samig, *flaumig*. ☉. An steinigten, unfruchtbaren O., (in Kärnthen; Istrien, Fiume.) St. h. 32. Cicer ervoides Brign. Bth. blau. D.

33. **PISUM** (L.) Erbse. — K. 5sp. Stb. 2brüderig; Stbf. pfriemlich. Gf. auf der untern Seite zsgefaltet-gekielt, auf der obern oberwärts härtig. Hülse 1fächerig, vielsamig. Nabel des S. wie bei Vicia. B. abgebrochen-gesiedert.

1. **P. ELATIUS** (M. Bieberst. fl. taur. canc. 2. p. 151.) Grosse E. — NebenB. eyf., *halb-herzf.*, an der Basis ungleich gezähnt, 2-3mal kürzer als der Bthstiel; B. dreipaarig, Blättchen elliptisch oder längl.; Bthstiele 1-2blüthig. ☉. ? In Heckengebüsch Istriens. Jun. ? *P. elatum* DC. prodr. Dadurch, dass die Bthstiele 2-3mal länger, als die NebenB., und dch den Standort in Hecken und nicht auf Feldern unterscheidet sich diese Pfl. von den beiden nächstfolgenden; wenn auch bei diesen der Bthstiel 2blüthig und deshalb etwas länger ist, als das NebenB., so reicht doch der Anheftungspunkt der untersten Bthe nie bis zur Spitze der NebenB. J.

2. **P. ARVENSE** (L.) Zucker-E. — Die NebenB. ey-halbherzf., an der Basis ungleich gezähnt, so lang, als die 1blüthigen Bthstiele oder etwas länger, als die untere Bthe des 2blüthigen Bthstieles; B. 2-3paarig; Blättchen eyf.; S. kantig-eingedrückt. ☉. Mehre Variet. werden, wie von der folgend., kultiv. Mai-Jul. *Pisum arvense* Schüb. und Mart. St. h. 4. Fahne hellviolett, Flügel purpurn. S. grau-grün, braun-punktirt. Kultiv.

3. **P. SATIVUM** (L.) Gemeine E. — Die NebenB. ey-halbherzf., an der Basis ungleich gezähnt, so lang, als die 1blüthigen Bthstiele oder etwas länger, als die untere Bthe des 2blüthigen Bthstieles; B. 3paarig; Blättchen eyf., S. kugelig. ☉. Kultiv. Mai-Jul. Bth. immer weiss. S. nicht eingedrückt, gleichfarbig, hellgefärbt. Dch den Anbau werden die Bthstiele vielblüthig. Kultiv.

4. **P. MARITIMUM** (L.) Meersstrands-E. — Die NebenB. spiessf. mit spitzen Oehrchen; B. 4paarig; Blättchen elliptisch, ganzrandig; Bthstiele reichblüthig; der St. kantig. 4. Am Meerstrande, (in Mecklenbg bei Warnemünde und Rostock und hin und wieder an der Ostsee von Pommern und Preussen; in Istrien.) Jun. Aug. Fl. dan. t. 338. Bth. purpurn, Fahne mit dunkleren Adern bemalt. D.

34. **LATHYRUS** (L.) Platterbse. — K. 5sp. oder 5zählig. Stbg. 2brüderig; Stbf. pfriemlich. Gf. lineal., oder aufwärts verbreitert, auf der obern Seite flach und von der N. an abwärts der Länge nach behaart, auf der unteren Seite kahl. Die N. gerade oder zurückgekrümmt; Hülse 2klappig, 1fächerig, 2-vielsa-

mig. Nabel des S. wie bei *Vicia*. (B. abgebrochen-gefiedert; der gemeinschaftl. Bstiel der obern B., mit Ausnahme von *L. Nissolia*, in eine einfache oder ästige Wickelranke endigend.)

I. Rotte. *NISSOLIA*. Die Blätter fehlend, Bstiel wickelranken- oder blattförmig.

1. *L. APHACA* (L.) Deckblattige P. — Bthstiele 1blüthig; Bstiele fädlich, *blattlos*, mit einer Wickelranke endigend; die NebenB. *sehr gross*, verkehrteyf., an der Basis geöhrt-pfeilf. ☉ Auf Aeckern der Ebenen, (stellenweise deh das mittl. und südl. D. und die Schw.) Jun. Jul. Bth. gelb. S. glatt.

2. *L. NISSOLIA* (L.) Einfachblättrige P. — Bthstiele 1-2blüthig; Bstiele *lanzettl., blattf., ohne Wickelranke*; die NebenB. pfriemlich, an der Basis halbspiessf. ☉ Auf den Aeckern der Ebenen, (von der westl. Schw. deh das Rheingebiet bis nach den Niederlanden stellenweise: sodann in Schles. und in Krain.) Mai-Jul. Bth. purpurn. S. knötig-rauh.

II. Rotte. *CLYMENUM*. DC. prodr. Die unteren Bstiele blattlos, die oberen B. tragend.

3. *L. OCHRUS* (De C. fl. fr. 4. p. 578.) Bthstiele 1blüthig, kürzer, als das B.; Bstiele *breitgeflügelt*, hinablaufend, *lanzettl. oder elliptisch*, die unteren blattlos, die oberen blättertragend, B. 1-2paarig; Hülsen *breitlängl., zsgedrückt*, netzig-aderig, kahl, 4-8samig, am oberen Rande 2flügelig; S. *etwas kantig, glatt*. ☉ Unter der Saat in Istrien. (Biasol.) Mai. Jun. *Pisum Ochrus* L. sp., Schkhr t. 200 *Ochrus pallida* Pers. synops. Blkr. gelblich-weiss, ins Grünliche spielend. J.

4. *L. AURICULATUS* (Bertoloni rar. ital. pl. dec. 2. ed. 1. p. 38.) Geöhrelte P. — Bthstiele 1-3blüthig; Bstiele *breitgeflügelt*, die unteren herablaufend, *lanzettl., zugespitzt, blattlos*, die oberen beblättert, B. 1-2paarig; Hülsen *längl.-lineal, am oberen Rande stumpf-2kiedig*; S. *etwas zsgedrückt*, oft an beiden Enden abgestutzt, glatt. ☉ Auf kultiv. Lande der Inseln von Istrien, (Insel Unie, Tommas.) Mai. Jun. *L. purpureus* Desfont. coroll. *L. spurius* Willd. en. h. berol. Fahne purpurn, Flügel bläulich, Schiffchen weiss. J.

III. Rotte. *EULATHYRUS* Sering. bei DC. prodr. Bstiele sämmtlich B. tragend.

§. 1. B. 1-2paarig. Bthstiele 1-2blüthig. W. jährig.

* S. glatt.

5. *L. INCONSPICUUS* (L.) Kleinblüthige P. — Bthstiele 1blüthig, kürzer, als der Bstiel, an der Basis gegliedert, *grannenlos* mit kleinen Deckblättchen; B. 1paarig; der Fruchtkn. *seidenh.-zottig*; Hülsen verlängert, lineal., 8-10samig, gedunsen, fläumlich, aderig-gestreift; S. *oval, beiderseits abgeschnitten-stumpf, glatt*, Nabel rundl. ☉ Am Meerstrande, (Istrien.) Jun. Jul. Bth. lila, halb so gross, als bei den folgenden beiden und auch die ausgewachsenen Hülsen noch flaumig. *L. parviflorus* Roth. Die Pfl. habe ich aus

Host aufgenommen, ein Exempl. aus Istrien kam mir noch nicht zu Gesichte. J.

6. L. STANS (Visiani in bot. Zeitg.) *Bthstiele 1blüthig*, kürzer als der Bstiel, an der Basis gegliedert, *grannenlos*, mit einem kleinen DeckB.; B. 1paarig; *Fruchtkn. kahl*, fein-drüsig-punktirt; Hülsen verlängert, lineal, 8-10samig, gedunsen, kahl, aderig-gestreift; S. kugelig, glatt, *Nabel rundl.* ☉. Unter der Saat, (Fiume, Osero, Noë.) Jun. Jul. Blb. lila. Unterscheidet sich von dem vorigen dch noch einmal so grosse Bth., die kahlen Fruchtkn. und die kugeligen S., von dem folgenden dch das Fehlen der Granne des Bthstieles, die Farbe der Bth. und die Hülsen, welche aderig-netzig, aber nicht aderig-gestreift sind, und dch rundl. Nabel. J.

7. L. SPHAERICUS (Retz.) Kugelsamige P. — *Bthstiele 1blüthig*, kürzer, als der Bstiel, an der Basis gegliedert und *begrannt*; B. 1paarig; *der Fruchtkn. kahl*; Hülsen verlängert, lineal., 8-10samig, gedunsen, kahl, aderig-gestreift, Adern hervorspringend; S. kugelig, glatt, *Nabel länglich-oval.* ☉. Auf Aeckern und an grasreichen O., (im Wallis, bei Botzen im südl. Tyrol; Triest; Istrien) Mai. Jun. L. roccineus All. L. axillaris Lam. L. inconspicuus Jacq. h. vind. v. 1. t. 86. Bth. ziegelroth.

8. L. CICERA (L.) Rothe P. — *Bthenstiele 1blüthig*, kürzer, als das B., oberwärts gegliedert, mit kleinen Deckblättchen; *Bstiele schmal-geflügelt, lineal.*, sämmtl. B. tragend; B. 1paarig; *Hülsen* (reif) länglich, zsgedrückt, netzig-aderig, kahl, meist 4samig, *der obere Rand gerade, schmal-2flügelig*; S. kantig, glatt. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O., (in der Schw., in der Gegend des Genfersees; im Littor. bei Triest, sehr selten; Istrien, Fiume.) Apr.-Jun. Bth. roth. S. röthlich, ungefleckt.

9. L. SATIVUS (L.) Essbare P. — *Bthstiele 1blüthig*, kürzer, als das B., oberwärts gegliedert, mit kleinen Deckblättchen; *Bstiele schmal-geflügelt, lineal.*, sämmtl. B. tragend; B. 1paarig; *Hülsen* elliptisch-länglich, flach-zsgedrückt, netzig-aderig, kahl, meist 4samig, *der obere Rand gekrümmt, 2flügelig*; S. kantig, glatt. ☉. Auf Aeckern unter der Saat, (in den südlicheren Gegenden; auch hin u. wieder im Grossen gebauet.) Mai. Jun. Var.: Blkr. blau, rosenroth und weiss. Zpfl des K. abstehend, welche bei L. Cicera aufrecht sind. S. ledergelb, braun-gefleckt.

** S. knötig-rauh.

10. L. SETIFOLIUS (L.) Borstenblättrige P. — *Bthstiele 1blüthig*, kürzer, als das B., oberwärts gegliedert, mit kleinen Deckblättchen; B. 1paarig; *Hülsen* länglich, flach-zsgedrückt, netzig-aderig, kahl, 2-3samig; S. kugelig, knötig-rauh. ☉. In Weinbergen, an steinigen O., (Istrien, Fiume häufig.) Apr.-Jun. Bth. purpurn. J.

11. L. ANNUUS (L.) Jährige P. — *Bthstiele 1-2blüthig*, kürzer, als das B., an den Bthstielchen mit Deckblättchen; B. 1paarig.

rig; *Hülsen* lineal.-länglich. zsgedrückt, netzig-aderig, kahl, 6samig; *S. kugelig, knötig-rauh*. ☉. An kultiv. O., (auf der Insel Osero.) Mai-Jun. Bth. gelb. Der St. geflügelt. J.

12. *L. ANGULATUS* (L.) Eckigsamige P. — *Bthstiele 1blüthig*, länger, als das B., an der Spitze gegliedert und begrannt; B. 1paarig; *Hülsen* schmal-lineal., glatt, aderlos, kahl, meist 10samig; *S. kubisch, knötig-rauh*. ☉. In Weinbergen und unter der Saat, (Triest und Görz, Tommas; Branson und Martinach im Wallis.) Bth. purpurn.

13. *L. HIRSETUS* (L.) Rauhh. P. — *Bthstiele 2blüthig*, länger, als das B.; B. 1paarig; *Hülsen* lineal.-länglich, *rauhh.*, *Haare an der Basis zweibelig*; *S. kugelig, knötig-rauh*. ☉. Unter der Saat, (zerstreut in Schles.; Thüringen; Franken; im Rheinthale bei Basel; im Oberelsass gemein; in der Rheinpfalz bei Otterbach hinter Kaiserslautern; Oberhessen; bei Würzburg; Frankf.; Spa; in Istrien.) Jun. Jul. Riv. t. 41. Bth. blau-

§. 3. B. 1-mehrpaarig. Bthstiele reichblüthig. W. perennirend.

* St. kantig, flügellos.

14. *L. TUBEROSUS* (L.) Knollige P. — *Bthstiele reichblüthig*, länger, als das B.; B. 1paarig; *Hülsen* lineal.-länglich, kahl, netzig-aderig; *S. schwach-knötig; die oberen Zähne des K. kurz-3eckig; die St. kantig, flügellos*. 4. Auf Aeckern, auf Kalk- und Lehm Boden. Jul. Aug. Riv. t. 42. Bth. purpurn.

15. *L. PRATENSIS* (L.) Wiesen-P. — *Bthstiele reichblüthig*, länger, als das B.; *Bth. allseitig abstehend*; B. 1paarig; *die NebenB. pfeilf.*; *Hülsen* lineal.-länglich, schief-aderig. Adern hervorspringend; *S. kugelig, glatt; Zähne des K. kürzer, als der Fruchtkn., sämmtl. lanzettl.-pfriemlich; die St. kantig, flügellos*. 4. Auf Wiesen, an Zäunen. Ufern. Jun. Jul. Bth. gelb. Scopoli trennt in der Fl. carniol. 2. p. 64. von seinem Lathyrus pratensis, welcher ohne Zweifel die unsrige und die Linnäische, und die überall gemeine Pflanze ist, („Blättchen zottig, Bth. traubig,“ Scop. a. a. O.) eine andere verwandte, diesseits der A. noch nicht aufgefundene Art, („B. kahl, Bth. einerseitswendig, Kelchzähne fast gleich, und nicht die 2 obersten einwärtsgekrümmt,“ Scop. a. a. O.) welche ganz mit d. *L. Hallersteinii* Baumg. übereinstimmt, weswegen ich diesen hier aufnehme, obgleich ich noch kein Krainer Expl. sah. Scopoli beschreibt die *NebenB. d. L. pratensis* nach denen der Aeste, denn an dem St. haben sie immer 2 Haken, wie bei der folgenden Art.

16. *L. SEPIUM* (Scop.) Hecken-P. — *Bthstiele reichblüthig*, länger, als das B.; Bth. einerseitswendig; B. 1paarig; *die NebenB. spießf.*, fast rechtwinkelig; *Hülsen* . . . ; *Zähne des K. sämmtl. lanzettl.-pfriemlich, der untere so lang, als der Fruchtkn.; die St. kantig, flügellos*. 4. An Hecken bei Görz. Mai. Jun. Diese Pflanze hatte ich für einerlei gehalten mit Lathyrus Hallersteinii Baumg., besonders aus dem Grunde, weil Rochel bei seinem *L. pra-*

tensis grandistipulatus, welchen derselbe mit *L. Hallersteinii*, den *L. sepium* Scop., citirt, nun aber bin ich darüber völlig in Zweifel, denn der *L. Hallersteinii* ward bis jetzt bei Görtz, wo Scop. seinen *L. sepium* entdeckte, nicht aufgefunden, und überdies giebt es noch eine andere, dem *L. pratensis* ähnlichere Pflanze, welche ich kürzlich aus der Schw. und Krain erhielt, in der man nach meiner Ansicht den *L. sepium* Scop. finden könnte. Diese unterscheidet sich von *L. pratensis* dch ihre Kahlheit und die grösseren Bl., aber als eigene Art ist sie mir doch noch nicht deutlich; die Hülsen und S., welche in dieser Gattung von grosser Wichtigkeit sind, sah ich bis jetzt nicht.

** S. augenfällig geflügelt.

17. *L. SYLVESTRIS* (L.) Wald-P. — Bthstiele reichblüthig, länger, als das B.; Blättchen 1paarig; Hülsen länglich-lineal., kahl; S. klein-runzelig, *der Nabel die Hälfte des S. umgebend; die St. breit- d. Bstiele schmal-geflügelt.* 4. An waldigen und buschigen, gebirgigen O. Jul. Aug. Fahne auf dem Rücken grün, in das Hellfleischrothe spielend, einwärts an der Basis purpurn, übrigens fleischroth mit dunkleren Adern, Flügel vorne und der Kiel an der Spitze purpurn. Var. mit 3 Linien und $1\frac{1}{2}$ Zoll breiten B. Der *L. latifolius* und *heterophyllus* der Schwedischen Fl. sind nach Fries Varietäten dieser Art.

18. *L. LATIFOLIUS* (L.) Breitblättrige P. — Bthstiele reichblüthig, länger, als das B.; B. 1paarig; Hülsen länglich-lineal., kahl; S. knötig-runzelig, *Nabel kaum $\frac{1}{3}$ des S. umgebend; die St. nebst den Bstielen breit-geflügelt.* 4. In Gebüsch und an Hecken, (in Istrien, Tommas., bei Fiume, Noë; wird in vielen Florengebieten angeführt, wo er wohl nur verwildert ist.) Jul. Aug. Bth. grösser, als bei der vorhergehenden, schön-rosenroth. — Var. wie *L. sylvestris* mit $1\frac{1}{2}$ Zoll breiten, schmäleren und ganz schmalen B. Die Variet:

β. angustifolius mit 1- $1\frac{1}{2}$ Linien breiten B. ist: *L. ensifolius* Badarr. in diar. phys. chem. papiens. 1824., *L. sylvestris α. ensifolius* DC. prodr.; gehört aber sicher zu *L. latifolius*, und nicht zu *L. sylvestris*. (bei Fiume, Noë)

19. *L. PLATYPHYLLOS* (Retz. prodr. fl. scand. ed. 2. n. 882.) Breitblättrige P. — Die vielblüthigen Bthstiele länger als das B.; B. einpaarig; Hülsen länglich-lineal.; S. schwach-knötig, *Nabel die Hälfte des S. umgebend; St. breit-geflügelt, Flügel der Bstiele fast eben so breit.* 4. In Gebüsch und Wald O., (zerstreut im nördl. und mittleren Geb.) Jul. Aug. Fahne an der inneren Seite rosenroth, die Flügel vorne violett. Unterscheidet sich von *L. latifolius*, ausser den schwach-knötigen S., dch den Nabel, um die Hälfte kleinere Bth, dch den nur halb so langen, dünneren Gf.; von *L. heterophyllus*, dch den Nabel, die immer 1paarigen B. und von *L. sylvestris* dch die breit-beflügelten Bstiele, die heller purpurnen Bl., die kleineren NebenB.

20. *L. HETEROPHYLLUS* (L.) Verschiedenblättrige P. — Bthstiele reichblüthig, länger, als das B.; *die oberen B. 2-3paarig; Hül-*

sen länglich-lineal., kahl; S. knötig-rauh, *Nabel kaum $\frac{1}{3}$ des S. umgebend*; die *St. nebst den Bstielen breitgeflügelt*. 4. In Gebüsch und an waldigen O., (hin und wieder, im nördl. und mittleren D. und der Schw.) Jul. Aug. L. intermedius Wallr. wegen „d. 2paarigen Blättchen.“ Var:

β. unijugus, mit 1paarigen B. „Diese Variet. unterscheidet sich von der breitblättrigen des L. sylvestris dch die graulich grüne Farbe, dch die *Flügel an den Bstielen, welche eben so breit sind, wie am St.* und dch die breiteren, längeren NebenB.“

21. L. PALUSTRIS (L.) Sumpf-P. — Bthstiele reichblüthig, länger, als das B.; B. 2-3paarig; Oehrchen der NebenB. lanzettl., zugespitzt; Hülsen lineal.-länglich, gerade, kahl; S. glatt, Nabel den vierten Theil des S. umgebend; *St. geflügelt*; *Bstiele flügellos*, schmalberandet. 4. Auf sumpfigen Wiesen, (stellenweise dch das ganze Gebiet.) Jul. Aug. Ausgezeichnet dch den bis zur Mitte seiner Länge bärtigen Gf. Bth. blau. — L. incurvus von Hochstetter in Mähren gesammelt. ist nach dessen neueren Beobachtungen eine Variet. d. L. palustris, was auch ein mir mitgetheiltes Expl. bestätigt.

35. ÓROBUS (L.) Walderbse. — B. abgebrochen-gefiedert; der gemeinschaftl. Bstiel mit einer krautigen Stachelspitze endigend. (Ausser dem Mangel der Wickelranken untersch. sich die Gattung Orobus von Lathyrus nicht weiter.)

1. O. VERNUS (L.) Frühlings-W. — Der St. kantig; B. 2-3paarig; *Blättchen eyf., länglich-eyf. und lanzettl. oder lineal., lang-zugespitzt, gewimpert, unterseits glänzend*; Bthstiele blattwinkelst., gerade, meist 4blüthig, ohngefähr so lang, als das B.; Hülsen kahl. 4. In Wäldern der Berge und Ebenen; in die A. hinaufsteigend. Apr. Mai. Bth. purpurn, sodann lasurblau-schimmernd, zuletzt von dem Blauen ins Grüne übergehend. S. glatt, Nabel $\frac{1}{3}$ des S. umgebend. St. h. 7. Var:

β. flaccidus, Blättchen lanzettl., 2-3 Zoll lang, 5-6 Linien breit. O. flaccidus Radus nach DC. prodr.

γ. gracilis, Blättchen lineal., $\frac{1}{2}$ oder 1 Linie breit, bis zu 3 Zoll lang: O. gracilis Gaud. helv., O. setiformis Schleich nach Gand. Mit Abnahme der Breite der Blättchen mehrt sich die Länge derselben, wie bei O. tuberosus.

2. O. VARIEGATUS (Tenore.) Bunte W. — Der St. kantig; B. 2-3paarig; *Blättchen breit-eyf., zugespitzt, an der Basis schief-abgerundet, gewimpert, unterseits glänzend*; Bthstiele blattwinkelst., einwärtsgekrümmt, reichblüthig, ohngefähr so lang, als das B.; *die jüngern Hülsen fein-drüsig-rauh*. 4. In Bergwäldern, (im wärmeren Theile des Küstenlandes stellenweise, nördlich bis zur Vrenscha Gora im Innerkrain; südl. Tyrol.) Mai. Jun. O. multiflorus Sieb. O. rigidus Lang. O. vernus b. latifolius Roch. O. pyrenaicus Scop. (nicht L.) O. venetus Rb. Er wächst aber nicht zu Venedig, sondern aus dieser Stadt wurden Clusius die S. gesandt. — Bth. halb so gross, als bei O. vernus, Flügel und Kiel rosenroth, etwas gestreift, Fahne purpurn mit dunkleren Linien dicht bemalt. D.

3. *O. TUBEROSUS* (L.) Knollige W. — *Der St. geflügelt*; B. 2-3 paarig; Blättchen lanzettl.-länglich oder lineal., unterseits meergrün, glanzlos; Gf. lineal.; Wurzelstock kriechend, an den Gliedern knollig. 4. In Wäldern der Ebenen und niedrigeren Bergen Apr. Mai. St. h. 2l. *O. prostratus* Host. Kommt vor mit: länglichen, $\frac{1}{2}$ Zoll breiten, und lanzettlichen Blättchen, und

β . *tenuifolius*, Blättchen lineal. oder auch sehr schmal-lineal., nur $\frac{1}{2}$ Linie breit: *O. linifolius* Reichard. *O. tenuifolius* Roth. Aus dem S. dieser Variet. erzog ich die gewöhnliche Pflanze.

4. *O. ALBUS* (L.) Weisse W. — *Der St. kantig*, einfach, oberwärts schmal-geflügelt; B. 2-3 paarig; Blättchen lineal.-lanzettl. und lineal., kahl; die NebenB. an die Basis der untern Blättchen reichend und kürzer; Gf. lineal.; W. büschelig, Fasern keulig. 4. Auf Bergwiesen und an rauhen O., (von Böhmen dch Mähren und Oestr., Rücken des Karstgebirges, Fiume; am südl. Abhange des Hirschaner und Wurminger Berges im Würtembergischen.) Mai. Jun. *O. pannonicus* Kramer. J. a. t. 39. *O. austriacus* Crantz. *O. asphodeloides* Gouan. *O. lacteus* M. Bieberst. taur. cauc. *O. montanus* Hoppe und Hornsch. decad. Bth. weiss oder gelbl.-weiss. Fahne auf dem Rücken oft rosenroth überlaufen. Hülse netzigaderig mit schiefen Adern. Die vollkommen reifen S. oval und gefleckt.

β . *versicolor*, die Fahne purpurn, die Flügel und das Schiffchen hellgelb. *O. versicolor* Gmel. syst. nat., Koch Synops. ed. I. *O. varius* Sims. bot. mag. t. 675. Nach Vergleichung vieler Expl. aus verschiedenen Gegenden habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass *O. albus* L., *O. lacteus* MB. und *O. versicolor* zu ein und derselben Art gehören. Dem letztern sehr ähnlich sind *O. alpestris* WK. und *O. canescens* L. fil. (*O. filiformis* Lam.) Mit *O. albus* stimmt *O. alpestris* in Hinsicht des St., der B., Grösse der Bth. und des lineal. Gf. überein, untersch. sich aber dch die purpurnen Bth., die nicht keulig-büschelige W., (die W. ist aus einem kurzen, mit langen, fädlichen Fasern in der Erde befestigten Wurzelstock gebildet,) und nach Kitaibel's Beschreibung dch die schief-gestreiften Hülsen und die rundlichen, 1farbigen S.; von *O. tuberosus*, dem der *O. alpestris* in Hinsicht der Bth. sehr ähnlich ist, untersch. sich dieser durch den flügellosen St.; (Hülsen und S. des *O. alpestris* sah ich noch nicht.) — Von allen diesen ist *O. canescens*, wovon ich bis jetzt noch kein deutsches Expl. sah, verschieden dch den so abgekürzten, gemeinschaftlichen Bstiel, dass die NebenB. oft an die Basis der obersten Blättchen reichen und dch den an der Spitze in eine rautenf. Figur verbreiterten Gf. Eine Variet. von *O. canescens* mit schwefelgelben Bth. ist: *O. pallescens* MBieb. D.

5. *O. LUTEUS* (L.) Gelbe W. — *Der St. kantig, meist 1fach*; B. meist 4paarig; Blättchen elliptisch, ziemlich spitz, unterseits meergrün, glanzlos; Gf. lineal., an der Spitze bärtig; Wurzelstock wagerecht, Fasern fädlich, die heurigen einfach, die älteren feinfaserig; Nabel $\frac{1}{4}$ des S. umgebend. 4. In den Wäldern höherer Gebirge und auf den A., (Schw., Tyrol, Salzbg., Krain.) Mai. Jun.

O. montanus Scop. *O. laevigatus* WK., letzterer ist dch kein wesentliches Merkmal verschieden. — Bth. anfänglich gelblich-weiss, sodann gelbbraun.

6. *O. NIGER* (L.) Schwarze W. — *Der St. kantig, ästig; B. meist 6paarig; Blättchen eyf.-länglich, stumpf, unterseits meergrün, glanzlos; Gf. lineal., von der Mitte bis zur Spitze bärtig; W. ästig.* 4. In den Wäldern der Ebenen und niedrigen Berge. Jun. Jul. Bth. purpurn, Fahne mit dunkleren Adern. — Was ich bisher als *O. tristis* Lang. sah, war v. *O. niger* nicht verschieden.

IV. Gruppe. *PHASEOLEEN*. Bronn. diss. p. 133. DC. prodr. 2. 381. Hülse 1 fächerig, oder dch locker-zellige Scheidewände zwischen den S. quer-getheilt. Die Keimb. dick, während des Keimens unverändert oder in dicke B. verwandelt. Die uranfängl. B. gegenst.

36. *PHASEOLUS* (L.) Bohne. — K. 2lippig, die obere Lippe 2-, die untere 3zählig. Gf. oberwärts bärtig, mit den Stbg. und dem Kiele schraubenf. gewunden. Der Fruchtkn. an der Basis mit einer kleinen Scheibe umzogen. Hülse 2klappig, dch locker-zellige Dämmchen etwas querfächerig. Ein lineal. Mantel den Nabel bedeckend.

1. *P. MULTIFLORUS* (Lam. enc. 3. p. 71.) Vielblumige B. — Blättchen eyf., zugespitzt; *Tr.* gestielt, *länger, als das B.*; Bthstielchen gezweiet; Hülsen hängend, etwas sichelf. ☉. Kultivirt. Jul. Aug. Bth. weiss. Var: Kultiv.

β. *coccineus*, Bthen hochroth: *P. vulgaris* β. *coccineus* L. spec. *P. coccineus* Lam. dict.

2. *P. VULGARIS* (L.) Gemeine B. — Blättchen eyf., zugespitzt; *Tr.* gestielt, *kürzer, als das B.*; Bthstielchen gezweiet; Hülsen hängend, ziemlich gerade. ☉. Davon werden viele Variet. kultiv. Jul. Aug. Die Variet. mit sich schlingendem hohem St.: *Ph. vulgaris* α. L. und mit niedrigem, kaum sich schlingendem St.: *Ph. nanus* L. Kultiv.

XXXII. Ordng. CAESALPINIEEN. R. Brown. gen. rem. p. 19. DC. prod. 2. 473.

K. 5zählig od. 2lippig, *abfällig od. vertrocknend. Blkr. unregelmässig*, schmetterlingsf. oder fast rosenartig, tief im K. eingefügt, 5blättrig; Blb. frei. Stbg. ungleich, mit den Blb. eingefügt, frei, (bei ausländischen auch zsgewachsen.) *Der Fruchtkn. frei, mit einem einseitigen Stträger.* S. eyweisslos. Keim gerade. B. wechselst., nebenblättrig.

1. *CERATONIA*. (L. gen. 1167.) Bth. vielehig oder 2häusig. K. 5sp. Blb. o. Stbf. 5. N. sitzend, kreisf. Hülse lederig, nicht aufspringend, vielsamig, durch fast fleischige Querwände vielfächerig; Klappen dick, innen markig.

1. *C. SILIQUA* (L. spec. 1513.) Johannisbrod. — Wehrlos, Blättchen oval, stumpf, flach. $\frac{1}{2}$. An unkultiv. O. in der Nähe des Meeres in Istrien, (bei Lovrana, der nördlichste bis jetzt bekannte Stand O., Tommas.) Sept. Oct. Hayne Arzngew. 7. 36.

2. *CERCIS* (L.) Judasbaum. — K. 5zählig, unterwärts höckerig. Blkr. 5blättrig, schmetterlingsf. Stbg. 10, frei, ungleich, abwärtsgeneigt. Hülse 1fächerig, zsgedrückt, vielsamig.

1. *C. SILIQUASTRUM* (L.) Gemeiner J. — B. sehr stumpf, ganz kahl. $\frac{1}{2}$. An steinigen O., (im südl. Tyrol.) Apr. Mai. Bth. rosenroth. Schk. t. 112. x

XXXIII. Ordng. AMYGDALEEN. Juss. gen. 340, mit Ausnahme von Arten. Drupaceae DC. fl. fr. 4. p. 479.

K. 5zählig, inwendig mit einer etwas fleischigen, honiggebenden Platte bedeckt. Blb. 5. *Stbg. 20, frei, mit den Blb. dem Rande des K. eingefügt*, in der Knospenlage einwärtsgekrümmt. *Der Fruchtkn. frei, 1fächerig, 2eyig*, Eychen hängend. Gf. 1; N. einfach. Steinfrucht mit 1, 2 S. Keim gerade, eyweisslos, von einer verdickten Innenhaut eingeschlossen; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Sträucher und Bäume, mit wechselst., *nebenblättrigen B.*

1. *AMÝGDALUS* (L.) Mandelbaum. — Steinfrucht saftlos, bei der Reife unregelmässig aufspringend.

1. *A. COMMUNIS* (L.) Gemeiner M. — B. lanzetl., drüsig-gesägt; *Bstiel* oberwärts drüsig, *so lang, als der Querdurchmesser des B. oder länger*; Röhre des K. glockig; Nusschale mit Löchelchen durchstoßen. $\frac{1}{2}$. Wird in wärmeren Gegenden kultiv. und ist nun an den Felsen im wärmeren Wallis und Fiume einheimisch geworden. Febr.-Apr. Bth. hellrosenroth, oder weiss. Kultiv.

2. *A. NANA* (L.) Zwerg-M. — B. lanzetl., *in einen kurzen Bstiel verschmälert*, drüsenlos-gesägt, an der Basis ganzrandig, gänzlich kahl; Röhre des K. walzlich; Nusschale fast glatt, ohne Löchelchen. $\frac{1}{2}$. An steinigen O., (bei Wien; an der Donau hinauf gegen Baiern.) Apr. Schk. t. 131. D.

2. *PÉRSICA* (Tournef.) Pfirsichbaum. — Steinfrucht saftig, nicht aufspringend. Nusschale unregelmässig mit Furchen durchzogen, und von Löchelchen durchstoßen.

1. *P. VULGARIS* (Mill.) Gemeiner P. — $\frac{1}{2}$. Wird in den wärmeren Gegenden unserer Fl. kultiv. und wächst fast wild in den Weinbergen von Fiume. März. Apr. *Amygdalus Persica* L. Unterschieden von *A. communis* dch die spitz und oft doppeltgesägten B. und *den kurzen, nicht den halben Querdurchmesser ei-*

nes *B. erreichenden Bstiel* auch zu der Zeit, wo der Baum keine Bth. und Früchte trägt. Var. Früchte filzig: *P. vulgaris* DC. und *β. laevis*, Früchte kahl: *P. laevis* DC. Uebrigens ist die Stellung der Bth. und Knospen von *Persica* genau wie bei *Amygdalus communis*, was in M. u. K. Deutschl. Fl. zu verbessern ist. Kultiv.

3. *PRUNUS* (L.) Pflaume (und Kirsche). — Steinfrucht saftig, nicht aufspringend. Nusschale glatt oder gefurcht, aber ohne Löchelchen. (Die Gattungen *Armeniaca* und *Cerasus* sind durch keine bestimmten Grenzen abgeschlossen; *Cerasus Padus* hat eine sehr runzliche Nusschale.) — Bth. weiss.

I. Rotte. *ARMENIACA* (Aprikose.) Tournef. Steinfrucht sammetartig. Bth. einzeln od. gezwieit, seitenst., vor den B. aus eigenen Knospen sich enthöllend. Die jüngerer B. zsgerollt.

I. *P. ARMENIACA* (L.) Aprikose. — Bth. seitenst., einzeln und gezwieit, kurzgestielt; Bthstielchen eingeschlossen; B. eyf., etwas herzf., zugespitzt, doppelt-gesägt. kahl; Bstiel drüsig. *h.* März. Apr. In den wärmeren Gegenden unserer Fl. kultiv. und daselbst in den Weinbergen beinahe wild. Kultiv.

II. Rotte. *PRUNI GENUINAE*. (Eigentliche Pflaumen.) Steinfrucht kahl, mit einem bläulichen oder weisslichen, leicht wegzuwischenden, Reife angehaucht. Bth. einzeln oder gezwieit, vor den B. aus eigenen Knospen sich enthöllend. Die jüngerer B. zsgerollt.

2. *P. SPINOSA* (L.) Schlehen-P. — Blütenknospen 1blüthig, einzeln, gezwieit oder zu dreien; Bthstiele kahl; Aestchen flaumig; B. elliptisch oder breit-lanzettl.; Früchte kugelig, aufrecht. *h.* Auf sonnigen Hügeln, in Gebüsch, an steinigen O. Apr. Mai. St. h. 9. Kommt seltner mit gleichzeitigen Bth. vor; *P. spinosa β. coetanea* Wimm. und Grab. *P. fruticans* Weihe.

3. *P. INSITITA* (L.) Kriechen-P. — Blütenknospen meist 2blüthig; Bthstiele sehr fein-flaumig; Aestchen sammtig; B. elliptisch; Früchte kugelig, hängend. *h.* Kultiv. und an Zäunen, in Obstgärten verwildert. Apr. Mai. Hafer schlehe, Spilling. Bth. schneeweiss, Blb. rundlich. Früchte schwarzviolett, var. jedoch röthlich, gelb und grasgrün. Die Bthstiele sind auch an den Expl. von Fries im Herb. norm. fein-flaumlich und die Aestchen sammtig. Stammutter der kultiv. Pflaumen mit kugeligen oder rundlichen Früchten. Kultiv.

✕ 4. *P. DOMESTICA* (L.) Gemeine P. — Blütenknospen meist 2blüthig; Bthstiele flaumig; Aestchen kahl; B. elliptisch; Früchte länglich. *h.* Wird kultiv. und kommt hie und da verwildert vor. Apr. Mai, später als die vorhergehende. Zwetsche. Blb. länglich-eyf., weiss, ins Grünliche spielend. Diese Art ist die Mutter der länglichen Pflaumen und varirt in der Farbe der Frucht, wie die vorhergehende; mehrere der kultiv. Variet. sind jedoch als Bastarde zwischen beiden zu betrachten. Linné hat einige Variet. der vorhergehenden Art nicht passend mit dieser vereinigt. Kultiv.

✕ 5. *P. CERASIFERA* (Ehrh.) Kirsch-P. — Blütenknospen 1blüthig; Bstiele nebst den Aestchen kahl; B. elliptisch; Früchte

kugelig, *hängend*. ♀. Wird unter dem Namen Kirschpflaume kultiv.
Apr. Mai. Früchte roth, saftig. Kultiv.

III. Rotte. CERASI. (Kirschen.) Steinfrucht kahl, ohne Reif. Die Bth. zu 2, oder doldig, aus einer Knospe, mit den B. oder ein wenig früher hervorbrechend. Die Dolden zu Sträussen gehäuft oder zerstreut. Die jüngern B. zsgefaltet.

6. P. AVIUM (L.) Süsse P. (Süsskirsche.) — *Dolden gehäuft und zerstreut, sitzend*; Schuppen der Blütenknospen blattlos; B. elliptisch, zugespitzt, *etwas runzelig, unterseits flaumig*; Bstiel 2drüsig; W. nicht ausläufertreibend. ♀. In Wäldern der Berge und VorA. Apr. Mai. Cerasus dulcis Fl. wett. Aeste des jüngeren Baumes quirlig, aufstrebend. Früchte der wilden Pflanze roth: Wilde Süsskirsche, Französisch: Merise. Kommt kultiv. vor mit kleineren, schwarzen Früchten: P. nigricans Ehrh. und mit weiss- und roth-bunten Früchten: P. varia Ehrh. und

β. *juliana*, Früchte grösser, herzf., schwarz, roth oder gelblich; Fleisch weich, nicht sauer: Cerasus Juliana DC. Deutsch: Molkenkirschen; Französisch: Guigne.

γ. *duracina*, Früchte grösser, herzf.; Fleisch härtlich, brüchig: Cerasus Duracina DC.: Krach- od. Knorpelkirschen, Französisch: Bigarreau.

7. P. CERASUS (L. mit Ausnahme mehrer Variet.) Saure P. (Sauerkirsche.) — *Dolden gehäuft und zerstreut, sitzend*; die innern Schuppen der Blütenknospen blättertrag.; B. *flach, kahl, glänzend*, etwas lederig, elliptisch, *sämmtl. zugespitzt*; Bstiel drüsenlos; W. ausläufertreibend. ♀. Aus dem Oriente herkommend, wird nun überall kultiv., und ist in Zäunen und Obstgärten verwildert. Apr. Mai. Cerasus acida Fl. wett. C. Caproniana DC. Früchte heller- und dunkler-roth und schwarzpurpurn. Var.:

α. *acida*, Bthstiel kürzer, Saft wasserhell: Prunus acida Ehrh. Deutsch: Glaskirschen, saure Weichsel, Französisch: Gobet.

β. *austera*, Bthstiel länger, Saft gefärbt: Prunus austera Ehrh. Morellen, Französisch: Griotte.

Als wilde Pflanze bildet sie einen niedrigen Baum, mit hängenden Aesten; es giebt aber kultiv. Variet. mit höherem Stamme, mit in der Jugend quirligen, aufstrebenden, zuletzt nur etwas abstehenden Aesten und angenehm-säuerlichen Früchten, welche Bastarde von dieser und der vorhergehenden Art zu sein scheinen; dazu gehört:

γ. *aproniana*, Schübl. und Mart. C. caproniana α. montmorencyana DC. Süsse Weichsel. — Eine Variet. von Prunus acida Ehrh. ist:

δ. *semperflorens*, die den ganzen Sommer Bth. und Früchte trägt. Die Achse der Dolde ist verlängert, an der Basis mit B., oberwärts mit Bth. besetzt: P. semperflorens Ehrh. P. serotina Roth, nicht Willd. Cerasus effusa Host. fl. a. C. intermedia und C. marasca desselben Autors sind wenig erhebliche Abarten von P. Cerasus.

8. P. CHAMAECERASUS (Jacq. ic. rar. t. 90.) Zwerg-P. — *Dolden einzeln, sitzend*; die innern Schuppen der Blütenknospen

blättertrag.; *B. flach, kahl, glänzend*, etwas lederig, die oberen länglich oder lanzettl. zugespitzt, *die der seitenst. Knospen* verkehrteyf., *abgerundet-stumpf*; Bstiel drüsenlos; W. ausläufertreibend. *h.* An Bergabhängen, Rainen, Wegen. (am Kahlenberge und Leopoldsberge bei Wien; in Böhmen!; um Halle; in der Rheinpfalz zw. Oppenheim und Mainz!) Apr. Mai. *P. Cerasus* Pollich. pal. *C. Chamaecerasus* und *C. humilis* Host. fl. a. Ein 1½ Fuss, oft nur eine Spanne länger und doch überall mit Bthdolden bedeckter kleiner Strauch. Die Bth. 3mal kleiner, als bei *P. Cerasus*. D.

IV. Rotte. *PADUS* (Traubenkirschen.) Steinfrucht kahl, ohne Reif. Bth. traubig, nach den B. erscheinend.

9. *P. PADUS* (L.) Ahl-K. — *Tr. überhängend*; *B. abfällig*, elliptisch, fast doppelt-gesägt, etwas runzelig; Bstiel 2drüsig. *h.* In feuchten Hainen, an Ufern und in Gebüsch; in d. VorA. hinaufsteigend. Mai. *Cerasus Padus* DC. Steinfrucht schwarz, selten weisslich-grün, oder roth, sehr herb. *Prunus petraea* Tsch hat etwas gröber-gesägte *B.* und der Beschreibung nach aufrechte Bthe- und Frucht-Tr.; ist aber noch weiter zu beobachten. Er findet sich bei dem kleinen Teiche im Riesengebirge.

10. *O. MAHALEB* (L.) Mahaleb-K. — *Ebensträusse gestielt, konvex*, einfach; *B. abfällig*, rundlich-eyf., etwas herzf., stumpf-gesägt. *h.* In Wäldern und an gebirgigen, steinigen O., in d. VorA. hinaufsteigend, (in der südl. Schw. und dch Südtirol und Krain nach dem Littorale; bei Wien aus Ungarn herauftretend; im Rheingebiete von Basel dch Oberbaden und dch Elsass bis in das Nahe- und Moselgebirg, wo die Pflanze häufig vorkommt.) Mai. Jun.

XXXIV. Ordng. ROSACEEN. Juss. gen. 334. DC. prodr. 2. p. 525, mit Ausnahme d. Amygdaleen, Pomaceen u. Sanguisorbeen.

K. 4-5 sp., Zpfl oft gedoppelt, die äussern abwechselnd. *Blkr. regelmässig, 4-5 blättrig. Stbg. 20 oder mehr, frei, mit den Blb. dem K. eingefügt*, in der Knospenlage einwärtsgekrümmt. *Fruchtkn. mehrere, frei, 1fächerig*; Gf. seitenst. *S. eyweisslos*. Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. *B. wechselst., nebenblättrig.*

I. Gruppe. *SPIRÆACEEN*. DC. prodr. 2. p. 541. Früchtchen mehrere, 2-4 eyig, bei der Reife kapselig, einwärts aufspringend.

1. *SPIRÆA* (L.) Spierstaude. — *K. 5 sp. Blb. 5.* Früchtchen ein einziges oder mehrere, kapselig, 2-4 samig.

I. Rotte. *CHAMAEDRYON* Ser. bei DC. prodr. 2. 542. Bth. zwittrig. NebenB. fehlend.

1. *S. SALICIFOLIA* (L.) Weidenblättrige S. — *B. länglich-lanzettl., ungleich - fast doppelt-gesägt, kahl*; *Tr. gedrungen - rispig.*

h. In Hainen, in feuchtem Gebüsch, und an Ufern, (Kärnthen, Krain, Steyermark, Böhmen.) Bth. rosenroth. D.

2 S. *ULMIFOLIA* (Scop.) Rüsterblättrige S. — *B. eyf.*, spitz, ungleich - fast doppelt-gesägt, an der Basis abgerundet u. ganzrandig, beiderseits kahl, die jüngern am Rande und unterseits flaumig; *Aestchen kantig-gestreift*; *Ebensträusse* endst., fast halbkugelig, *einfach*; Stbg. länger, als die Blkr. h. An felsigen, steinigen O., (in Krain bei Idria und in der Wochein; bei Görz.) Mai. Jun. St. h. 62. S. *chamaedryfolia* J. t. 140. Bth. weiss. Ein 4-5 Fuss hoher Strauch. D.

3. S. *CHAMAEDRYFOLIA* (L. sp. 701.) Chamaedrysblättrige S. — *B. verkehrteyf.* oder längl., stumpf, vorne mit wenig Kerben, an der Basis in den kurzen Bstiel verschmälert, am Rande flaumig-wimperig, die unteren ganzrandig; *Aestchen stielrund, glatt*; *Ebensträusse* endst., fast halbkugelig, *einfach*; Stbgf. so lang, als die Blb. h. In gebirgigen Gegenden, (Krain, Dolliner.) Mai. Jun. *Spiraea media* Schmidt oestr. Baumz. t. 54.

4. S. *DECUMBENS* (Koch. bei St. h. 62.) Niederliegende S. — *B. verkehrteyf.* oder länglich, stumpf, ungleich - fast doppelt-gesägt, an der Basis ganzrandig, in den Bstiel verschmälert, ganz kahl; *Aestchen stielrund, glatt*; *Ebensträusse* endst., *zsgesetzt*; Stbg. so lang, als die Blb. h. In den Karnischen A., (Resciuto und Ponteba, Grabowski, Valle della Piare zw. Perarollo und Longarone, Bartling.) Mai. Jun. St. h. 62. *Spiraea flexuosa* Rb. (nicht Cambess., welche unähnlich ist.) Ein kriechender, 3 Zoll, kaum eine Spanne hoher Strauch mit weissen Bth. D.

II. Rotte. *ARUNCUS* Ser. I c. p. 545. Bth. vielehig-2häusig. NebenB. fehlend.

5. S. *ARUNCUS* (L.) Geisbärtige S. — *B. mehrfachzgesetzt*; Aehren rispig; Bth. 2häusig. 4. In feuchten Hainen an Bächen und Quellen, in die VorA. hinaufsteigend, (stellenweise dch das ganze Gebiet.) Jun. Jul.

III. Rotte. *ULMARIA* Cambess. in d. Annal. sc. nat. I. p. 378. Bth. zwitтерig B. nebenblättrig; die NebenB. an den Bstiel angewachsen.

6. S. *ULMARIA* (L.) Sumpf-S. — *B. unterbrochen-gesiedert*; *Blättchen eyf., ungeth., das endst. grösser, handf.-3-5sp.*; *Ebensträusse* rispig, sprossend; Kapseln kahl, zsgewunden. 4. Auf feuchten Wiesen, an Gräben, in Weidengebüsch. Jun Jul. St. h. 18. Bth. weiss Var.:

a. *denudata*, B. unterseits kahl: S. *denudata* Hayn. arz. gew. 8. t. 31.

β. *discolor*, B. unterseits aschgrau- oder weissfilzig: S. *glauca* Schultz.

7. S. *FILIPENDULA* (L.) Knollige S. — *B. unterbrochen-gesiedert*; *Blättchen* länglich, *fiedersp.-eingeschnitten*, Lappen gesägt; *Ebensträusse* rispig, sprossend; Kapseln flaumig, gleichlaufend aneinander angedrückt. 4. Auf Wiesen und Triften, (fast in allen Pro-

vinzen, doch nicht überall.) Jun. Jul. St. h. 18. Bth. weiss, seltner röthlich.

II. Gruppe. *DRYADEEN*. Früchtchen 2. mehrere, 1eigig, nuss- oder steinfruchtartig, nicht aufspringend, auf einem trocknen oder fleischigen Fruchtb. sitzend. Der fruchttrag. K. krautig, oder verhärtet.

2. *DRYAS* (L.) Dryade. — K. 8-9 sp., flach, Zpfl 1reihig. Blb. 8-9. Früchtchen mit einem bleibenden, federartigen Gf. endigend. (Unterscheidet sich von *Geum* dch die gleichen, nicht abwechselnd kleinern Kzpfl.)

1. *D. OCTOPETALA* (L.) Achtkronblättrige D. — B. gekerbt-gesägt, stumpf. h. Auf Triften der A.; mit den Flüssen in d. Thäler herabsteigend, (dch d. g. A.K., nach Mönch auch auf dem Meisner in Hessen.) Jul. Aug. St. h. 20. *Geum chamaedrifolium* Crantz. Bth. weiss.

3. *GEUM* (L.) Geum. — K. 10 sp., Zpfl 2reihig, die 5 äussern kleiner, absteher. Blb. 5. Früchtchen mit bleibendem, rauhh. oder kahlem Gf. endigend. Fruchtb. trocken, walzlich.

1. Rotte. *CARYOPHYLLATA*. Der St. mehrblüthig. Gf. in der Mitte hakig-gliedert, das obere Glied abfällig.

1. *G. URBANUM* (L.) Gemeines G. — Früchtchen behaart, Granne derselben 2gliederig, kahl, das untere Glied 4mal so lang, als das obere, letzteres an seiner Basis flaumig; Bth. aufrecht; *der fruchttrag. K. zurückgeschlagen*; Blb. verkehrteyf.; *Fruchtträger fehlend*. 4. In Hainen und etwas feuchtem Gebüsch. Jul. Aug. St. h. 5. Bth. gelb. *Caryophyllata urbana* Scop. *C. officinalis* Moench.

2. *G. INTERMEDIUM* (Ehrh.) Mittleres G. — Früchtchen behaart, ihre Granne 2gliederig, kahl, das untere Glied 4mal so lang, als das obere, letzteres an seiner Basis haarig; Bth. nickend oder aufrecht; *der fruchttrag. K. absteher.* 4. In Hainen und feuchtem Gebüsch. (von Schles. dch Brandenbg., Pommern. Mecklenbg und Hannover nach Holstein; im Gebiete der Fl. von Spa.; St. Gallen in der Schw.) Mai. Juni. Untersch. sich von *G. urbanum* dch folg.: Bth. ein wenig grösser, oft nickend; K. röthlich, wagerecht und nicht nach der Blüthezeit sogleich zurückgeschlagen; Blb. breiter, plötzlich in einen, wiewohl kurzen Nagel, zsggezogen; Haare an der Basis des ersten Gliedes der Granne länger; von *G. rivale* dch die halb so grossen Bth., den nebst den Blb. wagerecht abstehernden K., den sehr kurzen Nagel der Blb., den fehlenden Fruchtträger und das obere, nur an der Basis behaarte Glied der Granne verschieden. Blb. gelb. Var. mit Bth. v. der Grösse der des *G. rivale* und mit um die Hälfte kleineren, welche Variet. ich aus den S. einer einzigen Pfl. erhielt. Var. ferner:

β. Blb. rothgelb; *G. rubifolium* Lej.

3. *G. RIVALE* (L.) Bach-G. — Früchtchen behaart, ihre Granne 2gliederig, das obere Glied zottig, fast gleichlang mit dem untern,

letzteres an der Basis haarig; Bth. nickend; *Blb.* so lang, als die aufrechten KB., breit-verkehrteyf., ausgerandet, lang-benagelt; Fruchtträger fast von der Länge des K.; die wurzelst. B. leierf.-gefiedert, die stengelst. 3zählig 4. Auf feuchten Wiesen, an Bächen; in die VorA. und A. hinaufsteigend, (in allen Provinzen, doch nicht an allen O., in manchen Gegenden dagegen auch in grosser Zahl.) Mai. Jun. St. h. 8. *Caryophyllata rivalis* Scop. *C. aquatica* Lam. Bth. gelb-feuerfarben, sehr selten citrongelb oder weiss. Ein wucherndes Expl. mit in B. verwandelten KB.: *G. hybridum* Wulf. bei J. ic. rar. t. 94.

4. *G. INCLINATUM* (Schleich. cat. 1815. 1821.) Geneigtes G. — Früchtchen behaart, ihre Granne 2gliederig, Glieder zottig, das untere 2mal so lang, als das obere; Bth. nickend; *Blb.* rundlich, sehr kurzbenagelt, so lang, als die aufrechten KB.; *Fruchtb.* der Früchtchen fast sitzend; die wurzelst. B. leierf.-gefiedert, die stengelst. 3zählig. 4. Auf feuchten Wiesen, (an den höchsten Abhängen der Sudeten; in der Schw.) Jun. Jul. *G. Tournefortii* Lap. *G. inclinatum* Willd. spec. Bth. gelb.

Geum pyrenaicum ist eine zweifelhafte Art. Willdenow, welcher sie zuerst beschrieb, nennt die Aehren der Früchtchen rauhh. und so findet man sie bei unserer Pfl.; DC. nennt sie kahl; Lapeyrous. nahm Willdenow's Definition unverändert auf, und Seringe führt das *G. intermedium* Schleicher's unter *G. pyrenaicum* De Candolle's mit einem! auf. Diese Verwirrung vermag ich nicht zu lösen.

II. Rotte. *OREOGEUM* Ser. bei DC. prodr. 553. *Siversia* Willd. berl. mag. 1811. Der St. 1blüthig. Gf. nicht gegliedert.

5. *G. REPTANS* (L.) Rankendes G. — Früchtchen nebst den ununterbrochenen (nicht gegliederten) Grannen zottig; *der St. 1blüthig*; *Ausläufer niedergestreckt*; B. unterbrochen-gefiedert, oberwärts breiter; *Blättchen eingeschnitten-gesägt, Sägezähne spitz*, meist 3sp., das endst. 3-5sp. 4. Auf den Jochen der höchsten A., auf Felsen und an kiesigen O., (in der Schw. und dch Tyrol, Salzbg, Kärnthen und Steyermark.) St. h. 14. Bth. gelb.

6. *G. MONTANUM* (L.) Berg-G. — Früchtchen nebst den ununterbrochenen (nicht gegliederten) Grannen zottig; *der St. 1blüthig*; *Ausläufer fehlend*; B. leierf.-unterbrochen-gefiedert; *Blättchen ungleich-gekerbt*, das endst. sehr gross, fast herzf., stumpflappig. 4. Auf Triften der A. und VorA., (dch d. g. AK. und in den höhern Sudeten.) Jun. - Aug. St. h. 14. *Caryophyllata montana* Scop. Blth. gelb.

Waldsteinia geoides, die wir in D. fl. 3. p. 437, als auf dem Berge Nanas in Krain wachsend aufgeführt haben, kommt dort nach der Bemerkung Tommasini's nicht vor.

4. RUBUS, (L.) Brombeerstrauch. — K. 5sp., ziemlich flach, bleibend. Blkr. 5blättrig. Stbg. zahlreich, mit den Blb. dem K. eingefügt. Fruchtkn. mehrere, einem halbkugeligen oder kegelf. Fruchtb. eingefügt; Gf. etwas seitenst.; N. einfach. Steinfrüchtchen in eine falsche, abfällige, oben konvexe, unterseits konkave Beere zsgewachsen.

1. *R. IDAEUS* (L.) Himbeerstrauch. — Die St. aufrecht, ästig, strachig; *B. gefiedert*, die oberen 3zählig; *Blb. verkehrtenförmig; aufrecht*; *K. abstehend*. *h.* In Wäldern und Hecken. Mai. Jun. Bth. weiss, Früchte roth, seltner geblichweiss.

2. *R. FRUTICOSUS* (L.) Gemeiner B. — Die St. bogig-zurückgekrümmt, oder gestreckt, ästig, strachig; *B. 5 und 3zählig*; *Blb. oval und nebst dem K. abstehend*; *Früchte glänzend*; *K. bei der Frucht oft zurückgebogen*. *h.* In Waldungen, Flecken, auf Aeckern. Jul. Aug. Man untersch.: 1. *R. fruticosus*, *B. unterseits weissfilzig*; 2. *R. corylifolius* Smith., *B. unterseits grün, haarig*; 3. *R. tomentosus* Borkh., *B. beiderseits filzig*; 4. *R. amoenus* Portensch. *B. unterseits filzig*; der St. von sehr dünnem, angedrücktem Filz weisslich-grau; 5. *R. hybridus* Vill. (*R. glandulosus* Bellard.) der St. oberwärts nebst der Rispe mit zahlreichen, drüsentrag. Borsten besetzt. Bth. weiss oder rosenroth. Früchte schwarz, glänzend.

3. *F. CAESIUS* (L.) Acker-B. — Die St. bogig-zurückgekrümmt oder gestreckt, ästig, strachig; *B. 5 und 3zählig*; *Blb. oval und nebst dem K. abstehend*; *Früchte glanzlos, blau-bereift*; *K. auf der Frucht aufliegend*. *h.* An Hecken, auf Aeckern. Jul. Aug. Schk. t. 135. Die untern B. seltner 5zählig-gefiedert. Bth. weiss, Früchte blau, glanzlos.

4. *R. SAXATILIS* (L.) Felsen-B. — Der fruchttrag. St. aufrecht, ganz einfach, krautig, die unfruchtbaren gestreckt, ausläuferartig; *B. 3zählig*; *Ebenstrauß endst., 3-6 blüthig*. 2. In Waldungen und Hainen, in die A. hinaufsteigend, (stellenweise dch das ganze Gebiet.) Jun. Jul. Bth. weisslich, Früchte roth. Schale der Steinfrüchtchen glatt, nicht grubig-runzelig, wie bei den vorhergehenden.

5. *R. CHAMAEMORUS* (L.) Zwerg-B. — *Der St. aufrecht, ganz einfach, 1blüthig*; *B. einfach, herz-nierenf., 5lappig*; Bth. 2häusig. 2. An sumpfigen, torfhaltigen O., (im Riesengebirge, auf der Elb- und Isarwiese daselbst; auf der Halbinsel Dars in Pommern; bei Königsberg in Preussen; nach Rupp auf dem Meisner in Hessen.) L. fl. lapp, t. 5. f. 1. Bth. weiss, Früchte roth, zuletzt gelbbraun.

Ueber die von Weihe und Nees von Esenbeck aufgestellten Arten von *Rubus*, deren Unterschiede mir noch nicht klar sind, vgl. D. fl. 3. p. 498 und folg.

5. *FRAGARIA* (L.) Erdbeere. — *K. 10sp., Zpfl 2reihig*, die 5 äussern kleiner, absteheuder. *Blb. 5. Stbg. 20 und mehr. Fruchtkn. mehrere.* Fruchtb. nach d. Blüthezeit vergrössert, zuletzt fleischig-saftig, eine falsche, oft abfällige Beere darstellend. Gf. seitenst., abfällig. Bth. aller weiss.

1. *F. VESCA* (L.) Wilde E. — *K. bei der Frucht weit abstehend oder zurückgekrümmt*; *Stbgf. kaum so lang, als das Köpfchen der Fruchtkn.*; *Haare der Bstiele und St. wagerecht abstehend, die der seitenst. oder sämmtlicher Bthstielchen aufrecht*

oder angedrückt. 2. In Wäldern, Hecken, auf Hügeln, unkultiv. O. Mai. Jun., blühet in den A. später und bis in den Herbst. St. h. 2. F. sylvestris Duchesn. bei Lam. Var.: 1. Früchte halbkugelig und kegelf. auf einem und demselben Standorte; 2. Ausläufer kurz oder fehlend: F. efflagellis Duch.; 3. B. einfach, die seitenst. Blättchen fehlen nämlich: F. monophylla Duch.; 4. immerblühend, den ganzen Sommer hindurch Bth. und Früchte tragend, wie Prunus Cerasus semperflorens. Zwischen dieser Variet. und der gemeinen Pflanze kann ich keinen Unterschied finden; letztere trägt auch nicht selten kegelf. Früchte.

2. F. ELATIOR (Ehrh.) Hochstengelige E. — *K. bei der Frucht weit abstehend, oder zurückgekrümmt; Stbgf. an der fruchtragenden Pfl. so lang, als das Köpfchen der Fruchtkn., an der nicht fruchtragenden noch einmal so lang, als das Köpfchen der Fruchtkn.; die Haare der Bstiele, des St. und sämtlicher Bthstiele wagerecht-abstehend.* 2. In Wäldern, besonders der Berge, (im ganzen Gebiet stellenweise.) Mai. Jun. Hayne arz. gew. t. 27. F. vesca β. pratensis L., var. γ. fl. suec. n. 450. Grösser und stärker, als die vorhergehende, immer dch Fehlschlagen 2häusig. Wird unter dem Namen Zimmetdbeere kultiv. Kultiv.

3. F. COLLINA (Ehrh.) Hügel-E. — *K. an die Frucht angedrückt, Stbgf. der nicht fruchtragenden Pfl. noch einmal so lang, als das Köpfchen der Fruchtkn.; Haare des Bstieles und des St. wagerecht-abstehend, die der seitenst. oder der sämtlichen Bthstiele aufrecht, oder angedrückt.* 2. An gebirgigen O., auf unkultiv. Hügeln, im Gebüsch, an Hecken. Mai. Jun. Hayne arz. gew. 4. t. 30. F. vesca β. L. fl. suec. n. 450. Wird leicht dch den nach dem Verblühen sogleich geschlossenen und die Fruchtkn. verbergenden K. und die schlanken Bthstiele von F. vesca unterschieden.

4. F. HAGENBACHIANA (Lang, Decan in Mühlheim.) Hagenbach's E. — *K. an die Frucht angedrückt; Stbgf. so lang, als das Köpfchen der Fruchtkn.; die Haare des Bstieles und St. wagerecht-abstehend, die der seitenst. oder der sämtlichen Bthstiele aufrecht oder angedrückt; die Blättchen langgestielt, die Stielchen des mittelsten den vierten Theil so lang, als die Blättchen.* 2. Auf steinigen Hügeln, (Zunzingen im Breisgau in der Gegend von Mühlheim, in grosser Menge und mit keiner anderen Art der Gattung vermischt, von H. Kraft, Gärtner in Mühlheim, entdeckt, Decan Lang.) Mai. Jun. F. Majaufea Seringe in DC. prodr.

4. F. GRANDIFLORA (Ehrh.) Grossblumige E. — *K. bei der Frucht angedrückt; Flaum der B.- und Bthstiele aufrecht; B. oberseits ziemlich kahl.* 2. Wird in Gärten unter dem Namen: Ananas-Erdbeere kultiv. Früchte sehr gross, B. dunkelgrün, grohsgäst. Mai. Jun. Duham. arb. 1. t. 6. Kultiv.

5. F. CHILOENSIS (Ehrh.) Chili-E. — *K. bei der Frucht aufrecht; Flaum der B. und Bthstiele weit abstehend; B. beiderseits zottig.* 2. Mai. Jun. Wird unter diesem Namen in Gärten

aber seltner kultiv. Unterscheidet sich dch die grössere Behaarung und die kurzen, breiten Sägezähne, die breiter, als lang sind. Kultiv.

6. *G. VIRGINIANA* (Ehrh.) Virginische E. — K. bei der Frucht *abstehend*; *Flaum der Bstiele aufrecht*, der der Bthstiele ange-drückt; B. oberseits ziemlich kahl. 2. Mai. Jun. Wird in Gärten unter dem Namen: Scharlach- oder Himbeer-Erdbeere kultiv. Die in die Grübchen des Fruchtb. eingesenkten Früchtchen unterscheiden diese Art. Kultiv.

6. *COMARUM* (L.) Siebenfingerkraut. — K., Blkr., Stbg- und Stempel wie bei *Fragaria*. Fruchtb. nach der Blüthezeit vergrössert, fleischig aber schwammig.

1. *C. PALUSTRE* (L.) Sumpf-S. — 2. An sumpfigen, torfhaltigen O., in Gräben, an Fischteichen. Jun. Jul. Schkhr. t. 138. *Potentilla palustris* Scop. carn. *P. Comarum* Nestl. pot. K. inwendig dunkelroth-braun. Blb. klein, fast 3mal kürzer, als der K., nebst den Stbg. und Gf. dunkel braun-purpurn.

7 *POTENTILLA* (L.) Fingerkraut. — K., Blkr., Stbg und Stempel wie bei *Fragaria*. Fruchtb. konvex oder kegelf., saftlos und nicht wie bei *Fragaria* und *Comarum*, beerenartig.

I. Rotte. *POTENTILLAE GENUINAE*. Früchtchen kahl, Fruchtb. haarig, aber die Haare kaum von der Länge der Früchtchen.

§. 1. *ACEPHALAE*. W. einfach, jährig oder 2jährig, einen einzigen St. oder einen von der Basis in mehre getheilten, aber keine unfruchtbare erst im folgenden Jahre blüthentragende Wurzelköpfe treibend.

1. *P. SUPINA* (L.) Niederliegendes F. — Der St. gabelsp.; B. gefiedert; Blättchen länglich, eingeschnitten-gesägt, die oberen herablanfend; Bth. einzeln; *Bthstiele nach dem Verblühen zurückgezogen*. ☉. Auf Aekern und an sandigen, etwas feuchten, im Winter überschwemmten O., an Wegen und Misthaufen, (dch das Gebiet, aber zerstreut und stellenweise; in der Schw. sehr selten.) Jun.-Herbst. J. a. t. 406.

2. *P. NORVEGICA* (L.) Norwegisches F. — Der St. gabelsp., reichblüthig, nebst den B. rauhh., Haare abstehend. an der Basis zwiebelig; B. 3zählig; Blättchen länglich-verkehrteyf. oder lanzettl., grobgesägt, *die wurzelst. 2-3paarig gefiedert*; die unteren Bth. gabelst., die oberen zuletzt fast traubig; Nüsschen kahl, schwach-runzelig. ☉. und ☉. An sandigen, schattigen, feuchten O., (in Holstein, Pommern, Brandenburg, Lausitz, Schles., Böhmen, bei Dresden und bei Königsberg; Salzburg; in Württemberg nur an einer Stelle in einem trocken gelegten Weiher bei Reipertshofen Oberamts Wangen.) Jun. Jul. Fl. dan. t. 171. *P. dichotoma* Mönch. *P. ruthenica* Willd. *P. diffusa* Willd. D.

§. 2. *MULTICAPITES*. W. perennirend, holzig, vielköpfig, blühende St. und zugleich Blätterbüschel, nämlich unfruchtbare im nächsten Jahr blüthentragende Wurzelköpfe, treibend.

* B. gefiedert, Bth. weiss.

3. *P. RUPESTRIS* (L.) Felsen-F. — Der St. aufrecht, oberwärts gabelsp.; die untern *B. gefiedert*, die obern 3zählig; Blättchen eyf.-rundlich, ungleich-eingeschnitten-gesägt, flaumig; die NebenB. ganz; Blb. versehrteyf., länger, als der K. 4. In Felsenspalten, an steinigen O., in die VorA. hinaufsteigend, (im mittleren und südl. D. und d. Schw.) Mai-Jul. J. a. t. 114.

** *B. gefiedert*, Bth. gelb.

4. *P. MULTIFIDA* (L.) Vielsp. F. — Der St. aufstrebend; *B. gefiedert*, wenig-paarig; Blättchen tief-fiedersp., Zpfl lineal., unterseits filzig. 4. Um die Gletscher, (auf d. südlichen Walliser A. sehr selten; auf d. Stock, d. Matterhorn, d. Fineln, in den Nicolai- und Bagnesthale.) Jul. Aug: S.

5. *P. ANSERINA* (L.) Gänse-F. — Der St. rankenartig, kriechend; *B. unterbrochen-gefiedert*, vielpaarig; Blättchen länglich, geschäftigesägt; Bthstiele einzeln; die stengelst. NebenB. scheidig, vielsp. 4. Auf Triften, an Wegen, um die Häuser der Dörfer, an sandigen Ufern. Mai-Jul. und wiederum im Herbst. St. h. 4. *B. unterseits weiss-seidenh.* Var.:

β. sericea, *B. beiderseits weissseidenh.*; *P. Anserina γ. concolor* Sering. bei DC.

γ. viridis, *B. beiderseits grasgrün*, spärlich-behaart oder auch oberseits kahl.

δ. geminiflora, Bth. gezweiet: *P. anserina β.* Nestl. Lehm.

* *B. gefingert*, Bth. gelb.

6. *P. RECTA* (L.) Aufrechtes F. — Die St. aufrecht, nebst den *B. rauhh.*, Haare verlängert, auf Knötchen sitzend, mit kurzen, drüsentrag. gemischt; *B. 5- und 7zählig*; Blättchen länglich, nach der Basis keilig-verschmälert, grob-eingeschnitten-gesägt; Nüsschen erhaben-runzelig, mit einem flügel. bleicheren Kiele umgeben. 4. An waldigen, steinigen O., auf sonnigen Hügeln, (in Oberelsass, der südl. Schw., dch d. südl. Tyrol, Steyerm., Krain, Littor. und Oestr., von da nach Böhmen, Schles., Lausitz und Sachsen; sodann bei Würzburg und Werthheim, bei Lüttich und in Holstein.) Jun. Jul. Bth. schwefelgelb. Var.:

β. obscura, Bth. citrongelb, oft ein wenig kleiner: *P. obscura* Willd. spec. Ferner:

γ. laciniosa, *B. eingeschnitten-gesägt*, die Zähne bis über die Mitte der BFläche hineingehend und oft wieder gesägt, Bth. schwefelgelb. (Häufig im Veldlin, v. Salis. Marschlins, auch aus Schlesien, v. Günth.) In Gärten kommt sie auch mit citrongelben Blb. vor und ist dann: *P. laciniosa* Lehm. monogr. t. 7.

7. *P. HIRTA* (L.) Haariges F. — Die St. aufrecht, oder aus liegender Basis aufstrebend, rauhh., Haare verlängert, auf einem Knötchen aufsitzend, mit kürzern, drüsenlosen gemischt; *B. 5- und 7zählig*; Blättchen eingeschnitten-gesägt, die der WB. verkehrteyf.-keilig, von der breiten, stumpfen Spitze allmählich nach der Basis verschmälert, die der StB. lineal.-keilig; Nüsschen erhaben-runzelig, mit einem häutigen flügel. Kiele umgeben. 4. An gras-

reichen O., (im Littor. um Triest und Fiume, Istrien.) Jul. Aug. Blättchen beiderseits mit 2-3 Zähnen. Var.:

β. *angustifolia*, Blättchen schmaler; die NebenB. 2 sp.: *P. angustifolia* DC.

γ. *pedata*, der St. roth, höher; Blättchen fast bis zur Basis gesägt, beiderseits mit 6-8 Zähnen: *P. pedata* Willd. *P. pilosa* DC. *P. rubense* All. Nestl.

8. *P. PILOSA* (Willd. spec. pl. 2. p. 1100.) Haariges F. — Die St. aufrecht, rauhh., von verlängerten, auf einem Knötchen sitzenden Haaren, und zugleich etwas filzig von kurzen Härchen; B. 5zählig; Blättchen lanzettl.-längl., von der Mitte nach der Basis verschmälert, grob-gesägt, mit verlängerten Haaren beiderseits bestreut und bewimpert, an den unteren B. verkehrteyf.-länglich; Früchtchen runzelig, mit einem sehr schmalen, geschürften Kiele umgeben. 4. Auf sonnigen Hügeln (bei Arnstadt in Thüringen, Oswald; bei Colmar, Grieselich; am hohen Elbufer bei Flottbeck unweit Hamburg, Sonder.) Mai. Jun. Gleichsam eine Mittelform zw. *P. recta* und *P. inclinata*; von jener unterscheidet sie sich dch die verkehrteyf.-längl. Blättchen der unteren und WB., die an dem im hiesigen Garten gepflegten Expl. beständig 5zählig sind, und dch den sehr schmalen, fadenf. Kiel der Früchtchen; von letzterer dch den höheren, kräftigeren Wuchs, die breiteren, im äusseren Umfang mehr verkehrteyf., unterseits rauhh., nicht filzigen Blättchen und dch die Früchtchen, welche mit einem zwar sehr schmalen, aber doch sogleich in das Auge fallenden Kiele umgeben sind.

9. *P. INCLINATA* (Vill.) Aufstrebendes F. — Die St. aufrecht, oder aus niederliegender Basis aufstrebend, weich-zottig und zugleich filzig, an der Spitze ebensträussig; B. 5zählig; Blättchen länglich-lanzettl., nach der Basis verschmälert, eingeschnitten-gesägt, unterseits dünn-grau-filzig, mit abstehenden Haaren bestreut oder gewimpert; Nüsschen runzelig, mit einem fädl. schwachen Kiele umgeben. 4. Auf sonnigen, trocknen Hügeln, (in Oestr., Steyer., Mähren, Böhmen und Schles., in dem Erzgebirge; Schw. selten; ausserdem im Elsass, bei Würzburg, im Lüttichischen und in Westphalen.) Mai. Jul. *P. canescens* Bess. *P. adscendens* Willd. *P. intermedia* Wahlenb. *P. recta* J. a. t. 38. Var., wie *P. recta*, mit Blb. noch 1mal so lang, als der K. und kürzer, als dieser, und mit zerfetzten, nämlich doppelt - eingeschnitten - gesägten B.

10. *P. ARGENTEA* (L.) Silberweisses F. — Die St. aufstrebend, filzig, an der Spitze ebensträussig; B. 5zählig; Blättchen aus einer ganzrandigen, verschmälerten Basis verkehrteyf., tief - eingeschnitten-gesägt, oder fiedersp.-zerfetzt, am Rande umgerollt, unterseits filzig; die Bthstielen nach dem Verblühen aufrecht. Nüsschen runzelig, unberandet. 4. An sonnigen, waldigen O., Wegen. Jun. Jul. St. h. 17. Var. B. oberseits grasgrün und oft glänzend und unterseits weiss-filzig; oder auch oberseits filzig, der Filz jedoch dünner, als auf der untern Fläche; oder unterseits aschgrau-filzig; oder

7. *impolita*, Blättchen nach der Spitze weniger verbreitert, am Rande beiderseits mit meist 6 Zähnen bezeichnet u. an der Basis eine kürzere Strecke ganzrandig: *P. argentea* β. Lehm. *P. impolita* Wahlenb. carp.

11. *P. COLLINA* (Wib.) Hügel-F. — *Die St. nach allen Seiten niedergelegt, zottig-filzig, von der Mitte an ausgebreitet-rispig, an der Spitze aufstrebend; B. 5zählig, die wurzelst. in einen mittelpunktst., dichten Rasen zsgestellt; Blättchen verkehrteyf.-keilig, flach, unterseits auf den Adern zottig, und ausserdem daselbst dünn-grau-filzig, eingeschnitten-gesägt; Bthenstielchen nach dem Verblühen zurückgebogen; Nüsschen runzelig, unberandet. 4. An sandigen, grasreichen O., Rainen, (in Schles. bei Neuschweinitz am Oderdamme, bei Grüneiche, Karlowitz, Wildschütz u. a. O.; in Böhmen; bei Wertheim.) Mai; blüht früher, als *P. argentea*. Fries novit. suec. und herb. norm. *P. Güntheri*, Pohl tent. fl. boh., Wimm et Grab. fl. siles. *P. sordida* Fries. nov. mant. *P. Lindackeri* Tausch. *P. Wiemanniana* Günth. Der *P. argentea* sehr ähnlich, aber der Habitus der lebenden, auch kultiv. Pflanze gänzlich verschieden. Die besten Merkmale geben die schwachen, oft gleich über der Basis in dünne Aestchen übergehenden, in einen Kreis ausgebreiteten St., so wie der mittelpunktst. Rasen der WB., welcher wie bei *P. alba* gestaltet ist. Ausserdem erscheinen die Zähne der B. mehr gerade-vorgestreckt, und die vorderen derselben stehen nicht so sehr ab, wie bei jener. *Potentilla* Güntheri trenne ich nicht ferner von *P. collina*. D.*

12. *P. PATULA* (WK.) Ausgebreitetes F. — *Die St. aus aufstrebender Basis aufrecht oder niederliegend nebst den Bstielen rauhh., Haare etwas angedrückt; B. 5 und 7zählig; Blättchen lineal-keilig, eingeschnitten-gesägt, unterseits gleichfarbig, auf dem Mittelnerven rauhh., Sägezähne der stengelst. auf jeder Seite 2 oder 3; Nüsschen runzelig. 4. Auf sonnigen Hügeln, (Czeiz in Mähren, und Leobschütz in Schles.) Mai. Die innern Zpfl des K. breit-eyf., spitz, kahl, am Rande gewimpert, seltner mit zerstreuten Haaren besetzt, die äusseren nebst der Basis des K. rauhh. D.*

13. *P. INTERMEDIA* (L.) Mittleres F. — *Die St. nach allen Seiten niedergelegt und aufstrebend, von der Mitte an gabelsp-rispig, rauhh., Haare absteheend, drüsenlos, auf einem Knötchen sitzend; R. ebensträussig, locker, beblättert; WB. rasig, 7zählig; Blättchen länglich-keilig, sämmtl. gleichfarbig, unterseits rauhh., eingeschnitten-gezähnt, Zähne beiderseits 5-10, absteheend, der letzte kleiner; Nüsschen runzelig. 4. An felsigen, kiesigen O. der Schw. (C. Waadt, Wallis und Tessin.) Mai. Jun. *P. intermedia* Nestl., *P. heptaphylla* Mill. Gärtnerlex. n. 9. S.*

14. *P. THURINGIACA* (Bernhardi bei Link.) Thüringisches F. — *Die St. nach allen Seiten absteheend und aufstrebend, von der Mitte an gabelsp-rispig, rauhh., Haare absteheend, drüsenlos, auf einem Knötchen sitzend; R. locker, beblättert; B. unterseits rauhh., gleichfarbig, die wurzelst. rasig, 7zählig, gesägt, Sägezähne ge-*

rade hervorgestreckt, eyf., *beiderseits 9-12*, die oberen B. lineal-lanzettl., entfernt-gesägt. Sägezähne etwas angedrückt; Nüsschen runzelig. 4. Auf waldigen, steinigen Hügeln, (am südl. Abhange des Thüringer Waldes bei Suhl, am Gleichberge bei Römhild, hinter Eisfeld, bei Schleusingen; Martinach im unteren Wallis; Unterengadin.) Mai-Jun. *P. parviflora* Gaud. helv. Von dieser untersch. sich die *P. chrysantha* Trevir. dch. ansehnlichere Grösse, elliptisch-verkehrteyf. Blättchen, die an den WB. die Zahl 5 nicht überschreiten, und an den obern B. nicht entfernt-gesägt sind. D.

15. *P. REPTANS* (L.) Kriechendes F. — *Die St. rankenf., gestreckt.* einfach, an den Gelenken wurzelnd; B. 5zählig mit eingemischten 3zähligen; Blättchen längl.-verkehrteyf., fast von der Basis an gesägt, kahl, oder unterseits angedrückt-behaart; Sägezähne eyf., stumpfl.; Bth. einzeln; *Bthentheile 5zählig*; *Früchtchen körnig-rauh*. 4. Auf feuchten Wiesen, an Wegen, Gräben, Ackerrändern. Jun. Aug. D. fl. Schk. 1. 136. Var.:

β. *glabra*, B. viel kleiner, 3-4 Linien lang, die oberen ganz kahl, fast 3eckig-verkehrteyf., vorne gesägt, seitwärts ganzrandig; Bth. und Früchtchen nicht verschieden. (Von Brittinger auf der A. Pyhrgas in Oberösterreich und von Lang auf trockenen Wiesen bei Mühlheim gesammelt.)

16. *P. MIXTA* (Nolte in Reichenb. fl. germ. exsicc. n. 1743) Gemischtes F — *Die St. rankenf., gestreckt*, oberwärts ästig; B. 5zählig mit eingemischten 3zähligen; Blättchen längl.-verkehrteyf., von der Spitze an bis in die Mitte gesägt, unterseits angedrückt-behaart; Sägezähne eyf., stumpfl.; Bth. einzeln; Bththeile meist 4zählig; Früchtchen 4. In Holstein auf Triften (Nolte.) Jul. Aug. Sehr ähnlich der *P. reptans*, aber dch. die ästigen St. und die 4zähligen Bththeile verschieden. Reife Früchtchen sah ich noch nicht. D.

17. *P. PROCUMBENS* (Sibthorp. oxon. 162.) Niederliegendes F. — *Die St. rankenf., gestreckt*, oberwärts ästig, die fruchtttragenden an den Gelenken wurzelnd; B. gestielt, 3zählig oder die untersten 5zählig; Blättchen verkehrteyf., eingeschnitten-gesägt, unter der Mitte keilf. und ganzrandig, Sägezähne abstehend. eyf.-lanzettl., zugespitzt; NebenB. ganzrandig oder 2-3 zahnig; *Bthentheile meist 4zählig*; Früchtchen fein-runzelig. 4. In schattigen Wäldern und an moosreichen O. (von den Niederlanden dch. Westphalen, Niedersachsen, nach Mecklenb., Brandenb., der Lausitz, Sachs., Schles., Böhm., und auf dem Thüringer Walde, in D. diesseits des Thüringer Waldes noch nicht gefunden; in der Schw. blos bei Belp im C. Bern; ein Expl. von diesem StandO. habe ich jedoch noch nicht gesehen.) Jun. Jul. *Potentilla nemoralis* Nestl. potent. *Tormentilla reptans* L. sp., D. fl., Koch Synops. ed. 1. Von *P. reptans* unterscheidet sie sich dch. die lanzettl. spitzen und mehr abstehenden Zähne der B., die meist 4zähligen Bththeile und die Früchtchen, welche gerunzelt und auf dem Rücken mit wenigen Höckern bezeichnet und nicht blos höckerig sind; von den nachfolgenden, dch. die gestielten B., die kleineren NebenB., die noch einmal so grossen Bthen, besonders aber durch die Art

der Fortpflanzung. Nämlich die St. treiben im Herbste aus den Gelenken Wurzeln und ein B. Büschel, und sterben sodann mit Ausnahme der bewurzelten Gelenke ab, dadurch entstehen so viele einzelne Stöcke, als Gelenke W. entwickelt haben.

18. *P. TORMENTILLA* (Sibthorp. oxon. 162.) Ruhrwurzel. — Die St. *niederliegend oder aufrecht*, überwärt ästig, nicht wurzelnd; B. 3 zählig, sitzend oder kurz-gestielt, die WB. länger gestielt, 3-5 zählig; Blättchen längl.-lanzettl., eingeschnitten-gesägt, an der Basis ganzrandig, die der unteren B. verkehrteyf., Sägezähne etwas abste hend, ey-lanzettf., spitz; NebenB. 3-vielspaltig; Bthentheile meist 4 zählig; Früchtchen schwach-runzelig. 4. In Wäldern; auf Haiden, Triften bis in d. A. Jun. Jul. *P. tetrapetala* Hall. fil. in Ser. mus. *P. sylvestris* Neck. delic. *Tormentilla erecta* L. spec., D. fl., Koch Synops ed. I., St. h. 34. *T. officinalis* Smith. fl. brit.

19. *P. AUREA* (L.) Goldfarbiges F. — Die Stämmchen niedergestreckt, auch wurzelnd; die St. aus gebogener Basis aufrecht und nebst den Bstielen behaart, Haare aufrecht, etwas angedrückt; WB. 5 zählig; Blättchen länglich, kahl, am Rande und auf den Adern unterseits silberglänzend-seidenh., an der Spitze spitz-gesägt, Sägezähne auf jeder Seite meist 3, der letzte kleiner; Nüsschen schwach-runzelig, kahl. 4. An grasreichen O. der A. und VorA., (Schw. und Tyrol nach Salzb., Kärnthen, Steyermark und Oestr.; auf d. Feldberg in Baden und auf d. Schles. u. Mähr. Gebirgen.) Jul. Ang. St. h. 17. *P. Halleri* Ser. DC. Gaud.

20. *P. ALPESTRIS* (Hall. fil. in Sering. mus. p. 53) Alpen-F. — Die Stämmchen niedergestreckt, zuweilen wurzelnd; die St. aus aufstrebender Basis aufrecht, flaumig; WB. 5 zählig; Blättchen verkehrteyf., kahl, am Rande und auf den Adern unterseits abste hend-haarig, vorne eingeschnitten-gesägt, Zähne hervorgestreckt, auf jeder Seite meist 3, der letzte fast gleich; die NebenB. sämmtl. eyf.; Nüsschen schwach-runzelig. 4. Auf den höhern A., (Schweiz, Tyrol, Salzb., Kärnthen, Steyermark und Krain; auf d. Babia Gora in den Sudeten; in Menge auf d. Hoheneck der Vogesen.) Jun.-Aug. *P. alpestris* Smith engl. fl., Fries nov. fl. succ. *P. salisburgensis* Haenke in Jacq. collect., D. fl., Koch Synops. ed. I. St. h. 17. Die Beschreibung Haenke's bezieht sich auf die ganze Art und nicht bloss auf eine Variet. *P. crocea* Hall. d. Sohn in Schleich. cat. 1807. *P. rubens* Vill. *P. aurea* Smith. *P. alpestris* Hall. d. Sohn in Sering. mus. p. 53. *P. dubia* Sut. *Fragaria villosa* Crantz. Bth. citrongelb, an der Basis safrangelb, zuweilen auch ganz safrangelb. B. oberseits manchmal mit zerstreuten Haaren besetzt. Var.:

α. firma, der St. stärker, höher: Blättchen rundlich-verkehrteyf., mit den Rändern sich wechselseitig deckend, Zähne breiter: *P. aurea firma* Gaud. *P. sabauda* DC. Schl. *P. affinis* Host.

β. gracilior, der St. schlanker; Blättchen verkehrteyf., ein wenig auseinandergestellt: *P. aurea α. crocea* Gaud. *P. filiformis* DC. *F. alpestris* Host. Geht dch. Mittelformen in die Variet. *α.* über.

γ. debilis; der St. dünn, schwach: Blättchen länglich-verkehrteyf., Zähne tief-eingeschnitten. *P. debilis* Schl. pl. exsicc. Die Expl., welche mir Schleicher sandte, gehören sicherlich zu den Abänderungen der *P. salisburgensis*.

P. alpestris untersch. sich beim ersten Anblick v. *P. aurea* dch folg.: Blättchen am Rande und auf den Adern der untern Blattfläche kürzh. und nicht seidenh.; v. *P. verna*, der sie näher steht: dch ihre beträchtlichere Grösse, die aufrechten, oder aufstrebender Basis aufrechten St., das freudigere Grün, die weichen Haare, und vorzüglich dch die NebenB., die sämmtl., die wurzelst. ebenmässig, eyf. sind: bei *P. verna* gehen die NebenB. der WB. in verlängert-lineal. Oehrchen über und die Haare sind steifer und borstlich. — Den Namen *P. alpestris*, obgleich er nicht der ältere, zog ich vor, da er mehr den Beifall der Botaniker zu haben scheint.

21. *P. AMBIGUA* (Gaud.) Zweideutiges F. — Die St. aufstrebend und nebst den Bstielen flaumig; die wurzel- und untern stengelst. B. 5zählig; *Blättchen* verkehrteyf., *oberseits zerstreut-unterseits auf den Adern dichter-fast seidenartig behaart, von vorne bis über die Mitte fast fingerf.-eingeschnitten*, Zähne lineal, beiderseits meist zu 3, der letzte fast gleich; die NebenB. sämmtl. eyf.; Nüsschen 4. Auf den A. von Wallis, (bisher blos über Zermatten.) Jul. *P. intermedia* Hegetschw. *P. alpestris* var. Hall. d. Sohn. *P. aurea γ. pectinata* Ser. bei DC. *P. geranioides* Schleich. Eine zweifelhafte, weitem Beobachtungen zu empfehlende Pflanze; von *P. salisburgensis*, von welcher sie doch vielleicht nur Abart ist, dch die fast bis zur Mittelrippe eindringenden Blattzähne verschieden. Bei dem ersten Anblicke hat sie einige Aehnlichkeit mit *P. argentea*, aber die B. sind an meinen v. Schleich. empfangenen Expl., weder filzig, noch grau, bloss die Adern sind unterseits mit geraden Haaren dichter bedeckt. S.

22. *P. VERNA* (L.) Frühlings-F. — *Die Stämmchen gestreckt, oft wurzelnd*; die St. aufstrebend und nebst den Bstielen von aufrechten, etwas abstehenden Haaren rauhh.; die untern B. 5 und 7zählig; *Blättchen* länglich-verkehrteyf., oder verkehrteyf., gestutzt, kahl, und am Rande oder unterseits oder ober- und unterseits haarig, tief-gesägt, Sägezähne meist 4 auf jeder Seite, der Endzahn kürzer; *die untersten NebenB. schmal-lineal.*; Nüsschen schwach-runzelig. 4. An sonnigen, trocknen O., an Waldrändern, überall. Apr. Mai St. h. 17. Var.:

β. crocea, Blb. an der Basis mit einem safrangelben Flecken: *P. verna aestiva* Gaud.

γ. pusilla, kleiner. Blättchen verkehrteyf., vorne auf jeder Seite nur mit 2 Sägezähnen versehen: *P. pusilla* Host, nach einem von Illadnik mitgetheilten Expl. Auf den VorA. und niedrigeren Gebirgen.

23. *P. CINEREA* (Chaix bei Villars.) Aschgraues F. — *Die Stämmchen gestreckt, oft wurzelnd; die St. aufstrebend nebst den Bstielen und B. grau-filzig und behaart mit aufrechten etwas abstehenden Haaren*; die untern B. 5zählig; Blättchen länglich-

verkehrteyf., und verkehrteyf., gestutzt, tief-gesägt, Sägezähne auf jeder Seite meist 4, der Endzahn kürzer; die untersten NebenB. schmal-lineal.; Nüsschen schwach-runzelig. 4. An sandigen, trocknen und felsigen, sonnigen O., (dch das ganze Gebiet, aber stellenweise; südl. der A. die Variet. β .) *P. opaca* Villars, Pollich. *P. arenaria* Borkhaus. *P. incana* Moench. *P. ovata* Poiret. nach Lehm. *P. verna* β . D. fl.

β . *trifoliata*, B. sämmtl. 3zählig, selten 4 oder 5zählig; *P. subacaulis* Wulf. bei J. ic. rar. t. 491. und L. sp. 715, nach einem von L. selbst bestimmten Expl. in Lehmann's Herbarium. — Davon unterscheidet sich *P. velutina* Lehm., die *P. subacaulis* L. nach der Beschreibung in d. sp. pl., dch die längern, länglich-keiligen, an der Spitze nur 3-5zähnigen, übrigens ganzrandigen Blättchen und den dickern Filz.

24. *P. OPACA* (L.) Glanzloses F. — Die Stämmchen gestreckt, oft wurzelnd; die St. aufstrebend und nebst den Bstielen rauh., *Haare verlängert, wagerecht-abstehend*; B. 5 und 7zählig; Blättchen länglich-keilig, tief-gesägt, gestutzt, der Endzahn kürzer; Nüsschen 4. Auf buschigen Hügeln, an felsigen O., (dch das ganze Gebiet, aber stellenweise und nicht überall.) Mai. Jun. St. h. 17. (nicht gut.) J. ic. rar. t. 91, gehört hierher und nicht zur *P. intermedia*.

25. *P. GRANDIFLORA* (L.) Grossblumiges F. — Die St. aus aufstrebender Basis *aufrecht*, und nebst den Blattstielen von kurzen, wagerecht abstehenden Haaren zottig; B. 3zählig; Blättchen verkehrteyf., *tief-gesägt*, oberseits flaumig, *unterseits zottig*; Nüsschen kahl. 4. Auf den höhern A. Tyrols und der Schw. bis auf die niederen Wiesen der A. herabsteigend. Jul. Aug. Hall. helv. t. 31. St. 3-7blüthig.

26. *P. NIVEA* (L.) Schneeweisses F. — Der St. *aufrecht*, armblüthig; WB. 3zählig; Blättchen länglich, eingeschnitten-gesägt, oberseits kahl oder rauh., *unterseits schneeweiss-filzig*, glanzlos, am Rande flach; Nüsschen kahl. 4. An grasreichen O. der höchsten GranitA., (im Wallis auf d. Matterhorn, Lötscherberg u. a.; Tyrol bei Kitzbichel auf d. Geisstein und d. kleinen Röthenstein.) Jun. Fl. dan. t. 1035.

27. *P. MINIMA* (Haller d. Sohn bei Schl.) Kleinstes F. — Die St. aufstrebend, flaumig, *meist 1blüthig*; B. 3zählig; Blättchen verkehrteyf., abgerundet-stumpf, kaum gestutzt, *kahl, am Rande und unterseits auf den Adern behaart* mit etwas abstehenden Haaren, *vorne eingeschnitten-gesägt*, Zähne auf jeder Seite meist 4, der endst. fast gleich. 4. Auf Triften und an felsigen O. der A.; bis zum ewigen Schnee hinaufsteigend, (dch d. g. AK.) Jul. Aug. *P. Brauniana* Hoppe. St. h. 17. *P. verna* α . *alpestris* Wallr. — Untersch. sich von *P. verna* dch die 3zähligen B., die breiteren, freudiger grünenden Blättchen, den Endzahn, der nicht kleiner, als die übrigen ist, die NebenB. der WB., und die weichern Haare; von *P. Salisburgensis* dch ihre viel mindere Grösse und die stets 3zähligen B.

28. *P. FRIGIDA* (Villars.) Gletscher - F. — *Ueberall sehr zottig*; die St. aufstrebend, meist 1blüthig; *B. 3zählig*; *Blättchen verkehrteylf., stumpf-gezähnt. Zähne am Rande sich deckend*; Nüsschen etwas runzelig, unbehaart. 4. Auf den höchsten A., (im Wallis auf dem Bernhard, am Matterhorn über Zermatten, im Bagnesthale, im C. Glarus auf d. Zutreibestock und Sandgrath; Oberengadin; in Tyrol auf d. Wormserjoch und auf d. Windalpe, Steyern. auf dem Hochgolling.) Jul. Aug. *P. glacialis* Hall. d. Solin bei Ser. *P. helvetica* Schl. Var., wie die verwandten, mit Blb., welche kürzer und noch 1mal so lang sind, als der K.

H. Rotte. *FRAGARIASTRUM* DC. prodr. 2. 583. Nüsschen auf der ganzen Oberfläche oder wenigstens am Nabel mit Haaren besetzt. Fruchtbl. sehr rauh.

29. *P. ALBA* (L.) Weissblumiges F. — Der St. schwach, aufstrebend, meist 3blüthig; *WB. 5zählig*; *Blättchen länglich-lanzettl., nach der Basis verschmälert, oberseits kahl, unterseits und am Rande seidenh., vorne gesägt, Sägezähne spitz, zsneigend, der endst. schmaler; Stbf. nebst dem Nüsschen kahl, letztere am Nabel behaart.* 4. In Wäldern, (dch das ganze Gebiet, aber stellenweise, an vielen O. gar nicht.) Mai. Jun. St. h. 4. *P. nitida* Scop.

30. *SPLENDENS* (Ramond in De Cand. fl. fr. 4. 467.) Die St. schwach, niederliegend, 2-4blüthig; *die W.B. 3-4-5zählig*; *die Blättchen verkehrteylf.-länglich., oder verkehrteylf., oberseits etwas kahl, unterseits und am Rande seidenh.-zottig, vorne gesägt, die oberen Sägezähne zsneigend, die endst. schmaler; Stbf. und Früchtchen kahl, diese am Nabel behaart; die Stämmchen niederliegend.* 4. In Wäldern Thüringens, (in Hecken, rechts von der Steigerthälschen Mittelmühle ausserhalb der Fl. von Halle, Wallroth; im Steiger bei Erfurt, Cammerer, Oswald.) Mai. *P. Vaillantii* Nestl. potent. *P. hybrida* Wallr. sched. crit. Koch syn. ed. 1.

31. *FRAGARIASTRUM* (Ehrh. Pers.) Erdbeerartiges F. — Die St. schwach, niederliegend, meist 1blüthig; *WB. 3zählig*; *Blättchen rundlich-eyf., gesägt, gestutzt, oberseits ziemlich kahl, unterseits zottig, die jüngeren seidenh., das mittlere vorne, die seitenst. an der äusseren Seite fast von der Basis an gesägt, das stengelst. B. 3zählig*; Nüsschen an dem Nabel behaart; Stämmchen kriechend. 4. Auf buschigen Hügeln, an Wäldern, grasreichen Wegrändern, (stellenweise dch das ganze Gebiet.) Apr. Mai. Schk.t. 135. *P. Fragaria* Smith. *P. fragaroides* Vill. *P. fragariaefolia* Gmel. *Fragaria sterilis* L. *Comarum fragarioides* Roth. Bth. weiss.

32. *P. MICRANTHA* (Ramond. bei DC.) Kleinblumiges F. — Die St. schwach, niederliegend, meist 2blüthig; *WB. 3zählig*; *Blättchen oval, gesägt, etwas gestutzt, oberseits ziemlich kahl, unterseits zottig, die jüngeren seidenh., d. mittlere vorne, die seitenst. an der äusseren Seite fast von der Basis an gesägt, das stengelst. B. einfach*; Nüsschen an dem Nabel behaart; die kriechenden Stämmchen fehlend. 4. An gebirgigen, steinigen, buschigen O., (in Untersteyermark, in der Schw. bei Nyon, Cleven; Nabethal in der Pfalz.) Apr. Mai. *P. breviscapa* Vest. Blb. bald ein wenig kür-

zer, bald ein wenig länger, als der K., weiss, vergl. DC. fl. fr. und prodr., nicht gelb, wie Tenore anführt.

33. *P. PETIOLULATA* (Gaud.) Stielblättriges F. — Der St. ziemlich aufrecht, reichblüthig; WB. 5- und 3zählig; *Blättchen kurz-gestielt, verkehrteyf.-länglich*, an der Basis keilig, nach vorne zu spitz-gesägt, ziemlich kahl, am Rande gewimpert; *Stbf. rauhh.*; Nüsschen überall zottig. 4. In Felsenspalten, (auf d. Saleve in der Schw.) *P. caulescens* β. *petiolulata* Ser. bei DC. Nicht ohne Zweifel führe ich diese Art hier auf, die leicht in die folgende übergehen mag. Bth. weiss. S.

34. *P. CAULESCENS* (L.) Vielstieliges F. — Der St. aufstrebend, reichblüthig; WB. 5zählig; *Blättchen fast sitzend, länglich-lanzettl.*, an der Basis keilig, nach vorne hin spitz-gesägt, etwas zottig, am Rande fast seidenh.-gewimpert; *Stbf. rauhh.*; Nüsschen überall zottig. 4. In Felsenspalten der VorA., in die niedrigeren Gebirge herabsteigend, (dch. d. g. AK.; an den Stadtmauern von Salzb.) Jul. Aug. J a. t. 220. St. h. l.

35. *P. CLUSIANA* (J. aust. t. 116.) Clusisches F. — Der St. aufstrebend, meist 3blüthig; WB. 5zählig; *Blättchen länglich-lanzettl.*, an der Basis keilig, *oberseits ziemlich kahl*, unterseits zottig, am Rande fast seidenh.-gewimpert, *an der Spitze 3zählig*; *Zähne geradevorgestreckt*; *Stbf. kahl*; Nüsschen überall zottig. 4. In Felsenspalten der höchsten A., (Tyrol dch Salzb nach Kärnth., Krain, Steyermark und Oestr.) Jul. Aug. Bth. weiss, Stbf. oft purpurn. D.

36. *P. NITIDA* (L.) Glänzendes F. — Der St. meist 1blüthig; B. 3zählig; *Blättchen elliptisch, beiderseits seidenh.-filzig*, *an der Spitze 3zählig*, Zähne gerade hervorgestreckt; Stbf. kahl; Nüsschen überall zottig. 4. Auf Felsen der höchsten A., (Krain; Kärnth.; Tyrol auf der Kirschbaumeralpe, d. Schlehern; Steyermark auf dem Hohenschwab.) Jul. Aug. St. h. 22. Bth. rosenroth. D.

9. *SIBBALDIA* (L.) Sibbaldie. — Der K., die Blkr., die Bildung der Stempel und des Fruchtk. wie bei *Potentilla*, aber Stbg. sind nur 5, und Stempel 5, seltner 10.

1. *S. PROCUMBENS* (L.) Gestreckte S. — B. 3zählig; Blättchen oberseits fast kahl, unterseits behaart; Bth. ebensträussig; Blb. lanzettl. 4. An abhängigen, felsigen O. auch der höchsten A., aber auch oft in die Thäler der A. herabsteigend, (in der Schw. und dch d. g. AKette, in einer Schlucht auf der Mittagsseite des Hoheneck.) Jul. Aug. St. h. 17. Blb. gelb.

10. *AGRIMONIA* (L.) Odernennig. — K. kreiself., mit einem 5sp., nach dem Verblühen aufwärts zsschliessenden Saume; unter dem Saume mit zahlreichen, hakigen, weichen, bei der Reife der Frucht vergrösserten und erhärteten Dornen bewehrt. Blb. 5. Stbg. 15, mit den Blb. vor einem drüsigen, den Schlund verengerten Ringe eingefügt. Fruchtk. 2, mit einem endst. Gf. Nüss-

chen 2, dch Fehlschlagen I, von dem erhärteten K. eingeschlossen. (Bth. gelb. Bthstiel kurz, an der Spitze mit einem Gelenke, und an diesem beiderseits mit einem Deckblatte versehen.)

1. A. EUPATORIA (L.) Gemeiner O. — Die entwickelten Aehren verlängert, ruthenf.; Fruchtkelche entfernt gestellt, *verkehrt-kegelf., bis zur Basis tief-gefurcht*; die äussern Dornen weit-abstehend; B. unterbrochen-gefiedert; Blättchen länglich-lanzettl., gesägt, unterseits grau-kurzhaar., die dazwischen gestellten kleineren eyf., gezähnt, das unpaarige gestielt. 4. Auf trockneren Wiesen, unkultiv., buschigen Hügeln; in die VorA. hinaufsteigend. Jun.-Aug. Schk. t. 128. St. h. 59.

2. A. ODORATA (Miller dict. n. 3.) Wohlriechender O. — Die entwickelten Aehren verlängert, ruthenf.; Fruchtkelche entfernt gestellt, *halbkugelig-glockig, bis zur Mitte seicht-gefurcht*; die äussern Dornen zurückgeschlagen; B. unterbrochen-gefiedert; Blättchen länglich-lanzettl., gesägt, unterseits kurz. und mit kleinen Drüsen bestreut, die dazwischen gestellten kleinern eyf., gezähnt, das unpaarige gestielt. 4. An grasreichen O., (an dem Lachensee in der Gegend von Bonn, N. von Esenbeck, bei Ems, Wirtgen, im Gebiete der Fl. von Spa.) Jun.-Aug. Agrimonia pro-cera Wallroth. Untersch. sich von der vorhergehenden leicht dch die halbkugelige, dickere und kürzere, nur bis zur Mitte seicht-gefurchte Röhre des fruchtrag. K. und die herabgebogenen äussern Stacheln. Die unterseits mit häufigen Drüsen bestreuten B. verbreiten einen starken Terpentingernuch. Von Agrimonia odorata ist A. repens L. durch folg. sehr verschieden: Aehren, auch die fruchtrag. sind dicht und kurz; Blättchen fast geruchlos, an der Basis ganzrandig, das unpaarige sitzend oder kaum gestielt, die dazwischen gestellten kleinern länglich, ganzrandig oder nur an der Spitze 2-3 sp., der St. niedrig, oberwärts mit grossen NebenB., von der Länge der Zwischenräume, ganz bedeckt. Diese Art wurde im Gebiete unserer Fl. noch nicht beobachtet.

14. AREMONIA (Necker.) Aremonie. — K. länglich, mit einem 5 sp., nach dem Verblühen aufwärts zsschliessenden Saume; unter dem Saume 5 kleine, mit den Zpfln abwechselnde, bei der reifen Frucht verlängerte, pfriemliche, erhärtete, aufrechte, an den Zpfl des Saumes angelehnte Zähnen. Blb. 5, und nebst den 5 oder 10 Stbg. vor einem drüsigen, den Schlund verengernden Ring, eingefügt. Fruchtkn. 2, mit einem endst. Gf. Nüsschen 2, dch Fehlschlagen I, von dem erhärteten, fast kugeligen K. eingeschlossen. (Bth. gelb, jede mit einer 6-10 sp., aus 2 zsgewachsenen Deckblättchen gebildeten Hülle umgeben.)

1. A. AGRIMONIOIDES (Neck.) Odermennigartige A. — 4. An gebirgigen, waldigen, rauhen O., (in Unterkrain!) Mai. Jun. St. h. 59. Agrimonia agrimonoides L. Amonia agrimonoides Nestl. Spalanzania agrimonoides Pollin. D.

III. Gruppe. ROSEEN. DC. prodr. 2. 596. Früchtchen mehrere, 1 eyig, nussartig, nicht aufspringend, von der fleischigen und, bei der Reife, saftigen Röhre des K. eingeschlossen.

12. ROSA. (L.) Rose. — K. krugf., 5 sp.; Röhre fleischig, an der Spitze zsgeschnürt; Schlund dch einen drüsigen Ring oder drüsige Scheibe verengert; Saum vertrocknend und bleibend oder abfällig. Blb. 5, mit 20 oder mehreren Stbg. vor der Scheibe eingefügt. Fruchtkn. mehrere, von der Röhre des K. eingeschlossen. Die Gf. herangestreckt. Eine aus der Röhre des K. gebildete falsche Beere.

1. Rotte. PIMPINELLIFOLIAE. Die Fruchtkn. im Mittelpunkte des K. kurzgestielt, mit einem Stiele nicht von der halben Länge des Fruchtkn., oder fast sitzend. Bth. einzeln, deckblattlos, oder mit einem einzigen DeckB. gestützt, das aus einem, auf ein NebenB. zurückgeführten B. entstanden. Die NebenB. fast gleichgestaltet. Die jungen Stämme sehr stachelig, Stacheln schlank, gerade oder zurückgerichtet, aber nicht zurückgekrümmt, ungleich, die untermischten dünneren borstlich.

Die NebenB. bei allen Arten unserer Fl. der Länge nach an den Bstiel so angewachsen, dass der freie Theil, das Ohrchen, meist augenscheinlich kürzer ist, als der angewachsene Theil. Bei den Banksischen Rosen und noch andern ausländischen Arten sind die NebenB. mit einer schmalen Basis angewachsen und fast frei. Die Früchte werden entweder spät im Herbst und Winter, oder auch schon im Aug. und Septb. weich und breilig; diese nannte ich markig, und jene spätern, die man bis zu Ende Septbr. hart findet, lederig und knorpelig.

1. R. LUTEA (Miller.) Gelbe R. — Die Stacheln der diesjährigen Wurzeltriebe gerade, gedrunken, ungleich, die grössern pfriemlich, die kleinern borstlich, an den Zweigen zerstreut, stärker, etwas gekrümmt; Blättchen 5-9, rundlich oder elliptisch, gleichfarbig, doppelt-gesägt; die NebenB. sämmtl. gleichgestaltet, flach, am Rande umgebogen, lineal-keilig, die Ohrchen lanzettl., zugespitzt, auseinanderfahrend; Zpfl des K. mit Anhängseln, kürzer, als die Blkr.; Früchte aufrecht, platt-kugelig, mit einem bleibenden, weit abstehenden oder zurückgebogenen K. bekrönt. *h.* Vaterland nach DC. unbekannt; kommt im Bezirk unserer Fl. hie und da an Zäunen verwildert vor. Jun-Jul. R. Eglanteria L., mit Ausschluss der zu R. rubiginosa und pimpinellifolia gehörenden Synon., (nicht Mill. und der meisten Flor.) R. chorophylla Ehrh. R. foedita Herm., nicht Bast. R. vulpina Wallr. *Bth.* schön dottergelb, *die Stbk. an der Basis spiessf.*, Früchte gelb-scharlachroth. Var.: *β. punicea*, Bth. scharlachroth: R. punicea Mill. R. bicolor J. vind. 1. t. 1. R. lutea *β. bicolor* Willd.

2. R. PIMPINELLIFOLIA. (DC.) Bibernelblättrige R. — *Die Stacheln ungleich, pfriemlich und borstlich, gerade, an den jährigen Wurzeltrieben gedrunken, an den Aesten zerstreut; Blättchen 5-9, rundlich oder oval, einfach oder doppeltgesägt, Sägezähne etwas abstehend; die NebenB. lineal-keilig, Ohrchen lanzettl., zugespitzt, etwas spreitzend, die der blühenden Aestchen breiter; Zpfl des K. ganz, halb so lang, als die Blkr., lineal-zugespitzt; Bthstiele 1 blüthig, die fruchtttrag. gerade; Früchte platt-kugelig, lederig, mit dem bleibenden zsschliessenden K. bekrönt. h.* Auf unkultiv. Hügeln, an felsigen Bergabhängen, Wegen, Ackerrändern und am sandigen Meeresstrande, (stellenweise dch d. g. Gebiet, jedoch nicht überall.) Jun. Jul. R. spinosissima Smith. R. campestris Wallr. R. Eglanteria C. Bauh. bei Tabern. krtbuch p. 1495. n. 9. Untersch. sich dch d. lineal-lanzettl., an d. Spitze nicht blattartig-verbreiterten und nicht mit Anhängseln versehenen Zpfl

des K., die so lang, als die Blkr. sind, bei der Frucht bleiben und aufwärts zsschliessen, und dch die kugeligen, schwarzen oder schwarz-blutrothen, aufrechten Früchte. Var.:

α. Bth. weiss, Bthstiele kahl: *R. pimpinellifolia* L. n. (Blättchen einfach gesägt) *R. spinosissima* β. Lindl.

β. *spinosissima*, dieselbe mit steifh. Bthstielen: *R. spinosissima* L.

γ. *myriacantha*, dieselbe, aber die B. unterseits drüsig, Bthstiele kahl oder steifh.: *R. myriacantha* DC. Lindl.

δ. *leiostyla*, dieselbe, die Gf. verlängert, nur an der Basis zottig: *R. microcarpa* Bess. *R. melanocarpa* Link. Varietäten mit verlängertem, kahlen Gf. kommen auch bei anderen Arten vor.

ε. *mitissima*, dieselbe, wenn die Stacheln sich verlieren: *R. mitissima* Gmel.

Eine Abänderung mit meergrünlichen B. ist *R. poteriifolia* Besser; eine andere mit länglichen Blättchen, *R. sanguisorbifolia* Donn. Alle bis hieher angeführten Abarten haben weisse Blüten; rothblüthige sind:

β. *rosea*. Bth. heller oder dunkler rosenroth: *R. pimpinellifolia* Willd.; Bth. rosenroth-gestreift: *R. spinosissima* β. *ciphiana* Sm.

η. *affinis*, Bth. rosenroth, der St. wehrlos: *R. affinis* Sternb.

Von *R. pimpinellifolia* untersch. sich *R. involuta* Smith dch folg.: Zpfl des K. von der Länge der Blkr., an der Spitze in ein lanzettl. Anhängsel verbreitert, und oft am Rande mit schmalen Anhängseln versehen: Röhre des K. grösser, mit stärkeren Borsten bestrent; Blättchen ein wenig grösser und unterseits auf den Adern oder auf der ganzen Oberfläche, manchmal auch oberseits mit etwas abstehenden Haaren besetzt; die NebenB. breiter, mit eyf. Ohrchen; die Früchte hochroth. Sie hat den Habitus einer stärkern *R. pimpinellifolia*, neigt sich aber auch manchmal zur *R. tomentosa* hin. Bth. weiss.

3. *R. GENTILIS* (Sternb.) Verwandte *R.* — *Die Stacheln pfriemlich und borstlich, gerade*, die der jährigen Stämme gedrunken, an den Aesten zerstreut; Blättchen 9-11. rundlich und oval, gesägt, Sägezähne etwas abstehend; *die NebenB. lineal-keilig, ausgebreitet*, Ohrchen ey-lanzettl., spitz, an den blühenden Aestchen eyf.; *Zpfl des K. ganz, halb so lang, als die Blkr., mit einer lanzettl. Spitze; Bthstiele mit einem DeckB. gestützt. Hülthig; die fruchttrag. nickend; Früchte rundlich-eyf. oder elliptisch, mit dem bleibenden, zsschliessenden K. gekrönt, lederartig.* h. An rauhen gebirgigen O. (auf dem Monte Maggiore in Istrien; bei Triest!) Mai. Jun. Blättchen kahl, Bthstiele und Röhre des K. drüsig-steifh. Bth. rosenroth, Frucht hochroth, und mehr oder weniger eyf., die bei *R. pimpinellifolia* platt-kugelig und schwarz ist. Hieher *R. rubella* Lindl. nach einem von Martius aus England mitgebrachten Expl., aber die gleichbenannte Pflanze Smith's hat eine kugelige Röhre des K. D.

4. *R. REVERSA* (Waldst. und Kit.) Rückwärtsstachelige *R.* — *Die Stacheln pfriemlich und borstlich, gerade*, die der jährigen Stämme gedrunken, an den Aesten zerstreut; Blättchen 5-7, eyf.,

gesägt; die NebenB. an den blühenden Aestchen verbreitet, an der Basis keilig, rinnig-zugefaltet, Aehren eyf., spitz; Zpfl des K. ganz, kürzer, als die Blkr., mit einer lanzettl. Spitze; Bthstiele mit einem DeckB. gestützt, 1blüthig, die fruchtttrag. abwärtsgebogen; Früchte eyf., mit dem bleibenden, zsschliessenden K. gekrönt, lederig. ♀ An gebirgigen, felsigen O., (auf dem Berge Slavnik bei Triest.) Mai. Blättchen grösser, als bei den beiden vorhergehenden, unterseits meist mit Haaren bestreut, 5-7 („2-3 paarig mit dem unpaarigen“ WK.) selten 9; untersch. sich beim ersten Blick von *R. pimpinellifolia* dch die länglichen, hängenden Früchte; von *R. gentilis* dch die schwarzen Früchte; von *R. alpina* durch diess Merkmal, die kürzeren Blättchen, die nicht die Länge der Blkr. erreichenden Zpfl des Kelches und die im Alter noch stacheligen Wurzelschösse und Aeste, die bei *R. alpina* gewöhnlich wehrlos sind. D.

5. *R. ALPINA* (L.) Alpen-R. — Die erwachsenen Stämme wehrlos, die jährigen gedrunen-stachelig, Stacheln borstlich, gerade, drüsenlos; Blättchen 7-11, länglich-elliptisch, doppelt- oder einfach-gesägt; die NebenB. an den blühenden Aestchen verbreitert und an der Basis keilig, die übrigen lineal. und an der Spitze breiter, die freien Ohrchen eyf.-zugespitzt, auseinanderfahrend; Zpfl des K. ganz, mit einer lanzettl. Spitze, länger als die Blkr.; die fruchtttrag. Bthstiele zurückgekrümmt; Früchte hängend, elliptisch oder länglich, mit dem bleibenden, zsschliessenden K. gekrönt. ♀ An felsigen O., (der A. und VorA., den höheren Vögessen und den Sudeten, auch auf dem Feldberge im Oberbadischen.) Jun. Jul. J. a. t. 279. St. h. 26. *R. rupestris* Crantz. *R. inermis* Mill. Var.:

α. B. kahl oder nur auf dem Mittelnerven haarig, und

β. *pubescens*, B. unterseits auf der ganzen Fläche mit Haaren bestreut: *R. reversa* Presl., nicht WK.

γ. *pyrenaica*, Bthstiele und Röhre des K., oder nur die Bthstiele drüsig-steifh.: *R. pyrenaica* Gouan.; dieselbe, mit zugleich tief-doppelt-gesägten B.: *R. monspeliaca* Gouan.

δ. *turbinata*, Bth. gefüllt und Röhre des K. kreiself.: *R. alpina* π. *turbinata* DC. *R. venusta* Waiz. nach Wallr.

R. pendulina Ait. und des Linnäischen Herbariums ist eine dch Cultur ein wenig vergrösserte *R. alpina*, und var. α. *latifolia* DC. Aber das Citat in den spec. plant. aus dem Hort. Eltham. gehört zur *R. stricta* Mühlenb. Eine schöne Variet. mit 3 lappigen Blb. und hervorstehendem mittleren Lappen erhielt ich von Prof. Hartmann in Wels.

6. *R. LUCIDA* (Ehrhart Beitr. 4. p. 11.) Spiegelnde R. — Die Stacheln der diesjährigen Stämme gerade, gedrunen, ungleich, die grösseren pfrieml., die kleineren borstl., drüsenlos, an der Basis der B. unter die NebenB. gestellt, gerade, an der erwachsenen Pfl. oft fehlend; Blättchen 7-9, längl.-lanzettl., einfach-gesägt, oberseits ganz kahl und spiegelnd; NebenB. fast gleichgestaltet, fast gleichbreit, flach, die Ohrchen eyf., mit ihren Spitzen zsniegender; Zipfl des K. so lang als die Blkr., ganzrandig oder mit

einem kleinen Anhängsel, die Spitze derselben am Ende lanzettl.; *die fruchtragenden Bthstiele gerade*; die Früchte platt-kugelig, früh reif; *der K. abfällig*. ♀. Am Meeresufer bei Rostock und an Flussufern (Elbe) bei Hamburg. Früchte anfangs roth, später schwarzbraun. Sonder. *Rosa baltica* Roth en. D.

II. Rotte CINNAMOMEAE. Die Fruchtkn. im Mittelpunkt des K. kurz gestielt, Stiel halb so lang, als der Fruchtkn. Bth. an der Spitze der Aestchen 3-5 und mehre, ebensträussig, sämmtlich, die mittlere ausgenommen, mit einem DeckB. gestützt. Wenn nur eine einzelne Bth. das Aestchen endigt, so erscheint doch ein oder das andere DeckB. mit dem Ansatz einer zweiten oder dritten Bth. Die NebenB. an den blühenden Aestchen deutlich breiter, als an den nicht blühenden. Die jüngern Stämme wie bei der ersten Rotte.

7. R. CINNAMOMEA. (L.) Zimmt-R. — Die Stacheln der diesjährigen Stämme gerade, gedrunen, ungleich, die grössern pfriemlich, die kleinern borstlich, drüsenlos, die der Zweige zu zweien an die Basis der NebenB. gestellt, stärker, gekrümmt; Blättchen 5 oder 7, oval-länglich, einfach-gesägt, unterseits aschgrau, flaumig; *die NebenB. der nicht blühenden Aestchen lineal-länglich, mit röhrig zsschliessenden Rändern*, die der blühenden oberwärts verbreitert, Ohrchen eyf., zugespitzt, absteht; Zpfl des K. so lang als die Blkr., ganz, mit einer lanzettl. Spitze; die fruchtrag. Bthstiele gerade; *Früchte kugelig, mit dem bleibenden, zsschliessenden K. gekrönt, frühreif, markig*. ♀. In Hecken, auf unkultiv. waldigen Hügeln, (die Hauptart mit einfacher Bth. echt wild im Donauthale und von da bis an die A., an vielen Orten sehr gemein, im Schles. und Mähr. Gebirg; ausserdem in D. nur verwildert und halbgefüllt; in der Schw.) Mai. Jun. R. collincola Ehrh. R. majalis Herm. R. spinosissima Wahlenb. ups. R. mutica Fl. dan. t. 688. und R. fluvialis Fl. dan. t. 868. Untersch. sich von allen Arten unserer Fl. dadurch, dass die NebenB. der nicht blühenden Aestchen fast in ein Röhrchen zsgerollt sind, und mit ihrer Basis mehr, als das halbe Aestchen umfassen. Bthstiele und Röhr des K. immer kahl, Blkr. rosenroth. Die NebenB. der R. turbinata umfassen auf dieselbe Weise mehr, als das halbe Aestchen, sind aber ausgebreitet und vorne sehr verbreitert. Var.:

β. *foecundissima*, Bth. halbgefüllt und gefüllt, wodurch die Röhr des K. oberwärts in der Form eines Bechers verbreitert wird; R. foecundissima Münchh.

8. S. TURBINATA (Ait.) Kreisel. R. — Die Stacheln der jährigen Stämme gedrunen, ungleich, die grössern aus verbreiteter Basis pfriemlich, fast sichelf., die kleineren borstlich, mit drüsentrag. Borsten untermischt, sämmtlich im Alter verschwindend; *Zweige wehrlos*; Blättchen eyf., grob gesägt; *die NebenB. der blüthenst. B. elliptisch-verbreitert*, die übrigen länglich, ziemlich flach, Ohrchen eyf., zugespitzt, *geradehervorgestreckt*; Zpfl des K. so lang, als die Blkr., Anhängsel wenige oder fehlend; *die fruchtrag. Bthstiele gerade*; *Früchte elliptisch oder länglich, mit dem weit abstehenden K. gekrönt*. ♀. In Hecken. Jun. Die Hauptart, welche einen eyf. oder rundlichen, in einen Hals zsggezogenen Fruchtkn., von der Gestalt des Fruchtkn. der R. canina hat und noch nicht beschrieben ist, fand Dolliner auf dem Kahlenberg bei Wien und ich selbst zog sie aus den S. der halbgefüllten

Variet. Für diese Hauptart ist allerdings der Art-Name nicht mehr passend, doch wollte ich ihn nicht umändern. Bthstiele steifh. oder kahl. Blkr. rosenroth. Zur Variet.:

β. plena, mit gefüllten Bth. und kreisel- oder becherf. Fruchtkn. gehört: *R. campanulata* Ehrh. *R. francofurtana* Münchh. *R. Chamaerhodon turbinata* Wallr. Der Fruchtkn. ist eben so, wie bei den gefüllten Variet. der *R. pimpinellifolia*, *alpina*, *cinnamomea* und bei einigen der *R. gallica*, beschaffen. In der Nähe der Dörfer hie und da, gleichsam wild.

9. *R. RUBRIFOLIA* (Vill.) Rothblättrige *R.* — Hechtblau-angelaufen; die Stacheln der Stämme ungleich, die grösseren etwas sichelf., an der Basis zsgedrückt, die kleineren schlank; Blättchen 5-7, elliptisch, einfach-geschärft-gesägt, *unterseits kahl*, die Sägezähne zsneigend; *die NebenB. flach, die der blüthenst. B. elliptisch-verbreitert*, die übrigen länglich, an der Basis keilig, *Oehrchen eyf.*, zugespitzt, *auseinanderfahrend*; *Zpfl des K. ganz oder mit schmalen Anhängseln*, mit einer lanzettl. Spitze, länger, als die Blkr., nach dem Verblühen zsschliessend, von der reifen Frucht abfallend; die fruchtrag. Bthstiele gerade; *Früchte kugelig, bei der Reife markig.* *h.* In den Thälern und an felsigen O. der VorA., und auch auf niedrigeren Bergen der südlicheren Gegenden, (dch d. g. AK. hin und wieder und auch auf niedrigeren Bergen an Waldsäumen bei Kolbingen im Württembergischen; im Oberelsass; im Littor.) Jun. *R. glaucescens* Wulf. *R. glauca* Desf. *R. rubicunda* Hull. Sohn. *R. multiflora* Reyn. Die jüngern *B.* purpurn. Bthstiele kahl oder drüsig-steifh. Blkr. rosenroth. Die mittelpunktst. Fruchtkn. gestielt, die Stiele die Länge des halben Fruchtkn. erreichend. Var.:

β. livida, *B.* oberseits violettgrün, unterseits blass und mehr oder weniger purpurn überlaufen: *R. livida* Host. *R. rubrifolia* Jacq. fragm. t. 108. *R. gutensternensis* Cat. h. vindob.

γ. pubescens, *B.* unterseits behaart, (Triest.)

10. *R. GLANDULOSA* (Bellardi.) Drüsenborstige *R.* — Die Stacheln an den Stämmen in geringer Anzahl, etwas sichelf., an der Basis zsgedrückt, an den Aestchen schlanker, meist paarweise unter die NebenB. gestellt; Blättchen 7, rundlich, doppelt-geschärft-gesägt, *unterseits kahl*, die obern Sägezähne zsneigend; *die NebenB. der blüthenst. B. elliptisch-verbreitet*, die übrigen länglich, an der Basis keilig, *Oehrchen eyf.*, zugespitzt, *auseinanderfahrend*; *Zpfl des K. fiedersp.*, mit einer lanzettl. Spitze (länger, als die Blkr. ?); die fruchtrag. Bthstiele aufrecht; Früchte fast kugelig. *h.* Auf den VorA., (Steiermark, Oberelsass, Schwz.) Jun. *R. Reynieri* Hall. Sohn. *R. glabrata* Vest. *R. montana* Murr., nicht Villars, dessen Pflanze verlängerte, zsgewachsene Gf. hat, wie *R. arvensis*. *R. rubrifolia β. montana* Gaud. *R. rubrifolia γ. glandulosa* Ser. bei DC. Bth., welche ich noch nicht sahe, nach der Beschreibung purpurn. Bthstiele nebst der Röhre des K. sehr steifh. Durch kleinere rundliche Blättchen und die steifhaaarigen Bthstiele u. K. von *R. rubrifolia* verschieden; von der folgenden

den die kleineren, rundl., unterseits kahlen Blättchen und die fast sichelf. Stacheln.

11. *R. SPINULIFOLIA* (Dematra Essai p. 8. n. 10., nach Gaud. fl. helv. 3. p. 353) Dörnchenblättrige *R.* — *Die Stacheln* der Stämme aus einer verbreiterten Basis *plötzlich verschmälert, pfriemlich, gerade*, an den Aestchen wenige schlanke; die *Blättchen* 7, elliptisch, doppelt-geschärft-gesägt, *unterseits drüsig, die Drüsen dicklich-, beinahe dornig-gestielt*, die oberen Sägezähne *zsneigend*; die NebenB. der blüthenst. B. elliptisch-verbreitert, die übrigen an der Basis keilf., die Oehrchen eyf., spreitzend; die *Zpfl des K. mit Anhängseln und einer lanzettl. Spitze*, länger, als die Blkr.; die fruchttragenden Bthstiele aufrecht; die Früchte rundl. oder elliptisch. ♀. In Hecken der Schw. selten, (bei Freiburg, Dr. Lager, bei Obergestelen im Wallis, Shuttleworth.) Jun. Jul. *R. rubiginosa* *μ. spinulifolia* Ser. in DC. prodr. Die B. sind unterseits drüsig, wie bei *R. rubiginosa*, aber die Stielchen der Drüsen etwas dicker und bemerklicher; hiedurch untersch. sie sich von den beiden vorhergehenden; von der *R. rubiginosa* dch die geraden, langen, zwar starken, aber schmalen und pfrieml. Stacheln und den K. der *R. rubrifolia*. Die Zipfel des K. sind an den Früchten, welche zu den frühreifen zu gehören scheinen, aufrecht. Die lebende Pfl. sah ich noch nicht.

III. Rotte. *CANINAE*. Die Fruchtkn. im Mittelpunkte des K. lang-gestielt, Stiel so lang, als der Fruchtkn. Bth an der Spitze der Aestchen 3-5, und mehre, ehensträussig, sämmtl., die mittlere ausgenommen, mit einem DeckB. gestützt. Die NebenB. wie bei der vorhergehenden Rotte, die an den obern B. der blühenden Aestchen verbreitert. Die grösseren Stacheln derb.

12. *R. CANINA* (L.) Hunds-*R.* — *Die Stacheln derb, sichelf., an der Basis verbreitert, zsgedrückt, ziemlich gleich*, an den Stämmen zerstreut, an den Zweigen meist paarweise unter' die NebenB. gestellt; Blättchen 5-7, elliptisch oder eyf., geschärft-gesägt, *die obern Sägezähne zsneigend*; die NebenB. der blüthenst. B. elliptisch, verbreitert, die übrigen länglich, ziemlich flach, Oehrchen eyf., zugespitzt, geradehervorgestreckt; *Zpfl des K. fiedersp.*, fast von der Länge der Blkr., zurückgeschlagen, von der reifenden Frucht abfallend; die fruchttrag. Bthstiele gerade; *Früchte* elliptisch oder rundlich, *knorpelig*; Nüsschen in der Frucht gestielt. ♀. An Hecken, Zäunen, waldigen O. Jun. St. h. 18. *R. Cynorrhodon* Wallr. Ein aufrechter Strauch, mit derben, an der Basis verbreiterten und zsgedrückten, plötzlich in eine Spitze zsgezogenen und sichelf. Stacheln. Nüsschen im Mittelpunkt des K., wie bei den 3 folg. Arten dieser Rotte gestielt, Stiele während der Blüthezeit von der Länge des Fruchtkn., bei der Reife der Frucht fleischig, wie die Substanz der Frucht selbst, und ebenso roth gefärbt. Einige, der *R. gallica* ähnliche und mit dieser oft verwechselte Variet., untersch. sich sicher dch die gestieltsten, mittelpunktst. Nüsschen; denn bei dieser sind sämmtl. Nüsschen beständig stielloos.

Var. mit grasgrünen, spiegelnden B.: *R. canina nitida* Fries. *R. nitens* Merat.; mit meergrünen, glanzlosen, von einem bläuli-

chen abwischbaren Reife angehauchten B.; *R. canina opaca* Fries. *R. senticosa* Ach.; und mit einfach- und doppelt-gesägten B. u.:

α. canina vulgaris: Bstiele, Blättchen, Bthstiele und Röhre des K. kahl, Bstiele öfters mit entfernten Drüsen bestreut und manchmal an der Basis etwas behaart; hierher gehören: *R. venosa* Sw. *R. sarmentacea* Sw. *R. dumalis* Bechst. *R. surculosa*, *R. nuda* und *R. sarmentacea* Woods. *R. glaucescens* Lej. *R. balsamica* Willd. *R. calycina* Bieberst. *R. mahmundariensis* Lej. Eine wehrlose Form dieser Variet. ist *R. glauca* Schott. und eine zierliche kleinblättrige und kleinblüthige: *R. aciphylla* Rau!

β. canina dumetorum: Bstiele überall behaart; Blättchen unterseits auf den Hauptadern oder auf der ganzen Blattfläche oder auch auf der obern Fläche mit Haaren bedeckt; Bthstiele nicht borstig-steifh. Hierher: *R. dumetorum* Thuill. *R. collina* DC., nicht Jacq. *R. corymbifera* Borkh. *R. agræstris* und *R. sepium* Sw. *R. caesia*, *R. Borreri*, *R. dumetorum*, *R. collina*, *R. bractescens* und *R. hibernica* Woods., aber der berühmte Autor trennte die Formen mit steifh. und kahlen Bthstielen nicht. *R. Forsteri* Sm. *R. platyphylla*, *R. sepium*, *R. affinis* und *R. dumetorum* Rau, *R. frutetorum*, *R. solstitialis*, *R. uncinella* Bess., *R. umbellata*, *R. collina*, *R. fastigiata*, *R. dumetorum*, *R. leucantha* Lej., *R. sylvestris* Schultz.

γ. canina collina: Bthstiele drüsig-steifh.; B. kahl oder behaart; Röhre des K. kahl oder drüsig-steifh.; Bstiele entfernter oder dichter mit Drüsen bestreut, und zugleich haarig oder unbehaart. Hierher:

1. *sempervirens* Rau, nicht L., *R. Ravi* Tratt., *R. andegavensis*, Bast. B. kahl, Blättchen einfach-gesägt, Bthstiele steifh. *R. ambigua* Lej., ist dieselbe Pflanze mit doppelt-gesägten B.

2. *collina* Jacq. und Rau, Bstiele und Blättchen unterseits flau-mig, letztere einfach-gesägt. J. aust. t. 197. Hierher: *R. campestris* Sw., *R. saxatilis* Stev., *R. Boreykiana*, *R. Ratomsciana* und *R. humilis* Bess. *R. caucasica* Bieberst.

3. *psilophylla* Rau, Blättchen doppelt-gesägt, unterseits kahl.

4. *trachyphylla* Rau, Blättchen 3 fach-gesägt, kahl und

5. *flexuosa* Rau, Blättchen 3 fach-gesägt, unterseits mit Haaren bestreut; zu den 3 letztern gehören: *R. nitidula*, *R. Junzilianiana* und *R. glandulosa* Bess. (nicht Bellard.) *R. Andrzejowsciana* Stev. *R. fastigata* Bast. *R. leucantha* Biebst., wenn die Bth. fast weiss sind.

Die schönste aller Variet. ist:

Rosa alba, L., die mit unzähligen Abänderungen in den Gärten kultiv. wird, auch mit blass-fleischrothen Bth. Sie ist sicherlich eine Variet. der *R. canina collina* mit gefüllten Bth., und ausser diesem Merkmal lässt sich nicht der geringste Unterschied finden.

δ. canina sepium, Bstiele und Blättchen unterseits oder auch beiderseits mit klebrigen Drüsen bestreut; Bthstiele und Röhre

des K. kahl. Geht dch Mittelformen in die vorhergehenden Variet. über. Sie steht der *R. rubiginosa* sehr nahe.

Eine grössere Form dieser Variet. δ . mit oft nach der Basis verschmälerten Blättchen: *R. glutinosa* Schultz. (nicht Sm.) *R. Kluckii* Bess. *R. stylosa* γ . *glandulosa* DC.

Eine kleinere Form kleinblättrig und oft kleinblumig: *R. sepium* Thuill. *R. myrtifolia* Hall. Sohn. *R. rubiginosa* o. *sepium* DC. mit Ausschluss des Syn. von Rau.

R. coriifolia Fries, im Bezirke unserer Fl. noch nicht aufgefunden, ist von *R. canina dumetorum* dch die „plattkugeligen, frühzeitigen, schon am Anfang des Sept. reifen und weichen Früchte, und, lebend, dch einen eignen Habitus verschieden.“

13. *R. RUBIGINOSA* (L.) Wein-R. — *Die Stacheln derb, sichelf., an der Basis verbreitert, zsgedrückt, an den Stämmen zerstreut, ungleich*, die kleineren gerader und schlanker, auf den Zweigen meist unter die NebenB. gestellt; Blättchen 5-7, elliptisch, spitzdoppelt-gesägt, *Sägezähne etwas abstehend*; die NebenB. der blüthenst. B. elliptisch, verbreitert, die übrigen länglich, ziemlich flach, Ohrchen eyf., zugespitzt, geradehervorgestreckt; *Zpfl des K. fiedersp.*, fast von der Länge der Blkr., zurückgeschlagen, von der reifenden Frucht abfallend; die fruchtttrag. Bthstiele gerade; *Früchte* rundlich, *knorpelig*. δ . Im Gebüsch und in Waldungen. Jun. J. a. t. 50. *R. Eglanteria* Mill. *R. suavifolia* Lightf. Der Busch gedrungener, als bei der *R. canina*, von ferne bräunlichgrün, Blättchen rundlicher, Zähne absteher. Bth. kleiner, gesättigter-purpurn, Stacheln des Stammes ungleicher und mit vielen kleineren untermischt; dch diese Merkmale untersch. sie sich von den drüsenblättrigen Variet. der *R. canina*, welche ausserdem den Habitus der *R. canina*, länglich-elliptische, manchmal lanzettl., einen terebinthenartigen Geruch verbreitende Blättchen und blasse, oft weisse Bth. und weniger ungleiche Stacheln haben. Von *R. tomentosa*, deren B. nicht selten eben so drüsig sind, untersch. sie sich dch die gras-grünen Blättchen und gekrümmten Stacheln.

Var. 1. Bthstiele kahl und steifh.; hierher gehört: *R. agrestis* Savi nach DC.; 2. Bthstiele sehr steifh. und Zweige oberwärts mit pfriemlichen Stacheln dicht bedeckt: *R. umbellata* Leers. *R. sempervirens* Roth., nicht L., *R. tenuiglandulosa* Merat. nach DC. Auf magrem, felsigem Boden ist sie oft kleiner und kleinblättrig und kleinblumig: *R. rubiginosa* var. γ . *parvifolia* Willd., var. α . DC. prodr., *R. micrantha* DC. fl. fr., *R. resinosa* Lej., letztere hat dünne, längere Stacheln; im Schatten der Wälder wird die Pflanze höher und lockerer und hat grössere Blättchen: *R. nemorosa* Libert., *R. Libertiana* Tratt., *R. micrantha* Sm.

14. *R. TOMENTOSA* (Smith.) Filzige R. — *Die Stacheln derb, gerade, an der Basis zsgedrückt*, auf den Stämmen zerstreut, ungleich, die kleineren schlanker, auf den Zweigen etwas sichelf., unter die NebenB. gestellt; Blättchen elliptisch oder eyf., graugrün, spitzdoppelt-gesägt, *Sägezähne etwas abstehend*; die NebenB. der blühenst. B. elliptisch, verbreitert, die übrigen länglich, ziemlich flach, Ohrchen eyf., zugespitzt, geradehervorgestreckt; *Zpfl des*

K. fiedersp., so lang, als die Blkr., meist bleibend; *Früchte* rundlich, *knorpelig*; Blb. am Rande kahl. ♀. In Hecken und Waldungen. Jun. Die langen, meist wagrecht-stehenden, schlankeren, fast geraden Stacheln, und die aschgraue, weder abwischbare, noch von Haaren herrührende Farbe der B. bilden den charakteristischen Unterschied dieser Art von den übrigen der Rotte. Die B. sind behaart und erscheinen wegen ihrer grauen Farbe filzig, obgleich sie es nicht sind, wenigstens im erwachsenen Zustande; sie sind auch, obwohl sehr selten, kahl: *R. marginata* Wallr., nach dem eigenen Citate des Autors. Bth. lieblich-rosenroth. Var. 1. B. zottig, drüsenlos, sehr weich anzufühlen, 2. B. zottig, drüsig, ziemlich rauh anzufühlen und 3. B. ziemlich kahl. Ausserdem sind die Früchte kugelig, *R. mollissima* Willd., oder eyf., *R. hispida* Borkh., *R. Borkhausenii* Tratt., *R. villosa* Poll.; oder Früchte und Bthstiele steifh. oder beide kahl; diese letzte sehr seltene Variet. ist *R. farinosa* Bechst. Ausser diesen Formen sind noch folg. als Abarten hieher zu rechnen: *R. dimorpha* und *terebinthacea* Bess., *R. cuspidata* Biebst., *R. pseudorubiginosa* Lej., *R. scabriuscula*, *R. villosa*, *R. heterophylla*, *R. pulchella* und *R. tomentosa* Woods., *R. mollis* und *R. subglobosa* Sm., *R. dubia* Wib.

15. *R. POMIFERA* (Herrmann.) Apfel-R. — *Die Stacheln* *derb*, *aus verbreiteter, zsgedrückter Basis pfriemlich*, gerade, an den jährigen Stämmen zerstreut, ungleich, die kleineren borstlich, an den Zweigen wenige, etwas gebogene; Blättchen 5-7, länglich-lanzettl. oder elliptisch, graugrün, doppelt-gesägt, Sägezähne etwas abstehend; die NebenB. der blüthenst. B. elliptisch-verbreitert, die übrigen länglich, ziemlich flach, *Oehrchen* eyf., *geradehervorgestreckt*; Zpfl des K. fiedersp., so lang, als die drüsig-gewimperte Blkr.; *Früchte* kugelig, frühreif, *nickend*, mit dem bleibenden, *zsschliessenden K. gekrönt*. ♀. Auf den VorA. und Gebirgen, (Oberwallis, Shuttleworth; Sagritz und Döllach in Kärnthen; im Fassathal des südl. Tyrols; Buchberg in Steyermark; im Münsterthale des Oberelsass, im Aarthale und bei Coblenz, Wirtgen) Jun. *R. villosa* Wulf., Lindl., DC. *R. cretica* Vest. bei Tratt. Der Name *R. villosa* ist zweideutig geworden; der allgemein bekannte Name *R. pomifera* kann dagegen nicht verwechselt werden. Linne vereinigte unter seiner *R. villosa* mehrere Arten.

16. *R. CILIATO-PETALA* (Besser en. plant. volhyn. p. 66.) Wimperblättrige R. — *Die Stacheln* *derb*, *aus verbreiteter, zsgedrückter Basis pfrieml.*, gerade, an den heurigen Stämmen und Zweigen wenige, meist unter die NebenB. gestellt, an den letztern zuweilen ein wenig gekrümmt; die *Blättchen* 5-7, eyf., gräulich, doppelt-gesägt, die Sägezähne abstehend; die NebenB. der blüthenst. B. elliptisch-verbreitert, die übrigen länglich, etwas flach, die *Oehrchen* eyf., *geradehervorgestreckt*; die Zpfl des K. fiedersp., so lang, als die drüsig-gewimperte Blkr.; die *Früchte* fast kugelig, *frühreif*, *aufrecht*, mit dem bleibenden *zsschliessenden K. gekrönt*. ♀. In den VorA. und Gebirgen, (Alpen von Tyrol, von Spitzel; Karstgebirg in Krain, Graf von Sternberg.) Jun. Jul. *R. resinosa*

Sternb. in der bot. Ztg., *R. cretica* Vest. in Tratt. ros., *R. mollissima* Fries nov. fl. suec., nicht Willd. prodr., und nicht Borkhausen. „Der Strauch läuft mit kriechender Wurzel auf den Kalkalpen bei Lofer in Tyrol weit und breit, und überzieht ganze Strecken, er erreicht unter anderen höheren Sträuchern nur eine Höhe von 4-5 Fuss; in offenen, freien Plätzen werden die jüngeren Zweige vom Vieh abgeweidet, wo dann der Strauch höchstens 2 Fuss hoch wird. Die Früchte werden in der Mitte des September markig von Spitzel. Lebende Exempl. der hier beschriebenen Pflanze habe ich noch nicht gesehen, allein Besserische Exemplare der *R. ciliato-petala* habe ich untersucht.

17. *R. SYSTYLA* (Bastard.) Griffelsäulige *R.* — Die Stacheln derb, sichelf., an der Basis zsgedrückt, ziemlich gleich, *an dem aufrechten Stamme* zerstreut, an den Zweigen öfters an die Basis der NebenB. gestellt; Blättchen 5-7, elliptisch, einfach-geschäftig, die obere Sägezähne zsneigend; die NebenB. länglich, Ohrchen eyf., zugespitzt, geradehervorgestreckt, die der blüthenst. B. breiter; Zpfl des K. fiedersp., fast so lang, als die Blkr.; die *Gf. kahl, zsgewachsen*. *b.* Auf den VorA., (in Steyermark, Sauter; Schw. bei Nyon, Thomas.) Jun. Vom Habitus der *R. canina vulgaris*. Die Säule der *Gf.* bald verlängert, bald kurz und kaum hervortretend. Bth. hellrosenroth, weiss oder gelblich. Der Stiel der Fruchtkn. im Mittelpunkte des K. kürzer, als bei den übrigen Arten dieser Rotte. Var. nach DC.

a. Devauxiana Ser., B. flaumig. Bthstiele nebst den K. kahl: *R. stylosa* Desv. *R. collina* Sm., nicht Jacq.

β. leucochroa, B. fast kahl, Bthstiele kahl: *R. leucochroa* Desv. *R. brevistyla* DC., wenn die *Gf.* kurz sind, oder nicht hervortreten.

IV. Rotte. *ROSAE NOBILES*. Die Fruchtkn. sämtl. völlig stiellos. Die NebenB. gleichgestaltet, an den blühenden Aestchen kaum breiter; daher die, aus den verkleinerten, blattlosen NebenB. gebildeten DeckB. schmaler. (Die *R. systylae* können keine eigne Rotte bilden, da die *Gf.* sind bei diesen nicht selten frei, bei *R. hybrida* hingegen kommen sie auch verlängert und zuweilen zsgewachsen vor.

18. *R. ARYENSIS* (Hudson.) Feld-*R.* — Die Stacheln zerstreut, derb, sichelf., an der Basis zsgedrückt; Aeste verlängert, peitschenf., niederliegend; Blättchen 5-7, rundlich-elliptisch, gekerbt-gesägt, verschiedenfarbig, unterseits glanzlos, abfällig; die NebenB. sämtl. gleichgestaltet, länglich-lineal., flach, Ohrchen eyf., zugespitzt, geradehervorgestreckt; Zpfl des K. schwach-fiedersp., die Spitze derselben kürzer, als die Blüthenknospe, von der reifenden Frucht abfallend; *Gf. zsgewachsen, so lang, als die Stbg.*; Früchte aufrecht, elliptisch oder fast kugelig. *b.* In Hainen und Hecken, in die VorA. hinaufsteigend. (stellenweise dch das g. Gebiet.) Jun. *R. sylvestris* Herrm. *R. repens* Wib. *R. scandens* Wallr. z. Theil. — *R. herporrhodon* Ehrh. scheint wegen der flaumigen *Gf.* zur unten erwähnten Variet. *δ.* der *R. gallica* zu gehören. — Bth. weiss. Säulchen der *Gf.* kahl. B. kahl. Bthstiele kurz-steifh., seltener kahl. Var.: mit flaumigen Bstielen und Unterseite d. B., weissen Blb., schwarz-purpurn und manchmal

nebst den Bthstielen und K. bläulich-bereiften St., letztere ist: *R. glauca* Dierb.

19. *R. SEMPERVIRENS* (L.) Immergrüne R. — Die Stacheln zerstreut, derb, sichelf., an der Basis zsgedrückt; Aeste verlängert, peitschenf., niederliegend; Blättchen 5-7, rundlich-elliptisch, fast angedrückt-gesägt, gleichfarbig, beiderseits spiegelnd, immergrün; die NebenB. sämmtl. gleichgestaltet, länglich-lineal., flach, Oehrchen lanzettl., zugespitzt, geradehervorgestreckt; Zpfl des K. ganz oder schwach fiedersp., von der reifenden Frucht abfallend; *Gf. zsgewachsen, fast von der Länge der Stbg.*; Früchte aufrecht-rundlich. $\frac{1}{2}$. An rauhen O., (im Littor., um Triest nicht selten.) Jun. *R. scandens* Mill. *R. balearia* Pers. *R. atrovirens* Viv. nach Lindl. *R. scandentis* var. Wallr. Dch die beiderseits spiegelnden, im Winter nicht abfallenden B. von der vorhergehenden verschieden; zurückgekrümmte NebenB. habe ich nun auch bei dieser beobachtet. Die *Gf.* zottig. Var. aber:

β . *leostyla*, die *Gf.* kahl. Vielleicht hierher: *R. prostrata* Desv. Var. ferner wie andere Arten als

γ . *microphylla* und *micrantha*, Blättchen und Bth. um die Hälfte kleiner: *R. sempervirens* β . *microphylla* DC. Ein sehr merkwürdiges Exemplar von dieser Variet. mit ganz freien *Gf.* erhielt ich von Salzmann.

20. *R. GALLICA* (L. Lindl.) Französische R. — Die Stacheln der jährigen Stämme gedrunken, ungleich, die grössern aus verbreiteter, zsgedrückter Basis, pfriemlich, etwas sichelf., die kleineren borstlich, *die eingemischten drüsentrag. Borsten zahlreich*; Blättchen elliptisch oder rundlich, etwas starr, lederig, einfach-gesägt; *die NebenB. lineal.-länglich, flach, Oehrchen ey-lanzettf., spitz, auseinanderfahrend*, an den blüthenst. B. *gleichgestaltet*; *Zpfl des K fiedersp., kürzer, als die Blkr., zurückgebogen, endlich abfällig*; *Nüsschen sämmtlich stiellos*; Früchte aufrecht, kugelig, knorpelig. $\frac{1}{2}$. In Hainen, an Waldrändern, und hie und da auf Aeckern, (stellenweise dch das g. Gebiet, an vielen O. jedoch gar nicht.) Jun. *R. Chamaerhodon* Wallr. *R. austriaca* Crantz. — Ein niedriger Strauch mit weit und breit herumkriechender W. Die Bth. gross, meist gesättigt-purpurn. Kommt vor: 1. der Stamm aufrecht, die Blättchen eyf.: *R. gallica sylvestris* der Autoren; derselbe mit rundlichen Blättchen: *R. austriaca* J. a. t. 198; mit weisslichen oder hellrosenrothen Bth.: *R. agrestis* Gmel. *R. arvensis* Rau. *R. germanica* Märklin, *R. centifolia simplex* der deutschen Autoren. 2. Der Stamm gestreckt: *R. geminata* Rau. en. 98. Var.:

β . die *Gf.* verlängert, von der Länge der Stbg., kahl: *R. hybrida* K. und Z. cat. *R. Czackiana* Bess.

γ . die *Gf.* verlängert, von der Länge der Stbg., behaart, frei: *R. hybrida* Schleich.!

δ . dieselbe, die *Gf.* in eine verlängerte, behaarte Säule zsgewachsen: *R. Axmanni* Gmel.

Die letzten 3 Variet. sind wahrscheinlich Bastarde von *R. gallica* und *arvensis*, Gartenvarietäten sind:

α. *plena*, Bth. gefüllt, gleichfarbig: *R. gallica* Linn. et Aut.; oder hellrosenroth mit dunklen Purpurstreifen: *R. basilica* Rössig.

β. *plena micrantha*: *R. parvifolia* Ehrh. *R. remensis* DC. *R. burgundica* Röss. Von allen diesen unterscheidet sich die

R. centifolia L., die Königin aller Blumen. Die W. ist viel weniger kriechend; die Stämme sind höher; die Stacheln ungleich, die grössern derber; die Blättchen von dünnerer Substanz, nicht so trocken und hart; Bth. fleischroth; die Röhre des K. schlanker und dessen Zpfl länger und schmaler. Die Frucht sah ich noch nicht. Kommt auch in Gärten als kleine und kleinblumige Variet. vor: *R. provincialis* Ait. Die Art selbst aber wächst bei uns nirgends wild.

XXXV. Ordng. SANGUISORBEEN. Lindl. syn. 102. DC. prodr. 2. 583.

K. 3-4-5 sp., *Zpfl* in der Knospenlage klappig; Röhre an der Spitze zsggezogen, die freien Fruchtkn. bergend; Schlund dch einen Ring verengert. *Btkr.* fehlend. *Stbg.* 4, oder dch Fehlschlagen weniger, oder zahlreich, vor dem Ringe des Schlundes eingefügt. Fruchtkn. 1, 2, 4, den Gf. auf der Spitze oder an der Basis tragend, 1 eyig, mit hängendem oder aufstrebendem Eychen. *N.* kopfig oder pinself. oder bärtig. Die Nuss oft im verhärteten K. eingeschlossen. *S.* eyweisslos. *B.* nebenblättrig. Bth. zwitterig oder eingeschlechtg.

1. *ALCHEMILLA* (L.) Frauenmantel. — Röhre des K. fast glockig; Saum 8 th., Zpfl abwechselnd kleiner. Stbg. 1-4, dem Ringe des Schlundes eingefügt, den kleinern Zpfln gegenst. Der Gf. ans der Seite des Fruchtkn. hervortretend, *N.* kopfig. Nuss in dem bleibenden K. eingeschlossen. (Bth. grün, am Schlunde gelblich.)

* Bth. in Ebensträussen endst.

1. *A. VULGARIS* (L.) Gemeiner F. — *WB.* nierenf., bis zum dritten Theile 7-9 lappig, Lappen halbkreisrund, ringsum-gesägt. 4. Auf Wiesen und Triften; in die A. hinaufsteigend. Mai-Jul. St. h. 2. Var. kahl und rauhh., mit abgerundeten kürzern, oder mehr eyf. und längern Lappen der B. und mit an der Basis weniger-herzf. und abgeschnittenen B., letztere ist *A. truncata* Tausch. Var. ferner

β. *subsericea*, B. etwas rauhh., etwas seidigglänzend: *A. montana* Willd. *A. vulgaris* γ. *hybrida* Willd. *A. alpina* β. *hybrida* L. Pluk. phyt. 240. f. 1.

2. *A. PUBESCENS* (MBieberst) Flaumiger F. — *WB.* nierenf., bis zum dritten Theile 7-9 lappig, Lappen kurz-verkehrteyf., ab-geschnitten, vorne spitz-gesägt, am Grunde ganzrandig. 4. Auf Triften der höchsten A., (auf der Pasterze in Kärnth., Tyrol und

auf der Seiseralpe, dem Röthenstein bei Kitzbichel, den Fuscher A.)
Jun. Jul. D.

3. A. FISSA (Schummel bei Wimm. u. Grab.) Gespaltener F. — WB. nierenf., bis zur Mitte 7-9 sp., Lappen verkehrteyf., vorne eingeschnitten-gezähnt, am Grunde ganzrandig. 4. Auf feuchten Triften der höhern A., (d. Schw. und dch die ganze AKette, in den Sudeten.) Jul. Aug. St. h. 56. A. minor Tausch. Host. A. pyrenaica Dufour. nach Steud. und Hochst. Meist kahl, die Wimpern der B. ausgenommen, seltner mit zerstreuten Haaren besetzt.

4. A. ALPINA (L. mit Ausschl. der Var. β .) Alpen-F. — WB. fingerig - 5-7 th., Zpfl lanzettl.-keilig, stumpf, an der Spitze ange-drückt-gesägt, unterseits seidenh. 4. An felsigen und kiesigen O. der A. und VorA.-Regionen, und höherer, die A. begleitender, Gebirge, (auf dem Rotabac und Rossberg in den Vogesen; in der Schw. und von da dch Tyrol, Salzbg, Kärnth., Krain und Steyerm.) Jun.-Aug. St. h. 51.

5. A. PENTAPHYLLEA (L.) Fünfblättriger F. — WB. bis zur Basis 5 th., die 3 mittlern Zpfl verkehrteyf.-keilig, vorne eingeschnitten-4-6-zählig, die seitenst. 2sp., 1-mehrzählig, Zähne geradehervorgestreckt. 4. An nassen, kalten O. der Alpengletscher, (Schw.; in Tyrol auf dem Wormser Joch und dem Madritsch-Gletscher zw. Rabbi und Martel.) Jul. Aug. Boccon. mus. p. 18. t. 1. St. B. u. K. kahl, oder die B. unterseits und am Rande mit einzelnen Haaren bestreut. — Alchemilla cuneata, von Thomas. In dem Aostathale gesammelt, unterscheidet sich von A. pentaphyllea dch zottige St., K. und Unterseite der B. und dch spitze Zpfl der B.

“ Bth. blattwinkelst., geknäuel.

6. A. ARVENSIS (Scop.) Feld-F. — B. handf.-3 sp., an der Basis kugelig, Zpfl vorne eingeschnitten-3-5zählig. ☉ Auf Aeckern der Ebenen und niedrigen Berge. Mai-Herbst. A. Aphanes Leers. Aphanes arvensis L. Schk. t. 26.

2. SANGUISORBA (L.) Wiesenknopf. — Röhre des K. an der Basis von 2-3 DeckB. umgeben, an der Spitze verengert; der Saum 4 theilig. Blb. 0. Stbgf. 4, 6-15. Fruchtkn. 1. Gf. endst., fädl. N. kopfig, weichstachelig dch längl. Papillen. Die Nuss in den bleibenden erhärteten K. eingeschlossen. Bth. vielehig.

I. S. OFFICINALIS (L.) Gemeiner W. — Aehren eyf.-länglich; Stbg. ohngefähr von der Länge der Zpfl des K.; Blättchen herz-f. länglich. 4. Auf den Wiesen der Ebenen und niedrignen Berge Schk. t. 24. — Var.: die besondern Bstiele an der Basis nackt oder mit einem ganzrandigen oder gezähnten Nebenblättchen gestützt; zu dieser mit Nebenblättchen versehenen Varietät gehört: Sanguisorba auriculata Scop. carn. Auf den Wiesen bei Wippach, (in Krain,) wo Scopoli seine S. auriculata „häufig“ sah, fand Tommasini nur die gewöhnliche S. officinalis.

2. *S. DODECANDRA* (Morett. in bibl. ital. tom. 70. p. 436. nach Bertol. fl. ital. 2. p. 186.) Zwölfmänniger W. — Die Aehren walzlich, verlängert; *Stbgf. 6-12, viel länger als die Zpfl des K.* 2. „Im Val d'Ambria des Veltlin von Dr. Massara entdeckt, nach dessen Angabe sie daselbst in Menge vorkommt,“ von Salis Marschlins, auf dem Zettel des mir überschickten Expl. Jul. Aug. nach Bertol.

3. *POTERIUM* (L.) Becherblume. — Röhre des K. an der Basis mit 2-3 DeckB. umgeben, an der Spitze verengert: Saum 4th. Blb. 0. Stbg. 20-30. Fruchtkn. 2-3; der Gf. endst., fädlich, N. pinself., vieltheilig, aus fädl., verlängerten Zpflu zsgesetzt. Nüsse 2-3, von dem bleibenden, verhärteten oder auch fast beerenartigen K. eingeschlossen. Bth. vielehig. Dch die N. unterscheidet sich diese Gattung hinreichend von der Gattung *Sanguisorba*.

1. *P. SANGUISORBA* (L.) Gemeine B. — Krautig; die St. kantig; *die fruchtrag. K.* knöchern-erhärtet, netzig-runzelig, *4kantig, Kanten stumpf.* 4. Auf Wiesen und Triften, vorzügl. an gebirgigen O.; in die VorA. hinaufsteigend. Jun. Jul. Schk. t. 300. *Pimpinella Sanguisorba* Gärtn. Var. kahl und unterwärts kurz.; hierher: *P. guestphalicum* v. Bönningh., aus S. gezogen, die ich von dem Autor selbst erhielt; ausserdem mit rundern oder mehr ovalen, an der Basis abgeschnittenen oder herzf., freudiger-grünen oder ins Meergrüne spielenden B.; zu dieser letzten: *P. glaucescens* Rb. fl. exc. Die Bth. beobachtete ich meist vielehig.

2. *P. POLYGAMUM* (W. und Kit.) Vielehige B. — Krautig; die St. krautig; *die fruchtrag. K.* knöchern-erhärtet, grubig-runzelig, *4kantig, Kanten geflügelt*, Runzeln erhaben, gezähnt. 4. An gebirgigen O. der südl. Gegenden, (in Krain, Istrien.) Untersch. sich von der vorhergehenden dch die Früchte, die höhere Statur und die mehr ovalen Köpfehen. Var. kahl und kurz.

XXXVI. Ordng. POMACEEN. Lindl. trans. 13. 93. Rosacearum tribus Pomaceae DC. prodr. 2. p. 626.

*Röhre des K. an den Fruchtkn. angewachsen, Saum 5zäh-
nig oder 5sp., verwelkend. Blb. 5. Stbg. 20, mit den Blb. dem,
den Schlund des K. umgebenden, Ringe eingefügt, in der Knos-
penlage einwärts-gekrümmt.* Eine oberweibige, oft honigführende
Scheibe bedeckt die Spitze des Fruchtkn. Der Fruchtkn. 2-5 fächer-
rig, Fächer 2-mehr-eyig, Eychen aufrecht; *STräger mittel-
punktst.* Gf. 5, oder weniger. Frucht fleischig, Fächer mit einer
sehr dünnen, weichen und kaum sichtbaren, oder papierartigen und
fast knorpeligen, oder knöchernen Haut bekleidet; daher entweder
eine Beeren- oder Apfel- oder mehrsteinige Steinfrucht. S. ey-
weisslos; Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

B. nebenblättrig, wechselst. und an den Seiten der Aeste büschelig.

1. CRATAEGUS (L.) Weissdorn. — K. 5 sp. Blb. 5. Gf. so viel, als Fächer des Fruchtkn. Der Fruchtkn. 2-5 fächerig, Fächer 2 eyig. Steinfrucht mit einer zugezogenen Scheibe endigend, die schmaler ist, als der Querdurchmesser der Frucht selbst, 1-5 steinig, Steine 2- oder dch Fehlschlagen 1 samig.

1. C. OXYACANTHA (L.) Gemeiner W. — B. verkehrteyf., 3-5 lappig, eingeschnitten und gesägt, an der Basis keilig nebst den Aestchen und *Bthstielen kahl*; Zpfl des K. aus eyf. Basis zugespitzt, drüsenlos; Früchte oval, 1-3 steinig. ♀. In Hecken der Ebenen und niedrigern Berge. Mai. Jun. Schk. t. 132. J. a. t. 292. f. 2. Mespilus Oxyacantha Gärtn. M. oxyacanthoides Thuill.

2. C. MONOGYNA (J. a. t. 292. f. 1.) Einsamiger W. — B. verkehrteyf., tief-3-5 sp., eingeschnitten und gesägt, an der Basis keilig; *Aestchen kahl*; *Bthstiele zottig*; Zpfl des K. lanzettl., zugespitzt, drüsenlos; Früchte fast kugelig, 1 steinig. ♀. In Hecken und Waldungen mit dem vorhergehenden, blühet aber 14 Tage später. Mespilus monogyna Willd. M. Oxyacantha Scop. DC. fl. fr., (im Prodr. als Variet. zu dem vorhergehenden gebracht.) C. kirtostyla Fingerh. Dieser berühmte Autor untersch. einen andern, erst noch näher zu untersuchenden C. monogyna dch einen geraden Gf., kahle K., zurückgebogene Zpfl und dch andere Merkmale von seinem C. kirtostyla, welcher mit rauhh. K. und abstehenden Zpfln versehen und die wahre C. monogyna Jacq. ist. Ueber die Verwechselung der Beschreibungen in J. fl. austr. vgl. Deutschl. fl. 3. 417.

3. C. AZAROLUS (L.) Azarol-W. — B. verkehrteyf., 3-5 sp., an der Basis keilig, Zpfl ganz oder 1-3 zählig; *die jüngern Aestchen filzig*; *Bthstiele nebst den K. krauszottig*; Zpfl des K. 3 eckig, spitz, drüsenlos. ♀. Auf Hügeln unter Gebüsch, (in Krain; im Littor.; südl. Tyrol.) Mai. Cam. epit. p. 153, sehr gut. D.

2. COTONEASTER (Medikus. Lindl.) Steinmispel. — Frucht, mit 3-5, unter sich zshängenden, und an den fleischigen K. angewachsenen, an der Spitze nackten und freien, und nicht in das Fleisch eingesenkten Steinen. Das Uebrige, wie bei Crataegus.

1. C. VULGARIS (Lindl.) Gemeiner S. — B. rundlich-eyf., an der Basis abgerundet, spitz oder ausgerandet; *K. kahl, am Rande nebst den Bthstielen etwas flaumig*. ♀. An gebirgigen, steinigen O., auf Felsen, in die VorA. hinaufsteigend, (dch d. g. AK. dies- und jenseits; auch stellenweise in den Gebirgen des mittleren D.) Apr. Mai. Fl. dan. t. 112. Mespilus Cotoneaster L. Blb. aufrecht, rosenroth. Früchte überhangend, blutroth; kommen in Schweden auch gelb und schwarz vor.

2. C. TOMENTOSA (Lindl.) Filziger S. — B. oval, abgerundet-stumpf; *K. nebst den Bthstielen filzig*. ♀. An Abhängen und stei-

len, felsigen O. der VorA. und A., (Oestr., Salzbg, Tyrol; in der Schw. nicht selten.) Mai. Früchte hochroth, meist aufrecht.

3. **MESPILUS** (L. mit Ausschluss von Arten.) Mispel. — Steinfrucht an der Spitze mit einer erweiterten Scheibe, fast von der Breite der Frucht selbst; sonst alles wie bei Crataegus.

1. **M. GERMANICA** (L.) Gemeiner M. — B. lanzettl., ungeth., unterseits filzig; Bth. einzeln. $\frac{1}{2}$. An gebirgigen O. unter dem Gebüsch, in Zäunen, (im südl. D. und der südl. Schw., ausserdem wohl bloß verwildert.) Mai. Schk. t. 333. **M. vulgaris** Rb. Var. mit fast doppelt-gesägten, klein-gesägten und ganzrandigen B.; kultiv. verliert er die Dornen.

4. **CYDONIA** (Tournef.) Quitte. — Fächer der Frucht vielsamig, sonst alles wie bei Pyrus.

1. **C. VULGARIS** (Persoon.) Gemeine Q. — B. eyf., an der Basis stumpf, ganzrandig, unterseits nebst den K. filzig. $\frac{1}{2}$. An felsigen O. in Gebüsch und in Zäunen, (am Ufer der Donau in Oestr.; im Littor. und bei Fiume, in der südl. Schw.; im übrigen Gebiete nur verwildert und kultiv.) Mai. **Pyrus Cydonia** L. J. a. t. 342. Var. mit fast kugeligen Früchten: **Cydonia maliformis** Mill.; eyflänglichen: **C. oblonga** Mill.; und mit breiteren B.: **C. lusitana** Mill.

5. **PYRUS** (L.) Birn, (Birn- und Apfelbaum.) — K. 5sp. Bbl. 5. Gf. so viel, als Fächer des Fruchtkn. Apfelfrucht 2-5fächerig, Fächer 2samig. (Untersch. sich von der Gattung Cydonia dch die 2samigen oder beim Fehlschlagen 1samigen Fächer der Frucht; von Crataegus, Cotoneaster und Mespilus dch die mit einer papierartig-knorpeligen, nicht knöchernen, Haut bekleideten Fächer.

1. Rotte. **PYRI GENUINAE**. Birnen. — Die Gf. frei, Frucht rundlich oder kreiself., an der Basis nicht benabelt. Bth. weiss.

1. **P. COMMUNIS** (L.) Gemeine B. — B. eyf., *ungefähr so lang als der Bstiel*, kleingesägt, im Alter nebst den Zweigen und Knospen kahl; Ebensträusse einfach; *die Gf. frei*. $\frac{1}{2}$. In Wäldern und Hecken. Apr. Mai. **Pyrus Achras** Gärtn. Nie sah ich diese Art mit lauter ganzrandigen B.; die Zähnen aber sind öfters unter dem Filze der untern Seite und des Randes verborgen und scheinen deswegen zu fehlen. Var.:

α . *glabra*: Ueberzug der B. dünn, spinnwebig, sich bei ihrer Entwicklung verlierend.

β . *tomentosa*: Filz der B. dicht, fast bis in den Herbst bleibend: **P. Pollveria** Lej. **P. communis** γ . *dasyphylla* Tausch in d. bot. Zeitg. — Wallroth untersch. 1. **P. communis** α . Achras, dch Dornen, an der Basis vorgezogene Früchte, und die jüngern, wohligen B.; u. 2. **P. communis** β . Pyrastrer, dch Dornen, an der Basis abgerundete Früchte, und die jüngern kahlen B. und andere Merkmale, die ich jedoch nicht immer vereinigt beobachtete. Der kultiv. Baum, **Pyrus communis** γ . *sativa* DC., der in unzähligen Abänderungen vorkommt, verliert seine Dornen.

Die *Pyrus Pollveria* L., *P. Bollwylleriana* DC., *P. Polvilla* Gmel., die im Bezirke unserer Fl. weder irgendwo wild wächst, noch zum ökonomischen Gebrauch kultiv. wird, untersch. sich dch tief-ungleich-gesägte B., zugespitzte, drüsenlose Sägezähne und den zsgesetzten Ebenstrauss. Die kleine birnf. Frucht ist nicht viel grösser, als die v. *Sorbus domestica*.

2. *P. AMYGDALIFORMIS* (Villars.) Mandelblättriger B. — *B. länglich-lanzettl.*, kurz-zugespitzt; an der Spitze schwach-kleingesägt, unterseits filzig, 3 oder 4mal so lang, als der Bstiel; Ebensträusse einfach. ♀. An sonnigen, trocknen O., (in Istrien bei Gimino und St. Vincenti, Müller, Thomas.) Apr. Eine durch die Zucht fortgepflanzte Variet. ist:

Pyrus nivalis (Jacq. a. t. 107.) *B. verkehrteyf.*, oder *elliptisch*; kurzzugespitzt, an der Spitze schwach-kleingesägt, unterseits filzig, 3 oder 4mal so lang, als der Bstiel; Ebensträusse 1fach. ♀. „An Rändern gebirger Wälder und an Weinbergen in Oestr., Jacq.“ „Wächst nicht in den A.; sondern wird in Weinbergen und Obstgärten kultiv., und dch Pfropfen, wie andere Gartenvarietäten von den Landleuten fortgepflanzt, welche die Frucht Schneebirne nennen, weil sie erst zu Anfang des Winters weich und geniessbar wird, wo Gärten, Weinberge, Wiesen meist mit Schnee bedeckt sind. Daher der Ursprung des Trivalnamens.“ Host. Mai. St. h. 34. D.

II. Rotte. *MALUS*. Aepfel. — Tournef. inst. t. 406. Die Gf. an der Basis zsgewachsen. Frucht an der Insertion des Bthstieles benabelt.

3. *P. MALUS* (L.) Gemeiner A. — *B. cyf.*, stumpf-gesägt, kurz-zugespitzt, kahl, oder unterseits filzig; Bstiele halb so lang, als das B.; Ebensträusse einfach; die Gf. an der Basis zsgewachsen. ♀. In Wäldern und Hecken der Ebenen und niedern Berge. Mai. Var. mit kahlen und an der Basis wolligen Griffeln und

α. *glabra*, die jüngern B. nebst dem Fruchtkn. ganz kahl: *P. Malus α. austera* Wallr. *Malus acerba* Merat. *Pyrus acerba* DC.

β. *tomentosa*, B. unterseits nebst dem Fruchtkn. wollig: *P. Malus β. mitis* Wallr. *P. Malus* DC.? Ich habe die beiden Variet., welche, den Ueberzug ausgenommen, vollkommen ähnlich, und dch kein anderes Merkmal zu unterscheiden sind, an ihren natürlichsten Standorten, an steilen, felsigen Stellen der höheren Berge beobachtet, und daselbst auch noch den Ueberzug sehr veränderlich gefunden. Allein in Zäunen und Hecken um die Dörfer kommt eine andere Variet. vor, welche aus den S. der kultiv. Varietäten entsteht, und wehrlos, aber auch nicht für eine wirklich wilde Pflanze zu halten ist. Hiezu möchte *P. Malus* DC. zu ziehen sein.

6. *ARONIA* (Persoon, mit Ausschluss von Arten.) Felsenmispel. — K. 5sp. Blb. 5. Der Fruchtkn. 5fächerig, Fächer dch unvollkommene Scheidewand 2sp., 2eyig. Beere dch Fehlschlagen 3-5samig. — Untersch. sich von *Pyrus* dch die 2sp. Fächer und die sehr dünne, weiche, im reifen Zustand kaum sichtbare, und nicht knorpelige, Fächerhaut.

1. *A. ROTUNDIFOLIA* (Pers.) Gemeiner F. — *B. oval*, stumpf, unterseits filzig, im Alter kahl; Blb. lanzettl.-keilig. ♀. An Bergab-

hängen, in Felsenspalten, (in der Schw. und auf beiden Seiten der AK. bis nach Krain und dem Littor., und bis nach Oestr.; ferner von der Schw. dch das Gebirge auf beiden Seiten des Rheines bis nach Coblenz; sodann bei Bleicherode in Thüringen.) Apr. Mai. J. a. t. 300. *Mespilus Amelanchier* L. *Pyrus Amelanchier* Willd. *Amelanchier vulgaris* Mönch. M. und K. D. fl. 3. 426. Bth. weiss. Bthstiele und K. fast kahl. Var. an denselben O.:

β. *tomentosa*. Bthstiele und Röhre des K. dicht-wollig-filzig; vielleicht *A. cretica* der deutschen Autoren? Aus unserm Gebiete habe ich bisher nur diese Variet. erhalten.

7. **SORBUS (E.)** Eberesche. — K. 5 sp. Blb. 5. Der Fruchtkn. 5fächerig, Fächer ungetheilt, 2eyig. Beere dch Fehlschlagen 1-5 sautig. Untersch. sich von *Aronia* dadurch, dass den Fächern die unvollständige Scheidewand fehlt; von *Pyrus* dch die sehr dünne und weiche, und nicht knorpelige, Fächerhaut.

* Blb. absteehend, weiss.

1. **S. DOMESTICA (L.)** Zahme E. — Die jüngern *B.* zottig, die ältern kahl, *gefiedert*; Blättchen spitz-gesägt; *Knospen* kahl, klebrig; Früchte birnf. β. An gebirgigen O., (echt wild in Oestr., Krain und im Littor.; aber in d. Jura d. Schwz., in den Rhein-gebirgen und bei Blankenburg am Harz hin und wieder, wie es scheint, verwildert.) Mai. Jun. J. a. t. 447. *Pyrus domestica* Sm. S. *Sorbus* Gärtn.

2. **S. AUCUPARIA (L.)** Gemeine E. — Die jüngern *B.* zottig, die ältern kahl, *gefiedert*; Blättchen spitz-gesägt; *Knospen* filzig. Früchte kugelig. β. In Wäldern und an schattigen O. Mai. Jun. Schk. t. 332. *P. aucuparia* Gärtn. Kommt, obgleich selten, schon zur Blüthezeit fast kahl vor; aber die gewöhnliche Pflanze ist an d. Knospen, jüngern Aestchen, Bstielen, der untern Fläche des B. Bthstielen und K. mit dichterem oder lockerem Filze überzogen, der sich jedoch meist gegen den Herbst verliert; zu dieser gewöhnlichen Form gehören die von mir gesehenen Expl. der *S. lanuginosa* Kit.

3. **S. HYBRIDA (L.)** Bastard-E. — *B.* unterseits filzig, länglich, an der Spitze doppelt-gesägt, *an der Basis gefiedert*, oder tief-fiedersp., Zpfl lanzettl.-länglich, ganzrandig, an der Spitze gesägt. β. In Gebirgswäldern, an Felsenwänden, (auf dem südl. Abhange Thüringens, und zwar auf dem Singer- und Willinger-Berge im Schwarzburg-Rudolstädtschen; bei Coburg; am Creux du Van im Jura, Shuttlew.) Mai. Fl. dan. t. 301. *Pyrus hybrida* Smith. brit., nicht Willd. *P. pinnatifida* Sm. engl. fl. *Crataegus Aria* β. Gaud. helv. — Unterscheidet sich leicht von *S. Aria* dch die an der Basis tief-bis zur Mittelrippe eingeschnittenen und daselbst in 2-4 lanzettl. gesonderte Fieder getheilten *B.*; bei *S. Aria* nehmen die kleinen Lappchen am Blattrande nach der Basis zu ab. Früchte wie *S. aucuparia*. Ist sicher keine Bastardpflanze. D.

4. **S. SCANDICA (Fries.)** Scandinavische E. — *B.* längl.-oval, eingeschnitten-gelappt, ungleich-gesägt, *unterscits filzig*, die *Lap-*

pen gleichlaufend, vorwärts-gekehrt, abgerundet, dch d. mittleren Zahn weichspitzig, die mittleren Lappen tiefer-eindringend, an d. Basis ganzrandig. ♀. Entdeckt in Preussen von H. Dr. Klusmann, (in Wäldern bei Redlau, 2 Meilen von Danzig.) *Pyrus intermedia* Ehrh. *Crataegus Aria* a. *Scandica* L. Beeren grösser, als bei *S. Aria*, von welcher sie sich dch entfernte Adern der B., den deutlich-lappigen Blattrand, dessen grössere Lappen die Mitte des B. Brandes einnehmen, unterscheidet; bei *S. Aria* nehmen die Lappchen schon von der Mitte des B. an nach der Basis ab, und gehen bald in Sägezähne und in die ganzrandige Basis über. In Deutschl. fl. 3. p. 428., hatte ich diese Art, die ich damals noch nicht gesehen hatte, mit der *S. latifolia* verwechselt, die eine verschiedene Art bildet.

5. *S. ARIA* (Crantz.) Mehliges E. (Mehlbeerbaum.) — *B.* eyf., länglich oder eyf., doppelt-gesägt, oder am Rande klein-gelappt, *unterseits filzig, Sägezähne und Lappchen von der Mitte des B. nach der Basis abnehmend*; Blb. abstehehd. ♀. In Bergwäldern, in die niedrigeren A. hinaufsteigend. Mai. *Crataegus Aria* a. L. spec., β. Fl. succ. *Aria nivea* Host. Der bald schneeweisse, bald aschgraue Filz der untern Blattfläche reicht nicht zu einem Unterscheidungscharakter hin. Beeren, roth oder gelblich.

6. *S. LATIFOLIA* (Persoon.) Breitblättriges E. — *B.* breit-eyf., *unterseits filzig*, am Rande lappig, Lappen 3eckig-eyf., zugespitzt, gesägt, *die untersten 3 grösser*, etwas abstehehd. ♀. In Laubwäldern, (auf der Nendinger Höhe bei Ludwigsthal im Württembergischen; Willinger Berge bei Stadtilm, Schönheit.) Mai. *Crataegus latifolia* Lam. *C. dentata* Thuill. *Pyrus arguta* Tausch in der bot. Zeitg. Unterscheidet sich von *S. scandica* dch folg.: Lappen 3eckig-eyf., die 2 hinteren unterhalb der Mitte des B. liegend und etwas abstehehd. Die Adern sind entfernt und nicht so sehr genähert wie *S. Aria*. Beeren roth. D.

7. *S. TORMINALIS* (Crantz.) Elsebeerbaum. — *B.* eyf., lappig, im Alter kahl, Lappen zugespitzt, ungleich-gesägt, *die untern grösser*, abstehehd. ♀. In Bergwäldern. Mai. *Crataegus torminalis* L. J. a. t. 443. *Pyrus torminalis* Ehrh. Beeren oval, lederbraun.

** Blb. aufrecht, rosenroth.

8. *S. CHAMAEMESPILUS* (Crantz.) Zwerg-E. — *B.* elliptisch od' lanzettl., doppelt-gesägt, kahl oder unterseits filzig; *Blb. aufrecht*. ♀. An felsigen Abhängen der A., (dch d. g. AK., auf d. Rotabac und d. Holneck d. Vogesen und im Teufelsgärtchen im Elbgrunde, im Riesengebirge.) Jun. Jul. *Mespilus Chamae-Mespilus* L. *Pyrus Chamae-Mespilus* DC. M. und K. D. fl. 3. p. 425. *Aria Chamae-Mespilus* Host. Var. B kahl und
β. unterseits filzig: *Pyrus sudetica* Tausch in der bot. Ztg.

XXXVII. Ordng. GRANATEEN. Don. in Jameson. edinb. phil. journ. 1826. p. 134. DC. prodr. 3. p. 3.

Röhre des K. an den Fruchtkn. angewachsen, Saum 5-7 sp., Zpfl in der Knospenlage klappig. Blb. 5-7. Stbg. mit den Blb. dem Schlunde des K. eingefügt, 20 und mehrere. Der Fruchtkn. mehrfächerig: Fächer vieleig, in 2 Reihen übereinandergestellt; 2 untere, 5 obere. Gf. I.; N. kopfig. Beere rindig, mit dem bleibenden K. gekrönt. S. von einem saftigen Samenmantel eingeschlossen, eyweisslos. Keim mit geradem, nach dem Nabel gerichteten, Würzelchen; die Keimb. zsgerollt. B. nebenblattlos, gegenst., weder punktirt, noch mit einer Ader berandet.

1. PÜNICA (L.) Granate. — Charakter der Gattung, wie der der Ordnung.

1. P. GRANATUM (L.) Gemeine G. — B. lanzettl.; der St. baumartig. b. Wird im Littor., südl. Tyrol kultiv. und kommt daselbst an unkultiv. O. und Zäunen verwildert vor. Jun. Jul. Schk. t. 131.

XXXVIII. Ordng. ONAGRARIEEN Jus. ann. mus. 3. p. 315. DC. prodr. 3. p. 35.

Röhre des K. mit ihrer ganzen Länge an den Fruchtkn. angewachsen, oder noch über denselben hinaus verlängert; Saum 2-5, öfters 4sp., Zpfl in der Knospenlage klappig. Blb. so viel als Zpfl des K., mit diesen abwechselnd, in der Knospenlage gedreht oder dachig, am Schlunde der Röhre eingefügt. Stbg. mit den Blb. eingefügt, bald so viel, bald doppelt so viel, bald halb so viel, als Blb. Der Fruchtkn. 2-mehreyig mit mittelpunkt. STrägern. Gf. I, N. kopfig oder gespalten. S. eyweisslos; Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

1. Gruppe. *ÓNAGREEN*. DC. prodr. 3. p. 40. Röhre des K. länger, als der Fruchtkn.; der freie Theil mit dem Saume abfällig.

1. EPILOBIUM (L.) Weidenröschen. — Saum des K. 4th., mit der an der Spitze des Fruchtkn. ringsum abspringenden Röhre abfällig. Blb. 4. Stbg. 8. Gf. fädlich; N. 4, kreuzf. abstehend, oder in eine Keule zsgewachsen. Kapsel 4fächerig, 4klappig, viel-samig; S. schopfig.

1. Rotte. *CHAMAENERION* Tausch. DC. prodr. 3. p. 40. B. zerstreut. Bth. ausgebreitet. Röhre des K. fast fehlend. Stbg. aus einer zsschliessenden Basis zurückgebogen, abwärts geneigt. Gf. zuletzt hakig-zurückgekrümmt.

1. E. ANGUSTIFOLIUM (L.) Schmalblättriges W. — B. zerstreut, lanzettl., ganzrandig oder schwach-drüsig-gezähnel, aderig; Blb. benagelt, verkehrteyf.; Gf. zuletzt abwärtsgebogen. 2. In Wäldern, besonders Schlägen; in die VorA. hinaufsteigend. Jul. Aug. St. h. Sl. Schk. t. 106. E. spicatum Lam. E. Gesneri Vill. Chamaenerion angustifolium Scop. Bth. traubig, und nicht ährig,

schön-purpurn, selten weiss. Variet. mit breitem B., (oder vielmehr ein Expl. aus fettem Boden mit elliptisch-lanzettl. B.): *E. angustifolium* β . L. *E. latifolium* Roth., nicht L.

2. *E. DODONAEI* (Vill.) Rosmarinblättriges W. — *B.* zerstreut, *lineal.*, nach beiden Enden verschmälert, ganzrandig oder schwach-gezähnel, *aderlos*; Blb. sitzend, elliptisch-länglich, nach der Basis verschmälert; *Gf. an der Basis flaumig, so lang, als die Stbg.*, zuletzt zurückgekrümmt. 2. An kiesigen O. der A., (dch d. g. AK., besonders auf den südl. Abhängen, und von da in die Thäler hinabsteigend.) Jul. Aug. St. h. 72. *E. Dodonaei* Gaud. fl. helv. *E. rosmarinifolium* Haenke bei Jacq., DC. *E. angustissimum* Ait. *E. angustifolium* γ . L. *E. angustifolium* Lam. *Chamaenerion palustre* Scop. Var. mit ganzrandigen und gezähnelten B., einem aufrechten und niederliegenden, einfachen und sehr ästigen St.

3. *E. FLEISCHERI* (Hochstetter.) Fleischer's W. — *B.* zerstreut, *lineal.*, oder *lineal.-lanzettl.*, nach beiden Enden verschmälert, ganzrandig oder schwach-gezähnel, *aderlos*; Blb. sitzend, elliptisch-länglich, nach der Basis verschmälert; *Gf. bis über die Mitte flaumig, halb so lang, als die Stbg.*, zuletzt zurückgekrümmt. 2. In Thälern der höhern A., (in dem Suldenthale am Fusse des Ortes in Tyrol; in der Schw., wenn die Variet. β . des *E. Dodonaei* Gand. hiehergehört.) Jul. Aug. St. h. 72. *E. denticulatum* Wender. M. n. K. D. fl. 3. p. 12., nicht Ruiz und Pav. *E. angustissimum* Rb. ic. I. t. 342? in der Abbildung ist der *Gf.* nämlich so lang, als die *Stbg.*

II. Rotte. *LYSIMACHION* Tausch. hort. canal. f. 1. Die untern B. gegenst., die obern wechselst. Bth. trichterf. Röhre des K. kurz, doch bemerklich. *Stbg.* aufrecht.

* Der St. stielrund, glatt.

4. *E. HIRSUTUM* (L.) Zottiges W. — *B.* gegenst., *stengelumfassend, mit blattiger Basis etwas herablaufend*, lanzettl. - länglich, *haarspitzig, gezähnel - kleingesägt*, die obern wechselst., *Sägezähne einwärtsgebogen*; der St. stielrund, sehr ästig, von einfachen längeren und drüsigen kürzeren Haaren zottig; die Narben abstehend; W. ausläufertreibend. 2. An sumpfigen, waldigen O., an Ufern, feuchten Hecken. Jun. Jul. St. h. 81. *E. grandiflorum* All. *E. ramosum* Huds. *E. amplexicaule* Lam. *E. aquaticum* Thuill. Bth. gross, purpurn. Der St. mit Zotten und kurzen drüsentrag. Haaren besetzt. Var.:

β . *subglabrum*, der St. nur mit kurzen Haaren besetzt, B. oberseits kahl, unterseits auf dem Nerven behaart; und

γ . *villosissimum*, der obere Theil des St., die Bthstiele und K. dicht - wollig - zottig: *E. hirsutum* β . *intermedium* DC. *E. intermedium* Merat.

5. *E. PARVIFLORUM* (Schreber.) Kleinblumiges W. — *B.* sitzend, *lanzettl.*, *spitz, gezähnel*, die untern gegenst., kurzgestielt; der St. stielrund, meist einfach, von einfachen Haaren zottig oder flaumig; *die Narben abstehend*; Ausläufer fehlend. 2. Auf sumpfigen Wiesen, an Ufern, im Weidengebüsch; in die VorA. hinaufstei-

gend. Jun. Jul. St. h. St. E. molle Lam. E. hirsutum β . L. E. hirsutum All. E. pubescens Roth. E. villosum Ait. Bth. hellviolett oder weisslich. Var., wie alle folg. Arten, mit um die Hälfte kleineren Bth. und

β . *subglabrum*, Haare spärlich, kurz, angedrückt, und so ausinandergestellt, dass die Pflanze kahl zu sein scheint: E. rivulare Wahlenb.; die grossblumige Variet. davon bei Rb. ic. f. 301.

6. E. MONTANUM (L.) Berg-W. — *B. eyf. oder eyf.-länglich, ungleich-gezähnt-gesägt*, am Rande und auf den Adern flaumig, die untern gegenst., gestielt; der St. stielrund, flaumig; die Narben abstehtend; Ausläufer fehlend. 4. In Wäldern und im Gebüsch. Jun.-Aug. St. h. 72. Rb. ic. 2. t. 189. Var.:

α . *verticillatum*, B. 3zählig. St. h. 72. Diese, unter der gewöhnlichen Pflanze hie und da vorkommende, Variet. unterscheidet sich von E. trigonum dch den stielrunden, nicht mit erhabenen Linien belegten St.

β . *lanceolatum*, B. eyf.-länglich, stumpfer, länger-gestielt, mit beblätterten, kurzen Aestchen in den Blattwinkeln; die ganze Pflanze oft roth überlaufen. St. h. 72. c. („St. flaumig, B. mit Borstchen besetzt, N. 4. th. Host a. a. O.“) Dch S. fortgepflanzt, geht die Pfl. in die gew. Form. über. E. lanceolatum Seb. u. Maur. ist eine andere Art nach Bertol. fl. ital.

γ . *collinum*, klein, B. 4mal kleiner, mehr eyf. und genähert, zwar kürzer- aber doch bemerklich-gestielt, manchmal sämmtl. wechselst.: E. collinum Gmel. E. montanum β . ramosissimum DC. fl. fr. E. montanum β . minus Wimm. und Grab.

7. E. HYPERICIFOLIUM (Tausch.) Johanniskrautblättriges W. — *B. eyf., zugespitzt, ganzrandig* auf den Adern und am Rande flaumig, die untern gegenst., gestielt; der St. stielrund, flaumig; die Narben abstehtend; Ausläufer fehlend. 4. An waldigen, gebirgigen O., (bisher blos in Böhmen.) Jun. Jul. St. h. 72. Dem E. montanum ähnlich, untersch. sich aber leicht dch die ganzrundigen Bth. Bth. zuerst weiss; dann hell-rosenroth. D.

8. E. PALUSTRE (L.) Sumpf-W. — *B. lanzettl., nach der Spitze allmählig verschmälert, ganzrandig oder gezähnt, mit keilf. Basis sitzend*, die untern gegenst.; der St. stielrund, etwas flaumig; die Narben in eine Keule zsgewachsen; Ausläufer sädlich. 4. Auf torfhaltigen, sumpfigen Wiesen, an Gräben. Jul. Aug. St. h. St. Fl. dan. t. 1574. Flaum des St. kraus und angedrückt, bisweilen in 2 herablaufende Linien geordnet, diese Linien aber werden blos aus Haaren und nicht aus Kanten des St. gebildet. Var.:

β . *pilosum*, der St. mit kurzen, wagerecht-abstehenden Haaren besetzt: E. simplex Tratt.

γ . *Schmidtianum*, B. breiter, deutlicher gezähnt: E. Schmidtianum Rostkow. in fl. sedin. — St. an der Spitze, sowie die Bth. vor dem Aufblühen hängend.

** Der St. zwar stielrund, aber mit 4, oder 2 gegenst. erhabenen, herablaufenden Linien belegt.

9. E. VIRGATUM (Fries.) Gertenf. W. — *B. lanzettl., von der*

*abgerundeten Basis an allmählig verschmälert, entfernt-gezäh-
nelt, fast sitzend, die oberen kurzgestielt, die untern gegenst.;*
der St. etwas flaumig, mit 2-4 erhabenen, herablaufenden Linien;
die Narben in eine Keule zsgewachsen oder etwas abstehend. 4.
Auf Wiesen und in feuchten Wäldern, an Quellen, Bächen des
nördl. D., (im Lanenburgischen: Driesen in der Neumark; die
Pfl. vom Unterharz und aus Schlesien sind mir jetzt zweifelhaft.)
Jul. Aug. St. h. Sl. E. obscurum Rb. fl. g. exsicc. n. 358. —
Bth. hellrosenroth. Nach Hartmann, Verfasser der Scand. Fl., sind
die Narben immer zu einer Keule zsgewachsen oder stehen nur
etwas und unordentlich auseinander, aber niemals als regelmässiges
Kreuz; die B. mit einem deutlichen Glanze versehen. — Dem E.
palustre unter den verwandten am ähnlichsten unterscheidet sich
dch folg.: der St. mit 4 oder 2 herablaufenden, erhabenen Linien,
die nicht blos aus Haaren gebildet sind, bezeichnet; der St. an
der Spitze sowie die Bth. vor dem Aufblühen aufrecht, und nicht
hängend; B. deutlicher-gezähnt und an der Basis abgerundet; (die
untersten B. haben, wie die aller verwandten Arten, eine ver-
schmälerte Basis;) bei E. palustre gehen alle B., auch die obern,
in eine keilige Basis über und man findet sie selten mit deutlichen
Zähnen versehen. E. alpinum ist viel kleiner, und hat, wie E.
palustre, nach der Basis verschmälerte B., welche an der Spitze
meist stumpf und viel schwächer-gesägt sind und einen an der
Spitze überhängenden St. D.

10. E. TETRAGONUM (L.) Vierkantiges W. — B. *lanzettl.*, von
der Basis bis zur Spitze allmählig verschmälert, gezähnt-gesägt,
die mittleren *mit blattiger Basis herablaufend-angewachsen*, die
untern etwas gestielt; der St. sehr ästig, fast kahl, mit 2-4 er-
habenen, herablaufenden Linien; die Narben in eine Keule zsgewachsen. 4. An sumpfigen O., Bächen, Gräben und Quellen. Jun.
Jul. St. h. Sl. Rb. ic. t. 189. Chamaenerion obscurum Schreb.
(dch herablaufende B. deutlich charakterisirt, denn ausser E. hirsutum hat keine andere Art dieser Gattung herablaufende B.) C.
ramosissimum Moench. An dem St. laufen meist beiderseits 2 Li-
nien herab, welche seltner in eine zsfließen; letzteres ist E.
obscurum Rb. ic. 2. t. 99. aber nicht fl. g. exsicc. Von allen Arten
dieser Rote untersch. sich E. tetragonum leicht dch seine mit
blattiger Substanz angewachsen-herablaufenden mittleren StB.

11. E. ROSEUM (Schreb.) Rosenrothes W. — B. *ziemlich lang-
gestielt, länglich*, an beiden Enden *spitz, dicht-ungleich-gezäh-
nelt-gesägt*, am Rande und auf den Adern fläumlich, die untern
gegenst.; der St. sehr ästig, reichblüthig, mit 2-4 erhabenen, he-
rablaufenden Linien, oberwärts flaumig; die Narben in eine Keule
zsgewachsen, oder zuletzt etwas abstehend. 4. In Gräben, an Bä-
chen und sumpfigen O. Jul. Aug. St. h. Sl. E. roseum Fries
herb. norm. E. nudum Schum. Rb. ic. 2. t. 190. Bth. rosenroth.

12. E. TRIGONUM (Schränk.) Dreikantiges W. — B. gegenst.,
zu 3 oder 4 quirlig, sitzend, fast stengelumfassend, länglich-eyf.,
zugespitzt, ungleich-gezähnt-gesägt, kahl, auf den Adern und am
Rande fläumlich, die obern wechselst.; der St. meist einfach, ober-

wärts nebst den 2-3-4 erhabenen, herablaufenden Linien fläumlich; die Narben in eine Keule zsgewachsen. 4. Auf etwas feuchten Triften der A. und VorA., (Schw. und dch die g. AK.; sodann auf dem Hohnack in den Vogesen, auf dem Feldberg im Oberbadischen; Mähr. und Schles. Gebirge.) Jul. Aug. St. h. 81. E. alpestre Rh. ic. 2. t. 200. (nicht Schmidt.) E. montanum β . alpestre Jacq. en. E. roseum γ . trigonum DC. prod. Jacq. erklärt es für eine Variet. von E. montanum, DC. für eine von E. roseum; nach meiner Meinung ist es eine gute Art, die auch mit gegenst. B., wiewohl seltener vorkommt.

13. E. ORIGANIFOLIUM (Lam.) Dostenblättriges W. — B. gegenst., etwas gestielt, eyf., zugespitzt, geschweift- und etwas entferntgezähnt, kahl, die untersten stumpf, die obern wechselst.; der St. einfach, armblüthig, mit 2 erhabenen, fläumlichen Linien; die Narben in eine Keule zsgewachsen. 4. An Bächen und Quellen in den VorA. und A., (dch die g. AK., auf dem Feldberge im Badischen; Mähr. und Schles. Gebirge.) Jul. Aug. St. h. 81. Rb. ic. 2. f. 314. E. alsinifolium Vill. E. alpestre Schmidt. Eine niedrige, 8-12 Zoll hohe Pflanze, in Hinsicht der B. einem kleinern Expl. von E. montanum ähnlich, aber dch den kahlen; mit 2 erhabenen, fläumlichen Linien belegten St. und dch die kleinen, stumpfen, ziemlich entfernten Zähnchen der B. verschieden; die untern B. kahl.

14. E. ALPINUM (L.) Alpen-W. — B. gegenst., etwas gestielt, länglich oder länglich-lanzettl., stumpf, ganzrandig oder schwach-gezähnt, an der Basis verschmälert, die obern lanzettl., wechselst., die der nicht blühenden Rosetten verkehrteyf.; der St. einfach, armblüthig, mit 2 erhabenen fläumlichen Linien; die Narben in eine Keule zsgewachsen. 4. An schlammigen O., Ufern der A. und VorA., (dch die ganze AK.; auf dem Feldberge im Badischen; Mähr. und Schles. Gebirge; Brocken.) Jul. Aug. St. h. 81. Fl. dan. t. 322. E. anagallidifolium Lam. Der St. 3-4 Zoll, auch bei der kultiv. Pflanze kaum 6 Zoll hoch. Untersch. sich von der vorhergehenden Art dch die länglichen, stumpfen oder nur spitzlichen, (nicht eyf. und nicht zugespitzten) StB. Die obern B. lanzettl. und oft auch spitz; Kapseln kahl; var. selten mit elliptischen und längl. B., die übrigens ebenfalls stumpf und an der Basis verschmälert sind: St. h. 82; und ferner:

β . nutans, mit grau-flaumigen Kapseln: E. nutans Tausch. Schmidt. (nicht Hornem.) E. nutans Hornem., hat lineal. StB. u. beständig weisse Bth.

2. OENOTHERA (L.) Nachtkerze. — S. ohne Schopf, sonst alles, wie bei Epilobium.

1. OE. BIENNIS (L.) Zweijährige N. — B. gezähnt, etwas geschweift, flaumig, die wurzelst. des ersten Jahres elliptisch, oder elliptisch-verkehrteyf., stumpf mit einem Spitzchen, in den Bstiel herablaufend, die unteren stengelst. elliptisch oder breit-lanzettl.; der St. flaumig und mit längeren, auf einem Knötchen sitzenden Haaren bestreut. ☉. An kiesigen Fluss-Stellen im

Weidengebüsch, auf Triften, an sandigen Wegen. Jun-Aug. St. h. 5. *Onagra biennis* Scop. Die W.B. sind an der Basis gezähnt, wie bei dem folgenden, die Blb. bis 10 Linien lang, var. aber:

β. *parviflora*, Blb. halb so gross. Hiezu ist aber *Oe. parviflora* L. nicht zu rechnen.

2. *OE. MURICATA* (L.) Weichstachelige N. — B. gezähnt, etwas geschweift, flaumig, die wurzelst. des ersten Jahres *verlängert-lanzettl., zugespitzt*, in den Bstiel herablaufend, die stengelst. lanzettl.; der St. flaumig und mit längeren, auf einem Knötchen sitzenden Haaren bestreut. ☉. An kiesigen Flussstellen, an Ufern, (am Treisam bei Freiburg im Breisgau; bei Colmar und Mühlhausen im Elsass; an der Elbe in Mecklenburg und Holstein.) Jun. Aug. D. fl. Fl. d. t. 1752. *Oe. parviflora* Gmel. bad. D.

II. Gruppe. *JUSSIEN*. DC. prodr. 3. p. 52. Röhre des K. nicht über den Fruchtkn. hervorgezogen, Saum 4-6sp., bleibend. Frucht kapselig, aufspringend.

3. *ISNARDIA* (L.) Isnardie. — Saum des K. 4th., bleibend. Blb. 4 oder fehlend. Stbg. 4. Der Gf. von der Basis an fädlich, abfällig, N. kopfig. Kapsel 4klappig, 4fächerig, vielsamig, fächer-schneidig-aufspringend.

1. *I. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-I. — Der St. an der Basis wurzelnd, kahl; B. gegenst., eyf., spitz, in d. Bstiel verschmälert; Bth. blattwinkelst., einzeln, sitzend, blumenblattlos. 4. In Gräben und langsam fliessenden Wassern, (in der Schwz bei Locarno, Genf, Neufchatel, Basel; auf der Rheinfläche bei Mannheim; Hengster im Gebiete d. Fl. d. Wett.; in Westphalen; Oldenb.; Hamb.; in Kärnthen.) Jul. Aug. St. h. 22. Die untergetauchte Pflanze steht aufrecht, blühet aber niemals; ausserhalb des Wassers liegt sie nieder und trägt Bth. und Früchte.

II. Gruppe. *CIRCAEEN*. DC. prodr. 2. p. 61. Röhre des K. nicht über den Fruchtkn. hervorgezogen, Saum 2-4sp., abfällig.

4. *CIRCAEA* (L.) Hexenkraut. — Saum des K. 2th. Blb. 2, verkehrtherzf. Stbg. 2, mit den Blb. abwechselnd. Frucht nussartig, 2fächerig; Fächer 1samig; S. aufrecht. (Bth. weiss, oder hellrosenroth.)

1. *C. LUTETIANA* (L.) Gemeines H. — B. eyf., etwas herzf., geschweift-gezähnt; *die Deckblättchen fehlend*. 4. In schattigen und feuchten Hainen. Jul. Aug. St. h. 23. Var. mit flaumigem und kahlem St. X
Pond.
Schlössch
am

2. *C. INTERMEDIA* (Ehrh.) Mittleres H. — B. eyf., an der Basis abgerundet oder fast herzf., geschweift-gezähnt; *die Deckblättchen borstlich; Früchte fast kugelig-verkehrteyf*. 4. In feuchten, schattigen mit vieler Dammerde versehenen Hainen, an schattigen Gebirgsbächen. Jul. Aug. *C. alpina* β. *intermedia* DC. Die Grösse, die fast längl.-herzf. B. und Bth. wie an *C. lutetiana*; der Habitus, die Blattzähne und Deckblättchen wie an *C. alpina*. X
Pond.
Schlössch
am

3. *C. ALPINA* (L.) Alpen-H. — B. breit-eyf., tief-herzf., geschweift-gezähnt; *die Deckblättchen borstlich; Früchte länglich-keulig*. 2. In schattigen Bergwäldern; in d. VorA. hinaufsteigend. Jun. Jul. St. h. 23.

IV. Gruppe. *HYDROCARYEN*. Link. enum. hort. berol. 1. p. 141. Röhre des K. angewachsen, Saum bleibend. Frucht nussartig, knöchern.

5. *TRAPA* (L.) Wassernuss. — Saum des K. 4th., bleibend. Blkr. 4blättrig. Stbg. 4. Gf. 1; N. kopfig. Der Fruchtkn. bis zur Mitte an den K. angewachsen, 2 fächerig: Fächer 1eyig; Eychen hängend, Nuss hart, doch die vergrösserten und verhärteten Zpfl des K. 4dornig, 1samig. Die Keimb. ungleich.

1. *T. NATANS* (L.) Gemeine W. — Früchte 4 dornig, Dornen an der Spitze rückwärts-rauh. ☉. In Seen, stehenden und langsam fließenden Wassern, (doch das g. Gebiet stellenweise.) Jun. Jul. St. h. 30. Bth. weiss.

XXXIX. Ordng. HALORAGEEN. R. Brown. gen. rem. p. 17. DC. prodr. 3. p. 65.

Röhre des K. an den Fruchtkn. angewachsen, Saum 4th., Blb. so viele, als Zpfl des K. und mit diesen abwechselnd, am Schlunde der Röhre eingefügt. Stbg. noch 1 mal so viele, als Blb., oder eben so viele. Der Fruchtkn. 1-mehrfächerig, Fächer 1eyig, Eychen hängend, STräger mittelpunktst. Der Gf. fehlend. N. eben so viele, als Fächer des Fruchtkn., sitzend, zottig oder pinself. Frucht nuss- oder steinfruchtartig. S. eyweisslos, Keim gerade, mittelpunktst., Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Bth bei den unsrigen eingeschlechtig.

1. *MYRIOPHYLLUM* (L.) Tausendblatt — Männchen. Saum des K. 4th. Blb. 4, sehr hinfällig. Stbg. 8. Weibchen. Röhre des K. 4kantig, Saum 4th., kleiner, als bei der männl. Bth. Blb. sehr klein, an die Spitze der Kanten des Fruchtkn. eingefügt, zurückgebogen, Zähnchen darstellend. N. 4, zottig. Der Fruchtkn. 4fächerig, Fächer 1eyig. Steinfrucht saftlos, bei der Reife in 4 Steine zerfallend. S. hängend, Eyweiss fast fehlend. Bth. rosenroth.

1. *M. VERTICILLATUM* (L.) Quirlf. T. — B. quirlf., fiederth., Zpfl borstlich; *Bth quirlig*, Quirl blattwinkelst. oder ährenf.; *die DeckB. sämmtlich kammf.-fiedersp.* 2. In Seen, Lachen, Gräben. Jul. Aug. Var.:

α. pinnatifidum, die DeckB. vielmal grösser, als die Bth., Fieder ziemlich entfernt: *M. verticillatum α. pinnatifidum* Wallr.

β. intermedium, die DeckB. 3mal so lang, als die Bth., Fieder genähert: *M. verticillatum β. pinnatum* Wallr.

γ. pectinatum, die DeckB. ohngefähr so lang, als die Bth.,

Fieder fast sich berührend: *M. verticillatum* γ. Wallr., *M. pectinatum* DC. Fl. dan. t. 1046. Diese Variet. untersch. sich von *M. spicatum* dch die sämmtl. fiedersp. DeckB.

2. *M. SPICATUM* (L.) Aehrenf. T. — B. quirlig, fiederth., Zpfl borstlich; *Bth. quirlig*, Quirl ährenf., *die jungen Aehren aufrecht*; *die untern DeckB. eingeschnitten*, so lang, als d. Quirl oder ein wenig länger, *die übrigen sämmtl. ganz*, kürzer, als d. Quirl. Jul. Aug. Schk. t. 296.

3. *M. ALTERNIFLORUM* (DC.) Wechselblumiges T. — B. quirlig, fiederth., Zpfl haarfein; die männlichen Bth. wechselst., ährig, *Aehren vor dem Aufblühen überhängend*; die weibl. Bth. nicht zahlreich, blattwinkelst., an der Basis der männl. Aehre quirlf. gestellt. 4. In Teichen mit klarem, kaltem Wasser, (in der Rheinpfalz, zw. Kaiserslautern, Schopp und Zweibrücken; Westphalen; Oldenb.; Braunschw.) Jul. Aug. D.

XL. Ordng. HIPPURIDEEN. Link. en. h. berol. I. p. 5. Haloragearum trib. III. DC. prdr. I. p. 71.

Saum des K. ganz, sehr klein, schwach-2 lappig, *Röhre an den Fruchtkn. angewachsen. Blb. fehlend. Stbg. 1*, dem Rande des K. an der Basis des vordern Lappens eingefügt: Stbf. kurz, Stbk. mit 2 Ritzen aufspr. *Der Fruchtkn. 1fächerig, 1 eyig*, Eychen hängend. Der Gf. fädlich, von der Furche des Stbk. aufgenommen. Steinfrucht mit dünnem Fleisch, dicker, knorpeliger Schale, Isänig, mit dem Rande des K. bekrönt. S. eyweisslos; Keim gerade.

1. *HIPPURIS* (L.) Tannenwedel. — Der Gattungscharakter derselbe wie der Ordnung.

1. *H. VULGARIS* (L.) Gemeiner T. — B. lineal., quirlig, Quirl mehrblättrig. 4. In Gräben, Weihern, Bächen, (dch das g. Gebiet, jedoch nicht überall.) Jul. Aug. St. h. 44. In Bächen fluthend trägt er verlängerte, durchscheinende B. Var. aber:

β. *maritima*, B. 4 oder 6, fast lanzettl.: *H. vulgaris* β. *maritima* Wahlenb. *H. maritima* Hellen. Rb. ic. f. 182. II. *lanceolata* Retz. *H. tetraphylla* L.

XLI. Ordng. CALLITRICHINEEN. Link. en. hort. berol. I. p. 7. Haloragearum trib. II. DC. pr. 3. p. 70.

Bth. zwitterig, oder öfters eingeschlechtig. *DeckB. 2, gegenst., blumenblattig*, durchsichtig, an der Basis der Bth. *K. fehlend*, oder untenst., sehr klein, 2 blätterig. (Vergl. Kützing. bei Rb. ic. 9. f. 1200. A.) Blkr. fehlend. *Stbg. 1*, das Stbk. *nierenf.*, 1 fächerig, mit einer Quernath aufspringend. *Fruchtkn. 1*,

4 kantig, (je zwei Kanten einander mehr genähert,) 4 fächerig, Fächer leygig. *Gf.* 2, pfriemlich, die *N.* ungeth. *Steinfrucht* saftlos, zuletzt sich in 4 nicht aufspringende Carpellen trennend. Keim umgekehrt, in der Achse des fleischigen Eyweisses gelegen. — Wasserkräuter.

1. CALLITRICHE (L.) Wasserstern. — Charakter wie der der Ordnung.

1. *C. STAGNALIS* (Scop.) Breitblättriger W. — *B. sämmtl. verkehrteyf.*; die *DeckB.* sichelf., an der Spitze zsneigend; die *Gf.* bleibend, zuletzt zurückgekrümmt; Kanten der Frucht flügelig-gekielt. 4. Sowohl in stehenden, als fliessenden Wassern. Blühet vom Frühling bis in den Herbst. *Rb.* ic. f. 1184—1186. Untersch. sich leicht dch die sämmtlich, auch an dem untern Theile der Aeste verkehrteyf. *B.*

2. *C. PLATYCARPA* (Kützing.) Breitfrüchtiger W. — Die untern *B. der Aeste lineal.*, die obern verkehrteyf.; die *DeckB.* sichelf., an der Spitze ziemlich gerade und sich kreuzend; die *Gf.* zuletzt zurückgekrümmt; Kanten der Frucht flügelig-gekielt. 4. Mit dem vorliegenden. *Rb.* ic. 9. f. 1187—1199. Untersch. sich dch die untern lineal. *B. der Aeste*, die gebogenen aber an der Spitze nicht hakigen *DeckB.*, und die zuletzt zurückgebogenen *Gf.*

3. *C. VERNALIS* (Kützing.) Frühlings-W. — Die untern *B. der Aeste lineal.*, die obern verkehrteyf.; die *DeckB.* etwas gebogen; die *Gf.* aufrecht, bald verschwindend; Kanten der Frucht spitzgekielt. 4. In Gewässern. Blühet mit den vorbergehenden. *Rb.* ic. 9. f. 1179—1183. — Untersch. sich von *C. platycarpa* dch die kürzern, aufrechten *Gf.*, und den sehr schmalen Flügel der paarweise mehr genäherten Fruchtkanten. Var. Früchte lang-gestielt: *C. pedunculata* DC., nach einem von Salzmann erhaltenen Expl.

4. *C. HAMULATA* (Kützing.) Hakenblüthiger W. — Die untern *B. der Aeste lineal.*, die obern verkehrteyf.; die *DeckB.* kreis-sichelf., an der Spitze hakig; die *Gf.* sehr lang, spreitzend; Kanten der Frucht flügelig-gekielt. 4. In Gewässern. Blühet mit den vorbergehenden. *C. autumnalis* Kütz. Reichenb. ic. 9. f. 1200—1220. Untersch. sich dch die stark-sichelf., an der Spitze hakigen *DeckB.* — *C. verna* L. und *C. pallens* MBieb. begreifen alle vorbergehenden Arten in sich. Unter *C. aquatica* fügen Huds. und Sm. diesen auch die folgende Art bei. — *C. minima* Hoppe, *C. cespitosa* Schulz, ist eine Landform der vorbergehenden Arten; *C. stellata* Hopp. eine Wasserform mit ovalen, weniger ausgerandeten obern Blättern; *C. intermedia* Hopp. eine Wasserform mit deutlicher ausgerandeten *B.*; *C. angustifolia* Hopp. eine Form mit lauter lineal. *B.*

5. *C. AUTUMNALIS* (L.) Herbst-W. — *B. sämmtl. lineal.*, an der Basis breiter, nach der Spitze schmaler; Kanten der Frucht flügelig-gekielt. 4. In langsam fliessenden Strömen und in Seen un-

ter dem Wasser, (in Mecklenbg und zwar am Rande des Sees hinter dem Hofgarten bei Neubrandenburg.) Herbst. „Die obersten B. gedrungener, aber nicht in eine Rosette gehäuft, Früchte sehr häufig, blattwinkelst.“ Schultz. D.

Die *Callitriche platycarpa* Kütz. und die *C. hamulata* Kütz. habe ich nach den von diesem berühmten Autor gegebenen Beschreibungen und Abbildungen und nach getrockneten Exemplaren, welche mir derselbe mitgetheilt hat, aufgenommen; lebend konnte ich bis jetzt diese Pfl. nicht beobachten.

XLIII. Ordng. CERATOPHYLLEEN. Gray. brit. pl. arr. 2. p. 554.

Bth. 1 häusig. Männch. Bthhülle 12 blättrig, B. lineal.; am Ende abgeschnitten und 2 dörnig *Stbk. 12-16*, sehr kurz-gestielt, ein wenig länger, als die Blüthenhülle, verkehrteyf., an der Spitze mit einem halbmondf., beiderseits in ein Dörnchen ausgehenden Einschnitte ausgerandet, 2 fächerig, *Fächer der eine unvollständige Scheidewand halb 2 sp.* Weibch. Blüthenhülle einblüthig. Der Fruchtkn. frei, eyf., 1 fächerig, 1 eyig, Eychen hängend; der Gf. pfriemlich. Nussfrucht mit einer von dem Gf. herrührenden Spitze versehen. *Keim* gerade, mit 4 quirligen Keimb., wovon 2 gegenst. breiter sind; Federchen sehr zsgesetzt.

1. CERATOPHYLLUM (L.) Hornblatt. — Gattungscharakter derselbe, wie der der Ordnung.

1. C. SUBMERSUM (L.) Glattes H. — B. 3 mal gabelsp. in 5-8 borstliche Zpfl getheilt; Früchte oval, flügellos, an der Basis nackt, an der Spitze mit einem Dorne, der mehrmal kürzer ist, als die Frucht. 4. In Seen, Weihern, Gräben, viel seltner, als die folg. Art. (Rheinpfalz bei Schwetzingen; in Oldenbg; Holstein.) Jun. Jul. C. muticum Cham. Linnaea 5. t. 4. A. B. B. freudiggrün, in haarfeine Zpfl gespalten. Die Früchte bei meinem Expl. mit kleinen Knötchen bestreut, wie sie Nolte beschreibt.

2. C. DEMERSUM (L.) Rauhes H. — B. gabelsp. in 2-4 lineal.-fädliche Zpfl getheilt; Früchte oval, flügellos, 3 dörnig, 2 Dornen an der Basis zurückgekrümmt, der endst. so lang, als die Frucht, oder länger. 4. In stehenden und langsam fließenden Wassern. Jul. Aug. Gärtner. fruct. t. 44. C. oxyacanthum Cham. linn. 4. p. 504. t. 5. f. 6. b. — Kraut dunkelgrün; B., vorzüglich die obern, noch 1 mal so dick, als bei der vorhergehenden. Ich fand oft die Dornen der Basis in kleine Knötchen verkürzt; hierher gehört C. apiculatum Cham.

3. C. PLATYACANTHUM (Chamisso. Linn. t. 5. f. 5. a.) Breitdorniger H. — B. gabelsp. in 2-4 lineal.-fädliche Zpfl getheilt; Früchte verkehrteyf., 3 dörnig, beiderseits zwischen den Dornen gestülgelt, Flügel etwas gezähnt; Dornen der Basis flach, der

endst. länger, als die Frucht. 4. In stehenden und langsam fließenden Wassern, (bei Berlin.) Jul. Aug.

XLIII. Ordng. LYTHRARIEEN. Juss. dict. sc. nat. 27. p. 453. DC. prodr. 3. p. 75.

K. 1blättrig, gezähnt, Zähne in der Knospenlage klappig oder auseinanderstehend, die Buchten bisweilen in kegelf. Läppchen oder äussere Zähne hervortretend, bleibend. *Blb.* am obern Ende der Röhre des *K.* zwischen die Lappen eingefügt, bisweilen fehlend. *Stbg.* in die Kelchröhre unterhalb der *Blb.* eingefügt, frei. *Der Fruchtkn.* frei, 2-4fächerig, vieleigig, mit mittelpunktst. *Strägern.* Gf. 1; N. einfach. Kapsel häutig, vom *K.* umgeben, 2-4 fächerig oder doch Verschwinden der Scheidewände 1 fächerig. S. eyweisslos. Keim gerade. B. nebenblattlos.

1. **LYTHRUM (L.) Weiderich.** — *K.* röhrig, walzlich, 8-12 zählig; 4-6 Zähne aufrecht, mit den *Blb.* abwechselnd der Lage nach die äussern, aber der Richtung nach die innern; 4-6 abstehend, den *Blb.* gegenst. der Lage nach die äusseren, der Richtung nach aber die innern, eigentlich die in Hörnchen hervortretende Buchten der Kelchzähne, pfriemlich, (bei ausländischen Arten) manchmal sehr klein. *Blb.* 4-6, auf dem Ende der Röhre eingefügt. *Stbg.* so viel, als *Blb.* oder noch einmal so viel, in die Basis oder in die Mitte der Kelchröhre eingefügt. Gf. fädlich; N. kopfig. Kapsel 2 fächerig, vielsamig; die *Sträger* dick, an die Scheidewand angewachsen.

1. **L. SALICARIA (L.) Gemeiner W.** — *B.* herz-lanzettf., die untern gegenst. oder quirlig; *Bth.* 12männig, quirlig-ählig; *K.* an der Basis ohne Deckblättchen, die innern Zähne pfriemlich, noch 1mal so lang, als die äusseren. 4. An sumpfigen O., im Weidengebüsch, an Ufern, Gräben. Jul.-Sept. Fl. dan. t. 671. Var. α , der Gf. kürzer, als der *K.*, an der Spitze nickend, und

β . *longistylum*, der Gf. noch einmal so lang, als der *K.*: *L. Salicaria* β . *gracile* DC.

γ . *canescens*, die *B.* von krausem Haare etwas filzig: *L. Salicaria* γ . *tomentosum* DC. Von diesem untersch. sich *L. tomentosum* Mill. gärtn. lex. deh „die 1 Zoll langen und $\frac{3}{4}$ Zoll breiten“, breiteyf. *B.* und nach Rb. deh die weitabstehenden äussern Kelchzähne; diese Art ist mir unbekannt.

2. **L. VIRGATUM (L.) Ruthenf. W.** — *B.* lanzettl., die untern gegenst., an der Basis abgerundet, die obern nach beiden Enden verschmälert; *Bth.* 12männig, die untern quirlig, die obern wechselt.; *K.* an der Basis ohne Deckblättchen, Zähne gleich, abwechselnd pfriemlich. 4. An feuchten O., Gräben, (Oestr., Böhm., Steyermark, hin und wieder; bei Verviers im Geb. d. Fl. von Spa.) Jun. Jul. J. a. t. 7. *L. acuminatum* Willd. gehört nach Biederst. auch hieher.

D.

3. *L. HYSSOPIFOLIA* (L.) Ísopblättriger W. — B. lineal. oder länglich; *Bth.* 6 männig, *einzeln*, blattwinkelst.; *K. an der Basis* mit 2 sehr kurzen, pfriemlichen Deckblättchen, Zähne pfriemlich, abwechselnd-länger. ☉. Auf Stellen, die im Winter überschwemmt waren und auf feuchten Triften. Jul.-Sept. J. a. t. 135.

2. *PEPLIS* (L.) Afterquendel. — K. glockig, etwas zsgedrückt, 12zählig, 6 Zähne kürzer, zurückgebogen. Blb. 6, dem Schlunde des K. eingefügt, schnell verschwindend oder fehlend. Stbg. 6, vor die breiten Zähne des K. eingefügt. Der Gf. sehr kurz; N. kreisrund. Kapsel 2 fächerig, vielsamig. Untersch. sich von *Lythrum* dch den kurzen, glockigen K.

1. *P. PORTULA* (L.) Gemeiner A. — B. gegenst., verkehrteyf., gestielt; *Bth.* blattwinkelst., einzeln, fast sitzend. ☉. Auf im Winter überschwemmt gewesenen O., auf feuchten Triften und an Ufern. Jun.-Sept. St. h. 1.

XLIV. Ördng. TAMARISCINEEN. Desv. diss. in ann. sc. nat 4. 344. DC. prodr. 3. p. 95.

K. 5th., in der Knospenlage etwas dachig. Blb. so viel, als KB., diesen wechselst., an der Basis des K. eingefügt, gleich, verweikend. Stbg. so viel, als Blb. oder noch 1mal so viel; Stbf. an der Basis 1brüderig oder fast frei. Der Fruchtkn. frei, 3kantig, 1 fächerig, vieleig; die Sträger auf einer Mittellinie oder auf der Basis der Klappen. Kapsel 3klappig. S. schopfig. Eyweiss fehlend, Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Sträucher mit kleinen, zuletzt sammt den Aestchen abfälligen B.

1. *TÁMARIX* (L. mit Ausschl. von Arten.) Tamarisken. — K. 4-5sp. oder 1th. Blb. 4-5. Stbg. so viel, als Blb. oder noch 1 mal so viel, auf einem nebenweibigen Ringe eingefügt. Gf. 3, abstehend, oberwärts in die Narbe verbreitert. S. auf der Basis der Kapsel angeheftet; Schopf an der Spitze des S. stiellös. (*Bth. rosenroth.*) Die Arten dieser Gattung sind noch nicht deutlich auseinandergesetzt.

1. *T. GALLICA* (L.) Französische T. — Kahl, meergrün; B. eyf., zugespitzt; Aehren seitenst.; *die DeckB. zugeschweift-haar-spitzig.* ♀. An sandigen O. des Meeresufers, (im Littorale bei Monfalcone.) Jul. *Tamarix pentandra* Pall. *Tamariscus pentandra* Lam. *T. gallicus* All. Var. mit kürzern und bemerklich längern Stbg., als die Blkr. D.

2. *T. AFRICANA* (Poir.) Africanische T. — Kahl, etwas meergrün; B. eyf., zugespitzt, an der Spitze selbst stumpf; Aehren seitenst.; *die DeckB. aus eyf. Basis länglich oder lanzettl., stumpf.* ♀. An sandigen, feuchten O. und am Meere, (auf der Insel Osero.) Jun. Jul. Aehren noch 1 mal so dick, als bei der vorgehenden.

2. **MYRICÁRIA** (Desv.) Myrikarie. — K. 5th. Blb. 5. Stbg. 10, abwechselnd kürzer, bis über die Mitte 1brüderig. Gf. fehlend. N. kopfig, meist 3lappig. Die STRäger auf die Mitte der Klappen längs angewachsen. Schopf des S. gestielt. (Bth. rosenroth.)

1. **M. GERMANICA** (Desv.) Deutsche M. — Strauchig, kahl; B. lineal-lanzettl., sitzend; Aehren endst., einzeln; die DeckB. länger, als die Bthstielen; Kapseln aufrecht, etwas abstehehd. $\frac{1}{2}$. Im Kiese der Waldbäche und Flüsse, (dch die g. AK. bis Oestr., in den Thälern der A. und bis in die Ebenen hinab; mit dem Rheine bis Pforzheim; in Oberschles. am Ufer der Weichsel.) Mai. Jun. Tabern. krb. 1354. f. 1. *Tamarix germanica* L. M. u. K. D. fl. 3. 482. *Tamariscus germanicus* Scop. Ein 4-5, oft 8 Fuss hoher Strauch. Blühet im Mai und zwar an der Spitze der Aeste und an den obern seitenst. Aestchen, dch welche eine dichte, endst. R. gebildet wird. Aber im Sommer, wenn die Frühlingsäste schon erhärtet sind, blühet er zum 2ten Male und treibt unter der fruchtrag. R. neue Blüthenäste, die meist mit längern B. versehen sind. Diese Sommerform ist, was den deutschen Standort anbetrifft, *Myricaria squamosa* Rb. nach Zuccar. in Briefen.

XLV. Ordng. PHILADELPHEEN. Don. DC. prodr. 3. p. 205; Myrtacearum genera Juss.

Röhre des K. kreiself., an den Fruchtkn. angewachsen; Saum 4-10th., bleibend. Blb. mit den Zpfln des K. abwechselnd und von gleicher Zahl, in der Knospenlage zsgerollt. Stbg. 20 u. mehrere, nebst den Blb. dem Schlunde des K. eingefügt. N. mehrere. Kapsel halb an den K. angewachsen, 4-10fächerig, vielsamig. Spfriemlich, in den mittelpunktst. Kanten der Fächer an einem kantigen STRäger gehüuft; Samenmantel locker, häutig; Eyweiss fleischig. Keim einwärtsgekehrt, Würzelchen vom Nabel entfernt. B. gegenst., unpunktirt, nebenblattlos, ohne eine Randader.

1. **PHILADELPHUS** (L.) Pfeifenstrauch. — Röhre des K. kreiself., Saum 4-5th. Blb. 4-5. Gf. 1 oder mehrere und an der Basis zsgewachsen; N. mehrere. Kapsel 4-5 klappig, 4-5fächerig. Samenmantel am Nabel gefranzt.

1. **P. CORONARIUS** (L.) Wohlriechender P. — B. elliptisch, zugespitzt, gesägt-gezähnt, oberseits kahl, unterseits kurzh.; Bth. traubig; Zpfl des K. zugespitzt; der Gf. tief-4 sp., kürzer, als die Stbg. $\frac{1}{2}$. In Zäunen und Hecken hie und da, verwildert. Mai. Jun. St. h. 3. Bth. weiss.

XLVI. Ordng. MYRTACEEN. R. Brown. gen. rem. p. 14. DC. prodr. 3. p. 207. Myrti Juss. gen. 323.

Röhre des K. an den Fruchtkn. angewachsen, Saum 5 sp., seltner 4, 6 sp. Blb. so viel, als Zpfl des K. und diesen wech-

selbst. *Stbg.* nebst den *Blb.* dem Schlunde des *K.* eingefügt, noch 1mal so viel, als *Blb.* oder *zahlreich*; *Stbf.* bald frei, bald vielbrüderig, in der Knospenlage einwärtsgekrümmt; die *Stbk.* eyf., mit einer doppelten Ritze aufspringend. *Der Fruchtkn. mehrfächerig, mit mittelpunktst. STrägern.* *Gf.* 1, *N.* einfach. *S. eyweisslos.* Keim gerade, mit nicht zsgerollten KeimB.; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Bäume oder Sträucher; *B. nebenblattlos*, ganzrandig, drüsig-punktirt, *die Queradern in eine einzige, dem Rande gleichlaufende zsfliessend.*

1. MYRTUS (L.) Myrte. — Röhre des *K.* fast kugelig, Saum 5th. *Blb.* 5. *Stbg.* frei. Beere 2-3fächerig, mit dem Saume des *K.* bekrönt, Fächer mehrsamig. *S.* nierenf.

1. M. COMMUNIS (L.) Gemeine M. — Bthstiele einzeln, 1blüthig, ein wenig kürzer, als das *B.*; die 2 Deckblättchen lineal, abfällig, unter die Bth. gestellt; *K.* 5sp.; *B.* ey- oder lanzettf., spitz. *b.* An sonnigen, felsigen O., (im östr. Littor. bei Triest, Duino.) Jul Aug. Lam. ill. t. 419. D.

XLVII. Ördng. CUCURBITACEEN. Juss. gen. p. 393. DC. prodr. 3. p. 297.

K. oberst., 5zählig, *Blkr.* 5sp. oder 5th., mit ihrer Basis an den *K.* angewachsen. *Stbg.* 5, 3brüderig, oder 3brüderig mit zsgewachsenen *Stbk.*; seltner frei. Die *Stbk.* schlängelich auf- und niedergebogen, *Gf.* 1; *N.* 3-5, 2lappig. *Der Fruchtkn.* 3-5fächerig; die *STräger wandst.*, an den äussern Kanten der Fächer angeheftet. Frucht fleischig, oft mit verschwindenden Fächern, (Pepo, Kürbisfrucht.) Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Eyweiss fehlend. Bth. meist 1geschlechtig. Kletternde Kräuter, mit schraubenf. Wickelranken.

1. CUCURBITA (L.) Kürbis. — *K.* 5zählig. *Blkr.* 5sp. Männch. *Stbg.* 5. *Stbf.* 3brüderig, oberwärts zsgewachsen; *Stbk.* 5, in eine Walze zsgewachsen. *N.* nicht ausgebildet. Weibch. *Stbf.* 3, nicht ausgebildet, in einen Ring verwachsen. *Der Gf.* 3sp.; die *N.* 2sp. *Der Fruchtkn.* 3fächerig, Fächer 2th.; Eychen in jedem Fache 2reihig. Beere rindig, geschlossen, nicht aufspringend. *S.* verkehrteyf., zsgedrückt, mit einem gedunsenen Rande umgeben.

1. C. PEPO (L.) Gemeiner K. — *Der St.* steifh., kletternd; Wickelranken ästig; *B.* herzf., 5lappig, rauh; *Früchte* rundlich und oval, *glatt.* ☉. Wird in wärmern Provinzen zum ökonom. Gebrauch mit der folg. Art kultivirt. Jun.-Aug. Bth. gelb. Kultiv.

2. C. MELOPEPO (L.) Turban-K. — *Der St.* steifh., kletternd, Wickelranken ästig; *B.* herzf., 5lappig, rauh; *Früchte* kreisrund,

plattgedrückt, vor der Spitze mit einem knötigen, hervorspringenden Rande umgeben. ☉. Ausser diesen aufgezählten werden in Gärten viele andere Arten u. Variet. zur Zierde kultivirt. Kultiv.

2. CUCUMIS (L.) Gurke. — K. 5zählig. Blkr. 5th. Männch. Stbg. 5; Stbf. 3brüderig; Stbk. zsschliessend. N. nicht ausgebildet. Weibchen. Stbf. 3, nicht ausgebildet. Der Gf. kurz, 3sp; die N. 2sp. Der Fruchtkn. 3fächerig, Fächer 2th.; Eychen in jedem Fächer 2reihig. Beere rindig, geschlossen, nicht aufspringend. S. verkehrteyf., zsgedrückt, mit einem spitzen Rande.

1. C. SATIVUS (L.) Gemeine G. — Der St. steifh., kletternd, Wickelranken einfach; B. herzf., 5eckig, *Ecken spitz*; Früchte länglich, knötig. ☉. Wird überall zum Hausgebrauch kultiv. Mai-Aug. Bth. gelb. Kultiv.

2. C. MELO (L.) Melonen-G. Melone. — Der St. steifh., kletternd; Wickelranken einfach; B. herzf., 5eckig, gezähnt, *Ecken rund*; Früchte kugelig und oval, glatt, knötig und netzig. ☉. Wird in den südl. Provinzen unserer Fl. im Freien kultiv., in den übrigen im Mistbeete. Kultiv.

3. BRYONIA (L.) Zaunrübe. — K. 5zählig. Blkr. 5th. Männch. Stbg. 5, 3brüderig. Weibchen. Gf. 3sp. Beere kugelig, 3fächerig, Fächer 2-wenigsamig.

1. B. ALBA (L.) Schwarzbeerige Z. — B. herzf., 5lappig, gezähnt, schwielig-rauh; K. des Weibchens so lang, wie die Blkr.; N. kahl. 4. In Zäunen und Büschen, (hin und wieder, aber nicht in allen Gegenden.) Jun. Jul. St. h. 80. Schk. t. 316. Beeren schwarz, und niemals roth. D.

2. B. DIOICA (J. n. t. 199.) Rothbeerige Z. — B. herzf., 5lappig, gezähnt, schwielig-rauh; K. des Weibchens halb so lang, als die Blkr.; N. rauhh. 4. In Zäunen und Büschen, (dch das g. Gebiet, in den südlichen Gegend. häufiger.) Jun. Jul. St. h. 80. Beeren roth. Die weibl. Bth. noch 1mal so gross, als bei der vorhergehenden, Ebensträusse kürzer gestielt, oft fast sitzend.

4. ECBALLION (Richard.) Eselsgurke. — K. 5zählig. Blkr. 5th. Männchen. Stbg. 5; Stbf. 3brüderig. Weibchen. Gf. 3sp.; die N. 2sp. Der Fruchtkn. 3fächerig, Fächer vieleig. Die reife von dem Bstiele getrennte Beere spritzt, elastisch sich zziehend, mit Gewalt ihren Saft und die Samen aus der an der Basis befindlichen Oeffnung heraus.

1. E. ELATERIUM (Rich.) Gemeine E. — Wickelranken fehlend; Früchte steifh. ☉. An Wegen und Zäunen, (im östr. Littor.) Jul.-Herbst. Momordica Elaterium L. Schk. t. 313. Elaterium cordifolium Moench. Echaliun agreste Rb. D.

XLVIII. Ordng. PORTULACEEN. Juss. gen. p. 313, mit Ausschl. von Arten.

K. 2blättrig oder 2sp., seltner 3, 5blättrig, in der Knospelage dachig. Blb. 5, ganz unten in dem K. eingefügt oder in eine 1blättrige Blkr. mehr- oder weniger verwachsen. Stbg. so viel, als Blb., oder weniger und den Blb. gegenst. und an diese angewachsen, oder zahlreich, frei, sämmtl. fruchtbar. Der Fruchtkn. frei oder an die Basis des K. angewachsen, 1fücherig, 3-vielezig, der STräger mittelpunktst. frei. Gf. 1 oder fehlend. N. mehrere. Kapseln ringsum aufspringend oder 3klappig. S. eyweisslos, mit einem ringf. Keime. *B. nebenblattlos*, seltner mit rauschenden NebenB. versehen, als Abweichung von der Regel der natürlichen Gruppe, wie Arten von *Spergula* bei den Alsineen, von *Oxalis* bei den Oxalideen und Arten von *Helianthemum* bei den Cistineen abweichen.

1. *PORTULACA* (L.) Portulak. — *K. 2sp.*, abfällig, die ringsum abgetrennte Basis bleibend. Blb. 4-6, dem K. eingefügt, frei, oder an der Basis zsgewachsen. Stbg. 8-15, im Grunde des K. eingefügt; Stbf. frei, oder an die an der Basis verwachsenen Blb. angeklebt. Der Fruchtkn. rundlich; der Gf. an der Spitze in 3-6 N. gespalten oder getheilt. Kapsel ringsumaufspringend.

1. *P. OLERACEA* (L. mit Ausnahme der var. β .) Gemeiner P. — Der St. nebst den Aesten gestreckt; B. länglich-keilig, fleischig; Bth. gabelst., einzeln, zu 2 oder 3, sitzend; *Zpfl des K. stumpf-gekielt*. ☉. An kultiv. O., Wegen. Jun.-Septbr. Schk. t. 130. *P. oleracea* α . *sylvestris* DC. Bth. gelb. Die Astgelenke an der Insertion der B. mit einem Ringe von kurzen Haaren umgeben.

2. *P. SATIVA* (Haw.) Gebaueter P. — Der St. aufrecht; Aeste ausgebreitet, aufstrebend; B. verkehrteyf.; Bth. gabelst., einzeln und mehrere, sitzend; *Zpfl des K. auf dem Rücken geflügelt-zsgedrückt*. ☉. Zum ökon. Gebrauch kultiv. *P. oleracea* β . *L. P. oleracea* β . *sativa* DC. *P. latifolia* Hornem. Von der vorigen verschieden dch einen mehr als noch einmal so hohen Wuchs, dch aufrechte oder aufsteigende und nicht auf den Boden niedergestreckte Aeste und Aestchen und vorzüglich dch den geflügelten Kiel der Kelchblättchen.

2. *MONTIA* (L.) Montie. — *K. 2blättrig*, bleibend. Blkr. trichterf.: Röhre bis auf den Grund mit einer einzigen Spalte gespalten, Saum (und nicht die ganze Blkr.) 5th., 3 Zpfl kleiner. Stbg. 3, dem Schlunde an der Basis der kleinern Zpfl eingefügt und diesen gegenst. Der Fruchtkn. kreiself.; der Gf. sehr kurz; N. 3, fläumlich. Kapsel mit dem bleibenden K. umgeben, 3klappig.

Wallroth hat zuerst beobachtet, dass die äussere Samenhaut der *Montia rivularis* Gml. und die der *Montia minor* Gml. deutlich verschieden sind, durch welches Merkmal man nun jene Pfl. als besondere Arten unzweifelhaft unterscheiden kann. Allein die *Montia fontana* meiner Synopsis rechnet W. zu irgend einer Variet.

der *M. rivularis*, die ich nie gesehen habe, und die mir gänzlich unbekannt ist. Die von mir beschriebene *Montia minor* ist jene gemeine Pflanze, welche Wallr. mit einem neuen Namen, *Montia arvensis*, beglückt hat. Beide Pflanzen sind nun folgendermaassen zu definiren:

1. *M. MINOR* (Gmel. bad. 1. p. 301.) Kleinere *M.* — S. knötig-
 rauh, fast glanzlos. ☉. Auf feuchten Aeckern, und im Winter
 durchnässten sandigen O. Mai. Aug. *M. fontana* Lin. fl. suec.
 nach den Synonymen. St. h. II. *M. arvensis* Wallroth in d. Lin-
 naea. *M. fontana* β. *erecta* Pers. syn. *M. aquatica minor* Mi-
 chel. gen. t. 13. f. 2. Die St. aufstrebend und weniger weich. Bth.
 weiss, wie bei der folgenden.

2. *M. RIVULARIS* (Gmel. bad. 1. p. 302.) Bach-Montie. — S.
 sehr fein knötig-punktirt, glänzend. 4. In Quellen und Bächen
 mit klarem Wasser (zerstreut dch d. Geb., doch nicht überall.)
 Blüht vom Frühling bis zum Herbst. *M. fontana* β. *major* Koch
 Syn. ed. 1. *M. fontana* β. *repens* Pers. Synops. *M. aquatica*
major Mich. gen. t. 13. f. 1.

XLIX. Ordng. PARONYCHIEEN. St. Hil. mem. plac.
 lib. p. 56. DC. prodr. 3. p. 365.

K. 5th., in der Knospenlage dachig, bleibend. Blb. ebenso-
 viel, als Kelchzpfl, oft klein und Trägern ohne Kölbchen ähnlich,
 dem *K.* eingefügt, mit den Zpfln abwechselnd. Die Stbg. frei, so
 viel, als Kelchzpfl oder weniger, nebenweibig, den Zpfln des *K.*
 gegenständig. Der Fruchtkn. frei, 1fächerig, Eychen an den
 mittelpunktst., freien STräger angeheftet; oder 1eyig, das Ey-
 chen an der Spitze des verlängerten, vom Grunde des Faches auf-
 steigenden Nabelstranges hängend. Die Gf. 2-3, getrennt oder an
 der Basis zsgewachsen. Frucht trocken, 3klappig oder nicht
 aufspringend. S. eyweisshaltig. Keim seitenst. oder ringf., Wür-
 zelchen nach dem Nabel gerichtet. *B.* nebenblättrig, NebenB.
 rauschend.

1. Gruppe. **TELEPHIEEN.** DC. prodr. 3. p. 366. Bartling.
 in Wendl. beiträg. 2. p. 157. *B.* wechsel-seltner gegenst. Blb. v.
 der Grösse der KB., tief unter dem *K.* auf einem undeutlich-ne-
 benweibigen Ringe eingefügt.

1. **TELEPHIUM** (L.) Telephie. — *K.* 5th. Blb. 5, tief unten
 in dem *K.* eingefügt, so lang, als die Kelchzpfl. Stbg. 5. Gf. 3,
 abstehend-zurückgekrümmt. Kapsel 3klappig, an der Basis 3fä-
 cherig, an der Spitze wegen nicht heraufziehenden Scheidewänden
 1fächerig. S. mehrere, an mittelpunktst. STräger angeheftet.

1. **T. IMPERATI** (L.) Wechselblättrige T. — *B.* wechselst.;
 Bth. traubig-ebensträussig, etwas gedrunen. 4. An felsigen, son-

nigen O., (in Südtirol im Vinschgau; im Wallis bei Sitten und Gonthey.) Jul. Schk. t. 85. Bth. weiss.

2. *CORRIGIOLA* (L.) Hirschsprung. — K. 5 th. Blb. 5, tief unten in dem K. eingefügt, so lang, als die Kelchzpfl. Stbg. 5. N. 3, sitzend. Kapsel 1 samig, nicht aufspringend. S. an einem aus dem Grund der Kapsel entspringenden Nabelstrange aufgehängt.

1. *C. LITTORALIS* (L.) Gemeiner H. - Ebensträusse beblättert; Bth. gestielt; StB. lineal-keilig. ☉. Im Kiese der Flüsse, an sandigen, feuchten Wegen, (dch das g. Gebiet stellenweise, in manchen Gegenden jedoch gänzlich fehlend.) Jul. Aug. Schk. t. 85. Bth. weiss.

II. Gruppe. *ILLECEBREEN*. DC. prodr. 3. p. 367. Bartling in Wendl. beitr. 2. p. 156. B. gegenst. Blb. fehlend oder sehr klein, pfriemlich, Trägern ohne Kölbchen ähnelnd, einem nebenweibigen Ringe eingefügt. Stbg. 5, selten 3 oder 1. Nicht aufspringende oder in schmale Fetzen zerreisende Kapsel- oder Schlauchfrucht, 1samig. S. an dem aus der Basis der Frucht entspringenden, verlängerten Nabelstrange hängend. (Die Blb. dieser Gruppe sind eigentlich Stbg. ohne Kölbchen, die auf dem nebenweibigen Ringe selbst, und nicht vor demselben eingefügt sind; vergl. auch Bartling a. a. O.)

3. *HERNIARIA* (L.) Bruchkraut. — K. 5 th., Zpfl flach-konkav, inwendig etwas gefärbt. Stbg. 10, die 5 mit den KB. abwechselnden ohne Kölbchen. Der Fruchtkn. kugelig. Der Gf. sehr kurz oder fehlend; N. 2, stumpf. Kapsel von dem K. bedeckt, häutig, nicht aufspringend, 1samig; Ansatz zu einem Deckelchen fehlend.

1. *H. GLABRA* (L.) Kahles B. — Die St. niedergestreckt; B. elliptisch oder länglich, nach der Basis verschmälert, *kahl*; Knäuelchen blattwinkelst., meist 10 blüthig; K. kahl. 2. Auf sandigen, kiesigen Feldern, trocknen Triften, Mäiden. Jul.-Herbst. Schk. t. 56.

2. *H. HIRSUTA* (L.) Behaartes B. — Die St. niedergestreckt, nebst den B. u. K. *kurzh.*; B. elliptisch oder länglich, nach der Basis verschmälert; Knäuelchen blattwinkelst., meist 10 blüthig; *Kelchzpfl von einer längern Borste stachelspitzig*. 2. Auf Sandfeldern, (dch das g. Gebiet, seltner, als das vorhergehende.) Jul.-Herbst.

3. *H. INCANA* (Lam.) Graues B. — Die St. niedergestreckt, nebst den B. u. K. *kurzh.*; B. länglich und lanzettl., nach der Basis verschmälert; Knäuelchen blattwinkelst., meist 3 blüthig, locker; *Haare der Kelchzpfl gleich*. 2. An sonnigen, trocknen O., (bei Fiume, Istrien, Veglia; für die Schw. zweifelhaft.) Mai. Jun. J.

4. *H. ALPINA* (Vill.) Alpen-B. — Die St. niedergestreckt; B. verkehrteyf. oder länglich, *gewimpert*; Knäuelchen blattwinkelst.,

1-armblüthig, an der Spitze der Aestchen gehäuft; K. kurz., Haare gleich. 4. Auf den Felsen der höchsten Walliser A., (auf dem Tzermontanaz; auf d. Gries über Bagnes, auf d. Stock, Torrent und Gex.) Jul. Aug. S.

4. *ILLÉCEBRUM* (L. mit Ausschl. von Arten.) Knorpelblume. — K. 5th., Zpfl verdickt, von der Seite zsgedrückt, oberwärts schief-abgeschnitten und in eine Haarspitze ausgehend; die innere Oberfläche schmal, etwas konkav. Stbg. 10, die 5 mit den KB. abwechselnden ohne Kölbchen. Der Gf. sehr kurz; N. 2, stumpf. Kapsel von dem K. bedeckt, 1 fächerig, längsgefurcht, nach den Furchen in mehrere Zpfl aufspringend, 1samig.

1. *I. VERTICILLATUM* (L.) Quirlige K. — 4. Auf nacktem, feuchtem Lande, vorzüglich auf sandigem, torfhaltigem Boden, an Gräben auf im Winter überschwemmten Aeckern, (vom Niederrhein nach Westphalen und d. nördl. D. nach Schles., Sachsen, Böhmen und das angrenzende Oestreich; in Oberbaden, Elsass; südl. Schw.) Jul. Aug. Schk. t. 50. Bth. schneeweiss.

5. *PARONYCHIA* (Tournef. DC.) Paronychie. — K. 5th., Zpfl flach-konkav. Stbg. 10, die 5 mit den KB. abwechselnden ohne Kölbchen. Der Gf. 2sp.; die N. stumpf. Kapsel vom K. bedeckt, häutig, mit einem angewachsenen Deckelchen versehen, nicht aufspringend, 1samig.

1. *P. CAPITATA* (Lam.) Kopfige P. — Die St. niederliegend od. aufstrebend; B. lanzettl. oder elliptisch, ziemlich stumpf, gewimpert; die DeckB. breit eyf., kurz-stachelspitzig, silberweiss-trockenhäutig, in endst. Köpfchen gedrängt, die Bth. bergend; Zpfl des K. grannenlos. 4. An sonnigen, trocknen O., (Fiume, Veglia, Oscre.) Mai. *P. serpyllifolium* D. fl. 2. p. 280. *Illecebrum capitatum* L. *I. serpyllifolium* Vill. in Schrad. Journ. 1801. 1. t. 4, die Fig. rechter Hand. *I. cephalotes* MBieb. (untersch. sich nach kaukasischen Expl. nicht.) Var.:

β. serpyllifolia, B. breiter, eyf. oder verkehrteyf.; *P. serpyllifolia* DC. *Illecebrum serpyllifolium* Vill. a. a. O. linker Hand. Ausser den breiteren B. bemerke ich keinen Unterschied zw. der Variet. *β.* und *α.*

III. Gruppe. *POLYCARPEEN*. DC. prodr. 3. p. 373. B. gegenst. Blb. 5, oder fehlend. Kapsel 1fächerig, vielsamig.

6. *POLYCARPON* (L.) Nagelkraut. — K. 5th., Zpfl konkav, gekielt. Blb. 5, ausgerandet, oder ganz. Stbg. 3, 5. Gf. 3, sehr kurz. Kapsel 1 fächerig, 3 klappig, vielsamig.

1. *P. TETRAPHYLLUM* (L. Sohn.) Vierblättriges N. — Dreimäunig; Blb. ausgerandet; B. am St. zu 4, an den Aesten gegenst. ☉. Auf sandigen O., (Baden bei Graben und Hockenheim, Waghäusel und zw. Carlsruh und Schwetzingen; bei Mannheim; im Littor.; in Schlesien um Breslau und Ohlau; im Veldlin.) Aug. Septbr. Barrel. t. 534. D.

L. Ordng. SCLERANTHEEN. Link. en. h. berol. 1. 417. DC. prodr. 3. 377, tribus Paronychiearum.

K. bleibend, der fruchttrag. mit dem eingeschlossenen Fruchtgehäuse abfällig: Röhre glockig, Schlund dch einen drüsigen Ring verengert; Saum 4-5th., in der Knospenlage dachig. Blb. fehlend. Stbg. vor dem Ringe des Schlundes eingefügt, 5, den Kelchzpfln gegenst., oder 10, davon die 5 den Kelchzpfln gegenst. meist Kölbchen tragend, oder 1. Der Fruchtkn. frei, 1-fächerig, 2eyig, Eychen an der Spitze eines aus der Basis des Fruchtkn. entspringenden Nabelstranges hängend; das eine fehl-schlagend. Gf. 2, mit kopfigen N., oder 1 mit ausgerandeter N. Schlauch häutig, in die erhärtete Röhre des K. eingeschlossen. Keim ringf. Eyweiss mehligartig. B. gegenst., nebenblattlos.

1. **SCLERÁNTHUS** (L.) Knaul. — K. 5sp. Stbg. 10, seltner 5 oder 2. Gf. 2.

1. **S. ANNUUS** (L.) Jähriger K. — Bth meist 10männig; *Kelchzpfl eyf., ziemlich spitz, sehr schmal häutig-berandet, so lang, als die Röhre, die fruchttrag. etwas abstehend.* ☉. Auf Feldern und an kultiv. O. überall. Jun.-Herbst. Fl. dan. t. 504. Var. niedriger, Bth. dicht-ebensträussig; und höher, die blühenden Aeste lockerer, die untern Bth. gabelst., entfernt: hieher *S. verticillatus* Tausch. Rb. fl. exc.

2. **P. PERENNIS** (L.) Mehrjähriger K. — Bth. 10männig; *Kelchzpfl länglich, abgerundet-stumpf, mit einem breiten häutigen Rande umgeben, die fruchttrag. geschlossen.* 4. Auf Sandfeldern, trocknen Triften, Haiden, an gebirgigen, felsigen O. Mai-Herbst. Schk. t. 120. Var. wie die vorbergehende: Bth. dicht- und locker-ebensträussig; zur letzteren: *S. perennis* β. *fallax* von Bönningh. *S. fastigiatus* Hochst., wenn die B. zugleich verlängert sind.

Ll. Ordng. CRASSULACEEN. DC. bull. philom. 1801. n. 49. p. 1. prodr. 3. p. 381.

K. sp. oder th. Blkr. regelmässig: Blb. so viel, als Zpfl des K. und mit diesen abwechselnd, frei oder in eine 1blättrige Blkr. zsgewachsen. Stbg. nebst den Blb. dem K. eingefügt, bald so viel, als diese und mit ihnen abwechselnd, bald noch 1mal so viel. Fruchtkn. so viel, als Blb., diesen gegenst., frei oder unterwärts zshängend, an der Basis mit einer unterweibigen Schuppe gestützt. S. an die innere Nath der Früchtchen angeheftet, eyweisslos. Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. nebenblattlos. Saftige Kräuter.

1. **TILLAEA** (L. mit Ausschl. von Arten.) Tilläe. — K. 3-4 th.

Blkr. 3-4blättrig. **Stbg.** 3-4. Früchtchen 3, 4, kapselig, 2samig, zw. den S. eingeschnürt.

1. **T. MUSCOSA** (L.) Moosartige T. — Die St. an der Basis niederliegend, Aeste aufstrebend; Bth. blattwinkelst., sitzend, 3sp. ☉. Auf feuchten Sandfeldern, (Westphalen bei Coesfeld hinter d. Klinke, bei Haltern und Marienbaum zw. Xanten und Cleve.) Mai. Jun. Rb. ic. 2. f. 330-332. D.

2. **BULLIARDA** (DC.) Bulliarde. — Bth. zwitterig. K. 4th. **Blkr.** 4blättrig. **Stbg.** 4. Früchtchen 4, kapselig, vielsamig.

1. **B. AQUATICA** (DC.) Wasser-B. — B. lineal.; Bth. sehr kurzgestielt oder sitzend. ☉. In stehenden Wassern und an Ufern, (sandiges Ufer der Elbe bei Wittenberg; bei Berlin; bei Trebon in Böhmen; bei Burgsteinfurt, Osnabrück in Westphalen.) Aug. Septbr. Tillaea aquatica L. mit Ausschl. der meisten Syn. „Pflanze sehr klein: im Wasser wachsend schmaler, aufrechter und grasgrüner; ausserhalb des Wassers öfters niedergestreckt, breiter und röthlicher.“ Wahlb. Niedergestreckte Expl. sind Tillaea prostrata Schk. t. 3. Bulliarda prostrata Fl. dan. t. 1510. D. fl. 1. 868. Bth. weiss. D.

2. **B. VAILLANTII** (DC.) Vaillantische B. — B. lineal-länglich; Bthstiele länger, als das B. ☉. An feuchten, etwas schattigen O., (auf den Donauinseln bei Nussdorf in Oestr., nach Schultes; der Stand O. in Oberbaden irrig, die daselbst gefundene Pflanze war Peplis Portula.) Jul. Aug. Tillaea aquatica Lam. ill. t. 90. (nicht L.) T. Vaillantii Willd. Vaill. par. t. 10. f. 2. Bth. fleischroth. D.

3. **RHODIOLA** (L.) Rosenwurz. — Bth. 2häusig. Männch. K. 4th. **Blkr.** 4blättrig. **Stbg.** 8. Unterweibige Schuppen 4 am Ansätze zu den Stempeln. Weibch. K. 4th. **Blkr.** fehlend, oder 4 viel kleinere Blb., als bei den männl. Bth. Unterweibige Schuppen 4. Früchtchen 4, kapselig, vielsamig.

1. **R. ROSEA** (L.) Gemeine R. — An felsigen O. der A., (dch die g. AK. und auf den Vogesen und Sudeten.) Jul. Aug. Schk. t. 331. Sedum roseum Scop. S. Rhodiola DC. K. purpurn, Blb. gelblich oder purpurlich.

4. **CRASSULA** (L.) Dickblatt. — K. 5th. **Blkr.** 5blättrig. **Stbg.** 5. Unterweibige Schuppen 5. Früchtchen 5, kapselig, vielsamig.

3. **C. RUBENS** (L.) Röthliches D. — Der St. aufrecht, oberwärts 3sp., trugdoldig oder ästig, Aeste aufstrebend; B. zerstreut, abstehend, halbwalzlich, kahl, stumpf; Bth. einzeln, einerseits-wendig, sitzend; Aeste nebst den K. drüsig-behaart. ☉. In Weinbergen und auf Aeckern, (in der westl. Schw. bei Genf, Nyon, Cobsbat, Duilliers; bei Basel; Riechen im Oberbadischen, Basel gegenüber; bei Trier.) Mai Jun. Blb. weiss, der starke Kiel

fleischroth. Bieberstein vereinigte in d. suppl. d. Fl. taur. p. 314 mit *Crassula rubens* sein *Sedum pallidum* Fl. taur 1. p. 353, was aber deutlich dch die stielrunden, schmälern B., die gespreitzten Aeste der Trugdolde, die 10 Stbg. und die zweijährige Dauer des St. verschieden ist; *Crass. rubens* hat beständig 5 Stbg. und ist jährig.

2. C. MAGNOLI (DC.) Kahles D. — Der St. aufrecht, oberwärts 2-3sp., trugdoldig, arnblüthig, nebst den Aesten, B. und K. kahl; B. eyf., stumpf, *dachig*; Bth. einzeln, einerseitswendig, sitzend. ☉. Auf sonnigen Hügeln, (Istrien.) Apr. C. caespitosa Cav. DC. *Tillaea rubra* Gouan. T. erecta Sauv. *Sedum caespitosum* DC. Pflanze um die Hälfte kleiner, als die vorhergehende. Bth. hell-fleischroth, Kiel der Blb. purpurn.

5. SEDUM (L.) Fetthenne. — K. 5 th. Blkr. 5 blättrig. Stbg. 10. Unterweibige Schuppen 5. Früchtchen 5, kapselig, vielsamig.

Die Gattungen: *Bulliarda*, *Crassula*, *Sedum*, und wenn man die eingeschlechtigen Bth. ausnimmt, *Rhodiola*, sind nur dch die Zahl der Blüthenstiele verschieden; aber alle *Semperviva* im Bezirk unserer Flora (mit alleiniger Ausnahme der einzigen Variet. des *Sempervivum tectorum* mit monströsen Stbgf.) sondern sich von *Sedum* und den übrigen Gattungen der Ordnung gar deutlich dch die an der Basis in eine 1blättrige Blkr. verwachsene Blb.

I. Rotte. TELEPHIUM. W. stark, ästig, vielköpfig, mehrstengelig; hat aber keine über die Erde hin kriechende Stämmchen. (Die W. treibt im Herbste neue Knospen oder Schösslinge, die im künftigen Jahr hervorsprossen, während die jährigen St. absterben.)

1. S. MAXIMUM (Sut.) Breitblättrige F. — B. *flach*, längl. oder eyf., stumpf, ungleich gezähnt-gesägt, meist gegenst. oder zu 3, *die unteren mit breiter Basis sitzend, die oberen an der Basis kurz-herzf.*, etwas stengelumfassend; die Trugdolden endst., gedrungen; die Blb. abstehend, gerade, an der Spitze rinnig eingedrückt, mit einem kleinen zsgedrückten Hörnchen endigend, die inneren Stbgf. tief auf der Basis der Blb. eingefügt. 4. In Bergwäldern, felsigen Gegenden, an Mauern, Rainen, Gebüsch, (dch das g. Gebiet, doch nicht aller Orten.) Beginnt in der Mitte des Aug. zu blühen. Richb. ic. 8. f. 969. S. *Telephium* δ. und ε. L. spec. S. *latifolium* Bertol. amoen. it., D. fl., St. h. 83. (sehr gut.) S. *Telephium* St. h. 6. (weniger gut.) *Anacampseros maxima* Haw. syn. Bth. grünlich-gelblich-weiss; die Blüthenknospen 5 seitig, an den Flächen leicht ausgehöhlt. Der Fruchtkn. auf dem Rücken konvex. Die B. haben an ihrer Basis kurze Ohrchen, welche an den Wurzelknospen dem St. anliegen, und unter die Einfügung des B. hinabtreten; dagegen sind bei *Sedum purpurascens* die B. zwar mit einer breiten Basis angeheftet, zeigen aber keine Spur von Ohrchen.

Die hier beschriebene Pflanze ist das *Sedum Telephium* der schwed. Fl., was ein lebendes, mir von Hornschuh aus Upsala mitgebrachtes und nun im hiesigen bot. Garten kräftig gedeihendes Expl. beweist.

2. *S. PURPURASCENS* (Koch.) Purpurröthliche F. — *Die B. flach*, verkehrteyf., längl., oder lanzettl., ungleich gezähnt-gesägt, oder fast ganzrandig, *die oberen mit abgerundeter Basis sitzend, die untersten kurzgestielt*, oft gegenst. oder zu 3; die Trugdolden endst., gedrunken; die Blb. über die Mitte zurückgekrümmt-abstehend, an der Spitze flach, ein wenig rinnig, schwach behörnelt; die inneren Stbgl. im Sechstel über der Basis der Blb. eingefügt. 4. Sonnige Berggegenden, waldige O., Raine, Gebüsche, (Schweiz und von da auf dem linken Rheinufer dch Bad. Würtemb., Hessen, Westph. bis Holstein.) Beginnt gegen das Ende des Jul. zu blühen. St. h. 83. *S. Telephium* Smith Engl. fl., Rehb. ic. f. 968. Koch Synops. ed. 1. *S. Telephium* β. *purpureum* L. spec. *Telephium purpurascens* Fuchs hist. stirp. Aehnlich dem vorigen, aber unzweifelhaft eine verschiedene Art: die Pfl. blühet um einen halben Monat früher, hat ihre Früchte schon gebildet und bereits die letzten Blthen entwickelt, wenn sich die ersten Blthen des *S. maximum* zu öffnen beginnen; sie ist niedriger, die B. sind mit abgerundeter, und nicht mit geöhreter Basis befestigt, und die untersten in einen kurzen Bstiel verschmälert; die Blthen sind blass-purpurn, am Rande mit einer schmalen weissen Linie eingefasst, die Blb. an der Spitze weit weniger eingedrückt, und daselbst mit einem viel kleineren deutlichen Hörnchen versehen, die Blthenknöpfe ebenfalls 5seitig, haben aber flache Seiten und die Fruchtkn. tragen auf dem Rücken einen schwach-rinnigen Eindruck. — Diese Pfl. ist das eigentliche, das ächte *Telephium purpureum* der älteren Schriftsteller, denn am Oberrhein und in Schwaben, wo Fuchs, Tragus, Tabernaemontanus u. Bauhin zu Hause waren, und die Pfl. ihrer Umgebungen beobachteten, ist jene sehr häufig. *Sedum Fabaria* dagegen gehört unter die seltensten Gewächse unserer deutschen Fl., ward bis jetzt nur auf zwei hohen Bergen gefunden und war gewiss den ebengenannten Botanikern nicht bekannt, man müsste denn *Telephium purpureum minus*, welches C. Bauhin „auf dem sehr hohen Berge im Breisgau, Belchen genannt,“ gefunden, für hierher gehörig halten. — Anstatt des Namens *Sedum purpureum* wählte ich wegen der Unbestimmtheit des Nebenwortes lieber den von Fuchs vorgeschlagenen. Var.:

β. *albiflorum*, mit weissen Blth. Tabern. Kräuterb. p. 1227. fig. 1. Lebend habe ich diese Variet. noch nicht beobachten können.

3. *S. FABARIA* (Koch. syn. ed. 1. p. 258.) Gebirgs-F. — *Die B. flach*. längl.-lanzettl., oder lanzettl., gezähnt-gesägt, mit der ganzrandigen, keilf. Basis *in den kurzen Bstiel verschmälert, wechselst. oder zerstreut*; die Trugdolden endst., gedrunken; die Blb. abstehend, an der Spitze flach, etwas rinnig, schwach-behörnelt; *die inneren Stbgl. ein Drittel über der Basis der Blb. eingefügt*. 4. Auf den Gipfeln hoher Berge, (bisher bloss auf dem Gipfel der Bahia Gora in Schlesien, Wimmer, und auf dem hohen Aicht in der Eifel, Wirtgen. Blüht um einen ganzen Monat, im Garten wenigstens, früher, als *S. purpurascens* und fast $1\frac{1}{2}$ Monat früher, als *S. maximum*, es entwickelt seine Blthen schon am Ende des Juni. St. h. 83. *S. purpureum* Tausch in der bot. Ztg.,

Wimm. Schles. Fl., S. Telephium Rehb. fl. exc., S. Telephium γ. L. spec.? S. Telephium purpureum minus C. Bauhin. prodr.? Die Farbe und Gestalt der Blb. und die Bildung der Blthenknöpfe ist wie bei der vorigen Art, aber die Bth. sind kleiner, die Blb. abstehend und nicht zurückgekrümmt, die Fruchtkn. kürzer und ohne Eindruck auf dem Rücken. Sicher wird diese von der vorigen Art unterschieden dch die weit frühere Blthezeit, die Insertion der Stbgf. und die Form der Fruchtkn.

4. S. ANACAMPSEOS (L.) Rundblättrige F. — *B. flach, verkehrteyf., ganzrandig*, sehr stumpf, kahl; die St. niederliegend; *Ebensträusse endst., gedrunge.* 4. Auf Felsen der A., (in der südwestl. Schw. auf d. Surchamp u. Richard, d. Aelener, u. auf d. Fouly, Alesse und andern der Walliser A.) Jul. Tabern. Krtb. p. 1228. f. 4. Bth. purpurn oder weiss, Kiel grasgrün. S.

II. Rotte. CEPAEA. W. dünn. Der St. einzeln, einfach, oder von der Basis an in Aeste oder Nebenstengel getheilt; die kriechenden Stämme fehlend. (W. jährig, oder 2jährig, mit dem fruchttrag. St. absterbend, seltner mit einem oder dem andern wurzelst., aufrechten Aste versehen, und mit diesem in das dritte Jahr dauernd.)

* B. flach.

5. S. STELLATUM (L.) Sternf. F. — *B. flach, rundlich, eckig-gekerbt*, in den Bstiel verschmälert, gegen- oder wechselst., kahl; *Trugdolde fast 2sp., armbüthig*; Bth. blattwinkelst., stiellos; Blb. lanzettl., spitz. ☉. An gebirgigen, felsigen O., auf Mauern, (in der südl. Schw.) Jun. Jul. Blb. weiss oder hell-rosenroth, Kiel grasgrün. S.

6. S. CEPAEA (L.) Rispiqe F. — *B. flach, ganzrandig*, stumpf, die untern gestielt, verkehrteyf., gegenst., 3- auch 4 st., die obern lineal-keilig; *die R. länglich*; Blb. lanzettl., in eine sehr feine Haarspitze ausgehend. ☉. An felsigen, rauhen, schattigen und waldigen O., (in der südl. Schw. und im Gebiete der Fl. von Spa; bei Maastricht!) Jun. Jul. C. Cepaea und S. galioides All. S. paniculatum Lam. S. spathulatum WK. Bth. hell-rosenroth, Kiel purpurn.

**B. halbstielrund oder stielrund.

7. S. HISPANICUM (L.) Spanische F. — B. beinahe stielrund, lineal., ziemlich spitz, abstehend, mit gleicher Basis aufsitzend; *Trugdolde fast kahl; Bth. 12 männig, 6 blättrig*; Blb. lanzettl., haarspitzig, 4 mal so lang, als der K.; kriechende Stämmchen fehlend. ☉. Auf Felsen der Alpenthäler, (C. Glarus und Schwyz; in Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark und Istrien.) Jul. St. h. 22. S. Guettardi Gmel. S. glaucum WK. S. sexfidum MB. Wächst gesellschaftlich, und die jährigen nicht blühenden Pflanzen kommen unter den 2jährigen und blühenden so untermischt vor, dass sie einen Rasen perennirender Pfl. darstellen. Blb. weiss, unterseits mit einem rosenrothen Nerven. — S. pallidum MBiebst. hat stumpfere B., eyf., plötzlicher in eine Haarspitze zsggezogene Blb., halb so breite, spitze Kapseln, beständig 5 Kelchzpf. und eben so

viele Blb. und Fruchtkn. und 10 Stbg. Die *Crassula rubens* ist von dieser Pfl. sehr verschieden.

8. *S. VILLOSUM* (L.) Drüsenhaarige F. — *B. lineal.*, stumpf, beinahe stielrund, oberseits ziemlich flach, aufrecht, mit gleicher Basis aufsitzend und nebst der *R drüsig-flaumig*; *R.* etwas traubig; Blb. eyf., spitz, noch 1mal so lang, als der K.; kriechende Stämmchen fehlend. ☉. Auf feuchten, schlammigen, torfhaltigen Wiesen der Ebenen, Berge und A. Jul. Aug. St. h. 6. Blb. rosenroth, mit einem purpurnen Rückenstreifen.

9. *S. ATRATUM* (L.) Schwärzliche F. — *B. stielrund - keulig*, mit gleicher Basis sitzend; *Ebensträusse endst, einfach, gedrun-gen, kahl*, nach dem Verblühen gleich-hoch; Bth. gestielt; Blb. ey-lanzettf., ziemlich stumpf mit einem kurzen Spitzchen, noch 1mal so lang, als der K.; *kriechende Stämmchen fehlend*. ☉. An felsigen, sonnigen O. der A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. J. a. t. 8. *S. haematotes* Scop. *Crassula rubens* St. h. 22, nicht gut. Blb. weiss oder grün-gelblich, mit einem grünlichen Nerven.

10. *S. ANNUM* (L. mit Ausschl. des Citats aus Ray.) Jährige F. — *B. lineal.*, stumpf, stielrund, oberseits ziemlich flach, mit gleicher Basis sitzend; *Trugdolden kahl*; der St. von der Basis an ästig; Aeste meist 2sp., zuletzt verlängert, schlängelig; Bth. 1seitig, fast sitzend; Blb. lanzettl., spitz, fast noch 1mal so lang, als der K.; *kriechende Stämmchen fehlend*. ☉. Auf Felsen und Mauern im nördl. D. und in den Gegenden der VorA., in die höchsten A. hinaufsteigend, (dch die g. AK. und auf den Vogesen; d. Belchen im Breisgau; auf Sandhügeln bei Pretz in Holstein.) Jun.-Aug. *S. saxatile* Wiggers (nicht All.) *S. aestivum* All. *S. rupestre* Oed. *S. Oederi* Retz. *S. saxatile* DC. (das Syn. *S. alpestre* Vill. und *S. saxatile* All. ausgeschl.) — *S. saxatile* Willd. ist eine gemischte Art; *S. schistosum* Lej. ist von *S. sexangulare* nicht verschieden. Blb. gelb.

III. Rotte. *SEDA GENUINA*. Die W. treibt einen Rasen von kriechend-n Stämmchen und aufstrebenden Stengeln. Die blühenden St. treten zw. den beblätterten hervor. (Die beblätterten, nicht blühenden Aeste dauern über der Erde fort, die blühenden St. aber sterben jährlich ab.)

* Bth. weiss oder rosenroth.

11. *S. ALBUM* (L.) Weisse F. — *B. länglich-lineal.*, und *lineal.*, stumpf, beinahe walzlich, oberwärts etwas flach, abstehend, mit gleicher Basis sitzend; *R. fast gleich-hoch, kahl*; Blb. lanzettl., stumpflich, 3mal so lang, als der K.; *Stämmchen kriechend*; die unfruchtbaren St. zerstreut- und abstehend-beblättert. 4. Auf Felsen, Mauern, an rauhen O. Jul. Aug. Fl. dan. t. 66. Blb. weiss oder hell - rosenroth; Stbk. braun - purpurn.

12. *S. DASYPHYLLUM* (L.) Bereifte F. — *B. fleischig, kurz-el-iptisch*, auf dem Rücken buckelig, mit gleicher Basis sitzend, die meisten gegenst.; *R. drüsig-flaumig*; Blb. eyf., stumpflich, noch 1mal so lang, als der K.; Stämmchen kriechend, die unfruchtbaren Aeste dicht-beblättert. 4. Auf etwas feuchten Felsen der Al-

penthäler, und an Mauern der die A. begleitenden Ebenen, (auf den Vogesen; dch. die g. AK.) Jun. Jul. Jacq. h. vind. 2. t. 153. S. glaucum Lam. nicht Kit. Blb. weiss, auf d. Rücken mit einer purpurnen Linie. Var. überall drüsig-flaumig, (letztere bei Lüttich!)

Sedum anglicum, auf die Autorität von Rb. in D. fl. 3. p. 311. aufgenommen, wächst nach Herrn Burkhard's Bemerkung nicht in d. Lausitz.

** Blb. gelb.

13. S. ACRE (L.) Scharfe F. — B. fleischig, eyf., spitzlich, auf d. Rücken buckelig, mit stumpfer Basis sitzend; Trugdolde kahl; Blb. lanzettl., spitz, noch 1mal so lang, als d. K.; Stämmchen kriechend; die unfruchtbaren St. 6zeilig-beblättert. 4. Auf Sandfeldern, Haiden, Mauern, an Bergabhängen. Jun. Jul. Schk. t. 123.

14. S. SEXANGULARE (S.) Sechskantige F. — B. stielrund, lineal., stumpf, mit abwärts bespitzter Basis sitzend; Trugdolde kahl; Blb. lanzettl., spitz, noch 1mal so lang, als der K.; Stämmchen kriechend; die unfruchtb. St. 6zeilig-beblättert. 4. An denselben O. mit dem vorhergehenden, aber nicht so häufig. Jun. Jul., doch später, als das vorhergehende. Fl. dan. t. 1644. S. sexangulare u. schistosum Lej. S. Forsterianum Rb. ic. 9. f. 1135., (die Zeichnung eines abgeblühten Ex. mit aufrechten Aesten d. Trugdolde.) S. boloniense Rb. ic. 9. p. 18. — Die B. sind bei S. sexangulare nicht so deutlich 6zeilig, als bei S. acre.

15. S. REPENS (Schleich. bei DC.) Kriechende F. — B. lineal., stielrund, beiderseits etwas flach, mit gleicher Basis sitzend; Trugdolde 2-5blüthig, kahl; Blb. eyf.-länglich, stumpf, andert-halbmal so lang, als der K.; Stämmchen kriechend; die unfruchtb. St. zerstreut - u. dichtbeblättert. 4. Auf Felsen d. A. u. höhern Gebirge, (in d. Schw., Tyrol, Salzbg, Kärnthen, Steyerm.; in d. Sudeten auf d. Schneekoppe, d. Altvater; auf d. Vogesen, auf d. Hohneck.) Jul. Aug. S. repens DC. S. rubens Haenke. S. alpestre Vill., (perennirend angegeben.) S. saxatile All. Den ältesten von v. Villars gegebenen Namen habe ich nicht vorangestellt, weil in Zweifel gezogen werden könnte, ob er dieselbe Pflanze bezeichne; u. den Namen Haenke's habe ich wegen seiner Zweideutigkeit mit S. rubens L. sp. pl., (Crassula rubens L. syst. veg.,) dem Schleicherischen nachgesetzt.

16. S. ANOPETALUM (DC.) Aufrechte F. — B. lineal.-pfriemlich, fleischig, spitz, stachelspitzig, oberseits etwas flach, an d. Basis vorgezogen, etwas gespornt, die der unfruchtb. Aeste dachig; Trugdolde kahl; Kelchzpf. zugespitzt; Blb. fast noch 1mal so lang, als der K., lanzettl., zugespitzt, aufrecht; Stämmchen kriechend. 4. Auf sonnigen Kalkfelsen u. Mauern, (bei Triest; in d. Schw. bei St. Claud. u. im Thale Anzasca, Gaud.; häufig bei St. Maurice, Sonder.) Jul. Aug.

17. S. REFLEXUM (L.) Zurückgekrümmte F. — B. lineal.-pfriemlich, spitz, kurz-stachelspitzig, fleischig, beiderseits konvex, an d. Basis vorgezogen, etwas gespornt, an d. unfruchtb. Aesten

dachig, abstehend u. zurückgekrümmt; Trugdolde kahl; Kelchzpfl spitz; *Blb.* noch 1 mal so lang, als der K., lanzettl., *abstehend*; Stämmchen kriechend. 4. An sonnigen O., auf Sandfeldern, felsigen O. Jul. Aug. *S. collinum* Wimm. u. Grab. Var. mit entfernten, abstehenden u. zurückgekrümmten, u. mit dicht-dachigen B.; ferner mit dünnern u. noch 1 mal so dicken; u.

β. *viride*, mit freudig-grünen B.: *S. reflexum* L. Rb. ic. 3. f. 459. *S. crassicaule* Link. Diese Var. wächst auf höheren, besonders Porphyr-Gebirgen.

γ. *glaucum*, B. bläulichgrün, meergrün u. hechtgrau: *S. rupestre* Willd., dies hat aufrechte, an den St. angedrückte B.; *S. collinum* Willd. abstehende; *S. recurvatum* Willd., *S. reflexum* Link., zurückgekrümmte; *S. glaucum* Sm. dünnere B. — Alle diese Variet. gehen mit unzähligen Formen in einander über; im Garten lassen sich zwar mehrere Arten trennen, die aber bei Untersuchung d. Gebirge, A., u. im Freien bald verschwinden.

18. *S. ELEGANS* (Lej.) Felsen-F. — *B.* lanzettl.-lineal., spitz, kurz-stachelspitzig, fleischig, beiderseits etwas flach, *an d. Basis vorgezogen, etwas gespornt*, die d. unfrucht. Aeste dicht-dachig; Trugdolde kahl; *Kelchzpfl abgerundet-stumpf*; *Blb.* länglich, noch 1 mal so lang, als der K., abstehend; Stämmchen kriechend. 4. Auf Felsen u. Mauern, (bei Maastricht.) Jul. Aug. *S. rupestre* Sm. D. fl. 3. p. 318. — *S. reflexum* L. (d. Syn. v. Dill. ausgeschl.) ist eine Variet. v. *S. reflexum*, weswegen ich auf die sehr richtige Erinnerung meines Freundes Hornung den Lejeunischen Namen wieder voranstellte. Lebend sah ich d. Pfl. noch nicht.

6. *SEMPERVIVUM* (L. zum Theil) Hauswurz. — K. 6-20 th. *Blb.* 6-20, an d. Basis mit den Stbgf. u. unter sich zu einer 1 blättrigen Blkr. zsgewachsen. Unterweibige Schuppen u. Früchtchen so viel, als *Blb.* (Bei *Sempervivum tectorum*, welches überall auf Mauern u. Dächern gezogen wird, aber daselbst nicht wild wächst, sind die Stbgf. durch monströse Entartung in Gf. umgebildet, entweder alle, od. mehrere u. in diesem Falle von den *Blb.* getrennt; bei der wilden Pfl. aber, welche auf den Felsen der A. zu Hause ist, sind die Stbgf. zu einer 1 blüthigen Blkr. zsgewachsen, wie bei den übrigen Arten dieser Gattung.)

1. Rotte. *SEMPERVIVUM GENUINUM*. *Blb.* u. Kelchzpfl sternf.-ausgebreitet; Kapseln an der Basis zsgewachsen, auseinander tretend u. aufstrebend, zusammen einen heckenf. Raum einschliessend, oberwärts schief-abgeschnitten, am äussern Rande in einen Gf. ausgehend.

1. *S. TECTORUM* (L.) Gemeine H. — *B.* der Rosetten länglich-verkehrteyf., plötzlich in eine Stachelspitze zugespitzt, grasgrün, kahl, *am Rande überall gewimpert*; *Blb.* sternf.-ausgebreitet, lanzettl., zugespitzt, noch 1 mal so lang, als der K.; *unterweibige Schuppen sehr kurz, konvex, drüsenf.* 4. Auf den Felsen d. A., (in d. Schw. auf d. Gotthard u. andern hohen Gebirgen; in Krain auf d. Felsen des Isonzothales; auf Mauern u. Dächern häufig angepflanzt.) Jul. Aug. St. h. 23., eine Variet. mit monströsen Stbgf. *Sedum tectorum* Scop. *Blb.* rosenroth, mit purpurnen Streifen bestreut, Kiel auf d. Rücken grün. Bei den auf Mauern u. Dä-

chern wachsenden Rasen dieser Art sind die 12 innern Stbg., od. auch alle, in gestielte Fruchtkn. umgewandelt und hängen nicht mit den Blb. zusammen; vgl. Sturm's Abbildung, u. die oben nach dem Gattungsscharacter eingeschaltete Anmerkung *)

2. *S. WULFENI* (Hoppe.) Wulfen's H. — *B.* der Rosetten länglich-verkehrteyf., plötzlich in eine Stachelspitze zugespitzt, meergrün, kahl, gewimpert, Rand d. Spitze im Alter kahl werdend; *Blb.* sternf.-ausgebreitet, lineal., an d. Spitze pfriemlich, 3mal so lang, als der K.; *unterweibige Schuppen aufrecht, plättchenf., fast 4eckig.* 2. Auf d. Felsen d. höchsten A., (Tyrol, Kärnthen u. Steyerm.) Jul. Aug. *S. globiferum* Wulf. bei J. a. app. t. 40. St. h. 23. Blb. schwefelgelb od. grün-gelblich. Die jungen Rosetten nicht kugelig. D.

Unter seinem *Sempervivum globiferum* verstand anfrügl. Linne vielleicht *S. soboliferum*, in den spec. plant. aber gab er diesen Namen der Russischen, v. D. Gmelin ihm gesandten u. neulich v. Besser in d. en. pl. Volh. ausführlicher beschriebenen Pflanze. Diese lebend v. Besser erhaltene Pfl. definire ich: *S. globiferum*, L. (mit Ausschl. der Syn.; denn die Syn. sind v. keiner Bedeutung u. nicht zu entziffern.) *B.* der Rosetten verkehrteyf.-keilig, kurz-zugespitzt, beiderseits drüsig-flaumig u. mit viel längern Borsten gewimpert; *Blb.* sternf.-ausgebreitet, lineal.-lanzettl., verschmälert-zugespitzt, 4mal so lang, als der K.; Stbf. unterwärts zsgedrückt; die Fruchtkn. schief-lanzettl.; *unterweibige Schuppen sehr kurz, konvex, drüsenf.* — Der St. 1 Fuss hoch, Blb. gelblichweiss, mit einem grünlichen Rückenstreif, Stbf. an d. Basis deutlich-zsgedrückt, anfangs weisslich, zuletzt hellrosenroth. *S. globiferum* Koch. bot. ztg. 18. p. 210. t. 1.

3. *S. FUNKII* (Braun. Koch. in d. bot. ztg.) Funk's H. — *B.* der Rosetten länglich, kurz-zugespitzt, beiderseits *drüsig-flaumig* D. Gmelin

*) Die *Semperviva* im Bezirk unserer Fl., mit Hinzufügung d. Russischen *S. globiferum*, sind:

A. Blb. 6, glockenförmig aufgerichtet.

Die StB. gewimpert u. zugleich beiderseits flaumig. *S. hirtum.*

Die StB. ausser d. Randwimpern kahl, längl.-keilf., fast verkehrteyf. ober der Mitte spitzig od. zugespitzt. *S. soboliferum.*

lanzettl., schon von d. Mitte an gegen die Spitze hin allmählig verschmälert. *S. arenarium.*

B. Blb. 12, od. mehrere, sternf.-ausgebreitet.

B. kahl, am Rande gewimpert;

freudig-grün. Blb. purpurn; *unterweibige Schuppen sehr kurz, konvex, drüsenf.* *S. tectorum;*

meergrün; Blb. schwefelgelb; *unterweib. Schuppen plättchenf., S. Wulfenii.*

B. drüsig-flaumig u. gewimpert, u. an d. Spitze mit spinnwebigen Haaren verbunden. *S. arachnoideum.*

B. drüsig flaumig u. gewimpert, ohne spinnwebige Haare.

Unterweib. Schuppen sehr kurz, konvex, drüsenf.; Blb. gelblichweiss, S. globiferum.

Unterweib. Schuppen plättchenf., aufrecht, fast 4eckig.

Fruchtkn. breit-rautenf.; Blattwimpern stärker, als d. übrigen Haare; Bth. purpurn. *S. Funkii.*

Fruchtkn. schief-lanzettl.; Wimpern kaum stärker, als d. übrigen Haare.

Bth. purpurn; Stbf. stielrund, aufrecht. *S. montanum.*

Bth. gelblich-weiss; Stbf. zsgedrückt, zurückgekrümmt. *S. Braunii.*

u. v. längern, starken Haaren gewimpert; *Blb. sternf.-ausgebreitet*, lanzettl., zugespitzt, fast 3mal so lang, als der K.; Stbf. stielrund; *die Fruchtkn. breitleyf., fast rautenf.*; unterweibige Schuppen aufrecht, plättchenf., fast 4eckig. 4. Auf d. A., (Tyrol, Kärnthen, Salzbg, am Malnitzer Tauern.) Jul. Aug. Blb. rosenroth, mit einem purpurnen Mittelstreifen. Die Beschreibung d. *S. montanum* in D. fl. 3. p. 387 gehört zu dieser Art. St. h. 67. D.

4. *S. MONTANUM* (L.) Berg-H. — *B.* der Rosetten länglich-keilig, kurz-zugespitzt, beiderseits *drüsig-flaumig* u. v. etwas längern Haaren undeutlich gewimpert, *die stengelst. länglich, aufrecht, vorne ein wenig breiter*; *Blb. sternf.-ausgebreitet*, lanzettl., pfriemlich, sehr spitz, fast 4mal so lang, als der K.; Stbf. stielrund; *die Fruchtkn. schief-länglich*; unterweibige Schuppen aufrecht, plättchenf., fast 4eckig. 4. Auf d. A. u. höheren Bergen, (Schw. u. dch. d. g. AK. u. auf d. Gipfel d. Babia Gora in d. Sudeten.) Jul. Aug. D. fl. 3. 387, mit Ausschl. der Beschreibung. St. h. 23 u. 67. Blb. lila, mit einem violetten Mittelstreif.

5. *S. BRAUNII* (Funk. Koch. bei St. h. 67.) Braun's H. — *B.* der Rosetten länglich-keilig, spitz, beiderseits *drüsig-flaumig* u. v. etwas längern Haaren undeutlich gewimpert, *die obernstengelst. aus breiterer, eyf. Basis lanzettl., abstehend*; *Blb. sternf.-ausgebreitet*, lineal.-lanzettl., verschmälert-zugespitzt, fast 3mal so lang, als der K.; Stbf. unterwärts zsgedrückt; *Fruchtkn. schief-länglich*; unterweibige Schuppen aufrecht, plättchenf., fast 4eckig. 4. Auf Felsen d. höchsten A., (auf d. Pasterze am Grossglockner in Kärnthen.) Blb. gelblich-weiss, mit einem grünen Rückenstreif. Stbf. weiss, mit gelben Stbk. D.

6. *S. ARACHNOIDEUM* (L.) Ueberspinnene H. — *B.* der Rosetten verkehrteyf. od. länglich, kurz-spitz, *drüsig-kurzh.*, borstiggewimpert, *an d. Spitze büschelig-gebärtet, mit strahlig-auseinander tretenden*, spinnwebartigen, die Spitzen der *B.* verbindenden Haaren; *Blb. länglich-lanzettl., zugespitzt, 3mal so lang, als der K.* 4. Auf Felsen d. A., (Schw., Tyrol, Salzbg, Kärnthen, Steyerm.) Jul. Aug. St. h. 23. Blb. rosenroth, mit einem Purpurstreif.

II. Rotte. *JOVIBARBA*. Blb. und Kelchzpfl. aufrecht, glockig, erstere an d. Spitze zurückgekrümmt. Kapseln gerade, aufrecht, der Länge nach gedrungen-zugestellt, allmählig in d. Gf. verschmälert. Keimknospen abfallend.

7. *S. HIRTUM* (L.) Kurzh. H. — *B.* der Rosetten länglich-lanzettl., spitz, v. d. Mitte nach d. Spitze verschmälert, kahl, am Rande gewimpert, *die stengelst. herz-eyf., zugespitzt u. nebst den K. am Rande wimperig u. ober- u. unterseits kurzh.*; *Bth. glockig*. 4. Auf Felsen d. A. u. niedrigeren Berge (Steyerm., Oestr., Mährische u. Schles. Gebirge.) Jul. Aug. St. h. 30. D.

8. *S. SOBOLIFERUM* (Sims.) Sprossende H. — *B.* der Rosetten länglich- od. verkehrteyf.-keilig, spitz, die stengelst. länglich, zugespitzt, die obersten eyf., *alle nebst den K. ober- u. unterseits kahl, am Rande gewimpert*; *Bth. glockig*; d. K. um d. Hälfte

kürzer als d. Blkr. 4. Auf Felsen, (dch d. g. A. Kette u. auf d. Polauer Bergen in Mähren; auch auf Mauern u. Dächern, wie *S. tectorum* angepflanzt.) Jul. Aug. *S. globiferum* Rb. fl. exc.

9. *S. ARENARIUM* (Koch.) Sand-II. — *B. der Rosetten lanzettl., von der Mitte an nach der Spitze allmählig schmaler, spitzig, die unteren stengelst. aus breiterer, etwas herzf. Basis eyf.-längl., die obersten 3eckig-eyf., sämmtlich nebst dem K. am Rande bewimpert, ober- u. unterseits kahl; die Bth. glockig; K. um ein Drittel kürzer als die Blkr. 4. Auf Waldhoden in Tyrol (v. Herrn Braun, Lehrer d. Naturwissenschaft in Bayreuth, bei Antholz im Brunnecker Thale entdeckt u. mir lebend mitgetheilt.) Jul. Aug. Aehnlich dem vorigen, aber um die Hälfte niedriger, die B. um die Hälfte kleiner u. schmaler, lanzettl., schon von der Mitte an gegen die Spitze hin allmählig verschmälert, desshalb auch im Ganzen viel schmaler; die Bth. jedoch nicht um die Hälfte kleiner wie bei jenem, aber gelblichweiss.*

7. *UMBILICUS* (DC.) Nabelkrant.-K. 5theilig. Blkr. 1blättrig, glockig, 5sp. mit aufrechten Zpfl. Stbgf. 10. der Blkr. eingefügt. Unterweibige Schuppen 5. Früchtchen 5.

1. *U. PENDULINUS* (DC. pl. grass. t. 156.) Hängendes N. — Die unteren B. schildf., kreisrund, konkav; die Bth. traubig, hängend, die Bthstielen so lang als die ganzrandigen NebenB. 4. Auf Felsen u. Mauern, (bei Belgirate am langen See, Cant. Tessin, Hegetschw. u. Heer. u. an d. Mauern d. Klosters d. Stadt Veglia, Morowich in d. bot. Zeitg.) Jun. Jul. *Cotyledon Umbilicus* Huds. angl., *C. Umbilicus* β. L. spec. Camerar. epit. 838. Schw. u. J.

LII. Ordng. CACTEEN. DC. prodr. 3. p. 457. Nopaleen. DC. theor. elem. 216. *Cacti* Juss.

K. an den Fruchtkn. angewachsen, Zpfl. zahlreich, an der Spitze frei, mehrreihig, allmählig in eine vielblättrige, dem K. eingefügte Blkr. übergehend. Blb. 2-vielreihig, frei, od. in eine verlängerte Röhre verwachsen u. nur an der Spitze frei. Stbg. zahlreich, der, die Spitze des Fruchtkn. bekleidenden Scheibe eingefügt. Gf. 1; N. mehrere. Fruchtkn. 1fächerig, vieleig; Eychen an wandst., in scheitelrechte Linien geordnete Sträger angeheftet. Die reife Beere ausgefüllt. S. im saftigen Marke nistend, eyweisslos; Keim gekrümmt od. schraubenf.; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Fleischige, stachelige Sträucher mit kleinen, fleischigen B.

1. *OPUNTIA* (Tournef.) Fackeldistel. — KB. an d. Fruchtkn. angeheftet, v. d. Gestalt der StB., die obersten flach u. kurz. Blb. zahlreich, frei. Gf. an d. Basis eingeschnürt; N. mehrere, aufrecht. Beere knötig.

1. *O. VULGARIS* (Mill.) Gemeine F. — Ausgebreitet-niederlie-

gend, kriechend; Glieder verkehrteyf.; Stacheln gleichgross, sehr kurz, haarf., sehr zahlreich. $\frac{1}{2}$. An sonnigen Felsen in d. südlichen Gegenden; aus Amerika stammend, nun aber einheimisch geworden, (in d. südl. Schw., Südtirol.) Jul. Cactus Opuntia L. D. fl. 3. 398. Bth. schwefelgelb.

LIII. Ordng. GROSSULARIEEN. DC. fl. franc. 4. p. 406. prodr. 3. p. 477.

Saum des *K. oberst.*, fast flach, od. glockig od. auch röhrig, 4-5sp., regelmässig. Blb. 4-5, am Rande des Schlundes eingefügt, mit den Zpfln abwechselnd, gleich. *Stbg.* 4-5, zw. den Blb. eingefügt, frei. Stbk. längs-aufspringend, 2fächerig. *Der Fruchtkn. 1fächerig*, vieleig; *STräger 2*, wand- u. gegenst. Der Gf. 2-4sp. Frucht beerenartig, mit dem verwelkten K. bekrönt. S. mit ihrer innern breitem u. stumpfen Spitze an einen verlängerten Nabelstrang angeheftet, eyweisshaltig; die äussere Decke gallertig, die innere häutig. Keim klein, v. Nabel entfernt, an d. schmalen Ende des S. liegend; die Keimb. nach dem Nabel gerichtet.

1. RIBES (L.) Johannis- (u. Stachel-) Beere. — Gattungscharacter derselbe, wie der Ordnung.

1. Rotte. GROSSULARIA Stachelbeere. — DC. prodr. 3. p. 477. Bthstiele 1-3blüthig. Die St. (bei den unsrigen) dornig, die Dornen ein Aestchen stützend.

1. R. GROSSULARIA (L.) Gemeine St. — Bthstiele 1-3blüthig, 2-3 deckblättrig; K. glockig, Zpfl länglich, zurückgebogen; Blb. verkehrteyf.; *Stacheln 3theilig*. $\frac{1}{2}$. An unkultiv. felsigen O., auf Mauern. Apr. Mai. Beeren grünlichweiss, seltner roth. Var. ausserdem:

a. glanduloso-setosum, die Fruchtkn. u. Beeren mit drüsentrag. Borsten besetzt: R. Grossularia L. St. h. 4. (seltner als d. folgende Variet. β ; am Weichselbache im Fuscherthale d. Salzbg. A., dort aber sehr häufig, v. Spitzel.)

β . pubescens, Fruchtkn. mit kurzen, weichen, drüsenlosen Haaren besetzt, die Beeren zuletzt kahl: R. Uva crispa L. St. h. 44.; überall gemein. R. Uva crispa Tausch in d. regensb. bot. Zeitg 21. p. 722. ist mir nicht bekannt.

γ . glabrum, Fruchtkn., B., Bstiele, Bthstiele, DeckB. u. K. kahl, Rand der B., Bstiele, DeckB. u. Kelchzpfl gewimpert: R. reclinatum L. Diese kultivirte Variet. scheint auch dch Kultur entstanden zu sein.

II. Rotte. RIBESIA. Johannisbeere. — DC. prodr. 3. p. 479. Bth. traubig, Tr. reichblüthig. St. wehrlos.

2. R. ALPINUM (L.) Alpen-J. — Tr. drüsig-behaart, aufrecht; K. kahl, flach, Zpfl eyf.; Blb. spatelig; *DeckB. lanzettl., länger, als d. Bthstielchen*. $\frac{1}{2}$. An gebirgigen, rauhen, felsigen O.; in d.

VorA. hinaufsteigend. Mai. Jun. J. a. t. 47. St. h. 51. Männl. Tr. 20-30 blüthig, der Fruchtk. fehlend, Stbk. mit Blütenstaub versehen, deswegen vollkommen; weibl. 2-5 blüthig, der Fruchtkn. vollkommen, die Stbk. ohne Bthstaub. Bth. gelblich-grün, die weibl. satter grün. Kennzeichen, wodurch *R. Mladnikianum* von *R. alpinum* zu unterscheiden wäre, konnte ich an den getrockneten Expl. nicht auffinden.

3. *R. NIGRUM* (L.) Schwarze J. — Tr. flaumig, hangend; K. flaumig, drüsig-punktirt, glockig, Zpfl des Saums länglich, zurückgekrümmt; Blb. länglich; *DeckB. pfriemlich*, kürzer, als d. Bthstielchen; *B.* fast 5lappig, *unterseits drüsig-punktirt*. $\frac{1}{2}$. An feuchten, waldigen O., in Hecken, an Sümpfen, Bächen, (im nördl. D. an vielen O. gemein; im mittlern u. südl. D. u. d. Schw. hin u. wieder; in manchen Gegenden gar nicht.) Apr. Mai. Tabern. Krtb. 1492. f. 2. Bth. grün, Blb. inwendig roth.

4. *R. RUBRUM* (L.) Rothe J. — Tr. fast kahl, nickend, nach dem Verblühen hangend; K. kahl, beckenf., Zpfl *am Rande kahl*, nebst den Blb. spatelig; *DeckB. eyf.*, kürzer, als d. Bthstielchen; *B.* fast 5lappig. $\frac{1}{2}$. In Wäldern an etwas feuchten O., in Obstgärten, an Wiesenrändern, (im nördl. D. an vielen O. in Menge, im mittlern nur um Dörfer u. Häuser verwildert, im südl. wieder in d. VorA.) Apr. Mai. Schk. t. 48. St. h. 4. Bth. 1farbig, gelblich-grün. Beeren roth, seltner fleischroth, u. gelblichweiss. Var.:

β . *sylvestre*, Grund des K. bräunlich od. mit braunen Punkten bestreut; Blb. kürzer; Gf. kürzer; Stbf. nicht so lang, als die Stbk. breit sind. D. fl. 3. p. 249. Ist nicht die Pflanze im wilden Zustande, sondern eine Variet.; vgl. auch Wimm. u. Grab. fl. siles. 1. p. 109.

5. *R. PETRAEUM* (Wulfen bei Jacq.) Rothblühende J. — Tr. etwas zottig, zuerst aufrecht u. nickend, nach dem Verblühen hängend; K. kahl, glockig, Zpfl spatelig, *gewimpert*, aufrecht-abstehend; Blb. spatelig; *DeckB. eyf.*, kürzer, als d. Bthstielchen; *B.* fast 5lappig. $\frac{1}{2}$. An felsigen, feuchten O. d. VorA., (Schw., Tyrol, Salzbg., Kärnthen, Steyermark; in d. Sudeten u. Vogesen.) April—Jun. J. ic. rar. t. 49. St. h. 56. Untersch. sich sogleich dch die röthlichen, gewimperten Bth. u. die spitzeren Lappen der B. Var. jedoch seltner mit nicht gewimperten Bth., (bei Zell am See in Tyrol von Hrn. v. Spitzel gesammelt.)

LIV. Ordng. SAXIFRAGEEN. Vent. tabl. 3. 277. DC. prodr. 4. 1. Saxifragae Juss. gen. 308.

K. 4-5 sp., od. 4-5 th., *bleibend*, an d. Frchtkn. gewachsen od. frei, in d. Knospenlage dachig. Blb. 4-5, dem K. eingefügt, mit d. Zpfln desselben abwechselnd, seltner fehlend. *Stbg. frei, so viel, als Blb. od. noch 1mal so viel*, dem K. eingefügt, od. unterweibig. Scheibe oberweibig od. unterweibig, bisweilen unmerklich. Der *Fruchtkn.* 1- od. 2 fächerig, aus 2, am Rande sa-

mentrag. Fruchtblättern bestehend: *Fächer vieleitig*; STräger in dem 1fächerigen Fruchtkn. wandst., im 2fächerigen mittelpunktst. *Gf. 2*, (seltner 4-5,) *bleibend*; N. schief-angewachsen. Frucht kapselig, oft 2lappig, zw. den Gf. mit einem Loche, od. mit einer Ritze v. d. Basis nach d. Spitze aufspringend. Keim in d. Achse d. Eyweisses, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

1. SAXIFRAGA (L.) Steinbrech. — K. 5sp., od. 5th., an den Fruchtkn. angewachsen od. frei. Blkr. 5blättrig. Gf. 2, bleibend. Kapsel 2schnäbelig, 2fächerig, zw. den Gf. mit einem Loche aufspringend, vielsamig; STräger in d. Mitte der Scheidewand.

1. Rotte. AIZOONIA. Tausch hort. canal. fasc. 1. DC. prodr. 4. p. 18. Stämmchen dauernd, behlättert. B. am Rande mit einer Längslinie v. eingedrückt'en Punkten bezeichnet, die mit einem weissen, kalkartigen, später ausfallenden Schülferchen bedeckt sind, wechselst., sämmtlich an d. Basis mit nicht gegliederten Wimpern besetzt, die untern zwar absterbend, übrigens aber nicht verändert. Der jährige blühende St. mit wechselst. B. besetzt; (nur Saxifraga mutata, die denselben Bau der B. hat, ist 2jährig.)

1. S. COTYLÉDON (L.) Nabelkrautartiger S. — B. der Rosetten zungig, längs d. gesägten Randes hin *vielpunktig*, die Punkte mit einer kalkigen, grübligen Schülfer gedeckt, *Sägezähne* an d. Spitze knorpelig, *vorwärts-zugespitzt*; R. pyramidal.; *Aeste v. d. Mitte an 5-15blüthig*; Blb. keilig. h. Auf den Granit-A., (in d. Schw. im Ursern Thale, am Gotthard, Graubünden, Veltlin, C. Tessin u. Wallis.) Jul. Aug. S. pyramidalis Lapeyr. St. h. 33. Blb. schneeweiss, gleichfarbig, od. am Nagel purpurn, od. nach Gaud. purpurf-aderig. St. h. 33. S.

2. S. AIZOON (J a. t. 438.) Traubenblüthiger S. — B. der Rosetten zungig, längs d. gesägten Randes hin *vielpunktig*, die Punkte mit einer kalkigen, grübligen Schülfer gedeckt, *Sägezähne* an der Spitze knorpelig, *vorwärts-zugespitzt*; der St. oberwärts traubig; *Aeste nackt, 1blüthig od. an d. Spitze 2-3blüthig*; Blb. rundlich. h. Auf d. Felsen d. A. u. VorA., auch auf d. niedrigeren Gebirgen, (dch d. südl. AK.; in d. Vogesen; d. höhern Bergen d. Schwarzwaldes u. v. Mähr. u. Schlesien; auch auf niedrigeren Bergen in Böhmen, auf d. Schwäbischen Alp., u. bei Kreuznach in d. Rheinpfalz.) Jul. Aug. St. h. 33. S. Cotyledon & L. K. meist kahl, bisweilen drüsig-behaart. Blb. schneeweiss, od. grünlich-weiss, an d. Basis purpurn-punktirt, seltner unpunktirt; letztere: S. intacta Willd. Var. ausserdem:

a. *major*, B. länglich-lineal., an d. Spitze nicht viel breiter: S. recta Lap.

β. *minor*, B. länglich-verkehrteyf., kürzer: S. Aizoon β. minor brevifolia Sternb. S. Aizoon Lap.

3. S. ELATIOR (M. u. Koch.) Hochstengeliger S. — B. der Rosetten zungig, längs d. gekerbten Randes hin *vielpunktig*, die Punkte dch ein kalkiges, grübliges Schülferchen gedeckt, *Kerben* knorpelig, *abgeschnitten*, die der stengelst. B. abgeschnitten u. gezähnel; der St. oberwärts traubig-rispig; Aeste verlängert, nackt, an d. Spitze ebensträussig, 6-12blüthig; Blb. verkehrteyf. 4. Auf

Felsen u. an felsigen O., (in d. südlichsten Schw., am Fusse d. Berges Umbrail bei Borlajo; in d. A. v. Krain; v. Steyerm. Maly; im Isonzothale.) Jul. Aug. *S. longifolia* β . *media* Sternb. *S. longifolia* Host. (nicht Lap.) St. h. 33. fig. a. b. und c. aber, das B., was die Kerben anbelangt, unrichtig gezeichnet. Die Kerben d. B. sind kurz, breit u. abgeschnitten; es sind keine zugespitzten, vorwärtsgerichteten Sägezähne vorhanden, wie bei d. beiden vorhergehenden. Der St. oft $1\frac{1}{2}$ Fuss lang. Vielleicht gehört hierher: *S. Hostii* Tausch? aber die B. sind keineswegs klein-gesägt, sondern abgeschnitten-gekerbt.

4. *S. CRUSTATA* (Vest.) Krustirter *S.* — *B.* der Rosetten *lineal.*, stumpf, *ganzrandig*, am Rande *vielpunktig*. Punkte mit einem kalkigen, grübligen Schülferchen gedeckt; der St. oberwärts traubig, Aeste nackt, Iblüthig, od. fast rispig, Aeste an d. Spitze 3-6blüthig; R. aufrecht; *Blb. stumpf, verkehrteyf.* od. keilig. 4. Auf d. höchsten A., (Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyerm.) Jul. Aug. *S. longifolia* St. h. 33. fig. d. e. *S. longifolia* γ . *minor* Sternb. Bth. weiss. — *S. longifolia* Lap. untersch. sich dch den v. d. Basis an risingen St., die nickende, pyramidale, weitläufige, sehr reichblüthige u. überall drüsig-behaarte R. Ausserdem ist die Pflanze viel grösser, manchmal 3 Fuss hoch u. mit viel längern B. versehen. D.

5. *S. MUTATA* (L.) Verwandelter *S.* — *B.* der Rosetten *zungig*, mit einem knorpeligen, hinten dicht-gefranzten, vorne *ganzrandigen* od. *undeutlich-klein-gesägten Rande* umgeben, längs d. Randes hin *vielpunktig*; der St. traubig-rispig; *Blb. lineal-lanzettl., spitz*. 4. An felsigen O. niedriger, die A. begleitender, Gebirge, (in d. nördl. Schw., Vorarlberg, Bayern, Salzb., Kärnthen, Steyerm.) Jun. Jul. St. h. 35. *Blb.* schmaler, als d. Kelchzpfl., pomeranzengelb.

6. *S. BURSERIANA* (L.) Burser's *S.* — *B.* der Stämmchen gedrungen-gehäuft, *pfriemlich, zugespitzt, starr-stachelspitzig*, 3kantig, geschärft-knorpelig-berandet, oberseits *7punktig*, an d. Basis kurz-gewimpert, die jüngern kalkig-bekrustet; *der St. meist 1 blüthig*; *Blb.* abstehend, rundlich, klein-gekerbt, vielnervig, Nerven gerade. 4. Auf Kalkfelsen u. in deren Spalten, (Tyrol, Salzb., Kärnthen, Krain, Steyerm.) Jun. Jul. St. h. 33. Bth. schneeweiss, 9 Linien breit. D.

7. *S. VANDELLI* (Sternb.) Vandel's *S.* — *B.* der Stämmchen *dicht-dachig, aufrecht, ey-lanzettf., spitz, starr-stachelspitzig*, 3kantig, knorpelig-berandet, oberseits *5punktig*, an d. Basis gefranzt, die jüngeren dünn-kalkig-bekrustet; *der St. armbüthig, dicht-drüsig-zottig*; K. aufrecht; *Blb.* noch 1 mal so lang, als der K., glockig-gestellt, oval, 5nervig, Nerven gerade. 4. Auf Felsen d. A., (auf d. Kankofel in Tyrol, Sauter; Wormser Joch, auf d. Corni di Canzo.) Jun.-Aug. Bth. weiss. B. so sehr dicht-dachig, dass nur d. breit-pfriemlichen Spitzen sichtbar sind; getrocknet sehr starr u. stechend.

8. *S. DIAPENSOIDES* (Bellard.) Diapensienartiger *S.* — *B.* der

Stämmchen *dicht-dachig*, *aufrecht* od. an d. Spitze etwas zurückgekrümmt, lineal.-länglich, stumpf, auf d. Rücken konvex, stumpfgekielt, oberseits *7punktig*, an d. Basis etwas gewimpert, die jüngern kalkig-bekruset; *der St. 2-5 blüthig, dicht klebrig-behaart*; Blb. verkehrteyfl., nach d. Basis verschmälert, ganzrandig, vielnervig, Nerven gerade. 4. Auf d. A. der Schw. sehr selten, (bisher blos an Felsen des Bagnesthales am St. Bernhard, Heer; aber später am M. Rosa gegen d. Zermattthal auf Schweizer Seite von Ed. Krauss gefunden.) Jun. Jul. Bth. schneeweiss. S.

S. aretioides Lapeyr., St. h. 35, dch die goldgelben, klein-gekerbten Blb. v. S. diapenoides beim ersten Anblick verschieden, ist in d. D. fl. nach d. Autorität d. H. Gr. v. Sternberg aufgenommen worden, aber aus d. Zahl d. einheimischen Pflanzen zu streichen; ein Expl. der Saxifraga caesia mit gelbl. Blthen gab Veranlassung zu dem Irrthume.

9. S. SQUARROSA (Sieber.) Sparriger S. — B. der Stämmchen *dachig*, *aufrecht*, *an d. Spitze bogig-abstehend*, lineal. lanzettl., *stumpf*, schwach-stachelspitzig, sehr schmal-knorpelig-berandet, auf d. Rücken konvex, stumpfgekielt, oberseits *7punktig*, an d. Basis gefranzt, die jüngern kalkig-bekruset; *der St. 2-6 blüthig, zerstreut-drüsig-haarig*; Blb. rundlich-verkehrteyfl., 5 nervig, Nerven gerade. 4. Auf d. A. (Tyrol, Schlehern, Ortlesspitze, Duren in Fassa, Facchini; Steyerm. auf d. Reducha, Zechent.; Krain, Wochein, Steineralp. Tommas.) Jul. Aug. Bertol. fl. ital. S. imbricata Bert. ann. stor. nat., S. caesia Scop. carn. l. t. 15. Bth. weiss od. gelblich-weiss. D.

10. S. CAESIA (L.) Meergrüner S. — B. der Stämmchen gedrungen-gehäuft, v. d. Basis *an bogig-zurückgekrümmt*, lineal.-länglich, spitzlich, oberseits *7punktig*, auf d. Rücken konvex, stumpfgekielt, v. d. Basis bis z. Mitte gefranzt, die jüngern kalkig-bekruset; *der St. 2-6 blüthig, kahl od. zerstreut-drüsig-haarig*; Blb. verkehrteyfl., 3-5 nervig, *Scitennerven bogig*. 4. Auf Felsen d. VorA. u. A. bis z. ewigen Schnee hinauf; mit d. Flüssen in d. Thäler hinabsteigend, (dch d. g. AK.) Jun. Jul. St. h. 33. S. recurvifolia Lap. Bth. weiss.

11. S. PATENS (Gaul.) Abstehendblättriger S. — B. der Stämmchen *dachig*, *weit-abstehend*, *an d. Spitze etwas zurückgekrümmt*, lineal.-länglich, spitz, oberseits *7punktig*, auf d. Rücken konvex, stumpfgekielt, v. d. Basis bis z. Mitte gefranzt, die jüngeren dünnkalkig-bekruset; *der St. 2-6 blüthig, zerstreut-drüsig-haarig*; Blb. länglich-verkehrteyfl., 3 nervig, *Scitennerven bogig*. 4. Auf Felsen der A. u. Alpenthäler, (auf d. Fouly in d. Schw.; bei Mittenwalde in Tyrol.) Jul. B. 2- u. 4 mal so gross, als bei S. caesia; Blb. länglich, gelblichweiss, nicht milchweiss.

12. Rotte. PORPHYRION Tausch. hort. canal. fasc. I. DC. prodr. 4. p. 17. Stämmchen dauernd, beblättert. B. *gegenst.*, *an d. dickern*, gestutzten Spitze mit 1-3 *eingedrückten Punkten*, die in d. Jugend mit einem kalkigen Schülferchen bedeckt, dann nackt sind, bezeichnet, v. d. gestutzten Spitze abwärts mit ungeglederten Franzen gewimpert; die unteren zwar abgestorben, übrigens aber nicht verändert. Die jährigen blüthentragenden St. zu Bthst. verkürzt.

12. *S. RETUSA* (Gouan.) Gestutzter *S.* — Die Stämmchen liegend, sehr ästig; die Aeste dicht-rasig; die *B.* gegenst. vierzeilig-dachig, von der Mitte an abstehend od. zurückgebogen, längl., lanzettl., dreiseitig-kielig, mit einer flachen dreieckigen, dreipunktigen Spitze gestutzt; die Zipfel des *K.* am Rande kahl; die *Bth.* endst., einzeln od. zu 3-4. 4. Felsen der *A.* (auf d. Hochgolling u. d. Sirbitzkogel in d. Judenburger *A.* in Steyerm., vom Pater Theod. Gassner entdeckt; am Monte Rosa auf d. Schweizer Seite, Ed. Krauss.) Jul. Aug. Die *Bth.* hell-purpurn, an d. Spitze der Aestchen sitzend, od. auf einem eigenen mit entferntstehenden *B.* besetztem Aestchen etwas hervorragend wie bei den beiden folgenden Arten. Die Zipfel des *K.* sind fast halb so lang als die Kapsel, die Schnäbel (die bleibenden *Gf.*) nicht mit eingerechnet, daher viel kürzer als die Kapsel; bei *S. oppositifolia* ragen sie bis über die Basis der Schnäbel hinaus.

13. *S. OPPOSITIFOLIA* (L.) Gegenblättriger *S.* — Die Stämmchen niedergestreckt, sehr ästig; Aeste aufrecht, gedrunken-rasig; *B. gegenst.*, 4reihig-dachig, länglich, stumpf, an der Spitze verdickt, 1punktig, unterseits durch einen Kiel 3kantig und nebst den *Kelchzpfln drüsenlos-gewimpert*; *Bth.* endst., fast sitzend, einzeln. 4. Auf Felsen der *A.*, (dch die *g. AK.* bis Steyermark und Krain; auf den Sudeten.) Mai. Jun. Rein. und Hohenw. reis. t. 3., St. h. 7. *S. caerulea* Pers. *S. retusa* Sternb. bei St. h. 35, (die *Bth.* sind unrichtig blau gemalt.), nicht Gouan. *Bth.* rosenroth, zuletzt violett.

14. *RUDOLPHIANA* (Hornsch.) Rudolphischer *S.* — Die Stämmchen niedergestreckt, sehr ästig; Aeste aufrecht, gedrunken-rasig; *B. gegenst.*, 4reihig-dachig, verkehrteyf., stumpf, an der Spitze etwas verdickt, 1punktig, auf dem drüsenlosen Rücken flach, schwach-gekielt, *die obersten nebst den Kelchzpfln drüsig-gewimpert*; *Bth.* endst., einzeln. 4. Auf den höchsten *A.*, (auf dem Kalsershörl bei Heiligenblut, auf den Judenburger *A.*, Steyrer.) Sehr ähnlich dem vorhergehenden, aber der *K.* und hie und da auch die obersten *B.* sind mit weichen, drüsentragenden Haaren bewimpert wie bei *S. biflora*, doch stehen die *Bth.* einzeln. Vermuthlich eine Variet. der *S. oppositifolia*, was jedoch noch weiter zu untersuchen ist.

15. *S. BIFLORA* (All.) Zweiblüthiger *S.* — Die Stämmchen niedergestreckt, sehr ästig; Aeste aufstrebend; *B. gegenst.*, ziemlich entfernt, verkehrteyf. oder spatelig, an der Spitze etwas verdickt, 1punktig, auf dem Rücken flach, schwach gekielt, *die obern nebst den Kelchzpfln drüsig-gewimpert*; *Bth.* endst., zu 2- und 3 kopfig; *Blb.* abstehend, lanzettl., *ohngefähr so lang, als die Stbg.* 4. Auf Felsen der Alpen bis zum ewigen Schnee, (Schw., Tyrol, Kärnthen, Steyermark.) Jul. Aug. St. h. 35. *Bth.* rosenroth oder weiss.

16. *S. KOCHII* (Hornung.) Koch's *S.* — Die Stämmchen niedergestreckt, ästig; Aeste aufstrebend; *B. gegenst.*, locker-dachig, verkehrteyf. oder spatelig, an der Spitze etwas verdickt, 1punktig,

auf dem Rücken flach, schwach-gekielt, *die obern nebst den Kelchzpfln drüsig-gewimpert*; Bth. endst., zu 2- und 3 kopfig; Bbl. länglich, einander berührend, 2- oder 3mal so lang, als die Stbg. 4. Auf Felsen der A., (in der Schw. auf dem Wege vom Leuker-Bade über den Gletscher ins Lütschthal, Dachröder; im Merzenbach Zehnden Gambs in Oberwallis, Lager; Zwing bei Zell im Salzbg., Sauter.) Jul. Aug. Habitus der S. biflora, auch locker-rasig, aber stämmiger, dabei die B. genähert und die Bth. noch 1mal so gross. Var. mit weissen Bth., Lager. Eine grossblüthige Form der S. biflora nach Heer.

III. Rotte. TRACHYPHYLLUM Gaud. helv. p. 108. Stämmchen dauernd, beblättert. B. wechselst., am Rande. wenigstens nach der Basis, mit nicht gegliederten Wimpern besetzt, vor der Spitze mit einem Knötchen bezeichnet, in das ein kleines, nacktes, in der Jugend mit keinem Schülferchen gedecktes Grübchen eingedrückt ist, was in der Mitte öfters ein Drüschen trägt. K. aufrecht oder abstehend.

17. S. ASPERA (L.) Rauher S. — B. lanzettl.-lineal., dörnig-begrannt und dörnig-gewimpert, an der Spitze oberseits 1 punktig, die stengelst. entfernt, abstehend; Stämmchen niedergestreckt, knospentrag; Knospen halb so lang, als das sie stützende B.; der St. mehrblüthig; K. unterst., abstehend, Zpfl kurz-stachelspitzig. 4. An felsigen, feuchten O. der A. und deren Thäler. Jul. Aug. St. h. 33. Bth. weiss-gelblich.

18. S. BRYOIDES (L.) Birnmoosartiger S. — B. lanzettl.-lineal., dörnig-begrannt und dörnig-gewimpert, an der Spitze oberseits 1 punktig, die stengelst. etwas genähert, aufrecht, an den St. beinahe angedrückt; Stämmchen niedergestreckt; Knäuel der B. dicht zusammengedrängt, so lang, als das sie stützende B.; der St. 1blüthig; K. unterst., abstehend, Zpfl etwas stachelspitzig. 4. An trocknen, felsigen und kiesigen O. der höchsten A., (dch die g. AK. und in der kleinen Schneeegrube der Sudeten.) Jul. Aug. St. h. 33. S. aspera β. bryoides DC. D. fl. 3. p. 128. Bth. weiss-gelblich. Die Stämmchen, oder vielmehr die ganzen Rasen sind aus Knospen und diese stützenden B. zgesetzt, wie bei der vorhergehenden Art, aber die Knospen sind viel grösser und meist dicht gedrängt, und die stützenden B. fallen nicht in die Augen, da sie die Knospen an Länge nicht übertreffen.

19. S. TENELLA (Wulfen. J. coll. t. 17.) Zarter S. — Stämmchen niedergestreckt oder aufrecht; B. lineal.-pfriemlich, haarspitzig-begrannt, borstig-wimperig oder kahl, an der Spitze oberseits 1 punktig; K. oberst.; Zpfl begrannt. 4. An felsigen O. der A., (Kärnthen, Krain, in dem Vochein häufig; auf A. um St. Lamprecht in Steyermark.) Jul. Aug. St. h. 35. S. arenarioides Brign. fasc. pl. foröjul. Bth. weisslich. D.

20. S. AIZOIDES (L.) Immergrüner S. — Stämmchen nebst den St. aufstrebend, beblättert; B. lineal., stachelspitzig, borstig-wimperig, unterseits flach, oberseits ziemlich konvex, vor der Spitze 1 punktig; K. halbuterst., Zpfl abstehend, grannenlos. 4. Im Kiese der Alpenbäche und an feuchten, nassen O. der VorA., (dch die g. AK. und auf dem Schwarzwalde.) Jul. Aug. St. h. 35.

Von dem Habitus des *Sedum reflexum*. Blb. citrongelb, mit safrangelben Punkten; auf den höhern A. ganz safrangelb, welches *S. autumnalis* St. h. 1. ist. Die Variet. mit steif-gewimperten B. und dunkel-pomeranzengelben Bth. ist *S. atrorubens* Bert. Eine Variet. mit wimperlosen B. ist *S. autumnalis* L. nach der Diagnose.

IV. Rotte. *Hirculus* Tausch. hort. canal. fasc. 1. DC. prodr. 4. p. 44. Stämmchen dauernd, der St. jährlich, beblättert. B. flach. K. zurückgeschlagen. Bth. an der Basis 2 schwielig. Stbf. pfriemlich.

21. *S. HIRCULUS* (L.) Cistenblumiger S. — Stämmchen niedergestreckt, fädlich; die St. aufrecht, beblättert; B. lanzettl., flach, ganzrandig, die untersten in den gewimperten Bstiel verschmälert; K. unterst., zurückgeschlagen; Bth. vielnervig, an der Basis 2 schwielig. 4. Auf Haiden und torfhaltigen Wiesen, (von Holstein dch Mecklenbg, Pommern und Brandenbg nach Preussen; in den Mösern von Oberschwaben und Oberbayern; in den kalten Sümpfen des Jura in der Schw.) Jul. Aug. St. h. 35. Blb. goldgelb, an der Basis safrangelb-punktirt.

V. Rotte. *Arabida* Tausch. hort. canal. fasc. 1. DC. prodr. 4. p. 40. Stämmchen dauernd, beblättert; die St. jährlich, blattlos, (Schäfte.) K. zurückgeschlagen, frei. Stbf. pfriemlich. Blb. schwieligenlos. Blattwimpern nicht gegliedert.

22. *S. STELLARIS* (L.) Sternblüthiger S. — Stämmchen rosettig oder zerstreut-beblättert; B. verkehrteyf-keilig, fast sitzend, an der Spitze gezähnt-gesägt; Schaft an der Spitze ebensträussig; K. unterst., zurückgeschlagen; Bth. abstehend, lanzettl., sämmtl. in einen Nagel verschmälert; Stbf. pfriemlich. 4. An bewässerten O. der A. und an Bächen; in die VorA. herabsteigend, (dch die g. AK.; auf den Vogesen und den höhern Bergen des Schwarzwaldes.) Jul. Aug. St. h. 35. Auf den höhern A. wird sie manchmal *stengellos*, mit auf den Blattrosetten sitzenden Bth.; an sehr kalten O. wird sie auch *schopfig*, mit in kleine, geknäuelte B. verwandelten Bth. Blb. schneeweiss, mit 2 citronengelben Punkten.

23. *S. CLUSII* (Gouan.) Clusen's S. — Stämmchen rosettig oder zerstreut-beblättert; B. länglich-keilig, gestielt, von der Mitte an gezähnt; Schaft an der Spitze ebensträussig; K. unterst., zurückgeschlagen; Bth. wagerecht-abstehend, ungleich, 3 ey-lanzettf, abgebrochen-benagelt, 2 lanzettl., in den Nagel verschmälert; Stbf. pfriemlich. 4. In den Thälern der A., an nassen O., (am wilden Krähkogel im Pinzgau, im Oetzthale in Tyrol; auf dem Jufen.) Jul. Aug. *S. leucanthemifolia* Lap. — Clusius Citat bei Gouan. gehört nicht zu dieser, sondern zur vorhergehenden Art. Blb. schneeweiss: 3 breiter, an der Basis mit 2 citrongelben Flecken; 2 einfarbig.

IV. Rotte. *Hydatika* Tausch. hort. canal. fasc. 1. DC. prodr. 4. 41. Stämmchen dauernd, beblättert; die St. jährlich, blattlos, (Schäfte.) K. zurückgeschlagen, frei. Stbf. aufwärts breiter. Blattwimpern gegliedert, an der Basis des B. aber gliederlos.

24. *S. CUNEIFOLIA* (L.) Keilblättriger S. — Stämmchen roset-

tig; B. rundlich-verkehrteyf. oder spatelig, sehr stumpf, geschweift-gekerbt, ganz kahl, am Rande knorpelig; *Bstiel* flach, keilig, *kahl*; Schaft rispig; *K. unterst., zurückgeschlagen; Stbf. oberwärts breiter.* 4. An schattigen Felsen der A., (südl. Schw., Tyrol, Kärnthen und Krain.) Jun. Jul. St. h. 33. Blb. milchweiss, mit 2 zsgelassenen, gelben Flecken. Var.:

β. apennina, B. kleiner, Platte an der Spitze abgestutzt, wenigzählig. Bertol. fl. ital. *S. apennina* Bert. fil. it. in nov. comm. bon. nach Bert. fl. ital. Diese im südl. Tyrol.

25. *S. UMBROSA* (L.) Schattenliebender S. — Stämmchen an der Spitze beblättert; B. verkehrteyf., etwas gestutzt, gekerbt, kahl, am Rande knorpelig; *Bstiel* verbreitert, flach, lineal., am Rande *zottig-gewimpert*; Schaft rispig; *K. unterst., zurückgeschlagen; Stbf. oberwärts breiter.* 4. An feuchten Felsen, in schattigen Wäldern in Mähren (hinter Goldstein im Gesenke und bei Oslova im Mittelgebirge, Reisseck.) Juli. — Scopoli beschreibt unter dem Namen *S. Geum* die *S. hirsuta* L., welche (in den Liburnischen Bergen,) bei Fiume gefunden ward. Diese untersch. sich von *S. umbrosa* dch folg.: B an der Basis etwas herzf., und *Bstiel* halb so breit, aber noch Imal so lang, und oberseits rinnig, unterseits halbstielrund und daselbst auf der ganzen Oberfläche rauhh. Host beschreibt aus den Bergen Krain's die wahre *S. Geum* L., die dch nierenf., an der Basis tief-herzf. B. und einen längern, überall zottigen *Bstiel* verschieden ist; aber die StandO. dieser Arten sind noch ziemlich ungewiss.

VII. Rote *DICTYLOIDES* Tausch. DC. prodr. 1 p. 23. Stämmchen dauernd, beblättert. B. weder am Rande, noch an der Spitze eingedrückt-punktirt, die untern zwar abgestorben, aber übrigens nicht verändert. Die St. jährig, beblättert oder blattlos. K. an den Fruchtkn. angewachsen, aufrecht oder abstehend. Blattwimpern sämmtlich gegliedert.

26. *S. PEDEMONTANA* (All.) Piemonteser S. — Stämmchen rasig, dicht-rosettig; B. (im trocknen Zustande nervig) keilig oder umgekehrt-3eckig, 3sp., Seitenzpfl 2sp. oder sämmtl. eingeschnitten-gezähnt, Lappen gerade vorgestreckt, grannenlos; der St. nackt, ebensträussig; die untern blüthenst. B. 3eckig-keilig, 5-7sp.; Blb. länglich, an der Basis in einen Nagel verschmälert, noch Imal so lang, als der K. 4. Auf den höchsten A., (auf dem monte Rosa, von Welden; die übrigen StandO. der Schw. zweifelhaft; in D. mit Sicherheit noch nicht gefunden.) Jul. *S. heterophylla* Sternb. St. h. 33. *S. cymosa* WK. Untersch. sich dch die langen, schmalen Kelchzpfl. die in einen schmalen Nagel verschmälerten, milchweissen Blb. und die Gl., welche viel länger, als die N. sind. S.

27. *S. MUSCOIDES* (Wulfen bei J.) Moosartiger S. — Stämmchen rasig, an der Spitze dicht-rosettig; B. ganz-glatt (im trocknen Zustande etwas nervig) lineal., ganz oder lineal-keilig, 3sp., Zpfl gerade hervorgestreckt, lineal., und so wie die ungetheilten B. an der Spitze abgerundet-stumpf, grannenlos, an den jungen Trieben sämmtlich ungeth.; der St. meist 1blättrig, an der Spitze gewöhnlich 1-mehrbülthig; Blb. abstehend, oval-länglich, stumpf, sitzend, länger, als der K. 4. An felsigen O. der A., (in der Schw.

u. dch die g. AK.; kleine Schneeegrube der Sudeten.) Jun. Jul. *S. caespitosa* Scop. *S. pyrenaica* Vill. (nicht Scop.) Blb. gelblich, seltner gelblich-weiss. Die lebende Pflanze untersch. sich leicht von den 3 folgenden Arten dch die ganz glatten, oder mit schwach eingedrückten, kaum bemerklichen Furchen bezeichneten B. Var. kahl und mit kurzen, drüsentrag. Haaren bestreut, und kommt weiter vor:

α. compacta, Rasen klein, sehr gedrunge, B. dicht-dachig, Rosetten nicht ausgebreitet, der St. meist 1blüthig, oft kaum $\frac{1}{2}$ Zoll lang. *S. acaulis* Gaud. helv.

β. intermedia, Rasen gedrunge, aber die obern B. in Rosetten ausgebreitet, der St. 2-3 Zoll hoch, mehrblüthig.

γ. laxa, Rasen locker, B. entfernt, gegen die Spitze der Aeste rosettig, daher die Stämmchen oft gleichsam quirlig. St. h. 35. Var. ausserdem:

δ. integrifolia, B. sämmtlich ungetheilt, manchmal mit dem Ansätze eines zweiten Lappens ausgerandet: *S. pygmaea* Haw.

ε. moschata, überall reichlich mit drüsig-klebrigen Haaren bedeckt: *S. moschata* Wulf. bei J. misc. t. 21. f. 21. St. h. 33.

ζ. atropurpurea, Bth. dunkel-purpur-roth; kommt übrigens kahl und drüsig-behaart vor: *S. atropurpurea* Sternb. bei St. h. 35.

η. crocea, Blb. schön safranfarben. *S. crocea* Gaud. helv. Diese fand Herr Ed. Krauss in der Schweiz (am Monte Rosa auf der Schweizer Seite gegen das Zermattthal.)

28. *S. EXARATA* (Vill.) Gefurchter *S.* — Stämmchen rasig, an der Spitze dicht-rosettig; *B. mit einer 3fachen Furche durchzogen* (getrocknet vorspringend-nervig) 3-5sp., die an den Rosetten keilig und sitzend, oder handf. und gestielt, an den jungen Trieben gestielt, 3 sp. mit einem lineal., flachen Bstiele, *Zpfl* lineal. oder länglich, *abgerundet-stumpf*, grannenlos; der St. meist 1blättrig, an der Spitze gewöhnlich 3-5blüthig; *Blb.* abstehend, oval oder länglich, stumpf, noch 1mal so lang, als der K., *sitzend*. 4. Auf Felsen d. A., (in der g. AK.) Jun. Jul. Lebend untersch. sie sich von *S. muscoides* leicht dch die mit 3-5 tiefen Furchen durchzogenen B., getrocknet schwerer: doch bieten die ovalen, weissen oder nur gelblichweissen (nicht grüngelben) Blb., die meist noch 1mal so lang, als der K. sind und die mit stärkern Nerven durchzogenen und fast immer 3 sp. B. gute Kennzeichen dar. Kommt vor:

α. compacta und zwar 1. B. sämmtl. breit-keilig, mit breiter Basis sitzend, in den Rosetten 3 Linien lang, $1\frac{1}{2}$ Linie breit, mehrere mit 5 Zähnen versehen, an kleinen Expl. oft so breit, als lang; an den Stämmchen schmaler, aber nicht länger; unter dieser Form kommt niemals *S. muscoides* vor. 2. B. sämmtl. wie an den Stämmchen der ersten Form; diese aber ist der *S. muscoides* sehr ähnlich. Zur Variet. *α*: *S. exarata* DC. *S. caespitosa* Gaud. (Blüthe weisslich, getrocknet gelblichweiss.) *S. hypnoides* All. (nicht L.) *S. nervosa* var. *maior* Sternb. *S. exarata* All. (Bth. gelblichweiss.) *S. intricata* Lapeyr. DC. *S. nervosa* minor Sternb.

(Bth. kleiner, weiss und B. ein wenig länger.) *S. striata* Hall. Sohn. Gaud., ein klebrig-flaumiges Expl. mit schmälern Blb.

β. laxa, B. der Rosetten, wie bei der Variet. *α*, an den Stämmchen aber $\frac{1}{2}$ Zoll lang, auf einem schmalen Bstiele sitzend, Saum handf., 3-5 sp., Zpfl schmal, lineal.: Hierher *S. nervosa* Lapeyr., nach einem echten Expl. *S. intermedia* Gaud., (Bth. weiss:) *S. exarata* Gaud., (Bth. fast gelblichweiss.) Wenn alle B., auch die der Rosetten, so beschaffen sind, wie an den Stämmchen dieser Variet., so entsteht nach meiner Meinung *S. pubescens* Pourret., *S. mixta* Lapeyr., welche DC. für eine eigene Art hält.

29. *S. CAESPITOSA* (L.) Rasiger *S.* — Die Stämmchen rasig, an der Spitze rosettig, die seitenst. liegend; B. gestielt, mit einem flachen, *glatten* oder *schwach-1furchigen Bstiele*, an den Rosetten handf. 5-9 sp., Zpfl elliptisch oder lanzettl., *stumpf*, grannenlos, oder kurz-stachelspitzig, an den jungen Trieben und St. handf.-3 sp.; der St. arnblätterig, oberwärts 3-9blüthig; Bth. abstehend, oval oder länglich, stumpf, noch 1mal so lang, als der K., sitzend. 4. In Felsenspalten und an steinigen O., (in Mähr., Böhmen, Schles., dem Harze, im Gebirge zw. Hessen und Westphalen auf dem Scharfenberg, in den Baireuther Bergen von Hersbruck bis Gösweinstein, in den Vogesen) Mai. Jun. *S. decipiens* Ehrh. St. h. 27. *S. palmata* Sm. *S. caespitosa* Sm. *S. petraea* Roth. Diese, mit Varietäten der *S. exarata* und *S. hypnoides* oft verwechselte Art ist ganz bestimmt *S. caespitosa* L., in dessen flor. suec., so wie die von Wahlenberg und aller Schweden. II. Hampe überschickte am Harze gesammelte $\frac{1}{2}$ Zoll lange Expl., die mit den Schwedischen und Grönländischen ganz genau übereinstimmen. Uebrigens kommen in Schweden auch grössere Expl. vor, und Wahlenb. sammelte solche, welche die *S. granulata* beinahe an Grösse übertrafen. Auf den A. der Schw. und D. wächst diese Art nirgends. Die *S. caespitosa* der Schweizer ist *S. exarata*, und *S. caespitosa* Scop. ist *S. muscoides*. Von *S. muscoides* untersch. sich *S. caespitosa* L. dch folg.: sie ist stämmiger; die B. der Rosetten sind 5-7 sp., die Zpfl handf.-auseinander fahrend, lanzett- oder eyf. und nicht bis zur Spitze von fast gleicher Breite; die Haare lang, gegliedert und die Blb. noch 1mal so lang, als die Kbl., weiss oder gelblichweiss; von *S. exarata* dch die (nicht linealen oder gleichbreiten) Blattzpfl und die an der getrockneten Pfl. viel weniger hervortretenden Nerven; lebend untersch. sie sich leicht: denn bei *S. exarata* ist jeder Blattzpfl mit einer tiefen Furche durchzogen, und diese Furchen fliessen am Bstiel in eine zs.; an den Blattzipfln der *S. caespitosa* sind keine oder nur schwache Andeutungen zu Furchen, die mit der schwachen Furche des Bstiels nicht zshängen. Var. mit kahlen, gewimperten und zottigen B. und grannenlosen oder kurz-stachelspitzigen Blattzpfln und ausserdem:

α. compacta, B. gedrunge-dachig und wenn der St. nur 1-2 Zoll hoch ist, so entsteht *S. groenlandica* L. (nicht Lap. noch DC.) nach dem Stand O.; vgl. Wahlenb.

β. laxa, B. locker gestellt. Diese und die Variet. *α*. kommen vor: mit kahlen B.: *S. palmata* Panz. bei St. h. 27., nach einem

Expl. von ihm selbst; mit gewimperten B.: *S. Sternbergii* Willd., *S. media* Tausch. *S. Steinmanni* Tausch.; mit zottigen B.: *S. villosa* Willd. — *S. uniflora* Sternb., ist ein 1blüthiges Expl. der Variet. β . D.

30. *S. SPONHEMICA* (Gmelin.) Sponheimischer *S.* — Stämmchen rasig, an der Spitze rosettig, die seitenst. niederliegend; *B.* gestielt, mit einem *flachen, glatten oder schwach-1furchigen Bstiele*, an den Rosetten *handf. 5-9sp.*, *Zpfl* lanzettl., *zugespitzt, stachelspitzig*, die an den Stämmchen und St. *handf.-3sp.*; der St. *oberwärts 3-9 blüthig*; *Blb.* oval oder länglich, stumpf, sitzend, noch 1mal so lang, als der K. 4. Auf Felsen der niedrigeren Gebirge, (in der Rheinpfalz in den Gebirgen der Nahe und zw. Burgesponheim und Winterburg, bei Niederalben und Irzweiler; im Gebiete der Fl. von Spa.) Mai. Jun. *S. condensata* Gmel. (eine kleinere Form.) *S. palmata* Lej. und *S. confusa* Lej. *S. bohémica* Panz. *S. flavescens* Sternb., (eine Abänderung mit gelblichweissen Bth.): *S. hypnoides* β . DC. — Von *S. caespitosa* L. (*S. decipiens* Ehrh.) dch *zugespitzte Blattzpfl* unterschieden, aber doch wohl nur Variet. davon. D.

31. *S. HYPNOIDES* (L.) Astmoosartiger *S.* — Die Stämmchen rasig, an der Spitze rosettig, die an der Seite kriechend; *B.* gestielt, mit einem (bei der lebenden Pflanze) unterseits aufgeblasen-halbstielrunden Bstiele, an den Rosetten *handf.-5sp.*, *Zpfl* elliptisch oder lanzettl., *zugespitzt, haarspitzig-begrannt*, an den jüngern Aesten und St. meist ungeth., an den Knospen *oft häutig-berandet*; der St. *armblättrig*, an der Spitze *2-9 blüthig*; *Blb.* abstehend, oval oder lanzettl., stumpf, noch 1mal so lang, als der K. 4. In Felsenspalten, (im Luxemburgischen bei Dickrick und Viandem, nicht in Böhmen.) Jun., später, als die vorhergehenden. *S. sponhemica* Panz., nicht Gmel. *S. aggregata* Lej. Von dem erwähnten Standorte habe ich nur unvollkommene Expl. gesehen, daher ist noch nicht ausgemacht, dass die Pfl. unserer Fl. angehört; in Böhmen wächst sie nicht. Sie unterscheidet sich von *S. caespitosa* dch die spätere Bthezeit, wurzelnde Stämmchen, wenn sie auf die Erde zu liegen kommen, die *haarspitzig-begrannten B.*, die an dem Ende und oft auch an den Seiten der Stämmchen in eine Knospe *zsgerollt*, oft mit einem häutigen Rand umgeben und manchmal ganz häutig sind, so, dass nur der starke, in eine lange Granne auslaufende Mittelnerv, noch aus der Blattsubstanz bestehend übrig bleibt. D.?

32. *S. STENOPETALA* (Gaud.) Nacktstieliger *S.* — Die Stämmchen zerstreut-beblättert und rosettig; *B. keilig, 3-5sp.* oder ganz, *Zpfl* ey-lanzettf., stumpf, grannenlos; die St. *blüthenstielf.*, *blattlos, 1blüthig*; *Blb. lineal., zugespitzt, 3mal schmaler, als die Kelchzpfl.* 4. Auf den höchsten A., (Schw., auf den Appenzeller, Glarner und Graubündner A., Tyrol, Algau, Salzb., Steyermark und Oberöstr.) Jul. Aug. *S. aphylla* Sternb. St. h. 33. — D. fl. 3. p. 156. *Blb. citrongelb.*

33. *S. SEDOIDES* (L.) Fetthennenähnlicher *S.* — Die Stämm-

chen zerstreut-blättrig und rosettig; *B. lanzettl., spitz, stachelspitzig, ungeth.*, an der Basis in einen verbreiterten Bstiel verschmälert, getrocknet 3nervig; *der St. blutlos, 1-3 blüthig; Blb. eyf., spitz, kürzer und schmaler, als die Kelchzpfl.* 4. Auf den Felsen der A., (Tyrol, Salzb., Kärnthen, Krain, Steyermark.) Jul. Aug. St. h. 35. *S. trichoides* Scop. *S. sedoides* a. *flavida* DC. *Blb. kürzer, als die Kelchzpfl oder gleichlang, citronengelb.* Var. kahl und zerstreut-behaart. D.

34. *S. HOHENWARTH* (Sternb.) Hohenwart's *S.* — Die Stämmchen zerstreutblättrig und rosettig; *B. lanzettl., spitz, stachelspitzig, ungeth.*, an der Basis in einen verbreiterten Bstiel verschmälert, getrocknet 3nervig; *der St. 1-3 blüthig, mit wechselst. B. besetzt; Blb. eyf., spitz, ohngefähr so lang, als der K.* 4. Auf den Felsen der A., (Krain, Steyermark, Kärnthen.) Jul. Aug. St. h. 33. *S. sedoides* var. *Hohenwartiana* DC. Untersch. sich von *S. sedoides* dch die fast bis zu den Bth. beblätterten St. *Blb. oft an der Spitze schwarz-purpurn.* D.

35. *S. FACCHINI* (Koch.) Facchini's *S.* — Die Stämmchen dicht-beblättert; *B. dachig, lineal- oder lanzettl., abgerundet-stumpf, grannenlos*, nach der Basis schmaler, sämmtlich ungetheilt. die abgestorbenen 3-5nervig, zuletzt weisslich; *die St. mehrblättrig, 1-3 blüthig; die Blb. verkehrteyf.-keilig, oder längl., gegen die Basis zu verschmälert, ganz oder ausgerandet, einnervig, so breit, als die Zipfel des K., aber etwas länger.* 4. Auf den höchsten A. Rücken (südöstl. Tyrol, Seiser A., Plattkogel, der Seiser A. gegenüber, Rosengarten und A. Contria in Fassa; ferner gesammelt von Priester Paterno auf Montalon in Valsugana, Facchini.) Jul. Aug. *S. planifolia* Var. β . *atropurpurea* Syn. ed. 1. p. 275. Die Farbe der Bth. ist veränderlich. vom Purpurrothen in das Gelbliche übergehend.

36. *S. PLANIFOLIA* (Lapeyr.) Flachblättriger *S.* — Die Stämmchen dicht-beblättert; *B. dachig, lanzettl., abgerundet-stumpf, grannenlos*, an der Basis verschmälert, sämmtl. ungeth., die abgestorbenen 3nervig, an der Spitze grau gefärbt; *der St. mehrblättrig, 1-5 blüthig; die Blb. verkehrteyf., an der Basis abgerundet, noch einmal so lang und breit, als die Zpfl des K. und dreifach-nervig.* 4. Auf Felsen der höchsten A., (südl. Schw.; Oberengadin, Salzb. im Nassfelde über dem Stohlermundloch am Rathhausberg, auf dem Bockhart; Tyrol in der Zwing im Fuscherthale.) St. h. 40. *S. tenera* Sut. *S. muscoides* All. Von *S. muscoides* untersch. sie sich dch folg.: *Blb. noch 1 mal so lang, als der K., weiss, getrocknet gelblichweiss und die abgestorbenen B. an der Spitze graugefärbt.* Var. nach Gaud. manchmal mit einigen 3sp. B.

Die Varietät β . *atropurpurea* der *S. planifolia* Syn. ed. 1. p. 275. bildet eine eigene Art, die vorstehende *S. Facchini*.

37. *S. SEGUERI* (Spreng.) Seguer's *S.* — Die *WB. rasig-gestiegt*, gestielt, spatelig-lanzettl., in den Bstiel verschmälert,

stumpf, ganzrandig und 2kerbig, *die abgestorbenen braun, 5-7nervig; der St. nackt*, oder 1blättrig, meist 1blüthig; *die Blb. längl.-lineal.*, *stumpf*, so lang und breit, wie die Zpfl des K., und dreifach-nervig. 4. Auf den höchsten A., (in der Schw. auf der Haupt-A.-Kette; auf den Tyroler A.: Wormserjoch, Rosskogel und Hochederer im Oberinntale.) Jul. Aug. S. planifolia γ. Seguieri Sternb. Bth. gelb.

38. S. ANDROSACEA (L.) Mannsschildartiger S. — *Die WB. rasig-gehäuft*, gestielt, spatelig-lanzettl. oder verkehrteyf., in den Bstiel verschmälert, an der Spitze 3zählig oder ganzrandig, *getrocknet 5-11nervig; der St. nackt* oder 1blättrig, *meist 2blüthig; Blb. verkehrteyf.*, ausgerandet, *noch 1mal so breit und lang, als die Kelchzpfl.* 4. An felsigen, feuchten O. der A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. St. h. 33. Bth weiss. Var. sehr klein mit einzelnen, auf der Mitte der WB. sitzenden, halb so grossen Bth., deren Bthstiel kaum 2 Linien hoch ist, und deren B. nur 2-3 Linien lang sind. Hornung in bot. ztg. 18. p. 4. 471.

VIII. Rotte. NEPHROPHYLLUM Gaud. 3. p. 103. *Stämmchen ober der Erde fehlend. Der St. beblättert.* Zwei DeckB. an der Basis der Bthstiele, das eine kleiner. K. halbangewachsen mit aufrechten oder etwas abstehenden Zpfln, oder frei und abstehend.

39. S. CONTROVERSA (Sternb.) Streitiger S. — *Der St. einzeln*, aufrecht, starr, *beblättert*; Aeste an der Spitze 3blüthig; *Bthstielchen 2deckblättrig*, die fruchtttrag. traubig, *von der Länge der Frucht; B. keilig, vorne 3-5zählig*, Zähne gerade hervorgestreckt, die stengelst. abwechselnd, die wurzelst. gehäuft, die uranfänglichen spatelig, ganz; W. einfach. ☉. An sehr rauhen O. der A. (stellenweise dch die g. AK.) Jun.-Aug. St. h. 33. S. adscendens L., nach meiner Meinung. S. petraea Gunn., nicht L. Bth. weiss. — Var. sehr klein, der St. fehlend, Bth. 2-3, in der Mitte der Rosette sitzend: S. Bellardi All.

40. S. TRIDACTYLITES (L.) Dreifingertiger S. — *Der St. einzeln*, aufrecht, einfach oder ästig, *beblättert*; *Bthstiele 1blüthig-2deckblättrig, vielmal länger, als die Frucht*; WB. verkehrteyf., spatelig, ungeth., 3lappig oder 3sp., langgestielt, mit flachem Bstiel, *die stengelst. abwechselnd, handf.-3sp.*; W. einfach. ☉. An trocknen, sonnigen O. und auf Mauern. April. Mai. St. h. 33. Bth. weiss. Kleine Expl. mit lauter ganzen B.: S. minuta Pollin.

41. S. PETRAEA (L.) Felsen-S. — *Der St. einzeln*, niederliegend, locker-ästig-rispig, *beblättert*; *Bthstiele 1blüthig, 2 deckblättrig, vielmal länger, als die Frucht*; B. handf.-3sp., *geschlitzt-gezähnt*, die untern beinahe nierenf., die obersten an der Basis keilig, ganz und 3sp., Lappen zugespitzt, Bstiel der untern verlängert, halbstielrund, rinnig; Blb. verkehrteyf., *noch 1mal so lang, als der K.*; W. einfach. ☉. An felsigen, feuchten O., (im Innerkrain, in der Grotte bei Haasberg, im Dorfe St. Kanzian, am Schlosse Lueg; in Oberkrain bei Krainburg, Wulfen, Host, Tommasini.) Mai. Jun. S. Ponae Sternb. — D. fl. 3. p. 163. St. h. 35. J. ic. rar. t. 81. S. rupestris Willd. S. geranioides Host. Bth. weiss. D.

42. *S. GRANULATA* (L.) Körniger S. — *Der St. aufrecht, oberwärts ästig-ebensträussig, armblättrig; WB. nierenf., lappig-gekerbt, gestielt; Bstiel rinnig; StB. keilig, 3-5sp.; K. halboberst.; Blb. länglich-verkehrteyf., noch 1mal so lang, als der K.; W. körnig.* 4. Auf Wiesen, sonnigen Hügeln, an Waldrändern. Mai. Jun. St. h. 6. Bth. weiss.

43. *S. BULBIFERA* (L.) Knollentrager S. — *Der St. aufrecht, ganz einfach, reichblättrig, an der Spitze drugdoldig; Trugdolde 3sp., 3-7 blüthig; WB. nierenf., lappig-gekerbt, gestielt, die obere StB. sitzend, länglich, an der Basis eingeschnitten, die obersten lineal., ganz, in den Winkeln zwiebeltragend; K. halboberst.; Blb. länglich-verkehrteyf., noch 1mal so lang, als der K.; W. körnig.* 4. Auf grasreichen Hügeln und trocknen Triften, (in Unteröstr. und Mähren; im Wallis, um Branson und Genoz.) Mai. Jun. St. h. 35.

44. *S. CERNUA* (L.) Nickender S. — *Der St. aufrecht, einfach oder etwas ästig, an der Spitze 1blüthig; WB. nierenf., handf.-5-7lappig, gestielt, die obere StB. sitzend, an der Basis eingeschnitten, die obersten lanzettl., ganz, in den Winkeln zwiebeltragend; K. frei; Blb. länglich, gestutzt.* 4. An bewässerten Felsen der A., (in der Schw., aber sehr selten; auf den Berner A. bei Sanen, im Wallis über Lenz und Bellalui; Deutschl. auf d. A. Eisenhut in Steyerm., Raimund Steyrer. Jul. Aug. L. fl. lapp. t. 2. f. 4.

45. *S. ROTUNDIFOLIA* (L.) Rundblättriger S. — *Der St. aufrecht, rispig, reichblüthig; WB. herz-nierenf., ungleich-grobgesägt, langgestielt, StB. eingeschnitten-gezähnt; K. frei, abstehend; Blb. lanzettl., noch 1mal so lang, als der K.* 4. An feuchten O. der A. und VorA., (dch d. g. AK.) Jun.-Aug. St. h. 33. Blb. sternf.-abstehend, milchweiss. unterhalb der Mitte mit gelben, oberhalb dieser mit rothen Punkten schön bemalt. Var.:

β. *repanda*, Kerben der B. stumpf, kurz bespitzt; *S. repanda* Willd. in Sternb. rev. t. 5.

46. *S. ARACHNOIDEA* (Sternb.) Spinnwebiger S. — *Die St. niederliegend, beblättert; B. rundlich-verkehrteyf., in d. Bstiel verschmälert, vorne sehr stumpf, 3-5lappig, Lappen sehr kurz, stumpf; Bth. zuletzt locker-traubig, sehr lang-gestielt (halb unterst.?). Blb. eyf., länger, als der K.* 4. An felsigen, schattigen O. d. südl. Tyrols, (in d. Valle d'Ampola, welches Thal zw. d. Bezirke Val di Ledro u. d. Dorfe Storo liegt, Facchini.) Jul. Aug. Blb. nie weiss, sondern blass citrongelb, nicht selten ausgerandet, Facchini. D.

IX. Rotte. *MICRANTHES* Tausch DC prodr. 4. p 38. Stämmchen über der Erde fehlend. *Der St. blattlos.* (Schaft.) K. halbangewachsen.

47. *S. NIVALIS* (L.) Schnee-S. — *Die sämmtl. B. wurzelst., verkehrteyf. od. spatelig, in d. Bstiel verschmälert, ungleich-gezähnt-gekerbt; Schaft blattlos, kopfig od. etwas ebensträussig, 5-8 blüthig; K. halboberst., aufrecht; Blb. länglich, stumpf, kurz-*

benagelt, länger, als der K. 4. Auf Felsen, (in d. kleinen Schnee-grube d. Sudeten.) Jul. St. h. 35. Bth. weiss. D.

48. S. HIERACIFOLIA (Waldst. u. K.) Habichtskrautblättriger S. — Die sämmtl. B. wurzelst., eyf.-länglich od. lünylich, entfernt-geschweift-gezähnt, in den Bstiel verschmälert, kahl, am Rande u. am Kiele unterseits zottig; Schaft traubig; Tr. an der Basis etwas zsgesetzt; K. halboberst., zuletzt zurückgebogen; Blb. eyf., spitz, so lang als der K. 4. Auf torfhaltigem Boden u. an Bächen, (des nordwestl. steilen Anhangs der Lantscher Alpe bei Grätz, an d. Wand über d. Putzenthaler Seen bei Schladning, u. an d. Reichart in d. Judenburger A.) Jul. Aug. Blb. abstehend, hell-grün, am Rande purpurn; Stbg. auf den Blb. aufliegend: Stbk. fleischroth. D.

2. ZAILBRUCKNERA (Rb. fl. exc.) Zahlbrucknere. — Die Blb. sind aus derselben Substanz wie die Zpfl des K., das Uebrige wie bei Saxifraga.

(Ich habe diese Pfl. lebend u. mit Bth. u. Früchten sehr genau beobachtet. Es sind 5 Blb. vorhanden, die mit breiter Basis sitzen, aber innerhalb des Randes vom K. an d. Rande der Scheibe, welche den Grund des K. einnimmt u. den freien Theil des Fruchtkn. umgiebt, eingefügt, nicht anders wie bei Saxifraga stenopetala u. andern. Die Kapsel springt mit einer runden Oeffnung auf, aber nach dem Aufspringen ist sie nicht ganz offen, wie Reichenbach anführt.)

1. Z. PARADOXA (Rb.) Zweifelhafte Z. — Der St. niederliegend, entfernt-beblättert; die unteren B. lang-gestielt, herz-nierenf., 5-7 lappig, die Lappen stumpf, od. kurz zugespitzt, die oberen 3lappig; die Bthn zuletzt langgestielt, einzeln, halb unterständig; die Blb. schmal-lanzettl., spitz, schmaler als die KB. ☉. Auf etwas feuchten Felsen u. an Bächen, (Kärnthn im obern Lavanthale zw. Wolfsberg u. Wiesenau; in Steyermark.) Jul. Aug. Saxifraga paradoxa Sternb. K. u. M. d. fl. 3. p. 169. St. h. 33.

3. CHRYOSPLENIUM (L.) Milzkraut. — K. 4sp., halboberst., gefärbt, 2 gegenst. Zpfl kleiner. Blkr. fehlend. Stbg. 8 mit einfächerigen Stbk., od. eigentlich 4 bis auf die Basis getheilt, rings um die drüsige Scheibe, welche den freien Theil des Fruchtkn. umgibt, eingefügt. Gf. 2. Kapsel 2schnäbelig, 1fächerig, bis zur Mitte in 2 Klappen aufspringend, und sodann einen 4lappigen Becher, der in der Mitte spiegelnde S. trägt, darstellend. (Seltner und zwar mehr monströs, als regelmässig, ein 10lappiger K. mit 5 zweitheiligen Stbg.) Die Bth. mit den blüthenst. B. einen goldgelben Ebenstrauss bildend.

1. C. ALTERNIFOLIUM (L.) Wechselblättriges M. — B. wechselst., nierenf., tief-gekerbt, Kerben ausgerandet. 4. An nassen, etwas schattigen O.; neben Quellen und Bächen. März. April. St. h. 12. *J. Schimper*

2. C. OPPOSITIFOLIUM (L.) Gegenblättriges M. — B. gegenst., halbkreisrund, geschweift-gekerbt, an der Basis abgeschnitten. 4. Stw. an feuchten, schattigen Felsen, an Bächen und Quellen bis in die höhern A., seltner, als das vorige. Mai. Jun. St. h. 4.

LV. Ordng. UMBELLIFEREN. Juss. gen. 218. DC. prodr. 4. p. 53.

Kelchröhre an den Fruchtkn. gewachsen. Saum 5zählig, oder verwischt. Blb. 5, dem K. eingefügt und mit dessen Zpfn abwechselnd, in der Knospe einwärtsgerollt. Stbg. 5, mit dem Blb. eingefügt und mit diesem abwechselnd, hinfällig, in der Knospenlage einwärtsgekrümmt. Der Fruchtkn. 2fächerig, Fächer leyig, Eychen hängend; sehr selten 1fächerig. Gf. 2, jeder an der Basis in eine überweibige Scheibe, (Stempelpolster,) verbreitert, das Ende der Frucht deckend. Frucht aus 2, mit dem halben K. verwachsenen Früchtchen zsgesetzt, an der Spitze einer 2sp. oder 2th. Achse hängend, von der Basis gegen die Spitze sich ablösend, seltner zsgewachsen. S. an das Fruchtgebäuss angewachsen, seltner frei. Eyweiss gross. Keim klein, hängend, in der Spitze des Eyweisses befindlich; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. wechsel-, seltner gegenst., an der Basis scheidig.

I. Unterordng. ORTHOSPERMEEN. (Geradesamige.) Eyweiss auf dem Querdurchschnitte rund oder auf der Fugenseite flach oder konvex, weder mit den Rändern eingekrümmt, noch sackartig-hohl.

1. Gruppe. HYDROCOTYLEEN. Spreng. bei Schult. syst. veg. 6. p. XXXII. mit Ausschl. von Gatt. *Frucht von der Seite zsggezogen oder von der Seite flach zsgedrückt*, mit konvexem oder spitzem Rücken. Eyweiss vorne ziemlich flach. Blb. abstehend, ganz, spitz, mit gerader oder etwas einwärtsgebogener Spitze. *Dolde unvollkommen.*

I. HYDROCOTYLE (L.) Wassernabel. — Rand des K. verwischt. Blb. eyf., ganz, spitz, Spitze gerade. Frucht von der Seite flach zsgedrückt, 2schildig. Früchtchen striemenlos, mit 5 fädlichen Riefen, die Kielriefe und die 2 seitenst. oft verwischt, die 2 mittleren bogig. S. gekielt - zsgedrückt.

I. H. VULGARIS (L.) Gemeiner W. — B. schildf., kreisrund, doppelt-gekerbt, 9nervig; Bstiele an der Spitze behaart; Dolden kopfig, meist 5blüthig; Frucht an der Basis etwas ausgerandet. 4. An sumpfigen O., an vom Winter überschwennten Ufern der Seen und Teiche. Jul. Aug. Fl. dan. t. 90. Bth. weiss oder röthlich. Var:

β. Blattkerben sehr stumpf; H. Schkuhriana Rb. fl. exc. Schk. t. 59.

II. Gruppe. SANICULEEN. Koch. umb. 138. *Frucht auf dem Querdurchschnitte fast stielrund.* Früchtchen mit 5 gleichen Hauptriefen, fehlenden oder schwachen Nebenriefen, mit Schuppen oder Stacheln bedeckt. Eyweiss auf dem Querdurch-

schnitte halbstielrund, vorne ziemlich flach. Blb. aufrecht, von der Mitte an eingeknickt-ausgerandet. *Dolden büschelig oder kopfig, einfach oder etwas und zwar unregelmässig zsgesetzt, oder kopfige Döldchen.*

2. **SANICULA** (L.) Sanikel. — Rand des K. 5zählig; Zähne blattig. Blb. aufrecht, zsneigend, verkehrteyf., ausgerandet durch eingeknicktes Läppchen von der Länge des Blb. Frucht fast kugelig, mit hakigen Stacheln dicht-bedeckt, von selbst sich nicht trennend. Früchtchen riefenlos, reichstriemig; der Fruchthalter nicht abgetrennt. (Bth. weiss oder röthlich, vielehig; die Röhre der männlichen nicht weichstachelig)

1. **S. EUROPAEA** (L.) Gemeiner S. — *WB.* handf.-geth.; Zpfl 3sp., ungleich-eingeschnitten-gesägt; die zwittrigen Bth. sitzend, die männlichen sehr kurz-gestielt. 4. In schattigen, etwas feuchten Wäldern. Mai. Jun. Schk. t. 60. *S. vulgaris* Koch Syn. ed. 1. war ein Schreibfehler. *Astrantia Diapensia* Scop.

3. **HACQUETIA** (Neck.) Hakquetie. — Rand des K. 5zählig; Zähne blattig. Blb. aufrecht, zsneigend, verkehrteyf., von der Mitte an einwärtsgeknickt in ein Läppchen von der Länge des Blb. Frucht (vollkommen reif und trocken) von der Seite zsggezogen, mit dem bleibenden K. gekrönt. Früchtchen höckerig-konvex, mit 5 fädlichen, inwendig hohlen Riefen. (Die noch nicht getrockneten Früchte sind von der Seite zsggedrückt, nicht zsggezogen, unterwärts glatt, obwärts von sehr schmalen Thälchen gefurcht, so wie sie aber anfangen trocken und braun zu werden, ziehen sie alsbald die äussere Rinde in 5 fädliche Streifen, in die Riefen, zusammen.)

1. **H. EPIACTIS** (DC.) Grüne H. — 4. In Wäldern der VorA. und Gebirge, (Kärnthen; Krain; Steyerm.; Mähren; südöstl. Sudeten; am Fusse des grossen Bernhards.) Apr. Mai. *Astrantia Epipactis* Scop. *Dondia Epipactis* Spreng. M. u. K. d. fl. 3. p. 474. St. h 24. *Dondisia Epipactis* Rb. in Mösl. Handb. D.

4. **ASTRANTIA** (L.) Astrantia. — Rand des K. 5zählig; Zähne blattig. Blb. aufrecht, zsneigend, länglich-verkehrteyf., von der Mitte an einwärtsgeknickt, in ein Läppchen fast von der Länge des Blb. Frucht vom Rücken her etwas zsggedrückt. Früchtchen striemenlos, mit 5 erhabenen, stumpfen, faltig-gezackten, aufgeblasenen Riefen, die in ihren Höhlungen kleinere, röhrlige Riefen einschliessen; Fruchthalter nicht getheilt.

1. **A. MINOR** (L.) Kleine A. — *WB.* gefingert, Blättchen 7-9, lanzettl., spitz, ungleich-spitz-eingeschnitten-gesägt; Hüllblättchen ganzrandig; Kelchzähne länglich-eyf., sehr kurz-stachelspitzig; Zähne der Riefen spitz. 4. Auf den höheren A., (in der südl. AK. der Schw.; in Südtirol.) Jul. Aug. St. h. 29. Bth. und Hüllblättchen weiss.

2. **A. GRACILIS** (Bartling.) Schlanke A. — *Die WB.* 3th., die Zpfl ungleich-gesägt, der mittlere keilf.-längl., die seitenst. 2sp., der äussere halbeyf.; die Hüllblättchen ganzrandig; *KZähne*

eyf., stumpf, stachelspitzig; die Zähne der Riefen kegelf.-pfrieml., spitz. 4. Auf den Krainer A. (Bartling.) „Zwischen A. minor und A. carniolica in der Mitte stehend, ist sie von jener dch die Dolden, von dieser dch die Frucht leicht zu unterscheiden.“ Bei der verwandten A. carniolica sind die Hüllblättchen manchmal auch länger, als die Dolde. D.

3. A. CARNIOLICA (Wulf. bei J. a. t. 10.) Krainische A. — WB. *handf.-5th.*, Zpfl. länglich-verkehrteyf., spitz, fast 3sp., ungleich-spitz-eingeschnitten-gesägt; Hüllblättchen ganzrandig; *Kelchzähne eyf., stumpf, kurz-stachelspitzig*; Zähne der Riefen stumpf. 4. Auf A. und in Thälern der VorA., (in Krain, Steyerm.; in den Baierischen A., häufig bei Kreuth.) Jul. Aug. St. h. 29. A. minor Scop. Bth. und Hüllblättchen immer weiss. D.

4. A. MAIOR (L.) Grosse A. — WB. *handf.-5th.*, Zpfl. länglich-verkehrteyf., spitz, fast 3sp., ungleich-spitz-eingeschnitten-gesägt; Hüllblättchen ganzrandig oder an der Spitze beiderseits 1-2zählig; *Kelchzähne ey-lanzettf., in eine Stachelspitze zugespitzt*; Zähne der Riefen stumpf. 4. Auf Gebirgstriften und den VorA., auch in den Ebenen, (Schweiz, Oberschwaben und die g. AK.; sodann in Böhm., Mähren, Schles., im Erzgebirge, am Harze und bei Würzburg.) Jun.-Aug. St. h. 29. Var.:

a. vulgaris. Hüllblättchen von der Länge der Dolde; kommt bleich und rosenroth vor: nämlich Bthstielen, K. und oft die Hülle sind rosenroth.

β. involucrata. Hüllblättchen $1\frac{1}{2}$ mal so lang, als die Dolde, und zuweilen an der Spitze mit 1 oder 2 Zähnchen, aber nicht an allen Blättchen und nicht an jedem regelmässig, versehen. Kommt auch bleich und rosenroth vor. Zu jener gehört: A. pallida Presl.; zu dieser: A. carinthiaca Hoppe!

5. ERYNGIUM (L.) Mannstreu. — Rand des K. 5 zählig; Zähne blattig. Blb. aufrecht, zsneigend, länglich-verkehrteyf., ausgerandet-einwärtsgeknickt in ein Lappchen von der Länge des Blb. Frucht verkehrteyf., schuppig oder knötig, auf dem Querdurchschnitte fast stielrund! Früchtchen riefen- und striemenlos. Fruchthalter 2th., seiner ganzen Länge nach an die Früchtchen angewachsen.

1. E. CAMPESTRE (L.) Feld-W. — B. 3zählig-doppeltfiedersp., netzig-aderig, dornig-gezähnt, die wurzelst. gestielt, die stengelst. gehöhrt-umfassend; *Oehrchen geschlitzt-gezähnt*; der St. rispig, ausgesperret; Hüllchen länger, als die rundlichen Köpfchen; Spreublättchen ganz; K. länger, als die Blkr. 4. Auf unfruchtbaren Hügeln, Feldern, an Wegen der Ebenen und niedrigem Gebirge, (stw. dch das g. Gebiet.) Jul. Aug. J. a. t. 155. Bth. hell-bläulich-grün.

2. E. AMETHYSTINUM (L. var. *a.*) Blaue M. — B. doppeltfiedersp., nervig-aderig, dornig-gezähnt, die wurzelst. gestielt, die stengelst. mit scheidiger, ganzrandiger Basis umfassend; der St. an der Spitze ebensträussig; Hüllchen länger, als die rundli-

chen Köpfchen; Spreublättchen ganz; Blkr. länger, als der K. 4. An sonnigen, trocknen O., (im südl. Tyrol und Krain, Fiume.) Bth. blau, wie der ganze Ebenstrauss. D.

3. *E. MARITIMUM* (L.) Meerstrands-M. — *B.* dornig-gezähnt und gelappt, weisslich-meergrün, *die wurzelt. ungeth.*, gestielt, herz-nierenf., die obern stengelumfassend, fast handf.-lappig; *Hüllblättchen eyf., gezähnt-dornig, fast 3lappig*, länger, als das rundliche Köpfchen; Spreublättchen mit 3 Haarspitzen. ☺. An sandigen O., Meeresstrand, (sowohl an der nördl., als südl. Küste.) Jun.-Aug. Fl. dan. t. 875. Bth. amethystblau od. weisslich. D.

4. *E. ALPINUM* (L.) Alpen-M. — *WB. ungeth.*, gestielt, tiefherzf., spitz, gesägt-gezähnt, die obern sitzend, handf.-3-5sp., gewimpert-gesägt; *Hüllblättchen vielsp.-fiedersp., borstig-gezähnt*, ein wenig länger, als das längliche Köpfchen; der St. 1-3 köpflg. 4. Auf Triften der A., (in der westl. und südl. Schw.; Oberkärnthen in d. Wochein.) Jul. Aug. J. ic. rar. t. 55. Hülle bläulich. Blkr. weiss.

5. *E. PLANUM* (L.) Flachblättrige M. — *WB. ungeth.*, gestielt, oval-herzf., stumpf, gekerbt-gesägt, die mittlern stengelst. sitzend, ungeth., die obern 5th., dornig-gesägt; *Hüllblättchen lineal-lanzettl., entfernt-dornig-gezähnt*, so lang, als das eyf. Köpfchen oder ein wenig länger; der St. an der Spitze ebensträussig. 4. An trocknen, sandigen O., auf Feldern, Wiesen und an Flüssen, (von Oestr. dch Mähren, Böhmen und Schles.; bei Frankfurt a. d. O.; in Preussen bei Königsberg.) Jun Jul. J. a. t. 592. Bth. und oft der ganze Ebenstrauss, amethystblau. D.

III. Gruppe. *AMMINEEN*. Koch. umb. p. 114. *Frucht von der Seite deutlich-zsgedrückt* und meist wegen zsgezogener Seiten 2knotig. *Früchtchen* mit 5 fädlichen, seltner etwas geflügelten, *Riefen*; die seitenst. randend; sämmtlich *gleich*. Eyweiss stielrund oder höckerig-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach oder auf dem Querschnitte stielrund. *Dolden vollkommen, zsgesetzt*.

6. *CICUTA* (L.) Wasserschierling. — Rand des K. 5zählig; Zähne blattig. Blb. verkehrtherzf., mit einem einwärts gebogenen Läppchen. Frucht rundlich, von der Seite zsgezogen, 2knotig. Früchtchen mit 5, fast flachen Riefen, die seitenst. randend. Thälchen Istriemig; Striemen die Thälchen ausfüllend, (bei der trocknen Frucht) ein wenig mehr hervorspringend, als die Riefen. Fruchthalter 2th. Eyweiss auf dem Querdurchschnitt stielrund.

I. *C. VIROSA* (L.) Giftiger W. — Wurzelfasern fädlich; B. 3fach-gefiedert: Blättchen lineal.-lanzettl., spitz, gesägt. 4. In Gräben, Teichen, Bächen und tiefen, moosigen Sümpfen. Jul. Aug. Schk. t. 71. Bth. weiss. Var.:

β. tenuifolia, niedrig, manchmal nur 1 Fuss hoch; W. nebst dem St. dünn; Blattzpfl lineal., spärlich-gesägt oder ganzrandig; Dolden 5-8 strahlig: *C. virosa β. stricta* Schult. *C. angustifolia* Kit. bei Schult. *C. tenuifolia* Fröl.

7. **APIUM** (L. mit Ausschl. von Arten.) Sellerie. — Rand des K. verwischt. Blb. rundlich, ganz. Stempelpolster plattgedrückt. Frucht rundlich, 2 knotig. Früchtchen mit 5, fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen lstriemig. Fruchthalter ungeth. Eyweiss höckerig-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach.

1. **A. GRAVEOLENS** (L.) Gewöhnliche S. — Kahl; B. gefiedert, die obern 3zählig; Blättchen keilig, an der Spitze eingeschnitten und gezähnt. ☉. An sumpfigen O. und in Gräben, am Meeresstrand und an salzigen Wassern, (an der Nord- und Ostsee und am Adriat. Meere; an den Salinen im Innern: auch überall kultivirt.) Jul. - Sept. Schk. t. 78. *Seseli graveolens* Scop. *Sium Apium* Roth. W. bei der wilden Pflanze spindelf., ästig, bei der kultiv. rundlich, fleischig. Bth. weiss, klein.

8. **PETROSELINUM** (Hoffm.) Petersilge. — Rand des K. verwischt. Blb. rundlich, einwärtsgekrümmt, ganz, kaum ausgerandet, in ein einwärtsgebogenes Läppchen verengert. Stempelpolster konvex, kurz-kegelf. Frucht eyf., von der Seite zsggezogen, fast 2knotig. Früchtchen mit 5 fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen lstriemig. Fruchthalter 2th. Eyweiss höckerig-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach.

X 1. **P. SATIVUM** (Hoffm.) Gewöhnliche P. — Der St. aufrecht, kantig; B. glänzend, 3fach gefiedert, die untern Blättchen eyf. keilig, 3sp. und gezähnt, die obern 3zählig, Blättchen lanzettl., ganz und 3sp. ☉. Ueberall kultiv. Jun. Jul. Bth. grün-gelblich. Var.:

β. *crispum*. DC.. die untersten B. grösser, breiter, und krauss: *Apium crispum* Mill.

2. **P. SEGETUM** (Koch.) Saat-P. — Der St. aufrecht, stielrund, fast nackt; B. gefiedert, Blättchen der untersten fast sitzend, fiedersp. - eingeschnitten, gezähnt - gesägt, die der stengelst. lineal., ganz und 3sp., die der obersten fahlschlagend; Hülle 2-3blättrig; Strahlen der Dolde und der Döldchen sehr ungleich. ☉. Auf lehmigen etwas feuchten Brachäckern, in der Schw. sehr selten, (im Thale Erguel, nach Haller.) Jul. Aug. *Sison segetum* L. J. h. v. t. 134. Bth. weiss oder röthlich. S.

9. **TRINIA** (Hoffm.) Trinie. — Rand des K. verwischt. Blb. der männl. Bth. lanzettl., in ein eingerolltes Läppchen verschmälert; die der weibl. oder zwittrigen Bth. eyf., kurz-bespißt, mit einwärtsgebogenem Spitzchen. Frucht von der Seite zsggedrückt, eyf. Früchtchen mit 5 fädlichen, hervorspringenden, gleichen Riefen, die seitenst. randend. Thälchen striemenlos oder verwischt-lstriemig, aber unter jeder Riefe ein deutlicher Kanal. Fruchthalter flach, 2th. Eyweiss höckerig-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach.

X 1. **T. VULGARIS** (DC.) Gewöhnliche T. — Kahl; Hüllchen fehlend oder 1blättrig; Riefen der Früchte stumpf. ☉. Auf sonnigen,

unfruchtbaren Hügeln, auf Kalkboden, (in der südwestl. Schw. und dch das Rheinthl bis Bingen; im Maintale bis Würzburg; in Südtirol, Krain und Oestr.; Mähr.) Apr. Mai. *Trinia pumila* Rb. und *T. glauca* Rb. *T. Henningii* M. und K. d. fl. 2. p. 446. und Gaud. *Pimpinella glauca* L. spec. „hat keine Hüllblättchen, was sie von *Seseli* unterscheidet.“ *L. P. pumila* J. a. t. 18. *Seseli pumilum* L. sp. *S. dioicum* Vill. Bth. weiss. Die Expl. aus Wien, von Elsmann aus Tyrol und die aus der Rheinpfalz sind nicht verschieden. Der St. bald 3 Zoll, bald fast $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, auf ein und demselben Stand O.; Früchte rundlich und oval. Die männl. Dolden oft proliferirend-rispig. Var. mit kürzern BZpfln und:

β . *Henningii*, mit verlängerten BZpfln; hierher gehört dann, wenn die Zpfl zugleich lineal-borstlich sind: *Trinia Henningii* Hoffm.

2. *T. KITABELII* (M. Bieberst. fl. taur. conc. 3. p. 246.) Kitabel's *Trinie*. -- Kahl; *Hüllchen 4-5blättrig*; die Riefen der Früchtchen stumpf. ☉. Auf trockenen Grasplätzen, (zw. Göding und Mutenitz im südl. Mähren, Reisseck.) Jun. *Pimpinella glauca* WK. pl. rar. hung. t. 72. *Seseli pumilum* L. spec. Ein auf dem angegebenen Standorte gesammeltes Ex. habe ich zwar noch nicht gesehen, allein ich nehme die Pflanze hier schon desswegen an, weil sie mit einer andern Art der Gattung nicht verwechselt werden kann. Die *T. Hoffmanni*, welche sich dch spitze Riefen der Früchte auszeichnet, ist in der Deutschl. Flora zu streichen, sie wächst nämlich nicht in Oestr. — Die *T. elatior* Gaud. dch ein kegelf. Griffelpolster ausgezeichnet, ist mir unbekannt.

10. *HELOSCIADIUM* (Koch.) Sumpfschirm. — Rand des K. 5zählig oder verwischt. Blb. eyf., ganz, mit gerader oder einwärtsgebogener Spitze. Frucht von der Seite her zgedrückt, eyf. oder länglich. Früchtchen mit 5 fädlichen, hervorspringenden, gleichen Riefen. Thälchen 1striemig. Fruchthalter ganz, frei. Eyweiss höckerig- oder stielrund-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach.

1. *H. NODIFLORUM* (Koch.) Knotenblüthiger S. — B. gefiedert, *Fieder ey-lanzettf., gleich-stumpflich-gesägt*; Dolden den B. gegenst., gestielt, sitzend; der St. an der Basis liegend und wurzelnd. 4. In Quellen, Gräben, Bächen und Teichen, (in der westl. Schw., im wärmern Krain, Elsass und auf der ganzen Rheinfläche bis nach den Niederlanden, und westlich bis zur französischen Grenze.) Jul. Aug. *Sium nodiflorum* L. *Seseli nodiflorum* Scop. Bth. weisslich-grünlich.

2. *H. REPENS* (Koch.) Kriechender S. — B. gefiedert, *Fieder rundlich-eyf., ungleich-gezähnt-gesägt od. gelappt*; Dolden den B. gegenst., kürzer, als der Bthstiel; der St. niedergestreckt, wurzelnd. 4. An sumpfigen O., (stellenweise auf d. Rheinfläche; sodann v. d. Niederlanden dch Westphalen, Bremen, Oldenbg nach Holstein; vereinzelt noch hin u. wieder in D. u. d. Schw.) Jul.-Sept. *Sium repens* J. a. t. 260. Bth weiss.

3. *H. INUNDATUM* (Koch.) Schwimmender S. — Die aufgetauchten B. gefiedert, Fieder keilf., an der Spitze 3 sp., *die untergetauchten in haardünne Fetzen vielfach-gespalten*; Dolden den B. gegenst., 2strahlig; der St. an der Basis kriechend. 4. In Sümpfen u. Gräben, (v. Westphalen dch Hanover, Bremen u. Oldenbg nach Holstein.) Jun. Jul. Fl. dan. t. 89. *Sison inundatum* L. *Meum inundatum* Spreng. *Hydrocotyle inundata* Sm. *Sium inundatum* Roth. Bth. weiss. D.

11. *PTYCHOTIS* (Koch.) Faltenohr. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., 2sp.-ausgerandet, in der Mitte mit einer Queerfalte, aus welcher das Läppchen hervortritt. Frucht v. der Seite her zsgedrückt, eyf. od. länglich. Früchtchen mit 5 fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen 1striemig. Fruchthalter 2 th. Eyweiss stielrund- od. höckerig-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach. (Bth. weiss.)

1. *P. HETEROPHYLLA* (Koch.) Verschiedenblättriges F. — Der St. aufrecht, sehr ästig; WB. gefiedert, Blättchen rundlich, eingeschnitten-gelappt u. gesägt, die StB. vielsp., Zpfl lineal.-fädlich; Frucht länglich: *Hüllblättchen sämmtl. borstlich* ☉. Auf sonnigen, felsigen Hügeln, (bei Trident im südl. Tyrol; bei Nyon u. einigen andern Orten am Genfersee, auf Sandboden.) Jul. Aug. *P. Bunius* Rb. fl. exc. *Critamus heterophyllum* D. fl. 2. p. 441. *Aethusa Bunius* Murr. *Carum Bunius* L. J. h. v. t. 198. *Seseli saxifragum* L. *Pimpinella genevensis* Vill. u. *Seseli Bunius* Vill. *Meum heterophyllum* Mönch. *Sium saxifragum* Roth.

2. *P. AMMOIDES* (Koch.) Ammiähnliches F. — Der St. aufrecht, ästig; B. gefiedert-vielsp., Zpfl lineal.-fädlich, die der wurzelst. lineal.-keilig, an der Spitze 2-3 sp.; Frucht eyf.; 2 *Hüllblättchen spatelig u. haarspitzig*, 3 derselben lineal.-pfriemlich. ☉. Auf Aeckern, in Weinbergen, Olivengärten, (südl. Istrien, Biasol.) Mai. *P. verticillata* Duby. DC. *Seseli ammoides* Gouan. (nicht J.) *S. verticillatum* Desf. *S. corsicum* Link. *S. pusillum* Brot. J.

12. *FALCARIA* (Host., nicht Cav.) Sicheldolde. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht länglich, v. der Seite her zsgedrückt. Früchtchen mit 5 fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Fruchthalter frei, 2sp. Thälchen 1striemig, Striemen fädlich. Eyweiss stielrund-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach. (Bth. weiss.)

1. *F. RIVINI* (Host.) Rivin's S. — WB. einfach u. 3zählig; StB. 3zählig, das mittlere Blättchen 3sp., die seitenst. auswärts 2- u. 3sp.; Zpfl lineal.-lanzettl., *gleich-genähert-gesägt*; Sägezähne dornig-stachelspitzig ☉. Auf Aeckern, unter d. Saat, an Wegrändern sowohl d. Ebenen, als niedern Gebirge, auf Kalk- u. Lettenboden, (stellenweise dch d. g. Gebiet, in d. Schw. bloss bei Basel.) Jul. Aug. *F. Rivini* DC. *Sium Falcaria* L. J. a. t. 237. *Drepanophyllum sioides* Wib. *D. agreste* Hoffm. *Critamus agrestis* Bess. M. u. K. d. fl. 2. 441. D.

2. *F. LATIFOLIA* (Koch.) Breitblättrige S. — B. 3zählig, die seitenst. Blättchen ungeth. u. 2sp., das endst. 3sp. od. 3th.; *Zpfl der untersten B. ungleich-tief-gesägt, eyf.*, an der Basis keilig, die der übrigen länglich-keilig, eingeschnitten-gezähnt, die seitenst. an der innern Seite, das endst. beiderseits, v. der Basis bis über die Mitte hinaus ganzrandig. ☉. VorA., auf Kalkboden, (auf d. Berge Zhaun in Innerkrain, ungefähr 4000 Fuss hoch, Iladnik.) Jun. Jul. *Iladnikia pastinacifolia* Rb. ic. 9. f. 1114. Dch kein Merkmal v. d. Gattung *Falcaria* verschieden; die B. sind übrigens denen der *Pastinaca sativa* nicht ähnlich. D.

13. *SISON* (L., mit Ausschl. aller Arten, ausser *S. Amomum*.) *Sison*. — Rand des K. verwischt. Blb. rundlich, tief-ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht v. der Seite zsgedrückt, eyf. Früchtchen mit 5 fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen 1 striemig; Striemen abgekürzt, keulenf. Fruchthalter 2th. Eyweiss höckerig-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach.

1. *S. AMOMUM* (L.) Bibernelblättriges S. ☉. An lettenhaltigen, etwas feuchten O., (um Genf, an vielen O.; in Gräben v. Krain, Scop., ob letztere d. rechte Pflanze?) Jul. Aug. Schk. t. 69. *Seseli Amomum* Scop. *Sium Amomum* Roth. *S. aromaticum* Lam. Bth. weiss.

14. *AMMI* (L.) *Ammi*. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., mit einem einwärtsgebogenen Läppchen ausgerandet-2lappig, dch ungleiche Lappen unregelmässig. Frucht v. der Seite zsgedrückt, eyf.-länglich. Früchtchen mit 5 fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen 1striemig. Fruchthalter frei, 2th. Eyweiss stielrund-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach.

1. *A. MAJUS* (L.) Grosses A. — Die untern B. einfach- u. doppeltgefiedert; Blättchen lanzettl., geschärft-knorpelig-stachelspitzig-gesägt, die obern doppeltzugesetzt, Zpfl lineal.-lanzettl., an der Spitze gesägt; der St. stumpfkantig. ☉. Auf Aeckern, (um Triest, Biasol.; Fiume; um Wien, Dollin.) Jul. Aug. Schk. t. 61. *Apium Ammi* Crantz. Bth. weiss. Hüllblättchen 3sp. D.

15. *AEGOPODIUM* (L.) Geissfuss. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht v. der Seite zsgedrückt, länglich. Früchtchen mit 5 fädlichen Riefen, die seitenst. randend. Thälchen striemenlos. Fruchthalter borstlich, an der Spitze gabelig. Eyweiss stielrund-konvex, vorne ziemlich flach.

1. *A. PODAGRARIA* (L.) Gemeiner G. — 4. An Hecken, u. etwas feuchten Zäunen, schattigen O.; in d. VorA. hinaufsteigend. Mai.-Jul. Schk. t. 79. *Sison Podagraria* Spreng. *Pimpinella angelicaefolia* Lam. Bth. weiss.

16. *CARUM* (L.) Kümmel. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen, regelmässig. Frucht v. der Seite zsgedrückt, länglich. Früchtchen

mit 5 fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Fuge flach. Thälchen 1 striemig. Fruchthalter frei, an der Spitze gabelig. Eyweiss stielrund-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach. (Bth. weiss.)

I. Rotte. CARVI DC. prodr. 4. 113. Carum L. Hülle fehlend; Hüllchen fehlend od. armblättrig.

1. C. CARVI (L.) Gemeiner K. — B. doppeltgefiedert; *Blättchen* fiedersp.-vielsp., die untersten Paare an den gemeinschaftlichen Bstiel *kreuzweise-gestellt*; *beide Hüllen fehlend*; der St. kantig; W. spindelig. ☉. Auf Wiesen u. Triften; in d. VorA. hinaufsteigend. Apr. Mai. Schk. t. 77. Seseli Carum Scop. Ligusticum Carvi Roth.

II. Rotte. BULBOCASTANUM Adans. DC. prodr. 4. p. 115. Die allgemeine u. besondere Hülle mehrblättrig.

2. C. BULBOCASTANUM (Koch.) Knolliger K. — B. fast 3fachgefiedert, Zpfl lineal., spitz; Dolden 12-24strahlig; *beide Hüllen reichblättrig*, Blättchen lanzettl., zugespitzt; *Bthstielchen nach d. Verblühen aufrecht*, Früchte aneinanderliegend, länglich, an d. Spitze verschmälert; der St. stielrund; W. fast kugelig. 4. Auf Aeckern, auf Letten - u. Kalkboden, (in d. südl. u. westl. Schw.; im Rheingebiete, in Elsass, seltner, aber v. Zweibrücken u. Kaiserslautern bis an d. Mosel stw. sehr gemein, besonders im Glahn- u. Nahethale, v. Oppenheim bis Frankfurt, in Hessen u. am Niederrheine hin u. wieder; in Krain.) Jun. Jul. Bunium Bulbocastanum L. Sium Bulbocastanum Spreng. Die ganzen Gf. herabgebogen, noch 1 mal so lang, als d. Stempelpolster. Die Thälchen 1 striemig.

3. C. DIVARICATUM (Koch.) Spreitzender K. — B. fast 3fachgefiedert, Zpfl lineal., spitz; Dolden 6-12strahlig; Hülle armblättrig, abfällig; *Hüllchen meist 3-6 blättrig*, Blättchen ey-lanzettf., zugespitzt; *Bthstielchen nach dem Verblühen spreitzend, die äusseren horizontal abstehend*; Früchte abstehend, lineal., an der Spitze etwas verdickt; der St. stielrund; W. fast kugelig. 4. Auf Aeckern, (Istrien; Biasol.) Mai. Bunium divaricatum Cesat. in d. Linnaea, nicht Bertol. Der St. viel niedriger, als bei der vorhergehenden, Dolden sehr gespreitzt, Stempelpolster fast v. d. Breite der Frucht selbst, Aeste etwas abstehend, die Gf. auf d. Stempelpolster aufliegend, u. ein wenig kürzer od. länger, als dieses. Die Thälchen 1 striemig. J.

4. C. VERTICILLATUM (Koch umb.) Quirliger K. — Die B. gefiedert, Blättchen vielth, Zpfl fädl., quirlig; *die W. gebüschelt, die Fasern fleischig verlängert-keulig*. 4. Auf trockenen, aber fruchtbaren Wiesen, (um Heinsberg, Regierungsbezirk Aachen, Apotheker Thieme.) Jul. Aug. Sium verticillatum Linn. spec. Sium verticillatum Lam. dict.

17. BUNIUM. (L. gen. n. 332.) Erdknoten. — Die Thälchen 3 striemig, das Uebrige wie bei Carum.

Ich nehme hier die Gattung *Bunium* auf, wie sie De Candolle aufgestellt hat; berücksichtigt man aber die Zahl der Striemen in den Thälchen nicht, so wird *Carum Bulbocastanum* zu *Bunium* gehören, dann aber auch, wie es schon dch Bieberstein geschehen, *Carum Carvi* zu dieser Gattung zu rechnen seyn, da der Bau der Bth. u. Frucht ganz derselbe ist. Die Gattung *Carum* habe ich aus einer gewissen Pietät gegen den grossen Meister stehen lassen.

1. *B. MONTANUM* (Koch.) Berg-E. — Die unteren B. 3 fach gefiedert, die Zpfl lineal., 1 nervig, kurz-stachelspitzig; die Dolde 6-10 strahlig; die beiden Hüllen 5-6 blättrig, die Blättchen des Hüllchens lanzettl., schmal-häutig-berandet, meist so lang als die Bthstielchen; die fruchttragenden Bthstielchen aufrecht-abstehend, die äusseren fast von der Länge der Frucht; der Gf. zurückgebogen; die W. fast kugelig. 4. Unter der Saat, (auf dem M. Maggiore in Istrien, Tommas, um Fiume, Noé.) Mai-Jul. *B. divaricatum* Bertol. fl. it., nicht Cesat. Sehr ähnlich dem *B. bulbocastanum* L.; dieses aber untersch. sich dch Blättchen mit einem spitzen, knorpeligen Ende u. nicht dch ein aufgesetztes Stachelspitzchen, dch 12-20 strahlige Dolden, dch Hüllchen, die nur halb so lang sind, als die Bthstielchen und dch 1 striemige Thälchen. *Carum divaricatum* ist von *Bunium montanum* weit verschieden; der St. von jenem ist in grösseren Expl. von der Basis an ästig, die Aeste sind abstehend-aufstrebend, die BZpfl etwas fleischig, fast nervenlos, die Stielchen bei den fruchttragenden Dolden noch einmal so dick als bei den blüthentragenden, die äusseren wagerecht abstehend, u. alle von einander entfernt, die Früchte noch einmal so gross u. die Thälchen mit einem einzigen schwarzbraunen Striemen ausgefüllt. *Bunium alpinum* ward im Bereiche unserer Fl. noch nicht gefunden; es unterscheidet sich von *B. montanum* dch weit niedrigeren Wuchs, lanzettl.-lineale, fleischige, nervenlose BZpfl, 5-6 strahlige Dolde mit kurzen Strahlen, welche kaum die Länge der fruchttragenden Doldchen erreichen, dch eyf.-lanzettl. Blättchen der Hüllchen mit breitem weiss-häutigem Rande; dch Fruchtstielchen, welche nur halb so lang sind als die Frucht selbst, dch dickere Stempelpolster, dch noch einmal so grosse schwarzbraune Früchte, deren Riefen nur ein wenig heller gefärbt sind. Die Thälchen sind wie bei jenem 3 striemig. J.

18. *PIMPINELLA* (L.) Bibernell. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht v. der Seite zsgezogen, eyf., mit dem kissenf. Stempelpolster u. den zurückgebogenen Gfn bekrönt. Fruchtkn. mit 5 fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen reichstriemig. Fruchthalter frei, 2 sp. Eyweiss höckerig-konvex, auf der Fugenseite ziemlich flach.

1. Rote *TRAGOSELINUM* Tournef. Früchte kahl. W. dauernd. Bth. weiss od. rosenroth.

1. *P. MAGNA* (L.) Grosse B. — B. gefiedert; Blättchen spitz, gezähnt, ungeth. od. lappig od. geschlitzt; der St. beblättert, kantig-gefurcht; die Gf. länger, als der Fruchtkn.; Früchte länglicheyf., kahl. 4. Auf Wiesen. Mai, Jun. J. a. t. 396. Var.;

β. rosea, Bth. rosenroth; auf höhern Gebirgen u. VorA.: P. rubra Hoppe.

γ. laciniata, Blättchen handf.-fiedersp., Zpfl. lanzettl., eingeschnitten-gesägt: P. magna *γ. laciniata* Wallr. P. *orientalis* Gouan. J. a t. 397. P. *media* Hoffm.

δ. dissecta, Blättchen handf. - doppelt - fiedersp.: P. magna *δ*. Wallr. P. *dissecta* Retz.

2. P. SAXIFRAGA (L.) Gemeine B. — B. gefiedert; Blättchen eyf., stumpf, gezähnt, lappig od. geschlitzt; der *St. stielrund*, *zart-gerillt*, *oberwärts fast nackt*, kahl od. flaumlich; d. *Bthstielchen kahl*; die Gf. während der Blüthezeit kürzer, als der Fruchtkn.; Früchte eyf., kahl. 4. Auf Triften, unkultiv. Hügeln, an sonnigen, waldigen O., in die A. hinaufsteigend. Jul. Aug. J. a. t. 395. Var.:

α. maior, Blättchen eyf., an den StB. oft zerschnitten: P. saxifraga B. maior Wallr. Diese, wie die 2 folg. Variet., sind bald kahl, bald flaumig.

β. dissectifolia, Blättchen der sämmtl. B. zerschnitten: P. saxifraga *dissectifolia* Wallr. P. *hircina* Leers.

γ. poterifolia, kleiner, Blättchen rundlich-eyf., gekerbt: P. saxifraga A. minor *poterifolia* Wallr.; diese an den sterilsten O.

δ. alpestris, kleiner, Blättchen im Umriss rundlich, fast handf.-eingeschnitten, Zpfl. lanzettl., zugespitzt: P. sax. *γ. alpestris* Spreng. P. *alpina* Host. Diese in den VorA., seltner auch in d. niedrigeren Gebirgen u. Ebenen.

2. b. P. NIGRA (Willd. prodr. fl. berol. n. 348) Schwarze B. — Die B. gefiedert, Blättchen eyf., stumpf, gelappt u. gezähnt, glanzlos; die *St. stielrund*, *zart gerillt*, *oberwärts fast blattlos*, die Aeste u. *Bthstielchen dicht flaumig*; die Gf. während der Bthezeit kürzer als der Fruchtkn.; die Früchte eyf., kahl. 4. Auf trockenen Hügeln u. unkultiv. O., (bisher mit Sicherheit bloß im nördlichen Gebiete.) Jul.-Aug. P. saxifraga var. *ε. nigra* Koch Synops. DC. prodr. var. *β*. Unterschieden von P. saxifraga ausser dem Ueberzug der Bthstielchen in stärkere St., eine bei der ältern Pfl. viel dickere W., u. dch das Eigenthümliche derselben, dass bei dem Zutritte der atmosphärischen Luft, wenn sie durchschnitten worden, ihre Durchschnittsflächen, besonders an den äusseren Schichten, sich sehr bald blau färben.

II. Rotte. TRAGIUM. Früchte flaumig od. rauhh. W. mehrjährig od. zweijährig.

3. P. PEREGRINA (L. spec. pl. 378.) Fremde B. — Die B. gefiedert; Blättchen der WB. eyf. od. herzf., gezähnt, der StB. eingeschnitten od. gelappt; die Früchte rauhh. von gerade abstehenden Haaren. ☉. Auf unbebauten Hügeln, (um Fiume, Noé.) Jun. Jul. P. Tragium Reichenb. fl. germ. exs. J.

III. Rotte. ANISUM Adans. Früchte flaumlich. Jährige Arten.

3. P. ANISUM (L.) Anis-B. — Die unterst. B. herzf.-rundlich, eingeschnitten-gesägt, die mittlern gefiedert, Blättchen keilig, lappig od. gezähnt, die obersten 3sp. od. ungeth.; Früchte eyf., an-

gedrückt-*flaumig*. ☉. Wird in Gärten u. auch im Grossen in Thüringen u. Elsass gebaut. Jul. Aug. Sison Anisum Spreng. Anisum vulgare Gärtn. Hayn. arzn. gew. 7. t. 22. Kultiv.

19. *BÉRULA* (Koch.) Berle. — Rand des K. 5 zählig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht eyf., v. d. Seite zsgezogen, fast 2knotig. Stempelpolster kurz-kegelf., mit einem schmalen Rande umzogen; die Gf. zurückgebogen. Früchtchen mit 5 fädlichen, gleichen Riefen; die seitenst. vor den Rand gestellt, reichstriemig; Striemen mit einem dicken, rindigen Fruchthäuse bedeckt. Eyweiss auf dem Queerdurchschnitt stielrund. Fruchthalter 2 th., Schenkel an die Früchtchen angewachsen, aber verwischt u. kaum bemerkbar.

1. *B. ANGUSTIFOLIA* (Koch.) Schmalblättrige B. — B. gefiedert; Blättchen eingeschnitten-gesägt; Dolden gestielt, den B. gegenst.; Hülle meist fiedersp. 4. In Gräben, Bächen, Teichen. Jul. Aug. Sium angustifolium L. J. a. t. 67. S. Berula Gouan. S. erectum Huds. Untersch. sich schon während der Blüthezeit leicht v. d. *Helosciadium nodiflorum* dch die weissen Bth., die verkehrterzf. Blb., die reichblättrige Hülle u. die eingeschnitten-gesägten StB.

20. *SIUM* (L., mit Ausschluss v. Arten.) Wassermärk. — Rand des K. 5 zählig, Zähne manchmal sehr klein. Blb. verkehrteyf., ausgerandet mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht v. d. Seite zsgeedrückt od. zsgezogen u. fast 2knotig, mit dem kissenf. u. am Rande niedergedrückten Stempelpolster u. den zurückgebogenen Gfn gekrönt. Früchtchen mit 5 gleichen, fädlichen, stumpflichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen 3striemig; Striemen oberflächlich. Fruchthalter 2 th., die Schenkel an das Früchtchen gewachsen od. frei. Eyweiss sehr konvex, auf der Fugenseite flach.

1. Rotte. *SIA GENUINA*. Schenkel d. Fruchthalters an die Früchtchen angewachsen.

1. *S. LATIFOLIUM* (L.) Breitblättriger W. — *W. faserig*, ausläufertreibend; B. *gefiedert*; Blättchen lanzettl., an der Basis ungleich, gleich-geschärft-gesägt, die der untergetauchten B. doppeltfiedersp. od. vielsp.; Hülle vielblättrig; *Schenkel des Fruchthalters an das Früchtchen angewachsen*. 4. In stehenden u. langsam fliessenden Wassern, (stellenweise dch d. g. Gebiet.) Jul. Aug. J. a. t. 66.

11. Rotte. *SISARUM*. Fruchthalter 2 th., frei.

2. *S. SISARUM* (L.) Zuckerhaltiger W. — *W. knollig-büscheilig*; die untern B. gefiedert, Blättchen länglich, ungleich-spitz-gesägt, das endst. eyf., an der Basis etwas herzf.; *die obern B. 3 zählig*, Blättchen lanzettl.; Hülle 1-5 blättrig; *Fruchthalter frei*. 4. Wird zum Hausgebrauch kultiv. Jul. Aug. Schk. t. 69. Kultiv.

2. *BUPLEURUM* (L.) Hasenohr. — Rand des K. verwischt. Blb. rundlich, ganz, eng-eingerollt; das Läppchen breit, gestutzt.

Frucht v. der Seite zsgedrückt, od. fast 2knotig, mit dem niedergedrückten Stempelpolster gekrönt. Früchtchen mit 5 gleichen, geflügelten, od. spitzen, od. fädlichen od. verwischten Riefen; die seitenst. randend. Thälchen striemig od. striemenlos. Fruchthälter frei. Eyweiss auf der Fugenseite ziemlich flach. (Bth. gelb.)

a. B. nicht durchgewachsen, Früchte körnig - rauh.

1. B. TENUISSIMUM (L.) Feines H. — Der St. aufrecht, ästig; B. lineal.-lanzettl., zugespitzt; die endst. Dolden 3strahlig, die seitenst. unvollständig; Hüllblättchen lineal.-lanzettl., zur Blüthezeit länger, als das 3-5 blüthige Döldchen; *Früchtchen 5riefig, zwischen den Riefen körnig-wichstachelig, d. Riefen körnig-gekräuselt*. ☉. An salzhaltigen Quellen, auf Wiesen bei Salinen, (Holstein; Böhmen; Halle in Sachsen; Nauenheim in d. Wetterau; Maxdorf, bei Mannheim; Buttelborn im Darmstädtischen; Unteröstr.; Mähr.) Jul. Aug. Rb. ic. f. 298. B. junceum Poll. B. junceum u. Pollichii Gmel. B. Gerardi Fl. wett. *Odontites tenuissima* Spreng. bei R. u. S. — Var. wie die meisten jährigen Arten dieser Gattung:

β. *nanum*, der St. sehr niedrig, sehr ästig. DC. prodr. D.

2. B. SEMICOMPOSITUM (L.) Schwachdoldiges H. — Der St. aufrecht, ästig; B. lanzettl., die untern stumpf, stachelspitzig, in den Bstiel verschmälert, die obern haarspitzig; die endst. Dolden 3-5strahlig, die seitenst. unvollständig; Hüllblättchen lanzettl., länger, als d. Döldchen; *Früchte körnig, Riefen verwischt*. ☉. An kräuterreichen O., (Istrien.) Jul. Aug. Rb. ic. f. 320. 321. *Odontites semicomposita* Spreng. bei R. u. S. O. luteola Hoffm. umb.

b. B. nicht durchwachsen, Thälchen der Frucht glatt, nicht körnig.

* Jährige.

3. B. AFFINE (Sadler. fl. comit. pesth. ed. I. p. 204. Verwandtes H. — Die St. rispig, Aeste ruthenf., etwas abstehend, von der Basis an mit Aestchen besetzt; *Aestchen kurz, aufrecht, fast angedrückt*; die B. schmal lineal.-lanzettl., zugespitzt, 3-5nervig, die unteren gegen die Basis zu verschmälert, die endst. Dolden meist 5strahlig, *die seitenst. meist 2strahlig*, die Blättchen der Hüllchen lanzettl., zugespitzt, länger als die Döldchen; *die Blüthenstielchen halb so lang als die Frucht*; Früchte oval, Riefen fädlich, geschärft, Thälchen mit einem vortretenden Striemen dehzogen. ☉. An unkultiv. O. u. Aeckerrändern, (bei Wien, Dolliner.) Jul. Aug. B. Gerardi var. β. Sadler fl. comit. pesth. ed. 2., Rchb. ic. f. 294. 295. B. junceum M. Bieberst. taur. cauc. Steht nach seinen Kennzeichen dem Bupleurum Gerardi, nach seinem äussern Ansehen dem B. tenuissimum am nächsten. D.

4. B. GERARDI (J. a. t. 256.) Der St. rispig; *Aeste ziemlich abstehend, an der Spitze doldentragend*; B. schmal-lineal.-lanzettl., zugespitzt, 3-5nervig, die untern nach der Basis verschmälert; Dolden meist 5strahlig; *Hüllblättchen lanzettl.-pfriemlich, spitz, etwas länger als die Döldchen; Bthstielchen so lang, als die Frucht*; Früchte lineal.-längl., Riefen fädlich, Thälchen

konkav, striemenlos ☉. In Weinbergen u. an steinigen O., (Oestr.) Jul. Aug. D.

5. *B. JUNCEUM* (L.) Binsenstengeliges H. — Der St. rispig; *B. lineal-lanzettl., zugespitzt, 7nervig*, die untern nach der Basis verschmälert; Dolden 2-3strahlig; *Hüllblättchen lanzettl.-lineal., spitz, kürzer, als das fruchtragende Döldchen; Bthstielchen halb so lang, als die Frucht*; Riefen geschärft, Thälchen konkav, striemenlos. ☉. An felsigen, rauhen O., (im Littor., Triest, Fiume, bei Verviers, wohl verschleppt; Wallis zweifelhaft.) Jul. Aug. Rb. ic. f. 297. *B. baldense* Wald. et. Kit. pl. rar. hung. tab. 257.

6. *B. ARISTATUM* (Bartling.) Begranntes H. — Der St. ästig; *B. lineal-lanzettl., zugespitzt, 3nervig*, die untern nach der Basis verschmälert; *Hüllchen* länger, als das Döldchen, *elliptisch* oder *lanzettl., begrannt-haarspitzig, krautig, mit einem durchscheinenden Rande umgeben, 3nervig, Nerven aderig-ästig; Bthstielchen halb so lang, als der Fruchtkn., gleich, das mittlere kürzer.* ☉. Auf sonnigen, rauhen Hügeln, (vom südl. Tyrol durch das südl. Krain bis Fiume; im Wallis zweifelhaft.) Jul. Aug. Rb. ic. t. 311. *B. Odontites* D. fl. 2. p. 427. L. spec. nach den Synonymen. *Odontites luteola* Spreng. bei R. und S., nicht Hoffm. Var.:

β. *nanum*, der St. 2-3 Zoll hoch, ästig, sperrig. D.

B. Odontites DC. prodr., Bertol. fl. ital., untersch. sich von *B. aristatum*; die Hüllchen sind nur an dem Mittelnerv aderig-ästig, und nur die Nerven und Adern sind krautig-berandet, ausserdem ist das ganze Hüllchen weiss und dchscheinend; die *Bthstielchen* sind viel länger.

.. Dauernde.

7. *B. FALCATUM* (L.) Sichelblättriges H. — Der St. ästig; *B. 5-7nervig*, zw. den Nerven aderig, *die untern elliptisch oder länglich*, in den Bstiel verschmälert, *die obern lanzettl., an beiden Enden spitz, sitzend; Hüllchen lanzettl., haarspitzig; Bthstielchen ungefähr von der Länge der Frucht*; Riefen schmal-geflügelt, Thälchen flach, 3striemig. 4. Auf Hügeln und trocknen Bergen, an steinigen O. Aug.-Oktb. J. a. t. 158.

8. *B. EXALTATUM* (M. Bieberst. fl. casp. p. 166. app. n. 30.) Hohes H. — Der St. locker-rispig; *WB. lanzettf.-lineal.*, in den Bstiel verschmälert, *die oberen lineal.*, nach der Basis zu schmaler, *sämmtlich spitzig, 5nervig, zw. den Nerven aderig*; die Dolden 5-10strahlig; *die Hüllblättchen lanzettl., zugespitzt, und so wie die Früchte fast so lang, als die Bthstielchen*; die Riefen schmal-geflügelt, die Thälchen flach, 3striemig. 4. Auf dem Berge Slavnik und anderen Bergen des Littorale (Tommasin.) Jul. Aug. *B. baldense* M. Bieberst. fl. taur. cauc., D. fl. Am nächsten verwandt mit *Bupleurum falcatum*, hat aber viel schmalere und am St. lineale *B.* Aehnlich auch dem *Bupl. scorzonrifolium* Willd., das in Sibirien wächst, aber dieses untersch. sich von *B. exaltatum* sowohl, als von *B. falcatum* dch die Blätter, welche zw. den 7 stärkeren Nerven mit 6 schwächeren dchzogen sind. D.

9. *B. RANUNCULOIDES* (L.) Ranunkelblüthiges H. — Der St. einfach oder ästig; *B. nervig*, die wurzelst. lineal.-lanzettl., od. lineal., zugespitzt, nach der Basis verschmälert, die stengelst. aus herz- oder eyf. stengelumfassender Basis verschmälert-spitz; Hülle meist 3blättrig; *Hüllblättchen elliptisch*, zugespitzt, länger, als die Döldchen; Riefen geflügelt, Thälchen Istriemig. 4. Auf höhern Triften der A., (Schw., Tyrol, Algau, Salzbg, Krain.) Jul. Aug. *B. angulosum* Spreng. Var.:

α. humifus, der St. einfach: *B. ranunculoides* Rb. ic. 9. f. 1107. 1108., die Hüllchen noch 1mal so lang, als die Döldchen; *B. angulosum* Rb. ic. 9. f. 1102., die Hüllchen nur ein wenig länger, als die Döldchen.

β. elatius, der St. höher, ästig: *B. caricifolium* Willd., *B. schmaler*; *B. gramineum* Vill., Dolden spärlicher; *B. Burserianum* Schleich., *B. verlängert*, aber breiter.

γ. caricinum (DC. prodr. var. *β.*) WB. sehr schmal, kaum breiter, als eine halbe Linie; *B. caricifolium* Rb. ic. 9. f. 1109. 1110.

10. *B. GRAMINIFOLIUM* (Vahl.) Grasblättriges H. — Der St. einfach, nackt, oberwärts 1blättrig; WB. lineal., zugespitzt, nervig, das stengelst. lanzettl.; Hülle meist 5blättrig; *Hüllblättchen elliptisch*, zugespitzt, länger, als die Döldchen, frei; Riefen . . . 4. In Felsenspalten und an steinigem O., (Krain; in Oberkärnthen.) Jul. Aug. Rb. ic. 9. f. 1106. *B. petraeum* Wulf. — *B. petraeum* Rb. ic. 9. f. 1105., das nach Rb. ober Bex in Wallis wächst, sah ich noch nicht. *Sedum petraeum* Ponae bei Clus. gehört zu *B. graminifolium*.

11. *B. STELLATUM* (L.) Sternblüthiges H. — Der St. einfach, nackt, oberwärts 1blättrig; WB. lineal.-lanzettl., nach der Basis verschmälert, netzig-aderig; *Hüllblättchen* verkehrteyf., kurz-zugespitzt, von der Basis an bis zur Mitte zsgewachsen, länger, als die Döldchen; Riefen häutig-geflegt, Thälchen Istriemig. 4. An felsigen O. der A., (auf den höhern A. der Schw.; Tyrol; Krain.) Jul. Aug. Rb. ic. 9. f. 1103.

12. *B. LONGIFOLIUM* (L.) Langblättriges H. — Der St. einfach, oberwärts etwas ästig; *B. eyf.* oder eyf.-länglich, die untern in den Bstiel verschmälert, die obern sitzend, mit tief-herzf. Basis stengelumfassend; Hüllchen elliptisch, kurz zugespitzt, so lang, als die Döldchen; Riefen fädlich, geschärft, Thälchen 3striemig. 4. An waldigen, gebirgigen O. und in den VorA., nicht in die A. hinaufsteigend, (Schw., Vogesen, Jura, Oberbaden und dch Württemberg bis nach Oestr.; von da nach Mähr., Schles., Böhmen, Sachsen, Thüringen und Hannover; und noch hin und wieder in D. zerstreut.) Jul. Aug.

c. B. durchwachsen.

13. *B. PROTRACTUM* (Link. und Hoffm.) Ausgebreitetes H. — Der St. von der Basis an ästig; *B. eyf.*, durchwachsen, die untern eyf.-länglich, stengelumfassend, die untersten nach der Basis verschmälert; Hüllchen eyf., zugespitzt; Riefen fädlich, Thälchen

bekörnt, striemenlos. ☉. Unter der Saat, (im Littor. bei Triest, in Istrien und bei Fiume.) Jun. Jul. Rb. ic. f. 1112-13. B. subovatum Link. bei Spreng. *Hüllchen immer abstehend*. D.

14. B. ROTUNDIFOLIUM (L.) Rundblättriges H. — Der St. oberwärts ästig; B. eyf., *durchwachsen*, die untern nach der Basis verschmälert, stengelumfassend; Hüllchen eyf., zugespitzt; Riefen fädlich, *Thälchen gerillt*, striemenlos. ☉. Unter der Saat, auf Letten- und Kalkboden. Jun. Jul. St. h. 5. B. perfoliatum Lam. *Hüllblättchen nach dem Verblühen aufrecht-zsneigend*.

IV. Gruppe. SESELINEEN. Koch. umb. p. 102. *Frucht auf dem Querdurchschnitt stielrund oder ziemlich stielrund. Früchtchen mit 5 fädlichen oder geflügelten Riefen*; die seitenst. randend, *gleich oder ein wenig breiter*. Eyweiss auf der Rücken-seite konvex und auf der Fugenseite flach oder fast stielrund. Fugennath randst. oder fast randst. Dolde vollkommen.

22. OENANTHE (L.) Rebendolde. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht walzlich, fast kreiself. oder länglich, mit den aufrechten, langen Gfn gekrönt. Früchtchen mit 5, ziemlich konvexen, stumpfen Riefen; die seitenst. randend, ein wenig breiter, Thälchen Istriemig. Fruchthalter nicht bemerklich. Eyweiss konvex, oder fast stielrund.

1. Rotte. OENANTHAE VERAЕ. W. büschelig, mit mehr oder weniger knollig-verdickten Fasern.

1. OE. FISTULOSA (L.) Röhrlige R. — W. büschelig, Fasern rübenf., länglich oder fädlich; der St. ausläufertreibend; StB. gefiedert, *kürzer, als der röhrlige Bstiel*; Blättchen lineal., einfach und 3sp.; WB. 2-3fach-gefiedert; Hauptdolde 2-3strahlig, fruchtbar, die übrigen 3-7 strahlig, fehlschlagend; Früchte kreiself.; Riefen zsgewachsen, die Thälchen verdeckend. 4. Auf sumpfigen Wiesen, in Gräben, stehenden Wassern, (stellenweise dch das g. Gebiet.) Jun. Jul. Schk. t. 70. B. der Ausläufer einfach-gefiedert, Fieder eyf., 3sp.; die wurzelst. B. doppeltgefiedert, Fiederchen eben so beschaffen. Var.:

β. *Tabernaemontani*; WB. meist 3fach gefiedert, nämlich die Fiederchen vielsp., Zpfl lineal.: Oe. *Tabernaemontani* Gmel., das Syn. Pollich's ausgeschlossen.

2. OE. LACHENALII (Gmel.) Lachenal's-R. — W. büschelig, Fasern fleischig, *fädlich oder verlängert-keulig*; WB. doppeltgefiedert, Blättchen eyf. oder keulig, eingeschnitten-stumpf-gekerbt; die untern StB. doppelt-, die obern einfachgefiedert, Zpfl lineal., spitz; *Früchte länglich, nach der Basis verschmälert, unter dem K. zsggezogen*; Blb. strahlend, rundlich-verkehrtherzf., *bis zur Mitte gespalten*. 4. Auf sumpfigen Wiesen, feuchten Triften, (in der westl. Schweiz, von Basel auf der Rheinfläche bis Mainz; von Holstein dch Mecklenbg bis Pommern.) Jun. Jul. Oe. *pimpinelloides* Pollich. Oe. *rhenana* DC. Oe. *megapolitana* Willd. Oe. *michefeldensis* Lachen. Oe. *gymnorhiza* Brign. Hülle oft viel-

blättrig, doch bisweilen auch fehlend. Gf. kürzer, als bei den verwandten Arten. Frucht an der Basis ohne schwieligen Ring. Var.:

β . *approximata*, WB. einfach gefiedert, Blättchen 3sp., stumpf, an der Basis keilig: Oe. *approximata* Mer. DC. Eigentlich kleine Expl., kaum Variet.

3. OE. PEUCEDANIFOLIA (Pollich.) Haarstrangblättrige R. — W. büschelig, *Fasern rübenf., oval oder länglich, sitzend*; WB. doppeltgefiedert, die obere StB. gefiedert, Zpfl aller B. lineal., die der wurzelst. kürzer; *Früchte länglich, nach der Basis verschmälert, unter dem K. gezogen*; Blb. strahlend, verkehrt-herzf., an der Basis keilig. $\frac{1}{3}$ gespalten. 4. Auf fruchtbaren Wiesen, (zerstreut in der Schw. u. d. Rheingegenden; in Hessen u. Thüringen, Württemberg.) Jun. Jul. Oe. *Pollichii* Gmel. Oe. *filipenduloides* Thuill. Unterscheidet sich von der vorübergehenden doch die strahlenden, noch 1mal so grossen, in einen längern Nagel verschmälerten, nur $\frac{1}{2}$ ihrer Länge gespaltenen Blb. sogleich.

4. OE. SILAIFOLIA (Bieberst.) Silanblättrige R. — W. büschelig, *Fasern länglich oder verlängert-keulig*; B. 3- und doppeltgefiedert, Zpfl fast gleichf., die der untern lanzettl., die der obere lineal.; *Früchte walzlich, an der Basis mit einer Schiele umgeben*. 4. An feuchten und sumpfigen O., (bei Laibach häufig! Pola in Istr., Tommasini.) Jun. Jul. Oe. *virgata hortorum* bot., nicht Poiret. Oe. *prolifera* Host., nicht L. Kann schon in der Blüthezeit, auch wenn die Früchte fehlen, durch die um die Hälfte kürzern Zpfl der oberen B. von Oe. *Lachenalii* unterschieden werden. D.

5. OE. PIMPINELLOIDES (L.) Biebernellartige R. — W. büschelig, *Fasern fädlich, an ihrem Ende in eine fast kugelige oder eyf. Knolle verdickt*; B. doppeltgefiedert; Blättchen der untern eyf., an der Basis keilig, fiedersp.-geschnitten, Zpfl spitz, die der ersten WB. eyf., eingeschnitten-stumpf-gekerbt, die der oberen StB. lineal., ungeth.; *Früchte walzlich, an der Basis mit einer Schiele umgeben*. 4. Auf nassen Wiesen, (im Littorale bei Triest und Fiume und in Unteröstr.) Jun. Jul. J. a. t. 394. Oe. *chaerophylloides* Pourr. Oe. *pimpinelloides* a. *chaerophylloides* DC. Diese trägt kugelige oder längliche, an einem langen Faden hängende Knollen. Var.:

β . *rapacea*, Knollen kürzer-gestielt, ey-rübenf.: Oe. *pimpinelloides* β . *pimpinellaefolia* DC. Oe. *virgata* Poir. Diese sah ich nur kultiv. D.

II. Rotte. PHELLANDRIUM. W. spindelig, faserig.

6. OE. PHELLANDRIUM (Lam.) Fenchelsanige R. — W. *spindelig*; Fasern fädlich, an den Gelenken quirlig; der St. sehr ästig; Aeste ausgesperrt; B. doppelt- und 3fach-gefiedert; Blättchen spreizend, eyf.-fiedersp.-eingeschnitten, die untergetauchten vielsp.; Zpfl. haardünn; Dolden den B. gegenst.; Früchte eyf.-länglich. 4? Denn die W. treibt oft kriechende Ausläufer, die in das nächste Jahr hinein dauern; vielleicht wird die Art durch Aus-

läufer fortgepflanzt, indem die Hauptwurzel mit dem St. jährlich abstirbt, wie bei den Menthen. In Gräben und Bächen der Ebenen. Jul. Aug. Schk t. 71. *Phellandrium aquaticum* L.

23. *AETHUSA* (L., mit Ausschl. von Arten.) Gleisse. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht eyf.-kugelig. Früchtchen mit 5 erhabenen, dicken, spitz-gekielten Riefen, die seitenst. randend und ein wenig breiter, mit einem etwas flügelig. Kiel umgeben. Thälchen Istrienig. Eyweiss halbkugelig. Fruchthalter 2th.

1. *AE. CYNAPUM* (L.) Garten-G. — *Hüllblättchen* 3st., länger, als die *Döldchen*; die äussern fruchttrag. Bthstielen noch Imal so lang, als die Frucht; Striemen der Fuge an der Basis etwas auseinanderstehend. ☉. An kultiv. O., auf Schutthaufen. Jun.-Herbst. Hayn. arzg. I. t. 35. Var.:

β. *pygmaea*, 1, 2-3 Zoll hoch: *Ae. Cynapium* β. D. fl. 2. p. 418. *Ae. Cynapium* β. *agrestis* Wallr. Bei sehr kleinen Expl. sind die äussern fruchttrag. Bthstielen oft nicht länger, als die Frucht, wie bei der folg. Art. Kommt auch an einem und demselben Stand O. höher vor. Die winzige Form mit stumpfen Abschnitten der B.: *Ae. segatalis* von Bönningh.

AE. CYNAPIOIDES (MBieb.) Wald-G. — *Hüllblättchen* 3st., so lang, als die *Döldchen*; die äussern fruchttrag. Bthstielen von der Länge der Frucht; Striemen der Fugen sich an der Basis berührend. ☉. An Wegen und in Wäldern, (in Unteröstr., Böhmen.) Jun.-Aug. D.

24. *FOENÍCULUM* (Hoffm.) Fenchel. — Rand des K. gedunsen, verwischt. Blb. rundlich, ganz, einwärtsgerollt; Läppchen fast 4eckig, gestutzt. Frucht auf dem Querdurchschnitt fast stielrund. Früchtchen mit 5 hervorspringenden, stumpf-gekielten Riefen. Thälchen Istrienig, seltner 3strienig. Fruchthalter 2th. Eyweiss fast halbstielrund. — Unterscheidet sich von *Bupleurum* dch die fast stielrunde Frucht und den kegelf. Stempelpolster.

1. *F. OFFICINALE* (All.) Gemeiner F. — Der St. an der Basis stielrund; Zpfl der B. lineal.-pfriemlich, verlängert; Dolden 13-20 strahlig, Hülle fehlend. ☉. Auf Felsen am Adriat. Meere und auf steinigen Hügeln, (im Littor., Untersteyern., der südl. Schw., dem Oberelsass.) Jul. Aug. F. vulgare Gärtn. M. und K. d. fl. 2. p. 420. DC. *Anethum Foeniculum* L. Hayne arzg. 7. t. 18. *Meum Foeniculum* Spreng. Bth. gelb.

25. *SĚSELI* (L.) Sesel. — Rand des K. 5zählig, Zähne kurz, dicklich. Blb. verkehrteyf., in ein einwärtsgebogenes Läppchen verschmälert, ausgerandet oder fast ganz. Frucht oval oder länglich, auf dem Querdurchschnitt fast stielrund, mit den rückwärtsgebogenen Gfn gekrönt. Früchtchen mit 5, hervorspringenden, oder erhabenen, dicken und rindigen Riefen; die seitenst. randend und oft ein wenig breiter. Thälchen Istrienig, seltner 2-3strienig.

Fruchträger 2th. Eyweiss fast halbstielrund. — Die Bth. unserer Arten weiss, auf der Aussenseite oft röthlich.

Ich gestehe zwar gerne zu, dass, wie von Cesati behauptet, zw. den Gattungen Seseli, Libanotis und Athamanta sich keine strengen Grenzen ziehen lassen, doch wollte ich in einer Spezialfl. die Namen nicht von Neuem umändern.

I. Rotte. HIPPOMARATHRUM DC. prodr. 4. 144. Hüllchen fast bis zur Spitze zsgewachsen.

1. S. HIPPOMARATHRUM (L.) Pferde-S. — Der St. oberwärts ästig; B. 3fachgefiedert, im Umriss länglich-eyf., Zpfl lineal.; Dolden 9-12strahlig; Strahlen kantig, einwärts nebst den jüngern Früchten fläumlich; *Hüllchen zsgewachsen-1blättrig, beckenf., gezähnt.* 4. An rauen, felsigen O., in Felsenspalten, (Krain, Oestr., Böhmen; in Thüringen bei Halle; im Rheingebiete, nämlich im Nahethale bei Kreuznach und am Kaiserstuhle im Oberbadischen.) Jul. Aug. J. a. t. 143. S. articulatum Crantz. Hippomarathrum pelviforme Fl. wett. B. meergrün. Hr. Stdpfr. Lang zu Mühlheim fand auf dem Kaiserstuhl eine Variet. mit verlängerten und sehr dünnen Zpfln der dunkelgrünen B. D.

II. EUSESELI DC. prodr. 4. 145. Hüllchen frei.

2. S. GOUANI (Koch.) Gouan's-S. — Der St. von der Basis an ästig, gesperrt; WB. 3mal-3zählig-zsgesetzt und doppelt-zsgesetzt, im Umriss 3eckig; Blättchen schmal und fast 3eckig lineal., mit stielrundem Bstiel; Dolden 3-6strahlig; Strahlen fast stielrund, kahl; Hüllblättchen pfriemlich, sehr schmal-häutig-berandet, zur Blüthezeit so lang, als die Bthstielen; die jüngern Früchte runzelig-fläumlich, die ältern kahl; *Thälchen 3rillig, 3striemig.* ☉. An felsigen O. der Kalkgebirge, (von Görz bis Fiume, Tommas.) Aug. Sept. S. elatum Gouan. ill. 16. t. 8., zu plump. Im Garten wurde sie sehr ästig und fast 3 Fuss hoch. Nach Bertolon. Bemerkung in der Fl. ital. ist diese Art im Linneischen Herbarium unter dem Namen Seseli elatum aufbewahrt, aber die Worte Linne's passen nicht dazu.

3. S. GLAUCUM (J. a. t. 44.) Meergrüner S. — Der St. ästig; WB. 5zählig-3fachgefiedert, im Umriss 3eckig; Blättchen lanzettl.-lineal. und lineal.; *Bstiel stielrund oder von der Seite zsgedrückt; Dolden 10-15strahlig; Strahlen fast stielrund, kahl; Hüllblättchen pfriemlich, sehr schmal-häutig berandet, zur Blüthezeit halb so lang, als die Bthstielen; die jüngern Früchte runzelig, kurz-kreisel-eyf., die reifen kahl oder fein-fläumlich; Thälchen 1rillig, 1striemig.* ☉. Auf kräuterreichen Hügeln und an gebirgigen, waldigen O., (Oestr., Mähren, Böhmen, Steyer.; in Kärnthen auf dem Loibel.) Jul. Aug. S. osseum Crantz. S. montanum β. glaucum DC. S. elatum L., nach Reichenb's Ansicht; aber der St. der auch auf fruchtbarem Boden kultiv. Pflanze ist niemals über 3 Fuss und nie mannshoch. Das Seseli glaucum L. „mit stützenden häutigen Bstielen“ kenne ich nicht. D.

4. S. VARIUM (Trevir.) Bunter S. — Der St. ästig; WB. 3zählig-3fachgefiedert, im Umriss 3eckig, Zpfl lineal.; *Bstiel oberseits*

rinnig; Dolden 15-25strahlig; Strahlen fast stielrund und nebst dem längl. Fruchtkn. kahl; Hüllblättchen lanzettl.- zugespitzt, häutig-berandet, zur Bthezeit halb so lang, als die Bthstielchen; die reifen Früchte lineal.-länglich; Thälchen 1rillig, 1striemig. ☉. An trocknen, steinigen O., (in Unteröstr.) Strahlen der Dolde noch 1 mal so lang, als bei *S. glaucum*; Kelchzähnen sehr klein. D.

5. *S. MONTANUM* (L.) Berg-S. — Der St. einfach-ästig; die W.- und untern StB. 3fachgefiedert, im Umriss länglich-eyf., Zpfl lineal.; Bstiel oberseits rinnig; Dolden 6-12strahlig; Strahlen fast gleich, kantig, einwärts nebst den jüngern Früchten fläumlich; Hüllblättchen lanzettl., sehr schmal-häutig-berandet, so lang, als die Bthstielchen oder Döldchen. 4. Auf Kalkgebirgen, (Schw. an dem Jura, zweifelhaft auf dem Wasserfall bei Basel; Elsass bei Wasslesheim und bei Mümpelgard; Istrien auf dem monte Maggiore.) Jul. Aug. *S. multicaule* J. h. vind. t. 129.

6. *S. TORTUOSUM* (L.) Gewundener S. — Der St. ästig, spreitzend; die W.- und StB. 3zählig-3fachgefiedert, im Umriss 3eckig, Zpfl lineal.; Bstiel oberseits rinnig; Dolden 6-10strahlig; Strahlen scharf-kantig, einwärtsfläumlich; Hülle 1-3blättrig, Hüllblättchen lanzettl., zugespitzt, breit-häutig-berandet, zur Blüthezeit so lang, als die Döldchen; Früchte flaumig-rauh. 4. An sonnigen, felsigen O., (im südlichen Istrien; zw. Triest und Fiume.) Jul. Aug. J.

7. *S. COLORATUM* (Ehrh.) Gefärbter S. — Der St. einfach-ästig; die W.- und untern StB. dreifach-gefiedert, im Umriss länglich-eyf., Zpfl lineal.; Bstiel oberseits rinnig; Hauptdolde 20-30strahlig, Strahlen kantig, fast gleich, einwärts nebst den jüngern Früchten fläumlich; Hülle fehlend; Hüllchen lanzettl., zugespitzt, breit-häutig-berandet, länger, als die Döldchen. ☉. oder 4. Auf kräuterreichen Hügeln und in Bergwäldern, (stellenweise dch das g. Gebiet.) Jul. Aug. *S. annuum* L. M. und K. d. fl. 2. p. 410. J. a. t. 35. *S. tortuosum* Pollich. *S. bienne* Crantz.

26. *LIBANOTIS* (Crantz.) Heilwurz. — Zähne des K. pfriemlich, verlängert, abfällig; sonst alles, wie bei *Seseli*, DC. — Eine mehr dem Habitus, als den Merkmalen nach von *Seseli* verschiedene Gattung.

1. *L. MONTANA* (Allioni.) Berg-H. — B. doppelt- u. dreifach-gefiedert; Blättchen fiedersp.-eingeschnitten, Zpfl lanzettl., stachelspitzig, die untersten Paare der Blättchen an der Mittelrippe kreuzst.; die allgemeine Hülle reichblättrig; der St. kantig-gefurcht; Früchte kurz. ☉. Auf Hügeln unter Gesträuch, an gebirgigen, waldigen O.; in die A. hinaufsteigend, (stellenweise dch das g. Gebiet.) Jul. Aug. *Libanotis vulgaris* DC. *L. daucoides* Scop. *L. athamantica* Fl. wett. *Athamanta Libanotis* L. J. a. t. 392. *Seseli Libanotis* Koch d. fl. 2. p. 411. Seltner die untersten Paare der Blättchen von der Mittelrippe entfernt: *L. Riviniana* Scop., öfters sind sie sehr zerschnitten: *L. vulgaris* γ. dau-

cifolia DC. Crithmum pyrenaicum L. Athamanta pyrenaica J. h. v. 2. t. 197. Var.:

β. minor, 1 Fuss hoch, der St. flaumig. B. weniger-zugesetzt; L. vulgaris *β. pubescens* DC. Seseli Libanotis *β. pubescens* D. fl. 2. p. 412. Athamanta pubescens Retz.

2. L. ATHAMANTOIDES (DC.) Kahlfrüchtige H. — B. 3fach-gefiedert; Blättchen fiedersp.-eingeschnitten, Zpfl lanzettl., stachelspitzig, die untersten Paare der Blättchen an der Mittelrippe kreuzst.; die allgemeine Hülle reichblättrig; der St. kantig-gefurcht; Früchte kahl. ☉. Auf Gebirgen und in den VorA., (Krain.) Jul. Aug. Seseli Libanotis *β.* D. fl. 2. p. 412. Kommt mit eingeschnittenen Hüllblättchen vor: Ammi daucifolium Scop., nach Illadnik und der Beschreibung Scopoli's Ligusticum athamantoides Spreng. Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, und nur doch die kahlen Früchte verschieden; etwa eine Varietät? D.

3. L. SIBIRICA. Grobgezähnte L. — B. gefiedert; Fieder grob-eingeschnitten-gezähnt, an der Basis fiedersp. und gezähnt, Zähne eyf., zugespitzt; die allgemeine Hülle reichblättrig oder fehlend; der St. kantig-gefurcht; Früchte kurz. ☉. An waldigen O., (in Preussen, bei Danzig.) Jul. Aug. L. vulgaris *ε. sibirica* DC. Seseli Libanotis *δ.* D. fl. 2. p. 412. S. athamantoides C. A. Meyer. in d. fl. altaic. Athamantha sibirica L. Gmel. B.

27. CNIDIUM (Cusson.) Brenndolde. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Lappchen. Frucht auf dem Querdurchschnitte fast stielrund. Früchtchen mit 5 gleichen, fast häutig-geflügelten Riefen; die seitenst. randend. Thälchen l. striemig. Fruchthalter frei. Eyweiss auf der Fugenseite flach. Grenzt zunächst an die Gattung Seseli, bei der aber die Striemen entweder flügellos oder in einen dicken, rindigen Flügel erhöht sind. — Bth. weiss.

1. C. MONNIERI (Cusson.) Französische B. — Der St. ästig, kantig; B. doppeltgefiedert; Blättchen fiederth., Zpfl lineal.-lanzettl. oder lineal., kurz-bespitzt; Scheiden locker; Hüllblättchen borstlich, borstig-rauh, so lang und länger, als die Döldchen. ☉. In Hecken und im Gebüsch, (bei Görz; im wärmern Krain.) Jul. Aug. C. confertum Moench. Selinum Monnierii L. J. h. vind. 1. t. 62. D.

2. C. APIOIDES (Spreng.) Silaublättrige B. — Der St. ästig, gerillt; B. 3fachgefiedert; Blättchen fiederth., Zpfl lineal.-lanzettl., stachelspitzig; Scheiden locker; Hüllblättchen borstlich, kahl, so lang, als die Bthstielchen. 4. An gebirgigen, felsigen O., (Fiume, im wärmern Krain und im Littor., Veldlin, C. Tessin.) Jul. Aug. Ligusticum apioides Lam. L. cicutae-folium Vill. Laserpitium silaifolium J. a. app. t. 44. D.

3. C. VENOSUM (Koch.) Aderige B. — Der St. gerillt, einfach oder oberwärts mit einfachen Aesten; B. doppeltgefiedert, Zpfl lineal. oder lanzettl.-lineal., kurz-bespitzt, ungeth. oder 2- und 3sp.;

Scheiden verlängert, die obern straff-anliegend; Hüllblättchen pfriemlich, kahl, so lang, als die Döldchen. 2. nach Fries. Auf Wiesen und in feuchten Wäldern, (in Holstein und von da dch Mecklenb., Hannover, Pommern nach Preussen, die Neumark und Schlesien; bei Halle, auf der Rheinfläche zw. Speier und Mutterstadt, im Jura.) Jul. Aug. C. palustre Rb. *Selinum sylvestre* L. spec., sowie Fries nov. und Nolte nov. *Seseli saxifragum* Scholl. *S. annuum* Ehrh. *S. dubium* Schk. I. 217. *S. venosum* Hoffm. *Selinum lineare* Schum. *S. pratense* Spreng. — Nach Nolte das wahre *Selinum sylvestre* L. D.

28. **TROCHISCANTHES** (Koch.) Rädchenblüthe. — Rand des K. 5zählig. Blb. lang-benagelt, spatelig-verkehrteyf., mit einem 3eckigen einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht ein klein wenig von der Seite zsgedrückt. Früchtchen mit 5 scharfen, etwas geflügelten, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen 3-4striemig. Fruchthalter 2th. Eyweiss fast halbstielrund. Bth. weiss.

1. *T. NODIFLORUS* (Koch.) Knotenblüthige R. — 2. An waldigen, rauhen O., im untern Wallis, über Port-Valais und Epenassuy zw. St. Morizen und Martinach.) Jun.-Aug. *Ligusticum nodiflorum* Vill. *Smyrnium nodiflorum* All. *Angelica paniculata* Lam — *Laserpitium verticillatum* WK. t. 171. stellt eine ganz andere Pflanze dar. S.

29. **ATHAMANTA** (Koch. Arten von *Athamanta* und *Bubon* bei L.) Augenwurz. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen, sehr kurz benagelt. Frucht eyf. oder länglich, auf dem Querdurchschnitt fast stielrund oder von der Seite ein klein wenig zsgedrückt, mit aufrechten oder spreitzenden Gfn bekrönt. Früchtchen mit 5 fädlichen, flügellosen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen 2-3striemig. Fruchthalter 2th. Eyweiss fast halbstielrund. (Bei *A. cretensis* sind die Gf. nicht selten wagerecht-gespreitzt.) Diese Gattung geht dch Mittelformen der Fruchtbildung bei ausländischen Arten in die Gattung *Seseli* über; vergl. die Anmerkung zu jener Gattung.

1. *A. CRETENSIS* (L.) Alpen-A. — Der St. etwas ästig, stielrund, gerillt; B. 3 fachgefiedert, Zpfl lineal., zugespitzt, 2-3sp.; *Dolde* 6-9strahlig; Hüllblättchen längl.-lanzettl., haarspitzig, häutig, mit einem krautigen Rückenstreifen; *Früchte* länglich-lanzettl., in einen Hals verschmälert, *kurzh. von weit abstehenden Haaren*. 2. An felsigen und kiesigen O. in der obern Region der Vora. u. d. untern der Alpen, (dch d. g. AK.) Jun. Jul. J. a. t. 62. *Libanotis cretensis* Scop. B. und Blb. unterseits kurzh. Var. auf den Felsen der niedrigen Regionen:

β. mutellinoides, B. fast kahl: *A. cretensis β. mutellinoides*, DC. *A. cretensis γ. glabra* Gaud, *A. mutellinoides* Lam. *A. rupestris* Vill. nicht Scop.

2. *A. MATTHIOLI* (Wulf. bei J.) Fadenblättrige A. — Der St.

ästig, stielrund, gerillt; B. gefiedert-vielfachzugesetzt, Zpfl fädlich, spreitend; *Dolde 15-25 strahlig*; Hüllblättchen länglich-lanzettl., haarspitzig, häutig, mit einem kantigen Rückenstreifen; *Früchte* länglich-lanzettl., in einen Hals verschmälert, *sammetartig von kurzen, aufrecht-abstehenden Haaren*. ☉. An felsigen O., in Felsenspalten, (Steiermark, Krain, Littor.) Jul. Aug. J. ic. rar. t. 57. *Libanotis rupestris* Scop. *Athamanta rupestris* Rb.? Eine bei Triest, (*A. rupestris* Rb.) und eine bei Görz am Ufer des Isonzo gesammelte Pflanze, (*A. Matthioli* Rb.) die ich der Gefälligkeit des H. Tommasini verdanke, untersch. sich wenigstens nicht. B. kahl; Blb. in der Mitte der Unterseite spärlich-behaart. Hülle sehr veränderlich; Hüllchen bald von der Länge der Bthstielchen, bald kürzer. D.

30. **LIGUSTICUM** (L., mit Ausschl. von Arten.) Liebstock. — Rand des K. 5zählig oder verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen; sehr kurz-benagelt, Frucht auf dem Querdurchschnitte fast stielrund oder von der Seite ein wenig zsgedrückt. Früchtchen mit 5 scharfen, etwas geflügelten, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen vielstriemig. Fruchthälter 2th. Eyweiss halbstielrund.

1. **L. FERULACEUM** (All.) Gartenkrautähnlicher L. — Der St. ästig, gerillt; B. vielfachzugesetzt, Zpfl lineal., zugespitzt-stachelspitzig; *Hüllblättchen an der Spitze fiedersp.* ☉. An sonnigen O. abschüssiger A., (auf dem Thiorv und Saleve im Jura.) Jun. Jul. Bth. weiss. — *Laserpitium dauricum* Jacq. hort. vind. 3. t. 38. gehört sicher nicht hieher, denn die Abbildung, sowie ein in der Sammlung des H. Buek aufbewahrtes Expl. zeigen eine aus lanzettl.-spitzigen und nicht aus an der Spitze fiedersp. Blättchen zsgesetzter Hülle. S.

2. **L. SEGUIERI** (Koch.) Seguiers L. — Der St. stielrund, gerillt, ästig; B. vielfachzugesetzt, Zpfl lineal., zugespitzt-stachelspitzig, am Rande kahl; *Hülle fehlend oder 1-3blättrig*; *Blättchen ungeth.* 4. An gebirgigen O. und in den VorA., (in Krain, im südl. Tyrol; auf dem monte Generosa im C. Tessin.) Jul. Aug. *Selinum Seguieri* L. Sohn. J. h. vind. 1. t. 61. *Imperatoria Seguieri* Spreng. — *L. pyrenaicum* untersch. sich dch: die nur halb so langen oder noch kürzern, nach der Spitze ein wenig breiter und am Rande rauhen Blättchen. — Bth. weiss.

31. **SILAUS** (Bess. bei Röm. und Schult.) Silau. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf.-länglich, in ein einwärtsgebogenes Läppchen verengert, ganz oder etwas ausgerandet, an der Basis mit Anhängseln oder abgeschnitten-sitzend. Sonst alles, wie bei *Ligusticum*.

1. **S. PRATENSIS** (Bess.) Wiesen-S. — Der St. kantig; WB. 3- und 4fachgefiedert, die seitenst. Abschnitte ganz oder 2th., die endst. 3th., Zpfl lineal., stachelspitzig; Hülle 1-2blättrig. 4. Auf fruchtbaren Wiesen. — Jun.-Aug. *Peucedanum Silaus* Spreng.

Seseli selinoides Jacq. enum. Sium Silaus Roth. tent. Bth. bleich-gelb.

32. MEUM (Tournef.) Bärenwurzel. — Rand des K. verwischt. Blb. ganz, elliptisch, an beiden Enden spitz, sonst alles wie bei Ligusticum. Bth. weisslich oder purpurlich.

1. M. ATHAMANTICUM (J. a. t. 303.) Haarblättrige B. — B. doppelt-gefiedert; *Fiederchen fiederth. -vielsp.*, *Zpfl* fast quirlig, *haardünn*, *spitz*. 4. Auf Triften der VorA. und A.; auch auf höhern Bergen, (Vogesen, Schwarzwald, dch die g. AK.; Böhmen, Schlesien, Sachsen, Eifel.) Jul. Aug. Athamanta Meum L. Aethusa Meum Murr. Ligusticum Meum Crantz. L. capillaceum Lam. Seseli Meum Scop.

2. M. MUTELLINA (Gärtn.) Alpen-B. — B. doppeltgefiedert; *Fiederchen fiederth.*, *Zpfl lineal-lanzettl.* und lineal., zugespitzt-stachelspitzig, ungeth. und 2-3sp. 4. Auf Triften der A. und VorA., (dch die g. AK.; im Thale St. Amarin in den Vogesen; auf dem Belchen des Schwarzwaldes; auf den Schles. und Mähr. Gebirgen.) Jul. Aug. Phellandrium Mutellina L. Ligusticum Mutellina Crantz.

33. GAYA (Gaud.) Gaye. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., etwas ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Striemen fehlend. Sonst alles, wie bei Ligusticum. Die bleichen Früchtchen sind oft an der Spitze braungefärbt und auch manchmal in den Thälchen, so dass es scheint, als ob Striemen dch die Thälchen zögen, aber wirkliche Striemen konnte ich doch nicht finden.

1. G. SIMPLEX (Gaud.) Einfache G. — Hüllblättchen 7-10, meist 3sp. 4. Auf Triften der höhern A., (Schw., Tyrol, Salzbg, Kärnthen.) Jul. Aug. DC. Laserpitium simplex All. Pachypleurum simplex Rb. — Die Gattung Pachypleurum Ledeb., in der fl. alt., untersch. sich von Gaya wesentlich und gehört zu einer andern Gruppe.

34. CRITHMUM (L.) Bazille. — Rand des K. verwischt. Blb. rundlich, ganz, einwärtsgerollt, Läppchen verkehrteyf. Frucht auf dem Querdurchschnitte fast stielrund. Früchtchen mit 5 erhabenen, geschärften, etwas geflügelten Riefen; die seitenst. ein wenig breiter, randend. Eyweiss halbstielrund, frei, überall von zahlreichen Striemen bedeckt.

1. C. MARITIMUM (L.) See-B. — Auf steinigem O. am Adriat. Meere; (bei Triest.) Jul. Aug. J. h. vind. t. 187. Cachrys maritima Spreng. D.

35. CONIOSELINUM (Fischer bei Hoffm.) Schirlingssilge. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrtherzf., mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht vom Rücken her etwas zsgedrückt. Früchtchen mit 5 geflügelten Riefen, Flügel gänzlich häutig, die der seitenst. randenden Riefen noch 1mal so breit. Thälchen 2-3stri-

nig. Fruchthalter 2th. Eyweiss auf der Fugenseite flach. — Untersch. sich von *Ligusticum* dch die überall, u. von der Basis an dünnen und häutigen Flügel, von denen die seitenst. noch 1mal so breit, als die rückenst. sind; von *Cnidium* dch dieselben Merkmale und die reichstriemigen Früchtchen; von *Selinum* und *Angelica* dch dieses letzte Merkmal und dch die Früchtchen, die sich mit der ganzen Berührungsfläche decken und nicht bloss mit einem schmalen Kiele zsggefügt sind; von *Angelica* ausserdem dch die verkehrtherzf. Blb.

1. C. FISCHERI (Wimm. und Grab.) 4. Fischer's S. — An gebirgigen, kräuterreichen und schattigen, etwas feuchten O., (auf den Sudeten, auf dem Nesselurlich und dem kleinen Keilig im Gesenke, in einige Grasgärten des Gebirges verpflanzt, Wimmer Fl. von Schlesien; am Wege, der zum Schlosse Windisch-Landsberg führt in Untersteyerm., Unger.) Jul. Aug. 4. C. tataricum Fisch. *Selinum* Gmelini Bray. *Angelica chaerophyllea* Lottermoser. *Ligusticum* Gmelini Cham. und Schlecht. D.

V. Gruppe. *ANGELICEEN*. Koch. umb. p. 98. *Frucht vom Rücken her zsgedrückt, mit einem verbreiterten, geflügelten*, wegen der klaffenden Flügel der Früchtchen *doppelten Rande* umgeben und daher am Rande 2flügelig. *Früchtchen mit 5 geflügelten Riefen oder 3 fädlichen Rückenriefen*; die seitenst. stets in einen Flügel ausgebreitet, der fast noch 1 mal so breit ist, als die rückenst. Eyweiss auf der Fugenseite ziemlich flach. Dolde vollkommen.

36. *LEVISTICUM* (Koch.) Liebstöckel. — Rand des K. verwischt. Blb. einwärtsgekrümmt, rundlich, ganz, mit einem kurzen Läppchen. Frucht vom Rücken her zsgedrückt, dch die am Rande klaffenden Früchtchen beiderseits 2flügelig. Früchtchen mit 5 geflügelten Riefen; Flügel der seitenst. noch 1mal so breit. Thälchen Istriemig. Fruchthalter 2th. Eyweiss auf der Fugenseite ziemlich flach.

1. L. OFFICINALE (Koch.) Gebräuchlicher L. — 4. Wird häufig in den Gärten der Landbewohner kultivirt und gegen Krankheiten des Viehes angewendet; wild nach Lej. auf Hügeln im Lüttichschen, (bei Limburg. Verviers u. and. O.) Jul. Aug. L. vulgare Rb. *Ligusticum Levisticum* L. Hayne arzg. 7. t. 6. *Angelica Levisticum* All. A. *paludapifolia* Lam. Kultiv.

37. *SELINUM* (L. mit Ausschl. von Arten.) Silge. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgehogenen Läppchen. Frucht vom Rücken her zsgedrückt, wegen der mit einem schmalen Kiel zsgefügten Früchtchen am Rande 2flügelig. Früchtchen mit 5 häutig-geflügelten Riefen, die Flügel der seitenst. Riefen noch 1 mal so breit. Thälchen Istriemig, die äussern oft 2striemig. Fruchthalter 2th. Eyweiss auf der Fugenseite ziemlich flach.

1. S. CARVIFOLIA (L.) Kümmelblättrige S. — Der St. gefurchkantig; Strahlen der Dolde kahl. 4. In etwas feuchten Wäldern,

auf Waldwiesen, in Hecken. Jul. Aug. J. a. t. 116. S. membranaceum Vill. S. angulatum Lam. S. Pseudo-carvifolia All. Angelica Carvifolia Spreng. Laserpitium selinoides Scop. Mylinum Carvifolia Gand.

38. **OSTÉRICUM** (Hoffm.) Mutterwurzel. — K. 5 zählig, Zähne eyf. Blb. benagelt, rundlich-verkehrtherzf., mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht von der Seite zsgedrückt, wegen der am Rande klaffenden Früchtchen beiderseits 2 flügelig. Früchtchen mit 3 fädlichen erhabenen Rückenriefen; die 2 seitenst. in einen viel breitem Flügel verbreitert, sämmtlich inwendig röhrig. Thälchen Istriemig, Striemen unter dem Fruchtgehäuse verborgen. Fruchthalter 2th. Eyweiss auf der Fugenseite flach, auf der Rückenseite ziemlich konvex. — Das aus grösseren Zellen gebildete Fruchtgehäuse hängt, beinahe wie bei Pleurospermum, nur mit den Striemen an dem S. an.

1. **O. PALUSTRE** (Bess.) Sumpf-M. — 4. Auf etwas feuchten Wiesen, (in Thüringen, Alperstedt, Dr. Weber; Freudenthal bei Arnstadt, Osswald; bei Erfurt; bei Halle.) Jul. Aug. Rb. ic. 5. f. 588. *O. pratense* Hoffm. DC. prodr. *Imperatoria palustris* Bess. *Selinum odoratum* Bernh. *Angelica pratensis* MB. D.

39. **ANGELICA** (L. mit Ausschl. von Arten, Hoffm.) Angelika. — Rand des K. verwischt; Blb. lanzettl., ganz, zugespitzt, mit gerader oder einwärts-gekrümmter Spitze. Frucht vom Rücken her zsgedrückt, wegen der dch einen schmalen Kiel zsgesfügten Früchtchen beiderseits 2 flügelig. Früchtchen mit 3 fädlichen, erhabenen Rückenriefen; die 2 seitenst. in einen häutigen, breitem Flügel verbreitert. Thälchen Istriemig. Fruchthalter 2th. Eyweiss fast halbstielrund.

1. **A. SYLVESTRIS** (L.) Wald-A. — B. 3fachgefiedert; *Blättchen* ey.- oder lanzettf., *geschärft-gesägt, nicht herablaufend*, das endst. ganz und 3sp., die seitenst. fast sitzend, an der Basis ungleich, und manchmal 2sp. 4. Auf Wiesen, an feuchten O. in Wäldern. Jul. Aug. Schk. t. 68. *Imperatoria sylvestris* DC. fl. fr. *Selinum sylvestre* Crantz. *S. pubescens* Moench.

2. **A. MONTANA** (Schleich.) Berg-A. — B. 3fachgefiedert; *Blättchen* länglich oder lanzettl., *geschärft-gesägt, die obersten an der Basis herablaufend*, das endst. ganz und 3sp., die seitenst. fast sitzend, an der Basis ungleich und manchmal 2sp. 4. Auf Wiesen und an feuchten O. der VorA. Jul. Aug. *A. montana* Gand. DC. prodr. *A. sylvestris* β . *elatior* Wahlenb. M. und K. d. fl. 2. p. 392. *A. Razoulii* All., nicht Gouan. *Imperatoria montana* DC. fl. fr.

3. **A. PYRENAEA** (Spreng.) Pyrenäische A. — WB. doppeltgefiedert; Fiederchen fiederth., *Zpfl lineal.-lanzettl. oder lineal., ganz und 2-3sp.*; Strahlen der Dolde 3-7, ungleich, der St. meist blattlos, einfach, gefurcht. 4. Auf Triften der VorA., (in der centralen Kette der Vogesen von 2500-4000 Fuss in Menge.) Jul.

Ang. *Seseli pyrenaicum* L. *Selinum pyrenaicum* Gouan. S. *Lachenalii* Gmel.

40. **ARCHANGELICA** (Hoffm.) Engelwurzel. — Rand des K. 5zählig. Blb. elliptisch, ganz, zugespitzt, mit einwärtsgekrümmter Spitze. Frucht vom Rücken her etwas zsgedrückt, wegen der am Rande klaffenden Früchtchen beiderseits 2 flügelig. Früchtchen mit dicklichen, gekielten Riefen, die 3 rückenst. erhaben, die 2 seitenst. in einen noch 1 mal so breiten Flügel verbreitert. Eyweiss nicht an dem Fruchtgehäuse hängend, einen freien, überall reichlich mit Striemen bedeckten Kern darstellend. Fruchthalter 2th.

1. **A. OFFICINALIS** (Hoffm.) Gebräuchliche E. — Der St. kahl, stielrund, gerillt; B. doppeltgefiedert; Blättchen ey- oder fast herzf., ungleich-gesägt, das endst. 3-, die seitenst. meist 2 lappig; die obern Bstiele sackartig-aufgeblasen; Dolden mehlig-flaumig. ☉. In Hecken und an sumpfigen O. der norddeutschen Ebenen und an kräuterreichen der südlichen VorA., (längs der Meeresküste von Holstein bis Preussen hin und wieder; auf den Sudeten; im Böhmerwalde; Steyermark und Kärnthen; um Görz; im Veltlin, Jura. Heer.) Jul. Ang. *Angelica Archangelica* L. Hayn. arz. 7. t. 8. *A. sativa* Mill. Blb. grünlich. Die Hüllchen fand ich oft halb so lang, als die Döldchen, bald kahl, bald mit einem fläumlichen Rand. *Angelica littoralis* Fries untersch. sich dch die weisslichen Bth., den härteren, höheren, oberwärts nebst den Dolden flammigen St. und die rauhen Hüllchen. Diese ward in unserer Fl. noch nicht gefunden und ist mir unbekannt.

VI. Gruppe. **PEUCEDANEEN**. DC. prodr. 4. 170. *Selineen* Koch. umb. p. 88. Frucht vom Rücken flach oder linsenf.-zsgedrückt, mit einem verbreiterten, geflügelten, abgeflachten, oder konvexen und verdickten Rande umgeben. Früchtchen mit 5 fädlichen und manchmal sehr dünnen Hauptriefen; die seitenst. dem verbreiterten Rande anliegend oder in denselben verschmelzend; Nebenriefen fehlend. Fugennath randst., daher die Frucht beiderseits 1flügelig. Eyweiss flach oder auf der Rückenseite ziemlich konvex. Dolde vollkommen.

41. **FERULAGO** (Koch.) Birkwurzel. — Rand des K. 5zählig. Blb. rundlich, ganz, mit einem kurzen, einwärtsgebogenen Lappchen; Frucht vom Rücken her flach zsgedrückt, mit einem verbreiterten, abgeflachten Rande umgeben. Früchtchen mit 3 rückenst., stumpfen und 2 seitenst., in den verbreiterten Rand verlaufenden, verwischten Riefen. Eyweiss flach, überall von sehr zahlreichen, 30-60, Striemen bedeckt; die rückenst. mit dem Fruchtgehäuse bedeckt, die auf der Berührungsfläche oberflächlich. — Eine gute Gattung nach meiner Ansicht, dch wesentliche Merkmale, auch dch den Habitus von *Fernla* verschieden.

1. **F. GALBANIFERA** (Koch.) Harzige B. — Der St. gerillt, etwas kantig; B. vielfachzsgesetzt, im Umrisse eyf; Zpfl lineal., haarspitzig, an den Hauptrippen kreuzst.; Blättchen der Hülle und Hüllchen lineal.-länglich, zugespitzt; die Gf. der Frucht bogig-

zurückgelegt, ein wenig länger, als der Rand des Stempelpolsters. 4. Auf unfruchtbaren Wiesen und an felsigen, rauhen O., (im wärmern Krain und im Littor, bei Triest, Fiume.) Jun. Jul. *Ferulago nodiflora* Koch. D. fl. 2. p. 388. *Ferula Ferulago* L. DC. *F. nodiflora* J. a. t. 5., ganz genau die hier aufgestellte Art. *F. galbaniflora* Lobel. Früchte gross, ansehnlich, 7-9 Linien lang. — Da die *Ferula nodiflora* L. und die *F. nodiflora* Jacq. zwei verschiedene Arten ausmachen, und der Linneische Namen vorangestellt werden müsste, so wählte ich anstatt des Namens *Ferula nodiflora* Jacq. den aus Lobelius entnommenen *F. galbanifera*. Meine *Ferulago nodiflora* zieht DC. zu *Ferula sulcata* Desf., die ich zwar noch nicht sah, welche aber, wie aus der schönen Abbildung in der Fl. atlant. t. 67. erhellt, eine andere Art darstellt. — *Ferula campestris* Bess., die ich vom Autor selbst erhielt, *F. sulcata* β. DC. untersch. sich dch. folg.: Zpfl. der B. halb so lang, rinnig; Hüllen und Hüllchen stumpf; Früchte halb so gross und die Gf. der Frucht an das Stempelpolster fest-angedrückt und dessen Rand nicht erreichend. D.

42. PEUCÉDANUM (L. Koch.) Haarstrang. — Rand des K. 5zählig und manchmal verwischt. Blb. verkehrtherzf., in ein einwärtsgebogenes Lappchen verengert, ausgerandet oder fast ganz. Frucht vom Rücken her flach oder linsenf.-zsgedrückt, mit einem verbreiterten, abgeflachten Rande umzogen. Fruchtschen mit fast gleich weit entfernten Riefen, die 3 mittlern fädlich, die 2 seitenst. schwächer, dem verbreiterten Rand anliegend oder in denselben verfließend. S. auf der Fugenseite flach. Thälchen 1striemig; Striemen auf der Berührungsfläche oberflächlich. Fruchthalter 2th.

Die Gattung *Thysselinum* habe ich nun von *Peucedanum* getrennt, da man sie dch. die verdeckten fugenst. Striemen unterscheiden kann; jedoch zw. *Peucedanum*, *Cervaria*, *Oreoselinum* und *Selinum* Gaud. (*Pteroselinum* Rb.) konnte ich bisher weder bestimmte Grenzen, noch deutlich unterscheidende Merkmale finden.

I. Rotte. PEUCEDANA LEGITIMA Koch. Rand der Früchtschen weniger vertheilt. Die allgemeine Hülle fehlend oder arnblättrig.

1. P. OFFICINALE (L.) Gemeiner H. — Der St. stielrund, gerillt; B. 5mal-3fach zsgesetzt; Blättchen lineal., an der Basis und Spitze verschmälert, ungeth., die endst. 3zählig; die allgemeine Hülle meist 3blättrig, abfällig; Bthstielchen 2- oder 3mal so lang, als die Frucht; Strahlen der Dolde kahl. 4. Auf fruchtbaren Wiesen, (im Rheinthale von der Schw. bis Mainz; im Mainthale bei Frankft. Würzburg und Werthheim; zerstreut in Steyermark bei Barbi, in Holstein, bei Danzig, Ingolstadt, Regensburg.) Jul. Aug. Schk. t. 63. *Selinum Peucedanum* Wigg. Bth. gelb. D.

2. P. PARISIENSE (DC.) Pariser-H. — Der St. stielrund, gerillt; B. 3- od. 4mal-3fachzsgesetzt; Blättchen lineal-lanzettl., an der Basis u. Spitze verschmälert, ungeth., die endst. 3zählig; die allgemeine Hülle arnblättrig, abfällig; Bthstielchen so lang als die Frucht; Strahlen der Dolde auf der innern Seite fläuml. chrauh. 4. Auf Wiesen, (um Triest; auf d. monte Magg.) Jul.

Aug. *P. officinale* Thuill., nicht *L. P. gallicum* Pers. *Bth. weiss*, Bthstielchen nebst den jüngern Früchten grün. Das sehr ähnliche *P. ruthenicum* hat gelbe Bth. u. auch die Bthstielchen u. jüngern Früchte sind bei ihm gelblich, d. Strahlen d. Dolde kahl, d. Bthstielchen dünner. Bertoloni hat in seiner Fl. ital. unsere Pfl irrthümlich zu *Peucedanum Petteri* gebracht. Die Aeste unserer Pfl sind aufrecht, die B. aus 36-46 Blättchen zsgesetzt, die Früchte kleiner u. mit einem nochmal so breiten Flügel versehen als bei jener, deren Blätter höchstens aus 7 Blättchen bestehen. *Peucedanum Petteri* wurde meines Wissens noch nicht im Gebiete unserer Fl. aufgefunden. D.

3. *P. CHABRAEI* (Rb. bei Mösl.) Kümmelblättriger H. — Der St. gefurcht, aufrecht; B. beiderseits glänzend, *gefiedert*; Fieder aller B. sitzend, *vielsp.* od. d. der obersten B. ungeth., Zpfl lineal., spitz, an der Basis kreuzst.; Strahlen der Dolde auf der innern Seite kurz.; Hüllchen meist 1blättrig; *Thälchen 3striemig*. 4. Auf fruchtbaren Wiesen, (im Rheinthale bei Basel, Strasbg, Bonn, Crefeld, im Blies-Saar, im Moselthale bei Trier, im Donanthale bei Regensburg u. Wien, Untersteyern.; am Fusse des Jura) Jul. Aug. Bth. gelblichweiss od. grünlich. *Peucedanum Chabraei* Gaud. *P. carvifolium* Vill. M. u. K. d. fl. 2. 379. *Selinum Chabraei* J. a. t. 72. *S. podolicum* Bess. *S. Carvifolia* Crantz. *Pteroselinum Chabraei* Rb. *Imperatoria Chabraei* Spreng. *I. pimpinelloides* Bönningh. *Palimbia Chabraei* DC. Die Gattung *Palimbia* muss man mit *Peucedanum* vereinigen, die Zahl der Striemen ist nämlich veränderlich. Es giebt in der Natur überhaupt kein Merkmal, das überall beständig u. unveränderlich wäre.

4. *P. SCHOTTII* (Bess.) Schott's H. — Der St. stielrund, *gerillt*, aufrecht od. aufstrebend; B. etwas meergrün, glanzlos, *gefiedert*; Fieder sitzend, die der unteren od. aller B. *vielsp.*, Zpfl lineal., zugespitzt, an der Basis kreuzst.; Strahlen der Dolde kahl; Hüllchen wenigblättrig od. fehlend; *Thälchen 1striemig*. 4. In Felsgegenden des wärmern Krain, (im Isonzothale.) Jul. Aug. *P. Schottii* DC. *Pteroselinum glaucum* Rb. *Oenanthe Karstthiae* Hacq. pl. alp. t. 3. in Bezug auf d. krautigen Theil. *Pastinaca glauca* Scop.? Bth. weiss. Var. alle B. Fieder *vielsp.* u.

β. *petraeum* (Noë.) Fieder sitzend, die der Stengelst. B. ungeth., lanzettl.-lineal., verschmälert - sehr spitz, die der wurzelst., 3 sp. u. *vielsp.*, Zpfl lineal., spitz; Hüllchen 5blättrig. Auf Felsen, an rauhen, felsigen O., (zw. Triest u. Fiume, an d. Felsen d. neuen Strasse.) — Die Abbildung v. *Oenanthe Karstthiae* Hacq. pl. alp. carn. t. 3., wenn man die Kelchzähne u. die Blättchen der allgem. Hülle hinwegdenkt, stellt genau unsere Pflanze dar; vielleicht vermengte der Autor Expl. v. *Oe. Lachenalii* mit dieser Pflanze.

H. Rotte. *CERVARIA* DC. prodr. 4. 179. Rand der Frucht weniger-verbreitert. Allgemeine Hülle reichblättrig.

6. *P. CERVARIA* (Lap.) Starrer H. — Der St. stielrund, gerillt; B. 3fachgefiedert; *Blättchen meergrün*, *cyf.*, fast dornig-gesägt, die untern an der hintern Seite der Basis gelappt, die

obern zssliessend; die allgemeine Hülle reichblättrig, zurückgebo-gen; Striemen der Berührungsfläche gleichlaufend. 2. Auf unbebaueten Hügeln, trocknen Wiesen und in Gebirgswäldern, (stw. dch d. g. G.) Jul. Aug. Athamanta Cervaria L. J. a. t. 60. Ligusticum Cervaria Spreng. Selinum Cervaria Crantz. Cervaria Rivini Gärtn. C. glauca Gaud. C. rigida Moench.

7. P. OREOSELINUM (Möncb.) Berg-II. — Der St. stielrund, gerillt; B. 3 fachgefiedert; Verästlungen des Bstieles zurückgeschlagen-spreizend; Blättchen glänzend, eyf., eingeschnitten- od. fast fiedersp.-gezähnt, Zähne kurz-zugespitzt-stachelspitzig; die allgemeine Hülle reichblättrig, zurückgebogen; *Striemen der Berührungsfläche bogig, dem Rande anliegend*. 2. Auf trocknen Wiesen, in Gebirgswäldern, (stw. im g. G.) Jul. Aug. Athamanta Oreoselinum L. J. a. t. 68. Oreoselinum legitimum MBieb.

8. P. ALSATICUM (L.) Elsassischer H. — Der St. kantig-gefurcht, fast rispig; Aeste ruthenf.; B. 3 fachgefiedert, Blättchen eyf., fiedersp.; Zpfl lineal.-lancettl., stachelspitzig, am Rande rauh; *allgemeine Hülle 5-8 blättrig, abste hend*; Strahlen der Dolde kahl; die Gf. der Frucht zurückgebogen, ein wenig länger, als d. Stempelpolster. 2. Auf Hügeln u. an gebirgigen, steinigen, trocknen O., an Wegrändern, (in d. westl. Schw.; auf d. Kalkhügeln d. Rheinfläche, v. Oberelsass u. v. Oberbaden bis Bingen; im Mainthale bei Würzburg, Thüringen bei Arnstadt; Steyerm.; in Oestr., Mähr., Böhmen.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 381. var. α. J. a. t. 70. Cnidium alsaticum Spreng. umb. Cervaria alsatica Gaud. Pteroselinum alsaticum Rb. Bth. gelblich.

9. P. VENETUM (Koch.) Venetianischer H. — Der St. kantig-gefurcht, fast rispig; Aeste ruthenf.; B. 3 fachgefiedert; Blättchen eyf., fiedersp., Zpfl lineal.-lancettl., stachelspitzig, am Rande rauh; *allgemeine Hülle 5-8 blättrig, abste hend*; *Strahlen der Dolde auf der innern Seite fläumlich-rauh*; die Gf. der Frucht zurückgebogen, länger, als der dritte Theil der Frucht. 2. An gebirgigen, trocknen, rauhen O., (v. d. südl. Schw. auf d. südl. Seite d. A. bis nach Triest u. Fiume.) Jul. Aug. Selinum venetum Spreng. P. alsaticum β. D. fl. 2. p. 382. Bth. weiss, grösser, als bei der vorhergehenden Art.

III. Rotte. SELINOIDES DC. prodr. 4. p. 180. Rand der Früchtchen breit, fast durchscheinend. Allgemeine Hülle reichblättrig.

10. P. AUSTRIACUM (Koch.) Oestreichischer H. — Der St. gefurcht, etwas ästig; B. 3 zählig-3 fachgefiedert; Blättchen eyf., fiedersp., Zpfl lancettl.-lineal., zugespitzt, am Rande kahl; *allgemeine Hülle reichblättrig, zuletzt zurückgebogen*; Strahlen d. Dolde einwärts fläumlich-rauh; *Bth. breit-verkehrtherzf., benagelt*. 2. An felsigen, rauhen O., unter Gesträuch, (Cant. Wallis, Waadt, Graubünden im Misoxer Thale, Krain, Kärnthen, Böhm.) Jul. Aug. Selinum austriacum Jacq. a. t. 71. S. argenteum Crantz. S. nigrum Lam. Pteroselinum austriacum Rb. Bth. weiss. Var. mit rundlich- u. länglich-ovalen Früchten u. schmälern Blattzpfen; hieher gehören: Selinum nigricans Gaud. S. montanum Schleich. S. polymorphum Spreng. Peucedanum montanum Koch. umb. — Bth. weiss.

11. *P. RABLENSE* (Koch.) Kärnthischer H. — Der St. gefurcht, etwas ästig; *B.* 3 zählig-3 fachgefiedert, *vielsp.*, *Zpfl* schmal-lineal, zugespitzt, am Rande kahl: allgemeine Hülle reichblättrig, zuletzt zurückgebogen; Strahlen der Dolde auf der innern Seite flümlisch-rauh; *Blb.* breit-verkehrtherzf., *benagelt*. 2. An rauhen O. d. VorA.-Regionen, (in Kärnthen im Raibethale; in Krain in d. Wochein; in d. südl. Schw. auf d. monte Generoso.) Jul. Aug. *Ferula rablensis* Wulf. *Selinum lineare* R. u. S., nicht Schumach. *S. elegans* Balb. *S. rablense* Spreng. *Oreoselinum rabl* Hoffm. *Pteroselinum rabl*. Rb. — Scheint schmalblättrige Variet. v. *P. austriacum*.

43. *TOMMASINIA* (Bertol. fl. ital. B. 3. S. 414.) Tommasinie. Die *Blb.* eingerollt, das Uebrige wie bei *Peucedanum*.

Die Pflanze hat zwar die Gestalt der *Angelica*, aber nach den Hauptmerkmalen gehört sie zur Abtheilung *Selinoides* von *Peucedanum*; doch unterscheidet sie sich von letzterem dch die zwar in ein Läppchen zsggezogenen, aber eingerollten *Blb.* u. das Fehlen der Hülle. Von *Angelica* ist sie dem Bau der Bth. u. Früchte nach sehr verschieden.

1. *T. VERTICILLARIS* (Bertol. Fl. ital.) Quirldoldige T. — Der St. stielrund, fein-gerillt, bereift; *B.* 3 fachgefiedert; *Blättchen eyf.*, *spitz-gesägt*, die seitenst. oft 2lappig, die endst. 3sp.; *Scheiden gross, aufgeblasen; Hülle fehlend*. 2. In den VorA., (Krain am Wasserfall, Cant. Wallis u. Tessin, Graubünden. Steyerm.; um Görz, Duino u. Monfalcone; in Graubünden.) Jul. Aug. *Angelica verticillaris* L. J. h. v. 2. t. 130. *Imperatoria verticillaris* DC. *Ostericum verticillare* Rb. Bth. grünelblich.

44. *THYSSELINUM* (Hoffm.) Olsenick. C. Bauh. in Tabernaem. krtb. — Die Striemen der Berührungsfläche von d. Fruchthäuse bedeckt, sonst alles wie bei *Peucedanum*.

1. *T. PALUSTRE* (Hoffm.) Sumpf-O. — Der St. gefurcht; allgemeine Hülle reichblättrig, zurückgeschlagen; *B.* 3 fachgefiedert; *Blättchen tief-liedersp.*, *Zpfl* lineal-lanzettl., zugespitzt, am Rande etwas rau; *Hüllblättchen* frei. ☉. Auf sumpfigen Wiesen, an Wiesenhecken, in Gräben u. Teichen. Jul. Aug. *Selinum palustre* L. Wahlenb. *S. sylvestre* J. a. t. 152., nicht L. *S. Thysselinum* Crantz. *Thysselinum Plinii* Spreng. *Th. silvestre, palustre* u. *angustifolium* Rb. *Peucedanum sylvestre* DC. *P. palustre* Mönch. M. u. K. d. fl. 2. p. 380. — Bth. weiss. Var. mit breitem, schmälern u. ganz schmalen, genäherten u. entfernteren u. mehr od. weniger spreitenden Blattzpfen. *Selinum intermedium* u. *Schieverckii* Bess. sind Formen dieser Art, nach Expl., vom Autor selbst. — *Selinum sylvestre* L. ist nach Nolte u. Fries einerlei mit *Cnidium venosum*.

45. *IMPERATORIA* (L.) Meisterwurzel. — Rand des K. vermischt, sonst alles, wie bei *Peucedanum*.

1. *I. OSTHRUTHIUM* (L.) Gemeine M. — *B.* doppelt-3 zählig; *Blättchen breit-eyf.*, doppelt-gesägt, die seitenst. 2sp., die endst. 3sp.; *Scheiden* erweitert. 2. Auf felsigen Triften u. in d. Thälern der VorA., (Schw. u. dch d. g. AK., in d. Sudeten, im Erz-

gebirge, d. Thüringer Walde; in Pommern.) Jun. Jul. Schk. t. 74. Peucedanum Ostruthium Koch. umb. p. 93. Bth. weiss.

2. I. ANGUSTIFOLIA (Bellard nach Hornem.) Schmalblättrige M. — WB. 3zählig, u. doppelt-3zählig; *Blättchen* geschärft - ungleich-gesägt, 3sp. u. 2sp., *an der Basis verschmälert*, *Zpfl länglich*, *vorne eingeschnitten*, *zugespitzt*; Scheiden erweitert. 4. Auf d. Schweizer-A., Schleicher; „hat aber d. speciellen Standort nicht angegeben.“ Gaud. S.

46. ANETHUM (L., mit Ausschl. v. Arten. Hoffm.) Dill. — Rand des K. verwischt. Blb. rundlich, ganz, einwärtsgerollt; Läppchen fast 4 eckig, gestutzt. Frucht v. Rücken her linsenf.-zsgedrückt, mit einem verbreiterten, abgeflachten Rande umzogen. Früchtchen mit fädlichen, gleich weit entfernten Riefen, wovon die 3 mittlern spitz-gekielt, die 2 seitenst. schwächern in d. Rand verfließen. Thälchen 1striemig; die Striemen das ganze Thälchen ausfüllend. Eyweiss ziemlich konvex, vorne flach.

1. A. GRAVEOLENS (L.) Gemeine D. — Blattzpfl lineal.-fädlich, verlängert; Frucht elliptisch, von einem verbreiterten, flachen Rande umgeben. ☉. Unter der Saat im Littor. u. Istrien; wird überall zum Küchengebrauch kultiv. Jul. Aug. Pastinaca Anethum Spreng. Bth. gelb. D.

47. PASTINACA (L.) Pastinack. — Rand des K. verwischt oder kleingezähnt. Blb. rundlich, ganz, einwärtsgerollt, gestutzt. Frucht vom Rücken her flach-zsgedrückt, mit einem verbreiterten, abgeflachten Rande umzogen. Früchtchen mit sehr dünnen Riefen, die 3 mittlern gleich weit entfernt, die 2 seitenst. bemerklich entfernt, an dem verbreiterten Rande anliegend. Thälchen 1striemig; Striemen lineal., spitz, von der Länge der Thälchen. Eyweiss flach. — Bth. aller gelb.

1. P. SATIVA (L.) Gemeiner P. — Der St. kantig-gefurcht; *B. gefiedert, oberseits glänzend, unterseits flaumig*; *Blättchen eyf.-länglich oder länglich*, stumpf, gekerbt-gesägt, die seitenst. an der Basis gelappt und 3zählig, das endst. 3lappig, Sägezähne sehr kurz-stachelspitzig; Hüllen fehlend; Kelchzähne verwischt; Früchte oval; Fuge 2striemig. ☉. Auf Wiesen, unkultiv. Hügeln, an Hecken; wird auch zum ökon.-Gebrauch kultiv. Jul. Aug. Anethum Pastinaca Wib. Die kultiv. Pflanze grösser, die W. fleischig, essbar.

2. P. OPACA (Bernh. bei Hornem.) Glanzloser P. — Der St. kantig-gefurcht; *B. gefiedert, glanzlos, beiderseits flaumig*; *Blättchen eyf., an der Basis herzf.*, stumpf, gekerbt-gesägt, die seitenst. an der Basis gelappt und 3zählig, das endst. 3lappig; Hüllen fehlend; Kelchzähne verwischt; Früchte oval; Fuge 2striemig. ☉. Auf Triften, (bei Fiume von H. Professor Bernhardi gesammelt und mir mitgetheilt.) Jul. Aug. J.

3. P. FLEISCHMANNI (Hladnick.) Fleischmann's P. — Der St. kantig-gefurcht; *B. doppelt-gefiedert, Fiederchen gegenst.*, ent-

fernt, *elliptisch-lanzettl., fiedersp.-gesägt*; Hüllen fehlend; Kelchzähne verwischt; Früchte oval; Fuge 2striemig. ☉. An gebirgigen, rauhen O., (auf dem Schlossberge bei Laibach, Mladnik.) Jul. Aug. Blattfiederchen kaum $\frac{1}{2}$ Zoll lang, $1\frac{1}{2}$ bis zu 3 Linien breit.

48. HERACLEUM (L.) Heilkraut. — K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgehogenen Läppchen; die äussern oft strahlend, 2sp. Striemen der Thälchen abgekürzt, meist keulig; sonst alles, wie bei Pastinaca.

1. Rotte. EUHERACLEUM DC. prodr. 4. 191. Heracleum Hoffm. umb. p. 141. Fuge 2striemig.

1. H. SPHONDYLUM (L.) Gemeines H. — B. rauh., *gesiedert oder tief-fiedersp.*; Fieder lappig oder handf.-getheilt, *gesägt*; Dolden strahlend; Fruchtkn. flaumig; Früchte oval, stumpf, ausgerandet, zuletzt kahl; Fuge 2striemig. ☉. Auf Wiesen und an waldigen, etwas feuchten O.; in die A. hinaufsteigend. Jun.-Herbst. Bth. weiss, oder weiss mit 2 grünen Flecken an der Basis, oder hellgrün oder rosenroth, welche Variet. nach der Heuerndte erscheinen. Lappen der B. bald breiter, bald schmaler, länger und kürzer. Eine Variet. mit verlängerten Bzpfhn:

β. *elegans*, H. elegans J. a. t. 175. H. Panaces Rb., nicht L. im hort. ups. Eine, hinsichtlich der B. ganz ähnliche Form gibt es auch unter den Variet. der folgenden Art.

2. H. SIBIRICUM (L.) Sibirisches H. — B. rauh., *gesiedert oder tief-fiedersp.*; Fieder gelappt oder handf.-geth., *gesägt*; Fruchtkn. fast kahl; die rundlich-ovalen Früchte an der Spitze tief-ausgerandet, kahl; *Blb. fast gleich*; Fuge 2striemig. ☉. Auf Triften der A. und VorA., (dch die g. AK. und auf den Sudeten.) Jun.-Herbst. Bth. grün oder gelblich, gleich oder nur wenig strahlend. Eine Variet. mit schmälern und längeren Blattzpfhn:

β. *longifolium*, H. longifolium J. a. t. 174. H. flavescens Bess., welcher die Blb. dunkeler oder heller grün nennt. Jacquin's Abbildg zeigt sich weiss; vielleicht ist Jacq. Pflanze eine Variet. von H. Sphondylium. — Das H. angustifolium L. mant. ist nach Fries Herbarium normale eine ganz andere Art und viel kleiner; die oberen B. sind sehr schmal und ganzrandig, die Früchte viermal kleiner, an der Spitze stumpf, kaum ausgerandet, das Stempel-polster ragt hervor, die Striemen laufen fast bis an das Ende der Frucht. Bei H. sibiricum sind die Früchte so tief ausgerandet, dass das Stempel-polster zw. die Lappen eingesenkt erscheint.

3. H. ASPERUM (MBieberst.) Rauhes H. — B. *einfach, fast handf.-lappig*, unterseits kurz- oder feinspitzig, ungleich-gezähnt-*gesägt*, die *stengelst. B. manchmal 3zählig*; Dolden strahlend; Fruchtkn. kurz- oder rauh; Früchte oval, ausgerandet, zuletzt kahl. ☉. In den Wäldern der VorA., besonders an Giesbächen, (im Jura, in den Bayerischen, Salzburger, Steyerer. und den Tyroler A.) Jul. Aug. H. Panaces Bertol. fl. ital., H. asperum MB. fl. taur. cauc. (letz-

teres ist nach verglichenen authentischen Expl. von *H. Panaces* Bert. nicht verschieden,) Rochel bannat. t. 26., *H. montanum* Schleich., Gaud. helv.; *H. pyrenaicum* Lam. dict. (ist eine Variet mit weissem filzigen Ueberzug auf der Unterseite der B.) Bthen weiss. Var. mit B., welche oberseits kahl und unterseits nur auf den Adern zerstreut-behaart sind, oder mit B., welche oben kahl oder rauh, unten aber ausser der erwähnten Behaarung noch mit weichen Härchen bedeckt und desshalb grau oder weiss sind. *H. palmatum* Baumg. p. transs. „mit warzig-borstigen Früchten“, nach Reichenb. auf dem Untersberg bei Salzburg. wachsend, ist mir nicht bekannt. Das *Heracleum Panaces* Koch. Synops ed. 2. musste wieder seinen alten Namen erhalten, denn nach der Bemerkung von Fries in seinen Novit. fl. suec. hat *H. Panaces* Lin., welches noch im bot. Garten zu Upsala vorhanden ist, warzig-rauhe Früchtchen; dadurch unterscheidet es sich sehr von den italienischen Arten, welche sämmtlich glatte und nicht warzig-rauhe Früchte erzeugen.

H. Rotte. WENDIA DC. prodr. 4. p. 194. Wendia Hoffm. umb. p. 136. Striemen auf der Berührungsfläche fehlend, oder verwischt und sehr klein.

4. *H. ALPINUM* (L.) Alpen-H. — *B. einfach, herzf.-rundlich, fast handf.-lappig*, am Rande und unterseits auf den Adern flaumig, zuletzt kahl werdend, *Lappen* gekerbt, *abgerundet*, mit einer Vorspitze oder stumpf; Früchte verkehrteyf.-kreisrund; *Striemen auf der Berührungsfläche sehr kurz oder fehlend*. 4. In Gehirgswäldern und auf den VorA., (auf dem Jura und im Wallis.) Jul. Aug. Bth. weiss.

5. *H. AUSTRIACUM* (L.) Oestreichisches H. — *B. gefiedert und 3zählig; Blättchen* sitzend, gesägt, die seitenst. ganz, die der WB. eyf., stumpf, *die der StB. lanzettl., zugespitzt*, an der Basis etwas lappig, das endst. 3sp.; Fruchtkn. flaumig; Früchte oval, kahl; *Striemen der Berührungsfläche fehlend oder sehr kurz*. 4. Auf Wiesen der A. und VorA., (Oestr., Steyermark, Kärnth., Salzburg, nördl. Tyrol) Jul. Aug. J. a. t. 61. *Sphondylium austriacum* Scop. carn. Var. mit weniger vorgezogener Spitze der StB. und oft rosenfarben Bl.; hieher gehört: *Heracleum siifolium* Rehb. fl. exc., *Tordylium siifolium* Scop. carn.

49. *TORDYLIUM* (L.) Zirmet. — Rand des K. 5zählig. Bth. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht vom Rücken her flach-zsgedrückt, mit einem verdickten, runzelig-knotigen Rande umgeben. Früchtchen mit sehr dünnen Riefen, die 3 rückenst. gleich-weit-abstehend, die 2 seitenst. an dem verdickten Rande anliegend oder von diesem bedeckt. Thälchen 1-3striemig. — Bth. weiss.

1. Rotte. EUTORDYLIUM DC. prodr. 4. 187. *Tordylium* Hoffm. umb. 1. p. 198. Striemen in den Thälchen einzeln. Fuge 2striemig.

1. *T. MAXIMUM* (L.) Grösster Z. — Steifh. am St. von rückwärtsgekehrten Haaren; *B. gefiedert; Blättchen stumpf-gekerbt*, die der untern B. eyf., die der obern lanzettl., das endst. verlängert; Hüllblättchen lineal., kürzer, als die Dolde; *Früchte bor-*

stig.-steifh. ☉. Auf unkultiv. Hügeln unter Gesträuch, an Hecken, (in D. sehr zerstreut, bei Dresden, Halle, Falkenstein am Harz, Barbi, Würzburg; in Mähren. Unteröstr., Steyermark; bei Berghaus im Elsass; Cant. Waadt.) Jul. Aug. J. a. t. 142.

II. Rotte. *CONDYLOCARPUS* Hoffm. umb. 1. p. 202. Mehrere Striemen auf der Fugenseite. Die Thälchen 3striemig.

2. *T. APULUM* (L.) Apulischer Z. — Der St. ästig, beblättert, unterwärts zottig; B. gefiedert; Blättchen eingeschnitten-gekerbt; Strahlen der Dolde vielmal länger, als die allgemeine Hülle und Döldchen; *Früchte im Mittelfelde rauh, vielstriemig.* ☉. An sonnigen O., (Istrien.) Apr. Mai. J. h. v. t. 53. *T. grandiflorum* Moench. *T. humile* Desf. *Condylocarpus apulus* Hoffm. *T. officinale* Rb. — Linne verwechselte in seinen spec. plant. die Synonyme von diesem mit den Synon. von *T. officinale*, aber die Worte der Diagnose „Döldchen entfernt“ beweisen, dass die hier aufgestellte Art auch die Linnäische desselben Namens sei. — *T. officinale* im angrenzenden Dalmatien einheimisch, untersch. sich dch folg.: der St. von der Basis ästig; Aeste verlängert, nackt; das endst. Blättchen eyf. und oft eyf.-länglich; allgemeine Hülle während der Blüthezeit von der Länge der Strahlen der Dolde und länger; die Früchte 4 mal kleiner, 5riefig, die Thälchen Istriemig. Die strahlige Blüthe mit 2 ungleich-2sp. Blb.; bei *T. apulum* ist ein einzelnes und gleichmässig 2sp. vorhanden. J.

VII. Gruppe. *SILERINEEN*. Koch. umb. 84. Frucht vom Rücken her linsenf.-zsgedrückt. Früchtchen mit 5 Hauptriefen, die seitenst. randend; Nebenriefen 4, weniger hervortretend. Eyweiss vorne ziemlich flach.

50. *SILER* (Scop.) Rosskümmel. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht vom Rücken her linsenf.-zsgedrückt. Früchtchen mit fädlichen, erhabenen stumpfen Riefen; Hauptriefen 5, die seitenst. randend; Nebenriefen 4, weniger hervortretend. Thälchen unter den Nebenriefen Istriemig.

1. *S. TRILOBUM* (Scop.) Dreilappiger R. — An gebirgigen O. unter Gesträuch, an Waldrändern, (Oestr. bei Wien; im Hanövr. bei Salzhemmendorf; bei Hildesheim und Bodenwerder; in Hessen auf dem Eichkopfe im Vogelsthal bei Ziegenberg; Steyermark bei Grätz und Marburg, Maly.) Jul. Aug. *S. trilobum* Crantz. *S. aquilegifolium* Gärtner. M. und K. d. fl. 2. p. 368. *Angelica aquilegifolia* DC. *Laserpitium aquilegifolium* J. a. t. 147. Wulf. D.

VIII. Gruppe. *THAPSIEEN*. Koch. umb. p. 73. Frucht vom Rücken her zsgedrückt, oder auf dem Querdurchschnitte fast stielrund. Früchtchen mit 5, fädlichen, manchmal borstlichen Hauptriefen; die seitenst. auf der Berührungsfläche liegend; Nebenriefen 4, Flügel wehrlos. Daher die Frucht entweder 8- oder beiderseits 2flügelig. Eyweiss vorne platt

51. *LASERPITIUM* (L.) Laserkraut. — Rand des K. 5zählig.

Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Lappchen. Früchtchen mit 5 fädlichen Hauptriefen, die 3 mittlern auf dem Rücken, die 2 seitenst. auf der Berührungsfläche liegend; Nebenriefen 4, sämmtlich geflügelt; Flügel ganz. Thälchen unter den Nebenriefen Istriemig.

1. *L. LATIFOLIUM* (L.) Breitblättriges L. — Die W. und untern StB. 3zählig-doppeltgefiedert; *Blättchen eyf., gesägt, an der Basis herzf., sämmtlich ungeth.* oder die endst. der WB. 3 sp.; *Strahlen der Dolde auf der inneren Seite rauh*; der St. stielrund, fein-gerillt, kahl. 4. In Gebirgen und auf den VorA. unter Gesträuch, (stellenweise dch das g. Gebiet.) Jul. Aug. J. a. t. 146. Var. mit flachen und wellig-krausigen Fruchtlügeln und tiefer- oder seichter-herzf. Blättchen, und:

α. glabrum, B. kahl: *L. glabrum* Crantz. DC. *L. Libanotis* Lam. *L. latifolium* Gmel.

β. asperum, B. unterseits nebst den Bstielen kurz-rah: *L. asperum* Crantz. DC. *L. Cervaria* Gmel. — In unsern Gegenden konnte ich zw. der kahlen und kurz-rah. Variet. keinen Unterschied finden.

2. *L. ALPINUM* (Waldst. und Kit.) Alpen-L. — Die W.- und untern StB. 3zählig-doppeltgefiedert und doppelt-3zählig; *Blättchen eyf., ungleich-gesägt, ganzrandig oder 2-3sp., die seitenst. meist 2sp., die endst. 3sp.; Dolde gleichhoch; die Strahlen kahl; Blb. breit-verkehrtherzf., an der Basis in einen kurzen Nagel gezogen*; der St. stielrund, gerillt, kahl. 4. In Wäldern und unter Gesträuch, (in Unterkrain zw. Kleisch und Altlag, und an dem Fuhrwege, der von Gottschee über Seisenburg nach Sittich und Weichselburg führt.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 354, mit Ausschl. des Syn. von Crantz. *Laserpitium trilobum* L., nach Murray. *L. aquilegifolium* DC., mit Ausschl. der Syn. von Murr. und Crantz. Ein Expl. v. d. obenerwähnten Standorten sah ich noch nicht; ich entwarf die Diagnose nach einem ungarischen und zwar echten Kitaibelischen Ex. Bth. weiss, wie sie auch Wulf. beschreibt, dessen Pflanze vielleicht dennoch eine andere Art darstellt, da der Autor den St. 6-7 Fuss hoch angibt. D.

3. *L. MARGINATUM* (Waldst. und Kit.) Berandetes L. — Die W.- und untern StB. 3zählig-doppeltgefiedert und doppelt-3zählig; *Blättchen ey- oder herzf., ungleich-gekerbt-gesägt, ungeth. oder 2-3sp.; Dolden weit abstehend, mit an d. inneren Seite kurz-rah. Strahlen*; Blb. rundlich-verkehrtherzf.; Hauptriefen der Früchte kurzsteifh.; der St. stielrund, gerillt, kahl. 4. An gebirgigen, rauen O. unt. Gesträuch, (Krain auf dem Berge Krium bei Laibach; auf dem monte Generosa im C. Tessin, und am Hinterrheine in Graubünden.) Jul. Aug. *L. marginatum* DC. Von der vorhergehenden, sehr ähnlichen Art leicht durch die gelblichen-purpurn-berandeten Blb. zu unterscheiden.

4. *L. GAUDINII* (Morett. in comm. fl. com. n. 344. nach DC

prodr. 4. p. 204.) Gaudin's L. — Die WB. und untern StB. 3zählig-doppeltgefiedert oder doppelt-3zählig; *die Blättchen eyf. oder herzf.*, ungleich-gekerbt-gesägt, *ganz oder 2-3sp.*; die Dolde abstehend, *die Strahlen* ungleich, *kahl*; *Bth. rundl., verkehrt-herzf.*; die Hauptriefen der Frucht kahl; der St. stielrund, gerillt, kahl. 4. In Gebirgen und den VorA., (M. Generosa im C. Tessin, am Hinterrhein in Graubünden; südl. Tyrol an vielen O., nördl. bis Teutschofen, Facchin.) Jul. Aug. L. luteolum Gaud. helv., L. aquilegifolium Schleich. Bth. gelblich, purpurn-berandet wie bei der vorigen.

5. L. SILER (L.) Gebräuchliches L. — B. ganz-kahl, die W. und untern StB. 3fachgefiedert; *Blättchen lanzettl., ganzrandig*, ungeth. oder 3lappig, *Hauptadern schief*; Früchte lineal.-länglich; die Gf. zurückgekrümmt, an die Frucht angedrückt; der St. stielrund, gerillt. 4. In Gebirgen und den VorA. unter Gesträuch, (dch die g. AK. und auf der Alp in Württemberg.) Jul. Aug. J. a. t. 145. Siler montanum Crantz. Bth. weiss.

6. L. PEUCEDANOIDES (L.) Haarstrangf. L. — B. ganz-kahl, die W. und untern StB. 3zählig-doppelt und 3fachgefiedert; *Blättchen lineal.-lanzettl. und lineal., ganzrandig, ungeth., Hauptadern mit dem Rande gleichlaufend*; Früchte oval; die Gf. aufrecht, fast spreitzend; der St. stielrund, gerillt. 4. In Gebirgen der VorA., (Krain, Tyrol, Steyerm., C. Tessin.) Jun. Jul. J. ic. rar. t. 350. Bth. weiss.

7. L. HIRSUTUM (Lam.) Rauhh. L. — B. kurz, mehrfachzgesetzt; *Fiederchen* im Umrisse *eyf., fiedersp., -vielsp.*, Fiederchen lineal.; Früchte oval, kahl; Stempelpolster kegelf.; die Gf. auseinanderfahrend; *der St. stielrund, gerillt, kahl.* 4. In Thälern der höhern A., (auf dem Gotthard und der südl. AK. der Schw.; im südl. Tyrol auf der Seiseralpe, dem Timpeljoch.) Jul. Aug. L. Panax Gouan. L. Halleri All. Var. B. fast kahl. Bth. weiss.

8. L. PRUTENICUM (L.) Preussisches L. — B. am Rande und den Bstielen rauhh., doppelt-gefiedert; *Blättchen fiedersp., Zpfl lanzettl.*; Früchte oval; Hauptriefen steifh.; Stempelpolster niedergedrückt, mit einem erhabenen, welligen Rande umzogen; *der St. kantig-gefurcht, unterwärts steifh.*, Haare rückwärtsgekehrt. ©. In feuchten Wäldern und auf Waldwiesen, (stellenweise im g. Gebiete.) Jul. Aug. J. a t. 153. L. selinoides Crantz. L. gallicum Scop. Bth. weiss, getrocknet, oft gelb.

9. L. NITIDUM (Zanted. comm. brix. 1813. nach Pollin. fl. veron. p. 351.) Glänzendes L. — Die B. doppelt-gefiedert, *Blättchen längl., fiedersp.-gelappt, geschürft-gesägt*, unterseits von zerstreuten Borsten steifhaarig; Früchte kahl; *die Blättchen der vielblättrigen allgemeinen Hülle an der Spitze eingeschnitten, oder 3sp.* 4. In felsigen Gebirgen, (südl. Tyrol, Facchini; im Veltlin?) Jul. Aug. L. hirtellum Gaud. helv. Bth. weisslich.

10. L. ARCHANGELICA (Wulf. bei J.) Angelikablättriges L. —

B. unterseits nebst den Bstielen rauhh., 3zählig-3fachgefiedert; *Blättchen eyf., ungleich-gesägt, die endst. 3sp., mit keiliger Basis herablaufend*, die seitenst. fast 3sp.; die obersten Scheiden sackartig-aufgeblasen; Früchte kahl; *der St. gefurcht, rauhh.* 2. In Wäldern der VorA., (an der südl. Lehne des Altvaters im Gesenke der Sudeten, auch, aber sehr selten, am Peterstein daselbst; in Krain auf dem Berge Slivinza bei dem Zirknitzersee und auf dem Berge Friedrichstein bei Gottschee.) Jul. Aug. J. ic. rar. t. 58. L. Chironium Scop. Bth. weiss. Eines oder das andere Blättchen der vielblättrigen Hülle ist an der Spitze 2-sp. D.

IX. Gruppe. DAUCINEEN. Koch. umb. p. 76. Frucht vom Rücken her linsenf.-zsgedrückt, oder auf dem Querdurchschnitte fast stielrund. Früchtchen mit 5 fädlichen, (borstigen) Hauptriefen, die seitenst. auf der Berührungsfläche liegend; Nebenriefen 4, mehr hervorspringend, stachelig; Stacheln frei oder in einen Flügel verwachsen. Eyweiss flach oder fast halbstielrund, vorne ziemlich platt.

52. ORLAYA (Hoffm.) Breitsame. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen, die äussern strahlend, tief-2sp. Frucht vom Rücken her linsenf.-zsgedrückt. Früchtchen mit 5 fädlichen, borstentragenden Hauptriefen; die 3 mittlern auf dem Rücken, die 2 seitenst. auf der Berührungsfläche liegend; Nebenriefen 4, 2-3 reihig-stachelig, gleich, oder die äussern mehr hervorspringend und fast flügelig. Thälchen unter den Nebenriefen 1 striemig. Eyweiss flach, hinten ziemlich konvex. (Bth. weiss.)

1. O. GRANDIFLORA (Hoffm.) Grossblumiger B. — Der St. aufrecht; *Blb. strahlend, vielmal länger, als der Fruchtkn.*; Nebenriefen der Früchtchen gleich, Stacheln an der Spitze pfriemlich, hakig. ☉. Unter der Saat, vorzüglich auf Kalkboden, (Schw. und im südl. und mittl. D. bis Hannover.) Jul. Aug. *Caucalis grandiflora* L. J. a. t. 54. *Platyspermum grandiflorum* D. fl. 2. p. 361.

2. O. PLATYCARPOS (Koch.) Breitfrüchtiger B. — Der St. ausgebreitet; Aeste spreitzend: *Blb. strahlend, mit dem Fruchtkn. gleichlang*; die äussern Nebenriefen der Früchtchen noch 1 mal so breit, Stacheln an der Spitze pfriemlich, hakig. ☉. Unter der Saat, (Istrien.) Jun. Jul. *Caucalis platycarpus* L. Colum. eeph. J. t. 94.

53. DAUCUS (L.) Mohrrübe. — Früchtchen mit 4, gleichen, geflügelten Nebenriefen, Flügel in eine einfache Reihe von Stacheln gespalten oder bis zur Basis getheilt. Sonst alles wie bei Orlaya.

1. D. CAROTA (L.) Gewöhnliche M. — Der St. steif; **B.** 2-3fachgefiedert, glanzlos; Fiederchen fiedersp., Zpfl. lanzettl., haarspitzig; Hüllblättchen 3sp. und fiedersp., fast so lang, als die Döldchen; Stacheln so lang, als der Querdurchmesser der länglich-ovalen Frucht. ☉. Auf Wiesen und Triften, an

Waldrändern. Wird auch zum Hausgebrauch kultiv. Jun - Herbst. Schk. t. 61.

II. Unterordng. *CAMPYLOSPERMEN*. Eyweiss am Rande einwärtsgekrümmt oder gänzlich-eingerollt, oder an der innern Seite rinnig von einer Längsfurche.

X. Gruppe. *CAUCALINEEN*. Frucht von der Seite her zsggezogen oder fast stielrund. Früchtchen mit 5 fädlichen, borstigen oder stacheligen Hauptriefen: die 3 mittlern auf dem Rücken, die 2 seitenst. auf der Berührungsfläche liegend; Nebenriefen 4, mehr hervorspringend, stachelig, oder dch eine Menge das ganze Thälchen bedeckende, Stacheln verwischt. Eyweiss einwärtsgerollt oder am Rande einwärtsgebogen. — Bth. weiss oder röthlich.

54. *CAUCALIS* (Hoffm.) Haftdolde. — Rand des K. 5zählig. Bib. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen, die äussern strahlend, 2sp. Frucht von der Seite her etwas zsggedrückt. Früchtchen mit 5 fädlichen, borstigen oder kleinstacheligen Hauptriefen: die 3 mittlern auf dem Rücken, die 2 seitenst. auf der Berührungsfläche liegend; Nebenriefen 4, mehr hervorspringend, stachelig, die Stacheln 1-3reihig. In jedem Thälchen unter den Nebenriefen ein einzelner Striemen. Eyweiss einwärtsgerollt oder am Rande einwärtsgekrümmt.

1. *C. DAUCOIDES* (L.) Mohrrübenf. II. — B. 2-3fachgefiedert; Fiederchen fiedersp., Zipfelchen lineal., spitz; Hülle fehlend oder einblättrig; *Stacheln der Nebenriefen einreihig, kahl*, aus einer kegelf. Basis pfrieml., an der Spitze hakig, so lang, oder länger, als der Querdurchmesser der Früchtchen. ☉. Unter der Saat. Jun. Jul. J. a. t. 157. St. h. 81. *C. leptophylla* Pollich. *Daucus platycarpus* Scop.

2. *C. MURICATA* (Bischoff, Heidelb. Saamencatalog vom Jahre 1839.) Kleinstachelige II. — Die B. 2-3fachgefiedert, Fiederchen fiedersp., Zipfelchen lineal., spitzig; Hülle fehlend oder 1blättrig; die Stacheln der Nebenriefen 1reihig, kahl, viel kürzer, als der Querdurchmesser des Früchtchens, auf einer fast walzl. Basis haarspitzig, die Haarspitze aufwärts-gebogen. ☉. Unter der Saat, (bei Neudorf unweit Wien, Dolliner.) Jun. Jul. St. h. 81.

3. *C. LEPTOPHYLLA* (L.) Schmalblättrige II. — B. 2-3fachgefiedert; Zipfchen lineal., spitz; Hülle fehlend; *Stacheln der Nebenriefen 3reihig, rauh, an der Spitze wiederhakig*. ☉. Unter der Saat, (in Istrien: Lüttich und Luxemburg; Eliesenhausen bei Göttingen, Cant. Wallis, Basel.) Jun. Jul. St. h. 3.

55. *TURGENIA* (Hoffm.) Turgenie. — Frucht von der Seite zsggezogen, fast 2knotig. Früchtchen mit 2 auf der Berührungsfläche liegenden, kurzstacheligen Riefen, die 7 übrigen 2-3reihig-stachelig, Stacheln gleich. Sonst alles, wie bei *Caucalis*.

1. *T. LATIFOLIA* (Hoffm.) Breitblättrige T. — B. gefiedert,

Fieder lanzettl., eingeschnitten-gesägt; Dolde 2-3strahlig; Stachelchen der Riefen auf der Berührungsfäche so lang, als der Querdurchmesser der Fuge oder kürzer. ☉. Unter der Saat, (im Wallis; im Rheingebiete von Oberbaden und dem Elsass bis nach den Niederlanden; in Schwaben, Oberbayern, Franken und Thüringen bis nach Hanover; Mähren, Böhmen; Istrien.) Jul. Aug. *Caucalis latifolia* L. syst. nat. M. u. K. d. fl. 2. p. 361. J. h. vind. t. 126. *Tordylium latifolium* L. sp. Bth. weiss und schön-purpurn. Die Turg. multiflora DC., die im benachbarten Dalmatien vorkommt, untersch. sich dch die fast noch einmal so grossen Früchte und dch die Stacheln der Riefen auf der Berührungsfäche, welche länger, als der Querdurchmesser der Fuge, sind.

56 TÓRILIS (Adanson. Hoffm.) Borstdolde. — Frucht v. d. Seite zsgezogen. Früchtchen mit 5 borstlichen Hauptriefen, die Nebenriefen aber dch eine Menge v. Stacheln, die das ganze Thälchen einnehmen, verwischt. Sonst alles, wie bei *Caucalis*. Bth. weiss od. röthlich.

1. T. ANTHRISCUS (Gmel.) Hecken-B. — Aeste abstehend; B. doppeltgefiedert; Blättchen eingeschnitten-gesägt; Dolden langgestielt; *allgemeine Hülle reichblättrig*; *Stacheln* einwärtsgekrümmt, an der Spitze einfach, spitz, *nicht widerhakig*. ☉. In Wäldern unt. Gesträuch, in Zäunen u. Hecken. Jun. Jul. *Tordylium Anthriscus* L. spec. J. a. t. 261.

2. T. NEGLECTA (R. u. S.) Vernachlässigte B. — Aeste abstehend; B. doppelt-gefiedert; Blättchen eingeschnitten-gesägt; Dolden langgestielt; Hülle 1blättrig od. fehlend; *Stacheln widerhakig*; *Blb. strahlend, noch 1mal so lang, als d. Fruchtkn.*; *Gf. viel länger, als d. Stempelpolster*. ☉. Auf Aeckern u. an Gesträuch u. Waldrändern, (Unteröstr.) Jul. Aug. *Scandix infesta* J. a. t. 46. T. *infesta* Rb. Untersch. sich v. der folgenden leicht dch die konvexern Döldchen, noch einmal so grossen Bth. u. langen Gf. D.

3 T. HELVETICA (Gmel.) Kletten-B. — Aeste aneinanderfahrend; die untersten B. doppeltgefiedert, die obern gefiedert u. 3-zählig; Blättchen eingeschnitten-gesägt, das endst. der obern B. oft verlängert; Dolden lang-gestielt; Hülle 1blättrig od. fehlend; *Stacheln widerhakig*; *Blb. so lang, als d. Fruchtkn.*; *Gf. kaum noch einmal so lang, als d. Stempelpolster*. ☉. Auf Aeckern unter d. Saat, auf Letten- u. Kalkboden, (auf d. Flächen d. C. Waadt, Basel u. Schaffhausen; Oberschwaben u. Oberelsass und dch das Rheingebiet bis nach Westphalen; im Maingebiete bis Würzburg; Grossensee in Franken; in Thüringen um Halle.) Jul. Aug. T. *helvetica* DC. T. *infesta* D. fl. 2. p. 364. (T. *infesta* Hoffm. gehört vielleicht zur vorhergehenden Art.) *Caucalis helvetica* J. h. vind. 3. t. 16. *Scandix infesta* L. syst. nat. *Caucalis arvensis* Huds. C. *infesta* Curt. Smith. Var. höher, 2-3 Fuss hoch.

4. T. HETEROPHYLLA (Guss.) Verschiedenblättrige B. — Aeste aufrecht, etwas abstehend; die untersten B. doppeltgefiedert, die

obern 3zählig; Blättchen eingeschnitten-gesägt, das endst. der obern B. oft verlängert und entfernt-gesägt; Dolden lang-gestielt; Hülle 1blättrig oder fehlend; *Stacheln widerhakig*; *Blb. halb so lang, als der Fruchtkn.* ☉. Auf Aeckern, an Flecken und unkultiv. O., (Istrien) Apr.-Jun.! T. infesta Variet. mit aufrechtem St., Würtemb. Reisever. 1827. Untersch. sich dch die sehr kleinen Bth. und die sehr schmalen und meist verlängerten obern Blättchen. J.

5. T. NODOSA (Gärtn.) Knotige B. — Aeste ausgebreitet; B. doppeltgefiedert; Blättchen fiedersp.-eingeschnitten; *Dolden geknäuelt, sitzend, blattgegenst.*; die äussern Früchte stachelig, widerhakig, die innern körnig-rauh. ☉. Auf Aeckern, (im Littor. bei Triest, in Istrien, Biasol.; Insel Osero, Noé; Varel in Oldenb., Böckler.) Apr. Mai. *Tordylium nodosum* L. J. a. app. t. 24. *Caucalis nodosa* Scop. C. nodiflora All.

XI. Gruppe. SCANDICINEEN. Koch. umb. p. 130. Frucht von der Seite her merklich-zsgedrückt oder zsggezogen, öfters geschnäbelt. Früchtchen mit 5 fädlichen, manchmal geflügelten oder an der Basis verwischten und an der Spitze nur bemerklichen Riefen, die seitenst. randend, sämmtlich gleich, Nebenriefen fehlend. Eyweiss konvex, vorne mit einer tiefen Furche ausgehöhlt oder am Rande einwärtsgerollt.

57. SCANDIX (L. mit Ausschl. mehrer Arten.) Nadelkerbel. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., abgeschnitten, mit einem einwärtsgekrümmten Läppchen. Frucht von der Seite her zsgedrückt, sehr lang-geschnäbelt. Früchtchen mit 5 stumpfen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen striemenlos oder schwach-striemig. Eyweiss stielrund-konvex, mit einer tiefen Furche ausgehöhlt. — Bth. weiss.

I. Rotte. PECTEN Dub. bei DC. bot. gall. 1. 210. Scandix Hoffm. umb. p. 23. Schnabel der Frucht vom Rücken her zsgedrückt.

1. S. PECTEN VENERIS (L.) Kammf. N. — Hüllblättchen an der Spitze 2-3 sp. und ganz; *Schnabel der Frucht vom Rücken her zsgedrückt, 2reihig-steifh.* ☉. Unter der Saat, auf Kalk- und Lettenboden. Mai. Jun. Myrrhis Pecten ven. All. Chaerophyllum rostratum Lam.

II. Rotte. WYLIA Hoffm. umb. 1. p. 3. Schnabel der Frucht von der Seite her zsgedrückt.

2. S. AUSTRALIS (L.) Südlicher N. — Hüllblättchen meist 2-zählig; *Schnabel der Frucht von der Seite her zsgedrückt, überall steifh.*; die äussern Blh. ein wenig länger; der St. kahl. ☉. Unter der Saat, (auf der Insel Osero.) Mai. Jun. Myrrhis australis All. Wylia australis Hoffm.

58. ANTHRISCUS (Hoffm.) Klettenkerbel. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., abgeschnitten oder ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen, oft sehr kurzen Läppchen. Frucht von der Seite zsggezogen, geschnäbelt. Früchtchen fast stielrund, rie-

fenlos, nur am Schnabel 5riefig. Eyweiss stielrund-konvex, mit einer tiefen Furche ausgehöhlt. — Bth. weiss.

1. A. SYLVESTRIS (Hoffm.) Grosser K. — Der St. unterwärts rauhh., oberwärts kahl; B. kahl, oder unterseits auf den Hauptnerven borstig-haarig, doppeltgefiedert; Fiederchen fiedersp., die untern Zpfl eingeschnitten; *Früchte länglich, glatt oder zerstreut-knötig, Knötchen grannenlos, Furchen des Schnabels $\frac{1}{3}$ so lang, als die Frucht*; Hüllblättchen 5blättrig, ziemlich lang-gewimpert; der Gf. länger, als das Stempelpolster. h. Auf Wiesen, an Hecken, Ufern; in d. A. hinaufsteigend. Mai. Jun. J. a. t. 149. Chaerophyllum sylvestre L. Bei der gemeinen Pflanze fand ich immer die Börstchen an der Spitze der Bthstielchen, welche die Basis der Früchtchen umgeben, bei d. Expl. aus d. A. aber fehlen sie manchmal. Unregelmässig zerstreute Knötchen, aber ohne Borstchen findet man nicht nur auf den Früchtchen der Expl. aus den A., sondern auch an der Pfl., welche in der Ebene wächst; diese ist A. sylvestris d. DC. prodr. Var. ferner:

a. B. 3fachgefiedert; Blättchen sehr eingeschnitten, die Läppchen schmal, genähert: A. sylvestris DC. prodr. Kommt vor mit unterwärts rauhh. oder kahlen Bstielen u. BNerven, zu jener gehört: A. sylvestris γ . pilosula DC. prodr.

β . alpestris, B. doppeltgefiedert; Blättchen weit weniger eingeschnitten, mit breiteren Läppchen: A. alpestris Wimm. et Grabow. fl. siles. A. sylvestris β . alpestris Wimm. fl. siles. Vielleicht gehört hierher auch A. torquata Dub. bot. gall., DC. prodr.? Ein authent. Expl. von letzterer habe ich noch nicht gesehen.

γ . tenuifolia; B. doppeltgefiedert; Blättchen in lineale auseinandergerückte Läppchen fiederspaltig zerschnitten: A. sylvestris β . tenuifolia DC. prodr. A. torquata Thom. cat., nicht DC. Chaerophyllum alpinum Vill. delph.

2. A. NEMOROSA (M. Biebst.) Schattenliebender K. — Der St. unterwärts rauhh., oberwärts kahl; B. kahl, unterseits auf den Nerven borstig-haarig, doppeltgefiedert; Fiederchen fiedersp., die untern Zpfl eingeschnitten; *Früchte länglich, knötig, Knötchen deh ein Borstchen weichstachelig; Furchen des Schnabels ohngefähr $\frac{1}{3}$ so lang, als die Frucht*; Hüllblättchen 5blättrig, ziemlich lang-gewimpert; der Gf. länger, als das Stempelpolster. h. An schattigen O., (bisher bloss bei Frankf. a. d. O.) Mai. Jun. Chaerophyllum nemorosum Biebst. A. sylvestris γ . D. fl. 2. 458., mit Ausschl. des StandO. D.

3. A. FUMARIOIDES (Spreng.) Erdrauchähnlicher K. — Der St. nebst d. B von sehr kurzem Flaum fast sammetartig; B. 2-3fachgefiedert; Fiederchen fiedersp.-eingeschnitten; *Früchte lineal-länglich, knötig, Knötchen deh ein Borstchen weichstachelig; Furchen des Schnabels ohngefähr $\frac{1}{3}$ so lang, als die Frucht*. 4. Auf d. VorA. und Krainer Gebirgen, (auf d. Nanas u. Planina; auf d. monte Maggiore.) Mai. Jun. Scandix fumarioides WK. Kommt hin und wieder vor mit kahlen B.; St. u. Bstiele fand ich jedoch immer fläumlich. „St. u. B. sind an dem jüngern Trieb von sehr feinem, ganz weichem und sehr kurzem Flaum sammetartig

und fallen manchmal in das Aschgraue.“ W. und Kit. Wimpern der Döldchen sehr kurz. Var., wie die vorigen, mit schmälern und längeren Blättchen, ferner:

β mit breiteren und kürzeren Blättchen: *Chaerophyllum Hladnikianum* Rehb. fl. germ. exsicc.

4. *A. TRICHOSPERMA* (Schultes.) Haarfrüchtiger K. — Der St. oberhalb der Gelenke flämlich; B. 3fachgefiedert, kahl, unterseits auf den Nerven zerstreut-haarig; Blättchen fiedersp.; *Früchte lineal., horstlich-weichstachelig; Furchen des Schnabels ohngefähr $\frac{1}{2}$ so lang, als die Frucht*; Hüllchen halbirt, 2-4blättrig; der Gf. länger, als das Stempelpolster. ☉. An Zäunen. (in Böhmen.) Mai. *A. Cerefolium* β. D. fl. 2. 459., das Syn. von Persoon, ausgeschl. *Chaerophyllum trichospermum* Schult. östr. fl. Presl. cech. Der folgenden Art sehr ähnlich, aber doch die weichstacheligen Früchtchen verschieden; ob doch Variet.? — *A. trichosperma* Rochel. Rb. fl. exc. ist eine ganz andere Pflanze und gehört nicht zu dieser Gattung. *A. trichosperma* Pers. gehört zur Gattung *Torilis*, ist aber nicht einheimisch. D.

5. *A. CEREFOLIUM* (Hoffm.) Gebräuchlicher K. — Der St. oberhalb der Gelenke flämlich; B. 3fachgefiedert, kahl, unterseits auf den Nerven zerstreut-haarig; Blättchen fiedersp.; *Früchte lineal., glatt; Furchen des Schnabels ohngefähr $\frac{1}{2}$ so lang, als die Frucht*; Hüllchen halbirt, 2-3 blättrig; der Gf. länger als das Stempelpolster. ☉. An Hecken, Waldrändern, in Weinbergen, (in dem südl. Gebiete; auf Schutthaufen u. a. O. im nördlichen verwildert.) Mai. Jun. *Scandix Cerefolium* L. *Chaerophyllum sativum* Lam. *Cerefolium sativum* Bess.

6. *A. VULGARIS* (Pers.) Gemeiner K. — Der St. kahl; B. 3fachgefiedert, kahl, unterseits auf den Nerven zerstreut-haarig; Blättchen fiedersp.; *Früchte eyf., stachelig, Stacheln pfriemlich, einwärts-gekrümmt*; Furchen des Schnabels ohngefähr $\frac{1}{3}$ so lang, als die Frucht; Hüllchen halbirt, 2-3 blättrig; der Gf. sehr kurz; die N. fast sitzend. ☉. An unkultiv. O. um Dörfer, an Landstrassen, Wegen, (stellenweise doch das g. Gebiet.) Mai. Jun. *A. Caulalis* MB. *Scandix Anthriscus* L. *Caulalis Scandix* Scop. *C. scandinavica* Roth. *C. aequicolorum* All. *Torilis Anthriscus* Gärtn.

59. *PHYSOCAULUS* (Tausch in der botan. Zeitung.) Blasenstengel. — Die Blb. verkehrt-eyf., stumpf, mit einem eingebogenen Läppchen. Die N. auf der Spitze der kegelf. Stempelpolster sitzend. Die Gf. fast ganz fehlend.

Die auf den Früchtchen sitzenden Knötchen wollte ich nicht in den Gattungscharacter aufnehmen, weil bei der verwandten Gattung *Anthriscus* Arten vorkommen, deren Früchtchen auf ähnliche Weise mit Knötchen besetzt sind und wieder andere, denen sie fehlen. Diese Gattung, am nächsten verwandt mit *Chaerophyllum*, kann nicht mit der Gattung *Torilis* verwechselt werden, denn diese hat blattige KZähne, verkehrtherzf., 2 sp.-ausgerandete Blb. und sehr schmale Hauptriefen.

1. **P. NODOSUS** (Tausch.) Knotiger B. — Der St. unter den Gelenken aufgeblasen; B. 3zählig-doppeltgefiedert; Fiederchen eyf., fiedersp.-eingeschnitten und gezähnt; Früchte steifh.; Stempelpolster kegelf.; Gf. fast fehlend; *N. fast sitzend*. ☉. Im Gebüsch und an Hecken, (bei Fiume.) Mai. Jun. *Scandix nodosa* L. J. h. v. t. 25. *Anthriscus nodosa* Pers. *Torilis macrocarpa* Gärtn. fruct. t. 25. *Chaerophyllum nodosum* Lam. dict., Koch Synops. ed. I., *Bia-solettia nodosa* Bertol. fl. ital. J.

60. **CHAEROPHYLLUM** (L.) Kälberkropf. — Der Rand des K. undeutlich. Blb. verkehrt-herzf. mit eingebogenem Läppchen. Frucht von der Seite her zsgezogen, längl. oder lineal. Fruchtk. mit 5 sehr stumpfen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen 1striemig. Gf. fädlich.

1. **C. TEMULUM** (L.) Berauscher K. — Der St. unter den Gelenken aufgeblasen, an der Basis steifh., oberwärts kurz.; B. doppeltgefiedert; *Blättchen* eyf.-länglich, lappig-fiedersp., *Lappen stumpf*, kurz-stachelspitzig, etwas gekerbt; *Hüllchen* ey-lanzettl., haarspitzig, gewimpert; Blb. kahl; *die Gf. zurückgekrümmt, so lang, als das Stempelpolster*. ☉. Im Gebüsch, an unkultiv. und waldigen O., unter Gesträuch. Jun. Jul. J. a. t. 65. *Myrrhis temula* Spreng. Der St. gefleckt.

2. **C. BULBOSUM** (L.) Knolliger K. — Der St. unter den Gelenken aufgeblasen, an der Basis steifh., oberwärts kahl; B. mehrfachzugesetzt; *Blättchen* tief-fiedersp., *Zfl* lineal.-lanzettl.-spitz, *die der obern B. lineal., sehr schmal*; *Hüllchen* lanzettl., haar-spitzig, kahl; *die Gf. zurückgebogen, ohngefähr so lang, als das Stempelpolster*. ☉. In Hecken, auf unkultiv. Hügeln unter Gesträuch, an Wegen, Ufern. Jun. Jul. J. a. t. 63. *Myrrhis bulbosa* Spreng. Der St. gefleckt. W. rübenf., bisweilen rundlich.

3. **C. AUREUM** (L.) Gelbfrüchtiger K. — Der St. unter den Gelenken etwas angeschwollen; B. 3fachgefiedert; *Blättchen* aus eyf. Basis lanzettl., zugespitzt, eingeschnitten und gesägt, *an der Basis fiedersp., an der lang-vorgezogenen Spitze einfach-gesägt*; *Hüllchen* breit-lanzettl., haarspitzig, gewimpert; Blb. kahl; *die Gf. zuletzt zurückgebogen, länger, als d. konvex-kegelf. Stempelpolster*. 4. Auf unkultiv. Hügeln unter Gesträuch, an Waldrändern; in die VorA. hinaufsteigend, (in der Schw. und dch das südl. und mittl. D. stw.) Jun. Jul. J. a. t. 64. *Myrrhis aurea* Spreng. Der St. gefleckt, seltner ungefleckt. Var. ferner: St. u. B. von kleinen Haaren, die am St. herabgebogen-angedrückt sind, etwas grau-flüumlich, und ausserdem der St. unterwärts von langen, abstehenden oder etwas zurückgebogenen Haaren steifh.; oder

β. glabriusculum, der St. kahl oder nur an der Basis von langen Haaren steifh.; B. kahl, am Rande und unterseits mit kurzen Haaren bestreut: *C. maculatum* Willd. DC. (ein Expl. aus dem Willdenow. Herbarium n. 5913., welches ich verglichen habe, hat an der Basis verschmälerte Früchte, und diese Gestalt, welche

einen gewissen unvollendeten Zustand anzuzeigen scheint, habe ich auch schon an andern Abänderungen beobachtet.)

γ. glabrum, der St. und die B. ganz - kahl: *C. monogonum* Kit bei Link. DC.

4. *C. ELEGANS* (Gaud.) Zierlicher K. — Der St. fast gleich; B. doppeltgefiedert, Fieder fiedersp.; Abschnitte lanzettl., eingeschnitten-gesägt, die untern fiedersp., *Hüllchen* verlängert, lanzettl.-lineal., zugespitzt, *durchaus häutig und nebst den Blb. gewimpert*; die Gf. aufrecht-etwas abstehend, mehrmals länger, als das Stempelpolster; *Fruchthalter bis auf die Basis getheilt*. 4. Auf den A. neben Giesbächen, (am Fusse des St. Bernhard im Wallis.) Jul. Aug. S.

5. *C. VILLARSH* (Koch) Villars. K. — Der St. fast gleich: B. doppeltgefiedert, Fieder fiedersp., Abschnitte lanzettl., eingeschnitten-gesägt, die untern fiedersp.; *Hüllchen* lanzettl., zugespitzt, *krautig, am Rande häutig und nebst den Blb. gewimpert*; die Gf. aufrecht mehrmals länger, als das Stempelpolster; *Fruchthalter bis auf die Basis getheilt*. 4. Auf Wiesen und in Wäldern der A. (in Tyrol; Bayerische A.; Steyermark; Schw., Hegetschw.) Jun. Jul. Chaerophyllum Cicutaria Rb. *C. hirsutum* Vill. Host., nicht L. Die Beschreibung von Chaerophyllum hirsutum, die Villars gibt, und der von ihm erwähnte Stand O. stimmen vollkommen mit der hier aufgestellten Art überein, und auf gleiche Weise passen die Beschreibung und der Stand O. von Chaerophyllum Cicutaria Villars auf die folgende Art.

6. *C. HIRSUTUM* (L.) Rauhh. K. — Der St. fast gleich; B. doppelt-3zählig; Blättchen 2-3sp. oder fiedersp., eingeschnitten-gesägt; *Hüllchen* breit-lanzettl., zugespitzt, krautig, am Rande nebst den *Blb. gewimpert*; die Gf. aufrecht, mehrmals länger, als das Stempelpolster; *Fruchthalter an der Spitze 2sp.* 4. An Bächen, auf nassen Wiesen und in feuchten Wäldern; in die A. hinaufsteigend, (stellenweise doch das g. Gebiet.) Jul. Aug. *C. palustre* Lam. *C. Cicutaria* Vill. *Myrrhis hirsuta* Spreng. Scandis hirsuta Scop. — DC. zieht das Synon. von Villars zu einer Art von Anthriscus, aber nach meiner Meinung bezeichnet die von Vill. gegebene Beschreibung genau diese Art. Variirt mit steifh. und kahlem, niedrigem und 3-4 Fuss hohem St. und schön-rosenrothen Dolden:

β. rosea: *C. Cicutaria* B. Villars.

7. *C. AROMATICUM* (L.) Gewürzhafter K. — Der St. unter den Gelenken angeschwollen; *B. 3fach-3zählig* oder 3fach-3zählig-doppeltgefiedert; *Blättchen ungeth.*, eyf.-länglich, zugespitzt, *gesägt*; *Hüllchen* breit-lanzettl., pfriemlich-zugespitzt, gewimpert; die Gf. spreitzend, länger, als das kegelf. Stempelpolster. 4. In Hainen und auf Waldwiesen, (von Oestr. nach Mähren, Böh., Schles. und Sachsen bis Frankf. an der O.) Jul. Aug. J. a. t. 150. *Myrrhis aromatica* Spreng. D.

61. *BIASOLETTIA* (Koch.) Biasolettie. — Rand des K. vermischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgeboge-

nen Läppchen. Frucht schnabellos, von der Seite zsgedrückt. Früchtchen mit 5 scharfen, fast flügeligen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen flach, 1striemig. Eyweiss vorne mit einer tiefen Furche ausgehöhlt.

Diese Gattung, welche auf bestimmten und deutlichen Merkmalen beruht, habe ich dem H. Dr B. Biasoletto, Direktor des bot. Gartens in Triest, gewidmet, welcher über die mikroskopischen Algen eine ausgezeichnete Arbeit geliefert hat. Der Habitus ist der eines *Anthriscus*, und einigermaßen wie der eines *Bunium*'s. Untersch. sich aber von *Anthriscus* dch die riesigen Früchtchen und 1striemigen Thälchen; von *Chaerophyllum* dch die breiten, flachen Thälchen und fast häutigen, scharfen Riefen; von *Sphallerocarpus* dch die 1striemigen Riefen und den verwischten Rand des K.; von *Myrrhis* dch das ganz an den Samen angewachsene Fruchtgehäuse, die 1striemigen Thälchen und das mit einer Furche ausgehöhlte u. nicht eingerollte Eyweiss. Von *Bunium* steht sie so ferne, als *Chaerophyllum* und *Anthriscus*.

1. *B. TUBEROSA* Knollige B. — 4. Biasoletto fand sie auf dem Monte Maggiore in Istrien und Monte Velebit in Dalmatien. *Myrrhis cynapioides* Guss. pl. rar. hung. t. 24., *M. Bunium* a. Tenor. syllog., (mit Ausschluss der Synonyme.) *Bunium cynapioides* Bertolon. fl. ital. Die W. ist knollig, rundl.; der St. 1 Fuss hoch mit 2-3 endst. Dolden, kahl; die B. doppelt-fiedersp., kahl, am Rande etwas rauh; die Blättchen fiederig-getheilt, die Zipfel der unteren B. lanzettl., der oberen lineal. Die Dolden 10strahlig, von der Gestalt wie bei *Chaerophyllum*, aber die Hüllchen sind absteehend, nicht zurückgebogen; sie sind eyf.-lanzettl., haarspitzig, am Rande kahl; die Früchte lineal., kohlschwarz, die Stempelpolster kegelf., die Gf. aufrecht. J.

62. *MYRRHIS* (Scop.) Süssdolde. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht von der Seite zsgedrückt. S. einwärtsgerollt, mit einer doppelten Haut bedeckt: die äussere in 5 geschärfte, spitzgekielte, inwendig hohle Riefen hervortretend; die innere fest angewachsen. Striemen fehlend.

1. *M. ODORATA* (Scop.) Wohlriechende S. — B. fein-zottig v. kurzen Haaren; Hüllchen lanzettl., zugespitzt. 2. In den Thälern der A., auf Triften der VorA. und Gebirge, (westl. Schw., Vogesen und dch die g. AK. bis Krain und Kärnthen; sodann in Mähren, in den Sudeten, auf dem Meisner in Hessen; in der Eifel bei Malmedy.) Jun. Jul. *Scandix odorata* L. J. a. app. t. 37. *Chaerophyllum odoratum* Lam.

63. *MOLOPOSPERMUM* (Koch.) Striemensame. — K. 5zäh-nig, blattig. Blb. lanzettl., ganz, lang-zugespitzt, mit aufstrebender Spitze. Frucht von der Seite her zsggezogen. Früchtchen mit 5 häutig-geflügelten Riefen; die 2 seitenst. randend, um die Hälfte schmaler; die 3 rückenst. geschärft. Eyweiss stumpf-4eckig; die der Fuge gegenst. Kante mit einer tiefen Furche ausgehöhlt. Zw. dem Eyweiss und der Fuge des Fruchtgehäuses ein leerer Kanal. Thälchen 1striemig. Fuge sehr schmal, striemenlos.

Striemen breit, braun. Frucht oft unförmig, die seitenst. Riefen fast verschwindend und die Striemen der seitenst. Thälchen fehlend.

1. *M. CICUTARIUM* (DC.) Farrenblättrige S. — 4. Auf rauhen Gehirgen, in die A. hinaufsteigend. (Wallis, Graubünden, Veldlin, C. Tessin; auf dem monte Generoso im C. Tessin; im südl. Tyrol; auf dem monte Santo, Matajur im südl. Krain.) Jul. Aug. *M. peloponnesiacum* Koch. *Ligusticum peloponnesiacum* L. J. a. app. t. 13. *L. cicutarium* Lam. Bth. weiss.

XII. Gruppe. *SMYRNEEN*. Koch. umb. 133. Frucht gedunsen, von der Seite her oft zsgedrückt oder zsgezogen. Früchtchen mit 5 Riefen, die seitenst. randend oder vor dem Rande gelegen, die Riefen bisweilen fast verwischt. Eyweiss einwärtsgerollt oder auf der innern Seite gefurcht, und desshalb auf dem Querschnitt halbmondf. oder zsgefaltet.

64. *ECHINOPHORA* (L.) Stacheldolde. — Rand des K. 5zäh-
nig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen, oder die äussern grösser und 2sp. Bth. im Strahle männlich, langgestielt: die weibl. einzeln im Mittelpunkte. Frucht eyf., fast stielrund, von einem hohlen Fruchtb. eingeschlossen, kurz-geschnäbelt. Schnabel hervorragend. Früchtchen mit 5 niedergedrückten, welligen, wellig-gerillten, gleichen Riefen. Thälchen Istrienig, Striemen mit einer spinnwebigen Haut bedeckt. Eyweiss einwärtsgerollt.

1. *E. SPINOSA* (L.) Starre St. — B. gefiedert; Blättchen fiedersp., die der obern B. einfach und 3sp., Zpfl lineal., starr, fast 3kantig, in einen Dorn zugespitzt. 4. Am Meeresstrande, (bei Aquileja.) Jun. Jul. Bth. weiss. D.

65. *CONIUM* (L.) Schierling. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrtherzf., etwas ausgerandet, mit einem sehr kurzen, einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht von der Seite her zsgedrückt, eyf. Früchtchen mit 5 hervorspringenden, wellig-gekerbten, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen vielrillig, striemenlos. Eyweiss mit einer tiefen, schmalen Furche eingeschnitten.

1. *C. MACULATUM* (L.) Gefleckter S. — Hüllblättchen lanzettl., kürzer, als die Döldchen. ☉. Auf Schutthaufen, in Hecken, an Wegen. Jul. Aug. J. a. t. 156. *Cicuta maculata* Lam. *C. maior* Lam. *Coriandrum Cicuta* Crantz. Bth. weiss. Was ich bisher als *C. croaticum* WK. sah, war Abänderung von *C. maculatum*.

66. *PLEUROSPERMUM* (Hoffm.) Rippensame. — Rand des K. 5zäh-
nig. Blb. verkehrteyf., ungeth. Frucht von der Seite her zsgedrückt, eyf. Früchtchen mit einer doppelten Haut versehen: die äussere in 5 gedunsene, hohle Riefen aufgeblasen; die innere fest angewachsen und in 5 kleineren, den äussern gegenst. Riefen hervortretend. Thälchen der innern Haut 1-2striemig, und deshalb die Striemen auf dem Samen selbst liegend. Eyweiss auf dem Querschnitte halbmondf.

1. *P. AUSTRIACUM* (Hoffm.) Oestreichischer R. — Riefen der Früchtchen stumpf, gekielt, Kiel etwas gekerbt. 4. Auf den VorA.

und A., auch auf niedrigen Gebirgen, (südl. Schw. und dch die g. AK., auf den Sudeten, dem Thüringer Walde, Mähr., bei Bottenroda in Hessen.) Jul. Aug. *Ligusticum austriacum* L. J. a. t. 151. L. Gmelini Vill. Bth. weiss.

67. *MALABAILA* (Tausch in der bot. Zeitung 1834. B. I. S. 356.) Malabaile. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrtherzf., mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht vom Rücken her etwas zsgedrückt, eyf. Fruchtgehäuse dünn, fast häutig. Früchtchen mit 5 geschärften, fast flügeligen, gleichen Riefen; die seitenst. randend. Thälchen flach, 3striemig; Striemen in dem Fruchtgehäuse eingewachsen und nicht auf dem Samen liegend. S. einen freien, blos mit dem Nabel angehefteten Kern darstellend, striemenlos, am Rande eingerollt.

Als ich die Gattung *Hladnikia* begründete, war mir ausser Acht gekommen, dass Tausch schon 1834 meine Pflanze unter der neuen Gattung *Malabaila* mit deutlichem Gattungs-Charakter aufgeführt hatte, deswegen habe ich jetzt den von mir später ertheilten Namen zurückgestellt. Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, dem verdienten Namen *Hladnik's* ein Denkmal zu stiften. — Eine von allen sehr verschiedene Gattung. Stimmt mit *Archangelica*, *Crithmum*, *Agasyllis*, *Cachrys*, *Frangos* und *Magydaris* dch den freien, mit dem Fruchtgehäuse nur vermittelst des Nabels anhängenden Samen überein. Untersch. sich aber von allen diesen durch das striemige Fruchtgehäuse und den striemenlosen Samen und noch weiter von den 3 erstern dch die verkehrtherzf. Blb. und den zsgerollten Samen; von *Archangelica* dch die gleichen Riefen; von *Agasyllis* dch die geschärften Riefen, wovon die seitenst. randen, und von den 3 letztern dch das dünne Fruchtgehäuse; von *Cachrys* und *Frangos* ausserdem dch die verkehrtherzf. Blb.

1. *M. HACQUETH* (Tausch) *Hacquet's M.* — 4. Auf den höhern Gebirgen von Krain, („nicht bloss auf dem Berge Golak, sondern auf vielen andern Bergen von Laibach bis Idria, vom Grostkahlen- und Katharinenberge an“, D. Graf!) Jun. Jul. *Athamanta Golaka* *Hacquet*. *Hladnikia golacensis* Koch. Synops. ed. 1. *Pleurospermum Golaca* Rb. fl. exc. *Ligusticum carniolicum* Host. Bth. weiss. D.

65. *SMYRNIUM* (L. mit Ausschl. von Arten.) *Smyrnum*. — Rand des K. verwischt. Blb. lanzettl. oder elliptisch, ganz, zugespitzt, mit einer einwärtsgebogenen Spitze. Frucht von der Seite her zsggezogen, dch die nierenf.-kugeligen Früchtchen 2knotig. Früchtchen mit 3 rückenst., hervorspringenden, geschärften Riefen; die 2 seitenst. randend, verwischt. Thälchen reichstriemig. Eyweiss eingerollt.

1. *S. PERFOLIATUM* (Mill.) *Durchwachsenes S.* — Der St. oberwärts kantig-geflügelt; die StB. stengelumfassend, herz-eyf., gekerbt. ☉. In Wäldern und auf Waldwiesen, (im Littor., im Walde von Lippiza bei Triest; bei Fiume.) Apr. Mai. *S. Discoridis* Spreng. Bth. gelb. D.

III. Unterordng. *COELOSPERMEN*. Eyweiss halbkugelig- oder sackartig-konkav

XIII. Gruppe. *CORIANDREEN*. Koch. umb. 82. Frucht kugelig, oder dch 2 fast kugelige Früchtchen 2knotig. Früchtchen

mit 3 niedergedrückten und geschlängelten oder eine verwischte Furche darstellenden Hauptriefen; die seitenst. vor einem Nebenrande liegend; Nebenriefen 4, mehr hervorspringend; sämmtl. flügellos. Eyweiss wie bei der Unterordnung.

66. *BIFÓRA* (Hoffm.) Bifore. — Rand des K. verwischt. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen, die äussern fast gleich oder strahlend und 2sp. Frucht 2knotig. Früchtchen kugelig-bauchig, körnig-runzelig, mit 5 eingedrückten, schwachen Rillen bezeichnet; die 2 seitenst. halbkreisf., vor dem Nebenrand liegend. Striemen fehlend. Fuge mit 2 Löchern. Eyweiss sackartig-konkav.

1. *B. RADIAN*S (MBiebst.) Strahlende B. — Dolden 5strahlig; die äussern Bth. strahlend; die Gf. ohngefähr halb so lang, als die Früchtchen; Früchtchen sehr stumpf. ☉. Unter der Saat, (Veltlin und bei Morbegno in Graubünden; südl. Tyrol bei Monfalcone, Triest und in Istrien.) Jun. Jul. Bth. weiss. — Die *B. testiculata* DC. (*B. flosculosa* Bieb. *Coriandrum testiculatum* L.) untersch. sich: dch die 2-3 strahligen Dolden, fast gleichen Blb., mehr runzeligen, an der Spitze in einen kurzen, kegelf. Schnabel vorgezogenen Früchtchen und dch die sehr kurzen Gf., die kaum länger, als das Stempolster sind. Ein im Gebiete unserer Fl. gesammeltes Expl. davon sah ich noch nicht. D.

67. *CORIANDRUM* (L. mit Ausschl. der zweiten Art.) Koriander. — Rand des K. 5zählig. Blb. verkehrteyf., ausgerandet, mit einem einwärtsgebogenen Läppchen. Frucht kugelig. Früchtchen mit 5 niedergedrückten, schlängeligen Hauptriefen, die seitenst. vor dem Nebenrand liegend; Nebenriefen 4, mehr hervorspringend, gekielt. Thälchen striemenlos. Eyweiss ausgehöhlt, mit einer abgelösten Haut bedeckt.

1. *C. SATIVUM* (L.) Gebaueter C. — ☉. Unter der Saat, (in den südlichen, über den A. gelegenen Gegenden, ausserdem hin und wieder verwildert.) Jun. Jul. Schk. t. 72. St. h. 3. Bth. weiss.

LVI. Ördng. ARALIACEEN. Juss. dict. 2. p. 348.

Röhre des K. an den Fruchtkn. angewachsen; Rand oberst., zählig, oder ganz. Blkr. 5-10blättrig, vor einer oberweibigen Scheibe eingefügt; Blb. mit breiter Basis sitzend, in der Knospenlage klappig. Stbg. wie die Blb. vor der Scheibe eingefügt, von gleicher Zahl mit denselben und damit abwechselnd oder in doppelter Anzahl vorhanden. Fruchtkn. 2-mehrfächerig; Fächer 1-eyig, Eychen hängend. Gf. 1 oder mehre; mit einer einfachen N. endigend. Frucht beerenartig. S. eyweisshaltig, hängend. Embryo gerade, in der Achse liegend, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Sträucher mit nebenblattlosen B.

Bei unserm einheimischen Ephen ist der Embryo nicht klein, sondern nimmt die ganze Länge des S. ein, und die Keimb. sind entwickelt und verbreitert, wie man sie bei der Gattung *Cornus* beobachtet, und die S. hängen ganz deutlich an der Spitze der Fächer. Ware vielleicht der Ordn. der Corneen wieder einzuverleihen? Das Eyweiss ist doch tiefe Queerritzen eingeschnitten. Die Abbildg. des Embryo von *Hedera* bei Gärtn. fruct. t. 26., vielleicht nach den unreifen S. gezeichnet, ist nicht gut.

1. *HÉDERA* (L. Schwartz) Ephen. — Rand des K. vorspringend oder gezähnt. Blb. 5-10, an der Spitze nicht müthenf.-zshängend. Stbg. 5-10. Gf. 5-10, zsneigend, oder in einen einzigen zsgewachsen. Beere 5-10fächerig.

1. II. *HELIX* (L.) Gemeiner E. — Der St. mit wurzelartigen Fasern kletternd; B. lederig, kahl, glänzend, winkelig-5lappig, die obersten und die der blühenden Äestchen ganz, eyf., zugespitzt; Dolden einfach, flaumig. ♀. In Wäldern, an Felsen und Mauern. Octb., die Beeren reifen erst im folgenden Frühling. Schk. t. 49. Bth. grün.

LVII. Ordng. CORNEEN. DC. prodr. 4. 271.

Steinfrucht, sonst alles, wie bei den Araliaceen.

1. *CORNUS* (L.) Hornstrauch. — Saum des K. oberst., 4zäh-
nig. Blb. 4 Stbg. 4. Gf. 1. Steinfrucht mit 2fächerigem Steine,
Fächer 1samig.

1. *C. SANGUINEA* (L.) Rother H. — Äeste aufrecht; B. eyf.,
gleichfarbig; *Trugdolden flach; Hülle fehlend*; Haare der Äeste
und Bthstiele angedrückt. ♀. Auf steinigen, buschigen Hügeln, in
Hecken und an Zäunen der Ebenen und niedrigeren Berge. Mai.
Jun. St. h. 52. Bth. weiss.

2. *C. MAS* (L.) Gelber H. — Äeste kahl, die jüngern ange-
drückt-haarig; B. eyf., zugespitzt; *die vor den Blättern blühen-
den Dolden ohngefähr so lang, als die Hülle.* ♀. Auf trocknen
Hügeln, an gebirgigen O. unter Gesträuch, (in der südl. Schw.,
Südtirol, Krain, Oestr., Böhmen, Sachs. und Thüringen, bei Re-
gensb.) März. Apr. St. h. 52. Bth. gelb.

3. *C. SUECICA* (L.) Schwedischer H. — Der St. krantig; B.
sämmtl. gegenst. sitzend, eyf., 5-7nervig; Dolde gestielt, halb so
lang, als die Hülle. ♀. An torfhaltigen, schattigen O., (in Ol-
denbg, Holstein, Ostfriesland.) Jun. Jul. St. h. 52. Bth. pur-
purn. D.

LVIII. Ordng. LORANTHACEEN. Don. prodr. fl. nep. 142. DC. prodr. 4. 277.

Röhre des K. an den Fruchtkn. angewachsen; Saum ganz
oder lappig. Blkr. 4th. oder 4blättrig, in der Knospenlage klap-
pig. Stbg. so viel, als Blb., und diesen gegenst.; Stbf. mehr oder
weniger auf d. Blkr. angewachsen oder fehlend und die Stbk. auf

der Blkr. aufgewachsen. Fruchtkn. 1, 1fächerig, 1eig, Eychen aufrecht. Gf. 1, mit kopfiger N. oder eine sitzende Narbe. Frucht beerenartig. Eyweiss fleischig. Embryo umgekehrt, Würzelchen vom Nabel entfernt. Schmarotzende Sträucher.

1. VISCUM (L.) Mistel. — Bth. 1geschlechtig. Männchen. K. fehlend. Blkr. 4th. Stbk. an d. Blb. angewachsen. Weibchen. Rand des K. oberst., ganz. Blkr. 4blättrig. Gf. fehlend. N. stumpf. Beere 1samig.

1. V. ALBUM (L.) Weisser M. — Der St. gabelsp., sehr ästig; Aeste stielrund; B. lanzettl., stumpf, nervenlos; Bth. endst., sitzend, meist 5zählig, geknäuel. h. Auf den Aesten verschiedener Bäume, vorzügl. der Birn- und Aepfelbäume. März. Apr. St. h. 8. Bth. gelblich. Beeren weiss. Var.:

β. *polycoccon*, Köpfchen reichblüthig. Gaud. helv. Cam. edit. 556.

2. V. OXYCEDRI (DC.) Blattloser M. — *Blattlos; der St. sehr ästig. gegliedert; Aestchen etwas zsgedrückt; Scheidchen beckenf.; die männl. Bth. an den Gelenken 1-3, sitzend, die weiblichen an der Spitze der Aestchen 3. kurzgestielt. h. Auf dem Juniperus Oxycedrus, (auf der Insel Cherso.) Blühet . . . Habitus einer Salicornia. „Die Frucht eine bläuliche, längliche, zwar weniger fleischige Beere; aber nicht kapselig.“ DC. Razoumowskia caucasica Hoffm. Arcanthobium Oxycedri MBieb. Clus. hist. 1. 39.*

2. LORANTHUS (L.) Riemenblume. — Bth. zwittrig oder 2häusig. Rand des K. oberst., kurz, abgeschnitten oder gezähnt. Blb. 4-8, öfters 5-6, getrennt oder mehr oder weniger zsgewachsen. Stbg. so viel, als Blb., diesen gegenst.; Stbf. an die Basis der Blb. angewachsen, an der Spitze frei. Der Gf. fädlich, die N. einfach. Beere 1samig.

1. L. EUROPAEUS (Jacq.) Europäische R. — Kahl, sehr ästig; Aeste stielrund; B. gegenst., gestielt, oval-länglich, stumpf, an der Basis etwas verschmälert, spärlich-aderig; Aehren endst., locker, einfach; Bth. dch. Fehlschlagen 2häusig, Bl. 6blättrig. h. Auf den Aesten der Eichen schmarotzend, (in Krain, Steyermark; Litor., Unteröstr. und Mähren.) Apr. Mai. J. a. t. 30. St. h. 34. Bth. gelblich-grün; Beere hellgelb. D.

LIX. Ordng. CAPRIFOLIACEEN. Juss. gen. p. 110., mit Ausschl. der sect. 2. und 4. DC. prodr. 4. p. 321.

K. oberst., Saum 2-5sp. oder fast ganz. Blkr. 1blättrig, auf dem Fruchtkn. gestellt, Saum 4-5sp. Stbg. der Blkr. eingefügt, frei, den Zpfn an der Zahl gleich und mit ihnen abwechselnd, oder noch einmal so viel, oder 4 und zweimächtig. Fruchtkn. 3-5fächerig, Fächer 1-mehreig, Eychen hängend. Frucht beeren-

artig, oft 1fächerig. Keim im Mittelpunkt des Eyweisses, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. gegenst. Frucht bisweilen aus 2 zsgewachsenen Fruchtkn. gebildet, sodann mit 2 K. bekrönt.

I. Gruppe. *SAMBUCEEN*. II. B. und K. nov. gen. am. 3. 487. Blkr. radf. Gf. oder N. 3-5.

1. *ADÓXA* (L.) Bisamkraut. — K. halboberst.; Saum 3 sp., halb so lang, als die Blkr. Blkr. radf.; Röhre sehr kurz, jedoch am Schlunde etwas verengert, Saum 5 th., flach. Stbg. 10, paarweise zw. die Zpfl des Saumes eingefügt, Stbk. aufliegend, 1fächerig. Gf. 5, pfriemlich, N. stumpf. Die Steinfrucht krantig-saftig, (wie die B. von *Sempervivum*.) in der Mitte mit den bleibenden Zähnen des K., an der Spitze mit den Gf. bekrönt, jünger 5fächerig, Fächer leyig. Eychen hängend, mehrere zuletzt fehlschlagend. An der endst. Bth. ist der Saum des K. 2sp., Blkr. 4sp., Stbg. 8, Gf. 4. Beere 4fächerig. — Es sind eigentlich 5 oder 4 bis auf die Basis getheilte Stbg. vorhanden; zuweilen sind sie nicht ganz bis auf den Grund gespalten. Eine der *Sambucus* hinsichtlich der Blüthe und Frucht sehr nahverwandte Gattung.

1. *A. MOSCHATELLINA* (L.) Gemeines B. — 4. In Hainen und etwas feuchten Hecken der Ebenen und niedrigen Berge und bis zu den höchsten A. hinaufsteigend. März. Apr. Schk. t. 109. a. Bth. grün.

2. *SAMBUCUS* (L.) Hollunder. — K. während der Bthezeit halboberst., Saum 5zählig. Blkr. radf.; Saum 5sp., zuletzt zurückgebogen. Stbg. 5. Gf. fehlend. N. 3, sitzend. Beere 3-5samig.

1. *S. EBULUS* (L.) Zwerg-H. — Der St. krantig, kleinwarzig; *die NebenB. blattig, eyf., gesägt*; Hauptäste der Trugdolde 3zählig. 4. An Waldrändern, Hecken. Jul. Aug. Schk. t. 83. Bth. weiss, auswendig röthlich; Beeren schwarz.

2. *S. NIGRA* (L.) Gemeiner H. (Flieder.) — Der St. strauchig, fast baumig; die NebenB. warzenf. oder fehlend; *Hauptäste der Trugdolde 5zählig.* 4. In Wäldern. Jun. Jul. Tabern. krtb. 1439. f. 1. Bth. weiss, Beeren schwarz, Mark der Aeste schneeweiss. Var.:

β. *virescens*, Früchte grün: *S. virescens* Desf.

γ. *leucocarpa*, Früchte weiss.

δ. *laciniata*, B. doppeltgefiedert, Fiederchen eingeschnitten: *S. laciniata* Mill. Taber. l. c.

3. *S. RACEMOSA* (L.) Trauben-H. — Der St. strauchig; *R. eyf.* 4. In Wäldern. Apr. Mai. J. ic. rar. t. 59. Bth. weiss, Beeren roth, Mark der ein Jahr alten Aeste rothgelb. Var.:

β. *laciniata*, B. doppeltgefiedert, Fiederchen gesägt und eingeschnitten (Koch bei DC fl. fr. suppl. p. 500.) In der Rheinpfalz entdeckt, nun dch mich in die bot. Gärten verbreitet.

3. **VIBURNUM** (L.) Schneeball. — K. oberst., Saum 5zählig. Blkr. radf., etwas glockig oder röhrig, 5lappig. Stbg. 5. N. 3, sitzend. Beere 1samig. — Bth. weiss.

1. **V. TINUS** (L.) Immergrüner S. — *B. eyf.-länglich, ganzrandig*, immergründend, unterseits in den Winkeln der Adern gebärtet. $\frac{1}{2}$. An rauhen, unkultiv. O., (Istrien und auf den nahe gelegenen Inseln.) März. Apr. Tinus 3. Clus. hist. 1. p. 49. J.

2. **V. LANTANA** (L.) Wolliger S. — *B. eyf., gezähnt-gezägt*, an der Basis etwas herzf., unterseits runzelig-aderig und nebst den Aestchen von einem sternf. Flaum kleig-filzig, oberseits von zerstreuten Sternhärchen fläumlich; Ebenstraus endst., gestielt. $\frac{1}{2}$. An waldigen, gebirgigen O., auf Letten- und Kalkboden. Mai. J. a. t. 341.

3. **V. OPULUS** (L.) Gemeiner S. — *B. 3- oder 5lappig*, Lappen zugespitzt, gezähnt: Bstiele drüsig, kahl; Ebensträusse endst., gestielt; die äussern Bth. strahlend, geschlechtlos. $\frac{1}{2}$ In etwas feuchten Hecken, an Ufern, Waldrändern. Mai. Jun. St. h. 27. Eine Variet. mit kugeligen Trugdolden und lauter grossen, geschlechtlosen Bth., *V. Opulus β . roseum L.*, wird in den Gärten kultiv.

II. Gruppe. **LONICEREEN**. Brown. char. und descr. p. 4. DC. prodr. 4. 329. Blkr. röhrig od. glockig, oft unregelmässig. Gf. fädlich.

4. **LONICÉRA** (mit Ausschl. von Arten.) Lonicere. — Saum des K klein, 5zählig. Blkr. röhrig oder fast glockig, Saum 5sp., unregelmässig. Sibg. 5. N. kopfig. Beere 3fächerig, Fächer mehrsamig. S. mit einer krustigen Samenhaut.

I. Rotte. **CAPRIFOLIUM** DC. prodr. 4. 331. Bth. kopfig-quirlig. Beeren mit dem bleibenden K. gekrönt. St sich schlingend.

1. **L. CAPRIFOLIUM** (L.) Geissblatt-L. — Bth. quirlig und kopfig, *das endst. Köpfchen sitzend*; B. abfällig, die oberen zsgewachsen, etwas durchwachsen; *der Gf. kahl*; Aeste sich schlingend. $\frac{1}{2}$. An rauhen, waldigen O. unter Gesträuch, (in Oestr., Krain und im südl. Tyrol und in der südl. Schw.; im übrigen Gebiete hin und wieder verwildert.) Mai. Jun. J. a. t. 357., die Variet. mit weisslichen Bth. *Caprifolium italicum R. und S.*, *Periclymenum italicum Mill.* Bth. weisslich oder purpurn, inwendig unfänglich weiss, dann gelb, die Aeste bisweilen ganz mit Haaren besetzt. Die *L. pallida* Host. gehört nach Tausch in der bot. Zeitg zur Var. mit weissen Bthen.

2. **L. IMPLEXA** (Ait.) Verflochtene L. — Bth. quirlig und kopfig, *das endst. Köpfchen sitzend*; B. immergrün, die obern zsgewachsen, etwas durchwachsen; *der Gf. rauhh.*; Aeste sich schlingend. $\frac{1}{2}$. Auf trocknen Hügeln unter Gesträuch, (Istrien.) Mai. Jun. Var.: die untern B. breiter, an der Basis herzf.: *L. balecaria*

Vivian. Bth. ein wenig kleiner, sonst genau, wie an *L. Caprifolium*. J.

3. *L. ETRUSCA* (Santi.) Etrurische *L.* — Bth. kopfig, *Köpfchen gestielt*; *B.* abfällig, *die obersten zsgewachsen und völlig dchgewachsen*; Gl. kahl; Aeste sich schlingend. ♀. Unter Gesträuch, an Zäunen, (im Littor.; im wärmern Wallis.) Jul. Aug. *B.* unterseits meist rauhh.

4. *L. PERICLYMENUM* (L.) Deutsche *L.* — Bth. kopfig, *Köpfchen gestielt*; *B.* abfällig, *sämmtl. getrennt*; *Aeste sich schlingend*. ♀. In Zäunen, an Waldrändern. Jun.-Aug. Schk. t. 40. *Periclymenum vulgare* Mill. Bth. gelblich-weiss, oft auswendig röthlich, zuletzt schmutzig-gelb. Var. mit unterseits rauhh. *B.* *L. etrusca* Lej.; und mit lappigen *B.*: *L. Periclymenum quercifolium* Ait.

II. Rotte. *XYLOSTEUM* DC. prodr. 4. 333. Bth. gezweiet. Saum des K. abfällig, die Beere nicht bekrönend. Die St. aufrecht

5. *L. XYLOSTEUM* (L.) Hecken-*L.* — *Bthstiele 2blüthig, zottlg, ohngefähr so lang, als die Bth.*; *Fruchtkn. an der Basis zsgewachsen*; *B.* oval, flaumig. ♀. In Hecken und Wäldern der Ebenen und niedrigen Gebirge. Mai. Jun. Fl. dan. t. 808. Blkr. flaumig, blassgelb. Beeren roth. + var. *caprifolia* Aug. 82

6. *L. NIGRA* (L.) Schwarze *L.* — *Bthstiele 2blüthig, kahl, mehrmals länger, als die Bth.*; *Fruchtkn. an der Basis zsgewachsen*; *B.* länglich-elliptisch, die jüngeren etwas flaumig, die ältern ganz kahl. ♀. In Wäldern der VorA., auch niedern Gebirgen, (dch die ganze AK. und in dem Gebirge von Schlesien und der Lausitz, Sudeten.) April. Mai. J. a. t. 314. Bth. weisslich oder auswendig purpurlich. Beeren schwarz. + var. *caprifolia* Aug. 82

7. *L. CAERULEA* (L.) Blaue *L.* — *Bthstiele 2blüthig, kürzer, als die Bth.*; *Fruchtkn. in etnen einzigen, kugeligen, 2blüthigen zsgewachsen*; *B.* länglich-elliptisch, stumpf oder ziemlich spitz. ♀. In Gebirgen und VorA., (dch die g. AK. bis Krain und Steyermark; mit den Flüssen in die Ebenen herabziehend, auf dem Riede bei Memmingen.) Apr. Mai. J. app. t. 17. Bth. gelblich-weiss. Beere schwarz, blaubereift. — *L. pyrenaica* L., die um Brixen im südl. Tyrol vorkommen soll, ist sehr ähnlich, aber leicht dch die freien und auf keine Weise zsgewachsenen Fruchtkn. zu unterch.

8. *L. ALPIGENA* (L.) Alpen-*L.* — *Bthstiele 2blüthig, mehrmals länger, als die Bth.*; *Fruchtkn. fast bis an die Spitze zsgewachsen*; *B.* elliptisch, lang-zugespitzt. ♀. In den A. und VorA., (dch die AK.; mit den Flüssen in die Ebenen hinabsteigend.) Mai. Jun. J. a. t. 274.

5. LINNAEA (Gronov. L.) Linnäa. — Saum des K. oberst., 5th., mit fast gleichen Zpfln. Stbg. 4, am Grund der Blkr. eingefügt, 2 länger. Der Fruchtkn. unterst., 3 fächerig, Fächer 1 eyig,

Eychen hängend. Gf. abwärtsgeneigt, N. kugelig. Beere trocken, dch Fehlschlagen Isamig, dch 2, mit der Frucht vergrösserte DeckB. vollkommen-eingeschlossen, und an diese bis zur Mitte angewachsen.

1. *L. BOREALIS* (L.) Nördliche L. — 4. In Nadelwäldern, in den Moosen kriechend, (von Holstein dch Mecklenbg, Pommern nach Preussen; in Brandenbg, der Lausitz, Schlesien, Böhmen und Mähr.; sodann in den A. von Salzbg und Tyrol, Graubünden und Wallis.) Mai. Jun., in den A. später. St. h. 17. Blkr. weiss, inwendig mit blutrothen Streifen. Fruchtkn. von 4 DeckB. (einem unterst. K. nach Linn.) umgeben, von denen 2 kleiner sind.

LX. Ordng. STELLATEN. L. ord. nat. R. Brown. in Congo. Rubiacearum tribus DC. prodr. 4. p. 580.

K. oberst.: Saum 4-5-6lappig, oder unmerklich und bei der Frucht verschwindend. Blkr. 1blättrig, auf dem Fruchtkn. sitzend. 4, 5, 6sp. Stbg. der Blkr. eingefügt, so viel, als Zpfl der Blkr., und mit diesen abwechselnd. Fruchtkn. 1, oft 2knötig, 2fächerig, Fächer 1eyig, Eychen aufrecht. Gf. 1, oft 2sp. N. 2-Frucht nuss- oder steinfruchtartig, nicht aufspringend, oft in 2 Früchtchen sich trennend. Keim gerade in der Achse des hornartigen Eyweisses liegend, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Kräuter mit nebenblattlosen, oft quirligen B.

1. *SHERARDIA* (L.) Sherardie. — Rand des K. 6zählig, sonst alles, wie bei *Asperula*.

1. *S. ARVENSIS* (L.) Acker-S. — ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. Schk. t. 22. Bth. lila.

2. *ASPERULA* (L.) Waldmeister. — Rand des K. unmerklich. Blkr. trichterf. oder glockig, 3, 4, 5sp., Saum absteht. Gf. 2sp., die N. kopfig. Frucht rundlich, 2knotig, Fruchtgehäuse dünn, trocken. Früchtchen fast halbkugelig.

1. *A. ARVENSIS* (L.) Feld-W. — B. unterseits rauh, die untern verkehrteyf., 4st., die übrigen stengelst. lineal.-lanzettl., stumpf 6- oder 8st.; Bth. endst., gebüschelt, kürzer als die borstig, gewimperte Hülle; Früchte kahl. ☉. Auf Aeckern, auf Kalk- und Lettenboden, (am Genfersee, von Basel dch die Rheinfläche bis Bingen; bei Lüttich; im Mainthale bis Würzburg; von Würtemb. dch Baiern nach Oestr.; von da nach Mähren, Schles. und Thüringen; südl. Tyrol; Littorale; in Mecklenbg sehr selten.) Mai. Jun. Bth. blau.

2. *A. TAURINA* (L.) Italischer W. — B. 4st., elliptisch, zugespitzt, 3nervig; Ebensträusse gebüschelt, gestielt; Röhre der Blkr. weit länger, als der Saum; Früchte kahl, punktirt-rauh. 4. In Gebirgswäldern, am Fusse der A., (in der Schw. und Vorarl-

berg, Tyrol; um Görz und Monfalcone.) Mai. Jun. Lobel. ic. 800. Bth. weiss.

3. *A. LONGIFLORA* (Waldst. und Kit.) Langblumiger W. — *B. 4st., lineal.*, kahl, die obern ungleich; W. spindelf., reichstengelig; die St. aufrecht und ausgebreitet; Bth. ebensträussig; die DeckB. lanzettl.-pfriemlich, haarspitzig; Blkr. kahl, *Röhre viel länger, als der Saum*; Früchte körnig-rauh. 4. In Hainen der VorA., (Finne, Steyerm., Kärnth., Krain, Görz, südl. Tyrol, Wallis, Tessin.) Jul. Aug. Blkr. auswendig schmutzig-purpurn, Saum inwendig gelblich. D.

3. *A. CANESCENS* (Visiani in der Regensb. bot. Zeitung B. 12. Erg. B. S. 4.) Weisslichgrauer W. — Kurzh. oder kahl; die B. lineal., stachelspitzig, 4ständig, ungleich; der St. aufstrebend; *Ebensträusschen seitest. fast sitzend oder kurzgestielt, und endst.*; DeckB. lanzettl.-pfrieml., stachelspitzig; die Blkr. kurzh. oder rauh., die Röhre viel länger, als der Saum; die Früchte kurzh. oder kahl und schwach körnig. 4. Auf steinigten rauen O. der Insel Losino bei Istrien, Tommasini. Sept. Bth. in das Purpurrothe spielend. Kommt vor:

α. *hirta*, die ganze Pfl. sammt den Bth. kurzbehaart.

β. *semiglabra*, die Pfl. von der Basis bis zur Mitte kurzh., nach obenhin kahl, die Bth. rauh.

γ. *glabra*, die ganze Pfl. kahl und nur die Bth. rauh.

4. *A. TINCTORIA* (L.) Färbender W. — *B. lineal.*, kahl, am Rande etwas rauh, die untern 6st., *die obern 4st.*, ungleich; W. kriechend; die St. aufrecht, einzeln; Bth. ebensträussig; *die DeckB. oval, spitz, grannenlos*; Blkr. kahl, *Röhre so lang, als der Saum*; Früchte glatt. 4. Auf Haiden und an gebirgigen O. unter Gesträuch, (in der Schw. sehr selten, übrig. stellenweise dch das g. Gebiet.) Bth. weiss.

5. *A. CYNANCHICA* (L.) Hügel-W. — *B. 4st., lineal.*, kahl, am Rande etwas rauh, die obern ungleich; W. spindelf., reichstengelig; die St. ausgebreitet, aufstrebend, sehr ästig; Bth. ebensträussig; *die DeckB. lanzettl., stachelspitzig*; Blkr. rauh, *Röhre so lang, als der Saum*; Früchte körnig-rauhlich. 4. An sonnigen O., auf Haiden, (stellenweise dch das g. Gebiet.) Jun. Jul. Bth. fleischroth, inwendig weiss. Var. die untern B. 6st.; St. höher, lockerer: *A. montana* Kit. bei Willd. In Gärten kommt unter diesem Namen auch oft *A. tinctoria* vor.

6. *A. ODORATA* (L.) Gemeiner W. — *B. lanzettl.*, kahl, am Rande und Kiel rauh, die untern 6st., die obern 8st.; *Ebensträusse gestielt*; *Früchte steifh., Borsten hakig*. 4. In der Dämmerde unter dem Schatten der Wälder und Haine, sowohl der Ebenen, als niedrigeren Gebirge. Mai. Jun. Schk. t. 23. Bth. weiss.

7. *A. APARINE* (Schott. bei Bess.) Kleberblättriger W. — *B. meist 8st., am Rande u. Kiel nebst d. St. rückwärts kleinstachelig-rauh*; Bth. rispig; Früchte körnig. 4. In etwas feuchten Büschen

und an Ufern, (Schles. und Mähren.) Jul. Aug. A. Aparine MB. Rb. ic. 2. f. 198. Bth. weiss. Var. Röhre halb so lang, als die Blkr., was auch bei der folg. Art vorkommt; dazu A. rivalis Sibth. Die schlesische Pfl. gehört zu der Form mit kurzer Blumenkronenröhre. In Mähren aber fand man die Form mit noch einmal so langer Röhre, vergl. Wimm. schles. Flor. D.

8. A. GALIODES (MBiebst.) Labkrautartiger W. — B. starr, lineal., stachelspitzig, am Rande umgerollt und rauh, die Stengelst. meist. 8st.; die St. aufrecht und aufstrebend, stielrund, schwachkantig, kahl oder an der Basis flaumig, oberwärts rispig-ebensträussig; Saum der Bl. länger, als die Röhre; Früchte glatt. 4. An sonnigen O., vorzügl. auf Kalkboden, (in der westl. Schw.; auf der Rheinfläche von Basel bis Bingen; dch Würtemberg nach dem Donaugebirge bis Regensburg und den südl. Fränkischen Bergen; im Mainthale bis Würzburg; Unteröst. und dch Böhm., Mähren und Sachs. bis an den Unterharz.) Jun. Jul. Galium glaucum L. J. a. t. St. G. campanulatum Vill. G. montanum Pollich. Var. mit aufrechtem und ausgebreitetem, an der Basis rauhem und ganz kahlem St. und mit nur halb so grossen Bth. Bth. weiss.

3. CRUCIANELLA (L.) Kreuzblatt. — Zpfl der Blkr. einwärtsgekrümmt-zsneigend. Früchtchen längl. oder halbeyf. Sonst alles, wie bei Asperula.

1. C. ANGUSTIFOLIA (L.) Schmalblättriges K. — B. 6st., lineal-lanzettl.; Aehren verlängert, 4zeilig-dachig, 4eckig; die äussern DeckB. an der Basis zsgewachsen, spitz-gekielt, mit einer flügeligen Kante herablaufend, am Rande kahl. ☉. An sandigen O., (im wärmeren Istrien und auf der Insel Brioni, Tommasini.) Jun. Jul. Barrel. t. 550. Bth. gelb. — C. latifolia L. untersch. sich dch folg.: die untersten B. breiter; Aehren 4eckig; die äussern DeckB. stumpf-gekielt, mit einer verdickten, abgerundeten oder niedergedrückten Kante herablaufend, am Rande gewimpert, die obern bis zur Mitte zsgewachsen. D.

2. C. MOLLUGINOIDES (MBiebst.) Weichlingblättriges K. — B. 6-12st., lineal-lanzettl., rauh; Köpfchen blattwinkelst. und endst. gestielt, fast rispig; die DeckB. ey-lanzettf., zugespitzt, am Rande zottig; Bth. mit der Fünzfahl. 4. An gebirgigen, rauhen O., (Krain, auf dem Kahlenberge bei Laibach; von H. Praef. Hladnik erhalten.) Jul. Aug. Rb. ic. 3. f. 424. Asperula moliuginoides Rb. fl. exc. D.

4. RUBIA (L.) Roethe. — Frucht rundlich, 2knotig, beerenartig, saftig. Sonst Alles, wie bei Galium.

1. R. TINCTORUM (L.) Färber-R. — Die St. jährig; B. 4- oder 6st., etwas gestielt, lanzettl., (getrocknet) netzig-aderig, am Rande rückwärts stachelig-rauh; Bth. blattwinkelst., 3gabelig; Zpfl der Blkr. in ein Anhängsel zugespitzt. 4. Im Orient und da, wo sie gebauet wird. auf Aeckern und an Zäunen, verwildert. Jun. Jul. St. h. 3. Bth. gelblich. Vor der Reihe der randenden Stacheln

an den B. bemerkt man noch eine, die aus kleineren vorwärts gekehrten Stachelchen gebildet ist. Die Mittelrippe der B. und die Kanten des St. sind oft rückwärts-stachelig, wie bei der folgenden. Kultiv.

2. R. PEREGRINA (L.) Fremde R. — B. mit dem St. dauernd, 4 oder 6st., sitzend, lanzettl. oder elliptisch, *adertos*, am Rande rückwärts-stachelig-rauh; Bthstiele blattwinkelst., 3gabelig; Zpfl der Blkr. dch ein Anhängsel haarspitzig. 2. In Hecken und an Zäunen zwischen Steinen, (östl. Littorale und vorzüglich auf den Inseln.) Mai. Jun. Rubia tinctorum Scop. R. anglica Huds.

5. GALIUM (L.) Labkraut — Rand des K. unmerklich. Blkr. radf. oder flach, 4- seltner 3sp. Frucht rundlich-2knotig, trocken. Früchtchen nicht aufspringend, 1samig.

1. Rotte. CRUCIATA Tournef. instit. 115. Arten von Valantia bei L. Bthstand blattwinkelst. Bth. vielehig. Die endst. Bthe an den Verästelungen zwitterig, fruchtbar; die seitenständigen männl., unfruchtbar. Bthstiele nach der Bltheit bogig-zurückgekrümmt, die Frucht unter den, nun ebenso zurückgeschlagenen B. hängend.

1. G. CRUCIATA (Scop.) Kreuzblättriges L. — B. 4st., elliptisch-länglich oder eyf., *3nervig*; Bthstiele seitenst., *ästig*, *deckblattlos*, steifh. oder kahl, bei der Fruchtreife abwärtsgekrümmt; Früchte glatt; der St. rauhh. 2. Auf Waldwiesen, an Zäunen, Hecken. Apr. Mai. St. h. 7. G. cruciatum Sm. Valantia Crucata L. V. chersonensis Willd. V. ciliata Opitz bei Presl. Bth. gelb. Var.:

β. *laevipes*, Bthstiele und Bthstielchen kahl: Valantia Crucata Willd. Presl.

2. G. VERNUM (Scop.) Frühblühendes L. — B. 4st., oval oder länglich, *3nervig*; Bthstiele seitenst., *ästig*, *deckblattlos*, kahl, bei der Fruchtreife abwärtsgekrümmt; Früchte glatt; St. kahl oder unterwärts kurz. 2. In schattigen Wäldern und auf feuchten Wiesen, (in dem C. Tessin, südl. Tyrol; im Littor. und von da dch Krain, Kärnthen, Steyermark, Oestr., Mähr. nach Schles.) Mai. Jun. Schk. t. 345. G. Bauhini R. und S. Valantia glabra L. „Blkr. gelb“ Scop. Die gewöhnliche Pflanze var. mit Bthstielen von der Länge der B. und um die Hälfte kürzer, und beide Variet. mit um die Hälfte kleinern Bth., wie d. Galium verum und andere Galien; seltner mit gelblichweissen und weisslichen Bth. — Ein von diesen Varietäten verschiedenes G. Halleri, ist mir unbekannt. Aus Krain erhielt ich bisher nur die gemeine Pflanze.

L. G. PEDEMONTANUM (All.) Piemontesisches L. — B. 4st., elliptisch-länglich, *3nervig*; Bthstiele seitenst., einfach oder 2sp., *deckblattlos*, zottig, bei der Fruchtreife abwärtsgekrümmt; Früchte glatt, kahl; der St. rückwärts-stachelig, ausserdem kahl oder zottig. ☉. An sandigen O., (im Wallis, bei Cleven im Veltlin; im Littor. und um Dornbach bei Wien.) Mai. Jun. Valantia pedemontana Bell. Bth. gelblich. Die Italienischen, Deutschen und

Ungarischen Expl. die ich sah, haben einen mehr oder weniger rückwärts-stacheligen und zugleich haarigen oder einen stacheligen, haarlosen St. und deshalb kann ich mich nicht überzeugen, dass *G. pedemontanum* und *retrosum* DC. als Arten verschieden seyen.

II. Rotte. *VAILLANTIOIDES*. Arten von *Vaillantia* bei L. Bthstand blattwinkelst. Bth. vielehig. Die endst. Bthe an den Verästelungen zwittrig, fruchtbar; die seitenständigen männl., unfruchtbar. B. nicht abwärtsgekrümmt.

4. *SACCHARATUM* (All.) Ueberzuckertes L. — B. meist 6st., lineal.-lanzettl., *stachelspitzig, Inervig, am Rande aufwärts stachelig-rau*; die St. schlapp, niederliegend, rückwärts stachelig-rau; *Bthstiele seitenst., 3blüthig, nach dem Verblühen zurückgeschlagen*; Bthstielchen kürzer, als die dichtwarzige Frucht. ☉. Auf Aeckern, (im Braunschweigischen; bei Bennstädt, Wansleben und Kölme in der Fl. von Halle; bei Basel; im Badischen; bei Merseburg, Peterm.) Jun. Jul. Bth. weisslich *G. verrucosum* Smith. *Valantia Aparine* L. *V. saccharata* Gmel.

III. Rotte. *APARINE*. Bthstand blattwinkelst., oder zuletzt rispig. Bth. zwittrig. Die St. von abwärtsgekrümmten, ziemlich breiten Stacheln rau, und mit diesen sich den Kleidern und sogar den Händen der Menschen anhängend.

5. *G. TRICORNE* (Withering.) Dreihörniges L. — B. meist. 8st., lineal.-lanzettl., *stachelspitzig, Inervig, am Rande rückwärts stachelig-rau*; die St. schlapp, gestreckt, rückwärts stachelig-rau; *Bthstiele seitenst., meist 3blüthig*; Bthstielchen *nach dem Verblühen zurückgekrümmt*, länger, als die warzig-körnige Frucht. ☉. Auf Aeckern und Kalk- und Lettenboden. Jul.-Herbst. *G. spurium* Roth. tent. *G. Valantia* Wigg. *V. Aparine* Pollich. Bth. weisslich.

6. *G. TRIFIDUM* (L.) Dreisp. L. — B. 4st., lineal.-länglich, vorne breiter, sehr stumpf, *grannenlos, Inervig, am Rande rückwärts stachelig-rau*; die St. schlapp, fädlich, 4eckig, rückwärts stachelig-rau; *Bthstiele seitenst., 1-3blüthig, nach dem Verblühen zurückgekrümmt*; Früchte glatt. 4. Auf schlammigen torfhaltigen Wiesen, (im Seethale bei Judenburg in Obersteiermark; am Bürgersee.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 48. Bth. weiss. D.

7. *G. APARINE* (L.) Kletterndes L. — B. 6- und 8st., lineal.-lanzettl., *stachelspitzig, Inervig, am Rande und an dem Kiele rückwärts stachelig-rau*; die St. schlapp, 4eckig, rückwärts stachelig-rau; *Bthstiele blattwinkelst., zuletzt fast rispig*; *Bthstielchen nach dem Verblühen gerade*; Früchte steifh. oder glatt; *Bthr. schmaler, als die entwickelte Frucht*. ☉. Auf Aeckern, in Gärten, an Zäunen. Jan.-Herbst. Fl. dan. 493. Bth. weiss oder grünlich; der St. ausser der Rauheit der Kanten an den Gelenken oder auch ganz-rauhh., var., aber sehr selten, mit nur wenigen Borsten auf der Frucht. Ferner im Schatten der Wälder und auf den A. mit zartem, niedergestrecktem St. und breiteren verkehrteyf.-lanzettl. B.; hieher gehört *G. tenerum* Schleich. catal.,

Gaud. helv., Koch Synops. ed. I. Durch Kultur geht sie in die gew. Pflanze über. Eine bemerkenswerthe Variet. ist ferner:

β. *Vaillantii*, kleiner, Früchte halb so gross und die St. an den Gelenken meist kahl, nicht rauhh.; übrigens wie die Hauptart: *G. Vaillantii* DC. *G. infestum* W. und Kit. *G. agrestre* α. *echinospermum* Wallr.

γ. *spurium*, Früchte glatt, ausserdem der Variet. β. ganz ähnlich: *G. spurium* L. *G. hispidum* Roth. *G. agrestre* β. *lejospermum* Wallr.

8. *G. ULIGINOSUM* (L.) Morast-L. — *B.* meist 6st., lineal.-lanzettl., stachelspitzig, Inervig, an dem Rande und Kiele rückwärts stachelig-rauh; die St. schlapp, 4eckig, rückwärts stachelig-rauh: *Bthstiele blattwinkelst.*, zuletzt fast *rispigi*; *Bthstielchen nach dem Verblühen gerade*; Früchte knötig-rauh: *Blkr. breiter, als die entwickelte Frucht*. 4. Auf moosigen, torfhaltigen Wiesen, an Gräben und Teichen. Mai-Jul. Bth. weiss. Die den Rand der *B.* einnehmenden Stachelchen sind immer rückwärts gerichtet; aber es ist meist neben dem Rande noch eine andere, nach der Spitze des *B.* gerichtete Reihe von Stachelchen vorhanden, welche, wenn sich der Rand einwärts biegt, was oft geschieht, auf dem Rand selbst zu liegen scheint. Man entdeckt jedoch die Täuschung, wenn man die *B.* umwendet. Aus diesem Irrthum entstand *G. Witheringii* Smith. *G. montanum* With.

9. *G. PARISIENSE* (L. spec. 157.) Pariser L. — *B.* meist 6 st., lineal.-lanzettl., stachelspitzig, Inervig, am Rande aufwärts stachelig-rauh; die St. schlapp, sehr ästig, rückwärts stachelig-rauh; *Bthstiele blattwinkelst.*, zuletzt fast *rispigi*, gerade; Früchte körnig-rauh oder steifh.; *Blkr. schmaler, als die entwickelte Frucht*. 4. Auf Aeckern. (die Var. α. in der südl. und westl. Schw.; in Oberbaden; zw. Mannheim und Mainz: die Variet. β. in der südl. Schw. und um S. Daniele im Littor. und im südl. Istrien.) Jun.-Aug. *G. parisiense* Tausch, bot. Ztg u. Bertol. fl. ital, nach diesen Vorgängern habe ich den Namen *G. parisiense* vorangestellt. *G. gracile* D. fl. I. p. 776. Bth. grün-gelblich, auswendig röthlich. Var.:

α. *trichocarpum* Tausch, Früchte borstig-steifh.: *G. parisiense* L. *G. litigiosum* DC. ic. rar. t. 26. *G. minutiflorum* Brot. *G. anglicum* β. *litigiosum* Koch Syn. ed. I. Aus dem kahlen Samen des *G. anglicum* zog mein Freund Hornung das *G. parisiense* mit borstig-steifh. Früchten.

β. *lejocarpum* Tausch, Früchte körnig-rauh: *G. anglicum* Huds. *G. gracile* Wallr. *G. rubrum* Pollich. *G. anglicum* α. Koch Syn. ed. I.

10. *G. PALUSTRE* (L.) Sumpf-L. — *B.* 4st., lineal.-länglich, vorne breiter, stumpf, *grannenlos*, Inervig, am Rande rückwärts-rauh; die St. schlapp, ausgebreitet, 4eckig, rückwärts-rauh; *R. ausgebreitet*; *Bthstielchen nach dem Verblühen gerade*, wagerecht-abstehend; Früchte glatt. 4. In Gräben, an Ufern. Mai-Jul. Fl. dan. t. 423. Bth. weiss; var. völlig glatt, indem nämlich

am St. und an dem B. die Stachelchen fehlen, und dann mit 5-6 ständigen B. am St.

IV. Rotte. *PLATYGALUM* DC. prodr. 4. p. 798. Bthstand endst., rispig, Bth. zwitterig. Bthstiele nach dem Verblühen gerade. B. 3nervig.

11. *G. ROTUNDFOLIUM* (L.) Rundblättriges L. — B. 4st., oval, 3nervig, kurz-stachelspitzig, am Rande borstig-rauh; die St. schlapp, 4eckig, kahl oder kurzh.; R. endst., gestielt, auseinanderfahrend, armblüthig; Früchte borstig-steifh. 4. In Hainen und schattigen Wäldern der VorA.-Regionen, auch der niedrigeren Gebirge, (auf den Vogesen, dch die g. AK., auch in Oberbaden, Würtemb., Franken, sodann von Oestr. dch Mähr., Schles., Böhm., nach Thüringen.) Jul. Aug. J. a. t. 91. Bth. weiss.

12. *G. BOREALE* (L.) Nordisches L. — B. 4st., lanzettl., 3nervig, grannenlos, am Rande rauh; der St. aufrecht, steif, 4eckig, kahl oder fläumlich, oberwärts rispig; Bthstielchen nach dem Verblühen aufrecht, abstehend; Früchte filzig-steifh. oder kahl. 4. Auf Haiden, in Wäldern, auf Waldwiesen. Jul. Aug. Fl. dan. t. 1024. Bth. weiss. Früchte mit kurzen, aufrechten, an der Spitze hakigen Borsten. Var. aber:

β. *intermedium*, Früchte mit sehr kurzen, angedrückten Börstchen bestreut, gleichsam mit silbernen Punkten bemalt: *G. boreale* γ. D. fl. 1. p. 773. DC. prodr.

γ. *hyssopifolium*, Früchte ganz kahl: *G. boreale* γ. D. fl. *G. hyssopifolium* Hoffm. *G. rubioides* Pollich., nicht L.

13. *G. RUBIODES* (L.) Rötheartiges L. — B. 4st., oval oder länglich-lanzettl., 3nervig, grannenlos, am Rande rauh; der St. ausgebreitet, aufstrebend, kahl, oberwärts rispig; R. verbreitet; Bthstielchen nach dem Verblühen aufrecht, abstehend; Früchte kahl oder etwas fläumlich. 4. An grasreichen O., Flussufern, auf Wiesen, in Waldungen (Krain.) Mai. Jun. Der vorhergehenden zwar sehr ähnlich, untersch. sich aber auf den ersten Blick dch ihr robustes Ansehen, und die viel grössern B. und Früchte; dennoch ist es sehr schwer, eine gute Diagnose zu geben. Früchte kahl oder mit kurzen, aufwärtsgerichteten Börstchen bestreut, auch die St. entweder glatt oder von ganz kleinen Knötchen an den Kanten rauh. D.

V. Rotte. *EGALUM* DC. prodr. 4. p. 593., zum Theil. Bthstand endst., rispig oder quirlig. Bth. zwitterig. Bthstielchen nach dem Verblühen gerade. B. 1nervig. Der St. kahl oder rauh., aber ohne rückwärtsgekrümmte Stachelchen.

14. *G. VERUM* (L.) Gelbes L. — B. lineal, stachelspitzig, unterseits fast sammtig-fläumlich, die stengelst. 8- oder 12st; der St. aufrecht oder aufstrebend, steif, stielrund, trippig, flaumig-rauh; Aeste der R. abstehend, dichtblüthig; Bthstiele nach dem Verblühen fast wagerecht-abstehend; Zpfl. der Blkr. stumpflich, sehr kurz-bespitzt; Früchte glatt. 4. Auf Wiesen, Triften, an Waldrändern. Jun.-Herbst. Schk. t. 23. Var. mit oberseits rauen B.: *G. verosimile* R. und S.; und mit unterseits kahlen B., dunkler-gelben und gelblich-weissen Bth. Die Form mit gelblich-

weissen Bth. und zugleich breiteren B. ist: *G. ochroleucum* Wolf. bei Schweig. und Körte., (nicht Kit., was sich dem *G. lucidum* mehr nähert.)

15. *G. PURPUREUM* (L.) Purpurfarbiges L. — *B. lineal.*, *sehr schmal*, stachelspitzig, die stengelst. 8- od. 10 st.; der St. aufrecht, steif, rispig, sehr ästig, stielrund, 4rippig, flaumig; *Bthstielchen haarfein, nickend, fast traubig*; Zpfl der Blkr. kurzbespitzt; Früchte glatt. 4. An steinigen Abhängen, auf unkultiv. Hügeln, (im C. Tessin, südl. Tyrol und dem Littor.) Jul. Aug. Bth. klein, blutroth.

16. *G. SYLVATICUM* (L.) Wald-L. — *B. länglich-lanzettl.*, *stumpf*, stachelspitzig, am Rande rauh, die stengelst. 8 st.; der St. aufrecht, stielrund, stumpf-4rippig, kahl oder kurzh.; *R. weit-schweifig*; *Bthstielchen haarfein, vor der Blüthezeit nickend*, nach dem Verblühen aufrecht-abstehend; Zpfl der Blkr. kurzbespitzt; Früchte kahl, etwas runzelig. 4. In Wäldern der Ebenen und niedrigeren Gebirge. Jun. Jul. *G. laevigatum* Vill. Bth. weiss. Var. kahl und;

β. pubescens, DC. Der St. nebst den Aesten und Blattnerven unterseits flaumig.

17. *G. ARISTATUM* (L.) Begranntes L. — *B. lanzettl.*, *nach beiden Enden verschmälert, spitz*, stachelspitzig, am Rande rauh oder glatt, die stengelst. 8 st.; der St. aufrecht, 4eckig; *R. weit-schweifig*; *Bthstielchen haarfein vor und nach der Bthzeit aufrecht- etwas abstehend*; Zpfl der Blkr. haarspitzig; Früchte glatt. 4. An gebirgigen rauhen O. unter Gesträuch, (Kärnthen, Steyerm., Tyrol von Botzen an weiter südl. an der ital. Grenze überall in Laubwäldern; südl. Schw., bei Lugano und Genf.) Jul. Aug. *G. aristatum* Trev. mit Ausschl. des Syn. von Villars. *G. laevigatum* Linn. sp. pl. nach dem eigenen Ausspruch Linné's in dem syst. nat. Var.:

α. scabriusculum, B. am Rande rauh: *G. aristatum* Gaud. — D. fl. 1. p. 768.

β. laevigatum, B. am Rande kahl oder fast kahl: *G. linifolium* Lam. DC. mit Ausschl. des Syn. von Villars. Das *G. laevigatum* Vill. ziehe ich wegen des stielrunden und ganz-glaten St. und der zarten, fast ovalen und stumpfen B. zu *G. sylvaticum* L.; d. *G. sylvaticum* Vill. ist eine Abänderung v. *G. Mollugo*.

18. *G. INSUBRICUM* (Gaud.) Lombardisches L. — *B. verkehrt-eyf., abgebrochen-bespitzt, stachelspitzig*, glanzlos, die stengelst. 6 st., die an den Aesten 4 st.; die St. gestreckt, sehr ästig, 4eckig, kahl; *Aeste armblüthig, mit einer einmal 3gabeligen Dolde endigend*; die abgeblühten Bthstielchen abstehend; Zpfl der Blkr. haarspitzig. 4. An felsigen O., (im C. Tessin.) Blkr. weiss, halb so gross, als bei *G. Mollugo*; die St. dünn; B. papierartig, dünn, äderig, die blüthenst. ziemlich gross; die DeckB. etwas breit, fast alle einzeln.

S.

19. *G. MOLLUGO* (L.) Weisses L. — *B. lanzettl. oder verkehrt-*

eyf.-lanzettl., stachelspitzig, unterseits glanzlos, die stengelst. meist Sst.; die St. gestreckt oder aufrecht, 4eckig, kahl oder kurz h.; *Aeste der ausgesperrten R. reichblüthig*, die *untern wagerecht-abstehend*; die *abgeblühten Bthstielchen spreitzend*; *Zpfl der Blkr. haarspitzig*; Früchte kahl, etwas runzelig. 4. Auf trocknen Wiesen, an Wegrändern, in Waldungen. Mai-Aug. Fl. dant. 435. Var. St. kahl und nebst den Aesten mit kurzem, gekrümseltem Flaume überzogen oder der St. unterwärts nebst den B. oder durchaus kurz h., von abstehenden aufrechten Haaren; Bth. weiss und gelblichweiss. — *G. tyrolense* Willd. ist ein kleineres, aufrechtes Expl. von *G. Mollugo*.

20. *G. LUCIDUM* (All.) Spiegelndes L. — *B. lineal.*, *stachelspitzig*, *steif*, *spiegelnd*, unterseits mit einem starken Nerven versehen, die stengelst. meist Sst.; die St. aufrecht, 4eckig, kahl oder kurz h.; die *untern Aeste der länglichen R. wagerecht-abstehend*; die *abgeblühten Bthstielchen spreitzend*; *Zpfl der Blkr. haarspitzig*; Früchte kahl, etwas runzelig. 4. An felsigen, unfruchtbaren O., (südl. Schw., südl. Tyrol, Littor., Steyer m., Unteröstr.) Mai. Jul. *G. rigidum* Vill. Var., wie die vorhergehende, mit kahlem und unterwärts kurz h. St.; letzteres *G. cinereum* Schleich! nicht All.; ferner mit sehr schmalen, (getrocknet) zugerollten und borstenf. B.: *G. corrudefolium* Vill. *G. tenuifolium* All.; und wenn der St. zugleich ausgebreitet ist: *G. tenuifolium* Wulf. Var.:

β. *cinereum*. St. und B. mit einem blauen Reife überzogen, aber wenn man diesen wegwischt, glänzend grün: *G. cinereum* All. Smith stellt 3 verwandte Arten auf, die ich noch nicht sah: *G. cinereum*, *erectum* und *aristatum*, (nicht L. syst. nat.) — *G. ochroleucum* Kit. gränzt ganz nahe an *G. lucidum*, untersch. sich aber dch folg.: B. zwar eben so schmal und zugerollt, aber noch einmal so lang, und die Ebensträusschen aufrecht, nicht spreitzend, wenigstens an der blühenden Pflanze und die fast von der Basis an mit Bth. beladenen Aeste und Bthstielchen sind länger; von der Var. *ochroleuca* des *Galium verum*, dch den ganz-kahlen St. und dch die mit einer fädlichen Haarspitze, fast von der Länge des halben Zpfls, endigenden Zpfl der Blkr.

21. *G. RUBRUM* (L.) Rothes L. — *B. lineal.-lanzettl.*, od. *lanzettl.*, *stachelspitzig*, *1nervig*, die stengelst. 6 st. od. Sst.; die St. schlapp, gestreckt, 4eckig, kahl od. kurz h.; R. ausgebreitet, spreitzend; Bthstielchen haarfein, gerade; *Zpfl der Blkr. begrannt-haarspitzig*; Früchte körnig. 4. Auf trocknen Bergwiesen, (im südl. Tyrol, südl. Thäler von Graubünden; im C. Tessin) Jun. Jul. Bth. blutroth, im Alter gelblich. Var. aber:

β. *obliquum*. Bth. weisslich: *G. obliquum* Vill. nach Trev. *G. obliquum* Wulf. *G. mucronatum* Lam. DC.

22. *G. SAXATILE* (L.) Felsen-L. — *B.* meist 6 st., *stachelspitzig*, *1nervig*, die untern verkehrteyf., die obern umgekehrt lanzettl.; die St. 4eckig, kahl, gestreckt, die blühetrag. aufstrebend; Bth. ebensträussig-rispig; Bthstielchen aufrecht-abstehend; *Zpfl der Blkr. spitz*; Früchte dicht-körnig-rauh. 4. Auf Haiden und

steinigen, sehr unfruchtbaren, etwas feuchten Bergtriften der südlichen, und in den torfhaltigen Ebenen der nördlichen Gegenden, (von Westphalen dch das g. nördl. D.; auf dem Harze, in der Lausitz, im Erzgebirge, in Schles. und Böhmen, Thüringen und den höhern Bergen des Rheingebietes von Oberelsass und Oberbaden bis nach den Niederlanden; Schw. hin und wieder.) Jul. Aug. *G. saxatile* Sm. *G. hercynicum* Weig. D. fl. I. p. 792. *G. montanum* Huds.

23. *G. SYLVESTRE* (Pollich.) Haide-L. — *B. lineal-lanzettl., vorne breiter, zugespitzt, stachelspitzig, 1nervig*, die stengelst. meist 8st., die untern verkehrt-lanzettf.; die St. aus aufstrebender Basis aufrecht od. liegend, 4eckig, kahl od. kurz h.; Bth. ebensträussig-rispig; Bthstielchen aufrecht-abstehend; *Zpfl der Blkr. spitz; Früchte unmerklich-körnig*. 2. Auf Haiden, an Waldrändern, in die A. hinaufsteigend. Jun. Jul. *G. pusillum* L. nach Smith; (aber d. Linnäische Pflanze gehört nach meiner Meinung zu *G. pumilum*.) *G. multicaule* Wallr. Bth. weiss. Var.:

α. glabrum, Rand der B. und das ganze Kraut kahl: *G. sylvestre* 1. *glabrum* Schrad. *G. multicaule α. polyphyllum* Wallr. *G. sylvestre vulgatum* Gaud. *G. umbellatum α. Lam. G. laeve* Thuill. DC. *G. anisophyllum* und *G. montanum* Vill. — Diese Variet., wenn die B. am Rande mit kleinen Bürstchen bedeckt sind, ist *G. sylvestre* 2. *hispidum* Schrad.

β. alpestre, dieselbe Variet., aber niedriger; die R. kürzer, dichter-gestellt: *G. sylvestre* 2. *alpestre* Gaud. d. D. fl. I. p. 792. *G. alpestre* R. und S. DC. *G. argenteum* Vill.

γ. hirtum, D. fl. I. p. 791, der St. nebst den B. von der Basis bis zur Mitte und höher von abstehenden Haaren kurz h.: *G. sylvestre* 3. *pubescens* Schrad. *G. multicaule eriophyllum* Wallr. *G. sylvestre* 3. *Boccone* Gaud. *G. Boccone* All. *G. Bocconi* DC. *G. umbellatum β. Lam. G. scabrum* Pers. *G. nitidulum* Thuill. *G. asperum* Schreb.

δ. supinum, niedrig, 2-3 Zoll hoch; R. kurz, einmal- 2mal-3gabelig; Aeste der R. von der Länge der stützenden B. od. kaum länger; *G. sylvestre ζ. supinum* D. fl. I. c. *G. sylvestre* 4. *supinum* Gaud. *G. supinum* Lam. DC.

Nach den wiederholt verglichenen Abbildungen Jacquin's glaube ich, dass man dessen *G. scabrum* Fl. a. t. 422. zu *G. sylvestre*, und *G. austriacum*, t. 80., zur grössern Variet. von *G. pumilum* ziehen müsse.

24. *G. PUMILUM* (Lam.) Zwergiges L. — *B. lineal., von der Mitte an pfriemlich-verschmälert, begrünnt*, am Rande und an der Basis etwas verdickt, *unterseits neben dem starken Nerven 2furchig*, die stengelst. 6- od. 8st.; die St. sehr ästig, liegend, aufstrebend, 4eckig; Aeste ebensträussig-rispig und nebst den Bthstielchen steif, diese aufrecht-abstehend; *Zpfl der Blkr. spitz; Früchte fein-körnig*. 2. Auf sonnigen Hügeln, (die kleinere Abart in Steyer. auf den Kребенzer A. bei St. Lambrecht unter *Saxifraga tenella*, Zechenter! die grössere am Calvarienberge bei Wien.) Jun. Jul. Lam. illust. t. 60. f. 2. *G. trichophyllum* All.

(Das *G. trichophyllum* Wulf. bei Röm. ist nach Tausch in der bot. Zeitg. eine zwergartige Variet. von *G. verum*.) Bth. weiss; die ganze Pflanze glänzend, etwas starr. Var.:

α. hypnoides, dichtrasig, liegend; Ebensträusse endst. armblüthig: *G. hypnoides* Vill

β. laxius, aus liegender Basis aufrecht; B. manchmal am Rande borstlich-rauh. D. fl. I. 794.

γ. hirtum. D. fl. I. c., der St. und B. mit kurzen, abstehenden Haaren überall besetzt: *G. pusillum* L., nach Gaudin's Meinung, dem ich beistimme: *G. pumilum* *δ. pubescens* DC., *β. hirtellum* Gaud.

δ. maius, 3-4 Zoll hoch, R. reichblüthig. Diese Var. ähnelt sehr dem *G. sylvestre*, untersch. sich aber dch die Form der B., den starren St. und die spreitzenden Aeste: bei kleineren Expl. ist der Blattnerve unterseits sehr dick und die Basis der B. fast halbkugelig-verdickt. — Das sehr ähnliche *G. Jussieni* Vill., *G. pumilum* *β. cespitosum* DC. prodr. untersch. sich dch die beiderseits flachen, nervenlosen und weder am Rande verdickten noch unterseits 2furchigen B.; das ähnliche *G. pyrenaicum*: dch den schwachen Nerven und die 1blüthigen Bthstiele, die halb so lang, als das B. sind.

25. *G. HELVETICUM* (Weigel) Schweitzer L. — B. 6- od. 8st., fast nervenlos, flach, etwas fleischig, grannenlos od. kurzstachelspitzig, sämmtlich verkehrt-eyf-spatelf. und stumpf, oder die obern lanzettl. und spitz; die St. sehr ästig, liegend, aufstrebend, 4eckig, kahl; Bthstiele doldig, end- und blattwinkelst., 1-3 blüthig, ein wenig länger, als die B.; Zpfl der Blkr. spitz; Früchte glatt, 2l. An kiesigen O. der A., mit den Flüssen hie und da in die Ebenen herabsteigend, (in der Schw. selten, auf dem Fouly und Enzeindaz, auf dem Weissenstein; auf den Tyrol. A.; Radstädter Tauern; bayerische A. u. nicht selten auf den Isarbänken bei München.) Jul. Aug. Bth. gelblichweiss. *G. baldense* Spreng. *G. saxatile* Sut. *G. rupicola* Bert. fl. it. nach einem von Facchini mitgetheilten Exempl. — Untersch. sich von den 3 vorhergehenden ausser andern Merkmalen dch die fast nervenlosen, wehrlosen od. mit einem kaum bemerklichen Stachelspitzchen versehenen B. — *G. Villarsii*, Requin in DC. prodr. wäre nach einem Citat aus Gaudin's fl. helv. „*G. sylvestre virens* Gaud.“ den Schweizergewächsen zuzuzählen; aber ich vermurthe, dass die Schweizer-Pflanze doch nicht hieher gehöre, da sie mit der Beschreibung nicht übereinstimmt. *Galium Villarsii* untersch. sich von *G. helveticum* dch die lineal.-verkehrt-eyf, an der Spitze abgerundet-stumpfen, mehr fleischigen, (getrocknet) schwarzen B. und dch die dicken endst., 3st. und 3sp. Bthstiele, die nicht länger, als die B. sind.

6. *VAILLANTIA* (DC., Arten von *Valantia* bei L.) Vaillantia. — Bth. 3st., die mittlere zwittrig, fruchtbar, die seitenst. männlichen mit der mittlern zsgewachsen. Saum des K. unregelmässig-gezähnt, bleibend. Blkr. radf., die männl. Bth. 3sp., die

zwitterige 4 sp. Frucht 3 hörnig, aus 3 zsgewachsenen, mit bleibendem K. gekrönten Fruchtkn. gebildet, 2 eyig, meist 1 samig.

1. V. MURALIS (L.) Mauer-V. — Der St. nebst den B. und K. kahl. ☉. An sonnigen O. und auf Mauern, (Istrien und den benachbarten Inseln.) Column. eph. 297. Bth. grüngelblich. J.

LXI. Ordng. VALERIANEEN. DC. fl. fr. 4. p. 237. prodr. 4. p. 623.

K. oberst.: Saum eingerollt und zuletzt in eine Haarkrone ausgebreitet, od. gezähnt, od. unmerklich. Blkr. 1 blättrig, auf dem Fruchtkn. sitzend: Saum 3-4-5sp., meist ungleich od. auch unregelmässig; Röhre an der Basis oft höckerig od. gespornt. Stbg. der Röhre der Blkr. eingefügt, frei, 4 od. weniger. Fruchtkn. 1 fächerig, od. 2-3 fächerig, nur ein Fuch fruchtbar, mit einem hängenden Eychen. S. eyweisslos. Keim gerade, nach dem Nabel gerichtet.

1. VALERIANA (L.) Baldrian. — Saum des K. während der Blüthezeit eingerollt; bei der Frucht in eine federige Haarkrone ausgebreitet. Blkr. trichterförmig, an der Basis höckerig; Saum 5 sp.

§. 1. Bth. sämmtlich gleichförmig, stets zwitterig.

1. V. EXALTATA (Mikan in Pohl's Tent. fl. boh. 1. p. 41.) Hoher B. — *Die B. sämmtlich gefiedert, 7-10paarig; Blättchen lanzettl., gezähnt-gesägt; St. gefurcht; W. vielstengelig ohne Ausläufer.* 4. In feuchten Wäldern. Jul. bis Aug. V. exaltata Koch bot. Ztg. V. a. altissima Koch Synops. ed. 1. V. altissima Hornem. hort. hafn., V. multiceps Wallr. in d. Linnaea. Blüht um einen Monat später als V. officinalis.

2. V. OFFICINALIS (L.) Gebräuchlicher B. — *B. sämmtl. gefiedert, 7-10paarig; Blättchen lanzettl., gezähnt-gesägt od. ganzrandig; der St. gefurcht; W. einstengelig mit Ausläufern.* 4. In Wäldern, an feuchten O., Ufern, Hecken. Jun. bis Aug. — Bth. fleischroth. Var. mit kahlen und flaumh. Früchten und ferner:

a. major; St. höher, B. sämmtlich gezähnt: V. officinalis St. h. 9., var. major Koch in d. bot. Zeitg., V. officinalis var. media Koch Synops. ed. 1., V. procurrens Wallr. in d. Linnaea.

β. minor; B. ganzrandig od. die untersten wenig gezähnt: V. officinalis var. minor Koch in d. bot. Zeitg. V. officinalis γ. angustifolia Koch Synops. ed. 1., V. angustifolia Tausch pl. sel., nicht Mill. V. collina Wallroth in d. Linnaea. Im Garten treibt diese immer viele Ausläufer.

Valeriana Cardamines Becker, ist nach Fresenius eine abnorme Abart von V. officinalis.

3. V. SAMBUCIFOLIA (Mikan bei Pohl.) Holderblättriger B. —

B. sämmtl. gefiedert, 4-5paarig; Blättchen lanzettl. od. länglich, gezähnt-gesägt; der St. gefurcht: W. einstengelig mit Ausläufern. 4. In feuchten Hainen in Böhm. und Schles., (im Elbgrunde der Sudeten und im Odergebiete von den Sudeten bis Frankfurt; dch Mähr. nach Oestr. und Steyermark, an d. Elbe bei Hamburg). Jun. bis Aug. Bth. fleischroth. Var. höher: *V. repens* Host. a. l. 33.

4. *V. PNU* (L.) Grosser B. — *WB. länglich-lanzettl.*, in den Bstiel verschmälert, *ungeth. od. eingeschnitten*, die *SB.* gefiedert, 3-4paarig; Blättchen ganzrandig; der St. stielrund; *W.* ohne Ausläufer. 4. In Hainen, (zw. Verviers und Limburg.) Mai. Jun. Bth. weiss od. hell-fleischroth.

§. 2 Die Bth. sind auf einem Stocke derselben Art grösser und die Stbk. länger als die Bl., auf dem anderen merklich kleiner und die Stbgf., wiewohl der Gf. über die Bl. hervorragt, doch in diese eingeschlossen, wodurch ein vielzählig-zweihäusiges Geschlecht angedeutet ist, wie bei *Mentha*, *Pulmonaria*, *Primula* u. A.; bei kleinblüthigen Expl. haben die Stbk. oft keinen Blütenstaub; sie repräsentiren dann das weibl. Geschlecht.

* StB. gefiedert

5. *V. DIOICA* (L.) Kleiner B. — Die untersten *WB.* rundlich-eyf. od. elliptisch, *die B. der unfruchtbaren Büschel lang-gestielt, eyf., spitzlich, die untern StB. leyerf.-fiederth.*, die obern meist 3paarig, die *Zpfl* lineal.; Ebensträusse endst.: *Früchte kahl; W. ausläufertreibend.* 4. Auf nassen Wiesen, auch in den VorA. Mai. Jun. St. h. 9. Bth. fleischroth. — Var. selten mit lauter ganzen StB. Rb. ic. f. 120.

6. *TUBEROSA* (L.) Knolliger B. — *WB. elliptisch-länglich, gestielt, die untern StB. leyerf.-fiederth.*, die obern 3-4paarig; die *Zpfl* lineal.; Ebensträusse endst.; *Früchte beiderseits mit 2 seidenh.-flaumigen Linien; W. knollig.* 4. Auf sonnigen Hügeln, Bergwiesen, (jenseits der A. in Krain und im Littor.) Mai. St. h. 54. Bth. fleischroth.

** StB. 3 zählig.

7. *V. TRIPTERIS* (L.) Dreiblättriger B. — *B. gezähnt*, die untersten wurzelst. rundlich, kürzer-gestielt, an den unfruchtbaren Büscheln herzf., langgestielt, *die Stengelst. 3 zählig*; Ebensträusse endst.; *W. vielköpfig.* 4. Auf höhern Gebirgen, den VorA. und A., (von dem obern Theile des Schwarzwaldes dch das Württembergische bis an den Bodensee, dch d. g. AK. bis nach Oestr.; sodann in den Sudeten und höhern Bergen Böhmens, Mähr. und Schles.; zieht hin und wieder mit den Flussbetten in die Ebenen.) Mai bis Aug. St. h. 44 J. a. t. 268. Bth. weiss od. fleischroth. — B. meergrün, nach Gaud. Var.:

β. *intermedia*, StB. ungeth.: *V. intermedia* Vahl., Hoppe und Sternbg.

*** B. ganz.

8. *V. MONTANA* (L.) Berg-B. — *B. etwas gezähnt od. ganz-*

randig, die untersten wurzelst. rundlich, kürzer-gestielt, die der unfruchtbaren Büscheln eyf., lang-gestielt, *die stengelst. eyf., zugespitzt*, die obersten lanzettl.; *Ebenstrauss* endst., *zsgesetzt*; W. vielköpfig. 4. An denselben O. mit der vorhergehenden, aber nicht in Schlesien. Jun.-Aug. — Untersch. sich von der vorhergehenden: dch den steifern, stärkern St., die sämmtl. eyf., ungeth., weniger gezähnten, oft ganzrandigen, satt-grünen, spiegelnden B., und den dichtern, fast kopfigen Ebenstrauss.

9. V. SUPINA (L.) Niedriger B. — B. gestielt, spatelig, ganzrandig od. etwas gezähnt, *gewimpert*, das obere Paar lanzettl., sitzend; *Ebenstrauss* endst., *kopfig*; W. vielköpfig. 4. An feuchten O., neben den Bächen in d. A., (Fraelen und Bernina in der Schw., in Kärnthen, in Tyrol u. Steyermark.) Jul. Aug. St. h. 24. Bth. fleischroth. Die St. aufstrebend, 2-3 Zoll hoch. D.

10. V. SALICUNCA (All.) Piemontesischer B. — B. ganzrandig, *völlig kahl, verkehrteyf.* od. länglich, in den Bstiel verschmälert, die stengelst. sehr wenige, lineal.; *Ebenstrauss* endst., *kopfig*; W. vielköpfig. 4. Auf den höhern A., (auf dem Berge Fouly im Wallis, und Mortais in Freib.; nach von Vest's Angabe auch in Steyermark.) Jul. Aug. Bth. fleischroth. S.

11. V. SAXATILIS (L.) Stein-B. — B. ganzrandig od. etwas gezähnt, 3-5nervig, gewimpert, die wurzelst. länglich-spatelig, lang-gestielt, die stengelst. lanzettl.-lineal.; *Ebensträusschen armblüthig*, zuletzt *locker, fast traubig-rispig*; W. *faserig-schopfig*. 4. Auf den VorA. und KalkA., (dch d. g. AK. bis nach Oestr. und Krain, Mährische Karpathen) Jun. Jul. J. a t. 267. Bth. schneeweiss.

12. V. ELONGATA (L.) Verlängerter B. — B. eyf., völlig kahl, die wurzelst. gestielt, etwas gezähnt, die stengelst. sitzend, eingeschnitten-gezähnt; *Ebensträusschen armblüthig, rispig-traubig*; W. *nicht schopfig*. 4. An etwas feuchten, felsigen O. der A., (vom Schlehern in Tyrol dch Kärnthen und Krain bis Oestr.) Jun. Jul. J. a. 3. t. 219. St. h. 54. Bth. schmutzig-gelblich. D.

13. V. CELTICA (L.) Celtischer B. — B. ganzrandig, völlig kahl, die wurzelst. länglich-lanzettl., in den Bstiel verschmälert, die stengelst. meist nur zwei, lineal.; *Ebensträusschen quirlig-ährig*; W. *schuppig-schopfig*. 4. Auf den höchsten GranitA., (Wallis, Tyrol, salzbg, Kärnthen und Obersteyermark, häufig auf den Judenburg A., Oberöstr.) Jul. Aug. J. coll. 1. t. 1. St. h. 44. Bth. trüb-gelblich, auswendig roth.

2. CENTRANTHUS (DC.) Spornblume. — Saum des K. während der Bthzeit eingerollt, hernach in eine federige Haarkrone ausgebreitet. Blkr. trichterf., an der Basis gespornt: Saum 5 sp. Frucht mit einer Haarkrone bekrönt. Stbg. 1.

1. C. ANGUSTIFOLIUS (DC.) Schmalblättrige S. — B. lineal.-lanzettl. od. lineal., ganzrandig; *Sporn* viel kürzer, als die Röhre, *ohngefähr so lang, als der Fruchtkn.* 4. An sonnigen, steinigen,

gebirgigen O., (am Creux du Van in dem C. Neufchatel). Jul. Aug. *Valeriana angustifolia* Mill., nicht Tausch und Host. *V. rubra* β. L. *V. monandra* Vill. Bth. purpurn.

2. *C. RUBER* (DC.) Rothe S. — B. ey- od lanzettf., die obersten etwas gezähnt: *Sporn* viel kürzer, als die Röhre, *noch einmal so lang, als der Fruchtkn.* 4. An gebirgigen, rauhen O. der südl. Gegenden, (in der südl. Schw. bei Sitten im Wallis, und im südl. Tyrol bei Botzen; Littorale, bei Triest). Jun.-Aug. Lam ill. t. 24. f. 2. Bth. purpurn.

3. *VALERIANELLA* (Pollich Palat. I. p. 29.) Feldsalat. — Saum des K. gezähnt. Blkr. trichterf. spornenlos: Saum 5 sp., regelmässig. Fruchtgehäuse mit dem bleibenden K. verschiedenartig-gezähnt und gekrönt, nicht aufspringend, 3 fächerig, mit 1-2 fehlschlagenden Fächern. — Die Gattung *Fedia* Gärtner, die in D. nicht vorkommt, untersch. sich dch die unregelmässige, fast 2lippige Blkr. — Bth. aller milchweiss od. bläulich.

I. Rotte. *LOCUSTAE* DC. prodr. Die Wand des Fruchtgehäuses am Rücken des samen tragenden Faches verdickt; die nicht samen tragenden Fächer dch eine unvollständige Scheidewand getrennt. Der Rand des K. schwach gezähnt.

1. *V. OLITORIA* (Pollich. palat.) Rapunzel-F. -- *Früchte* eyförmlich, *zugedrückt, beiderseits ziemlich platt*, auf dem Rande mit einer Furche durchzogen, *an den Seiten 2rippig*, die eine Rippe sehr dünn; Saum des K. unmerklich-3zählig. ☉. An kultiv. O. auf unfruchtbaren Feldern. Apr. Mai. *Valeriana olitoria* Willd. *V. Locusta* Engl. bot. *V. Locusta olitoria* L. *Fedia olitoria* Vahl. D. fl. I. 398. *F. striata* Stev. nach DC. *F. Locusta* Rb. ic. f. 121. Var.:

β. *laxiocarpa*, Früchte flaumig. Rb. ic. f. 122.

II. Rotte. *SELENOCOLAE*. DC. Wand des Fruchtgehäuses nicht verdickt; Fächer dch eine vollkommene Scheidewand getrennt. Rand des K. schwach- oder 1zählig.

2. *V. CARINATA* (Lois.) Gekielter F. — *Früchte* länglich, *fast 4seitig, auf der hintern Fläche tief-rinnig*, auf der vordern ziemlich platt, in einen beiderseits hervorspringenden Rand verbreitert, in der Mitte und auf den Seitenflächen fein-1rippig; K. *unmerklich-1zählig*. ☉. An kultiv. O., besonders in Weinbergen, (sehr gemein auf der Rheinfläche von Basel bis an die Niederlande; im Saarthale, in Thüringen, bei Berlin, Stargard, in Steyermark.) Apr. Mai. *Fedia carinata* D. fl. I. 399. Rb. ic. 2. f. 123.

III. Rotte. *PSILOCELAE* DC. Die 2 schmalen fadenf., nicht samen tragenden Fächer viel schmaler, als das samen tragende.

a. Saum des K. aus stielrunden, pfriemlichen, zurückgekrümmten Zähnen gebildet.

3. *V. ECHINATA* (DC.) Igelstacheliger F. — Früchte länglich fast 3seitig, 3furchig; *Kelch* aus 3, *kegelf.-pfriemlichen, steifen, zurückgekrümmten Zähnen*. ☉. An kultiv. und unkultiv. O. (im Littor. und wärmern Krain.) Apr. Mai. *Fedia echinata* Vahl. D. fl. I. 401. Rb. ic. I. f. 137. *Valeriana echinata* L. D.

b. Saum des K. krautig, schief-abgeschnitten, gezähnt, der hintere Zahn grösser.

4. *V. ERIOCARPA* (Desv.) Haarfrüchtiger F. — Früchte eyf., hinten konvex, fein 3rippig, vorne ziemlich platt, mit einem ovalen, zwischen erhabenen Rändern eingedrückten Beete; Saum des K. von der Breite der Frucht, glockig, schief-abgeschnitten, netzig-aderig, gezähnt; Aestchen der Ebensträusschen dicht gehäuft. ☉. An kultiv. O., (im Elsass selten; bei Zweibrücken, Trier und Koblenz; bei Lüttich; in Istrien.) Apr. Mai. *Fedia eriocarpa* D. fl. I. 397. Rb. ic. I. f. 132., nicht gut. *F. campanulata* Presl. *F. rugulosa* Stev. *F. muricata* R. und S. Aestchen der Ebensträusschen dick, sehr kantig und geflügelt, unterwärts dicht-zsgestellt, oberwärts zurückgekrümmt; Habitus fast der von *V. echinata*. Var. mit rauh., kahlen, dabei auf den Rippen haarigen, und durchaus kahlen Früchten. D.

5. *V. MORISONII* (DC.) Morison's F. — Früchte ey-kegelf., hinten konvex, fein 3rippig, vorne ziemlich platt, mit einem länglichen, zwischen erhabenen Rändern eingedrückten Beete; Saum des K. halb so breit, als die Frucht, schief-abgeschnitten, spitz, gezähnt; Aestchen der Ebensträusschen spreitzend. ☉. Unter der Saat. Jul. Aug. *Fedia dentata* D. fl. I. 396. α . und β . *Valerianella dentata* Koch Syn. ed. 2. latina. Wegen der zweifelhaften Benennung „*dentata*“ ist der frühere Name beizubehalten. Var.:

α . *lejocarpa*, mit kahlen Früchten, sie ist in D. und der Schw. gemeiner, als die Var. β .: *V. Morisonii* β . *lejocarpa* DC. prodr., var. α . Koch Synops ed. I. *Valeriana Locusta* δ . *dentata* L. sp. mit Ausschluss des Synon. von Rivin. *Fedia dentata* Vahl. enum., Fries herbar. norm., sowie mehrerer deutsch. Autoren und MBieberst. t. c. 3. p. 31., Rehb. ic. f. 124-126.

β . *lasiocarpa*, die Früchte überall kurz., die Haare abstehend, an der Spitze eingebogen: *V. dentata* β . *mixta* Soyer-Will. ess. monogr., *V. Morisonii* α . DC. prodr., Koch Synops. ed. I., *V. mixta* Dufr. valer. mit Ausschluss des Synonyms von Lois., DC. prodr., *V. pubescens* Merat. Lois. fl. gall., *V. microcarpa* Lois. not., *Fedia dentata* β . D. fl., *Fedia dentata* β . *dasycarpa* Rehb. ic. f. 127., *Fedia dasycarpa* Stev. mem. mosq., *F. Morisonii* Spreng. pug. (Die *Valerianella puberula* DC., *Fedia puberula* Bertol., *F. microcarpa* Rb. ic. f. 224. ist viel niedriger, als die vorhergehenden; die Aestchen dick, sehr kantig und dicht zsgestellt wie bei *V. eriocarpa*, aber die Früchte kleiner, als bei *V. Morisonii* und d. K. sehr kurz, stumpf, ganzrandig, kaum gezähnt.)

IV. Rotte. *PLATYCOELAE* DC. Die nicht samentragenden Fächer dem samentragenden fast gleich, oder grösser.

a. Der Rand des K. krautig, quer-abgestutzt, gezähnt, der hintere Zahn grösser.

6. *V. AURICULA* (DC.) Ohrfrüchtiger F. — Früchte fast kugelig-eyf., fein-3rippig, vorne 1furchig; Saum des K. ein Drittel so breit, als die Frucht, schief-abgeschnitten, vorne gezähnt, die Zähnchen sehr klein. ☉. Unter der Saat. Jul. Aug. *Fedia*

Auricula D. fl. 1. 400. Rb. ic. 1. f. 128. 129. *F. olitoria* Gärtn. Die *V. alerianella laxiflora* Dufr., *F. laxiflora* R. und S. ist eine zwergige Abänderung, mit breitem B. Var.:

β. *lasiocarpa*, Früchte fläumlich: *Fedia auricula* β. *dasy-carpa* Rb. ic. f. 130.

γ. *tridentata*, die vorderen Zähnen des Krandes etwas grösser, deutlich bemerkbar. *Valerianella dentata* DC. prodr., Koch Synops. ed. 1. *V. rimosa* Bast. *Fedia tridentata* Rb. ic. f. 131., nicht Stev. — Die *Valerianella pumila* DC., *Fedia pumila* Rb. 2. f. 223., *F. tridentata* Stev., Bieberst., *Valerianella membranacea* Lois., welche der *V. dentata* und *Auricula* sehr ähnlich ist, untersch. sich dch die auf der vordern Seite der Frucht in einen ovalen Nabel erweiterte Furche, die breitem, fast ganz häutigen DeckB., und den 3zähligen Saum des K., von dessen breiten, stumpfen Zähnen der hintere eyf., aufrecht, die seitenst. niedergedrückt sind.

b. Saum des K. becherf., glockig oder kugelig, häutig, aderig-netzig, in 6-12 an der Spitze borstliche Zähne sich endigend.

7. *V. coronata* (DC. fl. fr. 4. p. 241., nicht prodr.) Bekrönte F. — Früchte eyf., zottig, vorne lurchig; *Saum* des K. häutig, netzig-aderig, breiter, als die Frucht, becherf., *inwendig ganz kahl*, bis über die Mitte *6sp.*; *Zpfl eyf., begrannt, an der Spitze hakig.* ☉. An kultiv. O., (im südl. Tyrol, im Littor.; ferner bei Lüttich, bei Stettin, bei Göttingen.) Mai.-Jul. *V. hamata* Bast. In DC. fl. fr., DC. prodr., Koch Synops. ed. 1. *Fedia coronata* Vahl. D fl. 1. 401. Rb. ic. f. 133-35. *Valeriana Locusta* γ. *coronata* L. — Die sehr ähnliche *Valerianella discoidea* Lois. not., *V. coronata* DC. prodr., *Fedia discoidea* Rb. ic. f. 226., untersch. sich dch die niedrige Statur, die mehr eingeschnittenen B. und den grössern, offlern und inwendig rauhh. Saum des K. Ein oder der andere Zahn ist oft wiederum mit einem kleinern Zahne versehen, wodurch der K. unregelmässig 7-12 zählig wird. D.

8. *V. vesicaria* (Moench.) Blasiger F. — Früchte fast kreiself., zottig; *Saum des K. kugelig-aufgeblasen, häutig, netzig-aderig, an der Spitze 6zählig; Zähne begrannt, gerade, wagerecht-einwärtsgebogen.* ☉. An kultiv. O., (in der Provinz Lüttich) *Valeriana Locusta* β. *vesicaria* L. D.

LXII. Ordng. DIPSACEEN. DC. fl. fr. 4. p. 221. prodr. 4. p. 643.

Köpfchen der Bth. mit einer reichblättrigen Hülle, (die aus unfruchtbaren DeckB. gebildet ist,) umgeben, (gemeinschaftlicher K. nach L.) Bth. einzeln, oft dch DeckB., (die einen spreuigen Fruchtb. darstellen,) getrennt. *Eigentlicher K. doppelt, und beide bleibend; der äussere (Hüllchen) bei der Reife die Frucht dicht umgebend, deren äussere Decke bildend; der innere zuletzt an*

den Fruchtkn. angewachsen. Blkr. 1 blättrig, an die Spitze des innern K. eingefügt, 4-5sp, mit ungleichen Zpfln. Stbg. 4, der Röhre der Blkr. eingefügt, frei; Stbf. nicht gegliedert. Gl. 1; N. einfach. Fruchtkn. 1fächerig, 1eyig; Eychen hängend. Frucht nicht aufspringend, häutig, oder fast nussartig. S. eyweisshaltig. Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

1. DIPSACUS (L.) Karden. — Der innere K. beckenf., vielzählig oder ganzrandig; der äussere an der Spitze mit einem kurzen, gekerbten oder gezähnten Krönchen endigend. Fruchtb. sprengig. Die äussern Hüllblättchen länger, und die Spreublättchen an Länge übertreffend.

1. D. SYLVESTRIS (Mill.) Wilde K. — B. sitzend, gekerbt-gesägt, am Rande kahl oder zerstreut-stachelig, die untersten an der Basis verschmälert, die stengelst. breit-zsgewachsen, ganz oder die mittlern fiedersp.; Hüllblättchen lineal-pfriemlich, bogig-aufstrebend; Spreublättchen biegsam, länglich-verkehrteyf., begrannt-haarspitzig, gerade, länger, als die Bth. ☉. Auf Feldern, an Wegrändern und Gräben. Jul. Aug. D. fullonum Pollich. Schk. t. 21. D. fullonum a. L. D. vulgaris Gmel. Bth. lila, seltner weiss. Var.:

a. *pinnatifidus*, die mittlern StB. fiedersp. D. fl. I. p. 736.

2. D. LACINIATUS (L.) Geschlitzte K. — B. sitzend, borstig-gewimpert, die untersten ganz, an der Basis verschmälert und lappig-gekerbt, die übrigen fiedersp., die mittlern an der Basis breit-verwachsen; Hüllblättchen lanzettl.-pfriemlich, steif, bogig-aufstrebend; Spreublättchen biegsam, länglich, begrannt-haarspitzig, gerade, länger, als die Bth. ☉. Auf feuchten Triften, an Gräben, (von Basel und dem Oberelsass dch die Rheinfläche bis Worms; im Mainthale bei Frankf.; bei Limburg; von Krain nach Steyer., Oestr., Mähren, Böhm. und Schles.) Jul. Aug. J. a. t. 403. Bth. weisslich.

3. D. FULLONUM (Mill. L.) Weber K. — B. sitzend, eingeschnitten-gekerbt, die stengelst. breit-verwachsen, ungeth.; Hüllblättchen wagerecht-abstehend, an der Spitze etwas abwärtsgebogen; Spreublättchen steif, länglich, begrannt-haarspitzig, zurückgekrümmt, so lang, als die Blkr. ☉. Wird zum Gebrauch der Weber kultiv. Jul. Aug. Bth. lila.

4. D. PILOSUS (L.) Behaarte K. — B. gestielt, an der Spitze des Bstieles gehöhret; Hüllblättchen abwärtsgerichtet, ohngefähr von der Länge der Bth.; Spreublättchen verkehrteyf., begrannt-haarspitzig, borstig-gewimpert, gerade. ☉. An schattigen Ufern der Bäche, an Zäunen und in etwas feuchten Hainen. Jul. Aug. J. a. t. 278. *Cephalaria appendiculata* Schrad.

Dipsacus ferox ist aus der deutschen Flora zu streichen, da er an den in den Floren erwähnten O. nicht wächst.

2. CEPHALARIA (Schrad.) Cephalarie. — Der Innere K. be-

ckenf., vielzählig oder ganz; der äussere an der Spitze 4-mehrzählig oder mit einem kurzen, vielzähligen Krönchen endigend. Fruchtb. spreuig. Hülle dachig, die äussern Blättchen kürzer.

I. Rotte. *LEPICEPHALUS* D. fl. I. p. 741. Der äussere K. der Bth., (das Hüllchen) mit 4 oder mehr knorpeligen Zähnen endigend.

1. *C. ALPINA* (Schr.) Alpen-C. — B. gefiedert, flaumig, Fieder lanzettl., herablaufend, gesägt; *Hüll- und Spreublättchen* ey-lanzettf., *zugespitzt*; Zähne des äussern K. 8, pfriemlich, fast gleich; Blkr. gleich. 4. Auf den A. der südwestl. Schw., (in den Älener A. auf dem Gryon über Bex und dem Jura, auf der Saleve, Thoiry und a.; nicht in D.) Jun. Jul. *Scabiosa alpina* L. D. fl. I. p. 741. Bth. gelblichweiss. S.

2. *C. TRANSYLVANICA* (Schr.) Siebenbürgische C. — Der St. unterwärts nebst den B. zerstreut-behaart; B. gefiedert, Fieder etwas herablaufend, an den untern B. länglich, gesägt, der endst. sehr gross, an den StB. lineal.-lanzettl.; *Hüll- und Spreublättchen* ey-lanzettf., *begrannt-haarspitzig*; Zähne des äussern K. 8, pfriemlich, fast gleich; Blkr. strahlend. 4. An Weinbergen und Ackerrändern in Istrien. Jul. Aug. *Scabiosa transylvanica* L. J. h. v. 2. t. III.

II. Rotte. *CERIONANTHUS* D. fl. I. p. 742. Der äussere K. mit einem trocken-häutigen, glockigen, vielzähligen Saum endigend.

3. *C. LEUCANTHA* (Schr.) Weissblüthige C. — B. gefiedert, Fieder gezähnt oder fiedersp.; *Hüllblättchen* eyf., *die äussern abgerundet-stumpf*, die innern nebst den Spreublättchen spitz; äusserer K. mit einem trockenhäutigen, vielzähligen Saume gekrönt. 4. An gebirgigen, rauhen O., (im wärmern Krain, Littor. und Istrien.) Jul. Aug. Bth. weiss. *Scabiosa leucantha* L. D. fl. I. 743. Rb. ic. 4. f. 537. S. Trenta Hacq. D.

3. *KNAUTIA* (Coul. Trichera Schr.) Arten der Knautia und *Scabiosa* bei L.) Knautia. — Der innere K. 8-16zählig; Zähne aus breiterer Basis pfriemlich-borstlich; der äussere kurz-gestielt, nicht gefurcht, mit 4 oder mehreren, sehr kurzen Zähnen endigend. Fruchtb. rauh., Spreublättchen fehlend. Hülle reichblättrig.

1. *K. HYBRIDA* (Coul. DC.) Bastard-K. — Die untern B. länglich, an der Basis verschmälert, gekerbt-gesägt, ganz oder leyerf., die obern lanzettl.; *der innere K. 4mal kürzer, als die Frucht, meist 16zählig*. ☉. Auf Hügeln, an Weinbergen, (Istrien, Osero.) Jun. Jul. *Scabiosa hybrida* All. S. *lyrata* Lam. *Trichera mutabilis* Schr. Var.:

a. *lyrata*, W.- und die untern StB. leyerf.

β. *integrifolia*, WB. ganz, gekerbt: *Scabiosa integrifolia* L. Was Linne von seiner *Scab. integrifolia* sagt, stimmt genau mit dieser Variet. überein. J.

2. *K. LONGIFOLIA* (Koch.) Langblättrige K. — B. verlängert-

lanzettl., ganzrandig oder unmerklich-gezähnel, zugespitzt, ungeth.; der St. von kurzen Haaren sammtig oder an der Basis kahl, nach der Spitze von kurzen, drüsentrag. Haaren etwas klebrig, und von längern steifh.; der innere K. halb so lang, als die Frucht, meist Szählig. 4. Auf Triften der A., (in der Schw.; südl. Tyrol auf der Seiseralpe; Kärnthen auf d. Pasterze; nach Host in Steyermark und Oestr.) Jun. Jul. *Scabiosa longifolia* W. und Kit. *S. sylvatica* β . *longifolia* D. fl. I. p. 748. Bth. lila.

3. *K. SYLVATICA* (Dub. DC.) Wald-K. — *B. elliptisch-lanzettl.*, gekerbt, ganz oder an der Basis eingeschnitten; der St. ziemlich kahl, an der Basis von zwiebeligen Haaren steifh., oberwärts von sehr kurzen, drüsenlosen Haaren flaumig und von längern steifh.; der innere K. halb so lang, als die Frucht, meist Szählig. 4. In Gebirgswäldern, (stellenweise in den Gebirgsgegenden des g. Gebietes.) Jul. Aug. *Scab. sylvatica* L. D. fl. I. p. 747. Bth. roth-blau. Var. mit ganzrandigen und mit an der Basis eingeschnittenen B. Expl. mit breiteren B. geben die *S. dipsacifolia* Host. austr. nach einem von Dolliner erhaltenen Expl.

4. *ARVENSIS* (Coul. DC.) Acker-K. — Die StB. fiedersp., Zpfl. entfernt, lanzettl., ganzrandig, der endst. Lappen grösser, zugespitzt, etwas gesägt; der St. von sehr kurzen, drüsenlosen Haaren grülich und von längern steifh.; der innere K. halb so lang, als die Frucht, meist Szählig. 4. Auf Feldern, Hügeln, Wiesen, an Waldrändern. Jul. Aug. *Scabiosa arvensis* L. D. fl. I. p. 746. Schk. t. 22. Bth. blan, strahlend wie bei den vorhergehenden. Var. aber:

β . *campestris*, Blkr., auch die randst., nicht strahlend: *Scabiosa campestris* Bess. — Eine Variet. oder vielleicht eine ächte Art ist:

γ . *rigidiuscula*, ganz kahl, glänzend; B. fast lederig, glänzend, nur am Rande und auf der Mittelrippe gewimpert, fiedersp.; Zpfl. etwas genähert, die ersten W.- und die obersten StB. ganz; oder sämmtl. länglich-lanzettl., zugespitzt, gesägt, ungeth. Hladnik trennte sie zuerst.

δ . *glandulifera*, sämmtliche B. gefiedert, kahl oder nur am Rande bewimpert, der St. oberwärts weisslich und zugleich mit längeren einfachen und kürzeren, drüsentragenden Haaren besetzt. In Krain, Freyer. — Strenge Grenzen zw. *K. longifolia*, *sylvatica* und *arvensis* fehlen noch.

Dass *Scabiosa ciliata* Spreng., im Systema veget. von Roem. und Schult. herausgegeben, irrthümlich unter die Pfl. Mähren's gerechnet ward, geht daraus hervor, dass die Verf. der Fl. von Mähren sie an dem bezeichneten O. nicht auffinden konnten.

4. *SUCCISA* (M. und K. Arten der *Scabiosa* bei L. und DC.) Teufelsbiss. — Der innere K. schüsself., am Rande in 5 borstliche, rauhe Zähne auslaufend oder ganzrandig; der äussere tief-gefurcht, mit 8 durchlaufenden Furchen, in einen 4lappigen, krautigen Saum endigend. Fruchtb. spreuig. Hülle reichblättrig.

1. *S. PRATENSIS* (Moench.) Wiesen-T. — Köpfchen halbkugelig, die fruchttrag. kugelig; der äussere K. rauh.; Saum 4 sp., *Zpfl eyf., spitz, stachelspitzig*, der innere 5 borstig. 2. Auf Wiesen und in Wäldern. Aug. Sept. *Scabiosa succisa* L. D. fl. 1. 743. *Asterocephalus Succisa* Wallr. Fl. dan. t. 279. Bth. blau, seltner fleischroth oder weiss. Var. mit gezähnten und oft zugleich kahlen StB.: *Scabiosa glabrata* Schott. bei R. und S.

2. *S. AUSTRALIS* (Rb. fl. exc.) Südlicher T. — Die fruchttrag. Köpfchen längl.-eyf.; der äussere K. kahl; Saum 4lappig, *Lappen kurz, stumpf*, der innere K. ohne Borsten. 2. An sumptigen O., (Littor. bei Monfalcone und Aquileia; Kärnth., Steyern.; in Oberöstr.) Aug. Sept. *Scabiosa australis* Wolf. bei Röm. D. fl. 1. p. 744. Rb. ic. 4. f. 505. *S. repens* Brign. Blüth. hellblau. Die Var. mit einem innern in Borstchen ausgehenden K. sah ich noch nicht.

3. *SCABIOSA* (Röm. und Schult. — Arten der *Scabiosa* bei L.) Scabiose. — Der innere K. schüsself., am Rande in 5 oder 10 borstl., rauhe oder kammartig bewimperte Zähne ausgehend, oder seltner ganzrandig; der äussere tief-gefurcht, mit 8 durchlaufenden oder halbirtten Furchen, oder Strippig, aber nicht gefurcht, mit einem glockigen oder radf., trockenhäutigen, durchsichtigen Saum endigend. Fruchtb. spreuig. Hülle reichblättrig.

1. Rotte. *SCLEROSTEMMA* D. fl. 1. p. 749. *Sclerostemma* Schott. zum Theil. Frucht mit 8 tiefen, spitz-eingeschnittenen, auslaufenden Furchen, welche ebenso viele starke Riefen abtrennen. Krone des äussern K. von einfachen Nerven strahlig, am Rande schwach und kleingekerbt.

1. *S. GRAMUNTIA* (L.) Feinblättrige S. — B. an den unfruchtbaren Büscheln länglich, stumpf, an der Basis verschmälert, gestielt, gekerbt, ganz oder leyerf., *die stengelst.* bis auf die Mittelrippe doppelt- und 3fachfiedersp., *Zpfl* der obern B. lineal.; Frucht 8furchig, mit durchlaufenden Furchen; *Borsten* des innern K. *ungefähr so lang, als die Krone* des äussern oder *beinahe noch einmal so lang, oder fehlend*. 2. An grassreichen O., (im südl. Tyrol und dem Littor.) Jun. Jul. *Asterocephalus gramuntius* Spreng. *S. columbaria* *et* *gramuntia* DC. prodr. Bth. blau. Untersch. sich von *S. columbaria* dch die an den grössern Expl. 3fachgefiederten B. und durch die kurzen Borsten, die so lang, als die Krone oder kaum je noch einmal so lang sind, als diese; kommt vor:

α. agrestis, B. oberseits ziemlich kahl oder weniger flaumig; Borsten des untern K. 5: *S. agrestis* WK. Oft verschwinden 2-3 Borsten oder auch alle: *S. agrestis* Rb. ic. 1. f. 194. *S. leiocephala* D. fl. 1. 753. Ein wucherndes Expl. davon: *S. styriaca* Vest. D. fl. 1. 755.

β. mollis, die untern B. mit dichtem, weichem Flaum überzogen: *S. mollis* Willd. Rb. ic. 4. f. 534. *S. capillata* R. und S. *γ. tomentosa*, überall dicht-filzig: *S. mollissima* DC. *S. pyrenaica* Bert.; stimmen ganz gut überein, aber *S. pyrenaica* DC. ist nach der Beschreibung der Frucht eine andere Art, welche zur folgenden Rotte gehört.

D.

2. *S. OCHROLEUCA* (L.) Gelblichweisse *S.* — *B.* an den unfruchtbaren Büscheln länglich, stumpf, an der Basis verschmälert, gestielt, gekerbt, ganz oder leyerf., die untersten stengelst. leyerf., die übrigen bis auf die *Mittchrippe fiedersp.*, *Fieder lineal.*, an den untern *B. fiedersp.-gesägt*, an den obersten ganzrandig; Köpfchen der Frucht eyf.; Früchte 8furchig, mit durchlaufenden Furchen, *Borsten* des innern K. an der Basis zsgedrückt, nervenlos, 3 oder 4mal länger, als die Krone des äussern K. ☉ und 2, aber wie die folgende von keiner langen Dauer. Auf Gebirgen, Hügeln, (stellenweise im Gebiete.) Jul. Aug. J. a. t. 439. Rb. ic. 4. f. 536. *S. columbaria* δ. D. fl. I. 751. *S. tenuifolia* α. Roth. Diese trenne ich wegen des eyf. Köpfchens jetzt von *S. columbaria*, was nach Rb. an dieser kugelig ist; eigene Beobachtungen habe ich aber darüber nicht angestellt. Wimmer in der Fl. Schles. erklärt sie für eine Var. der *S. columbaria*. Bth. gelblichweiss, selten röthlich; aus dem *S.* der gelblichweissen Pflanze zog ich ein Expl. mit röthlichen Bth.

3. *S. COLUMBARIA* (L.) Tauben-*S.* — *B.* an den unfruchtbaren Büscheln länglich, stumpf, an der Basis verschmälert, gestielt, gekerbt, ganz oder leyerf., die untersten stengelst. leyerf., die übrigen bis auf die *Mittchrippe fiedersp.*, *Fieder lineal.*, an den untern *B. fiedersp.-gesägt*, an den obersten ganzrandig; Köpfchen der Frucht kugelig; Früchte 8furchig; Furchen durchlaufend; *Borsten* des innern K. an der Basis zsgedrückt, nervenlos, 3 oder 4mal länger, als die Krone des äussern K. ☉ und 2. Auf Felsen und trocknen Hügeln. Jun.-Herbst. D. fl. I. p. 749. var. α. *S. polymorpha* α. Weigel. Bth blau, *Borsten* des innern K. schwarzbraun. Die *S. columbaria* Rb. ic. 4. f. 535. ist eine Abänderung mit leyerf. *B.* an den unfruchtbaren Wurzelköpfen; aber nicht selten sind auch die *B.* dieser Wurzelköpfe sämmtlich ganzrandig. Var. Bth. fleischroth und weiss. Die Beschreibung der Frucht von *S. columbaria* Bert. amoen. it. und Fl. ital. stimmt nicht zu der deutschen Art.

4. *S. LUCIDA* (Vil.) Spieglende *S.* — *B.* an den unfruchtbaren Büscheln länglich, an der Basis verschmälert, gestielt, gekerbt, ganz oder leyerf., die untern stengelst. ganz od. an der Basis fiedersp., die obern fiedersp., Zpfl lanzettl.-lineal, eingeschnitten-gesägt oder ganzrandig; Frucht 8furchig, mit durchlaufenden Furchen; *Borsten* des innern K. an der Basis zsgedrückt, einwärts inervig-gekielt, 3- oder 4mal länger, als die Krone des äussern K. ☉. Auf d. Triften der A. und VorA., (dch die g. AK.; sodann auf den Vogesen, dch die Mähr., Böhm. und Schles. Gebirge,) Jul. Aug. Rb. ic. f. 560. *S. stricta* W. und K. *S. norica* Vest. Rein. und Hohenw. Bth. roth-lila. Untersch. sich von den vorhergehenden dch die *Borsten des innern K.*, die an der Frucht noch einmal so breit, an der Basis flach und einwärts mit einem Nerven bezeichnet sind.

S. lucida β. D. fl. I. 753., welche ganz mit kurzem, ange-drücktem Filze bedeckt und ausserdem mit verlängerten Borsten des innern K. versehen ist, steht der *S. lucida* sehr nahe. Gau-

din sah davon nie ein Schweizer Ex.; er hatte sie aus dem südl. Savoyen. Ob sie eine Variet. oder eine eigene Art sei, will ich nicht entscheiden, da ich die Früchte nicht vergleichen kann; mit *S. Hladnikiana* möchte ich sie aber keineswegs vereinigen. Zu ihr ziehe ich *S. holosericea* DC. in der fl. fr., obgleich die *S. holosericea* Bert. dabei citirt wird, welche sich nach der Beschreibung dch kurze Borsten des innern K. untersch. Die Beschreibg in der Fl gallica stimmt mit unserer Pfl. sehr genau überein, und meine Expl. sind auf dem Berge Pic d'Ereslits in den Pyrenäen gesammelt, woher auch DC. die seinigen hat.

5. *S. HLADNIKIANA* (Host.) Hladnik's *S.* — *B.* der unfruchtbaren Büschel und die untersten der St. länglich, an der Basis verschmälert, gestielt, gekerbt, *die stengelst. leyerf., der endst. Lappen sehr gross, eyf., spitz, gesägt*, die obersten fiedersp., Zpfl lanzettl., eingeschnitten-gesägt, die endst. zssliessend; Frucht 8furchig, mit durchlaufenden Furchen; Borsten des innern K. 3- oder 4mal länger, als die Krone des äussern K. 4. An gebirgigen O., (bei Billichgrätz in Krain; in Istrien.) Aug. Sept. Bth. blau. *B.* mit einem dünnen, graulichen Filze bedeckt oder zuletzt ziemlich kahl; die wurzelst. und untersten stengelst. schon bei der blühenden Pflanze abgestorben und fehlend; Gelenke des St. 6-8, sämmtl., auch die untern. entfernt; dch diese Merkmale untersch. sie sich leicht von der filzigen Variet. der *S. lucida*.

6. *S. SUAVEOLENS* (Desf.) Wohlriechende *S.* — *B.* der unfruchtbaren Büschel nebst den untersten stengelst. länglich oder lanzettl., ungeth., ganzrandig, *die übrigen fiedersp., Zpfl lineal., ganzrandig*; Frucht 8furchig, mit durchlaufenden Furchen; die Krone des äussern K. ganzrandig, gekerbt; Borsten $1\frac{1}{2}$ mal so lang, als die Krone. 4. Auf Hügeln, Haiden, an felsigen O. (stellenweise dch das g. Gebiet.) Jul.-Sept. Rb. ic. 1. f. 156. *S. canescens* WK. *Asterocephalus suaveolens* Wallr.

7. *S. SILENIFOLIA* (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 170.) Leimkrautblättrige *S.* — Die *B.* der nichtblühenden WKöpfe und die unteren stengelst. verkehrteyf.-keilig, ungetheilt, ganzrandig, die oberen fiedersp., *die Zpfl lineal., ganzrandig, der endst. sehr gross*; die Frucht 8furchig, mit anlaufenden Furchen; die Krone des äussern K. bis zur Mitte 4lappig, mit zugespitzten, gekerbten Lappen, die Borsten etwas länger, als die Krone. 4. An felsigen O., (bei Gottschee in Krain, Freyer.) Jul. *Asterocephalus suaveolens* var. *silenifolia* Rehb. fl. exc. Die Pfl. ist handhoch, der St. 1-3köpfig. Bth. hell-lila. Verschieden von *S. suaveolens* dch die niedrigere Gestalt, verkehrt-eyf. WB., die grossen Endzpfl der stengelst. *B.*, die längeren stumpfen Spreublättchen, welche bei *S. suaveolens* spitzig sind, und dch die vier spitzen Lappen der Fruchtkrone.

8. *S. VESTINA* (Facchini.) Vestinische *S.* — *Die B. der nichtblühenden WKöpfe spatel-keilf., ungetheilt, ganzrandig, die stengelst. B. fiederth., sämtliche Zpfl lineal., ganzrandig*; die Frucht 8furchig, mit auslaufenden Furchen; *die Krone des äussern*

K. ungetheilt, gekerbt, Borsten 4mal so lang, als die Krone. 4. An waldigen O. des südl. Tyr., (Thal Vestino und in den Bergen von Giudicarie, Bondon und Brixen, Facchini.) Jul. Aug. Bth. blau, die Borsten und oft auch die Krone des K. schwarzpurpurn.

II. Rotte. CYRTOSTEMMA Koch. in D. fl. I. 755. 1823. Vidua Coult. dips. 37. Frucht stielrund, mit 8 erhabenen Riefen. Krone des äussern K. glockig, aus 8 knorpeligen, flachen, breiten, an der Spitze bogig-zsfließenden und doch eine dünne Haut verbundenen Nerven gebildet, mit einem kurzen, häutigen, faltig-krausen Rande endigend. Der innere K. doch einen verlängerten, mit einer Scheide umgebenen Stiel erhöht.

Zu dieser Rotte gehört *S. maritima* L., (nicht Wulfen.) die aber im Gebiete unserer Fl. noch nicht gefunden wurde.

III. Rotte. ASTEROCEPHALUS Coult. dips. p. 33. Trochocephalus D. fl. I. 756. Frucht von der Basis bis zur Mitte stielrund, glatt oder schwach-rippig, dicht-zottig, oberhalb der Mitte in 8 säulenf. Zähne gespalten, die doch eben so viele, mit einer nach Innen gefalteten Haut ausgefüllte Gruben verbunden sind, und den glockigen oder radf. häutigen, von einfachen Nerven strahligen Saum des K. tragen.

9. *S. UCRANICA* (L.) Ukrainische *S.* — WB. lineal-länglich, gezähnt, die untern stengelst. fiederth., Zpfl entfernt, lineal., ganzrandig, die obern stengelst. lineal., fast ganz; Blkr strahlend; *Früchte von der Mitte bis zur Spitze grubig, an der Basis zottig, oberwärts kahl*; Borsten des innern K. 2mal so lang, als die spitz-gezähnte Krone. ☉. An sandigen O., am Ufer des Adriat. Meers, (bei Monfalcone und Sagrado gemein.) Jul. Aug. Rb. ic. 4. f. 489., ausschl. der Fig. c. *S. alba* Scopoli. *S. argentea* L. *S. maritima* Wulf. bei Röm., nicht L. *Asterocephalus argenteus* Spreng. Bth. blau, var. Bth. gelblichweiss, und gelblichweiss mit einem blauerandeten Strahle.

10. *S. GRAMINIFOLIA* (L.) Grasblättrige *S.* — B. lineal. oder lanzettl.-lineal., ganzrandig, silber-seidenh.; Blkr. strahlend; Früchte von der Basis bis zur Spitze zottig; Borsten des innern K. ein wenig länger, als die gekerbte Krone. 4. Auf rauhen Hügeln, (Krain, Görz, südl. Tyrol; M. Salvator bei Lugano, C. Tesin.) Jul. Aug. Bth. blau.

IV. Rotte. CALLISTEMMA D. fl. Die Frucht wie bei der vorhergehenden Rotte, aber an der Basis von angedrückten Haaren flaumig und nicht dicht-zottig; Borsten des innern K. 10, kammig-wimperig.

Diese Rotte möchte ich nicht mit *Pterocephalus plumosus* in eine Gattung zusammenstellen.

II. *S. MULTISETA* (Visiani stirp. dalmat. specim. p. I. t. I.) Vielborstige *S.* — Die untersten B. verkehrteyf. oder leyerf., etwas gesägt, die oberen fiederth., ganzrandig; die Bl. strahlig; die Früchte von der Mitte bis zur Spitze grubig, an der Basis angedrückt-flaumig; *Borsten des innern K.* lineal.-pfrieml., zsgedrückt, kammig-wimperig, noch einmal so lang, als die spitz-gezähnelte Krone. ☉. An grasreichen O., (im südl. Istrien zw. Dignano und Fasana, Tommas.) Mai. Jun. *Pterocephalus palaestinus* γ. dalmaticus, DC. prodr. Bth. weisslich, die des Strahles blau.

EXIII. Ordng. COMPOSITEN. Compositae. Adans. fam. 2. p. 103. DC. fl. fr. 4. p. 1. Synanthereae Rich. bot. med. deutsch. Ausg. 2. p. 579.

Bth. (Bthchen, flosculi nach L.) in ein Köpfchen (eine gemeinschaftl. Blüthe, flos communis L., calathidium nach Cassin.) dicht-gehäuft, von einem mehrblättrigen Hauptkelche (periclinium nach Cassin., calyx communis, gemeinschaftl. K. nach L.) umgeben, auf dem gemeinschaftl. Fruchtb., (rachis nach Lessing, clinanthium nach Cassin.) stehend, oder einzeln von einem HK. eingeschlossen und in ein gemeinschaftl. Köpfchen zsgestellt. *Eigentlicher K.:* die Röhre an den Fruchtkn. angewachsen; Saum trockenhäutig, (Pappus,) verlängert, verschiedenartig-gespalten, oder kurz und ungeth., oder kaum bemerklich. Blkr. auf der Röhre des K. stehend, 1blättrig; Saum regelmässig, 5sp., Zpfl in der Knospenlage klappig, oder unregelmässig, oder in ein Züngchen, (Zungenblüthchen,) gespalten. *Stbg. 5, der Röhre der Blkr. eingefügt*, mit deren Lappen abwechselnd; *Stbf. in der Mitte mit einem Gelenke*; *Stbk. lineal., in eine Röhre verwachsen*, einwärts aufspringend, an der Spitze immer in ein endst., an der Basis öfters in 2 grundst. Anhängsel ausgehend. *Fruchtkn. 1eyig*, Eychen aufrecht, Gf. 1, N 2. Honiggrübchen die Basis des Gf. umgebend. Frucht, (Achenium, Achene,) nicht aufspringend, trocken. Eyweiss fehlend. Keim gerade, Würzelchen unterwärts nach dem Nabel gerichtet. Bth. entweder alle zwittrig oder die zwittrigen mit weiblichen oder geschlechtslosen gemischt, vielehig; oder viel-ehig-2häusig; oder zweihäusig.

I. Unterordn. **CORYMBIFEREN.** Vaill. Juss. gen. 177. Bth. sämmtl. röhrig oder die des Randes zungenf. Gf. an der Spitze unter seinen Schenkeln nicht knötig-verdickt, oder an der Spitze nicht gegliedert.

1. Gruppe. **EUPATORIACEEN.** Lessing. (Eupatorieae, Adenostylae und Tussilagineae Cassin. Griffel der Zwitterblüthen walzlich, 2sp., die Schenkel lang, fast stielrund oder keilig, oberwärts von feinen Papillen flaumig; an der männl. Bth. ganz oder kurz-2sp.; Schenkel keulig.

I. Untergruppe. **EUPATORIEAE.** Sämmtliche Bth. zwittrig.

1. **EUPATORIUM (L.)** Wasserdost. — HK. dachig, walzlich. Bth. wenige, sämmtl. zwittrig, röhrig-trichterf.; Saum allmählig in die Röhre verschmälert. Die Schenkel des Gf. verlängert, fläumlich. Pappus haarig. Fruchtb. nackt.

1. *E. CANNABINUM* (L.) Hanfartiger W. — B. gestielt, 3- oder 5th., Zpfl lanzettl., gesägt, der mittlere länger. 2. An waldigen, nassen O., Bächen, Gräben. Jul. Aug. Fl. dan. 745. Bth. hellpurpurn.

2. *ADENOSTYLES* (Cassin.) Drüsengriffel. — HK. einfach, mit einem schwachen Aussenkelche. Bth. sämmtl. zwittrig, glockig-röhrig, nämlich der Saum an der Basis plötzlich erweitert. Die Schenkel des Gf. verlängert, fläumlich-rauh. Pappus haarig. Fruchtb. nackt. — Bth. purpurn.

1. *A. ALBIFRONS* (Reichenb. fl. exc.) Graublättriger D. — B. gestielt, nieren-herzf., *grob-ungleich-doppelt-gezähnt, unterseits etwas filzig*; Köpfchen 3-6blüthig. 2. An waldigen O. der VorA. und auf Triften der A., (auf die Vogesen, dem Schwarzwalde, dch die g. AK. und die Sudeten.) Jul. Aug. A. Petasitis Bl. und F. A. albida Cass. *Cacalia Petasites* Lam. C. hirsuta Vill. C. tomentosa J. a. t. 235. C. albifrons Lin. fil. suppl. St. h. 37. Var. wie die folgende mit an der Basis geöhlreten Bstielen.

2. *A. ALPINA* (Bl. und Fing.) Alpen-D. — B. gestielt, nieren-herzf., *etwas ungleich-gezähnt-gekerbt, unterseits auf den Adern flaumig*; Köpfchen 3-6blüthig. 2. Auf den Triften der A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. A. viridis Cassin. *Cacalia alpina* L., wegen der gezähnelten B. Jacq. a. t. 234. St. h. 37. C. glabra Vill. C. alliariaefolia Lam. *Tussilago Cacalia* Scop.

3. *A. HYBRIDA* (DC. prodr. 5 p. 204.) Bastard-D. — Die B. nieren-herzf., ungleich-, fast doppelt-gezähnt-gesägt, oberseits ziemlich kahl, unten filzig; Ebenstrauss etwas locker; HK. schwach wollig-flaumig; Köpfchen 12-18blüthig. 2. In den A. von Wallis und Graubünden. Aug. *Cacalia tomentosa* β. *hybrida* Vill. dauph. Nach DC. führe ich diese Pfl. als eigene Art an, damit sie weiter beobachtet werde. S.

3. *A. LEUCOPHYLLA* (Rb.) Weissblättrige D. — B. gestielt, nieren-herzf., etwas ungleich-gezähnt, beiderseits filzig; Ebenstrauss rundlich, gedrungen; HK. wollig; *Köpfchen 12-20blüthig*. 2. Auf den höchsten Walliser A., (auf den A. im Saas- und Nicolaitale über Zermatten.) Aug. A. candidissima Cass. *Cacalia leucophylla* Willd. C. tomentosa Vill., nicht Thunb., auch nicht Jacq. Var. mit oberseits ziemlich kahlen B.: C. tomentosa B. hybrida Vill. Die Bstiele sind oft mit einem kleinen Ohrchen versehen. S.

II. Untergruppe. *TUSSILAGINEEN*. Cassin. Bth. vielchig.

3. *HOMOGYNE* (Cassin.) Homogyne. — HK. einfach oder mit einem schwachen Aussenkelche. Bth. im Umfange 1reihig, wenige, weibl., fädlich, schief-abgeschnitten, unmerklich 5zählig; auf dem Mittelfelde mehrere, zwittrig, glockig-röhrig, 5zählig. N. lineal., spreitzend, von der Basis an fläumlich-rauh. Pappus haarig. Fruchtb. nackt. Bth. purpurlich.

1. *H. SYLVESTRIS* (Cassin.) Wilde H. — *B.* herz-nierenf., gelappt, die mittlern *Lappen* 3zählig. 4. An den Wäldern der VorA., (Kärnthen, Krain, Steyermark.) Mai. Jun. *Tussilago sylvestris* Scop. J. a. app. t. 12. St. h. 21. D.

2. *H. ALPINA* (Cassin.) Alpen-H. — *B.* herz-nierenf., gezähnt-gekerbt, unterseits auf den Nerven flaumig. 4. Auf etwas feuchten Triften der A. und VorA.; mit den Flüssen herabsteigend, (dch die g. AK.; auf dem Feldberge in Oberbaden; in Mähren und Schles.) Mai-Jul. *Tussilago alpina* L. J. a. t. 216. St. h. 21.

3. *H. DISCOLOR* (Cassin.) Verschiedenfarbige H. — *B.* herz-nierenf., geschweift-gekerbt, unterseits dicht-filzig. 4. Auf den höchsten A., (von Tyrol dch Kärnthen. Salzbg, Steyermark nach Oestr.) Mai.-Jul. *Tussilago discolor* J. a. t. 247. St. h. 21. T. alpina β . A. D.

4. *TUSSILÁGO* (L.) Huflattig. — HK. einfach, mit einem schwachen Aussenkelche. Köpfchen einbettig, verschiedenehig*). Weibl. Bth. randst. mehrreihig, zungenf., ganz; die des Mittelfeldes zwittrig, röhrig, 5zählig. N. lineal., von der Basis an fläumlich-rauh. Fruchtb. nackt. — Bth. purpurlich.

1. *T. FARFARA* (L.) Gemeiner-H. — St. h. 2. An feuchten O.: auf Lettenboden. 4. März. Apr. Bth. gelb.

5. *PETASITES* (Gärtn.) Pestilenzwurz. — HK. einfach, mit einem schwachen Aussenkelche. Köpfchen 2häusig, verschiedenehig. Die weibl. Bth. fädlich, schief-abgeschnitten oder fast zungenf.; in den weibl. Köpfchen vielreihig, an dem Rande der zwittrigen Ireihig und in geringer Zahl; die Zwitter (unfruchtbar) röhrig oder 5zählig; in den weibl. Köpfchen wenige im Mittelpunkt, in den männl. Köpfchen das ganze Mittelfeld einnehmend. Die N. von der Basis an fläumlich-rauh. Pappus haarig. Fruchtb. nackt.

1. *P. OFFICINALIS* (Mönch.) Gebräuchliche P. — *B.* herzf., ungleich-gezähnt, unterseits wollig-grau, die Lappen der Basis abgerundet; Strauss länglich; die weiblichen Bth. fädlich, die N. der Zwitterbth. kurz, eyf. 4. An Bächen und Flussufern, auf

*) Ein gleiches Köpfchen capitulum homogamum enthält gleichgeschlechtige Bth. und ein gleiches, 1bettiges Köpfchen capit. homogamum monoclincum nur Zwitter; gleichehige, 2bettige Köpfchen capit. homogama diclinica enthalten auf einem Köpfchen männliche, auf dem andern weibliche Bth., und sind 1häusig bei den Ambrosiaceen, und 2häusig bei den Arten von Gnaphalium. Ein verschiedenes Köpfchen capit. heterogamum monoclincum trägt auf dem Mittelfelde fruchtbare Zwitterblüthen, selten unfruchtbare und am Rande weibliche oder geschlechtslose; verschiedenehige, 2bettige Köpfchen capit. heterogama diclinica tragen in dem männl. Köpfchen wenige weibl. Bth. und zwar, der Regel nach am Rande, und in dem weibl. Köpfchen einige männliche, oder unfruchtbare Zwitter im Mittelpunkte. Vgl. Lessing. synop. compos. p. 421.

feuchten Wiesen. März. Apr. *P. vulgaris* Desf. fl. atl., DC. prodr. *Tussilago Petasites* Hoppe. Bth. purpurlich.

Zwitter. Strauss eyf.: *Tussilago Petasites* L. St. h. 2. *Petasites officinalis* Fl. wett. *P. vulgaris* Desf.

Weibchen. Strauss länglich, Köpfchen halb so gross: *Tussilago hybrida* L. Schk. t. 242.

2. *P. ALBUS* (Gärtn.) Weisse *P.* — *B. rundlich-herzf., winkelig, stachelspitzig-gezähnt*, unterseits wollig-filzig; Strauss eyf., oder gleichhoch; die weibl. Bth. fädlich; die *N. der Zwitterblüthen verlängert, lineal.-lanzettl., zugespitzt.* 4. Auf feuchten Wiesen und an den Bächen der Gebirge und niedrigeren A., (in den Vogesen; dem Feldberg in Oberbaden; dch die g. AK.; in Mähren, Schles., Böhm., Sachs., der Lausitz.) Apr. Mai. *Tussilago alba* Hoppe. Bth. gelblichweiss.

Zwitter. Strauss eyf., fast gleichhoch: *Tussilago alba* L. St. h. 21.

Weibchen. Strauss längl.-eyf.: *Tussilago ramosa* Hoppe. St. h. 21.

3. *P. NIVEUS* (Baumg.) Schneeweisse *P.* — *B. eyf.- oder fast 3eckig-herzf., ungleich-stachelspitzig-gezähnt, unterseits schneeweiss-filzig*, die Lappen der Basis auseinanderfahrend, ganz oder fast 2lappig; Strauss eyf.; die weibl. Bth. fädlich; die *N. der Zwitterblüthen verlängert, lineal.-lanzettl., zugespitzt.* 4. An Bächen in den VorA. und A., (dch die g. AK.) Apr. Mai. *Tussilago nivea* Vill. Hoppe bei St. h. 21. *T. frigida* Vill.

Weibchen. *T. paradoxa* Retz. St. h. 21.

4. *P. SPURIUS* (Retz.) Unächter *P.* — *B. fast 3eckig-herzf., ungleich-gezähnt, unterseits schneeweiss-filzig, die Lappen der Basis vorne verbreitert-einwärtsgekrümmt, und 2-3lappig*; Strauss fast ebensträussig; die weibl. Bth. oberwärts breiter, fast zungenf.; die *N. der Zwitterblüthen* kurz, eyf. 4. An Flussumfern im nördl. D., (an der Elbe in Mecklenbg und Holstein; an der Oder in Pommern; an der Weichsel bei Danzig; an der Pregel bei Königsberg.) Apr. Bth. weiss oder röthlich. *Tussilago tomentosa* Ehrh. Die Zwitterpfl. sah ich noch nicht. D.

II. Gruppe. *ASTEROIDEEN*. Less. Syn. 161. Gf. der Zwitterbth. walzl., 2sp., die Schenkel lineal., auswendig fast flach und oberseits gleichmässig- und kurz-flaumig.

I. Untergruppe. *ASTERINEEN*. Nees Ast. p. 3. Stbk. an der Basis ohne Anhängsel.

6. *LINOSYRIS* (DC. prodr. 5. p. 351.) Linosyre. — HK. dachig. Bth. sämmtlich zwitterig, röhrig. Achene schnabellos, zsgedrückt, Pappus haarig. Fruchtb. nackt.

1. *L. VULGARIS* (Cassin. DC. prodr. 5. p. 352.) Gemeine *L.* — *B. lineal., kahl; HK. locker.* 4. An sonnigen Felsen, (stellenweise in der Schw. und im südl. und mittleren D. bis Thüringen.) Jul.

Aug. *Chrysocoma Linosyris*. L. sp., Koch Synops. ed. 1., Schk. t. 238. Bth. gelb.

7. ASTER (L.) Aster. — HK. dachig. Bth. des Randes weiblich, zungenf., freihig, (verschiedenfarbig:) Mittelfeld zwittrig, röhrig. Stbk. ohne Anhängsel. Achene schnabellos, zsgedrückt. Pappus haarig, gleichf. Fruchtb. nackt.

1. A. ALPINUS (L.) Alpen-A. — B. dreinervig, flaumig, ganzrandig, die stengelst. lanzettl., die wurzelst. länglich, in den Bstiel verschmälert, die uranfänglichen spatelig; Blättchen des HK. lanzettl., locker; der St. 1köpfig. 4. An felsigen O. auf den Triften der A. und VorA. (dch die g. AK.; auf dem Feldberg im Breisgau, den Mährischen Karpathen: den Sudeten und dem Unterharze.) Jul.-Sept. St. h. 37. Bth. des Randes blau, des Mittelfeldes gelb, Köpfchen anscheinlich. Das Krant mehr oder weniger flaumig. Der Aster *hirsutus* Host. besteht aus haarigern Expl. und ist kaum als Variet. zu trennen.

2. A. AMELLUS (L.) Virgils-A. — B. dreifältig-nervig, flaumhaarig-rauh, etwas gesägt oder ganzrandig, die untern elliptisch, gestielt, in den Bstiel verschmälert, die obern längl.-lanzettl.; *Ebenstrauss einfach, abstehend; Blättchen des HK. abgerundet-stumpf, etwas abstehend.* 4. Auf Hügeln und an gebirgigen, sonnigen O., (stellenweise dch das g. südl. und mittlere Gebiet.) Aug.-Oct. J. a. t. 435. A. *amelloides* Hoffm. bei Röm. K. und Z. cat. Strahl violett-blau. Var. mit spitzen und stumpfen B. und rauhh. mit längeren Haaren: A. *amellus* γ. *hispidus* DC. pr. Ferner mit braunrothem und weissem Pappus. Zu letzterem scheint A. *tinctorius* Wallr. (in der Linnaea) zu gehören. Expl. mit braunrothem und weissem Pappus habe ich selbst gefunden, aber ich erkenne sie nicht für eigene Arten. Allein der A. *Pseudo-Amellus*, mit dreifältig-nervigen, rauhen, länglich-lanzettl., abgerundet-stumpfen, ganzrandigen B., wovon die untern in den Bstiel verschmälert sind, mit aufrechten, fast gleichlaufenden ebensträussigen Aesten, stumpfen, dachigen, an der Spitze abstehenden Blättchen des HK., von welchen die innern an der Spitze gefärbt sind, (D. fl. fr. suppl. und Wenderoth in Schrift. d. Ges. d. N. W. zu Marburg,) den Nees von E. als Var. unter A. *Amellus* setzt, bildet nach meiner Ansicht eine eigene Art, von welcher ich jedoch ein Deutsches Expl. noch nicht gesehen habe. Zu dieser Art gehört auch A. *Amelloides* Reichenb., der aber nicht bei Mainz wächst.

3. A. TRIPOLIUM (L.) Meerstrands-A. — B. fast fleischig, kahl, lineal-lanzettl., am Rande kleingesägt-rauh oder ganzrandig; der St. an der Spitze oder von der Basis an ästig; Aeste ebensträussig; die innern Blättchen des angedrückt-dachigen HK. länger, stumpf. ☉. Am Seestrände sowohl im Süden, als im Norden und an Salinen. Aug. Sept. Fl. d. t. 615. *Tripodium vulgare* Nees von E. Strahl blau. Var. mit an der Spitze purpurnen und ganz grünen Blättchen des HK. — A. *pannonicus* J. h. v. I. t. 8. zeigt auf der Abbildung, ohne Zweifel dch ein Versehen des Malers, den HK. aus einer einfachen und gleichmässigen Reihe von

Blättchen zsgesetzt. Die Pfl., welche ich bis jetzt aus Ungarn empfang., weicht von der gewöhnlichen nicht ab, und Host brachte die ganze Art als Synonym unter Aster Tripolium D.

4. A. BRUMALIS (Nees ab. E. gen. et spec. aster p. 70.) Winter-A. — B. den St. umfassend, lanzettl., zugespitzt, am Rande rauh, die unteren in der Mitte entfernt-geschärft-gesägt; der St. traubig-pyramidal, die Aeste meist einköpfig; HK. locker; die Blättchen fast gleichlang, die untersten von der Basis an abstehend. 4. Aus Nordamerika eingebracht, nun hier und da an Flussufern verwildert. Octob. Novemb. A. Novi Belgii Willd. spec. Die Köpfchen ziemlich gross. Der Strahl blau. Var. mit traubig-ästigen Zweigen, aber einköpfigen Aestchen.

5. A. NOVI BELGII (Lin. spec. p. 1231.) Neuhelgische A. — B. etwas den St. umfassend, lanzettl., spitz, oberwärts gegen den Rand hin rauh, die unteren in der Mitte entfernt-angedrückt-kleingesägt, die obersten der Bthstielchen in die Blättchen des HK. übergehend; der St. ebensträussig; der Ebenstrauß zsgesetzt oder mehrfach zsgesetzt; HK. locker, die Blättchen fast gleichlang, die äusseren fast von der Basis an abstehend. 4. Aus Nordamerika eingebracht, nun hier und da wild an Flussufern. Sept. Oct. A. serotinus Willd. spec. Strahl schön röthlich-violett.

6. A. SALICINUS (Willdenow. sp. pl. 3. p. 2040.) Weidenartiger A. — StB. sitzend, lanzettl., oberseits gegen den Rand hin rauh, ganzrandig oder in der Mitte etwas gesägt, *Sägezähne* wenige, *abstehend*; Blättchen der Bthstiele wenige, lineal., aufrecht; St. rispig, die Aeste an der Spitze sowie die Aestchen ebensträussig; HK. angedrückt-dachig, die Blättchen nur mit der äussersten Spitze etwas abstehend. 4. An Flussufern, (an der Elbe und den Nebenflüssen, von Sachsen bis Hamburg hin und wieder, an der Werra bei Allendorf, an der Donau bei Regensburg und bis gegen Passau, an der Bistricha in Mähren.) Jul. Aug. A. salicifolius Scholler Suppl. fl. barb. mit Abbildung. Köpfchen mit dem Strahl zollbreit. Strahl weiss, zuletzt lila.

7. A. LEUCANTHEMUS (Desfontaines Cat. hort. paris. ed. 3. p. 401.) Weissblüthiger A. — StB. sitzend, *verlängert-lanzettl.-lineal.*, verschmälert-zugespitzt, oberseits am Umfange rauh, ganzrandig, oder in der Mitte etwas gesägt, *Sägezähne* beiderseits 1-3, klein, entfernt; Blättchen der Blütenstielchen lineal.-abstehend; St. rispig; Aeste traubig; Aestchen 1köpfig, die oberen der Zweige 2-4köpfig; die Blättchen des HK. angedrückt, an der äussersten Spitze etwas abstehend. 4. Ursprünglich in Nordamerika, jetzt verwildert an Flussufern, (an der Spree bei Berlin.) Aug. Sept. A. dracunculoides Willd. spec. Strahl weiss, beim Abblühen an der Spitze blassröthlich. Köpfchen 10 Linien im Durchmesser.

8. A. PARVIFLORUS (Nees ab. E. gen. et spec. aster. p. 99.) Kleinblüthiger A. — StB. sitzend, lanzettl., zugespitzt, entfernt-

kleingesägt, oberseits im Umfange rauh, die der Aeste lineal.-lanzettl., an den Bstielchen viel kürzer, längl.-lanzettl., von der Mitte an gegen die Basis hin verschmälert; St. rispig; Aeste und Aestchen traubig; *HK. angedrückt-dachig*, die Blättchen an der äussersten Spitze abstehend. 4. Ursprünglich in Nordamerika, nun verwildert an Flussufern, (am Maine, Rheine, der Elbe hin und wieder.) Aug. Sept. *A. lanceolatus* Lejeune in Reichenb. fl. germ. exsicc. *A. miser* Ait. h. kew. nach Nees. Strahl weiss, beim Abblühen an der Spitze röthlich oder blass-lila und später ins Purpurrothe spielend. Köpfchen um die Hälfte kleiner, wie beim Vorigen.

S. GALATELLA (Cass.) Galatelle. — Bth. des Randes geschlechtslos, wegen des ganz fehlenden Gf. oder der unvollst. Narben; sonst alles wie bei Aster.

1. G. CANA (Nees v. E.) Graue G. — B. lanzettl., stachelspitzig, ganzrandig, 3nervig, punktirt, beiderseits nebst dem St. grau-flaumig; der St. oberwärts ebenstränssig-rispig. 4. In einem sumpfigen Wäldchen bei Mönitz in Mähren. Aug. Sept. *G. canescens* Cass. *Aster canus* W. und Kit. Strahl lila. D.

9. BELLIDIASTRUM (Cass., nicht Lessing) Bellidiastrium. — Blättchen des HK. gleich, 2reihig, sonst alles wie bei Aster.

× 1. B. MICHELII (Cass.) Michel's B. — 4. An kiesigen O. der A. und an feuchten Abhängen der VorA.-Regionen; mit den Flüssen in die an die A. grenzenden Ebenen herabsteigend, (dch die g. AK.; in Bayern bis Landshut hinab; Würtemberger Alp; Feldberg in Baden.) Jun. Jul. *B. montanum* Bl. und Fingh. *Doronicum Bellidiastrium* L. J. a. t. 400. St. h. 38. *Arnica Bellidiastrium* Willd. *Aster Bellidiastrium* Scop. *Magarita Bellidiastrium* Gaud. Strahl weiss oder unterseits purpurn.

10. BELLIS (L.) Gänseblümchen. — Blättchen des HK. gleich, 2reihig. Bth. des Randes weiblich, zungenf., 1reihig; des Mittelfeldes zwittrig, röhrig. Achene schnabellos, platt-zsgedrückt, berandet. Pappus fehlend. Fruchtb. nackt. — Strahl weiss oder unterseits purpurn.

× 1. B. PERENNIS (L.) Dauerndes G. — Blättchen des HK. sehr stumpf; B. verkehrteyf.-spatelig, gekerbt, meist 3nervig; Wurzelstock schief, später vielköpfig. 4. Auf Wiesen und Triften. Blühet fast das ganze Jahr hindurch. Schk. t. 251. Der Strahl weiss, unten purpurn. Die St. findet man nicht selten beblättert, die liegenden auch bisweilen wurzelnd. — *B. sylvestris* Cyrill. untersch. sich dch die länglichen, allmählig in den Bstiel verschmälerten, deutlich 3nervigen, fast sammtig-kurzh. B. und spitzlichen Blättchen des HK.

2. B. ANNUA (L.) Jähriges G. — Blättchen des HK. stumpf; B. verkehrteyf.-spatelig, gekerbt, 5nervig; W. später mehrköpfig. ☉. Auf Wiesen in Istrien. Apr. Jun. Der St. oft sehr kurz, wie bei der vorhergehenden. J.

11. **STENACTIS** (Cassin. mit Ausschl. von Arten.) Stenaktis. — Blättchen des HK. fast gleich, 2reihig. Bth. des Randes weiblich, zungenf., 2reihig; des Mittelfeldes zwitterig, röhrig. Stbk. ohne Anhängsel. Achene schnabellos, zsgedrückt. Pappus haarig, des Randes einfach aus kurzen Borstchen, des Mittelfeldes doppelt, der äussere aus kurzen, zahlreichen Borstchen, der innere aus verlängerten, spärlichen Haaren gebildet. Fruchtb. nackt.

1. **St. BELLIDIFLORA** (Alex. Braun.) Gänsblümchenblüthige St. — St. am Ende ebensträussig; die unteren B. verkehrteyf., grob-gesägt, die oberen lanzettl., entfernt-gesägt, oder ganzrandig; HK. rauhh. 4, aber doch von keiner langen Lebensdauer. In Wald O., an feuchten Hecken, Wiesenrändern, (von Basel dch die Rhein-fläche bis Koblenz; bei Rheinfelden; im Wallis; im Littorale und hin und wieder zerstreut in D.) Jul. Aug. *Pulicaria bellidiflora* Wallroth. *P. annua* Gärtn. *Aster annuus* L. *Diplopappus annuus* Bl. und Fingerh. *D. dubius* Gaud. *Erigeron annuum* Pers. *E. bellidioides* Spenn. *Stenactis dubia* Cassin. *S. annua* Nees ab E. Bth. fast wie bei *Bellis*. Der Strahl weiss.

12. **ERIGERON** (L.) Berufkraut. — HK. dachig, Bth. des Randes weiblich, mehrreihig, entweder sämmtl. zungenf., oder die innern fädlich; des Mittelfeldes zwitterig, röhrig. Stbk. ohne Anhängsel. Achene schnabellos. Pappus haarig, gleichf. Fruchtb. nackt.

1 **E. CANADENSIS** (L.) Gemeines B. — Der St. steif, rispig; *R. länglich, reich mit Köpfchen besetzt; Aeste nebst den Aestchen traubig*; B. kurz., lineal-lanzettl., beiderseits verschmälert, borstig-gewimpert, die untersten entfernt-gesägt. ☉. Jul. Aug. An kultiv. O. und im Kiese der Flüsse. Fl. dan. t. 1274. Strahl schmutzig-weisslich, klein.

2. **E. ACRIS** (L.) Scharfes B. — Der St. traubig, zuletzt fast ebensträussig; Aeste 1-3köpfig; B. entfernt, abstehend, lineal-lanzettl., *rauhh.*, die untern in den Bstiel verschmälert; *Strahl aufrecht, so lang, als die Bth. des Mittelfeldes oder ein wenig länger*; die innern weibl. Bth. fädlich und zahlreich. ☉. und 4, aber nicht von langer Lebensdauer. Auf unfruchtbaren Feldern, sonnigen Hügeln, Haiden. Jul. Aug. Schk. t. 241. Der St. braun-purpurn; B. ganzrandig, wie bei den übrigen, die untern nur an grössern Expl. und nicht immer entfernt-gesägt; Zungenblüthchen hell-purpurn oder weiss, wenig bemerkbar. Var. mit welligen und flachen B.; weisslichem Pappus; *E. acris* Weihe, *E. corymbosus* Wallr. in Linnaea; und röthlichem Pappus; *E. serotinus* Weih. (wenn die Zungenblüthen zugleich länger, als die Bth. des Mittelfeldes sind,) der aber nicht später blüht. Zum letztern scheint auch *E. podolicus* Rb. zu gehören. — *E. podolicus*, den ich vom Autor selbst erhielt, und der im Bezirk unserer Fl. noch nicht gefunden wurde, untersch. sich dch den höheren dichtbeblätterten St., die genäherten, aufrechten B., den endst., gedrunge-

Ebenstrauss und den bei der lebenden und kultiv. Pflanze etwas abstehenden Strahl.

3. *E. DROEBACHENSIS* (Mill. fl. dan t 874. nach Fries.) Dröbaches B. — Der St. traubig, zuletzt fast ebensträussig; Aeste 1-3köpfig; B. entfernt, abstehend, lineal-lanzettl., kahl, am Rande gewimpert; Wimpern aufwärts gekrümmt, die untern B. in den Bstiel verschmälert; *Strahl* aufrecht, *so lang, als die Bth. des Mittelfeldes oder ein wenig länger*; die innern weibl. Bth. fädl. und zahlreich. ☉. In den VorA.-Regionen, im Flusskiese, (zerstreut dch die AKette, am Rheine hinab bis Karlsruh.) Jul. Aug. *E. acris* droebachense Schleich. catal., *E. acris* β. angustatus Hartm. Handb. d. skand. fl., *E. angulosus* Gaud. helv., *E. elongatus* Ledeb. fl. alt. Strahl hell-purpurn. Sehr ähnlich dem *E. acris*, auch ist der St. nicht kantiger, untersch. sich aber doch dch die im Verhältniss zur Länge etwas schmälern, ganz kahlen und nur am Rande mit Haaren besetzten B. Vielleicht doch Variet.?

4. *E. VILLARSII* (Bellard.) Villars B. — Der St. 2-3köpfig oder fast rispig; Aeste *nebst den B. und dem HK. drüsig-flaumig*; B. länglich-lanzettl., die untern in den Bstiel verschmälert; Strahl abstehend; die innern weibl. Bth. röhrig-fädl. und zahlreich. 4. In den Thälern der A., (Schw. auf der Stockhornkette und den Wallis. A.; Kärnthen auf der Pasterze, Alpe Padon in Fassa, südl. Tyrol.) Jul. Aug. Strahl purpurn. *E. atticum* Vill. *E. rupestris* Hopp. — Der *E. rupestris* Bl. und Fingh. gehört zu einer andern Art. — Var. mit einfachen, langen, zw. dem kurzen, drüsentrag. Flaum gestreuten Haaren: *E. intermedius* Trachsel!

5. *E. ALPINUS* (L.) Alpen-B. — Der St. 1-armköpfig; B. lanzettl., rauhh., die untern in den Bstiel verschmälert, etwas spatelig; *Strahl abstehend, noch einmal so lang, als die Bth. des Mittelfeldes*; HK. rauhh.; *die innern weibl. Bth. röhrig-fädl. und zahlreich*. 4. An kiesigen O. der A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. St. h. 38. Strahl purpurn. Var., aber seltner, mit ziemlich kahlen B. und weissen Bth. Untersch. sich von allen Variet. des *E. acris* dch den Pappus, der noch einmal so lang ist, als die Achene; bei *E. acris* ist er 3mal länger. — *E. grandiflorus* Hopp. mit noch einmal so grossen Bth., als *E. alpinus*, ist an seinem StandO. näher zu untersuchen. Scheint eine grossköpfige Variet. von *E. alpinus*.

6. *E. GLABRATUS* (Hopp. und Hornsch. Cent. getr. Pfl.) Kahles B. — Der St. 1-armköpfig; B. lanzettl., kahl, kurz. - gewimpert oder kurz. , die untern in den Bstiel verschmälert, etwas spatelig; Strahl abstehend, noch einmal so lang, als die Bth. des Mittelfeldes; HK. *flaumig-kurz.*; *die weibl. Bth. sämmtl. zungenf.* 4. Auf den VorA. und A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. Strahl hell-purpurn, selten weiss. Dch den bloss flaumig-rauhh. und nicht wolligen und sehr rauhh. HK. verschieden von folgendem.

7. *E. UNIFLORUS* (L.) Einblüthiges B. — Der St. 1köpfig; B. lanzettl., rauhh., die untern in den Bstiel verschmälert, etwas

spatelig, kahl werdend; Strahl abste hend, noch einmal so lang, als die Bth. des Mittelfeldes; HK. dicht-wollig-rauhh.; die weibl. Bth. sämmtl. zungenf. 4. An grasreichen Ö. der höchsten A., (Schw., Tyrol, Salzbg, Steyerm., Kärnthen.) Jul. Aug. Strahl weiss oder hellpurpurn. St. h. 38.

13. **SOLIDAGO** (L.) Goldruth. — Bth des Randes gleichfarbig. Achene ziemlich stielrund. Sonst Alles, wie bei Aster.

1. **S. VIRGA AUREA** (L.) Gemeine G. — Der St. aufrecht, an der Spitze rispig-traubig, oder 1fach-traubig; Tr. aufrecht; B. ey- und lanzettf., zugespitzt, in den geflügelten Bstiel herablaufend, ziemlich haarig, die untern gesägt. 4. In Wäldern, auf unkultiv. Hügeln. Jul. Aug. Bth. gelb. St. h. 9. Var.:

α. *vulgaris*, höher; die untern B. gesägt, elliptisch, die obern lanzettl., ganzrandig; Aeste nebst den Bthstielchen flaumig; steht gleichsam zw. den 2 folg. Variet. in der Mitte.

β. *angustifolia*, höher; B. sämmtl. lanzettl., undeutlicher-gesägt oder ganzrandig; scheint *S. Virga-aurea* var. β. DC. prodr. zu seyn.

γ. *latifolia*, die StB. sämmtl. eyf.; Bthstielchen an der Spitze mit häufigen Deckblättchen. Diese kommt in der südl. Schw., im wärmern Tyrol und um Triest vor. Findet sich auch mit kahlen Bthstielchen und mit Blättchen des HK., von denen die mittlern stumpf sind.

δ. *alpestris*, niedrig; B. lanzettl. oder elliptisch-lanzettl., fast kahl; die untern Tr. oft kürzer, als das sie stützende B.; Köpfchen grösser: *S. alpestris* WK. Diese auf den höhern Gebirgen und A.

ε. *cambrica*, der St. niedriger, manchmal 3-4 Zoll hoch, und sodann mit einer einfachen Tr. endigend; Köpfchen noch einmal so gross; B. länglich-lanzettl., beiderseits haarig; Aeste nebst den Bthstielchen kurzfl.-flaumig; *S. Virgaurea* γ. *pumila* Gaud., γ. *cambrica* Sm. *S. cambrica* Huds. Dill. eth. f. 393. Diese auf den Triften der A. der Schw. n. d. südl. Tyrol.

Die hier aufgezählten Variet. bilden, wie mir scheint, mehrere Arten, sie sind jedoch bis jetzt noch nicht genugsam beobachtet.

II. Untergruppe. **TARCHONANTHEEN**. Lessing. Stbk. mit Anhängsel. Pappus aus getrennten Strahlen zsgesetzt, oder fehlend. Bth. des Randes weibl., des Mittelfeldes männl. oder steril.

14. **MICROPUS** (L. gen. n. 996.) Falzblume. — HK. 5-9blättrig, locker. Bth. sämmtlich röhrig, die des Mittelfeldes zwittrig, 5zählig, steril, dch einen einfachen Gf.; der weiblichen am Rande so viele, als Hüllblättchen, mit einem in 2 N. gespaltenen Gf. und fruchtbar. Achene der frucht. Bthen in die Hüllblättchen eingewickelt, ohne Pappus. Frucht. nackt.

1. **M. ERECTUS** (L. sp. 1313.) B. wechselst., lanzettl.; Bth. wollig; HK. wehrlos. ☉. Auf unkultiv. Feldern, (um Triest, Hoppe!

um Fiume, in Istrien.) Jun. Jul. Barrel. ic. t. 296. Bth. gelblichweiss. D.

15. EVAX (Gärtn. fruct. 2. p. 393. t. 165) Evax. — HK. 1-2-reihig, Blättchen angedrückt. Bth. sämmtlich röhrig, die des Mittelfeldes wenige, männlich, 4zählig; die des Randes vielreihig, weiblich, schlank. Achene ohne Pappus. Fruchtb. zw. den weiblichen Bthen spreublättrig, zw. den männlichen nackt.

1. E. PYGMAEA (Pers. Synops. 2. p. 422.) Zwerg-E. — Bthblätter verkehrteyf., stumpf. ☉. Trockene, sonnige, felsige O. am adriatischen Meere, (Insel Cherso.) Jun. Jul. E. umbellata Gärtn., Filago pygmaea L. sp., Filago acanlus Allion. ped. Bth. schmutzig-weiss. J.

III. Untergruppe. *BUPHTHALMEIEN*. Lessing. Stbk. mit Anhängseln. Pappus kronenf.

16. TELEKIA (Baumg.) Telekie. — Achenen lineal., fast stielrund, vielrillig; Pappus kurz, kronenf., ungeth., gekerbt; sonst Alles, wie bei Bupththalmum.

1. T. SPECIOSA (Baumg.) Ansehnliche T. — B. gestielt, herzf., doppeltgesägt, die obersten sitzend, an der Basis abgerundet oder herzf.-stengelumfassend. 4. An gebirgigen O., (bei Marstavadiza nicht weit von Fiume links der neuen Strasse in den Schluchten; in Böhmen am Rauschenbach im Rauschengrund nicht weit von Oberleitensdorf.) Aug. T. cordifolia DC. prodr. Bupththalmum speciosum Schreb. B. cordifolium WKit. — Baumgarten beschreibt den Pappus der Telekia federig, aber das Citat aus WK. hebt allen Zweifel. Bth. gelb. D.

17. BUPHTHALMUM (L.) Rindsauge. — HK. dachig. Bth. des Randes weiblich, zungenf., 1-reihig, die des Mittelfeldes zwittrig; Blkr. röhrig, stielrund, die Röhre unterwärts allmählig verschmälert. Die Stbk. geschwänzt. Achenen des Randes 3-seitig; die des Mittelfeldes zsgedrückt, fast 4-seitig. Pappus kurz, kronenf., aus zerrissen-gezähnelten Schnuppen gebildet. Fruchtb. spreuig. — Bth. gelb.

1. B. SPECIOSISSIMUM (Arduin.) Sehr ansehnliches R. — B. spitz-gezähnt, netzig-aderig, kahl, gewimpert, herzf.-stengelumfassend, die ohern eyf., zugespitzt, die untern länglich-eyf., nach der Basis verschmälert; Blättchen des HK. lineal.-lanzettl., verschmälert-spitz, die äussern länger, als das Mittelfeld; Achenen an der Spitze flümllich. 4. Auf den Bergen warmer Gegenden, (Kalkfelsen am Steiger zw. der Grenze von Bondon im Giudicarie und Valle di Vestino im südl. Tyrol, Facchini.) Jun. Aug. Telekia speciosissima Lessing. Der St. 1-köpfig. Die B. an den unfruchtbaren Büscheln nicht herzf., sondern länglich und allmählig in den Bstiel verschmälert. Achenen fast lineal., die der Randbth. 3eckig. D.

2. B. SALICIFOLIUM (L.) Weidenblättriges R. — B. länglich

und lanzettl., etwas gezähnt, flaumig, die untern stumpf, in den Bstiel verschmälert, die obern sitzend, verschmälert-spitz; *Blättchen des HK. lanzettl., haarspitzig, so lang, als die Bth. des Mittelfeldes*; Achenen kahl. 4. Auf Kalkboden in gebirgigen O., zw. Gesträuch, auf trocknen Wiesen, (dch die g. AK. bis in das Littor., vom Oberelsass dch Schwaben, Bayern bis Oestr. und Böhmen; in den Fränkischen Kalkbergen.) Jul. Aug. J. a. t. 370. Achenen des Randes verkehrteyf., scharf-3kantig. Var. mehr rauhh. und fast kahl, und

β. *angustifolium*, B. lanzettl., die obern lang-verschmälert-spitz; B. *grandiflorum* L. Kahl, ohne allen Flaum, wie man die Pfl. beschreibt, sah ich sie noch nicht.

18. **ASTERISCUS** (Tournef.) Sternauge. — Blkr. der Randbth. an der Basis doppeltgeöhrelt, die des Mittelfeldes stielrund, Röhre unterwärts verdickt. Sonst Alles, wie bei Buphthalmum.

I. A. **AQUATICUS** (Less.) Wasser-S. — B. länglich-lanzettl., stumpf; Köpfchen gabelst., sitzend und endst.; *Blättchen des HK. viel länger, als der Strahl*, stumpf, wehrlos; Achenen seidenh. ☉. Auf Brachäckern im Littor. und Istrien. Jul. Aug. Barrel. t. 552. Buphthalmum aquaticum L. Bth. gelb. D.

19. **PALLENIS** (Cass.) Pallenis. — HK. dachig. Bth. des Randes weiblich, zungenf., 2reihig; die des Mittelfeldes zwittrig, röhrig; Röhre an der innern Seite längsflügelig; Saum unter den Zähnen dünn, an der Basis kugelig-aufgeblasen. Pappus aus sehr kurzen Schuppen. Stbk. geschwänzt. Achenen des Randes flachzsgedrückt, 2flügelig, mit halbirtem Pappus; die des Mittelfeldes zsgedrückt, meist 1flügelig, mit kronenf. Pappus.

I. P. **SPINOSA** (Cass.) Dornige P. — ☉. Auf Brachfeldern und an Ackerrändern im Littor., (bei Fiume, auf Cherso.) Jun.-Aug. Buphthalmum spinosum L. Barrel. t. 551. Aehnlich dem Buphthalmum aquaticum, aber höher, wollig-zottig, und die Blättchen des HK. mit einem Dorne endigend. Bth. gelb. J.

IV. Untergruppe. **INULEEN**. Cassini. Stbk. mit Anhängeln. Pappus mit getrennten Strahlen. Bth. des Randes weibl., des Mittelfeldes zwittrig.

20. **INULA** (L.) Alant. — HK. dachig. Bth. des Randes weiblich, zungenf., (gleichfarbig;) die des Mittelfeldes zwittrig, röhrig. Stbk. geschwänzt. Achene schnabellos. Pappus haarig, gleichf. Fruchtb. nackt. — Bth. gelb.

I. Rotte. **CORVISARIA** Merat. Dub. bot. gall. 267. Die innern Blättchen des HK. an der Spitze verbreitert, spatelig.

I. I. **HELENIUM** (L.) Wahrer A. — B. *ungleich-gezähnt-gesägt, unterseits filzig*, die wurzelst. gestielt, elliptisch-länglich, *die stengelst. herz-eyf., zugespitzt, stengelumfassend*; die äussern Blättchen des HK. eyf., die innern lineal.-spatelig; Achenen kahl. 4.

Auf feuchten Wiesen, an Gräben, Ufern, (von Westphal. dch Niedersachs., Mecklenbg, Pommern; sodann in Schles. und Mähren, im übrigen Gebiete hin und wieder verwildert.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 728. Aster Helenium Scop.

H. Rotte. ENULA Dubl. bot. gall. 267. Die innern Blättchen des HK. am Ende zugespitzt.

a. Achenen kahl.

2. I. GERMANICA (L.) Deutscher A. — *B. länglich-lanzettl. oder länglich, spitzlich, entfernt-gezähnel, aderig, unterseits wollig-haarig, am Rande rauh, die stengelst., an der Basis herzf.; Ebenstrauss zsgesetzt, geknäuel, vielköpfig*; Blättchen des fast walzlichen HK. auf dem Rücken wollig-flaumig; *Zungenbth. kaum länger, als die des Mittelfeldes*; *Achenen kahl.* 4. Auf steinigen Hügeln, an Weg- und Ackerrändern, (in Oestr., Böhm. und Mähr.; in Thüringen bei Halle und Jena; Unterharz; in Franken bei Würzburg und Schweinfurt; Mittelrhein von Dürkheim bis Mainz.) Jul.-Aug. J. a. t. 134. D.

3. I. MEDIA (MBiebst.) Mittlerer A. — *B. lanzettl., spitz, entfernt-gezähnel, aderig, unterseits etwas haarig, am Rande gewimpert-rauh, die stengelst. an der Basis herzf.; Ebenstrauss fast einfach, gedrunen, vielköpfig*; Blättchen des etwas bauchigen HK. ziemlich kahl, gewimpert; *Zungenbth. ohngefähr noch einmal so lang, als die des Mittelfeldes*; *Achenen kahl.* 4. Auf Bergwiesen, selten, (zw. Kreuznach und Bingen, und bei Laubenheim in der Rheinpfalz, sodann bei Halle.) Jul. Aug. D.

4. I. HYBRIDA (Baumgart.) Bastard-A. — *B. schmal-lanzettl., spitz, entfernt-unmerklich-gezähnel und ganzrandig, nervig-aderig, kahl, am Rande rauh und etwas wollig, die stengelst. sitzend*; *Ebenstrauss meist 5köpfig, gedrunen*; die äussern Blättchen des HK. auf dem Rücken und dem Rande etwas zottig; *Achenen kahl.* 4. Auf Gebirgen, (auf dem Kahlenberge bei Wien.) Jul. Aug. HK. von 1-3 lanzettl., krautigen, 3nervigen Blättern, von der Länge des HK. selbst umgeben, wie bei der folgenden. Wächst immer zw. der I. germanica und ensifolia, desswegen vielleicht ein Bastard? D.

5. I. ENSIFOLIA (L.) Schwerdtblättriger A. — *B. lanzettl.-lineal., spitz, entfernt-unmerklich-gezähnel und ganzrandig, nervig, kahl, am Rande rauh und fast wollig, die stengelst. sitzend*; der St. 1-mehrköpfig; Köpfchen einzeln, endst.; HK. von 3-6 lanzettl., nervigen B. von der Länge des HK. selbst umgeben; *Achenen kahl.* 4. An unfruchtbaren, steinigen O., (im Littor., Krain, Unteröstr. bis Mähren; Val di Sarca, nördl. am Gardasee im südl. Tyrol.) Jul. Aug. J. a. t. 162. St. h. 34. Aster ensifolius Scop. D.

6. I. SALICINA (L.) Weidenblättriger A. — *B. lanzettl., zugespitzt, entfernt-unmerklich-gezähnel und ganzrandig, aderig, kahl, am Rande rauh, die obern herzf.-stengelumfassend*; der St. 1-

mehrköpfig, fast ebensträussig; Blättchen des HK. kahl, gewimpert; *Achenen kahl*. 4. Auf feuchten Wiesen, an Gräben. Jul. Aug. Fl. dan. t. 786. *Aster salicinus* Scop. B. abstehend, zurückgekrümmt. Var. seltener mit kurzbl. B. und St.

7. *I. SQUARROSA* (L.) Sparriger A. — B. oval oder lanzettl., gezähnel, *aderig, kahl*, am Rande gewimpert-rauh, *mit abgerundeter Basis sitzend*; der St. 1-mehrköpfig, fast ebensträussig; Blättchen des HK. kahl, gewimpert, die äussern allmählig kürzer; *Achenen kahl*. 4. Auf Hügeln und Bergen unter Gesträuch, (im C. Tessin, im Littor., dem wärmern Krain und Unteröstr.) Jul. Aug. I. Bubonium J. a. app. t. 19. *Aster Bubonium* Scop. HK. manchmal mit einem oder dem andern B., das länger, als die äussern Blättchen des HK. ist, umgeben. Willdenow. trennte in d. spec. pl. I. *squarrosa*, mit kleingesägten B., und I. *Bubonium*, mit gesägten B., welche jedoch kaum Var. darstellen. Die Form mit eyf.-lanzettl. B. ist: *Inula germanica* Vill. delph., Lam. dict., DC. fl. fr. Die Form mit endst. dichtem Ebenstrauss ist: *I. spiraeae-folia* Lin. spec. nach DC. prodr.

8. *I. HIRTA* (L.) Kurzbl. A. — B. oval, länglich oder lanzettl., ganzrandig oder etwas gezähnel, *aderig* und nebst dem St. von an der Basis zwiebeligen Haaren rauh.; der St. 1köpfig; *Blättchen des HK. lanzettl.-vershmälert, steifh., sämmtl. länger, als die Bth. des Mittelfeldes; Achenen kahl*. 4. Auf sonnigen, rauhen Hügeln hie und da, (in dem C. Tessin, im südl. Tyrol, Littor., Krain; von Oestr. dch Mähr., Böhm. nach Schles. und Hinterpommern; in Thüringen bei Jena, Halle; im Würtemb.; in dem Rheinthale vom Elsass bis an den Unterrhein; im Mainthale bis Würzb.) Mai. Jun. J. a. t. 358. I. *montana* Poll. *Aster hirsutus* Scop.

9. *I. VAILLANTH* (Vill.) Vaillant's A. — B. elliptisch-lanzettl., zugespitzt, ganzrandig, oder etwas gezähnel, *unterseits nebst dem HK. filzig*, die wurzelst. gestielt, *die stengelst. an der Basis verschmälert, etwas gestielt; Achenen kahl*. 4. An schlammigen O., Flussufern, (in der südwestl. Schw.) Aug. Sept. I. *cinerea* Lam. S.

b. Achenen rauh. oder flaumig.

10. *I. CONYZA* (DC. prodr. 5. p. 464.) Dürrewurzartiger A. — B. *elliptisch oder elliptisch-lanzettl.*, ziemlich spitz, oberseits flaumig, unterseits sowie der St. dünnfilzig, die unteren gestielt; der St. oberwärts rispig-ästig; *Aeste ebensträussig, vielköpfig*; Blättchen des HK. abstehend-zurückgebogen; *Bth. des Randes 3sp., kaum zungenf., so lang, als die innersten Blättchen des HK.* ☉. An unkultiv., felsigen, waldigen O. Jul. Aug. *Conyza squarrosa* L. spec. *Inula squarrosa* Bernhadi, nicht Linn.

11. *I. SUAVEOLENS* (J. h. vind. t. 51.) Wohlriechender A. — B. elliptisch-lanzettl., spitz, *unterseits filzig*, auf dem Mittelnerven, dem Rande, so wie der St. zottig-wollig, die untern gestielt, entfernt-gezähnel, *die obern an der Basis verschmälert, ganzrandig, der St. an der Spitze ebensträussig*; die Aeste 1-3köpfig;

die Hüllblättchen abstehend-zurückgebogen; Bth. des Randes zungenf. länger, als der HK.; *Achenen* kurz. 4. An feuchten O., (im Litt. bei Monfalcone, von Suffren angegeben, neulich aber nicht wiedergefunden, Tommasini.) Jul. Aug. Von dem Habitus der *I. Conyza*, die Köpfchen aber viel grösser, strahlig. D.

12. *I. OCLUS CHRISTI* (L.) Christusauge-A. — *B.* länglich, stumpflich, ganzrandig oder etwas gezähnt, nebst dem St. filzig-wollig, die untern in den Bstiel verschmälert, *die obern mit herzf. Basis stengelumfassend; Blättchen des HK. lanzettl., die äussern allmählig kürzer*, zottig; der St. 2-5köpfig; *Achenen* kurz. 4. An sonnigen, unfruchtbaren O., (in Unteröstr. und Mähr.) Jun. Jul. J. a. t. 129. Besser unterschied eine *Inula campestris*, welche die *I. Oculus Christi* MBiebst. ist, von der östreich. Art desselben Namens, doch den nackten Fruchtb.; aber auch an meinem östr. Expl. finde ich den Fruchtb. ganz nackt und nicht kurz. D.

13. *I. BRITANICA* (L.) Wiesen-A. — *B.* lanzettl., ganzrandig oder gezähnt, unterseits nebst dem St. zottig-wollig, die untern in den Bstiel verschmälert, *die obern mit herzf. Basis stengelumfassend*, oft an der Basis deutlicher gezähnt; *Blättchen des HK. lineal.-lanzettl., verschmälert, die äussern so lang, als die innern und das Mittelfeld oder länger*; der St. 2-5köpfig; *Achenen* kurz. 4. Auf feuchten Triften, an Gräben, Weihern, (doch das g. Gebiet, doch nicht überall.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 413. *I. hirta* Pollich, nicht L. Var. mit ziemlich kahlen B., ein wenig breitere Blättchen des HK.: *I. Otelliana* Rb. fl. exc. Variet.: β . *discoidea*, ohne Strahl, Tausch. pl. sel.

14. *I. MONTANA* (L.) Berg-A. — *B.* lanzettl., ganzrandig und etwas gezähnt, nebst dem St. zottig-wollig, *etwas seidenh.*, die untern gestielt, an der Basis verschmälert, *die obern sitzend; der St. köpfig*; die äussern Blättchen des HK. an der Spitze filzig-kurz., allmählig kürzer; *Achenen* kurz. 4. An gebirgigen, unfruchtbaren O., (in der westl. und südl. Schw.; in Oestr. an der Schwarza? in Mähren?) Jul. Aug. S.

15. *I. CRITHMOIDES* (L.) Meerfenchelähnlicher A. — *B. lineal., fleischig, die stengelst. stumpf-3zackig*, astst. ganzrandig. 4. An unüberschwemmten Meerstrande des Adriat. Meeres, (Triest, Aquileja.) Jul. Aug. *I. crithmifolia* Willd. D.

16. *I. GRAVEOLENS* (Desf. cat. hort. paris. ed. 2. p. 121.) Stinkender A. — Flaumig, klebrig; *der St. fast von der Basis an sehr ästig*; Aeste ruthenf., traubig, aufrecht, etwas abstehend; *B. fast lineal.*, ganzrandig. ☉. Auf feuchten Aeckern in Istrien. (Biasol! Veglia, Noë.) Aug. Sept. *Erigeron graveolens* L. spec. *Solidago graveolens* Lam. fl. fr., Koch Synops. ed. 1., Barrel. ic. 370. Bth. gelb. J.

21. *PULICARIA* (Gärtn.) Flöhkraut. — Pappus doppelt, der innere haarig, verlängert, der äussere kurz, mit in ein kleinge-

kerbtes oder borstlich - feingeschlitztes Krönchen verwachsen. Sonst Alles, wie bei *Inula*.

a. Der äussere Pappus borstlich-feingeschlitzt.

1. *P. VULGARIS* (Gärtn.) Gemeines F. — *B.* länglich-lanzettl., wellig, mit *abgerundeter Basis sitzend*, fast stengelumfassend, die jüngern nebst dem St. zottig; der St. rispig-ebensträussig; Köpfchen seiten- und endst.; Strahl sehr kurz. $\odot$. Auf feuchten Triften, an Sümpfen. Jul. Aug. Fl. dan. t. 613. *Inula pulicaria* L. *Aster pulicarius* Scop. *Diplopappus pulicarius* Bl. und Fing.

b. Der äussere Pappus kronenf., kleigekerbt.

2. *P. DYSENTERICA* (Härtn.) Ruhr-F. — *B.* länglich, mit breiterer, *tief-herzf. Basis stengelumfassend*, schwach-gezähnel, unterseits grau-filzig; Köpfchen an dem St. und Aesten ebensträussig; Strahl viel länger, als das Mittelfeld. 4. Auf feuchten Wiesen, an Gräben, Sümpfen, (im g. Gebiete, doch nicht allenthalben.) Jul. Aug. Fl. dan. 410. *Inula dysenterica* L. *Aster dysent.* Scop. *Diplopappus dysent.* Bl. und Fing.

3. *P. VISCOSA* (Cassini.) Klebriges F. — *B.* lanzettl., gesägt, nebst dem St. flaumig und klebrig; *Tr. endst., pyramidenf.*, an der Basis etwas zsgesetzt. 4. An rauhen O. am Adriat. Meer, (bei Triest und Fiume.) Jul. Aug. *Erigeron viscosum* L. J. h. vind. t. 163. *Inula viscosa* Ait. h. kew., DC. prodr. D.

III. Gruppe. *SENECIONIDEEN*. Lessing. Gf. der Zwitterbth. walzlich, Schenkel lineal., an der Spitze pinselig und gestutzt, oder über dem Pinsel mit einem kurzen Kegel, oder einem verlängerten, schmalen, rauh. Anhängsel versehen.

I. Untergruppe. *HELNIEEN*. Cassin. Stbk. ohne Anhängsel. Pappus aus mehreren Spreublättchen bestehend.

22. *GALINSOGA* (Ruiz. et Pavon. fl. peruv. 110.) Galinsoge. — HK. halbkugelig, 5-6blättrig. Bth. des Randes meist zu 5, weiblich, zungenf., die auf dem Mittelfeld zwitterig, röhrig. Pappus gleichf., spreublättrig, mit zugespitzten, federig-gefranzten Blättchen, von der Länge der Achene. Achene kantig. Fruchtb. spreuig.

1. *G. PARVIFLORA* (Cav. ic. 3 p. 41. t. 281.) Kleinblüthige G. — $\odot$. Aus Peru stammend, nun im nördl. D. hie und da einheimisch geworden, und in grosser Menge kultivirte O. überziehend. Jul. Aug. *Galinsoga parviflora* Willd. *Galinsoga parviflora*. DC. prodr. *G. quinqueradiata* Ruiz et Pavon. *Wiborgia Aomella* Roth. catal. bot., Koch Synops. ed. 1 Strahl weiss.

II. Untergruppe. *HELIANTHEEN*. Lessing. Stbk. ohne Anhängsel, schwärzlich. Pappus fehlend, oder begrannt, oder kronenf.

23. **BIDENS** (L.) Zweizahn. — HK. reichblättrig, 2reihig, die äussern Blättchen abstehend. Bth. sämmtl. zwittrig, röhrig, oder die des Randes zungenf. und geschlechtslos. Pappus mit 2-5, bleibenden, rückwärts stacheligen Grannen. Fruchtb. flach, spreuig. Bth. gelb.

1. **B. TRIPARTITA** (L.) Dreitheiliger Z. — Köpfchen scheibenblüthig; die äussern Blättchen des HK. länger, als die Köpfchen; Bth. 3th., Zpfl. lanzettl., gesägt; *Achenen verkehrteyf.*, am Rande rückwärts stachelig, so lang, als die äussern Blättchen des HK. ☉. An sumpfigen O. und Gräben. Jul.-Herbst. Die mittlern Zpfl. der B. an grössern Expl. 3sp., daher die B. gefiedert-5sp. Achenen braun-grau. Auf torfhaltigen Stellen kommen auch hier und da winzige Expl. vor, wie bei der folgenden Art; selten ist eine Variet.

β. mit strahligen Köpfchen. Loesel pruss. ic. 10.

2. **B. CERNUA** (L.) Nickender Z. — Köpfchen scheibenblüthig und strahlig, nickend; die äussern Blättchen des HK. länger, als die Köpfchen; B. lanzettl., gesägt, an der Basis etwas zsgewachsen; *Achene verkehrteyf.-keilig*, am Rande rückwärts stachelig, ohngefähr so lang, als die innern Blättchen des HK. ☉. An sumpfigen O., Wassern. Aug.-Herbst. Schk. t. 285. Achenen schwarz-braun, mit bleichern Borsten. An torfhaltigen O. wachsen winzige, 1köpfige, 2-3 Zoll hohe Expl. haufenweise beisammen: B. minima L. Fl. dan. t. 312. Variet.:

β. Strahl ansehnlich, gelb: Coreopsis Bidens L. St. h. 1.

3. **B. BIPINNATA** (L.) Doppeltgefiederter Z. — Köpfchen etwas strahlig; die äussern Blättchen des HK. von der Länge der innern; B. *doppeltgefiedert*; Blättchen eingeschnitten; *Achenen lineal.*, nach der Spitze verschmälert, am Rande glatt, *noch einmal so lang, als der HK.* ☉. An Ackerrändern und auf den Feldern, seltener am Wasser, (im südl. Tyrol eine Landplage, geht bis Botzen, Facchini.) Jun.-Herbst.

24. **HELICANTHUS** (L.) Sonnenblume. — HK. dachig, Bth. des Randes zungenf., geschlechtslos; die des Mittelfeldes röhrig, zwittrig. Stbk. schweiflos. Achenen gleichf. Pappus aus 2 und mehr Blättchen, abfällig. Fruchtb. flach-konvex, spreuig. — Bth. gelb.

1. **H. ANNUUS** (L.) Jährige S. — B. sämmtl. herzf., 3nervig, gesägt; Bthstiele verdickt; Köpfchen nickend. ☉. Wird in wärmeren Gegenden des öltragenden S. wegen kultiv.; stammt aus Peru. Jul.-Herbst. Kultiv.

2. **H. TUBEROSUS** (L.) Knollige S. — B. 3fachnervig, gesägt, rauh, die untern herz-eyf., die obern länglich-eyf. oder lanzettl., zugespitzt, wechselst. 4. Wird kultiv.; die Wurzelknollen dienen z. ökonom. Gebrauch. Stammt aus Brasilien. Oct. Nov. Kultiv.

III. Untergruppe. **GNAPHALIEEN**. Stbk. mit Anhängseln versehen.

26. **CARPESIUM** (L.) Kragenblume. — HK. dachig. Bth. röhrig, 5zählig; die des Randes weiblich, mehrreihig, schmaler, die des Mittelfeldes zwittrig. Stbk. geschwänzt, Achene oberwärts in einen Schnabel gezogen, Pappus fehlend. Fruchth. nackt. Bth. gelb.

1. **C. CERNUUM** (L.) Ueberhängende K. — Köpfchen einzeln, endst. überhängend. ☉. An feuchten O. und in Waldungen, (in Krain und Oestr.; Steyerm., südl. Tyrol; südl. Schw.) Jul. Aug. J. a. t. 204. Schk. t. 244.

2. **C. ABROTANOIDES** (L.) Stabwurzartige K. — Köpfchen blattwinkelst., fast traubig, einerseitswendig. ☉. In Wäldern auf fettem Boden, (bisher blos um Aquileja und Monfalcone.) Jul. Aug. B. wie bei der vorhergehenden, aber die Köpfchen 4mal kleiner, einzeln oder gepaart in den Blattwinkeln, fast sitzend. „Expl. aus Nepal gleichen ganz den europäischen und sichern die Identität mit der Pflanze in China.“ DC. prodr. D.

26. **FILÁGO** (L. Fries) Fadenkraut. — HK. dachig, 5kantig. Bth. des Mittelfeldes zwittrig, röhrig, 4zählig, fruchtbar; die des Randes weiblich, fädlich, an der Spitze gezähnel, mehrreihig, die äusserste Reihe oder mehrere zw. die Blättchen des HK. oder zw. Spreublättchen gestellt. Achene schnabellos. Pappus haarfein, hinfällig, der der äussersten Reihe oder mehrerer fehlend. — Die unter dieser sehr natürlichen Gattung aufgefassen Arten sind die wahren, in der Flora suecica beschriebenen Filagoarten Linne's, obgleich er nach Loesling in den Gen. plant. (vgl. 5te Ausg. p. 379.) einen nicht dazu gehörigen Gattungscharakter aufgenommen hat. Die Bth. weisslich-gelblich.

1. **F. GERMANICA** (L.) Deutsches F. — Filzig-wollig; der St. gabelsp.; B. lanzettl.; Köpfchen geknäuel, Knäuelchen gabel- und endst.; *Blättchen des HK. haarspitzig*, Haarspitze kahl. ☉. Auf Aeckern, an Feldwegen. Jul. Aug. St. h. 12. Gnaphalium germanicum Huds. Impia german. Bl. und Fing. Gifola vulgaris Cass. Var. mit gelb-graulichem Blattfilz und oft röthlichen Haarspitzen des HK. und: x

β. *pyramidata*, mit weissem Blattfilz, oft nach der Spitze breiter, verkehrteyf.-lanzettl. B. und meist bleichgelben Haarspitzen des HK.: *Filago pyramidata* Gaud. und d. deutschen Autoren, nicht Linn., *Filago germanica* β. *pyramidata* DC. prodr. — Die *Filago pyramidata* Lin. spec., (nicht der Fl. suec., welche letztere einerlei ist mit *F. germanica*, die auch Linne in den Spec. plant. unter *F. germanica* mit der Nummer 779 der Flora suecica anführt,) finde ich ebenso wie Sprengel in derjenigen Pfl., welche in den bot. Gärten unter diesem Namen gewöhnlich vorkommt, in D. aber noch nicht gefunden wurde. Sie unterscheidet sich dch den niedrigeren Haupt-St., durch die langen und niedergestreckten wurzelst. Aeste, dch die stumpferen B., hauptsächlich aber dch die 3-4 innern Blättchen des HK., die an der Spitze nervenlos sind, dadurch, dass auf dem oberen Theile des Blättchens der Nerv verschwindet.

2. *F. ARVENSIS* (L.) Feld-F. — Dicht wollig; *der St. rispig; Aeste aufrecht, beinahe einfach, fast ährig*; Knäuelchen seiten- und endst.; *B. lanzettl.*; Blättchen des HK. stumpflich, wollig, an der Spitze zuletzt kahl. ☉. Auf Feldern, Haiden. Jul. Aug. *F. arvensis* DC. prodr. *Gnaphalium arvense* Lam. St. h. 38., aber die Aeste zu sehr absteheh. *Achariterium arvense* Bl. und Fing. *Oglifa arvensis* Cass. *Filago montana* Wahlb. *F. montana* L. in der fl. suec. und in dem Herbarium ist eine Abart von *F. arvensis* L.; desswegen habe ich den passenderen Namen vorangestellt. Sehr häufig auf den Aeckern und Feldern, auch der Ebenen in D. Vergl. über diese Art Fries nov. ed. 2. p. 267.

3. *F. MINIMA* (Fries.) Kleinstes F. — Filzig, etwas wollig; *der St. ästig; Aeste gabelsp.*; Knäuelchen gabel-seiten- und endst., länger, als die *B.*: *B. lineal.-lanzettl.*, aufrecht und angedrückt; *Blättchen des HK. ziemlich stumpf, an der Spitze kahl.* ☉. Auf Aeckern, Brachäckern, Sandfeldern. Jul. Aug. *F. arvensis* Wahlb. *F. montana* Gaud., DC. prodr. und vieler Autoren. St. h. 38. *Gnaphalium minimum* Smith. *Gn. montanum* Huds. Die *F. montana* Linne's gehört nach der Diagnose und den Synonymen zu *F. minima*, wächst aber nicht an den von ihm angegebenen O. und fehlt in seinem Herbarium. — Willd. stellt in seiner Ausgabe der sp. plant. 2 Formen dieser Pflanze als eigene Arten auf, unter dem *Gnaphalium montanum* nämlich eine mehr wollige Form, mit lauter mehrköpfigen Knäuelchen, und unter dem *G. minimum* eine mehr angedrückt-filzige Form, mit manchmal einzelnen Köpfchen; kaum aber lassen sich diese beiden Formen deutlich als Variet. trennen.

4. *F. GALLICA* (L.) Französisches F. — Filzig, fast seidenh.; *der St. ästig; Aeste gabelsp.*; Knäuelchen gabel-seiten- und endst.; *B. lineal.-pfriemlich*, länger, als die Knäuelchen; Blättchen des HK. stumpflich, an der Spitze kahl. ☉. Auf Aeckern selten und sehr zerstreut, (in der Schw. bei Basel, im Wallis, Elsass in Baden, der Rheinpfalz, Westphalen, bei Halle, in Böhm.) Jul. Aug. *Gnaphalium gallicum* Huds. St. h. 38.

27. *GNAPHALIUM* (L.) Ruhrkraut. — HK. trockenhäutig, dachig, halbkugelig oder stielrund. Bth. des Mittelfeldes zwittrig, röhrig, 5zählig, fruchtbar; die des Randes weiblich, fädlich, an der Spitze gezähnt, mehrreihig; oder die Köpfchen 2häusig, die zwittrigen nämlich wegen einer unvollkommenen N. anfruchtbar. Haare des Pappus fädlich, oder oberwärts nur wenig verdickt, oder an den Zwitterblüthen keulig. Der ganze Fruchtb. nackt, und keine Bth. zwischen den Blättchen des HK.

1 Rotte. *GNAPHALION*. Köpfchen verschiedenehlig, 1häusig. Bth. des Randes mehrreihig, weiblich, die des Mittelfeldes zwittrig. Pappus aller fädlich, oder an der Spitze nur wenig verdickt. Bth. aller gelblich weiss.

1. *G. SYLVATICUM* (L.) Wald-R. — *Der St. einfach*, ruthenf., ährig; *WB. lanzettl.*, *StB. allmählig kleiner*, die obern lineal., sämmtl. spitz, nach der Basis verschmälert, unterseits weiss-filzig,

oberseits zuletzt kahl werdend; die äussersten Blättchen des HK. 3mal kürzer, als das Köpfchen. 4. Auf Haiden, trocknen Triften, an waldigen O. Jul. Aug. Schk. t. 213. G. rectum Smith. G. sylvaticum a. Wahlb.

2. G. NORVEGICUM (Gunner) Norwegisches R. — Der St. einfach, ruthenf., ährig; die B. lanzettl., dreinervig, oberseits dünn-, unterseits dicht-filzig, in einen kurzen Bstiel allmählig verschmälert, die mittleren stengelst. zugespitzt-stachelspitzig, von der Länge der unteren oder länger; die äusseren Blättchen des HK. 3mal kürzer, als das Köpfchen. 4. In den VorA. und A., (von der Schw. bis Oestr., auf den Sudeten, den Mähr. Gebirgen und den Vogesen.) Jul. Aug. St. h. 38. G. sylvaticum Smith brit. G. sylvaticum β . fuscum Wahlenb. suec., DC. prodr. G. fuscum Pers. Synops. G. fuscum Lam. dict., Reichenb. fl. exc., nicht Scop.

3. G. HOPPEANUM (Koch.) Hoppe's R. — St. einfach, aufrecht, an der Spitze ährig; B. lanzettl., an der Basis undeutlich 3nervig, beiderseits dicht-filzig, die mittleren stengelst. spitz, in einen Bstiel fast von der Länge des B. verschmälert, so lang, als die unteren, oder länger; die äusseren Blättchen des HK. 3mal kürzer, als das Köpfchen. 4. Auf den A., VorA. und höheren Bergen, (Kärnth., Steyerm., Oestr., und höheren Mähr. Gebirgen, Erzgebirg, Sudeten.) Jul. Aug. G. supinum Hoppe bei St. h. 38. Andere Schriftsteller halten diese Art für Variet. von Gnaphalium norvegicum. St. 2-4 Zoll hoch.

4. G. SUPINUM (L.) Niedriges R. — Die St. einfach, fast fädlich; Stämmchen kriechend, dicht-rasig; B. sämmtl. schmal-lanzettl. und lineal., wollig-filzig; Köpfchen kurz-ährig, oder fast traubig oder einzeln an der Spitze des St.: die äussersten Blättchen des HK. länger, als die Hälfte des Köpfchens. 4. An felsigen, befeuchten O. der A. und Sudeten. Jul. Aug. G. pusillum Haenke. Schk. t. 267., Gaud. helv. Omalotheca supina Cassin. DC. prodr. Untersch. sich durch die dicht rasigen Stämmchen, schwachen St. und vorzüglich dch die fehlenden, kurzen Blättchen, welche bei den 2 vorhergehenden die Basis des HK. bekleiden. Var.:

a. Köpfchen an der Spitze des St. sitzend, in einer kurzen und dichten Aehre: G. supinum Willd. Pers. G. supinum a. Wahlenb.

β . Köpfchen gestielt, fast traubig: G. fuscum Scop. G. pusillum γ . fuscum Pers., β . fuscum Hartm. G. fuscum Willd.

γ . die St. 1blüthig: G. pusillum Willd. G. supinum β . pusillum Pers.

5. G. ULIGINOSUM (L.) Schlamm.R. — Der St. von der Basis an ästig, ausgebreitet; B. lanzettl.-lineal., nach der Basis verschmälert, graulich; Köpfchen knäuelig-gehäuft, beblättert. ☉. An überschwemmt gewesenen O., Sümpfen, Ufern. Jul.-Herbst. Fl. dan. 859. Die HK. braun. Blkr. gelblich-weiss. Var.:

β . pilulare, Achenen feinstachelig: G. pilulare Wahlb. fl. lapp. t. 13. Dieses bei Stettin von Rostkowitz gefunden.

γ. glabrum, ganz kahl mit glatten Achenen: *G. nudum* Hoffm. D. fl. *G. pilulare β. nudum* DC. prodr. Dieses im nördl. D. Vergl. Bückler in der Regensb. bot. Ztg. Die von mir bis jetzt untersuchten Expl. dieser Variet. hatten alle glatte Achenen.

6. *G. LUTEO-ALBUM* (L.) Gelblichweisses R. — Der St. einfach oder an der Spitze ästig - ebensträussig; *Köpfchen geknäuel*t, *blattlos*; B. lanzettl., beiderseits wollig-flaumig, halbstengelumfassend, die untern vorne breiter, stumpf, die obern nach der Spitze verschmälert. ☉. Auf unfrucht. Feldern, Haiden. Jul. Aug. St. h. 38. Köpfchen von strohgelber Farbe.

II. Rotte. *LEONTOPODIUM*. Köpfchen verschiedenehig, 1häusig. Bth. des Randes mehrtheilig, weiblich, mit fädlichem Pappus; die des Mittelfeldes zwittrig, mit an der Spitze verdicktem Pappus.

7. *G. LEONTOPODIUM* (Scop.) Gestrahltes R. — Der St. ganz einfach; Köpfchen endst., ebensträussig - gehäuft; *Ebenstrauss strahlig durch dicht-wollige B., welche länger, als das Köpfchen sind*. 4. Auf sonnigen Triften der A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. J. a. t. 86. St. h. 38. *Filago Leontopodium* L. *Leontopodium alpinum* Cass. dict. sc. nat., DC. prodr. Bth. grün-gelblich-weiss.

IV. Rotte. *ANTENNARIA* Gärtn. f. 2. p. 410. t. 167. Köpfchen gleichehig, 2häusig; die zwittrigen unfrucht., mit einem an der Spitze verdickten Pappus.

× 8. *G. DIOICUM* (L.) Frühlings-R. — *Ausläufer gestreckt, wurzelnd*; die St. ganz einfach; WB. verkehrteyl.-spatelig, oberseits kahl, unterseits schneeweiss-filzig; *die StB. sämmtl. fast gleich, lineal-lanzettl., an den St. angedrückt*; Ebenstrauss endst., gedrun-gen; Blättchen des weibl. HK. gefärbt, stumpf, die der innersten Reihe spitz. 4. Auf Haiden, sonnigen, unfrucht. Hügeln, an lichten O. in Wäldern. Mai. Jun. St. h. 38. *Antennaria dioica* Gärtn., DC. prodr. *HK. rosenroth oder schneeweiss*. Bth. weiss oder rosenfarb. — Das in D. und der Schw. noch nicht aufgefunden *G. alpinum* L. ist dem *G. dioicum* sehr ähnlich und hat eben solche *gestreckte Ausläufer*, spatelige WB. und fast gleichgrosse StB., *aber der HK. besteht aus oliven-braunen, zugespitzten, und deutlicher-kleingesägten Blättchen*; wodurch es sich leicht untersch.

9. *G. CARPATICUM* (Wahl.) Karpaten-R. — Ausläufer fehlend; W. mehrköpfig mit aufrechten *Köpfen*; *die St. ganz einfach; B. lanzettl., an der Basis verschmälert, beiderseits wollig, 3 nervig, spitz, die ersten wurzelst. stumpf, die stengelst. allmählig an Grösse abnehmend*; Ebenstrauss endst., gedrun-gen; Blättchen des HK. spatelig-trockenhäutig, die innern zugespitzt. 4. An feuchten, felsigen Abhängen der höchsten A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. *G. alpinum* St. h. 38. Gaud. und mehrerer deutsch. Autor. *Antennaria carpatica* Bl. und Fing., DC. prodr. *HK. oliven-braun*. Bth. weiss.

G. margaritaceum wächst nicht wild im Gebiete unserer Fl. und ist nirgends verwildert.

28. *HELICHRYSUM* (Gärtn.) Sonnengold. — Bth. des Randes weiblich, wenige und 1-reihig, die übrigen zwittrig; sonst Alles, wie bei *Gnaphalium*. Bth. gelb.

1. *H. ARENARIUM* (DC.) Sand-S. — *Krautig*; *B.* filzig, die wurzelst. *verkehrtzf.-lanzettl.*, die stengelst. *lineal.-lanzettl.*, die untern stumpf, die obern spitzlich; Ebenstrauß zsgesetzt. 2. Auf sandigen Haiden, trocknen Triften. Jul. Aug. *Gnaphalium arenarium* L. St. h. 38. HK. schön-citrongelb; varirt mit an den Spitzen rothen Blättchen des HK.: *G. arenarium* β . *aurantiacum* Pers., und selten auch mit blassgelben Köpfchen.

2. *H. ANGUSTIFOLIUM* (DC.) Schmalblättriges S. — *Halbstrauhig*; *B. lineal.*, grau; Ebenstrauß zsgesetzt; Köpfchen ey-kreiself.; Blättchen des HK. stumpf. $\frac{1}{2}$. Auf sonnigen Hügeln, (überall in Istrien an wärmeren Stellen, Tommas.; bei Fiume, bedeckt daselbst alle Anhöhen.) Jul. Aug. *Gnaphalium angustifolium* Lam. *G. italicum* Roth. catal. HK. bleich-gelb, wodurch es sich, so wie dch die kleinern, zahlreichern, ey-kreiself. (und nicht rundlichen und schön-citrongelben) Köpfchen von *H. Stoechas* untersch. J.

IV. Untergruppe. *ANTHEMIDEEN*. Stbk. ohne Anhängsel, gelb. Pappus fehlend oder kronenf.

29. *ARTEMISIA* (L.) Beyfuss. — HK. dachig, eyf. oder kugelig. Bth. des Mittelfeldes zwittrig, 5-zählig, die des Randes 1-reihig, fädlich, etwas gezähnelte; oder sämmtl. zwittrig. Blkr. stielrund. Achene verkehrtzf., flügellos, mit einer kleinen, oberweibigen Scheibe. Fruchtb. nackt oder zottig. — Bth. aller Arten gelb, oder an der Spitze roth gefärbt, und fast alle kommen vor mit grösseren und halb so grossen Köpfchen.

I. Rotte. *ABSINTHIUM* Tournef. Köpfchen verschiedenehig. Bth. des Randes weiblich. Fruchtb. zottig.

1. *A. ABSINTHIUM* (L.) Wermuth-B. — Die St. aufrecht, rispig; *B. grau*, die wurzelst. *3fach-*, die stengelst. *doppeltfiedersp. und einfachfiedersp.*, Zpsfchen *lanzettl.*, stumpf, die blühenst. *B. ungeth*; *Bstiele öhrchenlos*; Köpfchen fast kugelig, nickend; Blättchen des HK. grau, die innern ganz stumpf, am Rande trockenhäutig, die äussern lineal., nur an der Spitze trockenhäutig, so lang, als die innern; *Fruchtb. rauhh.* 2. An unkultiv., gebirgigen, felsigen O., unter Gesträuch, (Anhöhe der Weinberge bei Tegernheim unweit Regensb., Felsen der Gebirge des Moselthales; im südl. Tyrol zwar zerstreut, aber an den Stand O. in grosser Menge; im Wallis und Graubünden, übrigens hin und wieder verwildert.) Jul. Aug. *Absinthium vulgare* Gärtn. fruct.

2. *A. CAMPHORATA* (Vill.) Kampfer-B. — Die unfruchtb. St. liegend, die blühentrag. aufstrebend, oberwärts traubig-rispig; R. schmal, rutenf.; *B. filzig-grau*, od. etwas grau od. kahl, *im Umriss rundlich-eyf.*, *doppeltgefiedert*, mit schmal-lineal. Zpsfn,

sämmtl. gestielt, an der Basis des Bstieles geöhreht, die obern einfach-gefiedert, die blüthenst. ganz; *Köpfchen fast kugelig*, nickend; *Blättchen des HK. grau*, die innern ganz stumpf, am Rande trockenhäutig, die äussern lineal., krautig; *Fruchtb. v. gekrünselten Haaren etwas zottig*. 4. An felsigen, unkultiv. O., auf Kalkboden bis in die A. hinauf. (im Elsass bei Colmar, Westhalten und Gebweiler; im südl. Tyrol bei Botzen, und südlicher in grösserer Menge: Görz und südl. Krain, bei Fiume.) Sept. Octb. A. Lobelii All. A. corymbosa Lam.; ein ganz unpassender Name. A. subcanescens Willd. en. A. rupestris Scop. nach Expl., die an dem von Scop. angeführten O., nämlich auf Felsen von Lison, gesammelt wurden. Var., wie die meisten, mit um die Hälfte kleinern Köpfchen und

a. saxatilis mit grauen B. und weiss-filzigen Köpfchen; A. saxatilis Willd. (in W. und Kit. Werk finde ich die Pfl. nicht.) A. campestris Scop., nicht L. A. humilis Wulf. in J. collect. 4. 295.

β. Biasoletiana mit v. weissem Filze dichtbedeckten B. und Köpfchen: A. Biasoletiana Visian. — A. intermedia Host.? D.

3. A. RUPESTRIS (L.) Felsen-B. — Die unfruchtb. St. liegend, die blühetrag. aufstrebend, einfach-traubig oder oberwärt ästigrispig; R. schmal, ruthenf.; B. kahl, doppeltgefiedert, mit lineal-lanzettl. Zpfchen, die untern gestielt, mit fiedersp.-gezähntem Bstiele, die stengelst. sitzend, *die obern und blüthenst. sämmtl. einfach, kammf.-fiedersp.*; Köpfchen fast kugelig, nickend; die *innern Blättchen des HK. eyf.*, am Rande häutig, angedrückt, die äussern *abstehend*, lineal., ganz oder eingeschnitten und krautig; *Fruchtb. zottig*. 4. Auf unfruchtb. Triften, auf Kalk- und Salzboden, (bis jetzt blos in Thüringen, bei Stassfurth, Bernbg und Borksleben.) Sept. Wallr. sched. t. 5. A. grandiflora Hoffm. A. viridifolia Led. Rb. ic. 4. f. 573. D.

4. A. LANATA (Willd. spec. 3. p. 1823. 1810.) Wolliger B. — Die unfruchtb. St. rasig, die *blühetrag. aufstrebend, ganz einfach*; B. *grau-seidenh.*, die untern gestielt, 3th.-vielsp., mit lineal-lanzettl. Zpfchen, *die obern und blüthenst. sitzend, fiedersp.*; *Köpfchen fast kugelig, traubig, sämmtl. gestielt und nickend, meist 24blüthig*; Blättchen des HK. filzig, am Rande trockenhäutig, eyf. 4. Auf den höchsten A. des südl. Tyrols, (Schlehorngebirge, Elsmann. und an vielen O. der Alpen in Fassa, ungefähr an der obersten Baumgrenze, aber auch viel niedriger, Facchini.) Jul. Aug. A. pedemontana Balb. in Lois. not., Koch Synops. ed. I. D.

5. A. GLACIALIS (L.) Gletscher-B. — Die unfruchtb. St. rasig, die *blühetrag. aufstrebend, ganz einfach*; B. *grau-seidenh.*, gestielt, die untern 3th.-vielsp., mit lineal.-lanzettl. Zpfchen, *die obern und blüthenst. fast fingerig-fiedersp.*, an der Basis des Bstieles oft geöhreht; *Köpfchen rundlich, aufrecht, etwas geknäuelährig, 30-40blüthig*; Blättchen des HK. filzig, am Rande trocken-häutig, die äussern eyf.; *Fruchtb. rauhh.* 4. Auf den

höchsten A. in der Nähe der Gletscher, (A. des Wallis und des Innthales innerhalb der Schw.) Jul. Aug. S.

6. A. MUTELLINA (Vill.) Mutellin-B. — Die unfrucht. St. rasig, die blüthentrag. aufstrebend, ganz einfach; B. grau-seidenh., gestielt, die untern 3 th.-vielsp., mit lineal.-lanzettl. Zpflchen, die obern und blüthenst. fast fingerig-fiedersp., an der Basis des Bstiels oft geöhret: Köpfchen rundlich-kreiself., aufrecht, traubig-ählig, meist 15 blüthig; Blättchen des HK. filzig, länglich, am Rande trockenhäutig; Fruchtb. zottig. 4. An sonnigen Felsen der höhern A., (südl. Schw., Tyrol, Salzbg, Kärnth. u. Steyerm.) Jul. Aug. A. rupestris All. DC. A. rupestris β. L. A. umbelliformis Lam. A. glacialis Wulf. bei J. a. app. t. 35. Var.:

β. Fruchtkn. und Blkr. zottig und Fruchtb. fast kahl; A. Baumgarteni Bess. A. spicata Roch.

II. ROTTE. ABROTANUM Tournef. Bess. Artemisia Cass. Köpfchen verschiedenehig. Bth. des Randes weibl. Fruchtb. nackt. Die Fruchtkn. auf dem Mittelfelde kommen bei einigen Arten nicht zur Reife; diese begreift Cassini unter der Gattung Oligosporus.

* B. vielsp., an der Basis des Bstieles nicht geöhret.

7. A. SPICATA (Wulf. bei J. a. t. 34.) Aehriger B. — Die unfrucht. St. rasig, die blüthentrag. aufstrebend, ganz einfach; B. grau-seidenh., gestielt, die untern fingerig-vielsp., mit lineal.-lanzettl. Zpflchen, die stengelst. im Umrisse länglich, fiedersp., an der Basis öhrchenlos, die obersten und blüthenst. ganz oder an der Spitze 3 zählig; Köpfchen fast kugelig, aufrecht, traubig-ählig; Blättchen des HK. filzig, am Rande trockenhäutig; Fruchtb. kahl. 4. Auf Felsen der höhern A., (südl. Schw., Tyrol, Salzbg, Kärnthen, Steyerm.) Jul. Aug. A. Boccone All. A. Genipi Stechm. A. rupestris Vill., nicht L.

8. A. LACINIATA (Willd.) Geschlitzter B. — Die unfrucht. St. rasig, die blüthentrag. aufstrebend, ganz einfach, mit einer einfachen Tr. endigend, oder ästig, die Aeste traubig, aufrecht; B. zuletzt kahl, doppeltfiedersp., Fiederchen gezähnt, Zähne und Zpflchen lanzettl., in eine kurze Stachelspitze zugespitzt; alle B. gestielt; Bstiel an der Basis öhrchenlos, die blüthenst. obern B. ganz; Köpfchen fast kugelig, nickend, fast 20 blüthig; Blättchen des HK. sämmtl. eyf., stumpf, am Rande trockenhäutig, die äussern kürzer; Fruchtb. nackt. 4. Auf Triften und trocknern Wiesen, auf Kalk- und Salzboden, (bisher blos im Mansfeldischen bei Borsleben, Bernburg und Stassfurth.) Jul. Aug. A. Mertensiana Wallr. sched. p. 466. t. 4. Die Oeländische Pfl. im Normalherbarium von Fries stimmt mit der Thüringischen, welche an den bezeichneten Orten eben so mit rispigen Köpfchen vorkommt, genau überein; auch an jener sind die Köpfchen nicht grösser. Besser verbindet in seiner Abhandl. über Abrotanum die Oeländische Pfl., welche ganz mit der unsrigen übereinkommt, mit seiner Artemisia punctata, die mir nicht hinlänglich bekannt ist. D.

9. A. TANACETIFOLIA (Allion. fl. pedem. I. 166.) Rainfarrenblättriger B. — Die nicht blühenden St. rasig; die blüthentrag.

nufstrebend, ganz einfach, mit einer einfachen, oder an der Basis zsgesetzten Tr. endigend: *B.* kahl oder behaart, *doppelt fiedersp., die Fiederchen gezähnt, die Zähne und Zpfchen lanzettl., in eine kurze Stachelspitze zugespitzt, sämmtl. B. gestielt, mit an der Basis öhrchenlosem Bstiel*, die blüthenst. oberen *B.* ganzrandig; Köpfchen kugelig, nickend, fast 40blüthig; sämmtl. Blättchen des HK. eyf., stumpf, am Rande brandig-trockenhäutig, die äussern kürzer; Fruchtb. nackt. 4. Auf den höchsten ARücken, (Spitze des Berges Morosch bei Flitsch in Krain.) Jul. Aug. *A. tanacetifolia* und *A. atrata* Lam. dict. *A. atrata* Besser. - - Dch die niedrigen St. und doppelt grössern Köpfchen ist sie von *A. laciniata* sogleich zu unterscheiden.

9. *A. ABROTANUM* (L.) Stabwurz - *B.* — Der St. strauchig, aufrecht, rispig; *B.* unterseits flaumig, sämmtl. gestielt, *an der Basis des Bstiels öhrchenlos, die untern doppelt-gefiedert, mit sehr schmal-lineal. Zpsfn*, die obern und blüthenst. 3sp. oder ganz, verlängert lineal.: *Köpfchen graulich, fast kugelig, nickend*; die innern Blättchen des HK. verkehrt-eyf., am Rande trockenhäutig, die äussern lanzettl., spitz, fast krautig. 4. Wird häufig in Gärten kultiv., (soll auch bei Sitten im Wallis und nach Scop. bei Triest wild vorkommen, hat sich aber in neuerer Zeit nicht wiedergefunden.) Sept. Hayn. arznz. 11. t. 22.

** *B.* vielsp., an der Basis des Bstiels geöhrelt. Köpfchen fast kugelig, oder rundlich-eyf., graulich.

10. *A. PONTICA* (L.) Römischer *B.* — *W.* kriechend; die St. aufrecht, oberwärts rispig, fast ruthenf.; *B.* unterseits filzig, oberseits kahl oder grau, doppelt-gefiedert, mit lineal., genäherten, ganzen oder etwas gezähnten Zpfchen, *die untern stengelst. am Bstiele geöhrelt*, die obern sitzend, die blüthenst. ganz; *Köpfchen grau, etwas kugelig, nickend*; Blättchen des HK. verkehrt-eyf., ganz stumpf, am Rande trockenhäutig, die äussern krautig, kürzer, lanzettl.; *Fruchtb. kahl*. 4. Auf sonnigen, unkultiv. Hügeln, (Steyerm., Unteröstr. und von da dch Mähr. und Böhm., Schlesien nach Sachsen und Thüringen; Rheinpfalz zw. Alzei und Mainz, bei Neuwied; in Würtemb. um Stuttgart, Tübing.; bei Werthheim; bei Dülmen in Westph.; Schw. selten.) Jul. Aug. J. a. t. 99. *A. balsamita* Willd. ist dieselbe Pfl.

11. *A. AUSTRIACA* (J. a. t. 100.) Oestreicher *B.* — *W.* kriechend, die St. aufrecht, oberwärts rispig; *B. grau-filzig*, im Umriss rundlich, doppelt-gefiedert - vielsp., mit lineal. Zpfchen, *die stengelst. fast gefingert-th., am Bstiel geöhrelt*, die obern sitzend, die obersten blüthenst. ganz; *Köpfchen rauhh.-filzig, rundlich-eyf.*; Blättchen des HK. länglich, stumpf, am Rande trockenhäutig, die äussern kürzer, die äussersten lineal., krautig. 4. Auf sonnigen Hügeln, (bisher blos in Unteröstr.) Jul. Sept. *A. repens* Pall. bei Willd. *A. orientalis* Willd. *A. nivea* Redowsk. bei Willd. D.

** *B.* vielsp., an der Basis des Bstieles geöhrelt. Köpfchen fast kugelig, oder rundlich-eyf., kahl.

12. *A. CAMPESTRIS* (L.) Feld-B. — *Die unfruchtb. St. rasig*, die blüthentrag. aufstrebend, rispig; *B. seidenh.-grau* oder kahl, im Umriss rundlich-eyf., doppelt-3fachgefiedert, mit lineal., stachelspitzigen Zpfchen, *die untern stengelst. am Bstiel geöhrelt oder fiedersp.-gezähnt*, die obern sitzend, einfach-fiedersp., die obern blüthenst. ungeth.; *Köpfchen eyf., kahl*, aufrecht oder nickend; Blättchen des HK. eyf., am Rande trockenhäutig, die äussern kürzer, die innersten eyf.-längl. 4. Auf Feldern, unfruchtb. Hügeln. Jul. Aug. Schk. t. 240. — Var. mit kleinen und 2- oder 3mal grössern, eyf. und mehr abgerundeten, auseinander- und in dichtgedrängte Träubchen zgestellten Köpfchen, kahlen und seidenh. B., an welchen zuletzt der Flaum schwindet, und

β. *sericea*, an welchen der Flaum bleibend ist: *A. campestris* β. *sericea* Fries. Var. ferner

γ. *robustior*, an allen Theilen grösser; B. im Umriss oft 3mal so gross; Köpfchen grösser, als bei der gewöhnlichen grossblüthigen Form, dabei die Pflanze ganz kahl; diese in den VorA. wachsende geht in den Alpen in die folgende über.

δ. *alpina*, niedrig, 3-6 Zoll hoch, die St. einfach oder kaum rispig; diese auf den höheren A.

14. *A. NANA* (Gaud. fl. helv. 5. p. 231.) Zwerg-B. — *Die nicht blühenden St. rasig*, die blüthentrag. aufstrebend, rispig-traubig; *B. seidig-grau*, im Umriss rundl.-eyf., doppeltfiedersp. mit lineal.-stachelspitzigen Zpfn, *die untern stengelst. am Bstiele geöhrelt oder fiedersp.-gezähnt*, die obern sitzend, einfach-fiedersp., die obern blüthenst. ungetheilt; *die Köpfchen kugelig, kahl*, aufrecht oder geneigt; die Blättchen des HK. eyf., am Rande trockenhäutig, die äussern kürzer. 4. An kiesigen Stellen der Alpenbäche, (am obersten Ende des Saasthales am See Mont-Mar im Wallis.) Jul. Aug. *A. helvetica* Schleich. Var. mit halb so grossen Köpfchen.

15. *A. SCOPARIA* (W. und Kit.) Besen-B. — *Der St. einzeln, aufrecht, nebst den B. v. etwas abstehenden Haaren rauhh.* oder kahl, rispig; R. sehr ästig, abstehend; B. im Umriss eyf., doppelt- u. 3fachfiedersp., Zpfchen der untersten lineal.-lanzettl., der übrigen sehr schmal-lineal., *die untern stengelst. B. am Bstiel geöhrelt oder fiedersp.-gezähnt*, die obern sitzend, einfach-fiedersp., die obern blüthenst. ungeth.; *Köpfchen rundlich-eyf., kahl*, nickend; Blättchen des HK. eyf., am Rande trockenhäutig, die äussern kürzer. ☉. An sandigen O., auf Hügeln, (Steyerm., Unteröstr., Mähr. und Böhm.) Aug. Sept.

**** B. ungeth.; Köpfchen kugelig oder rundlich-eyf.

16. *A. DRACUNCULUS* (L.) Dragen-B. — *Der St. krautig, aufrecht; B. grün, kahl, lanzettl.-lineal., ungeth.*, die wurzelst. an der Spitze 3 sp.; *Köpfchen rispig, fast kugelig*, nickend; Blättchen des HK. breit-elliptisch, die innern am Rande trockenhäutig. 4. Wird zum Küchengebrauche in den Gärten kultivirt. Aug. Sept. *Oligosporus condimentarius* Cassin. Kultiv.

**** B. vielsp., Köpfchen länglich.

17. *A. VULGARIS* (L.) Gemeiner B. — Die St. aufrecht, rispig; *B.* unterseits weiss-filzig, *fiedersp.*, *Fieder lanzettl.*, *zugespitzt*, *eingeschnitten*, *gesägt* und ganz, die stengelst. *B.* an der Basis geöhrelt, die obersten lineal.-lanzettl., zugespitzt; Köpfchen eyf. oder länglich, nickend und aufrecht, fast sitzend, filzig. 4. Auf unkultiv. Hügeln, an Wegen, Ufern. Aug. Sept. Tabern. krb. p. 27. f. 1 und 2.

III. Rotte. *SERIPHIDA* Bess in bull. mosc. Köpfchen gleichbig; Bth. sämmtl. zwittrig.

18. *A. MARITIMA* (L.) Meerstrands-B. — Die unfruchtbaren St. rasig, die blüthentrag. aufstrebend oder aufrecht; *B.* schneeweiss-filzig, oder dch den sich verlierenden Filz fast kahl, im Umrisse eyf., 2-3fach gefiedert, mit lineal., stumpfen Zipfelchen, die untern stengelst. *B.* am Bstiel geöhrelt, die obern sitzend, die obersten blüthenst. ungeth.; Köpfchen länglich, filzig; Blättchen des HK. länglich-lineal., die innern trockenhäutig, die äussern kürzer, krautig; Bth. sämmtlich zwittrig. 4. Auf Wiesen und Sandplätzen am Meere und an Salinen, (von Mecklenbg dch Pommern nach Preussen; an den Salinen in Thüringen, bes. an denen v. Artern.) Sept. Oct. *A. Seriphium* Wallr. Var.:

α. *maritima* Willd.: Köpfchen aufrecht, aber die Aeste und Aestchen an der Spitze nickend. Fl. dan. t. 1635.

β. *gallica* Willd.: Köpfchen aufrecht, Aeste steif, nicht nickend.

γ. *salina* Willd.: Köpfchen hängend. Spreng. hal. t. 12.

δ. *valesiaca*, ganz mit schneeweissem Filz bedeckt, Köpfchen und Aestchen aufrecht; *Artemisia valesiaca* All. ped., DC. prodr. Ausser dem Ueherzug der *B.* konnte ich zw. *A. valesiaca* und *A. gallica* keinen Unterschied auffinden. DC. beschreibt zwar die *A. gallica* mit 3blüthigen Köpfchen, aber auch *A. maritima* und *A. salina* kommen mit Köpfchen vor, welche nur 3 Bthen enthalten.

19. *A. CAERULESCENS* (L.) Bläulicher B. — Die St. strauchig; *B.* grau, lanzettl., ungeth., die der unfrucht. St. eingeschnitten und fiedersp.; Köpfchen länglich; Bth. sämmt. zwittrig. 4. An sumpfigen O. am adriat. Meer, (bei Triest. Monfalcone.) Aug. Sept. *Absinthium angustifolium* Dod. pempt. 26. f. 2. 3. D.

30. *TANACETUM* (L.) Rheinfarn. — HK. dachig, halbkugelig. Bth des Mittelfeldes zwittrig. röhrig, 5zählig, stielrand, die des Randes fädlich, 3zählig oder sämmtl. zwittrig. Achene kantig-gestreift; die oberweibige Scheibe v. der Breite der Achene. Pappus meist fehlend, oder klein und kronenf. Fruchtb. nackt. Bth. gelb.

1. *T. VULGARE* (L.) Gemeiner R. — *B.* doppeltfiedersp.; Zpfl gesägt. 4. Auf unkultiv. Hügeln, an Wegen, Ufern. Jul. Aug. St. h. 20.

2. *T. BALSAMITA* (L.) Ebenstränssiger R. — *B.* eyf., ungeth., gesägt, die untern gestielt, die obern sitzend, an der Basis geöh-

reht; Köpfehen ebensträussig. 4. An Wegen in der südl. Schw., (im C. Tessin bei Lugano nach Haller; in Gärten häufig kultiv.) Aug. Septbr. Schk. t. 240. Balsamita maior Desf. Bth. sämmtl. zwittrig. Unsere Pfl. untersch. sich v. d. Gattung Balsamita Desf. doch die gleiche und nicht geöhrelte Krone des Pappus. Kultiv.

31. CÔTULA (L.) Laugenblume. — HK. dachig, halbkugelig. Bth. des Mittelfeldes zwittrig, mit einer flach-zsgedrückten, 2flügeligen, an der Basis stumpf-2spornigen Blkr. und 4zähmigem Saume; die randst. weiblich, 1reihig, oft unfruchtbar, Blkr. fehlend. Achene der weibl. Bth. blattartig-flach, gestielt; der zwittrigen sitzend, zsgedückt. Pappus fehlend. Fruchtb. nackt.

1. C. CORONOPOLIA (L.) Krähenfussblättr. L. — B. lanzettl.-lineal., stengelumfassend, fiedersp.-gezähnt; der St. liegend; Aeste 1köpfig. ☉. An Gräben und Wegen, (längs der Seeküste von Emden in Ostfriesland bis Holstein, häufig bei Gestendorf im Bremerischen, bei Emden u. Jever.) Jul. Aug. St. h. 7. Bth. gelb. D.

32. SANTOLINA (L.) Heiligenpflanze. — HK. dachig, halbkugelig. Bth. sämmtl. röhrig. Röhre der Blkr. zsgedückt, 2flügelig, an der Basis beiderseits ein Anhängsel von einem halbirtten Häutchen. Pappus fehlend. Fruchtb. spreuig.

1. S. CHAMAE-CYPARISSUS (L.) Cypressenartige H. — Bthstiele 1blüthig; B. grau, 4reihig-gezähnt, Zähne stumpf; Aeste filzig; HK. flaumig. ☼. An sonnig. O. der wärmeren Gegenden, (in der Koschnitz und bei Breschia in den Weinbergen in Untersteyern., auch im Wallis bei Foully nach Haller und Murith.) Jul. Aug. Lam. illustr. t. 671. f. 3. Bth. gelb.

33. ACHILLÉA (L.) Schaafgarbe. — HK. eyf., oder länglich, dachig. Bth. des Mittelfeldes zwittrig, röhrig; Blkr. 5zähmig; Röhre flachzsgedückt, 2flügelig; die randst. Bth. weiblich, zungenf., kurz, ründlich. Achene zsgedückt, an der Spitze nackt oder mit einem hervorspring. Rande endigend. Fruchtb. spreuig.

1. Rotte. PTARMICA Tournef. Strahl meist 10blüthig, Zungenbth. von der Länge des HK. Bth. weiss, (an den einheimischen.)

1. A. PTARMICA (L.) Bertram-S. — B. kahl, lanzettl.-lineal., verschmälert-spitz, aus beiderseits eingeschnitten-gezählter Basis bis zur Mitte klein und dicht über der Mitte tiefer und entfernter-gesägt, Sägezähne stachelspitzig, klein-gesägt, ziemlich angedrückt; Ebenstrauss zsgesetzt; Zungenbth. von der Länge des HK. 4. An Gräben, Ufern und an Gebüsch feuchter O. Jul. Aug. St. h. 10. Ptarmica vulgaris DC. prodr.

2. A. ALPINA (L.) Alpen-S. — B. kahl oder spärlich-behaart, lanzettl.-lineal., verschmälert-spitz, fiedersp.-gesägt, Sägezähne lanzettl., stachelspitzig, etwas abstehend, so lang, als der Querdmesser der Bfläche; Ebenstrauss zsgesetzt; Zungenbth. von der Länge des HK. 4. Auf den Schw. A. sehr selten, (blos auf dem Gothard gegen Airolo zu.) Jul. Aug. A. alpina Ledeb. fl.

altaic. 4. 123. Köpfchen weiss, von der Grösse derer der A. Ptarmica. Ptarmica alpina DC. prodr. — Die Abbildung Boccone's, die Gmelin in der fl. sibir. bei Achillea n. 161., deren Bth. „von der Bth. der gemeinen Ptarmica in nichts abweichen“ und Willdenow, (aber nicht Linn.) in der spec. plant. bei A. alpina citiren, gehört zu einer andern Art, die ich in dem Samenregister des Erlanger Gartens vom J. 1834 unter dem Namen A. Bocconii aufstellte; diese untersch. sich leicht dch Köpfchen von der Grösse derer der A. Millefolium, welche nur 3-6 Zungenbth. haben, die halb so lang, als der HK. sind, und nicht deren 10-12. S.

3. A. CLAVENAE (L.) Bittere S. — Die W.- und die untern StB. im Umriss *länglich-keilig*, in den Bstiel verschmälert, *einfach-fiedersp.*, mit *länglichen*, *stumpfen ganzrandigen*, oder *2-3 zähligen Läppchen*, die obern stengelst. B. sitzend; der St. ganz einfach, *oberwärts nackt*; Ebenstrauß zsgesetzt oder einfach. 4. Auf den höchsten Felsenkämmen der A. (auf dem Monte Generoso im C. Tessin, sodann auf den A. von Tyrol und dch d. g. AK.) Jul. Aug. J. a. t. 76. St. h. 1. Ptarmica Clavenae DC. prodr. *Ueberall seidenh.-grau*; var. aber

β *glabrata*, B. und die Pflanze überhaupt ganz kahl. Auf den höchsten Kärthner A., Hoppe.

4. A. VALESIIACA (Sut.) Walliser S. — B. kahl oder etwas haarig, im Umriss elliptisch, *einfach-fiedersp.*; *Fieder länglich-lanzettl., spitz*, auf der vordern Seite *1-3* auf der hintern *3-6 zähl.*, Zähne lanzettl., in ein Stachelspitzchen zugespitzt; Ebenstrauß zsgesetzt; Zungenbth. von der Länge des HK. 4. Auf den Schweiz. A. selten, (bisher blos im Oberwallis bei der Quelle der Rhone.) Jul. Aug. A. helvetica Schleich. A. incisa Clairv. A. valesiaca Rb. ic. 3. f. 437. Ptarmica valesiaca DC. prodr. S.

5. A. THOMASIANA (Hall. fil.; Murith.) Thomasische S. — B. ziemlich haarig, im Umriss elliptisch, *einfach-fiedersp.*, *Fieder fast keilf., an der Spitze eingeschnitten-3-4 fahgezähnt*, Zähne lanzettl., in ein Stachelspitzchen verschmälert; die WB. *doppelt-fiedersp.*, Fieder 3-vielsp.; Ebenstrauß zsgesetzt; Zungenbth. v. der Länge des HK. 4. Auf den Schweiz. A., (bisher blos auf dem Bayonaz im obern Rhonethal.) Jul. Aug. A. montana Schleich. von Schleicher selbst. Ptarmica Thomasiana DC. prodr. Die Pflanze besitze ich von Thomas selbst als A. Thomasiana Hall. fil. S.

6. A. MACROPHYLLA (L.) Grossblättr. S. — B. ziemlich kahl, die stengelst. im Umriss breit-eyf., *einfach-gefiedert*; *Fieder* ziemlich breit-lanzettl., zugespitzt, *eingeschnitten-doppelt-gezägt*, *Sägezähne zahlreich*; die obern Fieder an der Basis zsfliessend, herablaufend; Ebenstrauß zsgesetzt; Zungenbth. von der Länge des HK. 4. In den Wäldern der VorA. und A., (in der Schw. nicht selten; in Tyrol; in Fassa und Finne, Facchini; auf der MödlesA. im Algau.) Jul. Aug. Barrel. 991. A. macrophylla Rb.

ic. 4. f. 484., ein Expl. mit gleich- und entfernt-gesägten. B.: *Ptarmica macrophylla* DC. prodr.

7. *A. MOSCHATA* (Wulfen bei J.) Bisam-S. — *B. kahl* oder etwas haarig, im Umriss länglich, *kammf.-fiedersp.*; *Fieder* lanzettl.-lineal., kurz-stachelspitzig, *ungeth. oder 1zählig*; Ebenstrauss einfach; Zungenbth. von der Länge des HK. 4. An nassen O. der höchsten GranitA., (Schw. und Tyrol, Steyerm., Oberkärnth.) Jul. Aug. J. a. t. 33. St. h. 69. *A. livia* Scop. t. 3. *Ptarmica moschata* DC. prodr. — Die *Achillea impunctata* Vest. scheint wegen der „länglichen, nicht aber breiten Strahlen“ eher zu der Variet. der *Anthemis alpina* mit mehrköpfigem St. zu gehören.

8. *A. HYBRIDA* (Gaudin.) Bastard-S. — *B. zottig-wollig*, im Umriss längl., *kämmig-gefiedert*, die *Fieder* lanzettl.-lineal., kurz-stachelspitzig, *ungeth. oder 1zählig*, oder die der untern B. fiedersp. - 3-5zählig; Ebenstrauss einfach; die Zungenbth. so lang, als der HK. 4. Auf den höchsten A. im Wallis. Jul. Aug. *A. moschata* β. *hybrida* Gaud. fl. helv. *Ptarmica moschata* β. *hybrida* DC. prodr. — *Achillea intermedia* Schleich., welche ich von Thomas erhalten, ist nicht verschieden von *A. hybrida*.

9. *A. NANA* (L.) Zwerg-S. — *B. sehr wollig-zottig*, im Umriss schmal-lanzettl., *gefiedert*; *Fieder* der StB. an der Basis *och ein Läppchen vergrößert*, 2 sp., Zpfl lineal.-lanzettl., spitz, der zweite kleiner, die der WB. 2 th., der vordere Zpfl 3 sp., der hintere 2 sp.; Ebenstrauss einfach, fast kugelig; Zungenbth. von der Länge des HK. 4. An kies. und felsig. O. der höchst. GranitA. bis zum ewigen Schnee, (auf der hohen Kette der Schw., dem Furca, Rossbodenstock u. a.; in Tyrol am Salennferner und auf dem Madritschferner über dem Suldenthale gegen den Ortles zu.) Jul. Aug. St. h. 59. — *Ptarmica nana* DC. prodr.

10. *A. ATRATA* (L.) Schwarzkelchige S. — *B. etwas haarig*, im Umriss länglich, *gefiedert*; *Fieder* 2-3sp. oder *gefiedert-5sp.*, Läppchen lineal., spitz, stachelspitzig; Ebenstrauss einfach; Zungenbth. von der Länge des HK. 4. Auf nassen Felsen und an den Seiten der Bäche in den Kalk- und GranitA., (och die g. AK.) Jul. Aug. St. h. 19. *Anthemis corymbosa* Haenke bei Jacq. *Ptarmica atrata* α. und β. DC. prodr.

11. *A. CLUSIANA* (Tausch.) Clusius S. — *B. etwas haarig*, im Umriss länglich, *doppelt-gefiedert*; *Fiederchen* 2-3 sp. oder *gefiedert-5-6sp.*, Läppchen schmal-lineal., spitz; Ebenstrauss einfach; Zungenbth. von der Länge des HK. 4. An feuchten O. der A., (Oestr., Steyerm. u. Krain.) Jul. Aug. *A. atrata* J. a. t. 77. Die Variet. der *A. atrata* mit doppelt-gefiederten B. bei L. in d. sp. pl. *Ptarmica atrata* γ. DC. prodr. Der vorhergehenden sehr ähnlich, unterscheidet sich dch die schmäleren und häufigeren Blattzpfl., an den grössern Fiedern finden sich 12-15 Läppchen; an den Fiedern der *A. atrata* nur 3-5; ist aber vielleicht doch nur Variet. D.

II. Rotte. MILLEFOLIUM Tournef. Strahl 5blüthig; Zungenbth. halb so lang, als der HK.

* Bth. gelb.

12. A. TOMENTOSA (L.) Filzige S. — B. sehr zottig, im Umrisse lanzettl.-lineal, gefiedert; Fieder der W.- und untern StB. fingerig-3th., Zpfl. lineal., stachelspitzig, der mittlere 3sp., die seitenst. 2sp. oder auch 3sp.; Fieder der obern B. 2- und 3sp., die der obersten ungeth., dicht-kammf.-genähert; Ebenstrauss doppeltzsgesetzt, Zungenbth. halb so lang, als der HK. 4. Auf rauhen Hügeln, im Flusskiese, an sandigen O, (im unt. Wallis u. im südl. Tyrol.) Mai. Jun. St. h. 59.

** Strahl weiss, purpurn oder schmutzig- und hell-gelblichweiss.
Mittelfeld weiss.

13. A. MILLEFOLIUM (L.) Gemeine S. — B. wollig-zottig oder fast kahl, die Stengelst. im Umrisse lanzettl. oder fast lineal., doppelt-fiedersp.; Fiederchen 2-3sp. oder gefiedert-5sp., Läppchen lineal. u. eyf., zugespitzt, stachelspitzig; Spindel ungezähnt oder an der Spitze des B. etwas gezähnt, Zähne ganz; Ebenstrauss doppelt zsgesetzt; Zungenbth. halb so lang, als der HK. 4. An unkultiv. O., Waldrändern, Wegen, Rainen. Jun.-Herbst. St. h. 10. Auf fettem Boden grösser mit breiteren B. und entfernteren Fiederchen und Läppchen: A. sylvatica Becker; auf sonnigem, felsigem, magerem Boden kleiner mit schmälern B. und dicht-gehäuftes Zpfln: A. collina Becker. Var. ferner mit weissem, purpurnem und schmutzig-weissem oder hellgelbem Strahl, mit stärkerer oder schwächerer Behaarung und

β. crustata, B. schmal, Läppchen kurz, an der Spitze verdickt und knorpelig: A. Millefolium β. crustata Roch. A. scabra Host.

γ. lanata, der St. der B. und der Ebenstrauss wollig-zottig, übrigens wie die gewöhnliche Form. — Die A. lanata Spr. (A. magna Willd.) unterscheidet sich von dieser durch den breiteren Umriss der B.

δ. sordida, eben so, doch weniger wollig; Zungenbth. schmutzig-weiss: A. polyphylla Schleich.

ε. alpestris, Blättchen des HK. mit einem breiten, schwarzbraunen Rande umgeben; B. meist fein-zerschnitten, die untern meist 3fachgefiedert: A. Millefolium β. alpestris Wimm. u. Grab. A. magna Haenke. Presl. A. Haenkeana Tausch. A. sudetica Opitz. A. dentifera Rb. Bth. meist purpurn, selten weiss; zu letzterer gehört: A. Seidlii Presl., nach Expl. von Opitz. Niedrige weissblüthige Expl. bilden: A. odorata Wulf. in Jacq. collect. 1. t. 21. nach Expl. von Wulfen selbst in Frölich's Herbarium.

ζ. setacea, Bzpl. sehr schmal; Zungenbth. oberseits gelblichweiss, unterseits weiss; Köpfchen meist halb so gross; Kraut wollig-rauhh.: A. setacea WK. A. odorata und A. polyphylla Schleich.

14. A. LANATA (Sprengel.) Wollige S. — B. wollig-zottig oder ziemlich kahl, die Stengelst. im Umrisse länglich oder lanzettl., doppeltfiedersp.; Fiederchen gezähnt-gesägt, Zähne zu-

gespitzt, stachelspitzig; Spindel geflügelt, die der untern B. unter den Fiedern gezähnt; Ebenstrauss doppeltzugesetzt; Zungenbth. halb so lang, als der HK. 4. Auf Bergwiesen, (bei Fiume, Krain, Steyerm., C. Tessin.) Jul. Aug. A. lanata Spreng. nach einem Expl. v. Autor im Willd. Herbarium. A. magna Willd. in seinem Herbarium fol. 1 und 4. — Eine Mittelart von A. Millefolium und tanacetifolia, vom Habitus der letztern, von der sie sich doch die spärlicher gezähnten Fiederchen und die unter den Fiedern nur an den untern B. gezähnte Spindel unterscheidet. Von A. Millefolium untersch. sie sich doch die im Umrisse noch einmal so breiten WB., dennoch sind Merkmale, wodurch sie sich deutlich von A. tanacetifolia unterscheidet, schwierig aufzufinden. Hierher scheint zu gehören: A. magna DC. prodr., A. compacta DC. fl. fr.

15. *A. TANACETIFOLIA* (All.) Rheinfarnblättr. S. — *B. wollig-zottig oder fast kahl, die Stengelst. im Umrisse länglich, doppelt-fiedersp.; Spindel geflügelt, gezähnt; Spindelzähne, Fieder und Fiederchen gezähnt-gesägt, Zähne zugespitzt, stachelspitzig; Ebenstrauss doppeltzugesetzt; Zungenbth. halb so lang, als der HK. 4. Auf Gebirgs- und Alpentriften, (im C. Tessin; im Wallis; in Graubünden; in Krain, Steyerm. und bei Hamburg.) Jul. Aug. Bth. oft purpurn. Diese Art scheint die A. magna Linn. nach der kurzen Beschreibung in d. spec. pl. Var.:*

α. dentifera, Bspindel sehr breit, an den mittlern StB. fast 2 Linien breit, der ganzen Länge nach vielzählig; Bzpfl von der Breite der Spindel ebenso vielzählig; A. dentifera DC. A. magna All. A. distans Willd. A. tanacetifolia u. b. distans Roch. Bth. weiss, selten rosenroth.

β. purpurea, Bspindel breit, unterhalb der Basis der Fieder beiderseits mit 2 wiederum 2- und mehrzähligen Zähnen versehen, übrigens ganzrandig; A. tanacetifolia All. DC. A. ambigua Pollin. A. magna Roch. Bth. purpurn, sehr selten weisslich nach Roch. Eine Abart mit breiterer Spindel und mehr getheilten Fiedern der B. scheint: A. magna DC. prodr.

γ. stricta, ebenso, aber die Spindel schmaler, kaum 1 Linie breit; B. und deren Zpfl schmaler, daher vom Habitus der A. Millefolium: A. stricta Schleich. A. Millefolium δ. lanuginosa Gaud.

δ. angustifolia, Spindel u. Bzpfl so schmal, dass die Pflanze den Habitus der A. setacea erhält. Bth. gelblichweiss. Ich sah sie nur kultivirt: A. compacta DC. fl. fr.?

Alle hier aufgezählten Var. unterscheiden sich von A. Millefolium doch die, wenigstens unter den Fiedern, vielzählige Spindel und die gezähnten Zähne derselben. Ausserdem konnte ich keine genauen Trennungszeichen zw. A. magna, A. dentifera und A. tanacetifolia DC. auffinden.

16. *A. NOBILIS* (L.) Edle S. — *B. wollig-flammig oder fast kahl, die Stengelst. im Umrisse oval, doppeltfiedersp.; Fiederchen fiederspaltig-gezähnt, die grössern 5-7zählige, Zähne kurz, stachelspitzig; Spindel schmal, von der Spitze bis zur Mitte des B. gezähnt, Zähne lineal, ganzrandig oder gezähnt; Ebenstrauss*

doppeltzugesetzt; Zungenbth. halb so lang, als der HK. 4. Auf Feldern, sonnigen, unkultiv. Hügeln, auf Kalkboden, (in der südl. und westl. Schw.; im Rheingebiete vom Elsass bis nach Lüttich und von Baden bis Hessen; den Main hinauf bis Würzburg; den Würtemberg bis zum Hesselberg; von Mähren del Thüringen bis zum Harze.) Jul. Aug. Schk. t. 255. A. Schkubrii Spreng. und A. ochroleuca Rb. sind nicht verschieden. — A. ochroleuca Ehrh. WK., A. pectinata Willd., kann mit A. nobilis nicht verwechselt werden; A. ochroleuca Willd. spec. n. im Herbar. ist eine Abänderung von A. Millefolium.

17. A. ODORATA (L.) Wohlriechende S. — B. wollig-flaumig, im Umrisse länglich-oval, doppeltfiedersp.; Fiederchen lineal, ganzrandig oder 12zählig nebst den Zähnen spitz, stachelspitzig; Spindel nicht gezähnt; Ebenstrauß doppeltzugesetzt; Zungenbth. halb so lang, als der HK. 4. An gebirgigen, kalkhalt. O. im Littor., (bei Triest überall, bei Monfalcone.) Jul. Aug. A. odorata DC. ! Der St. hand-, fusshoch, selten höher. Bth. schmutzig-weiss oder gelblichweiss. Der A. nobilis ähnlich, aber die StB. im Umrisse schmaler, die Spindel nicht gezähnt und die Hauptfieder beiderseits nur mit 3-4 Fiederchen oder Zähnen besetzt, die ganz sind oder nur ein einziges Zähnchen tragen; bei A. nobilis ist die Spindel vielzählig und die Hauptfieder sind beiderseits mit 4-5 Fiederchen besetzt, wovon die grösseren wiederum 5-7zählig sind. Die WB. bei A. odorata sind wie die der A. nobilis 3 fiedrig. — Kommt auch unter dem Namen *A. ligustica* All. vor; aber diese hat im Umrisse breitere B., eine deutlich-gezähnte Spindel mit langen, oft wiederum 2-3fachgezähnten Zähnen und in jedem Blattwinkel einen dichten Büschel kleinerer B., der bei A. odorata entweder ganz fehlt, oder nur aus wenigen B. zsgesetzt ist. Von A. nobilis unterscheidet sich die A. ligustica dadch, dass die Hauptfieder beiderseits nur 3, oder auch an der hintern Seite 4 spitze, ungeth., seltener mit 1 oder 3 Zähnen versehene Fiederchen tragen.

34. ANTHEMIS (L.) Anthemis. — HK. halbkugelig od. ziemlich flach, dachig. Bth. des Mittelfeldes zwittrig, röhrig; Blkr. spornlos, Röhre flach-zsgedrückt, 2flügelig, Saum 5zählig; die randst. Bth. weiblich, manchmal unfruchtbar, zungenf.; Zünglein länglich. Achenen flügellos oder schmal-geflügelt, fast gleichf., ohne Pappus, mit einem mehr oder weniger hervorspringenden Rande endigend, Fruchtb. spreng. — Zungenbth. aller weiss mit Ausnahme von A. tinctoria.

§. 1. Spreublättchen lanzettl. oder länglich, ganzrandig, in eine starre Stachelspitze zsgezogen.

* Fruchtb. konvex oder fast halbkugelig. Achenen 4eckig-zsgedrückt, 2schneidig, mit einem geschärften Rande bekrönt.

1. A. TINCTORIA (L.) Färber-A. — B. flaumig, doppeltfiedersp.; Spindel gezähnt; Fiederchen kammf.-gestellt, gesägt, Sägezähne stachelspitzig; Fruchtb. fast halbkugelig; Spreublättchen lanzettl., in eine starre Stachelspitze zugespitzt; Achenen

4eckig-zsgedrückt, schmal-geflügelt, beiderseits 5streifig, mit einem geschärften Rande endigend; *Zungenbth. kaum halb so lang, als der Querdurchmesser des Mittelfeldes.* 4. Auf Aeckern, unter d. 2jährigen Saat. ☉. Auf Feldern, Aeckern, bergigen und trockenen O., (stellenweise dch das Gebiet.) Jul. Aug. Fl. dan. 741. Köpfchen gelb, var. aber auch mit schwefelgelbem und weissem Strahl.

2. A. TRIUMFETTI (Allioni.) Triumfetti's A. — B. flaumig, doppeltfiedersp.; Spindel gezähnt; *Fiederchen kammf.-gestellt, etwas-gesägt*, Sägezähne stachelspitzig; *Fruchtb. fast halbkugelig; Spreublättchen lanzettl., in eine starre Stachelspitze zugespitzt*; Achene 4eckig-zsgedrückt, schmal-geflügelt, beiderseits 5streifig, mit einem geschärften Rande endigend; *Zungenbth. so lang, als der Querdurchmesser des Mittelfeldes.* 4. Auf Bergen der wärmern Gegenden, (im C. Tessin, in Istrien.) Jul. Aug. A. rigescens Willd. MB. A. caucasica Hornem. A. austriaca DC. A. tinctoria β. Triumfetti L. Chamaemelum Triumfetti All., mit Ausschl. des Syn. von Jacq. Strahl weiss. — A. nigrescens DC. prodr. u. A. austriaca β. Triumfetti DC. sind nach Expl. vom Stand O. nicht verschieden. Die Pfl. ist sicher 4. und nicht jährig.

3. A. AUSTRIACA (J. a. t. 444.) Oestreichische A. — B. wollig-flaumig, doppeltfiedersp.; Spindel gezähnt; *Fiederchen kammf.-gestellt, fast gleich, ganzrandig*, stachelspitzig; *Fruchtb. halbkugelig; Spreublättchen länglich, in eine starre Stachelspitze zugespitzt*; Achenen 4eckig-zsgedrückt, schmal-geflügelt, beiderseits 3streifig, mit einem geschärften Rande endigend. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O., (in Unteröstr., sodann bei Regensburg und in Istrien.) Jul. Aug. Strahl weiss. D.

4. A. ALTISSIMA (L.) Höchste A. — B. ziemlich kahl, doppeltfiedersp.; Spindel etwas gezähnt; Fiederchen gezähnt u. nebst den Zähnen stachelspitzig; *Fruchtb. halbkugelig; Spreublättchen verkehrteyf., plötzlich in eine starre Stachelspitze, so lang, als die Spreublättchen und länger, als die Bth. zsggezogen*; Achenen 4eckig-zsgedrückt, schmal-geflügelt, beiderseits 10rillig, mit einem geschärften Rande endigend. ☉. Unter der Saat, an Wegen, (in Istrien.) Jul. Aug. A. Cota des Willd. Herbar. und Wulf. in Röm. arch. Bthstiele während der Blüthe sich verdickend. J.

5. A. COTA (Viviani in der Berl. Samml.) Grosse A. — B. doppeltfiedersp.; Spindel etwas gezähnt; Fiederchen 3sp. oder gefiedert-5sp., Lappchen kurz-stachelspitzig; *Fruchtb. halbkugelig; Spreublättchen länglich, an der Spitze in eine steife Stachelspitze, die kürzer, als die Bth. ist, zugespitzt*; Achenen 4eckig-zsgedrückt, flügellos, beiderseits 5rillig, mit einem geschärften Rande endigend. ☉. In Weinbergen Istriens, (bei Fiume.) Jun. Jul. A. brachycentros Gay. in Briefen. A. Cota Vivian. A. austriaca var. virens Rb. fl. g. exsicc. Bthstiele an der Spitze nicht verdickt. J.

** Der fruchttrag. Fruchtb. verlängert, walzlich oder kegelf. Achenen stumpf-4kantig, Rillen gleich. Strahl weiss.

6. *A. RUTHENICA* (MBieberst. fl. taur. cauc. 2. p. 331.) Russische *A.* — Wollig-zottig; *B* doppeltfiedersp., Fiederchen lineal-lanzettl., ganzrandig, 2-3zählig, spitz, stachelspitzig; *Fruchtb.* walzlich verlängert; *Spreublättchen* lanzettl., an der Spitze stumpflich, etwas gezähnt und in eine steife Stachelspitze endigend; die *Achenen* stumpf 4kantig, gleichmässig gefurcht, mit scharfem Rande endigend, die äusseren oft mit einem halbrunden, quer-abgestutzten Krönchen versehen. ☉. Auf sonnigen, unbebauten Hügeln, (Böhmen, Rupprecht; südl. Istrien, Biasoletto.) Jul. Aug. Von dem Ansehen der *Anthemis austriaca*, mit der sie oft verwechselt worden; doch ihre Kennzeichen der *A. arvensis* am nächsten.

7. *A. ARVENSIS* (L.) Feld-*A.* — *B.* wollig-flaumig, doppeltfiedersp.; Fiederchen lineal-lanzettl., ungeth. oder 2-3fachgezähnt, spitz, stachelspitzig; *Fruchtb.* verlängert-kegelf.; *Spreublättchen* lanzettl.-spitz, in eine starre Stachelspitze zugespitzt; *Achenen* stumpf-4kantig, gleich-gefurcht, die äusseren mit einem gedünnten, faltig-ranzlichen Ringe, die innern mit einem spitzen Rande endigend. ☉. An Sandplätzen und überall auf kultiv. O. Jun.-Herbst. St. h. 27. *A. arvensis* und *A. agrestis* Wallr. sched. Nach meinen neueren Beobachtungen stellt die *A. arvensis* Wallroth's nur einen weniger entwickelten Zustand der *A. arvensis* dar, und *A. agrestis* ist die Pfl. mit vollständig entwickelten Früchten. Vergl. bot. Ztg 25. S. 734.

§. 2. *Spreublättchen* lineal.-borstlich, spitz. Strahl weiss.

8. *A. COTULA* (L.) Stinkende *A.* — *B.* ziemlich kahl, doppeltfiedersp.; Fiederchen lineal., ungeth. oder 2-3zählig, kurz-stachelspitzig; *Fruchtb.* verlängert-kegelf.; *Spreublättchen* lineal.-borstlich; *Achenen* beinahe stielrund, knötig-gestreift, mit einem kleingekerbten, ein etwas konvexes Mittelfeld umgebenden Rande endigend. ☉. An kultiv. O., auf Schutthaufen, an Wegen. Jun.-Herbst. Schk. t. 254. *Maruta Cotula* DC. prodr., *M. vulgaris* Bl. und Fingerh. comp. *M. foetida* Cass. dict.

§. 3. *Spreublättchen* gegen die Spitze häutig und rauschend, stumpf oder zerfetzt-gezähnt und manchmal doch einen mehr hervorspringenden Zahn stachelspitzig.

* Bth. des Mittelfeldes gelb.

9. *A. NOBILIS* (L.) Römische *A.* — *B.* flaumig oder fast kahl, gefiedert; Fieder vielsp., Zpfl lineal., kurz-stachelspitzig; *Fruchtb.* verlängert-kegelf.; *Spreublättchen* länglich, grannenlos, am Rande und an der Spitze trockenhäutig; *Achenen* fast 3kantig, glatt, mit einem schwach-angedeuteten Rande endigend; der St. ästig, vielköpfig. 24. Auf kiesigen Triften, (in der Schw. und in, Westphal., vielleicht bloss verwildert.) Jul. Aug. St. h. 27

10. *A. MONTANA* (L. spec. 1261.) Berg-*A.* — *B.* kahl, gefiedert die untern stengelst. 3-6paarig; Fieder einfach, 2-3sp. und gefiedert-5sp., Zpfl lineal-lanzettl., ziemlich spitz, wehrlos; *Fruchtb.*

halbkugelig; *Spreublättchen* lineal.-länglich, *an der Spitze brandfleckig und zerfetzt-gezähnt* und oft dch einen grössern Zahn stachelspitzig, so lang, als die Bth. des Mittelfeldes; die St. ganz einfach, 1köpfig. 4. Unter Gerölle der A., (bisher bloss auf der A. hohe Zinken, wenn man von Sekau durch den Steinmüllengraben über die Wolfspass zur Spitze hinaufsteigt, am Gräbel, unter dem Mittelplan.) Aug. Septbr. Rb. ic. f. 230. A. Kitaibellii Spreng. syst. veget. A. styriaca Vest. syllog. soc. bot. ratisb. A. montana d. Gay in Brief. A. saxatilis Willd. en. A. carpatica Willd. herb., ein unpassender Name, weil die Pfl. in den Carpaten nicht wächst. A. grandiflora Host. A. mucronulata Rb., nicht Bertoloni, dessen Pflanze nach der Beschreibung in d. amoen. ital. und nach Gussone'schen Expl. im Herb. von Zeyher sich dch die bedeutend mindere Grösse, die lanzetl., in eine borstenartige Spitze zugespitzten *Spreublättchen* und andere Merkmale sehr unterscheidet. Var. mit kahlen, flaumigen und seidenh. B.; die letztere Variet. ward aber in D. noch nicht gefunden.

** Bth. des Mittelfeldes und des Randes weiss.

II. A. ALPINA (L.) Alpen-A. — B. wollig-flaumig oder kahl, gefiedert, die untern stengelst. 10-12 paarig; Fieder einfach oder 2-3sp., Zpfl. lineal., verschmälert-spitz, stachelspitzig; Fruchtb. halbkugelig; *Spreublättchen* lineal.-länglich, stumpf, *an der Spitze zerfetzt-gezähnt und brandfleckig*, so lang, als der halbe Saum der Bth. des Mittelfeldes, die St. ganz-einfach, 1köpfig. 4. Auf den höchsten A., (auf den südöstl. A. von Tyrol an vielen O. gemein, Facchini; Schleherengebirg, Kirschbammer Alpe.) Jul. Aug. J. a. t. 30. St. h. 19. Ptarmica oxyloba DC. prodr. Untersch. sich von Achillea atrata dch die lineal.-längl., noch einmal so lang, als breiten Zungenblättchen des Strahles und fast immer 1köpfige St.; bei Achillea atrata sind die Zungenblüthchen rundl.-verkehrteyf.

35. ANACYCLUS (L. mit Ausschl. von Arten.) Kreisblume. — Achenen beiderseits geflügelt, verkehrtherzf., Flügel verbreitert, an der Spitze in einen Lappen vorgezogen; die mittelpunktst. schmäler-geflügelt. Sonst Alles, wie bei Anthemis.

I. A. OFFICINALIS (Hayn. arzn. 9. t. 46.) Gebräuchliche K. — Die St. aufrecht oder aufstrebend, meist 1köpfig; Spreublättchen verkehrteyf., nach der Basis verschmälert; Flügel der Achenen undurchsichtig; Bth. des Mittelfeldes gleichf. 5zählig. ☉. (Im südl. Europa zu Hause, wird in Thüringen im Grossen kultiv.) Mai. Jun. A. pulcher Besser in Briefen an DC., DC. prodr. Strahl weiss, unterseits purpurn-gestreift. Der sehr ähnliche A. Pyrethrum untersch. sich doch leicht: die Flügel der Achenen sind häutig, durchscheinend; die innern Spreublättchen plötzlich in einen Stiel zsggezogen, spatelig und die seitenst. St. verlängert, niedergestreckt. mehrköpfig. Kultiv.

36. MATRICARIA (L.) Kamille. — Fruchtb. nackt, fast walzlich-kegelf.; sonst Alles, wie bei Chrysanthemum.

J. M. CHAMOMILLA (L.) Gemeine K. — Blättchen des HK. stumpf. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. Mai-Jul. Schk. t. 253. b. „Diese Ackerpfl. wird auf Grasplätzen der Gärten und an Häusern schlank und geht dann in die Variet. *β.* (*M. suaveolens* L. *succ.*) über, welche um die Hälfte kleinere und auch wohlriechendere Bth. trägt.“ Wahlenb. Fl. *succ.* Untersch. sich von *Anthemis arvensis* und von *A. Cotula* dch den nackten, von *Chrysanthemum inodorum* dch den walzlich-kegelf. und von allen diesen dch den inwendig hohlen Fruchtb. Die Achenen sind klein, lineal., schwach-gebogen, dch 5 erhabene Linien etwas kantig, hinten aber glatt, an der Spitze gestutzt, und mit einem hervortretenden stumpfen Rande versehen. Die oberweibige Scheibe mit dem eben beschriebenen Rand hat die Breite der Achene. — *Matricaria suaveolens* Smith. und DC. (nicht L. fl. *succ.*, welche wohl kaum als Variet. der *M. Chamomilla* gelten kann,) die ich aus Vohynien besitze, hat Achenen, welche wenigstens noch einmal so gross, keulig, stielrund, nicht kantig, aber auf allen Seiten mit zärteren Riefen gerieft, an der Spitze abgerundet-stumpf sind, ohne allen Rand, und nur auf der abgerundeten Spitze mit einer sehr kleinen oberweibigen Scheibe bezeichnet sind. Die Achenen des Randes schlagen fehl. — Die *Matricaria coronata* Gay, von dem Autor selbst erhalten, welche um Paris und ausserdem im westlichen Frankreich und Spanien vorkommt, trägt an der Spitze der Achenen eine häutige, gezähnte Krone, die bei den Achenen des Randes quer aufsteigt und länger ist, als die Achene selbst. Die Achenen des Randes schlagen nicht fehl. Ob die *Matricaria Courrantiana* DC. *prodr.* eine von dieser verschiedene Art bildet, ist mir unbekannt.

37. CHRYSANTHEMUM (L.) Wucherblume. — HK. ziemlich flach oder halbkugelig, dachig. Bth. des Mittelfeldes zwit-terig, röhrig; Blkr spornlos, Saum 5 zählig; die randst. Bth. weiblich, zungenf., Röhre zsgedrückt. Achenen gleichf., flügellos, ohne Pappus, mit einem verwischten oder mehr oder weniger hervortretenden oder in eine Krone hervorgezogenen Rande endigend. Fruchtb. nackt, ziemlich flach oder halbkugelig.

* Strahl weiss.

1. C. LEUCANTHEMUM (L.) Weisse W. — Die untern B. langgestielt, verkehrteyf-spatelig, gekerbt, die obern sitzend, länglich-lineal., gesägt, Sägezähne der Basis schmaler und spitzer; Achenen sämtlich ohne Krönchen. 4. Auf Wiesen und an waldigen O. Jun. Jul. St. h. 2. *Leucanthemum vulgare* DC. *prodr.* Var.:

β. discoideum, Köpfchen ohne Strahl, nach Expl. von Sonder.

γ. atratum, niedrig, nur fingerslang oder Spanne hoch; die untersten B. an der Spitze stumpf-3lappig und am Rande ganzrandig oder daselbst mit einem oder 2 spitzeren Zähnen besetzt; Blättchen des HK. mit einem breiten, schwarz-braunen Rande umgeben: *C. atratum* Gaud., Thomas., nicht Lin.; das *Leucanthemum*

atratum DC. unterscheidet sich dch eine häutige Krone der Achenen.

2. *C. MONTANUM* (L.) Berg-W. — Die unteren B. länglich, in den Bstiel verschmälert oder verkehrteyf., gekerbt, die darauffolgenden sitzend, lanzettl. und lineal., gesägt, Sägezähne der Basis schmaler und spitzer; Achenen des Randes mit einem häutigen, halbirtten, gezähnten Krönchen, das halb so lang, als die Röhre ist, endigend, die des Mittelfeldes ohne Krönchen. 4. Auf Triften der A. und den südl. Abhängen der A. in die niedrigern Gebirge bis zum Adriat. Meere hinabsteigend. Jun. Jul. — Es kommen besonders 3 sehr merkwürdige, jedoch weiter an ihren StandO. zu beobachtende Formen vor; von *C. Leucanthemum* sind alle durch das den Fruchtkn. endigende Krönchen verschieden.

a. adustum, die untersten B. verkehrteyf., in den Bstiel plötzlich zsggezogen, grob-gekerbt; die stengelst. lanzettl., entfernt-gesägt. Köpfchen gross, Blättchen des HK. mit einem breiten, schwarzbraunen Rande umgeben: *C. Leucanthemum* H. *alpinum* Gand., diese auf Triften der A. Vielleicht gehört hieher *Leucanthemum atratum* DC. prodr.

β. heterophyllum, höher, die untersten B. länglich, in den Bstiel allmählig verschmälert, die obern lanzettl., fast gleich-gesägt; Blättchen des HK. vor dem breit-trockenhäutigen Rande mit einer schmalen, bräunlichen Linie bezeichnet: *C. atratum* α. Linn. nach dem Syn. Bauhin's: *Bellis alpina maior folio rigido* prodr. 120. *C. lanceolatum* Pers. *C. heterophyllum* Willd.; unpassend nach einem Ex. von Balbis. (unter n. 16164. im Willd. Herbar. aufbewahrt.) dessen StB. dch irgend einen Zufall verstümmelt waren, benannt. *Leucanthemum heterophyllum* DC. prodr. *Phalacrodiscus lanceolatus* Lessing. An den südl. Alpenabhängen und scheint in niedrigern Gegenden in die Variet.

γ. saxicola überzugehen. Die St. sind niedriger, die WB. bald verkehrteyf., bald länglich und allmählig in den Bstiel verschmälert, bald fast lanzettl., spärlich-gezähnt; die StB. lineal-lanzettl. und lineal., entfernt-gesägt und oft fast ganzrandig; Blättchen des HK. mit einer schwarzbraunen, bald schmalen, bald breiten Linie umzogen: dieses *C. montanum* L., *Leucanthemum montanum* DC. prodr. geht vielleicht auch in *C. graminifolium* über.

3. *C. CORONOPIFOLIUM* (Vill. mit Ausschl. des Syn. All.) Krähenfussblättrig. W. — Die untersten B. verkehrteyf.-keilig, eingeschnitten-5-7zählig, die stengelst. lanzettl. und lineal., eingeschnitten-gesägt, Zähne lanzettl.-pfriemlich; Achenen sämtlich häutig-bekrönt; Krönchen der randständigen schief-abgeschnitten, gezähnt, ohngefähr so lang, als die Röhre der Blkr. 4. An felsigen O. der höhern A., mit den Flüssen in die Nebenthäler hinabsteigend. (Schw.; Tyrol; Salzbg; Steyern.; im Isarbetten bei München.) Jul. Aug. *C. Halleri* Sut. *Pyrethrum Halleri* Willd. Diese Art ist ohne Zweifel das wahre *Chrysanthemum atratum* L.; die Diagnose: „die B. sämtl. keilf.-länglich, gesägt, fleischig“ passt auf sie allein.

4. *C. CERATOPHYLLOIDES* (All.) Hornblattähnliche W. — Die W.- und StB. fiedersp., Zpfl lanzettl.-lineal., verlängert, ungeth. und 2sp., entfernt, Spindel lineal. oder keilf.-verbreitert; Achenen sämmtl. häutig-bekrönt; Krone der randständigen schief-abgeschnitten, ohngefähr so lang, als die Röhre der Blkr. 4. An felsigen O. der A., (auf dem Linkerskopf in den bair. A.) Jul. Aug. *Pyrethrum ceratophylloides* Willd. Die Expl. mit verbreiteter Spindel nähern sich mehr der vorhergehenden Art, aber die Zähne oder vielmehr die Zpfl sind viel länger, entfernt und oft 2sp., bei beiden aber nicht selten sichelf. Vielleicht Variet. des vorigen? D.

5. *C. ALPINUM* (L.) Alpen-W. — WB. und die der unfruchtbaren St. kammf.-fiedersp., im Umriss rundlich-eyf., mit dicht-genäherten, ganzrandigen Fiedern, die der blüthentrag. St. lineal., ganzrandig; Achenen sämmtl. häutig-bekrönt; Krone der randständigen gleichf.-glockig, gekerbt; Blättchen des HK. länglich-eyf., stumpf. 4. An felsigen O. der höhern A., (Schw., Tyrol, Steyermark, Kärnthen.) Jul. Aug. St. h. 19. *Pyrethrum alpinum* Willd. Var.:

β. minimum, halb so gross, die B. nebst dem St. etwas filzig-rauhh., Bzpl fast elliptisch: *C. alpinum β. minimum* Gaud. *C. minimum* Vill. *Pyrethrum alpinum β. pubescens* Dub. bot. gall. Im Wallis (über Zermatten.) — Von dieser Variet. unterscheidet sich das in Corsica einheimische *C. tomentosum* Lois. ansser dem dichteren Filze der ganz blattlosen Bthstiel und die kurzen, 3eckig-eyf., spitzen, äussern Blättchen des HK.

6. *C. PARTHENIUM* (Pers.) Mutterkraut-W. — B. flaumig, gefiedert; Fieder elliptisch-länglich, stumpf, fiedersp., die obersten zsfliessend, Zpfl etwas gezähnt, sehr kurz-bespitzt; der St. ästig; Köpfchen ebensträussig; Achenen mit einem geschärften, sehr kurzen Rande endigend. 4. An waldig., felsigen O., auf Mauern, Schutthaufen, hie und da, aber wie es scheint, nicht wirklich einheimisch. Jun. Jul. Hayn. arzng. 6. t. 20. *Matricaria Parthenium* L. *Pyrethrum Parthenium* Smith.

7. *C. CORYMBOSUM* (L.) Ebensträussige W. — B. gefiedert; Fieder der untern fiedersp., Fiederchen geschürft-gesägt, Sägezähne stachelspitzig; Köpfchen ebensträussig; Zungenblüthen lineal.-längl.; Achenen sämmtl. häutig-bekrönt; Krone der randständigen ohngefähr so lang, als die Röhre. 4. An waldigen, gebirgigen O. Jun. Jul. J. a. t. 379. *Pyrethrum corymbosum* Willd. — *Pyrethrum Clusii* Fischer unterscheidet sich, wenigstens nach den Expl., die ich bisher sah, von *Chrysanthemum corymbosum* nicht.

8. *C. MACROPHYLLUM* (Waldst. und Kit. pl. rar. hung. 1. S. 97, t. 94.) Langblättrige W. — B. gefiedert, die Fieder in eine breit-geflügelte Spindel hinablaufend, breit-lanzettl., grob-eingeschnitten-gesägt, die Zähne fast doppelt-gesägt, die hinteren Fieder der unteren B. getrennt; Köpfchen ebensträussig; die Zungenbth. rundl.-verkehrt-eyf., von der halben Länge des HK.; sämmtliche

Achenen häutig-bekrönt, die Krone der randständigen viel länger, als die Röhre der Blkr. 4. In Bergwäldungen (Görjanz-Wald des Ukoken-Gebirges in Krain.) Jun. Jul. *Pyrethrum macrophyllum* Willd. spec. *Achillea sambucifolia* Desf. cat. *Gymnocline leucocephala* Cassin. *G. macrophylla* Bl. und Fingerh. Comp.

9. C. INODORUM (L.) Geruchlose W. — *B. doppelt-3fuchfiedersp.*, *Zpfl lineal-fädlich*; der Strahl abstehend; Fruchtb. halbkugelig. ☉. Unter der Saat. Jul.-Herbst. *Pyrethrum inodorum* Smith. Schk. t. 253. Var. an salzhaltigen O.:

β. maritimum, *Bzpfl* dicker; der St. mehr ausgebreitet; *Chrysanthemum inodorum β. maritimum* L. spec. *Pyrethrum inodorum β. salinum* Wallr.

Von dieser Variet. unterscheidet sich als besondere Art die *Matricaria maritima* L. spec., *Pyrethrum maritimum* Smith brit.

** Strahl gelb.

9. C. SEGETUM (L.) Saat-W. — *B. kahl, gezühnt, vorne verbreitert, 3sp.-eingeschnitten, die obern mit herzf. Basis stengelumfassend*; Achenen mit einem verwischten Rande endigend. ☉. Unter der Saat, (sehr zerstreut, an manchen O. eine wahre Landplage, dann auf weiten Strecken gar nicht; nicht in der Schw.; in den Oestr.-Deutschen Staaten nur auf Osero und in Friaul.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 995. Wegen der ganz verschiedenen Achenen kann diese nicht mit *Pinardia* verbunden werden. D.

38. PINARDIA (Cassin.) Pinardie. — Die randst. Achenen 3flügelig, der innere Flügel grösser, die des Mittelfeldes einflügelig, sämtliche Flügel an der Spitze in einen Dorn vorgezogen; sonst Alles, wie bei *Chrysanthemum*.

1. P. CORONARIA (Lessing.) Gekrönte P. — *B. vorne breiter, doppelt-fiedersp. und nebst dem St. kahl.* ☉. Auf den südl. A. der Schw. sehr selten, (auf dem Berge la Combaz im untern Wallis und auf dem Fräla im Veltlin.) Jul. Aug. Lam. ill. t. 678. f. 6. *Chrysanthemum coronarium* L. spec., DC. prodr. Bth. gelb. S

V. Untergruppe. *SENECIONEEN*. Pappus behaart; sonst Alles, wie bei den Anthemideen.

39. DORONICUM (L.) Gemswurz. — HK. halbkugelig oder ziemlich flach; Blättchen gleich, 2-3reihig. Bth. des Mittelfeldes zwittrig, röhrig; Saum 5zählig; die N. kopfig-abgeschnitten; die randst. Bth. weiblich, zungenf. Achene schnabellos, ungeflügelt, gefurcht. Pappus des Mittelfeldes behaart, des Randes fehlend. Fruchtb. nackt. — Bth. aller gelb; die randst. mit verkümmerten Stbg. versehen.

1. D. PARDALIANCHES (L. var. *β.*) Gemeine G. — *B. eyf., gezähnt, die wurzelst. langgestielt, tief-herzf., die mittlern stengelst. geöhrelt-gestielt, die obern sitzend, stengelumfassend*; Fruchtb. zottig; *unterirdische Ausläufer verlängert, dünn, an*

der Spitze zuletzt verdickt, blättertragend und wiederum ausläufertreibend. 4. In Gebirgswäldern, (sehr zerstreut doch das mittl. und südl. Gebiet, Schw., Krain, Oestr. Böh.; im Rheingebiete: Elsass, Oberbaden, Drachenfels in der Rheinpfalz, Winnigen an der Mosel, Trier, Limburg; im Maingebiete auf dem Taunus, um Würzburg, Schwabenberg bei Kastell; bei Hamburg.) Mai. Jun. J. a. t. 350. Hayn. arznz. 6. t. 21. St. h. 21. und 80. Dor. latifolium Clus. D. Matthioli Tausch. Rb. fl. exc. Im Garten treibt der St. oft 8-10 Köpfchen, an dem Stand O., jedoch kaum mehr, als 3. Die lebende Pflanze, so wie auch getrocknete, mit vollständiger W. verschene Expl. unterscheiden sich von allen folgenden leicht doch die dünnen verlängerten Ausläufer, die in Hayne's undCLUSIUS Abbildung sehr richtig dargestellt sind. Das *Doronicum macrophyllum* Fischer, St. h. 80., nicht von Bernhardi so benannt, (D. Pardalianches Tausch. und Rb.) ist eine asiatische Pflanze, ohne Ausläufer unter der Erde und verschieden doch rundlich-herzf., ganz stumpfe WB., kürzere, zugespitzte und nicht lang-verschmälerte Blättchen des HK., fläumliche Achenen des Randes und einen kahlen Fruchtb.

2. D. SCORPIOIDES (Willd., mit Ausschl. aller Syn. ausser des von Roth.) Scorpionartige G. — B. eyf., gezähnt, die wurzelst. lang-gestielt, an der Basis abgerundet oder abgeschnitten oder undeutlich herzf., in den Stiel ein wenig hervorgezogen, die mittlern stengelst. geöhret-gestielt, die obern sitzend, stengelumfassend; Fruchtb. zerstreut-behaart; *Rhizom kurz, wagerecht*; Ausläufer fehlend. 4. Auf den A., (auf dem Saleve bei Genf in der Schw.) Mai. Hayn. arznz. 6. t. 22., sehr richtig. St. h. 80. Var. mit fläumlichen und kahlen Fruchtb. der Randbth. S.

3. D. CORDIFOLIUM (Sternb. Denkschr. der bot. Gesellsch. in Regensb. 1818. p. 147.) Herzblättrige G. — B. fast kahl, die wurzelst. lang-gestielt, grob-gezähnt, rundlich-eyf., tief-herzf., Bucht abgerundet, offen, die StB. mit tief-herzf. Basis stengelumfassend; *Rhizom schief, abgebissen*; WKöpfe aufstrebend. 4. An felsigen O. und in Felsenspalten der A., (Tyrol, auf vielen Alpen; Salzbg auf dem Tennengebirge; Steyer. auf dem Hohenschwab; in Unteröstr. auf dem Durrenstein) Jun.-Aug. D. caucasicum Rochel bannat. t. 31., St. h. 80., DC. prodr., wegen der ganz kahlen Achenen des Strahles. D. orientale Adams. bei Willd. D. Columnae Ten. Arnica cordata Wulf. in Röm. Arch. Vergl. Koch in der bot. Ztg. 23. 1. S. 371. Fruchtb. von kurzen Haaren zottig. Achenen der Randbth. kahl. Der St. trägt bei der wilden Pflanze nur 1-3 Köpfchen, bei der kultiv. bis 8. Das D. Columnae DC. prodr. ist vielleicht nur eine Variet. von D. cordifolium, deren randsf. Achenen flaumig sind. Den Namen „cordifolium“ zog ich vor, weil er nicht zweideutig ist.

4. D. AUSTRIACUM (J. a. t. 130.) Oestreichische G. — Die WB. fehlend, die untersten 1-2 StB. viel kleiner, als die übrigen, die folgenden zahlreich. genähert, herzf., zugespitzt, gezähnt, geöhret-gestielt, die obern länglich, stengelumfassend, die obersten lanzettl.; *Rhizom abgebissen*; Ausläufer fehlend. 4. In

Schlagwäldern, an Waldrändern in den VorA., auf fetter Damm-
erde, (Tyrol; Salzbg; Steyern.; Krain; Oestr.; Mähr.; Böhm.;
Schles.) Jun.-Aug. St. h. 80. D. scorpioides W. und G. fl. siles
D. Pardalianches a. L. nach Clusius Synonym. Arnica austriaca
Hopp. bei St. h. 38. Doronicum VII. austriacum III. Clus. Var.
flaumig und fast kahl.

40. ARONICUM (Necker.) Schwindelkraut. — Achenen sämmtl.
mit einem Pappus versehen; sonst Alles wie bei Doronicum Bth.
ebenfalls gelb.

1. A. CLUSII (Koch, Arnica Clusii All.) Clusius S. — B. krau-
tig-weich, eyf. oder länglich, entfernt-gezähnt oder gezähfelt, oder
ganzrandig, die unteren gestielt, die stengelst. halbstengelumfassend;
Haare der Bthstiele sämmtl. spitz, gegliedert, Gelenke dersel-
ben entfernt; St. hohl; W. wagrecht. 4. An feuchten O. der
höchsten A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. A. Doronicum Rchb. fl.
exc., DC. prodr. Doronicum Clusii Tausch in der Regensb. bot.
Ztg Arnica Clusii All. pedem. A. Doronicum Jacq. a. t. 92. A.
styriaca Vill. delph. Grammarthron biligulatum Cass. Bth. gelb.
wie bei den folgenden „Der St. hohl, leicht biegsam. B. nicht
fest oder starr, sondern weich, leicht zu biegen und kurzbehaart“
Wulf. — Kommt vor mit ganz rauhen B. und St: D. Bauhini
Sauter in Reichenb. fl. exc., Aronicum Bauhini Rchb.; und mit
längl. B., deren untere in den Bstiel verschmälert, die oberen
lanzettl. Doronicum II. Clus. hist., I. Clus. pann. D. longifolium
Rchb. fl. exc. nach dem Citat. von Clusius. Die Pfl. ist behaart,
als das A. glaciale. Die Zungenbth. neigen bei Nacht ober-
wärts zsammen. Hoppe.

2. A. GLACIALE (Reichenb. fl. exc. p. 234.) Eis-S. — Die B.
starr, dicklich, eyf. oder längl., gezähnt oder ganzrandig, die un-
teren gestielt, die stengelst. halbstengelumfassend; *sämmtliche*
Haare der Bthstiele kurz, gegliedert mit entfernt-gestellten Ge-
lenken; St. starr, gefüllt, nur unter dem Köpfchen hohl; W.
schief-hinabsteigend. 4. An feuchten O. auf den höchsten A. nahe
der Eisregion, (zerstreut dch die AK.) Jul. Aug. A. Clusii δ.
glaciale Koch. Synops. ed. I. A. scorpioides γ. glaciale DC. prodr.
Arnica glacialis Wulf. in Jacq. collect., Jacq. ic. rar. 3. t. 586.,
St. h. 38. „St. starr, B. dicklich, fast brüchig. Die Zungenbth.
sind auch bei Nacht ausgebreitet und neigen nicht zsammen.“
Hoppe.“

2. A. SCORPIOIDES (Koch.) Skorpionartige S. — B. gezähnt,
die unteren breit-eyf., an der Basis stumpf, abgeschnitten oder
fast herzf., die stengelst. eyf. oder länglich, die oberen stengelum-
fassend; *Haare der Bthstiele stumpf, gegliedert, Gelenke der-*
selben dicht-genähert. 4. An kiesigen, felsigen O. der A., (dch
die g. AK.) Jul. Aug. Arnica scorpioides L. J. a. t. 349. St.
h. 38. Grammarthron scorpioides Bl. und Fingerh. Doronicum
IV. styriacum Clus. Kommt vor: das untere oder mittlere StB.
geöhrelt-gestielt: Doronicum Jacquini Tausch., Aronicum latifolium
Rb., A. scorpioides α. latifolium DC. prodr.; und die untern B. an

dem Bstiele nicht geöhrelt: *Doronicum Halleri* Tausch., *Aronicum scorpioides* Rb., *A. scorpioides* β . *medium* DC. prodr.

41. *ARNICA* (L. mit Ausschl. von Arten.) *Wolverley*. — HK. walzlich, Blättchen gleich, 2reihig. Bth. des Mittelfeldes zwittrig, röhrig; Saum 5 zählig, die N. oberwärts verdickt, mit einer kegelf., flaumigen Spitze endigend; die Bth. des Randes weiblich, zungenf., mit Stbg. ohne Stbk. oder nur mit einem Ansatz dazu. Achene schnabellos, ungeflügelt, gerillt. Pappus behaart; Fruchtb. nackt.

1. *A. MONTANA* (L.) *Berg-W.* — Die WB. länglich-verkehrt-eif., fast ganzrandig, 5nervig; der St. mit wenigen Köpfchen; Bthstiele und HK. zottig oder drüsig-flaumig. 4. Auf Waldwiesen und an gebirgigen feuchten O., in die A. hinaufsteigend. Jun. Jul. St. h. 34. Bth. gelb.

42. *CINERARIA* (L.) *Aschenpflanze*. — HK. ohne AussenK. Sonst Alles, wie bei *Senecio*. Um nicht zu sehr die Namen umzuändern, behielt ich diese Gattung bei, welche, nur dch die äussere Gestalt verschieden, sich dch besondere Charaktere wohl kaum von *Senecio* wird trennen lassen. Mit dem Namen *Cineraria* bezeichneten Lessing und De Candolle die Gattung *Xenocarpus* des Cassini.

Die mit einem einfachen Ebenstrauß versehenen Arten dieser Gattung sind noch nicht mit Sicherheit begrenzt. Ich habe deren vielleicht hier mehrere aufgestellt, als sich fest begründete vorfinden, ich wollte sie jedoch nicht übergehen, um sie der Aufmerksamkeit der Botaniker nicht zu entziehen. Die Farbe des HK. (HK. farbelos oder brandfleckig) der Flaum der Achene und die Länge des Pappus sind, wenigstens bei einer Art, sehr veränderlich, (vgl. auch Fl. sil. 3. p. 143.) aber alle diese Merkmale müssen, was die meisten Arten betrifft, an den StandO. durch fortgesetzte Beobachtungen noch näher geprüft werden.

1. *C. CRISPA* (J. a. t. 178.) *Krausblättr. A.* — Ebenstrauß endst., einfach; B. glatt, etwas spinnwebig-wollig, gezähnt, *die W.- und untern StB. eif., herzf.*, die folgenden in den breit-geflügelten, mehr oder weniger gezähnten Bstiel zsggezogen, die oberen lanzettl. und lineal., fast ganzrandig; *Fruchtkn. kahl*; der Pappus während der Bthezeit so lang, als die Röhre der Blkr. oder kürzer. 4. Auf den VorA., (in Unteröstr., Steyerml. in den Sudeten und den Mähr. Gebirgen; im Erzgebirge.) Mai. Jun. Bth. hell-, dotter- und safrangelb. Var. ausserdem;

α. genuina, (W. und G. fl. sil.) die stengelst. Bstiele breit-geflügelt und sowie die B. selbst gezähnt-gekräuselt. J. a. u. O. Rb. ic. 2. f. 214. *Senecio crispatus* DC. prodr.

β. rivularis, (W. und G.) Bstiele gezähnt oder ganzrandig, nicht gekräuselt; Blättchen des HK. gleichfarbig-grün: *C. rivularis* W. K. (Pappus von der Länge der Röhre.) — *C. rivularis* Rb. ic. 2. f. 215. (Pappus kürzer, als die Röhre der Blkr.)

γ. sudetica, Bstiele gezähnt oder ganzrandig, nicht gekräuselt; Blättchen des HK. entw. ganz, oder nur an der Spitze purpurn. Rb. ic. f. 212. *C. integrifolia* Schk. t. 246. gut. (Pappus von der Länge der Röhre.) *Senecio sudeticus* DC. prodr. — Die *Cineraria*

Schkuhrii Rb. ic. 2. f. 216., Senecio Schkuhrii DC. prodr. stellt ein Expl. dieser Variet. mit weniger deutlich-herzf. B. und mit einem Pappus, der kürzer, als die Röhre ist, dar.

δ. *crocea*, HK. purpurn, Bth. safrangelb: C. *crocea* Tratt. arch. 48. Rb. ic. 2. f. 213. (Pappus kürzer, als die Röhre.) Senecio *croceus* DC. prodr. D.

2. C. PRATENSIS (Hopp. Koch. bot. ztg. 6. 2. p. 506.) Wiesen-A. — Ebenstrauss endst., einfach; B. etwas spinnwebig-wollig, die unteren ausgeschweift-gezähnt, länglich, an der Basis in den Bstiel verschmälert, die folgenden lanzettl., an der Basis verschmälert, die oberen sitzend, lanzettl. und lineal.; Fruchtkn. kahl; Pappus während der Bthzeit ohngefähr so lang, als die Röhre. 4. Auf feuchten Wiesen am Fusse der A., (auf Sumpfwiesen bei Salzbg.) Mai. Jun. Pappus während der Bthzeit so lang, als die Röhre; HK. entw. ganz oder nur an der Spitze purpurn. Rb. ic. f. 218. Senecio *pratensis* DC. prodr. Bth. gelb. Var.:

β. *capitata*, Hopp. und Hornsch. (nicht Wahlenb.) Strahl fehlend. Rb. ic. f. 219. D.

3. C. LONGIFOLIA (J. a. t. 181.) Langblättr. A. — Ebenstrauss endst., einfach; B. kurzh.-rauh und mehr oder weniger wollig, die wurzelst. eyf. und länglich, gekerbt-gezähnt oder ganzrandig, die folgenden verlängert-lanzettl., an der Basis verschmälert, die oberen sitzend, lanzettl. und lineal.; Fruchtkn. flaumig; Pappus während der Bthzeit so lang, als die Röhre der Blkr. oder kürzer, als diese. 4. Auf Alpenwiesen, (Tyrol, Steyerm., Oestr., Kärnth.) Mai. Jun. Bth. gelb. — C. *longifolia* Rb. ic. f. 239., stellt ein Expl. mit breitem B. dar. Senecio *brachychaetus* DC. prodr.

β. *discoidea*, Strahl fehlend. Bei Heiligenblut, Hoppe. D.

4. C. ALPESTRIS (Hoppe taschenb. 1806. 130.) Alpen-A. — Ebenstrauss endst., einfach; B. kurzh.-rauh und mehr oder weniger wollig, die unterst. eyf. oder fast herzf., gekerbt-gezähnt, die folgenden länglich-eyf., in den breitgeflügelter, keiligen Bstiel gezogen, die oberen sitzend, lanzettl. und lineal.; Fruchtkn. kahl oder schwach-flaumig; Pappus während der Bthzeit so lang, als die Röhre, oder kürzer, als diese. 4. In den VorA., (Oestr., Tyrol, Steyerm., Kärnth. und Krain.) Mai. Jun., in den A. später. Bth. gelb. C. *integrifolia alpina* J. a. t. 179. Senecio *alpestris* DC. prodr. Var.: Mit gegliederten Haaren spärlicher bestreut, oder doch solche dicht kurzh.-rauh und zugleich mehr oder weniger, manchmal dicht mit Wollhaaren bedeckt.

α. *legitima*, Fruchtkn. etwas flaumig; C. *alpestris* Koch bot. ztg. 6. 2. 511. Rb. ic. 2. f. 220.

β. *Clusiana*, Fruchtkn. kahl, B. dicht-wollig. Cineraria *Clusiana* Host. a. 2. p. 482.

γ. *ovirensis*, Fruchtkn. kahl, B. dicht-wollig, die unteren stengelst., weniger spatelf.: Cineraria *ovirensis* Koch in der Regensb.

bot. Ztg., *C. crassifolia* Kit. in Spreng. syst. veg., *Senecio ovirens* DC. prodr. — Die Variet. mit schwach-flaumigen und ganz kahlen Fruchtkn. habe ich aus dem Samen ein und derselben Pflanze erzogen. D.

5. *C. SPATHULAEFOLIA* (Gmel.) Spatelblättr. A. — Ebenstrauss endst., einfach; *B.* mit gegliederten, kurzen Haaren spärlich bestreut und zugleich oberseits spinnwebig-flockig, *unterseits weisswollig, die untersten eyf., an der Basis fast abgeschnitten, gekerbt oder gezähnt, die folgenden eyf.-länglich, in den breit-geflügelten, keiligen Bstiel zsggezogen*, die oberen sitzend, lanzettl. und lineal.; HK. wollig; *Fruchtkn. dicht und kurz-steifh.*; *Pappus während der Bthzeit ohngefähr so lang, als die Bth.* 4. An gebirgigen, waldigen, rauhen O., (Schweiz, Schwäbische A., dch das Rheingebiet stw. bis Coblenz, im Mainthale bis Würzburg, in Thüringen und im Baireuth. Gebirge.) Mai. Bth. gelb. *C. spathulaefolia* Koch. bot. ztg. Rb. ic. f. 240. *C. longifolia* St. h. 40. *C. integrifolia* Wallr. *C. campestris* DC. Fl. fr. und dessen Herbar. nach Gaud. *Senecio spathulaefolius* DC. prodr. *Senecio memorensis* Pollich pallat. Die *Cineraria tenuifolia* Gaud. helv. unterscheidet sich nach einem Expl. von Thomas nicht als besondere Art. Var.:

β. discoidea: ohne Strahl, und

γ. lejocarpa, Fruchtkn. kahl. Ich habe diese aus den östr. A. Sie untersch. sich von *Cineraria alpestris* Variet. *α.* dch den Pappus, welcher so lang ist, als die Blkr., nach dem Verblühen aber etwas länger.

6. *C. CAMPESTRIS* (Retz.) Feld-A. — Ebenstrauss endst., einfach; *B.* fast glatt, spinnwebig-wollig, *die wurzelst. eyf. oder rundlich, in den kurzen Bstiel zsggezogen*, ganzrandig oder etwas gekerbt, die untern stengelst. länglich, nach der Basis verschmälert, die obersten lanzettl.; HK. fast kahl, an der Basis wollig, *an der Spitze meist ungefleckt*; *Fruchtkn. dicht und kurz steifh.*; *Pappus während der Bthzeit ohngefähr so lang, als die Bth.* 4. An sonnigen, kalkhaltigen Hügeln und auf trocknen Wiesen, (im Littor. bei Triest, Steyerm., Unteröstr., Böhm., Thüring., nach Gaud. auf den A. des Wallis.) Jun. Jul. Bth. hellgelb. *C. integrifolia* Smith. *C. integrifolia β. pratensis* J. a. t. 180. L. syst. veg. und des Linn. Herbar. nach Smith. *C. alpina γ. integrifolia* L. spec. *C. alpina* Huds. *C. campestris* Spreng. Wallr. *Senecio campestris* DC. prodr. — Untersch. sich dch die meist kurzgestielten WB. und *bleichen Köpfschen*, und den meist ungefleckten HK. Var.

β. papposa, Achenen kahl: *C. papposa* Reichenb. ic. fig. 238. *Senecio papposus* Lessing in der Linnaea, DC. prodr.

7. *C. AURANTIACA* (Hoppe.) Pomeranzenfarbige A. — Ebenstrauss endst., einfach; *B.* fast glatt, *spärlich-wollig, die wurzelst. eyf., in den kurzen Bstiel zsggezogen*, ganzrandig oder etwas gekerbt, die untersten stengelst. lanzettl., nach der Basis verschmälert, die oberen lineal.; *der St. oberwärts wegen der*

entfernten *B. fast nackt*; *HK. gefärbt*; Fruchtkn. dicht und kurzsteifh.; Pappus während der Bthzeit so lang, als die Bth. 4. Am Fusse der A., (Tyrol, Kärnth., Steyerm., Böhm., Schw.) Mai-Jul. *Senecio aurantiacus* DC. prodr. var. *a. Bth. roth-pomeranzenfarbig*. Pflanze schlank, dch verlängerten, oberwärts fast nackten St., *B. von einer dünnen Substanz, kurz-gestielt*. — *C. aurantiaca* Willd.; im Herbar. vermischt mit der Variet.: *D.*

β. lanata, *B. kurzh.-rauh* und wollig, die wurzelst. eyf., in den Bstiel zsggezogen, etwas gekerbt, die untern stengelst. länglich-eyf., nach der Basis verschmälert, die obersten lanzettl.; *HK. gefärbt*; *C. capitata* Koch Synops. ed. 1., Reichenb. ic. 2. f. 243. *Senecio aurantiacus γ. tomentosus* DC. prodr. Diese Variet. kommt auch vor:

γ. discoidea, ohne Strahl, Rehb. ic. 2. f. 244. *C. capitata* Wahlenb. carp.

8. *C. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-A. — Zottig; der St. oberwärts ästig; Aeste ebensträussig; *B. lanzettl.*, halbstengelumfassend, die untern *buchtig-gezähnt*. ☉. An sumpfigen, schlammigen O., (von den Niederlanden dch Westphalen, Hanov. und dch g. D. nördlich des Thüring. Waldes bis Schles.) Jun. Jul. Schk. t. 246. *Senecio palustris* DC. prodr. *Bth. hellgelb.* *D.*

43. *LIGULARIA* (Cass. Arten von *Hoppia* Rb.) Ligularie. — *HK. an der Basis mit 2 gegenst. verlängerten Deckblättchen*. Der Gf. oberwärts, so wie die N. von der Basis bis zur Spitze, dicht-fläumlich. Ansätze von Stbg. an den randst. Bth. Sonst Alles wie bei *Senecio*.

1. *L. SIBIRICA* (Cass.) Sibirische L. — *B. fast pfeil.-herzf.*, gezähnt; Traube endst., einfach. 4. Auf sumpfigen Wiesen, (bisher bloss bei Münchengrätz bei dem Forsthause Reckow in Böhmen, nach Sekera und bei Habstein in Böhmen, Tausch.) Jun. Jul. *Cineraria sibirica* L. W. und K. t. 15 *Hoppea sibirica* Reichenb. fl. exc. Aber „2lippig strahlende“ Randbth. sah ich noch nicht, obgleich ich sehr viele Expl. untersuchte. *Bth. gelb.* *D.*

44. *SENECIO* (L.) Kreuzwurz. — *HK. walzlich oder kegelf.*; Blättchen gleich, Ireihig; an der Basis mit einem Aussenk. von meist kleinern Blättchen. *Bth. des Mittelfeldes zwitterig, röhrig*; Saum 5zählig. Der Gf. oberwärts kahl; die N. halbstielrund, abgeschnitten-kopfig, nach dem Ende dichter fläumlich. Die randst. Bth. weiblich, zungenf.; seltner alle Bth. zwitterig und röhrig. Achene schnabellos, ungeflügelt, gefurcht. Pappus behaart, der der randst. Achenen ofters hinfällig. Fruchtb. nackt. — *Bth. unserer Arten gelb*; bei *S. Cacaliaster* gelblichweiss.

§. 1. *Bth. sämmtl. röhrig, oder die randst. zurückgerollte Zungenbth.*

1. *S. VULGARIS* (L.) Gemeine K. — *B. kahl oder spinnwebig-wollig, fiedersp.*, die untern in den Bstiel verschmälert, die obern

mit geöhreter Basis stengelumfassend: Fieder entfernt, länglich, stumpf, nebst der Spindel und den Oehrchen spitz-ungleich-gezähnt; Schuppen des Aussenkelches meist 10, angedrückt, viel kürzer, als der HK., lang-schwarz-gespitzt; die randst. Zungenbth. fehlend; Achenen flüml. ☉. Auf kultiv. und sandigen Boden überall. Blüht fast das ganze Jahr hind. Fl. dan. t. 513. Var. ganz spinnwebig-wollig, und ferner:

β. *radiatus*. Köpfchen strahlend: S. *denticulatus* Müll. fl. dan. t. 791., nach Nolte. (im nördl. Hannover und Holstein.) — Wahlenb. zieht dagegen den S. *denticulatus* Müll. zu einer Variet. oder vielmehr zu sehr kleinen Expl. von S. *sylvaticus* „mit nur buchtig-gezähnten B.“

2. S. *viscosus* (L.) Klebrige K. — B. tief-fiedersp., nebst den Bthstielchen und den HK. *drüsig-haarig, klebrig*; Fieder länglich, ungleich-gezähnt und fast fiedersp., nach der Basis allmählig an Grösse abnehmend; AussenK. locker, halb so lang, als der HK.; Zungenbth. zurückgerollt; Achenen kahl. ☉. An sandigen O., in Laubwäldern. Jun.-Oct.

3. S. *sylvaticus* (L.) Wald-K. — B. spinnwebig-flaumig, tief-fiedersp.; Fieder fast lineal., gezähnt od. fast fiedersp., die dazwischen gelagerten kleiner; Ebenstrauss weitschweifig, gleichhoch; HK. kahl oder flaumig; AussenK. sehr kurz, angedrückt, meist ungesleckt; Zungenbth. zurückgerollt; Achenen grau-flaumig. ☉. In sandigen Wäldern. Jul. Aug. — S. *lividus* Nolt. Smith, (nicht L., nach Meyer in der chlor. hannov.) ist eine mit Oehrchen an der Basis versehene Variet. von S. *sylvaticus*, aber die B. des letztern sind bei uns immer mehr oder weniger behaart.

§. 2. Bth. des Strahles abstehende Zungenbth. B. eingeschnitten, fiedersp. oder herzf. und an der Basis leyerf.

4. S. *vernalis* (W. und Kit.) Frühlings-K. — Der St. wollig; B. beiderseits von abstehenden Haaren zottig, länglich, fiedersp.-buchtig, die untern gestielt, die übrigen mit geöhreter, gezähelter Basis stengelumfassend; Fieder eyf., stumpf, nebst der Spindel und dem Rande kraus und gezähnt; Ebenstrauss locker; AussenK. 6-12blättrig, 4mal kürzer, als der HK. und nebst den Deckblättern an der Spitze lang-schwarz-zugespitzt; Strahl abstehend; Achenen grau-flaumig; Pappus bleibend. ☉. Auf Lettenboden, (bisher bloss in Schles., zuerst im Jahre 1822 bei Rosenberg, dann um Stremplowitz bei Troppau beobachtet, im Jahre 1835 zum Theil zahlreich an verschiedenen O. um Breslau, Opeln und Ober-Glogau, seitdem aber wieder verschwunden.) Apr. Reichenb. ic. 4. f. 513. D.

5. S. *nebrodensis* (L. spec. 1217., nach dem Herbarium Linné's) Nebrodensische K. — B. kahl oder etwas wollig, die untern längl.-verkehrt eyf., leyerf., gestielt, die stengelst. mit einem gezähnten Oehrchen stengelumfassend, die mittleren fiedersp.; Fieder länglich, stumpf und nebst der Spindel gezähnt, die vorderen zsfliessend; Ebenstrauss locker; Aussen-K. 6-12blättrig,

4mal kürzer, als der HK. und nebst den Deckblättern an der Spitze lang-schwarz-gespitzt; Strahl abstehend; Achenen grau-flaumig; Pappus hinfällig. ☉. Auf Kalkfelsen; in die A. hinaufsteigend, (Tyrol, Salzburg, Steyer., Unteröstr., Istrien, Veldin.) Mai-Jul. *S. rupestris* Waldst. und Kit. pl. rar. h. 2. t. 128., Koch Synops. ed. 1., Reichenb. ic. 4. f. 514. *S. rupestris* und *S. montanus* Willd. sp., *S. paradoxus* Hoppe bei Willd., *S. laciniatus* Bertol. amoen. ital. — Die Beschreibung Linne's von *Senecio nebrodensis* passt nicht auf alle Theile unserer Pfl., aber nach DeCandolle prodromus liegt doch die hier beschriebene Art unter dem erwähnten Namen in Linne's Herbarium. — Unsere Pflanze ist in den Gärten jährig und besitzt eine absteigende, weisse, ästig-faserige W.; die Abbildung in Waldst. und Kit. pl. rar. stellt ein wagrechtes schwärzliches Rhizom von der Dicke des kleinen Fingers dar, welches hinten in eine lange, dünne, einfache, niedersteigende W. endigt, u. die Verf. selbst nennen die W. perennirend. Doch kann ich die Expl. aus den Alpen des Bannates und aus den Nebroden nicht von unserer Art unterscheiden.

6. *S. SQUALIDUS* (L.) Schmutzige K. — *B.* kahl oder zottig-wollig, fiederth., die untern gestielt, die mittleren mit einem vielth. Ohrchen stengelumfassend; Fieder lineal. und nebst der Spindel fast fiedersp.-gezähnt, sämmtlich entferntstehend; Ebensträusse zerstreut, armblüthig; AussenK. meist 1blättrig und nebst den Deckblättern an der Spitze brandfleckig; Strahl abstehend; Achenen grau-flaumig. ☉. Auf Aeckern, Weinbergen, an Mauern, (im Littor.) Jun. Jul. *S. chrysanthemifolius* Poiret. Dict., DC. prodr.

7. *S. ABROTANIFOLIUS* (L.) Stabwurzblättr. K. — *B.* kahl, die untern doppeltgefiedert; Fieder schmal, lineal., ganzrandig, seltener Izhnig, die der Basis kleiner; Bstiel öhrchenlos, fiedersp.-gezähnt, Zähne lineal.-pfriemlich; Spindel ganzrandig; Ebenstrauß 3-6köpfig; AussenK. halb so lang, als der HK.; Strahl abstehend; Achenen kahl; Pappus bleibend. ☉. Auf den kalkhalt. A. und VorA., (vom Innthale in die Schw. dch Tyrol, Salzburg, Steyer., Kärnth. bis nach Oestr.) Jul. Aug. J. a t. 79. St. h. 21.

8. *S. ERUCIFOLIUS* (L. nach Expl. von den von L. angegebenen StandO.) Rankenblättr. K. — *B.* fiederth., die untern gestielt, die übrigen sitzend; Fieder lineal., gezähnt und fiedersp., die der Basis kleiner, ganzrandig, öhrchenf.; Spindel ganzrandig; Ebenstrauß vielköpfig, gedrängt; AussenK. mehrblättrig, gedrückt, halb so lang, als der HK.; Strahl abstehend; Achenen haarig-rauh, sämmtl. mit gleichf. Pappus; W. kriechend. ☉. Auf buschigen, kräuterreichen Hügeln, an Wegen und Wiesengebüsch, auf Thon- und Kalkboden. Jul. Aug. *S. erucifolius* Huds. Rb. ic. 4. f. 516., Pollich und der meist. deutsch. Autoren. *S. tenuifolius*. J. a. t. 278., ein Expl. mit schmal-zerschlitzen B. *B.* unten oder beiderseits zerstreut-wollig. — Der *erucifolius* L. schien Smith. zu *S. lividus* zu gehören; Rb. findet ihn im *S. na-*

pifolius Schrad., (*S. lycopifolius* Desf.,) wovon ich noch kein deutsch. Expl. sah.

9. *S. JACOBAEA* (L.) Jacobs - K. — Die W- und untern StB. gestielt, länglich-verkehrteyf., an der Basis verschmälert, leyerf., die übrigen stengelst. mit einem vielth. Oehrchen stengelumfassend, fiederth.; Fieder gezähnt oder fast fiedersp., vorne 2sp., Zpfl auseinanderfahrend; Spindel ganzrandig; Aeste des Ebenstraußes aufrecht; AussenK. meist 2blättrig, sehr kurz, angedrückt; Strahl abstehend; Achenen des Mittelfeldes haarig-rauh, die des Randes kahl, diese mit wenigbehaartem, hinfälligem Pappus; W. abgebissen, faserig. ☉. Auf Wiesen, an unkultiv., waldigen O. Jul. Aug. B. kahl oder an der Basis etwas wollig. Var.:

β. *discoideus*, Strahl fehlend: *S. Jacobaea* γ. Wimm. und Grab.

10. *S. AQUATICUS* (Huds.) Wasser-K. — Die W- und unteren StB. gestielt, länglich-eyf., an der Basis verschmälert, ungeth. od. fast leyerf., die übrigen stengelst. mit einem getheilten Oehrchen halbstengelumfassend, an der Basis eingeschnitten oder leyerf., die seitenst. Fieder länglich oder lineul., schief aus der Mittelrippe ausgehend, der endst. eyf.-länglich, gezähnt oder fast lappig, die oberen B. fiedersp. oder ungeth., gezähnt; Ebenstrauß aufrecht-abstehend, locker; AussenK. meist 2blättrig, angedrückt, sehr kurz; Strahl abstehend; Achenen des Mittelfeldes schwach-fläumlich, die des Randes kahl, diese mit wenig-behaartem, hinfälligem Pappus. ☉ Auf feuchten Wiesen, (stw. dch das g. G.) Jul. Aug. *S. aquaticus* Engl. bot. t. 1131.; grössere Expl. stellen den *S. barbareaefolius* Reh. dar. Köpfchen fast noch einmal so gross, als bei der vorhergehenden, die Pflanze meist niedriger, oft nur eine Spanne hoch.

11. *S. ERRATICUS* (Bertolon.) Spreitzende K. — B. leyerf., die untern gestielt, die übrigen mit einem getheilten Oehrchen halbstengelumfassend; Fieder gezähnt, meist zu 5, die seitenst. weit abstehend, verkehrteyf.-länglich, der endst. der WB. sehr gross, herz-eyf., der der obern keilig; Ebenstrauß spreitzend, locker; AussenK. meist 2blättrig, angedrückt, sehr kurz; Strahl abstehend; Achenen des Mittelfeldes kahl oder schwach-fläumlich, die des Randes kahl, diese mit wenigbehaartem, hinfälligem Pappus. ☉. Auf feuchten Wiesen, an Ufern, Gräben, (im südl. Tyrol, Krain, sodann am Ufer der Oder in Schles. und bis Frankf. an der O.) Jul. Aug. Rb. ic. 4. f. 538. Zu dieser, und nicht zur vorhergehenden Art gehört *S. barbareaefolius* Krocke nach Wimmer und Bueck, ich wollte jedoch den bereits zweifelhaft gewordenen Namen nicht voranstellen.

11. *S. LYRATIFOLIUS* (Rb. ic. 2. f. 238.) Leyerf. blättr. K. — B. unterseits dünn-spinnwebig-filzig, leyerf., mit vielth. Oehrchen halbstengelumfassend, die Seitenlappen länglich, gezähnt-gesägt, der endst. sehr gross, geschärft-doppeltgesägt oder an der Basis fast fiedersp.-eingeschnitten, der der StB. eyf., der obersten länglich; Strahl abstehend; Achenen fläumlich. 4. In den Thälern

der höhern A., (dch die g. AK. hin und wieder.) Jul. Aug. S. alpinus L. fil. mit Ausschl. des Syn. Haller's. Cineraria alpina β . alata L. C. Zahlbruckneri Host. Mir scheint es, dass die Achenen manchmal kahl werden, was an den StandO. genauer zu untersuchen ist.

13. S. CORDATUS (Koch.) Herzblättr. K. — B. unterseits dünnspinnwebig-filzig, gestielt, *herzf.*, *eyf.*, $1\frac{1}{2}$ mal so lang, als breit, ungleich-gezähnt; Bstiel mit einem Anhängsel oder nackt, die obersten B. lanzettl.; Bstiel schmal, ganzrandig, an der Basis etwas geöhrelt; Ohrchen kurz, kaum halbstengelumfassend; Strahl abstehend; Achenen kahl. 4. Auf Triften der A. und an Waldrändern der VorA., (dch die g. AK.) Jul. Aug. S. alpinus Rb. ic. 2. f. 256. (mit Ausschl. des Syn. Scop. u. L.) Cineraria cordifolia Gouan, Linn. Sohn. u. J. a. t. 176. (Abbildg nicht gut.) Den Namen habe ich verändert wegen des Senecio cordifolius Thunb. Senecio alpinus Scop. wird unrichtiger Weise von DeCandolle u. Anderen zu unserer Pfl. gezogen, denn Scopoli beschreibt unter seinem Senecio alpinus die Cineraria crispa und noch 2 andere Arten von Cineraria.

14. S. SUBALPINUS (Koch.) Voralpen-K. — B. kahl, unterseits auf den Adern kurzh., *herzf.*, *so breit als lang*, gezähnt, gestielt, Bstiel nackt oder der der obern B. mit einem Anhängsel; die obersten B. lanzettl., eingeschnitten-gezähnt oder ungeth., Bstiel derselben breit-geflügelt, an der Basis geöhrelt, stengelumfassend; Strahl abstehend; Achenen kahl. 4. Auf feuchten Wiesen der A. und VorA.-Regionen, (Steyerm., Oestr. und in Schles. daselbst auf dem Baranja, Dominowka und Babia Gora im Teschnischen.) Jul. Aug. S. alpinus β . auriculatus Rb. ic. 2. f. 257. Cineraria cordifolia auriculata J. a. t. 177. mit Ausschl. des WB., was gewiss dieser Art nicht angehört. C. alpina Host. D.

15. S. CARNIOLICUS (Willd.) Krainer K. — B. von angedrücktem, fast seidenh. Filze grau, zuletzt kahl werdend, die W. und untern StB. lang-gestielt, eingeschnitten-gekerbt oder fiedersp.; Fieder stumpf, ganzrandig und gekerbt, die oberen B. kurzgestielt, *öhrchenlos*; Fieder lineal., spitz; Strahl abstehend; Achenen kahl. 4. An kiesigen O. der höhern GranitA., (Tyrol, Salzburg, Kärnth., Krain, Steyerm.; in der Schw. bisher blos auf d. Fluela in Graubünden.) Jul. Aug. S. incanus Scop., nicht L. Nach v. Salis Beobachtungen ist jedoch diese Art eine Variet. von Senecio incanus Linn.

16. S. INCANUS (L.) Graue K. — B. von wolligem Filze schneeweiß, die wurzel- und untern stengelst. eyf., fiedersp., Fieder stumpf, eingeschnitten-2-3fachgekerbt; die oberen B. kurzgestielt, *öhrchenlos*, Fieder lineal., spitz; Ebenstrauß dicht; Strahl abstehend; Achenen kahl. 4. An kiesigen O. der höchsten A., (Tyrol und Schw.) Jul. Aug.

17. S. UNIFLORUS (All.) Einblüthiger K. — B. schneeweiß-filzig, die wurzel- und untern stengelst. eyf., eingeschnitten-ge-

kerbt, die obern lineal., ganzrandig: *der St. einköpfig; Achenen fläumlich*. 4. Auf den höchsten A. im Wallis. (auf dem Stock, Fouly, Matterhorn u. a.) Jul. Aug. Allion und Lagger halten den *S. uniflorus* für eine einköpfige Variet. des *Senecio incanus*. S.

§. 2. Bth. des Randes zungenf., abstehend, seltener als Var. sämmtl. Bth. röhrlig, abstehend; B. gesägt oder ganzrandig. (weder eingeschnitten noch zertheilt.)

18. *S. CACALIASTER* (Lam.) Pestwurzartige K. — *B. elliptisch-lanzettl.*, zugespitzt, ungleich-gezähnt-gesägt, *Spitzchen der Sägezähne gerade*, die untern B. kurz-herablaufend, die obern sitzend; Deckblätter lineal.; Ebensträusse vielköpfig; *Strahl fehlend*. 4. Auf den VorA., (im südl. Tyrol weit verbreitet.) Jul. Aug. *Cacalia saracenic* L. *S. croaticus* W. Kit. *Bth.* weiss oder gelblich-weiss., wie sie auch Kit. beschreibt. AussenK. von der Länge des HK. Die lebende Pfl. unterscheidet sich ausser der Bthfarbe noch dch Folgendes von *Senecio nemorensis*: der St. ist deutlicher und tiefer gerillt; vom Mittelnerven des B. und vom Blattkissen nämlich laufen drei starke Nerven hinab, welche zwei dazwischen liegende und tiefe Rinnen einschliessen, die gleichsam aus einer tiefen, an der Basis des B. gelegenen Grube hervortreten; überdies laufen noch die Ränder des B. mit hinab, jedoch mit einem feineren Riefen. Bei *Senecio nemorensis* treten blos die von den Rändern des B. hinablaufenden Riefen hervor, und die, welche zwischen diesen liegen, sind viel unmerklicher; allein bei der getrockneten Pfl. zeigen sich nun alle diese Riefen deutlich, und damit verschwindet dann dieses Unterscheidungszeichen. — Die Pfl., welche Funk auf den Rauriser Tauern gefunden (nicht auf den Radstadter Tauern, wie ich irrig angeführt), wird von Hoppe in der Regensb. bot. Ztg. für eine Varietas discoidea des *Senecio Fuchsii* erklärt. D.

19. *S. NEMORENSIS* (L.) Hain-K. — *B. elliptisch-lanzettl. oder eyf.*, kahl, oder unterseits flaumig, ungleich gezähnt-gesägt, mit *geradem Spitzchen der Sägezähne*, die untern in einen geflügelten Bstiel zsggezogen, die oberen sitzend, oder sämmtlich gestielt; Ebenstrauss vielköpfig; Deckblättchen lineal. od. lanzettl.-lineal.; *der AussenK. 3-5 blättrig*, so lang als der HK.; Strahl 5-8 blüthig; Achenen kuhl. 4. In waldigen Gegenden der niedern Gebirge und VorA. Jul. Aug. Nach Vergleichung unzähliger frischer und getrockneter Expl. aus verschiedenen Gegenden führe ich nun die folgenden Variet. auf, welche sicher dch Mittelformen in einander übergehen:

α. genuinus; Köpfchen breiter, 5-6 Zungenbth.: *S. nemorensis* Willd. sp. pl., Koch Syn. ed. 1, wo die duftende Varietät mitbegriffen ist; *S. frondosus* Tausch. pl. sel. *S. germanicus* Wallr. in d. Linnaea.

β. odoratus; Köpfchen stärker duftend, als bei der Var. *α.*, aber, für mich wenigstens, nicht angenehm; ausserdem dch nichts von der Var. *α.* zu unterscheiden: *S. nemorensis* Jacq. austr. 2. t. 184. *S. Jacquinianus* Reichenb. ic. 3. p. 80, DC. prod., *S. fontanus* Wallr. in d. Linnaea nach dem Synonym Reichenbachs.

γ. octoglossus; Köpfchen mit 7-8 Zungenbth., übrigen der Variet. *α.* ganz ähnlich: *S. octoglossus* DC. prodr., *S. nemorensis* Ledeb. fl. alt., Reichenb. ic. 3. f. 467.

ε. Fuchsii; B. oft gestielt, Köpfchen schmaler, DeckB. oft lineal.-borstlich, 5-6 Zungenbth.: *S. Fuchsii* Gmel. bad. und *S. nemorensis* Gmel. bad., Koch Synops. ed. I., *S. ovatus* Willd. sp. (dieser besteht aus breitblättrigen Expl.), *S. saracenicus* Pollich palat., *S. saracenicus* Wallr. in d. Linnaea, *S. salicifolius* Wallr. sched. (schmalblättrige Expl.) *S. alpestris* Gaud. helv. — Alle hier aufgezählten Variet. haben keine kriechende W.

20. *S. SARACENICUS* (L.) Saracenische K. — B. ziemlich kahl, länglich-lanzettl., sehr spitz, an der Basis keilig, die untersten in den geflügelten Bstiel verschmälert, die übrigen mit breiter Basis sitzend, sämmtl. ungleich-gezähnel- gesägt, *Spitzchen der Sägezähne vorwärts-gekrümmt*; Ebenstrauss vielköpfig; Deckblätter lanzettl.-lineal.; *AussenK. 5blättrig, ungefähr so lang, als der HK*; Strahl 7-8 blüthig; Achenen kahl. 4. An feuchten Hecken und in Weidenbüsch an Flussufern, (am Ufer des Mains von Kitzingen bis Mainz, der Mosel von Trier bis Koblenz und weiter am Unterrheine; am Donauufer von Regenbg bis Wien; am Ufer der Moldau in Böhmen; der Elbe bis Holstein; der Oder in Schles. bis Frankf.; der Weser und Leine im Hessischen und Hannöverschen.) Jul. Aug. J. a. t. 186. Rb. ic. 3. f. 468. Diese Art ist sicherlich Linne's *S. saracenicus*, wegen „der sehr stark kriechenden W.“ *S. fluviatilis* Wallroth in d. Linnaea. D.

β. flosculosus; Köpfchen ohne Zungenbth.: *S. saracenicus β. flosculosus* DC. prodr. mit Ausschluss des *S. croaticus* als Synonym. (bei Hamburg, Sonder.) — Die W. treibt weit und breit umherlaufende kriechende Läufer. Nach meinem Urtheil ist jederzeit diejenige die echte Pflanze, welche der Autor beschrieben hat. Linne aber sagt von seinem *S. saracenicus*, er werde dch sein Ansehen, die breiten B., die Grösse und die sehr weit kriechende W., (radice maxime repente) unterschieden.

21. *S. DORTA* (L.) Hohe K. — B. ganz kahl, in's Meergrüne ziehend, klein-gesägt oder fast ganzrandig, länglich, die untersten in den Bstiel verschmälert, die mittleren sitzend, fast herablaufend, die obersten sehr verkleinert, eyf., verschmälert-zugespitzt; Ebenstrauss vielköpfig; *Deckblätter aus eyf., fast herzf. Basis lineal.-pfriemlich*; *AussenK. sehr kurz*; *Strahl 5blüthig*; Achenen fläumlich. 4. Auf Wiesen, Triften und kräuterreichen Hügeln, (Unteröstr.) Jul. Aug. J. a. t. 185. D.

22. *S. PALUDOSUS* (L.) Sumpf-K. — B. sitzend, verlängert-lanzettl., verschmälert-spitz, *geschärft-gesägt*, kahl oder unterseits filzig; Ebenstrauss vielköpfig; *Strahl meist 13blüthig*; *AussenK. meist 10 blättrig*, halb so lang als der HK.; Achenen fläumlich. 4. Auf sumpfigen Wiesen, in Gräben, Teichen, langsam fließenden Flüssen, (stw. dch das g. G.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 385. Bth. gelb oder goldgelb. Var.:

β. glabratus, B. beiderseits kahl: *S. bohemicus* Tausch. pl. select. Dieser in Böhmen und Steyer.

γ tomentosus, B. unterseits dicht- und schneeweiss-filzig: *S. Sadleri* Lang. Sadl. fl. pesth.

23. *S. DORONICUM* (Linn. spec. 1222.) Gebirgs-K. — *B. lederig*, von sehr kurzen Härchen etwas rauh, und zugleich wollig oder ohne Wolle, die untern längl.-lanzettl. gezähnt oder gezähnelt, gestielt, die untersten oft eyf., die obern lanzettl. sitzend; *St. 1-3köpfig*; *HK. ziemlich kahl oder etwas wollig*; *AussenK. vielblättrig, so lang als der HK.*; *Strahl viele Zungenbth. enthaltend.* 4. An steinig. O. der A. und VorA. (in der Schw. u. dch Tyrol nach Salzb., Kärnth. und Krain.) Jul. Aug. Jacq. Austr. app. t. 45. Bth. goldgelb oder pomeranzengelb. Var. nach Facchini's Beobachtung mit 6-10köpfigem St.

24. *S. LANATUS* (Scopol. fl. carn. 2. p. 165. 1772.) Wollige K. *B. krautartig-weich*, wollig oder fast kahl, die untern spatelig-eyf., gezähnelt, gestielt, die obern lanzettl., sitzend; *St. einköpfig*; *HK. dichtwollig*; *AussenK. vielblättrig, so lang als der HK.*; *Strahl mit vielen Zungenbth.* 4. Auf Bergen, auch niedriger des östr. Littorale, (dch das g. Karstgebirge und bis in die Nähe von Triest.) Mai. Jun. *S. arachnoides* Sieber pl. rar. 1812 nach Reichenb. fl. exc. unter *Cineraria arachnoidea*. *S. arachnoides* DC. prodr. *S. Scopolii* Hoppe und Hornsch. Decad. *S. Doronicum β.* Koch Synops. ed. 1. *Arnica lanigera* Ten. Syllog. — Bth. citronengelb.

Register

über die

Namen der Ordnungen und Gattungen, die
in diesem Bande enthalten sind.

Abutilon 153.	Anthemis 436.	Bifora 374.
Acer 157.	Anthriscus 366.	Biscutella 81.
Acerineen 157.	Anthyllis 185.	Bonjeania 208.
Achillea 431.	Apium 330.	Brassica 62.
Aconitum 27.	Aquilegia 24.	Braya 57.
Actaea 29.	Arabis 43.	Bryonia 294.
Adenostyles 405.	Araliaceen 374.	Buffonia 124.
Adonis 11.	Archangelica 352.	Bulliarda 300.
Adoxa 377.	Aremonia 260.	Bunias 87.
Aegopodium 333.	Arenaria 135.	Bunium 334.
Aesculus 159.	Arnica 446.	Bupthalmum 414.
Aethionema 85.	Aronia 277.	Bupleurum 337.
Aethusa 343.	Aronicum 445.	Cacteen 309.
Agrimonia 259.	Artemisia 425.	Caesalpinieen 240.
Agrostemma 124.	Asperula 380.	Cakile 88.
Alchemilla 272.	Aster 408.	Calepina 87.
Alsine 130.	Asteriscus 415.	Callitriche 288.
Alsineen 124.	Astragalus 215.	Callitrichineen
Althaea 151.	Astrantia 327.	287.
Alyssum 67.	Athamanta 347.	Caltha 22.
Ammi 333.	Atragene 3.	Camelina 77.
Ampelideen 159.	Balsamineen 166.	Capparideen 89.
Ampelopsis 159.	Barbarea 42.	Capparis 90.
Amygdaleen 241.	Bellidiastrum 410.	Caprifoliaceen
Amygdalus 241.	Bellis 410.	376.
Anacyclus 439.	Berberideen 30.	Capsella 84.
Androsaemum 154.	Berberis 30.	Cardamine 49.
Anemone 8.	Berula 337.	Carpesium 421.
Anethum 357.	Biasoletia 370.	Carum 333.
Angelica 351.	Bidens 420.	Caucalis 364.

- Celastrineen 170.
 Centranthus 393.
 Cephalaria 397.
 Cerastium 140.
 Ceratocephalus 12.
 Ceratonia 240.
 Ceratophylleen 289.
 Ceratophyllum 289.
 Cercis 241.
 Chaerophyllum 369.
 Cheiranthus 39.
 Chelidonium 34.
 Cherleria 134.
 Chrysanthemum 440.
 Chrysosplenium 325.
 Cicer 224.
 Cicuta 329.
 Cimicifuga 29.
 Cineraria 446.
 Circaea 285.
 Cistineen 90.
 Cistus 90.
 Clematis 2.
 Clypeola 70.
 Cnidium 346.
 Cochlearia 75.
 Colutea 211.
 Comarum 250.
 Compositen 404.
 Conioselinum 349.
 Conium 372.
 Coriandrum 374.
 Coroneen 375.
 Cornus 375.
 Coronilla 220.
 Corrigiola 297.
 Corydalis 35.
 Cotoneaster 275.
 Cotula 431.
 Crambe 89.
 Crassula 300.
 Crassulaceen 299.
 Crataegus 275.
 Crithmum 349.
 Crucianella 382.
 Cruciferen 38.
 Cucubalus 115.
 Cucumis 294.
 Cucurbita 293.
 Cucurbitaceen 293.
 Cydonia 276.
 Cytisus 179.
 Daucus 363.
 Delphinium 25.
 Dentaria 52.
 Dianthus 109.
 Dictamnus 169.
 Diplotaxis 65.
 Dipsaceen 396.
 Dipsacus 397.
 Doronicum 443.
 Dorycnium 207.
 Draba 71.
 Drosera 103.
 Droseraceen 103.
 Dryas 246.
 Drypis 124.
 Echallion 294.
 Echinophora 372.
 Elatine 145.
 Elatineen 144.
 Epilobium 280.
 Epimedium 31.
 Eranthis 22.
 Erigeron 411.
 Erodium 165.
 Eruca 66.
 Erucastrum 64.
 Eryum 231.
 Eryngium 328.
 Erysimum 58.
 Enclidium 86.
 Eupatorium 404.
 Evax 414.
 Evonymus 170.
 Facchinia 129.
 Falcaria 332.
 Farsetia 69.
 Ferulago 352.
 Filago 421.
 Foeniculum 343.
 Fragaria 248.
 Fumaria 37.
 Fumariaceen 35.
 Galatella 410.
 Galega 211.
 Galinsoga 419.
 Galium 383.
 Gaya 349.
 Genista 176.
 Geraniaceen 159.
 Geranium 160.
 Geum 246.
 Glaucium 34.
 Glycyrrhiza 210.
 Gnaphalium 422.
 Granateen 279.
 Grossularieen 310.
 Gypsophila 107.
 Hacquetia 327.
 Halianthus 129.
 Haloragaceen 286.
 Haleria 375.
 Hedysarum 223.
 Helianthemum 91.
 Helianthus 420.
 Helichrysum 425.
 Helleborus 22.
 Helosciadium 331.
 Heracleum 358.
 Herniaria 297.
 Hesperis 53.
 Hibiscus 152.
 Hippocastaneen 158.
 Hippocrepis 222.
 Hippurideen 287.
 Hippuris 287.
 Holosteum 136.
 Homogyne 405.
 Hugueninia 57.
 Hutchinsia 84.
 Hydrocotyle 326.
 Hypecoum 35.
 Hypericineen 154.
 Hypericum 154.
 Iberis 80.
 Illecebrum 298.
 Impatiens 166.
 Imperatoria 356.
 Inula 415.
 Isatis 86.
 Isnardia 285.
 Isopyrum 23.
 Kerneria 65.
 Knautia 398.
 Laserpitium 360.
 Lathyrus 233.
 Lavatera 152.
 Lepidium 82.
 Lepigonum 128.
 Levisticum 350.
 Libanotis 345.

- Ligularia 449.
 Ligusticum 348.
 Lineæ 145.
 Linnaea 379.
 Linosyris 407.
 Linum 146.
 Lobularia 69.
 Lonicera 378.
 Loranthaceen 375.
 Loranthus 376.
 Lotus 208.
 Lunaria 70.
 Lupinus 183.
 Lychnis 122.
 Lythrarieen 290.
 Lythrum 290.
 Malabaila 373.
 Malachium 139.
 Malcolmia 54.
 Malva 149.
 Malvaceen 149.
 Matricaria 439.
 Matthiola 38.
 Medicago 186.
 Melilotus 193.
 Mespilus 276.
 Meum 349.
 Micropus 413.
 Moehringia 134.
 Moenchia 139.
 Molopospermum 371.
 Montia 295.
 Myagrum 87.
 Myosurus 12.
 Myricaria 292.
 Myriophyllum 286.
 Myrrhis 371.
 Myrtaceen 292.
 Myrtus 293.
 Nasturtium 39.
 Neslia 87.
 Nigella 24.
 Nuphar 31.
 Nymphaea 31.
 Nymphaeaceen 31.
 Oenanthe 341.
 Oenothera 284.
 Onagrarieen 280.
 Onobrychis 223.
 Ononis 184.
 Opuntia 309.
 Orlaya 363.
 Ornithopus 222.
 Orobus 238.
 Ostericum 351.
 Oxalideen 166.
 Oxalis 167.
 Oxytropis 213.
 Paeonia 29.
 Paliurus 171.
 Pallenis 415.
 Papaver 32.
 Papaveraceen 32.
 Papilionaceen 175.
 Parnassia 104.
 Paronychia 298.
 Paronychieen 296.
 Pastinaca 357.
 Peltaria 70.
 Peplis 291.
 Persica 241.
 Petasites 406.
 Petrocallis 71.
 Petroselinum 330.
 Peucedanum 353.
 Phaca 211.
 Phaseolus 240.
 Philadelphieen 292.
 Philadelphus 292.
 Physocaulus 368.
 Pimpinella 335.
 Pinardia 443.
 Pistacia 174.
 Pisum 233.
 Plenrospermum 372.
 Polycarpon 298.
 Polygala 104.
 Polygaleen 104.
 Pomaceen 274.
 Portulaca 295.
 Portulaceen 294.
 Potentilla 250.
 Poterium 274.
 Prunus 242.
 Ptychotis 332.
 Pulicaria 418.
 Punica 280.
 Pyrus 276.
 Radiola 149.
 Ranunculaceen 1.
 Ranunculus 12.
 Raphanus 89.
 Rapistrum 88.
 Reseda 102.
 Resedaceen 102.
 Rhamneen 171.
 Rhamnus 172.
 Rhodiola 300.
 Rhus 174.
 Ribes 310.
 Rosa 261.
 Rosaceen 244.
 Rubia 382.
 Rubus 247.
 Ruta 168.
 Rutaceen 168.
 Sagina 124.
 Sambucus 377.
 Sanguisorba 273.
 Sanguisorbeen 272.
 Sanicula 327.
 Santolina 431.
 Saponaria 115.
 Sarrhamnus 176.
 Saxifraga 312.
 Saxifrageen 311.
 Scabiosa 400.
 Scandix 366.
 Sclerantheen 299.
 Scleranthus 299.
 Scorpiurus 220.
 Securigera 223.
 Sedum 301.
 Selinum 350.
 Sempervivum 306.
 Senebiera 85.
 Senecio 449.
 Seseli 343.
 Sherardia 380.
 Sibbaldia 259.
 Silaus 348.
 Silene 115.
 Sileneen 107.
 Siler 360.
 Sinapis 64.
 Sison 333.
 Sisymbrium 54.
 Sium 337.
 Smyrnium 373.
 Solidago 413.
 Sorbus 278.
 Spartium 175.
 Spergula 127.

- Spiraea 244.
 Staphylea 170.
 Stellaria 137.
 Stellaten 380.
 Stenactis 411.
 Subularia 78.
 Succisa 399.
 Syrenia 62.
 Tamariscineen 291.
 Tamarix 291.
 Tanacetum 430.
 Teesdalia 80.
 Telekia 414.
 Telephium 296.
 Terebinthaceen 174.
 Tetragonolobus 210.
 Thalictrum 3.
 Thlaspi 78.
 Thysselinum 336.
 Tilia 153.
 Tiliaceen 153.
 Tillaea 299.
 Tommasinia 356.
 Tordylium 359.
 Torilis 365.
 Trapa 286.
 Tribulus 168.
 Trifolium 195.
 Trigonella 192.
 Trinia 330.
 Trochiscanthes 347.
 Trollius 22.
 Tunica 109.
 Turgenia 364.
 Turritis 43.
 Tussilago 406.
 Ulex 175.
 Umbelliferen 326.
 Umbilicus 309.
 Vaillantia 390.
 Valeriana 391.
 Valerianeen 391.
 Valerianella 394.
 Vesicaria 66.
 Viburnum 378.
 Vicia 224.
 Viola 94.
 Violarieen 94.
 Viscum 376.
 Vitis 159.
 Zahlbrucknera 325.
 Zizyphus 171.
 Zygomphylléen 167.

SYNOPSIS

DER

DEUTSCHEN

UND

SCHWEIZER FLORA,

enthaltend

die genauer bekannten phanerogamischen Gewächse,
so wie die cryptogamischen Gefäss-Pflanzen,

welche in

Deutschland, der Schweiz, in Preussen und Istrien

wild wachsen und derjenigen, welche zum Gebrauche der
Menschen in grösserer Menge gebauet werden,

nach dem DeCandollischen Systeme geordnet, mit einer
vorangehenden Uebersicht der Gattungen nach den
Classen und Ordnungen des Linneischen
Systemes,

bearbeitet von

D. WILH. DAN. JOS. KOCH,

Ritter des schwedischen Polarsternordens, des königl. bayer. Ludwigsordens, königl. bayer. Geh. Hofrath, ordentl. Professor der Medicin u. Botanik auf der Universität Erlangen, Director des bot. Gartens daselbst, Mitgliede der königl. Academie der Wissenschaften zu München, der königl. schwedischen zu Stockholm, zu Upsala, der kaiserl. Leopold. Carol., der medicinisch-botan. Gesellschaft zu London, der botan. Gesellschaft zu Regensburg und anderer gelehrten Gesellschaften.

Zweite Auflage.

ZWEITER THEIL.

Leipzig 1846.

Verlag von Gebhardt & Reisland.

COMPOSITEN.

II. Unterordnung. *CYNAROCEPHALEEN*. Vaillant. DC. Fl. fr., Koch Synops. ed. I. Sie machen in Verbindung mit den Gattungen *Calendula* und *Xeranthemum* die V. Gruppe der Compositen in DC. prodr. aus, nämlich:

IV. Gruppe. *CYNAREEN*. Lessing. syn. comp., DC. prodr. Der Gf. der Zwitterbth. an der Spitze unter den Schenkeln knottig-verdickt und oft am Knoten kurz- oder flaumig.

I. Untergruppe. *CALENDULACEEN*. DC. prodr. *Calenduleen* Cassin. mit Anschluss von Gattungen. Lessing syn. comp. HK. vielblüthig. Bth. des Strahles zungenf., weiblich, fruchtbar, Gfl. 2sp., mit verlängerten Schenkeln; Bth. des Mittelfeldes röhrig, zwittrig, fehlschlagend, Gf. an der Spitze in einen Knoten verdickt, kurz-2sp. oder ungetheilt.

45. *CALENDULA*. (Lin. gen. 990.) Ringelblume. — HK. halbku- gelig, Blättchen gleich, 2reihig. Bth. des Randes zungenf., die des Mittelfeldes röhrig., 5sp.

1. *C. ARVENSIS* (L.) Feld-R. — Achenen am Rande ganz, auf dem Rücken weichstachelig, die 3-5 äussersten lineal., geschnä- belt; Schnabel aufrecht, wenige eyf., nachenf., die innern lineal., in einen Ring zsgeskrümmt; B. länglich-lanzettl., etwas gezähnt, die untern an der Basis verschmälert, kurz gestielt, die obern mit abgerundeter Basis halbstengelumfassend; der St. ausgebreitet. ☉. An kultiv. O. und in Weinbergen, (von Basel dch Elsass bis Co- blenz, in manchen Weinbergen in zahlloser Menge; im Moselthale; seltner auf dem rechten Rheinufer und im Neckar- und Mainthale; um Halle, Leipzig und um Prag.) Jul.-Oct. Bth. gelb. — *Calen- dula officinalis* L., St. h. 8., die hie und da dch verschleppten Samen auf Schutthaufen, aber in unserer Flora nirgends wild vor- kommt, unterscheidet sich dch folg.: der St. aufrecht; die untern B. verkehrt-eyf., langgestielt, auch die obern nach der Basis ein wenig schmaler, Bth. noch einmal so gross, oft goldgelb, u. die meisten Achenen nachenf., wenige der innersten lineal., und nur selten ist eine oder die andere der äussern lineal. und geschnä- belt; bei der vorhergehenden fehlen diese niemals.

II. Untergruppe. *ECHINOPSIDEEN*. Lessing. synopsis. Die einblüthigen HK. in ein kugeliges Köpfchen zsgestellt.

46. *ÉCHINOPS* (L.) Kugeldistel. — Der Pappus besteht in kurzen, freien oder mehr oder weniger in ein Krönchen verwachsenen Borsten.

1. *E. SPHAEROCEPHALUS* (L.) Rundköpfige K. — B. oberseits von etwas klebrigen Haaren flaumig, unterseits wollig-filzig, graulich, die Zpfl längl.-verkehrt-eyf., buchtig, dörnig-gezähnt; HK. an der Basis borstig, Borsten länger, als die halbe Länge desselben, *die äussern Blättchen desselben drüsig-haarig; Strahlen des Pappus nur an der Basis verwachsen.* 2. In Weinbergen, an steinigem O., (in Schwaben, in den um die alte Burg Fahrenberg bei Burgheim gelegenen Weinbergen häufig; am nördl. Fusse des Eisberges bei Esslingen vor 40 Jahren angesäet; Baiern auf den Ruinen des alten Schlosses zu Welchenberg unter Straubing; um Malnik in Böhme; Insel Güstrow in Mecklenbg; hohes Elbufer bei Hamburg, Sonder.; im Wallis u. Tessin nicht selten, Heg; bei Grätz, Marburg in Steyerml., Maly.) Jul. Aug. Bth. weiss, mit bleifarbenen Stbk. Bthstiele filzig und zugleich drüsig-borstig. D.

2. *E. EXALTATUS* (Schrader. hort. götting. 2. p. 15. t. 9.) Erhöhte K. — B. oberwärts mit dornigen Borstchen locker bestreut, unterseits wollig-filzig und grau, tief fiedersp., Zpfl länglich, fiedersp.-buchtig, dörnig-gezähnt; HK. an der Basis borstig, die Borsten fast 3 mal kürzer als der HK, *Blättchen auf dem Rücken kahl; Strahlen des Pappus fast bis an die Spitze zsgewachsen.* 2. In Waldgegenden (in dem waldigen Thale von Suschiza, unweit des Dorfes Nacle, Gegend von Triest, Tommasini; Krain, Freyer.) Jul. Aug. Bth. weiss. D.

3. *E. RITRO* (L.) Glattblättr. K. — B. oberseits kahl oder etwas spinnwebig-wollig, unterseits schneeweiss-filzig, doppelt-fiedersp., dornig-gezähnt; HK. an der Basis borstig, Borsten fast 3 mal kürzer, als derselbe, *Blättchen desselben auf dem Rücken kahl.* 2. Auf sonnigen Hügeln, (im Littor. um Triest, Fiume.) Jul. Aug. Bth. amethystfarben. Bthstiele weiss-filzig, und nicht borstig. D.

III. Untergruppe. *CARDUINEEN*. Carduineen Lessing. syn. DC. prodr. und Silybeen Lessing, DC. Pappus haarig oder federig (aber nicht ästig), an der Basis zu einem Ring verbunden, abfällig. HK. vielblüthig. Bth. sämmtlich röhrig und zwitterig, die randst. seltener fehlschlagend.

47. *CIRSIMUM* (Tournef. Hall.) Kratzdistel. — HK. dachig. Bth. zwitterig, oder gleichheig-2häusig, sämmtl. röhrig. Die Stbk. frei. Pappus federig, an der Basis dch einen Ring verbunden, abfällig. Fruchtb. borstig-sprengig.

1. Rotte. *EPITRACHYS* DC. B. oberseits dörnig-kurz. Bth. purpurn.

1. *C. LANCEOLATUM* (Scop.) Lanzettblättr. K. — B. herabblau-

fend, oberseits dörnig-steifh., unterseits etwas spinnwebig-wollig, tief-fiedersp., Fieder 2sp., Zpfl. lanzettl. oder eyf., ganzrandig, der vordere an der Basis gelappt, Zpfl und Lappen mit einem derben Dorn endigend; Köpfchen einzeln, eyf., spinnwebig-wollig; Blättchen des HK. lanzettl., mit pfriemlicher in einen Dorn endigenden Spitze abstehtend. ☉. An Wegen, auf Triften, Schutthäufen. Jun. - Sept. Carduus lanceolatus L. Cnicus lanceolatus Willd. Fl. dan. t. 1173. Var.:

β. nemorale, B. unterseits weiss-wollig, weniger tief-fiedersp. mit breiteren Zpfln: C. nemorale Rchb. fl. exc., C. lanigerum Naeg. Cirs. der Schw. Diese an waldigen O., (Cant. Wallis, Schwytz; Lindenthal bei Leipzig.) — Nach Nägeli geht sie dch Mittelformen in die ursprüngliche Art über.

2. *C. ERIOPHORUM (Scop.) Wollköpfige K. — B. stengelumfassend, nicht herablaufend, oberseits dörnig-steifh., unterseits filzig, tief-fiedersp., Fieder 2th., Zpfl lanzettl., ganzrandig, der vordere an der Basis gelappt, Zpfl und Lappen mit einem Dorn endigend; Köpfchen einzeln, kugelig, spinnwebig-wollig; Blättchen des HK. lanzettl., mit der lineal., vor dem Dorne verbreiterten Spitze abstehtend. ☉. An Wegen, waldigen, gebirgigen O., in den VorA. u. Alpenthälern. (stw. in der Schw. u. bis nach Oestr., sodann dch Mähr. nach Böhmen, Schles., Thüring. und Franken; vom Elsass und Würtenb. dch die Rheingegenden bis Frankf.) Jul. Aug. Carduus eriophorus L. J. a. t. 171. Cnicus eriophorus Roth. Die verlängerte Spitze der Blättchen des HK. ist vor dem Dorne immer mehr oder weniger verbreitert und manchmal spatelig, aus letzterem entsteht: C. spathulatum Gaud. Var. ausserdem mit dicht- und weiss-spinnwebig-wolligen und mit fast kahlen Köpfchen.*

II. Rotte. CHAMAELEON. *B. oberseits nicht dörnig-kurz h. Blättchen des HK. mit einem einfachen Dorn endigend oder fast wehrlos. Bth. zwittrig, purpurn oder weiss oder gelblichweiss.*

§. 1. *B. ganz herablaufend oder etwas herablaufend.*

3. *C. PALUSTRE (Scop.) Sumpf-K. — B. gänzlich-herablaufend, zerstreut-haarig, tief-fiedersp., Fieder 2sp., Zpfl lanzettl., ganzrandig, der vordere an der Basis gelappt, Zpfl und Lappen mit einem Dorne endigend; Aeste an der Spitze vielköpfig; Köpfchen traubig-geknäuel; Blättchen des HK. dörnig-stachelspitzig. ☉. Auf nassen Wiesen, an sumpligen O. Jul. Aug. Carduus palustris Willd. Bth. purpurn. — Die nach der Heuernte aus dem untersten abgeschnittenen Theile des St. hervorwachsenden Aeste haben nur halb-herablaufende B. und einen oberwärts fast nackten St.: C. Chailloti Gaud. helv. (nicht Koch Synops. ed. I.) — Die Köpfchen sind seltener ebensträussig auseinander gestellt.*

4. *C. CANUM (M. Bieberst. taur. cauc. 3. p. 556.) Graue K. — B. zerstreut-haarig, unterseits oft etwas spinnwebig-wollig, verlängert-lanzettl., dörnig-gewimpert, entfernt-geschweift-gezähnt oder buchtig-fiedersp., Fieder 3eckig-lanzettl., spitz, oft 2lappig, die untern stengelst. B. herablaufend; der St. ganz einfach,*

1köpfig oder oberwärts ästig; Aeste verlängert und 1köpfig, fast nackt; *HK. deckblattlos*; *W. büschelig*; *Fusern verdickt, spindelf.* 4. Auf fruchtbaren, feuchten Wiesen, (Steyerm., Böhmen, Mähr., Schles., Sachs.) Jul. Aug. *Carduus canus* L. J. a. t. 42 und 43. Bth. purpurn. „*Cirsium canum* Allion. ped. scheint eine Var. des *Cirsium pratense*“ nach DC. prodr. D.

5. *C. PANNONICUM* (Gaud.) Ungarische K. — B. zerstreut-haarig und unterseits oft spinnwebig-wollig, länglich-lanzettl., *ungeth., ganzrandig und gezähnt*, ungleich-dörnig-gewimpert, die wurzelst. in den Bstiel verschmälert, *die mittlern stengelst. B. hinten verschmälert, an der Basis selbst wenig verbreitert*, halbstengelumfassend, kurz-herablaufend; der St. von der Mitte an nackt, mit wenigen schuppenf. DeckB. bestreut. 1-3köpfig; Bthstiele verlängert; *HK. deckblattlos*; *Rhizom schief*; *Fusern fädlich.* 4. An gebirgigen rauen O. und Bergwiesen, (Oestr., Kärnth., Littor. auf dem Monte Maggiore; südl. Tyrol, Monte Generoso C. Tessin.) Jun. Jul. *Carduus paunonicus* L. Sohn. *C. serratuloides* J. a. t. 127. (nicht L.) *Cirsium serratuloides* Scop. — Lässt sich von *Cirsium canum* auch ohne die Wurzel dch die über der kurz-herablaufenden Basis zugezogenen und gegen die Mitte allmählig breiteren untern StB. unterscheiden. Bth. purpurn. — *Carduus serratuloides* L., Gmel. sibir. t. 22., ist eine sehr verschiedene Pflanze: der St. ist von der Basis bis zur Spitze beblättert, vielköpfig und ästig, die Aeste sind selbst wieder ästig und beblättert und reichen über den St. hinaus.

6. *C. FREYERIANUM* (Koch.) Freyer's K. — B. kahl od. zerstreut-behaart, lanzettl., *fiedersp. - buchtig*, Fieder eyf., 2-3sp., die kurzen Lappen dornig-gewimpert und mit einem stärkeren Dorn endigend, *die mittlern stengelst. B. kurz-herablaufend*; St. 1köpfig, von der Mitte bis zur Spitze nackt, oder 2köpfig mit verlängerten Bthstielen; *HK. deckblattlos*; Blättchen angedrückt; 4. An unkultiv. O., (bei Gottschee in Unterkrain.) Jun. ? Jul. ? Hat das Köpfchen von *Cirsium tuberosum* und fast die B. von *C. acaule*, aber graugrün. St. oberwärts mit einigen schuppenf. kleinen B. bestreut. D.

§. 2. B. nicht herablaufend.

a. Die Schuppen des HK. länger zulaufend verschmälert, an der Spitze abstehend oder zurückgebogen.

7. *C. CARNIOLICUM* (Scop. carn. t. 54.) Krainer K. — B. kurz., die untern gestielt, an der Basis abgerundet, eyf., *ungeth. oder fiedersp., Zpfl länglich, gezähnt und nebst den Bstielen ungleich-dörnig-gewimpert*, die obern B. mit herzf. Basis stengelumfassend, kurz-herablaufend; *der St. oberwärts nebst den Bthstielen und DeckB. rostfarbig-zottig*; Köpfchen endst., 3-4gehäuft, an der Basis deckblättrig; DeckB. lineal. und nebst *den äussern Blättchen des HK. am Rande dornig.* 4. Auf den Krainer u. Kärnth. A., (auf dem Berge Privale über Kointschka in der Wochein und auf dem Loibl; Oberöstr. im Möll-Thale in der Feuchthalpe, Brittinger, im Alpenwald, Sauter.) Jul. Aug. *Cirsium rufescens*

Ram. bei DC. in d. fl. fr. Bth. gelblich-weiss. — Die obersten stengelst. B. laufen manchmal ein wenig herab, aber kaum merklich, deshalb habe ich diese Pfl. in gegenwärtige Rotte vor C. pauciflorum eingesetzt. D.

8. C. PAUCIFLORUM (Sprengel Syst. veget. 8. p. 373.) Armblüthige K. — B. oberseits zerstreut-haarig, *unterseits spinnebig-wollig*, eyf., am Rande gelappt und gezähnt, ungleich-dörnig-gewimpert, die wurzelst. gestielt, an der Basis abgerundet, die untern stengelst. mit dem geflügelten, gezähnten, an der Basis geöhrlten Bstiel stengelumfassend, die obern mit herzf. Basis sitzend; Köpschen endst., 2-4, gehäuft, mit der Spitze des Bthstieles nickend, mit einem lanzettl., gezähnten DeckB. gestützt; Blättchen des HK. lanzettl., spitz, kurz-stachelspitzig, fast wehrlos. 4. Auf Wiesen der GranitA. in Steyerm. und dem Littor., (am Bürgersee; am Rottenmannertauern; in der Voralpenwaldung Padaschnizza des Schneeberges im Karstgeb.) Jul. Aug. Cnicus pauciflorus Waldst. und Kit. Bth. purpurn. B. sehr gross an dieser ansehnlichen Pflanze. D.

9. C. ERISITHALES (Scop.) Klebrige K. — B. zerstreut-flaumig, ungleich-dörnig-gewimpert, stengelumfassend, tief-fiedersp., die untern stengelst. in den geflügelten, gezähnten, an der Basis verbreiterten Bstiel zsggezogen, Fieder länglich oder lanzettl., zugespitzt, gezähnt; Köpschen auf dem nickenden Bthstiele einzeln oder etwas gehäuft; Blättchen des HK. dörnig-stachelspitzig, von der Mitte an wagerecht-abstehend oder zurückgekrümmt. St. oberwärts fast nackt. 4. In Wäldern der Gebirge und VorA., (dch die g. AK.; in Oberbaden.) Jul. Aug. C. glutinosum Lam. DC. fl. fr. suppl. u. C. ochroleucum DC. ebendasselbst. C. glutinosum DC. prodr. u. C. ochroleucum DC. prodr. mit Ausschluss der Variet. Cnicus Erisithales L. Carduus Erisithales J. a. t. 310. Bth. gelblichweiss. — Cirsium ochroleucum Koch Synops. ed. 1. war, wie daselbst erwähnt worden, nach einem Expl. des bot. Gartens in Erlangen beschrieben, welches mit Allionis Beschreibung übereinstimmte, allein nun stimme ich Naegeli bei, welcher meine Pfl. für einen im Gartenlande erzeugten Bastard erklärte. Cirsium ochroleucum gehört nach Naegeli (die Cirsien der Schw. S. 100.) zu einer grössern Form des C. Erisithales, auch trennt dieser Autor C. ochroleucum DC. prodr., mit Ausschluss der Variet., und Cirsium glutinosum (C. Erisithales) keinesweges als Varietäten.

29. C. SPINOSISSIMUM (Scop.) Sehr stachelige K. — B. kahl od. zerstreut-behaart, unterseits auf den Nerven etwas zottig, längl. oder lanzettl., die untersten an der Basis verschmälert, die stengelst. stengelumfassend, sämmtl. fiedersp.-gelappt, Lappen eyf., 3sp., Zpfl spreitzend, dörnig-gewimpert und mit einem verlängerten starken Dorn endigend; der St. von der Basis bis zur Spitze dicht-beblättert, an der Spitze zottig; die Köpschen endst., gehäuft, deckblättrig; DeckB. verbleicht, geschlitz-fiedersp., dörnig; Blättchen des HK. mit einem Dorn von der Länge des HK. selbst endigend. 4. An

nassen O. und Bächen der A., (in der Schw. und von da dch Tyrol nach Salzbg, Kärnth., Steyerm. und Krain.) Jul. Aug. Bth. gelblich - weiss.

11. *C. OLERACEUM* (Scop.) Kohl-K. — *B. kahl oder zerstreut-fläumlich*, ungleich-dörnig-gewimpert, *stengelumfassend*, die untern fiedersp., Fieder lanzettl., zugespitzt, gezähnt, die obern stengelst. *B. stengelumfassend*, ungeth., gezähnt; *Köpfchen endst., gehäuft, deckblättrig; die äussern DeckB. eyf., verbleicht; Blättchen des HK. in ein Dörnchen endigend, an der Spitze abstehend.* 4. Auf feuchten Wiesen, an Gräben. Jul. Aug. Bth. gelblich - weiss. *Cnicus oleraceus* L. *Carduus acanthifolius* Lam. Var. mit ungeth. B.

12. *C. RIVULARE* (Link. en. h. b. 2 p. 301.) Bach-K. — *B. zerstreut-flaumig*, ungleich-dörnig-gewimpert, *stengelumfassend*, *fiedersp.*, die untern stengelst. in den geflügelten, gezähnten, an der Basis verbreiterten Bstiel zsggezogen, *Fieder lanzettl., zugespitzt, spärlich-gezähnt*; der St. oberwärts fast nackt; Köpfchen endst., 2-4, meist gehäuft; *die DeckB. lineal., ganzrandig; Blättchen des HK. angedrückt, stachelspitzig.* 4. Auf feuchten Wiesen, sowohl der Gebirge und VorA.-Regionen, als der an die A. angrenzenden Ebenen, (dch die g. AK., sodann in Oberschwaben, Oberbaiern, Mähr., Schles., Böhm. und um Königsberg in Preussen.) Jun. Jul. *Cirsium tricephalodes* Lam. *C. carniolicum* All., mit Ausschl. des Syn. von Scopoli. *Carduus Erisithales* Vill. *Carduus rivularis* Jacq. a. 1. t. 91. *Cnicus rivularis* Willd. — Kommt mit 2köpfigem Stengel und lang-gestieltem Köpfchen vor: *Cnicus salisburgensis* Willd. — Var. mit fast ungeth. nur an der Basis fiedersp. B.

b. Die Schuppen des HK. angedrückt, oft stumpflich, plötzlich in ein kurzes Dörnchen zugespitzt.

13. *C. HETEROPHYLLUM* (Allion.) Verschiedenblättr. K. — *B. oberseits kahl, unterseits schneeweiss-filzig*, ungleich-dörnig-gewimpert, stengelumfassend, lanzettl. oder elliptisch-lanzettl., zugespitzt, die wurzel- und untern stengelst. gesägt, letztere in den breitgeflügelten, an der Basis gehöhrt-verbreiterten Bstiel zsggezogen, die obern fast ganzrandig, *sämmtl. ungeth. oder die mittleren vorne eingeschnitten, Zpfl lanzettl., vorwärts gerichtet; der St. reichblättrig, 1-3köpfig*; die Köpfchen endst., einzeln, deckblattlos; Blättchen des HK. angedrückt. 4. Auf feuchten Wiesen und an Gräben in den VorA. und A., (stellenweise dch die AK.; sodann in Oberbaden, Oberbayern, Mähr., Schles., Sachsen, am Thüringer Walde, Böhm.) Jun. Jul. Bth. purpurn. *Carduus heterophyllus* L. *Cnicus heterophyllus* Willd. Explare mit sämmtl. ungeth. B.: *Carduus helenioides* Sut., nicht L., *Cirsium helenioides* All. Bth. purpurn. — Der *Carduus helenioides* L., untersch. sich nach Smith's Angabe dch einen noch einmal so hohen St., 4 oder mehrere, um die Hälfte kleinere, am Ende des St. sitzende Köpfchen.

14. *C. ANGLICUM* (Lam.) Englische K. — *B. oberseits zer-*

streut-haarig, *unterseits spinnwebig-wollig*, länglich-lanzettl., spitz, ungleich-dörnig-gewimpert, gezähnt oder fast buchtig, Lappen 2-3sp., die WB. gestielt, *der Stengelst. wenige, über der Stengelumfassenden Basis gezogen*; der St. 1köpfig, oberwärts blattlos; HK. deckblattlos, ziemlich wollig; Blättchen angedrückt, stachelspitzig. 4. Auf sumpfigen Gebirgs- und VorA-Wiesen, (zw. Stockach und Zizenhausen in Oberbaden; in Obersteyern.) Jun. *Carduus anglicus* Lam. *C. pratensis* Hud., nicht Lam. *C. dissectus* Huds. edit. 1. Vill., nicht L. *Cnicus pratensis* Willd., (nicht *Cirsium pratense* DC., welches mit der Variet. α . des *Carduus tuberosus* L. sp. pl. 1151. einerlei, im Gebiete unserer Flora aber noch nicht gefunden worden ist.) Der St. von der Mitte an nackt, und daselbst nur mit 1 oder 2 kleinen, schuppenf. B. besetzt. Ein im Gebiete unserer Fl. gefundenes Expl. kam mir noch nicht zu Gesicht. D.?

15. *C. BULBOSUM* (DC.) Knollige K. — B. oberseits zerstreut-haarig, *unterseits etwas spinnwebig-wollig*, dörnig-gewimpert, tief-fiedersp., die untern gestielt, Fieder gezähnt-kleingelappt und 2-3sp., Zpfl lanzettl.; der St. von der Mitte an blattlos, 1-3köpfig; Bthstiele verlängert; Blättchen des HK. angedrückt, klein-stachelspitzig; Wfasern verdickt, an der Basis und Spitze verschmälert. 4. Auf Wiesen, (in der westl. Schw. und dch den Elsass und Baden bis Mainz; im Maingebiete bis Würzburg; in Thüring. bis an den Harz.) Jul. Aug. *C. tuberosum* All. *Carduus tuberosus* Pollich. u. der meisten deutsch. Aut. *C. tuberosus* var. β . L. *Cnicus tuberosus* Willd. *C. spurius* Hoffm. — Var. grösser, mit 4-10köpfigem St.: *C. ramosum* Naeg. Cirs. d. Schw.

16. *C. ACAULE* (All.) Stengellose K. — B. kahl, lanzettl., buchtig-fiedersp., Fieder eyf., eckig-fast 3sp., Lappen kurz, dörnig-gewimpert und mit einem stärkern Dorn endigend; das Köpfchen einzeln stehend, oder 2-3 zsgestellt, oder an der St. treibenden Pfl. zerstreut; der St. meist gar nicht vorhanden, seltener vorhanden, aber niedrig und *von der Basis bis zur Spitze beblättert*; Blättchen des HK. angedrückt, kurz-stachelspitzig, die äussern eyf., 1nervig; Wfasern fädlich. 4. Auf Wiesen und besond. Triften der Berge, (dch das g. G., aber wie es nach Host's Flora erscheint, nicht in Kärnth., Steyern. und Oestr.) Jul. Aug. *Carduus acaulis* L. J. ic. rar. t. 579. *Cnicus acaulis* Willd. St. h. 24. Eine stengelige Variet. ist: *Cnicus dubius* Willd. prod. fl. berol. *Carduus Roseni* Vill.

III. Rotte. BREA Lessing. synops. compos. p. 10. B. oberseits nicht dörnig-kurzh. Blättchen des HK. mit einem einfachen Dorn endigend. Köpfchen gleichheilig, dch Verkümmerung 2häusig. Gattungen, die blos dch die Verschiedenheit des Geschlechts bestehen, halte ich nicht für geeignet, so kann z. B. *Rhamnus cathartica*, dch Verkümmerung 2häusig, von den übrigen *Rhamnus*-Arten nicht als Gattung getrennt werden.

17. *C. ARVENSE* (Scop.) Brach-K. — B. etwas herablaufend, längl.-lanzettl., dörnig-gewimpert, ungeth. oder fiedersp.-buchtig, an der Spitze und am Ende der Lappen mit einem stärkern Dorn versehen; Köpfchen rispig-ebensträussig, eyf.; Blättchen des HK. angedrückt, stachelspitzig, fast wehrlos; W. kriechend. 4.

Auf Aeckern und an kultiv. O. Jul. Aug. *Serratula arvensis* L. spec. Bth. purpurn. B. unterseits kahl. Var.:

α. horridum, B. sämmtl. wellig, fiedersp., sehr dornig.

β. mite, die StB. buchtig, die astst. ungeth. oder gezähnt, weicher-dornig.

γ. integrifolium, B. sämmtl. flach, ganzrandig oder etwas gezähnt: *Cirsium setosum* MBieb. *Cnicus setosus* Bess. *Serratula setosa* Willd. Diese Form ist, wenn die B. etwas lappig sind: *Serratula complicata* Schweigg.

δ. vestitum, B. unterseits schneeweiss-filzig: *C. argenteum* Vest.

Die Bastard-Formen, welche in der vorliegenden Gattung zahlreicher als bei anderen und unter den mannigfaltigsten Gestalten vorkommen, liess ich hier gänzlich weg, weil Herr Dr. Naegeli, der jene Pflanzen lange und genau beobachtete, eine von ihm gefertigte Synopsis derselben diesem unserm Werke als werthvollen Anhang begeben wird.

48. PICNOMON. (Cass. dict. sc. nat. B. 23. S. 223 und B. 40. S. 87.) Honiggrube 5 kantig. Das Uebrige wie bei *Cirsium*.

1. P. ACARNA (Cassin.) Spanisches K. — B. herablaufend, lanzettl., wollig-grau, gezähnt, dornig: Köpfchen gehäuft, deckblättrig; die innern Blättchen des HK. mit einem gefiederten Dorn endigend. 4. An felsigen unkultiv. O., (Istrien.) Jul. Aug. *Cnicus Acarna* L. *Cirsium Acarna* Moench. meth., Koch Synops. ed. 1. Bth. purpurn. J.

49. CYNARA (L.) Artischocke. — Blättchen des HK. an der Basis fleischig, an der Spitze ausgerandet mit einer Stachelspitze; sonst Alles, wie bei *Cirsium*.

1. C. SCOLYMUS (L.) Gemeine A. — B. etwas dornig, fiedersp. und ungeth.; Blättchen des HK. eyf. 4. Wird zum Küchengebrauch kultiv. Aug. Tabern. krtb. p. 1075. f. 2. 3. Bth. purpurn. Diese Art erscheint eine mehr wehrlose, dch Kultur entstandene Variet. der Folgenden. Kultiv.

2. C. CARDUNCULUS (L.) Kardunen-A. — B. dornig, sämmtl. fiedersp.; Blättchen des HK. eyf. 4. Wird zum Küchengebrauch kultiv. Aug. Tabern krtb. p. 1075. f. 4. Bth. purpurn. Kultiv.

50. SILYBUM (Gärtn.) Mariendistel. — Die Stbf. 1 brüderig; Pappus kurz federig, das Uebrige wie bei *Carduus*. Bei *Carduus nutans* sind die Schuppen des HK. gerade so mit Anhängseln versehen, wie bei *Silybum*. Die Strahlen des Pappus haben längere Zähnen, wie an einigen Arten von *Carduus*, sind daher etwas federig, wodurch sich *Silybum* von *Tyrinnus* unterscheidet.

1. S. MARIANUM (Gärtn.) Gemeine M. — ☉. Auf Gebirgstriften, (im östr. Littor. bei Duino, Ternova, ausserdem hin und wie-

der auf Schutthaufen verwildert.) Jul. Aug. *Carduus marianus* L. Tabern. krb. p. 1078. f. 3. D.

51. TYRIMNUS (Cassin. dict. de sc. nat. 41. S. 335.) — Die Stbf. 1brüderig. Pappus haarig, das Uebrige wie bei *Carduus*. Die Strahlen des Pappus sind glatt oder mit ganz kurzen Zählchen besetzt, wodurch sich die Gattung von *Silybum* unterscheidet, mit der sie passender zu verbinden wäre.

1. T. LEUCOGRAPHUS (Cassin. a. a. O.) ☉. An unkultiv. und kultiv. O., (bei Lossia auf Osero.) Mai. Jun. *Carduus leucographus* L. sp., Jacq. h. vind. 3. t. 23. Die St. 1- mehrköpfig, nebst den Aesten spinnwebig-wollig, die Aeste verlängert, 1köpfig; B. herablaufend, oberseits spärlich-, unterseits dichter-spinnwebig-wollig, fiedersp. oder buchtig, dornig-gezähnt, weiss-gefleckt. J.

50. CARDUUS (L., mit Ausschl. von Arten.) Distel. — HK. dachig. Bth. zwitterig, sämmtlich röhrig. Stbf. frei. Pappus behaart, Haare gezähnt, an der Basis dch einen Ring verbunden, mit einander abfällig. Fruchtb. borstig-spreuig. — Bth. aller purpurn, selten als Var. weiss.

1. Rotte. Köpfchen länglich, fast walzlich. (Die Rotten „Homatolepidoti und Clastolepidoti“ der 1. Ausg. der Synops. liess ich hier weg, weil durch Mittelformen eine in die andere allmählig übergeht.)

1. C. PYCNOCEPHALUS (J. h. v. t. 44.) Dichtköpfige D. — B. herablaufend, oberseits etwas zottig, unterseits wollig-filzig, buchtig und fiedersp., Lappen eyf., eckig, gezähnt, dornig; Köpfchen an dem St. und den Aesten endst., länglich, zu 2 oder mehreren, zsgestellt, die seitenst. sitzend; Blättchen des HK. aus breit-lanzettl. Basis zugespitzt, in einen Dorn verschmälert, an der Spitze etwas abstehend. ☉ und ☉. An unkultiv. O., Mauern, (um Triest, auf Istrien und den Inseln; auf Ballasterde am Ufer der Swine auf Swinemünde.) Jul. Aug. *C. tenuiflorus* DC. prodr. Var. γ . und δ . Rostk. u. Schm. fl. sed., nicht Sm. — *C. tenuiflorus* Smith gehört nach einem schottischen von Dr. Wattson mitgetheilten Expl. zur folg. Art. — Der *C. pycnocephalus* L. wird von DC. im prodr. mit einem ? nun zu seinem *Card. tenuiflorus* γ . *C. pycnocephalus* gezogen; (früher Cat. hort. monsp.) glaubte er, Linne's Pflanze sei ein *Cirsium*. Var. mit weiss gefleckten und ungefleckten B. und mit geflügelt-krausen kürzeren blüthetrag. Aesten: *C. tenuiflorus* DC. fl. fr. var. γ . *C. pycnocephalus* Dub. Var. γ .; und mit nackten, verlängerten, schlanken Aesten: *C. pycnocephalus* DC. fl. fr. *C. tenuiflorus* δ . *elongatus* Dub. D.

2. C. TENUIFLORUS (Curt) Schmalblüthige D. — B. herablaufend, oberseits dünn-, unterseits weisslich-wollig, buchtig und fiedersp., Lappen eyf., eckig, gezähnt, dornig; Köpfchen gehäuft, zahlreich, sitzend, fast walzlich; Blättchen des HK. lanzettl., zugespitzt, in einen Dorn verschmälert, etwas abstehend. ☉? In Thälern der A., (im obern Wallis.) *C. tenuiflorus* Sm. (nach einem Engl. Expl. und nach Smith's Beschreibg. „der St. 4 Fuss hoch u. s. w.“ bei *C. pycnocephalus* ist der St. 1, 1½ Fuss hoch.)

C. tenuiflorus Schl. *C. tenuiflorus* DC. prodr. var. *a.* *C. microcephalus* Gaud. *C. syncephalus* Rb. Köpfchen so gross, wie bei *Carduus crispus*. S.

II. Rotte. Köpfchen eyf. oder rundlich.

3. *C. ACANTHOIDES* (L.) Stachel-D. — *B. herablaufend, kahl* oder unterseits auf den Adern zottig, tief-fiedersp., Fieder eyf., fast handf. - 3sp. und gezähnt, dörnig-gewimpert, Lappen und Zähne mit einem starken Dorn endigend; Köpfchen meist einzeln, rundlich; Bthstiele kurz, gekräuselt, dörnig; Achenen sehr fein runzelig. ☉. An unkultiv. O., Wegen. Jul. Aug. J. a. t. 249. *C. polyacanthos* Schreb. Curt. *C. crispus* Huds., nicht L. Var. mit aufrechten und mit zurückgekrümmten und an der Spitze wieder einwärtsgebogenen Blättern des HK. und mit Bthstielen, welche an ihrem obern Theile auf der einen Seite nackt, auf der andern mit einem schmalen, gekräuselten Flügel bezeichnet sind. — Den *Carduus alpestris* Schleich., *C. acuminatus* Gaud., mit 2 Zoll langen, ganz oder nur auf der einen Seite nackten Bthstielen, ausserdem aber von *C. acanthoides* nicht verschieden, ziehe ich zu den Varietäten dieser Pfl.

4. *C. MULTIFLORUS* (Gaud. helv. 5. S. 166.) Reichblüthige D. — *B. herablaufend, zerstreut-haarig, unterseits auf den Adern zottig oder spinnwebig-wollig*, tief-fiedersp., Fieder eyf., fast handf. - 3sp. und gezähnt, gewimpert-dörnig, Lappen und Zähne mit einem stärkern Dorn endigend; Köpfchen eyf., 3-5, gehäuft; Bthstiele kurz, gekräuselt, dörnig. ☉. Achenen mit sehr feinen Längsrillen. An unkultiv. O., auf Aeckern, an Wegen, (in den Thälern des Jura gemein; bei Trier seltener.) Jul. Aug. *C. polyanthemus* Schleich. Koch. Synops. ed. 1., *C. acanthoides* Schk. t. 228. *C. crispus* β. DC. prodr., unterscheidet sich aber augenscheinlich von *C. crispus* deh die der Länge nach feingestrichelten Achenen (Sonder.) Linne's Beschreibung in der Mant. S. 109. passt ganz genau auf unsere Art, allein da der Name jetzt zweifelhaft geworden, so habe ich denselben hintenangesetzt.

5. *C. CRISPUS* (L.) Krause D. — *B. herablaufend, oberseits zerstreut-haarig, unterseits wollig-filzig* und auf den Adern etwas zottig, länglich, buchtig-fiedersp., Fieder eyf., 3lappig und gezähnt, der mittlere Lappen grösser. Lappen und Zähne dörnig-gewimpert und mit einem stärkeren Dorn endigend; Köpfchen rundlich, gehäuft und einzeln; Bthstiele kurz, dörnig oder an der äussersten Spitze nackt, Achenen auf den Streifen deutlich quer-runzelig. ☉. An unkultiv. O., Wegen. Jul. Aug. Fl. dan. t. 621. Var. mit untern tiefer-fiedersp. B. und auch mit ungeth. nur buchtig-gezähnten obern, und selten mit fein-zerschnittenen B. Eine Variet. mit längeren, 1köpfigen, unter dem Köpfchen 1 Zoll lang nur mit einem dünnen Flügel versehenen oder gänzlich nackten Bthstielen ist *C. arctioides* Schleich. — Der *C. acanthoides* var. *canescens* Schleich. gehört ebenfalls zu *C. crispus*.

6. *C. PERSONATA* (J. a. t. 348.) Maskenblumige D. — *B. her-*

ablaufend, oberseits zerstreut-haarig, *unterseits spinnwebig-wollig*, ungleich-dörnig-gewimpert, *die obern* ungeth., *ey-* und lanzettl., gesägt-gezähnt, *die untern* im Umriss breit-eyf., *bis zur Mittelrippe fiedersp.*, Fieder länglich, spitz, lappig und gezähnt, die obern zsließend; *Köpfchen* rundlich, *gehäuft*; Aeste und Bthstiele sehr schmal-geflügelt oder an der äussersten Spitze nackt. 4. Auf den VorA. und in den Athälern an Giesbächen, (dch die g. AK.; auf den Vogesen, der Schwäb. Alp, dem Schwarzwald, den höhern Gebirgen von Böhm., Mähr. und Schles.) Jul. Aug. *Arctium Personata* L. *Carduus arctioides* Vill.

7. *C. COLLINUS* (W. und Kit.) Weissliche D. — *B.* herablaufend, *unterseits* oder auf beiden Seiten wollig-filzig oder auch fast kahl, tief-fiedersp., *Fieder eyf.*, 3sp. und gelappt, Lappen dörnig-gewimpert oder mit einem stärkern Dorn endigend; *Aeste ruthenf.*, *oberwärts in einen nackten Bthstiel verlaufend*, indem die gekräuselten Flügel aufwärts allmählig abnehmen und verschwinden; *Köpfchen* meist einzeln; *Blättchen des HK.* lineal-lanzettl., *angedrückt* oder auch absteheend. ☉. An sonnigen, unkultiv. O., (bei Triest, Fiume, Unterkrain.) *C. candicans* Koch Syn. ed. I. Jul. Aug. Var. mit beiderseits filzigen und beiderseits fast kahlen *B.* Die Variet. mit angedrückten *Blättchen* des HK. ist: *C. candicans* W. und K. pl. rar. h. t. 83.

8. *C. HAMULOSUS* (Ehrhart Beitr. 7. S. 166.) Hakige D. — *B.* herablaufend, oberseits zerstreut-haarig, *unterseits spinnwebig-wollig* oder *ziemlich kahl*, tief-fiedersp., *Fieder eyf.*, 3sp. und lappig, Lappen dörnig-gewimpert und mit einem stärkern Dorn endigend; *Aeste ruthenf.*, *oberwärts in den nackten Bthstiel verlaufend*, indem die gekräuselten Flügel aufwärts allmählig abnehmen und verschwinden; *Köpfchen* einzeln; *Blättchen des HK.* aus lanzettl. Basis lineal., *die inneren zurückgekrümmt*. ☉. An trocknen, unkultiv. O., Wegen, (in Oestr.) *C. hamulosus* W. und K. pl. r. h. t. 233. Jul. Aug. D.

9. *C. ARCTIOIDES* (Willd.) Klettenartige D. — *B.* herablaufend, *unterseits spinnwebig-flaumig*, zuletzt kahl, tief-fiedersp., der endst. Lappen verlängert; *Fieder lanzettl.*, ungleich-dörnig-gewimpert, *an der vorderen Seite 2-3lappig*; *Bthstiele nackt*, meist 1köpfig; *Blättchen des HK.* lineal., dörnig-stachelspitzig, von der Mitte an absteheend. 4. In den A. und VorA., (Krain auf den Wocheiner A., im Bodenthale in Kärnthen, südl. Tyrol. Schw.) Jul. Aug. *Cirsium arctioides* Scop. *Arctium carduelis* L. *Carduus centauroides* Hopp. Var. mit eyf., 2sp. oder ungetheilten Fiedern: *C. alpestris* W. und Kit. pl. rar. h. t. 267. Koch Synops. ed. I., nicht *C. defloratus* β. *alpestris* DC. prodr. Geht dch Mittelformen in *C. arctioides* über und entsteht aus dem S. des letzteren. Der *C. medius* Gouan., den Bentham für eine Variet. des letztern mit mehr zerschnittenen *B.* erklärt, kann nach Expl. aus den Pyrenäen von *C. alpestris* nicht als Art getrennt werden; aber *C. Argemone* (Pourr. herb.) Lam. dict., nach DC. prodr. steht dem *C. defloratus* näher, ist übrigens selbst DC. zweifelhaft. D.

10. *C. DEFLORATUS* (L.) Abgeblühte D. — B. halbherablaufend, kahl oder unterseits auf den Adern haarig, lanzettl., etwas meergrün, od. *fast gleichfarbig*, dörnig-gewimpert, *gezähnt-gezägt oder gesägt-kleinlappig, die untersten und oberen halbherablaufend*, Läppchen 2sp.: Bthstiele verlängert, nackt; Blättchen des HK. lineal., dörnig-stachelspitzig, von der Mitte an abstehend. 4. An gebirgigen, felsigen O., in den VorA. und A., (dch die g. AK., südlich bis Triest und Fiume und in das südl. Tyrol hinab, im Jura, in Oberbaden, Würtemb., Mähr., Thüring., Baireuther Kalkgeb.) Jul. Aug. J. a. t. 89. *Cirsium defloratum* Scop. dch Versenke unter die Cirsien aufgenommen. Der St. an der wilden Pflanze einfach, 1-3köpfig, an der kultiv. ästig. Kommt vor grasgrün und mehr oder weniger satt-grau-grün; dann unter folgenden Formen: 1. B. grob-gezähnt, dörnig-wimperig: *C. summaus* Pollin. fl. veron t. 10., *C. crassifolius* Willd. en. h. b., *C. Argemone* Schleich. pl. exs., nicht Lam. — 2. B. grob-gezähnt, Zähne und Lappen 2 sp.: *C. transalpinus* Sut. fl. helv., *C. crassifolius* Koch Syn. ed. 1., *C. glaucus* Baumg. transs. — 3. B. tiefer-buchtig: *C. cirsiodes* Vill. delp. — 4. Dieselbe Form mit starken Dornen an den B.: *C. defloratus* δ . *rhaeticus* DC. prodr., *C. carlinaefolius* Koch Synops. ed. 1., nicht Lamarck. — 5. Dieselbe Form mit schmalen B.: *C. leptophyllus* Gaud. helv. — 6. B. bis zur Mitte fiedersp.: *C. defloratus* β . *alpestris* DC. prodr., nicht *C. alpestris* Waldst. und Kit. — *C. montosus* Pollin. fl. ver. gehört nach DC. prodr. zu *C. nutans*.

11. *C. NUTANS* (L.) Nickende D. — B. herablaufend, oberseits ziemlich kahl, unterseits auf den Adern zottig, tief-fiedersp., Fieder eyf., fast handf.-3sp. und gezähnt, dörnig-gewimpert, Lappen und Zähne mit einem starken Dorne endigend; *Köpfchen* rundlich, *einzeln, nickend; die mittlern Blättchen des HK. oberhalb der eyf. Basis verengert, oberhalb der Verengung lanzettl.*, in einen starken Dorn zugespitzt, zurückgeknickt-abstehend. ☉. Auf trocknen Triften, an Wegen. Jul. Aug.

12. *C. PLATYLEPIS* (Sauter bei Rb.) Breitschuppiger D. — B. herablaufend, oberseits ziemlich kahl, unterseits auf den Adern zottig, tief-fiedersp., Fieder eyf., fast handf.-3sp. und gezähnt, dörnig-gewimpert, Lappen und Zähne mit einem stärkern Dorne endigend; *Köpfchen* rundlich, aufrecht, einzeln und *gezeiet, das eine sitzend, wagerecht; die mittleren Blättchen des HK. oberhalb der eyf. Basis etrus verengert*, oberhalb der Verengung lanzettl., in einen Dorn zugespitzt. ☉. Auf Aeckern und Wiesen der Alpenthäler bei einer Höhe von 4000 Fuss, (bei Kitzbichel und Lofer in Tyrol, Steyerm.) Jul. Aug. Hiezu scheint zu gehören: *C. nutans* β . Bertol amoen. ital., wozu er den *C. carlinaefolius* DC. fl. fr. nach einem vom Autor empfangenen Expl. zieht, aber die Beschreibung in Lamarck's Dict. stimmt nicht zu. Die B. scheinen auf den ersten Blick ganz kahl. D.

Seltener kommen auch Bastarde von *Carduus nutans* und *C. acanthoides* und andere von jenem und *C. crispus* vor, welche, weil sie sich bald mehr dem einen, bald mehr dem anderen nä-

hern, kaum durch Worte zu bezeichnen sind. Die Köpfchen sind kleiner und zahlreicher, als bei *C. nutans*, und die Schuppen des HK. schmaler; es sind folgende:

13. *C. ACANTHOIDI-NUTANS*, Köpfchen einzelnstehend und nickend, (bei München. Alex. Braun! bei Hamburg, Sonder.)

14. *C. NUTANTI-ACANTHOIDES*, Köpfchen kleiner, aufrecht, die Schuppen des HK. viel schmaler; hierher gehört: *C. orthocephalus* Wallroth in der *Linnaea*, nach einem mir vom Autor mitgetheilten Expl.

15. *C. CRISPO-NUTANS*, Köpfchen einzeln oder zu zweienstehend, noch einmal so gross, als bei *C. crispus* und die B. weniger tief-fiedersp. und unterseits mehr oder weniger spinnwebig-filzig: *C. polyanthemus* Döll. rhein. Flor., nicht Schleicher, *C. Stangii* Bueck in Briefen und nach mitgetheilten Expl.

53. *ONOPORDUM* (L.) Eselsdistel. — Fruchtb. wabig, sonst Alles, wie bei *Carduus*. — Bth. purpurn.

1. *O. ACANTHIUM* (L.) Gemeine E. — B. elliptisch-länglich, buchtig, spinnwebig-wollig; *Blättchen des HK. aus eyf. Basis lineal.-pfriemlich, die untern weit abstehend.* ☉. An unkultiv. O., Wegen. Jul. Aug. Schk. t. 230. Var. mit niedrigerem St. und mehr gekräuselten und wolligen B.: *O. Schultesii* Brittinger.

2. *O. ILLYRICUM* (L.) Illyrische E. — B. lanzettl., fiedersp., spinnwebig-wollig; *Blättchen des HK. ey-lanzettf., die untern bogig-herabgekrümmt.* ☉. An trocknen, unfruchtbaren O., (in den am Meere gelegenen Gegenden Istriens, Fiume.) Jul. Aug. J. h. v. t. 148. *O. elongatum* Lam. fl. fr., DC. prodr. J.

54. *LAPPA* (Tournef. Lam.) Klette. — HK. dachig. Bth. zwittrig, sämmtlich röhrig. Stbf. frei. Pappus haarig, kurz, vielreihig. Blättchen des HK. mit einem hakigen, sehr spitzen Dorn endigend. — Bth. purpurn.

1. *L. MAJOR* (Gärtu.) Grössere K. — HK. ziemlich kahl; *Blättchen sämmtl. pfriemlich und hakig, die inneren gleichfarbig;* Köpfchen fast ebensträussig. ☉. Auf Schutthaufen, im Flusskiese, an Wegen. Jul. Aug. *L. officinalis* All. *Arctium majus* Schk. *A. Lappa* Willd. Hayn. arzg. 2. t. 35. Das *A. Lappa* L. sp. umfasst alle unsere Arten. Köpfchen noch einmal so gross, als bei der folg. Die Wimpern der Blättchen des HK. waren an den von mir untersuchten Expl. dieser Art von denen der folg. Arten nicht verschieden.

2. *L. MINOR* (DC.) Kleinere K. — HK. etwas spinnwebig-zotig; *Blättchen sämmtlich pfriemlich und hakig, die inneren etwas gefärbt;* Köpfchen traubig. ☉. Auf Schutthaufen, an Wegen; blühet um $\frac{1}{2}$ Monat später, als die 2 verwandten Arten. *Arctium minus* Schk. 3. p. 49. — Unter der Variet. *a.* von *Actium Lappa* begreift Linne diese und die vorhergehende.

3. *L. TOMENTOSA* (Lam.) Filzige K. — HK. spinnwebig-wollig; *die innern Blättchen lanzettl., stumpf, mit einem aufgesetzten, geraden Stachelspitzchen*, gefärbt, fast strahlend; Köpfschen beinahe ebensträussig. ☉. Mit den vorigen. Jul. Jul. *Arctium tomentosum* Schk. l. c. A. Bardana Willd. Hayn. arzg. t. 36.

IV. Untergruppe. *CARLINEEN*. Cass. zum Theil. Pappus freihig, ästig, abfällig. HK. reichblüthig. Bth. sämmtl. röhrig, zwitтерig.

55. *CARLINA* (L.) Eberwurz. — HK. dachig, die innersten Blättchen strahlend, trockenhäutig. Bth. zwitтерig, sämmtl. röhrig. Pappus abfällig, die Strahlen desselben an der Basis in einen Ring verwachsen, ästig; Aeste federig. Fruchtb. spreuig; Spreublättchen an der Spitze gespalten.

§. 1. Der St. iköpfig.

1. *C. ACAULIS* (L.) Stengellose E. — *Stengellos oder stengellich sich erhebend*; der St. iköpfig; B. kahl oder unterseits etwas spinnwebig-wollig, tief-fiedersp., Fieder eckig-gelappt, gezähnt; *die strahlenden Blättchen des HK. von der Basis bis über die Mitte lineal., an der Spitze lanzettl., die längern Fasern der Spreublättchen stumpf-keulig*. ☉ Auf trocknen Hügeln, Haiden, Gebirgstriften, (im mittlern und südl. Gebiete auf Kalkboden, aber auch hier nicht überall.) Jul. Aug. Hayn. arzg. 10. t. 45. *C. Chamaeleon* Vill. *C. caulescens* Lam. *C. subacaulis* DC. fl. fr. Strahl des HK. weiss.

2. *C. SIMPLEX* (W. und Kit.) Einfache E. — *Der St. iköpfig*; B. kahl oder unterseits etwas spinnwebig-wollig, tief-fiedersp., Fieder eckig-gelappt, gezähnt; *die strahlenden Blättchen des HK. lanzettl., unterhalb der Mitte verschmälert; die längern Fasern der Spreublättchen an der Spitze stumpf-keulig*. ☉. Auf Gebirgen und den VorA. an sonnigen O., (um Veldes und anderwärts in Oberkrain, später hat Dr. Graf unter dem Namen *C. simplex* die bei Laibach wachsende *C. acaulis* geschickt.) Jul. Aug. *C. aggregata* Willd. Strahl des HK. weiss. D.

3. *C. ACANTHIFOLIA* (All.) Krebsdistelblättr. E. — *Stengellos*; B. unterseits grau-wollig, die äussern fiedersp., eckig-gezähnt, die innersten ungeth., gezähnt; *die längern Fasern der Spreublättchen fädlich, spitzig, unter der Spitze ein wenig dicker*. ☉. An felsigen, unfruchtb. O., (in Istrien auf St. Antonia, nicht auf dem M. Maggiore, Tommas., auf der Koiniza; dem Berge Baba in Krain, Dolliner; auf dem Platnik bei Murenfeld.) Jun.-Aug. *C. Utzka* Haq. *C. acanthifolia* a. DC. prodr. Strahl des HK. weiss. J.

§. 2. Der St. mehrköpfig.

4. *C. LANATA* (L.) Wollige E. — *Der St. meist 3 köpfig*; B. lanzettl., ungleich-gezähnt, filzig-wollig; *Blättchen des HK.*

fast doppelt-fiedersp.-dornig, *die inneren* lanzettl., *in einen Dorn verschmälert*, *die strahlenden* lineal.-lanzettl., an der Basis verschmälert, *kahl*. ☉. An trocknen, sandigen O., (in Istrien gegen das Meer hin nicht selten; Fiume.) Jul. Aug. C. Pola Jacq. Strahl des HK. purpurn.

5. C. CORYMBOSA (L.) Ebensträussige E. — *Der St. fast ebensträussig*; B. länglich-lanzettl., buchtig, gezähnt; *Blättchen des HK. fast doppeltfiedersp.-dornig, die inneren länglich, stumpf, stachelspitzig, die strahlenden* lanzettl., an der Basis verschmälert, *kahl*. ☉. An felsigen, rauhen O., (einzeln an trocknen Abhängen im Triestiner Gebiete bei Contorello, Tommas.; bei Fiume an der Kirche Sanct Veit häufig. Wulf. bei Jacq.) Jul. Aug. Strahl des HK. gelb.

6. C. VULGARIS (L.) Gemeine E. — *Der St. 2- mehrköpfig*, fast ebensträussig; B. länglich-lanzettl., buchtig, gezähnt; *die äussern Blättchen des HK. doppeltfiedersp.-dornig, die inneren* lanzettl., verschmälert-stachelspitzig, *die strahlenden* lineal.-lanzettl., an der Basis ein wenig breiter, *bis zur Mitte gewimpert*; *die DeckB. kürzer, als die Köpfchen*. ☉. An unkultiv., waldigen O. Jul. Aug. Schk. t. 232. Strahl des HK. strohfarben.

7. C. NEBRODENSIS (Guss. in DC. prodr.) Nebrodische E. — *Der St. 1-3köpfig*; B. lanzettl., entfernt-gezähnt, *die untern verlängert-lanzettl.*; *die äussern Blättchen des HK. doppeltfiedersp.-dornig, die inneren* lanzettl., verschmälert-stachelspitzig, *die strahlenden* lineal.-lanzettl., an der Basis ein wenig breiter, *bis zur Mitte gewimpert*; *die DeckB. länger, als die Köpfchen*. ☉. Auf höhern Gebirgen und A., (an felsigen Triften oberhalb dem Sintersbachwasserfall fast 5000 Fuss hoch bei Kitzbichel in Tyrol; auf dem Hohneck in den Vogesen.) Jul. Aug. C. Biebersteinii Bernhardi in Hornem. hort. hafn. C. longifolia Reichenb. ic. f. 1008., Koch Synops ed. 1. Strahl des HK. weiss. D.

56. STAEHELINA (L.) Stacheline. — HK. dachig. Bth. zwittrig, sämmtl. röhrig. Pappus abfällig, *die Strahlen desselben an der Basis in einen Ring verwachsen, ästig*; Aeste einfach, haarf., fiederig-gestellt. Fruchtb. sprengig; Spreublättchen tief-gespalten.

I. S. DUBIA (L.) Zweifelhafte S. — B. lineal., entfernt-gezähnt, oberseits grau, unterseits filzig; *Blättchen des HK. lanzettl.*; Pappus weit länger, als der HK. h. An trocknen, unfruchtb. O., (auf Cherso und Osero.) Jun.-Jul. Gerard. prodr. prov. t. 6. Bth. purpurn. J.

V. Untergruppe. SERRATULEEN. Cass. HK. reichblüthig. Bth. zwittrig. Pappus mehrreihig, federig oder haarig, bleibend, *die innerste Reihe länger, als die übrigen*.

57. SAUSSUREA (DC.) Saussuree. — HK. dachig. Bth. zwittrig, sämmtl. röhrig. Pappus federig, bleibend, von den

äussern Strahlen einige wenige kurz und gezähnt. Fruchtb. borstig-spreuig. Bth. aller purpurn.

1. *S. ALPINA* (DC.) Alpen-S. — *B. unterseits spinnewebig-filzig*, oberseits zuletzt kahl, *die wurzelst. ey-lanzettf.*, an der Basis abgerundet, gestielt, *die stengelst. lanzettl.*, die obern sitzend; Köpfchen ebensträussig-gehäuft. 4. An grasreichen O. der höhern GranitA., (auf den Penninischen und Rhätischen A. der Schw., sodann in Tyrol und auf den Norischen A. zw. Kärnth. und Krain.) Jul. Aug. *Serratula alpina* L. var. *α.* und *β.* Fl. dan. t. 37. *S. macrophylla* Sauter in der bot. Ztg. Blättchen des HK. etwas breiter, die Gf. über die Bl. hervorragend.

2. *S. DISCOLOR* (DC.) Verschiedenfarbige S. — *B. unterseits schneeweiss-filzig*, oberseits zuletzt kahl, *die wurzel- und untern stengelst. ey-lanzettf.*, an der Basis herzf., gestielt, die obersten sitzend, lanzettl.; Köpfchen ebensträussig-gehäuft. 4. In Felsenspalten der höchsten GranitA., (auf den Penninischen und Lepontinischen A., Bernhardin, Splügen und Simplon und a.; südl. Tyrol, Krain, Oestr., Istrien, Berg Hook, Zehenden Gombs in der Schw.) Jul. Aug. *Serratula discolor* Willd. *S. alpina* γ. L. Hall. helv. I. t. 6. S.

3. *S. PYGMAEA* (Spreng.) Zwergige S. — *B. lineal.-lanzettl. oder lineal.*, oberseits zerstreut-, unterseits dicht-rauhh., ganzrandig oder gezähnt; die äussern Blättchen des HK. an der Spitze etwas abstehend; *der St. 1köpfig*. 4. An felsigen O. auf KalkA., (Oestr., Steyerm und Krain.) Jul. Aug. *Serratula pygmaea* J. a. t. 410. *Cnicus pygmaeus* L. *Cirsium pygmaeum* Scop. *Lagrostemon pygmaeus* Cass. Die Schweife der Stbk. sind kaum behaarter, als bei den vorhergehenden. D.

58. *SERRATULA* (L. mit Ausschl. von Arten.) Scharte. — HK. dachig. Köpfchen gleichhig, 1- oder 2bettig. Bth. sämmtl. röhrig. Pappus haarig, mehrreihig, die innerste Reihe der Strahlen desselben länger, die Strahlen bleibend, zuletzt aber einzeln abfallend. Fruchtb. borstig-spreuig. — Stbf. mehr oder weniger rauh. Die Bth. aller purpurn.

1. Rutte. Blättchen des HK. ohne Anhängsel.

1. *S. TINCTORIA* (L.) Färber-S. — *B. etwas rauh, geschärft-gesägt, eyf., ungeth. oder leyerf., oder fiedersp.*; *Köpfchen länglich, ebensträussig*; HK. länglich. 4. In Wäldern und auf feuchten Waldwiesen. Jul. Aug. St. h. 3.

2. *S. RADIATA* (MBieb.) Gestrahlte S. — *B. flaumig-rauh, kammf.-fiedersp.*; Zpfl. lanzettl., spitz, ganzrandig oder etwas gesägt; St. einfach oder ästig, die Aeste 1köpfig; HK. fast kugelig, Blättchen stachelspitzig-dornig. 4. An gebirgigen, kalkhalt., trocknen O., (bei Burkersdorf in der Gegend von Wien; Krinikberg im Littor., Koinizzaberg in Istrien, Tommas.) Jun. Jul. *S. centauroides* Host., nicht L. *Carduus radiatus* W. und Kit. D.

3. *S. HETEROPHYLLA* (Desf. cat. hort. paris. 1804. S. 93.) Verschiedenblättrige *S.* — *B.* von sehr kurzen Härchen etwas rauh, die wurzelst. u. die untern stengelst. eyf., grobgezähnt oder an der Basis eingeschnitten, die oberen längl., fiedersp.-gezähnt, die obersten lineal.-ganzrandig; *St.* einfach, einköpfig; *HK.* fast kugelig, Blättchen stachelspitzig 4. Auf steinigem O. und Bergwiesen, (bei Laxenburg und Münkendorf unweit Wien, auf dem Svlavnik, der Koinizza und den benachbarten Bergen im Littorale.) Jun. Jul. *Carduus lycopifolius* Vill. delph. 3. t. 19. *C. nitidus* W. und K. 1. p. 52. t. 52. D.

4. *S. NUDICAULIS* (DC. fl. fr.) Nacktstengelige *S.* — Die untern *B.* elliptisch-länglich oder länglich, stumpf, in den Bstiel herablaufend, ungetheilt, die oberen schmal-lanzettl., eingeschnitten-wenigzählig oder ungeth., sitzend; der *St.* 1köpfig, oberwärts nackt; *HK.* eyf., die äussern Blättchen dörinig-haarspitzig, die innern an der Spitze verbreitert, trockenhäutig. 4. Auf den A. des südl. Europa, (bisher blos auf der Saleve bei Genf.) Jun. Jul. *Centaurea nudicaulis* L. *Carduus cerinthefolius* Vill. *C. cerinthoides* Willd. *C. glaucus* Cav. Gerard. prov. t. 5. S.

II. Rotte. Blättchen des *HK.* mit Anhängseln versehen.

5. *S. RHAPONTICUM* (DC.) Klettenblättrige *S.* — *B.* gestielt, eyf.-länglich, gezähnt, unterseits wollig-filzig, die wurzelst. fast herzf., die oberen lanzettl.; der *St.* 1köpfig; Blättchen des *HK.* an der Spitze in ein breit-eyf., trockenhäutiges, wehrloses Anhängsel verbreitert. 4. Auf den südlichen A., (auf den Walliser, Graubündner, Südtirol. und Südkrain A., den Steiner A.) Jul. Ang. *Rhaponticum scariosum* Lam. *Centaurea Rhapontica* L.

59. *JURINEA* (Cassini im Dict. de sc. nat. 24. S. 287.) Jurinie. — Pappus mit seiner Basis an einem kurz-walzlischen Knötchen angewachsen und mit demselben abfallend. Ausserdem Alles, wie bei *Serratula*. — Bth. purpurn.

1. *J. MOLLIS* (Reichenbach fl. exc. S. 290.) Weiche *J.* — *B.* unterseits filzig, fiedersp., Fieder lineal, ganzrandig; der *St.* oberwärts nackt, meist 1köpfig; *HK.* fast kugelig; Blättchen lanzettl.-pfriemlich, spinnwebig-wollig; Achenen in Plättchen gefaltet. 4. An unkultiv., sonnigen O., (in dem östr. Littor. und von da dch Krain, Untersteyern., Niederöstr. bis nach Mähren.) Mai. Jun. *Carduus mollis* L. J. a. t. 18. *Serratula cyanoides* Gärtner. (mit Ausschl. von Syn.) *S. blanda* MB. *S. simplex* DC. diss. *S. mollis* Koch Syn. ed. 1. *Cirsium molle* Scop. carn. Var. mit ungeth. *B.* D.

2. *J. CYANOIDES* (Reichenb. fl. exc. S. 290.) Cyanenartige *J.* — *B.* unterseits filzig, fiedersp., Fieder lineal, ganzrandig; der *St.* 1-armköpfig; Köpfchen endst., einzeln, fast kugelig; Blättchen des *HK.* lanzettl.-pfriemlich, filzig-grau; Achenen glatt, schwachgrübig. 4. Auf Sandfeldern und trocknen, unkultiv. Hügeln, (Rheinfläche von Maxdorf bis Mainz; von Frankf. am M. stw. bis

Werthheim und Würzburg; Thüring. am Unterharze und bei Halle; Böhml.; Mecklenbg.) Jul. Aug. *Serratula cyanoides* DC. diss., MB. taur. cauc. *S. Pollichii* Koch Syn. ed. I. *Carduus cyanoides* α . *monoclonus* L. spec. *C. cyanoides* MB. taur. cauc., Spreng. hal. t. II. *C. mollis* Pollich palat. *Acarna cyanoides* Wib. werth. — Die Diagnose des *Carduus cyanoides* entwarf Linne von seiner Variet. β , von dem *Carduus monoclonos* Willdenow, welcher herablaufende B. hat. — Die *Serratula Pollichii* DC. hort. monsp. bildet nun im Prodr. die Variet. β . der *S. cyanoides*, aber es ist keine Variet., denn die Formen mit schmalen und breiteren BZpfln wachsen an ein und denselben O. unter einander und sind doch keine Grenzen geschieden. D.

VI. Untergruppe. *CENTAURIEEN*. Lessing. syn. comp. 6. HK. reichblüthig. Bth. zwittrig oder die randst. geschlechtslos. Pappus mehrreihig, federig oder haarig, bleibend, die vorletzte Reihe der Strahlen desselben länger, als die übrigen; oder kein Pappus.

60. *CARTHAMUS* (L. mit Ausschl. von Arten.) Farhendistel. — HK. dachig. Bth. zwittrig, sämmtlich röhrig, gleichgestaltet. Achene 4rippig. Pappus fehlend. Fruchtb. borstig-spreuig.

1. *C. TINCTORIUS* (L.) Gemeine F. — B. ungeth., gezähnt-gezägt und nebst dem St. kahl, Sägezähne dörnig. ☉. Aus Aegypten eingebracht, wird zum Farbegebrauch kultiv. Jul. Aug. Lam. ill. t. 661. f. 3. Bth. anfangs hellgelb mit safrangelbem Rachen, zuletzt ganz-safrangelb. Kultiv.

61. *KENTROPHYLLUM* (Neck. DC.) Spornblatt. — HK. dachig. Bth. zwittrig, sämmtl. röhrig. Pappus aller Bth. spreuig-borstig, mehrreihig; Strahlen desselben lanzettl.-lineal., die vorletzte Reihe länger, die innerste viel kürzer, zsschliessend; oder der Pappus der randst. Bth. fehlend. Fruchtb. borstig-spreuig.

1. *K. LANATUM* (DC. bei Dub.) Wolliges S. — Die untern B. fiedersp., gezähnt, die obersten stengelumfassend, fiedersp.-zählig; der St. nebst dem HK. wollig; die randst. Bth. ohne Pappus. ☉. An gebirgigen O. und Wegen, (im wärmern Krain; bei Finne. Noé; südl. Tyrol, Facchini; westl. Schw. selten nach Heg.) Jul. Aug. *Carthamus lanatus* L. *Centaurea lanata* DC. *Atractylis Fusus agrestis* Gärtner. *A. lanata* Scop. Bth. citronengelb. D.

62. *CENTAURÉA* (L.) Flockenblume. — HK. dachig. Die randst. Bth. geschlechtslos, die Röhre allmählig in einen trichterf. Saum erweitert; die des Mittelfeldes zwittrig, Saum an der Basis weiter, als die Röhre oder bauchig. Achene zsgedrückt, mit einem seitenst. Nabel an der Basis. Pappus mehrreihig, die Strahlen desselben borstenf. oder lineal., die vorletzte Reihe länger, die innerste kürzer und zsschliessend; seltner kein Pappus. Fruchtb. borstig-spreuig.

1. Rotte. *JACEA* Juss. Blättchen des HK. mit einem trockenhäutigen An-

hängsel endigend, dieses ungeth. oder an den mittlern und äussern Blättchen franz. geth., die letzte Franse borstlich, nicht dicker, als die übrigen, und nicht starrer. Bth. aller un-serer Arten dieser Rote fleischroth oder purpurn.

1. *C. SPLENDENS* (L.) Glänzende F. — *Die Anhängsel der Blättchen des HK. durchscheuend, eyf., ungeth., aufgeblasen-konkav; Pappus ohngefähr so lang, als die Achene; B. rauh, die untern doppeltfiedersp., die obern einfach-fiedersp., Fieder aller lineal., stachelspitzig* 4. An gebirgigen, sonnigen O., (im Littor. bei Triest, Fiume; im C. Tessin) Jul. Aug. Stoebe salmantica tertia Clus. — *Die Anhängsel des HK. manchmal auf dem Mittelfelde mit einem braunen Flecken bezeichnet. — Die C. alba L., welche der C. splendens sehr ähnlich, aber doch die kleineren Köpfchen und ungeth. oder nur an der Basis mit 2-4 Zähnen versehenen obern B. verschieden ist, wächst nicht im Gebiete unserer Flora; vgl. auch Gaud. helv. 5. p. 407., in der Anmerk.*

2. *C. AMARA* (L. spec. 1292) Bittere F. — *Die Anhängsel der Blättchen des HK. den ganzen HK. bedeckend, trockenhäutig, konkav, eyf., ganzrandig oder zerfetzt; Pappus fehlend; B. nebst dem St. flockig, fast filzig, die untersten ungeth. oder fiedersp., die stengelst. lanzettl.-lineal., ganzrandig.* 4. An trockenen unkultiv. O., (südl. Schw., südl. Tyrol, Littorale.) Aug.

3. *C. JACEA* (L.) Gemeine F. — *Die Anhängsel den ganzen HK. bedeckend, trockenhäutig, konkav, eyf., ungeth., zerrissen oder die untern kannf.-gefranst; Pappus fehlend; B. lanzettl., ungeth., oder die untern entfernt-buchtig oder fiedersp.* 4. Auf trocknen Wiesen, an unkultiv. O. Jun.-Herbst. St. h. 4. Eine ausnehmend vielgestaltige Pflanze; var.: der St. aufrecht, mehrköpfig, oder ästig, ruthenf. und vielköpfig, oder niedrig, fingerslang, ja auch nur 1 Zoll hoch u. iköpfig, liegend oder aufstrebend; B. ungeth., gezähnt oder ganzrandig, oder entfernt-buchtig und fiedersp., meist mit 2 eyf., lanzettl. oder lineal. Lappen auf jeder Seite; Farbe der B. grasgrün oder wegen des spinnwebig-wolligen Ueberzuges grau; Köpfchen ohne Strahl, und:

a. genuina, Blättchen des HK. sämmtlich mit einem löffelf. Anhängsel, ganzrandig, oder gezähnt, aber ganz oder nur hie und da mit einem Schlitz unregelmässig eingerissen.

β. vulgaris, die untersten 1-3 Blättchen des HK. mit einem gefransten Anhängsel, sonst wie die Variet. *a*.

γ. lacera, die meisten der untern Blättchen des HK. mit einem gefransten Anhängsel, die zunächstfolgenden mit einem unregelmässig zerfetzt-gefranstem Anhang, nur die oberen mit einem ungetheilten Anhang: *C. decipiens* Reichenb. ic. f. 1316. und wenn die Köpfchen ohne Strahl sind: *C. decipiens* Thuill. par., *C. nigra* *β*. DC. prodr.

ε. commutata, sämmtliche Blättchen des HK., die innersten ausgenommen, mit einem regelmässig- und tief-franzig-getheilten Anhängsel, dessen Fransen lineal-borstlich: *C. nigrescens* unserer Floren diesseits der A. und DC. prodr. Dieses Synonym zog ich in meinem Taschenb. der D. Fl. zur Variet. *γ*. von *C. nigres-*

cens, aber wegen der Worte des Autors: „verschieden von *Centaurea transalpina* doch das grosse Anhängsel an den unteren Schuppen ganz so wie bei *C. nigra*“ gehört es wohl hieher. Diese Variet. bildet, wenn der Strahl fehlt, die *C. Jacea capitata* Koch und Ziz. cat. pl. palat., die oft von *C. nigra* nur doch das Fehlen des Pappus zu unterscheiden ist.

5. *pratensis*, Blättchen des HK. mit einem spitzen, verlängerten, entfernter gefransten, oft zurückgebogenen Anhängsel; *C. pratensis* Thuill. paris., DC. prodr. nach dem Citat: Reichenb. icon. f. 1294.

3. *C. NIGRESCENS* (Willd.) Schwärzliche F. — *Die Anhängsel* des HK. eyf., aufrecht oder an der Spitze zurückgekrümmt, kammf. gefranst. *von einander entfernt*, die Fransen ohngefähr von der Breite ihres Mittelfeldes, die der innern Blättchen rundlich, zerrissen-gezähnt; *Pappus fehlend*; *B. länglich und eyf., gezähnt, ungeth. oder die untern leyerf.-buchtig.* 4. Auf Gehirgs- und Alpenwiesen, (Littorale, Krain, Steyerm., südl. Tyrol, südl. Schw.) Jul. Aug. Blh. purpurn. Die Anhängsel des HK. sind schwarz, auch schwarz-braun, seltener hell-braun und blasser. Kommt vor.

a. transalpina, die unteren Anhängsel der Blättchen des HK. klein, 3eckig, von einander entfernt, die mittleren angedrückt: *C. transalpina* Schleich pl. exs.

β. vochinensis, die Anhängsel der unteren und mittleren Blättchen des HK. eyf.-lanzettl., mit der Spitze zurückgebogen, sonst wie bei der Var. *a.*: *C. vochinensis* Bernhardi, *C. salicifolia* DC. prodr.

γ. Candollii, die Anhängsel der unteren Blättchen des HK. grösser, sich mit den Rändern deckend, die oberen entfernter, grösser, als bei der Variet. *β.*: *C. nigrescens* var. *γ.* Koch Taschenb. mit Ausschluss des Synonyms von DC. Diese fand Facchini im südl. Tyrol mit Formen, welche den Uebergang in die Variet. *a.* und *β.* darstellen. — Diese Art kommt auch mit Köpfchen ohne Strahl vor. — Willdenow sagt bei der Beschreibung von *Centaurea nigrescens*: „sie unterscheidet sich von *Centaurea nigra* doch die gewimperten und nicht federigen Schuppen des K.“ nämlich wie bei *C. nigra*. Die Anhängsel der Variet. *ε. commutata* der *Centaurea Jacea* sind genau verglichen, wie bei *C. nigra*.

5. *C. AUSTRIACA* (Willd.) Oestreichische F. — *Die Anhängsel* des HK. aus lanzettl. Basis lang-pfriemlich, zurückgekrümmt, gefiedert-gefranst, die untersten Fransen genähert, die oberen entfernt, sämtl. borstlich, *die Anhängsel der 3 innern Reihen rundlich*, zerrissen-gezähnt, *über die äusseren hinausragend*; Pappus 3 mal kürzer, als die Achene; Köpfchen eyf.; *B. länglich-elliptisch und lanzettl., gesägt-gezähnt*; der St. aufrecht, ästig. 4. Auf Wiesen und unkultiv., steinigem O., (Preussen bei Königsberg und Danzig, Schles., Unteröstr., südl. Tyrol, Graubünden.) Jul. Aug. *C. austriaca* Willd., in dessen Herbar. n. 16541., Fol. 1., ein von Kitaib. dem Autor. mitgetheiltes Expl.; (Fol. 2. ent-

hält ein Expl. von *C. nervosa*, ohne Zweifel ein kultivirtes, übriges mit einem ? bezeichnet.) Bth. purpurn. — *C. austriaca* allerdings der *C. Phrygia* sehr ähnlich; untersch. sich jedoch dch folg.: die Köpfchen mehr eyf.; die Anhängsel der äussern Blättchen des HK. nicht so sehr verlängert, und die 3 innern Reihen sind nur an der Spitze zerrissen-gefranst oder ungetheilt, und ragen über die übrigen deutlich hinaus; ob doch Variet.? Von *C. nigrescens* dch den Pappus hinreichend verschieden. — Var.:

α. genuina, die Anhängsel der Blättchen des HK. lang, das ganze Köpfchen mit Ausnahme der innersten Blättchen desselben locker bedeckend, ganz schwarz, nur an der obersten Spitze und den Spitzchen der Fransen braun.

β. fusca, die Anhängsel und deren Fransen von der Mitte an bis zur Spitze braun: *C. austriaca* *γ. ambigua* DC. prodr. nach Expl., welche an dem von DC. bezeichneten O. gefunden, mir dch die Güte des Herrn von Salis zu Theil wurden.

γ. pallida, die Anhängsel hell-bräunlich-gelb, nur an der Basis schwarz: *C. cirrata* Rehb. ic. 10. f. 1293.

δ. capitata, Köpfchen ohne Strahl, die Anhängsel der Blättchen des HK. wie bei der Variet. *α*.

5. *C. PHRYGIA* (L.) Phrygische F. — *Die Anhängsel* des HK. aus lanzettl. Basis *lang-pfriemlich*, *zurückgekrümmt*, *fiederig-gefranst*, die untersten Fransen genähert, die obern entfernt, sämmtl. verlängert-borstlich, die Anhängsel der innersten Reihe rundlich, zerrissen-gezähnt, von den Fransen der folgenden Reihe bedeckt; *Pappus 3 mal kürzer*, als die Achene; Köpfchen rundlich; B. länglich-elliptisch und eyf., ungeth., gezähnt; der St. aufrecht, ästig. 4. In Wäldern und auf Wiesen der Gebirge und VorA., (in der Schw. selten, im Oberinntale und im unteren Engadin, und in der AK. bis Oestr.; von Mähr. dch Böh., Schles., Thüring. an den Harz, bei Hamburg, und noch hin und wieder stw.) Jul. Aug. *C. phrygia* Willd. spec. und herbar.! *C. phrygia* Linn. spec. ist nach dem Citat der Abbildung von Clusius unsere Pfl.; in dieser Abbildung erkennt man auf den ersten Blick unsere Art. Die von Linne gegebene Diagnose enthält kein Merkmal, wodurch wir *C. phrygia* von *C. nervosa* unterscheiden können, bloss die Figur von Clusius gibt Aufschluss. Die übrigen Synonyme Linne's erläutern nichts. — *C. austriaca* DC. prodr., nicht Willd. — Var.:

β. pallida. Anhängsel blass-braun-gelb, nur an der Basis schwarz.

γ. capitata, Bth. des Strahles nicht grösser, als die übrigen: *C. flosculosa* Balbis, nach Expl. des Autors selbst in der Sammlung von Willd. und Froelich. Bth. purpurn.

7. *C. NERVOSA* (Willd.) Nervige F. — *Die Anhängsel* des HK. aus lanzettl. Basis *lang-pfriemlich*, *zurückgekrümmt*, *gefiedert-fransig*, die untersten Fransen genähert, die obern entfernt, sämmtlich verlängert-borstlich, die Anhängsel der innersten Reihe rundlich, zerrissen-gezähnt, von den Fransen der folg. Reihe be-

deckt; *Pappus* ohngefähr so lang, als die *Achene*; der *St.* einfach, 1köpfig; Köpfchen rundlich; *B.* lanzettl., ungeth., gezähnel, die oberen an der Basis tiefer-gezähnt, und fast abgeschnitten. 4. Auf Triften der A. (Schw., südl. Tyrol, Krain.) Jul. Aug. C. Berini Sieb. C. phrygia DC. prodr., Rb. ic. 4. t. 554. C. phrygia β . helvetica Gaud. C. austriaca Roch. — Kleine Expl. sind C. ambigua Thom. — Bth. purpurn. Var. sehr selten mit buchtig-gezähnten *B.* und β . *capitata* mit Köpfchen ohne Strahl. Der *St.* bekommt an der kultiv. Pflanze einen oder den andern Ast, aber von Salis sah unter 1000 wilden Expl. nur ein einziges mit einem Aste versehenes.

Centaurea uniflora L. in den A. von Savoyen und der Dauphiné einheimisch, aber für die Schw. und die D. Flora ein noch nicht gesicherter Bürger, ist der C. nervosa sehr ähnlich, untersch. sich jedoch dch die verlängerten, ganzrandigen oder fein-gezähnelten und nebst dem *St.* weisslich-wolligen *B.*, wovon die oberen an der Basis abgerundet, nicht abgeschnitten sind; dessen ungeachtet vermuthe ich, dass sie in C. nervosa übergeht.

8. C. NIGRA (L.) Schwarze F. — Die Anhängsel des HK. aufrecht, lanzettl., gefiedert-fransig, Fransen borstlich, noch einmal so lang, als die Breite ihres Mittelfeldes, sämmtl. genähert und den HK. verdeckend, die innern Anhängsel rundlich, zerrissen-gezähnt; *Pappus* 3mal kürzer, als die *Achene*; *B.* lanzettl., ziemlich rauh., die untern gezähnt oder fast buchtig. 4. An gebirgigen O. unter Gesträuch, an Wegen, (in den Gebirgen von Basel an dch Würtembg und Elsass längs dem Rheine bis nach den Niederlanden und Westphalen; in Niederöstr., Danzig.) Jul. Aug. Eine gute Abbildung in Reichards Fl. von Frankf. a. M. Var.

β . *pallens*, Fransen der Anhängsel blassbraun und gelb. — Bthen der Art purpurn.

H. Rotte, CYANUS L. sp. 1287. Das Anhängsel oder der Rand der Spitze von den Blättchen des HK. trockenhäutig, fransig-gespalten, die Endfranse breiter und stärker, (obgleich sie nicht selten kürzer ist, als die übrigen,) oft dörnig oder auch starr-dörnig. Die Länge der dörnigen Spitze ist sehr veränderlich und zwar bei einer und derselben Art.

9. C. MONTANA (L.) Berg-F. — Blättchen des HK. geschwärzberandet, gesägt-fransig, Fransen ohngefähr so breit, als der Rand; *B.* herablaufend, länglich-lanzettl., ungeth. oder buchtig, ganzrandig oder gezähnel. 4. In Wäldern der Gebirge und VorA., (dch die g. AK. und von der Schw. dch die Gebirge von Würtemb., Baden, Elsass auf beiden Seiten bis zum Unterrheine; von Oestr. dch Mähr., Schles. und Böhm. bis zum Harze stw.) Jul. Aug. J. a. t. 371. C. mollis W. und Kit. Die *B.* mehr oder weniger herablaufend. Fransen flach, meist nebst dem Rande selbst geschwärzt. Die randst. Bth. kornblumenblau, die des Mittelfeldes röthlich-violett, oft auch die randst. von derselben Farbe. *B.* mit spinnwebiger, angedrückter Wolle bedeckt oder auch ziemlich kahl.

10. *C. AXILLARIS* (Willd.) Seitenblüthige F. — Blättchen des HK. geschwärzt-berandet, gesägt-fransig, *Fransen fast knorpelig und beinahe noch einmal so lang, als der geschwänzte Rand*; *B. herablaufend*, verlängert-lanzettl., ungeth. oder buchtig, oder buchtig-gezähnt. 4. An gebirgigen O. der wärm. Gegenden, (Schw. jenseits der A.; Krain. Littor., Kärnth., bei München.) Jul. Aug. Bth. wie die der vorhergehenden Art. Var.: Rand der Blättchen des HK. hell-bräunlich mit weissen Fransen und schwarz mit an der Basis braunen und an der Spitze weissen Fransen; ferner

α. stricta, höher, *B. ungeth.*, die oberen am St. mit breitem Flügel herablaufend: *C. stricta* W. und Kit.

β. carniolica, höher, *B. buchtig-gezähnt*, Zähne oder Winkel beiderseits 2 oder 3: *C. carniolica* Host., nach einem von Illadnik erhaltenen Expl. *C. Triumphetti* All.

γ. seusana, niedrig, *B. sehr schmal*, herablaufend, lineal. ohngefähr 2 Linien breit, die untern entfernt-gezähnt: *C. seusana* Vill. *C. variegata* Lam.

11. *C. CYANUS* (L.) Korn-F. (Kornblume.) — Blättchen des HK. geschwärzt-berandet, *gesägt-fransig*; *B. lineal-lanzettl.*, die untersten an der Basis gezähnt, die wurzelst. verkehrtey-lanzettf., ungeth. und 3sp.; Pappus ohngefähr so lang, als die Achene. ☉. Unter der Saat überall. Jun. Jul. St. h. 4. Die randst. Bth. blau, die des Mittelfeldes violett.

12. *C. SCABIOSA* (L.) Scabiosenartige F. — Die Auhängsel des rundlichen HK. geschwärzt, 3eckig, spitz, flach, gefranst, *schmäler, als die dieselben nicht verdeckenden Blättchen*, diese *nervenlos*, Fransen schlängelich, so lang, als der Querdurchmesser des Blättchens, oder kürzer, die endständige kurz oder in einen Dorn vorgezogen; Pappus ohngefähr so lang, als der Fruchtkn.; *B. fast wollig und ausserdem rauh oder kahl, fiedersp. und doppeltfiedersp.*, Zpfl lanzettl., ganzrandig oder gezähnt, *mit einem schwieligen Punkte endigend*. 4. Auf trocknen, unkultiv. Hügeln, an Acker- und Wegrändern sowohl in den Ebenen, als auf den Gebirgen und bis in die VorA. Jul. Aug. Bth. violett. Var.: Bzpfl breiter, lanzettl. und schmaler, lineal., gezähnt und ganzrandig, seltner die *B. ungeth.*, lanzettl. und die oberen nur an der Basis fiedersp.; Köpfchen wollig und kahl, und ferner

α. vulgaris, *B. am Rande rauh und auf der Oberfläche kurz.*, seltner filzig; HK. mehr oder weniger wollig.

β. coriacea, *B. kahl, am Rande rauh*; HK. fast kahl: *C. coriacea* W. und Kit. t. 195. ein Expl. mit ziemlich breit-lanzettl., Fiedern; ausser dem fehlenden Ueberzuge finde ich keinen Unterschied zw. dieser Variet. und einer ähnlichen Form von der gewöhnlichen *C. Scabiosa*.

γ. badensis, *B. am Rande und auf den Flächen kahl*: *C. badensis* Tratt.

δ. spinulosa, die endst. Franse der Blättchen des HK. in einen länglichen, stärkeren Dorn verwandelt: *C. spinulosa* Roch. *C.*

Stoebe Willd. Herbar. Scheint nur eine dörnige Variet. von *C. Scabiosa*, die dch ganz D. zerstreut vorkommt. Auf ähnliche Weise variiren *C. orientalis*, *C. atropurpurea*, *C. rupestris* und andere. — *C. spinulosa* DC. prodr. hat keinen Pappus und scheint zu einer anderen Art zu gehören.

Die *Centaurea stereophylla* Bess., vom Autor selbst im Schul-tesischen Herbar., von welcher ich noch kein, im Gebiete unserer Flora gesammeltes Expl. gesehen habe, ist der *C. Scabiosa* hinsichtlich der B. ähnlich, unterscheidet sich jedoch dch die um die Hälfte kleineren Köpfchen und die sehr kleinen Anhängsel des HK. In diesen Merkmalen stimmt sie mit der Variet. *adonidifolia* der *C. rupestris* überein, von der sie dch die nicht so fein-zerschnittenen B., mit einem schwieligen Punkte und nicht mit einer dünnen Stachelspitze endigenden Zpfl derselben und die Farbe der Bth. abweicht.

13. *C. KOTSCHYANA* (Keuffel pl. exsicc.) Kotschy's F. — *Die Anhängsel des rundlichen HK. schwürzlich*, 3eckig, spitz, flach, gefranst, *die nervenlosen Blättchen bedeckend und breiter, als die Blättchen selbst*, die Fransen schlängelich, länger, als der Querdurchmesser des Anhängsels, die endständige kurz oder in einen Dorn verlängert; Pappus ohngefähr so lang, als der Fruchtkn.; B. etwas wollig, kahl oder glatt, *fiedersp. oder leyerf.-fiedersp.*, Zpfl lanzettl., ganzrandig oder gezähnt, mit einem schwieligen Punkt endigend. 4. An Abhängen des Berges Ortscher in Unteröstr., Dolliner. Jul. Aug. Bth. dunkel-violett.-purpurn. St. meist 1köpfig. Die Köpfchen 2-3mal grösser, als bei *C. Scabiosa*. — Zwischen dieser und der vorigen Art steht in der Mitte die *C. alpestris* Hegetschw. und Heer Fl. der Schw. Der St. ist ebenfalls 1-2köpfig, die Köpfchen gross, aber die Schuppen des HK. werden nicht dch die Anhängsel verdeckt. Diese Form macht den Uebergang zu *C. Scabiosa*, von der sich auch die *C. Kotschyana* als Art wohl nicht unterscheidet.

14. *C. SORDIDA* (Willd.) Schmutzige F. — *Die Anhängsel des rundlich-eyf. HK. geschrärzt*, 3eckig, spitz, flach, gefranst, *die Blättchen nicht verdeckend, diese nervenlos*, Fransen schlängelich, die endständige kurz oder in einen Dorn vorgezogen; Pappus ohngefähr so lang, als die Achene; B. etwas wollig, am Rande rauh oder kahl, *die wurzelst. doppelt-gefiedert, die obern stengelst. fiedersp.*, Zpfl lineal. in eine borstliche, schwielige Stachelspitze endigend. 4. Auf trocknen Wiesen im Littor. und Krain, (Adelsberg und am Fusse des Berges Nanas, Fiume, Triest, im Thale der Ljepina, des Isonzo, Tommas.) Jun. Jul. *C. variabilis* γ. *sordida* Bartl. Bth. bald schmutzig-gelb, bald schmutzig-purpurn; scheint ein Bastard von *C. Scabiosa* und *C. rupestris*. Schiede hielt sie für einen von *C. Scabiosa* und *C. collina*, wesswegen er sie *C. collino-scabiosa* nannte. Var.:

α. *lutescens*, die Endfranse der Anhängsel kaum dörnig; und wenn die Bth. zugleich schmutzig-gelblich: *C. pubescens* Willd.

β. *purpurascens*, die Endfranse der Anhängsel in einen stür-

keren Dorn verwandelt; und wenn die Bth. zugleich schmutzigg-purpurn: *C. sordida* Willd. herbar. *C. Grafiana* DC. prodr. D.

15. *C. RUPESTRIS* (L.) Felsen-F. — *Die Anhängsel des HK. länglich-eyf., kurz, bräunlich, flach, fransig. Fransen schlängelig, die endständige kurz oder stark-dornig; Pappus kürzer, als die Achene; B. kahl, am Rande rauh oder unterseits flockig-wollig, die wurzelst. doppelt-gefiedert, die obern stengelst. fiedersp., Zpfl. lineal., stachelspitzig.* 4. An sonnigen, felsigen O., auf Bergwiesen, (auf dem Karsch; bei Adelsberg in Krain; auf den Bergen bei Fiume.) Jun. Jul. Bth. citron- oder goldgelb. *C. varabilis* α. und β. Bartl. Var.:

α. *subinermis*, Dorn der Blättchen des HK. kurz, oft kürzer, als das Anhängsel selbst: *C. rupestris* L. nach der Beschreibg. *C. adonidifolia* Rb.

β. *armata*, Dorn der mittlern Blättchen stark, fast um die Hälfte länger, als der HK.: *C. rupestris* Rb. *C. collina* Scop. D.

Ein im Gebiete unserer Flora gesammeltes Expl. von *C. collina* L. sah ich noch nicht; Host. nahm sie wohl aus Irrthum unter die Krainer Pflanzen auf.

16. *C. MACULOSA* (Lamarck dict. 1. S. 669.) Fleckige F. — *Anhängsel des rundl., eyf. HK. mit einem 3eckigen, geschwärtzten, beiderseits sich etwas hinabziehenden Flecken bezeichnet, die erhaben-5nervigen Blättchen nicht bedeckend, gefranst, Fransen schlängelig, etwas knorpelig, die endständige oft einen Dorn bildend; Pappus halb so lang, als die Achene; die B. kahl, etwas wollig, die wurzelst. meist doppelt-gefiedert, die stengelst. einfach-fiederig mit linealen Zpfln, die astst. oft ungetheilt, lineal.; St. aufrecht, oberwärts rispig und fast ebensträussig.* ☉. An sonnigen, unkultiv. O., (sehr zerstreut dch das Gebiet.) Jul. Aug. *C. maculosa* DC. prodr. *C. paniculata* Jacq. austr. t. 320., Koch Synops. ed. 1. und sämmtlicher Autor. der deutschen Flora. Bth. blass-violett.

17. *C. PANICULATA* (Lam. Dict. 1. p. 669.) Rispige F. — *Die Anhängsel des eyf.-längl. HK. lederbraun, die erhaben-5nervigen Blättchen nicht bedeckend, gefranst, die Fransen etwas knorpelig, schlängelig, die endständige dicker und ein steifes fast stechendes Dörnchen bildend; Pappus ohngefähr so lang als der dritte Theil der Achene; B. rauh, filzig, die wurzelst. meist doppelt-fiedersp., die stengelst. einfach fiedersp. mit linealen Zpfln, die astst. meist einfach, lineal.; St. aufrecht, oberwärts locker rispig, die Köpfchen zerstreut.* ☉. An unbebauten O., an Wegen (im Wallis, Gaud.) Jul. Aug. Bth. nach Gaud. rosenfarb. *C. paniculata* DC. prodr. var. ε. *valesiaca*. — Linne scheint unter seine *C. paniculata* 2 oder mehrere Arten vereinigt zu haben. S.

18. *C. CRISTATA* (Bartl.) Federbuschartige F. — *Die Anhängsel des HK. breit-eyf., gefranst, die äussern Blättchen verdeckend, Fransen knorpelig, schlängelig, die endständige in einen Dorn vorgezogen oder fast gleich; Pappus fehlend; B. rauh, die wur-*

zelst. fast 3 fachgefiedert, die stengelst. gefiedert, Fieder nebst den obersten B. lineal.; der St. sehr ästig, spreitzend. ☉. An steinigem, trocknem, sonnigen O. (bei Triest und Fiume.) Jul. Aug. C. spinoso-ciliata Bernhadi bei Spreng. nach einem Expl. vom Autor selbst. C. acutiloba DC prodr. Rhaponticum paniculatum Scop. gehört wegen „der nackten Samen“ hieher. Bth. fleischroth. D.

19. C. KARSCHIANA (Scop.) Fränsige F. — *Die Anhängsel des eyf. HK. fast 3eckig, spitz, gefranst, die Blättchen nicht verdeckend, diese 5nervig*, Fransen knorpelig, etwas bogig, die endständige in einen Dorn hervorgezogen; *Pappus so lang, als der Fruchtkn.*; B. kahl, am Rande rauh, die wurzelst. fast doppelt-gefiedert, die stengelst. gefiedert, Fieder nebst den obersten B. lanzettl., vorne breiter; der St. von der Basis an sehr ästig, rasig. ☉. Auf sonnigen felsigen Gebirgswiesen, (auf d. Karscht, bei Duino, bei Smergo auf Cherso.) Jul. Aug. C. Karschiana Wulf. in Roem. arch. Bth. violett. D.

III. Rotte. CALCITRAPA. Blättchen des HK. am Rande nicht gefranst, aber an der Spitze in einen handf. oder gefiederten Dorn endigend.

20. C. SOLSTITIALIS (L.) Sommer-F. — *Blättchen des wolligen HK. handf.-dornig*, der mittlere Dorn stark, länger als das Köpfchen; *die endst. Köpfchen einzeln*; B. graulich, lineal.-lanzettl., herablaufend, ganzrandig, die wurzelst. leyerf. ☉. Auf Aeckern, an Wegen, (im Litter. um Triest; ausserdem einzeln und selten doch das g. Gebiet, wahrscheinlich mit Getreide eingeführt.) Jul. Aug. Bth. citrongelb.

21. C. CALCITRAPA (L.) Sterndistel-F. — *Blättchen des ganz kahlen HK. fast handf.-dornig*, der mittlere Dorn stark, länger, als das Köpfchen; *die seitenst. Köpfchen einzeln, fast sitzend*; Pappus fehlend; B. tief-fiedersp., mit lineal., gezähnten Fiedern, die untern gestielt, die obern sitzend, die obersten ungeth.; der St. sehr ästig, behaart. ☉. An unbekannten O. und Wegen, (stetw. fast in allen Provinzen) Jul. Aug. St. h. 4. Bth. purpurn.

Centaurea melitensis L. ward von Herrn Dr. Pfeiffer in Hessen („an sonnigen Rainen zw. Schönfeld und Wahlershausen bei Kassel“) am 16. Septbr. 1813 entdeckt. Ob dieselbe dort wirklich einheimisch ist oder werde, oder ob sie später wieder verschwinden wird, werden weitere Beobachtungen zeigen.

60. CRUPINA (Pers. bei Lessing.) Crupine. — Achene stielrund; Nabel endst.; sonst Alles, wie bei Centaurea.

I. C. VULGARIS (Pers.) Gemeine C. — *Blättchen des HK. lanzettl., zugespitzt*; B. gefiedert, rauh, Fieder lineal., spitz, stachelspitzig-kleingesägt. ☉. An unfrucht. O., (Istrien.) Jul. Aug. Centaurea Crupina L. Bth. fleischroth. J.

VII. Untergruppe. XERANTHEMEEN. Less. syn. comp. p. 14. HK. reichblüthig. Die randst. Bth. weiblich, die des Mittelfeldes zwittrig, fruchtbar.

61. *XERANTHEMUM* (L. mit Ausschl. von Arten.) Spreublume. -- HK. dachig; Blättchen trockenhäutig, die inneren länger, farbig, strahlend. Die randst. Bth. weiblich, wenige, unfruchtbar, 2lippig; die Bth. des Mittelfeldes zwittrig, fruchtbar, 5zählig. Pappus des Mittelfeldes spreuig; Spreublättchen 5-10, an der Basis lanzettl.; der der randst. Bth. fehlend. Fruchtboden spreuig.

1. *X. ANNUUM* (L.) Jährige S. — HK. halbkugelig, *Blättchen ganz kahl*, stachelspitzig, die äussern eyf., die innern lanzettl., noch einmal so lang, als das Mittelfeld ☉. An sonnigen, trocknen O., (im Littor. bei Triest, in Unteröstr., Mähr. und Böhm.) Jun. Jul. J. a. t. 388. *X. annuum* var. *α*. L. spec., *X. radiatum* Lam. fl. fr., DC. prodr. Strahl des HK. purpurn wie bei den folgenden.

2. *X. INAPERTUM* (Willd.) Geschlossene S. — HK. fast walzlich, *Blättchen ganz kahl*, stachelspitzig, die äussern eyf., die innern lanzettl., $1\frac{1}{2}$ mal so lang als die Bth. des Mittelfeldes. ☉. An unfruchtbar, trocknen O., (im mittlern Wallis nicht selten.) Mai. Jun. *X. annuum* β . *inapertum* L. Rb. ic. 7. f. 863. *X. erectum* Presl. del., DC. prodr.

3. *X. CYLINDRACEUM* (Smith.) Walzliche S. — HK. walzlich, die äussern *Blättchen* eyf., grannenlos, in der Mitte sitzig, am Rande breit-kahl, die innern lanzettl., $1\frac{1}{2}$ mal so lang, als die Bth. des Mittelfeldes. ☉. An sonnigen O., (bei Pola in Istrien, doch habe ich von da noch kein Expl. gesehen.) Mai. Jun. Rb. ic. 7. f. 862. *X. cylindricum* Spreng. *X. inapertum* DC. fl. fr. J.

III. Unterordn. und Gruppe. *CICHORACEEN*. Juss. gen. pl. 186. (Semiflosculosae L. Lactuceae Cass.) Der Gf. nicht gegliedert. Bth. sämmtl. zungenf. und zwittrig. Die Schenkel des Gf. fädlich, zurückgerollt, kurz, fläumlich.

I. Untergruppe. *SCOLYMEEN*. Less. syn. p. 126. Fruchtb. spreublättrig, die Spreublättchen gegen ihren Rand hin zsfaltet, die ganze Achene umhüllend und mit ihnen verwachsen, dadurch eine flügel-zsgedrückte Fruchthülle scheinbar darstellend.

63. *SCOLYMUS* (L.) Golddistel. — HK. dachig. Die Spreublättchen des Fruchtb. die Achene einschliessend und an diese angewachsen, zsgedrückte, breit-geflügelte Samen darstellend. Der Pappus ganz oder ein etwas gekerbter Rand, (*Scolymus* Cass.) oder aus 2 Spreublättchen u. aus einem kurzen, gezähnelten Krönchen gebildet, (*Myscolus* Cass.)

I. *S. HISPANICUS* (L.) Spanische G. — B. mit einem abwärts verschmälerten Flügel herablaufend; der St. fast traubig; Köpfchen blattwinkelst., einzeln oder 2-4zsgestellt; Blättchen des HK. sämmtl. zugespitzt; Pappus 2borstig. ☉. An felsigen, rauhen O., Wegen, Ackerrändern, (im Littor. bei Triest und Fiume; nicht im südl. Tyrol, Facchini.) Jul. Aug. Bth. citrongelb, die Stbk. gleich-

farbig. *S. maculatus* Scop. Host. (nicht L.) — Der *S. maculatus* L. unterscheidet sich dch B., welche mit einem gleichbreiten Flügel herablaufen und wie die DeckB. mit einem verdickten weissen Rande umgeben sind, dch mehrere aufrechte u. kämmig-fiederspaltige DeckB., endst. Köpfchen meist zu 3, keine Borsten am Pappus u. braune Stbk. — Der *S. grandiflorus* Desf. untersch. sich von *S. hispanicus* dch die noch einmal so grossen Köpfchen und die stumpfen äussern Blättchen des HK. D.

II. Untergruppe. *LAMPSANEEN*. Less. Pappus fehlend, oder an dessen Stelle ein hervorspringender kronenf. Rand. Der Fruchtb. ohne Spreublättchen.

66. *LÁPSANA* (L.) Rainkold. — HK. aus einer einfachen Reihe von Blättchen gebildet, 8-10blättrig, mit einem kurzen AussenK., nach dem Verblühen aufrecht und unverändert. Achenen zsgedrückt, 20riefig mit gleichen Riefen, mit einem schwachen Rande endigend, abfällig. Fruchtb. nackt.

1. *L. COMMUNIS* (L.) Gemeiner R. — B. gezähnt, die unteren leyerf.; der St. ästig, rispig ☉. An kultiv. und waldigen O. Jul. Aug. Fl. dan. t. 500. Bth. gelb.

67. *APOSERIS*. (Necker elem. 1. S. 57., nicht *Aposeris* Cassini.) Hainsalat. — Achenen zsgedrückt, 5riefig, vor der Spitze ein wenig zsggezogen, ausserdem Alles, wie bei *Lapsana*.

1. *A. FOETIDA* (Lessing Synops. S. 128.) Stinkender H. — Schafte 1 köpfig; B. schrotsägenf.-fiedersp., Lappen fast rautenf., der endst. 3eckig, fast 3lappig. 2. In Hainen der VorA., mit den Flüssen in die an die A. grenzenden Ebenen herabsteigend, (stw. längs der g. AK.) Jul. Aug. *Hyoseris foetida* L. St. h. 37. *Lapsana foetida* Scop. carn., Willd. spec., Koch Synops. ed. 1. — Bth. gelb.

68. *ARNÓSERIS* (Gärtn.) Lämmersalat. — HK. aus einer einfachen Blättchenreihe gebildet, vielblättrig, mit einem kurzen AussenK., nach dem Verblühen kugelig-zsschliessend, wulstig-gekerbt. Achenen 10riefig, Riefen abwechselnd mehr hervorragend; Krönchen kurz, 5kantig, abfällig. Fruchtb. nackt.

1. *A. PUSILLA* (Gärtn.) Kleinster L. — Schafte blattlos, 1-3köpfig; Bthstiele oberwärts keulig-verdickt, röhrig; B. verkehrt-eyl.-länglich, gezähnt. ☉. Auf Sandäckern. Jul. Aug. *A. minima* Koch Syn. ed. 1. dch einen Schreibfehler. *Hyoseris minima* L. Schk. t. 224. *Lapsana pusilla* Willd.

69. *RHAGADIOLUS* (Tournef. Gärtn.) Sichelsalat. — HK. aus einer einfachen Blättchenreihe gebildet, 5-8blättrig, mit einem AussenK. versehen, nach dem Verblühen abstehend. Achenen gebogen, ohne Pappus, jede der äusseren 5-6 von einem Blättchen des HK. eingehüllt und mit diesem bleibend; die 2-3 inneren frei und abfällig.

1. *R. STELLATUS* (Gärtn.) Sternförmiger S. — HK. mit einem kurzen AussenK. umgeben. Die äusseren Achenen sternf. ausgebreitet. ☉. An grasreichen O., Wegen, (Istrien, Fiume.) Apr. Mai. Bth. gelb. Var. mit ganzen, gezähnelten, unteren und mit leyerf. B., und beide Variet. kommen vor mit Blättchen des HK., welche dch eine Reihe von Borstchen auf dem Rücken rauhh., oder, wenn diese fehlen, kahl sind, und mit kahlen oder dch ganz kurze Haare rauhen inneren Achenen. — *Lapsana stellata* L. spec., *Rhagadiolus stellatus* Gärtn. hat aussen steifbehaarte Randfrüchte und ganzrandige B., *Lapsana Rhagadiolus* Lin. Spec., *Rhagadiolus edulis* Gärtn., kahle Früchte und leyerf. B. Die Mittelform besitzt schrotsägel.-leyerf. B.; zu ihr gehören: *Rh. stellatus* β. *intermedius* DC. prodr., *Rh. intermedius* Ten. fl. med., *Rh. lampsanoides* Desf. cat. hort. paris. J.

III. Untergruppe. *CICHORIEEN*. C. H. Schultz scelet. syst. art. cich. p. 1. Pappus kurz, aus abgeflachten, stumpfen, freien oder mehr oder weniger verwachsenen und ein Krönchen darstellenden Borstchen zsgesetzt.

70. *CICHORIUM* (L.) Cichorie. — HK. doppelt, der äussere 5blättrig, der innere 8blättrig; Blättchen an der Basis zsgewachsen. Pappus kronenf., kürzer als die Achene, 1-2reihig; Fruchtb. nackt oder fast wabig. Bth. blau.

1. *C. INTYBUS* (L.) Gemeine C. — Köpfchen gezweiet oder mehrere zsgestellt, sitzend und gestielt; die blüthenst. B. aus breiterer, fast stengelumfassender Basis lanzettl.; Pappus vielmal kürzer, als die Achene. 4. An unkultiv. O., auf trocknen Triften. Jul. Aug. St. h. 6. Kommt vor mit rosenfarbenen und weissen Bth.

2. *C. ENDIVIA* (L.) Endivie - C. — Köpfchen gezweiet oder mehrere zsgestellt, sitzend und gestielt; die blüthenst. B. breit-eyf., mit herzf. Basis stengelumfassend; Pappus 4mal kürzer, als die Achene. ☉. Aus Indien eingebracht, wird überall kultiv. Jul. Aug. Kultiv.

IV. Untergruppe. *HYOSERIDEEN*. Pappus spreublättrig, die Spreublättchen oft in ein Haar zugespitzt, aber weder federig, noch von der Basis an haarf.

71. *HYOSERIS* (L. mit Ausschl. von Arten. Hedynois Gärtn.) Schweinsalat. — HK. aus einer einfachen Blättchenreihe gebildet, 7-10blättrig, mit einem AussenK. versehen; die randst. Achenen von den äussern Blättchen eingehüllt. Achenen verschieden-gestaltet, die äussersten und innersten ziemlich stielrund, die dazwischen liegenden geflügelt-zsgedrückt. Pappus der äusseren borstig, kurz, kronenf.; der der innern Achenen aus 3-5 lanzettl. Spreublättchen und kürzeren Borsten zsgesetzt. Fruchtb. nackt.

1. *H. SCABRA* (L.) Rauher S. — Der Schaft oberwärts keulig-verdickt; B. schrotsägenf.-fiedersp., Lappen eyf., gezähnt; W. ein-

fach. ☉. An kultiv. O. und Wegen, (bei Fiume.) Mai. Jun. II. adspersa Mönch. II. microcephala Cass., DC. prodr. Rhagadiolus scaber All. Bth. gelb. J.

72. HEDYPNOIS (Tournef. Willd.) Röhrlinckraut. — Achenen gleichgestaltet, ziemlich stielrund. Pappus der äussern kurz, kronenf., borstig-vielth., der der innern aus 3-5 lanzettl., in eine Borste zugespitzten Spreublättchen und kürzern Borsten zsgesetzt; sonst Alles, wie bei Hyoseris. — Bth. gelb.

1. II. CRETICA (Willd.) Cretisches R. — Der St. ausgebreitet; die WB. buchtig-gezähnt; Bthstiele keulig-verdickt; Blättchen des HK. auf dem Rücken nach der Spitze steifh. ☉. An unkultiv. O., (bei Volosca in Istrien.) Mai. Jun. Die B. sind an den, auf den angegebenen Stand O. gesammelten Expl., tief-buchtig und nicht bloss etwas gezähnt, wie Tenore bei seiner Hedypnois clavata beschreibt. — Alle Arten der Gattung Hedypnois, die ich bisher, auch aus den vorzüglichsten botan. Gärten erhielt, gingen im Er-langer Garten doch die Kultur in eine und dieselbe Art über. J.

V. Untergruppe. LEONTODONTEEN. C. h. Schultz. Pappus aller Achenen federig, mit freien Haaren der Strahlen; oder der Pappus der randst. Achenen kronenf. Fruchtb. kahl oder fein-faserig mit bleibenden, Fäserchen (Fruchtb. nackt. *)

73. THRINCIA (Roth.) Hundslattich. — HK. dachig. Achene allmählig in einen Schnabel verschmälert. Pappus der randst. Achenen kurz, kronenf., gezähnt, der des Mittelfeldes federig; Strahlen an der Basis breiter, trockenhäutig, die Haare derselben zuletzt abfällig. Fruchtb. nackt. — Bth. gelb.

1. T. HIRTA (Roth.) Kurzh H. — W. an der Basis dch starke, fädliche Fasern vergrössert, zuletzt abgebissen; Achenen an der Spitze in einen Schnabel verschmälert. 4. Auf Triften, vorzügl. an sandigen, etwas feuchten O., (fast dch das g. Gebiet, aber doch an vielen O. gar nicht.) Jul. Aug. T. Leysseri Wallr., Rb. ic. S. f. 990-92., kleine Explre, T. hispida Rb. ic. S. f. 993., ein grösseres Expl., (nicht T. hispida Roth.) T. hirta DC. prodr., T. hispida DC., (nicht Roth.) und T. Leysseri DC., „Die Apargia Brumati Schiede nach Expl. vom bezeichneten O. und Apargia hyoseroides Vest., Hyoseris taraxacoides Wulf. in der Regensb. bot. Ztg. gehört nach einem Expl. aus dem Herbarium Wulfens zu Thrincia hirta.“ C. H. Schultz. bip. in Briefen. Leontodon hirtum L. nach Sm.; (die Beschreibg Linne's passt jedoch besser auf Leontodon Villarsii.) L. hispidum Pollich. L. saxatile Lam. Apargia hirta Sm. engl. Fl., der die W. abgebissen und mehr-jährig nennt. Hedypnois hirta Fl. brit. 824. Hyoseris taraxoides Vill., Villars beschreibt seine Pflanze ebenfalls als mehrjährig. Rhagadiolus taraxacoides All.

*) Derjenige Fruchtb. ist ein nackter, welcher keine Spreublättchen hat, er ist dabei entweder kahl oder auf dem Rande der Grübchen mit kurzen Fäserchen, die jedoch kürzer, als die Achene seyn müssen, besetzt.

Die *Thrinicia hispida* Roth catal., Koch Synops ed. I., *T. maroccana* Pers. Synops., DC. prodr. war dch einen Irrthum in unsere Fl. eingeführt.

2. *T. TUBEROSA* (DC.) Knolliges H. — *W. abgebissen*, büschelig, *Fasern rübenf.*; Achenen von der Mitte an in einen Schnabel verschmälert. 4. Auf Wiesen, (Istrien und auf den benachbarten Inseln.) Mai. Jun. *Leontodon tuberosum* L. Lob. ic. t. 232. f. 1. J.

74. *LEONTODON* (L.) Löwenzahn. — HK. dachig. Achene allmählig in einen Schnabel verschmälert. Pappus gleichgestaltet, federig, bleibend; Strahlen an der Basis trockenhäutig, und breiter, sämmtl. gleich oder die äussern haarf. Haare der Strahlen nicht abfällig. Fruchtb. nackt. Bth. gelb oder bei Variet. in das Safrangelbe spielend.

I. Rotte. *OPORINA* Don. *Scorzoneroides* Moench. *W. abgebissen*. Strahlen des Pappus fast gleich, sämmtl. federig, an der breitem Basis aber bloss kleingesägt. Die Köpfchen vor dem Aufblühen aufrecht.

1. *L. AUTUMNALIS* (L.) Herbst-L. — *W. abgebissen*, überall faserig; St. 1-mehrköpfig, nackt, *Bthstiele allmählig verdickt, oberwärts schuppig, vor dem Aufblühen aufrecht*; B. fiedersp. gezähnt; Riefen der Achenen fein-runzelig; sämtliche Strahlen des Pappus federig und gleichgestaltet, an der lanzettl. Basis kleingesägt. 4. Auf Wiesen überall, in die A. hinaufsteigend. Jul.-Herbst. *Hedypnois autumnalis* Huds. *Apargia autumnalis* Willd. *Oporina autumnalis* Don. DC. prodr. Die Haare der B. sind, wenn sie vorkommen, einfach, wie bei den 2 folg. Arten, und nicht gabelig. Var. mit 1köpfigem Schaft, und ungeth. und gezähnten B. und

β. pratensis, der HK. nebst den Bthstielen oberwärts dicht-braun-behaart: *Apargia pratensis* Link., und wenn zugleich der Schaft nur ein einziges Köpfchen trägt: *Hieracium Taraxaci* L. *Apargia Taraxaci* Sm. *A. autumnalis β. Hartm.* *Oporina pratensis* Less. DC. prodr.

II. Rotte. *DENS LEONIS*. *W. abgebissen*. Die Strahlen des Pappus ungleich, die innern federig, an der breitem Basis kleingesägt; die äussern kurz und bloss rauh.

a. Pappus schneeweiss.

2. *L. TARAXACI* (Lois.) Schwarzhaariger L. — *W. abgebissen*, von der Basis an mit starken Fasern besetzt; St. blattlos, 1köpfig, mit 1-2 Schuppen versehen, oberwärts allmählig verdickt und nebst dem HK. von schwarzen Haaren sehr rauh. B. lanzettl., in den Bstiel verschmälert, fast ganzrandig, gezähnt oder fiedersp., kahl oder mit einfachen Haaren bestreut; die innern Strahlen des *schneeweissen Pappus* federig, an der lineal. Basis kleingesägt, die äussern sehr kurz und bloss rauh. 4. Auf den Triften der höchsten A., (Schw., Tyrol, Salzb., Kärnth., Steyer.) Jul Aug. *Apargia Taraxaci* Willd. St. h. 37. DC. prodr. *Hedypnois Taraxaci* Vill. *Picris Taraxaci* All. *Leontodon montanum* Lam. — Ich behielt den sehr bekannten und überall angenommenen Trivial-

namen „Taraxaci“ bei, obgleich Hieracium Taraxaci L. zu den Variet. von Leontodon autumnalis gehört.

b Pappus schmutzig weiss.

3. *L. PYRENAICUS* (Gouan.) Pyrenäischer L. — *W. abgebissen*, v. der Basis an mit starken Fasern besetzt; *St. blattlos, 1köpfig, schuppig, oberwärts allmählig verdickt, vor dem Aufblühen überhangend*; B. verkehrteyf.-lanzettl., ausgeschweift-gezähnt oder gezähnt, kahl oder mit einfachen Haaren bestreut; die innern Strahlen federig, an der lineal. Basis kleingesägt, die äussern rauh, sehr kurz. 4. Auf Triften der A., (dch die g. AK., sodann auf den höhern Bergen des Schwarzwaldes und auf allen Höhen der Vogesen.) Jul. Aug. L. squamosum Lam. Apargia alpina Host. Syn., Willd. St. h. 37. Picris saxatilis All. Hedypnois pyrenaica Vill. — Dch das auf dem 1köpfigen Schafte vor dem Aufblühen überhangende Köpfchen und die aus lineal. Basis allmählig borstlich zulaufenden Strahlen des Pappus von Leontodon autumnalis; sowie von allen Variet. des L. hastilis dch schmale Bstiele und einfache Haare der B., wenn sie sich vorfinden, den allmählig verdickten, an der Spitze schuppigen Schaft, die an der Basis lineal., meist reichigen Strahlen des Pappus und die nicht gefransten Höfchen des Fruchtb. deutlich verschieden. Der L. alpinus J. a. t. 93., scheint wegen der nach der Basis allmählig in den breiten Bstiel verschmälerten B. und den nur mit einer einzigen Schuppe versehenen Schaft zu den Alpen-Varietäten von L. hastilis zu gehören. Var.:

β. *aurantiacus*, Bth. in das Safrangelbe spielend, übrigens der gewöhnl. Form ähnlich: Apargia aurantiaca Kit. im Willd. Herbar. Leontodon croceum Haenk. bei Jacq.

γ. *pinnatifida*, die B., wenigstens die innern, fiedersp.: Apargia crocea Willd., mit Ausschl. des Syn. von Haenke.

Apargia Gouani Schleich, umfasst grössere Expl. mit 1-1½ Fuss hohem St., der bisweilen einen Ast trägt.

4. *L. HASTILIS* (L.) Spiesslicher L. — *W. abgebissen*, von der Basis mit starken Fasern besetzt; *St. blattlos, 1köpfig, nackt oder mit 1-2 Schuppen besetzt, an der Spitze dicker*; B. länglich-lanzettl., in den Bstiel verschmälert, gezähnt oder fiedersp., kahl oder kurzha., *Haare 2-3gabelig*; die innern Strahlen federig, an der breitem Basis kleingesägt, die äussern kurz, rauh. 4. Auf Wiesen, Triften, an unkultiv. O.; in die höchsten A. hinaufsteigend. Jun.-Herbst. L. prothaeiforme Vill. Hedypnois hispida Smith. Var. mit gezähnelten, gröber-gezähnten, buchtig-gezähnten und fiedersp. B., mit eyf. oder, wiewohl selten, mit lineal. Fiedern, und

α. *vulgaris*, B., Schafte und die HK. oder bloss die B. kurzha. Haare bald sehr kurz, bald länger, doch nie merklich länger, als der Querdurchmesser des Schaftes; L. hispidum L. Apargia hispida Host. Hieracium incauum Pollich.

β. *glabratus*, B., Schafte und HK. kahl oder spärlich mit

Haaren bestreut: *L. hostile* L. J. a. t. 164. *L. danubiale* J. en. *Apargia hastilis* Host. *A. guestfalica* von Bönningh., aus, von dem Autor erhaltenen, Samen gezogen. *Hieracium danubiale* Pollich. — *Apargia hastilis* Willd. begreift ganz kahle Expl.; dessen *A. dubia* spärlich-behaarte Expl. — Die *A. dubia* Hoppe ist eine Form mit ziemlich dicken, fast lederigen, glänzenden B., welche auch auf niedrigern Gebirgen vorkommt. Hierzu gehört *A. hastilis* β . *lucida* Sant. in brieflichen Mittheilungen.

γ . *hyoserioides*, B. bis zur Mittelrippe fiedersp., Fieder schmal, lineal.: *Apargia hyoserioides* Welw. bei Rb. *A. hyoserioidiflora* Sant! *A. hastilis* γ . *pinnatifida* Sant. in brieflichen Mittheilungen.

δ . *opimus*, B. breiter, Schaft niedrig, an der Spitze deutlich-verdickt; eine sehr merkwürdige Alpen-Variet., geht aber dch Mittelformen in die gewöhnl. über: *L. caucasicus* Rb.; (ob auch MBieb.?), die Taurische Pfl. nämlich hat keine gabeligen Haare. — Dieser in den Schweizer, Tyroler und Kärnthner A.

Das *Leontodon Villarsii* Lois., *L. hirtum* Vill. und, nach meiner Ansicht, auch *L. hirtum* L., untersch. sich von *L. hispidum* dch folg. Merkmale: die W. steigt tiefer hinab, ist jedoch an der Basis mit einigen starken Fasern versehen; die Haare der meist tief-fiedersp. B. sind borstenf., steif und noch einmal so lang, als der Querdurchmesser des Schaftes, einfach oder an der Spitze sehr kurz-2zählig.

III. Rotte. *APARGIA* C. H. Schultz. W. senkrecht-hinabsteigend, spindelf., einfach, etwas ästig, mit haarfeinen Fäserchen bestreut. Die Köpfchen vor dem Aufblühen nickend. Strahlen des Pappus sämtl. federig, oder die äusseren kürzeren rauh, die innern aber an der Basis klein-gesägt.

5. *L. TENUIFLORUS* (DC. prodr. 7. S. 102.) Schmalblüthiger L. — W. senkrecht, einfach; St. einblüthig, nackt oder mit 2-3 Schuppen besetzt, unter dem Köpfchen dicker; B. lanzettl.-lineal. oder lanzettl. in einen Bstiel verschmälert, geschweift-gezähnt, kurz., mit 2-3 gabeligen Haaren; die äusseren Strahlen des Pappus kürzer, rauh, die inneren fiederig, so lang, als die Achenen. 4. Auf Bergen, (Salvadore bei Lugano Thomas.; auf dem Berge Calbege Lager, Cant. Tessin.) Jun. *Apargia tenuiflora* Gaud. helv. Die Haare der B. wie *L. hispidum*, die W. wie bei *L. incanum*. S.

6. *L. INCANUS* (Schrank.) Grauer L. — W. senkrecht, einfach, etwas ästig; St. blattlos, iköpfig, nackt oder mit 1-2 Schuppen besetzt, unter dem Köpfchen dicker; B. länglich-lanzettl., in den Bstiel verschmälert, ganzrandig oder entfernt-gezähnt, und nebst dem St. von sehr kurzen, 3-4gabeligen Haaren grau-, fast filzig-kurz.; Strahlen des Pappus etwas länger, als die Achenen, sämtl. federig, die innern auf der breitem Basis kleingesägt. 4. In Felsenspalten und an felsigen O. bis in die A., und mit den Flüssen in die Thäler hinabsteigend, (in der Schw. etwas selten, sonst dch die g. AK. bis Oestr. und von da dch Mähr.; sodann auf dem Jurakalk in Schwaben und Franken.) Jul. Aug. *Hieracium incanum* L. J. a. t. 287. *Apargia incana* Scop. St. h. 27. Un-

terscheidet sich von den vorhergehenden leicht dch die kaum gezähnten, weichen, gleichsam mit einem filzigen Flaum überzogenen B.

6. L. BERINII (Roth. man. bot.) Berinii's L. — *W. senkrecht, einfach, etwas ästig; St. 1-3 köpfig, an der Basis ästig, Aeste von einem B. gestützt; Bthstiele an der Spitze mit 1-2 Schuppen bestreut, unter der Bth. dicker; B. länglich lanzettl. in den Bstiel verschmälert, entfernt-gezähnt und nebst dem St. grau und etwas rauh, fast filzig, Flaum fast mehlig, 3-4gabelig; Pappus von der Länge der Achene, die Strahlen sämmtl. federig, die inneren an der breiteren Basis kleingesägt, 4. In Felsenspalten und im Kiese des Isonzo, (vom Flitschthale bis zum Ausflusse des Isonzo.) Jul. Aug. Apargia Berinii Bartl. A. canescens Sieber. herb. fl. austr. Zwei- oder 3mal kleiner, als die vorhergehende, der Ueberzug kürzer, gleichsam mehlig. D.*

IV. Rotte. ASTEROTHRIX Cass. *W. wie bei der vorhergehenden Rotte. Die unaufgeblüheten Köpfchen nickend. Strahlen des Pappus sämmtl. von der Basis an federig, die äussern kürzer.*

7. L. CRISPUS (Villars delph. 3. S. 84. t. 25.) Krauser L. — *W. senkrecht, einfach, etwas ästig; St. einköpfig, nackt oder mit 2-3 Schuppen bestreut, unter dem Köpfchen kaum dicker; B. tief-fiedersp.-getheilt, steifh. von starren 2-3gabeligen Haaren; die Achenen kurz-geschnabelt, gleichmässig knötig-rauh, kürzer, als der Pappus; sämmtliche Strahlen des Pappus von der Basis an federig, die äusseren kürzer, 4. In sonnigen Felsengegenden, (im oberen Wallis über Zermatten und an dem Flüelen, Thomas.; Berg Bre im Cant. Tessin, Diny.) Jul. Aug. Apargia crispa Willd. sp. S.*

8. L. SAXATILIS (Reichenb. fl. g. exc. 1. S. 252.) Felsen-L. — *W. senkrecht, einfach, etwas ästig; St. 1köpfig, nackt, oder mit 1-2 Schuppen besetzt, unter dem Köpfchen dicker; B. lanzettl. in den Bstiel verschmälert, buchtig- oder fiedersp.-gezähnt, steifh. von starren 3gabligen Haaren; die Achenen fast noch einmal so lang, als der Pappus, von der Mitte an in einen kurzh.-rauh Schnabel verschmälert; die Strahlen des Pappus sämmtlich von der Basis an federig, die äusseren kürzer, die Röhre der Bth. fast so lang, als das Zünglein, 4. In sonnigen Felsengegenden, (Littorale, Krain.) Jun. Jul. L. crispus Koch Syn. ed. 1. L. hispidum Scop. carn. nicht Lin., Apargia saxatilis Tenor. Syllog., A. tergestina Hoppe. — Apargia aspera W. K. pl. rar. h. t. 110., A. hispanica Willd. spec., in unserer Fl. noch nicht gefunden, untersch. sich von dieser dch höheren Wuchs, an der Basis ästigen St., die Aeste mit einem B. gestützt, dch grössere und mehrblüthige Köpfchen und mit 5-7 spaltigen kurzen Haaren dicht bewimperte Blättchen des HK. Bth. schwefelgelb, bei A. crispa rein gelb. D.*

75. PICRIS (L.) Bitterkrant. — HK. dachig. Achene allmählig in einen Schnabel verschmälert, oder an der Spitze unter dem

Schnabel eingeschnürt und dadurch sehr kurz geschnäbelt. Pappus gleichgestaltet, abfällig, die Strahlen an der Basis in einen Ring verwachsen, die innern an der Basis breiter, federig, die äusseren wenige, haarförm. Fruchtb. nackt. — Bth. gelb.

1. *P. HIERACIOIDES* (L.) Habichtskrantart. B. — Steifh.; B. länglich-lanzettl., gezähnt oder etwas buchtig, die mittlern stengelst. mit abgeschnittener oder spiessf. Basis etwas stengelumfassend; die Köpfchen an dem St. und den Aesten endst., ebensträussig; die äussern Blättchen des HK. abstehend, auf dem Rücken steifh., am Rande kahl; Zünglein fast noch einmal so lang, als seine Röhre; Achene unter dem Pappus eingeschnürt, fast schnabellos, fein-quer-runzelig. ☉. An unkultiv. O., Wegen, Wald-rändern. Jul. Aug. Schk. t. 216. Eine niedrige Form mit ganzrandigen B. ist *P. ruderalis* Schmidt bei Willd. (Herbar.) vgl. auch Tausch. bot. Ztg. 11. 1. 324. — Eine Form mit wenig beblätterten St., und in einem einfachen Ebenstrauss zsgestellten Köpfchen: *P. paleacea* Vest. (nach einem von Dr. Hölzl in Steyerm. gesammelten Expl.) *Leontodon umbellatum* Schrank. bayer. flor. *Apargia umbellata* Schrank. denkschr. *Picris umbellata* N. von Esenbeck. Eine mehr bemerkenswerthe Variet., vielleicht eigene Art ist:

β. *crepoides*, die obere B. länglich-eyf., lang-zugespitzt; Köpfchen ansehnlicher und die Achenen fast noch einmal so gross: *P. crepoides* Saut. Wächst auf Bergwiesen bei Kitzbichel in Tyrol, bei Admont in Steyerm. und auf dem Hohnack in den Vogesen.

2. *P. HISPIDISSIMA* (Bartl.) Sehr steifh. B. — Sehr steifh.; B. lanzettl., buchtig-gezähnt, die stengelst. mit herzf. Basis etwas stengelumfassend, die obersten ganz; die Köpfchen an dem St. und Aesten endst., ebensträussig; die äussern Blättchen des HK. abstehend, borstig-geimpert; Achenen an der Spitze kurz-zugespitzt, quer-, fast schuppig-runzelig. ☉. An dem flachen, sandigen Ufer der Insel Veglia, (bei der Stadt Castel Muschio.) Jun. Jul. *Picris laciniata* Visian. J.

76. *HELMINTHIA* (Juss.) Wurmsalat. — HK. doppelt, der innere 8blättrig, der äussere 5blättrig; Blättchen gleich. Achene an der Spitze abgerundet-stumpf, mit einem haarfeinen, verlängerten, aufgesetzten Schnabel. Pappus gleichgestaltet, federig, bleibend. Fruchtb. nackt. — Bth. gelb.

1. *H. ECHINOIDES* (Gärtn.) Scharfblättriger W. — Die äussern Blättchen des HK. ey-herzf., zugespitzt. ☉. Auf Aeckern, Schutthäufen und an Wegen, (um Cilli in Steyerm., Maly; um Haarhausen unweit Arnstadt in Thüringen, Lapp; bei Warnemünde auf der Ballaststelle; bei Börneke unweit Blankenburg im Braunschweigischen; bei Frankf. am M. unter dem neuen Kirchhofe; wohl mit fremder Erde oder fremdem Getraide eingeführt.) Jul. Aug. *Picris echinoides* L.

77. **UROSPERMUM** (Juss.) Schwanzsame. — HK. einfach, Sblättrig; Blättchen an der Basis verwachsen. Achene geschnäbelt; der Schnabel mit der Achene gegliedert, an seiner Basis aufgeblasen und inwendig dch eine Querwand von dem Keime getrennt. Pappus gleichgestaltet, federig, Federchen der Strahlen frei. Fruchtb. nackt.

1. **U. DALECHAMPII** (Desf.) Dalechamp's S. — HK. *weichflaumig*; Schnabel der Achene von der Basis bis zur Spitze allmählig verschmälert. 2. An sonnigen und steinigen O., (in Istrien und auf der Insel Cherso und Osero.) Mai. Jun. Tragopogon Dalechampii L. Arnopogon Dalechampii Willd. Barr. ic. f. 209. Bth. schwefelgelb.

2. **U. PICROIDES** (Desf.) Bitterkrautartiger S. — HK. *borstigsteif*; Schnabel der Achene oberhalb der eyf. Basis plötzlich in einen fadenf. Stiel zsggezogen. ☉. In Weinbergen und an kultiv. O., (auf der Insel Osero.) Mai. Jun. Tragopogon picroides L. Arnopogon picroides Willd. Bth. hellgelb. J.

VI. Untergruppe. **SCORZONEREEN**. C. H. Schultz. Pappus aller Achenen federig, Federchen der Strahlen verstrickt; oder der Pappus der randst. Achenen sprengig, Spreublättchen einfach; oder der aller Achenen einfach, die Strahlen klein-gesägt-rauh und an der Basis inwendig-zottig, Zotten verstrickt. Fruchtb. kahl oder fein-faserig, Fäserchen bleibend; (Fruchtb. nackt).

78. **TRAGOPÓGON** (L.) Bocksbart. — HK. einfach, 8-12blättrig; Blättchen an der Basis verwachsen. Achene in einen Schnabel verschmälert, inwendig mit keiner Querwand geschieden. Pappus gleichgestaltet, federig, Federchen der Strahlen verstrickt. Fruchtb. nackt.

1. **T. PORRIFOLIUS** (L.) Lauchblättriger B. — *Bthstiele* aufwärts allmählig verdickt, *keulig*; HK. Sblättrig, länger als die Blüten; *Köpfchen oberseits ganz flach*; die randst. Achenen fein-schuppig-knötig, ohngefähr so lang, als der fadenf. Schnabel oder noch einmal so lang. ☉. Auf den Wiesen des östr. Littorale. Wird zum Küchegebrauch kultiv. und kommt hie und da dch verschleppten Samen vor. Jun. Jul. J. ic. rar. t. 159. Bth. purpurn-blau. Die Pfl. ist immer noch einmal so hoch als die folgende. D.

2. **T. MAJOR** (J. fl. a. t. 29.) Grösserer B. — *Bthstiele* aufwärts allmählig verdickt, *keulig*, während der Bthezeit so dick als die Basis des HK.; HK. meist 12blättrig, länger, als die Blüten; *Köpfchen oberseits konkav*; die randst. Achenen schuppig-weichstachelig, scharfkantig, ohngefähr so lang, als der fadenf. Schnabel. ☉. Auf Hügeln und trocknen Wiesen, an Wegen, vorzüglich auf Kalkboden. (stw. dch das g. Gebiet.) Jun. Jul. Unterseh. sich von dem vorhergehenden ganz deutlich dch die hellgelben Bth., das oberseits konkave blühende Köpfchen, und dch die Kanten der Achenen, welche mit viel stärkeren Plättchen besetzt sind,

3. T. MINOR (Fries novit. fl. succ. ed. 2. S. 241.) Kleinerer B. — *Bthstiele gleich*, unter dem Köpfchen etwas verdickt; *HK. 8blättrig*, die Blättchen ober der Basis quer eingedrückt; *Bth. fast noch einmal so kurz, als der HK.*; die Achenen randst., knötig-rauh; der fadenf. Schnabel so lang od. länger, als die Achenen; B. aus erweiterter Basis lineal., lang-pfriemlich-verschmälert, *locker, herabhängend, flatterig.* ☉. Auf Wiesen, Rheinpfalz, Ziz; Westerwald, Wirtgen; Hamburg, Sonder; Schlesien, Wimmer.) Mai-Juli. T. pratensis β. micranthes Wimm. Fl. von Schles. In D. ist die Pfl. gewöhnlich höher, als T. pratensis. D.

4. T. PRATENSIS (L.) Wiesen-B. — *Bthstiele gleich*, unter der Bth. ein wenig verdickt; *HK. 8blättrig*, Blättchen oberhalb der Basis quer-eingedrückt; Bth. so lang, als der HK. und kürzer; *die randst. Achenen* so lang, als der fadenf. Schnabel, *knötig-rauh.* B. aus verbreiteter Basis lineal., pfriemlich-verschmälert, steif, oder an der Spitze zurückgebogen oder zsgedreht. ☉. Auf Wiesen und Triften. Mai-Juli. Fl. dan. t. 424. Bth. gelb. Sie schliesst die Köpfchen Vormittags um 8 oder 9 Uhr, Wimmer. Var.:

β. *tortilis*, B. wellig, an der Spitze zsgedreht: T. pratensis α. *tortilis* Mey. — Diese Variet. stimmt hinsichtlich der welligen und zsgedrehten B. mit T. undulatus Jacq. überein, letzterer ist aber dch die bleichgelben Bth. und vorzügl. dch die mit einem sehr kurzen Schnabel versehenen, fast schnabellosen, Achenen sehr verschieden, und im Gebiete unserer Fl. bisher noch nicht gefunden worden.

5. T. ORIENTALIS (L.) Orientalischer B. — *Bthstiele gleich*, unter dem Köpfchen ein wenig verdickt; *HK. 8blättrig*, Blättchen oberhalb der Basis quer-eingedrückt; Bth. meist länger, als der HK.; *die randst. Achenen* fast noch einmal so lang, als der fadenf. Schnabel, *von knorpeligen Schuppen kurzstachelig*; B. aus verbreiteter Basis lineal., pfriemlich-verschmälert, steif oder an der Spitze zurückgebogen oder zsgedreht. ☉. Auf fruchtbaren Wiesen, (besonders im südlicheren Gebiete.) Mai-Juli. T. undulatus Reichenb. fl. exc. (nicht Jacq.; vergl. die Bemerkung zur vorigen Art.) T. undulatum β. orientale DC. prodr., T. revolutus Schweigger in Hagen's Chlor. bor., (gehört nach Expl. von den angegebenen Standorten hieher und nicht zur vorigen Art.) Barbula hirci Camer. epit., eine schöne Abbildung, welche Linne unter seinem T. orientale anführt. Durch noch einmal so grosse Köpfchen und die schuppigen Achenen hinreichend verschieden von T. pratense. „Die Köpfchen sind bis Mittag offen.“ Wimmer. Bth. gelb.

6. T. FLOCCOSUS (W. u. Kit.) Flockiger B. — *Bthstiele gleich*, unter dem Köpfchen ein wenig verdickt; *HK. 8blättrig*, kürzer, als die Blüten; *die randst. Achenen* an der Basis fast glatt, *oberwärts fast bis zum Pappus fein-schuppig-weichstachelig*, *in einen sehr kurzen Schnabel verschmälert.* ☉. An grasreichen O. am Baltisch. Meere, (auf Ostwine bei Swinemünde in Pom-

mern, am Kurisch. Haff in Ostpreussen: Triest.) Juni. Juli. T. heterospermus Schweigg. Der flockige Filz verschwindet oft an der kultiv. Pflanze. Doch die Gestalt der Frucht von allen unsrigen sehr verschieden. Bth. hellgelb. D.

7. T. CROCIFOLIUS (L.) Safranblättriger B. — *Bthstiele gleich*, unter dem Köpfchen ein wenig verdickt; *HK. 5-8 blätterig*, länger, als die Blüthen; *die randst. Achenen von der Basis an schuppig-weichstachelig, scharfkantig, ohngefähr so lang, als der Schnabel.* ☉. Auf Triften d. A., (bisher blos auf dem grossen Bernhard.) Juli. Aug. Col. ephr. t. 230. Bth. schwarz-purpurn, an der Spitze gelb. S.

79. SCORZONÉRA (L. mit Ausschl. von Arten.) Schwarz-wurz. — *HK. dachig. Achene allmählig in einen Schnabel verschmälert, mit einer den Nabel umgebenden, sehr kurzen Schwiele an der Basis. Pappus gleichgestaltet, federig, Federchen der Strahlen verstrickt. Fruchtb. nackt.*

§. 1. Bth. gelb.

1. S. AUSTRIACA (Willd.) Oestreichische S. — Die wurzelst. B. länglich, lanzettl. oder lineal., die stengelst. 2-3, schuppenf.; der St. kahl, meist 1köpfig: *Blättchen des HK. zugespitzt*, an der Spitze selbst stumpf, *die äussern eyf.*; Achenen gerieft, die Riefen glatt; *Schopf der W. fädig.* 4. Auf Hügeln und an gebirgigen, felsigen, rauhen O., (in Mähr., Unteröstr., Steyerm., im Littor., südl. Tyrol; südl. Schw. im C. Waadt und Wallis.) April Mai. S. humilis J. a. a. t. 36. DC. prodr. Var.:

α. B. elliptisch-lanzettl., oder lanzettl., $\frac{1}{2}$ -1 Zoll breit: S. humilis latifolia secunda Clus. S. humilis Rb.

β. B. viel schmaler, lineal.-lanzettl. oder lineal., manchmal kaum 1 Linie breit: S. pannonica tertia Clus. S. angustifolia Rb. (nicht L.)

Die ganze Pflanze ist kahl, mit Ausnahme der Scheiden der B., welche einwärts und am Rande mit verwebter Wolle besetzt, und der Blättchen des HK., welche filzig-berandet sind. Der St. l., sehr selten 2köpfig. — Die S. angustifolia L. hat nach der Beschreibung „einen an der Basis ästigen, zottigen St.; gedrängte, lineal., pfriemliche B.; Bthstiele, die nach der Bth. hin dicker, als der St. selbst sind, und eine unterseits purpurliche Blkr.“ was keineswegs auf die S. austriaca, sehr gut aber auf die S. villosa Scop. passt. DC. beschreibt eine andere mir unbekannte Scorzonera angustifolia, die aber mit Linne's Beschreibung auch nicht übereinkommt.

2. S. HUMILIS (L. fl. suec.) Niedrige S. — WB. länglich, lanzettl. oder lineal-lanzettl., die 2-3stengelst. lineal.; der St. wollig, 1-3köpfig; *HK. halb so lang, als die Bth.*, die äusseren Blättchen ey-lanzettl., zugespitzt, an der Spitze selbst stumpf; *Achenen gerieft, die Riefen glatt; Wurzelschopf schuppig.* 4. Auf feuchten Wiesen, (stw. ich d. g. Gebiet.) Mai. Juni. S. lanata Schrank.

(beschreibt in der baier. Flor. die breit- und schmalblättrige Varietät.) *S. nervosa* *a.* Lam. *S. plantaginea* Schleich., Rb. *S. angustifolia* Wigg. — Grössere Exemplare, mit schmälern B.: *S. macrorrhiza* Schleich., Gaud. — Die hier aufgestellte *S. humilis* ist die wahre Linnäische Art der Schwedischen Flora nach den Friesischen Exemplaren im Herb. norm. und nach den Ehrhartischen bei Upsala gesammelten und nach Wahlenbergischen, vgl. Mey. chor. hanov.

3. *S. PARVIFLORA* (Jacq. a. t. 303.) Kleinblüthige *S.* — WB. lanzettl. oder lineal.-lanzettl., spitz, die stengelst. wenige, fast lineal.; der St. 1-3köpfig, kahl; *HK.* so lang, als die *Bth.*, die äusseren Blättchen ey-, die inneren lanzettf.; *Achenen* gestreift, die Riefen *glatt*; Wurzelkrone nackt oder etwas schuppig. ☉. Auf feuchten Wiesen. (Unteröstr., Mähr., Böhm.) Mai-Jul. *S. graminifolia* Tausch pl. sel. D.

4. *S. ARISTATA* (Ramond in DC. fl. fr. 1803. V. 4. S. 922.) Grannige *S.* — B. lineal.-lanzettl. oder lineal.; *St.* nackt, 1köpfig; die äussern Blättchen des *HK.* ey-lanzettf., an der verlängerten Spitze *pfriemlich*, oft so lang, als die inneren; *Achenen* quer-faltig-knötig; Wurzelkrone nackt oder etwas schuppig. 4? Auf den Triften der höchsten A., (bei Bassowitz in Krain; auf der A. Karthal, Frosnitz und der Pasterze bei Heiligenblut in Kärnthen; auf der Seiseralpe und im Brachsenthale in Südtirol.) Juli. *S. grandiflora* Lap. abb., Koch Synops. ed. 1. *S. Hoppeana* Sieb. *S. alpina* Hoppe bei St. h. 51. Meyer bemerkt in der chor. hanov., dass die *Scorzonera graminifolia* des L., nach sibirischen Expl. der Gmelinischen, von Linne citirten Pflanze, ganz mit *S. grandiflora* übereinstimme; aber in der Flora altaica wird eine *S. graminifolia* beschrieben, welche von DC. zu *S. austriaca* Willd. gezogen wird, von der sie sich aber doch den nach der Beschreibung meistens 2, manchmal auch 3köpfigen und selten 1köpfigen St. unterscheidet; *S. austriaca* hat immer einen 1köpfigen St. D.

5. *S. HISPANICA* (L.) Spanische *S.* — B. länglich oder lanzettl., zugespitzt; der *St.* beblättert, 1-mehrköpfig, etwas wollig; *HK.* halb so lang, als die *Bth.*, kahl, die äussern Blättchen 3eckig-eyf., die innern ey-lanzettf., sämmtlich spitz; die randst. *Achenen* fein-weichstachelig; Wurzelschopf schuppig. ☉. Auf fruchtbaren Wiesen, grasreichen Hügeln, unter Gebüsch, (Holstein, Hannov., Thüring., Böhm., Mähr. und Unteröstr., bei Triest, München, in Franken bei Windsheim, bei Bingen in der Rheinpfalz; Schweiz selten.) Juni. Juli. Variirt mit gezähnten B. und ausserdem:

a. latifolia, B. ey- oder länglich-lanzettf.: *S. hispanica a* sinuata Wallr. *S. denticulata* Lam. *S. edulis* Moench.

β. glastifolia, B. verlängert-lanzettl.: *S. hispanica β.* *glastifolia* Wallr. *S. glastifolia* Willd. *S. graminifolia* Roth.

γ. asphodeloides Wallr., B. lineal. — *S. montana* Mutel. fl. du Dauphiné, Monnard. syn. fl. helv., begreift diese und die vorhergehende Variet. in sich. Uebrigens sind die randst. *Achenen*

bei allen Variet. fein-weichstachelig, und auch bei *S. glastifolia* nicht glatt. Vgl. Monn.

Die *Scorzonera angustifolia* Gaud. helv. 5. p. 19. wächst nicht in der Schw.

§. 2. Bth. rosenroth.

6. *S. PURPUREA* (L.) Purpurfarbige *S.* — *B.* lineal. oder lineal.-lanzettl.; der St. beblättert, 1köpfig oder an der Spitze ästig und 2-4köpfig; *die äussern Blättchen des HK. ey-lanzettl.*; die Achenen gerieft mit glatten Riefen; *Wurzelschopf fädig.* 4. Auf kräuterreichen Kalkkügeln, (stw. in Krain, Oestr., Mähr., Böhm., Schles. bis Frankf. an d. O. und Berlin; Thüring. bis zum Unterharze; in Oberbaiern; Rheinfläche von Dürkheim bis Bingen; bei Stettin in Pommern und bei Bromberg in Preussen.) Mai. Juni. J. a. t. 35. Koch Syn. ed. I. mit Ausschluss der Variet. D.

7. *S. ROSEA* (Waldst. und Kit. pl. rar. hung. 2. S. 127. t. 121.) Rosenfarbne *S.* — *B.* lineal. oder lineal.-lanzettl.; St. beblättert, einköpfig, oder an der Basis mit einem oder dem anderen Zweige versehen; *die äusseren Blättchen des HK. eyf.-lanzettl.*; *die Achenen gerieft mit oberwärts fein-gezähnt-rauhem Riefen*; *Wurzelschopf fädlich.* 4. Auf Bergwiesen (Krain in der Wochein.) Juli. D.

70. *PODOSPERMUM* (DC. fl. fr.) Stielsame. — Achene bis zum Pappus gleich dick, nicht verschmälert; Schwiele an der Basis verlängert, etwas aufgeblasen, dicker, als die Achene selbst. Sonst Alles, wie bei *Scorzonera*. — Bth. aller gelb und die Köpfchen aller vor und nach der Blüthezeit achtkantig, was sich nicht allein bei *Scorzonera octangularis* so verhält.

1. *P. JACQUINIANUM* (Koch.) Jacquin's *S.* — *W. dauernd, vielköpfig, mit blüthentragenden Stengeln und unfruchtbaren Blätterbüschelchen versehen*; *die St. aufrecht, ästig, oberwärts gefurcht*; *B. fiedersp., Zpfl lineal., zugespitzt, der endst. lanzettl., verlängert*; *die randst. Bth. noch einmal so lang, als der HK.* 4. An unkultiv. trocknen O., Wegen, Rainen, (Unteröstr. und Mähren.) Juni-Aug. *P. octangulare* DC. prodr., nicht *Scorzonera octangularis* Willd. *Scorzonera laciniata* J. a. t. 356., nicht L., der seine Pflanze im Garten zu Upsala kultivirte und sie als 2jährig beschreibt; Jacquin's Pflanze, die ich lebend besitze, ist dauernd, wie Jacquin schon selbst erwähnt. Die unfruchtbaren Blätterbüschel, für die nächsten Jahre zum Blühen bestimmt, bilden nach Ablauf der Blüthezeit einen Rasen, was bei den folgenden nicht vorkommt, die nach der Fruchtreife absterben. D.

2. *P. LACINIATUM* (DC.) Geschlitzter *S.* — *W. 2jährig, einfach, die unfruchtbaren Büschel der B. fehlend*; der St. aufrecht, ästig, *Aeste* (bei der lebenden Pflanze) *stielrund*; *B. fiedersp., Zpfl lineal., zugespitzt, der endst. lanzettl., verlängert*; *die randst. Bth. so lang, als der HK. oder nur ein wenig länger.* ☉. Auf Aeckern und sonnigen Hügeln, auf Kalk- und Leberbo-

den, (stw. im C. Wallis im Littorale, in der Glahn-, Nahe- und Moselgegend bis Luxemburg; Maingegend von Mainz bis nach Würzburg; von Mähren dch Böhmen nach Thüring. bis zum Unterharze und bis Barby; in Holstein.) Mai-Juli. *Scorzonera laciniata* L. Pollich und der meist. deutsch. Autoren. — *S. octangularis* Willd. — Var.:

β. *muricatum*, der St. nebst den B. rauh von aufgestreuten kleinen Knötchen (welche Form gemeiner ist, als die ganz kahle:) *Podospermum muricatum* DC. fl. gall. *Scorzonera muricata* Balb. Die fiedersp. B. öfters mit ganzen gemischt; an kleineren Expl. sind manchmal alle ganz.

3. *P. CALCITRAPIFOLIUM* (DC.) Lanzenblättriger S. — W. 2jährig, vielstengelig, der mittlere St. aufrecht, die seitenst. liegend und aufstrebend; Aeste (an der lebenden Pflanze) stielrund, die unfruchtbaren WKöpfe fehlend; B. fiedersp., Zpfl elliptisch-lanzettl., der endst. grösser; die randst. Bth. ein wenig länger, als der HK. ☉. Auf Kalkhügeln, (im Oberelsass in der Gegend von Colmar bei Rosheim und Scharrachbergheim, für die Schw. zweifelhaft.) Mai-Jul. *P. resedifolium* DC., mit Ausschl. der Syn. von L. und Bocc. *Scorzonera calcitrapifolia* Vahl. *S. resedifolia* Retz. Gouan. Barr. fig. 800. — Ob diese Art dch Mittelformen in die *S. laciniata* übergehe, ist ferner zu untersuchen.

81. *GALÁSIA* (Cass.) Galasie. — HK. dachig. Achene bis zum Pappus gleich, nicht geschnäbelt. Pappus gleichgestaltet, mehrreihig, die Strahlen rauh, die äusseren haarf., die innersten an der Basis lanzettl.-verbreitert und daselbst an der innern Seite zottig, Zotten verwebt. Fruchtb. nackt.

1. *G. VILLOSA* (Cass.) 4. An rauhen O. des wärmeren Krain's und östr. Littorale, (gemein bei Triest und Fiume.) Mai. Juni. Bth. gelb. *Scorzonera villosa* Scop. t. 46. *S. angustifolia* Host. W. und Kit. und nach meiner Meinung auch *S. angustifolia* Linne's. D.

VII. Untergruppe. *HYPOCHOERIDEEN*. Lessing. syn. 130. Pappus federig. Fruchtbod. spreuig, mit abfälliger Spreu.

82. *HYPOCHOERIS* (L.) Ferkelkraut. — HK. dachig. Achenen in einen verlängerten Schnabel verschmälert oder weniger verschmälert und fast schnabellos. Pappus federig. Fruchtb. spreuig; Spreu abfällig. — Bth. gelb oder goldgelb.

I. Rotte. AECHE. Von den äusseren Strahlen des Pappus einige borstenf. und nicht federig.

1. II. *GLABRA* (L.) Kahles F. — Der St. ästig, kahl, blattlos; Blüth. so lang, als der HK.; die mittelst. Achenen lang-geschnäbelt, die randst. schnabellos, oder sämmtlich geschnäbelt. ☉. Auf bebauten sandigen O. Juli. Aug. Bth. gelb, wie bei den folgenden. Kommt auch vor mit kahlen, oder am Rande bewimperten oder bewimperten und auf beiden Seiten zerstreut-borstlichen B.

und überdiess mit sämmtlich geschnäbelten Achenen: *H. Balbisii* Koch Syn. ed. I., nicht Loiseleur's, dessen Pfl. sich in unserem Gebiete noch nicht vorgefunden. Der Stiel des Pappus ist bei *H. glabra* nur ein wenig länger als die Achene: bei *H. Balbisii* ist er zweimal länger, als dieselbe.

2. *H. RADICATA* (L.) Langwurzliges F. — Der St. ästig, kahl, blattlos: *Bth. länger, als der HK.*; Achenen sämmtl. lang-geschnäbelt. 4. Auf Wiesen, Triften, an Waldrändern. Juli. Aug. Fl. d. t. 150. *Achyrophorus radicans* Scop. „Bei einigen Blüthen (Köpfchen) fehlen manchmal die Spreublättchen gänzlich“ Gaud. fl. helv. Aus einem solchen Expl. entstand die *Scorzonera taraxacifolia* J. ic. rar. t. 160. Zu kleineren Exemplaren gehört *H. intermedia* Richter Flor. lips., wenigstens ist das Expl. in Reichenb. herb. flor. germ. n. 38. v. *H. radicata* nicht verschieden, denn ich erzog letztere aus dem reifen Samen des benannten Exemplares.

H. Rotte. ACHYROPHORUS. Alle Strahlen des Pappus federig. *Achyrophorus* C. H. Schultz und DC. prodr. (nicht Scopoli, dessen Gattung *Achyrophorus* einerlei ist mit der Gattung *Hypochoeris* bei Linne.)

3. *H. MACULATA* (L.) Geflecktes F. — Der St. 1-3köpfig, meist 1blüttrig, steifh.; Bthstiele fast gleichdick; Blättchen des HK. am Rande ganz, die mittlern an der Spitze filzig-berandet. 4. Auf Waldtriften, steinigcn Hügeln, Haiden, unter Gebüsch, (stw. dch d. g. Gebiet.) Juli. Aug. Hayn. arzng. 6. t. 43. Var. mit braungefleckten und ungefleckten B.

4. *H. UNIFLORA* (Vill.) Einblumiges F. — Der St. 1köpfig, steif., oberwärts allmählig verdickt, fast keulig, an der Basis beblättert: die äussern und mittlern Blättchen des HK. am Rande zerrissen-fransig. 4. Auf Triften der A. und VorA., (dch d. g. AK. bis nach Oestr. und Krain, sodann auf den höchst Bergkuppen von Mähren, Böhm. und Schles.; auf dem Feldberge in Baden.) Juli. Aug. *H. helvetica* Wulf. in Jacq. misc. J. ic. rar. t. 163. Scopoli hat keinen *Archyrophorus helveticus*.

VIII. Untergruppe. *CHONDRILLEEN.* Pappus haarig, die Strahlen fein, an der Basis nicht breiter. Fruchtb. nackt. Achene geschnäbelt, Schnabel an der Basis mit einem hervorragenden Krönchen oder mit schuppenf. Weichstacheln umgeben.

83. *WILLEMETIA* (Necker.) Willemetie. — HK. dachig, mit einem schwachen Aussenkelche. Bth. vielreihig. Achene an der Spitze mit einem feingekerbten Krönchen, das die Basis des verlängerten, fädlichen Schnabels umgiebt. Pappus haarig. Fruchtb. nackt.

1. *W. APARGIOIDES* (Cass.) Löwenzahnähnliche W. — Auf Wiesen und in Wäldern der A. und VorA.; auch in die Ebenen, welche die A. begleiten, hie und da herabsteigend. Juli. Aug. *W. hieracioides* Moench. *Hieracium stipitatum* J. n. t. 293. *Wibelia apargioides* Röhling. *Crepis aparg.* Willd. *Peltidium aparg.* Zol-

lik. Zollikoferia aparg. Nees v. E. Z. Peltidium Gaud. helv. Borkhausia aparg. Spreng. syst. veget. Chondrilla stipitata C. H. Schultz. Bth. gelb.

84. TARAXACUM (Juss.) Pfaffenröhrlein. — HK. dachig, mit einem undeutlichen Aussenkelche. Bth vielreihig. Achene etwas zsgedrückt, oberwärts schuppig-weichstachelig, plötzlich in einen fädlichen Schnabel zsggezogen. Pappus haarig. Fruchtb. nackt. Die Bth. unserer Arten gelb oder schwefelgelb.

1. T. OFFICINALE (Wigg.) Gebräuchliches P. — *Achenen lineal.-verkehrtkeif.*, gerieft, *an der Spitze schuppig-weichstachelig*, Riefen der äusseren Achenen von der Basis an knötig-runzelig, die der innern glatt; *der farblose Theil des Schnabels länger, als die Achene mit dem gefärbten Theile des Schnabels*; B. länglich- oder lineal.-lanzettl., fiedersp.-schrotsägenf. oder ungeth., gezähnt oder ganzrandig. 2. Auf sowohl feuchten als trocknen Wiesen, Triften, an kultiv. und unkultiv. O. überall. Mai-Herbst. T. vulgare Schrank. T. dens leonis Desf. Leontodon Taraxacum L. L. officinalis With. — Eine sehr variirende Pflanze. B. meist kahl, seltner flaumig-rauh; es finden sich alle Uebergänge von der tief-fiedersp.-schrotsägenf. Form mit schmalen und wiederum geschlitzten Zpsln bis zur ungetheilten und ganzrandigen. Der Schaft oft wollig, besonders nach der Spitze hin. Die Achenen kommen gewöhnlich hell-olivengrün, aber auch dunkelgrün und grasgrün und roth vor. Die folgenden Variet. sind die vorzüglichern.

a. *genuinum*, Blättchen des HK. sämmtlich lineal., die äusseren abwärtsgebogen: Leontodon Taraxacum Pollich. und der meist. Ant. Dens leonis Desf. atl., DC. prodr. Bth. meist goldgelb.

β *glaucescens*, Blättchen des HK. sämmtl. lineal., oder die äusseren lanzettl., diese wagerecht-abstehend; das Krant oft meergrünlich. Wenn die inneren Blättchen des HK. vor der Spitze mit einer Schwiele, oder einem kurzen Horn versehen sind, so entsteht: T. officinale b. corniculatum Koch. und Ziz. Leontodon Taraxacum 3. obliquus Fries. L. glaucescens M. Bieb. L. corniculatus Kit. bei Schult. oestr. fl., DC. prodr. — Bth. oft hell- oder schwefelgelb.

γ. *alpinum*, (welche aber nicht allein auf den A., sond. auch an niedrigeren O. vorkommt,) die äussern Blättchen des HK. eyf., abstehend, die innern vor der Spitze nicht behörnelt: L. alpinus Hopp. bei St. h. 41. DC. zieht diess im Prodr. zu T. laevigatum. L. caucasicus Stev. MB. L. nigricans Kit. — Eine besondere Form kommt auf den höchsten A. vor mit schmalen, an der Spitze abgerundet-stumpfen Blätterlappen.

δ. *taraxacoides*, die äussern Blättchen des HK. eyf., zugespitzt, angedrückt, die innern an der Spitze behörnelt: A. taraxacoides Hoppe bei St. h. 41. L. laevigatus Willd. nach DC. prodr.

ε. *lividum*, die äussern Blättchen des HK. eyf., zugespitzt, angedrückt, die innern an der Spitze nicht behörnelt: Taraxacum palustre DC. T. lanceolatum Poir. Leontodon Taraxacum β. palustre Wimm. und Grab. L. palustre Smith. L. lividus W. und Kit. L. erectum Schrank. L. Raii Gouan. L. Taraxacum 1. pa-

lustre Fries. *Hedypnois paludosa* Scop. t. 48. *Apargia salina* Fl. wett. Var. wunderbar in der Form der B. Eine Variet. mit lanzettl., buchtig-schrotsägenf. B.: *L. erectus* Hoppe bei St. h. 41.; mit schmal-lanzettl., gezähnt. oder nur klein-gezähnelte.: *L. salinus* Pollich. Hoppe.

ζ. *leptocephalum*. der vorhergehenden sehr ähnlich, aber die Köpfchen schmaler und die äusseren Blättchen lanzettl., an der Spitze zottig-härtig, übrigens aufrecht oder angedrückt: *Leontodon leptocephalus* Rb. fl. exc. (Am Moenitzer See in Mähren, Hochstetter!)

Scorzonera acaulis Roth. cat. l. p. 95. gehört nach einem von dem Autor an Willdenow geschenkten und in dessen Herbarium unter n. 14525. aufbewahrten Expl. zu den Abänderungen von *Taraxacum officinale* & *lividum* mit breit-eyf. äusseren Schuppen und buchtig-schrotsägenf. B. Der Schaft ist in der Mitte aufblasen, ein Naturspiel, das ich bei kultiv. Expl. anderer Modificationen dieser Species zuweilen selbst beobachtet habe.

Unter den aufgezählten Variet. findet man unzählige Mittelformen, und vergebens sieht man sich nach bestimmten Grenzen zwischen ihnen allen um.

2. *T. TENUIFOLIUM* (Hoppe in Brief.) Schmalblättriges P. — Achenen lineal-verkehrteyf., gerieft, an der Spitze schuppig-wichstachelig, Riefen der äusseren Achenen von der Basis an schwach-knötig, die inneren glatt; der ungefärbte Theil des Schnabels etwas kürzer, als die Achene mit dem gefärbten Theile des Schnabels; B. lineal-lanzettl., oder lineal., in den Bstiel verschmälert, ganzrandig, oder entfernt-gezähnelte. 4. An feuchten O., (an den Salinen von Zaule bei Triest.) April. Mai. *Leontodon tenuifolium* Hoppe bei St. h. 41. D.

3. *T. SEROTINUM* (Poir.) Spätblühende P. — Achenen länglich-lineal., brüderseits verschmälert, gerillt, an der Spitze feinknötig; Riefen der äusseren von der Basis an runzelig, die der inneren glatt; der ungefärbte Theil des Schnabels kürzer, als die Achene mit dem gefärbten Theile des Schnabels. B. länglich, im Frühlunge ungeth., die späteren gezähnt oder schrotsägenf. 4. Auf trocknen Hügeln und an Wegen, (auf den Polauer Bergen und um Czeitsch in Mähren.) Juli-Sept. *Leontodon serotinum* W. und Kit. Dch die schmalen, an beiden Enden verschmälerten, an der Spitze feinknötigen Achenen leicht von *T. officinale* zu unterscheiden. B. oft kurz. und der Schaft oft weiss-wollig. D.

85. *CHONDRILLA* (L.) Knorpelsalat. — HK. meist 8blättrig, an der Basis mit einem schwachen AussenK. von kurzen Blättchen. Bth. 7-12 an der Zahl, 2reihig. Achene an der Spitze weichstachelig und mit einem, die Basis des Schnabels umgebenden, Krönchen endigend. Bth. gelb.

1. *C. JUNCEA* (L.) Binsenartiger K. — WB. schrotsägenf., die obere Stengelst. B. lineal-lanzettl. und lineal.; Aeste ruthenf.;

die seitenst. Köpfchen einzeln, gezweiet oder gedreiet; Achene mit 5 lanzettl. Zähnen endigend. ☉. Auf Aeckern, an kiesigen O., auf sonnigen Hügeln. Juli. Aug. J. a. t. 427. Bth. gelb, unterseits mit 3 weisslichen Streifen. Der St. mehr oder weniger dörnigsteifh., Var.:

β. spinulosa, der St. unterwärts so wie der Rand der B. stachelig-steifh.: *C. acanthophylla* Borkhausen in Beckers Fl. von Frankf. (in Roem. neuem Magazin kommt sie nicht vor), vergl. Fresen. Taschenb. S. 485.

γ. latifolia, die ganze Pfl. stärker, die mittleren stengelst. und oberen B. elliptisch-lanzettl.: *C. latifolia* M. Bieb. taur. canc., *C. rigens* Reichenb. fl. exc. Diese vorzugsweise auf Kalkboden, (Rheinfläche zw. Dürkheim und Mannheim und bis Mainz, bei Verden, in Mecklenburg und ausserdem zerstr. dch das Gebiet). Der Kiel der Blättchen des HK. var., wiewohl selten, dornigsteifh., meistens ist er glatt; die Blättchen selber sind wie bei den vorhergehenden Varietäten mehlig-filzig. Expl., welche ich in der Rheinfläche sammelte, gleichen ganz denen vom Kaukasus. Sie geht dch Zwischenformen in die Variet. L. über.

2. *C. PRENANTHOIDES* (Vill.) Hasenlattichähnlicher K. — WB. lanzettl., nach der Basis verschmälert, entfernt-gezähnt; die St. fast nackt, gabelspaltig-ästig, die endst. *Köpfchen gleichhoch*; Achene ohngefähr so lang, als ihr Schnabel, mit einem kurzen, *kleingekerbten Krönchen endigend*. 4. An kiesigen O., (in Graubünden bei Chur an dem Giesbach Plessur und Landquart; bei Bregenz; bei Bad Kreuth an der Isar bei München; an der Save und dem Isonzo in Krain; in Valsugana am Bache Valcadiera in Tyrol.) Juli. Aug. Bth. gelb. *Prenanthes chondrilloides* L. *Lactuca prenanthoides* Scop. t. 49.

IX. Untergruppe. *LACTUCEEN*. Pappus haarig; Strahlen haarfein, an der Basis nicht breiter Fruchtb. nackt. Achene flach-zsgeedrückt, schnabellos oder mit einem, an der Basis nicht gekrönten, Schnabel endigend.

83. *PRENANTHES* (L., mit Auschl. von Arten.) Hasenlattich. — HK. meist Sblättrig, dch die äussern, kürzern Blättchen dachig. Bth. 5, freihig. Achene zsgeedrückt, schnabellos. Pappus haarig. Fruchtb. nackt.

1. *P. PURPUREA* (L.) Puppröther H. — B. mit herzf. Basis stengelumfassend, kahl, unterseits meergrün, die untern eyf. oder länglich, in den geflügelten Bstiel zsgezogen, gezähnt, *die obern lanzettl., zugespitzt*, ganzrandig; Köpfchen rispig. 4. In Gebirgswäldern, (im mittlern und südlichen D. und der Schw.) Juli. Aug. J. a. t. 307. *Chondrilla purpurea* Lam. Var. mit noch einmal so breiten und um die Hälfte schmälern B., letzteres ist:

β. angustifolia, B. aus herzf. Basis lanzettl.-lineal., verlängert; *P. tenuifolia* L. spec., All. ped. t. 33. f. 2. Die unteren B. dieser Variet. habe ich noch nicht gesehen. Bth. purpurn.

84. **LACTUCA (L.)** Salat. — HK. dachig. Bth 2-3reihig. Achene flach-zsgedrückt, in einen fädl. Schnabel zugespitzt. Pappus haarig, Fruchtb. nackt. — Der Pappus ist an der Basis mit einem dünnen, mehr oder weniger hervorspringenden und oft mit ganz kurzen Börstchen besetzten Rande umgeben.

1. Rotte. **LACTUCAE GENUINAE.** Achene beiderseits mit mehreren erhabnen Riefen. Bth. gelb.

1. **L. SATIVA (L.)** Garten-S. — B. am Kiel stachelig oder glatt, mit herz-pfeilf. Basis stengelumfassend, gezähnel, ungeth. oder schrotsägenf.-fiedersp.: R. verbreitert, ebensträussig, *flach*; Achenen beiderseits 5riefig; *Schnabel weiss, so lang, als die Achene oder länger.* ☉. Kommt hie und da auf dem Auswurf der Gärten verwildert vor. Es werden mehrere Variet. kultiv. Hayn. arzng. 7. 30. — Wenn *L. sativa* auf magerm Boden wächst, kommt sie in allen Merkmalen mit *L. Scariola* überein und untersch. sich nur dch den niedrigeren St. und die flache R. Kultiv.

2. **L. VIROSA (L.)** Giftiger S. — B. am Kiele stachelig, oval-länglich, stumpf, Pfeilf., stachelspitzig-gezähnel, ungeth. oder buchtig, die oberen zugespitzt; Rispe abstehend; Achenen beiderseits 5riefig, *ziemlich breit-berandet, an der Spitze kahl; Schnabel weiss, so lang, als die Achene.* ☉. An gebirgigen, felsigen O. unter Gesträuch, (stw. dch d. g. Gebiet, aber viel seltner, als die folg.) Juni-Aug. Hain. arzg. I. t. 47. *Wiestia virosa* C. H. Schultz. scelet. syst. cichor. Die Gattung *Wiestia* nach der *Lactuca elongata* und deren Verwandten construirt, kann recht wohl von den eigentlichen Arten der *Lactuca* getrennt werden, keineswegs aber die *Lactuca virosa*, denn die nach vorn ziemlich breit-berandeten Achenen der *Lactuca Scariola* bieten einen deutlichen Uebergang dar. Dch die schwarzen Achenen unterscheidet sich die *L. virosa* leicht von der folgenden *L. Scariola*.

3. **L. SCARIOLOA (L.)** Wilder S. — B. am Kiele stachelig, oval-länglich, spitz, Pfeilf., stachelspitzig-gezähnel, fiedersp.-schrotsägenf., seltner ungeth.: R. pyramident.: Aeste traubig; Achenen beiderseits 5riefig, *schmal-berandet, an der Spitze borstlich-flümmlich; Schnabel weiss, so lang, als die Achene.* ☉. An rauhen O., Wegen, auf Hügeln. Juli. Aug. Hayn. arzg. I. t. 46. Achenen bräunlich-grau. *L. virosa* Schk. t. 2. Die B. sind zwar deutlich vertikal umgedreht, aber bei einer, auf magerm Boden kultiv., *L. sativa*, sind sie es oft nicht weniger. — *L. Scariola* var. mit ungeth. B., und diese Variet. ist der *L. augustana* All. ped. t. 52. f. I. so ähnlich, dass ich keinen wahren Unterschied zu entdecken vermag. An dem von Balbis an Willd. mitgetheilten Expl. der *L. augustana*, n. 14570. fol. 2. des Willd. herb. ist die Rippe der B. unterseits stachelig. Die *L. Scariola* wird im bot. Garten zu Erlangen auf magerm und trockenem Boden nicht selten ebenfalls mannshoch.

4. **L. SALIGNA (L.)** Weidenblättriger S. — B. unterseits am Kiele stachelig oder glatt, *lineal., zugespitzt, ganzrandig, die*

untersten schrotsägenf.-fiedersp.; Aeste ruthenf., traubig-ährrig; die Achenen auf beiden Seiten 5riefig, der Schnabel weiss, noch einmal so lang als die Achene. ☉. Aecker, Ackerränder, (stellenweise von der nördl. Schwz. dch Würtemb., Baden und Elsass bis Coblenz; im Maingebiete bei Würzburg; an der Mosel; von Oestr. dch Mähren, Böhmen, Sachsen und Thüringen bis Barby und Hildesheim.) Juli. Aug. Jacq. a. t. 230.

5. *L. VIMINEA* (C. H. Schultz.) Klebriger S. — *B. herablau fend*, die untern tief-fiedersp., *Zpfl lineal.*, etwas gezähnt und ganzrandig, die obersten *B. lineal.*, ungeth. ☉. Auf Hügeln und rauhen Gebirgen, (von Oestr. dch Mähr. und Böhm. bis Dresden, im C. Wallis, nach Expl. von Schleicher.) Juli. Aug. *Phoenixopus decurrens* Cass. *Prenanthes viminea* L. J. a. t. 9. *Phoenixopus vimineus* Rchb. fl. exc., Koch Synops. ed. 1. Bth. gelb. — Var. mit 2-3, in den Winkeln der astst. *B.* zgestellten und mit einzelnen Köpfchen. — Die mährische Pflanze, welche mein Freund Hochstetter mir mittheilte, und die Reichenbach für die *Prenanthes ramosissima* Allioni hält, ist von der österreichischen und böhmischen nicht verschieden. *P. ramosissima* hat nach der Beschreibung und Abbildg *B.*, von denen die untern nur bis zur Mitte des Mittelfeldes buchtig sind, und rückwärts sichelf. und nach den Bstiele zurückgekrümmte *Zpfl* haben. Diese mir nicht hinlänglich bekannte Pflanze wird von mehreren Autoren für eine Variet. von *P. vimineus* gehalten.

6. *L. MURALIS* (Fresenius Tschcnb. p. 484. 1832.) Maner-S. — *B. gestielt*, leyerf.-fiedersp., *Zpfl eyf., winkelig*, gezähnt; Köpfchen rispig. ☉. In Wäldern, auf Schutthaufen. Juli. Aug. *Prenanthes muralis* L. Schk. t. 218. *Chondrilla muralis* Lam. *Mycelis angulosa* Cass. *M. muralis* Rb. *Cicerbita muralis* Wallr. *Lactuca muralis* Meyer. *Phoenixopus muralis* Koch Syn. ed. 1.

7. *L. STRICTA* (Waldst. und Kit. pl. rar. hung. t. 48.) Steifer S. — *B. unterseits* glatt, die wurzelst. und untersten stengelst. schrotsägen-leyerf., gezähnt, die obern *schrotsägenf.-fiedersp.*, an der Basis pfeilf.; *R.* ebensträussig; Achenen beiderseits 5riefig, *Schnabel halb so lang, als die Achene, kohlschwarz*. ☉. In Waldungen, (Mähr., Böhm., Sachs., Thüring., am Unterharze.) Juli. Aug. *L. quercina* Koch Synops. ed. 1. *Cicerbita corymbosa* Wallr. — Diese Art ist zwar an den von Linne angegebenen O. verschwunden, aber da keine andere im nördl. Europa einheimische Art, ausser dieser mit der Diagnose in d. sp. plant. übereinstimmt, so trage ich kein Bedenken, sie mit Willdenow für die *Lactuca quercina* L. zu halten, ich habe jedoch den Namen, den DC. nicht aufgenommen, nun auch nicht mehr vorangestellt. Die *L. quercina* des Willd. Herbarium gehört ganz gewiss hierher. Die *L. quercina* der bot. Gärten scheint mir Variet. von *L. sativa* mit mehr spreitzenden Aesten. D.

8. *L. SAGITTATA* (W. und Kit.) Pfeilblättriger S. — *B. unterseits* glatt, die wurzelst. in den Bstiel verschmälert, buchtig-gezähnt, *die stengelst. pfeilf., ungeth., gezähnt*, die untern läng-

lich, an der Basis verschmälert, die obere ey-lanzettl., zugespitzt; R. ebensträussig; Achenen beiderseits 5riefig, *Schnabel halb so lang, als die Achene, kohlschwarz*. ☉. In Wäldern, (bei Brünn in Mähren, in einem Gehölze mit *L. stricta* untermischt, Hochstetter; im Walde von Lippizza nur an einer Stelle, im Gehölze unter dem Dorfe Kanzian im Littorale, am Recalluss ebenfalls selten; im Thale Suschiza eine halbe Stunde von Kanzian gegen das verfallene Schloss Schwarzenegg im Waldgebüsch häufig, Tommas.) Juli. Aug. *L. augustana* Reichenb. fl. exc. in Bezug auf den Stand O. „im Walde von Lippizza“ Tommas. in brieflichen Mittheilungen. Die Achenen mit dem Schnabel schwarz. — Hochstetter vermuthet in der *L. sagittata* nur eine Var. mit ganzrandigen B. der *L. quercina* (*L. stricta* W. K.) was ich nicht läugnen will, allein doch die Aussaat wurden beide bis jetzt nicht verändert.

II. Rotte. CYANOSERTIS. Achene beiderseits auf der Mitte mit einer einzigen Riefe, am Rande etwas gedunsen. Bth. blau.

9. *L. PERENNIS* (L.) Ausdauernder S. — B. kahl, fiedersp., Zpfl lineal.-lanzettl., auf der vordern Seite gezähnt; Ebenstrauß locker, endst.: *Achenen beiderseits 3riefig*, ohngefähr so lang, als der weisse Schnabel. 4. An steinigen, felsig. O., in Felsenspalten, (in der westl. Schw. dch. Elsass, und auf dem linken Rheinufer im Gebirge bis Coblenz u. Trier; in den Maingebirgen bei Frankf. und Würzburg; auf den Kalkgeb. im Würtemb. bis Regensburg; im Baireuth. Gebirg; in Thüring., Sachsen und Böhmen; bei Danzig; in Krain und südl. Tyrol.) Mai-Juni. *L. caerulea* Sauter.

88. *SONCHUS* (L.) Gänsedistel. — HK. dachig. Bth. vielreihig. Achene zsgedrückt, an der Spitze abgeschnitten oder ein wenig verschmälert, ohne deutlichen Schnabel. Pappus haarig, weich, biegsam, an der Basis ohne Krönchen. Fruchth. nackt. Bth. gelb.

1. *S. TENERRIMUS* (L. gen. n. 908.) Ganz zarte G. — *St. oberwärts ästig-ebensträussig*; B. gestielt, fiederig-gezh., Zpfl evf., längl. oder lineal., die Bstiele der mittleren Stengelst. an der Basis verbreitert, pfeilf. mit lang-zugespitzten Ohrchen; HK. an der Basis weiss-flockig; die Achenen vielriefig, mit quer-runzeligen Riefen; W. spindelf. ☉. An steinigen Orten am adriat. Meere, (im Lazaretto sporco zu Triest, Tommasini.) Juni. Juli. Der St. und die HK. sind kahl, letztere nur an der Basis wollig-flockig, oder sie sind mit drüsentragenden, dchsig gelblichen Borsten besetzt. Die obersten B. sind ganzrandig, sitzend, aber an der Basis ebenfalls pfeilf.

2. *S. OLERACEUS* (L., mit Ausschl. der Variet. γ. und δ.) Gemeine G. — *Der St. ästig, Aeste doldig-ebensträussig*; HK. kahl; B. länglich, schrotsägef.-fiedersp. oder ungeth., die Stengelst. an der Basis herzf., mit zugespitzten Ohrchen; *Achenen quer-runzelig, beiderseits auf dem Mittelfelde 3riefig*. ☉. An kultiv. O., in Gärten, auf Schutthaufen überall, Juni-Herbst. Hayn.

arzg. t. 48. *S. laevis* Vill. *S. ciliatus* Lam. fl. fr., DC. prodr. *Hieracium oleraceum* Scop. Dod. pempt. p. 643. Fig. links. B. meist glanzlos, seltner glänzend. Var.:

α. *integrifolius*, Wallr.; B. nicht schrotsägenf.

β. *runcinatus*; B. schrotsägenf.-fiedersp., der endst. Zpfl 3eckig und grösser: *S. oleraceus* β. *triangularis* Wallr.

γ. *lacerus* Wallr.; B. fiedersp., Fieder gezähnt oder buchtig; der endst. auch buchtig, dadurch die Fieder fast gleich: *S. lacerus* Willd.

3. *S. ASPER* (Vill.) Rauhe G. — *Der St. ästig, Aeste doldig-ebensträussig*; HK. kahl; B. oval-länglich, ungeth. oder etwas schrotsägenf., die stengelst. an der Basis herzf., mit abgerundeten Oehrchen; *Achenen glatt, berandet, beiderseits auf dem Mittelfelde 3riefig*; W. spindelf. ☉. Mit der vorhergehenden überall. Juni-Herbst. Hayn. arzg. 2. 48. *S. fallax* Wallr. DC. prodr. *S. oleraceus* var. γ. und δ. L. Dod. pempt. p. 643. Fig. rechts. B. meist glänzend, steifer, als bei der vorhergehenden.

4. *S. MARITIMUS* (L.) Seestrands-G. — *Der St. einfach, an der Spitze 1-wenigköpfig*, nebst den HK. und den Bthstielen ganz kahl; die äussersten Schuppen des HK. breit-eyf., zugespitzt mit stumpfer Spitze; B. verlängert-lanzettl., ungeth. oder etwas buchtig, die stengelst. an der Basis herzf.; Achenen gerieft, Riefen quer-runzelig; W. kriechend. 4. An salzhaltigen, feuchten O. und Pfützen, am Adriat. Meere, (Aquileja, Gradisca.) Juli. Aug. All. ped. t. 16. f. 2. Die Form mit etwas buchtigen B.: *S. litoralis* Rb. fl. exc. DC. nennt die Riefen der Achenen glatt, aber an meinen Expl. und selbst an denen von Montpeillier sind sie genau, wie bei *S. arvensis* gebildet. D.

5. *S. ARVENSIS* (L.) Acker-G. — *Der St. einfach, an der Spitze ebensträussig*; HK. nebst den Bthstielen drüsig-behaart; die äussersten Schuppen des HK. eyf.-lanzettl., schmaler zulaufend, an der Spitze selbst aber stumpf; B. lanzettl., schrotsägenf., die stengelst. an der Basis herzf., die obersten ungeth.; Achenen riefig; Riefen quer-runzelig; W. kriechend. 4. Auf Aeckern, auf Letten- und Kalkboden. Juli. Aug. Fl. dan. t. 606. *Hieracium arvense* Scop. Var.:

β. B. ungeth., der St. 1-2blüthig. Dethard. consp. p. 60.

γ. *laevipes*, Bthstiele kahl, HK. etwas steifh., oder Bthstiele und HK. kahl: *S. intermedius* Bruckn. *S. arvensis* var. Schultz starg. *S. maritimus* L. amön. ac., Retz. scand. nach Wahlenberg.

6. *S. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-G. — *Der St. einfach, an der Spitze ebensträussig*, nebst den HK. und den Bthstielen drüsig-behaart; B. schrotsägenf.-fiedersp., Zpfl sämmtl. lanzettl., zugespitzt, die StB. an der Basis Pfeilf., die oberen ungeth.; Achenen gerieft, Riefen quer-runzelig; W. ohne Ausläufer. 4. Auf sumpfigen Wiesen, an Ufern, Gräben, (von Westphalen dch das nördl. D. bis Preussen, im übrigen D. sehr zerstreut, in Mähr., Sachsen,

bei Halle, Würzburg, Frankfurt, Strasburg; im obern Wallis und an wenigen andern O. in der Schw.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 1109. Var. mit kahlen Bthstielen.

89 **MULGEDIUM** (Cassin. Dict. d. sc. nat. 33. S. 296.) Milchlattig. — HK. mit einem AussenK. versehen, dachig; die äusseren Blättchen 2-3mal kürzer. Bth. vielreihig. Achene zsgedrückt, an der Spitze schmaler oder gegen die Spitze zu verschmälert. Pappus haarig, zerbrechlich, an der Basis von einem Krönchen aus kleinen kurzen Borsten umgeben. Fruchtb. nackt.

Durch das kleine, den Pappus umschliessende Krönchen stimmt diese Gattung mit mehreren Arten von *Lactuca* überein, aber die Achene hat keinen deutlichen Schnabel. — Bth. blau.

1. **M. ALPINUM** (Lessing Syn. S. 142.) Alpen-M. — *Tr. etn-fach u. zsgesetzt, drüsig-behaart*; B. gezähnt, leyerf., der endst. Lappen sehr gross, spießf.-3eckig, lang-zugespitzt, die stengelst. B. mit geflügeltem, an der Basis herzf., Bstiele stengelumfassend; Achenen länglich-lineal., vielreihig, an der Spitze ein wenig verschmälert. 4. An schattigen O., am Fusse und in den Thälern der A. und auf höhern Gebirgen. (dch die g. AK.: auf den Vogesen; dem Schwarzwalde, den Mähr., Böhm., Schles. Gebirgen; dem Erzgebirge, Thüringen, Voigtland, bei Neuhaus in Schwarzb. Rudolst., Ilmenau; bei Schmon in der Fl. von Halle; am Harze.) Jul. Aug. *M. alpinum* DC. prodr. *Sonchus alpinus* L. spec., Koch Synops. ed. 1. Fl. dan. t. 182. *S. montanus* Lam. *S. caeruleus* Smith. *S. canadensis* With. *Aracium alpinum* Moench. *Cicerbita alpina* Wallr. *Hieracium caeruleum* Scop. Unsere Pflanze ist der *Sonchus alpinus* der Fl. lapp. und der spec. plant., aber im Linnäischen Herbar. liegt als solcher *S. lapponicus* Fröhl., den Smith unter dem Namen *S. alpinus* aufstellt, der aber in Lappland nirgends wächst; vgl. Wahlenb. fl. lapp. p. 194.

2. **M. PLUMIERI** (DC. prodr. 7. S. 248.) Plumier's M. — Köpfchen ebensträussig; Bthstiele und HK. ganz kahl; B. schrotsägenf.-fiedersp., gezähnt, die stengelst. mit tief-herzf. Basis stengelumfassend, die obern lanzettl., zugespitzt, ungeth.; *Achenen elliptisch, von der Mitte an bis zur Spitze verschmälert, beiderseits 5reihig*. 4. An schattigen und felsigen O. der Voralpen, (in der westl. Schw., auf dem Hohnock und den Ballons der Vogesen.) Jul. Aug. *Sonchus Plumieri* L. spec., Koch Syn. ed. 1.

X. Untergruppe. **CREPIDIUM**. Pappus haarig, die Strahlen haarfein oder pfriemlich-borstlich, aber an der Basis nicht sprengig-verbreitert. Achene stielrund, oder kantig, oder etwas zsgedrückt, an der Spitze geschnäbelt, oder schnabellos und an der Spitze zsggezogen, oder von gleicher Breite.

90. **PICRIDIMUM** (Desf.) Picridie. — HK. dachig. Achenen gleichgestaltet, prismatisch, 4 kantig, 4 furchig, mit tief-gekerbten Kanten, am obersten Ende ein wenig zsggezogen. Pappus haarig. Fruchtb. nackt.

1. *P. VULGARE* (Des.) Gemeine P. — Die untern B. buchtig-fiedersp., gezähnt, die obern stengelumfassend, länglich, fast ganzrandig; Bthstiele an der Spitze dicker; Blättchen des HK. angedrückt. ☉. An kultiv. O. und Wegen, (bei Pola in Istrien und bei Fiume.) Apr. Mai. *Scorzonera picroides* L. *Sonchus picroides* All. ped. t. 16. f. 1. Bth. gelb. — *Picridium albidum* DC. Ist eine ächte Crepis: *C. albida* Vill. J.

91. *ZACYNTHA* (Tournef. t. 369.) Warzenkohl. — HK. mit einem AussenK., der fruchttragende kantig-wulstig, die innern Blättchen fleischig-verdickt, die randst. Achenen fest einschliessend, Achenen des Mittelfeldes lineal.-länglich, ziemlich stielrund; die randst. auf dem Rücken sehr höckerig; mit seitenst. Pappus. Pappus haarig. Fruchtb. nackt. — Bth. gelb.

1. *Z. VERRUCOSA* (Gärt. fruct. t. 157. f. 7.) ☉. Auf Feldern u. an unfrucht. O., (im Littor. und Istrien; bei Fiume.) Mai. Jun. *Lapsana Zazintia* L. J.

92. *PTEROTHEKA* (Cassin. Dict. d. sc. nat. 25. S. 62.) Haussalat. — HK. mit einem AussenK. Achenen verschieden-gestaltet, die des Mittelfeldes lineal., stielrund, geschnäbelt, die randst. auf dem Rücken konvex oder fast gekielt, auf der innern Seite 3-5kielig; Kiele fädlich, stumpf, oder häutig-geflügelt. Pappus haarf., der der randst. Achenen hinfällig. Fruchtb. spreulig, Spreue haarf.

1. *P. NEMAUSENSIS* (Cassin. a. a. O.) Zweispaltiger H. — B. gezähnt oder leyerf., die randst. Achenen auf der innern Seite 3kielig, Kiele fädl., od. geflügelt. ☉. An unfrucht., unkultiv. O., (bei Fiume.) Mai. Jun. *Hieracium sanctum* L. spec. *Andryala nemausensis* Vill. delph. 3. t. 26. *A. nudicaulis* Lam. dict. *Lagoseris nemausensis* Koch Syn. ed. 1. Bth. gelb. Achene 3-5 flügelig, mit häutigen Flügeln. Var. mit einem von 3 stumpfen Kielen durchzogenen Achenium: *Trichocrepis bifida* Visian. stirp. dalmat. t. 7. *Lagoseris bifida* Koch Synops. ed. 1.

93. *CREPIS* (L., mit Ausschl. von Arten.) Pippau. — HK. mit einem AussenK. oder etwas dachig. Achenen gleichgestaltet, stielrund oder ein wenig zsgedrückt, 10-30riefig, an der Spitze schmaler oder mit einem mehr oder weniger verlängerten Schnabel. Pappus haarig, Strahlen haarfein. Fruchtb. nackt. — Bth. aller, mit Ausnahme von *C. incarnata* und *aurea*, gelb.

1. Rotte. Achenen des Mittelfeldes oder sämtliche deutlich geschnäbelt: Barkhausie Mönch. method. 537.

§. 1. Bthstiele vor dem Aufblühen nickend. Die randst. Achenen viel kürzer, als die innersten; die innersten mit dem Schnabel über den HK. hervorragend. Schnabel verlängert. Pappus 2 oder 3mal kürzer, als die Achene.

1. *C. FOETIDA* (L. spec. 1135.) Stinkender P. — Der St. aufrecht, beblättert, ästig, nebst den B. rauhh.; B. schrotsägenf.-fiedersp., die obersten lanzettl., an der Basis tief-eingeschnitten; Bthstiele vor dem Aufblühen nickend; *Schnäbel der randst.*

Achenen kürzer, als der HK., die innersten länger, als derselbe; HK. überall grau und zottig, mit einfachen und drüsentrag. Haaren; Blättchen des AussenK. lanzettl., spitz. ☉. An unfrucht. O., Wegen, auf Aeckern, (im mittl. und südl. Gebiete stw., im nördl. seltner.) Jun.-Aug. Crepis foedita L. Bth. gelb. Barkhausia foedita DC. prodr., Koch Synops. ed. I.

2. *C. RHOEADIFOLIA* (M. Biebst) Klatschrosenblättriger P. — Der St. aufrecht, beblättert, ästig, nebst den B. borstig-steifh.; B. schrotsägenf.-fiedersp., die obersten lanzettl., an der Basis tief-eingeschnitten: *Bthstiele vor dem Aufblühen nickend; Schnabel aller Achenen kürzer, als der HK; der ganze HK. von starren Borsten steifh. und etwas grau; Blättchen des AussenK. lanzettl., spitz. ☉. An sonnigen O., (bei Brünn in Mähr., Hochstetter! Münchengrätz in Böhmen, Sekera.) Jun. Jul. Barkhausia rhoeadifolia MBiebst. fl. taur. cauc., Koch Syn. ed. I., DC. prodr. Bernhardt beschrieb schon 1806 diese Art im catal. plant. exsicc. unter dem Namen Crepis graveolens, vergl. Select. sem. hort. Erf. vom Jahre 1831, aber da dieser Name zweideutig geworden, so wollte ich ihn nicht voransetzen. Bth. gelb. D.*

3. *C. RUBRA* (L. spec. 1132.) Rothblühender P. — Die St. aufrecht und aufstrebend, einfach oder unterwärts ästig, nackt, an der Basis beblättert; B. schrotsägenf.-fiedersp., die obere lanzettl., an der Basis gezähnt; Bthstiele vor dem Aufblühen nickend; *die randst. Achenen so lang, als der fruchttrag. HK., die innersten länger, als derselbe; die innern Blättchen des HK. steifh., die des AussenK. kahl, ey-lanzettf. ☉. An unfrucht. O., Wegen, (auf der Insel Osero gemein) Jun. Jul. Barkhausia rubra Mönch method., DC. prodr., Koch Synops. ed. I. Var. mit gezählter Spindel der tief-fiedersp. B: C. incarnata Visian. — Bth. hell-purpurn. J.*

§. 2. Bthstiele vor dem Aufblühen aufrecht. Achenen sämmtlich gleich oder die äusseren ein wenig kürzer. HK. so lang, als der halbe oder ganze Pappus. Schnabel der Achene mittelmässig, kürzer, als die Achene.

4. *C. TARAXACIFOLIA* (Thuill.) Löwenzahnblättriger P. — Der St. aufrecht, beblättert, an der Spitze ebensträussig; B. schrotsägenf.-gezähnt oder schrotsägenf.-fiedersp.; Bthstiele vor dem Aufblühen aufrecht: *HK. grau und oft steifh., nach dem Verblühen die Hälfte des Pappus erreichend; Blättchen des AussenK. ey-lanzettf., nach der Spitze verschmälert, kahl, am Rande häutig; die DeckB. lineal., krautig, schmal-häutig-berandet. ☉. Auf trocknen Wiesen und an sonnigen, kiesigen O., auf Kalkboden, (in der westl. Schw.: im Elsass, in Baden bis Mannheim hinab, von Oberbaden deh. Würtemb. mit dem Jurakalk; längs des Bodensees bis Oberbaiern.) Mai. Jun. Bth. gelb, die randst. Zungenbth. unterseits mit einem purpurnen Streifen. B. taraxacifolia DC. prodr., Koch Synops. ed. I. B. taraxacifolia und B. praecox Rh. Crepis taurinensis Willd. C. tectorum Vill., nicht L. C. cinerea Desf. C. vesicaria Balb., vom Autor selbst im Willd. Herbar., nicht L. C. Lachenalii Gmel., nicht Gochn. C. scabra Willd.*

herb., Expl. mit verkehrt-eyf., an der Basis gezähnten und leyerf. WB. *Wibelia taraxacifolia* Röhl. Var.:

β *praecox*, die obere B. an der Basis verbreitert-geöhrelt; Dub. bot. gall. p. 299. *Crepis praecox* Balb.

γ . *intybacea*, die obere B. an der Basis geöhrelt, HK. kahl; Dub. l. c. *Barkh. intybacea* DC.

Var. ausserdem: Die B. ungeth., rückwärts-gezähnt oder bis an die Mittelrippe fiedersp., Zpfl. buchtig-gezähnt oder geschlitzt; Köpfchen grösser und um die Hälfte kleiner; HK. fast kahl, an der Basis der Blättchen nur mit spärlichem Filze bestreut und filzig-grau, die innern Blättchen und Bthstiele drüsig-steifh., und ohne drüsige Haare.

5. *C. VESICARIA* (L. spec. 1132.) Blasiger P. — Der St. aufrecht, ästig, ebensträussig, spärlich-beblättert; B. schrotsägenf.-gezähnt oder schrotsägenf.-fiedersp.; Bthstiele vor dem Aufblühen aufrecht; HK. grau und oft steifh., nach dem Verblühen die Hälfte des Pappus erreichend; Blättchen des AussenK. oval, konkav, häutig, kahl; die DeckB. länglich, stumpf, häutig, mit einem schmalen, krautigen Rückenstreifen. ☉. Auf Triften und an Wegen, (Fiume und auf der Insel Veglia und Osero.) Mai. *Barkhausia vesicaria* Spreng. s. veg., Koch Synops. ed. 1. Bth. wie bei den vorhergehenden. Var., wie die verwandten Arten, mit Aussenkelchblättchen, die merklich kürzer, als der HK., sind: *C. vesicaria* Willd., und die fast so lang, als der HK. sind: *C. scariosa* Willd. Letztere fehlt in Willd. Herbarium. J.

6. *C. SETOSA* (Haller. fil. in Roem. Arch.) Borstiger P. — Der St. aufrecht, beblättert, ästig, Aeste ebensträussig; B. schrotsägenf.-gezähnt oder leyer-schrotsägenf., die obere pfeilf., ganz oder an der Basis eingeschnitten-gezähnt; Bthstiele vor dem Aufblühen aufrecht; HK. nach dem Verblühen von der Länge des AussenK. lanzettl., spitz, nebst den DeckB. am Rande, den innern Blättchen auf dem Rücken und den Bthstielen fast dornig-steifh.; Borsten starr, einfach. ☉. Auf Aeckern und in Weinbergen, (Kleinstein bei Oppeln in Schles.; Mühlhausen im Elsass; Rheininsel Koller in der Rheinpfalz, Steyerm., südl. Tyrol; in der südl. Schw. u. im Littor. nicht selten.) Jul. Aug. *Borkhausia hispida* Link. *Crepis setosa* Haller fil. *C. hispida* W. und Klt. *Barkh. setosa* DC. fl. fr. und lc. fl. gall. t. 19., Koch Synops. ed. 1. Bth. gelb. Var. mit kahlen Bthstielen.

II. Rotte. Achenen ohne Schnabel, oder gegen die Spitze hin verschmälert und undeutlich geschnäbelt. *Crepis* DC.

§. 1. Achenen 10-13riefig Pappus schneeweiss, weich.

a. St. blattlos, an der Spitze viel öpfig. Köpfchen klein. HK. mit einem kurzen, augeprägten AussenK. *Intybus* Fries, nov. ed. 2. p. 244. *Intybellia* Monnier ess. monogr. p. 78.

7. *C. PRAEMORSA* (Tausch.) Abgebissener P. — Schaft blattlos, traubig, Tr. an der Basis zsgesetzt; die untern Bthstiele 2-3köpfig, die obere 1 köpfig; B. oval-länglich, an der Basis verschmälert, gezähnelte, flaumig. 4. An gebirgigen, steinigen O., auf

Kalkboden, (in der Schw. hin und wieder; stw. im Elsass und bis an die Mosel, dch das südl. und mittl. D., nördl. bis Thüring., Sachs. und Schles.) Mai. Jun. Hieracium praemorsum L. St. h. 39., Traube nicht gut abgebildet. Geracium praemorsum Rb. Intybus praemorsus Fries. Intybellia praemorsa Monn. Bth. gelb.

8. C. INCARNATA (Tausch) Fleischfarbiger P. — *Schaft blattlos, ebensträussig*; B. verkehrteyf.-länglich, an der Basis verschmälert, gezähnt. 4. Auf niedrigeren Gebirgen und den VorA., (im südl. Tyrol im Pusterthale, auf dem Berge Sorist im Feltrischen; in Krain nicht selten; in Kärnthen.) Mai. Jun. Hieracium incarnatum Wulf. in J. coll., ic. rar. t. 578. St. h. 39. H. montanum Scop. carn. t. 50. Geracium incarnatum Rb. Intybellia incarnata Monn. Bth. fleischroth oder röthlich oder weiss. Var.:

β. *lutea*, Bth. gelb, Tausch. a. a. O. Crepis Froelichiana DC. prodr. Hieracium parviflorum Schlecht. cat. 1807., aber die Bth. (Köpfchen) sind nicht kleiner, als bei der Var. α. und auch nicht von den kleinsten; H. praemorsum H. corymbosum Gaud. Geracium parvifl. Rb. (südl. Schw. und südl. Tyrol, Oberöstr. bei Steyer.) Die Fleischfarbe der Bth. geht in das Weisse und von diesem in das Gelbe über nach Facchini.

b. St. blattlos oder an der Basis mit einem oder den andern B. versehen, an der Spitze 1köpfig, einfach, oder von der Basis an bis zur Mitte einen oder den andern einköpfigen, an der Basis mit einem B. gestützten Ast treibend. — Köpfchen von den grössern, so gross, als die des Leontodon hastilis.

9. C. BULBOSA (Cassini.) Knolliger P. — *Schaft 1köpfig, blattlos* oder an der Basis 1blättrig, an der Spitze nebst der Basis des HK. kurz h.; B. länglich-lanzettl., etwas gezähnt, kahl; Wfasern knollentragend. 4. Auf Triften und an sonnigen O. des Seestrandes. (Istrien.) April. Mai. Leontodon bulbosum L. Prenanthes bulbosa DC. Hieracium bulbosum Willd. Aetheorrhiza bulbosa Cass. DC. prodr. Bth. gelb.

10. C. AUREA (Cassini.) Goldgelber P. — *Schaft 1köpfig, blattlos* oder an der Basis seltner wenig-blättrig und etwas ästig, oberwärts nebst dem HK. schwarz-rauhh.; B. länglich, gezähnt oder schrotsägef., kahl; Wfasern stielrund. 4. Auf etwas feuchten Triften der A. und VorA., (dch die g. AK) Jul. Aug. Hieracium aureum Scop. Vill. delph. 4 t. 33. St. h. 37. Leontodon aureum L. J. a. t. 297. Geracium aureum Rb. Bth. pomeranzengelb.

11. C. ALPESTRIS (Tausch.) Alpen-P. — *Schaft 1köpfig, blattlos* oder an der Basis wenig-blättrig, etwas ästig, an der Spitze filzig; HK. grau oder kurz h.; B. lanzettl., gezähnt oder schrotsägef. 4. An trocknen, felsigen O. der Gebirge, VorA. und A., (von Schaffhausen dch die nördl. Schw., Graubünden und die g. AK.; mit dem Jurakalk dch Würtemb. und längs der Donau bis Regensburg und Eichstädt.) Jul. Aug. Hieracium alpestre J. a. t. 191. St. h. 28. Bth. gelb.

12. *C. CHRYSANTHA* (Fröhlich in DC. prodr. 7. S. 165.) Goldfarbiger P. — *St. einköpfig, 1-2blüttrig, oberwärts nebst dem HK. dicht kurz h. von abstehenden, etwas zurückgebogenen, drüsenlosen, gelblichen Haaren; Blättchen des HK. lanzettl., dachig, WB. verkehrteyf., -längl. oder länglich-lanzettl., stumpf, nach der Basis verschmälert, ganzrandig, etwas gezähnt, oder schrotsägenf., kahl, das Stengelst. kurz h. 4. Auf den Walliser A., (im Thale Bagne, Em. Thomas.) Jul.? Aug.? C. chrysantha DC. prodr. C. jubata Koch Taschenb. C. frigida C. H. Schultz in Briefen. Hieracium frigidum Stev. in Briefen an Zeyher. H. chrysanthum Ledeb. fl. altaic. Bth. goldgelb. S.*

C. Der St. beblättert, an der Spitze ebensträussig. Grösse der Köpfchen bei verschiedenen Arten verschieden. Bth. aller citrongelb oder goldgelb.

13. *C. CHONDRILLOIDES* (Jacq.) Knorpelsalatähulicher P. — *Der St. armköpfig, grau und drüsig-behaart, unterwärts beblättert; Köpfchen fast ebensträussig; B. gefiedert, Fieder büschelig-geth., Zpfl lineal., sehr schmal; HK. filzig; Achenen 10riefig. 4. An sonnigen, felsigen, kalkhaltigen O., (im östr. Littor., Triest, Fiume; auf dem Berge Zhaun und um Adelsberg in Krain, und auf dem Bereich des Karstes.) Jun. Jul. C. foeniculacea Froel. in DC. prodr. C. Adonis Spreng. Andryala chondrilloides Scop. Wibelia chondrilloides Hopp. und Hornsch. Berinia andryaloides Brign. forojul. D.*

14. *C. BIENNIS* (L.) Zweijähriger P. — *Der St. beblättert, an der Spitze ebensträussig; B. gezähnt oder schrotsägenf.-fiedersp., die Stengelst. sitzend, fast Stengelumfassend, flach, an der Basis geöhreht-gezähnt, die obersten ganzrandig; Blättchen des HK. sämmtlich länglich-lineal., ziemlich stumpf, grau-fläuml., die äussern etwas abstehend, die innern auf dem Rücken steifh. oder kahl, auf der innern Oberfläche fast seidig-haarig; Achenen an der Spitze schmaler, 13riefig. ☉. Auf Wiesen und in etwas feuchten Waldungen überall. Mai. Jun. Var. mit steifh. und fast kahlem St. und B. und, wie alle verwandten, sehr in der Theilung der B.*

α. runcinata, B. fast gleichf. schrotsägenf., an der Spitze ungeth., Zpfl abwärts allmählig kleiner: *C. biennis α.* Wimm. und Grab. *C. lodomiriensis* Bess.

β. lacera, B. ungleichf. schrotsägenf.-fiedersp. oder zerrissen-fiedersp.: W. und G. *C. biennis* var. *bannatica* Rochel.

γ. dentata, B. verlängert, lineal.-länglich, die untern gezähnt, die obren ganzrandig.

15. *C. NICAEENSIS* (Balb.) Nicäischer P. — *Der St. beblättert, an der Spitze ebensträussig; B. gezähnt oder schrotsägenf., die Stengelst. sitzend, fast Stengelumfassend, flach, an der Basis pfeif., mit zugespitzten, abwärts gerichteten Ohrchen, die obersten ganzrandig; Blättchen des HK. lanzettl., nach vorne verschmälert, grau-fläuml., die äusseren etwas abstehend, die inneren auf dem Rücken steifh., auf der innern Oberfläche kahl; Achenen an der Spitze verschmälert, 10riefig. ☉. Auf trocknen Wiesen, (um Wien, Bern, bei Knielingen in der Gegend von*

Carlsruhe: wahrscheinlich auch bei Mannheim, von Mertin daher mitgetheilt.) Jun. Jul. *C. nicacensis* Balb.! in Willd. Herbar. n. 14731. *C. scabra* DC., nicht Willd., welche letztere zur *Barkhausia taraxacifolia* gehört. *C. agrestis* Fries herb. norm.

16. *C. TECTORUM* (L.) Dächer-P. — Der St. beblättert, ebenstränssig; die wurzelst. *B.* lanzettl., gezähnt oder schrotsägenfiedersp., die stengelst. lineal., sitzend, pfeüß., am Rande zurückgerollt; Blättchen des HK. lanzettl., nach vorne verschmälert und nebst den Bthstielen grau-flaumig, die äusseren lineal., etwas abstehend, die inneren auf der innern Oberfläche angedrückt-behaart; Achenen 10riefig, an der Spitze verschmälert-zsggezogen, fast geschnäbelt, Schnabel rauh. ☉. Auf Aeckern. (stwt. dch das g. Gebiet.) Mai. Jun. *C. tectorum* L., was Expl. bezeugen, die Ehrhart zur Zeit Linne's zu Upsala sammelte. Fl. d. t. 501. Schk. t. 222. *C. Dioscoridis* Poll., Gochn., DC. fl. fr. *C. stricta* Schultz. — Eine Variet. mit ungeth., fast gezähnten WB.: *C. tectorum* β. *segetalis* Roth. *C. Lachenalii* Gochn., nicht Gmelin. — Narben braun; dch dies Merkmal, die an die Erde angedrückten WB., die lineal., am Rande zurückgerollten StB., den kurz-faserigen Fruchtb. und die kastanienbraunen, oberwärts merklich-verschmälerten und rauen Achenen von der folgenden leicht zu unterscheiden.

17. *C. VIRENS* (Vill.) Schlitzblättriger P. — Der St. beblättert, ästig, ebensträussig; die wurzelst. *B.* lanzettl., gezähnt oder schrotsägenfiedersp., die obern stengelst. lineal., flach, an der Basis pfeüß.; die äussern Blättchen des HK. lineal., angedrückt, auf der innern Oberfläche kahl; Achenen lineal.-länglich, 10riefig, an der Basis und der Spitze fast gleichmässig-stumpf und an der Spitze nicht verschmälert; Riefen glatt; Fruchtb. kahl. ☉. Auf Aeckern, Triften, an Wegen. Jun.-Herbst. *C. virens* Willd. spec. pl.; Willd. Herbar., ist ganz die unsrige. *C. virens* DC. hort. monsp. ist nach Expl. beschrieben, welche ich dem Verfasser selbst mitgetheilt, vergl. DC. hort. monsp. p. 101. *C. virens* Gaud. helv. *C. tectorum* Pollich. palat., Koch und Ziz. Catal. pl. palat., Engl. bot. t. IIII. *C. polymorpha* Wallr. sched. crit. *C. polymorpha* DC. prodr. mit Ausschluss der meisten Synonyme; sie wurde nämlich von DC. zsgeworfen mit *Crepis cernua* Tenor. (*C. neglecta* L. nach Smith. und Bertolon.) welche dch die geschnäbelten Achenen und die vor dem Aufblühen nickenden Rispen sehr abweicht. *C. pinnatifida* Willd. sp. pl. und Herbar. ist eine Form der *C. virens* mit tief-fiedersp. *B.* *C. virens* L. kann aus der Beschreibung nicht enträthelt werden. — Nach meiner Beobachtung bekommt *C. virens* keine ausgebreiteten Stengel, ausser wenn der Hauptstengel abgeschnitten oder vom Vieh abgeweidet wird. Zu dieser vermeintlichen Form scheint zu gehören: *C. diffusa* DC. catal. hort. monsp. mit Ausschluss mehrerer Synonyme. Der verstorbene Schleicher gab diese verstümmelte Form unter dem Namen *C. diffusa*. Die Narben sind immer gelb, die Achenen hellbraun oder ledergelb, der Pappus ist hinfällig. Die Blattform ist sehr veränderlich, wie bei *C. biennis*: ausserdem

var. die Pfl. mit graulichen und drüsig-behaarten, kleineren und noch einmal so grossen Köpfchen; letztere Variet.:

β. *agrestis*, mit noch einmal so grossen Köpfchen ist: *C. agrestis* W. Kit., „der HK. der wilden Pflanze war drüsig-steif, an der kultivirten wurde er kahl.“ Willd.

18. *C. NEGLECTA* (L. mant. S. 107. nach Smith prodr. fl. graec. 2. S. 137.) St. aufrecht, von der Basis an ästig, beblättert; *Aestchen* 2-3köpfig, vor dem Aufblühen nickend; die unteren B. gezähnt oder schrotsägenf., die oberen pfeiff., oft an der Basis kämmig-fiedersp.; der fruchttragende HK. ohngefähr so lang, als der hinfällige Pappus; die Blättchen schwach-weisslich angefliegen, die des AussenK. lanzettl., angedrückt, und sowie die DeckB. am Rande kahl; die Achenen an der Spitze in einen schlanken Schnabel zugespitzt, welcher 3-4mal kürzer als die Achene ist. ☉. An unkultiv. O., Triften, Wegen, (bei Triest überall, Biasol.; bei Fiume, Noë.) April. Mai. *C. neglecta* Bertol. amön. ital. *C. cernua* Tenor. fl. neap. prodr. nach einem Expl. vom Autor selbst im Herb. von Martins. *C. stricta* Scop. carn. 2. t. 47. Bert. rar. ital. pl. *C. polymorpha* DC. prodr. zum Theil. *Barkhausia cernua* Reichenb. fl. exc., Koch Syn. ed. 1. Diese Art wurde bis jetzt nur allein im österr. Littorale, in den übrigen Provinzen aber noch nicht gefunden. D.

19. *C. PULCHRA* (L.) Schöner P. — Der Stiel an der Spitze rispig; die wurzelst. B. schrotsägenf., die stengelst. lanzettl., an der Basis abgeschnitten, hinten gezähnt; *R. gleich-hoch, nackt*; *HK. ganz kahl*; *Blättchen des AussenK. sehr kurz, eyf., angedrückt*; Achenen lineal., schwach 10riefig, an der Spitze wenig verschmälert, kahl, die randst. rauh. ☉. Auf Hügeln und vorzügl. in Weinbergen, an Abhängen unter Gebüsch, auf Letten- und Kalkboden, (stw. in Würtemb., Oberbaden, dem Elsass und dch das Gebirg auf dem linken Rheinufer bis an die Nahe, dann wieder in Oestr. und im Littor., im südl. Tyrol: nicht in der Schw., sondern im Aostathale in Piemont.) Jun. Jul. *Prenanthes hieracifolia* Willd. *P. pulchra* DC. *P. viscosa* Baumg. *Intybellia pulchra* Monn. *Sclerophyllum pulchrum* Gaud. *Chondrilla pulchra* Lam. *Lapsana pulchra* Vill. *Phaegasium lampsanoides* Cass. Dem Habitus nach mit *Prenanthes*, aber in den Merkmalen mit *Crepls* übereinstimmend. Gaudin stellte sie wegen des an den randst. Achenen fehlenden Pappus als eigene Gattung auf, aber der Pappus fehlt an diesen früher niemals, er geht nur bei der Relfe leicht verloren. D.

5. 2. Achenen 10-13riefig. Pappus ziemlich steif, zerbrechlich, weiss, in das Gelbliche spielend. (Bei C. Jacquinii ist der Pappus weniger zerbrechlich; bei *C. paludosa* sehr zerbrechlich.) *Aracium* Neck. Less. syn. p. 141. Bth. gelb.

20. *C. JACQUINI* (Tausch.) Jacquin's P. — Der St. an der Spitze 1-5köpfig; B. lanzettl., kahl, gestielt, die äussern wurzelst. ungeth., die stengelst. schrotsägenf., lang-zugespitzt, Zpfl der obern lineal.; HK. nebst den Bthstielen locker-filzig und oft schwarz-rauhh.; Achenen meist 12riefig. 4. An felsigen O. der

A., (auf den A. der östl. Schwz., dch Vorarlberg, Schwaben, Baiern, Tyrol, Steyerm., Krain, Oestr., Mähr.) Jul. Aug. Hieracium chondrilloides L. J. a. t. 429. St. h. 39. D. fl. fr., (nicht Vill.) Geracium chondrill. Rb.

21. C. PALUDOSA (Moench.) Sumpf-P. — Der St. aufrecht, ästig, *ebensträussig*; B. kahl, die untern länglich, spitz, schrotsägenf.-gezähnt, an der Basis verschmälert, *die obern ey-lanzettf., an der Basis herzf., stengelumfassend, gezähnt*, an der Spitze ganzrandig, *lang-zugespitzt, sehr spitz*; Blättchen des HK. lanzettl., verschmälert-spitz, *drüsig-behaart*, die äussern 3mal kürzer; Achenen 10riefig. 4. Auf Wiesen und in feuchten und sumpfigen Wäldern. Jun. Jul. Hieracium paludosum L. Schk. t. 221. Geracium paludosum Rb. Aracium paludosum Monn. Dch den gelblichen, sehr zerbrechlichen Pappus kommt sie mit den Hieracien überein, aber die unter der Spitze zsggezogenen Achenen sind ganz so wie bei Crepis.

§. 3 Achenen 20riefig. Pappus schneeweiss, weich oder etwas zerbrechlich. Bth gelb.

22. C. SUCCISAEFOLIA (Tausch.) Abbissblättriger P. — Der St. an der Spitze ebensträussig; Bthstiele ästig; B. *länglich, schwach-gezähnt*, kahl oder mit einfachen Haaren bestreut, die wurzelst. an der Basis verschmälert, gestielt, stumpf, *die stengelst. stengelumfassend, das unterste über der Basis zsggezogen*; Bthstiele *nebst den HK. drüsig-behaart*; Blättchen des HK. lanzettl., verschmälert-spitz, die äusseren halb so lang, angedrückt. 4. Auf feuchten Wiesen der VorA., auch der die A. und Voralpenregionen begleitenden Ebenen, (vom Jura an dch die sämmtl. VorA. bis Steyermark und Oestr. und stw. in Oberbaden, Würtemb., Oberbayern; im Böhmerwalde, auf den Mähr. Carpathen, in Schles. und am Harze, Thüringen um Singen und bis über Arnstadt, im Steiger bei Erfurt) Jul. Aug. Hieracium succisaefolium All. Omalocline succisaefolia Monnier.

a. mollis, der St. nebst den B. beiderseits von kurzen, drüsenlosen Haaren kurzh., an den obersten B. auch drüsig; Hieracium molle J. a. t. 119. H. croaticum W. K., nach einem authent. Expl. in der Mertensischen Sammlung. H. Sternbergii Hornem. Geracium croaticum Rb.

β. integrifolia, der St. nebst den B. kahl; Hieracium integrifolium Hoppe bei St. h. 39. Crepis hieracioides W. K. nach der Abbildg. und dem Expl. von Kitaibel in Willd. Herbar. n. 14746. Geracium succisaefolium Rb.

23. C. PYGMAEA (L.) Niedriger P. — Der St. wenig-köpfig, liegend, an der Basis ästig; B. *gestielt, eyf. oder etwas herzf., gezähnt*; Bstiel *leyerf.-gezähnt*; Achenen 20riefig. 4. Auf von Schneewasser befeuchtetem Gerölle der höchsten A., (in der Schw. auf den Aelener, Graubünder und Walliser A., auf der A. Stülferjoch in Tyrol, Fröl.) Jul. Aug. Hieracium pumilum L. H. prunellae-folium Gouan. H. brunellae-folium DC. fl. fr. Leontodon dentatum L. mant. 1. Omalocline prunellifolia Cass. Monn. S.

24. *C. BLATTARIOIDES* (Vill.) Schabenkrautartiger P. — Der St. 1-6köpfig; Köpfchen fast ebensträussig; *B.* länglich, gezähnt, die wurzelst. an der Basis verschmälert, *die stengelst. stengelumfassend, an der Basis pfeil- oder spießf.; Blättchen des HK. länglich-lanzettl., stumpf, die äusseren etwas absteehend, so lang, als die inneren, sämmtl. rauhh.;* Haare borstig, einfach; Achenen 20riefig. 4. Auf Triften der VorA. und niedrigeren A., (dch die g. AK, Jura, auch auf dem Ballon im Elsass.) Jul. Aug. *C. sibirica* Gouan., nicht L. *C. austriaca* J. a. t. 441. *Hieracium blattarioides* L. sp. II. pyrenaicum L. syst. nat. St. h. 39. — Var. nicht viel.

25. *C. GRANDIFLORA* (Tausch.) Grossblumiger P. — Der St. einfach, 3-5köpfig; *B. drüsig-flaumig*, gezähnt, die wurzelst. länglich-lanzettl., in einen breiten Bstiel verschmälert, *die stengelst. pfeilf.-stengelumfassend*, lanzettl., fast ganzrandig; *HK. nebst den Bthstielen von längern, einfachen und kürzern drüsentrag. Haaren rauhh., dessen Blättchen länglich-lanzettl., die inneren stumpf, die äusseren halb so lang, ziemlich locker, spitz, sämmtl. rauhh.* 4. Auf Triften der A., (in der Schw. etwas selten; von da stw. dch Tyrol, Oberbayern, Salzbg, Oberöstr. bis nach Kärnth. und Steyerin.) Jul. Aug. *Hieracium grandiflorum* All. Willd. II. *pappoleucum* Vill. *H. conyzaefolium* Gouan. — *Crepis grandiflora* Willd., ist nach der Beschreibg und dem Herbar., n. 14753. fol. 1., ein dch Kultur vergrössertes Expl.; das *Hieracium grandiflorum* fol. 2. aber ist *Crepis blattarioides* Vill., aus den Gebirgen von Idria, wozu *Crepis grandiflora* Link, nicht Willd., gehört.

§. 4. Achenen 30riefig. Pappus schmutzig-weiss, zerbrechlich. Bth. gelb.

26. *C. SIBIRICA* (L.) Sibirischer P. — Der St. rauhh., an der Spitze ebensträussig; *B. runzelig, elliptisch-länglich, gezähnt, die untern stengelst. in den tief-gezähnten, stengelumfassenden Bstiel verschmälert*, die oberen lanzettl., fast ganzrandig; *HK. von einfachen Haaren rauhh., die äussern Blättchen kürzer, locker; Achenen meist 30riefig.* 4. In Hainen der VorA., (in Schles. im Kessel an der Janowitzer Haide im Gesenke, Wimm.; vgl. Uebersicht der Arbeit. und Veränd. der schles. Ges. für vaterl. Cult. 1833. p. 72.) Jul. Aug. D.

Gatyna globulifera Cass. (*Crepis globifera* Hall. fil. bei Gaud., *C. Dioscoridis* DC. ic. fl. gall. t. 18., Willd. herb. n. 14759.) wurde dch eine Verwechslung mit *Crepis tectorum* unter den Schw. Pflanzen aufgezählt; sie wächst aber nicht in der Schw.

94. *SOYÉRIA* (Monnier.) Soyerie. — Strahlen des Pappus pfriemlich-haarf., an der Basis ein wenig dicker, sonst Alles, wie bei *Crepis*. — Die *Soyeria grandiflora* und *blattarioides* Monn. sind zu *Crepis* gebracht.

1. *S. MONTANA* (Monn.) Berg-S. — Der St. 1 köpfig, an der Basis beblättert, an der Spitze verdickt; *B. elliptisch-länglich, gezähnt, die stengelst. halbstengelumfassend; HK. sehr rauhh.* 4. Auf Wiesen der A. und VorA., (in der Schw., Tyrol, Salzbg,

Steyerm., Oestr.) Jun. Jul. Hieracium montanum J. a. t. 190. Hypochaeris pontana L. Andryala pontana Vill. Crepis montana Tausch. DC. prodr.

2. S. HYOSERIDIFOLIA (Koch.) Schweinsalatblättrige S. — Der St. 1köpfig, blattreich; B. *sämmtl. gestielt, schrotsägeenf.*, das oberste lineal., ganzrandig; HK. schwarz, sehr rauh. 4. Auf den höchsten A. (Schw. im C. Freiburg, Bern, Glarus, Appenzell; im Vorarlberg: bayer. A; Obersteyerm.) Jul. Aug. Hieracium hyoseridifolium Vill. bei Pers. Crepis hyoseridifolia Tausch. Apargia hyoseridifolia Less. Syn. Leontodon terglouensis Harquet. pl. alp. carniol. t. 2. f. 5.

95. HIERACIUM (L.) Habichtskraut. — HK. dachig; Achenen gleichgestaltet, stielrund, 10riefig oder fast prismatisch, bis zur Spitze von gleicher Breite, am Rande der Spitze mit einem dünnen, kleingekerbten Ringe versehen, ganz schnabellos. Pappus haarig, Strahlen haarfein, zerbrechlich. Fruchtb. nackt.

1. Rotte. PILOSELLOIDEA. Der St. schafff. Strahlen des Pappus sehr fein, einreihig, gleichlang, nur mit einem oder dem andern kürzern vermischt. Haare des St. und der B. borstenf.)

a. St. schafff., 1köpfig, oder in eine Gabel gespalten und 2köpfig, Bthstiele verlängert, in einem spitzen Winkel aufrecht; oder wiederholt-gabelig und 3-5-seltner mehrköpfig. Bth. gelblich oder schwefelgelb.

1. II. PILOSELLA (L.) Gemeines H. — *St. nackt, 1köpfig*; Ausläufer hingestreckt, unfruchtbar oder bthtragend, letztere an der Spitze aufstrebend, in einen 1köpfigen oder gabelig-2-3köpfigen Schaft verlängert; *HK. kurz-walzlich*; B. etwas ins Meergrüne spielend, verkehrtey-lanzettf. oder lanzettl., borstig-behaart, unterseits grau-filzig. 4. Auf trocknen Triften, Haiden, Hügeln, an Wegen. Mai.-Herbst. St. h. 27. Bth. schwefelgelb, die randst. unterseits mit einem Purpurstreifen. Den Hauptschaft sah ich sowohl bei der Stammart, als bei der Variet. immer ungeth., nie gabelig; die gabeligen Expl. der Herb. sind bthtragende Ausläufer. Die doch Ausläufer vermehrte Pflanze treibt aber immer dergleichen gabelige Nebensäfte und niemals mehr einen Hauptschaft. Var. mit breitem, verkehrteyf. und schmälern, lanzettl., unterseits grau- oder weiss-filzigen, seltner beiderseits filzigen B. und ausserdem:

a. *vulgare* Monnier.; Köpfchen kleiner; HK. drüsig-behaart; Ausläufer verlängert und dünn; B. unterseits filzig.

β. *robustus*; an allen Theilen grösser, meist behaarter; Köpfchen grösser; HK. von einfachen Haaren rauh.; Ausläufer zwar verlängert, jedoch merklich dicker; B. unterseits weiss-filzig.

γ. *farinaceum*; B. beiderseits, doch unterseits dichter, von einem feinsternf. Flaume filzig; II. Pilosella γ. *farinaceum* Hor-

*) Mehrere von den Schriftstellern aufgeführte Arten sowie andere Formen, die sie für Bastarde halten, liess ich absichtlich weg, da ich sie noch nicht hinlänglich untersuchen konnte.

nung. herb. *H. Pilosella* β . *incana* DC. fl. fr. *H. velutinum* Heg. und Heer fl. der Schw. Dies in den höhern A.

δ . *pilosissimum*; von der Grösse der vorhergehend. Varietät, aber dch verlängerte Haare sehr rauhh.; Köpfchen von langen Haaren sehr zottig, so wie bei *H. alpinum*; Blättchen des HK. an der Spitze verschmälert-spitz; Ausläufer dick, kurz. Scheint zwar eine eigene Art, aber beständige Merkmale habe ich bis jetzt nicht gefunden: *H. Peleterianum* Merat. DC. *H. Pilosella* β . Pollich. *H. Pilosella* C. *Peleterianum* Monn. *H. Pilosella* β . *pilosissimum* Wallr. Dieses kommt besonders auf dem Donnersberge der Rheinpfalz, um Winingen Fl. von Coblenz, und auf dem Berge Hohnack in d. Vogesen vor.

ϵ . *grandiflorum*; Köpfchen fast noch einmal so gross, als bei der gewöhnl. Form; HK. mit kurzen Drüsenhaaren besetzt; Ausläufer kurz, ziemlich dick: *H. Pilosella* γ . *grandiflorum* DC. *H. Pilos.* B. *alpestre* Monnier.

ζ . *Hoppeanum*; ebenso wie das vorhergehende, aber die äussern Blättchen des HK. oval-lanzettl., fast eyf., ziemlich stumpf: *H. Hoppeanum* Schult. *H. pilosellaeforme* Hoppe bei St. h. 37. Diese Variet. wächst wie die vorige in den Alpen; unsere Winter dauert sie schwer aus, wesshalb sie auch leicht eine eigene Art bilden mag.

2. *H. STOLONIFLORUM* (W. und Kit.) Ausläuferblumiges *H.* — *St. meist 1blättrig, gabelig-2köpfig oder wiederholt-gabelig-3- und mehrköpfig*; Bthstiele verlängert, aufrecht; Ausläufer liegend, unfruchtbar und bthtragend, letztere aufstrebend, 1köpfig oder gabelig-mehrköpfig; *der fruchttragende HK. unterhalb der Mitte niedergedrückt-kugelig-bauchig*; B. grasgrün, verkehrtey-lanzettf., borstig-behaart, unterseits dch den fein-sternf., zerstreuten Flaum etwas grau. 4. Auf Bergtriften, an kräuterreichen, unkultiv. O., (in Böhm.; um Hamburg, Sonder; die bei Darmstadt gefundene ist zweifelhaft.) Mai.-Jul. Bth. schwefelgelb, *die randst. unterseits mit einem Purpurstreifen*. Die lebende Pflanze untersch. sich sehr leicht von allen Variet. des *H. Pilosella* dch den, nach dem Verblühen an der Basis gleichsam mit einem bauchigen Ring umgebenen HK., es ist Schade, dass diess Merkmal bei der getrockneten und gepressten Pfl. verloren geht. Bemerkenswerthe Variet. sah ich niemals weder bei der wilden, noch kultiv. Pfl. — *Hieracium flagellare* Willd. gehört nach der Beschreibg zu den Variet. von *H. Pilosella*, an jeden Fall ist der Name *Hieracium stoloniflorum* älter. D.

3. *H. BIFURCUM* (M. Biebst.) Zweigabeliges *H.* — *Schaft meist 1blättrig, gabelig, 2köpfig oder wiederholt-gabelig und 3- und mehrköpfig*; Bthstiele verlängert, aufrecht; Ausläufer liegend, verlängert, unfruchtbar und bthtragend, letztere aufstrebend, 1köpfig, oder gabelig-mehrköpfig; *der fruchttragende HK. an der Basis ey-kegelf.*; Bth. gleichfarbig; B. meergrünlich, verkehrteyf.-lanzettf. oder lanzettl., borstig-haarig, unterseits dch den zerstreuten feinsternf. Flaum etwas grau. 4. An sonnigen O., Wegen, auf unkultiv. Hügeln, auf Kalk- und Lettenboden, (stiv.

im Rheinthale von Basel und Oberbaden und dem Elsass bis Frankf. und Mainz; sodann in Krain, südl. Tyrol, Steyer., Böhm., Thüring.) Mai. Jun. Bth. schwefelgelb. Untersch. sich von dem vorhergehenden dch. halb so grosse Köpfchen, meist gleichfarbige Bth. und den an der lebenden Pflanze kegelf.-bauchigen, nicht niedergedrückt-bauchigen, fruchttragenden HK. *H. collinum* Bess. galic. (die Bth. werden beiderseits hellgelb beschrieben.) *H. brachiatum* Bertol., nach einem Expl. aus der Hand des Autors. *H. hybridum* Gaud., (*H. hybridum* Chaix bei Vill. ziehe ich zu *H. furcatum*.) *H. flagellare* Froel. in DC. prodr., kaum Willd. — Var., wie seine Verwandten, mit um die Hälfte kleineren Köpfchen. — Eine Variet. mit breitem B. ist *H. auriculaefolium* Tausch.

4. *H. FURCATUM* (Hoppe.) Gabeliges *H.* — *St. nackt oder 1blättrig, gabelig, 2köpfig oder wiederholt-gabelig und 3-4köpfig*; Bthstiele verlängert, aufrecht; *Ausläufer meist fehlend*; *HK. nach dem Verblühen fast kugelig, B. kahl oder zerstreut-borstig*, unterseits mit feinsternf. Flaume bestreut und auf der Mittelrippe borstig, die inneren lanzettl., spitz, die äusseren halb so lang, verkehrteyf., stumpf. 4. Auf Triften der A. bis zum ewigen Schnee, (Schw., Tyrol, Bayern, Salz., Kärnth.) Jul. Aug. Die randst. Bth. unterseits mit einem Purpurstreifen, Hoppe bot. zg. 14. p. 182. *H. sphaerocephalum* Froel. in DC. prodr. Var., wie alle verwandten, mit 1köpfigem Schaft: *H. uniflorum* und *H. pusillum* Hoppe; ferner mit 2-3, an der Spitze des Schafts zsgestellten Köpfchen: *H. angustifolium* Hoppe bei St. h. 37., nach der eigenen Bemerkg. des Autors. — Var. weiter

β. alpicola, Schaft sehr rauhh.; HK. dicht-zottig von schwarzen Haaren; Ausläufer kürzer oder länger: *H. alpicola* Schleich. Gaud. Tausch.

In einem wuchernden Expl. dieser Art glaube ich *H. Auricula* Vill., *H. hybridum* Chaix. bei Vill. zu finden; „n'a pas de stolones“ sagt Villars, was mit *H. bifurcun* MB. nicht übereinstimmt.

b. *St. nackt oder 1blättrig*, an der Spitze 2-5köpfig, Köpfchen ebensträussig-zsgestellt, seltner endigt an verkümmerten Expl. der Schaft mit einem einzelnen Köpfchen oder es sind bei wuchernden mehr, als 5 vorhanden. Bth. hell- oder schwefelgelb.

5. *H. BREVISCAPUM* (DC.) Kurzschäftiges *H.* — *St. nackt oder 1blättrig, an der Spitze 2-5köpfig*; Bthstiele fast ebensträussig; Ausläufer sehr kurz oder fehlend; *B. beiderseits von einem feinsternf. Flaum graulich und borstig-steifh.*, die inneren lanzettl., die äusseren verkehrteyf. und oberseits kahl. 4. Auf den höheren A. der Schw., (bis jetzt nach Gaudin bloss auf dem Fouly, Nägeli.) Jul. Aug. *H. pusillum* Lap. — *H. Candolli* Monnier. mit Ausschl. des Syn. von Tausch. Untersch. sich von *H. angustifolium* und *H. auricula* dch. die beiderseits, ausser den steifen Haaren, von feinsternf. Flaume graulichen und, obschon schmalen, dch. sämmtl. abgerundet-stumpfen B., allein nach den mir von Nägeli mitgetheilten Expl. geht es in die folgende Art über.

6. *H. ANGUSTIFOLIUM* (Hoppe.) Schmalblättriges *H.* — *St. nackt*

oder 1blättrig, an der Spitze 2-5köpfig; Bthstiele ebensträussig, nach dem Verblühen aufstrebend; Ausläufer sehr kurz oder fehlend; Bth. gleichfarbig; B. freudig-grün, lanzettl. oder fast lineal., kahl oder am Rande und auf der Rippe feinsternf.-flaumlich, zerstreut-borstig-behaart. 4. Auf Triften der höhern A., (Schw., Tyrol, Kärnth., Salzbg., Steyerem.) Jun.-Aug. H. angustifolium Willd. DC. fl. fr. Vill. H. Auricula γ . angustifolium Dub. H. glaciale Lachen. — Eine Var. mit kurzen Ausläufern ist H. Auricula Smith.

7. H. AURICULA (L.) Aurikel-H. — St. nackt oder 1blättrig, an der Spitze 2-5köpfig; Bthstiele ebensträussig, nach dem Verblühen aufstrebend; Ausläufer liegend, verlängert, unfruchtbar oder (sehr selten) aufstrebend und bthtragend und gabelig-2mehrköpfig; Bth. gleichfarbig; B. bläulichgrün, lanzettl., kahl, zerstreut-borstig-behaart, die äusseren stumpf, die inneren spitz. 4. Auf Wiesen, Triften, Rainen. Jun.-Herbst. H. Auricula L., nach Expl., die zu Linne's Zeiten von Ehrhart zu Upsala gesammelt wurden; vgl. Mey. chlor. hannov. p. 415., Wahlenb. snec, Fries novit., DC. fl. fr., Monn. ess. H. dubium Smith., Willd. und Gaud. St. h. 37. H. Lactucella Wallr.

c St. an der Spitze ebensträussig-vielköpfig, 20-100köpfig. B. mehr oder weniger bläulich-grün, am Rande oder überall borstig-steifh. und unterseits oder auf beiden Flächen mit sternf. Flaum bestreut, selten ganz kahl. Bth. hell- oder schwefelgelb.

8. H. PILOSELLOIDES (Vill.) Florentinisches H. — Der St. schlank, nackt oder unterwärts armbtättrig, kahl; Ebenstrauß vielköpfig, fast rispig, locker, kahl oder zerstreut-behaart; HK. schwach feinsternf.-flaumlich; Bthstiele nach dem Verblühen abstehend und aufstrebend; B. bläulich-grün, schmal-lanzettl., kahl oder am Rande oder auf der ganzen Oberfläche zerstreut-borstig-behaart, Borsten stark, starr. 4. An felsigen O., auf sonnigen Hügeln, Flusskies, (in der Schw. und im südl. D., bes. auf der südl. Seite am Fusse der A.) Jun. Jul. H. piloselloides DC. Rb. ic. t. 38. f. 80. Sl. H. florentinum St. h. 39. All.? H. florentinum H. piloselloides Gaud. — Bth. klein; Bthstiele nach dem Verblühen spreitzend-aufstrebend. B. bald ganz kahl, oder nur am Rande der Basis hie und da mit einer oder der andern Borste besetzt, bald auch auf der obern Fläche und auf der Mittelrippe unterseits mit steifen Borsten bestreut, übrigens aber ebenfalls ohne sternf. Flaum. Bthstiele fast kahl oder nebst dem HK. mit drüsigen Haaren besetzt, ausserdem kahl oder zugleich fein sternhaarig-filzig, oder auch mit langen, einfachen Haaren locker-bestreut. Var.:

β . glareosum, niedrig, der St. von der Mitte an ästig, Aeste schlank, eine lockere, verbreiterte, spreitzende R. darstellend: H. Michellii Tausch. Diese vorzügl. im Flusskiese, (der Save und des Isonzo in Krain.)

Gaudin vereinigt H. piloselloides mit dem folgenden H. praealtum unter dem Namen H. florentinum zu einer Art und vielleicht nicht mit Unrecht; denn nach dem Zeugniß von Custor kommen

nicht selten Mittelformen vor, welche man mit gleichem Recht zu dieser und jener ziehen kann. Ich führe jedoch beide auf, damit man sie zukünftig weiter beobachten möge.

9. *H. praealtum* (Koch Synops. ed. 1., auch Villars aber mit Hinzufügung von Formen und Variet. Wimm. und Grab.) Hohes *H.* — Der *St.* kahl oder zerstreut-borstig-behaart und mit feinsternf. Flaume bestreut, *unterwärts 1-wenig-blättrig; Ebenstraus vielköpfig, gleich-hoch, locker*; Bthstiele und HK. *lockerer oder dichter-feinsternh.-grau* und behaart; Bthstiele nach dem Verblühen gerade; *B. bläulich-grün*, lanzettl., am Rande oder auf der ganzen Fläche borstig-haarig von *starken Borsten*, die länger, als der Durchmesser des *St.* sind. 4. Auf trocknen Wiesen, Bergen, unkultiv. Hügeln. Jun. Jul. Unterscheidet sich von *H. Auricula* durch die höhern, 20-100blüthigen Schäfte und die längern und grössern *B.* Die meist satt-bläulich-grünen *B.* haben auf der obern Fläche niemals einen feinsternh. Flaum, aber auf der untern findet man sie damit oft bestreut; bald fehlen die Borsten beinahe gänzlich, bald ist der Rand und die Mittelrippe unterseits, bald die ganze obere Fläche und zwar mit steifen und starken Borsten besetzt; übrigens sind die *B.* bald lanzettl., bald verkehrteyf-lanzettl., die innern spitz, die äusseren meist abgerundet-stumpf. Die Ausläufer sind bald vorhanden, bald fehlen sie, bald richten sie sich auf und bilden die bthtragenden Neben*St.* Der Schaft hat an der Basis 1-2 *B.* und meist ein wenig höher noch ein drittes kleineres. Villars begreift unter seinem *H. praealtum* nur kahle oder ziemlich kahle Expl. ohne Ausläufer; ich habe jedoch, indem ich der Schles. Flora folge, damit noch andere, davon nicht zu trennende Formen verbunden. Hauptsächliche Variet. sind:

α. florentinum, Ausläufer fehlen oder die aufstrebenden bthtragenden stellen seitenst. *St.* dar; *St.* kahl; *B.* am Rande und unterseits auf der Mittelrippe mit Borsten bewimpert: *H. praealtum* Vill. DC. fl. fr. 5. 441. Gochn. Rb. ic. t. 55. f. 114. *H. piloselloides* Fl. fr. 4. p. 25. mit Ausschl. des Syn. von Vill. *H. florentinum* Willd. Spreng. hal. t. 10. f. 1. *H. florentinum* L. praealtum Gaud. *H. praealtum* und *H. stellatum* Tausch. — Diese Var. mit ein wenig mehr behaartem Schäfte, und schwarz-drüsigen, behaarten Bthstielen und HK. ist: *H. obscurum* Rb. ic. 1. f. 115. — Bthstiele und HK. sind bald kahl und mit feinsternf. Flaume spärlich besetzt, bald mit drüsentrag Haaren lockerer und dichter bestreut; bald von feinsternf. Flaum grau und filzig und von drüsentrag. oder einfachen Haaren rauhh.

β. Bauhini, *St., B.* und alles übrige, wie bei der Variet. *α.*, aber mit fädlichen, verlängerten Ausläufern versehen: *H. Bauhini* Schult. Bess. *H. Auricula* Willd.; Vill. voyage unsere Variet. *δ.* damit begriffen. — *H. viscidulum* Tausch, wenn der Ebenstraus dicht-drüsig-behaart ist. Eine Abänderg davon mit einem 2sp. Schäfte, wechselst., aber doch chensträussigen, Bthstielen: *H. filiferum* Tausch.

γ. fallax, Ausläufer fehlend oder aufstrebend und bthtragend;

B. oberseits überall mit steifen Borsten bestreut; Schaft ziemlich kahl: *H. fallax* DC. *H. cymosum* Pollich. *H. fallax* I. Gaud.

δ. *decepiens*, St., B. und alles übrige, wie bei der Variet. γ. aber mit verlängerten Ausläufern versehen: *H. fallax* Koch. bei DC. *H. fallax* H. Gaud. *H. collinum*, *H. vulgare* und *H. calodon* Tausch.

ε. *hirsutum*, St. durchaus und die B. unterseits mit fein-sternh. Flaume bedeckt; Ausläufer aufstrebend, stengelst., bthtragend: *H. cymosum laxum* Mey. chlor. han., nebst unserer Var. ζ. *H. fallax* Willd. Rb. ic. f. 82., eine kleinere, weniger rauhh. Form; *H. cymigerum* Rb., „wegen der langen Haare.“ *H. Zizianum* Tausch, eine grössere, sehr rauhh. Form. Diese Variet. untersch. sich von *H. echiioides* dch die wenigen und nicht allmählig an Grösse abnehmenden StB., und dch die kleinern, nicht so dicht-filzigen Köpfchen. — *H. cymosum* β. *longifolium* Rb. ic. f. 116., scheint wegen der sehr kurzen Haare zu den Varietäten des *H. Nestleri* (n. H. unten) zu gehören.

ζ. *setosum*, dieselbe Var. wie die vorhergehende, aber mit liegenden, unfrucht. Ausläufern: *H. piloselloides* Wallr. (nicht Vill.) nach Meyer.

Hieracium glaucescens Bess. primit. fl. gal. 2. p. 150., hat den schlanken Schaft des *H. piloselloides* und dessen kleine Köpfchen, stimmt aber ausserdem mit der Variet. *Bauhini* von *H. praealtum* überein, aber die Borsten auf der obern Fläche der B. sind kurz, kürzer, als der Dchmesser des Schaftes, dieser ist kahl, schlängel. an der Basis mit kurzen Haaren locker bestreut; Ausläufer sind verlängert, schlank; Ebenstrauß dicht, gleich-hoch; Bthstiele graulich und behaart; B. kahl, lanzettl., oberwärts mit Borsten bestreut, die kürzer, als der Dchmesser des St. sind, an der Basis aber mit längeren Borsten gewimpert. Ob dieses eine Variet. von *H. praealtum*, oder eine eigne Art ist, wage ich nach wenigen Expl., ich besitze nur 2 bei Wien gesammelte, nicht zu entscheiden.

10. *H. ECHIIOIDES* (W. und Kit.) Natterkopffartiges *H.* — *Der St.* von feinsternf. Flaume dicht-filzig und von steifen Borsten, die länger, als der Dchmesser des St. sind, steifh., *reichblättrig*, (10-20blättrig;) *B. allmählig nach oben an Grösse abnehmend*, bläulich-grün, lanzettl., unterseits feinsternf.-flaumig, *beiderseits von starken, verlängerten Borsten steifh.*; *Ebenstrauß vielköpfig, gleich-hoch, locker, weiss-filzig* und behaart; Ausläufer fehlend oder aufstrebend, stengelf. und bthtragend. 4. Auf Hügeln und an gebirgigen, unkultiv. O., (im nördl. und östl. D.; im westl., so viel ich weiss, noch nicht aufgefunden.) Jun.-Aug. *H. cymosum* c. *setosum* Meyer. Untersch. sich dch den reichblättrigen St., die aufwärts allmählig an Grösse abnehmenden B. und die ziemlich grossen, weiss-filzigen Köpfchen; im Alter wird jedoch der weisse Filz bräunlich. Var.:

α. *setigerum*, Borsten des St. und der B. absteehend: *H. setigerum* Tausch *H. simplex* Tausch früher. *H. Rothianum* Wallr. nach Meyer, *H. cymosum* Spreng. hal. t. 10. f. 2. ? Das abgebill-

dete Expl. ist ein unregelmässiges und scheint wegen der wenigen StB. zu den rauh. Varietäten von *H. praealtum* zu gehören.

β. verum, Borsten des St. und der B. aufrecht oder ange-drückt; *H. echiodes* Lumn. W. und Kit. a. a. O., in der Beschrel-bung werden die Borsten anliegend genaunt.

γ. grandiflorum, Ebenstrauss aus wenigeren, aber noch einmal so grossen Köpfchen zgesetzt, fast so gross, als die Köpfchen des *H. Pilosella*; *H. cinereum* Tausch. D.

11. *H. NESTLERI* (Vill.) Nestler's H. — Der St. mit feinsternf. Flaum bestreut und von Borsten, die so lang, als der Dchmesser des St. oder kürzer sind, kurz., an der Basis mehrblättrig (3-6-blättrig); *B. länglich-lanzettl. und länglich, beiderseits feinsternf.-fläumlich und von kurzen Borsten kurz.*, die äusseren stumpf, die inneren spitz; *Ebenstrauss gedrungen, vielköpfig*, graulich und von drüsigen Haaren oder Borsten rauh; *Bthstielen* büschelig. 4. Auf unkultiv. Hügeln und gebirgigen, felsigen O., (Schwaben bis zum Hesselberg in Franken und dch Bayern, Böhm. nach Sachsen und Thüring.; Frankf. an der O., Schles.) Jun. Jul. Villars beschreibt ein Expl. mit ausgeschweift-gezähnelten B. und seine, übrig. rohe Abbildg stellt die verblühte Pflanze mit verlängerten Bthstielen gut dar. Ob diese Art das *H. cymosum* L. ist, lässt sich nicht ausmitteln; die Beschreibg in der sp. plant. stimmt ganz offenbar mehr mit der oben angeführten Variet. *γ.* von *H. praealtum* überein, als mit *H. Nestleri*. — Die B. sind meist ziemlich breit, länglich oder verkehrteyf., oft ausgeschweift und ein wenig schief. Der feinsternf. Flaum auf beiden Seiten der B. und die dünnen Haare der B. und des St., welche die Länge des Dchmessers vom St. haben, oder noch kürzer sind, zeichnen diese Art aus. Var.:

α. hirsutum, Haare des St. so lang, als dessen Dchmesser; Ebenstrauss von einfachen, verlängerten Haaren rauh.; *H. cymosum* Froel. Tausch. Rb. fl. exc., mit Ausschl. der Variet. — *H. cymosum α. Columnae* Rb. ic. t. 17. f. 34., sehr gut abgebildet.

β. brevisetum, die Borsten der St. und der B. sehr kurz; Ebenstrauss von einfachen, verlängerten Haaren rauh.

γ. Vaillantii, Borsten des St. und der B. sehr kurz; Haare des Ebenstrausses kurz, drüsig, mit wenigen darunter gemischten längern, einfachen; *H. Vaillantii* Tausch; auch scheint *H. cymosum β. longifolium* Rb. ic. f. 116. wegen der sehr kurzen Haare hieher zu gehören. D.

12. *H. PRATENSE* (Tausch) Wiesen-H. — Der St. unterwärts armblättrig, von verlängerten, schlanken Haaren rauh., oberwärts nebst dem Ebenstrauss von drüsentrag. Haaren und Borsten schwarz-behaart; *Ebenstrauss vielköpfig, gedrungen; Bthstielen während der Bthzeit geknäuel*; *B. grasgrün*, oder nur etwas bläulich-grün, länglich-lanzettl., von schlanken Haaren rauh., aber ohne den feinsternf. Flaum oder unterseits spärlich damit bestreut. 4. Auf Hügeln, torfhalt. Wiesen, (Elsass und auf der Rheinfläche bei Roxheim, an Rheindämmen zwischen Oggersheim und Oppau

in der Rheinpfalz; Kärnthen, häufiger im nördl. D.) Juni-Aug. *H. cymosum* St. h. 39. *B.* grasgrün, nur ein wenig in das Bläulichgrüne spielend, von langen dünnen Borsten rauhh., die weicher, als bei *H. piloselloides*, *H. praealtum* und *H. echioides* sind; besonders sind die *B.* auf der Mittelrippe unterseits dicht-zottig, seltner auf der obern Seite fast kahl. Nachdem ich die Abbildung in Gochnat's diss. d. plant. cichor. t. I. vergleichen konnte, blieb mir nicht im Mindesten zweifelhaft, dass die vorliegende Art das wahre *H. collinum* Gochnat und DC. sei; ich wollte jedoch den so oft verwechselten Namen nicht voransetzen. Syn. sind: *H. cymosum* Willd. nach einem von Willd. seinem Freunde Mertens mitgetheilten und in dess. Herbar. aufbewahrten Expl. *H. dubium* L., was die Expl., welche Ehrhart zu Linne's Zeit um Upsala sammelte, bezeugen; vgl. Meyer chlor. han. p. 416. *H. ambiguum* Ehrh. herb. 168. *H. cymosum* α. *conglomeratum* Meyer. — Am nächsten kommt diese Art dem *H. aurantiacum*, aber die Köpfschen sind viel kleiner, viel zahlreicher und dicht-geknäuel. Kommt ohne Ausläufer und mit liegenden unfruchtbar. und mit aufstrebenden bithragenden Ausläufern vor. D.

d. St. 2-mehrköpfig, wie im vorhergeh. §., aber die *B.* freudig-grün und ohne Mischung von Bläulichem, übrigens rauhh.

13. *H. AURANTIACUM* (L.) Pomeranzenfarbiges *H.* — *Der St. unterwärts armblättrig, von verlängerten, schlanken Haaren rauhh., oberwärts nebst dem Ebenstrauß schwarz-drüsig-behaart* und von einfachen Haaren rauhh.; Ebenstrauß 2-10köpfig (bei kultivirten 15-20köpfig), geknäuel, zuletzt locker; *B. grasgrün*, länglich oder verkehrtey-lanzettf. oder verkehrteyf., von schlanken Haaren rauhh., ohne feinsternf. Flaum. 4 oder 5. Auf Triften der A., (dch d. g. AK., sodann auf den höhern Kuppen der Vogesen, des Feldbergs in Baden, der Mähr., Böhm. und Schles. Gebirge.) Juni. Jul. J. a. t. 410. St. h. 39. Bth. dunkelpomeranzenfarben. Kommt, wie die vorhergehende, ohne Ausläufer und mit liegenden unfruchtbaren und mit aufstrebenden bithragenden Ausläufern vor. Var.:

β. *luteum*, Bth. gelb. *H. aurantiacum* δ. *flavum* Gaud. Schleich. Kommt dem *H. sabinum* am nächsten, untersch. sich aber hinlänglich dch die 3mal grössern Köpfschen und den lockern Ebenstrauß.

γ. *bicolor*, niedrig, 2köpfig, mit kleineren Köpfschen, die randst. Bth. pomeranzengelb, die mittelpunktst. schön-citrongelb: Custor. bei Gaud.; diese Var. sah ich noch nicht.

δ. *fuscum*, St. fast ohne *B.*, 1-2köpfig, die *B.* schmaler, graugrünlich: *H. fuscum* Vill. voy. t. I. f. 2. *H. aurantiacum* ζ. *fuscum* Froel. in DC. prodr.

14. *H. SABINUM* (Sebast. und Maur.) Sabinisches *H.* — *Der St. unterwärts mehrblättrig, nebst den Bthstielen und B. mit feinsternf. Flaum bestreut und von verlängerten Borsten rauhh.; Ebenstrauß vielköpfig (20-30köpfig), dicht-gedrängt; HK. sehr rauhh.; B. grasgrün, lanzettl. oder verkehrtey-lanzettf., die äus-*

cern stumpf, die innern spitz. 2. Auf Triften der Schweizer A.; in Deutschl. bisher bloss jenseits der AK., (im Walde von Lipizia bei Triest; Schleicher hat die Pflanze verschickt ohne Angabe des StandO; die Abart β . auf den A. des C. Waadt, auf der Naye und Verraux über Vevay.) Juni-Aug. H. cymosum Vill. DC. fl. fr. 5. p. 440. — Var.:

β . *rubellum*, Bth. röthlich: H. multiflorum Schleich. nach einem übersandten Expl. In den penninischen A.

„Der St. unterwärts 3-4blättrig; B. freudig-grün, wie bei H. aurantiacum, aber die Köpfchen sind dicht zsgestellt und der Ebenstrauß wird nie locker, noch ist der St. ästig, wie bei diesem; Bth. manchmal röthlich, aber die Köpfchen sind immer viel kleiner (von der Grösse derer des H. pratense) und immer dicht zsgestellt“ sagt Villars in den Précis d'un voyage bot. p. 64. 65.

H. Rotte. AURELLA Tausch. z. Theil. B. graugrün, lanzettl. oder längl., meist wollig von verlängerten Haaren oder am Bstiel behärtet, die der nichtblühenden Wköpfe überwinternd und noch während des Blühens grünend. Die Zähne der Bl. aussen kahl. Haare der B. gezahnt, aber keine drüsentragend. Strahlen des Pappus dicker, als bei der vorhergehenden Rotte und so wie bei den folgenden Rotten undeutlich 2reihig, längere mit mehreren kurzen vermischt.

15. H. STATICEFOLIUM (Vill.) Graselkenblättriges H. — Der St. fast nackt, 1-5köpfig; Bthstiele verlängert, oberwärts viel-schuppig und nebst dem HK. graulich; Blättchen des HK. zugespitzt; WB. lineal. oder lanzettl.-lineal., ziemlich stumpf, entfernt-gezähnt oder ganzrandig, nach der Basis verschmälert, kahl; W. kriechend. 2. An unfruchtbar., felsigen O. der A. und der die A. begleitenden Gebirge, mit den Flüssen in die Ebenen herabsteigend, und auf dem Flusskiese wachsend. (dch d. g. AK., und an den Flüssen in Oberschwaben gegen Vorarlberg, in Oberbayern, Salzbg., Oestr.) Juni, Juli. St. h. 28. nicht gut. Die W. steigt in die Erde hinab und kriecht tief unter der Oberfläche, Ausläufer treibend, wie der Convolvulus arvensis, weit und breit; dach untersch. sich diese Art von allen der Gattung.

16. H. PORRIFOLIUM (L.) Lanchblättriges H. — Der St. beblättert, meist von der Basis an ästig, locker-rispig, kahl; Aeste schlank, abstehend, meist 2köpfig; Bthstiele oberwärts schuppig und nebst dem HK. von feinsternf. Flaume etwas graulich; Blättchen des HK. an der Spitze stumpf, angedrückt, die untern etwas sparrig; B. bläulichgrün, lineal.-lanzettl. und lineal., zugespitzt, an der Basis verschmälert, fast ganzrandig, kahl oder an der Basis gewimpert, die stengelst. sitzend. 2. Auf VorA. u. A., (Oestr., Steyer., Krain, am Loibl auf der Krainer Seite, südl. Tyrol, im C. Tessin am Comersee.) Juli, Aug. J. a. t. 286. J. enum. t. 6. St. h. 39. — Var.:

α . *armerifolium*, B. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ Linien breit, ganzrandig oder mit wenigen kleinen Zähnen versehen: H. porrifolium α . armerifolium Fröl. in DC. prodr.

β . *denticulatum*, B. 3 — 6 Linien breit, mehr oder weniger

lanzettl., entfernt-gezähnel, an der Basis oder auch auf der untern Seite kurz h.: *H. porrifolium* δ , *dentatum* Froel. a. a. O.

γ . *Froelichtii*, B. wie bei der Variet. β ., aber unterseits mehr oder weniger mit kleinen sternf. Haaren bestreut. *H. saxatile* Jacq. obs. 2. t. 50., Froel. in DC. prodr. Ich besitze die ächte Pfl. von dem bezeichneten Stand O. im Baden in Oestreich. Der Name *Hieracium saxatile* Jacq. ist jetzt zweideutig geworden.

Aus den Saamen der schmalblättrigen Pflanze des *Hieracium porrifolium* zog ich Expl. mit lanzettl. unterseits behaarten W. und untern StB. und mit an der Basis zottigem St.

17. *H. GLAUCUM* (All. ped. 1. S. 214. t. 28. f. 3.) Graugrünes H. — *Der St.* unterwärts *beblättert*, 2-mehrköpfig, *kahl*; *Bthstiele spreitzend*, oberwärts schuppig und *nebst dem HK. von feinsternf. Flaume graulich*, übrigens kahl oder mit einfachen oder drüsigen Haaren spärlich bestreut; Blättchen des HK. ange-drückt; *B. bläulichgrün, lanzettl., zugespitzt*, nach der Basis verschmälert, ganzrandig, entfernt-gezähnel oder gezähnt, kahl oder an der Basis bärtig-gewimpert, die stengelst. entfernt, die unteren gestielt, die oberen sitzend. 4. An felsigen O. der A. und VorA. und auf Bergen und Hügeln, welche d. A. begleiten, und im Kiese der aus den A. entspringenden Flüsse, (dch d. g. AK., und von Oestr. nach Mähr.) Juni-Aug. DC. prodr. *H. saxatile* Jacq. ic. rar. t. 163., Koch Synops. ed. I., St. h. 39. *H. scorzonrifolium* Vill. z. Theil. *H. Allionii* Monn. — Untersch. sich von der vorbergehenden Art dch die noch einmal so grossen, 50-60 Bth. enthaltenden Köpfchen, den nach dem Verblühen viel bauchigern HK. und dch die Fäserchen des Fruchtb., die ein Drittel der Achene erreichen; die beiden letzten Merkmale gehen jedoch an der getrockneten Pflanze verloren. Bei *H. porrifolium* enthalten die Köpfchen oder die HK. 20-25, bei der kultiv. Pfl. 30-36 Bth., das Köpfchen erscheint nach dem Verblühen nur wenig bauchig und die Fäserchen des Fruchtb. sind kaum so lang, als der vierte Theil der Achene. — *H. Willdenowii* Monn. (*H. porrifolium* Ser. pl. exs. von ihm selbst. *H. glaucum* Schleich.) konnte ich von *H. glaucum* All. bisher nicht trennen.

18. *H. BUPLEUROIDES* (Gmel.) — Durchwachsartiges H. — *Der St. blattreich*, 2-mehrköpfig, *kahl*; *Bthstiele aufrecht*, oberwärts schuppig und *nebst dem HK. von feinsternf. Flaum etwas grau-lich und behaart mit einfachen Haaren*; Blättchen des HK. ziemlich spitz, die äusseren etwas abstehend; *B. bläulichgrün, lanzettl.-zugespitzt*, nach der Basis verschmälert, gestielt, ausge-schweift-gezähnel oder gezähnt, kahl oder an der Basis gewimpert, die stengelst. zahlreich, genähert, die obern sitzend. 4. An felsigen O. der A. und VorA., (Tyrol und wahrscheinlich dch d. g. AK., auf den schwäb. Alp.) Jul. Aug., später als die vorhergehende. *H. polyphyllum* Willd. Tausch. *H. glaucum* Wahlb. *H. graminifolium* β . *linearifolium* Froel. in DC. prodr., wenigstens nach der angeführten Abbildung Gmelins, aber dasselbe hat sowohl in der Zeichnung, wie an den am bezeichneten O. gesammelten Expl.

verlängert-lanzettl., und nicht lineale B. wie sie Froelich beschreibt. Vom *H. glaucum* besonders dch die aufrechten Bthstiele verschieden.

19. *H. SPECIOSUM* (Hornem. h. hafn. 2. S. 761.) Schönes *H.* — *St. beblättert*, 2-mehrköpfig, *rauhh.*, mit *sternf. Flaume* von der Mitte an zerstreut, *oberwärts sowie die Bthstiele und die HK. dicht-besetzt. und kurz.*; Bthstiele aufrecht, *oberwärts schuppig*; B. *graugrün lanzettl., oder längl.-lanzettl., zugespitzt*, an der Basis verschmälert, gezähnt, am Rande und auf der Rippe gewimpert oder beiderseits *rauhh.*, und oft mit *sternf. Flaum* bestreut, *etwas steif*, die Stengelst. *zahlreich*, die oberen sitzend. 4. In den VorA. des Algen und der Schw. *H. speciosissimum* Willd. ex suppl. Es unterscheidet sich von *H. glaucum* ausser anderen Kennzeichen dch die kurzbehaarten HK. und die aufrechten Bthstiele: von *H. bupleuroides* dch die meist breiteren B., den *rauhhaarigen*, von der Mitte an mit *sternf. Flaum* bestreuten St., dch die *rauhhaarigen* oder wenigstens am Rande und auf der Rippe *rauhh.-bewimperten B.*; die B. sind steifer, als bei den 3 vorhergehenden Arten und die Schuppen des HK. zwar verschmälert, aber stumpflich, nur die inneren spitz; dch diese Merkmale unterscheidet sich diese von der folgenden Pfl., zu welcher ich sie unrichtig gezogen hatte. Diese hat weiche B. und die inneren Schuppen des HK. sind in eine ganz feine Stachelspitze verschmälert.

20. *H. DENTATUM* (Hoppe bei St. h. 39. 1815.) Gezähntes *H.* — *Der St. beblättert*, 1-mehrköpfig, mit *sternf. Flaume* *bestreut und zottig*; B. *bläulichgrün, rauh.* oder oberseits *kahl werdend, lanzettl., zugespitzt*, ausgeschweift- oder kleingezähnt, in den Bstiel verschmälert, *weich, die Stengelst. zahlreich, die oberen kleiner, eif., sitzend*; Bthstiele *nebst dem HK. graulich und rauh.*; Blättchen des HK. *zugespitzt-verschmälert, die inneren verschmälert-spitzig.* (nach Hoppe) *angedrückt*. 4. An felsigen O. der A., (wahrsch. dch einen grossen Theil der A.) Juli Aug.

21. *H. GLABRATUM* (Hoppe bei Willd.) Kahles *H.* — *Der St. beblättert*, 1-mehrköpfig, und etwas chensträussig, *kahl*; B. *bläulichgrün, lanzettl., zugespitzt, flach, ganzrandig* oder entfernt-gezähnt, in den *schmalen Bstiel verschmälert, ganz kahl* oder an der Basis etwas gewimpert, die obern Stengelst. sitzend; Bthstiele *oberwärts von feinsternf. Flaum graulich und nebst dem HK. von weisslichen Haaren sehr zottig*; Blättchen des HK. *nach vorne verschmälert, und sehr spitz, die äussern etwas abstehend*. 4. An felsigen O. und im Kiese der Giessbäche der A. und VorA., (Tyrol, Salzbg, bayer A. und wahrscheinl. dch d. g. AK.) Jun. Jul. *H. glabratum* Hoppe bei St. h. 37. (*H. glabratum* Schleich. gehört zu *H. glanduliferum*.) *H. flexuosum* DC. Froelich in DC. prodr., nicht WK. *H. flexuosum* Gand. var. γ . (die Var. α , β , δ . ausgeschlossen.) *H. trichocephalum* Willd. — Eine zierliche Art mit den B. und dem Habitus von *H. saxatile* und mit den Bthstielen und Köpfchen des *H. villosum*; B. *flach, deutlich-gestielt*, mit

schmalen Bstiele. Bei *H. villosum* sind die WB. fast stiellos, sitzen auf einem breiten Bstiele und sind am Rande wellig.

22. *H. VILLOSUM* (Jacq. enum. S. 271., L. spec. 1130.) Zottiges *H.* — *Der St.* beblättert, 1-mehrköpfig und etwas ebensträussig und *nebst den B. wollig-rauhh.*; *B. bläulichgrün, länglich-lanzettl. und lanzettl.*, gezähnt, etwas wellig, *nach der Basis verschmälert, die stengelst. sitzend; die obere eyf. und halbstengelumfassend;* der St. oberwärts nebst den Bthstielen von sternf. Flaume graulich, von der Wurzel an *nebst den Bthstielen und dem HK. von weissen Haaren sehr rauhh.*; Blättchen des HK. aus einer eyf. Basis verschmälert und sehr spitz, locker, die äusseren weit abstehend. 4. An felsigen O. der A. und VorA., (dch d. g. AK.) Juni. Juli. St. h. 37. *H. eriophyllum* Schleich. pl. exsicc., Link. en. suppl. p. 54. Das *H. eriophyllum* Link. en. p. 86. gehört zu den Variet. v. *H. rupestre.* — Var. die obere Bfläche kahl: *H. flexuosum* W. und Kit. pl. r. hung. t. 209. nach der Abbildung. Ferner die WB. länglich-lanzettl., gezähnt, die stengelst. zahlreich, eyf., an der Basis fast herzf.-stengelumfassend, etwas gezähnt; die Haare des HK. (vielleicht an lange im Herbarium aufbewahrten Expl.) bräunlich und kürzer, aber dicht gestellt: *H. pilocephalum* Willd. en.

Das *Hieracium valde pilosum* Vill. ist mir unbekannt. Villars sagt: nach Haller ist es blos eine Variet. des vorhergehenden, (*H. villosum*), aber der St. ist einfach, endigt mit 1 oder 2 Bth. (Köpfchen) und ist um die Hälfte höher; die Schuppen des K. stehen nicht ab; die ganze Pflanze ist weniger weiss, mehr fuchsroth und die langen und federigen Haare, welche bei der vorhergehenden fast allein vorkommen, sind hier mit drüsentrag. und mit den sehr kleinen ästigen gemischt, wodurch der K. mehlig wird.

23. *H. SCHRADERI* (Schleicher. DC.) Schrader's *H.* — *Der St. 1-wenigköpfig, fast nackt, mit feinsternf., graulichem Flaume bedeckt und nebst dem HK. von verlängerten, drüsenlosen, grauen,* an der Basis schwarzen *Haaren sehr zottig;* Bthstiele in einem spitzen Winkel aufrecht; Blättchen des HK. locker, die äusseren abstehend; *B. bläulichgrün, lanzettl, spitz, in den Bstiel verschmälert, ganzrandig oder gezähnt, die wurzelst. rasig, die stengelst. wenige oder fehlend.* 4. Auf Triften der höhern A.; (wahrsch. dch die g. AK.) Jun. - Aug. *H. Schraderi* Gaud., mit Ausschl. der Var. *H. II. und III. H. alpinum* Willd. Hoppe bei St. h. 37.

24. *H. GLANDULIFERUM* (Hoppe bei St. h. 38.) Drüsentragendes *H.* — *Der St. 1köpfig, mit feinsternf., graulichem Flaum und kurzen, drüsentrag. Haaren dicht-bedeckt; HK. von verlängerten, rufsfarbig-grauen,* an der Basis schwarzen *Haaren sehr zottig;* Blättchen locker (nach Hoppe); *B. grasgrün, lanzettl., spitz, in den Bstiel verschmälert, ganzrandig, oder klein-gezähnt, die wurzelst. rasig, die stengelst. wenige oder fehlend.* 4. Auf den höchsten Jochen der A., (Schw., Kärnth., südl. Tyrol).

Juli. Aug. *H. glabratum* Schleich. DC. fl. fr. (nicht Hoppe; noch Willd.) *H. Schraderi* Hl. *glabratum* Gaud. Var. mit beiderseits dicht-zottigen und ganz kahlen B.

III. Rotte. CERINTHOIDEEN. B. dunkel-grau-grün, längl. oder elliptisch, meist von verlängerten Haaren wollig und am Bstiele behärtet, die der nicht blühenden WKöpfe durchwinternd und noch während der Bthezeit grünend. Die Zähne der Bl. aussen mit kurzen, gegliederten Haaren besetzt. Haare der B. gezähnt, aber keine drüsentragend, die Bthstiele jedoch drüsig-haarig. Bth. hell- oder goldgelb.

25. *H. SAXATILE* (Vill. Delph. 3. S. 112. t. 29.) Felsen-H. — *Der schlanke St. von der Basis an ästig*, unter dem untersten Aste blattlos, Aeste mit einem B gestützt, verlängert, fadenf., meist 1köpfig, *oberwärts etwas graulich und drüsig-behaart; B. grau-grün, elliptisch oder breit-lanzettl., zugespitzt oder stumpf mit einem aufgesetzten Spitzchen, ganzrandig, oder entfernt-gezähnt, in den Bstiel verschmälert. auf beiden Seiten rauhh., am Bstiel dicht-bärtig*, die astst. elliptisch, sitzend, die oberen klein, der HK. drüsig-behaart; die Blättchen angedrückt, die inneren spitz. 4. An steinig. O. (bei Martigny im Wallis.) Mai. Juni. Dem folgenden ähnlich, aber weit niedriger mit schlankem St. und dünnen Zweigen; die Bth jedoch ansehnlich. „Auf höheren Bergen ist die Pfl. 1köpfig und stellt das *H. saxatile* Vill. dar, an niedrigeren O. erzeugt die Pfl. 3-4 Köpfchen, woraus dann das *H. Lawsonii* Vill. (nicht Smith) entsteht.“ Mougeot in Brief. S.

26. *H. LONGIFOLIUM* (Schleich., vom Autor selbst erhalten). Langblättriges H. — *Der St. beblättert, 1-mehrköpfig und etwas ebensträussig, unterwärts rauhh.; B. bläulichgrün, breit-lanzettl., zugespitzt, ganzrandig oder entfernt-gezähnt, in den langen Bstiel verschmälert, am Rande und auf der Rippe rauhh.-bärtig*, die stengelst. entfernt, die oberen sitzend, ey-lanzettf., halbstengelumfassend; *Bthstiele graulich und drüsig-behaart; HK. zottig oder dicht-drüsig-behaart; Blättchen spitz, angedrückt, die äusseren etwas abstehend, die innersten pfriemlich-verschmälert.* 4. Auf kiesigen Triften der A. und Gebirge, (der südl. und westl. Schw. nicht selten). Juli. Aug. *H. helveticum* Sut. nach Gand. *H. polyphyllum* Schl. *H. flexuosum* Gaud., mit Ausschl. der var. γ ., die zu *H. glabratum* gehört. *H. Lawsonii* Smith Engl. bot. nach einem von Forster an Mertens mitgetheilten Expl. *H. cerinthoides* der deutsch. bot. Gärten. — Eine schöne Pflanze mit oft $\frac{1}{2}$ Fuss langen WB., und Köpfchen so gross, wie die des *H. villosum*. Die Köpfchen sind vor dem Aufblühen länger als bei *H. decipiens* sowie auch die Bthen. S.

27. *H. DECIPIENS* (Froel. in DC. prodr. 7. S. 230.) Täuschen-des H. — *St. wenig beblättert, etwas ebensträussig, an der Basis rauhh.; B. grau-grün, breit-lanzettl., entfernt-gezähnt, in den Bstiel verschmälert, am Rande und auf der Rippe unterwärts rauhh.-behärtet, die stengelst. lanzettl., sitzend, die Bthstiele grünlich und nebst dem HK. drüsig-haarig; Blättchen des HK. spitz, angedrückt, die äusseren ein wenig abstehend, die inneren verschmälert-pfriemlich, sehr spitz.* 4. Auf den höheren Vogesen,

(auf dem Hoheneck) Jul. Aug. H. cerinthoides γ . decipiens Monn. ess. H. longifolium β . Mougéoti Koch Syn. ed. 1. H. Mougéoti Froel. in Brief. H. cerinthoides Kirschleg. prodr. fl. d. Als. Köpfchen noch einmal so dick, als bei H. pallescens. Die Drüsen durchsichtig gelblich. H. cerinthoides Gouan. aus den Pyrenäen unterscheidet sich: die Stengelst. B. mit tief herzf. Basis stengelumfassend, Köpfchen halb so gross, an der ausgewachsenen Pfl. rispig, und die drüsentragenden Haare der Bthstiele und des HK. gelblich, nicht schwarz. D.

IV. Rotte. PULMONARIOIDEN. B. grasgrün oder bei den mit Hieracium murorum verwandten Arten auch graugrün, die der nichtblühenden W. Köpfe durchwintend und noch zur Bthezeit grünend. Zähne der Bth. aussen kahl. Haare der B. gezähnt, und keine drüsentragend, mit Ausnahme des H. Jaquinii, dessen B. zwischen den gezähnten Haaren mit wenigen drüsentragenden gemischt sind. Bth. hell- oder goldgelb.

28. H. VULGATUM (Fries) Gemeines H. — *Der St. einen Ebenstrauß tragend, von der Basis an beblättert, an der Spitze nebst den Bthstielen und dem HK. von sternf. Flaume graulich und von kohlschwarzen, drüsentrag. Haaren kurz h.; B. grasgrün, unterseits und am Rande rauhh., ey-lanzettf. oder eyf., an der Basis verschmälert, gezähnt, die Zähne der Basis tiefer und vorwärts gewandt, die StB. 3 oder mehrere, die W.- und untern StB. gestielt, die obern fast sitzend. 4. In Wäldern, an unkultiv. O., unter Gesträuch. Juni. Juli. H. vulgatum Fries nach Expl. vom Autor selbst und nach der Diagnose: „W. B. ausdauernd“ nicht H. Fries novit. mant. H. murorum γ . L., nach Fries. H. murorum γ . „caule magis folioso“ Pollich. H. murorum H. sylvaticum Gaud. H. sylvaticum Lam. Vill. Fl. dan. t. 1113 Smith. — Gouan's Pflanze, H. sylvaticum ill. p. 56., sollte man nicht citiren, da sie aus mehrern Arten zsgesetzt ist. — Var.: B. gefleckt: H. maculatum Sm.; B. breiter, fast eyf.: H. Lachenalii Gmel., und B. schmaler, lanzettl.: H. angustifolium Gmel. Pulmonaria gallica tenuifolia Tabernaem. krtb. p. 505. ic. An schattigen O. sind die B. von dünnerer Substanz, hieher gehört vielleicht H. pellucidum β . Wahlenb. snec.? Authentische Expl. von den Formen, welche Fries unter H. diaphanum zusammengestellt, habe ich noch nicht gesehen. — H. Mertini Gmel. bad. 4. p. 591., ist ein wucherndes Expl., wie Mertin selbst in Brief. bemerkt. — Var. seltner mit von der Basis an ästigem St., eine Variet., welche ausser der eigenthümlichen Gestalt noch dch den Flaum der Rispe von H. ramosum WK. verschieden ist. — Diese ganze Art unterscheidet sich dch die während und nach der Bthezeit grünbleibenden WB. von allen Formen des H. rigidum, womit sie öfters verwechselt wird. Hieracium rigidum hat keine durchwintenden WB. oder besser Blätterbüschel und hatte sie auch niemals.*

29. H. RAMOSUM (W. und Kit.) Aestiges H. — *Der St. rispig, einen Ebenstrauß tragend, meist von der Basis an ästig und beblättert, an der Spitze nebst den Bthstielen und dem HK. graulich und von schwarzen, an der Spitze grauen, einfachen Haaren kurz h.; B. grasgrün, am Rande und unterseits rauhh., ey-lanzettf., an der Basis verschmälert, gezähnt, die Zähne der Basis tiefer und abstehend, die W.- und untern StB. gestielt, die*

obern fast sitzend. 4. Hie und da in den Wäldern der südl. Schw., (auf dem Berge Jovat; vgl. Hegetschw. fl. helv. 2. p. 178.; wird auch in der Flora sedinensis und dresdensis angezeigt, es scheint aber hier eine Variet. von *H. vulgatum* vorzuliegen.) Juni-Aug. Untersch. sich von *H. vulgatum* vorzügl. dch. den Flaum der Rispe, und einen eigenthümlichen Habitus.

30. *H. PALLESCENS* (W. und Kit.) Bleiches *H.* — *Der St. einen Ebenstrauss tragend, 2-blättrig, an der Spitze nebst den Bthstielen und dem HK. graulich und mit einfachen, grauen, an der Basis schwarzen Haaren behaart; B. bläulichgrün, am Rande und unterseits rauhh., länglich, an der Basis allmählich in den Bstiel verschmälert, gezähnt, die Zähne der Basis tiefer und vorwärtsgekehrt, die W.- und untern StB. gestielt, das oberste fast sitzend. 4. In der Schw.; (ich besitze ein Expl. von Schleich., der den Stand O. aber nicht angab), blühet im Garten Juni-Aug. Stimmt sehr mit *H. Schmidtii* überein und untersch. sich vorzügl. dch. den graulichen, und nicht drüsig-behaarten Ebenstrauss; seltener sind wenige drüsentragende Haare mit dehsichtig-gelblichen Drüsen vorhanden. Von *H. incisum* versch. dch. die an der Basis allmählich in den Bstiel verschmälerten satt lauchgrünen B.; die B. des *H. incisum* sind an der Basis mehr oder weniger stumpf oder etwas herzf. S.*

31. *H. SCHMIDTII* (Tausch) Schmidt's *H.* — *Der St. einen Ebenstrauss tragend, meist 1-blättrig, an der Spitze nebst den Bthstielen und dem HK. graulich und mit an der Basis schwarzen, meist drüsentrag. Haaren behaart; B. bläulich-grün, am Rande und unterseits rauhh., ey-lanzettf., an der Basis verschmälert, gezähnt, die Zähne der Basis tiefer und vorwärtsgekehrt, die WB. gestielt, das StB. fast sitzend. 4. In Felsenspalten, (Böhm., Schles., Thüringer Berge an der Saale, Harz und auf dem Walpurgisberg bei Erlangen, auf dem Hohnock der Vogesen, Zermatten in dem Wallis.) Juni-Aug. Ist meist sehr rauhh., aber die Haare sind weder dicker, noch steifer, als bei den verwandten Arten. Untersch. sich dch. die bläulich-grüne Farbe und den armblättrigen oder nackten St. von *H. vulgatum*.*

32. *H. LASIOPHYLLUM* (Koch.) Wollblättriges *H.* — *St. 2-mehrköpfig, etwas ebensträussig, an der Spitze nebst den Aesten und HK. grau und kurz. von kohlschwarzen drüsentrag. Haaren; B. grau, oben und unten rauhh., ganzrandig, nach hinten zu wenig-zählig; die äusseren wurzelst. eyf., nach vorne etwas breiter, an der Spitze abgerundet-stumpf, das eine oder das andere innere länglich, spitzlich; die äusseren Blättchen des HK. stumpflich, die inneren spitz. 4. An felsigen O., (in der Grube Draga bei Orlich auf dem Karst.) Juni. Juli. *H. murorum* rotundatum Koch Synops. ed. I. (nicht *H. rotundatum* Kitaib.) D.*

33. *H. MURORUM* (L., zum Theil. Fries.) Mauer-*H.* — *Der St. ebensträussig, meist 1-blättrig, an der Spitze nebst den Aesten und dem HK. graulich und von ganz schwarzen, drüsentragenden Haaren kurz. B. grasgrün, unterseits und am Rande rauhh., die*

wurzelst. ey-fast herzf., gezähnt, die tiefern* Zähne der Basis rückwärtsgekehrt, das StB. kurz-gestielt oder sitzend; Blättchen des HK. verschmälert, die äusseren stumpflich, die inneren spitz. 4. In Wäldern, auf unkultiv. Hügeln, Mauern. Juni-Aug. Blüht früher, als *H. vulgatum* und untersch. sich von diesem ausser den anderen Merkmalen deß den spreitzenden Ebenstrauss. St. h. 39. *Pulmonaria gallica* mas. Tabern. krth. p. 504. *Hieracium murorum* Vill. Fries. *H. murorum* α. Pollich und vieler Aut. An schattigen O. wachsende Expl. haben B. von dünnerer Substanz: *H. pellucidum* α. Wahlenb. Var. ferner

β. *sylvaticum*, B. an der Basis eingeschnitten-gezähnt; Zähne rückwärtsgekehrt: *H. murorum* β. *sylvaticum* L. Pollich. *Pulmonaria gallica* fem. Tabern. krth. p. 504. sehr gut; (nicht *H. sylvaticum* Gouan., was eine gemischte Art ist.)

γ. *villosum*, die B. oberseits oder auf beiden Seiten sowie die Bthstiele von verlängerten Haaren wollig-rauhh.: *H. murorum* γ. *villosum* Froel. in DC. prodr., *H. murorum pilosissimum* Lin. spec. Dieses fand sich bis jetzt allein in Südfrankreich.

34. *H. INCISUM* (Hoppe bei St. h. 39.) Eingeschnittenes *H.* — Der St. 1-mehrköpfig und ebensträussig, meist 1blättrig. an der Spitze nebst Bthstielen und dem HK. graulich und von einfachen, grauen, an der Basis schwarzen Haaren kurz.; B. bläulich-grün, unterseits und am Rande rauhh., die wurzelst. gestielt, eyf. od. eyf.-länglich, an der Basis stumpf, fast herzf., gezähnt, Zähne der Basis tiefer, abstehend, das StB. kurzgestielt oder sitzend. 4. Auf den A. und den die A. begleitenden Gebirgen; auf den Gebirgen des Thüringer Waldes, (Unterharz, Wallroth; Willinger Berge bei Stadtilm, Schönheit; Schw., Nägeli) Juni-Aug. Sehr ähnlich dem *H. murorum*, aber deß die meist bläulich-grünlichen B., den nicht schwarzdrüsigen Ebenstrauss und die verschmälert-zugespitzten Blättchen des HK. verschieden; vielleicht doch nur eine Variet.

35. *H. BIFIDUM* (Kitaib. in Hornem. hort. hafn. 2. S. 761.) Zweispaltiges *H.* — Der schlanke St 2sp. oder 2armig-ästig, nackt oder 1blättrig; Aeste abstehend, 1köpfig, ziemlich ebensträussig sowie die HK. weisslich und mit einfachen weissgrauen an der Basis schwarzen Haaren bestreut; B. gräulich-grün unterseits und am Rande kurz., die wurzelst. elliptisch oder lanzettl., an der Basis verschmälert, gezähnt, die Zähne der Basis länger, vorwärts gerichtet, oder abstehend, fast sitzend. 4. An den Felsen der Voralpen (Oestr., Steyerm., die näheren StandO. sind noch auszumitteln). Juni-Aug. D.

36. *H. RUPESTRE* (Allioni.) Felsen-H. — Der St. schlank, fast fadenf. und fast gabelig-geth., mit wenigen verlängerten, 1köpfigen, an der Spitze nebst dem HK. gräulichen und von einfachen und drüsentrag. Haaren kurz. Aesten; B. bläulich-grün, die wurzelst. breit-lanzettl., zugespitzt, ungleich-wenigzählig, in den Bstiel verschmälert, fast ungleichseitig, am Rande und unterseits behaart oder überall dichterauh., die StB. wenig, lanzettl.-lineal.

24. In Felsenspalten, (Im Wallis, bei Vevay, im C. Wuadt, auf dem Walperle, (Walpurgisberg) bei Erlangen.) Juni. Juli. Der St. niedrig, schlank, von der Basis an in einen oder den andern Iköpfigen Ast ausgehend. B. gestielt, an der Basis verschmälert, am vordern Ende zugespitzt, in der Mitte oft mit 2-3 verlängerten Zähnen besetzt. Die vorstehende Art hat Froelich für das wahre *H. rupestre* erklärt. — *H. saxatile* Vill. ist diesem sehr ähnlich, untersch. sich aber leicht dch die Zähne der Bth., welche aussen mit kurzen Haaren besetzt sind, während sie *H. rupestre* kahl hat.

37. *H. JACQUINII* (Vill.) Jacquin's *H.* — Der St. niedrig, aufstrebend, beblättert, von einfachen und drüsigen Haaren kurz., meist 2köpfig oder von der Basis an ästig, mit abstehenden, 1-2-köpfigen Aesten: B. grasgrün, länglich-eyf., unterseits und am Rande behaart, die W., und untern Stengelst. B. gestielt, an der Basis tiefgezähnt oder fast fiedersp., die obern sitzend, die obersten lanzettl., ganzrandig; HK. kurz. 24. An felsigen und steinigen O. der A. und VorA., (dch d. g. AK. stw.; auf den schwäbischen Alp.) Juni-Juli. *H. humile* Host. Willd. *H. pumilum* J. a. t. 189., nicht Linne.

V. Rotte. *ANDRYALOIDEEN*. Mounier. B. von filzig-wolligen Haaren grau-grün oder grauweiss, die der nicht blühenden W. Köpfe überwintend und noch während der Bthezeit grünend. Ihre Haare deutlich federig, die Zähne der Haare nämlich sind 3-4mal länger, als der Querdurchmesser des einzelnen Haares. Bth. gelb.

38. *H. ANDRYALOIDES* (Villars.) Wolldistelblättriges *H.* — Der Stengel aufstrebend, einfach, 2köpfig oder ästig und mehrköpfig, oberwärts fast nackt; Bthstiele verlängert, fast ebensträussig, nebst dem HK. und den B. von federigen Haaren grau-filzig; B. verkehrteyf.-länglich, die W.- und untern StB. an der Basis gezähnt, gestielt, die obern fast lanzettl., zugespitzt. 24. An Felsen der wärmeren Gegend. der Schw. selten, (Genf auf der Saleve und eine Variet. mit längern Haaren im mittlern Wallis.) Juni. Juli. Var.

β. undulatum, die untern B. an der Basis dicht-wellig und gezähnt: *H. undulatum* Willd. S.

γ. pictum, B. oberseits kahl und braungefleckt: *H. pictum* Pers. Synops. S.

Das *H. Liottardi* Vill., welches ich im Herb. des Hrn. Buchinger sah, ist dem *H. andryaloides* ähnlich, aber viel wolliger, fast wie das folg. *H. lanatum*, der St. ist von der Basis an ästig, mit aufstrebenden Aesten und die B. sind an der Basis fiedersp.-gezähnt, wie bei einigen Variet. von *H. Jacquinii*, denen es, mit Ausnahme der Wolle, ähnlich ist. Die Abbildg bei Vill. t. 29. ist nicht gut.

39. *H. LANATUM* (Vill.) Wolliges *H.* — Der St. einfach, 2köpfig oder ästig, 5-6köpfig; Aeste verlängert nebst dem HK. und B. von federtigen Haaren dicht-wollig-filzig; B. dick, eyf., ganzrandig oder hinten entfernt-wenigzählig, die W.- und untern StB.

gestielt, die obern sitzend, die untern stumpf, die obern zugespitzt. 2. Auf sonnigen Felsen im untern und mittlern Wallis, (bei Sillon, zwischen Rida und Martinach über Zermatten u. a. andern O.) Mai. Juni. H. tomentosum All. (im Vereine mit H. andryaloides) H. verbascifolium Pers. (nicht Vill. voy.) Andryala lanata L. Dill. elth. t. 150. S.

VI. Rotte. PSEUDOCERINTHEEN. Koch. B grün, kaum ins Graue spielend, die der W.Köpfe durchwinternd und noch im darauffolgenden Jahre während der Bthezeit grünend. Zähne der Bth. aussen mit kurzgegliederten Haaren besetzt. Haare der Blätter alle oder die meisten drüsentragend.

40. H. PSEUDO-CERINTHE (Gaud. fl. helv. 5. S. 112.) Cerintheartiges H. — *Ueberall drüsig-behaart, Haare durchsichtig-gelblich oder die der Köpfechen an der Basis schwarz; St. 1-5köpfig unter dem unteren Aste 1-2blättrig; die dch ein B. gestützten Aeste absteehend, verlängert, etwas ebensträussig, meistens 1köpfig; B. weich, die wurzelst. längl.-lancettl. in einen Bstiel verschmälert, ganzrandig, oder entfernt-gezähnt, die stengelst. tiefherzf. stengelumfassend, die oberen breitherzf., zugespitzt; die inneren Blättchen des HK. verschmälert, sehr spitz. 2. An bergigen, felsigen O. (auf dem Saleve bei Genf.) Juli. Aug. H. cerinthoides Schleich., Thomas. — H. cerinthoides Gouan. hat auf der Rippe der B. unterseits und auf dem Bstiel lange Haare, aber keine drüsentragenden, der St. ist kahl, mehrblättrig, oberseits nebst den Aesten u. HK. drüsig. von gelblichen an der Basis nicht schwarzen Haaren; die inneren Blättchen des HK. verschmälert zwar, aber nicht spitzig. S.*

41. H. AMPLEXICAULE (L. spec. 1129) Stengelumfassendes H. — *Ueberall drüsig-behaart mit durchsichtigen, gelblichen Haaren, von denen die oberen an den Aesten mit schwärzlicher Basis; St. 3-vielköpfig, ober dem unteren Zweige 1-3blättrig; die dch ein B. gestützten Aeste absteehend, etwas ebensträussig; B. dicklich, steiflich, die wurzelst. elliptisch-längl., in einen Bstiel verschmälert, nach hinten zu grobgezähnt, die stengelst. sitzend, oder halbstengelumfassend, die oberen sowie die DeckB. eyf. oder herzf., die inneren Blättchen des lockeren HK. verschmälert, sehr spitz. 2. An grasigen, felsigen, sonnigen O. der A. und VorA. (Schw., Tyrol, Kärnthen, Oestreich.) Juni. Jull. All. ped. t. 15. f. 1. und h. 30. f. 1.*

42. H. PULMONARIOIDES (Villars Delph. 3. S. 133. t. 34.) Lunkenkrautähnliches H. — *Ueberall drüsig-haarig, die Haare durchsichtig gelblich, die der oberen Aeste an der Basis schwärzlich; die W. B. zugleich von verlängerten Haaren rauhh.; St. unter dem oberen Zweige 1-mehrblättrig, 2-4köpfig, die mit einem B. gestützten Aeste absteehend, ziemlich ebensträussig; B. weich, die wurzelst. elliptisch-längl., in den Bstiel verschmälert, nach hinten zu grobgezähnt, die stengelst. sitzend, kaum halbstengelumfassend, an der Basis verschmälert, lancettl.; die inneren Blättchen des lockeren HK. verschmälert. 2. Auf den Wiesen der A. u. VorA. Juni. Juli. H. petraeum Hoppe in Bl. und Fingh. Comp.,*

H. intybaceum Hoppe in St. h. 39. *H. amplexicaule* β . u. γ . Froel. in DC. prodr. Ich habe diese Pflanze als Art von der vorhergehenden getrennt, damit man weiter beobachten möchte, ob sie nur Variet. von *H. amplexicaule*, oder eine eigne Art sei.

43. *H. ALPINUM* (L.) Alpen-H. — Der St. 1-wenigköpfig, mit feinsternf., graulichem Flaum bestreut und nebst dem HK. von verlängerten, grauen, an der Basis schwarzen und von andern kurzen, drüsentrag. kohlschwarzen Haaren sehr zottig; Bthstiele in einem spitzen Winkel aufrecht; B. grasgrün, lanzettl. oder elliptisch, in den Bstiel verschmälert, ganzrandig oder gezähnt, die Stengelst. 1 oder mehrere, fast sitzend. 2. Auf Triften der A. und VorA., (dch d. g. AK., auf den Vogesen, dem Feldberge des Schwarzwaldes, den Mähr. Karpaten, den Sudeten, dem Erzgebirge und Brocken.) Juni. Juli. Var. vielfach: der St. nur 3 Zoll hoch und bis 1 Fuss lang, an der Basis 1blättrig oder überall beblättert, oberwärts nebst dem HK. mit verlängerten Haaren sehr dicht-bedeckt, oder mit diesen spärlicher und an deren Stelle mit kurzen, drüsentrag., kohlschwarzen Haaren dichter-bestreut; B. lanzettl., spitz oder stumpf. elliptisch, an der Basis verschmälert, oder plötzlich in den Bstiel zugezogen; kommt auch vor mit röhri-gen, nämlich ganz geschlossenen Bth. „Die Bthstiele sind bei den ästigen Formen immer aufrecht, ein Merkmal, wodurch (ausser den Zähnen der Bth., welche unterseits Haare tragen), auch jene, welche sich dem *H. murorum* nähern, von diesem leicht und bestimmt zu untersch. sind.“ „Aber die lockern Schuppen des HK. sind nichts als Deckblätter oder Stengelst. Blättchen, welche so wie sie sich der Bth. nähern, in die Schuppen des HK. übergehen. So wie nur der St. mit 1 oder mit mehrern kleinen Blätt-bekleidet ist, so trägt auch der HK. bald jene Hüllschuppen, bald fehlen sie ihm, und so erscheint derselbe bald locker, bald ange-drückt.“ Wimm. und Grab. fl. sil. 3. p. 183. Die bemerkenswertheren Variet. sind in dieser Flora ausgezeichnet behandelt:

a. alpinum genuinum, der St. 1köpfig, an der Basis 1-3blät-terig; B. lanzettl., die äusseren oft verkehrteyf.; HK. von ver-längerten Haaren grau und sehr zottig; *H. alpinum* L. und der meisten Autoren. Kommt mit dehaus spitzigen und abgerundet-stumpfen, ganzrandigen oder mehr oder weniger gezähnten B. vor.

β . pumilum, Haare des HK. kürzer, bisweilen alle drüsentra-gend, sonst Alles, wie bei dem vorhergehenden: *H. pumilum* Hoppe bei Willd. St. h. 37. Nach Hoppe sind die Blättchen des HK. immer angedrückt. Das Zottige verschwindet manchmal fast ganz, und der HK. ist von schwarzen, zum Theil drüsentrag. Borsten fast ganz bedeckt. WB. lanzettl.

γ . Halleri, WB. elliptisch-länglich, abgerundet-stumpf, an der Basis gezähnt und oft fast spiesf., gestielt, die StB. 1-2, lanzettl.: *H. Halleri* Vill. Hoppe bei St. h. 39. *H. atricapil-lum* Hoppe bot. ztg. 14. 1. 181., nach dem Citat des Ant. *H. hybridum* Vill. delph. (nicht Chaix in Vill. voy.) ein weniger ge-zähntes Expl.

δ. sudeticum, der St. 1 Fuss hoch, beblättert; B. lanzettl. gezähnt, die stengelst. kaum oder nur wenig-kleiner; St. 1-3-köpfig; Köpfchen gross und ansehnlich: *H. alpinum* 4. *sudeticum* Wimm. und Grab. (nicht *H. sudeticum* Sternb.) *H. sudeticum* Froel. in DC. prodr.

ε. nigrescens, WB. eyf., gestielt, gezähnt; der St. in der Mitte mit einem einzigen, kleineren B.; HK. mit schwarzen, drüsentrag., und spärlicher mit längeren, einfachen, an der Spitze grauen Borsten besetzt: *H. alpinum* 5. *nigrescens* Wimm. und Grab. Aehnelt dem *Hieracium murorum*, ist aber dch die auswendig mit Härchen besetzten Zähne der Bth. und dch die in einem spitzen und schmalen Winkel aufrechten Bthstiele sogleich zu unterscheiden; bei *H. murorum* sind die Zähne auswendig kahl, und die Bthstiele immer spreitzend. — *H. nigrescens* Willd. ist niedriger, als die hier beschriebene Form, doch übrigens nicht verschieden.

44. *H. CYDONIAEFOLIUM* (Villars delph. 3. S. 107. nach Froel. in DC. prodr. 7. S. 212.) Sudeten-H. — *Der St. an der Spitze einen Ebenstrauss tragend, von der Basis an beblättert, rauhh., an der Spitze nebst den Bthstielen und dem HK. von feinsternf. Flaume etwas graulich und drüsenhaarig von kohlschwarzen, mit darunter gemischten längeren, an der Spitze grauen Haaren; B. grasgrün, unterseits und am Rande rauhh., gezähnt, elliptisch, an der Basis verschmälert, die untern wurzelst. gestielt, die obern sitzend.* 4. Auf den Sudeten an den Quellen der Elbe und an grasreichen O. an der Spitze des Berges Veigstein, nach Sternberg; Kesselberg im Riesengebirge, Tausch; (steht in unserm Garten, aus Samen des Prager Gartens erzogen, freudig und hat sich nach wiederholter Aussaat nicht verändert.) Juni. Juli. *H. sudeticum* Sternb. in der Denkschr. der bot. Gesellsch. zu Regensb. *H. Th.* S. 62. t. 51. sehr gut, nicht Froel. in DC. prodr. *H. cydoniaefolium* Tausch pl. select. *H. pulmonarioides* Presl., (nicht Vill.) — Gleicht dem *H. vulgatum*, ist aber sicherlich näher mit *H. alpinum* verwandt, obgleich es im ganzen Habitus von diesem abweicht. Untersch. sich von *H. vulgatum* dch die auswendig mit Härchen besetzten Zähne der Bth. und dch die drüsentrag. Haare des HK., die mit vielen einfachen, längeren untermischt sind, und dch die längeren Achenen, wie sie *H. alpinum* hat; von letzterem aber dch die sämmtl. elliptischen und eyf. B. und den oberwärts rispigen, im bot. Garten bis zu 20 Köpfchen tragenden St.; ist auch dem *H. prenanthoides* nicht unähnlich, aber die B. sind keineswegs stengelumfassend.

VII. Rotte. INTYRACEEN. Die Pfl. ist im Herbste mit WKnospen versehen, aber ohne WB. Die WKnospen treiben im kommenden Jahre in St. hervor. Zähne der Bth. aussen kahl. B. des St. nebst denen der Aeste und der HK. dicht drüsig-behaart.

45. *H. ALBIDUM* (Vill.) Weissliches H. — *Der St. beblättert, nebst den Bthstielen, dem HK. und den B. drüsig-behaart, klebrig, 1köpfig, oder von der Basis an ästig mit 1köpfigen Aesten; B. verlängert-lanzettl., geschweift oder buchtig-gezähnt, die untersten an der Basis verschmälert, die nächsthöheren sitzend oder*

stengelumfassend. 4. An felsigen und kiesigen O. der A., (Hohneck der Vogesen, Schw., Tyrol, Salzbg., Kärnth.) Juli, Aug. Bth. hellgelb. B., wie bei H. amplexicaule, bald einfach-sitzend, bald den St. tief-umfassend. H. intybaceum Wulfen in J. a. app. t. 43.

VIII. Rolle. PRENANTHOIDEEN. Die Pfl. hat im Herbste WKnospen, oder auch kleine Blüschel, welche im nächstfolgenden Jahre zu St. werden, aber die B. der W. und St. sind schon vor dem Aufblühen, auch an freien O., vertrocknet, und die blühende Pfl. hat keine grünen WB. Die Bthstiele und HK. sind drüsig-behaart. Zähne der Bl. aussen mit kurz gegliederten Haaren besetzt. An Hieracium lycopifolium und prenanthoides haben die B. keine drüsentragenden Haare; an H. pictoides sind sie mit solchen dicht besetzt.

46. H. LYCOPIFOLIUM (Froel. in DC. prodr. 7. S. 224.) Wolfsgesichtblättriges H. — St. vielblättrig, rauhh., oberwärts rispig; Aeste (der grösseren Expl.) mehrköpfig, etwas traubig, sowie die Bthstiele und HK. mit drüsentragenden Haaren bestreut; B. halbstengelumfassend, grobgezähnt und an der Basis eingeschnitten-gezähnt, die oberen eyf., etwas herzf., die unteren länglich, an der Basis schmaler, die untersten in einen Bstiel verschmälert. 4. In Wäldern, (in der Waldanlage des Carlsruher Schlossgartens, und am Freiburger Schlossberge im Badischen, Alex. Braun, sodann um Stettin. Rostkov.) Jul. Aug. Die Achenen, wie bei dem folgenden, bleich gefärbt, hellbräunlich. D.

47. H. PRENANTHOIDES (Vill.) Hasenlattichartiges H. — Der St. blattreich, unterwärts von einfachen Haaren rauhh., oberwärts rispig; Aeste an den grösseren Expl. vielköpfig, fast traubig, nebst den Bthstielen und dem HK. etwas filzig, dicht-drüsig-behaart; B. mit herzf. Basis stengelumfassend, länglich-lanzettl. oder eyf., zugespitzt, gezähnt, gezähnt oder ganzrandig, unterseits netzaderig, die untern oberhalb der Basis fast geigelf. verschmälert, fast spatelig, die untersten zur Bltheit vertrocknet. 4. In den Wäldern der A., VorA. und höhern Gebirge, (auf dem Hohneck der Vogesen, dch die g. AK.; den Mähr., Böhm. und Schles. Geb., dem Feldberge des Schwarzwaldes.) Jul. Aug. Var. mit breiteren, eyf. und schmälern, länglich-lanzettl., gezähnten und ganzrandigen, heller-grünen und unterseits dunkel-bläulichgrünen, mit tief-herzf. Basis stengelumfassenden und fast sitzenden, kaum halbstengelumfassenden B. Eine höhere Variet., welche unterseits dunkel-bläulichgrüne B. von dünnerer Substanz, und einen vielköpfigen Ebenstrauß mit kleineren Köpfchen hat, ist H. praenanthoides Vill. Eine Variet., welche heller-grüne B. von dickerer Substanz und einen aus weniger Köpfchen zsgesetzten Ebenstrauß hat, ist nach Villars Meinung H. spicatum All., aber mir scheint es, dass All. beide Variet. nicht getrennt hatte. — Eine Variet. mit bläulich-grünen, einfach-sitzenden oder kaum halbstengelumfassenden B. ist H. denticulatum Smith., und eine mit tief-herzf. und stengelumfassenden B.: H. prenanthoides Smith., nach schottischen, von Borrer an Mertens gesandten Expln. — Froelich unterscheidet folgende Arten, die ich jedoch für Variet. halte: 1. H. prenanthoides DC. prodr. mit gezähnelten B. 2. H. perforatum Froel. mit fast ganzen B. 3. H. strictissimum Froel. mit an der Basis spitz-gezähnten B. und aufrechten Zähnen derselben

4. *H. cotoneifolium* Froel. in DC. prodr. (nicht Lamarck,) mit bemerklich grösseren Köpfchen.

48. *H. OCHROLEUCUM* (Schleich. cat. 1821.) Gelblichweisses *H.* — Der *St.* blattrich, oberwärts ästig, ebensträussig, von der Basis an nebst den Aesten, Bthstielen, HK. und den B. drüsig-behaart; B. mit herzf. Basis stengelumfassend, zugespitzt, gezähnt, die untern länglich-elliptisch, oberseits nach der Basis fast geigenf. verschmälert, die obern länglich-eyf. 4. Auf den höchsten Triften der A. in der Schw., ziemlich selten, (auf dem Gipfel des Valtzerjoch über Obersax in Graubünden; auf dem Grimsel und dem Gotthard; im Ursern Thale bei der Realp.) Jul. Aug. *H. lanceolatum* Schleich. cat. 1815. (nicht Vill.) *H. picroides* Froel. in DC. prodr.; ob Vill. voy.? Die Beschreibung von Villars scheint eher das *H. cotoneifolium* zu bezeichnen. Bth. blass-gelb. Die WB. fehlen während der Bthezeit immer, Thomas auf dem Zettelchen des überschickten Expl.

IX. Rotte. ACCIPITRINEN. Die Pfl. hat im Herbste WKnospen, aber keine BBüschel. Die Knospen werden im darauffolgenden Jahre zu St., keine aber zu nicht blühenden BBüscheln. Die Zähne der Bth. aussen kahl. Haare der B. nicht drüsentragend.

An *Hieracium boreale* und *H. rigidum* finden sich manchmal die StB. wegen des unterwärts nicht völlig entwickelten St., an dessen unterstem Theile dichtgehäuft, was man nicht mit WB. verwechseln darf,

49. *H. RACEMOSUM* (Waldst. und Kitaibel Pl. rar. hung. 2. S. 211. t. 198.) Traubiges *H.* — St. steif, vielblättrig, rauhh. oder fast kahl, von der Mitte oder der Basis an traubig-ästig, Aeste seitenst. steif-abstehend, 3-4bth., so wie die Bthstiele weisslich-grau; die seitenst. Bthstiele an den Aesten so lang, als das stützende DeckB. oder kürzer; der HK. fast kahl, nach dem Verblühen längl.-kugelf.; B. gezähnt, die untern in einen Bstiel verschmälert, die oberen eyl., zugespitzt, sitzend, etwas stengelumfassend; unfruchtbare BBüschel fehlend. 4. An unkult. O., Waldrändern in Steyerm., Maly. Jul. Aug. Diese Art unterscheidet sich auf den ersten Blick von den folgenden dch ihren eigenthümlichen Habitus.

50. *H. SABAUDUM* (L., mit Ausschl. des Syn. d. fl. snec.) Savoyer *H.* — Der St. starr, blattrich, rauhh. oder auch fast kahl, oberwärts rispig, an der Spitze fast ebensträussig; Bthstiele graulich u. oft etwas kurzl., bemerklich länger, als das stützende DeckB., unter den Köpfchen mit einer einzigen oder zwei Schuppen versehen; der fruchtttragende HK. breit-eyf., an der Basis abgestutzt und sehr stumpf; B. eyf., gezähnt, die untern in den kurzen verbreiterten Bstiel verschmälert, die obern mit herzf. Basis genau sitzend, stengelumfassend, die wurzelst. fehlend; Blättchen des HK. angedrückt. 4. Auf Hügeln unkultiv. O., unter Gesträuch, (sehr zerstreut dch das Gebiet.) Aug. Sept. Der St. dick, meistens mit den B. rauhh. Blättchen des HK. am Rande blassgrün. All. ped. t. 27. f. 2., sehr gut. Der Gf. und die N. sind rauchfarben angelauten. Das *H. sabaudum* untersch. sich von *H. boreale* dch die immer breiten B., dch die meistens noch einmal so brei-

ten, an der Basis ganz stumpfen, am Bthstiel fast genabelten Köpfchen, dch dünnere, unter dem Köpfchen nicht sichtlich verdickte Bthstiele und dadurch, dass unter dem Köpfchen meist nur eine einzelne Schuppe vorhanden ist.

51. *H. boreale* (Fries!) Nördliches *H.* — Der St. starr, blattreich, rauh, oder kahl, oberwärts ästig, *Aeste fast ebensträussig*; Bthstiele graulich und oft etwas kurz, bemerklich länger, als das stützende DeckB., unter dem Köpfchen mit mehreren Schuppen bestreut, welche in den fruchttragenden, an der Basis eyf. HK. übergehen. *B.* ey-lanzettf. oder lanzettl. gezähnt, die untern in den kurzen Bstiel verschmälert, *die obern fast sitzend, die wurzelst. fehlend; Blättchen des HK. angedrückt, gleichfarbig, (getrocknet) schwärzlich.* An unkultiv. O. unter Gesträuch, auf Haiden, an Waldrändern. Jul.-Herbst. *H. sylvestre* Tausch. *H. sabaudum* L. in der *H. succ.* Smith. nach einem Engl. Expl., Pollich und der meist. Deutsch. Aut. *H. sabaudum nigrescens* Sering. *H. sylvaticum* Wahlenb. *H. nemorosum* Dierb., von der Basis an ästige Expl. mit 1köpfigen Aesten. Die Blättchen des HK. sind meistens angedrückt, aber sie variiren, wiewohl seltener auch abstehend, und, wie bei *H. umbellatum*, abstehend und zurückgebogen. Die Variet. mit eyf. B., von welchen die oberen fast herzf. sind, und mit an der Spitze abstehenden Blättchen des HK., ist *H. latifolium* Froel. in DC. prodr. Aber aus Samen von diesem zog ich sowohl Expl. mit angedrückten Blättchen des HK., als mit abstehenden und zurückgebogenen. — Den Namen *Hieracium boreale*, welchen Fries dieser Pflanze gab, und den ich in die erste Ausgabe der Synopsis aufgenommen, habe ich beibehalten, obgleich ich nun durch Erfahrung belehrt bin, dass diese Pfl. in Südd. und jenseits der Alpen gemeiner ist, als diejenige, welche wir mit Froelich, Fries und A. unter dem Namen *H. sabaudum* kennen. — Das *H. boreale* var. wie das *H. umbellatum* ganz annehmend und ist von dem vorigen, dem *H. sabaudum* und den beiden folgenden in den Herbarien oft kaum zu unterscheiden, im Freien aber und im Walde ist dieses weniger schwierig. *H. boreale* unterscheidet sich von *H. sabaudum* dch seine B., deren obere zwar eyf., die unteren aber gewöhnlich lanzettl. sind, dch die längeren, unter dem Köpfchen deutlich verdickten, meistens mit mehreren Schuppen bestreuten Bthstiele, dch die fast um die Hälfte schmälern, wegen des verdickten Bthstieles an ihrer Basis abgerundet-eyf., nicht daselbst fast eingedrückten Köpfchen, und dch die satter rauchfarbenen Narben. Dennoch ist vielleicht das *H. boreale* eine Variet. von *H. sabaudum*, denn es kommen auch von *H. boreale* Expl. vor mit breit-eyf. B., welche, wenigstens im Herbarium, nicht von denen des *H. sabaudum* zu unterscheiden sind. — *Hieracium rigidum* Hartman (*H. laevigatum* Koch Synops. ed. I.) unterscheidet sich von *H. boreale* dch die kleineren Köpfchen, die am Rande meist blasseren Blättchen des HK., die tiefer und sparsamer gezähnten B., vorzüglich aber dadurch, dass es viel früher, nämlich gleichzeitig mit *H. vulgatum* zu blühen anfängt; *H. boreale* ist immer eine spät blühende Pfl.

52. *H. rigidum* (Hartman scand. fl. S. 300. 1820.) Steifes *H.* — Der

St. starr, beblättert, rauhh. oder kahl, *oberwärts ästig*, mit *fast ebensträussigen Aesten*; Bthstiele nebst dem HK. graulich und oft etwas kurz. *B.* ey-lanzettf., lanzettl. oder lineal-lanzettl., gezähnt, die untern in den kurzen Bstiel verschmälert, *die obern fast sitzend, die wurzelst. fehlend*; *Blättchen des HK.* ange-drückt, am Rande *bleich, getrocknet unverändert*, die äusseren an den jüngeren Bthknöpfen aufrecht, den Bthknopf überragend.

4. An waldigen O., steinigen Hügeln unter Gebüsch. Jun. Jul. Blühet $\frac{1}{2}$ Monat früher, als die 2 vorhergehenden. *H. rigidum* Fries herb. norm. *H. vulgatum tridentatum* Fries im beigefügten Zettelchen. *H. affine* Tausch. 1828. Froel. in DC. prodr. *H. laevigatum* Korch Synops. ed. 1. Schleich cat. 1807. nach einem Expl. von diesem selbst. *H. croaticum* Fl. sedinens., nach einem vom Autor übersandten Expl. Die Blättchen des HK. stehen manchmal ein wenig ab. Die äussern aufrechten Blättchen der jüngern Köpfchen, wenn sie erbsengross sind, ragen über das Köpfchen hinaus, und umgeben es gleichsam wie mit einem Krönchen, wodch sich, nebst dem fehlenden WB., die lebende Pflanze von *H. vulgatum*, mit der sie nicht selten verwechselt wird, gut untersch. *B.* seltner eyf., meist lanzettl. und oft verlängert-lanzettl., mässig-gezähnt, manchmal gefleckt. Kommt wie *H. umbellatum* kahl, kurz. und rauhh. vor und var. ausserdem:

β. coronopifolium, *B.* schmal-lanzettl., beiderseits mit 2-3verlängerten Zähnen.

γ. glandulosum, die Bthstiele und die HK. mit drüsenstrag. Haaren bestreut: *H. lanceolatum* Vill. delph. p. 30. Abbildung schlecht und roh. *H. lanceolatum* Tausch pl. select.

H. laevigatum Fries nov. mant. 2. S. 49. sah ich nur getrocknet und ist mir nicht hinreichend deutlich; die gleichnamige Pfl. des Berliner Gartens besitzt nun auch der Erlanger Garten, allein sie blühte noch nicht.

53. *H. UMBELLATUM* (L.) Doldiges *H.* — Der St. steif, vielköpfig, rauhh. oder kahl, *oberwärts ästig*, die *obersten Aeste doldig*; Bthstiele graulich; *B.* lanzettl. oder lineal., gezähnt oder ganzrandig, die untern in den kurzen Bstiel verschmälert, die obern fast sitzend, *die wurzelst. fehlend*; *Blättchen des HK.* an der Spitze zurückgekrümmt. 4. Auf Wiesen und trocknen Triften, Haiden, an waldigen O. Jul.-Herbst. Fl. dan. t. 680. Getrocknet oft dem *H. boreale* sehr ähnlich; die Schuppen des HK. am Rande ebenfalls dunkel und gleichfarbig und nicht bleich, und die *B.* genähert, aber sämmtliche *B.*, auch die obern sind lanzettl. oder lineal. und nicht eyf. und stengelumfassend. Var. mit lanzettl., ganzrandigen, entfernt-gezähnelten oder gezähnten *B.* und

β. coronopifolium, *B.* am Rande beiderseits mit 2-3 verlängerten Zähnen: *H. coronopifolium* Bernhard.

γ. angustifolium, *B.* schmal-lineal., kaum 1 Linie breit.

Kommt vor kahl, kurz. und rauh von Knötchen, welche ein kurzes, aber bald abfallendes Haar tragen.

Ausserdem kommt es auch mit niedrigem, 1 köpfigen St. vor, und mit einem von der Basis an in Aeste getheilten St., dessen

Aeste 1köpfig sind. Von diesem vermag ich, wenn die Blättchen etwas breit sind. II. *Lactaris* Bertol. amoen. it. nicht zu unterscheiden.

Hieracium sylvaticum Gouan., von den Autoren bald zu dieser, bald zu jener Art gerechnet, ist eine aus mehreren zsgesetzte Art, wie ich schon bei *Hieracium vulgatum* erwähnte.

LXIV. Ordng. AMBROSIAEEN. Link. Handb. z. Erkenn. d. Gew. I. p. 816.

Bth. 2bettig; die männlichen in ein von einem vielblättrigen oder vielsp. HK. umgebenes Köpfschen zsgestellt; die weiblichen einzeln oder gezweiet, vom HK. eingeschlossen. Perigon 1blättrig, 3zählig, Zähne in der Knospenlage klappig. Stbg. 5, auf dem Grunde des Perigon's eingefügt, frei oder 1brüderig. Gf. fädlich; N. stumpf, ungeth. Weib. Perigon fehlend. Fruchtkn. nackt; Gf. 1; N. 2, verlängert. *Frucht trocken, von dem verhärteten HK., der eine falsche Nuss darstellt, eingeschlossen.*

1. **XANTHIUM** (L.) Spitzklette. — Einhäusig. Männch. HK. vielblättrig. *Bth.* röhrig, dch Spreublättchen getrennt. Weibch. HK. 1 blättrig, 2 fächerig, 2 blüthig, zuletzt verhärtet. Perigon fehlend.

1. **X. STRUMARIUM** (L.) Gemeine S. — *Wehrlos*; die Früchte flaumh., Schnäbel der Früchte gerade, etwas zsneigend; *Dornen gerade, an der Spitze hakig.* ☉. Auf Aeckern, Schutthäufen, an Wegen, (zerstreut dch das g. Gebiet.) Jul. - Octb. Schk. t. 291. *Bth.* grün.

2. **X. MACROCARPUM** (DC. fl. fr. suppl. S. 366.) Langfrüchtiger S. — *Wehrlos*; die Früchte steifh. mit hakigen Schnäbeln; *Dornen fast von der Mitte an gebogen, an der Spitze zirkelf.-hakig.* ☉. Auf öden O., an Wegen bei Opso in Istrien, Tommasini; um Wien, Dolliner. Jul.-Oct. **X. orientale** L. sp. mit Ausschluss der Synonyme und der Heimath, Gärtner fruct. t. 184. **X. italicum** Monetti dec., Reichenb. ic. f. 503. *Bth.* grün.

3. **X. SPINOSUM** (L.) Dornige S. — *Die Dornen an der Basis der B. 3gabelig*; B. ungeth. oder 3lappig, der mittlere Lappen verlängert, zugespitzt. ☉. An Wegen, auf Schutthäufen der südl. Gegend., (um Triest und Fiume, Wien.) Jul. Aug. Moris. sect. 15. t. 2. f. 3. *Bth.* grün. D.

LXV. Ordng. LOBELIACEEN. Juss. ann. mus. 18. p. 1.

K. oberst., 5sp. oder ungeth. Blkr. 1blättrig, dem K. eingefügt, unregelmässig, 5sp., oben der Länge nach tief gespalten.

Stbg. 5, vor der *Blkr.* dem *Fruchtkn.* eingefügt, mit den *Zpfln* abwechselnd. *Stbk.* an die *Stbf.* gewachsen. *Fruchtkn.* 2-4fächerig, Fächer vieleigig; Samenträger mittelpunktst. *Gf.* 1. *N.* mit einem häutigen Krüge oder einer gewimperten Krone umgeben. Eine Kapsel- oder Steinfrucht. Keim gerade, von dünnem Eyweiss eingeschlossen; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. *B.* wechselst.

1. **LOBELIA** (L.) Lobelie. — *K.* 5 sp. *Blkr.* auf einer Seite gespalten; Saum 5th., unregelmässig. *Stbk.* verwachsen. Kapsel 2-3fächerig, an der Spitze 2-3klappig.

1. **L. DORTMANNA** (L.) Wasser-L. — *B.* lineal., 2 fächerig, ganzrandig; Schaft fast nackt. 4. Unter dem Wasser in Seen und Sümpfen, zur Bthezeit die Aehren emportauchend, (von Westphal. stw. bis nach Hannov. und Holstein.) Jul. Aug. Bth. kornblumenblau. Fl. dan. t. 39.

LXVI. Ordng. CAMPANULACEEN. Juss. gen. p. 163.

K. oberst., 5 sp. *Blkr.* 1blättrig, dem *K.* eingefügt, regelmässig, seltner unregelmässig. *Stbg.* 5, vor der *Blkr.* dem *Fruchtkn.* eingefügt, mit den *Zpfln* der *Blkr.* abwechselnd. *Stbk.* 2fächerig, zuweilen an der Basis verwachsen. *Fruchtkn.* 3-5fächerig, Fächer vieleigig; Samenträger mittelpunktst. *Gf.* 1. *N.* 2-5sp., nicht umhüllt. Eine Kapselfrucht. Keim gerade im Mittelpunkt des Eyweisses, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. *B.* wechselst.

1. **JASIONE** (L.) Jasione. — *Blkr.* 5th.; *Zpfl.* lineal., bei dem Aufblühen verwachsen, zuletzt von der Basis nach der Spitze sich trennend. *Stbf.* pfriemlich; *Stbk.* zshängend. Kapsel 2fächerig, an der Spitze mit einem Loche aufspringend. — *Bth.* blau.

1. **J. MONTANA** (L.) Berg-J. — *B.* lineal.; *W.* einfach, vielstengelig. ☉ An sandigen, trocknen O., auf Haiden, unfruchtbar. Hügelu. Jun. Jul. St. h. 9. Var. rauh. und kahl, und

β. maior, *W.* dick, vielstengelig, die St. 2 Fuss hoch, Köpfchen noch einmal so gross. D. fl. 2. p. 148. In Felsenspalten der Porphyergebirge, (bei Kronenburg an der Nahe, selbst gesammelt; an Hohenstein bei Weilmünster im Nassauischen, Apotheker Rudio.)

γ. littoralis, *W.* vielstengelig, die St. fingerslang nach allen Seiten niederliegend, und nur an der Spitze aufstehend; wächst am sandigen Strande des Meeres. *J. montana β. littoralis* Fries novit.

2. **J. PERENNIS** (Lam.) Ausdauernde J. — *B.* lineal., *W.* ausläufertreibend, die Stämmchen 1 stengelig. 4. An felsigen, gras-

reichen, waldigen O. (im Elsass überall, doch die ganze Gegend um Bitsch und bis Kaiserslautern in der Rheinpfalz; bei Rossleben in der Gegend von Halle; im Gebiete der Flora von Spa.) Jun-Aug. Eine um die Hälfte niedrigere und dicht-rasige Variet. aus den Pyrenäen ist *J. perennis* β . *humilis* D. fl. 2. p. 149. *J. humilis* Pers. D.

2. *PHYTEUMA* (L.) Rapunzel. — Blkr. 5th; Zpfl. lineal., bei dem Aufblühen verwachsen, zuletzt von der Basis nach der Spitze sich trennend. Stbf. an der Basis verbreitert. Stbk. frei. Kapsel 2-3fächerig, mit seitenst. Oeffnungen aufspringend.

1. Rotte. Bth. ährig. Aehre kugelig oder watzföhl.

a. Aehre immer kugelig oder nach dem Aufblühen oval. — Bth. aller violett.

1. *P. PAUCIFLORUM* (L.) Armblumige R. — *Das Köpfchen fast kugelig, 5bth.; B. verkehrteyf. oder verkehrteyf-lanzettf., stumpf, an der Spitze meist 3kerbig*, in den Bstiel verschmälert; die DeckB. rundlich-eyf., stumpf, zottig-gewimpert, kürzer, als die Köpfchen 2. Auf den höchsten Jochen der A., (Schw., Tyrol, Kärnth., Steyerm.) Jul. Aug. Rb. ic. 4. f. 545. Kommt auch mit weissen Bth. vor. Eine Variet.:

β . *globulariaefolium* mit breitem, fast verkehrteyf. B. und stumpfen DeckB. ist: *P. globulariaefolium* Hoppe und Sternb. *P. pauciflorum* und *P. globulariaefolium* Rb. ic. 4. f. 545. 547-49.

2. *P. HEMISPHAERICUM* (L.) Halbkugelige R. — *Das Köpfchen kugelig, meist 12bth.; B. lineal. oder lanzettl.-lineal, ganzrandig oder an der Spitze etwas gekerbt; die DeckB. eyf., zugespitzt, ganzrandig, zottig-gewimpert, halb so lang, als die Köpfchen. 2. An grasreichen O. der höhern A., (Schw., Tyrol, Kärnth., Steyerm.) Jul. Aug. Rb. ic. 4. f. 544. Kommt sehr selten mit weissen Bth. vor; die B. sind sämmtl. schmal-lanzettl.; oder die äussern lanzettl., die innern lineal., oder die B. sämmtl. schmal. lineal., oft in einem und demselben Rasen, die letztere Form ist: *P. graminifolium* Sieb.*

3. *P. HUMILE* (Schleich.) Niedrige R. — *Das Köpfchen kugelig, meist 12bth.; B. lanzettl.-lineal., die obern entfernt-gezähnt*, und nebst den DeckB. am Rande von sehr kurzen, etwas zurückgebogenen Haaren gewimpert-rauh; die äussern DeckB. aus eyf., zugespitzt-gezählter Basis lanzettl.-verschmälert, ohngefähr so lang, als die Köpfchen. 2. Auf den höchsten Jochen der GranitA. in Felsenspalten, (in dem Wallis, auf dem Räfel über Zermatten und auf dem Mori über Macunaga: südl. Tyrol, auf Granitfelsen der Gletscher Venezia im nordwestl. Gindicarie auf mittlerer Höhe der Gletscher, Facchini.) Var.: *coloratum* mit weichlicheren B. und gefärbten K. (Val de Fain und Bernina in Graubünden, Lagger) Jul. Aug. Gaud. Hegetschw. Reisen. f. 16. Rb. ic. 4. f. 546.; ein kleines Expl. *P. Carestiae* Birol. bei Brignatell. giosn. di lis. 1. p. 37. S.

4. *P. SIEBERI* (Spreng.) Sieber's S. — *Die Köpfchen kugelig, meist 15bth.; B. der unfruchtbaren Büschel lang-gestielt, herzf., eyf.*

oder ey-lanzettf., *gekerbt*, die stengelst. lanzettl., *die obern sitzend, aus rauten-eyf. Basis verschmälert*; die äussern DeckB. eyf., zugespitzt, *geschärft-gesägt*. 4. Auf den höchsten A., (Tyrol und Krain, Kärnth., Steyerm.) Jul. Aug. P. Charmelii Sieb., nicht Vill. Var. mit 3 Zoll und $\frac{1}{2}$ Fuss hohem St. und mit ganzrandigen und gezähnt-gesägten StB. — *Phyteuma cordata* Vill. und P. lanceolata Vill. delph. t. 12. gehören vielleicht zu dieser Art, aber ohne Ansicht von ächten Expl. lässt sich nichts Gewisses bestimmen. D.

5. P. ORBICULARE (Spreng.) Kugelförmige R. — *Das Köpfchen vielblüthig, kugelig*, oder nach dem Verblühen oval; B. *gekerbt-gesägt*, die der nicht blühend. Büschel und oft auch die untersten stengelst. lang-gestielt, herzf., eyf. oder ey-lanzettf., *die obern stengelst. lineal.*; die äussern DeckB. *aus eyf. Basis lanzettl. verschmälert, etwas gesägt*. 4. Auf Wiesen und Triften, vorzügl. zwischen Waldungen; in die A. hinaufsteigend, (stw. dch das g. Gebiet.) Jun. Aug. J. a. t. 437. Rapunculus orbicularis Scop. Var. an fetten O.:

β. *fistulosum*, der St. röhrig; ausserdem dch kein Merkmal verschieden. Aus dem von meinem Freunde Hoppe erhaltenen Samen zog ich Expl. mit röhrigem und solidem St. Ein nach dem Verblühen in eine ovale Form übergehendes Köpfchen beobachtet man auch bei der gewöhnl. Varletät, wenn sie auf fettem Boden wächst: P. fistulosum Rb.

6. P. SCHEUCHZERI (All.) Scheuchzer's R. — *Das Köpfchen vielblüthig, kugelig*; B. *gekerbt-gesägt*, die untern lang-gestielt, lanzettl., verschmälert-zugespitzt, die der nicht blühend. Büschel herzf., die obern lineal.; *die äussern DeckB. lineal.*, meist länger, als die Köpfchen. 4. An felsigen O. und in Felsenspalten der A. und VorA.-Regionen, und in niedrigeren Gegenden, (Walliser A., Gott-hard, Glarner A.; südl. Tyrol; Krain im Isonzothale; Steyerm., Maly, und geht wie mehrere Alpenpfl. südlich in die niedrigeren Gegenden hinab.) Jul. Aug. Rb. ic. 4. f. 541. P. Charmelii Vill. delph. t. II., mit Ausschl. der fig. B. und C., die unsere Variet. β. darstellen. P. corniculatum Clairvill. Gaud., mit Ausschl. der Variet. P. Scheuchzeri DC. fl. fr., eine Pflanze ohne WB., und P. Charmelii DC. fl. fr., eine Pflanze mit WB. Die DeckB. sind meistens ganzrandig, seltener gesägt. (Facchini.) Var.:

β. *serrata*, B. geschärft-gesägt, Zähne hervortretend: P. Charmelii var. Vill. l. c. t. II. f. B. C.

b. Aehre rundlich oder eyf., während der Blthezeit allmählig verlängert, zuletzt walzlich. Bth. aller, mit Ausnahme von Phyteuma spicatum, violett.

7. P. MICHELII (Bertolon. Fl. ital. 2. S. 538.) Micheli's R. — *Aehre reichblüthig, rundlich oder oval, zuletzt walzlich*; B. *entfernt-gekerbt-kleingesägt*, die wurzelst. und untern stengelst. herzf., eyf. oder lanzettf. oder fast lineal., gestielt, die oberen lanzettl.-lineal, oder lineal.-sitzend, etwas gesägt; *die DeckB. lineal., so lang oder kürzer, als die Bth.* 4. Auf Wiesen der A. und VorA., und auf der südl. Seite der A. in die niedrigeren Gegenden herab-

steigend. Jul. Aug. Ein Expl. mit weissen Bth. sandte mir Dr. Facchini. Var.:

α. betonicifolium, die WB. und die unteren stengelst. herzf. oder herzf.-längl.: *P. betonicifolium* Vill. delph. t. 12. Das *P. persicifolia* Hoppe bot. Ztg., Reichenb. ic. 3. f. 412. ist eine Abart mit fast lauter herzf.-lanzettl. B.

β. scorzonrifolium, WB. lanzettl. und langgestielt: *P. scorzonrifolium* Vill. delph. t. 12. Reichenb. ic. 3. f. 411.

γ. angustissimum, WB. lineal.-lanzettl., kurz-gestielt. *P. Michelii* All. ped. 1. t. 7. f. 3. Alle diese Variet. verschmelzen dch Mittelformen, und eine geht allmählig in die andere über; nicht selten wachsen sie unter einander auf einer und derselben Bergwiese.

8. *P. NIGRUM* (Schmidt.) Schwarze R. — *Aehre länglich*; *B. einfach-gekerbt-gesägt*, die untern gestielt, *eyf.*, an der Basis *herzf.*, die obersten lineal.; die DeckB. lineal. 4. In Laubwäldern, (stw. dch das g. Gebiet.) Mai Jun. *P. ovale* Hoppe. *P. spicatum* β. *Rapunculus* Pers. Bth. vor dem Ausbreiten der Zpfl schwarz-violett und sehr runzelig; bei *P. Halleri* zu dieser Zeit fast glatt.

9. *P. SPICATUM* (L.) Aehrige R. — *Aehre länglich*; *B. doppelt-gekerbt-gesägt*, die untern gestielt, *eyf.*, an der Basis *herzf.*, die obersten lineal. 4. In Wäldern und auf Bergwiesen, (stw. im Gebiete, aber bis jetzt z. B. nicht in der Rheinpfalz, wo *P. nigrum* gemein ist.) Mai. Jun. Schk. t. 39. *Rapunculus spicatus* Scop. — Bth. weiss oder gelblichweiss, an der Spitze grünlich.

10. *P. HALLERI* (All.) Hallers R. — *Aehre verkehrteyf.-länglich*; *B. grob-doppelt-gesägt*, die untern gestielt, *eyf.*, die obersten lanzettl.; die DeckB. lineal. 4. In Thälern und auf Triften der A. und VorA., (Schw., Tyrol, Kärnth., Steyerem.; sodann auf den Sudeten.) Jun. Jul. *P. ovatum* Schmidt. Willd. Hoffm. *P. urticifolium* Clairvill. Bth. schwarz-violett, selten weiss; ein solches Expl. erhielt ich von Facchini.

II. Rotte. *PHYTEUMATA COMOSA*. Bth. gestielt, doldig. Blkr. verkehrt-birnf., wie es scheint, niemals in freie Zpfl gespalten.

11. *P. COMOSUM* (L.) Schopfige R. — *Dolde endst.*; Bth. auf kurzen Bstielchen; *B. gezähnt*, die wurzelst. nierenf. 4. In Felsenspalten der Gebirge und A., (in Krain in der Wochein; zerstreut auf Kalkfelsen im ganzen südl. Tyrol, von der obersten Baumgrenze bis fast zur Region des Oelbaumes hinab, Facchini.) Jun. Jul. Jacq. austr. app. t. 30. St. h. 22. Bl. azurblau, nach vorne schwarz-purpurn. D.

III. Rotte. Bth. kurz-gestielt, einzeln, zerstreut, eine Tr. oder R. bildend.

12. *P. CANESCENS* (W. und Kit.) Grauliche R. — *B. sitzend*, die untern *eyf.*, gekerbt-gesägt, an der Basis verschmälert, die obern lanzettl., fast ganzrandig; *Bth.* kurz-gestielt, *traubig-rispiq.* 4. An unkultiv. O., unter Gesträuch, (unter Gebüsch in Gesell-

schaft von Rhus Cotinus zw. Cilli und Lichtenwald in Untersteyerm., Maly.) Jul.-Herbst. W. und Kit. pl. rar. h. t. 14. Bth. blau. D.

3. CAMPANULA (L.) Glocke. — Röhre des K. kreiself., Blkr. glockig oder radf., in 5 Abschnitte mehr oder weniger getheilt, im Grunde geschlossen von den an der Basis verbreiterten, fast halbkugelig-zsschliessenden und die oberweibige, flach-konvexe Scheibe bedeckenden Stbf. Stbk. frei. Fruchtkn. kreiself. Kapsel 2-3fächerig, an der Seite mit Löchern aufspringend.

1. Rotte. Buchten des K. ohne Anhängsel. Bth. gestielt, an reichblüthigen St. traubig oder rispig. — Bth. aller blau oder violett, selten als Variet. weiss.

a. Kapsel nickend, unter den KZpfln aufspringend.

1. C. ZOYSII (Wulfen bei Jacq.) Nickende G. — B. ganzrandig, *die untersten eyf.*, gestielt, *Bstiel so lang, als das B.*, die mittlern stengelst. B. spatelig, die obersten lineal.-länglich; der St 1-mehrblüthig; Zpfl des K. pfriemlich; *Blkr. länglich-glockig, mit dichtbärtigen Zpfln.* 4. An felsigen O. der A., (in dem Wochein in Krain; auf dem Ovir in Kärnth., auf dem Rechberge am Eingang in das Villachthal ebenfalls in Kärnth., auf der Oistrizta im Cillikreise im Sulzbachthale an Felsen der Nadel in Steyerm., Alpe Kren in Görtz.) Jul. Aug. Jacq. ic. rar. t. 334. St. h. 22. D.

b. Kapsel nickend, an der Basis aufspringend.

2. C. PULLA (L.) Dunkelblaue G. — B. elliptisch, gekerbt, gestielt, *3mal so lang, als der Bstiel*, die untern stumpf, die obern spitz; *St. 1blüthig; Bth. nickend; Zpfl des K. pfriemlich.* 4. Auf Triften der VorA. und A., (Oestr., Steyerm., Krain, Salzbg.) Jul. Aug. J. a. t. 286. St. h. 34. Blkr. dunkelviolett. D.

3. C. EXCISA (Schleich. Gaud.) Ausgeschnittene G. — B. lineal., ganzrandig, sitzend, die untern lineal.-keilig, in den kurzen Bstiel verschmälert, etwas gezähnel; *St. 1-3blüthig; Blkr. bauchig-glockig, bis auf ein Drittel 5sp., Zpfl eyf., an der Basis schmaler und doch eine rundliche Bucht geschieden; Zpfl des K. pfriemlich.* 4. In Felsenspalten, an Gletschern in der Schw., (in der südl. AK. des Wallis, auf dem Simplon an dem Kaltwassergletscher, auf d. Furca und Moro; im grossen Boden im Münsterthale Zehnden Gambs.) Jul. Aug. Rb. ic. 1. f. 159. 160. Gaud. helv. 2. t. 2., var. mit gezähnelten obern B. S.

4. C. CAESPITOSA (Scop.) Rasige G. — *Die W.- und untersten StB. verkehrteyf., in einen ziemlich breiten Bstiel, kaum von der Länge des B. herablaufend*, wenig-kerbig, die stengelst. sitzend, lineal.-lanzettl., etwas gesägt, die obern lineal., ganzrandig; *St. mehrblüthig*, traubig oder rispig; *Bthstiele 1-2blüthig; Blkr. länglich-glockig*, unter den Zpfln verengert, Zpfl des K. pfriemlich. 4. In Felsenspalten der KalkA. und VorA.-Regionen.

(Oberöstr., südl. Tyrol, Steyerm. und Krain.) Jul. Aug. Scopoli's Abbildg t. 4. ist nicht gut. — Eine von *C. pusilla* gänzlich verschiedene Art. Bl. blass-violett, in das Röthliche spielend, länglich-glockig, in der Mitte weiter, fast bauchig, unter den Zähnen schmaler, ausser dem stärkeren, in die Zähne verlaufenden Nerv, und den beiden stärkern seitlichen, noch von der Basis an bis zu den Zähnen mit einem deutlichen Adernetze versehen; die Zähne nach aussen gerichtet; die Basis der Stbgf. eyf., länger, als breit. D.

5. *C. pusilla* (Haenk. bei Jacq.) Niedrige G. — *B. der unfruchtbar. Büschel eyf., herz- und nierenf., gesägt, gestielt; Bstiel mehrmals länger, als das Blatt, die untern StB. elliptisch, kürzer-gestielt, die obern lineal., sitzend; St. traubig, 3-6 blüth.; Blkr. halbkugelig-glockig; Zpfl des K. pfriemlich. 2. An felsig und kiesig. O. der A., in die VorA. und mit den Flüssen in die an die A. grenzenden Ebenen herabsteigend; auch auf den Sudeten; (kommt mit dem Isarkiese bis München und mit dem Rheinkiese bis Strassburg hinab.) Jun.-Aug. C. caespitosa Vill., nicht Scop. C. rotundifolia β. L. Var., wie alle verwandten Arten, mit kurzen Haaren mehr oder weniger bestreut, oder*

β. *pubescens*, überall bis an die Kzpfl von kurzen Haaren kurz. C. pubescens Schmidt. Willd. Schmidt hatte sie aus den Salzburger A., aber nicht aus Böhmen; vgl. Tausch. bot. ztg. II. 2. p. 425. Reichenb. Abbildg in d. ic. I. t. 161. und 162. scheint wegen der fast kreiself. Blkr. zur flaumigen Variet. der C. rotundifolia zu gehören

Bei *C. pusilla* ist die Bl. an der Basis abgerundet, die Röhre bis zu den Zähnen wenig erweitert, nicht bauchig, und ausser dem stärkeren Mittelnerv und den beiden schwächeren seitlichen nicht netzig-aderig; die Zähne sind vorgestreckt, nur wenig nach Aussen hin gerichtet. Die Basis der Stbgf. ist kurz-eyf., breiter, als lang. Farbe der Bth. blau.

6. *C. rotundifolia* (L.) Rundblättrige G. — *B. der nicht blühend. Büschel eyf., herz- und nierenf., gestielt, Bstiel mehrmals länger, als das B., die untersten StB. lanzettl., die übrigen lineal., ganzrandig; St. rispig-vielblüthig; Blkr. ey- oder fast kreisel-glockenf.; Zpfl des K. pfriemlich, aufrecht. 2. Auf Triften, trocknen Wiesen, Mauern, in Wäldern, an Wegen. Jun.-Herbst. Fl. dan. t. 835. Var.:*

β. *hirta*, der untere Theil der Pflanze von ziemlich steifen Haaren kurz.

γ. *velutina*, ganz von kurzen, dichten Haaren grau; C. rotundifolia β. velutina DC. fl. fr.

δ. *lancifolia*, die untern StB. 2 Zoll lang, 3-4 Linien breit, die obern allmählig kürzer und schmaler: C. rotundifolia δ. lancifolia D. fl. C. rotundifolia β. reniformis Pers. C. Baumgarteni Becker. Kommt auf dem Feldberg bei Frankfurt am M. vor. — C. Hostii Baumg. transs. scheint von dieser Variet. nicht verschieden, doch konnte ich sie lebend nicht beobachten.

C. tenuifolia Hoffm. germ. l. p. 100. besteht aus Expl., die zwischen Gras gewachsen ihre untern B. dch Fäulniss verloren haben.

7. *C. SCHEUCHZERI* (Vill.) Scheuchzer's G. — *B. der nicht blühend. Büschel ey- oder herzf., gestielt, Bstiel mehrmals länger, als das B., die StB. lineal-lanzettl., ganzrandig oder die untern gekerbt-gesägt; St. 1blüthig oder traubig-2-6 blüthig; Zpfl des K. pfriemlich.* 4. Auf Triften und Wiesen der A. und VorA., (dch die g. AK., sodann auf den Sudeten und auf dem Belchen in Oberbaden.) Jul. Aug. *C. linifolia* Lam. Haenk. bei Jacq. D. fl. 2. p. 157. *C. rotundifolia* γ. L. Var.:

α. *glabra*, kahl: *C. linifolia* DC. fl. fr. *C. Scheuchzeri* Vill.

β. *hirta*, kurzhaarig: *C. valdensis* All. *C. uniflora* Vill.

8. *C. CARNICA* (Schied. bei Mert. und Koch.) Krainer G. — *B. der nicht blühend. Büschel ey- oder herzf., gestielt, Bstiel mehrmals länger, als das B., die StB. lineal., die obern sehr schmal; St. 1blüthig; Kzpfl lineal.-borstlich, so lang, als die Blkr., zurückgebogen.* 4. In Felsensp. der Krainer A., (zw. Resiutte und Ponteba an der Hauptstrasse; sodann zw. Veldes und Wochein, auf dem westlichen Abhange der A. Kren.) Jun. Jul. *C. linifolia* Scop. — Scopoli's Namen habe ich als zweideutig nicht vorangestellt. D.

9. *C. RHOMBOIDALIS* (L.) Rautige G. — *B. ey- oder lanzettf., gesägt, die obern sitzend, die untern kurz-gestielt; Bth. rispig, einseitswendig; Kzpfl lanzettl.-pfriemlich.* 4. Auf den VorA., (in der Schw. nicht selten, auf dem Jura überall; in Krain auf dem St. Katharinenberge bei Görz.) Jun. Aug. St. h. 72. Barrel. f. 567. *C. rhomboidea* Willd.

10. *C. BONONIENSIS* (L.) Bologneser G. — *B. gekerbt-gesägt, unterseits filzig-grau, die untern herzf., lang-gestielt, die obern eyf., zugespitzt, sitzend; die endst. Tr. einfach oder rispig-zsge-setzt; Kzpfl lanzettl.; der St. aufrecht, stielrund.* 4. Auf trocknen Wiesen, sonnigen Hügeln, an Waldrändern, (in Mecklenb., Pommern bei Stettin, Mittelmark, Schles., Mähr., Böhm.; am südöstl. Rande des Harzes; Sachsen, Thüringen, Erfurt, Tanna, Sondershausen; Unteröstr., Krain und südl. Tyrol; im untern Wallis.) Jul. Aug. St. h. 72. Rb. ic. 2. f. 221. (ein Expl. mit lockerer, an der Basis ästiger R.) und *C. Thaliana* Rb. l. c. f. 222. (ein Expl. mit zsgezogener R.) *C. Thaliana* Wallr. sched. (umfasst die ganze Art.) *C. simplex* DC. (ein Expl. mit einfacher R.) *C. ruthenica* M. Biebst.

11. *C. RAPUNCULOIDES* (L.) Rapunzelartige G. — *B. ungleich-gesägt, etwas rauhh., die untern fast herzf., lang-gestielt, die obern lanzettl.; Tr. endst., einseitswendig; Kzpfl lanzettl.; der St. aufrecht, stumpfkantig; W. kriechend.* 4. In Wäldern, auf Aeckern, unkultiv. Hügeln. Jul. Aug. Rb. ic. 6. f. 700. *C. tracheloides* Rb. l. c. f. 701., nicht MB.; *C. crenata* Link. Rb. ic. l. c. f. 702. *C. ucranica* Spreng. — Ein im Gebiete unserer

Fl. gesammeltes Expl. der *C. trachelioides* MBiebst. sah ich noch nicht.

12. *C. TRACHELIUM* (L.) Nesselblättrige G. — *B. grob-doppelt-gesägt. steifh., die untern lang-gestielt, herzf., die obern länglich, sitzend; Bthstiele blattwinkelst., 1-3 blüthig, in eine Tr. zsgestellt; Kzpfl ey-lanzettf.; der St. aufrecht, scharf-kantig.* 4. In Wäldern und im Gebüsch. Jul. Aug. Fl. dan. t. 1026. Var.:

β. *dasycarpa*, K. steifh.: *C. urticifolia* Schmidt. Willd.

13. *C. LATIFOLIA* (L.) Breitblättrige G. — *B. ey-lanzettf., zugespitzt, grob-doppelt-gesägt, kurz h., kurz-gestielt; Bthstiele blattwinkelst., einblüthig, in eine Tr. zsgestellt; Kzpfl ey-lanzettf.; der St. aufrecht, stumpf-kantig.* 4. In Wäldern und schattigen, etwas feuchten Hecken, (in Mecklenb. und dch Pommern nach Preussen, Schles., Böhm. und Mähr.; im Erzgebirge; bei Quedlinburg, Blankenburg am Harz; Rhön. Wenderoth; auf dem Feldberge in Oberbaden; den Vogesen; Steyerm.; Schw. hin und wieder.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 83. St. h. 72.

14. *C. ERINUS* (Link.) Gabelspaltige G. — *Kurzh., der St. ästig, oberwärts gabelsp.; die untern B. verkehrteyf-länglich, in den kurzen Bstiel verschmälert, die blüthenst. gegenst., beiderseits 1-2zählig; Bth. fast sitzend. ☉. An trocknen, felsigen O., (Pola in Istrien, im Amphitheater; um Fiume; um Mömpelgard im Oberelsass.) Jun. Wahlenbergia Erinus Link Handb., Koch Syn. ed. 1. Moris s. 5. t. 3. f. 25. Roncela Erinus Dumort. nach Rb.; in Dumortier's Schriften finde ich diesen Namen nicht.* D.

c. Kapsel aufrecht, an der Basis aufspringend.

15. *C. ELATINES* (L.) Tännel-G. — *B. gesägt, die der nicht blühend, Büschel und die untern stengelst. herzf., langgestielt, die obern stengelst. ey-herzf., zugespitzt, kürzer-gestielt; die St. rasig. einfach, liegend; Bth. traubig-rispig; Bthstiele blattwinkelst., meist 3blüthig; Kzpfl lineal-lanzettl.; Blkr. bis auf ein Drittel 5sp.* 4. In Felsenspalten der südl. Gegend, (auf der Insel Cherso.) Mai. Jun. All. ped. 1. p. 114. t. 7. Die B. beschreibt Allioni zugespitzt, liess sie so abbilden, und Linne erhielt seine Pflanze von Allioni. Was nun *C. Elatines* Moretti bei Host. fl. a. 1. p. 270., seyn mag, welche dch stumpfe B. von *C. elatinoides* und eben dadurch von *C. Elatines* verschieden ist, kann ich nicht erathen. J.

16. *C. MORETTIANA* (Rb. iconogr. 4. p. 18. f. 499. 500.) Moretti's G. — *B. einfach-gesägt, die der unfrucht. Büschel herzf., lang-gestielt, die stengelst. eyf., in den kurzen Bstiel vorgezogen, die untern und obern kleiner; der St. aufrecht, 1-2blüthig; Bth. aufrecht; Blkr. 4mal so lang, als die lanzettl. Kzpfl, 5lappig.* 4. In Felsenspalten im südl. Tyrol, (bisher bloss am Berge Udai im Fussa-Thale im südl. Tyrol, Elsmann; auf dem Berge Castellazzo

di Ponereggio in Fiemme und östl. bis an das Geb. von Agordo und Feltre, Facchini.) Jul. Aug. C. filiformis Moretti, nicht Ruiz. und Pav. C. pulla Pollin. Fl. veronensis. D.

17. C. GARGANICA (Tenore.) Garganische G. — B. ungleich- oder doppelt-gesägt, die der unfrucht. Büschel und die untern Stengelst. herzf., langgestielt, die mittlern Stengelst. eyf., in den Bstiel vorgezogen; die St. rasig, einfach, liegend; Bth. traubig-rispig; Bthstiele blattwinkelst., meist 3 blüthig; Kzpfl lanzettl.; Blkr. 5 th. 4. In Felsenspalten der südl. Gegend., (Felsen bei Tianova in Istrien, Felsen des Berges Triskavaz auf Veglia, Tommasini; auf der Insel Cherso.) Mai. Jun. C. garganica Ten. nach Expl. von dem Autor selbst im Herbar. meines Freundes Martins. C. Elatines Ten., nach einem Citat des Autors selbst, nicht L. J.

18. C. RAINERI (Perpent.) Rainer's G. — B. länglich-verkehrt-eyf., stumpf, entfernt-gekerbt, in den kurzen Bstiel herablaufend, flaumig, die untern kleiner, spatelig; der St. aufstrebend, 1blüthig; Bth. nickend; Kzpfl breit-lanzettl., zugespitzt, entfernt-gezähnt; Blkr. 5lappig. Lappen breit-eyf. 4. An felsigen O. der südl. Schw., (auf dem M. Generoso im C. Tessin.) Jul. Aug. S.

19. C. PYRAMIDALIS (L.) Pyramidenf. G. — B. gesägt, ganz-kahl, eyf., die obern lanzettl., die der unfrucht. Büschel herzf., lang-gestielt; der St. steif, aufrecht, sehr ästig, Aeste aufrecht, dem St. genähert; Kzpfl lanzettl. ☉. Auf steinig. Hügeln, Mauern, (in Krain um Idria und im Littor. bei Triest; Fiume sehr gemein, Noë; Monte Santo bei Görz, Tommas.) Jul. Aug. D.

d. Kapsel aufrecht, in der Mitte oder unter der Spitze aufspringend.

20. C. PATULA (L.) Absteheude G. — B. gekerbt, die wurzelst. länglich-verkehrteyf., in den Bstiel herablaufend, die Stengelst. lineal.-lanzettl., sitzend; R. absteheud, fast eben-sträussig; Bth. aufrecht; Aeste oberwärts getheilt; Kzpfl pfriemlich. ☉. Auf Wiesen, an Waldrändern, (zwar dch das g. Gebiet, aber oft auf weiten Strecken gar nicht, fehlt z. B. auf dem linken Rheinufer von der Rheinpfalz bis zu den Niederlanden.) Mai-Jul. Fl. dan. t. 373. Var. kahl und rauhh. und mit kahler K.-Röhre und

β. dasycarpa, K. rauhh.

γ. adenocarpa, K. drüs.-punktirt: C. patula β. punctata Wallr.

δ flaccida, Aeste südlich, Bth. halb so gross: C. patula γ. flaccida Wallr. C. neglecta R. und Schult.

21. C. RAPUNCULUS (L.) Rapunzel-G. — B. gekerbt, die wurzelst. länglich-verkehrteyf., in den Bstiel herablaufend, die Stengelst. lineal.-lanzettl.; R. fast traubig, Aestchen an der Basis getheilt; Kzpfl pfriemlich. ☉. Auf trocknen Wiesen, unkultiv. Hügeln, an waldigen O. Mai-Aug. Schk. t. 39. Var. mit kahlen

und kurz. St. und B. und mit aufrechten und zurückgekrümmten Kzpfln.

22. *C. PERSICIFOLIA* (L.) Pfirsighblättrige G. — *B.* entfernt-kleingesägt, *die wurzelst. länglich-verkehrteyf.*, in den *Bstiel herablaufend*, die *stengelst. lineal-lanzettl.*, sitzend; *Tr. armblüthig*; *Kzpfl lanzettl.* 4. In Wäldern, besonders in denen der Gebirge, an Gebirgsabhängen unter Gesträuch. Jun. Jul. Fl. d. t. 1087. Var. mit sehr grossen Blumen: *C. persicifolia* *β. grandiflora* DC.; mit kurz., graulichem St.: *C. hispida* Lej. und *β. eriocarpa*, K. steifh.; D. fl. 2. p. 160.

23. *C. CENISIA* (L.) Zwerg-G. — *B. verkehrteyf.*, stumpf, in den kurzen *Bstiel* zsggezogen, *ganzzrandig, kahl*, an der Basis gewimpert; *die St. aufstehend. 1blüthig*, oberwärts nebst dem K. steifh.; *Kzpfl* aus breiter Basis lanzettl.; *Blkr. fast 5th.*; *Kpfl ey-lanzettf.* 4. Auf den höchsten Jochen der A., (der südl. Kete im Wallis.) Jul. Aug. S.

II. Rotte. Buchten des K. ohne Anhängsel. Bth. sitzend, in Ähren oder Köpfchen zsggestellt.

24. *C. THYRSOIDEA* (L.) Straussblüthige G. — Steifh.; *B. lineal-länglich*, schwach gekerbt; *Bthe sitzend, in einer eyf.-länglichen, dichten Ähre*; *Kzpfl ey-lanzettf.* ☉. Auf Wiesen der A., (dch die g. AK.) Jul. Aug. J. a. t. 411. St. h. 41. Bth. gelblichweiss.

25. *C. SPICATA* (L.) Ährige G. — Steifh.; *B. länglich-lanzettl.*, schwach-kerbt, *die untern nach der Basis verschmälert*, die obern aus verbreiteter, stengelumfassender Basis lanzettl.-zugespitzt; *Bth. sitzend, in einer verlängerten, unterbrochenen Ähre, die untern zu dreien, die obern einzeln.* ☉. An felsigen, trocknen O. der A.-Thäler und am Fusse der südl. A., (Krain; auf der Seiseralpe, auch tief um Botzen und daselbst häufig, Hausmann; sparsam im ganzen südl. Tyrol, Facchini; im C. Wallis und Tessin.) Jun. Jul. St. h. 72. Bth. blau.

26. *C. CERVICARIA* (L.) Natterkopfbblättrige G. — Steifh.; *B. klein-kerbt, die wurzelst. lanzettl.*, in den *Bstiel verschmälert*, die *stengelst. lanzettl.-lineal.*, die obern mit stengelumfassender Basis sitzend; *Bth. sitzend in end- und seitenst. Köpfchen.* 4. In Wäldern und auf unkultiv. Hügeln unter Gesträuch, (stw. im g. Gebiete.) Jul. Aug. Rb. ic. 6. f. 778., 779. *C. ligulata* Rb. ic. 6. f. 780., 781., nicht Waldst. und Kit., welche zur folgenden Rotte gehört, und welche Rb. unter dem Namen der *C. capitata* ic. 6. f. 782. abgebildet hat. Bth. blau.

27. *C. GLOMERATA* (L.) Geknäuelte G. — Kurz. oder grauflaumig oder kahl; *B. klein-kerbt, die wurzelst. ey- oder ey-lanzettf.*, an der Basis *abgerundet oder herzf.*, die obern stengelst. mit herzf., stengelumfassender Basis sitzend; *Bth. sitzend, in end- und seltenst. Köpfchen.* 4. Auf Wiesen, an unkultiv.,

kräuterreichen O., Waldrändern, (dch d. g. Gebiet.) Mai. Juni. Bth. blau. Rb. ic. 6. f. 751-755., eine Form mit schmalen Bstielen; *C. congesta* Röm. und S., eine Form mit lauter gestielten B., nur das oberste sitzend. Var. mit breiteren und schmäleren B., grössern und um die Hälfte kleinern Bth., sodann kahl, kurz, rauhh. und

β. farinosa, der St. nebst den B. unterseits grau-filzig; *C. glomerata β. salviaefolia* Wallr. *C. glomerata β. farinosa* Rochel. *C. farinosa* Andr. Bess. *C. petraea* Schmidt. DC. fl. fr., nicht L. *C. aggregata α. farinosa* Rb. l. c. f. 757-759. Bth. oft klein.

γ. aggregata, grasgrün; Stiele der StB. breiter, geflügelt; Bth. grösser: *C. aggregata* Willd. Rb. ic. 6. f. 760. 761.

δ. speciosa, grasgrün; B. sämmtl. ey-herzf.; Bth. gross, ansehnlich: *C. speciosa* Hornem. Rb. ic. 6. f. 762.

ε. elliptica. B. sämmtl. an der Basis abgerundet oder in den Bstiel vorgezogen, nicht herzf.; *C. elliptica* Kit. bei Schult. Dieselbe Variet., aber mit bleichen, netzigen DeckB., was man auch an andern Variet. dieser Art beobachtet: *C. elliptica* Rb. ic. 6. f. 763. 764. — Vgl. fl. altaic. 1. p. 241.

III. Rotte. Buchten des K. mit herabgebogenen Anhängeln versehen, durch welche die K.-Röhre mehr oder weniger bedeckt wird. Bth. blau oder violett.

28. *C. ALPINA* (Jacq.) Alpen-G. — Der St. oberwärts nebst den B. am Rande und den Bthstielen und K. *wollig-zottig*; B. *lineal*, oder lineal-länglich, fast ganzrandig; Bth. lang-gestielt, fast traubig, hängend; Kzpfl lanzettl.-pfriemlich; Anhängsel der Buchten *sehr kurz*; Blkr. ein wenig länger, als der K., an der Spitze spärlich mit Haaren bestreut. 2. An trocken, felsigen O. der A., (in Graubünden, Tyrol, Salz., Kärnth., Steyerm. und Unteröstr.) Juni. Juli. St. h. 51. J. a. t. 118.

29. *C. BARBATA* (L.) Bärtige G. — Rauhh.; B. länglich-lanzettl., fast ganzrandig; Bth. gestielt, traubig, hängend, etwas einseitswendig; Kzpfl ey-lanzettl.; *Anhängel der Buchten ohngefähr so lang, als die K.-Röhre*; Blkr. fast 3mal so lang, als der K., an der Spitze *dicht-bärtig*. 2. An kräuterreichen O. der A. und VorA., (Schw. und dch d. g. AK.; in den Sudeten.) Juli. Aug. J. ob. hot. t. 37.

30. *C. SIBIRICA* (L.) Sibirische G. — Kurz.; B. lanzettl., wenig, die untersten stumpf, in den Bstiel verschmälert, die oberen spitz, halbstengelumfassend; Bth. gestielt, rispig, nickend; Kzpfl lanzettl.-pfriemlich, *mit Anhängseln so lang, als die K.-Röhre*; Blkr. *an der Spitze kahl*. ☉. Auf kräuterreichen Hügeln, (Istrien, südl. Tyrol, Unteröstr., Mähr., Schles. und bis Frankf. an der O., um Berlin). Mai. Juni. J. a. t. 200. D.

Die in D. fl. 2. p. 170. aufgeführte *Campanula Medium* L. wächst nicht an den angegebenen O. und ist nirgends im Gebiete

unserer Fl. einheimisch geworden. — Von *C. Allionii* Vill. ist es zweifelhaft, ob sie in der Schw. vorkommt.

4. *EDRAIANTHUS* (Alph. De Cand. in DC. prodr. 7. S. 448.) Büschelglocke. — Die Kapsel an der Spitze innerhalb der Kzpfl in Stücken oder unregelmässige, hinfällige Klappen zerspringend, später ganz offen, sonst wie *Campanula*.

1. *E. TENUIFOLIUS* (Alph. De Cand. in DC. prodr. 7. S. 449.) Schmalblättrige B. — B. lineal., mit steifen Borsten bewimpert; *DeckB. eyf.*, lang lineal.-gespitzt, *borstig-wimperig*; St. behaart. 4. An steinigen O., (Triest. Fiume; Monte d'Ossero, Tommas.) Juli. Aug. *Campanula tenuifolia* W. u. Kit. pl. rar. hung. 2. t. 153. *C. graminifolia* Host. austr., Koch Synops. ed. 1 Bth. blan. D.

2. *E. KITAIBELII* (Alph. De Cand. in DC. prodr. 7. S. 449.) Kitaibel's B. — B. lineal. oder schmal-lanzettl., an der Basis verschmälert, bewimpert mit weichen Haaren, oberwärts oft kahl; *DeckB. eyf.*, auf beiden Seiten 1-2zählig, *weichwollig-bewimpert*; St. laumig. 4. Auf A. Wiesen und steinigen O., (Schneeberg im Karstgebirge, Tommasini, Dolliner.) Juli. Bth. blau. D.

5. *ADENOPHORA* (Fischer. in act. mosq. 6. p. 165.) Drüseglocke. — Die oberweibige Scheibe um die Basis des Gf. in Gestalt eines Röhrchens hervorragend; sonst Alles, wie bei *Campanula*.

1. *A. SUAVEOLENS* (Meyer elench. plant. boruss. indig. S. 19.) Wohlriechende D. — Der St. aufrecht; B. länglich, die untern kurz-gestielt; R. ausgebreitet; Kzpfl mit einigen Drüsenzähnen; Gf. länger, als die Bl. ☉. Im Gebüsch und in Wäldern, (bei Rastenburg in Preussen, auf dem Karlstein der Velika Gora in Böhm. sehr selten, in Schles. am Geiersberge und den Strehlner Bergen, Gebirg Bondon im südl. Giudicarie bei dem Schlosse Lodron und bei Trembellano ober Roveredo.) Juli. Aug. *A. lilifolia* DC. prodr. *A. communis* Fischer, Ledeb. fl. altaic. *Campanula lilifolia* L. spec. p. 233. *C. Alpini* L. sp. p. 1669. *C. lilifolia* D. fl. 2. p. 162. MBiebst. und der meist Autor. *C. suaveolens* Willd. *C. intermedia* Schult. *C. Fischeri* Schult. Man vgl. über diese Art die Fl. altaic. 1. p. 246. D.

6. *SPECULARIA* (Heister. Syst. pl. S. 8 nach Alph. De Cand. monogr. camp. S. 44.) Spiegelglocke. — Blkr. radf.; Saum flach. Kapsel lineal.-länglich, prismatisch. Sonst Alles, wie bei *Campanula*.

1. *S. SPECULUM* (DC.) Schönblühende S. — Der St. aufrecht, ästig, spreitzend, die untern Aeste verlängert, aufstrebend; B. länglich, die untern verkehrteyf.; Bth. einzeln; *Kzpfl lineal.*, *von der Länge der Blkr. oder kürzer.* ☉. Unter der Saat, (stw. dch das südl. und mittl. Gebiet.) Juni. Juli. *Campanula Speculum* L. D. fl. 2. p. 178. *Prismatocarpus Speculum* L'Herit. in DC. fl. fr.,

Koch Synops. ed. 1. Bth. purpur-violett. Kommt auch mit einem K. von der Länge der Blkr. vor: *Campanula cordata* Visian. stirp. dahu. specim. t. 2.

2. *S. HYBRIDA* (Alph. De Cand. monogr. camp. S. 514.) Bastard-S. — Der St. aufrecht, ästig, die untern Aeste verlängert, aufstrebend; B. länglich, die untern verkehrteyf.; Bth. einzeln; *Kzpfl lanzettl., an der Basis und Spitze verschmälert, länger, als die Blkr., Fruchtkn. unter der Bthe zsgeschauert.* ☉. Unter der Saat, (bei Basel und stw. dch Elsass bis Mainz, bei Trier, Saarlouis und dch Baden bis Frankf. am M.; in Thüring. bei Arnstadt, Eisenach; im südl. Theil von Hannov. und in Westphal.; Triest; Istrien sehr häufig, ebenso Fiume, südl. Tyrol) Jun. Jul. *Campanula hybrida* L. D. fl. 2. p. 178. *Prismatocarpus hybridus* L'Herit. in DC. fl. fr., Koch Synops. ed. 1. Bth. purpurn. D.

3. *S. FALCATA* (Alph. De Cand. monogr. camp. S. 345.) Sichelf. S. — St. aufrecht, ästig, die unteren Aeste verlängert, aufstrebend; B. längl., die untern verkehrteyf.; Bth. einzeln; *Kzpfl von gleichbreiter Basis aus lanzettl.-lineal., lang-verschmälert, bogig zurückgekrümmt, länger als die Blkr.; Fruchtkn. an der Spitze gleich.* ☉. Unter der Saat und an bebauten O., (um Fiume häufig, Noé.)

7. *WAHLENBERGIA* (Schrud. cat. sem. hort. gött. 1814.) *Wahlenbergia*. — Kapsel halboberst., an der Spitze in 3-5 scheidewandtragende Klappen aufspringend; sonst Alles, wie bei *Campanula*.

1. *W. HEDERACEA* (Rb. ic. 5. p. 47. t. 380. f. 673.) Epheublätterige W. — *B. herzf.-rundlich, eckig-5lappig, gestielt, kahl;* der St. fädlich, ästig; Bthstiele einzeln, verlängert. 4. Auf torfh. Wiesen und an moorigen O., wo sie zwischen dem *Sphagnum* kriecht, (in der Rheinpfalz bei Kaiserslautern, zwischen dem Vogelwog und dem Blechhammer und an der östl. Seite des Pfaffenbergs, über dem Dorfe Frauenlautern bei Saarlouis, Buddensieg; Varel, Böckler; im Oldenburgischen im Wäldchen bei Neuendorf sparsam, nicht bei Jever, Meyer chlor. han. p. 375.; in der Gegend von Spa und Malmedy.) Juni. Aug. *Campanula hederacea* L. D. fl. 2. p. 179. Bth. hellblau. D.

LXVII. Ordn. VACCINEEN. DC. theor. elem. p. 216.

K. oberst., 4-5zählig oder ungeth. Blkr. Iblätterig, 4-5lappig. Stbg. mit den Zpfln der Blkr. abwechselnd oder noch einmal so viel, vor einer oberweibigen, gekerbten Scheibe eingefügt, an die Blkr. nicht angewachsen. Stbk. 2fächerig, oft 2hörig. Fruchtkn. 4-5fächerig; Fächer mehreyig; Samenträger mittelpunktst.

Gf. 1; N. einfach; Frucht eine Beere. Kelm in der Axe des Eiweisses liegend; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. — Sträucher mit wechselst. B.

1. VACCINIUM (L.) Heidelbeere. — K. 4-5 sp. oder gezähnt, manchmal fast ungezähnt. Blkr. 4-5sp. od. 4-5zählig. Beere kugelig.

1. Rotte. MYRTILLUS. B. abfällig. Blkr. eyf. oder kugelig. Die 2dörnigen Stbk. sind dieser Rotte nicht eigenthümlich, denn sie kommen auch bei dem Vaccinium intermedium der nächsten Rotte vor.

1. V. MYRTILLUS (L.) Gemeine H. — B. abfällig, *eyf.*, kleingesägt, kahl; Bthstiele blüthig, einzeln, blattwinkelst., überhängend; Blkr. kugelig; Aeste *scharfkantig*. *b.* In Wäldern und an deren Rändern; in die A. hinaufsteigend. Mai, Juni. Schk. t. 107. Bth. hellgrün, fleischfarben überlaufen. Beeren schwarz. Var. mit kurz-2dörnigen Stbk.

2. V. ULIGINOSUM (L.) Morast-H. — B. abfällig, *verkehrt-eyf.*, stumpf, ganzrandig, *unterseits bläulich-grün, netzig*; Aeste stielrund; Bthstiele gebüßt, überhängend; Blkr. eyf. *b.* In Nadelwäldern, auf Torf-Boden; in die A. hinaufsteigend. Mai, Juni. St. h. 12. Bth. weiss oder röthlich; Beeren schwarz.

II. Rotte. VITIS IDAEA. B. immergrün. Blkr. glockig.

3. V. VITIS IDAEA (L.) Preusselbeere. — B. immergrün, *verkehrt-eyf.*, stumpf, unmerklich-gekerbt, am Rande zurückgerollt, *unterseits punktiert*; Tr. endst., überhängend; Blkr. glockig; Stbk. wehrlos; *Gf. über die Blkr. hinausragend*; Aeste stielrund. *b.* In Wäldern und auf Heiden, auf Sandboden; in die A. hinaufsteigend. Mai-Juli. Fl. dan. t. 40. Bth. weiss oder röthlich; Beeren roth.

4. V. INTERMEDIUM (Ruthe Fl. von Brandenburg. S. 377.) Mittlere H. — B. immergrün, *oval*, stumpf, *stumpf-gezähnt*, am Rande etwas umgerollt, *unterseits sparsam punktiert*; die seitenst. Bth. einzeln oder die endst. in armblüthigen Tr.: Blkr. glockig; Stbk. auf dem Rücken 2dörnig; *Gf. eingeschlossen*; Aeste etwas kantig. *b.* An feuchten WaldÖ. (Jungfernhaide, ein Nadelwald bei Berlin.) Mai, Juni. Die Bth. grösser wie beim Vorigen. röthlich. Beeren roth. D.

III. Rotte. OXYCOCCOS Pers. syn. t. 419. B. immergrün. Blkr. radf., zurückgekrümmt.

5. V. OXYCOCCOS (L.) Moos-H. — Der St. kriechend; Aeste fädlich, liegend; B. immergrün, *eyf.*, *ziemlich spitz*, *unterseits aschgrau*; Bth. lang-gestielt, nickend; Blkr. radf., Zpfl. länglich.

h. An morastigen, torfh. O., die mit Sphagnum angefüllt sind. Jun.-Aug. Schk. t. 107. *Oxycoccus palustris* Pers. *Schollera Oxycoccus* Roth. Bth. purpurn. Beeren roth. D.

LXVIII. Ordn. ERICINEEN. Desv. journ. bot. 1813. p. 28. DC. fl. fr. 3. p. 671. und 675.

K. 4-5sp. oder th., bleibend. *Blkr. einblättrig*, 4-5sp. oder th., unterweibig, in der Knospenlage dachig. *Stbg.* mit den Zpfen der Blkr. abwechselnd, oder noch einmal so viel, *vor der Blkr. der unterweibigen Scheibe eingefügt, frei, und nicht an die Blkr. angewachsen.* *Fruchtkn.* auf der unterweibigen Scheibe eingefügt, frei, *vielfächerig*; Fächer 1-vieleigig; Samenträger mittelpunktst. Gf. l. N. l. Kapselfrucht oder Beere. *Samen geflügelt.* Keim in der Achse des Eyweisses; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. nebenblattlos.

1. Gruppe. *ARBUTEEN.* DC. prodr. 7. S. 580. Frucht beerenartig.

1. *ARBUTUS* (L.) Erdbeerbaum. — K. 5sp. Blkr. fast eyf., mit 5sp. Saume. Stbk. an der Spitze mit 2 kleinen Oeffnungen aufspringend. Beere 5fächerig; Fächer 4-5samig.

1. *A. ÜNEO* (L.) Gemeiner E. — Stamm aufrecht; B. verkehrteyf. oder länglich-lanzettl., gesägt, lederig, kahl; R. endst., hängend; Bthstielen kahl. h. An gebirgen, felsigen O., (Krain, Istrien.) Fiume vom Octbr. - Febr., Noë. Bth. weiss, an der Spitze grün. D.

2. *ARCTOSTAPHYLOS* (Adans.) Bärentraube. — Steinfrucht 5steinig; Steine 1samig; sonst Alles, wie bei Arbutus.

1. *A. ALPINA* (Spreng.) Alpen-B. — Stamm hingestreckt; B. verkehrteyf., *ungleich-klein-gesägt*, kahl, an der Basis ganzrandig und gewimpert, verwelkend, netzig-aderig, Adern unterseits etwas hervortretend; Tr. kurz, endst. h. An felsigen, trocknen O., (deh die AK.) Mai-Juli. *Arbutus alpina* L. Fl. dan. t. 73. St. h. 51. Bth. weiss, an der Spitze grün, mit den B. hervorbrechend.

2. *A. OFFICINALIS* (Winum und Grab.) Gebräuchliche B. — Stamm hingestreckt; B. länglich-verkehrteyf., *ganzrandig*, immergrün, kahl, netzig-aderig, Adern beiderseits-eingedrückt, unterseits unmerklicher, die jüngern B. am Rande flaumig; Tr. kurz, endst. h. Auf Haiden und in Fichtenwäldern des nördl. D. und an felsigen O. der VorA. in der Schw. und des südl. D., seltener in Mittel-D. Mai, Juni. *Arctostaphylos Uva ursi* Spreng. *Arbutus Uva ursi* L. St. h. 6. Bth. fleischfarben. Beere roth. B. unterseits netzig-aderig, nicht punktirt und am Rande nicht zurückge-

rollt, dadurch leicht von *Vaccinium Vitis idaea*, dessen B. in den Apotheken mit denen der *A. Uvae ursi* verwechselt werden, zu unterscheiden.

II. Gruppe. *ANDROMEDEEN*. DC. prodr. 7. S. 588. Frucht kapselig, fachspaltig aufspringend, die einfachen Scheidewände in der Mitte der Klappen. Blkr. abfällig.

3. *ANDROMEDA* (L.) Andromede. — Kapsel 5fächerig, 5klappig; sonst Alles, wie bei *Arbutus*.

1. *A. POLIFOLIA* (L.) Poleyblättrige A. — Bthstiele endst., fast doldig, 3mal so lang, als die Bth.; *B. lineal.-lanzettl.*, am Rande zurückgerollt, oberseits glänzend, *unterseits bläulichgrün*. $\frac{1}{2}$ In torfigen Sümpfen und auf morastigen Haiden und in kalten Sümpfen der höhern Gebirge, (doch d. g. Gebiet stw., aber nicht überall.) Juni. Juli. Schk. t. 118. *Rhododendron polifolium* Scop. Bthstiele und K. rosenroth, Blkr. weiss. in das Hellröthliche spielend.

2. *A. CALYCVLATA* (L.) Grosskelchige A. — Tr. endst., beblättert, einerseitswendig; *B. oval-länglich.*, stumpf mit einem kleinen Spitzchen, kaum merklich-gesägt, *beiderseits schuppig*. $\frac{1}{2}$ An sumpfigen Orten Ostpreussens, (bei Spittelhof in der Gegend von Königsberg, bei Rehrenhof in der Gegend von Greifswalde.) April. Mai. Schk. t. 118. *Cassandra calyculata* Don. in Edinb. phil. Journ. Juli 1834, DC. prodr. *Lyonia calyculata* Rb. D.

III. Gruppe. *ERICEEN*. Frucht kapselig, auf verschiedene Weise aufspringend. Bth. verwelkend.

4. *CALLUNA* (Salisb. bei Linn.) Haidekraut. — K. 4blättrig, länger, als die Blkr. Blkr. 4sp. Stbg. 8. Fruchtkn. 4fächerig, vieleiyig. Kapsel 4fächerig, 4klappig; die Scheidewände von den Klappen getrennt, an die Säulchen angewachsen, den Näthen gegenständig.

1. *C. VULGARIS* (Salisb. Smith.) Gemeines H. — $\frac{1}{2}$ In Wäldern, auf Waldtriften und trocknen Wiesen, auf Sandboden. Aug.-Herbst. *Erica vulgaris* L. D. II. 3. p. 37. St. h. l. Bth. lila, seltner weiss; var. an morastigen O.:

β . *pubescens*, B. flaumig; *E. ciliaris* Huds., nicht L.

5. *ERICA* (L.) Heide. — K. 4blättrig, oder 4th. Blkr. mit 4sp. Saume. Stbg. 8. Fruchtkn. 4fächerig, vieleiyig. Kapsel 4fächerig, 4klappig; Klappen in der Mitte scheidewandtragend; Scheidewand vollständig oder unvollständig.

1. *E. TETRALIX* (L.) Sumpf-H. — *Stbk. begrannt, eingeschlossen*; N. kopfig; Blkr. krug-eyf., 4zählig; *B.* 3 od. 4stündig, lineal., am Rande abgerundet, *steifh.-gewimpert*; Bth. endst., kopfig-doldig. $\frac{1}{2}$ Auf torfigen Haiden und an sumpfigen O., (auf

der Fläche des nördl. D. vom Niederrheine und Westphalen dch Hannov., Holstein bis Preussen und Schles.; in der Wetterau.) Juli-Sept. Fl. dan. t. 81. Bth. fleischfarben. D.

2. *E. CINEREA* (L.) Aschgrane H. — *Stbk. begrannt, eingeschlossen*; N. kopfig; Blkr. krug-eyf., 4zählig; B. 3ständig, lineal., mit scharfem Rande, unterseits konvex, mit einer Ritze durchzogen, kahl; Bth. quirlig-traubig. ♀. Auf Haiden, (über Dottendorf bei Bonn.) Juni. Juli. Fl. dan. t. 38. *E. humilis* Neck. *E. mutabilis* Salisb. Bth. bläulich-purpurn. D.

3. *E. CARNEA* (L.) Fleischfarbige H. — *Stbk. wehrlos, vorgestreckt, an der Spitze 2sp., an der Basis mit der Spitze des Stbf. verschmelzend*; N. klein; Blkr. krugig-röhrig, 4zählig; Blättchen des K. lanzettl., halb so lang als die Blkr.; B. 4ständig, lineal., spitz, mit scharfem Rande, kahl, die traubigen Bth. etwas nach einer Seite gewendet ♀. Auf Haiden und in Nadelwäldern der Gebirge und VorA., (von d. Schw. dch d. g. AK.; bei Regensb.; in Oestreich, Mähren, Böhmen und Schlesien.) April. Mai. D. fl., Jacq. austr. t. 32. *E. herbacea* St. h. 26. Die Bth. erscheinen im Herbst in dem grünen K. eingeschlossen, in welchem Zustande die Pfl. die *E. herbacea* L. darstellt. Bth. fleischfarben.

4. *E. VAGANS* (L. mant. S. 230.) Wandernde H. — *Stbk. wehrlos, vorgestreckt, 2sp., an der Spitze des Stbf. seitlich angeheftet*, N. klein; Blkr. glockig, 4zählig; Blättchen des K. eyf., 3mal kürzer als die Blkr.; B. 4ständig, lineal., mit einem scharfen Rande versehen, stumpfl., kahl; Bth. traubig. ♀. Im Gesträuch auf den Inseln Cherso und Osero im April. Bth. fleischfarben. Die diesem zunächststehende *E. multiflora* untersch. sich dch längere eyf.-glockige Blkr. und 2sp., nicht bis an die Basis getheilte Stbk. J.

5. *E. ARBOREA* (L.) Baumartige H. — *Stbk. mit einem Anhängsel, eingeschlossen*; Gf. hervorgestreckt, etwas abwärtsgeneigt; N. schildf.; Blkr. glockig, 4sp., mit eyf., stumpfen Zpfln; B. 3ständig, lineal., mit einem scharfen Rande, stumpf, unterseits konvex, mit einer Ritze dchzogen, kahl; Aeste kurz.; Bth. traubig-rispig. ♀. An rauhen O., (Istrien, bei Pola und auf Osero und Cherso, Südtirol in Guidicarie häufig; Veltlin.) Mai. Juni. *E. scoparia* Wulf. in Röm. arch. *E. lusitanica* Roth. und, wie es scheint, Rudolph. bei Schrad. Bth. weiss. D.

Die *Menziesia caerulea* Sw. habe ich als einen sehr zweifelhaften Bürger unserer Flora weggelassen.

IV. Gruppe. *RHODOREEN*. D. Don. in Edinb. phil. Journ. 17. S. 152., DC. prodr. 7. S. 712. Frucht kapselig, wandspaltig aufspringend; Scheidewände doppelt. Blkr. abfällig.

6. *AZÁLEA* (L.) Azalie. — K. 5th. Blkr. glockig, gleich, 5sp. Stbg. 5. Stbk. mit zwei Längenritzen aufspringend. Kap-

sel 4klappig, durch die einwärtsschlagenden Klappenränder 4-fächerig.

1. A. PROCUMBENS (L.) Liegende A. — Auf Felsen der höhern A., (deh d. g. AK.) Juli. Aug. Schk. t. 36. Chamaecledon procumbens Link. D. fl. 2. p. 139. Loiseleuria procumbens Desvaux. Bth. rosenroth.

7. RHODODENDRON (L.) Alpenrose. — K. trichter- oder radf. Stbg 10. Stbk. an der Spitze mit 2 Oeffnungen aufspringend. Sonst Alles, wie bei Azalea. Bth. rosenroth.

1. Rotte. ERHODODENDRON DC prodr. 7. S. 721. Blkr. trichterf. Stbg. abwärts geneigt.

1. R. FERRIGINEUM (L. spec. 562.) Rostfarbige A. — B. längl.-lanzettl. oder elliptisch, ganzrandig oder schwach-gekerbt, am Rande kahl, unterseits drüsig-schuppig, *die Schüppchen die ganze Unterfläche dicht-bedeckend*, zuletzt rostbraun; Tr. fast doldig; *Zähne des K. kurz-cyff., in die Quere breiter*; Blkr. trichterf. ♀. Auf den A. vorzüglich GranitA. (deh d. AK.) Juli. Aug., später als R. hirsutum und intermedium. D. fl., Jacq. a. t. 255.

2. R. INTERMEDIUM (Tausch in der Regensb. bot. Ztg. 19. S. 36.) Mittlere A. — B. längl.-lanzettl. oder elliptisch, schwach-gekerbt, oder ganzrandig, entfernt-gewimpert, unterseits dicht-drüsig-punktirt. Punkte gesondert, zuletzt rostbraun; Tr. fast doldig; *Zähne des K. längl.-lanzettl.*; Blkr. trichterf. ♀. Unter der Vorigen und der Nächsten, mit welcher diese Pfl. nach Herrn Fioke zugleich blüht. Ob sie eine Variet. der letztern, oder vielleicht ein Bastard ist, müssen weitere Untersuchungen lehren. Juli. Aug.

3. R. HIRSUTUM (L. spec. S. 562.) Rauh. A. — B. elliptisch, oder längl.-lanzettl., stumpf-gekerbt, entfernt-gewimpert, kahl, unterseits drüsig-punktirt, *die Punkte weithläufig zerstreut*; Tr. fast doldig; *Zähne des K. längl.-lanzettl.*; Blkr. trichterf. ♀. Auf den A. vorzüglich KalkA. Mai-Juli. D. fl., Jacq. austr. t. 98. Var. *R. latifolium* Hoppe in der bot. Ztg. die B. sind breit-elliptisch, oder verkehrteyf., Bth. grösser, heller gefärbt; var. ferner mit dichter- oder entfernter-gewimperten und am Rande fast kahlen B., und mit B., welche auch auf der Oberfläche punktirt sind.

11. Rotte. CHAMAECISTUS G. Don. Syst. 3. S. 541. DC] prodr. 7.] S. 725. Blkr. radf. Staubgef. ausgebreitet.

4. R. CHAMAECISTUS (L.) Niedrige A. — B. elliptisch-lanzettl., gesägt-gewimpert, kahl, *drüsenlos*; Bth meist gezweiet; Bthstiele nebst den K. drüsig-behaart; Blkr. flach, radf. ♀. Auf Felsen der KalkA.; in die VorA. herabsteigend. (Oestr., Steyerm., Krain, Salzbg. Tyrol.) Juni. Juli. J. a. t. 217. Rhodothamnus Chamaecistus Rb. D.

8. **LEDUM** (L.) Porst. — K. klein, 5zählig. Blkr. 5blättrig. Stbk. an der Spitze mit zwei Oeffnungen aufspringend. Kapsel 5fächerig, von der Basis bis zur Spitze in 5 Klappen aufspringend; Scheidewände aus den einwärtsgeschlagenen Rändern der Klappen gebildet. Samenträger 5, von der Spitze des Fruchtsäulchens herabhängend.

1. **L. PALUSTRE** (L.) Sumpf-P. — lineal., am Rande zurückgerollt, unterseits nebst den Aestchen rostfarben-filzig; Bth. 10männig. 6. An sumpfigen, torfigen O., (stw. im nördl. D., von Holstein bis Preussen und Schles.; seltner in Böhm. und Mähr., Sachs. und Thüring.; vereinzelt bei Jena, Regensburg, und auf dem Schwarzwalde.) Juli. Aug. Schk. t. 117. Bth. weiss, selten rosenroth. D.

LXIX. Ordn. PYROLACEEN. Lindl. Syst., deutsche Ausg. p. 283., mit Ausschl. der Monotropen Nutt.

Unterweibige Scheibe fehlend. S. sehr klein, in einen röhrigen, netzigen Samenmantel eingeschlossen, kugelig, viel kleiner, als der Samenmantel. Sonst Alles, wie bei den Ericineen.

1. **PYROLA** (L.) Wintergrün. — K. 5 th. Blb. 5. Kapsel 5fächerig, mit 5 Ritzen aufspringend; Klappen an der Basis und Spitze des Fruchtsäulchens angewachsen, in der Mitte scheidewandtragend. — Stbf. an der Spitze nickend, Stbk., nahe an ihrer Einfügung auf den Stbf., mit zwei Löchern aufspringend.

1. Rotte. **PYROLAE GENUINAE.** Stbf. prismisch, von der Basis an aufstrebend. Ränder der Kapselspalten durch wollige Haare verbunden. B. mit einem A-Netz versehen, welches auf der obern Seite mehr, als auf der untern hervortritt.

1. **P. ROTUNDIFOLIA** (L.) Rundblättriges W. — Die Stbg. aufwärts-gekrümmt, der *Gf.* abwärts geneigt, an der Spitze bogig; Blb. verkehrteyf.; *Kzpfel lanzettl., zugespitzt*, an der Spitze zurückgekrümmt, halb so lang, als die Blkr.; Tr. gleich. 4. In schattigen Wäldern. Juni. Juli. Fl. dan. t. 1816. Bth. weiss; var.:

β. *arenaria*, kleiner, B. halb so gross, spitzlich; Bthstiele kaum so lang, als der K.; K.-Zpfl breiter, länglich, ziemlich stumpf: diese auf der Insel Norderney.

2. **P. CHLORANTHA** (Swartz.) Grünlichblühendes W. — Die Stbg. aufwärts gekrümmt; *Gf.* abwärts geneigt, an der Spitze bogig; Blb. verkehrteyf.; *Kzpfel cyf., kurz-zugespitzt, so breit, als lang*, an die Blkr. und Kapsel angedrückt, 4mal kürzer, als die Blkr.; Tr. gleich. 4. In schattigen Wäldern, (stw. und wie es scheint, dch d. g. Gebiet) Juni. Juli. P. virens Schweigg. und Kört. P. media Hayn., nicht Sw., P. asarifolia Rad., nicht Michaux. P. rotundifolia St. h. 13. Bth grünlich-weisslich.

3. **P. MEDIA** (Swartz.) Mittleres W. — Die Stbg. gleichfzsschliessend; *Gf.* gerade, etwas schief, der Ring an der Spitze des *Gf.* breiter, als die N. 4. In schattigen Wäldern, selten,

(Schw. bei Rügisberg, Mecklenburg bei Lipen; Hessen bei Alend; Gött. am Wiessner; am Huy bei Halberstadt; Sachs., Thüringen, Böhmen, Schles.; bayer. Gebirg bei Kreuth; Elsass zw. Soultzmatt und Guefy.; Oberbad., Tyrol, Steyermk.) Juni. Juli. Rad. monogr. t. 3. f. 1. Bth. weiss.

4. *P. MINOR* (L.) Kleineres W. — *Die Stbg. gleichf. zusschliessend*; der Gf. gerade, senkrecht; N. 3kerbig, *noch einmal so breit, als der Gf.* 4. In Wäldern. Juni. Juli. St. h. 13. *P. rosea* Engl. bot. ist dieselbe Pflanze, vgl. Smith. engl. fl. 2. 257. Bth. rosenroth.

✓ 5. *P. SECUNDA* (L.) Einerseitswendiges W. — *Tr. einerseitswendig.* 4. In Wäldern. Juni. Juli. St. h. 13. Blkr. oval-länglich, grünlich-weiss. B. eyf., spitz.

II. Rott. *PARNASIODES*. (Monesis Salisb.) Stbf. pfriemlich, an der Basis auswärts gekrümmt, 3kantig, dick, aber nicht verbreitert, von da aufstrebend. Stbk. mit 2 auseinandertretenden Hörnchen. Ränder der Kapselspalten kahl. B. mit einem, auf der obern Seite etwas hervortretenden Adernetze versehen. — Diese Rott. stimmt weit mehr mit der folgenden, als mit der vorhergehenden überein.

6. *P. UNIFLORA* (L.) Einblumiges W. — *Schaft 1blumig.* 4. In schattigen Wäldern ziemlich selten. Juni. Juli. Schk. t. 119. *Monesis grandiflora* Salisb. in Gray brit. arrang., DC. prodr. Bth. ansehnlich, weiss.

III. Rott. *CHIMAPHILA* Pursh. Die Stbf. an der Basis auswärts gekrümmt, verbreitert, 3kantig, von da aufstrebend und pfriemlich. Stbk. mit 2 auseinandertretenden Hörnchen. Ränder der Kapselspalten kahl. B. mit einem oberseits eingedrückten Adernetze. Die Kapsel der *Chimaphila umbellata* ist ganz sicher von der Kapsel einer *Pyrola* nicht verschieden, und springt nicht an der Spitze, sondern an der Seite auf, gerade wie bei den übrigen Arten der Gattung.

7. *P. UMBELLATA* (L.) Doldiges W. — *Bth. doldig; B. lanzettl.-keilig.* 4. In Wäldern, (stw. und zerstreut dch das Gebiet.) Juni. Juli. Fl. dan. t. 1336. *Chimaphila umbellata* Nutt. DC. prodr. Bth. rosenfarben.

LXX. Ordn. MONOTROPEEN. Nutt. gen. amer. 1. 272. Dub. bot. gall. p. 319.

K. 3blättrig. bleibend. Blkr. 3blättrig, unterständig, in der Knospenlage dachig, bleibend. *Stbg.* unterweibig, *frei*, noch einmal so viel, als Blb., *5 abwechselnd aus der Bucht der unterweibigen Drüsen, die die Basis des Fruchtkn. umgeben, hervortretend*; 5 mit den Drüsen abwechselnd. *Fruchtkn.* frei, *halb-5fächerig.* Kapsel 3klappig; Klappen in der Mitte eine unvollständ., an der Basis des 3kantigen Fruchtsäulchens angewachsene, Scheidewand tragend. *Gf. 1.* N. gross, trichterf. S. zahlreich, von

einem röhrigen, netzigen Samenmantel eingeschlossen, fast kugelig, viel kleiner, als der Samenmantel. Die seitenständigen Bth. haben einen Blüthetheil weniger.

1. **MONOTROPA** (L.) Ohnblatt. — K. 5blättrig; KB. flach. Blkr. 5blättrig; Blb. an der Basis höckerig, fast gespornt und inwendig honigtragend.

1. **M. HYPOPITYS** (L.) Vielblumiges O. — Tr. reichblüthig; Blb. gezähnt. 2. In schattigen Wäldern, zwischen halbfaulen B. und lockerer Dammerde die Wurzeln treibend. Juli, Aug. Die ganze Pflanze farbelos und bleich, nur die N. von honiggelber Farbe. — Kommt vor:

α. glabra, ganz kahl; Fruchtkn. mit kleinen, erhabenen Punkten besetzt: *M. Hypophegea* Wallr. Rb. ic. f. 675. *M. Hypoxa* Spreng. *M. hypopitys α.* Roth. St. h. 13. *Hypopitys glabra* DC. prodr.

β. hirsuta, der St. zwischen der Bth. flaumig; die DeckB. gewimpert; KB. inwendig und am Rande nebst den Blb. auf beiden Seiten und den Stbg. und dem Stempel rauhh.: *M. Hypopitys* Wallr. Rb. ic. f. 674. *M. hypopitys β. hirsuta* Roth. *Hypopitys multiflora* Scop. carn. Zwischen den Variet. *α.* und *β.* findet man viele Mittelformen, welche untereinander, sowohl in Laub- als Nadelwäldern wachsen.

III. Unterklasse. COROLLIFLORAE. (Blumenkronenblüthige.)

K. frei, vereintblättrig, (einblättrig.) Blkr. einblättrig, unterweibig. Stbg. der Blkr. eingefügt, Fruchtkn. frei.

LXXI. Ordn. EBENACEEN. Vent. tabl. p. 443.

K. 3-6 sp., bleibend. *Blkr.* regelmässig, unterweibig; *mit 3-6sp. Saum*; *Zpfl* in der Knospenlage dachig. *Stbg. der Blkr. eingefügt, noch einmal so viel, als Zpfl, oder zahlreich.* Scheibe fehlend. *Fruchtkn. mehrfächerig: Fächer 1-2eyig; Eychen hängend.* Gf. 1, oft getheilt. Eine Kapselfrucht oder Beere. Keim gerade im fleischigen Eyweiss; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Bth. oft 2bettig.

1. **DIOSPYROS** (L.) Dattelpflaume. — K. 4-6 sp. Blkr. im Grunde des K. eingefügt, krugf., mit 4-6sp. Saum. Stbg. 8-16,

in dem Grunde der Blkr. eingefügt, bisweilen unfruchtbar. N. 4. Beere 8-12fächerig.

1. D. LOTUS (L.) Italienische D. — B. eyf.-länglich, unterseits verschiedenfarbig. 4. Auf Hügeln und in Zäunen der wärmern Gegenden, (im C. Tessin, doch wahrsch. nur verwildert.) Jul. Aug. Lam. illust. t. 858. Bth. purpurn. S.

LXXII. Ordn. AQUIFOLIACEEN. DC. theor. elem. ed. 1. p. 217. Celastrin. trib. prodr. 2. p. 11.

K. 4-6zählig, in der Knospenlage dachig. *Blkr. regelmässig, 4-6 th., unterweibig; Zpfl in der Knospenlage dachig. Stbg. der Blkr. eingefügt, mit den Zpfln derselben abwechselnd.* Scheibe fehlend. *Fruchtkn. 2-6fächerig; Fächer 1eyig; Eychen hängend; N. lappig, fast sitzend.* Eine Steinfrucht, nicht aufspringend. Eyweiss gross. Keim gerade, klein; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Bth. bisweilen 1geschlechtig.

1. ILEX (L.) Stechpalme. — K. 4-5zählig. Blkr. radf. 4-5th. N. 4-5, fast sitzend. Frucht 4-5steinig.

1. I. AQUIFOLIUM (L.) Gemeine S. — B. wechselst., eyf., spitz, kahl, spiegelnd, dornig-gezähnt oder ganzrandig und mit einem Dorne endigend; Bthstiele blattwinkelst., kurz, reichblüthig; Bth. fast doldig 4. In Wäldern und auf Bergtriften, (von Westphalen dch Hannover nach Holstein und Mecklenbg in Menge; in den Wäldern der die A. begleitenden Berge von Oestr. bis in die Schw.; Panowitzer Wald bei Görtz, im Schwarzwalde und den Vogesen und bis zur Mosel stw.) Mai. Juni. St. h. 7. Bth. weiss. Beeren roth.

LXXIII. Ordn. OLEACEEN. Lindl. syst. ed. germ. p. 305. Oleineae Hoffmannsegg. und Link, fl. port. Lilaceae Vent. tabl. 1. p. 308.

K. gezähnt oder geth. *Blkr. regelmässig, unterweibig, 1blättrig, mit 1sp. Saume; oder 4blättrig, mit paarweise durch einen Stbf. zsghefteten Bbl., in der Knospenlage klappig. Stbg. 2, der Röhre eingefügt oder an die Bbl. angewachsen.* Scheibe fehlend. *Fruchtkn. 2fächerig, Fächer 2eyig, Eychen hängend, und nebeneinander gestellt.* Eine Kapsel-, Beere oder Steinfrucht. S. eyweisshaltig; Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. wechselst.

1. Gruppe. **OLEINEEN.** Frucht fleischig.

1. *OLEA* (L.) Oelbaum. — K. 4zählig. Saum der Blkr. 4sp. Steinfrucht 1-2samig, mit einer knöchernen Schale.

1. *O. EUROPAEA* (L.) Gemeiner O. — B. gegenst., lanzettl., ganzrandig, verschiedenfarbig; die Tr. blattwinkelst., zsgesetzt. 2. Wird in den warmen Gegenden jenseits der A. kultiv. und ist auch daselbst einheimisch geworden, (Littor.; südl. Tyrol; C. Tessin.) Mai. Juni. Tabernaem. krtb. 1450. Bth. weiss.

2. *PHILLYRÉA* (L.) Steinlinde. — K. 4zählig. Saum der Blkr. 4sp. Steinfrucht 1samig, mit zerbrechlicher Schale.

1. *P. MEDIA* (L.) Mittlere S. — B. ey-lanzettf. oder länglich, kleingesägt und ganzrandig; Steinfrucht mit einem vorspringenden Spitzchen. 2. In Wäldern und Zäunen, (um Fiume, in Istrien, Felsen bei Duino, See von Toblin nördlich vom Garda-See, südl. Tyrol.) März. April. Phill. III. Clus. I. 52. Abbildg. Bth. weiss. — *P. angustifolia* L. mit lanzettl.-lineal., 2 oder 3mal schmälern, ganzrandigen, oder selten mit 1 oder 2 Zähnen versehenen B., hält Bertoloni für eine Variet. von *P. media*. — *P. latifolia* A. untersch. sich nach Bertoloni durch geschärft-gesägte B. der jüngern Pflanzen, und vorzüglich durch eine stumpfe, genabelte Steinfrucht.

3. *LIGUSTRUM* (L.) Hartriegel. — K. 4zählig. Saum der Blkr. 4sp. Fächer der Beere mit einer sehr dünnen Haut ausgekleidet.

1. *L. VULGARE* (L.) Gemeiner H. — B. länglich-lanzettl., kahl; R. endst., gedrungen. 2. In Wäldern, auf buschigen Hügeln, an Wegen. Juni. Juli. St. h. 14. Bth. weiss. Beeren schwarz.

H. Gruppe. *LILACEEN*. Vent. Frucht trocken.

4. *SYRINGA* (L.) Flieder. — K. 4zählig. Saum der Blkr. 4sp. Kapsel 1-2samig, 2fächerig, 2klappig; Klappen kahnl., die Hälfte der bei der Reife gespaltenen Scheidewand tragend.

1. *S. VULGARIS* (L.) Gemeiner F. — B. herzf., zugespitzt. 2. In Zäunen hier und da verwildert. Apr. Mai. St. h. 2. Bth. violett, var. aber purpurn und weiss.

5. *L. FRAXINUS* (L.) Esche. — K. 3-4th. oder fehlend. Blkr. 3-4th. oder fehlend. Fruchtkn. 2fächerig; die Scheidewand im kleineren Durchmesser; Fächer 1eyig. Nuss flach-zsgedrückt. Bth. vielehig-2häusig,

1. *F. EXCELSIOR* (L.) Hohe E. — B. 3-6paarig; Blättchen sitzend, lanzettl.-länglich, zugespitzt, gesägt; Bth. nackt; Nüsse an der Spitze schief-ausgerandet. 2. In Wäldern in die A. hinaufsteigend bis zu einer Höhe von 3500 F. Apr. Mai. St. h. 44. Bth. braun. Var. mit dottergelben Aesten: *F. aurea* Willd.; mit krausen B.: *F. atrovirens* Desf.; mit einfachen B.: *F. simplicifolia*

Willd. *F. heterophylla* Vahl. — *F. oxyphylla* MBieb. untersch. sich dch eine einfache, etwas ausgerandete N. und dch die an der Spitze abgerundet-stumpfen, ganzrandigen Nüsse.

2. *F. ORNUS* (L.) Blühende E. — B. meist 3paarig; *Blättchen gestielt*, lanzettl. od. elliptisch, zugespitzt, gesägt; Bth. vollständig ♀. Auf Gebirgen der südl. Regionen, (Krain, südl. Kärnth., südl. Tyrol, Cant. Tessin.) Apr. Mai. *F. florifera* Scop. *Ornus europaea* Pers. Bth. weiss.

LXXIV. Ordn. JASMINEEN. Rob. Brown, prod. fl. nov. holl. p. 520. Vent. tabl. 1. p. 311.

K. gezähnt oder geth. *Blkr. regelmässig*, unterständig, mit 5-8sp. Saume; Zpfl in der Knospenlage schraubenf.-zsgerollt. Stbg. 2, der Blkr. eingefügt. Scheibe fehlend. Fruchtkn. 2fächerig; Fächer 1eyig; *Eychen aufrecht*. Gf. 1. N 1. Kapselfrucht oder Beere. Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet; Eyweiss fast fehlend. B. gegenst.

1. *JASMINUM* (L.) Jasmin. — K. 5-Szähniq. Saum der Blkr. 5-8sp. Beere fest, 1-2samig.

1. *J. OFFICINALE* (L.) Gemeiner J. — B. gegenst., gefiedert, Blättchen zugespitzt; KZähne fädlich, länger, als die halbe Röhre der Blkr. ♀. Kommt in Weinbergen, an sonnigen O., auf Mauern der Schw., im südl. Tyrol und im Littor., aber eigentlich nicht wild, vor. Juli. Aug. — Schk. t. 2. Bth. weiss.

Der Standort des *Jasminum fruticans* bei Aquileja ist sehr zweifelhaft, nach Briefen von Tommasini.

LXXV. Ordn. ASCLEPIADEEN. R. Brown. in Wern. soc. 1. p. 12. Gattungen der Apocynern bei Juss. gen. p. 143.

K. 5th., bleibend. *Blkr. 1blättrig, unterweibig, regelmässig*, 5sp., in der Knospenlage dachig, selten klappig, abfällig. Stbg. 5, der Basis der Blkr. eingefügt; Stbf. oft verwachsen. *Bthstaub in Massen zsggeflossen, welche an die Drüsen der N. angeheftet sind*. Fruchtkn. 2; Gf. 2; die Narbe beiden Gf. gemein, verbreitert, 5kantig, auf jeder Kante eine Drüse. Balgkapseln 2; der Samen-träger an die Nath angelehnt, später frei. S. dachig, hängend. Eyweiss dünn. Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

1. *CYNANCHUM* (R. Brown.) Hundswürger. — Blkr. fast radf., 5sp. Der Staubfädenkranz aus einem Stücke, 5klappig; Lap-

pen den Stbk. gegenst. Bthstaubmassen bauchig, hängend. Balgkapseln 2.

1. Rotte. SCAMMONEA. Stbf.Kranz an der innern Seite mit 5 den Zpfn des äusseren Kranzes gegenüberstehenden Anhängseln versehen, daher doppelt.

1. C. ACUTUM (L. spec. 310.) Spitzer H. — *St. windend; B. tief-herzf., zugespitzt; Blkr. kahl; äusserer Kranz 10 lappig, mit 5 lanzettl.-spitzen Lappen, welche etwas länger sind, als die 5 dazwischenliegenden ausgerandeten; der innere 5 lappig, mit spitzen Lappen.* 4. Am Meeresstrande, (auf dem Scaglio di S. Marina im Golfo di Medolino an dem Südende von Istrien, Tommasini.) Jul. Bth. blass-rosenfarb. J.

11. Rotte. VINCETOXICUM. Kranz einfach ohne Anhängsel an seiner innern Seite.

2. C. VINCETOXICUM (R. Brown.) Gemeiner H. — *St. aufrecht; B. zugespitzt, am Rande und auf den Adern fläumlich, die mittleren ey-herzf.; die Blkr. kahl, mit eyf. Zpfn; Kranz 5 lappig, Lappen eyf., abgerundet-stumpf, gesondert, aber dch eine dch-sichtige Zwischenhaut verbunden.* 4. In bergigen, felsigen O., (stellenweise dch das Geb.) Mai, Jul. Asclepias Vincetoxicum L. sp. St. h. 9. Bth. weiss mit gelblichweissem Kranz, aussen gelblichweiss, an der Basis grünlich.

3. C. LAXUM (Bartling in Koch Taschenb.) Lockerer H. — *St. aufrecht; B. zugespitzt, am Rande und auf den Adern fläumlich, die mittleren aus herzf. Basis länglich-lanzettl., lang verschmälert; Blkr. kahl, mit längl., am Rande zurückgebogenen Zpfn; Kranz 5 lappig, die Lappen eyf., abgerundet-stumpf, gesondert, aber mit einer dch-sichtigen Zwischenmembran verbunden.* 4. Auf Bergen und den VorA., (Görz, Krain.) Mai-Jul. C. medium Koch Synops. ed. I. mit Ausschluss der Synonyme, C. nigrum Host. fl. a. mit Ausschluss sämtlicher Synonyme und der Beschreibung, welche von Jacquin, der die ächte Pfl. beschrieb, verwechselt worden. Die Blkr. beiderseits weiss, an der Basis grünlich. D.

4. C. CONTIGUUM (Koch.) Geschlossener H. — *St. aufrecht; B. zugespitzt, am Rande und den Adern fläumlich, die mittleren herzf.-eyf.; Blkr. kahl; Kranz bis zur Mitte 5 lappig, die Lappen aufrecht, dicht-zsstossend, wegen fehlender Zwischenhaut die Stbgf. eng-umschliessend.* 4. Auf Wiesen, (um Triest und in Istrien, Tommas.) Mai-Jul. Farbe der Bth. wie bei C. Vincetoxicum. D.

Die drei hier aufgeführten Arten sind genau mit einander verwandt, aber nach meiner Meinung doch verschieden, und im lebenden Zustande ohne Schwierigkeit zu unterscheiden. Cynanchum laxum zeichnet sich vor Cynanchum Vincetoxicum aus dch das schlankere Aeussere, die um die Hälfte schmälern mittleren StB., den lockeren Bthstand und die längl., an der Seite sehr zurückgebogenen Zpfl der Blkr.; Cynanchum contiguum gibt sich den beiden erwähnten gegenüber leicht zu erkennen dch die dicht

zsstossenden, die Stbhf. eng umschliessenden Lappen des Kranzes. — Von diesen ist *C. fuscatum* Link. verschieden dch die braune Farbe der Bth. und dch die rautenf., mehr getrennten und mit einer breiteren Zwischenhaut versehenen Lappen des Kranzes; *C. nigrum* hat eine innen flaumh. Blkr.

Der Standort des *Cynanchum nigrum*, in D. fl. 2. p. 291. nach Schultes östr. fl. 1. p. 438. aufgenommen, scheint sehr zweifelhaft.

LXXVI. Ordng. APOCYNEEN. R. Brown. prodr. 465. Gattungen der Apocyneen bei Juss. p. 143.

K. 5th., bleibend. *Blkr. 1blättrig, unterständig, regelmässig, 5sp., in der Knospenlage schief-zsgedreht, abfällig. Stbg. 5,* der Blkr. eingefügt, den Zpfln wechselst.; *Stbf. frei. Stbk. auf der N. aufliegend; Bthstauh körnig.* Fruchtkn. vieleig, zwei l-fächerige, oder ein 2fächeriger. *Gf. 2, oder 1. N. 1.* Fruchtgehäuse balgig, oder kapsel-, steinfrucht- oder beerenartig. *S. eyweisshaltig; Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.*

1. **APOCYNUM** (L.) Hundstod. — *Blkr. glockig. Zähnen der Röhre 5, spitz, den Zpfln der Blkr. gegenst. Die Stbk. in ihrer Mitte mit der N. zshängend. Fruchtkn. 2. Gf. fast fehlend. N. verbreitert. Balgkapseln 2.*

1. **A. VENETUM** (L.) Venetianischer H. — *B. länglich-lanzettl., kahl, stachelspitzig, am Rande gezähnel-rau; Dolden rispig; Bthstielchen nebst den Bth. staubig-flaumig. 2. An sumpfigen O. am Ufer des adriat. Meeres. (bei Triest, alla riva longa; zw. Monfalcone und Aquileja.) Jul. Aug. Bth. rosenfarben. D.*

2. **VINCA** (L.) Sinngrün. — *K. 5th.; Blkr. tellerf., der Schlund 5kantig, nackt; Saum 5th.; Zpfl an der Spitze schief-abgeschnitten. Stbk. oberhalb des Stempels zsschliessend, zuletzt gewunden. Gf. 1. nach der Spitze zu durch die saftige N. geringelt und an der Spitze selbst mit einer haarigen Krone endigend. Balgkapseln 2. Same nackt. — Bth. blau, seltner bei einer Variet. weiss.*

1. **V. MAJOR** (L.) Grösseres S. — *B. eyf., nach vorne schmaler zulaufend, hinten abgerundet und fast herzf.; Kzpfl gewimpert; der St. gestreckt kriechend, die bthtrag. Aeste aufrecht. 2. An Zäunen, (bei Görtz, Istrien, Wallis) Apr. Mai. Pervinca major Scop. B. am Rande meist gewimpert.*

2. **V. MINOR** (L.) Kleineres S. — *B. oval, an der Basis stumpf, oder lanzettl.-elliptisch oder lanzettl., u. an beiden Enden spitz; KZpfl kahl; der St. gestreckt kriechend, die bthtragenden Aeste aufrecht. 2. In Hainen und an schattigen Zäunen. Apr. Mai. Schk. 1. 5l. Pervinca minor Scop. B. am Rande kahl. Die Variet. mit lanzettl., an Spitze und Basis stumpfen B ist: V. intermedia Tausch. pl. sel. — Eine Variet. mit schief verschmälert*

zulaufenden Zpfln der Blkr. schickte Facchini unter dem Namen *Vinca acutiflora* Bert., aber Bertoloni's Pfl. in der Fl. ital. scheint eine gleichgestaltete Variet. von *Vinca major* zu seyn.

3. V. HERBACEA (W. und Kit.) Krautiges S. — Die untern B. eyf., die obern lanzettf.; KZpfl gewimpert; W. *reichstengelig*; die St. liegend, nicht wurzelnd. 4. Auf Bergen und sonnigen Hügeln, (bisher bloss auf dem Biesenberg in der Gegend von Wien, Osswald! Pittoni und Host.) Apr. Mai. B., wenigstens die jüngern, am Rande rauh. D

3. NERIUM (L. gen. 295.) Oleander. — K. 5th. Blkr. trichterf., der Schlund mit einem geschlitzten Kranz versehen, Rand 5th., die Zpfl an der Spitze schief-abgestutzt. Stbk. in einen fadenf. haarigen Anhang endigend. Gf. 1. N. abgestutzt, an der Basis mit einem Ringe umgeben. Balgkapseln 2. S. schopfig.

1. N. OLEANDER (L. spec. 305.) Gemeiner O. — B. lanzettl., 3st., unterseits gleichlaufend-aderig; Zpfl des K. abstehend; Zähne des Kranzes 3sp. h. An felsigen O. der südlicheren Gegenden, (an der westlichen Seite des Gardasees auf tyrolischem Geb., Facchini.) Jul. Aug. Bth. rosenfarben. D

LXXVII. Ordng. GENTIANEEN. Juss. gen. p. 141.

K. 1blättrig, gespalten, bleibend. *Blkr. 1blättrig, unterweibig, 4-8sp., verwelkend. Stbg. der Blkr. eingefügt, so viel, als Zpfl der Blkr. und mit diesen abwechselnd.* Fruchtkn. 1. Gf. 2, zum Theil oder gänzlich zsgewachsen. *Kapsel vielsamig, einfächerig, 2klappig, Klappenränder samentrag.; oder 2 fächerig, Klappen am Rande einwärtsgebogen, die Scheidewand bildend, die Samenträger mittelpunktst; oder eine vielsamige Beere.* Keim gerade, in der Achse des fleischigen Eyweisses liegend; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

1. Gruppe. *MENYANTHEEN.* Fruchtkn. auf eine unterweibige Scheibe gestellt oder mit Drüsen umgeben. B. wechselst.

1. MENYANTHES (L. mit Ausschl. von Arten.) Zottenblume. — K. 5th. Blkr. trichterf.; Saum 5th., inwendig bärtig. Fruchtkn. auf einem gewimperten Ring liegend. N. ausgerandet. Kapsel 1fächerig, 2klappig, vielsamig; Klappen auf ihrer Mitte der Länge nach die Samenträger tragend.

1. M. TRIFOLIATA (L.) Dreiblättrige Z. — B. 3zählig. 4. An sumpfigen O., auf torfigen Wiesen, in Gräben. Apr. Mai. St. h. S. Bth. hellrosenroth, mit weissem Barte.

2. LIMNANTHEMUM (Gmel. act. petrop. 1769. Griesebach gen. et. spec. Gent. S. 341.) Pfützenblume. — K. 5th. Blkr. radf.; Saum 5th., Ränder der Zpfl in der Knospenlage eingebogen.

gen, im Schlunde härtig. Drüsen 5, an der Basis des Fruchtkn., mit den Stbg. abwechselnd. N. 2sp. Kapsel 1fächerig, 2klappig, vielsamig; Klappen am Rande die Samenträger tragend.

1. L. NYPHOIDES (Link fl. portug. I. S. 344.) Seerosenähnliche P. — B. schwimmend, herzf.-kreisrund; Dolden blattwinkelst., sitzend; Blkr. gewimpert, 4. In stehenden und langsam fließenden Wassern schwimmend. Jul. Aug. Menyanthes Nymphoides L. St. h. 13. Waldschmidia Nymph. Wigg. Sweykerta Nymph. Gmel. bad. Limnanthemum peltatum Gmel. act. petrop. Villarsia nymphoides Vent. chois., Koch Synops. ed. I. Bth. gelb.

II. Gruppe. *AECHTE GENTIANEEN.* Die unterweibige Scheibe fehlend. B. gegenst.

3. CHLORA (L.) Bitterling. — K. 5th. Blkr. tellerf.; Saum Stb. Stbg. 8, dem Schlunde eingefügt. N. 2, seicht-ausgerandet. Kapsel 1fächerig; die Samenträger an die einwärtsgebogenen Ränder der Klappen angewachsen. — Bth. gelb.

1. C. PERFOLIATA (L.) Durchwachsener B. — Die StB. 3-eckig-eysf., mit ihrer ganzen Breite verwachsen; K. bis an die Basis Ssp., Zpfl pfriemlich, 1nervig, kürzer, als die Blkr.; Zpfl der Blkr. länglich, stumpf. ☉. Auf torfigen, feuchten Wiesen und Triften, (stw. auf den Flächen der Schw. und von Basel bis nach Mainz.; von dem Littor. nach Oestr. und Böhm.) Jul. Aug. Rh. ic. 3 f. 349.; aber der Gf. ist 2sp., wie bei der folg., und nicht ungeth. Gentiana perfoliata L.

2. C. SEROTINA (Koch bei Rh. ic. 3, p. 6. f. 351.) Spätblühender B. — Die StB. ey- oder ey-lanzettf., an der abgerundeten Basis verwachsen; K. tief-8sp., Zpfl lanzettl.-pfriemlich, getrocknet schwach-3nervig, ohngefähr so lang, als die Blkr.; Zpfl der Blkr. ziemlich spitz oder zugespitzt. ☉. Auf Wiesen und torfigen Triften, (auf der Rheinfläche von der Schw. dch. Elsass bis Worms und von Oberbaden bis Mannheim) Aug.-Okt. Expl. mit zugespitzten BlkrZpflu: C. acuminata K. und Ziz. Rh. ic. 3. f. 350.

4. SWEERTIA (L.) Sweertie. — K. 5th. Blkr. radf.; Saum flach, 5th., Zpfl an der Basis mit 2 an ihrem Rande fransigen Honiggrübchen. Kapsel 1fächerig; Samenträger an die Ränder der Klappen angewachsen.

1. S. PERENNIS (L.) Ausdauernde S. — Blkr. 5th.; Bthstiele fast geflügelt-4kantig; der St. einfach; die WB. elliptisch. 4. Auf torfigen Wiesen der A. und VorA. und an sumpfigen O. des nördl. D., (Schw. an dem Rigi, bei Einsiedeln, auf den Voges.; dch. die g. AK.; auf den Sudeten nur an einer Stelle oberhalb des Kessels; in dem Erzgeb.; auf den Mooren von Holst., Mecklenb. und Pomm., Oberbaden und Oberbayern.) Jul. Aug. J. a. t. 243. Bth. trüb-violett.

5. **LOMATOGONIUM** (A. Braun.) Fransenkante. — K. 5 th., Blkr. radf.; Saum flach, 5th., Zpfl an der Basis ohne Honiggrübchen. Gf. fehlend. N. kurz, ungeth., mit ihren Papillen an den Klappenrändern bis zur Basis des Fruchtkn. beiderseits in einer Linie herablaufend. Kapsel 1fächerig; Samenträger an den Rand der Klappen angewachsen.

1. **L. CARINTHIACUM** (A. Braun.) Kärnthner F. — Blkr. im Schlunde bärtig; KZpfl lanzettl.; B eyf., spitz, die wurzelst. verkehrteyf., stumpf; der St. an der Basis ästig und beblättert; Bthstiele verlängert, nackt. ☉. An sonnigen, steinigen O. der A. und im Kiese ihrer Giesbäche, (auf dem Nassfelde in Salzb.; an der Pasterze und Fleiss bei Heiligenblut, über Sagritz und Döllach u. a. d. höchsten Möllthaler A. in Kärnth.; Hochebene des Schlehern westlich von der Kapelle aus; im Saasthale in der Schw.) Aug.-Oct. *Swertia carinthiaca* Wulf. J. misc. 2. t. 6. St. h. 22. *Gentiana carinth.* Froel. *Pleurogyne carinthiaca* Grieseb. Bth. blass-azur-blau. D.

6. **GENTIANA** (L.) Enzian. — K. 4-9sp. oder th., oder halbirt und scheidenartig. Röhre der Blkr. walzlich oder glockig; Saum 5-9sp. Stbg. 5-9. der Röhre eingefügt. Gf. 2. oder 1. N. 2. Unterweibige Scheibe fehlend. Kapsel 1fächerig, die Samenträger an die einwärtsgebogenen Klappenränder angewachsen. — Die Stbk. manchmal zsgewachsen.

1. Rotte. **COELANTHE** Froel. Schlund der Blkr. nackt. Blkr. radf., mit kurzer Röhre, oder fast glockig, mit keulenf. Röhre; Röhre zwischen den Zpfln mit einer am Ende abgestutzten oder in ein ungeth. oder 2sp. Anhängsel vorgezogenen Falte versehen. — Der St. aller ganz einfach.

a. Bth. quirlig oder kopfig. K. halbirt, scheidenf.

1. **G. LUTEA** (L.) Gelber E. — Bth. quirlig, die untern gestielt; Blkr. im Schlunde nackt, radf., 5th., Zpfl lanzettl., *verschmälert-spitz, 3 mal so lang, als die Röhre; Stbk. frei; K. halbirt, scheidenf.; B. elliptisch, nervig. 4.* Auf Triften der A. und VorA., (Schw., Vorarlberg, südl. Tyrol, Krain; an den höhern Weiden der schwäb. Alp, des Schwarzwaldes und der Voges.; selten im Thüring. Walde, auf den Gleichen bei Arnstadt.) Jul. Aug. Tabern. krtb. 1102. Bth. gelb; Zpfl oft mit 3 Reihen brauner Punkte bezeichnet.

Die 3 nächstfolgenden Gentianeen werden zu den Bastardformen gerechnet.

2. **G. THOMASII** (Gillabog. bei Villars in Roem. coll. 1. S. 189. nach Griesbach gen. et spec. Gent. S. 212. *Gentiana purpureae-lutea* Griesbach.) Thomas's Enzian. — Bth. quirlig, die untern gestielt; Blkr. im Schlunde nackt, radf., tief-5sp., Zpfl *länglich-lanzettl., kurzgespitzt, halb oder 3 mal so lang, als die Röhre; Stbk. frei; K. halbirt, scheidenf.; B. elliptisch, nervig. 4.* Auf Triften der Schw. A., sehr selten, (an den A. über Bex in der Schw. und am Rhonegletscher.) Jul. Aug. *G. rubra* Clairv. *G. hybrida* Schleich, DC. fl. fr., Koch Synops. ed. 1. Bth. purpurn,

an einer Variet. mit violetten Punkten bezeichnet; untersch. sich doch diese Merkmale und die länglichen, ziemlich stumpfen, oder an der Spitze kurzgespitzten Blkr. Zpfl von der vorhergehenden Art, von der sie vielleicht Variet. ist. S.

3. *G. CHARPENTIERI* (Thomas. pl. exsicc. *Gentiana punctatae-lutea* Griesbach.) Charpentier's E. — Bth. quirlig, die unteren gestielt; Blkr. im Schlunde nackt, tief-5sp., Zpfl längl.-lanzettl., halb so lang, als die Röhre; *Stbk. frei*; *K. glockig, abgestutzt, kurz-2zählig*, Zähne lanzettl.-pfriemlich, zugespitzt. 4. In den Thälern der A. (Thal von Bevers in dem Engadin der Schw., Charpentier.) Jul. Aug. Der K hat manchmal ausser den grössern Zähnen noch 1-3 kleinere. Bth. gelb. S.

4. *G. GAUDINIANA* (Thomas. pl. exsicc. *Gentiana punctatae-purpurea* Griesbach.) Gaudin's E. — Bth. an der Spitze des St. kopfig oder quirlig; Blkr. 6sp. mit nakedem Schlund. Röhre glockig, Zpfl eyf., 3-4mal kürzer, als die Röhre; *K. glockig, häutig, abgestutzt, auf einer Seite 2-3zählig*, auf der andern zahnlos und daselbst auch bis zur Mitte gespalten; *Stbk. zsgewachsen*; B. nervig, die unteren elliptisch. 4. Auf den Schw. A., (über Bex.) Jul. Aug. *G. pannonica* Gaud. helv. Bth. purpurviolett. S.

5. *G. PURPUREA* (L.) Purpurblühender E. — Bth. kopfig und quirlig, sitzend; Blkr. im Schlunde nackt, glockig; Saum meist 6sp., Zpfl eyf., 3mal kürzer, als die Röhre; *Stbk. zsgewachsen*; *K. halbirt*, scheidenf.; B. nervig, die untern elliptisch. 4. Auf den südlicheren A. der Schw., (auf den Aelener, Berner und Waliser A.; auf dem Gotthard, Pilatus und a., nach von Welden in Maly's Fl. auch in Steyerm., von welchem Standorte ich noch kein Expl. gesehen habe.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 50. Blkr. auswendig satt- oder auch hellpurpurn, inwendig gelblich; Röhre gelb. S.

b. Bth. quirlig oder kopfig. K. glockig, fast gleichf. gezähnt; seltner sind halbirte unter regelmässige K. gemischt.

× 6. *G. PANNONICA* (Scop.) Ungarischer E. — Bth. quirlig, Blkr. 6-7sp., im Schlunde nackt, Röhre der Blkr. glockig, Zpfl des Saumes 3mal kürzer, als die Röhre, ziemlich stumpf; *K. glockig, Zähne lanzettl., zurückgekrümmt*; B. sitzend, nervig, die untern gestielt, elliptisch. 4. An grasreichen O. der A. und VorA., (nördl. Tyrol, und von da deh die g. AK. bis Oestr.; im Böhmerwalde.) Aug. Sept. J. a. t. 156. St. h. 54. *G. purpurea* Schrank. Blkr. dunkelpurpurn mit schwarzpurpurnen Punkten gescheckt; Röhre bleichgelb.

7. *G. PUNCTATA* (L.) Punktirter E. — Bth. quirlig, Blkr. 6sp., im Schlunde nackt, Röhre der Blkr. glockig, Zpfl des Saumes 3mal kürzer, als die Röhre; *K. glockig, Zähne lanzettl., aufrecht*; B. sitzend, nervig, die untern gestielt, elliptisch. 4. An grasreichen, sonnigen O. der A. und VorA., (deh die g. AK.; im Gesenke der Sud., Böhmer Wald.) Jul.-Sept. J. a. app. t. 28.

St. h. 54. Bth. hellgelb, mit schwarzpurpurnen Punkten bemalt. Var.:

β. *concolor*, Bth. unpunktirt: *G. campanulata* J. a. app. t. 29.

8. *G. CRUCIATA* (L.) Kreuzf. E. — *Bth. quirlig; Blkr. 4 sp.*, im Schlunde nackt, Röhre der Blkr. fast keulig; *B. lanzettl.*, 3-nervig, an der Basis *scheidig*, die untern *Scheiden verlängert*, oberwärts erweitert. 4. Auf trocknen Wiesen, an sonnigen, unkultiv. O., (stw. dch das g. G.) Jul.-Sept. J. a. t. 372. Bth. dunkelviolet, Saum auf der Innenseite azurblau. Die unterste Bth. einzeln-stehend, meist 5sp., Buchinger.

c. Bth. einzeln, blattwinkelst. oder an der Spitze des St. einzeln oder gezeiet.

9. *G. ASCLEPIADEA* (L.) Schwalbenwurzartiger E. — *Bth. entgegengesetzt*, blattwinkel- und endst.; Blkr. 5sp., im Schlunde nackt, Röhre der Blkr. keulig-glockig; *B. sitzend*, aus eyf., abgerundeter Basis lanzettl.-zugespitzt, 5nervig, am Rande rauh. 4. An grasreichen O. und Hecken der Athäler, VorA. und der die A. begleitet. Berge, (auf den Vog., den A. der Schw. bis Oestr., und auf den Sud.) Aug. Sept. J. a. t. 328. St. h. 54. Blkr. inwendig schön-azurblau, mit dunkleren Punkten, selten weiss.

10. *G. PNEUMONANTHE* (L.) Gemeiner E. — Der St. I-vielbth.; *Bth. einzeln*, wechsel- oder gegenst.; Blkr. 5sp., im Schlunde nackt, Röhre der Blkr. keulig-glockig; *B. sehr kurz-scheidig*. lanzettl.-lineal., stumpf, die untersten klein, schuppenf.; Stbk. zsgewachsen; die N. lineal., verlängert. 4. Auf feuchten, torfig. Wiesen, (stw. dch das G.) Jul.-Herbst. St. h. 30. Bth. inwendig dunkel-azurblau, mit 5 grünpunktirten Streifen.

11. *G. FRÖLICHII* (Hladn. nach D. Graf in Brief.) Frölichs E. — Der St. 1 blüth.; Blkr. im Schlunde nackt, Röhre keulig-glockig; *B. lanzettl.-lineal.*, die wurzel- und untern stengelst. gehäuft, scheidig, *Scheiden häutig*, oberwärts erweitert; Stbk. zsgewachsen; der Gf. verlängert, ohngefähr halb so lang, als der Fruchtkn.; die N. länglich. 4. Auf den höchsten Jochen der Julischen A., (zuerst von Hladnik auf der höchsten Kuppe der Steiner Alpen, Velka planava, aufgefunden.) Aug. Sept. G. Hladnikiana Host. *G. angustifolia* Rb. fl. exc. St. h. 54. *G. Frölichii* Jan. Rb. fl. exc. add. *G. carnica* Welw. nach Rb. Bth. hellblau, unpunktirt. D.

12. *G. FRIGIDA* (Haenk. bei J) Durchscheinender E. — Der St. 1-2 bth.; Blkr. im Schlunde nackt, Röhre keulig-glockig; *B. lanzettl.-lineal.*, die wurzel- und untern stengelst. gehäuft, scheidig, *Scheiden häutig*, oberwärts erweitert; Stbk. frei; Gf. kurz, vielmal kürzer, als der Fruchtkn.; die N. länglich. 4. Auf den höchsten Jochen der GranitA. in Steyer., (a. d. Seckauer A.; auf d. Grieskogel daselbst, Angelis; Hohe Zinken, Zechent. und andere O. nach Maly.) Jul. Aug. St. h. 54. Blkr. weisslich, mit

zerstreuten Punkten und inwendig mit 5 bläulichen Streifen, die in dem Schlunde zströmen. D.

13. *G. ACAULIS* (L.) Stengelloser E. — *Der St. 1 blüth.*; Blkr. im Schlunde nackt. *Röhre keulig-glockig*; *Zähne des K. aus breiterer Basis verschmälert-lanzettl.*, an die Blkr Röhre *angedrückt*; die *WB. rosettig*, lanzettl. oder elliptisch; Stbk. zsgewachsen; die N. halbkreisrund, gezähnt. 4. Auf Wiesen und Triften der A. und VorA., in die Ebenen herabsteigend, (auf den Vog. und dch die g. AK.; in Oberschwab. und dch Oberbayern bis Regensb. hinab; bei Halle selten.) Jul. Aug., in den Ebenen Mai. Jun., in den A. später. J. n. t. 136. St. h. 4. *G. acaulis* β. L. *G. angustifolia* Vill., ein sehr unpassender Name, da die Pfl. im Verhältniss zu andern Arten gewiss keineswegs schmalblättrig ist. Linne trennte sie von der folg. bloss als Variet.; dennoch gebührt ihr als der bekanntesten und von allen Autoren bis auf die neuesten Zeiten mit dem Namen der *G. acaulis* belegten Art der Name *G. acaulis*. Saum der Blkr. auf der obern Seite azurblau.

14. *G. EXCISA* (Presl.) Ausgeschnittener E. — *Der St. 1 blüth.*; Blkr. im Schlunde nackt, *Röhre keulig-glockig*; *KZähne aus einer ein wenig schmälern Basis ey-lanzettl., abstehend*; die *WB. rosettig*, oval oder elliptisch; Stbk. zsgewachsen; die N. halbkreisrund, gezähnt. 4. Auf Wiesen der höchsten GranitA. und KalkA.; im südl. Tyrol in den Thälern und Gegenden des Weinstockes und Oelbaumes. Facchini, (dch die g. AK.) Jul. Aug. *G. acaulis* α. L., nach dem Citate Casp. Bauhin's, der zuerst dieser Pflanze erwähnte, die er von den A. der Schw. hatte; aber Presl. beschrieb sie unter allen zuerst deutlich. *G. acaulis* Vill. — Var. mit stumpfen und spitzen B. und

β. *minor*, Bth. nebst den B. halb so gross: *G. alpina* Vill.

11. Rotte. *CALATHIA* Froel. Blkr. Röhre walzlich oder etwas bauchig; sonst Alles, wie bei der vorhergeh. Rotte, — Die Stb. aller frei.

a. Die W. reichstengelig, rasig, bthragende, einfache, 1 blüth. St. und unfruchtbare Blätterbüschel, (WKöpfe für die folg. Jahre) treibend. Bth. satt-azurblau, seltner bei einer Var. weiss.

15. *G. BAVARICA* (L.) Baierischer E. — *Der St. rasig, 1 blüth.*; Blkr. im Schlunde nackt, Röhre walzlich; *B. verkehrteyf., abgerundet-stumpf*, in den kurzen Bstiel zsggezogen, die untern öder alle gedrungen; *der Gf. tief-2 sp.*; die N. halbkreisrund. 4. An etwas nassen O., (dch die g. AK.) Jul. Aug. St. h. 41. *G. prostrata* Wahlenb., nicht L. B. nicht rosettig, var. aber:

β. *rotundifolia*, B. sämmtlich an dem kurzen St. dachig; *G. imbricata* Schleich., nicht Froel., *G. rotundifolia* Hopf.

16. *G. BRACHYPHYLLA* (Vill.) Kurzblättriger E. — *Die St. rasig, 1 blüth.*; Blkr. im Schlunde nackt, Röhre walzlich; *B. rundlich-eyf., kurz-gespitzt*, in den kurzen Bstiel zsggezogen, *die wurzelst. rosettig*; Gf. ungeth.; N. halbkreisrund. 4. Auf den höchsten GranitA., (südl. Schw., Tyrol, Kärnth. und Steyermark und

wahrscheinl. dch die g. AK.) Jul. Aug. St. h. 34. — *G. terglaviensis* Haq. t. 2. f. 3. scheint hierher zu gehören. — Untersch. sich von *G. verna*, der sie sehr ähnlich ist, nicht allein dch die kurzen, sondern auch ziemlich dicken, fast fleischigen und weichen B.

17. *G. VERNA* (L.) Frühlings-E. — *Die St. rasig, 1bth.*; Blkr. im Schlunde nackt, Röhre walzlich; *Kanten des K. schmal-geflügelt, Flügel gleich*; B. elliptisch oder lanzettl., spitz, nach der Basis schmaler, *die wurzelst. rosettig*; Gf. ungeth.; N. halbkreisrund. 4. Auf AWiesen bis zum ewigen Schnee; in die VorA. und die die A. begleitenden Ebenen herabsteigend, (dch die g. AK. und auf den niedrigern Bergen und dch die Flächen von Oberbad., Würtemb. und Baiern bis nach Oestr.; in Franken, selten auf den Sudeten und d. Böhm. Gebirg.) Mai. Jun., auf den A. später. St. h. 40. Rb. ic. 9. f. 1116. Bth. azurblau.

18. *G. AESTIVA* (Roem. et Schult.) Flügelkantiger E. — *Die St. rasig, 1bth.*; Blkr. im Schlunde nackt, Röhre walzlich; *Kanten des K. geflügelt, Flügel in der Mitte breiter*; B. elliptisch oder lanzettl., spitz, nach der Basis schmaler, *die wurzelst. rosettig*; Gf. ungeth.; N. halbkreisrund. 4. Auf AWiesen; in die an den südl. Abhängen gelegenen Ebenen herabsteigend, (Kärnth., Krain bis in die Berge des Karsches; VorA. in Südtirol, Sulzbacher Gebirge in Steyeru.) Mai. Jun. St. h. 54. *G. angulosa* MBieb. Rb. ic. 2. f. 246. 247. und 9. f. 1116-1118. *G. verna* β. *angulosa* Wahlenb. carp. D. fl. 2. p. 342. *G. utriculosa* Wahlenb. helv. *Hippion aestivum* Smidh. Roem. arch. t. 3. f. 8. — Bth. meist noch einmal so gross, als bei der vorhergehenden. Ich trage die *G. aestiva* als eigne Art vor, da sie von vielen sehr genauen Botanikern getrennt wird, fürchte aber doch, dass sie in *G. verna* übergeht; wenigstens muss man an der lebenden Pflanze bessere Unterscheidungsmerkmale ansuchen. — Nach Facchini's Beobachtungen, die derselbe wiederholt angestellt, geht sie dch Zwischenformen in die *G. verna* über; aber nach Hoppe wächst *G. aestiva* auf Felsen, während *G. verna* in Sümpfen und feuchten O. vorkommt.

19. *G. IMBRICATA* (Froel.) Ziegelblättriger E. — *Die St. rasig, 1bth.*; Blkr. im Schlunde nackt, Röhre walzlich; B. *lanzettl. elliptisch, spitz*, an der Basis verschmälert, am Rande rauh, *sämmtl. dachig*; Gf. ungeth.; N. halbkreisrund. 4. Auf den höchsten AJochen in Tyrol und Krain. (auf der Kirschbaumer Alpe in Tyrol und auf vielen A. in Südtirol, auf dem Kren und Manhart in den Jul. A.; Krainer A.) Jul. Aug. St. h. 41. *G. verna* γ. *imbricata* D. fl. 2. 342. D.

20. *G. PUMILA* (Jacq.) Zwerg-E. — *Die St. rasig, 1bth.*; Blkr. im Schlunde nackt, Röhre walzlich; B. *lineal., an der Basis kaum schmaler*, die untern gedrunken; Gf. ungeth.; N. halbkreisrund. 4. Auf den höchsten AJochen, (Krain, Steyeru., Oestr.) Jul. Aug. J. a. t. 302. D.

b. W. einfach. St. ästig; unfruchtbare Blätterbüschel fehlend.

21. *G. PROSTRATA* (Haenke bei Jacq.) Liegender E. — *Der St. an der Basis ästig*; W. einfach; Schlund der Blkr. nackt; Röhre walzlich; *Anhängsel halb so lang, als die Zpfl des Saumes*; B. verkehrteyf., stumpf; N. stumpf; Gf. 2th., zurückgerollt. ☉. Auf den höchsten A. bis an die Gletscher, (auf den A. Kartal und Frosnitz in Salzbg.; auf den Heiligenbluter Tauern und dem Pasterze in Kärnth.; auf dem todten Gebirge bei Aussee in Steyerm.; Tyrol auf der Hochebene des Schlehorn, westlich von der Kapelle aus.) Jul. Aug. Bth. hellblau. St. 1-2 Zoll lang. K. und Blkr. oft 4sp. D.

22. *G. UTRICULOSA* (L.) Bauchiger E. — *Der St. von der Basis an ästig*; W. einfach; Schlund der Blkr. nackt; B. eyf. oder länglich, stumpf, die wurzelst. rosettig; K. *aufgeblasen, geflügelt-kantig, länglich-oval*; Gf. verlängert, 2 sp.; N. halbkreisrund. ☉. Auf feuchten Triften der A. und VorA.; in die Ebenen herabsteigend, (auf den Flächen in Oberelsass, Oberbad., Oberbayern, auch auf der Rheinfläche zw Dürkheim und Mannheim.) Jun.-Aug. St. h. 30. Bth. brennend blau.

23. *G. NIVALIS* (L.) Schnee-E. — *Der St. von der Basis an ästig*; W. einfach; Schlund der Blkr. nackt; B. eyf. oder länglich, die wurzelst. rosettig; K. *walzlich, kielig-kantig*; Gf. ziemlich kurz, 2sp.; N. halbkreisrund. ☉. Auf den höchsten A., (dch die g. AK.; im südl. Tyrol hinabsteigend bis in die Region des Ackerbaues.) Jul. Aug. St. h. 22. Bth. sehr schön blau. — Auf den höchsten A. am ewigen Schnee, oft zwergig und 1blüthig.

III. Rotte. *ENDOTRICHIA* Froel. gent. 86. Schlund der Blkr. inwendig bärtig; an der Basis der einzelnen Zpfl ist nämlich eine 2sp. und zugleich haarfein-vielsp. Schuppe gelegen.

a K. röhrig, 4 5zählig. St. aufrecht, traubig oder rispig.

24. *G. CAMPESTRIS* (L.) Feld-E. — *Blkr. 4 sp., im Schlunde bärtig*; KZähne ungleich, die 2 äussern *breit-elliptisch*; B. ey-lanzettf., spitz, die wurzelst. verkehrteyf., gestielt; Kapsel fast sitzend. ☉. An sonnigen O. der A. und VorA.; auch auf Gebirgen und den Ebenen der nördl. Gegenden, (dch die g. AK.; in Mähr., Schles., Böhm. und dch das g. nördl. D. vom Harze an.) Jun.-Aug. Fl. dan. t. 387. Bth. sattviolett. Die Kapsel ganz kurzgestielt, so dass das Stielchen kaum den sechsten Theil so lang ist, als die Kapsel. Var. B. breiter, die untern stumpfer; *G. chlorae-folia* N. von Esenb.

25. *G. GERMANICA* (Willd.) Deutscher E. — *Blkr. 5 sp., im Schlunde bärtig*; K. *5zählig*, Zähne lineal-lanzettl., fast gleich; B. sitzend, *eyf.*, aus breiterer Basis verschmälert, *spitz*, die wurzelst. verkehrteyf., gestielt; Kapsel fast sitzend. ☉. Auf Wiesen und an waldigen, feuchten O. Aug. Sept. G. Amarella Pollich und der meist. deutsch. Aut. St. h. 23. — Sehr niedrige, 1bth. Explare sind; *G. uniflora* Willd. Hippion Gentianella Schmidt.

Roem. arch 1. p. 13. t. 3. f. 4. Die Kapsel wie bei der vorigen ganz kurz-gestielt.

26. *G. AMARELLA* (L.) Bittner E. — *Blkr.* 5sp., *im Schlunde bärtig*; *K.* 5zählig, Zähne lineal.-lanzettl., fast gleich; *B.* sitzend, *aus breiterer Basis lanzettl. oder lineal.-lanzettl., spitz*, die wurzelst. verkehrteyf., gestielt; die Kapsel lang gestielt, mit einem Stielchen, welches den dritten Theil der Kapsel misst. ☉. Auf Wiesen und feuchten Triften, (im nördl. D. gemein, sodann in Sachs., Böhm. und Schles.) Aug. Sept. Der vorhergehenden sehr ähnlich, aber die Bth. nur halb so gross und die B. halb so breit. Fast traubige Expl. mit kurzen Bthstielen, so dass die Bth. die Länge der Stengelglieder nicht erreichen: *G. Amarella* Willd., *G. axillaris* Rb. ic. 2. f. 250., *Hippion axillare* Schmidt; Expl. mit schlankern Bthstielen, die mit den Bth. länger, als die Stengelglieder sind; *G. uliginosa* Willd. Rb. ic. 1. f. 118. 119.; niedrige, sehr ästige Expl.: *G. obtusifolia* Rb. ic. 2. f. 249. Das Stielchen hat von dem Fruchtb. bis zu den Samen den dritten Theil der Länge der Kapsel.

27. *G. OBTUSIFOLIA* (Willd.) Stumpfbblätteriger E — *Blkr.* 5sp., *im Schlunde bärtig*; *K.* 5zählig, Zähne lineal.-lanzettl., fast gleich; *B.* sitzend, *länglich, stumpf*, die wurzelst. verkehrteyf., die obersten ey-lanzettl., spitz. ☉. Auf Triften der A. und VorA. und höhern Gebirge. Jul. Aug. *G. pyramidalis* Nees von Esenb., St. h. 54., (ein von der Basis an pyramidenf.-ästiges Expl.) *G. obtusifolia* St. a. a O. *G. spathulata* Bartl. bei Rb. ic. 1. f. 195-197. *G. montana* N. von Esenb. *Hippion obtusifolium* Schmidt. Var.:

β. *calycina*, Zpfl des K. sehr breit-eyf., in eine lanzettl. Spitze endigend. Diese im südl. Tyrol. Facchini.

b. K. 4-5th., an der Blkr. nicht anliegend. Der St. nur an der Basis ästig und beblättert; Aeste in die nackten, meist verlängerten Bthstiele verlaufend.

28. *G. TENELLA* (Rottboel. act. Hafn. 10. t. 2. f. 6.) Zarter E. — *Blkr.* 4sp., röhrig-glockig, *im Schlunde bärtig*, *K.* 4th., Zpfl ey-lanzettl., fast gleich; *B.* elliptisch-länglich, ziemlich spitz; St. an der Basis ästig, und beblättert; Bthstiele verlängert, nackt. ☉. Auf den höchsten A., oft in der Nähe der Gletscher, (auf der südl. AK. der Schw.; Tyrol, Salzbg. Kärnth.) Aug. Sept. St. h. 54. *G. glacialis* Abr. Thomas in Vill. delph., Koch Synops. ed. 1. *G. tetragona* Roth. *G. Koenigii* Gunn. *Hippion longepedunculatum* Schm. Röm. arch. 1. 21. t. 3. f. 5., gut.

29. *G. NANA* (Wulf in Jacq. misc. t. 18. f. 3.) Kleinster E. — *Blkr.* 4-5 sp., röhrig-glockig, *im Schlunde bärtig*; *K.* 4-5th., Zpfl eyf., fast gleich; *B.* verkehrteyf., abgerundet-stumpf; St. ästig, Aeste aufstrebend. ☉. Auf den höchsten Salz- und Kärnth. A. bis zum ewigen Schnee, (auf den Heiligenbluter und Nassfelder Tauern und der Gamsgrube bei Heiligenblut, südl. Abhang des Glockners, höchste Möllthaler A.) Aug. Sept. St. h. 22.,

nicht gut. *Hippion nanum* Schum. Röm. arch. I. t. 4. f. 10., sehr gut. D.

IV. Rotte. *CROSSOPETALUM* Froel. Blkr.Zpfl gefranst; Schlund nackt.

30. *G. CILIATA* (L.) Gefranster E. — Bth. endst.; Blkr. 4 sp., im Schlunde nackt, Zpfl gesägt, in der Mitte *eingeschnitten-gefranst*; B. lineal-lanzettl.; St. schlängelig, kantig. ☉. Auf rauhen Gebirgen, an etwas feuchten O. Aug. Sept. St. h. 23. Bth. blau.

7. *CICENDIA* (Adanson.) Bitterblatt. — K. röhrig, 4zählig oder 4 th. Stbgf. 4. Gf. I N. kopfig. Unterweibige Scheibe fehlend. Kapsel 1fächerig oder halb-2fächerig.

1. *C. FILIFORMIS* (L.) Fädliches B. — *Der St. von der Basis an ästig*; Bthstiele verlängert, nackt; W. einfach; Schlund der Blkr. nackt; B. lanzettl.; K. *kurz-glockig, 4zählig*; Gf. *ungeth.*; N. kopfig, 2lappig. ☉. Auf feuchten Sandtriften, (bei Birkenfeld an der Nahe und vom Niederrheine dch Westphal., Hannov., Holstein nach Mecklenb.; um Hanau in der Wetterau; Istrien auf dem südl. Vorgebirge.) Jul. Aug., in Istrien Mai. *Gentiana filiformis* L. spec. Koch Synops. ed. I. *Exacum filiforme* Willd. D. fl. I. p. 799. Vaill. bot. par. t. 6. f. 3. Bth. gelb. Anhängsel zw. den Blkr.Zpfln fehlend.

8. *ERYTHRAEA* (Ren. Richard bei Pers.) Tausendgüldenkraut. — K. 5 sp. Blkr. trichterf.; Saum 5 sp. Stbk. nach dem Verblühen schraubenf.-zsgedreht. Kapsel von den eingebogenen Klappenrändern 2fächerig.

1. *E. CENTAURIUM* (Pers.) Gemeines T. — *Der St. einfach, 4kantig*; B. *oval-länglich*, meist 5nervig; *Ebenstrauss* endst., gebüschelt, nach dem Verblühen ziemlich locker, *immer gleichhoch*; Blkr.Zpfl oval; Narben rundlich, 3-4mal kürzer, als der an der Spitze 2sp. Gf. ☉. Auf Triften und an lichten, etwas feuchten O. in Wäldern. *Gentiana Centaurium* L. *Chironia Centaurium* Schmidt. St. h. 12. Bth. schön fleischroth. Var.:

β. *capitata*, Ebenstrauss auch nach der Bthzeit sehr gedrun-gen und nicht verlängert; *E. capitata* Röm. und Sch. In Westphalen und Brandenburg.

Die *E. grandiflora* finde ich, nach wiederholter Untersuchung, wenigstens nach den von Presl in Sicilien gesammelten Expl. von *E. Centaurium* kein Merkmal verschieden.

2. *E. LINARIAEFOLIA* (*Gentiana* Lam. dict. 5. 611. *Erythraea linarifolia* Pers.) Leinkrautblättriges T. — *Der St. 4kantig*; B. *lineal.* oder lineal.-länglich, meist 3-nervig; *Ebenstrauss* zuerst gleichhoch, später *in aufrechte, rispig-verlängerte Aeste, mit entfernt gestellten Bth., sich entwickelnd*; Blkr.Zpfl oval; Narben rundlich, viermal kürzer, als der an der Spitze 2sp. Gf. ☉. Auf sandigen und salzhaltigen Triften, (an der Küste der Nord- und Ostsee; an salzhaltigen O. in der Mark Brandenburg und in Thü-

ring) Jul. Aug. D. fl. 2. 235. (mit Ausschl. der Syn. der *E. conferta*.) Rb. ic f. 185-189. *E. littoralis* Fries. *E. compressa* Hayn. bei Kunth. *E. angustifolia* Wallr. Von Lamarck entnahm Persoon seine Art, indem er den Namen, wahrscheinlich dch einen Schreibfehler, in *E. linearifolia* umänderte. *Chironia uliginosa* WK. Bth. fleischroth. D.

3 *E. PULCHELLA* (Fries.) Niedliches T. — Der St. scharf-4kantig, sehr ästig und *in absteigende Aeste sich auflösend*; B. eyf., 5nervig; Bth. blattwinkelst., *gestielt*; Blkr.Zpfl lanzettl.; Narben rundl., viermal kürzer, als der an seiner Spitze 2sp. Gf. ☉. Auf Triften und unfruchtbaren, etwas feuchten Wiesen. Jul. Aug. *E. inaperta* Schlechtend. Fl. berol. *E. ramosissima* Pers., mit Ausschl. der Var. β . *Chironia Gerardi* Schmidt. *Gentiana Centaurium* β . L. Verkümmerte Expl. mit einem l- oder armblüthigen, einfachen St.: *Chironia Vaillantii* Schm. *C. inaperta* Willd., mit Ausschl. der Syn. Vaill. *Gentiana pulchella* Swartz. act. holm. 1783. t. 3. f. 8. 9. Bth. fleischfarben.

4. *E. MARITIMA* (Pers. Syn. 1. 283.) Meer-T. — Der St. 4kantig, oberwärts ästig; B. eyf.; die achselst. Bth. gestielt oder sitzend; Zpfl der Blkr. eyf., spitzlich; *N. länglich, länger als der Gf.* ☉. Auf Wiesen, (Istrien in dem Valle Bendon zwischen Fasana und Pola; Insel Lossino.) Jun. *Gentiana maritima* L. mant. *Chironia lutea* Bert. amoen. it. *Chir. maritima* Bert. fl. it. J.

5. *E. SPICATA* (Pers.) Aehriges T. — Der St. 4kantig; *Aeste* einfach; die seitenst. Bth. *verlängert-ährig*; B. länglich, meist 5nervig; Blkr.Zpfl lanzettl.; Narben rundl., viermal kürzer, als der an der Spitze 2sp. Gf. ☉. An morastigen und sumpfigen O. am Adriat. Meere, (bei Triest und Aquileja.) Jul. Aug. *Gentiana spicata* L. Bth. rosenfarb. D.

LXXVIII. Ordng. POLEMONIACEEN. Lindl. syn. 168. Polemonideae Dub. bot. gall. p. 329.

K. 1blättrig, gespalten, bleibend. *Blkr. 1blättrig, unterweitig*, regelmässig oder ein wenig ungleich, 5sp., in der Knospenlage dachig. *Stbg. 5, der Blkr.Röhre eingefügt*, mit deren Zpfln abwechselnd. *Fruchtkn. frei, 3fächerig, wenig oder vieleigig*; Samenträger mittelpunktst.; Eychen aufstrebend oder schildf. Gf. l. N. 3sp. Kapsel 3klappig; Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend, oder mit einer hervortretenden Rippe versehen; Achse mittelpunktst., 3kantig, mit ihren Kanten an die Klappenscheidewände oder Rippen angelehnt. Keim gerade, in dem hornartigen Eyweisse; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

1. **POLEMONIUM** (L.) Sperrkraut. — K. sp. Blkr. radf., mit 5klappigem Saume; Schlund dch die an der Basis verbreiterten Stbg. geschlossen. Stbk. aufliegend.

1. *P. CAERULEUM* (L.) Blaues S. — Kahl oder zerstreut-behaart, oberwärts drüsig-flaumig; der St. kahl, beblättert; B. gefiedert, Fieder ey-lanzettf., zugespitzt, kahl; R. drüsig-behaart; Zpfl. des 5sp. K. ey-lanzettf., zugespitzt; Bth. aufrecht. 4. An sumptigen Wiesen und an kräuterreichen, feuchten O. in Wäldern und auf den VorA., (in Steyer., Krain, der Schw., Tyrol, Würtemb., Oberbayern, Unterharz, Preussen hin und wieder.) Jun. Jul. St. h. 27. Bth. blau, seltner weiss.

LXXIX. Ordng. CONVOLVULACEEN. Juss. gen. p. 132.

K. 5sp., bleibend. *Blkr.* 1blüttrig, unterweibig, regelmässig, abfällig; Saum 5lappig, meist der Länge nach gefaltet. *Stbg.* 5, in dem Grunde der Blkr. eingefügt, mit den Lappen abwechselnd. *Fruchtkn.* frei, auf einer unterweibigen Scheibe sitzend, 2-4fächerig, selten fast 1fächerig; *Eychen* von bestimmter Zahl aufrecht. Gf. 1., bisweilen getheilt. Kapsel 2, 3, 4klappig; mit vom Rande der Scheidewände sich ablösenden Klappen aufspringend, oder quer- oder nicht aufspringend. Samen auf der Basis der mittelpunktst. Kanten angeheftet; Scheidewände unvollständig, nur den Grund des Fruchtkn. einnehmend; Eyweiss spärlich, schleimig. Keim gekrümmt, Keimb. zsgefaltet, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet oder fehlend. Pfl., die oft windend und milchend sind, mit wechselst., nebenblattlosen B., die bei den Cuscutinen fehlen.

1. Gruppe. **ECHE CONVOLVULACEEN.** Link. handb. 1. 589. Mit B. und Keimb. begabt.

1. *CONVOLVULUS* (L.) Winde. — Blkr. trichterf.-glockig, eckig-5lappig, 5faltig. Gf. ungeth.; N. 2. Kapsel 2-4fächerig; Fächer 2samig.

§. 1. Bth. an der Basis mit 2 verbreiterten DeckB. umgeben. *Calystegia* R. Brown.

1. *C. SEPIUM* (L.) Zaun-W. — B. pfeilf., mit abgeschnittenen, oft gezähnten Oehrchen; K. von herzf. DeckB. eingeschlossen; Bthstiele 4kantig, 1bth., länger, als der Bstiel. 4. An Zäunen und in Gebüschen. Jul.-Herbst. St. h. 1. Bth. weiss. — Der *C. sylvestris* Willd. n. h. berol. *C. sylvaticus* W. Kit. pl. rar. hung. 3. t. 261., um Triest nicht selten vorkommend, blieb mir bis jetzt noch eine zweifelhafte Art, denn ausser der etwas bemerklichen Grösse sämtlicher Theile, vermochte ich, wenigstens an getrockneten Expl., noch kein stichhaltiges Unterscheidungszeichen aufzufinden.

2. *C. SOLDANELLA* (L.) Meerstrands-W. — B. nierenf.; K. mit eyf., stumpfen DeckB. gestützt; Bthstiele geflügelk.-kantig, 1bth. 4. Am sandigen Meeres-Strande, (bei Aquileja, Insel St. Andrea bei Istrien, „auf der Oldenb. Insel Wangeroog“ früherhin

vom verstorbenen Möhring gesammelt, dessen Exemplare ich besitze, im J. 1821 von H. D. Kellner“ Meyer chlor. hanov. p. 263.) Juli. Aug. Bth. weiss. D.

§. 2. Die DeckB. von der Bth. entfernt; der St. sich windend.

3. *C. ARVENSIS* (L.) Acker-W. — *B. pfeilf.*, mit spitzen Oehrchen; Bthstiele meist 1 bth.; *die DeckB. von der Bth. entfernt.* 4. An kultiv. O., auf Rainen, im Flusskiese. Juni. Juli. Fl. d. t. 459. Bth. rosenroth oder weiss, auswendig mit 3 rothen Streifen. Var.:

β. *hirtus*, kurz. h.: *C. villosus* Lej. Var. ausserdem mit eyf., länglichen und lineal. B., spitzen und stumpfen Oehrchen.

4. *C. TENUISSIMUS* (Sibth. und Smith fl. graec. prodr. I. S. 134.) Ganz zarte W. — *B. herzf.* und nebst dem St. *silberfarben-seidig*, die untern ungeth., die obern fussf.-geth., Zpfl lineal., ganzrandig; Bthstiele 1-2 bth. 4. An unfrucht. O., (Istrien, Cherso.) Juni. Juli. *C. althaeoides* Mert. und K. D. fl., K. Synops. ed. I. *C. althaeoides* var. β. L. spec. Clus. hist. 2. p. 49., die untere Fig. *C. argyrea* DC. Bth. rosenroth.

§. 3. Die DeckB. von der Bth. entfernt; der St. sich nicht windend.

5. *C. CANTABRICA* (L.) Cantabrische W. — *B. lineal-lanzettl.*, spitz; die St. ästig, gestreckt; K. behaart; Bthstiele meist 1 bth. 4. An unkultiv., rauhen, sonnigen O., (im südwestl. Tyrol bei Arco sparsam, Facch., Unteröstr.; bei Triest, Inseln von Istrien.) Juni. Juli. J a. t. 296.

II. Gruppe. *CUSCUTINEN*. Link. handb. I. p. 594. B. fehlend. Keim schraubenf., ohne Keimb.

2. *CUSCUTA* (L.) Flachsseide. — K. 4-5sp. Blkr. glockig oder krngf., 4-5sp. Gf. 2 oder 1. Kapsel rundum aufspringend. — Alle Arten unserer Flora haben in der Blkr. Röhre unterhalb der Stbg. Schuppen. Pfl mit fadenf., blattlosen St., der andere Pflanzen schmarotzend überzieht und sodann an seiner Basis über der Erde abstirbt.

1. *C. EUROPAEA* (L., mit Ausschl. der Var. β.) Gemeine F. — Der St. ästig; *Blkr.Röhre* walzlich, *so lang, als der Saum, mit aufrechten, an die Röhre angedrückten Schuppen*; N. fädlich. ☉ Auf der *Urtica dioica*, Hopfen, Hanf und Weiden schmarotzend. Juli. Aug. *C. major* DC. *C. vulgaris* Pers. *C. tubulosa* Presl. St. h. 10. Bth. blass purpurn.

2. *C. EPITHYMUM* (L.) Thymseide. — Der St. ästig; *Blkr.Röhre* walzlich, *so lang, als der Saum, doch gegen einander neigende Schuppen geschlossen*; N. fädlich. ☉. Auf Haiden und an waldigen O. auf Haide, Ginster, Quendel schmarotzend. Juli. Aug.

C. europaea γ. *Epithymum* L. *C. minor* DC. Bth. halb so gross, als bei der vorhergehenden. Bth. bläss purpurn.

3. *C. PLANIFLORA* (Tenore.) Flachblumige F. — Der St. ästig; Blkr. Röhre kurglockig; Saum 2mal so lang, als die Röhre, Schuppen . . .; N. fädlich. ☉. An gebirgigen O. des südl. Tyrol, (bei Botzen, mein Expl. auf *Colutea arborescens*.) Jul. Aug. Untersech. sich von der vorhergehenden leicht dch die bis über die Mitte 5 sp., fast 5 th. Blkr. Bth. weiss. D.

4. *C. EPILINUM* (Weibe.) Leinseide. — Der St. sehr einfach; Blkr. Röhre fast kugelig, 2mal so lang, als der Saum; Schuppen der Röhre aufrecht, an die Röhre angedrückt. ☉. Unter dem Lein, den er oft zerstört, (fast in allen Provinzen.) Juli. Aug. *C. major* Koch und Ziz. *C. vulgaris* Presl. Bth. weiss.

5. *HASSIACA* (Pfeiffer hall. bot. Ztg. 1843 S. 705) Hessische L. — Der St. ästig; Bth. büschelig, gestielt; Röhre der Blkr. glockig, so lang als der Saum, mit zneigenden Schuppen geschlossen; Saum 5 sp. mit abstehenden, an der Spitze hornf. einwärts-gebogenen Zpfn; Gf. 2; N. kopfig. ☉. An *Anthemis* *Colula*, *Sonchus asper*, *Galium verum*, *Medicago sativa* und anderen Pfl. schmarotzend, (bei Cassel in Hessen, Pfeiffer, und bei Weilmünster im Nassanischen, Fr. Rudol.) Aug. Sept. Bth. weiss, Stbk. gelb. St. hell-pomeranzenfarb. D.

5. *C. MONOGYNA* (Vahl.) Einweibige F. — Der St. ästig; Bth. einweibig, ährig, dch ein DeckB. gestützt, zuletzt gestielt; Blkr. Röhre walzlich, 2mal so lang, als der Saum, Schuppen aufrecht, an die Röhre angedrückt. ☉. In Hecken, besonders in Weidengebüsch, schmarotzend, (Schles. u. Böhm. u. Trittau im Lauenburg., nach Sonder.) Juli. Aug. *C. lupuliformis* Krock. sil. p. 261. t. 6. Bth. rosenfarb. D.

LXXX. Ordng. BORAGINEEN. Desv. Juss. gen. p. 128.

K. geth. oder gezähnt, bleibend. Blkr. 1blättrig, unterweibig, 5 sp., regelmässig oder ungleich. Stbg. 5, der Blkr. eingefügt und mit deren Zpfn abwechselnd. Fruchtkn. 4, frei, auf die unterweibige Scheibe gestellt, 1eyig, oder 2 und 2fächerig mit 1eyigen Fächern: Eychen hängend; oder auch ein einziger Fruchtkn., der aber bei der Reife in 4 Nüsse zerfällt. Gf. 1, in der Mitte der Fruchtkn. Nüsse 4 oder 2, von dem K. eingeschlossen. Keim eyweisslos, gerade; Würzelchen oberst. KeimB. blattig. B. wechselst., nebenblattlos.

1. Gruppe. *HELIOTROPEEN*. Fruchtkn. 1. mit 4 Näthen, an der Spitze den gemeinsamen Gf. tragend, bei der Reife sich in 4, an der Basis flache, Nüsse spaltend.

1. **HELIOTROPIUM** (L.) Sonnenwende. — Nüsse 4, mit den Rändern zshängend, vor der Reife eine einzelne Frucht bildend. Blkr. trichterf.; Saum faltig; Schlund ohne Deckklappen. Gf. einfach.

1. **H. EUROPAEUM** (L.) Europäische S. — Der St. aufrecht, ausgebreitet, krautig; B. eyf., ganzrandig, flach, gerade-aderig, filzig-rah; Aehren seitenständig und meist einzeln und endständig und gezweiet; Fruchtkelche sternf.-abstehend. ☉. Auf kultiv. O., vorzügl. in Weinbergen, (C. Wallis, Genf, von Basel dch Elsass stw. bis an die Mosel, dch Baden, einen Theil von Würtemb. bis Frankfurt, südl. Krain, Oestr. und Mähr.) Juli, Aug. J. a. t. 207. Bth. weiss oder hellviolett.

II. Gruppe. **CYNOGLOSSEEN**. Nüsse 4, an den bleibenden Gf. angeheftet.

2. **ASPERUGO** (L.) Scharfkraut. — Nüsse 4, zsgedrückt, mit der schmälern Seite an den Gf. angewachsen. Fruchtkelch zsgedrückt, aus 2 flachen, gleichlaufenden, huchtigen Platten gebildet.

1. **A. PROCUMBENS** (L.) Gestrecktes S. — ☉. An kultiv. O., Wegen, auf Schutthaufen, (zerstreut dch d. g. Gebiet.) Mai, Juni. Schk. t. 31. Bth. purpurn-bläulich.

3. **ECHINOSPERMUM** (Swartz.) Igelsame. Nüsse 4, 3kantig, am Rande weichstachelig, mit der Rückenante an den Gf. angewachsen. — Bth. blau.

1. **E. LAPPULA** (Lehm.) Klettenartiger I. — Der St. oberwärts ästig; B. lanzettl., angedrückt-haarig, gewimpert; Blkr. länger, als der K.; *Bthstiele auch nach dem Verblühen aufrecht*; Nüsse am Rande mit 2 Reihen widerhakiger Stacheln, auf dem Mittelfelde und den Seiten mit Knötchen besetzt. ☉. Auf trocken, unkultiv. Hügeln der Ebenen und niedrigeren Gebirge. Juli, Aug. St. h. 43. *Myosotis Lappula* L. *Rochelia Lappula* R. und S. *Cynoglossum Lappula* Scop. *Lappula Myosotis* Moench. Var. mehr oder weniger rauh. und so wie viele andere Boragineen mit einer Blkr.Röhre, die von der Länge des K. und kürzer ist; zur letztern Variet.: *E. squarrosum* Rb. bei St. h. 43., nicht MBieb. Bth. blau.

2. **E. DEFLEXUM** (Lehm.) Herabgebogener I. — Der St. rispig-ästig; B. lanzettl., abstehend behaart; *Bthstiele nach dem Verblühen zurückgebogen*; Nüsse am Rande mit 1 Reihe widerhakiger Stacheln. ☉. An steinig, schattigen O. der höheren Gebirge, (in einer Gebirgsschlucht bei Birkenfeld an der Nahe, auf dem Harze, den Sud., Böhm. und Mähr. und Oestr. Gebirgen; südl. Tyrol, im Nicolaithale des Wallis, im Thale der Hinterrhodes.) Mai, Juni. St. h. 43. *Lithospermum deflexum* Lehm. *Rochelia deflexa* R. und S. *Myosotis deflexa* Wahlenb. Bth. blau.

4. **CYNOGLOSSUM** (L., mit Ausschl. von Arten.) Hunds-
zunge. — Nüsse 4, plattgedrückt, weichstachelig, am Rande stumpf
oder mit einem eignen hervortretenden Rande umgeben, mit dem
Rücken an den Gf. angewachsen.

1. **C. OFFICINALE** (L.) Gebräuchliche H. — Der St. aufrecht; *B. von feinem, weichem Filze graulich*, spitz, die untern elliptisch, in den Bstiel vorgezogen, die obern aus fast herzf., halbstengelumfassender Basis lanzettl.; Tr. deckblattlos; Stbg. eingeschlossen; *Nüsse vorne flach, mit einem ziemlich dicken, hervortretenden Rande umgeben.* ☉. Auf unkultiv., steinig. Hügeln, an Wegen, Zäunen. Mai-Juli. St. h. 9. Bth. roth-violett. Var. mit weissen Bth., deren Deckklappen purpurn sind: *C. bicolor* Willd.

2. **C. PICTUM** (Aiton.) Geäderte H. — Der St. aufrecht; *B. von feinem, weichem Filze graulich*, spitz, die untern länglich, in den Bstiel verschmälert, die obern aus fast herzf., halbstengelumfassender Basis lanzettl.; Tr. deckblattlos; Stbg. eingeschlossen; *Nüsse vorne ziemlich konvex, ohne vortretenden Rand.* ☉. An unkultiv., rauhen O. Wegen, (Triest; Istrien; südl. Tyrol.) Mai. Juni. *C. cheirifolium* Scop. *C. creticum* Vill. Bth. hellblau, mit purpurnen Adern, Deckklappen blutroth. D.

3. **C. MONTANUM** (Lam.) Bergwald-H. — Der St. aufrecht; *B. zerstreut-behaart, spitz, oberseits fast kahl, glänzend*, unterseits etwas rauh, die untern elliptisch, in den Bstiel vorgezogen, die mittleren an der Basis verschmälert, beinahe spatelig, die obern aus fast herzf., halbstengelumfassender Basis länglich; Tr. deckblattlos; Stbg. eingeschlossen. ☉. In Gebirgswäldern. (Schw. an mehreren O., Unteröstr. und Mähr.; um Hessenkassel; Harz; um Hannov.; Halle; Vogesen; Donnersberg in der Rheinpfalz, in Würtemb. und Baden.) Juni. Juli. *C. sylvaticum* Haenke in J. collect. *C. officinale* γ. L., nach Smith. *C. Dioscoridis* Vill.

5. **OMPHALODES** (Tournef. Lehm.) Omphalode. — Nüsse 4, plattgedrückt, mit einem häutigen, oberwärts zugezogenen und eingebogenen Rande umgeben, napff., mit dem Rücken an den Gf. angewachsen.

1. **O. VERNA** (Moench.) Frühlings-O. — *B. gestielt, fast kahl, die wurzelst. herz-eyf.*, die obern stengelst. ey-lanzettf.; Tr. zweif. armblüthig. 4. In schattigen Wäldern, (in Krain, Untersteyern. und bei Salz.) Apr. Mai. *O. repens* Schrank. *Cynoglossum Omphalodes* L. St. h. 21. *Picotia verna* R. und S. Bth. azurblau. D.

2. **O. SCORPIOIDES** (Lehm.) Vergissmeinnichtartige O. — Der St. niederliegend, oberwärts gabelsp.; *B. rauh, die wurzelst. spatelig, die stengelst. lanzettl.*, sitzend, die untern gegenst., die obern wechselst.; Bthstiele blattwinkelst. ☉. In Hainen, schattigen, feuchten Gebüsch, (Schles., Mähr., Böhm. bis Dresden; Blankenburg am Harz, in Franken bei Schweinfurt, Steyern.)

Apr. Mai. *Cynoglossum scorpioides* Haenke in J. collect. St. h. 21. Bth. blau. D.

III. Gruppe. *ANCHUSEEN*. Nüsse 4, der unterweibigen Scheibe eingefügt, an der Basis mit einem gedunsenen, gerieften Ringe versehen, und innerhalb des Ringes ausgehöhlt. Gf. frei.

6. *BORÁGO* (L.) Borretsche. — Nüsse 4, frei, an der Basis ausgehöhlt, und daselbst mit einem gedunsenen, faltig-gerieften Rande umgeben. Blkr. radf., Deckklappen kurz, stumpf, ausgerandet. Stbf. 2 sp., der innere Schenkel das Stbk. tragend.

1. *B. OFFICINALIS* (L.) Gebräuchliche B. — Die untern B. elliptisch, stumpf, nach der Basis verschmälert; Zpfl des Sammes eyf., zugespitzt, flach. ☉. Wird in Gärten kultiv. und kommt daselbst, und auch auf Schutthaufen und Gartenauswürfen verwildert vor. Juni. Juli. St. h. S. Bth. blau.

7. *ANCHUSA* (L.) Ochsenzunge. — Nüsse 4, frei, an der Basis ausgehöhlt und daselbst mit einem gedunsenen, faltig-gerieften Ringe umgeben. Blkr. trichterf., Röhre gerade, Schlund dch stumpfe Deckklappen geschlossen.

1. *A. OFFICINALIS* (L.) Gebräuchliche O. — B. lanzettl., steifh.; DeckB. ey-lanzettf.; K. 5sp., Zpfl ziemlich spitz; Haare der Rispenäste und des K. etwas abstehend; Deckklappen eyf., sammtig. ☉, manchmal 4. An unkultiv., steinigem O., Wegen, Mauern. Mai-Herbst. St. h. 18. *A. angustifolia* DC. *A. officinalis* Rb. ic. 3. f. 479., eine Form mit gedrunghenen Aehren und nach der Bthezeit zsnzeigenden KZähnen. *A. arvalis* Rb. ic. 3. f. 470., eine Form mit lockeren Aehren und nach der Bthezeit aufrechten KZähnen. *A. officinalis* und *A. angustifolia* Pollich, Gmel. u. aller deutschen Aut. *A. officinalis* und *A. arvensis* Tausch. Var. mehr oder weniger steifh., B. breiter oder schmaler; Aehren gedrunghener oder lockerer; K. kann bis zur Mitte gesp. oder vorzügl. bei der Fruchtreife fast 5th.; KZähne nach der Bthezeit aufrecht oder zsschliessend, Farbe der vollkommen-entwickelten Bth. violett, violett mit einem azurblauen Streifen oder ganz azurblau, seltner auch fleischroth oder weiss, aber zwischen allen diesen Variet. sind keine Grenzen zu finden.

2. *A. LEPTOPHYLLA* (R. et S.) Schmalblättrige O. — B. lanzettl., steifh.; DeckB. ey-lanzettf.; K. 5sp.; Zpfl sehr stumpf; Haare der Rispenäste und des K. anliegend; Deckklappen eyf., sammtig. ☉. An unkultiv. O. Tyrols u. der südl. Schw. Juli. Aug. *A. angustifolia* Lehmann. — Ist der *A. officinalis* allerdings sehr ähnlich, scheint aber doch eine gute Art zu sein. B. im Vergleich zur Breite länger, von der Mitte nach der Spitze verschmälert und langgespitzt; R. an der getrockneten Pflanze grau und wegen der anliegenden Haare fast seidig. Frisch kam sie mir noch nicht zu Gesicht. — Dem Namen *Anchusa angustifolia*, habe ich den Namen *Anchusa leptophylla* vorangestellt, weil jener zweideutig geworden. Die *A. angustifolia* Linne's konnte bisher noch nicht

enträthelt werden. Die kurze Beschreibung bietet in einer so schwierigen Gattung kaum einen Charakter dar, woran man die Species erkennen könnte, und die Synonyme gehören nach meiner Meinung zu der Variet. der *Anchusa officinalis* mit rosenfarb. Bth. (*A. incarnata* Schrad.) Die schöne Abbildung bei Zanoni stellt gewiss nichts Anderes dar. Die Pfl. Sibthorps finde ich nach Vergleich von Tab. 161 der Fl. Griechenlands von *A. leptophylla* den K., welcher nur halb so lang ist, als die Röhre der Blkr. so wie die andern Merkmale sehr verschieden. *A. angustifolia* Rchb. ic. S. f. 967. mit Ausschluss der Synon. gehört zu *A. italica*, und *A. angustifolia* DC. fl. fr. zu *A. officinalis*, welcher Aiton unrichtiger Weise einen 5th. K. zuschreibt. In Willdenows Herbar. liegt unter n. 3307 Fol. 1. unter dem Namen *A. angustifolia*, die *A. leptophylla*, alle übrigen dieser Nummer zugefügten Exemplare gehören zu *A. officinalis*.

3. *A. ITALICA* (Retzius.) Italienische O. — Der St. ästig, aufrecht; *B.* lanzettl., wellig, steifh., *glänzend*; Tr. gezweigt, deckblättrig; DeckB. lineal.-lanzettl.; KZpfl pfriemlich, länger, als die Röhre der etwas ungleichen Blkr.; *Deckklappen länglich, pinselig-behaart*. ☉. In Weinbergen, an Wegen, (um Triest; C. Wallis und Tessin, Oberbaden am Kaiserstuhl.) Mai-Juli. *A. paniculata* Ait. Bth. ansehnlich, schön-azurblau, mit weissen Deckklappen. Var. aber. wie alle, mit grössern und kleinern Bth., kürzern und längern Gl., höher und tiefer-eingefügten Stbg. *A. angustifolia* Rb. ic. S. f. 967., *A. paniculata* Rb. fl. exc., *A. azurea* Rb. ic. 10. f. 1229. und *A. italica* Rb. fl. exc. Buglossum angustifolium Tausch., *B. paniculatum* T., *B. vulgare* T. und *B. italicum* T., sind Abänderungen von *Anchusa italica*.

8. *LYCOPSIS* (L.) Krummhals. — Blkr.Röhre eingeknickt-gebogen und aufwärts-gekrümmt, oder in einem Bogen gekrümmt, einen unregelmässigen und schiefen Saum tragend; sonst Alles, wie bei *Anchusa*. Bth. bei den unserigen blau.

1. *L. ARVENSIS* (L.) Acker-K. — Der St. aufrecht, ästig; *B.* lanzettl., *ausgeschweift-gezöhnt*, steifh., die untern in den Bstiel verschmälert, die obern halbstengelumfassend; Tr. beblättert; *Röhre der Blkr. in der Mitte gekrümmt*. ☉. Auf Brachäckern und an kultiv. O. Juni-Herbst. Schk. t. 31. *Anchusa arvensis* MBieb. D. fl. 2. p. 63. Bth. blau.

2. *L. VARIEGATA* (L.) Gescheckter K. — Die St. aufstrebend; *B.* *länglich-lanzettl., ausgeschweift-gezöhnt*, steifh., die untern in den Bstiel verschmälert, die obern halbstengelumfassend; Tr. oberwärts nackt, meist einzeln; *Blkr.Röhre ziemlich gerade, mit unregelmässigem, schiefem Saume*. ☉. An kultiv. O., Wegen, (Istrien.) Mai, Juni. *L. bullata* Cyr. *Anchusa variegata* Lehm. *A. perlata* Lam. Barrel f. 403. Saum der Blkr. azurblau, mit 5 weissen Linien, und schneeweissen Deckklappen.

3. *L. ORIENTALIS* (L.) Orientalischer K. — Der St. aufrecht, gabelsp.-ästig; *B. eyf.-länglich, ganzrandig* oder entfernt-undent-

lich - ausgeschweift - gezähnel, steifh., die untern in den Bstiel verschmälert, die obern an der Basis ungleich, halbstengelumfassend; Tr. beblättert; *Blkr. Röhre unterhalb der Mitte gekrümmt.* ☉. Unt. der Saat, (bei Verviers, ohne Zweifel mit Baumwolle eingeführt.) Bth. azurblau.

9. **NONNÉA** (Med.) Nonnee. — Schlund der Blkr. offen, bärtig oder mit schwachen, haarigen Deckklappen besetzt, aber doch diese kaum verengert. Sonst Alles, wie bei Anchusa.

1. **N. PULLA** (DC.) Schwarzbraune N. — Der St. aufrecht, fast einfach; B. lanzettl., ganzrandig, angedrückt-haarig, die blüthenst. ey-lanzettf.; Saum der gleichen Blkr. von der Länge der Röhre. ☉. Auf Aeckern und an Wegen, (im östl. D.; Oestr. und von da deh Mähr., Böhm., Schles. nach Sachs. und Thüring. und dem Harz und bis Berlin.) Mai. Juni. *Lycopsis pulla* L. D. fl. 2. p. 61. *Anchusa pulla* MBieb. Saum der Blkr. satt-purpurbraun, von weitem schwarz. D.

10. **SYMPHYTUM** (L.) Beinwurz. — Blkr. walzlich-glockig; Deckklappen 5, pfriemlich, in einen Kegel zsgestellt, am Rande drüsig-gezähnt. Nüsse 4, frei, an der Basis ausgehöhlt und dasselbst mit einem gedunsenen, faltig-gerieften Rande umgeben.

2. **S. OFFICINALE** (L.) Gebräuchliche B. — W. spindelf., ästig; *der St. ästig; B. herablaufend*, die untern und die wurzelst. ey-lanzettf., in den Bstiel zsggezogen, die obern und die blüthenst. lanzettl.; Saum der Blkr. 5zählig, Zähne zurückgekrümmt; Stbk. noch einmal so lang, als der Stbf. 4. Auf nassen Wiesen, an Flusssufern, Gräben und Wiesegebüsch. Mai. Juni. St. h. 17. Var. mit weissen, rosenrothen und violetten Blkr., mit aufrechten, an der Spitze zurückgekrümmten oder von der Basis an abstehenden K. und mit einem Gf., der länger und kürzer, als die Blkr. ist. Eine Form mit violetter Blkr. und abstehendem K. ist: *S. patens* Sibth.; eine Form mit weissen Blkr. und hervortretendem Gf.: *S. bohemicum* Schm.

2. **S. BULBOSUM** (Schimp.) Kriechende B. — Rhizom nebst den unterirdischen Ansläufern stielrund, schlank, verlängert und rundliche, zerstreute Knollen tragend; der St. beblättert, etwas ästig, an der Spitze 2 sp.; B. eyf.-länglich, halbherablaufend, die untern in den Bstiel zsggezogen, die obern sitzend, an der Basis abgerundet; Blkr. fast walzlich, Saum halb 5 sp., Zpfl aufrecht; Stbk. von der Länge der Stbf.; *Deckklappen hervortretend.* 4. In Weinbergen, (bei Heidelberg hinter der Krappfabrik; im C. Tessin der Schw., auf dem Monte Generoso, Thomas.) Mai. Juni. *S. filipendulum* Bischoff. *S. Clusii* Gmel. *S. punctatum* Gaud. Blkr.-Röhre weisslich; Saum hellgelb. An dem Schweizer Expl., was ich besitze, ragen die Deckklappen und der Gf. nur wenig über die Blkr. hervor, übrigens ist es ohne Zweifel zu dieser Art zu rechnen. Ein französisches Expl. aber, von meinem Freunde Ziz bei Toulon gesammelt, gehört zu einer andern und zwar meines Wissens noch nicht beschriebenen Art, die ich in D. fl. 2. p. 78.

mit *S. bulbosum* verwechselte und jetzt *S. mediterraneum* nenne; Rhizom . . . ; der St. beblättert; an der Spitze 2 sp.; B. eyf., die untern in einen, mit der etwas verbreiterten Basis stengelumfassenden, Bstiel zsggezogen, die obersten elliptisch-lanzettl., etwas herablaufend; Blkr. fast trichterf.-wälzlich; Saum 5zählig, Zähne aufrecht, 4mal kürzer, als der Saum. Stbk. noch einmal so lang, als die Stbf. Deckklappen eingeschlossen. Die Stbk. sind an der Basis herzf., wie bei allen, aber die Oehrchen sind bei dieser Art feinstachelspitzig. Untersch. sich von *S. tuberosum* dah. folg.: die untern StB. grösser, als die übrigen, mit einem an der Basis verbreiterten Bstiele stengelumfassend und die obersten B. nur etwas herablaufend; Blkr. halb so gross, ihre Zähne aufrecht und die Stbk. an der Basis beiderseits mit einem Spitzchen versehen. Die W. und Frucht sah ich noch nicht.

3. *S. TUBEROSUM* (L.) Knollige B. — Rhizom schief, stielrund, fleischig, knotig, hinten abgebissen und kurz-ästig, vorne mit hinabsteigenden, starken Fasern versehen; der St. ganz einfach oder an der Spitze 2sp.; B. herablaufend, die untern eyf., in den Bstiel zsggezogen, die obern elliptisch, *die untersten kleiner, während der Blthezeit schon verwelkt*; Blkr. trichterf.-röhrig, 5zählig, Zähne zurückgekrümmt; Stbk. noch einmal so lang, als die Stbf. 2. In schattigen, bes. gebirgigen Wäldern, (Oberbayern, Salzbg., Krain, Triest, Oestr., Mähr., Böhm., Schles. und dem Erzgeb.; Lugano in der südl. Schw.) Apr. Mai. J. a. t. 225. Bth. gelblichweiss.

IV. Gruppe. *LITHOSPERMEEN*. Nüsse 4 oder 2, der unteren Scheibe eingefügt, an der Basis nicht ausgehöhlt, sondern mit einem flachen oder etwas konvexen Hofe angeheftet. Gf. frei.

II. *ONOSMA* (L.) Lotwurz. — Nüsse 4, frei, mit einem grundst., fast 3eckigen, flachen Hofe angeheftet. Blkr. wälzlich-glockig, Schlund ohne Deckklappen. Stbk. pfelf., an der Basis zshängend — Bth. zuerst weiss, dann gelblichweiss.

1. *O. ECHINOIDES* (L.) Natterkopffartige L. — Der St. sehr ästig; B. lineal.-lanzettl. steifh., die Borsten *auf einem kahlen Knötchen sitzend*, die blüthenst. B. ey-lanzettf.; Stbf. halb so lang, als die *kahlen Stbk.* ☉, wenigstens in unserm Garten, seltner in das 3. oder 4. Jahr dauernd. Auf rauhen, sonnigen Hügeln, (in Mähr., Oestr. und Krain, bei Fiume, südl. Tyrol, im Wallis nach Gaud.) Juni. Juli. J. a. t. 295. *Cerinth echinoides* Scop. Der St. purpurn. Bth. gelblichweiss wie bei den folgenden.

2. *O. ARENARIUM* (W. und Kit.) Sand-L. — Der St. ästig; B. lineal.-lanzettl., steifh., die Borsten *auf einem kahlen Knötchen sitzend*, die blüthenst. B. ey-lanzettf.; Stbf. kürzer, als die *am Rande gezähnelten-ralhen Stbk.* ☉. In trocknen, sandigen Wäldern, (auf Sandplätzen im Föhrenwalde bei Mainz hinter der Hartmühle). Juni. Juli.

L.

3. *O. STELLULATUM* (W. und Kit.) Besternte L. — *Die St. ganz einfach*; B. lineal.-lanzettl., steifh., die Borsten *auf sternf.-behaarten Knötchen sitzend*, die blüthenst. B. aus eyf. Basls lanzettl.; Stbf. länger, als die Stbk. 4. An rauhen, sonnigen O., (bei Fiume, Triest, im südl. Tyrol, in der südl. Schw. im C. Waadt und Wallis.) Juni, Juli. *O. montanum* Sibth. und Smith fl. graec. prodr., Bertol. fl. lt. *O. echiioides* a. L. spec. Var.:

β. angustifolium, B. schmaler, dichter-behaart, Haare manchmal dünner: *O. stellulata β.* MBieb. *O. montana β.* Bert. fl. ital. *O. angustifolium* Lehm.

12. *CERINTHE* (L.) Wachtblume. — Nüsse 2, frei, 2fächerig, mit einem grundst., halbkreisf., flachen Hofe angeheftet. Blkr. walzlich-glockig, Schlund ohne Deckklappen. Stbk. pfelf., an der Basis zshängend.

1. *C. MAJOR* (L.) Grössere W. — *Blkr. 5zählig*, Zähne kurz-eyf., zurückgebogen, *Stbf. so lang, als das Stbk.* ☉. In Wäldern der A., (auf den Berner A.; ich besitze sie vom Stockhorn.) Juli, Aug. St. h. 12. Var. in den Gärten: Blkr. gelblichweiss, gelblichweiss mit violetter Röhre und überall gelblich-violett. Die Merkmale aber, nach denen Reichenb. eine *C. major*, *C. aspera* und *C. strigosa* unterscheidet, kann ich entweder nicht finden od. die 2 letztern der erwähnten Pfl. sind mir unbekannt. S.

2. *S. MINOR* (L.) Kleinere W. — *Blkr. über $\frac{1}{3}$ 3 sp.*; Zähne pfriemlich, aufrecht, zsschliessend; Stbf. 4mal kürzer, als die Stbk. ☉. Auf Feldern, an Ackerrändern, Wegen, (dch ganz Oberbaiern bis Regensb., südl. Tyrol, in Oestr. und von da dch Mähr. nach Schles., Böhm. bis Sachs.) Mai-Juli. St. h. 68. *C. glabra* Scop. Blkr. gelb. Var. mit ausgerandeten B.: *C. minor β. L.*; mit 5 braunen Flecken bezeichneter Blkr: *C. maculata* MBieb. und, wenn die B. zugleich gefleckt sind: *C. maculata* Rb. ic. 4. f. 482. D.

3. *C. ALPINA* (Kit. bei Schult.) Alpen-W. — *Blkr. 5zählig*, Zähne eyf., an der Spitze zurückgekrümmt; *Stbf. 4mal kürzer, als die Stbk.* 4. Auf den A. und mit den Flüssen in die Ebenen herabsteigend, (Schw. nicht selten; Allgäu und Tyrol und an der Iller und dem Lech bis gegen die Donau hin, im südl. Tyrol in Fiemme, Fassa und der benachbarten Gegend; Sulzbacher A. in Steyer.) Juni-Aug. St. h. 68. *C. quinquemaculata* Wahlenb. *C. suevica* Martens. *C. glabra* Gaud. Rb. ic. 5. f. 658. (nicht Mill., dessen Pflanze jährig ist, und sich von *C. maior* bloss dch den kahlen B. untersch.)

13. *ÉCHIUM* (L.) Natterkopf. — Nüsse frei, mit einem grundst., 3eckigen, flachen Hofe angeheftet. Blkr. glockig oder von der Basis an allmählig erweitert, Schlund ohne Deckklappen. Stbk. oval, frei.

1. *E. VULGARE* (L.) Gemeiner N. — Borstig-steifh.; der St. krautig; B. lanzettl.; Aehren ungeth.; *Blkr. Röhre kürzer, als der*

K.; Gf. an der Spitze 2 sp.; *Stbg.* abwärtsgeneigt, spreitzend, *an dem Saum der Blkr. anliegend*. ☉. An felsigen O., Wegen, Mauern, auf Brachfeldern. Juni-Sept. St. h. 18. Bth. blau, seltener rosenroth oder weiss. Var. mit grössern und halb so grossen Blkr., mit *Stbg.*, die kürzer, als die Blkr. sind und die lang hervortreten. — Das **E. Wierzbickii** Haberl., *Rb. fl. exc.*, welches in D. wild vorkommt, ist blos eine Variet. von **E. vulgare**, mit *Stbg.*, die kürzer, als die Blkr. sind; das aber, welches in botan. Gärten unter diesem Namen kultiv. wird, habe ich noch nicht gehörig untersucht.

2. **E. PUSTULATUM** (Sibth. und Sm.) Pusteliger N. — Borstigsteifh.; der St. krautig; B. lanzettl.; Aehren ungeth.; *Blkr.Röhre länger, als der K.*; Gf. an der Spitze 2 sp.; *Stbg.* abwärtsgeneigt, gleichlaufend, *von dem Saum der Blkr. entfernt*. ☉. An unkult. O., (Istrien, Veglia.) Mai-Juli. Fl. graec. t. 180. Bth. blau. — Dem **E. vulgare** ähnlich, untersch. sich aber von diesem, auch getrocknet, dch. dickere und steifere Borsten, die auf einem noch einmal so breiten Knoten sitzen, und dch. eine noch einmal so lange Blkr.Röhre, und an der lebenden Pflanze findet man noch folg.: **K.** an der Spitze nicht dicht an der Blkr. anliegend; Blkr. blau, mit 5 violetten, heller berandeten Streifen; *Stbg.* wegen der längern Röhre höher eingefügt, zwar abwärts geneigt, aber gleichlaufend und nirgends an der Blkr. anliegend. J.

3. **E. RUBRUM** (J. a. app. t. 3.) Rothblühender N. — Borstigsteifh.; der St. krautig, steif; B. lineal.-lanzettl.; Aehren ungeth.; *Blkr.Röhre* noch einmal so lang, als der **K.**; *Gf. an der Spitze ungeth.*; *Stbg.* länger, als die Blkr. ☉, seltner mehrere Jahre dauernd. Auf Wiesen und an waldigen O., (Unteröstr. und Mähr.) Juni. Juli. Bth. roth. D.

4. **E. ITALICUM** (L.) Italienischer N. — Borstig- sehr steifh.; der St. krautig, steif; B. lanzettl.; *Aehren* 2 sp., gedrungen; Gf. an der Spitze 2 sp.; *Stbg.* noch einmal so lang, als die Blkr. ☉. Auf unkult. Hügeln, (Istr., Litt., südl. Tyrol, Wallis.) Juni. Juli. **E. altissimum** J. a. app. t. 16. **E. asperissimum** MBieb. Bth. weiss.

5. **E. VIOLACEUM** (L.) Violetter N. — Der St. krautig, ästig; B. steifh., die untern länglich-lanzettl., in den Bstiel verschmälert, *die obern aus herzf., stengelumfassender Basis verschmälert*; Aehren ungeth., verlängert; *Stbg.* von der Länge der Blkr. ☉. Auf Feldern, an Wegen, (Istrien; auf der Insel Osero.) Mai. Juni. Bth. blau-violett, ansehnlich.

14. **PULMONARIA** (L.) Lungenkraut. — Nüsse 4, frei, an der Basis flach. Blkr. trichterf., Schlund behaart, ohne Deckklappen. **K.** 5 sp.

Die Arten dieser Gattung deuten hinsichtlich der Bildung der Bth. ein vielchig-2häusiges Geschlecht an, sowie die Primeln, Menthen und wie noch viele Arten von Boragineen und Labialen. Bei dem einen Geschlechte sind die *Stbg.* dem erweiterten Schlunde eingefügt und der kurze Gf. ist in der Röhre verborgen, bei dem andern Geschlecht sind die *Stbg.* in der Mitte der Röhre angeheftet und der

Gf. ist viel länger, als diese, reicht an den Schlund oder ragt länger oder kürzer über die Röhre hervor. Die Bth. sind an der langgriffeligen Form meist merklich grösser und haben oft einen noch einmal so breiten Saum.

1. *P. OFFICINALIS* (L.) Gebräuchliches L. — *Die äussern B. der nichtblühenden Wurzelköpfe herzf., gestielt; Bstiel schmal-geflügelt; StHaare borstig, mit wenigen eingemischten gegliederten und drüsentragenden Haaren.* 4. In schattigen Laubwäldern, (stw. dch d. g. Gebiet.) März. Apr. Rb. ic. 6. f. 699. St. h. 17. Bth. zuerst roth, dann violett, wie bei den 3 folgenden. B. manchmal mit hellgrünen Flecken bestrent.

2. *P. SACCHARATA* (Mill.) Grossgeschecktes L. — *Die äussern B. der nichtblüh. Wurzelköpfe eyf., in den schmal-geflügelten Bstiel plötzlich zsggezogen, die innern länglich, in den Bstiel hinablaufend; StHaare borstig, mit wenigen eingemischten gegliederten und drüsigen Haaren.* 4. In schattigen, etwas feuchten Wäldern, (im Geb. der Fl. von Spa und in Pommern, nämlich bei Stettin im Schrei von Garz häufig; Lukau in der untern Lausitz; Píperalpen in Steyerm., an der Sane bei Cilli in Steyerm.) März. Apr. Rb. ic. 6. f. 698. *P. grandiflora* DC. (eine langgriffelige Form), Rostk. und Schm. — B. mit weisslichen, zssfliessenden Flecken, und oft ganz weisslich, mit grasgrünen Flecken bestrent. Bth. lila oder weiss. D.

3. *P. MOLLIS* (Wolff.) Weichhaariges L. — *B. der nichtblüh. Wurzelköpfe elliptisch-lanzettl. und lanzettl., in den breitgeflügelter Bstiel hinablaufend; StHaare weich, gegliedert, klebrig-drüsigg.* 4. An felsigen, etwas schattigen O., (in den Baier. A. und Vorberg.; in Oestr.; um Schweinfurt und Würzburg, und vermuthl. noch an andern O. des südl. D., wahrsch. auch in der Schw.) Apr. Mai. Rb. ic. 6. f. 696. *P. media* Host.; ich besitze sie lebend, aus Samen von Hrn. von Jacquin mitgetheilt. B. weichflaumig. Bth. zuerst roth, dann violett.

4. *P. ANGUSTIFOLIA* (L.) Schmalblättriges L. — *B. der nichtblüh. Wurzelköpfe elliptisch-lanzettl. und lanzettl., in den geflügelten Bstiel hinablaufend; StHaare borstig, mit eingemischten wenigen drüsigen Haaren; Schlund inwendig unterhalb des bärtigen Kreises behaart.* 4. In Hainen, (stw. dch d. g. Gebiet.) Apr. Mai. *P. tuberosa* Schrank. *P. montana* Lej. Rb. ic. 6. f. 695. Bth. zuerst roth, dann violett. Var. mit lanzettl. B. und:

β. oblongata, mit ey-lanzettf.: *P. media* Rb. ic. 6. f. 697., nicht Host. *P. oblongata* Schrad. bei G. und S. Rb. fl. exc.

5. *P. AZUREA* (Besser.) Azurblaues L. — *B. der nichtblüh. Wurzelköpfe lanzettl., an der Basis in den geflügelten Bstiel verschmälert; StHaare borstig; Schlund inwendig unterhalb des bärtigen Kreises kahl.* 4. In Hainen, (Oberbayern, Oestr., Böhm., Schles., Sachs.; am Harze.) Apr. Mai. Rb. ic. 6. f. 694. *P. angustifolia* Schrank. *P. Clusii* Baumg. Bessera *azurea* Schult. Bth. azurblau. Dch den unterhalb des bärtigen Kreises kahlen Schlund, die innen kahle Röhre und die freudig-azurblaue Farbe

der Bl. unterscheidet sich diese sicher von der vorigen; die Röhre ist beständig kahl. D.

15. LITHOSPERMUM (L.) Steinsame. — K. 5 th., sonst Alles, wie bei Pulmonaria. Schlund der Blkr. zwar offen, aber doch dch 5haarige Falten oder flaumige Deckklappen ein wenig verengert.

1. L. OFFICINALE (L.) Gebräuchlicher S. — Die St. krautig, aufrecht, *sehr ästig*; B. lanzettl., spitz, adrig, sehr rauh; Haare an der Basis knötig, angedrückt: *Nüsse glatt*. 2. An gebirgigen, rauen O. unter Gebüsch. Mai-Juli. St. h. 5. Bth. grünlich-weiss.

2. L. PURPUREO-CAERULEUM (L.) Purpurblauer S. — Die St. krautig, *die blüthetrag. aufrecht, an der Spitze 2-3 sp., die nichtblüh. kriechend*; B. lanzettl., spitz, nach der Basis verschmälert, von angedrückten Haaren kurz h.; *Nüsse glatt*. 2. In Gebirgswäldern, (im südl. und mittl. Gebiete stw. bis Westphalen und Hildesheim.) Mai. Juni. J. a. t. 14. Bth. zuerst roth., dann azurblau.

3. L. ARVENSE (L.) Acker-S. — Der St. krautig, aufrecht, an der Spitze ästig, einfach oder an der Basis mit NebenSt. versehen; B. lanzettl., ziemlich spitz, von angedrückten Haaren kurz h., die untern länglich-lanzettl., stumpf, in den Bstiel verschmälert; *Fruchtkelche von einander entfernt; Nüsse runzlich-rauh*. ☉. Auf Aeckern und Feldern. Apr. Juni. Fl. dan. t. 456. Bth. weiss; var. selten blau.

4. L. APULUM (Vahl.) Apulischer S. — Steifh. von abstehenden Borsten; der St. krautig, aufrecht, an der Spitze ästig, einfach, oder an der Basis mit NebenSt. versehen; B. lineal., die untersten in den Bstiel verschmälert, fast spatelig-lanzettl.; *Fruchtkelche dicht nebeneinander; Nüsse höckerig-rauh*. ☉. Auf Brachäckern, (Istrien: Insel Lossino, Dr. Sendtner.) Apr. Mai. Myosotis apula L. Column. ecph. 185. fig. links. Bth. gelb.

Lithospermum maritimum Lehm., Pulmonaria maritima L., die in D. fl. p. 58 angeführt wurde, ist an den angegebenen Stand O. nicht einheimisch und aus unserer Fl. zu streichen.

16. MYOSOTIS (L.) Mauseohr. (Vergissmeinnicht.) — Nüsse 4. frei, vorne konvex, hinten stumpf-gekielt und mit einem schwachen, punktl., nach der Basis der Nuss zu befindlichen Hofe angeheftet. Blkr. trichter- oder tellerf.; Schlund dch kahle Deckklappen verengert. K. 5 sp.

§. 1. K. angedrückt-behaart.

1. M. PALUSTRIS (Withering.) Sumpf-M. — K. 5zählig, *angedrückt-behaart*, nach dem Verblühen offen; *Gf. ohngefähr so lang, als der K.*; die StB. länglich-lanzettl., ziemlich spitz; der

St. kantig; Rhizom schief, kriechend. 4. Auf Wiesen und feuchten Haiden, an Gräben, Ufern, Sümpfen. Mai-Juli. *M. scorpioides* Willd. *M. scorpioides* β . *palustris* L. *M. scorp. palustris* Ehrh. *M. perennis* Moench. *M. palustris* Rb. bei St. h. 42., eine Form mit abstehenden Stlhaaren; *M. repens* a. a. O., mit ein wenig tiefer-geht. K.; *M. strigulosa* daselbst mit angedrückten Stlhaaren. Bth. sehr schön blau, seltner fleischroth oder weiss. In Gräben und an Rändern von Pfützen bildet es grosse Rasen, und Tr. und Bthstiele werden länger und lockerer:

β . *laxiflora*: *M. laxiflora* Rb. bei St. h. 42.

2. *M. CAESPITOSA* (Schultz.) Rasiges *M.* — Nüsse kahl; *K.* 5 sp., angedrückt-behaart, nach dem Verblühen offen; *Gf.* sehr kurz; StB. lineal-länglich, stumpf; der St. (an der lebenden Pfl.) stielrund; W. hinabsteigend, überall faserig. ☉. Juni, Juli. In Gräben und Sümpfen, viel seltner, als das vorhergehende. St. h. 42. *M. lingulata* R. und S. *M. uliginosa* Schrad. — Der St. ist an der lebenden Pfl., vorzügl. unterwärts, dicker, als bei der vorhergehenden und mit einer vom Rande der B. herablaufenden, eingedrückten Linie bezeichnet; diese Linie tritt bei *M. palustris* hervor und bildet eine scharfe Kante. Bth. immer kleiner, mit schmälereu und meist ganzen Zpfln.

§. 2. *K.* behaart, Haare abstehend, die an der Basis weit abstehend und in einen Haken zurückgekrümmt.

3. *M. SYLVATICA* (Hoffm.) Wald-M. — *K.* tief-5sp., abstehend-behaart, Haare der Basis spreitzend, hakig; Zpfl des FruchtK. aufrecht-zsschliessend; Bthstielchen nach dem Verblühen so lang, als der *K.* und länger; Saum der Blkr. flach. ☉. (Im Garten immer 2jährig.) In Gebirgswäldern; steigt die A. hinauf und geht daselbst in die Var. β . über. Mai-Juli. St. h. 42. *M. arvensis* β . *sylvatica* Pers. *M. scorpioides sylvatica* Ehrh. *M. decumbens* Host., (letztere finde ich dch kein Merkmal verschieden.) Bth. wohlriechend, dunkler-blau, als bei *M. palustris*. Var.:

β . *alpestris*, niedriger, mit kürzern, dichter-auffliegend-behaarten Tr., dickern Bthstielchen und grössern *K.*: *M. alpestris* Schm. D. fl. 2. p. 45. St. h. 42. *M. suaveolens* Kit. bei R. u. S. u. St. h. 42. *M. odorata* Poir. *M. rupicola* engl. bot. Eine höhere Form von dieser Variet. ist: *M. montana* MBieb. *M. lithospermifolia* Hornem. und St. h. 42.

γ . *lactea* von Bönningh., von der Statur und dem Ueberzug der Var. β ., aber dch grosse, milchweisse Bth. ausgezeichnet. Aus Samen erhält man immer diese Abart, aber die Samen fand ich nicht grösser, als bei *M. sylvatica* Var. α ., obgleich sie der Autor am StandO. noch einmal so gross gesehen. In Westphalen und auch bei Bitsch an der deutschen Grenze unter der Abart α .

4. *M. VARIABILIS* (Moritz Angelis.) Veränderliches *M.* — *K.* tief-5sp., nach dem Verblühen geschlossen, abstehend-behaart, die Haare an der Basis spreitzend, hackig; Tr. gestielt; Bthstielchen nach dem Verblühen so lang, als der *K.*; Röhre der Bl.

zuletzt noch einmal so lang als der K.; Stbk. hervortretend, die Deckklappen überragend; StB. breit-lanzettl. ☉. In waldigen O. der niederen AGegenden. (in der Waldregion am Rottenmaner Tanern in Steyerm.) Juni? Bth. nach dem Aufblühen hellgelb, dann roth zuletzt blau. D.

5. *M. INTERMEDIA* (Link.) Mittleres M. — K. tief-5sp., nach dem Verblühen geschlossen, abstehend-behaart, die Haare spreitzend, hakig; Bthstielchen nach dem Verblühen abstehend, noch einmal so lang, als der K.; Saum der Blkr. konkav. ☉. Auf Aeckern. Juni-Aug. St. h. 42.

6. *M. HISPIDA* (Schlechtend.) Steifh. M. — K. 5sp., nach dem Verblühen offen, abstehend-behaart, Haare der Basis spreitzend, hakig; Tr. gestielt; Bthstielchen nach dem Verblühen wagrecht-abstehend, so lang, als der K.; Blkr.Röhre eingeschlossen. ☉. Auf Hügeln, Rainen, an kultiv. O. Mai. Juni. *M. collina* Rb. bei St. h. 42. *M. arvensis* Link. Bth. klein, dunkler-blau, als bei der *M. stricta*.

7. *M. VERSICOLOR* (Persoon, *M. arvensis* γ. *versicolor*.) Buntblumiges M. — K. tief-5sp., nach dem Verblühen geschlossen, behaart, Haare der Basis spreitzend, hakig; Tr. gestielt; Bthstielchen kürzer, als der K.; Blkr.Röhre zuletzt noch einmal so lang, als der K.; Stbk. bis an die Basis der Deckklappen hinaufreichend; StB. lineal.-lanzettl. ☉. An kultiv., etwas feuchten O., in Hainen, im Flusskiese, an Ufern. Mai. Juni. St. h. 42. *M. scorpioides collina* Ehrh. Bth. zuerst schwefelgelb, dann bläulich, dann violett.

8. *M. STRICTA* (Link.) Steifes M. — K. tief-5sp., nach dem Verblühen geschlossen, behaart, Haare der Basis spreitzend, hakig; Tr. an der Basis beblättert; Fruchstielchen kürzer, als der K.; Blkr.Röhre eingeschlossen. ☉. An sandig., unkultiv. und kultiv. O. Apr. Mai. *M. arenaria* Schrad. bei Schultz. *M. arvensis* Rb. bei St. h. 42. Bth. klein, blau.

9. *M. SPARSIFLORA* (Mikan, Pohl in Hopp. Taschb.) Zerstreutblüthiges M. — K. tief-5sp., behaart, Haare der Basis spreitzend, hakig; Tr. arnblüthig, an der Basis beblättert; die untern Fruchstielchen vielmal länger, als der K., zurückgeschlagen. ☉. In Wäldern und feuchtem Gebüsch, (Steyerm., Oestr., Mähr., Böhm., Schles., Sachs., Harz, Preuss., Pommern, Hamburg.) St. h. 42. Bth. blau. D.

17. *ERITRICHUM* (Schrad.) Eritrichium. — Nüsse 4, frei, 3kantig, vorne flach und mit einem vortretenden Rande umgeben, die hintere Kante stumpfer, mit dem kleinen, punktf. Rückenhöfchen an dem Fruchtb. angeheftet. Sonst Alles, wie bei *Myosotis*.

1. *E. NANUM* (Schrad. Gaud.) Zwerg-E. — B. längl.-lanzettl., zottig; die Tr. 3-6blüthig, unterwärts beblättert. 2. Auf den höchsten felsigen A.Rücken, (Wallis, Graubünden, südl. Tyrol,

Kärnth., Steyerm., Krain.) Juli. Aug. *Myosotis nana* Vill. delph. 2. t. 13. (roh.) „Ränder der S. gesägt.“ Vill. Reichenb. in St. b. 42 (die Nüsschen nicht richtig.) M. und K. D. fl. Die Pfl. ist 1-2 Zoll hoch, dicht-rasig. Bth. schön-blau, im Verhältniss zur Pfl. gross. Var.:

a. adontospermum, Nüsschen mit einem stachelig-wimperigen Rand umgeben.

β. lejospermum; Nüsse am Rande kahl oder mit 1-2 Zähnen auf beiden Seiten besetzt: E. Hacquetii Koch Synops. ed. I. *Myosotis terglouensis* Hacquet. pl. alp. t. 2. f. 6. M. nana Wulf. in Jacq. collect. Die Variet. *a.* und *β.* gehen dch Zwischenformen in einander über.

LXXXI. Ordng. SOLANEEN. Juss. gen. p. 124.

K. 5 sp. oder 3 th., bleibend oder abfällig und ringsum abspringend mit bleibender Basis. Blkr. 1blättrig, unterweibig, regelmässig oder etwas ungleich, hinfällig, in der Knospenlage gefaltet oder dachig. Stbg. 5, an der Basis der Blkr. eingefügt und mit deren Zpfen abwechselnd. Stbk. am Ende des spitzen Stbf. aufliegend, 2fächerig. Fruchtkn. frei, 2fächerig, vieleigig; Samenträger dick, in der Mitte der Scheidewand angewachsen. Gl. 1. N. einfach. Frucht eine Kapsel oder Beere. Eyweiss fleischig. Keim ring- oder schraubenf. B. wechselst., die obern oft gezweiet, das eine davon kleiner. Bthstand oft ausserhalb der Blattwinkel.

1. LYCIUM (L. gen. n. 262) Bocksdom. Blkr. trichterf. Stbgf. in der Mitte oder an der Basis der Röhre eingefügt. K. nach dem Verblühen klein, an die Basis der Frucht angedrückt.

1. L. EUROPAEUM (L. mant. I. S. 47.) Europäischer B. — B. lanzettl., nach der Basis verschmälert, oder verkehrt-lanzettl.; Röhre der Blkr. noch einmal so lang als der Saum. 4. Unter Gesträuch, (bei Besca nuova auf Veglia.) Mai. Juni. Bth. weiss oder blass purpurn. J.

2. L. BARBARUM (L. spec. 277.) Gemeiner B. — B. fast rautenf.-eyf. oder lanzettl., nach der Basis verschmälert.; Röhre der Blkr. so lang als der Saum. 4. Wird zu Hecken gezogen, nun hie und da einheimisch geworden. Juni. Juli. Bth. purpurn.

1. SOLANUM (L.) Nachtschatten. — Blkr. radf. Stbk. zsschliessend, an der Spitze mit einem Loche aufspringend. Eine Beere.

1. S. VILLOSUM (Lam.) Zottiger N. — Jährig; Kanten der Aeste schwach vortretend, mit wenigen Knötchen besetzt; B. eyf., buchtig-gezähnt und nebst dem St. fast filzig-zottig; Tr. einfach;

Fruchtsstielen an der Spitze verdickt, herabgebogen. ☉. Auf Schutthaufen, an Wegen hie und da. Jul.-Herbst. Bernhadi über den Begriff der Pflanzenart p. 56. und 63. *S. nigrum* γ. *villosum* L. *S. luteum* Mill. *Beeren gelb*. Bth. weiss oder bleich-violett, wie bei den 3 folg. Untersch. sich von *S. miniatum* leicht „dch den dichten, die Rauigkeiten des St. verbergenden Flaum und dch die gelben, zuletzt bräunlichen Früchte“ Bernh.

2. *S. MINIATUM* (Bernh. bei Willd.) Mennigrother N. — Jährig; Kanten der Aeste hervortretend, knötig; *B.* eyf., fast deltaf., buchtig-gezähnt und nebst dem St. *abstehend-zottig*; Tr. einfach; Fruchtsstielen an der Spitze verdickt, herabgebogen. ☉. Auf Schutthaufen und an Wegen. Jul.-Herbst. Bernh. p. 55. und 63. *S. villosum* Mill. Hayn Abbild. 2. 41. *S. alatum* Moench. *S. puniceum* Gmel. *S. nigrum* γ. D. fl. 2. p. 231. *Beeren roth*.

3. *S. HUMILE* (Bernh. bei Willd.) Niedriger N. — Jährig; Kanten der Aeste schwach hervortretend, mit wenigen Knötchen besetzt; *B.* ey-, fast rautenf., *ausgeschweift-gezähnt und nebst dem St. fast kahl*; Tr. einfach; Fruchtsstielen an der Spitze verdickt, herabgebogen. ☉. An kultiv. O., Wegen. Jul.-Herbst. Bernh. p. 55. und 63. *S. luteo-virescens* Gmel. *S. nigrum* δ. D. fl. 2. p. 230. *Beeren wachsgelb*. Von niedrigerer Statur, als das folg. *S. nigrum*, kahler und mit weniger hervortretend herablaufenden Blatträndern bezeichnet.

4. *S. NIGRUM* (L., mit Ausschl. von Varie.) Schwarzer N. — Jährig; Kanten der Aeste hervortretend, knötig; *B.* eyf., fast deltaf., *buchtig-gezähnt und nebst dem St. von einwärtsgekrümmte aufrechten Haaren flaumig*; Fruchtsstielen an der Spitze verdickt, herabgebogen. ☉. An kultiv. O., Wegen, auf Schutthaufen. Jul.-Herbst. Bernh. l. c. p. 52. und 64. St. h. 1. D. fl. 2. p. 230., mit Ausschl. von Variet. *S. melanocerasum* Willd. *S. atriplicifolium* Desp. *S. nigrum* Rb. ic. f. 1284. *S. pterocaulon* Rb. ic. f. 1284., nicht Donal. eine Form mit mehr weichstacheligen Astkanten. — *Beeren schwarz*. Var.:

β. *stenopetalum*, *B.* schmaler. Blkr. tief-geht. mit sehr schmalen Zpfln; *S. nigrum stenopetalum* Alex. Braun.

γ. *chlorocarpum*, *Beeren* bei der völligen Reife grün: *S. nigrum chlorocarpum* Spenn. fl. frib.

5. *S. DULCAMARA* (L.) Bittersüßer N. — Der St. strauchig, schlängelig; *B.* ey-herzf., *die obern spiessf.*; Ebensträusse meist blattgegenst. b. In Gebüsch und an feuchten, waldigen O., Ufern, Jun.-Aug. St. h. 18. Bth. violett, mit 2 grasgrünen, weiss-berandeten Flecken an der Basis der Zpfl, selten weiss. *Beeren roth*. Var.:

β. *tomentosum*, der St. nebst den *B.* filzig: *S. littorale* Raab. An verfallenen Feldmauern. (südl. Schw., südl. Tyrol, Schweinmünde in Pommern.)

6. *S. TUBEROSUM* (L.) Knolliger N. (Kartoffel.) — Der St. krautig; *B. gefiedert*, Blättchen ungleich, wechselst., sehr klein;

Büthstielchen gegliedert; Blkr. 5 winkelig; die Aeste unter der Erde knollentragend. 4. Die Knollen aber nur jährlich, indem dieselben absterben, nachdem sie im nächsten Jahre eine neue Pflanze mit neuen Knollen erzeugt haben. Jul. Aug. Kultiv.

2. **PHYSALIS (L.)** Schlutte. — Die Stbk. der Länge nach aufspringenden Beere in den aufgeblasenen und vergrößerten K. eingeschlossen; sonst Alles, wie bei *Solanum*.

1. **P. ALKEKENGİ (L.)** Gemeine S. — B. gezweiet, ungeth., spitz; der St. krautig, von der Basis an ästig. 4. Auf trocknen Hügeln unter Gesträuch, in Weinbergen, an Wegen, (stw. dch das g. Gebiet.) Jun. Jul. Schk. t. 45. Bth. weiss. Beere scharlachroth, von dem aufgeblasenen, mennigrothen K. eingeschlossen.)

4. **ÁTROPA (L.)** Tollkraut. — Blkr. aus kurzer Röhre glockig. Stbg. mit ihrer Basis den Schlund verschliessend, oberwärts aneinander tretend und nebst dem Gf. abwärts geneigt. Beere 2fächerig.

1. **A. BELLADONNA (L.)** Gemeines T. (Tollkirsche.) — Der St. krantig; B. eyf., ungeth. 4. In Wäldern und vorzügl. Laubw. und Schlägen. Jun. Jul. J. a. t. 309. St. h. 3. Bth. schmutzviolettbraun mit dunkelbraunen Adern, an der Basis olivengrün. — Die *Atropa Mandrágora* L., *Mandrágora officinalis* Mill., welche angeblich im südl. Tyrol und der Schw. jenseits der A. vorkommen soll, wurde neuerdings nicht wieder gefunden. X
Atropa
Aug. 17

5. **SCOPOLÍNA (Sult.)** Scopoline. — Blkr. röhrig-glockig, 5lappig. Kapsel rundlich, an der Basis rundum aufspringend.

1. **S. ATROPOIDES (Sult.)** Tollkrautähnliches S. — 4. Blkr. röhrig-glockig. In schattigen Wäldern (Krain, im Cillier Kreise in Steyerm.) Apr. Mai. *Hyoscyamus Scopolia* L. St. h. 21. Blkr. auswendig glänzend, braun, inwendig glanzlos und olivengrün.

2. **S. HLADNIKIANA (Freyer in Brief.)** Hladnik's S. — Blkr. verkehrt-eyf.-glockig. 4. In Bergwäldern, (Schelmje in Krain.) Apr. Mai. *S. viridiflora* Freyer in Reichenb. fl. germ. exsicc. D.

6. **HYOSCYAMUS (L.)** Bilsenkraut. — Blkr. trichterf., Saum 5lappig. Kapsel an der Basis bauchig, oberwärts in einen Hals zugezogen, an der Spitze rundum aufspringend.

1. **H. NIGER (L.)** Schwarzes B. — B. eyf.-länglich, fiedersp. buchtig, die untersten gestielt, die *stengelst. halbstengelumfassend*, die blüthenst. beiderseits 1-2zählig; Bth. fast sitzend. ☉. und ☉. Auf Schutthaufen, an Wegen, Hecken, auf Aeckern und an kult. O. zerstreut. Jun. Jul. St. h. 3. Blkr. schwefelgelb, mit schwarzen Adern, die in dem Schlunde schwarzpurpurn und breiter sind. Auf Aeckern und an kultiv. O. ist die Pfl. jährlich, mit weniger

nief-buchtigen B.; *H. agrestis* Kit. bei Schult. D. fl. 2. p. 225. *H. verviensis* Fl. von Spa. *H. bohemicus* Schm. Eine ebenfalls jährige, aber selten vorkommende Varietät

β. *pallidus*, mit einfarbigen bleichgelben Bth. ist: *H. pallidus* Kit. bei Willd.

2. *H. ALBUS* (L.) Weisses B — *B. sämmtl. gestielt*, rundlich-eyf., buchtig, stumpf-lappig, die obern ausgeschweift-gezähnt; Bth. fast sitzend. ☉. An kultiv. O., Wegen, Mauern, (um Fiume in Istrien und auf den Inseln.) Mai. Jun. Lam. illust. t. 117. f. 1. Bth. blassgelb mit violettem Schlund. J.

6. *NICOTIANA* (L.) Tabak. — Blkr. trichterf., Saum faltig, 5lappig. K. bleibend. N. kopfig. Kapsel an der Spitze 4lappig, 2-fächerig, vielsamig.

1. *N. TABACUM* (L.) Gemeiner T. — *B. länglich-lanzettl.*, zugespitzt, *die untern verschmälert-herablaufend*; Schlund der Blkr. aufgeblasen-bauchig; Saum 5th., mit zugespitzten Lappen. ☉. Angebauet. Jul. Aug. Schk. t. 41. Bth. rosenroth. Kultiv.

2. *N. LATISSIMA* (Mill.) Grossblättriger T. — *B. eyf.-lanzettf.*, *aus gehöhrter Basis herablaufend*; Blkr. Schlund aufgeblasen-bauchig; Saum 5sp., mit kurz-zugespitzten Lappen. ☉. Wird mit dem erstern gebauet. Jul. Aug. *N. macrophylla* Spreng. D. fl. 2. p. 223. Bth. rosenfarb. Kultiv.

3. *N. RUSTICA* (L.) Bauern-T. — Der St. stielrund; B. gestielt, eyf., ganzrandig; Blkr. Röhre walzlich, länger, als der K., *Zpfl des Saumes rundlich, stumpf*. ☉. Wird kultiv. Jul. Aug. Bth. gelblichgrün. Kultiv.

8. *DATURA* (L.) Stechapfel. — Blkr. trichterf., Saum faltig, 5lappig. K. abfällig, die Basis bleibend, kreisrund. N. aus 2 Plättchen gebildet. Kapsel 4lappig, 4fächerig, Fächer 2th., vielsamig.

1. *D. STRAMONIUM* (L.) Gemeiner S. — B. eyf., kahl, ungleich-buchtig-gezähnt; Kapseln aufrecht, dornig. ☉. An kultiv. O., Wegen, auf Schutthaufen. Jul. Aug. J. a. t. 43. *Stramonium foetidum* Scop. *S. vulgatum* Gärtn. Bth. weiss. Var. mit einfach- und doppelt-buchtig-gezähnten B. und

β. *chalybea*, St. Bstiele, Blattnerven satt-violett; K. violett-angelaufen; Blkr. hell-violett: *D. Tatula* L. Am Unterrheine, von Bönningh.

LXXXII. Ordng. VERBASCEEN. Bartling. ord. nat. p. 170.; als Rote der Scrophularineen.

Blkr. ungleich oder unregelmässig. Stbk. auf die verbreiterte Spitze der Stbf. quer- oder schief-angewachsen, 1fächerig. Sonst Alles, wie bei den Solaneen.

1. **VERBASCUM (L.)** Wollkraut. — Blkr. radf., Samm 5lappig, ungleich. Stbg. 5, ungleich. Kapsel an der Spitze 2klappig.

I. Rotte. B. völlig von B. zu B. herablaufend. (Bth. gelb, Wolle der Stbf. weiss.)

1. **V. SCHRADERI** (Meyer, V. Thapsus L. suec. S. 69. nach Fries.) Schrader's W. — B. kleingekerbt, filzig, der Filz gelblich, alle von B. zu B. hinablaufend; Tr. meist einzeln; die blüthen-trag. Bthstielen kürzer, als der K.; Blkr. trichterf.; Stbf. weisswollig, die 2 längern kahl oder oberwärts spärlich-behaart, 4-mal so lang, als ihr, auf der einen Seite kurz-hinablaufendes Stbk. ☉. Auf unkult., steinigen Hügeln, Sandfeldern. Jul. Aug. V. Thapsus Schrad. monogr. p. 17. D. fl. 2. p. 203. V. Thapsus a. Wahlenb. Kommt, aber seltner, mit bleichgelben Bth. vor: V. pallidum N. von Esenb., oder mit weissen: V. elongatum Willd.

2. **V. THAPSIFORME** (Schrad. monogr. I. S. 21.) Grossblumiges W. — B. gekerbt, filzig, der Filz gelblich, alle von B. zu B. hinablaufend; Tr. meist einzeln; die bthentrag. Bthstielen kürzer, als der K.; Blkr. radf.; Stbf. weisswollig, die 2 längern kahl oder oberwärts spärlich-behaart, $1\frac{1}{2}$ oder noch einmal so lang, als ihr auf der einen Seite lang-hinablaufendes Stbk. ☉. Mit dem vorigen an denselben O. Jul. Aug. V. Thapsus Mey. chl. han. Koch Synops. ed. I. V. thapsiforme Schrad. D. fl. 2. p. 200. Untersch. sich von dem vorhergeh. sogleich dch die viel grössern und flachen Blumen. Kommt mit weissen Bth. vor und sodann an mageren, in sandig. Fichtenwäldern wachsenden Ex. mit unterbrochener Aehre und dünnem Filze: V. cuspidatum Schrad. mon. p. 23. t. I. f. 1.

II. Rotte. B. kurz- oder halbhinablaufend.

a. Bth. gelb; Wolle der Stbf. weiss,

3. **V. PHLOMOIDES (L.)** Windblumenähnliches W. — B. gekerbt, filzig, der Filz gelblich, die obern kurz- oder halb-hinablaufend; Tr. meist einzeln; die bthentrag. Bthstielen kürzer, als der K.; Blkr. radf.; Stbf. weiss-wollig, die 2 längern kahl oder oberwärts spärlich-behaart, $1\frac{1}{2}$ oder noch einmal so lang, als ihr auf der einen Seite lang-hinablaufendes Stbk. ☉. An denselben O. mit den vorhergehenden. Jul. Aug. V. rugulosum Willd. — Kommt, aber selten, mit weissen Bth. vor. Ferner: 1. B. elliptisch, kurz-herablaufend, Tr. lockerer: V. phlomoides Schrad.; 2. B. elliptisch, halbherablaufend: V. australe Schrad.; 3. B. länglich-lanzettl., kurz-hinablaufend: V. nemorosum Schrad.; 4. B. elliptisch, kurz-hinablaufend, Tr. gedrun-gen: V. condensatum Schrad. — Uebrig. ist diese Art der vorhergeh. sehr ähnlich und untersch. sich bloss dch die kurz- und halbhinablaufenden B.

4. **V. MONTANUM** (Schrad.) Berg-W. — B. gekerbt, filzig, der Filz gelblich, die obern halb-hinablaufend; Tr. meist einzeln; Bth. einzeln und büschelig, Büschel 3-4bth.; die blüthentrag. Bth-

stielchen kürzer, als der K.; Bkr. radf.; *Stbf. sämmtl. weisswollig*, die 2 längern an der Spitze kahl, 4mal kürzer, als ihr auf der einen Seite *kurz-hinablaufendes Stbk.* ☉. Auf waldigen Hügeln der wärmern Gegenden., (bisher bloss im untern Wallis; der Stand O. in den Thälern der Vogesen scheint mir zweifelhaft.) Jul. Aug. *V. montanum* Schrad. *V. crassifolium* Schleich. Gaud., nicht DC., (welches kahle Stbf. hat; vgl. die Diagnose in Dub. bot. gall. p. 340.) Dem *V. phomoides* ähnlich, untersch. sich aber dch die eyf., plözllich in einen Bstiel zugezogenen untern B. und dch den Bau der Stbg. S.

b. Bth. gelb; Wolle der Stbf. heller oder dunkler-violett.

5. *V. SINUATUM* (L.) Buchtiges W. — *B. filzig*, die wurzel- und untern stengelst. *buchtig*, die obern gekerbt, kurz-hinablaufend; Tr. rispig; Stbk. sämmtl. purpurn-wollig; Stbk. gleich. ☉. An dürrn rauhen O., (Istrien, Biasol.; Osero, Noë.) Jul. Aug. J.

III. Rotte. B. nicht herablaufend. Bth. büschelig

a. Bth. gelb, (au Variet. weiss.) Wolle der Stbf. weiss.

6. *V. SPECIOSUM* (Schrad.) Ansehnliches W. — *B. ganzrandig, wellig, filzig, der Filz bleibend*, die untern länglich, spitz, in den Bstiel verschmälert, *die stengelst. gekerbt-herzf., sitzend*; Aeste kantig; Tr. rispig; Stbf. weisswollig; Stbk. gleich. ☉. Auf kräuterreichen Hügeln, an Waldrändern, (in Unteröst., Dolliner.) Jul. Aug. *V. longifolium* DC., ist nach Schrader hierher zu ziehen. D.

7. *V. FLOCCOSUM* (W. und Kit.) Flockiges W. — *B. dicht-filzig, der weisse, flockige Filz abfällig*, die wurzelst. länglich-elliptisch, in den Bstiel verschmälert, die übrigen sitzend, unmerklich-kerbt, *die obern lang-zugespitzt*, halbstengelumfassend; *der St. nebst den Aesten stielrund*; Tr. rispig, abstehtend; *Stbf. weisswollig.* ☉. Auf sonnigen Hügeln, an Wegen, (Schw. an mehreren O., auf der Rheinfläche von Basel bis Coblenz hin und wieder; bei Trier nicht selten, sodann im südl. Tyrol, Steyerm., im Littor., um Triest überall.) Jul. Aug. *V. pulverulentum* Sm. und der meisten Aut. — Bthstielen und K. vor der Bthezeit in dem schneeweissen, flockigen Filz vergraben.

8. *V. LYCHNITIS* (L.) Lychnitisartiges W. — *B. gekerbt, oberseits ziemlich kahl, unterseits staubig-filzig*, graulich, die untern elliptisch-länglich, in den Bstiel verschmälert, die übrigen untern kürzer-gestielt, *die obern sitzend*, eyf., zugespitzt; *Aeste aufrecht-abstehtend, pyramidenf.-rispig, scharf-kantig*; *Stbf. weisswollig.* ☉. Auf unkultiv. Hügeln, an waldigen, steinigen O., Ufern. Jul. Aug. Var.:

β. *album*, mit weissen Bth.: *V. Lychnitis* β. Schrad. *V. album* Mill. Moench. Eine Form mit feinerem Filz ist: *V. incanum* Gaud.

b. Bth. gelb, Wolle der Stbf. purpurn.

9. *V. NIGRUM* (L.) Schwarzes W. — *B.* gekerbt, oberseits ziemlich kahl, unterseits fein-filzig, *die untern* stengelst. länglich-eyf., an der Basis *herzf.*, lang-gestielt, die obern eyf.-länglich, fast sitzend; *der St. oberwärts scharf-kantig*; *Tr. verlängert*; Bthstielchen noch einmal so lang, als der K.; *Stbf. purpurn-wollig*. ☉. An gebirg., waldig. O., Wegen. Jul. Aug. Var.:

β. thyrsoidesum, *B.* dichter-filzig: *V. Alopecuros* Thuill. und *V. parisiense* Thuill.; letzteres hat nur halb so grosse Bth., als die gewöhnliche Form.

10. *V. LANATUM* (Schr.) Wolliges W. — *B.* unterseits wollig-filzig, die untern und mittlern länglich, gestielt, *fast buchtig-doppelt-gekerbt*, die obern länglich-eyf., sitzend, spitz-gekerbt; *der St. oberwärts kantig*; *Tr. einfach*; Bthstielchen noch einmal so lang, als der K.; *Stbf. purpurn-wollig*. ☉. An gebirgig. O., (Krain, Steyerm., Hamburg am hohen Elbufer, Kärnth.) Jul. Aug. *V. thyrsoidesum* Host. fl. a. Ist nach Facchini und Sonder eine Variet. von *V. nigrum*. D.

11. *V. ORIENTALE* (MBieb.) Schwächtiges W. — *B.* gekerbt, oberseits fast kahl, unterseits dünn-filzig, die untern eyf.-länglich, *in den Bstiel gezogen oder seicht-herzf.*, die mittlern eyf., kurz-gestielt, die obern sitzend, fast herzf.; *Aeste rispig und nebst dem St. fast stielrund*; Bthstiele $1\frac{1}{2}$ mal so lang, als der K.; *Stbf. purpurn-wollig*. ☉. Auf unkult., steinig. Hügeln, an Wegen, (Böhm., Mähr., Oestr., südl. Tyrol, Steyerm., wärmere Schw.) Jul. Aug. *B.* an der Basis tiefer-gekerbt. Var. mit unterseits weniger-filzigen *B.*: *V. austriacum* Schr. *V. virens* Host. fl. a. und:

β. Chaixi, *B.* an der Basis fast leyerf.-eingeschnitten: *V. Chaixi* Vill. delph. t. 13., nicht gut. *V. gallicum* Willd. D.

IV. Rotte. *B.* nicht hinablaufend. Bth. einzeln oder gezweiet.

12. *V. PHOENICEUM* (L.) Dunkelviolettes W. — *B.* unterseits flaumig, *die wurzelst. gestielt, eyf. oder länglich, gekerbt*, die mittlern und obern stengelst. viel kleiner, klein-gekerbt, sitzend; *Tr. drüsig-behaart*; *Bthstielchen einzeln*, viel länger, als die DeckB.; Stbk. sämmtl. gleich, nicht hinablaufend. ☉. Auf unkult., sonnigen Hügeln, (von dem Littorale nach Krain, Oestr., Mähr., Schles. und Böhm., Sachsen und Thüring. bis Magdeburg; Oberbayern und Tyrol.) Jun. Jul. J. a. t. 225. Bth. ansehnlich, dunkel-violett, mit gelblicher Röhre. D.

13. *V. BLATTARIA* (L.) Motten-W. — *B.* kahl, die untern *verkehrt-eyf.-länglich*, an der Basis *verschmälert, buchtig*, die stengelst. länglich, spitz, gekerbt, sitzend, die obern fast herzf., zugespitzt, halbstengelumfassend; *Tr. drüsig-behaart*; *Bthstielchen einzeln*, $1\frac{1}{2}$ oder noch einmal so lang, als die DeckB. ☉. An kiesigen feuchten O., Wegen. Jun. Jul. Bth. gelb, an der Basis inwendig violett-bärtig. Stbf. violett-wollig. Var. selten

mit weissen Bth., eine Variet., welche hie und da häufiger vorkommt.

Die nachfolgenden Arten sind Bastarde, oder werden doch für solche gehalten.

a. B. halbherablaufend. Bth. gelb. Wolle der Stbf. weiss.

14. V. THAPSO-LYCHNITIS (M. und K. D. fl. 2. S. 212) V. SPURIUM (Koch Synops. ed. 1.) Bastard-W. — B. gekerbt, *halbhinablaufend*, filzig, der Filz angedrückt, grau; der St. *oberwärts scharf-kantig*; Bthstielchen so lang, als der K.; *Stbf. sämmtl. weiss-wollig*; *Stbk. gleich*, die der längern Stbf. *nicht hinablaufend*. ☉. Auf unkult. Hügeln, (einmal in der Rheinpfalz gesammelt; bei Offenbach, Fl. der Wett., Lehmann; Schwarzb. Rudolstadt, Apoth. Hoë.) Jul. Aug. V. Thapso-Lychnitis M. und K. D. fl. 2. p. 212., mit Ausschl. des Syn. der Fl. lusit. — Stellt das V. Lychnitis dar, unterscheidet sich aber von diesem doch die hinablaufenden B., den dickern Filz, die kürzergestielten Bth., und grössern K. Scheint ein Bastard von V. Lychnitis und V. Schraderi zu seyn.

15. V. THAPSIFORMI-LYCHNITIS (Schiede de pl. hybr. S. 38.) V. RAMIGERUM (Schrader Monogr. t. 4.) Aestiges W. — B. gekerbt, kurz- oder *halbherablaufend*, filzig, der Filz angedrückt, graulich; der St. *oberwärts scharfkantig*; Büschel der Tr. *reichblüthig*; die blüthentrag. Bthstielchen *länger, als der K.*; *Stbf. sämmtl. weisswollig*; *Stbk. der längern Stbf. auf der einen Seite kurzhinablaufend*. ☉. An unkult. O., auf Triften, (hin und wieder im Gebiete.) Jul. Aug. V. Thapsiformi-Lychnitis D. fl. 2. 213. Dem vorhergehenden sehr ähnlich, untersch. sich aber doch die 3 mal grössern Blumen, fast von der Grösse wie die bei V. thapsiforme und doch die auf der einen Seite der längern Stbf. deutlich hinablaufenden Stbk. Scheint ein Bastard von V. Lychnitis und V. thapsiforme zu seyn.

b. B. kurz- oder halb herablaufend. Bth. gelb. Wolle der Stbf. heller- oder dunkler-violett.

16. V. THAPSIFORMI-FLOCCOSUM? V. NOTHUM (Koch.) Unächtcs W. — B. gekerbt, kurz- od. halbhinablaufend, filzig, der Filz gelblich-grau, die obern lang-haarspitzig; St. *stielrund*; *Büschel der Tr. reichblüthig*; die blüthentrag. Bthstielchen so lang, als der K.; *Stbf. weiss-wollig, oder die längeren purpurn-wollig*; *Stbk. der längern Stbf. etwas hinablaufend*. ☉. Auf unkult. Hügeln, an Wegen, (bei Mainz in Gesellschaft von V. floccosum und and. Arten.) Jul. Aug. Steht gleichsam zw. V. floccosum und V. thapsiforme in d. Mitte. Bth. desselben noch einmal so gross, als bei V. floccosum, übrig diesem ähnlich, wenn man die hinablaufenden B. und die Wolle der Stbf. ausnimmt, welche an den längern bald weiss, bald hell-, bald dunkler purpurn erscheint. Mein Freund Ziz hielt es für einen Bastard von V. thapsiforme und V. floccosum, dieser Meinung steht aber der violette Filz der Stbf.

im Wege. Vielleicht gehört hieher *V. nigro-pulverulentum* Sm.? doch die grossen Bth. und die dicht-flockig-bestäubte R. stimmen weder mit *V. nigrum*, noch mit *V. pulverulentum* überein.

17. *V. THAPSO-NIGRUM* (Schiede de pl. hybrid. S. 32.) *V. COL-LINUM* (Schräd.) Hügel-W. — B. gekerbt, halbhinablaufend, filzig, der Filz gelblich, die obern länglich, spitz; der St. *oberwärts scharf-kantig*; Büschel der Tr. meist 5bth.; die bthtrag. Bthstielchen so lang, als der K.; *Stbf. sämmtl. purpurn-wollig*; *Stbk. gleich, keine hinablaufend.* ☉. An schattigen, steinigen O., (im nördl. D.; in Hessen; bei Hessellohe oberhalb München; bei Altötting in Oberbayern; Grätz und Steyer.) Jul. Aug. *V. Thapso-nigrum*. D. fl. 2. p. 211. *V. ambiguum* Lej., wegen der „viel kleinern Blumen, als die bei *V. nemorosum*.“ — Das *V. seminigrum* Fries kann ich jetzt nicht vergleichen.

18. *V. THAPSIFORMI-NIGRUM* (Schiede de pl. hybrid. S. 36.) *V. ADULTERINUM* (Koch.) Gefälschtes W. — B. gekerbt, kurz- oder halbhinablaufend, filzig, der Filz graulich, die obern haarspitzig; der St. *oberwärts scharf-kantig*; Büschel der Tr. 5-7bth.; die blüthentrag. Bthstielchen so lang, als der K.; *Stbf. sämmtl. purpurn-wollig*; *Stbk. der längern Stbf. länglich, hinablaufend.* ☉. Im Flussklese, auf Triften, hie und da. Jul. Aug. *V. thapsiformi-nigrum*. D. fl. 2. p. 211. Bth. ansehnlich, von der Grösse wie bei *V. phlomoides*. Scheint ein Bastard von *V. thapsiforme* und *V. nigrum*.

c. B. kurz-herablaufend. Bth. rothbraun, Wolle der Stbf. violett.

19. *V. THAPSO-PHOENICEUM?* *V. VERSIFLORUM* (Schräd.) Rostfarbiges W. — B. gekerbt, kurzhinablaufend, filzig, der Filz graulich; der St. stielrund; Tr. rispig, die *Hauptbüschel 3-5bth.*; die *blüthentrag. Bthstielchen 1½ mal, die fruchtrag. fast 3 mal so lang, als der K.*; *Stbf. violett-wollig*; *Stbk. der längern Stbf. etwas herablaufend.* ☉. An unkult. O., (bisher bloss bei Prag in Böhm.) Jul. Aug. *Bth. rostfarben.* Eine mir nur aus der Beschreibung Schrader's bekannte Pflanze. D.

d. B. nicht herablaufend. Bth. büschelig, gelb. Wolle der Stbfg. weiss.

20. *V. LYCHNITIDI-FLOCCOSUM* (Ziz. in Brief.) *V. PULVERULENTUM* (Vill., nach Schräd.) Bestäubtes W. — B. gekerbt, *oberseits dünn-, unterseits dichter-filzig*, der Filz graulich, die untern länglich-elliptisch, in den Bstiel hinablaufend, die übrigen *sitzend*, die obern zugespitzt; der St. *oberwärts nebst den Aesten stumpf-kantig*; Tr. rispig, *abstehend*; *Stbf. weiss-wollig.* ☉. Auf Hügeln und an Wegen, (bisher bloss im Elsass und in der Gegend von Mainz.) Jul. Aug. Mein Freund Ziz hielt es für einen Bastard von *V. floccosum* und *V. Lychnitis*.

e. B. nicht herablaufend. Bth. büschelig, gelb. Wolle der Stbfg. purpurn.

21. *V. NIGRO-FLOCCOSUM*, *V. SCHOTTIANUM* (Schräd. mon. t. 3.

f. 2.) Schott's W. — *B. gekerbt, beiderseits filzig, oberseits dünner, unterseits dichter, die wurzelst, oval-länglich, ziemlich spitz, gestielt, die mittlern stengelst. länglich, spitz, sitzend, die obere eyf., zugespitzt, fast herzf., halbstenelumfassend; der St. oberwärts kantig; Aeste rispig; Bthstielchen noch einmal so lang, als der K.; Stbf. purpurn-wollig.* ☉. Auf unkultiv. Hügeln, an Wegen, selten. (Oestr.: Schott: Guehwiler im Elsass, Mühlenb.; Coblenz, Wirtgen; Rheinufer unterhalb Niederbreisig und oberhalb Hönningen unweit Linz, Bogenhard; Vevey Cant. Waadt.) Jul. Aug. V. mixtum Thom. pl. exsicc. Diese Pfl. scheint ein Bastard von *V. floccosum*, dem sie am nächsten steht, und wovon sie sich nur durch den kaum flockigen Filz und den violetten Ueberzug der Stbgf. unterscheidet: Expl. aus der Rheingegend ähneln mehr dem *V. nigrum*.

22. *V. NIGRO-LYCHNITIS* (Schiede pl. hybr. S. 40.) *V. SCHIEDRANUM* (Koch.) — Schiede's W. — Die *B. gekerbt, oberwärts fast kahl, unterseits fein-filzig, die unteren stengelst. länglich-eyf., an der Basis stumpf, in den Bstiel gezogen, lang-gestielt, die oberen eyf.-längl., fast sitzend; St. oberwärts scharfkantig; Tr. verlängert; Bthstielchen noch einmal so lang, als der K.; Stbgf. purpurn-wollig.* ☉. An unkultiv. O., (sehr zerstreut doch das Gebiet.) Jul. Aug. V. nigrum γ. ovatum Koch Syn. ed. 1.

f. B. nicht herablaufend Bth. rostfarben.

23. *V. NIGRO-PHOENICEUM* (F. W. Schultz.) *V. RUBIGINOSUM* (W. und Kit.) Röthlich-braunes W. — *B. gekerbt, unterseits flaumig, die untern länglich, stumpf, gestielt, die stengelst. länglich-eyf., ziemlich spitz, sitzend, die obere eyf., spitz, fast herzf., halbstenelumfassend; Tr. rispig; Bthstielchen vielmals länger, als der K.; Stbf. purpurn-wollig.* ☉. Auf Feldern, (von Herrn Dr. Schultz bei Berg eine Stunde von München auf dem rechten Isarufer in wenigen Expl. gefunden, bei Brünn in Mähren, Reisseck; auch über Montreux am Genfersee nach Gaud.) Jun. Jul. Bth. auswendig roth-braun, inwendig gelb-braun, nach der Röhre zu violett-gefleckt.

g. B. nicht herablaufend. Bth. einzeln oder zu zweien, gelb Wolfe der Stbgf. violett.

24. *V. LYCHNITIDI-BLATTARIA* (Koch.) *V. PSEUDO-BLATTARIA* (Schleich. pl. exsicc.) Falsches Motten-W. — Die *B. oberseits wenig, unterseits dichter flaumig, die wurzelst. längl.-lanzettl., spitz, an der Basis allmählig in den breiten Bstiel verschmälert, doppelt-gekerbt, oder etwas buchtig, die mittleren länglich, die oberen ey-herzf., zugespitzt, gekerbt mit kurzbespitzten Kerben; St. oberwärts ästig, die Aeste ruthenf., sowie die Bthstiele und K. von kurzen borstigen Haaren rauh; Bth. einzeln oder zu zweien, die Bthstielchen so lang, als der K. und nach dem Verblühen etwas länger.* ☉. An unkultiv. O., Wegen, (Wallis.) Jun. Jul. *V. blattarioides* Gaud. fl. helv., nicht Lamarck; (dieses unterscheidet sich durch sehr kurze Bthstielchen. 2-3 mal kürzer, als

der K., und dch noch einmal so grosse K.) Bth. gelb mit violetter Wolle der Stbgf. „Die Kapseln kommen kaum jemals zur Reife, so dass diese Pfl. wahrscheinlich ein Bastard von V. Blattaria und V. Lychnitis ist, in deren Gesellschaft sie wächst.“ Gaud.

2. SCOPHULARIA (L.) Braunnwurz. — Blkr. fast kugelig, mit einem kleinen Saume, 5lappig, der untere Lappen zurückgebogen. Stbg. 4, zweimächtig; oft ein Ansatz zu einem fünften Stbf., nämlich ein Rudiment eines Stbg., dessen Stielchen an die Blkr. angewachsen ist.

1. Rotte. Rispe. Bth. in endst., länglichen, aus gabelsp. Aesten zsgesetzten Tr.

a. Unter der obern Lippe ein rundliches oder nierenf. oder quer-längliches Auhängsel, aus dem Ansätze zu einem fünften, unfrucht. Stbf. entstanden.

1. S. NODOSA (L.) Gemeine B. — B. eyf.-länglich, eyf. oder fast herzf., kahl, doppelt-gesägt, die untern Sägezähne länger und spitzer; der St. geschärft-4 eckig; Bstiele flügellos; R. endst.; KZpfl eyf., stumpf, sehr schmal-häutig-berandet; Anhang des Stbf.-Rudimentes kurz-verkehrteyf., quer-länglich, seicht ausgerandet. 4. In feuchten Wäldern, an Gräben, Ufern, Wiesengebüsch. Jun. - Aug. St. h. 23. Bth. trüb olivengrün, auf dem Rücken braun, selten ganz grün.

2. S. EHRHARTI (C. A. Steven, conf. Babingt. manual of brit. bot. S. 218.) Ehrhart's B. — Die B. eyf.-länglich, eyf., oder etwas herzf., kahl, scharf-gesägt, die untern Sägezähne kleiner; St. und Bstiele breit-geflügelt; R. endst.; Zpfl des K. rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet; Anhang des Stbf.-Rudimentes verkehrt-herzf., 2lappig, mit spreitzenden Lappen. 4. An Flüssen, Bächen, Teichen, Gräben und im Wasser selbst. Jul.-Sept. S. aquatica Koch Synops. ed. I. und aller Autoren bis auf den heutigen Tag. D. fl. St. h. 23. Die Bth. sind auf dem Rücken purpurn-braun und weniger trüb, als bei dem vorigen. Die Aeste der Rispe stehen in einem halbrechten Winkel ab.

3. S. NEESH (Wirtgen, Verh. des naturh. Ver. I. S. 29.) Nees's B. — B. eyf.-längl., oder eyf., kahl, die untern stumpflich, gekerbt, die mittlern und oberen scharf-gesägt, die untern Sägezähne kleiner; St. und Bstiele breit-geflügelt; R. endst.; Zpfl des K. rundlich, ganz stumpf, breit-häutig-berandet; Anhang des Stbf.-Rudimentes quer-längl., 3 mal breiter, als lang, hinten abgestutzt, vorne seicht- und meist mit einem Zähnchen ausgerandet. 4. An Bächen und Flüssen. (an der Nette bei Neuwied, im Siechhausthale bei Coblenz; bei Düsseldorf, Wirtgen.) Jul.-Sept. „In allen Theilen zarter, Aeste des St. und der R. fast rechtwinkelig abstehend; Blkr. heller roth, wie bei der vorhergehenden, und das Roth derselben, mit Ausnahme der Basis, nie mit Grün vermischt.“ Wirtgen. Der Anhang des Stbf.-Rudimentes ist an der vorderen Seite oft ausgerandet mit einem dazwischen liegenden Zähnchen.

4. *S. BALBISH* (Hornem.) *Balbisens* B. — *B. herzf.-länglich*, abgerundet-stumpf, *kahl, stumpf-gekerbt*, an der Basis oft mit einem kleinen Blättchen beiderseits geöhret; *der St. nebst den Bstielen breit-geflügelt*; R. endst.; KZpfl rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet; Anhang des Stbf.-Rudimentes rundlich oder rundlich-nierenf., *kaum ausgewandet*. 4. An sumpfigen, feuchten O., Gräben, (bei Aachen häufig, Hornung; am Ufer der Mosel von Moselweiss bis Coblenz, 1-3 Stunden von Coblenz entfernt, Wirtgen; Carlsruh, Alex. Braun; im Elsass, Kirschleger) Jun. Jul. *S. aquatica* L. nach Steven., vergl. Babingt. manuale. Die Bth. sind grösser, als bei *S. Ehrharti*, ganz purpurn-braun, nur an der Basis grün. D.

5. *S. SCOPOLI* (Hoppe Pers.) *Scopoli's* B. — *B. eyf.-länglich* oder eyf., fast herzf., *beiderseits flaumig*, doppelt-gekerbt; der St. nebst den Bstielen zottig; R. endst.; KZpfl rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet. ☉. In Gebirgswäldern, (Schles., Mähr., Steyerm., Kärnth., Krain.) Jun. Jul. *S. glandulosa* W. und Kit. *S. auriculata* Scop., nicht L. *S. scorodonia* Host., nicht L. *S. granidentata* Tenor. fl. neap. prodr. nach einem Expl. des Autors in dem Herb. von Martius. Bth. wie bei *S. nodosa*. D.

6. *S. LACINIATA* (W. und Kit.) *Geschlitzte* B. — *B. kahl, lap-pig-eingeschnitten* und *an der Basis fiedersp. oder gefiedert*; Lappen und Fieder ungleich-gezähnt; R. endst., drüsig, Drüsen kurzgestielt; KZpfl rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet; *Ansatz des 5. Stbf. rundlich-nierenf.* 4. Auf Felsen und an Mauern, (bei Finne in Menge.) Apr. Mai. *S. lucida* MBieb., nicht L. Bth. grün, auf dem Rücken der Oberlippe purpurn-braun. J.

b. Anhangsel unter der obern Lippe schmal, lineal oder lanzettl., spitz, auch ganz fehlend.

7. *S. CANINA* (L.) *Hunds-B.* — *B. kahl, gefiedert*, Fieder ungleich- oder eingeschnitten-gezähnt; R. endst., drüsig, Drüsen fast sitzend; KZpfl rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet; *Ansatz des 5. Stbf. lanzettl., spitz oder auch fehlend; die Oberlippe der Blkr. 3 mal so lang, als die Röhre.* 4. An gebirg. und sandig. O. an Seefern und im Flusskiese, (in der Schw. an vielen O., längs dem Rheine auf Kies, von der Schw. bis Rastatt; im südl. Tyrol, Krain und dem Littor.) Jun. Jul. Rb. ic. f. 970. *S. canina* Wydler, mit Ausschl. der Variet. γ. und δ. *S. atropurpurea* Morett., nach Wydler. — *S. chrysanthemifolia* MBieb. untersch. sich nach Expl. vom Autor in Willd. Herb. dch. kein Merkmal von dieser. — Blkr. klein, violett-roth, die seitenst. Zpfl weisslich, der unterste weisslich-berandet. Var.: die obern Zpfl weisslich-berandet und die seitenst. ganz-weiss. — Die Bth. sind zwar nicht ganz sitzend, wie sie Linne nennt, aber doch viel kürzer gestielt, als bei der folgenden. Sonst hätte er die gegenwärtige nicht „mit sitzenden Blüthen“ definiren können.

8. *S. HOPPI* (Koch.) *Hoppe's* B. — *B. kahl, gefiedert* und

doppelt-geliedert. Zpfl eingeschnitten und gezähnt; R. endst., drüsig-behaart, Haare fast so lang, als der Querdchmesser der Bthstielchen; KZpfl rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet; *Ansatz des 5. Stbf. lanzettl., spitz oder auch fehlend; Oberlippe der Blkr. länger, als die halbe Röhre.* ☉. In ATHälern; auch in das niedrigere Gebirge der südlichen Seite herabsteigend, (auf dem Nanas in Krain; im Bodenthale und auf d. Loibel in Kärnten; Steyermark; auf d. Schlehern im südl. Tyrol, und dem Jura in der Schw.) Jul. Aug. S. canina Hoppe. S. canina Var. β . und γ . DC. fl. fr. S. canina Wydl. Var. γ . und δ . Bth. violett, wie bei der vorhergehenden, aber der K. noch einmal so gross, Bthstielchen meist so lang, als die Kapsel.

H. Rotte. Bth. blattwinkelst.; Bthstiele mehrblüthig und ebensträussig, oder nur 1-2bth.

9. S. VERNALIS (L.) Frühlings-B. — B. herzf., doppelt-gekerbt, flaumig; *der St. nebst den Bstielen zottig; Bthstiele blattwinkelst., 3-7bth.; Bth. ebensträussig-gehäuft; KZpfl länglich, ziemlich spitz, unberandet, an der Spitze zurückgekrümmt.* ☉. An feuchten O. unter Gebüsch, an Zäunen und Wegen, (sehr zerstreut dch das Gebiet.) Mai. Jun. St. h. 23. S. vernalis und S. latifolia Host. Bth. gelb, in das Grünliche spielend.

10. S. PEREGRINA (L.) Fremde B. — B. herzf., grob-, fast doppelt-gekerbt-gesägt, kahl, glänzend, die obern wechselst.; Bthstiele blattwinkelst., armbth.; *KZpfl ey-lanzettf., zugespitzt, unberandet.* 4. An kultiv. O. und auf Schutthaufen, (Istrien und auf den Inseln.) April. Mai. Bth. dunkel-blutroth. J.

LXXXIII. Ordng. ANTIRRHINEEN. Juss. gen. 118. Dub. bot. gall. p. 342. Personatae DC. fl. fr. 3. p. 573. Scrophularinearum gen. R. Brown.

K. gespalten, bleibend. *Blkr. 1blättrig, unterweibig, unregelmässig oder ungleich, abfällig, in der Knospenlage dachig. Stbg. 4, zweimüchtig oder 2, der Blkr. eingefügt; Stbk. an der Basis ohne Anhängsel.* Fruchtkn. frei, 2fächerig, vieleiyig, die Samenträger an der Mitte der Scheidewand angewachsen. Gf. 1. N. ungeth. oder 2lappig. Frucht eine Kapsel oder Beere. *Keim von dem fleischigen Eyweiss eingeschlossen, gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B., wenigstens die untern, gegenst.*

1. GRATIOLA (L.) Gnadenkraut. — K. 5th. Oberlippe der Blkr. 2sp.; Unterlippe 3sp. Stbg. 4, 5, der Röhre eingefügt, 2 davon vollkommen. Stbk. hängend, mit 2 Ritzen aufspringend. N. 2plattig.

1. G. OFFICINALIS (L.) Gebräuchliches G. — B. sitzend, lanzettl., 3nervig, kleingesägt, an der Basis ganzrandig; Bthstiele blattwinkelst., 1bth. 4. Auf feuchten Wiesen, an Ufern, (stw. dch

das g. Gebiet.) Jul. Aug. Schk. t. 2. Bth. weiss oder sehr blass-rosenfarb. mit gelblicher Röhre.

2. *DIGITALIS* (L.) Fingerhut. — K. 5th. Blkr. glockig, mit schiefer, 4sp. Saume, der obere Zpfl ausgerandet. Stbg. 4, zweimächtig, in dem Grunde der Blkr. eingefügt; Säckchen der Stbk. spreitzend, daher das Stbk. quer-aufspringend. Kapsel dch die eingebogenen Klappenränder 2 fächerig; Samenträger oberwärts frei.

1. *D. PURPUREA* (L.) Rother F. — B. ey-lanzettf., gekerbt, *unterseits nebst dem St. und den Bthstielen filzig*, die untern in den Bstiel verschmälert; KZpfl ey-lanzettf., kurz-zugespitzt, 3nervig, flaumig; *Blkr. erweitert-glockig, auswendig ganz kahl*; Oberlippe sehr stumpf, abgestutzt oder seicht-ausgerandet; Zpfl der Unterlippe kurz-eyf., abgerundet. ☉. An gebirg., rauhen, waldig. O., (von der nördl. Grenze der Schw. dch die Voges. und die Gebirge auf dem linken Rheinufer bis nach der Eifel, auf dem rechten dch den Schwarz- und Odenwald, Hessen bis Westphalen und bis zum Harze und dch den ganzen Thüring. Wald.) Jun.-Aug. St. h. 11. Bth. purpurn, selten fleischroth oder weiss, inwendig mit satt-purpurnen, weiss-berandeten Punkten bestreut.

2. *D. PURPURASCENS* (Roth.) Geschminkter F. — B. länglich-lanzettl., gesägt, kahl, unterseits auf den Nerven flaumig, die untern in den Bstiel verschmälert, die obern mit eyf. Basis sitzend; KZpfl länglich-lanzettl., zugespitzt, 3nervig, am Rande nebst den Bthstielen und dem K. oberwärts drüsig-flaumig; *Blkr. röhrtig-glockig, auswendig ganz kahl*; Oberlippe stumpf, ausgerandet; Zpfl der Unterlippe eyf., die seitenst. ziemlich spitz, *der mittlere sehr stumpf, viel kürzer, als die Blkr.* ☉. Auf Porphyrgebirgen der Rheinpfalz. (in der Gegend von Kusel im baier. Rheinkreise und auf den einige Stunden davon entfernten Gebirgen der Nahe; nach Lejeune auch bei Lüttich und Malmedy.) Jun.-Aug. Rb. ic. 2. f. 284. *D. longiflora* Lej., dessen *D. purpurascens* eine kleinblumige Varietät von *D. purpurea* ist. *D. purpureo-lutea* Meyer. *D. lutea* γ. *hybrida* Lindl. — Vielleicht ein Bastard aus *D. purpurea* und *D. lutea*, wächst aber an den angegebenen O. oft einzeln und nicht unter den verwandten Arten und pflanzt sich dch Samen fort. Blkr. gelb, mit einem hellpurpurnen Anstrich, seltner ganz purpurn; inwendig bleich und auf dem Bauche mehr oder weniger mit purpurnen Punkten bestreut. D.

3. *D. GRANDIFLORA* (Lam.) Grossblüthiger F. — B. länglich-lanzettl., gesägt, gewimpert, *flaumig*, die untern in den Bstiel verschmälert, die obern mit eyf. Basis halbstengelumfassend; KZpfl lanzettl., spitz; Bthstiele nebst dem St. oberwärts drüsig-behaart; *Blkr. erweitert-glockig, drüsig-flaumig*; Oberlippe sehr stumpf, ausgerandet oder etwas gezähelt; Zpfl der Unterlippe 3eckig, *der mittlere noch einmal so breit, spitz oder stumpf, viel kürzer, als die Blkr.* 4. An felsigen und steinigen O. der Gebirge; in die Vora hinaufsteigend. Jun. Jul. *D. ambigua* Murr. D.

ochroleuca J. a. t. 75. D. lutea Pollich. Blkr. trüb-schwefelgelb, inwendig von braunen Linien netzartig-wolkig. Var.:

a. *acutiflora*, Zpfl der Unterlippe spitz: D. ambigua St. h. H. D. ochroleuca Lindl. D. grandiflora Rb. ic. 2. t. 189.

β. *obtusiflora*, Zpfl der Unterlippe stumpf: D. ambigua Lindl. D. ochroleuca Rb. ic. 2. t. 290.

4. D. MEDIA (Roth.) Mittlerer F. — B. länglich-lanzettl., gesägt, kahl, gewimpert, die untern in den Bstiel verschmälert, die obern mit eyf. Basis sitzend; KZpfl lanzettl., Inervig, spitz, am Rande nebst den Bthstielen und dem St. oberwärts, drüsig-flaumig; Blkr. röhrig-glockig, auswendig drüsig-flaumig; Oberlippe stumpf, ausgerandet, Läppchen spitz; die seitenst. Zpfl der Unterlippe 3eckig, spitz, der mittlere eyf., stumpf, viel kürzer, als die Blkr. ☉. An gebirg., waldig. O., (auf den Porphyrgebirgen der Rheinpfalz, bei Kusel und Nideralben selten; bei Wieselbach, in der Gegend von Oberstein an der Nahe, in Gesellschaft von D. lutea und D. grandiflora in Menge, Bogenhard; in den Thälern des Jura, aber selten.) Jun.-Aug. Rb. ic. 2. f. 281. D. intermedia Pers. D. ambiguo-lutea Meyer. Unters. sich von D. lutea dch die grössern, breitern, inwendig am Bauche schwach braun-netzigen und an der Einfügung der Stbg. beiderseits mit einer breitem rothfarbnen Binde bezeichneten Blkr. Man hält sie für einen Bastard aus D. grandiflora und D. lutea.

5. D. LUTEA (L.) Gelber F. — B. länglich-lanzettl., gesägt, kahl oder an der Basis etwas gewimpert, die untern in den Bstiel verschmälert, die obern mit eyf. Basis sitzend; der St. nebst den Bthstielen kahl; KZpfl lanzettl., Inervig, spitz, am Rande drüsig-flaumig; Blkr. röhrig, auswendig kahl; Oberlippe spitz-ausgerandet, mit spitzen Läppchen; Zpfl der Unterlippe eyf., die seitenst. spitz, der mittlere ziemlich spitz oder stumpf, viel kürzer, als die Blkr. ☉. Auf Hügeln und rauhen Gebirgen, (Schw., südl. Tyrol, Oberschwaben, Schwarzwald, Odenwald und vom Elsass dch das Geb. der Rheinpfalz bis nach Luxemb. und Lüttich.) Jun.-Aug. Rb. ic. 2. f. 280.

6. D. FUSCESCENS (W. und Kit.) Bräunlicher F. — B. länglich-lanzettl., entfernt-gezähnel, kahl, gewimpert, die untern in den Bstiel verschmälert, die obern mit eyf. Basis stengelumfassend; KZpfl länglich-lanzettl., spitz, nebst den Bthstielen und dem St. oberwärts wollig-zottig; Blkr. glockig, drüsig-flaumig; Oberlippe stumpf, ausgerandet, die seitenst. Zpfl der Unterlippe 3eckig, der mittlere eyf., kurz-zugespitzt, so lang, als der dritte Theil der Blkr. ☉. An gebirg. O. der wärmern Gegend., (bei Finne.) Jul. Rb. ic. 2. f. 288. D. lanato- (laevigato-) ambigua Meyer. Blkr. ochergelb, inwendig mit einem rothbraunen, auswendig durchschimmernden Netze bemalt. — Meyer hält sie für einen Bastard aus D. lanata oder D. laevigata, welche beide er nicht als Arten trennt und aus D. grandiflora. J.

7. D. LAEVIGATA (W. und Kit.) Geglätteter F. — B. lanzettl., entfernt-gezähnel oder ganzrandig und nebst dem St. kahl; KZpfl

lanzettl., zugespitzt, am Rande so wie die Blkr. drüsig-flaumig; Blkr. kurz-glockig, hinter der Unterlippe buckelig, *der mittlere Zpfl der Unterlippe fast so lang, als die Blkr., eyf., zugespitzt*. ☉. Auf steinigcn Hügeln der wärm. Gegend., (Innerkrain und bei Fiume.) Juli. Blkr. ochergelb, mit braunen Adern gestreift und netzig, Unterlippe weiss, mit bleichgrünen Adern bezeichnet. D.

S. D. FERRUGINEA (L.) Rostrother F. — B. *lanzettl., entfernt-gesägtelt*, etwas gewimpert: *KZpfl längl.-eyf., abgerundet-stumpf, mit einem breit-häutigen Rande umgeben*; Blkr. kurz-glockig, hinter der Unterlippe buckelig, *der mittlere Zpfl der Unterlippe fast von der Länge der Blkr., eyf., abgerundet-stumpf*. ☉. An felsigen O., (im wärmern Krain und Littor.) Juli. Aug. Rb. ic. 2. f. 286. Blkr. ochergelb, inwendig rostroth, auf der Unterlippe mit einem braun-purpurnen Netze.

D. LUTESCENS Lindl. mon. t. 21., welche ich noch nicht sah, ist nach Meyer chlor. hanov. dieselbe Pflanze wie D. fucata Ehrh. und ein Bastard aus D. purpurea und D. grandiflora. D.

3. ANTIRRHINUM (L., mit Ausschl. von Arten.) — Löwen-maul. — K. 5th. Blkr. an der Basis buckelig, 2lippig; Unterlippe 3sp., in der Mitte aufgeblasen-hervortretend und den Schlund verschliessend; die obere 2sp. oder 2th. Stbg. 4. zweimächtig. Kapsel an der Spitze mit 3 Oeffnungen aufspringend

1. A. MAJUS (L., mit Ausschl. der Var. a.) Grosses L. — B. gegenst. oder wechselst., *lanzettl., kahl*; Bth. traubig; *KBlättchen eyf., stumpf, viel kürzer, als die Blkr.*; Oberlippe der Blkr. 2th. 4. Auf alten Mauern an felsigen Bergabhängen und im Flusskiese, (Südtirol bei La Sega unweit Roveredo an sehr warmen Abhängen, Facchini; Istr., Oestr., Böhm. und Schles., in der westl. Schw., und von da auf allen alten Mauern und Kirchen von Basel bis an die Niederlande, aber nur längs dem Rheine hin.) Juni-Aug. Blkr. $1\frac{1}{2}$ Zoll. purpurn oder weiss, mit 2 gelben Flecken auf dem Gaumen. (die Hervorragung auf der Unterlippe, die man Gaumen nennt.) — Das A. majus a. L. A. latifolium Mill. ist vielleicht im östr. Littor. zu finden, es untersch. sich dch folg.: die ganze Pflanze ist von der Basis an dicht mit drüsentrag. Haaren bedeckt; B., auch die obern, sind breit, oval, oder oval-lan-zettl.; Bth. gelb; Gaumen dunkler, manchmal purpurn-gestreift; Oberlippe kürzer und nicht bis zur Mitte 2sp.

2. A. ORONTIUM (L.) Feld-L. — B. gegenst. oder wechselst., *lanzettl.*; Bth. entfernt; *KZpfl lanzettl., länger, als die Blkr.* ☉. An kultiv. O. auf Schutt. Juli-Herbst. St. h. 27. Bth. purpurn, selten weiss.

4. LINARIA (Tournef. Mill.) Leinkraut. — K. 5th. Blkr. an der Basis gespornt, 2lippig; Unterlippe 3sp., in der Mitte aufgeblasen-hervortretend, den Schlund mehr oder weniger verschliessend; Oberlippe 2sp. oder 2th. Stbg. 4. zweimächtig. Kapsel an der Spitze in 2 Klappen aufspringend, wobei ein den Griffel tra-

gender Theil, der wie ein Bogen die Scheidewand überdeckt, zurückbleibt. Klappen ungeth. oder 3sp.

I. Rotte. CYMBALARIA. Die St. von der Basis an in rankenartige, fädliche, niedergestreckte Aeste geth. B. breit, rundlich, ey- oder spiessf., sämmtl., auch die obersten, deutlich-gestielt. Bthstiele dünn, verlängert, einzeln in den Winkeln der B. und zwar von der Basis bis an die Spitze des St. Schlund deh den Gaumen nicht völlig geschlossen.

1. L. CYMBALARIA (Mill.) Eckigblättriges L. — B. herzf.-rundlich, *stappig*, kahl. 4. Auf alten Mauern, vorzügl. von Weinbergen; auch hier u. da, aber seltner, in Felsenspalten, (südl. D u. Schw., weniger im nördl. D.) Juni-Aug. St. h. 70. Antirrhinum Cymbalaria L. Cymbalaria muralis Fl. wett. Blkr. hell-violett; Gaumen weiss. mit 2 dottergelben Höckern; eine Variet. mit kleineren weissl. Bth. sandte G. W. Bischoff.

2. L. ELATINE (Mill.) Liegendes L. — B. zerstreut, *ey-spiessf.*, die untern eyf.; der St. niedergestreckt; *Sporn gerade*; Bthstiele kahl. ☉. Auf Aeckern, Kalk- und Lettenboden. Juli-Herbst. St. h. 70. Antirrhinum Elatine L. Blkr. weisslich; Oberlippe an der inneren Oberfläche violett; Unterlippe schwefelgelb.

3. L. COMMUTATA (Bernhardi.) Verwechseltes L. — B. zerstreut, *spiessf.*, die untersten verkehrteyf.; die St. niedergestreckt; *Sporn fast hakig*; Bthstiele kahl. ☉. Auf Aeckern in Istr., auf der Insel Brioni. Aug. Sept. Blkr. noch einmal so gross, als bei der vorhergehenden. J.

4. L. SPURIA (Mill.) Unächtcs B. — B. zerstreut, *rundlicheyf.*, *ganzrandig*; die St. niedergestreckt; Sporn bogig; Bthstiele zottig. ☉. Auf Aeckern, Kalk- und Leimboden. Juli. Aug. St. h. 70. Antirrhinum spurium L. Bth. weisslich, die Oberlippe an der inneren Oberfläche schwarz-violett, Unterlippe hellgelb.

II. Rotte. CHAENORRHINUM DC. fl. fr. 5. p. 140. Bth. einzeln in den Blattwinkeln, beblätterte, sehr lockere Tr. bildend; B. lanzettl. oder elliptisch, die untern mehr oder weniger deutlich-gestielt, die obern sitzend. Schlund meist deh den Gaumen nicht völlig geschlossen.

5. L. MINOR (Desf.) Kleines L. — *Ueberall drüsig-behaart*; B. lanzettl., stumpf, in den Bstiel verschmälert, die untern gegenst., die obern wechselst., lineal.; Bth. einzeln, blattwinkelst., fast traubig; *Bthstiele 3mal so lang, als der K.*; *Zpfl der Oberlippe spreitzend*; Samen länglich, gefurcht. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. Juli-Herbst. St. h. 70. L. viscida Moench. Antirrhinum minus L. Blkr. hell-violett, mit gelblichweissen Lippen.

6. L. LITTORALIS (Bernhardi) Ufer-L. — *Ueberall drüsig-behaart*; B. lanzettl., stumpf, in den Bstiel verschmälert; die untern gegenst., die obern wechselst., schmaler; Bth. einzeln, blattwinkelst., fast traubig; *Bthstiele so lang, als der K.*; *Zpfl der Oberlippe gleichlaufend mit geschlossener Bucht*; Samen läng-

lich, gefurcht. ☉. Am Meeresufer von Istrien. Juni, Juli. St. h. 70. Bth. ein wenig grösser, als bei der vorhergehenden, freudiger-violett. J.

III. Rotte. *LISARIASTRUM* DC. Der St. nebst den Aesten mit einer Tr. oder Aehre endigend. B. sitzend oder nur die untersten in den kurzen Bstiel verschmälert. Schlund dicht geschlossen. — Neben den blüthragenden Hauptstengeln kommen nicht selten andere dünne, fädliche, unfruchtbare, mit kürzern und breiteren B., dichter besetzte Nebestengel vor und zwar nicht allein bei mehrjährigen, sondern auch bei einjährigen Arten.

a. Die untersten B. gegenst. oder quirlig.

7. *L. TRIPHYLLA* (Mill.) Dreiblättriges L. — Kahl: B. gedreiet, sitzend, oval-länglich, nervig; Bth. gedrunken-ährlig; KZpfl länglich, ziemlich spitz, schwach-3nervig, ungleich, länger, als die rundliche, ausgerandete Kapsel; S. schief-eyf., 3kantig, grubig-runzelig. ☉. An kultiv. O. in Istrien. Juni, Juli. *Antirrhinum triphyllum* L. Bocc. sic. t. 22. Bth. gelblichweiss. Gaumen dottergelb, Sporn violett. J.

8. *L. ALPINA* (Mill.) Alpen-L. — Völlig kahl: B. zu viereck. lineal.-länglich, an der Basis verschmälert; Tr. eyf., kurz; KZpfl lanzettl., spitz, kürzer, als die verkehrteyf., an der Spitze nicht ausgerandete Kapsel; S. flach, mit einem kreisrunden Flügel umgeben, glatt. ☉. An steinigen und kiesigen O. der A., mit den Flüssen in die Thäler und die, die A. begleitenden, Ebenen herabsteigend. Juli, Aug. St. h. 31. *Antirrhinum alpinum* L. Blkr. blau, Höcker des Gaumens safrangelb.

9. *L. PELISSERIANA* (Mill.) Langgesporntes L. — Völlig kahl; B. lineal., nach der Basis und Spitze verschmälert, die untern zu viereck. die der unfruchtbaren St. elliptisch; Tr. gestielt, kopfig, später verlängert; KZpfl aus breiterer Basis verschmälert, sehr spitz, noch einmal so lang, als die Kapsel; S. platt-zsgedrückt, kammig-bezimpert. ☉. An steinigen, unkultiv. O. in Istrien, und den benachbarten Inseln. Mai, Juni. *Antirrhinum pelisserianum* L. Blkr. hellblau mit dunkleren Adern, Gaumen weiss, mit bläulichen Streifen; Sporn halb so lang, als die Blkr. Var. mit ein wenig grössern Bth. und mit einem Sporne von der Länge der Blkr.: *Antirrhinum gracile* Pers., nach Salzmann. J.

10. *L. ARVENSIS* (Desf.) Feld-L. — Kahl: K. nebst den Bthstielen drüsig-behaart; B. lineal., nach der Basis und Spitze verschmälert, die untern zu viereck.; Tr. gestielt, kopfig, später verlängert; KZpfl lineal., stumpflich, die untern kürzer, als die verkehrteyf., nicht ausgerandete Kapsel; die Oberlippe der Blkr. aufrecht, eben, mit längl. stumpfen Zipfeln, S. flach, mit einem breiten, kreisrunden Flügel umzogen, glatt. ☉. Auf Aeckern und Sandfeldern: (Rheingegenden bis nach den Niederlanden, sodann im mittlern und nördl. D., Böhmen.) Juli, Aug. St. h. 70. *L. arvensis* a. Desf. *Antirrhinum arvense* a. L. *A. arvense* Willd. Blkr. klein, hellblau, mit dunkleren Streifen; Gaumen weisslich, mit einem feinen, violetten Netze. D.

11. *L. SIMPLEX* (DC.) Einfaches L. — *Kahl; K. nebst den Bthstielchen drüsig-behaart; B. lineal., an der Basis und Spitze verschmälert, die untersten zu vieren; Tr. gestielt, kopfig, später verlängert; KZpfl stumpflich, die untern kürzer, als die verkehrt-eyf., nicht ausgerandete Kapsel; die Oberlippe der Blkr. an den Setten zurückgebogen mit eyf. spitzen Zpfln; S. platt mit einem breiten kreisf. Flügel umgeben.* ☉. Auf Aeckern, (bei Lüttich; auf einem Acker bei Pfungen eine Stunde von Winterthur C. Zürich, Fuckel, Apotheker.) Juli. Aug. St. h. 70. *Antirrhinum simplex* Willd. *A. parviflorum* J. ic. rar. 499. *A. arvense* β. L. Blkr. hellgelb, mit feinen, violetten Streifen, Unterlippe und Gaumen dottergelb, einfarbig. Var. mit in der Mitte glatten S., so schickte sie mir Herr Fuckel aus der Schw. D.

12. *L. STRIATA* (DC.) Gestreiftes L. — *Völlig kahl; B. schmal-lanzettl. und lineal., 1nervig, oder schwach-3nervig, spltz, die untern quirlig, die obern zerstreut; Tr. locker; KZpfl lanzettl., spltz, kürzer, als die Kapsel; S. eyf., 3kantig, flügellos durch zsmündende Runzeln eingedrückt-punktirt, die Kanten scharf und nicht punktirt.* 4. An unkult. O., (im Lüttichschen bei Mastrecht; im Oberelsass bei Siegolsheim, im St. Amarinthale bei Weserling, Wildenstein, Geishausen; im C. Waadt; Westerplatte bei Danzig.) Jul. Aug. Rb. ic. f. 610. *L. decumbens* Moench. *Antirrhinum stratum* u. *A. galioides* Lam. *A. repens* Sm. *A. monspessulanum* und *A. repens* L. Blkr. graulich-weiss oder bläulich, mit violetten Streifen und violettem Adernetze am Gaumen; die Farbe an der kultiv. Pflanze ist sehr veränderlich.

13. *L. CHALEPENSIS* (Mill.) Aleppisches L. — *Völlig kahl; B. lineal.-lanzettl., spltz, schwach-3nervig, die untersten quirlig; Tr. verlängert, locker, schlängelig; KZpfl lineal., spltz, abgehend, noch einmal so lang, als die rundliche, zsgedrückte, ausgerandete Kapsel; S. eyf., 3kantig, quer-grübig-runzelig.* ☉. An steinigem O. der wärmern Gegend., (Fiume, Insel Veglia und Cherso.) Mai. Juni. *L. alba* Moench. *Antirrhinum chalepense* L. Blkr. weiss, manchmal undeutlich-blaugestreift, Lippen gelblichweiss. J.

b. *B. wechselst. oder ordnungslos zerstreut.*

14. *L. LOESELII* (Schweigger.) Lösel's L. — *Völlig kahl; B. wechselst., entfernt; lineal.-lanzettl., lang-verschmälert, schwach-3nervig; Tr. locker; KKpfl länglich-lanzettl., kurz-zugespitzt, schwach-nervig, kürzer, als die Kapsel; S. flach, mit etnem nierenf. Flügel umzogen, glatt.* 4. An sandigen O. am Meere, (Kurische Nehrung in Preussen, Dünen unweit Danzig, in Pommern.) Juni. Juli. *L. maritima* Rb. fl. exc. *L. juncea* Rb. ic. 5. f. 612. 613. *Antirrhinum odoratum* MBieb. *A. odoratissimum* Gildenst.; und wahrscheinlich: *A. linifolium* L. Bth. schwefelgelb; Sporn schwach-purpurn. D.

15. *L. GENISTIFOLIA* (Mill.) Ginsterblättriges L. — *Ueberall kahl; B. wechselst. oder zerstreut, lanzettl. oder lineal.-lanzettl.,*

3nervig, zugespitzt; Tr. locker: KZpfl aus breiterer Basis verschmälert-spitz, länger als die Kapsel; *S. eyf.*, 3kantig, flügellos, mit feinen zsmündenden Ranzelchen eingedrückt-punktirt; Kanten scharf-unpunktirt. 4. Auf sonnigen Hügeln, Oestr., Mähr., Böhm., Erzgeb.) Juli-Aug. D. fl. 4. p. 399., nicht DC. Rb. ic. 5. f. 626. *Antirrhinum genistifolium* L. Blkr. citrongelb. Var. mit breiterem, ey-lanzettf. B.: J. a. t. 244.; und mit breiterem B. und grössern Bth.: *L. chloraefolia* Rb. f. 627. D.

16. *L. ITALICA* (Trev.) Italienisches L. — Völlig kahl; B. wechselst. oder zerstreut lineal.-lanzettl., spitz, eben, 3nervig, Nerven, (an der frischen Pfl.) schwach, der mittlere oben nicht eingedrückt; Bth. traubig; KZpfl länglich-lanzettl., kurz-zugespitzt, nervenlos, kürzer, als die Kapsel; S. flach, mit einem kreisrunden Flügel umzogen, in der Mitte knötig-rauh. 4. An unkultiv., rauhen O., (im Wallis; südl. Tyrol und bei Marburg in Steyerm.) Juli-Sept. Rb. ic. 5. f. 608. *L. genistifolia* DC. *L. angustifolia* Rb. fl. exc. *L. paniculata* Peyer u. Vest. in d. Bot. Ztg. *L. linifolia* Rochel. *Antirrhinum genistifolium* Vill. A. Bauhini Gaud. Blkr. citrongelb. S. in der Mitte knötig, seltener durchaus glatt.

17. *L. VULGARIS* (Mill.) Gemeines L. — Kahl; Spindel nebst den Bthstielen drüsig-flaumig; B. ohne Ordnung gedrängtgestellt, lanzettl.-lineal., spitz, am Rande etwas zurückgebogen, 3nervig, der Mittel-Nerv oberseits mit einer Furche vertieft, unterseits stark hervorragend. Tr. dachig; KZpfl länglich-lanzettl., 3nervig, spitz, kürzer, als die Kapsel; S. flach, mit einem kreisrunden Flügel umgeben, in der Mitte knötig-rauh. 4. Auf Feldern, an Rainen, Wegen, Juli-Sept. *Antirrhinum Linaria* L. St. h. 18. Blkr. schwefelgelb, Unterlippe dottergelb, Gaumen safranfarben. Dr. Facchini überschickte Expl., welche die Mitte zw. *L. vulgaris* und *L. italica* halten und wahrscheinlich Bastarde sind. Die seltne *Peloria* der *Linaria vulgaris* sandte Herr Apotheker Rudio mit dem Beisatze: (auf magerem Thonschieferboden bei Weilmünster häufig).

5. *ANÁRRHINUM* (Desf.) Lochschlund. — Blkr.Röhre fast walzlich; Saum flach, schief; Schlund offen; Gaumen fehlend. Blkr. bespornt oder spornlos. Sonst Alles, wie bei *Linaria*.

1. *A. BELLIDIFOLIUM* (Desf.) Massliebenblättriger L. — WB. länglich-verkehrteyf., stumpf, ungleich-gesägt; StB. 5-7 th.; Zpfl lineal., ganzrandig. 4. An sonnigen Abhängen, (an Gebirgsabhängen längs der Mosel zw. Trier und Bernkassel; im C. Genf.) Jul. Aug. Blkr. klein, violett; Sporn schlank, aufstrebend.

6. *ÉRINUS* (L.) Leberbalsam. — K. 5th. Blkr. tellerf.; Röhre schlank, stielrund; Saum flach, etwas ungleich, 5sp., Zpfl. ausgerandet, ungleich. Stbg. 4, zweimächtig, in der Röhre eingeschlossen; Stbk. nierenf. Kapsel an der Spitze 2klappig, Klappen länger, als die Scheidewand.

1. *E. ALPINUS* (L.) Alpen-L. — Ebenstrauss einfach, später

traubig; B. spatelig, vorne gekerbt. 4. An felsigen, grasreichen O. der A. und höhern Gebirge, (in der Schw. nicht selten, auch auf dem zum Elsass gehörigen Jura; nach Host auch im südl. Tyrol.) Mai-Juli. Schk. t. 176. Bth. violett.

7. VERONICA (L.) Ehrenpreis. — K. 4-5th. Blkr. Saum 4sp., der obere Zpfl breiter. Stbg. 2; Stbk. mit 2 Längsritzen aufsprügend. N. ungeth. Kapsel ausgerandet.

1. Rotte. CHAMAEDRYS. Tr. blattwinkelst. (W. ausdauernd.)

a. K. 4 th.

1. V. SCUTELLATA (L.) Schildsaamiger E. — B. sitzend, lanzettl.-lineal., spitz, entfernt-rückwärts-gezähnt; Tr. blattwinkelst.; Bthstielen nach dem Verblühen weitabstehend; Kapsel zusammengedrückt, ausgerandet-2lappig, quer-breiter. 4. An nassen, auch kultiv., feuchten O., Gräben. Juni-Sept. St. h. 58. Bth. weisslich, rosenroth- oder blau-gestreift.

β. pubescens, der St. nebst den Bthstielen oder auch dem K. und Kapselrande zottig: V. parmularia Poit. und Turpin.

2. V. ANAGALLIS (L.) Wasser E. — B. sitzend, lanzettl. oder eyf., spitz, gesägt; Tr. blattwinkelst.; die fruchtrag. Bthstielen weitabstehend; Kapsel kreisrund, seicht-ausgerandet. 4. In stehenden Wassern und Bächen. Mai-Aug. Fl. dan. t. 903. Bth. hellblau mit dunkleren Adern. Var. mit fast ganzrandigen B.: V. tenella Schmidt.; mit rosenrothen Bth.: V. aquatica Bernhardi. — V. anagalloides Guss. untersch. sich dch die lanzettl.-lineal. B. und die elliptischen, mit einer kleinen Ausrandung versehenen Kapseln.

3. V. BECCABUNGA (L.) Quellen-E. — B. gestielt, elliptisch oder länglich, stumpf, gekerbt-gesägt; Tr. blattwinkelst.; die fruchtrag. Bthstielen abstehend; Kapsel rundlich, gedunsen, seicht-ausgerandet. 4. In stehenden Wassern, an Quellen, Bächen. Mai-Aug. St. h. 17. Bth. blau mit dunkleren Adern. Var. grösser und kleiner; mit fast ganzrandigen B.; mit rosenrothen Bth. und mit DeckB., die länger, als die Bthstielen sind: V. limosa Lej.

4. V. URTICIFOLIA (L. Sohn.) Nesselblättriger E. — B. sitzend, eyf., geschärft-gesägt, die obern lang-zugespitzt; Tr. blattwinkelst.; die fruchtrag. Bthstielen weit abstehend; Kapsel fast kreisrund, quer-breiter, ausgerandet; St. zerstreut-behaart. 4. In Hainen der VorA., mit den Flüssen in die Ebenen herabsteigend, (dch d. g. AK.) Mai-Juli. V. latifolia Scop. St. h. 58. J. a. t. 59. Bth. hellblau oder rosenroth, mit dunkleren Streifen.

5. V. CHAMAEDRIS (L.) Wald-E. — B. fast sitzend, eyf., eingeschnitten-kerbt-gesägt; Tr. blattwinkelst.; die fruchtrag. Bthstielen aufstrebend, länger, als die 3eckig-verkehrtherzf., gewinberte Kapsel; die St. aufstrebend, zweireihig-behaart. 4. Auf

trockneren Wiesen, an Waldrändern, Zäunen, Wegen, auch auf den A. Apr. Mai. St. h. 58. Bth. schön, hellblau, mit dunkleren Adern. — Var. der St. überall behaart, aber die Haare an den 2 entgegengesetzten Linien doch dichter: *V. pilosa* Schm. Willd. *V. plicata* Pohl.

6. *V. MONTANA* (L.) Berg-E. — *B. lang-gestielt*, eyf., eingeschnitten-gekerbt-gesägt; *Tr. blattwinkelst.*; die fruchttrag. Bthstielchen etwas abstehend; *Kapsel quer-breiter, an der Basis und Spitze ungerandet, flach, kahl, am Rande feingekerbt, gewimpert*; die St. an der Basis kriechend, zerstreut-behaart. 4. In schattigen Laubwaldungen, (dch d. g. Gehiet, aber nicht überall, in der Schw. sehr selten.) Mai. Juni. St. h. 58. J. a. t. 109. Blkr. welschlich, mit purpur-blauen Streifen; *Tr. locker, armbth.*; Kapseln gross, fast zweischidig.

7. *V. OFFICINALIS* (L.) Aechter E. — *B. kurz-gestielt, verkehrt-eyf.-elliptisch oder länglich, gesägt; Tr. blattwinkelst., reichbth., gedrungen; die fruchttrag. Bthstielchen aufrecht, kürzer, als die 3eckig-verkehrtherzf., stumpf-angerandete Kapsel*; die St. rauh., an der Basis kriechend, an der Spitze aufstrebend. 4. Auf Triften, waldigen Haiden, (in den A. bis 5500 F.) Juni. Juli. St. h. 58. Blkr. hellblau, mit dunkleren Adern, seltner ganz welsch, oder weiss mit rosenrothen Adern. — Kleine Expl. mit rundlich-verkehrteyf. B.: *V. Tournefortii* Schm. Rb. ic. f. 1054. 1055. Ein wucherndes Expl. mit rispigen *Tr.*: *V. spadana* Lej. — Die *V. pyrenaica* All., *V. Allionii* Vill., bisher aber weder in der Schw., noch in D. gefunden, untersch. sich durch kahle feingesägte B., längliche oder lineal. Blkr.Zpfl und vorzüglich dch länglich-verkehrt-herzf., spitz-angerandete Kapseln, mit runden Lappen. *V. Allionii*, welche Sternberg auf der Alpe Spinale in Tyrol gefunden hat, wurde in Host's fl. austr. nicht aufgenommen; sie ist aber auch nach Facchini eine blosse Abänderung von *V. serpyllifolia*.

8. *V. APHYLLA* (L.) Blattloser E. — *B. kurz-gestielt, verkehrt-eyf.-elliptisch, gekerbt-gesägt und ganzrandig; Tr. blattwinkelst., meist einzeln und meist 4bth.*; die fruchttrag. Bthstielchen aufrecht, länger, als die verkehrtherzf. Kapsel. 4. Auf den A., seltner mit den Flüssen in niedere O. herabsteigend. Auf dem Gpfel von Babia Gora in den Sudeten Juni-Aug. St. h. 56. *V. depauperata* WK. t. 215.

b. K. 5th., der fünfte Zpfl klein.

9. *V. PROSTRATA* (L.) Gestreckter E. — *B. kurz-gestielt, lineal-lanzettl., gekerbt-gesägt, an der Basis etwas eingeschnitten oder ganzrandig; Tr. blattwinkelst.*; Bthstielchen ohngefähr so lang, als die verkehrteyf., seicht-angerandete Kapsel; *K. 3sp., die unfruchtbar. St. gestreckt*, die bthetrag. aufstrebend. 4. Auf trocknen Haiden, sonnigen Hügeln, (zerstreut dch d. g. Gebiet an manchen O. häufig, aber nicht allgemein verbreitet.) Mai. Juni. St. h. 58.?, Abbildg. sehr verfehlt. Lebend untersch. sie sich leicht

von den 2 folg. Die Blthezeit ist früher, der St. viel schlanker, an der Basis hart, holzig, die jüngern und unfruchtbaren in einen Kreis auf die Erde gestreckt, die Blh. blasser; ändert auch mit weissen und fleischrothen Blh., was bei den folgenden nicht vorkommt.

10. *V. AUSTRIACA* (L.) Oestreichischer E. — *B. etwas gestielt*, gekerbt- oder fiedersp.-gesägt, lanzettl., oder vielsp. und im Umriss eyf.; Tr. blattwinkelst.; die obern Bthstielen so lang, als die verkehrteyf., spitz-ausgerandete Kapsel; *K. 5sp.; die St. sämmtl. aufrecht oder aus bogiger Basis aufstrebend.* 2. Auf trocken, sonnigen Hügeln des östl. und südl. D. und in der südl. Schw., (u. bei Troppau in Schles.; bei Karlstein in Böh.; Oestr., Steyeru.; Frankenhauseu im Schwarzb.; bei München; Genf; β . u. γ . Oestr. und Krain.) Juni. Juli. Bth. schön blau. Es zeichnen sich 3 Variet. aus:

α . *dentata*, *B.* lanzettl. oder lanzettl.-lineal., meist entfernt-gekerbt-gesägt, manchmal ganzrandig; *V. dentata* Schmidt. St. h. 58. *V. Schmidtii* R. und S.

β . *pinnatifida*, *B.* lanzettl. oder lanzettl.-lineal., fiedersp.-gezähnt: *V. austriaca* L. M. und K. D. fl. l. 326. J. a. t. 329., nebst der folg. Var. *V. polymorpha* Willd., nach Link. *V. Jacquini* Schott. R. und S. Eine Form mit lineal.-fädlichen BZpfln: *V. tenuifolia* MB., nach dem Autor selbst im Suppl. der Fl. t. c.

γ . *bipinnatifida*, *B.* doppeltfiedersp., im Umriss eyf.: *V. multifida* L. D. fl. l. 327. — Wenn die kapseln behaart sind: *V. pilocarpa* Link. *V. trichocarpa* R. und S.

Alle diese Variet. fliessen dch Mittelformen zusammen und entstehen aus dem Samen einer Pflanze. Die Var. β . und γ . findet man nicht selten auf einer Wurzel. Sie blühen früher, als die vorhergehende und später, als die folgende Art. Die lebende Pflanze lässt sich an einem eignen Habitus erkennen.

11. *V. LATIFOLIA* (L.) Breitblättriger E. — *B. sitzend*, aus fast. herzf. Basis eyf. und länglich, eingeschnitten-gesägt oder fiedersp.; Tr. blattwinkelst.; Bthstielen aufrecht, ohngefähr so lang, als die verkehrteyf., spitz-ausgerandete Kapsel; *K. 5sp.; die St. sämmtl. aufrecht, oder aus bogiger Basis aufstrebend.* 2. An grasreichen, trockneren, besonders bergigen O., (dch d. g. Gebiet, dch nicht aller O.) Juni. Juli. St. h. 58. *V. Pseudochamaedrys* J. a. t. 60. Bth. sehr schön, blau mit dunkleren Adern. Var.:

α . *major*, *B.* mit herzf. Basis stengelumfassend: *V. latifolia major* Schrad.

β . *minor*, *B.* an der Basis eyf. und meist länglich: *V. latifolia minor* Schrad. *V. Tencrimum* Vahl., nach der Beschreibung. Ob *V. Tencrimum* L. zu dieser, od. zu den Variet. von *V. austriaca* gehört, ist noch nicht ausgemittelt.

11. Rotte. *PSEUDO LYSIMACHIMUM*. Tr. endst. und oft mehrere seitenständige Nebentrauben. Blkr.Röhre walzlich, länger, als ihr Querdurchmesser; Saum fast 2lippig. (W. mehrjährig.)

12. *V. SPURIA* (L.) Unächter E. — B. gegenst., zu 3 und 4, länglich-lanzettl. oder lanzettl., spitz, einfach- oder fast doppelt-gesägt; Tr. endst., fast rispig, verlängert, ziemlich locker; die DeckB. lineal.-lanzettl., so lang oder kürzer, als die Bthstielchen; Kapsel rundlich, ausgerandet, gedunsen. 2. In Hainen, (bisher blos um Halle in Thüring. und zw. Verviers und Limburg im Geb. der Fl. von Spa) Juli. Aug. Bth. blau. Var. mit Bthstielchen, die so lang, als die DeckB. und 2 od. 3mal länger sind, mit lanzettl. und fast elliptischen, länger und kürzer zugespitzten B., einfachen und doppelten Sägezähnen. Die Spitze der B. ist mehr oder weniger ganzrandig und die DeckB. sind oft so lang, als die Bthstielchen, nie aber so lang, als der Kelch. Var. ferner:

a. *Schraderi*, B. lanzettl., kürzer-zugespitzt; Sägezähne entfernt, gleich, (doch nicht immer), Bthstielchen meist lang; *V. spuria* Schrad. comm. t. 2. f. 4. *V. amethystina* Willd. herb. 171. fol. 1. (fol. 2. Expl. von Pallas halten die Mitte zw. dieser und unserer Variet. d.) *V. paniculata* L.

β. *laxiflora*, B. lanzettl., lang-zugespitzt; Sägezähne genähert; *V. laxiflora* Lej. *V. spuria* Spreng. hal. t. 1. f. 1., ein Ex. mit einfachen Sägezähnen.

γ. *foliosa*, B. elliptisch-lanzettl., meist ungleich-gesägt; *V. foliosa* WK. t. 102. Spreng. hal. t. 1. f. 2. *V. nitida* Ehrh. *V. brevifolia* MB., (oberwärts flaumige Explare.)

Die *Veronica arguta* Schrad., welche ich aus dem Göttinger Garten erhielt, ist der *V. longifolia* in allen Theilen sehr ähnlich, und untersch. sich blos dah. die ungefähr nagellang ganzrandige Blattspitze. Von dieser *V. arguta* halte ich die *V. alternifolia* Lej. verschieden und für einen Abkömmling von *V. spicata*: weswegen ich sie unter die Varietäten von dieser stelle, nebst der *V. paludosa* Lej., welche letztere die *V. crenulata* Hoffm., wenigstens die *V. villosa* Schrad. nicht sein kann, obgleich auch diese letzte von der *V. spicata* oder von irgend einer Var. derselben entsprungen sein mag. Das Merkmal der feingekerbten und ganzrandigen B. ist sehr trüglich.

13. *V. LONGIFOLIA* (L.) Langblättriger E. — B. gegenst., zu 3 oder 4, aus ey- oder herzf. Basis lanzettl., zugespitzt, bis zur Spitze geschürft-doppeltgesägt; Tr. endst., verlängert, ährenf., sehr gedrungen; DeckB. lineal.-pfriemlich, ohngefähr so lang, als der K.; Kapsel rundlich, gedunsen, ausgerandet. 2. Auf feuchten Wiesen, an Gräben, Ufern. Juli. Aug. Schrad. comm. t. 2. f. 1. Diese Art var. ausnehmend mit unzähligen Formen der B. An verschiedenen Exemplaren gehen die B. aus der eyf. tief-herzf. Gestalt dah. Zwischenformen allmählig in die lineal.-lanzettl. mit verschmälter Basis über, und ausserdem kommt sie mit kürzeren und mit verlängerten und vorzüglich an der Basis, eingeschnitten-gesägten B. vor. Nachfolgende Variet. werden als besondere Arten aufgestellt:

a. *vulgaris*, B. an der Basis tief-herzf.; *V. longifolia* Schrad. comment. t. 2 f. 1.

β. maritima, B. an der Basis abgerundet oder etwas keilf.: *V. maritima* Schrad. c. t. 1. f. 1. wenn die B. zugleich schmal sind.

γ. media, B. an der Basis keilf.: *V. media* Schrad. c. t. 1. f. 2.

δ. glabra, B. ganz kahl: *V. glabra* Schrad. c. t. 1. f. 4., wenn die B. zugleich fast einfach-gesägt sind. — *V. elata* Host., *V. elatior* Host und *V. Hostii* sämmtlich in Host's Fl. austr., *V. complicata* Hoffm., *V. grossa*, *V. acuta*, *V. ambigua* Mart., *V. persicifolia* Schott., sind weitere Abweichungen von der Hauptart.

14. *V. SPICATA* (L.) Aehriger E. — B. gegenst., ey- oder lanzettf., gekerbt-gesägt, an der Spitze ganzrandig, die untern stumpf; Tr. endst., meist einzeln, verlängert, ährig, sehr gedrun-gen; DeckB. lanzettl.-pfriemlich, länger, als die Bthstielen; Kapsel rundlich, ausgerandet, gedunsen, die Haare am K. häufig gegliedert. 4. An sonnigen, trocknen O. der Ebenen und Berge, (dch d. g. Gebiet, doch nicht überall.) Juli, Aug. Vaill. par. t. 33. f. 4. Bth. blau, selten fleischroth oder weiss. Var.: 1. Der Flaum sehr kurz, drüsig, 2. sehr kurz, gekräuselt, 3. länger, fast feinborstig, aus geraden Haaren bestehend, 4. der K. kahl, kahl und gewimpert oder behaart; und 5. der St. nebst den B. kahl. Ferner:

α. vulgaris, gekräuselt- oder drüsig-flaumig, die untern B. länglich, an der Basis keilig: *V. spicata* der Autoren; *V. Clusii* Schott. R. und S., wenn die Haare drüsig sind; dieselbe mit kahlem, gewimpertem K.: *V. squamosa* Presl. Diese Variet. *α.* auf sehr fettem Waldboden oder dch Cultur bedeutend vergrößert stellt die *V. arguta* Morett., *V. spicata* Var. *γ.* Bertol. dar.

β. latifolia, gekräuselt- oder drüsig-flaumig, die untern B. eyf. oder auch fast herzf., geschärfter-gesägt: *V. hybrida* L. *V. australis* Schrad. comm. t. 2. f. 3. *V. paludosa* Lej. fl. spa. Rb. fl. g. exs. n. 621. (wenn die Bth. purpurn sind.) (Diese Variet. an Unterharz und im Geb. der Fl. von Spaa.)

γ. lancifolia, gekräuselt-flaumig, B. lanzettl., geschärfter-gesägt: *V. alternifolia* Lej. fl. spa. *V. media* Lej. rev.

δ. nitens, völlig kahl, B. nebst dem K. gewimpert: *V. nitens* Host. *V. Sternbergiana* Bernh. im Herb. Willdenows n. 161.

ε. setulosa, feinborstig-flaumig, von geraden, drüsenlosen Haaren; K. kahl, gewimpert: *V. Barrelieri* Schott. R. und S. Ist meist höher, als die vorhergehende und hat elliptisch-längliche B.; kommt aber auch mit elliptischen und lanzettl. B. vor.

ζ. cristata, flaumig, oder unterseits fast kahl, Zpfl der Blkr. mehr verschmälert, oft zsgedreht. *V. cristata* Bernh. *V. orchidea* Crantz. *V. hybrida* MB.; vgl. fl. altaic. 1. 31. *V. crassifolia* Kit. R. u. S., nach Sadler. (Diese in Unteröstr. und auf der Gans bei Kreuznach in Rheinpreuss., Wirtgen!)

Von allen diesen Variet. untersch. sich die *V. incana* L., *V. neglecta* Vahl, (*V. canescens* Schrad.) und *V. pallens* Host. fl. a., welche ich für Varietäten einer Art halte, dch die Haare des K., diese sind wollig, geschlängelt, dünner und unter dem Vergrös-

serungsgläse sehr entfernt- oder auch nicht gegliedert; bei den Variet. der *V. spicata* sind sie dicht-gegliedert, und dicker.

III. Rotte. *VERONICASTRUM*. Die Tr. an dem St. und den Aesten endst. Blkr. Röhre sehr kurz. Die StB. gehen bei den meisten allmählig in DeckB. über.

* Samen flach, schildf.

13. *V. BELLIDIODES* (L.) Massliebenblättriger E. — B. verkehrteyf., stumpf, etwas gekerbt, *die untern grösser, dicht-zsgestellt*, fast rosettig, die Stengelst. entfernt; Tr. endst., kurz, armblüthig, von gegliederten Haaren zottig; Kapsel verkehrteyf., seicht-*ausgerandet*. 4. An grasreichen O. der A. und VorA., (dch d. g. AK. und in den Sudet.) Juli, Aug. St. h. 58. Blkr. schmutzig-blau.

16. *V. FRUTICULOSA* (L.) Strauchiger E. — B. länglich, stumpf, etwas gekerbt, die untersten kleiner; Tr. endst., *armbth., drüsig-flaumig*; Kapsel oval, seicht-*ausgerandet*. 4. An felsigen und grasreichen O. der VorA., (dch d. g. AK.) Juli, Aug. St. h. 56. *V. frutescens* Scop. Blkr. fleischroth, mit rosenrothen Adern. Die Paare der StB. genähert. Fruchtkn. während der Bthezeit rundlich, sehr stumpf, drüsig-behaart.

17. *V. SAXATILIS* (Jacq. L. Sohn.) Felsen-E. — B. länglich oder elliptisch, etwas gekerbt, die untersten kleiner; Tr. endst., *armbth., von gekräuselten, drüsenlosen Haaren flaumig*; Kapsel eyf., *oberwärts verschmälert*, kaum *ausgerandet*. 4. An grasreichen und felsigen O. der A. und VorA., (dch d. g. AK. und auf den Voges.) Juli, Aug. St. h. 56. Blkr. ansehnlich, blau; Schlund mit einem purpurnen Ringe bemalt. Die Paare der StB. entfernt. Fruchtkn. während der Bthezeit eyf., spitz, grau-behaart, die Haare drüsenlos.

18. *V. ALPINA* (L.) Alpen-E. — B. elliptisch, gekerbt oder ganzrandig, die untersten kleiner, rundlich; Tr. endst., *armbth., von abstehenden, gegliederten, drüsenlosen Haaren rauhh.*; Kapsel länglich-verkehrteyf., *ausgerandet*. 4. An grasreichen O. der A. und VorA., (dch d. g. AK. und in den Sudet.) Juli, Aug. St. h. 56. Bth. klein, blau. B. stumpf oder spitzlich. Kommt vor mit ganzrandigen B.: *V. integrifolia* Schrank., *V. Gebhardiana* Vest; mit gekerbten B.: *V. rotundifolia* Schrank. und mit gekerbten, spitzeren B.: *V. pumila* All. t 22. f. 6.; aber diese Formen sind kaum Variet. zu nennen.

19. *V. SERPYLLIFOLIA* (L.) Quendelblättriger E. — B. eyf. od. länglich, etwas gekerbt, die untersten kleiner, rundlich, die obern blüthest. lanzettl. ganzrandig; *der St. nebst den Aesten reichbth., locker-traubig*; Bthstielen aufrecht, ohngefähr so lang, als der K.; Kapsel zsgedrückt, rundlich-verkehrthezf., *quer-breiter, stumpf-ausgerandet*; Gf. hervorgestreckt. 4. Auf Triften und an andern feuchten O. Apr.-Herbst. St. h. 58. Bth. weiss, mit blauen Adern. Eine grössere Form mit eyf. B.: *V. neglecta* Schmidt; eine kleinere Form, mit rundlichen B.: *V. tenella* All. ped. t. 22. f. 1.

20. *V. ACINIFOLIA* (L.) Thymianblättriger E. — *B. eyf.*, etwas gekerbt, die blüthest. lanzettl., ganzrandig; *der St. nebst den Aesten reichbth.*, *locker-traubig*; Bthstielen abstehend, noch einmal so lang, als der K.; *Kapsel* zsgedrückt, ziemlich flach, *quer-breiter, halbzeisp.*, *Lappen kreisrund*, Gf. von der Länge der Spalte. ☉. Unter der Saat, (auf der Rheinfläche bei Basel, Strasburg, Mühlheim, Carlsruhe und im Oberelsass; Krenznach an der Nahe, Giesen, Zürich; Untersteyern; im Thale der Rhone, in Istrien.) Apr. Mai. Vaill. par. t. 33. f. 3., sehr gut. St. h. 58., verfehlt. Bth. blau.

21. *V. ARVENSIS* (A.) Feld-E. — *B. herz-eyf.*, gekerbt, die obern blüthest. lanzettl., ganzrandig; *der St. nebst den Aesten reichbth.*, *locker-traubig-ählig*; Bthstielen aufrecht, kürzer, als der K., *Kapsel* zsgedrückt, *verkehrtherzf.-2lappig*, Gf. ein wenig länger, als die Spalte. ☉. An kultiv. O., auch auf unfruchtbaren Feldern. März und durch den ganzen Sommer. St. h. 58. Bth. blau. Sehr grosse Explare: *V. polyanthos* Thunill.; etwas kleine, einfache Explare: *V. nana* Lam. *V. Bellardi* All. ped. t. 85. f. 1., nach Balb.; vgl. Bertolon. fl. ital. I. 93. *V. romana* Schmidt.

22. *V. PEREGRINA* (L. spec. S. 20.) Fremder E. — Die unteren *B. verkehrteyf.-längl.*, kaum schwach gekerbt, die blüthenst. *lineal-längl.*, ganzrandig, *alle in den Bstiel keilf. verschmälert*; *St. und Aeste vielblüthig, traubig-ählig*; Bthstielen aufrecht, kürzer als der K.; *Kapsel* zsgedrückt, *verkehrtherzf.*, Gf. ganz kurz, so lang, als die Spalte der Kapsel. ☉. An bebauten O. bei Hamburg, (in der Nähe des Elbufers, am Wege nach Flottbeck nicht selten, Sonder; bei der hohen Luft, Sickmann.) Apr. Mai. *V. romana* L. mant. Bth. weiss oder bläulich, Kapsel ganz kahl. D.

23. *V. VERA* (L.) Frühlings-E. — *B. fiederth.*, die untersten eyf., ungeth., die blüthest. lanzettl.; *der St. nebst den Aesten reichbth.*, *traubig-ählig*; Bthstielen aufrecht, kürzer, als der K.; *Kapsel* zsgedrückt, *verkehrtherzf.*, Gf. von der Länge der Spalte. ☉. An sonnigen O., auf Feldern und in Sandwäldern. Apr. Mai. *V. Dillenii* Crantz. *V. pinnatifida* Lam. *V. succulenta* All. St. h. 13. — Bth. bläulich, mit dunkleren Adern. Kleine Explare, mit ungeth. B.: *V. Bellardi* Wulf. in Röm. arch. und *V. Bellardi* All. nach dem Herbar. des Autors. *V. polygonoides* Lam.

☿ Samen konkav, beckenf.

24. *V. TRIPHYLLOS* (L.) Dreiblättriger E. — *B. fingerig-geth.*, die untersten eyf., ungeth., die blüthenst. lanzettl.; *der St. nebst den Aesten reichbth.*, *locker-traubig*; Bthstielen länger, als der K., *abstechend*, aufstrebend; Kapsel rundlich-verkehrtherzf., gedunsen. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. März-Mai. St. h. 8. Bth. sattblau. Ziemlich kleine Expl.: *V. romana* All. ped. t. 83. f. 2., nicht L., nach Bertol.

25. *V. PRAECOX* (All. auct. t. I. f. I.) Früher *E.* — Die untern *B.* herz-eyf., gekerbt, stumpf, die blüthenst. lanzettl.: *der St. nebst den Aesten reichblth., locker-traubig*; Bthstielchen ohngefähr so lang als der K. oder länger, aufstrebend: *Kapsel* oval, verkehrt-herzf., *gedunsen*. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. (zerstreut dch d. Gebiet.) März-Mai. *V. romana* Scop. *V. ocymlifolia* Thuill., wenn die Bthstielchen von der Länge der blüthenst. *B.* sind. St. h. 58. Bth. blau, mit dunkleren Adern.

IV. Rote. *ALSTINGIUS*. Die Deck*B.* fehlend. Die blüthenst. *B.* den untern gleichgestaltet. Bthstiele blattwinkelst., einzeln, nach dem Verblühen zurückgekrümmt.

26. *V. AGRESTIS* (L.) Acker-*E.* — *Bthstiele blattwinkelst., einzeln*, ungefähr von der Länge des *B.*, nach dem Verblühen zurückgekrümmt: *B. ey-* fast herzf., gesägt-gekerbt; *Kapsel zerstreut-rüstig-behaart*, rundlich, spitz-ausgerandet, Lappen gedunsen, an der Nath etwas zsgedrückt; *Stbg. dem untern Rande der Röhre eingefügt*. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. März-Herbst. *V. pulchella* Bastard. St. h. 58. Rb. ic. 3. f. 410. *V. didyma* Ten. fl. neap. prodr. nach authentischen Expl. Blkr. milchweiss, fein-blaugestreift, der obere Lappen hellblau oder fleischroth. *B.* gelblichgrün oder olivengrün, mehr länglich-eyf., als bei den folgenden. Fächer der Kapsel 4-5samig.

27. *V. POLITA* (Fries novit. ed. 2. S. I.) Glatter *E.* — *Bthstiele blattwinkelst., einzeln*, ohngefähr so lang, als die *B.*, nach dem Verblühen zurückgekrümmt; *B. rundlich-eyf., fast herzf., tief-gesägt-gekerbt*; *Kapsel von abstehenden Haaren dicht-flaumig, spitz-ausgerandet, Lappen kugelig-konvex*; *Stbg. dem untern Rande der Röhre eingefügt*. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. März-Herbst. D. fl. I. 331. *V. polita*. St. h. 58. Rb. ic. 3. f. 304. 305. *V. didyma* Koch Synops. ed. I. so benannt nach Expl. der *V. polita*, welche aus Italien als *V. didyma* geschickt waren. Blkr. freudig-blau. *B. dunkelgrün, rundlich, herzf. KZpfl eyf., auch während der Bthezeit an der Basis sich gegenseitig bedeckend.* Fächer meist 10samig.

28. *V. OPACA* (Fries.) Glanzloser *E.* — *Bthstiele blattwinkelst., einzeln*, ohngefähr so lang als die *B.*, nach dem Verblühen zurückgekrümmt; *B. rundlich-eyf., fast herzf., gesägt-gekerbt*; *Kapsel gekräuselt-flaumig, quer-breiter, spitz-ausgerandet, Lappen gedunsen, am Rande zsgedrückt-gekielt*; *Stbg. dem Schlunde eingefügt*. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. hier und da. März. St. h. 58. Rb. ic. 3. f. 441. Kapsel halb so lang, als breit, fast verkehrt-nierenf., mit drüsenlosen, gekräuselten Haaren bedeckt, zwar gedunsen, aber am Rande deutlich-zsgedrückt; dch diese Merkmale und dch die Einfügung der Stbg. untersch. sie sich von den 2 vorhergehenden. Fächer 3-5samig.

29. *V. BUXBAUMI* (Tenore.) Buxbaum's *E.* — *Bthstiele blattwinkelst., einzeln*, nach dem Verblühen zurückgekrümmt, die obern länger, als die *B.*; *B. ey-*, fast herzf., tief-gekerbt-gesägt; *Kapsel*

quer-breiter, von *erhabenen Adern netzig*, stumpf-ausgerandet, *Lappen* an der Nath zsgedrückt, *spreitzend*. ☉. An kultiv. O. und auf Aeckern, (dch d. g. Gebiet stw.) Apr. Mai. St. h. 56. Rb. ic. f. 430. 431. V. hospita D. fl. l. 332. V. persica Poir. V. Tournefortii Gmel. V. cymbalariaefolia Schmidt nach R. u. S. V. filiformis DC. fl. fr. Bth. blau. Eine Var., mit einem sehr dünnen, fädlichen St., nur halb so grossen nicht tief-gekerbten B. und halb so grossen K.; V. hospita β. D. fl. l. 332., mit Ausschl. der Syn. Dieser Variet. ist die V. filiformis Sm. sehr ähnlich, untersch. sich aber dch stumpfere Bkerben, spitz-ausgerandete Kapseln, die eben so lang. als breit sind, und stumpfere Lappen derselben, dch den Gf., welcher fast noch einmal so lang, als die Kapsel ist, bei der V. Buxbaumii aber nur die Länge der Scheidewand hat und dch längere Bthstiele.

30. V. HEDERIFOLIA (L.) Epheublättriger E. — *Bthstiele blattwinkelst.*, *einzeln*, ohngefähr so lang, als die B., nach dem Verblühen zurückgekrümmt; B. herzf.-rundlich, kerbig-fast 5lappig; *Kapsel kugelig-4lappig*; *KZpfl herzf.*, nach dem Verblühen aufrecht. ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O., auch auf unfrucht. Feldern. März-Mai. St. h. 56. V. hederifolia Schrank, wenn die Lappen der B. abgerundet und V. Lappago Schrank, wenn sie spitzlich sind. Bth. blassblau.

31. V. CYMBALARIA (Bodard.) Zymbelkrautblättriger E. — *Bthstiele blattwinkelst.*, *einzeln*, nach dem Verblühen zurückgekrümmt, die obern länger, als die B.; B. fast halbkreisrund, etwas herzförmig, lappig-gekerbt; *Kapsel kugelig-4lappig*; *KZpfl elliptisch*, nach dem Verblühen weit abstehend. ☉. An alten Feldmauern und kultiv. O. (Triest.) März. April. V. cymbalariaefolia Vahl. D. fl. l. 334. V. hederaefolia β. L. V. panormitana Guss., magere Expl. nach Bertol. Bth. blassblau. D

8. PAEDEROTA (L.) Päderote. — K. 5th. Blkr.Saum 4sp., der obere Zpfl breiter, ungeth. oder 2sp. Stbg. 2, ganz unten an der daselbst mit einem Ring von Haaren geschlossenen Röhre eingefügt. Stbk. mit 2 Längsritzen aufspringend. N. ungeth. Kapsel 2fächerig. geschnäbelt-zugespitzt.

1. P. BONAROTA (L.) Blaue B. — B. gesägt, die obern eyf., spitz; Oberlippe der Blkr. ungeth.; *Stbg. länger, als die Blkr.* 4. In Felsenspalten der A. (Sulzbacher A., Untersteyerm., südl. Kärnth., südl. Tyrol, Schlehern, Kirschbaumeralpe.) Juni. Juli. St. h. 24. Brignol. fasc. pl. forojul. P. caerulea L. Sohn. P. chamaedrifolia Suffr. Wulfenia Bonarota Sm. W. chamaedrifolia Host. St. h. 24. Bth. blau, seltner rosenroth. Var. kleiner, Tr. sehr gedrunken; P. Bonarota β. Bertol. fl. ital. P. chamaedrifolia Brignol. fasc. pl. forojul. R. und Sch. s. veg. P. Bonarota Suffr. Michel. gen. t. 15. f. 2.

2. P. AGERIA (L.) Gelbe P. — B. gesägt, die obern ey-lanzettf., lang-zugespitzt; Oberlippe der Blkr. 2sp.; *Stbg. kürzer*,

als die Blkr. 4. In Felsenspalten der Gebirge und A., (Sulzbacher A., Untersteyern., in Krain auf den Steiner- u. Wocheiner- A., und auch tiefer bei Canziano unweit Triest.) Juni. Juli. St. h. 24. P. lutea L. Sohn. P. urticifolia Brign. P. Bonarota J. h. v. t. 121. Bonarota chamaedrifolia Scop. Wulfenia Ageria Sm. W. lutea Host. Var. kleiner, mit kürzern, weniger zugespitzten B. und zsgedrängter Tr.: P. Zanichellii Brign. P. Ageria β . Bertol. fl. ital. — Brignoli behauptet in der Regensb. bot. Ztg. 23. 1. S. 98. die P. chamaedrifolia und P. Zanichellii seien gute Arten: darüber erwarten wir Aufklärung von denjenigen Botanikern, welche diese Pfl. an ihren Standorten beobachten können. D.

9. WULFÉNIA (Jacq.) Wulfenie. — K. 5th. Oberlippe der Blkr. 2sp., Unterlippe 3sp. Stbg. 2, an dem Ende des Schlundes an der Basis der die Lippen trennenden Buchten eingefügt; Stbk. nierenf., in ein 2lippiges Scheibchen aufspringend. N. kopfig, genabelt.

I. W. CARINTHIACA (J.) Kärnthner-W. — Auf fettem Boden der Kalk A., (bisher bloss auf der im Gailthale bei der Kapelle Hermagor in Oberkärnthen gelegenen Küweger Alpe.) Juli. J. ic. rar. t. 2. St. h. 59. Bth. blau. D.

10. LINDERNIA (L.) Lindernie. — K. 5th. Oberlippe der Blkr. ausgerandet; Unterlippe 3sp., der mittlere Zpfl grösser. Stbg. 4, zweimächtig, dem Schlunde eingefügt; Säckchen der Stbk. nicht zsgewachsen. N. kopfig. Der Samenträger mittelpunktst., walzlich, frei.

I. L. PYXIDARIA (All.) Gewöhnliche L. — B. länglich-eyf., ganzrandig. 3nervig, sitzend; Bthstiele 1bth.; die St. liegend. ☉. An feuchten, im Winter überschwemmten O., See- u. Flussufern, (bei Genf, im Oberelsass und gegenüber im Badischen; bei Regensburg; Wittenberg; in Schles.: Böhme.; bei Klagenfurth; Steyern.) Juli. Aug. St. h. 30. Capraria gratioloides L. Anagaloides procumbens Krock. Blkr. weisslich, mit hell-fleischrothem Saume.

II. LIMOSÉLLA (L.) Sumpfkrant. — K. 5zählig. Blkr.-Saum 5sp., gleich. Stbg. 4, zweimächtig, dem Schlunde eingefügt; Stbk. mit. in eins zsgeflossenen Säckchen. quer-aufspringend. N. kopfig. Der Samenträger mittelpunktst., walzlich, frei und nur mit der Basis an die sehr kurze Scheidewand angewachsen.

I. L. AQUATICA (L.) Wasser-S. — An Rändern der Teiche und Sümpfe und an feuchten, im Winter überschwemmten O., (zerstreut dch d. Gebiet.) Juli-Aug. St. h. 30. Blkr.-Röhre grün; Saum fleischroth. Ein St., die Ausläufer ausgenommen, ist nicht vorhanden. Var. aber:

β . *caulescens*, mit 1-2 Zoll langem St.

LXXXIV. Ordng. OROBANCHEEN. Juss. annal. mus. 12. p. 445.

Fruchtkn. Ifächerig, mit wandst. Samenträgern. Sonst Alles, wie bei den Antirrhineen. — B. auf Schuppen zurückgeführt, niemals grün.

1. OROBANCHE (L.) Sommerwurz. — K. 4sp. oder 2blättrig, KB. öfters 2sp. Blkr. rachig, unterwärts drüsig-fleischig, zuletzt über der Basis ringsum abspringend, die Basis bleibend. Kapsel 1-5fächerig; die 2 Samenträger gegenüber und wandst.

1. Rotte. OSPRELEON Wallr. diasc. p. 21. K. 2blättrig, mit manchmal vorne zsgewachsenen KB., mit einem einzigen DeckB. gestützt. Ich nenne das Blättchen des K. *mehrnervig*, wenn es, gegen das Licht gehalten, ausser dem einen oder den beiden Hauptnerven noch einige andere feinere zeigt.

1. O. CRUENTA (Bertoloni.) Blutrothe S. — *Die KB. mehrnervig*, ziemlich gleichf. 2sp., länger, als die Blkr.Röhre; *Blkr. glockig, vorne an der Basis kropfig-bauchig*, auf dem Rücken gekrümmt, *Lippen* ungleich-gezähnel, *drüsig-frausig*, die obere helmartig, ungeth. oder etwas ausgerandet, mit abstehenden Seiten, *Zpfl der Unterlippe* fast gleich; *Stbg. in der Basis der Blkr. eingefügt, dicht-behaart*, oberwärts nebst dem Gf. drüsenhaarig; Narbenschleibe sammtartig, erhaben-berandet. 4. An grasreichen O., auf Wiesen auf den Wurzeln des Lotus corniculatus und der Hippocrepis comosa schmarotzend, (von Regensburg dch Bayern bis in die Bayer. und Salzbg. VorA.; Steyerml.; südl. Tyrol; in der Schw. gemein.) Jun. Jul. Rb. ic. 7. f. 896. O. gracilis Sm. Rb. ic. 7. f. 898. 899. O. vulgaris Gaud. O. caryophyllacea Schultz Beitr. 8. Untersch. sich dch folg.: Blkr. glockig, weit, an der Basis vorne kropfig-höckerig, inwendig blutroth, die Stbg. ganz unten an der Basis der Blkr. eingefügt, *N. gelb, mit einem braun-purpurnen Rande umzogen*, und die ganze Blkr. mit zahlreichen, kurzen, drüsentrag. Haaren bedeckt, und von angenehmem Geruche.

2. O. RAPUM (Thuill.) Rübenstengelige S. — *Die KB. mehrnervig*, meist ziemlich gleichf.-2sp. oder ungeth., ungefähr so lang, als die Blkr.Röhre; *Blkr. glockig, vorne an der Basis kropfig-bauchig*, auf dem Rücken gekrümmt, *Lippen* wellig, *schwach-gezähnel, (nicht gefranst,)* Oberlippe helmartig, ausgerandet, mit abstehenden Lappen, der mittlere Zpfl der Unterlippe noch einmal so gross, als die seitenst.; *Stbg. in der Basis der Blkr. eingefügt, unterwärts ganz kuhl*, an der Spitze nebst dem Gf. drüsenhaarig; Narbenschleibe sammtig, ohne hervortretenden Rand. 4. An unfrucht. O. auf den Wurzeln des Sarcobammi scoparius (auf dem Kniebis und dem Siebengebirge; Unterrhein, Westphalen, Wien; als Bürger der Schw. zweifelhaft.) Mai. Jun. O. major DC. Rb. ic. f. 900. (O. major.), f. 923. (O. Rapum.) Untersch. sich dch die (wie an der O. cruenta) weite, glockige, blass-röthlich-braune oder fleischfarbene, aber getrocknet gelb-braune Blkr.,

die nach dem Verblühen sich weissfärbenden Stbk., die unterwärts völlig-kahlen Stbg. und die nicht-fransigen Lippen. Diese Art ist nach Babingt., *manuale* p. 213., die *Orobanche major* Smith und Lin.; Fries jedoch erkennt die Linneische *O. major* Linn. in der *O. elatior* Sutton. vergl. Novit. fl. suec. mant. 3. p. 17.; ich habe von den angeführten Arten bisher weder schwedische, noch englische Expl. gesehen. D.

3. *O. PROCERA* (Koch.) Hohe S. — *Die KB. mehrnervig, breit-eyf.,* ziemlich gleichf.-2sp. oder ungeth., kürzer, als die Blkr.-Röhre; *Blkr. glockig, vorne an der Basis kropfig-bauchig,* auf dem Rücken gekrümmt, *Lippen ungleich-gezähnt,* am Rande ein wenig drüsig, Oberlippe ausgerandet, Lappen vorgestreckt, der mittlere Zpil der Unterlippe ein wenig grösser; *Stbg. in der Basis der Blkr. eingefügt, kahl, an ihrem Ursprunge spärlich-behaart,* an der Spitze nebst dem Gf. etwas drüsig. 4. Auf Aeckern, auf der Wurzel des *Cirsium arvense* schmarotzend, (bisher bloss um Mannheim in der Rheinpfalz.) Jun. D.

4. *O. PRUINOSA* (Lapeyr.) Bethauete S. — *Die KB. 5nervig, 2sp.,* Zpfl. ziemlich gleich, schmal, pfriemlich, von der Länge der Blkr.-Röhre; *Blkr. glockig, auf dem Rücken etwas gekrümmt, Lippen ausgebreitet, wellig-faltig und kraus, stumpf-gezähnt, nicht gewimpert, farbig-aderig,* Oberlippe 2lappig, Zpil der Unterlippe abgerundet, der mittlere noch einmal so gross; *Stbg. gleich über der Basis der Blkr. eingefügt, unterwärts zottig,* oberwärts nebst dem Gf. etwas drüsig. 5. Auf der Wurzel der *Vicia Faba* schmarotzend, (bei Fiume; Gypsgruben bei Dirschel in Schlesien, Wimm. fl. von Schles.) Jun. ? Rb. ic. t. 911. Blkr. gross, wie der vorhergehenden Art, aber von dünner Substanz, und im trocknen Zustande papierartig, mit grossen, faltig-krausen Lippen versehen und mit blauen Adern schön-bemalt. Nach Van-cher ist die N. violett.

5. *O. SCABIOSAE* (Koch.) Scabiosen-N. — *Die KB. mehrnervig, eyf.,* in eine pfriemliche Spitze verschmälert, so lang, selten länger, als die Blkr.-Röhre, oder 2sp., mit gleichlaufenden Zpfln; *Blkr. glockig, auf dem Rücken sanft gekrümmt, auswendig, so wie die Oberlippe inwendig haarig-rauh von zerstreuten kurzen Drüsenhaaren, die auf einem violetten oder schwarzen Knötchen sitzen,* Lippen ungleich, spitz-gezähnt, am Rande gekräuselt, Oberlippe an der Spitze ein wenig aufwärts-gebogen, 2lappig, die Lappen ausgebreitet, Zpil der Unterlippe gleich; *Stbg. nahe an der Basis der Blkr. eingefügt, unterwärts zerstreut-behaart,* an der Spitze nebst dem Gf. fast kahl. 4. Auf ATriften, auf der Wurzel der *Scabiosa columbaria* und des *Carduus defloratus* schmarotzend, (bei Berchtesgaden; bei Lofer; Steyerw., Angelis; Oberöstr., Sauter.) Blkr. blass-gelblich-braun, am Rande rötlich, auf dem Rücken violett. N. dunkel-purpurn oder schwarz. Der *O. Epithymum* ähnlich, aber es unterscheidet sie: der dickere, höhere St., die schwarzen Knötchen, worauf die Haare sitzen, die gleichen Lappen der Unterlippe und die an der Spitze kahlen, zsneigenden, aber nicht bogig-hinabsteigenden Stbf. D.

6. *O. PALLIDIFLORA* (Wimm. und Grab.) Bleichblüthige S. — Die KB. mehrnervig, breit-eyf., plötzlich in eine pfriemliche Spitze zsggezogen, so lang, als die Blkr.Röhre; Blkr. glockig, auf der Mitte des Rückens ziemlich gerade, oben vorwärts-gekrümmt, auswendig, sowie die Oberlippe inwendig von Haaren, die auf einem ochergelben Knötchen sitzen, drüsig-behaart, Lippen ungleich, spitz-gezähnt, am Rande gekräuselt, Oberlippe an der Spitze ein wenig aufwärts-gekrümmt, 2lappig, mit ausgebreiteten Lappen, Zpfl der Unterlippe fast gleich; Stbg. nahe über der Basis der Blkr. eingefügt, unterwärts zerstreut-behaart, oberwärts kahl; Gf. oben drüsig-behaart. 4. Auf der Wurzel des *Cirsium arvense* schmarotzend, (in Schles. und bei Frankf. an der O.) Jun. *O. speciosa* Dietrich Preuss. Fl., ob auch DC.? Blkr. gelblichweiss mit röthlichen Adern. N. kastanienbraun-roth. Der vorhergehenden sehr ähnlich, aber vorzüglich dch die KB., die Farbe der Bth. und die kleinern, ochergelben Knötchen, worauf die Haare sitzen, verschieden.

7. *O. EPITHYMUM* (DC.) Quendel-S. — Die KB. mehrnervig, lanzettl., pfriemlich-zugespitzt, länger, als die Blkr.Röhre, ungeth. oder dch einen spreitenden Zahn 2 sp.; Blkr. glockig, auf dem Rücken sanft-gebogen, auswendig, sowie die Oberlippe inwendig von Haaren, die auf einem sehr kleinen Knötchen sitzen, drüsig-behaart, Lippen ungleich, spitz-gezähnt, am Rande gekräuselt, Oberlippe an der Spitze ein wenig aufwärts gebogen, 2lappig, die Lappen ausgebreitet, der mittlere Zpfl der Unterlippe noch einmal so lang, als die seitenst.; Stbg. gleich über der Basis der Blkr. eingefügt, unterwärts zerstreut-behaart, an der Spitze nebst dem Gf. drüsig-behaart; Narbenscheibe fein-sammtig ohne hervortretenden Rand. 4. Auf Haiden und unkult. Feldern auf der Wurzel von *Thymus Serpyllum* schmarotzend, (im südl. Gebiet: Schw., Rheinlfläche, Würtemb., Bayern.) Jun. Aug. Rb. ic. 7. f. 887-889. *O. rubra* Engl. bot. t. 1786, sehr schlecht. Rb. ic. f. 885. *O. sparsiflora* Wallr. Niedriger, als die vorhergehenden, meist 5-6 Zoll hoch, lebend schmutzig-gelblich, oft purpurn-überlaufen, überall mit rostbraunen, klebrigen Haaren bedeckt, wohlriechend. N. dunkelpurpurn; dch letzteres Merkmal untersch. sich die Pflanze lebend leicht von *O. Rapum* und *O. cruenta*; getrocknet ist sie von ersterer ausser andern Merkmalen dch die braunen, und nicht weissen Stbk., von letzterer dch die an der Basis spärlich-behaarten Stbf. verschieden.

8. *O. GALI* (Duby) Labkrauts-S. — Die KB. mehrnervig, ziemlich gleichf.-2sp., halb so lang, als die Blkr.Röhre, vorne zsstossend oder zsgewachsen; Blkr. aus allmählig erweiterter Basis glockig, auf dem Rücken gekrümmt, Lippen ungleich-gezähnt, Oberlippe helmartig, mit vorwärts gerichteten, (nicht abstehenden) Seiten, Zpfl der Unterlippe eyf., fast gleich, vorwärts-gerichtet, nicht halb so lang, als die Röhre; Stbg. oberhalb der Basis der Blkr. eingefügt, dicht-behaart, oberwärts nebst dem Gf. drüsig-behaart; Narbenscheibe fein-sammtig, ohne hervortretenden Rand. 4. Auf unkult. Hügeln, Feldern, an Waldrändern auf der Wurzel

von *Galium verum* und *G. Mollugo* schmarotzend, (am weitesten deh das g. Gebiet verbreitet.) Jun. Jul. *O. caryophyllacea* Sm. *O. vulgaris* DC. *O. hipontina* Schultz. *O. caryophyllacea* Rb. ic. f. 890, 891. *O. Galii* f. 892-895. *O. strobiligena* f. 905, 906. *O. laxiflora* Rb. fl. exc. *O. vulgaris* ic. f. 808-810. *O. major* Pollich. — Blkr. weiss mit blassröthlicher oder violetter Farbe leicht angehaucht. Die N. dunkelpurpurn. Untersch. sich von den vorhergehenden nasser andern Merkmalen deh die dicht-behaarten Stbg., mit Ausnahme der *O. cruenta*, welche aber eine weitere, vorne an der Basis hückrige und anders gefärbte Blkr., absteheude Lappen der Oberlippe und eine gelbe N. hat.

9. *O. RUBENS* (Wallroth.) Braunröthliche R. — *KB. mehrnerrig*, breit-eyf., pfriemlich-zugespitzt, hinten und vorne mit einem Zahne versehen oder ungleich-2sp., ohngefähr so lang, als die Blkr.Röhre, vorne zsstossend oder zsgewachsen; *Blkr. aus gekrümmter Basis röhrig-glockig, auf dem Rücken gerade, an der Spitze helmartig-abschüssig*, Lippen ungleich-gezähnelte, die obere 2lappig, mit absteheuden Lappen. Zpfl der Unterlippe eyf., ziemlich gleich, die sitenst. abstehend; *Stbg.* in der Biegung der Blkr. eingefügt, von der Basis bis zur Mitte *dicht-behaart*; Narbenschleibe fein-sammetig, ohne hervortretenden Rand. 4. Auf Aeckern und Triften, auf der Wurzel von *Medicago falcata* und *M. sativa* schmarotzend. Mai. Jun. *O. elatior* Koch und Ziz. Rb. ic. f. 901, 902. *O. Medicaginis* Schultz. *O. Buekii* Dietrich Preuss. Fl. Diese Art untersch. sich deh die 9-10^{te} lange, gelbliche oder blass-bräunliche oder röthliche röhrlige Blkr., die oberhalb der Basis deutlich-gekrümmte, auf dem Rücken gerade oder etwas eingedrückte Röhre und die ausgezeichnet helmartig-gekrümmte, an der Spitze ein wenig aufwärts gebogene Oberlippe. N. *wachsgelb*.

10. *O. TEUCRI* (F. W. Schultz.) Gamander S. — *Die KB. mehrnerrig*, fast gleichmässig 2sp., Zpfl lanzettl., so lang, als die halbe Röhre der Blkr., vorne einander genähert oder verwachsen; *Blkr. glockig-röhrlig, am Rücken gerade, an der Spitze helmf., abschüssig*, die Lippen ungleich-gezähnt, die obere ganzrandig mit absteheudem Rand, die untere 3lappig, abwärts-gekehrt, mit rundl.-stumpfen Zpfln; *Stbgf. über der Basis der Blkr. eingefügt, von der Basis bis zur Mitte behaart*; Gf. an der Spitze drüsig-haarig; N. (nach Schultz) sammetig-feinwarzig ohne erhabenen Rand. 4. An trockenen, sonnigen O., auf der W. von *Tenerium chamaedrys*, *T. montanum* und *Thymus serpyllum* schmarotzend, (Salzburg, Zweibrücken, Dorilshelm im Elsass.) Jun.? Blkr. (nach Schultz) braun-roth, mehr oder weniger in das Violette oder Pomeranzenfarbe spielend, an der Basis gelblich. Gf. weiss, später violett, N. bräunlich-blutroth. D.

11. *O. STIGMATOTES* (Wimmer Fl. von Schles. S. 280.) Hochnarbige S. — *KB. mehrnerrig*, eyf., gleichmässig 2sp., Zpfl lanzettl., kürzer, als die Röhre der Blkr.; *Blkr. glockig-röhrlig, am Rücken bogig*, die Lippen ausgefressen-gezähnelte, die obere schwach 2lappig, mit hervorgestreckten Lappen, die untere etwas

abstehend, 2lappig, mit längl.-abgerundeten, fast gleichen Lappen; *Stbgf. unter der Mitte der Röhre eingefügt, von der Basis bis zur Mitte zottig*, oberwärts hie und da, sowie der Gl. an der Spitze, drüsig-haarig. 4. Auf Feldern und unbebauten O., (bei den Gypsgruben unweit Dirschel in Oberschlesien auf *Centaurea Scabiosa*, Wimmer; am Schlossberge bei Grätz, auf mehreren Pfl., auch auf *Anthericum ramosum*, Maly.) Blkr. an der Basis gelblich, vorne gelb-braun, etwas in das Röthliche spielend; N. violett. D.

12. *O. LORICATA* (Rb. fl. exc., mit Ausschl. des Syn. *O. flava* und der deutschen StandO.) Bepanzerte S. — Die KB. 3-5nervig, 2th., so lang, als die Blkr.Röhre; *Blkr. röhrig-glockig, auf dem Rücken gerade*, an der Spitze vorwärts-gekrümmt, Lippen stumpf-gezähnel, die obere 2lappig, mit abstehenden Lappen; *Stbg. unter der Mitte der Röhre eingefügt*, kahl, an der Basis spärlich-behaart; N., Scheibe . . . 4. An gebirgigen, unkult. O., auf der Wurzel von *Artemisia campestris* schmarotzend, (auf den Westbergen bei Aschersleben und bei Frankenhausen in Thüringen; selten auch im Wallis.) Jun. *O. Artemisiae campestris* Gaud. *O. elatior* Schleich., nach den von mir untersuchten Explaren. Untersch. sich dch die schmalen 3-5nervigen, tiefgeth. KB., die so lang oder länger sind, als die Blkr.Röhre, dch die 7-8 Linien lange, von der Basis bis zur Unterlippe gerade, nur auf dem Rücken der Oberlippe ein wenig gekrümmte Blkr., die 2lappige, abstehende Lippe, und die spärlich-behaarten, hoch, oberhalb des Drittels der Röhre eingefügten Stbg. Die N. nach Vauch. hellpurpurn.

13. *O. PICRIDIS* (F. W. Schultz bei Koch.) Bitterkrants-S. — Die KB. 1-2nervig, ungeth., oder vorne mit einem Zahne versehen, länger, als die Blkr.Röhre; *Blkr. röhrig-glockig, auf dem Rücken gerade*, an der Spitze vorwärts-gekrümmt, *Lippen stumpf-gezähnel, die obere ungeth.*, am Seitenrande etwas abstehend; *Stbg. fast in der Mitte der Röhre eingefügt, von der Basis bis über die Mitte dicht-behaart*, oberwärts von kleinen Wärzchen etwas rauh; *Narbenscheibe fast glatt, mit sehr kleinen und sehr stumpfen Körnchen dicht-bedeckt.* ☉. An gebirg. O., auf der Wurzel von *Picris hieracioides* schmarotzend. (Zweibrücken in d. Rheinpfalz, Rothsch in Steyer., Karschtgebirge.) Jun. *N. schmutzig-violett*, in das Amaranthfarbne und Lila varirend. Der *O. loricata* sehr ähnlich, aber der St. ist oberwärts nebst den DeckB. viel zottiger, die KB. sind 1nervig, seltner dch einen Zahn vergrößert, und dann 3nervig, die Blkr. ist oberwärts ein wenig mehr vorwärts gekrümmt, die Oberlippe ungeth., die Stbg. von der Basis bis über die Mitte dicht-behaart, und oberwärts mit Wärzchen besetzt. Von *O. flava* untersch. sie sich: sie ist behaarter, die KB. sind länger, als die Blkr.Röhre, die Blkr. ist auf dem Rücken viel weniger gekrümmt und die Oberlippe ungeth., mit kaum etwas abstehenden aber nicht zurückgeschlagenen Seiten, die Stbf. sind länger, an der Spitze viel weniger gekrümmt, die N. ragt über die Biegung der Stbf. hervor, ist schmutzig-violett und nicht wach-

gelb, breiter und auf der Scheibe fein-gekörnelt, nicht narbig. Von *O. lucorum* untersch. sie sich dch die gerade, vorne nur ein wenig gekrümmte Blkr., die stumpf-kleingekerbten Lippen, die ungeth. Oberlippe, die höhere Einfügung der Stbg. und die feingekörnelte N.

14. *O. FLAVA* (Martius bei Schultz.) Gelbe S. — Die KB. 1-nervig oder schwach-3nervig, ungeth. oder vorne mit einem Zahn versehen, halb so lang, als die Röhre; *Blkr.* röhrig-glockig, auf dem Rücken gekrümmt, *Lippen* gezähnelte, die obere 2lappig, *mit zurückgeschlagenen, rückwärts anliegenden Lappen*; *Stbg.* fast in der Mitte der Röhre eingefügt, von der Basis bis über die Mitte *dicht-behaart*; Gf. kahl: *Narbenscheibe warzig-narbig*. 4. Auf etwas feuchten Triften, auf der Wurzel von *Tussilago nivea* und anderen Pfl., (auf den Isarauen bei München, Martius; Oberöstr., Saüter; auf dem Blabusch bei Grätz und daselbst auf *Pencedanum Cervaria* und vielen anderen Pfl., Maly.) Jul. Durch die, wie bei *Antirrhinum*, zurückgeschlagen und hinten aneinander stossenden Lappen der Oberlippe, sehr ausgezeichnet. Die ganze Pfl. wachs- oder hellgelb; *Blkr.* 7^{'''} lang; die längern Stbg. an der Spitze wie ein Henkel stark-gebogen und herabsteigend; *N. wachsgelb*, warzig-narbig. D.

15. *O. LUCORUM* (A. Braun bei Schultz.) Hain-S. — Die KB. 2nervig, ungleich-2sp, so lang, als die Blkr.-Röhre; *Blkr.* röhrig-glockig, auf dem Rücken gekrümmt, *Lippen* fein-drüsig-gewimpert, schwach-gezähnelte, die obere 2lappig, *mit abstehenden Lappen*; *Stbg.* nahe an der Basis der Blkr. eingefügt, von der Basis bis über die Mitte *dicht-behaart*; Gf. kahl: *Narbenscheibe* glatt, sammtig. 4. Auf der Wurzel von *Berberis vulgaris* und der von Brombeerarten schmarotzend, (bisher blos im Engl. Garten zu München und in den Bayer. A. bei Partenkirchen; südl. Tyrol.) Jun. Jul. *O. loricata* Rb. ic. f. 918., die Einfügung der Stbg. an der Abbildg zu hoch. N. blass- und dunkler-gelb bis zum Braunrothen. Untersch. sich deutlich von *O. flava* dch folg.: Farbe gelb-rothbraun; *Blkr.* weiter; Rachen viel grösser; Lappen abstehend, nicht zurückgeschlagen; Stbf. länger, an der Spitze viel weniger gekrümmt; Gf. über die Biegung der Stbg. hervortretend und die N. grösser, *braunroth*, tiefer-2lappig, sammtig und nicht warzig-narbig. Var.:

β. *Rubi*, Bth. viel grösser und weiter, auf der Wurzel von *Rubus caesius* schmarotzend. Alex. Braun bei Koch, nicht Vanch. D.

16. *O. SALVIAE* (F. W. Schultz.) Salbei-S. — Die KB. 1nervig, ungleich-2sp., länger, als die Blkr.-Röhre; *Blkr.* röhrig-glockig, auf dem Rücken gekrümmt, *Lippen* gezähnelte, etwas gewimpert, die obere 2lappig, *mit gerade vorgestreckten Lappen*; *Stbg.* über der Basis der Blkr. eingefügt, von der Basis bis über die Mitte *dicht-behaart*, oberwärts mit drüsentrag. Haaren spärlichbestrent; *Narbenscheibe* sammtig. 4. Auf den VorA., auf der Wurzel von *Salvia glutinosa* schmarotzend, (in den Salz. A., der Ramsau bei Berchtesgaden und in den Bayer. A. zw. Lenggries

und der Glashütte; Steyerm., Wien, Schw.) Jun. Jul. *Die N. dunkel-wachsgelb.* Der *O. lucorum* sehr ähnlich, untersch. sich aber dch die immer 1nervigen KB., die reich-gezähnelten Lippen, die immer vorwärts gerichteten Lappen der Oberlippe, die nicht wie ein Henkel gekrümmten Stbf. und dch die sammtige Narbenscheibe; von *O. Picridis* dch die 2lappige Oberlippe, und die wachsgelbe, sammtige N.; von *O. loricata* dch die 1nervigen KB., die auf dem Rücken gekrümmte Blkr., die dichtbehaarten Stbf. und die wachsgelbe N.; von *O. minor* dch die 1nervigen KB., die dichtbehaarten Stbf. und die wachsgelbe N.

17. *O. MINOR* (Sutton.) Kleine S. — *Die KB. mehrnervig*, aus eyf. Basis plötzlich schmal-pfriemlich oder in 2 pfriemliche Zpfl gespalten, so lang oder länger, als die Blkr.Röhre; *Blkr. röhrig, sanft gekrümmt, Lippen stumpf-gezähnel*t, aderig, wellig, die obere 2lappig, vorwärts gerichtet, Lappen der Unterlippe rundlich, fast gleich; *Stbg. unter der Mitte der Röhre eingefügt*, kahl, unterwärts mit zerstreuten Haaren besetzt. ☉. Auf der Wurzel von *Trifolium pratense* schmarotzend, (Roschusberg bei Bingen; bei Bonn; im C. Waadt und Wallis; bei Fiume; Wien; südl. Tyrol.) Jun. Jul. nach Gaud. *Die N. purpurn oder lila.* Der nächst folgend. ähnlich, aber dch folg. verschieden: die DeckB. aus eyf. Basis lanzettl., so lang, als die Röhre oder auch als die Blkr.; Blkr. zwar gleich-breit, aber kürzer-röhrig, allmählig gekrümmt, und nicht plötzlich in ein Knie gebogen; Lippen abgerundet, stumpf-gezähnel und die Stbg. weniger hoch-eingefügt. — Die Orobanche *Hederac* Dub. bot. gall. ist der *O. minor* sehr ähnlich, mir aber noch nicht ganz klar; damit wird jedoch sehr irrig die *O. barbata* Poiret verbunden, welche eine gänzlich verschiedene Art darstellt; ich besitze in meiner Sammlung ein in Nord-Afrika gesammeltes Expl. der letzteren.

18. *O. AMETHYSTEA* (Thuill.) Amethystfarbene S. — *Die KB. 3-6nervig*, aus eyf. Basis plötzlich schmal-pfriemlich-verschmälert, oder 2sp., Zpfl schmal, pfriemlich, so lang, als die Blkr.; *Blkr. röhrig, an der Basis plötzlich in ein Knie gebogen* und vorwärts gekrümmt, sodann ziemlich gerade, *Lippen ungleich-spitz-gezähnel*t, wellig-kraus, ästig-aderig, die obere helmartig, gerade-vorgestreckt, ausgerandet oder beinahe 4lappig, die seitenst. Lappen der Unterlippe fast 2sp., der mittlere noch einmal so gross, 2-3 lappig; *Stbg. in der Biegung der Blkr. eingefügt*, kahl, unterwärts zerstreut-behaart. ☉. Auf den Wurzelästen von *Eryngium campestre*, die unter der Erde waagrecht kriechen, schmarotzend, (bei Bonn, Nees ab E.; Oberkassel bei Bonn, Fl. bonn.; Roschusberg bei Bingen, Bogenhard; Bogen. Sternberg und Liebenfels im Nassanischen, Wirtgen.) Jun. Jul. *O. Eryngii* Dub. *O. elatior* β. *microglossa* Wallr. Der St. violett oder purpurn; Bth. weisslich oder auf dem Rücken fein-lila, oder ganz lila und mit purpurnen Adern bemalt. *Die N. braun oder roth-braun.* D.

19. *O. BUEKIANA* (Koch.) Buek's S. — *KB. mehrnervig*, eyf., 2sp., Zpfl lanzettl., so lang, als die halbe Röhre der Blkr.; *Blkr. glockig-röhrig, über der Basis plötzlich vorwärts-gekrümmt, am*

Rücken bogenf., die Lippen ungleich-gezähnel. *Oberlippe* abgerundet, ganzrandig oder leicht-ausgerandet, hervorgestreckt, etwas helmf., am Rande ein wenig zurückgebogen, *Unterlippe* abwärts-gerichtet mit rundlichen, ganzrandigen Lappen, deren mittlerer etwas grösser; Stbgf. unter der Mitte der Röhre eingefügt, an der Basis spärlich mit Haaren bestreut; Gf. kahl, an der Spitze etwas drüsig. 4. An unbebauten O. auf *Medicago sativa* schmarotzend, (in der Neumark bei Frankf. an der O. auf dem Berge Lussow, Apoth. Buck.) Jun. O. *elatio* Dietrich Preuss. Fl. t. 118. mit Ausschluss der Synonyme. O. *rubens* Wallr. und O. *elatio* Sutton.; letztere ist spätblühend, blühet erst im Julius und August. Bth. blass-gelb, in das Röthliche spielend. Gf. an der Spitze purpurn. N. gelb. In der Preuss. Fl. ist O. *rubens* Wallr., eine in den Rheinprovinzen sehr gemeine Pfl., unter dem neuen Namen O. *Buckii* aufgeführt. D.

20. O. *FRAGRANS* (Koch.) Duftende S. — Die KB. ungeth. oder ungleich-2sp.; *Blkr.* an der Basis röhrig, nach oben allmählig erweitert, auf dem Rücken gekrümmt; *Stbg.* in der Mitte der Röhre eingefügt, aus bogig-abstehender Basis aufstrebend, unterwärts kahl, oberwärts behaart; Säckchen der Stbk. kurz- und sehr fein-stachelspitzig. 4.? In Unteröstr. von Dr. Schiede gesammelt. Jun.? Die Pflanze, auch getrocknet, duftend. D.

21. O. *CAERULESCENS* (Stephan bei Willd.) Bläuliche S. — Die KB. ungeth. oder 2sp., länger, als die *Blkr.*-Röhre; *Blkr.* röhrig, Röhre gekrümmt, unterwärts off., über dem Fruchtkn. eingeschnürt, Zpfl der Unterlippe konkav; Stbg. über der Mitte der Röhre eingefügt, an der Basis spärlich-behaart. O. Auf Sandplätzen, an Flussufern auf *Artemisia campestris* schmarotzend, (bei Regensburg; Danzig.) Mai, Jun. Bth. blau, gehören zu den kleineren. Aehre wollig-zottig, an getrockneten Explaren wie mit Schimmel überzogen. D.

H. Rotte. *TRICNYCHON* Wallr. l. c. K. 1blättrig, ringsum geschlossen, mit 3 DeckB. gestützt.

22. O. *CAERULEA* (Vill.) Blaue S. — K. 1blättrig, 5zähmig, Zähne lanzettl., spitz; *Blkr.* röhrig, vorwärts gekrümmt, Röhre in der Mitte verengert, Zpfl der Lippen spitz, flach; *Stbk.* kahl oder an der Basis ein wenig flaumig; *St.* einfach. 4. Auf der Wurzel von *Achillea Millefolium* schmarotzend, (in den meisten Provinzen.) Jun. Jul. O. *purpurea* J. a. t. 276. Bth. amethyst-blau, gehören zu den grösseren.

23. O. *ARENARIA* (Borkhausen bei Röm.) Sand-S. — K. 1blättrig, 5zähmig, Zähne pfriemlich; *Blkr.* röhrig, fast gerade, Röhre in der Mitte verengert, Schlund etwas aufgeblasen, Zpfl der Lippen stumpf, am Rande zurückgebogen; *Naht der Stbk.* wollig-behaart; *St.* einfach. 4. Auf der Wurzel von *Artemisia campestris* schmarotzend sowohl auf Sand- als Lettenboden, (in mehreren Prov. D.) Jul. Aug. Rb. ic. f. 929-931. Bth. amethyst-blau, eben so lang, wie bei der vorhergehenden Art. D.

24. O. *RAMOSA* (L.) Aestige S. — K. 1blättrig, 4zähmig;

Zähne eyf.-3eckig, pfriemlich-zugesplitt; Stbk. kahl; *St. ästig*. ☉. Auf der Wurzel von Cannabis, Nicotiana, Solanum nigrum und Mays schmarotzend, (zerstreut deh das Gebiet) Jun.-Aug. Rb. lc. f. 933. 934. Bth. halb oder ein Drittel so gross, als an den beiden vorhergehenden.

2. LATHRAËA (L.) Schuppenwurz. — Blkr. mit ihrer Basis abfällig. Fruchtkn. vorne mit einer freien Drüse gestützt; sonst Alles, wie bei Orobanche.

1. L. SQUAMARIA (L.) Gemeine S. — Der St. einfach; Bth. hängend, einerseitswendig; Unterlippe der Blkr 3sp. 2. In Laubwäldern, an schattigen Ö., nicht überall. März. Apr. Schk. t. 170. Die ganze Pflanze weiss oder in das Blass-Rosenfarbne spielend.

LXXXV. Ordng. RHINANTHACEEN. D. fl. fr. 3. p. 454. (mit Ausschl. von Arten.) Pediculares Juss. gen. 99. (mit Ausschl. von Arten.)

Die Stbk. an der Basis stachelspitzig oder dörnig, sonst Alles, wie bei den Antirrhineen.

1. TOZZIA (L.) Tozzie. — K. 5zählig. Blkr.Röhre walzlich, oberwärts allmählig erweitert; Saum 2lippig; Oberlippe 2-, Unterlippe 3sp., Lappen fast gleich. Fruchtkn. 2fächerig, Fächer 2eyig. Kapsel 1samig.

1. T. ALPINA (L.) Alpen-T. — 2 An schattigen, nassen Felsen der A. und VorA., (dch die g. AK. und auf den Sud.) Jul. Aug. St. h. 30. Blkr. gelb, Unterlippe blutroth-punktirt.

2. MELAMPYRUM (L.) Wachtelweizen. — K. röhrig, 4zählig. Fächer des Fruchtkn. 1-2samig. S. glatt. — Oberlippe der Blkr. am Rande zurückgeschlagen; Unterlippe 3furchig.

1. M. CRISTATUM (L.) Kammähriger W. — Aehren 4kantig, dicht-dachig; die DeckB. herzf., aufwärts zsgeschlagen, zurückgekrümmt, kämmig-gezähnt. ☉. In Wäldern und auf trocknen Wiesen. Jun. Jul. Fl. dan. t. 1104. Bth. weisslich, vorne blass-gelb mit dottergelber- oder purpurn mit inwendig gelber Unterlippe.

2. M. ARVENSE (L.) Acker-W. — Aehren locker, gleich; die DeckB. eyf., lanzettl.-zugespitzt, pfriemlich-gezähnt, unterseits zweireihig-punktirt; K. flaumig-rauh, fast so lang, als die Blkr.-Röhre, Zähne aus eyf. Basis verlängert, borstlich-zugespitzt. ☉. Auf Aeckern, Kalk- und Lehm Boden. Jun. Jul. Fl. d. t. 911. Blkr. purpurn, in der Mitte mit einem weissen Ringe und mit einem gelben Flecken an der Basis der Unterlippe; die DeckB. purpurn.

3. *M. BARBATUM* (W. und Kit.) Bärtiger W. — Aehren locker, gleich; die *DeckB.* *eyf.*, *lanzettl.-zugespitzt*, *pfriemlich-gezähnt*, unterseits nicht punktiert; *K. rauhh.*, 3mal kürzer, als die *Bldr.-Röhre*, *Zähne eyf.*, *zugespitzt*. ☉. Unter der Saat, (im Littor, in Oestr. und Mähr.) Mai, Jun. Die *DeckB.* gelb-grün, selten purpurn. *Bldr.* gelb.

4. *M. NEMOROSUM* (L.) Blauer W. — Aehren locker, einerseitswendig; die obere *DeckB.* *tief-herzf.*, *gezähnt*; *K. rauhh.*, ohngefähr halb so lang, als die *Bldr.*, *Zähne lanzettl.-pfriemlich*, abstehend. ☉. In Wäldern und Hainen, nicht überall, (fehlt in der ganzen Rheingegend.) Jul. Aug. St. h. 29. Die *DeckB.* azurblau, *Bldr.* goldgelb; *Röhre* rostbraun.

5. *M. PRATENSE* (L.) Wiesen-W. — Aehren locker, einerseitswendig; die *DeckB.* *lanzettl.*, die obere an der Basis beiderseits 1-2zählig; *K. kahl*, 3 mal kürzer, als die *Bldr.*; *Bth.* wagrecht-abstehend. ☉. In Wäldern, auf Haiden, torfigen Wiesen und an waldig. O. Jun. Jul. *M. vulgatum* Pers. *M. commutatum* Tausch pl. sel. *Bth.* gelb oder weiss und oben gelb. *M. sylvaticum* St. h. 9.

6. *M. SYLVATICUM* (L.) Gebirgs-W. — Aehren locker, einerseitswendig; die *DeckB.* *lanzettl.*, meist ganzrandig; *K. kahl*, so lang, als die *Bldr.*; *Bth.* aufrecht. ☉. In Wäldern und auf Wiesen der VorA., (dch die g. AK.; Vog.; Schwarzw.; Snd.; Thüringerw.; Harz; Böhmen.) Jul. Aug. St. h. 9. *M. pratense* Tausch pl. sel. *Bth.* halb so gross, als die des vorhergehenden, goldgelb, aufrecht; Frucht aber nickend. Dr. Facchini sandte Expl. mit beiderseits 1-3zähligen *DeckB.*

3. *PEDICULARIS* (L.) Läusekraut. — *K.* röhrig oder aufgeblasen, 5zählig. Fächer des Fruchtkn. vieleilig. S. netzig-grüblig.

1. Rotte. Oberlippe der *Bldr.* in einen, an der Spitze abgeschnittenen, und daselbst oft kleinekerbten Schnabel *zsggezogen*; die untern Ecken der Schnabelspitze nicht in einen deutlichen Zahn vorgezogen. Kapsel *zsggedrückt* schief-eyf.

1. *P. JACQUINI* (Koch.) Jacquin's L. — Oberlippe der *Bldr.* plötzlich in einen verlängerten, lineal., an der Spitze abgeschnittenen und ausgerandeten Schnabel verschmälert; die längern Stbf. an der Spitze zerstreut-behaart; *K. länglich-glockig*, kahl oder auf den Nerven und am Rande flaumig, Zpfl oberwärts blattig, ungleich gekerbt, an der Spitze zurückgekrümmt, 3 mal kürzer, als die *KRöhre*; *B.* tief-doppelt-fiedersp., Fiederchen gezähnt, die St. aufstrebend. 4. An feuchten O. der höhern A., (von den Bayer. A. und von Tyrol bis Oestr.) Jul.-Aug. *P. rostrata* J. a t. 205. St. h. 20. *Bth.* rosenroth. Der St. mit einer hinablaufenden, aus sehr kurzem Flaume gebildeten Linie bezeichnet. D.

2. *P. ROSTRATA* (L.) Geschnäbeltes L. — Oberlippe der *Bldr.*

plötzlich in einen *verlängerten, lineal.*, an der Spitze abgeschnittenen und ausgerandeten *Schnabel* verschmälert; die längern Stbg. über die Mitte härtig; *K. röhrig*, nach der Basis verschmälert, *überall kurz-zottig*, Zpfl oberwärts blattig, ungleich-gekerbt, *an der Spitze hakig*, 3mal kürzer, als die KRöhre; *B. tief-fiedersp.*, Fiederchen doppelt-gezähnt; die St. gestreckt, aufstrebend. 4. An feuchten O. der höhern A., (Schw., Grimsel, Alpe Tolud in Tessin; Tyrol auf der Zielalpe und d. Alpen im Suldenthale; südöstl. Tyrol, alpe la Colem zw. Val de Sole und Utten.) Jul. Aug. Bth. rosenroth. Der St. mit einer hinablaufenden, zottig-flaumigen Linie.

3. *P. ASPLENIFOLIA* (Floerke bei Willd.) Streifenfarnblättriges L. — Oberlippe der Blkr. plötzlich in einen *verlängerten, lineal.*, an der Spitze abgeschnittenen und ausgerandeten *Schnabel* verschmälert; Stbf. kahl; *K. länglich-glockig, wollig-zottig*, Zpfl oberwärts blattig, gekerbt, *an der Spitze hakig*, 3 mal kürzer, als die KRöhre; *B. tief-fiedersp.*, Blättchen doppelt-gezähnt, der St. aufrecht. 4. An feuchten O. der A., (Tyrol, Salzh., Kärnth., Steyer.) Jul. St. h. 20. Bth. rosenroth. D.

4. *P. PORTENSCHLAGI* (Sauter bei Rb. ic. 3. f. 387.) Portenschlag's L. — Oberlippe der Blkr. in einen *kurzen, kegelf.*, *an der Spitze abgeschnittenen Schnabel allmählig verlaufend*; die längern Stbf. über die Mitte härtig; *K. röhrig-glockig*, kahl, auf den Nerven und am Rande flaumig, Zpfl oberwärts ungleich-gekerbt, *an der Spitze zurückgekrümmt*, kürzer, als die KRöhre; *B. fiedersp.*, Fieder doppelt-gezähnt, der St. aufrecht, dicht-beblättert. 4. An feuchten O. der höchsten GranitA., (Obersteyerm., Angelt; Oestreich. Dolliner.) Jun. Jul. Bth. rosenroth. D.

5. *P. FASCICULATA* (Bellardi nach Willd.) Büscheliges L. — Oberlippe der Blkr. in einen *kurzen, kegelf.*, *an der Spitze abgeschnittenen Schnabel allmählig verlaufend*; die längern Stbf. über die Mitte härtig-zottig; *K. glockig*, bis über die Mitte 5sp., dicht-flaumig, Zpfl *plattig, fiedersp. und gezähnt, gerade*; die obern DeckB. 3sp., Zpfl fiedersp.; *B. gefiedert*, mit fiedersp. Fiedern und gezähnten Lappen. 4. Auf den A. und VorA., (auf dem Monte Generoso, Tamor, Calbege, Dr. Lagger; im C. Tessin; Berg Fedai in Primiero und über dem Wirthshause Bracon in Tesino, südl. Tyrol, Facchini.) Jul. Aug. *P. gyroflexa* Gand. fl. helv., nicht Vill. und nicht DC. Bth. purpurn, var. weiss und in das Blass-Rosenfarbne spielend. S.

6. *P. TUBROSA* (L.) Knotenwurzeliges L. — Oberlippe der Blkr. plötzlich in einen *verlängerten, lineal.*, an der Spitze abgeschnittenen und ausgerandeten *Schnabel* verschmälert; die längern Stbf. oberwärts härtig-zottig; *K. glockig, bis zur Mitte 5sp.*, Zpfl *blattig, eingeschnitten-gezähnt, gerade*; die obern DeckB. 3sp., Zpfl eingeschnitten-gezähnt; *B. tief-doppeltfiedersp.*, Fiederchen gezähnt. 4. An feuchten O. der höhern A., (Schw.; Tyrol; Salz.; Kärnth.; Krain.) Jul. Aug. St. h. 30. *P. gyroflexa* b.

Vill. *P. adscendens* Hopp. und Sternb. Bth. gelb. Var. grösser und mit zottiger Röhre des K.

7. *P. BARRELIERI* (Rh.) Barrelier's L. — Oberlippe der Blkr. plötzlich in einen *verlängerten, lineal.*, an der Spitze abgeschnittenen und ausgerandeten *Schnabel* verschmälert; die längern Stbf. oberwärts härtig-zottig; K. schmal-glockig, bis zur Mitte 5sp., *kahl*, *Zpfl* lanzettl., zugespitzt, *ganzrandig*, gerade, am Rande flaumig; die obern DeckB. fiederig-3-sp., die seitenst. *Zpfl* ganzrandig; B. tief-doppelt-fiedersp., Fiederchen gezähnt. 4. Auf KalkA., (auf dem Joche der Alp zw. d. C. Bern und Wallis.) Jul. Aug. *P. adscendens* Gaud., nicht Schleich. Aehre viel länger und unterwärts lockerer, als bei der vorhergehenden. Bth. gelb. S.

8. *P. INCARNATA* (J. a. t. 140.) Fleischfarbiges L. — Oberlippe der Blkr. in einen *verlängerten, lineal.*, an der Spitze abgeschnittenen und ausgerandeten *Schnabel* verschmälert; Stbf. kahl; K. röhrig-glockig, wollig, 5sp., *Zpfl* lanzettl.-pfriemlich, spitz, *ganzrandig*, *gerade*, die längern ohngefähr so lang, als ihre KRöhre; die obern DeckB. 3sp., ganzrandig; B. doppelt-fiedersp. und kleingesägt. 4. An etwas feuchten O. der A., (Oestr., Steyerm, Kärnth., Salzbu. Wallis, Graubünden.) Jul. Aug. St. h. 30. Bth. rosenroth, Oberlippe dunkler, Aehre sehr locker.

9. *P. ATRORUBENS* (Schleicher.) Schwarzrothes L. — Oberlippe der Blkr. *kurz-geschnäbelt*, *Schnabel abgeschnitten*, meist 3zählig; die längern Stbf. oberwärts behaart; K. glockig, wollig, *Zpfl* breit-lanzettl., zugespitzt, kleingesägt; die obern DeckB. *lanzettl.-lineal.*, *ungeth.*, an der Spitze kleingesägt; B. tief-fiedersp., Fieder eingeschnitten-gesägt, die Sägezähne kleingesägt. 4. An kräuterreichen O. der höchsten A., (auf dem grossen Bernhard, nicht weit von dem Kloster Albula in Graubünden.) Jul. Aug. Die Pflanze von dem Habitus des *P. sudetica* und *P. recutita*. Aehre gedrungen; Bth. satt-purpurn. S.

10. Rotte. Oberlippe der Blkr. kurz geschnäbelt; Schnabel vorne abgeschnitten und beiderseits an den Ecken in einen spitzen oder pfriemlichen Zahn vorgezogen. Kapsel zsgedrückt, schief-eyf.

10. *P. SYLVATICA* (L.) Wald-L. — Oberlippe der Blkr. fast sichelf., sehr kurzgeschnäbelt, abgeschnitten, die Ecken in einen 3eckig-pfriemlichen Zahn vorgezogen; K. 5zählig, Zähne oberwärts blattig und gezähnt; B. gefiedert, Fieder oval, fast fiedersp.-kleinlappig, Lappchen 2-3 zählig; der *HauptSt.* aufrecht, von der *Basis* an *blüthentragend.*, die *NebenSt.* gestreckt. 4. oder ☉. Auf schlechteren Wiesen, Haiden und feuchten Wäldern. Mai-Jul. St. h. 13. Bth. rosenroth.

11. *P. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-L. — Oberlippe der Blkr. fast sichelf., sehr kurz-geschnäbelt, abgeschnitten, die Ecken in einen pfriemliches Zähnchen vorgezogen; K. 2lappig, Lappen eingeschnitten-gezähnt kraus; B. gefiedert, Fieder länglich, fast fiedersp., klein-lappig, Lappchen gekerbt; der *St.* aufrecht, von der *Basis*

an ästig. 4. oder ☉. In Sümpfen und auf feuchten, schwammigen Wiesen. Mai-Jul. Schk. t. 171. Bth. fleischroth. Nebst dem Zähnchen an der Spitze der Oberlippe befindet sich ein anderes kleines in der Mitte des Randes derselben.

12. *P. SUDETICA* (Willd.) Sudeten-L. — *Oberlippe* der Blkr. *sichelf.*, sehr kurz-geschnäbelt, abgeschnitten, *die Ecken in einen 3eckig-pfriemlichen Zahn vorgezogen*; K. 5sp., auf den Kanten zottig, *Zähne lanzettl.*, ungeth., kleingesägt; B. fiedersp., Spindel verbreitert, Fieder lanzettl., spitz, kleingelappt-gezähnt, Zähne kleingesägt, der St. einfach. 4. An nassen O. und Quellen in den Sudet. Jun. Jul. Rb. ic. f. 574. Bth. fleischroth. D.

13. *P. FRIEDERICI-AUGUSTI* (Tommasini in der Linnaea B. 13. S. 69. und 74. t. 2.) Friedrich August's L. — *Die Oberlippe* der Blkr. *sichelf.*, kurzgeschnäbelt, abgestutzt, *die Ecken in einen 3eckig-pfriemlichen Zahn vorgezogen*; K. eyf., 5zählig, von langen Haaren wollig, *Zähne lanzettl.*, spitz, 2-3 mal länger, als breit; B. gefiedert, Fieder längl., fiedersp., Zpfl stachelspitzig-gesägt. 4. Auf Bergwiesen und grasigen Abhängen im Littorale, (auf dem Slavnik, auf der Grenze zwischen Krain und Istrien.) Mai. Bth. gelblich-weiss, beim Verblühen bräunlich-gelb. D.

14. *P. COMOSA* (L.) Schopfbülthiges L. — *Oberlippe* der Blkr. *sichelf.*, kurz-geschnäbelt, abgeschnitten, *die Ecken in einen 3eckig-pfriemlichen Zahn vorgezogen*; K. 5zählig, auf den Kanten flaumig, *Zähne sehr kurz, eyf., stumpf, breiter, als lang*; B. gefiedert, Fieder länglich, zugespitzt, fiedersp., Zpfl stachelspitzig-gesägt. 4. An gebirg. O., (südl. Tyrol.) Jun.-Aug. Blkr. gelblich-weiss oder citrongelb. Facchini fand sie nicht in Tyrol selbst, sondern im benachbarten Gebiet von Verona; in Tyrol ist sie daher noch zu suchen. D.

III. Rotte. Oberlippe der Blkr. gerade oder sichelf., an der meist nicht breiteren Spitze helmartig-stumpf, aber nicht geschnäbelt und nicht mit Zähnen versehen. Kapsel zsgedrückt, schief-eyf.

15. *P. FOLIOSA* (L.) Beblättertes L. — *Oberlippe* der Blkr. *fast gerade, stumpf, zahnlos, rauhh.*; K. glockig, ungeth., auf den Kanten zottig, 5zählig, *Zähne viel kürzer, als die Röhre*, aus 3eckiger Basis zugespitzt, der hintere Zahn länger; Stbf. sämmtlich an der Spitze dicht-bärtig; B. nebst den untern DeckB. gefiedert, Fieder tief-fiedersp., Fiederchen lineal.-lanzettl., eingeschnitten-stachelspitzig-gesägt; die obern DeckB. lanzettl., fiedersp.-gesägt. 4. An kiesigen O. der VorA., (dch die g. AK.; auf den Vog.) Jul. Aug. St. h. 20. Eine 6-12 Zoll hohe Pflanze. Bth. schwefelgelb.

16. *P. HACQUETII* (Graf.) Hacquet's L. — *Oberlippe* der Blkr. *fast gerade, stumpf, zahnlos, ziemlich kahl*; K. glockig, *halb-2sp.*, *fast blumenscheidig*, auf der vordern Seite zottig, 3-5zählig, *Zähne sehr kurz, 3eckig*, der hintere ein wenig grösser; die längern Stbf. an der Spitze dicht-bärtig; B. nebst den untern DeckB. gefiedert, Fieder tief-fiedersp., Fiederchen lineal.-lanzettl.,

ungleich-stachelspitzig-gesägt; die obere DeckB. lanzettl., fiedersp.-gesägt. 4. Auf den Wocheiner A. in Krain, (auf dem Javernik von Hacquet, und auf d. Zhera perst von Graf gefunden: Slavnik und M. Maggiore im Küstenlande, Thomas.) Mai. Eine 2-3 Fuss hohe Pflanze: Bth. schwefelgelb. D.

17. *P. RECUTITA* (L.) Beschnittenes L. — *Oberlippe* der Blkr. *fast gerade, stumpf, zahlos, kahl*; K. *glockig, kahl, fast halb-5sp.*; *Zähne* ungleich, *lanzettl., spitz*; die DeckB. lanzettl., ungeth. und 3sp., kürzer, als die Bth., die untere fiedersp., verlängert; B. tief-fiedersp., *Fieder* lanzettl., fiedersp.-gezähnt und gezähnt, *die obere* an der Basis *breit-zusfließend*. 4. Auf feuchten Wiesen und an Quellen der höhern A. (dch die g. AK.) Jul. Aug. J. a. t. 258. Bth. rostbraun-purpurn.

18. *P. ROSEA* (Wulf. bei Jacq.) Rosenrothes L. — *Oberlippe* der Blkr. *gerade, fast sichelf., zahlos, stumpf, kahl*; K. röhrig, glockig, *wallig, fast halb-5sp.*; *Zähne* gleich, *lanzettl.-pfriemlich, spitz*; die DeckB. fiedersp., gezähnt, ein wenig länger, als der K.; B. gefiedert, *Fieder* schmal-lanzettl., spitz-gesägt. 4. Auf KalkA. (Tyr., Steyeru. und Kärnth.) Jul. Aug. J. ic. rar. t. 115. St. h. 20. Blkr. rosenroth: Oberlippe satter D.

19. *P. VERSICOLOR* (Wahlenb. fl. helv., nicht fl. suec.) Buntes L. — *Oberlippe* der Blkr. *gerade, fast sichelf., an der Spitze zahlos, stumpf, kahl*; K. röhrig-glockig, nebst den DeckB. zottig, 5zählig, *Zähne* ungleich, lanzettl., an der Spitze zurückgekrümmt, etwas gekerbt; die DeckB. länglich, fiedersp.-gekerbt, die obere fast ganzrandig, ein wenig länger, als der K.; B. gefiedert, *Fieder* oval, doppelt-gekerbt, *die obere* sich *abwärts deckend*. 4. In Felsenspalten u. im feuchten Kiese der A. (Schw., Bayern, Tyrol, Steyeru.) Jun. *P. flammea* Wulf. bei Jacq. (nicht L.) *P. Oederi* Vahl, nach Hartm. scand. fl. Blkr. citrongelb, mit einem scharlachrothen oder schwarzpurpurnen Flecken unter der Spitze der Oberlippe. Unsere Pfl. unterscheidet sich von der Linneischen *P. flammea*, welche in Lappland einheimisch ist, dch die fast noch einmal so grossen Bth., dch den an den Nerven und dem Rande oder doch wenigstens am Rande zottigen K., dch die an der Spitze viel weniger zugerundete Oberlippe, dch die an der Spitze gehärteten 2 längeren Stbf. und den meist hervorragenden Gf. Bei *P. flammea* sind K. und Stbgf. ganz kahl, die Oberlippe an der Spitze sackförmig-zugerundet, der Gf. eingeschlossen, und nach Wahlenb. ist die Oberlippe fast durchaus schwarz-purpurn.

20. *P. ACAULIS* (Scop.) Stengelloses L. — *Oberlippe* der Blkr. *sichelf., abgerundet-stumpf, zahlos, am Rande zottig*; K. halb-5sp., *Zähne* oberwärts blattig, eingeschnitten-gezähnt; *Bthstiele* wurzelst., *einzeln*, viel kürzer, als die B.; B. gefiedert, *Fieder* eyl., fiedersp.-eingeschnitten, stachelspitzig-gezähnt. 4. An feuchten Abhängen unter Gesträuch, (in Krain auf niedrigeren Bergen und bis in die A. hinauf; unweit Fione im Giudicarie, Facchini.) Apr. Mai, in den A. später J. coll. t. 11. Blkr. weiss, in das Fleischrothe spielend. D.

21. *P. VERTICILLATA* (L.) Quirlblüthiges L. — Oberlippe der Blkr. fast gerade, zahlos. kahl; *K. aufgeblasen, rauhh., an der Spitze gespalten*, Zähne sehr kurz; *B. tief-fiedersp., Fieder eyf.-länglich. stumpf, ungleich-gezähnt*; *die StB., DeckB. und Bth. quirlig.* 4. An grasreichen, feuchten O., (dch die g. AK.) J. a. t. 206. St. h. 20. Blkr. purpurn. * Thausen
Fiedersp. 155

IV. Röhre. Blkr.Röhre in einen glockigen, dch die zsneigenden Lippen geschlossenen Schlund erweitert. Kapsel kugelig.

22. *P. SCEPTRUM CAROLINUM* (L.) Scepterf. L. — *Blkr.Röhre oberwärts glockig; Schlund dch die zsneigenden Lippen geschlossen*; Oberlippe sichelf., stumpf, zahlos; *K. kahl, 5 zählig, Zähne länglich, stumpf, spitz-ungleich-gekerbt*; *die DeckB. eyf., ungeth.; B. fiedersp., Fieder eyf.-länglich, stumpf, doppelt-gekerbt.* 4. Auf torligen, sumpfigen Wiesen, (Oberbayern, bei München; Salzbg; Steyern., Mähren., Mecklenb., Ostpreussen.) Jun.-Aug. St. h. 30. Blkr. ansehnlich, schwefelgelb; Rand der Unterlippe blutroth.

4. RHINANTHUS (L.) Klappertopf. — *K. aufgeblasen, 4zählig. Fächer des Fruchtkn. vielebig. S. mit einem kreisrunden Flügel umzogen.* — *Bth. aller gelb, oft mit einem oder dem andern violetten Flecken bezeichnet; Röhre weisslich.*

1. *R. MINOR* (Ehrh.) Kleiner K. — *Die DeckB. gleichfarbig, die obere eingeschnitten-gesägt, Zähne zugespitzt; Lippen der Blkr. gerade-vorgestreckt, Röhre gerade, Zahn auf beiden Seiten der Oberlippe kurz eyf., so lang, als breit; B. länglich-lanzettl.* ☉. Auf Wiesen. Mai Jun. *R. Crista galli* Pollich. *R. Crista galli a. L. Alectorolophus parviflorus* Wallr. Rb. ic. 8. f. 974. Zahn der Oberlippe bald weisslich, bald violett. Bth. halb so gross, als bei dem folgenden: die DeckB. oft tief-braun überlaufen. Var.: * Thausen
Fiedersp. 155

β. fallax, höher, der St. mit schwarzen kleinen Linien bestreut: *Alect. minor β. fallax* Wimm. und Grab.

γ. angustifolius, B. halb so breit: *Alect. minor γ. Rb. ic. 8. f. 973. Rhin. minor γ. alpinus* Gaud.? Auf den höhern A. Eine an dem Stand O. weiter zu beobachtende Variet. * Thausen
Fiedersp. 155

2. *R. MAJOR* (Ehrh.) Grosser K. — *Die DeckB. verschiedenfarbig, bleich, die obere eingeschnitten-gesägt, Zähne pfriemlich, haarspitzig; Lippen der Blkr. gerade-vorgestreckt; Röhre etwas gekrümmt, Zahn auf beiden Seiten der Oberlippe eyf.; K. kahl oder etwas flaumig; Flügel der Samen 1½ mal so breit, als der Same; B. länglich-lanzettl.* ☉. Auf Wiesen. Mai. Jun. D. fl. 4. p. 341., mit Ausschl. der Var. *β.* *R. Crista galli β. L. Alectorolophus grandiflorus* Wallr. A. major Rb. ic. 8. f. 975. Zahn der Blkr.Lippe violett. Var.: * Thausen
Fiedersp. 155

β. angustifolius, B. halb so breit, lanzettl.-lineal. *R. major var. angustifolia* Fries herb. norm.

3. *R. ALECTOROLOPHUS* (Pollich.) Acker-A. — *Die DeckB. ver-* * Thausen
Fiedersp. 155

schiedenfarbig, bleich, die obern eingeschnitten-gesägt, Zähne pfriemlich, haarspitzig; Blkr. Lippen hervorgestreckt, Röhre etwas gekrümmt, Zahn auf beiden Seiten der Oberlippe eyf.; *K. zottig*; *Samenflügel um die Hälfte schmaler, als der S.*; B. länglich-lanzettl. ☉. Auf Aeckern unter der Saat, (im mittlern und südl. Gebiete sehr gemein, im nördl. fast ganz fehlend.) Mai, Jun. R. *Crista galli* γ. L. R. *villosus* Pers. R. *hirsutus* Lam. *Mimulus Alectorolophus* Scop. *Alectorolophus grandiflorus* β. *pubens* Wallr. A. *hirsutus* All. R. ic. S. f. 966. (mit Ausschl. der Samen.) Eine oft 1½ und 2 Fuss hohe Pflanze. Nach Meyer's Vorgange und nach wiederholter Vergleichung der Samen habe ich diese Art von der vorhergehenden getrennt, vermunthe aber doch, dass dieselbe nur eine Variet. der vorigen darstelle; die Breite der Samenflügel scheint zu variiren.

Alectorolophus Reichenbachii Drejer. fl. exc. hafn. S. 210. *Rhinanthus major* Smith nach Babingt. man. S. 221., sowie *Rhinanthus buccalis* Wallr. in der Regensb. bot. Ztg B. 26. S. 501. sind mir nicht hinreichend bekannte Arten.

4. R. ALPINUS (Bahmgarten.) Alpen K. — *Die Deckb. verschiedenfarbig, bleich, oft schwarz-gefleckt und punktiert*, die obern eingeschnitten-gesägt, Zähne pfriemlich-lang-begrannt; die obere Lippe der Blkr. aufstrebend, *die untere abstehend*, Zahn auf beiden Seiten der Oberlippe länglich; B. länglich-lanzettl. oder aus lanzettl. Basis lang verschmälert. ☉. Auf den A. und VorA., (dch die AK. u. auf den Mähr. Carpaten, den Sudeten, die Variet. β. auch auf Kalkbergen am Unterharz und in Oberbaden) Jul. Aug. Der Zahn der Oberlippe ist blau, auf der Unterlippe befinden sich einer oder mehrere blaue Flecke. Var. selten, nach Facchini, mit angedrückter Unterlippe, aber sehr oft:

β. *angustifolius*, mit um die Hälfte schmälern B.: R. *Crista galli* β. L. sp. γ. *angustifolius* Gaud. helv.

5. BARTSIA (L.) Bartsie. — K. glockig, 4sp. Fächer des Fruchtkn. vieleig. S. am Nabel zsgedrückt, auf der Oberfläche rippig, die Rückenrippen flügelig-verbreitert.

✕ 1. B. ALPINA (L.) Alpen-B. — B. gegenst., eyf., fast stengelumfassend, stumpf-gesägt. 4. Auf Wiesen und im feuchten Kiese der A. und VorA.; mit den Flüssen in die Ebenen hinabsteigend, (dch die g. AK.; auf den Sudet.; dem Feldberge, dem Schwarzw.) Jul. Aug. St. h. 17. Bth. violett-röthlich.

6. TRIXAGO (Link.) Trixago. — Kapsel in einen Schnabel verschmälert; sonst Alles, wie bei Euphrasia.

1. T. LATIFOLIA (Rb.) Breitblättrige T. — B. handf.-gezähnt; Bth. fast kopfig-zsgehäuft ☉. Auf unkult. Hügeln, (Istrien.) Apr. Mai. *Bartsia latifolia* Sm. fl. graec. t. 386. *Euphrasia latifolia* L. Blkr. purpurn. J.

7. EUPHRASIA (L.) Angentrost. — K. röhrig oder glockig,

4zählig oder 4 sp. Flücher des Fruchtkn. vieleilig. S. gleichgerieft, mit flügellosen Riefen. Kapsel sehr stumpf oder ausgerandet.

I. Rotte. EUPHRASIAM. Das untere Stbk.Säckchen der kürzern Stbg. mit einem längern Dörnchen bewehrt, die übrigen Säckchen sehr fein- und kurz-stachelspitzig.

1. E. OFFICINALIS (L.) Gemeiner A. — *B. eyf.*, meist beiderseits 5zählig, die untern Zähne genäherter, die der obern B. zugespitzt, kürzer- und länger-stachelspitzig; die obere Lippe der Blkr. 2lappig, Lappen abstehend, 2-3 zählig, die untere 3sp., Zpfl tief-ausgerandet. ☉. Auf Wiesen, an lichten WaldO., auf Haiden. Jul. Aug. Var.:

a. pratensis, drüsig-behaart von abstehenden Haaren; Zähne der obern B. stachelspitzig; Bth. meist grösser, weiss, mit einem citrongelben Flecken an der Basis der Unterlippe, auf der obern Lippe mit 6, auf der untern mit 9 violetten Linien bezeichnet: E. off. var. A. pratensis Fries. E. pratensis Rb. E. Rostkoviana Hayn. E. off. St. h. 3. — Auf Wiesen häufig.

β. neglecta, von abstehenden, drüsenlosen Haaren behaart, die obern B., so wie bei der folg. Variet., tiefer-gesägt, mit haarspitzigen Zähnen: E. off. β. neglecta Wimm. und Grab. Sehr behaarte Explare: E. nemorosa β. pectinata Rb. Kommt auf den VorA. vor.

γ. nemorosa, von gekräuselten, angedrückten Haaren flaumig, die obern B. tief-gesägt, mit haarspitzigen Zähnen; Oberlippe meistens und manchmal die ganze Bth. blau: E. off. β. nemorosa Pers. E. officinalis Hayn. arz. 9. t. 8. Rb. fl. exc. E. stricta Host. An trockneren O. häufig.

δ. alpestris, Form der B., wie bei der Var. *a.*; Flaum wie bei der Var. *γ.* Diese Variet. kommt vor: 1. mit grössern Bth. von derselben Farbe, wie bei der Var. *a.*: E. off. alpestris Wimm. und Grab.; 2. mit grössern, blauen Bth.: E. caerulea Tausch.; 3. mit den kleinern Bth. der Variet. nemorosa: E. nemorosa Rb. var. *a.*; 4. mit stumpfern BZähnen, kleinen Bth.: E. micrantha Rb. Wächst auf den VorA. und höhern Gebirgen.

Die sehr vielgestaltigen Variet. und Formen dieser Art mit Einschluss der nächstfolgenden E. minima sind in den A. und höheren Bergen von Neuem zu untersuchen, damit ermittelt werde, ob nicht mehrere echte Arten daraus zu bilden, oder ob alle unter eine einzige zu bringen seyen.

2. E. MINIMA (Schleich. bei DC.) Kleinster A. — *B. eyf.*, meist beiderseits 5zählig; Zähne der obern kurz-stachelspitzig; die obere Lippe der Blkr. 2lappig, Lappchen zsneigend, 2zählig, die untere 3sp., Zpfl tief-ausgerandet. ☉. Auf Wiesen der A. Jul. Aug. E. pratensis *a.* Rb. fl. exc. Niedrig, sehr ästig, in den B. und dem Flaume der Var. nemorosa von E. officinalis ähnlich. Bth. klein, die obere Lippe blau, die untere ganz gelb, beide mit Linien bemalt, wie bei den vorhergehenden. Kommt vor mit ganz blauer Blkr. — Die Euphrasia minima habe ich nie

im lebenden Zustande untersuchen können; deshalb habe ich sie gesondert aufgeführt, damit sie von Botanikern, welche sie an ihren Stand O. beobachten können, weiter geprüft werde.

3. *E. SALISBURGENSIS* (Fruk. in Hopp. fascib.) Salzburger A. — *B.* lanzettl. oder länglich, an der Basis keilig, *beiderseits 2-3-zählig*, *Zähne gleichweit-entfernt, die der obern B. und des K. haarspitzig-begrannt*; die obere Lippe der Blkr. 2lappig, Lappen 2-3zählig, *die untere 3sp.*, *Zpfl tief-ausgerandet*. ☉. Auf den A. u. VorA. Juli, Aug. *E. alpina* DC. — Lamarck's gleichnamige Pflanze ist sehr niedrig und trägt grosse, blaue Bth.; scheint aber doch eine Variet. von *E. salisburgensis* zu sein.

4. *E. TRICUSPIDATA* (L.) Dreispitziger A. — *B. lineal.*, an der Spitze *beiderseits 1-zählig*; *Zähne*, auch die der obern B. und des K., *spitz, wehrlos*; die obere Lippe der Blkr. 2lappig; Lappen 2-3zählig, *die untere 3sp.*, *Zpfl tief-ausgerandet*. ☉. An gebirg. O. Tyrols. (im südl. Tyrol und nördlich bis zu dem Eingange in das Gebiet von Val di Non, Facchini.) Juli, Aug. *B.* schmal, lineal., 6 Linien lang, $\frac{1}{2}$ breit, von der Basis bis zu $\frac{3}{4}$ ihrer Länge zahnlos, dann mit 2 kurzen, nicht stachelspitzigen Zähnen, versehen. Bth. wie bei der *E. officinalis*. Ob die ganz schmalen B. und die stumpfen Zähne derselben ist sie sehr verschieden von *E. salisburgensis*. D.

H. Rott. ODONTITES Dub. gall. bot. p. 334. Stbk Sackchen gleichf. stachel spitzig.

5. *E. ODONTITES* (L.) Rother A. — *B. aus breiterer Basis verschmälert*, lanzettl.-lineal., entfernt-gesägt; die DeckB. länglich-lanzettl., länger, als die Bth.; *Blkr.* auf der Oberfläche und am Rande *dicht-flaumig*; Oberlippe zsgedrückt, abgeschnitten-stumpf; *Zpfl* der untern länglich, stumpf; *Stbk. an der Spitze durch Zotten verbunden*. ☉. Auf etwas feuchten Aeckern u. O., die im Winter überschwemmt werden. Juni-Herbst. *E. verna* Bellard. *Bartsia Odontites* Sm. *Odontites verna* Rb. Blkr. hellpurpurn.

6. *E. SEROTINA* (Lam.) Späthblühender A. — *B. lanzettl., zugespitzt*, nach der Basis etwas verschmälert, ziemlich entfernt-gesägt; die DeckB. länglich-lanzettl., kürzer, als die Bth.; *Blkr.* auf der Oberfläche und am Rande *dicht-flaumig*, die obere Lippe zsgedrückt, abgeschnitten-stumpf; *Zpfl* der untern länglich, stumpf; *Stbk. an der Spitze drh Zotten verbunden*. ☉. An gebirgigen, trocknen O., (in der südl. Schw.; am Triest und wahrscheinlich an mehrern O. im südl. Gebiet.) Juli, Aug. *E. Odontites* β. L. *Bartsia serotina* Bertol. *Odontites serotina* Rb. Blkr. blasspurpurn. D.

7. *E. LUTEA* (L.) Gelber A. — *B. lanzettl.-lineal.*, schwach-entfernt-gesägt, die obere lineal., ganzrandig, alle nebst dem St. oberwärts und den K. von angedrückten, gekräuselten, drüsenlosen Haaren flaumig; *Blkr. härtig-gewimpert*; Oberlippe zsgedrückt, abgeschnitten-stumpf; *Stbg. länger, als die Blkr.*; *Stbk. kahl*,

frei. ☉. Auf niedrigeren Gebirgen und unkultiv. Hügeln, auf Kalkboden, (im mittlern und südl. Gebiete und in Pomm.) Juli. Aug. J. a. t 398. *Odontites lutea* Rb. var. β . Bth. dottergelb. — Die *E. linifolia* L. var. α , welche sich durch die kahlen K. und durch Kapseln, die länger, als der K. sind, untersch., wurde im Gebiete unserer Flora noch nicht bemerkt. Von dieser ist jedoch die *Eufragia linifolia* Column. ceph. t. 69, welche in der spec. pl. zur *Euphrasia linifolia* gezogen wird, durch den röhrigen, schmälern, und fast noch einmal so langen K., die aufrechten DeckB., dch Stbg., die kürzer, als die Blkr. sind und vorzügl. dch die rundum bärtig-gewimperten Stbk. deutlich verschieden; sie gehört zu *E. tenuifolia* Pers., *E. linifolia* Brot.

S. E. viscosa (L.) Klebriger A. — B. lanzettl.-lineal., schwach-entfernt-gesägt, die obern lineal., ganzrandig, letztere nebst dem St. oberwärts und den K. von drüsentrag., abstehenden Haaren flaumig; *Blkr. am Rande kahl; Oberlippe zsgedrückt, abgeschnitten-stumpf*; Stbg. kürzer, als die Blkr.; Stbk. an der Spitze dch Zotten vereinigt. ☉. Im mittlern Wallis. Juli. Aug. *E. linifolia* β . L. Bth. blass-gelb. Die kahle Blkr. untersch. sie sogleich von den verwandten Arten. B. breiter, als bei der vorhergehenden. D.

Die *Euphrasia lanceolata* Gaud., welche in Piemont vorkommt, bis jetzt aber in der Schw. noch nicht gefunden wurde, hat die gelben Bth., die langen Stbg. und die kahlen und freien Stbk. der *E. lutea*, aber die B. der *E. Odontites*; von jener untersch. sie sich dch folg.: die B. sämmtlich, auch die astst. sind lanzettl. und sämmtl., wie die DeckB. gesägt, die Blkr. Lippen fast von gleicher Länge, die obere ist tief-ausgerandet, fast 2sp. und die untere hat, wenn man sie zurückschlägt, die Länge der Röhre; von *E. Odontites* ist sie dch die Farbe der Bth., die Stbg., welche länger, als die Blkr. sind und durch die kahlen und freien Stbk. verschieden.

LXXXVI. Ordng. LABIATEN. Juss. gen. p. 110.

K. röhrig, bleibend. *Blkr.* 1 blättrig, unterweibig, *unregelmässig*, oft 2lippig. Stbg. der Blkr. eingefügt, 4, zweimächtig, oder nur 2. *Fruchtkn. 4, frei, einer unterweibigen Scheibe eingefügt, 1 fächerig, 1 eyig*; Eychen aufrecht. *Gf. 1, in der Mitte der Fruchtkn.* Nüsse 4, vom K. eingeschlossen. Keim gerade, Würzelchen unten, nach dem Nabel gerichtet. Eyweis fehlend. B. gegenst. nebenblattlos *).

*) Die Gruppen der Labiaten unterscheiden sich nach folgend. Merkmalen.

Stbg. abwärts geneigt, I. OCYMOIDEEN.

Stbg. entfernt und entw. oberwärts auseinander tretend, oder unter der Oberlippe zsnneigend.

Blkr. trichterf. oder fast glockig, II. MENTHOLIDEEN.

Blkr. 2lippig.

Stbk. Sackchen an der Spitze zsstossend, V. MELISSOIDEEN.

I. Gruppe. *OCYMOIDEEN*. Benth. lab. p. 1. Blkr. 2lippig. Stbg. abwärts geneigt. Stbk. nierenf., 1fächerig, mit einer halbkreisförmigen Ritze aufspringend, nach Ausstreunung des Bthstaubs ein kreisrundes, flaches Plättchen darstellend.

1. *OCYMUM* (L.) Basilienkraut. — Stbg. auf der untern Blkr.Lippe aufliegend. Stbk. nierenf., 1fächerig, in ein kreisrundes, flaches Plättchen aufspringend. Die obere Blkr.Lippe 4sp., die untere ungeth. Die obere Klippe ungeth., die untere 4zählig.

1. *O. BASILICUM* (L.) Gemeines B. — B. gestielt, eyf. oder länglich, entfernt-schwach-gesägt, kahl; K. gewimpert; der St. flaumig. ☉. Wurde aus Ostindien gebracht, und wird nun wegen des angenehmen Geruchs und hier und da auch zum Küchengebrauche in mehren Variet. kultiv. Juli. Aug. Blkr. weiss. Kultiv.

2. *LAVÁNDULA* (L.) Lavendel. — Stbg. nebst dem Gf. in die Kröhre verborgen. Stbk. nierenf., 1fächerig, in ein kreisrundes, flaches Plättchen aufspringend. Die obere Blkr.Lippe 2sp., die untere 3sp. K. ungleich-gezähnt, nach dem Verblühen durch zsneigende Zähne geschlossen.

1. *L. VERA* (DC.) Wahrer L. — B. länglich-lineal. oder lanzettl., ganzrandig, die jüngern grau, am Rande zurückgerollt; Aehren unterbrochen; die DeckB. rauten-eyf., zugespitzt, sämmtl. eine Blüthe stützend, die obersten kürzer, als der K. 2. An gebirg., trocken, unkult. O., (bei Trient im südl. Tyr., daselbst aber angepflanzt, Facchini; an dem Lavendelberge bei Kreuznach in der Rheinpfalz; in Schwaben an einigen O.; häufig über Vully zw. Murten und dem Neuenburger See, in der Schwz, Schlutleworth, Lager.) Juli. Aug. L. Spica a. L. D. fl. 4. p. 239. L. officinalis Chaix bei Vill.

II. Gruppe. *MENTHOIDEEN*. Benth. lab. p. 152. Blkr. fast glockig oder trichterf.; Saum 4-5sp.; Lappen fast gleich. Stbg. von einander entfernt, gerade. Stbk.Säckchen gleichlaufend oder spreitzend, mit einer Ritze aufspringend.

3. *ELSHOLTIA* (Willd. in Ust. mag.) Elsholtie. — Stbg. von einander entfernt, gerade, oberwärts von einandertretend. Stbk.Säckchen auseinanderfahrend. Blkr. fast gleichf. 4sp., der obere

Stbk.Säckchen an ein verbreitertes Connectiv beiderseits schief angewachsen, an der Spitze getrennt. IV. SATOREINEEN.

Stbg. unter der Oberlippe genähert und gleichlaufend.

Blkr. 1lippig, X. AUGUOIDEEN.

Blkr. 2lippig, Stbg. 2, III. MONARPEEN.

Blkr. 2lippig, Stbg. 4, Früchte steinfruchtartig, IX. PRASEEN.

Blkr. 2lippig, Stbg. 4, Früchte nussartig, saftlos.

FruchtK. an der Spitze zsgedrückt-geschlossen, VIII. SCUTELLARINEEN.

FruchtK. an der Spitze nicht zsgedrückt.

Die obere Stbg. länger, VI. NEPETEEN.

Die untere Stbg. länger, VII. STACHYPEEN.

Lappen ziemlich aufrecht, etwas konkav, ausgerandet, die untern abstehend. K. 5zählig.

1. E. CRISTATA (Willd.) Hahnenkammartige E. — Krautlg. ziemlich kahl; B. gestielt, eyf. oder länglich, nach beiden Enden verschmälert; die DeckB. breit-eyf., spitz, gewimpert, einerseitswendig; Quirle genähert, einerseitswendig; Aehren rispig. ☉. An kult. O., (in der Gegend von Hamburg, vor Ritscher bei Nienstädten, Sickmann; Aecker bei Jever, C. Koch; auf dem Felde von Hohenzaden und Völschendorf in der Umgegend von Stettin, Rostkov.) Juli. Aug. *Hyssopus ocyimifolius* Lam. *Mentha Patrini* Lepech. *M. ovata* Cav. ic. rar. t. 360. f. 1. Blkr. bleichpurpurn. D.

4. MENTHA (L.) Münze. — Stbg. von einander entfernt, gerade, oberwärts auseinander tretend. Stbk. Säckchen gleichlaufend, mit gleichlaufenden Längsritzen aufspringend. Blkr. trichterf., die Röhre allmählig in den Schlund erweitert, der Saum 4sp., fast gleich, der obere Zpfl ausgerandet; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. 5zählig, Schlund offen (nicht mit Haaren geschlossen). Die Bth. aller blass-violett oder lila.

Die Menthen variiren mit rauhh. und kahlen, oder filzigen und kahlen St. und B.; und ausserdem mit krausen B.; deswegen gibt es rauhh., filzige, kahle und krause Variet. Die krausen B. werden meist breiter und die Bstiele, wenn die Pflanze solche hat, breiter und zugleich kürzer. Die Variet. mit hervortretenden Stbg. und grössern Bth., und mit eingeschlossnen Stbg. und kleinern Bth., zeigen eine Geschlechtsverschiedenheit und zwar ein vielheilig-2häusiges Geschlecht an.

1. M. ROTUNDIFOLIA (L.) Rundblättrige M. — Aehren lineal.-walglich; die DeckB. lanzettl.; K. schwach-gerieft, der fruchtrag. fast kugelig-bauchig, Zähne lanzettl.-pfriemlich, zuletzt zsneigend; B. sitzend, fast eyf., gekerbt-gesägt. 4. An Gräben und an Gebüsch feuchter O., (in der westl. Schw. und dch das Rheinth. bis nach Spa; im Mainthale; um Halle.) Juli. Aug. *M. macrostachya* Ten., mit hervortretenden Stbg. *M. rugosa* Lam. Roth. *M. fragrans* Presl. *M. suaveolens* Ehrh.

2. M. SYLVESTRIS (L.) Wilde M. — Aehren lineal.-walglich; die DeckB. lineal.-pfriemlich; K. schwach-gerieft, der fruchtrag. bauchig, oberwärts eingeschnürt, Zähne lineal.-pfriemlich, zuletzt ein wenig zsneigend; B. fast sitzend, ey- oder lanzettf., gezähnt-gesägt. 4. An Ufern, Gräben, an Gebüsch feuchter O. Juli. Aug. Var.:

a. *vulgaris*, B. filzig, flach, oder nur wenig wellig; und diese kommt weiter vor:

A. Der Filz an dem St. und den B. locker, dicker: *M. sylvestris* Willd. *M. hybrida* Schleich. *M. canescens* Roth. *M. nemorosa* Becker. *M. sylv. nemorosa* Rb. ic. f. 1315. *M. niliaca* J. h. v. 3. t. 87. — *M. velutina* Lej. rev., *M. gratissima* Lej. fl., ist eine merkwürdige Form mit rundlich-eyf., tief-gezähnten B.

B. Der Filz des St. und der untern Blattfläche angedrückt, weisslich: *M. nemorosa* Willd. *M. serotina* Ten. *M. candicans* Opitz! *M. sylvestris* Becker. — Das andere Geschlecht mit eingeschlossnen Stbg.: *M. reflexifolia* Opitz! *M. Halleri* Gmel.

C. B. oberseits dünner-unterseits nebst dem St. dichter mit dicklichem Filze bedeckt: *M. sylvestris* α, *molissima* Benth. *M. molissima* Borkh. *M. chaleprensis* Mill. und wenn die B. von sehr kurzem Filz grau sind: *M. candicans* Crantz. Eine Abänderung davon mit schmalen, verlängert-lanzettl. B.: *M. niliaca* Willd. und Vahl.

β. *undulata*, die B. meist kürzer, am Rande wellig und eingeschnitten-gezähnt; Zähne lanzettl., ungleich, zugespitzt: *M. sylvestris* γ *crispa* Benth. *M. undulata* Willd. Rh. ic f. 1311. *M. crispa* Ten. (*M. tomentosa* Desv. bildet nach Benth. eine eigne Art.) Aus dem Samen dieser Variet. zog ich die Var. *vulgaris*.

γ. *pubescens*, die B. auf den ersten Anblick oberseits kahl und unterseits flaumig, unter der Linse aber oberseits mit wenigen sehr kurzen Haaren bestreut und unterseits auf dem Adernetze mit kurzen Haaren bedeckt; der St. mit angedrücktem Flaume bedeckt oder fast kahl: *M. balsamea* Willd. nach Expl. aus der königl. Sammlung zu Berlin. *M. pyramidalis* Ten. nach Expl. aus dem Götting. Garten. Am Meeresufer nahe bei Servola sammelte sie H. Dr. Biasol.; eine andere Form sandte mir H. Stadpf. Lang.

δ. *glabra*. B. kahl oder unterseits auf den Adern zerstreut-behaart, der St. kahl oder etwas flaumig: *M. viridis* der deutschen Autoren. — *M. laevigata* Willd. ist Abänderung davon mit breitem, eyf.-länglichen B.

Die *Mentha viridis* Fries nov. S. 176 hat schmal-lanzettl. B. mit wenigen, sehr entfernt stehenden Sägezähnen. Das Herb. normale enthält 2 Expl., das eine davon ist kahl, das andere weisslichgrau. St. und B. unterseits sind filzig-grau: ein ähnliches in D. gefundenes Exemplar dieser Pflanze habe ich noch nicht gesehen. Unsere *Mentha viridis* kommt wohl auch hier und da mit lanzettl. B. vor, aber die Sägezähne stehen nicht so entfernt.

ε. *crispata*. B. kahl, blasig-runzelig, eingeschnitten-gezähnt: *M. crispata* Schrad. Willd. *M. hercynica* Röhl.

3. *M. NEPETOIDES* (Laj.) Dickährige *M.* — *Aehren länglich-walzlich*, die obern DeckB. lineal.-pflienlich; *KZähne* lineal.-horstlich, *des fruchttrag. K. gerade-vorgestreckt*, gerieft; *B. gestielt*, eyf., gesägt. 4. An Gräben, Ufern. Juli, Aug. *M. aquatica-sylvestris* Meyer. Die Pfl. hat die B. der *M. aquatica* und die Aehren der *M. sylvestris*, aber diese sind dicker; ist vielleicht von beiden ein Bastard. Die B. sind rauhh.; var. aber mit unterseits lockerer, vorzüglich nur auf den Adern behaarten B.: *M. hirta* Willd.; und unterseits dichter und mit einem gekräuselten Flaume besetzten B.: *M. pubescens* Willd.; ich sah Original-exemplare aus der königl. Sammlung zu Berlin. D.

4. *M. PIPERITA* (L.) Pfeffer-M. — Aehren länglich-walzlich; die ohern DeckB. lanzettl.; *KZähne* lanzettl.-pfriemlich, die des fruchttrag. *K. gerade-vorgestreckt*; Röhre gefurcht; *B. gestielt, länglich* oder eyf.-länglich, gesägt. 2. An Ufern, (in Oberbadcn am Klemmbach bei Mühlheim und zwar beide Abarten; die Var. *α.* auch in Tyrol bei Kufstein; im Laberthal bei Aichhofen unweit Regensburg in Menge, sie begleitet alle Wassergräben auf eine Strecke von mehreren Stunden, Führohr.) Juli. Aug. Var.:

α. Langii, der folgenden, welche überall in den Apothekergärten kultiv. wird, sehr ähnlich, von der sie sich blos dch den Flaum untersch.; der St. nämlich, die Bstiele, B. unterseits, Bthstielchen und K. sind rauh. und die B. oberseits zerstreut-behaart: *M. Langii* Steudel in Briefen. *M. pyramidalis* Tenor. fl. neap. 2. t. 35. nach Benth. lab. *M. suavis* Guss. pl. t. 66.

β. officinalis, kahl, der St. nebst den B. unterseits mit kurzen, angedrückten Haaren weitläufig bestreut: *M. glabrata* Vahl., nach Benth.

γ. crispa, Struktur und Kahlheit des St., der Aeste, Aehren, Bthstielchen, K. und Bth. genau so, wie bei der vorhergehenden Variet., der *M. piperita* der Apotheken, aber die B. sind eyf., blasig-runzelig, am Rande kraus und eingeschnitten-gezähnt, mit lanzettl., zugespitzten Zähnen: *M. crispa* L. *M. aquatica γ. crispa* Benth. Die Aehren haben die grösste Aehnlichkeit mit denen von *M. piperita*, wenigstens an den lebenden Exemplaren, die ich im Garten kultivire; weswegen ich sie der *M. piperita* als Variet. unterordne. Ich sah sie nur kultivirt D.

5. *M. AQUATICA* (L.) Wasser-M. — Bth. quirlig-kopfig; *KZähne* aus 3eckiger Basis pfriemlich, die des fruchttrag. *K. gerade-vorgestreckt*; Röhre gefurcht; B. gestielt, eyf., gesägt. 2. An Ufern, Gräben überall. Juli. Aug. *M. palustris* Mill. *M. intermedia* und *M. purpurea* Host. (etwas zottigere Explare). Kommt vor:

β. hirsuta, behaarter, B. oft kürzer-gestielt: *M. hirsuta* L. *M. dubia* Vill.

γ. glabrata, kahl, nur die K. gewimpert: *M. citrata* Ehrh. *M. odorata* Sol. *M. adpersa* Moench.

Meyer vereinigt in der chlor. hannov. die *M. aquatica* mit *M. sativa*. Es kommen allerdings Mittelformen vor, die man aber auch für Bastarde halten kann.

6. *M. SATIVA* (L., vgl. D. fl. 4. p. 253.) Gezähnte M. — Bth. quirlig; *Quirle sämmtlich entfernt, kugelig*; *K. röhrig-trichterf., Zähne 3eckig-lanzettl., zugespitzt*, die des fruchttrag. *K. gerade-vorgestreckt*; B. gestielt, eyf. oder elliptisch, gesägt, mit abstehenden Sägezähnen. 2. An Gewässern überall. Juli. Aug. Smith trans. soc. linn. *M. palustris* Moench. *M. verticillata* Roth. Var.:

α. vulgaris, Haare des St. herabgebogen oder abwärts ange-drückt: diese geht über in die Var.:

β. glabra, wenn die meisten Haare verschwinden: *M. rubra* Sm. *M. arvensis* *δ. rubra* Benth. *M. sativa* (Agardhiana) Fries. — Im andern Extreme der Formenreihe geht die Var. *α.* über in die

γ. hirsuta, die Haare, auch die des K. und der Bthstielechen wagerecht-abstehend. Selten kommt vor:

δ. crispa et pilosa, B. breiteref., blasig-runzelig, unregelmässig-eingeschnitten-gezähnt: *M. dentata* Roth. *M. sativa* Tausch. und *L. spec.* nach den Synonymen.

ε. crispa et glabra, dieselbe mit kahlen B.: *M. dentata* Moench.

ζ. parviflora, Bkr. nur ein wenig länger, als der K.: *M. parviflora* Schultz. *M. austriaca* J. a. t. 50. Alle Arten dieser Gattung kommen mit halb so grossen Bth. vor, aber bei dieser Variet., wenn man die übrigen Arten damit vergleicht, sind sie doch noch merklich kleiner.

Zu *Mentha sativa* gehören nach Benth.: *M. organifolia*, *tortuosa*, *maculata*, *serotina*, *nemorosa*, *longifolia*, *alata*, *carniolica*, *viridula*, *nitida*, *montana* und *sylvatica* Host. fl. austr.

7. *M. GENTILIS* (L. spec. 805. nach Fries nov. ed. 2. S. 187.) *M. PRATENSIS* (Sol. menth. brit. t. 17. nach Benth. lab. 174.) Einheimische M., Wiesen-M. — Bth. quirlig, *sämmtliche Quirle entfernt, kugelig; die K. röhrig-glockig, Zähne 3eckig-lanzettl., zugespitzt*, die des fruchtrug. K. gerade vorgestreckt; B. kürzer- oder länger-gestielt, elliptisch oder lanzettl., an beiden Enden spitz, *Sägezähne zugespitzt und vorwärtsgerichtet*. 4. An Ufern u. feuchten O. (sehr zerstreut dch das Gebiet.) Juli. Aug. *Mentha gentilis* Meyer chlor. hanov., Sole Menth. t. 15. Smith engl. bot. nach Benth. *Mentha pratensis* Sole Menth. t. 17. Benth. lab., Koch Synops. ed. 1. *M. gracilis* *γ.* Smith. trans. soc. lin. *M. rubra* Huds. nach Fries. Zu dem grossblüthigen Geschlechte gehört: *M. Agardhiana* Fries nov., welche Maly in Steyerm. fand. Diese Art ist nach der Versicherung von Fries die wahre *Mentha gentilis* des Linne, aber nach Benth.'s Zeugniß wird in Linne's Herbar. unter diesem Namen eine Abart der *M. arvensis* aufbewahrt, zu deren Varietäten Benth. nach Vergleichung des Herbar's von Smith, auch die *M. rubra* Smith und die *M. gracilis* *α.* Smith rechnet. — Diese Pflanze ist mehr oder weniger bisweilen fast ganz kahl, und die Breite der B. so wie die Länge der Bthstiele ändert sehr ab. Dem grossblüthigen Geschlechte ist, wenn man den Ueberzug ausnimmt, die Variet.:

β. acutifolia, welche überall mit abstehenden Haaren dicht-bedeckt ist, sehr ähnlich: *M. acutifolia* Rabenhorst. fl. lusat. und wahrscheinlich Smith. brit. *M. hortensis* Tausch pl. boh. select.

γ. gracilis, fast ganz kahl mit lanzettl. B.: *M. gracilis* Smith. brit.

δ. crispa, mit krausen B.: *M. pratensis* *β. crispa* Benth. lab. Diese sah ich noch nicht.

8. *M. ARVENSIS* (L.) Acker-M. — Bth. quirlig; *Quirle sämtlich entfernt, kugelig*; *K. glockig, Zähne 3eckig-eyf., so lang, als breit*, die des fruchtrag. K. gerade-vorgestreckt; B. gestielt, eyf. oder elliptisch, gesägt. 4. An Ufern und kultiv., etwas feuchten O. überall. Juli. Aug. *M. arvensis* Benth. var. *γ. δ.* Der Bau des K., vorzüglich des fruchtrag., weicht von dem der vorhergehenden Art ab. Var.:

α. vulgaris, der St. nebst den B. zottig: Bthstielchen zottig oder kahl: *M. arvensis γ. vulgaris* Benth. *M. arvensis* Sol. — *M. agrestis* Sol. (wenn die B. an der Basis fast herzf. sind.)

β. glabriuscula, Bthstielchen kahl, B. nebst dem St. ziemlich kahl: *M. arvensis η. Benth. M. gentilis* Sm. brit. *M. gracilis α. Sm. trans.*

γ. glaberrima, Kelche, Bthstiele, St. und B. ganz kahl: *M. praecox* Sol. Menth. brit. t. 13. nach Benth. *M. rubra* Herbar. Smith's nach Benth.

Nach Benth. sind zu dieser Art zu ziehen: *M. suaveolens*, *stachyoides*, *multiflora*, *tenuifolia*, *carinthiaca*, *divaricata*, *varians*, *prostrata*, *laxa*, *parviflora*, *polymorpha*, *pulchella*, *austriaca*, *grata*, *atrovirens*, *rubra* und *gentilis* Host. fl. austr.

5. *PULEGIUM* (Miller dict) Polei. — Stbf. von einander abstehend, gerade, oberwärts auseinander tretend; Säckchen der Stbk. gleichlaufend, mit gleichlaufenden Längspalten aufspringend. Blkr. trichterf., 4sp., fast gleich; der obere Zpfl ganz; Röhre plötzlich in einen bauchigen, vorne kielig-zsgedrückten Schlund erweitert. Ring in der Röhre fehlend. K. 2lippig, die obere Lippe 3sp. mit 3eckig-lanzettl. Zähnen, die untere 2sp. mit pfriemlichen Zähnen; der Fruchtk. mit Haaren geschlossen.

1. *P. VULGARE* (Mill. dict. n. 1.) Gemeiner P. — Bth. quirlig; *Quirle kugelig, sämtlich entfernt*; *K. röhrig der fruchtrag. mit einem Ring von Haaren geschlossen*, die obern KZähne zurückgekrümmt; B. gestielt, elliptisch, stumpf, schwach-gezähnt. 4. An Ufern und sumpfigen O., nicht überall. Juli. Aug. *Mentha Pulegium* L. spec. Koch Synops. ed. 1. Rb. Bth. hell-purpurn oder lila.

6. *LYCOPUS* (L.) Wolfsfuss. — Stbg. von einander entfernt, gerade, auseinandertretend; 2 vollkommen, die Stbk.Säckchen gleichlaufend, mit Längsritzen aufspringend; 2 unfruchtbar, aus kurzen, mit einem Knöpfchen versehenen Stbf. gebildet, oder auch gänzlich fehlend. Blkr. trichterf., 4sp., fast gleich, der obere Zpfl ausgerandet; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. 5zählig.

1. *L. EUROPAEUS* (L.) Gemeiner W. — B. gestielt, *eyf.-länglich*, grob-eingeschnitten-gezähnt, *an der Basis fiedersp.*; KZähne zugespitzt; der mittlere Zpfl der Unterlippe gerade hervorgestreckt, fast 4eckig, gestutzt, noch einmal so breit, als die seitenst. 4. An feuchten O., Ufern. Juli. Aug. Schk. t. 4. Bth. weiss, inwendig mit purpurnen Punkten, wie beim folgenden.

2. *L. EXALTATUS* (L., Sohn.) Hoher W. — *B.* gestielt, die unteren im Umrisse breit-eyf., die oberen lanzettl., alle bis auf den Mittelnerven fiedersp., die untern Zpfl etwas gezähnt, die obern zsfliessend; KZähne zugespitzt; die Zpfl der Unterlippe der Blkr. eyf., fast gleich, an der Spitze zurückgebogen. 4. An feuchten O., (in der Ecke des Rheines und Maines an der Vereinigung dieser Flüsse bei Bischoffsheim, Fresenius, Lehmann; am grossen Teiche bei Capricia auf der Insel Veglia.) Juli. Aug. D.

III. Gruppe. *MONARDEEN*. Benth. lab. p. 190. Blkr. 2lippig. Zwei fruchtbare unter der Oberlippe der Blkr. gleichlaufende Stbg.

7. *ROSMARINUS* (L.) Rosmarin. — Blkr. rachig; Oberlippe 2th. Stbg. hervortretend, gekrümmt, an der Basis mit einem rückwärts gerichteten Zahne versehen. Stbk. 1 fächerig. K. 2lippig.

1. *R. OFFICINALIS* (L.) Gemeiner R. — *B.* sitzend. h. Auf unkult., rauhen Hügeln, (Littor. und südl. Schw.) April, Mai. Bth. blass-blau.

8. *SALVIA* (L.) Salbey. — Blkr. rachig. Connectiv der Stbk. staubfadenf., aufstrebend, an der Spitze ein 1 fächeriges Säckchen tragend. K. 2lippig.

1. Rotte. *EUSPHACE* Benth. lab. p. 207. Blkr.Röhre inwendig mit einem haarigen Ringe, einer Haarleiste, versehen. Die Connective, hinten fast kopfig-verbreitert, ein seitlich angewachsenes Säckchen tragend.

1. *S. OFFICINALIS* (L.) Gemeiner S. — *Der St.* strauchig; *Aeste nebst den jüngern B.* grau-filzig; *B.* ey-lanzettf. und lanzettl., dicht-kleingekerbt, runzelig; Quirle 6-12bth., nackt; *die DeckB* hinfällig; *KZähne gerade-vorgestreckt, dörnig-begrannt*; Blkr.Röhre inwendig mit einer Haarleiste. h. Zw. Felsen an gebirg. O., (im Littor.; im C. Tessin.) Juni, Juli. St. h. 9. Blkr. violett, selten weiss.

II. Rotte. *DRYMOGRAPHACE* Benth. lab. 218. Blkr.Röhre ohne Haarleiste. Connective der Stbk. hinten kopfig und daselbst ein leeres Säckchen tragend, frei. Obere K Lippe 3zählig, mit sehr kurzen Zähnen.

2. *S. GLUTINOSA* (L.) Klebriger S. — *Der St.* krautig, oberwärts nebst den DeckB. und K. drüsig-zottig, klebrig; *B.* herzspreissf., grob-gesägt, flammig, die obern lang-zugespitzt; Quirle getrennt. 6bth.; obere K Lippe eyf., 3zählig, mit sehr kleinen Zähnen, unter 2zählig, Zähne eyf., spitz, wehrlos. 4. In Wäldern, an schattigen O. und im Gebüsch, in die VorA. hinaufsteigend, (längs d. g. AK.; in Oberbaden auf dem Kaiserstuhle und in Schles. und Böhm.) Juni, Juli. St. h. 17. Bth. schwefelgelb, braun-punktirt.

III. Rotte. *AETHIOPIS* Benth. lab. 222. Blkr.Röhre ohne Haarleiste. Connective der Stbk. hinten auf der einen Seite in einen Flügel verbreitert, daselbst

ein leeres Säckchen tragend und zshängend. Oberlippe des K. 3zählig, mit geraden Zähnen.

3. *S. AETHIOPIS* (L.) Ungarischer S. — *Der St.* krautig; *B.* *nebst den K. weiss-wollig*; *B.* eyf., fast herzf., grob-gekerbt, buchtig, oder lappig, sehr runzelig, so wie die *K. weiss-wollig*; die *DeckB.* rundlich-eyf., haarspitzig, konkav; *Quirle* getrennt, 6-10bth.; *KZähne eyf., spitz, dörnig-begrannt.* ☉. An unkult. O., Wegrändern (Oestreich, am Schlosse Bielstein im Höllenthal am Fusse des Meissners in Hessen.) Juni. Juli. J. a. t. 211. Blkr. weiss, Oberlippe bisweilen violett-überlaufen. D.

4. *S. SCLAREA* (L.) Muskateller-S. — *Der St.* krautig, zottig, *oberwärts drüsig-behaart*; *B.* eyf., doppelt-gekerbt, fast filzig, die unter herzf., runzelig; die *DeckB.* breit-eyf., haarspitzig, häutig, *farbig*, länger, als die *K.*; *Quirle* 6bth., getrennt; *KZähne eyf., spitz, lang-dörnig-begrannt.* ☉. Auf grasreichen Hügeln, an Wegen, (im Gebiete der Flora von Spa bei Verviers; in Istrien; Insel Lesina; im Rhonethale des Wallis.) Juni. Juli. St. h. 9. S. *Simsiana* R. und S. Blkr. hell-bläulich; *DeckB.* rosenroth.

IV. Rotte. PLETHIOSPHACE Benth. Röhre der Blkr. ohne Haarleiste. Oberlippe des K. konkav, 2furchig, mit 3 kleinen, zsnneigenden Zähnen. Connective der Stbk. hinten auf der einen Seite in einen Flügel verbreitert.

5. *S. AUSTRIACA* (J. a. t. 112.) Oestreichischer S. — *Der St.* krautig, *oberwärts nebst den DeckB. und K. drüsig-behaart* und zottig; *B.* eyf., doppelt-gekerbt, lappig, und fast fiedersp., flaumig, die wurzelst. gestielt, die stengelst. wenige (2-4), sitzend, vielmal kleiner; die *DeckB.* eyf., spitz, so lang, als der *K.*, krautig; obere Lippe des *K. kurz-3zählig*, untere 2sp., Zähne eyf., feinstachelspitzig; *Stbg. noch einmal so lang, als die Blkr.* 4. Auf kräuterreichen Hügeln in Oestr. Mai. Juni. Blkr. weisslich oder hellgelblichweiss. D.

6. *S. PRATENSIS* (L.) Wiesen-S. — *Der St.* krautig, *oberwärts nebst den DeckB., K. und Blkr. kebrig-behaart*; *B.* eyf. oder länglich, doppelt-gekerbt, *ungeth. oder 3lappig*, runzelig, unterseits flaumig, die wurzelst. an der Basis herzf., gestielt, der stengelst. wenige, die obern viel kleiner, stengelumfassend; die *DeckB.* eyf., zugespitzt, kürzer, als der *K.*, krautig; *Quirle* meist 6bth.; *obere Lippe des K. kurz-3zählig*, untere 2sp., Zähne eyf., stachelspitzig; obere Lippe der Blkr. länger, als die untere; *Stbg.* kürzer, als die Blkr. 4. Auf trocknen Wiesen und Rainen. Mai-Juli. Kommt vor mit grossen und kleinen, halb so grossen Bth. Blkr. satt-blau, auch heller-blau, rosenroth und weiss, und blau mit einem weissen Mittelzpf der Unterlippe, letztere ist: *S. variegata* Kit. bei Willd.

7. *S. SYLVESTRIS* (L.) Wilde S. — *Der St.* krautig, reichblättrig und nebst den *B.* unterseits und dem *K. grau-flaumig*; die obern allmählig an Grösse abnehmend, kürzer-gestielt und sitzend, meist einfach-gekerbt, an der Basis eyf. oder herzf.; die *DeckB.* eyf., zugespitzt, *farbig*, kürzer, als die Bth.; *Quirle* meist 6bth.

getrennt; *obere Lippe des K. kurz-3zählig*, untere 2sp., Zähne eyf., zugespitzt-stachelspitzig; Stbg. kürzer, als die Blkr. 4. Auf kräuterreichen Hügeln, an Wegen, (in Krain und dch Oestr. nach Böhm., Schles., Sachs. und der Elbe nach bis Thüring.; Offenbach Fl. d. Wett., C. B. Lehmann; im Rheinthale zw. Cöln und Limburg.) Juli, Aug. *S. sylvestris* Spr. Rb. ic. 6. 723. Bth. und DeckB. violett oder rosenfarb. — *S. nemorosa* L. Spr. fl. hal. Rb. ic. 722., eine Variet. mit längern, etwas abstehenden StHaaren. — *S. deserti* Schangin Rb. ic. f. 724., mit breitem B., sodann *S. elata* Host., *S. valentina* Vahl sind nach Benth. auch Variet.

S. S. CLANDESTINA (L. spec. plant., nicht des Herbarium.) Orientalischer *S.* — *Der St. krautig, flaumig oder zottig*, armblättrig; *B. länglich, lappig-gezähnt oder fiedersp.*, ungleich-gekerbt, runzelig, kahl, oder unterseits flaumig, die untern gestielt, an der Basis fast herzf., die obersten sitzend; die DeckB. rundlich-eyf., zugespitzt, krautig, am Rande nebst dem K. rauh., zuletzt herabgebogen; Quirle meist 6bth., die untern entfernt; *obere Lippe des K. abgerundet, klein-3zählig*, untere 2sp., Zähne eyf., stachelspitzig, 4. Auf kräuterreichen Hügeln, (Istr.) Mai-Aug. *S. verbenaca* D. fl. l. 355. *S. praecox* Savi, Lois. *S. verbenaca* Vahl. Rb. ic. f. 718., nicht L. *S. polymorpha* Hoffm. u. Link. Rb. f. 719. *S. oblongata* Rb. f. 717., nicht Vahl. *S. multifida* Sibth. und Sm. Rb. f. 720. *S. clandestina* Vahl. Rb. ic. f. 721. Vgl. Benth. lab. gen. et spec. p. 241. Bth. hellblau. J.

V. Rotte. HEMISPHERE Penth. lab. 310. Blkr.Röhre mit Haarleiste. Connective der Stbk. hinten entfernt, kurz, herabgebogen, spitz, zahnf.; Sibf. auf recht, mit dem Connective fast in derselben Lüle.

8. *S. VERTICILLATA* (L.) Quirlständiger *S.* — *B. fast 3eckig-herzf., ungleich-gezähnt-gekerbt*; Bstiele der untern geöhrt; *Quirle fast kugelig*, reichbth., getrennt; Bthstielchen ohngefähr so lang, als der K.; *Gf. auf der Unterlippe liegend*. 4. Auf unfruchth. Hügeln, an Wegen, (in Oberbad. bei Engen und Stockach und von da dch Würtemb. bis Mergentheim, dch Oberbaiern nach Krain, Steyeru., Oestr. und nach Böhm., Sachs. u. Schles.) Juli, Aug. Clus. hist. 2. 29. f. 3. Bth. blau.

IV. Gruppe. *SATUREINEEN*. Benth. lab. p. 324. Blkr. 2lippig. Stbg. 4, von einander entfernt und entweder oberwärts auseinanderführend oder unter der oberen Blkr.Lippe zsneigend. *Säckchen der Stbk. von einander getrennt, an das quer-verbreiterte Connectiv beiderseits schief-angewachsen*.

9. *ORIGANUM* (L.) Dosten. — Stbg. von einander entfernt, oberwärts auseinandertretend; Stbk.Säckchen getrennt, an das verbreiterte, fast 3eckige Connectiv beiderseits schief-angewachsen. Obere Blkr.Lippe gerade, ausgerandet, untere 3sp.; Haarleiste in der Röhre fehlend. *K. 5zählig oder schief-gespalten und an der Spitze 3zählig oder ungezähnt*.

I. Rotte. **ECHTE DOSTEN.** K. gleichf. 5zählig oder 2lippig, obere Lippe 3-, untere 2zählig. Schlund mit Haaren besetzt.

1. **O. VULGARE (L.) Gemeiner D.** — K. 5zählig, Zähne gleich; *die DeckB. auf der innern Seite drüsenlos*; B. eyf., spitz. 4. An unkult., sonnigen O. Juli. Aug. Fl. d. t. 1581. St. h. 3. Bth. purpurn, seltner weiss. Eine vielehig-2häusige Pflanze; das weibl. Geschlecht hat Stbg., die kürzer, als die Röhre sind und halb so grosse Blkr. Beide Geschlechter var. mit DeckB., die noch einmal so lang, als der K. oder kaum länger, als dieser und die nebst dem K. kurz- oder ganz kahl sind; ferner mit einem krausen od. abstehenden Flanne des St. und der R., mit kurzen oder längl., gefärbten oder grünen Aehren; zu letzterem gehört: *Origanum virens* Hoffmannsegg. und Link Fl. portug. t. 9., nach Vogel in der Linnaea und:

β. *megastachyum*, Aehren fast 1 Zoll lang, prismatisch und gefärbt; *O. vulgare* β. *prismaticum* Gaud. *O. creticum* DC. *O. creticum* Linne's Herb. und *O. creticum* β. L. spec. *O. monspeliense* Tabern. krtrh. 726. f. 5. Oder die Aehren sind grün, die Bth. weisslich: *O. creticum* Hayne Arzngew. 8. t. 7. *O. megastachyum* Link, und *O. macrostachyum* Link nach Vogel.

2. **O. HIRTUM (Link.) Kurzhaariger D.** — K. 5zählig, Zähne gleich; *die DeckB. auf der äussern und innern Seite drüsig-punktirt*; B. breit-eyf., kurz-zugespitzt. 4. An trocknen, unkult., rauhen O., (Istrien, Biasol; Lessin piccolo auf Osero, Noë.) Jun. Juli. *O. creticum* Sieb. Bth. purpurn oder weiss. Dem vorhergeh. sehr ähnlich, aber der St. ist schlanker, die B. sind halb so gross, und im Verhältniss zu ihrer Länge breiter, zwar stumpf, aber oft mit einem hervortretenden Spitzchen versehen u. nebst den DeckB. dichter drüsig von hervortretenden, feuerfarbnen Drüsen, die Aehren schlanker. Die DeckB. sind bald so lang, als die K., bald noch einmal so lang. *Origanum heracleoticum* Benth. Var. wie *O. vulgare* mit verlängerten und mit kürzeren Aehren. Die Var. mit kurzen Aehren ist: *O. heracleoticum* Benth. dem grösseren Theil nach; die Variet. mit verlängerten, prismatischen Aehren: *O. hirtum* Link im strengeren Sinne, nach Vogel. J.

O. paniculatum (Koch D. fl. 4. p. 306., in der Anm.) steht dem *O. vulgare* am nächsten, macht aber dch die rispig-zerstreuten Aehren und den 2lippigen K., dessen obere Lippe kurz-3zählig, die untere 2th. ist, den Uebergang zur folg. Rotte.

II. Rotte. **MAJORANA.** K. halbirt, auf der einen Seite fast bis zur Basis gespalten, an der Spitze 3zählig oder daselbst nicht gezahnt.

3. **O. MAJORANA (L.) Majoran-D.** — K. halbirt, zahnlos; *die DeckB. gefurcht*; sehr dicht-dachig; Aehren oval, 3zählig, sitzend; B. gestielt, elliptisch, stumpf, ganzrandig, beiderseits grau-filzig. ☉. und 4. Aus dem nördlichen Afrika eingebracht, wird jetzt überall zum Küchengebrauch kultiv. Juli. Aug. *Majorana hortensis* Mönch. — *O. majoranoides* Willd. ist dieselbe Pflanze im kalten Hause überwintert. Kultiv.

9. **THYMUS (L.)** Thymian. — Stbg. von einander entfernt, oberwärts auseinandertretend; Stbk.Säckchen getrennt, an das verbreiterte, fast 3eckige Connectiv beiderseits schief-angewachsen. Obere Blkr.Lippe gerade, ausgerandet, untere 3sp.; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. 2lippig. — Bth. purpurn.

Das vielhegig-weibliche Geschlecht hat halb so grosse Bth., in der Blkr.Röhre verborgne, verkümmerte Stbg. und einen gerade hervorgestreckten Gf. Bei dem vielhegig männlichen oder vielmehr zwittrigen Geschlechte sind der Gf. und die Stbg. unverkümmert und beide treten über den Schlund hervor.

1. **T. VULGARIS (L.)** Gemeiner T. — Quirle kopfig oder traubig; B. lineal. oder länglich-eyf., spitz, drüsig-punktirt, *am Rande umgerollt, in den Blattwinkeln büschelig*, die blüthenst. lanzettl., stumpf. h. An felsig. O., (Istrien.) Mai. Jun. J.

2. **T. SERPYLLUM (L.)** Feld-T. — Quirle kopfig oder traubig; B. lineal. oder elliptisch, stumpf, an der Basis in einen kurzen Bstiel zsggezogen, ganzrandig, *flach*, drüsig-punktirt, kahl oder rauh., am hinteren Rande gewimpert, die blüthenst. fast gleichgestaltet; *obere Blkr.Lippe* ausgerandet, *eyf.-fast 4eckig*, h. Auf Feldern und unkult. Hügeln, Haiden, lichten Waldstellen überall. Jul.-Sept. Var. sehr vielfältig; 2 Variet. aber sind vorzüglich zu unterscheiden:

a. *Chamaedrys*, der St. 2reihig-behaart: T. Chamaedrys Fries. T. Serpyllum Pers. T. Serpyllum β . L. T. Serpyllum, T. citriodorus, T. subcitratus und T. sylvestris Schreb. bei Schw. und Kört. fl. Erlang. Kommt

rauhh. vor, die B. nämlich beiderseits nebst dem St. rauh., aber 2 Seiten des St. sind kahl oder wenigstens weniger rauh.: T. lanuginosus Schk. t. 164. T. Serpyllum γ . L. Vaill. t. 32. f. 6.; ferner mit dem Geruche der Citrone: T. Serpyllum δ . L. T. citriodorus Link.

β . *pulegioides*, Bth. fast noch einmal so gross, als in der grossblüthigen Variet. von Th. Chamaedrys, B. meist rundlich, sonst wie diese: Thymus pulegioides Lang. Eine wahrhaft schöne Pfl. In den subalpinen Gegenden Schlesiens, (im Kessel des Gesenkes.)

γ . *angustifolius*, der St. überall gleichf.-behaart: T. angustifolius Pers. St. h. 70. T. Serpyllum Fries. B. lineal.-länglich; kommt aber auch mit elliptischen oder verkehrt-eyf. B. vor: T. Serpyllum Rh. T. reflexus Lej., und mit weissen Bth.: T. inodorus Lej.; mit rauh. B.: T. lanuginosus Link.

δ . *pannonicus*, grösser, als Th. angustifolius. B. meist länglich oder lanzettl., gegen die Basis zu verschmälert, manchmal lineal., übrigens mit demselben Ueberzug versehen, wie T. angustifolius: Th. pannonicus Allion. ped., Koch Synops. ed. I. Das Unterscheidungszeichen, welches ich von der Oberlippe entnahm, ist nicht beständig. Unter den unzähligen Formen des Th. Serpyllum, welche in den südlicheren und östlicheren Gegenden unserer Fl. vorkommen, habe ich vergebens nach bestimmten Grenzen ge-

sucht. Th. *pannonicus* kommt zerstreut vor dch die südl. Schw., das südl. Tyrol, das Oestr., Littorale, Mähren und Böhmen. Var. 1. B. elliptisch und der St. dreihig-behaart: T. *montanus* WK.; 2. B. elliptisch und der St. überall behaart. St. h. 70. 3. B. elliptisch, beiderseits rauhh.: T. *nummularius* MB.; 4. B. länglich-verkehrteyf., oder lineal.-länglich: T. *collinus* MB. und T. *Marschallianus* Willd. MB., mit abstehend-behaart. St. und T. *grabrescens* Willd., mit leicht-flaumigem St.; 5. B. lineal.: T. *odoratissimus* MB.; 6. B. schmaler, rauhh.: T. *hirsutus* MB. St. h. 70.

11. SATURÉJA (L.) Pfefferkraut. — Stbg. von einander entfernt, unter der obern Blkr.Lippe zsneigend; Stbk.Säckchen getrennt, an das verbreiterte, fast 3eckige Connectiv beiderseits schief-angewachsen. Obere Blkr.Lippe gerade, ausgerandet, untere 3sp.; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. röhrig-glockig, 10riefig. — Die Gattung *Satureja* untersch. sich von *Thymus* und *Origanum* dch die oberwärts bogig-zsneigenden Stbg.; von *Calamintha* dch den gleichf.-5zähigen, oder gleichf.-5sp. K.

I. S. HORTENSIS (L.) Gemeines P. — Der St. aufrecht, sehr ästig, krautig; *Ebensträusschen blattwinkelst.*, meist 5bth.; B. *lineal-lanzettl.*, spitz, wehrlos. ☉. Im Flusskiese der wärm. Gegend., (am Isonzo in Krain; wird häufig gebauet.) Jul.-Herbst. St. h. 5. Bth. lila oder weiss mit purpurn-punktirtem Schlund, vielehig-2hänsig.

2. S. MONTANA (L.) Berg-P. — Der St. halbstrauchig, *ziemlich stielrund, flaumig*; Tr. quirlig, fast einerseitswendig; *Ebensträusschen blattwinkelst.*, gestielt, meist 3bth.; B. *lanzettl.*, zugespitzt, nach der Basis verschmälert, *beiderseits drüsig-punktirt, die obern stachelspitzig*; Zpfl der untern Blkr.Lippe länglich, stumpf, *fast gleich*, Oberlippe tief-ausgerandet. ♀. An gebirg., rauhen O., (Krain und dem Littor., südl. Tyrol.) Jul. Aug. Schk. t. 156. *Micromeria montana* Rb. Blkr. weiss, obere Lippe sehr hell in das Rosenrothe spielend oder blass-rosenfarben, untere an der Basis und am Schlunde mit einigen purpurnen Punkten. Röhre der Blkr. noch einmal so lang, als die Unterlippe. D.

3. S. VARIEGATA (Host.) Geschecktes P. — Der St. halbstrauchig, *fast stielrund, flaumig*; Tr. quirlig, fast einerseitswendig; *Ebensträusschen blattwinkelst.*, gestielt, meist 3bth.; B. *lanzettl.*, zugespitzt, nach der Basis verschmälert, *beiderseits drüsig-punktirt, die obern stachelspitzig*; die seitenst. Blkr-Zpfl gestutzt, *der mittlere noch einmal so breit*, rundl., ungeth., am Rande wellig; Oberlippe schwach-ausgerandet. ♀. An gebirg., rauhen O., (im wärmeren Krain und dem Littor.; Fiume.) Jul. Aug. *Micromeria variegata* Rb. Der vorhergehenden sehr ähnlich, aber in weniger gedrungnen Rasen wachsend, die B. sind ein wenig schmaler, der Mittelnerve tritt auch an der lebenden Pflanze hervor und die Blkr.Röhre ist so lang, als die Unterlippe; bei der vorhergeh. ist die Röhre noch einmal so lang, und der mittlere Zpfl der Unterlippe ist an Grösse den übrigen fast gleich und nicht vorne

noch einmal so breit. Die Bth. der aus dem Samen vom Wiener Garten gezogenen Pfl. sind weiss, die Oberlippe ist hell-fleischroth, an der Basis inwendig mit einigen purpurnen Streifen und die Unterlippe mit einigen purpurnen Punkten bemalt. Röhre der Blkr. so lang, als die Unterlippe. D.

4. S. PYGMAEA (Sieber in Brief. an Fünk.) Kleines P. — Der St. halbsträuchig, *4eckig, kahl*; Tr. quirlig, fast einerseitswendig; Ebensträusschen gestielt, meist 3bth.; B. lanzettl., zugespitzt, nach der Basis verschmälert, *unterseits spärlich-drüsig-punktirt, die obere stachelspitzig*; die seitenst. Zpfl. der untern Blkr. Lippe gestutzt, der mittlere breiter, *verkehrt-herzf.* 5. An gebirg., felsig. O., (Krain, Linne) Jul. Aug. S. subspicata Vis. S. illyrica Host. Micromeria pygmaea Rb. Blkr. violett, mit dunkelvioletten Flecken am Schlunde. D.

12. MICROMERIA (Benth.) Micromerie. — Stbg. paarweise genähert. K. röhrig, 13rielig, sonst Alles, wie bei Satureja. — An den mir bekannten Micromerien, die ich jetzt lebend nicht untersuchen kann, ist der K., genau gesehen, 2lippig und die ganze Gattung möchte vielleicht nicht mit Unrecht mit Calamintha zu vereinigen seyn.

1. M. JULIANA (Benth.) Julianische M. — Der St. halbsträuchig, stumpf-4eckig; Bth. quirlig; Ebensträusschen fast sitzend, der Quirl 3-5bth., *aufrecht, sehr gedrungen*, gleich-hoch; Nüsschen längl.-zugespitzt, stachelspitzig; B. fast sitzend, flaumig-kurz, eyf., ziemlich stumpf, an der Basis abgerundet, am Rande zurückgerollt, die obere lineal.-zsgerollt, die blüthenst. an den Quirl angedrückt. 4. An rauhen steinigen O., (auf der Insel Cherso und Osero.) Jul. Aug. Satureja Juliana L. D. fl. 4. p. 232. Bth. purpurn.

2. M. GRAECA (Benth. S. 373) Griechische M. — St. halbsträuchig, stumpf-4kantig; Bth. quirlig; Ebensträusschen der Quirle 3-5blüthig, *gestielt, etwas einerseitswendig*; Nüsse längl., stumpf; B. beinahe sitzend, flaumig-kurz, am Rande zurückgerollt, die unteren eyf., die oberen lanzettl. oder lineal. 4. An trockenen, sonnigen, felsigen O., (Gandria im Cant. Tessin.) Jun. Jul. Satureja graeca L. spec. Satureja micrantha Hoffm. und Link fl. portug. Bth. purpurn. S.

13. CALAMINTHA (Mönch.) Calaminthe. — K. deutlich-2lippig; sonst Alles, wie bei Satureja.

1. Rotte. ACINOS Mönch. Quirle aus 6 ungeth. Bthstielen zsgesetzt. K. Schlund mit einem Ringe von Haaren besetzt.

1. C. ACINOS (Clairville. bei Gaud.) Feld-C. — Quirle 6bth.; Bthstiele ungeth.; B. eyf., gesägt; W. einfach; der St. aufrecht, an der Basis ästig, Aeste aufstehend; FruchtK. an der Spitze zsgesogen, *doch die anliegenden Zähne geschlossen*. ☉. Auf Feldern und an kultiv. O. Jun.-Aug. St. h. 70. C. arvensis Lam.

Thymus Acinos L. *Acinos thymoides* Mönch. *A. vulgaris* Pers.
Melissa Acinos Benth. Blkr. blass-violett.

2. *C. ALPINA* (Lam.) Alpen-C. — Quirle 6bth.; *Bthstiele* ungeth.; *B. eyf.*, gesägt; *W. vielköpfig*; die St. liegend, aufstrebend; *Zähne des Fruchtk.* aufrecht-abstehend; Schlund von Haaren geschlossen. 4. Auf VorA. und den untern Gegenden der A.; mit den Flüssen herabsteigend. Jul. Aug. *Thymus alpinus* L. J. a. t. 97. St. h. 51. Blkr. blass-violett.

II. Rotte. ECHTE CALAMINTHEN. Quirle aus gabelsp. Ebensträussen zsgesetzt.

a. KSchlund mit einem Ringe von Haaren besetzt

3. *C. GRANDIFLORA* (Mönch.) Grossblüthige C. — Quirle ebensträussig; *Bthstiele gabelsp.*, 3-5bth.; *B. eyf.*, spitz, tief- und spitz-gesägt und nebst dem St. behaart; Nüsse rundlich-oval. 4. An felsig., wald. O. der Berge und VorA., (südl. Schw., südl. Tyr., Krain, Steyerm., Littor., Istr.) Jul. Aug. St. h. 70. *Melissa grandiflora* L. *Thymus grandiflorus* Scop. Bth. rosenroth; Nüsse schwarz.

4. *C. OFFICINALIS* (Mönch.) Gebräuchliche C. — Quirle ebensträussig; *Bthstiele gabelst.*, 3-5bth.; *B. eyf.*, stumpf, angedrückt-gesägt, und nebst dem St. kurz.; KSchlund spärlicher behaart, Haare kaum hervorragend; Nüsse rundlich. 4. In Wäldern der Ebenen und Gebirge, (Schw. und dch die g. Rheinfläche zerstreut bis Aachen; südl. Tyrol, Krain und Litt.) Jul. Aug. St. h. 70. *C. montana* a. Lam. *C. menthaefolia* Host., nach Benth., *C. umbrosa* Rb., nicht MB. *Thymus Calamintha* DC., nicht Scop. *Melissa Calamintha* L. Bth. purpurn, mit einem weissen, violett-punktirten Flecken. Nüsse fast kugelig, braun.

5. *C. NÉPETA* (Clairv.) Poleyartige C. — Quirle ebensträussig; *Bthstiele gabelsp.*, 12-15 bth.; *B. rundlich-eyf.*, stumpf, angedrückt-gesägt und nebst dem St. kurz.; KSchlund aus hervorragenden Haaren dicht-behaart; Nüsse länglich. 4. An Abhängen und in wärmeren Thälern. (südl. Schw.; Stadtmanern von Nürnberg; von Regensb. bis Oestr.; Salz.; Tyrol; Littor.) Jul. Aug. St. h. 70. *C. parviflora* Lam. *C. trichotoma* Moench. *C. rotundifolia* Host. *C. obliqua* Host., nach einem Expl. von Dolliner gesandt. *Melissa Nepeta* L. *Thymus Nepeta* Sm. *T. Calamintha* Scop. Eine niedrigere und kahlere Variet. ist: *Thymus athonicus* Bernh. *Melissa Nepeta* β. *athonica* Benth. Bth. bläulich-purpurn. Nüsse länglich, braun.

b. KSchlund nackt.

6. *C. THYMIFOLIA* (Rb., nicht Host.) Quendelblättrige C. — Quirle ebensträussig; *Bthstiele gabelsp.*, meist 5bth.; *B. elliptisch*, stumpf, schwach-gesägt, kahl; KSchlund kahl; Nüsse länglich, an dem Ende in eine Stachelspitze verschmälert. 4. An felsigen

O., (Krain. Görz, Kärnth.) Jul. Aug. St. h. 70. *C. rupestris* Host. *Satureja thymifolia* Scop. *S. rupestris* Wulf. bei Jacq. *Melissa alba* WK. *Nepeta croatica* Spreng. syst. *N. pumila* Spreng. cent. Blkr. weiss, obere Lippe hellviolett, untere violett-punktirt.

14. **CLINOPODIUM** (L.) Wirbelborste. — Bth. mit einer Hülle umgeben, welche aus borstlichen B. zsgesetzt ist, die dem ganzen Quirl und nicht den einzelnen Bth. angehören. Sonst Alles, wie bei *Calamintha*.

1. *C. VULGARE* (L.) Gemeine W. — Die St. aufrecht, zottig; Quirle gleich, reichbth.; Hülle so lang, als der K. 4. An lichten Waldstellen, auf unkultiv. Hügeln, an Zäunen. Jul. Aug. *C. aegyptiacum* Lam. ist nicht verschieden. *Melissa Clinopodium* Benth. Bth. purpurn.

V. Gruppe. **MELISSINEEN**. Benth. Blkr. 2lippig. Stbg. 4, von einander entfernt, und entw. oberwärts auseinander tretend, oder unter der obern Blkr.Lippe zsneigend. Säckchen der Stbk. an der Spitze zsgewachsen, an der Basis aber später auseinanderfahrend oder vom Anfang an beide in einer Linie fast wagrecht aufliegend und beide mit einer gemeinschaftlichen Ritze aufspringend.

15. **MELISSA** (L.) Melisse. — Stbg. von einander entfernt, mit ihrer Spitze unter der Oberlippe bogig-zsneigend; Stbk.Säckchen an der Spitze zsgewachsen, mit einer Ritze aufspringend, zuletzt unten auseinander tretend. Obere Blkr.Lippe konkav, untere 3sp.; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. 2lippig, oben flach, die seitenst. Zähne der obern Lippe in einen an der Röhre hinabziehenden Kiel gefaltet.

1. *M. OFFICINALIS* (L.) Gebräuchliche M. — Krautig, aufrecht, ästig, B. eyf., gekerbt-gesägt, die untern an der Basis fast herzf.; Quirle blattwinkelst., halhirt, einerseitswendig; die DeckB. eyf. 4. An waldig. O. und Zäunen, (Oestr., Littor. und Istr.; Steyerm.; südl. Tyrol; südl. Schw.; in den Weinbergen vom Unterelsass.) Jul. Aug. St. h. 11. *M. graveolens* Host., nach Benth. Bth. weiss. Var.:

β. villosa, zottig: *M. officinalis β. villosa* Benth. *M. romana* Mill. *M. hirsuta* Hornem. *M. cordifolia* Pers. *M. altissima* Sibth. und Sm., nach Benth.

16. **HORMINUM** (L.) Drachenmaul. — Stbg. von einander entfernt, mit ihrer Spitze unter der Oberlippe bogig-zsneigend; Stbk. paarweise zsgeheftet; Säckchen unten auseinanderfahrend, an der Spitze verbunden, mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe gerade, 2sp., untere 3sp.; Röhre inwendig mit einer Haarleiste. K. 2lippig, die seitenst. Zähne der Oberlippe in einen Kiel gefaltet.

1. II. PYRENAICUM (L.) 4. An grasreichen, trocknen O. der A., (Monte Calbege im C. Tessin; Wormser Joch in Tyrol, und den Graubündener A.; in südl. Tyrol weit verbreitet; SuchA. in Krain; Saalfelder Kalkgebirg in Salzburg in Menge.) Jul. Aug. Melissa pyrenaica J. h. v. t. 183. Blkr. violett.

17. HYSSÓPUS (L.) Ysop. — Stbg. von einander entfernt, oberwärts auseinandertretend; Säckchen der Stbk. unten auseinanderfahrend, an der Spitze zshängend, mit einer Ritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe gerade, flach, 2sp., untere 3sp., der Mittelzplf grösser, verkehrtherzf.; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. 5zählig.

I. H. OFFICINALIS (L.) Gemeiner Y. — Bth. quirlig-traubig, einerseitswendig; KZähne aufrecht, fast gleich; B. lanzettl., ganzrandig. 4. An sonnig., fels. O., (Oestr., Krain, Littor., südl. Tyrol, hier bloss bei Rovoredo; Steyerm. bei Cilli; Unterwallis.) Jul. Aug. St. h. 3.

VI. Gruppe. NEPETEEN. Benth. Blkr. 2lippig. Stbg. unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend, genähert, nach dem Verblühen manchmal zur Seite hinabgebogen, die obern länger, (Benth. lab. p. 462.) Zähne des FruchtK. etwas abstehend oder zneigend.

18. NÉPETA (L.) Katzenmünze. — Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend, nach dem Verblühen auswärts zurückgebogen. Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe flach, gerade, 2sp.; der Mittelzplf der untern abgerundet, sehr konkav; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. röhrig, 5zählig.

I. N. CATARJA (L.) Gemeine K. — B. gestielt, eyf., spitz, tief-gesägt-gekerbt, an der Basis herzf., unterseits grau-filzig; Ebensträusschen gestielt, gedrunken, reichbth.; die DeckB. ohngefähr so lang, als die KRöhre; Mündung des eyf., flaumigen, etwas gekrümmten K. schief, Zähne aus lanzettl. Basis pfriemlich-stachelspitzig; Nüsse *glatt und kahl*. 4. Auf Schutthaufen um Dörfer, an Wegen. Jun.-Aug. Hayn. arzng. 4. t. 8. St. h. 84. Bth. weiss, in das Rosenrothe spielend; Unterlippe purpurn-punktirt. Hat zuweilen einen Citronengeruch: N. citriodora Becker.

2. N. NEPETELLA (L.) Walliser K. — B. gestielt, lanzettl., gekerbt, an der Basis abgerundet oder herzf., beiderseits grauflaumig oder filzig; Ebensträusschen gestielt, reichbth.; die DeckB. kaum länger, als das Bthstielchen; *Mündung des röhrigen, filzigen, gekrümmten K. schief*, Zähne aus lanzettl. Basis pfriemlich; *Nüsse knötig-rauh, an der Spitze kahl*. 4. In sonnig. Thälern am Fusse der Walliser A., (im Thale Törnanche und am Matterhorn; Unteröstr.) Jul. Aug. Gaud. Blkr. weiss oder hell-fleischroth, purpurn-punktirt. Kommt ferner vor mit an der Basis herzf. StB.: N. Nepetella L. spec. St. h. 84. sehr treu. Rchb. ic. 3. f.

Handwritten:
Nepetella
Aug 82

423. *N. austriaca* Host. fl. a. *N. amethystina* Poir. *N. paniculata* Mill. Sodann mit an der Basis abgerundeten oder keilf. B.: *N. lanceolata* und *N. arragonensis* Lam. St. h. 84. Rb. ic. 6. f. 805. *N. angustifolia* Vahl. *N. graveolens* Vill.

3. *N. NUDA* (L.) Nackte K. — Aufrecht, fast kahl; B. herzf. länglich, gekerbt-gesägt, beiderseits grasgrün, sitzend, die untern kurz-gestielt; Ebensträusschen gestielt, reichbth.; die DeckB. kürzer, als der K.; *Mündung* des fruchtrtag, eyf.-flaumigen K. *fast gleich*, Zähne lineal, spitzlich, wehrlos; *Nüsse knötig-rauh, an der Spitze flaumig*. 2. Auf unkultiv. Hügeln, an Waldrändern, (von dem Littor. nach Steyerm., Oestr., Mähr., Böhm., Schles.; in Thüring. am Schlosse Gleichen und bei Wandersleben; südl. Schw.; südl. Tyrol.) Jul. Aug. *N. pannonica* D. fl. 4. p. 236. J. a. t. 24. St. h. 84. *N. ucranica* MB. (nicht L.) Bth. weiss. Var.:

β. violacea, Bth. hell-violett, mit dunkel-violetten Punkten am Schlunde und der Oberlippe: *N. pannonica* J. a. t. 129. St. h. 84. *N. paniculata* Crantz. *N. violacea* Vill. — *Nepeta pannonica* und *N. violacea* L. sind zweifelhafte Pflanzen, wie aus Bentham's Werk. p. 486. erhellt.

19. *GLECHÔMA* (L.) Gudelrebe. — Stbg. genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend; Stbk. paarweise in ein Kreuz gestellt, mit Ritzen aufspringend. Obere Blkr.Lippe flach, gerade, 2sp.; der Mittelzpf der untern verkehrtherzf., flach; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. röhrig, 5zählig.

1. *G. HEDERACEA* (L.) Gemeine G. — B. gekerbt, nierenf., die obern fast herzf.; Quirle 6bth.; *KZähne* eyf., in eine Granne zugespitzt, 3 mal kürzer, als die Röhre. 2. In Hainen, an Zäunen, und am feuchten Gebüsch, an Wiesenrändern. Apr. Mai. St. h. 8. *Nepeta Glechoma* Benth. *Calamintha hederacea* Scop. Blkr. hellviolett, mit dunkelvioletten Flecken am Schlunde und auf der Basis der Unterlippe. Kommt vor:

β. major, in allen Theilen noch einmal so gross: *G. hederacea β. major* Gand.

γ. villosa, zottig: *G. heterophylla* Opitz.

2. *G. HIRSUTA* (WK.) Rauhhaarige G. — B. gekerbt, herzf., die untern nierenf.; Quirle 6bth.; *KZähne* lanzettl. in eine Granne zugespitzt, länger, als die halbe Röhre. 2. In Wäldern und an Zäunen, (in Unteröstr., Cillier-Kreis in Steyerm.) Mai. Jun. *Nepeta Glechoma β. hirsuta* Benth. — Bentham hält diese Art, und zwar, wie es scheint, nicht mit Unrecht, für eine Variet. von *G. hederacea*; ich konnte die Pflanze lebend noch nicht beobachten.

D.

20. *DRACOCÉPHALUM* (L.) Drachenkopf. — Stbg. genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend, an der Spitze vorwärtsgekrümmt; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe gewölbt; der Mittelzpf der untern ver-

kehrherzf.; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. röhrig, 2lippig, gezähnt. — Bth. violett, bei Varietäten weiss.

I. Rotte. MOLDAVICA. Stbk. kahl.

I. D. MOLDAVICA (L.) Türkischer D. — Quirle blattwinkelst.; *B. lanzettl., stumpf-tief-gesägt*, an der Spitze stumpf und ganzrandig, die obern nebst den Deck*B. lanzettl., spitz-gesägt*, Sägezähne lang-stachelspitzig. ☉. An kultiv. O, (in der Neumark nach Rebentisch; ob bloss verwildert? Wird als Küchengewächs hin und wieder kultiv.) Jul. Aug. D.

II. Rotte. RUYSCHIANA. Stbk. zottig.

2. D. RUYSCHIANA (L.) Schwedischer D. — Quirle ährig; *B. lineal-lanzettl., ungeth., ganzrandig*, wehrlos. 4. Auf Triften der A. und der Gebirge, (in den A. von Aelen und Wallis gemein; südl. Tyrol; auf dem Rheingrafenfeld bei Schweinfurt; bei Kissingen; Königsberg.) Jun.-Aug. Fl. dan. t. 121.

3. D. AUSTRIACUM (L.) Oestreichischer D. — Quirle unterbrochen-ährig; *B. gefiedert-sth.*, mit lineal., stumpfen Zpfln, die ast- und blüthenst. 3th.; Zpfl und die obersten ungeth. *B. stachelspitzig*. 4. An felsig. Abhängen der Gebirge und A., (Unteröst. bei Petersdorf, Bertholdsdorf; Böhm. bei Karlstein; Wallis au Rosé und an Diablei.) Mai Jun. J. ic. rar. t. 112.

VII. Gruppe. STACHYDEEN. Benth. Blkr. 2lippig. Stbg. unter der Oberlippe gleichlaufend, genähert, nach dem Verblühen manchmal zur Seite hinabgebogen, die untern länger. Zähne des Fruchtk. abstehend.

21. MELITTIS (L.) Immenblatt. — Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend; Stbk. paarweise in ein Kreuz gestellt, mit Ritzen aufspringend. Obere Blkr.Lippe ziemlich flach, gerade; der Mittelzpfl der untern verkehrteyf., flach; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. weit, glockig, lappig-2lippig.

I. M. MELISSOPHYLLUM (L.) Melissenblättriges I. — 4. An waldigen, buschigen O., (stw. dch das südl. und mittlere Gebiet bis zum Harze) Jul. Aug. Schk. t. 166. J. a. t. 26. Blkr. purpurn oder weiss- und purpurn-gescheckt, oder ganz weiss. *M. grandiflora* Sm., mit 4zähniem K, ist nicht verschieden; man findet 3, 4 und 5zähniige K. nicht selten auf einem Stengel.

22. LAMIUM (L.) Bienensaug. — Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe gewölbt, die Seitenzpfl der untern sehr klein, zahnf. oder fehlend. Eine Haarleiste in der Blkr.Röhre, welche bei einigen Arten fehlt.

I. Rotte. ORVALA Benth. Blkr.Röhre gerade, inwendig mit einer quer gestellten Haarleiste. Stbk. kahl.

1. *L. ORVALA* (L.) Grossblüthiger B. — B. breit-eyf., zugespitzt, an der Basis abgeschnitten oder herzf., etwas zottig, doppelt-tief-gesägt; Blkr.Röhre gerade, an der Basis inwendig haarig-beringelt; Rand des Schlundes vorne beiderseits mit einem 2-3sp. Zahne; *Stbk. kahl*. 4. An kräuterreichen Hügeln, unter Gebüsch, an Waldrändern und Zäunen. (Littor., Kärnth., Krain, Untersteyern., südl. Tyrol.) Apr. Mai. *L. pannonicum* Scop. *Orvala lamiioides* DC. — Eine monströse Variet. mit geschlitz-eingeschnittenen B.; *Orvala garganica* L. *Papia* Mich. gen. t. 17. Bth. purpurn, Röhre weiss. D.

II. Rotte. *LAMIOPSIS* Dumort. fl. belg. 45. Blkr.Röhre gerade, inwendig nackt. *Stbk. bärtig*.

2. *L. AMPLEXICAULE* (L.) Stengelumfassender B. — B. *ungleich-stumpf-gekerbt*, die untern herz-eyf. oder rundlich, gestielt, die obern sitzend, stengelumfassend, etwas lappig; Blkr.Röhre gerade, inwendig nackt; *KZähne vor und nach der Bthezeit zsschliessend*; *Stbk. bärtig*. ☉. An kultiv. O. überall. Blühet fast dch das ganze Jahr, aber im Frühling und Herbste heimlich. Schk. t. 159. — Die Frühlings- und Herbstpflanze hat unvollständige Blkr., aber doch fruchtbare Bth.; Rb. ic. S. f. 950. Bth. purpurn, wie die der folgenden.

3. *L. INTERMEDIUM* (Fries. novit. fl. suec. ed. 2. S. 192.) Mittlerer B. — B. *ungleich-stumpf-gekerbt*, die untern herz-eyf. oder rundlich, gestielt, *die oberen nieren-herzf., die obersten ganz kurz-gestielt, mit verbreitertem Bstiel*; Röhre der Blkr. gerade, gleichmässig walzlich, innen nackt; Zähne des K. nach dem Verblühen abstehend; *Stbk. bärtig*. ☉. An bebauten O. (Varel im Oldenb., Böckler; bei Hamburg, Sonder.) März-Octob. Bth. purpurn. D.

4. *L. INCISUM* (Willd.) Eingeschnittener B. — B. *ungleich-eingeschnitten-gekerbt*, die untern herz-eyf. oder rundlich und gestielt, *die obern eyf., fast rautenf., kurz-gestielt; Bstiel verbreitert*; *Blkr.Röhre gerade, gleichmässig walzlich, inwendig nackt*; *KZähne nach der Bthezeit abstechend*; *Stbk. bärtig*. ☉. An kultiv. O. (Westphalen, Mecklenb., Schw.) Blühet mit dem vorhergeh. Rb. ic. f. 370. 371. *L. dissectum* With. *L. hybridum* DC. *L. purpureum* β. *hebridum* Vill. *L. hybridum* und *L. dissectum* Rb. fl. exc. *L. westphalicum* Weihe. — Die in England wachsende Pfl. hat nach der Beschreibung von Smith und Babingt. eine Röhre ohne Haarleiste. Gehört etwa die Pfl. Benthams, welche er mit einer Haarleiste in der Röhre der Bl. beschreibt, zu *L. purpureum* β. *decipiens*?

III. Rotte. *LAMIDYPUS* Dumort. fl. belg. 45. Blkr.Röhre über der Basis gekrümmt, unter der Krümmung enger (bei *Lamium purpureum* manchmal gerade,) innen mit einer queren oder schiefen Haarleiste versehen. *Stbk. bärtig*.

5. *L. PURPUREUM* (L.) Rother B. — B. *ey-herzf., ungleich-gekerbt-gesägt, gestielt, alle Bstiele gleich-breit*; Röhre der Blkr. ober der Basis ein wenig gekrümmt, unter der Krümmung enger, innen mit einer Haarleiste versehen, *Schlund beiderseits mit 2*

Zähnnchen versehen, wovon das obere pfriemlich; KZähne nach der Bthezeit abstehend; *Stbk. bärtig*. ☉. An kultiv. O. überall. Blühet mit dem vorhergeh. Fl. dan. t. 523. Var.:

β. *decepiens*. B. ungleich eingeschnitten-gekerbt, fast wie bei dem *Lamium incisum*, sind aber im Verhältniss zu ihrer Breite länger und die Röhre der Blkr., wie bei jener, innen mit einer Haarleiste versehen. L. *purpureum* β. *decepiens* Sonder in Briefen.

6. L. *MACULATUM* (L.) Gelfleckter B. — B. ey-herzf., zugespitzt, ungleich-gesägt; *Blkr.Röhre gekrümmt*, über der Basis bauchig-erweitert, *unter der Erweiterung eingeschnürt* und inwendig mit einer Haarleiste, *Einschnürung und Leiste quer*; Rand des Schlundes abgerundet, mit einem pfriemlichen Zahne bezeichnet; *Stbk. bärtig*. 4. An etwas feuchten Waldränd., Wegen, Gebüsch. Apr.-Herbst. L. *album* β. Pollich. L. *vulgatum* α. *rubrum* Benth. L. *rubrum* Wallr. L. *rugosum* Ait. nach Benth. L. *maculatum* Rb. ic. f. 215, eine Form mit einer weissen Strieme auf den B.; L. *laevigatum* Rb. ic. f. 216., die gewöhnl. Form mit fast 3eckig-herzf. B.; L. *rugosum* Rb. ic. f. 217., eine Form mit mehr eyf. B. — Das L. *laevigatum* L. ist nach Benth., welcher wegen diesem und dem L. *maculatum* das Herbar. von Linn. verglichen hat, nicht verschieden. — Bth. purpurn, Unterlippe lila, mit purpurnen Flecken, seltener blass-rosenfarb.

7. L. *ALBUM* (L.) Weissler B. — B. ey-herzf., zugespitzt, ungleich-gesägt; *Blkr.Röhre gekrümmt*, über der Basis mit einer Kerbe erweitert, *unter der Kerbe zsgeschnürt* und inwendig mit einer Haarleiste, *Zsschnürung und Leiste schief-aufsteigend*, Schlundränder mit 3 kleinen und einem längern, pfriemlichen Zähnnchen bezeichnet; *Stbk. bärtig*. 4. An Zäunen, Mauern, Waldrändern. Apr. Mai. St. h. 8. L. *vulgatum* β. *album* Benth. Bth. weiss, Lippen gelblich-weiss, die untere an der Basis mit blass-olivengrünen Flecken bemalt.

23. GALEÓBDOLON (Huds.) Waldnessel. — Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend; Säckchen der Stbk. mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Lippe der Blkr. gewölbt; alle Zpfl der Unterlippe spitz. Eine Leiste von Haaren in der Blkr.Röhre.

1. G. *LUTEUM* (Huds.) Gelbe W. — In Wäldern und in etwas feuchtem Gebüsch. Mai. Jun. G. *vulgare* Pers. Galeopsis Galeobdolon L. Lamium Galeobdolon Crantz. Pollichia Galeobd. Willd. Leonurus Galeobd. Scop. — Blkr. gelb, der mittlere Lappen der Unterlippe überall und die seitenst. an der Basis dottergelb, mit bräunlichen Flecken. Exemplare mit grössern lanzettl. B.: G *vulgare* β. *montanum* Pers.

24. GALEÓPSIS (L.) Hohlzahn. — Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend; Stbk. mit 2 Klappen aufspringend. Obere Blkr.Lippe gewölbt; untere an der Basis beiderseits mit

einem spitzen, hohlen Zahne bezeichnet; MittelZpfl stumpf oder ausgerandet. — Die mit einer Klappe aufspringenden Stbk.-Säckchen unterscheiden Galeopsis von allen Gattungen der Labiäten.

1. *G. LADANUM* (L.) Acker-H. — *Der St.* von abwärts ange-drückten, *weichen Haaren flaumig*, unter den Gelenken nicht verdickt; *B. lanzettl. oder länglich-lanzettl.*, gesägt oder fast ganzrandig; Obere Blkr.Lippe schwach-gezähnel. ☉. Unter der Saat. Jul. Aug. St. h. 62. *Blkr. purpurn*, mit einem gelblichweissen, purpurn gefleckten Hofe auf der Basis der Unterlippe. Kommt vor:

α. latifolia, *B. länglich- oder seltner ey-lanzettl. oder eyf.*, entfernt- ziemlich stumpf-gesägt, an der Basis und Spitze ganzrandig; *G. Ladanum α. latifolia* Wimm. und Grab. *G. latifolia* Hoffm. *G. Ladanum* Rb.; kommt auch vor mit einer Blkr.Röhre, die noch einmal so lang, als der K. und auch nur so lang, als dieser ist; ausserdem

β. latifolia parviflora, wie der vorhergehende, aber die Blkr. nicht halb so gross; *G. intermedia* Vill. Rb. ic. f. 99. *G. parviflora* Lam.

γ. canescens, *B. ein wenig schmaler*, mit wenigern Sägezähnen bezeichnet; die DeckB. an der Spitze oft zurückgebogen; der St. oberwärts nebst dem K. mit kurzen, abstehenden Haaren dicht-bedeckt, aber keine drüsentrag. Haare oder doch sehr wenige; *G. canescens* Schult. MB. *G. grandiflora* Bl. und Fing., (nicht Roth.)

δ. angustifolia, *B. schmaler-lanzettl. oder lineal-lanzettl.*, am Rande mit wenigen entfernten Zähnen versehen und oft ganzrandig; KZähne, sowie die DeckB., schmaler, zurückgebogen und die Haare alle angedrückt; *G. angustifolia* Ehrh. Hoffm. *G. Ladanum β. angustifolia* Wimm. und Grab. St. h. 62. Blkr. so gross, wie bei der Var. *α.*; kommt aber auch nicht selten vor:

ε. angustifolia parviflora, Blkr. 2- oder 3mal kleiner.

2. *G. OCHROLEUCA* (Lam.) Gelblichweisser H. — *Der St.* von abwärts angedrückten, *weichen Haaren flaumig*, unter den Gelenken nicht verdickt; *B. gesägt, die stengelst. eyf.*, die astst. ey-lanzettl.; obere Blkr.Lippe eingeschnitten-gezähnel. ☉. Unter der Saat und auf unkult. Sandfeldern, (zerstreut deh das Gebiet.) Jul. Aug. St. h. 62. *G. cannabina* Pollich. (von Roth irrig zu *G. versicolor* vorgezogen.) *G. villosa* Huds. (ein sehr unpassender Name, denn die Pflanze ist nicht zottig) *G. grandiflora* Roth. *G. segetum* Rb. *G. dubia* Leers. *Blkr.* noch einmal so gross, als bei der grossblüthigen Variet. des vorhergeh., *gelblichweiss*, mit einem schwefelgelben Hofe an der Basis der Unterlippe — *G. prostrata* Vill. hat einen niedergestreckten, aufstrebenden St. und von dichten, langen, anliegenden Haaren seidige B., Sonder. Diese Art ist von den Botanikern der südlicheren Gegenden von neuem aufzusuchen und genauer zu beobachten.

3. *G. TETRAHIT* (L.) Gemeiner H. — *Der St. steifh.*, unter

den Gelenken verdickt; B. länglich-eyf., zugespitzt; *Blkr.Röhre so lang, als der K. oder kürzer; Mittelzpfl der Unterlippe fast 4eckig, flach, kleingekerbt, stumpf oder seicht - ausgerandet.* ☉. Unter der Saat, auf Schutthauf., an Wegen. Jul. Aug. St. h. 62. Blkr. hell-purpurn oder weiss, mit einem schwefelgelben, purpurn-gefleckten Hofe an der Basis der Unterlippe. Var. mit halb so grossen Bth.

4. G. BIFIDA (von Bönningh.) Ausgerandeter H. — *Der St. steifh., unter den Gelenken verdickt; B. länglich-eyf., zugespitzt; Blkr.Röhre nicht so lang, als der K.; der Mittelzpfl der Unterlippe länglich, ganzrandig, an der Spitze ausgerandet, später am Rande zurückgerollt.* ☉. Unter der Saat, an Wegen. Jul. Aug. St. h. 62. Die untersten DeckB. der Quirle sind sehr oft vergrössert und blattartig, Alex. Braun. Blkr. klein, rosenroth, der Mittelzpfl der Unterlippe dunkler-purpurn oder violett, mit einem weisslichen Rande umgeben und an der Basis mit 2 gelben Flecken bemalt. Mit von Bönningh. habe ich diese Pfl. von der vorhergeh. getrennt; ob sie jedoch bloss Variet. oder eine gute Art ist, muss noch weiter erforscht werden; die übrigen, hier vorgetragenen Arten dieser Gattung aber halte ich für wirkliche Arten.

5. G. VERSICOLOR (Curt.) Bunter H. — *Der St. steifh., unter den Gelenken verdickt; B. langlich-eyf., zugespitzt; Blkr.Röhre noch einmal so lang, als der K.; der Mittelzpfl der Unterlippe rundlich-4eckig, flach, kleingekerbt, stumpf, oder ausgerandet.* ☉. In Hainen, in Flusskiese, an Gräben, (in Böhm., Schles. und dem nördl. D.; auch in den VorA. von Bayern, Salzbr. und Oestr.; Steyerl., Unterengadin in der Schw.) Jul. Aug. St. h. 62. G. cannabina Roth., (nicht Pollich.) G. Tetrabit β . L. Blkr. gross, schwefelgelb, Röhre unterwärts weiss, Unterlippe an der Basis citronengelb, die seitenst. Zpfl von der Mitte an weiss, der mittlere violett, weisslich-berandet. Var. mit lfarbigen, gelben Blkr.; vgl. Meyer chl. hanov. p. 296.

6. G. PUBESCENS (Bess.) Flaumiger H. — *Der St. mit abwärts angedrücktem, weichem Flaume bedeckt, unter den Gelenken steifh. und etwas verdickt; B. breit-eyf., zugespitzt, die untern fast herzf.; Blkr.Röhre länger, als der K.; der Mittelzpfl der Unterlippe fast 4eckig, flach, kleingekerbt, seicht-ausgerandet.* ☉. Auf Aeckern und an Wegen, (im grössern Theile von D. und der Schw.; fehlt aber in der mittlern und untern Rheingegend, in Westphal., Hanov. und Mecklenb.) Jul. Aug. St. h. 62. G. Walterina von Schlechtend. fl. ber. p. 320. G. cannabina Gmel., (nicht Pollich.) G. versicolor Spenn. Blkr. meist satt-purpurn, auf der Basis der Unterlippe heller und daselbst purpurn-gefleckt, Röhre weisslich, oberwärts bräunlich-gelb; dch dieses letzte Merkmal ist sie von allen leicht zu unterscheiden. — Galeopsis mollis Tausch pl. sel. scheint eine Variet. von G. pubescens mit abstehend zurückgebogenen Haaren am St.

24. STACHYS (L.) Ziest. — Stbg. genähert, unter der obern

Blkr.Lippe gleichlaufend, einfach, nach dem Verblühen zsgedreht und auswärts zurückgehogen; Sthk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe konkav.; der Mittelzpf der untern verkehrteyf, oder verkehrt-herzf. Eine Leiste von Haaren in der Blkr.Röhre. Nüsse abgerundet-stumpf.

1. Rotte. ERYOSTACHYS Benth. tab. 535. Quirle reichbth. Die DeckB. halb oder völlig so lang, als der K. Bth. purpurn.

1. S. GERMANICA (L.) Deutscher Z. — Quirle reichbth.; der St. aufrecht, von einfachen Haaren dicht-wollig-zottig; B. gestielt, ey-herzf., gekerbt, wollig-filzig, die obern sitzend, schmaler, lanzettl.; KZähne eyf., zugespitzt, stachelspitzig, stechend. ☉. An unkult., rauhen O., Wegen, auf Kalkboden. Jul. Aug. J. a. t. 319. St. h. 83. S. lanata Crantz., nicht Jacq. S. polystachya Ten. nach einem Expl. vom Autor selbst in der Sammlung von Martius. (Tenore beschreibt d. S. germanica mit stumpfen und wehlosen KZähnen; eine solche Art wächst aber in D. nicht.) — S. biennis Roth. ist nicht verschieden.

2. S. ITALICA (Mill. dict. n. 3.) Italienischer Z. — Quirle reichbth.; der St. aufrecht, wollig-filzig; B. gestielt, kleingekerbt, filzig, die stengelst. länglich, an der Basis abgerundet oder fast herzf., die untersten in den Bstiel verschmälert, die obern sitzend, fast 3eckig-eyf.; KZähne lanzettl., zugespitzt, dörnig-stachelspitzig. 4. An rauhen O., (Istrien, Biasoletto; Finme, Noë.) Jul. Aug. S. salviaefolia Ten. fl. neap. und Syllog., Koch Syn. ed. 1. St. h. 83. J.

3. S. ALPINA (L.) Alpen-Z. — Quirle reichbth.; der St. aufrecht, rauhh., oberwärts drüsig-behaart; B. gestielt, ey-herzf., spitz, gesägt; KZähne eyf., stumpflich, stachelspitzig. 4. In Wäldern höherer Gebirge und der VorA., (dch die g. AK.; auf den Gebirgen von Böhm., Schles., bei Herborn in Nassau, auf dem Hesselberg in Franken, in der Eifel.) Jul. Aug. St. h. 51. Blkr dunkel-purpurn, in das Braune spielend.

11. Rotte. STACHYOTYPUS Benth. tab. 541. Quirle 2 fth. Die DeckB. klein. Bth. purpurn.

4. S. SYLVATICA (L.) Wald-Z. — Quirle 6bth., der St. aufrecht, rauhh., oberwärts ästig und drüsig-behaart; B. gestielt, breit-ey-herzf., zugespitzt, gesägt, rauhh.; KZähne aus 3eckiger Basis pfriemlich, stachelspitzig; Blkr. noch einmal so lang, als der K.; die unterirdischen Ausläufer gleichbreit, an der Spitze nicht verdickt. 4. An buschigen und waldigen, etwas feuchten O. Jun.-Aug. Tab. ktrb. 921. f. 5. St. h. 84. Bth. braun-purpurn, Unterlippe mit schlängeligen, weisslichen Streifen gescheckt. Die Röhre der Blkr. vom Haarringe bis zum Schlunde gleichbreit.

5. S. AMBIGUA (Smith.) Zweideutiger Z. — Quirle 6bth.; der St. aufrecht, von abwärts gebogenen Haaren steifh.; B. gestielt, aus herzf. Basis lanzettl. oder eyf.-lanzettl., zugespitzt, gesägt;

KZähne aus 3eckiger Basis pfriemlich, zugespitzt; Blkr. noch einmal so lang, als der K.; *die unterirdischen Ausläufer an der Spitze keulenf. verdickt*. 4. An buschigen, feuchten O., (sehr zerstreut dch das Gebiet.) Steht zw. der vorhergeh. und folg. gleichsam in der Mitte. Sie hat die Blkr. der folgenden Art, nur dunkler gefärbt, und die Röhre wird vom Haarringe aus gegen den Schlund hin allmählig etwas weiter.

6. S. PALUSTRIS (L.) Sumpf-Z. — Quirle 6-12bth.; der St. aufrecht, einfach, steifh. oder von herabgebogenen Haaren kurz.; *B. aus herzf. Basis lanzettl., spitz, gekerbt-gesägt, flaumig*, die untern kurz-gestielt, *die obern sitzend, halbstengelumfassend*; KZähne aus 3eckiger Basis pfriemlich, stachelspitzig; Blkr. noch einmal so lang, als der K.; *die unterirdischen Ausläufer an der Spitze keulenf. verdickt*. 4. An Ufern, auf sumpfigen Wiesen und feuchten Aeckern. Jul. Aug. St. h. 18. Blkr. purpurn, die Unterlippe mit weissen schlängeligen Streifen bemalt.

7. S. ARVENSIS (L.) Acker-Z. — Quirle 6bth.; der St. steifh., an der Basis ästig, Aeste aufstrebend; *B. gestielt, ey-herzf., stumpf, gekerbt, zerstreut-behaart, die blüthenst. sitzend, eyf.-länglich, begrannt*; *K. fast so lang, als die Blkr.*; Zähne lanzettl., stachelspitzig. ☉. An kultiv. O., (sehr zerstreut dch D. und die Schw.) Jul.-Herbst. St. h. 84. Glechoma Marrubiastrum Vill. Trixago cordifolia Mönch. Blkr. blass-purpurn.

III. Rotte. PSEUDO-SIDERITIS. Quirle 2-6bth. Die DeckB. klein. Bth. gelblich-weiss.

8. S. ANNUA (L.) Jähriger Z. — Quirle 4-6bth.; der St. von der Basis an bis zur Spitze ästig, oberwärts flaumig; *B. kahl, gestielt, gekerbt-gesägt, die untern oval-länglich, die blüthenst. lanzettl., zugespitzt, ganzrandig, kurz-stachelspitzig*; *K. zottig, Zähne kürzer, als die Blkr.* Röhre, lanzettl., stachelspitzig-pfriemlich, Stachelspitze fast bis an das Ende flaumig. ☉. Unter der Saat auf Kalk- und Lettenboden, (fast dch das g. Gebiet.) Jul.-Herbst. J. a. t. 360. St. h. 84.

9. S. MARITIMA (L.) Seestrands-Z. — Quirle meist 6- und mehrbth.; die St. aufstrebend, oberwärts nebst den obern B. filzig-zottig; *B. gestielt, oval-länglich, gekerbt, stumpf, in den Bstiel verschmälert, die blüthenst. eyf.-länglich, stumpf*, etwas bespitzt, ganzrandig, wehrlos; *K. filzig-zottig, Zähne länger, als die Blkr.* Röhre, ey-lanzettf., zugespitzt, bis in die Spitze flaumig. 4. Am Ufer des Adriat. Meeres, (bei Monfalcone, Triest und in Istrien.) Jnn. Jul. J. h. v. t. 70. St. h. 84.

10. S. RECTA (L.) Gerader Z. — Quirle meist 6-10bth.; St. aufrecht oder aufstrebend, sowie die B. kurz.; *B. länglich, oder lanzettl., an der Basis verschmälert, die unteren gestielt, alle gekerbt, die obern blüthenst. eyf., zugespitzt, ganzrandig, begrannt*; *K. rauhh., Zähne 3eckig, zugespitzt, mit einer kahlen Stachelspitze endigend, ohngefähr so lang, als die Blkr.*

Röhre, 4. An gebirg. rauhen O. zwischen Gesträuch. Jun - Aug. J. a. t. 359. St. h. St. S. Betonica Scop. S. Sideritis Vill. S. procumbens Lam. S. hufonia Thuill.

11. S. SUBCRENATA (Visiani in der Regensb. bot. Ztg. 1829. I Ergbl. S. 15.) Weniggekerbter Z. — Quirle 6-10 lth.; St. ausgebreitet oder aufstrebend, an grösseren Expl. sehr ästig, sowie die B. zerstreut-behaart; *StB. länglich oder lanzettl., entfernt-gekerbt, oder ganzrandig*, gegen die Basis zu verschmälert, die unteren gestielt; *B. der Aeste lineal., ganzrandig oder spärlich gekerbt, die oberen bthst. eyf. zugespitzt, ganzrandig, begrannt*; K. kurz., Zähne 3eckig-zugespitzt, mit einer kahlen Stachelspitze endigend, so lang, als die Röhre der Blkr. 4. In felsigen Gegenden, an unbebauten O. auf Feldern. (Fiume, Veglia, Cherso.) Jul. Aug. S. ramosissima Rachel bannat. p. 3. und 26. (der Name ohne Beschreibung.) Expl. von Bartling, zwischen Fiume und Kamenjak gesammelt, stimmen genau mit den Expl. von Stachys ramosissima Rachel's, welche ich vom Autor selbst empfangen, überein und unterscheiden sich nur durch kleinere Kelche von den Expl. aus Dalmatien, die ich von Neumajer erhielt, allein dieses Merkmal ändert bei der gegenwärtigen Gattung gar oft ab. Von diesen unterscheidet sich Stachys fragilis Visian. durch einen aufrechten St. und ey-herzf., nebst den Deckblättchen graulich-flaumige DeckB.

26 BETONICA (L.) Betonie. — Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend; Stbk.Säckchen auseinanderfahrend oder fast gleichlaufend, mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe konkav; der MittelZpfl der untern stumpf; Haarleiste in der Röhre fehlend. Nüsse abgerundet-stumpf. K. 5zählig.

1. B. OFFICINALIS (L.) Gebräuchliche B. — B. aus herzf. Basis eyf.-länglich oder eyf., rauh., oder kahl; K. *arterlos*; Blkr. auswendig dicht-flaumig; Lippen auseinanderstehend, die obere länglich-eyf., ganzrandig, gekerbt oder ausgerandet, später zurückgebogen; *Stbg. kürzer, als die halbe Oberlippe*. 4. Auf Wiesen, Haiden, in lichten Wäldern. Jun.-Aug. Schk. t. 160. Bth. purpurn. Var.:

α. hirta, der St. kurz., K. rauh.; B. hirta Leyser fl. halens. Rb. ic. S. f. 953.

β. glabrata, der St. nebst den K. kahl; B. officinalis Leyser fl. halens., Spreng. u. Rb. ic. S. f. 952. Diese Variet. wächst auf Torfwiesen. Es kommt auch eine andere Form, aber sehr selten, vor, mit einer Blkr.Röhre nur von der Länge des K.

γ. stricta, grösser, rauhhaariger, B. breiter; B. stricta Ait. Rb. ic. S. f. 954. Diese wächst häufig auf den A. und VorA.

δ. latifolia, stärker, B. breiter. Achse gedrunken; B. incana Rb. ic. S. f. 955. Diese ist durch Kultur entstanden. Die ausgerandete Oberlippe, die bei dieser Variet. nicht einmal an einer einzigen Achse sich beständig erweist, beobachtet man auch gar nicht selten an den übrigen Variet.

Ausserdem kommen alle angeführten Variet. mit einer dichtgedrungenen und dch entfernte Quirle unterbrochenen Aehre vor, und nirgends finden sich Grenzen. Eine kurz. Form mit unterbrochenen Quirlen: *B. serotina* Host. Ausser diesen Merkmalen konnte ich sowohl an der wilden, getrockneten, als an der lebenden, kultiv. *B. serotina* keinen Unterschied finden.

2. *B. hirsuta* (L.) Rauh. B. — B. aus herz. Basis länglich, stumpf-gekerbt, rauh.; K. netzig-aderig; Blkr. mit zerstreutem Flaume bewachsen; Oberlippe kahl, geradevorgestreckt, vorne breiter, sehr stumpf oder seicht-ausgerandet; *Stbg. fast so lang, als die Lippe*. 4. An gebirg. O., (in den Walliser A. an manchen O. in Menge; in Krain; ich habe von letztem O. noch kein Expl. gesehen; südl. Tyrol auf der A. Neva seconda in Primiero, im Thale della Cima del Frate in Giudicarie.) Jul. Aug. Rb. ic. 8. f. 956. *B. densiflora* Benth. *B. Monnierii* Gouan. *B. danica* Mill., nach Benth. *B. incana* Ait., nach demselben. K. noch einmal so lang, als bei der vorübergehenden, 5-6 Linien lang, und, vorzügl. an der getrockneten Pflanze, netzig-aderig. Blkr. purpurn.

3. *B. alopecuroides* (L.) Gelblichweisse B. — B. aus herz. Basis breit-eyf., tief-gekerbt, rauh.; K. oberwärts netzig-aderig; *Blkr. kahl, Lippen auswendig zottig-bärtig*, die obere in eine 2lappige Spitze verschmälert; Stbg. nicht so lang, als die halbe Lippe. 4. Auf Triften der A., (Tyrol, Salzbg., Steyer., Oestr.; C. Tessin.) Jul. Aug. Rb. ic. 8. f. 951., ganz verfehlt; J. a. t. 78., getreu, die Figur der Oberlippe ist gut ausgedrückt. Blkr. blassgelb, in das Grünliche spielend.

26. *SIDERITIS* (L.) Gliedkraut. — Stbg. nebst dem Gf. in der Blkr.-Röhre verborgen; Stbk.-Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Haarleiste an der Einfügung der Stbg. unterbrochen. Zähne des Fruchtk. abstehend. Nüsse an der Spitze abgerundet-stumpf.

I. Rotte. *EUSIDERITIS*. Die blüthenst. B. deckblattf., die Bth. umfassend, am Rande dörnig-gezähnt, K. 5zählig mit gleichen Zähnen. Halbsträucher oder Sträucher.

1. *S. scordiodoides* (L.) Schweizer G. — Halbstrauchig, rauh. oder fast kahl; die St. aufstrebend; B. eyf., länglich oder länglich-lineal., an der Basis verschmälert, eingeschnitten-gekerbt oder fast ganzrandig, die untern grannenlos, die obern stachelspitzig, *die Bth. breit-eyf., dörnig-gezähnt*. 4. An sonnig. O. der wärmern Gegenden, (bisher bloss am Thuiry und Dole im Jura.) Jul. Aug. *S. hyssopifolia* Gaud. *S. scordiodoides* Benth., welcher damit *S. hyssopifolia* L., als Variet. vereinigt und 7 verschiedene Formen beschreibt. S.

II Rotte. *HESTONIA* Benth. Die blüthenst. B. den stengelst. fast gleichgestaltet, aber kleiner, etwas gezähnt, Zähne wehrlos. K. 2lippig. Jährige Kräuter.

2. *S. montana* (L.) Deutsches G. — Krautig; W. einfach; B.

lanzettl., in den Bstiel verschmälert, vorne gesägt; *K. länger, als die Blkr., KÖberlippe 3sp.* ☉. Auf Brachäckern und in Weinbergen, (Oestr.; bei Hornburg und Ebersrode im Geb. der Fl. von Halle.) Jul. Aug. J. a. t. 434. St. h. 4. Blkr. zuerst gleichfarbig-citronengelb, bald aber am Rande braun, zuletzt die Lippen überall braun.

3 *S. ROMANA* (L.) Römisches G. — Krautig; W. einfach; B. elliptisch-lanzettl., in den Bstiel verschmälert, vorne gesägt; *K. so lang, als die Blkr.; obere K Lippe eyf., ungeth., untere 4zählig.* ☉. Auf Aeckern und am Meeresufer, (Istrien, Veglia und Cherso.) *Moris. s. 11. t. 12. f. 5.* Blkr. weiss, Oberlippe manchmal rosenroth angelaufen. J.

28. *MARRUBIUM* (L.) Andorn. — Nüsse an der Spitze mit einer 3eckigen Fläche abgeschnitten. Sonst Alles, wie bei *Sideritis*. — Bth. aller weiss.

1. *M. PEREGRINUM* (L.) Fremder A. — *Der St. sehr ästig*, Aeste spreitzend; B. grau-filzig, unten netzaderig, die untersten eyf., stumpf, gekerbt, die oberen länglich-lanzettl., gekerbt-gesägt, hinten ganzrandig; *Quirle 6-mehrbth., fast gleich-hoch; K. 5-10-zählig, Zähne* nebst den DeckB. pfriemlich, *filzig.* 2. An unkult. O., auf Schutthauf., Rainen, an Wegen, (Oestr.; Erdeborn im Geb. der Flora von Halle.) Jul. Aug. *M. panicillorum* Wallr. Kommt vor:

α. latifolium, B. breiter, Filz ein wenig lockerer, Stachelspitze der KZähne weiter kahl, die meisten K. haben zw. den grössern Zähnen kleinere: *M. peregrinum α. L. M. peregrinum* Willd. Spreng. hal. t. 6. f. 1. *M. paniculatum* Desr. bei Lam., Rb. ic. 2. f. 473. *M. remotum* Kit. bei Schult. *M. pannonicum* Rb. Benth. *M. affine* Host., nicht Hornem. — Die K. an den obern Quirlen fast immer 5-, und nicht 10zählig.

β angustifolium, B. an dem obern Theile des St. und der Aeste schmaler, spitzer, entfernter-gesägt; Filz dichter, besonders an den K. und deren Zähnen weiter hinauf überziehend: *M. peregrinum β. L. M. peregrinum* J. a. t. 160., Benth. *M. creticum* Mill. Spr. hal. t. 6. f. 2. Rb. ic. 3. f. 461. D.

2. *M. CANDIDISSIMUM* (L., nach Benth., der Linne's Herb. verglichen hat.) Glänzendweisser A. — *Der St. weiss, filzig, an der Basis ästig, Aeste* aufstrebend, *einfach*; B. filzig, unterseits netzaderig, die untern breit-eyf., ungleich-kerbt, die obern oval, gekerbt-gesägt; *Quirle reichbth., fast kugelig; K. 5zählig, Zähne* nebst den DeckB. pfriemlich, *filzig.* 2. An unkult., rauhen O., (im Littor. bei Triest, Duino in Istr.) Jul. Aug. *M. incanum* Desrouss. bei Lam. D. fl. 4. p. 297. *M. peregrinum* Rb. ic. 4. f. 485., nicht L. *M. supinum* Scop. Ich stelle jetzt den Namen *M. candidissimum* voran, da, wie bemerkt, Benth. das Herbarium von L. verglichen hat; nun ist aber auch das Syn. Dillen. „hort. elth. p. 218. t. 174.“ in dem Syst. nat., als zu einer andern Art gehörig,

zu streichen, und der vorliegenden Art des Syn. Dill. p. 219. t. 174., das man irrig zu *M. peregrinum* zog, unterzuordnen.

3. *M. VULGARE* (L.) Gemeiner A. — Der St. weiss-filzig, an der Basis ästig, Aeste aufstrebend, einfach; B. eyf., in den Bstiel hinablaufend, ungleich-gekerbt, filzig, runzelig, unterseits netzig-grübig, die untern herzf.-rundlich; Quirle reichbth., fast kugelig; K. 10zählig, Zähne nebst den DeckB. pfriemlich, zottig, von der Mitte an kahl, an der Spitze hakig-zurückgerollt. 4. Auf Sandfeldern, an Wegen, Mauern, (in mehreren Gegenden gemein, in andern gar nicht.) Jul.-Sept. Eine Variet. mit dichter wolligen B. ist nach Benth.: *M. apulum* Ten. fl. neap. t. 154.

29. *BALLŌTA* (L.) Ballote. — Die Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend, einfach, nach dem Verblühen gerade; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe konkav; der MittelZpfl der untern verkehrtherzf. Eine Leiste von Haaren in der Blkr.Röhre. Nüsse abgerundet-stumpf.

1. *B. NIGRA* (L.) Schwarze B. — B. eyf.; K. 5zählig, Zähne eyf., begrannt. 4. Auf Sandfeldern, Schutthaufen, an Wegen. Jun.-Aug. *B. nigra* Benth. lab. 597. Bth. violett, seltener weiss. Var. kurzsh. mit kürzern, an dem St. abwärtsgekrümmten, und rauhsh. mit längern, geraden Haaren und auch:

a. foetida, KZähne breit-eyf., in eine Granne endigend, die so lang oder kürzer, als der Zahn ist: *B. foetida* Lam. D. fl. 4. p. 293. *B. nigra* Sm. Dieselbe mit weissen Bth.: *B. alba* L. Eine Abänderg von dieser Variet., deren Granne an den KZähnen kürzer, als der Zahn selbst ist: *B. borealis* Schweigg. Rb. ic. 8. f. 1042.; wenn sie von der Länge des Zahns ist: *B. foetida* Rb. ic. 8. f. 1041. Eine Form davon mit geraden, abstehenden St.-Haaren: *B. nigra* des Berliner Gartens.

β. ruderalis, KZähne eyf., in eine Granne, die länger, als der Zahn ist, endigend: *B. ruderalis* Fries. *B. nigra* Rb. ic. f. 1039. *B. vulgaris* Hoffmsegg. und Link. fl. port. t. 115. Eine Abänderg von dieser Var. mit schmäleren Zähnen: *B. urticifolia* Ortmann bei Rb. ic. 8. f. 1040.

30. *LEONŪRUS* (L.) Löwenschwanz. — Stbg. genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend, einfach, nach dem Verblühen gedreht und auswärts zurückgebogen; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe konkav; die Zpfl der untern stumpf, meistens in einen spitzen Zpfl zsgerollt. Eine Haarleiste in der Blkr.Röhre. Nüsse flach, mit einer dreieckigen Fläche abgeschnitten.

1. *L. CARDIACA* (L.) Gemeiner L. — Die untern B. handf.-5sp., eingeschnitten-gezähnt, die obern ganzrandig, 3lappig, an der Basis keilig; K. kahl; untere Blkr.Lippe in einen länglichen Zpfl zsgerollt. 4. Auf Schutthaufen, an Wegen. Jul. Aug. St. h. 9. Blkr. purpurn, Unterlippe in der Mitte gelblichweiss, mit einem

gelben, purpurn-punktirten Flecken. Die Zpfl der Unterlippe rollen sich, wenn sich die Blkr. kaum noch entfaltet hat, in einen spitzen Zpfl zusammen

31. *CHAETURUS* (Host.) Katzenschwanz. — Nüsse an der Spitze mit einer 3eckigen Fläche abgeschnitten; sonst Alles, wie bei *Betonica*.

I. C. *MARRUBIASTRUM* (Rb.) Andornartiger K. — Auf Schutthäufen, an Wegen, (in Steyer. und Oestr. und von da dch Mähren, Böhm., Schles., Brandenb. und Sachs. nach Holst. und das nördl. Hannov.; Ostheim im Oberelsass.) Jul. Aug. St. h. 81. *Leonurus Marrubiastrum* L. spec. J. a. t. 405. Bth. rosenfarb.

32. *PHLOMIS* (L.) Filzkraut — Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend, mit ihrer Basis angewachsen und unter der angewachsenen Basis mit einem Auhängsel versehen; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe gewölbt; der Mittelzpfl der untern verkehrt-herzf. Eine Haarleiste in der Blkr.Röhre.

I. P. *TUBEROSA* (L.) Knolliges F. — Die wurzelst. B. eyf., an der Basis tief-herzf., gekerbt, die blüthenst. länglich-lanzettl.; die DeckB. pfriemlich, steifh.; KRöhre nebst dem St.kahl. 4. An waldigen O., Wegen, (Oestr., Mähr.) Jun. Jul. Schk. t. 163. Bth. purpurn. D.

VIII. Gruppe. *SCUTELLARINEEN*. Benth. Blkr. 2lippig. Stbg. unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend, genähert. K. 2lippig, die obere Lippe ungeth. oder kurz-3zählig; Fruchtk. dch die aufeinanderliegenden Lippen flach-geschlossen.

33. *SCUTELLARIA* (L.) Helmkraut. — Stbg. genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend, an der Spitze vorwärts gekrümmt; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe konkav., 3sp.; untere ungeth.; Haarleiste in der Röhre fehlend. K. 2lippig, Lippen ungeth., Oberlippe hinten mit einer konkaven Schuppe; Fruchtk. an der Spitze zsgedrückt-geschlossen.

I. Rotte. *LUPULINARIA* Benth. tab. 120. Die DeckB. oft häutig. Bth. in einer 4seitigen Aehre oder in einer fast gleichen Traube nicht einerseitswendig.

I. S. *ALPINA* (L.) Alpen-H. — Der St. liegend; B. fast sitzend oder kurz-gestielt, eyf., gesägt-gekerbt, einfarbig; die *DeckB. häutig, dachig*; Aehren 4seitig. 4. Im Kiese und an felsigen O. der A., (in der südwestl. Schw.) Jul. Aug. All. ped. t. 26 f. 3. Obere Blkr.Lippe violett, untere gross, weisslich. S.

II. Rotte. *GALERICULARIA* Benth. tab. 436. Bth. einerseitswendig, blattwinkelest. oder die obern in eine Traube geordnet; die blüthenst. B. krautig, die stengelst. gleichgestaltet, nur stufenweise kleiner.

2. *S. GALERICULATA* (L.) Gemeines H. — *B.* aus herzf. Basis länglich-lanzettl., entfernt-stumpf-gekerbt-gesägt; *Bth.* blattwinkelst., gegenst., einseitswendig; *K.* kahl oder von einfachen Haaren flaumig; *Blkr.Röhre* an der Basis fast rechtwinkelig-gekrümmt, vielmal länger, als der *K.* 4. In feuchten Hainen und an Ufern. Jul. Aug. Schk. t. 167. *Blkr.* hell-violett.

3. *S. HASTIFOLIA* (L.) Spontanblättriges H. — *B.* länglich-lanzettl., an der Basis beiderseits 1-2zählig, fast spießf., die untersten eyf., die obersten lanzettl., an der Basis fast herzf.; *Bth.* blattwinkelst., gegenst., einseitswendig, fast traubig; *K.* drüsig-flaumig; *Blkr.Röhre* an der Basis fast rechtwinkelig-gekrümmt, vielmal länger, als der *K.* 4. Auf feuchten Wiesen und an Gräben, (an einzelnen Stellen dch das g. Gebiet.) Jul. Aug. *Blkr.* violett.

4. *S. MINOR* (L.) Kleines H. — *B.* länglich-lanzettl., an der Basis beiderseits 1-2zählig, fast spießf., die untersten eyf., die obersten lanzettl., an der Basis fast herzf.; *Bth.* blattwinkelst., gegenst., einseitswendig; *K.* von drüsenlosen Haaren kurz; *Blkr.Röhre* gerade, an der Basis ein wenig bauchig. 4. Auf sumpfigen Wiesen und an Gräben, (auf der Rheinfläche und dch die Gebirge auf dem linken Rheinufer bis Westphal. und von da bis Hannov., Oldenb., Holst.) Jul. Aug. *Blkr.* violett. D.

34. *PRUNELLA* (L.) Brunelle. — *Stbg.* genähert, unter der obern *Blkr.Lippe* gleichlaufend, an der Spitze mit einem Zahne oder Höcker versehen. *Stbk.Säckchen* mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Obere *Blkr.Lippe* konkav, die *Zpfl* der untern stumpf. Eine Haarleiste in der *Blkr.Röhre*. *K.* 2lippig, bei der Frucht zsgedrückt-geschlossen.

1. *P. VULGARIS* (L.) Gemeine B. — Die längern *Stbg.* an der Spitze mit einem dornf., geraden Zahne versehen; Zähne der obern *K.Lippe* sehr kurz, abgeschnitten, stachelspitzig, die der untern ey-lanzettf., stachelspitzig, schwach-wimperig; *B.* gestielt, länglich-eyf., ganzrandig, gezähnt oder fiedersp. 4. Auf Wiesen, Trüften, an lichten WaldO. Jul. Aug. St. h. 5. *Bth.* violett, selten weiss. Var.:

β. *parviflora*, *Bth.* kaum länger, als der *K.*: *P. parviflora* Poir.

γ. *pinnatifida*, *B.* fiedersp.: *P. vulgaris* β. *pinnatifida* Rb. ic. f. 394. *P. vulgaris* b. *intermedia* Koch und Ziz. *P. laciniata* γ. L. (und mit weissen *Bth.*: *P. laciniata* β. L.) *P. intermedia* Link., nach Roth. *P. pinnatifida* Pers. *P. laciniata* Gaud.

2. *P. GRANDIFLORA* (J. a. t. 377.) Grossblüthige B. — *Stbg.* alle wehrlos, die längern an der Spitze mit einem kleinen Höcker versehen; Zähne der obern *K.Lippe* breit-eyf., zugespitzt-begrannt, die der untern lanzettl., in eine Granne zugespitzt, gewimpert; *B.* gestielt, länglich-eyf., ganzrandig, gezähnt oder fiedersp. 4. An gebirg., steinig., trocknen O., auf Kalkboden, (stw. dch das g.

Gebiet.) Jul. Aug. Schk. t. 68. *P. vulgaris* β . *grandiflora* L. Bth. violett, noch einmal so gross, als bei der vorhergehenden Art:

β . *pinnatifida*, B. fiedersp.: *P. grandiflora* β . *pinnatifida* K. und Ziz. Gaud. Jacq. beschreibt beide Variet.; aber nur die *pinnatifida* liess er abbilden. Fl. a. t. 377.

3. *P. ALBA* (Pallas bei MB.) Weisse B. — Die längern Stbg. an der Spitze mit einem vorwärts gebogenen Dorn versehen; Zähne der obern Klippe breit-eyf., zugespitzt-begrannt, die der untern lanzettl.-pfriemlich, kammf.-gewimpert; B. gestielt, länglich-eyf., ganzrandig, gezähnt oder fiedersp. 4. Angebirg, unkult. O. und auf trocknen Wiesen, (Unteröstr., südl. Tyrol, Schw. und hin und wieder in den Rheingegenden; Blankenburg am Harz.) Jul. Aug. Bth. gelblichweiss. Zähne der Unterlippe mit geraden Rändern gespitzt, und zwischen den Seitennerven nicht aderig, wie bei den 2 vorhergehenden; B. schmaler; Aehre mit 2 verlängerten B. gestützt. Jacq. erwähnt in seiner Beschreibung der Variet. mit ungetheilten B., bildet aber nur die mit fiedersp. ab, diese.

β . *pinnatifida*, mit fiedersp. B. ist: *P. laciniata* L., mit Ausschl. der Var. β . und γ . J. a. t. 378. Rb. ic. 3. f. 393.

IX. Gruppe. *PRASIEEN*. Benth. lab. 646. Blkr. 2lippig. Frucht steinfruchtartig.

35. *PRASIUM* (L.) Niccoline. — Stbg. genähert, unter der obern Blkr.Lippe gleichlaufend, einfach; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Ritze aufspringend. Obere Blkr.Lippe konkav; die Zpfl der untern stumpf; eine Haarleiste in der Blkr.Röhre. Nüsse fast steinfruchtartig. K. 2lippig, der fruchttrag. offen.

1. *P. MAJUS* (L.) Grosse N. — b. Auf steinig., unkult. Hügeln, (auf der Insel Osero.) März-Mai. Bth. weiss. *P. minus* L. ist nach Benth. nicht verschieden. J.

X. Gruppe. *AJUGOIDEEN*. Benth. 637. Blkr. 1lippig; obere Lippe fehlend oder sehr kurz. Nüsse netzig-runzelig. — Bei der Gattung *Ajuga* ist eine sehr kurze Oberlippe vorhanden; bei *Teucrium* treten die Stbg. aus einer Spalte hervor und die Lippe scheint ganz zu fehlen, aber sie ist in der That vorhanden und 2th., aber die Zpfl sind auf den Rand der Unterlippe versetzt, wesswegen diese aus 5 Lappen besteht.

36. *AJUGA* (L.) Günzel. — Obere Blkr.Lippe sehr kurz, aus 2 kleinen Läppchen bestehend; die untere 3sp., vielmal grösser. Stbg. genähert, gleichlaufend; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend. Eine Haarleiste in der Blkr.-Röhre.

1. Rolte. *REGULA* Tournef. t. 98. Bth.Quirle reichbth. Haarleiste in der Blkr.Röhre nicht unterbrochen, von der Einfügung der Stbg. entfernt.

1. *A. REPTANS* (L.) Kriechender G. — Bth. quirlig; *Ausläufer kriechend*; B. ausgeschweift oder schwach-gekerbt. 4. Auf Wiesen und Triften; in die A. hinaufsteigend. Mai. Juni. *A. reptans* Host. fl. a., *A. repens* Host. fl. a. und *A. latifolia* Host. fl. a. sind Spielarten und nicht einmal Varietäten hievon. Bth. blau, seltner fleisch-roth oder weiss. Var.:

β. *alpina*, Ausläufer kurz oder fehlend: *A. alpina* Vill.

2. *A. GENEVENSIS* (L.) Haariger G. — Bth. quirlig; *Ausläufer fehlend*, die untern *DeckB.* 3 lappig, gezähnt und ganzrandig, die obern kürzer, als der *Quirl*. 4. Auf Sandfeldern, Haiden, an Wegen. Mai Jun. *A. alpina* L. Sm. *A. montana* Rb. *A. rugosa* Host. ist eine Modification. Bth. blau oder fleischroth. Zu letzteren gehört: *A. foliosa* Schleicher. — *A. genevensis* spielt mit grob- oder tief-gesägten und mit geschweift-gekerbten B., mit kleinen oder sehr grossen B. auf der W. und an dem untersten Theil des St., und mit 3lappigen und gezähnten oder eyf., ganzen und ganzrandigen oberen *DeckB.* — Getrocknete und zwar authentische Expl. der *A. alpina* aus Schweden und England vermag ich nicht von unserer gemeinen *A. genevensis* zu unterscheiden. — *A. alpina* Thomas pl. exsicc. ist eine Form von *A. pyramidalis*.

3. *A. PYRAMIDALIS* (L.) Pyramidalischer G. — Bth. quirlig; *Ausläufer fehlend*; die *DeckB.* ausgeschweift-gekerbt, die obern noch einmal so lang, als der *Quirl*. 4. An lichten WaldO. und auf VorA. Triften, (dch die g. AK.; ausserdem selten in der Rheinpfalz und der Mark Brandenburg und um Halle.) Mai. Jun. *A. rupestris* Schleich. Bth. merklich kleiner, als bei der vorhergehenden, blau.

II. Rotte. *CHAMAEPITYS* Tournef. l. 98. Bth. in den Blattwinkeln einzeln, gegenst.; Haarleiste in der Blkr.Röhre an die Einfügung der Stbg. gestellt, aus unterbrochenen Haarbüschelchen zsgesetzt.

4. *A. CHAMAEPITYS* (Schreb.) Acker-G. — Bth. einzeln, blattwinkelst., kürzer, als das stützende B.; *Röhre der Blkr. noch einmal so lang, als der K.*; B. 3sp., *Zpfl lineal*. ☉. Auf Aeckern und Brachfeldern, auf Kalkboden, dch das g. Gebiet zerstreut.) Jun.-Herbst. *Teucrium Chamaepitys* L. sp. Fl. d. t. 733. Blkr. weisslich, Unterlippe citrongelb, an der Basis mit 4 Reihen rostbrauner Punkte bemalt.

5. *A. CHIA* (Schreb. unilab. S. 25.) G. von Chios. — Bth. einzeln, blattwinkelst., fast so lang, als das stützende B.; *Röhre der Blkr. 3 mal länger, als der K.*; B. 3sp., mit linealen *Zpfln*. ☉. An trocknen O., Haiden, auf unbebauten Aeckern, (Istrien zw. Rovigno und Dignano.) Jun.? Bth. blassgelb. J.

37. *TEUCRIUM* (L.) Gamander. — Obere Blkr.Lippe 2th.; *Zpfl* auf den Rand der Unterlippe vorgerückt; daher eine Spalte anstatt der Oberlippe, und eine 5lappige Unterlippe; Haarleiste in der Röhre fehlend. Stbg. genähert, aus der Spalte der Ober-

lippe hervortretend; Stbk.Säckchen mit einer gemeinschaftl. Längsritze aufspringend.

I. Rotte. *SCORODONIA* Adans. fam p. 158. K. 2lippig, obere Lippe eyf., ungeth.; untere 4zählig.

1. *T. SCORODONIA* (L.) Salbeiblättriger G. — *B.* herz-eyf. oder herzf.-länglich, gekerbt-gesägt, runzelig, flaumig; Tr. blattwinkel- und endst.; *obere K*lippe *eyf.*, *ungeth.* 4. An rauhen, unkult., wald. O., auf Rainen. (zerstreut deh das Gebiet, an manchen O. häufig, an andern fehlend.) Bth. weiss, in das Grüne spielend, Stbg. braun-roth.

II. Rotte. *SCORDIUM*. K. 5zählig. Quirle 2 6bth., blattwinkelst., von' einander entfernt; die blüthenst. B. den stengelst. gleichgestaltet.

2. *T. BOTRYS* (L.) Trauben-G. — *B. doppelt-fiedersp. geschlitzt*, die blüthenst. gleichgestaltet; Quirle 2-6bth. ☉. Unt. der Saat, auf Kalkboden. Jul.-Herbst. Bth. purpura.

3. *T. SCORDIUM* (L.) Knoblauchduftiger G. — *B.* sitzend, gekerbt-gesägt, die untern länglich, an der Basis abgerundet, *die obern länglich-lanzettl.*, oft *hinten verschmälert*, und von der Mitte an abwärts ganzrandig, *die blüthenst. gleichgestaltet*; Quirle 4bth.; der St. nebst den B. zottig oder etwas kahl. 4. Aufsumpf. Wiesen, an Gräben und überschwemmten O. Jul. Aug. Fl. dant. 593. Bth. purpura.

4. *T. SCORDIODES* (Schreb.) Starkkriechender G. — *B.* sitzend, die untern länglich-eyf. oder eyf., an der Basis fast herzf., *die obern eyf.*, alle ringsherum gekerbt-gesägt, *die blüthenst. gleichgestaltet*; Quirle 4bth.; der St. neht den B. mehr oder weniger wollig-zottig. 4. In Gräben und am Meeresufer, (bei Monfalcone in Menge, Wulsen; Veglia. Osero, Noë.) Jun. Jul. Unterscheidet sich von der vorübergehenden Art besonders deh die obern B., welche kurz-eyf., und dadurch, dass alle B. im Verhältniss zu ihrer Breite um die Hälfte kürzer sind. Der Ueberzug ist bei beiden Arten sehr veränderlich. D.

III. Rotte. *CHAMAEDRYS* Dillen. gen. t. 3. K. 5zählig. Quirle 2-6bth., in eine endst. Tr. zsgestellt, die obern blüthenst. B. oder alle deckblattförmig.

5. *T. CHAMAEDRYS* (L.) Gemeiner G. — *B.* gestielt, *keilig-eyf.*, eingeschnitten-gekerbt; Quirle 6 bth., *traubig*; die St. liegend; Aeste aufstrebend, flaumig. 4. Auf Hügeln und an rauh. Gebirg., an Wegen, Mauern. Jul.-Sept. Hayn. arzng. 6. 4. Bth. purpurn.

6. *T. FLAVUM* (L.) Gelber G. — *B.* gestielt, fast 3 eckig-eyf., stumpf-gekerbt, *an der Basis fast abgeschnitten*; Quirle 6 bth., *traubig*; die St. aufstrebend, strauchig. 4. An gebirg., steinig. O., (Göriz, Triest, Fiume.) Jul. Aug. Bth. gelb.

IV. Rotte. *POLICUM* Benth lab. 684. K. 5zählig. Quirle in endst. Köpfchen zagerückt.

7. *T. POLIUM* (L.) Poley-G. — Graulich-filzig, wollig oder haarig fast steifh.; B. sitzend, keilig, länglich oder lineal., stumpf, gekerbt, am Rande umgerollt, filzig; *Köpfchen rundlich und oval, gestielt*; die St. halbstrauchig, aufstrebend. 4. An fels., sonnig. O., (Aquileja, Triest, häufig im südl. Istrien, Fiume.) Jul. Aug. Bth. gelblichweiss. Benth. stellt 6 Variet. mit vielen Synon. auf, von welchen man im Gebiete unserer Flora folg. findet:

γ. *vulgare*, B. länglich und die Köpfchen filzig-wollig; Bth. weiss: *T. Polium* L. *T. Pseudo-Hyssopus* Schreb. und *T. Teuthrion* und *T. Belion* Schreb. *T. album* Poir.

δ. *angustifolium*, B. lineal. oder lineal.-länglich und nebst den kleinen Köpfchen grau-filzig, seltner gelblich: *T. capitatum* L. *T. flavescens* Schreb. und *T. valentinum* Schreb. D.

8. *T. MONTANUM* (L.) Berg-G. — *B. lineal.-lanzettl., ganzrandig*, unterseits oder beiderseits grau; Ebensträusse endst.; die St. halbstrauchig, gestreckt. 4. An sonnig., felsig., kies. O. der Ebenen und Gebirge, auf Kalkbod., (stw. im südl. und mittlern Gebiet.) Jun.-Aug. *T. supinum* J. a. t. 417. Linne's *T. supinum* ist eine schmalblättrigere Form des *T. montanum*.

LXXXVIII. Ordng. VERBENACEEN. Juss. *annal. mus.* p. 63.

K. röhrig, bleibend. *Blkr. 1blättrig, unterweibig, röhrig, mit unregelmässigem oder ungleichem Saume*, abfällig. *Stbg. 4, zweimächtig, oder 2, der Blkr. eingefügt.* Fruchtkn. frei, 4fächerig, mit aufrechten, einzelnen oder gezweigten Eychen. Gf. 1. *Fruchtgehäuse steinfruchtartig, 4 Isamige Steine enthaltend, oder in 4 Nüsschen zerfallend.* Keim gerade, Würzelchen unterst., nach dem Nabel gerichtet. Eyweiss fehlend.

1. *VITEX* (L.) Müllen. — K. 5zählig. Blkr. tellerf., mit schiefem, 5-lappigem, fast 2lippigem Saume. Eine trockne Steinfrucht mit 4fächeriger, 4samiger Nuss.

1. *V. AGNUS CASTUS* (L.) Gewöhnliche M. — B. gefingert-5- und 7zählig; Blättchen lanzettl., zugespitzt, ganzrandig, unterseits grau-filzig; Aehren endst., unterbrochen. 4. An sandig. O. und an Sandfelsen am Adriat. Meer. (Triest, Fiume.) Jul. Aug. Schk. t. 177. Bth. violett. D.

2. *VERBÉNA* (L.) Eisenkraut. — K. 5 sp. Blkr. tellerf., mit 5 lappigem, fast 2 lippigem Saume. Frucht in 4 Nüsse sich spaltend.

1. *V. OFFICINALIS* (L.) Gemeines E. — Aehren fädlich, rispig, B. eyf.-länglich, 3sp., geschlitzt und gekerbt, in den breiten Bstiel

zugesogen. ☉. Auf Schutthaufen, an Wegen, Mauern. Jun.-Herbst. St. h. 3. Bth. hell-purpurn.

LXXXVIII. Ordng. ACANTHACEEN. Juss. gen. p. 162.

Samen eyweisslos, oft mit knorpeligen, aufstrebenden Nabelsträngen angeheftet. Sonst Alles, wie bei den Antirrhineen.

1. **ACANTHUS** (L.) Bärenklau. — K. mehrblättrig; Blättchen ungleich, verschieden-gestaltet. Blkr. 1lippig, 3sp. Kapsel 2fächerig.

1. **A. MOLLIS** (L.) Weiche B. — B. fiederth., mit eyf. spitzen, grob-gezähnten Zpfln. Zähne wehrlos, stachelspitzig; DeckB. breit-eyf. 4. An grasreichen O., im Gebüsch, in Wiesen am Meere, (in Istrien bei Fiume.) Mai.-Jul. Lam. illustr. t. 550. f. 2. Bth. fast 2 Zoll lang. Die weisse Lippe ist in der Mitte auf den Adern grünlich und gegen den Rand hin bloss-rosenfarben überlaufen; der geflügelte Nagel ist weisslich mit röthlichen Flügeln. J.

2. **A. LONGIFOLIUS** (Host. fl. a. B. 2. S. 217.) Langblättrige B. — B. fiederth. mit länglich., buchtig-fiedersp. und gezähnten Zpfln, der EndZpfl lanzettl., Lappen und Zähne mit einem kurzen Dorn endigend; DeckB. länglich-eyf. 4. Am Meere, (auf dem Scoglio degli Olivi, einer kleinen Insel im Hafen von Pola.) Jul. Verschieden von der vorigen dch die längeren, tiefer buchtigen und am Rande dornigen Fieder der B. und schmalere DeckB. Die Bth. sind an meinem Expl. um die Hälfte kleiner, als bei voriger Art. — Der *Acanthus spinosus* unterscheidet sich von diesen beiden dch die lanzettl. Fieder der B., deren Lappen und Zähne in verlängerte starke Dornen endigen. J.

LXXXIX. Ordng. LENTIBULARIEEN. Rich. in d. fl. paris. I. p. 26.

K. getheilt, bleibend. Blkr. 1blättrig, unterweibig, unregelmässig, 2lippig, gespornt. Stbg. 2, an der Basis der Blkr. eingefügt. Fruchtkn. frei, 1fächerig, vieleiyig; Samenträger mittelpunktst., frei. Gf. 1. Kapselfrucht. Keim eyweisslos, manchmal ungeth.

1. **PINGUICULA** (L.) Fettkraut. — Blkr. rachig, gespornt. K. 5th.

1. **P. ALPINA** (L.) Alpen-F. — Sporn kegelf.; Kapsel zugespitzt, geschnabelt. ☉. Auf moosigen Wiesen der A. und VorA.; in die, die A. begleitenden, Flächen herabsteigend. Apr. Mai, auf

den A. später. St. h. 14. *P. flavescens* Flörk. bei Schrad. *P. alba* Kuchl. bei Hoppe. *P. purpurea* Willd. Bth. weiss, auf der Basis des Mittellappens der Unterlippe mit 2 citrongelben, oft in einen zsgeflossenen Flecken. — Lappländ. Expl. sind nicht verschieden.

2. *P. VULGARIS* (L.) Gemeines F. — *Sporn pfriemlich*, Kapsel eyf. 4. Auf torfigen Wiesen, (die Variet. *a.* zerstreut dch das Gebiet; Var. *β.* an feuchten Stellen der Gypsberge am Vorderharz; Var. *γ.* und *δ.* auf den Alpen.) Mai, Juni. St. h. 14. *P. vulgaris β. alpicola* Rb. ic. f. 173. begreift grössere Explare. Bth. violett, oder innen mit weissen Linien oder Flecken gezeichnet. Var.:

a. pratensis, Blkr. mittelmässig: *P. vulgaris* der Autoren.

β. minor, Blkr. fast um die Hälfte kleiner: *P. gypsophila* Wallroth in der Linnaea.

γ. grandiflora, Bth. fast noch einmal so gross, als bei der Var. *a.*: *P. grandiflora* Lam. dict., Koch Synops. ed. 1. *P. leptoceras* Reichenb. ic. f. 171. *P. vulgaris macrantha* Tausch, pl. select.

δ. longifolia, Bth. wie bei der Variet. *γ.*, die B. länger schmäler: *P. longifolia* Ramond. in DC. fl. fr., Koch Synops. ed. 1. — Nach Facchini's Beobachtungen gehen alle diese Variet. dch Zwischenformen in einander über. Sie sind an ihren StandO. genauer zu prüfen.

2. *UTRICULARIA* (L.) Wasserschlauch. — Blkr. larvig, gespornt. K. 2blättrig. Kapsel 1fächerig.

1. *U. VULGARIS* (L.) Gemeiner W. — *B.* nach allen Seiten hin abstehend, *gefiedert-vielth.*, Zpfl haarfein, entfernt-fein-dörnig; Sporn längl.-kegelf., hinabsteigend; Oberlippe ungefähr so lang, als der aufgeblasene Gaumen; *Stbk. zsgewachsen*. 4. In stehenden Wassern. Juni-Aug. Hayn. in Schrad. Journ. 1800. 1. t. 6. A. St. h. 13. Bth. dottergelb, Gaumen mit pomeranzengelben Streifen.

2. *U. NEGLECTA* (Lehmann.) Uebersehener W. — *B.* nach allen Seiten hin abstehend, *gefiedert-vielth.*, Zpfl haarfein, entfernt-fein-dörnig; Sporn längl.-kegelf., hinabsteigend; Oberlippe 2-3mal länger, als der aufgeblasene Gaumen; *Stbk. frei*. 4. In stehenden Wassern der Gegend von Hamburg, besonders um Eppendorf; Oldenburg, Unterharz. Juli. Aug. Untersch. sich von der vorhergehenden dch den dünneren St., die weiter von einander entfernten B., die 2-3mal den Gaumen überragende, niemals kürzere Oberlippe, den sichtlich kleineren K. und die freien Stbk.

3. *U. INTERMEDIA* (Hayn. bei Schrad.) Mittlerer W. — *B.* 2-zeilig, *gabelsp.-vielth.*, Zpfl borstlich, dörnig-gezähnt; Sporn pfriemlich, der Unterlippe anliegend; die Oberlippe ganz, zweimal länger, als der aufgeblasene Gaumen; die fruchttrag. Bthstiele aufrecht. 4. In stehenden Wassern, Gräben, (dch d. g. Gebiet,

jedoch nicht überall.) Juli. Aug. *U. media* Schumacher. St. h. 17. Hayn. a. a. O. t. 5. — Blkr. schwefelgelb: Oberlippe und Gaumen mit purpurnen Streifen bemalt.

4. *U. BREMI* (Heer Fl. d. Schw. S. 984 nach einem dch Nae-geli empfangenen Expl.) Brem's W. — *B.* nach allen Seiten hin abstehend, doppelt-gabelsp., vielth., Zpfl horstlich, kahl; Sporn ziemlich kegelf., sehr kurz; Oberlippe ausgerandet, von der Länge des plattgedrückten Gaumens; die Unterlippe kreisf. ausgebreitet: Blhstielchen nach dem Verblühen zurückgebogen. 2. In Sümpfen, an moosreichen Teichen und Gräben hie und da. Aug. Sept. *U. pulchella* Lehmann in Brief. Blkr. schwefelgelb. „Sehr ähnlich der *U. minor*, aber in allen Theilen stärker: KB. rundl., fast nierenf. mit einem kleinen Spitzchen: die Unterlippe der Blkr. rundl. und ausgebreitet, der Gaumen deutlich herandet, braunstreifig. Bei *U. minor* sind die KB. rundl., zugespitzt, die Unterlippe der Blkr. eyf. und an der Seite zurückgerollt, wesshalb sie sichtlich schmaler erscheint und ein ganz fremdartiges Ansehen bekommt, der in die Lippe zerfließende Rand des Gaumens ist gleichfärbig.“ Lehmann in briefl. Mittheilungen. Die Streifen des Gaumens scheinen in ihrer Farbe veränderlich zu sein.

4. *U. MIXOR* (L.) Kleiner W. — *B.* nach allen Seiten hin abstehend, gabelsp.-vielth., Zpfl borstlich, kahl; Sporn sehr kurz, fast kegelf.; Oberlippe ausgerandet, von der Länge des plattgedrückten Gaumens; Unterlippe eyf. mit ungerolltem Rand; die fruchttrag. Blhstiele zurückgebogen. 2. An sumptigen O. und in Gräben hie und da. Juni-Aug. Hayn. a. a. O. t. 6. f. B. St. h 17. — Blkr. blassgelb. Gaumen (nicht höckerig, sondern aus einem erhabnen Rande bestehend), mit rostbraunen Streifen bezeichnet. Lehmann sah jedoch den Gaumen stets ungefleckt, worüber weitere Beobachtungen anzustellen sind. Linne's Worte in seiner Fl. succ. „Unterlippe der Blkr. an den Seiten herabgebogen“ beweisen, dass diese Pfl. die ächte Art Linne's darstellt.

XC. Ordng. PRIMULACEEN. Vent. tabl. 2. p. 285.

K. 4-5th. oder 4-5zählig, bleibend. *Blkr.* 1blättrig, unterweibig, regelmässig, 4-5sp. *Stbg.* der *Blkr.* eingefügt, deren Lappen an Zahl gleich und denselben gegenst. oder noch einmal so viel und die äussern mit den Blkr.Zpfln abwechselnd, und unfruchtbar. *Fruchtkn.* frei, 1fächerig, vieleig, der *Samenträger* mittelpunktst., frei. Cf. 1. Kapselfrucht. S. schildf. Keim gerade, innerhalb des fleischigen Eyweisses; Würzelchen unterst, nach dem Nabel gerichtet.

1. *TRIENTALIS* (L.) Trientale. — K. tief-5th. Blkr. flach, 7blättrig, die Blh. dch einen inwendig hervorragenden Ring verbunden, Röhre fehlend. Stbg. auf dem Ringe aufgesetzt; Stbk.

nach dem Verblühen von der Spitze an rückwärts zugerollt. Kapsel fast fleischig, zuletzt in 7 Klappen bis zur Basis aufspringend. Bth.- u. Fruchtheile variiren manchmal von 5 bis zu 9. Mehrere Kapselklappen bleiben bei dieser Gattung, wie bei *Lysimachia*, oft noch verbunden, während die Frucht schon den S. ausstreut.

1. *T. EUROPAEA* (L.) Europäische T. — In feuchten Gebirgswäldern und auf schwammigen Haiden, (nördliches Gebiet, sodann in Mähr., Böhm., Schles., Fichtelgeb., Harz; im Schwarzwalde u. im Ursernthale der Schw.; im Vintschgan in Tyrol.) Mai-Juli. St. h. 17. Blkr. schneeweiss, Ring der Basis gelblichweiss, mit drüsentrag., sehr feinen Haaren besetzt.

2. *LYSIMACHIA* (L.) Lysimachie. — K. 5th. Blkr. radf., Röhre kurz oder fast fehlend; Saum 5th. Stbg. auf der Basis der Blkr. eingefügt, 10, die 5 äussern kürzer, unfruchtbar, oder 5, frei oder mehr oder weniger verwachsen. Kapsel 5klappig. — S. eyf. oder länglich auf dem Rücken gekielt und mit dem Kiele an den Samenträger angeheftet; Nabel lineal., oder die S. am Nabel ausgehöhlt.

Die Kapsel ist bei allen Arten unserer Flora 5klappig; ich habe alle Arten hinsichtlich der Frucht untersucht, aber an der aufgesprungenen Kapsel hängen oft 2-3 Klappen an ihren Rändern zusammen, was jedoch den Gattungsscharakter nicht beeinträchtigen kann, und was an anderen Gattungen ebenfalls nicht selten so vorkommt.

1. Rotte. *NAUMBURGIA* Moench. Bth. in gedrungenen, blattwinkelst. Tr. Ein kleiner Zahn zwischen den Blkr.Zpfn. Stbg. an der Basis durch einen sehr kurzen Ring zsgewachsen. S. glatt, kaum berandet; Nabel nicht ausgehöhlt.

1. *L. THYRSIFLORA* (L.) Straussblüthige L. — *Tr. blattwinkelst., gestielt, gedrungen*, walzlich, kürzer, als das stützende B.; B. gegen- und 3 und 4st., verlängert-lanzettl. 4. In Fischteichen, tiefen Sümpfen und Gräben, (stw. dch d. g. Gebiet; in den südl. Provinzen seltner.) Juni, Juli. Fl. d. 517. *Naumburgia guttata* Moench. *Thyrsanthus palustris* Schrank. Blkr. gelb, an der Spitze nebst dem K. rothpunktirt.

II. Rotte. *LYSIMASTRUM* Dub. bot. gall. 380. Bth. blattwinkelst., rispig, quirlig oder einzeln. Buchten zwischen den Blkr.Zpfn. zahnlos. S. geglättet, berandet.

a. Stbg. 10, frei, die wechselst. kleiner und ohne Staubkölbchen.

2. *L. CILIATA* (L.) Wimperige L. — Der St. aufrecht; B. gegenst., 3- oder 4st., gestielt, eyf.-länglich, fast herzf., kahl, am Rande rauh, Bstiele gewimpert; *Bthstiele* blattwinkelst., gegenst. und quirlig, *an der Spitze nickend*; Blkr.Zpfl. rundlich, spitz-gekerbt, sehr stumpf, mit einer aufsitzenden Haarspitze; *Stbg. 10, die wechselst. unfruchtbar*. 4. An sumpfigen O., Gräben und Ufern, (im Gebiet der Fl. von Spa, nach Lejeune wirklich eingebürgert.) Juni, Juli. Bth. gelb.

D.

b. Stbg. 5, bis zu dem dritten Theil ihrer Länge, oder bis zur Mitte zsgewachsen, den Fruchtkn. bedeckend.

3. *L. VULGARIS* (L.) Gemeine L. — Der St. aufrecht; B. gegenst. oder quirlig, kurz-gestielt, länglich-lanzettl. oder eyf., unterseits etwas zottig; Bthstiele aufrecht, wechselst, oder quirlig, traubig; Tr. rispig; *Blkr.Zpfl* eyf., ziemlich spitz, ganzrandig, *am Rande kahl*; *Stbg. 5, von der Basis bis zur Mitte zsgewachsen.*

4. An sumpfigen O., Ufern und Wiesengebüsch. Juni, Juli, Fl. d. t. 689. Die Bth. goldgelb. Die Zpfl des K. sind bald breiter, bald schmaler, bald länger, als die Frucht und bald kürzer. Var. im weichen Sumpfschlamm mit 4-8 Fuss langen Ausläufern: *L. paludosa* Baumg.; und mit grossen untern blüthenst. B. an der Endtraube, wodurch diese Variet. fast den Habitus von *L. verticillata* bekommt, aber ihre seitenst. Tr. sind von denen der *L. vulgaris* nicht verschieden: *L. westphalica* Weyh.

4. *L. PUNCTATA* (L.) Getüpfelte L. — Der St. aufrecht; B. gegenst. oder quirlig, kurz-gestielt, längl.-lanzettl. oder eyf., flaumig; Bthstiele blattwinkelst., gegenst. oder quirlig, 1bth. oder die untersten 2-3bth.; *Blkr.Zpfl* spitz, *drüsig-gewimpert*; *Stbg. 5, von der Basis bis zur Mitte zsgewachsen.* 4. An Ufern und stehenden Wassern, (Steyern., Oestr., Böh., Mähr., Zürich am Vorgebirge Horn.) Juni, Juli. J. a. t. 366. Explare mit getheilten 2-3bth. Bthstielen des untersten Quirls bilden die *L. verticillata* MBieb. An der kultiv. Pflanze aber kommen aus einer W. Stengel mit 2 3bth. Bthstielen am untersten Quirl und andere mit lauter 1bth. Bthstielen. Bth. gelb, an der Basis rostbraun, kommen auch ganz gelb vor, letztere ist *L. villosa* Schm. Die B. unterseits, wiewohl nicht immer, mit schwarzen Punkten bestreut.

c. Stbg. 5. frei, an der Basis sehr kurz-zsgewachsen, den Fruchtkn. nicht bedeckend.

5. *L. NUMMULARIA* (L.) Kriechende L. — *Der St. gestreckt*, kriechend; B. gegenst., herzf.-rundlich; Bthstiele blattwinkelst., einzeln, kürzer, als die B.; *KZpfl* herzf. 4. An Gräben, sumpf. O., in feuchten Wäldern. Juni, Juli. Schk. t. 36. Bth. citronengelb.

6. *L. NEMORUM* (L.) Hain-L. — *Der St. gestreckt*; B. gegenst., eyf. oder fast herzf., spitz, kahl; Bthstiele blattwinkelst., einzeln, länger, als das B.; *KZpfl* lineal.-pfriemlich. 4. In Hainen und etwas feuchten Laubwäldern. Juni, Juli. St. h. 1. Bth. citronengelb.

III. Rotte. *ASTEROLINUM* Link. und Hoffmannsegg. fl. port. 332. Bth. blattwinkelst., einzeln. Buchten zw. den *Blkr.Zpfln* zahllos. Stbg. frel. S. quer-rundzig, vorne ziemlich flach, hinten am Nabel ausgehöhlt.

7. *L. LINUM STELLATUM* (L.) Leinblättrige L. — Der St. aufrecht; B. gegenst., sitzend, lanzettl., zugespitzt, kahl, am Rande ziemlich rau; Bth. blattwinkelst., einzeln; *KZpfl* lanzettl., haar-spitzig, *3mal so lang, als die Blkr.* ☉. An sonnigen O., (Istrien;

auch von Lejeune bei Verviers gesammelt, aber wahrscheinl. mit ausländ. Wolle eingebracht und später nicht wieder gefunden.) Juni. Asterolinon stellatum Fl. portug. Blkr. weisslich, klein; Zpfl breit-eyf., kurz-zugespitzt.

3. ANAGÁLLIS (L.) Gauchheil. — K. 5th. Blkr. radf.; Röhre kurz oder fast fehlend; Saum 5th. Stbg 5, auf der Basis der Blkr. eingefügt, frei. Kapsel ringsum aufspringend.

1. A. ARVENSIS (L.) Acker-G. — Der St. ausgebreitet; B. gegenst. oder 3st., sitzend, eyf.; *Blkr. Zpfl klein-gekerbt, fein-drüsig-gewimpert, ein wenig länger, als der K.*; Bthstiele länger, als die B. ☉. Auf Aeckern, in Weinbergen, an kultiv. O. Juni-Herbst. St. h. 1. A. phoenicea Lam. A. mas Vill. Bth. mennigfarben, an der Basis blutroth. Var. mit 3st. B.; weissen, an der Basis blutrothen, und fleischrothen einfarbigen und fleischrothen an der Basis der Zpfl nur mit einem kleinen blutrothen Flecken bezeichneten Blkr.: A. carnea Schrank. — Dass die vorliegende und die folgende Art nur Variet. einer einzigen seyen, möchte ich nicht läugnen, aber da ich sie in neuerer Zeit nicht genauer beobachten konnte, so stelle ich sie hier als Arten auf, bis spätere Beobachtungen mich anders belehren.

2. A. CAERULEA (Schreb.) Blauer G. — Der St. ausgebreitet; B. gegenst. oder 3st., sitzend, eyf.; *Blkr. Zpfl klein-gekerbt, fast völlig drüsentos, ein wenig länger, als der K.*; Bthstiele ohngefähr so lang, als die B. ☉. Mit der vorhergehenden, aber seltner. Juni-Herbst. A. femina Vill. A. Monelli Rb., nicht L. „Anagallis mit lanzettl. B. Wird als Fremdling im temperirten Hause bewahrt, und ist mehrjährig“ Diese Worte sagt Linne im Hort. upsal. von seiner A. Monelli, die auch im hiesigen bot. Garten perennirt. — Bth. blau. Var. mit weissen Blkr. und 3st. B.

3. A. TENELLA (L.) Zarter G. — *Der St. fädlich, gestreckt, an der Basis kriechend; B. gegenst., gestielt, rundlich-eyf., kurz-bespitzt; Bthstiele länger, als die B.; K. 3mal kürzer, als die Blkr.* 4. An torfigen, moorigen O., (Westphalen bei Dorsten und Schelmbeck; Ostfriesland im Hochmoore bei Aurich; im C. Waadt an mehreren O., Lausanne, Vevay u. a.) Juli. Aug. Fl. d. t. 1085. Jirasekia alpina Schmidt. J. tenella Rb. Blkr. rosenroth, mit dunkleren Adern.

4. CENTUNCULUS (L.) Kleinling. — K. 4bth. Blkr. Röhre fast kugelig-bauchig; Saum 4th., abstehend. Stbg. 4. Kapsel ringsum aufspringend.

1. C. MINIMUS (L.) Wiesen-K. — B. wechselst., eyf.; Bth. sitzend. ☉. Auf Aeckern, Triften, Haiden, feuchtem Sandboden. Juni, Juli. St. h. 30. Bth. weiss oder blass-rosenroth.

5. ANDRÓSACE (L., mit Einschl. der Aretia der Species plant.) Mannsschild. — K. 5 sp. oder 5zählig. Blkr. tellerf. oder

trichterf.: Röhre eyf., an der Spitze verengert; Schlund mit kurzen Deckklappen versehen. Fruchtkn. 5-vieleiyig. Kapsel 5klappig.

1. Rott. *ARETIA* Linn. Die Stämmchen sehr ästig, dichte Rasen bildend; B. dachig, entweder alle, oder nur die an der Spitze der Aeste in Rosetten ausgebreitet, die untern zwar abgestorben, übrigens aber nicht verändert; Bthstiele 1bth., nackt, ohne DeckB.; ich fand an den getrockneten Pflanzen 5-8 Eychen. — Ausser den Bthstand konnte ich bisher zwischen den, unter dieser Rottle aufgezählten Aretien und den Androsacen der folgenden Rotten kein Gattungsmerkmal finden.

1. *A. HELVETICA* (Gaud.) Moosartiger M. — *B. dicht-dachig*, lanzettl., von *abwärts gekehrten*, einfachen *Haaren kurz*; Bth. einzeln, fast sitzend; Zpfl der Blkr. ganz; KZpfl spitzlich, so lang, als die Blkr.Röhre. 2. In Felsenspalten der höhern A., (Tyrol; Baiern; Schw.) Juli. Aug. *A. bryoides* DC. — D. fl. 2. p. 92. *Aretia helvetica* Schk. t. 30. *Diapensia helvetica* L. (irrig in D. fl. 2. p. 93 zu *A. imbricata* gezogen.) Die Bth. wegen dem kurzen, kaum 1 Linie langen Bthstiele zwischen den B. eingesenkt. Blkr. weiss, mit einem kreisrunden, gelblichen Hofe in der Mitte und gelben Deckklappen.

2. *A. IMBRICATA* (Lam. ill. t. 98. f. 1.) Dachiger M. — *B. dicht-dachig*, lanzettl., stumpf, nebst den Bthstielen und K. von sehr kurzen, sternf. Haaren *filzig-grau*; Bth. einzeln, fast sitzend und auch gestielt; Zpfl der Blkr. ganz; KZpfl stumpf, länger, als die Blkr.Röhre. 2. Auf Felsen der höchst. A., (auf dem Trone in Graubünden, den Grüben, Zmuth und Fineln über Zermatten im Wallis, auf dem Rosa; südöstl. Tyrol.) Juni. Juli. *A. Aretia* Lap. *A. argentea* Gärtn. fruct. 3. t. 198. f. 4. *A. tomentosa* Scheich. und Gaud. Diese letztere ist blos die längern Bthstiele verschiedenen; die *A. alpina* var. auf dieselbe Weise. *Aretia* Hall. helv. n. 618. var. γ . nach Gaud. Blkr.Röhre purpurn, der Saum weiss mit rothen Deckklappen nach Hegetschw. und Heer Fl. d. Schw. S.

3. *A. HEERI* (*Aretia* Hegetschweiler.) Heer's M. — *B. dicht-dachig*, lanzettl., stumpf, *kurz*, von *abstehenden einfachen, und gabelsp. Haaren*; Bth. einzelnstehend, fast sitzend oder gestielt; Zpfl des K. spitz, etwas länger, als die Röhre der Blkr. 2. Auf den A. der Schw. sehr selten, (bis jetzt blos in den A. des Kleintales im Cant. Glarus gegen das Martinsloch, in der Höhe von 7-8000 Fuss, Heer!) Juli. Aug. Von der Gestalt der *A. helvetica*, mit den Bth. der *A. glacialis*. Bth. rosenfarb. mit gelbem Schlund, getrocknet in das Bläuliche spielend. S.

4. *A. GLACIALIS* (Hoppein Brief) Eis-M. — *B. dicht-genähert*, an der Spitze der Aeste *rasettig*, lanzettl., spitzlich, an der Basis verschmälert, nebst den Bthstielen und K. flaumig, die Haare *zerstreut, sternf.*, sehr kurz, *kürzer, als der Querdurchmesser der Bthstiele*; Bth. einzeln, fast sitzend und auch gestielt; KZpfl spitz, länger, als die Blkr.Röhre. 2. Auf Felsen der höhern A., (von der Schw. dch Tyrol bis Steyer. und Kärnth.) Juli. Aug. *A. pennina* Gaud. *Aretia alpina* Lam. dict., Koch syn. ed. 1., Wulf. bei J. n. suppl. t. 18. *A. glacialis* Schleich. *A. Hall. helv. n. 618. var. β .* Blkr. rosenroth oder weiss mit gelben Deckklappen. Die

Aretia alpina L. spec. ward aus Haller's Schriften aufgenommen, in welchen 3 verschiedene Arten unter eine einzige zsgestellt werden.

A. brevis Hegetschw. Fl. d. Schw., *A. Charpentieri* Heer, unterscheidet sich von der ganz ähnlichen *A. glacialis* dch die stumpferen B. und Zpfl des K., dch die etwas schmälern und meist an der Spitze leicht ausgerandeten Zpfl des Blumensaumes. Dieser Pfl. steht die *A. Wulfeniana* Sieber herb. fl. austr. am nächsten, sie unterscheidet sich blos dch die spitzeren B. und Zpfl des K.; beide Arten sind noch genauer zu beobachten.

5. *A. PUBESCENS* (DC.) Flaumiger M. — *B. dicht-genähert*, an der Spitze der Aeste *rosettig*, lanzettl., stumpflich, an der Basis verschmälert, nebst den Bthstielen und K. *kurzh-flaumig*, die *Haare abstechend*, von der Länge des Querdessers der Bthstiele, *einfach*, mit gablichen untermischt oder sämmtlich einfach; Bth. einzeln, fast sitzend und auch gestielt; KZpfl spitz, länger, als die Blkr.Röhre. 4. Auf höhern A., (C. Waadt, Genf und Glarus.) Juni. Juli. *A. alpina* Gaud. DC. ic. pl. rar. gall. t. 5. *Aretia* Hall. helv. n. 618. var. *α*. Blkr. weiss, im Mittelpunkt gelblich. S.

11. Rotte. CHAMAEIASME. W. vielköpfig; die Stämmchen an der Spitze rosettig, Rasen bildend; Bthstiele doldig, mit einer Hülle umgeben; Fruchtkn. mit 5-10, bei den *A. obtusifolia* mit 25 und 30 Eychen.

6. *A. VILLOSA* (L.) Zottiger M. — W. vielköpfig; Rosetten entfernt, fast kugelig; *Schaft, Dolde und B. von verlängerten, undeutlich-gegliederten Haaren zottig*; *B. lanzettl.*, an der Basis verschmälert, *ganzrandig*; Bthstiele während der Bthezeit so lang oder kürzer, als die Hülle; Blkr. länger, als der K. 4. Auf Felsen der A., (auf dem Jura, den A. von Krain und Steyerm.) Juni-Aug. J. collect. t. 12. f. 3. *A. villosa α*. D. fl. 2. p. 99. Bth. weiss oder rosenroth, mit einem gelben oder purpurnen Nabel.

7. *A. CHAMAEIASME* (Host., nicht Wulf.) Haariger M. — W. vielköpfig, rasig; Rosetten flach; *Schaft, Dolde und B. von verlängerten, deutlich-gegliederten Haaren zottig*; *B. lanzettl.*, an der Basis verschmälert; Bthstiele zur Bthezeit so lang oder kürzer, als die Hülle; Blkr. länger, als der K. 4. Auf Felsen der A. und VorA., (dch d. g. AK.) Juni-Aug. *A. villosa* J. a. t. 332. *A. villosa β*. D. fl. 2. p. 100. Blkr. weiss, Nabel gelb.

8. *A. OBTUSIFOLIA* (All. ped. t. 46. f. 1.) Stumpfblättriger M. — W. vielköpfig, rasig; *Schaft* nebst den Bthstielen, K. und dem Blattrande *flaumig*; *Haare sehr kurz*, an dem Schafte und den Bthstielchen *sternf.*; *B. lanzettl.*, nach der Basis verschmälert, ganzrandig; Bthstiele länger, als die Hülle; Blkr. länger, als der K. 4. Auf den höchsten A., (dch d. g. AK. und am Basalt in der kleinen Schneegrube der Sudet.) Juni. Juli. *A. Chamaeiasme* Wulf. in J. collect., unter *A. villosa*, (nach der Beschreibg u. den Expl. von dem Autor selbst in den Sammlungen von Mertens und Frölich.) *A. Lachenalii* Gmel. *A. lactea* Vill. Blkr. weiss oder röth-

lich, mit gelblicher Röhre. Var. *excava* mit einem einzigen, wurzelst. Bthstiele: *A. obtusifolia* β . *aretioides* Gaul.

9. *A. LACTEA* (L.) Milchweisser M. — W. vielköpfig, rasig; Schaft nebst den Bthstielen und K. ganz kahl; B. lanzettl.-lineal, und lineal, ganzrandig, kahl oder an der Spitze oder dem Rande spärlich-gewimpert; Bthstiele verlängert; Blkr. länger, als der K. 4. Auf KalkA., (Jura, Tyrol, Salzb., Steyerm., Oestr.) Juli. Aug. J. a. t. 333. *A. pauciflora* Vill. Blkr. schneeweiss, mit einem goldgelben Kreis am Rande des Schlundes; der Schaft trägt 2-5 Bth., nicht selten auch nur 1 Bth.

10. *A. CARNEA* (L.) Fleischfarbener M. — W. vielköpfig, rasig; Schaft nebst den Bthstielen flaumig, von sehr kurzen, feinsternf. Haaren; B. lineal, von der Basis nach der Spitze verschmälert, kahl, kurz-gewimpert, unterseits gekielt, an der Spitze zurückgekrümmt; Bthstiele ohngefähr so lang, als die Hülle; Blkr. länger, als der K. 4. Auf Granitfelsen der A. und VorA., (auf dem Ballon der Voges., den A. des untern Wallis und in den Appenzeller A. auf der Seiseralpe in Tyrol.) Juli. Aug. Blkr. schön-fleischroth, mit gelbem Schlund.

III. Rotte. *ANDRASIS* Dub. bot. gall. p. 382., zum Theil. W. einfach, ohne Stämmchen, mit einer Rosette von B. endigend und einen oder mehrere Schäfte treibend. Bth. doldig. Fruchtkn. vieleig, 15-30 Eychen einschliessend. Deckklappen den Schlund verengernd.

11. *A. ELONGATA* (L.) Verlängerter M. — W. einfach, mit einer Rosette von B. gekrönt; B. lanzettl., gezähnt, am Rande nebst dem Schafte und der Dolde von sehr kurzen, feinsternf. Haaren flaumig; K. länger, als die Blkr. ☉. Auf sonnigen, unkult. Hügeln, auch auf Sandäckern, (stw. in Oestr., Mähr., Böhm., Schles., Sachs., Thüring., bei Würzb., Regensb., in der Rheinpfalz.) Juli. Aug. J. a. t. 300. *A. nana* Hornem. Blkr. milchweiss, mit gelblichen Deckklappen. D.

12. *A. SEPTENTRIONALIS* (L.) Nördlicher M. — W. einfach, mit einer Rosette von B. bekrönt; B. lanzettl., gezähnt, nebst dem Schafte und den Bthstielen von sehr kurzen, feinsternf. Haaren flaumig; K. kahl, kürzer, als die Blkr.; Blkr. Zpfl ungeth. ☉. Auf Sandäckern, (stw. in Unteröstr., Mähr., Schles., Sachs.; sodann Unterhessen, Frankf. a. M., Würzb. und Werthheim; vereinzelt bei Königsberg und im Nicolaithele der Schw.) Mai. Juni. Fl. d. t. 7. Blkr. milchweiss, mit gelben Deckklappen.

IV. Rotte. *ANDROSACE* Hall. helv. 1. p. 276. Deckklappen kurz, wie bei den vorübergehend, aber aufrecht und den Schlund keineswegs verengernd, sonst Alles, wie bei der 3. Rotte.

13. *A. MAXIMA* (L.) Grösster M. — W. einfach, mit einer Rosette von B. gekrönt; B. elliptisch oder lanzettl., gezähnt; Schaft und Dolde behaart, die Haare gegliedert; K. länger, als die Blkr., der fruchtttrag. sehr gross. ☉. Auf Aeckern, unter der Saat, (im mittlern Wallis, in der Rheingegend zwischen Worms, Kirch-

heimbolanden und Mainz, bei Wiesbaden; an der Mosel bei Winnungen, in Unteröstr.) Apr. Mal. J. a. t. 337. Blkr. weiss oder röthlich, mit gelblichem Schlund.

6. *ARÉTIA* (Gaud.) Aretie. — K. 5sp. Blkr. tellerf., mit walzlicher, an der Einfügung der Stbg. erweiterter Röhre; Schlund mit kurzen Deckklappen versehen. Fruchtkn. 5eyig. Kapsel 5klappig. — Der Fruchtkn. zeigt an der lebenden Pflanze beständig 5 Eychen, von denen aber meist 2 oder 3 nicht zur vollständigen Entwicklung kommen. Blkr. genau so, wie bei *Primula longiflora*; diese von Gaudin neuangestellte Gattung *Aretia* untersch. sich von *Primula* bloss dch die Zahl der Eychen.

1. *A. VITALIANA* (L.) Primelartige A. — Auf Felsen der höchsten GranitA., (in den südl. Walliser A.; auf dem Schlehorn im südl. Tyr.) Juli. Aug. *Primula Vitaliana* L. *Androsace Vitaliana* Lap. D. fl. 2. p. 96. Blkr. gelb.

7. *PRÍMULA* (L.) Primel. — K. 5sp. Blkr. tellerf. oder trichterf.; Röhre walzlich, an der Einfügung der Stbg. erweitert; Schlund mit Deckklappen versehen oder nackt. Fruchtkn. vieleiyig. Kapsel 5klappig.

1. Rotte. *ALEURITIA* Dub. bot. gall. 384. Die jüngern B. rückwärts zsgerollt, nach der Entwicklung flach, wenig runzelig und unterseits mehr oder weniger mit Mehl bestreut. Hüllblättchen an der Basis sackf.-verdickt. Deckklappen des Schlundes kurz, gefärbt.

1. *P. FARINOSA* (L.) Mehlstaubige P. — B. verkehrteyf.-länglich, stumpf-gekerbt, kahl, unterseits dicht-bepudert; Dolde reichbth.; KZähne eyf.; Blkr.Röhre am Schlunde mit kurzen Deckklappen versehen, meist anderthalbmal so lang, als der K. und Saum; Hüllblättchen lineal., an der Basis sackartig-verdickt. 4. Auf torfigen, sumptigen Wiesen, den Ebenen, Gebirgen und A., (dch d. g. AK. und die sie begleitenden Flächen von Oberschwaben, Oberbayern bis Oestr.; sodann im Norden in Mecklenburg, Pommern und Preussen; zerstreut bei Ansbach und Würzburg.) Juni-Aug. St. h. 14. Bth. fleischroth. Stbg. des langgriffeligen Geschlechtes in der Mitte der Röhre, des kurzgriffeligen an der Spitze der Röhre eingefügt. Var.:

β. denudata, B. unterseits ohne Puder. Diese nähert sich hinsichtl. der B. der *P. stricta* Hornem., (D. fl. 2. p. 103.), welche sich jedoch dch den bauchigen K. und den viel kleinern Blkr.-Saum, der fast 3mal kürzer, als seine Röhre ist, sattsam untersch.; diese hat Lehmann auf den Tyroler VorA. 1813 selbst gesammelt, sie wurde aber neuerlich nicht wieder gefunden.

2. *P. LONGIFLORA* (All. ped. t. 39. f. 3.) Langblumige P. — B. verkehrteyf.-länglich, schwach-gekerbt, kahl, unterseits dicht-bepudert; Dolde 2-5bth.; KZähne lanzettl.; Blkr.Röhre am Schlunde mit kurzen Deckklappen versehen, fast 3mal so lang, als der K. und Saum; Hüllblättchen lineal., an der Basis sackartig-verdickt. 4. Auf Triften der höchsten A., (in der Schw. nur bei

dem Gletschersee Matmor über Saas in Wallis; häufiger in Tyrol, Salzbg., Oberkärnth., Oestr.) Juni. Juli. St. h. 14. Blkr. fleischroth. Stbg. bei allen Exempl. am obersten Ende der Röhre eingefügt.

II. Rotte. *PRIMULASTRUM* Dub. bot. gall. p. 383. Die jüngern B. rückwärts zugerollt, von dünnerer Substanz, runzelig, flaumig oder filzig, unbestäubt. K. geschärft-kantig. Deckklappen am Schlunde kurz, meist mit der Basis des Saumes gleichfarbig. Hüllblättchen aus eyf. Basis pfriemlich.

3. *P. ACAULIS* (Jacq.) Stengellose P. — B. länglich-verkehrt-eyf., in den Bstiel verschmälert, gezähnt, runzelig, unterseits auf den Adern kurz h.; Bstiele wurzelst., 1bth. oder auf einem Schafte doldig; die Haare der Bthstielen länger, als der Querdurchmesser des Bthstiels; Zähne des geschärft-kantigen, fast 5sp. K. lanzettl., zugespitzt; Blkr. fast tellerf. mit flachen Zpsln des Saumes. 4. In Wäldern der VorA. und auf den Ebenen am Fusse der A. (von der Schw. dch Oberschwab., Oberbaiern bis Oestr.; wird als Seltenheit in Westphal., Mecklenb. und um Halle angegeben.) Blühet zu Ende des Winters und bis Anfang des Frühlings. St. h. 14. *P. veris* γ. *acaulis* L. *P. vulgaris* Sm. *P. grandiflora* Lam. *P. hybrida* Schrank. *P. sylvestris* Scop. *P. uniflora* Gmel. Bth. schwefelgelb, mit 5 safrangelben Flecken am Schlunde; selten, nach Gand., röthlich. Die kurz- und langgriffelige Form, wie bei den drei folgenden Var.:

β. *caulescens*, mit einem 2-3bth. Schafte. Diese Variet. ist zwar der folgenden Art ähnlich, unterscheidet sich aber durch die übrigen Merkmale, die beide Arten trennen, ohne Schwierigkeit.

4. *P. ELATIOR* (Jacq.) Garten-P. — B. eyf.-längl., oder eyf. an dem geflügelten und gezähnten Bstiel hinablaufend, runzelig, wellig-gekerbt, unterseits nebst dem Schafte und der Dolde kurz h.; Haare des Bthenstiels so lang, als dessen Querdurchmesser; Dolde reichbth.; Zähne des geschärft-kantigen K. eyf., zugespitzt; Blkr. trichterf. mit flachen Zpsln des Saumes; Hüllblättchen aus eyf. Basis pfriemlich. 4. In Wäldern und auf Waldwiesen. März. Apr. St. h. 14., die langgriffelige Form. *P. veris* β. *elator* L. Bth. schwefelgelb; var. aber mit einem dottergelben Kreise am Schlunde und auch in der Wildniss, wiewohl selten, mit purpurnen Bth.; in Gärten aber kultiv. man unzählige Abarthen, und von grosser Farbenmannigfaltigkeit und besonders ist darunter die Variet. *calycantha* merkwürdig, deren K., in eine Blkr. verwandelt, die Gestalt und Farbe der Blkr. angenommen hat. Die kurz- und langgriffelige Form ist wie bei der folgenden.

5. *P. OFFICINALIS* (Jacq.) Gebräuchliche P. — B. eyf. oder fast herzf. an dem geflügelten und gezähnten Bstiel hinablaufend, runzelig, wellig-gekerbt, unterseits nebst dem Schafte und der Dolde filzig-sammitig; Dolde reichbth.; Zähne des geschärft-kantigen, aufgeblasenen K. eyf., kurz zugespitzt; Blkr. trichterf. mit konkaven, glockiggestellten Zpsln des Saumes; Hüllblättchen

aus eyf. Basis pfriemlich. 4. Auf Wiesen und an lichten Wald O April und Anfangs Mai. St. h. 14. P. veris a. officinalis L. P. veris Lehm. An der kurzgriffeligen Form ist die Blkr.Röhre an der Spitze halbkugelig-aufgeblasen und die Stbg. sind dem Schlunde eingefügt, bei dem langgriffeligen Geschlechte sind die Stbg. mitten in der, über die Einfügung walzlich-erweiterten Röhre eingefügt. Bth. wohlriechend, citronengelb, mit 5 safrangelben Flecken am Schlunde, seltener lila.

6. P. SUAVEOLENS (Bertoloni Journ. bot. 1813 S. 76.) Wohlriechende P. — B. eyf. oder etwas herzf., an dem spärlich gezähnten Bstiel hinablaufend, wellig-gekerbt, unterseits schneeweissfilzig; Schaft und Dolde sammtig; Dolde reichbth.; Zähne des geschärft-kantigen, aufgeblasenen K. kurz-zugespitzt; Blkr. trichterf. mit konkaven, glockiggestellten Zpsln des Saumes; Hüllblättchen aus eyf. Basis pfriemlich. 4. Auf Bergwiesen des Littorale, (auf dem Monte Maggiore und Plavnik. Apr. Mai. P. Columnae Ten. cat. pl. hort. neap., Column. ecphr. p. 256. Abbildung.) — Blkr. wie bei der vorigen. D.

III Rotte. AURICULA Dub. bot. gall. p. 384. Die jüngern B. einwärts zsgerollt, nach der Entwicklung flach, fast fleischig, nicht runzelig. K. glockig oder länglich, stielrund. Blkr.Schlund ohne Deckklappen. Hüllblättchen eyf. Dolden der grössern Exemplare reichbth.; Bthstiele ungleich, die längern 2- oder 3mal so lang, als der K. Blkr.Zpsl zwar verkehrtherzf., aber doch nicht bis zum vierten Theil ihrer Länge ausgerandet.

6. P. AURICULA (L.) Aurikel. — B. verkehrteyf., gezähnt-ge-sägt, oder fast ganzrandig, am Rande bepudert oder dichtbewimpert mit kurzen drüsentragenden Haaren; Schaft kahl oder oberwärts, sowie die Bthstiele und K. bepudert; Hülle viel kürzer, als die Bthstielen, die Blättchen eyf.-stumpf; Schlund der Blkr. dicht-bepudert; Stbgf. des kurzgriffeligen Geschlechtes im Schlunde eingefügt; Kapsel etwas länger, als der K. 4. An Felsen der A. und VorA., auch in den die A. begleitenden Ebenen (ausser den A. auch auf dem Schwarzwalde und den Torfbrüchen von Oberbaiern und Oberschwaben.) Im Frühling an niedrigen O., auf den A. nach geschmolzenem Schnee. St. h. 15. Kommt vor: die B. kahl oder mit kurz-gestielten Drüsen bestreut, am Rande kurzbewimpert, aber nicht bepudert, oder daselbst schwach- oder so dicht bepudert, dass die Wimpern ganz mit dem Puder überdeckt sind. Stbg. der kurzgriffeligen Form an der Spitze der trichterförmigen Röhre und die der langgriffeligen an der Basis der walzlichen Röhre eingefügt. In Gärten prangt die Pf. mit purpurnen Bth. und in einem grossen Farbenwechsel, aber ein wildes Expl. mit purpurnen Bth. sah ich noch nicht. Var.:

β. ciliata, die Wimpern der B. länger: P. ciliata Morett. mem. I. S. 249. n. 16. t. 1. (nach Bertol.) wenn zugleich die B. mit kurzen drüsentragenden Haaren bestreut sind; an den K. dieser Variet. fehlt manchmal der Puder.

Die P. marginata Curt. meg. t. 191., P. crenata Lam. ill. 2. 98. f. 3., D. fl. 2. p. 112., liess ich hier weg, da es doch nicht ganz sicher ist, dass sie im Gebiete unserer Flora gefunden wurde.

Sie ist der *P. Auricula* ähnlich, aber nur halb so gross, die *B.* sind völlig kahl und nur am Rande mit einer weissen, bepuderten Linie eingefasst, tiefer-geägt und die *Bth.* kleiner und rosenroth.

8. *P. PUBESCENS* (Jacq. miscellan. B. 1. S. 159., nach einem Expl. von Wulfen selbst in der Sammlung von Froelich.) Flaumige *P.* — *B.* verkehrt-eyf., länglich, an der Spitze gezähnt-geägt, am Rande mit kurzen, drüsentragenden Haaren dichtbewimpert; Schaft kahl oder oberwärts nebst den *Bthstielchen* und dem *K.* bepudert; *Hülle viel kürzer, als die Bthstielchen, Blättchen eyf., stumpf; Schlund der Blkr. dicht-bepudert; Stbgf. des kurzgriffligen Geschlechtes etwas über der Mitte der Röhre eingefügt, Kapsel* 4. An Felsen, (häufig bei Pregraten unweit Windisch Matray in Tyrol, und auf den Pregratischen A., Wulfen.) April, auf den A. später. *P. helvetica* Schleicher pl. exsicc. (kultiv. Explare nach Em. Thomas Bemerkung.) *Bth.* purpurn. Aehnlich der *P. Auricula*, aber kleiner, die Röhre der *Blkr.* schlanker und die Einfügung der *Stbgf.* verschieden. D.

9. *P. RHAETICA* (Gaudin. fl. helv. 2. S. 91.) Rhaetische *P.* — *B.* länglich-verkehrt-eyf., oder verkehrteyf., an der Spitze gezähnt-klein-geägt, am Rande dicht-bewimpert mit kurzen drüsentragenden Haaren; Schaft und *Bthstielchen* kahl, oder mit ganz kleinen sitzenden Drüsen bestreut; *Hülle viel kürzer, als die Bthstielchen, Blättchen eyf., stumpf; Schlund der Blkr. nicht bepudert; Stbgf. des kurzgriffligen Geschlechtes unter der Spitze der Röhre eingefügt.* 4. In den rhätischen A. Apr. Mai. *P. alpina* Reichenb. ic. f. 1121. Sehr ähnlich der *P. villosa*, aber mit anderem Ueberzug, ausserdem sind die *B.* mehr länglich, weniger gezähnt, und der *K.* merklich kleiner. *Bth.* blass-purpurn, getrocknet violett. S.

10. *P. PEDEMONTANA* (Thomas. pl. exsicc.) Piemonter *P.* — *B.* länglich oder verkehrt-eyf., *ausgeschweift-schwach-gezähnt*, am Rande fransig von kurzen, drüsentragenden Haaren: *Schaft und Bthstielchen mit ganz kurz-gestielten, klebrigen Drüsen bestreut; Hülle viel kürzer, als die Bthstielchen, Blättchen eyf., stumpf; Schlund nicht bepudert; Stbgf. des kurzgriffligen Geschlechtes etwas unter der Mitte der Röhre eingefügt, Kapsel so lang, als der K.* 4. Schweizer A. (Walliser und Bündner Gebirge, Hegetschweiler; Valle de Lanzo in Frölich's Sammlung.) Jun. Jul. Drüsen am Rande der *B.* meist röhlich. S.

11. *P. VILLOSA* (Jacq. fl. austr. 5. S. 41.) Zottige *P.* — *B.* verkehrteyf. oder rundlich, in den *Bstiel* zugezogen, *von der Mitte bis zur Spitze gezähnt-geägt, beiderseits klebrig-flaumig*, mit drüsentragenden Haaren bewimpert; *Schaft und Bthstielchen kurz-zottig* von gegliederten, mit klebrigen Drüsen besetzten Haaren; *Hülle viel kürzer, als die Bthstielchen, Blättchen eyf., stumpf; Schlund nicht bepudert; Stbgf. des kurzgriffligen Geschlechtes ein wenig über der Mitte der Röhre eingefügt; der K. nach dem Verblühen 2 mal länger, als die Kapsel.* 4. Auf Felsen

der höhern GranitA., (auf den südl. A. der Schw. und Tyrols und den A. zw. Kärnth. und Krain.) Mai, auf den A. später. *P. villosa* Jacq., nach einem Expl. aus Wulfen's Hand, welches in Frölich's Herb. aufbewahrt wird, J. fl. a. app. t. 27., die obere Fig. mittelmässig, die untere sehr schlecht. St. h. 24. (gehört unter die Zahl der letztern.) *P. villosa* Willd. *P. ciliata* Schrank., Lehmann, D. fl. 2, 113., (nicht *P. villosa* D. fl. 2, 112., welche zu *P. latifolia* gehört.) *P. hirsuta* DC., er beschreibt das kurzgriffelige Geschlecht. Rb. ic. f. 854. das kurzgriffelige Geschlecht. *P. villosa* Rb. ic. f. 855. das langgriffelige Geschlecht. *P. viscosa* Rb. fl. exc. (DC. zieht die *P. viscosa* Vill. zu seiner *P. viscosa*, nämlich der *P. latifolia* Lap.) *P. viscosa* Gaud., nicht DC. — Bth. hellpurpurn, getrocknet violett. Var., wiewohl selten, mit weissen Bth.: *P. nivea* der Gärt. *P. villosa* var. *nivea* bot. mag. 1161. *P. ciliata* Rb. — Die *P. villosa* ist im Garten wegen ihrer klebrigen Haare stets mit Theilchen von Erde und Sand beschmutzt.

12. *P. LATIFOLIA* (Lapeyrouse abr. S. 97.) Breitblättrige *P.* — *B.* verkehrteyf. oder längl.-verkehrteyf., in den Bstiel verschmälert, von der Mitte bis zur Spitze gezähnt-gesägt, beiderseits mit kurzen Haaren bestreut und mit drüsentragenden Haaren bewimpert; Schaft und Bthstielchen mit kurzen, drüsentragenden Haaren bestreut; Hülle viel kürzer, als die Bthstielchen, Blättchen eyf., stumpf; Schlund spärlich bepudert; Stbgf. des kurzgriffeligen Geschlechtes dem Schlunde eingefügt; K. nach dem Verblühen ein wenig kürzer, als die Kapsel. 4. Auf den Schweizer A., (Graubünden, Engadin, Wallis.) Jun. Jul. *P. graveolens* Hegetschw. fl. der Schw. *P. villosa* M. und K. D. fl. *P. viscosa* DC. (er beschreibt das langgriffelige Geschlecht.) *P. hirsuta* All., nach DC. (aber das Expl. von *P. hirsuta* in Willd. Herbar., von Balbis mitgeteilt, unter N. 3483. fol. 5. aufbewahrt, gehört zu *P. pedemontana*.) — Ob die *P. viscosa* Villar's zu *P. latifolia* oder zu *P. villosa* Jacq. gehört, lässt sich aus dessen Beschreibung nicht ermitteln. S.

12. *P. VENUSTA* (Host.) Reizende *P.* — *B.* verkehrteyf., gezähnt-gesägt oder fast ganzrandig, beiderseits kahl; Schaft kahl, oberwärts nebst der Dolde spärlich-, die K. am Rande und inwendig dicht-bepudert; Hülle vielmal kürzer, als die Bthstielchen, Blättchen eyf., stumpf; K. 3mal kürzer, als die Blkr.Röhre, Zähne eyf., innen und am Rand bepudert; Kapsel ohngefähr so lang, als der K. 4. Auf Gebirgen und den VorA., (bei Idria.) Apr. Mai. St. h. 54. Bth. purpurn, getrocknet satt-violett. Der *P. Auricula* sehr ähnlich, aber die *B.* beiderseits kahl, am Rande mit kurzgestielten, entfernten Drüsen besetzt, kaum gewimpert, Schaft oberwärts nebst den K. mit sehr spärlichem Puder bestreut und die K. nur am Rande und inwendig dicht-bepudert. D.

14. *P. CARNIOLICA* (Jacq. a. app. t. 4.) Krainer *P.* — *B.* verkehrteyf. oder länglich, ausgeschweift-gekerbt oder ganzrandig nebst dem Schafte, den Bthstielchen und K. kahl; Hülle vielmal kürzer, als die Bthstielchen, Blättchen eyf., stumpf; K. 3 mal

kürzer, als die Blkr.Röhre, Zähne eyf. *kahl*; Kapsel ohngefähr so lang, als der K. 2. Auf Gebirgen und A., (Krain.) Mai. Jun. St. h 54. *P. integrifolia* Scop. Bth. purpurn, getrocknet rothviolett. D.

IV. Rotte *ARTHRITICA* Dub. bot. gall. p. 384. Die jüngern B. einwärts zugerollt, die ausgebildeten flach, fast fleischig. Dolde armblth., der Schaft nicht selten blth.; Bth. sehr kurz gestielt oder sitzend; Hüllblättchen länglich oder lineal-länglich, stumpf, viel länger, als die Bthstielchen. Blkr.Zpfl. halb-2sp., mit spreitzenden Lappen.

15. *P. SPECTABILIS* (Trutt., nach R. und S.) Ansehnliche *P.* — *B.* elliptisch-lanzettl. oder lanzettl., *ganzrandig, kahl, knorpelig-berandet*, mit sehr kurz-gewimpertem oder klein-gezähneltem Rande; Schaft von Drüsen etwas rauh, 1-3bth.; *Hüllblättchen lineal., so lang, als die Bthstielchen und länger*; *K. röhrig-glockig, kürzer, als die Blkr.Röhre.* 2. Im Kiese der A., in die VorA. herabsteigend, (Salzb., Tyrol, Kärnth., Krain, Steyerm., Oestr.) Jul. Aug. *P. integrifolia* St. h. 24. (nicht gut, daher zweifelhaft.) *P. integrifolia* L. nach dem Citate aus Clusius. Bth. purpurn. Var.:

a. ciliata, Rand der B. knorpelig und ausserdem mit kurzen Wimpern besetzt: *P. integrifolia* J. a. t. 327. Rb. ic. 1. f. 69., wo der knorpelige Rand ausgelassen ist, der aber niemals fehlt. *P. Clusiana* Tausch.

β. denticulata, Rand der B. knorpelig, fein-gezähnelte, ohne Wimpern: *P. integrifolia* Tausch. *P. calycina* Rb. ic. 1. f. 70. D. fl. 2. p. 116., nicht Gaud., eine Form mit spitzlichen KZähnen. D. Die Variet. mit gezähnten B. sah ich noch nicht.

16. *P. INTEGRIFOLIA* (L., nach dem Citat aus Haller und nach den StandO. der Schweizer A. und Pyrenäen.) Ganzblättrige *P.* — *B.* elliptisch oder länglich, kahl oder oberseits zerstreut-behaart, *am* (nicht knorpeligen) *Rande, sowie der Schaft zottig*, Schaft 1-3bth.; *Hüllblättchen lineal., länger, als die Bthstielchen*; *K. röhrig-glockig, kürzer, als die Blkr.Röhre.* 2. An moorigen O. der höchsten A. in der Sch., (A. der östlichen Schw., aber bisher noch nicht in D.) Jul. Aug. DC. fl. fr. und Gaud. *P. Candolleana* Rb. ic. 6. f. 803. Warum man den von den ausgezeichnetsten Schriftstellern, DC. und Gaud., adoptirten Namen abändern sollte, sehe ich doch nicht ein. Linne begreift unter seiner *P. integrifolia* die Pflanze der Schweiz, der Pyrenäen u. der Steyermärk. Alpen, aber die angeführten beiden Autoren beschrieben unter diesem Namen jene in der Schweiz und den Pyrenäen einheimische, und zwar schon viele Jahre vor Reichenbach, nicht aber die Steyermärkische. S.

17. *P. DINYANA* (Lagger in der Regensb. bot. Ztg. 22. S. 670.) Diny's *P.* — *B.* länglich- oder lanzettl. - *keilsf., vorne ausgeschweift oder gezähnelte, mit grannenlosen Zähnen*, von sehr kurzen, locker aufgestreuten Haaren flaumig, am Rande dicht- und kurz-bewimpert; Schaft 2-4bth., Bth. kurz-gestielt; *Blättchen* der Hülle eyf.-lanzettl., *länger, als die Bthstielchen*; *K. glockig.* 2.

Auf den höheren A. der Schw., (Albula in Graubünden.) Jun. Jul. P. Muretiana Moritzi Fl. der Schw.; nach Moritz's Bemerkung ist der von ihm gegebene Name der ältere. P. Mureti von Charpentier briefl. Mittheilungen. Bth. purpurn. S.

18. P. GLUTINOSA (Wulf. bei J. a. app. t. 26. 1778.) Klebrige P. — B. keilig-lanzettl., stumpf, klebrig und nebst dem Schafte völlig kahl, von der Mitte an bis zur Spitze gesägt, Sägezähne grannenlos; Schaft 3-5bth., Bth. sitzend; Hüllblättchen oval, so lang, als der K., und länger; K. röhrig-glockig. 4. An feuchten O. der höhern A., (Tyrol, Kärnth., Steyerm.) Jun.-Aug. P. glutinosa L. Sohn. St. h. 24., nicht gut. Bth. satt-violett. D.

19. P. ALLIONI (Loiseleur notice S. 38.) Allion's P. — B. verkehrteyf., stachelspitzig-gezähnt oder fast ganzrandig, beiderseits, sowie der Schaft und die K. drüsig-haarig, klebrig; Schaft 1-2bth., mit ganz kurzgestielten Bth.; Blättchen der Hülle keilf., länger, als die Bthstielchen. 4. An Kalkfelsen, (Berg Castellazo di Paneveggio in Fiemme und von da östl. an der obersten Baumgrenze, Facchini.) Jun. P. glutinosa All. auct. D.

20. P. FLOERKEANA (Schröd. bei Krünitz, nach Lehm. monogr.) Flörkens P. — B. verkehrteyf., an der Basis keilig und nebst dem Schafte kahl, etwas klebrig, vorne abgerundet und fast von der Mitte an gekerbt-gezähnt, Zähne zugespitzt-stachelspitzig; Schaft 3-5bth., Bth. kurz-gestielt; Hüllblättchen oval-länglich, ohngefähr so lang, als der K.; K. röhrig-glockig. 4. Auf den höchsten A., (südl. Tyrol, Facchini! Oberkärnth., Obersteyerm.) Jul. Aug. Lehm. Mon. prim. t. 8. Blkr. purpurn. Die langgriffelige Form sah ich noch nicht. D.

21. P. MINIMA (L.) Kleinste P. — B. verkehrteyf.-keilig und nebst dem Schafte kahl, vorne abgeschnitten-stumpf und gekerbt, Kerben zugespitzt-stachelspitzig; Schaft 1-2bth., Bth. fast sitzend; Hüllblättchen lineal., ohngefähr so lang, als der K.; K. röhrig-glockig. 4. An felsig., feuchten O. der A., (Gotthard und von Graubünden dch Tyrol, Salzbg., Kärnth., Steyerm., Oestr., auf der Schneekoppe in den Sudet.) Jul. Aug. St. h. 29. Bth. rosenroth, seltner weiss. Var. wie andere mit schmälern und breiteren Lappen der Zpfl der Blkr; die letztere ist P. Sauteri Schultz in der Regensb. bot. Ztg. und:

β. pubescens Bl. und F. comp. Fl. germ. Die B. anderthalb Zoll lang, etwas flaumig; P. truncata Lehm. Mon. t. 8. Auf den Salzbg. A. — Sah ich noch nicht.

Die Primula calycina Dub. in Gand. fl. helv. 2. S. 94. habe ich weggelassen, weil sie im Gebiete unserer Fl. noch nicht beobachtet wurde.

8. HOTTÓNIA (L.) Hottonie. - - K. 5th.; sonst Alles, wie bei Primula.

1. H. PALUSTRIS (L.) Sumpf-H. — Tr. endsändig, quirlig; Bth

gestielt; Gleider der Traube gleich; Blkr. viel länger, als der K.; B. kammf.-fiedersp. 4. In Gräben, Sümpfen und langsam fließenden Wassern. Mai. Jun. Schk. t. 33. Bth. weiss oder hellrosenroth. Bei dem kurzgriffeligen Geschlechte sind die Stbg. am Rande des Schlundes eingefügt, die Stbf. sind 4 mal länger, als die Stbk., ragen weit hervor, der Gf. ist so lang, als die Röhre; bei dem langgriffeligen Geschlechte sind die Stbg. in der Mitte der Röhre eingefügt, die Stbf. kaum von der Länge der Stbk. und ragen nicht über die Röhre hervor, der Gf. aber ist anderthalbmal so lang, als die Röhre und tritt hervor.

9. CORTUSA (L.) Cortuse. — K. 5th. Blkr. trichterf., mit kurzer Röhre, die Stbg. dem Schlunde eingefügt, auf einem hervortretenden Ringe entspringend. Fruchtkn. vieleig. Kapsel 2klappig, Klappen an der Spitze 2sp.

1. C. MATTHIOLI (L.) Matthiols C. — 4. An nassen O., an Rändern von Quellen und Giesbächen der ATHäler und VorA., in die untern ARegionen herabsteigend. (Schwab., Bayern, nördl. Tyrol und Steyermark.) Mai. Jun. J. ic. rar. t. 32. Bth. purpurn. D.

10. SOLDANELLA (L.) Drottelblume. — K. 5th. Blkr. trichterf.-glockig; Saum 5sp., Zpfl vielsp. Kapsel an der Spitze rundum-aufspringend, nach abgefallenem Deckelchen vielzählig.

1. S. MONTANA (Willd.) Berg-D. — B. rundlich, seicht-entfernt-gekerbt; *Schaft 2-4bth., Bthstielchen flaumig, Flaum sehr kurz und drüsentrag.*; Blkr. bis zur Mitte gespalten, Schlundschuppen ohngefähr so lang, als die Stbf.; Gf. so lang, als die Blkr. oder länger. 4. An torfligen, moorigen O., auf Gebirgen und VorA., (Steyerm., Salzbg., Oestr., Böhmen.) Mai.-Jul. S. alpina Schm. Bth. getrocknet violett. Stbf. halb so lang, als das Stbk. D.

2. S. ALPINA (L.) Alpen-D. — B. rundlich-nierenf., ganzrandig oder etwas ausgeschweift; *Schaft 2-4bth.; Bthstiele von kleinen, sitzenden Drüsen etwas rauh*; Blkr. bis zur Mitte gespalten, Schlundschuppen so lang, als die Stbf.; Gf. so lang, als die Blkr. oder länger. 4. Auf den A. bis zum ewigen Schnee; auch in die VorA. hinabsteigend, (dch die g. AK., sodann auf dem Feldberge im Schwarzw. und auf den Mähr. Karpat.) Mai, am schmelzenden Schnee bis gegen Herbst. St. h. 20. S. Clusii Schm., nicht Gaud. Blkr. violett, mit dunkleren Streifen, welche auf den Zpfln einen Mittelnerven vorstellen. Stbf. halb so lang, als das Stbk.

3. S. PUSILLA (Baumgartn.) Niedrige D. — B. herz-nierenf., etwas ausgeschweift; *Schaft 1bth.; Bthstielchen von kleinen, sitzenden Drüsen etwas rauh*; Blkr. kaum auf den dritten Theil gespalten, Zpfl gerade, Schlundschuppen fehlend; Gf. kürzer, als die Blkr. 4. Auf den höchsten A., (Schw., Tyr., Salzbg., Kärnth.,

Steyerm.) Blühet mit den vorhergeh. St. h. 41. S. Clusii Gaud., nicht Schm. Farbe der Blkr. fast kupferroth, ein wenig in das Bläuliche spielend, Zpfl gerade, nicht auswärts-gebogen. Stbf. fast von der Länge der an der Basis beiderseits mit einem Stachelspitzchen versehenen Stbk.

4. S. MINIMA (Hopp. bei St. h. 20.) Kleinste D. — B. *kreisrund, Schaft 1bth*, Bthstielchen flaumig, Flaum sehr kurz, drüsentrag.; Blkr. bis auf den dritten Theil gespalten, Zpfl an der Spitze abstehend, Schuppen am Schlunde sehr kurz oder fehlend; Gf. kürzer, als die Blkr. 4. Auf den A. und VorA., (Tyrol, Kärnth., Krain, Steyerm.) Jun. Jul. Blkr. hell-lila, inwendig purpurn-gestreift, die Streifen an der Basis der Zpfl verschwindend. Stbf. fast von der Länge der Stbk.; diese an der Basis der Zpfl beiderseits abgerundet. D.

11. CYCLAMEN (L.) Erdscheibe. — K. 5th. Blkr.Röhre kurz, glockig; Saum 5th., zurückgebrochen. Kapsel 5klappig.

1. C. EUROPAEUM (L.) Europäische E. — Blkr. am Schlunde nicht gezähnt, Zpfl spitz; B. *ausgeschweift oder klein-gekerbt*, rundlich oder eyf, mit einem Spitzchen, an der Basis tief-herzf., mit spitzer Bucht, *Kerben grannenlos*. 4. In Bergwäldern und auf den VorA., (dch die g. AK. bis Oestr. und von da nach Böhm. und Mähr.) Aug.-Oct. J. a. t. 401. St. h. 34. Bth. purpurn. — Das C. comm. Mill., welches nach Rb. in der Schw. vorkommt, untersch. sich von C. europaeum leicht dch die kreisrund-herzf., sehr stumpfen, nicht bespitzten, kaum ausgeschweiften B. und die rundlich-eyf., abgerundet-stumpfen Blkr.Zpfl. Ein Schweizer Expl. sah ich noch nicht.

2. C. HEDERIFOLIUM (Ait.) Ephenblättrige E. — Blkr. *Schlund 10zählig*, Zpfl spitz; B. eyf., gekerbt und eckig, an der Basis tief-herzf., mit geschlossener Bucht, *Kerben und Ecken grannenlos*. 4. An felsigen, sehr dürren O., (im Wallis.) Blühet im Spätherbste, vor der Entwicklung der B. C. neapolitanum Tenore. Clus. hist. 1. 265. links. Bth. purpurn. S.

3. C. REPANDUM (Sibth. und Sm.) Ausgeschweifte E. — Blkr. Schlund ungezähnt, Zpfl spitz; B. herzf., *ausgeschweift und eckig*, *Ecken und Kerben kurz-stachelspitzig*. 4. In Hainen, (Istrien.) Apr. C. hederifolium Tenore, nach einem Expl. vom Autor in der Sammlung von Martius. Bth. purpurn. Unser Cyclamen repandum gehört nach der Beschreibung Bertoloni's zu C. vernum desselben.

12. SÁMOLUS (L.) Pungen. — K. halboherst., 5 sp. Blkr.-Röhre kurz-glockig; Saum 5th., weit abstehend. Stbg. 10; die 5 fruchtbaren am Grunde der Blkr. eingefügt, den Blkr.Zpfln gegenst.; die 5 unfruchtbar. höher zw. den Zpfln eingefügt. Kapsel 5klappig.

1. *S. VALERANDI* (L.) Valerand's P. — Aufrecht; B. verkehrt-eif., oder länglich, stumpf; Tr. zuletzt verlängert; die DeckB. an der Mitte der Bthstielen; Kapsel fast kugelig. 2. An feuchten salzhaltigen O., in Gräben, (stw. dch. das Gebiet.) Jun.-Aug. Schk. t. 40. Bth. weiss.

13. *GLAUX* (L.) Milchkraut. — K. glockig, 5sp., farbig. Blkr. fehlend. Stbg. auf dem Grunde des K. eingefügt, die KZpfl. gegenst. Kapsel 5klappig.

Diese Gattung ist hinsichtlich des Baues der Bth. verwandter mit den Amarantaceen und Paronychieen, als mit den Primulaceen; mit diesen stimmt sie bloss in der Gestalt des Samens und in dem geraden mittelpunktst. Keime überein.

1. *G. MARITIMA* (L.) Meerstrands-M. — An feuchten, salzhalt. O., (am Strande der Ost- und Nordsee und an den Salinen des Binnenlandes.) Mai. Jun. Schk. t. 50. Bth. rosenfarb. D.

XCI. Ordng. GLOBULARIEEN. DC. fl. fr. 3. p. 427.

K. 5sp., in der Knospenlage dachig, bleibend. Blkr. 1blättrig, unterweibig, 5sp., meist ungleich. Stbg. 4, der Blkr.Röhre eingefügt und mit den Zpfln abwechselnd, das fünfte zw. den obern Zpfln fehlend. Fruchtkn. frei, 1fächerig, 1eigig; Eychen hängend. Gf. 1. N. 2sp. Frucht schlauchig, nicht aufspringend. Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Eyweiss fleischig.

1. *GLOBULARIA* (L.) Kugelblume. — Gattungscharakter so wie der der Ordn. — Bth. violett-blau, seltner als Variet. weiss.

1. *G. VULGARIS* (L.) Gemeine K. — Krautig; W. vielköpfig; WB. spatelig, ausgerandet oder kurz-3zählig; StB. zahlreich, lanzettl. 2. Auf trocknen Wiesen und felsigen, unkult. Hügeln, auf Kalkboden. Mai. Jun. St. h. 27.

2. *G. NUDICAULIS* (L.) Nacktstengelige K. — Krautig; W. vielköpfig; WB. länglich-keilig, an der Spitze abgerundet-stumpf; die St. nackt oder mit 1-2 entfernten Schuppen besetzt. 2. An felsig., fruchtbaren O. der KalkA., hie und da mit den Flüssen herabsteigend, (dch. die g. AK. und als Flüchtling im Isarbette bei München.) Mai-Juli. J. a. t. 230.

3. *G. CORDIFOLIA* (L.) Herzblättrige K. — Halbstrauchig, liegend, fast kriechend; B. verkehrt-eif., hinten keilig-verschmälert, an der Spitze sehr stumpf, ganzrandig, ausgerandet und 3zählig. 2. An kiesig., dürrn O. der A., auch in niedrigeren Regionen, (dch. die g. AK. und die die A. begleitenden Niederungen, südl. bis Triest.) Mai. Jun., auf den A. später. J. a. t. 245.

XCII. Ordng. PLUMBAGINEEN. Juss. gen. 92.

K. 5zählig, gefaltet, bleibend. *Blkr.* 1blättrig, regelmässig, mit 5th. Saume; oder 5blättrig, mit benagelten Blb. *Stbg.* 5, bei den 1blättrigen unterweibig, bei den vielblättrigen an die Nägel der Blb. angewachsen, in der Knospenlage gerade. *Fruchtkn.* frei, 1fächerig, 1eyig; Eychen von der Spitze eines verlängerten Nabelstranges herabhängend. *Gf.* 5; oder 1, mit 5 N. Kapsel an der Spitze aufspringend oder nicht aufspringend. Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Eyweiss fleischig.

1. **STÁTICE (L.)** Grasnelke. — *K.* oberwärts trockenhäutig. *Blkr.* 5blättrig, die Blb. manchmal an der Basis zsgewachsen. *Gf.* 5. Kapsel nicht aufspringend.

1. Rotte. *ARMERIA* DC. fl. fr. 3. p. 419. Bth. in Köpfchen zsgestellt, von einer gemeinschaftl., dachigen Hülle bedeckt. Die äussern Hüllblättchen an der Basis abwärts in eine walzliche Scheide vorgezogen. Das Köpfchen aus kurzen, 2-6blh. Träuchchen zsgesetzt; die einzelnen Bth. mit einem durchsichtigen DeckB. gestützt. — Die verwickelten Arten dieser Rotte bedürfen einer weitem Beobachtung, wesswegen ich die unserer Flora hier so vortrage, wie ich sie einst in der bot. Ztg. 6. 2. p. 689. beschrieb. In der D. fl. habe ich sie mit meinem Freunde Mertens, wie ich mich nun überzeugt habe, unpassend zusammengezogen.

1. **S. PLANTAGINEA (All., mit Ausschl. des Syn. von Jacq.)** Wegerichblättrige G. — *St.* 1köpfig, nackt; *B.* lineal.-lanzettl. oder lanzettl., zugespitzt, an der Basis in den Bstiel verschmälert, 2-7nervig; die äussersten Hüllblättchen haarspitzig, die innern sehr stumpf, dch den auslaufenden Nerven kurz-stachelspitzig; Bthstielchen von der Länge der Röhre des zottig-gerieften K. *) *Blb.* abgerundet oder abgeschnitten. 4. An sandigen O., (bisher bloss auf dem Sande und im Kieferwalde zw. Mainz und Nieder-Ingelheim, aber in Menge; sodann auf der südl. Seite der Walliser A.) Jun. Jul. *Armeria plantaginea* Willd. D. fl. 2. p. 486. Bth. rosenfarb. Allion's Pflanze ist sicherlich dieselbe, wie die unsrige, was bei Turin gesammelte Explare bezeugen. *Armeria scorzonrifolia* Willd. untersch. sich jedoch dch die grössern Köpfchen, die lilafarbigten Bth., dch Bthstielchen, die nur halb so lang, als die KRöhre sind und die tiefer-gestutzten Blb.

2. **S. ELONGATA (Hoffm.)** Verlängerte S. — *St.* 1köpfig, nackt; *B.* lineal., spitzlich, 1nervig, gewimpert; die äussersten Hüllblättchen haarspitzig, die innern sehr stumpf, dch den auslaufenden Nerven stachelspitzig; Bthstielchen von der Länge der Röhre des

*) Die KRöhre hat bei mehreren Arten zw. den zottigen Riefen kahle Zwischenräume, und diese nenne ich zottig-gerieft; bei andern Arten sind die Zwischenräume auch behaart und die Röhre wird durchaus zottig. An getrockneten Explaren ziehen sich jedoch die Zwischenräume so stark zusammen, dass man diese Merkmale nur schwierig findet.

zottig-gerieften K.; Blb. ungeth., klein-gekerbt oder ein wenig ausgerandet. 4. An sandig. O., (stiw. dch das g. Geb.) Fängt schon im Mai an, hin und wieder zu blühen und blühet sodann bis in den Herbst. *S. Armeria* L., „in Gärten mit Sandboden gepflanzt schmückt sie dch ein fortwährendes Blühen“ sagt Linn. *S. Armeria* β , *elongata* DC. *S. Armeria* St. h. L., Pollich und der meisten deutsch. Aut. *S. arenaria* Pers. (nach DC.) *Armeria vulgaris* Willd. — D. fl. 2. p. 487. — Bth. rosenfarben. *A. Littoralis* Willd. ist nicht verschieden. Var.:

β . *pubescens*, Schaft flaumig; *Armeria vulgaris* γ . *pubescens* Detharding.

3. *S. PURPUREA* (Koch.) Purpurnblüthige G. — *St. 1köpfig*, nackt; *B. lineal.*, stumpf, *1nervig*, an der Basis gewimpert; die äussersten Hüllblättchen stumpf, stuchelspitzig, die inneren sehr stumpf, wegen des vor der Spitze verschwindenden Nerven *wehrlos*; Bthstielchen von der Länge der Röhre des zottig-gerieften K.; Blb. abgeschnitten. 4. Auf Triften und schlammigen Wiesen, (bisher bloss auf der Riede bei Memmingen.) Jul. Aug. *Armeria purpurea* Koch. bot. Ztg. Untersch. sich sogleich dch die satt-purpurnen Bth. Schaft verlängert, wie bei *S. elongata*, immer kahl. Hülle wie die bei *Armeria maritima*. Das DeckB. der ersten Bth. der Träubchen ist kaum länger, als die Hälfte des K., das der zweiten so lang, als die Bthstielchen; bei *S. maritima* erreicht das DeckB. der ersten Bth. die Länge des K. Saumes, das der zweiten die der KRöhre, und die Blkr. sind lila. D.

4. *II. MARITIMA* (Miller dict. n. 3.) Seestrands-G. — *St. 1köpfig*, nackt; *B. lineal.*, *einnervig*, stumpf, am Rande gegen die Basis zu bewimpert; die äussersten Blättchen des HK. grannenlos oder mit einer kurzen, dicken, krautigen Granne endigend, die inneren sehr stumpf, wegen des vor der Spitze verschwindenden Nerven *wehrlos*; Bthstielchen so lang, als die überall zottige Röhre des K.; Blb. ausgerandet. 4. Am Meeresstrande, (bei Cuxhaven, Sonder.) Jun. Jul., seltener wiederum im Herbst. Bth. lila. *St. Armeria* Smith. Flor. brit., Engl. bot. t. 226., Hoffm. D. fl. *S. Armeria* β . DC. fl. fr. suppl. *Armeria maritima* Willd. en. h. berol. Koch in der Regensb. bot. Ztg. Bth. lila. Untersch. sich von *Statice elongata*: *B.* stumpf, sowie alle Hüllblättchen, von welchen nur die äusseren, 1-2, öfters mit einer und zwar stumpfen, krautigen Stachelspitze versehen sind; der K. ist durchaus zottig, besonders auffallend ist die Bthezeit, die bloss einen Monat dauert und nicht den ganzen Sommer hindurch, sowie die nur 3-4 Zoll langen, gleichhohen Schäfte, welche sich bei tausend und tausend Expl., die zur Einfassung der Gartenbeete benutzt werden, auch auf dem fettesten Boden niemals verlängern. D.

5. *S. ALPINA* (Hopp.) Alpen-G. — *St. 1köpfig*, nackt; *B. lineal-lanzettl.* oder *lineal.*, kahl, meist *3nervig*; die äussersten Hüllblättchen stumpf, sehr kurz-stachelspitzig, die inneren sehr stumpf, wegen des vor der Spitze verschwindenden Nerven *wehrlos*; Bthstielchen halb so lang, als die Röhre des zottig-gerieften

K.; Blb. ausgerandet. 4. Auf Triften der A., (Wallis, Tyrol, Kärnth., Steyerm., Oestr.) Jul. Aug. S. *Armeria* γ . *alpina* DC., mit Ausschl. des Syn. Mill., (dessen Pflanze pfriemliche B. hat.) *Armeria alpina* Willd. D. fl. 488. St. h. 51. Bth. rosenfarben. Alle von mir untersuchten Explare waren ganz kahl. Die S. *Armeria* α . *alpina* Gaud. mit behaartem Schafte und gewimperten B. sah ich noch nicht.

H. Rotte. LIMONIUM Dub. bot. gall. p. 387. Bth. ährig, Aehren einerseitswendig. Die WB. rosettig.

6. S. GMELINI (Willdenow. Spec. pl. 1. f. 1524.) Gmelin's G. — B. länglich-eyf. oder verkehrteyf., stachelspitzig, in den Bstiel verschmälert, kahl, *einnervig*; St. aufrecht, stielrund, kahl oder flaumig, von der Mitte an ästig-rispig; *Aeste sehr abstehend, die Aestchen zurückgebogen*, die untersten Aeste unfruchtbar; die Aehren einerseitswendig, Bth. dicht aneinandergestellt; das innere DeckB. breit-trockenhäutig-berandet; Zähne des K. eyf., spitz. 4. Am Strande des Adriatischen Meeres im Oestreichischen Littorale. Jul. Aug. Bth. violett-bläulich. D.

7. S. LIMONIUM (L. spec. 394.) Meer-G. — B. länglich oder verkehrteyf., stachelspitzig, in den Bstiel verschmälert, kahl, *einnervig*; St. aufrecht, stielrund, kahl, oberwärts ästig; *die Aeste aufrecht-abstehend, fast ebensträussig*, die Aestchen zuletzt herabgebogen, die untersten Aeste unfruchtbar; Aehren einerseitswendig, Bth. dicht aneinandergestellt; das innere DeckB. breit-trockenhäutig-berandet; Zähne des K. eyf., spitz. 4. Am Strande der deutschen Nordsee. Aug. Sept. Fl. d. t. 345. — Die S. Behn Dreyer fl. exc. hafn. S. 121., welche im benachbarten Dänemark und Schweden vorkommt, unterscheidet sich von St. Limonium dch aufrechte, kaum gekrümmte Aehren und auseinandergerückte Bth. D.

8. S. GLOBULARIAEFOLIA (Desfontaines fl. atlant. 1. S. 274.) Kugelblumenblättrige G. — Kahl; B. länglich-spatelf. stachelspitzig, in den Bstiel verschmälert, *3-5nervig*; St. stielrund, *glatt, rispig*, die unteren Aeste unfruchtbar; Aehren einerseitswendig, locker; Saum des K. 5 th., Zpfl länglich, abgerundet-stumpf, nach dem Verblühen weit-abstehend. 4. Am Strande des Adriatischen Meeres, (auf den Dünen von Primiero zwischen Grado und dem Ausflusse des Isonzo, Tommas.) Mai-Jul. Reichenb. ic. f. 375. Bth. blau-violett. D.

9. S. CASPIA (Willdenow. en. h. berol. 1. S. 336.) Caspische G. — B. verkehrteyf. oder lanzettl.-keilf., in den Bstiel verschmälert, kurz-stachelspitzig; *3nervig*, kahl; St. *sehr ästig, rispig, knötig-rauh*, die unteren Aeste unfruchtbar; die kurzen Aehren dicht-bth.; die äusseren DeckB. von der Basis, die inneren von der Mitte bis zur Spitze weiss-trockenhäutig; die Zähne des K. eyf., kurz-zugespitzt, fein-gezähnelte. 4. An sandigen O. am Adriat.

Meere, (bei Grado im östr. Littorale.) Jul. Aug. Reichenb. ic. f. 335. *S. bellidifolia* DC. fl. fr., nicht Sibth. u. Sm. Bth. blau. D.

10. *S. CANCELLATA* (Bernhardi in Bertol. fl. ital. 3. S. 525.) Gegitterte G. — *Filzig-kurzh.*; B. verkehrteyf.-spatelig oder keilf., *ausgerandet*; St. fast rechtwinkelig eingeknickt, hin und her gebogen, sehr ästig; Aeste zurückgebrochen-ausgespreizt, die unteren unfruchtbar; die Aehren etwas locker; Zpfl des K. nach dem Verblühen länglich-lanzettl., abstehend. 4. An den Felsen am Adriatischen Meere, (bei Triest und Fiume, Scoglio Talmego auf der Südspitze von Istrien.) Mai. Jun. *S. pubescens* Koch Synops. ed. 1. *S. furfuracea* Reichenb. ic. f. 327, vielleicht auch Lagasca? Bth. blau-violett. D.

2. *PLUMBAGO* (L.) Bleywurz. — K. röhrig, 5zählig. Blkr. 1blättrig, trichterf., 5lappig. Stbg. 5, unterweibig, an der Basis verbreitert. Gf. 1. N. 5. Kapsel an der Spitze aufspringend, 5klappig.

1. *P. EUROPAEA* (L.) Europäische B. — B. stengelumfassend, lanzettl., am Rande rauh, die wurzelst. verkehrteyf., gestielt; St. ästig, Zpfl der Blkr. oval. 4. An unkult. O., Zäunen, (Pola in Istrien und bei Fiume.) Aug. Sept. Blkr. lila. J.

XCIII. Ordng. PLANTAGINEEN. Juss. gen. p. 89.

Bth. zwittrig oder 2häusig. K. 4th., bleibend; (an der weibl. Bth. der eingeschlechtigen *Littorella* 3blättrig.) *Blkr. 1blättrig, unterweibig, 4sp., regelmässig, trockenhäutig.* Stbg. 4, der Blkr.Röhre oder dem Fruchtb. eingefügt und mit den Zpfln abwechselnd; Stbf. in der Knospenlage einwärtsgeknickt. Fruchtkn. frei, 1fächerig, 1eyig; Eychen aufrecht; oder dch einen mittelpunktst., zsgedrückten, 2flügeligen oder 4flügeligen Samenträger 2-4fächerig; Eychen in den Ecken des Samenträgers angeheftet, 1-mehrere. Gf. 1. Keim gerade, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Eyweiss hornartig.

1. *LITTORELLA* (L.) Strändling. — Einhäusig. Männl. Bth. gestielt. K. 4blättrig. Blkr.Röhre walzlich, mit 4th. Saume. Stbg. dem Fruchtb. eingefügt. Weibl. Bth. an der Basis des Bthstieles der männlichen sitzend. K. 3blättrig. Blkr. an der Basis und Spitze verschmälert, an der Mündung schwach-gezähnel. Nuss 1fächerig.

1. *L. LACUSTRIS* (L.) Ufer-S. — 4. An überschwemmten O., Fischteichen und Seen, auf Sandboden, (sehr zerstreut dch das g. Gebiet.) Jun. Jul. Schk. t. 287. St. h. 41. Bth. weisslich. An dem Rande stehender Wasser, wenn das Wasser sich minder

und zurückzieht, so blühet die Pflanze häufig, unter dem Wasser aber blühet sie niemals.

2. **PLANTÁGO** (L.) Wegetritt. — Bth. zwittrig. K. tief-4th., die 2 vordern Zpfl manchmal in einen verwachsen. Blkr.-Röhre eyf.; Saum 4th., zurückgebrochen. Stbg. im untersten Theile der Röhre eingefügt. Kapsel ringsum aufspringend, einen freien, 2-4flügeligen Samenträger einschliessend, und dadch 2-4fächerig. — Bth. sämmtlicher Arten weisslich oder bräunlich.

L. Rotte. ECHTER WEGETRITT. Der St., die WKöpfe der ausdauernden Arten abgerechnet, fehlend oder sehr kurz; die wurzelst. Bthstiele (Schäfte,) nackt, Samenträger 2flügelig.

a. Samenträger beiderseits 2-4samig. Blkr.Röhre kahl.

1. **P. MAJOR** (L.) Grosser W. — *B. gestielt, eyf. oder elliptisch*, etwas gezähnt, kahl oder zerstreut-flaumig, 5-9nervig; *Schaft aufstrebend*, stielrund, schwach-gerieft, *ohngefähr so lang, als die B.*; Aehre lineal., walzlich, verlängert; die DeckB. eyf. stumpflich, gekielt, am Rande häutig, *fast so lang, als der K.*; Kapsel 5samig. 4. An kult. O., auf Triften; in die VorA. hinaufsteigend. Jul.-Oct. Schk. t. 23. St. h. 87. Kommt an sandig. feuchten O. klein vor, mit $\frac{1}{2}$ Zoll langen B. und einer 3-10bth. Aehre: **P. minima** DC. Auf salzhaltigen Wiesen kommt die Pfl. mit viel längeren, schuhlangen, meist aufrechten Schaften vor: **P. media procera** Sonder in Brief. (diese bei Oldesloe, Sonder; bei Kissingen, Zeyher.)

2. **P. CORNUTI** (Gouan., nicht Jacq.) Cornuti's W. — *B. gestielt, eyf. oder elliptisch*, ganzrandig oder etwas gezähnt, kahl, 5-7nervig; *Schaft aufrecht*, tief-gerieft, *2- oder 3mal so lang, als die B.*; Aehre lineal.-walzlich, verlängert; die DeckB. eyf., stumpf, gekielt, am Rande häutig, *halb so lang, als der K.*; Kapsel 4samig. 4. Auf salzhaltigen Wiesen am Adriat. Meere, (Triest.) Jul. Aug. St. h. 87. **P. Gouani** Spreng. syst. veg. **P. limosa** Kit. bei Schult. unter der **P. major**. **P. Tabernaemontani** Baumg. en. Die Aehre fast schwarz. **D.**

b. Samenträger beiderseits 1samig. Blkr.Röhre kahl.

3. **P. MEDIA** (L.) Mittlerer W. — *B. elliptisch*, etwas gezähnt, 7-9nervig, beiderseits kurz., *in den kurzen breiten Bstiel zsggezogen*; Schaft stielrund, seicht-gerieft; Aehre länglich-walzlich, gedrungen; die DeckB. eyf., spitzlich, kahl, am Rande häutig; Blkr.Röhre kahl. 4. Auf Wiesen und Triften, in die A. hinaufsteigend. Mai. Jun. Fl. d. t. 531. St. h. 87.

4. **P. ALTISSIMA** (L. spec. 164.) Höchster W. — *B. lanzettl.*, beiderseits verschmälert, etwas gezähnt, 5-7nervig, kahl oder behaart; *Schaft vielfurchig*; Aehre länglich, cylindrisch, dicht; DeckB. eyf., verschmälert-zugespitzt, *trockenhäutig, kahl*; seidl. Zpfl des K. gekielt, *an der Spitze abgerundet-stumpf, am Rande*

bewimpert. 4. Auf Wiesen der südlicheren Gegenden, (häufig auf den Wiesen von Krain, südl. Tyrol.) Apr. Mai. *P. lanceolata* β. DC. fl. fr., Koch Synops. ed. 1. St. h. 87. D.

5 *P. LANCEOLATA* (L.) Lanzettblättriger W. — *B. lanzettl.*, nach beiden Enden verschmälert, etwas gezähnt, 3-6nervig, *kahl oder rauhh.*; Schaft *fünffurchig*; Aehre eyf. oder länglich-walzlich, gedrunken; *die DeckB. eyf., verschmälert-zugespitzt, trockenhäutig, kahl*; die seitenst. KZpfl kahnl., *in eine stumpfe Spitze zugespitzt, am Rande kahl*, auf dem Rücken gekielt, am Kiel gewimpert oder kahl. 4. Auf Wiesen und Triften überall. Apr.-Herbst. St. h. 7. *P. lanceolata* und *P. decumbens* Rb. Var.:

γ. *capitellata*, *B. schmal*, etwas rauhh., an der Basis sehr rauhh.; Schäfte *fingerslang*; Aehre fast kugelig; *P. lanceolata* γ. *sphaerostachya* D. fl. 1. p. 802. *P. lanceolata* ε. DC. Kommt auch vor mit schuhhohen Schaften, wobei jedoch die *B. von der gewöhnlichen Form* sind: *P. lanceolata* Var. *capitellata* Sonder im Brief.

δ. *lanuginosa*, *B. von langen*, etwas abstehenden Haaren mehr oder weniger rauhh., manchmal sehr rauhh.: *P. lanceolata* δ. D. fl. 1. 803. *P. lanceolata* η. *alpina* Gaud. *P. lanata* Portenschl. bei Host., wenn die *B. dicht-wollig behaart* sind; *P. ungarica* W. und Kit., wenn der Haare auf der obern Blattseite weniger sind. *P. lanata* St. h. 87.

Bei dieser Art finden sich, wie bei andern dieser Gattung, monströse Explare mit mehreren Aehren oder mit beblätterten Aehren, welche aber keineswegs als Variet. anzusehen sind.

6. *P. VICTORIALIS* (Poiret dict. 5. S. 377.) Seidenblättriger W. — *B. lanzettl.*, nach beiden Enden verschmälert, etwas gezähnt, 3-5nervig, *angedrückt-behaart, fast seidig*; Schaft stielrund, seicht-gerieft; Aehre eyf., gedrunken; *die DeckB. eyf., zugespitzt, trockenhäutig, in der Mitte zerstreut-behaart*; die seitenst. KZpfl fast flügelig-gekielt, am Kiele kahl. 4. An sonnigen, rauhen O., (Littorale, Krain, südl. Tyrol.) Mai. Jun. *P. Victorialis* DC. fl. fr., Bertol. fl. ital., St. h. 87. *P. sericea* W. und K. pl. rar. h. 2. t. 151., Koch. Syn. ed. 1., D. fl. 1. S. 804. *P. argentea* Villars delph., nicht Lam. nach DC. *P. capitata* Hoppe pl. exs.; *Plantago* n. 4. Gerard. fl. prov. t. 12. — Bertoloni trennt *P. Victorialis* Poir. und *P. sericea* WK. als verschiedene Arten, allein meine Expl. der *P. Victorialis* aus der Gegend von Triest unterscheiden sich doch nichts von denen der *P. sericea* aus Ungarn. D.

7. *P. LAGOPUS* (L.) Zottiger W. — *B. lanzettl.*, nach beiden Enden verschmälert, etwas gezähnt, 3-5nervig, rauhh. oder auch ziemlich kahl; Schaft gefurcht; Aehre eyf. oder länglich-walzlich, gedrunken; *die DeckB. ey-lanzettf., zugespitzt, trockenhäutig*, nebst dem K. an der Spitze *bärtig-zottig*; die seitenst. KZpfl gekielt; Blkr.Röhre kahl. ☉. An rauhen, kräuterreichen O., (Istrien.) April. Mai. St. h. 87. Die Blkr.Zpfl auf dem Rücken manchmal behaart. J.

8. *P. MONTANA* (Lam.) Berg-W. — B. lanzettl., nach beiden Enden verschmälert, etwas gezähnt, 3-5nervig, zottig oder kahl; Schaft stielrund; Aehre eyf., gedrunge; die DeckB. *brett-verkehrteyf., sehr stumpf, kurz- und stumpf-stachelspitzig, trocken-häutig, an der Spitze bärtig*; KZpfl häutig, unbekielt, kahl, an der Spitze bärtig. 4. Auf Triften der KalkA., (Schw., Tyr., Salzbg., Steyerm., Kärnth., Krain, im Kessel der Sudet.) Jul. Aug. St. h. 88. *P. atrata* Hopp. *P. alpina* Vill. Bertol. fl. ital. J. h. v. 2. t. 125. *P. saxatilis* M. Bieb. tauro-cauc. Die DeckB. schwarzbraun, mit einem grünen Rückenstreifen. Var. mit beiderseits dichtzottigen, fast seidigen B.: *P. montana* β . *holosericea* Gaud. Ein Schweizer-Explar davon sah ich noch nicht; ich besitze ein auf den Piemontesischen A. gesammeltes. Ist der *P. saxatilis* MBieb., wozu sie auch Rb. zieht, sehr ähnlich; aber sie hat breitere, verkehrt-herzf. DeckB. mit einer Stachelspitze, welche nicht über die Lappen hinausragt.

9. *P. PILOSA* (Pourrett.) Behaarter W. — B. lanzettl. oder lanzettl.-lineal., 3nervig, rauhh.; Schaft stielrund, von weit-abstehenden Haaren zottig; Aehren eyf. oder walzlich, gedrunge; die DeckB. und die äusseren KZpfl *krautig*, am Rande etwas häutig, eyf., verschmälert-zugespitzt, flaumig, die innern häutig, mit einem krautigen Rückenstreifen; Blkr.Röhre kahl. ☉. An unfrucht., trocknen O., (Istrien, Fiume.) Jun. *P. holostea* Lam. ill. n. 1667. *P. Bellardii* All. *P. lanata* Poir. *P. pilosa* Roth. cat. J. 2. p. 10. t. 1. St. h. 88.

c. Samenträger beiderseits Isamig. Blkr.Röhre behaart oder flaumig.

10. *P. ALPINA* (L.) Alpen-W. — B. lanzettl.-lineal. oder lineal., nach beiden Enden verschmälert, ganzrandig oder etwas gezähnt, fleischig, meist 3nervig, die Nerven nicht in gleichen Abständen, indem der Zwischenraum zwischen den Seitennerven und dem Mittelnerven noch einmal so breit ist, als der zwischen den Seitennerven und dem Rande; Schaft stielrund; Aehre länglich, walzlich, gedrunge; DeckB. eyf., spitz, am Rande häutig, so lang, als der K.; die vorderen Zpfl des K. am Rande häutig, der häutige Theil so breit, wie der krautige, die hinteren krautig-gekielt, mit spitzem Kiele.; Röhre der Blkr. etwas zottig. 4. Auf AWiesen, (Schw., Vorarlberg, Tyrol.) Im Garten schon Anfangs Mai, wo von den Aehren der *Pl. maritima* noch keine Spur vorhanden ist; auf den A. später. D. fl. S. 806. St. h. 51. und 88.

11. *P. MARITIMA* (L.) Meerstrands-W. — B. lineal. oder lanzettl.-lineal., nach beiden Enden verschmälert, ganzrandig oder gezähnt, am Rande kahl oder fein - borstig - gewimpert, ziemlich fleischig, 3nervig, Nerven in gleichen Abständen; Schaft stielrund; Aehre lineal.-verlängert, walzlich, gedrunge; die DeckB. eyf., spitzlich, am Rande häutig, ohngefähr so lang, als der K.; die vorderen Zpfl des K. am Rande häutig, der häutige Theil so breit, wie der krautige, die hinteren krautig-gekielt, mit spitzem Kiele,

Blkr.Röhre etwas zottig. 4. An feuchten O. am Meeresstrande und an Salinen; auch auf den A., daselbst vielleicht einen salzhaltigen Boden andeutend. Jun-Oct. Fl. d. t. 243. St. h. 88. *P. graminea* Lam. illustr. DC. fl. fr.

α. genuina, B. kahl, ganzrandig: *P. maritima* Roth. Eine Abart davon mit schmalen B. ist: *P. Wulfeni* Willd. (Willd. nennt sie ausdrücklich: *P. Wulfeni* Bernh.) *P. Wulfeni* Spreng. (mit Ausschl. von Wulfen's Syn.)

β. dentata, B. kahl, mit einigen lineal., verlängerten Zähnen versehen: *P. dentata* Roth. *P. bidentata* Murith. bot. vales., Gaud. fl. helv., wenn die B. schmaler und mehrere in der Mitte 2zählige vorhanden sind.

γ. ciliata, B. fein-borstig-gewimpert, ganzrandig oder mit einem oder dem andern Zahn bezeichnet: *P. Wulfeni* M. und K. D. fl. l. p. 809. *P. alpina* Sieb. *P. graminea* Schleich. (nicht DC.) *P. serpentina* Rb., nach Sieber's Citat und dem Stand O. „Passeyer Thal in Tyrol.“ (nicht *P. serpentina* Lam.)

12. *P. SERPENTINA* (Lam. ill. n. 1686.) Schlangen-W. — B. lineal., halbstielrund-3kantig, getrocknet gekielt, am Rande feinborstig-gewimpert; Schaft stielrund; Aehre lineal.-verlängert, walzlich, gedrunken; die *DeckB. aus eyf. Basis pfriemlich-verschmälert*, etwas länger, als der K., spitz, am Rande häutig, länger, als der K.; die vorderen Zpfl des K. am Rande häutig, der häutige Theil so breit, als der krautige, die hinteren krautig-gekielt, mit spitzem Kiele, *Blkr.Röhre ziemlich zottig.* 4. Auf Felsen und an steinig, rauhen O., (Fiume, Littorale, Krain, südl. Tyrol.) Jul.-Sept. *P. carinata* Schrad. D. fl. l. p. 810. *P. Wulfeni* Schreb. bei St. h. 21. *P. subulata* Wulf. bei Jacq. coll. t. 10. (nicht L.) *P. Gerardi* Schult. *P. Holosteum* Scop. (doch fasst Scopoli unter diesem Namen die *P. carinata*, *P. alpina* und *P. maritima* zusammen.) Var.:

β. longe bracteata, die *DeckB.* fast noch einmal so lang, als der K.: *P. serpentina* Lam. ill. n. 1687. „bractée ovale subulée à son sommet, presque une fois plus longue que le calice“ sagt Lam. Diese Varietät besitze ich aus der Gegend von Fiume. *P. Coronopus* kommt eben so vor. D.

13. *P. RECURVATA* (L. mant. S. 135) Gekrümmter W. — B. lineal. od. lanzettl.-lineal., nach beiden Enden verschmälert, ganzrandig, oder gezähnt, am Rande kahl, fleischig, rinnig, 3nervig; *Nerven in gleichem Abstände*; Schaft stielrund; Aehre lineal.-verlängert, walzlich, gedrunken; *DeckB. eyf., spitzlich*, am Rande häutig, *kürzer, als der K.*; die vorderen Zpfl des K. am Rande häutig, der häutige Theil 4 mal schmaler, als der krautige, *die hinteren häutig-gekielt, der Kiel geflügelt mit häutigem Flügel.* 4. An sandigen O. am Adriatischen Meere, (auf den Sanddünen von Primiero zw. Grado und dem Ausflusse des Isonzo, Tommasini.) Jul. Aug. St. h. 88. *P. incurvata* Murray comm. gött. 1780. t. 6. (dieser änderte den Linneischen Namen, weil die B. öfter einwärts-, als zurückgekrümmt seyen, aber nach meiner Beobachtung

ist die Richtung der B. sehr veränderlich. *P. maritima* DC. fl. fr., Dub. bot. gall., „DeckB. halb so lang, als die Zpfl der Bthhülle,“ sagt Dub. D.

II. Rotte. *CORONOPUS* Tournef. inst. t. 49. Samenträger 3-4flügelig, in jedem Fache einen einzelnen S. tragend; sonst Alles, wie bei der vorhergehenden Rotte.

14. *P. CORONOPUS* (L.) Schlitzblättriger W. — B. fiedersp. oder fiedersp.-gezähnt; Zpfl oder Zähne entfernt; Schaft stielrund; Aehre lineal.-verlängert, walzlich; die DeckB. aus eyf. Basis pfriemlich; *die seitenst. KZpfl* auf dem Rücken *geflügelt, Flügel häutig*, gewimpert; Blkr.Röhre etwas zottig. ☉. An grasreichen und unfrucht. O. am Meeresstrande. (im Littor. bei Triest und andern O.; in Wesphal., Hannov., Holst., Mecklenb., Genf.) Juli. Aug. Fl. d. t. 272. St. h. 88. *P. integralis* Gaud. fl. helv. nach einem Expl. von Thomas erhalten. Var. vielfach: Die B. kahl, oder am Rande oder auch überall rauhh.; die DeckB. kürzer, als der K. oder viel länger; die Spindel der B. breit und mit kurzen Zähnen, oder schmal und mit verlängerten Zähnen besetzt, welche letztere Fieder darstellen, die auch selbst wiederum gezähnt sind.

III. Rotte. *PSYLLIUM* Tournef. Der St. an vollständigen Expl. ästig, beblättert. Bthstiele blattwinkelst. Samenträger 2flügelig.

15. *P. PSYLLIUM* (L.) Betäubender W. — *Der St.* krautig, aufrecht, *ästig*; B. lineal., ganzrandig oder etwas gezähnt; Aehren eyf., ziemlich locker; die DeckB. aus eyf. Basis pfriemlich; *die KZpfl lanzettl., allmählig zugespitzt, gleichgestaltet*. ☉. An sandigen O. am Meeresstrande, (Istrien und auf den Inseln; Steyerm., bei Grätz, Maly.) Juli. Aug. Hayn. arzng. 5. t. 17. St. h. 88. J.

16. *P. ARENARIA* (W. und Kit.) Sand-W. *Der St.* krautig, aufrecht, *ästig*; B. lineal., ganzrandig oder etwas gezähnt; Aehren eyf.-länglich, gedrunken-dachig; die untersten DeckB. rundlicheyf., krautig-begrannt, die obern spatelig, sehr stumpf; *die vor, dern KZpfl schief-spatelig, sehr stumpf*, die hintern lanzettl.-spitz. ☉. An sandigen O., (südl. Schw.? stw. im südl. Tyrol, Littorale, in Krain, Unteröstr., Böhm., auf der Rheinfläche, nördl. D. gegen die Seeküste hin.) Juli. Aug. *P. Psyllium* St. h. 7.

17. *P. CYNOPS* (L.) Strauchartiger W. — *Die St.* strauchig, *ästig*, an der Basis liegend; B. schmal-lineal., ganzrandig; Aehren eyf.; die DeckB. breit-eyf., stumpf, die untern mit einer fädl., krautig. Granne, die obern stachelspitzig; *die vordern KZpfl breit-eyf., stumpf, stachelspitzig*, die hinteren schmaler, gekielt, am Kiele gewimpert. 4. An unkultiv. O. und am Meeresstrande, (in dem C. Waadt selten; bei Monfalcone nicht wiedergefunden; Baden bei Wien.) Juni. Juli. Hayn. arzng. 5. t. 18. St. h. 88. *P. Cynops* und *P. genevensis* DC.

IV. Unterklasse. MONOCHLAMYDEEN. (Kelchblüthige).

Perigon einfach, nämlich die Blb. entweder fehlend od. mit dem K. verschmolzen.

XCIV. Ordng. AMARANTHACEEN. Juss. gen. 87.

Perigon 3 - 5th., trockenhäutig, während der Knospenlage dachig. Stbg. 3 oder 5, unterweibig, frei oder 1brüderig, den Zpfln des Perigons gegenst., oder weniger als Zpfl. Fruchtkn. frei, 1fächerig, 1-mehreyig; Eychen am Grunde des Faches angeheftet. N. mehrere, oder 1 Gf. mit mehrern, oder mit einer einfachen N. Frucht nicht aufspringend, oder kapselartig und ringsum aufspringend. Keim am Umkreise des S. Eyweiss mehlig. B. wechselst., ohne NebenB. und Scheiden.

1. AMARANTHUS (L.) Amaranth. — Bth. 1häusig. Perigon 3 - 5th. Männch. Stbg. 3-5. Weibch. Gf. 3. Kapsel 1samig, ringsum-aufspringend. N. von E. gen. 8. 3. — Die Bth. unserer Arten grün oder rothbraun.

1. A. SYLVESTRIS (Desf.) Wilder A. — *Knäuelchen 3männig, sämmtl. blattwinkelst.; eine endst. Aehre nicht vorhanden; der HauptSt. aufrecht, die Nebenst. aufstrebend; B. rauten-eyf., am Rande wellig, an der Spitze ganz, die untersten seicht-ausgerandet; die DeckB. ohngefähr so lang, als die Bth. ☉. An kultiv O., Wegen, (Fiume, um Wien, in Böhmen; auf der Rheinfläche bei Carlsruhe und Speier.) Juli. Aug. Rb. ic. 5. f. 667. A. viridis All.*

2. A. BLITUM (L.) Gemeiner A. — *Knäuelchen 3männig, die blattwinkelst. rundlich, die endst. in eine nackte Aehre zsgereihet; die St. ausgebreitet, aufstrebend, kahl; B. eyf., fast rautenf., sehr stumpf oder ausgerandet; die DeckB. kürzer, als die Bth.; Kapsel rundlich-eyf. ☉. An kult. O., Wegen, (stw. dch. d. g. Gebiet.) Juli. Aug. A. adscendens Lois. A. viridis Pollich. A. Blitum var. β. DC. (aber grössere Explare bilden eigentlich keine Variet.) A. adscendens Rb. ic. f. 665., ein Expl. mit ungefleckten B.; die Pfl. var. nämlich mit ungefleckten und gefleckten B., wie der A. polygonoides; die gefleckte Variet. kommt hie und da sogar häufiger vor, als die ungefleckte.*

Unter dem Namen Amaranthus Blitum bildet Rb. in den ic. 5. f. 663. den A. polygonoides L. ab; aber ich zweifle sehr, ob die-

ser um Dresden wild vorkommt; das abgebildete Explar scheint ein Flüchtling aus einem bot. Garten.

3. *A. PROSTRATUS* (Balb.) Gestreckter A. — Knäuelchen 3männig, die blattwinkelst, rundlich, die endst. in eine nackte Aehre zsgereiht; die St. gestreckt, oberwärts behaart; B. rauten-eyf., vorne zugespitzt-verschmälert, an der Spitze selbst stumpf oder ausgerandet, am Rande wellig; die DeckB. obngefähr so lang, als die Bth.; Kapsel länglich-eyf. ☉. An kultiv. O., Wegen, (im östr. Littor.) Juli. Aug. Rb. ic. f. 666. D.

4. *A. RETROFLEXUS* (L.) Rauhestengeliger A. — Knäuelchen ährig, 5männig; die endst. Aehre zsgesetzt; der St. aufrecht, behaart; B. eyf., zugespitzt, an der Spitze selbst stumpf; die DeckB. noch einmal so lang, als das Perigon, fast dornig-stachelspitzig; Zpfl des Perigons lineal.-länglich, stumpf oder mit einem Stachelspitzchen gestutzt. ☉. An kultiv. O., (zerstreut dch d. Gebiet, an manchen O. ein lästiges Unkraut.) Juli. Aug. A. spicatus Lam. Rb. ic. 5. f. 668.

XCV. Ordng. PHYTOLACCEEN. R. Brown. cong. 35. Chenop. trib. Dub. bot. gall. p. 399.

Perigon 4-5th, in der Knospenlage dachig. *Stbg. auf dem Grunde des Perigons eingefügt*, von gleicher Anzahl und abwechselnd mit den Zpfln oder mehr als Zpfl. Fruchtn. frei, 1-10fächerig; Fächer leyig; Eychen aufrecht. Gf. so viele, als Fruchtn.-Fächer, ungeth. Eine wahre Beere, mit 1 oder mehrern Fächern. Keim am Umkreise des S. Eyweiss mehlig. B. wechselst., ohne NebenB. und Scheiden.

1. *PHYTOLACCA* (L.) Kermesbeere. — Perigon 4th. Stbg. 8-20. Fruchtn. 8-10riefig. N. 8-10. Beere 8-10fächerig; Fächer 1samig. N. von Esenb. gen. 8. 2.

1. *P. DECANDRA* (L.) Gemeine K. — Bth. 10männig, 10weibg. 4. Wird im südl. Tyrol und im Littor. kultiv. und kommt an Mauern, Wegen und auf Felsen am Ufer des Adriat. Meeres verwildert vor. Juli. Aug. Schk. t. 126. Bth. purpurfarbig. Kultiv. Zae 17

XCVI. Ordng. CHENOPODEEN. Vent. tabl. 2. p. 253. Atripliceae Juss. gen. p. 83.

Perigon 5th., in der Knospenlage dachig. *Stbg. auf dem Grunde des Perigons eingefügt*, so viel, als Zpfl oder weniger, den Zpfln gegenst. Fruchtn. frei oder unterwärts an das Perigon angewachsen, 1fächerig, leyig, das Eychen auf dem Grunde

des Fruchtkn. angeheftet. *Gf.* 1, einfach, oder 2, 3, 4th.; *N.* ungeth. *Frucht* nicht aufspringend, trocken oder eine falsche, aus dem fleischigen *K.* entstandene Beere. Keim kreisf., am Umkreise des *S.* gelegen, oder schraubenf. gewunden. Würzelchen nach dem Nabel gerichtet; Eyweiss mehlig oder fehlend. *B.* wechselst., ohne Neben*B.* und Scheiden. Bth. zwitterig oder vielheilig.

I. Unterordng. *SPIROLOBEEN.* C. A. Meyer. fl. alt. t. 1. 370. *S.* eyweisslos oder mit spärlichem Eyweisse. Keim schraubenförmig.

I. Gruppe. *SALSOLEEN.* Meyer. Bth. zwitterig. Keim schraubenf. Der St. nicht gegliedert.

1. *SCHOBERIA* (C. A. Meyer.) Schoberie. — Perigon 5th., ohne Anhängsel. Stant krustig; sonst Alles, wie bei *Salsola*, von der sich die Gattung durch den 5th. und nicht 5blättrigen *K.*, dessen Blättchen niemals quergekielt oder mit queren Anhängen versehen sind, unterscheidet. *N.* von Esenb. gen. 7. 11.

1. *S. FRUTICOSA* (C. A. Meyer.) Strauchige *S.* — Strauchig, kahl; *B.* halb-walzlich, stumpf; *Gf.* 3; *S.* glänzend, glatt. 4. An der Küste des Adriatischen Meeres, (am Theresienlazareth in Triest, Tommas.) Juli. Aug. *Salsola fruticosa* L. spec. *Chenopodium fruticosum* All. ped. D.

2. *S. MARITIMA* (C. A. Meyer fl. alt. S. 400.) Meerstrands-*S.* — Krantig, kahl; *B.* halbwalzlich, spitz; *Gf.* 2.; Zpfl. gekielt; *S.* glänzend, gegen den Rand zu fein gestreift-punktirt. ☉. Am Meeresstrand, (an der nördl. und südl. Küste, an der Sane bei Cilli, Maly.) Aug. Sept. *Chenopodium maritimum* L. spec. *Suaeda chenopodioides* Pall. ill. *S. maritima* Moquin-Tand. chenop. monogr. en D.

2. *SALSOLA* (L., mit Ausschl. von Arten.) Salzkraut. — Perigon 5blättrig, auf dem Rücken zuletzt mit einem queren Anhängsel. Stbg. 5, auf der Basis des Perigons eingefügt. *N.* 2. Hautfrucht plattgedrückt, häutig. Keim schraubenf. *N.* von Esenb. gen. 7. 10.

1. *S. KALI* (L.) Gemeines *S.* — Krantig, mit kurzen, dicklichen Haaren bestreut oder kahl, ausgebreitet-ästig; *B.* pfriemlich, an der Spitze dornig, abstechend; Bth. blattwinkelst., einzeln; Frucht *P.* knorpelig, nervenlos, Zpfl. zugespitzt, an der Spitze häutig, in der Mitte quergekielt, oder daselbst mit einem rundl., abstehenden Anhängel, das so lang ist, als der *K.*, versehen. ☉. An sandigen O. und am Meeresufer, (an allen Seeküsten und auf Sandplätzen in Oestr., Böhm., Mähr., Sachsen und der Rheinfläche bei Schwetzingen und Mainz.) Juli. Aug. Fl. d. t. 818. *Kali* Tra-

gus Scop. carn. Var. kurz-steifh. und kahl, mit dickeren und dünneren B. und:

α. vulgaris, Bth.Hülle rosenartig-herandet, das Anhängsel des Rückens so breit, als die Länge des obern Theils des Perigons von dem Anhängsel bis zur Spitze: S. Kali L.

β. brevimarginata, Anhängel der Zpfl der Bthhülle ganz kurz, einen kurzen, knorpeligen Rand darstellend: S. Tragus L. sp.

γ. mixta, mehrere Bthhüllen von der Form der Variet. *α.* auf ein und demselben St. D.

2. S. SODA (L.) Langblättriges S. — Krautig, kahl, ästig; Aeste aufstrebend; B. lineal., halbstielrund, spitzlich, kurz-stachel-spitzlg; Frucht *P. häutig*, Zpfl in der Mitte quer-gekielt. ☉. Am Meeresufer, (bei Triest; bei Danzig.) Juli–Sept. J. h. v. 1. t. 68. Kali Soda Scop. D.

II. Unterordng. *CYCLOLOBEEN*. S. eyweisshaltig. Keim ringförmig.

II. Gruppe. *SALICORNIEEN*. Mey. Bth. zwittrig. Kelm am Umkreise des S. Der St. gegliedert.

3. SALICORNIA (L.) Glasschmalz. — Perigon fleischig, ungeth., dch eine Ritze geöffnet, in eine Aushöhlung der Spindel eingesenkt. Stbg. 1. oder 2. Gf. sehr kurz; N. 2–3. Nuss von dem bleibenden Perigon eingeschlossen. N. von Esenb. gen. 7. 17.

1. S. HERBACEA (L.) Krautiges G. — Der St. krautig, ästig, gegliedert; Glieder der Aehren beiderseits 3bth.; die *P. in ein Dreieck geordnet*, S. fläunlich, glatt. ☉. Am Meeresufer und an Salinen. Aug. Sept. Schk. t. 1. S. acetaria Pall. ill. 7. — S. annua Engl. bot. t. 415., wenn die Bth. ein einzelnes Stbg., und S. procumbens Engl. bot. t. 2475., wenn sie 2 Stbg. enthält. Var. mit aufrechtem und liegendem St. und:

β. pachystachya; Aehren noch einmal so dick: S. radicans Sm. engl. bot., wenigstens nach einem Expl., welches Woods an Sonder geschickt. Diese Variet. wurde am baltischen Meere von Detharding gefunden.

2. S. FRUTICOSA (L.) Strauchiges G. — Der St. stranchig, ästig, gegliedert; Glieder der Aehren beiderseits 3bth.; die *P. nebeneinandergestellt*, S. kahl, knötig-rauh. ☿. Am Meeresstrande, (Insel Osero und Cassion bei Veglia.) Juli. Aug. D. fl. 1. 293. Arthrocnemum fruticosum Moquin-Tand. chenop. monogr. en., Cammer. epit. p. 216. Abbild. Var.:

β. pachystachya; Aehren noch einmal so dick: S. macrostachya Moricand, fl. venet. nach Bertol.

III. Gruppe. *CHENOPODIEEN*. Meyer. B. zwittrig. Keim am Umkreise des S. Der St. nicht gegliedert.

4. *CORISPERMUM* (L.) Wanzensame. — Perigon aus 1-5 durchsichtigen Schüppchen zsgesetzt oder fehlend. Stbg. 1-5. N. 2. Nuss zsgedrückt, auf der einen Seite konvex, auf der andern flach oder konkav, senkrecht. N. von Esenb. gen. 7. 18.

1. *C. MARSCHALLII* (Steven.) Marschall's W. — Perigon fehlend; Nüsse kahl, fast kreisrund, geflügelt, *Flügel gezähnel*, an der Spitze ausgeschnitten, auf der Mitte des Ausschnittes mit 2 Stachelspitzchen; die obersten DeckB. ey-lanzettf., verschmälertspitz und nebst den Innervigen B. stachelspitzig. ☉. An sandig. O. der Rheinfläche, (bei Schwetzingen.) Juli. Aug. St. h. 67. *C. squarrosus* L., nach Link. Nüsse 1 Linie lang. Sibg. 1-3. — Das sehr ähnliche *C. canescens* Kit. stimmt mit *C. Marschalli* hinsichtlich der an der Spitze ausgeschnittenen Nüsse überein, untersch. sich aber dch ein 2blättriges P. und halb so grosse Nüsse. D.

2. *C. INTERMEDIUM* (Schweigg.) Baltischer W. — Perigon fehlend; Nüsse kahl, fast kreisrund, geflügelt, *Flügel breit, durchscheinend, an der Spitze ganz*, mit 2 Stachelspitzchen; die obere DeckB. eyf., zugespitzt, mit einem häutigen Rande von der halben Breite des krautigen Theiles umzogen und nebst den Innervigen B. stachelspitzig. ☉. An sandigen O. des baltisch. Meeres, in Preussen. Juli. Aug. St. h. 67. Stbg. 1. — Dem *C. Marschalli* sehr ähnlich, aber dch die an der Spitze nicht ausgeschnittenen, sondern mittelst der bleibenden Basis der Gf. kurz-geschnäbelten Nüsse und dch die kaum gezähnelten Flügel derselben verschieden. *C. hyssopifolium* untersch. sich dch halb so grosse Früchte und ein 2blättriges P.

3. *C. HYSSOPIFOLIUM* (L. sp. 6.) Hyssopblättriger W. — Perigon 2bl., Nüsse kahl, rundl.-eyf., geflügelt, *Flügel nur am Rande ganz schmal dchscheinend, an der Spitze ganz* und daselbst mit 2 Stachelspitzchen versehen; obere DeckB. oval, zugespitzt, mit einem häutigen Rande umgeben, welcher halb so breit ist, als der krautige Theil, so wie die Blätter einnervig und stachelspitzig. ☉. An kiesigen O., am Donauufer in der Gegend von Wien, besonders bei Lobau.) Aug. Sept. Die Nüsse halb so gross, wie bei *C. intermedium*. D.

4. *C. NITIDUM* (Kitaib. bei Schult.) Glänzender W. — Perigon 2blättrig; Nüsse kahl, rundlich-oval, geflügelt *Flügel undurchsichtig, nur am Rande dchscheinend*, kaum gezähnel, an der Spitze ganz, und mit 2 Stachelspitzchen versehen; die obere DeckB. eyf., zugespitzt, mit einem häutigen Rande von der Breite des krautigen Theiles umzogen und nebst den Innervigen B. stachelspitzig. ☉. An kiesigen O. auf den Donauinseln, (bei Wien.) Juli. Aug. St. h. 67. *C. purpurascens* Host. B. sehr schmal-lineal, Aehren verlängert, sehr dünn, locker, die obere DeckB. fast rundlich, plötzlich in eine Spitze zsgesogen. Nüsse 4mal kleiner, als die des *C. intermedium*. Stbg. 5. D.

5. **POLYCNÉMUM** (L.) Knorpelkraut. Perigon 5blättrig, mit 2 DeckB. Stbg. 3, einem unterweibigen Ringe eingefügt. N. 2. Hautfrucht an der Spitze mit einem aufgewachsenen Deckelchen. S. senkrecht, Samenhaut krustig. N. von Esenb. gen. 7. 19.

1. **P. ARVENSE** (L.) Acker-K. — B. ziemlich steif, 3kantig-pfriemlich, stachelspitzig; Bth. blattwinkelst., sitzend. *Deckblättchen kaum so lang als das Perigon.* ☉. Auf Aeckern und an Wegen, auf Sand- und Lettenboden, (stw. dch d. g. Gebiet.) Juli. Aug. St. h. 44. Var. mit längern und nur halb so langen, abstehenden und aufrechten B., niedrigen, aufrechten St., letzteres: **P. pumilum** Hoppe; und mit verlängerten, ausgebreiteten St.: **P. inundatum** Schk.

2. **P. MAJUS** (Alex. Braun.) Grosses K. — B. ziemlich steif, 3kantig-pfrieml., stachelspitzig; die blattwinkelst. Bth. sitzend; *Deckblättchen länger, als das Perigon.* ☉. Auf Aeckern, und an Wegen. (stw. dch d. Gebiet.) Juli. Aug. Früchte noch einmal so gross, als bei der vorigen; die merklich stärkere Pfl. hat oft das Ansehen von *Salsola Kali*.

6. **KOCHIA** (Roth. in Schrad. journ. 1800. p. 307. t. 2.) Kochie. — Bth. zwittrig. Perigon 5sp.; Zpfl auf dem Rücken zuletzt mit Anhängseln versehen. Stbg. 5, auf der Basis des Perigons eingefügt; N. 2. Hautfrucht plattgedrückt. S. wagerecht, eyweisshaltig, Samenhaut häutig. Keim am Umkreise des S. — Untersch. sich von *Salsola* dch das einblättrige Perigon und den S.; von *Chenopodium* dch das zuletzt auf dem Rücken mit einem Anhängsel versehene Perigon. N. von Esenb. gen. 7. 8.

1. Rotte. **WILLENETIA** Maerklin (nicht C. A. Meyer.) Anhängsel der Zpfl. des Perigons flügelig.

1. **K. SCOPARIA** (Schrad. haloph. t. 1. f. 1.) Besenf. K. — Krautig, flaumig; *B. lineal.-lanzettl., gewimpert*; Bth. gezweiet; Anhängsel des FruchtP. sehr kurz, 3eckig, spitz. ☉. Auf Aeckern u. an kult. O., (im Littor., Triest, Görz, Steyrm. um Grätz, Unteröstr., Böhm., Mähr.) Juli-Sept. *Chenopodium Scoparia* L. D.

2. **K. ARENARIA** (Roth. in Schrad. Journ. B. 2. t. 2.) Sand-K. — Krautig, rauhh.; *B. pfriemlich-fädlich*, etwas fleischig, unterseits mit einer Furche dchzogen; Bth. meist zu 3, blattwinkelst., sitzend; Anhängsel des FruchtP. fast rautenf., ungleich. ☉. An sandigen O., (in Mähr. bei Bisenz, Scharditz, und in der Rheinpfalz von Schwetzingen bis Worms und Ingelheim.) Mai-Juli. St. h. 28. *Salsola arenaria* W. und Kit. pl. hung. 78. *Willemetia arenaria* Märklin bei Schrad. *Chenopodium arenarium* Fl. d. wett. Var. mit rothen St. und fast fehlenden BWimpern und:

a. longifolia, die blüthenst. B. vielmal länger, als die Bth.: *Camphorosma monspeliaca* Pollich, nicht L.

β. brevifolia, die blüthenst. B. von der Länge der Bth. oder kaum länger: *Camphorosma acuta* Pollich, nicht L. D.

3. *K. PROSTRATA* (Schr.) Gestreckte K. — Halbstrauchig; *B. lineal.*, flach, flaumig oder zottig-grau; Bth. meist zu 3, blattwinkelst., sitzend; Anhängel des FruchtP. rundlich, etwas länger, als der Durchmesser der Bth. 4. Auf Sandfeldern, (Unteröstr. und Mähr.) Juli-Sept. *S. prostrata* L. J. a. t. 294. *Chenopodium angustanum* All. ped. t. 38. f. 5. D.

II. Rotte. Anhängsel der Zpfl des Perigons kegelf. oder dornf.

4. *K. HIRSUTA* (Nolte.) Rauhh. K. — Krantig, rauhh.; *B. lineal.*, stumpf; Bth. gezweiet, blattwinkelst.: *Anhängsel des FruchtP. kegelf.* ☉. An vom Meere manchmal überschwemmten O., (Holstein bei Büsum und Deichsand nicht selten; in Mecklenb. aber sehr selten.) Aug. Sept. *Salsola hirsuta* L. *Chenopodium hirsutum* Wahlenb. *Echinopsilon hirsutum* Mocquin-Tandon *chenop. monogr. en.* D.

7. *CHENEPodium* (L.) Gänsefuss. — Bth. zwittrig. Perigon 5sp., oder 5th, auf dem Rücken ohne Anhängel. Stbg. 5, auf der Basis des Perigons eingefügt. N. 2. Hautfrucht plattgedrückt. S. wagerecht, eyweisshaltig, Samenhaut krustig. Kelm am Umkreise des S. N. von Esenb. gen. 7. 5.

I. Rotte. *PES ANSERINUS*. Der St., die B. und die P. mehr oder weniger mehlig oder auch kahl, aber nicht behaart. B. ganzrandig oder gezähnt.

1. *C. HYBRIDUM* (L.) Bastard-G. — *B. herzf.*, eckig-gezähnt; Ecken zugespitzt, die mittlere grösser, verlängert; Bthschweife rispig; *S. grüblig-punktirt.* ☉. An kultiv. O., Zäunen überall. Juli. Aug. St. h. 75.

2. *C. URBICUM* (L.) Steifer G. — *B. glänzend, 3eckig*, an der Basis in den Bstiel vorgezogen, buchtig- oder ausgeschweift-gezähnt; *Aehren* zsgesetzt, *aufrecht*, fast blattlos; S. glatt. ☉. An kultiv. O., Wegen, Dörfern, (stw. dch d. g. Gebiet.) Aug. Sept. St. h. 75. Die S. erscheinen unter einer stark-vergrösserten Linse sehr feinpunktirt. Var.:

α. *B. kürzer-gezähnt*; Zähne 3eckig, spitz: *C. urbicum* D. fl. 2. p. 296. *C. melanospermum* Wallr. *C. chrysomelanospermum* Balb.

β. *intermedium*, *B. buchtig-gezähnt*; Zähne 3eckig-lanzettl., zugespitzt: *C. intermedium* D. fl. 2. p. 297. St. h. 75. *C. urbicum* Engl. bot. t. 717. *C. rhombifolium* Mühlenb. bei Willd. — Die Kultur bewies, dass das *C. intermedium* bloss Variet. von *C. urbicum* ist.

3. *C. MURALE* (L.) Maier-G. — *B. rauten-eyf.*, glänzend, spitz-gezähnt; Bthschweife spreitzend; *S. glanzlos, gekielt-berandet.* ☉. Auf Schutthäufen, an Dörfern, Wegen. Juli-Sept. St. h. 75.

4. *C. ALBUM* (L.) Gemeinster G. — *B. rauten-eyf.*, *ausgebissen-gezähnt*, die obern länglich, ganzrandig; Bth. Schweiße fast blattlos; *S. glatt*, glänzend. ☉. Mit den vorhergehenden überall. Juli-Sept. *C. album* Sm. *C. leiospermum* DC. Die *S.* erscheinen unter einer starkvergrößernden Linse sehr fein-punktirt, was man auch bei dem folg. beobachtet. Var. mit mehr oder weniger gezähnten oder lauter ganzrandigen *B.* und:

a. spicatum, Bth. ährig: *C. album* L. St. h. 75.

β. cynigerum, Bth. trugdoldig: *C. viride* L. St. h. 75.

C. lanceolatum Merat. *C. album* var. *C. concatenatum* Thuill. par. St. h. 75. *C. glomerulosum* Rb. und *C. paganum* Rb. sind noch andere Modifikationen. — Die meisten Arten dieser Gattung kommen mit einem ährigen und trugdoldigen Bthstande vor, bei *C. album* aber tritt, so wie bei *C. polyspermum* dieses Merkmal ganz besonders hervor.

5. *C. OPULIFOLIUM* (Schrab. bei Koch und Ziz.) Bachholderblättriger G. — *B. rundlich-rautenf.*, *fast 3lappig*, *sehr stumpf*, *ausgebissen-gezähnt*, die obern elliptisch-lanzettl.; Bth. Schweiße fast blattlos; *S. glatt*, glänzend. ☉. An Wegen, Dörfern, auf Schutthaufen, (von Basel dch die Rheinfläche stw. bis Westphalen; sodann in Franken und Schles.) Juli-Sept. St. h. 75. Vaill. paris. t. 7. f. 1.

6. *C. FICIFOLIUM* (Sm.) Feigenblättriger G. — *Die untern B. 3lappig-spiessf.*, gezähnt, nach der Basis verschmälert, *der mittlere Lappen verlängert*, *länglich-lanzettl.*, *stumpf*, die obern *B. lineal.-lanzettl.*, ganzrandig; Bth. Schweiße fast blattlos; *S. glänzend*, *fein-eingedrückt-punktirt*. ☉. An Wegen, Dörfern, (nördl. Schw.; auf der Rheinfläche um die Dörfer dicht am Rheine von Basel bis nach den Niederlanden; Böhm., Schles., bei Dresden, Elbinseln bei Hamburg.) Juli. Aug. St. h. 75. *C. viride* Curt. *C. serotinum* Huds. — Das *C. serotinum* L. und der bot. Gärten, welches mit Linne's Beschreibg in den amoen. acad. vol. 4. p. 309., sehr genau übereinstimmt, ist viel höher, 4-5 Fuss hoch, und blühet sehr spät; bei uns kommen die *S.* im Freien gewöhnlich nicht zur Reife. Es untersch. sich ausserdem dch breitere *B.* am St. und ganzrandige, breit-längliche, an der Spitze abgerundete und sehr stumpfe an den Ästen und dch verlängerte doppeltzsgesetzte Tr., die beinahe wie bei *C. botrys* gestaltet sind.

7. *C. AMBROSIOIDES* (L.) Wohlriechender G. — *B. lanzettl.*, an beiden Enden verschmälert, entfernt-gezähnt, *unterseits drüsig*, mit sitzenden, zerstreuten Drüsen; Tr. beblättert. ☉. An kult. O. und im Flusskiese, (Oestr. an der Mar bei Grätz und bei Marburg in Steyerm.; Baden, am Ufer der Murg, besonders bei Rastadt.) Juni. Juli. St. h. 75. *Ambrina ambrosioides* Spach, Moquin-Tand., *Chenopodium* in der monogr. en.

8. *C. POLYSPERMUM* (L.) Vielsamiger G. — *B. eyf.*, ganzrandig, stachelspitzig, ganz kahl; Tr. blattlos; *S. glänzend*, sehr fein-punktirt; *FruchtP. absteheud*. ☉. An kult. O., Wegen,

im Flusskiese. Aug. Sept. Var. mit länglich-eyf., spitzeren B.; ferner:

α. cymoso-racemosum, Tr. aus Trugdolden zsgesetzt: *C. polyspermum* der meisten Autoren. St. h. 75.

β. spicato-racemosum, Tr. aus kleinen Aehren zsgesetzt: *C. acutifolium* Kit. bei Schult. St. h. 75.

9. *C. VULVARIA* (L.) Stinkender G. — *B. rauten-eyf.*, ganzrandig, grau-mehlig; Tr. blattlos; S. glänzend, sehr fein-punktirt. ☉. An Wegen, Zäunen, auf Schutthaufen. Juli. Aug. *C. olidum* Curt. D. fl. 2. p. 304. *C. foetidum* Lam.

II. Rotte. *BOTRYS*. Der St. nebst den B. und P. mehr oder weniger flaumig. B. fiedersp.-buchtig oder doppeltfiedersp.

10. *C. BOTRYS* (L.) Flaumiger G. — *Drüsig-flaumig*; *B. länglich*, fast *fiedersp.-buchtig*, stumpf-gezähnt, die obersten deckblattl., lanzettl., ganzrandig; Bth. Schweife in verlängerte Tr. geordnet. ☉. Im Flusskiese, auf Schutthaufen, (südl. Schw.; südl. Tyrol, Steyerm., Oestr., Schles., Böhmen und ausserdem hin und wieder als Gartenflüchtling.) Juli. Aug. St. h. 75. *Ambrina Botrys* Moquin-Tand. *chenop. monogr. en. Botrydium aromaticum* Spach, nach Moq.-Tand.

8. *BLITUM* (L., verbessert von C. A. Meyer.) Erdbeerspinat.

Alle S. aufrecht oder die der obersten Bth. an den einzelnen Knäuelchen wagerecht, oder die aufrechten mit wagerechten gemischt. Stbg. 1-5. FruchtP. oft saftig. Sonst Alles, wie bei *Chenopodium*.

I. Rotte. *BLITUM GENTINUM*. FruchtP. beerenartig. N. von Esenb. gen. 7. 7.

1. *B. CAPITATUM* (L.) Traubenähriger E. — *B. 3eckig*, fast spießsf., wenigzählig; *Aehren nackt*; *FruchtP. beerenartig*; S. am Rande spitz-gekielt. ☉. An kult. und kiesigen O., (im Littor.; Schw. stw., jedoch gemein in Graubünden; in Oberbad.) Juni-Aug. Schk. t. 1. f. 4. FruchtKnäuelchen gross, schön roth, die obern gänzlich ohne B. St. h. 74. Die endst. Bth. der Knäuelchen 4-5 sp., mit 4-5 Stbg.; die seitenst. 1 männig.

2. *B. VIRGATUM* (L.) Seitenblüthiger E. — *B. länglich-3eckig*, fast spießsf., tief-gezähnt; *Knäuelchen sämmtlich blattwinkelst.*; *die FruchtP. beerenartig*; S. mit stumpfen, auf der einen Seite rinnigem Rande. ☉. An kult. O. und Wegen, (im südl. Gebiet.) Juni-Aug. St. h. 74. und *B. capitatum* St. h. 2. *B.* nach oben allmählig kleiner, alle ein Knäuelchen auf der Basis des Bstieles tragend.

II. Rotte. *ORTHOSPERUM* C. A. Meyer. FruchtK. saftlos. Alle Bth. 5sp. und alle mit aufrechtem S. versehen, oder die oberste an den einzelnen Knäuelchen 6sp., mit 5 Stbg., und wagerechtem S.; die seitenst. 2-3 sp., mit 2-3 Stbg., und aufrechtem S.; oder mehr 6sp. mit 2-3sp. untermischt. N. von Esenb. gen. 7. 6.

3. **B. BONUS HENRICUS** (C. A. Meyer.) Ausdauernder E. — *B.* 3eckig-spiessf., *ganzzrandig*; die end- und blattwinkelst. Aehren zsgesetzt, die endst. in eine kegelf., blattlose Aehre zsgestellt; *Frucht P. saftlos*; alle S. aufrecht. 4. An Wegen, Zäunen, in die A. hinaufsteigend. Mai-Aug. St. h. 74. *Chenopodium Bonus Henricus* L. D. fl. 2. p. 294. Schk. t. 56. Agathophyton Bonus Henricus Moquin-Tand. ann. sc. nat. 2. ser. I. t. X. f. c. *Blitum Bonus Henricus* Moquin-Tand. chenop. monogr. en.

4. **B. RUBRUM** (Rb.) Rother E. — *B.* glänzend, *rautenf.-3eckig*, fast spiessf. - 3lappig, *buchtig-gezähnt*, Zähne lanzettl.; Aehren zsgesetzt, beblättert; *Frucht P. saftlos*; S. glatt, aufrecht, die der endst. Bth. an den Knäuelchen wagerecht. ☉. Auf Schutthaufen, an Dörfern, Wegen, (stw. dch d. g. Gebiet.) Juli-Sept. St. h. 74. *B. polymorphum* C. A. Meyer in Led. fl. alt. *Chenopodium rubrum* L. D. fl. 2. p. 298. Fl. d. t. 1149. Agathophytum rubrum Rchb. fl. sax. Die seitenst. Bth. 3 th., 1-2männig; die endst. 5 th., 5männig. Var.:

β. acuminatum, St. höher, B. in eine lange Spitze vorgezogen, die Knäulchen zuletzt blutroth. St. h. 74. n. 15. *Chenopodium blitoides* Lej. spa.

γ. paucidentatum, die untersten B. 3eckig, spiessf., die oberen rautenf. oder lanzettl., stumpf, fast zahnlos. St. h. 74. n. 16. *Chenopodium botryodes* Smith Engl. fl.

5. **B. GLAUCUM** (Koch.) Graugrüner E. — *B.* länglich oder eyf.-länglich, stumpf, entfernt-gezähnt, *unterseits graugrün*; Aehren blattlos; S. glatt, aufrecht und wagerecht. ☉. An feuchten O. um Dörfer. Juli-Sept. St. h. 75. *Chenopodium glaucum* L. D. fl. 2. p. 302. Fl. d. t. 1151. Bth. 4sp. Bei dieser Art finden sich mehr wagerechte, als senkrechte Samen.

9. **BETA** (L.) Mangold. — Bth. zwittrig. P. 5sp. Stbg. 5, dem fleischigen Ringe, welcher den Fruchtkn. umgiebt, eingelügt. N. 2. Frucht an das P. angewachsen. S. wagerecht, mit lederiger Samenhaut. Keim am Umfange des S. — Die meist zu 2-3, an der Basis verwachsenen Bth. stellen eine falsche Frucht dar und fallen zusammen als Eine Frucht ab. N. v. Esenb. gen. 7. 16.

1. **B. VULGARIS** (L.) Gemeiner M. — W. einstengelig, St. aufrecht, die wurzelst. B. eyf., fast herzf., die stengelst. rauten-eyf.; N. eyf. ☉ und ☉. Die Hauptart am Meeresufer, (ob im Gebiete?). Die Variet. *β.* und *γ.* werden in vielen Abänderungen kultiv. Die Zahl der Bth. in dem Knäulchen und die Länge der Deck B. sind trügerische Merkmale. Die Hauptvariet. sind:

a. maritima, die W. kaum dicker als der St., der St. dünn; *B. maritima* M. Bieberst. tanr. cauc., *B. foliosa* Ehrenb., *B. vulgaris maritima* Koch Syn. ed. I. mit Ausschluss des Synonym's von Linne. Es ist noch nicht gewiss, ob sich diese in unserem Gebiete findet.

β. Cicla, in allen Theilen der Variet. *α.* völlig ähnlich, nur dch die Cultur vergrößert und fetter: *B. vulgaris Cicla* L. die Var. *ζ.* und *η.* *B. hortensis* Mill.

γ. rapacea, W. dick, fleischig; die Pflanze ausserdem nicht verschieden: *B. vulgaris* L., mit Ausschl. d. Var. *ζ.* und *η.* *B. vulg.* Mill. Kultiv.

2. *B. MARITIMA* (L. sp. 322.) Meer-M. — W. vielstengelig, die St. niedergestreckt; B. rautenf.-eyf., kurz zugespitzt; *N. lanzettl.* 4. Am Meeresstrand (an der Nordsee). Juli. Aug. Die Pfl. ist im Gartenlande kreisf. niedergestreckt und hat nicht nur eine perennirende W., sondern auch der unterste Theil der Aeste überdauert den Winter und bringt im kommenden Frühling neue Aeste. Die hier aufgeführte Beta ist die wahre *B. maritima* Linn. „wegen der niederliegenden St.“ und nach einem Citate von Raj, welcher sagt: „Sie unterscheidet sich von den übrigen dieser Klasse dch die perennirende W.“ D.

10. *CAMPHOROSMA* (L.) Kampferkraut. — Bth. zwittrig. P. glockig, zsgedrückt, 4sp., die 2 gegenst. Zpfl. grösser. Stbg. 4, auf der Basis des P. eingefügt. Gf. verlängert, 2sp. Hautfrucht zsgedrückt. S. senkrecht, eyweisshaltig, mit dünn-häutiger Samenhaut. Keim am Umfange des S. N. v. Esenb. gen. 7. 9.

1. *C. MONSPELIACUM* (L.) Haariges K. — Rauhh.; B. nebst den Deck B. pfriemlich; Bth. blattwinkelst., geknäuel-ählig, fast sitzend, 4. An sandig. O., (im Littor. und auf Veglia.) Juli. Aug. Schk. t. 26. D.

IV. Gruppe. *ATRIPLICEEN*. Meyer. Bth. 1geschlechtig, 1 oder 2häusig, sehr selten mit zwittrigen untermischt. Keim am Umfange des S. Der St. nicht gegliedert.

11. *SPINACIA* (L.) Spinat. — Bth. 2häusig. Männch. P. 4th. Stbg. 4, auf dem Grunde des B. eingefügt. Weibch. P. 2-3sp. Gf. 4. Fruchtgehäuse mit dem verhärteten P. verwachsen. S. senkrecht, eyweisshaltig. Keim am Umfange des S. N. v. Esenb. gen. 7. 15.

1. *S. INERMIS* (Mönch.) Wehrloser S. — B. länglich-eyf.; Früchte wehrlos. ☉. oder ☉. Wird mit dem folg. zum Küchengebrauche kultiv. Mai. Juni. S. glabra Mill. S. oleracea *β.* L. Morison t. 30. f. 2. Vielleicht eine Variet. v. dem folg. Kultiv.

2. *S. SPINOSA* (Mönch.) Dorniger S. — B. an der Basis beiderseits spiessf.-2zählig; Früchte behörnt, ☉. oder ☉. Wird kult. Mai. Juni. S. oleracea Mill. S. oleracea *α.* L. Lam. ill. t. S14. Kultiv.

12. *EUROTIA* (Adans. fam. 2. S. 260.) Eurotie. — Bth. 1häusig. Männch. P. tief-4sp. Stbg. 4, auf dem Grunde des P. eingefügt. Weibch. P. röhrig-krugf., an der Spitze 2zählig.

Hautfrucht zsgedrückt. S. 1, senkrecht, eyweisshaltig, mit einer sehr dünnen Samenhaut. Keim am Umfange des S. N. v. Esenb. gen. 7. 14.

1. E. CERATOIDES (C. A. Meyer fl. altaic. 4. S. 230.) Graufilzige E. — B. lanzettl., graufilzig; die weibl. Bth. wollig. h. An unkult. O., (in Unteröstr. bei Ehrensbrunn und um die Stadt Retz gegen Mähren zu.) Aug. Sept. Axyris ceratoides L. J. ic. rar. t. 189. Ceratospermum papposum Pers. Achyranthos papposa Forsk. Diotis ceratoides Willd. sp. pl., Koch Synops. ed. 1. D.

13. HALIMUS (Wallr.) Halimus. — Bth. 1 häusig Männch. P. 4-5th. Stbg 4-5, auf der Basis des P. eingefügt. Weibch. P. zsgedrückt, 2lappig, Lappen 3zählig. Hautfrucht zsgedrückt. S. senkrecht, eyweisshaltig, mit einer häutigen Samenhaut. Keim am Umfange des S.; Würzelchen nach der Spitze des Fruchtkn. gerichtet. — Untersch. sich dch die häutige Samenhaut v. Atriplex. N. v. Esenb. gen. 7. 13.

1. II. PORTULACOIDES (Wallr.) Portulakartiger H. — Der St. halbstrauchig, aufstrebend; B. gegenst., ganzrandig, verkehrteyf. länglich, stumpf, an der Basis verschmälert; die Frucht P. sitzend, 3lappig, auf dem Rücken weichstachelig. h. An feuchten O. am Meeresufer, (an der Nord- und Ostsee und am Adriat. Meere.) Juli. Aug. St. h. 80. Atriplex portulacoides L. D. fl. 2. 318. Obione portulacoides Moquin-Tand. mon. D.

2. H. PEDUNCULATUS (Wallr.) Stielfrüchtiger H. — Der St. krautig, schlängelig, ästig; B. ganzrandig, stumpf, an der Basis verschmälert; die Frucht P. lang-gestielt, umgekehrt-3eckig, ausgerandet-2lappig, mit einem dazwischen gelegenen Zähnen. o. Am Meeresufer und an salzhalt. O., (a. d. Küste der Nord- und Ostsee und an den Salinen bei Artern in Thüring.) Sept. Oct. St. h. 80. Atriplex pedunculata L. D. fl. 2. 318. Fl. d. t. 304. Diotis Atriplicoides MB. D. atriplicina Spreng. Obione pedunculata Moquin-Tand. mon. en. D.

14. ÁTRIPLEX (L.) Melde. — Bth. 1 häusig, (bei wenigen Arten sind Zwitter eingemischt.) Männch. oder Zwitter: P. 3-5th.; Stbg. 3-5, auf der Basis des P. eingefügt. Weibch.: P. szgedrückt, 2lappig oder 2th., mit gezähnten oder ganzrandigen Lappen. Hautfrucht zsgedrückt. S. senkrecht, eyweisshaltig, mit einer krustigen Samenhaut. Keim am Umfange des S. Würzelchen nach der Basis, selten nach der Spitze des S. gerichtet. N. v. Esenb. gen. 7. 12.

I. Rotte. EUATRIPLEX Meyer. Bth. vielchig; die weibl. bis zur Basis 2th., einen senkrechten S. einschliessend; die zwitter. 3-5th., einen wagerechten S. einschliessend. Das Perigon der weibl. Bth. bei der Reife krautig oder häutig, die Blättchen nur an der Basis verwachsen.

1. A. HORTENSIS (L.) Garten-M. — Der St. krautig, aufrecht; B. herzf.-3eckig, gezähnt, gleichfarbig, glanzlos, die oberen läng-

lich, 3eckig, fast spiessf.; *das Fruchtp. rundlich-eyf.*, kurz-zugespitzt, netzaderig, *ganzrandig, bis auf die Basis 2th.* ☉. Wird kult. und kommt auf Schutt und Gartenauswürfen vor. Juli. Aug. Schk. t. 349. St. h. 79. Var. ganz blutroth. Kultiv.

2. A. NITENS (Rebentisch.) Glänzende M. — Der St. krautig, aufrecht; B. herzf.-3eckig, buchtig-gezähnt, *oberseits glänzend, unterseits silbern-bläulichgrün*, die obern aus 3eckiger, buchtig-gezähnter Basis lang-gespitzt, ganzrandig; *das Fruchtp. eyf.*, zugespitzt, netzaderig, *ganzrandig, bis auf die Basis 2th.* ☉. Auf Schutthauf. und an Wegen. (Mähr., Böhm., Schles., Niedersachs. bei Hildesheim, Berlin, Elbinseln bei Hamburg sehr häufig nach Sonder.) Juli. Aug. Schk. t. 348. St. h. 79. A. acuminata WKit. D

II. Rotte. SCHIZOTHECA Meyer. Bth. 1häusig; die weibl. 2th.

a. Weibliches Perigon bei der Reife krautig oder häutig, die Blättchen nur an der Basis zsgewachsen.

3. A. TATARICA (L. spec. 1493.) Tatarische M. — Der St. krautig, aufrecht; Aeste aufrecht-abstehend; B. *gleichfarbig, die untern ey-lanzettf.*, gezähnt, fast spiessf., die obern lanzettl., ganzrandig; *das Fruchtp. ey-fast-rautenf., ganzrandig, bis auf die Basis 2th.*; die fruchtttrag. Aehren locker, an der Spitze überhängend. ☉. An Wegen, auf Feldern und trocknen Hügeln, (auf der ganz. Rheinfläche v. Basel bis Coblenz; in Mähren, Sachsen, Thüringen.) Juli. Aug. A. tatarica Schk. t. 349. A. oblongifolia W. und Kit. pl. rar. h. t. 211. Koch Synops. ed. 1. St. h. 79. n. 3. Die schmalblättrige Variet. ist: A. campestris K. und Z. cat. plant. palat. St. h. 79. n. 4.

4. A. PATULA (L.) Schmalblättrige M. — Der St. krautig; die untern Aeste spreitzend; B. *gleichfarbig*, die untern lanzettl.-spiessf., gezähnt, die übrigen lanzettl., die obersten lineal.; *das Fruchtp. spiess-rautenf., bis auf die Basis 2th.*; Fruchthähren steif. ☉. An Wegen, kult. O. überall. Juli. Aug. A. patula L. spec. wegen der Worte: „B. fast-deltaf.-lanzettl.“ welche keineswegs auf die B. der Atriplex latifolia passen, und wegen des Synonyms aus C. Bauhin und Lobelius. A. patula Pollich palat. Schk. t. 347. St. h. 79. DC. fl. fr. und aller Autoren vor Smith. A. angustifolia Smith. brit. D. fl. 2. 315. Hartm. Scand. Fl., Babingt. man. A. virgata Hoffmann. Var. mit aufrechtem und gestrecktem St., mit weichstacheligen oder glatten, 3 oder 4mal grössern oder viel kleinern Fruchtp. Bei der Varietät:

β. *microcarpa*, sind die Fruchtperigone kaum grösser, als der S., deswegen konvex; sie sind reichlich mit Weichstacheln besetzt; A. erecta Sm. Babingt. man., wenn die untern B. gezähnt sind. St. h. 79.

5. A. LATIFOLIA (Wahlenb.) Breitblättrige M. — Der St. krautig, die untern Aeste spreitzend; die untern B. 3-*eckig-spiessf.*,

gezähnt, die obere spiess-lanzettf., die obersten lanzettl., ganzrandig; *das Fruchtp. 3eckig, ganzrandig oder gezähnt, bis auf die Basis getheilt.* ☉. An Wegen und kult. O. Juni.-Aug. St. h. 79. *A. patula* Sm. D. fl. 2. p. 312. DC. fl. fr. 5. p. 370. Hartm. Scand. fl., Babingt. man. *A. hastata* Pollich, Roth, und fast aller Autor. vor Smith. *A. hastata* Schk. t. 348. Kommt vor mit gezähnten und an der Basis mit einem beiderseits rückwärtsgerichteten Zahn fast pfeiff.-3eckig: *A. deltoides* Babingt. man. Var. ausserdem hinsichtlich der Grösse des Fruchtp. wie die vorhergehende, sodann mit gezähnten und ganzrandigen B., weichstacheligen und glatten P. Bei der Variet.

β. microcarpa, ist das Fruchtp. kaum grösser, als der S. und konvex: *A. microsperma* WK. Babingt. man. *A. ruderalis* Wallr. St. h. 79. Die Variet.

γ. salina, ist schülferig-grau: *A. patula* var. *salina* Wallr. *A. patula γ. farinosa* D. fl. 2. p. 313. *A. oppositifolia* DC., wenn die B. ganzrandig, oder fast ganzrandig sind. St. h. 79. *A. Sackii* Rostk. und Schm. fl. sedin. t. 1, wenn die untern B. gezähnt sind; St. h. 79. *A. prostrata* Babingt. man., aber *A. prostrata* DC. fl. fr. scheint eine verschiedene Art zu sein. *A. laciniata* Schk. t. 349., nach Meyer, die Abbildg. jedoch stimmt nach meinem Urtheil nicht gut damit überein. — Diese Variet. *salina* ist am Meeresufer und an den Salinen einheimisch.

6. *A. HASTATA* (L.) Spiessf. M. — Der St. krautig, die untern Aeste spreitzend; *die untern B. 3eckig-spiessf.*, tief-buchtig-gezähnt, die obere spiess-lanzettf., die obersten ganzrandig; *das Fruchtp. herzf.-3eckig, buchtig-gezähnt, bis auf die Basis getheilt. Zähne zugespitzt und pfriemlich.* ☉. Auf Schutthaufen und an Wegen, (bei Berlin; in Pommern; Rügen, Sonder; Frankf. a. d. O., Buek; Königsberg.) Juli. Aug. Rb. ic. 1. t. 16. Hartm. Scand. Fl. *A. hastata γ. calotheca* Schumacher. D.

7. *A. LITTORALIS* (L.) Ufer-M. — Der St. krautig, Aeste ausgespreitzt oder aufrecht; *B. lineal-lanzettl.* und lineal., geschärft-gezähnt oder ganzrandig; *Fruchtp. rautenf., gezähnt;* Aehren steif. ☉. Am Meeresufer, (an der Ost- und Nordsee.) Juli. Aug. Kommt mit ganz schmalen fast halbwalzlichen und breiteren buchtig-gezähnten B. vor. Die letztere ist: *A. marina* der Autoren, Dethard, consp. fl. megap. St. h. 80. Babingt. man. D.

b. Weibliches Perigon bei der Reife von der Basis bis zur Mitte knorpelig-verhärtet, und weiss, die Blättchen bis an die Mitte zsgewachsen.

8. *A. LACINIATA* (L.) Lappige M. — Der St. krautig; *B. tiefbuchtig-gezähnt, fast spiessf.*, die untern 3eckig-rautenf., die obere spiessf.-länglich; *Aehren nackt*, nur an der Basis beblättert; *Fruchtp. rautenf.*, oder fast 3lappig, gezähnt, oder fast ganzrandig, *von der Basis bis zur Mitte weiss-knorpelig und zsgewachsen.* ☉. Auf Schutthaufen, an Wegen, (Littorale, Oestr., Mähr. und Böhm., äusserst häufig um Prag; bei Würzburg; bei Warnemünde.) Juli. Aug. St. h. 80. Schk. t. 349. ? *A. sinuata* Hoffm. D.

9. *A. ROSEA* (L.) Rosen-M. — Der St. krautig, spreitzend; *B.* buchtig-gezähnt, die untern rautenf., die obern eyf.; *Aehren* unterbrochen, *beblättert*. FruchtP. 3eckig-rautenf., spitz, gezähnt, *von der Basis bis zur Mitte weiss-kuorpelig und zsgewachsen*. ☉. An Wegen und auf Schutthaufen, (Rheinfläche v. Worms bis Mainz, Westphalen, Mecklenb., Pomm., Brandenb., Thüring., Sachs., Schles., Böhm., Mähr., Oestr., Krain.) Juli. Aug. Schk. t. 350. St. h. 80. *A. verticillata* Lagasc. *A. alba* Scop. D.

15. *THELIGONUM* (L.) Hundskohl. — Bth. Ihäusig. Männch. P. 2sp. Stbg. ungefähr 12. Weibch. P. 2sp. Gf. 1; N. einfach. Nuss lederartig. N. von Esenb. gen. 8. 1.

1. *T. CYNOCRAMBE* (L.) Gemeiner H. — ☉. In Felsenspalten, an schattigen O., (auf der Insel Cherso.) Jun. Schk. t. 299. Bth. gelblichweiss. J.

XCVII. Ordng. POLYGONEEN. Juss. gen. p. 82.

P. unterst., 3, 5, 6th., in der Knospenlage dachig. Stbg. von bestimmter Zahl, an der Basis des P. eingefügt. Fruchtkn. frei, 1flücherig, 1eyig, Eychen aufrecht. Gf. 2-3. *Frucht nicht aufspringend*, nussartig oder fleischig, nackt oder doch die innern Zpfl des P., welche eine falsche Kapsel darstellen, verhüllt. Keim umgekehrt, ziemlich gerade und mittelpunktst., oder gekrümmt und seitenst., oder ringf. und am Umfange des S. gelagert. Eyweiss mehlig. *B.* wechselst., nebenblättrig; NebenB. scheidig.

1. *RUMEX* (L.) Ampfer. — *P.* bis auf die Basis 6th., die 3 innern Zpfl grösser, zsschliessend. Stbg. 6, paarweise den äussern Zpfln des P. gegenüber gestellt. N. pinself. Nuss 3eckig, doch die 3 innern Zpfl des P., welche eine falsche Kapsel darstellen, ganz bedeckt. N. von E. gen. 8. 9.

1. Rotte. *LAPATHUM* Tournef. Bth. zwittrig oder vielchig. Gf. frei. *B.* an der Basis verschmälert, abgerundet oder herzf., aber weder spiess-, noch pfeilf.

1. *R. MARITIMUS* (L.) Goldgelber A. — *Die innern Zpfl des FruchtP.* fast rautenf., *beiderseits borstlich-2zählig*, an der lanzettl.-vorgezogenen Spitze ganzrandig, alle schwieletragend, *die Zähne von der Länge des Längedchmessers des Zpfls*; Quirle mit einem *B.* gestützt, die oberen zsschliessend; *B.* lanzettl.-lineal., in den Bstiel verschmälert. ☉. An See- und Sumpfrändern und am Meeresufer. Jul. Aug. St. h. 73. n. 1. *R. Anthoxanthum* Murr. *R. aureus* With. Hoffm. *R. acutus* Pollich.

2. *R. PALUSTRIS* (Smith.) Grüngelber A. — *Die innern Zpfl des FruchtP.* eyf.-länglich, *beiderseits borstlich-2zählig*, an der lanzettl.-vorgezogenen Spitze ganzrandig, sämmtl. schwieletragend,

Zähne kürzer, als die Zpfl des P.; Quirle mit einem B. gestützt, ziemlich entfernt; *B. lanzettl.-lineal.* oder verlängert-lanzettl., *in den Bstiel verschmälert.* ☉. An sumpfigen O., an Teich- und Seerändern, (stw. dch das g. Gebiet, in der Schw. nur an einer Stelle bei Rheinfelden im Aargau.) Jul. Aug. St. h. 73. n. 2. R. maritimus Hoffm. R. limosus Thuill. Var. breithlättrig, die WB. 1 Fuss lang und 3 Zoll breit, Sonder.

3. R. STEINII (Becker.) Stein's A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp.* eyf., *beiderseits borstlich-2zählig*, an der vorgezogenen Spitze ganzrandig, alle schwieletragend, Zähne kürzer, als die Zpfl des P.; Quirle entfernt, die untern mit einem B. gestützt, die obern nackt; *die wurzelst. B. breit-länglich*, *an der Basis herzf.*, die stengelst. aus abgerundeter Basis lanzettl., die obern lanzettl. 4. Am Mainufer, (im Gebiete der Fl. von Frankf. bei Stockach, Fechheim und Offenbach.) Jul. Aug. St. h. 70. n. 3. Steht dem R. conglomeratus und R. nemorosus am nächsten, unterscheidet sich von diesen aber bemerklich dch die pfriemlich-gezähnten Zpfl des P.; von R. palustris dch die dauernde W., die 2 oder 3 mal breiter, an der Basis herzf. WB., und die an der Basis nicht verschmälerten StB.

4. R. CONGLOMERATUS (Murr.) Geknäuelter A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. lineal.-länglich*, stumpf, *ganzrandig*, sämtl. schwieletragend; die untersten B. herzf.- oder eyf.-länglich, stumpf oder spitz, die mittlern herzf.-lanzettf., zugespitzt; Äeste weit-abstehend, aufstrebend; Quirle entfernt, mit einem B. gestützt, nur die obersten nackt. 4. An Ufern, in Gräben und Sümpfen. Jul. Aug. St. h. 73. n. 4. R. glomeratus Schreb. Rb. ic. f. 552. R. Nemolapathum Ehrh. Rb. fl. exc. R. acutus Sm. DC. Meyer chlor. hanov. R. paludosus Wither. R. crispus β. Poll. R. undulatus Schrank. Das Fruchtp. trägt nur sehr selten an der Basis ein oder das andere Zähnchen, desswegen kann der R. acutus L. „mit gezähnten Klappen“ nicht zu dieser Art gehören. Ich habe die Ansicht, dass man den R. acutus L. in dem R. pratensis zu suchen habe.

5. R. SANGUINEUS (L.) Blutrother A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. lineal.-länglich*, stumpf, *ganzrandig*, ein einziger schwieletragend; die untersten B. herzf.-länglich, fast geigenf., stumpf oder spitz, die mittleren herzf.-lanzettf., zugespitzt; Äeste gerade, aufrecht-abstehend; Quirle sämtl. nackt, oder nur die untersten mit einem B. gestützt. 4. In feuchten Hainen. Jul. Aug. R. sanguineus Sm. Gaud. R. Nemolapathum Wallr. — D. fl. 2. p. 611. R. nemorosus Meyer. Die B. sind nicht selten über der Basis ein wenig zsggezogen und fast geigenf.

a. viridis, der St. und die BAdern nicht farbig: R. sanguineus β. viridis Sm. St. h. 73. n. 5. R. Nemolapathum α. exsanguis Wallr. R. nemorosus Schrad. bei Willd. R. Nemolapathum DC. fl. fr. 3. p. 373. und R. nemorosus DC. fl. fr. 5. p. 367. R. Nemolapathum Rb. ic. f. 551? (an der Hauptfigur nämlich sind alle Quirle beblättert abgebildet.)

β. genuinus, der St. und die Adern der B. blutroth: St. h. 73. n. 6. *R. sanguineus* L. Gaud. *R. Nemolopathum β. sanguineus* Wallr. (Dieser nach Rostkov. bei Stettin.)

Mit Smith und Gaudin habe ich den Linnäischen Namen vorangestellt, obgleich er nur eine Variet. bezeichnet.

6. *R. PULCHER* (L.) Schöner A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. eyf.-länglich, grubig-netzig, fast dornig-vielzählig, schwieletragend; die untersten B. herzf.-länglich oder herz-geigenf., stumpf, die mittlern spitz, die obersten lanzettl.; Aeste weit abstehend; Quirle entfernt und die meisten mit einem B. gestützt. ☉. An kult. O. (im östr. Litt.: Oberbaden und Oberelsass; Etschland in Tyrol; Genf bis Unterwallis, Bellens, Lugano.) Mai, Jun. St. h. 73. n. 7. Rb. ic. 6. f. 679. Var. mit über der Basis nicht zsggezogenen B.: R. divaricatus L. nach Bertol. St. h. 73. n. 8.*

7. *R. OBTUSIFOLIUS* (L.) Stumpfblättriger A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. eyf.-3eckig, hinten gezähnt, in eine längliche, stumpfe, ganzrandige Spitze vorgezogen, sämmtl. schwieletragend, Zähne 3eckig, zugespitzt oder pfriemlich; Tr. blattlos; Quirle ziemlich entfernt; die untern B. herz-eyf., stumpf oder spitzlich, die mittlern herzf.-länglich, spitz, die obersten lanzettl. 4. Auf Wiesen und um Dörfer. Jul. Aug. St. h. 73. n. 9. Rb. ic. 4. f. 550. R. divaricatus L. spec. nach der Meinung von Fries, aber die Aeste sind nicht stärker spreitzend, als in den Variet. *β.* und *γ.* Var.:*

β. discolor, der St. nebst den Bstielen, BAdern und Tr. blutroth: *R. obtusifolius β. discolor* Wallr. St. h. 73. n. 10. *R. purpureus* Poir. Dieser in Oberbaiern häufig.

γ. sylvestris, Zpfl des Perigon halb so gross, spärlicher-gezähnt: St. h. 73. n. 11. *R. sylvestris* Wallr. *R. obtusifolius* Lin. nach Fries. *R. acutus* Tausch [pl. select. Bei uns geht er doch viele Zwischenformen in die Var. *α.* über.

8. *R. PRATENSIS* (Mert. und Koch.) Wiesen-A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. eyf., fast herzf., stumpf, der vordere oder alle schwielentragend, gezähnt, an der Spitze ganzrandig, Zähne 3eckig, zugespitzt und pfriemlich; Tr. blattlos; Quirle genähert; die wurzel- und untern stengelst. B. herzf.-länglich, spitz, die obersten lanzettl. 4. Auf fruchtb. Wiesen, (auf der Rheinfläche bis Westphal.; Thüringen, um Halle; an der Saale bei Rudolstadt, bei Suhl.) Jul. Aug. St. h. 73. n. 12. R. acutus K. und Ziz., MB. und anderer Autoren, und nach der Meinung von Fries: *R. cristatus* Wallr. (nicht DC.). Scheint eine Bastardform. D.*

9. *R. CRISPUS* (L.) Krauser A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. rundl., fast herzf., ganzrandig oder an der Basis gezähnt, einer oder sämmtl. schwieletragend; Tr. blattlos; Quirle genähert; B. lanzettl., spitz, wellig, kraus. 4. Auf Wiesen und an kult. O. Jul. Aug. St. h. 73. n. 13. Die innern Zpfl des P.*

tragen sämmtl. eine Schwiele, bei einer Variet. aber trägt nur der vordere derselben eine solche.

10. *R. DOMESTICUS* (Hartmann Scand. Fl. ed. 1. S. 148.) Haus-A. — *Die inneren Zpfl des Fruchtp. rundlich-herzf., ganzrandig, oder stumpf-gezähnt, sämmtlich ohne Schwiele oder nur schwache Schwielen tragend; Tr. rispig, blattlos, gedrunken, die WB. und unteren StB. aus eyf. oder etwas herzf. Basis länglich, oder breit-lanzettl., wellig und kraus; Bstiele oberseits flach, mit einer schmalen Linie berandet. 4. An Flussufern, (an der Elbe und auf den Elbinseln bei Hamburg, Sonder.) Jul. Aug. Reichenb. ic. f. 526. die Rispe mit dem mittlern StB. Bstiele oberseits flach, mit einer erhabenen Linie, welche fein, aber gegen die Basis des B. hin stärker wird, beiderseits berandet; Sonder.*

11. *R. PATIENTIA* (L.) Garten-A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. rundlich-herzf., stumpf, ganzrandig oder kaum gezähnt, ein einziger schwieletragend; Tr. rispig, blattlos; Quirle genähert; die wurzel- und untern stengelst. B. ey-lanzettf., flach, zugespitzt, die obersten lanzettl.; Bstiele rinnig. 4. An Gräben, um Dörfer, (in Unteröstr.) Wird auch zum Küchengebrauch kult. St. h. 73. n. 14. D.*

12. *R. HYDROLAPATHUM* (Huds.) Riesen-A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. eyf.-3eckig, ganzrandig oder hinten gezähnt, alle schwieletragend; Tr. rispig, blattlos; B. lanzettl., zugespitzt, nach der Basis verschmälert, flach, am Rande wellig-kleingekerbt; Bstiele oberseits flach. 4. In Sümpfen, langsam fliessenden Wassern, Teichen und Gräben. Jul. Aug. St. h. 73. n. 15. Rb. ic. f. 554. R. aquatica Pollich. Fries. Sm. Meyer. — Die Form des Bstieles untersch. ausser den andern Merkmalen diesen und die beiden folgenden sehr deutlich.*

13. *R. MAXIMUS* (Schreb. bei Schweigg. und Kört.) Ansehnlicher A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. 3eckig-herzf., hinten gezähnt, alle schwieletragend; Tr. rispig, blattlos; die wurzel- und untern stengelst. B. länglich, spitz, an der Basis schief-eyf. oder herzf.; Bstiele oberseits flach oder breit-rinnig, und zu beiden Seiten mit einer hervortretenden Rippe berandet. 4. In Gräben, Teichen. Jul. Aug. St. h. 73. n. 16. R. heterophyllus Schultz. R. aquaticus α. heterophyllus Meyer chlor. hanov. D.*

14. *R. AQUATICUS* (L.) Wasser-A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. eyf. oder etwas herzf., häutig, ganzrandig oder etwas gezähnt, ohne Schwiele; Tr. rispig, blattlos; die WB. herz-eyf., spitz, an der Basis verbreitert; Bstiele oberseits schmal- und seicht-, unter dem B. aber deutlich-rinnig. 4. In Gräben und Teichen und an deren Rändern, (sehr zerstreut dch das g. Gebiet.) Jul. Aug. St. h. 47. n. 1. Rb. ic. 4. f. 553. sehr gut. R. Hippolapathum β. Fries. R. latifolius Meyer., mit Ausschl. des Syn. von Pollich; an den von Pollich angegebenen O. kommt der R. aquaticus nicht vor. — Die Worte Linne's „die Klappen ganzrandig,*

nackt; die B. herzf., spitz,“ beseitigen nach meinem Urtheil alle Zweifel, welche man über diese Pflanze schon erhoben hat. D.

15. *R. ALPINUS* (L.) Alpen-A. — Die innern Zpfl des FruchtP. herzf.-eyf., häutig, ganzrandig oder etwas gezähnt, ohne Schwiele; Tr. gedrunken-rispig, blattlos; die *WB. rundlich-herzf., abgerundet-stumpf* oder an der stumpfen Spitze kurz-zugespitzt; Bstiele oberseits rinnig. 2. Auf den A., vorzügl. um die Hütten, in die Thäler herabsteigend, (dch d. g. AK. und auf den höhern Kuppen des Riesengebirges, der Mährischen Gebirge und des Schwarzw.) Jul. Aug. St. h. 74. n. 2.

H. Rotte. *ACETOSA* Tournef. Bth. 2häusig oder vielehig. Die Gf. an den obern Theil der Kanten des Fruchtkn. angewachsen. B. spiess- oder pfeiff. Die innern Zpfl des Perigons bei allen ganzrandig, oder leicht ausgeschweift-fein-gekerbt.

a. Bth. vielehig.

16. *R. SCUTATUS* (L.) Schildf. A. — Die innern Zpfl des FruchtP. rundlich-herzf., ganzrandig, häutig, ohne Schwiele, die äusseren an den unteren Rund der inneren angedrückt; Halbquirle armbth., entfernt, blattlos; B. spiessf., eyf. und fast geigenf. 2. An steinig. O. zw. Felsen auf A. und VorA. und auch auf niedrigern Gebirgen und an alten Mauern, (dch die g. AK. von Oestr. bis in die Schw.; dch die Gebirge von Böhm., Würtemb., Baden und Hessen und von dem Elsass bis Lüttich.) Mai-Jul. Var.:

α. *hastifolius*, B. heiderseits mit einer tiefen und schmalen Bucht ausgeschnitten, der Endlappen eyf., fast breiter, als lang: St. h. 74. n. 3. *R. hastifolius* MB., diese ist die gewöhnliche Form.

β. *hastilis*, B. 3eckig. spitz, dch den heiderseits verlängerten Zahn der Basis spiessf. Die untersten B. oft wie bei der vorhergehenden Variet. St. h. 74. n. 4.

γ. *triangularis*, B. 3eckig-eyf., der Zahn der Basis fehlend oder sehr kurz: St. h. 74. n. 5. *R. glaucus* J. coll. I. p. 63. ic. rar. t. 67.; diese Variet. ist die seltenste.

b. Bth. 2häusig.

17. *R. NIVALIS* (Hegetschw. und Heer Fl. der Schw. S. 345.) Schnee-A. — Die inneren Zpfl des FruchtP. rundl.-herzf., ganzrandig, an der Basis mit einer hinabgebogenen Schwiele versehen, die äusseren zurückgeschlagen; B. dicklich, fast nerventlos, die äusseren wurzelt. rundl.-eyf., sehr stumpf, fast herzf., die inneren eyf. oder längl., spiessf., am Stengel nur ein einzelnes oder deren zwei, oder auch gar keines; St. einfach, quirlig-traubig, oder unter der Tr. mit wenigen einfachen Aesten versehen; DeckB. ganzrandig. 2. An kiesigen O. der höchsten A., (Schweiz, Bayern, Krain.) Jul. Aug. St. h. 88.

18. *R. ARIFOLIUS* (All. ped. 2. S. 202., nicht Ait.³ und nicht Lin. fil.) Arumblättriger A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. rundlich, an der Basis gestutzt oder herzf., mit einer schuppenf., kurzen, abgerundeten oder fast 4eckigen, herabgebogenen Schwiele versehen, die äusseren halb so lang, als die inneren, zurückgeschlagen; B. spiess-pfeilf., an der Basis 5-7nervig, die Nerven strahlend auseinandertretend, die stengelst. zugespitzt; St. oberwärts ästig, die Aeste quirlig-traubig, die stengelst. NebenB. ganzrandig.* 4. Auf Wiesen der A. und VorA., (dch die g. AK. und auf den Mährischen Karpaten, den Sudeten, dem Brocken, Schwarzw. und den Vogesen.) Juli. Aug. D. fl. 2. 620. St. h. 74. n. 6. *R. montanus* Poir. dict., Bertol. fl. ital. *R. hispanica* Gmel. bad. *R. Acetosa* δ . und ϵ . L. spec.; die Variet. δ . entstand aus *Oxalis major* Brockenbergensis Thals, welche ein Synonym von dem auf dem Brocken wachsenden *Rumex arifolius*. C. Baubin hat in seinem Pinax diese Thalische Pfl. unter dem Namen *Acetosa montana maxima* aufgeführt. Dieselbe Pfl. ist die *Acetosa montana lato ari folio rotundo* Boccon. mus. 125. t. 115., was die Variet. ϵ . in den Spec. pl. bildet. *R. Acetosa* β . Smith. engl. fl. 2. 196.

19. *R. ACETOSA* (L. spec. 481.) Sauer-A. — *Die innern Zpfl des Fruchtp. eyf.-rundl., an der Basis gestutzt oder herzf. mit einer schuppenf., kurzen, abgerundeten oder fast 4eckigen herabgebogenen Schwiele versehen, die äusseren halb so lang als die inneren, zurückgeschlagen; B. spiess- oder pfeilf., geädert; NebenB. geschlitzt-gezähnt.* 4. Auf Wiesen, Rainen, lichten WaldO., überall. 4. Mai. Juni und auf d. Wiesen wiederum nach der Heuernte. D. fl. 2. S. 619., Lin. spec. var. α ., fl. succ. var. α ., Smith engl. fl. var. α . *R. Pseudo-Acetosa* Bertol. fl. ital. Bertoloni glaubt den ächten *Rumex Acetosa* in der Gartenpfl., welche häufig zum Küchengebrauche angebaut wird, suchen zu müssen, allein die Variet. α . des *Rumex Acetosa* der Spec. pl. und der Fl. succ., die Urform, ist ganz sicher unsere überall gemeine wilde Pfl., der *Rumex Acetosa* sämtlicher Autoren. Linne vermischte jene Gartenpfl., die eine eigene Art darstellt, sowohl in den Spec. pl. als in der Fl. succ. mit *R. arifolius*. Der *R. Acetosa* varirt:

α . *vulgaris*, B. spiessf. oder pfeilf., längl., die unteren stumpf, die oberen spitz: St. h. 74. n. 7.

β . *auriculatus*, die unteren B. spiess-pfeilf., längl., die zunächstfolgenden spiessf., verlängert-lanzettl., wellig, mit gekrümmten Ohrchen, die obersten sehr schmal, oft spiralf. zurückgerollt, oder die WB. auch verlängert-lineal.-lanzettl., die stengelst. lineal., lang verschmälert, ausserdem aber dch kein anderes Merkmal von der Variet. α . verschieden. St. h. 74. n. 8., die Hauptfigur; dazu *R. Acetosa* β . *auriculatus* Wallr. sched., mit Einschluss der folgenden Variet.

γ . *fissus*, ganz die vorige Variet., nur sind die Ohrchen der B. 2-3sp.: *R. Acetosa* γ . L. spec. *R. Acetosa* γ . *fissus* Koch Synops. ed. 1. mit Ausschluss des Synonyms *R. intermedius* DC. fl. fr. *R. intermedius* St. h. 74. n. 7. f. β ., nicht DC. — Mit der Va-

riet. β . und γ ., welche überall häufig auf den Wiesen wachsen, ist nicht zu verwechseln der *R. Pseudo-Acetosa* β . Bert. fl. ital., womit der Verf. den *R. triangularis* DC. verbindet, welchen ich nicht kenne, der aber nach der Beschreibung in der Fl. ital. sich doch eine kleinere und schlankere Gestalt sowie doch dickere W. Fasern von der gewöhnlichen Form des *R. Acetosa*, und nach DC. doch ein deutliches Merkmal, nämlich doch hinfallige äussere Blättchen des Perigons, bemerklich unterscheidet. Unsere Varietäten kommen in der Grösse sämtlicher Theile, in der Dicke der W. Fasern und in allen Merkmalen genau mit der Variet. α . überein und unterscheiden sich nur doch die erwähnte Form der *B.* — Der *R. intermedius* DC., den ich mit unserer Variet. γ . verbunden hatte, unterscheidet sich nach den Beschreibungen von DC. und Bertol. und nach getrockneten Expl. aus der Gegend von Montpellier von unserem *R. Acetosa* doch die nierenf.-rundl., quer-breiteren inneren Blättchen des Perigons. Bertoloni zieht den *Rumex intermedius* DC. zu *R. thyrsoides* Desf. — Der *R. intermedius* so wie der ganz ähnliche *R. tuberosus*, der jedoch ausser den verdickten an Fäden hängenden Wurzelfasern durch die äussern Perigonialblättchen, welche mit den inneren fast gleiche Länge haben, leicht erkannt wird, müssen im Littorale und in Istrien gesucht werden.

20. *R. HISPANICUS* (*Acetosa Hispanica Maxima* Munting dissert. de vera herba Brittanica S. 225., eine gute Abbildung und treffliche Beschreibung.) Spanischer A. — *Die inneren Zpfl des FruchtP. eyf., mit einer längl. Schwiele, die etwas länger ist als die Hälfte des Zpfl's*, versehen, die äusseren zurückgeschlagen; *B.* pfeilf. oder spießf., aderig. 4. Wird für den Küchengebrauch angebant. Mai, Juni. *R. Acetosa* Bert. fl. ital. *R. hispanica* Gmel. bad. 3. S. 255. in der Anm., denn *R. hispanica* 2. S. 112. ist, wie der Verf. selbst bemerkt, einerlei mit *R. arifolius* All. *R. acetosa* β . L. fl. suec. in Beziehung auf den Küchengebrauch, denn die Pfl. aus Lappland gehört auch zu *R. arifolius* All. — In unserm bot. Garten steht nur das männliche Geschlecht, desshalb entnahm ich die Beschreibung der Frucht aus der Fl. ital. Kultiv.

21. *R. ACETOSELLA* (L.) Kleiner A. — *Die innern Zpfl des FruchtP. rundlich-herzf., häutig, netzaderig, ganzrandig, ohne Schuppe, v. der Länge der Nuss*, die äussern aufrecht, ange-drückt; *B.* spießf., lanzettl. oder lineal. 4. Auf Triften, Sandäckern, an kult. O. überall, besonders auf sandig. Stellen. Mai-Juli. Var.:

α . *vulgaris*, *B.* lanzettl., pfeilf. St. h. 74. n. 9.

β . *angustifolius*, *B.* lineal. oder schmal-lanzettl., oft nur mit einem, seltener auch ohne Ohrchen.

γ . *multifidus*, grösser, Ohrchen der *B.* 2-3sp.: *R. Acetosella* δ . *lacerus* und γ . *multifidus* Wallr. *R. Acetosella* δ . L. und *R. multifidus* L. *R. multifidus* St. h. 74.

2. *OXYRIA* (Hill.) Säuerling. — *P.* bis an die Basis 4th., die 2 innern Zpfl. grösser. Stbg. 6.; 2 den äussern Zpfl. des *P.*

und 1 den innern gegenst. N. 2, pinself. Hautfrucht geflügelt, viel länger, als das Fruchtp. N. v. E. gen. 8. 10.

1. O. DIGYNA (Campdera.) Nierenblättriger S. — 4. B. nierenf., ausgerandet. Auf Felsen d. A., (Schweiz, Tyr., Salzbg., Obersteyern., Kärnth.) Juli. Aug. O. reniformis Hooker. D. fl. 2. 606. Rumex digynus L. Rheum digynum Wahlenb. lapp. t. 9. f. 2. D.

3. POLYGONUM (L.) Knöterig. — P. 4-5sp. oder th., oberwärts farbig. Stbg. 2reihig; in der äussern Reihe 5, mit den Zpfln des P. abwechselnd; in der innern 3, den 3 innern Zpfln des P. und den Flächen des 3kantigen Fruchtkn. gegenst., letztere bei gewissen Arten entw. alle oder zum Theil fehlend. An der Basis der Stbg. oft Drüsen. Fruchtkn. 3kantig, mit 3 N. oder zsge-drückt, mit 2 N., (und zwar oft auf einem Exemplare,) die N. oder die Basis der Gf. mehr oder weniger zsgewachsen. Nuss v. dem bleibenden P. umgeben. — Die 5 Stbg. der äussern Reihe finden sich immer vor und bei 8männigen Bth. auch die 3 innern; bei 7männigen Bth. fehlt dasjenige Stbg., welches dem hintern Zpfl. des P. gegenüber steht, es sind aber die 2, den seitenst. Zpfln gegenüberstehende, vorhanden; bei 6männigen Bth. fehlen die beiden letztern, jenes aber ist vorhanden; 5männigen Bth. fehlen die 3 innern gänzlich. N. v. Esenb. gen. 8. 7 und 8.

I. Rotte. BISTORTA Tournef. Eine einzige Aehre an der Spitze des ganz einfachen St. Stbg. alle oder nur die 3 innern, von denen oft 1 oder 2 fehlen, aus drüsiger Basis hervorgehend. Gf. bis an die Basis gespalten, mit fädlichen, verlängerten Schenkeln; N. rundlich, sehr klein. Keim seitenst.; Keimblätter flach, schmal. — Bth. rosenroth oder weiss.

1. P. BISTORTA (L.) Nattern-K. — *Der St. ganz einfach, 1ährig*; Aehre gedrun-gen; B. länglich-eyf., fast herzf., wellig; *Bstiele geflügelt*. 4. Auf feuchten Wiesen der Aehren und niedrig. Berge. Juni. Juli. Fl. d. t. 421.

2. P. VIVIPARUM (L.) Spitzkeimender K. — *Der St. ganz einfach, 1ährig*; Aehre gedrun-gen; B. oval oder lanzettl., am Rande umgerollt, gerieft-kleingekerbt dch die verdickten Aederchen des Randes; *Bstiele flügellos*. 4. Auf Triften der A.; mit den Flüssen herabsteigend, (dch d. g. AK.) Juli. Aug. Fl. d. t. 13.

II. Rotte. PERSICARIA Tournef. Der St. ästig, jeder Ast mit einer Aehre endigend. Die äussern Stbg. drüsenlos, die innern aus einem Kranze v. Drüsen hervorgehend, aber fast immer 1 oder 2 derselben fehlend. Gf. bis zur Hälfte oder tiefer gespalten; N. gross, kopfig. Keim wie bei der vorhergeh. Rotte. — Alle Arten dieser Rotte var. mit purpurnen und weissen Bth., ungefleckten oder mit einem hufeisenf., braunen Flecken bezeichneten B.

3. P. AMPHIBIUM (L.) Wechsel-K. — *Aehren einzeln, gedrun-gen*, walzlich; Bth. 5männig; B. länglich-lanzettl.; *W. kriechend*. 4. An feuchten O. und zwar daselbst aufrecht, im Wasser selbst aber schwimmend. Bth. purpurn. Juni. Juli. Var.:

α. natans, B. schwimmend, langgestielt, kahl: P. amphibium α. natans Moench. In Teichen und Seen.

β. *coenosum*, der St. legt sich, nachdem das Wasser sich am Ufer zurückgezogen hat, oder nach ausgetrocknetem Sumpfe, mit den B. nieder, schlägt W., steigt aber an der Spitze in die Höhe und treibt daselbst die B. der folg. Variet.: *P. amphibium* β. D. fl. 2. p. 52.

γ. *terrestre*, aufrecht, B. kurz-gestielt, schmaler, flaumig-
rauh: *P. amphibium* β. *terrestre* Leers. Dieses an feuchten O.

δ. *maritimum*, der St. gestreckt; B. wie bei der vorhergeh. Variet., aber wellig: Dethard. consp. fl. megap. Diese kommt am Seestrande vor.

4. *P. LAPATHIFOLIUM* (L.) Ampferblättriger K. — *Aehren länglich-walzlich, gedrunken*, aufrecht oder etwas nickend; Bth. 6männig; B. eyf., elliptisch oder lanzettl.; *Tuten* kahl oder etwas wollig, kurz- und sehr fein-gewimpert; *Bthstiele nebst den K. drüsig-rauh*. ☉. An feuchten O., Ufern. Juli-Herbst. Rb. ic. 5. f. 688. die Stbg. irrig unterweibig abgebildet. *P. lapathifolium* Wahlenb. St. und Bth. grün oder roth oder der St. roth-gefleckt, bald gestreckt, bald aufrecht, die Gelenke manchmal sehr verdickt; *P. nodosum* Pers. Rb. ic. f. 689. Var. auch

β. *incanum*, B. unterseits wollig-filzig: *P. incanum* Schmidt. *P. tomentosum* Schrank. *P. Persicaria* γ. L.

5. *P. PERSICARIA* (L. var. α.) Flöh-K. — *Aehren länglich-walzlich, gedrunken*, aufrecht oder etwas nickend; Bth. 6männig; B. eyf., elliptisch oder lanzettl.; *Tuten* rauhh., lang-gewimpert; *Bthstiele nebst den K. drüsenlos*. ☉. Mit dem vorhergeh. überall. Juli-Herbst. Var. wie der vorhergehende, ihm sehr ähnliche. Nüsse einmal beinahe sämmtlich 3kantig: *P. rivulare* Roth.; ein andermal die meisten zsgedrückt: *P. lapathifolium* α. Roth.

6. *P. MITE* (Schrank.) Schlaßblüthiger K. — *Aehren fädlich, locker, überhangend*, fast gestielt; Bth. 6männig; B. lanzettl. oder länglich-lanzettl.; *Tuten* rauhh., lang-gewimpert; Bth. drüsenlos. ☉. An feuchten O., um Dörfer, an Gräben, (in der Schweiz, Elsass, Bad., Wetterau, Bayern, Schles., Westphal.) Juli-Oct. *P. laxiflorum* Weihe. D. fl. 3. p. 55. *P. mite* Meyer. chlor. hanov. *P. dubium* Stein., nach A. Braun. *P. Braunii* Bl. und Fing. Aehren anfangs weisslich, zuletzt purpurn. — Das *P. mite* Pers. (1805.) ist nach Meyer einerlei mit *P. hydropiperoides* Michaux, und von unserer Pfl. nicht verschieden. D.

7. *P. HYDROPIPER* (L.) Pfefferiger K. — *Aehren fädlich, locker, überhangend*, unterwärts unterbrochen; Bth. 6männig; B. lanzettl. oder elliptisch; *Tuten* fast kahl, kurz-gewimpert, die blüthenst. fast wimperlos; *Bth. drüsig-punktirt*. ☉. An feuchten O., Gräben überall. Juli-Herbst. Rb. ic. f. 687. Bth. grün, am Rande purpurn oder weisslich, selten ganz purpurn.

8. *P. MINUS* (Huds.) Kleiner K. — *Aehren fädlich, locker*, meist aufrecht; Bth. 5männig; B. lanzettl.-lineal., gleichbreit, nach vorn allmählig verschmälert, die stengelst. an der Basis abge-

rundet, die an den Aesten hinten spitziger; *Tuten* angedrückt-behaart, *lang-gewimpert*; Bth. drüsenlos. ☉. In Gräben, an feuchten O. Juli-Herbst. P. Persicaria *β. angustifolium* L. P. pusillum Lam. P. strictum All. ped. t. 68. f. 2. P. angustifolium Roth. Bth. purpurn oder selten weiss. Expl. aus England kommen mit den unsrigen völlig überein.

III. Rotte. AVICULARIA Meisn. polyg. p. 85., nach Dub b. gall. p. 405. Bth. in den Bwinkeln büschelig, oder doch Verkleinerung der B. an der Spitze der Aeste unterbrochne Aehren bildend. Stbg. 8., die Stbf. der 3 innern an der Basis breit-eyf., aber keine Drüsen im Grunde des P. Gf. 3., sehr kurz, frei; N. sehr klein. Keim wie bei den vorhergeh. Rotten.

9. P. AVICULARE (L.) Vogel-K. — Bth. *blattwinkelst.*; B. lanzettl. oder elliptisch, aderig, flach; Tuten meist 6nervig, 2sp., die Zpfl. lanzettl., zugespitzt, zuletzt vielsp.; der St. ästig, Aeste bis an die Spitze beblättert; Nüsse runzelig-gestrichelt, fast glanzlos. ☉. An Wegen, kult. O. überall. Juli-Herbst. St. h. 1. Bth. grasgrün, mit purpurnem oder weissem Rande. Var. mit gestrecktem, an d. Erde angedrücktem St. und:

β. erectum, St. aufrecht. P. aviculare *β. erectum* Roth.

γ. littorale, B. ziemlich dick: P. littorale Link. Dieses am Meeresufer.

10. P. MARITIMUM (L.) Meerstrands-K. — Bth. *blattwinkelst.*; B. elliptisch, aderig, am Rande umgerollt; Tuten meist 12nervig, 2sp., Zpfl. lanzettl., zugespitzt, zuletzt vielsp.; der St. ästig; Nüsse sehr glatt, glänzend. 4. An sand. O. am Ufer d. Adriat. Meeres, (bei Monfalcone, Bartling; auf d. Insel Sansego, Tommas.) Juli Aug. Bth. wie bei dem vorherg. D.

11. P. BELLARDI (All. ped. t. 90. f. 2.) Bellardi's K. — Bth. *blattwinkelst.*; B. aderig, flach, elliptisch, die obren lanzettl., zugespitzt; Tuten meist 6nervig, zuletzt vielsp.; der St. aufrecht; Aeste ruthenf., unterbrochen-ählig; Aehren oberwärts blattlos; Nüsse sehr fein-runzelig-gestrichelt. ☉. An kult. O., (im östr. Litt., Triest.) Juni. Juli. P. patulum MBieb. Bth. wie bei den vorhergeh. D.

IV. Rotte. HELIXINE D. fl. 3. p. 61. Bth. in den Bwinkeln gebüschelt. Stbg. 8, 3 wie gewöhnlich tiefer-eingefügt; Drüsen in der Basis des P. fehlend. Gf. 1, kurz, mit einer einzigen, 3lappigen N. Frucht P. vergrössert. Keim wie bei den vorhergeh. Rotten.

12. P. CONVULVULUS (L.) Windenartiger K. — Der St. krautig, windend, kantig-gerieft; B. herz-pfeilf.; die 3 innern Zpfl. des P. stumpf-gekielt; Nüsse 3kantig, glanzlos. ☉. An kult. O. überall. Juli-Herbst. Fl. d. t. 744. Bth. grasgrün, am Rande und inwendig weiss.

13. P. DUMETORUM (L.) Hecken-K. — Der St. krautig, windend, kantig-gerieft; B. herz-pfeilf.; die 3 äussern Zpfl. des P. häutig-geflügelt; Nüsse 3kantig, glänzend. ☉. In Zäunen, Hecken.

Juli. Aug. Fl. d. t. 756. *Fagopyrum dumetorum* von Bönningh. Farbe d. Bth. wie beim Vorigen.

V. Rotte. *ACONOGONUM* Meisn. polyg. p. 55. Bth. traubig; Tr. rispig. Stbg. 8, zwischen Drüsen eingefügt. Gf. 3, sehr kurz, mit dicken, kopfigen N. Frucht länger, als das P. Keim seitenst., gekrümmt, mit ziemlich flachen, an dem Eyweisse anliegenden Keim B.

14. P. ALPINUM (All. ped. t. 68. f. 1.) Alpen-K. — Tr. endst., rispig; Bth. Smännig; der St. aufrecht, ästig; B. länglich-lanzettl., zugespitzt, wellig, gewimpert, unterseits flaumig, in den kurzen Bstiel verschmälert; Tuten rauhh. 2. Auf fruchtbar. Wiesen der höchsten AThäler, (im Ursern- und Tössthal des C. Uri, im Binnthale d. Wallis, Tessin.) Juli. Aug. Bth. gelblichweiss oder bleich-rosenroth, mit purpurnen N. S.

VI. Rotte. *FAGOPYRUM* Tournef. Bth. traubig; Tr. rispig oder ebenstrüssig. Stbg. 8, die 3 innern zw. Drüsen eingefügt. Gf. 3, mit ziemlich dicken, kopfigen N. Frucht länger, als das P. Keim mittelpunktst. mit faltig-eingerollten Keim B.

15. P. FAGOPYRUM (L.) Buchweizen-K. — Tr. blattwinkelst., einfach, die endst. ebenstrüssig; Nüsse zugespitzt, 3kantig, Kanten ganzrandig; der St. aufrecht, wehrlos; B. pfeil-herzf., zugespitzt. ☉. Wird kult. Juli. Aug. St. h. 18. Bth. rosenroth oder weiss, an der Basis grün. Kultiv.

16. P. TATARICUM (L.) Tatarischer K. — Bth. büschelig; Büschel in den Blattwinkeln einzeln, und endst. in unterbrochenen, hangenden, blattlosen Ähren; Nüsse spitz, 3kantig, Kanten ausgeschweift-gezähnt; der St. aufrecht, wehrlos; B. pfeil-herzf., zugespitzt. ☉. Auf Aeckern, (bei Hamburg, in Westphal. und Hanov. und daselbst an manchen O. ein lästiges Unkraut; Krain, Dolliner.) Juli. Aug. Bth. grün, und nicht drüsenlos, wie sie v. Bönningh. beschreibt. D.

XCVIII. Ordng. THYMELEEN. Juss. gen. 76.

P. unterst., oft farbig, röhrig, mit 4, seltner 5 sp. Saume, in der Knospenlage dachig. Stbg. von bestimmter Zahl dem Schlunde oder der Röhre eingefügt, noch einmal so viel, als Zpfl. des P.; Stbk. 2fächerig, mit 2 Längsritzen aufspringend. Fruchtkn. frei, 1fächerig, 1eyig; Eychen hängend. Gf. 1. N. 1. Frucht trocken oder beerenartig. Eyweiss fehlend oder dünn und fleischig. Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Stränche und Kräuter ohne Neben B.

I. PASSERINA (L., nach Wickström's Verbesserung.) Vogelkopf. — P. mit 4 sp. Saume, bleibend, verwelkend. Stbg. 8. Eine Nuss. N. v. Esenb. gen. 7. 3.

1. *P. ANNUA* (Wikstr.) Jähriger V. — Der St. kahl, ästig; *B.* zerstreut, lanzettl.-lineal., spitz, *kahl*, aufrecht-abstehend; Bth. blattwinkelst., zu 5, 3 oder einzeln, flaumig; Zpfl. des Perigons nach der Blthezeit zsneigend. ☉. Auf Aeckern und an sonnigen O. der Ebenen und niedrig. Berge, vorzügl. auf Kalkboden, (zerstreut dch d. südl. und mittlere Geb.) Juli. Aug. *Stellera Passerina* L. Schk. t. 107 a. Bth. grün.

2. *P. HIRSUTA* (L. spec. 513.) Rauhhaariger V. — *Die St.* aufrecht, ästig, *filzig*; *B. eyf., fleischig, unterseits kahl, oberseits filzig*, Bth. gehäuft; Perigon aussen filzig, fast glockig, mit eyf. Zpfln. ♀. Auf unbebauten Anhöhen, (auf d. Insel Canidole piccole bei Lossino, Dr. Sendtner, erhalten dch Tommas.) Mai.

2. *DAPHNE* (L.) Kellerhals. — *P.* mit 4 sp. Saume, abfällig. Steinfrucht mit weichem oder lederigem Fleische. N. v. E. gen. 7. 2.

1. *D. MEZERÉUM* (L.) Gemeiner K. — *Bth. seitenst., sitzend*, meist zu 3, flaumig; Zpfl. des P. eyf., spitz; *B.* lanzettl., an der Basis keilig-verschmälert, kahl. ♀. In Hainen, in die VorA. hinaufsteigend. Febr. März. St. h. 8. Bth. rosenroth, selten weiss.

2. *D. LAURÉOLA* (L.) Immergrüner K. — *Tr.* kurz, meist 5bth., überhangend, *blattwinkelst.*; Bth. mit den DeckB. kahl; *B.* lanzettl., an der Basis keilig-verschmälert, kahl. ♀. In Gebirgswäldern, (westl. Schw. und Oestr., südl. Tyrol.) März. Apr. J. a. t. 183. Bth. gelblich-grün.

3. *D. ALPINA* (L.) Alpen-K. — *Bth. endst., gehäuft, sitzend*, zottig; Zpfl. des P. lanzettl., zugespitzt, um ein Drittel kürzer, als die Röhre; *B.* lanzettl. oder verkehrteyf., *flaumig, später kahl*, abfällig. ♀. Auf Felsen d. A., (dch d. g. AK.) Mai-Jul. St. h. 22. *Thymelaea candida* Scop. Bth. weiss.

4. *D. COLLINA* (Sm.) Hügel-K. — *Bth. endst., büschelig, auswendig, filzig-zottig*; Zpfl. des P. eyf., stumpf; *B.* länglich-verkehrteyf., stumpf oder gestutzt, glänzend, oberseits kahl, *unterseits rauhh.*, immergrünend. ♀. An felsigen O., (im Isonzothale, Brignoli.) März. Apr. Bth. rosenroth. Expl. von dem bezeichneten O. habe ich noch nicht gesehen. D.

5. *D. BLAGAYANA* (Freyer.) Blagayscher K. — *Bth. endst., büschelig, kurzgestielt*; die Röhre des Perigons mit kleinen, aufrechten Haaren bestrent; Zpfl. eyf., 3mal kürzer, als die Röhre; der Büschel an der Basis deckblättrig, die unteren DeckB. verkehrteyf., unterseits und am Rande seidenh. und ohne Bth., von den oberen die, welche die unteren Bth. stützen, lineal-keilf. und fast so lang, als die Röhre; *B. längl., verkehrt-eyf., stumpf, kurzstachelspitzig, kahl.* ♀. In Bergwäldern, auf dem St. Lorenzberge bei Billichgrätz in Krain, und Göstinger Berg bei Grätz in Steyermark.) Mai. Bth. gelblichweiss. „St. fadenf., kriechend,“ v. Welden.

6. *D. STRIATA* (Trattinnick.) Geriefter K. — *Bth. endst.*, büschelig, sitzend, *kahl*; Zpfl des P. elliptisch, um ein Drittel kürzer, als die Röhre; DeckB. eyf., kurz-stachelspitzig, ein Drittel so lang, als die Röhre; *B. lineal.*-keilig, stumpf oder ausgerandet, kurz-stachelspitzig, *kahl*. *h.* Auf Felsen d. A., (dch d. g. AK.) Juli. Aug. D. Cneorum Wahlenb. helv. (nicht fl. carp.) D. Cneorum *γ.* D. fl. 3. p. 46. *Bth. rosenroth.*

7. *C. CNEÓRUM* (L.) Wohlriechender K. — *Bth. endst.*, büschelig, kurz-gestielt, nebst den DeckB. und dem St. oberwärts *flaumig*; Zpfl des P. elliptisch, um ein Drittel kürzer, als die Röhre; DeckB. sehr kurz, abgeschnitten; *B. lineal.*-keilig, stumpf oder ausgerandet, kurz-stachelspitzig, *kahl*. *h.* Auf trocknen Triften und Haiden in Gebirgsgegenden und auf Flächen, (von der südl. Schw. dch das südl. Tyrol nach dem Littor.; von den Vögeln und den Gebirgen der Rheinpfalz dch Schwab., Bayern bis Unteröstr.; in Mähr. und Schles.) Juni. Juli. D. fl. 3. p. 46. *α.* J. a. t. 426. Pollich. pal. t. I. f. 4.

XCIX. Ordng. LAURINEFN. DC. fl. fr. 3. p. 361. Lauri Juss. gen. p. 80.

P. unterst., 4-6 sp. oder 4-6 th., in der Knospenlage dachig. *Stbg. auf der Basis der Zpfl eingefügt*, 6, in einer einfachen Reihe, oder 12, in einer doppelten Reihe. *Stbk. an den Stbf. angewachsen, 2fächerig*; Fächer mit einer Klappe von der Basis bis zur Spitze aufspringend. Fruchtkn. frei, 1eyig; Eychen hängend. Gf. I. N. I. Steinfrucht oder Beere. Eyweiss fehlend; Keim gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Bäume oder Sträucher. *Bth. zwittrig* oder dch Fehlschlagen 2häusig.

1. *LAURUS* (L.) Lorbeer. — *Bth. 2häusig.* P. 4th. Männch. Die endst. Bth. 12männig, ohne Fruchtkn.; Stbg. 2reihig, die 6 äussern einfach, die 6 innern in der Mitte mit 2 Drüsen, als doppeltes Anhängsel, versehen. Die seitenst. Bth. 9-10männig. Weibch. Stbg. 4, unfruchtbar; Fruchtkn. vollkommen. Eine Beere. N. von E. gen. 7. 4.

1. *L. NOBILIS* (L.) Edler L. — *B. länglich-lanzettl.*, an beiden Enden zugespitzt, etwas wellig, aderig; *Bth. blattwinkelst.*, büschelig. *h.* In Südeuropa einheimisch, jetzt in der Schw. jenseits d. A., im östr. Litt. eingebürgert, (in Tyrol blos kultiv., Fucchini.) Apr. Mai. Schk. t. 110.

C. Ordng. SANTALACEEN. R. Brown. prodr. p. 350.

P. oberst, 3, 4, 5 sp., inwendig farbig, in der Knospenlage klappig. *Stbg. 4-5, an der Basis der Zpfl des P. eingefügt und*

diesen gegenst. Fruchtkn. 1fächerig, 2-4eyig; Eychen neben der Spitze des mittelpunktst. Samenträgers angeheftet, hängend. Gf. 1. Frucht nuss- oder steinfruchtartig, 1samig. Eyweiss fleischig. Keim in der Achse liegend; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. B. wechselst. oder zerstreut, nebenblattlos.

1. THESIUM (L.) Thesium. — P. 4-5sp., tellerf. oder trichterf. Stbg. von einem Haarbüschel umgeben. Gf. 1; N. einfach. Steinfrucht 1samig, trocken oder saftig, mit dem bleibenden P. bekrönt. N. von Esenb. gen. 7. 1. Bth. grün, innen weiss.

1. Rotte. DREIDECKBLAETTRIGE. Der St. oberwärts traubig oder rispig. Tr. oder R. bis an den Gipfel mit Bth. besetzt. DeckB. 3 unter jeder Bth. Steinfrucht trocken.

a. P. nach dem Verblühen bis auf die Basis eingerollt, einen kurzen Knoten auf der Frucht bildend, welcher kaum den dritten Theil der Länge der Frucht erreicht.

1. T. MONTANUM (Ehrh. herb. exsicc. n. 2.) Berg-T. — *W. hinabsteigend, ästig, zuletzt vielstengelig; die St. aufrecht, oberwärts rispig; R. pyramidenf., Aestchen abstehend; B. lanzettl., oder lineal-lanzettl., lang-zugespitzt, 3-5 nervig; DeckB. zu 3.; Früchte rundl.-eyf., gestielt; das FruchtP. eingerollt, 3mal kürzer, als die Frucht. 4. Auf Gebirgen, in Wäldern (stw. dch d. Gebiet.) Juli. Aug. D. fl. 2. 282. Hayne in Schrad. Journ. 1800. t. 6. Die Stbk. sind noch einmal so lang, als die verblühten Stbk.*

2. T. INTERMEDIUM (Schrad. spicileg. fl. germ. S. 26.) Mittleres T. — *W. ausläufertreibend, St. aufrecht oder aufstrebend, oberwärts rispig; R. pyramidenf., Aeste abstehend; B. lineal-lanzettl. oder lineal., spitz, 3nervig; DeckB. zu 3.; Frucht oval oder längl., gestielt, das FruchtP. eingerollt, 3mal kürzer, als die Frucht. 4. Auf Bergwiesen und im Gesträuch, (an vielen O. häufig, an anderen gänzlich fehlend.) Juli. Aug. D. fl. 2. 283. T. linophyllum Pollich. palat. und vieler Autoren. Das T. linophyllum L. spec. ist eine nicht sicher zu ermittelnde Art. Die Stbk. nach dem Verblühen der Stbk. noch einmal so lang. Var.:*

β. fulvipes, Fruchtstiel so lang, als die Frucht, sowie der untere Theil der Frucht, gefärbt und bei der lebenden Pfl. saftig: *T. fulvipes* Griesselich in der regens. bot. Ztg. Kürzlich empfangene Expl. von *Thesium intermedium* belehrten mich, dass *Th. fulvipes* als Art nicht zu trennen sei; immerhin bleibt es aber eine bemerkenswerthe Variet., die den Uebergang von der ganz saftlosen Frucht der meisten Arten dieser Gattung zu der saftreichen des *T. rostratum* darstellt.

3. T. DIVARICATUM (Jan. in M. und K. deutsch. Fl. 2. S. 283.) Sperriges T. — *W. hinabsteigend, ästig, zuletzt vielstengelig; St. aufrecht, oder aufstrebend, oberwärts rispig; R. pyramidenf., Aestchen abstehend; B. lineal., spitz, einnervig oder schwach 3nervig; DeckB. zu 3, am Rande ein wenig rauh, kürzer, als die*

Frucht; Früchte walzlich-länglich, gestielt, Stielchen länger, als die Hälfte der Frucht; das Fruchtp. eingerollt, dreimal kürzer, als die Frucht. 4. An unbauten, bergigen O., (Triest u. Fiume.) Juli Aug. In der D. fl. ist die Frucht nach einem unvollständigen Expl. unrichtig beschrieben. Die Pfl. ist nicht so sehr sperrig, wie die folgende. D.

1. T. HUMIFUSUM (DC. fl. fr. 5. S. 366.) Niedergestrecktes T. — W. hinabsteigend, ästig, zuletzt vielstengelig; die St. niedergestreckt, oder aufstrebend, traubig oder ästig mit traubigen Aesten; die blüthetragenden Aestchen so lang, als die Bthe, oder länger zuletzt fast wagerecht-abstehend; die Kanten der Aestchen und der Rand der oberen B. gezähnel-rau; B. lineal., schwach-Inervig; DeckB. zu 3, von der Länge der Frucht, oder das mittlere der unteren Aestchen länger; Frucht eyf., fast sitzend; das Fruchtp. eingerollt, 3mal kürzer, als die Frucht. 4. Auf Hügeln und an Ackerrändern in Unterösterreich, (bei Wagram unweit Wien, Dolliner.) Juni. Juli. D.

5. T. RAMOSUM (Hayne in Schrad. Journ. 1800. I. S. 30. t. 7.) Ästiges T. — W. spindelrig, zuletzt vielstengelig; St. aufrecht, oder aufstrebend, ästig; Aeste traubig, und so wie die Aestchen aufrecht, etwas abstehend, und nebst dem Rande der oberen B. und der DeckB. gezähnel-rau; die blüthetragenden Aestchen 3-4mal länger, als die Frucht; B. lanzettl.-lineal., oder lineal., schwach 3nervig; DeckB. zu 3, das mittlere aller Bth. länger, als die Frucht; Früchte eyf., fast sitzend; das Fruchtp. eingerollt, 3mal kürzer, als die Frucht. 4. Auf trockenen Wiesen und Bergtriften, (bisher bloss bei Wien und bei Maria Zell in Steyerm.; das T. ramosum der fl. cech. ist T. intermedium.) Juni. Juli. D. fl. 2. 283., Hayn. mit Ausschluss des Synonyms von Pollich, welches zu T. intermedium gehört. T. palatinum Roth; irrthümlich so benannt, denn es wächst nicht in der Pfalz. D.

6. T. HUMILE (Vahl symb. 3. S. 43.) Niedriges T. — W. spindelrig, 1-mehrstengelig; St. aufrecht, oder aufstrebend, ästig, die Aeste traubig, und so wie die Aestchen und der Rand der oberen B. und der DeckB. gezähnel-rau; die blüthetragenden Aestchen sehr kurz, kürzer, als die Frucht, aufrecht; die Früchte eyf., fast sitzend, an den St. angelehnt; B. lineal, Inervig; DeckB. zu 3, dass mittlere länger, als die Frucht; das Fruchtp. eingerollt, 3mal kürzer, als die Frucht. 4. oder ☉? Auf Brachäckern in Unterösterreich, (zw. Wiener-Neustadt und Katzelsdorf, Welwitsch.) Juni. Juli. D.

b. P. nach dem Verblühen röhrig, nur an der Spitze eingerollt, von der Länge der Nuss oder länger.

7. T. PRATENSE (Ehrh.) Wiesen-T. — W. spindelrig; die St. traubig oder rispig; die fruchtrag. Aestchen wagerecht abstehend; B. lanzettl.-lineal., schwach-3nervig; DeckB. zu 3; Steinfrüchte fast kugelig; Fruchtp. röhrig, an der Spitze eingerollt, so lang, als die Frucht. 4. Auf Berg- und Alpenwiesen, (stw. deh d. g.

Gebiet.) Juni. Juli. Rb. ic. 5. f. 647. Die Zpfl des Perigons während der Bthe wagerecht abstehend; Dr. Pfeiffer.

8. *T. TENUIFOLIUM* (Sauter in Brief.) Feinblättriges T. — W. spindelf.; St. dicht rasenartig, gleichhoch, aufrecht, von der Mitte an ästig; Aeste dem Stengel genähert, aufrecht, die unteren keine Bth. tragend, die bthetragenden *Aestchen aufstrebend, gleichmässig-traubig*; B. schmal, lineal-verlängert, Inervig; DeckB. zu 3; *Früchte fast kugelig; das Fruchtp. röhrig*, an der Spitze eingerollt, *so lang, oder länger, als die Frucht*. 4. An grasigen, steinigen O., (am Ufer der Steyer bei Steyer in Oberöstr.) Juni. Juli. Sauter. D.

9. *T. ALPINUM* (L.) Alpen-T. — W. spindelf.; die St. etwas zerstreut, einfach oder hie und da mit einem Aste versehen, Aeste traubig, die fruchttrag. *Aestchen aufrecht-abstehend, einseitig-wendig*; B. lineal, Inervig; DeckB. zu 3; Steinfrüchte *fast kugelig; Fruchtp. röhrig*, an der Spitze eingerollt, *so lang, als die Frucht oder länger*. 4. Auf Haiden und Triften der Ebenen, Berge und A. Juni. Juli. St. h. II.

II. Rotte. EINDECKBLAETTRIGE. Der fruchttrag. St. an der Spitze durch unfruchtbar. DeckB. schöpfig. Ein einziges DeckB. unter jeder Bth. Steinfrucht trocken oder saftig.

10. *T. EBRACTEATUM* (Hayn. in Schrad. Journ. 1800. I. t. 6.) Deckblattloses T. — W. *kriechend*; Tr. einfach, die fruchttrag. dch unfruchtbare DeckB. an der Spitze schöpfig; *Bth. 1deckblättrig*; Steinfrüchte oval, gestielt, lederig, 3mal kürzer, als das röhrige, an der Spitze eingerollte Fruchtp. 4. Auf grasreichen Hügeln und in lichten Wäldern, (Mecklenb., Brandenb., Schles., Preuss.) Juni. Juli. Rb. ic. 5. f. 649. D.

11. *T. ROSTRATUM* (M. und Koch.) Schnabelfrüchtiges T. — W. *abgebissen, vielköpfig*; Tr. einfach, die fruchttrag. dch unfruchtbar. DeckB. an der Spitze schöpfig; *Bth. eindeckblättrig*; Steinfrüchte fast kugelig, sitzend, beerenartig, saftig, um die Hälfte kürzer, als das röhrige, an der Spitze eingerollte Fruchtp. 4. Auf trockenen, unfruchtbaren Wiesen und dem Kiese der Bäche in den A. und VorA., mit den Flüssen in die die A. begleitenden Thäler herabsteigend, (Schw.; Bayern im Isarbette bei München häufig, mit dem Flusse aus den A. herabgekommen; Tyrol; Salzb.) Juni. Juli. Rb. ic. 5. f. 650. Von allen dch die weichen, saftigen, schön-citronengelben Früchte sehr verschieden.

2. *ÓSYRIS* (L.) Harnkraut. — Bth. vielehig. P. 3sp. Männch. Stbg. 3. Zwitt. Stbg. 3, manchmal fehlschlagend; N. 3. Beere trocken. N. von E. gen. 3. 20.

1. *O. ALBA* (L.) Weisses H. — $\frac{1}{2}$. An felsig., unfruchtbar. O. im östreich. Littor., (Triest, Fiume.) Apr. Mai. Schk. t. 319. Bth. schmutzig-gelb. D.

CI. Ordng. ELAEAGNEEN. R. Brown. prodr. p. 330.

P. unterst., inwendig farbig, 2-4sp.; Zpfl während der Knospenlage dachig. *Stbg. dem Schlunde des P. eingefügt*, dessen Zpfl an der Zahl gleich und damit abwechselnd oder noch einmal so viel. *Stbk. 2 fächerig, mit 2 Längsritzen aufspringend.* *Fruchtkn.* in der Röhre des P. eingeschlossen, frei, *1eigig; Eychen aufrecht.* Gf. 1. N. 1. Eine falsche Steinfrucht, die aus dem bleibenden, beerenartig gewordenen P. und einer krustigen Nuss besteht. Eyweiss fleischig, dünn; Keim gerade; Würzelchen unterst. Bäume und Sträucher mit nebenblattlosen, silberweiss- oder bräunlich-schülferigen B. Bth. oft 1geschlechtig.

1. **ELAEAGNUS** (L.) Oleaster. — Bth. zwittrig; Röhre schlank; Saum glockig, 4-5sp.; Schlund dch einen kegelf. Ring verengert. *Stbg.* 4-5. Eine falsche Steinfrucht, aus dem beerenartigen und inwendig knöchernen, die Nuss einschliessenden K. gebildet. N. von E. gen. 3. 18.

1. **E. ANGUSTIFOLIA** (L.) Schmalblättriger O. — B. lanzettl., spitz, ganzrandig, beiderseits silberweiss-schülferig; Bth. blattwinkelst., gestielt, aufrecht, einzeln oder zu 3. ♀. Auf unfrucht. Hügeln der wärmern Gegenden, (häufig auf der Insel Osero.) St. h. 5. Bth. auswendig silberweiss-schülferig, wie die B., inwendig hell-pomeranzengelb. J.

2. **HIPPÓPHAË** (L.) Sanddorn. — Bth. 2häusig. Männch. P. 2th.; *Stbg.* 4. Weibch. P. röhrig, an der Spitze 2sp., ohne Ring am Schlunde. Eine falsche Beere, aus dem vergrößerten und saftigen, die Nuss einschliessenden K. gebildet. N. von E. gen. 3. 19.

1. **H. RHAMNOIDES** (L.) Weidenblättriger S. — ♀. An Fluss- und Meerufern, (an den Giesbächen und Flüssen dch d. g. AK. und mit den Flüssen in d. Ebenen v. Oberbad., Elsass, Schwab., Bayern und Oestr. hinabsteigend; stw. an der Küste von Holst. und von da bis Preuss.) Apr. Mai. Schk. t. 321. Bth. rostbraun.

CII. Ordng. CYTINEEN. A. Brogn. in den Annal. de scienc. nat. 1. 29. Rhizanthæae Blum. in der batav. Ztg.

Bth. 1geschlechtig. *P. oberst.*, 4-5th., in der Knospenlage dachig. *Stbg.* 8, 16 oder mehrere, an die mittelpunktst. Säule angewachsen. *Fruchtkn.* 1 fächerig, mit wandst. Samenträgern, vieleiylg. Eyweiss fleischig. Keim in der Achse liegend, gerade.

1. CYTINUS (L.) Hypocist. — Bth. 1häusig. P. röhrig-glockig, mit 4sp. Saume. Männch. 2DeckB. an der Basis des P. Stbk. 8, um die Spitze der mittelpunktst. Fruchtsäule herum auf-sitzend. Weibch. Fruchtkn. unterst., in der Mitte mit 2DeckB., 1fächerig, mit 8 wandst. Samenträgern.

1. C. HYPOCISTIS (L.) Gemeiner H. — 4. Auf der W. der Cisten schmarotzend, (auf den Inseln des Adriat. Meeres, Osero und Veglia, Lossino.) Mai. Lam. ill. t. 737. „Ist von Weitem dch die blutrothe Farbe, ehe er die Bth. geöffnet hat, zu erkennen.“ Link. Die geöffneten Bth. röthlich-gelb, wie die Pflanze selbst. J

CIII. Ordng. ARISTOLOCHIEEN. Juss. gen. 74., mit Ausschl. von Cytinus.

Bth. zwittrig. P. oberst., ungeth. und schief-abgeschnitten; oder 3sp., mit in der Knospenlage klappigen Zpfln. Stbg. zahlreich, frei und auf der Spitze des Fruchtkn. eingefügt oder mit dem Gf. und der N. zsgewachsen. Fruchtkn. 3-6fächerig, mit mittelpunktst., vieleiyigen Samenträgern. Keim sehr klein, an der Basis des knorpeligen Eyweisses liegend. B. wechselst.

1. ARISTOLOCHIA (L.) Osterluzei. — P. an der Spitze schief in eine Zunge, (eine Lippe), verbreitert, röhrig; Röhre an der Basis bauchig. Stbk. 6, unter der N. angewachsen. Kapsel 6fächerig. N. von E. gen. 8. 16.

1. A. ROTUNDA (L.) Runde O. — W. fast kugelig; die St. einfach, aufrecht; B. kahl, eyf., tief-herzf., sehr kurz-gestielt, Bstiele viel kürzer, als der Bthstiel; Bth. einzeln; Lippe des P. oval, an der Spitze abgerundet, ausgerandet, von der Länge der Röhre. 4. Auf trocknen Wiesen und an unkultiv. O. unter Gesträuch, (Litt., Triest, Fiume; bei Lugano im C. Tessin.) Apr. Mai. Perigon gelb, inwendig mit schwarz-purpurnen Streifen bemalt; Lippe gelb-braun.

2. A. PALLIDA (Willd. spec. 4. S. 162.) Bleiche O. — W. fast kugelig; die St. einfach, aufrecht; B. kahl, fast 3eckig-eyf., tief-herzf., gestielt, Bstiele so lang, als der Bthstiel oder länger; Bth. einzeln; Lippe des P. halb so lang, als die Röhre, ey-lanzettf., zugespitzt, an der Spitze selbst stumpf. 4. An gebirgigen O. unter Gesträuch, (Cilli in Untersteyern., Innerkrain und bis Triest und Fiume; Valle Bergami im C. Tessin.) März. Apr. A. lutea Desf. ann. mus. Perigon grün-gelblich, inwendig mit schwarz-purpurnen Längestreifen und einem Flecken von derselben Farbe an der Basis der Lippe. — Die A. lutea Desf. aus dem Valle Bergami hat kleinere, mit einem längeren Zünglein versehene Bth.,

ist aber sonst nicht verschieden. Die *A. longa* L. wurde im Gebiete unserer Fl. noch nicht gefunden; sie ist der *A. pallida* sehr ähnlich, hat aber eine spindelf., zuletzt walzliche, 1 Fuss lange W., ästige, laumige St., grün weisse, einfarbige Bth. und eine Blkr.Lippe fast von der Länge der Röhre. D.

3. *A. CLEMATITIS* (L.) Gemeine O. — W. kriechend, die St. einfach, aufrecht; B. eyf., tief-herzf., gestielt, kahl; Bth. blattwinkelst., büschelig. 4 In Weinbergen, an Zäunen, Ackerrändern, (stw. deh das Gebiet.) Mai, Juni. St. h. 6. Bth. gelblichweiss, oder blassgelb.

2. *ASARUM* (L.) Haselwurz. — P. glockig, 3-4sp. Stbg. 12, auf dem Fruchtkn. sitzend; Stbk. in der Mitte der Stbf. angewachsen. N. strahlig, 6lappig. Kapsel 6fächerig; Scheidewände mit den mittelpunktst. Kanten nicht zshängend. N. von E. gen. 8. 17.

1. *A. EUROPAEUM* (L.) Europäische H. — B. nierenf., stumpf. 4. In Bergwäldern, an schattigen Zäunen. März, Apr. St. h. 2. Die Bth. aussen grünlich-braun, innen dunkel-blutroth.

CIV. Ordng. EMPETREEN. Nutt. gen. 2. 233.

Bth. 1 geschlechtig. K. 3th., in der Knospenlage dachig. Blb. 3, mit den KB. abwechselnd. Stbg. 3, frei, den KB. gegenst. und, so wie die Blb. dem Fruchth. eingefügt. Stbk. 2fächerig, mit 2 Ritzen aufspringend. Fruchtkn. frei, auf einer fleischigen Scheibe liegend, 3-6 fächerig; Fächer 1eyig; Eychen aufstrebend. Gf. 1. N. strahlig; Strahlen so viele, als Fruchtkn.-Fächer. Frucht steinfruchtartig. Keim in der Achse des Eyweisses liegend, gerade; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Sträucher mit kleinen, immergrünen B.

1. *EMPETRUM* (L.) Rauschbeere. — Bth. 2häusig. K. 3th. Blkr. 3blättrig. Männch. Stbg. 3. Weibch. Gf. fast fehlend; N. mit 6-9 Strahlen. Steinfrucht 1fächerig, 6-9samig. N. von E. gen. 3. 17.

1. *E. NIGRUM* (L.) Schwarze R. — Liegend; B. länglich oder lineal, am Rande zurückgerollt, die Ränder in einer weissen Linie verbunden; N. 9strahlig. 4. An felsigen O. der höchsten A. und in morastigen Gegenden der VorA. und höheren Gebirge; auch an torfhaltigen O. des nördl. D., (deh d. g. AK.; Voges., Kniebis, Rhön, Brocken, Sudet.; von Wesphal. deh Niedersachs. bis Preussen.) Apr. Mai, auf den A. später. Schk. t. 318. Blkr. rosenroth; Stbg. purpurn.

CV. Ordng. EUPHORBIACEEN. Juss. gen. 384.

Bth. 1geschlechtig. *P.* unterst., in *Zpfl.* von bestimmter Zahl geth. oder fehlend. *Blb.* mit den *Zpfln* des *P.* abwechselnd, oder fehlend. Männch. *Stbg.* im Mittelpunkte der *Bth.* eingefügt oder unter einem Ansatz zu einem Stempel. *Stbk.* frei oder mannigfach-verwachsen. Weibch. Fruchtkn. frei, sitzend oder gestielt, 3fächerig, (seltner 2 oder mehrfächerig,) Fächer rings um den mittelpunktst. Samenträger in einen Kreis gestellt, 1-2egig; Eychen hängend, einzeln oder gezeiet. *N. geth.* Kapsel aus 2-3, oft elastisch-aufspringenden Springfrüchten gebildet. Eyweiss fleischig. Keim gerade, in der Achse liegend; Würzelchen nach dem Nabel gerichtet; Keim B. blattig. Oft milchende Pflanzen.

1. **BUXUS** (L.) Buxbaum. — *Bth.* 1häusig. Männch. K. 3th. *Blb.* 2. *Stbg.* 4. Ein Ansatz zu einem Fruchtkn. Weibch. K. 4th. *Blb.* 3. Kapsel 3schnäbelig, 3fächerig, mit 2samigen Fächern. *N. v. L.* gen. 3. 16.

1. **B. SEMPERVIRENS** (L.) Immergrüner B. — *B.* eyf., gestielt, am Rande etwas behaart; *Stbk.* ey-pfeiff. *b.* An gebirg., rauhen, unfrucht. O., (Steger in Oberöstr., Littorale; in Krain gegen d. Meeresküste hin; in der westl. Schw. an vielen O.; im Oberelsass bei Belfort auf Kalkhügeln häufig, eben so bei Grenzach im Oberbadischen und an der Mosel von Alken bis Bertrich.) März. Apr. Schk. t. 287. *Bth.* gelblich-grün. Es kommen 2 Variet., oder vielmehr Arten vor, allein die Früchte der Var. *β.*, welche vielleicht einige Verschiedenheit zeigen, habe ich noch nicht gesehen.

α. arborescens, gelangt zu einer Höhe von 5-10 Fuss oder zu einer noch grössern; die *B.* sind dunkler grün; im jüngern Zustande oft graugrün beduftet, und fast ohne Glanz. Die ganze Pfl. verbreitet einen unangenehmen Geruch, zumal in der heissen Jahreszeit. Diese findet sich an den oben bezeichneten O. *Buxus arborescens* Lam. dict. 1. S. 511.

β. humilis, 2-3 Fuss hoch, hat freudiger grüne *B.* ohne graulichen Anflug, und ist ohne Geruch. Diese im südl. Tyrol, (vom Gardasee zerstreut bis in die Region der *Pinus Mughus*, Facchini.) *Buxus suffruticosa* Lam. dict. 1. S. 511.

2. **ANDRACHNE** (L. gen. n. 973.) Andrachne. — *Bth.* einhäusig. Männch. K. 5th. *Blkr.* 5bl. *Stbgf.* 5. mit ihrer Basis an einen Ansatz zu einem Gf. angewachsen. Weibch. K. 5th. *Blkr.* fehlend. Gf. 3. Kapsel 3knotig; Knoten 2samig.

1. **A. TELEPHIOIDES** (L. spec. 1439.) *Telephium*artige A. — St. krautig, niederliegend; *B.* gestielt, eyf., kurz-zugespitzt; kahl.

○. An sonnigen, unbebauten O., (Insel Brioni, von Dr. Sendtner gesammelt, Tommasini.) Mai. Juni. J.

3. **EUPHORBIA** (L.) Wolfsmilch. — Die besondere (eigenthümliche) Bthhülle glockig, 9-10zählig; 5 Zähne derselben häutig oder krätzig, aufrecht oder einwärtsgekrümmt: 3, (oder 4,) mit diesen abwechselnde, auswärts gekehrt, auf ihrer obern Fläche mit einer fleischigen, Honig absondernden Scheibe ganz oder zum Theil bedeckt, welche man Drüse nennt. Männl. Bth. 10-20 u. mehrere, in der Basis der besondern Hülle, mit gewimperten oder gespaltenen Schuppen gestützt, nackt, 1männig, aus einem einzelnen, auf einem Bthstielchen stehenden nach der Bthezeit v. d. Bthstielchen abfälligen Stbg. bestehend. Weibl. Bth. einzeln, im Mittelpunkt d. besondern Hülle, gestielt, bleibend. K. sehr klein, etwas lappig oder auch kaum bemerkbar. Blb. fehlend. Fruchtkn. 1. Gf. 3sp. oder 3th, mit 2sp. oder ausgerandeten Schenkeln. Kapsel 3knotig. Springfrüchte 1samig, auf dem Rücken aufspringend und mit plötzlich zsgedrehten Klappen, die Samen wegschleudernd. N. v. Esenb. gen. 3. 11. D.

I. Rotte. **ANISOPHYLLUM** Roep. bei Dub. bot. gall. p. 412. B. nebenblättrig.

1. **E. CHAMAESYCE** (L.) Niedrige W. — Bth. blattwinkelst., einzeln; Drüsen ganz; Kapselklappen gekielt, glatt; *S. quer-runzelig*; *B. nebenblättrig, gegenst.*, gestielt, rundlich, an der Basis schief, vorne seicht-gekerbt. Kerben grannenlos; die St. gestreckt, ästig und nebst den B. kahl oder rauh. ○. An dürrn Rainen, in Weingärten, Brachfeldern, Gärten im Littor. Juni-Aug. Drüsen satt-roth. Var. kahl, mit zottigen Stengeln und mit grau-zottigen St. und B.; die letzte ist: **E. canescens** L. Ob hieher auch die v. Wulfen in Röm. Arch. 3. p. 364. beschriebene Pflanze gehöre, kann ich nicht entscheiden, da ich ein, an den angegebenen Stand O. gesammeltes Expl. noch nicht sah. Diejenige aber, die mir Salzmann unter dem Namen d. **E. massiliensis** DC., welche Duby zu **E. canescens** L. zieht, mittheilte, ist allerdings der behaarten Variet. v. **E. Chamaesyce** sehr ähnlich, allein doch sicherlich verschieden dch die dickeren St. und die grösseren B., die mit Ausnahme der Basis am ganzen Umrisse gekerbt-kleingesägt und deren Sägezähnen mit feinen Stachelspitzchen versehen sind.

2. **E. PEPLIS** (L.) Meerstrands-W. — Bth. blattwinkelst., einzeln; Drüsen ganz; Kapselklappen gekielt und nebst den *S. glatt*; *B. nebenblättrig, gegenst.*, gestielt, länglich, stumpf, ausgerandet, ganzrandig oder hinten klein-gekerbt, an der Basis halberzf.; die St. gestreckt, ästig und nebst den B. kahl. ○. Am Ufer d. Adriat. Meeres, (bei Triest gegen Servola zu.) Juli. Aug. Drüsen oben satt-roth. D.

II. Rotte. **TITHYMALUS**. B. nebenblattlos. Die Drüsen, (die Innern, mit der fleischigen Scheibe bedeckten Zähne der eigenthümlichen Hülle.) rundlich oder quer-oval, und ganz und nicht mondf. ausgeschnitten, noch 2 hornig.

a. Samen mit vertieften Punkten oder Grübchen deutlich ausgestochen.

3. *E. HELIOSCOPIA* (L.) Sonnenwendige W. — Dolde 5sp., Aeste 3gabelig, mit gabelsp. Aestchen; *Drüsen ungeth.*; Kapsel glatt; *S. wabig-netzig*; B. verkehrteyf., vorne gesägt. ☉. An kult. O. überall. Juli-Sept. Schk. t. 129. Die Drüsen gelb.

h. Samen glatt. Kapsel mit Warzen besetzt, welche halbkugelig, kurz-walzlich oder in einen Faden verlängert sind.

4. *E. PLATYPHYLLA* (L.) Flachblättrige W. — Dolden 3-5sp., Aeste 3gabelig, mit gabelsp. Aestchen; Drüsen ganz; Kapsel warzig, Warzen zerstreut, stumpf, *fast halbkugelig*; S. glatt; B. spitz, v. der Mitte an ungleich-kleingesägt, verkehrtlanzettl., *mit herzf. Basis sitzend*, die untersten verkehrt-eyf., sehr stumpf, in den Bstiel verschmälert; *Hüllchen fast 3eckig-eyf.*, stachelspitzig, kleingesägt; S. rundlich. ☉. An bebauten O., Wegen, Gräben. Juli-Sept. J. a. t. 376. *E. platyphyllos* Koch Synops. ed. 1. Drüsen gelb. Var.:

β. *literata*, B. unterseits und am Rande dicht-zottig, die ersten mit einem purpurnen oder braunen Flecke bezeichnet: *E. literata* Jac. ic. rar. 3. t. 482. Diese kommt an bebauten O. und am Meeresufer (Steyer in Oberöstr., Brittinger; Triest, Tommas.; Monfalcone, C. B. Lehmann) vor und ist der *E. pubescens* Vahl, *E. pilosa* Bert. fl. ital., sehr ähnlich, aber bei letzterer sind die Kapseln warziger, die B. auch oberseits zottig und die S. dch. erhabne, zerstreute Pünktchen rauh.

5. *E. STRICTA* (L.) Steife W. — Aeste der 3-5sp. Dolde 3gabelig, mit gabelsp. Aestchen; Drüsen ganz; Kapsel warzig, Warzen zerstreut, *kurz-walzlich*; B. spitz, von der Mitte an ungleich-kleingesägt, verkehrt-lanzettl., *mit herzf. Basis sitzend*, die untersten verkehrteyf., sehr stumpf, in den Bstiel verschmälert; *Hüllchen fast 3eckig-eyf.*, stachelspitzig, kleingesägt; S. oval, glatt. ☉. An waldig. O., sehr zerstreut dch. d. G.) Juni-Sept. *E. dubia* Dierb. *E. foetida* Hoppe in Brief. Die *E. stricta* untersch. sich v. der vorherg. dch. die um die Hälfte kleineren Früchte und dch. die Warzen derselben, die, wohl nicht verlängert, aber doch walzlich sind. — Die *E. micrantha* MBieb. ist der *E. stricta* sehr ähnlich, jedoch nach meinem Urtheil dch. folg. verschieden: der St. schlanker, aufstrebend, nicht steif; die B. satt-grün, fast elliptisch-lanzettl., deutlicher gestielt und nach der Basis weit mehr verschmälert; die Dolde, auch auf fettem Boden, bloß 3sp., die Warzen der Frucht verlängert und fädlich.

6. *E. DULCIS* (Jacq. fl. austr. 3. S. 8. t. 213) Süsse W. — Aeste der 5sp. Dolde einmal 2sp.; Drüsen ganz; Kapsel warzig, Warzen zerstreut, *ungleich, stumpf*; B. lanzettl.-länglich, stumpf, *nach der Basis verschmälert*, ganzrandig oder vorne kleingesägt, *sehr kurz-gestielt*; *Hüllen lanzettl.*; *Hüllchen an der Basis abgeschnitten*, 3eckig-eyf., kleingesägt; Rhizom wagerecht; *der St. stielrund*, (getrocknet,) feingerieft. 4. In Hainen und auf Waldwiesen, auf Gebirg. und d. VorA., (Schw. und vom Oberelsass längs d. g. AK. hin bis Oestr., sodann dch. Böhm., Mähr., Schles. nach Thüring. und d. Harze und Hessen; in d. Gebirgen d. Mosel

und des Unterrheines.) Apr. Mai. *E. dulcis* L. spec. nach der Diagnose und den angeführten Autoren. *Tithymalus dulcis* Scop. *E. solissequa* Rb. Drüsen schwarz-purpurn. Kapsel warzig und behaart. Var.:

β. purpurata, Kapseln zwar warzig, aber ohne Haare: *E. purpurata* Thuill. Rb. ic. 2. f. 267.

Ueber die Pflanzen, welche Linne unter seiner *E. dulcis*, *E. epithymoides* und *E. verrucosa* verstanden haben mag, herrscht unter den Schriftstellern eine grosse Meinungsverschiedenheit. Smith erkannte in der *E. verrucosa* Lam., vernuthlich nach einem Expl. von dem Herbarium Linne's, die wahre *E. dulcis*, allein dieser Ansicht widersprechen die Worte Linne's „Dolde 5th., 2th. und die B. ganzrandig“, denn an der *E. verrucosa* Lam. sind die B. viel bemerklicher kleingesägt, als an *E. dulcis* Jacq. und *E. epithymoides* Jacq.; auch beschrieben die Schriftsteller, welche L. unter seiner *E. dulcis* anführt, die *E. dulcis* Jacq. und nicht die *E. verrucosa* Lam. Bertoloni begreift unter seiner *E. dulcis* zugleich mit der *E. verrucosa* Lam. auch die *E. epithymoides* Jacq., welche jedoch der *E. fragifera* Jan. viel näher steht, als der *E. verrucosa* Lam. Linne hatte seine *E. epithymoides* von Jacquin, aber das Citat aus der Ecphr. des Columna gehört zur *E. fragifera*. Die hier oben bemerkte Veränderung und Uebertragung der Namen von einer Art zur anderen, haben bisher die bestehenden Zweifel nicht gehoben, desshalb habe ich denjenigen Namen vorangestellt, welcher keinem Zweifel unterliegt.

7. *E. ANGULATA* (J. ic. rar. t. 481.) Kantige W. — Aeste der 5sp. Dolde aufrecht, einmal 2sp.; Drüsen ganz; Kapsel warzig, Warzen zerstreut, stumpf, *fast halbkugelig*; S. glatt (?); B. länglich-oval oder länglich, *fast sitzend*, vorne kleingesägt; *Hülleneyf.*, sitzend; *Hüllchen an der Basis abgeschnitten*, fast 3eckig-eyf., so breit, als lang, kleingesägt; Rhizom wagerecht; *der St. geschürft-kantig-grieft*. 4. An gebirg., wald. O., (Oestr., Mähr. und Steyerm.) Mai. Juni. „Drüsen erst hell- sodann satt-gelb, zuletzt nach dem Verwelken rostbraun.“ Jacq. D.

8. *E. CARNIOLICA* (J. a. app. t. 14.) Krainer W. — Aeste der 5sp. Dolde *überhangend*, einmal 2sp.; Drüsen ganz; Kapsel warzig, Warzen zerstreut, stumpf, *fast halbkugelig*; S. glatt; B. lanzettl.-länglich, stumpf, ganzrandig, nach der Basis verschmälert, kurz-gestielt; *Hüllchen elliptisch, an der Basis abgerundet*, ganzrandig und nebst den Hüllen kurz-gestielt; Rhizom wagerecht. 4. Auf sonnig. Hügeln. (im wärmern Krain und Steyerm.) Apr. Mai. *Tithymalus pilosus* Scop. t. 21. Drüsen gelb. D.

9. *E. VERRUCOSA* (Lam.) Warzige W. — Aeste der 5sp. Dolde *aufrecht*, 3sp., und noch einmal 2sp.; Drüsen ganz; Kapsel warzig, Warzen *kurz, walzlich*; S. glatt; B. länglich-eyf., *fast sitzend*, kleingesägt; Hülleneyf.; *Hüllchen elliptisch*, stumpf, *an der Basis verschmälert* oder abgerundet, kurz-gestielt und nebst der Hülle kleingesägt; W. vielköpfig. 4. An unkult. O., unter Gesträuch, an Wegen, (vom Oberelsass und der Schw. deh. d. g.

südl. D. und nördlich bis Würzb.; vereinzelt bei Trier.) Mai, Juni. *E. verrucosa* DC. fl. fr., Gaud. fl. helv. *E. dulcis* Sm. Rb. Bertol. fl. ital. mit Ausschluss des Synonym's von Jacq. *Tithymalus verrucosus* Scop. Die ganze Dolde ist während der Blüthezeit schön-gelb. Var. niedriger, mit purpurnem St.: *E. flavicoma* DC., nach Roeper. — Die *E. verrucosa* Linn. ist zweifelhaft, aber die von Lamarck dch die treffliche Beschreib. ausser allem Zweifel.

10. *E. EPITHYMOIDES* (Jacq. fl. austr. 4. S. 23. t. 344.) Gelblättrige W. — Aeste der 5sp. Dolde aufrecht, 3sp. und noch einmal 2sp.; *Zpfl der eigenthümlichen Hülle so lang, als die Hülle selbst*; Drüsen ganz; Kapsel warzig, *Warzen* verlängert, *fadenf.*; S. glatt; B. länglich, sitzend; Hüllchen elliptisch, stumpf, ausgerandet, an der Basis verschmälert oder abgerundet, kurzgestielt und nebst der Hülle ganzrandig; W. vielköpfig. 4. Auf rauhen, waldigen Hügeln, (Krain, Steyerm., Unteröstr., Mähr., bei Aigenbach unweit Landshut, Dr. Einsele.) Mai, Juni. L. spec, wenn Jacquin die wahre Pflanze der Fl. austr. an Linne gesandt hatte. Die *E. epithymoides* ist dch innern Zpfl der Hülle, welche die Länge der Hülle selbst haben, leicht von *E. fragifera* Jan. und *E. verrucosa* Lam. zu unterscheiden. Drüsen gelb; Weichstacheln der Kapsel röthlich. D.

11. *E. FRAGIFERA* (Jan. getr. Pfl. und bei Link.) Erdbeertragende W. — Aeste der 5sp. Dolde 2sp.; *Zpfl der eigenthümlichen Hülle 4mal kürzer, als die Hülle*; Drüsen ganz; Kapsel warzig, *Warzen* verlängert, *fadenf.*; S. glatt; B. länglich oder lanzettl., sitzend; Hüllchen rundlich-eyf., an der Basis abgerundet, ganzrandig oder kleingesägt; W. vielköpfig. 4. An gebirg., rauhen O., (Steyerm., Krain und östr. Litt.) Apr. Mai. *E. spinosa* Wulf. bei Röm. *E. epithymoides* L. spec. nach den angeführten Citaten, Hoppe und Hornsch. Reise. *Tithymalus Pithyusa* Scop. *E. fragifera* Rb. ic. 7. f. 870. Drüsen braun-roth, so wie sie Scopoli beschreibt. Var. mit stumpfen und spitzen B., mit kahlem und zottigem St. D.

12. *E. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-W. — Aeste der *vielsp. Dolde 3sp. und weiter 2sp.*; Drüsen ganz; Kapsel warzig, *Warzen* länglich, *kurz-walzlich*; S. glatt; B. sitzend, lanzettl., ganzrandig oder etwas gezähnt, kahl; *Hüllchen* elliptisch, stumpf, *an der Basis verschmälert*, sitzend. 4. Auf feuchten Wiesen, an Ufern, (stw. dch d. g. Gebiet.) Mai, Juni. Fl. d. t. 886. Drüsen rothgelb,

c. Samen glatt. Kapsel glatt oder mit feinen Wörzchen oder erhabnen Pünktchen bestreut, aber eigentl. nicht warzig,

13. *E. PROCERA* (MBieb.) Hohe W. — Aeste der 5sp. Dolde 3sp. und noch einmal 2sp.; *Drüsen ganz; Kapsel glatt oder mit kleinen Knötchen bestreut, lang-behaart oder kahl; S. glatt; B. sitzend, länglich-lanzettl., kleingesägt*, hinten ganzrandig, *ober- und unterseits zottig*, manchmal auch kahl werdend; Hüllchen oval, stumpf, hinten abgerundet oder etwas verschmälert. 4. An waldigen, etwas feuchten O., unter Gesträuch, an Bächen,

(in Oberhad., Kärnth., Krain, Steyerm., Mähr., Oestr. und Schles.)
Juni. Juli. Drüsen gelb. Kommt vor:

α. Kapseln glatt, kahl: *E. procera* Rb. ic. 2. f. 270. *E. villosa* WK., die Kapseln werden glatt beschrieben, nur in der, aus Willdenow's Spec. plant. genommenen Diagnose heissen sie warzig.

β. *trichocarpa*. Kapseln glatt, von verlängerten Haaren, mehr oder weniger, manchmal dicht-behaart: *E. mollis* Gmel. *E. coralloides* L., nach Roeper; Linne's Beschreibg passt gut, aber ausser den Haaren an der Kapsel kann ich kein Merkmal entdecken, um sie v. *E. procera* zu unterscheiden.

Die Varietäten *γ.* und *δ.* der ersten Ausgabe der Synopsis, welche sich auf die *E. pilosa* M. Bieherst. taur. cauc. und Linne's, nach dem Citate aus Gmelins Fl. sibirica, beziehen, habe ich weggelassen, weil ich bis jetzt noch kein Expl. aus dem Bereiche unserer Fl. gesehen. D.

14. *E. GERARDIANA* (J. a. t. 36.) Gerard's W. — Aeste der vielsp. Dolde wiederholt-2sp.; *Drüsen ganz*; *Kapsel glatt* oder sehr fein-punktirt-rauh; *S.* glatt; *B.* bläulich-grün, lanzettl.-lineal. oder lineal., zugespitzt-stachelspitzig, *ganzrandig, ganz kahl*; Hüllchen 3eckig-eyf., quer-breiter, begrannt-stachelspitzig, an der Basis abgeschnitten oder herzf.; *W.* vielköpfig, hinabsteigend. 4. Auf Sandfeldern, an Wegen, Ufern, (südl. Schw.; südl. Tyrol; Rhein-fläche v. Basel bis Westphal.; Mainthal von Würzburg bis Frankf.; Thüring.; Oestr.) Juni. Juli. *E. Caiogala* Ehrh. *E. linariaefolia* Lam. *E. Esula* Pollich. Drüsen gelb.

15. *E. PANNONICA* (Host.) Ungarische W. — Aeste der vielsp. Dolde einmal 2sp.; *Drüsen abgeschnitten*; *Kapsel vor der Reife dicht-behaart von ziemlich dicken, fein-gegliederten Haaren*; *S.* glatt; *B.* bläulich-grün, lanzettl., spitz, kurz-stachelspitzig, vorne schwach-kleingekerbt, die obere breiter; Hüllchen breit-eyf., stumpf, stachelspitzig; *W.* vielköpfig. 4. Auf Wiesen, Feldern, an Ackerrändern, (häufig in d. Gegend v. Wien bei Lanzendorf und Himberg.) Drüsen gelb. „*Fruchtkn. mit Haaren bedeckt*.“ Host. Fl. a. Juni. Die *E. pulverulenta* Kit., v. Lang erhalten, ist eine Variet. mit schmälern *B.* und lanzettl. Hüllchen. D.

III. Rotte. *ESULA* Roeper bei Dub. im Bot. gall. p. 114. Drüsen halbmondf. oder 2hörnig.

a Samen glatt. Hüllchen zsgewachsen.

16. *E. AMYGDALOIDES* (L.) Mandelblättrige W. — Aeste der vielsp. Dolde wiederholt-2sp.; Drüsen halbmondf.-2hörnig; *Kapseln kahl*, fein-punktirt-rauh; *S.* glatt; *B.* flaumig, die vorjährigen verkehrteyf.-länglich oder lanzettl., in den Bstiel verschmälert, die heurigen der jungen St. länglich; Hüllchen eyf.; *Hüllchen in ein flaches Scheibchen zsgewachsen*. 4. In schattigen Laubwäldern, d. Gebirge und VorA., (Tyrol, Schw. und Elsass, und von da dch Würtemb. bis Oestr.; im Rhein- und Maingebiete; Harz, Thüring., Schles., Mähr., bei Danzig.) Apr. Mai. *E. sylvatica* J. a. t. 375.

Drüsen gelblich oder purpurn. Die besondere Hülle (der Kelch nach frühern Autoren) kahl, bei der folg. zottig. — Tenore führt in seiner Sylloge eine von *E. amygdaloides* verschiedene, mir jedoch unbekannte *E. sylvatica* auf.

17. *E. WULFENII* (Hopp.) Wulfen's W. — Aeste der vielsp. Dolde wiederholt-2sp.; Drüsen halbmondf.-ausgeschnitten, 2hörig; *Kapseln dicht-zottig*; S. glatt; B. sitzend, lanzettl.-lineal., ganzrandig, ober- und unterseits sammtig-filzig; Hüllen verkehrteyf. oder länglich; *Hüllchen kreiself.-zsgewachsen*. 4. An felsigen, rauhen O. im östr. Littor., (auf Veglia bedeckt sie die Abhänge bei Castel Muschio, Noë.) Apr. Mai. *E. Characias* Wulf. bei Röm., aber die Farbe der Blb., (Drüsen,) ist irrig „zuerst sattgelb, später schwarz-roth“ beschrieben; die Blb. der *E. Wulfenii* sind immer honiggelb, wechseln die Farbe nicht und gehen nie in das Schwarzrothe über. — Die *E. veneta* Willd. ist aus der *E. Wulfenii* und *E. Characias* zsgesetzt, die Beschreibg der Blb. bezieht sich auf die *E. Characias*; im Herb. liegt unter n. 9390. fol. 1. *E. Characias* fol. 2. *E. Wulfenii*. Um Venedig wächst unsere Art nicht, Ruchinger's fl. „dei Liti veneti“ erwähnt ihrer nicht. D.

Die *E. Characias* (L.) wurde im Gebiete unserer Fl. noch nicht gefunden; sie untersch. sich v. d. *E. Wulfenii* dch folg.: Dolde viel kürzer; Hüllchen fast flach, kaum beckenf., satt-grün; Bth. kleiner; Drüsen vorne abgeschnitten; die Ecken spitz oder in kurze Hörnchen endigend und die Farbe der Drüsen schwarz-purpurn, allmählig blasser werdend und in die schmutzig-ziegelrothe Farbe übergehend. Die *E. Wulfenii* erkennt man schon v. weitem an ihrer grossen grün-gelben Dolde; die Hüllchen sind fast in einem Trichter zsgewachsen; die besondere Hülle (der Kelch) ist grösser, die Drüsen sind vorne in einem Halbkreise ausgeschnitten, und endigen sich in 2 spitze, herabgebogene Hörner und ihre Farbe ist beständig verschieden.

b. Samen glatt, Hüllchen frei.

18. *E. CYPARISSIAS* (L.) Zypressen-W. — Strahlen der vielsp. Dolde wiederholt-2sp.; *Drüsen 2hörig*; Knöpfe der Kapsel auf dem Rücken fein-punktirt-rauh; S. glatt; B. genau-lineal. oder nach der Basis ein wenig verschmälert, ganzrandig, kahl, die astst. sehr schmal; Hüllchen rauten- oder 3eckig-eyf., breiter als lang, kurz-zugespitzt, ganzrandig; W. kriechend. 4. Auf Sandfeldern, an Wegen. Apr. Mai. J. a. t. 435. Drüsen wachsgelb.

19. *E. ESULA* (L.) Gemeine W. — Strahlen der vielsp. Dolde wiederholt-2sp.; *Drüsen 2hörig*; Knöpfe der Kapsel auf dem Rücken fein-punktirt-rauh; S. glatt; B. lanzettl., oder lineal-lanzettl., nach der Basis verschmälert, kahl, am Rande nach der Spitze zu etwas rauh, die untern kurz-gestielt, die astst. schmaler; Hüllchen rauten- oder 3eckig-eyf., breiter, als lang, stumpf, stachelspitzig oder kurz-zugespitzt; W. kriechend. 4. Auf Wiesen an Weidengebüsch, Gräben, feuchten Wegen, (stw. dch d. Geb., doch vielleicht nicht in d. Schw.) Juni-Aug. Fl. d. t. 1270. Drüsen wachsgelb.

20. *E. SALICIFOLIA* (Host.) Weidenblättrige W. — Strahlen der vielsp. Dolde wiederholt-2sp.; *Drüsen 2hörig*; Knöpfe der Kapsel auf dem Rücken punktirt-rauh; *S. glatt*; *B. lanzettl., nach der Basis und Spitze verschmälert, ganzrandig, dicht-flaumig*; Hüllchen ranten- oder 3eckig-eyf., breiter, als lang, stumpf, stachelspitzig oder kurz-zugespitzt; W. kriechend. 4. Auf Wiesen, an Wegen, (bisher blos in Unteröstr.) Mai. Juni. Rochel. bann. t. 7. f. 16., eine schmalblättrige Form. D.

21. *E. VIRGATA* (W. und Kit.) Ruthenförmige W. — Strahlen der vielsp. Dolde wiederholt-2sp.; *Drüsen 2hörig*; Knöpfe der Kapsel auf dem Rücken punktirt-rauh; *S. glatt*; *B. lineal.-lanzettl., v. der Mitte nach der Spitze allmählig verschmälert, ganzrandig, kahl, glanzlos*; Hüllchen ranten- oder fast 3eckig-eyf., breiter, als lang, stumpf, stachelspitzig oder kurz-zugespitzt; W. *hinabsteigend, vielköpfig*. 4. Auf Wiesen, an Wegen, (Littorale, Oestr., Mähr. und Böhm.) Mai. Juni. *E. uralensis* Fischer bei Link. Drüsen gelb. D.

22. *E. LUCIDA* (W. und Kit.) Spiegelnde W. — Strahlen der vielsp. Dolde wiederholt-2sp.; *Drüsen 2hörig*; Knöpfe der Kapsel auf dem Rücken punktirt-rauh; *S. glatt*; *B. lanzettl. oder lineal.-lanzettl., v. der Mitte an nach der Spitze allmählig verschmälert, ganzrandig, kahl, glänzend*; Hüllchen ranten- oder fast 3eckig-eyf., breiter, als lang, stumpf, stachelspitzig oder kurz-zugespitzt; W. *wagerecht-kriechend*. 4. Auf feuchten Wiesen, an Weidengebüsch, Gräben, (Mähr., Schles. und Frankf. a. d. O.) Juli. Aug. Drüsen gelb, zuletzt bräunlich. B. immer etwas glänzend. Var.:

α. *latifolia*, B. länglich-lanzettl., abgerundet-stumpf, der St. 2-4 Fuss hoch. Wimmer und Grabowski Flor. siles.

β. *salicifolia*, B. lineal.-lanzettl., ziemlich spitz, der St. 1½ Fuss hoch. W. und Gr.

γ. *linearifolia*, B. schmal-lineal., ziemlich spitz, sehr gedrun-gen, der St. ohngefähr 1 Fuss hoch, W. und Grab. D.

23. *E. SAXATILIS* (J. a. t. 345.) Felsen-W. — Strahlen der 5sp. Dolde einmal 2sp.; *Drüsen* vorne abgeschnitten, *2hörig*, *Hörnchen* kurz, stumpf; Knöpfe der Kapsel feinpunktirt und dadurch etwas rauh, auf dem Rücken mit einem dünnen Kiele; *S. glatt*; B. bläulich-grün, kahl, ganzrandig, *die untern lineal.-länglich, stumpf oder ausgerandet mit einer Stachelspitze, nach der Basis verschmälert, die obersten elliptisch*; Hüllchen quer-breiter, stumpf, stachelspitzig an der Basis abgeschnitten oder fast herzf.; W. *hinabsteigend, vielköpfig*. 4. An felsig., gebirg. O., (Unteröstr., Steyer., Krain, südl. Tyrol.) Mai. Juni. Drüsen wachs-gelb. — Die *E. portlandica* Huds. ist der vorliegenden Art ähnlich, aber leicht dch die B., welche auf der stumpfen Spitze, so wie die Hüllchen an ihrem Ende kurz-zugespitzt sind und dch die dicht-grüblig-punktirten S. zu unterscheiden. D.

24. *E. NICAENSIS* (All.) Glatte W. — Strahlen der viersp. Dolde einmal 2sp.; *Drüsen halbmondf.-ausgeschnitten oder 2hörig*; *Knöpfe der Kapsel (getrocknet) runzelig, auf dem Rücken mit einem dünnen Kiele*; *S. glatt*; *B. kahl, bläulichgrün, länglich-lineal., stumpf, kurz-zugespitzt und kurz-stachelspitzig, ganzrandig, nach der Basis ein wenig verschmälert*; *Hüllchen herzeif., stumpf, kurz-stachelspitzig*. 4. An unfrucht., unkult. O., (südl. Tyrol, Krain, Littor.) Juli. Aug. J. ic. rar. t. 485. *E. serotina* Host. *E. multicaulis* Thuill. *E. oleaefolia* Gouan. in Desf. Herb. Drüsen gelb. Var. *α*. Drüsen 2hörig und

β. glareosa, Drüsen halbmondf.-ausgeschnitten; Hörnchen fehlend: *E. glareosa* MB. *E. serotina* Host. D.

25. *E. PARALIAS* (L.) Dickblättrige W. — Aeste der 5, seltener 3-4sp. Dolde 2sp.; Drüsen halbmondf., nicht 2hörig; *Knoten der Kapsel (getrocknet) runzelig, auf dem Rücken mit einer Furche dehzogen*; *S. glatt*; *B. kahl, bläulichgrün, länglich-lineal. und lineal., spitz oder auch etwas stumpf, grannenlos, ganzrandig*; *Hüllchen quer-oval, konkav, grannenlos oder sehr kurz-bespitzt*. 4. An sandigen Strand O. am Adriat. Meere. Juni. J. h. v. t. 188. *E. paralia* Sm. Drüsen bräunlich. D.

c. Samen runzelig, höckerig, oder mannigfach-grübig und ausgestochen. B. wechselst. oder zerstreut.

26. *E. MYRSINTES* (L.) Südliche W. — Aeste der 5-8sp. Dolde 2sp.; *Drüsen 2hörig*, Hörner verbreitert; *Kapsel (getrocknet) runzelig*; Knoten auf dem Rücken etwas zsgedrückt, stumpf-gekielt; *S. grübig-runzelig*; *B. bläulichgrün, verkehrteyf., länglich oder verkehrteyf., stumpf oder kurz-zugespitzt, stachelspitzig, kahl, am Rande etwas rauh*; *Hüllchen nierenf., stachelspitzig*. 4. An felsigen, rauhen O. am Meeresufer, (auf Cherso.) Juni. Juli. Drüsen gelb. J.

27. *E. PINEA* (L.) Fichtenartige W. — Aeste der 5-9sp. Dolde wiederholt-2sp.; *Drüsen 2hörig*; Knoten der Kapsel auf dem Rücken mit einem fein-punktirt-rauhen Streifen bezeichnet; *S. grübig-netzig*; *B. bläulichgrün, stumpf, stachelspitzig, kahl, die untern lineal., die obern breiter, die obersten nebst den Hüllblättchen fast 3lappig*; *Hüllchen herz-nierenf.* 4 An felsigen O. am Meeresufer, (auf Cherso; Scoglio della Madonna di Veruda südl. von Pola, Tommas.) Mai. Juni. *E. pinea* Bert. fl. it. *E. caespitosa* Ten. syllog. *E. linifolia* Ten. prodr. *E. pinea* Guss. Die Diagnose Linne's passt gut auf die Gussonische, hier aufgeführte, Pflanze. *E. ragusana* Reichenb. fl. exc. *E. coscinosperma* Reichenb. fl. exsicc. Drüsen gelb. J.

28. *E. SEGETALIS* (L.) Acker-W. — Aeste der 5sp. Dolde wiederholt-2sp.; *Drüsen 2hörig*; Knoten der Kapsel auf dem Rücken mit einem feinpunktirt-rauhen Streifen bezeichnet; *S. grübig-netzig*; *B. bläulichgrün, lineal., zugespitzt, stachelspitzig, kahl, die obern breiter*; *Hüllchen nierenf. oder fast rautenf., stachelspitzig*. ☉. Unter d. Saat, (im Wallis, in Istrien, Steyerm.,

Oestreich, Schlesien, bei Frankf. a. M., Jena.) Juni. Juli. J. a. t. 450. Drüsen gelb.

29. *E. PEPLUS* (L.) Rundblättrige W. — Aeste der 3sp. Dolde wiederholt-2sp.; Drüsen 2hörig; Knoten der Kapsel auf dem Rücken 2kielig, der Kiel etwas geflügelt; *S. auf einer Seite der Länge nach 2furchig, auf der andern grubig-punktirt, die Rückenlinien aus 4 Grübchen gebildet*; B. gestielt, verkehrteyf., sehr stumpf, an der Basis in den Bstiel vorgezogen, ganzrandig, die untersten fast kreisrund; Hüllchen eyf. ☉. An kultiv. O. überall. Juli-Winter. Fl. d. t. 1100. Drüsen gelblich.

30. *E. PEPLOIDES* (Gonon. fl. monsp. S. 174.) Peplusartige W. — Aeste der 4sp. Dolde 2sp., Drüsen 2hörig; Knoten der Kapsel auf dem Rücken 2kielig, der Kiel etwas geflügelt; *S. auf der einen Seite der Länge nach 2furchig, auf der anderen grubig-punktirt, die 2 Rückenlinien aus 3 Grübchen gebildet*; B. gestielt, verkehrteyf., sehr stumpf, oder ausgerandet, in den Bstiel vorgezogen, ganzrandig, die untersten fast kreisrund. ☉. An unkultiv. O., zwischen Gebüsch, (Istrien, Pola und Veruda an der Südspitze des Landes, bei Dignano, Lossino piccolo, Tommasini.) April. Mai. *E. rotundifolia* Loisel. not. t. 5. f. 1. Drüsen roth und bräunlich. J.

31. *E. FALCATA* (L.) Sichelf. W. — Aeste der 3sp. Dolde wiederholt-2sp.; Drüsen kurz-2hörig; Kapseln glatt; *S. mit 4 Reihen v. ausgestochenen Querlinien bezeichnet*; B. lanzettl., an der Basis verschmälert, spitz oder zugespitzt, kahl, die untersten spatelig, stumpf oder ausgerandet mit einem Stachelspitzchen; Hüllchen eyf. oder elliptisch, stachelspitzig. ☉. Unter d. Saat, (südl. Schw., Südtyr., Littor. n. v. da nach Oestr., Mähr., Böhm. und Thüring.; auf der Rheinfläche v. Speyer bis Mainz und stellenweise weiter bis Neuwied.) Juli-Herbst. J. a. t. 121. *E. arvensis* Schleich. Drüsen gelb. Var. mit zugespitzten, spitzen und ziemlich stumpfen, doch immer stachelspitzigen B. und breit-eyf., zugespitzten oder elliptischen, spitzen Hüllchen, ferner mit entfernten Hüllchen und:

β. *minor*. „Hüllchen dachig; B. nebst den Deck B. zugespitzt.“ *E. acuminata* Lam. *E. obscura* Lois., nach Tenor. syllog. p. 234.

32. *E. EXIGUA* (L.) Kleine W. — Aeste der 3sp. Dolde wiederholt-2sp.; Drüsen 2hörig; Kapseln glatt; *S. knötig-runzelig*; B. lineal. oder lineal.-keilig, spitz oder stumpf, oder gestutzt mit einem Stachelspitzchen, kahl; *Hüllchen aus fast herzf. Basis lineal.*, spitz. ☉. Auf Aeckern und an kult. O. Juni-Herbst. Drüsen gelb. Var. mit lauter spitzen B. und

β. *truncata*, B. abgeschnitten oder etwas gestutzt mit einem hervorragenden Spitzchen; *E. exigua* β. *retusa* Roth.

γ. *tricuspidata*, B. an der Spitze plötzlich fast geöhrelt-verbreitert, gestutzt mit einem Stachelspitzchen und gleichsam 3happig; *E. exigua* γ. Lois. *E. rubra* DC., nicht Cav., nach Loisel. *E. tricuspidata* Lap. *E. diffusa* J. ic. rar. t. 88. Diese wächst in

SüdD. Sie scheint aber dch Mittelformen in die vorhergehende Variet. überzugehen; ich hatte jedoch noch keine Gelegenheit, die Pflanze lebend zu beobachten. Roeper vereinigt auch mit dieser Variet. die *E. rubra* Cav., welche mir nicht hinlänglich bekannt ist.

d. Samen runzelig, B. gegenst., die Paare in Kreuz gestellt.

33. *E. LATHYRIS* (L.) Kreuzblättrige W. — Aeste der 4sp. Dolde wiederholt-2sp.; Drüsen 2hörig; Kapseln (getrocknet) runzelig; S. runzelig, fast netzig; *B. gegenst., ins Kreuz gestellt*, länglich-lineal., *sitzend*, die obern an der Basis herzf.; Hüllchen länglich-eyf., spitz. ☉. An kult. O., (wild in der südl. Schw. und dem südl. Tyr. und dem Litt.; im nördl. Gebiete verwildert.) Juni. Juli. Drüsen blass-gelb.

4. *MERCURIÁLIS* (L.) Bingelkraut. — Bth. 2häusig oder 1häusig. P. 3th. Männch. Stbg. 9-12. Weibch. Gf. kurz; N. 2, verlängert. Kapsel 3knotig; Fächer 1samig. N. v. E. gen. 3. 15. Bth. grünlich.

1. *M. PERENNIS* (L.) Ausdauerndes B. — Der St. ganz einfach; *B. gestielt, eyf.-länglich oder lanzettl.; die weibl. Bth. lang-gestielt*. 4. In Bergwäldern. Apr. Mai. Fl. d. t. 400. *M. longifolia* Host. *M. Cynocrambe* Scop.

2. *M. OVATA* (Sternb. und Hoppe.) Eyrundblättriges B. — Der St. ganz einfach; *B. fast sitzend oder kurz-gestielt, eyf.; die weibl. Bth. lang-gestielt*. 4. In Bergwäldern, (südl. Tyrol, Kärnth., Krain, Steyerm., Unteröstr.) Apr. Mai. Ob diese Pfl. eine eigne Art oder eine Variet. der vorhergehenden ist, mögen spätere Beobachtungen entscheiden. D.

3. *M. ANNUA* (L.) Jähriges B. — Der St. ästig; *B. gestielt, ey-lanzettf. oder eyf.; die weibl. Bth. fast sitzend*. ☉. An kult. O. und auf Schutthaufen. Juni-Herbst. St. h. 29.

CVI. Ordng. URTICEEN. Juss. gen. p. 400.

Bth. 1häusig, 2häusig oder vielehig. P. unterst., 4th., seltner 3-6th., die Zpfl während der Knospenlage dachig; bei den weibl. Bth. das P. auch ungeth. Stbg. v. bestimmter Zahl, frei, dem Grunde des P. eingefügt, und dessen Zpfln gegenst. Fruchtkn. frei, 1fächerig, 1eyig oder 2fächerig, mit 1eyigen Fächern. Gf. 2, oder 1. Frucht nicht aufspringend. Keim gerade oder gekrümmt oder auch schraubenf. B. nebenblättrig, NebenB. frei, meist hinfällig.

1. Gruppe. *ECHTE URTICEEN*. Fruchtkn. 1fächerig. S. aufrecht, eyweisshaltig. Keim gerade.

1. *URTICA* (L.) Nessel. — Bth. 1häusig oder 2häusig. Männch. P. 4th. Stbg. 4, vor der Bthezeit einwärts-geknickt; die Stbf. bei dem Aufblühen elastisch-zurückspringend. Weibch. P. 2th. N. sitzend, köpfig-pinself. Eine Nuss. N. v. Esenb. gen. 3. 7. Bth. grünlich.

1. *U. PILULIFERA* (L.) Kugelährige N. — B. gegenst., eyf., zugespitzt, eingeschnitten-gesägt; *die weibl. Achren kugelig*, gestielt. ☉. An kult. O., auf Schutthäufen, (in d. Dörfe Windehausen bei Heringen und um das alte Schloss Mansfelden, um Ellrich und Quedlinburg in Thüring.) Juni-Oct. D.

2. *U. URENS* (L.) Brenn-N. — B. gegenst., oval, spitz, eingeschnitten-gezähnt; *R. blattwinkelst.*, gezweiet, *kürzer, als der Bstiel*. ☉. An kult. O., auf Schutthäufen, an Wegen, überall. Juli-Sept. Fl. d. t. 739.

3. *U. DIOICA* (L.) Zweihäusige N. — B. gegenst., länglich-herzf., zugespitzt, grob-gesägt; *R. blattwinkelst.*, *länger, als der Bstiel*, hängend; Bth. 2häusig. 4. An etwas feuchten Zäunen, in Wäldern. Juli-Sept. Fl. d. t. 746.

2. *PARIETARIA* (L.) Glaskraut. — Bth. vielehig. P. glockig, 4sp., das der Zwitterbth. zuletzt verlängert. Stbg. 4, vor der Bthezeit einwärts-geknickt; Stbf. elastisch-zurückspringend. Gf. fädlich; N. köpfig-pinself. Weibch. P., wie die Zwitter, aber nach dem Verblühen nicht verlängert, die Stbg. fehlend. Eine Nuss. N. v. E. gen. 3. 8. Bth. grün.

1. *P. ERECTA* (M. und Koch.) Aufrechtes G. — B. wechselst., gestielt, *länglich-eyf.*, an der Basis und Spitze zugespitzt, ganzrandig, dreifältig benervt, durchscheinend-punktirt, kurz.; Bthstiele gabelsp.; Deck B. sitzend, kürzer, als die Bth.; *Perigone glockig, die Stbf. tragenden so lang, als die Stbf.*; St. aufrecht, einfach. 4. An Mauern, auf Schutthäufen, (stw. dch d. G.) Juli-Herbst. E. officinalis Willd. DC. St. h. 9.

2. *P. DIFFUSA* (M. und K.) Ausgebreitetes G. — B. wechselst. *eyf.*, an der Basis und Spitze zugespitzt, ganzrandig, 3fältig benervt, durchscheinend-punktirt, kurz.; Bthstiele gabelsp.; Deck B. herablaufend, kürzer, als die Bth.; *die Stbf. tragende Perigone zuletzt verlängert, noch einmal so lang, als die Stbf.*; St. niedergestreckt, ausgebreitet, ästig. 4. An Mauern und Wegen, (im Rheinthale bei Heidelberg, Mainz bis Neuwied; im Nahethale bis Creuznach hinauf; im Moselthale: bei Minden und Göttingen; in der italien. Schw. und dem südl. Tyrol; Oestr., Littorale.) Juli-Herbst. P. officinalis Pollich. Sm. P. judaica Hoffm. Schk. t. 346. DC. Lam. ill. t. 853. f. 2. MBieb., nicht L. — Die *P. judaica* (L.) hat 3nervige und nicht 3fältig-benervte B.; vgl. Smith's Beschreibung der P. off. in der Fl. brit. p. 189. Zu dieser gehört: *Parietaria ocymi folio* Boccon. P. lusitanica β. MBieb., nicht P. lusitanica L. und DC. — Mein kaukasisches Expl. der *P. judaica* hat allerdings verlängerte Zwitterbth.

II. Gruppe. *CANNABINEEN*. Fruchtkn. 1eyig, ohne Eyweiss; Eychen hängend. Keim gekrümmt oder schraubenf., mit aufeinanderliegenden Keimb. Eine wahre Frucht; oder auch eine falsche trockne, aus einer Aehre in Gestalt eines Kätzchen gebildet.

3. *CANNABIS* (L.) Hanf. — Bth. 2häusig. Männch. P. 5th. Stbg. 5. Weibch. P. 1blättrig, auf der einen Seite der Länge nach gespalten. Gf. 2. Nuss v. dem bleibenden P. eingeschlossen. N. v. E. gen. 3. 9.

1. *C. SATIVA* (L.) Gebaueter H. — ☉. Aus Indien eingebracht, wird fast überall kult. Juli. Aug. Schk. t. 325. Bth. grün. Kultiv.

4. *HUMULUS* (L.) Hopfen. — Bth. 2häusig. Männch. P. 5th. Stbg. 5. Weibch. P. schuppenf., offen, zwischen den Schuppen einer zapfenf. Aehre. N. v. E. gen. 3. 10.

1. *H. LUPULUS* (L.) Gemeiner H. — 4. In Hecken und Zäunen; wird im Grossen hie und da kult. Juli. Aug. Schk. t. 326. Bth. grün. Kultiv.

III. Gruppe. *ARTOCARPEEN*. DC. fl. fr. 3. p. 318. Fruchtkn. 1 oder 2fächerig. S. hängend, eyweissaltig; Keim gekrümmt, mit aneinander liegenden Keimb. Eine falsche, fleischige oder saftige Frucht, entweder aus dem Fruchtb. allein oder aus dem Fruchtb. und dem P. gebildet.

5. *FICUS* (L.) Feigenbaum. — Bth. 1 oder 2häusig, in einem fleischigen, an der Spitze genabelten, inwendig hohlen Fruchtb. eingeschlossen. Männch. P. 3th. Stbg. 3. Weibch. P. 5sp. Fruchtkn. 1fächerig. Gf. seitenst.; N. 2. N. v. E. gen. 3. 6.

1. *F. CARICA* (L.) Gemeiner F. — B. herzf., ganz oder handf., oberseits rauh, unterseits flaumig. 2. Wird in den wärmern Provinzen kult. und wächst wild in den Felsenspalten des südlichen Tyrols und in d. Schw. jenseits der Alpen. Juli. Aug. Schk. t. 338. Kultiv.

6. *MORUS* (L.) Maulbeerbaum. — P. 4th. Männch. Stbg. 4. Weibch. Fruchtkn. 2fächerig, mit 1eyigen Fächern. Gf. 2. Eine falsche Frucht, aus dem Fruchtb., den P. und den Hautfrüchten, welche saftig geworden, gebildet. N. v. E. gen. 3. 5.

1. *M. ALBA* (L.) Weisses M. — B. herzf., an der Basis ungleich, eyf., ungeth. und lappig, gesägt; die weibl. Kätzchen ohngefähr so lang, als der Bthstiel; P. am Rande kahl; N. kahl, mit kurzen Papillen besetzt. 2. Wird kult. Mai. Schk. t. 290. Frucht weiss. Kultiv.

2. *M. NICRA* (L.) Schwarzes M. — B. herzf., eyf., ungeth. oder lappig, gesägt; die weibl. Kätzchen fast sitzend; vielmal länger, als der Bthstiel; P. am Rande nebst den N. rauhh. 2. Wird kult. Mai. Frucht schwarz. Kultiv.

IV. Gruppe. *CELTIDEEN*. Dub. bot. gall. p. 421. Fruchtkn. 1 fächerig. S. hängend, eyweisshaltig; Keim gekrümmt; Keimb. zsgefaltet. Eine wahre Frucht.

7. *CELTIS* (L.) Zürgelbaum. — Bth. vielehig. Zwitter. P. 5-6th. Stbg. 5-6, ganz unten in dem P. eingefügt. Fruchtkn. 1eyig. Gf. 2. Steinfrucht mit knöchernem Steine. Männch. Stempel fehlend; sonst Alles, wie bei den Zwittern. N. v. E. gen. 3. 4.

1. *C. AUSTRALIS* (L.) Gemeiner Z. — B. länglich-lanzettl., zugespitzt, geschärft-gesägt, oberseits rauh, unterseits weich- und kurz-zottig, an der Basis ungleich. b. An gebirgigen, rauhen O. unter Gestrüch der wärmern Gegenden, (südl. Schw., südl. Tyr., südl. Steyer., Littor.) Mai. Lam. ill. t. 844. f. 1.

V. Gruppe. *ULMACEEN*. Mirb. elem. 2. p. 905. Fruchtkn. 2 fächerig. S. hängend, ohne Eyweiss. Keim gerade; Keimb. flach. Eine wahre Frucht.

8. *ULMUS* (L.) Rüster. — Bth. zwittrig. P. glockig, 4-5-zählig, verwelkend. Stbg. 4, 5-12. Gf. 2. Nuss dch Fehlschlagen 1 fächerig, mit einem Flügel umgeben. N. v. E. gen. 3. 3.

1. *U. CAMPESTRIS* (L.) Feld R. — B. doppelt-gesägt, an der Basis ungleich; Bth. fast sitzend; *Früchte kahl*. b. In Bergwäldern. März. Apr. Kommt vor:

a. *nuda*, Rinde der Aeste glatt, nicht korkig und dabei 1) die B. rauh, die Früchte länglich: *U. campestris* Sm. *U. nuda* Ehrh.; 2) die B. rauh, die Früchte kreisrund: *U. montana* Sm. *U. excelsa* Borkh. *U. campestris* a. *latifolia* Meyer; 3) die B. kahl, die Früchte verkehrteyf.: *U. glabra* Mill. Sm. *U. campestris* b. *carpinifolia* Meyer.

β. *suberosa*, Rinde der Aeste mehr oder weniger korkig-geflügelt, und dabei 1) die B. grösser, die Früchte verkehrteyf.: *U. major* Sm. *U. hollandica* Mill.; 2) die B. kleiner, die Früchte kreisrund: *U. suberosa* Ehrh. *U. tetrandra* Schk. t. 57. a. b. Die Gestalt der Frucht ist nach meiner Beobachtung nicht beständig und zwar an einer und derselben Variet.

2. *U. EFFUSA* (Willd.) Langstielige R. — B. doppelt-gesägt, an der Basis ungleich; Bth. gestielt, hängend; *Früchte am Rande zottig-gewimpert*, viel kürzer wie der Bthstiel. b. In Bergwäldern hie und da. März. Apr. *U. ciliata* Ehrh. *U. octandra* Schk. t. 57. a. b. *U. racemosa* Borkh. — *U. effusa* Borkh. ist eine Abänderg mit grössern B. Die Stbf. sämmtlich über das P. hervortretend. — An der verwandten *U. americana* L. sind die Stbf. von ungleicher Länge und auch die längeren in den K. eingeschlossen, und die Früchte sind kaum kürzer, als der Bthstiel. Die meisten von verschiedenen Schriftstellern aufgenommenen Arten bringe ich unter die beiden hier aufgezählten.

CVII. Ordng. JUGLANDEEN. DC. theor. ed. 1. p. 215.

Bth. 1häusig; *Männch. kätzchentragend.* P. 2-6th. Stbg. mehrere, in die Mitte des P. eingefügt; Stbf. sehr kurz; Stbk. 2fächerig, der Länge nach aufspringend. *Weibl. Bth. einzeln oder zu 2 und 3 an der Spitze der Aestchen, ohne Hülle. K. oberst., 4zählig, abfällig. Blb. 4, krautig.* Fruchtkn. 1fächerig, 1eyig; *Eychen aufrecht.* N. 2, lanzettl. und verlängert oder 1 und schildf., 4lappig. Steinfrucht fleischig, mit 2-4klappiger Nusschale. S. eyweisslos. Keim mit fleischigen, 2sp., gewunden-faltigen Keimb. Würzelchen oberst., v. dem Nabel entfernt. Bäume mit nebenblattlosen, nicht punktirten B.

1. **JUGLANS** (L., mit Ausschl. v. Arten.) Wallnussbaum. — N. 2, lanzettl. N. v. E. gen. 3. 2.

1. **J. REGIA** (L.) Gemeiner W. — Blättchen meist zu 9, oval, kahl, etwas gesägt, fast gleich; Früchte kugelig. h. Wird in wärmern Gegenden häufig kultiv. Mai. Schk. t. 302. Kultiv.

CVIII. Ordng. CUPULIFEREN. Rich. med. Bot., deutsche Ausg. p. 187. Corylaceae Mirb. elem. p. 906. Quercineae Juss. dict. sc. nat.

Bth. 1häusig; *Männch. kätzchentragend.* Kätzchen walzlich oder rundlich, aus Deckblättchen (Schuppen) zsgesetzt. P. fehlend oder 4-5sp. Stbg. 5-20 und mehr, dem P. oder den Deckblättchen eingefügt. Stbk. 2fächerig, 2ritzig. *Weibch. Bth. einzeln oder mehr und zwar gehäuft oder ährig. P. an den Fruchtkn. angewachsen, mit gezähneltem, oft verschwindendem Saume.* Fruchtkn. 2-6fächerig, mit 1-2eyigen Fächern; Eychen hängend. N. 2-6, an der Basis oft verwachsen. *Hülle mannigfaltig, nach der Bthezeit sich vergrößernd, das Fruchtgehäuse bedeckend oder einschliessend, oft eine falsche Frucht darstellend.* Nuss dch Fehlschlagen 1fächerig, 1samig. S. eyweisslos. Keim gerade. Würzelchen nach dem Nabel gerichtet.

1. **FAGUS** (L.) Buche. — Männch. Kätzchen fast kugelig. Schuppen klein, abfällig. P. 5-6sp. Stbg. 10-15. Weibl. Bth. einzeln. Hülle 4sp., 2bth. Fruchtkn. mit dem kleinen P. gekrönt. N. 3. Unreifes Fruchtgehäuse 3fächerig, mit 2eyigen Fächern. Die reifen Nüsse 1-2samig, v. der vergrößerten, erhärteten Hülle eingeschlossen. N. v. E. gen. 1. 16.

1. *F. SYLVATICA* (L.) Gemeine B. — B. eyf., kahl, schwachgezähnt, am Rande gewimpert. b. Auf fruchtbarem Boden der Ebenen, Gebirge und VorA., über 4000 Fuss hinaufsteigend. Mai. Var. mit B. von leberbrauner Farbe: *F. sylvatica* β . Willd. spec. Diese im südl. Tyrol, (über Castellano im Rovoredischen, Facchini.)

2. *CASTANEA* (Tournef. inst. t. 352.) Kastanienbaum. — Männch. Kätzchen mit geknäuelten, sitzenden Bth.; Knäuelchen mit Deckblättchen gestützt. P. 6th. Stbg. 10-20. Weibch. Hülle 4 sp., 2-3 bth. P. oberst., 5-8 sp. N. 5-8. Fruchtkn. 5-8 fächerig, mit 2 eyigen Fächern. Nuss einfächerig. N. v. E. gen. 1. 17.

1. *C. VULGARIS* (Lam.) Gemeine K. — B. länglich-lanzettl., zugespitzt, stachelspitzig-gesägt, beiderseits kahl. h. Wird kult. und bildet in wärmern Gegenden Wälder, die jedoch dch Kultur entstanden sind. Juni. *C. sativa* Mill. *Fagus Castanea* L. Camer. epit. 118. Abbildg.

3. *QUERCUS* (L.) Elche. — Männch. Kätzchen. P. sitzend, 5-9 th. Stbg. 5-9. Weibl. Bth. in den Blattwinkeln einer abfälligen Schuppe. Eine Hülle aus sehr kleinen, später in einen Becher zfließenden Blättchen. P. klein, oberst. Gl. I. N. 3. Das unreife Fruchtgehäuse 3 fächerig, mit 2 eyigen Fächern. Die reife Nuss 1 fächerig, 1 samig.

a. Blätter abfällig.

1. *Q. SESSILIFLORA* (Sm.) Winterreiche. — B. gestielt, verkehrteyf., an der Basis ausgerandet oder in den Bstiel vorgezogen, buchtig, kahl, mit abgerundet-stumpfen, wehrlosen Lappen; Bthstiele so lang, als der Bstiel oder kürzer; die Schuppen des Bechers angedrückt. h. An gebirgigen etwas feuchten O., schattige Wälder bildend; steigt in den A. kaum über 3000 Fuss hinauf. Mai. *Q. sessilis* Ehrh., nach Sm. *Q. Robur* Roth. Schk. t. 301. b. *Q. Robur* β . L. fl. succ.

2. *Q. PEDUNCULATA* (Ehrh.) Sommerreiche. — B. kurzgestielt oder fast sitzend, länglich-verkehrteyf., an der Basis tief-ausgerandet, kahl, buchtig oder fiedersp., mit abgerundet-stumpfen, wehrlosen Lappen; Bthstiele vielmal länger, als der Bstiel; Schuppen des Bechers angedrückt. h. Auf den Ebenen und in wärmern, niedrigeren Gegenden. Mai. *Q. Robur* Sm. *Q. Robur a.* L. fl. succ. *Q. femina* Fl. d. t. 1180. *Q. racemosa* Lam. *Q. pedunculata* Schk. t. 301. a.

3. *Q. PUBESCENS* (Willd.) Flaumige E. — B. gestielt, verkehrteyf., an der Basis ausgerandet oder in den Bstiel vorgezogen, buchtig, im Frühlinge filzig, die herangewachsenen unterseits flaumig oder zuletzt kahl, die Lappen stumpf, ungeth. oder stumpf-1-2eckig, wehrlos; die Schuppen des Bechers angedrückt. h. Auf Hügeln und waldig. Gebirgen, (am Kaiserstuhl und auf Kalkbergen in Oberbaden, südl. Schweiz bis in das Littorale, Unteröstreich, Mähren, Böhmen.) Mai. *Q. lanuginosa* Thuill. *Q. collina* Schleich.

Q. robur δ . Lam. **Q. faginea** Rohr und May Fl. v. Mähr., nicht Lam. — Hr. Elsmann sandte mir aus Südtirol Exemplare, die dieser Art übrigens ganz ähnlich sind, deren Becher aber, schon erbsengross, auf einem gemeinschaftlichen, $\frac{1}{2}$ Zoll langen Bthstiele aufsitzen; ist dies wohl **Q. apennina** Lam. und DC. fl. fr.?

4. **Q. CERRIS** (L.) Oestreichische E. — **B.** verkehrteyf. oder länglich, buchtig oder fiedersp., flammig oder unterseits grau-filzig, mit stachelspitzigen Lappen; Schuppen des Bechers verlängert, lineal.-pfriemlich, abstehend, gewunden. γ . Auf waldigen Gebirgen, (ital. Schw., südl. Tyrol, Untersteyeru., Krain, Litt., Unteröstr.) Mai. **Q. crinita** Lam. **Q. Cerris** und austriaca Willd. **Q. Aegilops** Scop. Die vollkommenen Früchte sitzen unterhalb der **B.**, da sie erst im zweiten Jahre zur Reife kommen. Buchtig-gezähnte und fiedersp. **B.** kommen auf einem und demselben Baume vor. Manchmal sind die **B.** fast bis zur Mittelrippe fiedersp. mit lanzettl., hie und da etwas lappigen Zpfln.

b. Blätter ausdauernd.

5. **Q. SUBER** (L.) Kork-E. — **B.** immergrün, eyf. oder lanzettl., stachelspitzig, ganzrandig oder stachelspitzig-gesägt, unterseits grau oder filzig; Rinde ritzig-schwammig. γ . Auf Hügeln am Meere in Istrien. Mai. Tabern. krtb. 1379. J.

6. **Q. ILEX** (L.) Stein-E. — **B.** ey- oder lanzettl., immergrün, stachelspitzig, ganzrandig oder stachelspitzig-gesägt, unterseits grau oder filzig; Rinde eben. γ . Auf Hügeln, vorzüglich am Meere, (aber auch im Val di Sarca im südl. Tyr.; ital. Schweiz; im Litt. bei Triest und auf Cherso und Osero.) Mai. Tabern. krtb. 1380. Merkmale, wodch man die **Q. Suber** und **Q. Ilex** ausser der Rinde des Stammes unterscheiden könnte, habe ich an getrockneten, unter diesem Namen mitgetheilten Expl. bisher nicht finden können und finde sie auch nicht in den Schriften der Botaniker. D.

7. **Q. COCCIFERA** (L.) Kermes-E. — **B.** immergrün, eyf., dornig-gezähnt, kahl. γ . Auf Hügeln in Istrien. Mai. **Ilex coccifera** Tabern. krtb. p. 1381. J.

4. **CORYLUS** (L.) Haselnussstaude. — Männch. Schuppen der Kätzchen eyf., oben mit 2 kleinern Schüppchen. Stbg. 8, der Schuppe eingefügt; Stbk. 1 fächerig; Stbf. paarweise nebeneinander gestellt (der Stbf. bis auf die Basis getheilt.) Weibch. Eine Knospe mit dachigen Schuppen, die obern derselben fruchtbar, lbth. Fruchtkn. in den Fruchtb. eingesenkt, mit 2 fäd. N., zuletzt hervortretend und von einer 2lappigen, eingeschnittenen Hülle umgeben. Das unreife Fruchthäuse schwammig-markig, 2eyig, mit dem sehr kleinen P. bekrönt. Die reife Nuss 1-2samig.

1. **C. AVELLANA** (L.) Gemeine H. — NebenB. länglich, stumpf; Fruchthüllen glockig, an der Spitze etwas abstehend, zerrissen-gezähnt; B. rundlich, herzf., zugespitzt. γ . In Wäldern und Hecken. Febr. März. Schk. t. 305.

2. *C. TUBULOSA* (Willd.) Röhrlige H. — NebenB. länglich, stumpf; *Fruchthüllen röhrlig-walzlich, an der Spitze verengert, eingeschnitten-gezähnt*; B. rundlich, herzf., zugespitzt. ♀. In Wäldern der südl. Gegenden, (in Istrien häufig, wo *C. Avellana* nur auf den höheren kälteren Bergen des Karstes vorkommt, Tommasini.) Febr. März. Guimp. t. 151.

Die *C. Columna* wird in Host's syn. fl. aust. p. 523. unter die Pflanzen von Unterösterreich aufgezählt; da aber der Autor in der Fl. austr. diesen StandO. wegliess, so nahm ich sie nicht auf.

5. *CARPINUS* (L.) Hainbuche. — Männch. Kätzchen mit eyf. Schuppen. Stbg. 6-12, auf der Basis der Schuppe eingefügt. Stbk. 2fächerig, mit getrennten Fächern. Weibch. Kätzchen locker. Schuppen zu 3, 2bth., die äussere abfällig, die innern 2sp. oder eckig, bleibend, bei der Frucht sehr vergrössert. Fruchtkn. mit dem 6zähligen P. bekrönt, 2fächerig; Fächer 1eyig. N. 2. Die reife Nuss 1 fächerig.

I. *C. BÉTULUS* (L.) Gemeine H. — *Schuppen der Zapfen 3th.*, die Zpfl. lanzettl., der mittlere verlängert, gesägt oder ganzrandig. ♀. In Wäldern, besonders auf Gebirgen. Apr. Mai. Schk. t. 304. Die Variet. mit ganzrandigen Zpfln der Schuppen ist in D. nicht selten; gehört wohl hierher *C. Carpinizza* Host.? Eine monströse Variet.:

β. *incisa*, mit länglichen, unregelmässig-eingeschnitten-gesägten B., sammelte um Heidelberg mein Freund C. Schimper.

2. *C. DUINENSIS* (Scop. carn. t. 60. 1872.) Duiner H. — *Schuppen der Zapfen eyf.*, ungleich-gesägt, etwas eckig, *ungeth.* ♀. In Wäldern, (im Littor. gemein.) Apr. Mai. *C. orientalis* Lam. Die Nüsse 3mal kleiner, als bei dem vorigen. D.

6. *OSTRYA* (Micheli.) Hopfenbuche. — Männch. Kätzchen mit eyf. Schuppen. Stbg. 6-12, an der Basis der Schuppe eingefügt. Stbk. 2fächerig; Fächer dch den gespaltenen Stbf. getrennt. Weibch. Kätzchen locker, die Schuppen eyf., 2bth. Fruchtkn. mit dem P. gekrönt, mit einer krugf., an der Basis mit zahlreichen Borsten umgebenen Hülle eingeschlossen; Gf. 2, hervortretend. Fruchthülle vergrössert, aufgeblasen, kapself., häutig, auf ihrer Basis die 2 fächerige Nuss bergend, eine falsche Frucht darstellend.

I. *O. CARPINIFOLIA* (Scop.) Gemeine H. — Zapfen eyf., hängend; B. eyf., zugespitzt, an der Basis fast herzf.; Saum des fruchtttragenden P. sehr kurz, ganzrandig. ♀. An Flussufern, in Waldgegenden, (Steyerm., in Krain und im Littor., südl. Tyrol, C. Tessin.) Apr. Mai. *Carpinus Ostrya* L. *Ostrya italica carpinifolia* Michel. gen. p. 233. t. 104.

CIX. Ordng. SALICINEEN. Richard. in Kunth. nov. gen. amer. 2. p. 21. Amentacearum gen. Juss.

Bth. 1geschlechtig, 2häusig, in Kätzchen. Kätzchen aus Schuppen (aus schuppenf. Deckblättchen) gebildet. Anstatt des P. eine, manchmal gedoppelte, Drüse, oder ein fleischiger, schief-abgeschnittner Becher, an der Basis der Geschlechtsorgane, in dem Blattwinkel der Schuppe. Männch. Stbg. 2-24, frei, oder 1brüderig, aus dem Blattwinkel der Deckblättchen oder aus dem Becher hervortretend. Weibch. *Fruchtkn. frei*, 1fächerig, *vielezig*; Eychen hängend; Samenträger wandst. Gf. 1. N. 2, oft 2sp. Kapsel 2klappig. S. schopfig, eyweisslos. Keim gerade. Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Die Keimb. ziemlich flach. Bäume oder Sträucher, mit wechselst. B.

1. SALIX (L.) Weide. — Geschlechtsorgane an der Basis mit 1-2 Drüsen gestützt; P. fehlend.

1. Rotte. FRAGILES. Knackweiden. Die Kätzchenschuppen gleichfarbig, gelblichgrün, vor der Fruchtreife abfallend.

Die Kätzchen seitenst., die fruchttragenden auf einem seitenst., neugetriebenen, mit 3-5 entwickelten B. versehenen Aestchen endst., meist nach entwickelten B. blühend. 2 Honigdrüsen, die eine vorne, die andere hinten. Kapseln fast sitzend oder gestielt. Stbg. 2-10, an der Basis ein wenig zshängend und daselbst rauhh. Kätzchenschuppen früher oder später, aber immer vor der Fruchtreife abfallend. B. lanzettl. oder elliptisch, ausgezeichnet - zugespitzt und sehr spitz, gesägt, glänzend, ganz kahl oder von angedrückten Haaren seidig. Aeste an ihrer Einfügung, besonders zur Bthezeit sehr brüchig. Meist hohe und ansehnliche Bäume.

1. S. PENTANDRA (L.) Fünfmännige W. — *Fünf-zehenmännig*; Kätzchen gestielt; der Stiel beblättert; *Schuppen gleichfarbig, hinfällig* *); Kapseln aus eyf. Basis verschmälert, kahl, kurz-gestielt; Stielchen noch einmal so lang, als die Honigdrüse; Gf. mittelmässig; N. ziemlich dick, 2sp.; B. eyf.-elliptisch oder ey-lanzettf., zugespitzt, dicht-kleingesägt, ganz kahl; *NebenB. eyf.-länglich, gleichseitig, gerade*; Bstiel oberwärts viel-drüs. ♀. In den Thälern der VorA., an Giesbächen, mit den Flüssen an den Fuss der A. herabsteigend; und an sumpfigen, buschigen O. im nördl. D., (dch d. g. AK.; in Böhm., Mähr. und Schles.; im nördl. D. vom Harze an.) Mai. Juni. S. polyandra Schrank. S. tinctoria Sm. Var.:

α. B. ey-lanzettf.; Stbg. ohngefähr zu 5: S. pentandra α. L., Hartm. Diese ist nach Hartm. fast immer strauchig.

*) Die mit Cursivschrift gesetzten Worte bieten bei dieser Gattung die Merkmale dar, woran sich die Arten Einer Rotte und nicht immer die der ganzen Gattung sogleich erkennen lassen.

♂. *latifolia*, B. eyf.-elliptisch, Stbg. 5-10: *S. pentandra latifolia* Hartm. *S. pentandra* β. L. *S. polyandra* Bray. — Die *S. pentandra* β. L. vereinigt Fries mit der *S. cuspidata* Schultz; das Expl. aber, welches ich von Hartm. erhielt, gehört sicher zu *S. pentandra*.

Kommt selten mit mann-weiblichen Kätzchen, mit zum Theil in monströse Stempel verwandelten Stbg., vor, welche nach Wahlenb. die *S. hermaphrodita* L. darstellt.

2. *S. CUSPIDATA* (Schultz.) Haarspitzige W. — *Vier-fünfmännig*; Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert; *Schuppen gleichfarbig, abfällig*; Kapseln aus eyf. Basis verschmälert, kahl, gestielt, Stielchen 3 oder 4mal so lang, als die Honigdrüse; Gf. mittelmässig; N. ziemlich dick, ausgerandet; B. länglich-lanzettl., lang-zugespitzt, dicht-kleingesägt, ganz kahl; *NebenB. herzf., schief*; Bstiel oberwärts viel-drüsig. h. Auf sumpfigen, waldigen Wiesen, (Pommern und Mecklenb., Mittersill im Salz., Hamburg.) Mai. Juni. *S. cuspidata* Koch Sal. europ., mit Ausschl. des Syn. Linne's. (Meyer zieht in der Chl. hannov. p. 485. meine *S. cuspidata* zu *S. fragilis*; aber ich habe meine *S. cuspidata* nach Explaren, die ich von Schultz selbst empfing, beschrieben und besitze auch bis jetzt keine andere, in D. gesammelte.) Sie ist *S. tetrandra* L., it. Oel. im Regist., nach der Meinung von Fries. — Schultz hat zuerst diese Art deutlich beschrieben und deswegen habe ich den von ihm gewählten Namen voranzustellen, für Pflicht gehalten. — Das Fruchtkn. Stielchen ist an der blühenden Pflanze oft so lang, als die Honigdrüse, aber nach der Bthzeit wird es länger und zwar 3 oder 4mal so lang, als diese. Die B. sind fast wie die der Variet. *decipiens* der *Salix fragilis* und die *NebenB.* sind genau so, wie bei dieser Art, allein die B. an den junge Kätzchen tragenden Aestchen sind fein-gesägt, und nur die unteren ganzrandig, bei *Salix fragilis* sind alle B. an diesen Aestchen ganzrandig. Var. wie die *S. alba*, *S. rubra* und andere mit rückwärtsgekehrten Stbg. und rückwärtsgekehrten Schuppen der männl. Kätzchen; diese ist: *S. Meyeriana* Willd. D.

3. *S. FRAGILIS* (L.) Zerbrechliche W. — *Zweimännig*; Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert; *Schuppen gleichfarbig, abfällig*; Kapseln aus eyf. Basis lanzettl., kahl, gestielt, Stielchen 3 oder 4mal so lang, als die Honigdrüse; Gf. mittelmässig; N. ziemlich dick, 2sp.; B. lanzettl., zugespitzt, ganz kahl oder die jüngern etwas seidig, gesägt; Sägezähne einwärtsgebogen; *NebenB. halbherzf. h.* An Ufern, sumpfigen O. und feuchten Zäunen. Apr. Mai. St. h. 25., die Variet. γ. hier unten. Kommt vor:

α. *decipiens*, die Rinde der Aestchen ledergelb, die Knospen schwarz-braun, die untersten B. der Aestchen breit-verkehrteyf., sehr stumpf: *S. decipiens* Hoffm., Sm. nach einem engl. Expl. vom Autor. *S. vitellina* L., wegen dem Citate im Hort. upsal. nach Ansicht von Fries. — Kommt ferner vor:

β. *vulgaris*, Aestchen rothbraun, die untersten B. der Aestchen länglich-verkehrteyf.: *S. fragilis* Sm. bei Rees. *S. War-*

giana Lej. Fl. de spa. *S. fragilis* Wargiana Lej. Rev. *S. excelsa* Tausch.

γ. Russeliana, die jüngern B., daher auch die obern der heurigen Aestchen gegen den Herbst hin, seidig-behaart; Sägezähne meist kleiner; NebenB. mehr zugespitzt: *S. Russeliana* Sm., nach einem, aus dem Smithischen Garten von Mertens mir mitgetheilten Exemplar, *S. fragilis* St. h. 25., *S. pendula* Ser., *S. gracilenta* Tausch. — An unzähligen Exemplaren aller hier aufgezählten Variet. beobachtete ich immer 2 und nie mehrere Stbg., weswegen ich die *S. Ehrhartiana* Meyer, die *S. hexandra* Ehrh., zu der in der Chlor. hanov. die *S. Russeliana* Sm. gezogen wird, mit unserer Art nicht vereinigen kann. Ein echtes Exemplar der *S. hexandra* sah ich noch nicht.

Die *Salix fragilior* Host., *S. fragilissima*, *S. excelsior* und *S. palustris* dieses Autors sind Abänderungen von *S. fragilis*. Die *S. fragilis* Host., (die männl. Pflanze) scheint aber zu *S. cuspidata* zu gehören; das lebende Exemplar unseres Gartens hat noch nicht geblühet.

Die *S. viridis* Fries., von dem Autor selbst mitgetheilt, ist von allen bis hieher aufgeführten Arten verschieden.

4. *S. ALBA* (L.) Weisse W. — *Zweimännig*; Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert; Schuppen gleichfarbig, abfällig; Kapseln aus eyf. Basis verschmälert, stumpf, kahl, zuletzt etwas gestielt, *Stielchen kaum so lang, als die sehr kurze Honigdrüse*; Gf. kurz; N. ziemlich dick, ausgerandet; B. lanzettl., zugespitzt, kleingesägt, *beiderseits seidig*; NebenB. lanzettl. $\frac{1}{2}$. Mit der vorhergehenden an Ufern. Apr. Mai. *Salix alba* St. h. 25. Die B. der Bthstiele sind meist kahl mit gewimpertem Rande. Var. mit mehr oder weniger weiss-seidigen B. und:

β. caerulea, die älteren B. kahl: *S. caerulea* Sm.

γ. vitellina, die Aestchen dottergelb oder freudig-mennigroth. *S. vitellina* L., (nach den meisten Synonymen) und aller deutschen Autoren. Diese wird dch Stecklinge vermehrt.

II. Rotte. AMYGDALINAE. Mandelweiden. Kätzchenschuppen gleichfarbig, gelblich-grün, bleibend.

Die Kätzchen wie bei der vorhergehenden Rotte, aber die Schuppen bleibend. Eine doppelte Honigdrüse. Kapseln kürzer- oder längergestielt. Stbg. 2-3, an der Basis ein wenig zshängeud und daselbst rauhh. B. lanzettl. oder länglich-lanzettl., zugespitzt, ganz kahl oder die jüngern mit angedrückten, seidigen Haaren bestreut, im Alter aber auch kahl. Höhere, oft baumartige Sträucher, mit gerartenigen Aesten.

5. *S. AMYGDALINA* (L.) Mandelblättrige W. — *Dreimännig*; Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert; *Schuppen bleibend, gleichfarbig, an der Spitze kahl*; Kapseln ey-kegelf., ziemlich stumpf, kahl, gestielt, Stielchen 2 oder 3mal so lang, als die Honigdrüse; Gf. sehr kurz; N. wagerecht-auseinanderfahrend, ausgerandet; B. lanzettl. oder länglich, zugespitzt, gesägt, ganz kahl; NebenB. halbherzf. $\frac{1}{2}$. An Ufern und sumpfigen O. Apr. Mai. Wahlen-

berg folgend setze ich den Namen *S. amygdalina* voran. Var. auf mannichfaltige Weise sowohl in der Breite, als in der Farbe der untern Seite der B.: sie kommt nämlich vor mit ey-lanzettf., länglich-lanzettl. und lineal-lanzettl., an der Basis abgerundeten und verschmälerten, unterseits grasgrünen, zwar blässer, als auf der obern Seite, aber grünen und glänzenden und auf keine Weise bläulichgrünen, und auch mit unterseits bläulichgrünen und weissgrünen, matten, ohne irgend einen Glanz und in der Mitte bläulichgrünen, matten, an der Basis und Spitze grasgrünen und glänzenden B.: zwischen allen diesen Abänderungen findet man keine Grenzen. Uebrigens kommt die Variet. mit unterseits bläulichgrünen B., ebenfalls mit schmälern, breiteren, an der Basis runderen oder mehr verschmälerten B. vor, wie die Variet., deren B. unterseits grasgrün sind und glänzen. Auch die Schuppen des Kätzchens erscheinen bald länger, bald eben so lang, bald kürzer, als das Bthstielchen. Die Variet.:

α. discolor, B. unterseits bläulichgrün: *S. amygdalina* L. (in Schweden sind die B. nach Fries unterseits immer bläulichgrün.) *S. triandra* St. h. 25. *S. Villarsiana* Willd. *S. amygdalina* Vill., wenn die B. elliptisch und kleiner 1 oder $1\frac{1}{2}$ Zoll lang sind, wie sie vorzüglich an Explaren auf den VorA. vorkommen. *S. triandra* St. h. 25., ist diese breitblättrige Form. *S. Hoppeana* Willd., St. h. 25., wenn die B. lanzettl. und an der Basis verschmälert und wenn die meisten Kätzchen an der Spitze weiblich und an der Basis männlich sind. Manchmal verwandelt sich das mittlere Stbg. der obern Bth. in einen vollkommenen Fruchtkn. und die 2 seitenst. bleiben unverändert, wodch eine wahre, 2männige, 1weibige Zwitterbth. entsteht.

β. concolor, die B. unterseits grasgrün oder nur wenig in's Bläulichgrüne spielend: *S. triandra* L., nach Sm. Seine *S. triandra* führt L. nicht unter den Schwedischen Pflanzen auf.

Die *S. sempervirens* Host., *S. speciosa* und *S. tenuiflora* desselben Autors sind Abänderungen von der Variet. *α.*; und die *S. ligustrina* Host. und die *S. alopecuroides* Tausch. Abänderungen von der Variet. *β.*

6. *S. UNDULATA* (Ehrh.) Welligblättrige W. — Dreimännig; Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert; *Schuppen bleibend, gleichfarbig, filzig, an der Spitze bärtig*; Kapseln ey-kegelf., flaumig oder kahl, gestielt, *Stielchen noch einmal so lang, als die Honigdrüse*; Gf. verlängert; N. 2sp.; B. lanzettl., lang-zugespitzt, kleingesägt, flaumig, zuletzt kahl; NebenB. halbherzf. ♀. An Ufern im nördl. D. (vom Harze an nördl.) Apr. Mai. Var.:

α. Fruchtkn. flaumig: *S. undulata* Ehrh., nach getrockneten von Mertens mitgetheilten authentischen Explaren. Diese sah ich noch nicht lebend. Die *S. undulata* der bot. Gärten, auch des in Göttingen, gehört zu *S. hippophaëfolia*.

β. lanceolata, Fruchtkn. kahl, (B. flach, nicht wellig.) *S. lanceolata* Sm.

7. *S. HIPPOPHAËFOLIA* (Thuill.) Sanddornblättrige W. — Zweimännig; Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert; *Schuppen bleibend, gleichfarbig, filzig, an der Spitze bebärtet*; Kapseln ey-kegelf., filzig oder kahl, gestielt, *Stielchen so lang, als die Honigdrüse*; Gf. verlängert; N. 2 sp.; B. lanzettl., lang zugespitzt, klein-drüsig-gezähnel, flaumig, zuletzt kahl; NebenB. halbhierzf. $\frac{1}{2}$. An Ufern, feuchten Wegen, (Rhein- und Main- und Nahegebiet; Böhmen und Schlesien; bei Bremen.) Apr. Mai. *S. hippophaëfolia* Thuill., (nach einem Explar aus der Hand des Autors), Sering., mit Ausschl. der Syn. *S. violacea* Hollandr. (nicht Willd.). Der Rand der B. ist geschweift-schwach-kleingekerbt, und die Zähnen bestehen fast bloss aus einem Drüschchen; bei der *S. undulata* Ehrh. sind die B. deutlich-, wiewohl feingesägt. Die Kätzchen der *S. hippophaëfolia* sind ausserdem in allen Theilen nur halb so gross und die Fruchtkn. kürzer-gestielt. Var.:

a. planifolia, die Fruchtkn. grau-filzig und die B. flach.

1. *undulaefolia*, die Fruchtkn. grau-filzig oder flaumig und die B. zierlich-wellenf.: *S. undulata* des Götting. Gart. (Ich besitze daher ein lebendes Explar.) *S. undulata* Ehrh., nach Treviranus. Ehrhart hat vermuthlich diese und die vorhergehende Pflanze, welche einander sehr ähnlich sind, nicht als Arten getrennt.

y. leiocarpa, die Fruchtkn. kahl.

D.

III. Rote. PRUNOSAE. Schimmelweiden. Kätzchenschuppen an der Spitze verschiedenfarbig. Die Kätzchen seitenst. und auch die fruchttragenden sitzend, Stbk. nach dem Verblühen gelb. Die innere Rinde im Sommer citronengelb.

Kätzchen ganz sitzend, vor der Entwicklung der Blätter blühend, an der Basis mit kleinen, schuppenf. B. gestützt. Kapseln sitzend oder kurz-gestielt. Stbf. 2, frei. B. lanzettl., lang-zugespitzt, glanzend, die jüngern manchmal mit einem, zuletzt-verschwindenden, Flaume bedeckt, die ältern ganz kahl. Die Aeste oft mit einem hechtgrauen, leicht-wegzuwischenden, Reife überzogen. Die innere Rinde im Sommer und Herbst citronengelb. Freudig grüne höhere Strauche oder Bäume.

8. *S. ACUTIFOLIA* (Willd.) Spitzblättrige W. — Kätzchen sitzend, mit kleinen DeckB. am Grunde; Kapseln ey-kegelf., kahl, sitzend; Honigdrüse über die Basis des Fruchtkn. hinaufreichend; Gf. verlängert; N. lineal.-lanzettl., lang-zugespitzt, gesägt und nebst den jüngern Aestchen kahl; NebenB. lanzettl., zugespitzt. $\frac{1}{2}$. An Ufern, (in Schles. und bei Berlin, Pommern, Preussen.) März. *S. violacea* Sm. bei Rees., (nicht Willd.) Rinde der Aeste schwarzroth, mit einem dichten, hechtgrauen Reife überzogen. Der folgend. sehr ähnlich; aber doch durch die Art ihres Wachstums und die Form der B. und NebenB. verschieden, so dass sie nach meinem Urtheile eine eigene Art bildet.

D.

9. *S. DAPHNOIDES* (Vill.) Lorbeerblättrige W. — Kätzchen sitzend, mit kleinen DeckB. am Grunde; Kapseln ey-kegelf., kahl, sitzend; Honigdrüse über die Basis des Fruchtkn. hinaufreichend; Gf. verlängert; N. länglich; B. länglich-lanzettl., zugespitzt, drüsig-gesägt, kahl, die jüngern nebst den jungen Aestchen zottig;

NebenB. halbherzf. ♀. In den Thälern der VorA., mit den Flüssen in die Ebenen herabsteigend, (am Rheine bis Pforzheim, an den übrigen Flüssen bis zur Donau hinab; sodann in den Flächen des nördl. D.) März. Apr. Var. Die Aeste mit einem hechtgrauen Reife überzogen oder ohne solchen, die jüngern Aestchen fast kahl oder sehr rauhh.; die weiblichen Kätzchen sehr zottig, mit Zotten von der Länge der N., und weniger zottig, mit kürzern Zotten; die B. breiter und schmaler. *S. praecox* Hoppe bei St. d. fl. 1. 25. Willd. sp. pl. — Die Variet. mit rauhh. Aestchen: *S. cinerea* Willd., nach Link. Die Variet. mit schmälern B. und dünneren Kätzchen: *S. pomeranica* Willd. Die blüthetragenden Knospen sind im Herbste sehr gross, in diesem Zustande heisst sie Seringe *S. praecox gemmata*.

IV. Rotte. PURPUREAE. Purpurweiden. Kätzchenschuppen an der Spitze verschiedenfarbig. Die Kätzchen seitenst., sitzend, vor den B. entwickelt. Stbk. purpurn, nach dem Verblühen schwarz. Die innere Rinde im Sommer citronengelb.

Die Kätzchen seitenst., vor der Entwicklung der Blätter blühend, sitzend, an der Basis mit kleinen schuppenf. B. gestützt, die fruchttragenden kaum kurzgestielt. Kapseln sitzend oder kurzgestielt. B. schmal-lanzettl., oder auch verkehrt-eyf.-lanzettl., kleingesägt, kahl oder die jüngern mit angedrückten, seidigen Haaren bestreut, die später verschwinden. Höhere, oft baumartige, bläulich- oder dunklergrüne Sträucher.

10. *S. PONTEDERANA* (Schleich.) Pontedera's W. — *Einbrüderig*; Kätzchen sitzend, an der Basis mit DeckB. gestützt; Kapseln ey-lanzettl., gestielt, filzig, *Stielchen so lang, als die Honigdrüse*; Gf. mittelmässig; N. eyf., ausgerandet; B. verkehrtey-lanzettl., kleingesägt, kahl, die jüngern flaumig; *NebenB. halbherzf.* ♀. In Gebirgswäldern, (in Böhm.; Unteröstr.; Krain; Schweiz; südl. Tyrol, Facchini; Kitzbichel, nördl. Tyrol, Traumsteiner.) März. Apr. *S. Pontederana* Willd. nach Schleicher, (die Beschreibung in der Spec. pl., aber nicht die Syn.) *S. discolor* Host. und *S. austriaca* Host.

11. *S. PURPUREA* (L.) Purpur-W. — *Einmännig* *doch zsgewachsene Stbf.*; Kätzchen sitzend, an der Basis mit DeckB.; Kapseln eyf., sitzend, filzig; *Honigdrüse über die Basis des Fruchtkn. hinaufreichend*; Gf. kurz; N. eyf.; B. lanzettl., nach vorne breiter, zugespitzt, *geschürft-kleingesägt, kahl, flach.* ♀. An Ufern, auf feuchten Triften, in die VorA. hinaufsteigend. März. April. *Salix purpurea* L. St. h. 25. *S. monandra* Hoffm. Var., wie die *S. aurita* und andere: Stämme bald niedriger, bald höher; Aeste aufrechter und spreitzender, rötlich, korallenroth, dottergelb, ledergelb und gelbgrau; B. lineal.-lanzettl. und verlängert, oder breiter-lanzettl., oder verkehrtey-lanzettl. und kurz; Kätzchen, vorzüglich die weiblichen, sehr schlank oder noch einmal so dick, spärlich-zottig oder sehr rauhh.; Gf., wie bei vielen andern, ein wenig deutlicher, oder fast fehlend; N. rosenroth oder gelb, kürzer oder ein wenig länger. Zwischen allen diesen Abänderungen und Variet. finden sich keine Grenzen. Variet.:

a. der Stamm niedriger, die Aeste mehr spreitzend, die Kätzchen sehr schlank: *S. purpurea* Sm. Willd. St. h. 25. An dem

Smithischen Explare im Mertensischen Herb. ist der Gf. deutlich sichtbar.

β. *Lambertiana*, Kätzchen noch einmal so dick; B. grösser, breiter; sonst Alles, wie bei der vorhergehenden Variet.: S. *Lambertiana* Sm.

γ. *Helix*, Aeste aufrecht, wenig abstehend; B. länger; S. *Helix* L., Sm., St. h. 25.

δ. *monadelpha*, Stbg. nur bis zur Mitte zsgewachsen, nicht bis zur Spitze wie bei der gewöhnlichen Form.

ε. *sericea*, die jüngern B. mit dichtem, seidigem Flaume bedeckt, der jedoch später verschwindet: S. *monandra sericea* Seringe. Var. auch mit an der Spitze ziegelrothen Schuppen.

ζ. *androgyna*, Kätzchen zum Theil männlich, zum Theil weiblich: S. *mirabilis* Host. α.

Die S. *mutabilis*, S. *oppositifolia* und S. *carniolica* Host. sind Modificationen der S. *purpurea*.

12. S. *RUBRA* (Huds.) Rothe W. — *Einbrüderig*; Kätzchen sitzend, an der Basis mit DeckB. gestützt; Kapseln eyf., sitzend, filzig; *Honigdrüse über die Basis des Fruchtkn. hinaufreichend*; Gf. verlängert; N. länglich-lineal. oder fädlich; B. verlängert-lanzettl., zugespitzt, ausgeschweift-gezähnel, am Rande etwas zurückgerollt, flaumig, die erwachsenen kahl; NebenB. lineal. b. An Ufern und feuchten O. März. Apr. S. *fissa* Ehrh. Hoffm. S. *membranacea* Thuill. S. *virescens* Vill., nach DC. S. *concolor* Host. S. *olivacea* Thuill., eine Form mit breitem B. Var. mit Stbg., die ohngefähr bis gegen die Mitte, seltner bis an die Spitze zsgewachsen sind. Letztere Variet. ist der männl. Strauch von S. *Forbyana* Sm. Var. ferner mit länglich-lineal. N.: S. *rubra* Sm., und mit verlängerten, fädlichen N., letztere stellt den weiblichen Strauch von S. *Forbyana* Sm. dar.

β. *sericea*, die B., auch die erwachsenen, auf der untern Seite mit einem dichten, seidigen Flaume bedeckt: S. *elaeagnifolia* Tausch.

V. Rotte. VIMINALES. Korbweiden. Kätzchenschuppen an der Spitze verschiedenfarbig. Die Kätzchen seitenst., sitzend, frühzeitig oder fast gleichzeitig erscheinend. Stbk. nach dem Verblühen gelb. Kapseln sitzend, oder sehr kurz-gestielt, der Stiel nicht länger, als die Honigdrüse. Innere Rinde grünlich.

Kätzchen gänzlich sitzend, vor der Entwicklung der Blätter blühend oder fast gleichzeitig, an der Basis mit kleinen schuppenf. B. gestützt, manchmal die fruchttragenden kurz-gestielt, wobei sich die DeckB. in kleine B. verwandeln. Stbg. frei, seltner an der Basis zsgewachsen. Die B. im Verhältniss ihrer Breite lang, ganzrandig, oder fein-gezähnel, unterseits filzig. Meistens höhere, aufrechte, nicht selten baumartige Sträucher und unter ihnen ragt S. *viminalis* unter allen hervor und übertrifft sie alle an Schönheit. Die Aeste sind gertenartig.

a. Weibliche Kätzchen gerade.

13. S. *MOLLISSIMA* (Ehrh.) Weichblättrige W. — *Kätzchen sitzend* oder kurz-gestielt, an der Basis mit DeckB. gestützt;

Kapseln ey-kegelf., filzig, sitzend; *Honigdrüse über die Basis des Fruchtkn. hinaufreichend*; Gf. verlängert; N. lineal., 2sp., so lang, als die Haare der Schuppen; *B. verlängert-lanzettl.*, zugespitzt, entfernt-ausgeschweift-gezähnel, *die jüngern unterseits fein-filzig*; NebenB. eyf., spitz. γ . An Wassern, Ufern im nördl. D., (von Westphalen bis Pommern und Schles. stw.) April. S. mollissima Willd. sp. (nicht Sm.) Wahlenb. fl. carpat. S. pubera Koch. bei Böningh. Ich gab dieser Weide einen neuen Namen zur Zeit wo ich die S. acuminata Sm. für die echte S. mollissima Ehrh. hielt. — Untersch. sich von S. viminalis leicht durch den dünneren, gelblichen, glanzlosen Flaum der B., die lockeren Kätzchen, die gelblich-rostbraunen Schuppen und die schmutzig-weißen Haare von der Länge der 2sp. N. Bei S. viminalis sind die B. unterseits weiss und seidig-glänzend, die Schuppen schwarzbraun, und die Haare silberweiss, über welche die fädl., ungeth. N. hinausragen. — Die S. mollissima Sm. ist dch die länglich-lanzettl. und viel breiteren B., die eyf. und halbmöndf. NebenB. und die gestielten Kapseln, so wie dch den ganzen Habitus verschieden; die echte S. mollissima Ehrh. nähert sich weit mehr der S. undulata und hippophaëfolia, von denen sie sich aber durch den sitzenden Fruchtkn. und die unterseits deutlicher flaumigen B., von denen die jüngern fein-filzig sind, unterscheidet. D,

14. S. VIMINALIS (L.) Gertige W. — *Kätzchen sitzend*, an der Basis mit DeckB. gestützt; Kapseln aus eyf. Basis lanzettl., filzig, sitzend; *Honigdrüse über die Basis des Fruchtkn. hinaufreichend*; Gf. verlängert; N. fädl., ungeth.; die Haare der Schuppen kürzer, als der Gf; *B. verlängert-lanzettl.*, zugespitzt, ganzrandig, etwas ausgeschweift, *unterseits seidig und glänzend*; NebenB. lanzettl.-lineal., kürzer, als der Bstiel. γ . An Ufern und feuchten O. März. Apr. St. h. 25. Die Kätzchenschuppen schwarzbraun mit silberweissen Haaren.

15. S. STIPULARIS (Sm.) Nebenblättrige W. — *Kätzchen sitzend*, an der Basis mit DeckB. gestützt; Kapseln aus eyf. Basis lanzettl., filzig, sehr kurz-gestielt; *Honigdrüse über die Basis des Fruchtkn. hinaufreichend*; Gf. verlängert; N. fädl., ungeth.; die Haare der Schuppen ohngefähr so lang, als die N.; *B. verlängert-lanzettl.*, zugespitzt, ganzrandig, etwas ausgeschweift, *unterseits filzig, ein wenig glänzend*; NebenB. aus halbherzf. Basis lanzettl.-vershmülert, so lang, als der Bstiel. γ . An Ufern und in feuchten Hecken, (in Unteröstr.; Schles. und auf der Insel Nordey.) März. Apr. S. stipularis Koch. Commentat. (nicht Sering.) S. longifolia Host, die weibl. Pflanze. — Steht der S. viminalis am nächsten und hat mit der S. grandifolia keine Aehnlichkeit; von ersterer unterscheidet sie sich dch die um das doppelte dickern und längern, zottigern Kätzchen, den auf der untern Seite der B. weniger angedrückten, daher nicht sehr glänzenden Filz (nur die jüngsten B. haben einen glänzenden Ueberzug) und die an kräftigen Trieben befindlichen, aus halb-herzf. Basis lang-zugespitzten und, vorzüglich an der Basis, gezähnelten NebenB. Von der folgenden S. Smithiana dch die B., welche die Gestalt

der B. der *S. viminalis* haben, doch die kurzgestielten oder sitzenden Fruchtkn. und die geraden und nicht halbmondf.-gekrümmten NebenB. D.

16. *S. SMITHIANA* (Willd.) Smith's W. — Kätzchen sitzend, an der Basis mit DeckB. gestützt; *Kapseln* aus eyf. Basis lanzettl., filzig, gestielt, *Stielchen so lang, als die Honigdrüse*; *Gf. kürzer, als die N.*; N. fädlich, oft 2th.; B. länglich-lanzettl. oder lanzettl., zugespitzt, wellig-schwach-gekerbt u. sehr klein-gezähnt, *unterseits filzig, Filz seidig*; NebenB. nierenf.-halbherzf., zugespitzt. ♀. An Ufern und in etwas feuchten Zäunen, (sehr zerstreut doch d. Gebiet; im Glan- und Nahethale der Rheinpfalz, bei Bremen, Hamburg, in Schles.) März. Apr. *S. mollissima* Sm. *S. Smithiana* Koch. bot. Ztg., eine Abänderung mit satt-roth-braunen Aesten; *S. mollissima* Koch. a. a. O., eine Abänderung, mit gelbbraunen Aesten. *S. lanceolata* Fries, (nicht Sm., noch Sering.) D.

17. *S. ACUMINATA* (Sm.) Zugespitzte W. — Kätzchen sitzend, an der Basis mit DeckB. gestützt; *Kapseln* aus eyf. Basis lanzettl., filzig, gestielt, *Stielchen so lang, als die Honigdrüse*; *Gf. von der Länge der N.*; N. fädlich, ungeth.; B. länglich-lanzettl., zugespitzt, am Rande etwas wellig, klein-drüsig-gezähnt, *unterseits bläulich-grün, filzig, Filz glanzlos*; NebenB. nierenf.-halbherzf., spitz. ♀. An Ufern, feuchten O., (bei Kaiserslautern in der Rheinpfalz nur 1 Stock vom Männchen gefunden; Westphalen; Hannover; Lausitz; Schlesien; Unterösterreich.) Apr. *S. acuminata* Meyer (nicht Hoffm., und der deutsch. Autoren.) *S. longifolia* Host., die männl. Pflanze, nach einem Explar aus dem Wiener Garten. Die Ränder der B. sind mehr gleichlaufend, als bei der vorhergehenden und die B. starrer, der Filz an den erwachsenen glanzlos. Var.:

β. *virescens*, der Filz der untern BFläche sehr dünn oder auch ganz verschwindend: *S. acuminata* α. *virescens* Meyer. — Von dieser Art hatte ich den weibl. Strauch noch nicht lebend beobachten können, als ich in meiner Comment. de salic. europ. die Pfl. mit der vorhergehenden vereinigte. D.

VI. Rotte. CAPREAE. Sahlweiden. Kätzchenschuppen an der Spitze verschiedenfarbig.

Kätzchen seitenst., die bthtrag. sitzend, an der Basis mit kleinen B. gestützt, die fruchtrag. mehr oder weniger gestielt, der Stiel mit vergrößerten B. bekleidet. Stbk. nach dem Verblühen gelb. Kapseln gestielt, das Stielchen wenigstens noch einmal so lang, als die Honigdrüse.

18. *S. SERINGEANA* (Gaud.) Seringe's W. — Kätzchen sitzend, gekrümmt, an der Basis mit DeckB. gestützt; *Kapseln* aus eyf. Basis lanzettl., filzig, gestielt, *Stielchen noch einmal so lang, als die Honigdrüse*; *Gf. verlängert*; N. 2sp.; B. lanzettl.-länglich, zugespitzt, kleingekerbt, unterseits weiss-filzig, runzelig-aderig; NebenB. eyf., spitz. ♀. An den Bächen in den Thälern der Vora., (Schw., Tyr., Krain.) Apr. *S. Seringeana* Gaud. bei Sering. *S. lanceolata* Ser. Monogr., DC., (nicht Sm.) *S. holosericea* Ser., (nicht Willd.) *S. Kanderiana* Ser. Sal. exsicc. *S. longifolia*

Schleich., (nicht Mühlenb.) *S. intermedia* Host. — Die *S. canescens* des Willdenowischen Herbariums ist aus einem Blattzweige der *S. acuminata* Sm. und einem männlichen Blüthenzweige der *S. Sericeana* zsgesetzt. *S. canescens* Fries ist von dieser verschieden. — Den vieldeutigen Namen *S. lanceolata* wollte ich nicht gebrauchen um so mehr, da die *B.* eigentlich nicht lanzettl. sind.

19. *S. SALVIAEFOLIA* (Link bei Willd.) Salbeyblättrige W. — *Kätzchen sitzend, gekrümmt*, an der Basis mit Deck*B.* gestützt; *Kapseln* aus eyf. Basis lanzettl., *filzig*, gestielt, *Stielchen 2mal so lang, als die Honigdrüse*; *Gf.* kurz; *N.* länglich, fast ungeth.; *B.* länglich-lanzettl., spitz, nach der Basis verschmälert, schwachgezähnel, unterseits grau-filzig, runzelig-aderig, die untern stumpf; Neben*B.* halbherzf., spitz. *h.* An sumpfig. O., (in der Eymatte bei Bern, südl. Tyr.) April. Mai. *S. patula* Sering. Monogr. *S. oleifolia* Ser Sal. exsicc. *S. oleifolia* Vill. *S. Flüggiana* Willd., nach einem Explare von Flüge selbst in Mertens Herbarium. *S.*

20. *S. INCANA* (Schrank.) Graue W. — *Kätzchen fast sitzend, gekrümmt*, an der Basis mit Deck*B.* gestützt; *Kapseln* ey-lanzettl., *kahl*, gestielt, *Stielchen noch einmal so lang, als die Honigdrüse*; *Gf.* verlängert; *N.* 2sp.; Schuppen fast kahl, kurz-gewimpert; *B.* lanzettl.-lineal., zugespitzt, gezähnel, unterseits filzig-grau. *h.* In den Thälern der A., mit den Flüssen herabsteigend, (dch d. g. AK. und von da in den Ebenen, doch am Rheine nicht weiter, als Pforzheim, und an den übrigen Flüssen bis an die Donau; im Teschnischen an der Weichsel.) Apr. Mai. *S. riparia* Willd. St. h. 25. *S. lavandulaefolia* Lap. *S. angustifolia* Poir. bei Dub., (nicht Willd.) *S. rosmarinifolia* Gouan. Host., (nicht L.) *S. Elaeagnos* Scop.

21. *S. HOLOSERICA* (Willd.) Sammtige W. — *Kätzchen sitzend*, an der Basis mit Deck*B.* gestützt; *Kapseln* aus eyf. Basis lanzettl., *filzig*, gestielt, *Stielchen 2- oder 3mal so lang, als die Honigdrüse*; *Gf.* sehr kurz; *N.* eyf., ausgerandet; *B.* lanzettl., zugespitzt, nach der Spitze verschmälert und geschürft-gezähnel, unterseits *filzig*; Neben*B.* halbeyf., stumpf. *h.* An Ufern und auf feuchten Wiesen, (Gegend von Göttingen und um Treptow bei Berlin.) März. Apr. *S. holosericea* Willd. *S. velutina* Schrad., nach Exemplaren aus dem Göttinger Garten im Mertens. Herb. — Aeste, Knospen und Kätzchen sind denen der *S. cinerea* L., (*S. acuminata* der deutsch. Autoren), so sehr ähnlich, dass man sie kaum unterscheiden kann, aber die *B.* sind deutlich verschieden.

22. *S. CINEREA* (L.) Aschgraue W. — *Kätzchen sitzend*, an der Basis mit Deck*B.* gestützt; *Kapseln* aus eyf. Basis verlängert-lanzettl., *filzig*, gestielt, *Stielchen 4mal so lang, als die Honigdrüse*; *Gf.* sehr kurz; *N.* eyf., 2sp.; *B.* elliptisch- oder lanzettl.-verkehrtcyf., kurz-zugespitzt, *flach, wellig-gesägt, grau-grün, oberseits flaumig, unterseits filzig-kurz*; Neben*B.* nierenf.; *Knospen grau*. *h.* Auf Tristen und in feuchten Hecken. März. April. *S. cinerea* Wahlb. *S. acuminata* Hoffm. *S. cinerea* Sm.,

mit Ausschl. des Syn. aus Vill. *S. polymorpha* Host. *S. Hoffmanniana* Bl. und Fing. Doch die grau-grünen B., die dicklichen, grau-filzigen Zweige und die grau-flaumigen Knospen unterscheidet man diese Art auf den ersten Anblick von *S. aurita*, mit der man sie verwechseln kann. — Var. die B. länglich-lanzettl. und

β. B. verkehrteyf.: *S. aquatica* Sm. brit.

Von der *S. oleaefolia* erhielt ich von Mertens 2 aus dem Garten des H. Anderson herstammende Exemplare, welche ich zu den schmalblättrigen Variet. der *S. cinerea* zähle, aber ich zweifle, ob sie zur echten Smithischen Pflanze gehören. — Die Variet. mit männlichen und weiblichen Bth. in einem Kätzchen: *S. Timmii* Schk.

23. *S. NIGRICANS* (Fries.) Schwärzliche W. — *Kätzchen sitzend, die fruchttrag. kurz-gestielt*, an der Basis klein-beblättert; Kapseln aus eyf. Basis pfriemlich, gestielt, *Stielchen 2-3-mal so lang, als die Honigdrüse; Gf. verlängert; N. 2sp.; B. eyf., elliptisch oder lanzettl., wellig-gesägt, unterseits grau, und an der Spitze meistens grün, die jüngern nebst den Zweigen kurz.-flaumig*, zuletzt kahl; NebenB. halbherzf. mit gerader Spitze. ♀. In feuchten Hainen, auf morastigen Wiesen der Thäler in den VorA. und der sie begleitenden Ebenen, (doch d. g. AK. und mit dem Rheine bis Rastadt, mit den übrigen Flüssen bis zur Donau; auf dem Hetzles bei Erlangen; um Hamburg; in Ostpreussen.) Apr. Mai. Kommt vor, Fruchtkn. kahl oder kahl mit 2 behaarten kleinen Linien. *S. phylicifolia* Koch Comment. *S. stylaris* Sering. *S. phylicifolia* Wahlenb., Wulfen bei Jacq., nicht *S. Wulfeniana* Willd. *S. hastata* Hopp. Schk. t. 317. *S. Amaniana* Willd. St. h. 25. *S. Andersoniana* Sm. Zu dieser oder der folg. Variet. gehören: *S. menthaefolia* Host. *S. rivalis* Host. *S. prunifolia* Host. u. *S. parietariaefolia* Host. *S. ovata* Host. u. *S. aurita* Host.

β. *eriocarpa*, die Fruchtkn. überall filzig oder kurz., oder nur an der Basis mit einem kahlen Flecken bezeichnet: *S. nigricans* Wahlenb. *S. rupestris* Sm. *S. Forsteriana* Sm. *S. hirta* Sm. *S. cotinifolia* Sm. *S. Halleri* Sering. — Die weitläufige Aufzählung der Schleicherischen Arten übergehe ich hier. — Die gewöhnliche Form der B. ist elliptisch, sie kommen aber auch lanzettl., an der Basis und Spitze verschmälert, länglich, eyf., an der Basis abgerundet, fast herzf. und fast rundlich vor; sie sind meist wellig-gesägt, manchmal aber auch ganzrandig, mehr oder weniger flaumig und kurz. Die Kätzchen sind mehr oder weniger gestielt; Bthstiel mit zwar entwickelten, aber doch kleinen, B. besetzt; bisweilen sind die Kätzchen auch sitzend und nur mit kleinen DeckB. gestützt.

γ. *concolor*, B. unterseits grün und glänzend: *S. nigricans* γ. *punctata* Hartm. Scand. fl., aber *S. punctata* Wahlb. fl. lapp. t. 17. f. 1. gehört wegen der Knospen tragenden Kätzchen zu *S. retusa*.

In meiner Comm. de salicib. europ. folgte ich der Flora lapponica von Wahlenberg, welcher die kahlfrüchtige Variet. der *S. nigricans* unter dem Namen *S. phylicifolia* aufstellte. Zu dieser

fügte ich die *S. nigricans*, die bloss dch den Ueberzug der Frucht verschieden ist. Später stellte jedoch Fries eine andere *S. phyllifolia* auf, worüber die Anmerkung zu n. 29. zu vergleichen ist.

24. *S. SILESIACA* (Willd.) Schlesiſche W. — Kätzchen ſitzend; Kapseln aus eyf. Basis lanzettl., kahl oder ſeidig, geſtielt, *Stielchen 3 oder 4mal ſo lang, als die Honigdrüſe*; Gf. mittelmäſſig; N. eyf., 2sp.: *B. verkehrteyf.*, zugespitzt, *wellig-geſügt, unterſeits faſt gleichfarbig, die ältern ganz kahl*, die unterſten ſehr ſtumpf; NebenB. nierenf. - halbherzf. $\frac{1}{2}$. In ſchattigen, etwas gebirgigen Wäldern und auf den VorA., auf den Sudeten, im Geſenke und auf den mähr. Carpaten. Mai. Juni. Kommt mit kahlen Fruchtkn. vor: *S. silesiaca* Willd.

β . *eriocarpa*, Fruchtkn. mit ſeidigem Filze bedeckt: *S. fagifolia* Willd. — Steht der *S. Caprea* ſehr nahe, unterſcheidet ſich aber deutlich dch folg.: die ältern ausgebildeten B. ſind ganz kahl, von dünnerer Subſtanz, unterſeits kaum oder nur wenig ins Bläulichgrüne ziehend; die Kätzchen viel ſchlanker, die fruchttragenden lockerer; die Kapseln halb ſo groſs; der Gf. verlängert. D.

25. *S. GRANDIFOLIA* (Sering.) Groſsblättrige W. — Kätzchen ſitzend, die fruchttrag. geſtielt, an der Basis meiſt beblättert; Kapseln aus eyf. Basis verlängert-lanzettl., filzig-geſtielt, *Stielchen 6mal ſo lang, als die Honigdrüſe*; Gf. ſehr kurz; N. eyf., 2sp.; *B. länglich-verkehrteyf.*, zugespitzt, *flach, ſchwach-wellig-geſügt, kahl, unterſeits grau-grün, flaumig*; NebenB. nierenf.; *Knospen kahl*. $\frac{1}{2}$. In den Wäldern der VorA., (dch d. g. AK.; auf dem Feldberge des Schwarzv.) März. April. *S. stipularis* Sering, nicht Sm. — Knospen zuletzt ganz kahl; Bthſtielchen ſo lang, als die Kapsel; unterſch. ſich von *S. cinerea* dch die anfänglich kurzen und faſt eyf. Kätzchen, wie die der *S. Caprea* ſind, dch die viel gröſſern, oberſeits kahlen und satt- oder freudig-grünen B. und die im Alter kahlen Zweige; von *S. Caprea*, von der ſie vielleicht nur Variet. iſt, vorzüglich dch die länglichen oder länglich-lanzettl., zuletzt unterſeits faſt kahlen B. und die Nebenblätter an den kräftigen Trieben, welche gröſſer, als bei allen übrigen Arten ſind. Ich habe ſie jedoch als Art aufgeſtellt, um noch ferner beobachtet zu werden. Die *S. cinerascens* Willd. aus den Sümpfen von Portugal ſah ich noch nicht, das Exemplar aber in dem Willd. Herbarium, welches Flügge in den Pyrenäen geſammelt hat, iſt eine Variet. der *S. phyllifolia* Fries mit länglichen B.

26. *S. CAPREA* (L.) Sahl-W. — Kätzchen ſitzend, an der Basis mit kleinen DeckB. geſtützt; Kapseln aus eyf. Basis verlängert-lanzettl., filzig, geſtielt, *Stielchen 4-6mal ſo lang, als die Honigdrüſe*; Gf. ſehr kurz; N. eyf., 2sp.; *B. eyf. oder elliptiſch, flach, zugespitzt, mit zurückgekrümmter Spitze, ſchwach-wellig-gekerbt, oberſeits kahl, unterſeits bläulichgrün, filzig*; NebenB. nierenf.; Knospen kahl. $\frac{1}{2}$. In Wäldern und Hainen. März. Apr. *S. tomentosa* Sering. *S. ulmifolia* Thuill., nach DC. *S. arigerana* Lap. Die B. ſind oberſeits kahl und glänzend, unterſeits mehr- und weicher-filzig, als an den verwandten Arten, ſie ſind

meist elliptisch, doch oft auch rundlich, an der Basis manchmal herzf., oder auch nach der Basis verschmälert. Die Zweige mit den Knospen sind dick und kahl. Var. mit beiderseits-filzigen jüngern B., mit flaumigen jüngern Zweigen und mit ganzrandigen B.; letztere ist *S. sphacelata* Willd. Var. ferner mit ganzrandigen, verkehrteyf.-länglichen B.: *S. Caprea* β. *sphacelata* Wahlenb.

27. *S. aurita* (L.) Geöhrelte W. — Kätzchen sitzend, die fruchttrog. gestielt, an der Basis klein beblättert; Kapseln aus eyf., Basis verlängert-lanzettl., filzig, gestielt, *Stielchen 3 oder 4 mal so lang, als die Honigdrüse*; Gf. sehr kurz; N. eyf., ausgerandet; *B. verkehrteyf.* oder länglich-verkehrteyf., *zurückgekrümmt-bespitzt, wellig-gesägt*, runzelig, oberwärts flaumig, *unterseits bläulichgrün, filzig-kurzh.*; NebenB. nierenf.; *Knospen kahl.* ♀. Auf Triften, Wiesen und in feuchten Wäldern. Apr. Mai. *S. rugosa* Sering. *S. uliginosa* Willd., (eine höhere Form, mit verkehrteyf. B.) *S. aurita* Willd., (eine niedrigere Form, mit rundlich-verkehrteyf., halb so grossen B.) *S. heterophylla* Host. — Eine seltsame Variet. trägt hinter jeder Schuppe 2, 3 oder 4, bis über die Mitte zsgewachsene Stbf.: *S. cladostemma* Hayn. dendr. fl. p. 191. mit einer Abbildg. — Diese Art untersch. sich v. den 3 vorhergeh. dch die viel dünnern Zweige, die kleinern Kätzchen und Knospen und runzeligen B.; sie ist sehr ästig, mit spreitzenden Aesten. Var. wiewohl selten mit flaumigen Knospen.

28. *S. depressa* (L., nach Fries.) Niedergedrückte W. — Die fruchttrog. Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert; *Kapseln* aus eyf. Basis verlängert-lanzettl., *filzig*, gestielt, *Stielchen 5 mal so lang, als die Honigdrüse*; Gf. sehr kurz; N. eyf., 2sp.; *B. verkehrteyf.* oder elliptisch, *ganzrandig* oder entfernt-stumpf-gesägt, *unterseits bläulichgrün, sammtig oder flaumig oder die ältern gänzlich kahl*; NebenB. nierenf. ♀. In moorigen Sümpfen, (um Tschirnau, in Flor. von Schles.; bei Kapkeim in Ostpreussen, v. Duisburg.) Apr. *S. livida* Wahlenb. Koch. Comment. p. 39. *S. arbuscula* γ. L., nach Wahlenb. *S. Starkeana* Willd. — Fries führt an: eine Variet.

α. *velutina*, die B. sammtig, oberwärts zuletzt kahl: *S. sphacelata* Sm., oder die B. beiderseits filzig: *S. livida* β. *cinerascens* Wahlenb.

β. *livida*, die B. bald völlig kahl, unterseits bräunlich-meergrün: *S. livida* α. Wahlenb. *S. foliolosa* Afzel.

γ. *bicolor*, die B. bald völlig kahl, unterseits bläulichgrün, nicht ins Olivengrüne spielend: *S. bicolor* Fries, mit Ausschl. des Syn. v. Ehrhart.

Die *S. depressa* ist der *S. aurita* sehr ähnlich, aber die männlichen Kätzchen sind schlanker, die weiblichen viel lockerer und die ältern B. flach, nicht runzelig, ganz kahl, ganzrandig, nur die an jüngern, kräftigen Trieben stumpf-wellig-gesägt. D.

29. *S. phyllicifolia* (L. spec. 1442., nach Fries.) Zweifarbige W. — *Die Kätzchen sitzend*, an der Basis mit DeckB. gestützt,

die fruchttrag. etwas gestielt und an der Basis klein beblättert; Kapseln aus eyf. Basis verlängert-lanzettl., filzig oder kahl, *Stielchen 2-3 mal so lang, als die Honigdrüse; Gf. verlängert; N. 2sp.; B.* eyf., elliptisch oder lanzettl., entfernt-ausgeschweift-kleingesägt oder ganzrandig, unterseits bläulichgrün, die älteren völlig kahl; NebenB. halbherzf., mit schiefer Spitze. *h.* An feuchten Ö. der VorA., (auf dem Brocken und im Riesengrunde d. Sudet.) Mai. Juni. *S. bicolor* Ehrh. Beitr., Koch Synops. ed. I., Meyer, mit Ausschl. des Syn. v. Wahlenb. *S. arbuscula* Wahlenb., eine grössere Form. *S. arbuscula* Koch. Comment. de sal. europ. *S. phylicifolia* Sm. Fries. (aber nicht Wahlenb. noch Hartm., noch Laestad.) *S. Weigeliana* Willd. — Abänderungen sind: *S. radicans* Sm. und *S. Dicksoniana* Sm. Andere werde ich von neuem untersuchen. Var.:

β. laurina, B. oval-längl., dunkelgrün, nicht frisch-grün wie bei den übrigen Abänderungen dieser Art, unterseits, die noch ganz jungen beiderseits flaumig, mit der Zeit aber kahl. *S. laurina* Smith. tr. of lin. soc., Willd. Spec. *S. bicolor* Smith brit. *S. phylicifolia* Fries herb. norm. Diese Pfl. stellt eine dunklergefärbte Variet. dar, wie wir eine solche auch bei *S. triandra*, *vinimalis*, und anderen finden. Sie ward zuerst von Petermann an Flussufern in Sachsen aufgefunden, (zwischen Schönfeld und Abt-naundorf ohnweit Leipzig.) — Die Variet.:

γ. majalis, in D. noch nicht beobachtet, hat kahle Fruchtkn. und ist die *S. majalis* Wahlenb. nach Hartman; ferner *S. tenuifolia* Sm. brit. nach einem Expl. aus England und *S. petraea* Anders. nach einem Expl. des Autors in der Sammlung von Mertens. D.

30. *S. GLABRA* (Scop.) Kahle W. — *Die Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert; Kapseln aus eyf. Basis pfriemlich. gestielt, kahl, Stielchen ohngefähr noch einmal so lang, als die Honigdrüse; Gf. verlängert; N. 2th.; B. elliptisch oder verkehrteyf., gesägt, kahl, spiegelnd, unterseits bläulichgrün; NebenB. fehlend oder drüsenf., die an den kräftigen Trieben vielmal kürzer, als der Bstiel; Schuppen behaart, zuletzt nach abgefallenem Flaume kahl; Stbg. von der Basis bis über die Mitte zottig. h.* Auf den VorA. an Bächen und feuchten Abhängen. (Bayer. A.; Tyrol; Salzbg.; Kärnth.; Krain; Steyer.) Juni. Juli. *S. Wulfeniana* St. h. 25. Schon vor 14 Jahren habe ich diese Art auf den bayerisch. A. lebend beobachtet und in der bot. Ztg 1830. I. p. 140. ihre Merkmale und die der folg. deutlich auseinandergesetzt. *S. cornescans* Willd. Herb. 18161. fol. 1. 3. 4., (fol. 2. ist die *S. Waldsteiniana*.) *S. Wulfeniana* Willd. Herb. 18114. f. 1-S. und fol. 10., (fol. 9. ist die *S. hastata*.) *S. Wulfeniana* Host. St. h. 25. Die Exemplare der *Salix cornescans* und *S. Wulfeniana* des Willdenowischen Herbarium habe ich so genau verglichen, dass mir auch nicht der geringste Zweifel blieb. Fries vereinigt die *S. cornescans* Willd. mit der *S. majalis* Wahlenberg, welche sicherlich verschieden ist. D.

31. *S. HEGETSCHWEILERI* (Heer Fl. d. Schw. S. 963.) Hegetschweiler's W. — *Die Kätzchen zuletzt gestielt; der Stiel beblättert;*

Kapseln aus eyf. Basis pfrieml., gestielt, und kahl mit *filzigem Stielchen*, oder überall dünn-filzig, *Stielchen* noch einmal so lang, als die *Honigdrüse*; Gf. verlängert; N. 2th.; B. oval oder längl., verkehrteyf., feingesägt, unterseits bläulichgrün; *NebenB.* an den jüngeren Zweigen halbherzf. mit gerader Spitze, so lang, als der *Bstiel*; Schuppen zottig, die Zotten bei der Frucht nicht gekräuselt, bleibend; Staubf. kahl. $\frac{1}{2}$. In den Thälern der Schweizer A., (an der Reuss im Urserenthal unterhalb Hospental gegen Andermatt, grosse Gebüsche bildend, und bei Samoden und Bevers im Engadin, Heer.) Juni-Juli.

32. S. HASTATA (L.) Spiessf. W. — Kätzchen gestielt, Stiel beblättert; *Kapseln* aus eyf. Basis pfriemlich, gestielt, kahl, *Stielchen* ohngefähr $1\frac{1}{2}$ mal so lang, als die *Honigdrüse*; Gf. verlängert; N. 2sp.; B. eyf., elliptisch oder lanzettl., kahl, feingesägt; *NebenB.* halbherzf., mit gerader Spitze; *Schuppen* sehr zottig, *Zotten* lang aber bald gezogen und gekräuselt. $\frac{1}{2}$. Auf feuchten Triften der A., auch auf trockneren Jochen der höhern A., (dch d. g. AK., und in dem Gesenke der Sudet.) Juni. S. hastata Koch. Comment. de sal. europ., mit Ausschl. der Variet. S. Wulfeniana und mehrer Syn. S. Ludwigii Schk. t. 316. S. hastata Willd., mit eyf., an der Basis herzf. B. (ein nichtblühender kräftiger junger Trieb.) S. serrulata Willd. (die blüthragende Pflanze.) S. malifolia Sm., mit verkehrteyf.-länglichen, tiefer-gesägten B. S. elegans Host. Die langen und glänzend-weissen Zotten der blühenden Kätzchen sind an dieser Art auszeichnend.

33. S. MYRTILLOIDES (L.) Heidelbeerblättrige W. — Die fruchttrag. Kätzchen lang-gestielt, der Stiel beblättert; *Kapseln* aus eyf. Basis lanzettl., kahl, lang-gestielt, *Stielchen* 4 und mehrmal länger, als die *Honigdrüse*; Gf. kurz; N. eyf., ausgerandet; B. eyf., an der Basis fast herzf., länglich oder lanzettl., ganzrandig, glanzlos, völlig kahl, unterseits netzaderig; Kätzchenschuppen kahl oder gewimpert; *NebenB.* halbeyf. $\frac{1}{2}$. Auf sumpfigen Haiden und moorigen Triften, (in Schles. bei Oppeln; in den bayer. A. und in den Bruchern bei München.) Mai. Juni. S. elegans Bess. Die B. sind, so wie die jüngern Zweige bisweilen behaart, die ältern aber nebst diesen immer vollkommen kahl. Die BForm ist sehr veränderlich; die B. sind nämlich bald rundlich-eyf. und an der Basis fast herzf. und an der Spitze sehr stumpf, oder eyf., länglich, u. zugespitzt oder lanzettl., und an beiden Enden spitz. Diese letztere Form ist mit der S. repens nahe verwandt, während andere ein sehr verschiednes Ansehen haben; man untersch. sie aber sogleich dch die fast hechtgrauen, glanzlosen, ganz-kahlen B. Var. auch (in Lappland) mit behaarten Kapseln. D.

34. S. AMBIGUA (Ehrh.) Strittige W. — Kätzchen sitzend, die fruchttrag. kurz-gestielt, Stiel klein-beblättert; *Kapseln* aus eyf. Basis lanzettl., filzig, lang-gestielt, *Stielchen* 3 oder 4 mal so lang, als die *Honigdrüse*; Gf. kurz; N. eyf., ausgerandet; B. elliptisch, verkehrteyf.- oder lanzettf., zurückgekrümmt-bespitzt, ganzrandig oder entfernt-gezähmelt, unterseits runzelig-aderig, angedrückt-zottig, fast seidig, zuletzt kahl; *NebenB.* halbeyf., ge-

rade. *h.* Auf moorigen, sumpfigen Wiesen, feuchten Triften. Apr. Mai. *S. ambigua* Ehrh.; (ich habe echte Ehrhartische Exemplare mit Schwedischen verglichen.) *S. plicata* Fries. *S. incubacea* L., nach Fries, aber die Beschreibung Linne's stimmt doch nicht überein, und Smith beschreibt unter dem Namen der *S. incubaca* nach den Exemplaren des Linnäischen Herbariums die *S. incubaca* der deutschen Autor. (*S. angustifolia* Wulf.) *S. versifolia* Ser., nicht Wahlenb. *S. ambigua* Willd., mit ellipt. B.; *S. spathulata* Willd., mit verkehrteyf. B.; *S. prostrata* Sm. mit lanzettl. B. *S. aurito-repens* Wimm. fl. v. Schles. mit längl. verkehrteyf. B.; *S. cinereo-repens* Wimm., eine Variet. mit lanzettl. B. Steht als eine Mittelform zw. *S. aurita* und *repens*; v. ersterer untersch. sie sich dch die weniger-runzeligen, ganzrandigen oder fein-gezähnelten, unterseits fast seidigen B., die halbeyf. Neben B. mit gerader Spitze und die viel kleinere Statur; v. letzterer dch die unterseits runzelig-aderigen B. und die breitem Neben B.

Die *Salix versifolia* Wahlenb., nach Fries die eigentliche *S. fusca* L., ist in Lappland einheimisch. Sie steht der *S. myrtilloides* näher und untersch. sich von *S. ambigua* Ehrh. gleich auf den ersten Anblick dch den verlängerten Gf.

35. *S. REPENS* (L.) Kriechende W. — Kätzchen sitzend, die fruchtragenden oval-walzlich, kurzgestielt, der Stiel beblättert; Kapseln aus eyf. Basis lanzettl., filzig oder kahl, lang-gestielt, *Stielehen 2 oder 3 mal so lang, als die Honigdrüse*; Gf. mittel-mässig; N. eyf., 2sp.; B. oval, elliptisch oder lanzettl., *mit rückwärts gekrümmter Spitze*, am Rande etwas herabgebogen, ganzrandig oder entfernt-drüsigen-gezähnel, *glänzend, unterseits seidig*; Neben B. lanzettl., spitz. *h.* Auf schlechtern Wiesen, feuchten und sandigen, auch trocknen Triften und an moorigen, sumpfigen O. Apr. *S. repens* Koch. Comment. de sal. europ. *S. repens* Willd., mit unterseits ziemlich kahlen B.; *S. fusca* Willd., mit unterseits seidigen B. *S. depressa* Hoffm., nicht L. *S. fusca* Meyer. Die Gestalt der B. geht von der rundlich-eyf. dch alle Stufen in die schmal-lanzettl. über; sie sind dabei bald spärlich-flaumig, bald fast kahl, bald auf der untern oder auch auf beiden Seiten dicht-flaumig; die Neben B. sind an den Sommertrieben gross genug, bei andern aber auch viel kleiner, bei andern fehlen sie. Die hauptsächlichsten Variet. sind folgende:

α. vulgaris, B. lanzettl., Kapseln filzig: *S. repens* Sm., nach Exemplaren v. Autor selbst.

β. fusca, B. länglich-oval, Kapseln filzig: *S. fusca* Sm., nach Exempl. v. Autor selbst. Die *S. fusca* L. ist aber nach Fries einerlei mit *S. versifolia* Wahlenb.

γ. argentea, B. breit-oval oder oval-rundlich, unter- oder beiderseits seidenh., Kapseln filzig: *S. argentea* Sm. *S. arenaria* L., in der Fl. suecica, nach der gotl. Reise. *S. lanata* Thuill.

δ. leiocarpa, B. unterseits seidenh., Fruchtkn. und Kapseln kahl: *S. fusca α. leiocarpa* Meyer.

ε. finmarchica, B. kahl, die oberen, jüngeren seidenh., Kapseln kahl: *S. finmarchica* Willd. en. suppl., Willd. Berl. Baumz.

nach lebenden Expl. aus dem Berliner Garten (nicht Fries novit., welche ich von dem Autor empfang, und die er nun *S. campestris* nennt. Diese ist der *S. myrtilloides* weit näher verwandt, als der *S. aurita* und *repens*.) Zu *S. finmarchica* Willd. gehört *S. onusta* Bess. en. pl. vollh. mit Ausschluss der Var. γ .

Andere Variet. und Abänderungen sind: *S. parvifolia* Sm. bei Rees., *S. adscendens* Sm., *S. incubacea* und *S. rostrata* Thuill.

36. *S. ANGUSTIFOLIA* (Wulf. bei Jacq.) Schmalblättrige W. — Kätzchen sitzend, die fruchtragenden walzl., kurz-gestielt, der Stiel beblättert; Kapseln aus eyf. Basis lanzettl., filzig oder kahl, langgestielt, *Stielchen 2 oder 3 mal so lang, als die Honigdrüse*; Gf. mittelmässig; N. eyf., 2sp.; *B. verlängert-lanzettl.*, steif, mit *gerader Spitze zugespitzt, am Rande etwas zurückgerollt*, ganzrandig oder entfernt-drüsig-gezähnt, *unterseits seidig*; *Neben B. lanzettl.* $\frac{1}{2}$. An sumpfigen, torfigen O., (in Kärnthen und Krain, Unteröstr., Mecklenb., Schlesien und im Besenhorst bei Hamburg, dort nicht selten, aber ausserdem nicht um Hamburg, Sonder.) Mai. *S. angustifolia* Fries. *S. incubacea* Willd., und des Linnäischen Herb., vgl. Sm. *S. pratensis* Host. *S. rosmarinifolia* β . *incubacea* Koch. de sal. europ. *S. fusca* e. *longifolia* Meyer. *S. laeta* Schultz, eine Variet. mit dottergelben Aesten. — Die B. sind noch einmal so lang, als bei *S. repens*, den B. v. *S. viminalis* nicht unähnlich, doch dieses Merkmal und die gerade Spitze der B. untersch. sie sich v. *S. repens*; doch die mehr länglich-lanzettl. B. und die ovalen später verlängerten Kätzchen v. *S. rosmarinifolia*. Diese Arten sind schwer durch Beschreibung kenntlich zu machen, obgleich man sie lebend ohne Mühe unterscheidet. — Den Namen *S. angustifolia* habe ich vorangestellt, weil Fries behauptet, die *S. incubacea* Linne's sey einerlei mit seiner *S. plicata*; aber die *S. incubacea* des Linn. Herbar. gehört, wie ich schon bemerkte, zu *S. angustifolia* und nicht zu *S. plicata*. D.

37. *S. ROSMARINIFOLIA* (L.) Rosmarinblättrige W. — Kätzchen sitzend, die fruchtragenden rundlich, kurz-gestielt, der Stiel beblättert; Kapseln aus eyf. Basis lanzettl., filzig, langgestielt, *Stielchen 2 oder 3 mal so lang, als die Honigdrüse*; Gf. kurz; N. eyf., 2sp.; *B. lineal. oder lineal-lanzettl.*, verschmälert-zugespitzt, *am Rande flach, an der Spitze gerade*, ganzrandig oder entfernt-drüsig-gezähnt, *unterseits seidig*; *Neben B. lanzettl.* $\frac{1}{2}$. An sumpfigen, moorigen O., (in NordD., Schles., Böhmen, und um Wien.) Mai. *S. rosmarinifolia* Koch. Sal. europ., mit Ausschl. der Var. β . und γ . *S. tennis* und *parviflora* Host. Diese Art var. viel weniger, als die *S. repens*, und ihre B. sind immer länger und länger-verschmälert und zwar in eine gerade Spitze. D.

38. *S. DONIANA* (Smith.) Don's W. — Einbrüderig; Kätzchen sitzend, die fruchtragenden etwas gestielt, an der Basis kleinbeblättert; Kapseln ey-kegelf., filzig, gestielt, *Stielchen 2 mal so lang, als die Honigdrüse*; Gf. sehr kurz; N. kurz, ausgerandet; *B. oft gegenst., lanzettl. oder verkehrtey-lanzettf., spitz, steif, an der Spitze gerade, entfernt-kleingesägt, oberseits spiegelnd*,

nuterseits seidig, die Haare an den ausgewachsenen B. zerstreut. ♀. An Rändern feuchter Wiesen, (bei Steinfurth in Westphalen, Sonder; Unterharz, Wallroth.) Mai. Hr. Sonder entdeckte die Art, fand aber nur den männlichen Strauch, den weiblichen besitze ich lebend aus England. — Ein aufrechter, 3-4 Fuss hoher Strauch, der *S. purpurea* zwar sehr ähnlich, aber man erkennt doch den weiblichen sogleich an den gestielten Kapseln und den männlichen an den nach dem Verblühen gelb-braunen, und nicht schwarzen Stbk. Kätzchen kürzer, als bei dieser, aber doch walzlich. D.

VII. Rotte. FRIGIDAE. Alpenweide. Kätzchenschuppen an der Spitze ungleichfarbig. Die Kätzchen seitenst., und wenigstens die fruchttragenden mehr oder weniger gestielt, mit einem beblätterten Stiele. Stbk. nach dem Verblühen gelb oder braun. Kapseln sitzend oder kurzgestielt, aber mit einem Stielchen, das nicht länger, als die Honigdrüse ist.

Sehr ästige Sträucher, deren ältere Aeste knorrig und deren jüngere kaum gertenartig sind. Von den Sahlweiden untersch. sich diese Rotte doch die sitzenden oder kurzgestielten Kapseln, von den Korbweiden vorzüglich doch die Statur des sehr ästigen und knorrigen Strauches. Die Kätzchen sitzen meistens auf einem deutlichen Stiele, bei *S. Lapponum* findet man sie aber auch oft sitzend; übrigens die einzige mir bekannte Ausnahme.

39. *S. ARBUSCULA* (L., nach der Ansicht v. Laestadius, Fries und Hartman.) Bäumchen-W. — Kätzchen gestielt, *der Stiel beblättert*; Kapseln ey-kegelf., filzig, sitzend, zuletzt kurzgestielt; *Honigdrüse über die Basis der Kapsel hinaufreichend*; Gf. verlängert, oft bis zur Mitte gespalten; N. 2sp.; B. kahl, lanzettl. u. spitz oder eyf. u. an der Basis und Spitze stumpf oder kurz-zugespitzt, entfernter- oder dichter-gesägt, oberseits glänzend, *unterseits bläulich-grün, glanzlos*. ♀. Deh d. g. AK. Juni. Juli. Fries sagt: „diese ist ganz gewiss die ursprüngliche *S. arbuscula* L., auch nach dem Zeugnisse von Laestadius, dem Wiederhersteller, so wie der Flor. lapp. von Wahlenberg, was doch Vergleichung des Werkes de Veg. helv. und der Fl. carp. bestätigt wird. Aber man muss eine weit grössere ausschliessen, die sich vorzüglich auf die zunächst folgende (die *S. phylicifolia*) bezieht.“ — Wahlenberg, dem ich in meiner Commentatio über die Europäischen Weiden gefolgt bin, begreift unter seiner *S. arbuscula* „einen 6 Fuss hohen Strauch“, die *S. bicolor* Ehrh., *S. Weigeliana* Willd., *S. phylicifolia* Fries, und „einen niedrigen Strauch“, die *S. Waldsteiniana* W. und die *S. prunifolia* Sm. Jene hatte ich für die *S. arbuscula* Wahlenb. angenommen; jetzt aber, indem ich Fries folge, stelle ich unter diesem Namen die zwei letztern auf, da die oben erwähnten ausgezeichneten Botaniker darin übereinstimmen, dass diese die wahre Linneische Art sey, obgleich Linne unter *S. arbuscula* 3 verschiedene Arten begreift, nämlich die Variet. *α.*, welche Wahlenb. zu seiner *S. arbuscula*, Fries hingegen zu *S. maialis* zieht; die Variet. *β.*, welche nach Wahlenb. eine Variet. von *S. hastata* ist, und die Variet. *γ.*, welche die *S. arbuscula* Fries nach diesem Autor, nach Wahlenb. aber die *S. livida* darstellt. Die Art var.:

α. Waldsteiniana, die Sägezähne der B. entfernter, mehr angedrückt; Gf. sehr oft tief-geeth.; es kommen Exemplare vor, deren

Fruchtkn. bis zur Basis in zwei gesonderte getheilt sind: *S. Waldsteiniana* Willd. *S. coruscans* St. h. 25. *S. ovata* Ser. *S. arbuscula* J. a. t. 108, eine rohe Abbildung. Wahlenb. fl. carp. p. 316.

β. foetida, Sägezähne der B. häufig, mit einer dickern Drüse endigend, darum mehr genähert; Gf. meist nicht gespalten: *S. prunifolia* *β.* Koch. Sal. europ. p. 59. *S. foetida* Schleich. *S. alpina* Sut. *S. prunifolia* Ser. *S. vacciniifolia* Engl. bot., wenn die B. unterseits mit kleinen, angedrückten Haaren bestreut sind, aber nicht der bot. Gärten, welche eine Variet. v. *S. repens* ist. — Die *S. formosa* der Willd. Sammlung n. 18162., begreift diese und mehr andere Arten unter sich.

γ. prunifolia, Sägezähne der B. etwas wellig; Gf. kurz, nach der Bthezeit nur wenig verlängert; Schuppen grau-braun: *S. prunifolia* Sm., *S. venulosa* Sm., *S. carinata* Sm., die nach Exemplaren v. Autor nicht verschieden sind. Meine Exemplare wurden während der Blüthezeit gesammelt, fruchtttragende Exemplare dieser Variet. sah ich noch nicht.

40. *S. LAPPONUM* (L., nach Laestad. und Fries.) Lappländische W. — *Kätzchen sitzend*, die fruchtttrag., etwas gestielt; Kapseln ey-lanzettf., filzig oder kahl, sitzend, zuletzt sehr kurzgestielt; *Honigdrüse länger oder so lang, als die Bthstielchen*; Gf. verlängert; N. lineal., 2sp.; *B. lanzettl. oder elliptisch*, zugespitzt, ganzrandig oder kleingesägt, die jüngern seidig-zottig, die erwachsenen oberseits runzelig, *unterseits filzig, glanzlos*; NebenB. halbherzf., mit zurückgekrümmter Spitze. *h.* An feuchten, morastigen O. der A., (dch d. g. AK., in den Sudet. und Mähr. Karpaten.) Mai, Juni. *S. limosa* Wahlenb. *S. helvetica* Vill. *S. nivea* Ser. *S. lactea* Bray. *S. arenaria* Willd. Sm. St. h. 25. *S. glaucophylla* Willd. *S. Stuartiana* Sm. — Die B. unterseits oft schneeweiss-, manchmal auch grau-filzig, oberseits oft weisslich-zottig; die ausgewachsenen aber verlieren auf der obern Seite den Ueberzug und werden dunkelgrün; der Filz der untern Seite ist aus kurzen, dicht-verwebten Haaren gebildet; dch dieses Merkmal, so wie dch die sitzenden, deckblattlosen, oder kurzgestielten Kätzchen, deren Stiel mit einigen kleinen B. besetzt ist, wird sie am leichtesten von der folg. unterschieden. — Var.:

β. nur die jüngern B. schwach-filzig, die entwickelten beiderseits kahl, mit einem filzig-flaumigen Rande: *S. arenaria* *β. denudata* Tausch. *S. glauca* Sm.

Indem ich nach dem Vorgange von Fries und Hartmann den Namen *S. Lapponum* voranstelle, hoffe ich, dass er in Zukunft nicht noch einmal umgeändert werde; wiewohl das leicht geschehen könnte, da nach Smith, in d. Engl. fl. 4. p. 292., die *Salix Lapponum* des Linneischen Herbariums von *S. sericea*, (*S. glauca* Fries und Hartmann.) nicht verschieden ist, und die *S. glauca* des Linneischen Herb. zu *S. limosa* Wahlenb. gehört.

41. *S. GLAUCA* (L.) Bläulichgrüne W. — *Kätzchen langgestielt, der Stiel beblättert*; Kapseln ey-lanzettf., filzig, kurz-gestielt, *Stielchen so lang, als die Honigdrüse*; Gf. 2sp.; N. ver-

längert, 2sp.; *B.* lanzettl. oder elliptisch, ganzrandig, *unterseits grau, beiderseits seidig-zottig*, zuletzt ziemlich kahl, spitz, die untersten aber sehr stumpf; NebenB. eyf., spitz, gerade. ♀. Auf den höchsten A. der südl. Schw., (v. Gotthard deh die südl. Kette bis zum grossen Bernhard.) Juni. Juli. *S. sericea* Vill. Die *B.* sind unterseits grau-gefärbt und mit langen, geraden, angedrückten Zotten, aber nicht mit verwehtem Filze bedeckt, zuletzt fast kahl; Kätzchen langgestielt, der Stiel mit grossen *B.* besetzt. Dch diese Merkmale unterscheidet man sie mit Sicherheit von der vorhergehenden. — Eine Variet. mit schmälern, spitzern, lanzettl. *B.* ist die *S. glauca* var. γ . Lapponum Wahlenb., *S. albida* Schleich. und *S. elaeagnoides* Schleich, Ser. (an dieser Variet. stehen die Bth. etwas lockerer als gewöhnlich.) Eine Variet. mit fast ovalen, mit NebenB. versehenen *B.* und längern Kätzchenschuppen fast v. der Länge des Fruchtkn. ist *S. appendiculata* Vahl. Fl. dan. t. 1056., *S. glauca* β . *appendiculata* Wahlenb., diese Variet. untersch. sich vorzüglich dch die längern Schuppen, denn NebenB. fand ich auch oft bei andern Abänderungen. Uebrigens untersch. sich diese Variet. nach authentischen Exemplaren wenig v. der gewöhnlichen Form; kürzere und noch einmal so lange Schuppen kommen auch bei andern Arten nicht selten vor. *S.*

42. *S. CAESIA* (Villars.) Hechtblaue W. — *Kätzchen kurzgestielt*, der Stiel beblättert; Kapseln ey-kegelf., filzig, sitzend, zuletzt sehr kurz-gestielt; *Honigdrüse über die Basis der Kapsel hinaufreichend*; Gf. verlängert oder auch ziemlich kurz; N. eyf., länglich, ungeth. und 2sp.; *B.* elliptisch oder lanzettl., zugespitzt, *ganz kahl, beiderseits bläulichgrün, glanzlos*, am Rande zurückgerollt, *ganzrandig*. ♀. Auf den höchsten A., (bisher blos auf d. Enzeindaz im C. Waadt und auf d. VorA. della Coste in Levinalongo im südl. Tyrol.) Juni. Juli. *S. prostrata* Ehrh. *S. myrtilloides* Willd., nicht L., noch Sm. Die Länge des Gf. variirt bei dieser Art, wie bei *S. arbuscula*, auch die Kätzchen sind dieser sehr ähnlich, aber die glanzlosen, ganzrandigen und besonders unterseits hechtgrauen *B.* sind verschieden. *S.*

43. *S. MYRSINITES* (L.) Myrsinenartige W. — *Kätzchen langgestielt*, der Stiel ohngefähr von der Länge des Kätzchens, beblättert, oberwärts blattlos; Kapseln aus eyf. Basis lanzettl.-zugespitzt, sitzend, wollig-zottig, zuletzt sehr kurz-gestielt, kahl geworden; *Honigdrüse über die Basis der Kapsel hinaufreichend*; Gf. verlängert; N. lineal., ungeth. und 2sp.; *B.* elliptisch oder lanzettl., *beiderseits netzaderig, spiegelnd, gleichfarbig*, zuletzt ganz kahl, am Rande *dicht-drüsig-kleingesägt*. ♀. An feuchten O. der höhern A., (v. der Schw. bis Steyerm.) Juni. Juli. *S. myrsinites* Willd. und *S. arbutifolia* Willd. *S. dubia* Sut. Fruchtkn. nebst den Gf. schwarz-purpurn, Stbf. blau, Stbk. violett. Var.:

β . *lanata*, *B.* durchaus mit einer fast seidigen, dichten Wolle bedeckt.

γ . *leiocarpa*, Kapseln zuletzt kahl.

δ . *Jacquiniana* mit ganzrandigen *B.*: *S. Jacquiniana* Willd.

spec., Koch Synops. ed. I. S. Jacquinii Host. syn. S. fusca Jacq. austr., t. 409., nicht Linn. S. alpina Scop. carn. 2. t. 61.

VIII. Rotte. GLACIALES. Gletscherweiden. Kätzchen endst. Es sprosst nämlich aus der Endknospe der vorjährigen Aeste ein neues Aestchen hervor, das mit B. und in deren Winkeln mit Knospen, welche sich im folg. Jahre entwickeln, bekleidet und auf dessen Spitze das Kätzchen befindlich ist. Deswegen sitzen die Kätzchen auf einem beblätterten, bleibenden Bthstiele, wodch der Ast sich fortsetzt und verlängert.

Zwergartige Sträuchchen mit einem unter der Erde kriechenden Stamme und aufstrebenden Aesten.

44. S. RETICULATA (L.) Netzblättrige W. — *Kätzchen gestielt, endst.*; Kapseln eyf., filzig, fast sitzend; Honigdrüse über die Basis der Kapsel hinaufreichend; Gf. kurz; N. 2 sp.; B. *langgestielt, elliptisch-kreisrund*, stumpf, kurz-bespitzt oder gestutzt, am Rande zurückgerollt, ganzrandig, oberseits runzelig, *unterseits bläulichgrün, netzig*, zuletzt kahl. ♀. Auf bewässerten Felsen und an nassen O. der höchsten A., (dch d. g. AK.) Juli. Aug. St. h. 25.

45. S. RETUSA (L.) Ausgerandete W. — *Kätzchen gestielt, der Stiel beblättert, knospentrag.*; Kapseln ey-kegelf., kahl, kurzgestielt; Honigdrüse ohngefähr von der Länge des Bthstielchens; Gf. mittelmässig; N. 2 sp., lineal.; B. *sehr kurzgestielt, verkehrt-eyf. oder länglich-keilig*, stumpf oder gestutzt, ganzrandig oder an der Basis drüsig-gezähnt, *gleichlaufend-aderig, ganz kahl.* ♀. An felsigen O. der A. und VorA.; die Variet. γ. auf den höhern A. Juli. Aug. St. h. 25. unsere Variet. α. Var.:

β. *major*, B. 1 Zoll lang; Kätzchen reichbth.: S. Kitaibeliana Willd.

γ. viel kleiner; Stamm nebst den Aesten an d. Erde angedrückt, ineinander verflochten; B. halb so gross, die meisten nicht ausgerandet; Kätzchen kurzgestielt, armbth., 3-5, ja sogar nur 1bth.: S. serpyllifolia Scop. Willd. Aber die S. serpyllifolia Jacq. a. t. 298. stellt die gewöhnliche Form der S. retusa dar.

46. S. HERBACEA (L.) Krautige W. — *Kätzchen endst., gestielt*, Stiel 2blättrig, knospentrag.; Kapseln ey-kegelf., kahl, fast sitzend; Honigdrüse länger, als das kurze Bthstielchen; Gf. kurz; N. 2 sp.; B. *kreisrund* und oval, stumpf oder gestutzt, gesägt, *kahl, netzaderig, beiderseits glänzend.* ♀. An felsigen, sonnigen O. der höchsten A. zw. dem ewigen Schnee; auch auf den Sud. Juli. Aug.

2. PÓPULUS (L.) Pappel. — Bth. 2häusig. P. becherf., auf der Kätzchenschuppe liegend. N. v. E. gen. 1. 20.

I. Rotte. LEUCE. Dub. bot. gall. p. 427. Die jungen Zweige filzig oder, wenigstens an jungen Pflanzen, kurz. Sthg. 8. Kätzchenschuppen gewimpert

1. P. ALBA (L.) Silber-P. — B. rundlich-eyf., winkelig-gezähnt, *unterseits* nebst den Zweigen *schneeweiss-filzig*, die an den endst. Zweigen *herzf., handf.-5lappig*; Schuppen des weibl. Kätzchen lanzettl., an der Spitze gekerbt, gewimpert. ♀. In feuch-

ten Wäldern, (zerstreut dch d. Geb.; in Menge in den Wäldern der Rheinpfalz, dicht am Rheine mit der folgenden.) März. Apr. P. nivea Willd. Knospen filzig, nicht klebrig.

2. P. CANESCENS (Smith) Grauliche P. — B. rundlich-eyf., winkelig-gezähnt, *unterseits* nebst den Zweigen *grau-filzig*, die an den endst. Zweigen *herz-eyf.*, *ungelappt*; Schuppen des weibl. Kätzchen an der Spitze gespalten, am Rande gewimpert. ♀. In feuchten Wäldern, (sehr zerstreut dch d. Geb.) März. Apr. P. alba Willd. Knospen grünlich-weiss, nicht klebrig.

3. P. TREMULA (L.) Zitter-P. — B. fast kreisrund, gezähnt, beiderseits nebst den Zweigen *kahl*, die der wurzelst. Triebe und der jüngern Pflanzen kurz-*h.*, *eyf.*, *spitz*; Kätzchenschuppen fingerig-eingeschnitten, dicht-zottig-gewimpert. ♀. In Wäldern. März. Apr. Knospen *kahl*, *klebrig*. Kommt vor mit beiderseits angedrücktwolligen B.: P. villosa Lang; in Wäldern, auch hie und da um Erlangen.

II. Rotte. AIGEIROS Dub. bot. gall. p. 427. Die Zweige und auch die wurzelst. Triebe *kahl*. Stbg. 12-30. Kätzchenschuppen *kahl*.

4. P. PYRAMIDALIS (Rozier.) Pyramiden-P. — B. *rautenf.*, zugespitzt, gesägt, am Rande *kahl*; Aeste *aufrecht*. ♀. Aus dem Oriente gebracht, wird nun überall neben den Strassen kultiv. März. Apr. P. fastigiata Poir. P. dilatata Ait., ein zweidentiger Name. Sämmtliche Bäume dieser Art, welche ich bis jetzt gesehen, waren männlichen Geschlechtes. *Complanata* K. Kultiv.

5. P. NIGRA (L.) Schwarze P. — B. *3eckig-eyf.*, zugespitzt, gesägt, am Rande *kahl*, an der Basis abgeschnitten und gesägt; Aeste *abstehend*. ♀. An feuchten O., Ufern hie und da. Apr. Dod. pempt. S36.

6. P. MONILIFERA (Ait.) Perlenschnurtrag. P. — B. *3eckig-eyf.*, zugespitzt, gesägt, an der Basis abgeschnitten und fast ganzrandig, *am Rande flaumig*. ♀. Aus Nordamerika eingebracht, wird nun an die Strassen gepflanzt. Apr. Kultiv.

CX. Ordng. BETULINEEN. Rich. bei Kunth. nov. gen. 2. p. 21. Amentacearum gen. Juss.

Bth. eingeschlechtig, 1häusig, in *Kätzchen*. Kätzchen aus schuppenf., gestielten Deck B. gebildet. Männch. Perigone 3, ungeth. oder 4th., auf dem Stiele des Deck B. sitzend. Stbg. 2 oder 4 in jedem P.; (6-12 auf einem Deck B.) Weibch. Kätzchen aus Deck B. gebildet, welche während der Blüthezeit nicht gestielt sind. P. fehlend. *Fruchtkn. 2fächerig; Fächer 1eyig; N. 2*, fädlich. Fruchtgehäuse nicht aufspringend, zsgedrückt, häutig oder fast lederig, bisweilen an den Seiten mit einem Flügel umzogen

S. in jedem Fache einzeln, hängend, eyweisslos. Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. Keim B. flach. Bäume mit wechselst. B.

1. BÉTULA (L.) Birke. — Männch. Kätzchen. Schuppen gestielt, 1 bth., mit 2 Läppchen unter der schildf. Spitze. P. 3blättrig, auf dem Stiele der Schuppe sitzend. Stbg. 6. Die Säckchen der Stbk. dch den 2sp. Stbf. getrennt. Weibch. Kätzchen aus länglichen, an der Basis verbreiterten, zuletzt 3lappigen, und an der Basis keiligen und abfälligen, 2-3 bth. Schuppen gebildet. Fruchtkn. 2fächerig. N. 2. Nuss geflügelt, 1fächerig, 1samig. N. v. E. gen. 10.

I. Rotte. EXCELSAE. B. verästelt-aderig, aber nicht deutlich netzig-aderig.

1. B. ALBA (L. spec. 1393.) Weisse B. — B. rautenf. - 3 eckig, lang-zugespitzt, doppelt-gesägt, kahl; die fruchtragenden Kätzchen langgestielt, hängend, die seith. Lappen der Schuppen zurückgekrümmt, Nüsse elliptisch, mit einem Flügel umzogen, der noch einmal so breit ist, als die Nuss, und bis zur Spitze der Narben hinaufreicht. b. In Wäldern, vorzüglich auf Sandboden, auf Ebenen, Gebirgen und VorA. Apr. Mai. Var. mit aufrechten oder verlängerten und schlanken, lang-herabhängenden Zweigen; letztere ist B. pendula Roth. Exemplare mit harzigen Wäzchen an den Zweigen: B. verrucosa Ehrh. arb. n. 96., mit Ausschl. des blühenden Zweiges; vgl. Mey. chlor. han. 501. — Die B. hybrida Bechst., B. aurea Bork., ist eine strauchige Form, vgl. Mey. a. a. O. — Eine Var. mit geschlitzten B. ist B. alba γ. laciniata Wahlenb.

2. B. PUBESCENS (Ehrh.) Flaumhaarige B. — B. eyf. oder rautenf., spitz oder zugespitzt, doppelt-gesägt, anfängl. oft flaumh., später ganz kahl, oder in den Winkeln der Adern unterseits bärtig, die fruchtragenden Kätzchen langgestielt, hängend, die seith. Lappen der Schuppen zurückgebogen, oder weit-abstehend und gestutzt; Nüsse verkehrteyf., mit einem Flügel umzogen, der so breit ist, als die Nuss, und bis an die Spitze desselben hinaufreicht, kürzer als die N. b. In feuchten Wäldern, Sumpfmoores; in die VorA. hinaufsteigend. Apr. Mai, ein wenig später, als die vorhergehende. B. odorata Bechst. In den VorA. bildet sie oft einen niedrigen, spreitzenden Strauch mit kahlen B. und Bstielen und manchmal auch nackten Winkeln der BAdern; letztere Var. ist

β. carpatica, B. carpatica Willd. B. glutinosa Wallr.

II. Rotte. HUMILES. Die B. unterseits mit einem dichten Adernetze.

3. B. INTERMEDIA (Thomas. Pl. exsicc.) Mittlere B. — Die B. unterseits netzaderig, rundl.-eyf., fast doppelt-gekerbt-gesägt, mit spitzen Kerben; die fruchtragenden Kätzchen gestielt, (aufrecht?), der Stiel halb so lang, als das Kätzchen, und länger, oft mit einem kleinen Blatte versehen, die Lappen der Schuppen mit den Rändern zsstossend, die seitenst. abgerundet, stumpf, breiter und kürzer, als der mittlere; Nüsse längl.-verkehrteyf., der Flügel un-

gefähr so breit, wie die Nuss. ♀. In sumpfigen, torfigen Gegenden, (im Jura der Schw.) Mai. Juni. S.

4. *B. HUMILIS* (Schrank Baier. Fl. 1. S. 421.) Niedere *B.* — Die *B.* *unterseits netzaderig*, rundl.-eyf., oder eyf., ungleich-gekerbt-gesägt mit *spitzen Sägezähnen*; die *fruchttragenden Kätzchen* aufrecht, kurz-gestielt, *viel länger, als der Stiel*, die Schuppen fingerig-3sp., die Zpfl fast gleichgross, auseinandertretend; die Nüsse verkehrteyf., der Flügel halb so breit, als die Nuss. ♀. An sumpfigen, moorigen O., (Gegend von Memmingen und Kloster Roth in Oberschwaben; Trauchgan bei Hohenschwangau; Gegend von Salzburg und Reichenhall; zerstreut dch Mecklenburg, Pommern und Preussen, an manchen O. häufig; Oranienburg und Grüneberg in Brandenburg.) Apr. Fl. dan. f. 91. *B. fruticosa* Willd. sp. pl., Berl. Baumz., Koch Synops. ed. 1. Gestützt auf Willdenow's Autorität hatte ich die *B. humilis* Schrank's als *B. fruticosa* Pall. aufgeführt, denn Willd. hat ganz deutlich unter diesem Namen die *B. humilis* beschrieben, indem er in der Berl. Baumz. sagt: die Schuppen des weibl. Kätzchens sind 3sp. mit stumpfen, gleichlangen Lappen; allein hievon unterscheidet sich die ächte *B. fruticosa* Pallas allerdings und zwar dch Folgendes: die *B.* sind unterseits mit zahlreichen Pünktchen bestreut, die Zapfenschuppen ungleich-lappig, die Seitenlappen abgekürzt und breiter, der mittlere aber verlängert, und längl., der die Nuss umziehende Flügel ist verkehrt-herzf., mit Ohrchen, die bis über die Mitte der Narben hervorgestreckt sind. D.

5. *B. NANA* (L. spec. 1394.) Zwerg-*B.* — Die *B.* *unterseits netzig, aderig*, fast kreisrund, stumpf, oder in die Quere breiter und abgestutzt-stumpf, gekerbt, die *Kerben abgerundet, stumpf*; die *fruchttragenden Kätzchen* aufrecht, sitzend, *sehr kurz-gestielt*, die Schuppen fingerig, 3sp., die Zpfl fast gleichlang, längl. auseinandertretend; Nüsse rundl.-verkehrteyf. mit einem Flügel umzogen, der halb so breit ist, als die Nuss. ♀. In moorigen Sümpfen kälterer Gegenden, (Schw. im Waadtland, und Neuenburger Jura und bei Einsiedeln; Oberschwaben, Reichenholzrieder Moos; Oberbayern, Gegend von Schongau; Salzburg und Reichenhall; Alpengipfel von Steyerin. und Kärnth.; Iserwiese und Seefelder in d. Sudeten; Böhmerwald, bei Kuschwarta; Gottesgabe im Erzgebirg; hohe Stellen des Harzes; Osterode in Preussen.) Mai. Guimp. t. 149.

2. *ALNUS* (Tournef. instit. t. 359.) Erle. — Männch. Ein Kätzchen. Schuppen gestielt, auf der obren Seite 3bth., mit 4 Läppchen vor der schildf. Spitze. Die P. auf dem Stielchen sitzend, 4sp. oder 3blättrig, 4männig. Stbg. ungeth.; Stbk. 2-fächerig. Weibch. Ein Kätzchen. Schuppen eyf., 2bth., oben mit 4 Schüppchen versehen, an der Frucht vergrössert, keilig-verkehrteyf., bleibend. Fruchtkn. sehr klein. N. 2, südlich. Nuss zgedrückt, 2fächerig.

I. Rotte. *ALNOBETULA*. Perigone aus 3 getrennten B. zsgesetzt. Diese Rotte kann mit der Gattung *Betula* nicht vereinigt werden; sie untersch. sich von dieser dch die 3 bth. Schuppen des männl. Kätzchens, und die ungeth. Stbf.; ferner dch die bleibenden, vor der Spitze mit 4 Lappchen versehenen Schuppen des weibl. Kätzchens.

1. *A. VIRIDIS* (DC.) Grüne E. — *B. eyf.*, spitz oder kurz-zugespitzt, geschärft-doppelt-gesägt, kahl, gleichfarbig; Adern unterseits kurz h.; *S.* mit einem breiten, häutigen Flügel umzogen. ♀. An Abhängen der A. und VorA., (in Menge in den GranitA., wo sie die *Pinus Pumilio* ersetzt; auf den höhern Punkten des Schwarzwaldes.) Mai. Juni. *Betula ovata* Schrank. *B. Alnobetula* Ehrh. *B. viridis* Chaix. bei Vill. Juni. Juli.

II. Rotte. *CLETHRA*. Perigon 4 sp.

2. *A. INCANA* (DC.) Graue E. — *B. eyf.*, spitz oder kurz-zugespitzt, geschärft-doppelt-gesägt, unterseits bläulichgrün, flaumig oder fast filzig; *S.* ohne häutigen Flügel. ♀. In Athälern an Bächen, in die VorA. und mit den Flüssen in die Ebenen herabsteigend, (dch d. g. AK., mit d. Rheine bis Gernersheim; mit d. Iller u. s. w. bis zur Donau; sodann in Mähren, Böhm., Schles.; auf dem Brocken; der Rhön; in Ostpreussen.) Febr. März. Var.:

β. *pinnatifida*, *B.* fiedersp.-eingeschnitten; Zpfl gesägt, stumpf; *A. incana* β. *pinnatifida* Wahlenb. Diese wurde bisher nur in Schweden gefunden.

γ. *acutiloba*, *B.* fiedersp. mit spitzen Zpfl; im südl. Tyrol, Sartorelli.

3. *A. PUBESCENS* (Tausch in der Regensb. bot. Zeitg. 1834. S. 520.) Flaumige E. — *B. rundl. oder verkehrteyf.*, stumpf, oder die oberen spitzl., doppelt-gekerbt-gesägt, beiderseits grün, unterseits flaumig, oder schwach-filzig; Nüsse ohne häutigen Flügel. ♀. An feuchten O. und Flüssen, (Böhmen, Tausch; in Baden bei Mühlheim, Lang; Gegend von Carlsruh, Alex. Braun; Wiesenthal, Döll.) März, (drei Wochen später, als *A. incana*, und 10 Tage später, als *A. glutinosa* nach Tausch.) *A. badensis* Lang. *A. barbata* C. A. Meyer. D.

4. *A. GLUTINOSA* (Gärtn.) Klebrige E. — *B. rundlich, sehr stumpf*, gestutzt, an der Basis keilig, kahl; Winkel der Adern unterseits bärtig; *S.* ohne häutigen Flügel. ♀. In Sümpfen und an Ufern. Febr. März. St. h. 29. *Betula Alnus a. glutinosa* L. Var.:

β. *incisa*, *B.* eingeschnitten. Willd. sp. 4. 335.

γ. *laciniata*, *B.* fiedersp.; Zpfl spitz. Willd. a. a. O. Diese Variet. sah ich nur kultiv.

CXI. Ordng. MYRICEEN. Rich. elem. bot. p. 561.

Bth. 1geschlechtig, 1- oder 2häusig in Kätzchen, einzeln in den Winkeln von DeckB. oder Schuppen. Männch. Stbg. 2 oder

mehrere, frei oder 1brüderig. P. fehlend oder aus 1-2 kleinen Schüppchen gebildet. Weibch. P. aus 2-6 kleinen, unterweibigen, oft an den Fruchtkn. angewachsenen Schuppen zsgesetzt. *Fruchtkn. 1fächerig, 1eytig*; Eychen aufrecht. N. 2, *verlängert*, pfriemlich, Fruchthäuse nicht aufspringend, trocken, oder dch die vergrösserten und angewachsenen Schuppen des P. steinfruchtartig, 1samig. *Eyweiss fehlend*. Keim gerade, umgekehrt; Würzelchen nach der Spitze des S. gerichtet, v. Nabel entfernt.

1. MYRICA (L.) Gagel. — Bth. 2häusig in Kätzchen; Schuppen 1bth. Männch. Stbg. 4-6, auf der Basis der Schuppe eingefügt und genährt oder auch zsgewachsen. Weibch. Fruchtkn. 1, auf der Basis des. aus 4 Schüppchen zsgesetzten, P. angewachsen. N. v. E. gen. 3. 1.

1. M. GALE (L.) Gemeiner G. — B. lanzettl., etwas gesägt; St. stranchig. h. Auf feuchten, torligen Haiden. (v. Westphal. dch d. nördl. Theil v. Hanov., Holst., Oldenb., Mecklenb. bis Pommern.) Apr. Mai. Fl. d. t. 327. D.

CXII. Ordng. CONIFEREN. Juss. gen. 411.

Bth. 1geschlechtig; die männl. in Kätzchen; Kätzchen aus schuppenf. oder schildf. Deck B. gebildet. Stbk. an die Deck B. angewachsen oder 1 oder mehrere Stbgf. mit den Stbl. in ein Säulchen verwachsen, an der Spitze frei von einem auf der Basis der Kätzchenschuppen aufsitzenden Perigon umgeben. Die weibl. Bth. in Kätzchen, oder endst. zu 3, 2, oder einzeln. Die Eychen nackt, krugf., an der Spitze offen, oder dem schuppenf., flach-ausgebreiteten, aus dem Winkel des Deck B. hervortretenden Fruchtblatte aufgewachsen; oder auf die Basis der Kätzchenschuppen gestellt; bei Ephedra mit einem Perigone umgeben. Der Keim in der Mittellinie des Eyweisses; Keim B. 2, oder mehrere quirlig-gestellt.

1 Gruppe. EPHEDRINEEN. Nees v. Esenb. gen. fasc. 1. Bth. in Kätzchen; Schuppen gegenst., an der Basis szgewachsen. Männch. Hülle 2sp., der Kätzchenschuppe aufsitzend. Stbg. 1 oder mehrere zsgewachsene, an der Spitze freie; Stbk. 2fächerig. Weibl. Bth. endst., zu zweien gegenüber, aufrecht, mit einer 2th. Hülle, aus den 2 obersten, viel grössern und an der Basis zsgewachsenen Schuppen gebildet, umgeben. Eychen aufrecht, länger, als das P.; S. v. dem P. und der Hülle eingeschlossen, die zuletzt fleischig wird und eine falsche Beere darstellt.

1. ÉPHEDRA (L.) Meertrübchen. — Gattungscharakter wie der der Gruppe. N. v. E. gen. 1. 8.

1. *E. DISTACHYA* (L.) Europäisches M. — Bthstiele gegenst.; Kätzchen gezweigt. ♀. An sonnigen, felsigen O., (im Wallis und an der Ruine Siegmundskron bei Botzen in Südtirol.) Apr. Mai. Schk. t. 339.

II. Gruppe. *TAXINEEN*. Rich. Männl. Bth. in Kätzchen; Schuppen schildf., rund, unterseits mit 1 fächerigen in einen Kreis gestellten Stbk. besetzt. Weibl. Bth. endst., einzeln. Fruchtkn. aufrecht.

2. *TAXUS* (L.) Taxbaum. — Bth. 2häusig; die männl. in Kätzchen; Schuppen schildf., unterseits mit 1 fächerigen in einen Kreis gestellten Stbk. besetzt. Weibl. Bth. einzeln, auf einer ungeth. (aus fleischigen, verwachsenen Schuppen entstandener?) anfänglich sehr kleinen und ringf. Hülle sitzend. Samen mit einer nussartigen äussern Samenhaut bedeckt, in einer Hülle verborgen, die sich zuletzt in einen fleischigen, ganzen, eine falsche Beere darstellenden Becher verwandelt. N. v. E. gen. 1. 9.

1. *T. BACCATA* (L.) Gemeiner T. — B. genähert, lineal., spitz; Bth. blattwinkelst., sitzend. ♀. In Gebirgs- und VorA.-Wäldern, (nur in Gegenden, welche höhere Berge haben, deswegen in Norddeutschland nur angebaut.) März. Apr. Schk. t. 339.

III. Gruppe. *CUPRESSINEEN*. Rich. conif. 137. Männl. Bth. in Kätzchen. Stbk. 4-7, 1 fächerig, an dem untern Rande der schildf. Schuppen unterseits angewachsen. Weibl. Bth. in dem Winkel der Kätzchenschuppen sitzend; oder endst. und mit einer 3sp. Hülle umgeben. Eychen aufrecht. Ein besonderer Fruchtb. nicht vorhanden.

3. *JUNIPERUS* (L.) Wachholder. — Bth. 2häusig, die männlichen in Kätzchen. Stbk. 4-7 an der Zahl, 1 fächerig, auf dem untern Rande einer eyf., schildf. Schuppe eingefügt. Weibl. Bth. zu 3, endst., v. einer fleischigen, 3sp., aus 3 zsgewachsenen Kätzchenschuppen gebildeten, Hülle umgeben, frei, aufrecht. S. mit einer knöchernen, nussartigen Samenhaut bedeckt, in der vergrößerten, fleischigen, eine falsche Beere darstellenden Hülle verborgen. N. v. E. gen. 1. 7.

1. *J. NANA* (Willd.) Zwerg-W. — Strauchig, liegend; B. zu 3, einwärtsgekrümmt, lanzettl.-lineal., in eine stechende Stachelspitze zugespitzt, oberseits seicht-rinnig, unterseits stumpf-gekielt, mit einer eingedrückten, den Kiel durchziehenden Linie; Beeren eyf., bereift, ohngefähr so lang, als die B. ♀. An felsigen O. der A., auch der VorA., (dch d. g. AK. und in den höhern Mähr., Böhm. und Schles. Gebirgen.) Juli. Aug. Schk. t. 338. *J. sibirica* Burgsdorf. *J. communis* γ. L., γ. *montana* Ait., γ. *alpina* Gaud. Beeren schwarz, hechtblau-bereift.

2. *J. COMMUNIS* (L.) Gemeiner W. — Strauchig, aufrecht, zuletzt baumartig; B. zu dreien, weit-abstehend, lineal.-pfriemlich, in eine stechende Stachelspitze zugespitzt, oberseits seicht-rinnig,

unterseits stumpf-gekielt, mit einer eingedrückten, den Kiel durchziehenden Linie; Beeren eyf., bereift, 2 oder 3 mal kürzer, als die B. ♀. Auf Hügeln, Haiden und sowohl in trocknen, als feuchten Wäldern. Apr. Mai. Beeren schwarz, hechtblau-bereift.

3. J. MACROCARPA (Sibthorp.) Grossbeeriger W. — Strauchig; B. zu 3, weit-abstehend, lanzettl.-lineal., in eine stechende Stachelspitze zugespitzt, oberseits 2furchig, *unterseits spitz-gekielt*; Beeren eyf. oder kugelig, bereift, so lang, als die B. und länger. ♀. An rauhen O., (felsige Küste zw. Triest und Duino; bei Fiume.) Mai. Tabernaem. krtb. p. 1358. f. 4. Beeren sehr gross, reif roth-braun, hechtblau-bereift. Untersch. sich v. J. Oxycedrus, vorzüglich durch die Beeren, welche an letzterem nur halb so gross, scharlachroth und glänzend sind. J.

4. J. OXYCEDRUS (L. sp. 1470.) — Strauchig; B. zu 3, weit abstehend, lineal., in eine stechende Stachelspitze zugespitzt, oberseits 2furchig, *unterseits spitz-gekielt*; Beeren kugelig, bei der Reife glänzend, nicht so lang, als das B. ♀. An unbauten buschigen O., (Istrien und auf den benachbarten Inseln.) Mai. Beeren roth, glänzend. J.

5. J. PHOENICEA (L.) Scharlachrother W. — B. kurz-eyf., ziemlich stumpf, 6reihig-dicht-dachig, auf dem Rücken mit einer Furche durchzogen; Beeren abstehend. ♀. An rauhen O., (auf d. Insel Cherso und Osero.) Mai. Tab. krtb. 1352. f. 2. Beeren roth. Tenore hat in d. sylloge fl. neap. eine Variet.

♂. mit blauen Beeren mit dem Synonyme: J. lycia L. sp. 1471. J.

5. J. SABINA (L.) Sade-W. — B. rautenf., spitz, 4reihig-dicht-dachig und auf dem Rücken mit einer Drüse eingedrückt oder lanzettl., zugespitzt, etwas abstehend, herablaufend und mehr oder weniger entfernt; Beeren mit dem zurückgekrümmten Bthstiele hängend. ♀. Auf den A., (Wallis, Südtirol, auch im Oetzthal, Matreyer Thal; Krain.) Apr. Mai. Beeren blau.

4. CUPRESSUS (L.) Cypresse. — Bth. 1häusig in Kätzchen; Männch. Stbk. 4, 1fächerig, am untern Rande einer eyf., schildf. Schuppe eingefügt. Weibch. Eychen 8 und mehr, auf der Basis der Kätzchenschuppe sitzend, aufrecht. S. mit einer nussartigen Samenhaut versehen. Zapfen trocken, aus holzartigen, schildf. kantigen, in der Mitte mit einem Buckel versehenen Schuppen zsgesetzt.

1. C. SEMPERVIRENS (L.) Immergrüne C. — Aeste aufrecht; Zweige 4kantig; B. 4reihig-dachig, stumpf, angedrückt, konvex; Zapfen fast kugelig; Schuppen in der Mitte mit einem wehrlosen Buckel. ♀. In südlichen Gegenden, (südl. Krain, Istrien, Südtirol, ital. Schweiz, doch wahrscheinlich nur angepflanzt.) Febr. März. Schk. t. 310. Kultiv.

IV. Gruppe. ABIETINEEN. Rich. conif. 145. Bth. in Kätzchen; Männch. Stbk. an die Schuppen, (Deck B.) des Kätzchens

unterseits angewachsen; Stbf. fehlend. Weibl. Bth., ein Kätzchen aus Eychen tragenden Schuppen gebildet, welche oft mit einem Deck B. gestützt sind, sich vergrössern, und sodann die grössern Schuppen eines trocknen Zapfens darstellen. Die Eychen umgekehrt, an der Basis der Schuppe aussen angewachsen.

5. PINUS (L. gen. n. 1077.) Fichte. — Männl. Kätzchen: Stbk. 2, 1fächerig, den Schuppen unterseits angewachsen. Weibl. Kätzchen: Schuppen dachig; Eychen an der Basis der Schuppen zu 2, nebeneinanderstehend, mit der Spitze abwärts-gerichtet, mit einer zerschlitzen, offenen Mündung versehen. S. mit einer ledrigen oder knöchernen Samenhaut.

1. Rotte. PINASTER. (Pinus Tournef. instit. 355.) B. immergrün, zu 2 oder mehreren büschelig zsgestellt. Schuppen des Zapfens bleibend, (die Schuppen an der Spitze mit einer verdickten, in der Mitte mit einem Knopfe versehenen Fläche, [einem Schilde,] ausgestattet.) welches bei P. Cembra den Knopf am Ende der Schuppe trägt. Der Flügel des S. hinfällig oder fehlend.

An den heurigen Aesten, welche man gewöhnlich Sprossen nennt, bestehen die Blätter in trockenhäutigen, am Rande zerschlitzen Schuppen, welche nach der Entwicklung des Zweiges abfallen, wobei nur ihre Basis zurückbleibt. Aus den Winkeln dieser schuppenf. B. sprosst mit der Entwicklung des jungen Zweiges, gleichsam ein Jahr zu frühe, ein Büschel grüner B., gebildet aus einem Zweige, dessen Achse sich nicht verlängert, hervor. Wenn jedoch die Spitze des Astes abgeschnitten wird, so entspringt mitten aus diesem Büschel gar oft ein neuer Ast, der die Fortsetzung des verloren gegangenen Astes bildet.

1. P. SYLVESTRIS (L. spec. 1418. mit Ausschluss der Variet.) Wald. F. — B. *gezweiet*, lauchgrün; die stützenden Schuppen lanzettl.-pfrieml., weiss-berandet, und an der Spitze weiss-gefranst, die Fransen spinnwebig zshängend, den jungen Zweig locker umgebend; *die Zapfen ohne Glanz, die heurigen auf einem hakenf. Stiel von der Länge des Zapfens selbst, nach der Erde hinabgebogen*, die reifen kegelf., der Schild der Schuppen konvex, oder an den unteren stumpf-geschnäbelt, mit kurzem, zurückgebogenem Schnabel; der Flügel 3mal länger, als der S.; die männl. Kätzchen eyf. oder längl.; der Kamm der Stbk. nierenf. oder kurz-eyf., wenig und stumpf-gezähnel. *h.* Auf Flächen und niedrigeren Gebirgen, besonders auf Sandboden, oft mächtige Wälder bildend; auf den VorA. seltener, und selten bis zu einer Höhe von 5000 Fuss hinaufsteigend. Mai. Guimp. t. 153. Antoin. Conif. t. 4. f. 3. P. Mughus Jacq. ic. rar. t. 193.; sie ist keine Variet., sondern Pinus sylvestris selbst, welche in den Julischen A. strauchartig, als Legföhre, vorkommt, gerade wie P. Mughus. Zu P. sylvestris gehört auch als syn. P. rubra Mill. dict. n. 3.; denn die P. sylvestris Mill. dict. n. 1. ist Pinus Pinaster mit „7-8 Zoll langen Zapfen“. — Der reife offene Zapfen ist an seiner Basis mehr oder minder kegelf.

Pinus sylvestris L. und Pinus Mughus Scop. und zumal dessen aufrechte Variet., welche die Pinus uliginosa der Autoren darstellt, wurden oft verwechselt, obgleich sie leicht zu unterscheiden sind. Pinus sylvestris hat lauchgrüne oder graugrünliche B. und die jungen $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ jährigen Zapfen sind auf einem langen hakenf. Fruchtstiel gegen die Erde zu herabgebogen, ein Merkmal, wodch diese

Art von allen übrigen unserer Fl. auf den ersten Blick und standhaft verschieden ist; *Pinus Mughus* dagegen hat grasgrüne B. und die heurigen Zapfen stehen aufrecht auf einem kürzern Fruchtsiele oder nur wenig schief, nie aber abwärtsgerichtet. Wie mehrere dieser Arten, so sind auch diese beiden schon an den Knospen kenntlich. Die Knospen der *Pinus sylvestris* sind während des Sommers und bis zu ihrer Entwicklung im darauffolgenden Frühling längl.-eyf. von der Mitte an allmählig verschmälert, während sie bei *Pinus Mughus* eyf., oder längl.-wäzlich, kurz-spitzig, oder auch stumpf sind. Von diesen ist leicht zu unterscheiden die *Pinus Laricio* dch die in einen langen Schnabel zugespitzten Knospen; und von allen bisher erwähnten die *Pinus Pinea* dch die an der Spitze sperrigen Knospen, indem nämlich die obern Schuppen derselben von der Mitte an abstehend oder umgebogen sind. Zwischen den Knospen von *Pinus uncinata* und *Pinus Mughus* aber, konnte ich noch keinen Unterschied finden, so wie zwischen denen von *Pinus Pinea* und *Pinus Pinaster*, welche letztere im Gebiete unserer Fl. noch nicht gefunden wurde.

2. *P. Mughus* (Scop. carn. 2. S. 247.) Zwergkiefer. — B. gezwelt, grasgrün, die stützenden Schuppen lanzettl.-pfrieml., oberwärts weissberandet, und an der Spitze weiss, gefranst, die Fransen spinnwebig-zshängend, den jungen Zweig locker umgebend; Zapfen glänzend, die heurigen auf einem Stiel von der halben Länge des Zapfens, aufrecht, die reifen oval oder kegelf., abstehend, oder hinabgebogen, der Schild der Schuppen konvex, oder stumpf-geschnäbelt, mit kurzem, zurückgebogenem Schnabel; der Flügel 2-3mal länger, als der S.; männl. Kätzchen eyf.; Kamm der Stbk. nierenf. oder fast viereckig, unregelmässig-gezähnel. b. Auf den A. und VorA., besonders den kalkhaltigen, an Felsen und an feuchten O. häufig; mit den Flüssen in die Thäler herabsteigend, und daselbst in die Variet. *a.* ausartend. Mai. Auf den A. später. Var.:

a. uliginosa, Stamm aufrecht, bis 40 Fuss hoch; *P. obliqua* Sauter in der Regensb. bot. Ztg. *P. rotundata* Link Abh. d. Berl. Acad. *P. uliginosa* Neumann (in Uebers. d. Arbeit d. schles. Gesellsch.). Diese ist nicht nur in sumpfigen Gegenden der Sudeten heimisch, sondern wächst auch häufig in den Thälern der A. und in feuchten Wäldern der Oberpfalz.

β. *Pumilio*, (Legföhre,) Stamm aufstehend, von der Basis an ästig, mit niederliegenden Aesten; *P. Pumilio* Haenke Beob. a. d. Riesengeb. W. und Kit. pl. rar. hung. t. 149. Antoin. Conif. t. 3. f. 1. *Pinaster Pumilio* Clus. pan. p. 15. Abbildg. (*Pinus Mughus* Jacq. gehört zu *Pinus sylvestris*, und *P. Mugho* Poir. zu *Pinus uncinata*.)

3. *P. UNCINATA* (Ramond in DC. fl. fr. 3. S. 726.) Hakige F. — B. gezwelt, grasgrün; die stützenden Schuppen eyf.-lanzettl., zugespitzt, sehr schmal-weissberandet, spärlich gefranst; Zapfen glänzend, die heurigen auf einem Stiele von der halben Länge des Zapfens aufrecht, die reifen oval oder kegelf., abstehend oder hinabgebogen; der Schild aller Schuppen, oder der vordern

Seite des Zapfens verlängert-geschnübelt, der Schnabel zurückgebogen; der Flügel 3mal länger, als der S.; männl. Kätzchen eyf., Kamm der Stbk. rundl., dicht- und geschärft-gezähnt. b. Auf den A., (bisher auf den A. der südwestl. Schw.) Juni. Juli. P. uncinata Antoin. Conif. t. 3. f. 3. P. Mugho Poiret. in Lamarck. dict. Knospen wie beim Vorigen. S.

4. P. LARICIO (Poiret in Lamarck's Dict. 5. S. 339.) Schwarzföhre. — *B. gezeit*, grün, die stützenden Schuppen lanzettl. pfrieml., breit-weissberandet, und an der Spitze weiss, fransig, die Fransen frei; *die Zapfen glänzend, die heurigen aufrecht, sehr kurz-gestielt, der Stiel viel kürzer, als der Zapfen*, die reifen sitzend, abstehend, kegelf. der Schild der Schuppen konvex; der Flügel 3mal länger, als der S.; *die männl. Kätzchen walzlich; zuletzt sehr verlängert*; der Kamm der Stbk. rundl. konvex, dicht- und geschärft-gezähnt, fast dehscheinend, in der Mitte dunkler. b. In Wäldern, besonders auf Kalkboden, (in Unteröstreich und im angrenzenden Steyerm., Antoine; in den Gebirgen von Finne, Noë; und als Zwergart, [Legföhre.] auf den Julischen A., Tommasini.) Mai. P. Laricio β . austriaca Antoine Conif. t. 2. f. 2. P. maritima B. minor Duham. arbor. t. 72. bis. P. maritima Koch Synops. ed. 1. P. austriaca Höss. Anl. P. nigricans Host. fl. a. Link in der Linnaea, Höss. Beschreib. d. Schwarzföhre in der Regensb. bot. Ztg. P. Pinaster Rochel banat. t. 39. P. nigra Link Abh. d. B. Ak. Die jüngeren Zweige anfangs grün, später mehr oder minder gelblich-braun, die B. stark, steif. Schild der Zapfenschuppen flach-konvex oder kurz-pyramidenf. Die S. auf beiden Seiten neblig-grau, dch schwarze und graulich-weiße Fleckchen, oder auf der einen Seite weisslich. Antoine stellt in seinen Conif. t. 2. f. 3. eine Variet. γ . Pallasiana auf mit mehr gelbbraunlichen Zweigen, die jedoch kaum als Variet. gelten kann; dazu gehört nach Antoine: Pinus Pallasiana Lamb. pin. t. 5., P. maritima Pall. fl. taur. ined., P. halepensis M. Bieberst. taur. cauc. — Von diesen ist zwar P. Laricio α . Poiretiana Antoine t. 2. f. 1. (P. Laricio Poiret. in Lam. dict., P. maritima Ait. kew.) dch um die Hälfte dünnere, leicht biegbare, oft hin- und hergebogene B., jedoch kaum als Art verschieden; hierüber mögen diejenigen Botaniker entscheiden, welche die Pfl. lebend untersuchen und vergleichen können. Uebrigens kommt die Pinus sylvestris in unseren Wäldern auch hie und da mit um die Hälfte dünneren B. vor und ändert auch eben so wie P. Laricio, mit fast flachem und kurz-pyramidenf. Schilde der Zapfenschuppen ab. — Die Pinus Pinaster Ait. kew., Antoine Conif. t. 6. f. 1. (P. maritima major Duhamel, P. Laricio Santi, nicht Poiret., P. sylvestris γ . L. spec., P. sylvestris Mill. dict., nicht Lin.), welche am Meere in Süd-Frankreich und Italien wächst, im Gebiete unserer Fl. aber noch nicht gefunden wurde, wird oft mit P. Laricio verwechselt, unterscheidet sich jedoch deutlich von dieser letzteren dadurch, dass die jungen Zweige von den spinnwebig-zshängenden Fransen der stützenden Schuppen dicht umwickelt sind, dass die heurigen Zapfen auf einem Fruchstiele von der halben Länge des Zapfens sitzen, und dch noch einmal so grosse, auf der einen Seite schwarz und weiss-

nebelige, auf der anderen ganz schwarze und einfarbige S. und russfarbene Flügel derselben, welche letztere bei *P. Laricio* hellbräunlich sind. D.

5. *P. PINEA* (L. spec. 1419.) Pinienföhre. — *Die B. gezweit*, lauchgrün, die stützenden Schuppen eyf.-lanzettl., verschmälert-zugespitzt, dicht-fransig und nebst der Basis der Fransen braun, gegen den Rand hin heller, die Fransen frei; die Zapfen stark-glänzend, fast stiellos, rundl.-eyf., stumpf; der Schild der Schuppen konvex, in der Mitte eingedrückt; *die Flügel 3mal kürzer, als der S.*; die männlichen Kätzchen längl.; der Kamm der Staubk. nierenf., am Rande kleinlappig und geschärft-gezähnt. $\frac{1}{2}$. Im südl. Tyrol gezogen. Mai. Antoin. Conif. t. 3. f. 2. Camerar. epit. Abbildung. Kultiv.

Die Knospen sind wie bei *Pinus Pinaster* Ait.; nach einem lebenden Expl von diesem zu urtheilen, welches jedoch noch keine Früchte getragen hat.

6. *P. CEMBRA* (L. spec. 1419.) — *Die B. zu 3-5. grün, später*, nach abgefallener Scheide, *an der Basis nackt*, die stützenden Schuppen eyf.-lanzettl., pfriemlich-zugespitzt, weiss-berandet, spärlich befranst, die Fransen frei; die Zapfen sitzend, eyf., stumpf; die Schuppen flach, aufrecht, flaumig, mit einem Spitzchen endigend, an der Spitze etwas absteehend, ohne Schild; *die S. flügellos*. $\frac{1}{2}$. Auf den höchsten A., (von der Schw. bis Oestreich.) Juni. Camerar. ep., Antoin. Conif. t. 20. f. 2. Die Samen sind wie bei den übrigen mit einer Schuppe bedeckt, aber diese Schuppe verbreitert sich in keinen Flügel.

II. Rotte. *LARIX*. Tournef. inst. t. 337. Die B. abfällig, die meisten büschelig-gestellt, die der heurigen Aeste einzeln. Zapfenschuppen bleibend. (Flügel der S. bleibend. Schuppen an der Spitze flach).

7. *P. LARIX* (L. spec. 1420.) Lörchenbaum. — *Die B. büschelig-gestellt*, flach, etwas rinnig, abfällig; Zapfen eyf., aufrecht, mit sehr stumpfen an der Spitze lockeren Schuppen. $\frac{1}{2}$. In den Wäldern der A. und VorA. bis zur Höhe von 5000 Fuss hinauf. Mai. *Larix europaea* hort. paris. DC. fl. fr. *Abies Larix* Lam. illustr. t. 785. f. 2. Koch Synops. ed. 1: *Pinus Larix* Antoine t. 21. f. 2.

III. Rotte. *ABIES*. Link in der *Linnaea* 1841. S. 525, *Picea* Antoin. Conif. S. 61. Die B. immergrün, alle einzeln stehend. Die S. bei der Reife mit den von der bleibenden Axe losgelösten Schuppen und DeckB. abfallend.

8. *P. PICEA* (L. spec. 1420.) Weisstanne. — *Die B. einzelnstehend*, 2zeilig, *ausgerandet*, *unterseits weiss-2streifig*; Zapfen walzlich, aufrecht; Zapfenschuppen sehr stumpf, angedrückt, die DeckB. länger, als die Schuppen. $\frac{1}{2}$. In Wäldern, namentlich auf den A. und VorA. bis 4500 Fuss hinauf. Mai. *Abies pectinata* DC. fl. fr., Link in der *Linnaea*. A. *excelsa* Link Abh. der Berl. Akad. A. *vulgaris* Poiret in Lam. Dict. *Pinus Picea* Antoin. Conif. t. 27. f. 2. P. *Abies* Du Roi harbk., Camerar. epit. Abbildung.

IV. Rotte. *PICEA* Link in der *Linnaea* 1841. S. 516. Die B. immergrün, sämtlich einzelnstehend. Zapfenschuppen bleibend.

9. *P. ABIES* (L. spec. 1421.) Rothtanne, Fichte. — Die B. einzelnstehend, zsgedrückt, fast 4kantig, stachelspitz, grün; Zapfen walzl., hängend; Schuppen ausgenagt-gezähnel. ♀. In Berggegenden, A. und VorA.; bildet Waldungen und steigt in den A. bis zu 5500 Fuss hinauf. Mai. *Pinus excelsa* Lam. fl. fr. *P. Picea* Du. Roi harbk. *Abies excelsa* Poirlet in Lam. Dict., Koch Synops. ed. 1. *Picea excelsa* Link in der *Linnaea*. *P. vulgaris* Link in der Abh. der Berl. A., Camerar. epit. Abbildung.

II. Classe. PHANEROGAMISCHE ENDOGENEN (Zerstreutfaserige, Wahrnehmbarblühende) oder MONOCOTYLEDONEN (Einkeimblättrige).

Der Stamm, sowohl ohne mittelpunktständiges Mark und ohne Markstrahlen, als auch ohne Rinde, besteht aus zerstreuten, durch das Zellgewebe laufenden Fasern, erhärtet am Rande eher, als im Mittelpunkte, ist daher an der Basis öfters dünner, als an der Spitze. Die Bth., mit Geschlechts-Organen versehen, sind sehr oft nach der Dreizahl gebildet. Die Stbk. sind mit 2 Säckchen versehen, seltner 1fächerig. Der Keim trägt nur ein einziges Keimblatt oder hat vielmehr wechselst. Keimblätter.

CXIII. Ordng. HYDROCHARIDEEN. DC. fl. fr. 3. p. 265.

K. 3blättrig, krautig. Blkr. 3blättrig, regelmässig. Stbg. frei, 3, und mit den Blb. abwechselnd oder noch einmal so viel, als Blb. oder mehrere. Fruchtkn. unterst., 1-mehrfächerig, vieleigig; Samenträger an die Fruchtwand oder an die Scheidewände angewachsen. Gf. 3, 6, meist 2sp. Frucht nicht aufspringend, fleischig, inwendig breiig. Keim walzenf., gerade. Eyweiss fehlend. Bth. 2häusig oder zwittrig

1. *VALLISNERIA* (Lin. gen. N. 1097.) Vallisnerie. — Bth. 2häusig. Männl. ein endständiger, auf einem kurzen, aufrechten, auf den W. entspringenden Schafte befindlicher Kolben. Bth

dichtgehäuft, mit einer später 3sp. Bthscheide umhüllt, lösen sich während des Blühens von den Bthstielen und schwimmen auf der Oberfläche des Wassers. K. 3th. Stbgf. 3. mit den Zpfln des K. wechselst. Weibl. Bth. einzeln, am Ende eines wurzelst., fädlichen, spiralf. gewundenen, sehr langen Schaftes. Bthscheide röhrig, an der Spitze 2sp. den Fruchtkn. umschliessend. K. 3th. Anstatt der Blkr. 3 kleine, 2sp. mit den Zpfln des K. wechselst. Schuppen. Fruchtkn. unterst., 1fächerig, vieleiyig, Eychen wandst. Gf. fehlend. N. 3, eyf. 2sp.

1. V. SPIRALIS (L. sp. 1441) Spiralf. V. — In Seen, (bei Sopra il confine im Gardasee im südl. Tyrol, Facchini; und in der Bucht von Agno und Capo di Lego des Luganersees im C. Tessin, Lagger.) Juli. Aug. Sämmtl. B. wurzelst., lineal, grasartig, ähnlich den untergetauchten der Sagittaria sagittifolia, aber spitzziger und gegen die Spitze zu stachelspitzig-gezähmelt. Bth. weiss.

2. STRATIÓTES (L.) Wasserscheer. — Bth. 2häusig. K. 3th. Blkr. 3blättrig. NebenStbg 20-30. Männch. Ausgebildete Stbg. 12. Weibch. Gf. 6, 2sp. Beere 6seitig, 6fächerig, viel-samig. N. v. E. gen. 6. 16.

1. S. ALODES (L.) Aloëartige W. — B. schwertf.-3eckig, stachelig-gewimpert. 2. In stehenden Wassern schwimmend, (Oestreich, Mähren, Schlesien: dch d. g. nördl. D. von Westphalen bis nach Ostpreuss.; im Entensee bei Bürgel unweit Offenbach, ursprünglich eingesetzt, jetzt in zahlloser Menge, Lehmann.) Juli. Aug. Schk. t. 335. a. b. Bth. weiss. D.

3. HYDRÓCHARIS (L.) Froschbiss. — Bth. 2häusig. K. Saum 3th. Blkr. 3blättrig. Männch. Stbg. 9. Stempel 3, fehlschlagend. Weibch. NebenStbg. 3, fädlich. Honigschuppen 3, fleischig. Gf. 6; N. 2th. N. v. E. gen. 6. 15.

1. H. MORSUS RANAE (L.) Gemeiner F. — In stehenden Wassern, (stw. dch d. Gebiet.) Juli. Aug. St. h. 44. Bth. weiss.

4. UDÓRA (Nuttall.) Udore. — Bth. 2häusig. K. 3th. Blkr. 3blättrig. Männch. Stbg. 3. Weibch. Gf. 3, 2sp.; N. verlängert, federig, (die männlichen Bth. sah ich noch nicht.)

1. U. OCCIDENTALIS (Pursh. unter Serpicula nach Spreng. syst. veg. 1. 1. p. 171.) Westliche U. — B. lanzettl.-lineal., gerade, sehr fein-stachelspitzig-kleingesägt, Sägezähne vorwärts gekehrt. 2. In stehenden Wassern, Seen, (im Damm'schen See in der Nähe des Rodenberges bei Stettin in Pommern häufig.) Blühend fand man sie am bezeichneten O. noch nicht. Serpicula verticillata Rostk. und Schm. Udora verticillata Spreng., was die Pflanze von Nordamerika anbelangt. Elodea canadensis Michaux. Die deutsche Art, von der ich mehrere, von Rostkovius gesammelte Exemplare besitze, stimmt genau mit der Amerikanischen, bei Bethlehem in Pensylvanien gesammelten, Pflanze überein. Von

dieser ist die *Udora lithuanica* Besser, von dem Autor selbst erhalten, allerdings verschieden, die B. sind breiter, kreisförmig-zurückgekrümmt, stachelig-gezähnt; aber diese ist in D. noch nicht entdeckt worden. Reichenb. scheint die Pommersche Pfl. noch nicht gesehen zu haben, da er sie mit der *U. lithuanica* für einerlei erklärte, vgl. Fl. exc. p. 139. — Die *Serpicula verticillata* Ostindien's sah ich noch nicht. D.

CXIV. Ordng. ALISMACEEN. Juss. dict. sc. nat. 7. 474., mit Ausschl. von Gattungen.

K. 3 blättrig, krautig. Blkr. 3 blättrig, regelmässig, unterweibig. Stbg. unterweibig, frei, 6 oder zahlreich. Fruchtkn. 3, 6, oder viele, jeder mit einem Gf. endigend, oberst., 1-2 eyig; Eychen an die innere Nath angeheftet. G. einfach. Früchtchen trocken, nicht aufspringend. S. eyweisslos. Keim gekrümmt.

1. **ALISMA** (L.) Froschlöffel. — Bth. zwittrig. *K. 3 blättrig. Blkr. 3 blättrig. Stbg. 6. Früchtchen 6 oder viele, Isamig, nicht aufspringend. N. von E. gen. 6. 18.*

1. **PLANTAGO** (L.) Gemeiner F. — Schaft quirlig-rispig; die Fruchtkn. inwendig über der Basis den Gf. tragend; *Früchtchen an der Spitze abgerundet-stumpf, wehrlos, auf dem Rücken 1-2-furchig, in eine stumpf-3eckige Frucht zsgestellt; B. herzf., eyf. oder lanzettl. 4 In Gräben und stehenden Wassern und an deren Ufern. Die Variet. β . und γ . nicht überall. Juli. Aug. Schk. t. 102. Bth. weiss oder hell-rosenroth. Var. mit breitem und schmälern, mehr- oder weniger herzf. B. und*

β . lanceolatum, B. lanzettl., nach der Basis verschmälert, 6 Zoll lang und 1 Zoll breit: A. lanceolatum Wither. 362. A. Plantago β . Willd. — Wenn diese Variet. im Wasser wächst, so sind die ersten B. oft lineal., grasartig und durchscheinend und schwimmen auf dem Wasser; die Pfl. kommt auch vor, wiewohl selten,

γ . graminifolium, alle B. grasartig und schwimmend, nur ein oder das andere mit einer schmal-lanzettl. Blattfläche über das Wasser hervortretend: A. Plantago γ . graminifolia Wahlenb. D. fl. 2. p. 631. A. graminifolium Ehrh. A. natans Pollich.

2. **A. PARNASSIFOLIUM** (L.) Parnassienblättriger F. — Schaft quirlig-traubig oder an der Basis etwas rispig; *Früchtchen verkehrteyf., an der Spitze auswärts abgerundet und einwärts begrannt, vielrillig; B. tief-herzf., ziemlich stumpf. 4. In Seen und stehenden Wassern, (in einem kleinen See bei Tempelhof in der Gegend von Berlin; „erscheint blos bei niedrigem Wasserstande, wenn das Wasser $\frac{1}{3}$ -1 Fuss über den Wurzeln steht,“ Bouché; sodann am See bei dem Basedower Theerofen und am Longritzer See in Mecklenb., bei Frankf. a. d. O., im Entensee bei Bürgel,*

unweit Offenbach, in den Lannen bei Sichelsdorf in Untersteyerm.) Juli. Aug. Rb. ic. f. 377. „Die im Wasser selbst wachsenden Exemplare haben sehr lange Bstiele und schwimmende B., dies ist *A. dubia* Willd. prodr.; an Orten aber, wo das Wasser zurückgetreten ist, sind die Bstiele kaum 2 Zoll lang, diess ist *A. Damasonium* Willd. a. a. O.“ Dethard. consp. p. 32. Bth. weiss. D.

3. *A. NATANS* (L.) Schwimmender F. — Der St. beblättert; Bth. an den Gelenken des St. einzeln, zu 3 oder 5; *Früchtchen* länglich, stumpf, zugespitzt-geschnäbelt, viel-12-15rillig, etwas abstehend; *die stengelst. B.* gestielt, oval oder länglich, die wurzelst. lineal., sitzend. 4. In Fischteichen und stehenden Wassern, (bei Trier, Andernach am Unterrheine und von da dch Westphalen, Hannover und d. g. nördl. D.) Juni-Aug. Rb. ic. l. f. 77. 78. Bth. weiss. Die untergetauchten B. sind oft lineal. und häutig, manchmal sind alle B. so beschaffen: *A. natans sparganifolium* Fries novit. D.

4. *A. RANUNCULOIDES* (L.) Ranunkelblättriger F. — Schaft an der Spitze doldig oder quirlig-doppelt-doldig; *Früchtchen* schiefe-elliptisch, fünfkantig, spitz, in ein kugeliges Köpfchen zsgestellt; B. lanzettl., 3nervig. 4. In Sümpfen und an überschwemmt gewesenen O., (am Unterrheine und von da dch Westphalen, Hannover und das nördl. D. bis Mecklenb.; in Böhmen, Preussen, am Neuenburger See in der Schw., Monfalcone.) Juni-Aug. Rb. ic. f. 79. Bth. weiss. Die B. sind hie und da sämmtlich lineal, häutig und schwimmend: *A. ranunculoides zosterifolium* Fries novit.

2. *SAGITTARIA* (L.) Pfeilkraut. — Bth. 1 häusig. K. 3th. Blb. 3. Männch. Stbg. zahlreich. Weibch. Früchtchen zahlreich, auf einem kugeligen Fruchth. N. v. E. gen. 6. 19.

1. *S. SAGITTAEFOLIA* (L.) Gemeines P. — B. tief-pfeilf.; Schaft einfach. 4. In stehenden Wassern. Juni. Juli. Schk. t. 298. Var. mit lanzettl. zugespitzten und eyf., spitzen B.: letztere ist die *S. heterophylla* Schreb. bei Kört. und Schw. fl. erlang. St. h. 16. Blb. weiss, mit purpurnen Nägeln.

XCv. Ordng. BUTOMEEN. Rich. mem. du mus. 2. p. 365.

K. 3blättrig, manchmal gefärbt und den Blb. ähnlich. Blkr. 3blättrig, unterweibig. Stbg. unterweibig, frei, von bestimmter oder unbestimmter Zahl. Fruchth. 3-6, mehrere, oberständig, getrennt, oder an der Basis zsgewachsen, jeder mit einer N. endigend, vieleiyig, die Eychen die ganze innere Oberfläche des Fruchtkn. einnehmend. S. eyweisslos. Keim in der Richtung des S. liegend.

1. **BÛTOMUS** (L.) Wasserviole. — P. 6blättrig, blumenkronenartig. Stbg. 9, davon 3 innere. Kapseln 6, unterwärts zsgewachsen, einwärts aufspringend. N. v. E. gen. 6. 20.

1. **B. UMBELLATUS** (L.) Doldige W. — In Gräben, Fischteichen und langsam fliessenden Wassern. Juni-Aug. St. h. 18. Schk. t. 111. Bth. rosenroth.

CXVI. Ordng. JUNCAGINEEN. Rich. mem. du mus. 2. 1. 365.

Perigon unterst. 6blättrig, kelchartig oder etwas gefärbt. Stbg. unterweibig, 6. Fruchtkn. 3, 6, jeder mit einem freien Gf. oder einer schief-aufgewachsenen N. endigend, oberst., oberwärts getrennt und nur an der Basis zsgewachsen oder in einen ganzen 3-6furchigen Fruchtkn. zsgewachsen, aber bei der Reife in eben so viele Früchtchen von der mittelpunktst. Achse sich lössend, 1, 2eyig; Eychen aufrecht. Frucht trocken. S. eyweisslos. Keim in der Richtung des S. liegend, mit einer Seitenritze versehen, woraus bei dem Keimen das Federchen hervortritt. Bth. in Tr. oder Aehren.

1. **SCHEUCHZÉRIA** (L.) Scheuchzerie. — P. tief-6th. Stbg. 6, Stbf. schlank. Fruchtkn. 3-6, 2 eyig. Gf. fehlend. N. auf die Spitze des Fruchtkn. auswärts schief-aufgewachsen. Kapseln auseinanderfahrend, aufgeblasen, an der Basis zsgewachsen, 2klappig. N. v. E. gen. 2. 9.

1. **S. PALUSTRIS** (L.) Sumpf-S. — In torfigen Sümpfen, in die VorA. hinaufsteigend, (stiv. dch das Gebiet.) Mai. Juni. Schk. t. 100. St. h. 78.

2. **TRIGLÓCHIN** (L.) Dreizack. — P. 6blättrig. Stbg. 6; Stbk. fast sitzend. Fruchtkn. 3-6, 1 eyig. Gf. fehlend. N. federrig. Kapseln 3-6, an eine kantige Achse angeheftet, zuletzt an der Basis sich trennend und an der innern Kante der Länge nach aufspringend. Bth. grünlich. N. v. E. gen. 2. 8.

1. **T. MARITIMUM** (L.) Seestrands-D. — *Früchte eyf., kantig, unter der zurückgekrümmten N. eingeschnürt*, in 6 Kapseln zerfallend; Tr. verlängert. 4. Am Seestrande und auf salzigen Wiesen an Salinen. Juni. Juli. St. h. 78. D.

2. **T. PALUSTRE** (L.) Sumpf-D. — *Früchte lineal., kantig, nach der Basis verschmälert*, an die Spindel angedrückt, in 3 Kapseln zerfallend; N. sitzend. 4. Auf Wiesen und feuchten Triften. Juni. Juli. St. h. 13. — Das Triglochin Barrelieri Lois. fl. gall. untersch. sich dch niedriger, 5-6 Zoll langen St., 6-12 bth. Tr., aufrecht-abstehende, nicht angedrückte, nach der Basis

nicht verschmälerte, aber daselbst ein wenig breitere und über der Basis ein wenig zgeschnürte Früchte.

CXVII. Ordng. POTAMEEN. Juss. dict. sc. nat. p. 93.

Perigon unterst., 4th. oder fehlend. Stbg. frei, 1, 2, 4. Fruchtkn. 4, mehrere, getrennt, 1eigig, mit einem Gf. oder einer sitzenden N. endigend. Früchtchen nicht aufspringend, nuss- od. steinfruchtartig. S. eyweisslos. Keim gekrümmt oder eingerollt. In dem Wasser lebende Kräuter; die B. alle untergetaucht oder die obern schwimmend. Bth. zwittrig oder 1geschlechtig.

1. POTAMOGETÓN (L.) Laichkraut. — Bth. zwittrig. P. 4th. Sibk. 4, sitzend, auf der Basis der Zpfl des P. eingefügt. Fruchtkn. 4; Gf. fehlend. Steinfrüchte 4, sitzend. N. v. E. gen. 6. 13. Bth. grünlich.

1. Rotte. HETEROPHYLLI, Verschiedenblättrige. B. wechselst., nur die die Bthstiele stützenden gegenst., die obersten bei der vollkommen erwachsenen Pflanze schwimmend, und der Gestalt nach und oft auch nach ihrem Gewebe von den untergetauchten verschieden.

a. Die bthst. B. alle lederig und schwimmend.

1. P. NATANS (L.) Schwimmendes L. — B. alle lang-gestielt, die jüngeren untergetauchten schmaler, lanzettl. oder länglich, die schwimmenden lederig, an der Basis seicht-herzf., oval oder länglich; die untergetauchten Bstiele während der Bthezeit wegen der abgefallenen Blattfläche blattlos. Bthstiele gleich; die frischen Früchte zgedrückt, am Rande stumpf*), der St. einfach. 4. Das erste und das zweite B. am jungen St. sind wahre Phyllodien ganz ohne Blattscheibe, wie ich jetzt erst während der Frühlingszeit beobachtet habe; das darauf folgende B., hat eine sehr schmale Scheibe; diese wird jedoch allmählig an den folgenden B. breiter und um so breiter, je höher das B. am St. entspringt. Man findet diese Phyllodien aber nur im Frühjahr, denn schon in der Mitte des Mai gehen sie dch Fäulniss zu Grund und bei der Bthe sind sie lange nicht mehr vorhanden; untere B., wie sie nach Gaudin's Beschreibung dann vorkommen sollen, habe ich noch nicht gesehen; derselbe sagt: „die unteren untergetauchten B. sind wechselst., lineal, spitz aber ohne Stachelspitzchen, sehr

* Die Früchte der Potamogetonen, sowie alle Steinfrüchte, muss man im frischen und lebenden Zustande beschreiben, getrocknet werden sie runzelig, nehmen oft allerlei Formen an und geben alsdann trüglche Merkmale. Der Potamogeton natans z. B. hat Früchte, die im frischen Zustande am Rande stumpf und abgerundet sind, und durch dieses Merkmal unterscheidet er sich sehr gut von P. spatulatus und P. rufescens, welche linsenf., mit einem spitzen Rande umzogene Früchte haben. Doch gehen auch die getrockneten Früchte bei gewissen Arten gute Merkmale. In der Diagnose habe ich bemerkt, ob die Früchte im lebenden Zustande oder im getrockneten beschrieben wurden.

schmal, $\frac{1}{2}$ Schuh lang und länger, gerinnt, viel frischer grün, als die übrigen Theile der Pfl. Die untersten Bstiele haben gar keine Blattscheibe; die NebenB. sind lang und grünlich,“ und in der Anmerkung „solche jüngere schön grüne und sehr zarte Bstiele kommen im Monat August und September in der Regel vor.“ „Uebrigens stellen die nicht blühenden Aeste und die B. fast eine Form des P. gramineus dar und kommen auch manchmal in den Herbarien unter diesem Namen vor.“ Was hiemit gesagt sein soll, ist mir gänzlich unbekannt. — Die schwimmenden B. unserer hier beschriebenen Art, wenigstens die oberen, sind an der Basis seicht-herzf. ausgeschnitten, und zu beiden Seiten des Bstieles in eine Falte erhoben, wenn man sie flach ansbreitet: P. natans vulgaris D. fl. 1. 837. Schk. Handb. t. 28. Fries novit. (wo die Frucht nach getrockneten Expl. beschrieben ist.) Kommt vor:

α. vulgaris, B. breit-eyf, Bstiele mittelmässig lang: P. natans *α. vulgaris* D. fl. 1. 837. St. h. 9. verkleinert. Diese in Teichen und stehenden Wassern.

β. proluxus, B. und Bstiele in Bächen sehr verlängert und die B. werden in raschströmenden Bächen oft schmaler und längl.-lantzettl.; zu dieser letzteren Form gehört: Potamogeton natans lacustris Fries novit. P. serotinus Schrad. Die untergetauchten B. sind oft zahlreich vorhanden, an der Basis und an der Spitze verschmälert, dchscheinend, aber nicht so merklich, als bei P. fluitans.

2. P. OBLONGUS (Viviani fragm. fl. it. S. 2. t. 13.) Längliches L. — Die sämtlichen B. langgestielt, die untergetauchten, während der Bthezeit vorhandenen lanzettl., die schwimmenden lederig, längl., die obersten eyf. und an der Basis seicht-herzf.; die Bstiele auf der oberen Seite seichttrinnig; Bthstiele gleich; die frischen Früchte zsgedrückt, am Rande stumpf; der St. einfach. 4. In den Gräben der Sumpfwiesen und Torfmoore. Juli. Aug. P. natans intermedius und minor D. fl. Auf die Erinnerung von Fries habe ich diese nun als eigene Art getrennt. Sie unterscheidet sich von P. natans dadch, dass während der Bthezeit die untergetauchten B. noch nicht verfault sind, und dch kleinere Früchte; ausserdem aber sind letztere, mit Ausnahme der Grösse nach genauem Vergleiche von denen des P. natans nicht verschieden. Zudem ist die Pfl. hinsichtlich ihrer Grössenverhältnisse sehr veränderlich. Oft sind die untergetauchten B. schmal-lanzettl. und von den schwimmenden die ersten an der Basis in den Bstiel verschmälert, die obersten an der Basis seicht-herzf. Unter dieser kommt in weniger tiefen Gräben eine Abänderung mit nur 1 oder $1\frac{1}{2}$ Zoll langen schwimmenden B. vor: P. natans *ε. minor* D. fl. 1. 839. Diese Abänderung bestimmte mir Schrader in Briefen als sein P. parnassifolius. Dieser Potamogeton, vorzüglich die mittlere und kleinere Form, wenn sie in torfigen Sümpfen wächst, die während des Sommers das über ihnen gestandene Wasser verlieren, so geht er in die Form mit abgekürztem St. und lauter gleichgestalteten B., welche die Form der schwimmenden haben, über.

3. *P. FLUITANS* (Roth.) Fluss-L. — *B. alle lang-gestielt, die untergetauchten während der Bthezeit vorhandenen verlängert-lanzettl., häutig, durchscheinend, die schwimmenden lederig, länglich-lanzettl. oder oval, an der Basis spitz oder abgerundet; Bstiele auf der oberen Seite konvex; Bthstiele gleich; Früchte im frischen Zustande zsgedrückt, mit ziemlich spitzem Rande.* 4. In Flüssen, (Nördl. D. und Rheingegend.) Juli. Aug. *P. oblongus* Meyer. Chlor. hannov., *P. natans* γ. *angustatus* D. fl. I. p. 838. Die Beschreibung der Bstiele nahm ich aus Nolte's Novitiae fl. holsat., aber verdickte Bthstiele, deren daselbsterwähnt werden, finde ich nicht. Die *B.*, auch die obersten, sind an der Basis in keine Falte gebogen und daselbst bald abgerundet, bald verschmälert. Kommt in Gräben und mit stehendem Wasser angefüllten Sümpfen mit *B.*, von denen die untern zwar von dünnerer Substanz und lanzettl., aber wenig durchscheinend, und die obersten oval oder länglich sind:

β. *stagnatilis*: *P. natans* β. *explanatus* D. fl. I. 837.; nach Vergleichung mehrerer Expl. aus verschiedenen Gegenden fand ich, dass dieses Potamogeton eine Abänderung von *P. fluitans* ist. — Der *P. sparganifolius* Laestad. bei Fries und der *P. variifolius* Thor. sind von *P. fluitans* sehr verschieden.

4. *P. SPATHULATUS* (Schrader bei Koch und Ziz.) Spatelblättriges L. — *B. alle gestielt, die untergetauchten häutig, durchscheinend, die untersten schmal-lanzettl., in den Bstiel lang-keilig-verschmälert, die folgenden allmählig mehr länglich, in den langen Bstiel hinablaufend, die schwimmenden lederig, oval-länglich, stumpf, an der Basis vorgezogen, 2 bis 3mal kürzer, als der Bstiel; Bthstiele gleich; die frischen Früchte linsenf.-zsgedrückt, mit einem spitzen Rande versehen.* 4. In mit reinem, kaltem Wasser angefüllten Gebirgsbächen, (bisher blos in der westl. Gegend der Rheinpfalz bei Kaiserslautern und Zweibrücken, Limbach und Kirel.) Juli. Aug. Eine nach meiner Meinung gute Art, welche sich durch die freudig- und hellgrüne Farbe der schwimmenden *B.* von dem verwandten *P. natans* und *P. rufescens* schon von weitem unterscheidet. Ausser der hellgrünen Farbe der *B.* (an der lebenden Pflanze), und den linsenförmigen, mit einem spitzen Rande versehenen Früchten untersch. er sich von *P. natans* dch die untern *B.*, welche in einen kurzen Blattstiel lang- und allmählig verschmälert sind, und dch die zwar länglichen, aber an der Basis lang-keilig-verschmälerten mittleren StB.; von *P. rufescens*, mit dem er in den Früchten übereinstimmt, dch die langgestielten und nicht sitzenden mittleren StB. und auch dch die ebenfalls langgestielten obersten *B.*, von denen die unter den Bthstielen stets lederig sind. Uebrigens sind die untern *B.* in der Bthezeit, wie bei *P. natans* und *P. rufescens* meist schon dch Fäulniß zerstört, und deshalb an unfruchtbaren St. zu untersuchen. Die Samen, welche ich von dem StandO. erhielt, keimten in unserm Garten nicht. — Die unter dem Namen *P. spathulatus* in NordD. gesammelten und in Herbarien vorkommenden Exemplare, welche ich bisher sah, gehören nicht zu dieser Art. D.

b. Die blüthest. B. den stengelst. ähnlich, nur die spätern schwimmend und entweder lederig oder häutig und, wiewohl nicht bei allen, auch in der Gestalt verschieden. Diese schwimmenden B. sind oft nicht vorhanden.

5. *P. RUFESCENS* (Schrad. in Chamiss. Anmerk. zu Kunth. Flora berolin.) Röthliches L. — *Die untergetauchten B. sitzend, häufig, durchscheinend, lanzettl., nach der Basis und Spitze verschmälert, ziemlich stumpf, am Rande glatt, die schwimmenden lederig, verkehrteyf., stumpf, in einen Bstiel, der kürzer als das B. ist, verschmälert; Bthstiele gleich; die frischen Früchte linsenfösgedrückt, mit einem spitzen Rande versehen; St. einfach.* 4. In stehenden Wassern und Bächen. Juli. Aug. *P. semipellucidum* Koch und Ziz. cat. *P. obscurum* DC. *P. serratum* Roth. *P. fluitans* Sm. *P. annulatum* Bellard. act. taur. t. 1. f. 2. *P. alpinum* Balb. *P. purpurascens* Seidel. *P. obtusus* Ducros bei Gaud.

6. *P. HORNEMANNI* (Meyer.) Hornemann's L. — *B. alle gestielt, häufig, durchscheinend, am Rande glatt, die untern untergetauchten lanzettl., die schwimmenden fast herzeif.; Bstiele halb so lang, als die B.; Bthstiele gleich; die frischen Früchte zsgedrückt, am Rande stumpf; St. ästig.* 4. In stehenden Wassern, (auf der Rheinfläche; in Westphalen, Lauenburg und Ostfriesland; im Waadtlande und C. Bern der Schw.) Juli. Aug. *P. coloratus* Hornem. fl. d. t. 1449. *P. plantagineus* Ducros bei Roem. und Schult. D. fl. 1. p. 842. Die Pflanze bald ganz rothbraun, bald freudig-grasgrün. Die frischen Früchte, wie bei *P. natans*, am Rande stumpf. — Mit Vergnügen benenne ich, wie Meyer, diese Pflanze nach dem Namen eines sehr verdienstvollen Botanikers. Var. mit rundlich-eif. obern B., diese ist *P. plantagineus rotundifolius* D. fl. 1. p. 842.

7. *P. GRAMINEUS* (L.) Grasartiges L. — *Die untergetauchten B. häufig, durchscheinend, lanzettl.-lineal. oder schmal- oder breit-lanzettl., zugespitzt, nach der Basis verschmälert, sitzend, am Rande ein wenig rauh, die obersten kürzer, breiter, gestielt, die schwimmenden lanzettl. oder eif., langgestielt, lederig, letztere oft fehlend; Bthstiele nach der Spitze verdickt; die frischen Früchte zsgedrückt, am Rande stumpf; der St. sehr ästig.* 4. In fließenden und stehenden Wassern. Juli. Aug. *P. heterophyllus* Schreb. — D. fl. 1. 843. Var.:

a. *graminifolius*, die untergetauchten B. lanzettl.-lineal., nach beiden Enden verschmälert, schlapp; St. verlängert. Ich besitze ein Exemplar mit 5 Zoll langen, 3 Linien breiten B.: *P. gramineus a. graminifolius* Fries. *P. heterophyllus γ. elongatus* D. fl. 1. p. 845. *P. gramineum* L., vgl. Fries Novit. ed. 2. p. 36. Kommt vor: 1. die St. u. B. sehr lang, im Wasser der Flüsse und Bäche fluthend: *P. gramineus α. fluvialis* Fries. 2. der St. im Wasser aufrecht, sehr ästig; die B. kürzer, die obersten allmählig breiter und gekrümmt: *P. gramineus b. lacustris* Fries. Diese besitze ich in Exempl., an denen die obersten Blätter, wie bei den übrigen lederig und lang-gestielt sind. Die hier aufgestellte Variet. α. ver-

dient allerdings den Namen *P. gramineus*, aber für die Art in allen ihren Formen ist er doch sehr unpassend.

β. heterophyllus, die untergetauchten *B.* kürzer, zurückgekrümmt, meist starrer, nicht selten beträchtlich starr: *P. gramineus β. heterophyllus* Fries. *P. heterophyllus α. foliosus* D. fl. 1. p. 844. *P. Proteus heterophyllus* Chamiss. und Schlechtend. *P. hybridum* Thuill. *P. angustanum* Balb. misc. t. 3. *P. distachyum* Bellard. und *P. crassipes* Kit. nach Willdenow's Herbarium. Die schwimmenden *B.* sind lederig und oft sehr lang-gestielt.

γ. Zizii, 2 oder 3mal so gross, als die vorhergehenden Formen, besonders die obere *B.* stumpf, aber immer mit einer Stachelspitze und oft auffallend wellig: *P. heterophyllus δ. latifolius* D. fl. 1. p. 845. *P. Proteus B. Zizii* Cham. und Schl. Nicht selten erscheint sie in einer gehörnten Form, indem nämlich den meisten *B.* der Saum fehlt und diese fast auf den Mittelnerven zurückgeführt sind. Bei zurückgetretenem Wasser trägt sie gestielte, lederige *B.*, wie die vorhergehende; aber auch im Wasser selbst habe ich diese Form, wiewohl viel seltner, gesehen. Zur Variet., deren oberste *B.* lederig sind, gehört: *P. lucens δ. coriaceus* D. fl. 1. p. 850., daselbst irrig zu *P. lucens* gezogen. *P. lucens β. heterophyllus* und *γ. amphibius* Fries, scheinen auch dieser Variet. anzugehören. Doch Mittelformen geht sie in die vorhergehende über, wie ich öfters beobachtet habe.

8. *P. NITENS* (Weber, nach Nolte.) Glänzendes L. — Die untergetauchten *B.* häutig, durchscheinend, lanzettl. oder lineal-lanzettl., spitz, grannenlos, an der Basis abgerundet, halbstengelumfassend, am Rande ein wenig rauh, die schwimmenden länglich oder lanzettl., in den Bstiel verschmälert, lederig, letztere oft fehlend; Bthstiele nach der Spitze meist dicker; die getrockneten Früchte zsgedrückt, am Rande gekielt; St. sehr ästig. 4. In fliessenden und stehenden Wassern. (bisher blos im nördl. D.) Juli. Aug. *P. nitens* Fries. — D. fl. 1. 846. Var. wie der vorhergehende:

α. salicifolius, die untergetauchten *B.* lineal-lanzettl., gerade; der St. verlängert: *P. nitens α. salicifolius* Fries. *P. gramineum* Wahlenb. (In der Fl. succ. v. Wahlenb. scheint diese Art mit der vorhergehenden verbunden.) Kommt in Flüssen und Bächen vor.

β. heterophyllus, die untergetauchten *B.* kürzer, lanzettl., manchmal ey-lanzettl., zurückgekrümmt; der St. kürzer, sehr ästig: *P. nitens β. heterophyllus* Fries. *P. heterophyllus lacustris* Chamiss. *P. curvifolius* Hartm. Scand. *P. Proteus curvifolius* Chamiss. und Schlechtend. D.

II. ROLLE. HOMOPHYLLI. Gleichblättrige. Die ganze Pflanze untergetaucht, nur die Ähren während der Blüthezeit über das Wasser hervortretend. Die Bl. wechselst., die blüthenst. gegenüber, alle häutig, lanzettl. und breiter, bis zu einer rundlichen Gestalt.

9. *P. LUCENS* (L.) Spiegelndes L. — *B. alle untergetaucht, häutig, durchscheinend, gestielt, oval oder lanzettl., stachelspitzig, am Rande fettesüßig-rauh; Bthstiele oberwärts verdickt; die*

frischen Früchte zsgedrückt, am Rande stumpf, schwach-gekielt; der St. ästig. 4. In stehenden und fliessenden Wassern. Juli. Aug. Fl. d. t. 195. *P. serratum* Weber. *P. Protens* A. *lucens* Chamiss. und Schlechtend. Kommt mit ovalen und lanzettl. B. vor, auch unter einer gehörnten Form, wenn die Blattfläche kürzer und schmaler wird und mit einer dornf. Spitze endigt; *P. acuminatum* Schumacher; oder wenn die ganze Blattfläche verschwindet und bloss ein etwas verdickter Mittelnerv zurückbleibt. — Die in D. fl. 1. p. 848. erwähnte verschiedenblättrige Form gehört nicht zu *P. lucens*, sondern zu *P. gramineus* var. *γ. Zizii*. — Der *P. longifolius* Gay. bei Poiret, (*P. macrophyllus* Wolfgang, nach einem v. Besser übersandten Expl.) ist dem *P. lucens* ähnlich, aber die B. sind viel schmaler, lanzettl., nach beiden Enden spitz, in einen 1 Zoll langen Bstiel verschmälert, 8 Zoll lang, 8 Linien breit und am Rande glatt. Soll in der Schw. vorkommen, aber weder Gaud., noch ich selbst haben Schweizer Exemplare gesehen.

10. *P. DECIPIENS* (Nolte in Briefen an s. Freunde.) Täuschendes L. — *B. alle untergetaucht, häutig, dchscheinend, mit abgerundeter Basis sitzend*, eyf. oder längl., stumpf, *stachelspitzig, am Rande glatt*; Bthstiele gleich; Früchte 4. In Flüssen, (in der Bille im Hamburgischen und in Holstein, Sonder.) Juli. Aug. Unterscheidet sich von *P. lucens* dch die genäherten Adern der B. und den nicht gezähnelten Rand derselben; von *P. praelongus* dch die an der Basis nicht erweiterten und an der Spitze nicht kappenf. zsggezogenen B.; von *P. Zizii*, mit dem es nahe verwandt ist, dch die sitzenden und nicht in den Bstiel verschmälerten oberen B. Die Frucht sah ich noch nicht. D.

11. *P. PRAELONGUS* (Wulf. bei Roem.) Langgedehntes L. — *B. alle untergetaucht, häutig, dchscheinend, aus eyf., stengelumfassender Basis verlängert-länglich* oder lanzettl., stumpf, wehrlos, an der Spitze kappenf.-zsggezogen, *am Rande glatt*; Bthstiele gleich; *die getrockneten Früchte zsgedrückt, auf dem Rücken flügelig-gekielt*; St. ästig. 4. In Flüssen und Seen, (von Holst. und Lüneb. dch das nördl. D. bis Pommern und Brandenb.; in den Alpenseen der Schweiz und in dem Laibachflusse in Krain.) Juli. Aug. Rb. ic. 2. f. 323. *P. lucens* Weber. *P. flexuosum* Schleich. *P. flexicaulis* Dethard. *P. acuminatum* Wahlenb.

12. *P. PERFOLIATUS* (L.) Durchwachsenes L. — *B. alle untergetaucht, durchscheinend, aus herzf., stengelumfassender Basis eyf. oder ey-lanzettf., am Rande etwas rauh*; Bthstiele gleich; die frischen Früchte zsgedrückt, am Rande stumpf; der St. etwas ästig. 4. In Pflützen und Flüssen, (stw. dch d. Geb.) Juli. Aug. Var. mit herzf.-rundlichen B.: *P. Loeselii* R. und S.; mit herzf.-länglichen, 3 Zoll langen, 1 Zoll breiten, in der Mitte ein wenig breitem und herzf.-lanzettl. B.

13. *P. CRISPUS* (L.) Krauses L. — *B. alle untergetaucht, häutig, durchscheinend, sitzend, lineal.-länglich, ziemlich stumpf, kurz-zugespitzt, kleingesägt, wellig-kraus*; Bthstiele gleich; Früchte

zsgedrückt, geschnäbelt; St. ästig, zsgedrückt. 4. In stehenden und fliessenden Wassern. Juli. Aug. Fl. d. t. 927.

III. Rotte. *CHLOEPHYLLI*, Grashlätttrige. Die ganze Pflanze untergetaucht, nur die Aehren während der Blüthezeit über das Wasser hervortretend. B. grauartig, genau-lineal., alle gleichgestaltet, sitzend und wechselst., bloss die blüthenst. gegenüber.

14. *P. COMPRESSUS* (L.) Wasserriemenblättrige L. — *B. alle* untergetaucht, häutig, durchscheinend, sitzend, *genau-lineal.*, stumpf, kurz-stachelspitzig, *vielnervig*; mit 3-5 stärkern Nerven; Aehren *walzlich*, 10-15 bth.; der St. geflügelt-plattgedrückt, ästig. 4. In stehenden und langsam fliessenden Wassern. Juli. Aug. *P. zosteraefolius* Schumacher. D. fl. 1. p. 853. Rb. ic. 2. f. 308. *P. complanatus* Willd. *P. cuspidatum* Schrad. bei Sm. D.

15. *P. ACUTIFOLIUS* (Link. bei R. und S.) Spitzblättriges L. — *B. alle* untergetaucht, häutig, durchscheinend, sitzend, *genau-lineal.*, am Ende haarspitzig, *vielnervig*, mit 3-5 stärkern Nerven; Aehren 4-6 bth., die fruchttrag. rundlich; der St. geflügelt-plattgedrückt, sehr ästig. 4. In stehenden Wassern und Bächen, (stwd. d. Geb.) Rb. ic. 2. f. 309. D.

16. *P. OBTUSIFOLIUS* (M. und Koch.) Stumpfblättriges L. — *B. alle* untergetaucht, häutig, durchscheinend, sitzend, *genau-lineal.*, stumpf, kurz-stachelspitzig, 3-5 nervig; Bthstiele so lang, als die 6-8 bth., ununterbrochne Aehre; der St. zsgedrückt, an den Rändern abgerundet, sehr ästig. 4. In Seen und Fischteichen, (zerstreut dch d. Geb.) Juli. Aug. *P. gramineum* Sm. *P. compressum* Roth. und Anderer. *P. gramineus* Gaud.

17. *P. PUSILLUS* (L.) Kleines L. — *B. alle* untergetaucht, häutig, durchscheinend, sitzend, *genau-lineal.*, ziemlich spitz, kurz-stachelspitzig, 3-5 nervig; Bthstiele 2 oder 3 mal so lang, als die 4-8 bth., oft unterbrochne Aehre; Früchte schief-elliptisch; der St. aus dem Stielrunden zsgedrückt, sehr ästig. 4. In stehenden Wassern und Bächen. Juli. Aug. Var.:

α. major, B. breiter, fast 1 Linie breit: *P. compressus* D. fl. 1. p. 856. Sm. *P. pusillus α. major* Fries. A. Chamisso. und Schlechtend.

β. vulgaris, B. ohngefähr $\frac{1}{2}$ Linie breit: *P. pusillus β. vulgaris* Fries. *P. pusillus α. major* D. fl. 1. p. 856.

γ. tenuissimus, B. sehr schmal, manchmal kaum eine $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{5}$ Linie breit: *P. pusillus γ. tenuissimus* D. fl. 1. p. 856.

18. *P. TRICHOIDES* (Chamisso und Schlechtend., mit Ausschl. des Syn. aus M. und Koch D. fl.) Haarartiges L. — *B. alle* untergetaucht, häutig, durchscheinend, sitzend, *borstlich-lineal.*, zugespitzt, *1nervig*, *aderlos*; Bthstiele 2 oder 3 mal so lang, als die 4-8 bth., oft unterbrochne Aehre; Früchte *halbkreisrund*; St. ziemlich stielrund, sehr ästig. 4. In Seen und Fischteichen, (Schlesien, Berlin, Bremen.) Juli. Aug. Unter den Stand O. wird in der Lin-

naea auch das Erlanger Gebiet angeführt, wo ich die Pfl. noch nicht finden konnte; ich lernte sie erst neulich durch ein in NordD. gesammeltes Exemplar kennen. — Die Beschreibung von *P. gracilis* Fries stimmt genau mit unserer Pflanze überein, den Umriss der Frucht ausgenommen, welche der Autor elliptisch-kugelig und nicht zsgedrückt beschreibt. D.

IV. Rotte. COLEOPHYLLI. Scheidenblättrige. Die ganze Pflanze untergetaucht, nur die Aehren während der Bthezeit über das Wasser hervortretend. Die B. grasartig, genau lineal., alle gleichgestaltet, wechselt., an der Basis scheidig, die Scheide an die NebenB. angewachsen.

19. *P. PECTINATUS* (L.) Fadenblättriges L. — *B. alle untergetaucht, häutig, durchscheinend, an der Basis scheidig, lineal. oder lineal.-borstlich, spitz, 1nervig, quer-aderig, Adern ziemlich dick; Aehren langgestielt; Früchte schief-verkehrteyff., halbkreisrund, zsgedrückt, im getrockneten Zustande auf dem Rücken gekielt.* 4. In stehenden Wassern und Flüssen. Juli. Aug. *P. pectinatus* D. fl. 1. p. 857. (mit Ausschl. von *P. marinus* L.) — Der *P. zosteraceus* Fries., durch die 3-5nervigen, breitem B. v. *P. pectinatus* verschieden, wurde im Gebiete uns. Fl. noch nicht gefunden.

20. *P. MARINUS* (L.) Meer-L. — *B. alle untergetaucht, häutig, durchscheinend, an der Basis scheidig, lineal. oder lineal.-borstlich, spitz, 1nervig, queraderig, Adern ziemlich dick; Aehren langgestielt; Früchte verkehrteyff., fast kugelig, im trocknen Zustande runzelig, auf dem Rücken breit-abgerundet und kiellos.* 4. Im salzigen Wasser am Meeresstrande in NordD. und in einem kleinen Teiche auf d. A. zw. Badia und Gardona im südl. Tyrol. Juli. Aug. *P. marinus* Fries. *P. setaceum* Schum. *P. filiformis* Pers. Nolt. Chamiss. und Schlechtend. (mit Ausschl. d. Syn. aus M. und K. D. fl.) — Eine seltne Pflanze, welche ich neulich dch 2, von Gehrhard bei Stötteritz gesammelte Exemplare kennen lernte. Die frischen Früchte scheinen saftig, wie sich nach der sehr zsgefallenen und runzeligen Rinde vermuthen lässt D.

V. Rotte. ENANTIOPHYLLI. Gegenblättrige. Die ganze Pflanze untergetaucht, nur die Aehren während der Bthezeit über das Wasser hervortretend. B. durchscheinend, alle gegenst.

21. *P. DENSUS* (L.) Dichtblättriges L. — *B. alle gegenst. und untergetaucht, häutig, durchscheinend, sitzend, stengelumfassend, elliptisch, lanzettl. oder lineal.-lanzettl.; Aehren gabelständig, kurzgestielt, nach dem Verblühen zurückgebogen; die getrockneten Früchte zsgedrückt, breit-gekielt, geschnäbelt.* 4. In stehenden und fließenden Wassern, (stw. dch d. Geb.) Juli. Aug. Fl. d. t. 1264. Var.:

α. *B. eyf., zugespitzt: P. densus* L.

β. *lanceifolius*, B. aus eyf. Basis allmählig und fast in gerader Linie verschmälert-spitz, ohngefähr 1 Zoll lang, 3-4 Linien breit; *P. oppositifolium* DC. *P. serratum* L.

γ. angustifolius, eben so wie die vorübergehende Variet., aber die B. nur 1 oder $1\frac{1}{2}$ Linien breit: *P. oppositifolium β. lancifolium* DC. *P. setaceum* L.

2. **RUPPIA** (L.) Ruppia. — Bth. zwittrig. P. fehlend. Stbg. 2. Stbf. sehr kurz, schuppenf. Stbk. Säckchen zu beiden Seiten des kurzen Stbf. eingefügt, an der Basis auseinanderfahrend, an der Spitze zsstossend. Fruchtkn. 4; Gf. fehlend. Nüsse (trockne Steinfrüchte?) 4, zuletzt lang-gestielt. N. v. Esenb. gen. 6. 12.

1. *R. MARITIMA* (L.) Meer-R. — *Stbk. Säckchen länglich*; Früchte eyf., schief-aufrecht. 4. In Gräben und Sümpfen am Meeresstrande, (am Adriat. Meere, an der Ost- und Nordsee, auch im Binnenlande im Fürstenth. Göttingen im Denkerhäuser Sumpfe.) Aug.-Herbst. Rb. ic. 2. f. 307. *R. maritima α*, D. fl. 1. p. 861. D.

2. *R. ROSTELLATA* (Koch bei Rb. ic. 2. f. 306.) Geschnäbelte R. — *Stbk. Säckchen fast kugelig*; Früchte fast halbmond-eyf., aus stumpfer Basis aufstrebend. 4. In Gräben am Meeresstrande und an Salinen, an der Ostsee und bei Artern in Magdeb.) Aug.-Herbst. *R. maritima β*. D. fl. 1. p. 861. *R. obliqua* G. F. Meyer. Mspt. *R. rostellata* Chlor. hanov. D.

3. **ZANICHELLIA** (L.) Zanichellie. — Bth. Häusig; die männl. und weibl. in derselben Scheide. Männch. P. fehlend. Stbg. 1. Weibch. P. glockig. Gf. bleibend; N. schief-schildf. Nüsse 3-5 oder mehrere, jede auf einem fädlichen Fruchtträger sitzend. N. v. E. gen. 6. 11.

1. *Z. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-Z. — Die Früchte kurzgestielt; *Gf. halb so lang, als die Frucht*. 4. In stehenden und fließenden Wassern. Juli-Sept. Kommt vor in tieferem Wasser mit verlängertem, schwimmendem, an der Basis nicht kriechendem St.: *Z. major* Bönningh. in Reichenb. ic. 8. f. 1005. und in nicht tiefem Wasser mit an den Gelenken bewurzeltem St.: *Z. repens* Bönningh. fl. monaster. prodr., Reichenb. ic. 8. f. 1003; ausserdem mit am Rücken kaum geflügelten, daselbst geflügelt-gekerbten, und auf beiden Seiten geflügelten, sowie nach zerstörter Flügelsubstanz mit daselbst dornigen Früchten.

2. *Z. PEDICELLATA* (Fries novit. mant. 3. S. 135.) Gestielt Z. — Die Früchte etwas länger gestielt; *Gf. schlank, so lang, als die Frucht*. 4. Im Meerwasser und in Gräben in der Nähe der Salinen. Juli-Sept. *Z. palustris β. pedicellata* Wahlenb. fl. suec. Kommt vor unter denselben Formen wie die vorige. Die Form, deren Frucht einen breiten Rückenflügel trägt, ist: *Z. pedunculata* Rehb. ic. f. 1067.; die Form mit auf beiden Seiten geflügelter Frucht: *Z. gibberosa* Reichenb. ic. f. 1006.

3. *Z. POLYCARPA* (Nolte nov. fl. hols. S. 75.) Vielfruchtige Z. — Die Früchte sitzend oder ganz kurz-gestielt; *der Gf. nur den vierten Theil so lang, als die Frucht*. 4. Auf dem Meeresgrunde gegen die Küste hin, (In der Nordsee an der Küste von Holstein,

an der Ostsee bei Heiligenhafen, Sonder.) Juli-Sept. Reichenb. ic. f. 1004.

CXVIII. Ordng. NAJADEEN. Link. Handb. 1. p. 820. Najades Jass. und DC. fl. fr. 2. p. 583. zum Theil.

Bth. 1geschlechtig, zerstreut. Bthkolben vielbth. in ein B. endigend oder 1bth. und ein krugf. P. darstellend. Stbg. frei, 1, 3. Stbf. fehlend, Stbk. sitzend. *Fruchtkn.* 1, 1fächerig, 1eyig; N. 1, sitzend (bei Najas klein und kaum bemerkbar) oder 2-3 und fädlich. Fruchtgehäuse nussartig oder fast steinfruchtartig. *S. eyweisslos.* Keim gerade oder bogig-gekrümmt. Unter dem Wasser lebende Kräuter.

1. NAJAS (L.) Najade. — Bth. 1 oder 2häusig. Männch. Blüthenscheide 1blättrig, krugf., an d. Spitze 2-3zählig, ein P. vorstellend, das Stbk. eng-einschliessend; Stbk. (bei N. major.) 4fächerig, in 4 zurückgeschlagene Klappen aufspringend. Weibch. Ein Bthkolben wie beim Männchen. Der Fruchtkn. sitzend, 1fächerig, 1eyig mit aufrechtem Eychen. Gf. (bei Najas major) fehlend. N. nicht bemerkbar (Thedenius). Wenn die Pfl. über das Wasser hervorragt, oder im Schlamme länger frisch erhalten wird, erhebt sich der Stbk. mit dem Stbf., wie dieses in Micheli's Gen. Pl. t. 8. gezeichnet ist. N. v. E. gen. 6. 10.

1. N. MAJOR (Roth.) Grosse N. — B. lineal., ausgeschweift-gezähnt, Zähne stachelspitzig; *BScheiden ganzrandig.* ☉. In Seen und Fischteichen, (stw. dch d. Geb.) Aug. Sept. Najas marina α. L. N. fluvialis Lam. N. monosperma Willd. St. h. 41. Ittnera Najas Gmel. bad. 3. t. 3.

2. N. MINOR (Allion.) Kleine N. — B. schmal-lineal., ausgeschweift-gezähnt, zurückgekrümmt, Zähne stachelspitzig; *BScheiden feinschwimperig-gezähnt.* ☉. In Lachen und Gräben, (stw. dch d. Geb.) Aug. Sept. Schk. t. 296. N. fragilis Rostk. und Schm. Caulinia fragilis Willd. Ittnera minor Gmel. bad. 3. t. 4.

3. N. FLEXILIS (Rostk. und Schm.) Biegsame N. — B. schmal-lineal., sehr feinstachelspitzig gezähnt; *BScheiden feinschwimperig-gezähnt.* ☉. Auf sandigem Boden der Seen, (bisher blos im Gebiete der Fl. v. Stettin, aber daselbst häufig im Linowschen See.) Aug. Sept. Caulinia flexilis Willd. D.

2. ZOSTÉRA (L.) Wasserriemen. — Blumenscheide gestielt, plattgedrückt, in ein B. endigend. Kolben lineal., 3nervig, der Mittelnerve der vordern Seite fruchttragend. P. fehlend. Bth. nackt; die männl. blos aus einem Stbk., die weibl. blos aus dem, unter der Spitze angehefteten, Stempel gebildet. Gf. 1. N. 2. (Bei den Einhäusigen wechseln 2reihige Stbk. mit 2reihigen Stempeln ab.) N. v. E. gen. 6. 14.

1. *Z. MARINA* (L.) Gemeiner W. — B. 3nervig; *Stiel der Blumenscheide oberwärts breiter*; Nüsse gerillt. 4. Auf sandigem Meeresgrunde. Aug. Schk. t. 279. D.

2. *Z. NANA* (Roth.) Zwerg-W. — B. 1nervig; *Stiel der Blumenscheide v. gleicher Breite*; Nüsse bei der Reife glatt. 4. Auf sandigem Grunde des die Insel Norderney bespülenden Meeres, (Mertens!). Juli. Aug. Z. Nolte Hornem. fl. d. t. 2041. (nach Meyer in der *Chloris hanov.*) *Z. uninervis* Rb. fl. exc. (Ich bezweifle sehr, dass *Z. uninervis* Vahl, aus dem rothen Meere „deren B. 7 Zoll lang sind und darüber“ zu unserer Art gehöre, denn bei dieser sind die B. nicht über Fingers lang. Vollkommene Früchte v. der *Z. nana* sah ich noch nicht D.

CXIX. Ordng. LEMNACEEN. Link. Handb. z. Erkenng. d. Gew. 1. p. 289.

P. 1blättrig, zsgedrückt, ungeth. oder am Rande feingekerbt. Stbg. 1-2, unterweibig, das eine davon später entwickelt. Stbk. zweiknötig, 2fächerig. *Fruchtkn. frei*, 2-6eyig; Eychen aufrecht. Gf. kurz; N. stumpf. Frucht schlauchartig, durchsichtig. S. eyweisslos. Keim kurz-bogig, umgekehrt; Würzelchen oberst, nach dem, an der Spitze des S. gelegenen, Hagel gerichtet. Während des Keimens wird das Keimb. in einen blattf. Körper ausgedehnt, aus dessen Mittelnerven unterseits einfache Wurzelfasern später hervortreiben. — Schwimmende, blattlose Wasserpflänzchen, mit einem in Form eines B. verbreiterten, gegliederten St., welcher mehrere B. darstellt, von denen eines aus dem andern herauskommt. Diese blattf. Glieder treiben unterseits aus einem Grübchen, die in das Wasser hinabhängenden Wurzelfasern, welche, anfanglich kurz, und in einer, in die Furche der untern Blattfläche ange-drückten Scheide eingeschlossen sind, nachher sich verlängern, die Scheide, mit Zurücklassung eines kleinen Bechers abreißen, und sie gleich einer Mooshaube auf der Spitze tragen.

1. *LEMNA* (L.) Wasserlinse. — Die Merkmale der Ordnung. N. v. E. gen. 6 9. Die Wasserlinsen sind perennirend, sie pflanzen sich sowie *Oxalis stricta*, *Solanum tuberosum* und andere Gewächse dch überwinternde Knospen fort.

1. *L. TRISULCA* (L.) Kreuzweise W. — *Laub lanzettl.*, zuletzt gestielt; Glieder kreuzweise zshängend; Wurzeln einzeln. ☉. In stehenden Wassern untergetaucht. Apr. Mai. St. h. 44. Stau-rogeton Reichenb. consp.

2. *L. POLYRRHIZA* (L.) Vielwurzliche W. — *Laub rundlich-verkehrteyf.*; *W. büschelig.* ☉. In stehenden Wassern schwimmend. Apr. Mai. St. h. 44. *Spirodela polyrrhiza* Schleiden in d. *Linnaea*.

3. *L. MINOR* (L.) Kleine W. — *Laub verkehrteyf.*, unten und oben flach; Glieder sitzend; W. einzeln. ☉. In stehenden Wassern schwimmend. Apr. Mai. St. h. 44.

4. *L. GIBBA* (L.) Buckelige W. — *Laub verkehrteyf.*, ziemlich konvex, unterseits schwammig-konvex; Glieder sitzend; W. einzeln. ☉. In stehenden Wassern schwimmend. Apr. Mai. St. h. 44. *Telmatophace gibba* Schleiden in d. *Linnaea*.

5. *L. ARRHIZA* (L. mant. 2. S. 294.) Wurzellose W. — *Das Laub* elliptisch oder rundl., unterseits kugelig-konvex, ohne W. ☉. In stehenden Wassern schwimmend, (Gebiet der Fl. von Spaa, Lej. fl. de spa.) Mit Blüthe ward sie noch nicht gefunden. Michel. gen. t. 11. St. h. 44. Ich nahm diese Art nun unter die Pflanzen unserer Fl. mit auf, obgleich mir noch keine Expl. von dem bezeichneten O. zu Gesicht gekommen, weil Dr. I. F. Hoffmann dieselbe in den benachbarten Provinzen sehr häufig vorfand. Das Laub ist 4mal kleiner, als bei *Lemma minor* und unterseits schon vom ersten Entstehen an kugelig-konvex; bei *L. gibba* ist dasselbe im jungen Zustande flach und wird erst später mit gleichsam schaumigen Zellen bedeckt. Die Oberfläche des Laubes der *L. arrhiza* ist flach, oder in der Mitte etwas buckelig und hell- und blassgrün, die untere breiter, kugelig-konvex und weniger gefärbt, fast dchscheinend. Die Form des Laubes ist veränderlich, bald mehr, bald weniger elliptisch, oder verkehrteyf. oder rundl. (vgl. die treffliche Beschreibung Hoffmann's in Wiegmann's Archiv für Naturgesch. 1840. S. 138.); aus diesem Grunde zweifle ich nun nicht daran, dass die italienische und französische Pfl. zu derselben Art gehören.

CXX. Ordng. TYPHACEEN. Juss. gen. 25.

Bth. 1häusig, in sehr gedrängte, walzliche oder kugelige Aehren zsgestellt; die obern Aehren männlich, die untern weiblich. P. aus 3 und mehreren Schuppen oder Borsten gebildet. Männch. Stbg. 3, frei oder zsgewachsen, oder vielmehr 3 oder mehrere Stbk. auf einem einfachen Stbf. sitzend. Weibch. Fruchtkn. frey, 1eyig; Eychen hängend. Gf. 1. N. einfach. Fruchtgehäuse nicht aufspringend, trocken. Keim gerade, im Mittelpunkte des Eyweisses liegend.

1. *TYPHA* (L. gen. n. 1040.) Rohrkolbe. — Die Aehren walzl. oder zuletzt elliptisch. Männl. Aehre: Bth. nackt, 2-3-männig, mit Borsten umgeben; Stbf. zsgewachsen, oder an der Spitze frei. Weibl. Aehre: die weibl. Bth. mit geschlechtslosen vermischt, nackt, mehrere zugleich an pinselförmigen kurzen Fruchtböden eingefügt. Weibl. Bth.: ein längl. Fruchtkn., zuletzt langgestielt, das Stielchen an der Basis mit verlängerten Borsten bestreut; Gf. fädl.; N. spatel-eyf., oder lineal. und verlängert. Die geschlechtslosen Bth. (bei allen Arten vorkommend,) sind keulenf.,

stumpf, mit einer aufgesetzten griffelförmigen Stachelspitze, langgestielt, der Stiel an der Basis mit verlängerten Borsten bestreut. Die Schlauchfrucht 1samig. Die Aehren sind bei allen Arten beim Aufblühen dünn, nach dem Verblühen 2-3mal dicker.

1. *T. ANGUSTIFOLIA* (L. sp. 1377. mit Ausschluss der Variet. β .) Schmalblättriger R. — Die B. schmal-lineal., *länger, als der blüthentragende Halm*; Aehren walzl., v. einander entfernt, Stbk. der männl. Bth. $1\frac{1}{2}$ mal so lang, als der Stbk., die meisten weibl. Bth. an ihrer Basis mit einem füll., an der Spitze etwas spatelf. verbreiterten DeckB. von der Länge der Borsten gestützt; *N. verlängert, schmal-lineal., lang verschmälert und über die Borsten hinausragend.* 4. In stehenden Wassern und Flüssen. Juli. Aug. Fl. dan. t. 815. *T. angustifolia* Rehb. fl. germ. exsicc. n. 701., die fruchttragende Pfl.; *T. elatior* Reichenb. fl. g. exsicc. n. 702., dieselbe Pfl. zur Blthezeit. Var. in der Breite der B. an einem und demselben O. 2-4 Linien. Die rothbraunen weibl. Aehren sind beim Aufblühen $1\frac{1}{2}$ -2 Linien breit, nach dem Verblühen messen sie 5-6 Linien in der Quere. Nichts ist trüglicher, als die Breite der B. und die Dicke der Aehren bei *T. angustifolia* und *T. latifolia*. — *T. elatior* Bönningh., welche Sonder an den im Prodr. fl. monast. bezeichneten O. häufig gesehen, ist die *T. angustifolia* L. selbst; v. Bönningh. hielt kleinere Expl. derselben Art für *T. angustifolia*.

2. *T. LATIFOLIA* (L. sp. 1377.) Breitblättriger R. — Die B. breit-lineal., *länger, als der blüthentragende Halm*; Aehren walzl., zsgerrückt, selten etwas entfernt; Stbgf. der männl. Bth. 2-3mal länger, als der Stbk.; weibl. Bth. ohne DeckB.; *N. schief, spatelig-eyf., spitz, mit dem gefärbten Theil über die Borsten hervorragend.* 4. In stehenden Wassern, Flüssen. Juli. Aug. Schk. t. 271. B. 3-6 Linien breit. Weibl. Aehre schwarz, ins Grüne spielend, beim Aufblühen 2 Linien breit, fruchttragend 6-7 Linien im Querdurchmesser messend. Die Form mit etwas entfernten Aehren kommt selten vor.

3. *T. SHUTTLEWORTHII* (Koch und Sonder.) Shuttleworth's R. — Die B. lineal., *länger, als der blüthentragende Halm*; Aehren walzl., zsgerrückt; Stbk. der männl. Bth. 2-3mal länger, als der Stbk.; weibl. Bth. ohne DeckB.; *N. schief, spatelf.-lunzettel-spitz, Borsten über die Spitze der N. hinaufreichend.* 4. An Flusssufern, (an der Aar in der Schw. im C. Bern, und auch bei Aarau noch gesammelt, Shuttleworth.) Juli. Aug. Die Pfl. ist 2-3 Fuss hoch, so viel ich aus den mir vorgekommenen Expl. entnehmen kann, die B. 2-4 Linien breit, die weibl. Aehre am Ende der Blthezeit dick, grau und nebelig dch schwarze Punkte, indem die ruffarbenen N. unter den Spitzen der Borsten verborgenen sind. S.

4. *T. MINIMA* (Hoppe.) Kleinste R. — *B. der blüthentrag. St. lanzettl., vielmal kürzer, als der St., die der unfrucht. Büschel schmal-lineal.; Aehren walzlich, die weiblichen blüthentragenden schmal-walzl., die fruchttragend. dicker und eyf.* 4. In Sümpfen, (bei Salzburg; auf der Rheinfläche gegen den Rhein hin,

in Oberbaden und Elsass; am Bodensee; in der südl. Schw.) Apr. Mai. T. minor Sm. T. angustifolia β . L.

2. SPARGANIUM (L.) Igelsknospe. — Aehren kugelig. Bth. doch ein spreuiges P. geschieden. Steinfrucht trocken, sitzend. N. v. E. gen. 2. 2.

1. S. RAMOSUM (Huds.) Aestige I. — B. an der Basis 3kantig, an den Seiten konkav; der St. ästig; N. lineal. 4. In Gräben, an Ufern. Juli. Aug. Schk. t. 282. S. erectum α . L.

2. S. SIMPLEX (Huds.) Einfache I. — B. an der Basis 3kantig, an den Seiten flach; St. einfach; N. lineal. 4. In Lachen und Gräben. Juli. Aug. Schk. t. 282. S. erectum β . L.

3. S. NATANS (L.) Schwimmende I. — B. liegend, flach; St. einfach; N. länglich; die männliche Aehre meist einzeln. 4. In Fischteichen und Sümpfen. Juli. Aug. Fl. d. t. 260.

CXXI. Ordng. AROIDEEN. Juss. gen. p. 23.

Kolbe fleischig, einfach, ganz oder zum Theil mit 1 geschlechtigen und nackten, oder zwitterigen und mit einem 4-6blättrigen P. versehenen Bth. dicht-bedeckt; P., Blättchen schuppenf. Die Stbg. bei den 1geschlechtigen auf sehr kurzen Stbf., unter die Fruchtkn. gemischt oder über die Fruchtkn. gestellt; bei den zwitterigen den Blättchen des P. gegenst., mit Stbf. von der Länge des P. Fruchtkn. frei, 1-3fächerig, vieleiyig. Gf. 1 oder N. 1. Fruchtgehäuse nicht aufspringend, trocken oder beerenartig. S. 1 oder mehrere, eyweiss-haltig. Keim in der Achse des Eyweisses liegend, gerade, stielrund, mit einer Längenritze, in der das Federchen liegt.

I. Gruppe. ECHTE AROIDEEN. Brown. Bth. ohne P.

1. ARUM (L.) Aron. — Blumenscheide kaputzenf. Kolbe an der Spitze nackt. P. fehlend; die männl. Bth. blos aus einem Stbk., die weibl. aus dem Stempel bestehend. Die Stbk. vielreihig, höher stehend; die Stempel an der Basis des Kolbens eingefügt. Beere 1samig. N. v. E. gen. 2. 5.

I. Rotte. DRACUNCULUS Tournef. Drüsen rankenf., 2-3reihig, über den Stbk. dem Kolben eingefügt.

1. A. MACULATUM (L.) Gefleckter A. — B. spiess-pfeilf., gleichfarbig oder braun-gefleckt; Kolben gerade, kürzer, als die Blumenscheide, keulig, Keule 3mal kürzer, als ihr Stiel. 4. In schattigen Hainen der Ebenen und niedrigern Gebirge. Mai. St. h. 44. B. meist gleichfarbig, selten mit braunen Flecken bestrent. Kolbe schwarz-purpurn.

2. *A. ITALICUM* (Mill.) Weissaderiger A. — *B.* spieß-pfeilf., weissaderig; *Kolben* gerade, kürzer, als die Blumenscheide, keulig; Keule so lang, als ihr Stiel. 4. In Weinbergen und Waldungen der wärmern Gegenden, (bei Fiume gemein.) Apr. Kolben gelb. J.

II. Rolte. *ARISARUM* Tournef. Die rankenf. Drüsen fehlend.

3. *A. ARISARUM* (L.) Stachelspitzblättriger A. — *B.* herzpfeilf., stachelspitzig; Lappen der Basis stumpf; *Kolben* walzlich, an der Spitze etwas keulig, *einwärtsgekrümmt*, kürzer, als die kaputzenf. Blumenscheide. 4. In Weinbergen und an schattigen O. der wärmern Gegenden, (bei Fiume und auf den benachbarten Inseln.) März. J.

2. *CALLA* (L.) Drachenwurz. — Bl.Scheide flach. Der Kolben von den Stbg. und den wenigern unter diese gemischten Fruchtkn. überall bedeckt. P. fehlend. Männch. Stbg. 1; Stbk. zweiknötig. Weibch. Fruchtkn. 1. Beere. N. v. E. gen. 2. 4.

1. *C. PALUSTRIS* (L.) Sumpf-D. — *B.* herzf.; Bl.Scheide flach. 4. An sumptigen O., (stw. dch d. Geb., aber nicht in d. Schw.) Juli. Aug. St. h. 5. Bl.Scheide oben schneeweiss. D.

II. Gruppe. *ORONTIACEEN*. Brown. Bth. mit einem P. versehen.

3. *ACORUS* (L.) Kalmus. — Bl.Scheide fehlend. P. 6blättrig. bleibend. Stbg. fädlich, dem Fruchtb. eingefügt; N. stumpf, sitzend. Kapsel 3fächerig, nicht aufspringend. N. v. E. gen. 2. 3.

1. *A. CALAMUS* (L., mit Ausschl. d. Variet. β.) Gemeiner K. — Die Spitze des Schaftes blattig, sehr lang. 4. In stehenden Wassern und Flüssen. Juni. Juli. Schk. t. 97.

CXXII. Ordng. ORCHIDEEN. Juss. gen. p. 64.

P. oberst., blumenblattartig, 6th., unregelmässig, meist rachig: die 3 äussern Zipfel und 2 von den innern die Oberlippe, (den Helm,) der dritte von den innern, nach der ursprüngl. Lage der obere, dch die Drehung des Fruchtkn. aber meist der untere, in der Gestalt und oft auch in der Richtung verschieden, die Unterlippe, (die Honiglippe,) bildend. Der Fruchtkn. 1fächerig, vieleiyig, mit wandst. Samenträgern. Stbg. 3, auf dem Fruchtkn. eingefügt. *Die Stbf. mit dem Gf. genau-verwachsen*, die Befruchtungssäule zsetzend; die 2 seitenst. unfruchtbar, der mittlere fruchtbar; oder seltner die 2 seitenst. fruchtbar und der mittlere unfruchtbar. Stbk. 2fächerig; Fächer dch unvollkommene Scheidewände oft 2 oder 4sp.; die Säckchen getrennt und seitlich an den

über die Stbg. hinausragenden Gf. angewachsen oder zsgewachsen und sodann ein unbewegliches und bleibendes, oder ein bewegliches, deckelf. und abfälliges Stbk. bildend. Bthstaub in wachsartige oder körnige Massen zsgeballt, letztere mit leicht trennbaren oder elastisch zshängenden Körnern. N. auf der vordern und obern Seite des Gf. liegend, aus einer mit Kleber überzogenen seichten Vertiefung und über dieser in ein Spitzchen oder eine Platte, (Schnäbelchen,) endigend. Kapsel mit 3 Längsspalten aufspringend. S. feilstaubartig. Keim an der Basis des fleischigen Eyweisses liegend. Kräuter mit scheidigen oder stengelumfassenden, bisweilen auf farbelose Schuppen zurückgeführten B., mit ährigen, deckblättrigen Bth., einer büscheligen oder aus 2 ungeth. oder handf. Knollen, von denen der eine jährlich abstirbt, bestehenden Wurzel.

I. Gruppe. *OPHRYDINEEN*. Stbk. ganz angewachsen. Bthstaubmassen kleinlappig, elastisch-zshängend.

1. *ORCHIS* (L., mit Ausschl. v. Arten.) Knabenkraut. — P. rachig, mit 2 oder 5, in einen Helm zsschliessenden Zpfln. Honiglippe abstehend, unterseits nach hinten gespornt, an der Befruchtungssäule bis an das Stbk. angewachsen, in der Knospenlage aufrecht und von den äussern Zpfln des P. dachig-bedeckt. Stbk. ganz angewachsen; Fächer gleich-laufend, unterwärts auseinanderliegend, mit einem dazwischengeschobenen Fortsatze des Schnäbelchens, an der Basis dch ein gemeinschaftliches zweifächeriges Beutelfchen verbunden. Bthstaubmassen kleinlappig, gestielt. Fruchtkn. gedreht. N. v. E. gen. 5. 1.

§. 1. DeckB. 1nervig. Knollen ungeth.

a. Honiglippe 3 th., der mittlere Zpfl vorne verbreitert, 2 sp., meist mit einem Zähnchen in der Ausbuchtung der auseinander tretenden Zipfel.

1. *O. FUSCA* (Jacq. a. t. 307.) Braunes K. — *Honiglippe* pinselig-punktirt, 3 th., die *seitenst. Zpfl lineal.*, der *mittlere v. der Basis an allmählig verbreitert, verkehrt-herzf.*, meist mit einem dazwischen liegenden borstlichen Zahne, Lappen eyf., fast abgeschnitten, ausgebissen-gekerbt, Sporn mehr als um das Doppelte kürzer, als der Fruchtkn.; PZpfl in einen eyf. Helm zsschliessend, unterwärts zsgewachsen; die *DeckB. häutig, 1nervig, vielmal kürzer, als der Fruchtkn.*; B. länglich; Knollen ungeth. 4. In waldigen, gebirgigen O., auf Kalkboden. Mai. Juni. St. h. 41. *O. militaris* β. und γ. L. Der Helm schwarzpurpurn, mit dunkleren Punkten oder grünlich und mit schwarzpurpurnen Punkten bestreut; Honiglippe weiss oder hell-rosenroth mit purpurnen, rauh. Punkten bemalt. *O. moravica* J. ic. rar. t. 182. ist eine Abänderung mit blässerem Bth. und einem nur wenig ausgerandeten mittlern Zpfl der Honiglippe.

2. *O. MILITARIS* (L.) Helmartiges K. — *Honiglippe* pinselig-punktirt, 3th., die seitenst. Zpfl lineal., der mittlere lineal., an der Spitze verbreitert, 2sp., mit einem dazwischen liegenden borstlichen Zahne, Lappen länglich, spreitzend, an der Spitze feingekerbt, Sporn mehr, als um das Doppelte kürzer, als der Fruchtkn.; PZfl in einen ey-lanzettf. Helm zsschliessend, unterwärts zsgewachsen; die DeckB. häutig, 1nervig, vielmal kürzer, als der Fruchtkn.; B. länglich; Knollen ungeth. 4. Auf Kalkhügeln unter Gesträuch. Mai. Juni. Hall. helv. t. 28. f. 1. Helm aschgrau oder hell-purpurn; Honiglippe blass-purpurn, in der Mitte weisslich, mit purpurnen Punkten bemalt. — Eine Variet. mit linealen und fast an sämtlichen Bth. einnervigen Seitenlappen des mittleren Zpfls der Honiglippe ward vom verstorbenen Lang bei Mühlheim im Breisgau gesammelt, und mir mitgetheilt. Diese stimmt gut mit der Beschreibung der *Orchis macra* Lindl. in Babingt. manual. überein, aber sie scheint mir doch blos eine Variet., wenigstens in Bezug auf unsere Art; die Pfl. aus England habe ich noch nicht gesehen. *O. Simia* untersch. sich hinreichend von dieser dch Lappen des mittleren Zpfls, welche noch einmal so lang sind, als der Zpfl selbst.

3. *O. SIMIA* (Lam.) Affen-K. — *Honiglippe* samuntig-punktirt, 3th., die seitenst. Zpfl schmal-lineal., ganzrandig, einwärtsgekrümmt, der mittlere 2sp., mit einem dazwischen liegenden, lineal. Zahne, die Schenkel verlängert, mit den seitenst. Zpfln der Lippe gleichgestaltet und noch einmal so lang, als der Zpfl selbst; Sporn halb so lang, als der Fruchtkn.; PZfl in einen ey-lanzettf. Helm zsschliessend, unterwärts zsgewachsen; die DeckB. häutig, 1nervig, vielmal kürzer, als der Fruchtkn.; B. länglich; Knollen ungeth. 4. Auf Kalkhügeln, (in der Schweiz hin und wieder; Südtirol; im Elsass und in Oberbaden; im Littor.) Mai. *O. tephrosanthos* Vill. *O. militaris* ε. L. Column. ecphr. p. 320, die fig. rechts. Der Helm grau in das purpurne spielend, die Lippe purpurn oder weiss, dunkler purpurn-punktirt.

4. *O. VARIEGATA* (All.) Buntes K. — *Honiglippe* punktirt, kahl, 3th., die seitenst. Zpfl länglich, der mittlere breit-verkehrtherzf., meist mit einer dazwischen liegenden Stachelspitze, alle spitz-gezähnt, Sporn halb so lang, als der Fruchtkn. oder länger; PZpfl in einen Helm zsschliessend, sämtl. verschmälertspitz, die 2 innersten nur ein wenig kürzer, als der rückenst.; die DeckB. häutig, 1nervig, halb so lang, als der Fruchtkn. und länger; B. länglich; Knollen ungeth. 4. Auf Wiesen und Bergtriften, (im südl. Hanov.; Pommern, bei Stettin; bei Halle; Mähren; in Oberschlesien im Tschensch.; Littorale; Steyermark; Südtirol; Oberbaden.) Mai. J. ic. rar. 3. t. 599. *O. Simia* Vill., nach Haller's Syn. (nicht Lam.) *Orchis tridentata* Scop. carn. ist zwar der ältere Name, aber ich wollte ihn nicht anwenden, um eine Verwechselung mit der *O. tridentata* Mühlenberg's zu vermeiden. Bth. hellpurpurn; Honiglippe purpurn-punktirt. Der St. bei dieser gewöhnlich 6blättrig, bei der vorhergehenden 4blättrig. — Die *O. acuminata* Desf. atl. 2. t. 247. ist dieser Art sehr ähnlich, aber dch die lang-zugespitzten und haarspitzigen PZpfl, von denen die 2

innern fast um die Hälfte kürzer, als die 3 äussern sind, verschieden. D.

5. *O. USTULATA* (L.) Angebranntes K. — *Honiglippe* sammtig-punktirt, 3th., die seitenst. *Zpfl* länglich-lineal., an der Spitze etwas gekerbt, der mittlere 2sp., meist mit einem dazwischen liegenden Zähnchen, *Lappen* länglich-lineal., etwas gekerbt, Sporn 3mal kürzer, als der Fruchtkn.; *PZpfl* in einen fast kugeligen Helm zsschliessend, eyf., frei, die innern fast spatelig, stumpf; die *DeckB.* häutig, 1nervig, halb so lang, als der Fruchtkn.; B. länglich-lanzettl.; Knollen ungeth. 4. Auf fruchtbaren Wiesen, (dch d. g. Geb., doch gegen Norden nur bis an die nördliche Grenze des Harzes.) Mai. Juni. St. h. 12. Helm dunkel-schwarz-purpurn; Honiglippe weiss, mit satt-purpurnen Tropfen.

b. Honiglippe tief-3sp., der Mittelzpfl länglich, ungeth. oder abgeschnitten-ausgerandet.

6. *O. CORIOPHORA* (L.) Stinkendes K. — *Honiglippe* halb-3sp., herabhängend, *Zpfl* fast gleich, der mittlere länglich, ungeth., die seitenst. fast rautenf., kürzer, Sporn kegelf., gekrümmt, hinabsteigend, 2 oder 3mal kürzer, als der Fruchtkn.; *PZpfl* in einen Helm zsschliessend, zugespitzt; die *DeckB.* häutig, 1nervig, so lang, als der Fruchtkn. oder länger; B. lineal-lanzettl.; Knollen ungeth. 4. Auf Wiesen, (im südl. und mittlern Gebiete.) Mai. Juni. J. a. t. 122. Helm schmutzig-rothbraun; Honiglippe in der Mitte hell-röthlich mit dunkelpurpurnen Punkten; *Zpfl* grün mit röthlichem Rande.

7. *O. GLOBOSA* (L.) Kugelähriges K. — *Honiglippe* halb-3sp., gerade-hervorgestreckt, *Zpfl* länglich, der mittlere breiter, abgeschnitten-ausgerandet, oft mit einer dazwischen liegenden Stachelspitze, Sporn fast walzlich, gekrümmt, hinabsteigend, 2 oder 3mal kürzer, als der Fruchtkn.; *PZpfl* glockig-helmig, eyf., mit einer spateligen Haarspitze endigend; die *DeckB.* 1nervig, so lang, als der Fruchtkn. oder länger, die untersten manchmal 3nervig; B. lanzettl.; Knollen ungeth. 4. Auf A.- und VorA.-Wiesen, (Vogesen, Schwarzwald, dch d. g. AK., Mähr., Böhm., Riesengeb., Erzgeb., Frankf. a. d. O.) Mai. Juni. J. a. t. 265. Nigritella globosa Rb. Bth. purpurn; Honiglippe punktirt.

c. Honiglippe 3lappig; Lappen breit, kurz.

8. *O. MORIO* (L.) Triften-K. — *Honiglippe* 3lappig, Lappen breit, der mittlere abgeschnitten-ausgerandet, Sporn walzlich oder fast keulig, wagrecht oder aufstrebend, ohngefähr so lang, als der Fruchtkn.; *PZpfl* stumpf, alle in einen Helm zsschliessend; die *DeckB.* 1nervig, die untersten meist 3nervig, so lang, als der Fruchtkn.; B. länglich-lanzettl.; Knollen ungeth. 4. Auf Wiesen. Apr. Mai. Schk. t. 271. Bth. purpurn, mit grünen, starken Adern auf der Oberlippe. Var. mit satt-violetten, purpurnen, rosenrothen und weissen Bth.

9. *O. SPITZELII* (Santer.) Spitzel's K. — *Honiglippe 3lappig*, etwas sammtig, herabhängend, Lappen breit, gekerbt, der mittlere ausgerandet, Sporn kegel-walzf., senkrecht hinabsteigend, viel kürzer, als der Fruchtkn.; *PZpfl* stumpf, die seitenst. abstehend, die 2 innersten an der Spitze abgeschnitten und ausgerandet; die DeckB. 1nervig, so lang, als der Fruchtkn.; B. länglich-verkehrteyf., stumpf; Knollen ungeth. 4. An grasreichen O. der Tyroler A., (auf der Weissbachalpe im Buchweissbach bei Saalfelden in Salzbg., v. Spitzel, und auf VorA. im Val di Ledro in Südtirol, Facchini.) Juni. Bth. purpurn.

10. *O. PALLENS* (L.) Gelblich-weisses K. — *Honiglippe seicht 3lappig, ganzrandig* oder kaum fein-gekerbt, an der Basis sammtig, Sporn walzlich, wagerecht oder aufstrebend, ohngefähr so lang, als der Fruchtkn.; *PZpfl* eyf., stumpf, die 3 innern fast gleich, die 2 seitenst. zuletzt zurückgebogen; die DeckB. 1nervig, so lang, als der Fruchtkn.; die entwickelte Aehre eyf.; B. verkehrteyf.-länglich, stumpf; Knollen ungeth. 4. An waldigen O. und mit Gesträuch bewachsenen Bergen, auf Kalkboden, (zerstreut dch d. südl. Geb. und bis an die nördl. Grenze von Thüringen.) Apr. Mai, unter allen die früheste. J. a. t. 45. Bth. gelblichweiss, sehr selten purpurn. Untersch. sich von *O. sambucina* leicht dch die viel kleinern, 1nervigen und nicht netzaderigen DeckB., von *O. mascula*, der sie sehr ähnlich ist, ausser den angegebenen Merkmalen dch die viel frühere Bthezeit und den starken, unangenehmen Geruch.

11. *O. PROVINCIALIS* (Balbis. misc. alt. S. 20. t. 2.) Provinz-K. — *Honiglippe 2lappig, gekerbt, oder fast ganzrandig*, oberseits sammtig, Sporn schmal-walzl., gekrümmt-aufstrebend, fast so lang, als der Fruchtkn.; *Zpfl des P.* eyf., stumpf, die beiden seitt. abstehend oder etwas zurückgebogen; DeckB. 1nervig, so lang, als der Fruchtkn.; die entwickelte Aehre locker; B. lanzettl., kurz-stachelspitzig; Knollen ungetheilt. 4. Auf buschigen Hügeln, (südl. Istrien, um Pola und an andern O., Tommasini.) Mai. Bth. blass-gelbl., die Lippe dunkler, in d. Mitte mit röthlichen Punkten bestreut, nach Bertol. amoen. ital. J.

✓ 12. *O. MASCUA* (L.) Männliches K. — *Honiglippe tief-3lappig*, an der Basis kurzbl., Lappen breit, gezähnt, der mittlere ausgerandet mit einem dazwischen liegenden Zahne, Sporn walzlich, wagerecht od. aufstrebend, ohngefähr so lang, als der Fruchtkn.; *PZpfl* eyf.-länglich, stumpf, spitz oder zugespitzt, die 2 innersten kürzer, als der rückenst., die 2 seitenst. zuletzt zurückgeschlagen; die DeckB. 1nervig, so lang, als der Fruchtkn.; die entwickelte Aehre verlängert, locker; die B. länglich oder lanzettl. 4. Mai. Juni. Bth. purpurn. Den Sporn habe ich an der entwickelten Aehre immer wagerecht oder aufstrebend gefunden und auch bei den stumpfbth. Explaren. Var.:

α. *obtusiflora*, *PZpfl* stumpf.

β. *acutiflora*, *PZpfl* spitz oder kurz-zugespitzt; diese Form ist gemeiner, als die übrigen: Hall. helv. t. 33. die Figur links.

γ. speciosa, PZpfl lang-zugespitzt: *O. speciosa* Host. *O. macula* J. ic. rar. t. 180., aber die Farbe der Honiglippe ist nicht natürlich.

§. 2. Die DeckB. 3-mehrnervig und entweder die untersten oder alle zugleich netzaderig. Knollen ungeth. oder (bei *O. sambucina*) an der Spitze kurz-2lappig.

13. *O. LAXIFLORA* (Lam.) Lockerblüthiges K. — Honiglippe 3lappig, die seitenst. Lappen vorne abgerundet, der mittlere tief-ausgerandet, breiter, kürzer oder ein wenig länger, als die seitenst., *Sporn walzlich, wagerecht oder aufstrebend*, kürzer, als der Fruchtkn.; PZpfl. länglich, stumpf, die seitenst. zurückgeschlagen; *die DeckB. 3-5nervig*, die untern zugleich aderig; Ähre verlängert, locker; *B. lanzettl.-lineal*; *Knollen ungeth.* 4. Auf torfigen, sumpfigen Wiesen, (stw. in dem südl. und mittlern Geb., sehr selten im nördl.) Mai. Juni. Bth. purpurn. Var.:

α. Tabernaemontani, der Mittellappen merklich-kürzer, diese ist *O. laxiflora* Lam., *O. Tabernaemontani* Gmel.

β. palustris, der Mittellappen der Honiglippe so lang, als die seitenst. oder auch ein wenig länger: *O. palustris* J. ic. rar. t. 181.

14. *O. SAMBUCINA* (L.) Hollunder-K. — Honiglippe kurz-3lappig, Sporn kegel-walzenf., hinabsteigend, so lang, als der Fruchtkn.; die seitenst. PZpfl absteigend; *die DeckB. sämmtl. nervig und aderig*, länger, als die Bth.; St. 4-6blättrig; *Knollen länglich, ungeth. oder an der Spitze kurz-2-3lappig.* 4. In Gebirgswäldern und auf den VorA., (im südl. und mittlern Geb. bis z. Harze.) Mai. Juni. J. a. t. 108. *O. latifolia* Scop. carn. Bth. geruchlos, gelblichweiss; Honiglippe hellgelb, an der Basis mit purpurnen Pünktchen bestreut. Var.:

β. purpurea, Bth. purpurn: *O. incarnata* Willd. und der deutsch. Autoren.

15. *O. PAPILIONACEA* (L.) Schmetterlingsartiges K. — Honiglippe rundlich-eyf., gezähnt, ungeth., Sporn pfriemlich, hinabsteigend, kürzer, als der Fruchtkn.; PZpfl in einen ey-lanzettf. Helm zsschliessend; *die DeckB. 3-5nervig*; *B. lanzettl.*; Knollen ungeth. 4. Auf Wiesen der wärmern Gegenden, (im wärmern Krain; in Istrien.) März. *O. rubra* J. ic. rar. 1. t. 183. Bth. purpurn. D.

§. 3. Die DeckB. 3-mehrnervig und entweder die untersten oder alle zugleich netzaderig. Knollen handf.

16. *O. MACULATA* (L.) Geflecktes K. — Honiglippe 3lappig, Sporn kegel-walzenf., hinabsteigend, kürzer, als der Fruchtkn.; die seitenst. PZpfl absteigend; *die DeckB. 3nervig und aderig*, die mittlern so lang, als der Fruchtkn., die untersten länger, als derselbe; *der St. nicht hohl, meist 10blättrig*; *die obern B. verkleinert, deckblattf., das oberste von der Ähre weit-entfernt*, die mittlern lanzettl., nach beiden Enden verschmälert, die untersten länglich; *Knollen handf.* 4. In Wäldern und auf feuchten Wiesen. Juni. Hall. helv. t. 32. Bth. hell-lila, mit purpurnen

Flecken und Strichen. Die B. oft braun-gefleckt. Var. mit schneeweissen unpunktirten Bth. und ungefleckten B., aber sehr selten.

17. *O. LATIFOLIA* (L.) Breithlättriges K. — Königlippe 3lappig, Sporn kegel-walzenf., hinabsteigend, kürzer, als der Fruchtkn.; die seitenst. PZpfl aufwärts zurückgeschlagen; die untern und mittlern *DeckB.* länger, als die Bth., alle *3nervig und aderig*; *St. röhrig*, 4-6blättrig; *B. abstehend*, die untern *oval oder länglich, stumpf*, die *obern kleiner, lanzettl., zugespitzt*; *Knollen handf.* 4. Auf vorzüglich feuchten, Wiesen häufig. Mai. Juni. *O. latifolia* St. h 7. Fries. Novit. mant. 1. p. 16. *O. majalis* Rb. ic. f. 170. *O. comosa* Scop. carn. Bth. purpurn; B. oft braun-gefleckt.

18. *O. INCARNATA* (L. fl. succ. S. 312., L. spec. 1335. nach Fries.) Fleischfarbiges K. — Honiglippe 3lappig, Sporn kegel-walzenf., hinabsteigend, kürzer, als der Fruchtkn.; die seitenst. PZpfl abstehend, nachher aufwärts zurückgeschlagen; die *DeckB.* alle länger, als die Bth., *3nervig und aderig*; der *St. röhrig*, 4-6blättrig; *B. aufrecht*, mit dem *St. gleichlaufend, verlängert-lanzettl., verschmälert, an der Spitze kapuzenf.-zsggezogen*, das oberste über die Basis der Aehre hinaufreichend, das unterste kürzer, abstehend; *Knollen handf.* 4. Auf torfigen, sumpfigen Wiesen Juni, später, als die vorhergeh. Pfl.; wenn diese schon abgeblühet hat, fängt jene erst an ihre Bth. zu öffnen. *O. latifolia* Rb. ic. 6. 769. *O. angustifolia* Wimm. und Grab. fl. siles., Koch Syn. ed. 1. *O. incarnata* Fries herb. norm. fasc. 7. n. 63. novit. mant. 3. p. 127. (nicht 2. p. 51., welche zur folgenden Art gehört.) Wimm. schles. fl. 328. „Sie ist der *O. latifolia* sehr ähnlich,“ hat aber einen „nun die Hälfte niedrigeren St. und *DeckB.*, welche kaum länger, als die Bth. oder der Fruchtkn. sind“ sagt Linne in der Fl. succ. p. 312., was mit der folgenden, keineswegs aber mit *O. angustifolia* übereinstimmt, die sehr oft einen stärkern und höhern St. hat, als die *O. latifolia*, und *DeckB.*, wovon auch die *obern* länger, als die Bth. sind. D.

19. *O. TRAUNSTEINERI* (Sauter in Briefen.) Traunsteiner's K. — Honiglippe 3lappig, Sporn kegel-walzenf., kürzer, als der Fruchtkn.; die seitenst. PZpfl aufwärts zurückgeschlagen; die *DeckB.* *3nervig und aderig*, die untern so lang, als die Bth., die *obern* kürzer, als die Bth.; der *St. röhrig*, 4-5blättrig; die untern *B. lanzettl.-lineal., aufrecht-eticus abstehend*, die *obern lineal., aufrecht, an der Spitze flach, ein wenig rinnig*; *Knollen handf.* 4. Auf torfigen, moorigen Wiesen in Tyrol. Mai. Juni. Diese Art ist in dem lebenden Zustande näher zu beschreiben. *O. angustifolia* Fries mant. 3. p. 130. *O. incarnata* Fries mant. 2. p. 54. *O. angustifolia* Rb. ic. S. f. 1140. (mit Ausschl. des Synonyms von Loiseleur, welcher keine *O. angustifolia* beschreibt, aber in der Fl. gallica ed. 2. p. 267. eine schmalblättrige Variet. der *O. latifolia* aufstellt, wozu nach Loisel. die *O. divaricata* Rich. gehört, welche eine gedrungene Aehre, eine fast keilige Honiglippe, mit einem schwachen Mittellappen und einen 2th. Knollen hat, was nicht auf unsere Art passt. — Die „*O. haematotes* Rb. fl. exc.

p. 126. und p. 140. n. 857. gehört nach ihrem Stand O. um Bregenz und dem Finder D. Sauter nebst der O. *sambucina incarnata* var. *subalpina* Rb. fl. exc. p. 140. n. 853. hieher.“ Traunsteiner in Briefen. D.

2. ANACAMPTIS (Richard mem. d. mus. d'hist. nat. 4. S. 19.) *Anacamptis*. — Die Fächer der Stbk. dch ein 1fächeriges Beutelchen verbunden. Die Staubmassen auf einem gemeinschaftlichen Halter eingesetzt. Das Uebrige wie bei *Orchis*.

1. A. PYRAMIDALIS (Richard.) Pyramidenf. A. — *Honiglippe* halb-3sp., an der Basis mit 2 Plättchen, die Lappen länglich, stumpf, gleich, ganzrandig, Sporn fädlich, so lang, als der Fruchtkn. oder länger; PZpfl ey-lanzettf., ziemlich spitz, die seitenst. abstehend; die DeckB. an der Basis 3nervig; Aehre gedrunken; B. lanzettl.-lineal.; Knollen ungeth. 4. Auf Wiesen und buschigen Hügeln, auf Kalkboden, (zerstreut dch d. Gebiet.) Mai-Juli. *Orchis pyramidalis* L. spec. Koch Syn. ed. 1. Jacq. a. t. 266. Bth. purpurn.

3. GYMNADENIA (R. Brown, zum Theil.) *Gymnadenia*. — Das Beutelchen an der Basis der Stbk. Fächer fehlend; sonst Alles, wie bei *Orchis*. N. v. E. gen. 5. 6.

1. G. CONOPSEA (R. Brown.) Fliegenartige G. — *Honiglippe* 3sp., Lappen eyf., stumpf, Sporn fädlich, fast noch einmal so lang, als der Fruchtkn.; die äussern PZpfl weit-abstehend; die DeckB. 3nervig, so lang, als der Fruchtkn. oder länger; Aehre walzlich, verlängert; B. verlängert-lanzettl.; Knollen handf. 4. Auf Wiesen besonders der Gebirgsgegenden. Juni. Juli. Rb. ic. 6. f. 816. O. *conopsea* L. spec. Bth. purpurn, seltner weiss. Zu dieser letztern gehört die O. *ornithis* J. a. t. 138. als weissblüthiges Explar. Die Beschreibung und Abbildung wurde, wie Jacquin, der Sohn, in einem Schreiben an Zeyher bemerkt, nach einem weissblüthigen Explare, dem bei dem Ausgraben die Spitzen der Knollen abgeschnitten waren, entworfen. Var. ferner grösser, mit gedrungener Aehre und schwächerem Geruche der Bth.; und kleiner, ein wenig später blühend, mit lockerer Aehre und stärkerem Geruche der Bth.

2. G. ODORATISSIMA (Richard.) Wohlriechende G. — *Honiglippe* 3sp., Lappen eyf., stumpf, Sporn fädlich, ohngefähr so lang, als der Fruchtkn.; die äussern PZpfl weit-abstehend; die DeckB. 3nervig, so lang, als der Fruchtkn. und länger; Aehre walzlich, verlängert; B. lineal.-lanzettl. und lineal.; Knollen handf. 4. Auf Wiesen der A. und VorA.; seltner auch auf niedrigeren Gebirgen, (dch d. g. AK., auf den Vogesen; Würtemb.; Oberbad.; bei Zweibrücken in der Rheinpfalz, Hessen und Westphalen.) Juni. Juli. O. *odoratissima* L. spec. J. a. t. 264. *Gymnadenia odoratissima* Richard. Bth. purpurn; var. *rosenroth* und seltner weiss.

3. G. ALBIDA (Richard.) Weissliche G. — *Honiglippe* tief-3sp., Zpfl ganzrandig, die seitenst. spitz, der mittlere noch einmal so breit, länglich, stumpf, Sporn 3mal kürzer, als der Fruchtkn.;

PZpfl in einen rundlichen Helm zsschliessend; die Deck B. 3nervig, so lang, als der Fruchtkn.; Achse verlängert, fast einersseitswendig; die untersten B. länglich-verkehrteyf., die obern lanzettl.; *Knollen büschelig*. 4. An grasreichen O. der A. und VorA., seltner auch auf niedrigeren Gebirgen, (dch d. g. AK.; Vogesen, Oberhaden, Hunsrück, Württemberg, Schlesien, Böhmen, Erzgebirge, Harz, Moselgebirge bis nach den Niederlanden; Holstein und Preussen.) Juni-Aug. *Satyrium albidum* L. *Orchis albida* Scop. carn., *Peristylus albidus* Lindl., Koch Taschenb. *Habenaria albida* R. Brown. Hall. helv. t. 26.

4. HIMANTHOGLÖSSUM (Spreng.) Riemenzunge. — Honiglippe gedreht, in der Knospenlage schraubenf. zsgewollt; sonst Alles, wie bei *Orchis*. N. v. E. gen. 5. 3.

1. *H. hircinum* (Rich.) Bocks-R. — Honiglippe 3th., *Zpfl lineal.*, der mittlere sehr lang, etwas gedreht, die seitenst. viel kürzer, wellig-kraus. 4. Auf buschigen Hügeln, Bergtriften und an waldigen O., auf Kalkboden, (stw. dch d. südl. und mittlere Geb. bis an die nördl. Grenze v. Thüringen.) Mai, Juni. *Satyrium hircinum* L. Spenn. J. a. t. 367. *Loroglossum hircinum* Rich. *Orchis hircina* Swartz. Helm weisslich, inwendig mit purpurnen und grünen Streifen; Honiglippe weisslich-grün, mit röthlichen Punkten bestreut.

5. COELOGLOSSUM (Hartm. Scand. fl. ed. 1. S. 329. 1820., nicht Lindley. *Peristylus* in der Uebersicht der Gattungen unseres Werkes.) Hohlzunge. — P. rachig; *Zpfl* 3-5, in einen Helm zsneigend; Honiglippe abstehend, unterseits nach hinten gespornt, an die Befruchtungssäule bis an das Stbk. angewachsen. Stbk. ganz angewachsen; Fächer unterwärts dch die Bucht der ausgeschnittenen N. v. einander entfernt; Schnäbelchen fehlend. Blüthenmassen fein-lappig; Halter nackt; Beutelfchen fehlend. Fruchtkn. zsgedreht. N. v. E. gen. 5. 8. — Diese Gattung unterscheidet sich von der nächstfolgenden *Platanthera* nur dch den sehr kurzen beutelf. Sporn.

1. *C. viride* (Hartm.) Grüne H. — *Honiglippe lineal.*, an der Spitze 3zählig, der mittlere Zahn sehr kurz, die seitenst. geradehervorgestreckt, *Sporn sehr kurz, beutelf.*; P. in einen Helm zsneigend. 4. Auf feuchten Wiesen; in die A. hinaufsteigend, (zerstreut dch d. Geb.) Juni, auf den A. später. *Satyrium viride* L. *Orchis viridis* Swartz. *Gymnadenia viridis* Rich. Rb. ic. 6. f. 813. *Habenaria viridis* R. Brown verm. Schrift., Koch Synops. ed. 1. *Peristylus viridis* Lindl. Koch Taschenb. — Den Namen *Peristylus* habe ich, weil der Name *Coeloglossum* Hartm. der ältere ist, diesem nachgesetzt.

6. PLATANTHÉRA (Richard.) Breitkölbchen. — Perigon rachenf. mit 3-5 zu einem Helm zsgeschlossenen *Zpfln.* Honiglippe abstehend, unterseits nach hinten zu bespornt, an die Befruchtungssäule bis zum Stbk. angewachsen. Stbk. ganz angewachsen, die Fächer unten dch eine Bucht der ausgeschnittenen N.

von einander entfernt; Schnäbelchen fehlend. Staubmasse kaum lappig; Halter nackt, das Beutelchen fehlend. Fruchtkn. gedreht. Sporn bei unseren Arten fädl. verlängert. N. v. E. gen. 5. 7.

1. **P. BIFOLIA** (Richard.) Zweiblättriges B. — Honiglippe ungeth., lineal., *Sporn* $1\frac{1}{2}$ -2 mal so lang, als der Fruchtkn., *fädl.*; *Stbk.Fächer gleichlaufend*. 4. In schattigen Wäldern. Juni. Juli. Rb. ic. 9. f. 1143. *Orchis bifolia* L. *O. bifolia* β . *brachyglossa* Wallr. *Habenaria bifolia* R. Brown. Var. mit kürzerer Honiglippe. Die *Plantanthera brachyglossa* Rb. ic. 9. f. 1144. ist eine Abändrg mit gestutzter N., dieses Merkmal ist aber nicht beständig.

2. **P. CHLORANTHA** (Custor bei Rb. in Mösl. Handb.) Grünblumiges B. — Honiglippe ungeth., lineal., *Sporn* noch einmal so lang, als der Fruchtkn., *fädl.*, *nach hinten fast keulig*; *Stbk.Fächer* mit der Spitze an einander stossend, unterwärts *spreitzend*. 4. In schattigen Wäldern. Juni. Juli. Rb. ic. 9. f. 1145. *Orchis bifolia* α . *macroglossa* Wallr., nach d. Citat Hall. helv. t. 35. *O. bifolia* β . *elatio*r Gaud. *O. virescens* Zollik. bei Gaud.

7. **NIGRITELLA** (Rich. de orch.) Schwärzling — P. etwas abstehend, fast glockig, die Honiglippe oben. Fruchtkn. nicht zsgedreht, sonst Alles, wie bei Ophrys. — N. v. E. gen. 10. 8. Die Halter nennt Richard halbnackt, mir schienen sie aber ganz nackt.

1. **N. ANGUSTIFOLIA** (Rich. de orch.) Schmalblättriger S. — Honiglippe eyf., zugespitzt; PZpfl lanzettl., zugespitzt; *Sporn verkehrteyf.*, 3 mal kürzer, als der Fruchtkn. 4. An grasreichen O. der A. und VorA., (dch d. g. AK.) Mai-Aug. *Satyrium nigrum* L. J. a. t. 368. *Orchis nigra* Scop. Bth. schwarzpurpurn, einen Vanillegeruch verbreitend, seltner purpurn und sehr selten fleischfarb., Traunst. Aehre eyf., sehr gedrunge; B. lineal., kurz-gezähmelt-gewimpert, wie bei der folgenden.

2. **N. SUAVEOLENS** (Koch.) Wohlriechender S. — Honiglippe eyf., beiderseits in der Mitte mit einem stumpfen Zahne versehen und deswegen fast 3lappig, der mittlere Lappen vorgezogen, an der Spitze selbst stumpf; PZpfl ey-lanzettf., spitzlich; *Sporn walzlich-pfriemlich*, so lang, als der Fruchtkn. 4. Auf den A., sehr selten, (auf dem Dolaz in der Schweiz und auf dem Solstein bei Zierl in Tyrol; Kärnth.) Juli. Aug. *N. fragrans* Sauter bei Rb. ic. 8. f. 1010. *Orchis suaveolens* Vill. delph. 2. t. 1. Abbildg schlecht, wie die meisten in diesem, übrigens treflichen Werke, DC. fl. fr. 3. p. 331., er beschrieb seine Pflanze nach Exemplaren in Villar's Herbarium. Die Aehre fast walzlich, die Bth. grösser, als bei der vorhergehenden und freudig-purpurn.

8. **OPHRYS** (L., mit Ausschl. v. Arten.) Ragwurz. — P. abstehend. Honiglippe abstehend, spornlos, an der Befruchtungs-säule bis an das Stbk. angewachsen. Stbk. ganz angewachsen; Fächer zwar gleichlaufend, aber an der Basis getrennt. Schnäbelchen fehlend. Bthstaubmassen feinlappig, gestielt; jeder Halter in

einem eigenen Beutelchen eingeschlossen. Fruchtkn. nicht zsgedreht. N. v. E. gen. 5. 5.

1. *O. MUSCIFERA* (Huds.) Mückentragende R. — *Honiglippe* länglich, sammtig, *in der Mitte mit einem fast 4eckigen, kahlen Flecken* bezeichnet, noch einmal so lang, als das P., 3sp., die seitenst. Lappen lanzettl., der mittlere noch einmal so lang, an der Spitze tief-2lappig, *ohne Anhängsel*; die 2 innern PZpfl zottig, lineal., zsgerollt und fädlich. 4. In Gebirgswäldern, auf Kalkboden, (stw. im südl. und mittlern Geb.; in Mecklenb. selten.) Juni. *O. myodes* Jacq. misc. Swartz. St. h. 40. *O. insectifera* α. *myodes* L. *Orchis muscaria* Scop. Honiglippe satt-purpur-braun, in der Mitte mit einem grau-bräunlichen Flecken und an der Basis mit 2 glänzenden, schwarzbraunen Höckerchen bezeichnet. P. grün.

2. *O. ARANIFERA* (Huds.) Spinnenlippige R. — *Honiglippe* länglich-verkehrteyf., ungeth., konvex, gedunsen, am Rande zurückgebogen, *an der Spitze stumpf oder seicht-ausgerandet, ohne Anhängsel*, behaart, *in der Mitte mit 2-4* an der Basis querverbundenen, *kahlen Längelinien*; die äussern PZpfl ohngefähr so lang, als die Honiglippe, *die innern kürzer, kahl*. 4. Auf kalkigen Hügeln und Bergen, (stw. v. der Schweiz dch Tyrol, Oberbaden, Württemberg bis Oestreich und dem Littorale; vom Elsass bis Mainz und bis Würzburg) Mai. Juni. Rh. ic. 9. f. 1154-1156. *O. fucifera* Curt. Honiglippe ungeth. mit einem stumpfen, kleinen Zahne beiderseits in der Mitte des Randes, aber nicht 4lappig, purpurbraun oder gegen den Rand hin gelblich, die kahlen Linien von schmuziggelber Farbe; meistens finden sich 2 solche, seltner 4: *O. atrata* Lindl. An der getrockneten Pfl. fand ich ausser der Zahl der Streifen kein Unterscheidungszeichen zw. *O. aranifera* und *O. atrata*. Das P. grün.

3. *O. BERTOLONII* (Morett.) Bertoloni's R. — *Honiglippe* breit-verkehrteyf., ziemlich flach, behaart, *vor der ein wenig aufstrebenden Spitze mit einem fast 4eckigen, kahlen Flecken bezeichnet*, sehr stumpf, ganz, *an der Spitze kurz-3lappig*, der mittlere Lappen schmal, zahnf., an der Spitze kahl; die innern PZpfl lineal.-lanzettl., spitz, kahl, am Rande fläumlich; Befruchtungssäule geschnäbelt, zugespitzt. 4. Auf grasreichen Hügeln, (in Istrien und Veglia.) Apr. Mai. *O. Speculum* Bert. Rh. ic. 9. f. 1157. 1158. — Honiglippe schwarz-purpurn, der kahle Flecken bleicher. J.

4. *O. ARACHNITES* (Richard.) Spinnenblumige R. — *Honiglippe* breit-verkehrteyf., ungeth., konvex, gedunsen, am Rande flach, vorne abgeschnitten und sehr stumpf, sammtig, *an der Basis mit Flecken oder kahlen in einander verzweigten Aederchen gescheckt*, *an der Spitze seicht-ausgerandet, mit einem kahlen, aufwärts gebogenen Anhängsel*; die 2 innern PZpfl. eyf., sammtig; Befruchtungssäule kurz-geschnäbelt. 4. Auf unkult., buschigen Kalkhügeln, (stw. im südl. und mittlern Geb.) Juni. *O. insectifera* η. L. *O. aestrifera* Rh. fl. exc., nicht MBieb. *O. fucifera* Rh. ic. 9. f. 1162-1165. *Orchis Arachnites* Scop. — P. rosenroth. Honiglippe satt-purpur-braun, an der Basis gelb-gescheckt; das An-

hängsel grün-gelb. — Die Hervorragungen an beiden Seiten der Lippe sind bald kurz und stumpf, bald kegelf. und 2-3 mal länger, aber bestimmte Grenzen unter diesen Formen konnte ich nicht auffinden. — Die Ophrys andrachnitis Rb. ic. 9. f. 1168., (mit Ausschl. des Synonyms aus Scop.) welche kahle, innere PZpfl hat, ist mir unbekannt. Die Orchis Arachnites Scopoli's besteht aus 3 verschiedenen Arten, von denen er die Deckelchen (die innern PZpfl) „zottig“ angibt.

5. *O. APIFERA* (Huds.) Bienenträgende R. — *Honiglippe* rundlich-verkehrteyf., konvex, *gedunsen*, sammtig, *gescheckt*, 5sp., die 2 hintern *Lappen* eyf., etwas abstehend, an der Basis mit einem rauhb. Höcker versehen, die 3 vorderen zurückgekrümmt, unterseits *zsneigend*, der mittlere in ein kahles Anhängsel endigend; die innern PZpfl kurz, kurz. 4. Auf buschigen Kalkhügeln, (stw. v. d. Schweiz und d. Elsass dch Oberbaden und Württemberg und d. südl. D. bis Ungarn, und auf der Südseite d. A. dch Tyrol; im Rheinthale bei Mainz, Trier, bei Verviers; im Mainthale bei Würzburg.) Juni. Juli. Rb. ic. 9. f. 1159. *O. insectifera* ε. L. — Die Honiglippe braun mit gelben Verzierungen. *O. Pseudospeculum* ward irrthümlich in die Synopsis aufgenommen.

9. *CHAMAEORCHIS* (Rich. de orch.) Zwergknabenkraut. — P. helmig; sonst Alles, wie bei Ophrys. — N. v. E. gen. 19. 9., *Chamaerepes*.

1. *C. ALPINA* (Rich.) Alpen-Z. — *Honiglippe* eyf.-länglich, stumpf, an der Basis beiderseits mit einem schwachen Zahne bezeichnet; B. schmal-lineal., so lang, als der St. und länger. 4. Auf Triften der höhern A., (dch d. g. AK.) Juli. Aug. Ophrys alpina L. J. en. stirp. vind. t. 9. *Chamaerepes alpina* Spreng. Bth. klein, gelb-grün.

10. *ÁCERAS* (R. Brown.) Spornlose. — *Honiglippe* spornlos. Die Fächer des Stbk. an d. Basis dch ein gemeinschaftl. 1fächeriges Beutelchen verbunden; die Staubmasse einem einzigen, gemeinschaftl. Halter eingefügt; das Uebrige wie bei Ophrys. N. v. E. gen. 5. 4.

1. *A. ANTHROPOPHORA* (R. Brown.) Menschenträgende S. — *Honiglippe* 3th., der mittlere Zpfl lineal.-2sp., oft mit einem dazwischen geschobenen Zähnchen; die Abschnitte desselben so wie die seitenst. Zpfl *lineal.-fädlich* 4. Auf Hügeln und feuchten Gebirgs-Wiesen, auf Kalkboden, (Schweiz, Oberelsass, Oberbaden und Württemberg; bei Trier, Linz am Rheine und bei Halle, an beiden letzten O. sehr selten.) Mai. Juni. Ophrys anthropophora L. *Loroglossum anthropophorum* Rich. Fl. d. t. 103. P. grünlich, am Rande purpurn; *Honiglippe* rothbraun, zuletzt ins Goldgelbe spielend.

11. *HERMINIUM* (R. Brown.) Herminie. — P. glockig; Zpfl und *Honiglippe* aufrecht. *Honiglippe* an der Basis sackartig-höckerig,

stumpf-gekielt, sporulos. Sonst Alles, wie bei *Platanthera*. N. v. E. gen. 5. 9.

1. H. *MONORCHIS* (R. Brown.) Einknollige H. — *Die innere Pzpf 3lappig*, der Mittellappen verlängert; Honiglippe tief-3sp., Zpfl lineal., die seitenst fast spiessf.-abstehend, der mittlere noch einmal so lang. 4. Auf Wiesen, Bergtriften und grasreichen Hügeln, in die A. hinaufsteigend, (sehr gemein dch d. g. AK. und stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. *Ophrys Monorchis* L. Fl. d. t. 102. Bth. klein, grünlich-gelb.

12. *SERAPIAS* (L., mit Ausschl. v. Arten.) Stendelwurz. — Honiglippe spornlos, zweigliederig, 3lappig, der Mittellappen grösser, in einem Gelenke zurückgebrochen-herabhängend. Fruchtkn. nicht zsgedreht. Fächer des Stbk. an d. Basis dch ein gemeinschaftl., fächeriges Beutelchen verbunden. Staubmasse einem einzigen gemeinschaftl. Halter eingefügt. Sonst Alles, wie bei *Orchis*. N. v. E. gen. 10. 7.

1. S. *CORDIGERA* (L. sp. 1345.) Herztragende S. — *Das hintere Glied der Honiglippe 2lappig, innerhalb an d. Basis mit 2 länglichen Plättchen besetzt, das vordere breit-eyf., oder fast herzf. zugespitzt*, an der Basis behärtet, mit seitlichen wiederholt-verzweigten Adern versehen. 4. Auf unbebauten Hügeln, (auf der Insel Levano grande unweit Promontore in Istrien, Dr. Sendtner.) Mai. P. ziegelroth, mit dunkleren Längsstreifen, die 2 inneren Blättchen schwarz-roth, die Lippe gleichfärbig, an der Basis rinnig, und die Wände der Rinnen (die an die Honiglippe angedrückten Plättchen) schwarzroth. Bert. amoen. ital. J.

2. S. *PSEUDO-CORDIGERA* (Moricand., Sebast. rom. plant. fasc. 1. S. 14. t. 4.) Falsche herztragende St. — *Das hintere Glied der Honiglippe 2lappig, innen an der Basis mit 2 längl. Plättchen besetzt, das vordere lanzettl. oder längl.-lanzettl., verschmälert-zugespitzt*, an d. Basis behärtet und mit seitlichen spärlich verzweigten Ästchen, oft vor dem Rande ineinander mündenden Adern versehen. 4. Auf unbebauten Hügeln und Bergwiesen, (C. Tessin, südl. Tyrol, Litt.) Apr. Mai. S. *Lingua* Bertol. amoen. ital. Gaud. fl. helv. S. *cordigera* Heg. und Heer Fl. d. Schw., Koch Synops. ed. 1. S. *longipetala* Pollin. fl. veron. *Orchis Lingua* Scop. carn. Die Honiglippe ziegelroth mit dunkleren Oehrchen. St. 1-1½ Fuss hoch.

3. S. *LINGUA* (L. spec. 1314.) Zungenlippige S. — *Das hintere Glied der Honiglippe 2lappig, innen an der Basis mit einer einfachen Schiele besetzt, das vordere längl.-lanzettl., spitz*, an der Basis spärlich behärtet. 4. Auf unbebauten buschigen Hügeln, (Fiume, Insel Osero, Noë; auf Promontore in Südistrien, Dr. Sendtner.) Apr. Mai. S. *Lingua* DC. fl. fr. S. *oxyglottis* Bertol. amoen. ital. — Der St. nicht über ½ Fuss hoch; Bth. um die Hälfte kleiner, als beim vorigen; nach Bertoloni's Beschreibung ist das P. blassroth, mit dunkleren Streifen; die Schiele an der Basis der Honiglippe schwarz-roth, mit weissem Saum, die Seitenlappen der Honig-

lippe schwarzroth, der vordere Lappen pfirsichblüthfarben. — Die *Orchis macrophylla* Column. cephr., welche Bertoloni zu *S. Lingua* zieht, die nach Columna einen 3 Fuss hohen St. hat, und deren unterste B. $1\frac{1}{2}$ Fuss lang sind, kann nicht zu jener Art gehören. Zu dieser gehört *S. Lingua* β . L. spec. J.

4. *S. TRILOBA* (Viviani.) Dreilappige *S.* — Das hintere Glied der Honiglippe sehr kurz und schmal, mit wenig bemerklichen Lappen, das vordere 3sp., gezähnt, die seitlichen Zipfel schiefeyf., der mittlere eyf., zugespitzt, an der Basis spärlich bebärtet. 4. Auf einer Wiese bei Triest fand Tommasini nur ein einziges Expl. Mai. D.

II. Gruppe. *LIMODOREEN*. Stbk. frei. Bthstaubmassen aus zahlreichen, kantigen, elastisch-zshängenden Läppchen zsgesetzt, oder mehlig; Halter nackt, oft mit ihrer Basis zshängend.

13. *EPIPOGIUM* (Richard.) *Epipogium*. — P. umgewendet, abstehend. Honiglippe zweigliederig, die Platte aufrecht, hinten in einen aufgeblasenen, aufrechten Sporn endigend. Stbk. kurzgestielt, in die 3sp. Spitze der N. eingesenkt. Bthstaubmassen feinklappig, gestielt. Fruchtkn. nicht zsgedreht. N. v. E. gen. 10. 10.

1. *E. GMELINI* (Richard.) Gmelin's *E.* — Blattlos; der St. bescheidet, armbth.; Bth. hängend. 4. In schattigen Wäldern, auf faulem Holze schmarotzend, (am Fusse der A. v. der Schweiz bis Oestreich stw. und auf höhern Bergen, d. Vogesen, Schwarzwalde, Sudeten, Harz; und ausserdem zerstreut, wiewohl selten im Gebiete.) Juli. Aug. *E. aphyllum* Bl. und Fingerh. Comp. *Satyrium Epipogium* L. spec. St. h. 18. Jacq. austr. t. 84. *Limodorum Epipogium* Swartz nov. act. ups. *Epipogium* Gmel. sib. 1. S. 11. t. 2. f. 2. — Die Pfl. ist farblos, das P. gelbl., der Sporn blass fleischfarben.

14. *LIMODÓRUM* (Tournef. Rich.) Dingel. — P. aufrecht-abstehend. Honiglippe zweigliederig, abwärts gespornt; Platte aufrecht. Stbk. endst., frei. Befruchtungssäule mit der Honiglippe nicht zsgewachsen. Bthstaub staubartig. Fruchtkn. nicht zsgedreht. N. v. E. gen. 5. 11.

1. *L. ABORTIVUM* (Swartz.) Violetter D. — Blattlos; Schaft bescheidet; Honiglippe eyf., wellig; Sporn pfriemlich, von der Länge des Fruchtkn. 4. Auf buschigen Hügeln und in Wäldern, (Schweiz, Oberbaden am Kaiserstuhle, bei Trier, in Oestreich und dem Littorale, Steyerm., südl. Tyrol.) Mai. Juni. *Orchis abortiva* L. St. h. 40. *Serapias abortiva* Scop., die ganze Pflanze hell-violett, der Schaft so wie die Striche auf dem P. gesättigter.

15. *CEPHALANTHÉRA* (Rich. de orch.) *Cephalanthere*. — PZpfl. aufrecht, etwas zsn eigend. Honiglippe sporulos, zweigliederig, das untere Glied sackartig-konkav. Stbk. endst., frei. Bthstaub staubartig. Fruchtkn. zsgedreht. N. v. E. gen. 5. 12.

1. *C. PALLENS* (Richard.) Blasse C. — *Fruchtkn. kahl*; Platte der Honiglippe herz-eyf., breiter, als lang; alle Zpfl des P. stumpf; *die DeckB. länger, als der Fruchtkn.*; B. eyf. oder ey-lanzettf., zugespitzt. 4. In Waldungen, (stw. deh d. Geb.) Mai. Juni. Hall. helv. t. 41. *Serapias grandiflora* Scop. *S. longifolia* Huds. *S. lancifolia* Roth. *Epipactis grandiflora* Sm. (*Serapias grandiflora* L. scheint zu *Cephalanthera ensifolia* zu gehören.) *E. pallens* Swartz. Bth. gelblich-weiss.

2. *C. ENSIFOLIA* (Richard.) Schwertblättrige C. — *Fruchtkn. kahl*; Platte der Honiglippe sehr stumpf, quer-breiter; die äussern PZpfl spitz; *die DeckB. vielmal kürzer, als der Fruchtkn.*, die untersten manchmal so lang, als derselbe; B. lanzettl., die obern lineal-lanzettl., verschmälert-spitz. 4. An waldigen O., (stw. deh d. Geb., aber viel seltner, als vorige.) Mai. Juni. *Serapias ensifolia* Sm. Schk. t. 274. *S. grandiflora* Fl. dan. t. 506. *Epipactis ensifolia* Swartz. Bth. schneeweiss, mit einem gelben Flecken an der Spitze der Honiglippe.

3. *C. RUBRA* (Richard.) Rothe C. — *Fruchtkn. flaumig*; PZpfl alle zugespitzt; Platte der Honiglippe eyf., zugespitzt, so lang, als die innern Zpfl. 2. In Wäldern und auf buschigen Kalkhügeln, (stw. deh d. Geb.) Juni. Juli. *Epipactis rubra* All. *Serapias rubra* L. Fl. d. t. 345. Bth. schön-purpurn.

16. *EPIPACTIS* (Richard.) Sumpfwurz. — *Fruchtkn. nicht zsgedreht, aber an der Basis in einen gedrehten Stiel verschmälert. Befruchtungssäule kurz. P. glockig, etwas abstehend. Sonst Alles, wie bei Cephalanthera. N. v. E. gen. 5. 10.*

1. *E. LATIFOLIA* (Allion. fl. ped. 2. S. 151.) Breitblättrige S. — B. eyf., am Rande und auf den Nerven *flaumig-rauh*, länger, als ein Zwischenglied; P. zuletzt weit-abstehend, die Zpfl desselben alle kahl, Platte der Lippe zugespitzt, an der Spitze zurückgebogen, *die Höcker an der Basis derselben glatt*. 4. In Wäldern, und auf unbebauten buschigen Hügeln. Juli. Aug. Bth. grün oder ins Blassrosa spielend, das vordere Glied der Honiglippe lila.

2. *E. RUBIGINOSA* (Gaud. fl. helv. 2. S. 182. *E. latifolia* β . *rubiginosa*.) Braunrothe S. — B. eyf., am Rande und auf den Nerven *flaumig-rauh*, länger, als ein Zwischenglied; P. glockig-offen, die 3 äusseren Zpfl etwas flaumig, Platte der Lippe zugespitzt, an der Spitze zurückgekrümmt; *die Höcker an der Basis derselben faltig-kraus*. 4. Auf unbebauten Hügeln. Juni. *E. latifolia* β . *rubiginosa* Gaud. fl. helv., Koch Synops. ed. 1. *E. media* Fries nov. mant. *Serapias latifolia atro-rubens* Hoffm. d. fl. Reichenb. ic. 9. f. 1141. Bth. schmutzig-violett, oder grün und rostbraun überlaufen.

3. *E. MICROPHYLLA* (Ehrh. Beitr. 4. S. 42.) Kleinblättrige St. — B. ey-lanzettf. oder lanzettf., am Rande *flaumig-rauh, auf den Nerven kahl*, die mittleren und oberen kürzer, oder so lang, als ein Zwischenglied; P. glockenf.; die Zpfl an der Spitze gerade-

vorgestreckt, die 3 äusseren flaumig; Platte der Lippe zugespitzt, an der Spitze zurückgekrümmt, *die Höcker an der Basis faltig-kraus*. 4. In schattigen Wäldern, (in Westphalen, am Harz, im südl. Hannover und in Thüringen, bei Eberndorf in Kärnth., R. Graf.) Juni. Juli. W. Kit. pl. rar. h. t. 270. Bth. grünl., am Rande röthlich, Honiglippe am Rande weisslich. D.

4. E. PALUSTRIS (Crantz.) Gemeine S. — B. lanzettl.; *Platte der Honiglippe rundlich, stumpf*, so lang, als die PZpfl. 4. Auf sumpfigen Wiesen, (stw. dch d. Geb.) Juni. Juli. Hall. helv. t. 39. *Serapias palustris* Scop. *S. longifolia* L. St. h. 13. Bth. graugrünlich, inwendig an der Basis ins Rosenfarbe spielend; Honiglippe weiss, roth-gestreift.

17. LISTÉRA (R. Brown.) Listere. — P. rachig; Zpfl in einen Helm zsneigend. Honiglippe spornlos, herabgebogen. Befruchtungssäule hinten mit einem eyf. Fortsatze endigend, auf dessen Basis oder Spitze das Stbk. eingefügt ist. Stbk. frei, sitzend, bleibend. Bthstaub mehlig. Schnäbelchen ein ungetheiltes Plättchen. Fruchtkn. nicht zsgedreht. N. v. E. gen. 5. 14.

1. L. OVATA (R. Brown.) Eyrundblättrige L. — *Der St. 2-blättrig*; B. eyf., gegenst.; *Honiglippe lineal.*, 2 sp. 4. Auf Bergwiesen und an grasreichen WaldO. Mai. Juni. *Ophrys ovata* L. *Epipactis ovata* All. St. h. 29. Schk. t. 273. Bth. grün.

2. L. CORDATA (R. Brown.) Herzblättrige L. — *Der St. 2-blättrig*; B. herzf., gegenst.; *Honiglippe 3 sp.*, die seitenst. Zpfl lineal., kurz, *der mittlere 2 sp.*; Schenkel verlängert, lineal., zugespitzt. 4. In schattigen Wäldern der Gebirge und VorA., (Schw. und längs der ganzen AK., Vogesen, Oberbaden, Würtemberg, Schlesien, Böhmen, Mähren, Harz, Fichtelgebirg.) Mai-Juli. *Ophrys cordata* L. *Epipactis cordata* All. Bth. grün.

18. NEOTTIA (L.) Nestwurz. — P. glockig, fast helmig. Honiglippe spornlos, gerade vorgestreckt, an der Basis konkav, nicht eingeschlossen. Stbk. endst., frei, sitzend, dem hintern Rande der Befruchtungssäule eingefügt, bleibend. Bthstaub mehlig. Schnäbelchen ein zungenf., ungeth. Plättchen. Fruchtkn. nicht zsgedreht. N. v. E. gen. 5. 15.

1. N. NIDUS AVIS (Richard.) Blattlose N. — 4. Auf den W. der Bäume in schattigen Wäldern schmarotzend. Mai. Juni. *Ophrys Nidus avis* L. *Neottidium Nidus avis* v. Schlechtend. *Epipactis Nidus avis* All. *Die Pflanze blattlos, überall bräunlich-weiss*.

19. GOODYÉRA (R. Brown.) Goodyere. — P. rachig. Honiglippe spornlos, eingeschlossen, unterwärts sackartig-höckerig, oberwärts zurückgekrümmt. Stbk. frei, hinter dem Schnäbelchen eingefügt, gestielt, bleibend. Bthstaub aus kantigen Körnchen. Schnäbelchen ein 2sp. Plättchen. Fruchtkn. nicht zsgedreht. N. v. E. gen. 10. 11.

1. *G. REPENS* (R. Brown.) Kriechende *G.* — *WB.* eyf., *gestielt*, *netzig*; der *St.* oberwärts nebst den *Bth.* behaart. 4. In schattigen Wäldern der Gebirge und VorA., (stw. dch d. Geb.) Jul. Aug. *Satyrion repens* L. J. a. t. 369. *Neottia repens* Swartz. *Bth.* weisslich.

20. *SPIRANTHES* (Richard.) Blüthenschraube. — *P.* rachig. Honiglippe eingeschlossen, spornlos, an der Basis rinnig, oberwärts zurückgekrümmt. *Stbk.* frei, hinter dem Schnäbelchen eingefügt, sitzend, bleibend. *Bthst.* aus meist 4 zshängenden Körnchen bestehend. Schnäbelchen ein eyf., an der Spitze 2 sp. Plättchen. Fruchtkn. nicht zsgedreht. N. v. E. gen. 5. 13.

1. *S. AESTIVALIS* (Richard.) Sommer-B. — *Der St.* beblättert; *B.* lanzettl.-lineal.; Aehre schraubenf.; Honiglippe länglicheyf., an der Spitze abgerundet. 4. Auf Triften und feuchten moorigen Wiesen, (stw. im Elsass und bis Heidelberg und Dürkheim; Württemberg; bei Lüttich; Tyrol; am Bodensee bei Bregenz; in der Schweiz nicht selten) Jul. Rh. ic. 2. f. 337. *Neottia aestivalis* DC. *Ophrys aestivalis* Lam. *O. aestivalis* Balb. *Bth.* weiss.

2. *S. AUTUMNALIS* (Richard.) Herbst-B. — *Der St.* blattlos, bescheidet; *WB.* eyf. oder eyf.-länglich, in den Bstiel zsggezogen, *dem St.* seitlich; Aehre schraubenf.; Honiglippe verkehrteyf., ausgerandet. 4. Auf feuchten Bergtriften, (stw. dch d. Geb.) Aug.-Öct. *Ophrys spiralis* L. *St.* h. 12. *Neottia spiralis* Sw. *Bth.* weiss.

III. Gruppe. *MALAXIDINEEN*. *Stbk.* frei. *Bthst.* wachsig oder aus Körnchen bestehend, welche zuletzt in eine wachsigartige Masse zssfliessen.

21. *CORALLORRHIZA* (Hall.) Korallenwurz. — *P.* rachig. Honiglippe an der Basis mit den seitenst. PZpfln zsggeflossen und einen kurzen, daselbst angewachsenen Sporn darstellend. *Stbk.* frei, endst., abfällig. *Bthst.* in 4 dichte, fast kugelige, zuletzt wachsigartige Massen zsggeballt. N. v. E. gen. 10. 10.

1. *C. INNATA* (R. Brown.) Eingewachsene K. — Aehre arm^{bth.}; PZpfln spitz, die untern herabgebogen; Honiglippe länglich, stumpf, beiderseits stumpf-1 zählig, das Mittelfeld der Länge nach 2schwielig. 4. In schattigen Wäldern der Gebirge und VorA., (dch d. g. AK.; ausserdem sehr zerstreut in D.) Jun.-Aug. *C. Halleri* Rich. *Ophrys corallorrhiza* L. Hall. helv. t. 44. *Bth.* grünlich-weiss.

22. *STURMIA* (Rb.) Sturmie. — *P.* abstehend. Honiglippe aufrecht, hinten spornlos. Befruchtungssäule nach der Spitze berandet. Schnäbelchen stumpf. *Stbk.* endst., abfällig. *Bthst.* wachsigartig, 2, aus 2 Körperchen gebildete, Kügelchen darstellend. — *Liparis* Richard; aber *Liparis* ist eine Fischgattung, die schon Artdi aufgestellt hat. N. v. E. gen. 10. 13.

1. *S. LOESELII* (Rb.) Lösel's S. — Der St. 3kantig, an der Basis 2blättrig; B. elliptisch-lanzettl.; Aehre 3-8 bth.; Honiglippe eyf., stumpf, feingekerbt, v. der Länge der PZpfl. 2. In moorigen Sümpfen, (Südtirol; im Wallis bei Sitten; bei Zürich, im Elsass bei Strassburg, Hagenau; bei Trier; im Badischen bei Waghäusel, Hengster Fl. d. Wett.; Württemberg, am Bodensee; Salzburg am Zellersee; Schlesien; in Böhmen und im nördl. D. v. Harze an.) Jun.-Aug. *Ophrys Loeselii* L. Fl. d. t. 877. O: liliifolia Lam. *Liparis Loeselii* Rich. Bth. gelb-grünlich.

23. *MALAXIS* (Swartz.) Weichkraut. — P. weit abstehend, mit fast gleichen Zpfln. Honiglippe v. der Gestalt der Zipfel, spornlos, hinten. Stbk. endst., frei, sitzend, bleibend. Bthstaub wachsartig, in 4 längliche Körperchen zsgeballt. Fruchtkn. nicht zsge-dreht. N. v. E. gen. 5. 16.

1. *M. PALUDOSA* (Swartz.) Sumpf-W. — Der St. 5seitig, unterwärts 3-4 blättrig; Honiglippe konkav, zugespitzt. 2. In torfigen, moorigen Sümpfen unter den Sphagnen, (stw. im nördl. D. v. Untertheine und Westphalen bis Preussen, im südwestl. seltnr; Bodensee, Schwarzwald, Rheinpfalz v. Bitsch bis Kaiserslautern und Homburg, in Hengster Fl. d. Wett.) Jul. Aug. *Ophrys paludosa* L. Fl. d. t. 1234. Bth. grünlichgelb. D.

2. *M. MONOPHYLLOS* (Swartz.) Einblättriges W. — Der St. meist 1 blättrig, 3kantig; Honiglippe konkav, zugespitzt. 2. An moosigen, grasigen, feuchten O. der VorA., (sehr zerstreut dch d. AK. v. der Schweiz dch Tyrol, Salzburg, Krain, Kärnthen und Steyermark; sodann in Hengster Fl. d. Wett., im Gesenke d. Sudet. und in den kalten Brüchern v. Preussen.) Jul. *Ophrys monophyllos* L., Wulf. bei J. coll. t. 13. f. 2. *Microstylis monophylla* Lindl., Koch Taschenb. Die Gattung *Microstylis* liess ich wieder weg, weil sie sich nur dch ein sehr unerhebliches Kennzeichen von *Malaxis* unterscheidet. Bth. grünlich.

IV. Gruppe. *CYPRIPEDIEEN*. Bth. 2männig.

24. *CYPRIPÉDIUM* (L.) Frauenschuh. — P. abstehend. Honiglippe bauchig, aufgeblasen. Befruchtungssäule an der Spitze 3 sp., die seitenst. Lappen die Stbk. tragend, der mittlere unfruchtb. Fruchtkn. nicht zsgedreht. N. v. E. gen. 5. 17.

1. *C. CALCEOLUS* (L.) Gemeiner F. — Der St. beblättert; Lappen der einwärts gekrümmten Befruchtungssäule herabgebogen, eyf., stumpf; Honiglippe etwas zsgedrückt, kürzer, als die PZpfl. 2. An waldigen, schattigen O., (stw. dch d. südl. und mittlere Geb. bis zum Harze, auch noch bei Stettin.) Mai. Jun. St. h. S. P. purpurn-braun; Honiglippe gelb.

CXXIII. Ordng. IRIDEEN. Juss. gen. p. 57.

P. oberst., blumenartig, 6 th. Stbg. 3, an der Basis der äussern PAbschnitte eingefügt. Stbk. auswärts aufspringend. Fruchtkn.

3fächerig, vieleiyig; Eychen 2reihig; Samenträger mittelpunktst. N. 3, einfach, od. geschlitzt od. blumenblättrig. Kapsel 3klappig; Klappen scheidewandtragend. Keim innerhalb des Eyweisses. Kräuter mit knolligen, seltner zwiebeligen W.

1. CROCUS (L.) Safran. — P. blumenartig, regelmässig, trichterf.; Röhre sehr lang; Saum 6th. glockig. N. 3sp. od. 3th.; Zpfl aufwärts breiter, zsgerollt, gezähnel od. eingeschnitten. N. v. E. gen. 5. 21.

1. C. BIFLORUS (Mill. dict. n. 4.) Zweiblüthiger S. — Bth.-Scheide 2 blättrig; Schlund des P. kahl; N. tief-3 sp., kürzer, als das P., die Zipfel trompetenf. an der Spitze gezähnel; *die Wurzelschalen papierartig, glutt, sich in breite, an dem obern Ende gespaltene Zpfl trennend.* 4. Auf grasigen Waldplätzen, (um das Dorf Comen, zwei und eine halbe Stunde ungefähr von Triest entfernt, Tommasini.) März. Die Bth weiss od. schwach violett-überlaufen, od. die 3 äusseren Zpfl mit dunkel-violetten Längsstreifen bemalt; Schlund gelb. An den Wurzelschalen ist diese Art leicht kenntlich. D.

2. C. VERNUS (All.) Frühlings-S. — Bl.Scheide 1 blättrig; Schaft eng-bescheidet; Schlund des P. bärtig; N. 3sp., *ohngefähr um die Hälfte kürzer, als der PSaum*, die Zpfl aufrecht, aufwärts kammf-verbreitet, gezähnel; die Fasern der Wurzelschalen *haarfein, ineinandermündend, die Maschen länglich, schmal.* 4. Auf den A. und VorA., in die niedlern Gebirge und Ebenen herabsteigend, (dch d. g. AK. bis Oestreich und bis an das Adriat. Meer; auch im Würtemb. bei Zavelstein.) März Apr., auf den A. später. St. h. 22. J. a. app. 36. — C. sativus β vernus L. C. sativus Scop. — Bth. satt; od. hellviolett, gleichfarbig, od. weiss und violett-streifig, od. ganz weiss. Schlund weiss od. violett, nie gelb, Bert. fl. it. Var. ausserdem mit $1\frac{1}{2}$ Zoll langem Bth. Saume und N., welche viel länger als die Stbgf. sind: C. vernus grandiflorus Gay.; mit nur 1 Zoll langem Saume: C. vernus parviflorus Gay. und mit weisser Bth: C. albiflorus Hoppe und Hornsch. St. h. 22. — Die Variet. β . von C. vernus bei St. h. 27. stellt den spezifisch verschiedenen, im Gebiete unserer Fl. noch nicht aufgefundenen C. luteus Lam. dar.

3. C. VARIEGATUS (Hopp. und Hornsch.) Bunter S. — Bl Scheide 2blättrig; Schlund des P. kahl; N. 3sp., *ohngefähr um die Hälfte kürzer, als der PSaum*, die Zpfl aufrecht, aufwärts breiter, gezähnel und eingeschnitten; *Fasern der Wurzelschalen stark, netzig, ineinandermündend, die Maschen eyf. od. rundlich.* 4. An grasreichen, rauhen O. um Triest. Febr. März. St. h. 51. C. reticulatus β . M. Bieberst. taur. cauc. Bth. hellblau, die 3 äussern Zpfl auswendig mit 3 violetten, fransig-gestrichelten Binden bemalt; Schlund gelblich. D.

4. C. SATIVUS (All.) Aechter S. — Bl.Scheide 2blättrig; Schlund des P. bärtig; N. 3th., *so lang, als der PSaum*, die Zpfl verlängert, oberwärts ein wenig verdickt, an der Spitze gezähnt, ab-

stehend, *seitlich hervortretend*; Fasern der Wurzelschalen haarfein, dicht aneinandergestellt, Maschen schmal. 4. Wird in Oestreich, Südtirol und im wärmern Wallis kultiv. Sept. Oct. Hayn. arzn. 6. 25. Bth. violett, Schlund ebenfalls violett. Kultiv.

2. TRICHONÉMA (Ker.) Fadennarbe. — P. blumenartig, regelmässig; Röhre kurz; Saum 6th., abstehend. N. 3, 2th.; Zpfl sehr schmal, zurückgekrümmt. S. rundlich. N. v. E. gen. 5. 20.

1. T. BULBOCODIUM (Ker.) Europäische F. — B. pfriemlich, zsgedrückt, gefurcht, gerade, später gewunden und zurückgekrümmt; die innere Bl. Scheide breit, häutig-berandet; Stbg. kürzer, als der Stempel. 4. An grasreichen O., (bei Fiume und in Istrien.) Febr. März. *Ixia Bulbocodium* L. J. ic. rar. 271. Bth. inwendig v. der Basis bis zur Mitte satt-gelb, an dem übrigen Theile violett od. weisslich. J.

3. GLADIOLUS (L.) Siegwurz. — P. blumenartig, 6th., unregelmässig, fast 2lippig. N. 3, aufwärts verbreitert. Stbg. aufstrebend. S. etwas geflügelt. N. v. E. gen. 5. 19.

1. G. PALUSTRIS (Gand. Fl. helv. 1 S. 97.) Sumpf-S. — *Die Fasern der Wurzelschalen stark, netzig, mit runden und eyf. Maschen*; die oberen seitlichen Zpfl des P. rauten-eyf.; die Stbk. kürzer, als der Träger, die Oehrchen an der Basis der Stbk. stumpf und parallel; die Zpfl d. Narbe aufwärts allmählig verbreitert und fast von ihrer Basis an mit Papillen bewimpert, die Kapsel längl-verkehrteyf., gleichmässig 6furchig, an d. Spitze abgerundet, nicht eingedrückt. 4. Auf feuchten und sumpfigen Wiesen, (Gegend von Berlin, Schles., Böhm., Oestr., Krain, Gebirge zw. Istrien und Innerkrain, südl. Tyrol, Salzb., Fuss d. bayerischen A., Elsass, Rheinpfalz.) Mai. Jun. St. h. 83. G. Boucheanus Schlechtend. in d. Linnäa. G. communis Wimm. Schles. fl. G. pratensis Alb. Dietrich fl. boruss. t. 13., nach D. Dietrich Synops. G. tenuis M. Bieberst. taur. cauc., nach Bueck. — Bth. purpurn, mit einem weisslichen, dunkel-purpurn berandeten lanzett. Flecken auf den 3 untern PZpfln, so wie bei allen Arten unserer Flora. Unterscheidet sich leicht dch die rundlichen und eyf. Maschen des starken Netzes der Wurzelschalen und die Gestalt der Kapsel. Samen wie bei folgender Art.

2. G. COMMUNIS (L.) Gemeine S. — *Fasern der Wurzelschalen ziemlich stark, gleichlaufend*, oberwärts ineinermündend, Maschen lineal., schmal; die oberen seith. Zpfl des P. rautenf.-eyf.; die Stbk. kürzer, als der Träger, die Oehrchen an der Basis der Stbk. stumpf und parallel; *die Zpfl d. Narbe aufwärts allmählig verbreitert und fast von ihrer Basis an mit Papillen bewimpert*; die Kapsel verkehrteyf., 3kantig, an der Spitze eingedrückt, *die Kanten nach oben in einen Kiel hervortretend*. 4. Auf Wiesen, (bisher blos bei Frankfurt a. d. O. und bei Stettin;) wird überall in Gärten kultivirt. Mai. Jun. St. h. 56. und 83. Farbe d. Bth. wie bei d. Vorigen, nur spielen die Nägel der Zpfl und die

Röhre des P. ins Rothbraune; bei *G. palustris* sind die Nägel schön purpurroth und die Röhre spielt kaum etwas ins Rothbraune. S. breit-geflügelt. D.

3. *G. ILLYRICUS* (Koch in St. h. 83. Abbildg. und Beschreibung.) Illyrische S. — *Die Fasern der Wurzelschalen fein, parallel, sehr gedrunken*, oberwärts ineinandermündend mit häufigen, sehr schmalen Maschen; die oberen seith. Zpfl des Perigons rautenf.-eyf., od. rautenf.-längl.; die Stbk. kürzer, als der Träger; die Oehrchen an der Basis der Stbk. zugespitzt, zuletzt spreizend; *Zpfl d. Narbe von der Basis bis zur Mitte lineal., am Rande kahl, über der Mitte plötzl. in eine rundl.-eyf. Platte erweitert*, und am Rande mit Papillen bewimpert; die Kapsel verkehrteyf., 3 kantig, an der Spitze eingedrückt, die Kanten nach oben in einen Keil hervortretend. 4. Auf feuchten Wiesen der südlicheren Gegenden, (Krain, Triest, Fiume.) Mai. St. h. 83. Macht sich kenntlich dch die zuletzt spreitzenden Oehrchen der Stbk., dch die N., (die aber an der lebenden vollständig entwickelten Pfl. untersucht werden müssen.) sowie dch die 3 kantigen, an den Kanten schmalheflügelt S. B. meistens sehr spitz. D.

4. *G. IMBRICATUS* (L. spec. 52.) Dachige S. — *Die Fasern der Wurzelschalen fein, parallel, sehr gedrunken*, oberwärts ineinandermündend mit sehr schmalen Maschen; die oberen seith. Zpfl des P. rautenf.-eyf.; die Stbk. kürzer, als der Träger, die Oehrchen an der Basis der Stbk. parallel; *die Zpfl der N. aufwärts allmählig verbreitert, fast von der Basis an mit Papillen bewimpert*; die Kapsel verkehrteyf., 3 kantig, an d. Spitze eingedrückt, *die Kanten überall abgerundet*. 4. Auf feuchten, torfigen Wiesen, (Wobschna in Böhm., Grafschaft Glatz, Frankfurt a. d. O., Steiger im Thüringer Wald, häufig in Haferfeldern bei Reihwiesen im Mährisch-Schlesischen Gebirge, Schauer; in Ostpreussen, Duisburg.) Jun. St. h. 56. und 83. *G. rossicus* Pers. Synops. *G. neglectus* Schult. obs. *G. galiciensis* Bess. S. mit einem breiten Flügel umgeben. Kenntlich dch die kleinern sehr genäherten Bth., die beim Trocknen bläulich werden, sowie dadch, dass das unterste B. stumpf ist und dch die spätere Blüthezeit. D.

5. *G. SEGETUM* (Gawler bot. mag. 719.) Feld-S — *Die Fasern der Wurzelschalen parallel, ziemlich stark, oberwärts netzig ineinandermündend mit längl. und ovalen Maschen*; die oberen seith. Zpfl des P. lineal.-keilig, von dem obersten entfernt; *die Träger kürzer, als der Stbk.*; Kapsel kugelig, 3 furchig, an der Spitze eingedrückt, die 3 Höcker abgerundet, nicht in einen Kiel zsgedrückt. 4. Auf Aeckern, (Stramare, zwischen Zaule und Muchia bei Triest, in Istrien und bei Fiume.) Mai. Jun. St. h. 83. *G. communis* Sibth. und Sm. fl. graec. prodr., Fl. graec. t. 37 Bertol. fl. ital. *G. Ludovicae* Jan. elench. *G. italicus* Gaud. helv. D.

4. IRIS (L.) Schwertlilie. — P. blumenkronenartig, an der Basis röhrig; Saum 6 th.; Zpfl abwechselnd zurückgebogen und aufrecht oder letztere zsneigend. N. 3 th., blumenblattig. N. v. E. gen. 5. 18.

1. Rotte. GEBÄRTETE. Die äussern PZpfl an der Basis inwendig mit einem Streifen dicht-gestellter Haare besetzt.

1. I. PALLIDA (Lam.) Blasse S. — Bärtig; B. schwertf., St. mehrbth., länger, als die B.; *Bl.Scheiden schon vor der Bthezeit durchaus trockenhäutig*; d. inneren Zpfl des P. so lang, als die äusseren, rundl.-eyf., plötzlich in den Nagel zsgezogen; die Stbgf. bis zur Hälfte der Zpfl d. N. hinaufreichend; Stbk. kürzer als d. Träger, nach dem Verblühen von der Mitte an hakenf.-zurückgebogen; Zpfl der N. längl., in der Mitte ein wenig breiter, die Lappen eyf., gerade vorgestreckt. 4. An steinigen O. Istriens. Mai. Jun. St. h. 87. Bth. blass violett, die Zpfl an d. Basis braungeadert. Durch die schon während der Bthezeit durchaus häufigen DeckB. und dch wohlriechende Bth. ausgezeichnet. J.

2. I. GERMANICA (L. spec. 55.) Deutsche S. — Bärtig; die B. schwertf.; der St. mehrblüthig, länger, als die B.; *Bthscheiden während der Bthezeit von der Basis bis zur Mitte krautig*; die inneren Zpfl des P. so lang als die äusseren, breit-verkehrteyf., plötzl. in den Nagel zsgezogen; *Stbk. so lang, als der Träger*; Zpfl der N. längl., an der Spitze breiter, *die Lappen eyf., spreitzend*. 4. An Felsen und bergigen, steinigen O., (im südl. Tyrol, der südl. Schw. und überhaupt im südl. Gebiete, ausserdem wohl an den meisten angezeigten Orten verwildert.) April. Mai. früher als I. pallida, I. sambusina und I. squalens. St. h. 87. Bth. geruchlos, dunkelviolett, mit gelblichen, braunheaderten Nägeln. Die äusseren Zpfl des P. sind fast senkrecht herabgebogen; hiedch und dch den reicher blüthigen St., die grösseren, anders gefärbten, geruchlosen Bth., und dch die frühere Bthezeit, unterscheidet sie sich sogleich von den beiden folgenden. — Die Iris florentina (L. sp. 55., St. h. 87.) meines Wissens in der Schw. und in D. noch nicht gefunden, aber hie und da in Gärten gezogen, unterscheidet sich folgendermassen v. I. germanica: die B. breiter, die inneren zwar zpitzig, aber weder lang- noch schmal-zugespitzt; die Bth. weiss, oft ins Blassblaue spielend, die Nägel übrigens wie bei jener, gelblich und braungeadert, die inneren Zpfl des P. längl.-verkehrteyf., die Zpfl der N. in der Mitte ein wenig breiter, mit hervorgestreckten, aber nicht ausgespreizten Lappen. Der Geruch der Bth. ist angenehm, aber schwächer, als bei I. pallida.

3. I. SAMBUCINA (L. spec. 55.) Holderduftige S. — Bärtig; die B. schwertf.; St. mehrblüthig, länger als die B.; *die Bthscheiden während der Bthezeit von der Basis bis zur Mitte krautig*; äussere Zpfl des P. verkehrteyf., die inneren so lang als die äusseren, oval, mit einer spitzen Kerbe deutlich ausgerandet, plötzlich in den Nagel zsgezogen; *Träger $1\frac{1}{2}$ mal so lang als das Stbk.*; die Zpfl der N. länglich, in der Mitte ein wenig breiter, *die Lappen eyf., mit ihrem inneren Rande zsschliessend*. 4. An steinigen O. und den Abhängen steiniger Gebirge, (im Würtenbergischen an vielen O., bei Monheim an der Donau, Ehrenbreitenstein am Rheine.) Juni, später als Iris squalens. St. h. 87. Jacq. h. vind. 1. t. 2. Bth. unangenehm riechend, fast so wie die innere Rinde von Sambucus nigra, kleiner als an I. germanica:

die äusseren Zpfl des P. abstehend und viel weniger zurückgebogen, als bei der vorhergehenden Art, violett, am Rande und hinten weiss mit dunkleren Adern verziert, Nagel gelblich, mit braunen Adern; die inneren blass bläulich-grau, am Rande und am Nagel gelb; Zpfl der N. gelb. Der St. 6—8blüthig, während der Bthezeit noch einmal so lang, als die B. D.

4. I. SQUALENS (L. sp. 1. 56.) Schmutzige S. — Bärtig; die B. schwertf.; der St. mehrblüthig, länger als die B.; *die Bth. Scheiden während der Bthezeit von der Basis bis zur Mitte krautig*; die äusseren Zpfl des P. verkehrteyf., die inneren so lang, als die äusseren, oval, an der Spitze ganz, oder leicht-ausgerandet, plötzlich in den Nagel zsggezogen; *Träger $1\frac{1}{2}$ mal so lang als das Stbk.*; Zpfl d. N. längl., in der Mitte ein wenig breiter, *die Lappen eyf., vorgestreckt, auseinander tretend.* 4. An steinig. O. und Bergabhängen. (um Heidelberg, am Schlossberge bei Oppenheim.) Juni, später als I. germanica, und früher als I. sambucina. Letztere ist ihr sehr ähnlich, aber die angegebenen Merkmale und die Bthezeit verschieden. Die Bth. verbreiten einen Honig-Geruch; die Platte der äusseren Zpfl des P. ist blasser violett, die inneren Zpfl sind blass schmutzig-gelb. D.

5. I. BOHEMICA (F. W. Schmidt boh. cent. 4. S. 5. und 6.) Böhmisches S. — Bärtig; die B. schwertf., *während der Bthezeit so lang, als der St.*, nach dem Verblühen noch einmal so lang; *St. mehrblüthig*; der untere Bthstiel unter der Mitte oder an der Basis des St. entspringend; *die Bth. Scheiden durchaus dünn-krautig, eyf.-längl., aufgedunsen, am Rücken gekrümmt, während der Bthezeit grün, später an der Spitze trockenhäutig*; die inneren Zpfl des P. so lang als die äusseren, eyf., plötzlich in den Nagel zsggezogen; *Fruchtkn. fast stielrund, gleichmässig 6furchig.* 4. An sonnigen O., (an sonnigen Rändern und Blössen kleiner Gehölze, im Mittelholze und Lindholze bei Halle, v. Schlechtend.; an den Gebirgen der Moldau bei Kuchelbad, Sct. Procop und Troja in Böhmen, Pohl; am Abhange des Georgenberges bei Striegau in Schlesien, Schauer.) Mai. I. nudicaulis Schauer Flora 1843. S. 506., vielleicht auch Lamarck?, was aber ohne Ansicht eines authentischen lebenden Expl. kaum zu ermitteln ist. I. bohemica Fieber in St. h. 56. Bth. violett. Die Bth. Scheiden mit Ausnahme des oft gefärbten schmalen häutigen Randes, durchaus grün. „Fruchtkn. rundlich mit 6 Furchen versehen.“ Schmidt. D.

6. I. FIEBERI (Seidl. in d. oek. techn. Fl. Böhm. 1. S. 48.) Fieber's S. — Bärtig; die B. schwertf., *während der Bthezeit so lang, als der St.*, nach dem Verblühen noch einmal so lang; *St. mehrblüthig*; der untere Bthstiel unter der Mitte oder an der Basis des St. entspringend; *die Bth. Scheiden dünn-krautig, aufgeblasen, lanzettl., zugespitzt, an der Spitze trockenhäutig*; die inneren Zpfl des P. so lang als die äusseren, oval, plötzlich in den Nagel zsggezogen; *der Fruchtkn. stumpf 3seitig, an den Seiten tief-furchig.* 4. Auf sonnigen Waldwiesen und auf Felsen, (bei Kottwitz in Schlesien, Schauer; auf dem Berge Geltsch im Leitmeritzer Kreise in Böhmen, Seidl.) Mai. I. Fieberi Fieber in St.

h. 56. I. biflora Schauer Flora 1843. S. 510., vielleicht Lin.? welche in Portugal zu Hause. I. nudicaulis Wimm. und Grab. Fl. v. Schles. Bth. wie bei der vorigen. Die Bthscheiden zwar aufgeblasen, aber nicht höckerig-bauchig, grün mit blass-violetter Färbung gegen den Rand hin. D.

7. I. HUNGARICA (Waldst. und Kit. pl. rar. hung. B. 3. S. 251. t. 226.) Ungarische S. — Bärtig; die B. schwertf., während der Bthezeit so lang, als der St., nach dem Verblühen noch einmal so lang; St. mehrblütig; der untere Bthstiel unter der Mitte, oder an der Basis des St. entspringend; die dünn-krautigen Bthscheiden eyf., höckerig-aufgeblasen, fast ganz gefärbt, an der Spitze trockenhäutig; die inneren Zpfl des P. so lang, als die äusseren, oval, plötzlich in den Nagel zugezogen; der Fruchtkn. stumpf-3seitig, an den Seiten tief-gefurcht. 4. In Berggegenden, (am Millerschan in Böhmen, Fieber.) Mai. St. h. 56. I. hisflorens Host. fl. austr. Die Bthscheiden kurz, sehr höckerig, fast ganz violettgefärbt; Bth. wie bei der vorigen. — Die unter den Ziffern 5, 6 und 7 hier aufgeführten Irisarten sind noch genauer dch fortgesetzte Beobachtungen abzugrenzen und zu bestätigen. D.

8. I. VARIEGATA (L.) Bunte S. — Bärtig; B. schwertf., sichelf., fast so lang, als der mehrbth. St.; Bl.Scheiden krautig; PZpfl länglich-verkehrteyf., die innern nach der Basis allmählig verschmälert. 4. Auf kräuterreichen Hügeln und an waldigen O. in Oestreich. Mai. Juni. J. a. t. 5. St. h. 40. Bth. sehr schön, gelb, die äussern Zpfl mit braun- oder schwarz-purpurnen Adern zierlich bemalt. D.

9. I. PUMILA (L.) Niedrige S. — Bärtig; B. schwertf., länger, als der sehr kurze, 1bth. St.; Röhre über die Bl.Scheide hervortretend; PZpfl länglich-verkehrteyf. 4. Auf sonnigen Hügeln, (häufig in Oestreich, im übrigen Gebiete hin und wieder auf Mauern, wahrscheinlich ursprünglich angepflanzt.) Apr. Mai. J. a. t. 1. St. h. 40. Var. mit violetten, hellblauen und weissen Bth. D.

10. I. LUTESCENS (Lam.) Gelbliche S. — Bärtig; B. schwertf., ziemlich gerade, kürzer, als der meist 1bth. St.; Röhre von den Bl.Scheiden eingeschlossen; PZpfl länglich-verkehrteyf. 4. An Kalkfelsen, (am Schlosse Tourbillon bei Sitten in der Schweiz.) Mai. „Bth. gelblich-weiss, die äussern Zpfl schwach-violett-aderig, die innern fast gleichfarbig und nur nahe an der Basis mit purpurnen Adern bezeichnet.“ Gaud. Der St. 6-8 Zoll lang. S.

II. Rotte. BARTLOSE. Die äussern PZpfl bartlos.

II. I. PSEUD-ACORUS (L.) Wasser-S. — Bartlos; B. schwertf., lanzettl.-lineal., ohngefähr so lang, als der stielrunde, mehrbth. St.; die äussern PZpfl eyf., breit-benagelt, die innern lineal., schmaler und kürzer, als die Zpfl der N. 4. In Gräben und stehenden Wassern. Juni. Juli. Fl. d. t. 494. — Bth. gelb, die äussern Zpfl anstatt des Bartes einen dunkelgelben, mit schwarzen oder schwarz-purpurnen sehr feinen Adern schön bemalten Flecken tragend.

12. *I. SIBIRICA* (L.) Sibirische S. — *Bartlos*; B. schwertf., lineal., kürzer, als der stielrunde, röhrige, meist 2bth. St.; *die äussern PZpfl verkehrteyf., in einen kurzen Nagel verschmälert*; Fruchtkn. 3seitig; Kapsel kurz-bespitzt. 4. Auf Wiesen, (in der nördl. Schweiz und dch d. g. Geh. zerstreut, doch nicht überall.) Juni. J. *pratensis* Lam. St. h. 40. Die äussern PZpfl hellblau, von violetten Adern netzig; Nagel bräunlichgelb; die innern violett, mit dunkleren Adern.

13. *I. SPURIA* (L.) Bastard-S. — *Bartlos*; B. schwertf., lanzettl.-lineal., kürzer, als der armbth., *stielrunde, dichte St.*; *die äussern PZpfl rundlich, kürzer, als der lanzettl. Nagel*; Fruchtkn. 6seitig; Kapsel lang-geschnäbelt. 4. Auf nassen Wiesen, (in Oestreich, und erst wieder auf der Rheinfläche in der Gegend von Mainz zwischen Bauschheim und Astheim.) Juni. J. a. t. 4. St. h. 40. J. *spatulata* Lam. Platte der äussern Zpfl weiss-gelblich, mit blauen Adern schön-bemalt; Nägel beiderseits schief-gestreift; die innern Zpfl violett, gleichfarbig. D.

14. *I. GRAMINEA* (L.) Grasblättrige S. — *Bartlos*; B. schwertf., lineal., viel länger, als der 2schneidige, meist 2bth. St.; *Platte der äussern PZpfl anhängself., eyf., viel kürzer, als der verbreiterte Nagel*; Fruchtkn. 6seitig. 4. Auf Wiesen und kräuterreichen Hügeln, (in Schles. im Teschenschen, Böhmen, Oestreich, Steyer., Krain, Littorale, Berg Camiol in Vestino, Farchini; Bayern bei Hohenschwangau, Oberschwaben, Württemberg, am Prassberg bei Wangen: auf dem Ballon der Vogesen.) Mai. Juni. J. a. t. 2. St. h. 40. Der Nagel der äussern PZpfl sehr verbreitert, purpurn, in der Mitte mit einer gelben Linie bezeichnet; Platte weisslich, mit violetten Adern bemalt; die innern Zpfl sattviolett. D.

Iris foetidissima wächst nicht im Gebiete unserer Flora.

CXXIV. Ordng. AMARYLLIDEEN. R. Brown. prodr. 296. *Narcissi* Juss. gen. 54., mit Ausschl. von Gattungen.

Stbg. 6. Stbk. einwärtsgewendet. Sonst Alles, wie bei den Irideen.

1. *STERNBERGIA* (W. und Kit.) Sternbergie. — P. oberst. trichterf; Röhre aufrecht, allmählig erweitert; Saum regelmässig, 6th. Stbg. ganz oben in der Röhre eingefügt, aufrecht, 3 kürzer. Gf. 3seitig; N. 3lappig. Kapsel beerenartig, nicht aufspringend.

1. *S. LUTEA* (Ker. R. und S.) Gelbe S. — B. lineal.; Bth. aufrecht; Schaft 2schneidig; PZpfl oval-länglich, stumpf. 4. An grasreichen O., (bei Rovigno in Istrien, Insel Lossino.) Herbst. *Amaryllis lutea* L. Clus. hist. 164. J.

2. *AGÁVE* (L. gen. n. 431.) Agave. — P. oberst. trichterf., Saum regelmässig, 6th. Stbg. der Röhre des P. angeheftet, so wie der

Gf. fädlich, vor dem Aufblühen einwärtsgebogen, während des Blühens hervortretend. Kapsel 3lappig. N. v. E. gen. 10. 6.

1. A. AMERICANA (L. spec. 461.) Amerikanische A. — B. gezähnt-dornig; St. ästig; Röhre des P. in der Mitte verengert; Stbgf. länger, als das P., kürzer, als der Gf. 4., aber einfrüchtig. In felsigen Gegenden, (auf der Südspitze der Insel Cherso, Noë.) Juni. Bth. grün-gelb. J.

3. NARCISSUS (L.) Narzisse. — P. tellerf.; Saum regelmässig, 6th. Nebenkrone, (der Kranz) glockig, auf dem Schlunde des P. eingefügt. Stbg. in der Röhre eingefügt, wechselst. kürzer.

1. N. POËTICUS (L.) Echte N. — B. lineal., stumpf, ziemlich flach, stumpf-gekielt; Schaft zsgedrückt, 2schneidig, gefurcht, 1bth.; *Fruchtkn. während des Blühens zsgedrückt-2schneidig; Nebenkrone sehr kurz in ein flaches Schüsselchen ausgebreitet, mit einem feingekerbten, scharlachrothen Rande umgeben*; 3 Stbgf. etwas länger, als der Gf., 3 kürzer in dem Schlunde eingeschlossen; PZpfl eyf. 4. Auf Wiesen und an grasreichen O. der wärmern Gegenden, (im Oestr., im Littorale und im Wallis und Waadtlande; Im übrigen Geh. hin und wieder in Grasgärten verwildert.) Apr. Mai. Schk. t. 90. Saum weiss; Nebenkrone gelb, am Rande zinnoberroth. B. bläulichgrün. Der Fruchtkn. zwar grün, aber nicht dunkler, als der St.; die Röhre deutlich zsgedrückt, mit 4-5 Furchen dchzogen.

2. N. RADIFLORUS (Salisb. prodr. 225.) Strahlblüthige N. — B. lineal., stumpf, etwas flach, stumpf-gekielt; St. zsgedrückt, 2schneidig, gefurcht, 1blüthig; *Fruchtkn. während des Blühens stielrund; die Nebenkrone ganz kurz, becherf., aufrecht, mit einem gekerbten scharlach-rothen Rande umgeben*; sämmtliche Stbgf. mit d. Stbk. länger, als die Röhre. 4. Auf Bergen und den VorA., (Monte Spaccato im östr. Littorale, Steyerm., im Waadtlande und Wallis.) Apr. Mai. Die Zwiebel länglicher, als bei der vorigen, die ganze Pfl. kleiner, B. und St. schmäler, Fruchtkn. schlanker, längl., stielrund, dunkel-grün; die Röhre schlank; die Zpfl des P. schmaler, mehr von einander entfernt, zwar weiss, aber ein wenig schmutzig-weiss und nicht schneeweiss; die Nebenkrone wie bei der vorigen kurz, aber von der Basis an aufrecht, nicht ausgebreitet, ebenfalls gelb, mit scharlachrothem Rande.

3. N. BIFLORUS (Curt. mag. t. 197.) Zweiblumige N. — B. lineal., stumpf, ziemlich flach, stumpf-gekielt; Schaft zsgedrückt, 2schneidig, gerillt, 2bth.; *Nebenkrone sehr kurz, schüsself., mit einem feingekerbten, farbenlosen Rande*; PZpfl eyf. 4. Auf Wiesen der südl. Schw., (im Wallis und in der Gegend des Genfersee's.) Apr. Mai. Saum schmutzig-weiss; Nebenkrone gelb, mit weisslichem Rande; B. mehr grasgrün, als bei der vorhergeh., aber unterseits auf gleiche Weise mit einem stumpfen, gefurchten Kiele durchzogen. S.

4. N. TAZETTA (L.) Tazetten-N. — B. lineal., stumpf, ziemlich flach; Schaft zsgedrückt, 2schneidig, glatt, 3-10 bth.; *Neben-*

krone becherf., ganzrandig, 3 mal kürzer, als die lanzettl.-eyf., spitzen PZpfl. 4. An steinig. O. am Adriat. Meer, (auf der Insel Osero und St. Andrea bei Rovigno.) März. J.

5. *N. PSEUDO-NARCISSUS* (L.) Gelbe N. — B. lineal., etwas rinnig, kiellos, in der Mitte 2rillig; Schaft zsgedrückt, 2schneidig, 1bth.; *Nebenkrone glockig*, am Rande wellig und ungleichgekerbt, *so lang, als die PZpfl. 4.* Auf Bergwiesen, (stw. im Geb.) März. Apr. Bth. gelb, Nebenkrone goldgelb oder fast gleichfarbig.

4. *LEUCOJUM* (L.) Knotenblume. — P. 6th., glockig; Zpfl gleich, an der Spitze verdickt. Stbl. gleich.

1. *L. VERNUM* (L.) Frühlings-K. — *Bl.Scheide 1bth.*; Gf. keulig. 4. In Hainen und auf feuchten Wiesen, (stw. dch d. Geb.) Febr. März. St. h. 11. Bth. weiss; PZpfl mit einer grünen Spitze bezeichnet.

2. *L. AESTIVUM* (L.) Sommer-K. — *Bl.Scheide vielbth.*; Gf. fädlich-keulig. 4. Auf feuchten Wiesen, (Steyerm., Krain, Oestr., Böhm., Erzgeb., Westphal., Hamburg, Lübeck, an manchen O. häufig.) Mai. J. a. t. 203. St. h. 88. Bth. wie der vorhergehenden Art. D.

5. *GALANTHIUS* (L.) Schneeglöckchen. — P. 6th., die 3 äussern Zpfl abstehend; die 3 innern aufrecht, kürzer, ausgerandet.

1. *G. NIVALIS* (L.) Gemeines S. — 4. In Hainen und auf feuchten Wiesen, (zerstreut dch d. Geb.) Febr. März. St. h. 2. Bth. reinweiss, die innern PZpfl auswendig vor der Spitze mit einem halbmondf. gelb-grünen Flecken und inwendig mit 8 gelb-grünen Linien bemalt.

CXXV. Ordng. ASPARAGEEN. Juss. gen. p. 40.

P. unterst., blumenartig, 6sp. oder 6blättrig, oder 4-8th. Stbg. so viel, als PZpfl, dem Fruchtb. oder P. eingefügt. Stbk. einwärtsgewendet. *Fruchtkn. frei*, 3fächerig; Fächer 1-mehreyig; Eychen in den mittelpunktst. Winkeln angeheftet. Gf. 1-3. *Frucht saftig, nicht aufspringend*, 3fächerig, manchmal dch Fehlschlagen 1fächerig, 1samig. Bth. bei einigen Gattungen 1geschlechtig.

1. *ASPÁRAGUS* (L.) Spargel. — Bth. dch Fehlschlagen 2häusig. P. glockig, 6th., an der Basis oft in ein blüthenstielf. Röhrchen zsgezogen. Stbg. 6. Fruchtkn. 3fächerig; Fächer 2eyig. *Gf. 1; N. 3, zurückgebogen.* — Die auf Schuppen zurückgeführten B. der Aeste tragen in ihrem Winkel ein Büschel fädlicher B., welche aus zsgezogenen, nicht verlängerten Aestchen gebildet sind. N. v. E. gen. 2. 14.

1. *A. OFFICINALIS* (L., mit Ausschl. der var. α . und β .) Gebräuchlicher S. — Der St. krautig, stielrund, aufrecht; B. büschellg,

borstlich, stielrund und *nebst den Zweigen ganz kahl und glatt; Röhrchen des P. halb so lang, als der Saum; Stbf. der männl. Bth. von der Länge des länglichen Stbk. 4. Auf fruchtb. Wiesen, (stw. dch d. Geb.) Juni. Juli. Schk. t. 96. Bth. grünlich-weiss, wie bei den folgenden.*

2. *A. SCABER* (Brign.) Rauher S. — Der St. krautig, stielrund, aufrecht; *Riefen der fein-kantig-gerieften Zweige und die Kanten der büscheligen, borstlichen B. gezähnt-rauh; Röhrchen des P. halb so lang, als der Saum; Stbf. der männl. Bth. von der Länge des länglichen Stbk. 4. An grasreichen O., (im Littorale bei Triest, bei Fiume und auf den Inseln.) Mai. Juni. A. amarus DC. A. officinalis a. L. A. marinus Rb. D.*

3. *A. TENUFOLIUS* (Lam.) Dünnblättriger S. — Der St. krautig, stielrund, aufrecht; *B. büschelig, haardünn und nebst den Zweigen ganz kahl; Röhrchen des P. sehr kurz, vielmal kürzer, als der Saum; Stbf. der männl. Bth. viel länger, als das rundliche Stbk. 4. In Wäldern und auf Bergwiesen der wärmern Gegenden, (Istrien, Littorale, Krain, Cilli in Steyerm.) Mai. Juni. A. sylvaticus W. und Kit. t. 201. A. officinalis β. L. D.*

4. *A. ACUTIFOLIUS* (L.) Spitzblättriger S. — Der St. strauchig, wehrlos, kantig; *Zweige flaumig; B. lineal., ziemlich stielrund, steif, stachelspitzig, immergrün; Röhrchen des P. so lang, als der Saum. 4. In Hecken und an gebirgigen kräuterreichen O., unter Gesträuch, (Littorale, Triest, Fiume.) Aug. Sept. A. Cor-ruda Scop. D.*

2. *STREPTOPUS* (Michaux.) Knotenfuss. — *P. bis auf die Basis 6th. Fruchtkn. 3fächerig; Fächer vieleigig; Gf. 1; N. stumpf. Beere. N. v. E. gen. 2. 18.*

1. *S. AMPLEXIFOLIUS* (DC.) Stengelumfassender K. — *B. stengelumfassend und nebst dem St. kahl. 4. In Wäldern der A. und VorA., (dch d. g. AK. bis Oestreich; in Böhmen, Schlesien, Erzgebirge, Vogesen.) Juli. Aug. S. distortus Mich. Uvularia amplexifolia L. St. h. 41. Bth. weisslich. Beeren roth.*

3. *PÄRIS* (L.) Einbeere. — *P. wagerecht-abstehend, bis auf die Basis 8th., die 4 äussern Zpfl einen K., die 4 schmälern innern eine Blkr. darstellend. Stbg. 8; Stbk. auf der Mitte der Stbf. aufgewachsen. G. 4; N. einfach. Beeren 4fächerig, Fächer 4-8samig. N. v. E. gen. 2. 19.*

1. *P. QUADRIFOLIA* (L.) Vierblättrige E. — *B. zu 4; die äussern PZpfl lanzettl., die innern an Breite und Länge übertreffend. 4. In schattigen Hainen. Mai. St. h. 12. Bth. grün; Fruchtkn. und N. schwarz-purpurn. Kommt vor mit 3-5th. B. und Blüten-theilen.*

4. *CONVALLARIA* (L., mit Ausschl. von Arten.) Maiblümchen. — *P. glockig oder röhrig, 6sp. oder 6zählig. Fruchtkn.*

3 fächerig, Fächer 2 eyig. N. stumpf, 3 seitig. Beere 3 fächerig, Fächer 1 samig.

I. Rotte. *Polygonatum* Tournef. P. walzlich-röhrig. Bth. weiss, an der Spitze grün. N. v. E. gen. 2. 16.

1. *C. VERTICILLATA* (L.) Quirliges M. — Der St. aufrecht, kantig; *B. quirlig*. 4. In Bergwäldern, (zerstreut dch d. Geb.) Mai. Juni. Fl. d. t. 86. Beeren roth.

2. *C. POLYGONATUM* (L.) Weisswurzliches M. — Der St. kantig; *B. stengelumfassend*, wechselst., eyf.-länglich oder elliptisch, ziemlich stumpf, kahl; Bthstiele blattwinkelst., 1-2 bth. und nebst den *Stbg. kahl*. 4. In steinigten Bergwäldern. Mai. Juni. Fl. d. t. 377. Stbf. von der Länge der Stbk., über der Mitte der Röhre eingefügt. Beeren violett, wie bei den 2 folgenden.

3. *C. LATIFOLIA* (J. a. t. 232.) Breitblättriges M. — Der St. kantig; *B. kurz-gestielt*, wechselst., eyf., zugespitzt, *unterseits auf den Nerven flaumig*; Bthstiele blattwinkelst., 1-4 bth., flaumig; *Stbg. kahl*. 4. In Bergwäldern. (Oestr., Steyerm.) Mai. Juni. Bth. so gross, wie die der *C. Polygonatum*. D.

X 4. *C. MULTIFLORA* (L.) Vielblumiges M. — Kahl; der St. stielrund; *B. stengelumfassend*, wechselst., eyf.-länglich oder elliptisch, ziemlich stumpf, kahl; Bthstiele blattwinkelst., 3-5 bth., kahl; *Stbf. behaart*. 4. In etwas feuchten Wäldern. Mai. Juni. Schk. t. 97. Bth. um die Hälfte schmaler, als bei *C. Polygonatum*, an der Basis etwas bauchig; *Stbg.* sehr kurz, auf dem obern Theile der Röhre eingefügt. Var.:

β. bracteata, die untern Bthstiele in ein Aestchen verlängert und an der Basis der Bth. mit einem oder 2 B. besetzt: *C. bracteata* Thomas. Gaud.

II. Rotte. *Coelocroton*. *Lilium convallium* Tournef. Bth. glockig. ganz weiss. N. v. E. gen. 2. 15.

5. *C. MAJALIS* (L.) Wohlriechendes M. — *Schaft* nackt, *halbstielrund*; *Bth. traubig, überhangend*. 4. In schattigen Wäldern. Mai. Juni. St. h. 14.

5. *MAIANTHEMUM* (Wiggers.) Schattenblume. — *P. 4th.*; Zpfl wagerecht-abstehend oder zurückgebogen. *Stbg. 4. Gf. 1.* N. stumpf. Beeren 2 fächerig, Fächer 1 samig. N. v. E. gen. 2. 17.

1. *M. BIFOLIUM* (DC) Zweiblättrige S. — Der St. 2 blättrig; *B. wechselst.*, gestielt, herzf. 4. In schattigen Wäldern. Mai. Juni. *M. Convallaria* Wigg. *Convallaria bifolia* L. St. h. 13. Fl. d. t. 291. *Sciaphila convallarioides* Wib. *Smilacina bifolia* Desf. Bth. weiss.

6. *SMILAX* (L.) Stechwinde. — Bth. 2 häusig. P. bis auf die Basis 6th. Männch. Stbf. frei. Weibch. Fruchtkn. 1-3-

fächerig, Fächer 1eyig. *Gf.* 3, kurz. *N.* stumpf. Beere dch Fehlschlagen 1-2samig. *N. v. E. gen.* 2. 12.

1. *S. ASPERA* (L.) Stachelblättrige *S.* — Der *St.* stachelig, kantig; *B.* fast spieß-herzf., eyf. oder lanzettl., 7-9nervig, stachelig-gezähnt, lederig. 4. Im Gebüsch an dem Ufer des Adriat. Meeres, Host; Duino, Kützing. Aug. Sept. *Schk.* t. 328. *Bth.* grünlich. *D.*

7. *RUSCUS* (L.) Mäusedorn. — *Bth.* 2häusig. *P.* bis auf die Basis 6th. Männch. *Stbf.* in ein eyf. Röhrchen verwachsen, auf dessen Spitze die 3 *Stbk.* liegen. Weibch. *Stbf.* gleichfalls in ein Röhrchen verwachsen, aber mit unfrucht. *Stbk.* *Gf.* 1. *N.* kopfig. Beere 3fächerig, Fächer 2samig. — Die stengel- und astst. *B.* dieser Gattung sind klein und schuppenf., wie bei *Asparagus*; die an den Zweigen aber sind nebst den Zweigen in ein eyf. oder längliches, lederig-krautiges *B.* verbreitert und mit dem Aestchen zsgewachsen. Das angewachsne Aestchen endigt bei unsern Arten auf der Mitte des *B.* und trägt daselbst oft ein Büschel v. *Bth.* und ausser den Deckblättern des Büschels auch noch ein anderes kleines *B.* — *N. v. E. gen.* 2. 13.

1. *R. ACULEATUS* (L.) Stechender *M.* — *B.* eyf., in eine sehr spitze Stachelspitze zugespitzt, oberseits blüthentragend; *Büschel* meist 2*bth.*, an der Basis mit einem kleinen, trockenhäutigen, haarspitzigen, 1nervigen *B.* gestützt. *h.* An unkult. *O.* unter Gerstrüch, in Wäldern, (Istrien, Littor., südl. Tyrol und südl. Schw.) März. Apr. *St.* h. 41. *Bth.* grünlich, wie bei dem folg.

2. *R. HYPOGLOSSUM* (L.) Zungen-*M.* — *B.* länglich-lanzettl., zugespitzt, ohne Stachelspitze, oberseits blüthentragend; *Büschel* vielblüthig, an der Basis mit einem kleinen, krautigen, lanzettl., spitzten, 3-5nervigen *B.* gestützt. *h.* An gebirgigen, waldigen *O.*, (Steyerm. im Teufelsgraben bei Cilli, Zechent., auf dem Wotschberg im Cillier Kreise, Maly; im wärmern Krain und im Littor.) März. Apr. *D.*

CXXVI. Ordng. DIOSCOREEN. Rob. Brown. prodr. fl. nov. holland. p. 294.

Fruchtkn. unterst. (*P.* an den Fruchtkn. gewachsen); sonst Alles, wie bei den Asparageen.

1. *TAMUS* (L.) Schmeerwurz. — *P.* glockig; Saum 6th. Männch. *Stbg.* 6. Weibch. *P.* oberständig (an den Fruchtkn. gewachsen); Saum 6th., bleibend. *Stbg.* 6, sehr kurz, fehlschlagend. Fruchtkn. 3fächerig, Fächer 2eyig. *Gf.* 3sp.; *N.* zurückgebogen. Beere. *N. v. E. gen.* 2. 20.

1. *T. COMMUNIS* (L.) Gemeine *S.* — *B.* herzf., zugespitzt, ungeth. 4. An Zäunen und in schattigen Gebüsch, an Bächen, (Littorale, Krain, Südtyrol, Schweiz, Oberbaden, Rheinwälder bei

Carlsruhe, Elsass bei Mühlhausen und Strassburg.) März. Apr.
Engl. bot. t. 91. Bth. grünlich.

CXXVII. Ordng. LILIACEEN. DC. theor. elem. ed. 1.
p. 240.

P. unterst., blumenartig, 6 sp. oder 6 blättrig. Stbg. 6, dem Fruchtb. oder P. eingefügt. Stbk. einwärts-gewendet. *Fruchtkn. frei, 3 fächerig, vieleiig; Eychen 2 reihig, in den mittelpunktst. Winkeln angeheftet.* Gf. 1. N. 3, oder 1 und 3 kantig. Frucht trocken, aufspringend; Klappen in der Mitte scheidewandtragend. Keim innerhalb des Eyweisses.

1. Gruppe. **TULIPEEN.** P. 6 blättrig. Kapselfächer viel-samig. S. flach, reihenweise dicht übereinander liegend. Samen-haut immer bleich oder braun, nicht krustig und schwarz.

1. **TULIPA (L.)** Tulpe. — P. 6 blättrig. Honigbehälter feh-lend. Gf. fehlend. N. 3 lappig. S. flach.

1. **T. SYLVESTRIS (L.)** Wilde T. — Der St. 1 bth., kahl; Bth. vor dem Aufblühen überhangend; die innern PBlätter und Stbg. an der Basis bärtig. 4. Auf Aeckern, Weinbergen und Waldwiesen, (stw. im südl. und mittlern Geb., seltner im nördl.) Mai. Juni. Schk. t. 93. St. h. 29. Bth. gelb.

2. **T. OCLUS SOLIS** (St. Amans. fl. ag. t. 3.) Sonnenäugige T. — Der St. 1 bth. kahl; B. länglich-lanzettl.; die äussern PBlätter zugespitzt, die innern stumpf, bespitzt, alle ey-lanzettf. und nebst den Stbg. ganz kahl; Stbf. so lang wie die Stbk. 4. Auf Aeckern und an kult. O., (bisher blos bei Sitten im Wallis.) Mai. **T. acutiflora Poir.** P. satt-purpurn, die Perigonalblätter an der Basis mit einem grossen schwarzblauen, gelbeingefassten Flecken. Die Tulipa Gesneriana unterscheidet sich von dieser dadch, dass sämt-liche B. des P. sehr stumpf sind, die äussern am obern Ende mit einem Spitzchen, die innern mit einer Kerbe versehen, und dass die Stbf. um die Hälfte kürzer sind, als das Stbk. S.

2. **FRITILLARIA (L.)** Schachblume. — P. 6 blättrig; PB. an der Basis mit einer Honiggrube. Gf. an der Spitze 3 sp.

1. **F. MONTANA** (Hoppe.) Berg-S. — Der St. 1 bth., beblättert, oberwärts nackt; die 2 blüthenst. B. gegenüber, v. den stengelst. weit-entfernt; B. lanzettl.-lineal., verschmälert-spitz, wechselst., die 2 untersten gegenst.; P. würfelig bemalt. 4. An gebirgigen, grasigen O. im Littorale. Mai. **F. pyrenaica D. fl. 2. p. 537.**, nicht L. **F. tenella Rb. fl. exc.**, nicht MB. vgl. Koch a. a. O. Bth. gelblich mit rothbraunen Flecken. Der **F. montana** Hoppe ist eine andere Art, welche ich in der Synops. ed. 1. unter dem Namen **F. involucrata** All. angeführt habe, ähnlich, aber sicherlich

dch folg. verschieden: ihre B. sind länger, fast sichelf. und stehen gleichweit von einander, daher ist der St. oberwärts nicht nackt; stengelständige B. sind 2 gegenst. Paare oder 2 gegenst. Paare und ein einzelnes vorhanden, v. blüthest. 3, quirlliche; die PB. sind ausserdem stumpfer, abgerundet-stumpf und mehr v. gleicher Breite. Ich habe eine Menge von Expl., welche in den Seealpen v. Piemont zwischen Tenda und Col. di Tenda gesammelt wurden, untersucht, und bewahre noch jetzt hievon 6 Expl. in meinem Herbarium auf. Sie ist mit der *F. montana* viel näher verwandt, als mit *F. Meleagris* und unterscheidet sich ohne Zweifel von letzterer. Bertoloni zieht die *F. involucrata* All. zu einer Variet. der *F. Meleagris* mit „grün-gelblich-gewürfelter Bthe und stumpfen KB.“ Fl. ital. 4. S. 75. D.

2. *F. MELÉAGRIS* (L.) Gemeine S. — Der St. 1-2bth., beblättert; *B. lineal.*, rinnig, zurückgekrümmt, fast gleichweit von einander entfernt, *alle wechselst.*; *P.* würfelig bemalt; *PBlätter* an der Spitze zsggezogen. 4. Auf feuchten Wiesen, (Steyerm.; Krain; Böhmen; bei Hildesheim; Hamburg; in Holstein; bei Steinfurt und Sassenberg in Westphalen; im C. Neufchatel; bei Ansbach.) Apr. Mai. J. a. ann. t. 32. St. h. 18. Bth. fleischroth oder gelblich, mit blutrothen Würfeln sehr schön bemalt; var., aber selten, weiss und ungefleckt.

3. *LILIUM* (L.) Lilie. — *P.* 6blättrig, glockig oder zurückgerollt; *B.* an der Basis mit einer honigführenden, rinnigen oder geschlossenen Längsfurche bezeichnet. Gf. ungeth.; N. 3seitig. S. flach.

1. *L. BULBIFERUM* (L.) Knollentragende L. — *B. zerstreut*; *Bth. aufrecht*; *P.* glockig, inwendig von fleischigen Warzen rauh. 4. In Gebirgswäldern, auf den A. und VorA., (stw. dch d. AK., sodann auf dem Harze; in Thüringen; Sachsen; Böhmen; Oberbaden; Württemberg; bei Frankfurt a. M.) Juni. Juli. J. a. t. 226. Bth. safrangelb, mit braunrothen Flecken.

2. *L. CARNIOLICUM* (Bernhardi, vgl. M. und Koch D. fl. 2. p. 536.) Krainer L. — *B.* alle aufrecht und etwas abstehend, gleichmässig zerstreut, lanzettl., spitz, am Rande und auf den 5-7 Nerven der untern Seite flaumig-rauh, die obern allmählig kleiner; der St. kahl; *Bth. überhangend*; *P. zurückgerollt*. 4. Auf Gebirgen und den VorA., (in Steyerm., Krain und im Littorale nicht selten.) Mai-Juli. *L. chalcedonicum* D. fl. 2. p. 535. J. a. app. t. 20., nicht L. *P.* mennigfarben oder gelb, inwendig von der Mitte an nach dem Nagel mit vielen erhabenen braun-purpurnen, zum Theil in fädliche Wärzchen vorgezogenen kleinen Linien besetzt; Nägel grün. — *L. chalcedonicum* L. ist sehr verschieden: Die B. sind lanzettl.-lineal., nach vorne verschmälert, an der Spitze selbst jedoch stumpf, unterseits kahl und nur am Rande flaumig-rauh, gedreht, auf der Mitte des St. plötzlich kleiner, lineal. und fast an dem St. angedrückt, („der St. bis zur Spitze mit gedrunghen B. bekleidet.“ L.), der St. ist besonders auf den Riefen flaumig-rauh, die Bth. sind zinnoberroth, mit gleichfarbigen Wärzchen; blühet

14 Tage später. — Das *L. carniolicum* steht dem *L. pomponium* L. näher, als das *L. chalcedonicum*. Die Bthen von jenem sind den Bthen von *L. carniolicum* ähnlich, aber die B. sind viel zahlreicher und gedrungener, lanzettl.-lineal., die obern allmählig schmaler, lineal. und sehr dicht-zsgestellt, doch etwas abstehend, (nicht an den St. angedrückt, wie bei *L. chalcedonicum*.) und unterseits auf den Nerven kahl und nur am Rande gewimpert. D.

3. *L. MARTAGON* (L.) Türkenbund-L. — B. *quirliq*, elliptisch-lanzettl., zugespitzt, am Rande rauh; der St. flaumig-rauh; Bth. überhangend; P. zurückgerollt. 4. In Bergwäldern, (stw. dch d. Geb.) J. a. t. 351. Bth. hell-violett-fleischroth, mit kleinen purpur-braunen Flecken.

4. *LLOYDIA* (Salisbur.) Lloydie. — P. 6blättrig, abstehend; B. inwendig über der Basis mit einer, unterwärts dch eine Querfalte berandeten, Honiggrube. Gf. ungeth.; N. 3seitig. S. flach.

1. *L. SEROTINA* (Salisb.) Späthblühende L. — An sonnigen, grasigen, felsigen O. der höchsten A., (von der Schw. dch Tyrol, Salzbg., Kärnth. und Steyerm.) Juni-Aug. *Anthericum serotinum* L. St. h. 28. *Phalangium serotinum* Lam. *Ornithogalum striatum* MBieb. Bth. weiss; PB. inwendig mit 3 röthlichen Streifen; Nägel gelblich. Sie ist nicht späthblühend, Facchini.

II. Gruppe. *ASPHODELEEN*. P. 6blättrig. Kapselfächer wenigsamig. S. von mannigfacher Gestalt, oft mit einer schwarzen Samenhaut versehen. — Die Samenhaut kommt bei verschiedenen Arten einer Gattung schwarz und gelblich vor, was in der Folge noch genauer zu untersuchen ist.

5. *ERYTHRONIUM* (L.) Hundszahn. — P. 6blättrig, an der Basis glockig, über derselben abstehend, zuletzt zurückgebogen; die 3 innern B. an der Basis inwendig 2schwielig. Gf. 3sp. S. abgerundet.

1. *E. DENS CANIS* (L.) Gemeiner H. — B. länglich-elliptisch, so wie die PBlätter spitz. 4. An gebirgigen, waldigen O., (in der westl. Schweiz sehr selten; im Littor.; in Krain und Steyerm.; Wald Hradiso an d. Sazawa in Böhmen, Sekera; Valsugana im südl. Tyrol, Facchini.) Apr. Mai. St. h. 34. Bth. rosenfarb.

6. *ASPHODELUS* (L.) Affodill. — P. tief-6th., abstehend. Honigbehälter aus der verbreiterten Basis der Stbg. gebildet, welche wie ein Gewölbe den Fruchtkn. überdecken. Gf. ungeth. S. kantig. Bthstielen mit einem Gelenke, wie bei *Anthericum*.

I. Rotte. *RHIZOPHYLLI*. Stbg. alle aufrecht-abstehend oder die untern abwärts geneigt, die StB. fehlend. Bth. weiss.

1. *A. RAMOSUS* (L.) Aestiger A. — B. breit-lineal., flach; St. blattlos, ästig; Aeste traubig; Bth. gedrunken; Basis der Stbf. rundlich-verkehrteyf., sehr stumpf, plötzlich in den Stbf.

zsgezogen; Kapsel kugelig. 4. Auf steinigen Hügeln der wärmern Gegenden, (bei Fiume.) März. Apr. D. fl. 2. p. 555., mit Ausschl. des Syn. St. h. 6.; diese Abbildg nämlich stellt den *A. fistulosus* dar, der im Gebiete unserer Fl. erst neuerlich sich vorfand. J.

2. *A. ALBUS* (Miller.) Weisser A. — B. breit-lineal., flach; *St. blattlos, sehr einfach*; Tr. gedrunken; *Basis der Stbf. länglich-lanzettl., in den Stbf. verschmälert*; Kapsel eyf., 3seitig, mit 3 dazwischen gelegenen schwachen Kanten. 4. An gebirgigen O., (Krain; Littor.; Castellano Roveredo gegenüber im südl. Tyr.; Monte generoso, C. Tessin.) Mai. Juni. Kommt vor: die Traube unten mit einem oder dem anderen Zweig versehen: *A. neglectus* Schult. syst. veget., Koch Synops. ed. 1., nach Tommasini. D.

3. *A. FISTULOSUS* (L. sp. 44.) Röhriker A. — B. pfrieml., halbstielrund, röhrig-hohl; *der nackte St. ästig*; die einzeln stehenden Bth. von einander entfernt. ☉. An bebauten und unbebauten O., (auf dem Scoglio grande im Hafen von Pola auf der Mittagsseite häufig, Tommasini.) Apr. A. ramosus. St. h. 9. P. weiss oder blass-fleischfarben mit einem grünen oder purpurnen Mittelstreifen. J.

II. Rotte, COLEOPHYLLI. Bth. gelb, Stbg. abwärtsgeneigt, St. ganz oder zum Theil mit den Scheiden der B. bedeckt. Asphodeline Rb. fl. exc. p. 116.

4. *A. LUTEUS* (L.) Gelber A. — B. pfriemlich, 3kantig, gerillt, glatt, an der Basis in eine häutige Scheide verbreitert; *St. sehr einfach, mit BScheiden bis an die Tr. bedeckt*; Bth. gedrunken; DeckB. ohngefähr so lang, als die Bth. 4. Auf steinigen Hügeln der wärmern Gegenden, (bei Fiume und auf Veglia.) Mai. Juni. J. h. v. t. 77. Asphodeline lutea Rb. J.

5. *A. LIBURNICUS* (Scop. carn. t. 12. Abbildg sehr schlecht.) Liburnischer A. — B. pfriemlich, 3kantig, gerillt, auf den Killen gezähnelte-rauh, an der Basis in eine häutige Scheide verbreitert; *St. sehr einfach, oberwärts nackt*; Bth. locker-traubig; DeckB. viel kürzer, als die Bthstielchen. 4. Zwischen Wiesenbüsch der wärmeren Gegenden, (bei Fiume.) Juni. Juli. A. creticus Lam. dict. Willd. spec. Der Name, welchen Scopoli dieser Pfl. gab, verdient als älterer den Vorzug. Asphodeline liburnica Rb. J.

7. *ANTHÉRICUM* (L., mit Ausschl. v. Arten.) Zaumblume. — P. 6blättrig, abstehend. Honigbehälter fehlend. Stbg. dem Fruchtb. eingefügt; Stbf. pfriemlich. Stbk. aufliegend, (mit dem Rücken angeheftet.) Gf. ungeth. S. kantig. Bthstielchen mit einem Gelenke versehen; das P. nämlich ist an der Basis in einen Stiel vorgezogen, welcher mit dem Bthstiele gegliedert ist. — Bth. weiss.

I. *A. LILIAGO* (L.) Astlose Z. — B. lineal., etwas rinnig, aufrecht, kürzer, als der ganz einfache blattlose St.; *Gf. abwärtsgeneigt*. 4. Auf kräuterreichen, buschigen Hügeln und an felsigen, gebirgigen O., (stw. dch d. Geb., aber nicht im Littor., in Oestr., Mähr. und nicht in Schles.) Mai. Juni. J. h. v. t. 83. Phalan-

gium Liliago Schreb. kommt vor mit einem oder dem anderen Zweig am St.

2. A. RAMOSUM (L.) Aestige Z. — B. lineal., rinnig, aufrecht, kürzer, als der ästige blattlose St.; *Gf. gerade*. 4. An gebirgigen, steinigen O., (stw. dch d. Geb.) Juni. Juli. St. h. 56. Phalangium ramosum Lam.

8. PARADISIA (Mazzugati viag. alle Alp. Giul. S. 27., nach Bertol. fl. it. 4. S. 132.) Paradisie. P. 6 blüthrig, trichterf. Fruchtkn. dch einen kurzen Fruchträger über den Fruchtb. erhoben. Stbg. an der Spitze des Fruchträgers unter dem Fruchtkn. eingefügt. Stbk. aufliegend; *Gf. ungeth.*; N. schwach-3lappig. S. kantig. N. v. E. gen. 6. 2.

1. P. LILIASTRUM (Bertol.) Lilienartige P. — 4. Auf Berg- und ATriften, (in der Schweiz nicht selten und bis zum Orles in Tyrol; im südl. Tyrol weiter verbreitet; auf der A. Plecken im Gailthale in Kärnthen.) Juli. Aug. P. hemeroanthericoides Mazz. Anthericum Liliastrium L. D. fl. 2. p. 558. Heimerocallis Liliastrium L. spec., erste Ausgabe. Czackia Liliastrium Andr., Koch Synops. ed. I. „*Bth. reinweiss, ansehnlich, dem Lilium candidum ähnlich, aber wenigstens um die Hälfte kleiner.*“ Gaudin.

9. ORNITHÓGALUM (L., mit Ausschl. v. Art.) Milchstern. — P. 6blüthrig, abstehend. Honigbehälter fehlend. Stbg. dem Fruchtb. eingefügt oder nur wenig an der Basis des P. anhängend; Stbk. aufliegend (mit dem Rücken angeheftet.) *Gf. ungeth.*; N. stumpf. S. eyf., fast kugelig oder kantig. Bthstiele nicht gegliedert. Bl.-Scheide fehlend.

1. Rotte. Stbg. lanzettl., einfach.

1. O. SULPHUREUM (Röm. und Schult. syst. veget. 7. S. 519.) Schwefelgelber Milchstern. — *Tr. verlängert*, reichblüthig; *Bthstiele* abstehend, *die fruchthragenden an den Schaft angedrückt*; *DeckB. ey-lanzettf., allmählig in eine Spitze verschmälert*; B. des P. lineal.-längl.; *Gf. so lang, als die Stbl.*; *Fruchtkn. eyf., nach oben spitzer*; B. grasgrün, lanzettl.-lineal., ziemlich flach, oder mässig-rinnig. 4. Auf unbebauten Hügeln, Wiesen, (zerstreut im südl. Gebiete.) Mai. Juni. O. pyrenaicum Bert. fl. ital. O. stachyoides Host. austr. Anthericum sulphureum Wuldst. und Kit. pl. rar. hung. I. t. 95. Bth. schwefelgelb mit einem gelb-grünen Streifen auf dem Rücken der Perigonblätter. Sehr ähnlich dem O. pyrenaicum, und schlecht-getrocknete Expl. sind sogar schwer zu unterscheiden, dennoch stellt es nach meinem Dafürhalten eine eigene Art dar. Es unterscheidet sich von jenem ausser der früheren Bthzeit und der Farbe der Bth., dch weniger tief gerinnte, grasgrüne, so wie beim Hyacinthus orientalis gefärbte, schon während des Anblühens an der Spitze abgestorbene B. und den eyf. nach oben hin schmälern, nicht auf beiden Seiten gleichmässig abgerundeten Fruchtkn. — Die B. erscheinen nicht erst nach der Bthe, „da ich oft den blüthentragenden Schaft ohne B. gefunden

habe,“ sagt Bertoloni, so meinte ich (in den Amoën. ital.) die B. kämen erst nach der Bth. hervor; aber nachdem ich die Zwiebeln in den Garten versetzt hatte, bemerkte ich, dass sie eher zum Vorschein kommen, als der Schaft, jedoch sogleich nach dem Aufblühen wieder verschwinden. Bert. fl. ital. 4. S. 102.

2. *O. PYRENAICUM* (L. spec. 440.) Pyrenäen-M. — *Tr. verlängert, reichblüthig; Bthstiele absteehend, die fruchttragenden an den Schaft angedrückt; DeckB. eyf.-lanzettl., allmählig in eine Spitze verschmälert; B. des P. lineal.-längl.; Gf. so lang, als die Stbf; Fruchtkn. oval, an der Basis und der Spitze gleichmässig abgerundet; B. lauchgrün, lineal., tief-gerinnt. 4. Auf Wiesen und unkultiv. O., (im südl. Gebiete.) Juni. Juli, 14 Tage später, als das vorhergehende. Jacq. austr. t. 103. („gehört hierher und nicht zu *O. sulphureum*“ sagt Smith. brit.,) DC. fl. fr. Bth. weisslich mit einem zarten bläulich-grünen Anfluge; die PBlätter unten mit einem lauchgrünen Streifen. „Bth. weisslich-grün,“ Smith. brit. Jacquin sagt „die Blb. sind blass, aber nicht wirklich weiss, in der Mitte mit einem grünlichen Längsstreifen bezeichnet, und dies auf der hinteren Seite deutlicher.“ Getrocknet, werden die Bth. mehr gelblich.“*

3. *O. STACHYOIDES* (Schultes Sohn in Roem. und Schult. syst. veget. 7. S. 518.) Ziestartiger M. — *Tr. verlängert, reichblüthig; Bthstiele abstechend, die fruchttragenden an den Schaft angedrückt; DeckB. eyf., plötzlich in eine lange Spitze zsggezogen; B. des P. lanzettl.-längl.; Gf. etwas länger, als die Stbf.; B. lineal., gerinnt. 4. Auf Aeckern, (in den wärmeren Gegenden um Triest und in Istrien, Tommasini.) Mai. Juni. *O. stachyoides* Ait. kew.? denn die wechselst. Stbgf. sind nur ein wenig, und nicht um die Hälfte kürzer. *O. pyrenaicum* β . *stachyoides* DC. fl. fr. Dub. bot. gall. Bth. weiss, die PBlätter mit einem grünen Streifen auf dem Rücken. Die Bthstiele sind etwas kürzer und während des Blühens aufrechter, als bei den vorigen, von denen sich diese sehr deutlich dch die plötzlich in eine lange, borstliche Spitze zsggezogenen DeckB. unterscheidet; um diess an getrockneten Expl. besser bemerken zu können, muss man das DeckB. mit einigen Tropfen frischen Wassers aufweichen. — Diese unsere Pfl. wird nach Gussone im Herbarium Linne's unter dem Namen *O. narbonense* aufbewahrt, vergl. Bertol. fl. ital., aber das *O. narbonense* des Dodonaeus stellt sicher eine andere Art dar. D.*

4. *O. ARCUATUM* (Steven in den act. mosq. 7. S. 75.) Bogiger M. — *Tr. verlängert, reichblüthig; Bthstiele in einem rechten Winkel abstechend, die fruchttragenden bogig aufstrebend; DeckB. eyf.-lanzettl., allmählig in eine Spitze verschmälert; die B. des P. elliptisch; Gf. kürzer, als die Stbf., halb so lang, als der Fruchtkn.; B. lineal., gerinnt. 4. In grasigen Obstgärten, (bei Steyer in Oestreich, Sauter.) Juni. Bth. weiss, mit keinem oder einem nur schwachen grünen Streifen auf dem Rücken der PBlätter.*

5. *O. COMOSUM* (Lin. spec. 440.) Schopfiger M. — *Tr. zuletzt längl.; die blüthen- und fruchttragenden Bthstiele in einem*

halbrechten Winkel absteheud, alle zuletzt gleichlang; B. des P. längl., stumpf; Stbf. zahelos; B. aus lanzettl.-linealer Basis verschmälert, lauchgrün, ohne weissen Streifen, gewimpert. 4. Auf unbebauten Hügeln zwischen Gebüsch (um Fiume, Noë.) Mai. Juni. Bth. rein-weiss mit grünem Rückenstreifen wie die 3 folgenden. Die Stbgf. nach dem Verblühen von der Mitte an auswärtsgebogen. Jacq. ic. rar. t. 426. Ornithogalum pannonicum albo flore Clus. hist. J.

6. *O. COLLINUM* (Gussone fl sicul. I. S. 412.) Berg-B. — *Bth. ebensträussig; die blüthen- und fruchttragenden Bthstiele in einem halbrechten Winkel absteheud, die unteren länger; B. des P. breit-lanzettl., stumpf; Stbf. zahelos; B. lineal., flatterig, grün mit einer weissen Mittellinie bezeichnet, oft bewimpert. 4. Auf Bergwiesen, (um Wien, Erxleben, am Karstgebirge, Tommasini.) Mai. Juni. O. collinum Bertol. fl. ital. O. saxatile Visiani in der Regensb. bot. Ztg. nach Expl. aus Dalmatien. Bertoloni verbindet in seiner Fl. von Italien mit O. collinum folgende mir unbekannte Ornithogala: 1. O. tenuifolium Guss. (O. Gussonii, Tenor.) welches Tenore in seiner Sylloge dch südl. B. und spitze Blättchen des P. unterscheidet. 2. O. orthophyllum Tenor. mit 5 Linien breiten, nicht bewimperten, mit einem breiten weissen Streifen bezeichneten B. und trauhigen Bth. 3. O. garganicum Tenor. mit 6 Linien breiten, nicht bewimperten B. ohne weissen Streifen. — Das O. montanum Cyrill. unterscheidet sich von diesen dch Stbf., welche mehr als um die Hälfte kürzer sind, als das P. und dch lanzettl., (nicht bewimperte) B. ohne weisse Linie. D.*

7. *O. UMBELLATUM* (L. spec. 441.) Doldiger M. — *Bth. ebensträussig; die unteren fruchttragenden Bthstiele wagerecht absteheud mit aufstrebender Frucht; B. des P. längl., stumpf; Stbgf. zahelos; B. lineal., gerinnt, kahl, mit einem weissen Mittelstreifen. 4. Auf Wiesen, Aeckern, (zerstreut dch d. G.) April. Mai. Jacq. a. t. 343.*

8. *O. REFRACTUM* (Waldst. und Kit. in Willd. en. h. berol. S. 18.) Hinabgeschlagener M. — *Bth. ebensträussig; die unteren fruchttragenden Bthstiele vom St. spreitzend-hinabgeschlagen mit aufstrebender Frucht; DeckB. kaum länger, als der Bthstiel; B. des P. längl., stumpf; Stbf. zahelos; B. lineal., gerinnt, kahl, mit einem weissen Mittelstreifen. 4. Auf Aeckern und Weinbergen, (um Triest, Tommasini.) April. Mai. Reichenb. ic. f. 265., nicht gut. — Das ähnliche O. exscapum hat eyf.-längl., kurz-spitze DeckB., so lang oder etwas länger, als die Bthstiele, und ist im Ganzen kleiner. D.*

II. Rotte. ALBUCKA. Reichenbach. Stbgf. 3 zählig.

9. *O. NUTANS* (L. spec. 441.) Nickender M. — *Bth. lockertraubig, schon während des Aufblühens einerseitswendig und hängend; Stbf. sämmtl. 3 zählig, abwechselnd um die Hälfte kürzer, die seitlichen Zähne der längeren Stbf. etwas länger, als das noch nicht entfaltete Stbk.; Fruchtkn. eyf.; an der Spitze tief-nabelig, während des Blühens deutlich kürzer, als der Gf.; Bthstiele wäh-*

rend der Bthezeit länger, als der Fruchtkn.; B. zu dieser Zeit noch ganz frisch-krautig. 4. Auf Wiesen und Feldern, (zerstreut dch d. Geb.) April. Mai. N. kopfig-3seitig. Kapsel breit-eyf., an der Spitze tief-nabelig, gleichmässig 6furchig. S. braun, grubig-netzig, kugelig.

10. *O. CHLORANTHUM* (Sauter in Koch Taschenb. S. 508.) Grünlichblühender M. — *Bth. genähert-traubig*, während der Bthezeit wagerecht, zuletzt einersitwendig und hängend; sämmtl. Stbgf. 3zählig, abwechselnd um die Hälfte kürzer, die seith. Zähne der längeren Stbf. so lang oder etwas kürzer, als das nicht aufgesprungene Stbk.; *Fruchtkn. längl., mit einer stumpfen, nicht nabeligen Spitze*, so lang, als der Gf.; *Bthstiele während des Blühens halb so lang, als der Fruchtkn.*; B. zu dieser Zeit oberwärts abgestorben. 4. An grasigen O., in Obstgärten, (bei Steyer in Oestreich.) April. Mai. Bth. innen weiss, aussen auf den Blättchen mit einem breiten sattgrünen Streifen. N. 3seitig, nicht breiter, als der Gf. Kapsel längl. eyf. mit stumpfer, nicht nabelig-eingedrückter Spitze, fast gleichmässig 6furchig. S. wie beim vorigen, aber nur halb so gross. D.

10. *GAGEA* (Salisb.) Gagee. — P. 6blättrig, oberwärts abstehend, mit den Stbgf. bleibend. Honigbehälter fehlend. Stbk. aufrecht, (nämlich mit ihrer Basis auf der Spitze des Stbf. eingefügt.) Gf. ungeth. N. 3seitig. S. abgerundet. Die Samenhaut fand ich bei allen Arten, die ich untersuchen konnte, lichtbraun, nie schwarz. Bth. aller gelb, mit einem grünen Rückenstreifen auf den Perigonalblättern.

I. Rotte. Die W. aus 3 wagerechten, nackten u. von keiner gemeinschaftl. Haut eingeschlossenen Zwiebeln zsgesetzt, v. diesen sind die 2 diesjährigen blattlos, die 2jährige dritte aber trägt ein einzelnes B. und einen blüthentragenden St.

1. *G. STENOPETALA* (Rb.) Schmalblättrige G. — WB. einzeln, lineal., nach der Basis und Spitze verschmälert, flach, geschärft-gekielt, die 2 blüthest. B. gegenst.; *Bthstiele kahl, einfach, nach dem Verblühen nach allen Seiten abstehend; Zwiebeln 3, wagerecht, die heurigen keulig-gestielt*. 4. Auf Aeckern. April. Mai. G. pratensis R. u. Schult., mit Anschl. der var. γ . *Ornithogalum stenopetalum* Fries, nach Exempl. v. Autor selbst. D. fl. 2. p. 541. *O. luteum* Hoffm. u. vieler Autor. St. h. 12. *O. pratense* Wahlenb. Eine Abänderg mit grössern Bth. ist *G. Schreberi* Rb. nach einem v. Autor selbst mir mitgetheilten Explare. Var.

β . *pratensis*, das untere bthst. B. spatelf., mit eyf., konkaver Basis die Bthstiele unten umfassend; Bthstiele nach dem Verblühen einersitwendig; die heurigen Zwiebeln eyf., an der Basis breiter. G. pratensis Koch in der Regensb. bot. Ztg. G. pratensis R. u. S. *Ornithogalum stenopetalum* γ . D. fl. 2. p. 542. *O. pratense* Pers., unsere Varietät β . mit *O. stenopetalum* vereinigt. D.

II. Rotte. Die W. aus 2 aufrechten, v. einer gemeinschaftlichen Haut eingeschlossenen Zwiebeln gebildet, zwischen denen der Schaft hervorsprosst. Die eine Zwiebel ist mit Wfasern versehen, der anderen, der Nebenzwiebel, welche im folg. Jahre Blüthen trägt, fehlen diese.

2. *G. ARVENSIS* (Schult.) Feld-G. — WB. zu 2, lineal., rinnig, stumpf-gekielt, zurückgekrümmt; StB. fehlend, die 2 blüthest. B. gegenst.; Bthstiele ästig, ebensträussig, zottig; PBlätter lanzettl., spitz; die Zwiebel rundlich. 4. Auf Aekern u. an kultiv. O. März. April. *Ornithogalum arvense* Pers. bei Ust. ann. 5. t. 1. D. fl. 2. p. 543. O. *minimum* Roth. St. h. 12. O. *villosum* MBieb.

3. *G. BOHEMICA* (Schult.) Böhmisches G. — Die wurzelst. B. zu 2, fädlich, rinnig, die stengelst., wechselst., lanzettl., zugespitzt oder mit verlängert-fädlicher Spitze endigend; Bth. endst., meist einzeln; PBlätter länglich, vorne breiter, abgerundet-stumpf, an der Basis nebst dem St. oberwärts und den B. am Rande flammig; Fruchtkn. verkehrterzf., mit konkaven Seiten; die Zwiebel rundlich. 4. An felsigen, etwas feuchten O., (Böhm., Mähr., Schles.) März. April. *Ornithogalum bohemicum* Zauschner. D. fl. 2. p. 544. St. h. 23. Var. kahl, mit nur wenigen Haaren auf dem Rande der obersten B. D.

4. *G. SAXATILIS* (Koch bei Schult.) Felsen-G. — Die wurzelst. B. zu 2, fädlich, rinnig, die stengelst., wechselst., lanzettl., zugespitzt oder mit verlängert-fädlicher Spitze endigend; Bth. endst., meist einzeln; PBlätter länglich-lanzettl., stumpf, an der Basis nebst dem St. und dem Rande der B. zottig; Fruchtkn. länglich-verkehrterzf., gestutzt mit ziemlich konvexen Seiten; Zwiebel rundlich. 4. An felsigen, etwas feuchten O., (Rheinpfalz bei Creuznach, Callstadt, am Donnersberge; Thüringen an der Wartburg bei Eisenach, Seeberg bei Gotha, bei Halle; am Harze; in der Schweiz.) März. früher als die übrigen. *Ornithogalum bohemicum* β. *saxatile* D. fl. 2. p. 545. O. *bohemicum* Gaud. O. *fistulosum* Wallr. *G. arvensis* subumiflora Rb. fl. exc. — Die *G. arvensis* kommt, obgleich selten, mit 1bth. Schäfte vor, eine Variet., die sich jedoch v. *G. saxatilis* leicht untersch. lässt. Der Schaft jener Variet. ist kahl, nackt, nur an der Basis des Bthstieles mit 2 gegenst. blüthest. B. besetzt; ausserdem finden sich keine StB. vor, der Bthstiel ist 3- oder 4mal so lang, die PBlätter sind lineal.-lanzettl., spitz, und der Fruchtkn. ist tiefer ausgerandet. D.

5. *G. LIOTTARDI* (Schult.) Liottardi's G. — Die wurzelst. B. einzeln oder zu 2, röhrig, kahl, halbstielrund, an der Basis rinnig, die blüthenst. gegenüber, das grössere scheidig, zugerollt, an der Basis eyf.; Bthstiele 1-5, einfach, doldig, zottig; PBlätter elliptisch-lanzettl., stumpf; die Zwiebel rundlich. 4. Auf Triften der A., (Schw., Tyr., Salz., Kärnth.) Mai. Juni. *Ornithogalum Liottardi* Sternb. O. *fistulosum* Ramond bei DC. fl. fr., mit Ausschl. des Syn. von O. *bohemicum*. Var. mit kahlen Bthstielen.

6. *G. SPATHACEA* (Schult.) Scheidige G. — Die wurzelst. B. zu 2, aufrecht, fädlich, halbstielrund, oberseits flach oder seicht-rinnig, das blüthenst. einzeln, lanzettl., scheidig-zugerollt v. der gestielten, 2-5bth. Dölde entfernt; die besondern Bthstiele einfach, kahl; PBlätter länglich-lanzettl., stumpf; Zwiebel eyf. 4. In feuchten Hainen, (v. Westphal, dch Hanov., Oldenb., Holst., Meck-

lenb. bis Pommern; bei dem Dorfe Lösnitz unweit Leipzig.) Apr. Mai. *Ornithogalum spathaceum* Hayn. in Ust. ann. 15. t. 1. D. fl. 2. p. 546. *O. Haynii* Roth. bei Röm. St. h. 27. *O. minimum* β. Wahlenb. D.

7. *G. MINIMA* (Schult.) Kleinste *G.* — Das wurzelst. *B.* einzeln, aufrecht, lineal., ober- und unterseits flach oder etwas rinnig, das blüthenst. einzeln, scheidig, lanzettl., an der Basis den gemeinschaftlichen Bthstiel der 2-5 bth., gestielten Dolde einschliessend; die besondern Bthstiele einfach oder ästig, kahl; *PBlätter* lineal.-lanzettl., zugespitzt; *Zwiebel eyf.* 4. In Hainen, Gebüsch, auf Waldwiesen; in d. A. hinaufsteigend, (stw. dch d. Geb., in den A. häufiger.) Apr. Mai. *Ornithogalum minimum* L. *O. Sternbergii* Hoppe. St. h. 23. *O. gracile* Hagen. chlor. bor.

III. Rotte. Die *W.* aus einer festen, aufrechten Zwiebel gebildet, welche an der Basis den St. umgiebt, und ein einzelnes *B.* trägt. Die Nebenzwiebel fehlend.

8. *G. LUTEA* (Schult.) Gelbe *G.* — Das wurzelst. *B.* einzeln, aufrecht, lineal.-lanzettl., plötzlich-zugespitzt, flach, geschärft-gekielt, die 2 blüthenst. fast gegenüber; die besondern Bthstiele einfach, doldig, kahl; *PBlätter* länglich, stumpf; Stbk. längl.; *Zwiebel eyf.*, einzeln. 4. In Hainen und auf Waldwiesen, in d. A. hinaufsteigend, (stw. dch d. Geb.) Apr. Mai. *Ornithogalum luteum* β. L. D. fl. 2. p. 548. *O. luteum* β. sylvaticum Willd. *O. sylvaticum* Pers. in Ust. annal. 5. t. 1. f. 1. *O. Personii* Hoppe. St. h. 27.

9. *G. PUSILLA* (Schult.) Winzige *G.* — Das wurzelst. *B.* einzeln, aufrecht, schmal-lineal., verschmälert-spitz, rinnig, die 2 blüthenst. gegenüber, das untere grösser, zugerollt-scheidig; Dolde sitzend, 2-6 bth.; die besondern Bthstiele einfach, doldig, kahl; *PBlätter* lanzettl., stumpf; Stbk. rundl.; *Zwiebel eyf.*, einzeln. 4. An waldigen, steinigen *O.* (Böhm., Oestr., Türkenchanze bei Wien.) März. Apr. *Ornithogalum pusillum* Schmidt. D. fl. 2. p. 549. Rb. ic. 2. f. 228. 229., sehr gut. Böhmisches Explare sah ich noch nicht, Ungarische und Sibirische stimmen aber ganz genau mit der citirten Abbildg überein und sind ganz sicher v. *G. lutea* verschieden. Die Exmpl., welche Dolliner um Wien gesammelt, sind viel stärker, als die ungarischen und tragen bis gegen 9 Bth. — *G. Clusiana* Tausch und *Ornithogalum tunicatum* Presl. sind nicht verschieden. D.

II. *SCILLA* (L.) Meerzwiebel. — P. 6 blättrig, abstehend oder fast glockig. Honigbehälter fehlend. Stbg. ganz unten an die Basis der *PBlätter* angewachsen; Stbk. aufliegend. Gf. ungeth.; N. stumpf. S. abgerundet. Bthstiele nicht gegliedert. Bth.Scheide fehlend. N. v. E. gen. 4. 11. — Die *S.* sind bei *Scilla autumnalis* kohlschwarz, bei *S. bifolia* und *S. amoena* aber lichtbraun und blassgelb, wie bei *Gagea*. Die Gattung *Scilla* untersch. sich v. *Ornithogalum* mehr dch die Farbe der Bth., als dch Merkmale.

I. *S. AMOENA* (L.) Schöne *M.* — Zwiebel vielblättrig; *B.* aufrecht, breit-lineal., ziemlich flach, an der Spitze fast kappenf.

stumpf; Schaft kantig; Bthstiele aufrecht; *DeckB.* kurz, *abgeschnitten* od. gezähnt. 4. Auf Wiesen und in Hainen, (auf Wiesen an der Donau bei Wien nach Jacquin und im Gehölze bei Wallbeck am Harz, Hampe, als wirklich wild angegeben, ausserdem in Grasgärten wohl bloss verwildert.) Apr. Mai. J. a. t. 218. Bth. blau.

2. *S. BIFOLIA* (L.) Zweiblättrige M. — Zwiebel 2blättrig; *B.* abstehend oder zurückgekrümmt, *lanzettl.-lineal.*, rinnig, in eine stielrunde Spitze zugerollt; Schaft stielrund; *Bthstiele aufrecht*; *DeckB. fehlend*. 4. In felsigen Laubwäldern, an Bachufern; in die VorA. hinaufsteigend, (südl. und westl. Schweiz, Elsass u. v. da deh das Rheingebiet bis zum Unterrheine, dem Maingebiet bis Würzb., dem Moselgebiet und deh Würtemb. und Bayern bis Oestr.; sodann im südl. Tyrol, in Krain, Mähren, Böhmen, Schlesien, Erzgebirge.) März. Apr. J. a. t. 117. Bth. blau.

3. *S. ITALICA* (L. spec. 442.) Italienische M. — Zwiebel vielblättrig; *B. lineal.*; Tr. kegelf.; *DeckB. zu zweien, das eine von der Länge des Bthstiels*; *P.* abstehend. 4. Felder und unkultiv. O., (in der Gegend von Bern, Trachsel; bei Kleinlaufenberg in Oberbaden, Alex. Braun.) Letzterer benachrichtigte mich, dass an dem bezeichneten O. die *Scilla italica* wachse, die *Scilla verna* aber nicht vorkomme. Apr. Mai. *S. verna* Koch Synops. ed. I. Bth. blau.

4. *S. AUTUMNALIS* (L.) Herbst-M. — Zwiebel mehrblättrig; *B. schmal-lineal.*, *sich nach der Bth. entwickelnd*; Tr. fast ebensträussig, nach dem Verblühen verlängert; *Bthstiele aufstrebend*; *DeckB. fehlend*. 4. Auf Kalkhügeln und in Weinbergen, (im Elsass bei Orschwyhr, im Kästelwald bei Colmar; im östr. Littor. und bei Fiume.) Aug. Sept. *Anthericum autumnale* Scop. E. bot. t. 78. Bth. blau. D.

Die *Scilla italica* L. und die *S. patula* DC., zwar in der Flora der Schweiz aufgenommen, kommen aber daselbst nicht wild vor.

12. *ALLIUM* (L.) Lauch. — P. 6blättrig, glockig oder abstehend. Honigbehälter fehlend. Stbg. mehr oder weniger an der Basis der PBlätter anhängend und mit ihrer Basis mehr oder weniger in eine Haut verwachsen. Stbk. aufliegend. Gf. ungeth.; N. stumpf. S. kantig. Bth.Scheide 1-2blättrig, die Dolde vor der Bthzeit einschliessend. — Die sehr natürliche Gattung *Allium* möchte ich nicht in mehrere zersplittern. Die Kennzeichen der Gattungen, welche die Autoren aus der Gattung *Allium* gebildet und aufgestellt haben, sind sehr schwankend. Die 1- und 2-3blättrigen Bl.Scheiden und deren Länge trennen die ähnlichen Arten nicht von den unähnlichen, und die 3 spitzigen Stbgf. gehen deh die, welche an der Basis beiderseits 1zählig und die, welche unterwärts mit einem Winkel verbreitert sind, in die einfachen über und die Stbg. aller Arten erscheinen an der Basis mehr oder weniger zsgewachsen und hängen mehr oder weniger an den PBlättern an.

I. Rotte. ANGUINUM Don. Die W. ein Rhizom, auf welchem die Zwiebeln sitzen. Der St. mit wechselst. B. bekleidet^{*)}. Stbgf. einfach.

1. A. VICTORIALIS (L.) Wegtrittblättriger L. — Der St. bis zur Mitte beblättert, stielrund, oberwärts kantig; B. *kurzgestielt, lanzettl. oder elliptisch*, flach; Bth.Scheide 1klappig, bleibend; Dolde kapseltragend, kugelig; Stbg. zahnlos, länger, als das P. 4. An felsigen O. der A. und höhern Gebirge, (dch d. g. AK., d. Vogesen und Sudeten.) Juli. Aug. J. a. t. 216. A. plantagineum Lam. Bth. weiss, in das Grünliche spielend, getrocknet gelblichweiss.

II Rotte. MOLIMUM Don. W. zwiebelig. B. verbreitert oder breit-lineal, flach, alle wurzelst. St. nackt. Stbg. ganz unten in dem P. eingefügt, einfach.

2. A. URSINUM (L.) Bären-L. — St. blattlos, stumpf-3kantig; B. *langgestielt, elliptisch-lanzettl.*; Bth.-Scheide 1klappig, 2-3 sp., bleibend; Dolde kapseltragend, gleich-hoch, locker; Stbg. zahnlos, kürzer, als das P. 4. In schattigen, feuchten Wäldern, an Gebirgsbächen, (stw. dch d. Geb.) Apr. Mai. St. h. 4l. Bth. schneeweiss.

3. A. MULTIBULBOSUM (Jacq. fl. a. l. p. 9. t. 10.) Vielzwiebliger L. — Schaft blattlos, stielrund; WB. sitzend, *breit-lanzettl.*, zugespitzt, flach, *am Rande kahl*; Bth.Scheide 1klappig, 2-3klappig, bleibend; Dolde kapseltragend, konvex; Stbg. zahnlos, an der Basis breit-verwachsen, länger, als das halbe P.; Zwiebel plattgedrückt-kugelig. 4. Auf Gebirgsäckern, (bei Wien, u. zw. Beuel und Schwarz-Rheindorf in der Gegend v. Bonn auf dem rechten Rheinufer.) Mai. A. nigrum Red. lil. 2. t. 102. Koch Syn. ed. 1. — Unter dem Namen A. nigrum beschreibt Bert. in der Fl. von Italien eine andere, mir nicht bekannte Pfl.; da auch ausserdem die Beschreibung Linne's von A. nigrum nicht ganz auf unsere Pfl. passt, so zog ich den Namen A. multibulbosum vor. Bth. weisslich, mit einem grünen Rückenstreifen; Fruchtkn. schwarz-grün. D.

4. A. ROSEUM (L.) Rosenrother L. — S. stielrund, blattlos; WB. breit-lineal, zugespitzt, flach, gekielt, an der Spitze eingerollt, *am Rande gezähnel-terau*; Bth.Scheide 1klappig, 2-4klappig, bleibend; Dolde konvex; Stbg. zahnlos, kürzer, als das P.; Zwiebel rundlich. 4. In Weinbergen, auf Aeckern u. kräuterreichen Hügeln der wärmern Gegenden, (Istrien auf der Insel St. Andrea, um Fiume und auf den Inseln.) Apr. Mai. A. illyricum J. ic. rar. t. 365. Bth. für die Gattung Allium gross, schön-rosenroth. Die ganze Dolde ist aus kapseltrag. Bth. zsgesetzt, kommt aber auch vor

β. *bulbiferum*, mit zwiebeltragender Dolde und wenigern eingemischten Bth.: A. roseum β. DC. Bert. amoen. ital. A. carneum Bertol. rar. pl. dec. A. ambiguum Sibth. u. Sm. fl. gr. prodr., A. Tenorii Spreng. syst. veget.

^{*)} Alle mir bekannten Arten v. Allium haben im eigentl. Sinne keinen beblätterten St. und alle haben einen blattlosen Schaft; aber die BScheiden sind bei vielen so verlängert, dass der Schaft einem v. der Basis bis zur Mitte beblätterten St. ähnelt.

5. *A. SUBHIRSUTUM* (L.) Bewimperter L. — Schaft stielrund, blattlos; WB. breit-lineal., zugespitzt, flach, gekielt, am Rande zottig-gewimpert oder kahl; Bth.Scheide 1klappig, eys., ungeth., halb so lang, als die Dolde; Dolde gleich-hoch; Stbg. zahlos, halb so lang, als das P.; Zwiebel rundlich. 4. Auf kräuterreichen Hügeln unter Gebüsch der wärmern Gegenden, (auf der Insel Osero, Lossino.) Apr. Mai. *A. trifoliatum* Cyrill. pl. rar. fasc. 2. t. 3. Bth. weiss. — Reichenb. änderte den Namen *A. subhirsutum* gegen die Ansicht aller Autoren in *A. subvillosum* Salzm., weil die v. Linne citirte Figur v. Clusius, das *A. subvillosum* Salzm. darzustellen scheint. J.

6. *A. CHAMAEMOLY* (L. spec. 433.) Der unterirdische St. sehr kurz, die wurzelst. B. lineal., zugespitzt, flach, gekielt, am Rande kurzh. - bewimpert; die 1klappige Bth.Scheide kürzer, als die Dolde; Dolde wenigblüthig; die fruchttragenden Strahlen zurückgekrümmt; Stbf. zahlos, halb so lang, als das P.; Zwiebel rundlich. 4. An unfruchtbaren und sandigen O. in der Nähe des Meeres, (bei Veruda in Süd-Istrien und Insel Osero und Lossino.) Januar. Bth. weiss. J.

III. Rotte. *RHIZIRIDEUM* Don. Die W. aus einem wagerechten Rhizome bestehend, welches die Zwiebeln der Pflanze trägt. Der St. steht an der Seite des Blätterbüschels und ist mit diesem Büschel an der Basis v. gemeinschaftl. Scheiden eingeschlossen. Stbg. einfach.

7. *A. FALLAX* (Don.) Trüglicher L. — St. nackt, oberwärts scharf-kantig; B. lineal., ohngefähr v. der Breite des Schaftes, flach, unterseits schwach-nervig, kiellos; Bth.Scheide 2-3sp.; Dolde rundlich, kapseltrag.; Stbf. zahlos, länger, als das P.; Zwiebel an den queren Wurzelstock angewachsen, mit ganzen Häuten bedeckt. 4. Auf Felsen der Gebirge und VorA., (südl. Tyrol, dch d. g. AK. bis Oestr.; in Mähr.; Böhm.; Schles.; Thüring.; Hessen; Baireuther Gebirg; bei Berlin.) Juli. Aug. Schult. syst. veg. var. α . u. β . *A. angulosum* J. a. t. 423. *A. angulosum* α . majus Trevir. *A. acutangulum* β . montanum und γ . calcareum D. fl. 2. p. 521. *A. senescens* W. u. Grab., Schmidt boh. u. A. montanum Schmidt. *A. angulosum* β . petraeum DC. Gaud. β . calcareum Wallr., γ . serotinum Gaud. — Bth. rosenroth. B. 1-2 Linien breit, getrocknet durchscheinend, mit stärkern und schwächern Nerven dchzogen, der mittlere aber nicht dicker. — *A. senescens*, ist aus unserer Fl. zu streichen; es ist eine Sibirische Pflanze, dch 5-6 Linien breite B., die 3- oder 4mal breiter, als der Schaft und satt-bläulichgrün sind und dch spitz-2schneidige Schäfte v. *A. fallax* gänzlich verschieden.

8. *A. ACUTANGULUM* (Schrud.) Spitzkantiger L. — St. oberwärts scharf-kantig; B. flach, lineal., ohngefähr v. der Breite des Schaftes, unterseits 5nervig und dch den hervortretenden Mittelnerven scharf-gekielt; Bth.Scheide 2-3sp., halb so lang, als die Dolde; Dolde fast gleich-hoch, kapseltrag.; Stbg. so lang, als das P., zahlos; Zwiebel an den queren Wurzelstock angewachsen, mit ganzen Häuten bedeckt. 4. Auf nassen Wiesen, (stw. dch

d. Geb.) Juni- Aug. *A. acutangulum* Willd. *A. angulosum* Pollich und der meisten Aut. *A. angulosum* var. *major*. Trev. Bth. rosenroth. B. kaum 2 Linien breit, getrocknet dchscheinend, mit stärkern und schwächern Nerven dchzogen, der Mittelnerven dicker; bei der vorigen Art ist er nicht dicker.

IV. Rotte. *Scorodon*. W. zwiebelig. Die St. unterwärts oder bis zur Mitte beblättert. Die B. nicht röhrig. Die Stbg. einfach, oder abwechselnd an der Basis mit einem kurzen, stumpfen Zahne versehen, in dem P. ganz unten eingefügt.

a. Die Stbg. abwechselnd breiter, aber an der Basis nicht gezähnt.

9. *A. MOSCHATUM* (L.) Bisam-L. — Der St. stielrund, unterwärts beblättert; B. borstlich - pfriemlich, *stielrund*, gefurcht, *schmal- und tief-rinnig*, am Rande fein-wimperig-rauh; Bth.Scheide 2klappig, stachelspitzig; Dolde locker, kapseltragend; *Stbg.* um den dritten Theil *kürzer, als das P., alle einfach*; Zwiebelhäute an der Spitze zuletzt netzig-faserig. 4. Auf trocknen, felsigen Hügeln der wärmeren Gegenden, (bei Fiume.) Juli. Aug. Rb. ic. 5. f. 615. *A. setaceum* W. u. Kit. pl. r. h. t. 68. Bth. weisslich, mit einem purpurnen Rückenstreifen oder überall röthlich; nach Kitaib. wie Fichtenzapfen, nicht wie Biesam riechend. J.

10. *A. SAXATILE* (MBieb.) Stein-A. — Der St. stielrund, an der Basis beblättert; B. lineal. - pfriemlich, *stielrund*, gefurcht, *schmal- und tief-rinnig*, am Rande kahl; Bth.Scheide 2klappig, lang-stachelspitzig; Dolde konvex, kapseltragend; *Stbg. fast noch einmal so lang, als das P., alle einfach*; Zwiebelhäute ungeth. 4. In Felsenspalten, vom Monte Spaccato an am ganzen südl. Abhange des Kalkgebirges bis Opschina, (Tommas.) Aug. Sept. Bth. weiss oder schwach bleichröthlich, mit einem dunkleren Rückenstreifen. D.

11. *A. OCHROLEUCUM* (W. u. Kit. 2. t. 186.) Gelblichweisser L. — Der St. stielrund, an der Basis beblättert; B. lineal., *flach*, unterseits durch 2-3 mehr hervortretende Nerven scharf-gekielt, getrocknet viel-nervig, mit 2-3 stärkern Nerven; *Blattscheiden an der Spitze quer-abgeschnitten*; *Bth.Scheide 2klappig, kürzer, als die Bthstiele*; Dolde fast kugelig, kapseltragend; *Stbg. zuletzt noch einmal so lang, als das P., alle einfach*; Zwiebelhäute an der Spitze unregelmässig-gespalten. 4. An felsigen O. in Krain und im Littorale, (bei Cilli in Steyerm., bei Laibach und auf dem Monte Nanas.) Juli. Aug. D. fl. 2. p. 520., mit Ausschl. des Stand O. Rb. ic. 5. f. 659. *A. ericetorum* Thor. *A. ambiguum* DC. *A. appendiculatum* Ramond. Bth. gelblichweiss oder weisslich. D.

12. *A. SUAVEOLENS* (J. ic. rar. 2. 361.) Wohlriechender L. — Der St. stielrund, an der Basis beblättert; B. lineal., *flach, etwas rinnig*, unterseits scharf-gekielt, getrocknet vielnervig, mit 2-3 stärkern Nerven; *Blattscheiden an der Spitze schief-abgeschnitten*; *Bth.Scheide 2klappig, kürzer, als die Bthstiele*; Dolde fast kugelig, kapseltragend; *Stbg. 1½mal so lang, als das P., alle einfach*; Zwiebelhäute an der Spitze unregelmässig-gespalten. 4. Auf moorigen, sumpfigen Wiesen, (Unterösterreich, Valle di Vestino in

Tyrol, Zermatten im Wallis; Erdinger Moos bei Freising und wahrscheinlich noch weiter gegen München hinauf, Dr. Einsele; im Riede bei Memmingen in Schwaben; bei Dachau in Oberbayern.) Juli. Aug. P. hell-purpurn.

b. Die Stbg. an der Basis beiderseits mit einem kurzen, stumpfen Zahne versehen; die Dolde kapseltragend.

13. A. STRICTUM (Schräd.) Steifblättriger L. — Der St. stielrund, an der Basis beblättert; B. lineal, oberseits gerinnt, gegen die Spitze zu flach, unterseits fast halbstielrund, kahl, schwachnervig; Bth.Scheide 2klappig; Dolde fast kugelig, kapseltragend; *Stbg. abwechselnd an der Basis beiderseits 1zählig, Zähne viel kürzer, als der Stbf.; Zwiebelhäute zuletzt durchaus netzig-faserig.* 4. An felsigen O. (Böhm. im Kugelbad bei Prag; Fürstenth. Götting. an den Felsabhängen des Bielsteines, zwischen Albugen und dem Meissner im Hessischen; Krain; im Nikolaithale des Wallis.) Juli. D. fl. 2. p. 523., mit Ausschl. aller Stand O., ausser des Böhmischen. A. reticulatum Presl. A. volhynicum Bess. A. suaveolens Gaud., nicht Schräd. Bth. hell-purpurn.

c. Die Stbg. an der Basis beiderseits mit einem kurzen, stumpfen Zahne versehen; die Dolde zwiebeltragend.

14. A. SATIVUM (L.) Knob.-L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; B. breit-lineal, flach, etwas rinnig; Bth.Scheide 1klappig, sehr lang-geschnäbelt, hinfällig; Dolde zwiebeltragend; *Stbg. abwechselnd an der Basis beiderseits 1zählig, Zähne viel kürzer, als der Stbf.; Zwiebel gehäuft, Zwiebelchen eyf.-länglich, in eine Haut eingewickelt.* 4. Wird zum Küchengebrauche kultiv. Juli. Aug. A. sativum a. D. fl. 2. p. 526. Bth. schmutzig-weiss. Der St. vor der Blthezeit in einen Ring zsgedreht, wie bei der folgenden Art. Kultiv.

15. A. OPHIOSCÓRODON (Don.) Schlangen-L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; B. breit-lineal, flach; Bth.Scheide 1klappig, sehr lang-geschnäbelt, hinfällig; Dolde zwiebeltragend; *Stbg. abwechselnd an der Basis beiderseits 1zählig, Zähne viel kürzer, als der Stbf.; Zwiebel gehäuft, Zwiebelchen rundlicheyf., in eine Haut eingewickelt.* 4. Wird zum Küchengebrauche unter dem Namen Rockenbolle, (Rocambole Französ.) kultiv. Juli. Aug. Scheint eine Variet. der vorhergeh. Art. Das A. Ophioscorodon Link. gehört zu A. controversum Schräd., und ist doch eine einfache Zwiebel verschieden. Kultiv.

V. Rotte. PORRUM Tournef. Die W. zwiebelig. Der St. unterwärts oder bis zur Mitte beblättert. Die Stbg. abwechselnd breiter, 3fach-haarspitzig, die mittlere Haarspitze das Stbk. tragend, die seitenst. fadlich, meist zsgedreht.

16. A. PORRUM (L.) Gemeiner L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert, aus dem Mittelpunkt einer einfachen Zwiebel hervorgehend; B. flach; Dolde kapseltragend, kugelig; PBlätter am Kiele rauh; Stbf. ein wenig länger, als das P., die 3 innern 3fach-haarspitzig, die mittlere Haarspitze Stbk. tragend, halb

so lang, als der Stbf. selbst. ☉ und 4. Wird zum Küchengebrauche überall kultiv. und kommt in wärmern Gegenden hie und da um Gärten und in Weinbergen verwildert vor. Juni. Juli. Bth. hell-purpurn. B. am Rande bald kahl, bald gewimpert, wie bei den 2 folg. Arten, auch die Stbf. sind bei diesen allen mehr oder weniger wimperig-gezähnel, besonders an der Basis. Kultiv.

17. A. AMPELOPRASUM (L.) Sommer-L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; Zwiebel seitenst., fest, brutzwiebelig; B. flach; Dolde kapseltragend, kugelig; P. auswendig rauh; Stbf. ein wenig länger, als das P., die 3 innern 3fach-haarspitzig, die mittlere Haarspitze Stbk. tragend, so lang, als der Stbf. selbst. 4. Auf Aeckern, (bisher in der Gegend von Basel bei Wiesa, Crenzach und Neudorf; im Littorale.) Juni. Juli. Die Zwiebel habe ich nicht gesehen, die Diagnose entwarf ich nach einem von Schleicher erhaltenen, ohne Zweifel kultiv. Exemplare. Bth. hell-purpurn.

18. A. ROTUNDUM (L.) Runder L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; Zwiebel aus zahlreichen, von einer Haut eingeschlossenen, Zwiebelchen gebildet; B. flach; Dolde kapseltragend, fast kugelig; die seitenst. Bthstiele viel kürzer; PBlätter auf dem Rücken rauh; Stbk. eingeschlossen, nicht so lang, als das P.; die 3 innern Stbf. 3fach-haarspitzig, die mittlere Haarspitze Stbk. tragend, 3mal kürzer, als der Stbf. selbst. 4. Auf Aeckern unter der Saat, (Rheingebiet von Basel bis Bingen; Maingebiet bis Würzburg; Thüringen, Unterösterreich, Böhmen, Mähren, Brandenburg, bei Frankfurt an d. O., Preussen.) Juli. Aug. A. Ampeloprasum WKit. t. 82.

19. A. SPHAEROCÉPHALUM (L.) Rundköpfiger L. — Der St. bis zur Mitte beblättert; B. halbstiellrund, oberseits tief-rinnig, röhrig; Dolde kapseltragend, kugelig, zuletzt fast kegelf.; PBlätter mit einem glatten Kiele; Stbk. hervortretend; die 3 innern Stbf. 3fach-haarspitzig, die mittlere Haarspitze Stbk. tragend, halb so lang, als der Stbf. selbst. 4. Auf Aeckern unter der Saat, (stw. dch. d. Geb.) Juni. Juli. A. veronense Pollin. Bth. purpurn. B. oft, doch nicht immer, an der Basis inwendig hohl. Eine Form deren innere Bthstiele verlängert sind, die oft vorkommt, ist nach Bertoloni Allium descendens L. spec.

20. A. VINEALE (L.) Weinberg-L. — Der St. bis zur Mitte beblättert; B. stielrund, oberseits schmal-rinnig, inwendig hohl; Dolde zwiebeltragend; Stbg. länger, als das P., die 3 innern 3fach-haarspitzig, die mittlere Haarspitze Stbk. tragend, länger, als der Stbf. selbst. 4. Auf Aeckern und an kult. O. Juni. Juli. A. arenarium L. fl. succ., nach Fries. Bth. purpurn. Var.:

β. Die Dolde kapseltragend, ohne Zwiebelchen: A. descendens Koch Synops. ed. 1., nicht Linn.

21. A. SCORODÓPRASUM (L., mit Ausschl. der var. β.) Sand-L. — Der St. bis zur Mitte beblättert, gerade; B. flach, am Rande rauh; Dolde zwiebeltragend; Stbg. kürzer, als das P., abwech-

selnd 3fach-haarspitzig, die mittlere Haarspitze Stbk. tragend, halb so lang, als der Stbf. selbst. 4. Auf Wiesen, (stw. dch d. Geb., in der Schweiz nur bei Basel.) Juni. Juli. *A. arenarium* Sm. und der meisten Autor. Rupp. jen. t. 2. f. 2. Bth. schwarz-purpurn. — Zwischen *A. scorodoprasum* und *A. arenarium* der Autor. konnte ich bisher keinen wahren Unterschied finden.

VI. Rolte. *CODONOPRASUM*. Die W. zwiebelig. Der St. bis zur Mitte beblättert. Stbg. sämmtl. einfach, über der Basis der PBlätter eingefügt. Bth.Scheide 2klappig, die eine Klappe lang gehört.

22. *A. OLERACEUM* (L.) Gemüse-L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; *B.* lineal., rinnig, gegen die Spitze zu flach, unterseits vielrillig; Bth.Scheide 2klappig, bleibend, *die eine Klappe lang-geschnübelt*; *Dolde zwiebeltragend*; *Stbg. zahlos, ohngefähr so lang, als das P.*; PBlätter stumpf. 4. Auf Aeckern und an kult. O. Juni. Juli. Bth. weisslich-grün oder hell-schmutzgrünlich, mit einem grasgrünen oder purpurrothen Rückenstreifen. Kommt vor:

α. angustifolium; *B.* 1-1½ Linien breit, daher mehr rinnig; *A. oleraceum* Koch Synops. ed. I. *A. oleraceum* D. fl. 2. S. 529.

β. latifolium; *B.* 3 Linien breit, daher flacher; *A. carinatum* Pollich. palat., *A. oleraceum* *β.* D. fl., *A. oleraceum* *β. complanatum* Fries novit., Haller de Allio. t. 2. Abbildg rechts. Das Allium mit zwiebeltragender Dolde, 2höriger Klappe und stielrunden *B.* Haller de Allio. t. I. Abbildg rechts, ist mir jetzt zweifelhaft.

23. *A. CARINATUM* (L. spec. 426.) Vielfurchiger L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; *B.* lineal., rinnig, gegen die Spitze hin flach, mit 3-5 hervorragenden Streifen; Bth.Scheide 2klappig, bleibend, *die eine Klappe sehr lang-geschnübelt*; *Dolde zwiebel- oder kapseltragend*; *Stbg. zahlos, zuletzt noch einmal so lang, als das P.*; PBlätter länglich-verkehrteyl., an der Spitze sehr konkav, abgeschnitten-stumpf, etwas ausgerandet. 4. Auf buschigen Hügeln, auch an kult. O., (sehr zerstreut; Schw., südl. Tyrol, Frankf. an d. O., Berlin.) Juni. Juli. *A. carinatum* Fries. D. fl. 2. p. 528. *A. violaceum* Willd. *A. flexum* W. und Kit. pl. rar. hung. t. 278, Koch Synops. ed. I. *A. flexuosum* Host. Bth. rosenroth, getrocknet violett. *B.* unterseits fast glatt, schwach-stumpfrillig, aber weder gefurcht, noch gekielt. Var.:

β. capsuliferum, Zwiebelchen in der lockern Dolde fehlend; *A. montanum* Sibth. und Sm. fl. gr. prodr., *A. pulchellum* Don., *A. paniculatum* Rb. ic. 5. f. 604. Redout. lil. 5. t. 252.

24. *A. FLAVUM* (L.) Gelber L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; *B.* lineal., markig, (an der lebenden Pfl.) ganz glatt, unterseits konvex, oberseits oft seicht-rinnig, *am Rande stumpf*; Bth.Scheide 2klappig, bleibend, *die eine Klappe lang-geschnübelt*; *Dolde kapseltragend*; *Stbg. zahlos, zuletzt noch einmal so lang, als das P.*; PBlätter abgeschnitten oder gestutzt. 4. Auf rauen, kräuterreichen Hügeln, (Südtirol, Unteröstr., Mähr.)

Juli. Aug. J. a. t. 141. St. h. 34. D. fl. 2. p. 532., mit Ausschl. d. var. β . Bth. schön-gelb. Die B. sind immer plattgedrückt und oft seicht-rinnig, aber nie stielrund oder röhrig. D.

25. A. PALLENS (L. spec. 427.) Blasser L. — Der St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; B. lineal., grasartig, innen hohl, an der Basis schwach-rinnig, oberseits flach, unterseits kantig-gefurcht; Bth.Scheide 2klappig, bleibend, die eine Klappe sehr lang-geschnäbelt; Dolde kapseltragend; Stbg. zahnlos, kürzer, als das P.; PBlätter abgerundet-stumpf, oder etwas gestutzt. 4. Auf sonnigen Hügeln, (Insel Losino bei Istrien.) Juli. Aug. A. paniculatum Koch Synops. ed. 1. Bth. bleich oder grünlich, mit einem grünen oder rostbraun-grünen Rückennerven. Dch die unten lanzettl. sich allmählig in eine lange Spitze verschmälernden Klappen der Bl.Scheide zeichnet sich diese Pfl. vorzugsweise vor A. oleraceum aus, bei welchem die Bl.Scheiden eyf. und plötzlich in die Spitze zsggezogen sind. J.

26. A. PANICULATUM (L. sp. 428.) Rispiger L. — St. stielrund, bis zur Mitte beblättert; B. schmal, lineal., halbstielrund, rinnig, nicht hohl (Bertoloni.); die 2klappige Bth.Scheide bleibend, die eine Klappe lang-geschnäbelt; Dolde kapseltragend; Stbf. zahnlos, kürzer, als das P.; Blättchen des P. spitzlich. 4. Auf sonnigen Hügeln, (Istrien und Insel Brioni, nach Bertoloni.) Juni. Juli. Bth. blass-rosenfarben, halb so gross, wie bei A. pallens. Bertoloni bezeichnet die B. als unterseits gestreift, Treviranus aber, als unterseits glatt: Die Pfl. ist im hiesigen Garten ausgegangen. J.

VII. Rotte. SCHOENOPRASUM. Die W. zwiebelig. Die B. vollkommen-röhrig, stielrund oder halbstielrund. Bth.Scheide kurz, 2klappig.

27. A. SCHOENOPRASUM (L.) Schnitt-L. — Schaft nackt oder an der Basis armblättrig; B. lineal., pfriemlich, gleichf.-stielrund oder aus dem Stielrunden zsggedrückt, vollkommen-röhrig; Bth.Scheide 2klappig, ohngefähr so lang, als die Dolde; Dolde kapseltragend, fast kugelig; PBlätter lanzettl., spitz; Stbg. kürzer, als das P., zahnlos. 4. An feuchten O. und Flussufern, (sehr häufig am Moselufer, auch am Bodensee und Oberrheine und hin und wieder am Ufer des Rheines unterhalb der Einmündung der Mosel; in der Schweiz hin und wieder, am Ufer der Elbe.) Juni, Juli. Schk. t. 91. Bth. blass-purpurn. Var.:

β . alpinum, grösser; die PBlätter breiter und grösser, schmaler zulaufend, an der Spitze zurückgekrümmt: A. Schoenoprasum β . alpinum Gaud. A. foliosum Clairon, bei DC. — Das A. sibiricum Willd. wird in der Fl. altaica mit dieser Variet. vereinigt, und nicht einmal als Variet. davon getrennt. Die Pflanze, welche ich unter diesem Namen in Gärten und Herbar. sah, gehört allerdings zur Variet. β ; ich konnte sie aber bisher dch beständige Merkmale von der Variet. α . nicht unterscheiden. Die Variet. alpina ist häufig auf den A., Karpaten und Sudeten und steigt mit den Flüssen hinab.

28. *A. ASCALONICUM* (L.) Levantischer L. — Der St. gleich, an der Basis beblättert; *B.* pfriemlich, gleichf.-stielrund, vollkommen-röhrig; Bth. Scheide 2klappig, kürzer, als die kapsel- oder zwiebeltragende Dolde; *Stbg.* ein wenig länger, als das P., abwechselnd an der Basis beiderseits kurz-1zählig. 4. Wird zum Küchengebrauche gebauet, (in den Weinbergen bei Fiume verwildert) Blühet selten. Bth. weiss. Kultiv.

29. *A. CEPA* (L.) Gemeine Zwiebel. — Der St. an der Basis beblättert, unterhalb der Mitte bauchig-aufgeblasen; *B.* vollkommen-röhrig, stielrund, bauchig; Dolde kapseltragend, kugelig; *Stbg.* länger, als das P., wechselweise an der Basis beiderseits kurz-1zählig. 4. Wird überall gebauet. Juni. Juli. Bth. weisslich. Kultiv.

30. *A. FISTULOSUM* (L.) Röhriger L. — Der St. an der Basis beblättert, in der Mitte aufgeblasen; *B.* vollkommen-röhrig, stielrund, bauchig; Dolde kapseltragend, kugelig; *Stbg.* zahlos, länger, als das P. 4. Wird zum Küchengebrauche gebauet. Juni. Juli. *A. altaicum* Pall. Bth. weisslich. Kultiv.

III. Gruppe. *HEMEROCALLIDEEN*. R. Brown. Prod. fl. nov. holl. 295. P. 1blättrig, getheilt. Kapselfächer wenigsamig. Gestalt des S. mannigfach, (bei den unsrigen) mit einer schwarzen Samenhaut.

13. *HEMEROCALLIS* (L.) Tagblume. — P. trichterf.; Röhre 1blättrig, walzlich; Saum 6th. Stbg. auf der Basis des P. eingefügt, pfriemlich, abwärts geneigt. S. kugelig.

1. *H. FLAVA* (L.) Gelbe T. — *PZpfl* flach, nervig, aderlos. 4. An sumptigen, schattigen O., (im untern Wallis; in Krain; bei München in der Nähe der Hirschau.) Juni. Schk. t. 98. St. h. 7. Bth. schön gelb.

2. *H. FULVA* (L.) Rothgelbe T. — *PZpfl* nervig und aderig, die innern am Rande wellig. 4. Auf Wiesen und an felsigen, grasigen O., (im untern Wallis und in der Gegend von Aelen; im C. Zürich, auf nackten Felsen bei Salzburg.) Juli. Aug. Dod. pempt. 204. Bth. rothgelb.

14. *ENDYMION* (Dumortier.) Endymion. — P. glockig, 6th., B. an der Basis zsgewachsen. Stbg. gerade, unterhalb der Mitte der PB. eingefügt, angewachsen-herablaufend. S. fast kugelig. — *Agraphis* N. v. E. gen. 4. 12.

1. *E. NUTANS* (Dumort.) Ueberhangender E. — B. breitt-lineal.; Tr. überhangend; Bth. glockig-walzlich, *PZpfl* an der Spitze zurückgekrümmt; DeckB. gezweiet. 4. In schattigen Hainen, (bei Coesfeld und Kürenzig unweit Jülich, Löhr; in Westphalen an einer Stelle in dem kleinen Haine hinter dem Bauland; in den Niederlanden ausser dem Gebiete unserer Flora nicht selten.) Mai. *Hyacinthus non scriptus* L. *Scilla nutans* Sin. engl. bot. t. 377. D. fl. 2. p. 554. *Agraphis nutans* Link. D.

15. **MÚSCARI** (Tournef.) Bisamhyacinthe. — P. kugelig-eyf. oder walzlich, an der Mündung eingeschnürt; Saum sehr kurz, 6-zähnig. N. v. E. gen. 4. 9.

1. **M. COMOSUM** (Mill.) Schopfbliithige B. — Bth. kantig-walzlich, *die untern entfernt, wagerecht-abstehend*, die obern länger-gestielt, aufrecht, genähert, schopfig, geschlechtslos; B. lineal., rinnig. 2. Auf Aeckern und in Weinbergen, (stw. dch d. Geb., nördl. bis Quedlinburg.) Mai. Juni. *Hyacinthus comosus* L. J. a. t. 126. Bth. bräunlich, an der Basis und Spitze olivengrün, die obern nebst den Bthstielen und der Spitze des St. amethystblau.

2. **M. RACEMOSUM** (Mill.) Traubige B. — Bth. eyf., *überhangend, gedrunken*, die obersten aufrecht, geschlechtslos; B. lineal., rinnig, bogig-zurückgekrümmt, schlapp. 2. Auf Aeckern und in Weinbergen, (stw. dch d. Geb.) Apr. Mai. *Hyacinthus racemosus* L. J. a. t. 167. Bth. satt-blau, bereift; Zähne an der Spitze weiss.

3. **M. BOTRYOIDES** (Mill.) Steifblättrige B. — Bth. fast kugelig-eyf., *überhangend, zuletzt mässig-entfernt*, die obersten aufrecht, geschlechtslos; B. lanzettl.-lineal., rinnig, nach der Basis verschmälert, *aufrecht*. 2. Auf Aeckern und in Weinbergen, (Steyerm., westl. Schw., Elsass, Oberbaden, Württemberg, bei München, bei Mainz, Lüttich, Coesfeld in Westphalen, Werthheim, Würzburg, Arnstadt und Halle in Thüringen.) Apr. Mai. *Hyacinthus botryoides* L. St. h. 7. Bth. dunkelblau.

IV. Gruppe. **ABAMEEN**. P. 6blättrig, Samenhaut locker, an der Basis und Spitze mit einem Anhängsel.

16. **NARTHÉCIUM** (Moehring. in d. Ephem. 1742. t. 5. f. 1.) Narthecie. — P. 6blättrig. Honigbehälter fehlend. Stbf. bärtig. Gf. ungeth.; N. 3seitig. S. an der Basis und Spitze fädlich. N. v. E. gen. 4. 1.

1. **N. OSSIFRAGUM** (Huds.) Sumpf-N. — Die WB. lineal.-schwertf.; Kapsel spitz, ein wenig länger, als das bleibende P. 2. An torfigen und sumpfigen, moorigen O. in NordD., (Aachen, dch Westphal, Ostfriesland, Lüneb. bis nach Holstein.) Juli. Aug. Fl. d. t. 42. N. anthericoides Hoppe. *Anthericum ossifragum* L. *Abama ossifraga* DC. fl. fr.

CXXIX. Ordng. COLCHICACEEN. DC. fl. fr. 3. p. 192.

P. 6sp. oder 6blättrig. Stbg. 6, dem Fruchtkn. oder dem P. eingefügt; Stbk. auswärtsgewendet. *Fruchtkn.* frei, 1, 1griffelig oder 3, jeder mit einem Gf. oder einer N. endigend und an der Basis mehr oder weniger zshängend, *mehreyig*; *Eychen an die mittelpunktst. Winkel angeheftet*. *Frucht* einwärts aufspringend, *bald aus 3 getrennten, 1fächerigen Balgkapseln zsgesetzt, bald*

doch die zugehefteten Balgkapseln *eine 3klappige, und doch die einwärtsgebogenen Klappenränder 3fächerige Kapsel* darstellend, deren Fächer bei der Reife zuletzt auseinandertreten.

1. **BULBOCÓDIUM** (L.) Uchtblume. — P. 6blättrig, trichterf.; Nägel verlängert, in eine Röhre zsschliessend und am Schlunde doch seitenst. Zähne verbunden. Stbg. auf der Spitze der Nägel eingefügt. Fruchtkn. 1; Gf. an der Spitze 3sp. Kapselfächer zuletzt an der Spitze sich trennend und einwärts aufspringend. N. v. E. gen. 6. 8.

1. **B. VERNUM** (L.) Frühlings-U. — 4. Auf Wiesen der wärmern Gegenden, (in der Schw. blos bei Branson, la Barme und Montorge im untern Wallis.) März. Apr. N. v. E. a. a. O. „Bth. hell-violettroth.“ Von dem Aeusseren eines Colchicum. S.

2. **CÓLCHICUM** (L.) Zeitlose. — P. trichterf.; Röhre verlängert. Stbg. auf der Spitze der Röhre eingefügt. Fruchtkn. 1, Gf. 3. Kapsel aufgeblasen; Fächer zuletzt auseinandertretend und an der Spitze einwärts aufspringend. N. v. E. gen. 6. 7.

1. **C. AUTUMNALE** (L.) Herbst-Z. — Saum des P. viel kürzer, als die Röhre, Zpfl wellig-nervig, lanzettl., die äussern verkehrteylanzettf.; Stbg. wechselsweise höher eingefügt; Zwiebel mehrblüthig; B. sich nach den Bth. entwickelnd, *breit-lanzettl., gegen die Basis und die Spitze zu verschmälert*, steif. 4. Auf ziemlich feuchten Wiesen, (überall, aber nördl. nur bis zum 52. Grad, Meyer. Chlor. han.) Aug.-Oct. St. h. 3. Bth. fleischfarben. Die B. erscheinen mit der Frucht im darauffolgenden Frühling. Die Gf. haben anfänglich die Länge der Stbg., zuletzt aber sind sie viel länger und so entsteht *C. patens* Schultz. bot. Ztg. Die im Herbst doch Ueberschwemmungen zurückgehaltenen Bth. sprossen im Frühling mit den B. hervor, sind aber meist kleiner und haben unvollkommene Geschlechtsorgane: *C. vernale* Hoffm.

2. **C. ALPINUM** (DC.) Alpen-Z. — Saum des P. viel kürzer, als die Röhre, Zpfl wellig-nervig, lanzettl.; Stbg. gleichf.-eingefügt (Gay.); Zwiebel 1bth.; B. sich nach den Bth. entwickelnd, *lineal-lanzettl., stumpf, nach der Basis verschmälert*. 4. Auf Wiesen der Athäler, (auf der zwischen dem Wallis und Piemont gelegenen AK. nicht selten.) Blühet im Juli-Aug. und treibt ein wenig später noch in demselben Jahre die B. mit der Frucht. *C. montanum* All. ped., nach Bertol. *C. autumnale* γ. Bertol. fl. ital. Die Pfl. ist nur halb so gross, als die vorhergehende, und ihre Stbk. sind kürzer. Bth. fleischfarb.

3. **C. ARENARIUM** (Waldst. und Kit. pl. rar. hung. 2. S. 195. t. 179.) Sand-Z. — Saum des P. viel kürzer, als die Röhre, Zpfl lanzettl.-lineal., *gerade-nervig*; Zwiebel 1-3blüthig; B. sich nach der Bthe entwickelnd, lanzettl.-lineal., nach der Basis und der Spitze zu verschmälert, rinnig. 4. Auf unbebauten Hügeln, (Gegend um Fasana in Südistrien, Tommasini.) Sept. Octbr. Bth.

3mal kleiner und dunkler gefärbt, wie bei *C. autumnale*, Adern gerade, nicht wellig. J.

3. *VERATRUM* (L.) Germer. — P. 6blättrig. Stbk. quer in 2, eine Scheibe darstellende Klappen aufspringend. Kapseln 3, unterwärts zsgewachsen, einwärts aufspringend, vielsamig. S. an der Spitze flach-zsgedrückt oder geflügelt. Die reifen Kapseln oft gänzlich getrennt. Bth. dch Fehlschlagen vielehig. N. v. E. gen. 2. 10.

1. *V. NIGRUM* (L.) Schwarzer G. — Tr. rispig, filzig; *PZpfl* elliptisch, ganzrandig, weitabstehend, *so lang, als die Bthstielchen*; DeckB. kürzer, als die Bthstielchen; die untern B. breit-elliptisch, kahl. 4. An gebirgigen, waldigen O., (Oestr., Steyerm., Krain, Görz, südl. Tyrol, auf dem Monte Generoso im C. Tessin.) Juli, Aug. J. a. t. 336. Bth. schwarz-purpurn.

2. *V. ALBUM* (L.) Weisser G. — Tr. rispig-flaumig; *PZpfl* länglich-lanzettl., gezähnt, abstehend, *viel länger, als die Bthstielchen*; DeckB. länger, als die Bthstielchen; B. elliptisch oder elliptisch-lanzettl., unterseits flaumig, *schief in eine Scheide verlaufend*. 4. Auf Wiesen d. VorA. und A., (dch d. g. AK. und auf den Mähr., Böhm. und Schles. Gebirgen; auch in Würtemb. an mehreren Stellen.) Juli. Aug. *V. album* α. D. fl. 2. p. 625. *V. album* B. albicans Gaud. Bth. inwendig weisslich, auswendig grasgrün. Var.:

β. *lobelianum*, Bth. blassgrün. *V. lobelianum* Bernhadi in Trommsdorf's Journ. 16. S. 266. *V. album* β. D. fl. 2. p. 625. *V. album* A. Gaud. Die BScheiden nicht blos quer-abgeschnitten, sondern oft auch über die Einfügung des B. vorne noch ein wenig hinaufgezogen, was jedoch kein stichhaltiges Kennzeichen abgibt.

4. *TOFIELDIA* (Huds.) Toffjeldie. — P. 6blättrig. Stbk. mit 2 Längsritzen aufspringend. Gf. pfriemlich. Kapseln 3, bis über die Mitte zsgewachsen, einwärts an der Spitze aufspringend, vielsamig. S. länglich, stielrund. N. v. E. gen. 2. 11.

1. *T. CALYCVLATA* (Wahlenb.) Kelchblüthige T. — Bthstielchen doppeldeckblättrig; das eine DeckB. länglich, die Basis des Bthstielchens stützend, *das andere kelchf., 3lappig, der Bth. genähert*; B. vielnervig, verschmälert-sehr spitz. 4. Auf sumpfigen Wiesen der Berge, VorA. und A., auch auf den Ebenen, (dch d. g. AK. und in Schwaben und Bayern auf dem rechten Donauufer bis Oestr.; sodann in Mähr., Böhm., Schles., bei Frankfurt a. d. O., Berlin und Halle.) Juli. Aug. St. h. 78. n. 6. *T. palustris* Hopp. und Sternb. Denkschr. 1815. p. 153. *T. alpina* Smith. linn. trans. *Anthericum calyculatum* var. α. L. Flor. suec. 107. *A. Pseudoasphodelus* Jacq. *Scheuchzeria Pseudoasphodelus* Scop. *Narthecium iridifolium* Vill. *Heriteria anthericoides* Schrank. *Helonias borealis* Willd. *Hebelia allemannica* und *collina* Gmel. bad. 2. t. 1. Bth. gelblich, Aehre verlängert-walzlich, oder längl., oder selbst kugelig. Diese letztere kommt auf magerem Torfboden und

hohen Bergen vor: *T. palustris* γ . *capitata* Hoppe. *T. glacialis* Gaud. St. h. 78. 7. Die Pfl. spielt ferner mit entferntstehenden Bth., Varietas *sparsiflora* Sonder; und mit verlängerten unteren Bthstielen, welche 2-5 Bth. tragen: Varietas *ramosa* Hoppe.

2. *T. BORREALIS* (Wahlenb.) Nordische *T.* — *Bthstielchen an der Spitze nackt*, an der Basis mit einem einfachen, 3lappigen DeckB.; B. meist 3nervig, Nerven entfernt. 4. Auf moorigen O. der höchst. A., am ewigen Schnee. Juli. Aug. *T. alpina* Hopp. und Sternb. Denkschr. 1813. S. 152. *T. palustris* Huds. angl., Smith engl. fl. *Anthericum calyculatum* β . L. fl. snec. — Die Benennung von Hudson ist allerdings die ältere, aber die Namen der *Tofieldia palustris* und der *T. alpina* wurden so oft verwechselt, dass ich keinen davon voranstellen wollte.

CXXX. Ordng. JUNCACEEN. Bartling ord. nat. p. 37. Junceae R. Brown prodr. 237. DC. fl. fr. 3. p. 192.

P. unterst., trockenhäutig, 6blättrig; *B. balgf.*, einen 6blättrigen K. darstellend. Stbg. 6, seltner 3, den PZpfln gegenst.; Stbg. pfriemlich, steif; Stbk. 2fächerig. *Fruchtkn. 1.* Gf. 1; N. 3, fädlich, behaart. Kapsel vielsamig, 3klappig, die Klappen in der Mitte eine Scheidewand mit dem Samenträger tragend; oder 3samig, die Klappen ohne Scheidewand und an der Basis einen einzigen S. enthaltend. Keim fast walzlich; Eyweiss fleischig. — Bth. ebensträussig; Ebenstrauss oft in ein Köpfchen zsgezogen; bei *J. trifidus* auf einen einzigen Ast und oft eine einzige Bth. zurückgeführt. Wir nennen den Ebenstrauss der Juncaceen und Cyperaceen Spirre (Anthela). Ein jeder Ast und jedes Aestchen der Spirre ist an der Basis mit 2 DeckB. versehen, von denen das äussere grössere, in eine blattartige oder pfriemliche Spitze auslaufende, die Hülle, (*involucrum*;) genannt wird, wenigstens dasjenige, welches sich an der Basis der untern Aeste befindet; das andere kleinere, innere, dem äussern gegenständige, die Basis des Astes und Aestchens wie ein Röhrchen einhüllende heisst Stiefelchen (*Ochrea*). Die DeckB. scheinen gegenst., sind es aber eigentlich nicht, denn das eine, und zwar das innere, ist ein wenig höher eingefügt.

1. **JUNCUS** (L., mit Ausschl. v. Arten.) Simse. — *P.* 6blättrig; *B.* balgartig, krautig-trockenhäutig. Stbg. 6, seltner 3. Kapselklappen in der Mitte scheidewandtragend. S. zahlreich. N. v. E. gen. 2. 6.

1. Rotte. Die unfruchtbaren Halme pfriemlich, so wie die fruchtbaren ohne Knoten, an der Basis von blättertragenden oder blattlosen Scheiden eingeschlossen. Die B. vollkommen, oder auf eine Stachelspitze zurückgeführt. S. mit Anhängseln,

die Samenhaut an beiden Enden in ein Säckchen erweitert. — Die unfruchtbaren Halme pfriemlich, zugespitzt, ganz einfach. Die Spirre aus einzelnen Bth. oder Ebensträusschen zsgesetzt, ausgebreitet oder zsgeballt, eigentlich endst., erscheint aber wegen des untern, aufrechten, und eine Fortsetzung des Halmes darstellenden Hüllblattes oft seitenständig.

1. **J. MARITIMUS** (Lam.) Strand-S. — *Halm nackt; WB. stielrund, stechend*, knotenlos; Spirre doppelt-zsgesetzt, aufrecht; PBlätter lanzettl., die äussern spitz, die innern stumpf, ganz; *Kapsel* elliptisch, stachelspitzig, *so lang, als das P. 2.* An feuchten und sumpfigen O. am Meeresufer, (am Adriat. Meere; an der Küste von Mecklenb. und Holst., auf den Inseln Ostfrieslands.) Juli. Aug. St. h. 71. D.

2. **J. ACUTUS** (L., var. *a.*) Spitzige S. — *Halm nackt; WB. stielrund, stechend*, knotenlos; Spirre mehrfachzsgesetzt, geballt; die äussern PBlätter lanzettl., ziemlich stumpf, gekielt, die innern eyf., sehr stumpf, tief-ausgerandet; *Kapsel* rundlich-eyf., zugespitzt, *noch einmal so lang, als das P. 2.* An feuchten, schlammigen O. am Ufer des Adriat. Meeres, Mai. Juni. Engl. bot. 1614. St. h. 71. D.

3. **J. JACQUINI** (L.) Jacquin's S. — *Halm nackt*, oberwärts 1blättrig; wurzelst. Scheiden stachelspitzig; *Köpfchen endst., 4-8 bth., gestielt von dem HüllB. entfernt*; PBlätter lanzettl., spitz, halb so lang, als die spitze ausgerandete Kapsel; *Stbf. kaum halb so lang, als das Stbk.; W. kriechend.* 2. An feuchten O. der höhern A., (dch d. g. AK.) Juni. Juli. J. a. t. 221. St. h. 71.

II. Rotte. Die unfruchtbaren Halme pfriemlich, so wie die fruchtbaren an der Basis mit blattlosen oder auch stachelspitzigen Scheiden eingeschlossen. Samenhaut die Nuss dichtumgebend (Samen nicht mit einem Anhängsel. — Spirre seitenst. oder vielmehr trugseitenst.; das untere HüllB. ist dem Halme ähnlich, und setzt den Halm fort, so dass die Spirre aus der Seite des Halmes selbst hervorzugehen scheint. Sonst Alles, wie bei der vorhergeh. Rotte.

4. **J. CONGLOMERATUS** (L.) Geknäuelte S. — *Halm nackt*, feingerillt, mit ununterbrochenem Marke angefüllt; wurzelst. Scheiden blattlos; *Spirre seitenst., doppeltzsgesetzt*, dichtbth.; PBlätter lanzettl., sehr spitz; Gf. fast fehlend; *Kapsel verkehrteyf., gestutzt, mit der auf einer erhabenen Zitze sitzenden Basis des Gf. endigend.* 2. An sumpfigen und feuchten O., (dch d. g. Geb., aber doch nicht überall.) Mai-Juli, um ein Monat früher, als *J. effusus*. Leers t. 13. f. 1. St. h. 71. Var. mit ausgebreiteter Rispe. — Die Scheiden lichtbraun und die Bth. 3männig, wie bei der folgenden Art, mit der sie jedoch lebend nicht verwechselt werden kann.

5. **J. EFFUSUS** (L.) Ergossene S. — *Halm nackt*, ganz glatt, getrocknet feinrillig, mit ununterbrochenem Marke angefüllt; wurzelst. Scheiden blattlos; *Spirre seitenst. doppeltzsgesetzt*, dichtbth.; PBlätter lanzettl., sehr spitz; Gf. fast fehlend; *Kapsel verkehrteyf., eingedrückt gestutzt, mit der kurzen, in einem Grübchen sitzenden Basis des Gf. endigend.* 2. An feuchten O. überall. Juni. Juli. Leers t. 13. f. 2. St. h. 71. Var. mit geknäuelter Rispe.

6. *J. DIFFUSUS* (Hoppe.) Ausgebreitete S. — *Halm nackt, feingerillt*, mit ununterbrochenem Marke angefüllt; wurzelst. Scheiden blattlos; *Spirre seitenst., doppeltzsgesetzt, dichtbth*; PBlätter lanzettl., sehr spitz; Gf. bemerklich; *Kapsel verkehrteyff, stumpf, stachelspitzig*. 2. In Gräben, (bei Regensburg, in Brandenb., Odesloe in Holst., Schnepfenthal in Thüringen und bei Appenzell in der Schw. und wahrscheinlich noch an andern O.) Juni, Juli. St. h. 77. Vom Habitus des *J. glaucus*, auch die Scheiden sind schwarz-purpurn, aber der St. ist grasgrün, nicht bläulichgrün, feiner-gerillt und mit ununterbrochenem Marke angefüllt; v. *J. conglomeratus* untersch. sie sich dch die Farbe der Scheiden, die kastanienbraunen, 6männigen Bth. und den deutlichen Gf.

7. *J. GLAUCUS* (Ehrh.) Bläulichgrüne S. — *Halm nackt, tief-gerillt, mit fächerig-unterbrochenem Marke angefüllt*; wurzelst. Scheiden blattlos; *Spirre seitenst., doppeltzsgesetzt, dichtbth*; PBlätter lanzettl., sehr spitz; Gf. bemerklich; Kapsel länglich-elliptisch, stumpf, stachelspitzig. 2. An feuchten O. Juni-Aug. St. h. 71. *J. inflexus* Leers t. 13. f. 3. und vieler Autor. und, wie es scheint, auch *L. J. effusus* Pollich. *J. tenax* Poir. Bth. 6männig. Scheiden schwarzpurpurn.

8. *J. PANICULATUS* (Hopp. Decad. gram.) Rispige S. — *Halm nackt, tief-gerillt, mit fächerig-unterbrochenem Marke angefüllt*; wurzelst. Scheiden blattlos; *Spirre seitenst., doppeltzsgesetzt, locker*; die äussern Aeste sprossend-verlängert; Bth. entfernt; PBlätter lanzettl., sehr spitz; Gf. bemerklich; Kapsel länglich-elliptisch, stumpf, stachelspitzig. 2. Am Ufer des Adriat. Meeres. Juli. Aug. St. h. 77. Spirre strohgelb, auch die Kapseln sind strohgelb, letztere seltner braun; Halm, wie bei *J. glaucus* gerillt und zuverlässig mit fächerigem Marke angefüllt, doch untersch. sich die Pfl. dch die Form der Rispe und ihre Farbe ohne Schwierigkeit; vielleicht sind an der lebenden Pfl. mehrere Merkmale zu finden. D.

9. *J. BALTICUS* (Willd.) Baltische S. — *Halm nackt, ganz glatt, getrocknet schwach-rillig*, mit ununterbrochenem Marke angefüllt; wurzelst. Scheiden blattlos; *Spirre seitenst., doppeltzsgesetzt*; PBlätter ey-lanzettl., stachelspitzig, die innern ziemlich stumpf; Gf. bemerklich; *Kapsel elliptisch*, stumpf, stachelspitzig. 2. Auf sandigen, etwas feuchten O. am Strande der Nord- und Ostsee. Juli. Aug. St. h. 77. *J. helodes* Link. *J. glaucus* β. littoralis Wahlenb. Halme freudig-grün, nicht bläulichgrün und die Kapseln noch einmal so gross, als bei *J. glaucus*. Scheiden gelblich-braun. D.

10. *J. ARCTICUS* (Willd.) Arctische S. — *Halm nackt, ganz glatt, getrocknet schwach-rillig, steif-aufrecht*; wurzelst. Scheiden blattlos; *Spirre seitenst., kopfig, meist 7bth.*; PBlätter wehrlos, die äussern lanzettl., spitz, die innern eyf., ziemlich stumpf; Gf. bemerklich; Kapsel oval, stumpf, stachelspitzig. 2. Auf glimmerigem Boden der höchsten AThäler sehr selten, (am Breuil, am Abhange des Matterhorns und über Saas, am See Mat-Mor unten

am Berge Moro im Wallis; auf dem Schlehern und Doronthal im südl. Tyrol.) Juni. Juli. St. h. 71. *J. acuminatus* Balb. bei Roem. *J. effusus* β. L. Halme 1 Fuss hoch, dick.

11. *J. FILIFORMIS* (L.) Fadenf. S. — *Halm nackt, fädlich*, überhangend, glatt, getrocknet fein-gerillt; wurzelst. Scheiden blattlos; *Spirre seitenst., meist 7 bth.*; PBlätter lanzettl., spitz; *Gf. fast fehlend*; Kapsel rundlich, sehr stumpf, kurz-stachelspitzig. 4. Auf sumpfigen Wiesen der A., VorA. und höhern Gebirgen und auf d. Ebenen NordD., seltener in Mitteld.) Juni. Juli. St. h. 36. Halm 1 Fuss lang, nicht viel dicker, als ein Faden. Var.:

β. *foliatus*, die Scheiden Blätter tragend, B. kurz, rinnig.

III. Rotte. Die unfruchtbaren Halme fehlend und statt dieser unfruchtbare Blätterbüschel. Bth. kopfig oder auf der Spitze des Halmes einzeln. S. mit einem Anhängsel.

12. *J. STYGIVS* (L.) Hochalpen-S. — *Halm 1-2 blättrig*; B. borstlich, etwas zsgedrückt, oberseits rinnig; *Köpfchen endst., meist einzeln, 3 bth. oder zu 2 übereinanderstehend*; PBlätter spitz, fast um die Hälfte kürzer, als die längliche, spitze Kapsel; Bth. 6männig; *Stbf. viel länger, als das Stbk.*; *W. faserig.* 4. oder ○? An sumpfigen, moorigen O. der höhern A., (auf d. Alpe bei Seck im Algau, Fröhlich; Einsiedeln in der Schw., Hegetschw.; Niederungen bei Böbing und Rothenbuch in Oberbayern, Ohmüller.) Juli. Aug. Der Standort: Seiseralpe in Südtirol hatte sich irrthümlich in M. und K. D. fl. und in die I. Ausg. der Synopsis eingeschlichen. St. h. 71. Dem *J. supinus* nicht unähnlich.

13. *J. CASTANEUS* (Sm.) Kastanienbraune S. — *Halm 2 blättrig*; WB. pfriemlich, oberseits ziemlich flach; *Köpfchen endst., einzeln oder zu 2 oder 3*; PBlätter lanzettl., spitz, kürzer, als die längliche, stumpfe Kapsel; *Stbf. noch einmal so lang, als das Stbk.*; *W. ausläufertreibend.* 4. Auf Wiesen und an feuchten, kiesigen O. der höchsten A., (in Graubünden, Tyrol, Salzb., Steyerin., Kärnth.) Juli. Aug. St. h. 71. *J. triceps* Rostk.

14. *J. TRIGLUMIS* (L.) Dreibälige S. — *Halm nackt*; WB. pfriemlich, ziemlich stielrund, an der Basis rinnig; *Köpfchen endst., aufrecht, meist 3 bth.*; PBlätter ziemlich stumpf, kürzer, als die längliche, stumpfe, stachelspitzige Kapsel; *Stbf. vielmal länger, als das Stbk.*; *W. faserig.* 4. oder ○? An schlammigen, moorigen O. der A., (dch d. g. AK.) Juli. Aug. St. h. 28.

15. *J. TRIFIDUS* (L.) Dreispaltige S. — *Halm nackt, fädlich, 1-3 bth.*, an der Basis bescheidet; die oberste Scheide blatttragend; *das B. sehr kurz*, viel kürzer, als der Halm, pfriemlich, rinnig; *die HüllB. endst., 2-3, wechselständig, verlängert, borstlich*; Blatthäutchen 2öhrig, gewimpert-geschlitzt; P. so lang, als die Kapsel; Kapselklappen eyl.; *W. kriechend.* 4. In Felsenspalten, besonders bei Wasserfällen und Bächen der höchsten GranitA., (dch d. g. AK. und auf den Sudet. und höhern Mährischen Gebirgen.) Juli. Aug. St. h. 71. D. fl. 2. p. 579., daselbst mit der

folgenden verwechselt. Fl. d. t. 107. Die Ausläufer haben längere B.

16. J. HOSTH (Tausch.) Host's S. — *Halm nackt*, fädlich, 1-3bth., an der Basis bescheidet; die oberste Scheide oder die 2 obersten blatttragend; B. *verlängert*, *länger*, als die Hälfte des Halmes, borstlich, rinnig; die HüllB. *endst.*, 2-3, *wechselständig*, *verlängert*, *borstlich*; Blatthäutchen 2öhrig, wimperig-geschlitzt; P. ohngefähr so lang, als die Kapsel; Kapselklappen eyf.-länglich; W. kriechend. 4. In Felsenspalten der A., wie die vorhergehende, aber auf KalkA., (Tyr., Salzbg., Steyerm., Oestr.) Juli. Aug. J. monanthos J. En. stirp. vind. t. 4. f. 1., ein 1blüthiges Explar. Host. gram. 3. t. 83. St. h. 71.

IV. Rotte. Die unfruchtbaren Halme fehlend, statt dieser unfruchtbare Blät-terbüschel. Bth. in Köpfchen, die Köpfchen einzeln am Ende des Halmes oder zu 2 eines über dem andern, oder mehrere und viele in einer Rispe. S. ohne Anhängsel.

17. J. TRIANDRUS (Gouan. herbar. nach getrockneten Expl. von Salzmann bei Montpeillier gefunden, und mir unter diesem Namen mitgetheilt.) Dreimännige S. — *Halm nackt*; WB. borstlich-pfrieml., rinnig; endst. Köpfchen einzeln oder zu 2, wovon das eine gestielt; das untere DeckB. des fruchttragenden Köpfchens ab-*stehend*, oder mit *bogiger Basis aufstrebend*; die äusseren Zpfl des P. eyf.-lanzettl., zugespitzt-haarspitzig, länger, als die eyf., stumpfe Kapsel. ☉. An etwas feuchten O., (Promontore in Süd-istrien und auf Lossino, Tommas.) Apr. Mai. DC. fl. fr. unter J. ericetorum. Juncus foliatus minimus Joh. Bauhin hist. mit Abbildg; die abgebildete Pfl. war im südl. Frankreich gefunden. — Sehr ähnlich dem folgenden, aber niedriger, 1-1½, selten 3 Zoll hoch, und auf den ersten Blick an den abstehenden DeckB. kenntlich; nach dem Verblühen oft ganz rothbraun. Der J. capitatus erreicht eine Höhe von 5-6 Zoll und das untere DeckB. bleibt immer, auch nach dem Verblühen steif aufgerichtet. J.

18. J. CAPITATUS (Weigel.) Köpfige S. — *Halm nackt*; WB. borstlich-pfrieml., rinnig; Köpfchen *endst.*, einzeln oder ein zweites oder drittes gestieltes; das untere DeckB. immer *steif-aufrecht*, die äusseren PBlätter ey-lanzettf., *zugespitzt-haarspitzig*, länger, als die eyf., stumpfe Kapsel. ☉. Auf Tristen und sandigen, feuchten Aeckern, (von Basel dch die Rheinfläche bis nach den Niederlanden, und dem mittlern und nördl. D.; aber nicht in Oestr. und Oberbayern und von da südlicher; in der Schweiz sehr selten.) Juni-Aug. St. h. 13. J. ericetorum Pollich. J. gracilis Roth. Ich fand die Bth. immer 3männig.

19. J. OBTUSIFLORUS (Ehrh.) Stumpfblüthige S. — *Halm 2-3-blättrig*, und nebst den Scheiden und B. *stielrund*, letztere fächerig-röhrig; *Spirre endst.*, *doppeltsgesetzt*, spreitzend, die seitenständigen Aestchen zurückgebrochen; PBlätter *gleich*, *abgerundet-stumpf*, ohngefähr so lang, als die eyf., spitze Kapsel. 4. In Gräben und Lachen, (stw. dch d. Geb.) Juli. Aug. St. h. 77. J. bifolius Hopp. J. retroflexus Rafn. J. divergens Koch und Z. J. Neesii Heller.

20. *J. SYLVATICUS* (Reichard.) Spitzblüthige S. — Halm 2-3-blättrig, nebst den Scheiden und *B. stielrund-zsgedrückt*; *B. fächerig-röhrig*, Scheidewände aussen sichtbar, *Glieder glatt, oder nach dem Austrocknen sehr fein gestreift*; *Spirre endst., doppelt-zsgesetzt, ausgesperrt*; *PBlätter zugespitzt, begrannt, die innern länger, an der Spitze zurückgekrümmt*, alle kürzer, als die eyf., zugespitzt-geschnäbelte Kapsel. 4. In Gräben und an sumpfigen O. Juli. Aug. *J. acutiflorus* Ehrh. D. fl. 2. p. 588. *J. articulatus* γ. L. *J. subnodulosus* Schrank. Var. mit braunen oder schwärzlichen Köpfchen und:

β. macrocephalus, die Köpfchen noch einmal so gross, weniger zahlreich, auch die Bth. grösser; Kapsel v. der Länge des P.: *J. acutiflorus β.* D. fl. 2. p. 589. *J. brevirostris* N. v. Esenb. *J. acutiflorus β. multiflorus* Weih.

γ. pallescens: *J. acutiflorus γ.* Meyer, eine bleiche im Schatten der Wälder gewachsene Form.

21. *J. LAMPROCARPUS* (Ehrh.) Glanzfrüchtige S. — Halm 2-3-blättrig, nebst den Scheiden und *B. stielrund-zsgedrückt*; *B. fächerig-röhrig*, Scheidewände aussen sichtbar, *Glieder glatt, oder nach dem Austrocknen sehr fein gestreift*; *Spirre endst., doppelt-zsgesetzt*, abstehehend oder ausgesperrt; *PBlätter gleich-lang, gerade, an der Spitze kurz-stachelspitzig*, die äussern spitz, die innern stumpf, alle kürzer, als die ey-lanzettf., stachelspitzige Kapsel. 4. In Gräben und an feuchten O. Juli. Aug. St. h. 71. *J. aquaticus* Roth. *J. adscendens* Host. gram. 3. t. 87. *J. articulatus α. β. L.* Var. mit blässern und schwärzlichen Köpfchen.

β. fluitans, der Halm verlängert, in Bächen fluthend: *J. lamprocarpus ε.* Meyer syn. junc. p. 21. Diese Variet. legt sich, wenn das Wasser sich zurückzieht, auf die Erde und wurzelt daselbst.

22. *J. ATRATUS* (Krocker sil. n. 539. 1787.) Schwärzliche S. — Halm 2-3 blättrig, nebst den Scheiden und *B. rundl.-zsgedrückt*; *B. fächerig-röhrig*, mit aussen undentl. Querwänden, *die Glieder nach dem Austrocknen tiefgerillt*; *Spirre endst., doppelt-zsgesetzt*, abstehehend; *B. des P. zugespitzt-begrannt, die inneren länger*, an der Spitze etwas zurückgebogen, ungefähr von der Länge der eyf.-zugespitzt-geschnäbelten Kapsel. 4. Gräben und Sümpfe, (Schlesien, Sachsen und wahrscheinlich noch an anderen O., aber übersehen.) Juli. Aug. *J. melananthos* Reichenb. fl. exc. *J. heptangulus* Peterm., nach Reichenb. Der Halm 2-3 Fuss hoch, aufstrebend; die *B. stärker und dicker*, als am *J. sylvaticus*, lebhafter grün, fein gestreift. Bth. glänzend, schwarz, fast noch einmal so gross. Wimm. fl. v. Schles.

23. *J. ALPINUS* (Vill.) Alpen-S. — Halm 2 blättrig; Scheiden auf dem Rücken mit einer spitzen Kante bezeichnet; *B. fächerig-röhrig*; *Spirre endst., zsgesetzt*, aufrecht; *PBlätter gleich-lang, abgerundet-stumpf, kürzer*, als die eyf.-längliche, stachelspitzige Kapsel, *die äussern unter der Spitze kurz-stachelspitzig*. 4. An feuchten O. und in Gräben der A., VorA. und höhern Gebirge; auch auf den Ebenen v. NordD., seltner im mittlern D. Juli. Aug. *J. fusco-ater* Schreb. bei Schw. und Kört. Fl. erlang. D. fl. 2.

p. 586. St. h. 71. *J. ustulatus* Hopp. Auleit. p. 30., mit einer Abbildg. Hartm. scand. ed. 2. 94. *J. nodulosus* Wahlenb. *J. geniculatus* Schrank. *J. alpestris* Hartm. scand. ed. 1., die gewöhnl. Form und *J. rariflorus* Hartm. mit blassen Bth. Diese Art untersch. sich v. den verwandten am deutlichsten dch die unter der Spitze der äussern PBlätter eingefügte kurze Stachelspitze.

24. *J. SUPINUS* (Moench. Enum. pl. Hass. t. 5. 1777.) Wirtelblättrige S. — Halm fädlich; *B. fast borstlich, oberseits schmalrinnig*, unterseits konvex; Aeste der *endst. Spirre* verlängert, fast einfach; Köpfchen entfernt; *Bth. 3männig*; PBlätter lanzettl., kürzer, als die länglich-stumpfe, stachelspitzige *Kapsel*, die äussern spitz, die innern stumpf; *Stbf. so lang, als das Stbk.* 4. An feuchten O.; die Variet. β . im Schlamme; γ . schwimmend im Wasser. Juli. Aug. *J. uliginosus* a. Meyer. D. fl. 2. 589. St. h. 13. *J. bulbosus* L. spec. ed. 1. *J. setifolius* Ehrh. *J. subverticillatus* Wulf. bei Jacq. *J. fasciculatus* Schrank. *J. verticillatus* Pers. *J. capitatus* Schk. t. 98. Var. mit dch einen Blätterbüschel schopfigen und mit nackten Köpfchen, mit 6männigen Bth., so wie:

β . *repens*, Halme liegend, wurzelnd. Schk. a. a. O. *J. uliginosus* Roth.

γ . *fluitans*, Halme verlängert, fluthend. Lam. Encycl. 3. 271.

δ . *nigritellus*, Kapseln kürzer, an der Spitze eingedrückt: *J. nigritellus* Koch Synops. ed. 1., St. h. 78., nicht Engl. bot.; geht dch Zwischenformen in die normale über.

V. Rotte. Die unfruchtbaren Halme fehlend, statt dieser Blätterbüschel. Bth. einzeln, entfernt oder ebensträussig und eine endst. Rispe bildend. S. ohne Anhängsel.

25. *J. SQUARROSUS* (L.) Sperrige S. — Halm etwas kantig, nackt, an der Basis mit BScheiden umgeben; *B. lineal., rinnig*, abstehend, starr; Spirre endst., zsgesetzt, mit ebensträussigen Aesten; PBlätter ey-lanzettf., spitz oder etwas stumpf, so lang, als die verkehrteyf., stumpfe, stachelspitzige Kapsel; *Stbf. 4mal kürzer, als das Stbk.* 4. Auf Haiden und torfigen Wiesen, (in der Schw. sehr selten; in der übrigen AK. gar nicht, auch nicht in Oestr. und südlicher; aber häufig auf den Vogesen, dem Schwarzwalde und auch auf Niederungen dch das mittlere und nördl. D.) Juli. Aug. St. h. 36. *J. Sprengelii* Willd.

26. *J. COMPRESSUS* (Jacq.) Zusammengedrückte S. — Halm zsgedrückt, in der Mitte 1blättrig; die WurzelB. und das stengelst. *B. lineal., rinnig*; Spirre endst., zsgesetzt, Aeste aufrecht, Aestchen ebensträussig; PBlätter eyf.-länglich, sehr stumpf, fast um die Hälfte kürzer, als die fast kugelige Kapsel; Gf. halb so lang, als der Fruchtkn. 4. Auf feuchten Triften, an Wegen der Wiesen. Juli. Aug. *J. bulbosus* L. spec., nach Smith. engl. fl., Pollich. palat. und viele Autoren. St. h. 36. — *J. bulbosus* L. gehört nach Meyer in d. chlor. ban. zur folgenden Art.

27. *J. GERARDI* (Lois.) Gerard's S. — Halm fast stielrund, in der Mitte 1blättrig; die WurzelB. und das stengelst. *B. lineal.,*

rinnig; *Spirre* endst., zsgesetzt, Aeste aufrecht, Aestchen ebensträussig; *PBlätter* eyf.-länglich, sehr stumpf, fast so lang, als die länglich-ovale, etwas 3seitige *Kapsel*; *Gf.* so lang, als der Fruchtkn. 4. Am Meeresufer und an Salinen, (zeigt vielleicht überall einen Salzboden an; findet sich aber auch an einigen O., wo keine eigentl. Salzquellen in der Nähe sind.) Juli. Aug. J. Gerardi Lois. Fl. gallic. ed. 2. mit guter Diagnose. J. bottnicus Wahlenb. fl. lapp. t. 6. D. fl. 2. p. 581. St. h. 71. J. consanguineus Koch und Z. J. coenosus Bichen. J. bulbosus β . Wahlenb. D.

28. J. TENUIS (Willd.) Dünne S. — *Halm* ziemlich stielrund, nackt, an der Basis mit BScheiden eingeschlossen; *B. lineal.*, rinnig, aufrecht; *Spirre* endst., zsgesetzt, gedrunken, Aeste trugdoldig, abstehend; *PBlätter* lanzettl., verschmälert-spitz, 3nervig, ein wenig länger, als die eyf.-längliche *Kapsel*; *Stbf.* länger, als das *Stbk.* 4. An Wegen, auf Rainen und an lichten WaldO., (bei Dickenreishausen in der Gegend v. Memmingen in Oberschwaben in grosser Menge, Köberlin; Oldesloe im Holstein. und auf einer Elbinsel bei Hamburg, Sonder; Waldwege in der Winterlitt bei Hessenkassel, Pfeiffer; bei Kloster Roth in der Illergegend, Lechler.) Juni. Juli. St. h. 61. D.

29. J. TENAGEIA (Ehrh.) Zarte S. — *Halm* 1-2blättrig; B. borstlich, an der Basis rinnig; *Aeste* der *Spirre* verlängert, 2sp., abstehend; *Bth.* einzeln, entfernt; *PBlätter* ey-lanzettf., spitz, stachelspitzig, ein wenig länger, als die rundliche, sehr stumpfe *Kapsel*, oder so lang als dieselbe. ☉. An sandigen, feuchten O., zerstreut dch d. Gebiet. Juni. Juli. St. h. 10. J. Vaillantii Thuill. J. gracilis Lej. Var., wie J. bufonius, mit *PBlättern*, die ein Drittel länger, als die *Kapsel* sind, was man aber nicht bei allen *Bth.* findet; diese ist: J. Tenageia β . Meyer. D. fl. 2. p. 583, wovon sich J. sphaerocarpus, wie ich jetzt überzeugt bin, als besondere Art unterscheidet.

30. J. SPHAEROCARPUS (Nees v. Esenb., vergl. Funk in der Regensb. bot. Ztg. 1818. S. 321.) Kugelfrüchtige S. — *Halm* 1-2blättrig; B. borstl., an der Basis rinnig; *Aeste* der *Spirre* verlängert, 2sp., aufrecht; *Bth.* einzeln, entfernt; B. des P. längl., lanzettl., zugespitzt, stachelspitzig, bemerklich länger, als die rundl. stumpfe *Kapsel*. ☉. Feuchte O., (auf der Röhn in Franken, Heller; Umgegend von Wien, Welwitzsch.) Juni. Juli. D.

31. J. BUFONIUS (L.) Kröten-S. — *Halm* beblättert; B. borstlich, an der Basis rinnig; *Aeste* der *Spirre* verlängert, 2sp., aufrecht; *Bth.* einzeln, entfernt; *PBlätter* lanzettl., zugespitzt, länger, als die längliche, stumpfe *Kapsel*. ☉. An feuchten O. überall. Juli. Aug. St. h. 36. Var.:

β . fasciculatus, der St. niedriger, stärker; die *Bth.* zu 2 oder 3, büschelig; J. bufonius δ . Schult. J. mutabilis Sav. J. hybridus Brot. Diese Variet. kommt auf der Rheinfläche zwischen Mainz und Worms vor.

Den Juncus pygmaeus habe ich nicht aufgenommen, weil er von Nolte in Dänemark (im Fürstenth. Schleswig), aber nicht in Holstein gefunden wurde.

2. **LUZULA** (DC.) Hainsimse. — Kapsel 1 fächerig, 3 klappig, 3 samig; Klappen ohne Scheidewand, sonst Alles, wie bei *Juncus*. N. v. E. gen. 2. 7.

I. Rotte. Die Samen an der Spitze mit einem grossen, kammf. Anhängsel.

1. **L. FLAVESCENS** (Gaud.) Gelbliche H. — *Spirre* doldig, einfach; *Aeste* abstehend, *meist 1 bth.*, die blüthen- und fruchttragenden aufrecht; Anhängsel des S. sichelf.; die *WB.* lineal.; *W. ausläufertreibend.* 4. In VorA.-Wäldern, (Schw., Tyr., Salzbg., Steyer., Kärnth.) Juni. Juli. St. h. 77. *L. Hostii* Desv. *L. pubescens* Bot. Ztg. 1. 416. *Juncus flavescens* Host. gram. 3. t. 94.

2. **L. FORSTERI** (DC.) Forster's H. — *Spirre* ebensträussig, einfach oder zsgesetzt, *die blüthen- und fruchttragenden Aeste aufrecht, Bth. einzeln*; Anhängsel des S. gerade, stumpf; die *WB.* lineal.; *W.* rasig. 4. In Gebirgs- und VorA.-Wäldern, (Schw., Voges., Oberbad., Bergabhänge im Nahethale bei Sobernheim und im Moselthale bei Koblenz, Bayr. A.) Juni. Juli. *Luciola Forsteri* Sm. engl. Fl. St. h. 77. *Juncus Forsteri* Sm. Fl. brit.

3. **L. PILOSA** (Willd.) Behaarte H. — *Spirre* ebensträussig, einfach; *Aeste* meist 3 bth., aufrecht, die *obern nach dem Verblühen zurückgebrochen*; *Bth. einzeln*; Anhängsel des S. sichelf.; die *WB. lanzettl.* 4. In Wäldern. Apr. Mai. *L. pilosa* St. h. 77. *L. vernalis* DC. *Juncus vernalis* Ehrh. *J. luzulinus* Vill. *J. Luzula* Krock. *J. pilosus* a. L. Exempl. der *L. pilosa* mit blüthigen Aesten unterscheiden sich von *L. Forsteri* mit Sicherheit dch das sichelf. Anhängsel am S.

II Rotte. Die Samen ohne Anhängsel, oder nur mit einem kleinen und kaum bemerkbaren Anhängsel auf der Spitze des S.

4. **L. MAXIMA** (DC.) Grösste H. — *Spirre mehrfach-zsgesetzt*, ausgesperrt, *länger, als die Hülle*; Bthstiele an der Spitze 3 bth.; PBlätter stachelspitzig, ohngefähr so lang, als die Kapsel; Stbf. sehr kurz; B. lanzettl. - lineal., *am Rande behaart.* 4. In Bergwäldern, in die A. hinaufsteigend, (im südl. und mittlern Geb. und bis zum Harze.) Mai. Juni. St. h. 36. *L. sylvatica* Gaud. *Juncus maximus* Ehrh. *J. latifolius* Wulf. bei Jacq. *J. sylvaticus* Sm. *J. nemorosus* β. Pollich. *J. pilosus* δ. L. *J. montanus* Lam.

5. **L. GLABRATA** (Hoppe.) Geglättete H. — *Spirre mehrfach-zsgesetzt*, länger, als die Hülle; die untern Aeste überhangend; *Bthstiele 1 bth.*; PBlätter ohngefähr so lang, als die Kapsel, stachelspitzig; Stbf. 6 mal kürzer, als das Stbk.; Gf. v. der Länge des Fruchtkn.; B. lanzettl. *kahl.* 4. Auf A.-Triften, Kalkboden, (Salzbg., Tyrol, Steyer., Oestr.) Juni. Juli. St. h. 28. *L. spadicea* γ. D. fl. 2. p. 598. *Juncus glabratus* Hopp. bei St. h. 28. *J. intermedius* Host. gram. 3. t. 99. D.

6. **L. SPADICEA** (DC.) Glänzendbraune H. — *Spirre mehrfach-zsgesetzt*, länger, als die Hülle, abstehend; *Bthstiele oberwärts*

schlängelg, meist 4bth.; PBlätter ohngefähr v. der Länge der Kapsel, stachelspitzig; Stbf. 4mal kürzer, als das Stbk.; Gf. v. der Länge des Fruchtkn.; B. lineal. oder lanzettl.-lineal., *an der Basis bärtig*. 4. Auf Triften der A. und VorA., (dch d. g. AK. und auf den Vogesen, dem Schwarzwalde und Sudeten.) Juni. Juli. St. h. 28. L. spadicea a. D. fl. 2. p. 597. Juncus spadiceus All. St. h. 28.

Die Luzula parviflora Desv., Wahlenb. Fl. suec., mit Ausschl. v. Host's Syn., Juncus pilosus β. L., J. parviflorus Ehrh., untersch. sich dch die breitem B., die an der Basis der B. fehlenden oder spärlich aufgestreuten Haare, vorzügl. aber, sowohl v. Luzula spadicea als v. L. glabrata dch die Stbf., welche die halbe Länge des Stbk. haben und den kurzen Gf., der während der Bthezeit um die Hälfte kürzer ist, als der Fruchtkn.

7. L. ALBIDA (DC.) Weissliche H. — *Spirre mehrfachsgesetzt, abstehend, die Hülle nicht erreichend*; Bthstiele meist 4bth.; PBlätter spitz, länger, als die Kapsel; *Stbk. fast sitzend*; B. lineal., *am Rande behaart*. 4. In Wäldern, besonders Berg-Wäldern, in die A. hinaufsteigend. Juni. Juli. St. h. 56. Juncus albidus Hoffm. J. angustifolius Wulf. bei Jacq. J. luzuloides Lam. J. pilosus ε. L. J. nemorosus a. Pollich. Bth. weisslich. Var.:

β. *rubella* Hoppe. Bth. in das Fleischrothe oder Kupferrothe spielend: L. albida b. cuprina Rochel.

8. L. NIVEA (DC.) Schneeweisse H. — *Spirre doppeltsgesetzt, abstehend, die Hülle nicht erreichend*; Bth. büschelig; PBlätter spitz, grannenlos, länger, als die Kapsel; *Stbf. v. der Länge des Stbk.*; B. lineal., *am Rande behaart*. 4. In A.-Thälern, (Schw. und Tyrol, Salzbg., Matajur in Görz, Tommas.) Juni. Juli. St. h. 36. Juncus niveus L. Bth. weiss.

9. L. LUTEA (DC.) Gelbe H. — *Spirre doppeltsgesetzt, länger, als die Hülle*; *Ebensträusschen* gedrunen, zuletzt *fast ähriggeballt*; PBlätter stachelspitzig, so lang, als die Kapsel; Stbf. halb so lang, als das Stbk.; B. lanzettl.-lineal., *ganz kahl*. 4. Auf A.-Triften, (Schw. und Südtirol, auf vielen Alpen, Facchini.) Juli. Aug. St. h. 77. Juncus luteus All. J. campestris ε. L. Bth. gelb.

III. Rotte. Die Samen an der Basis mit einem kegelf. Anhängsel.

10. L. CAMPESTRIS (DC. Fl. fr., mit Ausschl. v. Variet.) Gemeine H. — *Aehren eyf., doldig, sitzend und gestielt, letztere zuletzt etwas nickend*; PBlätter zugespitzt, länger, als die rundliche, stumpfe, stachelspitzige Kapsel; *das Stbk. nach dem Verblühen 3 mal länger, als der Stbf.*; B. am Rande behaart, zuletzt kahl. 4. Auf Triften, Haiden, an unkultiv. O. März-Mai. St. h. 77. n. 5. L. campestris D. fl. 2. p. 601. var. α. Juncus campestris L. var. α. J. nemorosus Host. gram. 3. t. 97.

11. L. MULTIFLORA (Lejeun.) Reichblüthige H. — *Aehren eyf., doldig, sitzend und gestielt*; Bthstiele steif; PBlätter zugespitzt,

stachelspitzig, länger, als die rundliche, stumpfe, stachelspitzige Kapsel; das Stbk. nach dem Verblühen 2mal länger, als der Stbf.; B. am Rande behaart, zuletzt kahl. 4. In Wäldern, auf Berghaiden. Mai. Juni. St. h. 77. n. 7. *L. erecta* Desv. *L. campestris* var. β . D. fl. 2. p. 601. *L. campestris* β . *nemorosa* Meyer Monogr. *L. intermedia* Spenner. *Juncus multiflorus* Ehrh. *J. erectus* Pers. *J. intermedius* Thuill. Die Aehren wie bei der folg. Variet. β ., braun, aber gestielt; bei der Variet.

β . *congesta*, sind sie kurz-gestielt und sitzend und in ein lappliges gelbbraunes Köpfchen zsgeballt: *L. campestris* β . Meyer Monogr. D. fl. 2. p. 602. var. ϵ . *L. congesta* Lej. *Juncus congestus* Thuill. Var. ferner:

γ . *nigricans*, die Aehren gestielt und sitzend, schwarz-brann; die B. nur an der Basis behaart und oft ganz kahl: *L. nigricans* Desv. *A. campestris* δ . *alpina* Meyer. δ . *nigricans* D. fl. 2. p. 602. *L. nigricans* DC. Hoppe in St. h. 77. n. 8. *Juncus sudeticus* Willd. Host. gram. 4. t. 99. Diese wächst auf den Kämmen der Alpen und höhern Gebirge.

δ . *nivalis*, Bth. in ein dichtes, gelapptes, schwarzbraunes Köpfchen gehäuft: *L. campestris*. γ . *nivalis* Wahlenb. fl. suc. *L. alpina* Hoppe in St. h. 77. n. 6.

ϵ . *pallescens*, Alles, wie bei der Variet. α ., aber die Aehren sind heller gefärbt: *L. pallescens* Hoppe in St. h. 77. n. 9. — Von dieser unterscheidet sich deutlich: *L. campestris* β . *pallescens* Wahlenb. fl. suc. Fries herb. norm., *L. pallescens* Besser. en. pl. vollh., nach Expl. vom Autor selbst, dch 3-4mal kleinere und viel zahlreichere Aehren, wurde aber im Gebiete unserer Fl. noch nicht gefunden. — Die Varietäten der *L. multiflora* müssen an den StandÖ. noch genauer untersucht werden.

12. *L. SPICATA* (DC.) Aehrige H. — *Aehre länglich, lappig, überhangend*; PBlätter zugespitzt, länger, als die rundlich-eyf., stachelspitzige Kapsel; B. rinnig, an der Basis behaart; Stbf. halb so lang, als das Stbk. 4. Auf A.-Triften, (dch d. g. AK., und in den Sudeten) Juni-Aug. *Juncus spicatus* L. St. h. 28., nicht gut. Auf den höchsten A. sind die Aehren oft in ein rundliches Köpfchen zsgestellt: β . *conglomerata*, *L. conglomerata* Mielichhof. — Die *Luzula pediformis*, die im Gebiete unserer Fl. noch nicht gefunden wurde, hat die Stbf. sehr kurz, vielmal kürzer, als das Stbk. und der Gf. ist so lang, als der Fruchtkn., welcher bei *L. spicata* kürzer ist.

CXXXI. Ordng. CYPERACEEN. Juss. gen. p. 26.

Bth. balgartig, zwitтерig oder eingeschlechtig, in Aehren zsgestellt, die man nach der Aehnlichkeit mit denen der Gräser mit dem Namen Aehrchen (*spiculae*) bezeichnet. Der *Balg* (welcher auch Schuppe genannt wird und aus dem untern DeckB. gebildet ist)

1klappig; oder (aus 2 DeckB. entstanden) *2klappig*, die innere Klappe (bei *Cyperus*) an die Spindel angewachsen, oder (bei *Carex*) in einen kleinen Krug umgewandelt. Das P. in 6 und mehrere Borsten, (unterweibige Borsten nach R. Brown) oder (bei *Eriophorum*) in zahlreiche Fäden getheilt, seltner dch Fehlschlagen aus wenigen Borsten bestehend, oder auch gänzlich verschwindend. Stbg. 3, bei einem 6borstigen Perigone den Borsten gegenst.; *Stbk. an der Spitze ungeth. Fruchtkn. frei.* Gf. 1. N. 2-3. Nüss 3kantig oder zsgedrückt, nackt oder mit den bleibenden Borsten des P. umgeben, oder (bei *Carex*) in dem vergrösserten, bleibenden, krugf. P., welches eine falsche Schlauchfrucht darstellt, eingeschlossen; zugleich mit dem P. oder der Frucht abfällig. Keim sehr klein, in der Basis des mehligten Eyweisses. — Die grasartigen Blätter der Cyperaceen sitzen auf einer ungeth. Scheide, welche aus dem, in eine Scheide verwachsenen Blattstiele gebildet ist; nicht selten fehlen sie auch gänzlich oder bestehen bloss in einer auf die Spitze der Scheide aufgestellten Stachelspitze. Die innere Fläche der Scheide ist mit einer geglätteten Haut überzogen, welche aus den inwendig an den Bstiel, an die Scheide, angewachsenen Nebenblättern entstanden ist, wie bei *Polygonum Persicaria* und andern Knötericharten, und diese Haut ragt nicht selten über den Rand der Scheide hervor und bildet auf der Basis des B. ein Blatthäutchen. Die Spirre und die DeckB. an der Basis der Aeste und Aestchen sind wie bei den Juncaceen gebildet; das innere DeckB. ist ebenfalls in ein Röhrchen zsgerollt und stellt das Stiefelchen dar.

I. Gruppe. *CYPEREEN.* Bth. zwittrig; Bälge 2reihig.

1. *CYPÉRUS* (L.) Cypergras. — Aehrchen 2reihig. Bälge gekielt, zahlreich, 1klappig, alle blüthentragend, oder 2-3 der untersten kleiner und leer. Borstchen oder Schüppchen fehlend. — Bei mehrern Arten ist eine innere Balgklappe vorhanden, aber an die Spindel angewachsen, welche dadurch geflügelt erscheint; bei andern Arten aber ist diese Klappe kaum bemerkbar. — *Cyperus* und *Picreus* N. v. E. gen. 9. 1. 2.

1. *C. FLAVESCENS* (L.) Gelbliches C. — Spirre zsgesetzt; Köpfchen rundlich, gestielt und sitzend; Aehrchen lanzettl., zsgedrückt-flach; Bälge länglich-eyf., dicht-dachig; N. 2; Nüsschen rundlich-eyf., zsgedrückt; Hülle meist 3blättrig, länger, als die Dolde; *W. faserig.* ☉. Auf feuchten Triften, an nassen, sumpfigen O. Juli. Aug. St. h. 52. *Picreus flavescens* Rb. Bälge gelblich, mit einem breiten, grasgrünen, vor der Spitze verschwindenden Rückenstreifen, nicht gerillt.

2. *C. FUSCUS* (L.) Braunes C. — Spirre fast doppeltzsgesetzt; Köpfchen rundlich, gestielt und sitzend, auf der Spitze der längern

Aeste zu 2 oder 3; Aehren lineal., zsgedrückt-flach; Bälge länglich-eyf., zuletzt etwas absteigend und etwas entfernt; N. 3; Nüsschen elliptisch, nach beiden Enden verschmälert, scharf-3kantig; Hülle meist 3blättrig, länger, als die Dolde; *W. faserig*. ☉. An denselben O. mit dem vorhergeh., aber nicht so gemein. Juli. Aug. St. h. 52. Bälge schwarz-braun, mit einem breiten, grasgrünen, in die Spitze auslaufenden Rückenstreifen. Var.:

β. virescens. Bälge bräunlich, mit grünem Kiele, oder blassgelb mit einem braunen, an den grünen Kiel stossenden Rückenstreifen: *C. virescens* Hoffm. *Cyperus glaber* St. h. 52., aber nicht L. Gf. nach meiner Beobachtung immer 3sp. — Der *C. glaber* L. ist nach Bertolon. einerlei mit *C. pictus* Tenore und untersch. sich von *C. fuscus* und *virescens* dch einen 2 Fuss langen Halm, lanzettförmige, etwas gedunsene Aehrchen, und an der Seite braunrothe, deutlich-nervige Bälge.

3. *C. ESCULENTUS* (L.) Essbares C. — Spirre doppeltzugesetzt; Aehren gestielt und sitzend, an der Spitze der längern Aeste zu 3 oder 5, die seitenst. gestielt, absteigend, die mittlere sitzend; Aehrchen lineal., zsgedrückt-etwas gedunsen, ziemlich entfernt; Bälge eyf., stumpf, auf dem Rücken gerillt; N. 3; Hülle sehr lang; *W. ausläufertreibend, mit an fädlichen Fasern hängenden quer gestreiften Knollen*. 4. Wird in wärmern Gegenden kultiv. Juli. Aug. St. h. 52. Aehrchen strohgelb. Bei mageren Exmpl. endigen die Aeste mit einem einzelnen Aehrchen. Kultiv.

4. *C. BADIUS* (Desf. atl. I. t. 7. f. 2.) Maronenbraunes C. — Spirre doppeltzugesetzt; Aehren gestielt und sitzend, an der Spitze der längern Aeste zu 3 und 4, die seitenst. Aestchen in einem fast rechten Winkel ausgehend; Aehrchen lanzettl.-lineal., zsgedrückt; Bälge eyf., stumpf, auf dem Rücken gerillt; N. 3; Nüsschen länglich-verkehrteyf., scharf-3kantig; Hülle sehr lang; *W. kriechend*. 4. An sumpfigen O., an den Bädern v. Burscheid bei Aachen; im Schleidener Thale der Eifel.) Juli. Aug. St. h. 78. *C. thermalis* Dumort. *C. longus* *β.* Bertol. Ist zwar dem *Cyperus tenuiflorus* Rottb., welcher in bot. Gärten kultiv. wird und mit Rottboell's und Jacquin's Abbildungen genau übereinstimmt, sehr ähnlich, letztere scheint sich aber doch dch die entfernten, und nicht dichtgestellten Aehrchen zu unterscheiden; er bildet wenigstens eine merkwürdige Variet. — Von *Cyperus longus* untersch. sich aber der *C. badius* hinlänglich dch die Spirrenäste und B., die grössern Spirrenäste sind an der Spitze nicht doldig, wie bei jenem und tragen keine verlängerten, aufrechten Strahlen, die seitenst. Strahlen der Aeste stehen im Gegentheile in einem fast rechten Winkel ab; die B. sind nur halb so breit. D.

5. *C. LONGUS* (L.) Langes C. — Spirre doppeltzugesetzt, die längern Aeste an der Spitze doldig; Bthstiele der Döldchen aufrecht, ungleich, theils verlängert, theils kurz; Aehrchen lineal., flach-zsgedrückt; Bälge eyf., stumpf, auf dem Rücken rillig; N. 3; Nüsschen länglich-verkehrteyf., scharf-3kantig; Hülle sehr lang; *W. kriechend*. 4. In Gräben und feuchten Wiesen, (südl. Schweiz

Südtirol, Lindau am Bodensee und dch d. Littorale bis Istrien; Baden bei Wien.) Juli. Aug. St. h. 52. Bälge röthlichbraun, am Rande blasser; Kiel grün.

6. C. MONTI (L., Sohn.) Montisches C. — *Spirre doppeltzgesetzt*; Aehren gestielt und fast sitzend, an der Spitze der längeren Aeste zu 3 und 4; Aehrchen fast rechtwinkelig abstehend, verlängert-lanzettl., zsgedrückt aber etwas gedunsen; Bälge eyf., stumpf, auf dem Rücken gerillt; N. 2; Nüsschen verkehrteyf., zsgedrückt, mit abgerundeten Rändern; Hülle sehr lang; W. *kriechend*. 4. An sumpfigen O. und in Gräben, (südl. Schw., Südtyr. und dch d. Littor.) Juli. Aug. St. h. 52. C. serotinus Rottböll. l. p. 31. mit Abbildg. Picreus Monti Rb.

7. C. GLOMERATUS (L.) Geknäueltes C. — *Spirre doppeltzgesetzt*; Aehren sehr gedrunzen-zsgeballt, kugelig und oval, sitzend und gestielt, an der Spitze der längern Aeste zu 3; Aehrchen lineal., spitz, zsgedrückt; Bälge lineal.; N. 3; Nüsschen länglich, 3kantig; Hülle sehr lang; W. *kriechend*. 4. Am Ufer des Adriat. Meeres, (bei Monfalcone, bei Grätz in Steyerin.) Juli. Aug. St. h. 52. C. australis Schrad. D. fl. l. p. 424. D.

Der Cyperus pannonicus ist keine deutsche Pflanze, er kommt in Oestr. und Mähren nicht vor; Jacquin erhielt seine Explare aus Ungarn, vgl. Fl. aust. 5. p. 29., und Rohrer und Meyer führen ihn in der Fl. morav. nicht auf.

2. SCHOENUS (L.) Knopfgras. — Aehrchen 2zeilig. Bälge 6-9, 1klappig, die 3-6 untersten kleiner und leer. Die unterweibigen Borsten 1-5 oder fehlend. — Untersch. sich v. Cyperus dch die undeutlicher zweizeiligen Aehrchen, welche nur 2-4 fruchtbare Bälge tragen und dch den ganzen Habitus; aber Schoen. mucronatus würde passender zur Gattung Cyperus gebracht. — Schoenus und Streblidia N. v. E. gen. 9. 16. 17.

1. S. MUCRONATUS (L.) Spitziges K. — Halm stielrund, nackt; Köpfchen endst., halbkugelig; Hülle 3-6blättrig, weit abstehend; B. lineal., flach, etwas rinnig. 4. Am Meeresufer, (bei Aquileja.) Juni. Juli. St. h. 40. Mariscus mucronatus Presl., untersch. sich aber v. der Gattung Mariscus dch die reichbth. Aehrchen und die 1-2 untersten Bälge, welche grösser, und nicht kleiner, als die übrigen sind. D.

2. S. NIGRICANS (L.) Schwärzliches K. — Halm stielrund, nackt; Köpfchen aus 5-10 Aehrchen zsgesetzt, endst.; das äussere Hüllblatt schief-aufstrebend; die unterweibigen Borsten meist fehlend; B. pfriemlich, halb so lang, als der Halm. 4. Auf torfigen Wiesen, (stw. im nördl. D. v. Holst. bis Pommern und Berlin, im mittlern bei Jena, im südl. v. Oestr. dch Bayern, Württemberg, in den Flächen der Schweiz und von da dch die Rheinfläche bis nach den Niederlanden, sodann im Litt., Krain und südl. Tyrol.) Mai. Juni. St. h. 40. — Eine einzelne unterweibige Borste habe ich schon oft gefunden. — Aehrchen schwarz-braun.

3. *S. FERRUGINEUS* (L.) Rostfarbenes K. — Halm stielrund, nackt; Köpfchen aus 2-3 Aehrchen zsgesetzt, auf der Spitze des Halmes seitenst.; das äussere Hüllblatt steif-aufrecht; unterweibige Borsten 3-5; B. pfriemlich, viel kürzer, als der Halm. 4. Auf torfigen Wiesen, (Schw., südl. Tyrol, Kärnthen, Oberbäd., Würtemb., Oberschwab. und Oberbayern, Mecklenb., Pommern, Thüring., in Oestr. an der Ungar. Grenze.) Mai. Juni. St. n. 40. *Strebliidia ferruginea* Link. — Aehrchen schwarz-braun.

II. Gruppe. *SCIRPEEN*. Bth. zwitterig; Bälge von allen Seiten her dachig auf einander gelegt.

3. *CLADIUM* (Patrick Brown.) Sumpfgras. — Aehrchen v. allen Seiten dachig. Bälge 1klappig, meist 6 in dem Aehrchen, die 3 untersten kleiner, leer. Unterweibige Borsten fehlend. Nuss mit einer krustigen, zerbrechlichen Rinde. Gf. fädlich, abfallend. N. v. E. gen. 9. 18.

1. *C. MARISCUS* (R. Brown.) Gewöhnliches S. — Spirren doppeltzsgesetzt, eine am Ende, die übrigen seitenst.; Aehrchen kopfig-geknäult; Halm stielrund, glatt, beblättert; Ränder und Kiel der B. rauh. 4. In Gräben, Sümpfen und stehenden Wassern, (südl. Tyrol, Schw. hin und wieder, Elsass bei Strass., Oberschwab. bei Memmingen, Oberbayern, Alpenstädte unweit Erfurt, Rheinfläche bei Waghäusel zwischen Schwetzingen und Carlsruhe, Laacher See bei Coblenz; Fl. v. Spa; bei Göttingen, Berlin; in Mecklenb. und Holst., nirgends gemein.) Juli. Aug. *C. germanicum* Schrad. fl. germ. D. fl. I. 360. St. h. 44. *Schoenus Mariscus* L.

4. *RHYNCHOSPORA* (Vahl.) Schnabelsame. — Aehrchen v. allen Seiten dachig, wenigbth. Bälge 1klappig, 2-3 derselben fruchtbar; die 3-4 untern kleiner und leer. Die unterweibigen Borsten eingeschlossen. Die Basis des Gf. bleibend, zsgedrückt-kegelf., erhärtet, mit der Nuss doch ein Gelenk verbunden. N. v. E. gen. 9. 15.

1. *R. ALBA* (Vahl.) Weisses S. — Aehrchen fast ebensträussig-geknäult, die Büschel ohngefähr so lang, als die Hülle; unterweibige Borsten 10, v. der Länge der Nuss; W. faserig. 4. An sumpfigen, torfigen O. und auf nassen, unfruchtbaren Triften. Juli. Aug. D. fl. I. 448. St. h. 40. *Schoenus albus* L. Aehrchen während der Bthezeit weiss.

2. *R. FUSCA* (R. u. Schult.) Brauner S. — Aehrchen kopfig-geknäult, die Büschel vielmal kürzer, als die Hülle; unterweibige Borsten 3, noch einmal so lang, als die Nuss; W. kriechend. 4. Auf torfigen Wiesen, (stetw. doch d. Geb., seltner als *R. alba*.) Juni. Juli. *Schoenus fuscus* L. D. fl. I. 449. St. h. 40. Aehrchen während der Bthezeit braun.

5. *HELEÓCHARIS* (R. Brown.) Teichbinse. — Aehrchen v. allen Seiten dachig. Bälge 1klappig, die untern grösser, die 1-2 untersten unfruchtbar. Unterweibige Borsten eingeschlossen. Gf.

Basis verbreitert, mit dem Fruchtkn. dch ein Gelenk verbunden. Nuss mit der bleibenden erhärteten Gf. Basis bekrönt. Eleocharis und Scirpidium N. v. E. gen. 9. 11. und 13.

1. *H. PALUSTRIS* (R. Brown.) Sumpf-T. — Aehrchen endst., einzeln, länglich; Bälge ziemlich spitz, der unterste nicht grösser, die halbe Basis des Aehrchens umfassend; N. 2; Nuss verkehrteyf., zsgedrückt, glatt, an den Rändern abgerundet-stumpf; die zurückbleibende Basis des Gf. eyf.; Halm stielrund, etwas zsgedrückt; W. kriechend. 4. In Sümpfen, Gräben, an Seeufern, auf nassen Wiesen. Juni-Aug. *Scirpus palustris* L. D. fl. 1. 425. St. h. 9. Wenn die Pfl. im Wasser wächst, sind die Halme 2-3 Fuss lang und fast so dick, als ein Gänsekiel, und die Bälge rothbraun; ausserhalb des Wassers aber haben die Halme oft nur 3-6 Zoll Länge und nur die Dicke einer Taubenfeder, und die Bälge sind dunkelbraun und lockerer-dachig; zu letzterem gehört *Scirpus varius* Schreb. bei Schw. und Kört. in der Fl. erlang. Nüsse braun.

2. *H. UNIGLUMIS* (Link.) Einbalgige T. — Aehrchen endst., einzeln, länglich; Bälge ziemlich spitz, der unterste nicht grösser, rundl., die Basis des Aehrchens ganz umfassend; N. 2; Nuss verkehrteyf., zsgedrückt, glatt, an den Rändern abgerundet-stumpf; die zurückbleibende Basis des Gf. eyf.; Halm stielrund; W. kriechend. 4. An sumpfigen und feuchten O. Juni-Aug. D. fl. 1. 426. Rb. ic. 2. f. 319. St. h. 78. *S. tenuis* Schreb. *S. intermedius* Thuill., nicht Poir. Nüsse hellbraun.

3. *H. MULTICAULIS* (Sm., nämlich *Scirpus multicaulis*.) Vielstengelige T. — Aehrchen endst., einzeln, länglich; Bälge abgerundet-stumpf, der unterste nicht grösser, rundlich, die Basis des Aehrchens ganz umfassend; N. 3; Nuss länglich-verkehrteyf., scharf-3kantig, glatt; Halm stielrund; W. faserig. 4. An torfigen, sumpfigen O., (bisher blos in Westphalen bei Bentheim, Gronau und häufiger bei Dinslaken und zwischen Rheina und Burgsteinfurt; sodann in Holstein.) Juni-Aug. Engl. bot. t. 1187. St. h. 78. Nüsse schwarzbraun. Die eine oder andere der untersten Bth. des Aehrchens oft lebendig gebärend. D.

4. *H. OVATA* (R. Brown.) Eyförmige T. — Aehrchen endst., einzeln, rundlich oder breit-eyf.; Bälge breit-eyf., abgerundet-stumpf, der unterste nicht grösser, die halbe Basis des Aehrchens umfassend; N. 2; Nuss verkehrteyf., zsgedrückt, glatt, mit scharfen Rändern; die zurückbleibende Basis des Gf. 3eckig, so breit, als lang; Halm stielrund, getrocknet feingerillt; W. faserig. ☉. Am Rande der stehenden Wasser und an überschwemmt gewesenen O. Juni. Juli. *Scirpus ovatus* D. fl. 1. 428. St. h. 10. *S. capitatus* Schreb. *S. compressus* Moench. *S. multicaulis* Gmel. *S. annuus* Thuill. *S. turgidus* Pers. *Eleocharis ovata* N. v. E. — Nüsse strohgelb, mit der zsgedrückt-3kantigen Basis des Gf. gekrönt; bei dem Amerikanischen *S. capitatus* sind die Nüsse schwarz und mit einer niedergedrückten, in der Mitte kurzstachelspitzigen Basis des Gf. versehen; unser *S. ovatus* kommt jedoch auch in Nordamerika wild vor.

5. *H. ATROPURPUREA* (Eleocharis atropurpurea Kunth. en. B. 3. S. 151.) Schwarzpurpure T. — Das endst. Aehrchen einzeln, eyf.; Bälge längl.-eyf., abgerundet-stumpf, der unterste nicht grösser, die halbe Basis des Aehrchens umfassend; N. 2; Nuss verkehrteyf., *zsgedrückt, glatt*, scharf berandet; *die zurückbleibende Basis des Gf. kreisförmig, niedergedrückt, fast schüsself.*; Halm stielrund, getrocknet tiefgerillt; W. faserig. ○. An sandigen, feuchten O., (am Genfersee zwischen Lausanne und Morges an einem Orte Pierettes genannt.) Juli. Aug. Scirpus atropurpureus Retz. obs. nach Gay. S. Lereschii Thom. pl. exsicc. Nüsse bei der Reife schwarz. S.

6. *H. CARNIOLICA* (Koch) Krainische T. — Das endst. Aehrchen einzeln, längl.; Bälge längl.-eyf., stumpf, *der unterste nicht grösser, die Basis des Aehrchens ganz umfassend*; N. 2; Nuss verkehrteyf., *zsgedrückt, glatt*, scharfberandet; *die zurückbleibende Basis des Gf. lanzettl., 3 mal so lang, als breit*; Halm (getrocknet) gerillt; W. faserig. ○. In nassen Wiesen, (um Adelsberg in Krain, Dolliner.) Juli. Aug. Die Pflanze hat das Aeussere von Eleocharis acicularis, ist aber grösser und an ihren glatten Nüssen sogleich zu erkennen, auch die Aehrchen sind breiter und kürzer. Nüsse grünlich-braun. Eine oder die andere der untersten Früchte ist zuweilen lebendig-gebärend.

7. *H. ACICULARIS* (R. Brown.) Nadelförmige T. — Aehrchen endst., einzeln, eyf.; Bälge eyf., stumpf, der unterste nicht grösser; N. 3; Nuss länglich, *fein-vielrippig*; Halm gefurcht-4seitig; W. kriechend. ○. An sumpfigen O. und am Rande stehender Wasser. Juni-Aug. Scirpus acicularis L. D. fl. I. 428. St. h. 10. Scirpidium aciculare N. v. Esenb. Limnochloa acicularis Rb. Ist jährig, obgleich die W. kriecht. Unterweibige Borsten sind bald vorhanden, bald fehlen sie.

6. *SCIRPUS* (L.) Binse. — Aehrchen v. allen Seiten dachig; Bälge 1klappig, die untern grösser, die 1-2 untersten unfruchtbar. Unterweibige Borsten meist 6, oder fehlend. Gf. dch kein Gelenk mit dem Fruchtkn. verbunden, mit einer gleichen Basis abfällig. — Scirpus, Malacochaete, Isolepis, Holoschoenus, Dichostylis, Blysmus, Baeothryon und Eleogiton N. v. E. gen. 9. n. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14.

1. Rotte. Aehrchen endst., einzeln am Ende des Halmes oder der Halmäste, aber die Äeste nicht rispig.

1. *S. CAESPITOSUS* (L.) Moor-B. — Halm stielrund, an der Basis bescheidet, *die oberste Scheide in ein kurzes B. endigend*; Aehrchen endst., einzeln, eyf.; Bälge stumpf, der unterste grösser, ohngefähr so lang, als das Aehrchen und dieses umfassend, stachelspitzig, *Stachelspitze ziemlich dick, fast blattig*; N. 3; Nuss 3-seitig, glatt; *Borsten länger, als die Nuss*. 4. An torfigen O. der VorA. und A., auf den die A. begleitenden Flächen und auf torfigen Haiden in NordD., (dch d. g. AK., Vogesen, Schwarzwald, Odenwald; auf allen Torfgründen v. Bodensee dch Ober-

bayern bis Salzbr.; Böhmerwald, Sudeten, Sachsen und Thüringen sparsam; häufiger v. den Niederlanden dch Westph. und dem nördl. D. und das nördl. Preuss.) Mai. Juni. St. h. 10. *Limnochloa caespitosa* Rb.

2. *S. ALPINUS* Schleicher (Gaud. fl. helv. I. S. 108.) Alpen-B. — Halm stielrund, an der Basis bescheidet, *die oberste Scheide in ein kurzes B. endigend*; das endst. Aehrchen einzeln, eyf.; Bälge stumpf, der unterste kürzer, mit seiner Basis das Aehrchen halbumfassend, mit einem sehr kurzen dicklichen Stachelspitzchen zugespitzt; N. 3; Nuss 3seitig, glatt; *Borsten fehlend*. 4. An feuchten O. der höchsten A., (Zermatten in der Schw.) Juli. Aug. S.

3. *S. PAUCIFLORUS* (Lightfoot.) Armblüthige B. — Der Halm stielrund, an der Basis bescheidet, *Scheiden blattlos*; Aehrchen endst., einzeln, eyf.; Bälge stumpf, *grannenlos*, der unterste grösser, das Aehrchen umfassend, mit einem vor der Spitze sich verlierenden Nerven dchzogen; N. 3; Nuss 3seitig, glatt; *Borsten ein wenig kürzer, als die Nuss*. 4. An torfigen O., an Ufern, auf nassen Triften. Juni. Juli. S. Baeothryon Ehrh. St. h. 10. D. fl. I. 430. S. Halleri Vill. S. cespitosus Pollich. *Limnochloa Baeothryon* Rb. — Kleinere Explare bilden den *S. campestris* Roth.

4. *S. PARVULUS* (Roem. und S.) Zwerg-B. — Der Halm stielrund, inwendig-quer-wandig; *Scheiden sehr zarthäutig, blattlos*; Aehrchen endst., einzeln, eyf.-länglich; Bälge stumpf, *wehrlos*; N. 3; Nuss 3seitig, glatt; Borsten länger, als die Nuss. ☉. An feuchten O., (am süssen (weniger salzhaltigen) und am salzigen See im Mansfeldischen, bei Monfalcone im Littor., und nach der Chloris hanov. auf den Elbinseln bei Voitze im Lauenburgischen.) Juli. Aug. S. nanus Spr., nicht Poir. S. humilis Wallr. *Limnochloa parvula* Rb. W. mit haarfeinen Ausläufern kriechend. Borsten 6, länger, als die Nuss. D.

5. *S. FLUITANS* (L.) Fluthende B. — Der Halm gestreckt oder fluthend, ästig, beblättert, an der Basis wurzelnd; Aehrchen auf der Spitze der blattwinkelst. Bthstiele einzeln; N. 2; Nuss zsgedrückt, mit spitzem Rande; Borsten fehlend. 4. In Sümpfen und stehenden Wassern, (v. den Niederland. dch Westphal., Hanover, Oldenb., Holst. bis Mecklenb.) Juli-Sept. St. h. 85. Fl. d. t. 1802. S. stolonifer Roth. bei Ust. *Dichostylis fluitans* Rb. *Isolepis fluitans* Brown. *Eleogiton fluitans* Link. D.

II. Rotte. Spirre trugseitenst., indem das grössere Hüllblatt sich aufrichtet und eine Fortsetzung des Halmes darstellt, Aehrchen 2, mehrere in ein einzelnes Büschel gehäuft; oder viele einzeln am Ende der Rispenäste oder daselbst büschelig-gehäuft; B. der Hülle und, wenn sie vorhanden sind, des Halmes, halb-stielrund oder 3kantig-rinnig.

• Bälge an der Spitze ganz, stachelspitzig.

6. *S. SETACEUS* (L.) Borstliche B. — Halm stielrund; Aehrchen einzeln, *gezweiet oder gedreiet*, trug-seitenst.; das HüllB. vielmal kürzer, als der Halm, aufrecht, zuletzt etwas zurückgebogen; Bälge stumpf, stachelspitzig; N. 3; Nuss zsgedrückt, längs-

rtipptig; Borsten fehlend. ☉. (nach Wahlenb. 24.) An feuchten O., Ufern. Juli. Aug. St. h. 10. *Isolepis setacea* R. Brown., var. mit weit-kriechender W. — Der sehr ähnliche *Scirpus Savii* Sebast. und Maur., *S. filiformis* Sav., *S. leptaleus* Koch, der im Oestr. Littorale zu suchen ist, untersch. sich dch eine Hülle, die meist nicht länger, als das Aehrchen ist und glatte Nüsschen, die nur unter dem Glase sehr fein punktirt erscheinen.

7. *S. SUPINUS* (L.) Niedrige B. — *Halm stielrund; Aehrchen in ein Büschel gehäuft, sitzend, trug-seitenst.*; das HüllB. aufrecht, ohngefähr so lang, als der Halm: Bälge stumpf, fein-stachelspitzig; N. 3; Nuss 3seitig, *quer-runzelig*; Borsten fehlend. ☉. An nassen O., Ufern, (selten und zerstreut: auf der Rheinfläche bei Dachland im Badischen; bei Mannheim; in Unteröstr.; zwischen Aschersleben und Magdeb.; bei Berlin; in der Schw. am Genfersee.) Juli. Aug. Schrad. germ. I. t. I. St. h. 85. *Isolepis supina* R. Brown. Ich habe oft eine oder 2 kleine Borsten gefunden.

8. *S. MUCRONATUS* (L.) Steifgespitzte B. — *Halm 3kantig; Aehrchen in ein Büschel gehäuft, sitzend, trug-seitenst.*; das grössere HüllB. aufrecht, zuletzt wagerecht-zurückgeschlagen; Bälge stumpf, stachelspitzig; N. 3; Nuss 3seitig, *quer-runzelig*; unterweibige Borsten rückwärts fein-stachelig. 4. In stehenden Wassern, (Littor., Krain und Kärnth., Steyerm.; im Würtemb. bei Canstadt nur an einer Stelle; im Badisch. auf einer nassen Wiese bei Baden; am Cosbacher Weiher bei Erlangen; Schw. am Bodensee; im C. Wallis u. Tessin.) Juli. Aug. St. h. 36. *S. glomeratus* Scop. u. Host.

•• Bälge an der Spitze mit einer Stachelspitze ausgerandet.

9. *S. LACUSTRIS* (L.) See-B. — *Halm stielrund; Spirre zsgesetzt, trug-seitenst.*; das grössere HüllB. aufrecht; Aehrchen büschelig-gehäuft, Büschel gestielt und sitzend; *Bälge glatt, fransig*, mit einer Stachelspitze ausgerandet; N. 3; Nuss 3seitig, glatt; unterweibige Borsten rückwärts feinstachelig. 4. In stehenden und langsam fliessenden Wassern. Juni. Juli. St. h. 36. Die Spitze der Stbk. kurz-bärtig. Var. mit bläulichgrünem Halme. — Die Variet. *β. minor bodanica*, mit fast 3kantigem Halme, Gaud. fl. helv. I. 113., ist mir unbekannt, nach Custor untersch. sie sich v. *S. trigonus* Roth. (*S. Duvalii*) blos dch die meist 3th. und seltner 2th. N.

10. *S. TABERNAEMONTANI* (Gmel.) Tabernaemontan's B. — *Halm stielrund; Spirre zsgesetzt, trug-seitenst.*; das grössere HüllB. aufrecht; Aehrchen büschelig-gehäuft, Büschel gestielt und sitzend; *Bälge punktirt-rauh*, fransig, mit einer Stachelspitze ausgerandet; N. 2; Nuss fast 3seitig-konvex, glatt; unterweibige Borsten rückwärts fein-stachelig. 4. An denselben O. mit dem vorhergeh. Juni. Juli. Der *Juncus n. 5. sylvaticus*. Tabern. Krb. p. 366., gehört wegen des auf der Abbildg stielrunden Halmes allerdings zu dieser, auf der Rheinfläche sehr gemeinen, Pflanze und nicht zu *S. triquetus*, wie Nolte behauptet. *S. glaucus* Engl. bot. t. 2321. Die Nuss kleiner, als bei *S. lacustris*, mit einer sehr stumpfen Rücken-

kante. Var. mit freudiger-grünem Halme, Custor bei Gaud. Die Stbk. sind nicht immer ganz bartlos. Die ganze Art ist vielleicht blos eine Variet. v. *S. lacustris*.

11. *S. DUVALII* (Hoppe in St. h. 36.) Duval's B. — *Halm unterwärts stielrund, in der Mitte 3seitig; Kanten stumpf; zwei von den Seiten ziemlich konvex, die dritte flach; Spirre zsgesetzt, trug-seitenst.; das grössere HüllB. aufrecht; Aehrchen büschelig-gehäuft, Büschel gestielt und sitzend; Bälge glatt, fransig, mit einer Stachelspitze ausgerandet; N. 2; Nuss glatt, auf dem Rücken konvex; unterweibige Borsten rückwärts fein-stachelig.* 4. Am Ufer der Seen und Flüsse, (in Holst. an der Elbe und Eider, bei Regensb., aber neuerdings nicht wieder aufgefunden; in der Schw. am Bodensee; am Rheine in Oberbad.) Juni. Juli. *S. Duvalii* Roth. enum. D. fl. I. 435. Koch Synops. ed. I. *S. trigonus* Nolte. *S. carinatus* Sm. *Heleogiton trigonum* Rb. Untersch. sich v. *S. lacustris* dch den niedrigeren, stumpf-3kantigen, auf der einen Seite flachen Halm, die an der Spitze bartlosen Stbk., die 2N. und dch die kleinere, auf dem Rücken konvexe Nuss; v. *S. Tabernaemontani* dch die Form des Halmes und die rostbraunen, und nicht braun-purpurnen, glatten, und nicht raupunktirten Bälge; mit den übrigen Arten kann sie nicht verwechselt werden.

12. *S. LITTORALIS* (Schröd. germ. t. 5. f. 7.) Meerstrands-B. — *Halm 3kantig; Spirre zsgesetzt, trug-seitenst.; das grössere HüllB. aufrecht; Aehrchen einzeln, gestielt und sitzend; Bälge ganzrandig, etwas gezähnel, an der Spitze mit einer Stachelspitze ausgerandet; N. 2; Nuss glatt, auf dem Rücken konvex; unterweibige Borsten pinselig-federig, Haare aufrecht, gegliedert.* 4. An stehenden Wassern an dem Ufer des Adriatischen Meeres, (bei Duino und Monfalcone.) Juni. Juli. St. h. 85. *S. mucronatus* Scop. *Malacochaete littoralis* N. v. Esenb.

13. *S. TRIQUETER* (L.) Dreikantige B. — *Halm 3kantig; Spirre zsgesetzt, trug-seitenst.; das grössere HüllB. aufrecht; Aehrchen eyf., büschelig-gehäuft, Büschel gestielt und sitzend; Bälge am Rande fransig, mit einer Stachelspitze ausgerandet, Lappchen stumpf; N. 2; Nuss glatt, auf dem Rücken konvex; unterweibige Borsten rückwärts feinstachelig.* 4. An Ufern und in Gräben und stehenden Wassern, (stw. in der Schw., v. da am Rheine bis nach Westphalen; in dem Gebiete der Donau v. Unterbayern bis Oestreich; an der Elbe und Eider in Holst.) Juli. Aug. St. h. 36. Roth. enum. *S. trigonus* Roth. neue Beitr. *S. mucronatus* Pollich. Host. gram. 3. t. 66. *Heleogiton triquetrum* Rb. Var.:

β. Bälge purpur-braun, punktirt-rauh: *S. Hoppii* Weih.

γ. *pallidus*, Bälge weisslich-grün, der Nerve grün, mit länglichen Pünktchen: *S. Lejeunii* Weih.

14. *S. ROTHII* (Hoppe in St. h. 36. 1814.) Roth's B. — *Halm 3kantig; Spirre geknäuel, trug-seitenst.; das grössere HüllB. aufrecht; Aehrchen alle sitzend, eyf.-länglich; Bälge am Rande fransig, mit einer Stachelspitze ausgerandet, Lappchen spitz; N. 2;*

Nuss glatt, auf dem Rücken konvex; unterweibige Borsten 2- oder 3mal kürzer, als die Nuss. 4. An Ufern, (an der Leese bei Vegesak und am Ausflusse der Weser; an der Elbe in Holst., Hamburg; Rheininseln in Breisgau; Schw. sehr selten.) Juli. Aug. S. Rothii Koch Synops. ed. I. D. fl. I. 437. Roth. enum. S. mucronatus Roth. tent. fl. germ. S. pungens Vahl en, Koch Synops. ed. I. S. triquetus Roth. S. triquetus β . Sm. S. tenuifolius DC. — Der Halm viel dünner, als bei S. triquetus, die Scheiden des Halmes mit langen B. endigend. Das Spitzchen der Stbk. pfriemlich, gezähnel-wimperig, welches bei S. triquetus kurz und bartlos erscheint. Ist, wie Nolte bemerkt, S. pungens Vahl, nach dessen Herbarium.

III. Rotte. Spirre trug-seitenst., aus kugeligen, dicht zsgesballten Köpfchen zsgesetzt. Holoschoenus Link.

15. S. HOLOSCHOENUS (L.) Knopfgrasartige B. — Halm stielrund; Spirre trug-seitenst.; das grössere HüllB. aufrecht, verlängert; *Köpfchen dicht zsgesballt, kugelig*, sitzend und gestielt; Bthstiele einfach oder zsgesetzt; Bälge abgeschnitten, stachelspitzig; N. 3; Nuss kahl; Borsten fehlend; B. halbstielrund, rinnig 4. An feuchten O., Ufern, (südl. Schw., Südtirol, bei Grätz in Steyer., Littor., im Flussgeb. der Elbe in Böhm. und bei Barby, der Oder in Schles. und bei Frankf., bei Werder hinter Potsdam.) Juli. Aug. Isolepis Holoschoenus R. und Schult. Var.;

α . *vulgaris*, Halm höher, 2-3 Fuss lang; Spirre zsgesetzt: S. Holoschoenus L. St. h. 36. Holoschoenus vulgaris Link. H. Linnaei Rb.

β . *australis*, Halm niedriger, dünner; Köpfchen klein, ohngefähr erbsengross, ein einzelnes sitzend und wenige gestielt: S. australis L. syst. veg. S. romanus β . L. spec. Holoschoenus exserens und H. filiformis Rb.

γ . *romanus*, Halm niedriger; Köpfchen grösser, v. der Grösse einer Haselnuss, einzeln oder mit 1 oder 2 gestielten kleineren gestützt: S. romanus L. St. h. 36. Holoschoenus australis Rb. Link. und Bertol. vereinigen jetzt nach wiederholten, an den Stand O. vorgenommenen, Untersuchungen alle diese Formen zu einer Art.

IV. Rotte. Spirre endst., zsgesetzt. B. des Halmes und der Hülle grasartig.

16. S. MARITIMUS (L.) Meer-B. — Halm 3kantig, beblättert; Spirre zsgesetzt; Aehrchen büschelig, gestielt und sitzend; *Hülle flachblättrig*; Bälge an der Spitze stachelspitzig und 2 sp., Lappchen spitz, gezähnel; N 3; unterweibige Borsten rückwärts steifhaarig. 4. Am Meeresstrande, an Ufern und Gräben. Juli. Aug. St. h. 13. var. α . Aehrchen gestielt und sitzend, und

β . *compactus*, Aehrchen alle sitzend, geknäuel: Scirpus compactus Krock. S. tuberosus Desf. (die ausgebildete W. ist nicht blos bei dieser Varietät, sondern bei allen Formen des S. maritimus knollig-knotig.)

γ. macrostachys; Aehrchen fast zolllang; *S. maritimus* β. Bertol. fl. ital. *S. macrostachys* Willd. en. h. berol. Schenckz. agr. t. 9. f. 7. 8., (am Elbufer bei Hamburg, Sonder; Fiume, Noë.)

17. *S. SYLVATICUS* (L.) Wald-B. — Halm 3kantig, beblättert; *Spirre ebensträussig, mehrfachsgesetzt; Aehrchen büschelig*, Büschel gestielt und sitzend; *Hülle flachblättrig*; Bälge stumpf, feinstachelspitzig; N. 3; unterweibige Borsten gerade, rückwärts steifh. 4. Auf feuchten, besonders waldigen Wiesen, an Ufern, Gräben. Juni. Juli. St. h. 36.

18. *S. RADICANS* (Schkuhr bei Ust.) Wurzelnde B. — Halm 3kantig, beblättert; *Spirre ebensträussig, mehrfachsgesetzt; Aehrchen alle gestielt; Hülle flachblättrig*; Bälge stumpf, wehrlos; N. 3; unterweibige Borsten zsgedreht, glatt. 4. Auf Wiesen, auf sumpfigen, im Winter überschwemmten Stellen, an den schlammigen Rändern der Sümpfe, und an sandigen, feuchten O., (v. Westphal. an dch Holst., Pomm. und Preussen bis Königsberg, sodann dch Schles., Sachs. und Böhm. bis Oestr., Steyerm.; auf einer Stelle bei Zweibrücken in der Rheinpfalz, Trier.) Juli. Aug. St. h. 36. — Es entspringen jedesmal mehrere Halme aus einem Punkte, von denen die unfrucht. nach der Bthezeit sich verlängern, 2-3 Fuss lang und länger werden und in einem Bogen hinabgekrümmt an ihrer Spitze wurzeln; die Aehrchen sind länger und spitzer, als bei *S. sylvaticus*. D.

19. *S. MICHELIANUS* (L.) Michelische B. — Halm 3kantig, beblättert; *das Köpfchen endst., rundlich, lappig; Hülle flachblättrig*; Bälge lanzettl., in eine etwas abstehende Stachelspitze verschmälert; N. 2; unterweibige Borsten fehlend. ☉. An feuchten O. und Flussufern, (im Littor.; in Steyerm.; Mähr.; Schles. selten, an der Elbe bei Wittenberg.) Juli. Aug. Host. gram. 3. t. 69. St. h. 85. *Isolepis Micheliana* Röm. und *S. Dichostylis Micheliana* N. v. E. D.

V. Rotte. Aehrchen in eine endst. Aehre geordnet, 2reihig, genähert, einzeln. *Blysmus* Panzer.

20. *S. COMPRESSUS* (Pers.) Zsgedrückte B. — Halm undeutlich-3seitig; *Aehre 2zeilig*; Aehrchen 6-8bth.; B. unterseits gekielt; *Borsten rückwärts stachelig*. 4. Auf Wiesen und feuchten Triften. Juli. Aug. St. h. 85. *S. Caricis* Retz. *S. caricinus* Schrad. *Schoenus compressus* L. sp. p. 65. Leers herb. t. 1. f. 1. *Carex uliginosa* L. sp. p. 1381. *Blysmus compressus* Panz. bei Link.

21. *S. RUFUS* (Schrad. t. 1. f. 3.) Braunrothe B. — Halm stielrund; *Aehre 2zeilig*; Aehrchen 2-5bth.; B. kiellos; *Borsten aufrecht-flaumhaarig oder fehlend*. 4. Am Meeresstrande und auf etwas salzigen Wiesen, (in Holst. sowohl am Deutsch., als Baltisch. Meere nicht selten; Hanover, Mecklenb.; auf salzhaltigen Wiesen bei Selbelang in der Gegend v. Berlin; am Kölmersee bei Halle.) Juni. Juli. St. h. 85. *Schoenus rufus* Huds. *Scirpus bifolius* Wallr. *Blysmus rufus* Link. D.

7. *FIMBRISTYLIS* (Vahl.) Fransenbinse. — Aehrchen v. allen Seiten dachig. Bälge 1klappig; die untern grösser; die 1-2 untersten unfruchtbar. Unterweibige Borsten meist 6, oder fehlend. Gf. zsgedrückt, unter der ein wenig verbreiterten Basis mit dem Fruchtkn. durch ein Gelenk verbunden, oberwärts gewimpert. — Untersch. sich v. *Scirpus* dch den zsgedrückten, wimperigen, mit dem Fruchtkn. dch ein Gelenk verbundenen Gf. N. v. E. gen. 9. 8.

1. *F. DICHOTOMA* (Vahl.) Gabelspaltige F. — Halm fast 3seitig, beblättert; B. flach, ohngefähr so lang, als der Halm; *Dolde aus zahlreichen Aehrchen zsgesetzt*; Aehrchen eyf.-länglich, gestielt, einzeln, die mittelpunktst. sitzend; Bälge stachelspitzig; N. 2; Nuss längsrippig, mit querrunzeligen Furchen. ☉. An nassen O., (Südtirol und wohl auch im C. Tessin. Diese StandO. sind noch nicht gesichert, und deswegen noch weitere Untersuchungen anzustellen.) Juni-Aug. St. h. 85. *Scirpus dichotomus* L. Rottb. gram. t. 13. f. 1. *S. bisumbellatus* Forsk. *S. annuus* Host. gr. austr. 3. t. 63.

2. *F. ANNUA* (Röm. und S.) Einfachdoldige F. — Halm fast 3seitig, beblättert; B. flach, kürzer, als der Halm; *Dolde fast einfach*; Aehrchen meist 5, eyf., das mittelpunktst. sitzend; Bälge stachelspitzig; N. 2; Nuss längsrippig, Furchen quer-runzelig. ☉. An feuchten O., (Südtirol zwischen Botzen und Meran, Link in der Regensb. bot. Ztg.; Cant. Tessin, Hegetschw. und Heer Fl. d. Schw.) Juli. Aug. St. h. 85. *Scirpus annuus* All. ped. t. 88. f. 5.

8. *ERIOPHORUM* (L.) Wollgras. — Aehrchen v. allen Seiten dachig. Bälge 1klappig, bleibend. Unterweibige Borsten zuletzt viel länger, als die Bälge, als eine sehr lange Wolle die Nuss einhüllend. N. v. E. gen. 9. 10.

I. Rotte. *TRICHOPOHORUM* Pers. Unterweibige Borsten 4-6, nach vollendeter Blüthezeit in eine kräuslich-schlangelige Wolle verlängert.

1. *E. ALPINUM* (L.) Alpen-W. — *Halm* 3kantig, *rauh*; Aehrchen einzeln, länglich. 4. An torfigen O. der A. und VorA. und der daran grenzenden Ebenen, so wie auf den Flächen des nördlichsten D., (dch d. g. AK; auf den Niederungen v. Oberschwaben und Oberbayern; auf dem Böhmerwald, den Sudet. und stw. auf der Schneekoppe im Thüringer Walde, Brocken, auf den Flächen v. Hanov. bis Pommern.) April. Mai. St. h. 10. — Ist zur Blüthezeit dem *Scirpus caespitosus* sehr ähnlich, aber sogleich dch den 3kantigen, rauhen Halm zu unterscheiden.

II. Rotte. *ERIOPHORUM*. Pers. Unterweibige Borsten zahlreich, nach vollendeter Blüthezeit in eine gerade Wolle verlängert.

• Aehrchen einzeln.

2. *E. VAGINATUM* (L.) Scheidiges W. — *Halm* kahl, oberwärts 3seitig; B. am Rande *rauh*; Aehrchen einzeln, länglich-eyf.; W. faserig. 4. In Torfsümpfen der Ebenen und Gebirge; in die untere A.-Region hinaufsteigend. Apr. Mai. St. h. 10. *E. caespitosum* Host. gr. 1. t. 39. Wächst in grossen u. gedrunghenen Rasen.

3. *E. SCHEUCHZERI* (Hoppe.) Scheuchzer's W. — Halm stielrund, kahl; *B. kahl*; Aehrchen einzeln, fast kugelig; W. Ausläufer treibend. 4. An torfigen O. der höhern A., (dch d. g. AK. der hohen A.) Juni. Juli. St. h. 10. *E. capitatum* Host gr. t. 38. (1801.) Nur sehr wenige Halme kommen aus einem Punkte hervor; sie sind weich.

** Aehrchen mehrere.

4. *E. LATIFOLIUM* (Hoppe.) Breitblättriges W. — Halm fast 3seitig; *B. flach*, an der Spitze 3kantig; Aehrchen sehr viele; *Bthstiele rauh*. 4. Auf feuchten Wiesen der Ebenen und niedern Gebirge. Apr. Mai. St. h. 10. *E. pubescens* Sm., mit Ausschl. des Syn. Poit. und Turp. *E. polystachyum* β . L. Vaill. par. t. 16. f. 2.

5. *E. ANGUSTIFOLIUM* (Roth.) Schmalblättriges W. — Halm ziemlich stielrund; *B. lineal.-rinnig*, an der Spitze 3kantig; Aehrchen mehrere; *Bthstiele glatt*. 4. In Sümpfen und auf Torfwiesen, in die VorA. hinaufsteigend. Apr. Mai. St. h. 10. *E. polystachyum* α . L. fl. suec. Kommt vor:

α . *vulgare*, mit bis zu 2 Linien breiten *B.* und gestielten Aehren: *E. angustifolium* β . *laxum* M. und K. D. fl. 1. S. 456.; oder mit fast sitzenden Aehren: *E. angustifolium* α . *congestum* D. fl. 1. S. 456. *E. polystachyum* β . *Vaillantii* Dub. bot. gall. *E. Vaillantii* Poit. und Turp. fl. par. t. 52. DC. fl. fr., und mit einer Wolle, welche 4mal so lang ist, als das Aehrchen: *E. angustifolium* Smith. engl. fl., *E. Vaillantii* Koch's Taschenb., nach der Beschreibung Smith's und einem englischen Expl. aufgenommen. Eine grössere Anzahl von Expl. jedoch, von Sonder gütigst zugesandt, belehrte mich, dass die Länge der Wolle ein unhaltbares Kennzeichen sey.

β . *elatus*, Halm höher; *B.* gegen 3 Linien breit: *E. angustifolium* β . *longifolium* Hopp. gr. 1. n. 9. Hierher scheint *E. polystachyum* Sm. in der Engl. Fl. zu gehören, welches mit *E. latifolium* Hopp. und Schrad. daselbst verwechselt ist.

γ . *minus*, spannenlang, die StB. fast auf eine 3kantige Spitze zurückgeführt, nur an der Basis mit einem kurzen, rinnigen Saume. Die *B.* vertrocknen deswegen schnell, weil die Spitze bei allen Variet. schnell vertrocknet: *E. angustifolium* γ . *alpinum* Gaud. *E. gracile* Smith engl. fl., nicht Koch. Kommt nicht blos auf den A., sondern auch in waldigen, kalten Sümpfen der Ebenen vor. Alle diese Varietäten gehen dch Zwischenformen in einander über.

6. *E. GRACILE* (Koch bei Roth.) Schlankes W. — Halm undeutlich-3seitig; *B. 3kantig*; Aehrchen mehrere; *Bthstiele filzig-rauh*. 4. In moorigen, torfigen Sümpfen. Mai. Juni, später, als die vorhergehenden. *E. triquetrum* Hopp. St. h. 10. *E. polystachyum* γ . L., nach Wahlenb.

III. Gruppe. *CARICEEN*. Bth. eingeschlechtig.

9. *ELYNA* (Schrad.) Elyne. — Aehrchen 2bth., mit einem DeckB. gestützt und bedeckt; Balg 1klappig; Klappenränder an

der Basis zsgewachsen. Unterweibige Borsten fehlend. Die untere Bth. der Aehrchen weiblich. Fruchtkn. mit 1 Gf. und 3 N. Nuss 3seitig, dch die bleibende Gf. Basis kurz-stachelspitzig. Die obere Bth. männlich, kurz-gestielt. Stbg. 3. — N. v. E. gen. 9. 19.

1. *E. SPICATA* (Schrud.) Aebrige E. — 4. Auf den höchsten A., (Schw., Tyr., Kärnth., Salzb., Steyerm., Görz.) Juni. Juli. St. h. 26. *Carex myosuroides* Vill. delph. 2. t. 6. *C. Bellardi* All. ped. t. 92. f. 2. *C. Dufourii* Lapeyr. *Kobresia scirpina* Willd.

10. *KOBRÉSIA* (Willd.) Kobresie. — Aehrchen 1bth. oder 1bth. mit einem Ansätze zu einer zweiten, gestielten Bth.; die untersten an der Hauptähre machmal 2bth., mit einer untern weiblichen und einer obern männlichen Bth. Weibl. Aehrchen. Balg 1klappig, mit einem DeckB. (Schuppe) bedeckt; Fruchtkn. 1; Gf. 1; N. 3. Das Bthstielchen an der Basis des Fruchtkn. (der Ansatz zu einer zweiten Bth.) ein balgartiges Knötchen, oder einen leeren Balg, oder seltner, (an der Basis der Hauptähre,) einen mit männlichen Geschlechtsorganen versehenen Balg tragend und ein mannweibiges Aehrchen darstellend. Männlich. Aehrchen aus einem 1klappigen, mit männlichen Geschlechtstheilen versehenen DeckB. bestehend, (wie die männlichen Bth. der Carices,) Balg fehlend. Stbg. 3; auf einem kurzen Bthstielchen sitzend. N. v. E. gen. 9. 20.

1. *K. CARICINA* (Willd.) Seggenartige K. — Auf den höchsten A. an den Gletschern, (in der Schw. am Gletscher der Aar und der Rhone, Gemmi, auf den A. von Tyrol, Kärnth. und Steyerm.) Aug. St. h. 78. *Elyna caricina* D. fl. l. 458. *Schoenus monoicus* Engl. bot. t. 1410. *Carex mirabilis* Host. a. — Die *Carex hybrida* Schk. stellt eine gänzlich verschiedene Pflanze dar.

11. *CAREX* (L.) Segge. — Bth. 1geschlechtig. Aehrchen 2-vielbth. Balg 1klappig. Weibch. Fruchtkn. 1, von einer besondern flaschenf. Hülle eingeschlossen. Gf. 1. N. 2 oder 3. Die Frucht stellt eine falsche Hautfrucht dar, welche aus der bleibenden und vergrößerten besondern Hülle gebildet ist und welche eine Nuss einschliesst. — Diese Hülle entspricht dem innern DeckB. an den Aestchen der zwitterigen Cyperaceen, so wie der 1klappige Balg der Carices dem äussern DeckB. verwandt ist. *Carex* und *Vignea* N. v. E. gen. 9. 21, 22.

1 Rottb. *PSYLLOPHORAE*. *Flohseggen* Lois. fl. gall. ed. 2 v. 2. p. 282. Aehrchen einzeln auf der Spitze des Halmes. Granne an der Fruchtbasis fehlend*).

a. Narben 2; Aehrchen 2häusig.

1. *C. DIOICA* (L.) Zweihäusige S. — Aehrchen endst., einzeln, 2häusig; N. zu 2; Früchte ziemlich aufrecht, eyf., vielnervig, oberwärts am Rande rauh; B. und Halme kahl; W. Ausläufer treibend. 4. Auf moorigen, sumpfigen, kalten Wiesen der Ebenen;

*) Die Gestalt der Aehrchen ist dch die ganze Gattung nach den fruchttragenden beschrieben.

in die VorA. hinaufsteigend, (stw. dch d. Geb.) Apr. Mai. St. h. 69. C. Linnaeana Host. gram. t. 77. Kommt vor mit mann-weiblichem Aehrchen: C. dioica isogyna Fries novit. mant. C. Metteniana C. B. Lehmann. — Die C. parallela Laestad., Hartm. scand. fl. bildet eine von der Carex dioica verschiedene Art.

2. C. DAVALLIANA (Sm.) Davallische S. — *Aehrchen endst., einzeln, 2häusig*; Früchte zurückgekrümmt - abstehend, länglich-lanzettl., fein-vielnervig, oberwärts am Rande etwas rauh; B. am Rande nebst den Halmen rauh; W. faserig. 4. Auf torfligen, mit Sphagnum angefüllten, Wiesen. Apr. Mai. St. h. 50. C. dioica Host. gr. t. 41. Var. selten mit unterwärts männlicher und oberwärts weiblicher Aehre und zwar auf der W. der männlichen Pflanze: C. Sieberiana Opitz. C. spicata Spreng. fl. halens., nach dem Herbarium des Autors und dem Standorte „unter dem Tannenberge bei Gutenberg.“ Vergl. Schlechtendal in der Regensb. bot. Ztg. B. 23. S. 322.

b. Narben 2; Aehrchen mannweibig.

3. C. PULICARIS (L.) Floh-S. — *Aehrchen endst., einzeln, mannweibig, oberwärts männlich*; N. 2; *Früchte entfernt, länglich, nach beiden Enden verschmälert*, nervenlos, zurückgebogen; *Bälge abfüllig*; B. borstlich. 4. Auf feuchten Wiesen und nassen Triften, (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. St. h. 2. und 53. C. psyllophora L. suppl.

4. C. CAPITATA (L.) Kopfige S. — *Aehrchen endst., einzeln, mannweibig, oberwärts männlich*, rundlich-eyf.; N. 2; *Früchte dicht-gedrungen*, eyf., zugespitzt, *flach-zsgedrückt*, ganz glatt, nervenlos, auf dem Rücken ein wenig konvex, *länger, als der bleibende Balg*. 4. Auf schlechtern, sumpfigen, moorigen Wiesen der Ebenen und A., (Oberbayern am Wurensee, Rothenbuch, im Deininger Moos bei München; Oberschwab. bei Grönebach und Nesselwang; Tyrol auf der Seiseralpe.) Mai. St. h. 50. D.

c. Narben 3.

5. C. OBTUSATA (Liljeblad vet. ac. handl. 1792. S. 69. t. 4.) Abgestumpfte S. — *Aehrchen endst., einzeln, lineal., mannweibig, oberwärts männlich*; N. 3; *Früchte länger, als der Balg, eyf. oder elliptisch*, gedunsen, glänzend, *in einen stielrunden, glatten, an der Spitze weissen und dchscheinenden 2sp. Schnabel zugespitzt*; B. lineal., flach. 4. An sandigen O., („an einem Waldhügel bei Bienitz, 2 Stunden von Leipzig, von mir zuerst wieder gefunden.“ Kunze auf dem Zettelchen der mitgetheilten Pflanze.) Der Standort bei Halle wieder aufzusuchen, vergl. Schlechtend. in der Regensb. bot. Ztg. B. 23. S. 322. Apr. Mai. C. spicata Schk. caric. t. D. 15. St. h. 61. D.

6. C. RUPESTRIS (All. ped. 2. t. 93. f. 2.) Felsen-S. — *Aehrchen endst., einzeln, lineal., mannweibig, oberwärts männlich*; N. 3; *Früchte verkehrteyf., sehr kurz-geschnäbelt, mit gestutztem Schnabel*, zsgedrückt-3kantig, *kürzer, als der bleibende Balg*,

dachig; B. lineal., flach. 4. Auf den höchsten A. an kräuterreichen Felsen, (auf den A. von Wallis, auf d. Schlehern in Südtirol, Glockner, Judenburger A. in Steyerm., Manhardt in Görz; auf d. rothen Berge im Gesenke in Schles.) Juli. Aug. St. h. 61., die abgebildete Frucht ist eine dch Brand verdorbene. C. petraea Schk. t. kkk. f. 139. und C. rupestris t. nnnn. f. 200., eine Copie v. Allioni's Abbildg. Aehrchen braun.

7. C. PAUCIFLORA (Lightf. fl. scot. t. 6. f. 2.) Armblüthige S. — *Aehrchen endst., einzeln, mannweibig, meist 4bth.*; männl. Bth. endst., meist einzeln; N. 3; Früchte lanzettl.-pfriemlich, stielrund, zurückgebogen; weibliche Schuppen hinfällig. 4. Auf torfigen, moorigen Wiesen der Ebenen, Gebirgen und A., (stw. dch d. Geb.) Juni. Juli. St. h. 61. C. patula Huds. C. leucoglochin L. Aehrchen strohgelb.

II. Rotté. ORTHOCERATES. *Geradhörnige*. Aehrchen endst., einzeln. Eine fädlich-pfriemliche Granne an der vordern Basis der Nuss, welche aus einem fehlgeschlagenen Aestchen entstanden.

8. C. MICROGLOCHIN (Wahlenb.) Kleinhakige S. — *Aehrchen endst., einzeln, mannweibig; meist 10bth.*; männl. Bth. meist 6, endst.; N. 3; Früchte lanzettl.-pfriemlich, zsgedrückt-stielrund, zurückgebogen; die grundst. Granne gerade, länger, als die Hautfrucht. 4. In moorigen Sümpfen, (auf den Walliser A.; bei Aufkirchen gegen den Staarenberger See in Oberbayern; auf d. Deiningen Moos bei München, Rothenbuch an der Ammer, Südtirol.) Mai, auf den A. Juli. Aug. St. h. 61. Aehrchen hell-braun.

III. Rotté. CYPEROIDEAE. *Cypergrasartige*. Aehrchen in ein rundliches oder lappiges Köpfchen gehüllt, welches an der Basis mit einer 2-3 blättrigen, verlängerten Hülle umgeben ist. Pflanzen von dem Ansehen eines Cyperus.

a. Narben 2 Aehrchen an der Basis männlich.

9. C. CYPEROIDES (L.) Cypergrasähnliche S. — *Aehrchen mannweibig, unterwärts männlich, in ein kugeliges, mit einer meist 3 blättrigen, verlängerten Hülle umgebenes Köpfchen zsgeballt*; N. 2; Früchte lanzettl., sehr lang-geschnäbelt, doppelt-haarspitzig; W. faserig. 4. An See- und Sumpfgründen, (Steyerm., Oestr., Böh., Mähr., Sachs., Frank., Baden, Oberschwaben.) Aug. Sept. St. h. 55. C. bohémica Schreb. gr. 2. t. 28. Schelhammeria capitata Moench. Köpfchen grasgrün. D.

b. Narben 3. Aehrchen an der Spitze männlich.

10. C. BALDENSIS (L.) Baldische S. — *Aehrchen mannweibig, oberwärts männlich, meist 3, in ein lappiges, an der Basis mit einer 2 blättrigen, wagrecht-abstehenden Hülle umgebenes Köpfchen gehäuft*; N. 3; Früchte walzlich-länglich, stumpf, sehr kurz-geschnäbelt. 4. Auf Gebirgen an den Ufern der Waldbäche und an kiesigen Orten der Thäler der VorA. und A., (Oberbayern am linken Ufer der Loisach von Garnisch an und weiter oben an d. Naidach, Dr. Einsele; südl. Tyrol weit verbreitet, Facchini; Schw.

in der Egina, Zehnden Gombs, Lager.) Mai. Juni. St. h. 47.
Köpfchen weiss. D.

IV. Rotte. VIGNEAE. *Vigneen*. Aehrchen mannweibig, in eine ununterbrochene oder unterbrochene Aehre geordnet, mit einem DeckB. gestützt, von denen das unterste oft in ein BlüthenB. übergeht. — Die Gattung *Vignea*, aus unähnlichen Arten unnatürlich und bloss nach der Anzahl der N. errichtet, wollte ich nicht annehmen, habe aber der vorliegenden sehr natürlichen Rotte diesen Namen erhalten. Wer möchte wohl die Arten von *Phyteuma* und *Polygonum*, nach den 2 oder 3 N. in mehrere Gattungen zersplittern!

a. Narben 3. Aehrchen oberwärts männlich.

11. C. GYNOMANE (Bertol.) Lockerährlige S. — *Aehrchen mannweibig, 2, oberwärts männlich, entfernt, lockerbth., das untere oft gestielt; DeckB. blattig, das untere länger, als der Halm; N. 3; Früchte entfernt, geschnäbelt, 2nervig, Schnabel an der Spitze häutig, ungeth. oder kurz-2lappig. 4. An gebirg. O. und Wegen, (Istrien und auf den Inseln.) Apr. Mai. C. Linkii Schk. t. bbb. f. 118. 1808. St. h. 61. C. tuberosa Degl. bei Lois. C. distachya Desf., nach Lois., aber Desfontaines Diagnose passt nicht, Aehrchen strohgelb. J.*

12. C. CURVULA (All. ped. t. 92. f. 3.) Gekrümmte S. — *Aehrchen mannweibig, oberwärts männlich, angedrückt und in ein längliches Köpfchen sehr gedrungen-gehäuft; N. 3; Früchte länglich, 3kantig, in einen an der Spitze häutigen, 2lappigen, unter der Spitze am Rande rauhen Schnabel verschmälert; W. faserig, dicht-rasig. 4. An kräuterreichen O. der A., (Schw. und dch Tyrol, Salzb., Kärnth. nach Steyerm.) Juli. Aug. St. h. 47., die Abbildg zeigt eine dch Brand verdorbene Frucht.*

b. Narben 2. Aehrchen oberwärts männlich.

* Wurzel lange Ausläufer unter der Erle treibend.

13. C. INCURVA (Lightf. fl. scot. t. 24. f. 1.) Einwärtsgebogene S. — *Aehrchen mannweibig, oberwärts männlich, in ein rundlicheyf. Köpfchen gehäuft; N. 2; Früchte aufgeblasen, höckerig-konvex, zugespitzt-geschnäbelt, Schnabel glatt, an der Spitze schief-abgeschnitten; Halm glatt, einwärtsgebogen, so lang, als die B.; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. Auf Glimmerboden der höchst. GranitA., (auf den höchsten A. der Schweiz und auf dem Schlehern in Südtirol.) Juli. Aug. St. h. 47. C. juncifolia All. ped. 2. t. 92. f. 4.*

14. C. CHORDORRHIZA (Ehrh.) Fadenwurzliche S. — *Aehrchen mannweibig, oberwärts männlich, in ein eyf. Köpfchen gehäuft; N. 2; Früchte eyf., nervig-rillig, in einen am Rande glatten, an der Spitze trockenhäutigen, kurz-2lappigen Schnabel zugespitzt; Halm glatt, an der Basis ästig, viel länger, als die B.; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. In tiefen, wasserreichen Sümpfen, (im nördl. D. v. Ostfriesl. dch Holst., Lüneb. bis Ostpreuss., in Oberbayern, bei Memmingen in Oberschwab., Schles. am See an der Heuscheuer, bei Kaiserslautern in der Rheinpfalz;*

in der Schweiz im C. Waadt und Zürich.) Mai. Juni. St. h. 55. C. funiformis Clairv.

15. C. STENOPHYLLA (Wahlenb.) Schmalblättrige S. — Aehrchen mannweibig, oberwärts männlich, in ein eyf. oder längliches Köpfchen gehäuft; N. 2; *Früchte* eyf., auf dem Rücken konvex, 9-11nervig, in einen an der Spitze weißshäutigen, auf dem Rücken ausgerandeten, am Rande feingesägt-rauhen Schnabel zugespitzt; *Bälge* spitz; Halm glatt, an der Spitze etwas rauh; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. Auf kräuterreichen Hügeln, Wiesen, (Holst.; bei Prag in Böhm., Gödinger Wald in Mähr., häufiger in Unteröstr., auf der Schweinstratte bei Grätz, bei Cilli.) Apr. St. h. 47. C. juncifolia Host. Schk. caric. t. G. f. 32., nicht All. C. glomerata Host. gr. t. 44. D.

16. C. DIVISA (Hudson fl. angl. ed. I. S. 348.) Getheilte S. — Aehre zsgesetzt, eyf. oder länglich; Aehrchen länglich, gedrunken, oberwärts männlich; N. 2; *Früchte* breit-eyf., auf dem Rücken konvex, 3-11nervig, in einen spitz- und tief-2sp., am Rande feingesägt-rauhen Schnabel zugespitzt; *Bälge* so lang. als die Frucht; Halm an der Spitze etwas rauh; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. Auf Wiesen und an feuchten O., (Steyerm., Unteröstr., Littor., Istrien.) Mai. Juni. St. h. 55. Schk. caric. t. r. und Vv. f. 61. C. schoenoides Host. gram. t. 4. C. austriaca Schk. caric. t. Qqq. f. 157. — Eine Abänderung mit breiteren fast rundl. eyf. Früchten ist: C. schoenoides Koch Synopsis ed. I. D.

17. C. DISTICHA (Huds.) Zweizeilige S. — Aehre doppeltzsgesetzt, länglich, gedrunken, oder unterwärts unterbrochen; die obersten und untersten Aehrchen weiblich, die mittlern männlich; N. 2; *Früchte* eyf., flach-konvex, 9-11nervig, mit einem schmalen, feingesägt-rauhen Rande umgeben, in einen 2zähligen Schnabel zugespitzt, länger, als der Balg; *Bälge* spitz, mit einem vor der Spitze verschwindenden Nerven; Halm an den Kanten rauh; W. Ausläufer treibend. 4. Auf frucht., etwas feuchten Wiesen. Mai. Juni. St. h. 55. C. intermedia Good. St. h. 55. C. spicata Pollich. C. arenaria Leers herb. t. 14. f. 2. Aendert ab mit Aehren, deren obere und mittlere männlich sind.

18. C. ARENARIA (L.) Sand-S. — Aehre doppeltzsgesetzt, länglich oder fast eyf., gedrunken oder unterwärts unterbrochen; die obern Aehrchen männlich, die untern weiblich, die mittlern an der Spitze männlich; N. 2; *Früchte* eyf., flach konvex, 7-9nervig, von der Mitte an mit einem verbreiterten, feingesägt-rauhen, an dem 2sp. Schnabel hinaufziehenden Flügel eingefasst; *Bälge* zugespitzt, so lang, als die Frucht; Halm oberwärts auf den Kanten rauh; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. An sandigen O. in NordD. und am Meeresufer, (von Ostfriesl. bis Preussen am Meeresstrande, landeinwärts bis Magdeburg und Osabrück; am Adriat. Meere.) Mai. Juni. St. h. 2. und 69. D.

** W. faserig; einen dichten Rasen von B. und Halmen treibend, treibt aber keine, oder nur sehr kurze Ausläufer.

19. *C. FOETIDA* (All.) Stinkende S. — *Aehrchen* mannweibig, oberwärts männlich, *in ein rundlich-eyf. Köpfchen gehäuft*; N. 2; *Früchte aufrecht*, eyf., schwach-nervig, *in einen verlängerten, an der Spitze 2sp., am Rande feingesägt-rauhen Schnabel zugespitzt*; Halm *von der Basis an auf den Kanten rauh*; W. kurze Ausläufer treibend. 4. An grasreichen, feuchten O. der höchsten A., (Schw. nicht sehr selten, in D. nur am Salendferner in Südtirol.) Juli. Aug. St. h. 47.

20. *C. MICROSTYLA* (Gay in Gaud. fl. helv. 6. 37.) Kleingriffliche S. — Aehre zsgesetzt-eyf. oder längl.; *Aehrchen* zahlreich, längl., spitz, *meist dicht-zsgedrängt*, oberwärts männlich, oder männliche und weibliche eingemischt; Narben 2; *Früchte aufrecht*, eyf., zsgedrückt, *nervenlos*, so lang, als der Balg, *von der Mitte an allmählig in den Schnabel verschmälert*, der Schnabel am Rande etwas rauh, *an der Spitze auf der innern Seite ungetheilt*, auf dem Rücken gespalten; Halm oberwärts rauh; W. einen Rasen und kurze Ausläufer treibend. 4. Auf den höchsten A., (Berner und Walliser A., auch auf den Salzburgerischen, daselbst v. Mielichhofer entdeckt.) Juli. Aug. *C. lobata* Schleicher, nicht All.

21. *C. VULPINA* (L.) Fuchs-S. — Aehre doppeltzsgesetzt, *eyf.-länglich* und gedrunken oder verlängert und unterbrochen; Aehrchen oberwärts männlich; N. 2; *Früchte sperrig-abstehend*, eyf., *flach-konvex*, in einen 2sp., am Rande dicht-feingesägt-rauhen Schnabel zugespitzt, *6-7nervig*; Bälge stachelspitzig, *kürzer, als die Frucht*; Halm an den Kanten sehr rauh; W. *faserig*. 4. An sumpfigen O., Gräben, Bächen. Mai. Juni. St. h. 57. Var.:

β. *nemorosa*, Bälge ausser einem grünen Rückenstreifen weisslich, am Rande bräunlich: *C. nemorosa* Willd. und Rebentisch, nicht Lumnitzer. Diese Varietät entsteht im Schatten der Wälder; die verlängerten DeckB. und eine unterbrochene Aehre kommen bei der gewöhnlichen *C. vulpina* gerade so vor, wie bei der Variet. *nemorosa*. — St. h. 57.

22. *C. MURICATA* (L., nach Sm. und Wahlenb.) Weichstachelige S. — Aehre zsgesetzt, *länglich*, gedrunken oder an der Basis unterbrochen; Aehrchen oberwärts männlich; N. 2; *Früchte sperrig*, die untersten fast wagerecht abstehend, lanzettl.-eyf., *flach-konvex*, in einen am Rande dicht-feingesägt-rauhen Schnabel zugespitzt, *nervenlos*, oder undeutlich-nervig; Bälge stachelspitzig, kürzer, als die Frucht; Halm an den Kanten oberwärts rauh; W. dicht rasig, ohne Ausläufer. 4. Auf Wiesen, an Wegen, in Wäldern. Mai. Juni. *C. canescens* Leers herb. t. 14. f. 3. Pollich. *C. spicata* Huds. *C. contigua* Hopp. bei St. h. 61. Var.:

β. *virens*, Bälge bleicher; Aehre gewöhnlich mehr verlängert und unterbrochen; Früchte grün und oft ein wenig grösser: *C. virens* Lam. *C. muricata* var. *loliacea* Weih. *C. loliacea* Schreb. *C. muricata* Hopp. bei St. h. 61. *C. divulsa* Gaud., nicht Good. Deutliche Unterscheidungsmerkmale zwischen dieser Variet. und der gemeinen Pflanze konnte ich nicht finden. Eine, wiewohl

seltner vorkommende, Abänderung hat an der Basis der Aehre ein blattiges DeckB., welches die Aehre an Länge übertrifft; diese ist *C. virens* Lam. im wahren Sinne des Wortes.

23. *C. DIVULSA* (Good. tr. of. linn. soc. B. 2. S. 160.) Zer-rissene S. — *Die Aehre* zsgesetzt, *verlängert*; Aehrchen an der Spitze männlich, die oberen genähert, die übrigen entfernt, die untersten oft zsgesetzt, das unterste weiter entfernt und oft gestielt; N. 2; *Früchte aufrecht-abstehend, eyf.*, flach-konvex, in einen am Rande etwas rauhen Schnabel verschmälert, nervenlos, oder schwach-nervig; Bälge stachelspitzig, kürzer, als die Frucht; *Halm schlank, etwas überhängend*, oberwärts rau; W. dicht-rasig, ohne Ausläufer. 4. In Wäldern und Hainen, (sehr zerstreut dch d. Gebiet.) Mai. Juni. St. h. 57. O. F. Lang in der Flora B. 26. S. 146. Bälge weiss, mit grünem Rückenstreifen.

24. *C. GUESTPHALICA* (v. Bönninghausen in Catal. sem. hort. monast. 1829.) Westphälische S. — *Aehre* zsgesetzt, *verlängert*; die Aehrchen an der Spitze männl., die oberen genähert, die unteren entfernt, zuweilen zsgesetzt, das unterste weiter abstehend, und meist gestielt; N. 2; *Früchte aufrecht-abstehend, rundlich-eyf.*, vorne konvex, in einen am Rande ziemlich rauhen Schnabel zugespitzt, nervenlos oder undeutlich-nervig; Bälge stachelspitzig, kürzer, als die Frucht; *Halm sehr schlank und dünn, zuletzt in einem Bogen zur Erde gekrümmt*; W. dicht-rasig, ohne Ausläufer. 4. An sumptigen O., (Westphalen, v. Bönninghausen in brieflichen Mittheilungen.) Mai. Juni. *C. guestphalica* O. F. Lang in der Flora 26. S. 147. Ob diese Pfl. eine wirkliche Art ausmacht, oder nur eine sehr schlanke Variet. v. *C. divulsa* ist, wird die Fortpflanzung dch die Aussaat lehren. D.

25. *C. TERETIUSCULA* (Good. tr. of. linn. soc. 2. t. 19. f. 3.) Stielrundliche S. — *Aehre* zsgesetzt oder *doppeltzsgesetzt, gedrungen-gehäuft*; Aehrchen oberwärts männlich; N. 2; *Früchte eyf., höckerig-konvex*, glänzend, *nervenlos, glatt*, auf dem Rücken an der Basis etwas rillig, in einen 2zähnigen, am Rande feingesägt-rauhen Schnabel verschmälert; Bälge ohngefähr so lang, als die Frucht; *Halm* oberwärts rau, 3kantig, *die Seiten ziemlich konvex*; *Rhizom schief, ein wenig kriechend*. 4. Aufsumptigen Wiesen. Mai. Juni. St. h. 50. *C. diandra* Roth. *C. paniculata* β. Pollich. *C. paniculata* β. *teretiuscula* Wahlenb. *C. teretiuscula cylindrica* Hartm. Var.:

β. *maior*, oft noch einmal so hoch; W. grössere Rasen hervortretend; Aehre dicker und zsgesetzter: *C. teretiuscula* α. Hartm. *C. Ehrhartiana* Hoppe. Diese kommt auch in D. vor und ist noch weiter zu untersuchen.

26. *C. PANICULATA* (L.) Rispige S. — *Aehren rispig*; Aehrchen oberwärts männlich; N. 2; *Früchte eyf., höckerig-konvex, nervenlos, glatt*, auf dem Rücken an der Basis etwas rillig, in einen 2zähnigen, am Rande feingesägt-rauhen Schnabel zugespitzt; Bälge ohngefähr so lang, als die Frucht; *Halm* oberwärts sehr

rauh, 3kantig, *die Seiten flach; W. faserig, dicht-rasig.* 4. An sumpfigen, moorigen O. Mai. Juni. St. h. 50. Diese ist nach den Synonymen und dem Vaterlande die wahre *Carex paniculata* L.

27. *C. PARADOXA* (Willd. act. acad. berol. 1794. t. I. f. 1.) Selt-same S. — *Aehren rispig; Aehrchen* oberwärts männlich; N. 2; *Früchte* eyf., *höckerig-konvex*, auf dem Rücken und auf der vordern Seite *nervig-gerült*, in einen 2zähligen, am Rande feingesägt-rauhen Schnabel zugespitzt; Bälge so lang, als die Frucht; Halm oberwärts sehr rauh, 3kantig, die Seiten etwas konvex; W. faserig, dicht-rasig. 4. Auf torfigen Wiesen, (stw. dch d. g. Geb.) Mai. Juni. St. h. 50. *C. paniculata* Hartm., nach Exemplaren v. Autor selbst. *C. paniculata* Wahlenb. Die W. Köpfe sind immer mit Fasern bedeckt, welche von den Nerven der abgestorbenen B. herrühren, was bei *C. teretiuscula* und *C. paniculata* nicht der Fall ist.

c. N. 2. Aehrchen an der Basis männlich, in einer einfachen Aehre wechselst., seltner (bei *C. axillaris* und *C. Boeninghausiana*.) die 2-3 untern aus 2-5 zgesetzt.

* W. lange Ausläufer treibend.

28. *C. SCHREBERI* (Schränk.) Schreber's S. — Aehre zsgesetzt; *Aehrchen* meist 5, wechselst., *dichtstehend, gerade*, eyf.-länglich, unterwärts männlich; N. 2; *Früchte aufrecht, so lang, als der Balg, länglich-eyf., flach-konvex, fast von der Basis an am Rande feingesägt-wimperig, in einen 2sp. Schnabel zugespitzt; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend.* 4. An sandigen O., Wegen, (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. St. h. 61. *C. praecox* Schreb. Aehrchen dunkelbraun.

29. *C. BRIZOIDES* (L.) Zittergrasartige S. — Aehre zsgesetzt, fast 2zeilig; *Aehrchen* meist 5, wechselst., *genähert, gekrümmt, länglich-lanzettl., sämmtlich mannweibig*, unterwärts männlich; N. 2; *Früchte aufrecht, so lang, als der Balg, lanzettl., flach-konvex, glatt, geschnäbelt-verschmälert, am Rande von der Basis an feingesägt-wimperig, Schnabel 2sp.; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend.* 4. In etwas feuchten Hainen und an grasreichen, schattigen O., (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. St. h. 50. Aehrchen weisslich.

30. *C. OHMÜLLERIANA* (O. F. Lang in der Flora B. 26. S. 240.) Ohmüller's S. — Aehre zsgesetzt, oberwärts etwas zweizeilig; *Aehrchen 8-12, die oberen 4-6 männl., genähert, lanzettl., zuletzt oft gekrümmt, die untern 2-4 entfernt, längl.-verkehrt-eyf., an der Basis männl., das unterste mit einem blattigen DeckB. gestützt; N. 2; Früchte aufrecht, anderthalbmal so lang, als der Balg, lanzettl., in einen 2sp. Schnabel zugespitzt, flach-konvex, berandet, am Rande fast von der Basis an feingesägt-wimperig; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend.* 4. Auf feuchten Wiesen, (bei Rothenbuch in Oberbayern von Pfarrer Ohmüller entdeckt.) Mai. Juni. Sehr ähnlich der *C. Boeninghausiana*, aber die untern nicht zsgesetzten Aehrchen, die deutlicher berandeten

Früchte und das ausläuferartige Rhizom, welches an den Gelenken B. und Halme treibt, unterscheidet sie hinreichend.

** Die W. einen dichten Rasen von B. und Halmen treibend, aber ohne Ausläufer, oder nur mit ganz kurzen versehen.

31. *C. BOENNINGHAUSIANA* (Weihe in der Regensb. bot. Ztg. 9. 2. S. 743.) Bönninghausen's S. — Aehren zsgesetzt, an der Spitze etwas 2zeilig; *Aehrchen* 8-12, wechselst., an der Basis männl., die oberen lanzettl., genähert, an der Basis und Spitze, oder durchaus männl., zuletzt gekrümmt, die unteren entfernt, längl.-lanzettl., zsgesetzt, das unterste mit einem blattigen DeckB. gestützt; N. 2; Früchte aufrecht, so lang, als der Balg, ey-lanzettf., in einen 2sp. Schnabel verschmälert, flach-konvex, am Rande fast von der Basis an feingesägt-rauh; W. dicht-rasig, ohne Ausläufer. 4. Auf sumpfigen Wiesen, (zwischen Halle und Diessen in Westphalen; neben der Ammer bei Rothenbuch in Oberbayern.) Juni. Juli. St. h. 55. *C. Boeninghausiana* Kunth, en. *C. axillaris* Fries nov. mant., nicht Goodenough. D.

32. *C. REMOTA* (L. spec. 1383.) Entfernte S. — Aehre zsgesetzt; *Aehrchen* wechselst., unterwärts männl., die 3-4 unteren entfernt, mit einem über den Halm hinausragenden DeckB. gestützt, alle einfach, oder selten das unterste zsgesetzt; N. 2; Früchte aufrecht, flach-zsgedrückt, eyf., in einen 2zähligen, feingesägt-rauen Schnabel zugespitzt, länger, als der Balg; Halm schlank und schwach, in einem Bogen überhängend; W. dicht-rasentreibend, ohne Ausläufer. 4. An feuchten, schattigen O. Mai. Juni. St. h. 50.

33. *C. AXILLARIS* (Goodenough trans. of. linn. soc. B. 2. S. 151. t. 19. f. 1.) Seitenständige S. — Aehre zsgesetzt; *Aehrchen* wechselst., unterwärts männl., die unteren entfernt, zsgesetzt, das unterste mit einem steifen, über den Halm hinausragenden DeckB. gestützt; N. 2; Früchte aufrecht, flach-zsgedrückt, eyf., in einen 2zähligen, feingesägt-rauen Schnabel zugespitzt, länger, als der Balg; Halm aufrecht, steif; W. dicht-rasentreibend, ohne Ausläufer. 4. In sumpfigen Wiesen, (bei Möllen im Lauenburgischen von Rostkovius mitgetheilt; bei Driburg in Westphalen von Weihe gesammelt, in dem Herbar. von Sonder.) Mai. Juni. St. h. 55. D.

34. *C. STELLULATA* (Good.) Sternige S. — Aehre zsgesetzt; Aehrchen meist 4, ziemlich entfernt, unterwärts männlich; N. 2; Früchte sparrig-abstehend, flach-konvex, eyf., in einen 2zähligen, feingesägt-rauen Schnabel zugespitzt, zart-nervig-gerillt; die DeckB. kürzer, als das Aehrchen; Halm glatt; W. faserig, rasig. 4. Auf feuchten Wiesen. Mai. Juni. St. h. 50. *C. muricata* Pollich. *C. echinata* Murr; dieser ist der ältere Name. Var.:

β. grypus, mit 3 einander mehr genäherten, dunkler braunen Aehrchen und öfters einwärtsgebogenem Schnabel der Früchte; *C. grypus* Schk. caric. t. Hhh. f. 193. Koch Synops. ed. I. Diese auf den höchsten A.; hat fast das Aeussere von *C. lagopina*. Dch

Mittelformen geht sie in die gewöhnliche Pfl. über, eine solche Mittelform ist die *C. grypus* St. h. 57. Vergl. *C. grypos* O. F. Lang in d. Regensb. bot. Ztg. B. 26. S. 242. Ob die Pfl. bei Thun wächst, ist noch nicht ausgemacht, denn Thomas verwechselte sie mit *C. Gaudiniana*.

35. *C. LEPORINA* (L.) Hasen-S. — Aehre zsgesetzt; Aehrchen meist 6, wechselst., genähert, rundlich-elliptisch, unterwärts männlich; N. 2; *Früchte aufrecht*, flach-konvex, eyf., in einen 2zähligen Schnabel zugespitzt, *nervig-gerillt und mit einem geflügelten*, feingesägt-rauhen, in die Spitze des Schnabels auslaufenden *Rande umzogen*; W. faserig, rasig. 4. Auf Triften, Wiesen, an Wegen. Juni. Juli. St. h. 47. *C. ovalis* Good. *C. leporina* Leers herb. t. 14. f. 6. und aller Autoren vor Goodenough. Diese ist ganz sicher die von Linne in der Fl. suec. und den Sp. plant. aufgestellte *C. leporina*, wie unzweifelhaft aus der Beschreibung erhellt, nur ist das Syn. aus der Fl. lapp. auszuschliessen, wo unter der *Carex*, mit dreizähligen, sitzenden, gedrunghenen, mannweibigen Aehren die *C. lagopina* Wahlenb. verstanden ist. Die Bälge graubraun, var. aber selten im Schatten des Waldes.

β. argyroglochin, Bälge weisslich oder strohgelb, jedoch mit dem grünen Rückenstreifen der Art: *C. argyroglochin* Hornem. fl. d. t. 1710. St. h. 55. (In Holst. und Lüneb.; in der Rheinpfalz v. mir selbst an einer Stelle, und später von F. W. Schultz an vielen O. gefunden, im Taunus und wahrscheinlich noch anderwärts.) Ausser der Farbe der Bälge finde ich keinen Unterschied zwischen dieser Varietät und der Hauptart.

36. *C. ELONGATA* (L.) Verlängerte S. — Aehre zsgesetzt; Aehrchen wechselst., genähert, walzlich, unterwärts männlich; N. 2; *Früchte abstehend, lanzettl., zsgedrückt*, auf dem Rücken ziemlich konvex, auf der vordern und hintern Seite *nervig-vielrillig*, in einen *fast ganzen*, am Rande etwas rauhen *Schnabel verschmälert*, länger, als der eyf. Balg, etwas zurückgekrümmt; W. einen dichten Rasen treibend. 4. Auf sumpfigen Wiesen. Mai. Juni. St. h. 50. *C. multiculmis* Ehrh. Var. auf höhern Gebirgen mit kürzern Aehrchen. Diese Variet. ist *C. Gebhardi* Willd. „mit länglichen, nervigen, verschmälerten Früchten“, Schk. caric. t. hhhh. f. 192., welche mir auch Thomas unter diesem Namen mittheilte. Aber Schk. selbst gesteht nach wiederholter Untersuchung, dass sie v. *C. elongata* nicht verschieden sey.

37. *C. LAGOPINA* (Wahlenb.) Genäherte S. — Aehre zsgesetzt; Aehrchen 3, rundlich-elliptisch, wechselst., *dichtstehend*, unterwärts männlich; N. 2; *Früchte aufrecht, eyf., flach-konvex, glatt*, in einen *ungeth.*, am Rande kahlen *Schnabel zugespitzt*, ein wenig länger, als der Balg; *Halm glatt*; W. kurze Ausläufer treibend. 4. Auf den höchsten GranitA. an grasreichen, feuchten O., (Schw., Tyrol, Salzbg., Kärnth., Steyerm.) Juli. Aug. St. h. 47. *C. leporina* Linne's Herbar., Good. trans. of. lin. soc., Smith engl. Fl., Willd. Schk. t. fff. 129. *C. Lachenalii* Schk. t. y. 79. *C. approximata* Hopp. (ein zwar älterer, aber vom Autor selbst zurückgesetzter Name.) *C. bipartita* All. nach Gay.

38. *C. HELEONASTES* (Ehrh.) Torf-S. — Aehre zsgesetzt; *Aehrchen* 3-4, ründlich, *genähert*, unterwärts männlich; N. 2; *Früchte* eyf., *zsgedrückt-3kantig*, glatt, *in einen kurzen, ungeth.*, am Rande etwas rauhen *Schnabel zugespitzt*, ein wenig länger, als der Balg; *Halm rank*. 4. Auf sumpligen, torfigen Triften, (hinter Ursprung bei Salzbg.; Oberbayern, Oberschwaben, Cant. Bern.) Mai. St. h. 57. D.

39. *C. CANESCENS* (L.) Grauliche S. — Aehre zsgesetzt; *Aehrchen* meist 6, eyf. oder länglich, *etwas entfernt*, unterwärts männlich, die endständige an der Basis langverschmälert; N. 2; *Früchte* eyf., *fein-gerillt*, *zsgedrückt*, auf dem Rücken etwas konvex, *in einen kurzen, ausgerandeten, hinten nicht gespaltenen*, am Rande etwas rauhen *Schnabel zugespitzt*, länger, als der Balg; W. Rasen und kurze Ausläufer treibend. 4. Auf feuchten Wiesen, an Gräben, stehenden Wassern. Mai. Juni. St. h. 50. *C. cinerea* Pollich. *C. curta* Good. *C. elongata* Leers herb. t. 14. f. 7. — Die *C. canescens* Pollich, welche irrig unter *C. elongata* gebracht wurde, ist *C. muricata* und die *C. muricata* desselben ist die *C. stellulata*. Die *C. elongata* Pollich ist die wahre Linnäische Art. — Die Bälge weisslich oder hell-ledergelb, am Rande weisslich.

40. *C. PERSOONII* (Sieber Herbar. fl. austr. n. 282.) Persoon's S. — Aehre zsgesetzt; *Aehrchen* 5-S, die oberen *meist dicht-genähert*, die unteren entfernt, alle eyf., unterwärts männl., die oberen mit ganz kurz-verschmälert Basis; N. 2; *Früchte* eyf., *fein-gerillt*, auf dem Rücken etwas konvex: *in einen kurzen, hinten der ganzen Länge nach gespaltenen*, am Rande feingesägt-rauhen *Schnabel zugespitzt*, länger, als der Balg; W. Rasen und kurze Ausläufer treibend. 4. An feuchten, sumpligen O. der A. Juni. Juli. *C. Persoonii* O. F. Lang in der Regensb. bot. Ztg. B. 25. S. 748. *C. canescens* β . *brunnescens* Koch Syn. ed. 1. *C. Gebhardi* Hoppe caric., nicht Willd. und nicht Schk. *C. Gebhardi* St. h. 50. *C. canescens* β . *alpicola* Wahlenb. snec. Bälge braun.

41. *C. LOLIACEA* (L.) Lolchartige S. — Aehre zsgesetzt; *Aehrchen* meist 4, ziemlich entfernt, unterwärts männlich, die fruchttrag. ründlich; N. 2; *Früchte* elliptisch, stumpf, *schnabellos*, am *Munde ganzrandig, nerrig*; Halm glatt, an der Spitze rauh; W. kurze Ausläufer treibend. 4. Auf torfigen, trockneren Wiesen unter Gebüsch, (im Bourtanger Moore 1 Stunde von Rhede im Kreis Meppen in Westphalen.) Mai. St. h. 60. Aehrchen strohgelb. D.

V. Rotte. LEGITIMAR. *Echte Seggen*. Die endst. Aehre männlich, die seitenst. weiblich; seltner die endst. an der Spitze weiblich oder der männlichen mehr als eine.

§. 1. Narhen 2.

A. Früchte in einen berandeten, auf der vordern Seite flachen Schnabel endigend.

42. *C. MUCRONATA* (All.) Stachelspitzige S. — Die männliche Aehre einzeln, lanzettl., die 1-2 weiblichen genähert, halb so lang,

elliptisch-rundlich, sitzend, die Scheiden umfassend, die unterste in eine borstliche, blattige Spitze endigend; N. 2; *Früchte* länglich, in einen berandeten, 2sp. auf der vordern Seite flachen Schnabel verschmälert, *flümmlich, am Rande wimperig-rauh*, länger, als der spitze Balg; B. *borstlich, rinnig*. 4. Auf felsigen Triften der A. und VorA., (Schw., Tyr., Kärnth., Krain, Steyerm., Salzbg., bayerische A.) Juli. Aug., auf den VorA. früher. St. h. 53.

43. C. GAUDINIANA (Guthnick.) Gaudin's S. — Die endst. Aehre lineal., an der Spitze oder an der Basis und der Spitze weibl., selten ganz männl., *die seitenständigen 2-3 weibl. bemerklich kürzer, genähert*, sitzend; die DeckB. häutig, ohne Scheide; N. 2; *Früchte* kahl, von der eyf. Basis an in einen an der vorderen Seite flachen, am Rande feingesägt-rauhen, *an der Spitze 2zähni gen Schnabel allmählig verschmälert*; Halm oberwärts stumpf-kantig; B. schmal-lineal., tief-rinnig, an der *flach-zsgedrückten* Spitze und den Rändern etwas rauh. 4. Auf sumpfigen, torfigen Wiesen, (Hengster, eine grosse torfige Strecke bei Seligenstadt, Fl. d. Wett.; C. Bern bei Thun; Vorarlberg bei Bregenz; Tyrol bei Kitzbichel.) Juni. Juli. St. h. 69. Sehr ähnlich dem folgenden, aber niedriger und doch den Halm, die Spitze der B. und die Form der Früchte sicher verschieden.

44. C. MICROSTACHYA (Ehrh. Beitr. 2. S. 72.) Kleinährige S. — Die endst. Aehre männl. oder an der Spitze weibl., *die 2-3 seitenst. weibl., bemerklich kürzer, genähert*, sitzend; die DeckB. häutig, ohne Scheide; N. 2; *Früchte* kahl, eyf., in einen an der vorderen Seite flachen, am Rande kahlen oder schwach-gezähnelten, *an der Spitze kurz-2zähni gen Schnabel zugespitzt*; Halm oberwärts scharf-3kantig; B. schmal-lineal., tief-rinnig, an der Spitze scharf-3kantig, mit rauen Rändern. 4. Auf sumpfigen, torfigen Wiesen, (Ostfriesland bei Aurich, Schlutap in Holstein, Stettin in Pommern, zwischen der Schindel- und Giesemühle bei Wohlan in Schlesien.) Juni. St. h. 55. Die Pfl. ist sehr schlank und hat dünne Aehren. D.

B. Früchte schnabellos, oder mit einem stielrunden gestutzten oder schief-abgeschnittenen oder auch 2zähni gen, aber sehr kurzen Schnabel endigend.

a. Die DeckB. nicht scheidig oder sehr kurz-scheidig. Früchte kahl.

45. C. STRICTA (Good. t. 21. f. 9.) Steife S. — *Männl. Aehren* 1-2, weibl. 2-3, aufrecht, verlängert-walzl., sitzend, oder die untern gestielt; DeckB. an der Basis beiderseits geöhret, ohne Scheide, das untere blattig; N. 2; *Früchte* elliptisch, *flach, nervig*, kahl, sehr kurz-geschnäbelt, Schnäbelchen stielrund, ungeth.; *BScheiden am Rande sämmtlich netzig-gespalten*; Halm steif-aufrecht, scharf-kantig, rauh; W. dichte Rasen bildend ohne Ausläufer. 4. In moosigen Sümpfen sehr grosse, dichte Rasen bildend, (zerstreut doch d. Geb.) April. Mai. St. h. 50. Die Früchte fallen bei ihrer Reife bald ab. Gay glaubt diese Art zur Carex caespitosa Linn. fl. suec. ziehen zu müssen, aber Fries hält letztere für einerlei mit der Carex Drejeri. Da jedoch hierüber die Botaniker und selbst die ausgezeichnetsten sich niemals vereinigen werden, so habe ich für zweckmässiger erachtet, Namen zu wählen, welche Jeder so-

gleich versteht. Was man unter *Carex stricta* Good. versteht, weiss jeder Botaniker und darüber waltet nicht der geringste Zweifel.

46. *C. DREJERI* (O. F. Lang in der Regensb. bot. Ztg. B. 25. S. 548.) Drejer's S. — Männl. Aehre einzeln, weibl. 1-2, selten 3, aufrecht, walzl., kurz-gestielt, die obere meist sitzend; DeckB. an der Basis umfassend, fast scheidenartig, beiderseits geöhrelt, das untere blattig; N. 2; *Früchte* elliptisch, zsgedrückt, *vorne und hinten etwas konvex*, von sehr kleinen Pünktchen fein-rauh, nervenlos, sehr kurz-geschnäbelt, Schnäbelchen stielrund, ungeth.; *die unteren BScheiden netzig-gespalten*; Halm ziemlich schlaff, scharfkantig, rauh; W. dicht-rasig ohne Ausläufer. 4. Auf feuchten, sumpfigen Wiesen. (bei Hamburg, Hannover, Leipzig.) April; früher als *C. vulgaris*. *C. pacifica* Drejer Fl. exc. hafn. *C. caespitosa* Lin. fl. succ. nach Fries. D.

47. *C. VULGARIS* (Fries novit. fl. succ. mant. 3. S. 153. *C. caespitosa* der Autoren.) Gemeine S. — Männl. Aehre 1, selten 2, weibl. 2-3, seltener 4, aufrecht, längl.-walzl., sitzend, seltener die untere gestielt; DeckB. an der Basis beiderseits sehr kurz-geöhrelt, ohne Scheide, *das untere blattig, kürzer, als der Halm*, selten so lang, als dieser; N. 2; *Früchte* kahl, elliptisch, *vorne flach, auf dem Rücken ein wenig konvex und vielnervig*, sehr kurz-geschnäbelt, Schnäbelchen stielrund, ungeth.; *die BScheiden nicht netzig-gespalten*; Halm steif-aufrecht, scharfkantig, auf den Kanten rauh; W. locker-rasig und Ausläufer treibend. 4. Auf feuchten Wiesen, Triften, Waldstellen, überall. April. Mai. *C. acuta* a. *nigra* L. sp. *C. caespitosa* Good. trans. of lin. soc. t. 21. f. 8. Koch Synops. ed. 1. St. h. 50. und sämtlicher Autoren bis auf die neueste Zeit. *C. Goodenowii* Gay in der Regensb. bot. Ztg. 23. S. 214. Eine niedrigere Form giebt die *C. stolonifera* Hoppe in St. h. 69. — Dem Namen *Carex vulgaris*, obgleich er der Pflanze später beigelegt wurde, habe ich den Vorzug gegeben, weil dieselbe ohne Zweifel die *Carex nigra verna vulgaris* Linne's ist und weil leicht in dem Herbar. Linne's eine andere verwandte Art, die *C. Drejeri*, unter dem Namen *C. caespitosa* aufbewahrt gefunden werden könnte. Goodenow hat diese, so wie alle Botaniker bis auf Drejer, von *C. vulgaris* nicht unterschieden. Es wären daher die Expl. der *C. caespitosa* in Linne's Herbar. in dieser Hinsicht von Neuem zu untersuchen.

48. *C. ACUTA* (L. spec. 1388. var. β .) Spitzige S. — Männl. Aehren 2-3, weibl. 3-4, verlängert-walzlich, *die blühenden nickend*, die unterste länger oder kürzer gestielt; DeckB. blattig, an der Basis beiderseits sehr kurz-geöhrelt, ohne Scheide, *das untere länger, als der Halm*; N. 2; *Früchte* kahl, elliptisch, zsgedrückt, *etwas aufgeblasen, vorne und hinten ziemlich konvex, undeutlich-nervig*, kurz- und dünn-geschnäbelt, Schnäbelchen stielrund, ungeth.; *BScheiden nicht netzig-gespalten*; Halm aufrecht, scharfkantig, an den Kanten rauh; W. Ausläufer treibend. 4. An sumpfigen O., Gräben, Ufern. Mai. St. h. 57. *C. acuta* β . *ruffa* L. spec. *C. gracilis* Curt. lond. t. 62. Die reifen Früchte fallen früher aus, wie bei *C. vulgaris*.

49. *C. RIGIDA* (Goodenough.) Starre S. — *Die männliche Aehre einzeln*, weibliche 3, aufrecht, walzlich, sitzend, die unterste gestielt; DeckB. an der Basis beiderseits geöhrelt, ohne-Scheide, das unterste blattig; N. 2; *Früchte* kahl, elliptisch, linsenf.-zsgedrückt, fast 3seitig, *glatt, sehr kurz-geschnübelt, Schnäbelchen stielrund, ungeth*; B. *zurückgekrümmt*, mit ganzen BScheiden; Halm scharf-kantig, rauh; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. An sumpfigen, steinigen O. der höheren Gebirge, (auf dem Brocken, besonders am südl. Abhange; dem Riesengeb., Gesenke und dem Schneeberg d. Grf. Glatz.) Juni. Aug. *C. saxatilis* Willd., nicht L. St. h. 69. — Die *C. saxatilis* L. ist einerlei mit *C. pulla* Good. nach Explaren „in Solanders Herb., welcher sie aus Lappland brachte,“ Hartm. in Briefen. — Die Schwedischen Explare v. *C. saxatilis* Wahlenb. und die Englischen v. *C. rigida* Good. stimmen mit unserer Pfl. vollkommen überein. Uebrigens waren die Schwedischen Botaniker neuerdings darüber in Zweifel, ob die *C. saxatilis* Lin. in unserer Pfl. oder in der *C. pulla* zu suchen sei. D.

b. Die DeckB. scheidig.

50. *C. BICOLOR* (All.) Zweifarbig S. — *Aehren gestielt, 3 an der Spitze des Halmes gedrungen, und öfters eine vierte entfernt und länger-gestielt und mit einem blattigen, scheidigen DeckB. gestützt*, die endständige an der Basis männlich, die folgenden weiblich; N. 2; *Früchte* kahl, verkehrteyf., stumpf, *schnabellos*, an der ringf. Mündung ganzrandig; Bälge eyf., stumpf. 4. Auf den höchsten GranitA., an feuchten, kiesigen O., (Schweiz, Tyrol, Salzb., Kärnth.) Juli. Aug. St. h. 47. *C. androgyna* Balb.

§. 2. Narben 3. Die endst. Aehre männlich oder mannweibig, nämlich die untern Bth. männlich.

A. Früchte schnabellos oder mit einem stielrunden, am Ende gestutzten oder schief-abgeschnittenen oder 2zähligen Schnabel endigend.

a. DeckB. nicht scheidig oder sehr kurz-scheidig. Früchte kahl.

51. *C. BUXBAUMI* (Wahlenb.) Buxbaum's S. — *Die endst. Aehre mannweibig, verkehrteyf., unterwärts männlich*, weibliche meist 3, die unterste kurz-gestielt, entfernter, mit einem an der Basis beiderseits geöhrelten oder sehr kurz-scheidigen DeckB. gestützt; N. 3; Früchte kahl, elliptisch, 3kantig, stumpf, sehr kurz-geschnäbelt, Schnäbelchen stielrund, klein-2zählig; Bälge haar-spitzig; BScheiden *netzig-gespalten*. 4. Auf torfigen Wiesen, (Schw. nur bei Orbe im C. Bern; Bad. bei Kirchzarten; Wetterau; bei Meppen in Westphal.; bei Trittau in Holst.; Brieselang bei Berlin; bei Niesky in der Lausitz; Dolau bei Halle; Schles., Böhm. und Mähr. an mehreren O.; Franken bei Dechsendorf in d. Fl. v. Erlangen; Dachauer Moos in Oberbayern; Salzb.) April. Mai. St. h. 61. *C. polygama* Schk. t. gg. f. 76. *C. subulata* Schumach.

52. *C. VAHLII* (Schkuhr. Caric. 1. 87. 2. 46. t. G. g. f. 44. u. t. P. p. p. f. 154.) Vahl's S. — *Aehren 3, dicht-gehäuft, kurz-gestielt, rundl., die endst. mannweibig, an der Basis männl., die*

übrigen weibl.; DeckB. an der Basis geöhreht oder kurz-scheidig, das unterste schmal-blattig; N. 3; Früchte kahl, elliptisch, auf dem Rücken konvex und stumpf-gekielt, *dreiseitig*, mit einem kurzen, stielrunden, klein-zweizähligen Schnäbelchen endigend; BScheiden ganz; *Halm glatt*. 4. Auf den höchsten A., (auf d. Albulä und im Val Bevers in d. Schw.) Juli. Aug. C. alpina Wahlenb. act. holm. S.

52. C. NIGRA (All.) Schwarze S. — *Aehren 3 oder 4, dicht-gehäuft, sitzend, oder kurz-gestielt, eyf., die endständige männweibig, an der Basis männlich*, die übrigen weiblich; DeckB. an der Basis 2öhrig oder kurz-scheidig, das unterste schmal-blattig; N. 3; Früchte kahl, verkehrteyf., *zsgedrückt, auf dem Rücken stumpf-gekielt*, mit einem ganz kurzen, stielrunden klein-zweizähligen Schnäbelchen endigend; BScheiden ganz; *Halm glatt*, 4. An grasigen, trocknen O. der A., (Schweiz, Tyrol, Kärnth., Steyeru.) Juli. Aug. St. h. 47. C. atrata *γ. nigra* Gaud. C. parviflora Host. Früchte violett-schwarz, am Rande grün.

53. C. ATERRIMA (Hoppe.) Kohlschwarze S. — *Aehren 3-5, gedrun-gen, länglich-walzlich, aufrecht, die endständige männweibig, an der Basis männlich*, die weiblichen gestielt, die unterste länger-gestielt; DeckB. an d. Basis 2öhrig oder kurz-scheidig, das unterste blattig; N. 3; *Früchte kahl, rundl.-eyf., zsgedrückt, auf dem Rücken stumpf-gekielt*, mit einem kurzen, stielrunden, klein-2zähligen Schnäbelchen endigend; BScheiden ganz; *Halm rauh*. 4. An grasreichen, nassen O. der höchsten A., (Schw., Tyr., Kärnth., Salzbg., Steyeru.) Aug. St. h. 47. C. atrata *β. dubia* Gaud. Früchte violett-schwarz am Rande und an der Basis grün, breiter, als die schwarzen Bälge. Gewöhnlich findet sich ein unfruchtbares, blattiges DeckB. unter den Aehren an dem obern Theile des Halmes, was ich bei der vorhergehenden noch nicht gesehen habe.

54. C. ATRATA (L.) Geschwärzte S. — *Aehren 3-5, gedrun-gen, die endständige eyf., männweibig, an der Basis männlich, die weiblichen länglich, gestielt, zuletzt hängend*, die unterste länger-gestielt; DeckB. an der Basis 2öhrig, oder kurz-scheidig, das unterste blattig; N. 3; Früchte kahl, rundlich-eyf., *zsgedrückt, auf dem Rücken stumpf-gekielt*, mit einem kurzen, klein-2zähligen Schnäbelchen endigend; BScheiden ganz; *Halm glatt*. 4. An felsigen, kiesigen, trocknen O. der A., (dch d. g. AK. und im Riesengebirge und Gesenke in Schles.) Juni-Aug. St. h. 47. C. atrata *α. varia* Gaud. Früchte grün, breiter, als der schwarz-violette Balg, getrocknet gelblich.

55. C. IRRIGUA (Sm., nach Hartm.) Bewässerte S. — *Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-3, ziemlich genähert, nickend oder hängend, lang- und dünn gestielt, eyf., gedrun-genbth.*; DeckB. schmal-blattig, an der Basis beiderseits geöhreht oder kurz-scheidig; N. 3; *Früchte rundlich-oval, stumpf, linsenf.-zsgedrückt, kahl, nervenlos oder schwach-nervig*, mit einem kleinen, stielrunden, abgeschnittenen Schnäbelchen bespitzt, kahl; B. lineal,

flach, glatt, am Rande nach der Spitze hin rauh; W. Ausläufer treibend. 4. An sumpfigen, moorigen O. der höchsten A., (Salzb., Kärnth., Tyrol, Sudet., Schw.) St. h. 53. C. limosa γ. irrigua Wahlenb. lapp. t. 15. f. 2. Der folgenden sehr ähnlich, aber doch die kürzern Aehren und flachen, breiten B. leicht zu unterscheiden. Die endst. Aehre manchmal an der Spitze weiblich, was man auch bei der folg. beobachtet. „Sie unterscheidet sich von C. limosa doch die meist um die Hälfte kürzere männl. Aehre, die 2-3 ebenfalls kürzeren weibl., bei C. limosa sind 1-2, nie 3 verbunden, ferner doch die vorn und hinten schwach 2-3nervigen oder ganz nervenlosen Früchte, die bei C. limosa immer vielnervig sind, und doch die flachen B., die bei C. limosa rinnig sind.“ O. F. Lang auf dem beigelegten Zettelchen.

56. C. LIMOSA (L.) Schlamm-S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 1-2, ziemlich genähert, nickend oder hängend, lang- und dünn-gestielt, länglich, gedrungeblüthig; DeckB. schmal-blattig, an der Basis beiderseits geöhrt oder kurz-scheidig; N. 3; Früchte rundlich-oval, stumpf, linsenf.-zsgedrückt, kahl, vielnervig, mit einem kleinen, stielrunden, abgeschnittenen Schnäbelchen bespitzt, kahl; B. schmal-lineal., faltig-rinnig, am Rande v. der Basis an etwas rauh; W. Ausläufer treibend. 4. An schlammigen O. und in moosigen Sümpfen. Mai. Juni. St. h. 53. Die vollkommen reifen Früchte sind mit Längenlinien bezeichnet, welche ich an getrockneten Explaren der vorhergeh. Art nicht finde. Die Länge der Bälge var. wie bei der vorhergeh.

58. C. SUPINA (Wahlenb.) Niedergehaltene S. — Männliche Aehre einzeln, lineal.-lanzettl., weibliche 1-2, genähert, halb so lang, rundlich, sitzend; DeckB. häutig, stengelumfassend, das untere haarspitzig; N. 3; Früchte kugelig-elliptisch, 3kantig, glänzend, ganz kahl, in einen an der Spitze trockenhäutigen und 2-lappigen Schnabel zugespitzt; W. Ausläufer treibend. 4. Auf sonnigen Hügeln, (Holst., Hanov.; Pommern bei Stettin; bei Halle, Magdeb., Berlin; in Pomm., Böhm., Mähr., Unteröstr.; Rheinfläche bei Mannh. und Mainz.) Apr. Mai. St. h. 47. C. campestris Host. D.

b. Die DeckB. nicht scheidig oder sehr kurz scheidig; Früchte flaumig oder filzig.

59. C. PILULIFERA (L.) Pillentragende S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche meist 3, genähert, rundlich, sitzend; das untere DeckB. lineal.-pfriemlich, nicht scheidig, gänzlich blattig, aufrecht-abstehend; N. 3; Früchte kugelig-verkehrteyf., 3seitig, kurz-geschnäbelt, am Munde etwas ausgerandet, flaumig; Bälge doch den auslaufenden Nerven kurz-stachelspitzig; die fruchttragenden Halme rückwärtsgeneigt; W. faserig. 4. In Waldungen. Apr. Mai. St. h. 50. C. decumbens Ehrh. C. filiformis Pollich. Fl. d. t. 1048.

60. C. TOMENTOSA (L.) Filzfrüchtige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 1-2, fast sitzend, walzlich, stumpf; das untere DeckB. blattig, sehr kurz-scheidig, wagerecht-abstehend; N. 3; Früchte kugelig-verkehrteyf., 3seitig, kurz-geschnäbelt, am Munde

etwas ausgerandet, *kurzh.-filzig*; Bälge spitz, mit einem in die Spitze auslaufenden Nerven; Halme steif-aufrecht; W. Ausläufer treibend. 4. An feuchten O., auf Triften, Wiesen, (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. St. h. 53. *C. sphaerocarpa* Ehrh. BScheiden purpurn. Ich habe sie mit zsgesetzten weiblichen Aehren gefunden und mit Aehren, welche sämmtlich weiblich und oberwärts männlich waren; zur letztern scheint *C. thuringiaca* Schk. zu gehören, nicht Willd., welche nach Kunth, en. eine monströse Entartung von *C. glauca* ist, mit fast sitzenden, rundl. weibl. Aehren. Expl. von *Carex Grassmanniana* Rabenh., so viele ich deren bis jetzt gesehen, konnte ich nicht für verschieden von *C. tomentosa* halten.

61. *C. MONTANA* (L.) Berg-S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 1-2, dichtgenähert, eyf.; DeckB. *gänzlich häutig*, stengelumfassend, begrannt oder mit einer blattigen Spitze versehen; N. 3; *Früchte* länglich-verkehrteyf., 3seitig, kurz-geschnäbelt, am Munde ausgerandet, *kurzh.-flaumig*; Bälge stumpf oder gestutzt, stachelspitzig; W. *faserig, gedrunge-n-rasig*. 4. In Wäldern und in schattigem Gebüsch. Apr. Mai. St. h. 69. *C. collina* Willd. Bälge schwarz-braun; BScheiden purpurn. Var. mit flaumigen B.: *C. montana* β . *procerior* Gaud. helv.

62. *C. ERICETORUM* (Pollich) Haide-S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 1-2, genähert, eyf.; DeckB. häutig, stengelumfassend, spitz oder begrannt; N. 3; *Früchte* verkehrteyf., 3seitig, sehr kurz-geschnäbelt, am Munde abgeschnitten, *flaumig*; Bälge *verkehrteyf.*, *kurz-gewimpert, sehr stumpf, mit einem vor der Spitze verschwindenden Nerven*; W. Ausläufer treibend. 4. An sandigen, sehr trocknen O., (in der Schweiz bei St. Gallen und Zürich; in D. stw. in allen Provinzen.) Apr. Mai. St. h. 57. *C. ciliata* Willd. *C. montana* Leers t. 16. f. 6. — Var.:

β . *membranacea*, mit mehr länglichen Bälgen: *C. membranacea* Hoppe in St. h. 61. Diese vielleicht mit der gewöhnlichen Form auf den höchsten GranitA. an sonnigen, unfrucht. O., (auf den A. der Schw. an vielen O.; auf der Pasterze am Grossglockner in Kärnth.) Juli. Aug. St. h. 61. *C. approximata* All., nicht Willd., noch Hoppe., ein vieldeutig gewordener Name.

63. *C. PRÆCOX* (Jacq. n. t. 446.) Frühzeitige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 1-3, genähert, länglich-eyf., die unterste oft gestielt; die DeckB. am Rande häutig, stengelumfassend oder das unterste scheidig; N. 3; *Früchte* verkehrteyf., 3seitig, kurz-geschnäbelt, am Munde etwas ausgerandet, *flaumig*; Bälge dch den auslaufenden Nerven stachelspitzig; Halme aufrecht; W. *Ausläufer treibend*. 4. Auf unkultiv. Hügeln, trocknen Wiesen, an Wegen. März. Apr. St. h. 69. *C. montana* Pollich. *C. filiformis* Leers. h. t. 16. f. 5. *C. stolonifera* Ehrh. Eine an schattigen O. vorkommende Abänderg mit höhern Halmen ist *C. umbrosa* Host. gr. 1. t. 69. Host. nennt die W. der letztern kriechend. Eine Abänderung mit ausgerandeten, lang-stachelspitzigen Bälgen ist: *C. mollis* Host. gram. 4. t. 82. wenigstens diejenige Pfl., welche ich seither unter diesem Namen erhielt. Eine Abänderung mit über

der ersten Aehre eingebogenem Halme ist: *C. reflexa* Hoppe Caric., ob auch die von Hoppe angeführte *C. refracta* Roth. tent.? Die Beschreibung stimmt nicht in allen Stücken zu.

64. *C. POLYRRHIZA* (Wallroth Sched. S. 492.) Reichwurzellige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 1-3, genähert, länglicheyf., sitzend, die unterste etwas gestielt; *die DeckB. am Rande häutig*, stengelumfassend, *das unterste scheidig*; N. 3; *Früchte* verkehrteyf., 3seitig, kurz-geschnäbelt, am Munde etwas ausgerandet, *flaumig*; Bälge dch den auslaufenden Nerven stachelspitzig; Halme aufrecht; *W. faserig, gedrun-gen-rasig*. 4. In Wäldern, (stw. im südl. und mittl. Geb.) Mai. *C. umbrosa* Hopp. bei St. h. 57. Gaud. *C. longifolia* Host. gr. 4. t. 85., (nicht Rob. Brown.) Koch Synops. ed. 1.

c. Die DeckB. scheidig; Früchte flaumig.

65. *C. HUMILIS* (Leysser.) Niedrige S. — Männliche Aehre einzeln, gestielt, *weibliche 2-3, entfernt, meist 3bth.*, alle gestielt; *Bthstiele von einem häutigen, scheidigen, blattlosen DeckB. eingeschlossen*; N. 3; *Früchte* verkehrteyf., 3seitig, sehr kurz-geschnäbelt, am Munde abgeschnitten, an der Spitze *flaumig*; B. rinnig, länger, als der Halm; *W. faserig, rasig*. 4. Auf Hügeln und sonnigen Bergen, auf Kalkboden, (stw. dch d. Geb., wo Kalkboden sich vorfindet.) März. Apr. St. h. 2. und 69. *C. clandestina* Good. *C. prostrata* All.

66. *C. GYNOBASIS* (Vill.) Wurzelblüthige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-3, meist 5bth., *die obern genähert, die unterste fast wurzelst., sehr lang-gestielt*; die untern DeckB. scheidig; N. 3; *Früchte* verkehrteyf., 3kantig, sehr kurz-geschnäbelt, am Munde etwas ausgerandet, nervig, *fein-flaumig*; *W. faserig, rasig*. 4. Auf grasreichen Hügeln, (südl. Schw., C. Wallis, Waadt, südl. Tyrol, Steyer., im Littor. und Unteröstr.) März. Apr. St. h. 47. *C. alpestris* All. *C. diversiflora* Host. gr. 1. t. 70. Aehren strohgelb.

67. *C. DIGITATA* (L.) Fingerförmige S. — Männliche Aehre einzeln, sitzend, *weibliche meist 3, lineal., etwas entfernt, gestielt*, die fruchttragenden lockerbth.; *Bthstiele v. einem häutigen, scheidigen, schief-abgeschnittenen DeckB. eingeschlossen*; N. 3; *Früchte* verkehrteyf., 3seitig, sehr kurz-geschnäbelt, an der Mündung etwas ausgerandet, *flaumig, so lang, als der Balg*; *W. faserig, rasig*. 4. In schattigen Wäldern. Apr. Mai. St. h. 61. Bei dieser und der folg. Art sind die blüthentragenden Halme mit kleinen B. versehen, haben aber keine WB., dagegen haben die unfruchtbaren Blätterbüschel lange und ziemlich breite B.

68. *C. ORNITHOPODA* (Willd.) Vogelfussförmige S. — Männliche Aehre einzeln, sitzend, *weibliche meist 3, lineal., dicht-zugestellt, gestielt*, die fruchttragenden lockerbthig; *Bthstiele v. einem häutigen, scheidigen, schief-abgeschnittenen DeckB. eingeschlossen*; N. 3; *Früchte* verkehrteyf., 3seitig, sehr kurz-geschnäbelt

an der Mündung etwas ausgerandet, *flaumig, länger, als der Balg*; W. faserig, rasig. 2. In schattigen Wüldern, seltner, als die vorige. Apr. Mai. St. h. 61.

d. Die DeckB. scheidig; Früchte kahl.

69. *C. ALBA* (Scopol.) Weisse S. — Männliche Aehre einzeln, gestielt, weibliche 2, gestielt, *meist 5bth.*; DeckB. *scheidig, häutig, blattlos*, auf dem Rücken mit einem krautigen Streifen bezeichnet; N. 3; *Früchte kugelig-cyf.*, gerillt, kurz-geschnäbelt, *kahl*, Schnabel stielrund, an der Spitze häutig, schief-abgeschnitten; B. schmal-lineal.; W. Ausläufer treibend. 2. In Wäldern der Gebirge, VorA. und der die A. begleitenden Ebenen, (v. d. Jura an dch d. g. AK. und dch Oberbaden, Würtemb. und Oberschwaben, Oberbayern bis Oestr., nördl. bis an die Donau.) Apr. Mai. St. h. 53. *C. nemorosa* Schrank.

70. *C. NITIDA* (Host. gr. t. 71.) Glänzende S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2, länglich, *die untere heraustretend-gestielt, gedrunken-blüthig*, meist 12bth., *die obere fast sitzend*; DeckB. scheidig, das untere blattig-stachelspitzig; N. 3; *Früchte kugelig-cyf.*, gerillt, kurz-geschnäbelt, *kahl*, Schnabel stielrund, an der Spitze *weisslich-häutig, 2lappig*; B. lineal.; W. Ausläufer treibend. 2. Auf sonnigen, unfruchtbaren Hügeln, (Unteröstr. bei Wien; Istrien; Krain bei Monfalcone; Steyern.; Südtirol; C. Wallis und Waadt.) Apr. Mai. St. h. 47. *C. verna* Schk. caric. t. 1. f. 46. u. t. ppp. 156.

71. *C. PILOSA* (Scop.) Behaarte S. — Männliche Aehre einzeln, gestielt, weibliche 2-3, entfernt, aufrecht, heraustretend-gestielt, lockerbth.; DeckB. scheidig, blattig; N. 3; *Früchte fast kugelig-verkehrtecyf.*, 3seitig, ganz *kahl*, gerillt, geschnäbelt, Schnabel stielrund, an der Spitze häutig, schief-abgeschnitten; Halme ganz glatt, gerillt, *meist blattlos*; B. der unfruchtb. Büschel länger, als die Halme, breit-lineal., *behaart-wimperig*. 2. In Bergwäldern. (in der Schw. an mehrern O., doch selten; Oberbayern, Oberbaden; Krain; Kärnthen; Steyern.; in Unteröstr., Mähr., Schles.; zw. Förste und Dorste im Fürstenth. Göttingen.) Apr. Mai. St. h. 55.

72. *C. PANICEA* (L.) Fennichartige S. — Männliche Aehre einzeln, gestielt, *immer aufrecht*, weibliche meist 2, entfernt, aufrecht, *lockerbth.*, die unterste heraustretend-gestielt; DeckB. *blattig*, scheidig; N. 3; *Früchte fast kugelig-cyf.*, kurz-geschnäbelt, *kahl*, Schnabel stielrund, abgeschnitten; Halme glatt, an der Basis beblättert; B. lineal., kahl, am Rande rauh; W. Ausläufer treibend. 2. Auf Wiesen und an feuchten O. Mai. Juni. St. h. 50. Var.:

β. *microcarpa*, mit um die Hälfte kleineren Früchten: *C. panicea microcarpa* Sonder in Briefen.

73. *C. VAGINATA* (Tausch.) Bescheidete S. — Männliche Aehre einzeln, gestielt, *während der Bthezeit rechtieinklig-zurückge-*

brochen, weibliche 2-3, entfernt, aufrecht, heraustretend-gestielt, lockerbth.; DeckB. blattig, scheidig; N. 3; *Früchte fast kugelig-eyf.*, 3seitig, ganz kahl, geschnäbelt, *Schnabel stielrund, schief-abgeschnitten*, ausgerandet; *Halme* ganz glatt, gerillt, *an der Basis beblättert*; B. breit-lineal., kahl, am Rande gegen die Spitze hin rau; W. Ausläufer treibend. 4. An O., die von Quellen bewässert sind, in den VorA., (Riesengebirge am Brunnenberge im Anpagrunde und in der Kesselgrube im Gesenke; auf dem Brocken am Brockenhause.) Juni. Juli. St. h. 6l. C. phaeostachya Sm. C. salina Don., nicht Wahlenb. C. tetanica Rb., nicht Schk. C. subspathacea WomskioId. fl. d. t. 1530. Der Halm ist jedesmal an derjenigen Aehre, welche ihre Bthen entfaltet, zurückgebrochen, nach vollendeter Entwicklung richtet er sich daselbst auf, erscheint aber nun an der folg. Aehre eben so zurückgebrochen; nach der Bthezeit aber hat er eine aufrechte Richtung. D.

74. C. GLAUCA (Scop.) Bläulichgrüne S. — *Männliche Aehren meist 2*, weibliche 2-3, entfernt, *walzlich, gedrungen-blüthig, lang-gestielt, zuletzt hängend*; DeckB. blattig, die untersten kurz-scheidig; N. 3; *Früchte elliptisch, stumpf und mit einem sehr kurzen, ausgerandeten Schnäbelchen bespitzt, zsgedrückt-konvex, ein wenig rau, nervenlos*; Halm glatt; B. am Rande rau; W. Ausläufer treibend. 4. Auf Triften und an lichten, feuchten WaldO., auf Lettenboden; in die A. hinaufsteigend. April. Mai. St. h. 53. C. recurva Huds. C. flacca Schreb. Spicil. app. C. pendula Schreb. Spicil. p. 62. Eine Form mit aufrechten, kürzer gestielten Aehren und Bälgen, welche länger sind, als die Frucht, ist: C. erythrostachys Hoppe; eine andere Form mit einem Mittelnerv auf den Bälgen, welcher in eine krautige Stachelspitze von der ganzen oder halben Länge des Balges vorgezogen ist, giebt die: C. acuminata Willd. Schk. car. 2. t. Cccc. fig. 184., C. cuspidata Host. gram. 1. t. 97.

75. C. CLAVAEFORMIS (Hopp. bei St. h. 6l.) Keulenförmige S. — *Männliche Aehren meist 2*, weibliche 2-3, entfernt, *keulig, an der Spitze breiter, verlängert-gestielt, hängend*; DeckB. blattig, die untersten kurz-scheidig; N. 3; *Früchte elliptisch-länglich, stumpf, mit einem sehr kurzen, etwas ausgerandeten Schnäbelchen bespitzt, zsgedrückt-konvex, ein wenig rau, nervenlos*; Halm glatt; B. am Rande rau; W. Ausläufer treibend. 4. Auf den höchsten A. von Kärnthen, Krain und d. Schw. Aug. Hoppe vergleicht diese Art mit C. Mielichhoferi, (ferruginea Scop.) und mit C. frigida, von diesen aber ist die Pfl. dch den Bau der Frucht sehr verschieden; mir scheint sie am nächsten an C. glauca zu grenzen, von der sie sich dch die keuligen, länger-gestielten Aehren und die länglichern Früchte untersch.

76. C. MAXIMA (Scop.) Grosse S. — *Männliche Aehre einzeln und nebst den weiblichen gekrümmt, zuletzt hängend*, weibliche meist 4, aneinanderstehend, walzlich, verlängert, gedrungen-blüthig, die oberen eingeschlossen-, die unteren heraustretend-gestielt; DeckB. blattig, scheidig; N. 3; *Früchte elliptisch, 3kantig kurz-geschnäbelt*, kahl, *Schnabel 3seitig*, ausgerandet; Halm 3

kantig, oberwärts etwas rauh; B. lanzettl.-lineal.; W. rasig, faserig. 4. An feuchten WaldO. (stw. in der AK.; auf den Voges., Schwarzw., Oestr., Böhm., Mähr., Schles., im südl. Theile v. Hanover, Harz; bei Erlangen in Franken, Winnungen an d. Mosel; Westphal; Fiume.) Juni. C. agastachys Ehrh. St. h. 55. C. pendula Good.

77. C. STRIGOSA (Huds.) Schlankährige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche meist 4, auseinanderstehend, nickend, *schlank, lockerblüthig*, die untern heraustretend-gestielt; DeckB. blattig, scheidig; N. 3; *Früchte länglich-lanzettl., nervig, 3seitig, nach vorne verschmälert*, am Munde schief-abgeschnitten; W. Ausläufer treibend. 4. An feuchten WaldO., Bächen und Quellen, (Westph.; Hanov.; Holst.; bei Heidelberg; in der nördl. Schw. bei Basel und Schaffhausen.) Mai. C. leptostachys Ehrh. St. h. 55. Die Pflanze grasgrün; Bälge weiss mit einem grünen Rückenstreifen.

78. C. PALLESCENS (L.) Bleiche S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-3, genähert, nickend, länglich-eyf., gedrungeblüthig, heraustretend-gestielt; DeckB. blattig, scheidig; N. 3; *Früchte elliptisch-länglich, stumpf, schnabellos, beiderseits konvex, etwas zsgedrückt, schwach-nervig, kahl, die kleine Mündung abgeschnitten; B. und die untern Scheiden behaart; W. faserig, rasig.* 4. Auf Wiesen, feuchten Triften, in Schlagwaldungen. Mai. St. h. 53.

79. C. CAPILLARIS (L.) Haarstielige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-3, lang-gestielt, nickend, *locker und meist 5-10 bth.*, die 2 obern gegenst., länger, als die männliche, die dritte oft entfernt; DeckB. scheidig, blattig; N. 3; *Früchte elliptisch, gedunsen, 3seitig, an der Basis und Spitze verschmälert, kahl; Schnabel stielrund, schief-abgeschnitten; B. flach; W. faserig.* 4. An felsigen, grasigen, feuchten O. der A.; in die VorA. herabsteigend, (dch d. g. AK. und auf den Sudeten.) Juni, Juli. St. h. 53.

80. C. USTULATA (Wahlenb.) Angebrannte S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-3, etwas genähert, gestielt, hängend, eyf., gedrungeblüthig; DeckB. scheidig, die unterste Scheide in eine blattige Stachelspitze, nicht v. der Länge der Aehre, endigend; N. 3; *Früchte flach-zsgedrückt, oval, kahl, in einen stielrunden, an der Spitze 2lappigen Schnabel plötzlich-zugespitzt; B. flach, am Rande nach der Spitze hin rauh; W. faserig.* 4. An moorigen O. der höchsten A., (Wocheiner A. in Krain; Margaritzen in Oberkärnth.; Oestr., Steyerm.) Aug. St. h. 53. Schk. caric. 2. p. 73. und C. atro-fusca Schk. caric. t. y. n. 82. C. limosa Scop. Bälge schwarzbraun; die Früchte, da wo sie v. den Bälgen nicht bedeckt werden, eben so gefärbt oder ganz schwarzbraun, am Rande jedoch immer heller und grasgrün. Auf Hoppe's und Host's Autorität hin nahm ich diese Art hier mit auf, denn ein im Gebiete unserer Fl. gefundenes Expl. kam mir bis jetzt nicht zu Gesicht; auf unseren A. ist von Neuem nach ihr zu forschen. Im Ganzen besitzt sie viel Aehnlichkeit mit Carex fuliginosa, C. frigida und C. atrata, aber genauer betrachtet, unterscheidet sie sich doch

leicht. Ihre Früchte sind eyf., an ihrer Spitze plötzlich in einen kurzen Schnabel gezogen, die v. *C. fuliginosa* und *C. frigida* dagegen lanzettl., und allmählig in einen langen Schnabel verdünnt. *Carex ustulata* ist hinsichtlich der Früchte am nächsten verwandt mit *C. atrata*, aber auch von dieser unterscheidet sie sich sogleich durch ihr langscheidiges unterstes DeckB.

D.

B. Die Früchte geschnäbelt; der Schnabel berandet, auf dem Rücken ziemlich konvex, auf der vordern Seite flach, an der Spitze 2sp., mit gerade-vorgestreckten Zähnen, seltner fast ungeth. Männliche Aehre einzeln, manchmal an der Spitze weiblich; seltner zwei männliche Aehren.

81. *C. FULIGINOSA* (Schk. caric. t. cc. n. 47.) Russfarbige S. — Aehren alle gestielt, ziemlich genähert, die endständige mannweibig, an der Basis männlich, keulig, weibliche 2-3, länglich, gedrunken-blüthig, die untern zuletzt hängend; DeckB. scheidig, blattig; N. 3; Früchte lanzettl., kahl, in einen berandeten, feingesägt-wimperigen, 2zähligen, auf der vordern Seite flachen Schnabel verschmälert; W. faserig, rasig. 4. An kiesigen, grasreichen O. der höchsten A., (Salzb., Kärnth., Tyrol, Steyerm., Krain, Oberöstr.) Juli, Aug. *C. fuliginosa* Sternb. und Hopp. Denkschr. d. Regensb. Ges. 1815. t. 3. St. h. 46. *C. frigida* Wahlenb. Host. gr. 4. t. 90. Den an der Spitze weisslich-berandeten Schnabel stellt die Schkuhrsche Abbildg. gut dar.

82. *C. FRIGIDA* (All.) Kalte S. — Männliche Aehre endst., lanzettl., seltner an der Spitze weiblich, weibliche meist 4, länglich, gedrunken-blüthig, die oberste sitzend, die unterste entfernt, sehr lang-gestielt, hängend; DeckB. scheidig, blattig; N. 3; Früchte lanzettl., kahl, in einen berandeten, feingesägt-wimperigen, auf der vordern Seite flachen, 2zähligen Schnabel verschmälert; W. Ausläufer treibend. 4. An felsigen, feuchten O. und Giesbächen der A., (Voges., Schw., Tyr., Salzb., Kärnth., Steyerm., auf dem Feldberge in Oberbad., Sudet.) Juli, Aug. St. h. 53. *C. fuliginosa* Wahlenb. Fl. carp. bei *C. frigida*. *C. geniculata* Host. gr. t. 94. und *C. fuliginosa* Host. gr. t. 93. Aehren schwarzbraun, oder russfarbig, wie bei der vorhergeh., aber die Früchte sind nebst dem Schnabel grün-berandet und der Mittelnerv der Balge erscheint oft grün, und der Schnabel ist an der Spitze nicht weisslich-berandet; bei jener, der *C. fuliginosa*, sind die Früchte überall russfarbig und die Mündung des Schnabels ist an der Spitze mit einer weisslichen Linie eingefasst.

83. *C. SEMPERVIRENS* (Vill.) Immergrüne S. — Aehren länglich-lanzettl., die männliche endst., einzeln, die weiblichen meist 3, etwas lockerbth., die untern hervortretend-gestielt, aufrecht; DeckB. blattig, scheidig; N. 3; Früchte ey-lanzettf., in einen berandeten, feingesägt-wimperigen, auf der vordern Seite flachen, an der Spitze trockenhäutig 2lappigen Schnabel zugespitzt, auf dem Rücken nach der Spitze hin fein-kurz.; B. schmal-lineal., aufrecht, an den nicht blühenden Büscheln verlängert, an den blühenden Halmen kurz, und viel kleiner; Halm etwas stumpf-kantig, kahl; W. faserig, gedrunken-rasig. 4. An grasigen, trocknern O. der A. und der die A. begleitenden höhern Gebirge gemein, in

die Thäler und angrenzenden Ebenen herabsteigend, (dch. d. g. AK.) Juni-Aug. *C. sempervirens* Dub. *C. ferruginea* Schk. caric. t. m. f. 48. St. h. 53. DC. fl. fr. *C. varia* Host. gr. 1. t. 80. — Die *C. sempervirens* Vill. ist gewiss wegen „der langen, biegsamen B.“ unsere, hier beschriebene Pflanze und nicht die *C. rigida*. Var. mit kahlen, nur am Rande gewimperten Früchten und

β. Früchte auf der Oberfläche mit kurzen Haaren bestreut: *C. erecta* DC. fl. fr. nach Dub.

84. *C. HISPIDULA* (Gaud. fl. helv. B. 6. S. 88.) Steifhaarige S. — Aehren längl.-lanzettl., die männl. einzeln, die weibl. meist 2, aufrecht, die unterste gestielt, mit eingeschlossenem, seltner hervorragendem Stiele; DeckB. blattig, scheidig; N. 3; Früchte eyf., berandet, feingesägt-wimperig, in einen etwas kurzen, vorne flachen, mit 2 Haarspitzen endigenden Schnabel zugespitzt, auf dem Rücken flaumig; B. lineal., am Halm und den nicht blühenden Büscheln gleichlang, halb so lang, als der Halm; Halm scharf-3kantig, rauh; W. Ausläufer treibend. 4. In den Felsenspalten der höchsten A., (Schw. im Wallis, an dem Matterhorn über Zermatten und am Räfel über dem Bagnesthal.) Juli. Aug. *C. simbrinta* Schk. 2. n. 75. t. U. u. u. f. 165. S.

85. *C. FIRMA* (Host.) Festblättrige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche meist 2, aufrecht, gedrungebth., elliptisch, die obere genähert, fast sitzend, die untern entfernt, hervortretend-gestielt; DeckB. scheidig, mit einer blattigen Spitze ungefähr v. der Länge der Aehre; N. 3; Früchte länglich-lanzettl., kahl, in einen berandeten, feingesägt-wimperigen, auf der vordern Seite flachen, an der Spitze abgeschnittenen 2 lappigen Schnabel zugespitzt; B. lanzettl.-lineal., 3reihig-abstehend, steif. 4. An felsigen, feuchten O. der A., in die VorA. herabsteigend, (dch. d. g. AK., in d. Mährischen Karpaten.) Juni-Aug. St. h. 57.

86. *C. FERRUGINEA* (Scop.) Rostbraune S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2 oder 3, entfernt-stehend, lineal., etwas lockerbth., alle hervortretend-gestielt, die fruchttragenden überhangend; DeckB. scheidig; N. 3; Früchte elliptisch-länglich, 3seitig, in einen berandeten, feingesägt-rauhen, auf der vordern Seite flachen, an der Spitze kurz-2zähligen Schnabel zugespitzt; B. lineal., aufrecht; W. Ausläufer treibend. 4. An feuchten und moorigen O. der A., in die VorA. herabsteigend, (dch. d. g. AK.) Juni. Juli. *C. Miclichhoferi* Schk. caric. mumm. f. 198. St. h. 53. *C. Scopoli* Gaud. Var.:

α. Früchte kahl, am Rande nach der Spitze hin rauh, und

β. Früchte am Rande deutlicher-gewimpert und auf der Oberfläche nach der Spitze hin mit kurzen Haaren, wie man sie bei *C. sempervirens* beobachtet, bestreut: *C. spadicea* DC. fl. fr. (wegen der hängenden Aehrchen, doch mit Ausschl. des Synonymes von Schkuhr, das zu *C. sempervirens* gehört.)

γ. Früchte kürzer und breiter, auf der Oberfläche kahl oder flaumlich: *C. Scopoli* β. Gaud. *C. Scopollana* Willd.? Diese war

Willd. selbst zweifelhaft. Die Varietät selbst ist eine wenig bemerkenswerthe, denn die meisten Arten var. mit breitem u. schmälern, längern und kürzern Früchten.

87. *C. TENUIS* (Host, gr. 4. t. 92.) Dünne S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-3, entfernt-stehend, lineal., etwas lockerbth., *alle hervortretend-gestielt*, die fruchttragenden überhangend; DeckB. scheidig; N. 3; *Früchte lanzettl.-länglich*, in einen berandeten, auf der vordern Seite flachen, an der Spitze 2zähigen Schnabel *vershmälert*, 3seitig, auf der Oberfläche und am Rande kahl; B. borstlich-lineal., W. gedrunen-rasig und zugleich Ausläufer treibend, (nach Hopp.) 4. An felsigen, feuchten O. der untern ARegion, (stw. dch d. g. AK., auf den höchsten Gebirgen v. Mähren.) Juni. Juli. *C. brachystachys* Schk. caric. t. P. f. 58. St. h. 53. Der Name *C. brachystachys* Schrank. ist nach der Bemerkg des Autors selbst aus einem unvollkommenen Expl. entstanden u. ganz unpassend; deshalb stellte ich den Hostischen Namen voran.

88. *C. DEPAUPERATA* (Goodenough. trans. of. lin. soc. 2. S. 181.) Armblüthige S. — Männl. Aehre einzeln, *die weibl.* meist 3, entfernt, hervortretend-gestielt, aufrecht, 3-6 blüthig; DeckB. scheidig, blättrig, viel länger, als die Aehre, fast so lang, wie der Halm; N. 3; *Früchte* elliptisch-verkehrteyf., 3seitig, angeschwollen, kahl, in einen lineal.-verlängerten, am Rande feingesägt-rauhen, vorne flachen, an der Spitze trockenhäutigen, 2lappigen Schnabel plötzlich zsggezogen, *vielnervig*, mit ungefähr 30 hervorragenden N.; W. (nach Smith.) faserig. 4. In Wäldern und zwischen Gesträuch, (südl. Istrien, zw. Pola und Stignano, Tommasini; Kästelwald bei Colmar, Kampmann.) Mai. Juni. *C. ventricosa* Curt. lond. fasc. 6. t. 68. *C. triflora* Schk. car. 94. t. M. f. 50. D.

89. *C. MICHELI* (Host.) Micheli's S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 1-2, entfernt-gestellt, elliptisch, eingeschlossen-oder die untere hervortretend-gestielt, aufrecht, 6-12blüthig; DeckB. scheidig, *ohngefähr so lang, als die Aehre, viel kürzer, als der Halm*; N. 3; *Früchte verkehrteyf., bauchig-3seitig, kahl, in einen lineal.-verlängerten*, am Rande fein-gesägt-rauhen, auf der vordern Seite flachen, am Ende spitz-2sp. Schnabel plötzlich *vershmälert*, schwach-nervig; W. Ausläufer treibend. 4. Auf waldigen Gebirgen, (Mähren, Böhmen, Unterösterreich, Littorale, Unterkärnten, Südtirol.) Mai. St. h. 55. Aehren strohgelb. D.

90. *C. HORDEISTICOS* (Vill. delph. 2. S. 221. t. 6.) Gerstenförmige S. — Männliche Aehren 2, weibliche 3, aufrecht, eyf., gedrunenbth., die unterste hervortretend-gestielt; DeckB. scheidig, aufrecht, blättrig und nebst den WB. viel länger, als der Halm; N. 3; Früchte elliptisch, 3seitig, glatt, kahl, in einen spitz-2sp., berandeten, am Rande feingesägt-rauhen, auf der vordern Seite flachen Schnabel zugespitzt; Halm glatt. 4. An schlammigen O., Gräben, (Unteröstr. und Mähren, Istrien, Rheinpfalz zw. Alzey und Wörstadt.) Apr. *C. hordeiformis* Wahlenb. act. holm., Willd. spec., Schk. caric. t. Ddd f. 121., eine Kopie der rohen Abbildung bei Villars. *C. secalina* Wahlenb., Willd. spec., Schk. caric. t. S.

f. 65. Die Exempl. aus Frankreich und D. stimmen ganz überein und stellen eine und dieselbe Art dar. D.

91. *C. FLAVA* (L.) Hellgelbe S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-3, ziemlich genähert, rundlich-eyf., die obern fast sitzend, die unterste meist eingeschlossen-gestielt; *DeckB. blattig, kurz-scheidig, zuletzt weit abstehend oder zurückgebrochen*; N. 3; *Früchte* eyf., aufgeblasen, nervig, kahl, *in einen zurückgekrümmten*, auf der vordern Seite flachen, am Rande *feingesägt-rauhen*, 2zähligen *Schnabel zugespitzt*; Halme kahl; W. gedrunken-rasig, faserig. 4. An sumpligen O., auf feuchten Wiesen. Mai. St. h. 57. Var. nach Gaud.

β. polystachya, weibliche Aehren 5-6: *C. flava β.* Gaud. Fl. helv. *C. foliosa* Gand. Agrost. *C. uetliaca* Sut.

Die *Carex lepidocarpa* Tausch. pl. select., St. h. 69., konnte ich nicht deh deutliche Merkmale von der *C. flava* unterscheiden, die Früchte sind kleiner und der Schnabel ist etwas kürzer.

92. *C. OEDERI* (Ehrh.) Oeder's S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-3, genähert, rundlich-eyf., die obern fast sitzend, die unterste eingeschlossen-gestielt, oft entfernt; *DeckB. blattig, zuletzt weit abstehend oder zurückgebrochen, kurz-scheidig oder das unterste entfernt und verlängert-scheidig*; N. 3; *Früchte* rundlich, aufgeblasen, nervig, kahl, *in einen geraden*, auf der vordern Seite flachen, am Rande *feingesägt-rauhen*, 2zähligen *Schnabel zugespitzt*; Halm kahl; W. faserig, rasig. 4. An sumpligen O., am Rande von stehenden Wassern, auch in ausgetrockneten Gräben. Mai-Juli. St. h. 57. *C. flava γ.* und *δ.* Willd.

93. *C. FULVA* (Good.) Rothgelbe S. — Männliche Aehre einzeln, *weibliche 2, die unterste entfernt*, hervortretend-gestielt, oder 3 und die beiden oberen genähert, alle aufrecht, eyf.-länglich, gedrunkenbth.; *DeckB. lang-scheidig, das unterste blattig, die männliche Aehre erreichend, oder überragend*; N. 3; *Früchte* eyf., etwas aufgeblasen, beiderseits konvex, nervig, kahl, *in einen 2sp.*, geraden, auf der vordern Seite flachen, am Rande feingesägt-rauhen *Schnabel zugespitzt, abstehend, die untersten oft wagerecht-abgehend*; *Bälge spitz*; Blatthäutchen blattgegenst., eyf., kurz, abgeschnitten; *Halm rauh*; W. rasig und kurze Ausläufer treibend. 4. Auf feuchten Wiesen. Mai. Juni. St. h. 57. *C. bifloris α. sterilis* Schultz.

94. *C. HORNSCHUCHIANA* (Hoppe.) Hornschuch's S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche meist 3, aufrecht, eyf.-länglich, gedrunkenbth., *die unterste weit-entfernt*, hervortretend-gestielt; *DeckB. lang-scheidig, das unterste schmal-blattig, länger, als die Aehre*; N. 3; *Früchte* eyf., etwas aufgeblasen, beiderseits konvex, nervig, kahl, *in einen 2sp.*, geraden, auf der vordern Seite flachen, am Rande feingesägt-rauhen *Schnabel zugespitzt, aufstrebend*; *Bälge spitz*; *Halm kahl* oder an der Spitze ein wenig rauh; Blatthäutchen blattgegenst., eyf., kurz, abgeschnitten; W. rasig und kurze Ausläufer treibend. 4. Auf feuchten Wiesen. Mai. St.

h. 57. *C. speirostachya* Sm. *C. distans* Fl. d. t. 1049. *C. binervis* Wahlenb. *C. biformis* β . *fertilis* Schultz. *C. Hosteana* DC. cat. h. monsp.? DC. citirt die *Carex distans* Host. t. 77., welche ich gegenwärtig nicht vergleichen kann.

95. *C. DISTANS* (L.) Abstehendährlige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche meist 3, aufrecht, eyf.-länglich, gedrungebth., sämmtlich weit-entfernt, die unterste hervortretend-gestielt; *DeckB. lang-scheidig, die untersten blattig, länger, als die Aehre*; N. 3; *Früchte* eyf., 3seitig, etwas aufgeblasen, auf der vordern Seite ziemlich flach, in einen 2sp., geraden, am Rande feingesägt-rauhen Schnabel zugespitzt, kahl, *nervig, die seitenst. Nerven ein wenig mehr hervorspringend*; *Bälge eyf., stumpf, mit einer rauhen Stachelspitze endigend*; *Halm kahl*; *Blatthäutchen blatt-gegenst., länglich*; W. rasig. 4. Auf Wiesen und feuchten Triften, (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. St. h. 53. Das blattgegenst. Blatthäutchen lang, stumpf. Die Zähne des Schnabels sind an der inneren Seite der Frucht mit kleinen Dörnchen besetzt, wodch sich *C. distans* von *C. fulva* und *C. Hornschuchiana* am leichtesten unterscheidet.

96. *C. BINERVIS* (Sm.) Zweinervige S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche meist 3, aufrecht, entfernt, gedrungebth., die unterste weiter entfernt, hervortretend-gestielt; *DeckB. scheidig, die untersten blattig, länger, als die Aehre*; N. 3; *Früchte* 3seitig, mit 2 starken, hervortretenden Nerven durchzogen, übrigens schwach-nervig, in einen 2sp., geraden, feingesägt-rauhen, auf der vordern Seite flachen Schnabel zugespitzt, kahl; *Bälge eyf., stumpf, mit einer rauhen Stachelspitze endigend*; *Halm glatt*; *Blatthäutchen blattgegenst., länglich*; W. rasig. 4. Auf trockneren Haiden, (Westphal. zw. Bentheim und Nordhorn; Holst.) Mai. Juni. St. h. 55. Früchte purpurn-gefleckt, mit 2 grasgrünen Nerven. *Blatthäutchen* lang, wie bei der vorhergeh. D.

97. *C. EXTENSA* (Good. tr. of. linn. soc. 2. t. 21. f. 7.) Ausgedehnte S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 2-4, länglich-oval oder rundlich, gedrungebth., die obern sitzend, ziemlich zsgestellt, die unterste etwas entfernt, eingeschlossen-gestielt; *DeckB. sehr lang, länger, als der Halm, zuletzt zurückgekrümmt und weit abstehend*, das unterste kurz-scheidig; N. 3; *Früchte* eyf., beiderseits konvex, nervig, kahl, in einen kurzen, 2zähligen, am Rande kahlen Schnabel zugespitzt; *Bälge stumpf, feinstachelspitzig*; *Halm ganz glatt*; B. schmal-lineal., rinnig; W. rasig. 4. An feuchten O. am Seestrande, (Ostfriesl., Lüneb., Holst., Mecklenburg, Oestr., Littor., Schles.? Mähr.?) Juni. St. h. 57. *C. nervosa* Desf. D.

98. *C. PUNCTATA* (Gaud.) Punktirte S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche meist 3, entfernt, aufrecht, gedrungebth., die unterste hervortretend-gestielt; *DeckB. scheidig, blattig, verlängert*, das unterste ohngefähr so lang, als der Halm oder länger; N. 3; *Früchte eyf., beiderseits konvex, schwach-nervig, in einen kurz-2zähligen, am Rande kahlen Schnabel zugespitzt*; *Bälge*

zugespitzt, mit einer rauhen Stachelspitze endigend; Halm ganz glatt; *B. schmal-lineal.*, flach; *Blatthäutchen blattgegenst.*, *länglich*. 4. Auf grasigen Hügeln. (bei Salzb. und im C. Tessin.) Apr. Mai. St. h. 61. Die Früchte hell-grün, glänzend, aus einem sehr fein-netzigen Zellgewebe gebildet, woch sie unter schärfern Gläsern fein-punktirt erscheinen.

99. *C. LAEVIGATA* (Sm.) Geglättete S. — Männliche Aehre einzeln, seltener 2, weibliche 3-4, entfernt, aufrecht, walzlich, gedrungebth., hervortretend-gestielt, die unterste weit-entfernt, etwas hängend; DeckB. blattig, verlängert-bescheidet; N. 3; Früchte eyf., beiderseits konvex, nervig, in einen am Rande ein wenig rauhen *haarspitzig-2sp.*, auf der vordern Seite flachen *Schnabel* zugespitzt; *Bülge* lanzettl., *verschnälert-zugespitzt*, stachelspitzig; Halm glatt; *B. breit-lineal.*; *Blatthäutchen blattgegenst.*, *längl.* 4. Auf feuchten, schattigen Wiesen, (im Geb. der Flora v. Spa bei Eupen, Malmedy und Spa; Veen bei Aachen; in Holst. bei Clausdorf in der Gegend v. Kiel; Schw.?) Mai. Juni. St. h. 55. *C. biligularis* DC. *C. patula* Schk. caric. 1. t. bbb. f. 116. Früchte fein-braun-punktirt. Aehren hell-grasgrün.

100. *C. SYLVATICA* (Huds.) Wald-S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 4, entfernt, *lang-gestielt*, hängend, lineal., *locker-bth.*; DeckB. blattig, verlängert-scheidig; N. 3; *Früchte elliptisch, 3seitig, kahl, ganz glatt*, in einen *lineal.*, berandeten *2sp.*, am Rande kahlen *Schnabel* zugespitzt; Halm glatt; *B. breit-lineal.*; das blattgegenst. Blatthäutchen fast fehlend. 4. In Wäldern. Juni. *C. Drymeia* Ehrh. St. h. 55. *C. vesicaria* β. L. *C. patula* Scop. carn. 2. t. 59. *C. capillaris* Leers. herb. t. 15. f. 2. Aehren bleichgrün.

C. Die Früchte geschnabelt, der Schnabel stielrund oder zsgedrückt, berandet, doppelhaarspitzig, die Haarspitzen auseinander-stehend. Männliche Aehren meist mehrere.

a. DeckB. nicht- oder kurz-scheidig. Früchte kahl.

101. *C. PSEUDO-CYPERUS* (L.) Trug-Cyperngras-S. — Männliche Aehre einzeln, weibliche 4-6, lang-gestielt, hängend, walzlich, gedrungebth.; DeckB. blattig, die untern kurz-, seltener länger-scheidig; N. 3; Früchte ey-lanzettl. in einen doppelhaarspitzigen Schnabel verschmälert, nervig, kahl; *Bülge lineal. pfriemlich, rauh*; Halm *scharf-kantig, Kanten rauh*. 4. An sumpfigen, waldigen O., (stw. dch d. Geb.) Juni. St. h. 57. Aehren blassgrün.

102. *C. AMPULLACEA* (Good.) Flaschen-S. — Männliche Aehren 1-3, weibliche 2-3, entfernt, walzlich, kurz-gestielt, aufrecht, gedrungebth.; DeckB. blattig, scheidenlos; N. 3; *Früchte weit-abstehend, fast kugelig, aufgeblasen, kahl, auf dem Rücken meist 2nervig*, Schnabel lineal., zsgedrückt, doppelhaarspitzig; Halm *stumpf-kantig, glatt*. 4. An sumpfigen O., Fischteichen und Ufern. Mai. Juni. St. h. 2. 57. *C. obtusangula* Ehrh. *C. vesicaria* Huds. Roth. *C. vesicaria* β. L. *B.* bläulich-grün; Aehren gelblich.

103. *C. VESICARIA* (L.) Blasen-S. — Männliche Aehren 1-3, weibliche 2-3, entfernt, länglich-walzlich, sitzend oder kurz-gestielt, aufrecht, gedrungebth.; DeckB. blattig, scheidenlos; N. 3; *Früchte schief-abstehend, ey-kegelf., aufgeblasen*, in einen zsgedrückten, doppelthaarspitzigen Schnabel verschmälert, *kahl, auf dem Rücken meist 7nervig; Halm scharf-kantig, Kanten rauh.* 4. An denselben O. mit der vorhergeh. Mai. Juni. St. h. 69. *C. inflata* Huds. Roth. *C. vesicaria* α. L. B. freudig-grün. Aehren grünlichweiss. Kommt selten vor mit mannweibiger Aehre, Prot. t.

104. *C. PALUDOSA* (Good.) Sumpf-S. — Männliche Aehren 2-3 die untern Bälge stumpf, weibl. Aehren 2-3, walzlich, aufrecht, gedrungebth., sitzend oder gestielt, Bälge zugespitzt oder haarspitzig; DeckB. blattig, scheidenlos; N. 3; *Früchte eyf. oder länglich-eyf., zsgedrückt, etwas 3seitig, nervig*, in einen kurzen, 2zähnnigen Schnabel zugespitzt, *kahl; Halm scharf-kantig, Kanten rauh.* 4. Mit den vorhergeh. Mai. St. h. 53. *C. acuta* Curt. lond. fasc. 4. t. 61. *C. acutiformis* Ehrh. Var. Früchte eyf. und

β. Früchte länglich-eyf. Diese ist, wenn die Bälge der weiblichen Aehren zugleich mit einer langen Haarspitze endigen: *C. Kochiana* DC. St. h. 69. *C. spadicea* Roth. — Die endst. Aehre bei der Variet. α. und der Hauptart ist dicker, als die übrigen Aehren, und vor dem Aufblühen 3seitig.

105. *C. RIPARIA* (Curt. fl. lond. fasc. 4. t. 60.) Ufer-S. — Männliche Aehren 3-5, mit haarspitzigen Bälgen, weibliche 3-4, walzlich, aufrecht, gedrungebth., sitzend oder gestielt, mit haarspitzigen Bälgen; DeckB. blattig, scheidenlos; N. 3; *Früchte ey-kegelf., am Rande abgerundet, beiderseits konvex, vielnervig*, in einen kurzen, spitz-2zähnnigen Schnabel übergehend, *kahl; Halm scharf-kantig, Kanten rauh.* 4. An Gräben, Fluss- und Teichufern. Mai. Juni. St. h. 69. *C. crassa* Ehrh. Unter allen die grösste.

106. *C. NUTANS* (Host. gr. 1. t. 83.) Ueberhangende S. — Männliche Aehren 1-2, weibliche 3-4, walzlich oder eyf., aufrecht, sitzend oder die untern gestielt, gedrungebth.; Bälge haarspitzig; DeckB. blattig, scheidenlos; N. 3; *Früchte ey-kegelf., am Rande abgerundet, beiderseits konvex, fein-eingedrückt-rillig*, in einen kurzen, doppelthaarspitzigen Schnabel verschmälert, *kahl; Halm glatt* oder an der Spitze ein wenig rauh. 4. An schattigen, feuchten O., (im Laaer Wäldchen bei Wien; höhere Bergwälder bei Sulzbach nach Schwarzbach zu, und bei Cilli in Steyerin.) April. Mai. St. h. 61. D.

b. DeckB. nicht scheidig oder das unterste kurz-scheidig. Früchte kurz.

107. *C. EVOLUTA* (Hartm.) Entwickelte S. — Männliche Aehren 2-3, weibliche 3, entfernt, walzlich, aufrecht, gedrungebth., sitzend oder die unterste gestielt; Bälge haarspitzig; DeckB. blattig, scheidenlos; N. 3; *Früchte eyf., gedunsen, kurzflaumig*, in einen kurzen, doppelthaarspitzigen Schnabel übergehend; Halm scharf-kantig, an den Kanten rauh; *B. flach, breiter, als der*

Halm. 4. An Ufern, (bisher bloß am Donauufer im Steinhäule bei Ulm, v. Hrn. von Martens entdeckt.) Mai. St. h. 69. C. Kochiana Schübl. und Martens, mit Ausschl. des Synonymes aus Roth. D.

108. C. FILIFORMIS (L.) Fädliche S. — Männliche Aehren 1-2, weibliche 2-3, entfernt, länglich oder eyf., aufrecht, gedrun-genbth., sitzend oder die unterste gestielt; Bälge stachel- oder haarspitzig; DeckB. blattig, das unterste oft kurz-scheidig; N. 3; *Früchte* länglich-eyf., gedunsen, *kurzh.-flaumig*, in einen kurzen, doppelthaarspitzigen Schnabel übergehend; Halm stumpf-kantig, glatt oder an der Spitze ein wenig rauh; *B. rinnig, kaum breiter, als der Halm.* 4. In stehenden Wassern und tiefen Sümpfen. Mai. Juni. St. h. 53. C. splendida Willd. prodr. n. 103. t. 1. f. 3. C. lasiocarpa Ehrh. gram. n. 19.

c. DeckB. lang-scheidig. Früchte kurzh.

109. C. HIRTA (L.) Kurzhaarige S. — Männliche Aehren 2, weibliche 2-3, aufrecht, länglich-walzlich, die untern gestielt, die oberste fast sitzend; Bälge begrannt; DeckB. blattig, das unterste lang-scheidig; N. 3; *Früchte* eyf., in einen doppelthaarspitzigen Schnabel zugespitzt, *kurzh.*; Halm glatt; *B. und Scheiden be-haart.* 4. An sandigen, feuchten sowohl als trocknen O. Mai. Juni. St. h. 55. Aehren bleich.

CXXXII. Ordng. GRAMINEEN. Juss. gen. p. 28.

Bth. (Flosculi, Blüthchen bei Linne) *balgartig*, zwitтерig oder 1geschlechtig, in 1-vielblüthige Aehrchen geordnet. Der unterste Balg leer, 2klappig, mit 2zeilig gestellten Klappen, seltner 1klappig oder fehlend, heisst bei Linne Gluma calychna, Kelchbalg. Die folgenden 2klappigen oder eigentlich 3klappigen Bälge, indem von den 3 Klappen, (Spelzen, Paleae,) die 2 innern mit ihrem Rande in Einen verwachsen sind, bilden das Bälglein, (Glumella, Corolla, Blumenkrone bei Linne,) schliessen 2-3, mit den 3 Klappen des Bälgleins, den Spelzen, abwechselnde, ein inneres Perigon andeu-tende Schüppchen, (Squamulae, Lodiculae,) so wie die Geschlechts-theile ein und bilden damit die Bthe. Stbg. 3, den Schüppchen wechselst., seltner 6, oder dch Fehlschlagen 2, 1, unterweibig. Die Stbk. an der Basis und Spitze ausgerandet. Fruchtkn. frei; Gf. 2, oder 1 mit 2 N.*). Die Karyopse einen nackten S. vor-

*) Die Narhen geben sehr gute Merkmale bei dieser schwierigen Ordnung ab und sind:

1) fädlich: diese treten aus der Spitze der Bthe hervor und werden dch den verlängerten, oberwärts, oder auch v. der Basis an, auf allen Seiten locker mit kurzen Haaren bestreuten Gf. gebildet;

2) sprengwedelförmig: werden dch den verlängerten, oberwärts mit lan- gern, gedrungener-zsgestellten Haaren auf allen Seiten besetzten Gf. gebildet

stellend. *Eyweiss mehlig. Keim ausserhalb des Eyweisses an dessen Basis liegend.* Der Stengel, Halm genannt, ist mit Knoten, welche die B. tragen, versehen. *Die Basis der B. (der Bstiel,) in eine, vorne gespaltene Scheide zsgerollt,* trägt an der Spitze, an der Basis des Blattes, das BHütchen, (Ligula,) welches aus der Spitze der, zwischen dem Blattstiel befindlichen, mit der inneren Oberfläche der Scheide (wie bei *Potamogeton pectinatus*) verwachsenen, Nebenblätter gebildet ist.

I. Gruppe. *OLYREEN* Nees v. Esenb. *Bth. 1häusig;* die männlichen den weiblichen nicht ähnlich.

1. *ZEA* (L.) Mais. — *Einhäusig; männliche Bth. endst., traubig-rispig. Aehrchen 2bth., beide Bthen sitzend. Balg 2klappig; Bälglein 2spelzig. Weibliche Bth. in blattwinkelständige, v. Scheiden eingehüllte Aehren geordnet. Aehrchen 2bth., das eine davon geschlechtslos. Balg 2klappig; Bälglein 2spelzig; Klappen und Spelzen fleischig-häutig, quer-länglich und zsgerollt. Gf. sehr lang; N. feingewimpert. Karyopsen rundlich-nierenf., in 8, paarweise genäherte Reihen geordnet, der fleischigen Achse eingefügt. N. v. E. gen. 14. 19. 20.*

1. *Z. MAYS* (L.) Gemeiner M. — ☉. Aus Südamerika eingebracht, wird zum ökonomischen Gebrauche kultiv. Juni. Juli. N. v. E. a. a. O. Abbildg. *Mays Zea* Gärtn. fr. 1. t. I. Kultiv. Aug 1875

II. Gruppe. *ANDROPOGONEEN.* Kunth. enum. I. p. 470. *Aehrchen vom Rücken her zsgedrückt, 1bth., mit einem spelzigen Ansatz einer untern Bth. oder mit einer untern männlichen Bth. Die untere Klappe grösser. Die Gf. lang; N. sprengwedelf., unter der Spitze der Blüthe heraustretend. — Aehrchen an den Gelenken einer bei der Reife meist zerbrechlichen und an den Gelenken sich trennenden Aehre oder Rispe gezweiet, das eine sitzend, das andere gestielt; die endständigen zu 3, wovon die 2 seitenständigen gestielt, das mittlere sitzend erscheint.*

2. *ERIANTHUS* (Richard.) Wollzucker. — *Aehrchen alle zwittrig; sonst Alles, wie bei Andropogon.*

1. *E. RAVENNAE* (Pal. d. Beauv.) Ravenna-W. — *R. sehr ästig; B. gekielt; Klappen des sitzenden Aehrchens kahl, des gestielten Aehrchens an der Basis behaart, die Haare das Aehrchen umgebend und v. der Länge desselben. 4. An sandigen, feuchten O. der südl. Gegenden, (auf der Insel Cherso, Sansego.) Juli*

und treten zu beiden Seiten, unter der Spitze oder in der Mitte der Bthen hervor;

3) federig: diese treten zu beiden Seiten an der Basis der Bth. heraus oder sind daselbst eingeschlossen und verborgen, sie sitzen auf einem kurzen Gf. oder auf dem Fruchtkn. selbst, und sind oft aus 2reihigen oder einreihig gegen die obere Seite gerichteten Haaren zsgesetzt.

Andropogon Ravennae L. spec. *Saccharum Ravennae* L. syst. D. fl. 1. 537. Rb. ic. II. f. 1505. J.

3. **ANDROPÓGON** (L.) Bartgras. — Aehrchen lineal., an den Gelenken gezweiet; das eine sitzend, zwittrig, das andere gestielt, männlich; die endst. zu 3, davon das mittlere sitzend; alle 1bth., mit einem 1spelzigen Ansatz zu einer untern Bth., seltner (bei ausländischen) mit einer untern männlichen, 2spelzigen Bth. Balg 2klappig; die untere Klappe auf dem Rücken ziemlich flach, kielloß; die obere auf dem Rücken gekielt. Spelzen durchsichtig, 3, die mittlere, (die untere Spelze der Zwitterbthe) begrannt. Die G. verlängert; N. sprengwedelf., unter der Spitze des Aehrchens hervortretend. — Bei *Androp. Gryllus* sind nur 3 endst. Aehrchen vorhanden, die seitenst. fehlen.

I. Rotte. **DACTYLOPÓGON**. Aehren fingerf., oder traubenweise geordnet, mit seiten- und endständigen Aehrchen besetzt. *Andropogon* N. v. E. gen. 14. 3.

1. **A. ISCHAEMUM** (L.) Vielähriges B. — *Aehren 5-10, fingerig-zsgestellt; Bälge gerillt; die untere Klappe des zwittrigen Aehrchens von der Basis bis fast zur Mitte behaart, die des männl. Aehrchens kahl; Spindel und Bthstielen behaart.* 4. Auf trocknen, sonnigen O., besonders auf Kalkboden, (im südl. und mittlern Gebiet, nördl. bis Quedlinburg.) Juli. Aug. D. fl. 1. S. 639. St. h. 53. *A. angustifolius* Sm. prodr. fl. graec. 1. S. 47.

2. **A. PUBESCENS** (Visiani in d. Regensb. bot. Ztg. 1829. 1. ErgzB. S. 3.) Flaumiges B. — *Aehren an der Spitze der Bthstiele zu zweien; Bthstiele verlängert, mit einem kahlen B. bescheidet, rispig; die untere Klappe der Aehrchen behaart, die obere kahl, oder an der Spitze spärlich behaart, die Granne des zwittrigen Aehrchens 6mal länger, als das Aehrchen selbst; Spindel und Bthstielen behaart.* 4. Auf trocknen Wiesen und Hügeln, (Insel Sansego, Lossino, Tommasini.) Aug. Sept. J.

3. **A. DISTACHYUS** (L.) Zweijähriges B. — Die endständigen Aehren gezweiet; *Aehrchen kahl; Halm einfach, aufrecht.* 4. Auf rauhen, sonnigen Hügeln, (Istrien und auf den benachbarten Inseln.) Juli. St. h. 52. *Pollinia distachyos* Spr. syst. 1. 288. Explare v. dem angegebenen StandO. sah ich noch nicht. J.

II. Rotte. **CHRYSOPOGON**. Rispenäste quirlig. Endständige Aehrchen 3, seitenständige fehlend. *Chrysopogon* N. v. E. gen. 14. 1.

4. **A. GRYLLUS** (L.) Goldhaariges B. — Rispenäste einfach; *die Aehrchen endständig zu 3, die seitenständigen fehlend; Bthstielen an der Basis bärtig.* 4. Auf Hügeln und trocknen Wiesen der südl. Gegenden, (Istrien; Littor.; südl. Tyrol; C. Tessin.) Juni. Juli. St. h. 52. *Chrysopogon Gryllus* Trin.

4. **HETEROPÓGON** (Persoon.) Schopfsgras. — Aehrchen an den Gelenken gezweiet, die endständigen zu 3; die untern der sitzenden krautig und männlich, die obern knorpelig und weiblich

mit fehlschlagenden Stbg.; die gestielten alle männlich. Sonst Alles, wie bei Andropogon.

1. *H. ALLIONII* (Roem. und S.) Allioni's S. — Männliche Aehrchen kahl. 4. An felsigen O. der südl. Gegenden, (bei Botzen im südl. Tyrol; C. Tessin.) Juli. Aug. *H. glaber* Pers. Andropogon Allionii DC. *A. contortum* All. ped. t. 91. f. 4., nicht L.

5. *SORGHUM* (Persoon.) Morrhirse. — Aehrchen eyf. oder länglich-eyf.; Klappen an der Spitze 3zählig; sonst Alles, wie bei Andropogon. N. v. E. gen. 14. 2.

1. *S. HALEPENSE* (Pers.) Aleppo-M. — Rispe abstehend; die zwittrigen Aehrchen längl.-lanzettl.; die männlichen lanzettl. auf einem Stielchen sitzend, welches fast so lang ist, wie die Hälfte des Aehrchens; W. Ausläufer treibend. 4. In Weinbergen und auf unfruchtbaren Hügeln, (östr. Littor., Istrien, südl. Tyrol.) Juni. Juli. Andropogon halepensis Sibth. graec. I. t. 68. D. fl. I. 542. St. h. 52. *A. avenaceus* Humb. und Kunth. *A. arundinaceum* Scop. *Holcus avenaceus* L. *Trachypogon avenaceus* N. v. Esenb. bei Mart. D.

2. *S. SACCHARATUM* (Pers. Synops. I. S. 101.) Zuckerhaltige M. — Aeste der R. bis zur Mitte fast nackt, die blühenden weit abstehend, die fruchtrtragenden aufrecht; die zwittrigen Aehren verkehrteyf.-elliptisch, die männl. lanzettl., auf einem Stielchen sitzend, welches 4mal kürzer ist, als das Aehrchen; W. faserig. ☉. Wird kultiv., in den südlichsten Gegenden des Geb.) Juli. Aug. *Holcus saccharatus* L. spec. Kultiv.

3. *S. VULGARE* (Pers. Synops. I. S. 101.) Gemeine M. — R. eyf.-längl., gedrunken, die zwittrigen Aehrchen verkehrteyf., die männl. längl.-lanzettl., sehr kurz-gestielt; W. faserig. ☉. Wird kultiv., (in den südlichsten Gegenden des Geb.) Juli. Aug. *Holcus Sorghum* L. spec. Kultiv.

III. Gruppe. *PANICEEN*. Kunth. *Aehrchen vom Rücken her zsgedrückt* und auf dem Rücken konvex, vorne flach oder ziemlich flach, 1bth. oder 1bth. mit einem Ansatz einer untern Bth., welche eine dritte Klappe darstellt. Balg 2klappig, die untere Klappe kleiner, oft sehr klein, an die flache oder ziemlich flache Seite des Aehrchens angedrückt. Die Gf. verlängert; die N. sprengwedelf., unter der Spitze der Bth. hervortretend.

6. *TRAGUS* (Desf.) Stachelgras. — Aehrchen auf dem Rücken konvex, vorne flach, vom Rücken her zsgedrückt, 1bth. Balg 2klappig, die untere Klappe klein, häutig, auf der flachen Seite des Aehrchens liegend, nackt; die obere lederig, dornig, das häutige, 2speltige Bälglein einschliessend. N. v. E. gen. 13. 10.

1. *T. RACEMOSUS* (Desf.) Traubenblüthiges S. — ☉. An sandigen O. der südl. Gegenden, (Wagram bei Wien, Istrien, Littor.,

Südtirol, Wallis.) Juni, Juli. *Cenchrus racemosus* L. Lappago racemosa Schreb. Willd. St. h. 34.

7. **PÁNICUM (L.) Fennich.** — Aehrchen auf dem Rücken konvex, vorne flach oder ziemlich flach, 1bth., mit einer untern 1spelzigen, geschlechtslosen oder seltener männlichen Bth., welche eine dritte Klappe darstellt. Balg 3klappig, (die dritte Klappe ist die untere Spelze der ebengenannten geschlechtslosen oder männlichen Bth., deren obere Spelze fehlt.) Bälglein knorpelig oder lederig. Hülle fehlend.

I. Rotte. *DIGITARIA* Scopoli. *Syntherisma* Schrad. Aehrchen in einfache, fast fingerige Aehren geordnet, zu 2, das eine länger-gestielt. — *Digitaria* N. v. E. gen. 13. 7.

1. **P. SANGUINALE (L.) Blut-F.** — Aehren meist zu 5, *fingerig*, aufrecht- etwas abstehend; B. und Scheiden ziemlich behaart; Aehrchen länglich-lanzettl.; *die Spelze der geschlechtslosen Bth. kahl, am Rande flaumig*, auf dem äussersten Seitennerven ohne *Wimpern*. ☉. An kultiv. O., Sandwegen. Juli-Herbst. *Digitaria sanguinalis* Scop. Rb. ic. 11. f. 1407. *Paspalum sanguinale* Lam. *Dactylon sanguinale* Vill. *Syntherisma vulgare* Schrad.

2. **P. CILIARE (Retzius.) Gewimperter F.** — Aehren meist zu 5, *fingerig*, aufrecht- etwas abstehend; B. und Scheiden ziemlich behaart; Aehrchen länglich-lanzettl.; *Spelze der geschlechtslosen Bth. kahl, am Rande flaumig, auf dem äussersten Seitennerven steifh.-gewimpert*. ☉. Auf Sandfeldern, (C. Tessin; südl. Tyrol; Steyerm.; v. Basel auf der Rheinfläche bis Mainz; Kärnth.; Böhm.; bei Stettin in Pommern.) Juli-Herbst. *Digitaria ciliaris* Koehl. *Paspalum ciliare* DC. *Syntherisma ciliare* Schrad. germ. t. 3. f. 7. N. v. E. a. a. O. Abbildg.

3. **P. GLABRUM (Gaud.) Kahler F.** — Aehren meist zu 3, *fingerig*; B. und Scheiden kahl; Aehrchen *elliptisch, flaumig, auf den Nerven kahl*. ☉. Auf Feldern und Sand-Aeckern. Juli-Herbst. *P. Ischaemum* Schreb. bei Schw. und Kört. *P. humifusum* Kunth. *P. lineare* Krock. *P. sanguinale* Pollich. *Digitaria filiformis* Koehl. *Paspalum ambiguum* DC. *Syntherisma glabrum* Schrad. germ. t. 3. f. 7.

II. Rotte. *ECHINOCHLOA* Beauv. Aehrchen risplg, die Rispe aus einseltigen, zsgesetzten Aehren gebildet. Klappen in eine Stachelspitze oder raue Granne verschünälert. N. v. E. gen. 13. 8.

4. **P. CRUS-GALLI (L.) Hühner-F.** — Aehren wechsel- und gegenst., zsgesetzt, lineal.; Aehrchen genähert, *begrannt*; Spindel an der Basis 5kantig. ☉. Auf Aeckern und an kultivirten, etwas feuchten O. Juli, Aug. *Echinochloa Crus-galli* Beauv. Var.:

α. Spelze der geschlechtslosen Bth. kurz-begrannt. Rb. ic. 11. 1411.

β. Spelze der geschlechtslosen Bth. lang-begrannt. Rb. ic. 11. 1412.

III. Rotte. MILIUM. Aehrchen rispig. Die Rispe ausgebreitet oder geknäuel. Die Klappen in eine kurze Granne zugespitzt oder grannenlos. Panicum N. v. E. gen. 13. 6.

5. P. MILIACEUM (L.) Hirsen-F. — R. weitschweifig, ausgebreitet, überhangend; B. lanzettl. und nebst den Scheiden behaart; Klappen zugespitzt-stachelspitzig. ☉. Aus dem Oriente eingebracht, wird zum Küchegebrauch kultiv. Juli. Aug. N. v. E. a. a. O. Abbildg. P. Miliun Pers. Kultiv.

6. P. CAPILLARE (L.) Haarfeiner F. — R. weitschweifig, abstehend; Aeste sehr dünn, steif; Klappen zugespitzt-stachelspitzig; B. und Scheiden sehr rauhh. ☉. An kultiv. O. um Wien nun verwildert, aus Nordamerika eingebracht. Juli. Aug. D.

IV. Rotte. OPLISMENUS Palis. Orthopogon R. Brown. Aehrchen in armbth. Büschel oder kurze Aehren, welche wechselseitig und in Zwischenräumen an der gemeinschaftlichen Spindel stehen, geordnet. Die untere Klappe sehr lang-begrannt. N. v. E. gen. 13. 10.

7. P. UNDULATIFOLIUM (Arduin, spec. 2. t. 4.) Wellenblättriger F. — Büschel meist 10, in eine unterbrochene Aehre geordnet, armbth.; Klappen kahl, gewimpert, begrannt, Grannen kahl, stumpf; Spindel, Halm und Scheiden v. abstehenden Haaren rauhh.; B. ey-lanzettf., wellig. ☉. In schattigen Wäldern der südl. Gegenden, (C. Tessin; südl. Tyrol; östr. Littor. bei Aquileja.) Aug. Sept. P. hirtellum Wulf. bei Jacq. (ganz gewiss, wie aus der treffl. Beschrbg erhellt.) P. hirtellum All., nicht L. P. Burmanni MBieb. Oplismenus undulatifolius Kunth., mit Ausschl. des Syn. v. Host. Orthopogon undulatifolius Spr. Rb. ic. 11. f. 1409. — Das Panicum Burmanni Retz., Orthopogon Burmanni R. Brown., Rb. ic. 11. f. 1410., mit Ausschl. des Syn. v. Wulf., wächst nicht im Bereich unserer Fl.

8. SETARIA (Palis. de Beauv.) Borstgras. — Hülle aus grannenf. Borsten zsgesetzt, unter der Basis der Bthstielchen eingefügt; sonst Alles, wie bei Panicum. — Untersch. sich dch die Hülle v. Panicum, wie Cynosurus v. Festuca. N. v. E. gen. 13. 9.

1. S. VERTICILLATA (Beauv.) Quirliges B. — R. ährenf., gedrunken, an der Basis oft unterbrochen; Hüllen abwärts rauh, durch rückwärtsgekehrte Zähnen; Spelzen der Zwitterbth. ziemlich glatt. ☉. An kultiv. O., im Flusskiese, (stw. dch d. Geb.) Juli. Aug. Rb. ic. 11. f. 1463. Panicum verticillatum L. D. fl. 1. 468. Pennisetum verticillatum R. Brown.

2. S. VIRIDIS (Beauv.) Grünes B. — R. ährenf., walzlich; Hüllen aufwärts rauh, dch vorwärts-gerichtete Zähnen; Spelzen der Zwitterbth. ziemlich glatt, so lang, als die Spelze der geschlechtslosen Bth. ☉. An kultiv. O., auf Sandfeldern. Juli. Aug. Rb. ic. 11. f. 1467. Panicum viride L. D. fl. 1. 469. P. bicolor Moench. — P. reclinatum Vill. scheint die gemeine Form und P. viride desselben eine niedrige Form dieser Art. Kommt vor: kleiner, oft schmutzig-purpurn überlaufen: P. Weinmanni R. und S.; und grösser, als gewöhnlich: P. viride var. β . majus Gaud.

3. *S. GLAUCA* (Beauv.) Bläulich-grünes B. — R. ährenf., walzlich; *Hüllen* aufwärts rauh, doch vorwärts-gerichtete *Zähnen*; *Spelzen* der *Zwitterbth.* quer-runzelig, noch einmal so lang, als die *Spelze* der geschlechtslosen *Bth.* ☉. An kultiv. O. und auf Sandfeldern. Juli. Aug. Rb. ic. II. 1466. *Panicum glaucum* L. D. fl. I. 470. *P. flavescens* Moench.

4. *S. ITALICA* (Beauv.) Italienisches B. — R. ährenf., doppelzsgesetzt, lappig; *Hüllchen* aufwärts rauh, die *Zähnen* vorwärts-gerichtet; *Spelzen* der *Zwitterbth.* ziemlich glatt. ☉. An kult. O. in Südeuropa und Indien, (in der Gegend von Wien, Dolliner; Cant. Tessin; übrigens bloss kultiv.) Juli. Aug. Diese schon seit langer Zeit kultiv. Pflanze kommt nun in vielen Variet. in den Gärten vor. Eine Variet. mit *Hüllen*, die nur ein wenig länger, als die *Aehrchen* sind und mit langen Haaren besetzter *Spindel* ist: *P. germanicum* Roth.; eine Variet. mit kürzern *Hüllen*, als die *Aehrchen*: *P. sibiricum* der Gärten. Kultiv.

IV. Gruppe. *PHALARIDEEN*. Kunth. en. I. p. 18. *Aehrchen* von der Seite her zsgedrückt, 1bth., mit einem spelzigen Ansätze zu einer zweiten oder dritten untern *Bth.*, oder mit einer oder zwei untern männlichen *Bth.* Der *Gf.* lang, die *Narben* fädlich oder fast sprengwedelf., aus der Spitze des *Aehrchens* hervortretend.

9. *PHALARIS* (L.) Glanzgras. — Balg 2klappig, mit v. der Seite her gekielt-zsgedrückten fast gleichen Klappen, 1bth., mit einem schuppenf. Ansätze einer untern einzelnen oder zweier untern *Bth.* Bälglein der vollkommenen *Bth.* 2spelzig, knorpelig, grannenlos, kürzer, als die Klappen. Die *Gf.* lang, die *N.* aufrecht, fädlich. N. v. E. gen. II. 15.

1. Reihe. ECHE PHALARISARTEN. Klappen auf dem Rücken geflügelt. Aehrchen auf der äussern Seite etwas konvex, auf der hintern etwas konkav.

1. *P. CANARIENSIS* (L.) Kanarisches G. — R. ährenf., oval; Klappen zugespitzt, am Rande 1nervig, auf dem Rücken geflügelt, mit einem ganzrandigen Flügel; die 2 unfruchtbaren *Bth.* halb so lang, als die fruchtbare; die *Spelzen* von letzterer ange-drückt-behaart. ☉. An kultiv. O., Wegen, (in Istrien, ausserdem hin und wieder verwildert.) Juli. Aug. Rb. ic. II. f. 1492. J.

2. *P. MINOR* (Retz.) Kleineres G. — R. ährenf., länglich; Klappen zugespitzt-stachelspitzig, am Rande 1nervig, auf dem Rücken geflügelt, mit einem ausgebissen-gezähnelten Flügel; die eine unfruchtbare *Bth.* sehr klein, die andere halb so lang, als die fruchtbare; die *Spelzen* von letzterer angedrückt-behaart; Balm an der Basis gleich. ☉. Am mittelländ. Meere, (im Littor. zw. Fiume und Laurana.) Mai. Juni. *P. aquatica* Ait. D. fl. I. 485. Rb. ic. II. 1493. J.

3. *P. AQUATICA* (L.) Wasser-G. — R. ährenf., längl.; Klappen zugespitzt-stachelspitzig, am Rande 1nervig, auf dem Rücken

geflügelt, mit einem ausgebissen-gezähnelten Flügel; die eine unfruchtbare Bth. sehr klein, die andere fehlend; *Spelzen* der fruchtb. Bth. kahl; Basis des Halmes knollig-verdickt, 4. An feuchten O. der südl. Gegenden, (bei Stramare in der Gegend von Triest.) Mai. *P. caerulescens* Desf. *P. bulbosa* Presl., nicht L. *P. variegata* Spr.; die Linneische Benennung dieser Art ward neuerlich in Zweifel gezogen, vergl. Hall. bot. Ztg. B. I. S. 448. D.

4. *P. PARADOXA* (L.) Benagtes G. — R. ährenf., walzlich, 6 Aehrchen auf den Aestchen, das mittlere zwitterig, die seitenst. geschlechtslos 2 oder 4mal kleiner, die 4 vorderen der untern Aestchen keilig, sehr stumpf, kleingekerbt; *Klappen* der fruchtb. Bth. lang-zugespitzt, am Rande 3nervig, auf der Mitte des Rückens geflügelt, mit einem lanzettl., zahnf. Flügel. ☉. An kultiv. O. und Wegen in den südl. Gegenden, (Istrien; neue Aufschüttung bei Triest.) Mai. Juni. Rb. ic. II. f. 1491. D.

II. Rotte. BALDINGERA Fl. der Wetterau. Klappen auf dem Rücken flügellos. Aehrchen zsgedrückt, beiderseits konvex. N. v. E. gen. II. 16.

5. *P. ARUNDINACEA* (L.) Rohrblättriges G. — R. abstehend; Aehrchen büschelig-zsgestellt; Klappen flügellos; die Zwitterbthe kahl, die unfruchtbaren behaart. 4. An Ufern und in stehenden Wassern. Juni. Juli. N. v. E. a. a. O. Abbildg. Var.:

β. *picta*, B. weiss-gestreift: *P. arundinacea picta* L.

10. *HIERÓCHLOA* (Gmelin.) Darrgras. — Balg 2klappig, 3bth. Die 2 untern Bth. männlich, 3männig, mit zweikieliger oberer Spelze; die obere Bthe 2männig, obere Spelze derselben 1kielig. Bälglein 2spelzig, grannenlos oder aus der Spitze kurz-begrannt oder auf dem Rücken begrannt. Die Gf lang. N. fast federig, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend. N. v. E. gen. 14. 5.

1. II. *ODORATA* (Wahlenb.) Wohlriechendes D. — R. ausgesperrt; *Bthstielchen* kahl; die Zwitterbthe wehrlos, die männlichen Bth. unter der Spitze sehr kurz-begrannt; W. kriechend. 4. Auf feuchten Wiesen, (v. Oldenb. dch das nördl. D. bis Preussen; Schles., Böhm., Mähr.; bei München selten.) Mai. Juni. II. borealis R. und Schult. D. fl. I. 548. *Holcus borealis* Schrad. St. h. 40. II. repens Host. D.

2. II. *AUSTRALIS* (R. und Schult.) Südliches D. — R. ausgesperrt; *Bthstielchen* an der Basis der Aehrchen behaart; die Zwitterbthe wehrlos, die untere männliche Bthe unter der Spitze sehr kurz-begrannt, mit einer geraden Granne, die obere männl. Bthe auf der Mitte des Rückens mit einer geknieten Granne; W. kriechend. 4. In schattigen Wäldern, (Mähr., Oestr., Steyererm., Salz., Kärnth., Tyrol; bei Regensburg, Nürnberg; Mühlhausen in der Schw.) März. Apr. *Holcus australis* Schrad. St. h. 4. II. odoratus Host. gr. t. 4. Schk. t. 344.

11. **ANTHOXÁNTHUM** (L.) Ruchgras. — Balg 2klappig, 3bth.; die 2 untern Bth. geschlechtslos, 1 spelzig, auf dem Rücken begrannt: die obere zwitterige kleiner, 2 spelzig, wehrlos. Der untere Balg halb so lang, der obere länger, als die Bth. Stbg. 2. Die Gf. lang; N. fädlich, behaart, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend. N. v. E. gen. II. 17.

1. **A. ODORATUM** (L.) Gelbes R. — R. ährenf., länglich, ziemlich locker; die untere Klappe halb so lang, als das Aehrchen, spitz; Spelze der unfruchtbaren Bthen angedrückt-behaart, abgerundet-stumpf, halb so lang, als die innere Klappe. 4. Auf Wiesen, in Wäldern. Mai. Juni. St. h. 4.

12. **IMPERÁTA** (Cyrill. ic. pl. rar. t. II.) Imperate. — Balg 2klappig, 1bth., mit einer geschlechtslosen untern, 1 spelzigen Bthe. Klappen konvex zsgedrückt, auf dem Mittelnerven gekielt, länger, als die Bthe. Die untere Spelze, (die geschlechtslose 1 spelzige Bthe) länger, von der halben Länge des Balges; die zweite und dritte, (die 2 spelzige Zwitterbthe,) um die Hälfte kürzer. Gf. 2, lang, von der Basis an bis zur Mitte zsgewachsen; N. verlängert, fädlich, behaart, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend.

1. **I. CYLINDRICA** (Palis. de Bauv. Agrost. 7. t. 5. f. 1.) Walzliche I. — 4. In Olivenwäldern und Weinbergen, (Istrien und die Inseln.) Juli. Aug. Rb. ic. II. f. 1504. *Imperata arundinacea* Cyrill. *Lagurus cylindricus* L. *Saccharum cylindricum* Lam. J.

V. Gruppe. **ALOPECUROIDEEN.** Aehrchen v. der Seite her zsgedrückt, 1bth. oder 1bth. mit einem Ansätze zu einer obern Bthe, rispig oder in einer einfachen Tr. wechselständig. Klappen so lang, als die Bthe oder länger. Die Gf. lang; N. verlängert, fädlich, behaart, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend.

13. **ALOPECÚRUS** (L.) Fuchsschwanz. — Balg 2klappig, 1bth. Balglein 1 spelzig, schlauchf., an dem einen Rande gespalten, auf dem Rücken begrannt. Gf. lang. N. verlängert, behaart, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend. N. v. E. gen. II. 12.

1. **A. PRATENSIS** (L.) Wiesen-F. — Halm aufrecht, kahl; R. ährenf., walzlich, stumpf; Aeste der R. 4-6 Aehrchen tragend; Klappen spitz, unterhalb der Mitte zsgewachsen, zottig-gewimpert, die Rhizome schief und kurz, oder kurz-ausläuferartig. 4. Auf fruchtbaren Wiesen. Mai. Juni. St. h. 8. Die Wurzel auf Sandboden etwas kriechend. Granne bald eingeschlossen, bald hervortretend, auch die Klappen var. grasgrün und gefärbt.

2. **A. NIGRICANS** (Hornem. hort. hafn. I. S. 68.) Schwärzlicher F. — Halm aufrecht, kahl; R. ährenf., walzl., stumpf; die Aestchen der R. 4-6 Aehrchen tragend; Klappen spitz, unterhalb der Mitte zsgewachsen, zottig-gewimpert; Ausläufer weitkriechend. 4. Auf Wiesen, (um Hamburg.) Mai. Juni. Die reifen Aehrchen schwarz, bei *A. pratensis* sind sie farblos oder seltener an d. Basis schwärz-

lich. *A. nigrescens* Jacq. ecl. gram. 2. t. 13. *A. repens* MBieberst. taurico-cauc. *A. ruthenicus* Weinm. cat. dorp. 1810. *A. arundinaceus* Poiret in Lam. Dict. An trocknen O. ist d. Halm niedriger und die oberste Scheide sehr banchig: *A. ventricosus* Pers. Synops. D.

3. *A. AGRESTIS* (L.) Acker-F. — Halm aufrecht, oberwärts ein wenig rauh; R. ährenf., walzlich, nach beiden Enden verschmälert; Aeste der R. 1-2 Aehrchen tragend; *Klappen bis zur Mitte zsgewachsen, zugespitzt*, am Kiele schmal-gellügelt, *sehr kurz-gewimpert*. ☉. Auf Aeckern mit Leimboden. Juni, Juli. Leers herb. t. 5. f. 8.

4. *A. GENICULATUS* (L.) Geknieter F. — Halm aus liegender Basis aufstrebend, kahl; R. ährenf., walzlich; *Aehrchen eyf-länglich*; *Klappen stumpf*, gewimpert, *nur an der Basis zsgewachsen*; *Spelze unter der Mitte begrannt*. ☉. In Gräben, Sümpfen, an feuchten O. Mai-Aug. Leers t. 2. f. 7. Granne fast noch einmal so lang, als ihre Spelze.

5. *A. FULVUS* (Sm.) Rothgelber F. — Halme aus liegender Basis aufstrebend, kahl; R. ährig, walzlich; *Aehrchen elliptisch*; *Klappen stumpf*, gewimpert, *nur an der Basis zsgewachsen*; *Spelze aus der Mitte begrannt*. ☉. An demselben O. mit dem vorhergehenden. Mai-Aug. *A. paludosus* Palis. D. fl. 1. 481. *A. geniculatus* Pollich. — Untersch. sich sogleich dch die hecht-blaue Farbe der Scheiden und die rothgelben Stbk., welche bei *A. geniculatus* gelblichweiss und nach Ausstreung des Bthstaubes braun sind. Die Granne ist kaum jemals länger, als der Balg.

6. *A. UTRICULATUS* (Persoon.) Schlauchscheidiger F. — Halme aufrecht und aufstrebend; Aehre eyf. oder eyf-länglich; Aeste 1-2 Aehrchen tragend; *Klappen bis zur Mitte* verwachsen und allmählig verbreitert, *über der Mitte plötzlich in eine plattgedrückte Vorspitze zsggezogen*; die oberste BScheide schlauchig-aufgeblasen. ☉. Auf fruchtb. Wiesen, (Triest; Steyerm.; Schlettstadt im Elsass; bei Zweibrücken in der Rheinpfalz, und von da im Blies- und Saarthale und Moselthale bis Trier.) Mai. Juni. Scheuchz. t. 2. f. 2. D.

14. *CRYPsis* (Aiton.) Dornengras. — Balg 2klappig, 1bth., kürzer, als die Bthe. Klappen gekielt-zsgedrückt, die untere kürzer. Bälglein 2spelzig; Spelzen lanzettl., fast gleich, die obere 1kielig oder undentlich-2kielig. Stbg. 2-3. Gf. verlängert. N. fädlich, behaart, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend. N. v. E. gen. 11. 14.

1. *C. ACULEATA* (Ait.) Stechendes D. — Halme ästig, etwas zsgedrückt; R. ährenf., *halbkugelig, in die blattige Hülle eingesenkt*; Bth. 2männig. ☉. In Sümpfen, (Unteröstr., Littor.; zw. Satschau und Mautnitz in Mähr.) Juli, Aug. St. h. 26. *Anthoxanthum aculeatum* L. fil. Suppl. *Schoenus aculeatus* L. sp. *Phleum*

schoenoides J. n. app. t. 7. *Agrostis aculeata* Srop. *Heleochloa diandra* Host. Die obere Spelze 1nervig, gekielt. D.

2. C. SCHOENOIDES (Lam. ill. t. 42. f. 1.) Knopfgrasartiges D. — Halme ästig, etwas zsgedrückt; R. ährenf., oval-länglich, an der Basis v. der obersten Scheide eingeschlossen; Bth. 3männig. ☉. An feuchten O., (östr. Littor.) Juli. Aug. St. h. 26. *Spartina phleoides* Roth. *Phleum schoenoides* L. *Heleochloa schoenoides* Host. Die obere Spelze 2nervig, wie bei dem folgenden. D.

3. C. ALOPECUROIDES (Schrud.) Fuchsschwanzartiges D. — Halme einfach, ziemlich stielrund; R. ährig, länglich-walzenf., nackt; Bth. 3männig. ☉. An nassen O., (an dem ausgetrockneten Rande des Teiches von Doberdo zw. Duino und Görz; Unteröstr.; bei Bisenz in Mähr.) Aug. Sept. St. h. 26. *Heleochloa alopecuroides* Host. D.

15. PHLEUM (L.) Lieschgras. — Balg 2klappig, 1bth., länger, als die Spelzen; Klappen fast gleich, gekielt-zsgedrückt, an der Spitze abgeschnitten oder spitz, begrannt oder fast unbewehrt. Bälglein 2spelzig, häutig, begrannt oder grannenlos. Ansatz zu einer obern Bthe stiel. oder ganz fehlend. Gf. mässig-lang; N. sehr lang, behaart, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend.

I. Rotte. ACHNODON Link. Untere Spelze 5nervig, am Ende abgeschnitten. N. v. E. gen. 13. 4.

1. P. TENUE (Schrud.) Zartes L. — R. ährig, walzenf.; Aehren flach-zsgedrückt, elliptisch; Klappen am Rücken halbmondf.-gekrümmt, kurz-stachelspitzig, kahl, sehr fein-knötig-rauh. ☉. An kräuterreichen O. und Wegen, (an überschwemmt gewesenen O. neben der Muhr bei Grätz in Steyer; in Istrien; Inseln St. Andrea bei Rovigno, Veglia und Cherso.) Juni. P. Bellardi Willd. Achnodon Bellardi Link. N. v. E. a. a. O. mit Abbildg. Achnodonton tenue und Bellardi Beauv. *Phalaris bulbosa* L. P. cylindrica DC. P. tenuis Host. gr. 2. t. 36. P. subulata Sav. P. sativa Pers. D.

II. Rotte. CHILOCHLOA Beauv. Untere Spelze 3nervig, stumpf. Ein Bthenstielchen an der Basis der obern Spelze, den Ansatz zu einer zweiten obern Bthe andeutend. N. v. E. gen. 13. 3.

2. P. ARENARIUM (L.) Sand-L. — R. ährenf., länglich, an der Basis meist verschmälert; Klappen lanzettl., in eine kurze Granne zugespitzt, am Kiele steifh.-gewimpert; W. mehrhalmig; unfruchtbare Blätterbüschel fehlend. ☉. An sandigen O. am Meeresstrande. (v. Ostfriesland bis nach Mecklenb.; in Preussen; Seeküste am Adriat. Meere; auch im Binnenlande auf dem Sande bei Mainz und bei Aachen.) Juni. Juli. St. h. 29. *Phalaris arenaria* Willd. *Chilochloa arenaria* Beauv. D.

3. P. MICHELII (All.) Michelisches L. — R. ährenf., walzlich; Klappen lanzettl., in eine kurze Granne zugespitzt, auf dem Rücken

steifh.-gewimpert; *W. einen Rasen von fruchtbaren Halmen und unfruchtbaren Blätterbüscheln treibend.* 4. Auf ATriften (dch d. g. AK.) Juli. Aug. *P. hirsutum* Sut. *Phalaris alpina* Haenk. *Chilochloa Michellii* Rb. ic. II. f. 1489. — Das *Pbleum trigynum* Host. gr. 4. t. 20., *P. Hostii* Cat. d. Wien Gart., *Chilochloa cuspidata* Beauv., Rb. ic. II. f. 1490. besitze ich lebend aus Samen des Wiener Gartens gezogen; kann aber keinen wahren Unterschied zwischen ihm und dem *P. Michellii* finden.

4. *P. BOEHMERI* (Wibel.) Böhmer's L. — R. ährenf., walzlich; *Klappen lineal.-länglich, schief-abgeschnitten, zugespitzt-stachelspitzig*, zsgedrückt, auf dem Rücken steifh.-gewimpert oder rauh; *W. einen Rasen von fruchtbaren Halmen und unfruchtbar. Blätterbüscheln treibend.* 4. Auf unfruchtbaren Hügeln, trocknen Wiesen, (stw. dch d. Geb.) Juni. Juli. *P. phalaroides* Koehl. *P. glabrum* Bernh. *P. laeve* MBieb. *Phalaris phleoides* L. *Chilochloa Böhmerti* Beauv. N. v. E. a. a. O. Abbildg.

5. *P. ASPERUM* (Vill. delph. 2. t. 2. f. 4.) Rauhes L. — R. ährenf., walzlich; *Klappen keilf., abgeschnitten, an der Spitze aufgeblasen-kantig*, stachelspitzig, rauh. ☉. Auf Aeckern, in Weinbergen, an unbebauten Hügeln, (stw. dch d. südl. und mittlere Geb.) Mai. Juni. St. h. 26. *P. viride* All. *P. ventricosum* Moench. *P. paniculatum* Huds. *Phalaris aspera* Retz. *Chilochloa aspera* Beauv.

III. Rotte. *PHLEUM* Beauv. Untere Spelze 3nervig, stumpf. Ansatz zu einer zweiten Bthe fehlend. N. v. E. gen 13. 2.

6. *P. PRATENSE* (L.) Wiesen-L. — R. ährenf., walzlich; *Klappen länglich, quer-abgeschnitten*, in eine Granne plötzlich zugespitzt, am Kiele steifh.-gewimpert; *Grannen kürzer, als der Balg.* 4. Auf fruchtbaren Wiesen; die kleinere Variet. an trocknen O. Juni. Juli. Leers herb. t. 3. f. 1. — Das *P. Bertolonii* DC. ist nach Bertoloni's Bemerkg eine Abänderg mit wenigern Wimpfern am Balge und kürzern Grannen. — An trocknen O. wird die ährenf. R. kürzer, die Pflanze niedriger und der Halm erscheint über der W. deutlicher zwiebelig-verdickt; dieses ist *P. nodosum* L. *P. bulbosum* Host. gr. 4. t. 21. Leers a. a. O. f. 2.

7. *P. ALPINUM* (L.) Alpen-L. — R. ährenf., walzlich oder oval; *Klappen länglich, quer-abgeschnitten*, in eine Granne plötzlich zugespitzt, am Kiele steifh.-gewimpert; *Grannen so lang, als der Balg.* 4. Auf Triften der A. und VorA., (dch d. g. AK. und auf den Sudet. und Mähr. Karpaten.) Juni-Aug. St. h. 29. Var. mit einer walzlichen verlängerten und kurzen, ovalen Aehre; beide Variet. kommen ausserdem mit langgewimperten Grannen und ohne Wimpfern an denselben vor: letzteres ist *P. commutatum* Gaud. *P. Gerardi* Panz. bei St. h. 29. Ausser den fehlenden Wimpfern an den Grannen finde ich zwischen beiden auch nicht den geringsten Unterschied.

8. *P. ECHINATUM* (Host. gr. 3. t. 11.) Igeliges L. — R. ährig, oval; *Aehrchen abste hend, die untersten herabgebogen; Klappen*

eyf.-länglich, quer-abgeschnitten, in eine Granne plötzlich zugespitzt, am Kiele steifh.-gewimpert; Grannen ein wenig länger, als der Balg. ☉(?) Auf Bergwiesen, (Istrien.) Mai. P. felinum Sm. Rb. ic. 11. f. 1486. J.

Das Phleum Gerardi kommt nach Gand. fl. helv. in der Schw. nicht vor. Nach der Flora styriaca soll es in den Steyerischen A. (im Salzbacher Gebirge) wachsen, da ich jedoch ein an dem genannten StandO. gesammeltes Exemplar noch nicht gesehen habe, so liess ich diese so oft verwechselte Pfl. ganz weg. Phleum capitatum Scop. bezieht sich nach der Beschreibung auf eine ganz andere Pfl., welche an ihrem StandO. aufzusuchen ist.

16. CHAMAGROSTIS (Borkhaus.) Zwerggras. — Balg 2klappig; Klappen auf dem Rücken abgerundet, kiellos, länger, als das Bälglein, grannenlos. Bälglein 2spelzig; Spelzen kiellos, unbewehrt, haarig-gewimpert. Stbk. v. der Basis an bis zur Mitte gespalten, an der Spitze ungeth. Gf. mässig-lang; N. verlängert, fädlich, behaart, aus der Spitze des Aehrchens heraustretend. N. v. E. gen. 13. 5.

1. C. MINIMA (Borkh.) Kleinstes Z. — ☉. Auf Sandfeldern, (stw. auf der Rheinfläche von Philippsburg bis Mainz: im Maingebiete bis Würzb.; in Holstein.) März. Apr. Sturmia minima Hopp. bei St. h. 7. S. verna Pers. Knappia agrostidea Sm. K. verna Trin. ic. 2. t. 17. Agrostis minima L. Mibora verna Beauv. D. fl. 1. 477.

V. Gruppe. CHLORIDEEN. Kunth. en. 238. *Aehrchen v. der Seite her zsgedrückt, 1bth.*, (bei ausländischen 2-vielblüthig,) in einseitige Aehren geordnet und zwar auf *der untern Seite der Achrenspindel eingefügt*. Untere Klappe länger, als die Bthe, oder nur ein wenig kürzer, (bei den vielblüthigen ausländischen kürzer, als die nächste Blüthe). Gf. mittelmässig oder lang, manchmal in einen einzigen zsgewachsen; N. verlängert, fädlich oder fast sprengwedelf., behaart.

17. CYNODON (Richard bei Pers.) Hundszahn. — Balg 1bth., 2klappig, abstehend, nur an der Basis das Blüthchen umfassend. Bälglein 2spelzig, ein wenig länger, als der Balg, untere Spelze eyf., nachenf.-zsgedrückt, die obere linealische, auf dem Rücken durch eine Furche ausgehöhlte, einschliessend. Ansatz einer zweiten Bthe stielchenf., mit einem balgartigen Köpfchen oder ohne solches. Gf. lang; N. fast sprengwedelf., unter der Spitze der Bthe hervortretend. N. v. E. gen. 11. 18.

1. C. DACTYLON (Pers.) Wuchernder H. — Aehren zu 3-5-fingerig; Spelzen kahl, etwas gewimpert; B. unterseits behaart; Ausläufer gestreckt. 4. Auf Sandfeldern, an Wegen, (stw. in der Schw. und von da dch. das Rheingebiet bis Westphalen; dch. das Maingebiet bis Würzb.; Mosel bei Trier; Saar bei Saarlouis; im südl. D.; in Steyerm., Mähren und bei Berlin.) Juli. Aug. Rb.

ic. II. f. 1404. *Panicum Dactylon* L. *Digitaria stolonifera* Schrad. *Paspalum umbellatum* Lam. ill. 1. 176. *Dactylon officinale* Vill.

18. SPARTINA (Schreb.) Besengras. — Balg 2klappig, 1bth. Klappen gekielt-zsgedrückt, die untere kürzer. Bälglein 2spelzig; Spelzen häutig, wehrlos, die untere zsgedrückt-gekielt, die obere länger, nachenf., auf dem Rücken 2nervig. Gf. verlängert, oft unterwärts zsgewachsen. N. verlängert, fädlich, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend. N. v. E. gen. II. 19.

1. S. STRICTA (Roth.) Steifes B. — Aehren 2-4, angedrückt; Aehrchen flaumig, locker-dachig, aufrecht; B. eingerollt. 4. An sumpfigen O. am Ufer des Adriat. Meeres, (bei Monfalcone, auf dem rechten Ufer des Isonzo gegen Aquileja und Grado.) Aug. Sept. N. v. E. a. a. O. Abbildg. *Limnetis pungens* Rich. bei Pers. *Dactylis stricta* Ait. *Trachynotia stricta* DC. D.

VI. Gruppe. ORYZEEN. Kunth. enum. p. 5. Aehrchen von der Seite her zsgedrückt. Klappen fehlend oder sehr klein.

19. LEERSIA (Solander bei Swartz.) Leersie. — Aehrchen 1bth. Balg fehlend. Bälglein 2spelzig, papierartig; Spelzen zsgedrückt-gekielt, wehrlos, fast gleich, die untere viel breiter. Gf. mittelmässig; N. federig, aus der Seite des Aehrchens hervorgehend. Karyopse von den Spelzen eingeschlossen. N. v. E. gen. II. 2.

1. L. ORYZOIDES (Swartz.) Reisartige L. — R. abstehend; Aeste schlängelig; Aehrchen 3männig, halboval, gewimpert. 4. In Gräben, an Ufern. Aug. Sept. N. v. E. a. a. O. Abbildg. *Phalaris oryzoides* L. *Homalocenchrus oryzoides* Pollich. *Ehrharta clandestina* Wigg. *Asprella oryzoides* Lam. ill. 167.

20. COLEANTHUS (Seidel bei R. und S.) Scheidenblüthgras. — Aehrchen 1bth. Balg fehlend. Bälglein 2spelzig; Spelzen häutig; die untere 1nervig, gekielt, zugespitzt-begrannt; die obere halb so lang, 2nervig, 2kielig. Stbg. 2. Gf. kurz. N. lang, fädlich, mit kurzen Haaren bestreut. Karyopse nackt, länger, als die Spelzen, und nur an der Basis von diesen bedeckt.

1. C. SUBTILIS. Feinblüthiges S. — ☉. In ausgetrockneten Fischteichen und an Sumpfufern in Böhmen, (die von Tausch gelieferten Explare bei Wosseck gesammelt.) Juli-Sept. *Schmidtia utriculosa* Sternb. bot. Ztg. 2. I. mit einer Abbildg. S. subtilis Tratt. aust. t. 451. D. fl. I. 361. D.

VII. Gruppe. AGROSTIDEEN. Kunth. en. p. 198. Aehrchen von der Seite her mehr oder weniger zsgedrückt, 1bth. oder 1bth. mit einem Ansatz zu einer obern Bthe. Deckspelzen 2. Gf. fehlend, oder kurz; N. federig, an der Basis des Aehrchens heraustretend. Karyopse mit den häutigen Spelzen bedeckt.

21. POLYPÓGON (Desf.) Bürstengras. — Balg 2klappig, 1bth., länger, als das Bälglein, konvex-zsgedrückt. Klappen fast

gleich, aus der stumpfen, etwas ausgerandeten Spitze borstig-begrannt. Bälglein an der Basis kahl, 2spelzig; die untere Spelze oft begrannt. Gf. fast fehlend; N. federig, an der Seite des Aehrchens hervortretend. N. v. E. gen. II. 5.

1. *P. MONSPELIENSIS* (Desf.) Französisches B. — R. gedrun- gen, lappig; *Klappen* länglich, kurz h - rauh, *aus der kurz- aus- gerandeten, stumpf-2lappigen Spitze begrannt*; *Granne 3mal so lang, als ihre Klappe*; Bth. nahe unter der Spitze begrannt; W. faserig. ☉. An kultiv. und unkultiv. feuchten O. am Adriat. Meere im Littor., (Istrien: Littorale; auf dem Ramis, einem Sand- steinfelsen in der Stadt Freiburg in der Schw.) Mai. Juni. N. v. E. a. a. O. Abbildg. *Alopecurus monspeliensis* L. *A. paniceus* Lam. *A. aristatus* Huds. *Agrostis panicea* Willd. *Phleum crini- tum* Schreb. gr. I. t. 20. *Santia plumosa* Sav. — *Alopecurus pani- ceus* L. scheint zu *Polypogon maritimus* Willd. zu gehören.

2. *P. LITTORALIS* (Smith.) Strand-B. — R. gedrun- gen, lappig; *Klappen* lineal-lanzettl., ein wenig rauh, *aus der Spitze begrannt*; *Granne* der untern Klappe *so lang, als die Klappe selbst*, die der obern kürzer; Bth. unter der Spitze begrannt; W. kriechend. 4. Auf morastigen O. am Strande des Meeres, bisher bloss im Nordwest der Insel Norderney. Juli. Aug. Rh. ic. II. f. 1417., nicht gelungen. *Agrostis littoralis* Sm. *A. lutosa* Poir. D.

22. *AGROSTIS* (L.) Windhalm. — Balg 2klappig, 1bth., konvex-zsgedrückt, länger, als die Bthe. Klappen spitz, die un- tere länger. Bälglein 2spelzig, häutig, an der Basis mit sehr kurzen Haarbüscheln gestützt, begrannt oder grannenlos; Granne sehr dünn; obere Spelze manchmal fehlend. Ansatz einer obern Bthe fehlend. Gf. sehr kurz. N. federig, an der Basis des Aehr- chens heraustretend. N. v. E. gen. II. 3.

a. *VILPA* Beauv. Die B. alle flach. Die obere Spelze nicht fehlend.

1. *A. STOLONIFERA* (L. var. β .) Ausläufer treibender W. — Die blüthetrag. R. länglich-kegelf.; Aeste wagerecht-abstehend; Aest- chen gegen die Seiten der Aeste und abwärts gerichtet, die frucht- tragenden zsggezogen; Aeste und Bthstielen rauh; *Blatthäutchen länglich*; *B. alle lineal., flach*. 4. Auf Wiesen, Triften, in Wäl- dern, im Flussskiese, an Wegen. Juni nach der Sonnenwende und im Juli. *A. alba* Schrad. germ. I. t. 2. f. 1. D. fl. I. 508. *A. ca- pillaris* Pollich. Var. mit grannenlosen und, jedoch nur selten, begrannnten Aehrchen. Die gemeine, überall vorkommende, Form hat bald eine grüne R.: *A. alba* Schrad. var. α . D. fl. I. 510. var. α . Linn. Spec. pl. *A. stolonifera* Host. gr. 4. t. 56.; bald eine farbige: *A. alba* β . D. fl. I. 510. *A. diffusa* Host. gr. I. t. 55. *A. varia* Host. gr. t. 57. Figur links. *A. decumbens* Haller, Sohn, bei Gaud. *A. alba* H. *decumbens* Gaud.

β . *gigantea*, wie die Hauptart, aber grösser und stärker, mit sehr reichblüthiger R.: *A. alba* α . *gigantea* Meyer Chlor. hanov. *A. gigantea* Gaud. Agr. *A. alba* α . major Fl. helv. *A. alba* γ .

D. fl. I. 511. Wenn die R. von dieser Variet. breit und ausgebreiteter ist und die meisten Aehrchen begrannt sind, entsteht: *A. alba* δ . **D. fl. I. 511.** *A. gigantea* Roth. *A. compressa* Willd. bei Ust. *A. varia* Host. gr. 4. t. 57. Figur rechts und *A. sylvatica* Host gr. 4. t. 58. die unbegrante Form. (*A. decumbens* Host. gr. t. 54., zieht Meyer auch zu dieser Variet.)

γ. prorepens, meist niedriger, mit Ausläufern weit und breit herumkriechend; R. dicht-gedrungen, lappig und meist satt-gefärbt; im Flusskiese und an sandigen O. hie und da: *A. alba* β . *stolonifera* Sm. (mit Ausschl. des Syn. v. Linn., vergl. Meyer.) — Diese Form mit dicht-gedrungener R. wird auf höhern Bergen und A., auch manchmal auf Ebenen, kleiner und die R. erscheint sehr sattgefärbt, diese ist *A. pauciflora* Schrad. (wenn die untere Spelze eine gerade Granne auf dem obern Theile des Rückens trägt.) *A. patula* Gaud. Agr. Rb. ic. II. f. 1432. *A. alba* III. *patula* Gaud. Fl. helv.

δ . *maritima*, weit und breit umher kriechend; R. gedrungen; B. steif, bläulichgrün: *A. alba* γ . *maritima* Meyer. a. a. O. *A. stolonifera* L. iter. scanic. Fl. d. t. 564. *A. stolonifera* β . L. Sp. pl., mit Ausschl. des Syn. v. Schenckzer, was zu *A. verticillata* Vill. gehört. *A. maritima* Lam. Rb. ic. II. f. 1436. DC., nach einem Explan v. Autor. *Vilfa glaucescens* Presl. gram. sicul. S. 23.

Kommt im wuchernden Zustande lebendig-gebärend mit Bthen, welche in Blätterknospen verwandelt sind, vor: *A. sylvatica* Rb. ic. II. f. 1434. Huds. L.; und in einem krankhaften Zustande mit Bthen, welche durch Brand verdorben sind, diese ist: *A. alba* ϵ . *pumila* Kunth.

Dadch, dass die Aestchen der Aeste an der fruchttragenden R. in Aehren zsggezogen oder die Aeste mit allen Aestchen in eine einzige Aehre zsggezogen sind, wird die *A. stolonifera* schon von Weitem von der nächstfolgenden *A. vulgaris* unterschieden, deren R. mit ausgespreizten Aesten und Aestchen bis spät in den Herbst hinein unverändert bleibt.

Die *A. verticillata* Vill. wurde im Gebiete unserer Flora noch nicht gefunden; sie untersch. sich dch die überall fläumlichen Klappen und das nur halb so lange, abgeschnittene und gezähnte Blatthäutchen.

2. A. VULGARIS (Withering.) Gemeiner W. — R. im Umriss länglich-eyf, während und nach der Bthezeit weit abstehend; Aestchen gespreizt, nach allen Seiten hin gerichtet, ein wenig rauh; *Blatthäutchen* kurz, abgeschnitten; *B. alle lineal.*, *flach*. 2. Kommt mit dem vorhergehenden vor und blühet zu gleicher Zeit. Aehrchen grannenlos. Schrad. germ. t. 2. f. 3. *A. stolonifera* Pollich. *A. hispida* Willd. *A. rubra* β . Wahlenb. ups. *A. tenella* Hoffm., letztere mit bleichen Aehrchen. Var. seltener mit begrannten Aehrchen.

β. stolonifera, Ausläufer an sandigen O. verlängert, kriechend: *A. stolonifera* α . L., nach Ehrhartischen, zur Zeit Linné's zu Up-

sala gesammelten Explaren und nach den Worten der Diagnose „Aestchen spreitzend.“ Meyer chlor. han.

Kommt ausserdem mit lebendig-gebärenden Aehrchen vor: Rb. ic. II. f. 1429. *A. sylvatica* Pollich; und mit dch Brand verdorbenen Aehrchen: *A. pumilla* L. Rb. ic. f. 1425. Die Halme sind bei dieser krankhaften Variet. viel niedriger, als gewöhnlich.

Die *Agrostis rubra* L., welche besonders im nördl. Schweden einheimisch ist, ward im Gebiete unserer Fl. noch nicht gefunden. Nach einem Expl., welches Wahlenberg selbst an den seel. Gaudin gesendet, und von welchem mir letzterer aus Gefälligkeit einen mit einer W. versehenen Halm zukommen liess, sowie nach anderen in Scandinavien gesammelten Expl. unterscheidet sie sich hinreichend von allen unseren Arten. Sie giebt sich schon einigermaassen dch die steife Haltung der Aeste der R. zu erkennen. Sie hat ganz die Blätter der *Agrostis vulgaris*, aber ein längl. Blatthäutchen, eine nicht ausläufertreibende W., und die obere Spelze fehlt immer; sie gehört desshalb in die Rotte *Trichodium*. Allein sie ist auch von allen unseren Arten der Rotte *Trichodium* wieder verschieden dch flache B., von denen die wurzelst. zwar schmaler, aber doch flach sind, was man auch noch im getrockneten Zustande bemerkt. Ausserdem unterscheidet sie sich von *Agrostis rupestris* dch kurz-steifhaarige obere Aeste und Bthstielchen, von *A. alpina* dch merklich kleinere Aehrchen, und die etwas unter der Mitte, und nicht aus der Basis der Spelze entspringende Granne, von *A. canina* dch kleinere Gestalt, eine spärlicher besetzte R., eine nicht ausläufertreibende W. und ein eigenthümliches Aeussere. Wahlenberg hat sie sehr gut in der Fl. lapp. beschrieben, allein später nicht richtig mit *A. vulgaris* vereinigt.

b. *TRICHODIUM* Michaux. Die Wurzelblätter zsgefaltet-borstlich. Die obere Spelze meist fehlend.

3. *A. CANINA* (L.) Hunds-W. — R. ausgebreitet, eyf.; Aeste rauh, während der Bthezeit auseinanderfahrend, nach dem Verblühen zsggezogen; *die untere Spelze unter der Mitte des Rückens begrannt*, an der Spitze fein-gekerbt, die obere fehlend oder sehr klein; *WB. zsggefaltet-borstlich*; Blatthäutchen länglich. 4. Auf Wiesen und an feuchten O. Juni-Aug. Rb. ic. II. f. 1424. *Trichodium caninum* Schrad. *Agraulis caninus* Beauv. agr. 5. t. 4. f. 7. Die Aehrchen meist mit einer zsggedrehten und geknieten, seltner mit einer kürzern und geraden Granne versehen und manchmal sind sie auch völlig grannenlos. Eine Variet. mit grössern Aehrchen ist die *Agrostis hybrida* Gaud. Rb. ic. II. f. 1424.; eine kleine, $\frac{1}{2}$ Fuss hohe, weniger reichblüthige Modification bildet die *A. alpina* Leyss. und Roth — Kommt ausserdem mit bleicher R., lebendig-gebärenden und dch Brand verdorbenen Aehrchen vor.

4. *A. ALPINA* (Scopol.) Alpen-W. — R. abstehend; Aeste und Bthstielchen rauh; *die untere Spelze an der Basis begrannt*, an der Spitze kurz-2borstig, die obere sehr klein; *WB. zsggefaltet-borstlich*; Blatthäutchen länglich. 4. Auf AWiesen und Triften,

(dch d. g. AK.; auf dem Belchen im Schwarzwalde; Janowitzer Gebirg in Mähren; Sudeten.) Juli. Aug. *A. alpina* Scop.; Scopoli sagt: „das eine Blumenblatt treibt aus der Basis eine Granne.“ Rb. ic. 11. f. 1422. Willd., nach der, aus Scopoli entnommenen Anmerk., aber mit Ausschl. aller Syn. ausser Scopoli's und Scheuchzer's. *A. festucoides* Vill.; Villars sagt: „die Granne auf der Basis der Blkr. eingefügt.“ *A. alpina* DC., nach dem Syn. Vill. *A. rupestris* Dub. Bertol. fl. ital. *Trichodium rupestre* Schrad. — Eine Abänderg mit lockerer R. ist: *A. filiformis* Schleich. und auch von Villars nach Gaud. Eine hellgelbliche Variet. ist: *Avena aurata* All. pedem.

5. *A. RUPESTRIS* (All., nach einem von Balbis an Schrader gesandten Explare.) Felsen-W. — R. abstehend; *Aeste nebst den Bthstielchen kahl*; untere Spelze an der Spitze feingekerbt, mit einer unterhalb der Mitte des Rückens hervortretenden Granne; *WB. zsgesaltet-borstlich*; Blatthäutchen länglich. 4. Auf AWiesen und Triften, (dch d. g. AK.; auf d. Belchen im Schwarzwalde, im Gesenke der Sudeten.) Juli. Aug. Rb. ic. 11. f. 1423. Willd., nach den Syn. aus All. und Haller. *A. setacea* Vill. Villars sagt: „die Granne ein wenig tiefer gestellt, als die Mitte der Korolle.“ *A. rupestris* DC., nach dem Syn. Allioni's und Vill. und nach der Beschreibg. *A. alpina* Dub. Bertol. fl. ital.

23. *APÉRA* (Adans. Beauv.) Windfahne. — Die untere Klappe kleiner, sonst Alles, wie bei *Agrostis*. Ein Stielchen, den Ansatz zu einer zweiten Bthe darstellend, befindet sich an der Basis der obern Klappe. N. v. E. gen. 11. 4.

1. *A. SPICA VENTI* (Beauv.) Weitschweifige W. — *R. weit-schweifig*; Bth. unter der Spitze begrannt, Granne gerade oder etwas schlängelg, 3- oder 4mal so lang, als ihre Spelze; *Stbk. lineal-länglich*. ☉. Unter der Saat, auch an kiesigen und sandigen, unkultiv. O. Juni. Juli. Rb. ic. 11. f. 1421. *Agrostis spica venti* L. D. fl. 1. 504. *Anemagrostis spica venti* Trin. — Die *Agrostis purpurea* Gaud. ist noch ferner zu beobachten.

2. *A. INTERRUPTA* (Beauv.) Unterbrochene W. — *R. schmal*, zsggezogen; Bth. unter der Spitze begrannt, Granne gerade oder etwas schlängelg, 3- oder 4mal so lang, als ihre Spelze; *Stbk. rundlich-oval*. ☉. An kultiv. und sandigen O., (in Unteröstr., Krain, im untern Wallis, in Hanover bei Salzderhelden im Fürstenth. Grubenhagen.) Juni. Juli. Rb. ic. 11. f. 1419. *Agrostis interrupta* L. D. fl. 1. 504. Vaill. par. t. 17. f. 4. — Trinius hält diese Art für eine Variet. der vorhergehenden.

24. *LAGŪRUS* (L.) Sammtgras. — Klappen pfriemlich, in eine Granne verschmälert. Die untere Spelze mit 2 endst. geraden und einer dritten rückenständigen, geknieten Granne. Sonst Alles, wie bei *Agrostis*. Ein Stielchen, den Ansatz zu einer zweiten Bthe darstellend, an der Basis der obern Spelze. N. v. E. gen. 13. 20.

1. *L. OVATUS* (L.) Eyrundes S. — ☉. Auf Hügeln, in Weinbergen, (Abhänge an der Sane auf dem Wege von Cilli nach Reichenburg, Istrien.) Juni. Juli. Rb. ic. 11. f. 1415. J.

25. CALAMAGROSTIS (Roth.) Reithgras. — Spelzen an der Basis mit Haaren gestützt, welche länger, als der Querdurchmesser der Spelze sind; sonst Alles, wie bei Agrostis. Bei mehreren Arten befindet sich ein behaartes Stielchen, als Ansatz zu einer zweiten Bthe, an der Basis der obern Spelze. N. v. E. gen. II. 6.

1. Rottz. EPIGEIOS. Spelzen häutig, durchscheinend-weiss. Ansatz zu einer zweiten Bthe fehlend.

1. C. LANCEOLATA (Roth.) Lanzettiges R. — R. abstehend; Klappen schmal-lanzettl., zugespitzt; Haare länger, als das Bälglein; *Granne endst., gerade aus einer sehr kurzen Ausrandung hervortretend und kaum länger, als diese.* 4. Auf feuchten Wiesen, (stw. dch d. Geb.) Juli. Aug. Rb. ic. II. f. 1448. C. ramosa Host. gr. 4. t. 44. Arundo Calamagrostis L. D. fl. I. 518. A. Leersii Oettel. In Hainen kommt sie mit blasserer R. vor: Calamagrostis Gaudiniana Rb. ic. II. f. 1447. Arundo canescens Wigg. prim. fl. hols., nach Sonder.

2. C. LITTOREA (DC.) Ufer-R. — R. abstehend; Klappen schmal-lanzettl., in eine pfriemliche, zsgedrückte Spitze verschmälert; Haare länger, als das Bälglein; *Granne endst., gerade, so lang oder länger, als die Hälfte ihrer Spelze.* 4. Im Flussskiese und an Ufern, (in der Schw., v. da dch Tyrol bis Oestr., mit den Flüssen in die Ebenen neben der AK. hinabsteigend; am Rheine bis Carlsruh, an der Isar bei München, im Littor. bis an das Meer; sodann am Harze an den Ufern der Bode.) Juli. Aug. C. laxa Host. gr. 4. t. 43. Rb. ic. II. f. 1450. und C. littorea Rb. a. a. O. f. 1449. Arundo littorea Schrad. germ. I. t. 4. f. 2. D. fl. I. 519. A. Pseudophragmites Haller, Sohn, bei Röm. A. effusa Gmel. A. glauca MBieb.

3. C. EPIGEIOS (Roth.) Land-R. — R. steif, abstehend, *geknäuel-tappig*; Klappen lanzettl., in eine pfriemliche, zsgedrückte Spitze endigend; Haare länger, als das Bälglein; *Granne aus der Mitte des Rückens hervortretend, gerade.* 4. An waldigen O., auf Sandfeldern, an Ufern. Juli. Aug. Rb. ic. II. f. 1453. Arundo Epigeios L. D. fl. I. 520. MB. 2. p. 88. A. Calamagrostis MB. I. p. 78. Eine Abänderg mit am Rande nur schmal-gefärbten Aehrchen ist Arundo intermedia Gmel., Calamagrostis Huebneriana Rb. ic. II. f. 1451.; eine andere mit überall grünen Aehrchen ist C. glauca Rb. a. a. O. f. 1451., mit Ausschl. des Syn. der Flora taur. caucasica.

4. C. HALLERIANA (DC.) Hallerisches R. — R. abstehend; *Aehrchen fast gleichf.-zerstreut*; Klappen lanzettl., zugespitzt; Haare länger, als das Bälglein; *Granne unterhalb des Rückens eingefügt, gerade.* 4. An waldigen, feuchten O., (in den VorA., dch d. g. AK.; Sudet. und Gesenke in Schles.; Erzgeb.; Unterharz; sodann v. Holstein dch d. nördl. D.) Juli. Aug. C. Pseudophragmites Rb. ic. II. 1444. C. varia Host. gr. a. t. 47. C. Clavionis Lois. Fl. gall. ed. 2. C. pulchella und C. nutans Saut. bei Rb. ic. II. f. 1445 und 1446. Arundo Halleriana Gand. D. fl. I.

521. A. Pseudophragmites Schrad., nicht Haller. A. Calamagrostis Hall., Sohn, bei Röm. A. Clarionis Lois. ed. I. Var. selten:

β. mutica, mit grannenlosen Aehrchen.

5. C. TENELLA (Host. gr. t. 50., die begrannete Variet.) Zartes R. — R. abstehehd; Klappen lanzettl., spitz; *Haare halb so lang, als das Bülglein; dieses grannenlos oder auf dem Rücken begrannt, Granne gerade.* 2. Auf Triften und in Wäldern der A., (stw. dch d. g. A.K. v. der Schw. bis Oestr.) Juli. Aug. Rb. ic. II. f. 1438. Arundo tenella D. fl. I. 521. Var.:

α. mutica, Aehrchen grannenlos: Arundo tenella Schrad. germ. I. t. 5. f. 1. Agrostis pilosa Schleich. Gaud. Calamagrostis alpina Host. gr. t. 51.

β. aristata, Aehrchen begrannt: C. tenella Host. a. a. O. Arundo tenella *β.* D. fl. I. 522. Arundo humilis R. und Schult.

II. Rotte. DEYEUXIA Beauv. Ansatz zu einer zweiten Bth. in einem behaarten, aus der Basis der obern Spelze hervortretenden Stielchen bestehend. N. v. E. gen. II. 7.

6. C. STRICTA (Spreng.) Steifähriges R. — R. *schmal*, abstehehd, steif; Klappen spitz; *Haare kürzer, als das Bülglein; Granne unterhalb der Mitte des Rückens entspringend, gerade.* 2. Auf feuchten Wiesen, (im nördl. D. v. Holstein und Lüneburg bis Berlin, Pommern und Preussen; der Stand O. in der Wetterau beruht auf einer irrigen Bestimmung.) Juli. Aug. Rb. ic. II. f. 1439. Arundo stricta Timm. bei Siemsen. D. fl. I. 522. St. h. 29. A. neglecta Ehrh. Deyeuxia neglecta Kunth. D.

7. C. MONTANA (Host. gr. 4. t. 46.) Berg-R. — R. abstehehd; Klappen zugespitzt; *Haare so lang, als das Bülglein* oder fast um die Hälfte kürzer; *Granne rückenst., gekniet, kaum über die Klappen hinausragend.* 2. In Wäldern der Gebirge und VorA., (stw. dch d. Gebiet.) Juli. Aug. DC. fl. fr. R. ic. II. f. 1443. Arundo montana Gaud. A. varia Schrad. D. fl. I. 523. Deyeuxia varia Kunth. — Die Calamagrostis sylvatica Host. gr. 4. t. 48. ist eine Variet. mit kleinern Aehrchen. Var. ferner:

β. acutiflora, höher; Klappen schmaler, länger, pfriemlich-verschmälert: Rb. ic. II. 1442: A. acutiflora Schrad. D. fl. I. 524. Calamagrostis acutifl. DC. Deyeuxia acutifl. Kunth. Der Ansatz zu einer zweiten Bthe, der auch bei der Variet. *α.* manchmal vermisst wird, fehlt bei der Variet. *β.* nicht immer.

8. C. SYLVATICA (DC.) Wald-R. — R. abstehehd; Klappen zugespitzt; *Haare 4mal kürzer, als das Bülglein; Granne rückenständig, gekniet, über die Klappen hinausragend.* 2. An waldigen O., (stw. in d. Geb.) Juli. Aug. Rb. ic. II. f. 1440. C. arundinacea Roth. C. pyramidalis Host. gr. 4. t. 49. Rb. ic. II. f. 1441. Agrostis arundinacea L. Arundo sylvatica Schrad. germ. I. t. 4. f. 7. Deyeuxia sylvatica Kunth.

26. PSAMMA (Palis. de Beauv. agr. 143.) Sandried. — Untere Klappe kleiner; sonst Alles, wie bei Calamagrostis. N. v. E.

gen. 11. 8. — Der Name *Ammophila* ward schon im Jahre 1798 von Kirby einer Gattung der Hymenopteren beigelegt.

1. *A. ARENARIA* (R. et S. syst. veget. 2. S. 845.) Sand-A. — *R. ährenf.*, gedrunken, *walzlich*, oberwärts verschmälert; *Klappen* lineal.-lanzettl., *spitz*; Haare 3mal kürzer, als das Bälglein; B. eingerollt. 2. An sandigen O. am Meeresstrande, und hie und da an sandigen O. im Binnenlande, (an allen Seeküsten v. Norden, landeinwärts bis Wittenberg; sodann noch bei Dresden und Darmstadt.) Juli. Aug. Rb. ic. 11. f. 1454. *Ammophila arenaria* Link. hort. berol., Koch Synops ed. 1. A. arundinacea Host. gr. 4. t. 41. *Arundo arenaria* L. *Calamagrostis arenaria* Roth. D.

2. *A. BALTICA* (R. et S. syst. veget. 2. S. 845.) Baltische A. — *R. ährenf.*, gedrunken, *lanzettl.*, *spitz*; *Klappen* lanzettl., *in eine pfriemliche Spitze verschmälert*; Haare halb so lang, als das Bälglein; B. eingerollt. 2. An sandigen O. des Meeresstrandes, (v. Bremen dch Holst. und d. nördl. D. bis Preussen.) Juli. Aug. Rb. ic. 11. f. 1455. *Arundo baltica* Flügge bei Schrad. germ. t. 5. f. 3. — Die Granne der unteren Spelze ist meistens nicht länger, als die Zähne der Spitze, seltener aber kommt sie auch vor mit einer Granne, welche fast noch einmal so lang ist, als die Zähne. D.

27. *GASTRIDIDIUM* (Beauv. agr. t. 6. f. 6.) Nissengras. — *Klappen* stark-zsgedrückt, an der Basis fast kugelig-gedunsen; Bälglein an der Basis kahl; sonst Alles, wie bei *Agrostis*. N. v. E. gen. 13. 1.

1. *G. LENDIGERUM* (Gaud.) Südliches N. — ☉. Auf Aeckern und an kultiv. O. der südl. Gegenden, (Gegend v. Genf und in Istrien.) Juli. G. australe Beauv. *Milium lendigerum* L. St. h. 26. *Agrostis australis* L. A. *ventricosa* Gouan. h. monsp. t. 1. f. 2. A. *panicea* Lam. *Calamagrostis Schwabii* Spreng., nach Rb., der ein Explar v. Autor untersuchte. Var.:

β. grannenlos, Gaud., nach Expl. vom Autor selbst. Von dieser Variet. ist jedoch *Gastridium muticum* Spreng. nov. prov., G. *scabrum* Presl. cyp. et gram. sic., welche im Gebiete unserer Fl. bis jetzt noch nicht gefunden wurde, sehr verschieden. S.

IX. Gruppe. *STIPACEEN*. Kunth. *Aehrchen konvex*, v. Rücken her ein wenig zsgedrückt oder stielrund, 1bth., ohne einen Ansatz zu einer zweiten Bthe. Untere Klappe grösser. Deckspelzen 3, bei *Milium* 2. *Gf. fehlend oder kurz*; N. federig, an den Seiten des Aehrchens heraustretend. *Karyopse von den erhärteten*, knorpeligen oder papierartigen Spelzen *dicht-eingewickelt*.

28. *MILIUM* (L., mit Ausschl. v. Arten.) Hirsegras. — Balg 2klappig, 1bth., beiderseits konvex, oder v. Rücken her etwas zsgedrückt, länger, als die Bthe. Bälglein 2spelzig, zuletzt knorpelig, grannenlos, untere Spelze eyf., bauchig-konvex. Deckspelzen 2. N. v. E. gen. 13. 12.

1. *M. EFFUSUM* (L.) Ausgebreitetes H. — R. abste hend; Spelzen spitz; Halm kahl; B. lanzettl.-lineal. 4. In schattigen Wäldern. Mai-Juli. Leers h. t. 8. f. 2. Die R. grün, seltener sind die Aehrchen auf der einen Seite purpurn, (dieses am Aargletscher, Shuttleworth.) Var. ferner:

β. elatius, 3 Schuh hoch und höher: *M. effusum β.* Gaud. *M. confertum* Mill. und L. Die von Miller beschriebene „überall in Wäldern wachsende“ Art ist sicherlich zu irgend einer Modifikation v. *M. effusum* zu rechnen; die Linneische aber ist eine aus der Scheuchzerischen Pfl. und einer kultivirten von Royen zsgesetzte; die Scheuchzerische stellt nach Haller u. Gaud. blos eine höhere Variet. v. *M. effusum* dar; die v. Royen aber scheint allerdings zu dem *M. confertum* Guss., *M. scabrum* R. und S., welches im südl. Europa und Belgien einheimisch ist, zu gehören. Im Gebiete unserer Fl. wurde letzteres noch nicht aufgefunden.

29. *PIPTÁTHERUM* (Beauv. agr. t. 5. f. 10.) Grannenhirse. — Untere Spelze an der Spitze begrannt; Granne an der Basis mit einem Gelenke versehen und in diesem abfällig. Deckspelzen 3; sonst Alles, wie bei *Milium*. N. v. E. gen. 11. 11.

1. *P. PARADOXUM* (Beauv.) Fremdartiges G. — R. abste hend; Aehrchen ey-lanzettf.; *Spelzen flüumlich*; B. *flach*. 4. In Wäldern der südl. Gegenden, (Krain, Istrien.) Mai. Juni. *Milium paradoxum* L. D. fl. 1. 501. Rb. ic. 11. 1460. *Urachne virescens* Trin. D.

2. *P. MULTIFLORUM* (Beauv.) Reichblüthiges G. — R. abste hend; Aehrchen ey-lanzettf.; *Spelzen kahl*; B. *flach*. 4. An waldigen O.-der südl. Gegenden, (südl. Tyrol und Istrien, Insel Los-sino.) Juni. Juli. *Milium multiflorum* Cav. D. fl. 1. 501. Rb. ic. 11. f. 1459. *Agrostis miliacea* L. *Milium frutescens* Sieb. *Urachne parviflora* Trin. J.

30. *STIPA* (L.) Pfriemengras. — Balg 2klappig, 1 bth., länger, als die Bthe; Klappen spitz oder aus der Spitze begrannt. Bälglein 2klappig, zuletzt knorpelig; die untere Spelze walzlich-zsgerollt, mit einer gedrehten, an der Basis mit einem Gelenke versehenen, aber bleibenden Granne endigend. Deckspelzen 3. Karyopse von den knorpeligen Spelzen dicht-eingewickelt. N. v. E. gen. 11. 9.

1. *S. PENNATA* (L.) Federiges P. — R. an der Basis eingeschlossen; *Grannen* sehr lang, gekniet, *federig*, an der Basis bis zu dem vierten Theile ihrer Länge kahl; die untere Spelze unterwärts mit 5 seidenh. Linien bezeichnet. 4. Auf trocknen, sonnigen Hügeln, Sandfeldern, (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. Schk. t. 16.

2. *S. CAPILLATA* (L.) Haarförmiges P. — R. an der Basis eingeschlossen; *Grannen* sehr lang, gekniet, *kahl*; die untere Spelze unterwärts mit 5 seidenh. Linien bezeichnet. 4. Auf dürren, sonnigen Hügeln, (stw. dch d. Geb.) Blühet ein wenig später. St. h. 26.

3. *S. ARISTELLA* (L.) Kurzgranniges P. — R. schmal, zsggezogen; *Grannen* gerade, *kahl*, noch einmal so lang, als die *Bthe*; Spelzen überall angedrückt-flaumlich. 4. An rauhen O. Istriens, Fiume, Noë. Juli. Aug. Rb. ic. II. f. 1461. J.

31. *LASIAGRÖSTIS* (Link.) Raubgras. — Balg 2klappig, 1bth., länger, als die *Bthe*. Klappen spitz, die untere grösser. Bälglein 2spelzig, zuletzt fast lederig, die untere Spelze auf dem Rücken mit verlängerten Haaren besetzt, unter der Spitze eine starke, gekniete, mit keinem Gelenke versehene Granne tragend. Deckspelzen 3. Karyopse v. den Spelzen dicht-eingewickelt. N. v. E. gen. II. 10.

1. *L. CALAMAGROSTIS* (Link.) Riedartiges R. — R. abstehend; Granne 3mal so lang, als die *Bthe*. 4. An felsigen O. der VorA., (südl. und mittl. Schw., Tyrol, Krain, Calvarienberg bei Fuessen.) Juli. Aug. N. v. E. a. a. O. Abbildg. *Agrostis Calamagrostis* L. *Arundo speciosa* Schrad. *Stipa Calamagrostis* Wahlenbg. *Calamagrostis argentea* DC. *C. speciosa* Host. gr. 4. t. 45.

Die *Lasiagrostis variegata* Meyer Chl. han. ist mir unbekannt.

X. Gruppe. *ARUNDINACEEN*. Kunth. en. I. 236. *Aehrchen* 2-reichbth. *Gf. verlängert*. N. sprengwedelf., aus der Mitte oder über der Mitte der *Bthe* hervortretend.

32. *PHRAGMITES* (Trinius.) Rohrschilf. — Balg 2klappig, 3-7bth.; die untere *Bthe* männlich, nackt; die folgenden zwitterig, mit verlängerten Haaren umgeben. Bälglein 2spelzig, grannenlos; die untere Spelze an der Spitze ungeth. *Gf. lang*; N. sprengwedelf. N. v. E. gen. 14. 6.

1. *P. COMMUNIS* (Trin.) Gemeines R. — R. ausgebreitet; *Aehrchen* 4-5bth. 4. In stehenden Wassern, Fischteichen, an Fluss- und Seeufern. Aug. Sept. *Arundo Phragmites* L. Leers herb. t. 7. f. 1.

Var. an sandigen, unfruchtbaren, etwas feuchten O. mit 1-2bth. *Aehrchen*: *Arundo Phragmites* β . *subniflora* DC. *A. Pseudophragmites* Lej. *Calamagrostis nigricans* Merat. An diesen O. ist die Pfl. auch oft niedrig und kriecht weit und breit umher: *Phragmites communis* b. *repens* Meyer Chl. han. Kommt auf der Insel Norderney und auf den grossen Sandfeldern der Rheinfläche vor. Var. ferner:

β . *flavescens*, die *Aehrchen* sind hellbraun, ausserdem unterscheidet sich die Pflanze durch kein Merkmal von der Art selbst: *Arundo Phragmites* β . *flavescens* Custor in Gaud. fl. helv. *A. isiaea* Sieber nach J. C. Schmidt in der Regensb. bot. Ztg. 13. 2. S. 659. *A. Plinii* Mayer und Brann in der Regensb. bot. Ztg. 6. S. 177., nicht Turra.

33. *ARUNDO* (L., mit Ausschl. v. Arten.) Rohr. — Balg 2klappig, 2-7bth., konvex-zsggedrückt, ohngefähr so lang, als die

Bthe. Bälglein 2spelzig, an der Spitze 3sp.; Zpfl stachelspitzig, der mittlere in eine borstliche, längere Granne vorgezogen. Gf. verlängert; N. sprengwedelf.

1. **A. DONAX** (L.) Pfahl-R. — R. längl., sehr ästig, etwas abstehend; Aehrchen meist 3bth.; *untere Spelze an der Spitze doppelthaarspitzig* und begrannt, die Haare der Blüten fast so lang, als der Balg; *B. lanzettl.*, lang-verschmälert. 4. An sumpfigen O., (Istrien, Littor., südl. Tyrol; wird daselbst, so wie in der südl. Schw. zum ökonomischen Gebrauche kultiv.) Oct. Host. gr. 4. t. 38. *Scolochloa arundinacea* D. fl. 1. 539. *Donax arundinaceus* Beauv.

2. **A. PLINIANA** (Turra fl. ital. prodr. S. 63. 1780.) Plinius' R. — R. sehr ästig, verlängert, schmal-längl.; Aehrchen 1-2 blüthig, *die untere Spelze aus der kurz-2sp. Spitze begrannt*; Haare der Bth. kürzer, als der Balg; *B. breit-lineal.*, lang-verschmälert. 4. An steinigen Flussufern, (auf der Nordspitze der Insel Cherso, Noë.) Aug. Sept. A. Plinii Vitm. A. collina Tenor. Syllog. A. mauritanica Desf. fl. atl. Die Aehrchen um die Hälfte kleiner, als bei A. Donax. J.

34. **AMPELODESMOS** (Link. hort. reg. berol. B. 1. S. 136.) Rebenrohr. — Balg 2klappig, 3-5 blüthig, die Klappen kürzer, als die nächste Bthe. Bthen lanzettl., zsgedrückt, gekielt, zwittrig. Das Bälglein 2spelzig, die untere Spelze an der Basis auf dem Rücken mit ziemlich langen Haaren besetzt und mit Haaren umgeben, aus der 2sp. Spitze kurz-begrannt mit einer borstl., geraden Granne. Gf. sehr kurz, N. federig. — Diese Gattung gehörte nach der Bildung des Gf. und d. N. zu den Festucaceen, aber ihres Aeusseren wegen setzte ich sie unter die Arundinaceen.

1. **A. TENAX** (Link. a. a. O.) Zähe R. — R. einerseitswendig, überhangend; B. lineal., rinnig, lang-verschmälert, sehr spitz, Blatthäutchen verlängert; Halm nicht hohl. 4. Am Meeresstrande, (auf dem Scoglio di Gerolamo ausserhalb des Hafens von Pola gegen Brioni zu von Dr. Sendtner gefunden, Tommasini.) Mai. Juni. *Arundo tenax* Vahl. Symb. A. mauritanica Poir. voy. A. festucoides Desf. atl. 1. t. 34. A. Ampelodesmos Cyrillo neap. fasc. 2. t. 12. Die getrockneten B. sind zsgerollt und laufen in eine sehr feine Spitze aus. J.

XI. Gruppe. SESLERIACEEN. Aehrchen 2-reichbth. Balg gross, fast die Bthen bedeckend. Gf. fehlend oder sehr kurz; N. fädlich, aus der Spitze der Bthe hervortretend, gezähnelte oder kurz-behaart.

35. **ECHINARIA** (Desf.) Klettengras. — Balg 2klappig, 2-4 bth. Bälglein 2spelzig, an der Basis häutig; untere Spelze handf.-5sp.; Zpfl lanzettl. - pfriemlich, krautig, steif, der obere 2sp. Gf. fehlend; N. fädlich, sehr lang, gezähnelte, aus der Spitze der Bthe hervortretend. N. v. E. gen. 15. 7.

1. E. CAPITATA (Desf.) Kopfiges K. — ☉. An kräuterreichen O. Istriens. Mai. Juni. *Cenchrus capitatus* L. *Sesleria echinata* Host. gr. 3. t. 8. N. v. E. a. a. O. Abbildg.

36. SESLERIA (Arduin) Seslerie. — Balg 2klappig, 2-6bth. Bälglein 2spelzig; Spelzen häutig; die untere ungeth., stachelspitzig oder begrannt, oder an der Spitze 3-5zählig, Zähne stachelspitzig oder begrannt. Gf. sehr kurz oder fehlend; N. fädlich, sehr lang, flümmlich, aus der Spitze der Bthe hervortretend. N. v. E. gen. 13. 19.

1. Rutte. SESLERIAE GENUINAE. *Echte Seslerien*. Tr. ährig, einfach oder zsgesetzt, auf allen Seiten mit Aehrchen bedeckt.

1. S. TENUIFOLIA (Schröd. fl. germ. t. 6. f. 4.) Dünablättrige S. — Aehre länglich, Aehrchen meist 3bth.; untere Spelze in 2-4 Borsten und eine aus der Mitte der Spitze hervorgehende Granne endigend. *Borsten und Granne nicht halb so lang, als die Spelze*; B. schmal-lineal., stumpf oder kurz-gespitzt, rinnig oder zsgerollt; *Scheiden zuletzt in schlängelig-verwebte Fäden aufgelöst*; W. rasig und zugleich Ausläufer treibend. 4. An steinig und felsigen O. am Ufer des Adriat. Meeres, (Triest und Fiume.) Mai. S. juncifolia Suffren. bei Host. gr. 4. t. 22. S. tenuifolia Host a. Aira juncifolia Wulf. — Die B. der Expl., welche im hiesigen Garten auf hinreichend trockenem und magerem Boden gezogen wurden, sind rinnig und offen, und keineswegs zsgerollt. — Die Form mit dickeren steifen B. ist: S. juncifolia Host a. 4. S. 138. D.

2. S. CAERULEA (Arduin. spec. t. 6. f. 3-5.) Blaue S. — Aehre oval-länglich, meist einerseitswendig, Aehrchen 2-3bth.; untere Spelze in 2-4 Borsten und eine aus der Mitte der Spitze hervorgehende Granne endigend. *Borsten und Granne nicht halb so lang, als die Spelze*; B. lineal., flach, an der Spitze plötzlich in eine rauhe Stachelspitze zsggezogen; *Scheiden ungeth., zuletzt am Rande gespalten*; W. rasig, Ausläufer fehlend. 4. An felsigen, trocknen O., besonders auf Kalkboden; in die A. hinaufsteigend, (stetw. im südl. und mittl. Gebiete, nördl. bis nach Mähren, Böhmen, Sachsen, Thüringen und dem Harz.) März. Apr., auf den A. später. *Cynosurus caeruleus* L. St. h. 6.

3. S. ELONGATA (Host. gr. 2. t. 97.) Langährige S. — Aehre verlängert-walzlich, Aehrchen meist 3bth.; untere Spelze in 2-4 Borsten und eine aus der Mitte der Spitze hervorgehende Granne endigend. *Borsten und Granne nicht halb so lang, als die Spelze*; B. lineal., rinnig, in eine sehr rauhe Spitze verschmälert; *Scheiden ungeth., zuletzt am Rande gespalten*; W. rasig und Ausläufer treibend. 4. An felsigen O., auf trocknen Wiesen, (Krain, Littor. bei Triest, Fiume.) Aug.-Herbst, seltner im Frühlänge. Phleum autumnale Scop. Aira alba Wulf. „Blühet, obschon seltner, im Frühlänge, und diese Form ist die *Sesleria elongata* Visian.“ Tommasini in Briefen. — Die *Sesleria cylindrica* DC., S. argentea Sav., S. nitida Tenor., kommt in Dalmatien vor und untersch. sich v. S. elongata dch folg.: Aehre kürzer, länglich, oder oval; B. an

der Spitze plötzlich in eine sehr spitze Stachelspitze gezogen; Stachelspitze u. Blattkiel kahl; am Rande aber sind die B. rauh. D.

4. *S. MICROCEPHALA* (DC.) Kleinköpfige S. — Aehre eyf.; Aehrchen 2bth., untere Spelze 5grannig, mittlere *Granne länger, als die Spelze*; B. schmal-lineal., stumpflich. 4. In Felsenspalten und an steinigen O. der höchsten A., (Oestr., Steyerm., Kärnth., Salzb., Tyrol, Watzmann, bayer. A.) Juni. Juli. *S. tenella* Host. gr. 2. t. 100. D. fl. I. 628. *Cynosurus microcephalus* Hoffm. C. ovatus Hoppe bei St. h. 6. D.

5. *S. SPHAEROCEPHALA* (Arduin. spec. 2. t. 7.) Rundköpfige S. — Aehre kugelig, Aehrchen meist 3bth.; untere *Spelze* an der Spitze ausgerandet, *aus der Ausrandung kurz-begrannt*; B. schmal-lineal., stumpflich. 4. Auf Felsen der A., (südl. Schw., Tyrol, Steyerm., Kärnth., Salzb.) Juli. Aug. *S. leucocephala* DC., die Variet. mit weisslichen Aehrchen. *Cynosurus sphaerocephalus* Wulf. bei Jacq. J. ic. rar. t. 20., die weissliche und blaue Variet.; die Aehren nämlich sind meist weisslich, var. aber auch, wiewohl seltner, blau.

II. Rotte. *OREOCHLOA* Link. Aehre einfach, 1seitig, 2zeilig.

6. *S. DISTICHA* (Pers.) Zweizeilige S. — Aehre eyf., 2zeilig; Aehrchen 3-6bth.; untere *Spelze grannenlos oder kurz-begrannt*; B. fadenf. 4. Auf Felsen der höchsten A., (südl. Kette der Schw., und höchste A. von Graubünden, Tyrol, Salzb., Steyerm., Kärnth.) Juni. Juli. *Poa disticha* Wulf., bei Jacq. St. h. 6. *P. seslerioides* All. ped. 2. t. 91. f. 1. *Cynosurus distichus* Hoffm.

XII. Gruppe. *AVENACEEN*. Kunth. en. I. p. 286. Aehrchen 2-vielbth., die endst. Bthe oft verkümmern. *Balg gross, fast das ganze Aehrchen umgebend*. Gf. sehr kurz oder fehlend; N. federig, *aus der Basis der Bthe beiderseits hervortretend*.

37. *KOELERIA* (Pers.) Kölerie. — Aehrchen 2-vielblüthig; Bth. zwitterig. Balg zsgedrückt-gekielt, 2klappig. Bälglein 2spelzig; untere Spelze aus einer ungeth. oder 2sp. Spitze stachelspitzig oder begrannt; Granne borstlich, gerade. Gf. sehr kurz; N. federig, an den Seiten des Aehrchens hervortretend.

I. Rotte. *AIROCHLOA*. Untere Spelze grannenlos oder kurz stachelspitzig.

1. *K. CRISTATA* (Pers.) Kämmige K. — R. ährig, an der Basis unterbrochen; Aehrchen 2-4bth.; untere *Spelze zugespitzt, wehrlos oder stachelspitzig*; B. flach, die untern *gewimpert*; die vertrockneten *BScheiden ungeth.* 4. Auf kräuterreichen Hügeln, trocknen Wiesen. Juni. Juli. St. h. 85. *Aira cristata* L. sp. *Poa cristata* L. syst. Leers herb. t. 5. f. 6. *Dactylis cristata* MB. *Festuca cristata* Vill. *Airochloa cristata* Link. Var. mit kahlen B., die Wimpern ausgenommen, und zottigen BScheiden. Zur gewöhnl. Form gehört: *Koeleria avenacea* Tausch., der vielleicht unsere Variet. γ . für die Hauptart ansieht.

β. gracilis, B. sehr schmal; Aehre verlängert, schmal, schlank; K. cristata *γ*. DC. fl. fr.

γ. major, Halm 2 Fuss lang und länger; R. fast $\frac{1}{2}$ Fuss lang, luppig; Aehrchen 4 Linien lang; K. cristata *γ*. DC. *Poa pyramidalis* Lam. ill. I. p. 183.

2. K. GLAUCA (DC.) Bläulich-grüne K. — R. ährig, an der Basis unterbrochen; Aehrchen 2-3bth.; untere Spelze stumpflich, wehrlos oder mit einem, auf der stumpfen Spitze aufgesetzten Stachelspitzchen; B. flach, kahl; die vertrockneten B-Scheiden ungeth. 4. Auf Sandfeldern, (stw. dch d. Geb.) Juni. Juli. Rb. ic. 11. f. 1672. *Poa glauca* Schk. *Aira glauca* Schrad.

3. K. VALESIACA (Gaud.) Walliser K. — R. ährig, dicht-gedrungen; Aehrchen 2-3bth.; untere Spelze zugespitzt, wehrlos oder stachelspitzig; WB. zugerollt, kahl; die vertrockneten B-Scheiden zuletzt in schlängelig-verwebte Fäden aufgelöst. 4. Auf sonnigen Hügeln im untern Wallis gemein. Apr. Mai. *Aira valesiaca* All. Var.:

β. setacea, untere Spelze auf dem Rücken zottig-gewimpert; K. valesiaca Rb. ic. 11. f. 1671. K. setacea DC. K. setacea und K. tuberosa Pers. *Festuca splendens* Pourret. *Poa pectinata* Lam. — Von dieser Variet. ist die K. grandiflora Bertol., K. gracilis Guss., K. splendens Presl., wozu Bertoloni die K. setacea DC. zieht, ganz verschieden. S.

II. Rotte. KOERLERTA. (Koeleriae spuriae und festucaeformes DC. hort. monsp. (119.) Untere Spelze aus ungeth. oder 2sp. Spitze begrannt. Bei K. hirsuta trifft die Granne bald aus der ungeth., bald aus der 2sp. Spitze der Spelze hervor.

4. K. HIRSUTA (Gaud.) Rauhaarige K. — R. ährig, eyf. oder eyf.-länglich; Aehrchen 2-3bth., zottig; Bth. aus ungeth. oder 2sp. Spitze begrannt; B. schmal-lineal., kahl; Halm oberwärts filzig; W. rasig mit fruchtbaren und unfruchtbaren Blätterbüscheln. 4. Auf Felsen und felsigen Triften der höchsten A., (Schw. auf d. Furka, am Rhonegletscher, im Merzenbach Zehenden Gombs und auf dem Distelthurm in der Egina, Dr. Lagger; südl. Tyrol, auf d. Schlehern, zw. Rabbi und Martel, Fedala in Fassa; Timpeljoch im Ortzthale; im Passeyerthale bei Mös am Ortles.) Juli. Aug. St. h 85. Rb. ic. 11. f. 1673. *Aira hirsuta* Schleich. *Festuca hirsuta* DC. fl. fr. *Airochloa hirsuta* Link.

5. K. PHLEOIDES (Persoon.) Lieschgrasähnliche K. — R. ährig, walzlich; Aehrchen 4-5bth., zottig; die untern Bth. unter der Spitze begrannt; Grannen über die Bthe hinausragend, borstlich, weich; B. breit-lineal., behaart; Halm kahl; W. mehrhalmig, ohne unfruchtbare BBüschel. ☉. An kultiv. O. und Wegen. (Istrien, um Fiume und auf den Inseln.) Mai. Juni. *Festuca phleoides* Vill. delph. 2. t. 2 f. 7. Host. gr. 3. t. 21. *Trisetum phleoides* Trin. *Bromus trivialis* Sav. *Festuca cristata* L. J.

38. LAMARCKIA (Moench.) Lamarckie. — Aehrchen zwit-terig, mit mehrern geschlechtslosen gemischt. Zwitter 1bth. mit

einem Ansatz zu einer zweiten Bthe. Balg 2klappig; Klappen schmal, begrannt-zugespitzt, so lang, als die Bthe oder länger. Die untere Bthe vollständig, dch ein Stielchen v. den Klappen entfernt; Bälglein 2spelzig, untere Spelze aus 2sp. Spitze begrannt; Granne gerade. Fruchtkn. kahl. Gf. kurz. N. verlängert, kurz-behaart. Unvollständige Bthe gestielt, unter der Spitze begrannt. Geschlechtslose Aehrchen: Balg 2klappig, wie der der Zwitterbthe gebildet, 5-8bth.; Bth. 1spelzig; Geschlechtstheile fehlend; Spelze eyf., abgerundet-stumpf. N. v. E. gen. 14. 9.

I. L. AUREA (Moench.) Goldene L. — ☉. An steinigten, kräuterreichen O. in Istrien, Host. Mai. Juni. N. v. E. a. a. O. Abbildg. *Cynosurus aureus* L. *Chrysurus cynosuroides* Pers. Host. *C. aureus* Beauv. — Die Gattung *Lamarckia* ist v. *Cynosurus* dch den ganzen Blütenbau völlig verschieden. J.

39. AIRA (L., mit Ausschl. der meisten Arten.) Schmielen. — Aehrchen 2bth., oder 2bth. mit einem gestielten Ansatz zu einer dritten Bthe, seltner 3bth. Bthen zwitterig. Balg zsgedrückt, 2klappig. Bälglein 2spelzig; untere Spelze auf der Basis oder auf der Mitte des Rückens begrannt; Granne in der Mitte einwärts gebogen oder fast gerade. Gf. sehr kurz; N. federig, an der Basis der Bthe hervortretend.

I. Rotte. *DESCHAMPSIA* Beauv. Granne nur ein wenig einwärts gebogen und an der Basis kaum gedreht.

I. A. CAESPITOSA (L.) Rasen-S. — B. flach, *oben sehr rauh*; R. weitschweifig, breit-pyramidenf.; Bthstielchen rauh; Granne borstlich, meist so lang, als die Spelze; W. *dicht-rasig*. 4. Auf fruchtb. Wiesen und an waldigen, etwas feuchten O. Juni. Juli. *Aira caespitosa* D. fl. 1. 552. Leers h. t. 4. f. 8. *Deschampsia caespitosa* Beauv. B. oberseits sehr rauh. Var.: 1. Aehrchen noch einmal so gross, wehrlos, (v. Hoppe auf den A. gesammelt.) 2. Aehrchen 3bth., die dritte Bthe vollständig oder dch Fehlschlagen des Fruchtkn. männlich, (v. demselben an Gletschern der höchsten A. in Kärnth. gesammelt.) 3. Aehrchen lebendig-gebärend, (v. Sauter am Bodensee gesammelt.) Auf den A. kommt die Pfl. ganz dunkelgefärbt und zugleich niedriger vor; und diese steigt auch in die Niederungen hinab und bildet daselbst die Variet. *littoralis* Gaud.; an trockneren O. wird sie niedriger und bekommt zuletzt eingerollte B.: *Aira alpina* Roth., nicht L. *A. caespitosa* β. Roth. Der Autor sagt: „B. zuletzt eingerollt,“ dch welches Merkmal sich diese Form v. der Variet. *setifolia* Bisch. hinreichend unterscheidet.

β. *pallida*, Klappen gelblich-weiss, auf dem Rücken grün; Spelzen grün-gelblich, an der Spitze weiss: *Aira altissima* Lam. *A. parviflora* Thuill. Diese kommt an schattigen O. vor. Ob hierher *Aira caespitosa* α. *fluviatilis* Meyer Chl. han. gehört, zu der der Autor die *A. bottnica* Wahlenb. zieht, kann ich nicht beurtheilen. Die wahre *Aira bottnica* untersch. sich jedoch nach meiner Meinung v. *A. caespitosa* hinlänglich und als gute Art, dch den ganzen Habitus und dch folg.: die R. ist schmal, steif-aufrecht

und nicht weitschweifig und ausgebreitet und überhangend; die Aeste sind weit weniger zsgesetzt und tragen nur 10-20, und nicht 50-60 Aehrchen; die Aehrchen sind noch einmal so gross, die Klappen im Verhältniss ihrer Länge bemerklich schmaler, die zweite Bthe länger-gestielt, das Stielchen der dritten Bthe v. der Länge der zweiten Bthe und die Granne viel stärker und fast 2mal so lang, als die Bthe selbst.

γ. setifolia, sänimtl. B. von Anfang an borstlich - zsgerollt von der Form der B. der *Festuca ovina*: *A. caespitosa* var. *setifolia* G. W. Bischoff in Briefen. (In dem seit mehreren Jahren vor dem Mannheimer Thor zu Heidelberg begonnenen Hafen, der aber noch wasserleer ist.)

2. *A. WIBELIANA* (Sonder in Brief.) Wibel's S. — *B. flach, oberseits etwas rauh*; R. ausgebreitet, längl.-pyramidenf.; Bthstielchen rauh; Granne borstlich, so lang wie die untere Spelze; *W. Ausläufer treibend*. 4. An sandigen, feuchten, oder lehmigen O., an Flussufern, aber nicht in Sümpfen, (Ufer der Elbe bei Hamburg und Altona.) Juni Juli. *A. paludosa* Wib. werthh. S. 118. Letzterer fand die Pfl. bei Altona und nicht im Gebiete der Fl. von Werthheim, und belegte sie mit dem Namen von Roth's *Aira paludosa*, die aber, aus Scheuchzer entlehnt, zu den zweifelhaften Pfl. gehört und wahrscheinlich unter die Varietäten der *Aira caespitosa* zu bringen ist. Diese Beschreibung Roth's passt auch durchaus nicht auf die *Aira uliginosa* Weihe. D.

H. Rotte. *AVENELLA* Compend. fl. germ. ed. 2. I. 1. p. 130. Granne deutlicher in ein Knie gebogen und an der Basis gedreht. Von *Avena* untersch. sich diese Rotte dch die abgeschnittene, gezähnelte, aber nicht 2zählige oder doppelt haarspitzige untere Spelze.

3. *A. FLEXUOSA* (L.) Schlängelige S. — R. abstehend, überhangend; Bthen kaum länger, als der sehr ungleiche Balg, über der Basis begrannt; *Stielchen der zweiten Bthe 4mal kürzer, als die Bthe selbst*; *B. sehr schmal, fast borstlich, stielrund-fädlich, inwendig dicht*; *Blatthäutchen ziemlich kurz, abgeschnitten*. 4. In Wäldern und auf Haiden, auch an den trockensten und unfruchtbarsten O. Juni-Aug. *Avena flexuosa* D. fl. 1. 570. Leers h. t. 5. f. 1. Var. mit heller- und dunkler-gefärbten Aehrchen. Die Variet. mit dunkel-gefärbten Aehrchen und kleinerer, zsgzogenerer R. ist *A. montana* L., aber ursprünglich scheint Linne unter dieser die *Aira bottnica* Wahlenb. verstanden zu haben.

4. *A. ULIGINOSA* (Weihe bei v. Bönningh.) Morast-S. — R. abstehend, aufrecht; Bthen kaum länger, als der gleiche Balg, oberhalb der Basis begrannt; *Stielchen der zweiten Bthe halb so lang, als die Bthe selbst*; *B. sehr schmal, flach oder zsgfaltet*; *Blatthäutchen länglich, verschmälert-spitz*. 4. An überschwemmten und morastigen, torfigen O. (Westphal. und Ostfriesland.) Aug. Sept., viel später, als die vorhergehende. Rb. ic. 2. f. 280. *Aira paludosa* Weih. *A. flexuosa* b. *paludosa* Meyer Chlor. han. Untersch. sich von der vorhergeh. dch die zwar sehr schmalen, jedoch flachen oder zsgfalteten, aber nicht stielrund-fädlichen und

unausgehöhlten B., dch das lang-verschmälerte Blatthäutchen, die aufrechte, mehr reichbth. R., die halb so grossen Aehrchen, stumpferen, fast gleichen Balgklappen und die länger-gestielte zweite Bthe. D.

40. CORYNÉPHORUS (Beauv. agr. t. 18. f. 2.) Keulengranne. — Untere Spelze ungeth.; Granne rückenst., gerade, oberwärts keulig, in der Mitte mit einem bärtigen Gelenke; sonst Alles, wie bei Aira.

1. C. CANESCENS (Beauv.) Grauliche K. — R. absteehend, vollblüthig; Bth. kürzer, als der Balg; B. borstlich. 4. Auf sehr unfruchtbar. Sandfeldern. Juli. Aug. Aira canescens L. D. fl. 1. 554. Weingärtneria canescens Bernh. Schk. t. 12.

41. HOLCUS (L., mit Ausschl. der meisten Arten.) Honigras. — Balg 2klappig, 2bth.; die untere Bthe zwitterig, wehrlos, die obere männlich, begrannt, die Granne rückenst., gerade, zuletzt zurückgebogen. Bälglein 2spelzig, die untere Spelze an der Spitze ungeth. Gf. sehr kurz; N. federig, an der Basis der Bthe heraustretend. N. v. E. gen. 14. 4.

1. H. LANATUS (L.) Wolliges H. — R. absteehend; Granne der männl. Bthe zurückgekrümmt, *im Balg eingeschlossen*; W. faserig. 4. Auf Wiesen, Triften, in Wäldern. Juni-Aug. Avena lanata Koel. Leers t. 7. f. 6.

2. H. MOLLIS (L.) Weiches H. — R. absteehend; Granne der männl. Bthe gekniet-eingebogen, *über den Balg hinausragend*; W. kriechend. 4. In Wäldern und Büschen. Juli. Aug. Avena mollis Koel. Leers t. 7. f. 7.

42. ARRHENATHERUM (Beauv. agr. t. 11. f. 5.) Glatthafer. — Balg 2klappig, 2bth.; untere Bthe männlich, auf dem Rücken begrannt, Granne gekniet-eingebogen; obere Bthe zwitterig, wehrlos oder unter der Spitze kurz-begrannt. Bälglein 2spelzig. Gf. fehlend; N. federig, an der Basis der Bthe hervortretend.

1. A. ELATIUS (M. und Koch.) Hoher G. — B. flach. 4. Auf Wiesen, Triften, im Gebüsch, an Waldrändern. Juni. Juli. A. avenaceum Beauv. Avena elatior L. Leers t. 10. f. 4. Holcus avenaceus Scop. Var. mit kurz-begrannnten und grannenlosen Aehrchen und kahlen und zottigen Halmknoten, und

a. vulgare, mit an der Basis nicht knollig-angeschwollenem Halme.

β. bulbosum, der Halm an der Basis in 2-3 übereinanderliegende Knollen verdickt: A. elatius *β*. D. fl. 547. A. bulbosum Schlecht. Avena bulbosa Willd. A. precatoria Thuill. Holcus bulbosus Schrad. Unterscheidet sich nur dch die W. von der Variet *a.*, scheint aber doch eine besondere Art zu sein.

43. AVÉNA (L.) Hafer. — Balg 2klappig, 2-vielbth. Bthen zwitterig. Bälglein 2spelzig; untere Spelze an der Spitze 2zählig

oder 2grannig, manchmal 2sp. mit unregelmässig gezähnelten Zpfln; Granne rückenst., in ein Knie gehogen, an der Basis gedreht. Fruchtkn. an der Spitze behaart oder kahl. Gl. fehlend; N. fiederig, an der Basis der Bthe heraustretend.

1. Rotte. AVENAE GENEINAE. *Echte Haferarten.* Aehrchen, wenigstens nach dem Verblühen hängend. Klappen 5-9nervig. Fruchtkn. an der Spitze behaart. W. jährig; unfruchtbar. Blätterbüschel fehlend.

1. A. BREVIS (Roth.) Kurzer H. — R. einerseitswendig; Bälge meist 2bth., so lang, als die Bthen; *obere Klappe 7nervig; Bthen kahl oder oberwärts borstig-behaart, länglich, stumpf*, an der Spitze 2sp. und gezähnelte; Achse kahl, unter den Bthen büschelig-behaart. ☉. Unter der Saat, (im Herzogth. Bremen seltener; häufiger im Herzogth. Verden, O. F. Lang; und in Unteröstr.) Juli. Aug. Host. gr. t. 42. D.

2. A. HYBRIDA (Petermann in Reichenb. Fl. Sax. S. 17.) Bastard-H. — R. abstehend, gleich; die Bälge meist 2blüthig, länger, als die Bth.; *die obere Klappe 9nervig; Bth. kahl, lanzettl., gegen die Spitze zu verschmälert*, an der Spitze 2sp. und etwas gezähnelte, sämmtlich begrannt; *Achse und Schiele der Bth. borstig-rauh.* ☉. Unter der Saat, (Sachsen bei Rückmannsdorf und Dölzig, Peterm.; Schwarzb.-Rudolst. um Söding, auch bei Tondern in Schleswig, Schönheit.) Juli. Aug.

3. A. SATIVA (L.) Gemeiner H. — R. abstehend, *gleich*; Bälge meist 2bth., länger, als die Bthen; *obere Klappe 9nervig; Bth. kahl, lanzettl., nach der Spitze verschmälert, an der Spitze 2sp. und gezähnelte*, die obere wehrlos; Achse kahl, an der Basis der untersten Bthe kurz-büschelig-behaart. ☉. Wird kultiv. Juli. Aug. Host. gr. 2. t. 56. Var. mit lauter wehrlosen Bth., auch mit bei der reifen Frucht weisslichen oder schwarzen Spelzen. Eine Variet. mit meist 3 Bthen im Aehrchen, v. denen eine oder die andere begrannt ist, bildet die A. trisperma Schübl. und Mart. Kultiv.

4. A. ORIENTALIS (Schreb.) Türkischer H. — R. *einerseitswendig*, zsggezogen; Bälge meist 2bth., länger, als die Bthen; *obere Klappe 9nervig; Bthe kahl, lanzettl., nach der Spitze verschmälert, an der Spitze 2sp. und gezähnelte*, die obere wehrlos; Achse kahl, an der Basis der untersten Bthe kurz-büschelig-behaart. ☉. Wird kultiv. Juli. Aug. Host. gr. 3. t. 44. Kultiv.

5. A. STRIGOSA (Schreb.) Rauch-H. — R. fast einerseitswendig; Bälge meist 2bth., so lang, als die Bthen; *obere Klappe 7-9nervig; Bth. kahl, lanzettl., nach der Spitze verschmälert*, auf dem Rücken begrannt, mit geknieter Granne, *an der Spitze 2sp., mit begranneten Zpflu* und geraden Grannen; Achse kahl, an der Basis der obern Bthe mit einem kurzen Haarbüschel. ☉. Wird kultiv. und kommt hier und da unter der Saat verwildert vor. Juli. Aug. Host. gr. 2. t. 56. A. nervosa Lam. ill. n. 1115. Danthonia strigosa Beauv. Kultiv.

6. A. NUDA (L.) Nacktes H. — R. etwas einerseitswendig; Bälge meist 3bth.; *obere Klappe 7-9nervig; die Bthen über den*

Balg hervorragend, lanzettl., kahl, v. der Basis bis zur Spitze stark-nervig, an der Spitze haarspitzig-2sp., die obere wehrlos; Achse kahl. ☉. Wird hier und da kultiv. Juli. Aug. Host. gr. 3. t. 43. Untersch. sich leicht v. den vorhergehenden dch die krautig-häutige, mit starken, durchlaufenden Nerven versehene untere Spelze. Kultiv.

7. A. STERILIS (L.) Tauber H. — R. einerseitswendig; Bälge meist 4bth.; obere Klappe 9nervig; Bth. lanzettl., an der Spitze gezähnt-2sp., die 2 untern auf dem Rücken begrannt, v. der Basis bis fast zur Mitte borstig-behaart, die obere wehrlos und so wie die Achse kahl. ☉. Unter der Saat, (Istrien und Fiume.) Juli. Aug. J. ic. rar. t. 23. J.

8. A. FATUA (L.) Wilder H. — R. gleich, abstehend; Bälge meist 3bth.; obere Klappe 9nervig; Bthen lanzettl., an der Spitze gezähnt-2sp., auf dem Rücken begrannt, v. der Basis bis zur Mitte borstig-behaart; Achse rauhh. ☉. Unter der Saat. Juli. Aug. Schreb. gr. 1. t. 15.

9. A. HIRSUTA (Roth.) Rauhhaariger H. — R. einerseitswendig, etwas abstehend; Bälge meist 2bth.; obere Klappe 9nervig; Bth. lanzettl., auf dem Rücken begrannt, v. der Basis an fast bis zur Mitte borstig-behaart, an der Spitze 2sp.; Zpfl borstlich, in eine gerade Granne auslaufend; Achse rauhh. ☉. Unter der Saat, auf Wiesen, an Wegen, (Fiume, Osero und den Inseln um Istrien.) Juli. Aug. A. barbata Brot. lusit. 108. A. atherantha Presl. cyp. et gram. sic. J.

II. Rotte. AVENASTRUM. Aehrchen nicht hängend. Klappen 1-3nervig; Fruchtkn. an der Spitze behaart. W. ausdauernd, unfruchtbare Blätterbüschel und fruchtbare Halme treibend.

10. A. PLANICULMIS (Schröd. fl. germ. 1. t. 6. f. 2.) Plathalmiger H. — R. verlängert, zsgezogen; Aeste zu 2, 3 oder 4, die längern 2-3 Aehrchen tragend; Aehrchen meist 6bth.; Klappen 3nervig; Fruchtkn. an der Spitze, so wie die Achse behaart; B. kahl, am Rande rauh; die halmst. lanzettl.-lineal; Scheiden 2-schneidig, flach-zsgedrückt. 4. An v. Quellen bewässerten O. der VorA., (in Schlesien auf dem Schneeberg der Grafsch. Glatz, im Gesenke, auf Waldwiesen am rechten Ufer der Drau bei Marburg in Steyerm.) Juli. Aug. D.

11. A. PUBESCENS (L.) Kurzhaariger H. — R. gleich, traubig; Aeste ein einzelnes Aehrchen, die längern deren 2 tragend, die unteren meist zu 5; Aehrchen 2-3bth.; die untere Bthe auf der Mitte des Rückens begrannt, gegen die Spitze hin silberweiss-trockenhäutig; Klappen 1-3nervig, an der Spitze weiss-trockenhäutig; die obere so lang, als das Aehrchen, oder etwas kürzer; Fruchtkn. an der Spitze so wie die Achse behaart; Haare an der Basis der zweiten Bthe fast halb so lang, als die Bthe selbst; B. lineal., flach, auf beiden Seiten nebst den untern Scheiden zottig. 4. Auf Wiesen. Mai. Juni. Leers h. t. 9. f. 2.

12. *A. AMETHYSTINA* (Clarion in DC. fl. fr. 5. S. 260.) Amethyst-H. — R. gleich, traubig; Aeste ein einzelnes Aehrchen, die längeren aber deren 2 tragend, die unteren meist zu 3; Aehrchen, meist 2bth.; *untere Bth.* $\frac{1}{2}$ *über der Basis begrannt, von der Mitte bis zur Spitze silberweiss-trockenhäutig; Klappen 3nervig*, von der Basis an bis zum dritten Theil ihrer Länge gefärbt; obere länger, als das Aehrchen: Fruchtkn. an der Spitze und die Achse behaart, *die Haare an der Basis des zweiten Blüthchens fast halb so lang, als die Bthe selbst*; B. lineal., flach, auf beiden Seiten nebst den unteren Scheiden zottig. 2. Auf Gebirgen, (am Monte Baldo bei St. Giacomo im südl. Tyrol.) Mai. Klappen fast noch einmal so gross, wie bei *A. pubescens*, von der Basis an bis zum dritten Theile ihrer Länge violett, die obere 8 Linien lang. Die obere Spelze an den Kanten kahl, nicht bewimpert. D.

13. *A. ALPINA* (Smith.) Hochalpen-H. — R. zsgezogen, traubig; Aeste zu 2, ein einzelnes Aehrchen, die längern seltner deren 2 tragend; *Aehrchen meist 8bth., Bthen auf dem Rücken oberhalb der Mitte begrannt*; obere Klappe 3nervig; die Achse behaart, die obersten Haare der Glieder dreimal so lang, als die Schwielen; der Fruchtkn. an der Spitze behaart. B. lineal., *oberseits sehr rauh*; Scheiden stielrund. 2. Auf den Krainer A., (in der Wochein.) Juli. Aug. *Avena alpina* Rb. ic. 12. f. 1703. *A. praenusta* Rb. fl. exc. — R. vom Habitus der *Avena planiculmis*, aber mit den Merkmalen der *A. pratensis*, v. der sich die Pfl. dch die grössern Aehrchen, die gezweigten obern Rispenäste und die höher eingefügten Grannen unterscheidet. D.

14. *A. PRATENSIS* (L.) Wiesen-H. — R. zsgezogen, traubig, die untern Aeste gezweigt, *die obern einzeln*, alle ein einzelnes Aehrchen, oder die längern v. den untersten deren 2 tragend; *Aehrchen 4-5bth., Bthen auf dem Rücken in der Mitte begrannt*; obere Klappe 3nervig; die Achse behaart, die obersten Haare der Glieder dreimal so lang, als die Schwielen; der Fruchtkn. an der Spitze behaart; B. lineal., *oberseits sehr rauh*; Scheiden stielrund. 2. Auf trocknen Wiesen, steinigen, unkult. Hügeln, an Waldrändern, (stw. dch d. Geb.) Juni. Juli. Leers h. t. 9. f. 1. Sehr grosse, auf fettem Waldboden gewachsene Explare mit 6-8bth. Aehrchen: *A. bromoides* D. fl. l. S. 570., Koch Synops. ed. 1. — Die *Avena bromoides* L. (nicht M u. K.), welche Sonder im südl. Frankreich gefunden u. gesammelt hat, ist zwar der *Avena pratensis* sehr ähnlich, aber sicher eine verschiedene Art. Sie hat immer 6—8blüthige Aehrchen, einen sehr kurzen Flaum an der Achse und Haare an der Spitze der Glieder der Achse, welche kaum etwas länger, als die Schwielen selbst sind. Sie möchte im östr. Littorale zu suchen sein.

15. *A. VERSICOLOR* (Vill. delph. 2. t. 4. f. 5.) Bunter H. — R. fast eyf., traubig; Aeste gezweigt, ein einzelnes Aehrchen oder deren 2 tragend; Aehrchen 5bth.; die Bth. auf der Mitte des Rückens begrannt; obere Klappe 3nervig; die Achse behaart, die Haare der Glieder dreimal länger, als die Schwielen; *Fruchtkn. an der Spitze behaart*; B. lineal., *oberseits ziemlich glatt*. 2.

Auf Triften der höhern A., (dch d. g. AK. bis Steyerm.) Juli. Aug. St. h. 26. A. Scheuchzeri All.

16. A. SEMPERVIRENS (Vill. delph. 2. t. 5., nach Bertol. fl. it.) Immergrüner H. — R. ausgebreitet; die unteren Aeste zu 3-4, *die längeren 2-5 Aehrchen tragend*; Aehrchen 3-4blüthig; die 2 unteren Bth. auf der Mitte des Rückens begrannt, die oberen 1-2 unvollkommenen grannenlos; *die untere Spelze rauh durch sehr kleine Pünktchen, glanzlos, von der Basis an 3-5nervig*; die obere Klappe 3nervig; *Fruchtkn. an der Spitze sowie die Achse haarig*; die wurzelst. B. zsgefaltet, starr, oberseits rauh; *Blatthäutchen der Stengelblätter längl., kahl.* 4. An felsigen Abhängen der A., (Oestr., Steyerm., Krain, bayer. A.) Juli. Aug. A. sempervirens Host. fl. austr. u. Allion. auct. (nach Bertol.) Reichenb. ic. f. 1701. In K. u. M. D. fl. ward sie auf die Autorität von Lapeyrous hin mit anderen vermischt. Die Scheiden der unteren B. sind oft kurzhaarig, von kurzen, abstehenden oder zurückgebogenen Haaren. Ob zu dieser unserer Avena sempervirens die Pfl. von Villars gehöre, oder zu einer anderen verwandten Art, ist aus Villars Beschreibung nicht zu ermitteln. Unsere Pfl. macht sich vor den verwandten A. fallax, A. sempervirens DC. und A. sedinensis DC. sogleich kenntlich durch das längl., kahle Blatthäutchen. Die unteren Aeste der R. stehen an mageren Expl. nur einzeln oder zu zweien, wie bei den Folgenden u. Anderen. D.

17. A. STRIATA (Lam. dict. 1. S. 332.) Gestreifter H. — R. ausgebreitet; *die unteren Aeste zu 3-4, die längeren 2-3 Aehrchen tragend*; Aehrchen 3-4blüthig; Bth. sämmtlich begrannt, die beiden unteren auf der Mitte des Rückens, die oberen 1-2 unvollkommen; *die untere Spelze glatt, glänzend, schwachnervig, aber an der Spitze dch ganz feine Pünktchen etwas rauh und deutlich 5nervig*; die obere Klappe 3nervig; Fruchtkn. an der Spitze sowie die Achse haarig; die wurzelst. B. zsgefaltet, starr, oberseits ranh; *Blatthäutchen der Halmst. kurz und dicht-wimperig.* 4. In Felsenspalten, (allenthalben auf der Insel Lossino von Dr. Sendtner entdeckt; Tommasini.) Mai. A. fallax Tenor. Syll., Bertol. fl. ital. und nach einem Expl. aus Sicilien von Tineo an Decker gegeben. A. fallax R. und Schult.? unter diesem Namen begreifen sie auch A. sempervirens DC., eine nach meiner Ansicht von A. striata Lam. verschiedene Art. Die wurzelst. und unteren stengelst. B. sind an ihrer Basis, an der Spitze der Scheide, aussen mit einem kurzen, dichten Flaum überzogen, „pubescentes a l'entrée de leur gaine“ Lam. — Die A. striata ist von der vorhergehenden Art leicht zu unterscheiden dch ihr Blatthäutchen, dch die an der Basis glatte und glänzende untere Spelze und dadurch, dass sämmtliche Bthen, auch die oberen unvollkommenen, begrannt sind.

Von meinem Freunde Mertens erhielt ich ein von Dr. Clarion auf den A. der Dauphiné gefundenes Expl. von einer Art, die den beiden erwähnten sehr ähnlich ist. Dieses scheint mir die A. sempervirens DC. und die Pfl. aus den Carnischen A. zu sein, welche Bertoloni in der Fl. von Italien unter dem Namen A. fallax beschreibt. Das kurze Blatthäutchen ist wimperig und am Ausgange

der Scheide auf der einen Seite mit einem Bündel länglicher Haare besetzt, ein Merkmal, wodurch sich die Pfl. sogleich von *A. sempervirens* unterscheidet; von der *A. striata* Lam. aber unterscheidet sie sich durch die bemerklich längere untere Spelze, welche von der Basis an etwas rauh, glanzlos und deutlich 5nervig ist, und durch die Haare der zweiten Bthe, welche halb so lang sind, wie die Bthe selbst. — Eine andere, ganz ähnliche Pfl. aus den Pyrenäen theilte mir H. Salzmann unter dem Namen *A. sedinensis* mit. Sie hat die Aehrchen der *A. sempervirens*, aber das Blättchen ist kurz und bewimpert und die B. sind flacher. Zweifelhafte trage ich die beiden hier erwähnten Pflanzen vor, (denn aus wenigen und zum Theil unvollständigen Expl. lässt sich nichts Klares ermitteln,) damit sie an ihren Stand O. noch näher untersucht werden möchten. J.

III. Rotté. *VENTENATA* Koel. gram 253. Untere Bthe an der Spitze, nicht auf dem Rücken, begrannt Klappen 7-9nervig. Fruchtkn. kahl.

18. *A. TENUIS* (Mönch) Zarter II. — R. gleich; Aehrchen meist 3bth.; Klappen 7-9nervig; *untere Bthe an der Spitze in eine Granne zugespitzt, auf dem Rücken nicht begrannt*, die folgenden an der Spitze haarspitzig-2grannig und auf dem Rücken mit einer gekniet-einwärtsgebogenen Granne versehen; W. faserig. ☉. Auf Hügeln und sonnigen, unfruchtb. Bergen, (in den Gebirgen der Rheinpfalz, von Neustadt an der Haardt und Zweibrücken an und durch das Gebiet der Nahe und Mosel und bis nach den Niederlanden; im Maingebiete bis Würzburg und durch Hessen bis Göttingen, sodann im Littor. in Unterästr. und Mähr.) Juni. *A. dubia* Leers h. t. 9. f. 3. *A. triaristata* Vill. delph. 2. t. 4. *A. striata* Lam. *A. fertilis* All. *Ventenata bromoides* und *avenacea* Koel. *Bromus triflorus* Pollich. *Holcus biaristatus* Wigg. *Trisetum tenue* R. u. S. D.

IV. Rotté. *TRISETUM* Persoon. Granne aus der Mitte der Bthe od. oberhalb der Mitte hervortretend. Klappen 1-3nervig. B. lineal., flach, Fruchtkn. kahl, (mit Ausnahme von *A. alpestris*.) — Persoon schreibt den *Trisetum*arten, wenigstens was die mir bekannten anbelangt, irrig eine nicht gewundene, rückenständige Granne zu.

19. *A. FLAVESCENS* (L.) Gelblicher II. — R. *ausgebreitet, gleich*; die längern Aeste 5-8 Aehrchen tragend; Aehrchen 3bth.; obere Klappe 3nervig, länglich-lanzettl., oberhalb der Mitte zugespitzt; *Fruchtkn. kahl; Achse behaart; Haare viel kürzer, als die Bthe*; untere Spelze doppelt-kurz-borstlich-haarspitzig; Halme einfach; B. flach. 4. Auf Wiesen. Juni. Juli. Leers h. t. 10. f. 5. *Trisetum flavescens* Beauv. *T. pratense* Pers. *T. splendens* Presl. Var. mit noch einmal so grossen Aehrchen: *Avena flavescens* β. major Schrad; und mit schreckigen Aehrchen, die Klappen nämlich und ein Streifen auf den Bth. sind dunkel-violett: *A. flavescens* β. *variegata* Gaud.; letztere Variet. kommt nicht blos auf den A., sondern auch auf den Ebenen, obschon seltener, vor.

20. *A. ALPESTRIS* (Host. gr. 3. t. 39) Voralpen-II. — R. *ausgebreitet, gleich*, die längern Aeste 3-6 Aehrchen tragend; Aehr-

chen 3bth.; *obere Klappe 3nervig, lanzettl., von der Mitte an allmählig verschmälert; Fruchtkn. an der Spitze flaumig*; Achse behaart; Haare viel kürzer, als die Bthe; untere Spelze an der Spitze doppelt-kurz-borstlich-haarspitzig; Halme einfach; *B. flach und nebst den Scheiden behaart.* 2. Auf Triften der A., (Oestr. und Steyerm.) Juli. Aug. St. h. 85. A. sesquitertia Host. synopsis. Trisetum alpestre Beauv. Der vorhergeh. A. flavescens sehr ähnlich, aber doch verschieden dch den niedrigeren Halm, die schon von der Mitte an nach der Spitze verschmälerte obere Klappe, die bei A. flavescens von der Basis an allmählig und bis über die Mitte breiter wird und sich erst dann in eine Spitze verschmälert, ferner dch die ein wenig stärkeren Grannen und den an der Spitze flümmlichen Fruchtkn. Wegen dieses letztern Merkmales steht sie der 1. und 2. Rotte näher. D.

21. A. DISTICHOPHYLLA (Vill. delph. 2. t. 4. f. 4) Fächerblättriger H. — R. ausgebreitet, gleich; die längeren Aeste 3-4 Aehrchen tragend; Aehrchen meist 3blüthig; *beide Klappen 3nervig; Fruchtkn. kahl; Achse behaart; Haare an der Basis der unteren Bth. halb so lang, als die Bthe*; untere Spelze doppelt-borstlich-haarspitzig; Halme an der Basis liegend, wurzelnd; sehr ästig; B. flach. 2. Auf den höhern A. an trockenen Abhängen im Kiese der Giessbäche, (südl. Schw., Tyr., Salz., Kärnth.) Juli. Aug. St. h. 26. A. brevifolia Host. gr. 3. t. 40. Trisetum distichophyllum Beauv. agr. 88.

22. A. ARGENTEA (Willd. enum. S. 125.) Silber-H. — R. ausgebreitet, gleich; die längeren Aeste 4-8 Aehrchen tragend; Aehrchen meist 3bth.; *obere Klappe an der Basis 3nervig; Fruchtkn. kahl; Achse behaart; Haare an der Basis der unteren Bthe ein Drittel so lang, als die Bthe*; die untere Spelze doppelt haarspitzig; Halme an der Basis liegend und wurzelnd, sehr ästig; B. flach. 2. Auf Felsen und an kiesigen Stellen der A. (Schweiz, Salz., Tyrol, Kärnthen, Steyerm.) Juli. Aug. Als Varietät der A. distichophylla Koch Synopsis. ed. 1. A. distichophylla Host. gr. 2. t. 53. Schrad. germ. St. h. 26. Die Halme sind dünner und höher und die Aehrchen kleiner, wie bei der vorhergehenden, von der ich diese nun trenne.

23. A. SUBSPICATA (Clairv.) Schmielenähnlicher H. — R. ährig, *eyf. oder walzlich und fast lapptg, gedrunken*; Aehrchen meist 3bth.; obere Klappe 3nervig; *Fruchtkn. kahl, Achse behaart*; Haare viel kürzer, als die Bthe; untere Spelze an der Spitze 2sp., Zpfl. lanzettl., stachelspitzig; Halme meist einfach; B. flach. 2. Auf den höchsten A. an Gletschern, (Schw., Tyr., Salz., Kärnth.) Juli. Aug. Aira. spicata L. sp. A. subspicata L. syst. Avena airoides Koel. gr. D. fl. 1. 566. A. subspicata Gaud. Rb. ic. 11. 1691. St. h. 86. Trisetum airoides R. u. S. Koehleria subspicata Rb. fl. exc.

24. A. CAVANILLESII (Koch.) Cavanille's H. — R. ährig, gedrunken; Aehrchen 2bth.; *obere Klappe schwach-3nervig; Fruchtkn. kahl; Achse behaart; Haare ohngefähr so lang, als*

die *Bthe*; *Bthe* oberhalb der Mitte des Rückens begrannt, an der Spitze 2borstig, Borsten um die Hälfte länger, als die *Bthe*; Halm an der Spitze so wie die *B.* und Scheiden flaumig. ☉. An unkult. O., Wegen. (bisher blos um Montorge bei Sitten und um St. Leonhard im Wallis.) Apr. *Avena Loefflingiana* Cav. lc. 1. t. 45. f. 1. Gaud. *Trisetum Cavanillesii* Trin. S.

V. Rotte. CARYOPHYLLEA. Granne unterhalb der Mitte der *Bthe* hervortretend. Klappen 1-3nervig. Fruchtkn. kahl. *B.* zugerollt-borstlich. — Diese Rotte unterscheidet sich von *Aira* dch die an der Spitze doppelthaarspitzige, nicht abgeschnittene und gezähnelte untere Spelze.

25. A. CARYOPHYLLEA (Wigg.) Nelken-H. — *R. absteehend, 3gabelig; Aehrchen 2bth., an der Spitze der Aestchen etwas gedrängt*; *Bthstielchen* oft kürzer, als die Aehrchen; Balg länger, als die *Bthen*; untere Spelze an der Spitze doppelthaarspitzig, an beiden *Bthen* unter der Mitte des Rückens begrannt, oder seltener an der unteren *Bthe* grannenlos. *B. borstlich.* ☉. Auf Sandfeldern, Haiden, an Waldrändern. Juni. Juli. *Aira caryophyllea* L. Rb. ic. 11. 1676.

26. A. CAPILLARIS (M. und Koch.) Haardünnere H. — *R. ausgesperrt, 3gabelig; Aehrchen 2bth., gleichf.-zerstreut; Bthstielchen verlängert* und die meisten viel länger, als das Aehrchen; Balg länger, als die *Bthen*; untere Spelze an der Spitze doppelthaarspitzig, die der untern *Bth.* wehrlos, die der obern unterhalb der Mitte des Rückens begrannt, oder daselbst an beiden begrannt; *B. borstlich.* ☉. Auf unfruchtbar. Triften, (südl. Tyrol, Fiume, Istrien und auf Veglia.) Mai. *Aira capillaris* Host. gr. 4. t. 35. Seltener kommt eine Variet. vor, an welcher die beiden *Bthen* der Aehrchen begrannt sind, dennoch unterscheidet sich nach meiner Ansicht die Pfl. hinlänglich von der vorhergehenden dch den Bau der Rispe. D.

27. A. PRAECOX (Beauv.) Früher H. — *R. länglich, ährig-gedrungen; Aehrchen 2bth.; Balg länger, als die Bthen; untere Spelze an der Spitze doppelthaarspitzig, an beiden Bthen unter der Mitte des Rückens begrannt; B. borstlich.* ☉. Auf Haiden, unfruchtbaren, ein wenig nassen Feldern, (stetw. dch d. Geb.) Apr. Mai. *Aira praecox* L. Rb. ic. 11. f. 1675. *A. pusilla* Wigg. *Trisetum praecox* Dumort. Untersch. sich von den vorigen beiden leicht dch die immer in eine ovale oder längliche Gestalt zugezogene *R.*

44. DANTHONIA (DC.) Danthonie. — Balg 2klappig, 2-vielbth., weit, bauchig-konvex, oft so lang, als die *Bthen*, oder länger. Bälglein 2spelzig; die untere Spelze konkav, an der Spitze 2sp., mit einer unterwärts flachen und schraubenf.-gedrehten Granne zwischen den Zpfln. Fruchtkn. kahl; Gf. kurz; N. federig, an der Seite der *Bthe* heraustretend.

1. D. PROVINCIALIS (DC.) Alpen-D. — Tr. fast einfach; Bälge 4-6bth., länger, als die *Bthen*; untere Spelze an der Spitze dop-

pélthaarspitzig; Scheiden an der Spitze bärtlg. 4. Auf Bergwiesen, (Krain, Littor., südl. Tyrol.) Juni. St. h. 86. *D. alpina* Vest. *D. fl.* 1. 677. *D. calycina* Rb. ic. 12. 1714. *Avena calycina* Vill. *A. stricta* Host. *A. spicata* β . Willd. *D.*

45. TRIÓDIA (R. Brown.) Dreizahn. — Balg 2klappig, 3-5bth., weit, bauchig-konvex, die Bthen umfassend. Bälglein 2spelzig, die untere Spelze an der Spitze 2sp., mit einer dazwischen liegenden geraden Granne. Fruchtkn. kahl; Gf. kurz; N. federig, an der Basis der Bth. heraustretend.

1. T. DECUMBENS (Beauv.) Niederliegender *D.* — R. traubig; Aeste einfach, ein einzelnes Aehrchen oder die untern 2-3 derselben tragend; Aehrchen länglich-eyf., 3-5bth.; B. flach und nebst den Scheiden behaart; Halme niederliegend oder während der Bthezeit aufstrebend. 4. Auf Wiesen, Triften, Haiden, an lichten WaldO. Juni. Juli. *Festuca decumbens* L. Leers h. t. 7. f. 5. *Poa decumbens* Scop. *Sieglingia decumbens* Bernh. *Melica rigida* Wib. *Danthonia decumbens* DC.

46. MÉLICA (L.) Perlgras. — Balg 2klappig, weit, konvex, häutig, 1-2bth., mit einer geschlechtslosen Bthe, welche 1 oder mehrere solche unvollkommene einschliesst. Die unterste Bthe oder die 2 untersten vollkommen, der geschlechtslosen nicht ähnlich. Bälglein 2spelzig, zuletzt knorpelig, wehrlos. Gf. mässiglang; N. gegen die Basis der Bthe heraustretend.

1. M. CILIATA (L.) Gefranstes P. — R. ährig, gleich; untere Spelze am Rande v. der Basis bis zur Spitze dicht-gewimpert-zöttig; geschlechtslose Bthe länglich. 4. An rauen, felsigen O., (stw. im südl. u. mittl. Gebiete und bis an die nördl. Grenze von Thüringen.) Mai. Juni. Rb. ic. 11. 1575.

2. M. BAUHINI (All.) Bauhin's P. — R. locker, fast einseitswendig; untere Spelze vor dem Rande von der Basis an bis über die Mitte gewimpert-behaart; geschlechtslose Bthe kreiself., nach der Basis verschmälert. 4. An rauen O. am Meeresstrande, (in Istrien, Dolliner.) Juni. M. pyramidata Desf. Rb. ic. 11. 1578. J.

3. M. UNIFLORA (Retz.) Einblüthiges P. — R. locker, einseitswendig; Aeste etwas abstehend, die untern meist 2 Aehrchen tragend; Aehrchen aufrecht, eyf.; Bth. bartlos, eine einzige vollkommen; B. flach; Blatthäutchen blattgegenst., zugespitzt, fast krautig. 4. In schattigen Wäldern. Juni. Juli. Rb. ic. 11. f. 1576. M. Lobelii Vill. delph. 2. t. 3. M. nutans Pollich.

4. M. NUTANS (L.) Ueberhangendes P. — R. in eine einfache, einseitswendige, lockere Tr. zsggezogen; Aehrchen hängend, eyf.; Bth. bartlos, zwei vollkommene; B. flach; Blatthäutchen sehr kurz-abgeschnitten. 4. In schattigen Wäldern. Mai. Juni. Leers t. 3. f. 4. M. montana Huds.

XIII. Gruppe. *FESTUCACEEN*. Kunth. en. 321. *Aehrchen 2-vielbth.*, mit einer oft verkümmerten endst. Bthe, *gestielt. Balgklappen kürzer, als die nächste Bthe.* Gf. sehr kurz oder fehlend; N. aus der Basis der Bth. beiderseits heraustretend.

47. *BRIZA* (L.) Zittergras. — Balg 2klappig, 3-vielbth. Bth. wehrlos, in ein 2zeiliges Aehrchen dicht-dachig geordnet, 2spelzig; untere Spelze eyf., stumpf, aufgeblasen-bauchig, an der Basis geöhrelt-herzf. Fruchtkn. kahl; Gf. kurz; N. federig, an den Seiten der Bthe heraustretend. — Bei *Briza minor* sind die Klappen allerdings länger, als die nächste Bthe, aber sie überragen diese doch nicht, wenn man sie an dieselben andrückt.

1. *B. MAXIMA* (L.) Grosses Z. — R. an der Spitze überhangend; *Aehrchen eyf., 9-17bth.*; *Blatthäutchen verlängert, lanzettl., spitz.* ☉. An grasreichen O., (Istrien und bei Fiume.) Mai. Juni. Host. gr. 2. t. 30. J.

2. *B. MEDIA* (L.) Mittleres Z. — R. aufrecht, abstehend; Aehrchen fast herz-eyf., 5-9bth.; *Blatthäutchen sehr kurz, abgesechnitten.* 4. Auf Wiesen. Juni. Juli. St. h. 2.

3. *B. MINOR* (L.) Kleines Z. — R. aufrecht, ausgebreitet; *Aehrchen 3eckig, 5-7bth.*; *Blatthäutchen verlängert, lanzettl., spitz.* ☉. Auf Brackäckern, (Istrien; C. Waadt bei Vevay.) Mai. Juni. Host. gr. 2. t. 28. S.

48. *ERAGRÖSTIS* (Beauv.) Liebesgras. — Balg 2klappig, 2-vielbth.; Klappen kürzer, als die nächste Bthe, abfällig. Bth. eyf. oder lanzettl., auf dem Rücken gekielt-zsgedrückt, am innern Rande bauchig. Bälglein 2spelzig; untere Spelze abfällig, die obere nebst der Achse bleibend. Fruchtkn. kahl. Gf. kurz; N. federig, an der Basis der Bthe hervortretend. Achse nicht gelenkweise sich trennend.

1. *E. MEGASTACHYA* (Link.) Grossähriges L. — *Rispenäste einzeln* oder gezwielet; *Aehrchen lineal-länglich, 15-20bth.*; Bth. auf der stumpfen, etwas ausgerandeten Spitze kurz-stachelspitzig, mit einem starken seitenst. Nerven dchzogen; Scheiden kahl, an der Mündung bärtig; W. faserig. ☉. Auf sandigen Brachfeldern, (stw. am Genfersee; auf der Rheinfläche; im Elsass; in Baden, bei Carlsruh, zw. Schwetzingen und Mannheim; Blankenburg am östl. Harze; bei Regensburg; in südl. Tyrol, Littor.) Juli. Aug. *E. major* Host. gr. 4. t. 24. *Poa megastachya* Koel. gr. D. fl. 1. 597. *Briza Eragrostis* L.

2. *E. POAEOIDES* (Beauv.) Rispengrasähnliches L. — *Rispenäste einzeln* oder gezwielet; *Aehrchen lanzettl.-lineal., 8-20bth.*; Bth. stumpf, mit einem seitenst. starken Nerven dchzogen; Scheiden an der Mündung bärtig; W. faserig. ☉. An kultiv. O. und auf Sandfeldern, (südl. Schw., südl. Tyrol, Littor., Steyerm., Unteröstr.; zerstreut auf der Rheinfläche bis Westphal.; in Franken; Blankenburg am östl. Harz; bei Dresden; bei Breslau; in Böh-

men.) Juli. Aug. E. minor Host. E. poaeformis Link. Poa Eragrostis L. Host. gr. 2. t. 69. D. fl. I. 596. — Die drüsenf. Zähnen am Rande der B. kommen bei dieser und der vorhergeh. Art vor, was in der D. fl. a. a. O. nachzutragen ist. Bertol. vereinigt diese mit der vorhergeh. in eine Art.

3. E. PILOSA (Beauv.) Behaartes L. — *Die untersten Rispenäste halb-quirlig, zu 4 oder 5; Aehrchen lineal, 5-12bth.; Bth. ziemlich spitz, mit einem schwachen seitenst. Nerven durchzogen; Scheiden an der Mündung bärtig; W. faserig.* ☉. An kultiv. O., auf Sandfeldern und an Wegen, (Istrien; Steyerm.; südl. Tyrol; südl. Schw.; sodann bei Basel, Colmar, Bruchsal und bei Halle.) Juli. Aug. Poa pilosa L. D. fl. I. 595. Host. gr. 2. t. 68.

49. POA (L., mit Ausschl. v. Arten.) Rispengras. — Balg 2klappig, 2-vielbth.; Klappen kürzer, als die nächste Bthe. Bth. eyf. oder lanzettl., auf dem Rücken gekielt-zsgedrückt, mit einem Gliede der, sich zuletzt an den Gelenken trennenden Achse abfällig. Bälglein 2spelig. Fruchtkn. kahl; Gf. kurz oder fehlend; N. federig, an der Basis der Bth. hervortretend.

1 Rotte. CATAPODIUM Link. hort. berol. I. 44. Aehrchen auf einem sehr kurzen, dicken Bthstielchen sitzend, in eine einfache, 1seitige Aehre oder in eine, aus einfachen, einseitigen Aehren gebildete R. geordnet. Aehrenspindel zsgedrückt, schlängelg., starr. Bälge u. Spelzen lederig.

1. P. LOLIACEA (Huds.) Lolchartiges R. — *Aehre starr, 1seitig, 2zeitig, schmal, einfach oder an der Basis ästig; Aehrchen sehr kurz-gestielt, genähert, eyf., spitzlich, 5-7bth.; Bth. stumpf; W. faserig.* ☉. Am Meeresstrande, (Fiume und auf der Insel Veglia, Sansego, Insel Brioni bei Istr., Tommas.) Mai. Juni. Triticum loliaceum Sm. T. unilaterale Vill. Host. gr. 3. 21. T. Rottboella DC. Brachypodium loliaceum R. u. S. Catapodium loliaceum Link. Rb. ic. II. f. 1370. Festuca rottboellioides Kunth. J.

2. P. DURA (Scop.) Hartes R. — *R. eyf., einseitig, gedrun-gen, starr, aus kurzen, 3-6 Aehrchen tragenden Aehren zsgesetzt; Aehrchen sehr kurz-gestielt, länglich, 5bth.; untere Spelze lineal.-länglich, nervig, stumpf oder ausgerandet, meist kurz-stachelspitzig; W. faserig.* ☉. Auf Triften und an Wegen, (südl. Mähr.; Unteröstr.; südl. Wallis; stw. Elsass, in der Rheinpfalz bei Oggersheim, Alzei, Creuznach und bis an die Mosel; Erfurt und Arnstadt in Thüringen und bei Quedlinburg und Auleben im Regierungsbezirke Magdeburg.) Mai. Juni. Cynosurus durus L. Pollich. pal. I. t. I. f. I. Eleusine dura Lam. ill. n. 1127. Sclerachloa dura Beauv. Festuca dura Vill. Sesleria dura Kunth. — Gandin sagt, dass die N. aus der Spitze der Blüthen hervorragen; ich fand sie aber aus der Seite derselben nach der Basis zu herausgetreten, gerade wie bei den übrigen Arten v. Poa.

II. Rotte. POAE GENUINAE. Aehrchen gestielt, zerstreut in einer R. Bth. frei oder mit wolligen, krausen Haaren zshängend, stumpflich, spitz od. zugespitzt,

A. W. faserig, Ausläufer fehlend.

a. Rispenäste einzeln oder gezwieit. Bth. ausser der Wolle, wodurch sie manchmal verbunden sind, kahl.

3. *P. ANNUA* (L.) Jähriges R. — *R.* meist einerseitswendig, spreitzend; *Aeste* kahl, einzeln oder gezwieit, zuletzt herabgeschlagen; Aehrchen länglich-eyf., 3-7 bth.; *Bth.* kahl; die obern Blatthäutchen länglich; Halme zsgedrückt, bisweilen niederliegend, an der Basis wurzelnd und Ausläufer treibend; W. faserig. ☉. An kultiv., unkultiv. O., Strassen, um Häuser überall. Blühet das ganze Jahr hindurch, wenn nicht Alles v. Kälte starrt. Rb. 16. II. f. 1621. Var. auf den A.:

β. varia, Aehrchen auffallend - bunt: *P. annua* H. *varia* Gaud. *P. supina* Schrad. Host. gr. t. 27. *P. variegata* Hall., Sohn, bei Schleich. Diese auf den A.

b. Rispenäste einzeln oder gezwieit. Bth. ausser der Wolle, mit der sie manchmal verbunden sind, auf dem Rückennerven und beiderseits auf dem Randnerven mit einer dicht-seidig-flaumigen Linie versehen.

4. *P. LAXA* (Haenke) Schlaffes R. — *R.* länglich, zsggezogen, an der Spitze nickend; *Aeste* fädlich, gezwieit oder einzeln, kahl; Aehrchen eyf., meist 3 bth.; *Bth.* ey-lanzettf., am Rande und auf dem Rücken dicht-flaumig, meist frei; B. schmal-lineal., verschmälert-spitz; Blatthäutchen alle länglich, spitz; W. faserig, rasig. 4. Auf Triften der A. und VorA., (stw. dch d. AK. bis Steyerem.; auf dem Belchen im Schwarzw.; auf den Sudet.) Juni-Aug. St. h. 59. Rb. ic. 11. f. 1630. und 1631. (Bthstielchen zu dünn gezeichnet.) Sm. Engl. Fl. *P. flexuosa* Sm. brit., nach dem eigenen Citate. *P. elegans* DC. Bthstiele und Bthstielchen zwar dünn, aber doch augenfällig dicker, als bei der folgenden Art. Var.:

β. pallescens, hellgelblich-bleich: *P. flavescens* Thom. pl. exsicc.

5. *P. MINOR* (Gaud.) Kleineres R. — *R.* länglich, oder fast eyf., zsggezogen, überhangend; *Aeste* haardünn, gezwieit und einzeln, ziemlich kahl; Aehrchen länglich-eyf., 4-6 bth.; *Bth.* lanzettf., am Rande und auf dem Rücken dicht-flaumig, und an der Basis dch Wolle zshängend; B. schmal-lineal.; Blatthäutchen alle länglich, spitz; W. faserig, rasig. 4. Auf Felsentriften und in Felsenspalten der A.; mit den Flüssen in die Thäler herabsteigend, (stw. dch d. g. AK. bis Steyerem.) Juli, Aug. Rb. ic. 11. f. 1623. *P. supina* Panz. bei St. h. 4., unvollkommene Abbildg. R. haarfein, überhangend, beständig zitternd, wenn man sie in der Hand hält.

6. *P. PUMILA* (Host.) Krainer R. — *R.* aufrecht, spreitzend; *Aeste* gezwieit und einzeln und nebst den Aestchen fast rechtwinkelig auseinanderfahrend, rauh; Aehrchen während des Aufblühens fast gleichf.-zerstreut, eyf., 4-6 bth.; *Bth.* länglich-lanzettf., am Rande und auf dem Rücken dicht-flaumig, frei; B. schmal-lineal.; Blatthäutchen alle länglich, spitz; W. faserig, rasig. 4. Auf Bergen und Bergwiesen Krains, (meine Explare sind um Laibach gesammelt.) Mai, Juni. Untersch. sich v. dem vorhergehenden und den beiden folgenden dch die, während der Bthezeit recht-

winkelig - ausgespernte R., v. ersterer und *P. bulbosa* ausserdem dch die freien Bthen; zuweilen fand ich, jedoch nur 1 oder 2 Fäden, welche die Bthen verbanden. D.

7. *P. CONCINNA* (Gaud., nicht R. Brown.) Gedrängtfähriges R. — *R. aufrecht, abstehend; Aeste gezweiet und einzeln, rauh; Aehrchen an der Spitze der Aeste gedrunge*n, eyf.-spitz, 6-10-bth.; Bth. länglich-lanzettl., am Rande und auf dem Rücken dicht-flaumig, frei; B. schmal-lineal.; *Blatthäutchen alle länglich, spitz; W. faserig, rasig.* 4. An sandigen, trocknen O., (im untern Wallis; um Triest.) Juni. Rb. ic. 11. f. 1617. und 1618. An trocknen O. ist der Halm an der Basis etwas zwiebelig-aufgetrieben, im Garten aber bleibt er gleich-dick. Dem vorhergeh. ähnlich, aber dch die abstehende, und nicht ausgespernte R. und die gedrängten und nicht zerstreuten Aehrchen deutlich verschieden; v. dem folgend., sehr ähnlichen, untersch. es sich dch die freien Bth. und die 6-10bth. Aehrchen. S.

8. *P. BULBOSA* (L.) Zwiebeltragendes R. — *R. aufrecht, abstehend; Aeste gezweiet und einzeln, rauh; Aehrchen an der Spitze der Aestchen gedrunge*n, eyf., 4-6bth.; Bth. länglich-lanzettl., am Rande und auf dem Rücken dicht-flaumig, und mit einer häufigen, sich lang-hervorziehenden Wolle zshängend; B. schmal-lineal.; *Blatthäutchen alle länglich, spitz; W. faserig, rasig; Halm an der Basis oft zwiebelf.-verdickt.* 4. An sonnigen, unkultiv. O., (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. Rb. ic. 11. f. 1619. Var.:

β. vivipara, Bth. in blattige Knospen verwandelt, und diese kommt sogar häufiger vor, als die normale Form: *P. bulbosa β. L.* Rb. ic. 11. f. 1620

9. *P. ALPINA* (L.) Alpen-R. — *R. aufrecht, während der Bthezeit weit-abstehend; Aeste gezweiet, kahl oder rauh; Aehrchen eyf., 4-10bth.; Bth. ey-lanzettl., am Rande und auf dem Rücken dicht-flaumig, frei oder dch spärliche Haare zshängend; B. ziemlich breit-lineal., plötzlich in ein spitzes Ende zsgezogen; die untern Blatthäutchen kurz, abgeschnitten, die obern länglich, spitz; Blätterbüschel an der Basis nebst dem blühenden Halme v. gemeinschaftl. Scheiden eingeschlossen.* 4. Auf Triften der A. und VorA.; die Variet. *β.* auf sandigen Niederungen, (dch d. g. AK. und auf dem Schwarzw.; die Variet. *ε.* stw. auf der Rheinfläche v. Oberbaden bis Darmstadt und Bingen; im Sponheimischen an der Mosel; in Thüringen zw. Halle und dem östl. Harze; in Mähr. und Unteröstr.) Mai. Juni, auf den A. später. Rb. ic. f. 1625-1628. *P. badensis* St. h. 29. Var.:

β. vivipara, Bth. in blattige Knospen verwandelt: *P. alpina vivipara L.*

γ. minor, Halme 3 Zoll lang; B. ziemlich lang; Bthstiele sehr dünn: *P. alpina γ.* Gaud. Auf den höchsten A. an Gletschern.

δ. brevifolia, B. kurz, mit einem knorpeligen, schmalen Rande umzogen, die halnst. kaum $\frac{1}{2}$ Zoll lang; R. gedrungener; Blatthäutchen der unfrucht. Büschel länger, ein wenig hervortretend,

doch abgeschnitten: *P. alpina* H. *brevifolia* Gand. Diese ist der folg. Variet. sehr ähnlich, und untersch. sich nur durch die freudig-grünen und nicht steifen B.; sie bildet aber den Uebergang v. der Hauptart zur folgenden Variet.

ε. badensis, B. kurz, breit, steif, bläulich-grün, mit einem weissen, knorpeligen Rande umzogen; Blatthäutchen wie bei der Variet. *δ*: *P. badensis* Haenk. bei Willd. *P. brevifolia* DC. *P. collina* Host. gr. 2. t. 66. *P. trivialis* Pollich. Koel. *P. Koeleri* DC. *P. brizoides* Woblib. *P. thermalis* Pers. *P. Molinerii* Balb. *P. cenisia* Rb. ic. H. f. 1624. und 1625., nicht All. — Eine ausgezeichnete Variet., aber wegen der in der Mitte stehenden Variet. *δ* konnte ich kein festes Unterscheidungsmerkmal ausfindig machen. — Die *P. cenisia* Host., die ich aus Samen des Wiener Gartens zog, ist eine höhere Variet. v. *P. alpina*, mit reichbth. Aehrchen.

Die folgende *Poa caesia* trägt meist, wie die vorhergehenden, gezeigte Aeste in der Rispe.

c. Die untern Rispenäste zu 5, nur bei mageren Explaren weniger, 2-3. Bth. schwach-5nervig, ausser der Welle, die sie zuweilen verbindet, mit einer scheidig-flaumigen Linie auf dem Rückenerven und heidersits auf dem Randnerven.

10. *P. CAESIA* (Sm.) Hechtthlaues R. — R. abstehend; Aeste rauh, die untern zu 2 bis 5; Aehrchen ey-lanzettf., 2-5bth.; Bth. schwach-nervig, am Rande und auf dem Rücken flaumig; *Scheiden länger, als die Halmglieder, die Halmknoten deckend, die oberste länger, als ihr B.; Blatthäutchen kurz, abgeschnitten*, oder das oberste eyf.; W. faserig, rasig. 4. An sonnigen Felsen auf den A. und VorA., (in der Schw. nicht sehr selten; südl. Tyrol; Schlesien am Köpernickstein im Gesenke.) Juni. Juli. *P. glauca* Sm., wenn die Aehrchen 2-3bth. sind; *P. caesia* Sm., wenn sie 4-5bth. sind. *P. Gandini* R. und S. Var. mit glattem Halme und

β. aspera, Halme oberwärts bemerklich rauh. *P. aspera* Gand. agr. helv. Die lebende Pflanze ist schön hechtblau; Blatthäutchen kurz, abgeschnitten, oder das oberste eyf., immer mehr hervorragend, als bei *P. nemoralis*. Der obere Knoten des Halmes ist manchmal entblösst, aber der Halme ist nur bis zum dritten Theil mit Scheiden bekleidet. Aus dem Samen der rauen Pflanze zog ich Explare mit glatten und rauen Halmen. Gandin vermenigte unter seiner Variet. *glauca* und *caesia* der *P. nemoralis* Varietäten von dieser und der *P. caesia*, und ich selbst verfiel in der D. fl. in denselben Irrthum.

11. *P. NEMORALIS* (L.) Hain-R. — R. abstehend; Aeste rauh, die untern zu 2 bis 5; Aehrchen ey-lanzettf., 2-5bth.; Bth. schwach-nervig, am Rande und auf dem Rücken flaumig; *Scheiden kürzer, als die Halmglieder; Halmknoten entblösst; die oberste Scheide kürzer, als ihr B.; Blatthäutchen sehr kurz, fast fehlend*; W. rasig und kurze Ausläufer treibend. 4. In Wäldern, auf Felsen, Mauern. Juni. Juli. Der Halme ist bis über die Mitte hinauf, oft fast bis zur Spitze beblättert. Var. so sehr, dass man verschiedene Arten vor sich zu haben glaubt.

α. vulgaris, grasgrün; Halme dünn, schwach, mit der lockern R. überhangend; *Aehrchen* 2bth. Gaud. Leers h. t. 5. f. 3. Diese Variet. hat zuweilen 1bth. Aehrchen mit einem köpfchenf., gestielten Ansätze einer zweiten Bthe: *P. nemoralis β.* D. fl. I. 617. Eine krankhafte Abänderung ist *P. nemoralis vulgaris β.* Gaud. mit schwammig ineinander gewirrten rankenartigen Fäden an den Halmknoten.

β. firmula, grasgrün; Halme steif; *Blattscheiden* glatt; R. aufrecht oder an der Spitze überhangend; *Aehrchen* 3-5bth.; diese, in Weidengebüsch wachsende Form hat eine weitschweifige und absteigende R. und meist freie Bthen: *P. nemoralis II. firmula* Gaud.; auf Mauern und an trocknen O. erscheint die R. zsggezogen und die Bthen hängen mit wolligen Haaren zusammen: *P. nemoralis VI. coarctata* Gaud. *P. coarctata* Hall., Sohn, bei Murith. DC. fl. fr. *P. dubia* Sut. und *P. Scheuchzeri* Sut. *P. caespitosa* Poir. *P. trivialis* Leers h. t. 6. f. 2.

γ. rigidula, dunkelgrün, oft fast bläulichgrün; *Halme* steif, *nebst den BScheiden ein wenig rauh*; R. aufrecht oder an der Spitze überhangend; *Aehrchen* 3-5bth.; Bthen dch Wolle verbunden: *P. nemoralis δ.* D. fl. I. 617. *P. pratensis* Leers h. t. 6. f. 4. *P. palustris* DC. *P. polymorpha* Wib., nach Explaren v. Autor. *P. serotina* Schrad., nach einem Explar v. Autor selbst, und nach dem „kurz - abgeschnittenen Blatthäutchen.“ Diese Variet. kommt nicht überall vor.

δ. glauca, mehr oder weniger bläulichgrün; Halme steif; R. wie bei der Variet. *β.* und *γ.*, mit zahlreichen Aehrchen gedrungenbesetzt: *P. nemoralis η. glauca* und *θ. caesia* D. fl. I. p. 619. zum Theil. Untersch. sich v. *P. caesia* dch den bis über die Mitte hinauf beblätterten Halm, die entblössten Halmknoten, weil die Scheiden kürzer, als die Halmglieder sind, und das oberste B., welches so lang, als seine Scheide oder länger ist. Diese Variet. scheint bloss die höhern Berge zu bewohnen. Ich besitze sie lebend im Garten.

ε. montana, Halme schlank; R. mit auseinandergestellten, grossen, 3-5bth. Aehrchen spärlich-besetzt; Rispenäste 1-3 Aehrchen tragend; Aehrchen auf dünnen und langen Stielen. Eine ausgezeichnete, aber dch Zwischenformen in die übrigen übergehende Variet.: *P. nemoralis III. montana* Gaud.

12. *P. FERTILIS* (Host. gr. 3. t. 14.) Vielblüthiges R. — R. ausgebreitet, absteigend; *Aeste* rauh, die untern meist zu 5; Aehrchen ey-lanzettf., 2-5bth.; Bthen schwach-nervig, am Rande nach der Basis und auf dem Rücken mit einer schmalen, flaumigen Linie bezeichnet; Halme nebst den BScheiden glatt; *Blatthäutchen* länglich, spitz; *W. faserig, rasig.* 4. Auf feuchten Wiesen, an Ufern. Juni. Juli. *P. palustris* Roth. *P. serotina* Gaud. und auch Ehrhart's, nach Meyer in der Chlor. hanov., aber ein unpassender Name, denn die Pfl. blüht nicht später, als die verwandte *P. nemoralis* und deren Abarten: *P. effusa* Kit. bei Schult. *P. angustifolia* L., nach Fries und Wahlenb., aber die in der Fl. suc.

aufgezeichnete Beschreibg Linne's passt nicht. *P. angustifolia* Rb. ic. 11. f. 1645-1647.

d. Die untern Rispenäste halb-quirlig, zu 5. Die Bthen mit 5 starken, an der getrockneten Pflanze besonders bemerklichen Nerven versehen, kahl oder unterwärts auf dem Rücken mit wolligen Haaren bestreut, aber ohne behaarte Randleine.

13. *P. SUDETICA* (Haenke.) Sudeten-R. — R. abstehend; Aeste rauh, die untern zu 5; Aehrchen eyf.-länglich, 3-5bth.; *Bth. erhaben-5nervig, ganz kahl* oder an der Basis spärlich mit zottigen Haaren besetzt; *B. lanzettl.-lineal., an der Spitze plötzlich zugespitzt und kappenf.-zsggezogen*, Scheiden 2schneidig; *Blatthäutchen sehr kurz; unfruchtbare Blätterbüschel 2zeilig, flach-zsgedrückt*, während der Bthezeit grünend und lebend. 4. In Wäldern der Gebirge und VorA., (dch d. AK. bis Oestr.; Voges.; Schwarzw.; höhere Gebirge an der Mosel, und Wälder um Coblenz; Hessen; Franken; Thüringen; am Harz; im Teutoburger Walde; und zerstreut im nördl. D.) Juni. Juli. Rb. ic. 11. f. 1657. und 1658. *P. rubens* Mönch. *P. quadripedalis* Ehrh. *P. sylvatica* Vill. *P. trinervata* DC., nicht Ehrh. Die Wurzelköpfe wurzeln am Umfange des Rasens, aber eine wahrhaft kriechende oder Ausläufer treibende Wurzel habe ich v. dieser Art bei den kultiv. Pflanzen unseres Gartens noch nicht gesehen. Var.:

β. remota, die Aeste der R. sehr verlängert, an der Spitze überhangend: *P. sudetica β. remota* Fries nov. fl. suc. In der ersten Ausgabe der Synopsis hatte ich diese Form nicht richtig mit *P. hybrida* verbunden; sie wächst in Schlesien und Franken (im Gesenke der Sudeten, und in der Brucker Lache bei Erlangen, einem Waldsumpfe; und in Wäldern bei Darmstadt.) *P. hybrida* Reichenb. 11. f. 1656.

14. *P. HYBRIDA* (Gaud.) Bastard-R. — R. ausgebreitet; Aeste rauh, hängend, die untern zu 5; Aehrchen eyf.-länglich, 3-5bth.; *Bth. erhaben-5nervig, kahl, an der Basis mit wolligen Haaren spärlich-bestreut; B. von der lanzettl.-lineal. Basis an allmählig verschmälert, sehr spitz*; Blattscheiden 2schneidig; *Blatthäutchen kurz, abgeschnitten; unfruchtbar. Blätterbüschel 2reihig, flach-zsgedrückt*, während der Bthezeit meist dürre. 4. In feuchten Wäldern, (im Jura am Fusse hochgelegener Felsen; auf dem Untersberge bei Salzb.; Kitzbichel in Tyrol, auf dem Kalbling und im Dürnthale auf den Gailer A. in Steyer.; Grimsel in d. Schw.) Juni. Juli. D. fl. 1. 610. in der Anmerk. *Festuca montana* Sternb. und Hopp., nach einem ächten, v. Hoppe selbst erhaltenen Explar und nach der Diagnose. — Dch die flach-zsgedrückten unfruchtbaren Blätterbüschel ist diese und die vorhergeh. Art v. allen der Gattung sehr verschieden.

15. *P. TRIVIALIS* (L.) Gemeines R. — R. abstehend; Aeste rauh, die untern zu 5; Aehrchen eyf., meist 3bth.; *Bth. erhaben-5nervig, kahl*, an der Basis schwach-behaart; *Scheiden etwas zsgedrückt, rauh; Blatthäutchen der obern Scheiden vorgezogen, länglich, spitz*; W. faserig. 4. Auf nassen Wiesen und an feuchten O. Juni. Juli. *P. dubia* Leers herb. t. 6. f. 5. *P. scabra* Ehrh. *P. pratensis* Pollich.

B. W. mit verlängerten Ausläufern weit und breit umherkriechend.

16. *P. PRATENSIS* (L.) Wiesen-R. — R. abstehend; Aeste rauh, die untern meist zu 5; Aehrchen eyf., 3-5bth.; *Bthen* auf dem Rücken und am Rande dicht-flaumig, und nach ihrer Trennung mit einer langen Wolle zshängend, 5nervig, Nerven etwas hervortretend; Halm nebst den Scheiden kahl; die oberste Scheide viel länger, als ihr B.; Blatthäutchen kurz, abgeschnitten; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. Auf Wiesen, Triften, sandigen Brachfeldern. Mai. Juni. *P. glabra* Ehrh. *P. angustifolia* Pollich. Leers herb. t. 6. f. 3. Kommt auf fruchtbaren Wiesen mit freudig-grüner Farbe und verlängerten, zwar schmälern, aber nicht borstlich-zsgefalteten WB. vor; an sandigen, etwas feuchten, auch trockneren O. aber entsteht oft die Variet.:

β. latifolia, die WB. kürzer und breiter und, wie die ganze Pflanze, v. bläulichgrüner oder hechtblauer Farbe: *P. subcaerulea* Engl. bot. t. 1004. *P. pratensis γ. Sm.* *P. depressa* Presl. *P. humilis* Ehrh. — An trocknern und unfruchtbaren O. wird daraus:

γ. angustifolia, WB. zsgefaltet oder zsgerollt - borstlich: *P. pratensis β. angustifolia* Sm. *P. angustifolia* L., nach Sm. Leers herb. t. 6. f. 3. An feuchten und fetten O., welche entblösst worden und noch nicht mit Kräutern bedeckt sind, entsteht:

δ. anceps, grösser, Halm zsgedrückt, fast 2schneidig: *P. pratensis IV. anceps* Gaud. helv.

17. *P. CENISIA* (All.) Zweizeilig - beblättertes R. — R. abstehend; Bthenstiele glatt oder etwas rauh, die untern gezweiet, selten zu 5; Aehrchen eyf., 3-5bth.; *Bth.* auf dem Rücken und am Rande dicht-flaumig und nach ihrer Trennung mit einer langen Wolle zshängend, 5nervig, die mittlern Nerven schwach; Halm nebst den Scheiden kahl; die oberste Scheide viel länger, als ihr B.; Blatthäutchen kurz, das obere eyf.; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. Im Kiese der Giesbäche der A., (stw. dch d. AK. und auf dem Brocken.) Juli. Aug. *P. cenisia* Bertol. Flor. ital. *P. stolonifera* Bellard. *P. distichophylla* Gaud. D. fl. 1. 603. Rb. ic. 11. f. 1632. *P. flexuosa* Wahlenb. Host gr. 4. t. 26. D. fl. 1. 604. Rb. ic. 11. 1633. Var.:

β. pallescens, bleich, flatterig von einem schattigen StandO.: *P. Halleridis* R. und Schult. syst. veget. 1. 350. D. fl. 1. 605. Reichenb. ic. 11. f. 1632. *P. pallens* Gaud. agr. 1. 201.

18. *P. COMPRESSA* (L.) Zsgedrücktes R. — R. abstehend, meist einerseitswendig; Bthstiele rauh, die untern meist zu 2, seltner zu 5; Aehrchen eyf.-länglich, 5-9bth.; Bth. auf dem Rücken und am Rande nach der Basis zu fläumlich, frei, oder mit spärlicher Wolle zshängend, schwach-nervig; Halme 2schneidig-zsgedrückt, an der Basis liegend; W. mit verlängerten Ausläufern kriechend. 4. Auf Triften, an trocknen, kultiv. und unkultiv. O., Sandfeldern. Juni. Juli. — *P. compressa* Wib. ist eine Abänderung mit freien Bthen; *P. muralis* Wib. eine, deren Bthen mit Wolle zshängen. Var. ferner:

β. *Langeana*. Halm 2 Fuss hoch; R. locker, reichlich mit Aehrchen besetzt; P. *Langeana* Reichenb. ic. H. f. 1647. P. compressa β. effusa Tausch. pl. sel.

50. GLYCÉRIA (R. Brown, mit hinzugefügten Arten.) Süßgras. — Bth. stumpf, auf dem Rücken halbwalzlich, einwärts etwas hauchig; sonst Alles, wie bei Poa. Glyceria und Catabrosa N. v. E. gen. 11. 11.

1. Rotte. AECHE. Aehrchen 4-11 blüthig.

1. G. SPECTABILIS (M. und Koch.) Ansehnliches S. — R. gleich, weitschweifig, sehr üstig; Aehrchen 5-9 bth.; Bth. stumpf, 7nervig, Nerven stark, hervortretend; W. kriechend. 2. In stehenden Wassern und an Ufern. Juli. Aug. Glyceria aquatica Wahlb. Poa aquatica L. Leers herborn. t. 5. f. 3. P. altissima Mönch. Molinia maxima Hartm. scand. Hydrochloa aquatica Hartm. gr. suec.

2. G. PLICATA (Fries novit. mant. 3. S. 176.) Gefaltetes S. — R. quirlig, fast gleich, die unteren Aeste meist zu 5; Aehrchen 7-11 blüthig; Bth. oval-längl., sehr stumpf, schwach-3kerbig, 7nervig, Nerven stark, hervortretend; die jungen B. mehrfach gefaltet. 2. In ruhigen und stehenden Wassern hie und da, mit der folgenden verwechselt. Juni. Juli

3. G. FLUITANS (R. Brown.) Fluthendes S. — R. einerseitswendig; Aeste während der Bthezeit rechtwinkelig-abstehend; die unteren meist zu zweien; Aehrchen 7-11 bth., an den Ast ange-drückt; Bth. lanzettl.-längl., spitzlich, oft schwach-3kerbig, 7nervig, Nerven stark, hervortretend; die jungen B. einfach-zsgefaltet. W. kriechend. 2. In stehenden Wassern, Bächen, Gräben. Juni. Juli. Festuca fluitans L. Schreb. gr. t. 3. Poa fluitans Scop. Hydrochloa fluitans Hartm.

4. G. DISTANS (Wahlenb.) Abstehendes S. — R. gleich, ausgesperret; die fruchttragenden Aeste herabgeschlagen, die unteren zu 5; Aehrchen 4-6 bth.; Bth. eif.-länglich, abgestutzt-stumpf, schwach-5nervig; W. faserig. 2. An feuchten O., Gräben, besonders auf Salzboden, (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. Poa distans L. P. salina Pollich. P. retroflexa Curt. lond. 6. t. 1. P. arenaria var. α. Trin. Festuca distans Kunth. enum. Molinia distans Hartm. scand. fl. — Die Glyceria capillaris Wahlb. gothob., nach Hartm. scand. fl. ist eine Variet. der Glyceria distans, mit haarfeinen, flatterigen Aesten und spitzigeren Aehrchen.

5. G. FESTUCAEFORMIS (Heynhold bei Rh.) Schwingelähnliches S. — R. gleich, abstehend; die unteren Aeste meist zu 5, die fruchttragenden an die Spindel angedrückt oder aufrecht-abstehend; Aehrchen 5-9 blüthig; Bth. lineal.-längl., stumpf, oft 3kerbig, schwach-5nervig; die unfruchtbaren, Ausläufer treibenden, niedergestreckten Stengel fehlend; W. faserig. 2. An sumpfigen und sandigen O. am Adriat. Meere. Juni. Juli. Glyceria capillaris D. fl. 1. 869, mit Ausschl. d. Syn. Wahlb. Poa festucae-

formis Host. gr. 3. 12. t. 17., sehr schlecht beschrieben. *P. arenaria* var. β . Trin. *Festuca Hostii* Kunth. *F. palustris* Secnus nach Schrad. — Von der vorigen ist sie verschieden dch die ährenfzgezogenen, oder aufrecht-abstehenden, nie herabgebogenen fruchttragenden Aeste, und dch längere Bthen; von der folgenden *G. maritima* dch das Fehlen der verlängerten, niedergestreckten, unfruchtbaren Aeste, sowie der Wurzelausläufer. Die Halme sind nicht ästig an der Basis, wie bei der folgenden. D.

6. *G. MARITIMA* (M. und Koch.) Meerstrand's S. — R. gleich, abstehend; *die unteren Aeste meist zu 2*, die fruchttragenden Aeste zsgezogen; Aehrchen 4-6bth.; *Bth.* lineal.-länglich, stumpf, oder schwach-5kerbig, *schwach-5nervig*; *die nicht blühenden St. verlängert, ausläuferf., niedergestreckt*; *W. kriechend*. 4. Am sandigen Meeresstrande, und an den an das Meer stossenden Flussufern, (v. Ostfriesland bis Mecklenburg.) Juni. Juli. *Poa maritima* Huds. *Poa arenaria* var. γ . Trin. *Hydrochloa maritima* Hartm. gr. succ. *Molinia maritima* Hartm. scand. *Festuca thalassica* Kunth. gr. — Diese und die vorige sind anzupflanzen und im Garten noch ferner zu beobachten. D.

II. Rotte. CATABROSÆ. Aehrchen 2blüthig, sehr selten mehrblüthig.

7. *G. AQUATICA* (Presl.) Wasser-S. — R. gleich, ausgebreitet; Aehrchen lineal., 2bth.; *Bth.* länglich, stumpf, *3nervig*; *Nerven hervortretend*; *W.* mit Ausläufern kriechend. 4. In stehenden Wassern, Gräben, Quellen, an sandigen, befeuchteten O., (stw. dch d. Geb., aber nicht überall.) Juni. Juli. *G. airoides* Rb. *Aira aquatica* L. *Molinia aquatica* Wib. *Poa airoides* Koel. *Hydrochloa airoides* Hartm. *Catabrosa aquatica* Beauv. *Colpodium aquaticum* Trin. Var. sehr selten mit 3-5 blüthigen Aehrchen. Diese Varietät besteht aus wuchernden Expl., wie ich sie vor vielen Jahren in der Rheinfläche fand, und die sich zur gewöhnlichen Art gerade so verhielten wie die *Poa nemoralis firmula* zu *Poa nemoralis vulgaris* und zu *Poa nemoralis uniflora*; ich konnte aber seit jener Zeit diese Varietät nicht wieder finden und führe sie daher auch nur als eine ganz seltene an.

51. *MOLÍNIA* (Schrank.) Molinie. — *Bth.* aus einwärts-bauchiger Basis kegelf., auf dem Rücken halbwalzlich; sonst Alles, wie bei *Poa*.

I. Rotte. ECHE MOLINIEN. Aehrchen wehrlos.

1. *M. CAERULEA* (Mönch.) Blaue M. — R. etwas zsgezogen; Aehrchen aufrecht, wehrlos, meist 3bth.; *Bth.* 3nervig; *Halm fast nackt*. 4. In Wäldern und auf feuchten Waldwiesen; eine kleinere Variet., auf morastigen und unfruchtbaren Triften. Aug. Sept. *M. variabilis* Wib. *Aira caerulea* L. sp. Leers herborn. t. 4. f. 5. *Melica caerulea* L. mant. *Enodium caer.* Gaud. *Festuca caer.* DC. *Hydrochloa caer.* Hartm. Eine grössere, in einem fetten Waldboden vorkommende Variet. ist *M. altissima* Link., *M. arundinacea*

Schrank., *M. littoralis* Host., nach Kunth., aber die angegebene weit kriechende W., welche Host. dieser Pfl. zuschreibt, habe ich nicht finden können.

II. Rottle. *DIPLACHNE* Beauv. agr. 60. Link. hort. 1. 154. Untere Spelze aus ungeth. oder kurz-2sp. Spitze begrannt; Granne gerade, kurz.

2. *M. SEROTINA* (M. und Koch.) Späte M. — R. abstehend; Aehrchen 2-5bth., kurz-begrannt; Bth. 5nervig; *Halm fast bis an die Spitze mit BScheiden bedeckt.* 4. Auf steinigten Hügeln, an Wegen, (Istrien, Littor., südl. Tyrol, C. Wallis, Waadt, Tessin.) Aug. Sept. *Festuca serotina* L. spec. *Agrostis serotina* L. mant. *Melica nodosa* Pill. und Mitterbach. *Bromus strictus* Scop. *Diplachne serotina* Link.

52. *DÁCTYLIS* (L.) Knäulgras. — Bth. gekielt-zsgeedrückt, wie bei *Poa*, aber ungleichseitig, an der Spitze nach der innern Seite gebogen, aus ungeth. oder ausgerandeter Spitze kurz-begrannt. — Pflanzen v. Habitus eines *Cynosurus*, und den Merkmalen der *Koeleria*. Von letzterer untersch. sich die Gattung bloß durch den Habitus, doch die etwas mehr gedunsenen Aehrchen und die an der Spitze ein wenig einwärts-gebogenen Bthen; v. *Poa* durch die kurz-begrannten Bthen; v. *Festuca* durch die gekielt-zsgeedrückten, und auf dem Rücken nicht stielrunden Bthen.

1. *D. GLOMERATA* (L.) Gemeines K. — *Untere Spelze 3nervig*; W. rasig; Ausläufer fehlend. 4. Auf Wiesen und in Wäldern. Juni. Juli. Leers herbort. t. 3. f. 3. St. h. 6. *Festuca glomerata* All. *Bromus glomeratus* Scop. Aeste unterwärts nackt. Var. mit bläulichgrünen Bthen: *D. glaucescens* Willd. *D. altaica* Bess. bei Schult. Var. ferner:

β. hispanica. R. in eine lappige Aehre zsgezogen; Aeste v. der Basis an mit Aehrchen besetzt; *D. hispanica* Roth. *Festuca phalaroides* Lam. ill. n. 1036., nach DC.

2. *D. LITTORALIS* (Willd.) Strand-K. — *Untere Spelze 9-11nervig*; Ausläufer verlängert, gestreckt. 4. Am Ufer des Adriat. Meeres, (Triest, Fiume.) Juni. Juli. *D. maritima* Schrad. germ. 1. t. 6. f. 1. *D. distichophylla* Brign. *Poa littoralis* Gouan. D. fl 1. 594. *P. pungens* MBieb. *Calotheca littoralis* Spreng. syst. veget. D.

53. *CYNOSURUS* (L.) Kammgras. — Jedes Aehrchen an der Basis mit einem, aus zahlreichen, 2reihigen, wechselst. Bälgen und Bälglein zsgesetzten DeckB. gestützt; sonst Alles, wie bei *Festuca*. N. v. E. gen. 14. 5.

1. *C. CRISTATUS* (L.) Gemeines K. — R. ährig, gedrunken, lineal., gerade; *Bälge der DeckB. in eine Stachelspitze verschmälert.* 4. Auf Wiesen. Juni. Juli. St. h. 4. *Phleum cristatum* Scop.

2. *C. ECHINATUS* (L.) Weichstacheliges K. — R. ährig-zsgezogen, eyf.; *Bälge der DeckB. sehr lang-begrannt.* O. An kultiv. O., Wegen, Wiesen, (Istrien; bei Steyer in Oestr.; Stattenberg

und Cilli in Steyerm.; im obern Wallis; am Gardasee in Tyrol; Fiume.) Mai. Juni. Host. gr. t. 95.

54. **FESTÚCA (L.)** Schwingel. — Bth. lanzettl. oder lanzettl.-pfeilförmlich, auf dem Rücken stielrund, mit einem hervortretenden Nerven und ohne einen solchen. Sonst Alles, wie bei *Poa*. Obere Spelze sehr fein-gewimpert, wodurch sich die Gattung v. *Brachypodium* untersch. — *Festuca*, *Schedonorus* und *Vulpia*. N. v. E. gen. h. 14. n. 13. 14. 15.

I. Rotte. **NARDURUS** Comp. fl. germ. ed. 2. p. 193. Aehrchen in einer einfachen *Tr.* sehr kurz-gestielt; Bthstielen dick, aber v. gleicher Breite W. klein, jährlich. Unfruchtbare Blätterbüschel fehlend. — Diese Rotte untersch. sich v. *Triticum* dch die traubigen, nämlich auf Stielchen sitzenden Aehrchen, v. *Brachypodium* dch die sehr fein-gewimperte obere Spelze.

1. **F. TENUIFLORA** (Schr.) Zartblüthiger S. — *Tr. einfach*; Aehrchen sehr kurz-gestielt, 2zeilig-1seitig; Klappen lanzettl., verschmälert-spitz, untere um die Hälfte schmaler, 1nervig; Bth. lanzettl.-lineal., sehr spitz, in eine kürzere Stachelspitze oder verlängerte Granne verschmälert. ☉. An unkultiv., sonnigen O., (Istrien und im Wallis.) Juni. Juli. Var. mit kahlen und flaumigen Bth. und

α. mutica, Bth. alle nur kurz-stachelspitzig: *Triticum unilaterale* L. DC.

β. biuncialis, Bth. der untern Aehrchen der Traube stachelspitzig, die der obern lang-begrannt: *T. biunciale* All., nach Bertoloni.

γ. aristata, Bth. mit einer Granne v. der Länge der Bthe selbst: *T. Nardus* DC. *T. tenellum α.* Lam. Host. gr. 2. t. 26. *Brachypodium tenellum* und *tenuiflorum* R. u. S. *B. psilanthum* Link.

2. **F. LACHENALII** (Spenn.) Lachenal's S. — *Tr. einfach*; Aehrchen sehr kurz-gestielt, wechselst.; Klappen länglich-lanzettl., stumpflich, die untere ein wenig kürzer, beide 3nervig; Bth. länglich-lanzettl., stumpflich, wehrlos oder begrannt. ☉. An sandigen O. und auf Aeckern, (in Menge auf den trocknen Sandplätzen der Granitischen Vogesen und auf dem Kiese der Bäche daselbst; im Oberbadischen bei Freiburg, zwischen Weil und Basel; C. Tesin.) Juni. Juli. F. *Poa* Kunth. *Triticum Lachenalii* Gmel. *T. tenellum* L., nach Bertol. *T. Poa* DC. *T. Halleri* Vivian. ann. 2. t. 5. *Brachypodium Poa* und *Halleri* R. und S. Var.:

β. ramosa, Aehre unten ästig: *Triticum Festuca* DC. fl. fr. *T. Poa β.* Dub. bot. gall. Var. ferner:

γ. aristata, Bth. begrannt: *Triticum tenuiculum* Lois. not. *T. festucoides* Bertol. fl. ital. *T. hispanicum* Vivian. ann. bot. 1. t. 3. f. 2. *Festuca tenuicula* Kunth. en.

II. Rotte. **SCLEROCHLOA**. R. steif. Bthstielen kurz, dick, aber v. gleicher Breite. W. klein, jährlich.

3. **F. RIGIDA** (Kunth.) Starrer S. — R. 2zeilig-1seitig, gedrängt, starr; Aeste nebst den Aestchen 3kantig; Aehrchen

länglich, 6-12bth., *aufrecht, ein wenig abstehend*, genähert, *die seitenst. der Aeste sehr kurz-gestielt*; Bth. lineal., stumpf, seicht-
ausgerandet und sehr kurz-stachelspitzig; W. faserig. ☉. An gras-
sigen, trocknen O., in Weinbergen, an Wegen, (östr. Littor. bei
Fiume, Triest; Südtirol; in der Gegend des Genfersees und im C.
Tessin; bei Aachen, Lehrer Kaltenbach.) Juni. Juli. St. h. 86.
Poa rigida L. *Glyceria rigida* Sm. *Megastachya rig.* Beauv. *Sclero-*
chloa rig. Link. Rb. ic. II. f. 1518.

4. *F. DIVARICATA* (Desf. atl. I. t. 22.) Ausgesperrter S. — *R.*
steif; Aeste 3kantig; Aehrchen lineal., 6-12bth., während der
Blthezeit *ausgesperrt-abstehend, die seitenst. der Aeste sehr kurz-*
gestielt; Bth. lineal.-lanzettl., stumpf, kurz-ausgerandet und sehr
kurz-stachelspitzig; W. faserig. ☉. An dürrn, steinigen O., (Fiume.)
Apr. Mai. *Sclerachloa articulata* Link. *Schedonorus divaricatus*
R. und S. *Dactylis memphitica* Spreng. Roth. J.

III. Rotte. *Vulpia* Gmel. *Mygalurus* Link. Rispenästchen ziemlich dick oder
auch nach der Spitze beinerklich-verdickt und fast keulig. Bth. lanzettl., pfriem-
lich, lang-begrannt, bei mehreren 1mannig. W. klein, faserig; unfruchtbar. Büschel
der B. fehlend.

5. *F. UNIGLUMIS* (Soland. bei Ait.) Einbalgiger S. — *R.* einer-
seitswendig, *zsggezogen, fast ährig; obere Klappe begrannt, untere*
sehr klein oder fehlend; Bth. lanzettl., pfriemlich-verschmälert,
lang-begrannt, *kürzer, als die Granne*, kahl, an der Spitze ein-
wenig rauh; W. faserig. ☉. An unfruchtbaren, trocknen O., (bei
Triest.) Mai. *F. uniglumis* Soyer-Willemet. *Mygalurus uniglumis*
Link. en. *Vulpia membranacea* Link. hort. V. *uniglumis* Rb. D.

Willemet trennt v. *Festuca uniglumis* die *F. bromoides* L. dch
eine lockere R. und dch eine, eine Linie lange untere Klappe, wel-
che bei *F. uniglumis* fast nicht vorhanden ist; aber dieses Merk-
mal ist nicht ganz sicher, denn meine Explare der *F. uniglumis*
haben bald eine beinahe fehlende, bald eine längere und bis 1 Linie
lange untere Klappe; auch der Umstand, dass die R. unten in die
oberste Scheide eingeschlossen ist, oder mit dem nackten Halm
weniger oder mehr hervortritt, giebt bei dieser Art, sowie bei den
beiden folgenden keinen sicheren Haltspunkt ab.

6. *F. CILIATA* (der Autoren) *F. MYUROS* L. spec. 109. nach
Willemet und den Worten Linne's unter *F. bromoides* „von *F.*
myuros verschieden dch die nicht wimperigen Büdgel.“) Mäuse-
schwanzartiger S. — *R.* einerseitswendig, *zsggezogen, fast ährig;*
obere Klappe spitz, untere sehr kurz oder fehlend; Bth. lanzettl.,
pfriemlich-verschmälert, lang-begrannt, *kürzer, als die Granne,*
zottig und dicht-bewimpert; Blatthäutchen 2 ährig; W. faserig. ☉.
An unkultiv. O., Zäunen der wärmern Gegenden, (Istrien und bei
Fiume; bei Genf.) Mai. Juni. *F. myuros* Soyer-Willemet. *F. ci-*
liata Danth. bei DC. *Vulpia ciliata* Link. J.

7. *F. MYUROS* (der Autoren) *F. PSEUDO-MYUROS* Soyer-Wille-
met.) Trug-Mäuseschwanz-S. — *R.* einerseitswendig, *zsggezogen,*
fast ährig, bogig-überhangend, die untersten Aeste viel kürzer,

als die *R.*; obere Klappe spitz, untere 2- oder mehrmal kürzer; *Bth.* lanzettl., pfriemlich-verschmälert, lang-begrannt, *kürzer, als die Granne*, rau; Blatthäutchen 2öhrig; *W.* faserig. ☉. An unkultiv. O., auf Hügeln, Sandfeldern. Mai. Juni. D. fl. I. 637. *F. myuros* Ehrh. und aller Autor. *Vulpia myuros* Gmel. *V. Pseudomyuros* Rb. *Mygalurus caudatus* Link. Der Halm tritt nicht selten aus der Scheide hervor.

8. *F. BROMOIDES* (der meisten Autoren *F. SCIUROIDES* Roth.) Trespenartiger *S.* — *R. einerseitswendig, während des Blühens steif, aufrecht, abstehend, die untersten Aeste fast so lang, als die halbe R.*; obere Klappe spitz, untere 2- oder mehrmal kürzer; *Bth.* lanzettl., pfriemlich-verschmälert, lang-begrannt, *kürzer, als die Granne*, rau; *Halm oberwärts lang-nackt*; Blatthäutchen 2öhrig; *W.* faserig. ☉. An unkultiv. O., auf trocknen Triften. Mai. Juni. *F. bromoides* D. fl. I. 636., und der meisten Autoren und nach Bertoloni, auch Linne's. *Bromus dertonensis* All., nach Bertol. *B. ambiguus* Cyrill. *Vulpia bromoides* Link. *V. sciuroides* Rb. — Die untere Klappe ist bei dieser, wie bei der vorhergeh. Art, bald länger, bald kürzer, aber bei dieser ist die *R.* kurz, steif-aufrecht, während des Blühens abstehend, und die untersten Aeste sind fast so lang, wie die Hälfte der *R.* Mehrere Jahre hindurch ziehe ich beide im Garten und sie bleiben sich unveränderlich gleich, so dass man sie schon von Weitem ihrem Aeusseren nach für ganz verschieden erkennen muss.

IV. Rotte. *FESTUCAE GENUINAE. Echte Schwingel.* Bthstielchen der *R.* fädlich, unter den Bthen nur mässig dicker. *Bth.* lanzettl., spitz oder zugespitzt, wehrlos oder begrannt. *B.* alle zsgefaltet-fädlich oder die halmst. flach. Blatthäutchen 2öhrig, nämlich sehr kurz und beiderseits in ein rundliches Oehrchen vorgezogen. *W.* ausdauernd, faserig oder Ausläufer treibend; unfruchtbar. Büschel der *B.* immer vorhanden.

9. *F. HALLERI* (All.) Haller's *S.* — *R.* zsggezogen, während der Bthezeit aufrecht, etwas abstehend; Aehrchen 4-5 bth., die oben einzeln fast sitzend, die untern länger-gestielt, einzeln, oder 2 oder 3 auf einem Aste wechselst.; *Bth.* lanzettl., begrannt, *Granne* halb so lang, als die Bthe; untere *Spelze* 5nervig, *lanzettl.-verschmälert, an der Spitze 2sp.*; *B. alle zsggefaltet - borstlich*; *Blatthäutchen 2öhrig*; *W.* faserig. 4. Auf den höchsten A., (stwdch die AK.) Juli. Aug. *F. alpina* St. h. 86., und hierher gehört wahrscheinlich auch *F. alpina* Sut. fl. helv. Untersch. sich v. *F. ovina* dch die deutlich-nervigen Bth. und die fast v. der Basis an verschmälerte obere *Spelze*. *F. Halleri*, die französische Pflanze und die Schweizer Pflanze desselben Namens sind nicht verschieden, was ich dch die v. den Autoren selbst, v. DC. und Gaud. erhaltenen Explare beweisen kann.

10. *F. OVINA* (L.) Schaafs-S. — *R.* während der Bthezeit abstehend; Aehrchen 4-8 bth.; *Bth.* lanzettl., wehrlos oder begrannt, *Granne* kurz oder auch länger und halb so lang, als die Bthe; untere *Spelze* schwach-5nervig, *obere länglich-lanzettl., an der Spitze 2zählig*; *B. alle zsggefaltet - borstlich*; *Blatthäutchen 2öhrig*; *W.* faserig. 4. Auf schlechteren Wiesen, Triften, an unkult.

O. überall, in die höchsten A. hinaufsteigend. Mai. Juni. **F. duriuscula** Bertol. — Kommt in vielen Formen vor, von welchen ich aber, da ich bei meinen während langer Zeit fortgesetzten Beobachtungen unzählige Uebergänge gefunden habe, jetzt spezifische Unterschiede zu geben nicht im Stande bin. Die hauptsächlichsten dieser Variet. sind:

α. vulgaris, B. grasgrün oder nur ein wenig bläulichgrün, sehr dünn, ein wenig rauh oder wirklich rauh; Aehrchen kleiner, kurz-begrannt: **F. ovina** D. fl. 1. 641. Kommt vor 1) etwas selten, mit wehrlosen Aehrchen: **F. tenuifolia** Sibth. Schrad. 2) mit sehr dünnen, verlängerten B. (in schattigen Hainen): **F. capillata** Lam. **Poa capillata** Merat. **P. setacea** Koel. 3) mit wehrlosen, 6bth. Aehrchen: **Festuca paludosa** Gaud.

β. alpina, ebenso, aber niedriger; B. glatt; R. spärlicher mit Aehrchen besetzt; Aehrchen grösser; Grannen länger, manchmal so lang, als die Bthe: **F. alpina** Gaud. agr. D. fl. 1. 644. Wächst auf den A. und VorA. Diese Form ist, wenn die Aehrchen violett gefärbt erscheinen, nach Shuttleworth die **F. Gaudini** Kunth. enum. mit Ausschluss der Synonyme.

γ. violacea, ebenso, aber die Bthe glänzend, violett, gelb und grün zierlich-gescheckt: **F. violacea** Gaud. agr. D. fl. 1. 646. Kommt auf den A. und VorA. vor.

δ. valesiaca, höher; Aehrchen grösser; B. verlängert, sehr dünn hechtblau, sehr rauh: **F. valesiaca** Schleich., nach einem Explare v. Autor. D. fl. 1. 651. Gaud. Kommt unter den gewöhnlichen Formen hie und da vor.

ε. duriuscula, höher; Aehrchen grösser; B. grasgrün oder bläulichgrün, dünner oder auch ziemlich dick, steif oder zurückgekrümmt: **F. duriuscula** L. sp., nicht syst. nat. Pollich pal. D. fl. 1. 646. **P. ovina** Schrad. **F. duriuscula** Host. gr. 2. t. 83. und **F. stricta** Host. gr. 2. 86. Kommt vor: die Scheiden und die unteren B. zottig; die Aehrchen mehr oder weniger flaumig, hieher: **F. hirsuta** Host. gr. 2. 61. Auf felsigen Gebirgen ist sie niedriger, die B. sind kurz und zurückgekrümmt: **F. curvula** Gaud. agrost. **F. duriuscula** β. **curvula** Gaud. fl. helv.; oder bekommt längere und dickere B.: **F. dura** Host. gr. 2. t. 87. — Die Variet. **ε.** ist überall gemein.

ζ. glauca, ebenso; B. bläulichgrün: **F. glauca** Schrad. germ. D. fl. 1. 649. **F. pallens** Host. gr. t. 88. St. h. 26. Kommt, besonders an sandigen O. am Meeresstrande, hechtblau vor: **F. glauca** Lam.; sodann auf den A. mit dickeren, geglätteten B.: **F. duriuscula** γ. **laevigata** Gaud. **F. laevigata** Clairv. und daselbst mit sehr steifen, langen, sehr dicken B.: **F. pungens** R. und S.

η. amethystina, B. gras- oder bläulichgrün, steif, abstehend; Aehrchen wehrlos oder kurz-stachelspitzig: **F. amethystina** Host. gr. 2. t. 89. D. fl. 1. 653. Die Aehrchen kleiner, als bei der vorhergeh. Wächst in Oestr.

θ. vaginata, B. dünn, weich, verlängert, gras- oder bläulichgrün; Aehrchen länger, 8bth., wehrlos: **F. vaginata** Willd., nach

Explaren aus dem Berliner Garten. D. fl. l. 652. Eine während der Bthezeit weit ausgesperrte R. beobachtete ich zuweilen auch bei andern Abänderungen. Diese wächst in Oberschwaben und Oberbayern und zwar in Menge im Isarkiese bei München.

ι. pannonica, B. ein wenig dicker, bläulichgrün; Aehrchen lang, 8-10 bth., begrannt: *F. pannonica* Host. gr. 4. t. 62. D. fl. l. 652. Diese untersch. sich v. *F. glauca* blos dch die Zahl der Bth. in den Aehrchen.

Eine *Varietas vivipara*, eine lebendiggebärende, kommt besonders auf höhern Gebirgen und den A. vor.

11. *F. HETEROPHYLLA* (Lam.) Verschiedenblättriger S. — R. während der Bthezeit abstehend; Aehrchen 4-5 bth.; Bth. begrannt, lanzettl., Granne kurz oder auch länger und fast so lang, als die Bth.; *WB. zsgefaltet-borstlich, die halmst. B. flach; Blatthäutchen 2öhrig; W. faserig.* 4. In Wäldern der Gebirge, VorA. und A.; kommt auf niedrigeren Gebirgen seltner vor. Mai. Juni, in den Alpen später. *F. heterophylla* Hänk. bei Jacq. coll. D. fl. l. 655. *F. duriuscula* L. syst., nicht spec. *F. duriuscula* Schrad. var. *α.* *F. nemorum* Leyss. Im Schatten der Wälder sind die WB. sehr dünn und verlängert, und die R. hängt mit ihren grasgrünen Aehrchen über; in Waldschlägen, welche der Sonne ausgesetzt sind, werden die B. steif und die R. richtet sich auf; auf den A. erscheinen die Aehrchen violett und gelb gescheckt; diese letzte ist *F. nigrescens* Lam. *F. nigricans* Schleich. Die *Festuca heterophylla* und *nigrescens* habe ich aus Samen gezogen und im Garten beobachtet.

12. *F. RUBRA* (L.) Rother S. — R. während der Bthezeit abstehend; Aehrchen meist 5 bth.; Bth. lanzettl., begrannt, Granne kürzer oder auch länger; *die wurzelst. B. zsgefaltet-borstlich, die astst. flach; Blatthäutchen 2öhrig; W. Ausläufer treibend* und lockere Rasen bildend. 4. Auf Wiesen, Triften, Sandfeldern, an Waldrändern. Mai. Juni. An sandigen O. kriecht sie weit umher und treibt in Zwischenräumen einzelne Halme. Var. mit oberwärts ein wenig zottigen Aehrchen und:

β. villosa, mit solchen, welche ganz mit kurzen Zotten bestreut sind: *F. dumetorum* L. *F. barbata* Schrank.

γ. arenaria, eine bemerkenswerthe Variet. mit grössern und wollig-zottigen Aehrchen: *F. rubra γ. lanuginosa* K. Syn. ed. 1. *F. cinerea* DC. *F. arenaria* Osbeck. bei Retz. *F. rubra β. arenaria* Fries. *F. baltica* Hohnmann in Brief. *F. dumetorum* Rafn.

V, Rotte. SCHEDONORI. Bthstiele der R., Aehrchen und Bthen wie bei der vorhergeh. Rotte; aber das Blatthäutchen ist abgeschnitten oder auch vorgezogen und länglich, jedoch nicht 2öhrig. Die B. öfters flach, auch die wurzelst., bei andern auch fädlich. — Blos bei *F. loliacea* sind die Aehrchen in eine Tr. geordnet und sitzen auf kurzen und dicken Bthstielen; die übrigen Arten sind rispig und ihre Aehrchen sind mit längern und dünnern Bthstielen versehen.

13. *F. VARIA* (Hänk. bei Jacq.) Bunter S. — R. zsggezogen, während der Bthezeit abstehend; Aeste einzeln oder gezweigt;

Aehrchen 5-8bth., kurz-begrannt oder wehrlos; *untere Spelze schwach-5nervig, lanzettl., von der Mitte an allmählig schmaler; Fruchtkn. an der Spitze behaart; B. alle zsgesaltet, fädlich, fast stielrund; Blatthäutchen länglich; W. faserig, ohne Ausläufer.* 4. Auf felsigen Triften der A. und VorA., (stw. dch d. AK. und in den Sudeten.) Juli. Aug. *F. varia* Gand. helv. *F. acuminata* Gaud. agrost. DC. fl. fr. B. grasgrün oder auch lauchgrün. Aehrchen grün, weiss und purpurn zierlich-gescheckt; Blatthäutchen bald stumpf, bald spitz. Bei der Variet.

β. flavescens, sind die Aehrchen blass und weit weniger bunt; *F. flavescens* Bellard., wenn, nach Bertol., die B. dünn und schlapp sind; die B. nämlich var. bei dieser Art sowohl in ihrer Dicke, als Steifheit und mit grasgrüner oder bläulichgrüner Farbe, so wie die der *F. ovina*. Die *F. xanthina* R. und S. und die *F. alpina* Host. gr. 4. t. 63., letztere aus Samen des Wiener Gartens gezogen, gehören zu den Modificationen dieser Art. Die Variet.

γ. crassifolia, hat dicke und steife B.: *F. Eския* Ramond. bei DC.; von Müller in Krain gesammelt. Die Achse der Aehrchen var. mehr oder weniger rauh oder kurz-behaart, wie bei der Art überhaupt.

Ich habe den Namen *Festuca varia* vorangesetzt, obgleich Hänke unter *F. varia* sowohl diese, als die *F. pumila* begriffen zu haben scheint; der Name *F. flavescens* passt auf eine, oft ausgezeichnet-bunte Pflanze nicht.

14. *F. PUMILA* (Vill.) Niedriger S. — R. aufrecht, zsggezogen, während der Blthezeit etwas abstehend; Aeste einzeln oder gezweiet; Aehrchen 3-4bth., begrannt; *untere Spelze schwach-5nervig, länglich-lanzettl., über der Mitte plötzlich zugespitzt; Fruchtkn. an der Spitze behaart; B. alle zsgesaltet-fädlich, fast stielrund; Blatthäutchen länglich; W. faserig.* 4. Auf felsigen Triften der A., (dch d. g. AK.) Juli. Aug.

15. *F. PILOSA* (Haller, Sohn.) Behaarter S. — R. abstehend; Aeste halbquirlich, die untern meist zu 5; Aehrchen meist 3bth., begrannt oder wehrlos; *Achse unter den Bthen mit einem Büschel von Haaren gebärtet; Fruchtkn. kahl, die halmst. B. zsgesaltet oder flach, die wurzelst. fast stielrund; Blatthäutchen länglich-lanzettl.; W. faserig.* 4. Auf den höchsten Jochen der A., (Schw., Tyr., Kärnth., Steyerin.) Juli. Aug. *F. rhaetica* Snt., mit Ausschl. der Syn. aus Scheuchzer und Haller. St. h. 86. *F. poaeformis* Host. gr. 2. t. 81. *Poa violacea* Bellard. act. taur. 5. t. 5.

16. *F. LAXA* (Host. gr. 2. t. 80.) Schlaffer S. — R. abstehend, schlapp-überhangend; Aeste haarfein, ein wenig rauh, v. der Basis an lang-entblösst, einzeln oder gezweiet; Aehrchen meist 5bth., wehrlos oder begrannt; Achse flümmlich; untere Spelze schwach-5nervig, nicht punktirt; *Fruchtkn. an der Spitze behaart; B. schmal-lineal., oberseits sammtig, die untersten zsgesaltet; Blatthäutchen kurz, abgeschnitten, fast 2lappig.* 4. Auf den Krainer A., (auf dem Loibl.) Juni. Juli. D.

17. *F. SPECTABILIS* (Jan. elench.) Ansehnlicher S. — R. weit-schweifig, überhangend, die untern Aeste gezweiet oder gedreiet, unterwärts nackt; Aestchen rauh; Aehrchen meist 5bth., wehrlos; Achse sehr kurz-fläumlich; *untere Spelze sehr fein-punktirt, deutlich-5nervig*; *Fruchtkn. an der Spitze behaart*; Blätterbüschel unterwärts mit blattlosen, allmählich in B. übergehenden Schuppen bedeckt; *B. verlängert-lineal., flach, gleichfarbig, oberseits rauh*; Blatthäutchen vorgezogen, länglich; W. faserig. 2. An steinigen u. kiesigen O. u. auf der Südseite der A., (in Tyrol und Krain.) Juni. Juli. *F. spadicea* β. *nemorosa* Pollin. D.

18. *F. SPADICEA* (L. syst.) Brauner S. — R. zsgezogen, während der Bthezeit etwas abstehend; Aeste einzeln oder gezweiet und nebst den Aestchen kahl; Aehrchen meist 5bth., wehrlos oder kurz-stachelspitzig; Achse ein wenig rauh; *untere Spelze sehr fein-punktirt, 5nervig, 3 Nerven hervortretend*; *Fruchtkn. an der Spitze behaart*; *B. schmal-lineal., ganz kahl, flach*, die Scheiden der unfruchtbaren, zuletzt zsgerollten Blätterbüschel knorpelig-verdickt, Blatthäutchen eyf., W. faserig, rasig. 2. Auf Triften der höchsten A., (auf der südl. AKette der Schw., in Tyrol, Salzb., Kärnth., Krain.) Juli. Aug. St. h. 86. *Poa Gerardi* All. *Anthoxanthum paniculatum* L. sp. Die Scheiden der unfruchtbaren B.-Büschel stellen scheinbar eine verlängert-kegelf. Zwiebel dar.

19. *F. SYLVATICA* (Vill.) Wald-S. — R. aufrecht, ausgebreitet, sehr ästig; Aeste rauh, die untern zu 2, 3 oder 4; Aehrchen meist 5bth.; Achse ein wenig rauh; obere Spelze verschmälert, sehr spitz, wehrlos, feinpunktirt-rauh, fast 5nervig, 3 Nerven stärker hervortretend; *Fruchtkn. an der Spitze behaart*; Blätterbüschel unterwärts mit blattlosen, allmählich in B. übergehenden Schuppen bedeckt; *B. lanzettl.-lineal., oberseits bläulichgrün, unterseits freudig-grün*, am Rande rauh; Blatthäutchen länglich, stumpf; W. faserig. 2. In schattigen Wäldern, (stw. dch d. Geb.) Juni. Juli. D. fl. 1. 669., mit Ausschl. des Syn. v. Wibel. *F. calamaria* Sm., *F. decidua* Sm. und *F. calamaria* β. Hook. (Explare mit schmälern B. u. 2-3bth. Aehrchen.) *F. calamaria* Host. gr. 4. t. 60. *Poa trinervata* Schrad. Fl. d. t. 1545. *P. sylvatica* Pollich. *Bromus triflorus* Ehrh. Auf feuchtem Boden der höhern Gebirge werden die B. breiter; diese ist nach den Explaren, welche Hoppe an dem Fürstenbrunnen auf dem Untersberge bei Salzburg gesammelt hat, die *Festuca latifolia* Host. und *F. sylvatica* Sternb. Aber diese Abänderung ist kaum als eine Variet. aufzustellen, denn ein lebendes, schmalblättriges Exemplar, aus den Erlanger Waldungen, auf einen fetten Boden des botanischen Gartens verpflanzt, trieb schon im folgenden Jahre breitere B., als die Pflanze vom Untersberge hat. Die W. ist bei dieser Art wirklich faserig und nur selten kommt ein oder der andere fädliche und kurze Ausläufer, wodch sich der Rasen vergrößert, vor, aber die Pflanze kann keineswegs kriechend genannt werden.

20. *F. DRYMEIA* (M. u. Koch.) Forst-S. — R. ausgebreitet, sehr ästig, an der Spitze überhangend; Aeste rauh, die untern zu

2 oder 3; Aehrchen meist 5bth.; Achse etwas rauh; untere Spelze zugespitzt, stachelspitzig, sehr fein-punktirt, 5nervig, 3 Nerven stärker hervortretend; *Fruchtkn. an der Spitze behaart*; Blätterbüschel v. der Basis an beblättert; *B. lanzettl. - lineal., oberseits bläulich-grün, unterseits freudig-grün*, am Rande rauh; Blatthäutchen länglich, stumpf; *W. mit verlängerten, beschuppten Ausläufern kriechend*. 4. In feuchten Gebirgswäldern, (Oestr., Mähr., Böhm.) Juni, Juli. *F. drymeia* M. und Koch., mit Ausschl. des Syn. der *Festuca montana* Sternb. und Hopp., welches zu *Poa hybrida* gehört. *F. sylvatica* Host. gr. t. 78., nicht Vill. *F. montana* Rb., nicht Sternb. *F. exaltata* Presl. Bertol. — Der vorhergeh. zwar sehr ähnlich, aber doch die während der Blthezeit überhangende R., die weniger verschmälerten, kaum rauen Bth., besonders aber die verlängerten, 1-2 Fuss langen, beschuppten Ausläufer, welche die Dicke und Gestalt der Ausläufer der *Carex hirta* haben, verschieden und ohne Zweifel eine sehr ausgezeichnete Art. Ich besitze sie lebend im Garten. D.

21. *F. SCHEUCHZERI* (Gaud.) Scheuchzer's S. — R. abstehend, an der Spitze überhangend; *Aeste kahl*, die untern gezweiet; Aehrchen 4-5bth.; Achse ein wenig rauh; untere Spelze spitz, wehrlos oder unter der Spitze fein-stachelspitzig, rauh, 5nervig; Nerven hervortretend; *Fruchtkn. kahl*; *B. lineal., flach, kahl*; *Blatthäutchen länglich*, stumpf; *W. kriechend, schwach-rasig*. 4. Auf Triften der A., (stw. dch d. AK.) Juli, Aug. St. h. 86. *F. pulchella* Schrad. germ. I. t. 5. f. 5. *F. nutans* Host. gr. 4. t. 61., nicht Wahlenb., die mir unbekannt ist.

22. *F. GIGANTEA* (Vill.) Riesen-S. — R. weit abstehend; *Aeste an der Spitze schlapp-überhangend*; Aehrchen 5-8bth.; Bth. unter der Spitze begrannt; *Grannen schlängelig, noch einmal so lang, als die Spelze*; *Fruchtkn. kahl*; *B. lineal., flach, kahl*; Blatthäutchen sehr kurz. 4. In schattigen Wäldern. Juni, Juli. *Bromus giganteus* L. Schreb. gr. I. t. 11. Var.:

β. *triflorus*, Aehrchen 3bth.; Halm niedriger; *B. schmaler*; *F. triflora* Engl. bot. t. 1918. *Bromus triflorus* L.

23. *F. BOREALIS* (M. u. Koch.) Nördlicher S. — R. ausgebreitet, an der Spitze überhangend, sehr ästig; *Aeste rauh*, meist zu 5; Aehrchen 4-5bth.; Achse ein wenig rauh; *untere Spelze 5nervig, feinpunktirt-rauh*, an der Spitze stumpf, mit 3 stachelspitzigen Zähnchen, *an der Basis mit einem Haarbüschel umgeben*; *Fruchtkn. an der Spitze behaart*; *B. lanzettl. - lineal., am Rande rauh*; Blatthäutchen länglich, abgeschnitten, zerrissen; *W. kriechend*. 4. Im Wasser der Flüsse und Seen, (bei Berlin, in der Spree und Havel und in den damit in Verbindg stehenden Seen; um Stettin; bei der Steinschleuse am Eiderkanal bei Friedrichsort in Holstein.) Juni, Juli. *F. arundinacea* Liljeb., 1792., nicht Schreb., welcher seine *F. arundinacea* schon 1771 beschrieben hat. *F. donacina* Wahlenb. *Donax borealis* Trin. *D. festucaceus* Beauv. *Arundo festucacea* Willd. *Glyceria arundinacea* Fries. nov. fl. suec. mant. 2. S. 8. D.

24. *F. ARUNDINACEA* (Schreb.) Rohrartiger S. — R. ausgebreitet, überhangend; *Aeste* *rauh, gezweiet, verzweigt, 5-15 Aehrchen tragend*; Aehrchen ey-lanzettf., 4-5bth.; untere Spelze unter der Spitze stachelspitzig oder auch wehrlos; *Fruchtkn. kahl*; B. flach, lanzettl.-lineal.; *Blatthäutchen sehr kurz*. 4. In Wiesengebüsch, an Ufern. Juni. Juli. *F. elatior* Sm. *F. spadicea* Mönch. *Bromus arundinaceus* Roth. *B. littoreus* Retz. Host. gr. 1. t. 8. *B. elatior* Spreng. *Poa Phoenix* Scop.

Die *Festuca decolorans* M. u. K. Deutschl. fl. 1. S. 663, Koch Synops. ed. 1. ist nichts Anderes, als die *Festuca arundinacea* Schreber mit sehr feinen Theilchen von kohlen saurem Kalk überzogen, einem Niederschlag aus dem Wasserdunst des Staubbaches, eines Flusses im Lanterbrunner Thale im C. Bern, Guthnik. — „Cette plante n'est autre chose, que *Festuca arundinacea* recouverte d'un enduit calcaire faisant evervescence avec l'acide nitrique, et déposé par l'eau en poussière, qui mouille continuellement la place ou cette plante croit.“ v. Charpentier auf dem Zettelchen des mir gefälligst mitgetheilten Exempl.

25. *F. ELATIOR* (L.) Höherer S. — R. einerseitswendig, zsggezogen, während der Bthezeit abstehend; *Aeste* *rauh, gezweiet, der eine davon sehr kurz und 1 Aehrchen, der zweite traubig und 3-4 Aehrchen tragend*; Aehrchen lineal., 5-10bth.; Klappen stumpf; untere Spelze 5nervig, an der Spitze gezähnel, wehrlos oder unter der Spitze stachelspitzig; *Fruchtkn. kahl*; B. flach, lanzettl.-lineal.; *Blatthäutchen sehr kurz*. 4. Auf fruchtb. Wiesen. Juni. Juli. *F. pratensis* Huds. *Bromus elatior* Koel. *Poa curvata* Koel., eine niedrige Form.

26. *F. LOLIACEA* (Huds.) Lolchartiger S. — *Tr. 2zeilig*, etwas überhangend; *Aehrchen* lineal.-länglich, *wechselst., entfernt*, die untern kurz-gestielt, bisweilen gezweiet, die obern sitzend; *B. flach, lanzettl.-lineal.* 4. Auf fruchtb. Wiesen, (stw. dch d. Geb.) Mai. Juni. *F. elongata* Ehrh. *F. adscendens* Retz. *F. Phoenix* Thuill. *Lolium festucaceum* Link. — Die Aehrchen, wie bei der vorhergeh. Art, aber die Pfl. hat den Habitus von *Lolium perenne*, von dem sie sich dch die deutlich-gestielten, untern Aehrchen, welche mit einer untern Klappe versehen und nicht 1klappig sind und dch die obere Klappe, welche nicht länger ist, als die Bthe, an welcher sie anliegt, unterscheidet. An den obern Aehrchen fehlt oft die untere Klappe, oder sie ist zwar vorhanden, aber klein und in 2 gesonderte gespalten. — Die *F. loliacea* ist nach meiner Ansicht eine gute Art; sie ist nicht gemein, aber wo sie vorkommt, erscheint sie meist zahlreich, und man wird sie daselbst mit verwandten Pfl. nicht verwechseln.

55. *BRACHYPODIUM* (Palisot. de Beauv. agr. t. 19. f. 3.) Zwenke. — Obere Spelze am Rande mit steifen Börstchen kammf. gewimpert, sonst Alles, wie bei *Festuca*. N. v. E. gen. 14. 16., mit Ausschl. v. *Nardurus*.

1. **B. SYLVATICUM** (Röm. u. S.) Wald-Z. — Aehre 2zeilig, überhängend; *Aehrchen* zahlreich, begrannt; *Grannen der obern Bthen länger, als die Spelze*; B. flach, lanzettl.-lineal., schlapp; W. faserig. 4. In Wäldern und in Gebüsch. Juli. Aug. *Festuca sylvatica* Huds. (der älteste Name.) *Bromus pinnatus* β. L. *B. sylvaticus* Pollich. *B. dumosus* Vill. *B. gracilis* Weig. *Festuca gracilis* Mönch. meth. *Triticum sylvaticum* Mönch. hass. *T. terefillorum* Wib.

2. **B. PINNATUM** (Beauv.) Gefiederte Z. — Aehre 2zeilig, aufrecht oder ein wenig überhängend; *Aehrchen* zahlreich, begrannt; *Grannen kürzer, als die Spelze*; B. flach, lineal. oder lanzettl.-lineal., ziemlich steif; W. kriechend. 4. Auf sonnigen, unkult. Hügeln, an steinigen, buschigen O. Juni. Juli. *Bromus pinnatus* L. *Festuca pinnata* Mönch. meth. *Triticum pinnatum* Mönch. hass. *T. bromoides* Wib. Kommt mit kürzern und verlängerten und wie ein Horn gekrümmten, zottigen, rauhen oder kahlen Aehrchen vor; und ferner:

α. vulgare, Aehrchen rauh oder zottig, gerade oder gekrümmt. Rb. ic. II. f. 1376.

β. rupestre, Aehrchen wie die der Variet. *α.*, aber kahl; nicht selten auch verlängert und fast sichelf.: *B. pinnatum* β. Gand. *B. rupestre* Röm. und S. *Bromus rupestris* Host. gr. 4. t. 7. *B. corniculatus* Lam. *Triticum pinnatum* γ. DC.

γ. caespitosum, Aehrchen kleiner, kahl, gerade oder fast sichelf.; B. schmaler; *B. caespitosum* R. u. S. *Bromus caespitosus* Host. gr. 4. t. 18. *Triticum gracile* DC. Fl. fr. 3. *T. pinnatum* β. DC. suppl. Ausser den schmälern B. und kleinern Aehrchen kann ich keinen wesentlichen Unterschied zw. dieser und der vorhergeh. Variet. auffinden; ich besitze die Pflanze lebend aus dem Wiener Garten.

3. **B. RAMOSUM** (Röm. u. S.) Aestige Z. — Aehre aufrecht, aus 2-5 Aehrchen zsgesetzt; Bth. begrannt; *Grannen kürzer, als die Spelze*; B. abstehend, zsgerollt sehr schmal, bläulichgrün, steif; Halme an der Basis sehr ästig. 4. An trocknen, felsigen O. In Istrien. Juni. *B. Plukenetii* Link. *Bromus ramosus* L. Host. *B. Plukenetii* All. Host. gr. t. 19. *Festuca caespitosa* Desf. atl. I. t. 24. f. 1. *Triticum caespitosum* DC. — Die bei Nizza gesammelten Explare, (v. DC. u. Balbis erhalten,) stimmen in Allem ganz genau mit denjenigen überein, welche mir Biasoletto, von ihm selbst in Istrien gesammelt, mittheilte. Var.: J.

β. phoenicoides, Halm weniger ästig, B. mehr aufrecht; Aehre aus mehreren Aehrchen zsgesetzt. *Triticum phoenicoides* DC. fl. fr. und nach einem von dem berühmten Autor selbst erhaltenen Expl., und wahrscheinlich auch Linne's in der mant. Sonder fand im südl. Frankreich Expl., welche zwischen der Variet. *α.* und *β.* die Mitte halten, und theilte mir dieselben freundlichst mit. *Festuca* n. 5. Gerard. gallo-provinc. gehört zur Variet. *γ.* von *Brachypodium pinnatum*.

1. **B. DISTACHYON** (Röm. u. S.) Zweijährige Z. — *Aehrchen 1-3, end- und wechselst.*, 6-12bth., begrannt; *Grannen länger, als die Spelze*; Halm kahl; B. flach; W. faserig. ☉. An kultiv. O., Wegen, (Triest, Istrien und bei Fiume.) Mai. St. h. 86. *Bromus distachyos* L. *Festuca diandra* Mönch. *F. monostachya* Poir. Desf. atl. I. t. 24. f. 2. *F. ciliata* Gouan. *Triticum ciliatum* DC. *Trachynia distachya* Link. Rb. ic. II. f. 1368. J.

56. **BROMUS** (L.) Tresne. — Balg 2klappig, vielbth.; Klappen kürzer, als die nächste Bthe. Bthe 2spelzig; untere Spelze unter der Spitze begrannt; Granne gerade oder zurückgekrümmt. Fruchtkn. an der Spitze behaart, auf der vordern Seite oberhalb der Mitte die Gf. tragend. Gf. kurz. N. federig, gegen die Basis der Bthe hervortretend.

Der *Bromus asper*, *B. erectus* und *B. inermis* reihen sich, nachdem man das schöne Kennzeichen der Einfügung der N. entdeckt hat, sehr passend wieder in die Gattung *Bromus* ein.

1. Rotte. **LIBERTIA** Weihe. Untere Spelze beiderseits unterhalb der Mitte mit einem Anhängsel, aus einem eyf., häutigen Zahne bestehend, versehen, 7-9-nervig, die 2 randst. Nerven genäherter.

1. **B. ARDUENNENSIS** (Kunth.) Ardennen-T. — R. abstehend, zuletzt überhangend; Bth. aus eyf. Basis verschmälert; *untere Spelze 9nervig, am Rande unterhalb der Mitte beiderseits mit einem Anhängsel, aus einem eyf., häutigen Zahne bestehend, versehen.* ☉. Unter der Saat, (bisher blos bei Aiwaille in den zu der Provinz Lüttich gehörigen Ardennen beobachtet, wo sie von dem bot. Gärtner Michel entdeckt wurde.) Juni. Juli. *Libertia arduennensis* Lejenn. in den neuen Acten des leop.-car. acad. B. 12. 2. t. 63. *Calotheca bromoidea* Lej. *Michelaria bromoidea* Dumort. agrost. t. 16. *Bromus multiflorus* β. Rb. Der ganze Bau der Aehrchen und Blüten weicht von dem *Bromus secalinus*, (dem *multiflorus*.) weit ab, und ganz sicherlich entsteht aus dem Samen jenes nicht diese Pflanze. Sie verträgt unsern Winter nicht gut und geht oft im bot. Garten zu Erlangen zu Grunde. D.

11. Rotte. **SERRAFALCUS** PARLATORE. **BROMI SECALINI** Bertol. fl. ital. I. 654. Aehrchen, auch nach dem Verblühen, nach der Spitze zu schmaler. Untere Klappe 3-5nervig, obere 5-vielnervig. Obere Spelze mit steifen Borsten entfernt-kammf.-gewimpert.

2. **SECALINUS** (L.) Roggen-T. — R. abstehend, nach dem Verblühen überhangend; Aehrchen länglich; *Bthen* breit-elliptisch, *die fruchthragenden am Rande zugezogen, stielrund, sich nicht deckend*; *untere Spelze 7nervig, am Rande abgerundet, so lang, als die obere*; Granne hervorgestreckt, schlängelich, oder ziemlich gerade; Scheiden kahl. ☉. Auf Aeckern unter der Saat. Juni. Juli. Var.:

α. *grossus*, Aehrchen grösser, kahl oder rauh: *B. grossus* β. Gaud. *B. grossus* α. D. fl. I. 680.

β. velutinus, Aehrchen grösser, kurzh.-sammtig: *B. grossus* α. Gaud. *B. grossus* β. u. γ. D. fl. a. a. O. *B. grossus* DC. Gmel. bad. 4. t. 2. *B. velutinus* Schrad. l. t. 6. f. 3. *B. multiflorus* Smith.

γ. vulgaris, Aehrchen kleiner, kahl oder rauh: *B. secalinus* Schrad. Leers herb. t. 11. f. 2. D. fl. l. 679., wenn die Aehrchen kahl und die Grannen kurz und bemerklich-schlingelig sind; wenn aber die Grannen länger werden und die Länge der Bth. erreichen, so entsteht: *Bromus elongatus* Gaud., nach einem Explan v. Autor selbst.

δ. hordaceus Gmelin, Aehrchen kleiner, flaumig oder kurzh.: *B. hordaceus* Gmel. bad. 4. t. 1., wenn zugleich die Aehrchen von sehr kurzen Haaren flaumig und die Grannen fast so lang, als die Spelzen sind, und *B. badensis* Gmel. a. a. O. t. 5., wenn die Aehrchen von kurzen Haaren kurzh.-sammtig erscheinen. *Bromus hordaceus* Fries ist eine andere, mir nicht hinlänglich bekannte Pflanze.

3. *B. COMMUTATUS* (Schrad.) Verwechselfte T. — *R.* abste-
hend, zuletzt überhangend; Aehrchen länglich-lanzettl., kahl;
Bth. elliptisch-länglich, die fruchttragenden am Rande sich dachig
deckend; untere Spelze 7nervig, am Rande oberhalb der Mitte
in einem stumpfen Winkel hervortretend, bemerklich länger, als
die obere; Grannen gerade hervorgestreckt, fast von der Länge
ihrer Spelze; die untern Scheiden behaart. ☉. Unter der Saat
und auf Triften, (südl. Hanov. und nördl. Thüringen, Bezirke von
Göttingen, Hildesheim, Braunschw., Magdeburg und bis an den
Harz; Oberbaden, Schweiz.) Mai Juni. Rh. ic. 11. f. 1589. Zu
dieser Art gehört der *B. simplex* Gaud. agrost., welcher später
in der Fl. helv. mit *B. racemosus* verbunden wurde. Sie untersch.
sich von *B. secalinus* dch die fruchttragenden, sich mit dem Rande
dachig-deckenden Bthen, die untere Spelze, welche bemerklich
länger, als die obere ist, dch dünnere Bthstiele und zottige untere
Scheiden; von *B. racemosus* dch die längere, und wenn man sie
ausbreitet, längl.-eyf. untere Spelze mit einem oberhalb seiner
Mitte in einem stumpfen Winkel hervortretenden Rande, entfernter
von der Spitze eingefügte Grannen und die lineal.-längliche obere
Spelze, welche an ihren fast gleichlaufenden Rändern nur an der
Basis verschmälert ist, (bei *B. racemosus* ist die untere Spelze,
wenn man sie ausbreitet, breit-eyf., mit abgerundeten Rändern,
die obere lineal.-verkehrteyf.) von *B. patulus*, der übrigens dem
B. arvensis viel ähnlicher ist, als dem *B. commutatus*, dch die
breiteren, bei der Fruchtreife am Rande dicht-dachig sich decken-
den, niemals zugerollten Bthen und dch die geraden Grannen.
Ich ziehe die Pfl. nun mehrere Jahre hindurch im Garten, wo sie
sich dch die Aussaat unverändert fortpflanzt. Sie zeigte sich
durchaus immer 2jährig. Die Stbk. des *B. commutatus* sind um
ein Drittel kürzer, als beim *Bromus racemosus*.

4. *B. RACEMOSUS* (L.) Traubige T. — *R.* abste-
hend, etwas überhangend, nach dem Verblühen zugezogen; Aehr-
chen eyf.-länglich, kahl; Bthen breit-elliptisch, die fruchttragen-

den am Rande sich dachig deckend; untere *Spelze* 7nervig, am Rande abgerundet, bemerklich länger, als die obere; *Grannen* gerade hervorgestreckt, fast von der Länge ihrer *Spelze*; die untern Scheiden behaart. ☉. Auf Wiesen und Triften. Mai. Juni. Rb. ic. II. f. 1590. *B. pratensis* Ehrh. *B. multiflorus* Roth. Die Pfl. ist 2jährig, wie ich aus deren Zucht ersah.

5. *B. mollis* (L.) Weichhaarige T. — *R. aufrecht*, nach dem Verblühen *zsgezogen*; Aehrchen eyf.-länglich, weich-behaart, seltner fast kahl; Bthen breit-elliptisch, die fruchtttragenden am Rande dachig sich deckend; untere *Spelze* 7nervig, am Rande oberhalb der Mitte in einem stumpfen Winkel hervortretend, bemerklich länger, als die obere; *Grannen* geradehervorgestreckt, fast v. der Länge ihrer *Spelze*; Scheiden nebst den B. behaart. ☉. Auf Wiesen, an Wegen. Mai. Juni. Leers herb. t. II. f. 1. Var. mit grösserer, ausgebreiteterer und kleinerer und mehr *zsge*drängter *R.* und selten mit kahlen Aehrchen, welche nur auf den Nerven dch ganz kurze Härchen etwas rauh sind. — Den *B. nanus* Weig. obs. 8. t. I. f. 9. stellen zwergartige Explare dar.

6. *B. confertus* (MBieb.) Gedrungenrispige T. — *R. gedrungen*, *aufrecht*, nach dem Verblühen *zsgezogen*; Aehrchen eyf.-länglich, rauh, oder weich-behaart; Bth. elliptisch, bei der Fruchtreife am Rande sich dachig-deckend; untere *Spelze* 7nervig, bemerklich länger, als die obere; *Grannen* im getrockneten Zustande gewunden und gebogen, fast von der Länge ihrer *Spelze*; Scheiden nebst den B. behaart. ☉. Unter der Saat in Istrien. Mai. Juni. *B. confertus* Rb. ic. II. f. 1593., ein nicht hinlänglich entwickeltes Explar, mit geraden *Grannen* gezeichnet. *B. intermedius* Guss. *B. erectus* Moris. stirp. sard. fasc. 1. *B. alopecuroides* Moris. fasc. 2. Varietäten mit rauen und zottigen Aehrchen beobachtete schon M. Bieberstein; vergl. Fl. taurico-caucas. 3. p. 78.

J.

7. *B. brachystachys* (Hornung bot. Ztg. 16. 2. t. 8.) Kurzährige T. — *R. aufrecht-abstehend*, nach dem Verblühen *unverändert*; Aehrchen ey-lanzettf. oder eyf.; Bth. fast rautenf., bei der Fruchtreife am Rande dachig sich deckend; untere *Spelze* 7nervig, am Rande oberhalb der Mitte in einem stumpfen Winkel hervortretend, die obere fast so lang, als die untere; Granne gerade-hervorgestreckt, halb so lang, als die Bth.; die untern Blattscheiden behaart. ☉. Auf Ackerrainen bei Aschersleben in der Provinz Magdeburg. Juni. Aehrchen kahl. In unserm Garten ist die Pfl. streng 2jährig, bleibt beständig und verliert dch die Cultur weder ihren Habitus, noch ihre Merkmale. Kann mit *B. arvensis*, *patulus* und *mollis* verglichen werden; von letzterem untersch. sie sich ausser dem Ueherzuge dch die nach dem Verblühen nicht *zsgezogene R.*, die verlängerten Aeste derselben, die an den untern Quirlen zu 6, bei grössern Explaren zu 12 und mehreren vorhanden sind, dch gleichlange *Spelzen*, und lineal., noch einmal so lange Stbk.; v. *B. arvensis* dch die 2jährige W.,

die steifere R., die stärkern Aeste, kürzern und breitem Bth. und die *verkehrteyf.-längliche Karyospe.*, die *ein wenig länger ist, als die Spelzen*, bei *B. arvensis* aber lineal. und um den 1ten Theil kürzer ist, als diese; v. *B. patulus* dch dieselben Merkmale und die fast gleichen Spelzen. Vgl. Hornung a. a. O. p. 418. D.

8. *B. ARVENSIS* (L.) Acker-T. — *R. abstehend*, aufrecht, bei der Fruchtreife etwas überhangend; Aehrchen lineal.-lanzettl.; Bth. elliptisch-lanzettl., die fruchttrag. am Rande dachig sich deckend; untere Spelze 7nervig, am Rande oberhalb der Mitte in einem stumpfen Winkel hervortretend, die obere ohngefähr so lang, als die untere; Grannen gerade-hervorgestreckt, fast von der Länge der Spelze, im trocknen Zustande manchmal auswärtsgebogen; Scheiden nebst den B. behaart. ☉. Auf Aeckern unter der Saat. Juni. Juli. Leers herborn. t. 11. f. 3. *B. versicolor* Pollich. *B. multiflorus* Weig. obs. 2. t. 1. f. 1.

9. *B. PATULUS* (M. u. Koch.) Abstehehendbegrannte T. — *R. abstehend*, nach dem Verblühen 1seitig-überhangend; Aehrchen lanzettl.; Bth. elliptisch-lanzettl., bei der Fruchtreife etwas entfernt; untere Spelze 7nervig, am Rande oberhalb der Mitte in einem stumpfen Winkel hervortretend, bemerklich länger, als die obere; Grannen bei der Reife spreitzend-zurückgebogen; Scheiden nebst den B. behaart. ☉. Unter der 2jährigen Saat, (stw. dch d. Geb., die Standörter sind nicht genau auszumitteln, weil die Pflanze überall mit *B. commutatus* verwechselt wurde.) Mai. Rh. ic. 11. f. 1588. *B. commutatus* Koch und Ziz., nicht Schrad. *B. multiflorus* Host. gr. 1. t. 11., nicht Weigel. Im Garten ist die Pfl. genau 2jährig und hängt schon mit reifen Früchten beladen über, wenn *B. arvensis* erst zu blühen anfängt, welcher in unserm Garten immer jährig ist. Die Stbk. 3mal kürzer, als bei *B. arvensis* und die untere Spelze immer augenfällig kürzer, als die obere. Var. mit kahlen Aehrchen, und

β. velutinus, Aehrchen weich-behaart: *B. patulus β.* M. und Koch.

10. *B. SQUARROSUS* (L.) Sparrige T. — *R. abstehend und schlapp überhangend*; Aehrchen länglich-lanzettl.; Bth. breit-elliptisch, die fruchttragenden am Rande dachig sich deckend; untere Spelze 7nervig, am Rande oberhalb der Mitte mit einem stumpfen Winkel hervortretend, bemerklich länger, als die untere; Grannen im getrockneten Zustande zsgedreht-spreitzend. ☉. Auf Brachäckern und in Weinbergen, (südl. Schw., Südttyrol, Littor., Steyern, auch selten in Oberbad., bei Crenzach und Wyl in der Gegend von Basel.) Mai. Juni. Var. mit kahlen Aehrchen, und

β. villosus, Aehrchen weich-behaart: *B. squarrosus β.* D. fl. *B. squarrosus* Host. gr. 1. t. 13. *B. villosus* Gmel. *B. hirsutus* Schrank.

III. Rotte. *BROMI VIRIDISSIMI* Bertol. fl. ital. 1. 676. Aehrchen, auch die verblüheten, nach der Spitze hin schmaler. Untere Klappe 1-, obere 3nervig. Obere Spelze am Rande dch sehr kurze Haare baumlich.

11. **B. ASPER** (Murr.) Rauhe T. — *R. üstig, schlapp-überhängend*; Aehrchen lineal.-lanzettl., 7-9bth.; Bth. lineal.-lanzettl., spitz; untere *Spelze* aus sehr kurz-2zähliger Spitze begrannt und länger, als die Granne, 5nervig, die 2 mittlern Nerven schwach ausgedrückt, *die obere Spelze am Rande fein-flaumig-gewimpert*; die untern Scheiden nebst den B. rauhh. 4. In Wäldern, besonders in gebirgigen. Juni. Juli. *B. ramosus* Morr., nicht L. *B. nemoralis* Huds. *B. nemorosus* Vill. *B. hirsutus* Curt. *B. montanus* Pollich. *B. montanus* und *asper* Gmel.

12. **B. ERECTUS** (Huds.) Aufrechte T. — *R. gleich, aufrecht*; die untern Aeste zu 3 und 6; Aehrchen lineal.-lanzettl.; Bth. lanzettl.; untere *Spelze* an der Spitze sehr kurz-2zählige, aus der Ausrandg begrannt und länger, als die Granne, 5-7nervig, *die obere am Rande fein-flaumig-gewimpert*; WB. schmaler, am Rande *gewimpert*. 4. Auf unkultiv., sonnigen Hügeln, trocknen Wiesen, an Ackerrändern. Mai. Juni. *B. agrestis* All. Host. gr. I. t. 10. *B. perennis* Vill. *B. angustifolius* Schrank. *B. montanus* Fl. wett. *B. arvensis* Pollich. *B. pseudoarvensis* Koel. *Festuca montana* Savi pis. D. fl. I. 673.

13. **B. INERMIS** (Leyser.) Wehrlose T. — *R. gleich, aufrecht*; die untern Aeste zu 3 und 6; Aehrchen lineal.-lanzettl.; Bth. lanzettl.; untere *Spelze* an der Spitze sehr kurz-2zählige, aus der Ausrandung stachelspitzig oder kurz-begrannt, 5-7nervig, *die obere am Rande fein-flaumig-gewimpert*; *B. kahl*. 4. Auf unkultiv. Hügeln, an Wiesenrändern, Wegen. Juni. Juli. *B. inermis* L. Schreb. gr. I. t. 13. *Festuca inermis* DC. fl. fr. D. fl. I. 674. *F. speciosa* Schreb. *F. Leysseri* Mönch.

IV. Rotte. **BROMI GENUINI**. Aehrchen oberwärts breiter. Untere Klappe 1, obere 3nervig. Obere Spelze mit starren Borsten kammf.-gewimpert.

14. **B. STERILIS** (L.) Taube T. — *R. locker, zuletzt überhängend*; Aeste verlängert, an der Spitze hängend; Aehrchen länglich, oberwärts breiter; Bthen lineal.-pfriemlich; untere Spelze aus 2th. Spitze begrannt; Grannen gerade, länger, als die Spelze; obere Spelze kammf.-gewimpert; *Halm kahl*. ☉. An kultiv. O., Wegen, auf Schutthäufen. Mai und den ganzen Sommer hindurch. Leers herb. t. II. f. 4.

15. **B. TECTORUM** (L.) Dach-T. — *R. hängend, fast einerseitswendig*; Aehrchen lineal., zuletzt oberwärts breiter; Bthen lanzettl.-pfriemlich; untere Spelze aus 2th. Spitze begrannt; Grannen gerade, so lang, als die Spelze; obere Spelze kammf.-gewimpert; *Halm an der Spitze flaumig*. ☉. Auf Aeckern, Feldern, Mauern. Mai. Juni. Leers herborn. t. 10. f. 2.

16. **B. RIGIDUS** (Roth. in Röm. und Ust. ann.) Steife T. — *R. nebst den Bthstielen aufrecht*; Aehrchen länglich, oberwärts breiter; Bthen lanzettl., verschmälert-spitz; untere Spelze unterhalb der, bis zur Mitte 2sp. Spitze begrannt; Grannen gerade, länger, als die Spelze; obere Spelze kammf.-gewimpert; *Halm*

oberwärts flaumig. ☉. An kultiv. O., Wegen, in Weinbergen, (im östr. Littor. und in Istrien.) Mai. Juni. Schrader. germ. S. 367. B. rubens Host. gr. I. t. 18. Unterscheidet sich vom folgenden durch „ganz einfache kürzere Rispenäste, lineal.-lanzettl., etwas angeschwollene Aehrchen, weit bemerklichere Grösse der Bälge, namentlich des äussern Kelch- und Korollen-Balges, doch Grannen, welche länger, als der Balg sind, sowie doch die weichen Zotten, womit Spindel, Äeste, (die bei B. madritensis immer nackt und rauh erscheinen,) sowie alle übrigen Theile der Pfl. überzogen sind.“ Schrader. Näher verwandt ist der B. rigidus mit B. maximus Desf., von dem er sich unterscheidet durch eine mehr zugezogene R., kürzer gestielte Aehrchen und den Halm, der oberwärts sowie die Spindel und die Stielchen mit kurzen Zotten überzogen sind. Die Aehrchen sind nur ein wenig kleiner, und die Grannen $1\frac{1}{2}$ oder noch einmal so lang, als ihre Spelze. Die untere Spelze der untersten Bthe misst 10-14 Linien, die Granne $1\frac{1}{2}$ -2 Zoll. Hierher scheint B. maximus? Babingt. man S. 374. zu gehören.

17. B. DIANDRUS (Curt. fl. lond. fasc. 6. t. 5.) Zweimännige T. — R. *nebst den Bthenstielen aufrecht*; Aehrchen lineal.-länglich, *oberwärts breiter*; Bth. lanzettl.-pfriemlich; untere Spelze unterhalb der fast bis zur Mitte 2sp. Spitze begrannt; Grannen gerade, so lang, als die Spelze; *Halm kahl.* ☉. An kultiv. O., Wegen, (Oestr., Littor. und südl. Tyrol.) Mai. Juni. B. diandrus Smith engl. fl. B. gynandrus Roth in Roem. und Usteri ann. B. madritensis Koch Synops. ed. I., Host. gr. I. t. 17., Schrader. germ. Lin. spec. was den Stand O. „England“ betrifft. B. scaberrimus Bertoloni fl. ital., nach Expl. vom Autor selbst; die englischen Expl. vom Fusse des Felsen St. Vincent bei Bristol in England stimmen genau mit den erwähnten italienischen überein. — Den Namen B. madritensis wollte ich, weil er zweifelhaft geworden, nicht mehr voranstellen. D.

XIV. Gruppe. HORDEACEEN. Kunth. enum. I. 435. *Aehrchen 2-viellbth., an den Ausschnitten der Spindel sitzend; Bthenstielchen fehlend.* Die endst. Bthe oft verkümmern. Gf. sehr kurz oder fehlend. *Narben federig, aus der Basis der Bth. beiderseits hervortretend.*

57. GAUDINIA (Palisot. de Beauv. agr. t. 19. f. 5.) Gaudinie. — Aehrchen einzeln, auf den Ausschnitten der Spindel sitzend, mit der Spindel gleichlaufend, (mit der Seite gegen die Spindel gerichtet.) Balg 2klappig, 4-7 bth. Bälglein 2spelzig, untere Spelze auf dem Rücken begrannt; Granne an der Basis gewunden.

1. G. FRAGILIS (Beauv. a. n. O.) Zerbrechliche G. — Aehre gegliedert, an den Gelenken zerbrechlich. ☉. An unkultiv. O., (Istrien, im C. Waadt der Schw. und auf einer Wiese bei Eppendorf unweit Hamburg, Insel Sansego bei Istrien.) Juni. Avena fragilis L. Schreb. gram. I. t. 24. f. 3.

58. TRITICUM (L.) Weizen. — Aehrchen einzeln, auf den Ausschnitten der Spindel sitzend, mit der Spindel gleichlaufend,

(mit der Seite gegen die Spindel gerichtet.) Balz 2klappig, 3-vielbth.; Klappen gekielt, spitz oder stachelspitzig. Bälglein 2spelzig, untere Spelze aus der Spitze begrannt oder wehrlos.

1. Rotte. CEREALIEN, *Getreide*. Aehrchen mehr oder weniger bauchig-gedunsen. Klappen eyf. oder länglich.

1. T. VULGARE (Vill.) Gemeiner W. — *Aehre 4seitig*, dachig; Spindel zähe; Aehrchen meist 4bth.; *Klappen bauchig*, eyf., abgeschnitten, stachelspitzig, *unter der Spitze zsgedrückt*, auf dem Rücken abgerundet-konvex, d. Nerve stumpf-hervortretend; Früchte frei. ☉. und ☉. Wird kultiv. Juni. Juli. Metzger europ. Cereal. t. 1. und 2. Var. mit begrannter Aehre, (T. aestivum L.) mit fast wehrloser, (T. hybernum L.) mit weisser, brauner und schwarzer, kahler und sammtiger Aehre. Kultiv.

2. T. TURGIDUM (L.) Englischer W. — *Aehre 4seitig*, dachig; Spindel zähe; Aehrchen meist 4bth.; *Klappen bauchig*, eyf., abgeschnitten, stachelspitzig *gekielt*, d. Kiel der ganzen Länge nach hervortretend, *fast flügel.*; Früchte frei. ☉. und ☉. Wird kultiv. Juni. Juli. Metzger europ. Cereal. t. 3. Var., wie der vorhergeh.; und ausserdem mit zsgesetzter Aehre: T. compositum L. — Unterscheidet sich v. dem vorhergeh. dch den, auch auf dem Rücken der Klappe stark hervortretenden Kiel. Kultiv.

3. T. DURUM (Desf.) Hartsamiger W. — *Aehre 4seitig*, dachig; Spindel zähe; Aehrchen meist 4bth.; *Klappen bauchig*, *länglich*, *3mal so lang, als breit*, breit-stachelspitzig, *gekielt*, d. Kiel der ganzen Länge nach hervortretend, *fast flügel.*; Früchte frei. ☉. und ☉. Wird hier und da in der Schweiz um Bern kult. Juni. Juli. Metzger europ. Cereal. t. 4. T. hordeiforme Host. gr. 4. t. 5. Klappen 3mal so lang, als breit, sonst Alles, wie bei dem Englischen Weizen. Kultiv.

4. T. POLONICUM (L.) Polnischer W. — *Aehre unregelmässig-4seitig oder zsgedrückt*; Spindel zähe; Aehrchen meist 3bth.; *Klappen etwas bauchig*, *länglich-lanzettl.*, *papierartig-krautig*, *deutlich-vielnervig*, auf dem Rücken gekielt, an der Spitze kurz-2zählig, der vordere Zahn schwach; Früchte frei. ☉. und ☉. Wird hier und da in der südl. Schw. kultiv. Juli. Aug. Metzger europ. Cereal. t. 5. und 6. Kultiv.

5. T. SPELTA (L.) Dinkel-W. — *Aehre vierseitig und fast gleichseitig*, parallel-zsgedrückt, locker-dachig; *Spindel zerbrechlich*; Aehrchen meist 4bth.; *Klappen breit-eyf.*, *abgeschnitten*, *2-zählig*, der Zahn am Kielende gerade, *der vordere schwach*; Früchte beschalt. ☉. Wird auf Lehm- und Kalkboden überall kultiv. Juni. Juli. Var. in der Farbe und dem Ueberzuge der Aehren, wie T. vulgare. D. fl. t. 699. Metzger europ. Cereal. t. 6. Kultiv.

6. T. DICOCUM (Schrank.) Ehmer W. — *Aehre v. der Seite her zsgedrückt*, dicht-dachig; *Spindel zerbrechlich*; Aehrchen meist

4bth.; Klappen schief-abgeschnitten, gezähnt-stachelspitzig, d. *Kiel zsgedrückt, sehr hervortretend*, oberwärts mit dem Zahne der Spitze einwärtsgehogen; Früchte beschalt. ☉. und ☉. Wird kult. Juni. Juli. T. amyleum Sering. Metzg. europ. Cereal. t. 7. T. tricoccum Schübl. bot. Ztg. 3. 2. t. 1. und 2. Kultiv.

7. T. MONOCOCCUM (L.) Einkörniger W. — Aehre v. der Seite her zsgedrückt, dicht-dachig; *Spindel zerbrechlich*; Aehrchen meist 3bth.; *Klappen an der Spitze 2zählig, Zähne spitz* und nebst der Spitze des Kieles *gerade*; Früchte beschalt. ☉. und ☉. Wird in Gebirgsgegenden auf magerem Boden, wo T. Spelta nicht fortkommt, kultiv. Juni. Juli. Host. gr. 3. t. 22. Metzg. europ. Cereal. t. 17. Kultiv.

8. T. VILLOSUM (MBieb.) Zottiger W. — Aehre 2zeilig; *Aehrchen* meist 4bth.; Klappen keilig, abgeschnitten, begrannt und nebst der Spindel *büschelig-behaart*; B. knötig-haarig. ☉. Unter der Saat (in Istrien und Fiume.) Mai. Juni. Secale villosus L. Host. gr. 2. t. 48. Im Garten immer ☉. J.

H. Rotte. AGROPYRA. *Hundswitzen*. Aehrchen nicht bauchig-gedunsen. Klappen lanzettl. oder lineal.-länglich, an der Spitze gerade und nicht auswärtsgehogen. N. v. E. gen. 13. 17.

a. Die Nerven der Blätter oberseits mit zahlreichen Reihen sehr kurzer Haare dicht-besetzt.

9. T. JUNCUM (L.) Binsen-W. — Aehre 2zeilig; Aehrchen 5-8bth., entfernt; *Klappen lineal.-lanzettl., 9-11nervig*, stumpf, um den dritten Theil kürzer, als das Aehrchen; Bthen ziemlich stumpf, wehrlos; B. *oberseits weich und sehr dicht- und sehr kurz-sammtig*; Spindel kahl; W. weit-kriechend. 4. An sandigen Meeresufern, (an den nördl. und südl. Seeküsten.) Juni-Aug. Host. gr. 3. t. 33. T. farctum Viv. frag. I. t. 26. Agropyrum juncum Beauv. D.

10. T. STRICTUM (Dethard.) Steifer W. — Aehre 2zeilig; Aehrchen 5bth., genähert; *Klappen lineal.-lanzettl., kahl, 5nervig*, spitz, länger, als das halbe Aehrchen; Bth. stumpf, wehrlos, v. der Basis an bis oberhalb der Mitte nebst der Achse behaart; Spindel am Rande rau; B. *oberseits sehr dicht- und sehr kurz-sammtig und dabei ein wenig rau*; W. weit-kriechend. 4. An sandigen, im Winter vom Meerwasser überschwenmt gewesenen O. bei Warnemünde. Juni. Juli. T. acutum d. strictum D. fl. l. 703. Halm dick, steif, aufrecht. D.

11. T. ACUTUM (DC.) Spitzer W. — Aehre 2zeilig; Aehrchen 5-8bth., genähert; Klappen lineal.-lanzettl., 7nervig, spitz oder stumpflich, um den dritten Theil kürzer, als das Aehrchen; Bthen spitz oder stumpflich, wehrlos oder kurz-begrannt, kahl; Spindel meist kahl; B. *oberseits mit spitzen Pünktchen sehr dicht-besetzt*, rau; W. weit-kriechend. 4. Am sandigen Meeresstrande, (an der Seeküste bei Triest und der Insel Norderney.) Juni. Jull. Var. mit am Rande rauher u mit auf dem Rücken zottiger Spindel.

Die Art von *Triticum*, welche unter dem Namen *Triticum affine* in den Sammlungen aufbewahrt wird, halte ich für einerlei mit *T. acutum*. *T. laxum* Fries herb. norm. ist wahrscheinlich nur eine Variet. mit flatterigeren B. D.

b. Blattnerveu oberseits mit einer einfachen Reihe sehr kleiner Stacheln oder Borstchen besetzt und dadurch rauh.

12. *T. RIGIDUM* (Schrad.) Steifer W. — Aehre 2zeilig; Aehrchen 5-10bth., die untern entfernt, die obern genähert; *Klappen* länglich, 9nervig, breit-abgeschnitten oder sehr stumpf, halb so lang, als das Aehrchen; Bthen sehr stumpf, wehrlos; Spindel kurzborstig - rauh; B. oberseits v. einzelnen kurzen Borstchen sehr rauh; W. faserig, rasig, ohne Ausläufer. 4. An sandigen O. am Ufer des Adriat. Meeres und auf Sandfeldern in Oestr. und Böhm. Juli. Aug. *T. elongatum* Host. gr. 2. t. 18. *T. junceum* β. giganteum Roth. Im Garten ist die W. stets faserig und durchaus ohne Ausläufer, woch sich diese Art v. allen der Rotte deutlich unterscheidet, mit Ausnahme des *T. caninum* und *T. biflorum*, welche beide nicht mit Ausläufern versehen sind. D.

13. *T. PUNGENS* (Persoon.) Stechender W. — Aehre 2zeilig; Aehrchen 5-10bth., genähert; *Klappen* lanzettl., 6nervig, spitzlich oder kurz-stachelspitzig, halb so lang, als das Aehrchen; Bthen stumpf, wehrlos; Spindel kahl oder rauh; B. oberseits v. einzelnen kurzen Borstchen sehr rauh; W. kriechend. 4. An sandigen O. am Adriat. Meere und der Nordsee. Juni. Juli. Vielleicht bloß eine Variet. von *T. repens*. D.

14. *T. GLAUCUM* (Desf.) Graugrüner W. — Aehre 2zeilig; Aehrchen meist 5bth., genähert, die untern ein wenig entfernt; *Klappen* länglich, 5-7nervig, sehr stumpf oder abgeschnitten, halb so lang, als das Aehrchen; Bth. sehr stumpf, wehrlos oder begrannt; Spindel fein-borstig - rauh; B. oberseits v. einzelnen spitzen Pünktchen etwas rauh; W. kriechend. 4. An Ufern und Wegen, (in Oestr., Böhm., Steyer., südl. Tyrol, der Schweiz.) Juni, Juli. *T. intermedium* Host. fl. a. *T. junceum* Host. gr. 2. t. 22. — Scheint eine grössere Variet. v. *T. repens* mit stumpferen Bthen. *T. repens* kommt auch graugrün vor.

15. *T. REPENS* (L.) Quecken-W. — Aehren 2zeilig; Aehrchen meist 5bth.; *Klappen* lanzettl., 5nervig, zugespitzt; Bth. zugespitzt oder stumpflich, wehrlos oder begrannt; Spindel meist rauh; B. oberseits v. spitzen, einzelnen Pünktchen mehr oder weniger rauh; W. kriechend. 4. An kultiv. O., Zäunen, vorzügl. auf Sandboden überall. Juni. Juli. Leers herb. t. 12. f. 3. 4. Var. mit spitzen oder zugespitzten Bthen und mit stumpfen, ferner mit begrannnten (*Elymus caninus* Leers herborn. t. 12. f. 4.) stachelspitzigen oder wehrlosen Bthen, mit grasgrünen oder meergrünen B.; Explare mit meergrünen B. und spitzen, begrannnten Bthen: *Agropyrum caesium* Presl.; mit stumpfen, wehrlosen Bthen: *Agropyrum firmum* Presl. — Das *T. repens* b. *maritimum* Koch und Ziz. ist überall graugrün, hat zugerollte B. und stumpfe oder stumpfliche

Bthen, und kommt auch mit vollkommen glatter Spindel vor. Wächst auf Sandfeldern bei Mainz. — *T. littorale* Host. gr. 4. t. 9. untersch. sich nach den aus Samen des Wiener Gartens gezogenen Explaren nicht v. *T. repens*. Ein im Mertensischen Herb. aufbewahrtes Explar aus dem Hostischen Garten hat schmälere, oberseits sehr rauhe B. und eine kahle Spindel, aber es ist doch sicher auch bloß eine Variet. v. *T. repens*.

16. *T. BIFLORUM* (Brignol. fasc. pl. rar. forojul. 1810.) Zweiblütthiger W. — Aehre 2zeilig; Aehrchen 2-4blütthig; *Klappen lanzettl., 3nervig, zugespitzt*; Bth. begrannt; *Granne fast 3mal kürzer, wie die Bthe*; Spindel ein wenig rauh; B. glatt, am Rande ein wenig rauh; W. faserig. 4. Auf den A. v. Görz, (auf den felsigen Kämmen des Matajur) Juli. Aug. *T. biflorum* Brignol. in der Regensb. bot. Ztg. 23. S. 97. 638. In den nördlichsten Gegenden entsteht die Variet.:

β. *Hornemannii*, mit niedrigeren, steiferen Halmen und gefärbten, fast immer 2-3blütthigen Aehrchen: *T. violaceum* Hornem. fl. dan. t. 2044, Fries herb. norm. 5. n. 99. — Die B. des *T. biflorum* sind um die Hälfte schmaler, als bei *T. caninum*, dem dasselbe sehr ähnlich ist, sie sind auf beiden Flächen glatt und nur am Rande rauh, die Nerven der Klappen stehen gleichweit von einander ab. D.

17. *T. CANINUM* (Schreb.) Hunds-W. — Aehre 2zeilig; Aehrchen meist 5bth.; *Klappen lanzettl., 4-7nervig, zugespitzt*; Bth. zugespitzt, begrannt; *Granne länger, als die Bthe*; Spindel feinborstig-rauh; *B. beiderseits rauh*; W. faserig. 4. In Wäldern, an Waldbächen und schattigen Zäunen. Juni. Juli. Host. gr. 2. t. 25. *Elymus caninus* L.

Das *T. imbricatum* MB. „wächst nicht um Prag, und ist selbst niemals wild vorgekommen, es wurde nur einmal auf dem Walle der Stadt und zwar nur an einer einzigen Stelle gleichsam verwildert gefunden, ist aber seit dieser Zeit verschwunden und nicht wieder erschienen.“ Kosteletzky in Briefen.

59. *SECÁLE* (L.) Roggen (Korn.) — Klappen pfriemlich. Aehrchen 2bth., mit einem lang-gestielten Ansatz einer dritten Bthe; sonst Alles, wie bei *Triticum*. — N. v. E. gen. 13. 15.

1. *S. CEREALE* (L.) Gemeiner R. — Klappen kürzer, als die Aehrchen; Spindel zähe. ☉. und ☉. Mai. Wird überall kultiv. Metzg. europ. Cereal. t. 9. Kultiv.

60. *ÉLYMUS* (L.) Haargras. — Aehrchen 2-vielbth., zu 2, 3, 4, auf den Ausschnitten der Spindel sitzend. Balg 2klappig, vor die Bthen gestellt; die Klappen der zu 3 gestellten Aehrchen eine 6blättrige Hülle darstellend. Die oberste Bthe oft verkümmert. Balglein 2spelzig. N. v. E. gen. 13. 14.

1. *E. ARENARIUS* (L.) Sand-H. — Aehre aufrecht, gedrunken; Aehrchen meist 3bth., flaumig, so lang, als die auf dem Kiele

gewimperten Klappen oder länger, an der Mitte der Aehre zu 3; B. zuletzt zugerollt, starr. 4. An sandigen O. am Meere und auf Sandfeldern hie und da, (an der Küste der Nord- und Ostsee; stw. auf Sandfeldern bei Berlin, in Böhme, der Lausitz, in Sachs., der Rheinpfalz.) Juli. Aug. Schreb. gr. 2. t. 40. D.

2. E. EUROPAEUS (L.) Europäisches H. — Aehre aufrecht; Aehrchen 2bth. oder 1bth., mit dem Ansatz zu einer zweiten Bthe, in der Mitte der Aehre zu 3; Klappen gerade, lineal.-pfrieml., begrannt; *die untere Spelze rauh, begrannt; die Granne 2mal länger, als die Spelze*; B. flach, kahl; Scheiden behaart. 4. In Wäldern auf Gebirgen und Vor., (stw. deh d. Geb.) Juni. Juli. Host. gr. 1. t. 28. Triticum sylvaticum Salisb. Cuviera europaea Koel. Hordeum cylindricum Murr. H. sylvaticum Huds., Vill. H. europaeum All. H. montanum Schrank.

3. E. CRINITUS (Schreber Gräser t. 24. f. 1.) Gemähntes H. — Aehre aufrecht; Aehrchen zu zweien, 1bth. mit dem Ansätze zu einer zweiten Bthe; Klappen gerade, lineal.-pfrieml., begrannt; *die untere Spelze rauh, begrannt, die Granne vielmal länger, als die Spelze*; B. flach, oberseits zottig; Scheiden kahl. ☉. Auf Aeckern und unbauten O., (auf der neuen Aufschüttung in Triest in Menge, Tommasini.) Mai. Juni. Elymus intermedius M. Bieberst. fl. taur. cauc. Hordeum crinitum Desfont. fl. atl. D.

61. HÖRDEUM (L.) Gerste. — Aehrchen 1bth. oder 1bth. mit einem grannenf. Ansätze zu einer zweiten Bthe; sonst Alles, wie bei Elymus. Die seitenst. Bthen meist männlich. N. v. E. gen. 13. 13.

1. Rotte. HORDEA SATIVA. Angepflanzte Gerstarn. Bth. alle zwitтерig oder die seitenst. männlich und diese immer wehrlos. Fast sämtliche Arten werden als Getreide angebaut.

1. H. VULGARE (L.) Gemeine G. — Aehrchen alle zwitтерig, die fruchttragenden *6reihig-geordnet*, 2 Reihen auf beiden Seiten mehr hervorspringend. ☉. und ☉. Wird kultiv. Metzger europ. Cereal. t. 9. Var. mit schwarzer Aehre und freien, nicht an die Spelzen angewachsenen, Samen; zur letztern gehört: H. vulgare β. coeleste L. Kultiv.

2. H. HEXASTICHON (L.) Sechszeilige G. — Aehrchen alle zwitтерig, *gleichf. - 6reihig-geordnet*. ☉. Wird kultiv. Metzger europ. Cereal. t. 10. Kultiv.

3. H. DISTICHUM (L.) Zweizeilige G. — Das mittlere zwitтерige Aehrchen *eyf.*, begrannt, mit aufrechter Granne; die seitenst. männl. lineal., grannenlos; die Grannen der Klappen so lang, als die Aehrchen; W. faserig. ☉. Angebaut. Juni. Juli. D. fl. 1. 721. Metzger europ. Cereal. t. 11. Kultiv.

4. H. ZEOCRITON (L. spec. 125.) Bart-G. — Das mittlere zwitтерige Aehrchen *eyf.*, begrannt; die seitenst. männl. lineal.,

grannenlos; die Grannen der mittleren Aehrchen fächerf. - abste-
hend. ☉. Angebaut. Juni. Juli. D. fl. I. S. 721. Metzger europ.
Cereal. t. II. Kultiv.

5. *H. STRICTUM* (Desf. atl. I. S. 113.) Steife G. — Aehrchen
lanzettl., das mittlere zwittrig, begrannt mit aufrechter Granne;
die seitenständigen männlich, grannenlos; die Grannen der Klap-
pen länger, als die Aehrchen; Halm über der Basis zwiebelig - an-
geschwollen. 4. Auf Grasplätzen, (Istrien, Biasoletto; bei Preus-
sisch-Oldendorf in Westphalen, Göring.) Mai. Juni. *H. bulbosum*
L. spec.? Linne nämlich nennt sämtliche Bthen fruchtbar. *H.*
bulbosum Bertolon. fl. ital. *H. nodosum* Sav. cent. 2. S. 37. D.

H. Rotte. *HORDEA MURINA.* Die seitenst. Bth. männl. & der geschlechtslos;
alle begrannt.

6. *H. MURINUM* (L. spec. 126.) Mäuse G. — Sämmtliche Aehr-
chen begrannt; die Klappen des mittleren Aehrchens lineal-
lanzettl., bewimpert, die äussere der seitenst. Aehrchen borstl.,
rauh, die innere lineal.-borstl., gegen die Basis zu an einer Seite
bewimpert. 4. An Wegen, Mauern, öden O. Juli. Aug. D. fl. I. 722.

7. *H. PSEUDO-MURINUM* (Dr. Trappeiner in Briefen.) Falsche
Mäuse-G. — Die Aehrchen alle begrannt; die Klappen des mitt-
leren Aehrchens und die innere der seitenst. lineal.-lanzettl.,
beiderseits-bewimpert, die äussere der seitenst. lineal.-borstl., ge-
gen die Basis zu an einer Seite bewimpert. ☉. An Wegen im
südl. Tyrol, (bei Schländers in Vintschgan, Dr. Trappeiner.) Juli.
Aug. Sehr ähnlich dem *H. murinum*, aber doch die breiteren Klap-
pen und die auf beiden Seiten bewimperte innere der seitenst.
Aehrchen sogleich kenntlich. Ob diese Pfl. vielleicht nur eine,
allerdings bemerkenswerthe, Variet. sei, werden fernere Beob-
achtungen lehren.

8. *H. SECALINUM* (Schreb. Spicileg. S. 148. 1771.) Getreide-G.
— Die Aehrchen sämmtlich begrannt; die Klappen aller Aehr-
chen borstl., rauh. 4. Auf Wiesen, (sehr zerstreut dch d. Geb.)
Juni. Juli. *H. pratense* Huds. fl. angl. *H. nodosum* M. Bieberst.
fl. taur. cauc., D. fl. I. 722., Koch Synops. ed. I., nach Bieberstein
so benannt, aber unrichtig, denn die von Linne aufgeführte Pfl.
hat grannenlose seitenst. Bth. und Hüllchen, vergl. Spec. pl. p. 126.;
allein das *H. murinum* β. L. spec. gehört nach dem Synonym von
Scheuchzer zu *H. secalinum*. Vaill. par. t. 17. f. 6. Die Pflanze
ist perennirend, wie die kultivirte zeigt. Die aufgeblasenen Schei-
den der WB. an der Basis des Halmes geben den Anschein einer
Zwiebel, der Halm selbst schwillt aber sehr selten zwiebelig an —
Var.:

β. *marinum*, die seitenst. Aehrchen mit einigen Haaren besetzt.
H. maritimum Roth. tent.

9. *H. MARITIMUM* (Withering arr. 172.) Meerstrands-G. — Die
Aehrchen sämmtlich begrannt; die Klappen aller Aehrchen rauh,
die inneren der seitenst. Aehrchen etwas geflügelt-halb-lanzettl.,

die übrigen borstl. ☉. Auf Triften und an sandigen O. am Meere, (an der Nordsee in Holstein und am Adriat. Meere.) Mai. Juni. *H. geniculatum* All. ped. 2. t. 91. f. 3. *H. rigidum* Roth. catal. D.

62. LÓLIUM (L.) Lolch. — Aehrchen einzeln, auf den Ausschnitten der Spindel sitzend, mit dem Rücken gegen die Spindel gestellt. Balg 1klappig, 3-vielbth., oft halb so lang, auch so lang, als das Aehrchen; an dem endst. Aehrchen 2klappig. Untere Spelze wehrlos oder unter der Spitze begrannt. — Einige Arten sind an den seitenst. Aehrchen mit einer sehr kleinen, 2sp., oder in zwei gesonderte Klappen getheilten obern Klappe versehen. — N. v. E. gen. 14. 18.

I. Rotte. Die W. blühende Halme und nicht blühende Blätterbüschel treibend, perennirend. Bth. lanzettl. Spelzen häutig, die obere lanzettl., von der unteren bedeckt.

1. L. PERENNE (L. sp. 122.) Ausdauernder L. — Aehrchen länger, als die Klappe; Bthen lanzettl.; W. blühende Halme und nicht blühende Blätterbüschel treibend, die jungen B. einfach-zsgesaltet. 4. Auf Wiesen, Triften, an Wegen. Juni-Herbst. D. fl. 1. 714. Leers herb. t. 12. f. 1. Bth. grannenlos oder kurz-stachelspitzig. Var. mit 7-9 blüthigen und 3-4 blüthigen Aehrchen, mit zsgesetzter, ästiger und lebendig-gebärender Aehre. Zur Variet. mit 3-4 blüthigen Aehrchen gehört nach Smith. L. tenue L. spec.

2. L. ITALICUM (Alex. Braun in der Regensb. bot. Ztg. 17. S. 241.) Italienischer L. — Aehrchen länger, als die Klappe, Bth. lanzettl., W. blühende Halme und nicht blühende Blätterbüschel treibend; die jungen B. zsgerollt. 4. Auf Wiesen und Grasplätzen, (zerstreut dch d. Geb., jetzt aber an vielen O. gefunden und hin und wieder angesäet, an den meisten O. aber sicherlich wild, nur bisher mit dem vorhergehenden verwechselt.) Juni-Herbst. L. Boncheanum Kunth. en. L. multiflorum Poir. in Lam. dict., DC. fl. fr. 3. p. 90, die grannenlose Variet. DC. fl. fr. 5. p. 286. — Kommt vor mit begranneten, und seltener mit grannenlosen Aehrchen, welche letztere Variet. man dch die im jungen Zustande zsgerollten B., einem von Alex. Braun entdeckten Merkmale, sogleich von L. perenne unterscheidet.

II. Rotte. Die W. nur blühende Halme tragend, ist 2jährig, bei Lollum rigidum vielleicht auch jährig. Bth. lanzettl., mit häutigen Spelzen, deren obere lanzettl. —

3. L. MULTIFLORUM (Gaud. fl. helv. I. S. 354. und der botan. Gärt.) Vielblüthiger L. — Die Klappe 3mal kürzer, als die Aehre; Aehrchen oberwärts verschmälert, spitz, 12-20 blüthig; Bth. lanzettl., dicht-dachig, die oberen begrannt; W. ohne unfruchtbare Blätterbüschel. ☉. Auf Aeckern der südl. Schweiz. Juni. Juli. Gaud. fl. helv. Reichenb. ic. 11. f. 1345. ein fruchttragendes Expl. Die Abbildg des Vaillant. t. 17. f. 3. stellt ebenfalls das Aeußere dieser Pfl. nicht übel dar, wie Gaud. ganz richtig erwähnt. Ich sah sie bisher nur gezogen. S.

4. *L. RIGIDUM* (Gaud.) Steifer L. — *Klappe länger, als die Hälfte des Aehrchens* oder ohngefähr so lang, als dieses; Aehrchen 5-10blth., stumpf; Bth. lanzettl., wehrlos; Halm an der Basis ästig; W. ohne unfruchtbare Blätterbüschel. ☉. Auf trocknen Wiesen und an Wegen, (Triest, Fiume; eigentl. nicht in der Schw., sondern im Aostathale in Piemont v. Gaudin gefunden.) Juni, Juli. Unter dem Namen *L. strictum* Presl. schickte Decker diese Pfl. aus Sicilien.

III. Rotte Die W. nur blühende Halme tragend, jährlich. Bth. bei der Frucht-reife elliptisch. Die untere Spelze unter der Mitte fast knorpelig, bemerklich schmaler, als die obere, welche bei der Frucht-reife zu beiden Seiten hervortragt.

5. *L. LIMCOLA* (Sonder in Briefen.) Flachsliebender L. — *Die Klappe länger, als das halbe Aehrchen*, oder beinahe so lang; Aehrchen längl. oder eif.; Bth. kurz-begrannt oder unbegrannt, bei der Frucht-reife elliptisch; nicht blühende Blätterbüschel fehlend. ☉. Auf Aeckern unter dem Flachs. Juni, Juli. *L. arvense* Schrad. germ. D. fl. I. 715. und mehrerer Autoren. Reichenb. ic. II. f. 1337-39. *L. remotum* Hoffm. D. fl. Var.:

β. complanatum, mit breiteren Aehrchen und bei der Frucht-reife mehr abstehenden Bth.: *Lolium complanatum* Schrad., Reichenb. ic. II. f. 1341. — *Lolium arvense* With. gehört nach der sehr richtigen Beobachtung von Sonder zu *L. temulentum* Var. *β.* und *γ.*

6. *L. TEMULENTUM* (L. spec. 122.) Betäubender L. — *Die Klappe von der Länge des Aehrchens, und oft länger*; Aehrchen längl., bei der Frucht-reife elliptisch; Bthen länger- oder kürzerbegrannt; nicht blühende Blätterbüschel fehlend. ☉. Unter der Saat. Juni, Juli. D. fl. I. 717. Leers t. 12. f. 2. *Craepalia temulenta* Schrank. bayer. Fl. Scheiden und Halm rauh; Grannen stark, gerade oder ein wenig geschlängelt, länger, als die Bthe. Var. aber mit kurzen und mit sehr kurzen und sehr geschlängelten Grannen, welche Abänderungen sich zu der Urform verhalten, gerade wie der gewöhnliche *Bromus secalinus* mit kurzen Grannen zum *Bromus secalinus* mit langen Grannen. Ausserdem kommt noch als Variet. vor:

β. speciosum, mit glatten Scheiden und Halmen: *L. speciosum* Steven in MBieb. fl. taur. cauc. *L. speciosum* Var. mit glattem Halm, Koch Synops. ed. I. *L. temulentum β. arvense* Babingt. man. *L. arvense* Withering. arrang. nach der Beschreibung, dem Stand O. und nach englischen Expl. *L. arvense* Smith. engl. fl., welcher schon vermuthete, dass diese Pfl. nichts anderes als eine Variet. des *L. temulentum* sei.

γ. robustum, der Variet. *β.* sehr ähnlich, und nur dch die rauhen Scheiden und Halme verschieden: *L. robustum* Rb. ic. II. f. 1340. *L. speciosum scabrum* Koch Synops. ed. I.

63. *AËGILOPS* (L.) Walch. — Aehrchen einzeln, auf den Ausschnitten der Spindel sitzend, mit der Seite gegen die Spladel

gerichtet. Balg 2klappig, 3-4bth.; Klappen auf dem Rücken abgerundet-konvex, kiellos, an der Spitze 2-4zählig; Zähne lanzettl.-pfriemlich, begrannt oder wehrlos. Bälglein 2spelzig, untere Spelze an der Spitze 1-4grannig. N. v. E. gen. 13. 18.

1. *A. OVATA* (L.) Eyförmiger W. — *Aehre eyf.*, aus 3-4 Aehrchen zsgesetzt; Klappen kurz, alle meist 4grannig; *Grannen* aller Aehrchen *fast gleich*, v. der Basis an am Rande rauh; untere Spelze 2-3grannig, Grannen etwas abstehend, viel länger, als die Spelze. ☉. In Weinbergen und an andern kultiv. O., (im Littor. bei Triest, in Istrien, bei Fiume.) Mai. St. h. 86. Rb. ic. 11. f. 1353. *A. geniculata* Roth. Phleum Aegilops Scop. D.

2. *A. TRIARISTATA* (Willd.) Dreigranniger W. — *Aehre eyf.*, nach oben verschmälert, aus 4-5 Aehrchen zsgesetzt; Klappen steifh., alle 2-3grannig; *Grannen* aller *fast gleich*, am Rande ihrer Basis kahl; untere Spelze 2-3grannig, Grannen aufrecht, viel länger, als die Spelze. ☉. Mit der vorhergeh. Art. Mai. Rb. ic. 11. f. 1354. *A. neglecta* Requien. bei Bertol. *A. ovata* Roth. bei Ust. Die Aehrchen grösser, als bei *A. ovata*, die Grannen länger. Zu unserer Pflanze gehört ganz sicher Aegilops ovata Roth.; ich besitze diese v. Autor selbst und zweifle auch nicht, dass Willd. dieselbe Pflanze vor Augen hatte. D.

3. *A. TRIUNCIALIS* (L.) Langgranniger W. — *Aehre lineal-verlängert*, aus 5-6 Aehrchen zsgesetzt; Klappen alle 3grannig oder die der untersten Aehrchen 2grannig; *Grannen der obern Aehrchen noch einmal so lang*; untere Spelze 3zählig, Zähne spitz oder begrannt, *Zähne und Grannen kürzer, als die Spelze*. ☉. An kultiv. O. und Wegen, (im östr. Littor., bei Triest, Fiume und auf den Inseln.) Mai. Juni. St. h. 86. Rb. ic. 11. f. 1365. Var. mit zottiger und kahler Spindel, zu letzterer gehört: *A. triaristata* Requien bei Bertoloni Flor. ital. 1. p. 789. *A. echinata* Presl. D.

Die *Aegilops caudata* L., (*A. cylindrica* Host. u. Gaud.) kommt in Piemont, aber nicht in der Schweiz vor.

64. *LEPTURUS* (R. Brown.) Fadenschwanz. — Aehrchen einzeln, 1bth., oder 1bth. mit einem gestielten oder stielchenf. Ansätze zu einer zweiten Bthe, in die Aushöhlungen einer gegliederten Aehre eingesenkt. Balg 1-2klappig, knorpelig, die Bthen bedeckend. Bälglein häutig. Gf. kurz; N. federig. Monerma und Ophiurus N. v. E. gen. 10. n. 16. und 17.

1. *L. INCURVATUS* (Trin.) Gekrümmter F. — *Aehre stielrund*, im trocknen Zustande einwärts-gekrümmt; *Balg 2klappig, um den dritten Theil länger, als die Bthe*. ☉. An sandigen O. am Adriat. Meere, (Triest und auf der Insel Veglia.) Mai. Rottboellia incurvata L., Sohn. Aegilops incurvata L. sp. Ophiurus incurvatus Beauv. Agrostis incurvata Scop. D.

2. *L. FILIFORMIS* (Trin.) Dünner F. — *Aehre stielrund*, ein wenig zsgedrückt, aufrecht oder etwas gekrümmt; *Balg 2klappig*,

so lang, als die Bthe, oder kaum ein wenig länger. ☉. An sandigen O. am Meere, (Istrien, bei Varel im Oldenburg., an d. Ostsee in Holstein.) Mai. *Rottboellia filiformis* Roth. *R. erecta* Savi. *R. incurvata* Nolte nov. fl. holst. nach Sonder. *Ophiurus filiformis* Röm. und S. D.

3. *L. CYLINDRICUS* (Trin.) Walzlicher F. — Aehre stielrund, aufrecht; *Balg 1klappig*. ☉. An sandigen O. am Adriat. Meere, (an den Salzwerken bei Triest.) Mai. *Rottboellia cylindrica* Willd. *R. subulata* Sav. *Monerma subulata*, Beauv. D.

65. *PSILURUS* (Trin.) Borstenschwanz. — Aehrchen einzeln, seltner gezeiet, 2bth., in die Aushöhlungen einer gegliederten Spindel eingesenkt. Untere Bthe auf einem Knötchen sitzend; die obere gestielt, meist fehlschlagend. *Balg 1klappig*, viel kürzer, als die Bthe. *Bälglein 2spelzig*, untere Spelze begrannt. Gf. sehr kurz; N. federig. N. v. E. gen. 10. 14.

1. *P. NARDOIDES* (Trin.) Begrannter B. — ☉. An trocknen, unfruchtbaren O., (Triest, Istrien, Fiume.) Mai. Juni. *Nardus aristata* L. *Rottboellia monandra* Cav. ic. l. t. 39. f. l. *Monerma monandra* Beauv. *Asprella nardiformis* Host. gr. 4. t. 29. D.

XV. Gruppe. *NARDOIDEEN*. Aehrchen in den Aushöhlungen einer Aehrenspindel sitzend. N. fädlich, fläumlisch, aus der Spitze der Bth. heraustretend. N. v. E. gen. 10. 15.

65. *NARDUS* (L.) Borstengras. — Aehrchen einzeln, in die Aushöhlungen einer Spindel eingesenkt. 1bth. *Balg* fehlend. *Bälglein 2spelzig*, untere Spelze fast lederig, pfriemlich, 3seitig, die häutige obere einschliessend. Gf. l. N. einfach, fädlich, verlängert, aus der Spitze der Bth. heraustretend.

1. *N. STRICTA* (L.) Steifes B. — 4. Auf morastigen, torfigen Triften; in die A. hinaufsteigend. Mai. Juni. Schreb. gram. t. 7.

Register

über die

Namen der Ordnungen und Gattungen, die
in diesem Bande enthalten sind.

-
Acanthaceen 682.	Antirrhineen 611.	Betonica 672.
Acanthus 682.	Antirrhinum 614.	Betula 783.
Aceras 823.	Apera 933.	Betulineen 782.
Acorus 812.	Apocyneen 372.	Blitum 718.
Adenophora 558.	Apocynum 572.	Boragineen 586.
Aegilops 988.	Aposeris 490.	Borago 589.
Agave 836.	Aquifoliaceen	Brachypodium 973.
Agrostis 930.	568.	Briza 954.
Aira 943.	Arbutus 561.	Bromus 975.
Ajuga 678.	Arctostaphylos 561.	Bulbocodium 562.
Alisma 795.	Aretia 691.	Butomeen 796.
Alismaceen 795.	Aristolochia 741.	Butomus 797.
Allium 852.	Aristolochieen	Buxus 743.
Alnus 784.	741.	Calamagrostis 934.
Alopecurus 924.	Arnoseris 490.	Calamintha 660.
Amaranthaceen	Aroideen 811.	Calendula 463.
710.	Arrhenatherum 945.	Calla 812.
Amaranthus 710.	Arum 811.	Calluna 562.
Amaryllideen 836.	Arundo 938.	Campanula 551.
Ambrosiaceen	Asarum 742.	Campanulaceen
546.	Asclepiadeen 570.	547.
Ampelodesmos 939.	Asparageen 838.	Camphorosma 720.
Anacamptis 819.	Asparagus 838.	Cannabis 755.
Anagallis 687.	Asperugo 587.	Carduus 471.
Anarrhinum 618.	Asphodelus 844.	Carex 888.
Anchusa 589.	Atriplex 721.	Carlina 476.
Andrachne 743.	Atropa 601.	Carpinus 760.
Andromeda 562.	Avena 945.	Carthamus 480.
Andropogon 918.	Azalea 563.	Castanea 758.
Androsace 687.	Ballota 675.	Celtis 756.
Anthericum 845.	Bartsia 644.	Centaurea 480.
Anthoxanthum 924.	Beta 719.	Centunculus 687.

- Cephalanthera 825.
 Cerinthe 593.
 Chaiturus 676.
 Chamaeorchis 823.
 Chamagrostis 928.
 Chenopodeen 711.
 Chenopodium 716.
 Chlora 574.
 Chondrilla 506.
 Cicendia 582.
 Cichorium 491.
 Cirsium 461.
 Cladium 878.
 Clinopodium 662.
 Coeloglossum 820.
 Colchicaceen 861.
 Colchicum 862.
 Coleanthus 929.
 Compositen 463.
 Coniferen 786.
 Convallaria 839.
 Convolvulaceen 584.
 Convolvulus 584.
 Corallorrhiza 828.
 Corispermum 714.
 Cortusa 698.
 Corylus 759.
 Corynephorus 945.
 Crepis 513.
 Crocus 830.
 Crupina 488.
 Crypsis 925.
 Cupressus 788.
 Cupuliferen 757.
 Cuscuta 585.
 Cyclamen 699.
 Cynanchum 570.
 Cynara 470.
 Cynodon 928.
 Cynoglossum 588.
 Cynosurus 964.
 Cyperaceen 874.
 Cyperus 875.
 Cypripedium 829.
 Cytineen 740.
 Cytinus 741.
 Dactylis 961.
 Danthonia 952.
 Daphne 735.
 Datura 602.
 Digitalis 612.
 Dioscoreen 811.
 Diospyros 557.
 Dracocephalum 664.
 Ebenaceen 567.
 Echinaria 939.
 Echinops 464.
 Echinosperrnum 587.
 Echium 593.
 Edraianthus 558.
 Elaeagneen 740.
 Elaeagnus 740.
 Elsholtia 648.
 Elymus 981.
 Elyna 887.
 Empetreen 712.
 Empetrum 712.
 Endymion 860.
 Ephedra 786.
 Epipogium 825.
 Epipactis 826.
 Eragrostis 954.
 Erianthus 917.
 Erica 562.
 Ericineen 561.
 Erinus 618.
 Eriophorum 886.
 Eritrichium 598.
 Erythraea 582.
 Erythronium 844.
 Euphorbia 741.
 Euphorbiaceen 713.
 Euphrasia 614.
 Eurotia 720.
 Fagus 757.
 Festuca 965.
 Ficus 755.
 Fimbristylis 886.
 Fraxinus 569.
 Fritillaria 812.
 Gagea 849.
 Galanthus 838.
 Galasia 503.
 Galeobdolon 667.
 Galeopsis 667.
 Gastridium 936.
 Gaudinia 980.
 Gentianeen 573.
 Gentiana 575.
 Gladiolus 831.
 Glaux 700.
 Glechoma 664.
 Globularia 700.
 Globularieen 700.
 Glyceria 962.
 Goodyera 827.
 Gramineen 916.
 Gratiola 611.
 Gymnadenia 819.
 Halimus 721.
 Hedynois 492.
 Heleocharis 878.
 Heliotropium 587.
 Helminthia 497.
 Hemerocallis 860.
 Herminium 823.
 Heteropogon 918.
 Hieracium 522.
 Hierochloa 923.
 Himantoglossum 820.
 Hippophaë 740.
 Holcus 945.
 Horniminum 662.
 Hordeum 985.
 Hottonia 697.
 Humulus 755.
 Hydrocharideen 793.
 Hydrocharis 794.
 Hyoscyamus 601.
 Hyoseris 491.
 Hypochaeris 503.
 Hyssopus 663.
 Jasione 547.
 Jasmineen 570.
 Jasminum 570.
 Ilex 568.
 Imperata 924.
 Irideen 829.
 Iris 832.
 Juglandeen 757.
 Juglans 757.
 Juncuceen 864.
 Juncagineen 797.
 Juncus 864.
 Juniperus 787.
 Jurinea 479.
 Kentrophyllum 480.
 Kobesia 888.
 Kochia 715.
 Koeleria 941.
 Labiaten 647.
 Lactuca 508.
 Lagurus 933.

- Lamarckia 942.
 Lamium 665.
 Lappa 475.
 Lapsana 490.
 Lasiagrostis 938.
 Lathraea 637.
 Laurineen 736.
 Laurus 736.
 Lavandula 648.
 Ledum 565.
 Leersia 929.
 Lemna 808.
 Lemnaceen 808.
 Lentibularieen 682.
 Leontodon 493.
 Leonurus 675.
 Lepturus 989.
 Leucium 838.
 Ligustrum 569.
 Liliaceen 812.
 Lilium 843.
 Limnanthemum 573.
 Limodorum 825.
 Limosella 628.
 Linaria 614.
 Lindernia 628.
 Listera 827.
 Lithospermum 596.
 Littorella 704.
 Lloydia 844.
 Lobelia 547.
 Lobeliaceen 546.
 Lolium 987.
 Lomatogonium 575.
 Luzula 872.
 Lycium 599.
 Lycopsis 590.
 Lycopus 653.
 Lysimachia 685.
 Majanthemum 840.
 Malaxis 829.
 Marrubium 674.
 Melampyrum 637.
 Melica 953.
 Melissa 662.
 Melittis 665.
 Mentha 649.
 Menyanthes 573.
 Mercurialis 753.
 Micromeria 660.
 Milium 936.
 Molinia 963.
 Monotropa 567.
 Monotropceen 566.
 Morus 735.
 Mulgedium 512.
 Muscari 861.
 Myosotis 596.
 Myrica 786.
 Myricceen 785.
 Naiadeen 807.
 Naias 807.
 Narcissus 837.
 Nardus 990.
 Narthecium 861.
 Nerium 573.
 Neottia 827.
 Nepeta 663.
 Nicotiana 602.
 Nigritella 821.
 Nonnea 591.
 Ocimum 648.
 Olea 569.
 Oleaceen 568.
 Omphalodes 588.
 Onopordon 475.
 Onosma 592.
 Ophrys 821.
 Orchideen 812.
 Orchis 813.
 Origanum 656.
 Ornithogalum 846.
 Orobanche 629.
 Orobanchceen 629.
 Ostrya 760.
 Osyris 739.
 Oxyria 730.
 Paederota 627.
 Panicum 920.
 Paradisia 846.
 Parietaria 754.
 Paris 839.
 Passerina 734.
 Pedicularis 638.
 Phalaris 922.
 Phillyrea 569.
 Phleum 926.
 Phlomis 676.
 Phragmites 938.
 Physalis 601.
 Phyteuma 548.
 Phytolacca 711.
 Phytolacceen 711.
 Picnomon 470.
 Picridium 512.
 Picris 496.
 Pingicula 682.
 Pinus 789.
 Piptatherum 937.
 Plantagineen 704.
 Plantago 705.
 Platanthera 820.
 Plumbagineen 701.
 Plumbago 704.
 Poa 955.
 Podospermum 502.
 Polemoniaceen 583.
 Polemonium 583.
 Polycnemum 715.
 Polygoneen 724.
 Polygonum 731.
 Polypogon 929.
 Populus 781.
 Potameen 798.
 Potamogeton 798.
 Prasiium 678.
 Prenanthes 507.
 Primula 691.
 Primulaceen 684.
 Prunella 677.
 Psamma 935.
 Psilurus 990.
 Pterotheca 513.
 Pulegium 653.
 Pulmonaria 594.
 Pyrola 565.
 Pyrolaceen 565.
 Quercus 758.
 Rhagadiolus 490.
 Rhinanthaceen 637.
 Rhinanthus 643.
 Rhododendron 564.
 Rhynchospora 878.
 Rosmarinus 654.
 Rumex 724.
 Ruppia 806.
 Ruscus 841.
 Sagittaria 796.
 Salicineen 761.

- Salicornia 713.
 Salix 761.
 Salsola 712.
 Salvia 651.
 Samolus 699.
 Santalaceen 736.
 Satureia 659.
 Saussurea 477.
 Scheuchzeria 797.
 Schoberia 712.
 Schoenus 877.
 Scilla 851.
 Scirpus 880.
 Scolymus 489.
 Scopolina 601.
 Scorzonera 500.
 Scrophularia 609.
 Scutellaria 676.
 Secale 984.
 Serapias 824.
 Serratula 478.
 Sesleria 940.
 Setaria 921.
 Sideritis 673.
 Silybum 470.
 Smilax 840.
 Solaneen 599.
 Solanum 599.
 Soldanella 698.
 Sonchus 510.
 Sorghum 919.
 Soyeria 521.
 Sparganium 811.
 Spartina 929.
 Specularia 558.
 Spinacia 720.
 Spiranthus 828.
 Stachys 669.
 Staehelina 477.
 Statice 701.
 Sternbergia 836.
 Stipa 937.
 Stratiotes 794.
 Streptopus 839.
 Sturmia 828.
 Swertia 574.
 Symphytum 591.
 Syringa 569.
 Tamus 811.
 Taraxacum 505.
 Taxus 787.
 Teucrium 679.
 Theligonum 724.
 Thesium 737.
 Thrinicia 492.
 Thymeleen 734.
 Thymus 658.
 Tofieldia 863.
 Tozzia 637.
 Tragopogon 498.
 Tragus 919.
 Trichonema 831.
 Trientalis 684.
 Triglochin 797.
 Triodia 953.
 Triticum 980.
 Trixago 644.
 Tulipa 842.
 Tyrimnus 471.
 Typha 809.
 Typhaceen 809.
 Udora 794.
 Ulmus 756.
 Urospermum 498.
 Urtica 754.
 Urticeen 753.
 Utricularia 683.
 Vaccineen 559.
 Vaccinium 560.
 Vallisneria 793.
 Veratrum 863.
 Verbasceen 602.
 Verbascum 603.
 Verbena 681.
 Verbenaceen 681.
 Veronica 619.
 Vinca 572.
 Vitex 681.
 Wahlenbergia 559.
 Willemetia 504.
 Wulfenia 628.
 Xanthium 546.
 Xeranthemum 489.
 Zacyntia 513.
 Zanichellia 806.
 Zea 917.
 Zostera 807.

Druckfehler.

- Seite 27. Zeile 10. von unten ist nach dem Worte „aufliegend“
hinzuzusetzen: niedrig, nach vorne abstehend: A. Fun-
ckianum R. ill. t. 66.; Haube aufliegend.
- 34. Zeile 25. von unten lies: *Chelidonium Glancium* statt
Chelidonium glaucium.
- 35. Zeile 1. von oben lies: *Ch. laciniatum* statt *Ch. Flaci-
nium*.
- 36. Zeile 4. von oben lies: *Corydalis intermedia* Merat.
statt *F. intermedia*.
- 39. Zeile 7. von unten lies: OFFICINALE statt OFFICINALIS.
- 60. Zeile 11. von unten lies: CHEIRANTHUS statt CHEIRANTUS.
- 64. Zeile 10. von unten lies: *cheiranthiflorus* statt *Cheiran-
thiflorus*.
- 65. Zeile 19. von oben lies: *Eruca Erucastrum* Fl. d. Wett.
Brassica Erucastrum β . *ochroleuca* Gaud. helv. statt
Eruca Erucastrum β . *ochroleuca* Gaud.
- 67. Zeile 21. von oben lies: *gemonense* statt *Gemonense*.
- 134. Zeile 5. von unten lies: *polygonoides* st. *polygorioides*.
- 252. Zeile 7. von oben lies: *rubens* st. *rubense*.
- 261. Zeile 20. von unten lies: *chlorophylla* st. *chorophylla*.
- 265. Zeile 25. von unten lies: *Hall. Sohn.* st. *Hull. Sohn.*
- 278. Zeile 23. von oben lies: *P. Sorbus* st. *S. Sorbus*.
- 318. Zeile 21. von unten lies: PEDEMONTANA st. PEDEMONTANA.
- 327. Zeile 15. von oben ist beizufügen: *Sanicula officinalis*
Gouan.
- 378. Zeile 1. von unten lies: *balearica* st. *balecaria*.
- 406. Zeile 15. von oben lies: *alpina* β . *L.* st. *alpina* β . *A.*
- 418. Zeile 22. von unten lies: *Oetteliana* st. *Otelliana*.
- 419. Zeile 5. von unten lies: *Acmella* st. *Aomella*.
- 437. Zeile 18. von oben lies: *A. rigescens* st. *A. nigrescens*.
- 448. Zeile 19. von oben lies: *nemorensis* st. *memorensis*.
- 505. Zeile 7. von unten lies: *L. taraxacoides* st. *A. taraxa-
coides*.
- 604. Zeile 8. von oben lies: *phlomoïdes* st. *phomoides*.
- 619. Zeile 4. von unten lies: CHAMAEDRYS st. CHAMAEDRIS.
- 639. Zeile 8. von unten lies: TUBEROSA st. TUBROSA.
- 659. Zeile 7. von oben lies: *glabrescens* st. *grabrescens*.
- 666. Zeile 13. von unten lies: β . *hybridum* st. β . *hebridum*.
- 716. Zeile 12. von unten lies: *urbicum* st. *urbibum*.
- 762. Zeile 1. von oben lies: β . *latifolia* st. δ . *latifolia*.
- 818. Zeile 1. von unten lies: *haematodes* st. *haemutotes*.
- 820. Zeile 11. von oben lies: *Himantoglossum* statt *Himan-
thoglossum*.
- 822. Zeile 11. von unten lies: *Reichard* st. *Richard*.
- 822. Zeile 3. von unten lies: *oestrifera* st. *aestrifera*.

Druck von C. H. Hossfeld in Leipzig.

SYNOPSIS

DER

DEUTSCHEN

UND

SCHWEIZER FLORA,

enthaltend

die genauer bekannten phanerogamischen Gewächse,
so wie die cryptogamischen Gefäss-Pflanzen,

welche in

**Deutschland, der Schweiz, in
Preussen und Istrien**

wild wachsen und derjenigen, welche zum Gebrauche der
Menschen in grösserer Menge gebauet werden,

nach dem DeCandollischen Systeme geordnet, mit einer
vorangehenden Uebersicht der Gattungen nach den
Classen und Ordnungen des Linneischen
Systemes,

bearbeitet von

D. WILH. DAN. JOS. KOCH,

Ritter des schwedischen Polarsternordens, des königl. bayer. Ludwigsordens, königl. bayer. Geh. Hofrath, ordentl. Professor der Medicin u. Botanik auf der Universität Erlangen, Director des bot. Gartens daselbst, Mitgliede der königl. Academie der Wissenschaften zu München, der königl. schwedischen zu Stockholm, zu Upsala, der kaiserl. Leopold. Carol., der medicinisch-botan. Gesellschaft zu London, der botan. Gesellschaft zu Regensburg und anderer gelehrten Gesellschaften.

Zweite Auflage.

D R I T T E R T H E I L .

Leipzig 1847.

Verlag von Gebhardt & Reisland.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

 

CHICAGO, ILL. 60607

CRYPTOGAMISCHE
GEFAESSPFLANZEN.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

III. Classe. CRYPTOGRAMISCHE ENDOGENEN oder ACOTYLEDONISCHE GEFAESS-PFLANZEN.

Der Stamm ist aus regelmässigem Zellgewebe und aus auf verschiedene Weise geordneten Gefässbündeln gebildet. Staubgefässe fehlen; das männliche und weibliche Geschlecht ist hier und da durch die kleinen und grösseren Sporen bei einer und derselben Art dunkel angedeutet. Die Sporen sind in eine Sporenhaut eingeschlossen; der Embryo fehlt. — Meistens wächst aus der Sporenmasse ein blatt- oder ein korallenförmiger Körper hervor, ein Vorkeim, Proembryo, aus welchem sich die junge Pflanze weiter entwickelt, und der sodann abstirbt. Die Keimung selbst wurde, mit Ausnahme der Farenkräuter, bis jetzt noch bei wenigen Arten beobachtet.

Ordng. CXXXII. EQUISETACEEN. De Cand. fl. fr. 2. S. 580.

Fruchtstand: ein endst. Kötzchen, auch Aehre genannt, aus quirlig-gestellten Schuppen zsgesetzt. Die Schuppen sind schildf., eckig, gestielt und tragen auf ihrer unteren Seite 4-7 in einen Kreis gestellte Sporenbehälter. Diese sind häutig, längl., an der inneren Seite der Länge nach gespalten. Die Sporen, sehr zahlreich, kugelig, mit einem aufgesetzten Spitzchen, mit 2 Fäden gestützt; die Fäden endigen beiderseits in eine spatelf. Spitze, sind kreuzweise gestellt, spiralf. um die Spore zsgerollt, und springen bei dem Trocknen elastisch zurück. Der Wurzelstock ist unterirdisch, gegliedert und kriechend. Der Stengel einfach oder ästig, an der Basis der Glieder mit einer gezähnten Scheide versehen, welche durch Verwachsung verkleinerter Blätter gebildet ist. Aeste und Aestchen quirlig.

1. **EQUISETUM** (Lin. gen. n. 1196.) Schafthalm. — Der Charakter der Gattung ist derselbe, wie der der Ordnung.

1. Rottc. **EQUISETA VERNALIS**. Alex. Braun. Stengel zweigestaltig; die fruchttragenden erscheinen frühzeitig sind nicht grünerfarbt, ganz einfach, zart, und verdorren und verschwinden schnell nach Ausstreuung der Sporen; die späteren tragen keine Früchte, sind härter, treiben grüne Aeste und durchdauern den Sommer. Aehren stumpf.

X
Scheiden
55
1. **E. ARVENSE** (L. sp. 1516.) Acker-S. — Die frühzeitigen, fruchttragenden St. ganz einfach, mit kreiself.-röhrigen, oberwärts trockenhäutigen, in 8 lanzettl., spitze, theilweise zshängende Zähne gespaltenen Scheiden; die späteren unfruchtbaren St. quirlig-ästig, die Aeste vierkantig, einfach oder verästelt, mit 4zähligen Scheiden; Aehren stumpf. 2. Auf mageren Wiesen, Rainen, Triften und feuchten, schlammigen Aeckern. Apr. Mai; die fruchttragenden St. erscheinen später. Schk. t 167. Kommt vor: 1. als spätere Form mit ästigem und zugleich in eine fruchttragende Aehre endigendem St.; die Gelenke sind mit Aesten besetzt, die 2-3 oheren ausgenommen, welche nackt bleiben: *E. arvense* α. *serotinum* Meyer Chlor. hanov. S. 666. *E. campestre* Schultz. fl. stargard. suppl. S. 59. Nicht unähnlich dem *Equisetum palustre*, aber bemerklicher rauh und dadurch, sowie durch die 4zähligen Scheiden der Aestchen mit gleichfarbigen, schmal weiss-berandeten, an der Spitze abstehenden Zähnen sogleich zu unterscheiden. Ich besitze ein Original-Exemplar hiervon, welches mir Schultz mittheilte. Scheint selten vorzukommen. 2. Als niederliegende Form, mit niederliegendem unfruchtbarem St., ausserdem der gewöhnlichen Pflanze ganz ähnlich: *E. arvense* c. *decumbens* Meyer Chlor. hanov. S. 667.

β. *alpestre*, der unfruchtbare Stengel niederliegend, vom ersten Quirle an nur 3-4 Zoll lang, mit sehr angenäherten Quirlen: *E. arvense* β. *alpestre* Wahlenb. fl. lapp. S. 296. „kommt an den unteren Abhängen der A. öfters häufig vor und macht sich doch seine ganz fremdartige Gestalt bemerklich“ Wahlenb. n. a. O. Dieselbe Varietät fand Baron v. Hausmann häufig auf den Wiesen der VorA. und zwar auf dem Rittnerberge in Südtirol, (unweit Botzen,) in einer Höhe von 4500 Fuss.

γ. *nemorosum*, *E. arvense nemorosum* Alex. Braun in Doell. rhein. Fl. S. 27. mit aufrechtem, höheren, 2 Fuss hohen, unterwärts weit hinauf nackten St. und mit sehr langen, wagerechten oder zurückgekrümmt-abstehenden, gar nicht oder nur wenig verzweigten Aesten: *E. arvense* β. Schultz fl. stargard. suppl. S. 58. *E. pratense* Roth. tent. 3. S. 6., nicht Ehrh. Dieses in feuchten Wäldern, steigt bis zu den A. hinauf und ist stets steril.

2. **E. TELMATEJA** (Ehrh. Beitr. 2. S. 159.) Grossscheidiger S. — Die frühzeitigen fruchttragenden St. ganz einfach, mit kreiself.-röhrigen, oberwärts trockenhäutigen, 20-30zähligen Scheiden, deren Zähne pfriemlich borstlich sind; die späteren, nicht fruchttragenden St. quirlig-ästig, mit einfachen Aesten und 4-5zähligen Scheiden; Aehre stumpf. 2. In Heinen und feuchten Wäldern

(sehr zerstreut dch d. Gebiet.) April; im Mai erscheinen die fruchttragenden St. *E. eburneum* Roth. catal. bot. I. S. 128. *E. fluviale* Smith. brit. 3. S. 1104., nicht Lin., Fl. dan. tab. 1461. Der fruchttragende St. ist oft über 1 Fuss lang und fingerdick, weissröthlich, mit weissen Scheiden, röthlichen und später bräunlichen Zähnen, die nicht fruchttragenden St. sind 2-3 Fuss lang, weiss, glänzend und die verlängerten Aeste dünn und gesättigt-grün.

II. Rotte. *EQUISETA SUBVERNALIS*. Alex. Braun a. a. O. Die fruchttragenden St. erscheinen gleichzeitig, sind weisslich oder röthlich, zur Zeit der Fruchtentwicklung ganz einfach oder nur mit kurzen Andeutungen von Aesten versehen. Die Aehre, auf einem zarten, nackten Stiele endständig, vertrocknet mit ihrem Stiele schnell, sobald die Sporen ausgefallen sind, während sich die Aeste verlängern und mit ihrem Stengel, sowie die nicht fruchttragenden Stengel, den Sommer durchdauern.

3. *E. SYLVATICUM* (L. spec. 1516.) Wald-S. — Die gleichzeitigen fruchttragenden St. *astlos*, später nach Vertrocknung der Aehre *ästig*; die Aeste der fruchttragenden und der nicht fruchttragenden St. dicht-quirlig, verlängert, an der Spitze *bogig-überhängend*, vierseitig, *quirlig-verästelt*, mit 3kantigen Aestchen; die Scheiden an dem St. kreiself-röhrig, trockenhäutig, nach oben lappig-gespalten oder gezähnt, an den Aesten 3zählig mit pfriemlichen Zähnen. 4. In feuchten, schattigen Wäldern und auf nassen Waldwiesen. Apr. Mai. Schk. t. 166.

4. *E. UMBROSUM* (Meyer in Willd. spec. pl. 5. S. 3.) Hain-S. — Die gleichzeitigen fruchttragenden St. *astlos*, später nach Vertrocknung der Aehre *ästig*, die Aeste der fruchttragenden und der nicht fruchttragenden St. dicht-quirlig, verlängert, *bogig-überhängend*, einfach, 3seitig; die Scheiden an den St. kreiself-röhrig, 10-15 zählig mit trockenhäutigen, spitzen Zähnen, an d. Aesten 3zählig mit eyf., spitzen Zähnen. 4. In Wäldern, Hainen, auf Waldwiesen und feuchten Aeckern, (Mecklenburg, Neubrandenburg, Stargard, Schultz; Unterharz, Hampe, Meyer; Osnabrück, Mayer; Bergschluchten des Habichtswaldes bei Cassel, Pfeiffer; Berlin, Schlechtend.; Sachsen sehr selten, Reichenb.; Nahethal bei Duchroth, nach Bogenhard; Salzburg und Heiligenblut sehr gemein, Hoppe; Tyrol bei Innsbruck, Heuffler; Zermatten in Wallis, Mühlenbeck.) Mai. Juni. *E. Ehrharti* Mey. Chlor. hanov. S. 666. *E. pratense* Ehrh. Beitr. 3. S. 77., nicht Roth. Hoffm. phyt. Blätt. S. 117. tab. 2. *E. sylvaticum* β . minus Wahlenb. snec. S. 689. *E. amphibolium* Retz. Fl. scand. suppl. 2. S. 12. *E. Drummondii* Hook., Babingt. man. S. 380., nach Alex. Braun in Briefen; ein Expl. aus Schottland sah ich noch nicht. Die Pflanze ist 3mal kleiner, als die vorige. Die fruchttragenden St. sind zierlich gescheckt, die Scheiden weisslich-grün, glänzend, die Zähne hellbraun, mit einem schwärzlichen Streifen auf dem Rücken bezeichnet, später ganz schwärzlich, Schultz. Fl. starg. suppl. S. 59.

III. Rotte. *EQUISETA AESTIVALIS*. Alex. Braun a. a. O. Die fruchttragenden und die nicht fruchttragenden St. gleichgestaltet, grün, zur Zeit der Frucht völlig entwickelt, den Sommer überdauernd, aber im darauffolgenden Winter absterbend. Die Aehre stumpf.

5. *E. PALUSTRE* (L. spec. 1516.) Sumpf-S. — Die fruchttragenden und die nicht fruchttragenden St. gleichgestaltet, tief-6-8furchig; die Scheiden fast kreisf., 6-8zählig, die Zähne lanzettl., mit einem breiten weiss-häutigen Rand umgeben; die Aeste einfach, tief-5-6furchig, mit 5-6zähligen Scheidchen; die Aehre stumpf. 4. Auf feuchten Wiesen, an Gräben. Sommer. Schk. t. 160. Bischoff Crypt. Gew. II. 1. t. 3. Kommt vor mit einer einzigen endständigen Aehre und mehrährig mit ährentragenden Aesten; ferner mit schwächerem St. und mit ganz einfachen Aesten ohne alle Verzweigung; *E. prostratum* Hoppe.

6. *E. LIMOSUM* (L. spec. 1517.) Schlamm-S. — Die fruchttragenden und die nicht fruchttragenden St. gleichgestaltet, ganz einfach oder ästig, schwach-10-20riefig, getrocknet tief-gerieft; die Scheiden walzlich, anschliessend, an der Spitze etwas breiter, 10-20zählig, die Zähne lanzettl.-pfriemlich, sehr schmal-häutig-herundet; die Aeste einfach, 5-6kantig, mit 5-6zähligen Scheidchen; die Aehre stumpf. 4. In Sümpfen, Gräben, Teichen und langsam fließenden Gewässern. Sommer. Schk. t. 171. Kommt vor: 1) ganz einfach, 1ährig ohne Aeste und weiter oberwärts quirlig-ästig mit kurzen, aufstrebenden Aesten; 2) vielährig, indem die Aeste der obersten Quirle Aehren tragen und länger sind, als der St., wobei meist die Hauptähre verkümmert; 3) gar nicht fruchttragend mit verlängerten, schlanken, oft bogig-niederhängenden Aesten. Ferner mit Zähnen, welche an den Scheiden von der Mitte gegen die Spitze zu schwarz, an den Scheidchen grün, oder nur an der Spitze braun sind: *E. limosum* Wahlenb. fl. suec. S. 689. und nach Wahlenb.: Linn. suec. S. 368.; und mit Zähnen, welche sowie der Rand an den Scheiden überall schwarz, an den Scheidchen von der Mitte an schwärzlich sind: *E. fluviatile* Wahlenb. fl. suec. S. 690. und nach Wahlenb.: Linn. suec. a. a. O.; allein letzteres fließt mit dem *E. limosum* Wahlenb. bei uns überall die Mittelformen zusammen. — „*E. uliginosum* Mühlenberg in Willd. spec. pl. 5. S. 4 ist eine kleinere Form des *Equisetum limosum*, auf torfhaltigen Wiesen Deutschlands vorkommend, nach dem Original-Exempl. des Willd. Herbars.“ Alex. Braun in Briefen.

IV. Rotte. *EQUISETA HYEMALIA*. Alex. Braun a. a. O. Die fruchttragenden und die nicht fruchttragenden St. gleichgestaltet, den Winter durchdauernd, immergrünend. Die Aehre in eine Stachelspitze zugespitzt. — Alle Arten mehr oder minder rauh.

7. *E. RAMOSUM* (Schleich. cat. pl. helv. 1807. S. 27.) Aestiger S. — Die fruchttragenden und die nicht fruchttragenden St. gleichgestaltet, 8-15rippig, die Rippen ohne eingedrückte Rückenlinie; die Aeste einzeln oder zu 2-9 quirlig; die Scheiden konvex-rippig, an den Aesten kreisf., das Zwischenglied locker umgebend, 6-8zählig, die Zähne in der Mitte konvex und mit einer vertieften Linie durchzogen, oder schwach 4riefig, in eine aufgesetzte lanzettl.-pfrieml. häutige Spitze endigend; die Aehre zugespitzt-stachelspitzig. 4. Auf feuchtem und trockenem Sandboden, (auf der Fläche des Rheines stellenweise von Strassburg auf beiden Ufern bis Mainz und Ingelheim; Wetterau zw. Offenbach und

Biber; südl. und westl. Schweiz; Tyrol, Innsbruck, zw. Botzen und Meran; Littorale bei Triest.) Im Sommer. *E. ramosum* DC. fl. fr. suppl. S. 245. *E. elongatum* Willd. sp. 5. S. 8. *E. pannonicum* Willd. spec. 5. S. 6. nach einem Expl. des Willd. Herb. (Alex. Braun) *E. illyricum* Hoppe nach dem Verf. *E. ramosissimum* Desf. atl. 2. S. 398., nicht Humb. u. Bonpl. *E. procerum* Pollin. nach Alex. Braun in der Regensb. bot. Ztg. 22. S. 308. *E. hyemale* C. *E. elongatum* Döll. rhein. Fl. S. 31. Graugrün, die Aeste schlank, meist sehr verlängert; kleinere Exemplare sind oft an der Basis sehr ästig, mit verlängerten Aesten und sehen aus wie ein Rasen von einfachen St. Die Scheiden sind einfarbig, nur gegen die Spitze zu an den Zähnen, oder vielmehr an der Basis der Zähne schwärzlich, jedoch stets mit einem weissen häutigen Rande umgeben. Oft ist nur ein braunes Pünktchen auf den Zähnen vorhanden und sehr selten umgibt ein schwärzliches Band die Spitze der Scheide unter den Zähnen. Mir scheint diese Art v. den verwandten doch die oberwärts bemerklich weiteren, kreiself. Scheiden der Aeste hinreichend verschieden.

8. *E. HYEMALE* (L. spec. 1517.) Winter-S. — Die fruchttragenden und die nicht fruchttragenden St. gleichgestaltet, einfach, oder an der Basis etwas ästig, 14-20 rippig; *die Rippen der Scheiden etwas flach, die Scheiden walzlich, eng-anschließend*, mit etwas abstehenden, zugerundeten, stumpfen, sowie die Spitze der Rippen, fast gleichförmig 4riefigen Zähnen, *welche in eine aufgesetzte, lanzettl.-pfriemliche, häutige, schnell sich kräuselnde und abfallende Spitze* endigen; die Aehre zugespitzt-stachelspitzig. 4. In schattigen, feuchten Wäldern, sumpfigen Berggegenden, (sehr zerstreut doch d. Geb., in der Schweiz und in Tyrol bis in die Alpen hinaufsteigend.) Im Sommer. Schk. tab. 171. *E. hyemale* A. vulgare Doll. rhein. Fl. S. 30. Bricht oder schneidet man den St. in der Mitte ab, so treibt er oft 2-3, quirlige, einfache, in eine Aehre endigende Aeste. Die Scheiden sind an der Basis stets mit einem schwarzen Bande versehen, und kommen auch hie und da an der Basis und Spitze mit einem solchen eingefasst vor, manchmal sind auch die untersten ganz und gar schwarz gefärbt.

9. *E. TRACHYODON* (Alex. Braun in d. Regensb. bot. Ztg. 22. S. 308.) Rauhzähniger S. — Die fruchttragenden und die nicht fruchttragenden St. gleichgestaltet, einfach, einzeln-stehend oder rasig, 7-11 rippig; *die Rippen der Scheiden etwas flach; die Scheiden das Zwischenglied etwas locker umgebend, die Zähne eyf., stumpf*, sowie die Spitze der Rippen fast gleichförmig-4riefig, *in eine aufgesetzte, lanzettl.-pfrieml., häutige, stehenbleibende Spitze* endigend; die Aehre zugespitzt-stachelspitzig. 4. An feuchten, sandigen O., (auf der Rheinfläche bei Dachlanden im Bad.; zw. Speier und der Rheinschanze bei Mannheim, hier häufig, Doell.) Im Sommer. Dreimal dicker, als die folgende Art; der häutige, den Zähnen der Scheiden aufgesetzte, aus eyf.-lanzettl. Basis entspringende Theil ist pfrieml., auf dem Rücken und am Rande feinstachelig-rauh, weiss, mit einer braunen, in die Spitze auslaufenden Rückenlinie. — Vielleicht gehört hierher auch das *E. Mackaii* Newman Babingt. man. S. 381.? — Kommt vor mit Scheiden, von

denen die unteren und mittleren an der Spitze mit einem breiten schwarzen Bande umgeben sind, und mit solchen, welche an der Basis und an der Spitze ein, wiewohl schmäleres Band haben: *E. paleaceum* Schleich. cat. pl. helv.

10. *E. VARIEGATUM* (Schleich. cat. pl. helv. 1807. S. 27.) Schekiges S. — Die fruchttragenden und die nicht fruchttragenden St. gleichgestaltet, rasig, einfach, 6-Srippig; die Rippen der Scheiden konvex, mit einer eingedrückten Rückenlinie bezeichnet, die Scheiden oberwärts weiter, das Zwischenglied locker umgebend, in 6-8 Zähne allmählig übergehend und an der Spitze, sowie auch die Zähne selbst fast gleichförmig 4riefig; die Zähne flach, rauschend, weisshäutig, mit einem schwärzlichen Mittelstreifen versehen, haarspitzig, und wenn die hinfällige Haarspitze abgefallen, eyf. 4. (Zerstreut im Geb.; in der Schweiz und auf der Rheinfläche bei Worms; bei München; Salzb.; Heiligenblut; in Steyermark; am Harze und wohl noch anderwärts.) Sommer. *E. tenue* Hoppe. *E. reptans* β . *variegatum* Wahlenb. fl. lapp. S. 298. — Von unserer Pflanze ist deutlich verschieden: *Equisetum scirpoides* Mich. fl. bor. amer. S. 281., (*E. reptans* Var. α . Wahlenb. fl. lapp. S. 298., wozu der Verf. unsere Pfl. als Variet. β . rechnet,) durch die niedrigeren, um die Hälfte dünneren 6eckigen St. mit nur 3zähligen Scheiden, deren Zähne stehen bleiben. Die St. des *E. scirpoides* sind eigentlich 3rippig, aber die eingedrückte Rückenlinie der Rippen ist so vertieft, dass sie den zwischen den Rippen liegenden Rillen an Tiefe gleichkommt.

Ordng. CXXXIII. MARSILEACEEN. Rob. Brown. prodr. 166.

Die Sporenbehälter verschiedengestaltet, in die Sporenfrüchte, (Fruchthüllen oder Fruchtlager) eingeschlossen. Die Sporenfrüchte kugelig oder länglich, Nüssen oder Kapseln ähnelnd, an der Basis der Blätter oder Blattstiele oder zwischen den Wurzelfasern angeheftet. Wassergewächse.

1. Gruppe. *MARSILEEN*. Marsiliaceen Bartling ord. nat. S. 15. Die Sporenfrüchte lederhäutig, an der Basis der B. oder Bstiele angeheftet. Der Wurzelstock fädlich, unter dem Wasser niedergestreckt und wurzelnd. Die B. in der Knospenlage schneckenf.-engerollt.

1. *PILULARIA* (Lin. gen. N. 1183.) Pillenkraut. Die Sporenfrüchte an der Basis der B. einzelnstehend, sehr kurz-gestielt, kugelig, lederig, 4flücherig, bei der Reife an der Spitze in 4 Lappen aufspringend. Die Sporenbehälter einer erhabenen zwischenklappigen Längslinie angeheftet; die unteren enthalten in einem Fache eine einzige, grössere, eyf., in der Mitte eingeschnürte Spore, die oberen sehr zahlreiche, ganz kleine Sporen.

1. *P. GLOBULIFERA* (L. spec. 1563.) Kugeltragendes P. — Die B. binsenartig, borstlich, ohne Blattfläche, die Sporenfrüchte von der Grösse einer Erbse. 2. In ruhigen, stehenden Wassern, Gräben, Sümpfen und am Rande der Teiche und Seen; wenn das Wasser im Sommer sich zurückzieht, kommt die Pfl. auch an feuchten O. fort, (vom Oberelsass dch d. Rheinfläche zerstreut bis Hannau und weiter hinab bis Westphalen, und von da dch das nördl. Deutschl.; in der Lausitz; Dechsendorfer Weiher bei Erlangen.) Aug. Sept. Bischoff Crypt. Gew. Tab. 7. 8. St. II. h. 1.

2. *MARSILÉA* (Lin. gen. N. 1182. mit Ausschl. v. Arten.) Marsilie. — Die Sporenfrüchte am unteren Theile der Bstiele, gestielt, einzelnstehend, oder 2-3 auf einem 2-3spaltigen Stielchen, oder fast sitzend, etwas kugelig oder eyf., lederig, 2fächerig und in die Quere in viele kleinere Fächer getheilt, bei der Reife in 2 Lappen aufspringend. Die Sporenbehälter an die erhabenen, in den Fächerchen querlaufenden Wandleisten angefügt, grössere und kleinere unter einander, die grösseren mit einer einzigen eyf., längl., nicht zsgeschnürten Spore versehen, die kleineren mit zahlreichen ganz kleinen Sporen angefüllt.

1. *M. QUADRIFOLIA* (Lin. spec. 1563.) Vierblättrige M. — Die Blättchen verkehrt-ey-keilf., ganzrandig, kahl; die Sporenfrüchte gestielt. 2. In ruhigen, stehenden Wassern, Gräben, (sehr zerstreut auf der Rheinfläche dch d. Elsass bis Germersheim hinab, und dch Baden bis gegen Mannheim; zw. Rosenheim und Kloster Roth in Oberbayern; Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyerm.) Juli-Sept. Die B. sind 4zählig, die Blättchen schwimmend. Bischoff Crypt. Gew. Tab. 7. 8. St. II. h. 1.

II. Gruppe. *SALVINIACEEN*. Bartling. ord. nat. S. 15. Die Sporenfrüchte sind häutig, zwischen den Wurzelfasern eingefügt oder an die Basis des Stengels oder der Zweige angewachsen und abwärts-gerichtet. Die Pfl. schwimmen frei im Wasser umher. Die B. 2reihig, in der Knospenlage von der Seite her eingerollt.

3. *SALVINIA* (Michel. gen. 107. t. 58.) Salvinie. — Die Sporenfrüchte kugelig oder oval, (bei der unserer Flora angehörigen Art) zwischen den Wurzelfasern einem kurzen, abwärts-gerichteten Zweig angeheftet, zu 4-8 zsgehäuft, häutig, nicht aufspringend, 1fächerig, auf der Basis des Faches mit einem Fruchttträger versehen, der in Stielchen gespalten ist, welche die Sporenbehälter tragen. Die Sporenbehälter 1sporig, in den äusseren Sporenfrüchten kugelig, in einem oder dem anderen der inneren eyf.; die Spore mit dem Sporenbehälter gleichgestaltet.

1. *S. NATANS* (Hoffm. Deutschl. Fl. B. 2. S. 1.) Schwimmende S. — Die B. elliptisch, stumpf, oberwärts von Sternhärchen etwas rauh; die Sporenfrüchte geknäult. 2. Auf rubigem Wasser schwimmend, (sehr zerstreut dch d. Gebiet, südl. Tyrol; Istrien; Schlesien; bei Berlin; bei Barby; Lübeck; in Baden bis Mannheim

hinab; Unterelsäss; Rheinpfalz bei Germersheim.) Juni. Aug. Bischoff Crypt. Gew. t. 9. St. II. h. I. Marsilea natans L. spec. 1562.

III. Gruppe. *ISOËTEEN*. Bartling. ord. nat. S. 19. Die Sporenfrüchte häutig, der inneren Fläche der Blatthasis angewachsen. Die B., auch in der Knospenlage nicht zugerollt. — Diese Pflanze lebt unter dem Wasser. Der Wurzelstock knollenförmig, niedergedrückt, unterwärts mit langen Fasern zahlreich besetzt, oberwärts mit einem dichten Blätterbüschel bedeckt. Ein St. fehlt. Die B. pfrieml., fast durchsichtig, innen mit Querwänden durchzogen und unterwärts 4 fächerig.

4. *ISOËTES* (Lin. gen. N. 1184.) Brachsenkraut. — Die Sporenfrüchte oval oder rundl., auf die erweiterte, konkave Blatthasis aufgewachsen, häutig, nicht aufspringend, oberwärts halbverdeckt durch eine halbmondf., aus dem Blatte hervortretende Membran, und an der Spitze mit einem herzf. Schüppchen gestützt, im Inneren mit aus dem Rücken strahlend hervortretenden und die Sporenbehälter tragenden Fäden durchzogen; zweigestaltig, nämlich die einen davon aussen holperig, grössere Sporenbehälter enthaltend, die anderen glatt, mit sehr kleinen, staubartigen Sporenbehältern gefüllt. Die grösseren Sporen sind mit 3 an der Spitze zulaufenden Rippen und einem erhabenen Ring bezeichnet. Der Sporenbehälter selbst, aus einer zarten, enganschliessenden Haut bestehend, lässt sich im jungen Zustande von der Spore als eine ganze Haut ablösen, mehr gereift fällt derselbe von selbst aber in Stückchen von der Spore ab.

1. I. *LACUSTRIS* (Lin. spec. 1563.) Gemeines Brachsenkraut. — 4. Unter dem Wasser auf dem Grunde der Seen, (im Bistritzer See in Böhmen, eine Abänderung mit sichelförmig-gebogenen Blättern im Eisensteiner See im Böhmerwalde, Tausch; auf dem Grunde des Sees Gerardmer in den granitischen Vogesen, F. W. Schultz. fl. exsicc. n. 574.; Feldsee im Breisgau, Lang; im See unweit Trittau Fl. v. Hamburg, Sonder; sodann in sumpfigen Wiesen (?) bei dem Dorfe Süsel in Holstein, nach Wiggers.) Juli-Sept. St. II. h. 17.

Ordng. CXXXIV. LYCOPODIACEEN. DC. fl. fr. 2. S. 257.

Die Sporenbehälter in den Winkeln der St.-B. sitzend, in Klappen aufspringend. — Der St. mit seiner Basis niederliegend oder als Wurzelstock über oder in der Erde kriechend, mit aufrechten Aesten oder Stengeln. Die Wurzelfasern stark. Die B. immer wechselständig, aber manchmal 2- oder 4zeilig, die, welche die Frucht stützen, bei mehreren Arten zu DeckB. verkleinert, wodurch der Fruchtstand ährenförmig wird.

1. *LYCOPodium* (Lin. gen. N. 1185. mit Ausschluss von *Lycopodoides* und *Selceginoides* Dillen.) Bärlapp. — Die Sporen-

behälter sitzend oder sehr kurz-gestielt, rundl., nierenf. oder quereyf., 1fächerig, mit einer Querritze aufspringend, sämmtlich gleichgestaltet. Die Sporen sehr fein, mehlig, kugelig, zu viere in 3seitigen Körperchen zshängend.

§. 1. Die Sporenbehälter blattwinkelständig, nicht in einer Aehre; sämmtliche B. gleichgestaltet, keine in anders gestaltete DeckB. verwandelt.

1. L. SELAGO (L. spec. 1565.) Tannen-B. — Die St. *aufrecht, aufstrebend*, dicht-beblättert, von der Basis an gabelspaltig verästelt, mit gleichhohen Aesten; die B. lanzettl., zugespitzt, ganzrandig oder etwas gezähnt, lederig, starr; die *Sporenbehälter blattwinkelständig*. 4. In schattigen Bergwäldern an Felsen und Baumwurzeln. Juli Aug. Bischoff Crypt. Gew. t. 10. fig. 1. u. 7., t. 11. fig. 22-24. St. II. h. 5. Die B. aufrecht, angedrückt; kommt hie und da auch vor mit abstehenden oder zurückgebogenen B. und zurückgekrümmten Aesten: L. recurvum Kit. bei Willd. sp. pl. 5. S. 50.

§. 2. Die Sporenbehälter ährig, aber weniger deutlich, die Aehre auf einem aufrechten, ganz einfachen Ast, die DeckB. mit den B. gleichgestaltig, nur an der Basis ein wenig verbreitert.

2. L. INUNDATUM (L. spec. 1565.) Sumpf-B. — Die St. *auf die Erde niedergedrückt, wurzelnd*, sowie die Aeste dicht-beblättert; die Aeste aufrecht, ganz einfach, in eine einzelnstehende Aehre endigend; die B. lineal.-lanzettl., verschmälert-zugespitzt, ganzrandig, *mit den DeckB. gleichgestaltet*. 4. Auf Haiden und unbauten, feuchten, torfigen O., (zerstreut dch d. Gebiet.) Juli. Aug. Die DeckB. sind an der Basis verbreitert und hie und da mit einem Zähnen versehen. Bischoff Crypt. Gew. t. 10. fig. 2. und 8., t. 11. fig. 26. St. II. h. 5.

§. 3. Die Aehren stiellos auf der Spitze der Zweige, einzelnstehend; die DeckB. den B. unählich. Die Aeste des St. aufrecht oder aufstrebend verzweigt oder auch sehr verzweigt.

3. L. ANNOTINUM (L. spec. 1566.) Sprossender B. — Die St. kriechend, die Aeste aufrecht oder aufstrebend, unten ein- oder mehrmal gabelig-getheilt, sodann einfach; die B. lineal.-lanzettl., zugespitzt, *stachelspitzig*, nach vorne gesägt, abstehend oder zurückgebogen; die *Aehren* endst., *einzeln, sitzend*; die DeckB. breit-eyf., haarspitzig, ausgebissen-gezähnt. 4. In schattigen Wäldern der Gebirge und VorA., (sehr zerstreut dch d. Gebiet.) Juli. Aug. St. und Aeste sind mit einer vom Blattrande hinablaufenden vertieften Linie bezeichnet. Bischoff Crypt. Gew. t. 10. fig. 3. und 9., t. 11. fig. 21. St. II. h. 5.

4. L. ALPINUM (L. spec. 1367.) Alpen-B. — Die St. kriechend, die Aeste aufrecht, gabelig-gebüschelt; die B. lanzettl., *spitz, ganzrandig, angedrückt*, die der Aeste *4reihig*; die *Aehren* endst., *einzeln, sitzend*, die DeckB. breit-eyf., zugespitzt, gezähnt. 4. An trockenen und hochgelegenen O. der VorA. und A. bis hinauf zum ewigen Schnee, (zerstreut dch die Alpenkette; auf den hohen Punkten der Vogesen, des Harzes und der Sudeten.) Aug. Sept. St. II. h. 5.

6. 4. Die Aehren auf einem verlängerten, meistens an der Spitze 2-3-6theiligen Stiele befindlich. Die DeckB. den B. unähnlich, die Aeste aufrecht, verzweigt oder auch sehr verzweigt.

5. L. CHAMAECYPARISSUS (Alex. Braun in Doell. rhein. Fl. S. 36.) Cypressenähnlicher B. — Die St. kriechend, die Aeste aufrecht, gabelspaltig, sehr verzweigt, *die Aestchen aufrecht*, zsgedrückt, zweischneidig, auf der inneren Seite flach, gebüschelt, *die Büschel gleichhoch*, die B. der Aestchen 4reihig, lanzettl., zugespitzt-stachelspitzig, die seitlichen aufrecht-abstehend, unten zsgewachsen und herablaufend, die äusseren und inneren angedrückt und an Grösse fast gleich; *die fruchtragenden Stiele verlängert, 2-6 ährig*; die DeckB. breit-eyf., haarspitzig, ausgebissen-feingekerbt. 4. In Wäldern und Haiden, zumal sandigen, (zerstreut in Tyrol, der Schweiz und den Gebirgen zu beiden Seiten des Rheines bis Westphalen; von da dch das nördl. Deutschland bis nach Preussen, der Lausitz und Schlesien.) Juli. Aug. L. complanatum Pollich. palat. 3. S. 27. und mehrerer deutsch. Fl. Bischoff Crypt. Gew. t. 10. fig. 5. St. II. h. 5. Chamaecyparissus Tabernaem. kräuterb. S. 1357. mit Abbild.

6. L. COMPLANATUM (Lin. spec. 1567.) Flacher B. Die St. kriechend, die Aeste aufstrebend, gabelspaltig, sehr verzweigt, *die Aestchen fächerartig auseinander tretend*, zsgedrückt, 2schneidig, an der inneren Seite flach; die B. der Aestchen 4reihig, die seitlichen eyf., zsgewachsen, herablaufend, zugespitzt-stachelspitzig, abstehend, die äusseren lanzettl., angedrückt, die inneren pfrieml., sehr klein; *die fruchtragenden Stiele verlängert, 2-6 ährig*; die DeckB. breit-eyf., haarspitzig, ausgebissen-feingekerbt. 4. In Bergwäldern der A. und VorA., (Schweiz, Tyrol und zerstreut dch die Alpenkette; sodann in Schles.; Mähr.; Böhmen und angeblich auch im nördl. D.) Juli. Aug. St. II. h. 5.

7. L. CLAVATUM (L. spec. 1564.) Gemeiner B. — Die St. kriechend, die Aeste aufstrebend; *die B. zerstreut, lineal-lanzettl., zugespitzt, in ein verlängertes Haar endigend*; die Aehren gestielt, gepaart; die DeckB. breit-eyf., haarspitzig, ausgebissen-gezähnt. 4. In etwas feuchten Wäldern und Haiden. Juli. Aug. Bischoff Crypt. Gew. t. 10. fig. 4. und 11., fig. 14. 15. 16. 25. St. II. h. 5.

2. SELAGINELLA (Spring. in Doell. rhein. Fl. S. 38.) Selaginelle. — Die Sporenbehälter von zweierlei Form, die einen nierenf. oder rundl., mit sehr kleinen, wie bei Lycopodium zu vieren aneinanderhängenden, aber feinstacheligen Sporen gefüllt; die anderen 3-4knöpfig, 3-4 grössere Sporen enthaltend, welche mit 3 erhabenen, an der Spitze zulaufenden Riefen versehen sind.

1. S. SPINULOSA (Alex. Braun bei Doell. a. a. O.) Dornige S. — Die St. kriechend, die Aeste aufstrebend; *die B. zerstreut, lanzettl., abstehend, dornig-gezähnt*; die Aehren endst., einzeln. 4. An feuchten O. der A. und VorA., (dch d. Alpenkette und auf dem Feldberge im Breisgau, den höchsten Punkten des Harzes und der Sudeten.) Juli. Aug. Lycopodium Selaginoides L. sp. 1563. Bischoff Crypt. Gew. t. 11. fig. 17-19., 35-38. St. II. h. 5. Selaginoides foliis spinosis Dillen. musc. t. 68. fig. 1.

2. *S. HELVETICA* (Spring. in Doell. rhein. Fl. S. 39.) Schweizer-S. — Die St. niederliegend, rasig, an ihrer Basis wurzelnd, die Aeste flach; die *B.* 4zeilig, am Rande gezähnel-*rauh*, längl.-eyf. oder eyf., die der *Seitenzeilen* rechtwinkelig-abstehend, die der *inneren Zeilen* halb so gross, aufrecht übereinanderliegend; die Aehren verlängert, einfach oder 2spaltig, auf einem klein-beblätterten Fruchtsstiele befindlich; die Deck*B.* eyf., spitz. 2. (Auf Felsen der A. und VorA. bis in die Wälder am Fusse der A. und daselbst auf Baumwurzeln; um Salzburg, München u. s. w.; Vögesen.) Juli. Aug. *Lycopodium helveticum* L. spec. 1568. Bischoff Crypt. Gew. t. 10. fig. 6. und 10., t. 11. fig. 31-34. St. II. h. 5. L. radicans Schrank. haier. Fl. N. 1447. *Lycopodioides denticulatum pulchrum repens*, spicis pediculis insidentibus, Dillen. musc. 465. t. 65. fig. 2. Die ganz ähnliche *Selaginella denticulata* (*Lycopodium denticulatum* L. sp. 1569) unterscheidet sich durch Folgendes: die *B.* sind bemerkbarer gesägt und die Deck*B.* haben gleiche Grösse und Farbe wie die *B.* der Aeste, weshalb die Aehren als sitzend beschrieben werden; die oberen Deck*B.* endigen in eine Haarspitze, während solche bei *S. helvetica* einfach spitz sind.

Ordng. CXXXV FILICES. Farne. Lin. gen. pl. ed. 4. S. 484. mit Ausschl. d. Arten. Rob. Brown. prodr. S. 146.

Die Sporenbehälter befinden sich auf der untern Seite der *B.* (des Wedels) und stellen bei einzelnen, wo die BZpfl sich verschmälern und sich zu einer blossen Mittelrippe zsziehen, Aehren oder Rispen dar. — Perennirende Pflanzen mit kriechendem Wurzelstock, seltener mit aufrechtem St.

1. Gruppe. *OPHIOGLOSSSEN*. Rob. Brown. prodr. S. 163. Die Sporenbehälter sitzend oder an den Seiten zsgewachsen, kugelig, lederig, undurchscheinend, ohne Ring, ohne Gefässe, einfächerig, regelmässig 2klappig.

1. *BOTRYCHIUM* (Swartz. Syn. S. 171.) Mondraute. — Die Sporenbehälter nicht mit einander zshängend, in zsgesetzte, rispige, einseitige Aehren 2reihig geordnet, halb-2klappig.

1. *B. LUNARIA* (Swartz. Syn. S. 171.) Gemeine M. — *Der nicht fruchttragende einzelne Wedel* längl., 2-3 mal schmaler als lang, dem Bstiel des fruchttragenden Laubes bis zur Mitte und noch höher angewachsen und denselben umwickelnd, fiedertheilig, die Fieder in die Quere breiter, keil-halbmondf., ganzrandig, fein-gekerbt, oder fächerf.-eingeschnitten. 2. Auf Wiesen und trockenen Weiden, freien Waldplätzen, Haiden, bis in die höchsten A. hinaufsteigend. Mai. Juni. *Osmunda Lunaria* L. spec. 1519. St. II. h. 1. Stempel. filic. berol. fig. 1-4.

2. *B. MATRICARIAEFOLIUM* (Alex. Braun in Doell. rhein. Fl. S. 24.) Mutterkrautf. M. — *Das nicht fruchttragende einzelne*

Wedel *längl.*, 2—3 mal schmaler als lang, dem Bstiel des fruchttragenden Laubes bis zur Mitte und noch höher angewachsen und denselben umwickelnd, fiedertheilig, *die Fieder eyf. oder längl.*, fiederspaltig-gelappt, die Lappen 2-3kerbig. 4. Auf Wiesen und trockenen Weiden, (selten und sehr zerstreut durch d. Geb.) Mal. Juni. *B. rutaceum* Swartz. Syn. filic. S. 171. Willd. spec. pl. 5. S. 62. *B. Lunaria* β . *rutaceum* Wahlenb. fl. succ. S. 681. Fries nov. ed. 2. S. 289. *B. Lunaria* δ . *rutacifolia* Roep. fl. meckl. 1. S. 111. Stempel. filic. herol. f. 5. — *Lunaria racemosa minor* Matricariae folio Breyn. cent. S. 184. t. 94. — Ich trennte diese Art, damit sie weiter beobachtet werde; sie scheint mir eine eigenthümliche Species und keine Variet. von *B. Lunaria*. Die Wedel dieser Art sehen einigermassen aus wie die Blätter von *Matricaria Parthenium*; die der folgenden Art haben mit denselben keine Aehnlichkeit.

3. *B. RUTAEFOLIUM* (Alex. Braun. in Doell. rhein. Fl. S. 24.) Rautenblättrige M. — Die meistens 2 nicht fruchttragenden Wedel langgestielt, der Bstiel des unteren die Basis des fruchttragenden scheidig umgebend, der des oberen angewachsen, *der Wedel dreieckig*, in die Quere breiter und 3zählig, die Abschnitte fiederig, die Fieder *längl.*, stumpf, kerbig-gelappt. 4. Auf Triften, in Wäldern und den VorA., (Oberschlesien, bei Gnadenfeld, Radoscher und Wroniner Wald, im Gesenke bei Ludwigsthal, am Uhstein bei Einsiedel, Grabowski; Wolesschna in Böhmen, Tausch pl. sel.; Nisky in der Lausitz; in dem Hayforste bei Hadersbach zw. Regensburg und Straubing; nicht wiedergefunden auf den in der naturh. Topogr. von Regensb. angegebenen StandO., Fürnrohr; Bacherberge in Steyerm. v. Heuffler; hohe Vogesen auf Granit, Ballon von Sultz, Rotherrück, Hoheneck; Steyermk.) Juni. Juli. *B. rutaceum* Swartz. Syn. fil. S. 171. (nicht Willd.) Swartz verwechselte es mit der rautenblättrigen Variet. von *B. Lunaria*, dem *B. rutaceum* Willdenows. Fries nov. S. 289. *B. rutaceum* Wahlenb. fl. succ. S. 681. *B. matricarioides* Willd. sp. 5. S. 62. *Osmunda matricariae* Schrank baier. Fl. 2. S. 419. St. II. h. 6. Die von Alex. Braun vorgeschlagenen Namen habe ich angewandt, weil der Name *B. rutaceum* vielfach verwechselt wurde.

2. *OPHTOGLOSSUM* (Lin. gen. N. 1171.) Natterzunge. Die Sporenbehälter in eine einseitige Aehre zweireihig geordnet, an ihren Seiten zsgewachsen, *quer-zwei-klappig*; die Aehre vor der Reife knötig-gegliedert, dann, nachdem die Sporenbehälter sich geöffnet, ausgerandet-gezähnt.

1. *O. VULGATUM* (Lin. sp. 1518.) Gemeine N. — Der nicht fruchttragende Wedel *eyf. oder länglich* mit kurz herablaufender Basis, die einzeln vorhandene Aehre einfach oder 2spaltig. 4. Auf feuchten Wiesen und grasigen Waldplätzen, (zerstreut durch d. Geb.) Juni. St. II. h. 1.

2. *O. LUSITANICUM* (L. spec. 1518.) Portugiesische N. — Der nicht fruchttragende Wedel *lanzettl.*, von der Mitte gegen die Basis zu keilf. verschmälert, die Aehre einzeln vorhanden. 4. Auf

sandigen O. am Meere, (am Hafen von Veruda in Istrien.) Januar. Barrel. t. 252. f. 2. Das nicht-fruchtttragende Laub ist $1\frac{1}{2}$ Zoll lang und 2—3 Linien breit.

II. Gruppe. *OSMUNDACEEN*. Rob. Brown prodr. S. 161. Die Sporenbehälter ohne Fruchtring, aderig-netzig, auf dem Rücken mit einem gestreiften Höcker, (einem unvollkommenen Fruchtring) versehen, von der Basis bis zu dem Rücken-Höcker der Länge nach regelmässig in 2 Klappen aufspringend, ährig oder ährig-rispig, indem die Fieder des Wedels verschmälert, oder zu einer Mittelrippe zsgeschmolzen sind.

3. *OSMUNDA* (Lin. gen. N. 1172.) Traubenfarn. — Die Sporenbehälter kugelig, gestielt, aderig-netzig, am Rücken mit einem kleinen Höcker versehen, regelmässig 2klappig.

1. *O. REGALIS* (Lin. sp. 1521.) Königs-Farn. — Die Wedel doppelt-gefiedert, die Fieder lanzettl., schwach gekerbt, an der Basis schief-abgestutzt; die Fruchthäufchen rundlich, wechselständig, dicht-ährig, die Aehren in eine doppelt-gefiederte endst. Rispe zsgestellt. 4. Auf feuchten Waldwiesen und in sumpfigen Wäldern (der Berge und Ebenen.) Juni. St. II. h. 6. Die Fiederchen der beiden Fieder, welche unter der fruchtttragenden Rispe stehen, werden oft an ihrer Basis lappig-gekerbt und tragen daselbst auf der unteren Seite randst. Fruchthäufchen; manchmal ist der Wedel unten und oben nicht verändert, während die Fiederchen der mittleren Fieder an der Basis Früchte tragen.

III. Gruppe. *POLYPODIACEEN*. Rob. Brown. prodr. S. 146. Die Sporenbehälter einfächerig, netzig-aderig, der Länge nach mit einem gegliederten, meist auf einer Seite unvollständigen Ringe eingefasst, in die Queere unregelmässig aufspringend.

I. Untergruppe. *NACKTE POLYPODIACEEN*. Die Fruchthäufchen nackt, weder mit einem häutigen Schleierchen, noch mit dem umgerollten Rande des Wedels bedeckt.

4. *GRAMMITIS* (Swartz. Syn. S. 21.) Strich-Farn. — Die Fruchthäufchen lineal., auf dem Mittelfelde des Wedels schief und fiederig oder gabelig gelagert. Das Schleierchen fehlend.

1. *G. CETERACH* (Swartz. filic. S. 23.) Gemeiner S. — Der Wedel fiederspaltig, unterseits spreuig-schuppig, mit eyf. oder längl. stumpfen Zipfeln, die Sprenschuppen am Rande ausgeschweift gezähnel. 4. Auf Felsen und Mauern an sonnigen O., zumal auf Kalkboden, (zerstreut dch d. Geb.) Juni. Juli. *Asplenium Ceterach* L. spec. 1538. St. II. h. 5. *Ceterach officinarum* Willd. sp. 5. S. 136. *Gymnogramma Ceterach* Spreng. s. v. 4. S. 38. *Scolopendrium Ceterach*. Roth. tent. 3. S. 48.

5. *POLYPODIUM* (Lin. gen. N. 1179. mit Ausschluss von Arten.) Tüpfel-Farn. Die Fruchthäufchen rundl., zerstreut oder in Reihen geordnet. Schleierchen und Hülle fehlend.

1. *P. VULGARE* (Lin. spec. 1544.) Gemeiner Tüpfelfarn, Engelsüss. — *Der Wedel* dem äusseren Umfange nach lanzettl., *fiedertheilig*, die Fieder von der Basis gegen die Spitze zu allmählig kleiner, genähert, wechselständig, lineal.-längl., *ungetheilt*, meist feingesägt; die Fruchthäufchen auf der einzelnen Fieder 2reihig, der Stiel kahl. 2. An alten Mauern, in Felsenspalten, auf Felsen, in Wäldern zw. den Wurzeln alter Bäume. Juni. Juli. St. II. h. I. Die Variet. β . in Willd. sp. pl. B. 5. S. 173. mit an ihrer oberen Basis geöhrelten unteren Zipfeln des Wedels, und γ . mit grösserem, bemerklich gesägtem Wedel, kommen hie und da vor, aber die Variet. ϵ . mit viel breiterem Wedel und fiederspaltig-gezähnten Zipfeln, *P. cambricum* L. sp. 1546, ist eine monströse Entartung und wird bei uns nur in Gärten gezogen.

2. *P. PHEGopteris* (L. spec. 1555.) Buchen-Tüpfelfarn. — *Der Wedel* dem äusseren Umfange nach eysf., lang zugespitzt, beiderseits flaumhaarig, am Rande gewimpert, gefiedert, die Fieder fiederspaltig, die untersten hinabgerichtet, die Fiederchen längl., stumpf, schwach gekerbt; *das unterste Paar der Fiederchen mit dem gleichen der gegenüberstehenden Seite zu einer vier-eckigen oder rautenf. Figur zsgewachsen*. 2. An steinigen O., Felsen und Wurzeln alter Bäume in feuchten Wäldern der Ebenen, Berge u. VorA.Gegenden. Juni. Aug. Schk. Crypt. 17. t. 20.

3. *P. DRYopteris* (L. sp. 1555.) Eichen-T. — *Der Wedel* rückwärts-geneigt, *kahl*, im äusseren Umfang *deltaförmig*, *dreizählig-doppelt-fiederspaltig*, die untersten Fieder fiederig-getheilt, die Fiederchen längl., stumpf, ganzrandig, oder die unteren gekerbt, die Fruchthäufchen immer getrennt. 2. Auf Felsen, an steinigen O., an Baumwurzeln in Wäldern und an alten schattigen Mauern. Juni. Aug. St. II. h. I.

4. *P. ROBERTIANUM* (Hoffm. D. II. crypt. Jahrg. 1795, im Anh. S. 10.) Robert's T. — *Der Wedel* gerade-aufwärts-gerichtet, *drüsig-flaumig*, im äusseren Umfange *deltaförmig*, *dreizählig-doppelt-fiederspaltig*, die untersten Fieder fiederig-getheilt, die Fiederchen längl., stumpf, ganzrandig, oder die unteren gekerbt; die Fruchthäufchen später zssliessend. 2. An steinigen, waldigen O. und im Gebüsch, namentlich der Kalk-Gebirge, (Schweiz, Elsass, Baden, Regensburg, Salzb., Oestr., Steyeru., Böhm., Harz.) Juni—Aug. *P. calcareum* Smith. brit. S. 1117. 1804. *P. Dryopteris* Bolt. filic. 53. t. 1.

5. *P. ALPESTRE* (Hoppe pl. exsicc.) Alpen-T. — *Der Wedel* *kahl*, im äusseren Umfange *längl.-lanzettl.*, *gegen die Spitze und Basis allmählig schmäler*, *doppelt-fiedersp.*, die Fiederchen *lanzettl.*, *fiederth.*, die Lappchen längl., eingeschnitten-kerbt, schief-stachelspitzig; die Fruchthäufchen getrennt. 2. An feuchten O. und neben Gesträuch auf den A. und VorA. (dch die Alpenkette, auf den höchsten Punkten der Vogesen und des Schwarzwaldes; Harz, Felsen an der Bode; Oberschlesien, im Gesenke weit-verbreitet.) Juni—Aug. *P. alpestre* Spenn. fl. frieb. I. S. 12. Walfr. fl. crypt. S. 14. Doell. rhein. Fl. S. 6. *P.*

rhaeticum DC. fl. fr. 5. S. 242. Vill. voy. S. 12. mit Ausschl. des Syn. von Roth. Schk. crypt. t. 60. Godron fl. d. Lorr. 2. S. 213. *P. molle* All. ped. 2. S. 287. Vill. delph. 3. S. 844. *P. rhaeticum* L. spec. 1552. nach dem Citat aus J. Bauhin (hist. 3. S. 470. mit einer Abbildung, welche genau unsere Pflanze darstellt.) Das *Polypodium alpestre* unterscheidet sich leicht von dem sehr ähnlichen *Asplenium Filix femina*, (*Polypodium* L.) dch die vom Anfang an kreisförmigen Fruchthäufchen. — Smith erwähnt, dass ein Expl. von *Polypodium Filix femina* unter dem Namen *P. rhaeticum* im Linneischen Herbar aufbewahrt werde, allein dieses Expl. ist nach meiner Ansicht noch einmal von Neuem genau zu untersuchen, da Smith das ganz ähnliche *P. alpestre* Hoppe's nicht kannte. Das *Polypodium rhaeticum* der meisten Autoren nach Linne gehört zu den Abänderungen von *Cystopteris fragilis*.

6. **WOODSIA** (Rob. Brown. trans. of the lin. soc. B. 11. 1816. S. 170–174.) Woodsie. — Die Fruchthäufchen rundlich. Die Hülle kelchf., offen, am Rande behaart, gestielte Kapseln einschliessend; R. Brown a. a. O. — Die Haut, welche die um die Fruchthäufchen gelagerten spreuartigen Haare an ihrer Basis in eine Hülle zsfügt, konnte ich an den getrockneten Pflanzen nicht auffinden; im lebenden Zustande dieselben zu untersuchen, hatte ich noch nicht Gelegenheit.

1. **W. HYPERBOREA** (Koch.) Nördliche Woodsie. Der Wedel im äusseren Umfange längl. oder lanzettl., unterwärts an der Spindel und dem Stiel spreuig-rauhh., gefiedert, die Fieder eyf. oder eyf.-lansettl., fiederspaltig, die Läppchen rundl. oder eyf., ganzrandig oder schwach-stumpf-gekerbt. 4. An Felsen bergiger Gegenden, der A. und VorA. Sommer. *W. ilvensis* Babingt. man. S. 384. *Polypodium hyperboreum* Wahlb. fl. suec. S. 670. *Acrostichum Marantae* Wulf. in Jacq. col. 2. S. 5. nach den angeführten StandO., nämlich auf dem Berge Tollstein in Stmk. Kommt vor:

α. arvonica, die Fieder kurz, 3eckig-eyf., die untersten Läppchen zu 1—2 übereinander-liegend oder an einander stossend, die übrigen zsgelassen: *Polypodium arvonicum* Withering, Smith. brit. 3. S. 1115. *P. hyperboreum* Sw. Syn. fil. S. 39. St. II. h. 11. *Acrostichum hyperboreum* Liljebl. in act. holm. 1793. S. 201. t. 8. *Ceterach alpinum* DC. fl. fr. 2. S. 567. Diese in d. A. der Schweiz, Salzbg., Kärnth., Schles., (kleine Schneegrube im Riesengebirge.)

Mittelformen zwischen dieser und der folgenden Variet. fasst Babington unter seiner Variet. *β. intermedia* zusammen.

β. rufidula, die Fieder lanzettl., die Läppchen derselben ein wenig entfernt von einander. *Woodsia ilvensis* Rob. Brown. a. a. O. *Acrostichum ilvense* L. spec. 1528. *Polypodium ilvense* Swartz. syn. filic. S. 39. St. II. h. 6. *P. Marantae* Hoffm. D. fl. 2. S. 5. *Polystichum Marantae* Roth. tent. 3. S. 92. *Aspidium rufidulum* Swartz. Syn. fil. S. 58. *Nephrodium rufidulum* Mich. amer. 2. S. 269. (Tyrol, Oetzthal oberhalb Umhausen, Bischoff; Böhmen an dem Schlosse Tollenstein auf der Grenze der Lausitz, auf dem

Berge Kleis an der schroffen Mittagsseite, an dem hohen Felsen des Dorfes Kauerzimeg am Ufer der Beraun, Wulfen; an den Milleschauer Bergen, Tausch, pl. sel.; Schlesien an Felsen im Weistritzthal, Wimmer; Hessen. Burghausungen bei Cassel, Pfeiffer; Rhön, Wenderoth; Harz, in dem Ocker- und Bodethale, G. F. W. Meyer.

II. Untergruppe. *BESCHLEIERTE POLYPODIACEEN.* Die jüngeren Fruchthäufchen mit einem häutigen Schleierchen bedeckt.

7. *ASPIDIUM* (Rob. Brown. prodr. fl. nov. holl. ed. norimb. S. 3.) Schild-Farn. — Die Fruchthäufchen rundl. in Reihen geordnet oder zerstreut. Das Schleierchen häutig, kreisrund, schildf., gestielt, im Mittelpunkte angeheftet, ringsherum frei. — Diese Gattung hat wahrhaft schildf. Schleierchen, verdient daher den Namen Schildfarn (*Aspidium*) vor allen anderen.

1. *A. LONCHITIS* (Swartz. Synops. fil. S. 43.) Lanzenartiger S. — Der Wedel im äusseren Umfange verlängert-lanzettl., gefiedert, die Fieder ungetheilt, lanzettl.-sichelf., an der Basis vorne spitz-geöhrt, unten spreuig-haarig, doppelt-gesägt, die grösseren Sägezähne dornig-haarspitzig, Stiel und Spindel spreuig. 4. An Felsen in den VorA. und A., (doch die Alpenkette; hohe Vöge- sen; Feldberg in Baden; rauhe Alp in Würtemberg; Vogelsberg in Hessen; Kessel im schlesischen Gesenke; Harz.) Juli. Aug. *Polypodium Lonchitis* L. spec. 1548. St. II. h. I. *Polystichum Lonchitis* Roth, tent. 3. S. 71. Die untersten Fieder des Laubes sind eyf. und meist an der Basis zu beiden Seiten beöhrt.

2. *A. ACULEATUM* (Döll. rhein. Fl. S. 20.) Stacheliger Schild-Farn. — Der Wedel im äusseren Umfang längl.-lanzettl., unten spreuig-haarig, doppelt-gefiedert, die Fieder lanzettl., zugespitzt, die Fiederchen schief-eyf., etwas halbmondf., vorne oft geöhrt, ungleich stachelig-gezähnt, gestielt, die oberen sitzend, in einander fliessend, Stiel und Spindel spreuig. 4. An feuchten, schattigen Stellen der Wälder, (zerstreut doch d. Geb.) Juli. Aug. St. II. h. II. *Polypodium aculeatum* L. spec. 1552. *Polystichum aculeatum* Roth, tent. 3. S. 70. Folgende Variet. sind bemerkenswerth:

a. vulgare, Doell. rhein. Fl. S. 20., der Wedel steif, die Fiederchen fast rautenf., an der Basis kurz-keilf., breittlicher gestielt mit etwas herablaufenden Stielchen; die oberen Fiederchen an der Basis zusammenfliessend, an den obersten Fiedern zu einer einzigen grob-gezähnten zsschmelzend, das unterste obere Fiederchen deutlich grösser, wie die übrigen. *A. lobatum* Swartz. filic. S. 53. *A. aculeatum* St. II. h. II. nicht getren. *Polypodium lobatum* Hdb. angl. 459. *Polystichum lobatum* Presl. pterid. S. 83.

Das *Polystichum Plukenetii* DC. fl. fr. 5. S. 241., *Polypodium Plukenetii* Lois. not. 146. scheint in jüngeren Expl. der Variet. *a.* zu bestehen mit fiederspaltig-gelappten Fiedern; es sind nämlich alle Fiederchen bis zur Mitte zsgelassen, auch sind sie unvoll-

ständig-fructificirend; ein Original-Expl. aber habe ich noch nicht gesehen.

β. Swartzianum, der Wedel ist weicher, die Fiederchen schief-eyf., stumpfl., an der Basis abgestutzt, auf einem zwar kurzen, aber schlankeren und nicht herablaufenden Stielchen sitzend, vorne geöhrelt, das unterste obere Fiederchen oft nicht grösser, als die übrigen: *Aspidium aculeatum* Swartz. filic. S. 53. Smith. engl. fl. B. 4. S. 277. Willd. sp. 5. S. 258. *Polystichum aculeatum* Presl. pterid. S. 83. Von diesem ist kaum als Variet. zu trennen:

A. angulare Kit. bei Willd., denn es kommt in allen Stücken überein und unterscheidet sich blos dadurch, dass das unterste obere Fiederchen fiederspaltig und deutlich grösser ist, wie die übrigen. *A. angulare* Willd. spec. 257. Smith. engl. fl. 4. S. 278. *A. aculeatum* Schultz. fl. gall. et germ. exsicc. n. 571. *Polystichum angulare* Presl. pterid. S. 83. Eine merkwürdige Form von *A. aculeatum* *Swartzianum* ist:

subtripinnatum, welches der vorhergehenden Form ähnlich ist, aber viel breitere Fieder und fiederig-getheilte untere Fiederchen hat, deren unterste Lappchen gestielt und frei sind.

γ. Braunii Döll. a. a. O., der Wedel gegen die Basis zu mehr verschmälert, die Fieder längl.-lanzettl., die unteren stumpf und an der stumpfen Spitze kurz-zugespitzt, die Fiederchen gleichgestaltet, breitlich-länglich und an der Basis fast rechtwinkelig abgestutzt: *A. Braunii* Spenner. fl. frib. I. S. 9.

Die Stand O. der hier aufgeführten Varietäten sind sorgfältiger aufzuzählen. Die Variet. *α.* ist in den Rheingegenden hie und da gemein; die Var. *β.* im Bereiche Badens sehr selten; *γ.* besitze ich aus Frankreich und *δ.* aus England; *ε.* wurde in dem Thal „Hölle“ des Schwarzwaldes und in den Sudeten gefunden, woher ich es erhalten habe.

8. POLYSTICHUM (Roth. tent. fl. germ. 3. S. 69.) Wald-farn. — Die Fruchthäufchen rundl., in Reihen geordnet oder zerstreut. Das Schleierchen häutig, rundl., im Mittelpunkte und mit einer niedergedrückten Falte angeheftet, nierenf. — *Lastrea* Presl. pterid. S. 73. Ich habe den Namen „*Polystichum*“ beibehalten, welchen Roth den hier aufgeführten Arten beigelegt hat, nach Trennung der wenigeren Arten, welche, mit wahrhaft schildförmigen Schleierchen versehen, der Gattung *Aspidium* Rob. Brown angehören. Roth war der erste, welcher die beschleierte Polypodien in drei Gattungen mit Klarheit vertheilt hat, nämlich in *Athyrium*, *Polystichum* und *Cyathea*, (*Cystopteris*.) Die Gattung *Athyrium* habe ich nach Bernhardt's Vorgang mit *Asplenium* vereinigt. — Ueber das *Nephrodium* Michaux, der diese Gattung zuerst angestellt hat, vergl. Link. hort. reg. bot. ber. B. 2. S. 125.; der Name *Nephrodium* ist von den neueren Botanikern in verschiedenem Sinne gebraucht worden.

1. P. THELYPTERIS (Roth. tent. fl. g. 3. S. 77.) Sumpf-Wald-farn. — Der Wedel drüsenlos, gefiedert, die Fieder lineal.-lan-

zettl., fiederig - getheilt, die *Fiederehen* längl., spitzlich, ganzrandig oder ausgeschweift, mit zurückgerolltem Rande am fruchthtragenden Wedel; die Fruchthäufchen auf der Mittelfläche der Fiederehen zweireihig, später zulaufend; der Wurzelstock kriechend. 4. Auf sumpfigen, torfigen Wiesen, an Waldgraben auf feuchtem Boden, (zerstr. dch d. Geb.) Juli, Aug. Polypodium Thelypteris L. mant. 303., St. II. h. I. Acrostichum Thelypteris L. sp. pl. 1528. Aspidium Thelypteris Swartz. s. fil. 50. Lastraea Thelypteris Presl. pterid. S. 276. Die Fruchthäufchen sind auf dem Mittelfelde der Fiederehen in zwei Reihen geordnet, wie wir das an grösseren Expl., deren untere Fieder an ihrem Rande nicht zurückgerollt sind, bemerken, aber auch an diesen Expl. haben die oberen Fieder, sowie bei kleineren Expl. alle zusammen, einen zurückgerollten Rand, was den Schein giebt, als seyen die Fruchthäufchen randständig, zuletzt fliessen diese zusammen, so dass sie an kleineren Expl. die ganze Oberfläche bedecken.

2. P. OREOPTERIS (DeC. fl. fr. 2. S. 562.) Berg-Waldfarn. — Der Wedel unterseits harzig-drüsig, im Umfange lanzettl. - längl., von der Mitte an abwärts schmaler, gefiedert, die Fieder lineal-lanzettl., fiederth., die untersten sehr klein, im Umfange 3eckig, die Fiederehen längl., spitzl., ganzrandig oder ausgeschweift; die Reihen der Fruchthäufchen neben dem Rande hinlaufend; der Wurzelstock rasig. 4. In schattigen, feuchten, besonders bergigen Waldungen, (zerstr. dch d. Geb.) Juli, Aug. Polystichum montanum Roth. tent. 3. S. 74. Polypodium Oreopteris Ehrh. crypt. n. 22. P. montanum Vogler. diss. Ges. 1787. P. limbospermum Allion. auct. S. 49. P. pterioides Vill. delph. 4. S. 811. Aspidium Oreopteris Swartz. syn. filic. 50. Schk. crypt. t. 35. 36. Lastrea Oreopteris Presl. pter. S. 76.

3. P. FILIX MAS (Roth. tent. fl. germ. B. 3. S. 82.) Gemeiner Wald-Farn. — Der Wedel im Umfange elliptisch-längl., gefiedert, die Fieder lanzettl. zugespitzt, fiederth., die Fiederehen kahl oder unterseits auf der Mittelrippe zerstreut spreuhaarig, längl., stumpf oder etwas abgestutzt, angedrückt - an der Spitze ungleich - gezähnt, die Zähnen unbegrannt; die Fruchthäufchen zweireihig, das Mittelfeld von der Basis des Fiederehens an bis über die Mitte hinauf einnehmend; Stiel und Spindel sprengig. 4. In Wäldern und an steinigten, gesträuchigen O. Juli, Aug. Polypodium Filix mas L. sp. 1531. Aspidium Filix mas Swartz. s. fil. S. 55. Schk. crypt. t. 44. Lastraea Filix mas Presl. pterid. S. 76. Kommt, wiewohl selten, vor mit etwas abgestutzten, ganzrandigen oder an der Spitze klein-gesägten Fiederehen; auch mit entferntergestellten Fiedern und längeren, am Rande lappig- fast fiederspaltigen Fiederehen, deren Lappchen gezähnt sind: Aspidium Filix mas β . erosum Döll rhein. fl. S. 16. A. depastum und A. erosum Schk. crypt. t. 45 u. 51. Polypodium Heleopteris Borkh. in Roem. arch. 1. 3. S. 19. Diese Form neigt sich mehr zu den monströsen Entartungen, als zum Typus der Variet.

4. P. CRISTATUM (Roth. tent. fl. germ. B. 3. S. 84.) Gezackter Waldfarn. — Der Wedel im Umfange verlängert-lanzettl., ge-

fiedert, die Fieder von der Mitte gegen die Basis des Wedels allmählig kürzer, gefiedert, die Fieder im Umfange eyf.-lanzettl., fiedertheilig, die untersten breit-dreieckig; die Fiederchen länglich, fiederspaltig-kleinlappig, mit abgerundeten, 2-6 zähligen Läppchen, deren Zähne stachelspitzig sind; die Fruchthäufchen auf dem Mittelfelde 2reihig. 4. An torfigen O., im Gehölz und in feuchten Wäldern der Ebene, der Gebirge und der VorAlpen-Gegenden, (zerstreut durch das Gebiet.) Juli. Aug. Polypodium cristatum L. sp. 1351. P. Callipteris Ehrh. Beitr. 3. S. 77. Aspidium cristatum Swartz. syn. fil. 5. 52. Schk. Crypt. t. 37. Lastrea cristata Presl. pterid. S. 77.

5. P. SPINULOSUM (De Cand. fl. fr. 2. S. 561.) Dorniges Farnkraut. — *Der Wedel im Umfange eyf. oder längl., doppelt-gefiedert, nur das unterste Paar der Haupt-Fiedern kürzer, als die übrigen; die Fiederchen fiedertheilig, die Lappen längl., stumpf, einfach- oder doppelt-gesägt, die oberen zssliessend, die Sägezähne haarspitzig und dornig-stachelspitzig; die Fruchthäufchen meistens zweireihig; Stiel, Spindel und Mittelrippe der Fieder unterseits spreuig 4. In schattigen Wäldern. Juli. Aug. Aspidium spinulosum Döll rhein. fl. S. 17. A. dilatatum Godron. fl. d. Lorr. S. 209. Nephrodium spinulosum Strempt. fil. ber. 30. Kommt vor: grösser und kleiner, der Wedel im Umfange, der Strunk und die Spindel dicht mit Spreuen besetzt oder nur mit wenigen bestreut; und ausserdem noch unter zwei ausgezeichneteren Variet., welche jedoch durch Mittelformen sehr oft in einander übergehen.*

α. vulgare; nur die untersten Läppchen der Fiederchen (der Fieder der zweiten Ordnung) sind getrennt, die übrigen verschmelzen mit der breiten Spindel. Der Wedel ist im Umfange längl. oder eyf.-längl. und das unterste, meist nicht fruchttragende Paar der Haupt-Fiedern steht mehr entfernt. Polystichum spinosum Roth. tent. 3. S. 91. Aspidium spinulosum Willd. sp. pl. 5. S. 262. Swartz. s. fil. S. 420. A. spinulosum *α.* Hartm. scand. fl. ed. 3. S. 252. Lastrea spinulosa Presl. pterid. S. 76. — Nicht nur bei dieser, sondern auch bei der folgenden Variet. findet man am Rande der jüngeren Schleierchen gestielte Drüsen, oft fehlen sie aber auch.

β. dilatatum; die Läppchen der Fiederchen (der Fieder der zweiten Ordnung) sind fast sämmtlich getrennt und mit einer schmalen Spindel verbunden, nur die obersten verschmolzen. Der Wedel an diesem ist meistens breiter und dreieckig-eyf. Diese Variet. kommt übrigens in kleinen und in sehr grossen Formen vor. Polystichum multiflorum Roth. tent. 3. S. 87. Polypodium dilatatum Hoffm. deutsch. Fl. 2. S. 7. Aspidium dilatatum Willd. sp. 5. S. 263. Swartz. syn. fil. 420. A. spinulosum var. *β.* Hartm. scand. fl. ed. 3. S. 252. Lastrea dilatata Presl. pt. S. 77. Ein authentisches Expl. von Aspidium dumetorum Smith engl. fl. 4. 281., welches Babingt. unter den Variet. von A. spinulosum aufführt, habe ich noch nicht gesehen.

γ. muticum Alex. Braun in Doell. rh. Fl. S. 18., eine ausgezeichnete Variet.; auf den ersten Blick stellt sie ein Expl. der

Variet. β . mit schmalen, fiedertheiligen Fiederchen dar, aber bei genauerer Ansicht findet man sie merklich verschieden durch die unbegrenzten, nicht stachelspitzigen Zähne der Fiederchen und durch die unteren Läppchen derselben, welche bemerklich länger sind, als die übrigen und mehrfach gezähnt; die zunächst folgenden Läppchen sind fast abgebrochen-kürzer und sind nur aus einem einzigen Zahne gebildet, (sehr selten auf dem hohen Schwarzwalde; Alex. Braun.)

6. *P. RIGIDUM* (DeC. fl. fr. 2. S. 560.) Steifer Waldfarn. — *Der Wedel im Umfange längl.-lanzettl., unterseits drüsig, doppelt-gefiedert, die Fieder der zweiten Ordnung lanzettl.-fiederth., die Fiederchen eyf. oder längl., an der Spitze gezähnt, mit spitzen, kurz stachelspitzlichen Zähnen; die Fruchthäufchen auf den Fiedern der zweiten Ordnung zweireihig; der Stiel, die Spindel und die Mittelrippe der Fiedern unterseits spreuig.* 4. Auf den Felsen der A., (Schweiz, Salzb., Tyrol, Steyer.) Im Sommer. *Aspidium rigidum* Swartz. s. fil. 53. St. II. h. II. Willd. sp. 5. S. 265. *Polypodium rigidum* Hoffm. 2. S. 6. *P. fragrans* Vill. delph. 3. S. 843. *P. Villarsii* Bellard. *Polystichum strigosum* Roth. tent. 3. S. 86. *Lastrea rigida* Presl. pter. S. 77. — *Aspidium rigidum b. remotum* Alex. Braun in Doell rhein. Fl. S. 16. ist mir wie dem verehrten Autor, dessen Güte ich schöne Expl. davon verdanke, zweifelhaft geblieben. Der Autor hält es für eine Variet. des *A. rigidum*, vielleicht bildet es aber besser eine fast stachelspitzlose Variet. von *Aspidium spinulosum elevatum*. Die Zucht aus Samen würde leicht hierüber Aufklärung verschaffen.

9. *CYSTOPTERIS* (Bernh. in Schrad. n. Journ. B. I. Th. 2. S. 26.) Blasen-Farn. — Die Fruchthäufchen rundl., zerstreut oder etwas in Reihen geordnet. Das Schleierchen häutig, rundl. oder eyf., nur an einer kleinen Stelle des Randes angeheftet, später runzelig zugezogen und verschwindend.

1. *C. FRAGILIS* (Bernh. a. a. O.) Zerbrechlicher Blasen-Farn. — *Der Wedel doppelt-gefiedert, im Umfang längl. oder lanzettl., das unterste Fieder-Paar kürzer, als die zunächst-folgenden, die unteren Fiederchen lappig-fiederspaltig oder an der Basis fiedertheilig, die Läppchen verkehrt-eyf., eyf. oder längl.-eyf., gezähnt oder gezähnt mit spitzlichen Zähnen.* 4. Im Schatten an Mauern und Felsen, im Sommer. *Polypodium fragile* L. sp. 1553. Es spielt diese Art in vielen Formen, die aber durch Mittelformen deutlich ineinander übergehen; doch führe ich folgende namhaftere Varietäten an:

a. lobulato-dentata, Fiederchen kurz, eyf., klein gelappt oder fiederspaltig-kleingelappt, kurz-gezähnt: *Cystea dentata* Sm. engl. fl. 4. S. 287. *Polypodium dentatum* Dicks. crypt. fasc. 3. t. 7. Hoffm. d. fl. 2. S. 9. *Cyathea dentata* Sm. brit. 1141. *Aspidium dentatum* Sw. syn. fil. 59. Willd. sp. B. 3. S. 273. *A. fragile* St. II. h. 11. *Cyathea fragilis* Roth. tent. B. 3. S. 94.

β . pinnatipartita. Die verschiedenen Formen hiervon haben Roth, Hoffm. und Smith unter drei besonderen Arten beschrieben,

die ich hier aufführe, obgleich sie kaum als Variet. zu unterscheiden sind. 1.) *C. anthriscifolia*, die Fiederchen längl.-eyf., fiedertheilig, die Lappchen längl., kurz gezähnt: *Cystea fragilis* Smith. engl. fl. 4. S. 283. *Aspidium fragile* Swartz. filic. 58. Willd. sp. 5. 280. *Cyathea fragilis* Sm. brit. 1139. *C. anthriscifolia* Roth. tent. 3. 94. *Polypodium anthriscifolium* Hoffm. d. fl. 2. S. 9. mit Ausschl. des *P. angustatum*. 2.) *cynapifolia*, die Fiederchen längl.-eyf., fiedertheilig, die Lappen verkehrt-eyf., an der Spitze gezähnt und gleichsam abgestutzt: *Cyathea cynapifolia* Roth. tent. 3. S. 98. *Polypodium cynapifolium* Hoffm. d. fl. 2. S. 9. 3.) *angustata*, die Fiederchen lanzettl., spitz, fiedertheilig, die Lappen lanzettl.-längl., eingeschnitten-gezähnt, mit spitzen Zähnen: *Cystea angustata* Sm. engl. fl. 4. S. 288. *Polypodium fragile angustatum* Hoffm. in Roem. und Ust. mag. fasc. 9. *P. tenue* Hoffm. d. fl. 2. S. 9. *P. rhaeticum* Dicks. hort. sicc. fasc. 1. n. 17. *Aspidium rhaeticum* Willd. spec. 5. S. 280. mit Ausschluss von *Synon. Cyathea regia* Roth. tent. 3. S. 96., nicht Smith.

2. *C. REGIA* (Presl. pterid. S. 93.) Königs-Farn. — *Der Wedel doppelt-gefiedert, im Umfang längl. oder lanzettl., das unterste Fiederpaar kürzer als die zunächst-folgenden, die unteren Fiederchen fiedertheilig, die Lappen fast fiederspaltig-gezähnt, die Zähne eyf.-längl., abgerundet-stumpf, an der Spitze ganz, oder kurz-zweizähmig-ausgerandet.* 4. An etwas feuchten Felsen, zumal der A. und VorA. Sommer. Kommt vor:

a. fumariaeformis, mit kürzeren Lappen der Fieder: *Polypodium regium* L. sp. 1533. nach dem Citat aus Vaillant: *Filicula regia Fumariae pinnulis* Vaill. par. S. 52. t. 9. fig. 1. *Aspidium regium* Swartz. filic. S. 58. Willd. spec. 5. S. 281. *Cyathea regia* Smith. brit. S. 1140., nicht Roth. *C. incisa* engl. bot. t. 163. *Cystea regia* Smith. engl. fl. S. 290.

β. alpina, die Fieder-Zipfel entfernter und länger, in der Mitte und an der Spitze mit 2 Zähnen versehen, oder an der Spitze dreizähmig, die Spindel der Fiederchen nicht breiter, als die der Fieder. *Cystopteris alpina* Link. h. berol. 2. S. 130. *Polypodium alpinum* Wulf. in Jacq. col. 2. S. 171., ic. rar. t. 642. *Aspidium alpinum* Willd. sp. 5. S. 282. St. II. h. 11. — Das *Polypodium regium* L. und *Polypodium alpinum* Wulf. werden von DeC. und anderen Botanikern für Varietäten von *Cystopteris fragilis* gehalten, was jedoch durch fernere Beobachtungen noch zu bestätigen ist; durch ein eigenthümliches Aussehen machen sie sich jedenfalls kenntlich.

3. *C. MONTANA* (Link. hort. bot. berol. 2. S. 131.) Gebirgs-Farn. — *Der Wedel kahl, im Umfang deltaförmig, dreizählig-dreifach-fiederig, die Fiederchen fiederspaltig, die unteren fiedertheilig, die Lappchen gezähnt, die meisten Zähne an der Spitze ausgerandet-zweizähmig.* 4. An Felsen der A. und VorA. (Schweiz, Salzburg, Steyermark und wahrscheinlich dch einen grossen Theil der Alpenkette.) Im Sommer. *Polypodium montanum* Haenke in Jacq. coll. 2. S. 46. *P. myrrhidifolium* Vill. delph. 3. S. 851. t. 53. *Aspidium montanum* Swartz. fil. 61. Schk. crypt. 61. t. 63. Willd.

sp. 5. S. 286. *Cyathea montana* Roth. tent. 3. S. 100. Im äusseren Umfange dem *Polypodium Dryopteris* ähnlich, aber die Fiederchen gleichen denen von *Cystopteris regia*.

10. ASPLENIUM (L. spec. 1178. mit Ausschl. v. Art.) Streifen-Farn. — Die Fruchthäufchen lineal, oder oval, auf dem Mittelfelde des Wedels befindlich. Das Schleierchen häutig, lineal., oder in die Quere oval, gerade oder etwas halbmondf., auf der äusseren Seite des Fruchthäufchens angeheftet, an der inneren offen.

a. Die Fieder gegen die Spitze und Basis des Wedels allmählig kleiner und wenigstens unterwärts fiederspaltig-gelappt.

1. A. FILIX FEMINA (Bernhard. in Schrad. neu. Journ. V. B. 2. S. 27. t. 2. f. 7.) Weiblicher Str. — Der Wedel im äusseren Umfange elliptisch-längl., zugespitzt, gegen die Basis zu schmaler, doppelt-gefiedert, die Fieder lang-zugespitzt, die Fiederchen lanzettl., fiederspaltig oder fiedertheilig, die Läppchen eyf. oder längl., gezähnt, die Zähne spitz oder stumpf., unbegrannt; die Schleierchen quere-oval, am Rande fransig-zerfetzt, die unteren an den Fiederchen halbmondförmig. 4. In Wäldern, an steinigen O. im Gebüsch. Im Sommer. *Polypodium Filix fem.* L. spec. 1551. *Aspidium Filix fem.* Swartz. syn. fil. 59. Schk. crypt. 56. t. 58. 59. *Athyrium Filix fem. Bernardi* in Schrad. neuem Journ. B. 1. Th. 2. S. 27. tab. 2. f. 7. Diese Art ändert vielfach ab in der Grösse des Wedels und den Einschnitten der Fiederchen. Roth unterschied folgende Formen: 1. *Athyrium molle* Roth. tent. 3. S. 61.; eine kleinere Form, die Fiederchen längl., stumpf, doch eine blattige Spindel verbunden, die Läppchen eyf., die unteren zweizählig, oder an den untersten Fiederchen 3zählig, die oberen nur einen einzigen Zahn bildend, die Zähne kurz-zugespitzt, ziemlich gerade; hierher gehört: *Aspidium irriguum* Smith. engl. fl. 4. S. 283. *Polypodium dentatum* St. H. h 1., eine mangelhafte Abbildung. 2. *Athyrium trifidum* Roth a. a. O. S. 63.; eine grössere Form als die vorige, die Fiederchen oft herablaufend, aber die blattige Spindel nur am oberen Theile der Fieder deutlich vorhanden, die Lappen eyf., die untersten an der Basis beiderseits mit einem Zahn versehen und an der Spitze dreizählig, die Zähne in eine eingebogene Spitze auslaufend. 3. *Athyrium ovatum* Roth. a. a. O. S. 64.; eine grössere Form, die Fiederchen genähert, die Spindel am unteren Theile der Fieder nicht geflügelt, die Läppchen der Fiederchen breit-längl., stumpf, oft sehr stumpf, am Rande mit 1-2 Zähnen beiderseits versehen und mit 3 Zähnen endigend, die Zähne eyf., spitz oder stumpf., gerade-vorgestreckt. 4. *Athyrium Filix femina* Roth. a. a. O. S. 65.; eine grössere Form, die Fiederchen fast bis zur Basis fiedertheilig, die Läppchen schmal-längl. oder lineal., eingeschnitten-gezähnt, die Zähne lanzettl., spitz, gerade-vorgestreckt; die Spindel am unteren Theile der Fieder nicht geflügelt. 5. *Athyrium rhacicum* Roth. a. a. O. S. 67.; die Läppchen der Fieder sind zurückgebogen und verdecken die Fruchthäufchen zum Theil, sodann sind die Fieder selbst von ihrer Spindel gänzlich hinabgeschlagen, so dass sie sich fast mit ihren unteren Flächen bedecken, wodurch diese Spielart

ein eigenthümliches Ansehen bekommt. Dieses ist das wahre *Athyrium rhaeticum* Roth's a. a. O. nach einem Expl. v. Autor selbst und nach der gegebenen Beschreibung; Roth sagt nämlich a. a. O. S. 68.: „die Punkte der Fructificationen sind rundl.-eyf. und mit einer spreuartigen, rostbraunen, seitlich aus einem Aederchen entspringenden zerschlitzt-wimperigen Hülle bedeckt,“ was keineswegs auf das *Polypodium alpestre* Hoppe passt, welches Andere mit dem Namen *Athyrium rhaeticum* Roth. bezeichnet haben; überdies ist das wahre *Polypodium alpestre* eine Pfl. der A. und VorA., und in Norddeutschland, dem von Roth angegebenen StandO., noch nicht gefunden worden.

2. A. HALLERI (Rob. Brown.) Haller's Str. — Der Wedel im äusseren Umfang lineal.-lanzettl. oder längl.-lanzettl., gefiedert, die Fieder gegen die Basis und Spitze des Wedels zu allmählig kleiner, im Umfang eyf. und an der Basis fiederspaltig-gelappt, oder längl.-eyf. und gefiedert, die Fiederchen rundl.- oder rautenförmig-eyf., kantig-gezähnt, die Zähne dornig-stachelspitzig, ausgespreizt, die Schleierchen quer-oval, ganzrandig, gerade oder etwas gekrümmt. 4. An Felsen, Mauern, steinigen O., nicht an Quellen, (Cant. Genf am Saleve; C. Waadt; nicht in Deutschland.) Im Sommer. Kommt vor:

a. *pedicularifolium*, die Fieder längl.-eyf., gefiedert: *Polypodium fontanum* L. sp. 1550. Smith engl. fl. 4. S. 209. *Aspidium Halleri* Willd. sp. 5. S. 274. *Athyrium Halleri* Roth. tent. 3. S. 60. *Polypodium pedicularifolium* Hoffm. d. fl. 2. S. 10.

β. *angustatum*, die Fieder kurz-eyf., fast herzf., klein-geklappt, einzelne Läppchen an der Basis der Fieder in ein Fiederchen abgesondert, daher der Wedel im Verhältniss zu seiner Länge schmaler. *Aspidium fontanum* Willd. sp. 5. S. 272. Es verhält sich diese zu der vorigen Variet., wie die *Woodsia hyperborea* zur *Woodsia ilvensis*, und die *Cystea dentata* Smith zur *Cystea fragilis* Smith. Ein Expl. dieser Variet. aus der Schweiz habe ich noch nicht gesehen, ich besitze sie von Salzmann in den Cebennen gesammelt.

b. Die Fieder gegen die Spitze und Basis des Wedels zu kleiner, ungetheilt, ausgeschweift oder gekerbt, aber nicht fiederspaltig-eingeschnitten.

3. A. TRICHOMANES (L. sp. 1540.) Widerthon-Str. — Der Wedel im Umfang lanzettl.-lineal., einfach-gefiedert, die Fieder eyf. oder rundl., ausgeschweift oder klein-gekerbt, an der Basis abgestutzt oder etwas keilf., der St. kahl, die Spindel mit einem schmalen, trockenhäutigen, gezähnelten Rande versehen. 4. An Felsen in Wäldern, und schattigen Mauern. Im Sommer. Schk. Crypt. 69. t. 74. Stiel und Spindel braun und glänzend.

4. A. VIRIDE (Huds. fl. angl. ed. 2. S. 453.) Grüner Str. — Der Wedel im Umfang lanzettl.-lineal., einfach-gefiedert, die Fieder rautenf.-rundl., gekerbt, hinten abgestutzt-keilf., der St. mit gegliederten Haaren bestreut, die Spindel ohne häutigen Rand. 4. An Felsenspalten und Mauern in den Gegenden der A. und VorA., (in

der Alpenkette, auf den Vogesen, dem Harz und den Sudeten.) Im Sommer. St. II. h. I. Der St. an der Spitze und die Spindel grün.

c. Der Wedel 2-3fach fiederig oder wenigstens an der Basis doppelt-gesiedert, und an der Basis breiter.

5. A. BREYNI (Retz. 1769. nach Fries herb. norm. fasc. 9. n. 100.) Breyn's Str. — *Der Wedel im Umfang lanzettl., von der Mitte bis zur Spitze einfach-gesiedert*, die Fieder wechselständig, entfernt, aufrecht, keilf., an der Spitze eingeschnitten-gezähnt, die mittleren Fieder an der Spitze 2-3spaltig, die untersten mit 2-3 Zipfeln fiederspaltig, länger, die Zipfel keilf., die Schleierchen ganzrandig. 4. In den Felsenspalten der Gebirgsgegenden und VorA., (zerstreut dch d. Geb.) Sommer. A. germanicum Weis. pl. crypt. fl. gött. S. 299. 1779.) St. II. h. 5. A. alternifolium Wulf. in Jacq. misc. 2. S. 51. t. 5. fig 2.

6. A. FISSUM (Kitaib. in Willd. sp. pl. 5. S. 348.) Gespaltener Str. — *Der Wedel im Umfang eyf., dreifach-gesiedert*, die Fiederchen keilf., 3spaltig, die Zipfel an der Spitze 2-3zählig, die Zähne oft ausgerandet; *die Schleierchen ganzrandig*. 4. In Felsenspalten der A., (auf dem Loibl in Krain, Kärnthen, Sieber; Eisenerzerhöhe in Steyermark, Zechenter.) Sommer. Der Wedel fein-zertheilt, 2 Zoll lang, auf einem 3 Zoll langen Stiele, die Fiederchen klein. Die Pflanze hat das Ansehen von Cystopteris alpina, wie Willd. ganz richtig bemerkt.

7. A. RUTA MURARIA (L. spec. 1541.) Mauer-Ranten-Str. — *Der Wedel im Umfang 3eckig-eyf., doppelt- oder 3fach-gesiedert*, die Fiederchen verkehrt-eyf., ganz oder etwas gelappt, vorne klein-gekerbt, *die Schleierchen am Rande zerfetzt-fransig*. 4. In Felsenspalten und an Mauern. Sommer. Schk. crypt. t. 80. b.

8. A. ADIANTHUM NIGRUM (L. sp. 1541.) Schwarzer Streifenfarn. — *Der Wedel im Umfang deltaförmig-länglich, zugespitzt, glänzend*, doppelt-gesiedert, an der Basis oft 3fach-gesiedert, *die Fieder von der Basis gegen die Spitze des Wedels zu allmählig kürzer*, die Fiederchen eyf., spitz-gesägt, gegen die Basis zu keilf. und ganzrandig, die oberen zsfließend; die Schleierchen ganzrandig. 4. In Felsenspalten und an steinigen, moosigen, schattigen O. der VorA. und Gebirgsgegenden, (zerstreut dch d. Geb.) Sommer. St. II. h. 5. Var.:

β. *Serpentini*, die Fiederchen kleiner, entfernter, die untersten tiefer-lappig: A. Serpentin und A. Serpentin β. incisum Tausch. pl. select., (auf Serpentinsteinfeldern um Einsiedel, Tausch.)

d. Der Wedel aus 2-4 gestielten Fiederchen zsgesetzt.

9. A. SEPTENTRIONALE (Swartz. syn. filic. S. 75.) Nord-Str. — *Der Wedel lang-gestielt, 2-4 gestielte Fiederchen tragend*, diese lineal- oder lineal-lanzettl., an der Spitze ungleich eingeschnitten-3zählig. 4. In Felsenspalten, an trockenen O. der Berggegenden und VorA., (zerstreut dch d. Geb.) Im Sommer. St. II. h. 5. Acro-

stichum septentrionale L. spec. 1524. Scolopendrium septentrionale Roth. tent. 3. S. 49. Acropteris septentrionalis Link. hort. berol. 2. S. 56. Blechnum septentrionale Wallr. comp. fl. g. 3. S. 24.

11. **SCOLOPENDRIUM** (Smith. act. taurin. 5. S. 410. t. 9. fig. 2.) Zungenfarn. — Die Fruchthäufchen lineal., gerade, im Mittelfelde des Wedels schief in die Quere gestellt, gleichlaufend, zu beiden Seiten mit einem Schleierchen versehen. Die Schleierchen häutig, gegen das Fruchthäufchen zu offen.

1. **S. OFFICINARUM** (Swartz. syn. filic. 89.) Officineller Z. — Der Wedel lanzettl. oder längl.-lanzettl., an der Basis herzförmig. 2. In waldigen, steinigen, schattigen Berggegenden und den VorA., (Vogesen, Moselthal, Spa; Odenwald, Werthheim, Nassauisches Gebirge und weiter hinab längs dem Rheine; Harz; sodann längs der Alpenkette und zerstreut in alten Brunnen niederer Gegenden.) Im Sommer. Schkuhr. crypt. 78. t. 83. S. Phyllitis Roth. tent. 3. 47. Asplenium Scolopendrium L. sp. 1537. In Gärten werden als Variet. gezogen: 1) *crispa* mit welligem und oft am Rande eingeschnitten-gelapptem Wedel, und 2) *daedalea* mit an der Spitze verbreitertem, vielspaltigem Wedel.

12. **BLECHNUM** (L. gen. N. 1175.) Rippenfarn. — Die Fruchthäufchen lineal., gerade, verlängert, zu beiden Seiten mit der Mittelrippe der Fieder gleichlaufend und ununterbrochen. Das Schleierchen häutig, aus dem Mittelfelde der Fieder entspringend, ununterbrochen fortziehend, nach Innen zu offen.

1. **B. SPICANT** (Roth. tent. B. 3. S. 44.) Gemeiner Rippenfarn. — Der Wedel im Umfang verlängert-lanzettl., fiederig-getheilt, der fruchttragende fast noch einmal so lang, die Fieder ganzrandig, kurz-zugespitzt, am nicht fruchttragenden Wedel lanzettl.-lineal., genähert, am fruchttragenden lineal., entfernter-stehend, alle gegen die Basis des Wedels zu an Grösse abnehmend, die untersten sehr klein. 2. In feuchten, schattigen Wäldern, (zerstreut dch d. Geb.) Im Sommer. Blechnum boreale Swartz. filic. 115. St. II. h. 11. Acrostichum Spicant Vill. delph. 4. S. 838. Roth tent. I. S. 444. Lomaria Spicant. Desv. mag. d. natf. z. Berl. 5. 325. Onoclea Spicant Hoffm. D. fl. 2. S. 11. Osmunda Spicant L. sp. 1522. Struthiopteris Spicant Scop. carn. 2. S. 288. Weiss crypt. S. 287.

13. **PTERIS** (Lin. gen. 1174. mit Ausschl. v. Arten.) Saumfarn. — Die Fruchthäufchen randständig, lineal., ununterbrochen. Das Schleierchen häutig, aus dem Rande des Wedels selbst, oder ein wenig vor dem Rande aus der Blattfläche entspringend, lineal., ununterbrochen, nach innen zu offen.

1. **P. AQUILINA** (L. spec. 1533.) Adler-Saumfarn. — Der Wedel 3fach-gefiedert, die Fiederchen längl.- oder lineal.-lanzettl., stumpf, am Rande zurückgerollt, ganz, die untersten fiederspaltig. 2. In Wäldern und auf öden Waldwiesen. Im Sommer. St. II. h. 1. ein Theil des Wedels. Allosorus aquilinus Presl. pterid. S. 153. Kommt vor mit $1\frac{1}{2}$ und fast 5 Fuss grossen Wedeln. Die

Fiederchen sind beiderseits oder wenigstens unten flaumh. Eine *Pteris brevipes* habe ich bis jetzt als besondere Art nicht unterscheiden können.

14. *ADIANTHUM* (Lin. spec. 1180.) Krull-Farn. — Die Fruchthäufchen randständig, auf das Schleierchen selbst, nicht auf die Blattfläche gelagert. Die Schleierchen anfangs häutig, später trockenhäutig und fast lederig, aus dem Rande des Wedels entspringend, schuppenförmig, rundl., längl. oder lineal., oft etwas halbmondförmig, nach innen zu geöffnet.

1. *A. CAPILLUS VENERIS* (L. sp. 1558.) Frauenhaar-Krull-Farn.

Der Wedel doppelt- oder 3fach-gefiedert, die Fiederchen verkehrt-eif., an der Basis keilförmig, die fruchttragenden vorne ungleich-gelappt, die Lappen in ein quer-lineal.-längl. Fruchthäufchen endigend, die nicht fruchttragenden gekerbt. 2. In befeuchteten Felsenspalten der südlicheren Gegenden. (Schweiz bei St. Aubin am Newchateller See in den Tuffstein-Grotten dicht am See in Menge, Alex. Braun; transalpinische Schweiz; südl. Tyrol, Littorale.) Sommer. Jacq. misc. 2. t. 7.

III. Untergruppe. *VERHÜLLTE POLYPODIACEEN*. Die Seiten oder die Kerben der Fieder oder Fiederchen des Wedels zurückgebogen, die Fruchthäufchen ganz oder einen Theil derselben bedeckend, meistens in einen häutigen, schmälern oder breiteren Rand übergehend und das Schleierchen ergänzend.

15. *NOTHOLAENA* (Rob. Brown. prodr. fl. nov. holl. ed. N. ab Esenb. S. 1.) Spreu-Farn. — Der Rand der Fiederchen zurückgerollt, mit einer feinen, häutigen Linie eingefasst, die Sporenbehälter zum Theil verdeckend, das Schleierchen ergänzend. Die Sporenbehälter auf dem Rande und an der Basis der Fiederchen zerstreut, bei unserer Art unter spreuartigen Haaren verborgen. — Die übrigen von R. Brown aufgestellten Arten dieser Gattung, weichen, wie aus den Beschreibungen hervorgeht, von diesem Gattungs-Charakter ab.

1. *N. MARANTAE* (R. Brown. a. a. O.) Maranta's S. — Der Wedel doppelt-gefiedert, die Fiederchen lineal.-längl., stumpf, unterseits mit Spreuen dachig und dicht-bedeckt, ganz, oder die untersten an der Basis lappig-fiederspaltig, der Stiel spreuig-haarig. 2. An gegen Mittag gelegenen Abhängen und in Felsenspalten der wärmeren Thäler, nirgends auf den A., (um Botzen im südl. Tyrol gemein. v. Haussmann.) Im Sommer. *Notochlaena Marantae* Desv. journ. d. bot. 1. 92. Spreng. syst. veget. B. 4. S. 43. *Acrostichum Marantae* L. sp. 1527. St. II. h. 6. *Ceterach Marantae* DC. fl. fr. 2. S. 567. — Das *Polystichum Marantae* Roth. tent. 3. S. 92. gehört nach dem beigefügten Stand O. nicht zu unserer Pfl., sondern zur *Woodsia ilvensis*.

16. *ALLOSORUS* (Bernh. in Schrad. neuem Journ. B. 1. Th. 2. S. 36.) Roll-Farn. — Die Fiederchen des fruchttragenden Wedels

sind bis zur Mittelrippe zurückgerollt, holperig, die Fruchthäufchen einhüllend; der zurückgebogene Theil in einen häutigen Rand übergehend, später horizontal - ausgebreitet und lappig - gespalten. Die Fruchthäufchen zuerst rundlich, aber schnell in einander fließend und ein ununterbrochenes, vor dem häutigen Rande der Blattfläche gelagertes Fruchthäufchen bildend.

1. A. CRISPUS (Bernh. a. a. O.) Gekrauster Roll-Farn. — Der Wedel 3fach-gefiedert, die fruchttragenden Fiederchen lineal., ganz, die nicht fruchttragenden eingeschnitten, mit linealen, an der Spitze 2zähligen oder ungetheilten Lappchen. 4. An felsigen O. der A. und VorA.-Gegenden, (zerstreut in der Alpenkette, auf d. Vogesen und Sudeten.) Im Sommer. *Osmunda crispa* L. sp. 1512. *Pteris crispa* All. ped. 2. S. 284. Swartz. Synops fil. 101. *Onoclea crispa* Hoffm. d. Fl. 2. S. 11. St. II. h. I. das fruchttragende Laub. *Acrostichum crispum* Vill. delph. 4. S. 838. *Blechnum crispum* Hartm. scand. fl. ed. 3. S. 255. *Cryptogramma crispa* R. Brown., Hook. scot. 448. *Struthiopteris crispa* Wallr. in comp. fl. germ. 3. S. 27.

17. STRUTHIOPTERIS (Willd. en. h. berol. S. 1071.) Strauss-Farn. — Die Fieder des fruchttragenden Laubes bis zur Mittelrippe zurückgerollt, holperig, die Fruchthäufchen einwickelnd; der zurückgebogene Theil in einen häutigen Rand übergehend, später horizontal - ausgebreitet und lappig - gespalten, mit Zurücklassung von kleinen, an der Mittelrippe hängenden Stückchen. Die Fruchthäufchen bedecken dicht die ganze Fläche der Fieder.

1. S. GERMANICA (Willd. a. a. O.) Deutscher Strauss-Farn. — Die Wedel gefiedert, die nicht fruchttragenden im Umfange breitlängl., zugespitzt, gegen die Basis verschmälert, die Fieder fiedertheilig, die Fiederchen längl., stumpf, ganzrandig; die fruchttragenden Wedel lanzettl., die Fieder lineal., ganz, fast stielrund, später flach - ausgebreitet. 4. In feuchten Wäldern, auf Sumpfwiesen, in tiefen Thälern am Ufer der Bäche, (in den VorAlpen von Bern; Kärnthen; Steyermark; Oestr., Böhmen; Sudeten; Preussen selten; Sachsen, Oberlausitz; Harz; Nassau, Siegen.) Sommer. *Osmunda Struthiopteris* L. sp. 1522. *Onoclea Struthiopteris* Hoffm. deutsch. fl. 2. S. 11.

SYSTEMATISCHE ANORDNUNG

DER ARTEN AUS DER GATTUNG

C I R S I U M,

**DER AECHTEN SOWOHL WIE DER
BASTARD-FORMEN,**

WELCHE

**IM BEREICHE UNSERER FLORA UND DER NACH-
BAR-LAENDER WACHSEN.**

VON

CARL NAEGELI.

A. AECHTE ARTEN.*)

I. Rotte. EPITRACHYS DC. Die *B. oberseits dörnig-kurzhaarig*. Der Rand der Blkr. bis auf die Mitte 5sp. Die Haarkrone immer kürzer, als die Blkr. Die Blättchen des HK. in einen einfachen Dorn endigend.

1. C. ERIOPHORUM (Carduus e. L. sp. 1153.) Die Bthstiele wenig verlängert, beblättert, spinnwebig; die *B. nicht herablaufend, oberseits dörnig-kurz*, unterseits meistens filzig, tief-buchtig-fiedersp., die Fieder bis zur Basis 2theilig, die Zpfl lanzettl., die Nerven auf der Unterseite hervortretend, in starke Dornen anslaufend; die Köpfchen kugelig, mit blattigen DeckB. versehen; die Blättchen des HK. an der Spitze zurückgekrümmt oder wagrecht-abstehend; der Saum der Blkr. kürzer, als die Röhre. ☉. An Wegen, auf Triften und Waldplätzen der Berge, VorA. und A. bis zu 6500 Fuss hinauf, (westl., südl. und südöstl. Schweiz bis nach Oestreich, durch Mähren nach Böhmen, Schlesien, Thüringen und Franken; von Elsass und Württemberg durch die Rheingegenden bis Frankfurt.) Juli. Aug. Jacq. a. t. 171. Cirsium eriophorum Scop. carn. 2. S. 130. Cnicus eriophorus Roth. tent. 2. 286. Bth. purpurn. — Var. mit unten etwas kahlen B., ungetheilten oder 2theiligen, oder 2theiligen und zugleich vorne an der Basis gelappten Fiedern, mit Blättchen des HK., welche an der Spitze vor dem Dorne mehr oder minder verbreitert oder auch fadenf. sind, und:

a.) *vulgare* mit spinnwebig-wolligen Blättchen des HK. C. eriophorum der Autoren.

b.) *spathulatum* (Cnicus sp. Moretti pl. ital. dec. 3. S. 6.) mit etwas kahlen Schuppen. C. spathulatum Gaud. fl. helv. 5. S. 202.

2. C. LANCEOLATUM (Carduus l. L. sp. 1149.) Die Bthstiele wenig verlängert, beblättert, spinnwebig; die *B. herablaufend, oberseits dörnig-kurz*, meist buchtig-fiedersp. und die Fieder bis zur Basis 2theilig, die Zpfl lanzettl., die Nerven wenigstens an der Spitze der Lappen unterseits hervortretend, in harte Dornen auslaufend; die Köpfchen eyf. oder etwas rundl., mit blattigen DeckB. versehen, welche ein wenig kürzer sind, als der HK.; die Blättchen des HK. in einen langen abstehenden Dorn allmählig

*) Die Methode der systematischen Aufzählung der ächten und Bastard Arten dieser Gattung werde ich in einer umfassenderen Monographie derselben (in der Zeitschrift für wissenschaftliche Botanik von Schleiden und Nägeli) erläutern. Nägeli.

verschmälert; der Saum der Bkr. kürzer, als die Röhre. ☉. An Wegen, auf Schutthäufen, Triften und auf Waldplätzen bis zur Höhe von 4000'. Juni-Sept. Fl. dan. t. 1173. *Cirsium lanceolatum* Scop. carn. 2. S. 130. *Cnicus lanceolatus* Willd. sp. 3. 1666. Die Bth. purpurn, selten fleischfarbig. — Var.: St. einfach oder ästig; B. wenig oder auch fast ganz herablaufend, die B. oberwärts mit Dörnchen oder mit Dörnchen und zugleich mit Haaren bedeckt, die B. fast ungetheilt oder gelappt, oder fast bis zur Rippe fiedersp., die Fieder 2theilig an der vorderen Basis gelappt, die Zpfl lanzettl., verlängert, oder kurz, eyf.-3eckig. die Bthstiele kurz oder mehrmal länger, als das Köpfchen; die HK. spinnwebig-wollig, oder etwas kahl, ferner:

a.) *vulgare*, die B. unterseits nur wenig spinnwebig, tief-fiederspaltig, die Köpfchen mehr eyf. C. lanceolatum der Autoren.

b.) *nemorale* (C. n. Rehb. fl. exc. S. 286. Koch Syn. ed. I. 392.), die B. unterseits spinnwebig-filzig, meistens weniger tief-fiedersp. oder nur gelappt, die Köpfchen mehr rundl. (Im Walde von Lindenthal bei Leipzig; Holstein; Schleswig; Schweiz, besonders in der Bergregion: Uto bei Zürich, Sihlthal, Bergthäler des Wallis.) C. lanigerum Nägeli Cirsien der Schweiz S. 113. t. III.

c.) *paradoxum*, die B. lanzettl.-länglich, ungetheilt, dornig-gezähnelte, unterseits etwas haarig, die obersten unterseits filzig, die Köpfchen kleiner, wollig, die Schuppen des HK. breit-lanzettl., in einen kurzen Dorn auslaufend. (Bei Speier im Igelheimer Wald.) Es hat das Ansehen von C. arvense, so dass es auf den ersten Anblick eine Bastardform von C. lanceolatum und C. arvense zu sein scheint. Allein die Hauptkennzeichen gehören ganz dem C. lanceolatum an und nähern sich weder denen des C. arvense, noch einer andern Art, wie es z. B. bei C. lanceolato-palustre der Fall ist. Uebrigens veranlasst es nicht blos die Vermuthung, dass es eine Variet., sondern vielmehr dass es eine Monstrosität sei, weil die sämtl. blattartigen Organe (von den B. an bis zu den Strahlen der Haarkrone) breiter, ungetheilte und weit weniger verletzend sind.

II. Rotte. CHAMAELON. Die B. sind oberseits nicht dornig-rauh. Der Rand der Bkr. bis zur Mitte 5sp. Die Haarkrone immer kürzer, als die Bkr. Die Blättchen des HK. mit einem einfachen Dorn endigend.

§. 1. Die Blätter herablaufend.

3. C. PALUSTRE (Carduus p. L. sp. 1151.) Der St. beblättert; die Bthstiele fehlend oder kurz, nackt, filzig; die B. weit hinablaufend, oberseits nicht dornig-rauh., meistens buchtig-fiederspaltig, die Fieder 2spaltig, die Zpfl lanzettl.; die Köpfchen zahlreich, klein, längl., traubig-geknäuelte, deckblattlos; die Blättchen des HK. längl., stumpf, angedrückt, mit einem abstehenden, sehr kurzen, weichen, röthlichen oder gelblichen Dörnchen endigend, gekielt mit einem purpurnen, klebrigen Kiele; der Saum der Bkr. länger, als die Röhre. ☉. Auf feuchten Wiesen, an sumpfigen O., abgetriebenen Wäldern bis zur Höhe von 4500 Fuss hinauf. Jull. Aug. Engl. bot. tab. 974. *Cirsium palustre* Scop. carn. 2. S. 128.

Cnicus palustris Willd. sp. pl. 3. 1662. Bth. purpurn. — Var.: der St. einfach und an der Spitze vielköpfig oder ästig, die B. oberseits kahl oder haarig, unterseits haarig oder spinnwebig-filzig, gelappt oder fiederspaltig, die Fieder gezähnt oder 2spaltig und gelappt. — Die Aeste, welche nach der Heuernte aus der Basis des St. hervortreiben, sind niedriger, mit gezähnten oder fast ganzen, weniger tief hinablaufenden B. und weniger und länger gestielten Köpfchen: *C. Chailleti* Gaud. fl. helv. 5. S. 182. (nicht Koch.) *C. palustre* β . *putatum* Näg. C. d. Schw. t. II. — Das *C. Chailleti* Koch Syn. ed. I. S. 393. ist ein Bastard von *C. arvense* und *C. palustre*: *C. arvensi-palustre*.

4. *C. PANNONICUM* (*Carduus* p. L. fil. suppl. S. 348.) *Die Wurzelfasern fädlich*; der St. unten beblättert, oben mit einzelnen Schuppen versehen; *die Bthstiele verlängert*, nackt, spinnwebig; *die B. kurz-herablaufend*, oben nicht dörnig-kurz., ganzrandig, dörnig-gezähnt, die mittleren am St. meistens über der verbreiterten Basis verschmälert; *die wenigen* (1-3) *Köpfchen* grösser, eyf., *einzeln*, deckblattlos, *die Blättchen des HK.* längl., spitz, an der Spitze abste hend, in ein ganz kurzes Dörnchen endigend, *nicht klebrig*, *der Saum der Blkr. deutlich länger, als die Röhre*. 4. Auf rauhen Hügeln, Bergtriften, (Böhmen, Oestreich, Kärnten, Krain, südl. Tyrol; Littorale auf dem Monte maggiore; ital. Schweiz auf dem Corni di Canzo.) Juni. Juli. *Cirsium pannonicum* Gaud. fl. helv. 6. S. 363. *Carduus serratuloides* Jacq. a. t. 127. (nicht Linn.) *Cirsium serratuloides* Scop. carn. 2. S. 127. Bth. purpurn. — Var.: B. beiderseits flaumig oder oberseits flaumig und unterseits spinnwebig, oder beiderseits spinnwebig, oberhalb der Basis verschmälert, oder gleich-breit, oder von der Basis an gleichmässig verbreitert, die Köpfchen einzeln, oder selten je zwei genähert und sitzend. — *Carduus serratuloides* L. sp. 1155. mit dem Citate: Gmel. fl. sib. t. 22. ist eine ganz verschiedene Pfl., der St. nämlich ist bis zur Spitze beblättert, ästig, vielköpfig, die Aeste beblättert (nach Gmelin's Abbild.), die B. halbstengelumfassend, die Köpfchen mit einem lanzettl. DeckB. gestützt (nach der Beschreibung Linne's.)

5. *C. CANUM* (*Carduus* c. L. mant. S. 108.) *Die Wurzelfasern verdickt, spindelf., büschelig*; der St. bis über die Mitte hinauf beblättert, an der Spitze fast nackt, *die Bthstiele verlängert*, ziemlich nackt, spinnwebig; *die B. halb-herablaufend*, oberseits nicht dörnig-kurz., ganz, oder ausgeschweift- und buchtig-fiedersp., die Fieder 3eckig-lanzettl., ganz oder gezähnt; *die Köpfchen wenige*, grösser, eyf., *einzeln*, deckblattlos; *die Blättchen des HK.* aus eyf. Basis lanzettl., stumpf., angedrückt, plötzlich in ein sehr kurzes, abste hendes Dörnchen zugespitzt, *nicht klebrig*; *der Saum der Blkr. kürzer oder eben so lang, als die Röhre*. 4. Auf guten, feuchten Wiesen, (Oestreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, Sachsen.) Juli. Aug. Jacq. a. t. 42. und 43. *Carduus tuberosus* Jacq. en. stirp. agr. vind. S. 280. *Cirsium canum* MBieberst. Suppl. n. 1657. (nicht All.) Bth. purpurn. — Var.: der St. einfach, einköpfig oder oberwärts ästig, die B. flaumh. oder kahl oder unter-

seits spinnwebig, der HK. kahl oder etwas spinnwebig. — Vom *C. pannonicum* unterscheidet sich das gegenwärtige ausserdem dch die über der Basis nicht verschmälerten B., die grösseren Köpfchen, die parabolischen (nicht gleichmässig verschmälerten) Blättchen des HK., und die längeren, schlankeren Bthen.

§. 2. Die Blätter nicht herablaufend.

6. *C. BULBOSUM*. Die Wurzelfasern verdickt, spindelf.; der St. unten oder überall beblättert; die Bthstiele verlängert, ziemlich nackt, spinnwebig; die B. nicht herablaufend, oberseits nicht dörnig-kurzh., unterseits spinnwebig, halb-stengelumfassend, meistens buchtig-gezähnt, oder buchtig-fiederspaltig, die Fieder eyf., 3-4spaltig, die Zpfl lanzettl.; die Köpfchen wenige, hauchig, einzeln, deckblattlos; die Blättchen des HK. längl., stumpf., plötzlich in ein sehr kurzes Dörnchen zugespitzt, nicht gekielt, spinnwebig; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Auf feuchten Wiesen, in bergigen Hainen, (nördl. Schweiz von Zürich bis Basel, Baden und Elsass bis Mainz, im Maingebiete bis Würzburg, Thüringen, Harz.) Juli. Aug. Bth. purpurn, selten hell-fleischroth. — Var.: der St. niedrig, einköpfig, oder hoch, ästig vielköpfig; die B. oberseits flaumig oder kahl, oder ein wenig spinnwebig, unterseits haarig, auf den Rippen spinnwebig, oder auf beiden Flächen spinnwebig-wollig, ganz und dörnig-gezähnt, oder gezähnt, oder tief-fiederspaltig, die Fieder-Zpfl eyf. oder längl., oder lanzettl.-lineal., die Schuppen des HK. angedrückt oder oberwärts absteehend, ferner:

a.) *vulgare*, der St. von der Mitte an blattlos, 1-3köpfig, die B. schwächer dörnig. *Carduus tuberosus* Pollich. palat. 2. 420. und mehrerer deutsch. Autoren. *C. tuberosus* var. β . L. sp. 1154. *Cirsium tuberosum* All. ped. 1. S. 151. *Cnicus tuberosus* Willd. sp. 3. 1680. Engl. bot. tab. 2562. *C. spurius* Hoffm. fl. germ. ed. 2. B. 2. S. 128. *Cirsium bulbosum* DC. fl. fr. 4. S. 118. Koch Syn. ed. 1. S. 399.

b.) *ramosum* (Nägeli Cirs. d. Schw. S. 73.), der St. hoch, ästig, viel- (6-15) köpfig, sowie die Aeste beblättert, die B. dorniger, grösser, am Rücken etwas spinnwebig-wollig. (Zürich am Uto.)

c.) *anglicum* (Lobel. icon. t. 583. f. 1., Koch Syn. ed. 1. 399.), der St. meist einfach, einköpfig, die B. ganz oder gelappt, am St. wenig über der verbreiterten Basis verschmälert, die Blättchen des HK. längl.-lanzettl., mehr spitz. (Stockach und Zizenhausen in Oberbaden nach Gmelin; Obersteiermark nach Host.) *Carduus anglicus* Lam. dict. 1. S. 705. *C. pratensis* Huds. angl. S. 353., nicht Lam. *C. dissectus* Huds. fl. angl. ed. 1. S. 307. Vill. delph. 3. S. 15., nicht Linn. *Cnicus pratensis* Willd. sp. 3. 1672 (nicht *Cirsium pratense* DC., welches einerlei ist mit der Var. α . des *Carduus tuberosus* Lin. sp., im Gebiete unserer Fl. aber noch nicht gefunden wurde.) — Das *C. bulbosum* und *C. anglicum* vereinigte ich zu einer Art, weil Unterscheidungsmerkmale fehlen, denn man findet *C. bulbosum* manchmal mit nur gezähnten und über der Basis wenig verschmälerten B. und ebenso *C. anglicum* mit tiefer-fiedersp., über der Basis nicht verschmälerten B. und mit 2-3lappigen Fiedern.

7. *C. RIVULARE* (*Carduus r.* Jacq. austr. 1. S. 57. t. 91. 1773.) Die Wurzelfasern fädlich; der St. unten beblättert, oberwärts ziemlich nackt; die *Bthstiele* fehlend oder kurz, *nackt*, *spinnwebig*; die *B.* nicht herablaufend, oberseits nicht dörnig-kurzhl., etwas flaumig und nicht unterseits spinnwebig, *geöhrelt-stengelumfassend*, gezähnel oder buchtig-fiederspaltig, die Fieder nur gezähnt; die *Köpfchen* wenige, meist *zsgerrückt*, deckblattlos; die Blättchen des HK. längl.-3eckig, spitzlich, in ein sehr kurzes, weiches, gefärbtes Dörnchen endigend, ohne Kiel, ziemlich glatt, in's Purpurne spielend; der *Saum der Blkr. länger*, als die *Röhre*. 2. Auf feuchten Wiesen der Gebirge und A. bis zu 4500 Fuss Höhe, und auf den die A. begleitenden Flächen, (durch die ganze Alpenkette, sodann in Oberschwaben, Oberbayern, Mähren, Schlesien, Böhmen und um Königsberg in Preussen.) Juni. Juli. *Cirsium tricephaloides* Lam. dict. 1. 704. *C. carniolicum* All. ped. 1. S. 149. mit Ausschl. des Synon. von Scop. *Carduus Erisithales* Vill. delph. 3. S. 20. *Cnicus rivularis* Willd. sp. 3. S. 1676. *Bth. purpurn.* — Var.: der St. einfach, 1-4köpfig, die Köpfchen gehäuft und sitzend, oder gestielt und einzeln, (diese letztere Form ist *Cnicus salisburgensis* Willd. sp. 3. 1675.) oder der St. hoch, ästig, 8-12köpfig, die Köpfchen an der Spitze des St. gehäuft und auf den Aesten einzeln (*C. r.* Var. *heteropus* Näg. C. d. Schw. S. 81.), die *B.* oberseits flaumig oder kahl, unterseits allenthalben oder nur an den Nerven flaumig, ganz oder fiederspaltig, die Fieder längl. oder selten lanzettl.-lineal., ganz oder gezähnt, die Blättchen des HK. angedrückt oder an der Spitze kurz-abstehend.

8. *C. HETEROPHYLLUM* (*Carduus h.* Lin. sp. 1154.) Die Wurzelfasern fädlich; der St. beblättert, an der Spitze ziemlich nackt, die *Bthstiele* etwas kurz, *nackt*, *spinnwebig*; die *B.* nicht herablaufend, oberseits nicht dörnig-kurzhl., *oberseits kahl*, *unterseits weiss-filzig*, *herzf.-stengelumfassend*, ganz, oder die mittleren vorne spitz-eingeschnitten, die Fieder ganz, lanzettl.-lineal., vorwärts-gerichtet; die Köpfchen wenige, einzeln, oder etwas gehäuft, deckblattlos, bauchig; die Blättchen des HK. längl., stumpfl., in ein ganz kurzes Dörnchen zugespitzt, nicht gekielt, kahl; der *Saum der Blkr. so lang oder ein wenig kürzer*, als die *Röhre*. 2. Auf feuchten Wiesen, an Bächen und in Wäldern der Gebirgsgegenden und VorA., (durch die ganze Alpenkette, 4000-6000 Fuss hinauf; sodann in Oberbaden, Oberbayern, Mähren, Schlesien, Böhmen.) Juni. Juli. *Bth. purpurn.* *Cirsium heterophyllum* All. ped. 1. 152. t. 34. *Cnicus heterophyllus* Willd. sp. 3. 1673. — Var.: der St. einfach oder ästig, 1-6köpfig, die Köpfchen sitzend oder länger-gestielt und einzeln, die *B.* unterseits schneeweiss oder schwach-spinnwebig, die Blättchen des HK. angedrückt oder an der Spitze kurz-abstehend. Expl. mit lauter ungetheilten *B.* sind: *Cirsium helenioides* All. ped. 1. 152. t. 13. *Carduus helenioides* Sut. helv. 2. 163., nicht Linn. — Der *Carduus helenioides* Linn. unterscheidet sich nach Smith „durch den doppelt höheren St., und die um die Hälfte kleineren, zu 4 oder mehreren an der Spitze des St. aufsitzenden *Bth.*“

9. *C. ACAULE* (*Carduus a.* Lin. sp. 1156.) Die Wurzelfasern fädlich; *St. und Bthstiel oft fehlend*, oder nur niedrig, beblät-

tert, wollig oder flaumig, *nicht spinnwebig*; die *B.* nicht herablaufend, oberseits nicht dörnig-kurzh., etwas flaumig und *nicht spinnwebig*, *nicht geöhret*, gelappt, oder buchtig-fiedersp., die Fieder eyf., winkelig, 3-4spaltig, die Zpfl eyf.; die Köpfchen wenige, cylindrisch, mit DeckB. versehen, letztere blattförmig; die *Blättchen des HK.* eyf., angedrückt, stumpf, plötzlich in ein abstehendes, sehr kurzes Dörnchen zugespitzt, nicht gekielt, *kahl*; der *Saum der Blkr. kürzer, als die Röhre.* 4. Auf Wiesen und Triften der Gebirge und Alpen bis zu 7000 Fuss, (durch das ganze Gebiet) Juli. Aug. Jacq. ic. rar. t. 579. *Cirsium acaule* All. ped. 1. 153. *Cnicus acaulis* Willd. sp. 1681. St. h. 24. *Bth. purpurn*, selten blass-fleischfarben. — Var.: stengellos, oder einen 1 Fuss hohen, 1köpfigen oder seltener 2-4köpfigen St. treibend, die Köpfchen auf der Wurzel, oder an der Spitze des St. und der Aeste einzeln, oder an der W. gehäuft; die *B.* oberseits kahl oder haarig, unterseits an den Nerven oder allenthalben haarig, gelappt oder tief-fiederspaltig, die Fieder getrennt oder einander gegenseitig deckend, gezähnt, oder lappig-eingeschnitten und gezähnt. — Die Var. mit fusshohem St. ist: *Cnicus dubius* Willd. prodr. n. 801. t. 6. fig. 11. *Carduus Roseni* Vill. delph. 3. 14. t. 21. Stengellose, meist mehrköpfige Expl. mit zahlreicheren Blatt-Fiedern, welche fast dachziegelf., etwas kraus und sehr dörnig, sind: *Cirsium gregarium* Boiss. DC. Pr. VII. 305. (Alpen des Wallis an sonnigen, dürren Stellen.)

10. *C. ERISITHALES* (*Cnicus* E., Lin. spec. 1157.) Der St. beblättert, oberwärts ziemlich nackt; die *Bthstiele* etwas kurz, *fast nackt, dicht-flaumig*; die *B.* nicht herablaufend, oberseits nicht dörnig-kurzh., beiderseits flaumig (*nicht spinnwebig*), geöhret-stengelumfassend, tief-etwas-buchtig-fiederspaltig, die Fieder wagerecht, etwas zurückgebogen, lanzettl.-längl., gezähnt; die *Köpfchen etwas gehäuft, nickend*, ohne DeckB., rundl.; die *Blättchen des HK.* längl.-lanzettl., mit einem sehr kurzen Dörnchen endigend, *klebrig-gekielt, flaumig*, nicht spinnwebig, von der Mitte an wagerecht-abstehend; der *Saum der Blkr. länger, als die Röhre.* 4. In felsigen Hainen der Gebirge, (Schweiz: im Jura und am Südabhang der Alpen 2000-4000 Fuss weit hinauf; durch die übrige Alpenkette und in Oberbaden.) *Carduus Erisithales* Jacq. a. t. 310. Lam. dict 1. 704. *Cirsium Erisithales* Scop. carn. 2. S. 125. *Cirsium glutinosum* Lam. fl. fr. 2. 27. DC. fl. fr. suppl. S. 464. *C. ochroleucum* a. DC. fl. fr. 4. 115. Rehb. fl. exc. 1923. *Bth. citrongelb.* — Var.: der St. einfach, wenig- (2-5) köpfig, oder ästig, viel- (10-15) köpfig, die Köpfchen einzeln oder gehäuft und fast sitzend. — *C. ochroleucum* All. ped. 1. 150. ist nach der Beschreibung ein *Cirsium*, das keinem von allen denen gleicht, welche ich bis jetzt gesehen. In DeCandolle's Herbar finden sich unter diesem Namen Expl. von *C. Erisithales* und dem Bastard von *C. rivulare* und *C. oleraceum* vereinigt. In Koch Syn. ed. I. S. 396. ist eine aus dem Samen gezogene Pfl. beschrieben, die, mir wenigstens ein Bastard scheint von *C. Erisithales* und *C. oleraceo-canum* oder *C. oleraceo-acaule*. Ein Bastard aus *C. palustri-oleraceum* und *C. Erisithales*, welcher im Garten von Zürich wild wuchs, *C. [palustri-oleraceo]-*

Erisithales passt zwar zu Koch's Diagnose, nicht aber mit seinem Expl. — Allion's Pfl. hat einen ununterbrochen-beblätterten St., B., welche unterseits von einer kurzen Behaarung *weisslich sind*, Fieder gezähnt, Fieder mit 2 oder 3 grössern Zähnen zu beiden Seiten, ein oder das andere nicht-gefiederte, lanzettl. Blättchen unter das Köpfchen gestellt; 4 oder 5 fast sitzende Köpfchen, einen klebrigen rundl.-kegelf. HK., lanzettl., am Ende etwas zurückgebogene und grüngelbe Blättchen.

11. *C. CARNIOLICUM* (Scop. carn. 2. S. 128. t. 54.) Der St. beblättert, sowie die kurzen mit DeckB. versehenen Bthstiele wollig-filzig mit röthlich-braunen Haaren; die B. nicht herablaufend, oberseits nicht dornig-kurzh., beiderseits flaumig, (*nicht spinnwebig*), gehöhrt-stengelumfassend, die unteren gestielt, *mit abgerundeter Basis*, ganz oder spitz-fiederspaltig, die Fieder eyf., gezähnt, die oberen B. sitzend, an der Basis herzf.; *die wenigen Köpfchen gehäuft, aufrecht, mit DeckB. versehen*, die DeckB. lineal., dornig-wimperig; *die Blättchen des HK. lanzettl.*, allmählig zu einem kurzen Dorn verschmälert, *nicht gekielt, flaumh.* (*nicht spinnwebig*, oberwärts abstehend, *die äusseren am Rande dornig*; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. An felsigen Stellen der A., (Kärnthen, Krain, Oberösterreich.) Juli. Aug. *C. rufescens* Ram. in DC. fl. fr. 4. S. 114. *Bth. gelblich-weiss.*

12. *C. SPINOSISSIMUM* (Cnicus sp. L. sp. 1157.) Der St. bis zur Spitze beblättert; *die Bthstiele fehlend oder sehr kurz* und spinnwebig; *die B. nicht herablaufend*, oberseits nicht dörnig-kurzh., auf beiden Flächen *etwas haarig (nicht spinnwebig)*, an der Basis gehöhrt, sehr dornig, die Adern vor dem Dorne unterseits hervorstehend, buchtig-fiederspaltig, die Fieder eyf., kantig-3spaltig, die Zpfl 3eckig; *die Köpfchen gehäuft, mit DeckB. versehen*, die DeckB. länger, als die Köpfchen, längl.-lineal., *nicht gefärbt, dornig-zipfelig*; *die Blättchen des HK. lanzettl.-lineal.*, nicht gekielt, *kahl, allmählig in einen Dorn verschmälert, der so lang, als der übrige Theil der Schuppe, hart und abstehend ist*; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Auf Triften, an Bächen und kiesigen O. der A. 4000-8600 Fuss hinauf, (Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark, Krain.) Juli. Aug. *Cirsium spinosissimum* Scop. carn. 2. 129. *Bth. gelblich-weiss.* — Var.: *stengellos* (auf den höchsten Alpen), oder mit einfachem St., oder der St. wird hoch, ästig, und die Köpfchen sind an der Spitze des St. oder der Aeste gehäuft, (*Cirsium spinosissimum* var. *ramosum* Näg. C. d. Schw. S. 97.) die B. oberseits kahl oder zerstreut-haarig, unterseits an den Adern flaumh. oder wollig.

13. *C. OLERACEUM* (Cnicus oleraceus L. sp. 1156.) Der St. bis zur Spitze beblättert; die Bthstiele fehlend, oder kurz und spinnwebig; *die B. nicht herablaufend*, oberseits nicht dörnig-kurzh., *fast kahl (nicht spinnwebig)*, stengelumfassend, ganz oder fiederspaltig, die Fieder längl.-lanzettl., gezähnt; *die Köpfchen gehäuft, mit DeckB. versehen*, walzlich; *die DeckB. länger, als die Köpfchen, eyf. oder längl., nicht gefärbt, fast ganz*; *die Blättchen des HK. lanzettl., weiss-gekielt, in einen weichen, abstehenden*

Dorn, der dreimal kürzer, als die Schuppe ist, allmählig verschmälert; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Auf feuchten Wiesen, an Gräben, in abgetriebenen Wäldern bis zu 5000 Fuss hinauf. *Cirsium oleraceum* Scop. carn. 2. 124. *Cardus acanthifolius* Lam. enc. 1. 703. *Bth. gelblich-weiss.* — Var.: die Köpfchen sitzend oder gestielt, die B. oberseits kahl oder zerstreut-flaumh., an der Basis gehöhrt oder daselbst herzförmig.

III. Rotte. BREA. Lessing. Synops. compos. S. 10. CEPHALONOPLOS DC. prodr. VI. S. 643. Die B. oberseits nicht dornig-kurzh. *Der Saum der Blkr. bis auf die Basis 5theilig. Die Haarkrone zuletzt länger, als die Blkr.* Die Blättchen des HK. in einen einfachen Dorn endigend.

14. C. ARVENSE (Serratula L. sp. 1149.) Der St. beblättert, die unteren Aeste kurz, beblättert, keine Bth. tragend; die Bthstiele ziemlich kurz, nackt, spinnwebig; die B. etwas herablaufend, oberwärts nicht dornig-kurzh., etwas kahl oder unterseits spinnwebig, fast ganz, oder buchtig-fiedersp., die Fieder etwas gezähnt; *die Köpfchen durch Fehlschlagen zweihäusig, ohne DeckB., walzlich, rispig-doldentranbig; die Blättchen des HK. angedrückt, etwas spinnwebig, nicht gekielt, in ein ganz kurzes, abstehendes Dörnchen zugespitzt; die Haarkrone weich, zerbrechlich, schmutzig-weiss, zuletzt dreimal länger, als die Blkr.; der Saum der Blkr. bis auf die Basis 5theilig, wenig oder viel kürzer, als die Röhre; die Staubf. ziemlich kahl.* 4. Auf Aeckern, an bebauten O., öden Plätzen, an Wegen, in abgetriebenen Wäldern bis 5000 Fuss hinauf. *C. arvense* Scop. carn. 2. 126. *Bth. hell-purpurn, selten weiss.* — Var.: der St. oberwärts kahl oder spinnwebig, die Bthstiele weiss-grau oder weiss-filzig, fast fehlend, oder ziemlich verlängert; die B. sehr kurz- oder vollkommen-herablaufend, oberseits kahl oder schwach-spinnwebig, unterseits kahl oder weiss-filzig, flach oder wellig und kraus; die Dornen lang und hart, oder kurz und kaum stechend, die Blättchen des HK. grünlich oder purpurn, nur die unteren oder auch die mittleren an der Spitze dornig. — Expl. mit flachen und ungetheilten B. sind: *C. setosum* MBieb. taur. cauc. 3. 561. *Cnicus setosus* Bess. cat. h. crem. 1816. *Serratula setosa* Willd. sp. 3. 1645. Dieselbe Form mit fast lappigen B.: *Serratula complicata* Schweigg. in Hag. Chlor. bor. S. 303. Expl. mit unterseits filzigen B.: *C. argenteum* Vest. nach Maly fl. styr. S. 73. *C. incanum* Fisch. cat. h. gor. 1812. (Es giebt deutsche Expl. von *C. arvensis*, welche sich nicht von denen vom Caucasus unterscheiden.)

IV. Rotte. PICNOMON (Lobel. ic. 2. 14. f. 2.) Die B. oberseits nicht dornig-kurzh. Der Saum der Blkr. nicht bis zur Mitte 5spaltig. Die Haarkrone stets kürzer, als die Blkr. *Die Blättchen des HK. in einen fiederig-dornigen Anhang zugespitzt.*

15. C. ACARNA (Cnicus A. Lin. spec. 1158.) Der St. bis zur Spitze beblättert; die B. vollständig herablaufend, oberseits nicht dornig-kurzh., beiderseits spinnwebig, entfernt-gezähnt, oder fieder-spaltig, die Fieder 2spaltig, die Zpfl eyf.-3eckig; die Köpfchen an der Spitze der Aeste gehäuft, mit DeckB. versehen, letztere lanzettl., dornig-gezähnt, länger als das Köpfchen; *die Blättchen*

des HK. spinnwebig-verstrickt, blattartig, in einen pfriemlichen, gefiedert-dornigen, zurückgebogenen Anhang zugespitzt; die Haarkrone weich, vielreihig, kürzer als die Blkr.; der Saum der Blkr. nicht bis zur Mitte 5spaltig, ein wenig kürzer, als die Röhre. ☉. An sonnigen, öden Plätzen, (Istrien.) Juli. Aug. *Cirsium Acarna* DC. fl. fr. 4. 111. *Picnomon Acarna* Cass. dict. sc. nat. B. 25. S. 225. Bth. purpurn.

B. BASTARD-ARTEN.*)

§. 1. Die Blätter oberseits dornig-kurz. Die Blättchen des HK. in einen einfachen Dorn endigend.

16. (2 + 3.) C. e LANCEOLATO et PALUSTRI. Auf Waldplätzen unter den Stamm-Pflanzen, Zürich!, bei Lausa in Sachsen, nach Reichenbach.)

C. LANCEOLATO-PALUSTRE (Näg. Cirs. d. Schw. S. 158. t. VIII.) Der St. beblättert, (ästig) etwas spinnwebig, die Bthstiele ziemlich kurz, mit kleinen DeckB. versehen; die B. weit hinablaufend, oberseits mit kleinen, sparsamen Dörnchen und kurzen Haaren bedeckt, (unterseits spinnwebig), (buchtig-fiederspaltig, die Fieder 2spaltig, die Zpfl lanzettl., die Köpfchen eyf., etwas traubig, meist ohne DeckB., die DeckB. lanzettl., an der Basis dornig-gezähnt, viel kürzer als der HK.; die Blättchen des HK. in einen abstehenden Dorn allmählig verschmälert, welcher fast wehrlos, schlank, gelblich und fast fünfmal kürzer, als die Schuppe selbst ist, kaum klebrig-gekielt; der Saum der Blkr. etwas länger, oder so lang, als die Röhre. ☉. (Zürich am Uto unter den Eltern!) Bth. purpurn. — Die B. sind mehr die von C. palustre, mit kleineren, schlankeren Dornen, die Adern vor den Dornen unterseits wenig hervortretend, die Zpfl an der Spitze in's Purpurne spielend; die DeckB. halten das Mittel von beiden; auch die Köpfchen stehen in der Mitte zwischen beiden, nähern sich aber doch mehr dem C. lanceolatum.

17. (2 + 9.) C. e LANCEOLATO et AGAULI.

*) Alle nun folgende Cirsien sind Bastarde. Ich habe sie nach den Stamm-Pflanzen geordnet; wo ihre Abkunft erwiesen war, wählte ich einen zusammengesetzten Namen, so dass man den beider Arten, derjenigen, von welcher der Befruchtungs-Staub kam vorne, derjenigen, von welcher der Same erzeugt wurde, hinten, zu einem einzigen Worte vereinigt findet. Bei Aufstellung der Diagnose und bei Namhaftmachung der Haupt-Kennzeichen, habe ich vorzugsweise die Stamm-Pflanzen im Auge behalten. Was übrigens die Art u. Weise, sowie die Gründe dieser Methode betrifft, so verweise ich auf meine bereits obenbezeichnete Abhandlung (in der Zeitschrift für wissenschaftliche Botanik). Naegeli.

C. LANCEOLATO-ACAULE. Der St. niedrig, bis zur Spitze beblättert, zottig; die Bthstiele etwas kurz, beblättert, etwas spinnwebig-zottig; die B. kurz-herablaufend, oberseits flaumlich und sehr zerstreut mit Dörnchen besetzt, unterseits haarig, sehr dornig, buchtig-fiederspaltig, die Fieder eyf., 3spaltig, die Zpfl länglich; die Köpfchen wenige (3), eyf., mit DeckB.; letztere blattförmig, wenig kürzer als der HK.; die Blättchen des HK. ziemlich kahl, aus dem Länglichen kurz-zugespitzt, oberwärts abstehend, in einen kurzen Dorn verschmälert; der Saum der Blkr. kürzer, als die Röhre. 4.? (bei Chambéry in Savoiën.) Bth. purpurn. Die B. von C. acanle, aber ein wenig hinablaufend, oberseits zerstreut-dörnig, am Rande mehr dornig, mit vorgezogener Spitze; die Köpfchen von C. lanceolatum, aber die Blättchen laufen in eine kürzere Spitze und einen kleineren Dorn aus; die Blkr. lang, schlank, wie an C. lanceolatum. Obgleich mir von den Verhältnissen des Stand O. dieser Pfl. nichts bekannt ist, so bezeichnen doch alle Kennzeichen so offenbar die Stamm-Pflanzen, so dass man sie ohne allen Anstand nach diesen benennen kann.

§. 2. Die Blätter oberseits nicht dörnig-kurz., mehr oder weniger herablaufend. Die Blättchen des HK. in einen einfachen Dorn endigend.

18. (3 + 6.) C. e PALUSTRI et BULBOSO. Cnicus palustri-tuberosus Schiede de pl. hybr. 36. C. semidecurrens (Richter) Reichenbach fl. exc. 1920. C. palustri-bulbosum DC. prodr. VI. 646. C. Kocheanum Löhr Flora 1842. 7. C. laciniatum Döll. rhein. Fl. 508. Auf feuchten Wiesen unter den Eltern. (Zürich!, Elsass, Rheinpfalz!, Bayern.)

I. C. PALUSTRI-BULBOSUM (Näg. Cirs. d. Schw. 154.) Die Wurzelfasern etwas verdickt; der St. unterwärts dichter-, oberwärts entfernter und klein beblättert; die Bthstiele etwas verlängert, nackt, filzig; die B. kaum bis zur Mitte herablaufend, etwas dornig, buchtig-fiederspaltig, die Fieder längl., 2-3spaltig, die Zpfl lanzettl.; die Köpfchen mittelmässig, zahlreich (6-15), klein, längl., ohne DeckB., fast einzelt; die Blättchen des HK. länglich, stumpfl., angedrückt, in ein absteheendes, sehr kurzes, kaum verletzendes Dörnchen geendigt, schwach-klebrig-gekielt; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. (Zürich am Uto unter den Eltern!, bei Deidesheim in der Rheinpfalz!). Bth. purpurn. Die büschelige Wurzel, das ausdauernde Rhizom, die B. und die Verästelung sind mehr von C. bulbosum, die (etwas grösseren) Köpfchen von C. palustre. Die B. oberseits flaumig, unterseits etwas haarig oder spinnwebig.

B. RÜCKBILDUNG (zu C. bulbosum). Die Wurzelfasern mehr verdickt; die Bthstiele sehr verlängert; die B. kurz-herablaufend, weniger dornig; die Köpfchen wenige (2-3), grösser, bauchig, einzelnstehend; die Blättchen des HK. nicht gekielt. — Von C. bulbosum, mit welchem es sehr übereinstimmt, unterscheidet es sich hauptsächlich durch die kurz-herablaufenden B. (Zürich!, Deidesheim!).

? II. *C. BULBOSO - PALUSTRE*. Die Wurzel?; der St. unterwärts beblättert, oberwärts etwas nackt; die Bthstiele etwas verlängert, nackt, filzig; *die B. weit-hinablaufend*, unterseits spinnwebig, dornig, buchtig-fiederspaltig, die Fieder längl.-lanzettl., 2-3spaltig; die Zpfl lanzettl.-lineal.; *die Köpfchen mittelmässig, zahlreich* (8-16), *gross, bauchig*, ohne DeckB., *etwas vereinzelt*; *die Blättchen des HK. längl., stumpfl., angedrückt*, in ein abstehendes, sehr kurzes Dörnchen geendigt, *nicht klebrig*; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. ☉? (Zürich am Uto unter den Eltern!) Bth. purpurn. — Die *B. von C. palustris*, der Bthenstand die Mitte haltend, die Köpfchen von *C. bulbosum*. Ob jedoch diese Form wirklich aus Samen von *C. palustre*, welches von *C. bulbosum* befruchtet worden, hervorgegangen sei, ist noch näher zu erforschen.

19. (3 + 7.) *C. c PALUSTRI et RIVULARI*. *Cnicus palustri-rivularis*, Schiede de pl. hybr. 54. *Cirsium palustri-rivulare* Näg. Cirs. d. Schw. S. 155. *C. subalpinum* Gaud. fl. helv. V. 182. (mit Ausschl. der Var. β . Koch Syn. ed. I. 393.) Auf feuchten Wiesen unter den Eltern, (Schweiz, Süddeutschland von Bregenz bis in's Breisgau.)

I. *C. PALUSTRI - RIVULARE*. Der St. fast bis zur Spitze (oberwärts entfernter und klein) beblättert, unterwärts unterbrochen-geflügelt, oberwärts fast ganz ohne Flügel; die Bthstiele kurz, nackt, filzig; *die B. kaum bis zur Mitte, (die oberen kurz-) herablaufend*, beiderseits flaumig, wenig dornig, buchtig-fiederspaltig, *die Fieder längl., gezähnt, oder lappig-gezähnt*; *die Köpfchen mittelmässig, zahlreich* (6-12), *klein*, ohne DeckB., *etwas gehäuft*, *die Blättchen des HK. längl., stumpfl., angedrückt*, in ein sehr kurzes, weiches, abstehendes Dörnchen geendigt, in's Purpurene spielend, *schwach-klebrig-gekielt*; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 2. (Schweiz in der Vallée de Toux und im Sihlthal mit den Eltern!) Der ausdauernde Wurzelstock und die *B. mehr von C. rivulare*, die Köpfchen von *C. palustre*, der Blütenstand zwischen beiden, aber der letzteren Art ähnlicher.

B. *RÜCKBILDUNG* (zu *C. rivulare*). (Näg. Cirs. d. Schw. S. 157.) Der St. oberwärts ziemlich nackt; *die B. kurz-herablaufend*, weniger dornig, spitzer-eingeschnitten, die Fieder gezähnt; *die Köpfchen wenige* (2-4), *grösser*; *die Blättchen des HK. nicht klebrig*. — Vom *C. rivulare* unterscheidet es sich vorzüglich durch die kurz-herablaufenden *B.* Die Köpfchen sind denen des *C. rivulare* ähnlich und variiren wie bei diesem gestielt und ungestielt; die *B. sind manchmal ungetheilt*. (Schweiz in der Vallée de Toux und im Sihlthal.) — Diese Form, häufiger vorkommend, wie die übrigen, wird vorzugsweise als *C. subalpinum* bezeichnet.

II. *C. RIVULARI - PALUSTRE*. Der St. fast bis zur Spitze (oben entfernter-) beblättert, unterwärts fast ganz-, oberwärts unterbrochen-geflügelt, die Bthstiele ziemlich kurz, nackt, filzig; *die B. tief- (die oberen bis zur Mitte) herablaufend*, oberseits flaumig, unterseits meistens schwach-spinnwebig, dornig, buchtig-fiederspaltig, *die Fieder meist 2spaltig*, die Zpfl lanzettl.; *die Köpf-*

chen mittelmässig - zahlreich (6 - 12), grösser, deckblattlos, etwas gehäuft; die Blättchen des HK. längl. - 3eckig, spitzlich in ein sehr kurzes, weiches, abstehendes Dörnchen geendigt, nicht klebrig, in's Purpurne spielend; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. ☉? (Schweiz im Sihlthal mit den Eltern!) Bth. purpurn. — Die B. und (kransen, dornigen) Flügel von C. palustre, die Köpfchen von C. rivulare, der Blütenstand hält die Mitte zwischen beiden, ist aber der letzten Art ähnlicher. — An herbstlichen Aesten abgeschnittener Expl. sind die B. weniger getheilt und weniger herablaufend, als an dem abgeschnittenen C. palustre.

20. (3 + 9.) C. e PALUSTRI et ACAULI. C. Kirschlegeri C. H. Schultz in Briefen. Auf feuchten Wiesen mit den Eltern (bei Blankenburg im Harz, bei Strassburg.) — Von dieser Bastard-Art sah ich nur ein einziges Expl. und dieses in seiner Rückbildung zu C. acaule.

C. PALUSTRI - ACAULE (Hampe prodr. fl. hercyn. S. 48.)

B. RÜCKBILDUNG (zu C. acaule). (Nägeli C. d. Schw. S. 163.) *Der St. kurz, (2köpfig); die Bthstiele beblättert, spinnwebig - zottig, an der Spitze filzig; die B. kurz - herablaufend, beiderseits zerstreut-haarig (nicht spinnwebig), buchtig - fiederspaltig, die Fieder eyf., 2-3lappig; die Köpfchen wenige (2), grösser, einzelnstehend, längl., mit linealen DeckB. fast von der Länge des HK.; die Blättchen des HK. eyf. - längl., angedrückt, stumpf, (an der Spitze bräunlich-purpurn), am Rande leicht spinnwebig in ein sehr kurzes, abstehendes Dörnchen geendigt; der Saum der Blkr. so lang, als die Röhre. 4. (Bei Blankenburg!) Bth. purpurn. — Unterscheidet sich vom C. acaule durch die kurz - herablaufenden B., die schlankeren, an der Blattbasis zahlreicheren Dornen, den spinnwebigen Bthstiel, die etwas kleineren Köpfchen und Deckblätter, und den mit der Röhre gleichlangen Saum der Blkr.*

21. (3 + 10.) C. e PALUSTRI et ERISITHALI.

C. PALUSTRI-ERISITHALES. *Der St. beblättert, ästig, an der Spitze ziemlich nackt, unterwärts abgebrochen-geflügelt, oberwärts fast flügellos; die Bthstiele kurz, nackt, spinnwebig - flaumig, die B. bis zur Mitte (die oberen kurz-) hinablaufend, etwas flaumig, (die oberen unterseits schwach - spinnwebig), etwas dornig, tief-buchtet - fiederspaltig, die Fieder wagerecht, längl. - lanzettl., gezähnt oder gelappt; die Köpfchen zahlreich, klein, eyf., aufrecht, ohne DeckB., an der Spitze des St. und der Aeste traubig-geknäuel, die Blättchen des HK. verlängert-längl., stumpflich, oberwärts gefärbt, flaumig (nicht spinnwebig), klebrig - gekielt, in ein sehr kurzes, weiches, abstehendes Dörnchen geendigt; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Im Garten zu Turin unter den Eltern wild gewachsen. Juli. Aug. Bth. purpurn. — Der (ausdauernde) Wurzelstock, St. und die B., ausser dass diese herablaufen und dorniger sind, ganz ähnlich dem C. Erisithales; der Blütenstand zwischen beiden die Mitte haltend; die Köpfchen von C. palustre, aber ein wenig grösser und breiter, die Blättchen*

des HK. länger und an der Spitze etwas abstehend. — Die Art und Weise, nach welcher diese Pfl. erschien, lässt nicht zweifeln, dass der Same von *C. Erisithales*, welches durch *C. palustre* befruchtet war, herstammte.

22. (3 + 13.) *C. e PALUSTRI et OLERACEO.* — *Cnicus palustri-oleraceus* Schiede de pl. hybr. 63. *Cirsium hybridum* Koch in DC. fl. fr. 5. 463. Koch Syn. ed. 1. 394. *Cnicus lacteus* Schleich. exsicc. *Cirsium subalpinum* β . *lacteam* Gaud. fl. helv. 5. 183. *C. lacteam* Koch Syn. ed. 1. 394. *Cnicus parviflorus* Heller Wirz. suppl. 76. *Cirsium parviflorum* DC. pr. 6. 647. *Cnicus nudiflorus* Schleich. exsicc. *Cirsium subalatum* Thom. exsicc. (nicht Gaud.) *C. oleraceo-palustre* Näg. C. d. Schw. S. 148. — Auf feuchten Wiesen, an sumpfigen O., in abgetriebenen Wäldern unter den Eltern, (durch Deutschland und die Schweiz hin und wieder.)

C. PALUSTRI-OLERACEUM. Der St. beblättert, oder an seinem obersten Ende fast nackt, unterwärts abgebrochen-geflügelt, oberwärts beinahe ganz flügellos; die Bthenstiele fehlend, oder kurz, fast nackt und filzig; die B. bis zur Mitte (die oberen kurz-) herablaufend, etwas flaumig oder unterseits schwach-spinnwebig, fast ungetheilt oder etwas buchtig-fiederspaltig, die Fieder längl. oder längl.-lanzettl., gezähnt, oder seltener 2spaltig; die Köpfchen zahlreich, klein, an der Spitze des St. und der Aeste geknäuel, mit einigen DeckB. versehen, die DeckB. lanzettl., fast so lang, als die Köpfchen, oder lineal. und kürzer, die Blättchen des HK. verlängert-längl., an der Spitze kürzer-abstehend, in ein kurzes, weiches Dörnchen geendigt, oberwärts gefärbt, auf dem Rücken etwas klebrig, am Rande schwach-spinnwebig; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Die Bth. gelblichweiss oder milchweiss, blass in's Röthliche spielend, die Griffel purpurn. — Den (ausdauernden) Wurzelstock und die B. hat es vom *C. oleraceum*, der Blütenstand und die DeckB. stehen zwischen beiden Arten in der Mitte, die Köpfchen sind von *C. palustre*; aber die B. sind mehr gespalten und mehr dornig, als bei *C. oleraceum*, die Köpfchen etwas grösser, und die Blättchen ein wenig länger, als bei *C. palustre*.

B. RÜCKBILDUNG (zu *C. oleraceum*). Der St. bis zur Spitze beblättert; die B. ziemlich stengelumfassend, kurz-herablaufend, fast kahl, (nicht spinnwebig); die Köpfchen weniger zahlreich, grösser, mit DeckB. versehen; die DeckB. längl.-lanzettl., oder länglich, ziemlich bleich, so lang oder länger, als die Köpfchen; die Blättchen des HK. mehr verlängert, nicht klebrig. 4. Bthen gelblich-weiss, die Griffel purpurn. — Von *C. oleraceum* unterscheidet es sich noch dch die herablaufenden B., die DeckB. und kleineren Köpfchen, durch die weniger gekielten, in ein kürzeres, dünneres Dörnchen endigenden Blättchen des HK. — *C. oleraceo-palustre* d. *frigido-glomeratum* Näg. C. d. Schw. t. VI. ist eine in der anfangenden Rückbildung begriffene Form.

Es varirt diese Bastard-Form wie deren Eltern: der St. einfach oder ästig; die B. tief-fiedersp. oder ungetheilt, oberseits kahl

oder flaumig; die Köpfchen sitzend oder kurz-gestielt. — An den nach der Heuernte getriebenen Aesten sind die B. ganz oder gelappt, wenig herablaufend und die Köpfchen kleiner und länger-gestielt. — Die meisten Autoren theilen diese Art in zwei: in *C. hybridum* und *C. lacteum*, oder in *C. hybridum* und *C. parviflorum*, oder in *C. palustri-oleraceum* und *C. oleraceo-palustre* etc. Aber sämtliche Expl., welche mir zu Gesicht gekommen, sind, wenigere zu dem reinen *C. palustri-oleraceum*, mehrere zu den sich rückbildenden Formen zu rechnen gewesen; keine fand ich mit B. und Wurzel von *C. palustre* und Köpfchen von *C. oleraceum*, so dass sie ein *C. oleraceo-palustre* darstellten. *C. lacteum* Schleich. in welchem Koch (Syn. ed. I. S. 394) einen Bastard von *C. palustre* und *C. Erisithales* vermuthet, unterscheidet sich von *C. palustri-oleraceum* nur als Variet., ist aber von *C. palustri-Erisithales* völlig verschieden.

23. (3 + 14.) *C. e PALUSTRI et ARVENSI.*

C. ARVENSI-PALUSTRE. Der St. beblättert (oberwärts ziemlich nackt); die Bthstiele kurz, nackt, spinnwebig-filzig; die B. weit hinablaufend, ziemlich kahl, an der Basis und den Flügeln buchtig-gelappt, die oberen entfernt, wenig herablaufend; die Köpfchen ohne DeckB., walzlich, an der Spitze des St. geknäuelte; die Blättchen des HK. angedrückt, etwas spinnwebig, nicht gekielt, in ein gelbliches abstehendes Dörnchen geendigt; die Haarkrone? der Rand der Bthr. bis auf $\frac{3}{4}$ oder darüber 5theilig; die Staubf. etwas behaart. ☉? (In sumpfigen Wiesen zwischen Bruck und Batrandorf unweit Wien.) Aug. C. Chailloti Koch Syn. ed. I. 393. (nicht Gaudin.) *C. pannonicopalustre*, Koch Taschenb. 291. Bth. purpurn. — Obgleich am StandO. die Eltern nicht bekannt wurden, so kann man solche doch aus den Hauptmerkmalen erkennen; denn die tief-hinablaufenden B., die Bildung der Flügel und der Blütenstand deuten auf *C. palustre*, die Köpfchen aber und vorzüglich die tiefer 5spaltigen, schlankeren, mit einer längeren Röhre versehenen Bthr. auf *C. arvense*. Uebrigens scheint das einzige Expl., welches ich in der Sammlung von Alex. Braun gesehen, eine abgeschnittene Form zu seyn, daher zwischen *C. arvense* und *C. palustre putatum* (*C. Chailloti* Gaud.) in der Mitte zu stehen.

24. (1 + 9.) *C. e PANNONICO et ACAULI.*

C. PANNONICO-ACAULE. Der St. nicht hoch, beblättert; die Bthstiele verlängert (so lang wie der St.), fast nackt, spinnwebig; die B. sehr kurz herablaufend, kahl oder zerstreut-flaumig (nicht spinnwebig), etwas buchtig-fiederspaltig, die Fieder eif., 2-3lappig, die Lappen kurz, eif. oder längl.; die Köpfchen wenige (1-2), einzeln stehend, ohne DeckB.; die Blättchen des HK. längl., spitzlich, kaum etwas spinnwebig, in ein sehr kurzes Dörnchen geendigt; der Saum der Bthr. ein wenig länger, als die Röhre. 4. Oede Plätze, (Gottsche in Unterkrain.) *C. Freyerianum*, Koch Taschenb. S. 288. Bth. purpurn. — Die B. von *C. ncaule* aber graugrün, die Bthstiele die Mitte haltend

zwischen *C. acaule caulescens* und *C. pannonicum*; die Köpfchen, die Blättchen des HK. und die Bth. von *C. pannonicum*, nur ein wenig grösser. — Ich weiss nicht, ob dieses *Cirsium* wirklich in Gesellschaft von *C. acaule* und *C. pannonicum* gefunden worden ist; aber wenn man nach den Kennzeichen schliessen darf, so verrathen sich die Eltern ganz leicht.

25. (4 + 10.) *C. e PANNONICO et ERISITHALI*. *Carduus tenuifolius?* Thom. exsicc. *Cirsium Erisithali-pannonicum* Heer, nach Briefen. In Berg-Wäldern unter den Eltern, (Corni di Canzo in der ital. Schweiz.)

C. PANNONICO-ERISITHALES. Der St. unterwärts beblättert, oberwärts ziemlich nackt, beinahe ohne Flügel; die *Blüthenstiele* etwas verlängert, oder seltener etwas kurz, nackt, *spinnwebig*; die *B. fast stengelumfassend*, *kurz-herablaufend*, beiderseits flaumig oder unterseits schwach-spinnwebig, *etwas buchtig-fiederspaltig*, die *Fieder wagerecht oder etwas nach vorne gerichtet, länglich, gezähnt*; die *Köpfchen wenige* (2-3), breit-eyf., ohne DeckB., *aufrecht*; die *Blättchen des HK. längl., spitz*, an der Spitze aufrecht-abstehend, *schwach klebrig*, in ein sehr kurzes Dörnchen geendigt; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Die *Bth. purpurn.* — Die B. sind mehr von *C. Erisithales*, der Blütenstand, der HK. und die Bl. mehr von *C. pannonicum*.

B. RÜCKBILDUNG (zu *C. Erisithales*.) Die B. geöhrelt-stengelumfassend, kaum herablaufend; die *Köpfchen* etwas grösser, *rundl., fast überhangend*; die *Blättchen des HK. mehr verlängert, auf dem Rücken klebrig*, oberwärts *bogig-abstehend*. 4. Die Bth. röthlich oder purpurn. Von *C. Erisithales* unterscheidet sich dieses noch durch die etwas herablaufenden B. und die Farbe der Bth.

26. (5 + 13.) *C. e CANO et OLERACEO*. *Carduus tataricus* L. sp. 1155. Jacq. a. t. 92. *Cnicus tataricus* Bess. fl. gal. 2. 171. *Cirsium tataricum* Wimm. et Grab. fl. siles. 2. 96. (nicht All.) Koch syn. ed. 1. 394. *C. cano-oleraceum* Rehb. fl. exc. 1927. Auf feuchten Wiesen unter den Eltern, (Oestreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, Sachsen.)

C. CANO-OLERACEUM. Die *Wurzelfasern fädlich*; der St. unterwärts dichter-, oberwärts entfernter-beblättert; die *Bthstiele etwas verlängert, klein beblättert*, spinnwebig; die *B. etwas stengelumfassend, kurz-* (die oberen kaum-) *herablaufend*, ziemlich kahl oder unterseits schwach-spinnwebig, ungetheilt oder buchtig-fiederspaltig, die Fieder gezähnt; die *Köpfchen wenige* (1-5), *einzelnstehend*, oder etwas genähert, mit DeckB. versehen; die *DeckB. wenige* (1-3), *grün*, (nicht farblos), *lineal.*, am Rande dornig, *kürzer als der HK.*; die *Blättchen des HK. längl.-lanzettl., allmählig verschmälert, spitz*, an der Spitze kurz abstehend, *in ein kurzes, nicht verletzendes Dörnchen endigend*; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Die *Bth. weisslich-gelb, oder milchweiss.* — Die Wurzel und die B. stimmen mit *C.*

oleraceum, die (verlängerten) Bthstiele und der HK. mehr mit *C. canum* überein; durch die (kleinen) B. der Bthstiele und die DeckB. steht es zwischen beiden Arten. Die B. sind derber, als an *C. oleraceum*, graugrünlich und dorniger.

B. RÜCKBILDUNG (zu *C. oleraceum*.) Der St. bis zur Spitze beblättert; die Bthstiele etwas kurz, beblättert; die B. *geöhreht-stengelumfassend*, *wenig herablaufend*, nicht spinnwebig; die Köpfschen *etwas gehäuft*, ein wenig zahlreicher, mit DeckB. versehen; die DeckB. *längl.-lunzettl.*, *so lang als die Köpfschen*, dornig-gezähnt, etwas entfärbt; die Blättchen des HK. mehr verlängert, etwas gekielt, an der Spitze weiter abstehend. — Die Bth. gelblichweiss. — Von *C. oleraceum* unterscheidet es sich noch durch die etwas herablaufenden, an der Basis mehr dornigen B., und dch die schmälern, kürzeren, fast grünen DeckB.

27. (13 + 14.) *C. ex OLERACEO et ARVENSI*. In abgetriebenen Wäldern unter den Eltern, (Zürich, an der Weisseritz in Sachsen nach Reichenbach.)

C. OLERACEO-ARVENSE (Nägeli C. d. Schw. S. 146. t. IV.) Der St. bis zur Spitze beblättert; die unteren Aeste *wenig*, *kurz*, *beblättert*, *keine Blthen treibend*; die Bthstiele etwas kurz, spinnwebig; die B. *kurz*, *geöhreht-herablaufend*, etwas kahl, unterseits graugrün (an den nicht blühenden Aesten am Rücken zart spinnwebig), buchtig-gelappt oder buchtig-fiederspaltig, die Fieder *längl.*, etwas gezähnt; die Köpfschen etwas gehäuft, walzlich, mit DeckB. versehen; die DeckB. *fast so lang wie der HK.*, *längl.*, *grün*, ungetheilt; die Blättchen des HK. schwach-spinnwebig, etwas gekielt, *in ein Dörnchen geendigt*, *welches kaum verletzend*, *vielmals kürzer*, *als die Schuppe* und abstehend ist; die Haarkrone zuletzt etwas kürzer oder kaum so lang wie die Blkr.; der Saum der Blkr. über die Mitte 5spaltig, kürzer als die Röhre; die Stbf. etwas kahl. 4. (Zürich am Uto unter den Eltern.) Blth. gelblichweiss oder milchweiss, manchmal an der Spitze röthlich. — Die derbern B. und die Verästelung, zumal die unteren, nicht blühenden Aeste sind ganz wie bei *C. arvense*; der Blütenstand, die DeckB. und die Blättchen des HK. halten mehr die Mitte; die Blkr. weichen wieder wenig von denen des *C. oleraceum* ab, nur sind sie etwas schlanker und länger-röhrig.

B. RÜCKBILDUNG (zu *C. arvense*.) (Nägeli C. d. Schw. S. 147.) Die B. *nicht geöhreht*, *kurz-herablaufend*, dorniger, derber; die DeckB. *kleiner*, *lunzettl.*, *viel kürzer*, *als der HK.*; die Köpfschen fast vereinzelt, fast nackt; die Blättchen des HK. *in ein kürzeres*, härteres, absteheendes Dörnchen geendigt; die Haarkrone zuletzt *fast um den vierten Theil länger*, *als die Blkr.*; die Blkr. tiefer 5spaltig, milchweiss. 4. (Zürich mit der reinen Bastardform.) — Es steht in allen Theilen dem *C. arvense* näher, von dem es aber immer noch besonders verschieden ist durch die grösseren Köpfschen mit wenigen DeckB., durch die nicht bis auf die Basis getheilte Blkr. und die milchweissen Blth.

§. 3. Die Blätter oberseits nicht dornig-kurzh. und nicht herablaufend. Die Blättchen des HK. mit einem einfachen Dorn geendigt.

28. (6 + 9.) C. e BULBOSO et ACAULI. Cnicus acauli-tuberosus Schiede de pl. hybr. S. 61. Cirsium medium All. fl. ped. t. 49. f. 2. C. Zizianum Koch Syn. ed. 1. S. 398. Auf etwas feuchten Bergwiesen mit den Eltern, (bei Zürich!, um Mainz!, an Bienitz in Sachsen.)

C. BULBOSO-ACAULE. Die Wurzelfasern ein wenig verdickt; der St. beblättert; die *Blthstiele* verlängert (fast so lang wie der St.), *spinnwebig*, fast nackt; die B. nicht geöhret, etwas behaart, und nicht spinnwebig, gelappt oder buchtig-fiederspaltig, die *Fieder eyf.*, dreispaltig, die *Zipfel* länglich; die *Köpfchen* wenige (1-4), einzelnstehend, etwas bauchig, *deckblattlos*; die Blättchen des HK. länglich, stumpflich, plötzlich in ein ganz kurzes, absteheendes Dörnchen zugespitzt, schwach-spinnwebig oder fast kahl, der *Saum der Blkr.* ein wenig länger, als die *Röhre*. 4. (Zürich am Uto unter den Eltern.) Blth. purpurn. — Die B. von C. acaule, die Köpfchen von C. bulbosum. Der Blthstiel ist mit wenigen, ganz kleinen linealen DeckB. besetzt.

B. RÜCKBILDUNG (zu C. acaule.) Die Wurzelfasern fädlich; die *Blthstiele* ziemlich kahl oder fläumlich, an der *Spitze* kaum spinnwebig, klein beblättert; die B. am Blthstiele lanzettl., gezähnt; die *Köpfchen* kaum bauchig, fast ohne *DeckB.*, ziemlich kahl; die Blättchen des HK. breiter; der *Saum der Blkr.* so lang als die *Röhre*, oder etwas kürzer. (Zürich mit der reinen Bastardform!) — Blth. purpurn. — Von der stengeltreibenden Var. des C. acaule ist dieses vorzugsweise verschieden durch die oberwärts nackten Blütenstiele und die fast nackten Köpfchen, durch die etwas spinnwebigen Blthstiele und die weniger schlanke Blkr.

Es scheint noch eine andere Bastardform, ein C. acauli-bulbosum, mit den B. von C. bulbosum und den Köpfchen von C. acaule, so wie eine Form davon in der Rückbildung zum C. bulbosum vorzukommen, ist jedoch noch genauer zu untersuchen.

29. (7 + 9.) C. e RIVULARI et ACAULI. C. Heerianum Näg. C. d. Schw. S. 75. Auf feuchten Bergwiesen unter den Eltern, (Schweiz in der Vallée de Toux!)

C. RIVULARI-ACAULE. Der St. beblättert, an der Spitze ziemlich blattlos; die *Blthstiele* kurz oder verlängert, ziemlich nackt, spinnwebig; die B. nicht geöhret, flaumig, buchtig-fiedersp., die *Fieder* längl., 2spaltig, die *Zpfl* längl.; die *Köpfchen* wenige (1-5), ohne *DeckB.*, einzelnstehend oder etwas gehäuft, die *Blättchen des HK.* längl.-dreieckig, in ein ganz kurzes, weiches Dörnchen geendigt, fast kahl, ins *Purpurne* spielend; der *Saum der Blkr.* länger, als die *Röhre*. 4. Blth. purpurn. Die B. von C. acaule, aber etwas weniger tief fiederspaltig, die Einschnitte schmaler, die Fieder und Zpfl weniger breit, die Dornen kleiner; der Blütenstand und die Köpfchen von C. rivulare, letztere aber etwas grösser.

B. RÜCKBILDUNG (zu *C. acaule*.) Kleiner, die *Blthstiele* fast kahl oder flümllich, an der Spitze schwach-spinnwebig, klein beblättert; die *B.* dorniger, tiefer buchtig-fiederspaltig, die *Fieder* breiter, 2-3spaltig, die *B.* der Blütenstiele lanzettl.; gezähnt oder gelappt; die *Köpfchen* einzelnstehend, grösser, mit einem oder dem anderen lineal. oder lanzettl., dornig-gezähnelten, mit dem *HK.* fast gleich langen *DeckB.* gestützt; die Blättchen des *HK.* breiter, weniger gefärbt; die *Blkr.* schlanker. — Die *Blth.* purpurn. — Es unterscheidet sich von der stengeltreibenden Var. des *C. acaule* durch die *B.* und deren etwas schmalere Theilungen, durch die weniger beblätterten, etwas spinnwebigen *Blthstiele*, die mit wenigen *DeckB.* versehenen *Köpfchen*, die mehr verlängerten und spitzeren Blättchen des *HK.* und den mit der Röhre wenigstens gleich langen Saum der *Blkr.*

Es variirt diese Bastardform gerade so, wie ihre Eltern, nämlich: der *St.* einfach, einköpfig oder etwas ästig und 3-5köpfig; die *Köpfchen* gehäuft und sitzend oder gestielt und vereinzelt; die *B.* oberseits flaumig oder fast kahl; die Blättchen des *HK.* ange-drückt oder mit der Spitze kurz-abstehend.

30. (8 + 9.) *C. ex HETEROPHYLLO et ACAULI.* *C. alpestre* Näg. *C. d. Schw.* S. 84. Auf feuchten Wiesen der VorA. unter den Eltern, (Schweiz im Wallis bei Zermatt!)

C. HETEROPHYLLO-ACAULE. Der *St.* kurz, beblättert; die *Blthstiele* verlängert, so lang als der *St.* oder länger, spinnwebig, etwas beblättert; die *B.* sitzend, (nicht stengelumfassend), oberseits zerstreut-flüml., unterseits etwas spinnwebig, meist buchtig-fiederspaltig, die *Fieder* längl., gezähnt, 2spaltig, etwas vorwärts-gerichtet, die Lappen längl., die *B.* der *Blthstiele* lanzettl., gezähnt; die *Köpfchen* wenige (1-3), einzelnstehend, nackt, oder mit einem oder dem anderen linealen *DeckB.* gestützt, welches halb so lang ist als der *HK.*, bauchig; die Blättchen des *HK.* länglich, stumpflich, in ein sehr kurzes Dörnchen zugespitzt, kahl, der Saum der *Blkr.* kürzer, als die Röhre. 2. *Blth.* purpurn. — Die Gestalt von der stengeltreibenden Variet. des *C. acaule*; die *B.* ähnlicher denen von *C. acaule*, aber weniger tief-fiederspaltig, weniger dornig, auf der Unterseite spinnwebig oder kahl, graugrün, die Einschnitte und *Fieder* schmaler; die *Köpfchen* sind die des *C. heterophyllum*, aber etwas grösser, die Blättchen des *HK.* etwas breiter und weniger gefärbt.

B. RÜCKBILDUNG (zu *C. acaule*.) Kleiner, die *B.* unterseits etwas haarig (nicht spinnwebig), die *Fieder* breiter, weniger vorwärts-gekehrt; die *Blthstiele* ein wenig spinnwebig, beblättert, die *Köpfchen* kaum bauchig, mit wenigen lanzettl., gezähnten, mit dem *Köpfchen* gleichlangen *DeckB.* gestützt; die Blättchen des *HK.* breiter und weniger gefärbt. *Bth.* purpurn. — Von der stengeltreibenden Variet. des *C. acaule* unterscheidet sich dieses noch: durch die weniger breiten, etwas weniger stacheligen *B.* und deren Zertheilungen, durch die spinnwebigen *Blthstiele* und durch die kleineren und schmäleren *Köpfchen*.

Das *C. heterophyllo-acaule* variirt wie seine Eltern: die *B.* lappig-gezähnt oder fiederspaltig, oberseits etwas kahl oder flaumig, unterseits schwach spinnwebig oder kahl, die Fieder gezähnt oder 2spaltig.

31. (7 + 8.) *C. e RIVULARI et HETEROPHYLLO. C. pauciflorum* Koch Syn. ed. I. S. 395. Reichenb. fl. exc. 1908. Auf den Wiesen der Granit-A. von Obersteyermark (am Bürgersee Host, am Rottemannertauern Angelis!)

C. RIVULARI-HETEROPHYLLUM. Der St. beblättert, oberwärts ziemlich nackt; die Blütenstiele etwas kurz, nackt, spinnwebig; die *B.* oberseits fast kahl (selten zerstreut- und ganz kurz-flaumh.), unterseits spinnwebig-weiss, herzförmig-stengelumfassend, gezähnt oder durchaus fiederspaltig, die Fieder wagerecht oder ein wenig vorwärts gerichtet, lanzettl., an der Basis etwas gezähnt; die Köpfchen wenige (2-5), ohne DeckB., etwas gehäuft; die Blättchen des HK. längl.-3eckig, in ein sehr kurzes abstehendes Dörnchen geendigt, fast kahl, nach oben ins Purpurne spielend; der Saum der Blkr. länger als die Röhre. 4. Blth. purpurn. — Den *B.* nach dem *C. heterophyllum*, den Köpfchen nach dem *C. rivulare* ähnlicher.

Von den Expl. aus Piemont sind die, welche Schleicher unter dem Namen eines *C. ambiguum* ausgab, verschieden. In diesen ist der St. mitunter bis zur Spitze beblättert, die *B.* unterseits spinnwebig oder fast kahl, die Fieder manchmal 2spaltig, die Blättchen des HK. länglich, stumpflich (vergl. die zu der folgenden Art später noch hinzugefügte Bemerkung. K.)

32. (8 + 10.) *C. ex HETEROPHYLLO et ERISITHALI. Cnicus pauciflorus* Waldst. et Kit. pl. r. hung. t. 161. *Cnicus ambiguus* Schleich. cat. 1807. *Cirsium pauciflorum* Spreng. syst. 3. 375. *Cirsium ambiguum* Koch. Syn. ed. I. 396. Auf feuchten Wiesen der A. unter den Eltern, (im mittleren Vinschgau, Dr. Tappeiner.)

C. ERISITHALI-HETEROPHYLLUM. Der St. beblättert, oberwärts ziemlich nackt; die Blütenstiele etwas kurz, nackt, spinnwebig-filzig; die *B.* oberseits etwas flaumh., unterseits spinnwebig-grauweiss, herzf.-stengelumfassend, die unteren gestielt, eyf., gelappt, die Lappen gezähnt; die Köpfchen wenige (2-7), etwas gehäuft, überhängend, deckblattlos oder mit einem lanzettl.-linealen DeckB. gestützt, rundl.; die Blättchen des HK. längl.-lanzettl., in ein sehr kurzes Dörnchen endigend, klebrig-gekielt, purpurfarbig überlaufen, nach oben bogig-abstehend; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Blth. purpurn. — Nach den Hauptkennzeichen und der Analogie mit den Uebrigen halte ich das *C. pauciflorum* für einen Bastard der beiden angeführten Arten, wenigstens spricht keines der Merkmale dagegen. Die unterseits spinnwebigen, oberseits frisch-grünen *B.* und der filzige St. erinnern an *C. heterophyllum*, die überhängenden, rundl. Köpfchen (die oberen etwas gehäuft, eines oder das andere der unteren vereinzelt und gestielt) und die klebrigen Blättchen aber an *C. Erisithales*. Die Blättchen des HK. sind purpurn, wie zu Zeiten auch

bei *C. heterophyllum*; die Blth. purpurn, weil die Farbe der Blth. bei *C. Erisithales* so leicht abändert (an den sich sehr zurückbildenden Expl. von *C. pannonicum-Erisithales* bleiben doch d. Blth. noch purpurn.) Hierher gehört *Cnicus pauciflorus* W. K. a. a. O., denn die Köpfschen sind überhängend und die Schuppen klebrig; deutsche Explare des *Cirsium pauciflorum* aber müssen, wie es scheint, dem *Cirsium rivulari-heterophyllum* beigelegt werden.

Das *Cirsium Erisithali-heterophyllum* wurde neuerlich in den Tyroler A. von Dr. Tappeiner unter den Eltern aufgefunden mit den sich zu *C. heterophyllum* zurückbildenden Exemplaren. Diese Bastardform giebt sich zu erkennen durch die überhängenden, kugeligen Köpfschen, die abstehenden klebrigen Schuppen und die unterseits weiss-filzigen B. An Expl. aus dem Vinschgau sind die B. fiederspaltig, die Zipfel etwas nach vorne gerichtet, gezähnt und zweilappig. Hierher gehört der *Cnicus ambiguus* Schleicher's nach Expl. vom Autor selbst.

33. (7 + 12.) *C. e RIVULARI et SPINOSISSIMO. C. spinosissimorivulare* Näg. *C. d. Schw. S. 140. t. VII. Auf Wiesen der A., (Mt. Cenis im Piemont!)*

C. RIVULARI-SPINOSISSIMUM? Der St. bis zur Spitze und an dieser selbst entfernt-beblüthert, oberwärts schwarz-purpurn, etwas spinnwebig; die Blthstiele fehlend oder sehr kurz und filzig; die B. auf beiden Seiten zerstreut-flaumh., geöhreht-stengelumfassend, buchtig-fiederspaltig, die Fieder eyf.-längl., zugespitzt, gezähnt oder 3spaltig, winkelig, mit fast 3eckigen Zipfln.; die Köpfschen wenige (6), mit DeckB.; die DeckB. lanzettl.-lineal., oder lineal., unterwärts gezähnt, länger als die Köpfschen, grün, (nicht farblos); die Blättchen des HK. lanzettl., an der Spitze abstehend, in einen kurzen, breitlichen, nicht verletzenden Dorn geendigt, oberseits gefärbt: der Saum der Blkr. länger als die Röhre. 4. Die Blth. milchweiss. — Nach den B. steht es dem *C. spinosissimum*, nach den Köpfschen und dem Blüthenstande dem *C. rivulare* näher. Das einzige Expl., welches ich aus der Sammlung von Charpentier gesehen und das ich sonst für *C. spinosissimorivulare* gehalten, scheint mir nun nach gewonnener besserer Ueberzeugung *C. rivulari-spinosissimum* mit einiger Rückbildung zu *C. spinosissimum*.

34. (8 + 12.) *C. e HETEROPHYLLO et SPINOSISSIMO. C. purpureum* All. ped. n. 548. t. 36. *Cnicus Cervini* Thom. exsicc. (!) Schleicher. cat. 1821. *Cirsium Cervini* Koch Syn. ed. 1. S. 399 (!) *C. Hallerianum* Gaud. fl. helv. V. 188. (!) *C. controversum* DC. prodr. 6. 654. (!) *C. erucagineum* DC. prodr. 6. 649. (mit Ausschl. v. Explar.) (!) *C. ambiguum* γ. *albidum* DC. prodr. 6. 653. (!) *Carduus autareticus* Vill. delph. 3. S. 12. t. 19. *Cnicus autareticus* Lois. fl. gall. 541. *Cirsium autareticum* Mutel. fl. dauph. *Cirsium rigens* β. *laevigatum* β. α. Gaud. fl. helv. 5. 186. *C. spinosissimoheterophyllum* Näg. *C. d. Schw. S. 142. S. spinosissimomalpestre* Näg. *C. d. Schw. S. 141. Auf feuchten Wiesen, an Bächen und in Wäldern der A. unter den Eltern, (Schweiz auf dem Berninal*

im Rheinwald! am Scopi! im Urserenthale! bei Zermatt! am Mt. Cenis!

C. HETEROPHYLLO-SPINOSISSIMUM. Der St. bis zur Spitze beblättert, oberwärts spinnwebig; die Blthstiele fehlend oder sehr kurz und filzig; die *B.* oberseits kahl oder zerstreut-flaumig, *unterseits spinnwebig-weiss*, breit-geöhrelt-stengelumfassend, etwas dornig, *buchtig-fiederspaltig*, die *Fieder* längl., *2-3spaltig*, die Zipfel längl.-lanzettl., der hintere meist etwas länger, als der vordere; die *Köpfchen* wenige (2-5), gehäuft, mit *DeckB.*; die *DeckB. lanzettl.-lineal.*, oder *lineal.*, an der Basis gezähnt, *so lang als die Köpfchen, grün*, (nicht farblos); die *Blättchen des HK. verlängert-längl.*, mit der Spitze kaum abstehend, *in einen kurzen, etwas breiten, nicht verletzenden Dorn geendigt*; der Saum der Blkr. etwas länger, als die Röhre. 4. Die Blth. milchweiss, meist an der Spitze röthlich oder purpurn. — Die WurzelB. sind denen von *C. spinosissimum* sehr ähnlich, unterseits wenigspinnwebig, oberseits etwas haarig, die Zertheilungen und Einschnitte etwas breiter, als an den St. B.; die St. B. sind, je mehr sie sich der Spitze nähern, dem *C. spinosissimum* weniger, dem *C. heterophyllum* mehr ähnlich, unterseits filzig, oberseits kahl, die Zertheilungen und Einschnitte schmaler; die *DeckB.* die Mitte einhaltend; die *Köpfchen* nähern sich mehr denen des *C. heterophyllum*.

B. RÜCKBILDUNG (zu *C. spinosissimum*.) Die *B. unterseits wenig-spinnwebig*, oder kahl und graugrün, dorniger, mit breiteren Einschnitten und Fiedern; die *DeckB. lanzettl.-lineal.* oder *längl.-lineal.*, länger als die *Köpfchen*, grün, (nicht farblos); die *Blättchen des HK. lanzettl.*, oben abstehend, *zu einem längeren, nicht verletzenden Dorn allmählig verschmälert*. — Die Blth. milchweiss oder gelblich-weiss. — Es unterscheidet sich von *C. spinosissimum* durch die unterseits etwas spinnwebigen *B.*, die kleineren, nicht farblosen *DeckB.* und die oberwärts gefärbten, kurz- und weichdornigen *Blättchen des HK.*

Unter den Expl., welche mir bisher als Bastard-Formen zwischen *C. heterophyllum* und *C. spinosissimum* vorkamen, erkannte ich mit Sicherheit nur das *C. heterophyllo-spinosissimum* und dessen Rückbildungs-Formen. Das eigentliche *C. heterophyllo-spinosissimum* findet man selten, denn es geht stets mehr oder minder in das *C. spinosissimum* zurück. Ob auch ein *C. spinosissimoheterophyllum* vorkomme, ist weiter zu untersuchen.

35. (9 + 12) **C. ex ACAULI et SPINOSISSIMO.** *C. spinosissimomacaule* Näg. C. d. Schw. 139. t. V. Auf Alpentriften unter den Eltern; (Schweiz auf dem Bavonnaaz bei Bex! in den Alpen von St. Moritz im Engadin!)

C. ACAULI-SPINOSISSIMUM. Der St. niedrig, durchaus dicht beblättert, zottig; die *Blthstiele* kurz, spinnwebig-zottig; die *B. beiderseits* etwas haarig, geöhrelt, stengelumfassend oder ungeöhrelt, dornig, *buchtig-fiederspaltig*, die *Fieder* eyf., *winkeltig-3spaltig*, die *Zipfel* etwas *3eckig*; die oberen *B. länger*, als die

Köpfchen; *die Köpfchen wenige* (1-4), *an der Spitze des St. gehäuft*, mit DeckB.; die DeckB. lanzettl.-lineal., dornig-geschlitzt, länger, als die Köpfchen, grün, (*nicht farblos*); *die Blättchen des HK. längl., mit der Spitze kurz-abstehend, in einen kurzen, etwas breiten, nicht verletzenden Dorn geendigt*, oberwärts gefärbt; *der Saum der Blkr. etwas länger, oder so lang wie die Röhre der Blkr.* 4. *Blth. gelblichweiss oder milchweiss.* — Es giebt Expl., welche den B. nach am meisten mit *C. spinosissimum*, den Köpfchen nach nicht minder mit *C. acaule* übereinstimmen, und andere, deren Köpfchen mit einem von beiden Aehnlichkeit haben, somit zu den Rückbildungen zu gehören scheinen, wenn sie nicht ein *C. spinosissimo-acaule* darstellen, was künftig weiter geprüft werden muss.

36. (6 + 13) *C. e* BULBOSO et OLERACEO. *Cnicus tuberoso-oleraceus* Schiede de pl. hybr. S. 51. *Cnicus Lachenalii* Gmel. fl. bad. ed. 2. S. 380. *Cirsium Lachenalii* Koch. Syn. ed. 1. 397. (zum Theil.) *C. inerme* Reichenb. fl. exc. 1926. *C. bulbosum* β. pallens Wallr. sched. 445. La Chen. act. helv. 4. S. 294. t. 16. *C. pallens* DC. prodr. 6. 647. *C. oleraceo-bulosum* Näg. Cirs. d. Schw. S. 123. *C. oleraceo-ramosum* Näg. Cirs. d. Schw. S. 126. *C. oleraceo-lanceolatum* Schultz. Auf etwas feuchten Wiesen mit den Eltern, (Schweiz, bei Zürich und Basel; Baden und Elsass bis Mainz, Thüringen!, Sachsen.)

1. *C. BULBOSO-OLERACEUM.* *Die Wurzelfasern fädlich; der St. unterwärts dichter, oberwärts wenig-beblättert; die Blthstiele ziemlich verlängert*, etwas spinnwebig, klein-beblättert; die B. etwas kahl oder flaumb. (*nicht spinnwebig*) gelappt, oder buchtig-fiederspaltig, *die Fieder längl. oder längl.-lanzettl., gezähnt*, selten 2spaltig; *die Köpfchen einzeln, bauchig, mit einem oder dem anderen linealen DeckB., welches kürzer ist, als der HK., gestützt; die Blättchen des HK. verlängert-längl., mit der Spitze abstehend, spinnwebig, in ein sehr kurzes, schlankes, wenig verletzendes Dörnchen geendigt; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre.* 4. (Zürich unter den Eltern!) *Die Blth. gelblichweiss oder milchweiss.* — Nach der W. und den B. steht es dem *C. oleraceum*, nach den Köpfchen und dem Blütenstande dem *C. bulbosum* nahe. — Var.: der St. unterwärts einfach, an der Spitze 2-5köpfig, oder ästig und viel- (10-30) köpfig; die B. tief-fiederspaltig oder blos gezähnt.

B. RÜCKBILDUNG (zu *C. oleraceum*.) Der ganze St. beblättert; die Blthstiele kürzer; *die Köpfchen etwas gehäuft, mit DeckB.; die DeckB. lanzettl. oder längl.-lanzettl., fast so lang als das Köpfchen*, grün, (*nicht entfürbt*); *die Blättchen des HK. lanzettl., etwas gekielt, in einen breittlichen, nicht verletzenden Dorn, der vielmal kürzer, als die Schuppe ist, geendigt*, (Zürich mit dem reinen Bastard!) — Vom *C. oleraceum* unterscheidet es sich durch die weniger gehäuftten und weniger mit DeckB. versehenen Köpfchen und durch die kürzeren Blättchen des HK. Später, wenn es sich noch weiter zurückbildet, ist es dem *C. olera-*

ceum ganz ähnlich, nur die *DeckB.* sind eyf.-längl., länger als das Köpfchen, und grün.

H. C. OLERACEO-BULBOSUM. Die Wurzel-Fasern etwas verdickt; der St. unterwärts dichter-, oberwärts entfernter-beblättert; die *Blthstiele* abgekürzt, etwas blätterig, filzig; die B. etwas stengelumfassend, oberseits flaumh., unterseits etwas spinnwebig, buchtig-fiederspaltig, die *Fieder* eyf., längl., 2-3spaltig, die Lappen lanzettl. oder längl.; die *Köpfchen* etwas gehäuft, mit *DeckB.*; die *DeckB.* lanzettl., ein wenig kürzer, als die Köpfchen, nicht farblos; die *Blättchen* des HK. lanzettl., oberwärts abstehend, gekielt, in einen nicht verletzenden, breittlichen Dorn, der viel kürzer ist, als die *Schuppe*, allmählig verschmälert; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. (Zürich mit den Eltern!) Blth. gelblich-weiss. — Die B. von C. bulbosum, die Blthe zwischen beiden Arten, die Köpfchen von C. oleraceum; Var. mit einfachem, wenigköpfigem und ästigem, vielköpfigem St. und geklappten oder tief-fiederspaltigen B.

B. RÜCKBILDUNG (zu C. bulbosum.) Die Wurzelfasern verdickt; der St. oberwärts etwas nackt, die Blattfiedern 3spaltig, die Zipfel lanzettl.; die *Köpfchen* etwas bauchig, einzeln, deckblattlos; die *Blättchen* des HK. verlängert-längl., an der Spitze wenig-abstehend, in ein schlankes, sehr kurzes Dörnchen geendigt, (Zürich mit der reinen Bastardform!) Die Blth. gelblich-weiss oder milchweiss, manchmal an der Spitze ein wenig röthlich. — Verschieden von C. bulbosum durch die kleinen, bauchigen und kürzer-gestielten Köpfchen, die längeren Blättchen des HK. und die gelblich-weissen Blthen. Zuletzt wird es nur noch an der Farbe der Blthen erkannt, so dass es eine reine, bleiche Varietät von C. bulbosum zu seyn scheint.

Das C. Lachenalii Koch's ist aus Expl. beider Arten, nämlich aus den Bastarden von C. oleraceum und C. acaule und aus den Bastarden von C. oleraceum und C. bulbosum zusammengesetzt; die Expl. aus der Schweiz und das Synonym C. rigens Gaud. gehören zu dem Bastarde aus C. oleraceum und C. acaule. Keineswegs aber ist das C. lanceolatum herbeizuziehen, um den Uebergang in die Bastardform zu erläutern (wie dies Koch im Taschenbuch S. 294. vermuthet hat), da die Pflanzen durch kein Merkmal, weder durch die herablaufenden B., noch die dornige Oberseite der B., noch durch die dornigen, abstehenden Blättchen des HK. an C. lanceolatum erinnern.

37. (7 + 13.) C. e RIVULARI et OLERACEO. Cnicus oleraceo-rivularis Schiede de pl. hybr. 58. Cirsium oleraceo-rivulare DC. prodr. 6. 647. C. erucagineum DC! fl. fr. 3083. (mit Ausschl. v. Expl. und dem Synonym Carduus autareticus Vill., der ein Bastard ist aus C. spinosissimum und C. heterophyllum.) C. ochroleucum β. DC! fl. fr. 3. 3082. prodr. 6. 648. (zum Theil.) Cnicus saanensis Schleich. exsicc.! C. semipectinatus Schleich. exsicc.! Cirsium semipectinatum Reichenb. fl. exc. 1929. (nicht DC. prodr. 6. 646, und nicht Carduus semipectinatus Lam. dict. 1. 705.) Koch. Synops. ed. 1. S. 396. C. praemorsum Michx. bot. Ztg. 3. 1. S. 317. Koch. Synops.

ed. I. 397. Auf feuchten Wiesen der VorA. und der die A. begleitenden Thäler unter den Eltern, (Schweiz, im Appenzell, im Sihlthal!, im Saanenland! n. im Jura!; in Oberbayern!; Oberschwab.)

Cirsium mit unterwärts dichterem, oberwärts entfernt-beblättertem St.: die *Bthenstiele* kurz, filzig, *klein-beblättert*; die B. kahl oder flaumh., gehöhrt-stengelumfassend, ungetheilt oder fiederspaltig, die Fieder längl.-lanzettl. oder lanzettl., etwas gezähnt; die *Köpfchen* gehäuft, mit *DeckB.*; die *DeckB. lanzettl. oder lanzettl.-lineal, so lang als die Köpfchen*, grün, (*nicht entfärbt*); die *Blättchen des HK.* längl.-lanzettl. oder lanzettl., mit der Spitze abstehend, in ein nicht verletzendes, *kurzes Dörnchen geendigt*, etwas kahl, oder schwach-spinnwebig, oberseits etwas gefärbt; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Die *Bth. gelblich-weiss oder milchweiss, manchmal an der Spitze röthlich.* — Var.: der St. einfach, 1-4köpfig, oder ästig, 6-10köpfig; die B. unterseits grün oder grau-grün, ungetheilt oder nach hinten fiederspaltig, nach vorne ungetheilt, oder durchaus fiederspaltig, mit spitzlichen oder buchtig-stumpfen Einschnitten. — Ausserdem findet man alle Zwischenstufen zw. *C. oleraceum* und *C. rivulare*, und es fehlt nicht an Formen, die zu beiden Arten zurücklaufen, woraus hervorgeht, dass sowohl das *C. oleraceo-rivulare*, als das *C. rivulari-oleraceum* in diesen Bastardformen verborgen sei. Da aber die diagnostischen Merkmale von den B. und Köpfchen zwischen *C. oleraceum* und *C. rivulare* geringer sind, als bei allen übrigen Arten, so kann deren Stellung in der Bastard-Bildung auch noch nicht ausgemittelt werden. — Die Expl. in der Rückbildung zu *C. oleraceum* sind diesem sehr ähnlich, aber die *DeckB.* sind kleiner und schmaler, grün, (nicht farblos, und die Köpfchen ein wenig kleiner, (*Cnicus hybridus* Schleich. exsicc.! *Cirsium ochroleucum* γ. *mixtum* DC. prodr. 6. 619.!) — Die Expl. in ihrer Rückbildung zu *C. rivulare* unterscheiden sich von diesem nur dadurch, dass die *Blättchen des HK.* ein wenig länger, und weniger gefärbt, die *Bth.* milchweiss, (oder in das Röthliche spielend) und die Köpfchen etwas grösser sind.

38. (8 + 13.) *C. ex HETEROPHYLLO et OLERACEO.* *C. oleraceo-heterophyllum* Nägeli *C. d. Schw.* S. 138. *C. affine* Tausch pl. sil. exsicc.! Auf feuchten Wiesen der Gebirge und VorA. unter den Eltern, (Schweiz im Veltlin! und im Rheinwald! Böhmen um Kuschwarta! im sächs. Gebirge bei Hammern, nach Reichenbach.)

C. OLERACEO-HETEROPHYLLUM. Der St. bis zur Spitze beblättert, spinnwebig; die *Bthstiele* fehlend, oder kurz und filzig; die B. herzförmig-stengelumfassend, oberseits kahl, *unterseits spinnwebig-weisslich*, ungetheilt, oder *spitz-eingeschnitten*; die *Fieder lanzettl., nach vorne gerichtet*, ungetheilt; die *Köpfchen* wenige, gehäuft, mit *DeckB.*; die *DeckB. längl.-lanzettl., oder lanzettl., länger als die Köpfchen*; die *Blättchen des HK.* längl.-lanzettl., allmählig zu einem kurzen, nicht verletzenden Dörnchen verschmälert; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. (Böhmen!) *Bth.* gelblich-weiss. — Die B. von *C. heterophyllum*, die Köpfchen von *C. oleraceum*.

II. C. HETEROPHYLLO-OLERACEUM. Der St. bis zur Spitze beblättert, spinnwebig; die Bthstiele fehlend, oder kurz und filzig; die B. geöhrelt, stengelumfassend, oberseits ziemlich kahl, buchtig-fiederspaltig, die Fieder lanzettl. oder längl.-lanzettl., wenig gezähnt; die untersten B. unterseits etwas kahl, grau-grün, die mittleren unterseits spinnwebig, grau-weiss, die obersten unterseits filzig; die Köpfchen gehäuft, ein wenig bauchig, mit DeckB.; die DeckB. längl.-lineal., oder lanzettl.-lineal., nicht farblos, so lang oder etwas länger, als die Köpfchen; die Blättchen des HK. länglich, angedrückt, oder an der Spitze kurz-abstehend, in ein sehr kurzes Dörnchen geendigt; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. (Rheinwald!) Bth. gelblich-weiss oder milchweiss. — Die B. mehr vom C. oleraceum, die Köpfchen vom C. heterophyllum.

Das C. heterophyllo-oleraceum und das C. oleraceo-heterophyllum sind nicht viel von einander verschieden und noch genauer zu untersuchen; wahre Rückbildung zu einer oder der anderen dieser Arten, sah ich noch nicht.

39. (9 + 13.) C. ex ACAULI et OLERACEO. Cnicus rigens Ait. hort. kew. ed. I. 3. 144. Cirsium rigens Wallr. sched. 446. C. tataricum DC. fl. fr. 4. 144. mit Ausschl. der Syn. von Allion und Jacquin. Cnicus acauli-oleraceus Schied. (!) de pl. hybr. 46. Cirsium oleraceo-acaule Hampe (!) in Linnaea 1837. S. I. Nägeli C. d. Schw. 120. C. decoloratum Koch Syn. ed. I. 398. C. Lachenalii Koch Syn. ed. I. 397. (zum Theil). Auf feuchten Wiesen mit den Eltern, (zerstreut durch das ganze Gebiet.)

I. C. OLERACEO-ACAULE. Der St. meist niedrig, durchaus beblättert; die Bthstiele kurz, oder ein wenig verlängert, beblättert, etwas spinnwebig; die B. fast sitzend, (wenig-geöhrelt), zerstreut-flaumh., buchtig-fiederspaltig, die Fieder eyf., 3spaltig, die Zpfl. längl.; die Köpfchen etwas gehäuft, oder vereinzelt, mit DeckB.; die DeckB. lanzettl., nicht entfärbt, dornig-gezähnt, fast so lang, als die Köpfchen; die Blättchen des HK. längl.-lanzettl., oberwärts abstehend, allmählig in einen kurzen, nicht verletzenden, breitlichen Dorn verschmälert, schwach-gekielt und fast kahl; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. (Zürich! Alpen von Bex! Jura! Harz! Thüringen!) Bth. gelblich-weiss. — Die B. von C. acaule, die Köpfchen von C. oleraceum; der Blütenstand und die DeckB. die Mitte haltend. Var.: niedrig, 2-5köpfig (vom Ansehen der stengeltreibenden Variet. des C. acaule, aber mit kürzeren Aesten), oder 2-3 Fuss hoch und 6-15köpfig.

B. RÜCKBILDUNG (zu C. acaule.) Die B. buchtig-fiederspaltig; die Bthstiele verlängert, flaumh., (nicht spinnwebig); die Köpfchen vereinzelt, mit DeckB.; die DeckB. lineal.-länglich, gezähnt; die Blättchen des HK. eyf.-verlängert, an der Spitze kurz-abstehend, in ein sehr kurzes Dörnchen zugespitzt, (Zürich, Jura mit dem reinen Bastard!) Bth. gelblich-weiss oder an der Spitze etwas röthlich. — Vom C. acaule unterscheidet es sich vorzugsweise durch die längeren und spitzeren Blättchen des HK., die Farbe der Bth. und den Saum der Blkr., der länger ist, als die Röhre.

II. C. ACAULI-OLERACEUM. Der St. meist niedrig, durchaus beblättert; die Bthstiele etwas verlängert, beblättert, schwach-spinnwebig-flaumh.; die B. etwas stengelumfassend, ziemlich kahl oder flaumh., gelappt oder fiederspaltig, die Fieder längl., gezähnt oder 2lappig; die Köpfchen vereinzelt, mit DeckB., die DeckB. lineal-lanzettl. oder lineal-längl., dornig-gezähnt, nicht entfarbt, fast so lang, als die Köpfchen; die Blättchen des HK. eyf.-verlängert, an der Spitze kurz-abstehend, in ein ganz kurzes, fast wehrloses Dörnchen zugespitzt; der Saum der Blkr. etwas länger, als die Röhre. 4. (Zürich! Alpen von Bex! Jura! Harz!) Die Bth. gelblich-weiss oder milchweiss. — Nach den B. steht es dem C. oleraceum, nach den Köpfchen dem C. acaule näher; Blütenstand und DeckB. halten die Mitte, sind aber der letzten Art ähnlicher. — Var.: mit niedrigem, 1-3köpfigem, (mit dem Ansehen des stengeltreibenden C. acaule) und höherem 4-8köpfigem St.

B. RÜCKBILDUNG (zu C. oleraceum.) Die B. geöhrelt-stengelumfassend; die Bthstiele kürzer, die Köpfchen mit DeckB.; die DeckB. längl.-lanzettl., länger als die Köpfchen, nicht entfarbt; die Blättchen des HK. längl.-lanzettl., oberwärts abstehend, allmählig in einen kurzen, nicht verletzenden, breittlichen Dorn verschmälert, schwach-gekielt; der Saum der Blkr. ein wenig länger, als die Röhre. (Zürich mit dem reinen Bastard!) Bth. gelblich-weiss. — Verschieden von C. oleraceum durch die manchmal 2lappigen Blattfiedern, die länger-gestielten Köpfchen, die schmaleren, grünen DeckB. und die breiteren, in eine kürzere Spitze geendigten Blättchen des HK.

40. (10 + 12.) C. ex ERISITHALI et SPINOSISSIMO. C. flavescens Koch Taschenb. S. 292. Auf Alpenwiesen (Monte di Pozza in Fassa im südl. Tyrol, Facchini! im mittleren Vintsehgau, Dr. Tappeiner!)

C. SPINOSISSIMO - ERISITHALES. (Koch a. a. O.) Der St. bis zur Spitze beblättert; die Bthstiele fehlend, oder kurz und spinnwebig-zottig; die B. geöhrelt-stengelumfassend, oberseits flaumh., unterseits an den Adern zottig, wenig-dornig, tief-buchtig, fiederspaltig; die Fieder längl., winkelig-gezähnt, waagrecht, etwas zurückgebogen; die Köpfchen gehäuft, mit DeckB., etwas überhangend; die DeckB. lanzettl.-lineal., dornig-gezähnt, so lang als die Köpfchen, oder etwas kürzer, nicht entfarbt; die Blättchen des HK. lanzettl., kahl, (nicht klebrig) nach oben bogig-abstehend, in einen etwas harten, dreimal kürzeren Dorn, als der übrige Theil der Schuppe, verschmälert; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Bth. gelblich-weiss. — Ueber die Stamm-Pflanzen am Stand O. wurde noch nichts beobachtet. Aber die B. sind von C. Erisithales, jedoch weniger breit und dorniger, die Fieder kürzer, breiter, die Einschnitte zw. den Zähnen der Fieder stumpfer; die DeckB. halten die Mitte; die Köpfchen sind die von C. spinosissimum, aber die Blättchen des HK. sind mehr abstehend, kürzer, und weniger dornig.

B. RÜCKBILDUNG (zu C. Erisithales.) Der St. bis zur Spitze beblättert, die Blattfiedern länger; die DeckB. kleiner; die

Köpfchen überhangend, rundlich, die Blättchen des HK. etwas klebrig, längl.-lanzettl., in einen kurzen, breitlichen Dorn geendigt. — Im bot. Garten zu Erlangen aus dem Samen von *C. spinosissimo-Erisithales* gezogen. — Von *C. Erisithales*, dem es sehr ähnlich ist, verschieden durch den durchaus beblätterten St., die breiteren, mehr gelappten und mehr dornigen Blattfieder, die grösseren DeckB., die weniger klebrigen, allmählig in einen kurzen, breitlichen Dorn, und nicht in ein kurzes, schlankes Dörnchen geendigten Blättchen des HK.

41. (10 + 13.) *C. ex ERISITHALI et OLERACEO.* *C. Candolleianum* Nägeli *C. d. Schw.* S. 98. In Hainen der Gebirgsgegenden unter den Eltern, (ital. Schweiz im Val Assino und am Monte Legnone beim Comersee!)

C. ERISITHALI - OLERACEUM. Der St. bis zur Spitze (oberwärts entfernt-) beblättert; die *Bthstiele* fehlend, oder kurz und flaumh., kaum spinnwebig; die *B.* etwas kahl, stengelumfassend, buchtig-fiederspaltig, die Fieder ziemlich wagerecht, längl.-lanzettl., gezähnt; die *Köpfchen* rundl., gehäuft, überhangend, mit *DeckB. versehen*; die *DeckB. lanzettl.*, an der Basis gezähnt, vorn zugespitzt, so lang als die *Köpfchen*, nicht entfärbt; die *Blättchen des HK. längl.-lanzettl., in ein kurzes, nicht verletzendes Dörnchen geendigt, klebrig, oberwärts horizontal-abstehend*; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Bth. citrongelb oder gelblich-weiss. — Die *B.* und *DeckB.* mehr von *C. oleraceum*; der Blütenstand und die *Köpfchen* mehr von *C. Erisithales*.

B. RÜCKBILDUNG (zu C. oleraceum.) Der St. durchaus beblättert; die *Bthstiele* filzig; die *Köpfchen* aufrecht, mit *DeckB. versehen*; die *DeckB. längl.-lanzettl. oder längl., länger als die Köpfchen*, noch nicht entfärbt, mit längeren, oberwärts aufrecht-abstehenden, allmählig in ein, ein wenig breiteres und längeres Dörnchen verschmälerten, nicht klebrigen Schuppen. Es unterscheidet sich von *C. oleraceum* durch die schmäleren, grünen *DeckB.* und die breiteren, in ein kleineres Dörnchen geendeten Blättchen des HK.

42. (12 + 13) *C. e SPINOSISSIMO et OLERACEO.* *C. Thomasii* Nägeli *Cirs. d. Schw.* S. 93. Auf feuchten Wiesen der VorA. unter den Eltern, (Schweiz auf dem Bavonaz bei Bex!)

C. SPINOSISSIMO - OLERACEUM. Der St. bis zur Spitze beblättert; die *Bthstiele* fehlend oder kurz und spinnwebig; die *B.* geöhrelt-stengelumfassend, beiderseits zerstreut-flaumh., wenig stachelig, fiederspaltig, die Fieder längl.-gelappt und gezähnt; die *Köpfchen* gehäuft, mit *DeckB. versehen*; die *DeckB. eyf.-lanzettl., oder längl.-lineal.*, geschlitzt-gezähnt, ungefärbt, länger als die *Köpfchen*; die *Blättchen des HK. lanzettl.-lineal., kahl, nicht gekielt, in einen hürtlichen, abstehenden Dorn, der dreimal kürzer ist, als die Schuppe, geendigt*; der Saum der Blkr. länger, als die Röhre. 4. Die Bth. gelblich-weiss. — Durch die Blätter steht es dem *C. oleraceum*, durch die *Köpfchen* dem *C. spinosissimum* näher; die *DeckB.* halten die Mitte zwischen beiden.

STRAßE

189

VERBESSERUNG.

ZUSAETZE
UND
VERBESSERUNGEN.

REVISED

AMERICAN EDITION

ZUSÄTZE UND VERBESSERUNGEN.

S. XXXV. Nach SPIRAEA ist einzuschalten: C. Bth. unvollständig, unterst.

POTERIUM. Der Saum des K. 4th. Blb. fehlend. Stbgf. vor dem Ring des Schlundes eingefügt. Fruchtkn. 2, 3. Der Gf. mit pinself. N. Bthen vielehig.

S. XLVIII. füge man der Gattung *Sonchus* hinzu: der Papp. durchaus haarig, weich, biegsam, und der Gattung *Mulgedium*: der Papp. zerbrechlich, das Kränzchen etc.

S. LIV. Zeile 16. füge man bei: a.) der Fruchtkn. zsgedreht; die Fächer des Staubb. zusammenstossend.

S. LVI. füge man der Gattung *Pinus* bei: die S. geflügelt, allein bei einigen Arten ist der Flügel sehr schmal.

S. LVI. ist nach *Morus* einzufügen: zur Tetrandria, *Potertum*.

S. 3. In der Diagnose des *Thalictrum aquilegifolium* lese man: die Früchte 3 kantig-geflügelt.

S. 5. streiche man das *Thalictrum majus*; die dort beschriebene Pflanze gehört zu den grösseren Abarten des *Thalictrum Jacquinianum*. Dolliner theilte mir folgende treffliche Beobachtungen über die in der Gegend von Wien wachsenden Arten, das *Thalictrum minus* L. und *Thalictrum Jacquinianum*, mit:

1. *Thalictrum minus* L. hat einen an der Basis blattlosen, schuppigen St. und Srippige Früchte; kommt vor:

α. mit auf beiden Seiten grünen B.: Th. *virens* Wallr.; selten unter der Var. β. — Irrthümlich rechnen DC. und Reichenb. dasselbe zu Th. *minus* Jacq.

β. mit, zumal auf dem Rücken graugrün-bereiften B., 1½ Schuh hohem St.: Th. *roridum* Wallr. Dieses gemein in kalkhaltigen Gebirgen.

7. mit, zumal auf dem Rücken graugrün-bereiften B. und mit $1\frac{1}{2}$ bis 4 Fuss hohem St.: *Th. dumosum* v. Schlecht. *Th. majus* Crantz, Jacq., Smith., Reichenb. Kommt in regnerischen Jahren und an schattigen O., wiewohl selten, vor. Alle diese Abänderungen blühen zu Ende des Mai und bis in die Mitte des Juni.

2. *Thalictrum* mit, wenigstens im jungen Zustande, an der Basis beblättertem St. und 10 rispigen Früchten. Der St. 1 bis 4 Fuss hoch. Die B. beiderseits grün. Blüht im Juli und August. Diese Art, wenn sie mit Nebenblättchen versehen ist, stellt das *Th. minus* Jacq., und ohne Nebenblättchen das *Th. flexuosum* Reichenb. dar, allein die Nebenblättchen sind an dieser Art von keiner Bedeutung (In unserem Garten wächst gegenwärtig diese Pflanze freudig und treibt aus einer und derselben Wurzel Stengel, welche B. mit Nebenblättchen, andere, welche B. ohne Nebenblättchen haben.

S 8. Der *Anemone Halleri* füge man die Beobachtung hinzu: Die ersten Blüthen erscheinen vor den B., die späteren mit den B. und auch nachdem die B. schon entwickelt sind, wie bei den folgenden der Rote. Die Blüthe an der *A. Halleri*, wenigstens an der kultivirten Pflanze, ist immer aufrecht, und die Blb. sind zuerst aufrecht, später erst biegen sie sich an der Spitze nach aussen.

S. 9. Was von der *Anemone montana* S. 9. gesagt ist, gilt von der verblühten Pfl., die entfaltete Blüthe aber stellt ganz sicher zu der Zeit, wenn die Staubb. der mittleren und oberen Stbf. noch nicht geöffnet sind, einen aus kurz-glockiger Basis ausgebreiteten Stern dar. Die Blüthe von *Anemone pratensis* zeigt zur selben Zeit der Entwicklung eine geschlossene Glocke, die in der Mitte etwas bauchig ist.

S. 11. Zu *Anemone trifolia* setze man: Bth. weiss.

S. 12. *Ceratocephalus falcatus*, (an Ackerrändern und auf Aeckern, auf lehmigem Boden an der Hainleite bei Sondershausen, Buddensieg, Pharm.) „Die mittelpunktständigen (oberen) Bth. sind kurz-gestielt, und das Pflänzchen wächst vereinzelt. Bei *C. orthoceras* wachsen die Pflänzchen in Häufchen, und die sämtlichen Bthstielen sind von gleicher Länge.“ Buddensieg nach briefl. Mittheilung.

S 12. *Ceratocephalus orthoceras* (auf Aeckern am rechten Donauufer zw. Ulm und Wiblingen, von Martens; um Wien, häufiger als *C. falcatus*, Pfund.)

S. 13. *Ranunculus hederaceus*. Der Fruchtb. kahl; die Lappen der B. ganz. Diesem steht sehr nahe der *Ranunculus Lenormandi* F. W. Schultz Reg. bot. Ztg. 24. S. 558.; derselbe ist jedoch deutlich verschieden durch 5lappige B., deren mittlerer Lappen 3kerbig und deren seitliche 2kerbig sind, sowie durch die grösseren Bthen. Im Gebiete unserer Flora wurde er bis jetzt noch nicht aufgefunden.

S. 14. Den *Ranunculus divaricatus* hat der verstorb. Schrank in seiner bayer. Fl. im Jahre 1789 deutlich beschrieben; Sibthorp aber hat seinen *Ranunculus circinatus* in seiner Fl. oxon. erst im Jahre 1794 aufgeführt, deshalb habe ich den von Schrank dieser Pflanze ertheilten Namen vorangestellt.

S. 19. Zur Diagnose des *Ranunculus acris* füge man hinzu: der St. vielblüthig, die Bstiele flaumh. mit aufrechten oder ange-drückten Haaren.

S. 21. Bei der Diagnose des *Ranunculus muricatus* lese man anstatt „mit höckerig - dornigen Früchtchen“: mit dornigen oder höckerigen Früchtchen.

S. 22. Bei der Diagnose des *Ranunculus parviflorus* lese man anstatt „mit dornigen Früchtchen“: mit dornigen oder höckerigen Früchtchen.

S. 22. *Eranthis hyemalis* setze man bei: Bth. gelb.

S. 37. füge man der *Corydalis capnoides* folgende Synonyme bei: *C. capnoides* Ledeb. fl. ross. Bd. 1. S. 103. *C. Gebleri* Ledeb. index h. dorp. 1823. S. 3. Fl. altaic. 3. S. 246.

S. 37. Die Gattung *Fumaria* unserer Flora ist auf folgende Weise einzutragen:

FUMARIA Syn. S. 37.

a. Die völlig reifen Früchte glatt und nicht höckerig-runzelig.

1. *F. CAPREOLATA* (L. spec. 985.) *Die Früchte kreisrund, fast abgestutzt - stumpf, glatt*; die KB. eyf., kurz - zugespitzt, gezähnt, die halbe Länge der Blkr. erreichend oder überragend; die entwickelten Tr. locker, die Bthstielchen später zurückgebogen; die BZpfl längl. und oval.

2. *F. MURALIS* (Sonder nach br. Mitth.) *Die Früchte rundl.-eyf., stumpf, glatt*; die KB. eyf., zugespitzt, kürzer, als die Hälfte der Blkr., gezähnt; die entwickelten Tr. locker; die Bthstielchen stets abstehend; die BZpfl längl. - lanzettl. oder lanzettl. ☉. Auf Mauern bei Hamburg; zuerst von Sonder aufgefunden. *F. Petteri* Koch Syn. ed. 2. S. 435.

Diese Pfl. hat die ausgebreitete und niederliegende Gestalt der *F. capreolata*, aber die Bthen sind schön-purpurn, und die Früchte sind zwar rundl., allein wegen der blos stumpfen, nicht aber abgestutzten Spitze zeigen sie eine rundl.-eyf. Gestalt. Die Bthstielchen sind abstehend, nicht zurückgebogen. Die KB. auffallend kleiner. — Die *F. Petteri* ist hinlängl. verschieden dch die beider-seits 1zähni gen und an der Basis keilf.-verschmälerten KB.

b. Die Früchte, selbst die reifen, deutlich - höckerig - runzelig.

3. *F. AGRARIA* (Lagascu elench. pl. hort. reg. bot. madrit. Jahrg. 1816. S. 21.) *Die Früchte rundl., stumpf*, mit einem Kerbchen

ausgerandet, knötig-runzelig; die KB. eyf., spitz, gezähnt, mehr als um die Hälfte kürzer, als die Blkr., breiter als das Bthstielchen; die DeckB. kürzer als das Bthstielchen der Frucht; die völlig entwickelten Tr. locker: die BZpfl. längl. oder verkehrt-eyf. ☉. An Gebüschen und Mauern in Istrien, (auf Osero, Noë; bei Pola, Biasoletto; von beiden Botanikern unter *F. capreolata* überschickt.) Mai. Juni. *F. major* Badarro in Morett. bot. ital. 1. S. 10. Reichenb. ic. f. 1222. und 4455. *F. media* DC. syst. nat. 2. S. 1134. zum Theil, nach Boissier. Lois. not. S. 101. und 102.? Auf diese passt besser, was Loisel. von seiner *F. media* sagt, als auf die übrigen europäischen Arten dieser Gattung, allein die Autoren zweifeln dennoch, ob es die Pfl. Loiseleur's sei. — Die Pfl. hat Aehnlichkeit mit der *Fumaria capreolata*, ist aber starrer und mehr aufrecht, die Grösse der Bthe ist dieselbe, ebenso die weisse oder ganz blass-rosenfarbene Blkr., die Bstiele sind oft rankenförmig. Durch die bemerklich runzeligen Früchte unterscheidet sie sich sogleich von *F. capreolata* und *F. muralis*.

4. *F. OFFICINALIS* (L. sp. 981.) Die Früchtchen runzelig, in die Quere breiter, vorne abgestutzt, etwas ausgerandet, knötig-runzelig; die KB. eyf.-lanzettl., haarspitzig, gezähnt, mehr als um die Hälfte kürzer, als die Blkr., breiter als das Bthstielchen; die BZpfl lanzettl. Variet. sind:

α. *vulgaris*, grösser, weitschweifig, die Bstiele oft rankenf. *F. media* der meisten Botaniker.

β. *minor*, das Kraut gesättigter grau-grün, die Bth. halb so gross. *F. officinalis tenuifolia* Fries.

γ. *floribunda*, das Kraut starrer, derber, dunkel-grau-grün, die Tr. ansehnlich, die Bth. dunkler-purpurn; eine schöne Pfl.

5. *F. WIRTGENI* (Koch.) Die Früchtchen rundl., stumpf, an der Spitze selbst wieder kurz-gespitzt, knötig-runzelig; die KB. eyf.-lanzettl., zugespitzt-haarspitzig, gezähnt, mehr als um die Hälfte kürzer, als die Blkr., breiter als das Bthstielchen; die DeckB. kürzer, als das Bthenstielchen der Frucht; die BZpfl lanzettl. ☉. Auf Aeckern und an bebauten O., (zu Moselweiss bei Coblenz, Wirtgen.) Mai. Sept. Bth. rosenroth. Sie unterscheidet sich durch das Ansehen, durch die Bthen von *Fumaria officinalis* und durch die Schütchen von *Fumaria Vaillantii*. Die Bstiele sind oft rankenf.

6. *F. VAILLANTII* (Lois.) Die Früchte fast kreisf., abgerundet-stumpf, knötig-runzelig; die KB. rautenf., spitz, gezähnt, schmaler als das Bthstielchen, vielmal kürzer als die Blkr.; die BZpfl lanzettl. oder lineal.

7. *F. MICRANTHA* (Lagasc. nach Babingt. man. of brit. bot. S. 14.) Die Früchte rundl., stumpf, knötig-runzelig; die KB. rundl., kurz-zugespitzt, gezähnt, fast so lang, wie die Hälfte der Blkr., und breiter als dieselbe; die DeckB. so lang als das Bthenstiel-

chen der Frucht oder länger; die BZpfl lineal. ☉. Auf thonhaltigen Aeckern, (bei Hamburg von Herrn Sonder entdeckt.) Juni. F. calycina Babingt. in den transact. bot. soc. Edinb. F. densiflora DC. hort. monsp. S. 113. Jahrg. 1813. Syst. nat. 2. S. 137. In Frankreich fand der verstorbene Ziz die Pfl. zuerst, von welchem ich dieselbe, welche er vorher schon DeCandolle gegeben hatte, im Jahre 1810, damals aber noch ohne den Art-Namen erhielt. Sie ist leicht an den breiten und grossen KB. zu erkennen. Die B. sind sehr fein zertheilt. Die Beschreibung von DC. in seinem hort. monsp. und in der Fl. franc. passt ganz genau.

S. F. PARVIFLORA (Lam.) Die Früchte eyf.-rundl., kurz-zugespitzt, knötig-runzelig; die KB. eyf., zugespitzt, gezähnt, sechs-mal kürzer, als die Blkr., und so breit als dieselbe; die DeckB. so lang als das Bthenstielchen der Frucht oder länger; die BZpfl lineal. —

S. 41. setze man zu *Nasturtium anceps*: (auch an der Elbe bei Hamburg, Sonder.)

S. 42. Der *Barbarea arcuata* füge man als Synonym bei: *Erysimum arcuatum* Opitz in Presl. fl. cech. S. 183. 1819.

S. 59. *Erysimum odoratum* var. *a. denticulatum*. Diesem werde beigefügt: *E. odoratum* Rob. Brown. Verm.-Schrft. herausg. v. N. v. E. Bd. 5. S. 60. nach dem Synonyme aus Jacq. fl. austr. I. S. 42. t. 73.

S. 66. Bei *Vesicaria utriculata* ist der Buchstabe S. am Rande zu streichen.

S. 67. Bei *Alyssum petraeum* streiche man die angeführten StandO. und setze dafür: Görtz, Freier.

S. 67. setze man bei *Alyssum medium* hinzu: kommt vor mit Blb., welche durch eine tiefere Kerbe ausgerandet sind, und mit 6eyigen Schötchen.

S. 76. streiche man *Cochlearia pyrenaica* als besondere Art und füge der *Cochlearia officinalis* (S. 75.) folgende Bemerkung bei:

Kommt vor mit B., wovon der grösste Theil in die Quere breiter ist: *C. pyrenaica* DC. syst. 2. S. 365. *C. grönlantica* Host., nicht Lin. Nolte hält die *Cochlearia grönlantica* der Sp. pl. für eine zsgesetzte Art, und zwar aus kleinen Expl. der *Cochlearia officinalis* und aus kleineren, ganzblättrigen der *Cochlearia danica*. Vergl. Nolte novit. a. a. O. Hooker und Babingt. halten dagegen die *Cochlearia grönlantica* Linne's für eine Alpen-Varietät der *C. officinalis* mit schmälern, eyf.-längl. oder längl., beiderseits ein-zähligen, sitzenden StB.

S. 76. definire man die *Cochlearia danica* folgendermassen: die unteren B. gestielt, die wurzelst. herzf., die stengelst. 3-5 lap-pig, die oberen eyf.-lanzettl., kurz-gestielt oder sitzend. Sonderland in Holstein eine Variet. mit fast 3eckig-spiessf. WB. und gefensterten Schötchen.

S. 89. ist *Raphanus sativus* zu definiren: R. Die Schoten längl., mit gleicher Oberfläche, oder hier und da zsgeschnürt, die S. netzig-runzelig. Mit dem Samen von *Medicago sativa* nun an verschiedenen Orten eingeführt, (im Nassanischen bei Weilburg u. an andern Orten, Rudio; bei Hessen-Cassel, Pfeiffer.) Hieraus entsteht die Variet.:

β. sylvestris: die W. dünn, holzig, wenig dicker, als der St.; übrigens dem gebräuchl. Rettig ganz ähnlich. Die Blh. sind, wie an der kultiv. Pfl., mit violetten Adern bemalt und variiren ausserdem violett, weiss mit violettem Rande und gelblich. Von dieser wilden Pflanze unterscheidet sich *Raphanus Landra* Morett. in DC. syst. nat. 2. S. 668. nur durch mehrere Zsschnürungen an den Schoten, allein im hiesigen botan. Garten, wo er eine Reihe von Jahren hindurch angebaut ist, bekam derselbe Schoten mit gleicher und wenig eingeschnürter Oberfläche und eine dicke, fleischige W., welche der W. der kleineren Abarten der essbaren Varietät des *Raphanus sativus* ganz ähnlich ist, und so verwandelte er sich in den kultivirten *Raphanus sativus*.

Raphanus Raphanistrum ist nun so zu definiren: die Schoten lineal., zw. den S. zsgeschnürt; die S. glatt. Die S. sind unter starker Vergrösserung zart-gestrichelt, aber nicht netzig.

S. 103. Die flaumhaarige Variet. der *Polygala nicaeensis* mit violetten Bth. sammelte Dr. Sendtner auf der Insel Veglia.

S. 130. *Alsine biflora* Wahlenb. In der Diagnose, anstatt Aestchen 1-2blüthig, zu lesen: St. 1-2blüthig, und als Blüthenzeit hinzuzusetzen: Juli, Aug.

S. 163. Das *Geranium bohemicum* wurde nun an mehreren O. Böhmens aufgefunden, (Berg Bösig, Pfund! Carlsbad Ortmann, Schalta Opitz.)

S. 169. streiche man *Dictamnus obtusiflorus*, welcher durch Zwischenformen in *Dictamnus Fraxinella* übergeht, und setze:

Dictamnus Fraxinella β. obtusiflorus Koch Taschenb. S. 109. Die Blättchen der B. um das Vierfache kleiner, die Bth. kleiner und die Blb. breit-elliptisch.

S. 168. *Ruta graveolens*; füge man den Stand O bei: (Oberbaden am Kaiserstuhl in Menge und ohne Zweifel wild, Alex. Braun, Decan Lang.)

S. 187. ist vor *Medicago radiata* einzusetzen:

M. CIRCINATA (L. spec. 1096) Die Bthstiele meist 4blüthig; die Hülsen nierenf., flach-zsgedrückt, geadert, haarig, am vorderen Rande gezähnt, am hinteren ganzrandig; die *B. gefiedert*, die Blättchen längl., das endst. viel grösser, die beiden untersten die Nebenblättchen ergänzend. ☉. An Wegen und an bebauten Orten, (Nedelino und Pomer, Südspitze Istriens, Tommas.; Lessino, Noë.) Juni. Juli. *Hymenocarpus circinatus* Savi. fl. pis. 2. S. 205. Bth. gelb. J.

S. 191. ist nach *Medicago minima* einzusetzen:

M. CORONATA (Lam. dict. 3. S. 634.) Die Bthstielchen vielblüthig, 2-3mal länger, als das B.; die Hülsen dornig, schneckenf., kurz-walzl., etwas grau-flaumh., Windungen 2, einander locker deckend, der Rand breit, flach, etwas rinnig, 2reihig-dornig, die Dornen auf- und abwärts gerichtet, senkrecht, in Form einer Krone einwärts gebogen, zu beiden Seiten mit einer Furche versehen; die NebenB. eyf., gezähnt; die Blättchen verkehrt-herzf. ☉. In Weinbergen, (Lessino; Noë) Mai. Juni. *M. polymorpha* O. coronata Linn. Spec. 1098. Bth. gelb. J.

S. 193. füge man zu *Trigonella monspeliaca*: (im Vintschgau von Goldrain bis Laas, häufig am Hofe Loritz. Juni. Juli. Dr. Tappeiner)

S. 203. ist vor *Trifolium parviflorum* einzusetzen:

TRIFOLIUM STRICTUM (Waldst. et Kit. pl. rar. Hung. 1. S. 36. t. 37.) Die Aehren eyf., fast kugelig, an der Basis mit einer sehr kurzen, trockenhäutigen, gezähnten Hülle umgeben; die Bthstiele blattwinkelst., länger als das B., die Bthstielchen sehr kurz, so lang als das gezähnte Deckblättchen, nach dem Verblühen nicht herabgebogen; der K. kürzer, als die Blkr., kahl, im Schlunde nackt, der fruchttragende kreiself.-erweitert, die Zähne aus breiterer Basis pfrieml.; die Nebenblätter trockenhäutig, eyf., spitz, und sowie die Blättchen geschärft-drüsig-gezähnt, die untersten Blättchen verkehrt eyf., stumpf, die oberen lanzettl., spitz. ☉. Auf etwas feuchten Grasplätzen von Süd-Istrien, (zw. Pola und Barbana bei Altura, Tommas.) Mai. Juni. Die Hülsen quer-eyf., an der unteren Seite bis zum Querdurchmesser mit dichter Masse gefüllt. Der Gf. ist bei diesem, sowie bei *T. parviflorum* an der Spitze hakig.

S. 205. ist zu *Trifolium Michelianum* hinzuzufügen: wurde nur am novo campo marzo. (neue Aufschüttung) bei Triest aufgefunden, aber ohne Zweifel durch ausländischen S. eingeschleppt. Ob jedoch diese Pflanze das lbt heimlich werden wird, müssen weitere Beobachtungen lehren.

S. 214. Zu *Oxytropis lapponica* setze man den Stand O.: (im Laaserthal im mittleren Vintschgau im südl. Tyrol, Dr. Tappeiner.)

Da die Pfl. nun auch in Deutschland gefunden worden, so ist das S. am Rande wegzustreichen.

S. 217. ist zu *Astragalus vesicarius* zu setzen: kommt mit gelblichen Bl. vor; Südtirol, Dr. Facchini und Dr. Tappeiner.

S. 219. An die Stelle des Arten-Namens: *Astragalus Wulfenii* Koch, setze man den Namen: *A. incurvus* Desf. fl. atl. 2. S. 182. t. 203. Kürzlich schickte nämlich Tommasini Expl. mit kurzen, 8 bis 10 Linien langen, ganz genau mit der Abbild. in der Fl. atlantica übereinkommenden Hülsen; es giebt demnach 2 Formen:

1. *brachyceras*, die hier erwähnte Form mit kurzen Hülsen.
2. *macroceras*, die Form mit 2 Zoll langen Hülsen: *A. Wulfenii* Koch.

Es unterscheiden sich diese Formen von *A. monspessulanus* durch noch einmal so dicke Hülsen und dadurch, dass die samen-tragende Nath mit der Hülse hinabsteigt; an *A. monspessulanus*, wenigstens den von mir untersuchten Expl., sind die Hülsen schlank und steigen mit der samen-tragenden Nath aufwärts. Ueber *Astragalus incanus* bin ich noch nicht ganz im Reinen, ich habe zwar eine Menge blühender Expl., aber bisher nur 3 Hülsen gesehen; ob nun derselbe eine leichte Art oder nur eine weissgraue Variet. des *Astragalus monspessulanus* ausmache, darüber mögen die Botaniker im südlichen Frankreich entscheiden. Der Ueberzug der Pfl. giebt kein gutes Unterscheidungszeichen.

S. 221. füge man ein:

ONOBRYCHIS CAPUT GALLI (Lam. fl. fr. 2. S. 631) Der St. aufstrebend; die Tr. meist 5blüthig; der *K.* so lang als die *Blkr.*; die Flügel so lang als das Schiffchen; die Hülsen auf der Mittelfläche erhaben-netzig und dornig, am vorderen Rande geflügelt-gekielt, der Kiel in Dornen gespalten, die Dornen aus 3eckiger Basis pfriemlich, sämtliche Dornen an der Spitze einwärts gebogen oder hakig. 4. Auf den Weinbergen der Inseln Istriens, (Lessino in Weingärten, Dr. Noë.) Mai, Juni. Bth. purpurn. J.

S. 236. ist *Lathyrus sepium* zu streichen. Die dort beschriebene Pfl. ist *Lathyrus Hallersteinii* Baumgarten, *L. pratensis grandistipulatus* Rochel., der, obgleich Rochel bei seiner Pfl. den *Lathyrus sepium* Scopolis anführt, doch im Gebiete unserer Flora noch nicht gefunden worden. Der *Lathyrus pratensis* kommt vor: kahl, flaumh. und grau-zottig, mit kleineren und grösseren Bth., welche am gemeinschaftl. Bthstiele rundumgestellt oder einerseitswendig, und mit Kelchzähnen, welche fast gleich-lang oder von welchen die 2 oberen kurz und gekrümmt sind. Aus fortgesetzten, namentl. von Sonder angestellten Beobachtungen ergiebt sich, dass zwischen allen diesen Formen keine sicheren Grenzlinien gezogen sind. Die kahle Form, wenn dabei zugleich die Bl. nach einer Seite hin gerichtet und die KZähne fast gleich-lang erscheinen, stellt den *Lathyrus sepium* (Scop. carn. 2. S. 64.) dar, welcher

kürzlich an mehreren Orten aufgefunden worden ist. Die gleichfalls kahle Form mit grösseren und ansehnlicheren Bth. ist L. Lusseri Heer.

S. 244. In der Beschreibung der *Spiraea salicifolia* ist anstatt: die Tr. gedrunge-rispig, zu lesen: die Rispe endst., pyramidenf.

S. 245. ist nach *Spiraea salicifolia* einzusetzen:

SPIRAEA CARPINIFOLIA (Willd. en. h. berol. S. 540.) Die B. *verkehrt-eyf.-elliptisch*, an der Basis kurz-keilf., ungleich-, fast doppelt-gesägt, kahl; die *Rispe endst., pyramidenf.* ♀. In feuchten Hainen, (in einem sumpligen Gehölze bei Hamburg, Sonder!) Juli. Aug. Blüht später, als das Vorige, die B. sind um die Hälfte kürzer, die Bstiele länger und schmaler berandet. Bth. weiss. D.

S. 245. Vor *Spiraea decumbens* ist einzuschalten:

SPIRAEA OBLONGIFOLIA (Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 3. 216. t. 235.) Die B. lanzettl.-längl., spitz, ganzrandig oder an der Spitze zu beiden Seiten stachelspitzig - 1 - 2zählig, die jüngeren flaumh., die ausgewachsenen kahl, am Rande bewimpert; die *Doldentrauben seitenst., gestielt*, die Stiele nur an der Basis beblättert, oder die untersten ganz beblättert; die KZpfl zurückgekrümmt. ♀. In den Gebirgsgegenden Istriens, (am Abhang des Slavnikberges unter dem kleineren Gipfel Spignik am Rande des Buchwaldes, Tommasini.) Bth. weiss. Die B. der untersten Aestchen oder der aus der Wurzel hervorsprossenden jungen St. erscheinen oft breiter und an der Spitze mehrfach eingeschnitten - gezähnt. D.

S. 245. ist nach *Spiraea oblongifolia* einzuschalten:

SPIRAEA OBOVATA (Waldst. et Kit. in Willd. en. hort. berol. S. 541.) Die B. *verkehrt-eyf.*, sehr stumpf, an der Spitze ungleich-stumpf-gekerbt, die oberen keilf.-verkehrt-eyf., die jüngeren flaumh.; die *Doldentr. seitenst., sitzend*; die Bthstielchen noch einmal so lang, als der K.; die KZpfl abstehend, an die Blkr. angedrückt. ♀. Auf Hügeln und sonnigen Gebirgen, (bei Nenfchatel in der Schweiz, besonders an Weinbergsmauern; in Frankreich, im Departement vom Cher weit verbreitet, Gay; und ausserdem im südl. Frankreich, und deswegen wohl ohne Zweifel wild in der Schweiz.) Mai. S. *crenata* Gouan illustr. 31. S. *hypericifolia* var. γ. DC. fl. fr. 5. S. 645. Var. δ. DC. prodr. 2. S. 543. Unterscheidet sich von S. *hypericifolia* durch um die Hälfte kürzere Stielchen der Doldentr. und kürzere, breitere B., von denen die unteren an der Spitze deutlich gekerbt sind; von S. *crenata* durch die sitzenden Doldentrauben, welche bei dieser auf einem beblätterten heurigen Aestchen sitzen. Bth. weiss. S.

S. 248. Die Steine der Steinfrüchtchen des *Rubus saxatilis* sind in den getrockneten Früchten grubig - runzelig; im frischen Zustande werde ich sie von neuem untersuchen.

S. 255. füge man der Diagnose der *Potentilla alpestris* bei: die Früchtchen fein-quer-runzelig.

S. 269. Die Rose, welche ich unter dem Namen *Rosa ciliato-petala* auführte, gehört nicht zu dieser, wie ich neuerlich in Erfahrung gebracht habe. Die *Rosa ciliato-petala* Besser ist eine Form der *Rosa pomifera* mit breiteren Blättchen. Ueber den Namen und die Synonyme, welche dieser Art zukommen, werde ich mich nach ferner angestellten Beobachtungen erklären.

S. 282. ist vor *Epilobium montanum* einzuschalten:

EPILOBIUM LANCEOLATUM (Sebastian et Mauritz. flor. rom. prodr. S. 138 t. 1. fig. 2.) Die *B. lanzettl.*, entfernt-gezägt-gezähnel, an der keilf. Basis ganzrandig, am Rande und den Adern flaumh., die unteren stumpf, ziemlich lang-gestielt, die oberen spitz; St. rund, flaumh.; die *N.* abstehend; Ausläufer fehlend. 4. Auf waldigen Gebirgen, (im Gebiete der Flora vom Niederrheine von H. Wirtgen aufgefunden.) Juni. Aug. Dieses steht der lanzettl. Variet. des *Epilobium montanum*, die ich nun: „die eyf-lanzettl.“ nenne, sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die lanzettl., länger gestielten, entfernter gezähnelten, und an der keilf. Basis ganzrandigen *B.* Mit der Abbild. im Prodr. fl. rom. stimmt unsere Pfl. genau überein, dennoch ist sie nach meiner Ansicht eine Art, welche durch künftige Beobachtungen als solche noch zu bestätigen ist.

S. 282. streiche man *EPILOBIUM VIRGATUM*, denn die dort beschriebene Pfl. ward im Bereiche unserer Fl. noch nicht aufgefunden. Ich machte die Beschreibung nach einem Expl., welches ich vor vielen Jahren von H. Hartman mit der Bemerkung empfing, dass sie eine jährige Pfl. sei. Dieses Expl. findet sich dargestellt in Sturm's D. fl. a. und C. Heft 81. tab. 6.; fig. β. und D sind nach einem mageren, in Schlesien gefundenen Expl. von *Epilobium tetragonum* gezeichnet. Die schlesischen Expl. verwechselte ich damals mit der oben erwähnten Pfl., die jetzt von H. Lamy im mittleren West-Frankreich in grosser Menge aufgefunden worden ist. Durch die Güte dieses Naturforschers empfing ich Samen, aus denen ich Pfl. gezogen, die seit 3 Jahren üppig gedeihen. Herr F. W. Schultz gab nun dieser Pfl. den Namen: *Epilobium Lamyl.* Vergl. d. Regensb. bot. Ztg. 1844. S. 806. Sie ist 2jährig; bei der Aussaat erscheinen die Pflänzchen im Herbste, tragen im darauffolgenden Jahre Bth. und Früchte, und gehen dann wieder ein. Es hält gleichsam die Mitte zw. *Epilobium palustre* und *Epilobium tetragonum*; von jenem ist es ausser anderen Kennzeichen hinreichend verschieden durch die Samen, denn diese sind bei *Epilobium Lamyl.* oval-längl., an der Basis und Spitze abgerundet und feinpunktirt, sowie bei *E. tetragonum*; bei *E. palustre* sind sie noch einmal so lang, lineal-keilf. und glatt; von *E. tetragonum* unterscheidet es sich aber durch das Aeussere des *Epilobium palustre* und dadurch, dass sämtliche *B.* zwar kurz-, aber deutlich gestielt

sind mit schwach-herablaufenden Rändern der Bstiele, und durch die unzweifelhafte jährige oder 2jährige Dauer. Alle Expl., welche ich unter dem Namen eines *Epilobium virgatum* aus dem Bereiche unserer Fl. empfang, gehören zum *Epilobium tetragonum*, sowie auch das *Epilobium obscurum* Laasch in Reichenb. fl. exsicc. N. 358., das ich unter dem *E. virgatum* citirt hatte; aus den Samen nämlich, welche mir der Entdecker gefälligst mitgetheilt hatte, zog ich das *Epilobium tetragonum*. Ein Expl. von *Epilobium virgatum*, welches ich von Fries als Ergänzung des zweiten Faszikels vom Herbarium normale, (den ich noch nicht gesehen habe) mit dem zehnten Faszikel empfang, welchen ich, sowie alle vom dritten bis zum zehnten Faszikel der Freigebigkeit des berühmten Autors verdanke, ist mir nicht ganz deutlich; die getrocknete Pfl. kann ich von *E. tetragonum* durch kein deutliches Merkmal unterscheiden.

S. 292. *Philadelphus coronatus* ist in Steyermark, (In der wilden 4 Stunden langen Bergschlucht bei Weitz häufig und ganz ohne Zweifel wild.) Dr. Maly.

S. 298. ist einzuschalten:

POLYCARPON ALSINEFOLIUM (DC. prodr. 3. S. 376.) Die B. rundl.-verkehrt-eyf. oder verkehrt-eyf., etwas fleischig, entgegengesetzt; die Bth. endst, dicht-gehäuft; die Blb. ganz oder leicht-ausgerandet, kürzer, als der K. ☉. An sandigen O. am Meere, (auf der Insel San Pier di Membri bei Lossino, Tommasini.) April. Mai. Die Bth. noch einmal so gross, wie an *P. tetraphyllum*.

Die Diagnose von *Polycarpon tetraphyllum* ist in folgender Weise abzuändern: P. Die B. verkehrt-eyf., entgegengesetzt, am St. 4st.; die Bth. rispig, die Blb. ausgerandet, kürzer, als der K.

S. 305. streiche man den Namen *Sedum sexangulare* und setze an dessen Stelle: *Sedum boloniense* Lois. notic. S. 71. Die Synonyme sind: *S. boloniense* Rh. ic. 9. S. 18. *S. sexangulare* M. et K. Deutschl. fl. 3. S. 313. und Synops. ed 2. S. 287. *S. schistosum* Lej. fl. de Spa S. 206. *S. Forsterianum* Reichenb. ic. 9. f. 1135.; die übrigen dort erwähnten Synonyme sind zu streichen. Der Beschreibung ist beizufügen: die Aeste der Trugdolde 6-10blüthig.

Das *Sedum sexangulare*, welches hier und da vorkommt, ist dem *Sedum acre* sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch mehr längliche, an den nicht blühenden Aesten sehr dicht spiralförmig und 6reihig auf einander liegende und auch an den blühenden St. genäherte B., durch wenig-blüthige Trugdolde mit 1-2blüthigen Aesten und einen kaum scharfen Saft. Vergl. die Fl. aenica und Godron fl. de Lorraine Bd. 1. S. 258. Lebend werde ich diese Arten von neuem untersuchen.

S. 352. *Archangelica officinalis*. Die Pfl. aus den Sudeten, aus einer Gebirgskette, welche an die Karpaten grenzt, ist ohne Zweifel einerlei mit der, welche Wahlenberg in der Fl. carpat.

S. 83. und S4. aufführt und die nach der Beschreibung grüne Blb. und ganz glatte, mit dem Döldchen gleich lange Hüllchen hat. Von dieser unterscheidet er eine andere, verwandte Art, die *Archangelica littoralis*, welche an den Meeresufern des nördl. Deutschl. vorkommt, und zwar durch weissliche Blth. und die fast borstlichen rauhen Hüllchen, welche nur halb so lang sind, als das Döldchen. Die Blth. bezeichnet er als weniger grünlich, die Samen (Halbfrüchte) auch als korkig, aber als weniger aufgeblasen und mit undeutlichen Rücken-Riefen versehen. Nach Fries ist letzteres die *Angelica sativa* Miller: er beschreibt dieselbe mit trockenhäutigen B.Scheiden, kugelige Dolde, sammtthaarigen Blthstielen, längl., zsgedrückten Früchtchen, und unterscheidet von ihr die officinelle Pfl. durch krautige B.Scheiden, halb-kugelig abstehende Dolden, fast kahle Blthstiele und aufgedunsene, halbkugelige Früchtchen. Da aber die erwähnten Unterscheidungszeichen an getrockneten Pfl. nicht genau von mir ermittelt werden konnten, so empfehle ich diese Pfl. den deutschen Botanikern, damit entschieden werde, ob beide Arten auf deutschem Boden vorhanden sind, oder welche von beiden darin vorkommt.

S. 360. schalte man nach T. maximum ein:

TORDYLIUM OFFICINALE (L. spec. 315.) Der St. an der Basis ästig, die Aeste verlängert, nackt; die B. eingeschnitten-gekerbt, die unteren mit 5 Blättchen gefiedert, das endst. Blättchen eyf., grösser, die oberen dreizählig-fiederig, das endst. Blättchen verlängert; die *Strahlen der Dolde so lang oder kürzer, als die Hülle*; die Früchte fünfriefig, die Thälchen einstriemig. ☉. Auf den Inseln Istriens (auf Lossino, Dr. Sendtner, v. H. Praesid. Tommas. mitgetheilt.) Mai. J.

S. 363. werde eingesetzt:

LASERPITIUM VERTICILLATUM (Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 2. S. 186. t 171.) Die WB. und die unteren des St. dreizählig-dreifach-gefiedert; die *Blättchen* eyf. oder längl., doppelt-eingeschnitten-gezähnt, die *endst. 3spaltig, mit keilf., ganzrandiger Basis herablaufend*; die oberen Aeste oft quirlig; die *Strahlen der Dolde ungleich, kahl*; die Blättchen der Hüllchen lanzettl.; die Blb. rundl.-verkehrtherzf., sitzend; der St. stielrund, gerillt. 4. Auf Bergwiesen in Istrien, auf dem M. Maggiore und M. Siia, Tommas. Juli. Aug. Blkr. weiss. Das *Ligusticum nodiflorum* Vill., *Smyrnum nodiflorum* All., *Trochiscanthes nodiflorus* Koch ist weit verschieden von diesem *Laserpitium verticillatum* W. Kit., welches Sprengel in seinem Syst. veg. I. S. 907. mit jenem verbunden hat.

S. 373. setze man nach *Smyrnum perfoliatum*:

SMYRNUM OLUSATUM (L. spec. 376.) Die unteren B. meist 3zählig, die *oberen 3zählig*, die Blättchen eyf., ungleich eingeschnitten-gekerbt oder gesägt; die Hüllchen sehr kurz. ☉. An feuchten Stellen in Istrien. Sant Giovanni im Pelago bei Rovigno

und Scoglio N. S. Pietro bei Pola, Tommas.) April. Mai. Blth. grün-gelblich.

S. 383. Dem Gattungs-Character von *Galium* werde zugesetzt: die Frucht rundl. - oder längl. - zweiknotig.

S. 387. ist N. 18., *Galium insubricum*, zu streichen; es ist nämlich eine an schattigem Orte gewachsene Form von *Galium Mollugo*, mit breiteren, verkehrt-eyf. B., ärmlicher Rispe und kleineren Blthen. Vergl. Bertol. fl. ital. 2. S. 365.

S. 385. Zu *Galium parisiense* setze man die Variet.:

γ. divaricatum, von mehr aufrechter Gestalt und mit verlängerten Blthstielen; *G. divaricatum* Lam. dict. 2. S. 580. DC. fl. fr. 4. S. 259. Wurde in Istrien gesammelt; ich verdanke dasselbe der Güte Biasoletto's und Tommasini's. Durch beständige Merkmale vermag ich dasselbe von der kahlfrüchtigen Variet. des *Galium parisiense* nicht zu unterscheiden; die am meisten abweichenden Formen fallen durch die erwähnte Bildung allerdings in die Augen, aber Zwischenformen verlöschen wieder jede Abgrenzung. Manchmal bemerkte ich auch auf den Höckerchen der Früchte kurze Borstchen, und durch diese nähert es sich dann der behaartfrüchtigen Variet.

S. 390. Nach *Galium helveticum* setze man:

Rotte VI. Aspera DC. prodr. 4. S. 610. Die Blth. blattwinkelständig, entgegengesetzt oder quirlig, zwitтерig. Die Früchte oval oder längl. Die Blstielchen absteehend oder herabgebogen.

GALIAM MURALE (DC. fl. fr. 4. S. 264.) Die B. stachelspitzig, die unteren sechst., elliptisch-lanzettl., die mittleren 4st., lanzettl.; die St. niederliegend; die Blth. blattwinkelst. zu zweien, einander entgegengesetzt, kurz-gestielt, nach dem Verblühen herabgebogen; die Früchte längl., steifhaarig, oder kahl und an der Spitze borstig-behärtet. ☉ An rauhen, sonnigen O., an Mauern in Istrien und Fiume, (bei Fiume, Noë; Insel Lossino, Sendtner.) Mai. *G. minimum* R. et S. syst. veg. 3. S. 262. *Sherardia muralis* L. sp. 149.

S. 414. Die äusserst seltene *Telekia speciosa* wurde im Littorale aufgefunden, (im Thale Padesch, an einem Seitenbache des Rekaflusses in sehr schattigen Obstgärten an verschiedenen Stellen, Tommasini.)

S. 440. setze man zu *Matricaria Chamomilla*:

Die von mir aufgeführte *Matricaria suaveolens* entstand aus einem Versehen und ist zu streichen; die dort beschriebenen Achenen gehören zu *Anthemis lithuanica* Bess.

Herr C. H. Schultz bipont. hat in seinem Werke über die Tanaceteeen S. 26. eine von ihm entdeckte Art von *Matricaria* unter dem Namen *Matricaria Kochiana* beschrieben, welche der ge-

meinen Art zwar sehr ähnlich ist, sich aber durch öhrchenförmige häutige Krone der Achenen des Strahles unterscheidet. Durch dasselbe Kennzeichen unterscheidet sie sich auch von *Matricaria Courrantiana* DC. prodr. 6. S. 52., wozu nach Schultz die *Matricaria coronata* Gay zu rechnen ist, bei welcher der Pappus aller Achenen häutig und kronenförmig, und an denen des Strahles lang-scheidenförmig erscheint. Da ich jedoch selbst im vergangenen Jahre an einer Variet. des *Chrysanthemum leucanthemum* L. und der Synops. einen öhrchenförmigen und häutigen Pappus der Achenen des Strahles beobachtet habe, so kann man hieraus schliessen, dass der Pappus auch an *Matricaria Kochiana* und *M. Courrantiana* bloss eine Variet., wiewohl eine sehr bemerkenswerthe bezeichne.

S. 443. Herr C. H. Schultz in Zweibrücken führt in seinem erwähnten Werke über die Tanaceteen das *Chrysanthemum inodorum* L. und der Synops. unter der neuen Gattung *Tripleurospermum* auf, welche durch die ungetügelten, am Rücken konvexen, ungestreiften und am Bauche mit 3 Rippen, zweien am Rande und einer in der Mitte, versehenen Achenen von den Verwandten verschieden ist. Das *Chrysanthemum inodorum* β . *maritimum* beschreibt er, wie es auch in der Synopsis geschehen, als Variet. davon, allein ich halte diese Variet. nun für ein und dieselbe Pfl. mit *Matricaria maritima* L., welche wir nun ganz nicht aus Samen, die ich von dem Expl. von Fries, im Herb. norm. dieses berühmten Autors, genommen und gezogen habe, im hiesigen Garten besitzen, und welche mir nun eine eigene Art darstellt.

Sie werden jetzt folgendermassen zu definiren sein:

1. *TRIPLEUROSPERMUM INODORUM* (C. H. Schultz bip. de tanacet. S. 31.) Die B. dreifach-gefiedert, die Zpfl. lineal.-fädll., etwas kurz; der HK. an der Basis anfangs kreiself., dann flach; der Fruchth. etwas halbkugelig, zuletzt kegelförmig oder fast walzlich, noch einmal so lang als breit.

2. *TRIPLEUROSPERMUM MARITIMUM*. Die B. dreifach-gefiedert; die Zpfl. lineal.-fädll., verlängert; der HK. an der Basis abgestutzt, etwas genabelt; der Fruchth. breit-eyf., so breit, als lang. ☉. Am Ufer des baltischen Meeres und der Nordsee, (Sonder.) Die Achenen sind bemerklich grösser, wie beim Vorigen. Den Rand der Schuppen des HK. aber fand ich, so wie bei den verwandten Arten, veränderlich, heller- oder dunkler-gefärbt. Beide Arten tragen oft an der Spitze des Fruchtbodens Spreublättchen von der Form derer der *Anthemis cotula*. — Von den übrigen Gattungen der Anthemideen in der Synopsis wird anderwärts die Rede sein.

S. 445. *Aronicum Clusii* variirt mit Köpfchen ohne Strahl; Dr. Lager.

S. 450. *Senecio vulgaris* β . *radiatus* ist *Senecio denticulatus* Nolte nov. fl. hols. S. 71., nicht aber fl. dan., der zu den kleineren Formen des *Senecio sylvaticus* gehört; vergl. Fries nov. mant. 3. S. 104.: — „kleinere Expl. des *Senecio sylvaticus* mit schmälere-

ren, buchtig-gezähnten oder buchtig-fiedersp. B. geben den *S. denticulatus* Müll. fl. dan. t. 791., Wahlenb. fl. suec. S. 521, Fries novit. mant. 3. S. 104. n. grosse, wuchernde Expl. den *Senecio lividus* Nolte nov. fl. hols. S. 72., *S. sylvaticus* a. *auriculatus* Meyer Chlor. hanov. S. 388., Engl. bot. 2515., *S. sylvaticus* β . *lividus* Hook. brit. fl. ed. 5., Babingt. man. S. 167.⁶ Sonder in briefl. Mittheilungen.

S. 450. Dem *Senecio nebrodensis* füge man bei:

Var.: der Strahl an den Köpfchen fehlend; hierzu gehört *S. paradoxus* Hoppe pl. exsicc.

S. 454. Zu *Senecio nemorensis* Var. α . ist beizufügen: diese Var. mit achtblüthigem Strahle ist nun in Deutschland öfter gefunden worden, und die sibirische Pfl., welche ich nach den Expl. des Herbar's von Ledebour verglichen habe, stellt ganz genau unsere Variet. dar.

S. 455. Zu *Senecio saracenicus* füge man hinzu: Godron in seiner Flor. de Lorrain 2. S. 11. legt dem *Senecio saracenicus* Jacq. und der Synops. den Namen *Senecio salicetorum* bei, weil die von Linne angeführten Synonyma und Standorte den *Senecio Fuchsii* bezeichneten. Mir aber gelten die Worte eines Schriftstellers mehr, als die Synonyme. Linne zog seinen *Senecio saracenicus* im bot. Garten von Upsala, nennt ihn wuchernd und erwähnt in den Spec. pl. S. 1222: „macht sich durch seine weit kriechende Wurzel kenntlich.“ Die Wurzel des *Senecio Fuchsii* oder *S. nemorensis*, kriecht nicht, während sie an *S. saracenicus* Jacq. und der Syn. weit und breit mit ihren Ausläufern wuchert.

S. 480. Zu *Xeranthemum cylindricum* ist der Standort: (bei Umago in Istrien, Tommas.) zu setzen.

S. 517. ist bei *Crepis nicaeensis* die Blüthezeit abzuändern und zu setzen: Mai und Anfangs Juni, früher als *C. biennis*, (wenn *Crepis nicaeensis* in voller Blüthe steht, am Ende Mai und Anfang Juni, fängt *C. biennis* erst zu blühen an, und wenn diese vollständig aufgeblüht ist, steht jene mit abgedürzten Blättern und reifen Samen da. Alex. Braun.)

S. 545. Nach *Hieracium rigidum* ist einzuschalten:

HIERACIUM VIRESCENS (Sonder nach briefl. Mittheilung.) *Der St.* steif, aufrecht, *einfach*, beblättert, kahl, oberwärts sowie an den Blthstielen flaumhaarig; *die B. zahlreich, genähert*, lanzettl., gezähnt, kahl oder unterseits zerstreut behaart, die untersten in einen kurzen Bstiel verschmälert, die oberen sitzend, allmählig kleiner werdend, *die wurzelständigen fehlend*; *die Blthstiele* dicht traubig-ebensträussig; *der HK. während der Blthezeit kreiself.*, die Blättchen angedrückt, grün, die inneren am Rande blass, die äusseren an den jungen Blütenköpfen einander deckend.
2. In Laubwäldern, (bei Flottbeck und Nienstädt, Umgegend

von Hamburg.) Aug. Sept. „Aehnlich dem *Hieracium rigidum*, unterscheidet sich durch dichtbeblätterten, immer einfachen St., fast kreiselförmige, im frischen Zustande grasgrüne HK. und den meist traubigen Blütenstand. „Sonder nach briefl. Mitth.“

S. 578. In der Beschreibung der *Gentiana brachyphylla* ist anstatt: die B. kurz-spitz, zu lesen: die B. kurz-zugespitzt. Ferner ist das Synonym: *Gentiana terglowiensis* Hacquet, welches nach Tommasini's Bemerkung nicht zu *G. brachyphylla*, sondern zu *Gentiana imbricata* gehört, zu streichen.

S. 603. ist dem *Verbascum montanum* als Standort beizufügen: (bei Grade an der Küste von Görz, Tommasini.) Daher ist der Buchstabe S. am Rande zu streichen.

S. 682. *Acanthus longifolius* Host. scheint einerlei zu sein mit *Acanthus niger* Mill. dict., von dem Link in d. en. hort. berol. 2 S. 132. sagt, dass er sich von *Acanthus mollis* durch die 2 Linien langen Dörnchen der B., welche an jenem ganz fehlen, sehr unterscheidet. Ebenda bemerkt er, dass die Dornen von *Acanthus spinosus* 6 und mehr Linien lang seien. Zu *A. spinosus* gehört nach Griesbachs fl. rumel. et bithyn. *A. spinosissimus* Reichenbach.

S. 702. ist der *Statice maritima* als Standort beizufügen: (auf Wiesen am Seestrande durch ganz Ditmarsen häufig, Sonder.)

S. 713. Der *Salicornia herbacea* var. β . *polystachya* oder *Salicornia radicans* füge man als Standort bei: (in Ditmarsen an Teichen bei Büsum am Meere.)

S. 716. Der Standort von *Kochia hirsuta* ist abzuändern: (im Holsteinischen an der Ostsee, bei Grossenbrodt unweit Heiligenhafen, bei Lütjenburg und Hochwacht; an der Nordsee bei Büsum und Deichsland, Nolte. Im Mecklenburgischen bei Warnemünde sehr selten, Dethard.)

S. 800. *Potamogeton fluitans*. Die jüngeren Bstiele sind oberwärts flach, unterseits konvex, ausgewachsen aber beiderseits konvex. Sonder in Briefen.

S. 802. Reichenbach erläuterte in der XVII. Cent. seiner Iconographie die *Potamogetonen* durch schöne Zeichnungen, allein den Bestimmungen kann ich nicht überall beipflichten. *Potamogeton Zizii* wird als Variet. des *Potamogeton lucens* aufgeführt, während es nach der Lage und Anordnung der Blattadern genau mit *Potamogeton gramineum* übereinkommt und ganz von *P. lucens* abweicht; aber das Expl. auf Taf. XXXVIII., welches eine sterile Pflanze darstellt, nämlich die untere Figur, welche in die Quere untergelegt ist, gehört allerdings zu *P. lucens* und nicht zu *P. Zizii*. Dasselbe gilt von *Potamogeton lucens coriaceus*; den Blattnerven nach stimmt dasselbe genau mit *Potamogeton Zizii*,

d. h. mit der grösseren Variet. von *P. gramineus*, nicht aber mit *P. lucens* überein.

S. 803. ist zu *Potamogeton decipiens* zu setzen: „Nolte in Reichenb. fl. exsicc. n. 1603.“ und der Standort abzuändern: (Lauenburg im Schellsee und in der Bille, sodann bei Kiel, Nolte in Brief. 1845; in der Bille bei der Annmühle unweit Bergedorf, Flora von Hamburg, Sonder in Brief.)

S. 805. *Potamogeton pectinatus* setze man zu nach: „die Früchte am Rücken gekielt,“ mit einem kurzen, aufsteigenden Gl. endigend; sowie zu *Potamogeton marinus* nach: „die Früchte ... nicht gekielt,“ mit einer breiten, sitzenden Narbe bekrönt. Die Früchte des letztern sind mehr als um die Hälfte kleiner, als bei *P. pectinatus*. Von diesem aber unterscheidet sich bemerklich jene interessante Pfl., welche Herr Gebhardt bei Stötteritz gefunden, die ich unter *Potamogeton marinus* erwähnte und von der ich 3 Expl. besitze. Die Früchte sind mehr als noch einmal so gross, gelb, ausnehmend runzelig und am Rücken ganz stumpf. Nach ihrer Grösse kommen die Früchte mit denen von *P. pectinatus* überein, allein sie unterscheiden sich wieder durch die breite, sitzende Narbe, durch das Fehlen des Rückenkieles und die übrigen Kennzeichen, welche ich angegeben habe.

S. 806. *Zanichellia polycarpa* Nolte. Es ist der Standort abzuändern: (In dem Meere an der Küste der Ostsee bei Heiligenhafen, Nolte in briefl. Mittheilungen 1845; in den Novitiis florae holsat. ist gar kein Standort angegeben und bei Reichenb. pl. exsicc. n. 1102. heisst es blos: Küste von Holstein; in Salzwasser an der Küste der Nordsee bei Brunsbüttel, Sonder.)

S. 837. Zu *Narcissus biflorus* ist zu setzen: auf Bergen bei Botzen seltener als *N. Pseudo-Narcissus* und *N. incomparabilis*.

S. 838. ist nach *N. Tazetta* einzuschalten:

NARCISSUS INCOMPARABILIS (Mill. dict. n. 3.) Die B. lineal., etwas flach, ohne Kiel, in der Mitte 2riefig; der Schaft fast walzlich, zweischneidig, einblüthig; die Nebenkrone glockig, aufrecht, am Rande gekerbt-kraus, um die Hälfte kürzer, als die Zipfel des Perigons. 4. Auf Wiesen der südlicheren Gegenden (um Botzen, Baron v. Hausmann; Krain, Freyer.) Anfangs April.

S. 908. Zu *Carex ustulata* ist das Synonym: *C. atro-fusca* Hoppe gram. cent. I. n. 78. zu setzen.

S. 915. Zu *Carex paludosa* füge man die Bemerkung: die Scheiden sind oft am Rande netzig-gespalten, wie bei *C. stricta*, was schon Gaud. (vergl. fl. helv. 6. S. 131.) beobachtete.

S. 956. ist der Beschreibung von *Poa annua* zuzusetzen: Die Blth. kahl oder am Kiele und am Rande mit einer flaumbaa-

rigen, aus kurzem, weichem Flaum zusammengesetzten Linie versehen. Ferner noch die Bemerkung: Die flaumhaarigen Linien am Kiele und beiden Rändern steigen bis über die Mitte der Spelze hinauf und manchmal steht zw. dem Rücken und den Seitenstreifen noch ein feiner flaumhaariger Streifen.

S. 966. setze man zum Standorte der *Festuca ciliata*: (um Triest, Tommas.) und der Buchstabe S. am Rande ist zu streichen.

Mehreres habe ich zu genauerer Prüfung bei Seite gelegt; dieses und was noch ausserdem übrig sein mag, bin ich gesonnen, nachdem die nöthigen Untersuchungen vorausgegangen sind, in einem Supplemente zu diesem Werke zu geben.

Druckfehler.

Seite 688. Zeile 3. von unten lies: *A. alpina* statt *Aretia alpina*, und vor Wulf. werde eingesetzt: *Aretia alpina*.

Seite 831. Zeile 13. von oben ist einzuschalten: *Romulea Bulbocodium* Sebast.

R E G I S T E R

über die

**ORDNUNGEN, GATTUNGEN, ARTEN
UND SYNONYME.**

REGISTER

über die Ordnungen, Gattungen, Arten, Synonyme und die Namen von Pflanzen, welche in der Synopsis zur Vergleichung angeführt werden.

Die mit liegender Schrift gedruckten Namen sind die der Arten der Deutschen und Schweizer Flora, welche in der Synopsis vorkommen; die mit aufrechter Schrift gedruckten Namen sind die der Synonyme und der verglichenen Pflanzen. Die Zahlen zeigen die Seiten des Buches an.

A.

- Abama** *ossifraga* DC. 861.
Abies *excelsa* Lk. 792.
 excelsa Poir. 793.
 Larix Lmk. 792.
 pectinata DC. 792.
 vulgaris Poir. 792.
Absinthium *angustifolium* Dod. 430.
 vulgare Gärt. 425.
Abutilon Trnf. 153.
 Avicennae Gärt. 153.
ACANTHACEEN. 682.
Acanthus L. 682.
 longifolius Hst. 682. 1074.
 mollis L. 682.
 niger Mill. 1074.
 spinous Host. 682. 1074.
 spinossissimus Rehb. 1074.
Acarna *cyanoides* Wib. 480.
ACERINEEN. 157.
Acer L. 157.
 austriacum Tratt. 158.
 campestre L. 158.
 italicum Lauth. 158.
 laciniatum Du Roi 158.
 monspessulanum L. 158.
 neapolitanum Ten. 158.
 obtusatum Kit. 158.
 opulifolium Vill. 157.
 Opalus Ait. 158.
 Opulus DC. 158.
 platanoides L. 158.
 Pseudoplatanus L. 157.
 rotundifolium Lmk. 158.
 trilobatum Lmk. 158.
Aceras R. Brw. 823.
 anthropophora R. Brw. 823.
Achariterium *arvense* Bl. Fgh. 422.
Achillea L. 431.
 alpina Ledeb. 431.
 alpina L. 431.
 ambigua Pollin. 435.
 atrata Jcq. 433.
 atrata L. 433.
 atrata v. fol. bipinnatis L. 433.
 Bocconii 432.
 Clavenae L. 432.
 Clavenae β. glabrata Hopp. 432.
 Clusiana Tsch. 433.

- Achillea collina* Beck. 434.
compacta DC. 435.
dentifera DC. 435.
dentifera Rehb. 434.
distans Roch. 435.
distans Willd. 435.
Haenkeana Tsch. 434.
helvetica Schleich. 432.
hybrida Gaud. 433.
impunctata Vest. 433.
incisa Clairv. 432.
intermedia Schleich. 433.
lanata Spr. 434.
ligustica All. 436.
livia Scop. 433.
macrophylla L. 432.
macrophylla Rehb.? 432.
magna All. 435.
magna DC. 435.
magna Haenk. 434.
magna L. 435.
magna Roch. 435.
magna Willd. 434. 435.
Millefolium L. 431.
Millefolium β . *alpestris* Wimm.
 et Grab. 431.
Millefolium β . *crustata* Roch.
 431.
Millefolium δ . *lanuginosa* Gaud.
 435.
montana Schleich. 432.
moschata Wulf. 433.
moschata β . *hybrida* Gaud. 433.
nana L. 433.
nobilis L. 435.
ochroleuca Ehrh. 436.
ochroleuca Rehb. 436.
ochroleuca Willd. 436.
odorata L. 436.
odorata Schleich. 434.
odorata DC. 436.
odorata Wulf. 434.
pectinata Willd. 436.
polyphylla Schleich. 434.
Ptarmica L. 431.
sambucifolia Desf. 443.
scabra Host. 431.
Schkuhrii Spr. 436.
Seidlii Presl. 431.
setacea W. K. 431.
stricta Schleich. 435.
sudetica Opitz. 434.
- Achillea sylvatica* Beck. 434.
tanacetifolia All. 435.
tanacetifolia Roch. 435.
Thomastiana Hall. fil. 432.
tomentosa L. 431.
valesiaca Rehb. 432.
valesiaca Sut. 432.
Achnodon Bellardii Link. 926.
Achnodonton Bellardii Beauv.
 926.
tenue Beauv. 926.
Achyranthes papposa Forsk. 721.
Achyrophorus radicans Scop.
 504.
Acinos thymoides Mönch. 661.
vulgaris Pers. 661.
Aconitum L. 27.
acuminatum Rehb. 28.
acutum Rehb. 27.
album Ait. 28.
amoenum Rehb. 27.
angustifolium Bernh. 27.
Anthora L. 27.
autumnale Rehb. 27.
Bernhardianum Rehb. 27.
Bernhardianum Wallr. 28.
Cammarum Jacq. 28.
Cammarum L.? 28.
cernuum Rehb. 28.
cernuum Wulf. 28.
Decandollii Rehb. 27.
eminens Koch. 27.
eulophum Rehb. 27.
exaltatum Rehb. 28.
flexicaule Hopp. Hsch. 28.
formosum Rehb. 27.
Funkianum Rehb. 27.
hebegynum DC. 28.
Hoppeanum Rehb. 27.
Jacquini Rehb. 27.
intermedium DC. 28.
Koellecanum Rehb. 27.
Lamareckii Rehb. 29.
laxum Rehb. 27.
Lycoctonum L. 28.
molle Rehb. 28.
multifidum Koch. 27.
Myoctonum Rehb. 29.
Napellus Dod. Rehb. 27.
Napellus L. 27.
Napellus Stoerk. 28.
nasutum Fisch. 28.

- Aconitum nemorosum** MB. 27.
neomontanum Willd. 28.
neomontanum Wulf. 27.
neubergense Rchb. 27.
pallidum Rchb. 29.
palmatifidum Rchb. 28.
paniculatum Lmk. 28.
paniculatum Rchb. 28.
pyramidale Mill. 27.
pyrenaicum DC. 29.
rostratum Bernh. 28.
rostratum album Rchb. 28.
Stoerkeanum Rchb. 28.
strictum Bernh. 27.
tauricum Wulf. 27.
Thelyphonum Rb. 29.
variegatum L. 28.
variegatum Rchb. 28.
Vulparia Rchb. 29.
Acorus L. 812.
Calamus L. 812.
Acropteris septentrionalis Link. 1023.
Acrostichum crispum Vill. 1025.
hyperboreum Liljeb. 1013.
ilvense L. 1013.
Marantae L. 1024.
Marantae Wulf. 1013.
septentrionale L. 1023.
Spicant Vill. 1023.
Thelypteris L. 1016.
Actaea L. 29.
spicata L. 29.
cimicifuga L. 29.
Adenarium peploides Rafin. 129.
Adenophora Fisch. 538.
communis Fisch. 538.
lilifolia DC. 538.
suaveolens Fisch. Mey. 538.
Adenostyles Cass. 405.
albida Cass. 405.
albifrons (Cacalia) L. fil. 405.
alpina Bl. Fgh. 405.
candidissima Cass. 405.
hybrida DC. 405.
leucophylla Rchb. 405.
Petasites Bl. Fgh. 405.
viridis Cass. 405.
Adiantum L. 1024.
Capillus veneris L. 1024.
Adonis L. 11.
aestivalis Gaud. 11.
aestivalis L. 11.
aestivalis Rchb. 11.
ambigua Gaud. 11.
anomala Wallr. 11.
apennina Jcq. 12.
apennina L. 12.
autumnalis L. 11.
citrina DC. 12.
citrina Hoffm. 11.
flammea Jcq. 11.
flava Schlecht. 11.
flava Vill. 11.
maculata Wallr. 11.
miniata Jcq. 11.
pyrenaica 12.
vernalis L. 12.
Adoxa L. 377.
Moschatellina L. 377.
Adyseton calycinum Scop. 69.
Aegopodium L. 333.
Podagraria L. 333.
Aegilops L. 988.
caudata L. 989.
cylindrica Hst. 989.
echinata Presl. 989.
geniculata Roth. 989.
incurvata L. 989.
neglecta Req. 989.
ovata L. 989.
ovata Roth. 989.
triaristata Requien. 989.
triaristata Willd. 989.
triuncialis L. 989.
Aesculus L. 159.
Hippocastanum L. 159.
Aetheorrhiza bulbosa Cass. 516.
Aethionema R. Brw. 85.
gracile DC. 85.
saxatile R. Brw. 85.
Aethusa L. 343.
Bunius Murr. 332.
cynapioides M. B. 343.
Cynapium L. 343.
Cynapium β . D. Fl. 343.
Cynapium β . *agrestis* Wallr. 343.
Menu Murr. 349.
segetalis v. Boenningh. 343.
Agathophyton Bonus Henricus Moq. Tand. 719.
rubrum Rchb. 719.

- Agave* L. 836.
americana L. 837.
Agraphis nutans Link. 860.
Agraulos caninus Beauv. 932.
Agrimonia L. 259.
agrimonioides L. 260.
Eupatorium L. 260.
odorata Ait. 260.
odorata Mill. 260.
procera Wallr. 260.
repens L. 260.
Agropyrum caesium Presl. 983.
firmum Presl. 983.
juncum Beauv. 982.
Agrostemma L. 124.
coronaria L. 123.
Flos Jovis L. 123.
Flos Jovis Poll. 123.
Githago L. 124.
nicæensis Willd. 124.
Agrostis L. 930.
aculeata Scop. 926.
alba α , β , γ , δ . D. Fl. 930.
931.
alba var. α . Schrad. 930.
alba L. 930.
alba α . major Gaud. 930.
alba β . decumbens Gaud. 930.
alba γ . patula Gaud. 931.
alba ϵ . pumila Kunth. 931.
alba α . gigantea Mey. 930.
alba β . stolonifera Mey. 931.
alba γ . maritima Mey. 931.
alba δ . stolonifera Sm. 931.
alba Schrad. 930.
alpina DC. 933.
alpina Dub. 933.
alpina Leyss. 932.
alpina Scop. 932.
arundinacea L. 935.
australis L. 936.
Calamagrostis L. 938.
canina L. 932.
capillaris Poll. 930.
compressa Willd. 931.
decumbens Hall. 930.
decumbens Host. 930.
diffusa Host. 930.
festucoides Vill. 933.
filiformis Schleich. Vill. 933.
gigantea Gaud. 930.
gigantea Roth. 931.
Agrostis hispida Willd. 931.
hybrida Gaud. 932.
incurvata Scop. 989.
interrupta L. 933.
littoralis Sm. 930.
lutosa Poir. 930.
maritima Lmk. 931.
miliacea L. 937.
minima L. 928.
panicea Lmk. 936.
panicea Willd. 930.
patula Gaud. 931.
pauciflora Schrad. 931.
pilosa Schleich. 935.
pumila L. 932.
purpurea Gaud. 933.
rubra L. 932.
rubra γ . Whlbg. 931.
rupestris All. 933.
rupestris DC. 933.
rupestris Dub. 933.
serotina L. 964.
setacea Vill. 933.
Spica Ventii L. 933.
stolonifera Hst. 930.
stolonifera α . L. 931.
stolonifera β . L. 930.
stolonifera L. it. scan. 931.
stolonifera Poll. 931.
sylvatica Hst. 931.
sylvatica L. Rehb. 931.
sylvatica Poll. 932.
tenella Hoffm. 931.
varia Hst. 930, 931.
ventricosa Gouan. 936.
verticillata Vill. 931.
vulgaris Schrad. 931.
vulgaris With. 931.
Aira L. 943.
alba Wulf. 940.
alpina Roth. 943.
altissima Lmk. 943.
aquatica L. 963.
bottnica Whlbg. 943.
caerulea L. 963.
caespitosa L. 943.
caespitosa α . fluviatilis Mey. ?
943.
caespitosa β . Roth. 943.
caespitosa D. fl. 943.
caespitosa var. *littoralis* Gaud.
943.

- Aira caespitosa* var. *setifolia* Bisch. 943. 944.
canescens L. 945.
capillaris Hst. 952.
caryophyllea L. 952.
cristata L. 941.
flexuosa L. 944.
flexuosa β . *paludosa* Mey. 944.
glauca Schrad. 942.
hirsuta Schleich. 942.
juncifolia Wulf. 940.
montana L. 944.
paludosa Weih. 944.
paludosa Wib. 944.
parviflora Thuill. 943.
praecox L. 952.
pusilla Wigg. 952.
spicata L. spec. 951.
subspicata L. syst. 951.
uliginosa Weih. 944.
valesiaca All. 942.
Wibekiana Sond. 944.
Airochloa cristata Link. 941.
hirsuta Link. 942.
Ajuga L. 678.
alpina L. 679.
alpina Thom. 679.
alpina Vill. 679.
Chamaepitys Schreb. 679.
chia Schreb. 679.
foliosa Schleich. 679.
genevensis L. 679.
latifolia Hst. 679.
montana Rehb. 679.
pyramidalis L. 679.
repens Hst. 679.
reptans Hst. 679.
reptans L. 679.
rugosa Hst. 679.
rupestris Schleich. 679.
Alchemilla L. 272.
alpina L. 273.
alpina β . *hybrida* L. 272.
Aphanes Leers. 273.
arvensis Scop. 273.
cuneata Thom. 273.
fissa Schummel 273.
minor Tsch. 273.
montana Willd. 272.
pentaphyllea L. 273.
pubescens M. B. 272.
pyrenaica Duf. 273.
Alchemilla truncata Tausch. 272.
vulgaris L. 272.
vulgaris γ . *hybrida* Wallr. 272.
Alectorolophus grandiflorus Wallr. 643.
grandiflorus β . *pubens* Wallr. 644.
hirsutus All. 644.
major Rehb. 643.
minor β . Rehb. 643.
minor β . *alpinus* Gaud. 643.
minor β . *fallax* Wimm. et Grab. 643.
parviflorus Wallr. 643.
Reichenbachii Drey. 644.
ALISMACEEN. 795.
Alisma L. 795.
Damasonium Willd. 796.
dubia Willd. 796.
graminifolium Ehrh. 795.
lanceolatum With. 795.
lanceolatum Willd. 795.
natans L. 796.
natans Pollich. 795.
natans *sparganifolium* Fries. 796.
parnassifolium L. 795.
Plantago L. 795.
Plantago β . Willd. 795.
Plantago γ . *graminifolium* Whlbg. 795.
ranunculoides L. 796.
ranunculoides *zosterifolium* Fries 796.
Alliaria officinalis Andrzej. 56.
Allium L. 852.
acutangulum Schrad. 854.
acutangulum Willd. 855.
acutangulum β . *montanum* D. Fl. 854.
acutangulum γ . *calcareum* D. Fl. 854.
altaicum Pall. 860.
ambiguum DC. 855.
ambiguum Sibth. et Sm. 853.
Ampeloprasum L. 857.
Ampeloprasum Waldst. K. 857.
angulosum Jcq. 854.
angulosum α . *majus* Trev. 854.
angulosum β . *petraeum* DC. 854.

- Allium angulosum* β . *calcareum* Wallr. 854.
angulosum γ . *serotinum* Gaud. 854.
angulosum Poll. 855.
angulosum var. *major* Trev. 855.
appendiculatum Ram. 855.
arenarium L. succ. 857.
arenarium Sm. et plurim. auct. 858.
Ascalonicum L. 860.
carinatum Fries. 858.
carinatum Pollich. 858.
carinatum Sm. L. spec. 858.
carneum Bertol. 853.
Cepa L. 860.
Chamaemoly L. 854.
controversum Schrad. 856.
descendens L. 857.
ericetorum Thore. 855.
fallax Don. 854.
fistulosum L. 860.
flavum L. 858.
flexum W. K. 858.
flexuosum Hst. 858.
foliosum Clarion. 859.
illyricum Jcq. 853.
montanum Schmidt. 854.
montanum Sibth. et Sm. 858.
moschatum L. 855.
multibulbosum Jcq. 853.
nigrum Bertol. Schult. 853.
nigrum Red. 853.
ochroleucum W. Kit. 855.
oleraceum L. 858.
oleraceum α . D. Fl. 858.
oleraceum β . D. Fl. 858.
oleraceum β . *complanatum* Fries. 858.
Ophioscorodon Don. 856.
Ophioscorodon Link. 856.
pallens L. 859.
paniculatum L. 859.
paniculatum Rb. 858.
plantagineum Lmk. 853.
Porrum L. 856.
pulchellum Don. 858.
reticulatum Presl. 856.
roseum L. 853.
roseum β . DC. 853.
rotundum L. 857.
- Allium sativum* L. 856.
sativum α . D. Fl. 856.
saxatile MB. 855.
Schoenoprasum L. 859.
Schoenoprasum β . *alpinum* Gaud. 859.
Scorodoprasum L. 857.
senescens L. 854.
senescens Schmidt. 854.
senescens Wimm. et Grab. 854.
setaceum W. K. 855.
sibiricum Willd. 859.
sphaerocephalum L. 857.
strictum Schrad. 856.
suaveolens Gaud. 856.
suaveolens Jcq. 855.
subhirsutum L. 854.
subvillosum Salzm. 854.
trifoliatum Cyrill. 854.
Tenorii Spreng. 853.
urinum L. 853.
veronense Pollin. 857.
Victorialis L. 853.
vincale L. 857.
violaceum Willd. 858.
volhynicum Bess. 856.
- Allosurus* Bernh. 1024.
aquilinus Presl. 1023.
crispus Bernh. 1025.
- Alnus* L. 784.
badensis Lang. 785.
barbata Mey. 785.
glutinosa Gaertn. 785.
glutinosa β . *incisa* Willd. 785.
incana DC. 785.
incana β . *pinnatifida* Whlbg. 785.
pubescens Tsch. 785.
viridis DC. 785.
- Alopecurus* L. 924.
agrestis L. 925.
aristatus Hds. 930.
arundinaceus Poir. 925.
fulvus Sm. 925.
geniculatus L. 925.
geniculatus Poll. 925.
monspeliensis L. 930.
nigrescens Jcq. 925.
nigricans Hornm. 924.
paludosus Beauv. 925.
panicus Lmk. 930.
panicus L. 930.

- Alopecurus pratensis* L. 924.
repens M. B. 925.
ruthenicus Weinm. 925.
utriculatus Pers. 925.
ventricosus Pers. 925.
- ALSINEEN.** 124.
Alsi ne Whlb. 130.
aretioides M. K. 130.
austriaca M. K. 131.
biflora Whlb. 130. 1064.
fasciculata M. K. Gouan. 133.
Gerardi Whlb. 132.
Jacquini Koch. 133.
lanceolata M. K. 129.
laticifolia Whlb. 131.
marginata Schrb. 128.
marina Whlb. 129.
marina a. D. fl. 129.
media L. 137.
mucronata Gouan. L. Sibth. 133.
peplodes Whlb. 129.
propinqua R. Brw. 132.
recurva Whlb. 132.
rostrata Koch. 133.
rubra Whlb. 128.
saxatilis Whlb. 132.
sedoides Froel. 132.
segetalis L. 128.
setacea M. K. 132.
stricta Whlb. 130.
tenuifolia Whlb. 133.
umbellata DC. 137.
verna Bartl. 131.
Villarsii M. K. 131.
Villarsii β . D. fl. 131.
viscosa Schreb. 133.
- Alsinella erecta* Mönch. 139.
viscosa Hartm. 133.
- Althaea** L. 151.
cannabin a L. 151.
hirsuta L. 152.
officinalis L. 151.
pallida Kit. 152.
rosea L. 152.
- Alyssum** L. 67.
alpestre L. 67.
alpestre Wulf. 68.
alpestre β . D. Fl. 68.
alpestre β . argenteum Gaud. 68.
alpinum Scop. 76.
arenarium Gmel. 68.
arenarium Lois. 69.
- Alyssum** *argenteum* Vilm.
 DC. 68.
Bertolonii Dsv. 68.
calycinum L. 69.
campestre L. 69.
campestre M. B. 69.
campestre Auct. 69.
clypeatum L. 70.
Draba Willd. 69.
edentulum W. K. 67.
gemonense D. fl. 67.
gemonense L. 67.
hirsutum M. B. 69.
incanum L. 69.
maritimum Lmk. 69.
medium Hst. 67. 1063.
minimum Willd. 69.
montanum L. 68.
murale W. K.; M. B. 68.
myagroides All. 76.
obtusifolium Stev. 68.
paniculatum Willd. 87.
petraeum Arduin. 67. 1063.
rupestre Willd. 76.
saxatile L. 67.
serpyllifolium M. B. 63.
sinuatum L. 67.
tortuosum W. K. 68.
utriculatum L. 66.
Wulfenianum Bernh. 68.
- AMARANTHACEEN.** 710.
Amaranthus L. 710.
adscendens Lois. 710.
adscendens Rehb. ic. 710.
Blitum L. 710.
Blitum Rehb. 710.
Blitum β . DC. 710.
polygonoides L. 711.
prostratus Balb. 711.
retroflexus L. 711.
spicatus Lmk. 711.
sylvestris Dsf. 710.
viridis All. 710.
viridis Poll. 710.
- AMARYLLIDEEN.** 836.
Amaryllis lutea 836.
Aubrina ambrosioides Spach,
 Moq. Tand. 718.
Botrys Moq. Tand. 718.
- AMBROSIACEEN.** 546.
Amelanchier vulgaris Mönch. 278.
Ammi L. 333.

- Ammidaucifolium* Scop. 346.
majus L. 333.
Ammophila arenaria Link. 936.
arundinacea Hst. 936.
Amonia agrimonoides Nestl. 269.
AMPELIDEEN. 159.
Ampelodesmos Link. 939.
tenax Link. 939.
Ampelopsis Mich. 159.
hederacea Mich. 159.
AMYGDALEEN. 241.
Amygdalus L. 241.
communis L. 241.
nana L. 241.
persica L. 241.
Anacampseros maxima Haw. 301.
Anacamptis Rich. 819.
pyramidalis Rich. 819.
Anacyclus L. 439.
officinalis Hayn. 439.
pulcher Bess. 439.
Pyrethrum 439.
Anagallis L. 687.
arvensis L. 687.
caculea Schreb. 687.
carnea Schrk. 687.
femina Vill. 687.
mas Vill. 687.
Monelli Rehb. 687.
phoenicea Lmk. 687.
tenella L. 687.
Anagalloides procumbens Krock. 628.
Anarrhinum Dsf. 618.
bellidifolium Dsf. 618.
Anastatica syriaca L. 86.
Anchusa L. 589.
angustifolia DC. 589. 590.
angustifolia Lehm. 589.
angustifolia L.? 589.
angustifolia Rehb. 590.
arvalis Rehb. 589.
arvensis M. B. 590.
arvensis Tsch. 589.
azurea Rehb. 590.
incarnata Schrad. 590.
italica Rehb. 590.
italica Retz. 590.
leptophylla R. S. 589.
officinalis L. 589.
officinalis Poll. 589.
officinalis Rehb. 589.
Anchusa officinalis Tsch. 589.
paniculata Ait. 590.
paniculata Rehb. 590.
perlata Lmk. 590.
pulla M. B. 591.
variegata Lehm. 590.
Andrachne L. 743.
telephioides L. 743.
Andromeda L. 562.
calyculata L. 562.
polifolia L. 562.
Andropogon L. 918.
Allionii DC. 919.
angustifolius Sm. 918.
arundinaceum Scop. 919.
avenaceus Humb. et Kunth. 919.
contortum All. 919.
distachyus L. 918.
Gryllus L. 918.
halepensis Sibth. 919.
Ischaemum L. 918.
pubescens Vis. 918.
Ravennae L. 918.
Androsace L. 687.
alpina Gaud. 688. 689.
alpina Lmk. 688.
Aretia Lapeyr. 688.
argentea Gaertn. 688.
bryoides DC. 688.
carnea L. 690.
Chamaejasme Hst. 689.
Chamaejasme Wulf. 689.
elongata L. 690.
glacialis Hoppe. 688.
Heerit 688.
helvetica Gaud. 688.
imbricata Lmk. 688.
Lachenalii Gmel. 689.
lactea L. 690.
lactea Vill. 689.
maxima L. 690.
nana Hornem. 690.
obtusifolia All. 689.
obtusifolia β . *aretioides* Gaud. 690.
pauciflora Vill. 690.
pennina Gaud. 688.
pubescens DC. 689.
septentrionalis L. 690.
tomentosa Schleich. 688.
villosa Jcq. 689.
villosa L. 689.

- Androsace villosa** *α. β. D.* Fl. 689.
Vitaliana Lapeyr. 691.
Androsænum All. 154.
officinale All. 154.
vulgare Gärtn. 154.
Andryala chondrilloides Scop. 517.
lanata L. 539.
nemausensis Vill. 513.
nudicaulis Lam. 513.
pontana Vill. 522.
Anemagrostis *Spica venti* Trin. 933.
Anemone L. 8.
acutipetala Schleich. 8.
alpina L. 10.
alpina Scop. 10.
apiifolia Wulf. 10.
baldensis L. 10.
fragifera Wulf. 10.
Hackelii Pohl. 8.
Halleri All. 8. 1060.
Hepatica L. 8.
hortensis L. 9.
intermedia Hopp. 9.
montana Hopp. 9. 1060.
myrrhidifolia Vill. 10.
narcissiflora L. 10.
nemorosa L. 10.
patens Hopp. 8.
patens L. 9.
pratensis L. 9.
Pulsatilla L. 8.
Pulsatilla α. praecox Gaud. 8.
Pulsatilla nutans Gaud. 9.
ranunculoïdes L. 11.
stellata Lmk. 10.
sulphurea L. 10.
sylvestris L. 10.
tenuifolia Schleich. 8.
trifolia L. 11. 1060.
vernalis L. 8.
Wolfgangiana Bess. 9.
Anethum L. 357.
Foeniculum L. 343.
graveolens L. 357.
Pastinaca Wib. 357.
Angelica L. 351.
aquilegifolia DC. 360.
Archangelica L. 352.
Carvifolia Spr. 351.
chaerophyllea Lotterm. 350.
Angelica Levisticum All. 350.
littoralis Fries. 352.
montana Gaud., Schleich. 351.
paludapifolia Lmk. 350.
paniculata Lmk. 347.
pratensis M. B. 351.
pyrenæa Spr. 351.
Razoulii All. 351.
sativa Mill. 352. 1070.
sylvestris L. 351.
sylvestris β. elatior Whlbg. 351.
verticillaris L. 356.
Anisum vulgare Gaertn. 337.
Antennaria carpatia Bl. Fgh. 424.
dioica Gaertn. 424.
Anthemis L. 436.
agrestis Wallr. 438.
alpina L. 439.
altissima L. 437.
arvensis L. 438.
arvensis Wallr. 438.
austriaca DC. 437.
austriaca Jcq. 437.
austriaca var. *virens* Rehb. 437.
austriaca β. Trimmfetti DC. 437.
brachycentros Gay. 437.
carpatia Willd. 439.
caucasica Hornem. 437.
corymbosa Haenk. 433.
Cota Vivian. 437.
Cota Willd. 437.
Cotula L. 438.
grandiflora Hst. 439.
Kitaibelii Spr. 439.
lithuanica Bess. 1071.
montana L. 438.
montana δ. Gay. 439.
mucronulata Bertol. 439.
mucronulata Rehb. 439.
nobilis L. 438.
rigescens Willd. DC. 437.
ruthenica M. B. 438.
saxatilis Willd. 439.
styriaca Vest. 439.
tinctoria L. 436.
tinctoria β. Trimmfetti L. 437.
Trimmfetti All. 437.
Anthericum L. 845.
autumnale Scop. 852.
calyculatum α. L. 863.
calyculatum β. L. 864.
Liliago L. 845.

- Anthericum** *Liliastrum* L. 846.
ossifragum L. 861.
Pseudasphodelus Jcq. 863.
ramosum L. 846.
serotinum L. 844.
sulphureum W. K. 846.
Anthoxanthum L. 924.
aculeatum L. 925.
odoratum L. 924.
paniculatum L. 971.
Anthriscus Hoffm. 360.
alpestris Flor. Siles. Wim. et Grab. 367.
Caucalis M. B. 368.
Cerrefolium Hoffm. 368.
Cerrefolium β . D. Fl. 368.
fumarioides Spr. 367.
nemorosa M. B. 367.
nodosa Pers. 369.
sylvestris Hoffm. 367.
sylvestris DC. 367.
sylvestris β . *alpestris* Wim. 367.
sylvestris β . *tenuifolia* DC. 367.
sylvestris γ . *pilosula* DC. 367.
sylvestris γ . D. fl. 367.
sylvestris δ . DC. 367.
torquata Dub. Thom. 367.
trichosperma Roch. 368.
trichosperma Pers. 368.
trichosperma Schult. 368.
vulgaris Pers. 368.
Anthyllis L. 185.
affinis Britt. 186.
alpestris Hgtschw. 185.
Dillenii Schult. 186.
maritima Schweig. 186.
montana L. 185.
Vulneraria L. 185.
Vulneraria Hgtschw. 185.
Vulneraria β . *polyphylla* DC. 186.
ANTIRRHINEEN. 611.
Antirrhinum L. 614.
alpinum L. 616.
arvense α . L. 616.
arvense β L. 617.
arvense Willd. 616.
Bauhini Gaud. 618.
chalepense L. 617.
Antirrhinum *Cymbalaria* L. 615.
Elatine L. 615.
galioides Lmk. 617.
genistifolium L. 618.
genistifolium Vill. 618.
gracile Pers. 616.
latifolium Mill. 614.
Linaria L. 618.
linifolium L. ? 617.
majus L. 614.
minus L. 615.
monspessulanum L. 617.
odoratissimum Gildenst. 617.
odoratum M. B. 617.
Orontium L. 614.
parviflorum Jcq. 617.
pelisserianum L. 616.
repens L. 617.
repens Sm. 617.
simplex Willd. 617.
spurius L. 615.
striatum Lmk. 617.
triphylum L. 616.
Apargia *alpina* Willd. Hst. 494.
aspera W. K. 496.
aurantiaca Kit. 494.
autumnalis Willd. 493.
autumnalis β . Hartm. 493.
Berinii Bartl. 496.
Brumati Schied. 492.
canescens Sibr. 496.
crispa Willd. 496.
crocea Willd. 494.
dubia Hopp. 495.
dubia Willd. 495.
Gouani Schlecht. 494.
guestphalica v. Bugh. 495.
hastilis Hst. 495.
hastilis Willd. 495.
hastilis β . *lucida* Saut. 495.
hastilis γ . *pinnatifida* Saut. 495.
hirta Sm. 492.
hispanica Willd. 496.
hispida Hst. 494.
hyoseridiflora Saut. 495.
hyoseridifolia Less. 522.
hyoserioides Vest. 492.
hyoserioides Welw. 495.
incana Scop. 495.
pratensis Link. 493.
salina Fl. d. Wett. 506.

- Apargia saxatilis* Ten. 496.
Taraxaci Sm. 493.
Taraxaci Willd. 493.
tenniflora Gaud. 495.
tergestina Hopp. 496.
umbellata Schrk. 497.
Apera Adans. 933.
interrupta Beauv. 933.
Spica venti Beauv. 933.
Aphanes arvensis L. 273.
Apium L. 330.
Amni Crtz. 333.
crispum Mill. 330.
graveolens L. 330.
APOCYNEEN. 572.
Apocynum L. 572.
venetum L. 572.
Aposeris Neck. 490.
foetida Less. 490.
AQUIFOLIACEEN. 568.
Aquilegia L. 24.
alpina Haenk. 25.
alpina L. 25.
alpina Lmk. Stbg. 25.
atrata Koch. 25.
Haenkeana Koch. 25.
montana Stbg. 25.
nigricans Rchb. 25.
nigricans Baumg. 25.
platysepala Rchb. 24.
pyrenaica DC. 25.
Sternbergiana Rchb. 25.
viscosa W. K. 24.
vulgaris L. 24.
vulgaris atroviolacea Avé Lallem. 25.
Arabis L. 43.
alpina L. 43.
arenosa Scop. 47.
aspera All. 44.
auriculata Lmk. 44.
bellidifolia Jcq. 48.
bellidifolia Scop. 49.
bellidioides Lmk. 49.
brassicæformis Wallr. 43.
caerulea Haenk. 49.
ciliaris Willd. 45.
collata R. Brw. 45.
collina Ten. 46.
contracta Spenn. 45.
Crantziana Ehrh. 47.
crispata Willd. 44.
Arabis Gerardi Bess. 44.
glastifolia Rchb. 45.
Halleri DC. 48.
Halleri L. 48.
hirsuta DC. 46.
hirsuta Scop. 45.
hirsuta β . *longisiliqua* Koch. 45.
hirsuta I. *sessilifolia* Gand. 46.
hirsuta II. *incana* Gand. 46.
hirsuta γ . *glaberrima* Whlbg. 45.
hirta Lmk. 46.
hispida L. fil. 47.
incana Mönch. 44.
incana Roth. 44.
incana Willd. 46.
longisiliqua Wallr. 45.
muralis Bertol. 46.
nova Vill. 44.
nutans Mönch. 48.
ochroleuca Lmk. 48.
ovirensis Wulf. 48.
patula Wallr. 44.
patula β . Wallr. 44.
petraea Lmk. 47.
planisiliqua Pers. 45.
planisiliqua Rchb. 45.
praecox Willd. 47.
procurrens W. K. 47.
pubescens Dsf. 46.
pumila Jcq. 48.
recta Vill. 44.
rugosa Münch. 45.
sagittata DC. 45.
sagittata Wimm. 45.
saxatilis All. 44.
scabra All. 48.
serpillifolia Vill. 46.
stolonifera DC. 48.
stricta Hds. 46.
tenella Hst. 48.
Thaliana L. 57.
Thaliana β . *hispida* Whlbg. 57.
Turrita L. 48.
umbrosa Crtz. 48.
verna R. Brw. 44.
vochinensis Spr. 47.
Aracium alpinum Monn. 512.
paludosum Monn. 520.
ARALIACEEN. 374.
Arbutus L. 561.
alpina L. 561.

- Arbutus** *Unedo* L. 561.
Uva ursi L. 561.
Archangelica Hoffm. 352.
littoralis Wtlbg. 1070.
officinalis Hoffm. 352. 1069.
Arctium *Bardana* Willd. 476.
carduelis L. 473.
Lappa L. 475.
Lappa Willd. 475.
majus Schk. 475.
minus Schk. 475.
Personata L. 473.
tomentosum Schk. 476.
Arctostaphylos Adans 561.
alpina Spr. 561.
officinalis Wimm et Gr. 561.
Uva ursi Spr. 561.
Arenthobium *Oxycedri* M. B. 376.
Arenonia Neck. 260.
Agrimonioides Neck. 260.
Arenaria L. 135.
aretioides Portschl. 130.
austriaca Jacq. 131.
austriaca All. 131.
austriaca β . DC. 131.
bavarica L. sp. 134.
biflora L. 136.
caespitosa Ehrh. 132.
cherlerioides Vill. 130.
ciliata L. 136.
ciliata Wulf. 136.
fasciculata Jcq. 133.
fastigiata Sm. 133.
frutescens Kit. 132.
Gerardi Willd. 132.
gothica Fries. 136.
graminifolia M. B. 132.
grandiflora All. 136.
grandiflora L. spec.? 131.
heteromalla Pers. 132.
juniperina Vill. 136.
lanceolata All. 130.
lanceolata β . *cherlerioides* DC. 130.
laricifolia L. 131.
laricifolia β . DC. 131.
liniflora Jcq. 132.
liniflora L. fil. 131.
macrocarpa Hornem. 131.
marginata DC. 129.
marina Roth. 129.
Arenaria marina β . Sm. 129.
Marschlinii Koch 135.
media L. 129.
mucronata DC. 133.
mucronata Sibth. 133.
multicaulis L. 136.
obtus All. 130. 134.
peplodes L. 129.
polygonoides Wulf. 134.
quadrivalvis R. Brw. 132.
recurva All. 132.
rostrata Kit. 131.
rostrata Pers. 133.
rubra α . *campestris* L. 128.
rubra β . *marina* L. 129.
saxatilis Lois. 132.
saxatilis Roth. 132.
segetalis Lmk. 128.
serpyllifolia L. 135.
serpyllifolia β . *alpina* Gaud. 135.
setacea Thuill. 132.
sphagnoides Thom. 130.
striata L.? 132.
striata Roth. 132.
tenuifolia L. 133.
trinervia L. 135.
trinervis Sm. 135.
uliginosa Schleich. 130.
verna L. 132.
Villarsii Balb. M. K. 131.
villosa Wulf. 135.
viscida Hall. fil. 135.
viscida Lois. 136.
Aretia Gaud. 691.
alpina L. 688.
alpina Wulf. 688.
brevis Hgtschw. 689.
Charpentieri Heer. 689.
glacialis Schleich. 688.
helvetica Schk. 688.
Vitaliana L. 691.
Wulleniana Sieb. 689.
Aria nivea Hst. 279.
Chamaemespilus Hst. 279.
ARISTOLOCHIEEN. 741.
Aristolochia L. 741.
Clematitis L. 742.
longa L. 742.
lutea Desf. 741.
pallida W. K. 741.
rotunda L. 741.

- Armeria alpina* Willd. 703.
littoralis Willd. 702.
maritima Willd. 702.
plantaginea Willd. 701.
purpurea Koch. h. ztg. 702.
scorzonerifolia 701.
vulgaris Willd. 702.
vulgaris γ . *pubescens* Deth. 702.
Armoracia rusticana Fl.d.Wett. 77.
Arnica L. 446.
austriaca Hopp. 445.
Bellidiastrum Willd. 410.
Bellidiastrum Vill. 410.
Clusii All. 445.
cordata Wulf. 444.
Doronicum Jcq. 445.
glacialis Wulf. 445.
lanigera Ten. 456.
montana L. 446.
scorpioides L. 445.
styriaca Vill. 445.
Arnopogon Dalechampii Willd. 498.
picroides Willd. 498.
Arnoseric Gaertn. 490.
pusilla Gaertn. 490.
AROIDEEN. 811.
Aronia Pers. 277.
cretica Auct. germ. 278.
rotundifolia Pers. 277.
Aronicum Neck. 445.
Bauhini Rehb. 445.
Clusii Koch. 445. 1072. •
Clusii δ . *glaciale* K. 445.
Doronicum Rehb. 445.
glaciale Rehb. 445.
latifolium Rehb. 445.
scorpioides Koch. 445.
scorpioides Rehb. 446.
scorpioides α . *latifolium* DC. 445.
scorpioides β . *medium* DC. 446.
scorpioides γ . *glaciale* DC. 445.
Arrhenatherum Beauv. 945.
avenaceum Beauv. 945.
bulbosum Schld. 945.
elatus M. K. 945.
elatus β . D. fl. 945.
Artemisia L. 425.
Abrotanum L. 428.
Artemisia Absinthium L. 425.
atrata Bess. 428.
atrata Lam. 428.
austriaca Jcq. 428.
balsamita Willd. 428.
Baumgartenii Bess. 427.
Biasoletiana Vis. 426.
Boccone All. 427.
caerulescens L. 430.
campestris L. 429.
campestris β . *sericea* Fries. 429.
campestris Scop. 426.
camphorata L. 425.
corymbosa Lmk. 426.
Dracunculus L. 429.
gallica Willd. 430.
Genipi Stoeckh. 427.
glacialis L. 426.
glacialis Wulf. 427.
grandiflora Hoffm. 426.
helvetica Schleich. 429.
humilis Wulf. 426.
intermedia Hst. ? 426.
lactiniata Willd. 427.
lanata Willd. 426.
Lobelii All. 426.
maritima L. 430.
maritima Willd. 430.
Mertensiana Wallr. 427.
mutellina Vill. 427.
nana Gaud. 429.
nivea Redowsk. 428.
orientalis Willd. 428.
pedemontana Balb. 426.
pontica L. 428.
repens Pall. 428.
rupestris Allion. 427.
rupestris L. 426.
rupestris Scopol. 426.
rupestris Vill. 427.
rupestris β . L. 427.
salina Willd. 430.
saxatilis Willd. 426.
scoparia W. K. 429.
Scirpium Wallr. 430.
spicata Koch. 427.
spicata Wulf. 427.
subcanescens Willd. 426.
tanacetifolia All. Lam. 427.
umbelliformis Lmk. 427.

- Artemisia valesiaca* All. 430.
viridifolia Ledeb. 426.
vulgaris L. 430.
Arthrocnemum fruticosum Moq.
 Tand. 713.
Arthrolobium scorpioides DC.
 221.
Arum L. 811.
Arisarum L. 812.
italicum Mill. 812.
maculatum L. 811.
Arundo L. 938.
acutiflora Schrad. 935.
Ampelodesmos Cyrill. 939.
arenaria L. 936.
baltica Flüg. 936.
Calamagrostis Hall. fil. 935.
Calamagrostis L. 934.
Calamagrostis M. B. 934.
canescens Wigg. 934.
Clarionis Lois. 935.
collina Ten. 939.
Donax L. 939.
effusa Gmel. 934.
Epigeios L. 934.
festucacea Willd. 972.
festucoides Desf. 939.
glauca M. B. 934.
Halleriana Gaud. 934.
humilis R. S. 935.
intermedia Gmel. 934.
isiaca Sieb. 938.
Leersii Oert. 934.
littorea Schrad. 934.
mauritanica Desf. 939.
mauritanica Poir. 939.
montana Gaud. 935.
neglecta Ehrh. 935.
Phragmites L. 938.
Phragmites β . *subuniiflora* DC.
 938.
Phragmites β . *flavescens* Curt.
 938.
Pliniana Turr. 939.
Plinii May. et Br. 938.
Plinil Vilm. 939.
Pseudophragmites Hall. fil.
 934.
Pseudophragmites Lej. 938.
Pseudophragmites Schrad. 935.
speciosa Schrad. 938.
stricta Tium. 935.
Arundo sylvatica Schrad. 935.
tenax Vahl. 939.
tenella D. Fl. 935.
tenella Schrad. 935.
tenella β . D. Fl. 935.
varia Schrad. 935.
Asarum L. 742.
eupaeum L. 742.
 ASCLEPIADEEN. 570.
Asclepias Vincetoxicum. 571.
 ASPARAGEEN. 838.
Asparagus L. 839.
acutifolius L. 839.
amarus DC. 839.
Corruda Scop. 839.
marinus Rehb. 839.
officinalis L. 838.
ollicinalis α . β . L. 839.
scaber Brign. 839.
sylvaticus W. K. 839.
tenuifolius Lmk. 839.
Asperugo L. 587.
procumbens L. 587.
Asperula L. 380.
Aparine Schott. M. B. 380.
 381. 382.
arvensis L. 380.
canescens Vis. 381.
cynanchica L. 381.
galinoides M. B. 382.
longiflora W. K. 381.
molluginoides Rehb. 382.
montana Kit. 381.
odorata L. 381.
rivalis Sibth. 382.
taurina L. 380.
tinctoria L. 381.
Asphodeline liburnica Rehb. 843.
lutea Rehb. 845.
Asphodelus L. 844.
albus Mill. 845.
creticus Lam. 845.
fistulosus L. 845.
liburnicus Scop. 845.
luteus L. 845.
neglectus Schult. 845.
ramosus L. 844.
ramosus St. 845.
Aspidium R. Brwn. 1014.
aculeatum Döll. 1014.
aculeatum Schltz. 1015.

- Aspidium aculeatum* St. 1014.
aculeatum Sw. 1015.
aculeatum α . *vulgare* Döll. 1014.
aculeatum subtripinnatum Sw. 1015.
alpinum Willd. 1019.
angulare Kit. 1015.
angulare Willd. 1015.
Braunii Spenn. 1015.
cristatum Sw. 1017.
dentatum Sw. 1018.
depastum Schkhr. 1016.
dilatatum Godr. 1017.
dilatatum Willd. 1017.
dumetorum Smith. 1017.
erosum Schkhr. 1016.
Filix fem. Sw. 1020.
Filix mas Sw. 1016.
Filix mas β . *erosum* Döll. 1016.
fontanum Willd. 1021.
fragile St. 1018.
fragile Sw. 1019.
Halleri Willd. 1021.
irriguum Smith. 1020.
lobatum Sw. 1014.
Lonchitis Sw. 1014.
montanum Sw. 1019.
Oreopteris Sw. 1016.
regium Sw. 1019.
rhaeticum Willd. 1019.
rigidum Sw. 1018.
rigidum b. remotum Alex. Br. 1018.
rufidulum Sw. 1013.
spinulosum Döll. 1017.
spinulosum Willd. 1017.
spinulosum α . Hartm. 1017.
spinulosum β . Hartm. 1017.
Thelypteris Sw. 1016.
Asplenium L. 1020.
Adiantum nigrum L. 1022.
alternifolium Wulf. 1022.
Breytii Retz. 1022.
Ceterach L. 1011.
fissum Kit. 1022.
Filix femina Bernh. 1020.
germanicum Weis. 1022.
Halleri Rob. Brwn. 1021.
Ruta muraria L. 1022.
Scolopendrium L. 1023.
Asplenium septentrionale Sw. 1022.
Serpentini Tsch. 1022.
Serpentini β . *incisum* Tsch. 1022.
Trichomanes L. 1021.
viride Huds. 1021.
Asprella nardiformis Hst. 990.
oryzoides Lmk. 929.
Aster L. 408.
alpinus L. 408.
amelloides Hoffm. 408.
amelloides Rehb. 408.
Amellus L. 408.
Amellus γ . *hispidus* DC. 408.
annuus L. 411.
Bellidiastrum Scop. 410.
brumalis N. a. E. 409.
Bubonium Scop. 417.
canus W. et K. 410.
dracunculoides Willd. 409.
dysentericus Scop. 419.
ensifolius Scop. 416.
Helenium Scop. 416.
hirtus Scop. 417.
hirsutus Hst. 408.
lanceolatus Lej. 410.
leucanthemus Desf. 409.
miser Ait. 410.
Novi Belgii L. 409.
Novi Belgii Willd. 409.
pannonicus Jcq. 408.
parviflorus N. a. E. 409.
Pseudo-amellus DC. 408.
pulicarius Scop. 419.
salicifolius Scholl. 409.
salicinus Scop. 417.
salignus Willd. 409.
serotinus Willd. 409.
tinctorius Wallr. 408.
Tripolium L. 408.
Asteriscus Tournef. 415.
aquaticus Less. 415.
Asterocephalus argenteus Spreng. 403.
gramuntinus Spr. 400.
suaveolens Wallr. 402.
suaveolens var. *silenifolia* Rb. 402.
succisa Wallr. 400.
Asterolinon stellatum Flor. Portug. 687.

- Astragalus* L. 215.
albidus W. K. 218.
alopecuroides L. 220.
alpinus L. 212.
arenarius L. 216.
arenarius Pall. 216.
argenteus Vis. 217.
aristatus L'Herit. 219.
asper Jcq. 219.
austriacus Jcq. 216.
campestris L. 213.
chloranthus Pall. 219.
Cicer L. 218.
danicus Retz. 216.
dealbatus Pall. 218.
depressus L. 218.
dichopterus Pall. 217.
epiglottis L. syst. 216.
exscapus L. 219.
foetidus Vill. 214.
glaucus M. B. 218.
glycyphyllos L. 218.
Halleri All. 214.
hariosus L. 218.
hypoglottis L. mant. 216.
incanus Wulf. L. 220.
incurvus Dsf. Rehb. 220. 1066.
leontinus Whlbg. 212.
leontinus Wulf. 215.
leucophaeus Sm. 219.
microphyllus Schübl. Mart. et plurim. auct. germ. 218.
microphyllus Willd. 216.
 — — L. 216.
monspessulanus L. 219.
montanus L. 214.
Mülleri Stend. et Hochst. 217.
Onobrychis L. 216.
Onobrychis Poll. 216.
oroboides Hornem. 212.
pilosus L. 214.
purpureus Lmk. 215.
sempervirens Lmk. 219.
sesameus L. 218.
sordidus v. Spitzel. 213.
sordidus Willd. 213.
subulatus Koch. bot. ztg. 217.
sulcatus L. 217.
tyrolensis L. 213.
uralensis L. 213.
uralensis Wulf. 213.
valesiacus Thom. 214.
Astragalus velutinus Sieb. 213.
vesicarius L. 217. 1066.
virgatus Rehb. 217.
Wulfenii Koch. 219. 1066.
Astrantia L. 327.
carinthiaca Hopp. 328.
carniolica Wulf. 328.
Diapensia Scop. 327.
Epipactis L. fil. 327.
gracilis Bartl. 327.
major L. 328.
minor L. 327.
minor Scop. 328.
pallida Presl. 328.
Athamantia Koch. 347.
Cervaria L. 355.
cretensis L. 347.
cretensis β . mutellinoides DC. 347.
cretensis γ . glabra Gaud. 347.
Golaka Hacq. 373.
Libanotis L. 345.
Matthioli L. 347.
Matthioli Rehb. Sut. 348.
Meum L. 349.
mutellinoides Lmk. 347.
Oreoselinum L. 355.
pubescens Retz. 346.
pyrenaica Jcq. 346.
rupestris Rehb. 348.
rupestris Vill. 347.
sibirica L. 346.
Athyrium Filix femina Bernh. 1020.
Filix femina Roth. 1020.
Halleri Roth. 1021.
molle Roth. 1020.
ovatum Roth. 1020.
rhaeticum Roth. 1020.
trifidum Roth. 1020.
Atractylis usus agrestis Gaertn. 480.
lanata Scop. 480.
Atragene L. 3.
alpina L. 3.
austriaca Scop. 3.
Wenderothii Schl. 3.
Atriplex L. 721.
acuminata W. K. 722.
alba Scop. 724.
angustifolia Sm. 722.

- Atriplex** *campestris* Koch. *Avena capillaris* M. K. 952.
 et Z. 722.
deltoides Bab. 723.
erecta Sm. 722.
hastata L. Skhr. 723.
hastata γ. *calotheca* Schumach.
 723.
hastata Poll. et plurium auct.
 723.
Hermanni Willd. 722.
hortensis L. 721.
laciniata L. 723.
laciniata Schk. 723.
latifolia Whlbg. 722.
littoralis L. 723.
marina Deth. 723.
microsperma W. K. 723.
nitens Rbt. 722.
oblongifolia W. K. 722.
oppositifolia DC. 723.
patula L. 722.
patula Sm. 722. 723.
patula var. *salina* Wallr. 723.
patula γ. *farinosa* D. Fl. 723.
pedunculata L. 721.
Portulacoides L. 721.
prostrata DC. Bab. 723.
rosea L. 724.
ruderalis Wallr. 723.
Sackii Rostk. 723.
sinuata Hoffm. 723.
tatarica L. 722.
tatarica Schk. 722.
verticillata Lagasc. 724.
virgata Hoffm. 722.
- Atropa** L. 601.
Belladonna L. 601.
Mandragora L. 601.
- Avena** L. 945.
airoides Koel. 951.
alpestris Hst. 950.
alpina Sm. Rchb. 948.
amethystina Clar. 948.
argentea Willd. 951.
atherantha Prsl. 947.
aurata All. 933.
barbata Broter. 947.
brevifolia Hst. 951.
brevis Roth. 946.
bromoides L. 948.
bulbosa Willd. 945.
calycina Vill. 953.
- caryophylla* Wigg. 952.
Cavanillesii Koch. 951.
distichophylla Hst. 951.
distichophylla Vill. 951.
dubia Leers. 950.
elatio L. 945.
fallax Bert. 949.
fallax DC. 949.
fallax R. et S. 949.
fallax Ten. 949.
fatua L. 947.
fertilis All. 950.
flavescens L. 950.
flavescens β. *major* Schrad. 950.
flavescens γ. *variegata* Gaud.
 950.
flexuosa D. Fl. 914.
fragilis L. 980.
hirsuta Roth. 947.
hybrida Peterm. 946.
lanata Koel. 945.
Loeflingiana Cav. 952.
mollis Koel. 945.
nervosa Lmk. 946.
nuda L. 946.
orientalis Schreb. 946.
paniculatis Schrad. 947.
praecox Beauv. 952.
praeusta Rchb. 948.
pratensis L. 948.
precatoria Thuill. 945.
pubescens L. 947.
pusilla Wigg. 952.
sativa L. 946.
Schenckzeri All. 949.
sedinensis DC. 949.
sedinensis Salz. 950.
sempervirens Vill. 949.
sempervirens Hst. 949.
sempervirens DC. 919. 949.
sesquitertia Hst. 951.
spicata β. Willd. 953.
sterilis L. 947.
striata Lmk. diction. 949.
striata Lmk. illustr. 949. 950.
stricta Hst. 953.
strigosa Schreb. 946.
subspicata Clairv. 951.
subspicata Gaud. Rchb. 951.
tenuis Mönch. 950.
triaristata Vill. 950.

- Avena trisperma* Schübl. et Mart. 946.
versicolor Vill. 948.
Axyris ceratoides L. 721.
Azalea L. 563.
procumbens L. 564.
- B.**
- Ballota* L. 675.
alba L. 675.
borealis Schweig. 675.
foetida Lmk. 675.
foetida Rchb. 675.
hirta Hort. Berol. 675.
nigra L. 675.
nigra Rchb. 675.
nigra Sm. 675.
ruderalis Fries. 675.
urticifolia Ortin. 675.
vulgaris Hoffmussg. et Link. 675.
- BALSAMINEEN.** 166.
- Balsamita major* Dsf. 431.
Barbarea R. Brw. 42.
arcuata Rchb. 42. 1063.
hirsuta Weib. Rchb. 42.
iberica DC. 43.
parviflora Fries. 43.
praecox Brw. 43.
stricta Andr. 42.
taurica DC. 42.
vulgaris Brw. 42.
vulgaris Sturm. 43.
vulgaris β . D. Fl. 42.
- Barbula hirci* Camer. 499.
- Barkhausia cernua* Rchb. 519.
foetida DC. 514.
intybacea DC. 515.
praecox Rchb. 514.
rhoeadifolia M. B. 514.
rubra Münch. 514.
setosa DC. 515.
taraxacifolia Rchb. 514.
taraxacifolia Thuill. 514.
taraxacifolia β . *praecox* Dub. 515.
taraxacifolia γ . *intybacea* Dub. 515.
vesicaria Spr. 515.
- Bartsia* L. 644.
alpina L. 644.
- Bartsia latifolia* Sm. 644.
Odontites Sm. 646.
serotina Bartl. 646.
- Bellidiastrum* Cass. 410.
Micheli Cass. 410.
montanum Bl. Fgh. 410.
- Bellis* L. 410.
alpina major Bauh. 441.
annua L. 410.
perennis L. 410.
sylvestris Cyrill. 410.
- BERBERIDEEN.** 30.
- Berberis* L. 30.
vulgaris L. 30.
- Berinia andryaloides* Brign. 517.
- Berteroa incana* DC. 69.
viridis Tsch 70.
- Berula* Koch. 337.
angustifolia Koch. 337.
- Bessera azurea* Schult. 595.
- Beta* L. 719.
foliosa Ehrh. 719.
hortensis Mill. 720.
maritima L., M. B. 720.
vulgaris L. 719.
vulgaris Cica L. 720.
vulgaris *maritima* Koch. 719.
- Betonica* L. 672.
Alopecurus L. 673.
danica Mill. 673.
densiflora Benth. 673.
hirsuta L. 673.
hirta Rchb. 672.
incana Ait. 673.
Monnieri Gouan. 673.
officinalis L. 672.
officinalis Spr. Leys. Rchb. 672.
serotina Hst. 673.
stricta Ait. 672.
- Betula* L. 783.
alba L. 783.
alba γ . *laciniata* Whlbg. 783.
Alnobetula Ehrh. 783.
Alnus a. glutinosa L. 785.
aurea Borkh. 783.
carpatica Willd. 783.
fruticosa Pall. 784.
fruticosa Willd. 784.
glutinosa Wallr. 783.
humilis Schrk. 784.
hybrida Bechst. 783.

- Betula** *intermedia* Thom. 783.
nana L. 784.
odorata Bechst. 783.
ovata Schrk. 785.
pendula Roth. 783.
pubescens Ehrh. 783.
verrucosa Ehrh. 783.
viridis Chaix. 785.
- BETULINEEN.** 782.
- Biasoletia** Koch. 370.
nodosa Bert. 369.
tuberosa Koch. 371.
- Bidens** L. 420.
bipinnata L. 420.
cernua L. 420.
minima L. 420.
tripartita L. 420.
- Bifora** Hoffm. 374.
flosculosa M. B. 374.
radians M. B. 374.
testiculata DC. 374.
- Biscutella** L. 81.
alpestris W. K. 82.
ambigua DC. 82.
ambigua Wallr. 82.
didyma Scop. 82.
hispida DC. 81.
laevigata L. 81.
laevigata β . *glabra* Gaud. 82.
longifolia Vill. 82.
lucida DC. 82.
obcordata Rehb. 82.
saxatilis Schleich. 82.
subspathulata Sut. 82.
- Blechnum** L. 1023.
boreale Sw. 1023.
crispum Hrtm. 1025.
septentrionale Willr. 1023.
Spicant Roth. 1023.
- Blitum** L. 718.
Bonus Henricus C. A. Meyer. 719.
capitatum L. 718.
glaucum Koch. 719.
polymorphum C. A. Meyer. 719.
rubrum Rehb. 719.
virgatum L. 718.
- Blysmus compressus** Panz. 886.
rufus Link. 886.
- Bonarota chamaedrifolia** Scop. 628.
- Bonjeania** Rehb. 208.
hirsuta Rehb. 208.
- Boottia vulgaris** Neck. 115.
- Borkhausenia lutea** Fl. d. Wett. 36.
- Borkhausia apargioides** Hst. 505.
hispida Link. 515.
- BORAGINEEN.** 586.
- Borago** 589.
officinalis L. 589.
- Botrychium** Swtz. 1009.
Lunaria Swtz. 1009.
Lunaria β . *rutaceum* Whlbg. 1010.
Lunaria δ . *rutaeifolia* Roep. 1010.
matricariaefolium Alex. Br. 1009.
matricarioides Willd. 1010.
rutaceum Swtz. 1010.
rutaceum Whlbg. 1010.
rutaceum Willd. 1010.
rutaeifolium Alex. Br. 1010.
- Botrydium aromaticum** Spach. Moq. Tand. 718.
- Brachylobus amphibius** All. 40.
- Brachypodium** Beauv. 973.
caespitosum R. S. 974.
distachyon R. S. 975.
Halleri R. S. 965.
loliaceum R. S. 955.
pinnatum Beauv. 974.
pinnatum α . *vulgare* Rehb. 974.
pinnatum β . Gaud. 974.
Plukenetii Link. 974.
Poa R. S. 965.
psilanthum Link. 965.
ramosum R. S. 974.
rupestre R. S. 974.
sylvaticum R. S. 974.
tenellum Schult. 965.
tenuiflorum R. S. 965.
- Brassica** L. 62.
alpina L. 43.
austriaca Jcq. 62.
campestris Koch. 63.
campestris L. 63.
campestris oleifera praecox DC. 63.
campestris pabularia DC. 63.
cheiranthiflora DC. 64.

- Brassica Cheiranthus** Vill. 61.
Eruca L. 66.
Erucastrium α . Gaud. 65.
Erucastrium β . *ochroleuca* Gaud. 65.
Erucastrium DC. et L. 65.
Erucastrium Poll. 64.
montana DC. 61.
muralis Hds. 65.
Napus L. 63.
Napus oleifera (biennis) DC. 63.
Napus rapifera Mez. 63.
Napus β . *esculenta* DC. 63.
nigra Koch. 63.
oleracea L. 62.
oleracea α . *Napobrassica* L. 63.
orientalis L. 62.
præcox W. K. ? 63.
Rapa L. 63.
Rapa oleifera annua Metz. 63.
Rapa C. oleifera DC. 63.
Rapa rapifera Metz. 63.
- Braya** Stbg. Hopp. 57.
alpina Stbg. Hopp. 57.
pinnatifida (Sisymbrium) L. 57.
supina (Sisymb.) L. 57.
- Brixa** L. 954.
Eragrostis L. 954.
maxima L. 954.
media L. 954.
minor L. 954.
- Bromus** L. 975.
agrestis All. 979.
alopecuroides Moris. 977.
ambiguus Cyrill. 967.
angustifolius Schrk. 979.
ardueunensis Kunth. 975.
arundinaceus Roth. 973.
arvensis L. 978.
arvensis Poll. 979.
asper Gmel. 979.
asper Murr. 979.
badensis Gmel. 976.
brachystachys Hornung. 977.
caespitosus Hst. 974.
commutatus Koch. et Z. 978.
commutatus Schrad. 976.
confertus M. B. Rehb. 977.
corniculatus Lmk. 974.
dertonensis All. 967.
diandrus Curt. 980.
- Bromus diandrus** Smth. 980.
distachyos L. 975.
dumosus Vill. 974.
elatio Koel. 973.
elatio Spr. 973.
elongatus Gaud. 976.
erectus Hds. 979.
erectus Moris. 977.
giganteus L. 972.
glomeratus Scop. 964.
gracilis Weig. 974.
grossus DC. 976.
grossus α , β , γ . D. Fl. 975. 976.
grossus α , β . Gaud. 975. 976.
gynandrus Roth. 980.
hirsutus Curt. 979.
hirsutus Schrk. 978.
hordaceus Fries. 976.
hordaceus Gmel. 976.
inermis Levss. 979.
inermis L. 979.
inermis Schrb. 979.
intermedius Guss. 977.
littoreus Retz. 973.
madritensis L. 980.
maximus Babgt. 980.
maximus Desf. 980.
mollis L. 977.
montanus Gmel. 979.
montanus Fl. d. Wett. 979.
montanus Poll. 979.
multiflorus Hst. 978.
multiflorus Roth. 977.
multiflorus Smith. 976.
multiflorus Weig. 978.
multiflorus β . Rehb. 975.
nanus Weig. 977.
nemoralis Hds. 979.
nemorosus Vill. 979.
patulus M. K. 978.
patulus β . M. K. 978.
perennis Vill. 979.
pinnatus L. 974.
pinnatus β . L. 974.
pratensis Ehrh. 977.
Plukenetii All. 974.
pseudoarvensis Koel. 979.
ravemosus L. 976.
ramosus L. 974.
ramosus Murr. 979.
rigidus Roth. 979.
rubens Hst. 980.

- Bromus** *rupestris* Hst. 974.
scaberrimus Bert. 980.
secalinus L. 975.
secalinus Schrad. 976.
simplex Gaud. 976.
squarrosus Hst. 978.
squarrosus L. 978.
squarrosus β . D. Fl. 978.
sterilis L. 979.
strictus Scop. 964.
sylvaticus Poll. 974.
tectorum L. 979.
triflorus Ehrh. 971.
triflorus L. 972.
triflorus Poll. 950.
trivialis Sav. 942.
velutinus Schrad. 976.
versicolor Poll. 978.
villosus Gmel. 978.
Bryonia L. 294.
alba L. 294.
dioica L. 294.
Buffonia L. 124.
tenuifolia L. 124.
Buglossum *angustifolium* Tsch. 590.
italicum Tsch. 590.
paniculatum Tsch. 590.
vulgare Tsch. 590.
Bulbocodium L. 862.
vernum L. 862.
Bulliarda DC. 300.
aquatica DC. 300.
prostrata D. Fl. 300.
Vaillantii DC. 300.
Bunias L. 87.
aspera Retz. 88.
Cakile L. 88.
Erucago L. 88.
orientalis L. 88.
syriaca Gaertn. 86.
Bunium Koch. 334.
Bulbocastanum L. 334.
cynapioides Bert. 371.
divaricatum Bert. Ces. 334.
montanum Koch. 335.
Buphthalmum L. 414.
aquaticum L. 415.
cordifolium W. K. 414.
grandiflorum L. 415.
speciosissimum Ard. 414.
speciosum Schreb. 414.
Buphthalmum *spinosum* L. 415.
salicifolium L. 414.
Bupleurum L. 337.
affine Sadl. 338.
aristatum Bartl. 339.
angulosum Spr. Rchb. 340.
baldense M. B. 339.
baldense W. K. 339.
Burserianum Schleich. 340.
caricifolium Rchb. 340.
caricifolium Willd. 340.
caricinum DC. 340.
exaltatum M. B. 339.
falcatum L. 339.
Gerardi Jcq. 338.
Gerardi Fl. d. Wett. 338.
Gerardi var. β . Sadl. 338.
gramineum Vill. 340.
graminifolium Vahl. 340.
juncum Gmel. 338.
juncum L. 339.
juncum Poll. 338.
juncum M. B. 338.
longifolium L. 340.
Odontites D. Fl. 339.
Odontites Rchb. DC. 339.
perfoliatum Lmk. 341.
petraeum Wulf. Rchb. 340.
Pollichii Gmel. 338.
protractum Link. et Hoffmssg. 340.
ranunculoides L. 340.
ranunculoides Rchb. ic. 340.
rotundifolium L. 341.
semicompositum L. 338.
stellatum L. 340.
subovatum Link. 341.
tenuissimum L. 338.
tenuissimum β . nanum DC. 338.
BUTOMEEN. 796.
Butomus L. 797.
umbellatus L. 797.
Buxus L. 743.
sempervirens L. 743.
suffruticosa Lam. 743.

C.

Cacalia *albifrons* (L.) Sturm. 405.
alliarifolia Lmk. 405.

- Cacalia alpina* L. 405.
glabra Vill. 405.
hirsuta Vill. 405.
leucophylla Willd. 405.
Petasites Lmk. 405.
saracenicæ L. 454.
tomentosa Jacq. 405.
tomentosa Vill. 405.
tomentosa β . *hybrida* Vill. 405.
Cachrys maritima Spr. 349.
CACTEEN. 309.
Cactus Opuntia L. 310.
CAESALPINIEEN. 240.
Cakile Tournef. 88.
aegyptiaca Willd. 88.
latifolia Poir. 88.
maritima Scop. 88.
maritima β . *sinuatifolia* DC. 88.
rugosa L'Herit. 89.
Serapionis Gaertn. 88.
Calamagrostis Roth. 934.
acutiflora DC. 935.
alpina Hst. 935.
arenaria Roth. 936.
argentea DC. 938.
arundinacea Roth. 935.
Clarionis Lois. 934.
Epigetos Roth. 934.
Gaudiniana Rehb. 934.
glauca Rehb. 934.
Halleriana DC. 934.
Hübneriana Rehb. 934.
lanceolata Roth. 934.
laxa Hst. 934.
littorea DC. 934.
littorea Rehb. 934.
montana Hst. 935.
nigricans Merat. 938.
nutans Saut. 934.
Pseudophragmites Rehb. 934.
pulchella Saut. 934.
pyramidalis Hst. 935.
ramosa Hst. 934.
Schwabii Spr. 936.
speciosa Hst. 935.
stricta Spr. 935.
sylvatica DC. 935.
sylvatica Hst. 935.
tenella Hst. 935.
varia Hst. 934.
Calamintha Mönch. 660.
Acinos Clairv. 660.
alpina Lmk. 661.
arvensis Lmk. 660.
grandiflora Mönch. 661.
hederacea Scop. 664.
menthaefolia Hst. 661.
montana α . Lmk. 661.
Nepeta Clairv. 661.
obliqua Hst. 661.
officinalis Mönch. 661.
parviflora Lmk. 661.
rotundifolia Hst. 661.
rupestris Hst. 662.
thymifolia Rehb. 661.
trichotoma Mönch. 661.
umbrosa Rehb. 661.
Calendula L. 463.
arvensis L. 463.
officinalis L. 463.
Calepina Dsv. 87.
Corvini Dsv. 87.
Calla L. 812.
palustris L. 812.
Callianthemum coriandrifolium Rehb. 15.
rutae-folium Meyer. 15.
rutae-folium Rehb. 15.
Callitriche L. 288.
angustifolia Hopp. 288.
aquatica Hds. 288.
autumnalis Kütz. 288.
autumnalis L. 288.
caespitosa Schultz. 288.
hamulata Kütz. 288.
intermedia Hopp. 288.
minima Hopp. 288.
pallens M. B. 288.
pedunculata DC. 288.
platycarpa Kütz. 288.
stagnalis Scop. 288.
stellata Hopp. 288.
verna L. 288.
vernalis Kütz. 288.
CALLITRICHINEEN. 287.
Calluna Salisb. 562.
vulgaris Salisb. 562.
Calotheca bromoidea Lej. 975.
littoralis Spr. 964.
Caltha L. 22.
palustris L. 22.

- Camelina* Crtz. 77.
austrica Pers. 40.
dentata Pers. 78.
microcarpa Andr. 77.
pinnatifida Hum. 78.
sativa Crtz. 77.
sativa β . *glabrata* DC. 77.
sativa var. β . Fries. 77.
saxatilis Pers. 76.
sylvestris Fries. 77.
sylvestris Wallr. 77.
Campanula L. 551.
aggregata Willd. 557.
aggregata α . *farinosa* Rehb. 557.
Allionii Vill. 558.
alpina Jcq. 557.
Alpini L. 558.
barbata L. 557.
Baumgartenii Beck. 552.
bononiensis L. 553.
caespitosa Scop. 551.
caespitosa Vill. 552.
capitata Rehb. 556.
carnica Schied. 553.
cenisia L. 556.
Cervicaria L. 556.
congesta R. S. 557.
cordata Vis. 559.
crenata Link. 553.
Elatines All. 554.
Elatines L. 554.
Elatines *Morettii* Hst. 554.
Elatines Ten. 555.
elliptica Kit. 557.
elliptica Rehb. 557.
Erinus L. 554.
excisa Schleich. 551.
farinosa Andr. Bess. 557.
filiformis Morett. 555.
Fischeri Schult. 558.
garganica Ten. 555.
glomerata L. 556.
glomerata β . *farinosa* Rehb. 557.
glomerata β . *salviaefolia* Wallr. 557.
graminifolia L. 558.
hederacea L. 559.
hispida Lej. 556.
Hostii Bmg. 552.
hybrida L. 559.
intermedia Schult. 558.
Campanula latifolia L. 554.
ligulata Rehb. 556.
ligulata W. K. 556.
lilifolia D. Fl. 558.
linifolia DC. 553.
linifolia Lmk. 553.
linifolia Scop. 553.
Medium L. 557.
Morettiana Rehb. 554.
neglecta R. S. 555.
patula L. 555.
patula β . *punctata* Wallr. 555.
patula γ . *flaccida* Wallr. 555.
persicifolia L. 556.
persicifolia β . *grandiflora* DC. 556.
petraea Schmidt. 557.
pubescens Schmidt. 552.
pulla L. 551.
pulla Poll. 555.
pusilla Haenk. 552.
pyramidalis L. 555.
Raineri Perpent. 555.
rapunculoides L. 553.
Rapunculus L. 555.
rhomboidalis L. 553.
rhomboidea Willd. 553.
rotundifolia L. 552.
rotundifolia β . L. 552.
rotundifolia γ . L. 553.
rotundifolia δ . *lanceifolia* D. fl. 552.
rotundifolia β . *reniformis* Pers. 552.
rotundifolia β . *velutina* DC. 552.
ruthenica M. B. 553.
Scheuchzeri Vill. 553.
sibirica L. 557.
simplex DC. 553.
speciosa Hornem. 557.
Speculum L. 558.
spicata L. 556.
suaveolens Willd. 558.
tenuifolia Hoffm. 553.
tenuifolia W. K. 558.
Thaliana Rehb. 553.
Thaliana Wallr. 553.
thyrsoides L. 556.
trachelioides M. B. 553.
trachelioides Rehb. 553.
Trachelium L. 554.
ucranica Spr. 553.

- Campanula uniflora* Vill. 553.
urticifolia Sch. 554.
valdensis All. 553.
Zoisii Wulf. 551.
- CAMPANULACEEN.** 547.
- Camphorosma* L. 720.
acuta Poll. 715.
monspeliaca L. 720.
monspeliaca Poll. 715.
- Cannabis* L. 755.
sativa L. 755.
- CAPPARIDEEN.** 89.
- Capparis* L. 90.
Fontanesii DC. 90.
herbacea Willd. 90.
ovata Dsf. 90.
ovata M. B. 90.
rupestris Sibth. 90.
spinosa L. 90.
spinosa β . L. 90.
spinosa γ . Lmk. 90.
- Capraria gratioloides* 628.
- CAPRIFOLIACEEN.** 376.
- Caprifolium italicum* R. S. 378.
- Capsella* Medik. 84.
Bursa pastoris Mönch. 84.
elliptica var. *integrifolia* St. 85.
elliptica Mey. 85.
integrifolia DC. 85.
pauciflora Koch. 85.
petraea Fries. 84.
procumbens Fries. 85.
- Cardamine* L. 49.
alpina Willd. 49.
amara L. 50.
amara β . *hirta* Wimm. et Gr. 51.
amara γ . *pubescens* Lej. et Court. 51.
amara γ . *umbrosa* Wimm. et Gr. 51.
amara γ . *umbrosa* DC. 51.
asarifolia L. 49.
bellidifolia L. 49.
bellidifolia β . *alpina* DC. 49.
dentata Schult. 50.
diversifolia Sternb. 48.
feroensis Fl. Dan. 47.
graeca L. 51.
hastulata Engl. Bot. 47.
heterophylla Hst. 49.
- Cardamine hirsuta* Fl. Dan. 51.
hirsuta L. 50.
hirsuta α . β . D. Fl. 50.
hirsuta α . *campestris* Fries. 50.
hirsuta β . *sylvestris* Fries. 50.
hirsuta β . *micrantha* Gaud. 50.
hirsuta v. *clandestina* Fries. 50.
impatiens L. 50.
intermedia Hornem. 50.
Libertiana Lej. 51.
maritima Portschl. 51.
maritima var. Rehb. 51.
multicaulis Hopp. 50.
Opicii Presl. 51.
parviflora L. 49.
petiolaris DC. 51.
petraea L. 47.
pratensis L. 50.
pratensis β . *dentata* Rehb. 50.
Plumierii Vill. 51.
resedifolia L. 49.
stolonifera Scop. 48.
sylvatica Bess. 50.
sylvatica Hoffm. Hartm. 51.
sylvatica Link. 50.
thalictroides All. 51.
trifolia L. 51.
umbrosa Andr. 50.
umbrosa Lej. 51.
- Cardaria Draba* Dsv. 82.
- Cardioplepis dentata* Wallr. 82.
- Carduus* L. 471.
acanthifolius Lmk. 468. 1036.
acanthoides L. 472.
acanthoides Schkhr. 472.
acanthoides v. *canescens* Schl. 472.
acaulis L. 469. 1033.
acuminatus Gaud. 472.
alpestris Schleich. 472.
alpestris W. K. 473.
anglicus Lmk. 469. 1032.
arctioides Schleich. 472.
arctioides Vill. 473.
arctioides Willd. 473.
Argemone Lmk. 473.
Argemone Schleich. 474.
autareticus Vill. 1048.
candicans W. K. 473.
canus L. 466. 1031.
carlinaefolius DC. 474.
carlinaefolius Lmk. 474.

Carduus centauroides Hopp. 473.

cerinthaeifolius Vill. 479.

cerinthoides Willd. 479.

cirsoides Vill. 474.

collinus W. Kit. 473.

crassifolius Hornem. 474.

crassifolius Willd. 474.

crispus Huds. 472.

crispus L. 472.

crispus β . DC. 472.

cyanoides M. B. 480.

cyanoides α . monoclonos L. 480.

defloratus L. 474.

defloratus β . alpestris DC. 473. 474.

defloratus δ . rhaeticus DC. 474.

dissectus Huds. 469. 1032.

eriphorus L. 465. 1029.

Erisithales Jcq. Lmk. 467. 1034.

Erisithales Vill. 468. 1033.

glaucus Baumg. 474.

glaucus Cavan. 479.

hamulosus Ehrh. W. K. 473.

helenioides L. 468. 1033.

helenioides Sut. 468. 1033.

heterophyllus L. 468.

lanceolatus L. 465. 1029.

leptophyllus Gaud. 474.

lycopifolius Vill. 479.

marianus L. 471.

medius Gouan. 473.

microcephalus Gaud. 472.

mollis Poll. 479. 480.

montosus Pollin. 474.

multiflorus Gaud. 472.

nitidus W. K. 479.

nutans L. 474.

nutans β . Bert. 474.

orthocephalus Wallr. 475.

palustris L. 465. 1030.

pannonicus L. fil. 466. 1031.

Personata L. 472.

platylepis Saut. 474.

polyacanthos Schreb. 472.

polyanthemus Doell. 475.

polyanthemus Schleich. 472.

pratensis Huds. 469. 1032.

pratensis Willd. 456. 1032.

pycnocephalus DC. 471.

pycnocephalus Dub. 471.

pycnocephalus Jcq. 471.

Carduus pycnocephalus L. 471.

radiatus W. K. 478.

rivularis Jcq. 468. 1033.

Roseni Vill. 469. 1034.

semipectinatus Lmk. 1009.

serratuloides Jcq. Scop. 466. 1031.

serratuloides L. Gmel. 466. 1031.

Stangii Buek. 475.

summanus Pollin. Spr. 474.

syncephalus Rehb. 472.

tataricus L. 1043.

tenuiflorus Curt. 471.

tenuiflorus Rostk. 471.

tenuiflorus DC. 471.

tenuiflorus Schleich. 472.

tenuiflorus Sm. 471.

tenuiflorus δ . elongatus Dub. 471.

tenuifolius Thom. 1043.

transalpinus Sut. 474.

tuberosus Jcq. 1031.

tuberosus α . β . L. 469. 1032.

tuberosus Pollich. 469. 1032.

Carex L. 888.

acuminata Willd. 879.

acuta Curt. 915.

acuta L. 900.

acuta α . nigra L. 900.

acuta β . rufa L. 900.

acutiformis Ehrh. 915.

agastachys Ehrh. 908.

alba Scop. 906.

alpestris All. 905.

alpina Willd. 902.

ampullacea Good. 914.

androgyna Balb. 901.

approximata All. 904.

approximata Hopp. 897.

approximata Willd. 904.

arenaria Leers. 892.

arenaria L. 892.

argyroglochin Hornem. 897.

aterrima Hopp. 902.

atrata L. 902.

atrata α . varia Gaud. 902.

atrata β . dubia Gaud. 902.

atrata γ . nigra Gaud. 902.

atrofusca Hopp. 1075.

atrofusca Schk. 908.

austriaca Schk. 892.

axillaris Fries. 896.

- Carex axillaris* Good. 896.
baldensis L. 890.
Bellardi All. 888.
bicolor All. 901.
biformis α . *sterilis* Schltz. 912.
biformis β . *fertilis* Schltz. 913.
biligularis DC. 914.
binervis Sm. 913.
binervis Whlbg. 913.
bipartita All. 897.
Boenninghausiana Knth. 896.
Boenninghausiana Weib. 896.
bohémica Schb. 890.
brachystachys Schrk. 911.
brizoides L. 895.
Buxbaumii Whlbg. 901.
caespitosa Good. 900.
caespitosa L. fl. *suec.* 900.
campestris Hst. 903.
canescens Leers. 893.
canescens L. 898.
canescens Poll. 895. 898.
canescens β . *alpicola* Whlbg. 898.
canescens β . *brunescens* Koch. Syn. I. 898.
capillaris Leers. 914.
capillaris L. 908.
capitata L. 889.
chordorrhiza Ehrh. 891.
ciliata Willd. 901.
cinerea Poll. 898.
clandestina Good. 905.
clavaciformis Hopp. 907.
collina Willd. 904.
contigua Hopp. 893.
crassa Ehrh. 915.
curta Good. 898.
curvula All. 891.
cuspidata Hst. 907.
cyperoides L. 890.
Davalliana Sm. 889.
decumbens Ehrh. 903.
depauperata Good. 911.
diandra Roth. 894.
digitata L. 905.
dioica L. 888.
dioica Hst. 889.
dioica *isogyna* Fries. 889.
distachya Dsf. 891.
distans Fl. Dan. 913.
distans L. 913.
Carex disticha Huds. 892.
diversiflora Hst. 905.
divisa Huds. 892.
divulsa Gaud. 893.
divulsa Good. 894.
Dregeri Lang. 900.
Drymeia Ehrh. 914.
Dufourii Lapeyr. 888.
echinata Morr. 896.
elongata Leers. 898.
elongata L. 897.
elongata Poll. 898.
erecta DC. 910.
Ehrhartiana Hoppe. 894.
ericetorum Poll. 904.
erythrostachys Hoppe. 907.
evoluta Hartm. 915.
extensa Good. 913.
ferruginea Schk. 910.
ferruginea Scop. 910.
filiformis Leers. 904.
filiformis L. 916.
filiformis Poll. 903.
fimbriata Schk. 910.
firma Hst. 910.
flacca Schreb. 907.
flava L. 912.
flava β . Gaud. 912.
flava γ . et δ . Willd. 912.
foetida All. 893.
foliosa Gaud. 912.
frigida All. 909.
frigida Whlbg. 907. 909.
fuliginosa Hst. 909.
fuliginosa Schk. Stb. Hopp. 909.
fuliginosa Whlbg. 909.
fulva Good. 912.
funiformis Clairv. 892.
Gaudiniana Guthn. 899.
Gebhardi Hopp. 898.
Gebhardi Willd. Schk. 897.
geniculata Hst. 909.
glauca Scop. 907.
glomerata Hst. 892.
Goodenowii Gay. 900.
gracilis Curt. 900.
Grassmanniana Rehb. 904.
grypos Lang. 897.
grypos Schk. 896.
grypos St. 897.
guestphalica Bnght. 894.
guestphalica Lang. 894.

- Carex gynomane* Bertol. 891.
gynobasis Vill. 905.
Heleonastes Ehrh. 898.
hirta L. 916.
hispidula Gaud. 910.
hordeiformis Whlbg. 911.
hordeistichos Vill. 911.
Hornschuchiana Hopp. 912.
Hosteana DC. 913.
humilis Leyss. 905.
hybrida Schk. 888.
incurva Lightf. 891.
inflata Hds. 915.
intermedia Good. 892.
irrigua Sm. 902.
juncifolia All. 891.
juncifolia Hst. 892.
Kochiana DC. 915.
Kochiana Schübl. et Mart. 916.
laevigata Sm. 914.
Lachenalii Schk. 897.
lugopina Whlbg. 897.
lasiocarpa Ehrh. 916.
lepidocarpa Tsch. 912.
leporina L. Leers. 897.
leporina L. herb. Good. 897.
leptostachys Ehrh. 908.
leucoglochin L. 890.
limosa L. 903.
limosa Scop. 908.
limosa γ . irrigua Whlbg. 903.
Linkii Schk. 891.
Linnaeana Hst. 889.
lobata All. 893.
lobata Schleich. 893.
loliacea L. 898.
loliacea Schreb. 893.
longifolia Hst. 905.
maxima Scop. 907.
membranacea Hopp. 904.
Metteniana Lehm. 889.
Michelii Hst. 911.
microglochin Whlbg. 890.
microstachya Ehrh. 899.
microstyla Gay. 893.
Mielichhoferi Schk. 907. 910.
mirabilis Hst. 888.
mollis Hst. 904.
montana Leers. 904.
montana L. 904.
montana Poll. 904.
montana β . procerior Gaud. 904.
Carex mucronata All. 898.
multiculmis Ehrh. 897.
muricata Hopp. 893.
muricata L. 893.
muricata Poll. 896.
muricata v. loliacea Weih. 893.
myosuroides Vill. 888.
nemorosa Lumn. 893.
nemorosa Schrk. 906.
nemorosa Willd. 893.
nervosa Dsf. 913.
nigra All. 902.
nitida Hst. 906.
nutans Hst. 915.
obtusangula Ehrh. 914.
obtusata Liljbd. 889.
Oederi Ehrh. 912.
Ohmülleriana Lang. 895.
ornithopoda Willd. 905.
ovalis Good. 897.
pacifica Drej. 900.
pallescens L. 908.
paludosa Good. 915. 1075.
panicea L. 906.
panicea microcarpa Sond. 906.
paniculata L. 894.
paniculata Hartm. 895.
paniculata Whlbg. 895.
paniculata β . Poll. 894.
paniculata β . teretiuscula Whlbg. 894.
paradoxa Willd. 895.
parallela Lästd. 889.
parviflora Hst. 902.
patula Hds. 890.
patula Schk. 914.
patula Scop. 914.
pauciflora Lightf. 890.
pendula Good. 908.
pendula Schreb. 907.
Persoonii Lang. 898.
Persoonii Sieb. 898.
petraea Schk. 890.
phaeostachya Sm. 907.
pilosa Scop. 906.
pilulifera L. 903.
polygama Schk. 901.
polyrrhiza Wallr. 905.
praecox Jcq. 904.
praecox Schreb. 895.
prostrata All. 905.
Pseudo-Cyperus L. 914.

Carex *psyllophora* L. 889.
pulicaris L. 889.
pulla Good. 901.
punctata Gaud. 913.
recurva Hds. 907.
reflexa Hpp. 905.
refracta Rth. 905.
remota L. 896.
rigida Good. 901.
riparia Curt. 915.
rupestris All. 889.
rupestris Schk. 890.
salina Don. 907.
saxatilis L. 901.
saxatilis Willd. Whlbg. 901.
schoenoides Hst. 892.
schoenoides Koch Syn. ed. I. 892.
Schreberi Schk. 895.
Scopoliana Willd.? 910.
Scopolii Gaud. 910.
Scopolii β . Gaud. 910.
secalina Whlbg. 911.
secalina Willd.? 911.
sempervirens Vill. 909.
sempervirens Dub. 910.
Sieberiana Optz. 889.
spadicea DC. 910.
spadicea Rth. 915.
speirostachya Sm. 913.
sphaerocarpa Ehrh. 904.
spicata Hds. 893.
spicata Poll. 892.
spicata Skhr. 889.
spicata Sprg. 889.
splendida Willd. 916.
stellulata Good. 896.
stenophylla Whlbg. 892.
stolonifera Ehrh. 904.
stolonifera Hpp. 900.
stricta Good. 899.
strigosa Hds. 908.
subspathacea Wormsk. 907.
subulata Schumach. 901.
supina Whlbg. 903.
sylvatica Hds. 914.
tenuis Hst. 911.
teretiuscula Good. 894.
teretiuscula α , et β . *cylindrica* Hartm. 894.
tetanica Schk. 907.
tetanica Rbch. 907.

Carex *thuringiaca* Schk.? 904.
thuringiaca Willd. 904.
tomentosa L. 903.
triflora Schrk. 911.
tuberosa DC. 891.
uetliaca Sut. 912.
uliginosa L. spec. 885.
umbrosa Hopp. 905.
umbrosa Hst. 904.
ustulata Whlbg. 908 1075.
vaginata Tsch. 906.
Vahlkii Skhr. 901.
varia Hst. 910.
ventricosa Curt. 911.
verna Schk. 906.
vesicaria Hds. 914.
vesicaria L. 915.
vesicaria α , β . L. 914.
virens Lmk. 893. 894.
vulgaris Fries. 900.
vulpina L. 893.
Carlina L. 476.
acanthifolia All. 476.
acanthifolia α . DC. 476.
acaulis L. 476.
aggregata Willd. 476.
Biebersteinii Bernh. 477.
caulescens Lmk. 476.
Chamaeleon Vill. 476.
corymbosa L. 477.
lanata L. 476.
longifolia Rehb. 477.
nebrodensis Guss. 477.
Pola Hacq. 477.
simplex W. K. 476.
subacaulis DC. 476.
Utzka Hacq. 476.
vulgaris L. 477.
Carpesium L. 421.
abrotanoides L. 421.
cernuum L. 421.
Carpinus L. 760.
Betulus L. 760.
Carpinizza Hst.? 760.
duinensis Scop. 760.
incisa Schimp. 760.
orientalis Lmk. 760.
Ostrya L. 760.
Caryophyllus L. 480.
lanatus L. 480.
tinctorius L. 480.
Carum L. 333.

- Carum Bulbocastanum* Koch. 334.
Bunius L. 332.
Carvi L. 334.
divaricatum Koch. 334.
verticillatum Koch. 334.
Caryophyllata aquatica Lmk. 247.
montana Scop. 247.
officinalis Mönch. 246.
rivalis Scop. 247.
urbana Scop. 246.
Cassandra calyculata Don. 562.
Castanea L. 758.
sativa Mill. 758.
vulgaris Lmk. 758.
Catabrosa aquatica Beauv. 963.
Catapodium liliaceum Lk. 955.
Caucalis Hoffm. 364.
aequicolorum All. 368.
arvensis Hds. 365.
daucoïdes L. 364.
grandiflora L. 363.
helvetica Jcq. 365.
infesta Curt. Smith. 365.
latifolia L. syst. 365.
leptophylla L. 364.
leptophylla Poll. 364.
muricata Bisch. 364.
nodiflora All. 366.
nodosa Scop. 366.
platycarpus L. 363.
scandicina Roth. 368.
Scandix Scop. 368.
Caulinia flexilis Willd. 807.
fragilis Willd. 807.
CELASTRINEEN. 170.
Celtis L. 756.
australis L. 756.
Cenchrus racemosus L. 920.
capitatus L. 940.
Centaurea L. 480.
acutiloba DC. 488.
adonidifolia Rchb. 487.
alba L. 481.
alpestris Hgtschw. et Heer. 486.
amara L. 481.
ambigua Thom. 484.
austriaca Roch. 484.
austriaca Willd. 482.
austriaca γ. ambigua DC. 483.
axillaris Willd. 485.
Centaurea badensis Tratt. 485.
Berini Sieb. 484.
Calcitrapa L. 488.
carniolica Hst. 485.
cirrhata Rchb. 483.
collina L. 487.
collina Scop. 487.
collino-scabiosa Schied. 486.
coriacea W. K. 485.
cristata Bartl. 487.
Crupina L. 488.
Cyanus L. 485.
decipiens Thuill. Rchb. 481.
flosculosa Balb. 483.
Grafiana DC. 487.
Jacea L. 481.
Jacea c. capitata Koch. et Z. 482.
Karschiana Wulf. 488.
Kartschiana Scop. 488.
Kotschyana Heuffl. 486.
lanata DC. 480.
maculosa Lmk. 487.
maculosa DC. 487.
melitensis L. 488.
mollis W. K. 484.
montana L. 484.
nervosa Willd. 483.
nigra L. 484.
nigra β. DC. 481.
nigrescens Willd. 482.
nigrescens Koch. 481. 482.
nudicaulis L. 479.
paniculata L. Lmk. 487.
paniculata s. valesiaca DC. 487.
phrygia L. 483.
phrygia DC. 487.
phrygia Rchb. 484.
phrygia Willd. 483.
phrygia β. helvetica Gaud. 484.
pratensis Thuill. 482.
pubescens Willd. 486.
Rhapontica L. 479.
rupestris L. 487.
rupestris Rchb. 487.
salicifolia DC. 482.
Scabiosa L. 485.
sensana Vill. 485.
solsitialis L. 488.
sordida Willd. 486.
spinoso-ciliata Bernh. 488.
spinulosa Roch. DC. 485.

- Centaurea splendens* L. 481.
stereophylla Bess. 486.
Stoebe Herb. Willd. 486.
stricta W. K. 485.
transalpina Schleich. 482.
Triumfetti All. 485.
uniflora L. 484.
variabilis α , et β , γ Bartl. 487.
variabilis γ , *sordida* Bartl. 486.
variegata Lmk. 485.
vochinensis Bernh. 482.
- Centranthus* DC. 393.
angustifolius DC. 393.
ruber DC. 394.
- Centunculus* L. 687.
alpinus Scop. 143.
minimus L. 687.
- Cephalanthera* Richard. 823.
ensifolia Rich. 826.
pallens Rich. 826.
rubra Rich. 826.
- Cephalaria* Schrad. 397.
alpina Schrad. 393.
appendiculata Schrad. 397.
leucantha Schrad. 398.
transylvanica Schrad. 398.
- Cerastium* L. 140.
alpinum L. 143.
alpinum β , *glabratum* Whlbg. 143.
alpinum Wulf. 143.
anomalum W. K. 137.
apetalum Dumort. 140.
aquaticum D. fl. 140.
arvense L. 143.
barbulatum Whlbg. 140.
Biebersteinii DC. 144.
brachypetalum Dsport. 140.
brachypetalum Lois. DC. 140.
campanulatum Viv. 142.
carinthiacum Vest. 143.
filifolium Vest. 134.
filiforme Schleich. 143.
flexuosum Hgtschw. 143.
glabratum Hartm. 143.
glaciale Gaud. 143.
glaciale Sturm. 143.
glomeratum Thuill. 140.
glutinosum Fries. 141.
grandiflorum W. K. 144.
grandiflorum β , *bannaticum* Roch. 144.
- Cerastium Grenieri* Schltz. 141.
Grenieri α , Schltz. 141.
Grenieri β , Schltz. 141.
lanatum Lmk. 143.
laricifolium Vill. 144.
latifolium L. 142.
latifolium γ , *intermedium* Gaud. 143.
latifolium δ , *subacaule* Gaud. 143.
litigiosum De Lens. 141.
macilentum Aspeg. 141.
manticum L. 139.
obscurum Chaub. 141.
ovale Bess. 141.
ovale Pers. 140.
ovatum Hopp. 143.
pedunculatum Gaud. 143.
pellucidum Chaub. 141.
praecox Ten. 142.
pumilum D. fl. 141.
refractum All. 137.
repens M. B. 144.
repens L. 144.
rotundifolium Denkschr. d. Reg. bot. Ges. 140.
semidecandrum L. 140.
semidecandrum Pers. 141.
Soleirolii Ser. 143.
Stellarioides Hartm. 137.
strictum Haenk. 144.
strictum L. 144.
strigosum Fries. 140.
suffruticosum L. 144.
sylvaticum W. K. 142.
tetrandum Curt. 141.
tomentosum Lej. 144.
tomentosum L. 144.
trigynum Vill. 137.
triviale Link. 141.
uniflorum Murr. 143.
viscidum Link. 141.
viscosum Fries. 140.
viscosum L. Herb. 141.
viscosum Pers. 141.
viscosum Poll. 140.
viscosum β , *glandulosum* v. Bönng. 142.
vulgatum Whlbg. 141.
vulgatum L. Herb. 140.
vulgatum β , *holosteoides* Fries. 142.

- Cerasus acida* Fl. d. Wett. 243.
Caproniana DC. 243.
Caproniana a. Montmorencyana DC. 243.
Chamaecerasus Hst. 244.
Duracina DC. 243.
dulcis Fl. Wett. 243.
effusa Hst. 243.
humilis Hst. 244.
intermedia Hst. 243.
Juliana DC. 243.
marasca Hst. 243.
Padus DC. 244.
Ceratocephalus Mönch. 12.
falcatus Fieb. 12.
falcatus Pers. 12. 1060.
orthoceras DC. 12. 1060.
spicatus Mönch. 12.
Ceratonia L. 240.
Siliqua L. 241.
CERATOPHYLLEEN. 289.
Ceratophyllum L. 289.
apiculatum Cham. 289.
demersum L. 289.
muticum Cham. 289.
oxyacanthum Cham. 289.
platycanthum Cham. 289.
submersum L. 289.
Ceratospermum papposum Pers. 721.
Cercis L. 241.
Siliquastrum L. 241.
Cerifolium sativum Bess. 368.
Cerinth L. 593.
alpina Kit. 593.
echioides Scop. 592.
glabra Gaud. 593.
glabra Scop. 593.
maculata Rehb. 593.
maculata M. B. 593.
major L. 593.
minor L. 593.
minor p. L. 593.
quinquemaculata Whlbg. 593.
suevica Mart. 593.
Cervaria alsatica Gaud. 355.
glauca Gaud. 355.
rigida Mönch. 355.
Rivini Gaertn. 355.
Ceterach alpinum DC. 1013.
Marantae DC. 1024.
Ceterach officinarum Willd. 1011.
Chaerophyllum L. 369.
alpinum Vill. 367.
aromaticum L. 370.
aureum L. 369.
bulbosum L. 369.
Cicutaria Vill. Rehb. 370.
Cicutaria B. Vill. 370.
elegans Gaud. 370.
hirsutum L. 370.
hirsutum Vill. 370.
Hadnikianum Rehb. 368.
maculatum Willd. 369.
monogonum Kit. 370.
nemorosum M. B. 367.
nodosum Lmk. 369.
odoratum Lmk. 371.
palustre Lmk. 370.
rostratum Lmk. 336.
sativum Lmk. 338.
sylvestre L. 337.
temulum L. 339.
trichospermum Schult. Lmk. 38.
Villarsii Koch. 370.
Chaeturus Hst. 676.
Marrubiastrum Rehb. 676.
Chamaecyparissus Tabernm. 1008.
Chamaeledon procumbens Lk. 564.
Chamaemelum Triumfetti All. 437.
Chamaenerion angustifolium Scp. 280.
obscurum Rb. 283.
palustre Scop. 281.
ramosissimum Mönch. 283.
Chamaeorchis Rich. 823.
alpina Rich. 823.
Chamaeplium officinale Wallr. 54.
Chamaerepes alpina Spr. 823.
Chamaagrostis Borkh. 928.
minima Borkh. 928.
Cheiranthus DC. L. 39.
alpinus Jcq. 60.
alpinus Lmk. 61.
Boccone All. 60.
cauus Pill. et Mitterb. 62.
Cheiri L. 39.
decumbens Schlech. 61.
erysimoides Jcq. 60.
erysimoides L. 60.
firmus Schlech. 59.

- Cheiranthus fruticosus** L. *mant.* 39.
helveticus Jcq. 62.
helveticus Schlecht. 61.
hieracifolius Lmk. 60.
maritimus L. 54.
ochroleucus Hall. fil. 61.
pallens Hall. fil. 61.
pumilus Schlecht. 61.
rhaeticus Schlecht. 60.
scapigerus Willd. 58.
sinuatus L. 39.
sylvestris Lmk. 58.
tristis Suffren. 39.
turritoides Lmk. 55.
varius Sibth. 39.
virgatus Poir. 62.
- Chelidonium** L. 34.
corniculatum L. 34.
Glaucium L. 34.
laciniatum Mill. 34.
laciniatum β . *fumariaefolium* DC. 35.
majus L. 34.
quercifolium Willem. 34.
- CHENOPODEEN.** 711.
- Chenopodium** L. 716.
acutifolium Kit. 718.
album Sm. 717.
album L. 717.
album var. *concatenatum* Thuill. 717.
ambrosioides L. 717.
arenarium Fl. Wtt. 715.
angustatum All. 716.
blitoides Lej. 719.
Bonus Henricus L. 719.
botryoides Sm. 719.
Botrys L. 718.
chrysomelanospermum Balb. 716.
ficifolium Sm. 717.
foetidum Lmk. 718.
fruticosum All. 712.
glaucum L. 719.
glomerulosum Rehb. 717.
birsutum Wbg. 716.
hybridum L. 716.
Intermedium D. Fl. 716.
lanceolatum Mer. 717.
leiospermum DC. 717.
- Chenopodium maritimum** L. 712.
melanospermum Wallr. 716.
murale L. 716.
olidum Curt. 718.
opulifolium Schrad. 717.
paganum Rehb. 717.
polyspermum L. 717.
rhombifolium Mühlb. 716.
rubrum L. 719.
Scoparia L. 715.
serotinum hort. berol. et L. amoen.? 717.
serotinum Hds. 717.
urbicum D. Fl. 716.
urbicum Engl. Bot. 716.
urbicum L. 716.
viride Curt. 717.
viride L. 717.
Vulcaria L. 718.
- Cherleria** L. 134.
imbricata Ser. 130.
octandra Sieb. 130.
sedoides L. 134.
- Chilochloa arenaria** Beauv. 926.
aspera Beauv. 927.
Boehmeri Bv. 927.
cuspidata Bv. 927.
Michellii Rehb. 927.
- Chimaphila umbellata** Nutt. 566.
- Chironia Centaurium** Schmidt 582.
Gerardi Schum. 583.
inaperta Willd. 583.
lutea Bert. 583.
maritima Bert. 583.
uliginosa W. K. 583.
Vaillantii Schum. 583.
- Chlora** L. 574.
acuminata Koch. et Z. 574.
perfoliata L. 574.
serotina Koch. 574.
- Chondrilla** L. 503.
acanthophylla Wallr. 507.
juncea L. 503.
latifolia M. B. 507.
muradisi Lmk. 509.
prenanthoides Vill. 507.
pulehra Lmk. 519.
purpurea Lmk. 507.
rigens Rehb. 507.
stipitata Schltz. 503.

- Chrysanthemum** L. 440.
alpinum L. 442.
alpinum β . *minimum* Gaud. 442.
atratum Gd. 440.
atratum L. 441.
atratum α . L. 440.
ceratophylloides All. 442.
coronarium L. 443.
coronopifolium Vill. 441.
corymbosum L. 442.
Halleri Sut. 441.
heterophyllum Willd. 440.
inodorum L. 443. 1072.
inodorum β . *maritimum* L. 445.
 1072.
lanceolatum Pers. 440.
Leucanthemum L. 440.
leucanthemum H. *alpin.* Gaud. 441.
macrophyllum W. et Kit. 442.
minimum Vill. 442.
montanum L. 441.
Parthenium Pers. 442.
segetum L. 443.
tomentosum Lois. 442.
Chrysocoma Linosyris L. 408.
Chrysopogon Gryllus Trin. 918.
Chrysosplenium L. 325.
alternifolium L. 325.
oppositifolium L. 325.
Chrysurus aureus Beauv. 943.
cynosuroides Pers. Host. 943.
Cicendia Adans. 582.
filiformis Rchb. 582.
Cicer L. 224.
arietinum L. 224.
ervoides Brign. 233.
Lens Willd. 232.
physodes Rb. 224.
sativum Rb. 224.
Cicerbita alpina Wallr. 512.
corymbosa Wallr. 509.
muralis Wallr. 509.
Cichorium L. 491.
Endivia L. 491.
Intybus L. 491.
Cicuta L. 329.
angustifolia Kit. 329.
maculata Lmk. 372.
major L. 372.
tenuifolia Fr. 329.
virosa L. 329.
Cicuta virosa β . *stricta* Schultz. 329.
Cimicifuga L. 29.
foetida L. 29.
Cineraria L. 446.
alpestris Hopp. 447.
alpestris Koch. 447.
alpina Hst. 453.
alpina Hds. 448.
alpina β . *alata* L. 453.
alpina γ . *integrifolia* L. 448.
arachnoides Rchb. 456.
aurantiaca Hopp. 448.
aurantiaca Willd. 449.
campestris DC. 448.
campestris Retz. Spreng. 448.
capitata Rchb. 449.
capitata Hopp. n. Hornsch. 449.
capitata Whlbg. Rchb. 449.
Clusiana Hst. 447.
cordifolia Gouan. 453.
cordifolia auriculata Jcq. 453.
crassifolia Kit. 448.
crispa Jcq. 446.
crocea Tratt. 447.
discoidea Hpp. 447.
integrifolia Skhr. 446.
integrifolia Sm. 448.
integrifolia Wallr. 448.
integrifolia alpina Jcq. 447.
integrifolia β . *pratensis* Jcq. 448.
longifolia Jcq. 447.
longifolia St. 448.
longifolia Rchb. 447.
ovirensis Koch. 447.
palustris L. 449.
papposa Rchb. 448.
pratensis Hpp. 447.
rivularis W. K. 446.
rivularis Rchb. 446.
Schkuhrii Rb. 447.
sibirica L. 449.
spathulaefolia Gmel. 448.
spathulaefolia Koch. 448.
tenuifolia Gaud. 448.
Zahlbruckneri Hst. 453.
Circaea L. 285.
alpina L. 286.
alpina β . *intermedia* DC. 285.
intermedia Ehrh. 285.
lutetiana L. 285.
Cirsium Trnf. 464. 1029.

- Cirsium Acarna** DC. 1036.
Acarna DC. Mönch. 470. 1037.
acaule All. 469. 1033.
acaule-oleraceum Näg. 1034.
acaule-spinosissimum Näg. 1049.
affine Tsch. 1052.
alpestre Näg. 1046.
ambiguum Koch. 1047.
ambiguum γ . *albidum* DC. 1048.
anglicum Link. 468.
anglicum Lobel. 1032.
argenteum Vest. 470. 1036.
arctioides Scp. 473.
arvense Scp. 469. 1035.
arvensi-palustre Näg. 1042.
autareticum Mutel. 1048.
bulbosum DC. 469. 1032.
bulbosum β . *pallens* Wilr. 1050.
bulboso-acaule Näg. 1045.
bulboso-oleraceum Näg. 1050.
bulboso-palustre Näg. 1039.
Candolleianum Näg. 1055.
canum All. 466. 1031.
canum M. B. 465. 1031.
cano-oleraceum Rehb. Näg. 1043.
carniolicum All. 468. 1033.
carniolicum Scop. 466. 1035.
Cervini Koch. 1048.
Chailleti Gaud. 465. 1031.
Chailleti Koch. 1031. 1042.
controversum DC. 1048.
decoloratum Koch. 1053.
defloratum Scp. 474.
eriphorum Scp. 465. 1029.
Erisithales Scp. 467. 1034.
Erisithali-heterophyllum Näg. 1047.
Erisithali-oleraceum Näg. 1055.
Erisithali-pannonicum Heer. 1043.
erucagineum DC. 1048. 1051.
flavescens Koch. 1054.
Freyerianum Koch. 466. 1042.
glutinosum Lmk. 467. 1034.
gregarium Boiss. 1034.
Hallerianum Gaud. 1043.
Heerianum Näg. 1045.
helenioides All. 463. 1033.
heterophyllum All. 463. 1033.
Cirsium heterophyllo-acaule Näg. 1036.
heterophyllo-oleraceum Näg. 1053.
heterophyllo-spinosissimum Näg. 1049.
hybridum Koch. 1041.
inermis Rehb. 1050.
incanum Fisch. 1036.
Kirschlegeri C. H. Schlitz. 1040.
Kocheanum Löhr. 1038.
Lachenalii Koch. 1050. 1051. 1053.
laciniatum Döll. 1038.
lacteanum Koch. 1041.
lanceolatum Scp. 464. 1029. 1030.
lanceolato-acaule Näg. 1038.
lanceolato-palustre Näg. 1037.
lanigerum Näg. 465. 1030.
medium All. 1045.
molle Scp. 479.
nemorale Rehb. 465. 1030.
ochroleucum All. 467. 1034.
ochroleucum DC. fl. fr. suppl. 467.
ochroleucum Näg. 467.
ochroleucum α . β . DC. fl. fr. 1034. 1051.
ochroleucum γ . *mixtum* DC. prodr. 1052.
oleraceum Scp. 468. 1035.
oleraceo-acaule Hmp. Näg. 1053.
oleraceo-arvense Näg. 1044.
oleraceo-bulbosum Näg. 1050. 1051.
oleraceo-heterophyllum Näg. 1052.
oleraceo-lanceolatum Schlitz. 1050.
oleraceo-palustre Näg. 1041.
oleraceo-ramosum Näg. 1050.
oleraceo-rivulare DC. 1051.
pallens DC. 1050.
palustre Scp. 465. 1030.
palustre β . *putatum* Näg. 1031.
palustri-acaule Hmp. 1040.
palustri-bulbosum DC. Näg. 1038.
palustri-Erisithales Näg. 1040.
palustri-oleraceum Näg. 1041.
palustri-rivulare Näg. 1039.

- Cirsium pannonicum* Gaud. 466. 1031.
pannonico-acaule Näg. 1042.
pannonico - Erisithales Näg. 1043.
pannonico-palustre Koch. 1012.
parviflorum DC. 1041.
pauciflorum Koch. 1047.
pauciflorum Sprg. 467. 1047.
praemorsum Mich. 1031.
pratense DC. 469. 1032.
purpureum All. 1048.
pygmaeum Sep. 478.
ramosum Näg. 469. 1032.
rigens Gaud. Willr. 1031. 1033.
rigens var. *laevigatum* Gaud. 1048.
rivulare Link. Jcq. 468.
rivulare All. 1033.
rivulari acaule Näg. 1045.
rivulari - heterophyllum Näg. 1047.
rivulari - palustre Näg. 1039.
rivulari - spinosissimum Näg. 1048.
rufescens Ram. 466. 1035.
semidecurrens Richt. Rehb. 1038.
semipectinatum DC. 1031.
semipectinatum Rehb. 1031.
serratuloides Sep. 466. 1031.
setosum MB. 470. 1036.
spathulatum Gaud. 465. 1029.
spinosissimum Sep. 467. 1035.
spinosissimum-acaule Näg. 1049.
spinosissimum - alpestre Näg. 1048.
spinosissimum-Erisithales Koch. 1054.
spinosissimum - heterophyllum Näg. 1048.
spinosissimum - oleraceum Näg. 1055.
spinosissimum-rivulare Näg. 1048.
spurium Hfin. 1032.
subalatum Thom. 1041.
subalpinum Gaud. 1039.
subalpinum β . *lacteum* Gaud. 1041.
tataricum DC. 1053.
tataricum Wim. et Grab. 1043.
Thomasii Näg. 1055.
tricephalodes Lmk. 468. 1033.
- Cirsium tuberosum* All. 469. 1032.
Zizianum Koch. 1045.
- CISTINEEN.** 90.
- Cistus** L. 90.
anglicus L. 92.
apenninus L. 93.
canus Jcq. 92.
creticus L. 91.
grandiflorus Scop. 93.
helianthemoides Crtz. 92.
Helianthemum L. 92.
hirsutus Hds. 92.
hirsutus Lej. 92.
linearis Lej. 93.
marifolius Sm. 92.
monspeliensis L. 90.
mutabilis Jcq. 93.
plantagineus Willd. 91.
pilosus α . L. 93.
polifolius L. 93.
pulverulentus Lej. 93.
quartus Clus. 93.
salicifolius L. 92.
salvifolius L. 90.
Segneri Crtz. 92.
serpillifolius Crtz. 92.
serpillifolius L. 92.
serratus Cav. 91.
serratus Dsf. 91.
surrejanus L. 93.
tomentosus Sep. 93.
villosus Wulf 91.
vinealis Willd. 92.
- Claudio** Patrick. Brw. 878.
germanicum Schrad. D. Fl. 878.
Mariscus R. Brw. 878.
- Clematis** L. 2.
alpina Lmk. 3.
caespitosa Scop. 2.
erecta All. 2.
Flammula Brkh. 2.
Flammula L. 2.
fragrans Ten. 2.
inclinata Scop. 2.
integrifolia L. 2.
maritima Lmk. 2.
recta L. 2.
scandens Borkh. 2.
sepium Lmk. 2.
Vitalba L. 2.

- Clematis Viticella* L. 3.
Clinopodium L. 662.
 aegyptiacum Lmk. 662.
 vulgare L. 662.
Clypeola L. 70.
 Jonthlaspi L. 70.
 maritima L. 69.
Cnicus *Acarna* L. 470. 1036.
 acaulis Willd. 469. 1034.
 acauli-oleraceus Schied. 1033.
 acauli-tuberosus Schied. 1045.
 ambiguus Schlecht. 1047. 1048.
 antareticus Lois. 1043.
 Cervini Thom. 1048.
 dubius Willd. 469. 1034.
 eriophorus Rth. 465. 1029.
 Erisithales L. 467. 1034.
 heterophyllus Willd. 463. 1033.
 hybridus Schlecht. 1052.
 Lachenalii Gmel. 1050.
 lacteus Schlecht. 1041.
 lanceolatus Willd. 465. 1030.
 nudiflorus Schlecht. 1041.
 oleraceus L. 463. 1035.
 oleraceo-rivularis Schied. 1051.
 palustris Willd. 453. 1031.
 palustri-oleraceus Schied. 1041.
 palustri-rivularis Schied. 1039.
 palustri-tuberosus Schied. 1038.
 parviflorus Heller. 1041.
 pauciflorus W. K. 467. 1047.
 pratensis Willd. 469.
 pygmaeus L. 478.
 rigens Ait. 1043.
 rivularis Willd. 468. 1033.
 saanensis Schlecht. 1051.
 salisburgensis Willd. 468. 1033.
 semipectinatus Schlecht. 1051.
 setosus Bess. 470. 1035.
 spathulatus Moench. 1029.
 spinosissimus L. 1035.
 spurius Hoffm. 469. 1032.
 tataricus Bess. 1043.
 tuberosus Willd. 469. 1032.
 tuberosus-oleraceus Schied. 1050.
Cnidium Cuss. 346.
 alsaticum Spr. 345.
 apioides Spr. 346.
 confertum Moench. 346.
 Monnerti Cuss. 346.
 palustre Rehb. 347.
Cnidium venosum Koch. 346.
Cochlearia L. 75.
 anglica L. 76.
 Armoracia L. 77.
 auriculata Lmk. 76. 87.
 brevicaulis Facch. 77.
 Coronopus L. 86.
 danica L. 76. 1054.
 danica s. integrifolia DC. 76.
 Draba L. 82.
 groenlandica Hst. 76. 1063.
 groenlandica L. 76. 1063.
 officinalis L. 75. 1063.
 pyrenaea DC. 76. 1053.
 rusticana Lmk. 77.
 saxatilis Lmk. 76.
Coeloglossum Hrtm. 820.
 viride Hrtm. 820.
COLCHICACEEN. 861.
Colchicum L. 862.
 alpinum DC. 862.
 arenarium W. K. 862.
 autumnale L. 862.
 autumnale γ. Bert. 862.
 montanum All. 862.
 patens Schultz. 862.
 vernale Hoffm. 862.
Coleanthus Seid. 929.
 subtilis Seid. 929.
Colpodium aquaticum Trin. 963.
Colutea L. 211.
 alpina Lmk. 212.
 arborescens L. 211.
 australis Lmk. 212.
 frigida Poir. 212.
 hirsuta Roth. 211.
 orientalis Du Roi 211.
Comarum L. 250.
 fragarioides Roth. 258.
 palustre L. 250.
COMPOSITEN. 404.
Condylcarpus apulus Hoffm. 360.
CONIFEREN. 786.
Conioselinum Fisch. 349.
 Fischeri Wimm. et Gr. 350.
 tataricum Fisch. 350.
Conium L. 372.
 croaticum W. K. 372.
 maculatum L. 372.

- Conringia orientalis** Andrz. 62.
Thaliana Rehb. 57.
Convallaria L. 839.
bifolia L. 840.
bracteata Thm. 840.
latifolia Jcq. 840.
majalis L. 840.
multiflora L. 840.
Polygonatum L. 840.
verticillata L. 840.
CONVOLVULACEEN. 584.
Convolvulus L. 584.
althaeoides L. 585.
argyreus DC. 585.
arvensis L. 585.
cantabrica L. 585.
sepium L. 584.
Soldanella L. 584.
sylvaticus W. Kit. 584.
sylvestris Willd. 584.
tenuissimus Sibth. 585.
villosus Lej. 585.
Conyza squarrosa L. 417.
Corallorrhiza Hall. 828.
Halleri Rich. 828.
innata R. Brw. 828.
Coreopsis *Bidens* L. 420.
Coriandrum L. 374.
Cicuta Crtz. 372.
sativum L. 374.
testiculatum L. 374.
Corispermum L. 714.
canescens Kit. 714.
hyssopifolium L. 714.
intermedium Schweig. 714.
Marschallii Stev. 714.
nitidum Kit. 714.
purpurascens Hst. 714.
squarrosum L. 714.
CORNEEN. 375.
Cornus L. 375.
mas L. 375.
sanguinea L. 375.
suecica L. 375.
Coronilla L. 220.
coronata DC. 221.
coronata Jcq. Scop. 221.
coronata L. 221.
coronata minor Rehb. 221.
cretica L. 221.
Coronilla Emerus L. 220.
minima Jcq. 221.
minima L. 221.
minima α . β . Lmk. 221.
montana Scop. 221.
parviflora Mönch. 222.
scorpioides Koch. 221.
Securidaca L. 223.
vaginalis Lmk. 220.
varia L. 222.
Coronopus depressus Mönch. 86.
didymus Sm. 86.
pinnatus Horn. 86.
Ruellii All. 86.
vulgaris Dsf. 86.
Corrigiola L. 297.
littoralis L. 297.
Cortusa L. 698.
Matthioli L. 698.
Corydalis DC. 35.
acaulis Pers. 36.
acaulis β . Rehb. 36.
bulbosa DC. 35.
capnoides L. 37.
capnoides Ledeb. 1061.
capnoides α . DC. 36.
capnoides β *lutea* DC. syst. 36.
cava Schweig. et Kört. 35.
claviculata Pers. 37.
digitata Pers. 35.
fabacea Pers. 35.
Gebleri Ledeb. 1061.
intermedia Mer. 36.
Lobellii Tsch. 36.
lutea DC. Fl. franc. 36.
ochroleuca Koch. 36.
pumila Hst. 36.
solida Sm. 35.
tuberosa DC. 35.
Corylus L. 759.
Avellana L. 759.
Columna 760.
tubulosa Willd. 760.
Corynephorus Beauv. 945.
canescens Beauv. 945.
Cotinus Coggyria Scop. 174.
Cotoneaster Medik. 275.
tomentosa Lindl. 275.
vulgaris Lindl. 275.
Cotula L. 431.
coronopifolia L. 431.
Cotyledon Umbilicus Huds. 309.

- Cotyledon Umbilicus** β . L. 309.
Craepalia temulenta Schrk. 988.
Crambe L. 89.
 Corvini All. 87.
 laciniata Lmk. 89.
 maritima L. 89.
 Tataria Jcq. 89.
 tatarica Willd. 89.
Crassula L. 300.
 caespitosa Cav. 301.
 Magnoli DC. 301.
 rubens L. 300.
 rubens Sturm. 304.
CRASSULACEEN. 299.
Crataegus L. 275.
 Aria α . L. 279.
 Aria α . *scandica* L. 279.
 Aria β . fl. *suec.* 279.
 Aria β . *Gaud.* 278.
 Azarolus L. 275.
 dentata Thuill. 279.
 kyrtostyla Fgh. 275.
 latifolia Lmk. 279.
 monogyna Fgh. 275.
 monogyna Jcq. 275.
 oxyacantha L. 275.
 terminalis L. 279.
Crepis L. 513.
 Adonis Spr. 517.
 agrestis Fries. 518.
 agrestis W. K. 519.
 albida Vill. 513.
 alpestris Tsch. 516.
 apargioides Willd. 504.
 aurea Cass. 516.
 austriaca Jcq. 521.
 biennis L. 517.
 biennis α . *Wimm. et Gr.* 517.
 biennis var. *bannatica* Roch. 517.
 blattarioides Vill. 521.
 bulbosa Cass. 516.
 cernua Ten. 519.
 chrysantha Froel. 517.
 cinerea Dsf. 514.
 chondrilloides Jcq. 517.
 diffusa DC. 518.
 Dioscoridis DC. 521.
 Dioscoridis Pollich. 518.
 foeniculacea Froel. 517.
 frigida Schlitz. 517.
 Frulichiana DC. 516.
 globifera Hall. fil. 521.
 grandiflora Willd. 521.
 grandiflora Link. 521.
 grandiflora Tsch. 521.
 graveolens Bernh. 514.
 hieracioides W. K. 520.
 hispida W. K. 515.
 hyoseridifolia Tsch. 522.
 Jacquini Tsch. 519.
 incarnata Tsch. 516.
 incarnata Vis. 514.
 jubata Koch. 517.
 Lachenalii Gmel. 514.
 Lachenalii Gochn. 518.
 lodomiriensis Bess. 517.
 montana Tsch. 522.
 neglecta L. 519.
 neglecta L. *Sm. Bert.* 519.
 nivacensis Balb. 517. 1073.
 paludosa Mönch. 528.
 pinnatifida Willd. 518.
 polymorpha Wallr. DC. 518. 519.
 praecox Balb. 515.
 pruerosa Tsch. 515.
 pulchra L. 519.
 pygmaea L. 520.
 rhoeoifolia M. B. 514.
 rubra L. 514.
 scabra DC. 518.
 scabra Willd. 514.
 scariosa Willd. 515.
 setosa Hall. fil. 515.
 sibirica L. 521.
 sibirica *Gouan.* 521.
 stricta Schultz. 518.
 stricta Scop. 519.
 suevicaefolia Tsch. 520.
 taraxacifolia Thuill. 514.
 taurinensis Willd. 514.
 tectorum L. 518.
 tectorum Pollich. 518.
 tectorum Vill. 514.
 tectorum β *segetalis* Roth. 518.
 vesicaria Balb. 514.
 vesticaria L. 515.
 vesicaria Willd. 515.
 virens L. 518.
 virens Vill. DC. 518.

- Critamus** *agrestis* Bess. 332.
heterophyllus D. Fl. 332.
Crithmum L. 349.
maritimum L. 349.
pyrenaicum L. 346.
Crocus L. 830.
albiflorus Hopp. et Hsch. 830.
biflorus Mill. 830.
luteus Lmk. 830.
reticulatus β . M. B. 830.
sativus All. 830.
sativus Scop. 830.
sativus β . *vernus* L. 830.
variegatus Hpp. et Hsch. 830.
vernus All. 830.
vernus, *grandiflorus* Gay. 830.
vernus, *parviflorus* Gay. 830.
vernus var. β . Sturm. 830.
Crucianella L. 382.
angustifolia L. 382.
latifolia L. 382.
molluginoides M. B. 382.
CRUCIFEREN. 38.
Crupina Pers. 488.
vulgaris Pers. 488.
Crypsis Ait. 925.
aculeata Ait. 925.
alopecuroides Ait. 925.
schoenoides Ait. 925.
Cryptogramma *crispa* R. Brwn. 1025.
Cucubalus L. 115.
alpinus Lmk. 119.
Antelopum Vst. 119.
baccifer Gärtn. 115.
bacciferus L. 115.
Behen L. 119.
chloranthus Willd. 113.
glaucus Willd. 119.
horizontalis Mönch. 115.
italicus L. 117.
mollissimus W. K. 117.
Otites L. 118.
parviflorus Ehrh. 118.
parviflorus Lmk. 118.
Pumilio L. 119.
silenoides Vill. 117.
tataricus L. 118.
viscosus L. 117.
Cucumis L. 294.
Melo L. 294.
Cucumis *sativus* L. 294.
Cucurbita L. 293.
Melopepo L. 293.
Pepo L. 293.
CUCURBITACEEN. 293.
Cupressus L. 788.
sempervirens L. 783.
CUPULIFEREN. 757.
Cuscuta L. 585.
Epithimum Weih. 586.
Epithimum L. syst. 585.
europaea L. 585.
europaea γ . *Epithimum* L. spec. pl. 586.
hassica Pf. 586.
lupuliformis Krock. 586.
major DC. 585.
major Koch. et Z. 586.
minor DC. 586.
monaggya Vhl. 586.
planiflora Ten. 586.
tubulosa Presl. 585.
vulgaris Pers. 585.
vulgaris Presl. 586.
Caviera *europaea* Koel. 985.
Cyathæa *anthriscifolia* Rth. 1019.
cynapifolia Rth. 1019.
dentata Sm. 1018.
fragilis Rth. 1018.
fragilis Sm. 1019.
incisa Engl. bot. 1019.
montana Rth. 1020.
regia Rth. 1019.
regia Sm. 1019.
Cyclamen L. 699.
coum Mill. 699.
europæum Mill. 699.
hederifolium Ait. 699.
hederifolium Ten. 699.
neapolitanum Ten. 699.
repandum Sibth. 699.
vernum Bert. 699.
Cydonia Tournes. 276.
lusitanica Mill. 276.
maliformis Mill. 276.
oblonga Mill. 276.
vulgaris Pers. 276.
Cymbalaria *muralis* Fl. d. Wett. 615.
Cynanchum R. Brw. 570.

- Cynanchum acutum** L. 571.
contiguum Koch. 571.
fuscatum Link. 572.
laxum Bartl. 571.
medium R. Brw. 571.
nigrum Hst. 571.
Vincetoxicum R. Brw. 571.
Cynara L. 470.
Cardunculus L. 470.
Scolymus L. 470.
Cynodon Rich. 923.
Dactylon Pers. 923.
Cynoglossum L. 583.
bicolor Willd. 588.
cheirifolium Scop. 588.
ereticum Vill. 588.
Dioscoridis Vill. 588.
Lappula Scop. 587.
montanum Link. 588.
officinale L. 588.
officinale γ. Link. 588.
omphalodes L. 588.
pictum Ait. 583.
scorpioides Haenk. 589.
sylvaticum Haenk. 588.
Cynosurus L. 964.
aureus L. 943.
caeruleus L. 940.
cristatus L. 964.
distichus Hoffm. 941.
durus L. 935.
echinatus L. 964.
microcephalus Hoffm. 941.
ovatus Hopp. 941.
sphaerocephalus Wulf. 941.
CYPERACEEN. 874.
Cyperus L. 875.
australis Schrad. 877.
badius Dsf. 876.
esculentus L. 876.
flavescens L. 875.
fuscus L. 875.
glaber L. 876.
glaber Sturm. 876.
glomeratus L. 877.
longus L. 876.
longus β. Bert. 876.
Monti L. 877.
pannonicus L. 877.
pictus Ten. 876.
serotinus Rutb. 877.
Cyperus tenuiflorus Rutb. 876.
ibermalis Dum. 876.
virescens Hoffm. 876.
Cypripedium L. 829.
Calceolus L. 829.
Cystea angustata Sm. 1019.
dentata Sm. 1018.
fragilis Sm. 1019.
regia Sm. 1019.
Cystopteris Bernh. 1018.
alpina Link. 1019.
fragilis Bernh. 1018.
montana Link. 1019.
regia Presl. 1019.
CYTINEEN. 740.
Cytinus L. 741.
Hypocistis L. 741.
Cytisus L. 179.
alpinus Mill. 179.
argenteus L. 183.
argyreus Rehb. 182.
austriacus L. 180.
biflorus L'Hérit. 182.
biflorus W. K. 182.
bisflorens Hst. 181.
canescens Presl. 180.
capitatus Jcy. 181.
ciliatus Whlbg. 181.
cinereus Hst. 182.
elongatus W. K. 182.
emerifolius Rehb. 180.
falcatus W. K. 182.
glabrescens Sart. 180.
hirsutus L. Scop. Hst. 181.
holopetalus Fischm. 183.
Laburnum L. 179.
lanigerus DC. 180.
leucanthus W. K. 181.
nigricans L. 179.
polytrichus M. B. 182.
prostratus Scop. 181.
purpureus Scop. 182.
quintus Clus. 180.
radiatus (Spartium) L. 183.
ramentaceus Sieb. 179.
ramosissimus Ten. 182.
ratishonensis Schff. 182.
sagittalis (Genista) L. 183.
septimus Clus. 181.
sessilifolius L. 180.
spinescens Sb. 182.

- Cytisus spinosus* Lmk. 180.
supinus Bertol. 181.
supinus DC. 181.
supinus Jcq. 182.
supinus α . L. 181.
supinus β . L. 182.
supinus β . Willbg. 182.
virgatus Vest. 182.
Weldeni Vis. 179.
Czackia Liliastrum Andr. 846.

D.

- Dactylis* L. 964.
altaica Bess. 964.
cristata M. B. 941.
distichophylla Brign. 964.
glaucescens Willd. 964.
glomerata L. 964.
hispanica Rth. 964.
littoralis Willd. 964.
maritima Schrad. 964.
memphitica Spr. 966.
stricta Ait. 929.
Dactylon officinale Vill. 929.
sanguinale Vill. 929.
Danthonia DC. 952.
alpina Vest. 953.
calycina Rehb. 953.
decumbens DC. 953.
provincialis DC. 952.
strigosa Beauv. 946.
Daphne L. 735.
alpina L. 735.
Blagayana Frey. 735.
Cneorum L. 736.
Cneorum Willbg. 736.
Cneorum γ . D. Fl. 736.
collina Sm. 735.
Laureola L. 735.
Mezereum L. 735.
striata Tratt. 736.
Datura L. 602.
Stramonium L. 602.
Tatula L. 602.
Daucus L. 383.
Carota L. 383.
platycarpus Sc. 364.
Delphinium L. 25.
alpinum W. K. 26.
Clusianum Hst. 26.
Consolida L. 26.

- Delphinium cuneatum* Stev. DC. 26.
elatum All. 26.
elatum L. 26.
fissum W. K. 26.
hirsutum Rth. 26.
hybridum L. Herb. 23.
hybridum Willd. 26.
hybridum M. B. 25.
intermedium Ait. 26.
intermedium DC. 25.
montanum DC. 26.
palmatifidum DC. 26.
paniculatum Hst. 26.
speciosum M. B. 26.
urceolatum Jcq. 26.
Staphysagria L. 27.
Dens leonis Desf. 505.
Dentaria L. 52.
bulbifera L. 53.
digitata Lmk. 52.
emacaphyllos L. 52.
glandulosa W. K. 52.
heptaphyllos Vill. 53.
ochroleuca Gd. 52.
pentaphyllos Sc. 52.
pentaphyllos β . γ . L. 52.
pinnata Lmk. 53.
polyphylla Gaud. 52.
polyphylla W. K. 52.
trifolia W. K. 52.
Deschampsia caespitosa Beauv. 943.
Deyeuxia acutiflora Kunth. 935.
neglecta Kunth. 935.
sylvatica Kunth. 935.
varia Kunth. 935.
Dianthus L. 409.
acuminatus Tsch. 114.
alpestris Balb. 111.
alpestris Ppp. Stb. 114.
alpinus L. 112.
alpinus DC. 112.
alpinus Sturm. 112.
arenarius L. 114.
arenarius Thor. 114.
Armeria L. 110.
asper Lej. 111.
asper Rehb. 111.
asper Willd. 111.
atrorubens All. 110.
atrorubens Gd. 110.

- Dianthus atrorubens** M. B. 110.
Balbisii Ser. 111.
barbatus L. 110.
caesi Sm. 113.
capitatus DC. 110.
Carthusianorum All. 111.
Carthusianorum L. 110.
Carthusianorum β . *atrорubens* DC. 110.
caryophylloides Rehb. 113.
Caryophyllus L. 113.
Caryophyllus γ . *inodorus* L. 113.
ciliatus Guss. 112.
ciliatus Ten. 112.
collinus Balb. 111.
collinus Gaud. 111.
collinus W. K. 111.
controversus Gd. 111.
Courtoisii Rb. 111.
deltoides L. 112.
deltoides β . Sm. 112.
diminutus L. 109.
diutinus Kit. 110.
diutinus Rehb. 110.
erubescens Trv. 114.
Fischeri Spr. 111.
frigidus Bot. Ztg. 113.
gallicus Pers. 114.
geminiflorus Ls. 111.
glacialis DC. 112.
glacialis Haenk. 112.
glaucophyllus Hornem. 111.
glaucus Hds. 113.
glaucus L. 112.
hirtus Lmk. 110.
hortensis Schrd. 114.
lithuriticus Barth. 111.
litoralis Hst. 112.
monspeliacus L. 114.
monspessulanus L. 114.
montanus M. B. 111.
moschatus Mey. 114.
neglectus Lois. 111.
odoratus Vest. 114.
plumarius L. 113.
plumosus Spr. 114.
polymorphus M. B. 110.
prolifer L. 109.
racemosus Vis. 112.
scaber Schleich. 111.
Scheuchzeri Rb. 113.
- Dianthus Segueri** Rb. 111.
Segueri Vill. 111.
Segueri Wulf. 111.
serotinus W. K. 114.
Steinbergii Schleich. 111.
superbus L. 114.
supinus Lmk. 112.
sylvaticus Hpp. 111.
sylvestris Wulf. 112.
tener Balb. 112.
vaginatus Rb. 110.
vaginatus Vill. 110.
velutinus Guss. 109.
virginicus Hst. 113.
virginicus Jcq. 113.
virginicus L. 113.
virginicus β . L. 113.
Waldsteinii Stbg. 114.
- Diapensia helvetica** L. 688.
- Dichostylis fluitans** Rehb. 881.
Micheliana N. ab E. 885.
- Dictamnus** L. 169.
albus Link. 169.
Fraxinella Pers. 169.
Fraxinella β . *obtusiflorus* Koch. tschb. 1054.
obtusiflorus Koch. 169, 1054.
- Digitalis** L. 612.
ambigua Lindl. 613.
ambigua Murr. 612.
ambigua Sturm. 613.
ambiguo-lutea Mey. 613.
ferruginea L. 614.
lucata Ehrh. 614.
fuscescens W. K. 613.
grandiflora Lmk. Rehb. 612.
grandiflora Rb. 613.
intermedia Prs. 613.
laevigata W. K. 613.
lanato - (*laevigato* -) *ambigua* Mey. 613.
longiflora Lej. 612.
lutea L. 613.
lutea Poll. 613.
lutea γ *hybrida* Lindl. 613.
lutescens Lindl. 614.
media Roth. 613.
ochroleuca Jcq. Rehb. 613.
ochroleuca Lindl. 613.
purpurascens Roth. 612.
purpurea L. 612.
purpureo-lutea Mey. 612.

- Digitaria ciliaris* Koel. 920.
filiformis Koel. 920.
sanguinalis Scop. 920.
stolonifera Schrad. 929.
- DIOSCOREEN.** 541.
- Diospyros* L. 567.
Lotus L. 568.
- Diotis atriplicina* Spr. 721.
Atriplicoides M. B. 721.
ceratoides Willd. 721.
- Diplachne serotina* Link. 964.
- Diplopappus annuus* Bl. Fgh. 411.
dubius Gaud. 411.
dysentericus Bl. Fgh. 419.
pulicarius Bl. Fgh. 419.
- Diplostaxis* DC. 65.
brevicanlis Bl. Fgh. 66.
muralis DC. 65.
tenuifolia DC. 65.
viminea DC. 66.
- DIPSACEEN.** 396.
- Dipsacus* L. 397.
ferox 397.
Fullonum Mill. 397.
fullonum Poll. 397.
fullonum α . L. 397.
laciniatus L. 397.
pilosus L. 397.
sylvestris Mill. 397.
sylvestris β . pinnatifidus D. Fl. 397.
vulgaris Gmel. 397.
- Donax arundinaceus* Beauv. 939.
borealis Trin. 972.
festucaceus Beauv. 972.
- Dondia Epipactis* Spr. 327.
- Dondisia Epipactis* Rehb. Mösl. 327.
- Doronicum* L. 443.
austriacum Jq. 444.
austriacum Hl. Clus. 445.
Bauhini Saut. 445.
Bellidiastrum L. 410.
causasicum Rorh. 444.
Clusii Tsch. 445.
Columnae Ten. 444.
Columnae DC. 444.
cordifolium Stbg. 444.
Halleri Tsch. 446.
Jacquini Tsch. 445.
- Doronicum latifolium* Clus. 444.
longifolium Rb. 445.
macrophyllum Fisch. 444.
Matthioli Tsch. 444.
orientale Adms. 444.
Pardalianches L. 380. α . L. 443.
Pardalianches Tsch. Rehb. 444.
Pardalianches α L. 445.
styriacum IV. Clus. 445.
scorpioides Willd. 444.
scorpioides Wimm. et Grab. 445.
- Dorycnium* Trnf. 207.
herbaceum Vill. 203.
hirsutum DC. 208.
intermedium Ledeb. 203.
monspeliacum Willd. 208.
pentaphyllum Rb. 203.
sabaudum Rb. 208.
suffruticosum Vill. 208.
- Draba* L. 71.
affinis Hst. 71.
aizoides L. 71.
aizoides St. 71.
aizoon Whlbg. 71.
androsacea Whlbg. 74.
androsacea Willd. 74.
arabiformis Hohenw. 47.
austriaca Crtz. 72.
carinthiaca Hpp. 73.
ciliaris Whlbg. 74.
ciliata Scop. 74.
confusa D. fl. 75.
confusa Ehrh. 75.
contorta Ehrh. 75.
dubia Sut. 72.
elongata Hst. 71.
fladnizensis DC. 74.
fladnizensis Gaud. 74.
fladnizensis Wulf. 74.
frigida Saut. 72.
glacialis Hopp. et Hsch. 72.
helvetica Schleich. 74.
hirta Gaud. 73.
hirta Jq. 72.
Hoppeana Rb. 72.
Hoppeana Rdlph. 73.
Hoppii Trachs. 73.
incana L. 75.
Joannis Hopp. 73.

- Draba Johannis* Hst. 73.
lactea Adam. 74.
laevigata Hpp. 74.
lapponica Willd. herb. 74.
lasiocarpa Koch. 71.
Liljebladii Wallm. 73.
mollis Scop. ? 47.
mollis St. 47.
muralis L. 74.
muricella Whlbg. 73.
nemoralis Ehrh. 74.
nemorosa All. 74.
nivalis DC. 73.
nivalis Liljebl. 73.
nivalis Ser. 74.
pyrenaica L. 71.
rubra Crtz. 71.
ruderalis Bng. 82.
saxatilis Koch. bot. Ztg. 72.
Sauteri Hopp. 72.
sclerophylla Gd. 74.
spatulata Lang. 75.
Spitzelii Hopp. 72.
stellata Jcq. 72.
stellata Saut. 72.
stellata Koch. bot. Ztg. 72.
stellata β . *hebecarpa* DC. 73.
Thomasii Koch. 75.
tomentosa Wbg. 72.
Traunsteineri Hpp. 73.
verna L. 75.
Wahlenbergii Hartm. 73.
Zahlbruckneri Hst. 71.
- Dracocephalum* L. 664.
austriacum L. 665.
Moldavica L. 665.
Russchiana L. 665.
- Drepanophyllum* *agreste* Hoffm. 332.
sioides Wib. 332.
- Drosera* L. 103.
anglica Hds. 101.
intermedia Hb. 104.
longifolia L. 104.
longifolia Sm. 104.
obovata M. K. 104.
rotundifolia L. 103.
rotundifolia-*anglica* Schled. 104.
- DROSERACEEN.** 103.
- Dryas* L. 246.
octopetala L. 246.
- Drypis* L. 124.
spinosa L. 124.
- E.**
- EBENACEEN.** 567.
- Ecballion* Rich. 294.
agreste Rehb. 294.
Elaterium Rich. 294.
- Echinaria* Dsf. 939.
capitata Dsf. 940.
- Echinochloa* Crns. *galli* Beauv. 920.
- Echinophora* L. 372.
spinosa L. 372.
- Echinops* L. 464.
exaltatus Schr. 464.
Ritro L. 464.
sphaerocephalus L. 464.
- Echinopsilon* *hirsutum* Moq. Tand. 716.
- Echinosperrum* Swartz. 587.
deflexum Lehm. 587.
Lappula Lehm. 587.
squarrosus Rh. 587.
- Echium* L. 593.
altissimum Jcq. 594.
asperrimum M. B. 594.
italicum L. 594.
pustulatum Sibth. 594.
rubrum Jcq. 594.
violaceum L. 594.
vulgare L. 593.
Wierzbickii Haberl. 594.
- Edraianthus* A. DC. 558.
Kitaibelii A. DC. 558.
tennifolius A. DC. 558.
- Ehrharta clandestina* Wigg. 929.
- ELAEAGNEEN.** 740.
- Elaeagnus* L. 740.
angustifolia L. 740.
- Elaterium cordifolium* Münch. 294.
- Elatine* L. 145.
alata Fl. sedio. 145.
Alsinastrum L. 145.
hexandra DC. 145.
Hydropiper DC. 145.
Hydropiper L. 145.
Hydropiper β . L. 145.

- Elatine major** Braun. 145.
Schkuhriana Drev. et Hayn. 145.
triandra Schk. 145.
tripetala Sm. 145.
ELATINEEN. 144.
Eleocharis atropurpurea Kunth. 880.
Eleogenus ovatus N. ab. Esenb. 879.
Eleogiton fluitans Link. 881.
Eleusine dura Lmk. 955.
Elodea canadensis Michx. 794.
Elodes palustris Spach. 157.
Elsholtzia Willd. 648.
cristata Willd. 649.
Elymus L. 984.
arenarius L. 984.
caninus Leers. 983.
caninus L. 984.
crinitus Schrb. 985.
europaeus L. 985.
intermedius M. B. 985.
Elyna Schrad. 887.
caricina D. Fl. 883.
spicata Schrad. 888.
EMPETREEN. 742.
Empetrum L. 742.
nigrum L. 742.
Endymion Dumort. 860.
nutans Dum. 860.
Enodium caeruleum Gaud. 963.
Ephedra L. 786.
distachya L. 787.
Epilobium L. 280.
alpestre Rb. 284.
alpestre Schm. 284.
alpinum L. 284.
alsinefolium Vill. 284.
amplexicaule Lmk. 281.
anagallidifolium Lmk. 284.
angustifolium Lmk. 281.
angustifolium α . β . γ . L. 280. 281.
angustissimum Ait. 281.
angustissimum Rb. ic.? 281.
aquaticum Thuill. 281.
collinum Gmel. 282.
denticulatum Wender. 281.
Dodonaei Vill. Gaud. 281.
Epilobium *Fleischeri* Hochst. 281.
Gesneri Vill. 280.
grandiflorum All. 231.
hirsutum All. 282.
hirsutum L. 281.
hirsutum β . *intermedium* DC. 231.
hypericifolium Tsch. 282.
intermedium Merat. 281.
latifolium Rth. 230.
Lamyi Schlitz. 1063.
lanceolatum Sebast. 232. 1068.
molle Lmk. 282.
montanum L. 282.
montanum β . *alpestre* Jcq. 284.
montanum β . *ramosissimum* DC. 232.
montanum β . *minus* Wimm. et Gr. 282.
nudum Schumach. 283.
nutans Hornem. 284.
nutans Tsch. 284.
obscurum Laasch. 1069.
obscurum Rehb. Fl. exsc. 233.
obscurum Rehb. ic. 283.
origanifolium Lmk. 284.
palustre L. 282.
parviflorum Schrb. 281.
pubescens Rth. 282.
ramosum Hds. 231.
rivulare Rehb. 282.
rivulare Whlbg. 282.
roseum Fries. 283.
roseum Schreb. 283.
roseum γ . *trigonum* DC. 284.
rosmarinifolium Haenk. 281.
Schmidtianum Rostk. 282.
simplex Tratt. 282.
spicatum Lmk. 280.
tetragonum L. 283.
tetragonum Rehb. ic. 283.
trigonum Schrk. 283.
villosum Ait. 282.
virgatum Fries. 282. 1068.
Epimedium L. 31.
alpinum L. 31.
Epiactis Rich. 826.
cordata All. 827.
ensifolia Swrtz. 826.
grandiflora Sm. 826.
latifolia All. 826.

Epipactis latifolia β . *rubiginosa* Gaud. 826.
media Fries. 826.
microphylla Ehrh. 826.
Nidus avis All. 827.
ovata All. 827.
pallens Swartz. 826.
palustris Crtz. 827.
rubiginosa Gaud. 826.
rubra All. 826.

Epipogium Gmel. 825.
aphyllum Bl. Fgh. 825.
Gmelini Rich. 825.

EQUISETACEEN. 999.

Equisetum L. 1000.
amphibolium Retz. 1001.
arvense L. 1000.
arvense β . Schltz. 1000.
arvense β . *alpestre* Whlbg. 1000.
arvense α . *serotinum* Mey. 1000.
arvense γ . *decumbens* Mey. 1000.
arvense γ . *nemorosum* Alex. Brn. Doell. 1000.
campestre Schltz. 1000.
Drummondii Hook. 1001.
eburneum Rth. 1001.
Ehrharti Mey. 1001.
elongatum Willd. 1003.
fluviatile L. 1001.
fluviatile Sm. 1001.
fluviatile Whlbg. 1002.
hyemale L. 1003.
hyemale A. *vulgare* Doell. 1003.
hyemale C. *elongatum* Doell. 1003.
illyricum Hpp. 1003.
limosum L. 1002.
limosum L. *succ.* Whlbg. 1002.
Mackii Newm. 1003.
paleaceum Schlecht. 1004.
pannonicum Willd. 1003.
palustre L. 1002.
pratense Ehrh. 1001.
pratense Roth. 1000.
procerum Pollin. 1003.
prostratum Hpp. 1002.
ramosissimum Desf. 1003.
ramosissimum Humb. et Bonpl. 1003.

Equisetum ramosum DC. 1003.
ramosum Schlecht. 1002.
repens α . Whlbg. 1004.
repens β . *variegatum* Whlbg. 1004.
scirpoides Mich. 1004.
sylvaticum L. 1001.
sylvaticum β . *minus* Whlbg. 1001.

Telmateja Ehrh. 1000.
tenue Hpp. 1004.
trachydodon Alex. Brn. 1003.
uliginosum Mühlbg. 1002.
umbrosum Mey. 1001.
variegatum Schlecht. 1004.

Eragrostis Beauv. 954.
major Hst. 954.
megastachya Link. 954.
minor Hst. 955.
pilosa Beauv. 955.
poaeformis Link. 955.
poaeoides Beauv. 954.
Eranthis Salisb. 22.
hyemalis Salisb. 22. 1061.
Erianthus Rich. 917.
Ravennae Beauv. 917.

Erica L. 562.
arboorea L. 563.
carnea L. 563.
ciliaris Hds. 562.
cinerea L. 563.
herbacea L. 563.
humilis Neck. 563.
lusitanica Rth. 563.
multiflora 563.
mutabilis Salisb. 563.
scoparia Wulf. 563.
Tetralix L. 562.
vagans L. *mont.* 563.
vulgaris L. 562.

ERICINEEN. 561.

Erigeron L. 411.
acere droebachense Schlecht. 412.
arvensis L. 411.
acris Weih. 411.
acris β . *angustatus* Hartm. 412.
alpinus L. 412.
angulosus Gd. 412.
annuus Pers. 411.
atticum Vill. 412.

- Erigeron bellidioides** Spenn. 411.
canadensis L. 411.
corymbosus Willr. 411.
droebachensis Mill. 412.
elongatus Ledeb. 412.
glabratus Hpp. 412.
grandiflorus Hpp. 412.
graveolens L. 418.
intermedius Trehs. 412.
podolicus Bess. 411.
podolicus Rb. 411.
rupestris Bl. Fgh. 412.
rupestris Hpp. 412.
serotinus Weih. 411.
uniflorus L. 412.
Villarsii Bllrd. 412.
viscosum L. 419.
- Erinus** L. 618.
alpinus L. 618.
- Eriophorum** L. 886.
alpinum L. 886.
angustifolium Rth. 887.
angustifolium Sm.? 887.
angustifolium α . congestum D. fl. 887.
angustifolium β . laxum M. et K. 887.
angustifolium β . longifolium Hpp. 887.
angustifolium γ . alpinum Gaud. 887.
caespitosum Hst. 886.
capitatum Hst. 886.
gracile Koch. 887.
gracile Sm. 887.
latifolium Hpp. 887.
polystachyum α . β . L. 887.
polystachyum β . Vaillantii Dub. 887.
polystachyum γ . L. 887.
polystachyum Sm.? 887.
pubescens Sm. 887.
Scheuchzeri Hpp. 887.
triquetrum Hpp. 887.
vaginatum L. 886.
Vaillantii Koch Tschb. 887.
Vaillantii Poit. et Turp. 887.
- Eritrichium** Schrad. 593.
Hacquetii Koch. 599.
nanum Schrad. 593.
- Erodium** L'Herit. 163.
cicutarium Willd. 163.
cicutarium α . γ . Sm. 163.
malacoides Willd. 163.
moschatum L'Herit. 163.
- Erophila americana** DC. 73.
præcox Rb. Stev.? 75.
vulgaris DC. 73.
- Eruca** DC. 66.
Erucastrium Fl. d. Wett. 65.
sativa Lmk. 66.
- Erucago aspera** Hornem. 83.
glandulosa Rhl. 83.
runcinata Hornem. 83.
- Erucastrium** Schimp. et Spn. 61.
incanum Koch. 65.
inodorum Rchb. 65.
obtusangulum Reich. 64.
Pollitii Schimp. et Spn. 65.
- Ervum** L. 231.
cassubicum Peterm. 225.
Ervilia L. 232.
gracile DC. 231.
hirsutum L. 231.
Lens L. 232.
Lenticula Schreb. 233.
longifolium Ten. 232.
monanthos L. 232.
nigricans M. B. 232.
pisiforme Peterm. 225.
soloniense L. 232.
sylvaticum Peterm. 225.
tenuifolium Lagasc. 232.
tenuissimum Pers. 232.
tetraspermum L. 231.
uniflorum Ten. 232.
- Eryngium** L. 328.
alpinum L. 329.
amethystinum L. 328.
campestre L. 328.
maritimum L. 329.
planum L. 329.
- Erysimum** L. 58.
Alliaria L. 56.
altissimum Lej. 58.
angustifolium Ehrh. 62.
arcuatum Opitz. 1018.
austriacum Bng. 62.
Barbarea L. 42.
campestre Scop. 62.
canescens Roth. 60.

- Erysimum carniolicum** Dollin. 59.
cheiranthoides L. 58.
Cheiranthus Pers. 60.
Cheiranthus Presl. 60.
Cheiranthus firmus Rb. Schlch. 59.
cheiriflorum Wallr. 59.
crepidifolium Rb. 59.
diffusum Ehrh. 60.
durum Presl. 58.
helveticum Gd. DC. 61.
helveticum DC. 61.
hieracifolium Jcq. 59.
hieracifolium Herb. L. DC. 59. 60.
hieracifolium Ehrh. 59.
hieracifolium L. soc. 53.
lanceolatum DC. Gd. 59.
lanceolatum R. Brw. 59. 60.
longisiliquosum Rehb. 58.
longisiliquosum Schleich. 58.
micranthum Bk. 58.
murale Dsf. 60.
ochroleucum DC. 61.
odoratum Ehrh. 59.
odoratum Koch. et Z. 60.
odoratum R. Brwn. 1063.
officinale L. 54.
orientale R. Brwn. 62.
pallens Koch. 60. 61.
pallens Wallr. 60.
paenonicum a. Crtz. 59.
perfoliatum Crtz. 62.
pumilum Gaud. 61.
ramosissimum Crtz. 59.
repandum L. 59.
rheticum DC. 60.
strictum DC. 59.
strictum Fl. d. Wett. 58.
strictum β . *odoratum* DC. 59.
suffruticosum Spr. 61.
suffruticosum DC. 61.
virgatum DC. 59.
virgatum Lej. 61.
virgatum Rb. 58.
virgatum Schleich. 58.
virgatum juranum Gaud. 59.
- Erythraea** Ren. Rich. 582.
angustifolia Wallr. 582.
capitata R. S. 582.
centaureum Pers. 532.
- Erythraea compressa** Hayn. 582.
grandiflora 582.
inaperta Schld. 583.
linariaefolia Pers. 582.
littoralis Fries. 582.
maritima Pers. 583.
pulchella Fries. 583.
ramosissima Pers. 583.
spicata Pers. 583.
- Erythronium** L. 844.
Dens Canis L. 844.
- Esmarchia cerastoides** Rehb. 141.
- Eucledium** R. B. 86.
syriacum R. B. 84.
- Eufragia linifolia** Column. 647.
- Eupatorium** L. 404.
cannabinum L. 405.
- Euphorbia** L. 744.
acuminata Lmk. 752.
amygdaloides L. 748.
angulata Jcq. 746.
arvensis Schleich. 752.
caespitosa Tn. 751.
Cajocala Ehrh. 748.
canescens L. 744.
carniolica Jcq. 746.
Chamaesyce L. 744.
Characias L. 749.
Characias Wlf. 749.
coralloides L. 748.
coscinosperma Rehb. 751.
Cyparissias L. 749.
diffusa Jcq. 752.
dabia Dierbach. 745.
dulcis L. 745.
dulcis Rehb. 747.
dulcis Sm. 747.
epithymoides L. 747.
Esula L. 749.
Esula Poll. 748.
exigua L. 752.
exigua β . *retusa* Roth. 752.
exigua γ . Lois. 752.
falcata L. 752.
flavicauda DC. 747.
foetida Hpp. 745.
fragifera Jam. Rb. 747.
Gerardiann Jcq. 749.
glareosa M. B. 751.
helioscopia L. 745.
Lathyrus L. 753.

- Euphorbia linariaefolia** Lmk. 748.
linifolia Ten. 751.
literata Jeq. 745.
lucida W. K. 750.
lucida α . *latifolia* Wimm. et Gr. 750.
lucida β . *salicifolia* Wimm. et Gr. 750.
lucida γ . *linarifolia* Wimm. et Gr. 750.
massiliensis DC. 744.
micrantha M. B. 745.
mollis Gmel. 748.
multicaulis Thuill. 751.
Myrsinites L. 751.
nicaeensis All. 751.
obscura Lois. 752.
oleaefolia Gouan. 751.
palustris L. 747.
pannonica Hst. 748.
paralia Sm. 751.
Paralias L. 751.
Peplis L. 744.
peploides Gouan. 751.
Peplus L. 752.
pilosa Bert. 745.
pilosa M. B. 748.
pineae L. Guss. 751.
platyphylla L. 744.
platyphyllos Koch. 745.
portlandica Hds. 750.
procera M. B. 747.
procera Rchb. 748.
pubescens Vhl. 745.
pulverulenta Kit. 748.
purpurata Thuill. 746.
ragusana Rchb. 751.
rotundifolia Lois. 752.
rubra Cav. 752.
rubra DC. 752.
salicifolia Hst. 750.
saxatilis Jeq. 750.
segetalis L. 751.
serotina Hst. 751.
solissequa Rb. 746.
spinosa Wulf. 747.
stricta L. 745.
sylvatica Jeq. 748.
sylvatica Ten. 748.
tricuspidata Lpr. 752.
uralensis Fisch. 750.
- Euphorbia verrucosa** DC. 747.
verrucosa Lmk. 746.
verrucosa L. 747.
veneta Willd. 748.
villosa W. K. 748.
virgata W. K. 750.
Wulfenii Hpp. 749.
- EUPHORBIACEEN.** 743.
- Euphrasia** L. 644.
alpina DC. 646.
caerulea Tsch. 645.
lanceolata Gd. 647.
latifolia L. 644.
linifolia L. α . β . Brot. 647.
lutea L. 646.
micrantha Rb. 645.
minima Schlecht. 645.
nemorosa Rb. 645.
nemorosa β . *pectinata* Rchb. 645.
Odontites L. 646.
Odontites β . L. 646.
officinalis Hayn. 645.
officinalis var. *A. pratensis* Fries. 645.
officinalis L. 645.
officinalis, *alpestris* Wimm. et Gr. 645.
officinalis β . *nemorosa* Pers. 645.
officinalis, *nemorosa* β . *neglecta* Wimm. et Gr. 645.
pratensis Rb. 645.
pratensis α . Rb. 645.
Rostkoviana Hayn. 645.
salisburgensis Funk. 646.
serotina Lmk. 646.
stricta Hst. 645.
tennifolia Pers. 647.
tricuspidata L. 646.
verna Bellard. 646.
viscosa L. 647.
- Eurotia** Adans. 720.
ceratoides Mey. 721.
- Eva** Grtn. 414.
pygmaea Pers. 414.
umbellata Grtn. 414.
- Evonymus** L. 170.
europaeus L. 170.
latifolius Scop. 171.
verrucosus Scop. 171.

Evonymus vulgaris Scop. 171.
Exacum filiforme Willd. 532.

F.

- Facchinia* Rehb. 129.
lanceolata Rehb. 129.
Fagopyrum dumetorum v. Bngh. 734.
Fagus L. 758.
castanea L. 758.
sylvatica L. 758.
sylvatica β . Willd. 758.
Falcaria Hst. 332.
latifolia Hst. 333.
Rivini Hst. DC. 332.
Farsetia R. Brw. 69.
clypeata R. Brw. 70.
incana R. Brw. 69.
Fedia Auricula DC. 396.
auricula β . *dasycarpa* Rb. ic. 396.
campanulata Presl. 395.
carinata D. Fl. 394.
coronata Vahl. 396.
dasycarpa Stev. 395.
dentata D. Fl. Vahl. 395.
dentata M. B. et plurim. auct. 395.
dentata β . D. fl. 395.
dentata β . *dasycarpa* Rb. ic. 395.
discoidea Rb. 396.
echinata Vahl. 394.
eriocarpa D. Fl. 395.
laxiflora R. S. 396.
Locusta Rb. ic. 394.
Locusta β . *lasiocarpa* Rb. 394.
microcarpa Rb. 395.
Morisonii Spr. 395.
muricata R. S. 395.
olitoria Gaertn. 396.
olitoria Vahl. 394.
puberula Bert. 395.
pumila Rehb. 396.
rugulosa Stev. 395.
striata Stev. 394.
tridentata Rb. 396.
tridentata Stev. M. B. 396.
Ferula campestris Bess. 353.
Ferulago L. 353.
galbanifera Lobel. 353.
Ferula nodiflora Jcq. 353.
rablensis Wulf. 356.
sulcata β . DC. 353.
Ferulago Koch. 352.
galbanifera Koch. 352.
nodiflora Koch. 353.
Festuca L. 965.
acuminata Gd. 970.
adscendens Retz. 973.
alpina Gaud. 968.
alpina Hst. 970.
alpina Strm. Sut. 967.
amethystina Hst. 968.
arenaria Osbek. 969.
arundinacea Liljbl. 972.
arundinacea Schreb. 973.
baltica Hohm. 969.
barbata Schrk. 969.
borealis M. K. 972.
bromoides D. Fl. et plurim. auct. 967.
caerulea DC. 963.
caespitosa Dsf. 974.
calamaria Sm. Hst. 971.
calamaria β Hook. 971.
capillata Lmk. 968.
ciliata Auct. 966. 1076.
ciliata Dant. 966.
ciliata Gonan. 975.
cinerea DC. 969.
cristata L. 942.
cristata Vill. 941.
curvula Gaud. 968.
decidua Sm. 971.
decolorans M. K. 973.
decumbens L. 953.
diandra Mönch. 975.
distans Kunth. 962.
divaricata Dsf. 966.
donacina Whlbg. 972.
drymnia M. K. 971.
dumetorum L. 969.
dumetorum Rafin. 969.
dura Vill. 953.
dura Host. 968.
duriuscula Btrl. 968.
duriuscula Hst. 968.
duriuscula L. spec. 968.
duriuscula L. syst. 969.
duriuscula α . Schrad. 969.
duriuscula β . *curvula* Gd. 968.
duriuscula γ . *laevigata* Gd. 968.

- Festuca elatior* L. suec. 973.
elatior Sm. 973.
elongata Ehrh. 973.
Eskia Ramond 970.
exaltata Presl. 972.
flavescens Bellard. 970.
fluitans L. 962.
Gaudini Kunth. 968.
gigantea Vill. 972.
glauca Lmk. 968.
glauca Schrad. 968.
glomerata All. 964.
gracilis Mönch. 974.
Halleri All. 967.
heterophylla Lmk. Haenk. 969.
hirsuta DC. 942.
hirsuta Hst. 968.
Hostii Kunth. 963.
inermis DC. 979.
Lachenalii Spenn. 963.
laevigata Clairv. 968.
latifolia Hst. 971.
laxa Hst. 970.
Leysseri Mönch 979.
lofiacea Hds. 973.
monostachya Poir. 973.
montana Rb. 972.
montana Sav. 979.
montana Stb. Hpp. 960.
myuros Auct. 966.
myuros Ehrh. et Auct. 967.
myuros L. 966.
myurus Soy. Will. 966.
nemorum Leyss. 969.
nigrescens Lmk. 969.
nigricans Schleich. 969.
nutans Hst. 972.
nutans Whlbg. 972.
ovina D. Fl. 968.
ovina L. 967.
ovina Schrad. 968.
ovina var. *vivipara* 969.
pal lens Hst. 968.
paludosa Gd. 968.
palustris Sns. 963.
pannonica Hst. 969.
phalaroides Lmk. 964.
phleoides Vill. 942.
Phoenix Thuill. 973.
pilosa Hall. fil. 970.
pinnata Mönch. 974.
Poa Kunth. 965.
Festuca poaeformis Hst. 970.
pratensis Hds. 973.
Pseudo - Myuros Soy. Will. 966.
pulchella Schrad. 972.
pumila Vill. 970.
pungens R. S. 968.
rhactica Sut. 970.
rigida Kunth. 965.
rotthoeloides Kunth. 955.
rubra L. 969.
rubra β . *arenaria* Fries. 969.
rubra γ . *lanuginosa* Koch. 969.
Scheuchzeri Gd. 972.
sciuroides Roth. 967.
serotina L. 964.
spadicea L. 971.
spadicea Mönch. 973.
spadicea β . *memorosa* Poll. 971.
speciosa Schreb. 979.
spectabilis Jan. 971.
splendens Presl. 942.
stricta Hst. 968.
sylvatica Hst. 972.
sylvatica Stbg. 971.
sylvatica Hds. 974.
sylvatica Vill. 971.
tenuicula Kunth. 965.
tenuiflora Schrad. 965.
tenuitolia Sibth. 968.
thalassica Kunth. 963.
triflora Engl. Bot. 972.
uniglumis Soland. 966.
uniglumis Soy. Will. 966.
vaginata Willd. 968.
valesiaca Schleich. 968.
varia Haenk. Gaud. 969.
violacea Gd. 968.
xanthina R. S. 970.
Ficaria ranunculoides Roth. 18.
verna Hds. 18.
Ficus L. 755.
carica L. 755.
Filago L. 421.
acaulis All. 414.
arvensis L. 422.
arvensis Whlbg. 422.
arvensis DC. 422.
gallica L. 422.
germanica L. 421.
germanica β . *pyramidata* DC. 421.

- Filago** *Leontopodium* L. 424.
minima Fries. 422.
montana DC. 422.
montana Gaud. et mult. auct. 422.
montana L. suec. 422.
montana Willbg. 422.
pygmaea L. 414.
pyramidata Gaud. L. 421.
- FILICES.** 1009.
- Filicula regia** *Fumariae* pinnulis Vaill. 1019.
- Fimbristylis** Vahl. 886.
annua R. S. 886.
dichotoma Vahl. 836.
- Foeniculum** Hoffm. 343.
officinale All. 313.
vulgare Gaertn. 313.
- Fosselina** *Jonthlaspi* All. 70.
- Fragaria** L. 248.
chiloensis Ehrh. 249.
collina Ehrh. 249.
efflagellis Duchesn. 249.
elatior Ehrh. 249.
grandiflora Ehrh. 249.
Hagenbachiana Lang. 249.
Majaneke Ser. 249.
monophylla Duchesn. 249.
sterilis L. 258.
sylvestris Duchesn. 249.
vesca L. 248.
vesca β . L. suec. 249.
vesca β . pratensis L. spec. 249.
vesca γ L. suec. 249.
villosa Crtz. 255.
virginiana Ehrh. 250.
- Frangula vulgaris** Rb. 174.
Wulfenii Rb. 173.
- Fraxinus** L. 569.
atrovirens Dsf. 569.
aurea Willd. 569.
excelsior L. 569.
florifera Scop. 570.
heterophylla Vahl. 570.
Ornus L. 570.
oxyphylla M. B. 570.
simplicifolia Willd. 569.
- Fritillaria** L. 842.
Meleagris L. 843.
montana Hpp. 842.
involuta All. 842.
- Fritillaria pyrenaica** DC. 842.
tenella M. B. 842.
tenella Rehb. 842.
- Fumaria** L. 37. 1061.
acaulis Wulf. 36.
agraria Lag. 33. 1061.
bulbosa α . L. 35.
bulbosa β . γ . L. 35. 36.
calycina Babgt. 1063.
capnoides L. 34.
capnoides Scop. 36.
capreolata L. 37. 1061.
cava Mill. 35.
densiflora DC. 1063.
fabacea Retz. 36.
Halleri Willd. 35.
intermedia Ehrh. 36.
lutea L. 36.
major Badar. 1062.
media Aut. bot. 1062.
media DC. 1062.
media Lois. 38. 1062.
micrantha Lagasc. 1062.
muralis Sond. 1061.
officinalis L. 38. 1062.
ollicinalis tenuifolia Fries. 1062.
parviflora Lmk. 38. 1063.
Petteri Rehb. 37. 1061.
solida L. mscr., Sm., Ehrh. 35.
tenuifolia Fl. d. Wett. 38.
Vaillantii Lois. 38. 1062.
Wirtgeni Koch. 1062.
- FUMARIACEEN.** 35.
- G.**
- Gagea** Salisb. 849.
arvensis Schlt. 850.
arvensis subuniflora Rb. 850.
bohemica Schult. 850.
Clusiana Tsch. 851.
Liottardi Schult. 850.
lutea Schult. 851.
minima Schult. 851.
pratensis Koch. 849.
pratensis R. S. 849.
pratensis γ . R. S. 849.
pusilla Schult. 851.
saxatilis Koch. 850.
Schreberi Rb. 849.

- Gagea spathacea* Schult. 850.
stenopetala Rb. 849.
Galanthus L. 838.
nivalis L. 838.
Galasia Cass. 503.
villosa Cass. 503.
Galatella Cass. 410.
cana Nees ab Esenb. 410.
canescens Cass. 410.
Galega L. 211.
officinalis L. 211.
Galeobdolon Hds. 667.
luteum Hds. 667.
vulgare Pers. 667.
vulgare β . *montanum* Pers. 667.
Galeopsis L. 667.
angustifolia Ehrh. 668.
bifida a Bugh. 669.
canescens Schlt. 668.
cannabina Gmel. 669.
cannabina Poll. 668.
cannabina Rth. 669.
dubia Leers. 668.
Galeobdolon L. 667.
grandiflora Bl. Fgh. 668.
grandiflora Roth. 668.
intermedia Vill. 668.
Ladanum L. 668.
Ladanum Rb. 668.
Ladanum α . *latifolia* Wimm. et Gr. 668.
Ladanum β . *angustifolia* Wimm. et Gr. 668.
latifolia Hfin. 668.
mollis Tsch. 669.
ochroleuca Lmk. 668.
parviflora Lmk. 668.
prostrata Vill. 668.
pubescens Bess. 669.
segetum Rehb. 668.
Tetrahit L. 668.
Tetrahit β . L. 669.
versicolor Curt. 669.
versicolor Spenn. 669.
villosa Hds. 668.
Walterina Schld. 669.
Galinsoga Ruiz. 419.
parviflora Cav. 419.
parviflora DC. 419.
quinqueradiata Ruiz. 419.
Galinsoga parviflora Willd. 419.
Galium L. 383.
Galium agreste α . *echinospermum* Wallr. 385.
agreste β . *leiospermum* Wallr. 385.
alpestre R. S. 389.
anglicum Hds. 385.
anglicum α . Koch. 385.
anglicum β . *litigiosum* Koch. 385.
anisophyllum Vill. 389.
Aparine L. 384.
argentum Vill. 389.
aristatum Gd. 387.
aristatum L. 387.
aristatum Trev. 387.
aristatum Sm. 388.
asperum Schrb. 389.
austriacum Jeq. 389.
baldense Spr. 390.
Bauhini R. S. 383.
Boccone All. 389.
Bocconi DC. 389.
boreale L. 386.
boreale β . γ . D. Fl. 386.
campanulatum Vill. 382.
cinerum All. 388.
cinerum Schleich. 388.
cinerum Sm. 388.
corudaefolium Vill. 388.
Cruciata Scop. 383.
cruciatum Sm. 383.
divaricatum Lmk. 1071.
erectum Sm. 388.
glaucum L. 382.
gracile D. Fl. 383.
gracile Wallr. 385.
Halleri R. S. 383.
helveticum Weig. 390.
hercynicum Weig. 389.
hispidum Rth. 385.
hyssopifolium Hoffm. 386.
hypnoides Vill. 390.
infestum W. K. 385.
insubricum Gd. 387, 1071.
Jussieui Vill. 390.
laeve Thuill. 389.
laevigatum L. 387.
laevigatum Vill. 387.
linifolium Lmk. 387.
litigiosum DC. 385.
lucidum All. 388.
minimum R. et S. 1071.

- Galium minutiflorum** Brot. 383.
Mollugo L. 387.
 montanum Hds. 389.
 montanum Poll. 382.
 montanum Vill. 389.
 montanum With. 385.
 mucronatum Lmk. 388.
 multicaule Wallr. 389.
 multicaule *a.* polyphyllum Willr. 389.
 multicaule eriophyllum Wallr. 389.
murale DC. 1071.
 nitidulum Thuill. 389.
 obliquum Vill. 388.
 obliquum Wulf. 388.
 ochroleucum Kit. 383.
 ochroleucum Wolf., Wimm. et Grab. 387.
palustre L. 385.
pariense L. 385. 1071.
 pariense Tsch. 385.
pedemontanum All. 383.
 pedemontanum DC. 384.
pumilum Lmk. 389.
 pumilum β . laxius D. Fl. 390.
 pumilum β . caespitosum DC. 390.
 pumilum γ . hirtum D. Fl. 390.
 pumilum δ . pubescens DC. 390.
 pumilum β . hirtellum Gd. 390.
purpureum L. 387.
 pusillum L. 389. 390.
 pyrenaicum L. 390.
 retrorsum DC. 384.
 rigidum Vill. 388.
rotundifolium L. 386.
rubroides L. 386.
 rubroides Poll. 386.
rubrum L. 388.
 rubrum Poll. 385.
 rupicola Bert. 390.
saccharatum All. 384.
saxatile L. 388.
 saxatile Sm. 389.
 saxatile Sut. 390.
 scabrum Jcq. 389.
 scabrum Pers. 389.
 spurium L. 385.
 spurium Roth. 384.
 supinum Lmk. 389.
sylvaticum L. 387.
- Galium sylvaticum** Vill. 387.
 sylvaticum β . pubescens DC. 387.
sylvestre Poll. 389.
 sylvestre hirtum D. Fl. 389.
 sylvestre virens Gaud. 390.
 sylvestre vulgatum Gaud. 389.
 sylvestre 1. glabrum Schrad. 389.
 sylvestre 2. alpestre Gd. 389.
 sylvestre 2. hispidum Schrad. 389.
 sylvestre 3. Boccone Gd. 389.
 sylvestre 3. pubescens Schrad. 389.
 sylvestre 4. supinum Gd. 389.
 sylvestre δ . D. Fl. 389.
 sylvestre ϵ . supinum D. Fl. 389.
 tenerum Schleich. 384.
 tenuifolium All. 388.
 tenuifolium Wulf. 388.
 trichophyllum All. Wulf. 389. 390.
tricornue With. 384.
trifidum L. 384.
 tyrolense Willd. 388.
uliginosum L. 385.
 umbellatum *a.* et β . Lmk. 389.
 Vaillantii DC. 385.
 Valantia Wigg. 384.
vernum Scop. 383.
 verosimile R. S. 386.
 verrucosum Sm. 384.
verum L. 386.
 Villarsii Req. 390.
 Witheringii Sm. 385.
- Gastridium** Beauv. 936.
 australe Beauv. 936.
lentigerum Gd. 936.
 muticum Sprg. 936.
 scabrum Presl. 936.
 Gatyona globulifera Cass. 521.
- Gandinia** Beauv. 930.
fragilis Beauv. 930.
- Gaya** Gaud. 349.
simplex Gaud. 349.
- Genista** L. 176.
anglica L. 178.
 anxantica Ten. 177.
 arcuata Koch. 178.
 dalmatica Bartl. 178.
 decumbens Willd. 176. 177.

- Genista diffusa* Willd. 176.
elatior Koch. 177.
genuensis Pers. 177.
germanica L. 178.
Halleri Revn. 176.
hirsuta Vahl. 179.
hispanica L. 178. 179.
hispanica Wlf. 178.
holopetala Rehb. 183.
humifusa Wlf. 176.
jannensis Viv. 177.
nervata Kit. 178.
ovata W. K. 177.
pedunculata L'Her. 176.
pilosa L. 176.
procumbens W. K. 176.
prostrata Lmk. 176.
pubescens Lang. 177.
radiata Scop. 183.
sagittalis L. 183.
scariosa Viv. 177.
sericea Wulf. 177.
sibirica L. 177.
sylvestris Sep. 178.
tinctoria L. 177.
triangularis Willd. 177.
triquetra W. K. 177.
virgata Bias. 177.
virgata Willd. 177.
Gentiana L. 575.
acaulis L. 578.
acaulis a. β. L. 578.
acaulis Vill. 578.
aestiva R. S. 579.
alpina Vill. 578.
Amarella L. 581.
Amarella Poll. 581.
Amarella Willd. 581.
angulosa M. B. 579.
angustifolia Rb. 577.
angustifolia Vill. 578.
asclepiadea L. 577.
axillaris Rb. 565.
bavarica L. 578.
brachyphylla Vill. 578. 1074.
campanulata Jcq. 577.
campestris L. 580.
carinthiaca Froel. 575.
carnica Welw. 577.
Centaurium L. 582.
Centaurium β. L. 583.
Charpentieri Thom. 576.
Gentiana chloraefolia Nees
ab Es. 580.
ciliata L. 582.
cruciata L. 577.
excisa Presl. 578.
filiformis L. 582.
frigida Ike. 577.
Froelichii Jan. 577.
Froelichii Hladn. 577.
Gaudiniana Thom. 576.
germanica Willd. 580.
glacialis Abr. Thom. 581.
Hladnikiana Hst. 577.
hybrida Schleich. 575.
imbricata Frl. 579.
imbricata Schleich. 578.
Koenigii Gunn. 581.
lutea L. 575.
maritima L. 583.
montana Nees ab Es. 581.
nana Wulf. 581.
nivalis L. 580.
obtusifolia Rb. ic. 581.
obtusifolia Willd. 581.
pannonica Gaud. 576.
pannonica Sep. 576.
perfoliata L. 574.
Pneumonanthe L. 577.
prostrata Ike. 580.
prostrata Wbg. 578.
pulehella Swartz. 583.
pumila Jcq. 579.
punctata L. 576.
punctatae-lutea Grseb. 576.
punctatae-purpurea Grseb. 576.
purpureae-lutea Grseb. 575.
purpurea L. 576.
purpurea Schrk. 576.
pyramidalis N. ab Es. 581.
rotundifolia Hpp. 578.
rubra Clairv. 575.
spathulata Brtl. 581.
spicata L. 583.
tenella Rottb. 581.
tergloviensis Harq. 579. 1074.
tetragona Rth. 581.
Thomasii Hall. fil. Gillab. 575.
uliginosa Willd. 581.
uniflora Willd. 580.
utriculosa L. 580.
utriculosa Whlbg. 579.
verna L. 579.

Gentiana verna β . *angulosa*

Whlbg. 579.

verna γ . *imbricata* D. Fl. 579.

GENTIANEEN. 573.

Geranium aureum Rb. 516.

chondrilloides Rb. 520.

croaticum Rb. 520.

incarnatum Rb. 516.

paludosum Rb. 520.

parviflorum Rb. 516.

praemorsum Rb. 516.

succisaefolium Rb. 520.

GERANIACEEN. 159.

Geranium L. 160.

aconitifolium L'H. 161.

argenteum L. 162.

bohemicum Krock. 164.

bohemicum L. 163. 1064.

chaerophyllum Cav. 163.

ciconium L. spec. 165.

cicutarium L. Sm. Roth. 165.

columbinum L. 163.

dissectum L. 163.

divaricatum L. 164.

lividum L'Hrit. 160.

lucidum L. 164.

macrorrhizum L. 160.

malacoides L. 166.

malvaceum Whlbg. 164.

malvaefolium Sep. 163.

molle Fl. d. Wett. 162.

molle L. 161.

moschatum L. 165.

nodosum L. 161.

palustre L. 161.

parviflorum Curt. 163.

phaeum L. 160.

pratense L. 161.

purpureum Vill. 164.

pusillum Fl. d. Wett. 164.

pusillum L. 163.

pyrenaicum L. 162.

robertianum L. 164.

robertianum δ . Gand. 164.

rivulare Vill. 161.

rotundifolium L. 163.

rotundifolium Poll. 163.

sanguineum L. 162.

sibiricum L. 162.

sylvaticum L. 161.

Geranium umbrosum W. K.

162.

viscidulum Frs. 164.

Winterli Rth. 164.

Genm L. 246.

chamaedryfolium Crtz. 246.

hybridum Wlf. 247.

inclinatum Schlecht. 247.

intermedium Ehrh. 246.

intermedium Schlecht. 245.

montanum L. 247.

reptans L. 247.

pyrenaicum Ramond. 247.

rivale L. 246.

rubifolium Lej. 246.

Tournefortii Lap. 247.

urbanum L. 246.

Gifola vulgaris Cass. 421.

Githago segetum Dsf. 124.

Gladialis L. 831.

Boncheanus v. Schild. 831.

communis L. 831.

communis Sibth. Sm. 832.

communis Wim. 831.

galiciensis Bess. 832.

illyricus Kch. 832.

imbricatus L. 832.

italicus Gd. 832.

Ludovicæ Jan. 832.

neglectus Schl. 831.

palustris Gd. 831.

pratensis Dietr. 831.

rossicus Pers. 832.

segetum Gawl. 832.

tennis M. B. 831.

Glancium Trnf. 34.

corniculatum Curt. 34.

flavum Crtz. 34.

fulvum Sm.? 34.

luteum Scop. 34.

phoeniceum Grtn. 34.

rubrum Rehb. 34.

tricolor Bernh. Rb. 34.

Glaux L. 700.

maritima L. 700.

Glechoma L. 664.

hederacea L. 664.

hederacea β . *major* Gand. 664.

heterophylla Opitz. 664.

hirsuta W. K. 664.

Marrubiastrum Vill. 671.

Globularia L. 700.

Globularia cordifolia L.
700.

nudicaulis L. 700.

vulgaris L. 700.

GLOBULARIEEN. 700.

Glyceria R. Brw. 962.

airoides Rb. 933.

aquatica Presl. 963.

aquatica Wbg. 962.

arundinacea Fries. 972.

capillaris D. Fl. 962.

capillaris Wbg. 962.

distans Whlbg. 962.

festucaeformis Haynh. 962.

fluitans M. K. 932.

maritima M. K. 963.

plicata Fries. 962.

rigida Sm. 936.

spectabilis M. K. 962.

Glyzorrhiza L. 210.

glabra L. 211.

Gnaphalium L. 422.

alpinum L. 424.

alpinum Sturm. Gd. et plur.
auct 424.

angustifolium Lmk. 425.

arenarium L. 425.

arenarium β . *aurantiacum* Pers.
425.

arvense Lmk. 422.

carpathicum Whlbg. 424.

dioicum L. 421.

fuscum Pers. 423.

fuscum Lmk. 423.

fuscum Sep. 423.

fuscum Willd. 423.

gallicum Hds. 422.

germanicum Hds. 421.

Hoppeanum Koch. 423.

italicum Rth. 425.

Leontopodium Scop. 424.

luteo-album L. 424.

margaritaceum L. 424.

minimum Sm. 422.

minimum Willd. 422.

montanum Hds. 422.

montanum Willd. 422.

norvegicum Gunn. 423.

nudum Hoffm. 424.

pilulare Whlbg. 423

pilulare β . *nudum* DC. 424.

Gnaphalium pusillum Hke. 423.

pusillum Willd. 423

pusillum β . *fuscum* Hartm. 423.

pusillum γ . *fuscum* Pers. 423.

rectum Sm. 423.

supinum Hopp. 423.

supinum L. 423.

supinum Willd. 423.

supinum α . Whlbg. 423.

supinum β . *pusillum* Pers. 423.

sylvaticum L. 422

sylvaticum Sm. 423.

sylvaticum α . Wbg. 423.

sylvaticum β . *fuscum* Wbg.
423.

uliginosum L. 423.

Goodyera R. Brw. 827.

repens R. Brw. 828.

Gorinkia orientalis Presl. 62.

GRAMINEEN 916.

Grammarthron bilignatum Cass.
445.

scorpioides Bl. Fgh. 445.

Grammitis Swrtz. 1011.

Ceterach Sw. 1011.

GRANATEEN. 279.

Gratiola L. 611.

officinalis L. 611.

GROSSULARIEEN. 310.

Gnepinia nudicaulis Bast. 80.

Gymnadenia R. Bwr. 819.

albida Rich. 819.

conopsea R. Brw. 819.

odoratissima Rich. 819.

viridis Rich. 820.

Gymnocline leucocephala Cass.
443.

macrophylla Bl. Fgh. 443.

Gymnogramma Ceterach Sprg.
1011.

Gypsophila L. 107.

ancutifolia Fisch. 108.

arenaria W. K. 108.

fastigiata L. 103.

muralis L. 108.

paniculata L. 93. 108.

prostrata All. 108.

repens L. 103.

- Gypsophila rigida* L. 109.
Saxifraga L. 109.
serotina Hayn. 108.
Vaccaria Sm. 115.

H.

- Habenaria albida* R. Br. 820.
bifolia R. Br. 821.
viridis Rob. Brwn. 820.
Hacquetia Nek. 327.
Epipartis DC. 327.
Helianthus Fries. 129.
peplodes Fries. 129.
Halimus Willr. 721.
pedunculatus Willr. 721.
Portulacoides Willr. 721.

HALORAGEEN. 286.

- Hebelia allemannica* Gm. 863.
collina Gmel. 863.
Hedera L. 375.
Helix L. 375.
quinquefolia L. 159.
Hedypnois Truf. 492.
autumnalis Hds. 493.
clavata Ten. 492.
cretica Willd. 492.
hirta Sm. Brit. 492.
hispida Sm. 494.
paludosa Sep. 503.
pyrenaica Vill. 494.
Taraxaci Vill. 493.
Hedysarum L. 223.
alpinum Jacq. 223.
angustifolium Thun. 224.
arenarium Kit. 224.
controversum Crtz. 223.
obscurum L. 223.
Onobrychis L. 223.
pallidum Schlecht. 224.
petraeum Biberst. 224.
saxatile Vill. 224.
supinum Vill. 224.
Heleocharis R. Brw. 878.
aricularis R. Brw. 880.
atropurpurea Knth. 880.
carniolica Koch. 880.
multicaulis Sm. 879.
ovata Brw. 879.

- Heleocharis palustris* Brw. 879.
uniglumis Link. 879.
Helechla alopecuroides Hst. 926.
diandra Hst. 926.
schoenoides Hst. 926.
Heleogiton trigonum Rehb. 883.
triquetrum Rb. 883.
Helianthemum Tournef. 91.
alpestre Rehb. 92.
apenninum DC. 93.
apenninum Gd. 93.
apenninum Schlecht. 93.
Chamaecistus Mill. 92.
denticulatum Thb. 92.
Fumana Mill. 91.
grandiflorum DC. 93.
guttatum Mill. 91.
intermedium Thb. 92.
obscurum Pers. 92.
oelandicum Whlbg. 91.
oelandicum Rb. 92.
oelandicum α . Gd. 92.
oelandicum α . Wbg. 92.
oelandicum β . Gd. 92.
oelandicum β . ciliatum Wbg. 92.
oelandicum γ . canescens Wbg. 92.
polifolium (Cistus) L. 93.
punctatum Willd. 92.
salicifolium Pers. 92.
sanguineum Hst. 92.
surrejanum Mill. 93.
vulgare DC. 92.
vulgare Gaertn. 92.
vulgare β . obscurum Whlbg. 92.
Helianthus L. 420.
annuus L. 420.
tuberosus L. 420.
Helichrysum Gaertn. 425.
angustifolium DC. 425.
arenarium DC. 425.
Heliotropium L. 587.
europaeum L. 587.
Helicorus L. 22.
atrorubens W. K. 23.
dumetorum W. K. 23.
foetidus L. 23.
hyemalis L. 22.

- Helleborus niger** L. 22.
odoratus W. K. 23.
viridis L. 23.
Helminthia Juss. 497.
echinoides Grtn. 497.
Helonias borealis Willd. 863.
Helosciadium Koch. 331.
inundatum Koch. 332.
nodiflorum Koch. 331.
repens Koch. 331.
Hemerocallis L. 860.
flava L. 860.
fulva L. 860.
Liliastrum L. 846.
Hepatica triloba DC. 8.
Heraclenum L. 338.
alpinum L. 339.
angustifolium L. 338.
asperum M. B. 338.
austriacum L. 339.
elegans Jcq. 338.
flavescens Bss. 338.
longifolium Jcq. 338.
montanum Schlecht. 339.
palmatum Bgt. 339.
Panaces L. Bert. 338.
Panaces Rb. 338.
pyrenaicum Lmk. 339.
sibiricum L. 338.
stifolium Rehb. 339.
Sphondylium L. 338.
Heritiera anthericoides Schrk. 863.
Herminium R. Br. 823.
Monorchis R. Br. 824.
Herniaria L. 297.
alpina Vill. 297.
glabra L. 297.
hirsuta L. 297.
incana Lmk. 297.
Hesperis L. 53.
Alliaria Lmk. 56.
bituminosa Sav. 53.
inodora L. 53.
laciniata All. 54.
matronalis L. 53.
runcinata W. K. 53.
tristis L. 54.
verna L. 44.
Heteropogon Pers. 918.
Allionii R. S. 919.
glaber Pers. 919.
Hibiscus L. 152.
pentacarpus L. 153.
syrincus L. 153.
Trionum L. 152.
Hieracium L. 522.
affine Tsch. 543.
albidum Vill. 541.
Allionii Monn. 531.
alpestre Jcq. 516.
alpicola Schlecht. 524.
alpinum L. 540.
alpinum Willd. 533.
alpinum 4. sudeticum Wimm et Gr. 541.
alpinum 5. nigrescens Wimm. et Gr. 541.
ambiguum Ehrh. 529.
amplexicaule L. 539.
amplexicaule β . DC. 540.
andryaloides Vill. 533.
angustifolium Gmel. 535.
angustifolium Hpp. Tschb. 524.
angustifolium Hopp. bei Sturm. 524.
angustifolium Willd. 525.
arvense Scop. 511.
atricapillum Hopp. 540.
aurantiacum L. 529.
aurantiacum β bicolor Cust. ap. Gaud. 529.
aurantiacum δ . flavum Gd. 529.
aurantiacum ζ . fuscum Froel. 529.
aureum Scop. 516.
Auricula L. spec. 525.
Auricula Sm. 525.
Auricula Vill. ? 524.
Auricula Willd. 526.
Auricula γ . angustifolium Dub. 525.
auriculae-folium Tsch. 524.
Bauhini Schlecht. 526.
bifidum Kit. 537.
bifurcam M. B. 523.
blattaroides L. 521.
boreale Fries. 514.
brachiatum Bertol. 524.
breviscapum DC. 524.
bulbosum Willd. 516.
bupleuroides Gmel. 531.
caeruleum Scop. 512.

- Hieracium Candollii** Monn. 524.
cerinthoides Gn. 533. 539.
cerinthoides hort. bot. germ. 532.
cerinthoides Kirschleg. 535.
cerinthoides δ . *decipiens* Monn. 535.
cerinthoides vogesianum Kirs. 535.
chondrilloides L. 520.
chrysanthum Ledeb. 517.
cinerum Tsch. 528.
collinum Bess. 524.
collinum Koch. DC. 529.
collinum vulgare et caladon Tsch. 527.
conyzaeifolium Gouan. 524.
coronopifolium Bernh. 545.
cotoneifolium Froel. 543.
croaticum Fl. sedin. 545.
croaticum W. K. 520.
cydoniaeifolium Tsch. 541.
cydoniaeifolium Vill. 541.
cymigerum Rb. 527.
cymosum L. ? 528.
cymosum Froel. in litt. Rb. exc. 528.
cymosum Poll. 527.
cymosum Spreng. Hal. ? 527.
cymosum Willd. 529.
cymosum Vill. 530.
cymosum laxum Mey. 527.
cymosum α . *Columnae* Rb. ic. 528.
cymosum α . *conglomeratum* Mey. 529.
cymosum β . *longifolium* Rb. ic. 527. 528.
cymosum γ . *setosum* Mey. 527.
danubiale Poll. 495.
decipiens Froel. 534.
dentatum Hpp. 532.
denticulatum Sm. 542.
diaphanum Frs. 535.
dubium L. spec. 529.
dubium Monn. 532.
dubium Sm. 525.
echioides Linn. 528.
echioides W. K. 527.
eriophyllum Link, Schleich. 533.
fallax DC. 527.
- Hieracium fallax** I. Gaud. 527.
fallax H. Gaud. 527.
fallax Kch. ap. DC. 527.
fallax Willd. 527.
filiferum Tsch. 526.
flagellare Froel. 524. Willd. 523.
flexuosum DC. 532.
flexuosum Gd. 534.
flexuosum γ . Gd. 532.
flexuosum W. K. 533.
florentinum Sturm. 525.
florentinum Willd. 526.
florentinum L. *praealtum* Gd. 526.
florentinum H. *piloselloides* Gd. 525.
frigidum Stv. 517.
furcatum Hpp. 524.
fusum Vill. 529.
glabratum Hpp. 532.
glabratum Schleich. 532. 534.
glaciale Lehm. 525.
glanduliferum Hpp. 533.
glaucescens Bess. 527.
glaucum All. DC. 531.
glaucum Schleich. 531.
glaucum Wbg. 531.
graminifolium β . *linearifolium* Froel. 531.
grandiflorum All. 521.
Halleri Vill. 540.
helveticum Sut. 533.
Hoppeanum Schl. 523.
humile Hst. 538.
hybridum Chx. 524.
hybridum Gd. 524.
hybridum Vill. 540.
hyoseridifolium Vill. 522.
Jacquini Vill. 538.
incanum L. 495.
incanum Poll. 494.
incarnatum Wulf. 516.
incisum Hpp. 537.
integrifolium Hpp. 520.
intybaceum Hpp. 540.
intybaceum Jcq. Wulf. 542.
Lachenalii Gmel. 535.
Lactaris Bert. 546.
Lactucella Waltr. 525.
laevigatum Willd. Fries. 545.

- Hieracium lanatum* Vill. 538.
lanceolatum Schleich. 543.
lanceolatum Vill. Tsch. 545.
lastophyllum Koch. 536.
latifolium Froel. 544.
Lawsonii Vill. Sm. 534.
Liottardi Vill. 538.
longifolium Schleich. 534.
longifolium β . Mougeoti Froel. 535.
lycopifolium Froel. 542.
maculatum Sm. 535.
Mertini Gmel. 535.
Michellii Tsch. 525.
molle Jcq. 520.
montanum Jcq. 522.
montanum Sep. 516.
Mougeotie Froel. 535.
multiflorum Schleich. 530.
murorum L. 536.
murorum Vill. Fries. 537.
murorum α . pilosissimum L. ? 537.
murorum α . Poll. 536.
murorum β . sylvaticum L. 537.
murorum γ . L. Pollich. 535.
murorum γ . villosum Froel. 537.
murorum rotundatum Koch. 536.
murorum H. sylvaticum Gd. 535.
Mougeoti Froel. 535.
nemorosum Dierb. 544.
Nestleri Vill. 528.
nigrescens Willd. 541.
obscurum Rb. 526.
ochroleucum Schleich. 543.
oleraceum Sep. 511.
pallescens W. K. 536.
paludosum L. 520.
pappoleucum Vill. 521.
parviflorum Schleich. 516.
Peleterianum Mer. 523.
pellucidum α . Whg. 537.
pellucidum β . Whg. 535.
perfoliatum Froel. 542.
petraeum Hpp. 539.
picroides Vill. Froel. 543.
pictum Pers. 538.
pilocephalum Willd. Link. 533.
- Hieracium Pilosella* L. 522.
Pilosella α . vulgare Monn. 522.
Pilosella B. alpestre Monn. 523.
Pilosella β . Poll. 523.
Pilosella β . farinaceum Hornung. herbar. 522.
Pilosella β . incanum DC. 523.
Pilosella β . pilosissimum Wallr. 523.
Pilosella C. Peleterianum Mnn. 523.
Pilosella γ . grandiflorum DC. 523.
pilosellaeforme Hopp. 523.
piloselloides Fl. Franc. 526.
piloselloides Vill. DC. 525.
piloselloides Wallr. 527.
polyphyllum Schleich. 534.
polyphyllum Willd. 531.
porrifolium L. 530.
porrifolium Sr. 531.
porrifolium α . armerifolium Froel. 530.
porrifolium δ . dentatum Froel. 530.
praealtum Tsch. 526.
praealtum Vill. Wimm. et Gr. 526.
praemorsum L. 516.
praemorsum H. corymbosum Gaud. 516.
pratense Tsch. 528.
prenanthoides Sm. DC. 542.
prenanthoides Vill. 542.
prunellae-folium Gn. DC. 520.
Pseudo-Cerinth Gaud. 539.
pulmonarioides Presl. 541.
pulmonarioides Vill. 539.
pumilum Hpp. 540.
pumilum Jcq. 538.
pumilum Lpr. 524.
pumilum L. 520.
pusillum Hpp. 521.
pyrenaicum L. 521.
racemosum W. K. 543.
ramosum W. K. 535.
rigidum Fries. 545.
rigidum Hrtm. 544.
Rothianum Wallr. 527.
rotundatum Kit. 536.

- Hieracium rupestre* All. 537.
sabaudum L. spec. 543.
sabaudum L. succ. 544.
sabaudum nigrescens Ser. 544.
sabinum Sebast. Maur. 529.
sanctum L. 513.
saxatile Jcq. Froel. 531.
saxatile Vill. 531.
Schmidtii Tsch. 536.
Schraderi Gd. 533.
Schraderi Schlech. 533.
Schraderi Hl. glabratum Gd. 531.
scorzonerifolium Vill. 531.
setigerum Tsch. 527.
simplex Tsch. 527.
speciosissimum Willd. 532.
speciosum Hornem. 532.
sphaerocephalum Froel. 524.
spicatum All. 542.
staticefolium Vill. 530.
stellatum Tsch. 526.
Sternbergii Hornem. 520.
stipitatum Jcq. 504.
stoloniflorum W. K. 523.
strictissimum Froel. 542.
succisaefolium All. 520.
sudeticum Sibg. 527, 541.
sylvaticum Gn. 533, 537, 546.
sylvaticum Lmk. 535.
sylvaticum Whlbg. 544.
sylvestre Tsch. 544.
Taraxaci L. 493.
Taraxaci Louis. 493.
tomentosum All. 530.
trichocephalum Willd. 532.
umbellatum L. 545.
undulatum Willd. 538.
uniflorum Hpp. 524.
Vaillanti Tsch. 528.
valde pilosum Vill. 533.
velutinum Hgtschw. 523.
verbascifolium Pres. 539.
villosum Jcq. L. 533.
virescens Sond. 1073.
viscidulum Tsch. 526.
vulgare Tsch. 527.
vulgatum Fries. 535.
vulgatum tridentatum Fries. 545.
Willdenowii Monn. 531.
Zizianum Tsch. 527.
- Hierochloa* Gmel. 923.
australis R. S. 923.
borealis R. S. 923.
odorata Whlbg. 923.
Himantoglossum Spr. 820.
hircinum Spr. 820.
Hippion aestivum Schmidt. 579.
axillare Schm. 581.
Gentianella Schm. 581.
longe pedunculatum Schm. 581.
nanum Schm. 582.
obtusifolium Schm. 581.
- HIPPOCASTANEEN. 158.**
- Hippocrepis* L. 222.
comosa L. 222.
missiliquosa L. 223.
Hippomarathrum pelviforme Fl. d. Wett. 344.
Hippophaë L. 740.
rhamnoides L. 740.
- HIPPURIDEEN. 287.**
- Hippuris* L. 287.
lanceolata Retz. 287.
maritima Hlln. 287.
tetraphylla L. 287.
vulgaris L. 287.
vulgaris β . *maritima* Whlbg. 287.
- Hirschfeldia adpressa* Mönch. 65.
- Hladnikia golacensis* Koch. 373.
pastinacifolia Rehb. 373.
- Holcus* L. 945.
avenaceus Scp. 945.
avenaceus L. 945.
australis Schrad. 923.
biaristatus Wigg. 950.
borealis Schrd. 923.
bulbosus Schrd. 945.
lanatas L. 945.
mollis L. 945.
odoratus Hst. 923.
repens Hst. 923.
saccharatus L. 919.
Sorghum L. 919.
- Holoschoenus australis* Rb. 894.
exserens Rb. 884.
filiformis Rb. 884.

- Holoschoenus Linnaei** Rb. 884.
vulgaris Link. 884.
Holosteuum L. 136.
umbellatum L. 137.
Homalocenchrus oryzoides Poll. 929.
Homogyne Cass. 405.
alpina Cass. 406.
discolor Cass. 403.
sylvestris Cass. 405.
Honkenya peploides Ehrh. 129.
Hoppea sibirica Rb. 449.
Hordeum L. 985.
bulbosum Bert. 986.
bulbosum L. 986.
crinitum Desf. 985.
cylindricum Murr. 985.
distichum L. 985.
europaeum All. 985.
geniculatum All. 987.
hexastichon L. 985.
maritimum Wthr. Rth. 986.
montanum Schrk. 985.
murinum L. 986.
murinum β . L. 986.
nodosum M. B. 986.
nodosum L. Sav. 986.
pratense Hds. 986.
pseudo-murinum Tapp. 986.
rigidum Roth. 987.
secalinum Schreb. 936.
strictum Dsf. 986.
sylvaticum Hds. 985.
vulgare L. 985.
vulgare L. β . *coeleste* 985.
zeocriton L. 985.
Horminum L. 662.
pyrenaicum L. 663.
Hottonia L. 697.
palustris L. 697.
Hugueninia Rb. 57.
tanacetifolia Rb. 57.
Humulus L. 755.
Lupulus L. 755.
Hutchinsia R. Br. 84.
alpina R. Br. 84.
brevicaulis Hpp. 84.
corymbosa Gay. 80.
petraea R. Br. 84.
procumbens Dsv. 85.
Hyacinthus botryoides L. 861.
comosus L. 861.
Hyacinthus nonscriptus L. 860.
racemosus L. 861.
HYDROCHARIDEEN. 793.
Hydrocharis L. 794.
Morsus ranæ L. 794.
Hydrochloa airoides Hartm. 963.
aquatica Hrtm. 962.
caerulea Hrtm. 963.
fluitans Hrtm. 962.
maritima Hrtm. 963.
Hydrocotyle L. 326.
inundata Sm. 332.
Schkuhriana Rb. 326.
vulgaris L. 326.
Hymenocarpus circinatus Savi. 1065.
Hyo scyamus L. 601.
agrestis Kitt. 602.
albus L. 602.
bohemicus Schm. 602.
niger L. 601.
pallidus Kit. 602.
Scopolia L. 601.
verviensis F. d. Spa. 602.
Hyo seris L. 491.
adspersa Mnch. 492.
foetida L. 490.
microcephala Cass. 492.
minima L. Schrk. 490.
scabra L. 491.
taraxacoides Lmk. Wlf. 492.
taraxacoides Vill. 492.
Hypocoum L. 35.
littorale Wulf. 35.
pendulum L. 35.
HYPERICINEEN. 154.
Hypericum L. 154.
alpinum W. K. 156.
androsaemifolium Vill. 156.
Androsaemum L. 154.
barbatum Jcq. 155.
ciliatum Lmk. 156.
commutatum Nlte. 155.
Coris L. 157.
delphinense Vill. 155.
dubium Leers 155.
elegans Steph. 156.
elodes L. 156.
fimbriatum Lmk. 156.
hirsutum L. 156.
humifusum L. 155.

- Hypericum humifusum** β .
 Liottardi Vill. 155.
 Kohlianum Spr. 156.
 Leersii Gmel. 155.
 maculatum Crtz. 155.
 medium Peterm. 155.
 montanum L. 156.
 perforatum L. 155.
 perforatum β . Gand. 155.
 pulchrum L. 156.
 quadrangulare L. 155.
 quadrangulare Sm. 155.
 quadrialatum Wbg. 155.
 Richert Vill. 156.
 tetrapterum Fries. 155.
 veronense Schrk. 155.
- Hypochaeris** L. 503.
 Balbisii Lois. 504.
 glabra L. 503.
 helvetica Wulf. 504.
 intermedia Richt. 504.
 maculata L. 504.
 pontana L. 522.
 radicata L. 504.
 uniflora Vill. 504.
- Hypopitys glabra** DC. 567.
 multiflora Scp. 567.
- Hyssopus** L. 663.
 ocymifolius Lmk. 649.
 officinalis L. 663.
- I.**
- Jasione** L. 547.
 humilis Pers. 548.
 montana L. 547.
 montana β . littoralis Fries. 547.
 montana β . major Koch. 547.
 perennis L. 547.
 perennis β . humilis Koch. 548.
- JASMINEEN.** 570.
- Jasminum** L. 570.
 fruticans 570.
 officinale L. 570.
- Iberis** L. 80.
 amara L. 81.
 amara Scop. 81.
 amara β . Comp. Fl. Belg. 81.
 campestris Willr. 83.
 cepeaeifolia DC. 80.
- Iberis intermedia** Guers. 81.
 nudicaulis L. 80.
 pinnata L. 81.
 rotundifolia L. 80.
 ruficaulis Lej. 81.
 saxatilis L. 80.
 umbellata L. 80.
- Jirasekia alpina** Schmidt. 687.
 tenella Rchb. 687.
- Ilex** L. 568.
 Aquifolium L. 568.
 Coccifera Tbrn. 759.
- Illecebrum** L. 298.
 capitatum L. 298.
 cephalotes M. B. 298.
 serpillifolium Vill. 298.
 verticillatum L. 298.
- Impatiens** L. 166.
 Noli tangere L. 166.
- Imperata** Cyrill. 924.
 arundinacea Cyrill. 924.
 cylindrica P. d. Beauv. 924.
- Imperatoria** L. 356.
 angustifolia Bellrd. 356.
 Chabraei Spr. 354.
 montana DC. 351.
 Ostruthium L. 356.
 palustris Bess. 351.
 pimpinelloides a Bugh. 354.
 Seguierei Spr. 348.
 sylvestris DC. 351.
 verticillaris DC. 356.
- Impia germanica** Bl. Fgh. 421.
- Intybellia incarnata** Monn. 516.
 praemorsa Monn. 516.
 pulchra Monn. 519.
- Intybus praemorsus** Fries. 516.
- Inula** L. 415.
 Britannica L. 418.
 Bubonium Jcq. 417.
 campestris Bess. 418.
 cinerea Lmk. 417.
 conyza DC. 417.
 crithmifolia Willd. 418.
 crithmoides L. 418.
 dysenterica L. 419.
 ensifolia L. 416.
 germanica L. 416.
 germanica Vill. 417.
 graveolens Desf. 418.
 Helenium L. 415.
 hirta L. 417.

Inula hirta Poll. 418.
hybrida Bmg. 416.
media M. B. 416.
montana L. 418.
montana Poll. 417.
Oculus Christi L. 418.
Oculus Christi M. B. 418.
Oetteliana Rb. 418.
pulicaria L. 419.
salicina L. 416.
spiraeaefolia L. 417.
squarrosa Bernh. 417.
squarrosa L. 417.
suaveolens Jcq. 417.
Vaillantii Vill. 417.
viscosa Dsf. 419.

IRIDEEN. 829.

Iris L. 832.
biflora L. 835.
biflora Schaur. 835.
bisflorens Hst. 835.
bohemica Schm. 834.
bohemica Strm. 834.
Fieberti Seidl. 834.
Fieberti Fieb. 834.
florentina L. 833.
foetidissima L. 836.
germanica L. 833.
graminea L. 836.
hungarica W. Kitt. 835.
lutescens Lmk. 835.
nudicaulis Schaur. 834.
nudicaulis Wimm. 835.
nudicaulis Lmk. 834.
pallida Lmk. 833.
pratensis Lmk. 836.
Pseud-Acorus L. 835.
pumila L. 835.
sambucina L. 833.
sibirica L. 836.
spathulata Lmk. 836.
spuria L. 836.
squalens L. 834.
variegata L. 835.

Isatis L. 86.
alpina All. 87.
campestris Stv. 86.
praecox Kit. DC. 86.
tinctoria L. 86.
Villarsii Gaud. 87.

Isnardia L. 285.

Isnardia palustris L. 285.

Isoëtes L. 1006.

acustris L. 1006.

Isolepis fluitans Brw. 881.

Holoschoenus R. S. 884.

Michelliana R. S. 885.

setacea R. Br. 882.

supina R. Br. 882.

Isopyrum L. 23.

thalictroides L. 23.

Ittnera minor Gmel. 807.

Najas Gmel. 807.

JUNGLANDEEN. 757.

Juglans L. 757.

regia L. 757.

JUNCACEEN. 864.

JUNCAGINEEN. 797.

Juncus L. 864.
acuminatus Balb. 867.
acutiflorus Ehrh. 869.
acutiflorus β . D. Fl. 869.
acutiflorus β . multiflorus Wh. 869.
acutiflorus γ . Mey. 869.
acutus L. 865.
adscendens Hst. 869.
albidus Hoffm. 873.
alpestris Hrtm. 870.
alpinus Vill. 869.
angustifolius Wulf. 873.
aquaticus Rth. 869.
arcticus Willd. 866.
articulatus α . β . L. 869.
articulatus γ . L. 869.
atratus Krok. 869.
balticus Willd. 866.
bifolius Hopp. 868.
bottnicus Wbg. 871.
brevirostris Nees ab Es. 869.
bufonius L. 871.
bufonius δ . Schult. 871.
bulbosus L. spec. ed. I. 870.
bulbosus L. spec. ed. II. 870.
bulbosus β . Whlbg. 871.
campestris α . L. 873.
capitatus Weig. 868.
capitatus Skhr. 870.
castaneus Sm. 867.

- Juncus coenosus** Bichen. 871.
compressus Jcq. 870.
congestus Thll. 874.
conglomeratus L. 863.
consanguineus Kch. et Z. 871.
diffusus Hpp. 866.
divergens Koch et Z. 868.
effusus L. 863.
effusus Poll. 866.
effusus β . L. 867.
erectus Pers. 874.
ericetorum Pll. 868.
fasciculatus Schrk. 870.
filiformis L. 867.
flavescens Hst. 872.
foliatus minimus Bauh. 868.
Forsteri Sm. 872.
fusco-ater Schreb. 869.
geniculatus Schrk. 870.
Gerardi Lois. 870.
glabratus Hpp. 872.
glaucus Ehrh. 866.
glaucus β . *littoralis* Whlbg. 866.
gracilis Roth. 868.
gracilis Lej. 871.
helodes Link. 866.
heptangulus Peterm. 869.
Hostii Tsch. 868.
hybridus Brot. 871.
Jacquini L. 865.
inflexus Leers. 866.
intermedius Hst. 872.
intermedius Thuill. 874.
latifolius Wulf. 872.
lamprocarpus Ehrh. 869.
lamprocarpus γ . α . Mey. 869.
luteus Allion. 873.
Luzula Krock. 872.
luzulinus Vill. 872.
luzuloides Lmk. 873.
maritimus Lmk. 865.
maximus Ehrh. 872.
melananthos Rb. 869.
monanthos Jcq. 868.
montanus Lmk. 872.
multiflorus Ehrh. 874.
mutabilis Sav. 871.
Neesii Heller. 868.
nemorosus Hst. 873.
nemorosus Pll. 873.
nemorosus β . Poll. 872.
Juncus nigrnellus Dn. 870.
niveus L. 873.
nodulosus Whlbg. 870.
obtusiflorus Ehrh. 868.
paniculatus Hopp. 866.
parviflorus Ehrh. 873.
pilosus α . L. 872.
pilosus β . δ . ϵ . L. 872. 873.
pygmaeus 871.
rariflorus Hrtm. 870.
retroflexus Rafin. 868.
setifolius Ehrh. 870.
spadiceus All. 873.
sphaerocarpus N. ab. E. 871.
spicatus L. 874.
Sprengelii Willd. 870.
squarrosus L. 870.
stygicus L. 867.
subnodulosus Schrk. 869.
subverticillatus Wulf. 870.
sudeticus Willd. 874.
supinus Mönch. 870.
sylvaticus Reich. 869.
sylvaticus Sm. 872.
Nro. V. sylvaticus Thbrnm. 882.
Tenageia Ehrh. 871.
Tenageia β . Mey. 871.
tenax Poir. 866.
tenuis Willd. 871.
triandrus Guan. 868.
triceps Rstk. 867.
trifidus L. 867.
triglumis L. 867.
uliginosus Rth. 870.
uliginosus α . Mey. 870.
ustulatus Hpp. 870.
Vaillantii Thll. 871.
vernalis Ehrh. 872.
verticillatus Pers. 870.
Juniperus L. 787.
communis L. 787.
communis γ . L. 787.
communis γ . *alpina* Gand. 787.
communis γ . *montana* Ait. 787.
lycia L. 788.
macrocarpa Sibth. 788.
nana Willd. 787.
Oxycedrus L. 788.
phoenicea L. 783.
Sabina L. 788.
sibirica Burgsdorf. 787.

Jurinea Cass. 479.
cyanooides Rbch. 479.
mollis Rbch. 479.
Ixia Bulbocodium L. 831.

K.

Kali Soda Sep. 713.
 Tragus Sep. 713.
Kentrophyllum Neck. 480.
lanatum DC. 480.
Kerneria Medik. auriculata Rb.
 77.
myagroides Med. 76.
saxatilis Rb. 76.
Ketmia Trionum Sep. 152.
Knappia agrostidea Sm. 928.
verna Trin. 928.
Knautia Coult. 398.
arvensis Coult. 399.
hybrida Coult. 393.
longifolia Kch. 393.
sylvatica Dab. 399.
Kobresia Willd. 883.
caricina Willd. 883.
scirpina Willd. 888.
Kochia Roth. 715.
arenaria Rth. 715.
hirsuta Nolt. 716. 1074.
prostrata Schrad. 716.
Scoparia Schrad. 715.
Koeleria Pres. 941.
avenacea Tsch. 941.
cristata Pers. 941.
cristata β . γ . D. Fl. 941.
cristata γ . DC. 942.
glauca DC. 942.
gracilis Guss. 942.
grandiflora Bertol. 942.
hirsuta Gd. 942.
phleoides Pres. 942.
setacea DC. 942.
setacea Pers. 942.
splendens Pres. 942.
subspicata Rb. 951.
tuberosa Pers. 942.
valesiaca Gd. 942.
valesiaca Rb. 942.
Koellea hyemalis Bir. 22.
Krockeria oligoceros Mnch.
 210.

L.

LABIATEN. 647.
Labrea aquitica St. Hil. 139.
aquitica Ser. 140.
Lactuca L. 503.
angustana All. 508.
caerulea Saut. 510.
muralis Mey. 509.
perennis L. 510.
preanthoides Sep. 507.
quercina L. 509.
quercina Hort. 509.
quercina Willd. 509.
sagittata W. K. 509.
saligna L. 508.
sativa L. 508.
Scartola L. 508.
stricta W. K. 509.
viminea Schlitz. 509.
virosa L. 508.
virosa Schk. 508.
Laelia cochlearioides Pers. 87.
orientalis Dsv. 88.
Lagoseris bifida Koch. 513.
nemausensis 513.
Lagrostemon pygmaeus Coss. 478.
Lagurus L. 933.
cylindricus L. 924.
ovatus L. 933.
Lamarckia Mönch. 942.
aurea Mönch. 943.
Lamium L. 665.
album L. 667.
album β . Poll. 667.
amplexicaule L. 666.
dissectum Rb. 666.
dissectum With. 666.
Galeobdolon Crtz. 667.
hybridum DC. 666.
hybridum Rb. 666.
incisum Willd. 666.
intermedium Fries. 666.
laevigatum L. 667.
laevigatum Rb. 667.
maculatum L. 667.
maculatum Rb. 667.
Orvala L. 666.
pannonicum Scop. 666.
pupureum L. 666.
purpureum β . decipiens Sond.
 667.

- Lamium purpureum* β . *hybridum* Vill. 666.
rubrum Wallr. 667.
rugosum Ait. Rehb. 667.
vulgatum α . *rubrum* Benth. 667.
vulgatum β . *album* Benth. 667.
westphalicum Weih. 666.
- Lappa* Tourn. 475.
major Gaertn. 475.
minor DC. 475.
officinalis All. 475.
tomentosa Lmk. 476.
- Lappago racemosa* Schreb. 920.
- Lappula Myosotis* Mönch. 587.
- Lapsana* L. 490.
communis L. 490.
foetida Willd. Scop. 490.
pulchra Vill. 519.
pusilla Willd. 490.
Rhagadiolus L. 491.
stellata L. 491.
Zacyntha L. 513.
- Larbreia aquatica* Ser. 140.
aquatica St. Hilair. 139.
- Larix europaea* Hort. Paris. 792.
- Laserpitium* L. 360.
alpinum W. K. 361.
aquilegifolium DC. 361.
aquilegifolium Jcq. 360.
aquilegifolium Schleich. 362.
Archangelica Wulf. 362.
asperum Crtz. 361.
Cervaria Gmel. 361.
Chironium Sep. 363.
dauricum Jcq. 348.
gallicum Sep. 362.
Gaudtnti Morett. 361.
glabrum Crtz. 361.
Halleri All. 362.
hirsutum Lmk. 362.
hirtellum Gaud. 362.
latifolium Gmel. 361.
latifolium L. 3^o1.
Libanotis Lmk. 361.
luteolum Gd. 362.
marginatum DC. 361.
marginatum W. K. 361.
nitidum Zant. 362.
Panax Gouan. 362.
peucedanoides L. 362.
prutenicum L. 362.
selinoides Crtz. 362.
- Laserpitium selinoides* Sc. 351.
silafolium Jcq. 346.
Siler L. 362.
simplex All. 349.
trilobum L. 361.
verticillatum W. K. 347. 1070.
- Lasiagrostis* Link. 938.
Calamagrostis Link. 938.
variegata Mey. 938.
- Lastraea cristata* Presl. 1017.
dilatata Presl. 1017.
Filix mas Presl. 1016.
Oreopteris Presl. 1016.
rigida Presl. 1018.
spinulosa Presl. 1017.
Thelypteris Presl. 1016.
- Lathraea* L. 637.
Squamaria L. 637.
- Lathyrus* L. 233.
angulatus L. 236.
annuus L. 235.
Aphaca L. 234.
auriculatus Bert. 234.
axillaris Lmk. 235.
bithynicus Lmk. 228.
Cicera L. 235.
coccineus All. 235.
ensifolius Badarr. 237.
Hallersteinii Bmg. 236. 1066.
heterophyllus L. 237.
hirsutus L. 236.
inconspicuus Jcq. 234.
incurvus Hochst. 238.
intermedius Wallr. 238.
latifolius Fl. suec. 237.
latifolius L. 237.
Lusseri Heer. 1067.
monanthus Willd. 232.
Nissolia L. 234.
Ochrus DC. 234.
palustris L. 238.
parviflorus Roth. 234.
platyphyllus Retz. 237.
pratensis L. 236.
pratensis b. *grandistipulatus* Roch. 236. 1061.
purpureus Desf. 234.
sativus L. 235.
sepium Scop. 236. 1066.
sepium Scop. 1066.
setifolius L. 235.
sphaericus Retz. 235.

- Lathyrus** *spurius* Willd. 234. *stans* Vis. 235.
sylvestris L. 237.
sylvestris α . *ensifolius* DC. 237.
tuberosus L. 236.
tumidus Willd. 228.
turgidus Lmk. 228.
- LAURINEEN.** 736.
- Laurus** L. 736.
nobilis L. 736.
- Lavandula** L. 648.
officinalis Chx. 648.
Spica α . L. 648.
vera DC. 648.
- Lavatera** L. 152.
Thurngiaca L. 152.
- Ledum** L. 565.
palustre L. 565.
- Leersia** Soland. 929.
orizoides Sw. 929.
- Lemna** L. 808.
arrhiza L. 809.
gibba L. 809.
minor L. 809.
polyrrhiza L. 809.
trisulca L. 808.
- LEMNACEEN.** 808.
- LENTIBULARIEEN.** 682.
- Leontodon** L. 493.
alpinum Jcq. 494.
alpinus Hopp. 505.
aureum L. 516.
autumnale L. 493.
Berinii Roth. 496.
bulbosum L. 516.
caucasicus M. B.? 495.
caucasicus Rb. 495.
caucasicus Stev. 505.
corniculatus Kit. 505.
crispus Vill. 496.
croceum Haenk. 494.
danubiale Jcq. 495.
dens leonis DC. 505.
dentatum L. 520.
erectum Schrk. 505.
erectus Hopp. 506.
glaucescens M. B. 505.
hastile L. Jcq. 495.
hastilis L. 494.
- Leontodon** *hirtum* Vill. 495.
hirtus L. 492. 495.
hispidum L. 494.
hispidum Pollich. 492.
hispidum Scop. 496.
incanus Schrk. 495.
laevigatus Willd. 505.
leptocephalus Rb. 506.
lividus W. K. 505.
montanum Lmk. 493.
nigricans Kit. 505.
officinale With. 505.
palustre Sm. 505.
prothaeiforme Vill. 494.
pyrenaicus Gouan. 494.
Raii Gouan. 505.
salinus Poll. 506.
saxatilis Lmk. 492.
saxatilis Rehb. 496.
serotinum W. K. 506.
sqamosum Lmk. 494.
Taraxaci Lois. 493.
taraxacoides Hopp. 505.
Taraxacum L. 505.
Taraxacum Pollich. 505.
Taraxacum I. *palustris* Fries. 506.
Taraxacum 3. *obliquus* Fries. 505.
Taraxacum β . *palustre* Wimm. et Gr. 505.
tenuiflorus DC. 495.
tenuifolius Hopp. 506.
terglouensis Hacq. 522.
tuberosum L. 493.
umbellatum Schrk. 497.
Villarsii Lois. 492. 495.
- Leontopodium** *alpinum* Cass. 424.
- Leonurus** L. 675.
Cardiaca L. 675.
Galeobdolon Scop. 667.
Marrubiastrum L. 676.
- Lepidium** L. 82.
alpinum L. 84.
anglicum Hds. 86.
campestre R. Brw. 83.
didymum L. 86.
Draba L. 82.
graminifolium L. 83.
Halleri Crtz. 84.
Iberis L. 83.
Iberis Poll. 83.

- Lepidium incisum** Roth. 83.
latifolium L. 83.
Linnaei Crtz. 84.
perfoliatum L. 83.
petraeum L. 84.
Pollichii Roth. 83.
procumbens L. 85.
ruderales L. 83.
sativum L. 82.
sativum β . *crispum* L. 83.
sativum latifolium DC. 83.
scapiferum Wallr. 80.
Lepigonum Whlbg. 128.
marginatum D. fl. 129.
marinum Whlbg. 129.
medium Whlbg. 128.
rubrum Whlbg. 128.
segetale D. fl. 128.
Leptocarpha Loeselii DC. 55.
Lepturus R. Brw. 989.
cylindricus Trin. 990.
filiformis Trin. 989.
incurvatus Trin. 989.
Leucanthemum atratum DC. 440.
heterophyllum DC. 441.
montanum DC. 441.
vulgare DC. 440.
Leucoium L. 838.
aestivum L. 838.
vernum L. 838.
Levisticum Koch. 350.
officinale Koch. 350.
vulgare Rb. 350.
Libanotis Crtz. 345.
athamantica Fl. d. Wett. 345.
athamantoides DC. 346.
cretensis Scop. 347.
daucoides Scop. 345.
montana All. 345.
Riviniana Scop. 345.
rupestris Scop. 348.
sibirica Koch. 346.
vulgaris DC. 345.
vulgaris β . *pubescens* DC. 346.
vulgaris γ . *daucifolia* DC. 345.
vulgaris δ . *sibirica* DC. 346.
Libertia arduennensis Lej. 975.
Ligularia Cass. 449.
sibirica Cass. 449.
Ligusticum L. 348.
apioides Lmk. 346.
athamantoides Spr. 346.
Ligusticum austriacum L. 373.
capillaceum Link. 349.
carniolicum Hst. 373.
Carvi Roth. 334.
Cervaria Spr. 355.
cicutaefolium Vill. 346.
cicutarium Lmk. 372.
ferulaceum All. 348.
Gmelini Cham. 350.
Gmelini Vill. 373.
Levisticum L. 350.
Meum Crtz. 349.
Mutellina Crtz. 349.
nodiflorum Vill. 347. 1070.
peloponnesiacum L. 372.
pyrenaicum L. 348.
Seguteri Koch. 348.
Ligustrum L. 569.
vulgare L. 569.
LILIACEAE. 842.
Lilium L. 843.
bulbiferum L. 843.
carniolicum Bernh. 843.
chalcedonicum D. Fl. Hst. Jcq. 843.
chalcedonicum L. 843.
Martagon L. 844.
pomponium L. 844.
Limnanthemum Gmel. 573.
Nymphoides Link. 574.
peltatum Gmel. 574.
Limnietis pungens Rich. 929.
Limnochloa acicularis Rb. 880.
Braeothryon Rb. 881.
caespitosa Rb. 881.
parvula Rb. 881.
Limodorum Trnf. Rich. 825.
abortivum Swartz. 825.
Epigonium Sw. 825.
Limosella L. 628.
aquatica L. 628.
Linaria Trnf. 614.
alba Mönch. 617.
alpina Mill. 616.
angustifolia Rb. 618.
arvensis (α) Dsf. 616.
chalepensis Mill. 617.
chloraefolia Rb. 618.
commutata Bernh. 615.
Cymbalaria Mill. 615.
decumbens Mönch. 617.

- Linaria Elatine** Mill. 615.
genistifolia DC. 618.
genistifolia Mill. 617.
italica Trev. 618.
juncea Rb. 617.
linifolia Roch. 618.
littoralis Bartl. 615.
Loeselii Schw. 617.
maritima Rb. 617.
minor Dsf. 615.
paniculata bot. Ztg. 618.
pelisseriana Mill. 616.
simplex DC. 617.
spuria Mill. 615.
striata DC. 617.
triphylla Mill. 616.
viscida Mönch. 615.
vulgaris Mill. 618.
Lindernia L. 623.
pyxidaria All. 623.
LINEEN. 145.
Linnaea Gronov. 379.
borealis L. 380.
Linosyris DC. 407.
vulgaris Cass. 407.
Linum L. 146.
alpinum Jcq. 148.
alpinum β . Bertol. 148.
angustifolium Hds. 147.
aureum DC. 146.
aureum W. K. 146.
austriacum L. 149.
austriacum Poll. 149.
bavaricum Schlitz. 148.
campanulatum M. B. 147.
campanulatum L. 147.
catharticum L. 149.
corymbulosum Rb. 146.
flavum L. 147.
gallicum L. 146.
hirsutum L. 147.
laeve Richb. 147.
laeve Scop. 148.
liburnicum Scop. 146.
maritimum L. 146.
montanum Schl. Gand. DC. 148.
narbonense L. 147.
nodiflorum L. sp. 146.
perenne All. 148.
perenne L. 148.
Radiola L. 149.
Linum strictum L. 146.
sylvestre Scop. 147.
tauricum Willd. 147.
tennifolium L. 147.
tennifolium γ . L. 147.
usitatissimum L. 148.
usitatissimum α . vulgare Schübl.
 et Mart. 148.
usitatissimum β . crepitans Schübl.
 et Mart. 148.
viscosum L. 147.
Liparis Loeselii Rich. 829.
Listera R. Brw. 827.
ovata R. Brw. 827.
cordata R. Brw. 827.
Lithospermum L. 596.
apulum Vahl. 596.
arvense L. 596.
deflexum Lhm. 587.
maritimum Lhm. 596.
officinale L. 596.
purpureo-caculeum L. 596.
Littorella L. 704.
lacustris L. 704.
Lloydia Salisb. 844.
serotina Salisb. 844.
Lobelia L. 547.
Dortmanna L. 547.
LOBELIACEEN. 546.
Lobularia Dsv. 69.
maritima Dsv. 69.
Loiselenia procumbens Dsv. 564.
Lolium L. 937.
arvense Sm. 988.
arvense With. Schrad. 988.
Boucheanum Kunth. 987.
complanatum Schrad. 988.
festucaceum Link. 973.
italicum Alex. Br. 987.
linicola Sond. 988.
multiflorum Poir. 987.
multiflorum Lmk. Gaud. 987.
perenne L. 937.
remotum Hfsm. 988.
rigidum Gd. 988.
robustum Rb. 938.
speciosum Stv. 988.
speciosum scabrum Koch. 988.
speciosum var. culmo glabro
 Koch. 988.
strictum Presl. 988.

- Lolium temulentum* L. 988.
 temulentum β . *arvense* Bbgt. 988.
 tenue L. 987.
Lomaria Spicant. Dsv. 1023.
Lomatogonium Alex. Br. 575.
carinthiacum Alex. Br. 575.
Lonicera L. 378.
 alpitgena L. 379.
 balearica Vivn. 378.
 caerulea L. 379.
 Caprifolium L. 378.
 etrusca Lej. 379.
 etrusca Sant. Viagg. 379.
 implexa Ait. 378.
 nigra L. 379.
 pallida Hst. 378.
 Periclymenum L. 379.
 Periclymenum quercifolium Ait. 379.
 pyrenaica L. 379.
 Xylosteum L. 379.
LORANTHACEEN. 375.
Loranthus L. 376.
 europaeus L. 376.
Loroglossum anthrophorum Rich. 823.
 hircinum Rich. 820.
Lotus L. 208.
 angustissimus L. 210.
 arvensis Schk. 209.
 ciliatus Ten. 209.
 corniculatus L. 209.
 corniculatus γ . Poll. 209.
 corniculatus γ . *tenuifolius* L. Pollich. 209.
 corniculatus C. *villosus* Ten. 209.
 cytisoides L. 209.
 decumbens Forst. 209.
 diffusus Sm. 210.
 edulis L. 210.
 hirsutus L. 208.
 major Scop. 209.
 major Sm. 209.
 maritimus L. 210.
 ornithopodioides L. 208.
 sericeus DC. 208.
 siliquosus L. 210.
 tenuifolius Rchb. 209.
 tenuis Kit. 209.
Lotus tetragonolobus L. 210.
 tomentosus Rohd. 208.
 uliginosus Schk. 209.
 villosus Thuill. 209.
 vindicatus v. Bgh. 209.
Luciola Forsteri Sm. 872.
Lunaria L. 70.
 annua L. 70.
 biennis Mönch. 70.
 canescens Willd. 70.
 perennis Gmel. 70.
 rediviva L. 70.
Lunaria racemosa minor Matri-
 cariae folio Breyn. 1010.
Lupinus L. 183.
 angustifolius L. 183.
 hirsutus L. 183.
Luzula DC. 872.
 albida DC. 873.
 albida β . *cuprina* Roch. 873.
 alpina Hpp. 874.
 campestris DC. 873.
 campestris α . β . D. Fl. 873. 874.
 campestris β . *nemorosa* Mey. 874.
 campestris β . *pallescens* Whlbg. 874.
 campestris γ . Mey. α . D. Fl. 874.
 campestris γ . *nivalis* Whlbg. 874.
 campestris δ . *alpina* Mey. 874.
 campestris δ . *nigricans* D. Fl. 874.
 congesta Lej. 874.
 conglomerata Michx. 874.
 erecta Dsv. 874.
 flavescens Gd. 872.
 Forsteri DC. 872.
 glabrata Hpp. 872.
 Hostii Dsv. 872.
 intermedia Spenn. 874.
 lutea DC. 873.
 maxima DC. 872.
 multiflora Lej. 873.
 nigricans DC. 874.
 nigricans Dsv. 874.
 nivea DC. 873.
 pallescens Bess. 874.
 pallescens Hpp. 874.
 parviflora Dsv. 873.
 pediformis L. 874.

Luzula pilosa St. 872.
pilosa Willd. 872.
pubescens bot. Ztg. 872.
rubella Hopp. 872.
spadicea DC. 872.
spadicea α . γ . D. Fl. 873.
spicata DC. 874.
sylvatica Gd. 8 2.
vernalis DC. 872.

Lychnanthus scandens Gmel. 115.

Lychnis L. 122.
Agrostemma Spr. 124.
alba Mill. 123.
alpina L. 123.
arvensis Schrk. 123.
baccifera Scop. 115.
Coronaria Lmk. 123.
dioica α . et β . L. 123.
diurna Sibth. 123.
Flos Cuculi L. 123.
Flos Jovis Lmk. 123.
Githago Lmk. 124.
pratensis Spr. 123.
Pumilio Scop. 119.
sylvestris Hpp. 123.
vespertina Sibth. 123.
Viscaria L. 122.

Lycium L. 599.
barbarum L. 599.
europaeum L. 599.

LYCOPODIACEEN. 1006.

Lycopodioides denticulatum Dill.
 1009.

Lycopodium L. 1006.
alpinum L. 1007.
annotinum L. 1007.
Chamaecyparissus Alex. Br.
 1008.
clavatum L. 1008.
complanatum L. 1008.
complanatum Pollich. 1008.
denticulatum L. 1009.
helveticum L. 1009.
inundatum L. 1007.
radicans Schrk. 1009.
recurvum Kit. 1007.
Selaginoides L. 1008.
Selago L. 1007.
Lycopsis L. 590.
arvensis L. 590.
bullata Cyrill. 590.

Lycopsis orientalis L. 590.
pulla L. 591.

variegata L. 590.

Lycopus L. 653.

europaeus L. 653.

exaltatus L. 654.

Lyonia calyculata Rb. 562.

Lysimachia L. 685.

ciliata L. 685.

Linum stellatum L. 686.

nemorum L. 686.

Nummularia L. 686.

paludosa Bmg. 686.

punctata L. 686.

thyrsiflora L. 685.

verticillata M. B. 686.

villosa Schm. 686.

vulgaris L. 686.

westphalica Weih. 686.

LYTHRARIEN. 290.

Lythrum L. 290.

acuminatum Willd. 290.

Hyssopifolia L. 291.

Salicaria L. 290.

Salicaria β . *gracile* DC. 290.

Salicaria γ . *tomentosum* DC.
 290.

tomentosum Mill. 290.

virgatum L. 290.

M.

Majanthemum Wigg. 840.

bifolium DC. 840.

Convallaria Wigg. 840.

Majorana hortensis Mönch. 657.

Malabaila Tsch. 373.

Haquetii Tsch. 373.

Malachium Fries. 139.

aquaticum Fries. 140.

manticum Rehb. Koch. 139.

Malacochaete littoralis N. ab Es.
 883.

Malaxis Sw. 829.

monophyllos Sw. 829.

paludosa Sw. 829.

Malcolmia R. Br. 54.

maritima Br. 54.

Malus acerba Mer. 277.

Malva L. 149.

Alcea L. 150.

- Malva** Bismalva Bernb. 150.
borealis Willm. 151.
decumbens Hst. 150.
fastigiata Cav. 150.
Henningii Ghl. 151.
italica Pollin. 150.
mauritiana L. 150.
moschata L. 150.
Morenii Poll. 150.
neglecta Willr. 151.
nicæensis All. 150.
parviflora Hds. 151.
pusilla With. 151.
rotundifolia Fries. 151.
rotundifolia L. 150.
setigera Spnn. 152.
sylvestris L. 150.
vulgarts Fries. 151.
- MALVACEEN.** 149.
- Mandragora officinalis** Mill. 601.
Margarita Bellidiastrum Gd. 410.
Mariscus mucronatus Presl. 577.
Marsilea L. 1005.
natans L. 1005.
quadrifolia L. 1005.
- MARSILEACEEN.** 1004.
- Marrubium** L. 674.
affine Hst. 674.
apulum Ten. 675.
candidissimum L. 674.
creticum Mill. 674.
incanum Desr. 674.
paniculatum Desr. 674.
pannonicum Rehb. Benth. 674.
pauciflorum Wallr. 674.
peregrinum Jcq. 674.
peregrinum L. (α , et β .) 674.
peregrinum Rh. 674.
peregrinum Willd. 674.
remotum Kit. 674.
supinum Scop. 674.
vulgare L. 675.
- Maruta Cotula** DC. 433.
foetida Cass. 438.
vulgaris Bl. et Fgh. 438.
- Matricaria** L. 439.
Chamomilla L. 440. 1071.
coronata Gay. 440. 1072.
Courrantiana DC. 440. 1072.
Kochiana C. H. Schltz. 1071.
- Matricaria maritima** L. 443.
 1072.
Parthenium L. 442.
suaveolens L. 440.
suaveolens Sm. DC. 440.
- Matthiola** Brw. 38.
sinuata R. Brw. 39.
varia DC. 39.
- Mays Zea** Gaertn. 917.
- Medicago** L. 186.
aculeata Grtn. 192.
annularis Bss. 187.
arabica All. 191.
apiculata Willd. 191.
carstiensis Jcq. 192.
catalonica Schk. 192.
circinata L. 1055.
confinis Koch. 191.
conica Schk. 192.
coronata Lmk. 1065.
corymbifera Schm. 188.
denticulata Willd. 191.
disciformis DC. 190.
falcata L. 185.
falcata β *versicolor* Willr. 187.
falcata β , *hybrida* Gaud. 187.
falcata δ , D. fl. 187.
Gerardi W. K. 190.
glomerata Blb. 187.
graeca Hornem. 191.
hirsuta All. 191.
hirsuta Thuill. 190.
Hornemanniana DC. 189.
intermedia Schult. 187.
lappacea DC. 192.
littoralis Rohde. 189.
lunata Rehb. 187.
lupulina L. 187.
maculata Willd. 190.
margnata Willd. 188.
marina L. 187.
media Pers. 185.
minima Lmk. 191.
minima γ , *longiseta* DC. 191.
mollissima Spr. 191.
muricata Lej. 192.
orbicularis All. 188.
polymorpha α , L. 188.
polymorpha β , L. 188.
polymorpha γ , *arabica* L. 191.
polymorpha δ , *coronata* L. 1065.

- Medicago** *polymorpha* α . *rigidula* L. 190.
polymorpha μ . *minima* L. 191.
procumbens Bess. 187.
prostrata Jcq. 187.
pubescens Hornem. 189.
radiata L. 187.
rigida Lmk. 190.
rigidula Roth. 191.
rigidula Thuill. 190.
rigidula Willd. 189.
sativa L. 186.
sativa β . Spenn. 186.
scutellata All. 188.
tentaculata Willd. 189.
Terebellum Willd. 192.
tribuloides Lmk. 189.
truncatula Gaertn. 189.
tuberculata Willd. 188.
villosa DC. 190.
villosa β . DC. 190.
Willdenowii a Bng. 188.
Willdenowii Merat. 188.
- Megastachya** *rigida* Beauv. 966.
- Melampyrum** L. 637.
arvense L. 637.
barbatum W. K. 638.
commutatum Tsch. 638.
cristatum L. 637.
memorosum L. 638.
pratense L. 638.
pratense Tsch. 638.
sylvaticum L. 638.
vulgatum Pers. 638.
- Melandrium** *pratense* Roehl. 123.
sylvestre Roehl. 123.
- Melica** L. 953.
Bauhini All. 953.
caerulea L. 963.
ciliata L. 953.
Lobelii Vill. 953.
montana Hds. 953.
nodosa Pill. et Mitterb. 964.
nutans L. 953.
nutans Poll. 953.
pyramidata Dsf. 953.
rigida Wib. 953.
uniflora Retz. 953.
- Melilotus** Trnf. 193.
alba Dsr. 194.
arvensis Wallr. 194.
caerulea Lmk. 195.
- Melilotus** *dentata* Willd. 193.
diffusa Koch. 194.
gracilis DC. 195.
leucantha Koch. 194.
macrorrhiza DC. 193.
mauritanica Willd. 195.
officinalis Dsf. 194.
officinalis Dsr. 194.
officinalis DC. 194.
officinalis Willd. 194.
parviflora Dsf. 195.
Petitpierreana Rchb. Willd. 194.
sulcata Dsf. 195.
vulgaris Willd. 194.
- Melissa** L. 662.
Acinos Benth. 661.
alba W. K. 662.
altissima Sibth. 662.
Calamintha L. 661.
Clinopodium Benth. 662.
cordifolia Pers. 662.
grandiflora L. 661.
graveolens Hst. 662.
hirsuta Hornem. 662.
Nepeta L. 661.
Nepeta β . *athonica* (β . *villosa*) Benth. 661.
officinalis L. 662.
officinalis β . *villosa* Benth. 662.
pyrenaica Jcq. 663.
romana Mill. 662.
- Melittis** L. 665.
grandiflora Sm. 665.
Melissophyllum L. 665.
- Mentha** L. 649.
acutifolia Rabh. 652.
adpersa Mönch. 651.
Agardhiana Fries. 652.
agrestis Sol. 653.
alata Hst. 652.
aquatica L. 651.
aquatica Mey. 651.
aquatica sylvestris Mey. 650.
aquatica γ . *crispa* Benth. 651.
arvensis Benth. 653.
arvensis L. 653.
arvensis Sol. 653.
arvensis δ . *rubra* Benth. 652.
arvensis η . Benth. 652.
arvensis ζ . *vulgaris* Benth. 653.
atrovirens Hst. 653.
austriaca Hst. 653.

Mentha austriaca Jcq. 651.

balsamea Willd. 650.
 candicans Crtz. 650.
 candicans Opitz. 650.
 canescens Rth. 649.
 carinthiaca Hst. 653.
 carniolica Hst. 652.
 chalepensis Mill. 650.
 citrata Ehrh. 651.
 crispa L. 651.
 crispa Ten. 650.
 crispata Schrad. 650.
 dentata Mönch. 652.
 dentata Roth. 652.
 divaricata Hst. 653.
 dubia Vill. 651.
 fragrans Presl. 649.
 gentilis Hst. 653.
gentilis L. 652.
 gentilis Mey. 652.
 gentilis Sm. 653.
 gentilis Sol. 652.
 glabrata Vahl. 651.
 gracilis α . Sm. 652. 653.
 gracilis γ . Sm. 652.
 grata Hst. 653.
 gratissima Lej. 649.
 Halleri Gmel. 650.
 hercynica Rhl. 650.
 hirsuta L. 651.
 hirta Willd. 650.
 hortensis Tsch. 652.
 hybrida Schleich. 649.
 intermedia Hst. 651.
 laevigata Willd. 650.
 Langii Steud. 651.
 laxa Hst. 653.
 longifolia Hst. 652.
 macrostachya Ten. 649.
 maculata Hst. 652.
 mollissima Borkh. 650.
 montana Hst. 652.
 multiflora Hst. 653.
 nemorosa Beck. 649.
 nemorosa Hst. 652.
 nemorosa Willd. 650.
nepetoides Lej. 650.
 niliaca Jcq. 649.
 nillaca Willd. 650.
 nitida Hst. 652.
 odorata Sol. 651.
 organifolia Hst. 652.

Mentha ovata Cav. 649.

palustris Mill. 651.
 palustris Mönch. 651.
 Patrini Lepech. 649.
 parviflora Hst. 653.
 parviflora Schultz. 652.
piperita L. 651.
 polymorpha Hst. 653.
 praecox Sol. 653.
pratensis Sol. 652.
 pratensis β . crispa Benth. 652.
 prostrata Hst. 653.
 pubescens Willd. 650.
 pulchella Hst. 653.
 Pulegium L. 653.
 purpurea Hst. 651.
 pyramidalis Benth. 651.
 pyramidalis Ten. 650. 651.
 reflexifolia Opitz. 650.
rotundifolia L. 649.
 rubra Hst. 653.
 rubra Hds. 652.
 rubra Sm. 652. 653.
 rugosa Lmk. 649.
sativa L. 651.
 sativa (Agardhiana) Fries. 652.
 sativa Tsch. 652.
 serotina Hst. 652.
 serotina Ten. 650.
 stachyoides Hst. 653.
 suaveolens Ehrh. 649.
 suaveolens Hst. 653.
 suavis Guss. 651.
 sylvatica Hst. 652.
 sylvatica nemorosa Rchb. 649.
 sylvestris Bck. 650.
sylvestris L. 649.
 sylvestris Willd. 649.
 sylvestris α . molissima Benth. 650.
 sylvestris γ . crispa Benth. 650.
 tenuifolia Hst. 653.
 tomentosa Drv. 650.
 tortuosa Hst. 652.
 undulata Willd. 650.
 varians Hst. 653.
 velutina Lej. 649.
 verticillata Rth. 651.
 viridis L. 650.
 viridula Hst. 652.

Mentha ovata L. 573.

Nymphoides L. 574.

- Menyanthes trifoliata** L. 573. **Moechringia trinervia** Chrv. 135.
Menziesia caerulea Sw. 563.
Mercurialis L. 753.
annua L. 753.
Cynocrampe Scop. 753.
longifolia Hst. 753.
ovata Stbg. 753.
perennis L. 753.
Mespilus L. 276.
Amelanchier L. 278.
Chamaemespilus L. 279.
Cotoneaster L. 275.
germanica L. 276.
monogyna Willd. 275.
Oxyacantha Grtn. 275.
Oxyacantha Scop. 275.
oxyacanthoides Thuill. 275.
vulgaris Rb. 276.
Meum Tournef. 349.
athamanticum Jcq. 349.
Foeniculum Spr. 343.
heterophyllum Mönch. 332.
inundatum Spr. 332.
Mutellina Gaertn. 349.
Miborna verna Beauv. 928.
Michelaria bromoides Dum. 975.
Micromeria Benth. 660.
graeca Benth. 660.
Juliana Benth. 660.
montana Rb. 659.
pygmaea Rb. 660.
variegata Rb. 659.
Micropus Benth. 413.
erectus L. 413.
Microstylis monophylla Lindl. 829.
Milium L. 936.
confertum Guss. 937.
effusum L. 937.
effusum β . Gaud. 937.
frutescens Sb. 937.
lendigerum L. 936.
multiflorum Cv. 937.
paradoxum L. 937.
scabrum R. u. S. 937.
Mimulus Alectorolophus Scop. 644.
Moechringia L. 134.
diversifolia Doll. 135.
muscosa L. 134.
polygonoides M. K. 134.
Ponae Fenzl. 134.
villosa Fenzl. 134.
Mönchia Ehrh. 139.
erecta Fl. d. Wett. 139.
glauca Pers. 139.
mantica Bartl. 139.
octandra 139.
quaternella Ehrh. 139.
Molinia Schrk. 963.
altissima Lmk. 963.
aquatica Wib. 963.
arundinacea Schrk. 963.
caerulea Mönch. 963.
distans Hrtm. 962.
littoralis Hst. 964.
maritima Hrtm. 963.
maxima Hrtm. 962.
serotina M. K. 964.
variabilis Wib. 963.
Molopospermum Koch. 371.
cicutarium DC. 372.
peloponnesiacum Koch. 372.
Momordica Elaterium L. 294.
Monerma monandra Beauv. 990.
subulata Beauv. 990.
Monesis grandiflora Salisb. 566.
Monotropa L. 567.
Hypophegea Wallr. 567.
Hypopitys L. 567.
Hypopitys Wallr. 567.
hypopitys α . Rth. 567.
hypopitys β . hirsuta Rth. 567.
Hypoxya Spr. 567.
MONOTROPEEN. 566.
Montia L. 295.
aquatica major Mich. 296.
aquatica minor Mich. 296.
arvensis Wallr. 296.
fontana L. 296.
fontana β . erecta Pers. 296.
fontana β . major Koch. 296.
fontana β . repens Pers. 296.
minor Gm. 296.
rivularis Gm. 296.
Morus L. 755.
alba L. 755.
nigra L. 755.
Mulgedium Cass. 512.
alpinum DC. 512.
alpinum Less. 512.

- Mulgedium Plumieri** DC. 512.
- Muscari** Tournef. 861.
botryoides Mill. 861.
comosum Mill. 861.
racemosum Mill. 861.
- Myagrurn** L. 87.
alpinum Lpr. 76.
aquaticum Lmk. 40.
auriculatum DC. 76.
austriacum Jcq. 40.
Baubini Gmel. 78.
clavatum Lmk. 88.
Crantzii Vitm. 40.
dentatum Willd. 78.
erucaefolium Vill. 87.
littorale Scop. 87.
paniculatum L. 87.
perenne L. 88.
perfoliatum L. 87.
pinnatifidum Ehrh. 78.
rostratum Scop. 86.
rugosum L. 89.
rugosum Vill. 87.
sativum L. 77.
sativum γ. L. 78.
saxatile L. 76.
taraxacifolium Lmk. 88.
- Mycelis angulosa** Cass. 509.
muralis Rb. 509.
- Mygalurus caudatus** Link. 967.
uniglumis Link. 966.
- Mylinum Carvifolia** Gaud. 331.
- Myosotis** L. 596.
alpestris Schm. 597.
apula L. 596.
arenaria Schrad. 598.
arvensis Link. 598.
arvensis Rb. 598.
arvensis β. *sylvatica* Pers. 597.
caespitosa Schultz. 597.
collina Rb. 598.
decumbens Hst. 597.
deflexa Wihlg. 587.
hispida Schld. 598.
intermedia Link. 598.
Lappula L. 587.
laxiflora Rb. 597.
lingulata R. S. 597.
lithospermifolia Hornem. 597.
montana M. B. 597.
nana Vill. 599.
- Myosotis nana** Wulf. 599.
odorata Poir. 597.
palustris Rb. 597.
palustris With. 593.
perennis Mönch. 597.
repens Rb. 597.
rupicola Engl. Bot. 597.
scorpioides Willd. 597.
scorpioides β. *palustris* L. 597.
scorpioides collina Ehrh. 598.
scorpioides palustris Ehrh. 597.
scorpioides sylvatica Ehrh. 597.
sparsiflora Mik. 593.
strigulosa Rb. 597.
stricta Link. 598.
suaveolens Kit. 597.
sylvatica Hoffm. 597.
sylvatica, var. *lactea* a Bngb. 597.
terglouensis Hacq. 599.
uliginosa Schrad. 597.
variabilis Ang. 597.
versicolor Pers. 598.
- Myosurus** L. 12.
minimus L. 12.
- Myrica** L. 786.
Gale L. 786.
- Myricaria** Dsv. 292.
germanica Dsv. 292.
squamosa Rb. 292.
- MYRICEEN.** 785.
- Myriophyllum** L. 285.
alterniflorum DC. 287.
pectinatum DC. 287.
spicatum L. 287.
verticillatum L. 286.
verticillatum β. *pinnatum* Willr. 286.
verticillatum γ. *pinnatifidum* Wallr. 286.
verticillatum γ. Wallr. 287.
- Myrrhis** Scp. 371.
aromatica Spr. 370.
aurea Spr. 369.
australis All. 366.
bulbosa Spr. 369.
Banum α. Ten. 371.
cynapioides Guss. 371.
hirsuta Spr. 370.
odorata Spr. 371.
Pecten ven. All. 366.

Myrrhis temula Spr. 369.

MYRTACEEN. 292.

Myrtus L. 293.

communis L. 293.

N.

NAJADEEN. 807.

Najas L. 807.

flexilis Rostk. et Schm. 807.

fluvialis Lmk. 807.

fragilis Rostk. et Schm. 807.

major Roth. 807.

marina α. L. 807.

minor All. 807.

monosperma Willd. 807.

Napus Agriasinapis Spenn. 64.

Leucosinapis Spenn. 64.

Narcissus L. 837.

biflorus Curt. 837. 1075.

incomparabilis Mill. 1075.

poëticus L. 837.

Pseudo-Narcissus L. 838.

radiiflorus Salisb. 837.

Tazetta L. 837.

Nardus L. 990.

aristata L. 990.

stricta L. 990.

Narthecium Mhr. 861.

anthericoides Hpp. 861.

iridifolium Vill. 863.

ossifragum Hds. 861.

Nasturtium R. Br. 39.

amphibium R. Br. 40.

α. indivisum DC. 40.

anceps Rb. 41. 1063.

aquaticum Wallr. 40.

armoracioides Tsch. 40.

austriacum Crtz. 40.

barbaraeoides Tsch. 41.

lippicense DC. 41.

microphyllum Rb. 40.

Morisoni Tsch. 41.

officinale R. Br. 39.

palustre DC. 41.

pyrenaicum R. Br. 42.

riparium Wallr. 40.

rivulare Rb. 41.

ruderale Sep. 83.

siifolium Rb. 40.

Nasturtium sylvestre Brw. 41.

sylvestre St. 38.

sylvestre Rb. 41.

terrestre Br. 41.

terrestre Tsch. 41.

Wulfenianum Hst. 42.

Naumburgia guttata Mönch. 683.

Neottia L. 827.

aestivalis DC. 828.

Nidus avis Rich. 827.

repens Swartz. 828.

spiralis Swartz. 828.

Neottidium Nidus avis a Schl. 827.

Nepeta L. 663.

amethystina Poir. 664.

angustifolia Vahl. 664.

aragonensis Lmk. 664.

austriaca Hst. 664.

Cataria L. 663.

citriodora Bck. 663.

croatica Spr. 662.

Glechoma Benth. 664.

Glechoma β. *hirsuta* Bnth. 664.

graveolens Vill. 664.

lanceolata Mill., Lmk., Rchb. 664.

Nepetella L. 663.

nuda L. 664.

paniculata Crtz. 664.

paniculata Mill. 664.

pannonica Jcq. 664.

pannonica L. 664.

pumila Spr. 662.

ucranica M. B. 664.

violacea Vill. 664.

Nephrodium rufidulum Mich. 1013.

spinulosum Strmp. 1017.

Nerium L. 573.

Oleander L. 573.

Neslia Dsv. 87.

paniculata Dsv. 87.

Nicotiana L. 602.

latissima Mill. 602.

macrophylla Spr. 602.

rustica L. 602.

Tabacum L. 602.

Nigella L. 24.

arvensis L. 24.

damascena L. 24.

sativa L. 24.

- Nigritella** Rich. 821.
angustifolia Rich. 821.
fragrans Sant. 821.
globosa Rb. 815.
suaveolens Koch. 821.
Noccaea alpina Rb. 84.
brevicaulis Rb. 84.
cepeaeifolia DC. 80.
procumbens Rb. 85.
Nonnea Medik. 591.
pulla DC. 591.
Notholaena R. Brwn. 1024.
Marantae R. Brwn. 1024.
Notochlaena *Marantae* Dsv. 1024.
Nuphar Sm. 31.
intermedium Ledeb. 32.
luteum Sm. 32.
pumilum Sm. 32.
sericeum Lang. 32.
Spennerianum Gd. 32.
minima Spenn. 32.
Nymphaea Sm. 31.
alba L. 31.
alba β . minor DC. 31.
biradiata Sommerauer. 31.
candida Presl. 31.
calmiana Hck. 32.
lutea L. 32.
minima Sm. 32.
pumila Hffm. 32.
NYMPHAEACEEN. 31.

O.

Obione pedunculata Mcq. Tand. 721.
portulacoides Mcq. Tand. 721.
Ochrus pallida Pers. 234.
Ocymum L. 648.
Basilicum L. 648.
Odontites lutea Rb. 647.
luteola Hffm. 338.
luteola Spr. 339.
semicomposita Spr. 338.
serotina Rb. 646.
tenuissima Spr. 338.
verna Rb. 646.
Oenanthe L. 341.
approximata Mrt. 342.
chaerophylloides Pourr. 342.
filipenduloides Thuill. 342.
Oenanthe fistulosa L. 341.
gymnorhiza Brign. 341.
Karstthiae Hacq. ? 354.
Lachenalii Gmel. 341.
megapolitana Willd. 341.
michefeldensis Lachen. 341.
peucedanifolia Poll. 342.
Phellandrium Lmk. 342.
pimpinelloides L. 342.
pimpinelloides Poll. 341.
pimpinelloides α . *chaerophylloides* DC. 342.
pimpinelloides β . *pimpinellaeifolia* DC. 342.
Pollichii Gmel. 342.
prolifera Hst. 342.
rhenana DC. 341.
silaifolia Bieb. 342.
Tabernaemontani Gmel. 341.
virgata hortorum et Koch. ap. DC. 342.
virgata Poir. 342.
Oenothera L. 284.
biennis L. 284.
muricata L. 285.
parvillora Gm. 285.
Oglifa arvensis Cass. 422.
Olea L. 569.
europaea L. 569.
OLEACEEN. 568.
Oligosporus condimentarius Cass. 429.
Omalocline prunellifolia Css. 520.
succisaefolia Monn. 520.
Omalotheca supina Cass. 423.
Omphalodes Tournef. 588.
repens Schrk. 588.
scorptoides Lehm. 588.
verna Mönch. 588.
Onagra biennis Scp. 285.
ONAGRARIEEN. 280.
Onobrychis Tournef. 223.
arenaria DC. 224.
Caput galli Lmk. 1066.
carnea Schlecht. 224.
gracilis Bess. 224.
montana DC. 223.
petraea Dsv. 224.
sativa Lmk. 223.
saxatilis DC. 224.

- O nobrychis** *supina* DC. 224.
supina Gd. 224.
viciaefolia Scop. 223.
Onoclea *crispa* L. 1025.
Spicant Hffm. 1023.
Struthiopteris Hffm. 1025.
Ononis L. 184.
altissima Lmk. 184.
antiquorum L. 184.
arvensis L. syst. 184.
arvensis α . *inermis* Sm. 184.
arvensis β . γ . Sm. 184.
campestris Koch. et Z. 184.
Cherleri Koch. 185.
Columnae All. 184.
foetens All. 184.
hircina Jcq. 184.
minutissima Jcq. 185.
mitis Gmel. 184.
mollis Lagasc. 185.
Natrix Lmk. 185.
parviflora Lmk. 184.
pilosa Brtl. 185.
pinguis DC. 185.
procurrens Wallr. 184.
reclinata L. 185.
repens L. Rb. 184.
rotundifolia L. 185.
spinosa L. DC. 184.
spinosa α . *mitis* L. 184.
spinosa β . L. 184.
subocculta Vill. 185.
O nopordum L. 475.
Acanthium L. 475.
elongatum Lmk. DC. 475.
illyricum L. 475.
Schultesii Britting. 475.
O nosma L. 592.
angustifolium Lehm. 593.
arenarium W. K. 592.
echiodes L. 592.
echiodes α . L. 593.
montanum Sm. 593.
montana β . Bert. 593.
stellulatum W. K. 593.
stellulata M. B. 593.
O phio glossum L. 1010.
lusitanicum L. 1010.
vulgatum L. 1010.
O phiurus *filiformis* R. S. 990.
incurvatus Beauv. 989.
O phrys L. 821.
- O phrys** *aestiva* Balb. 828.
aestivalis Lmk. 828.
alpina L. 823.
andrachnitis Rb. ic. 823.
anthropophora L. 823.
apifera Hds. 823.
arachnites Reich. 822.
aranifera Hds. 822.
atrata Lindl. 822.
Bertolonii Morett. 822.
corallorrhiza L. 828.
cordata L. 827.
fucifera Curt. 822.
fuciflora Rb. 822.
insectifera α . *myodes* L. 822.
insectifera η . L. 822.
insectifera ε . L. 823.
Loeselii L. 829.
liliifolia Lmk. 829.
monophyllos L. 829.
Monorchis L. 824.
muscifera Hds. 822.
myodes Sw. 822.
Nidus avis L. 827.
oestrifera Rb. 822.
ovata L. 827.
paludosa L. 829.
Pseudo-speculum DC. 823.
Speculum Bert. 822.
spiralis L. 828.
Oplismenus *undulatifolius* Kunth. 921.
Oporina *autumnalis* Don. 493.
pratensis Less. 493.
O p u n t i a Tournef. 309.
vulgaris Mill. 309.
ORCHIDEEN. 812.
O r c h i s L. 813.
abortiva L. 825.
acuminata Dsf. 814.
albida Scop. 820.
angustifolia Fries. 818.
angustifolia Rb. 818.
angustifolia Wimm. et Gr. 818.
Arachnites Scop. 822.
bifolia L. 821.
bifolia α . *macroglossa* Wallr. 821.
 β . brachyglossa Wallr. 821.
 β . elatior Gd. 821.
comosa Scop. 818.

- Orculis conopsea** L. 819.
coriophora L. 815.
divaricata Rich. 818.
fusca Jcq. 813.
globosa L. 815.
haematodes Rb. 818.
hircina Swartz. 820.
incarnata Fries. 818.
incarnata L. 818.
incarnata Willd. 817.
incarnata Wimm. 818.
latifolia L. 818.
latifolia St. Frs. Rb. 818.
latifolia Scop. 817.
laxiflora Lmk. 817.
Lingua Scop. 824.
macrophylla Column. 825.
maculata L. 817.
majalis Rb. 818.
mascula Jcq. 816.
mascula L. 816.
militaris L. 814.
militaris β . γ . ϵ . L. 813. 814.
moravica Jcq. 813.
Morio L. 815.
muscaria Scop. 822.
nigra Scop. 821.
odoratissima L. Jcq. 819.
ornithis Jcq. 819.
pallens L. 816.
palustris Jcq. 817.
papilionacea L. 817.
provincialis Balb. 816.
pyramidalis L. 819.
rubra Jcq. 817.
sambucina L. 817.
sambucina incarnata var. sub-
alpina Rb. 819.
Simia Lmk. 814.
Simia Vill. 814.
speciosa Hst. 817.
Spitzelii Sant. 816.
suaveolens Vill. 821.
Tabernaemontani Gmel. 817.
tephrosanthos Vill. 814.
Traunsteineri Sant. 818.
tridentata Scop. 814.
ustulata L. 815.
variegata All. 814.
virescens Zollik. 821.
viridis L. 820.
Oreoselinum legitimum M. B. 355.
Oreoselinum rablense Hflm. 356.
Ori ganum L. 656.
creticum DC. 657.
creticum Hayn. 657.
creticum Sieh. 657.
creticum β . L. 657.
heracleoticum Benth. 657.
hirtum Link. 657.
macrostachyum Link. 657.
Majorana L. 657.
majoranoides Willd. 657.
megastachyum Link. 657.
monspeliense Tabern. 657.
paniculatum Koch. 657.
virens Hflm. Link. 657.
vulgare L. 657.
vulgare β . prismaticum Gd. 657.
O r l a y a Hflm. 363.
grandiflora Hflm. 363.
platycarpus Koch. 363.
O r n i t h o g a l u m L. 846.
arcuatum Stev. 847.
arvense Pers. 850.
bohemicum Gd. 850.
bohemicum Zauschn. 850.
bohemicum β . saxatile D. Fl.
850.
chloranthum Saut. 849.
collinum Bert. 848.
collinum Guss. 848.
comosum L. 847.
exscapum 848.
fistulosum Wallr. 850.
fistulosum Ramond. 850.
garganicum Ten. 848.
gracile Hagen. 851.
Gussonii Ten. 848.
Haynii Roth. 851.
Liottardi Stbg. 850.
luteum Hflm. et mult. auct. 849.
luteum β . L. 851.
luteum β . sylvaticum Willd. 851.
minimum L. 851.
minimum Rth. 850.
minimum β . Whlbg. 851.
montanum Cyrill. 848.
narbonense Dod. 847.
narbonense L. 847.
nutans L. 848.
orthophyllum Ten. 848.
pannonicum albo flore Clus.
848.

- Ornithogalum Personii** Hpp. 851.
pratense Pers. ? 849.
pratense Whlbg. 849.
pusillum Schm. 851.
pyrenaicum Bertol. Gonan. 846.
pyrenaicum β . *stachyoides* DC. 847.
pyrenaicum L. DC. 847.
refractum W. et Kit. 848.
saxatile Vis. 848.
spathaceum Hayn. 851.
stachyoides Ait. 847.
stachyoides Hst. 846.
stachyoides Schl. 847.
stenopetalum Fries. 849.
stenopetalum γ . D. Fl. 849.
Sternbergii Hopp. 851.
striatum MB. 844.
sulfureum R. S. 846.
sylvaticum Pers. 851.
tenuifolium Guss. 848.
tunicatum Presl. 851.
umbellatum L. 848.
villosum M. B. 850.
- Ornithorhynchium syriacum** Rhl. 86.
- Ornithopus** L. 222.
intermedius Roth. 222.
perpusillus L. 222.
roseus Dufour. 222.
sativus Brot. 222.
scorpioides L. 221.
- Ornus europaea** Pers. 570.
- Orobanche** L. 629.
amethystea Thuill. 635.
arenaria Brkh. 636.
Artemisiae campestris Gd. 633.
barbata Poir. 635.
bipontina Schultz. 632.
Buekii Dietr. 632.
Buekiana Koch. 635.
caerulea Vill. 636.
caerulescens Steph. 636.
caryophyllacea Rb. Sm. 632.
caryophyllacea Schultz. 629.
cruenta Bertol. 629.
elatio Koch. et Z. 632.
elatio Dietr. 636.
elatio Sutt. 630. 636.
elatio Schleich. 633.
elatio β . *microglossa* Willr. 635.
- Orobanche Eptithymum** DC. 631.
Eryngii Dub. 635.
flava Mart. 634.
fragrans Koch. 636.
Galii Dub. 631.
Galii Rehb. 632.
gracilis Sm. 629.
Hederae Dub. 635.
laxiflora Rb. 632.
loricata Rb. exc. 633.
loricata Rb. ic. 634.
lucorum Alex. Braun. 634.
major DC. 629.
major L. Sm. 630.
major Poll. 632.
Medicaginis Schultz. 632.
minor Sutt. 635.
pallidiflora Wimm. et Gr. 631.
Picridis Fr. W. Schultz. 633.
procera Koch. 630.
pruinosa Lpr. 630.
purpurea Jcq. 636.
ramosa L. 636.
Rapum Thuill. 629.
rubens Wallr. 632. 636.
rubra Engl. Bot. 631.
Salviae Fr. W. Schultz. 634.
Scabiosae Koch. 630.
sparsiflora Wallr. 631.
speciosa DC. ? 631.
speciosa Dietr. 631.
stigmatotes Wim. 632.
strobiligena Rb. 632.
Teucrii Schlitz. 632.
vulgaris DC. 632.
vulgaris Gd. 629.
vulgaris Rb. 632.
- OROBANCHEEN.** 629.
- Orobis** L. 238.
albus L. fil. 239.
alpestris W. K. 239.
asphodeloides Gn. 239.
austriacus Crtz. 239.
canescens L. fil. 239.
Clusii Spreng. 228.
filiformis Lmk. 239.
flaccidus Rad. 238.
gracilis Gaud. 238.
lacteus M. B. 239.
laevigatus W. K. 240.

- Orob**us linifolius Reich. 239.
luteus L. 239.
 montanus Hpp. et Hornsch. 239.
 montanus Scop. 240.
 multiflorus Sb. 238.
niger L. 240.
 pallescens M. B. 239.
 pannonicus Kram. 239.
 prostratus Hst. 239.
 pyrenaicus Scop. 238.
 rigidus Lang. 238.
 setiformis Schl. 238.
 sylvaticus L. 225.
 tenuifolius Rth. 239.
 tristis Lang. 240.
tuberosus L. 239.
variegatus Tn. 238.
 varius Soland. 239.
 venetus Mill. Rb. 238.
vernus L. 238.
 vernus β . latifolius Roch. 238.
 versicolor Gmel. 239.
 vicioides DC. 223.
Orthopogon undulatifolius Spr. 921.
 Burmanni R. Br. 921.
Orvala garganica L. 666.
 lamioides DC. 666.
Osmunda L. 1011.
 crispa L. 1025.
 Lunaria L. 1009.
 matricariae Schrk. 1010.
regalis L. 1011.
 Spicant L. 1023.
 Struthiopteris L. 1025.
Ostericum Hoffm. 351.
palustre Bess. 351.
 pratense Hoffm. 351.
 verticillare Rb. 356.
Ostrya Michel. 760.
carpinifolia Scop. 760.
 italica carpinifolia Mich. 760.
Osyris L. 739.
alba L. 739.
OXALIDEEN. 166.
Oxalis L. 167.
Acetosella L. 167.
 Acetosella δ . parviflora DC. 167.
corniculata L. 167.
 corniculata Sturm. 167.
Oxalis parviflora Lej. 167.
stricta L. 167.
Oxycoccus palustris Pers. 561.
Oxyria Hill. 730.
digyna Cambd. 731.
 reniformis Hk. 731.
Oxys Acetosella Scop. 167.
Oxytropis DC. 213.
campestris DC. 213.
cyanea M. B. 214.
foetida DC. 214.
Halleri Bung. 213.
lapponica Gd. 214. 1065.
montana DC. 214.
 montana Sprg. 216.
pilosa DC. 214.
 sordida Gand. 213.
triflora Hopp. 214.

P.

Pachypleurum Ledeb. 349.
 simplex Rb. 349.
Paederota L. 627.
Ageria L. 627.
 Ageria β . Bert. 628.
 Bonarota Jcq. 627.
Bonarota L. Suffr. 627.
 Bonarota β . Bert. 627.
 caerulea L. fil. 627.
 chamaedryfolia Suffren. R. et S. Brign. Mich. 627.
 lutea L. fil. 628.
 urticifolia Brign. 628.
 Zanichellii Brign. 628.
Paeonia L. 29.
 bannatica Roch. 30.
corallina Retz. 29.
 festiva Tsch. 30.
 humilis Retz. 30.
 officinalis D. fl. 30.
 officinalis Retz. 30.
 officinalis β . L. 29.
 paradoxa And. 30.
 paradoxa β . lejocarpa DC. 30.
peregrina DC. 29.
 peregrina β . DC. 30.
 peregrina D. fl. 30.
 pubens Sm. 30.
 rosea Hst. 30.
 Russi Biv. 29.
Palimbia Chabraei DC. 354.

- Paliurus** Tournef. 171.
aculeatus Lmk. 171.
australis Gärtn. 172.
- Pallenis** Cass. 415.
spinosa Cass. 415.
- Panicum** L. 920.
bicolor Mönch. 921.
Burmanni M. B. Retz. 921.
capillare L. 921.
ciliare Retz. 920.
Crus Galli L. 920.
Dactylon L. 929.
flavescens Mönch. 922.
germanicum Roth. 922.
glabrum Gd. 920.
glaucum L. 922.
hirtellum Wulf. All. 921.
humifusum Kunth. 920.
Ischaemum Schreb. 920.
lineare Krock. 920.
miliaceum L. 921.
Milium Pers. 921.
reclinatum Vill. 921.
sanguinale L. 920.
sanguinale Poll. 920.
sibiricum hortor. 922.
undulatifolium Ard. 921.
verticillatum L. 921.
viride L. 921.
viride β . *majus* Gd. 921.
Weinmanni R. S. 921.
- Papaver** L. 32.
alpinum Hopp. 33.
alpinum Jcq. 33.
alpinum L. 32.
Argemone L. 33.
arvense Borkh. 33.
aurantiacum Lois. 33.
Burseri Crtz. 33.
clavigerum Lmk. 33.
dubium L. 33.
hybridum L. 33.
intermedium Beck. 33.
laevigatum M. B. 34.
maritimum With. 33.
officinale Gmel. 34.
pyrenaicum α . *luteum* DC. 33.
Rhoeas L. 33.
Rhoeas β . *strigosum* a Bngl. 33.
Roubiaei Vig. 33.
setigerum DC. 34.
- Papaver somniferum** Gmel. 34.
somniferum L. 34.
trilobum Wallr. 33.
- PAPAVERACEEN.** 32.
- Papia** Michel. 666.
- PAPILIONACEEN.** 175.
- Paradisia** Mzg. 846.
hemeroanthericoides Mzg. 846.
Liliastrum Bert. 846.
- Parietaria** L. 754.
diffusa M. K. 754.
erecta M. K. 754.
judaica Hoffm. 754.
judaica L. 754.
lusitanica β . M. B. 754.
lusitanica DC. L. 754.
ocymi folio Bocc. 754.
officinalis Poll. 754.
officinalis Willd. 754.
- Paris** L. 839.
quadrifolia L. 839.
- Parnassia** L. 104.
palustris L. 104.
- Paronychia** Trnf. 298.
capitata Lmk. 298.
serpyllifolia DC. 298.
serpyllifolia D. Fl. 298.
- PARONYCHIEEN.** 296.
- Paspalum** ambiguum DC. 820.
ciliare DC. 820.
sanguinale Lmk. 820.
umbellatum Lmk. 929.
- Passerina** L. 734.
annua Wickstr. 735.
hirsuta L. 735.
- Pastinaca** L. 357.
Anethum Spr. 357.
Fleischmanni Hladn. 357.
glauc Scop. ? 354.
opaca Bernh. 357.
sativa L. 357.
- Pedicularis** L. 638. .
acaulis Scop. 642.
adscendens Gd. 640.
adscendens Hopp. 640.
asplenifolia Floerk. 639.
atrorubens Schlich. 640.
Barrelierii Rb. 640.
comosa L. 641.

- Pedicularis fasciculata* Bell. 639.
flammea Wulf. 642.
foliosa L. 641.
Friederici Augusti Tomm. 641.
gyroflexa b. Vill. 639.
gyroflexa Gaud. 639.
Hacquetii Grf. 641.
Jacquinii Koch. 638.
incarnata Jcq. 640.
Oederi Vahl. 642.
palustris L. 640.
Portenschlagii Saut. 639.
recutita L. 642.
rosea Jcq. 642.
rostrata Jcq. 638.
rostrata L. 638.
Sceptrum Carolinum L. 643.
sudetica Willd. 641.
sylvatica L. 640.
tuberosa L. 639.
versicolor Whlbg. 642.
verticillata L. 643.
- Peltaria* L. 70.
alliacea L. 70.
- Peltidium apargioides* Zollik. 504.
- Pennisetum verticillatum* R. Br. 921.
- Peplis* L. 291.
Portula L. 291.
- Periclymenum italicum* Mill. 378.
vulgare Mill. 379.
- Peristylus albidus* Lindl. 820.
viridis Lindl. 820.
- Persica* Trnf. 241.
laevis DC. 242.
vulgaris DC. 242.
vulgaris Mill. 241.
- Pervinca major* Scop. 572.
minor Scop. 572.
- Petasites* Gaertn. 406.
albus Gaertn. 407.
niveus Baumg. 407.
officinalis Mönch. 406.
officinalis Fl. d. Wett. 407.
spurius (Tussilago) Retz. 407.
vulgaris Dsf. 407.
- Petrocallis* R. Brw. 71.
pyrenaica R. Brw. 71.
- Petroselinum* Hoffm. 330.
sativum Hoffm. 330.
sativum β . crispum DC. 330.
- Petroselinum segetum* Koch. 330.
- Pencedanum* L. 353.
alsaticum L. 355.
alsaticum β . D. Fl. 355.
austriacum Koch. 355.
carvifolium Vill. 354.
Cervaria Lpr. 354.
Chabraei Rb. Gaud. 354.
gallicum Pers. 354.
montanum Koch. 355.
officinale L. 353.
officinale Thuill. 354.
Oreoselinum Mönch. 355.
Ostruthium K. 357.
palustre Mönch. 356.
paristense DC. 353.
Petteri 354.
pratense Lmk. 348.
rablense Koch. 356.
rothenicum 354.
Schottii Bess. DC. 354.
Schottii β . petraeum Noë. 354.
Silaus L. 348.
sylvestre DC. 356.
venetum Koch. 355.
verticillare Koch. 356.
- Phaca* L. 211.
alpina Jcq. 212.
alpina L. 212.
astragalina DC. 212.
australis L. 212.
campestris Whlbg. 213.
campestris β . sordida Whlbg. 213.
frigida L. 212.
glabra Clar. 212.
Halleri Vill. 212.
lapponica Whlbg. 214.
minima All. 212.
montana Crtz. 214.
montana Whlbg. 214.
ochreata Crtz. 212.
oroboides DC. 212.
Tragacantha All. 219.
uralensis Wbg. 213.
- Phacellium lampsanoides* Cass. 519
- Phalacrodiscus lanceolatus* Lss. 441.
- Phalangium Liliago* Schreb. 845.
ramosum Lmk. 846.

- Phalangium serotinum** Lmk. 844. **Phleum cristatum** Sep. 964.
Phalaris L. 922.
alpina Haenk. 927.
aquatica Ait. 922.
aquatica L. 922.
arenaria Willd. 926.
arundinacea L. 923.
arundinacea picta L. 923.
aspera Retz. 927.
bulbosa L. 926.
bulbosa Presl. 923.
canariensis L. 922.
caerulescens Dsf. 923.
cylindrica DC. 926.
minor Retz. 922.
oryzoides L. 929.
paradoxa L. 923.
phleoides L. 927.
sativa Pers. 926.
subulata Sav. 926.
tenuis Hst. 926.
variegata Spr. 923.
Phaseolus L. 240.
coccineus Lmk. 240.
multiflorus Willd. 240.
nanus L. 240.
vulgaris L. 240.
vulgaris a. L. 240.
vulgaris β. coccineus L. 240.
Phellandrium aquaticum L. 343.
Mutellina L. 349.
PHILADELPHÉEN. 292.
Philadelphus L. 292.
coronarius 292. 1069.
Phillyrea L. 569.
angustifolia L. 569.
latifolia L. 569.
media L. 569.
Phleum L. 926.
Aegylops Scop. 989.
alpinum L. 927.
arenarium L. 926.
asperum Vill. 927.
autumnale Sep. 940.
Bellardi Willd. 926.
Bertolonii DC. 927.
Boehmeri Wib. 927.
bulbosum Hst. 927.
capitatum Sep. 928.
commutatum Gaud. 927.
crinitum Schrb. 930.
echinatum Hst. 927.
felinum Sm. 928.
Gerardi Panz. 927.
glabrum Bernh. 927.
hirsutum Sut. 927.
Hostii Hort. Vind. 927.
laeve M. B. 927.
Micheli All. 926.
nodosum L. 927.
paniculatum Huds. 927.
phalaroides Koel. 927.
pratense L. 927.
schoenoides Jcq. 926.
schoenoides L. 926.
tenuis Schrd. 926.
trigynum Hst. 927.
ventricosum Mch. 927.
viride All. 927.
Phlomis L. 676.
tuberosa L. 676.
Phoenixopus decurrens Cass. 509.
muralis Kch. 509.
vimineus Rb. 509.
Phragmites Trin. 938.
communis Trin. 938.
communis b. repens Mey. 938.
communis var. flavescens Cust. 938.
Physalis L. 601.
Alkekengi L. 601.
Physocaulus Tsch. 368.
nodosus Tsch. 369.
Phytenua L. 548.
betonicifolium Vill. 550.
canescens W. K. 550.
Carestiae Bir. 548.
Charmelii DC. 549.
Charmelii Sieb. 549.
Charmelii Vill. 549.
Charmelii varietas Vill. 549.
comosum L. 550.
cordata Vill. 549.
corniculatum Clrv. 549.
fistulosum Rb. 549.
globulariaefolium Hpp. Stbg. 548.
globulariaefolium Rb. 548.
graminifolium Sieb. 548.
Halleri All. 550.
hemisphaericum 548.
humile Schlch. 548.

- Phyteuma lanceolata** Vill. 549. **Pimpinella hircina** Leers. 336.
Michelii Bert. 549. *magna* L. 335.
Michelii Hgtschw. All. 550. *magna* γ . laciniata Wall. 336.
nigrum Schm. 550. *magna* δ . Wallr. 336.
orbiculare L. 549. *media* Hoffm. 336.
ovale Hopp. 550. *nigra* Willd. 336.
ovatum Schm. 550. *orientalis* Gn. 336.
pauciflorum L. 548. *peregrina* L. 336.
pauciflorum Rb. 548. *pumila* Jcq. 331.
persicifolia Hpp. 550. *rubra* Hopp. 336.
Scheuchzeri All. 549. *saxifraga* L. 336.
Scheuchzeri DC. 549. *saxifraga* A. minor, *poterifolia*
Scorzonerifolium Vill. 550. Willr. 336.
Sieberi Spr. 548. *saxifraga* B. major Wallr. 336.
spicatum L. 550. *saxifraga* γ . alpestris Spr. 336.
spicatum β . *Rapunculus* Pres. 550. *saxifraga dissectifolia* Wallr.
urticifolium Clrv. 550. 336.
Phytolacca L. 711. *Tragium* Rehb. 336.
decandra L. 711. *verticillata* Dub. 332.
- PHYTOLACCEEN.** 711. **Pimpinella Sanguisorba** Grt. 274.
Picea excelsa Link. 793. **Pinardia** Cass. 443.
vulgaris Link. 793. *coronaria* Less. 443.
Picnemon Cass. 470. **Pinaster Pumilio** Clus. 790.
Acarna Cass. 470. 1037. **Pinguicula** L. 682.
Picotia verna R. S. 583. *alba* Kuchl. 683.
Picrens flavescens Rb. 875. *alpina* L. 682.
Monti Rb. 877. *flavescens* Flk. 683.
Picridium Dsf. 512. *grandiflora* Lmk. 683.
albidum DC. 513. *gypsophila* Wallr. 683.
vulgare Dsf. 513. *leptoceras* Rb. 683.
Picris L. 496. *longifolia* Ramond. 683.
crepoides Sant. 497. *purpurea* Willd. 683.
Echioides L. 497. *vulgaris* L. 683.
hieractoides L. 497. *vulgaris macrantha* Tsch. 683.
hispidissima Bartl. 497. *vulgaris* β . *alpicola* Rb. 683.
laciniata Vis. 497. **Pinus** L. 789.
paleacea Vest. 497. *Abies* L. 793.
ruderalis Schm. 496. *Abies* Du Roi. 792.
saxatilis All. 494. *austriaca* Höss. 791.
Taraxaci All. 493. *Cembra* L. 792.
umbellata Nees ab Es 497. *excelsa* Lmk. 793.
Pilularia L. 1004. *halepensis* M. B. 791.
globulifera L. 1005. *Laricio* Poir. 791.
Pimpinella L. 335. *Laricio* Santi. 791.
alpina Hst. 336. *Laricio* α . *Poiretiana* Ant. 791.
angelicaefolia Lmk. 333. *Laricio* β . *austriaca* Ant. 791.
Antium L. 336. *Laricio* γ . *Pallasiana* Ant. 791.
dissecta Retz. 336. *Larix* Ant. 792.
genevensis Vill. 332. *Larix* L. 792.
glauca L. 331. *maritima* Ait. 791.
glauca W. et Kit. 331. *maritima* Lmk. 791.

Pinus *maritima* Pollech. 791.
maritima B. minor Duh. 791.
maritima major Duh. 791.
Mughus Jcq. 789, 790.
Mughus Poir. 790.
Mughus Scp. 790.
nigra Link. 791.
nigricans Hst. 791.
obliqua Sant. 790.
Pallasiana Lamb. 791.
Picea Ant. 792.
Picea Du Roi. 792, 793.
Picea L. 792.
Pinaster 789.
Pinaster Ait. 791.
Pinaster Roch. 791.
Pinea L. 792.
Pumilio Haenk. Ant. 790.
rotundata Link. 790.
rubra Mill. 789.
sylvestris Mill. 789, 791.
sylvestris L. 789.
sylvestris γ . L. 791.
uliginosa Autor. 789.
uliginosa Neum. 790.
uncinata Ant. 791.
uncinata Ram. 790.

Piptatherum Bv. 937.
multiflorum Bv. 937.
paradoxum Bv. 937.

Pistacia L. 174.
Lentiscus L. 174.
Terebinthus 174.

Pisum L. 233.
arvense L. Schübl. et Mart. 233.
elatius M. B. 233.
elatum DC. 233.
maritimum L. 233.
Ochrus L. 234.
sativum L. 233.

PLANTAGINEEN. 704.

Plantago L. 705.
alpina L. 707.
alpina Sieb. 708.
alpina Vill. 707.
altissima L. 705.
arenaria W. K. 709.
argentea Lmk. Vill. 706.
atrata Hopp. 707.
Bellardi All. 707.

Plantago *bidentata* Murith. 708.
capitata Hpp. 706.
carinata Schrd. 708.
Cornuti Gn. 705.
Coronopus L. 709.
Cynops DC. 709.
Cynops L. 709.
decumbens Rb. 706.
dentata Roth. 708.
genevensis DC. 709.
Gerardi Schl. 708.
graminea DC. 708.
graminea Schleich. 708.
Gouani Spr. 705.
holostea Lmk. 707.
Holosteum Scop. 708.
incurvata Murr. 708.
integralis Gaud. 709.
Lagopus L. 705.
lanata Portschl. 707.
lanata Poir. 706.
lanceolata L. 706.
lanceolata β . DC. 706.
lanceolata γ . *sphaerostachya* D. Fl. 706.
lanceolata δ . D. Fl. 706.
lanceolata var. *capitellata* Sond. 706.
lanceolata ϵ . DC. 706.
lanceolata η . *alpina* Gaud. 706.
limosa Kit. 705.
major L. 705.
maritima DC. 709.
maritima L. 707.
maritima Rth. 703.
media L. 705.
media *procera* Sond. 705.
minima DC. 705.
montana Lmk. 707.
montana β . *holosericea* Gd. 707.
pilosa Pourr. 707.
pilosa Roth. 707.
Psyllium L. 709.
Psyllium Strm. 709.
recurvata L. 708.
saxatilis M. B. 707.
sericea W. K. 705.
serpentina Lmk. 705.
serpentina Rb. 708.
subulata Wulf. 708.

- Plantago** *Tabernaemontani* Bmg. 705.
ungarica W. K. 706.
Victorialis Poir. 706.
Victorialis DC. 706.
Wulfeni Bernh. 708.
Wulfeni M. K. 708.
Wulfeni Schrb. 708.
Wulfeni Willd. Spreng 708.
- Platanthera** Rich. 820.
btfolia Rich. 821.
brachyglossa Rb. 821.
chlorantha Cust. 821.
- Platyspermum** *grandiflorum* D. Fl. 363.
- Pleurogyne** *carinthiaca* Grieseb. 575.
- Pleurospermum** Hoffm. 372.
austrlacum Hoffm. 372.
Golaka Rb. 373.
- PLUMBAGINEEN** 701.
- Plumbago** L. 704.
europaea L. 704.
- Poa** L. 955.
niroides Koel. 953.
alpina L. 957.
alpina H. *brevifolia* Gaud. 958.
- Poa** *alpina* γ . Gd. 957.
alpina *vivipara* L. 957.
altissima Mönch. 952.
angustifolia Rb. 950.
angustifolia L.? Sm. 959.
angustifolia Poll. 951.
annua L. 956 1075.
annua H. *varia* Gd. 956.
aquatica Leers. 962.
arenaria α , β , γ . Trin. 962. 963.
aspera Gaud. 958.
badensis Hnk. 958.
badensis Strm. 957.
brevifolia DC. 958.
brizoides Wöhl. 958.
bulbosa L. 957.
bulbosa β . *vivipara* L. 957.
caesia Sm. 958.
caespitosa Pr. 959.
capillata Mrt. 968.
cenisia All. 961.
cenisia Bert. 961.
cenisia Hst. 958.
cenisia Rb. 958.
- Poa** *coarctata* Hall. fil. 959.
collina Hst. 958.
compressa L. 951.
compressa Wb. 961.
compressa β . *effusa* Tsch. 962.
concinna Gd. 957.
cristata L. 941.
curvata Koel. 973.
decumbens Scop. 953.
depressa Presl. 961.
distans L. 962.
disticha Wulf. 941.
distichophylla Gd. 961.
dubia Leers. 950.
dubia Sut. 959.
dura Scop. 955.
effusa Kit. 959.
elegans DC. 956.
Eragrostis L. 955.
fertilis Hst. 959.
festucaeformis Hst. 962.
flavescens Thom. 956.
flexuosa Sm. 956.
flexuosa Whlbg. 961.
fluitans Sep. 962.
Gaudini R. S. 958.
Gerardi All. 971.
glabra Ehrh. 961.
glauca Schk. 942.
glauca Sm. 958.
Halleridis R. S. 961.
humilis Ehrh. 961.
hybrida Gd. 960.
hybrida Rchb. 960.
Koeleri DC. 958.
Langeana Rchb. 962.
laxa Haenk. 956.
littoralis Gn. 964.
loliacea Huds. 955.
maritima Hds. 963.
megastachya Koel. 954.
minor Gaud. 956.
Molinerii Balb. 958.
muralis Wib. 961.
nemoralis L. 958.
nemoralis β , δ , γ . *glauca* ϕ . *caesia* D. Fl. 959.
nemoralis *vulgaris* Gaud. 959.
nemoralis *vulgaris* β . Gaud. 959.
nemoralis H. *firmula* Gd. 959.
nemoralis Hl. *montana* Gd. 959.
nemoralis Vl. *coarctata* Gd. 959.

P o a *pallens* Gd. 961.
palustris DC. 959.
palustris Rth. 959.
pectinata Lmk. 942.
Phoenix Scp. 973.
pilosa L. 955.
polymorpha Wib. 959.
pratensis Lrs. 959.
pratensis L. 961.
pratensis Poll. 960.
pratensis angustifolia Sm. 961.
pratensis IV. anceps Gd. 961.
pratensis γ. Sm. 961.
pumila Hst. 956.
pungens M. B. 964.
pyramidata Lmk. 942.
quadripedalis Ehrh. 960.
retroflexa Crt. 962.
rigida L. 966.
rubens Mönch 960.
salina Poll. 962.
scabra Ehrh. 960.
Scheuchzeri Sut. 959.
serotina Gd. Ehrh. 959.
serotina Schrd. 959.
seslerioides All. 941.
setacea Koel. 968.
stolonifera Bellard. 961.
subcaerulea Engl. Bot. 961.
sudetica Hnk. 960.]
sudetica β. *remota* Fries. 960.
supina Panz. 956.
supina Schrd. 956.
sylvatica Poll. 971.
sylvatica Vill. 960.
thermalis Prs. 958.
trinervata DC. 960.
trinervata Schrad. 971.
trivialis Leers. 959.
trivialis L. 960.
trivialis Poll. Koel. 958.
variegata Hall. fil. 956.
violacea Bellard. 970.

P o d o s p e r m u m DC. 502.
calcitrapifolium DC. 503.
Jacquinianum Kch. 502.
laciniatum DC. 502.
muricatum DC. 503.
octangulare DC. 502.
resedifolium DC. 503.

POLEMONIACEEN. 583.

P o l e m o n i u m L. 583.
caeruleum L. 584.
Pollichia Galeobdolon Willd. 667.
Pollinia distachyos Spreng. 918.
P o l y c a r p o n L. 298.
alsinesfolium DC. 1069.
tetraphyllum L. fil. 298. 1069.
P o l y c n e m u m L. 715.
arvense L. 715.
inundatum Schk. 715.
majus Alx. Br. 715.
pumilum Hpp. 715.
P o l y g a l a L. 104.
alpestris Rb. 107.
amara Jcq. 107.
amara L. 106.
amara Rchb. 106.
amarella Crtz. 107.
amblyptera α. Rb. 107.
amblyptera β. *pubescens* Rbch. 105.
austriaca Rb. 107.
buxifolia β. Rb. 105. 107.
Buxi min. fol. Vaill. 106.
calcareia Schltz. 105.
Chamaebuxus L. 107.
comosa Schk. 105.
depressa Wndr. 106.
majus Jcq. 105.
monspeliaca. 106.
multicaulis Tsch. 105.
myrtifolia Frs. 107.
nicaeensis Risso. 105. 1064.
oxyptera Rb. 105.
serpyllacea Weihe. 106.
uliginosa Rb. 107.
vulgaris L. 105.
vulgaris densiflora Tsch. 105.
vulgaris depressa Fries. 106.

POLYGALEEN. 104.

POLYGONEEN. 724.

P o l y g o n u m L. 731.
alpinum All. 734.
amphibium L. 731.
amphibium α. *natans* Mönch. 731.
amphibium β. D. Fl. 732.
amphibium β. *terrestre* Lrs. 732.
angustifolium Rth. 732.
aviculare L. 733.

- Polygonum** aviculare β . erectum Roth. 733.
Bellardi All. 733.
Bistorta L. 731.
Braunii Bl. Fgh. 732.
Convolverulus L. 733.
dubium Stein. 732.
dumetorum L. 733.
Fagopyrum L. 734.
Hydropiper L. 732.
hydropiperoides Michx. 732.
incanum Schum. 732.
lapathifolium L. Wblb. 732.
lapathifolium α . Roth. 732.
laxiflorum Weih. 732.
littorale Link. 733.
maritimum L. 733.
minus Hds. 732.
mile Schrk. Mey. Pers. 732.
nodosum Prs. 732.
patulum M. B. 733.
Persicaria L. 732.
Persicaria β . angustifolium L. 733.
Persicaria γ . L. 732.
pusillum Link. 732.
rivulare Rth. 732.
strictum All. 732.
tataricum L. 734.
tomentosum Schrk. 732.
viviparum L. 731.
- Polypodium** L. 1011.
aculeatum L. 1014.
alpestre Hpp. 1012.
alpestre Spenn. 1012.
alpinum Wulf. 1019.
anthriscifolium Hffm. 1019.
arvonicum Wthrg. 1013.
calcareum Sm. 1012.
Callipteris Ehrh. 978. 1017.
cambricum L. 1012.
cristatum L. 1017.
cynapifolium Hffm. 1019.
dentatum Dicks. 1018.
dentatum St. 1020.
dilatatum Hffm. 1017.
Dryopteris Bolt. 1012.
Dryopteris L. 1012.
Filix femina L. 1020.
Filix mas. L. 1016.
fontanum L. 1021.
fragile L. 1018.
- Polypodium** fragile angustatum Hffm. 1019.
fragrans Vill. 1018.
Heleopteris Brkh. 1016.
hyperboreum Sw. 1013.
hyperboreum Wblb. 1013.
ilvens Sw. 1013.
limbospermum All. 1016.
lobatum Huds. 1014.
Lonchitis L. 1014.
Marantae Hffm. 1013.
molle All. 1013.
montanum Hak. 1019.
montanum Vogl. 1016.
myrrhidifolium Vill. 1019.
Oreopteris Ehrh. 1016.
pedicularifolium L. 1021.
Phegopteris L. 1012.
Plukenetii Lois. 1014.
pterioides Vill. 1016.
regium L. 980. 1019.
rhaeticum DC. 1013.
rhaeticum Dicks. 1019.
rhaeticum L. 1013.
rhaeticum Sm. 1013.
rigidum Hffm. 1018.
robertianum Hffm. 1012.
tenue Hffm. 1019.
Thelypteris L. 1016.
Villarsii Bell. 1018.
vulgare L. 1012.
vulgare β , γ , ϵ , Willd. 1012.
- Polypogon** Dsf. 929.
littoralis Sm. 930.
maritimus Willd. 930.
monspeliensis Dsf. 930.
- Polystichum** Roth. 1015.
aculeatum Prsl. 1014. 1015.
aculeatum Roth. 1014.
angulare Prsl. 1015.
cristatum Roth. 1016.
Filix mas Roth. 1016.
lobatum Prsl. 1014.
Lonchitis Roth. 1014.
Marantae Roth. 1013.
montanum Roth. 1016.
multiflorum Roth. 1017.
Oreopteris DC. 1016.
Plukenetii DC. 1014.
rigidum DC. 1018.
spinulosum Roth. 1017.
spinulosum DC. 1017.

- Polystichum spinulosum** γ. *muticum* Alx. Br. 1017.
strigosum Roth. 1018.
Thelypteris Roth. 1015.
- POMACEEN.** 274.
- Populus** L. 781.
alba L. 781.
alba Willd. 782.
canescens Sm. 782.
dilatata Ait. 782.
fastigiata Poir. 782.
monilifera Ait. 782.
nigra L. 782.
nivea Willd. 782.
pyramidalis Rozier. 782.
tremula L. 782.
villosa Lang. 782.
- Portulaca** L. 295.
latifolia Hrn. 295.
oleracea L. 295.
oleracea α. *sylvestris* DC. 295.
oleracea β. *sativa* DC. 295.
oleracea γ. L. 295.
sativa Haw. 295.
- PCRTULACEEN.** 294.
- POTAMEEN.** 798.
- Potamogeton** L. 798.
acuminatum Schum. 803.
acuminatum Whlbg. 803.
acutifolius Link. 804.
alpinum Balb. 801.
annulatum Bellard. 801.
augustanum Balb. 802.
coloratus Hornem. 801.
complanatum Willd. 804.
compressum Roth. 804.
compressus D. Fl. 804.
compressus L. 804.
crassipes Kit. 802.
crispus L. 803.
curvifolius Hartm. 802.
cuspidatum Schrad. 804.
decipiens Nolte. 803. 1075.
densus L. 805.
distachyum Bellard. 802.
flexicaulis Dth. 803.
flexuosum Schleich. 803.
filiformis Pers. 805.
fluitans Roth. 800. 1074.
- Potamogeton fluitans* Sm. 801.
gracilis Frs. 805.
gramineum L. succ. 801.
gramineum Sm. 804.
gramineum Whlbg. 802.
gramineus Gd. 801.
gramineus L. spec. 801.
gramineus α. *fluvialis* Fries. 801.
gramineus β. *lacustris* Fries. 801.
gramineus α. *graminifolius* Frs. 801.
gramineus β. *heterophyllus* Frs. 802.
heterophyllus Schreb. 801.
heterophyllus lacustris Chmss. 802.
heterophyllus α. *foliosus* D. Fl. 802.
heterophyllus γ. *elongatus* D. Fl. 801.
heterophyllus δ. *latifolius* D. Fl. 802.
Hornemanni Mey. 801.
hybridum Thll. 802.
Loeselii R. S. 803.
longifolius Gay. 803.
lucens L. 802.
lucens Web. 803.
lucens β. *heterophyllus* Frs. 802.
lucens γ. *amphybius* Frs. 802.
lucens δ. *coriaceus* D. Fl. 802. 1074.
macrophyllus Wolfgang. 803.
marinus L. 805. 1075.
marinus Fries. 805.
natans L. 798.
natans intermedius D. Fl. 799.
natans lacustris Fries. 799.
natans vulgaris D. Fl. 799.
natans α. *vulgaris* D. fl. 799.
natans β. *explanatus* D. Fl. 800.
natans γ. *angustatus* D. Fl. 800.
natans ε. *minor*. D. Fl. 799.
nitens Web. Fries. 802.
nitens α. *salicifolius* Frs. 802.
nitens β. *heterophyllus* Frs. 802.
oblongus Mey. 800.
oblongus Viv. 799.
obscurum DC. 801.
obtusum Duer. 801.
obtusifolius M. K. 804.
oppositifolium DC. 805.

- Potamogeton oppositifolium* β .
lanceifolium DC. 805.
parnassifolius Schrad. 799.
pectinatus L. 805.
pectinatus D. fl. 805. 1075.
perfoliatus L. 803.
plantagineus Durr. 801.
plantagineus rotundifolius D. Fl. 801.
praelongus Wulf. 803.
Proteus curvifolius Cham. et Schld. 802.
Proteus heterophyllus Cham. et Schld. 802.
Proteus A. lucens Cham. et Schld. 803.
Proteus B. Zizii Ch. et Schld. 802.
purpurascens Seid. 801.
pusillus L. 804.
pusillus A. Ch. et Schld. 804.
pusillus a. major Fries. 804.
pusillus a. major D. Fl. 804.
pusillus b. vulgaris Fries. 804.
pusillus β . tennissimus D. Fl. 804.
rufescens Schrad. 801.
semipellucidum Koch. u. Z. 801.
serotinus Schrd. 799.
serratum L. 805.
serratum Weh. 803.
serratum Roth. 801.
setaceum Schum. 805.
setaceum L. 805.
sparganifolius Laestad. 800.
spathulatus Schrd. 800.
trichoides Ch. et Schld. 804.
variifolius Thr. 800.
Zizii. 1074.
zosteraceus Fries. 805.
zosteracefolius Schumach. 804.
- P**otentilla L. 250.
descendens Willd. 252.
affinis Hst. 255.
alba L. 258.
alpestris Hall. fil. 255. 1068.
alpestris Hst. 255.
alpestris Sm. 255.
alpestris var. Hall. fil. 256.
ambigua Gaud. 256.
angustifolia DC. 252.
anserina L. 251.
anserina β . Nestl. 251.
- Potentilla anserina* γ . concolor. Ser. 251.
arenaria Brkh. 257.
argentea L. 252.
argentea β . Lehm. 253.
aurea L. 255.
aurea Sm. 255.
aurea a. crocea Gand. 255.
aurea β . firma Gd. 255.
aurea γ . pectinata Ser. 256.
brauniana Hopp. 257.
breviscapa Vst. 258.
canescens Bss. 252.
caulescens L. 259.
caulescens β . petiolulata Ser. 259.
chrysantha Trev. 254.
cinerea Chaix. 256.
Clusiana Mrr. 259.
collina Wib. Fries. 253.
Comarum Nstl. 250.
crocea Hall. fil. 255.
debilis Schl. 256.
dichotoma Mönch. 250.
diffusa Willd. 250.
dubia Sut. 255.
filiformis DC. 255.
frigida Vill. 258.
Fragaria Sm. 258.
fragariaefolia Gml. 258.
Fragariastrum Ehrh. 258.
fragarioides Vill. 258.
geranioides Schl. 256.
glacialis Hall. fil. 258.
grandiflora L. 257.
Guentheri Phil. 253.
Halleri Ser. 255.
helvetica Schleich. 258.
heptaphylla Mill. 253.
hirta L. 251.
hybrida Wallr. 258.
impolita Whlbg. 253.
incana Much. 257.
inclinata Vill. 252.
intermedia Hegetschw. 256.
intermedia L. 253.
intermedia Nestl. 253.
intermedia Whlbg. 252.
laciniosa Kit. Lehm. 251.
Lindackeri Tsch. 253.
micrantha Rmd. 258.
minima Hall. fil. 257.

- Potentilla mixta** Nolte. 254.
multifida L. 251.
nemoralis Nestl. 254.
nitida L. 259.
nitida Scop. 258.
nivea L. 257.
norvegica L. 250.
obscura Willd. 251.
opaca L. 257.
opaca Vill. 257.
ovata Poir. 257.
palustris Scop. 250.
parviflora Gd. 254.
patula W. K. 253.
pedata Willd. 252.
petiolulata Gd. 259.
pilosa DC. 252.
pilosa Willd. 252.
procumbens Sibth. 254.
pusilla Hst. 256.
recta Jcq. 252.
recta L. 251.
reptans L. 254.
rubens All. 252.
rubens Vill. 255.
rupestris L. 251.
ruthenica Willd. 250.
sabanda DC. 255.
salisburgensis Haenk. 255.
sordida Fries. 253.
splendens Ram. 258.
subacaulis L. 257.
subacaulis Wulf. 257.
supina L. 250.
sylvestris Neck. 255.
tetrapetala Hall. fil. 255.
thuringiaca Bernh. 253.
Tormentilla Sibth. 255.
Vaillantii Nestl. 258.
velutina Lehm. 257.
verna L. 256.
verna aestiva Gd. 256.
verna α . *alpestris* Wallr. 257.
verna β . D. fl. 257.
Wiemanniana Gnth. 253.
Poterium L. 274.
glaucescens Rb. 274.
guestphalicum a Bngl. 274.
polygamum W. K. 274.
Sanguisorba L. 274.
Prasium L. 678.
majus L. 678.
Prasium minus L. 678.
Prenanthes L. 507.
bulbosa DC. 516.
chondrilloides L. 507.
hieracifolia Willd. 519.
muralis L. 509.
pulchra DC. 519.
purpurea L. 507.
ramosissima All. 509.
tenuifolia L. 507.
viminea L. 509.
viscosa Bmg. 519.
Primula L. 691.
acaulis Jcq. 692.
Allionii Lois. 697.
alpina Rb. 694.
Auricula L. 693.
calycina Dub. 697.
calycina Rb. 696.
Candolleana Rb. 696.
carniolica Jcq. 695.
ciliata Morett. 693.
ciliata var. Rb. 695.
ciliata Schrk. 695.
Clusiana Tsch. 696.
Columnae Ten. 693.
crenata Lmk. 693.
Dinyana Lagg. 696.
elatior Jcq. 692.
farinosa L. 691.
Floerkeana Schrd. 697.
glutinosa Wulf. L. fil. 697.
grandiflora Lmk. 692.
graveolens Heget. 695.
helvetica Schlich. 694.
hirsuta All. 695.
hirsuta DC. 695.
hybrida Schrk. 692.
integrifolia Jcq. 696.
integrifolia L. 696.
integrifolia L. ex cit. Clus. 696.
integrifolia Scop. 696.
integrifolia Sturm. 696.
integrifolia Tsch. 696.
latifolia Lpr. 695.
longiflora All. 691.
marginata Curt. 693.
minima L. 697.
Mureti Charp. 697.
Muretiana Moritz. 697.
nivea Hortor. 695.
officinalis Jcq. 692.

- Primula pedemontana* Thm. 694.
pubescens Jcq. 694.
rhaetica Gaud. 694.
Santeri Schltz. 697.
spectabilis Tratt. 696.
stricta Hornem. 691.
sylvestris Scp. 692.
suaveolens Bertol. 693.
truncata Lehm. 697.
uniflora Gmel. 692.
venusta Hst. 695.
veris Lehm. 693.
veris α . officinalis L. 693.
veris β . elatior L. 692.
veris γ . acaulis L. 692.
villosa Jcq. 694.
villosa Willd. Rb. 695.
villosa, var. *nivea* Bot. Mag. 695.
viscosa DC. 695.
viscosa Gd. 695.
viscosa Rb. 695.
viscosa Vill. 695.
Vitaliana L. spec. 691.
vulgaris Sm. 692.
- PRIMULACEEN.** 684.
- Prismatocarpus hybridus* L'Herit. DC. 559.
Speculum L'Herit. 558.
- Protens heterophyllus* Cham. et Schld. 802.
- Prunella* L. 677.
alba Pall. 678.
grandiflora Jcq. 677.
grandiflora β . pinnatifida Koch. et Z. 678.
intermedia Lnk. 677.
laciniata Gd. 677.
laciniata L. 678.
laciniata β . L. 678.
laciniata γ . L. 677.
parviflora Pr. 677.
pinnatifida Pres. 677.
vulgaris L. 677.
vulgaris b. *intermedia* Koch. et Z. 677.
vulgaris β . *grandiflora* L. 678.
vulgaris β . *pinnatifida* Rb. 677.
- Prunus* L. 242.
acida Ehrh. 243.
Armeniaca L. 242.
austera Ehrh. 243.
avium L. 243.
cerasifera Ehrh. 242.
Cerasus L. 243.
Cerasus Poll. 244.
Cerasus aproniana Schübl. Mrt. 243.
Chamaecerasus Jcq. 243.
domestica L. 242.
fruticans Weih. 242.
insititia L. 242.
Mahaleb L. 244.
nigricans Ehrh. 243.
Padus L. DC. 244.
petraeus Tsch. 244.
semperflorens Ehrh. 243.
serotina Roth. 243.
spinosa L. 242.
spinosa β . *coactanea* Wimm. et Gr. 242.
varia Ehrh. 243.
- Psamma* Pal. 935.
arenaria R. S. 936.
baltica R. S. 936.
- Pseudo-Ruta* Mich. 169.
- Psilurnus* Trin. 990.
nardoides Trin. 990.
- Parnica alpina* DC. 431.
atrata α , β , γ . DC. 433.
Clavenae DC. 432.
macrophylla DC. 433.
moschata DC. 433.
moschata β . *hybrida* DC. 433.
nana DC. 433.
oxyloba DC. 439.
Thomasiana DC. 432.
valesiaca DC. 432.
vulgaris DC. 431.
- Pteris* L. 1023.
aquilina L. 1023.
crispa All. 1025.
- Pterocephalus palaestinus* γ . *dalmaticus* DC. 403.
- Pteroneurum bipinnatum* Rb. 51.
- Pteroselinum alsaticum* Rb. 355.
austriacum Rb. 355.
Chabraei Rb. 354.
glaucum Rb. 354.
rablense Rb. 356.
- Pterotheca* Cass. 513.
nemausensis Cass. 513.

- Ptychotis* Koch. 332.
ammoides Koch. 332.
Bunius Rb. 332.
heterophylla Koch. 332.
verticillata Dub. 332.
Pulegium Mill. 653.
vulgare Mill. 653.
vulgare Rehb. 653.
Pulicaria Gaertn. 418.
annua Gaertn. 411.
bellidiflora Wallr. 411.
dysenterica Grtn. 419.
viscosa Cass. 419.
vulgaris Grtn. 419.
Pulmonaria L. 594.
angustifolia L. 595.
angustifolia Schrk. 595.
azurea Bess. 595.
Clusii Bmg. 595.
gallica mas et femina Tbrnm. 537.
gallica tennifolia Tbrnm. 535.
grandiflora DC. 595.
maritima L. 596.
media Hst. 595.
media Rb. 595.
mollis Wolf. 595.
montana Lej. 595.
oblongata Schrd. 595.
officinalis L. 595.
saccharata Mill. 595.
tuberosa Schrk. 595.
Pulsatilla alba Rb. 10.
Bogenhardiana Rb. 9.
Burseriana Rb. 10.
Halleri Presl. 8.
hybrida Mik. et Presl. 8.
media Bghd. 9.
patens Mill. 9.
pratensis Mill. 9.
vernalis Mill. 8.
vulgaris Mill. 8.
Punica L. 280.
Granatum L. 280.
Pyrethrum alpinum Willd. 442.
alpinum β . pubescens Dub. 442.
ceratophylloides Willd. 442.
corymbosum Willd. 442.
Clusii Fisch. 442.
Halleri Willd. 441.
inodorum Sm. 443.
Pyrethrum inodorum β . salinum Wallr. 443.
macrophyllum Willd. 443.
maritimum Sm. 443.
Parthenium Sm. 442.
Pyrola L. 565.
asarifolia Rad. 565.
chlorantha Swartz. 565.
media Hayn. 565.
media Swartz. 565.
minor L. 566.
rosea Engl. Bot. 566.
rotundifolia L. 565.
rotundifolia Sturm. 565.
secunda L. 566.
umbellata L. 566.
uniflora L. 563.
virens Schweig. et Koert. 565.
PYROLACEEN. 565.
Pyrus L. 276.
acerba DC. 277.
Achras Gaertn. 276.
Amelanchier Willd. 276. 278.
amygdaliformis Vill. 277.
arguta Tsch. 279.
aucuparia Gaertn. 278.
Bolwylleriana DC. 277.
Chamaemespilus DC. 279.
communis L. 276.
communis α . *Achras* Wallr. 276.
communis β . *Pyraster* Willr. 276.
communis γ . *dasyphylla* Tsch. 276.
communis γ . *sativa* DC. 276.
Cydonia L. 276.
domestica Sm. 278.
hybrida Sm. 278.
intermedia Ehrh. 279.
Malus L. 277.
Malus DC. ? 277.
Malus α . *austera* Wallr. 277.
Malus β . *mitis* Willr. 277.
nivalis Jcq. 277.
pinnatifida Sm. 278.
Pollveria Lej. 276.
Pollveria L. 277.
Polvilla Gmel. 277.
Sorbus Gaertn. 278.
sudetica Tsch. 279.
torminalis Ehrh. 279.

Q.

- Quercus** L. 758.
Aegilops Scp. 759.
apennina Lmk. ? 759.
austriaca Willd. 759.
Cerris L. 759.
Cerris Willd. 759.
collina Schleich. 758.
coccifera L. 759.
crinita Lmk. 759.
faginea Rohr et Mey. 759.
femina Fl. Dan. 758.
Ilex L. 759.
lanuginosa Thuill. 758.
pedunculata Ehrh. 758.
pedunculata Schk. 758.
pubescens Willd. 758.
racemosa Lmk. 758.
Robur β . L. Fl. suec. 758.
Robur Roth. tentam. 758.
Robur α . L. suec. 758.
Robur δ . Lmk. 759.
Robur Sm. 758.
sessiliflora Sm. 758.
sessilis Ehrh. 758.
Suber L. 759.

R.

- Radiola** Gmel. 149.
linoides Gmel. 149.
millegrana Sm. 149.

RANUNCULACEEN. 1.

- Ranunculus** L. 12.
aconitifolius L. 16.
acris L. 19. 1061.
agrarius All. 21.
alpestris L. 15.
anemonoides Zahlbr. 15.
aquatilis L. 13.
aquatilis β . L. 14.
aquatilis β . peltatus DC. 13.
aquatilis δ . L. 13.
aquatilis ϵ . pantothrix Koch. 14.
arvensis L. 21.
arvensis γ . inermis N. v. E. 21.
aureus Rb. 20.
aureus Schleich. 19.
auricomus L. 18.

- Ranunculus auricomus** ϵ . fallax
 Wimm. et Gr. 19.
auricomus α . St. 18.
Baudotii Godr. 14.
Breynius Crtz. 20.
bulbosus L. 20.
bupleurifolius Lpr. 17.
carinthiacus Hopp. 19.
cassubicus L. 19.
cassubicus Rb. 17.
cassubicus α . St. 19.
circinatus Sibth. 14. 1061.
Columnae All. 15.
cochlearifolius Hornem. 17.
cordifolius Bst. 17.
crenatus W. K. 16.
divaricatus Schrk. 14. 1061.
falcatus L. 12.
Flammula L. 17.
Ficaria L. 18.
fistulosus Brign. 17.
fluitans Lmk. 14.
fluviatilis Wigg. 13.
glacialis L. 15.
Gonani Willd. 19.
gracilis Schl. 19.
gramineus L. 17.
hederaceus L. 13. 1060.
heterophyllus Wigg. 13.
hirsutus Curt. 21.
Hornschuchii Hpp. 19.
hybridus Bir. 18.
illyricus L. 18.
intermedius Pr. 21.
lacerus Bellard. 17.
lanuginosus L. 20.
lapponicus Vill. 19.
Lenormandi F. W. Schltz. 1060.
Lingua L. 18.
montanus Willd. 19.
muricatus L. 21. 1061.
myosurus Afzel. 12.
napellifolius Crtz. 19.
nemorosus DC. 20.
nivalis Jcq. 19.
ophioglossifolius Vill. 17.
ophioglossoides Willd. 17.
oreophilus M. B. 19.
pallidior Vill. 21.
pantothrix α , γ . DC. 14.
parnassifolius L. 16.
parviflorus L. 22. 1061.

Ranunculus parvulus L. 21.
paucistamineus Tsch. 14.
peltatus Schrk. 13.
Petiveri Koch. 13.
peucedanifolius All. 13.
peucedanoides Dsf. 14.
Philonotis Ehrh. 21.
Ptora Crtz. Rb. 18.
plantagineus All. 17.
platanifolius L. 15.
polyanthemus L. 20.
polyanthemus Schleich. 20.
polymorphus All. 19.
Pseudo-Thora Hst. 18.
pumilus Thuill. 21.
pyrenaicus Gn. 19.
pyrenaicus L. 16.
repens L. 20.
reptans L. 17.
rigidus Hoffm. 14.
rutaefolius L. 15.
sardous Crtz. 21.
sceleratus L. 21.
scutatus W. K. 18.
Sequieri Vill. 15.
sericeus Willd. 18.
stagnatilis Willr. 14.
Steveni Andr. 20.
tenuifolius Schleich. 19.
testiculatus Crtz. 12.
Thora Jcq. 18.
Thora L. 18.
Thora β . L. 18.
tomentosus Mönch. 18.
Traunfellneri Hpp. 16.
tripartitus DC. 13.
tripartitus Nolt. 13.
tripartitus β . obtusiflorus DC. 13.
tripartitus α . micranthus DC. 13.
triphyllus Willr. 13.
tuberculatus DC. 21.
uliginosus Willd. 17.
vaginatus Som. 16.
velutinus Ten. 20.
vernus Spenn. 19.
verrucosus Strnb. 21.
verrucosus Tom. 20.
Villarsii DC. 19.
Raphanis magna Mönch. 77.
Raphanistrum arvense Willr. Rb. 89.

innocuum Medik. 89.
Lampsana Grtn. 89.
segetum Rb. 89.
Raphanus L. 89.
cheiranthiflorus Willd. 64.
Landra Moret. 1064.
Raphanistrum L. 89. 1064.
sativus L. 89. 1064.
Rapistrum Brb. 88.
arvense All. 89.
diffusum Crtz. 88.
paniculatum Grtn. 87.
perenne All. 88.
rugosum All. 88.
Rapunculus orbicularis Scp. 549.
spicatus Scop. 550.
Razoumowskia caucasica Hoffm. 376.
Reseda L. 102.
lutea L. 103.
luteola L. 103.
ochracea Mönch. 103.
odorata L. 103.
Phyteuma L. 103.

RESEDACEEN. 102.

Rhagadiolus Tournef. 490.
edulis Gaertn. 491.
intermedius Ten. 491.
lampsanoides Desf. 491.
scaber All. 492.
stellatus Grtn. 491.
stellatus β . intermedius DC. 491.
taraxacoides All. 492.

RHAMNEEN. 171.

Rhamnus L. 172.
Alaternus L. 173.
alpina L. 173.
cathartica L. 172.
Clusii Willd. 173.
Frangula L. 174.
infectoria L. 172.
Paliurus L. 172.
pumila L. 173.
pumilus Wulf. 173.
rupestris Scp. 173.
saxatilis L. 173.
tinctoria W. K. 172.
Wulfenii Bot. Ztg. 173.

Rhamnus Zizyphus L. 172.
Rhaponticum paniculatum Scop.
 488.

scariosum Lmk. 479.

Rheum digynum Whlbg. 731.

RHINANTHACEEN. 637.

Rhinanthus L. 643.

Alectorolophus Poll. 643.

alpinus Baumg. 644.

γ. angustifolius Gaud. 644.

buccalis Willr. 644.

Crista galli Poll. 643.

Crista galli α. β. L. 643.

Crista galli γ. L. 644.

hirsutus Lmk. 644.

major Ehrh. 643.

major Sm. 644.

major var. *angustifolia* Fries.
 643.

minor Ehrh. 643.

minor β., γ. alpinus Gd. 643.

villosus Pers. 644.

Rhizobotrya alpina Tsch. 77.

Rhodiola L. 300.

rosea L. 300.

Rhododendron L. 564.

Chamaecistus L. 564.

ferrugineum L. 564.

hirsutum L. 564.

intermedium Tsch. 564.

latifolium Hpp. 564.

polifolium Sep. 562.

Rhodothamnus Chamaecistus Rb.
 564.

Rhus L. 174.

Cotinus L. 174.

Toxicodendrum L. 174.

Rhynchospora Vahl. 578.

alba Vahl. 578.

fusca Vahl. 578.

Ribes L. 310.

alpinum L. 310.

Grossularia L. 310.

nigrum L. 311.

petraeum Wlf. 311.

reclinatum L. 310.

rubrum L. 311.

rubrum β. sylvestre D. Fl. 311.

Uva crista Tsch. L. 310.

Rochelia deflexa R. S. 587.

Lappula R. S. 587.

Romulea Bulbocodium Sebast.

Ist S. 831 ausgelassen.

Roncela Erinus Dumort. Rb. 534.

Rosa L. 261.

aciphylla Rau. 267.

affinis Rau. 267.

affinis Stbg. 262.

agrestis Gmel. 271.

agrestis Sav. 268.

agrestis Sw. 267.

alba L. 267.

alpina L. 263.

alpina α. latifolia DC. 263.

alpina π. turbinata DC. 263.

ambigua Lej. 267.

andegavensis Bst. 267.

Andrzejowskianna Stev. 267.

arvensis Hds. 270.

arvina Rau. 271.

atrovirens Viv. 271.

austriaca Crtz. 271.

austriaca Jcq. 271.

Axmanni Gmel. 271.

balearica Pers. 271.

balsamica Willd. 267.

ballica Roth. 264.

basilica Roess. 272.

bicolor Jcq. 261.

Boreykiana Bess. 267.

Borkhausenii Trtt. 269.

Borreri Woods. 267.

bractescens Wds. 267.

brevistyla DC. 270.

burgundica Roess. 272.

caesia Woods. 267.

calycina Biberst. 267.

campanulata Ehrh. 265.

campestris Sw. 267.

campestris Wallr. 261.

canina L. 266.

canina nitida Fries. 266.

canina opaca Fries. 267.

caucasica Bieberst. 267.

centifolia L. 272.

centifolia simplex Auct. germ.
 271.

Chamaerhodon Wallr. 271.

Chamaerhodon turbinata Willr.
 265.

chlorophylla Ehrh. 261.

ellato-petala Bess. 269. 1068.

cinnamomea L. 264.

Rosa collina DC. 267.

collina Jacq. 267.

collina Lej. 267.

collina Sm. 270.

collina Woods. 267.

collincola Ehrh. 264.

coriifolia Frs. 268.

corymbifera Borkh. 267.

cretica Vest. 269, 270.

cuspidata Bieb. 269.

Cynorrhodon Willr. 266.

Czackiana Bss. 271.

Devauxiana Ser. 270.

dimorpha Bess. 269.

dubia Wib. 269.

dumalis Belist. 267.

dumetorum Lej. 267.

dumetorum Rau. 267.

dumetorum Thuill. 267.

dumetorum Woods. 267.

Eglantheria C. Bauh. 261.

Eglantheria L. 261.

Eglantheria Mill. 268.

farinosa Bchst. 269.

fastigiata Bast. 267.

fastigiata Lej. 267.

flexuosa Rau. 267.

fluvialis Fl. Dan. 264.

foecundissima Münchh. 264.

foetida Herm. 261.

Forsteri Sm. 267.

francofurtana Münchh. 265.

frutetorum Bess. 267.

gallica L. 271.

gallica sylvestris autor. 271.

geminata Rau. 271.

gentilis Stbg. 262.

germanica Merkl. 271.

glabrata Vest. 265.

glandulosa Bellard. 265.

glandulosa Bess. 267.

glauca Dsf. 265.

glauca Dierb. 271.

glauca Schott. 267.

glaucescens Lej. 267.

glaucescens Wulf. 265.

glutinosa Schultz. 268.

gutensteinensis cat. hort. Vin-
dob. 265.

herporrhodon Ehrh. 270.

heterophylla Wds. 269.

hibernica Wds. 267.

Rosa hispida Borkh. 269.

humilis Bess. 267.

hybrida Koch. et Z. 271.

hybrida Schlecht. 271.

inermis Mill. 263.

involuta Sm. 261.

Jundzilliana Bess. 267.

Luckii Bess. 268.

leucantha Lej. 267.

leucantha M. B. 267.

leucochroa Dsv. 270.

Libertiana Tratt. 268.

livida Host. 265.

lucida Ehrh. 263.*lutea* Mill. 261.*lutea* β , bicolor Willd. 261.

majalis Herrm. 264.

malmundariensis Lej. 267.

marginata Wallr. 269.

melanocarpa Link. 262.

micrantha DC. 268.

micrantha Sm. 268.

microcarpa Bess. 262.

mitissima Gmel. 262.

mollis Sm. 269.

mollissima Fries. 270.

mollissima Willd. 269.

monspeliaca Gn. 263.

montana Murr. 265.

montana Vill. 265.

mutica Fl. Dan. 264.

myriacantha DC. 262.

myrtifolia Hall. fil. 268.

nemorosa Lib. 268.

nitens Merat. 266.

nitidula Bess. 267.

nuda Woods. 267.

parvifolia Ehrh. 272.

pendulina Ait. 263.

pimpinellifolia DC. 261.

pimpinellifolia L. 262.

pimpinellifolia Willd. 262.

platyphylla Rau. 267.

pomifera Herrm. 269.

poterifolia Bess. 262.

provincialis Ait. 272.

prostrata Dsv. 271.

pseudo-rubiginosa Lej. 269.

psilophylla Rau. 267.

pulchella Woods. 269.

punicea Mill. 261.

pyrenaica Gn. 263.

- R o s a** *Ratomsciana* Bess. 267.
Ravi Tratt. 267.
remensis DC. 272.
repens Wib. 270.
resinosa Lej. 268.
resinosa Stbg. 269.
reversa Presl. 263.
reversa W. K. 262.
Reynieri Hall. fil. 263.
rubella Lindl. 262.
rubicunda Hall. fil. 263.
rubiginosa L. 268.
rubiginosa γ . *parvifolia* Willd. 268.
rubiginosa μ . *spinulifolia* 266.
rubiginosa σ . *sepium* DC. 268.
rubrifolia Jcq. 263.
rubrifolia Vill. 263.
rubrifolia β . *montana* Gd. 263.
rubrifolia ρ . *glandulosa* Ser. 263.
rupestris Crtz. 263.
sanguisorbifolia Donn. 262.
sarmentacea Sw. 266.
sarmentacea Wds. 267.
saxatilis Stev. 267.
scabriuscula Wds. 269.
scandens Mill. 271.
scandens Wallr. 270.
scandens, var. Wallr. 271.
sempervirens L. 271.
sempervirens Rau. 267.
sempervirens Roth. 268.
sempervirens β . *microphylla* DC. 271.
senticosa Achr. 267.
sepium Rau. 267.
sepium Sw. 267.
sepium Thuill. 268.
solstitialis Bess. 267.
spinosissima L. spec. 262.
spinosissima Sm. 261.
spinosissima Whlbg. 264.
spinosissima β . Lindl. 262.
spinosissima β . *ciphiana* Sm. 262.
spinulifolia Dmtr. 266.
stylosa Dsv. 270.
stylosa γ . *glandulosa* DC. 268.
suavifolia Lightf. 268.
subglobosa Sm. 269.
surculosa Wds. 267.
R o s a *sylvestris* Herrm. 267. 270.
sylvestris Schultz. 267.
systyla Bast. 270.
tenuiglandulosa Merat. 268.
terebinthacea Bess. 269.
tomentosa Sm. 268.
tomentosa Woods. 269.
trachyphylla Ran. 267.
turbinata Ait. 264.
umbellata Leers. 268.
umbellata Lej. 267.
uncinella Bess. 267.
venosa Sw. 266.
venusta Waitz. 263.
villosa L. 269.
villosa Poll. 269.
villosa Woods. 269.
villosa Wulf. Lindl. DC. 269.
vulpina Wallr. 261.
ROSACEEN. 214.
Rose *multiflore* Reyn. 263.
R o s m a r i n u s L. 654.
officinalis L. 654.
Rottboellia *cylindrica* Willd. 990.
erecta Sav. 990.
filiformis Roth. 990.
incurvata L. fil. 989.
incurvata Nolt. 990.
monandra Cav. 990.
subulata Sav. 990.
R u b i a L. 382.
anglica Huds. 383.
peregrina L. 383.
tinctorum Scop. 383.
tinctorum L. 382.
R u b u s L. 247.
amoenus Portschl. 248.
caesius L. 248.
Chamaemorus L. 248.
corylifolius Sm. 248.
fruticosus L. 248.
glandulosus Blld. 248.
hybridus Vill. 248.
Idaeus L. 248.
saxatilis L. 248. 1067.
tomentosus Borkh. 248.
R u m e x L. 724.
Acetosa L. 729.
Acetosa β . *auriculatus* Wallr. 729.
Acetosa Bert. 730.

Rumex Acetosa β . L. 730.

- Acetosa β . Smth. 729.
 Acetosa γ . fissus Koch. 729.
 Acetosa δ . γ . L. 729.
 Acetosella L. 730.
 Acetosella δ . L. 730.
 Acetosella δ . lacerus Wallr.
 730.
 Acetosella γ . multifidus Wallr.
 730.

- acutus Hartm. 727.
 acutus Koch. et Z. 726.
 acutus L. 725.
 acutus Poll. 724.
 acutus Sm. 725.
 acutus Tsch. 726.
 alpinus L. 728.
 Anthoxanthum Murr. 724.
 aquaticus L. 727.
 aquaticus Poll. 727.
 aquaticus α . heterophyllus Mr.
 727.

- arifolius All. 729.
 aureus With. 724.
 conglomeratus Murr. 725.
 crispus L. 726.
 crispus β . Poll. 725.
 cristatus Wallr. 726.
 digynus L. 731.
 divaricatus Fries. 726.
 divaricatus L. 726.
 domesticus Hrtm. 727.
 glaucus Jcq. 728.
 glomeratus Rb. ic. 725.
 glomeratus Schreb. 725.
 hastifolius MB. 728.
 heterophyllus Schultz. 727.
 Hippolapathum β . Fries. 727.
 hispanica Gmel. 729. 730.
 hispanicus Munth. 730.
 Hydrolapathum Hds. 727.
 intermedius DC. 729.
 latifolius Mey. 727.
 limosus Thuill. 725.
 maritimus Hoffm. 725.
 maritimus L. 724.
 maximus Schreb. 727.
 montanus Poir. 728.
 multifidus L. 730.
 Nemolapathum D. Fl. 725.
 Nemolapathum Ehrh. 725.
 Nemolapathum Rb. excurs. 725.

Rumex Nemolapathum Rb. ic. ?
725.

- Nemolapathum Wallr. 725.
 Nemolapathum α . exsanguis
 Wallr. 725.
 Nemolapathum β . sanguineus
 Wallr. 725.
 nemorosus DC. 725.
 nemorosus Mey. 725.
 nemorosus Schrad. 725.
 nivalis Hgtschw. 728.
 obtusifolius L. 726.
 obtusifolius β . discolor Wallr.
 726.
 paludosus With. 725.
 palustris Sm. 724.
 Patientia L. 727.
 pratensis M. K. 726.
 Pseudo-Acetosa Bert. 729.
 pulcher L. 726.
 purpureus Poir. 726.
 sanguineus L. Sm. Gaud. 725.
 sanguineus I. Gd. 726.
 sanguineus β . viridis Sm. 725.
 scutatus L. 728.
 Steinii Beck. 725.
 sylvestris Wallr. 726.
 thyrsoides DC. 730.
 triangularis DC. 730.
 tuberosus 730.
 undulatus Schrk. 725.

Ruppia L. 806.

- maritima L. 806.
 maritima α . β . D. Fl. 806.
 obliqua G. F. Meyer. 806.
 rostellata Koch. 806.

Ruscus L. 841.

- aculeatus L. 841.
 Hypoglossum L. 841.

Ruta L. 168.

- angustifolia Pers. 169.
 bracteosa DC. 169.
 crithmifolia Moric. 169.
 divaricata DC. 169.
 divaricata Tn. 168.
 graveolens L. 168. 1064.
 graveolens α . L. 169.
 montana L. 169.
 patavina L. 169.

RUTACEEN. 168.

S.

Sabulina austriaca Rchb. 131.*biflora* L. sp. Rb. 130.*caespitosa* Rb. 132.*fastigiata* Rb. 133.*Gerardi* Rb. 132.*obtusata* Rb. 130.*polygonoides* Rb. 134.*Ponae* Rb. 134.*recurva* Rb. 132.*rostrata* Rb. 133.*setacea* Rb. 132.*stricta* Rb. 130.*tenuifolia* Rb. 133.*verna* Rb. 132.*Villarsii* Rb. 131.*viscosa* Rb. 133.*Saccharum cylindricum* Lmk. 924.*Ravennae* L. 918.*Sagina* L. 124.*apetala* L. 125.*bryoides* Froel. 125.*cerastoides* Engl. Bot. 141.*ciliata* Fries. 124.*decandra* Rb. 132.*depressa* Schultz. 125.*erecta* L. 139.*glabra* Koch. 127.*maritima* Don. 125.*nodosa* E. Meyer. 127.*procumbens* L. 125.*saxatilis* Wm. 125.*stricta* Fries. 125.*subulata* Wm. 127.*Sagittaria* L. 796.*heterophylla* Schreb. 796.*sagittaeifolia* L. 796.

SALICINEEN. 761.

Salicornia L. 713.*acetaria* Pall. 713.*annua* Engl. Bot. 713.*fruticosa* L. 713.*herbacea* L. 713. 1074.*macrostachya* Moric. 713.*procumbens* Engl. Bot. 713.*radicans* Sm. 713. 1074.*Salix* L. 761.*acuminata* Hoffm. 770.*acuminata* Sm. Mey. 769.*acuminata a. virescens* Mey. 769.*Salix acutifolia* Willd. 763.*andscendens* Sm. 777.*alba* L. 763.*albida* Schleich. 780.*alopecuroides* Tsch. 764.*alpina* Scop. 781.*alpina* Sut. 779.*Amaniana* Willd. 771.*ambigua* Ehrh. 775.*ambigua* Willd. 775. 776.*amygdalina* L. 763.*amygdalina* Vill. 764.*Andersoniana* Sm. 771.*angustifolia* Fries. 777.*angustifolia* Poir. 770.*angustifolia* Wulf. 777.*appendiculata* Vahl. 780.*aquatica* Sm. 771.*arbuscula* Jcq. 779.*arbuscula* L. 778.*arbuscula* Whlbg. Kch. Comm.

773. 774.

arbuscula γ. L. 773.*arbutifolia* Willd. 780.*arenaria* L. 776.*arenaria* Willd. 779.*arenaria* β. *denudata* Tsch. 779.*argentea* Sm. 776.*aurigerana* Lapeyr. 772.*aurita* L. 773.*aurita* Willd. 773.*aurita* Hst. 771.*aurito-repens* Wm. 776.*austriaca* Hst. 766.*bicolor* Ehrh. 774.*bicolor* Fries. 773.*bicolor* Sm. 774.*caerulea* Sm. 763.*caesia* Vill. 780.*campestris* Fries. 777.*canescens* Willd. Fries. 770.*Caprea* L. 772.*Caprea* β. *splacelata* Wbg. 772.*carinata* Sm. 779.*carniolica* Hst. 767.*cinerascens* Willd. 772.*cinerea* L. Whlbg. Sm. 770.*cinerea* Willd. 766.*cinereo-repens* Wm. 776.*cladostemma* Hayn. 773.*concolor* Hst. 767.*coruscans* St. 779.

- Salix coruscans* Willd. 774.
cotinifolia Sm. 771.
cuspidata Schultz. Koch. 762.
daphnoides Vill. 765.
decipiens Hoffm. 762.
depressa Hoffm. 776.
depressa L. 773.
Diksoniana Sm. 774.
discolor Hst. 766.
Doniana Sm. 777.
dubia Snt. 780.
Ehrhartiana Mey. 763.
Elaeagnos Scop. 770.
elaeagnifolia Tsch. 767.
elaeagnoides Schleich. 780.
elegans Bess. 775.
elegans Hst. 775.
excelsa Tsch. 763.
excelsior Hst. 763.
fagifolia Willd. 772.
finmarchica Willd. 776.
fissa Ehrh. 767.
Flüggeana Willd. 770.
foetida Schleich. 779.
foliolosa Afzel. 773.
Forbyana Sm. 767.
formosa Willd. Hb. 779.
Forsteriana Sm. 771.
fragilior Hst. 763.
fragilis Hst. 763.
fragilis L. 762.
fragilis Sm. 762.
fragilis St. 763.
fragilis Wargiana Lej. 763.
fragillissima Hst. 763.
fusca Jcq. 781.
fusca L. 776.
fusca Sm. 776.
fusca Willd. 776.
fusca c. longifolia Mey. 777.
fusca a. lejocarpa Mey. 776.
glabra Scop. 774.
glauca Fries. Hrtm. 780.
glauca L. 779.
glauca Sm. 779.
glauca β. appendiculata Whlb. 780.
glauca γ Lapponum Whlbg. 780.
glaucophylla Willd. 779.
gracilentia Tsch. 763.
grandifolia Ser. 772.
- Salix Halleri* Ser. 771.
hastata Hopp. 771.
hastata L. Koch. 775.
hastata Willd. 775.
Hegetschweileri Heer. 774.
Helix L. Sm. 767.
helvetica Vill. 779.
herbacea L. 781.
herinaphrodita L. 762.
heterophylla Hst. 773.
hexandra Ehrh. 763.
hippophæifolia Thuill. 765.
hirta Sm. 771.
Hoffmanniana Bl. Fgh. 771.
holosericea Ser. 769.
holosericea Willd. 770.
Hoppeana Willd. 764.
Jacquiniana Willd. 780.
Jacquinii Hst. Synops. 781.
incana Schrk. 770.
incubacea L. nach Fries. 776.
incubacea Thuill. 777.
incubacea Willd. et Herb. L. 776. 777.
intermedia Hst. 770.
Kanderiana Ser. 769.
Kitaibeliana Willd. 781.
lactea Bray. 779.
lactea Schultz. 777.
Lambertiana Sm. 767.
lanata Thuill. 776.
lanceolata Fries. 769.
lanceolata Ser. 769.
lanceolata Sm. 764.
Lapponum L. 779.
laurina Sm. 774.
lavandulaefolia Lapeyr. 770.
ligustrina Hst. 764.
limosa Whlbg. 779.
livida Whlbg. 773.
livida α. Whlbg. 773.
livida β. cinerascens Whlbg. 773.
longifolia Hst. 769.
longifolia Schleich. 769.
longifolia fem. Hst. 768.
Ludwigii Schk. 775.
majalis Whlbg. 774.
malifolia Sm. 775.
membranacea Thuill. 767.
menthaefolia Hst. 771.
Meyeriana Willd. 762.

- Salix mirabilis* Hst. 767.
mollissima Koch. Bot. Ztg. 769.
mollissima Ehrh. Willd. 767.
mollissima Sm. 769.
monandra Hoffm. 766.
monandra, *sericea* Ser. 767.
mutabilis Hst. 767.
myrsinites L. 780.
myrsinites Willd. 780.
myrtilloides L. 775.
myrtilloides Willd. 780.
nigricans Fries. 771.
nigricans Whlbg. 771.
nigricans γ , *punctata* Hartm. 771.
nivea Ser. 779.
oleaeifolia Vill. 770.
oleifolia Ser. 770.
olivacea Thuill. 767.
onusta Bess. 777.
oppositifolia Hst. 767.
ovata Host. 771.
ovata Ser. 779.
palustris Hst. 763.
parietariaefolia Hst. 771.
parviflora Hst. 777.
parvifolia Sm. 777.
patula Ser. 770.
pendula Ser. 763.
pentandra L. 761.
pentandra α . L. 761.
pentandra β . L. 762.
pentandra *latifolia* Hartm. 762.
petraea Anders. 774.
phylicifolia Fries. 773. 774.
phylicifolia Koch. 771.
phylicifolia Sm. 774.
phylicifolia Whlbg. 771.
plicata Fries. 775.
polyandra Bray. 762.
polyandra Schrk. 761.
polymorpha Hst. 771.
pomeranica Willd. 766.
Pontederana Willd. Schleich.
766.
praecox Hpp. 766.
praecox *gemmata* Ser. 766.
pratensis Hst. 777.
prostrata Ehrh. 780.
prostrata Sm. 776.
prunifolia Hst. 771.
prunifolia Ser. Koch. 779.
prunifolia Sm. 779.
Salix pubera Koch. 768.
punctata Whlbg. 771.
purpurea L. 766.
purpurea Sm. 766.
purpurea var. *monadelpha* Kch.
comm. 767.
radicans Sm. 774.
repens Koch. 776.
repens L. 776.
repens Sm. 776.
repens Willd. 776.
reticulata L. 781.
retusa L. 781.
riparia Willd. 770.
rivalis Hst. 771.
rosmarinifolia Gouan. 770.
rosmarinifolia Kch. comm. 777.
rosmarinifolia L. 777.
rosmarinifolia β . *incubacea* Kch.
comm. 777.
rostrata Thuill. 777.
rubra Hds. 767.
rubra Sm. 767.
rugosa Ser. 773.
rupestris Sm. 771.
Russeliana Sm. 763.
salciaefolia Link. 770.
sempervirens Hst. 764.
sericea Vill. 780.
Seringeana Gand. 769.
serpyllifolia Jcq. 781.
serpyllifolia Scop. 781.
serrulata Willd. 775.
silesiaca Willd. 772.
Smithiana Koch. Bot. Ztg. 769.
Smithiana Willd. 769.
speciosa Hst. 764.
spathulata Willd. 776.
sphacelata Sm. 773.
sphacelata Willd. 773.
Starkeana Willd. 773.
stipularis Ser. 772.
stipularis Sm. Koch. 768.
Stuartiana Sm. 779.
stylaris Ser. 771.
tenuiflora Hst. 769.
tennifolia L. Sm. 774.
tennis Hst. 777.
tetrandra L. 762.
Timmii Schk. 771.
tinctoria Sm. 761.
tomentosa Ser. 772.

- Salix** triandra L. 764.
 uliginosa Willd. 773.
 ulmifolia Thuill. 772.
 undulata Ehrh. 764.
 undulata hort. Goetting. 764.
 vacciniifolia Engl. bot. 779.
 vacciniifolia hort. bot. 779.
 velutina Schrad. 770.
 venulosa Sm. 779.
 versifolia Ser. 776.
 versifolia Whlbg. 776.
 Villarsiana Willd. 764.
 viminalis L. 768.
 violacea Sm. Hollandr. 765.
 virescens Vill. 767.
 viridis Fries. 763.
 vitellina L. sec. Fries. 762.
 vitellina L. secund. Synonyma. 763.
 Waldsteiniana Willd. 778.
 Wargiana Lej. 762.
 Weigeliana Willd. 774.
 Wulfeniana Willd. 771. St., Hst. 774.
Salsola L. 712.
 arenaria W. K. 715.
 fruticosa L. 712.
 hirsuta L. 716.
 Kali L. 712.
 prostrata L. 716.
 Soda L. 713.
 Tragus L. 713.
Salvia L. 654.
 Aethiops L. 655.
 austriaca Jcq. 655.
 clandestina L. 656.
 clandestina Vahl. 656.
 deserta Schang. 656.
 elata Hst. 656.
 glutinosa L. 654.
 multifida Sibth. 656.
 nemorosa L. 656.
 oblongata Rb. 656.
 officinalis L. 654.
 polymorpha Hoffm. 656.
 praecox Sav. 656.
 pratensis L. 655.
 Sclarea L. 655.
 Simsiana R. S. 655.
 sylvestris L. Spreng. 655.
 valentina Vahl. 656.
 variegata Kit. 655.
 Salvia verbenaca DC. Vhl. 656.
 verticillata L. 656.
 Salvinia Mich. 1005.
 natans Hoffm. 1005.
 Salzwedelia sagittalis Fl. d. Wett. 183.
Sambucus L. 377.
 Ebulus L. 377.
 laciniata Mill. 377.
 nigra L. 377.
 racemosa L. 377.
 virescens Dsf. 377.
Samolus L. 699.
 Valerandi L. 700.
Sanguisorba L. 273.
 auriculata Scop. 273.
 dodecandra Mortt. 274.
 officinalis L. 273.
SANGUISORBEEN. 272.
Sanicula L. 327.
 europaea L. 327.
SANTALACEEN. 736.
 Santia plumosa Sav. 930.
 Santolina L. 431.
 Chamae-Cyparissus L. 431.
Saponaria L. 115.
 lutea L. 115.
 ocymoides L. 115.
 officinalis L. 115.
 rubra Lmk. 115.
 Vaccaria L. 115.
Sarothamnus Wimm. 176.
 scoparius Koch. 176.
 vulgaris Wimm. 176.
Satureja L. 659.
 graeca L. 660.
 hortensis L. 659.
 illyrica Hst. 660.
 Juliana L. 660.
 micrantha Hffng. et Link. 660.
 montana L. 659.
 pygmaea Sieb. 660.
 rupestris Wulf. 662.
 subspicata Vis. 660.
 thymifolia Scop. 662.
 variegata Hst. 659.
Satyrion albidum L. 820.
 Epipogium L. 825.
 hircinum L. 820.
 nigrum L. 821.
 repens L. 828.

- Satyrinum viride* L. 820.
Saussurea DC. 477.
 alpina DC. 478.
 discolor DC. 478.
 pygmaea Spr. 478.
Saxifraga L. 312.
 acaulis Gaud. 319.
 adscendens L. 323.
 aggregata Lej. 316.
 atroides L. 316.
 Aizoon Jcq. 312.
 Aizoon Lpr. 312.
 Aizoon β . *minor brevifolia*
 Stbg. 312.
 androsacea L. 323.
 apennina Bert. 318.
 aphylla Stbg. 321.
 arachnoidea Stbg. 324.
 arenarioides Brign. 316.
 aretioides Lpr. 314.
 aspera L. 316.
 aspera β . *bryoides* DC. 316.
 atropurpurea Stbg. 319.
 atrorubens Bertol. 317.
 autumnalis L. 317.
 autumnalis St. 317.
 Bellardi All. 323.
 biflora All. 315.
 bohemica Panz. 321.
 bryoides L. 316.
 bulbifera L. 324.
 Burseriana L. 313.
 caerulea Pers. 315.
 caesia L. 314.
 caesia Scop. 314.
 caespitosa Gd. 319.
 caespitosa *Helvetiorum* 320.
 caespitosa L. 320.
 caespitosa Sm. 320.
 caespitosa Scop. 319.
 cernua L. 324.
 Clusii Gouan. 317.
 condensata Gmel. 321.
 confusa Lej. 321.
 controversa Stbg. 323.
 Cotyledon L. 312.
 Cotyledon ϵ . L. 312.
 crocea Gd. 319.
 crustata Vest. 313.
 cuncifolia L. 317.
 cymosa W. K. 318.
 decipiens Ehrh. 320.

Saxifraga diapensstoides Bell.
 313.
 clatior M. K. 312.
 exarata All. 319.
 exarata DC. 319.
 exarata Gd. 320.
 exarata Vill. 319.
 Facchini Koch. 322.
 flavescens Stbg. 321.
 geranioides Hst. 323.
 Geum L. 318.
 Geum Scop. 318.
 granulata L. 324.
 groenlandica L. 320.
 heterophylla Stbg. 318.
 hieracifolia W. K. 325.
 Hirculus L. 317.
 hirsuta L. 318.
 Hohenwartii Stbg. 322.
 Hostii Tsch. ? 313.
 hypnoides All. 319.
 hypnoides L. 321.
 hypnoides β . DC. 321.
 imbricata Bert. 314.
 intacta Willd. 312.
 intermedia Gd. 320.
 intricata Lpr. 319.
 Kochii Hrnung. 315.
 leucanthemifolia Lapeyr. 317.
 longifolia Hst. 313.
 longifolia Lpr. 313.
 longifolia Strm. 313.
 longifolia β . *media* Stbg. 313.
 longifolia γ . *minor* Stbg. 313.
 media Tsch. 321.
 mixta Lapeyr. 320.
 minuta Pollin. 323.
 moschata Wulf. 319.
 muscoides All. 322.
 muscoides Wulf. 318.
 mutata L. 313.
 nervosa Lpr. 320.
 nervosa *major* Stbg. 319.
 nervosa *minor* Stbg. 319.
 nivalis L. 324.
 oppositifolia L. 315.
 palmata Lej. 321.
 palmata Panz. 320.
 palmata Sm. 320.
 paradoxa Stbg. 325.
 patens Gd. 314.
 pedemontana All. 318.

- Saxifraga petraea** Gunn. 323.
petraea L. 323.
petraea Roth. 320.
planifolia Lpr. 322.
planifolia β . *atropurpurea* Kch.
 Syn. ed. 1. 322.
planifolia γ . *Seguierii* Spr. 323.
Ponae Stbg. 323.
pubescens Prr. 320.
pygmaea Hw. 319.
pyramidalis Lapr. 312.
pyrenaica Vill. 319.
pyrenaica Scop. 319.
recta Lapeyr. 312.
recurvifolia Lapeyr. 314.
repanda Willd. 324.
retusa Gouan. 315.
retusa Stbg. 315.
rotundifolia L. 324.
Rudolphiana Hornsch. 315.
rupestris Willd. 323.
sedoides L. 321.
sedoides α . *flavida* DC. 322.
sedoides *Hohenwartiana* DC.
 322.
Segueri Spr. 322.
sponhemica Gmel. 321.
sponhemica Panz. 321.
squarrosa Sb. 314.
Steinmanni Tsch. 321.
stellaris L. 317.
stenopetala Gaud. 321.
Sternbergii Willd. 321.
striata Hall. fil. Gaud. 320.
tenella Wulf. 316.
tenera Sut. 322.
trichodes Scop. 322.
tridactylites L. 323.
umbrosa L. 318.
uniflora Stbg. 321.
Vandelli Stbg. 313.
villosa Willd. 321.
- SAXIFRAGEEN.** 311.
- Scabiosa** R. S. 400.
agrestis Rb. 400.
agrestis W. K. 400.
alba Scop. 403.
alpina L. 398.
argentea L. 403.
arvensis L. 399.
- Scabiosa australis** Wif. 400.
campestris Bss. 399.
canescens W. K. 402.
capillata R. S. 400.
ciliata Spr. 399.
columbaria Bertol. 401.
Columbaria L. 401.
Columbaria α , δ . D. Fl. 401.
Columbaria ϵ . *gramuntia* DC.
 400.
columbaria Rb. 401.
dipsacifolia Hst. 399.
glabrata Schott. 400.
graminifolia L. 403.
gramuntia L. 400.
Hladnikiana Hst. 402.
holosericea Bertol. 402.
holosericea DC. 402.
hybrida All. 398.
integrifolia L. 398.
leiocephala D. Fl. 400.
leucantha L. 398.
longifolia W. K. 399.
lucida Vill. 401.
lucida β . D. Fl. 401.
lyrata Lmk. 398.
maritima Wif. 403.
mollis Willd. 400.
mollissima DC. 400.
multiseta Vis. 403.
norica Vest. 401.
ochroleuca L. 401.
polymorpha α . Weig. 401.
pyrenaica Brtl. 400.
pyrenaica DC. 400.
repens Brign. 400.
silenifolia W. et Kit. 402.
stricta W. K. 401.
styriaca Vest. 400.
suaveolens Dsf. 402.
Succisa L. 400.
sylvatica L. 399.
sylvatica β . *longifolia* D. Fl.
 399.
tenuifolia α . Roth. 401.
transsylvanica L. 398.
Trenta Hacq. 398.
ucranica L. 403.
vestina Facch. 402.
- S** *candix* L. 366.
Anthriscus L. 368.
australis L. 366.

- Scandix Cerefolium* L. 368.
funarioides W. K. 367.
hirsuta Scop. 370.
infesta Jcq. L. 365.
infesta Rb. 365.
nodosa L. 369.
odorata L. 371.
Pecten Veneris L. 366.
Schedonorus divaricatus R. S. 966.
Schelhammeria capitata Mönch. 890.
Schenchzeria L. 797.
palustris L. 797.
Pseudasphodelus Scop. 863.
Schmidtia subtilis Tratt. 929.
utriculosa Stbg. 929.
Schoberia C. A. Meyer. 712.
fruticosa C. A. Meyer. 712.
maritima C. A. Meyer. 712.
Schoenus L. 877.
aculeatus L. 925.
albus L. 878.
compressus L. 885.
ferrugineus L. 878.
fuscus L. D. Fl. 878.
Mariscus L. 878.
monoicus Engl. Bot. 888.
mucronatus L. 877.
nigricans L. 877.
rufus Hds. 885.
Schollera Oxycoccus Roth. 561.
Schweyckerta Nymphoides Gml. 574.
Sciaphila convallarioides Wib. 840.
Scilla L. 851.
amoena L. 851.
autumnalis L. 852.
bifolia L. 852.
italica L. 852.
nutans Sm. 860.
patula DC. 852.
verna Hds. 852.
Scirpidium aciculare Nees ab Es. 880.
Scirpus L. 880.
acicularis L. 880.
alpinus Schleich. 881.
annuus All. 886.
annuus Hst. 886.
annuus Thuill. 879.
Scirpus atropurpureus Retz. 880.
australis L. syst. 881.
Baeothryon Ehrh. 881.
bifolius Wallr. 885.
bisumbellatus Frsk. 886.
caespitosus L. 880.
caespitosus Poll. 881.
campestris Roth. 881.
capitatus Schreb. 879.
caricinus Schrad. 885.
Caricis Retz. 885.
carinatus Sm. 883.
compactus Krock. 884.
compressus Mönch. 879.
compressus Pers. 885.
dichotomus L. 886.
Duvalii D. fl. 882.
Duvalii Hopp. 883.
filiformis Sav. 882.
fluitans L. 881.
glaucus Engl. bot. 882.
glomeratus Scp. 882.
Halleri Vill. 881.
Holoschoenus L. 884.
Hoppii Weih. 883.
humilis Wallr. 881.
intermedius Thill. 879.
lacustris L. 882.
lacustris β . minor *bodamicus* Gd. 882.
Lejeunii Weih. 883.
leptaleus Kch. syll. 882.
Lereschii Thom. 880.
littoralis Schrad. 883.
macrostachys Willd. 884. 885.
maritimus L. 884.
maritimus β . Bert. 885.
Michelianus L. 885.
mucronatus L. 882.
mucronatus Pil. 883.
mucronatus Rth. 884.
mucronatus Scp. 883.
multicaulis Gmel. 879.
multicaulis Sm. 879.
nanus Poir. 881.
nanus Spr. 881.
ovatus Rth. D. fl. 879.
palustris L. 879.
parvulus R. S. 881.
pauciflorus Lightf. 881.
pungens Vahl. 884.

- Scirpus radicans** Schk. 883.
romanus L. spec. 884.
romanus β . L. spec. 884.
Rothii Hopp. 883, 884.
rufus Schrad. 883.
Savii Sebast. 882.
setaceus L. 881.
stolonifer Rth. 881.
supinus L. 882.
sylvaticus L. 883.
sylvaticus Nro. 5. Tabern. 883.
Tabernaemontani Gmel. 882.
tenuifolius DC. 884.
tenuis Schreb. 879.
trigonus Rth. 882, 883.
trigonus Nolt. 883.
triquetus L. 883.
triquetus Rth. 884.
triquetus β . Sm. 884.
tuberosus DC. Dsf. 884.
turgidus Pres. 879.
uniglumis D. Fl. 879.
varius Schreb. 879.
- SCLERANTHEEN.** 299.
- Scleranthus** L. 299.
annuus L. 299.
fastigiatus Hochst. 299.
perennis L. 299.
perennis β . fallax a. Bng. 299.
verticillatus Tsch. 299.
- Sclerobloa articulata** Lmk. 966.
dura Beauv. 935.
rigida Link. 966.
- Sclerophyllum pulchrum** Gd. 519.
- Scolochloa arundinacea** D. Fl. 939.
- Scolopendrium** Sm. 1023.
Ceterach Rth. 1011.
officinatum Sw. 1023.
Phyllitis Rth. 1023.
septentrionale Rth. 1023.
- Scolymus** L. 489.
grandiflorus Dsf. 490.
hispanicus L. 489.
maculatus L. 490.
maculatus Sep. 490.
- Scopolina** Schult. 601.
atropoides Schult. 601.
Hladnikiana Frey. 601.
viridiflora Frey. 601.
- Scorodonia heteromalla** Mch. 680.
- Scorpinurus** L. 220.
subvillosa L. 220.
- Scorzonera** L. 500.
acaulis Roth. 506.
alpina Hopp. 501.
angustifolia L. 500, 503.
angustifolia Gand. 502.
angustifolia Rehb. 500.
angustifolia Hst. 503.
angustifolia Wigg. 501.
aristata Ram. 501.
austriaca Willd. 500.
calcitrapifolia Vhl. 503.
denticulata Lmk. 501.
edulis Mönch. 501.
glastifolia Willd. 501.
graminifolia L. 501.
graminifolia Roth. 501.
graminifolia Tausch. 501.
grandiflora Lpr. 501.
hispanica L. 501.
hispanica α . sinuata Wallr. 501.
hispanica β . glastifolia Wallr. 501.
hispanica γ . asphodeloides Wallr. 501.
Hoppeana Sb. 501.
humilis Jcq. 500.
humilis L. 500.
humilis Rb. 500.
humilis latifolia secunda Clus. 500.
laciniata Jcq. 502.
laciniata L. 502, 503.
lanata Schrk. 500.
macrorrhiza Schl. 501.
montana Mutel. 501.
muricata Balb. 503.
nervosa α . Lmk. 501.
octangularis Willd. 503.
pannonica Hl. Clus. 500.
parviflora Jcq. 501.
picroides L. 513.
plantaginea Schleich. 501.
purpurea L. 502.
rosea W. K. 502.
resedifolia Rtz. 503.
taraxacifolia Jcq. 504.
villosa Sep. 500, 503.

- Scribaea baccifera* Fl. d. Wett. 115.
- Scrophularia* L. 609.
aquatica L. 609. 610.
atropurpurea Morett. 610.
auriculata Scp. 610.
Balbisii Horn. 610.
canina Hopp. 611.
canina L. 610.
canina Wydl. ex parte 610.
canina β , γ . DC. 611.
canina γ , δ . Wydl. 611.
chrysanthemifolia M. B. 610.
Ehrharti Stev. 609.
glandulosa W. K. 610.
granidentata Ten. 610.
Hoppii Koch. 610.
laciniata W. K. 610.
latifolia Hst. 611.
lucida M. B. 610.
Neesii Wrtg. 609.
nodosa L. 609.
peregrina L. 611.
Scopolii Hopp. 610.
Scorodonia Hst. 610.
vernalis L. 611.
vernalis Hst. 611.
- Scutellaria* L. 676.
alpina L. 676.
galericulata L. 677.
hastifolia L. 677.
minor L. 677.
- Secale* L. 984.
Cereule L. 984.
villosum L. 982.
- Securidaca legitima* Gaertn. 223.
lutea Mill. 223.
- Securigera* DC. 223.
Coronilla DC. 223.
- Sedum* L. 301.
acre L. 305.
aestivum All. 304.
album L. 304.
alpestre Vill. 304. 305.
Anacampseros L. 303.
anglicum Rb. 305.
annuum L. 301.
anopetalum DC. 305.
atratum L. 301.
holoniense Rb. ic. 305. 1069.
boloniense Lois. 1069.
caespitosum DC. 301.
- Sedum* *Cepaea* All. 303.
Cepaea L. 303.
collinum Willd. 306.
collinum Wimm et Gr. 305.
crassicaule Link. 306.
dasyphyllum L. 301.
elegans Lej. 306.
Fabaria Kch. 302.
Forsterianum Rb. ic. 305. 1069.
galioides All. 303.
glaucum Sm. Engl. Fl. 306.
glaucum Lmk. 305.
glaucum W. K. 303.
Guettardi Gml. 303.
haematotes Scp. 304.
hispanicum L. 303.
latifolium Brtl. 301.
maximum Sut. 301.
Oederi Retz. 301.
pallidum M. B. 301. 303.
paniculatum Lmk. 303.
petraeum Ponae Clus. 340.
purpureum Tsch. 302.
purpurascens Koch. 302.
recurvatum Willd. 306.
reflexum Fries. 306.
reflexum Link. 306.
reflexum L. 305.
repens Schleich. DC. 305.
Rhodiola DC. 300.
roseum Scop. 300.
rubens Haenk. 305.
rubens L. 305.
rupestre Oed. 304.
rupestre Sm. Brit. 306.
rupestre Willd. 306.
saxatile All. 304. 305.
saxatile Wigg. DC. 304.
saxatile Willd. 304.
schistosum Lej. 301. 305. 1069.
sexangulare Lej. 305.
sexangulare L. 305. 1069.
sexangulare M. et K. D. fl. 1069.
sexfidum M. B. 303.
spathulatum W. K. 303.
stellatum L. 303.
Telephium fl. suec. 301.
Telephium Rb. exc. 303.
Telephium Rb. ic. 303.
Telephium Sm. 302.
Telephium Sturm. 301.
Telephium β . *purpureum* L. 302.

- Sedum Telephium purpureum* minus C. B. 303.
Telephium γ. L. 303.
Telephium δ, ε. L. 301.
tectorum Sep. 306.
villosum L. 301.
- Selaginella* Spring. 1003.
helvetica Spring. 1009.
spinulosa Alx. Br. 1008.
- Selaginoides foliis spinosis* Dill. 1003.
- Selinum* L. 350.
angulatum Lmk. 351.
argenteum Crtz. 355.
austriacum Jcq. 355.
Carvifolia Crtz. 354.
Carvifolia L. 350.
Cervaria Crtz. 355.
Chabraei Jcq. 354.
Chabraei Knth. 347.
elegans Balb. 356.
Gmelini Bray. 350.
intermedium Bess. 356.
Lachenalii Gmel. 352.
lineare R. S. 356.
lineare Schumach. 347.
membranaceum Vill. 351.
Monnieri L. 346.
montanum Schlch. 355.
nigricans Gd. 355.
nigrum Lmk. 355.
odoratum Brnh. 351.
palustre L. succ. Moench. Whlb. 356.
Peucedanum Wigg. 353.
podolicum Bss. 354.
pratense Sprng. 347.
polymorphum Spr. 355.
Pseudo-Carvifolia All. 351.
pubescens Mönch. 351.
pyrenaicum Gn. 352.
rablense Spr. 356.
Schieverreckii Bss. 356.
Seguieri L. fil. 348.
sylvestre Crtz. 351.
sylvestre Jcq. DC. 356.
sylvestre L.? 347.
Thysselinum Crtz. 356.
venetum Spr. 355.
- Sempervivum* L. 306.
arachnoideum L. 308.
arenarium Koch. 309.
- Sempervivum Braunii* Funk 308.
Funckii Braun. 307.
globiferum L. 307.
globiferum Rb. 309.
globiferum Wulf. 307.
globiferum Kch. b. Z. 307.
hirtum L. 308.
montanum L. 308.
soboliferum Sims. 303.
tectorum L. 303.
Wulfenii Hpp. 307.
- Senebiera* Prs. 85.
coronopus Poir. 86.
didyma Pers. 86.
pinnatifida DC. 86.
- Senecio* L. 449.
abrotanifolius L. 451.
alpestris Gd. 455.
alpestris DC. 447.
alpinus L. fil. 453.
alpinus Rb. 453.
alpinus β. auriculatus Rb. 453.
aquaticus Hds. 452.
arachnoideus Sieb. 456.
aurantiacus DC. 449.
aurantiacus γ. tomentosus DC. 449.
barbareaefolius Rchb. Krok. 452.
bohemicus Tsch. 456.
brachychaetus DC. 447.
Cacaliaster Lmk. 454.
campestris DC. 448.
carniolicus Willd. 453.
chrysanthemifolius Poir. 451.
cordatus Koch. 453.
crispatus DC. 446.
croaticus W. K. 454.
croceus DC. 447.
denticulatus Müll. 1073.
denticulatus Müll. 450.
denticulatus Nolte. 1072.
Doria L. 451.
Doronicum L. 456.
Doronicum β. Koch. 456.
erraticus Brtl. 452.
erucifolius L. 451.
erucifol. Pollich. Huds. 451.
fluvialis Willr. 455.
fontanus Willr. 454.
frondosus Tsch. 454.

- Senecio Fuchsii** Gmel. Koch. 455.
germanicus Wallr. 454.
Jacobaea L. 452.
Jacobaea γ . Wimm. et Gr. 452.
Jacquinianus Rb. 454.
incanus L. 453.
incanus Scop. 453.
laciniatus Bert. 451.
lanatus Scop. 455.
lividus Nolt. 450, 1073.
lycopifolius Desf. 452.
lyratifolius Rb. 452.
montanus Willd. 451.
napifolius Schrad. 452.
nebrodensis L. 450, 1073.
nemorensis L. 454.
nemorensis Poll. 448, 1073.
nemorensis Jcq. Willd. Ledeb. Gmel. Rb. 454.
octoglossus DC. 455.
ovatus Willd. 455.
ovirensis DC. 448.
paludosus L. 455.
palustris DC. 449.
papposus Less. 448.
paradoxus Hpp. 451, 1073.
pratensis DC. 447.
rupestris W. K. 451.
rupestris Willd. 451.
Sadleri Lang. 456.
salicetorum Godr. 1073.
salicifolius Wallr. 455.
saracenicus Jcq. 1073.
saracenicus L. 455, 1073.
saracenicus Poll. Willr. 455.
saracenicus β . flosculosus DC. 455.
Schkuhrhii DC. 447.
Scopolii Hopp. et Hsch. 456.
spathulaefolius DC. 448.
squalidus L. 451.
subalpinus Koch. 453.
sudeticus DC. 446.
sylvaticus L. 450.
sylvaticus α . auriculatus Meyer. 1073.
sylvaticus β . lividus Hock. 1073.
tenuifolius Jcq. 451.
uniflorus All. 453.
vernalis W. K. 450.
- Senecio viscosus** L. 450.
vulgaris L. 449.
vulgaris β . radiatus. 1072.
Senkenbergia ruderalis Fl. d. Wett. 83.
- Serapias** L. 824.
abortiva Sep. 825.
cordigera Hgtschw. et H. 824.
cordigera L. 824.
ensifolia Sm. 826.
grandiflora Fl. Dan. 826.
grandiflora Scop. 826.
lanceifolia Rth. 826.
latifolia atrorubens Hoffm. 827.
Lingua Bert. Gaud. 824.
Lingua DC. 824.
Lingua L. 824.
Lingua β . L. 824.
longifolia Hds. 826.
longifolia L. 827.
longipetala Pollin. 824.
oxyglottis Bert. 824.
palustris Sep. 827.
Pseudo-Cordigera Moric. 824.
rubra L. 826.
triloba Viv. 825.
- Serpicula verticillata** Rostk. 794.
- Serratula** L. 478.
alpina L. 478.
alpina γ . L. 478.
arvensis L. 470, 1036.
blanda M. B. 479.
centauroides Hst. 478.
centauroides L. 478.
complicata Schwg. 470, 1036.
cyanoides Gaertn. DC. 479.
discolor Willd. 478.
heterophylla Dsf. 479.
macrophylla Saut. 478.
mollis Koch. 480.
nudicaulis L. 479.
Pollichii DC. 480.
pygmaea Jcq. 478.
radiata M. B. 478.
Rhaponticum DC. 479.
setosa Willd. 470, 1036.
simplex DC. 479.
tinctoria L. 478.
- Seseli** L. 343.
ammoides Gn. 332.
Amomum Sep. 333.
annuum Ehrh. 347.

- Seseli* *anuum* L. 345.
aromaticum Lmk. 333.
articulatum Crtz. 344.
athamantoides C. A. Meyer. 346.
biene Crtz. 345.
Bunius Vill. 332.
Carum Scop. 334.
coloratum Ehrh. 345.
corsicum Link. 332.
dioicum Vill. 331.
dubium Schk. 347.
elatum Gouan. 344.
elatum L. 344.
glaucum Jcq. 344.
Gouani Koch. 344.
graveolens Sep. 330.
Hippomarathrum L. 344.
Libanotis Kch. 345.
Libanotis β , δ . pubescens D. Fl. 346.
Meum Scop. 349.
montanum L. 345.
montanum β . *glaucum* DC. 344.
multicaule Jcq. 345.
nodiflorum Sep. 331.
osseum Crtz. 344.
pumilum L. 331.
pusillum Brot. 332.
pyrenaicum L. 352.
saxifragum L. 332.
saxifragum Scholl. 347.
selinoides Jcq. 349.
tortuosum L. 345.
tortuosum Poll. 345.
varium Trvr. 344.
venosum Hfm. 347.
verticillatum Dsf. 332.
- Sesleria* Ard. 940.
argentea Sav. 940.
caerulea Ard. 940.
cylindrica DC. 940.
disticha Pers. 941.
dura Kunth. 953.
echinata Hst. 940.
elongata Hst. 940.
elongata Vis. 940.
juncifolia Hst. 940.
juncifolia Sfrn. 940.
leucocephala DC. 941.
microcephala DC. 941.
nitida Ten. 940.
- Sesleria* *sphaerocephala* Ard. 941.
tenella Hst. 941.
tenuifolia Hst. 940.
tenuifolia Schrad. 940.
- Setaria* Beauv. 921.
glauca Beauv. 922.
italica Beauv. 922.
verticillata Bv. 921.
viridis Bv. 921.
- Sherardia* L. 380.
arvensis L. 380.
muralis L. 1071.
- Sibbaldia* L. 259.
procumbens L. 259.
- Sida* *Abutilon* L. 153.
- Sideritis* L. 673.
hyssopifolia Gaud. L. 673.
montana L. 673.
romana L. 674.
scordioides Benth. 673.
scordioides L. 673.
- Siebera* *cherlerioides* Hopp. 130.
- Sieglingia* *decumbens* Bernh. 953.
- Silene* Bess. 348.
pratensis Bess. 348.
- Silene* L. 115.
acaulis L. 122.
alpestris Jcq. 122.
anglica L. 116.
annulata Thor. 121.
Armeria L. 120.
baccifera Rth. 115.
bipartita Dsf. 116.
cerastoides DC. 116.
cerastoides L. 116.
chlorantha Ehrh. 118.
coarctata Lagasc. 116.
colorata Poir. 116.
contea L. 119.
conoidea L. 119.
Cucubalus Wb. 119.
dichotoma Ehrh. 116.
eranthema Wib. 120.
exscapa All. 122.
gallica L. 116.
inflata Sm. 119.
inflata β . D. Fl. 119.
infracta W. K. 118.
insubrica Gd. 117.
italica Pers. 117.
linaecola Wib. 120.

- Silene linicola* Gmel. 120.
maritima Hst. With. 119.
membranacea Poir. 117.
nemoralis W. K. 117.
noctiflora L. 120.
nutans L. 117.
nutans β . *infracta* Whlb. 118.
Otites Sm. 118.
petraea W. K. 114.
pilosa Spr. 117.
pubibunda Hoffm. 122.
Pumilio Wulf. 119.
pusilla W. K. 121.
quadrifida L. 121.
quinquevulnera L. 116.
reticulata Dsf. 120.
rubella Wulf. 121.
rupestris L. 122.
Saxifraga L. 121.
sedoides Jcq. 121.
sedoides DC. 121.
stricta L. 120.
sylvestris Rb. 116.
tatarica Pers. 118.
uniflora Rth. 119.
uniflora β . γ . DC. 119.
vallesia L. 120.
vespertina Retz. 116.
viscida Spr. 121.
viscosa Pers. 117.
viscosa Schleich. 117.
- SILENEEN.** 107.
- Siler* Scop. 360.
aquilegifolium Gaertn. 360.
montanum Crtz. 362.
trilobum Sep. Crtz. 360.
- Silybum* Grtn. 470.
marianum Grtn. 470.
- Sinapis* L. 64.
alba L. 64.
arvensis L. 64.
Cheiranthus Koch. 64.
Eruca Roehl. 66.
hispanica Lmk. 65.
incana L. 65.
maritima All. 55.
nigra L. 64.
orientalis L. 64.
orientalis Murr. 64.
pyrenaica L. 55.
recurvata All. 64.
- Sinapis tenuifolia* Brwn. 65.
Tournefortii All. 64.
- Sison* L. 333.
Anomum L. 333.
Anisum Spr. 337.
inundatum L. 332.
Podagraria Spr. 333.
segetum L. 330.
verticillatum L. 334.
- Sisymbrium* L. 54.
acutangulum DC. 55.
acutangulum Tilleri. 55.
acutangulum hyoseridifolium Gd. 55.
Alliaria Sep. 56.
altissimum L. 56.
amphybium L. 40.
anceps Whlbg. 41.
aquaticum Poll. 40.
arenosum L. suec. ed. II. 57.
arenosum L. 48.
austriacum Jcq. 54.
brevicaule Wih. 66.
bursifolium Vill. 57.
Columnae L. 55.
contortum Willd. 55.
dentatum All. 57.
eckartsbergense Willd. 55.
Erucastrum Gn. 66.
Erucastrum Poll. 65.
Erucastrum Vill. A. B. 65.
erysimifolium Prr. 55.
hirtum Hst. 65.
Iris L. 55.
lippicense Wlf. 42.
Loeselii L. 55.
monense Gmel. 64.
murale L. 66.
multisiliquosum Hoffm. 55.
Nasturtium L. 39.
obtusangulum Schl. 65.
officinale Sep. 54.
palustre Leyss. 41.
pannonicum Jcq. 56.
parviflorum Lmk. 56.
pumilum Lmk. 66.
pyrenaicum L. 42.
pyrenaicum Vill. 55.
Roripa Scop. 40.
Sinapeos Retz. 56.
Sinapistrum Crtz. 56.
Sophia L. 56.

- Sisymbrium strictissimum* L. 56.
tanacetifolium L. 57.
taraxacifolium DC. 55.
tenuifolium L. 65.
Thalianum Gd. 57.
vimineum L. 66.
- Sium* L. 337.
Amomum Rth. 333.
angustifolium L. 337.
Apium Roth. 330.
aromaticum Lmk. 333.
Berula Gouan. 337.
Bulbocastanum Spr. 334.
erectum Hds. 337.
Falcaria L. 332.
inundatum Roth. 332.
latifolium L. 337.
nodiflorum L. 331.
repens Jcq. L. fil. 331.
saxifragum Roth. 332.
Silau Roth. 349.
Sisarum L. 337.
verticillatum Lmk. 334.
- Smilacina bifolia* Dsf. 840.
Smilax L. 840.
aspera L. 841.
- Smyrniun* L. 373.
Dioscoridis Spr. 373.
nodiflorum All. 347. 1070.
Olusatrum L. 1070.
perfoliatum Mill. 373.
- SOLANEEN.** 599.
- Solanum* L. 599.
alatum Moch. 600.
atriplicifolium Dsport. 600.
Dulcamara L. 600.
humile Bernh. 600.
littorale Raab. 600.
luteo-virescens Gmel. 600.
luteum Mill. 600.
melanocerasum Willd. 600.
miniaturum Bernh. 600.
nigrum L. 600.
nigrum Rb. ic. 600.
nigrum γ, δ. D. Fl. 600.
nigrum γ. villosum L. 600.
nigrum chlorocarpum Spnn. 600.
nigrum stenopetalum Alx. Br. 600.
- Solanum pterocaulon* Rb. 600.
pterocaulon Dunal. 600.
puniceum Gml. 600.
tuberosum L. 600.
villosum Lmk. 599.
villosum Mill. 600.
- Soldanella* L. 698.
alpina L. 698.
alpina Schmidt. 698.
Clusii Gaud. 699.
Clusii Schmidt. 698.
minima Hopp. 699.
montana Willd. 698.
pusilla Baumg. 698.
- Solidago* L. 413.
alpestris W. K. 413.
cambrica Hds. 413.
graveolens Lmk. 418.
Virga aurea L. 413.
Virga aurea γ. cambrica Sm. 413.
Virga aurea β. DC. 413.
Virga aurea β. angustifolia Gd. 413.
Virga aurea γ. pumila Gd. 413.
- Sommerauera quadrifida* Hpp. 130.
- Sonchus* L. 510.
alpinus L. 512.
arvensis L. 511.
arvensis var. Schultz. 511.
asper Vill. 511.
canadensis With. 512.
caeruleus Sm. 512.
ciliatus Lmk. 511.
fallax Willr. 511.
intermedius Brckn. 511.
lacerus Willd. 511.
laevis Vill. 511.
lapponicus Froel. 512.
littoralis Rb. 511.
maritimus L. 511.
montanus Lmk. 512.
oleraceus L. 510.
oleraceus β. triangularis Willr. 511.
oleraceus γ. lacerus Willr. 511.
oleraceus γ. et δ. L. 511.
palustris L. 511.
picroides All. 513.
Plumieri L. 512.
tenerrimus L. 510.
- Sorbus* L. 278.

- Sorbus Aria* Crtz. 279.
aucuparia L. 278.
Chamaemespilus Crtz. 279.
domestica Crtz. 278.
hybridu L. 278.
lanuginosa Kit. 262.
latifolia Pers. 279.
scandica Fries. 278.
torminalis Crtz. 279.
Sorghum Pers. 919.
halepense Pers. 919.
saccharatum Pers. 919.
vulgare Pers. 919.
Soyeria Monn. 521.
hyoseridifolia Kch. 522.
montana Mnn. 521.
Spalanzania agrimonioides Pillin. 260.
Sparganium L. 811.
erectum α , β . L. 811.
natans L. 811.
ramosum Hds. 811.
simplex Hds. 811.
Spartianthus juncens Link. 176.
Spartina Schreb. 929.
phleoides Rth. 926.
stricta Roth. 929.
Spartium L. 175.
decumbens Jcq. 176.
junceum L. 175.
lanigerum Dsf. 180.
radiatum L. 183.
scoparium L. 176.
spinosum L. 180.
villosum Poir. 180.
Specularia Heist. 558.
falcata A. DC. 559.
hybrida DC. 559.
Speculum DC. 558.
Spergella nodosa Rb. 127.
*saginoide*s Rb. 127.
subulata Rb. 127.
Spergula L. 127.
arvensis L. 127.
glabra Wild. 127.
glandulosa Rss. 127.
laricina Wulf. 123.
maxima Weih. 128.
nodosa L. 127.
pentandra L. 123.
*saginoide*s All. 127.
*saginoide*s L. 127.
*Spergula saginoide*s β . D. Fl. 127.
sativa a Bngh. 123.
stricta Sw. 130.
subulata Sw. 127.
vulgaris a Bngh. 128.
Spergularia salina Presl. 129.
Sphondylium austriacum Scop. 359.
Spinacia L. 720.
glabra Mill. 720.
inermis Mönch. 720.
oleracea Mill. 720.
oleracea α , et β . L. 720.
spinosa Mönch. 720.
Spiraea L. 244.
Aruncus L. 245.
carpinifolia Wild. 1067.
chamaedryfolia Jcq. 245.
chamaedryfoliu L. 245.
crenata Gouan. 1057.
decumbens Koch. 245.
denudata Hn. 245.
Filipendula L. 245.
flexuosa Rb. 245.
glauca Schultz. 245.
hypericifolia γ . DC. 1067.
media Schm. 245.
oblongifolia Wldst. Kit. 1067.
obovata Wldst. Kit. 1067.
salicifolia L. 244. 1067.
Ulmaria L. 245.
ulmifolia Scop. 245.
Spiranthes Rich. 823.
aestivalis Rich. 823.
autumnalis Rich. 823.
Spirodela polyrhiza Schld. 808.
Stachys L. 669.
alpina L. 670.
ambigua Sm. 670.
annua L. 671.
arvensis L. 671.
Betonica Sep. 672.
biennis Roth. 670.
bufonia Thuill. 672.
fragilis Vis. 672.
germanica L. 670.
italica Mill. 670.
lanata Crtz. 670.
maritima L. 671.
palustris L. 671.
polystachya Ten. 670.

- Stachys procumbens* Lmk. 672.
ramosissima Roch. 672.
recta L. 671.
salviaefolia Ten. 670.
Sideritis Vill. 672.
subcrenata Vis. 672.
sylvatica L. 670.
Staphylea L. 170.
pinnata L. 170.
Stachelina L. 477.
dubia L. 477.
Statice L. 701.
alpina Hopp. 702.
arenaria Pers. 702.
Armeria L. St. Poll. 702.
Armeria Sm. 702.
Armeria α . alpina Gd. 703.
Armeria β . DC. 702.
Armeria β . elongata DC. 702.
Armeria γ . alpina DC. 703.
Behen Drey. 703.
bellidifolia DC. 704.
cancellata Bernh. 704.
caspia Willd. 703.
elongata Hfin. 701.
furfuracea Rb. 704.
globulariaefolia Desf. 703.
Gmelini Willd. 703.
Limonium L. 703.
maritima Mill. 702. 1074.
plantaginea All. 701.
pubescens DC. 704.
purpurea Kch. 702.
Staurogeton Rb. 808.
Stellaria L. 137.
aculeata Scop. 129.
Alsine Richd. 139.
aquatica Poll. 139.
aquatica Scop. 140.
arvensis Hpp. 138.
biflora Wulf. L. spec. 130. 131.
bulbosa Wulf. 137.
cerastoides L. 137.
ciliata Scop. 134.
crassifolia Ehrh. 139.
dichotoma Scop. 138.
dichotoma Wigg. 139.
Dilleniana Lrs. 139.
Dilleniana Mönch. 138.
elodes M. B. 139.
flaccida Peterm. 138.
fontana Wulf. 139.
Stellaria Frieseana Ser. 138.
glauca With. 138.
graminea L. 138.
graminea β . L. 138.
graminea γ . L. 139.
Holostea L. 138.
hypericifolia Wigg. 139.
latifolia Pers. 137.
longifolia Frs. 138.
longifolia Mühlb. 138.
mantica L. 139.
media Vill. 137.
multicaulis Willd. 137.
nemorum L. 137.
neglecta Weih. 137.
palustris Retz. 138.
rupestris Scop. 130.
uliginosa Murr. 139.
umbrosa Optz. 137.
viscida M. B. 137.
STELLATEN. 380.
Stellera passerina L. 735.
Stenactis Cass. 411.
annua N. a. E. 411.
bellidiflora Alx. Br. 411.
dubia Cass. 411.
Sternbergia W. K. 836.
lutea Kert. R. S. 836.
Stipa L. 937.
Aristella L. 938.
Calamagrostis Whlbg. 938.
capillata L. 937.
pennata L. 937.
Stipularia rubra Haw. 128.
Stoebe salamantica tertia Clus. 481.
Stramonium foetidum Scop. 602.
vulgatum Grtn. 602.
Stratiotes L. 794.
aloides L. 794.
Streblidia ferruginea Link. 878.
Streptopus Michx. 839.
amplexifolius DC. 839.
distortus Michx. 839.
Struthiopteris Willd. 1025.
crispa Willr. 1025.
germanica Willd. 1025.
Spicant Scop. Weis. 1023.
Sturmia Rb. 828.
Loeselii Rb. 829.
Sturmia minima Hpp. 928.

- Sturmia verna* Pers. 928.
Suaeda chenopodioides Pall. 712.
 maritima Moq. Tand. 712.
Subularia L. 78.
 alpina Willd. 47.
 aquatica L. 78.
Succisa M. K. 399.
 australis Rb. 400.
 pratensis Münch. 400.
Swertia L. 574.
 carinthiaca Wulf. 575.
 perennis L. 574.
Sweykerta Nymphoides Gmel. 574.
Symphytum L. 591.
 bohemicum Schim. 591.
 bulbosum Schimp. 591.
 Clusii Gmel. 591.
 filipendulum Bischoff. 591.
 mediterraneum Koch. 592.
 officinale L. 591.
 patens Sibth. 591.
 punctatum Gd. 591.
 tuberosum L. 592.
Syntherisma ciliare Schrad. 920.
 glabrum Schrd. 920.
 vulgare Schrd. 920.
Syrenia Andr. 62.
 angustifolia Rb. 62.
 Ehrharti Andr. 62.
Syringa L. 569.
 vulgaris L. 569.

T.

- TAMARISCINEEN.** 291.
Tamariscus gallicus All. 291.
 germanicus Scop. 292.
 pentandra Link. 291.
Tamarix L. 291.
 africana Poir. 291.
 gallica L. 291.
 germanica L. 292.
 pentandra Pall. 291.
Tamus L. 841.
 communis L. 841.
Tanacetum L. 430.
 Balsamita L. 430.
 vulgare L. 430.
Taraxacum Juss. 505.
 Dens leonis Dsf. 505.
 lanceolatum Pr. 505.
 officinale Wigg. 505.

- Taraxacum officinale* β . *corniculatum* Kch. et Z. 505.
 officinale α . *lividum* Roth. Willd. 505.
 palustre DC. 505.
 serotinum Pr. 506.
 tenuifolium Hpp. 506.
 vulgare Schrk. 505.
Taxus L. 787.
 baccata L. 787.
Teesdalia R. Brw. 80.
 Iberis DC. 80.
 nudicaulis R. Brw. 80.
 petraea Rehb. 84.
Telekia Bmg. 414.
 cordifolia DC. 414.
 speciosa Bmg. 414. 1071.
 speciosissima Lss. 414.
Telephium L. 295.
 Imperati L. 296.
 purpurascens Fuchs. 302.
 purpureum majus C. Bauh. 302.
Telnatophace gibba Schld. 809.

TEREBINTHACEEN. 174.

- Tetragonolobus* Sep. 210.
 purpureus Münch. 210.
 siliquosus Roth. 210.
Teucrium L. 679.
 album Poir. 681.
 Belion Schreb. 681.
 Botrys L. 680.
 capitatum L. 681.
 Chamaedrys L. 680.
 Chamaepitys L. 679.
 flavescens Schreb. 681.
 flavum L. 680.
 montanum L. 681.
 Polium L. 681.
 Pseudo-Hyssopus Schreb. 681.
 scordioides Schrb. 680.
 Scordium L. 680.
 Scorodonta L. 680.
 supinum Jcq. 681.
 supinum L. 681.
 Teuthrion Schreb. 681.
 valentinum Schreb. 681.
Thalictrum L. 3.
 acutifolium DC. 4.
 alpestre Gaud. 4.
 alpinum L. 3.
 ambiguum Willd. herb. 5.

- Thalictrum ambiguum* Schl. 5.
angustifolium Jcq. 6.
angustifolium L. 7.
angustifolium Pll. 6.
angustifolium heterophyllum
Wimm. et Gr. 7.
angustifolium stenophyllum
Wimm. et Gr. 7.
anonymon Wallr. 7.
aquilegifolium L. 3.
atropurpureum Jcq. 3.
Bauhini Spr. 7.
Bauhinianum Wallr. 6. 7.
capillare Rb. 5.
dumosum v. Schlecht. 1030.
elatum Gd. Autor. germ. 5.
elatum Jcq. 6.
exaltatum Gaud. 7.
flavum L. 7.
flexuosum Bernh. 5.
flexuosum Rb. 5. 1060.
foetidum L. 4.
galioides Nestl. 6.
heterophyllum Lej. 7.
Jacquinianum Koch. 5.
laserpitifolium Willd. 7.
lucidum DC. 7.
lucidum L.? 7.
majus Jcq. 4. 5. 1059.
majus Sm. 5.
majus Crntz., Jcq., Sm., Rehb.
1060.
medium Jcq. 6.
minus DC. 4.
minus Jcq. 5. 1060.
minus L. 4. 1059.
minus Poll. 4.
minus Fl. dan. 6.
minus saxatile Gaud. 5.
minus δ . strictum Koch. 4.
minus ϵ . *dumosum* Koch. 5.
montanum Wallr. 4.
montanum glandulosum Wllr. 5.
montanum roridum Wllr. 5.
montanum α . *virens* Wallr. 5.
Morisonii Gmel. 7.
nigricans DC. 7.
nigricans Gaud. 7.
nigricans Lej. et Curt. 7.
nigricans Jcq. 7.
pubescens Schl. 5.
roridum Wllr. 1059.
- Thalictrum rufinerve* Lej. 7.
saxatile Rbch. 4.
saxatile DC. Schleich. 4. 5.
simplex L. 6.
sylvaticum Koch. 4.
virens Wllr. 1059.
- Theligonum* L. 724.
Cynocrambe L. 724.
- Thesium* L. 737.
alpinum L. 739.
divaricatum Jan. 737.
ebracteatum Hayn. 739.
fulvipes Griess. 737.
humifusum DC. 738.
humile Vahl. 738.
intermedium Schr. 737.
linophyllum L. 737.
linophyllum Poll. 737.
montanum Ehrh. 737.
palatinum Roth. 738.
pratense Ehrh. 738.
ramosum Hn. 738.
rostratum M. K. 739.
tenuifolium Saut. 739.
- Thlaspi* L. 78.
alliaceum L. 78.
alpestre Comp. Fl. Belg. 79.
alpestre Gmel. 79.
alpestre L. 79.
alpinum Jcq. 79.
alpinum Schl. 79.
arvense L. 78.
Bursa pastoris L. 84.
caerulescens Presl. 79.
calaminare Comp. Fl. Belg. 79.
campestre L. 83.
cepeaefolium Koch. 80.
montanum var. γ . DC. 79.
montanum L. 79.
montanum Poll. 79.
montanum Sep. 79.
montanum β . *praecox* DC. 79.
peregrinum Scop. 85.
perfoliatum L. 79.
praecox Fl. de Spaa. 79.
praecox Wulf. 79.
procumbens Wallr. 85.
rotundifolium Gd. 79.
saxatile L. 85.
sylvium Gaud. 79.
- Thrinchia* Rth. 492.
hirta Rehb. 492.

Thrinicia hirta Roth. 492.
hispida Rehb. 492.
hispida Roth. 493.
Leysseri Wllr. 492.
maroccana Pers. 493.
tuberosa DC. 493.

Thymelea candida Scop. 735.

THYMELEEN. 734.

Thymus L. 658.

Acinos L. 661.
alpinus L. 661.
angustifolius Pers. 658.
athonicus Bernh. 661.
Calamintha DC. 661.
Calamintha Scop. 661.
Chamaedrys Fries. 658.
citriodorus Link. 658.
citriodorus Schreb. 658.
collinus M. B. 659.
glabrescens Willd. 659.
grandiflorus Scop. 661.
hirsutus M. B. 659.
inodorus Lej. 658.
lanuginosus Link. 658.
lanuginosus Schk. 658.
Marchallianus Willd. 659.
montanus W. K. 659.
Nepeta Sm. 661.
nummularius M. B. 659.
odoratissimus M. B. 659.
annonicus All. 658.
pulegioides Lang. 658.
reflexus Lej. 658.
Serpyllum Frs. 658.
Serpyllum L. 658.
Serpyllum Pres. 658.
Serpyllum Rb. 658.
Serpyllum Schreb. 658.
Serpyllum β , γ , δ , ϵ , L. 658.
subcitratus Schreb. 658.
sylvestris Schreb. 658.
vulgaris L. 658.

Thysanthus palustris Schrk. 685.

Thysselinum Hoffm. 356.

angustifolium Rb. 356.
palustre Hoffm. 356.
palustre Rb. 356.
Plinii Spreng. 356.
sylvestre Rb. 356.

Tilia L. 153.

corallina Hst. 154.

Tilia cordata Mill. 153.

cordifolia Bss. 153.
corylifolia Hst. 154.
europaea Hst. 154.
europaea Sm. 154.
europaea β , γ , δ , ϵ , L. 153.
grandifolia Ehrh. 153.
grandifolia Hst. 154.
intermedia DC. 154.
intermedia Hst. 154.
latebracteata Hst. 154.
microphylla Willd. 153.
mutabilis Hst. 154.
obliqua Hst. 154.
parviflora Hayn. 154.
parviflora Hst. 154.
pauciflora Hn. 153.
parvifolia Ehrh. 153.
platyphyllos Scp. 153.
praecox Hst. 154.
pyramidalis Hst. 154.
tenuifolia Hst. 154.
ulmifolia Scp. 153.
vitifolia Hst. 154.
vulgaris Hayn. 153.

TILIACEEN. 153.

Tillaea L. 299.

aquatica Lmk. 300.
aquatica L. 282.
erecta Sauv. 301.
muscosa L. 300.
prostrata Schk. 300.
rubra Gouan. 301.
Vaillantii Willd. 300.

Tinus tertius Clus. 378.

Tithymalus dulcis Scp. 746.

pilosus Jacq. 746.
Pithyusa Scp. 747.
verrucosus Scp. 747.

Tosfieldia Hds. 863.

alpina Hpp. et Stbg. 864.
alpina Sm. 863.

borcalis Whlbg. 864.

calyculata Whlbg. 863.

glacialis Gaud. 864.

palustris Sm. 864.

palustris Hds. 864.

palustris Hpp. 863.

palustris γ , *capitata* Hpp. 864.

ramosa Hpp. 864.

sparsiflora Sond. 864.

- Tommasinia** Bert. 356.
verticillaris Bert. 356.
Tordylium L. 359.
Anthriscus (Jcq.) L. 365.
apulum L. 360.
grandiflorum Mnch. 360.
humile Dsf. 360.
latifolium L. 365.
maximum L. 359.
nodosum L. 366.
officinale Rb. 360.
officinale L. sp. 1070.
silfolium Scp. 359.
Torilis Adans. 365.
Anthriscus Gmel. 365.
Anthriscus Gaertn. 368.
helvetica Gmel. DC. 365.
heterophylla Guss. 365.
infesta D. Fl. 365.
infesta Hoffm. 365.
infesta Rchb. 365.
infesta var. Un. itin. 366.
macrocarpa Grtn. 369.
neglecta R. S. 365.
nodosa Grtn. 366.
trichosperma Sprg. 347.
Tormentilla erecta L. 255.
officinalis Sm. 255.
reptans L. 254.
Tozzia L. 637.
alpina L. 637.
Trachynia distachya Link. 975.
Trachynotia stricta DC. 929.
Trachypogon avenaceus Nees ab Es. 919.
Tragopogon L. 498.
crocifolius L. 500.
Dalechampii L. 498.
floccosus W. K. 499.
heterospermus Schweig. 500.
major Jcq. 498.
minor Fries. 499.
orientalis L. 499.
picroides L. 498.
porrifolius L. 498.
pratensis L. 499.
pratensis α . tortilis Mey. 499.
pratensis β . micranthes Wimm. 499.
revolutus Schweig. 499.
undulatus Jcq. 499.
undulatus Rb. 499.
Tragopogon undulatum β . orientale DC. 499.
Tragus Dsf. 919.
racemosus Dsf. 919.
Trapa L. 286.
natans L. 286.
Tribulus L. 168.
terrestris L. 168.
Trichera mutabilis Schrd. 398.
Trichodium caninum Schrd. 932.
rupestre Schrd. 933.
Trichocrepis bifida Vis. 513.
Trichonema Ker. 831.
Bulbocodium Ker. 831.
Trientalis L. 684.
europaea L. 685.
Trifolium L. 195.
agrarium Gmel. 207.
agrarium L. 206.
agrarium Poll. 206.
albidum Retz. 187.
album Lois. 194.
alexandrinum L. 198.
alpestre L. 197.
alpestre β . bicolor. Rb. 185.
alpinum L. 202.
altissimum Ls. 194.
angulatum W. K. 205.
angustifolium L. 199.
arvense L. 199.
aureum Poll. 206.
aureum Thuill. 207.
badium Schrb. 206.
Biasolettianum Steud. et Hchst. 203.
Bocconi Savi. 200.
Brittingeri Wtwb. 200.
campestre Gml. 206.
campestre Schreb. 207.
cespitosum Rn. 204.
cespitosum Sturm. 203.
Cherleri L. 199.
chrysanthum Gd. 207.
dentatum W. K. 193.
elegans Rchb. exc. 204.
elegans Sav. 205.
expansum Kit. 196.
expansum β . Rchb. 196.
filiforme L. 207.
filiforme Sm. St. 207.
filiforme β . minimum Gd. 207.
flexuosum Jcq. 196.

- Trifolium fragiferum* L. 201.
glareosum Schleich. 203.
glomeratum L. 202.
gracile fl. g. exs. 200.
heterophyllum Lej. 196.
hybridum L. 204.
hybridum Sav. 204.
hybridum α . L. 204.
incarnutum L. 199.
irregulare Pour. 198.
Kochianum Hayn. 193.
lappaceum L. 199.
macrorrhizum W. Kit. 194.
maritimum Hds. 198.
medium L. 196.
Melilotus altissimum Gml. 194.
Melilotus caerulea L. 195.
Melilotus dentata Strm. 193.
Melilotus indica L. 195.
Melilotus indica γ . L. 195.
Melilotus officinalis α . L. 194.
Melilotus officinalis β . L. 194.
Melilotus officinalis γ . L. 194.
Michelianum Gaud. 204. 1065.
Michelianum Sav. 205.
micranthum Viv. 207.
microphyllum Dsv. 196.
minus Sm. 207.
Molinieri Balb. 199.
montanum L. 202.
multistriatum Koch. 202.
nigrescens Viv. 204.
nivale Sieb. 196.
noricum Wulf. 197.
ochroleucum L. 197.
pallescens Schreb. 203.
pallidum W. K. 195.
palustre W. K. 194.
panuonicum Jcq. 197.
parisiense DC. 207.
parviflorum Ehrh. 203.
patens Schrb. 207.
pensylvanicum Willd. 196.
Petitpierreanum Hayn. 194.
polyanthemum Tn. 204.
pratense L. 196.
pratense alpinum Hpp. 196.
pratense sativum Schr. et Hpp. 196.
procumbens L. 206.
procumbens Poll. 207.
procumbens β . Gml. 207.
- Trifolium procumbens* Schr. 207.
prostratum Bias. 203.
pseudo-procumbens Gml. 207.
repens L. 203.
resupinatum L. 201.
rigidum Savi. 198.
rubens L. 197.
sativum Rehb. 196.
saxatile All. 200.
scabrum L. 200.
scabrum Schrb. 200.
spallicum L. 206.
spadicum Vill. 206.
squarrosum M. B. 198.
squarrosum Sav. 198.
stellatum L. 198.
striatum L. 200.
striatum Strm. 200.
strictum Schreb. L. ? 203.
strictum W. K. 203. 1065.
subterraneum L. 201.
suffocatum L. 203.
tenuiflorum Ten. 200.
tomentosum L. 201.
vesiculosum Sav. 202.
- Triglochin* L. 797.
Barrelieri Ls. 797.
maritimum L. 797.
palustre L. 797.
- Trigonella* L. 192.
caerulea Ser. 195.
corniculata L. 193.
elator Sm. 193.
Foenum graecum L. 192.
Foenum graecum β . L. 193.
gladiata Stev. 163.
monspeliaca L. 193. 1065.
prostrata DC. 193.
- Trinia* Hoffm. 330.
elator Gaud. 331.
glauca Rehb. 331.
glauca W. K. 331.
Henningii M. K. 331.
Henningii Hoffm. 331.
Hoffmanni M. B. 331.
Kitabelii M. B. 331.
pumila Rehb. 331.
vulgaris DC. 330.
- Triodia* R. Br. 953.
decumbens Bv. 953.
- Tripleurospermum inodorum* C. H. Schltz. 1072.

- Tripleurospermum maritimum*. 1072.
Tripolium vulgare Nees ab Es. 403.
Trisetum airoides R. S. 951.
 alpestre Bv. 951.
 Cavanillesii Trin. 952.
 distichophyllum Beauv. 951.
 flavescens Bv. 950.
 phleoides Trin. 942.
 praecox Dmrt. 952.
 pratense Pers. 950.
 splendens Prsl. 950.
 tenue R. S. 950.
Triticum L. 980.
 acutum DC. 982.
 acutum δ , *strictum* D. Fl. 982.
 aestivum L. 981.
 affine. 983.
 amyleum Ser. 982.
 biflorum Brign. 984.
 biunciale All. 965.
 bromoides Wb. 974.
 caespitosum DC. 974.
 caninum Schreb. 984.
 ciliatum DC. 975.
 compositum L. 981.
 dicoccum Schrank. 981.
 durum Dsf. 981.
 elongatum Hst. 983.
 farctum Viv. 982.
 Festuca DC. 965.
 festucoides Bertol. 965.
 glaucum Dsf. 983.
 gracile DC. 974.
 Halleri Viv. 965.
 hispanicum Viv. 965.
 hordeiforme Hst. 981.
 hybernum L. 981.
 imbricatum M. B. 984.
 intermedium Hst. 983.
 juncum Hst. 983.
 juncum L. 982.
 juncum β , *giganteum* Roth. 983.
 Lachenalii Gmel. 965.
 laxum Fries. 983.
 littorale Hst. 953.
 loliaceum Sm. 955.
 monococcum L. 982.
 Nardus DC. 965.
 phoenicoides DC. 974.
Triticum pinnatum Mönch. 974.
 pinnatum β , γ . DC. 974.
 Poa DC. 965.
 Poa β . Dub. 955.
 polonicum L. 981.
 pungens Pers. 983.
 repens L. 983.
 repens b. *maritimum* Koch et Z. 983.
 rigidum Schrd. 983.
 Rottboella DC. 955.
 Spelta L. 981.
 strictum Deth. 982.
 sylvaticum Mönch. 974.
 sylvaticum Salish. 985.
 tenellum L. 965.
 tenellum a. Link. 965.
 tenuicolum Ls. 965.
 teretiflorum Wib. 974.
 triccocum Schübl. 982.
 turgidum L. 981.
 unilaterale L. 965.
 unilaterale Vill. 955.
 villosum M. B. 982.
 violaceum Horn. 984.
 vulgare Vill. 981.
Trixago Link. 644.
 cordifolia Mönch. 671.
 latifolia Rb. 644.
Trochiscanthes Koch. 347.
 nodiflorus Koch. 347. 1070.
Trollius L. 22.
 europaeus L. 22.
 humilis Crtz. 22.
 medius Wender. 22.
 minimus Wend. 22.
 napellifolius Rp. 22.
Tulipa L. 842.
 acutiflora Poir. 842.
 Gesneriana. 842.
 Oculus solis St. Am. 842.
 sylvestris L. 842.
Tunica Scop. 109.
 arenaria Scop. 114.
 prolifera Scop. 109.
 Saxifraga Scop. 109.
Turgenia Hoffm. 364.
 latifolia Hoffm. 364.
 multiflora DC. 365.
Turritis L. 43.
 alpestris Schleich. 46.
 alpina L. 46.

Turritis Brassica Leers. 43.

- ciliata* Schleich. 46.
- ciliata* Whlb. 46.
- Gerardi* Bess. 44.
- glabra* L. 43.
- hirsuta* L. Wbg. 45.
- hirsuta* c. *minor* Vill. 46.
- humilis* Schlech. 46.
- major* Willr. 48.
- minor* Schlech. 46.
- nemorensis* Wulf. 45.
- patula* Ehrh. 44.
- pauciflora* Prsl. 43.
- purpurea* Lmk. 44.
- Raji* Presl. 45.
- Raji* Vill. 46.
- rupestris* Hopp. 46.
- sagittata* Bert. 45.
- verna* Lmk. 44.

Tussilago L. 403.

- alba* Hpp. 407.
- alba* L. 407.
- alpina* L. 406.
- alpina* β . L. 406.
- Cacalia* Scop. 405.
- discolor* Jcq. 406.
- Farfara* L. 406.
- frigida* Vill. 407.
- hybrida* L. 407.
- nivea* Vill. 407.
- paradoxa* Rtz. 407.
- Petasites* Hpp. 407.
- Petasites* L. 407.
- ramosa* Hpp. 407.
- spuria* Retz. 407.
- sylvestris* Sep. 406.
- tomentosa* Ehrh. 407.

Typha L. 809.

- angustifolia* L. 810.
- angustifolia* Rb. 810.
- angustifolia* β . L. 811.
- elatior* a Bngl. Rb. 810.
- latifolia* L. 810.
- minima* Hpp. 810.
- minor* Sm. 811.
- Shuttleworthii* Koch. et Sond. 810.

TYPHACEEN. 809.**Tyrimnus** Cass. 471.

- leucographus* Cass. 471.

U.**Udora** Nutt. 794.

- lithuanica* Bss. 795.
- occidentalis* Prsh. 794.
- verticillata* Spr. 794.

Ulex L. 175.

- europaeus* L. 175.
- nanus* Sm. 175.
- provincialis* Ls. 175.

Ulmus L. 756.

- campestris* L. 756.
- campestris* Sm. 756.
- campestris* α . *latifolia* Mey. 756.
- campestris* β . *carpinifolia* Mey. 756.

- ciliata* Ehrh. 756.
- effusa* Borkh. 756.
- effusa* Wild. 756.
- excelsa* Borkh. 756.
- glabra* Mill. 756.
- hollandica* Mill. 756.
- major* Sm. 756.
- montana* Sm. 756.
- nuda* Ehrh. 756.
- octandra* Schk. 756.
- racemosa* Brkh. 756.
- suberosa* Ehrh. 756.
- tetradra* Schk. 756.

UMBELLIFEREN. 326.**Umbilicus** DC. 309.

- pendulinus* DC. 309.

Urachne parviflora Trin. 937.

- virescens* Trin. 937.

Urospermum Jss. 498.

- Dalechampii* Dsf. 498.
- picroides* Dsf. 498.

Urtica L. 754.

- dioica* L. 754.
- pilulifera* L. 754.
- urens* L. 754.

URTICEEN. 753.**Utricularia** L. 683.

- Bremii* Heer. 684.
- intermedia* Hn. 683.
- media* Schmch. 684.
- minor* L. 684.
- neglecta* Lehm. 683.
- pulchella* Lehm. 684.
- vulgaris* L. 683.

Uvularia amplexifolia L. 839.

V.

Vaccaria pyramidata Fl. d. Wett.
115.
vulgaris Hst. 115.

VACCINEEN. 559.

Vaccinium L. 560.
intermedium Ruth. 560.
Myrtillus L. 560.
Oxycoccus L. 560.
uliginosum L. 560.
Vitis Idaea L. 560.
Vaillantia DC. 390.
muralis L. 391.
Valantia Aparine L. 384.
Aparine Poll. 384.
chersonensis Willd. 383.
ciliata Presl. 383.
Cruciata L. 383.
Cruciata Willd. 383.
glabra L. 383.
pedemontana Bellard. 383.
saccharata Gml. 384.

Valeriana L. 391.
altissima Hrn. 391.
angustifolia Mill. 394.
angustifolia Tsch. 394.
Cardamines Beck. 391.
celtica L. 393.
collina Willr. 391.
dioica L. 392.
echinata L. 394.
elongata L. 393.
exaltata Koch. 391.
exaltata Mik. 391.
intermedia Vhl. 392.
Locusta Engl. Bot. 394.
Locusta olitoria L. 394.
Locusta β . *vesicaria* L. 396.
Locusta γ . *coronata* L. 396.
Locusta δ . *dentata* L. 395.
monandra Vill. 394.
montana L. 392.
multiceps Willr. 391.
officinalis L. 391.
officinalis St. 391.
officinalis major Koch. 391.
officinalis media Koch. 391.
officinalis minor Koch. 391.
officinalis α , *altissima* Kch. 391.

Valeriana officinalis γ . *angustifolia* Koch. 391.
olitoria Willd. 394.
Phu L. 392.
procurrens Willr. 391.
repens Hst. 392.
rubra β . L. 394.
saliunca All. 393.
sambucifolia Mik. 391.
saxatilis L. 393.
supina L. 393.
tripteris L. 392.
tuberosa L. 392.

VALERIANEEN. 391.

Valerianella Mönch. 394.
Auricula DC. 395.
carinata Lois. 394.
coronata DC. 396.
dentata DC. 395. 396.
dentata β . *mixta* Soy. Willmt. 395.
discoidea. 396.
echinata DC. 394.
eriocarpa Dsv. 395.
hamata Bast. 396.
laxiflora Duf. 396.
membranacea Lois. 396.
microcarpa Ls. 395.
mixta Duf. 395.
Morisonii α . DC. 395.
Morisonii β . *lejocarpa*. 395.
olitoria Mönch. 394.
olitoria β . *lasiocarpa* Rb. 394.
puberula DC. 395.
pubescens Mer. 395.
pumila DC. 396.
rimosa Bast. 396.
vesicaria Mönch. 396.

Valisneria L. 793.

spiralis L. 794.

Ventenata avenacea Koel. 950.
bromoides Kl. 950.

Veratrum L. 863.

album L. 863.
album A. Gaud. 863.
album α , β . D. Fl. 863.
album B. *albicans* Gaud. 863.
Lobelianum Bernh. 863.
nigrum L. 863.

VERBASCEEN. 602.

Verbascum L. 603.
adulterinum Koch. 607.
album Mill. 604.
Alopecuros Thuill. 605.
ambiguum Lej. 607.
australe Schrd. 603.
austriacum Schrd. 605.
Blattaria L. 605.
blattarioides α , β . Gd. 605. 608.
Chaixi Vill. 605.
collinum Schrd. 607.
condensatum Schrd. 603.
crassifolium Schleich. 604.
cuspidatum Schrd. 603.
elongatum Willd. 603.
floccosum W. K. 604.
gallicum Willd. 605.
incanum Gaud. 601.
lanatum Schrd. 605.
longifolium DC. 604.
Lychnitidi-Blattaria Kch. 608.
Lychnitidi-floccosum Ziz. 607.
Lychnitis L. 604.
Lychnitis β . Schrd. 604.
mixtum Thom. 608.
montanum Schrd. 603. 1074.
nemorosum Schrd. 603.
nigro-floccosum Schrd. 607.
nigro-Lychnitis Schied. 608.
nigro-phoeniceum Schltz. 608.
nigro-pulverulentum Sm. 607.
nigrum L. 605.
nigrum γ . ovatum Koch. 608.
nothum Koch. 606.
orientale M. B. 605.
pallidum Nees ab Es. 603.
parisiense Thuill. 605.
phlomidoides L. 603.
phlomidoides Schrd. 603.
phoeniceum L. 605.
Pseudo-Blattaria Schleich. 608.
pulverulentum Sm. 604.
pulverulentum Vill. 607.
ramigerum Schrd. 606.
rubiginosum W. K. 608.
rugulosum Willd. 603.
Schiedeanum Koch. 608.
Schottianum Schrd. 607.
Schraderi Mey. 603.
seminigrum Fries. 607.
sinnuatum L. 604.
speciosum Schrd. 604.

Verbascum *spurtum* Kch. 606.
thapsiforme Schrad. 603.
thapsiformi-floccosum? Koch. 605.
thapsiformi-Lychnitis Schied. M. u. K. 606.
thapsiformi-nigrum Schd. 607.
Thapso-Lychnitis M. et K. 606.
thapso-nigrum Schied. 607.
thapso-phoeniceum Schrd. 607.
Thapsus L. suec. 603.
Thapsus Mey. 603.
Thapsus Schrd. 603.
Thapsus α . Whlbg. 603.
thyrsoidenum Hst. 605.
versiflorum Schrd. 607.
virens Hst. 605.
Verbena L. 681.
officinalis L. 681.

VERBENACEEN. 681.

Veronica L. 619.
aciniifolia L. 625.
acuta Mart. 623.
agrestis L. 626.
Allionii Vill. 620.
alpina L. 624.
alternifolia Lej. 622. 623.
ambigua Mart. 623.
amethystina Willd. 622.
Anagallis L. 619.
anagalloides Guss. 619.
aphylla L. 620.
aquatica Bernh. 619.
arguta Morett. 623.
arguta Schrd. 622.
arvensis L. 625.
australis Schrd. 623.
austriaca M. K. 621.
austriaca L. M. u. K. 621.
Barrelieri Schott. 623.
Beccabunga L. 619.
Bellardi All. 625.
Bellardi Wulf. 625.
bellidioides Wulf. 624.
brevifolia M. B. 622.
Buxbaumii Tn. 626.
canescens Schrd. 623.
Chamaedrys L. 619.
Clusii Schott. 623.
complicata Hoffm. 623.
crenulata Hoffm. 622.

- Veronica crassifolia* Kit. 623.
cristata Beroh. 623.
Cymbalaria Boird. 627.
cymbalariaefolia Schmidt. 627.
cymbalariaefolia Vahl. 627.
dentata Schm. 621.
depauperata W. K. 620.
didyma Ten. 626.
Dillenii Crtz. 625.
elata Hst. 623.
elatio Host. 623.
filiformis DC. 627.
filiformis Sm. 627.
foliosa W. K. 622.
frutescens Scp. 624.
fruticulosa L. 624.
Gebhardiana Vest. 624.
glabra Schrd. 623.
grossa Mart. 623.
hederaefolia β . L. 627.
hederifolia L. 627.
hederifolia Schrk. 627.
hospita M. K. 627.
hospita β . D. fl. 627.
Hostii Hst. 623.
hybrida L. 623.
hybrida M. B. 623.
Jacquini Schtt. 621.
incana L. 623.
integrifolia Schrk. 624.
Lappago Schrk. 627.
latifolia L. 621.
latifolia Scop. 619.
latifolia major Schrad. 621.
latifolia minor Schrad. 621.
laxiflora Lej. 622.
limosa Lej. 619.
longifolia L. 622.
longifolia Schrad. 622.
maritima Schrad. 623.
media Lej. 623.
media Schrad. 623.
montana L. 620.
multifida L. 621.
nana Lmk. 625.
neglecta Schm. 623. 624.
nitens Hst. 623.
nitida Ehrh. 622.
ocymifolia Thuill. 622.
officinalis L. 620.
opaca Fries. 626.
orchidea Crtz. 623.
- Veronica pallens* Hst. 623.
paludosa Lej. 622. 623.
paniculata L. 622.
panormitana Guss. 627.
parmularia Poit. Turp. 619.
peregrina L. 625.
persica Poir. 627.
persicifolia Schott. 623.
pilocarpa Link. 621.
pilosa Schmidt. 620.
pinnatifida Lmk. 625.
plicata Pohl. 620.
polita Rhch. 623.
polita Fries. 626.
polyanthos Thuill. 625.
polygonoides Lmk. 625.
polymorpha Willd. 621.
praecox All. 626.
prostrata L. 620.
Pseudo-Chamaedrys Jcq. 621.
pulchella Bast. 626.
pulchella Guss. 610.
pumila All. 624.
pyrenaica All. 620.
romana All. 625.
romana L. 625.
romana Schm. 625.
romana Scop. 626.
rotundifolia Schrk. 624.
saxatilis Jcq. 624.
Schmidtii R. S. 621.
scutellata L. 619.
serpyllifolia L. 624.
spadana Lej. 620.
spicata Auct. 623.
spicata L. 623.
spicata γ . Brtl. 623.
spuria L. 622.
spuria Schrad. 622.
spuria Spr. 622.
squamosa Prsl. 623.
Sternbergiana Bernh. 623.
succulenta All. 625.
tenella All. 624.
tenella Schm. 619.
tenuifolia M. B. 621.
Teucrium L. 621.
Teucrium Vahl. 621.
trichocarpa R. S. 621.
triphyllus L. 625.
Tournefortii Gmel. 627.
Tournefortii Schm. 620.

- Veronica urticifolia* L. 619.
verna L. 625.
villosa Schrad. 622.
Vesicaria Lmk. 66.
sinuata Poir. 66.
utriculata Lmk. 66. 1063.
Viburnum L. 378.
Lantana L. 378.
Opulus L. 378.
Opulus β . *roseum* L. 378.
Tinus L. 378.
Vicia L. 221.
angustifolia Forst. 230.
angustifolia Roth. 230.
angustifolia Sm. 230.
articulata Willd. 232.
Biebersteinii Bess. 229.
bithynica L. 228.
Bobartii Forst. 230.
cassubica Fl. Dan. 225.
cassubica L. 225.
cassubica β . *Serin.* 225.
cordata Wulf. 230.
Cracca Bertol. 227.
Cracca L. 226.
Cracca β . Koch. 225.
Cracca H. *Gerardi* Gaud. 226.
dumetorum L. 226.
Ervilia Willd. 232.
Faba L. 227.
galloprovincialis Poir. 226.
gemella Crtz. 231.
Gerardi DC. 226.
Gerardi Jcq. 225.
gracilis Lois. 232.
grandiflora Sep. 229.
hirsuta Koch. 231.
hirta Balb. 229.
hybrida L. 229.
incana Vill. 225.
Kitaibeliana Rb. 226.
lathyroides L. 230.
lughanensis Schlch. 230.
lutea L. 229.
lutea β . *pallidiflora* DC. 229.
militans Crtz. 225.
monantha Kch. Willd. 232.
montana v. *Frl.* 223.
multifida Willr. 232.
multiflora Poll. 225.
narbonensis L. 228.
Onobrychioides L. 227.
Vicia oroboides Willd. 228.
Orobis DC. 225.
pannonica Jcq. 228.
pannonica β . Willd. 229.
peregrina L. 230.
pisiformis L. 225.
polyphylla Dsf. 226.
polyphylla Kch. 227.
polyphylla W. K. 227.
Pseudocracca Bert. 227.
purpurascens DC. 229.
sativa L. 230.
sativa α . *obovata* Ser. 230.
sativa β , δ . Ser. 230.
segetalis Thll. 230.
sepium L. 228.
sepium β . *ochroleuca* Bast. 228.
serratifolia Jcq. 228.
sordida M. B. W. K. 229.
striata M. B. 229.
sylvatica L. 225.
tenuifolia Rth. 226.
tenuifolia Ten. 227.
tetrasperma Moench. Koch. 231.
uncinata Rb. 229.
varia Hst. 227.
villosa Roth. 227.
Vicioides uncinata Mönch. 229.
Vilfa glaucescens Prsl. 931.
Villarsia Nymphoides Vent. 574.
Vinca L. 572.
acutiflora Bert. 573.
herbacea W. K. 573.
intermedia Tsch. 572.
major L. 572.
minor L. 572.
Viola L. 94.
alba Bess. 96.
Allionii Pio. 97.
alpina Jcq. 102.
ambigua W. K. 96.
angustifolia Schlch. 101.
arenaria DC. 97.
arvensis Murr. 100.
bannatica Kit. 100.
Bertolonii Pio. 101.
biflora L. 100.
Billotii Schlz. 99.
calcarata L. 101.
campestris M. B. 96.
canina DC. 97.

Viola canina L. 98.
canina lucorum Rb. 98.
canina α , β , γ . D. Fl. 98.
canina β . sylvatica Fries. 97.
canina β . Ruppil D. fl. 98.
canina γ . Bert. 98.
canina γ . montana Fries. 98.
canina ϵ . D. Fl. 97.
cenisia L. 102.
collina Bess. 95.
Comollia Mass. 102.
declinata W. K. 101.
elutior Fries. 99.
epipsila Ldb. 94.
ericetorum Schrd. 98.
flavicornis Sm. 98.
glauca M. B. 97.
gracilis Biv. 101.
gracilis fl. graec. 101.
grandiflora Hds. 101.
grandiflora Vill. 101.
heterophylla Bertol. 101.
hirta L. 95.
hirta var. aprica Spr. 97.
Kitaibeliana R. S. 101.
Krockeri R. S. 97.
lactea Rehb. 99.
lactea K. et Z. 99.
lactea Sm. 98.
lancifolia Bess. 99.
lancifolia Thore. 98.
livida Kit. Rehb. 97.
lutea Sm. Hds. 101.
mirabilis L. 100.
montana Rehb. 99.
nemoralis Kütz. 99.
nitens Hst. 95.
odorata L. 96.
palustris L. 94.
palustris β . uliginosa Fries. 94.
persicifolia D. Fl. 100.
persicifolia Hartm. 99.
persicifolia Rth. 99.
pinnata L. 94.
pratensis M. K. 99.
pumila β . ericetorum DC. 98.
Riviniana Rb. 97.
rothomagensis Dsf. 101.
rupestris Rb. 97.
rupestris Schm. 97.
Ruppil All. 99.
Ruppil Presl. Koch. 99.

Viola Ruppil Rehb. 98.
saxatilis Schm. 100.
scaturiginosa Wlfr. 95.
Schultzii Billot. 98.
sciaphila Koch. 95.
stagnina Kit. 98.
stricta Hornem. 99.
suavis M. B. 97.
sudetica Willd. 101.
sylvestris Lmk. 97.
tricolor v. *syratica* Floerke. 100.
tricolor L. 100.
uliginosa Schrd. 94.
umbrosa Hopp. 95.
umbrosa Saut. 95.
valderia DC. 102.
valderia Rb. 101.
valderia All. 101. 102.
Zoysii Wlf. 102.

VIOLARIEEN. 94.

Viscago clavata Mönch. 117.
Viscaria purpurea Wim. 122.
Viscum L. 376.
album L. 376.
album β . polycoccon Gaud. 376.
Oxycedri DC. 376.
Vitex L. 681.
Agnus Castus L. 681.
Vitis L. 159.
hederacea Willd. 159.
laciniosa L. 159.
sylvestris Gml. 159.
vinifera L. 159.
Vogelia paniculata Hornem. 87.
sagittata Medik. 87.
Voglera spinosa Fl. d. Wett. 178.
Vulpia bromoides Link. 967.
bromoides Rb. 967.
ciliata Link. 966.
membranacea Link. hort. 966.
myuros Gml. 967.
Pseudo-myuros Rehb. 967.
sciuroides Rb. 967.
uniglumis Rb. 966.

W.

Wahlenbergia Schrad. 559.
Erinus Link. 554.
hederacea Rb. 559.

- Waldschmidia Nymphoides* Wig. 574.
Waldsteinia geoides. 247.
Weingaertneria canescens Bernh. 945.
Wibelia apargioides Roehl. 504.
chondrilloides Hpp. et Hsch. 517.
taraxacifolia Roehl. 515.
Wiborgia Acmeila Roth. 419.
Wiestia virosa C. H. Schltz. 508.
Wiggersia lutea Fl. d. Wett. 229.
sepium Fl. d. Wett. 228.
sylvatica Fl. d. Wett. 225.
Willemetia Neck. 504.
apargioides Cass. 504.
arenaria Mrkl. 715.
hieracioides Monn. 504.
Woodsia R. Brwn. 1013.
hyperborea Koch. 1013.
ilvensis Bbgt. 1013.
ilvensis R. Brwn. 1013.
ilvensis β . *intermedia* Bbgt. 1013.
Wulfenia Jcq. 628.
Ageria Sm. 628.
Bonarota Sm. 627.
carinthiaca Jcq. 628.
chamaedryfolia Hst. 627.
lutea Hst. 628.
Wylia australis Hoffm. 366.
- X.**
- Xanthium* L. 546.
italicum Morett. 546.
macrocarpum DC. 546.
orientale L. 546.
spinosum L. 546.
strumarium L. 546.
Xeranthemum L. 489.
annuum L. 489.
annuum β . *inapertum* L. 489.
- Xeranthemum cylindraceum* Sm. Spreng. 489. 1073.
cylindricum Spr. 489.
inapertum DC. 489.
inapertum Willd. 489.
radiatum Lmk. 489.
- Z.**
- Zacyntha* Trmf. 513.
verrucosa Gaertn. 513.
Zahlbrucknera Rehb. 325.
paradoxa Rb. 325.
Zanichellia L. 806.
gibberosa Rb. 806.
major a Bngl. 806.
palustris L. 806.
palustris β . *pedicellata* Whlb. 806.
pedicellata Fries. 806.
pedunculata Rb. 806.
polycarpa Nlt. 806. 1075.
repens a Bngl. 806.
Zea L. 917.
Mays L. 917.
Zizia pyrenaica Rth. 71.
Zizyphus Tourn. Gaert. 171.
Jaiuba Mill. 171.
Paliurus Willd. 172.
sativa Dsf. 171.
vulgaris Link. 171.
Zollikoferia apargioides Nees ab Es. 505.
Peltidium Gaud. 505.
Zostera L. 807.
marina L. 808.
nana Roth. 808.
Noltei Hrn. 808.
uninervis Rb. 808.
uninervis Vahl. ? 808.
- ZYGOPHYLLEEN.** 167.

D r u c k f e h l e r .

Seite 688. Zeile 3. von unten lies: *A. alpina* statt *Aretia alpina*; und vor Wulf. werde eingesetzt: *Arctia alpina*.

Seite 831. Zeile 13. von oben ist einzuschalten: *Romulea Bulbocodium* Sebast.

621 / 628

New York Botanical Garden Library

OK314 .K6 1846

Koch, Wilhelm Danie/Synopsis der deutsch gen

3 5185 00121 5456