4QK314

.C32

581.943.37

CH

LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Special Book Fund
1905

Septemb 1897

R. W. Gibson. Inv.

Uebersicht
der
Flora von **Augsburg**,
enthaltend:
die in der Umgebung Augsburgs
wildwachsenden und allgemein cultivirten
Phanerogamen.

Bearbeitet
von
F. Friedrich Saflisch

unter Mitwirkung

von
Dr. Gustav Körber und Gottfried Deisch.

Augsburg 1850.

In Commission
der **von Jenisch & Stage**'schen Buchhandlung.

+QK314

.C32

11 09 09 11

11 09 09 11

11 09 09 11 11 09 09 11

11 09 09 11 11 09 09 11

11 09 09 11 11 09 09 11

11 09 09 11 11 09 09 11

11 09 09 11 11 09 09 11

Den
verehrlichen Mitgliedern
des
naturhistorischen Vereins
in Augsburg

hochachtungsvollst gewidmet

vom

Verfasser.

1887

Verzeichnis der

1887

Verzeichnis der

1887

Verzeichnis der

1887

1887

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Vorwort.

Indem ich den verehrlichen Mitgliedern des naturhistorischen Vereins vorliegendes Werk'chen übergebe, entledige ich mich zuvörderst der angenehmen Pflicht meinen Mitarbeitern Herrn *Dr. Körber* und Herrn *G. Deisch* für die eifrige Mitwirkung zu danken, durch welche sie mich unterstützt haben. Aber auch allen jenen Mitgliedern unseres jungen Vereines fühle ich mich zum Danke verpflichtet, welche sich bei der botanischen Durchforschung unseres Gebietes betheiligten, und kann nur wünschen, dass dieselben auch ferner nicht ermüden werden, ihre Thätigkeit einem Felde des Wissens zuzuwenden, das auch auf beschränktem Raume so mannigfaltige und interessante Probleme zu lösen gibt.

Das erste Verzeichniss einer Flora von Augsburg wurde schon vor 29 Jahren unter dem Titel „Augsburgische Blumenlese“ von Herrn Dr. J. W. v. Alten herausgegeben. Dieses Werkchen wurde bis jetzt von angehenden Botanikern zur Orientirung in der Umgebung benützt. Jedoch die Veränderungen, welche zum Theil durch die Cultur in unserer Flora herbeigeführt wurden, und noch mehr die Fortschritte der Wissenschaft, machten eine neue Bearbeitung des Gegenstandes zum Bedürfniss. Indem ich mich dieser Aufgabe unterzog, leitete mich ein doppelter Zweck.

Zunächst wollte ich angehenden Botanikern, einen Wegweiser bei botanischen Excursionen und einen Anhaltspunkt zur leichtern Bestimmung der Pflanzen bieten; für's zweite hoffe ich aber auch der Wissenschaft einen Dienst damit zu leisten; denn es ist längst anerkannt, dass genaue Verzeichnisse von Specialfloren für die Pflanzengeographie von grossem Werthe sind. Deswegen war auch mein vorzüglichstes Augenmerk darauf gerichtet, ein kritisch genaues Verzeichniss der Arten unseres Bezirkes aufzustellen, und wenn dasselbe auch noch Lücken enthalten und manches unsern gemeinschaftlichen Nachforschungen entgangen sein sollte: so kann ich doch wenigstens die Versicherung geben, dass das vorhandene Material mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit geprüft und alles ausgeschieden wurde, was einigermassen zweifelhaft erschien. Da ich bei

Bestimmung mehrerer Arten mit den Ansichten meiner Freunde nicht übereinstimmte, so beschlossen wir die Entscheidung unserer Differenzen einer botanischen Autorität zu übertragen. Ich wendete mich mit diesem Anliegen an die Herrn *Dr. A. Schnizlein* in Erlangen und *A. Frickhinger* in Nördlingen. Diese als Botaniker so rühmlich bekannten Männer kamen meinem Wunsche auf das bereitwilligste entgegen, und widmeten dem schwierigen Geschäfte die grösste Sorgfalt, wofür ich ihnen hiemit im Namen der Wissenschaft den innigsten Dank abstatte.

Dass ich bei der Anordnung des Verzeichnisses das natürliche System von De Candolle, beziehungsweise die Synopsis von Koch zur Grundlage wählte, wird wohl keiner Rechtfertigung bedürfen. Es sind nicht nur die Synopsis, so wie die verbreiteten Taschenbücher von Koch und Schnizlein, sondern auch die meisten in neuerer Zeit erschienenen Floren nach diesem Systeme bearbeitet, und es springt in die Augen, dass sowohl für die Bestimmung nach jenen, als für eine Vergleichung mit diesen die Gleichförmigkeit in der Anordnung des Stoffes eine grosse Erleichterung gewährt.

Das Verzeichniss enthält: a) die wildwachsenden Phanerogamen des Bezirkes, welche durch fortlaufende Nummern ausgezeichnet wurden; b) die im Grossen cultivirten Nutzpflanzen und c) Kulturpflanzen von untergeordneter Bedeutung. Zu den

letztern zählte ich die in Gärten als Gewürz- oder Arzneipflanzen etc. cultivirten Arten, die in öffentlichen Anlagen gepflanzten Ziersträucher und Bäume, sowie solche Ziergewächse, die im Freien als Gartenflüchtlinge vorkommen. Ich glaubte die unter c begriffenen Arten ohne Bedenken aufnehmen zu können, da ihr Vorkommen doch manches Interesse bietet. Uebrigens wurde durch den kleinern Druck derselben dafür gesorgt, dass sie sich gleich auf den ersten Blick von den übrigen unterscheiden.

Schliesslich bemerke ich noch, dass zu meinem grössten Bedauern einige Arten zum Theil durch eigenes Versehen, ausgelassen wurden. Sie sind sämmtlich in dem Nachtrage aufgeführt, welchen ich deshalb zu berücksichtigen bitte.

Augsburg den 8. Mai 1850.

Der Verfasser.

Einleitung.

Es liegt nicht in unserm Plane auf eine specielle Darstellung jener Verhältnisse einzugehen, welche die Vegetation einer Gegend bestimmen; aber wir können uns eben so wenig dazu entschliessen, diese Faktoren ganz unerwähnt zu lassen: deswegen hier nur eine gedrängte Uebersicht der topographischen und klimatischen Verhältnisse.

Die Ausdehnung unseres Florenggebietes ist durch keine natürlichen Grenzen bezeichnet; wir wollen auch nicht den Zirkel im Mittelpunkte einsetzen und so durch einen willkürlich gezogenen Kreis den Bezirk abgrenzen; denn da wir nur über das berichten wollen, was uns hinlänglich genau bekannt ist, so müssen wir folgerichtig die Grenzen dahin setzen, wo eine genauere Kenntniss des Terrain's aufhört. — Der Zug der Eisenbahnen, die Richtung der Thäler und andere untergeordnete Umstände reizten stets mehr zu Ausflügen nach Nord und

Süd, als nach Ost und West. In Folge dessen dehnte sich die Erforschung in den ersten beiden Richtungen weiter aus, als in den letztern, und es wird daher der Umfang des Gebietes durch ein Oval zu bezeichnen sein, dessen Längendurchmesser von S. nach N. 4, und dessen Querdurchmesser von O. nach W. 3 deutsche Meilen beträgt. Die Grenzlinie wäre demnach durch folgende Orte zu ziehen: Langwaid, Aach, Affing, Obergriesbach, Mering, Ottmarshausen, Hard, Oberschönefeld, Lützelburg — zurück nach Langwaid.

Im Mittelpunkt des so begrenzten Areals liegt Augsburg unter $48^{\circ} 22'$ nördlicher Breite.

Gütigen Mittheilungen des Herrn Prior Postelmayer zufolge ist das Haupt-Jahresmittel der Temperatur aus 50 Jahrgängen der meteorologischen Beobachtungen zu Augsburg = $+6,585$ Reaumur; der herrschende Wind: West, und die Erhebung der Wasserfläche des Lech und der Wertach bei Augsburg 1470 pariser oder 1636 bayr. Fuss.

(Nach den Angaben Lamont's liegt Friedberg 1572' — das Pflaster der Kirche von St. Ulrich 1518' — das Lechfeld 1667'; — nach Weiss der Boden der Domthürme 1478', das Lechfeld 1660'; — nach Stolz Lechhausen 1443, St. Ulrich 1472' in pariser Schuhen.)

Die topische Gestaltung des Terrain's ist sichtlich durch Wasserfluthen bewirkt worden. Die heutigen Gewässer zeigen in ihrem Laufe

manche eigenthümliche Erscheinung. Dabin gehört z. B. ein auffallender Parallelismus *), sowie der eigenthümliche Lauf der Paar, welche, nachdem sie bei Merching die Lechebne betreten und dem Rinnal des Lech sich bis auf 5000 Schritte genähert hat, sich plötzlich nordöstlich wendet und den steilen Thalrand zwischen Mergenthau und Friedberg durchbrechend, einen eigenen Weg zur Donau sucht.

Der Character unserer Flüsse ist so verschieden, als ihr Ursprung. Der im Hochgebirg entspringende Lech fliesst fast in gerader Richtung und mit reisender Schnelle. Sein Gefäll beträgt auf 1000' im Durchschnitte 25". Sein breites Bett ist mit vielen und ausgedehnten Bänken von Grus und Sand ausgefüllt, deren oft blendendes Weiss ihren Ursprung verräth. Hie und da haben Weiden und Sanddorn ihre Wurzeln eingeschlagen und so aus nackten Kiesbänken grünende Inseln geschaffen, auf welchen dann auch manche aus den Alpen herabgeschwemmte Pflanzenkeime sich festsetzen. An Wasserpflanzen ist der bedeutende Fluss sehr arm, da das reissende

*) Die Sinkel begleitet die Wertach in einer Entfernung von 1000 — 1500 Schritt von Schwabmünchen bis Göggingen; Aach und Schmutter übernehmen die Begleitung des Lech bis zum Donauthal, und zwar erstere östlich von Friedberg an in einer mittlern Entfernung von $\frac{1}{2}$ Meile, letztere im Westen vom Kobel an in einer mittlern Entfernung von $\frac{5}{8}$ Meilen.

Gewässer und der bewegliche Grund desselben ihnen nirgends die nöthige Zeit zur Entwicklung lässt. Günstigere Verhältnisse für diese Gewächse bietet die Wertach, da sie langsamer fließt und namentlich, da sie an Altwässern reicher ist. Die geeignetsten Standorte für Wasserpflanzen bieten jedoch die kleineren Flösschen, z. B. die träge Aach, und die in vielen Krümmungen fließende Schmutter, sowie die Gräben und stagnirenden Wasser der Lechebene.

An Quellen ist die Lechebene reicher als die angrenzenden Höhen. So entspringen auf dem Lechfelde und in der Meringerau mehrere Quellen, welche zum Theil den Brunnenwerken der Stadt ihr Wasser liefern: zwischen dem Pulvermagazine und der Paar entspringt die Aach, und in der Nähe Lechhausens der Brunnenbach, der wasserreiche Brandweinbach und der Mühlbach. Auch der östliche Thalrand des Lechthales ist reich an Quellen, welche zwar nicht so wasserreich, aber in botanischer Beziehung interessant sind. Die Quellen der westlichen Höhen sind meist nur die trüben Abflüsse schwammiger Waldmoore; sie sind an Zahl und Wassermenge unbedeutend.

Weiher finden sich in dem Umkreise unseres Florengebietes nur wenige und unbedeutende (Obergriesbach, Schöppacherhof, Hard) und auch diese werden von der Cultur immer mehr beschränkt. So wurde jüngst erst ein kleiner Weiher am Schöp-

pacher Hof trocken gelegt, in welchem *Typha latifolia*, *Acorus Calamus* etc. in Menge wuchsen.

Der Zug der Gewässer, welche die Gegend durchflutheten, zerlegte dieselbe in drei Hauptparthien: die Lech-Wertachebne, und die beiden in Ost und West sie begleitenden Höhenzüge. Die Breite der genannten Ebene ist sehr beträchtlich und beträgt im Süden des Gebietes zwischen Mering und Strassberg 2 Meilen, in dessen Mitte zwischen Friedberg und Leitershofen $1\frac{1}{2}$ Meilen und weiter nördlich zwischen Scherneck und Achsheim $1\frac{1}{6}$ Meile. In dieser Ebene haben sich Lech, Wertach und Schmutter tiefere Rinnsale gefurcht.

Zwischen Lech und Wertach blieb nach dem Sinken der Gewässer eine, auf Specialkarten gewöhnlich mit dem Namen Lechfeld bezeichnete flache Erderhöhung zurück. Diese fällt an ihrem höhern Westrande steil gegen die Wertach ab, während sie gegen Osten durch zwei parallellaufende Terrassen den linken Thalrand des Lechthales bildet. Die mächtigen Lehmlager, aus welchen sie grössten Theils besteht, sind mit einer tiefen Schichte fruchtbarer Dammerde bedeckt, welche die Cultur für den Bau der Cerealien in Anspruch genommen. Auf der nördlichsten Spitze dieses flachen Erdwalles, da wo er gegen den Vereinigungspunkt des Lech und der Wertach abfällt, wurde die alte Augusta gegründet. Jenseits der Wertach tritt eine ganz ähnlich gebildete Fläche als Wasserscheide zwischen

Lech und Schmutter auf, welche eine durch das Wertachthal unterbrochene Fortsetzung der erstern bildet. Sie ist unter dem Namen Breitfeld bekannt. Auch ihr Steilabfall richtet sich gegen Westen, während sie gegen den Lech hin ebenfalls in 2 Terrassen abfällt; ja sogar ihre Breite ist fast ganz die nämliche und beträgt wie bei jener im Mittel $c.\frac{3}{8}$ Meilen.

Die Lechthalebene im engern Sinne bietet für die Cultur die ungünstigsten Verhältnisse dar, während sie dagegen dem Botaniker die reichste Ausbeute an Seltenheiten gewährt. Ihre Breite schwankt zwischen $\frac{3}{4}$ und einer ganzen Meile. Westlich ist sie von den oben bezeichneten Culturflächen begrenzt, und östlich findet sie ihre Grenze in dem steilabfallenden Thalrand, den ihr die bayer'sche Höhe verleiht. Denken wir uns durch die Thalsole vom Jakoberthore nach Mergenthau eine gerade Linie gezogen, so ist sie durch diese schiefe Linie in eine südliche und nördliche Hälfte getheilt. Die südliche Hälfte ist höher und trocken gelegt. Der Vegetationscharakter dieser steppenähnlichen Fläche ist in der Nähe der Stadt durch die Cultur fast gänzlich verwischt. Nur auf der vor dem Spickel gelegenen Schafweide tritt er ziemlich deutlich hervor und erst südlich von Haunstetten zeigt er sich in seiner vollen Eigenthümlichkeit. Dort beginnt das eigentliche Lechfeld, das sich am linken Ufer des Lech bis gegen Landsberg hinzieht, während es am rechten Ufer bis an die Höhen von Mering und Kissing sich ausbreitet. Diese weite unabsehbare Fläche, welche

fast in gleichem Niveau mit dem Lech liegt, erzeugt auf einer dünnen Humusschichte nur kurzes Gras; aber der dürftige Rasen ist mit zahlreichen Ansiedlungen seltner Alpengewächse durchwebt, welche hier ein freudiges Gedeihen finden. Einige Quellenbäche, welche in der Ebene entspringen, machen es möglich, dass auch Sumpfgewächse (*Gladiolus palustris*, *Bartsia alpina* u. A.) ihr Fortkommen finden können. Durch die Culturen der neuangelegten Kolonie Königsbrunn gehen jedoch diese natürlichen Verhältnisse einer immer weiter fortschreitenden Umgestaltung entgegen.

Nördlich von der oben angegebenen Querlinie und ausschliesslich längs des rechten Lechufers zieht sich ein feuchtes, sumpfiges Torfmoor hin. Es erstreckt sich mit einiger Unterbrechung von den Quellen der Paar bis unter Scherneck und ist von Bächen, Wassergräben und Torfstichen nach allen Richtungen durchkreuzt. An seinen Rändern ist es zum Theil durch Cultur in fruchtbaren Wiesengrund verwandelt; aber manche Strecken werden wegen ihrer tiefen Lage noch lange der Entwässerung schwere, wo nicht unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen. Es gilt dies besonders von der an seltenen Pflanzen so reichen Sumpfstrecke zwischen Mühlhausen und Anwalding.

Längs den Ufern des Lech befindet sich eine Reihe von Wäldern und Wäldchen, welche den Namen Auen führen. Fichten und Föhren sind

die vorherrschenden Bestandtheile derselben und ihr Anblick ist höchst einförmig. Doch haben ihnen die Ueberschwemmungen, denen sie theilweise ausgesetzt sind auch manche botanische Seltenheit zugeführt und im Ganzen hat ihre Vegetation manches Eigenthümliche aufzuweisen. Die bedeutendsten dieser Auen sind: Die Meringerau, der Siebentischwald, die Wolfszahnau, die obere Au.

Die Vegetation des Wertachthales ist weniger reich, als die der Lechebne; doch hat es manche subalpine Pflanzenformen aufzuweisen. Culturwiesen bedecken weitaus den grössten Theil desselben, deren Grund eine mehr oder minder tiefe Lage schwarzer Dammerde bildet. Besonders zeichnen sich aber das Schmutterthal, welches unter dem Kobel die Lechebne betritt, sowie das Paarthal durch schöne, fette Wiesgründe aus.

Die Anhöhen, welche die eben geschilderten Thäler begleiten, zeigen im Vergleich gegen diese keine bedeutenden relativen Höhenunterschiede, und doch ist die Flor derselben von derjenigen der Lechebne wesentlich verschieden, was die am Schlusse beigefügte vergleichende Uebersicht darthun wird. Die Ursachen dieser Verschiedenheit mögen zum Theil in der chemischen und physikalischen Verschiedenheit des Bodens liegen, theils aber auch in dem Hereingreifen der Alpenflor in den Flussthälern des Lech und der Wertach ihre Erklärung finden.

Die westlich gelegenen Höhen werden durch das Schmutterthal in zwei Parthien geschieden: die Höhen diesseits und jenseits der Schmutter. Jene nehmen an Breitenausdehnung gegen Süden zu, während sie gegen Norden in ihrem letzten Ausläufer, dem Kobel, gegen das Breitfeld abfallen. Die Grundgewässer haben sich in diesen Höhen mehrere Thäler gebildet, deren bedeutendere sämmtlich der Hauptsenkung des Landes gegen Nord folgen. Die bekanntesten derselben sind: das Giebelthal, das sich hinter Strassberg und Banacker herabzieht und in das Wertachthal mündet, und das Anhauserthal, das hinter Guggenberg entspringt, und über Burgwalden sich nach dem Schmutterthale wendet. Der sumpfige Grund dieser Thäler beherbergt eine reiche Flor von Cyperaceen und andern Sumpfpflanzen. Auch auf den Höhen und namentlich an ihrem Abhange gegen das Wertachthal (Strassberg) finden sich feuchte Moorgründe, wo zwischen Sphagnum-Polstern die zarten Blüthen eines *Vaccinium Oxycoccos* prangen. Im Allgemeinen haben die Höhen jedoch meist trocknen, in der südlichen Hälfte mehr festen, thonigen, in der nördlichen mehr lockern, sandigen Boden. Wohl über 90 pro Ct. derselben sind mit herrlichen Wäldern bewachsen, deren vorherrschenden Bestandtheil die Fichte bildet. Doch gibt es auch ziemlich ausgedehnte Bestände von Birken, Eichen und Buchen. — Nördlich vom Kobel, am Abfall des Breitfeldes gegen das Schmutterthal befinden sich, gleich vorgeschobenen Posten der

Waldregion drei kleine Wäldchen, Lohe genannt, welche auf beschränktem Raume eine durch Mannigfaltigkeit interessante Flor aufzuweisen haben. — Die Höhen jenseits der Schmutter sind in ihrem Vegetationscharacter den diesseitigen ziemlich ähnlich; doch fehlen ihnen die obenerwähnten Moosbildungen.

Wie die westlichen Höhen durch die Schmutter, so sind (nur in entgegengesetzter Weise) die im Osten das Lechthal begleitenden Höhen durch die Paar in zwei Theile zerlegt. Auch diese sind durch die auf ihnen entspringenden kleinen Gewässer durchfurcht; aber die Richtung der so gebildeten Thäler geht durchgehends entweder westwärts gegen das Lechthal oder ostwärts gegen die Paar. In Beziehung auf die Beschaffenheit des Grund und Bodens zeigen die östlichen Höhen mit den westlichen viel Analoges, sind aber in Beziehung auf Bewachsung von diesen sehr verschieden, da sie grösstentheils mit Aeckern bedeckt sind, zwischen denen nur einzelne Waldparcellen von geringerem Umfange zerstreut liegen. Ein reiches Pflanzenleben entwickelt sich an den quellenreichen Abhängen und in den schattigen Schluchten, welche sich der Lechebne zuwenden. Besonders ist dies zwischen Friedberg und Derching, sowie zwischen Mühlhausen und Scherneck der Fall. Der Thalrand ist auf diesen Strecken mit einem bunten Gemisch von Laub-, Nadel- und Unterholz bekleidet und Schatten

und Feuchtigkeit gewähren mancher seltenen Pflanze die nöthigen Bedingungen zu ihrem Gedeihen.

Der hier gegebene Ueberblick schien uns eines- theils zu einem bessern Verständnisse der Angaben über die Standorte der aufgeführten Pflanzen noth- wendig, anderntheils lässt er auch erkennen, dass die mannigfaltigsten Bedingungen für eine reiche Flor gegeben sind. Bringen wir in Anschlag, dass unsere Gegend nicht wie manche andre auch durch das Zusammentreten verschiedener Gebirgsformatio- nen oder Flussgebiete begünstiget ist: so ist aller- dings ihre Flor eine reiche zu nennen, wie das nun folgende Verzeichniss darthun wird. Bei der An- ordnung desselben folgten wir Koch's Synopsis Florae Germanicae et Helveticae, Ed. II.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

Bei Angaben der Standorte wurden folgende Abkürzungen angewendet:

Abb. = Abhänge.	Grb. = Gräben.
Ak. = Aecker.	Gbsch. = Gebüsch.
Beh. = Bäche.	Hd. = Haiden.
Bg. = Berg.	Hg. = Hügel.
Br. Ak. = Brachäcker.	Hh. = Höhen.
Eb. = Ebene.	Hk. = Hecken.
feht. = feucht.	L. W. = Laubwälder.

M. = Mauern.	Thl. = Thäler.
N. W. = Nadelwälder.	tr. = trocken.
Smpf. = Sümpfe.	U. = Ufer.
Trf. M. = Torfmoore.	W. = Wälder.
Trft. = Triften.	Ws. = Wiesen.

Verbreitung und Menge der Pflanzen wurden nach dem Vorgange von Schnizlein und Frickhinger in ihrer trefflichen Arbeit über „die Vegetationsverhältnisse der Jura- und Keuperformation“ durch römische und arabische Ziffern ausgedrückt. Durch die römischen Ziffern von I. bis VI. wird die Verbreitung oder die Menge der Standorte bezeichnet, so dass z. B. eine Pflanze welche höchstens auf drei Standorten sich findet, I, wenn von ihr 4 bis 6 Standorte bekannt sind, II, und so nach ihrer Verbreitung in dem Bezirk stufenweise bis VI. erhält. Durch die arabischen Ziffern 1—6 wird die Menge der Individuen, welche auf den einzelnen Standorten vorkommen, bezeichnet. So erhielt z. B. *Ranunculus Lingua* die Bezeichnung I. 2, weil er nur auf einem Standorte, und dort nur in einigen Exemplaren zu finden ist; dagegen erhielt *Ranunculus acris* die Bezeichnung VI. 6, weil er über den ganzen Bezirk verbreitet ist und gewöhnlich in grosser Menge vorkommt.

Solche Pflanzen welche seit 10 oder mehr Jahren nicht mehr gefunden wurden, sind mit einem * bezeichnet. Die des Nutzens wegen im Grossen cultivirten Pflanzen erhalten den Beisatz: Cult. = Cultivirt.

I. Classe:
DICOTYLEDONEN

oder

Pflanzen mit zwei Keimblättern.

I. Unterlasse:
Thalamifloren oder Fruchtbodenblüthige.

1. RANUNCULACEEN.

Clematis. L. Waldrebe.

— *Vitalba*. L. Jun. Jul. Hek.; Gbsch. Lechufer und Auen.

III. 3. (1)

Thalictrum. L. Wiesenraute.

— *aquilegifolium* L. Mai, Jun. Gbsch. und Waldränder
der Lechauen; Siebentischwld., zwischen Lechlsn.
u. Gersthfn. IV. 3. (2)

— *minus* L. Jun. Gbsch. am Lechufer. * (3)

Var. *γ dumosum* v. Schldl. Lohwäldchen am Ko-
bel. I. 1.

— *galiioides* Nestl. Jul. Hd. Lechfeld bei den Sandgruben;
Ws. unfern der Mühle von Derching; Wolfszahn
I. 2. (4)

— *flavum* L. Jul. Gbsch. der Lech- und Wertach-Ufer;
Wolfszahn: fcht. Ws. vor Mühlhfn. II. 3. (5)

Anemone L. Windröschen.

— *Hepatica* L. (Leberröschen) Mrz. Apr. Gbsch., W. des
östl. Thalrandes; Statzling bis Scherneck. II. 4. (6)

— *Pulsatilla* L. (Küchenschelle) Mrz. Apr. Tr. Hg., Hd.
Rosenaubg. Lechfeld, Karlsbg. b. Mühlhfn. III. 4. (7)

— *nemorosa* L. Apr. Gbsch., W. V. 5. (8)

Adonis L. Adonis.

- *aestivalis L.* Mai, Jun. Ack. unter dem Getrd. bes.
häufig längs der Strasse nach Göggingen. III. 3. (9)
- Var. β *pallida* mit gelben Blumen.

Myosurus L. Mausschwänzchen.

- *minimus L.* Mai. Sandige u. thon. Ak., Diedorf, Banacker.
Deuringer Ziegelstdl., zwischen Pfersee u. Stadt-
bergen. II. 3. (10)

Ranunculus L. Hahnenfuss, Schmalzblume.

- *aquatilis L.* Jun. Bch. u. stehend. Wssr. IV. 5. (11)
- *divaricatus Schr.* Jun. Jl. Bch., Grb. der Lechebue;
Statzling u. a. O. III. 4. (12)
- *fluitans Lam.* Jun. Fliessend. Wssr. IV. 5. (13)
- *Flammula L.* Jul. Smpf. Ws. III. 5. (14)
- *Lingua L.* Jul. Aug. Ufer der Aach südlich von dem
Pulvermagazin. I. 2. (15)
- *Ficaria L.* Mai. An fecht. schatt. Orten. V. 5. (16)
- *auricomus L.* Apr. Hk. fecht. Ws.; Eichelau, Pfersee.
III. 3. (17)
- *montanus L.* Apr. W. u. Hd. der Lechebue; Sieben-
tischwald, Lechfeld zwisch. Bergheim u. Wöllen-
burg. III. 4. (18)
- *acris L.* Mai. Ws., W. VI. 6. (19)
- *lanuginosus L.* Mai. Gbsch., W. der östlichen und
westl. Bg.-Abhg. IV. 2. (20)
- *polyanthemus L.* Jun. Hd. Strassberg, Lechfld. I. 1. (21)
- *nemorosus D C.* Lechauen, W. der westl. u. östl. Hg.
III. 2. (22)
- *repens L.* Mai. Ak., Ws., Grb. W. V. 6. (23)
- *bulbosus L.* Mai. Ak., Wd. IV. 5. (24)
- *sceleratus L.* Jun. Grb. Smpf. am Wege v. Lechhsn. gegen
Miedring unfern der Aach; bei Derching. I. 4. (25)

Ranunculus arvensis L. Jun. Jl. Ak. IV. 4. (26)

Caltha L. Dotterblume.

— *palustris* L. Apr. Mai. Grb., Bch., fcht. Ws. V. 5. (27)

Trollius L. Trollblume.

— *europaeus* L. Mai. Torfws. im Schmutterthal, Lecheb.

II. 4. (28)

Aquilegia L. Akelei.

— *atrata* Koch. Jun. Lechauen, Siebentischw. zwisch.

Lechhausen und Gersthofen II. 3. (29)

A. vulgaris L. kommt verwildert auf der Insel vor.

Delphinium L. Rittersporn.

— *Consolida* L. Jun. Unter dem Getrd. IV. 4. (30)

Aconitum L. Eisenhut.

— *Napellus* L. (*pyramidale*, Mill.) Jul. Aug. Lech- und Wertachauen I. 3. (31)

— *Lycotctonum* L. Aug. Gbsch. sumpfiger Waldthäler; Giebelthal zw. Bauacker u. Strassberg; zw. Wöl- lenburg u. Anhausen. I. 2. (32)

Actaea L. Christophskraut.

— *spicata* L. Schattig. L. W.; Strassbg. Wolfertshauser Sägmühle; Heck. bei Miedring am Abhg. I. 1. (33)

2. BERBERIDEEN.

Berberis L. Sauerdorn.

— *vulgaris* L. Mai. W. Hk. besonders der Lech- und Wertachauen. IV. 5. (34)

3. NYMPHAEACEEN.

Nymphaea L. Seerose.

— *alba* L. Jul. Aug. Teiche; Schöppacher Hof, zwisch. Strassbg. und Burgw. II. 3. (35)

Var. β minor D C. Smpf. zwischen Lechhsn. u. Mühlhausen, Statzling — Derching.

Nuphar Smith. Gelbe Seerose, Seemummel.

- *luteum* Sm, Jun. Jul. In der Paar bei Mering. I. 3. (36)

4. PAPAVERACEEN.

Papaver L. Mohn.

- *Argemone* L. Jun. Ak. Gersthofen, a. d. Strasse nach Haunstetten; am Strassberg. II. 2. (37)
- *Rhoeas* L. Jun. Jul. Ak. unt. d. Getreide V. 6. (38)
- *dubium* L. Jun. Jul. Ak. unt. d. Getrd. III. 5. (39)

Chelidonium L. Schöllkraut.

- *majus* L. Mai Hek. Wegränder, Schnft. V. 5. (40)

5. FUMARIACEEN.

Corydalis D C. Hohlwurz.

- *cava* Schw. ♂ K. Mai. Hek. Vorw. besonders der östl. Höhen. III. 3. (41)

Fumaria L. Erdrauch.

- *capreolata* L. Wurde im Oktbr. 1844 von Zolleis zwisch. der Lechhsr. u. Friedberger Brücke am Lechuf. gefunden. I. 1. (42)
- *officinalis* L. Mai. Jun. Ak. V. 4. (43)
- *Vaillantii* Lois. Mai. Jun. Ak. am Wege nach Statzling, Friedbergerau; ev. Gottesacker. II. 4. (44)

6. CRUCIFEREN.

Nasturtium R. Brun. Brunnenkresse.

- *officinale* R. Br. Jul. Quellen. IV. 6. (45)
- *sylvestre* Br. Jul. Grb. fcht. Ws. Exercierplatz, Schmutterthl. u. a. O. IV. 5. (46)
- *palustre* D C. Jun. — Aug. Grb. an dem Wege nach Bergheim, III. 4. (47)

Barbarea R. Br. Winterkresse.

- *vulgaris* R. Br. Mai — Jul. Strassgrb. fcht. Plätze.
V. 4. (48)

Turritis L. Thurmkrant.

- *glabra* L. Mai, Jun. Tr. Graspl. Lechfeld, Kobel,
Derching. III. 2. (49)

Arabis L. Gänsekrant.

- *hirsuta* Scop. Jun. Jul. Graspl. Raine; Lechfeld,
Mühlhsn., Derching. III. 4. (50)

Cardamine L. Schaumkrant.

- *pratensis* L. Mai. Fcht. Ws., W., an Bächen, (standhaft
gefüllt a. d. Aach bei Statzling) V. 6. (51)
- *amara* L. Apr. Mai. An u. in fliessendem Wasser,
Grb. IV. 5. (52)

Hesperis matronalis L. wird sehr oft als Gartenflüchtling auf Schutthaufen u. a. O. gefunden.

Sisymbrium L. Rauke.

- *officinale* L. Jun. — Aug. An Wegen, Strassgrb.
Schutthfn. V. 4. (53)
- *Sophia* L. Mai. Jun. Schutthfn., Grb. b. d. städtisch.
Ziegelstadel. II. 4. (54)
- *Alliaria* Scop. Mai. Jun. Hk. Waldränder, Wolfertshsn.
Derchiug, Hk. um Oberhsn. II. 3. (55)
- *Thalianum* Gaud. Mai — Sept. Tr. Ak. der östlichen
u. westl. Hhn. IV. 6. (56)

Erysimum L. Hederich.

- *cheiranthoides* L. Jun. — Aug. Ak. zwischen Pfersee
u. Leitershofen — Wöllenbg. II. 4. (57)

Brassica L. Kohl.

- *oleracea* L. Die Varietäten: Kohl, Wirsig, Krant,
Kohlrabe u. Blumenkohl werden angebaut.
- *Rapa* L. Rübe. a) *var. campestris* (Sommerrübe)
kommt spontan unter dem Getreide vor. III. 2. (58)

γ) rapifera. Cult. u. zwar als weisse od. Wasserrübe, Tellerrübe u. bayersche od. Teltower Rübe.
Brassica Napus L. Die Varietäten: Kohltreps und Bodenrübe werden gebaut.

B. nigra L. kommt hie und da verwildert vor.

Sinapis L. Senf.

— *arvensis L.* Jun. Jul. Unter der Saat. VI. 6. (59)

S. alba L. wurde früher bei Siebentisch angebaut und kommt nun einzeln verwildert vor.

Erucastrum Sch. & Sp. Rempe.

— *Pollichii Sch. & Sp.* Jul. Aug. Wrtchufer. II. 4. (60)

Alyssum L. Steinkresse.

— *calycinum L.* Jun. Jul. Ak., an Mauern, fr. Abhg.

IV. 5. (61)

Draba L. Hungerblümchen.

— *verna L.* Apr. Aecker, Haiden. V. 5. (62)

Cochlearia L. Löffelkraut.

— *officinalis L.* Apr. Quellen zwischen Statzling und

Derching, am Abhg. I. 4. (63)

Armoracia Fl. d. W. Meerrettig.

— *rusticana Fl. d. W.* Cult. und hie und da verwildert;

an der Paar bei Mergenthau.

Kernera Med.

— *saxatilis Rb.* Jun. Jul. Auf Lechkies beim Ablass.

I. 1. (64)

Camelina Crantz Leindotter.

— *sativa Cr.* Jun. Jul. Cultiv. u. verwildert auf Brach-

u. Saatäckern. IV. 4. (65)

Thlaspi L. Täschelkraut.

— *arvense L.* Mai. Ak. u. Gartenland. VI. 6. (66)

— *perfoliatum L.* Mai. Hk. Flssuf. Ak. Gersthofen,

Pfersee. III. 4. (67)

Iberis umbellata L. wurde von Prof. Märtel als Gartenflüchtling auf Lechkies gefunden.

Biscutella L. Brillenschötchen.

— *laevigata* L. Mai, Jun. Ws., Wd. der Lechgeb. u. des Wertachthales. III. 5. (68)

Lepidium L. Kresse,

— *sativum* L. (Gartenkresse) Cult. u. hie und da verwildert.

— *campestre* L. Jun. Jul. Grb. an der Strasse nach Statzling. I. 3. (69)

Hutchinsia R. Br. Alpenkresse.

— *alpina* R. Br. Jul. — Sept. Auf Lechkies. I. 1. (70)

Capsella Med. Täschelkraut.

— *Bursa pastoris* Moench. Ak. Gärten. VI. 6. (71)

Isatis tinctoria L. wurde früher versuchsweise gebaut.

Neslia Desv. Ackerdotter.

— *paniculata* Desv. Ak. III. 4. (72)

Raphanus L. Rettig.

— *sativus* L. Cultiv. und zuweilen auf Schutt verwildert.

— *Raphanistrum* L. Jun. Jul. Ak. unter der Saat als Unkraut. VI. 6. (73)

7. CISTINEEN.

Helianthemum Tourn. Haideröslein.

— *Fumana* Mill. Wuchs früher auf einer Haide vor Siebentisch und scheint durch Cultivirung derselben aus der Gegend verschwunden zu sein. * (74)

— *vulgare* Gaertn. Jun. — Aug. Hd. IV. 5. (75)

8. VIOLARIEEN.

Viola L. Veilchen.

— *hirta* L. Apr. W., Gbsch. V. 5. (76)

— *collina* Bess. Apr. Meringerau am Lech, waldig. Hhu. b. Derching. II. 3. (77)

Viola odorata L. Mrz. Apr. Hk. zwischen dem rothen u.

Hallthore, Klinkerthor. III. 3. (78)

— *arenaria* D C. Apr. Mai. Hd., W. Meringerau, am
Ablass, Siebentischw., Friedbergerau. II. 2. (79)

— *sylvestris* Lam. Mai. Gbsch., W. III. 4. (80)

— *canina* L. Mai. W., Hk. V. 5. (81)

— *stagnina* Kil. Mai. Jun. Torfmoore am Wege nach
Derching. I. 2. (82)

— *tricolor* L. Mai. Jun. Ak. V. 6. (83)

Die Var. *α vulgaris* am Wege nach Affing.

β arvensis gemein.

9. RESEDACEEN.

Reseda L.

— *lutea* L. Jul. An Wegen, Schutthfn. V. 6. (84)

— *luteola* L. Jul. (Wau) Kiesgruben an der Haunstetter
Strasse, Schutthaufen II. 2. (85)

10. DROSERACEEN.

Drosera L. Sonnentau.

— *rotundifolia* L. Jul. Aug. Moore der Lecheb. u. der
westl. Hhn.; zw. Strassberg u. Banacker; bei Burg-
walden (unter *Sphagnum* u. *Vaccin. Oxycoccus*)
II. 2. (86)

— *longifolia* L. Jul. Aug. Torfmoore, Smpf., Strassbg.,
zwischen Statzling u. Derching. III. 4. (87)

Parnassia L. Leberblume.

— *palustris* L. Jul. Aug. Smpf., Ws., Hd., Moore IV. 5. (88)

11. POLYGALEEN.

Polygala L. Kreuzblume.

— *vulgaris* L. Wiesen, Wd. IV. 5. (89)

Var. *β oxyptera* Rb.

Polygala comosa Schk. Jun. Ws., Hd., tr. Abhänge. IV. 4. (90)

— *amara* L. Jun. — Aug. Fcht. Ws., Flussuf. bes. an
Lech- u. Wrtchuf. IV. 5. (91)

— *Chamaebuxus* L. Apr. Hd., W., Auen der Lecheb. u.
hinter Leitershofen. III. 6. (92)

12. SILENEEN.

Gypsophila L. Gypskraut.

— *repens* L. Jun. Jul. Hd. auf dem Lechfeld. II. 3. (93)

— *muralis* L. Jul. Aug. Ak. bei Bergheim, Grb. am
Stadtberger Ziegelstadel. II. 3. (94)

Tunica Scop.

— *Saxifraga* Scop. Jul. Aug. Tr. Hg., Abhg., Trft. der
Lecheb.; Rosenaubg., Lechfeld, Lechuf. IV. 6. (95)

Dianthus L. Nelke.

— *Armeria* L. Wurde von Dumler an einem Waldrand
bei Wöllnbg. gesammelt, konnte aber seit langer
Zeit nicht mehr aufgefunden werden. * (96)

— *Carthusianorum* L. Jul. Tr. Hgl., Raine, Grasplätze.
V. 5. (97)

— *Seguierii* Vill. β *sylvaticus* Hopp. Von Deisch wurde
vor mehrern Jahren bei Biburg am Saum des
Waldes gegen Aistetten ein Exempl. gefunden. * (98)

— *deltoides* L. Jul. Aug. Tr. Hgl. bes. der westl. Höhen;
Leitershofen, Banacker, Westheim. III. 4. (99)

— *superbus* L. Jun. Jul. Fcht. Ws. der Hhn. u. Flussthr.;
Strassbg., Schmutterthal, Wolfertshausen. III. 3. (100)

Saponaria L. Seifenkraut.

— *officinalis* L. Jul. Ak. Wegränder, Ziegelstadel, Gög-
gingen, Grb. zwischen Kriegshaber und Steppach.
II. 3. (101)

Silene L. Leimkraut.

— *nutans* L. Jun. — Aug. Grasige Abhg., Trft. V. 5. (102)

Silene inflata Sm. Jul. Aug. Ws., W., Trft. V. 6. (103)

— *noctiflora* L. Wurde früher von Dumler auf Schutt bei Lechhausen gefunden. * (104)

Lychnis D C. Lichtnelke.

— *Viscaria* L. (Pechnelke) Jun. Grasige Abhg., Gbsch., Friedberg bis Scherneck, Strassbg. V. 5. (105)

— *Flos cuculi* L. (Kuckucksblume) Mai. Feld- und Waldws. V. 5. (106)

— *vespertina* Sibth. Jun. Ws. Raine. IV. 5. (107)

— *diurna* Sibth. (Himmelsschlüssel) Mai. Ws., Gbsch., W. VI. 6. (108)

Agrostemma L. Ackerrade.

— *Githago* L. Jun. Jul. Ak. unt. d. Getrd. V. 6. (109)

13. ALSINEEN.

Sagina L. Mastkraut.

— *procumbens* L. Mai. Hd. Brachäcker. V. 6. (110)

— *apetala* L. Sept. Mauerbrüstung der Rothenthor-Brücke. I. 2. (111)

— *nodosa* E. Meyer. Jul. Aug. Felt. Flussuf., Hd. mit Torfgrund zwisch. Lechhsn. u. Miedring. III. 4. (112)

Spergula L. Spark.

— *arvensis* L. Mai. Jun. Ak. unter der Saat, Banacker, Kobel. III. 5. (113)

Lepigonum Wähl.

— *rubrum* W. Jul. Aug. Sandige Hgl., Engelshof, Auhausen, Luisensruh. II. 2. (114)

Alsine Wahlbg. Miere.

— *stricta* W. Jun. Waldmoore der westl. Hhn., Strassberg, zwisch. Banacker u. Burgwalden. II. 5. (115)

— *Jacquini* Kch. Jul. Aug. Tr. Hgl. des Lechfeldes, bei der Bleiche von Haunstetten. I. 3. (116)

Moehringia L.

- *trinervia* Clairr. Jun. Fcht. Hk., Grb., Ak. III. 4. (117)

Arenaria L. Sandkraut.

- *serpyllifolia* L. Jul. Tr. Grasplätze, Ak, Mauern.
IV. 5. (118)

Holosteum L. Spurre.

- *umbellatum* L. Apr. Hd., Aecker. V. 6. (119)

Stellaria L. Sternkraut.

- *nemorum* L. Mai. Fcht. Hk., L. W. III. 4. (120)
— *media* Vill. (Vogelskraut) Apr. — Jul. Aufcultiv. Lande,
Grb., Wegränder. VI. 6. (121)
— *Holostea* L. Mai. Hk., Waldränder; zwischen Der-
ching u. Statzling. I. 3. (122)
— *glauca* With. Jun. Grb., an der Schmutter, bei Wöl-
lenbg. I. 2. (123)
— *graminea* L. Jun. Ak., Hk., Ws. IV. 5. (124)
— *uliginosa* Murr. Grb. u. Pfützen in W., Deuringen
etc. III. 5. (125)

Malachium Fries.

- *aquaticum* Fries. Jun. Jul. Grb., fcht. Hk. IV. 4. (126)

Cerastium L. Hornkraut.

- *triviale* Link. Mai — Aug. Ak., Ws. V. 6. (127)
— *arvense* L. Mai. Ak., Raine. V. 6. (128)

14. LINEEN.

Linum L. Lein.

- *flavum* L. Jul. Lechfeld. I. 1. (129)
— *viscosum* L. Jun. Jul. Lechfeld u. Meringerau. II. 3. (130)
— *usitatissimum* L. (Flachs) Cult.
— *catharticum* L. Jul. Aug. Ws., Wd. IV. 6. (131)

15. MALVACEEN.

Malva L. Käspappel.

- *Alcea L.* Jul. Aug. Weg- und Waldränder; Wolfertshausen, Pfersee, Wöllenbg. II. 2. (132)
- *sylvestris L.* Jul. Aug. Hk. um die Dörfer; Lechhsn. Stadthergen. III. 3. (133)
- *rotundifolia L.* Jul. — Sept. Wegränder, Hk. IV. 5. (134)
Althaea officinalis kommt hie und da als Gartenflüchtling auf Schutt u. a. O. vor.

16. TILIACEEN.

Tilia L. Linde.

- *parrifolia Ehrh.* Jul. W., Alleen. III. 4. (135)
T. grandifolia Ehrh. wurde in dem Bezirk noch nicht aufgefunden.

17. HYPERICINEEN.

Hypericum L. Hartheu.

- *perforatum L.* Jul. Aug. Hk., Hd., W. V. 5. (136)
- *humifusum L.* Jun. — Aug. Fcht. W., Aistetten, Oberschönefeld, Wolfertshsn. II. 2. (137)
- *quadrangulum L.* Jul. Aug. Grh., fcht. Hk. IV. 3. (138)
- *tetrapterum Fries.* Jul. Aug. W. Wolfertshausen, Meringerau. II. 2. (139)
- *pulchrum L.* Aug. Waldrand am Wege von Strassberg nach Burgwalden. I. 1. (140)
- *montanum L.* Jul. Aug. W. der östl. und westl. Hhn. III. 2. (141)
- *hirsutum L.* Jun. — Aug. W. der westl. Hhn. II. 3. (142)

18. ACERINEEN.

Acer L. Ahorn.

- *Pseudoplatanus L.* Mai, Jun. W. der Ost- und Westseite. Alleen. II. 3. (143)
A. platanoides L. In der Allee zwischen dem Rothen- und Schwibbogenthor angepflanzt.

Acer campestre L. Vorwälder der Ostseite; bei Derching
am Fusse des Hügels. III. 3. (144)

19. HIPPOCASTANEEN.

Aesculus L. Rosskastanie.

- *Hippocastanum* L. Mai. Allee zwischen dem Vogel-
und Schwibbogenthor; kommt verwildert im Sieben-
tischwald vor.

20. AMPELIDEEN.

Vitis L. Weinstock.

- *vinifera* L. wird nur an Häusern als Spalier gezogen,
wurde aber im Schmutterthale verwildert vorge-
funden: ein Beweis, dass seine Cultur früher all-
gemeiner war.

21. GERANIACEEN.

Geranium L. Kranichschnabel.

G. sylvaticum L. wurde früher einmal gefunden, aber
es fehlt uns eine Angabe des Standortes.

- *pratense* L. Jun. — Aug. Ws. der Lechebne; am
Fussweg nach Siebentisch, Kuhbrücke, Batzenhäusel
bei Pfersee. III. 4. (145)
- *palustre* L. Jul. Aug. Grb. Bachuf., fcht. Hk. IV. 3. (146)
- *sanguineum* L. Jun. Hd., Lechfeld; Waldsaum bei
Hammel. I. 1. (147)

G. pyrenaicum L. Gbsch. links vom Fusswege nach Sie-
bentisch am Saum des Waldes, woselbst es vor
vielen Jahren angepflanzt wurde.

- *pusillum* L. Mai — Aug. Ak., Schutt. V. 6. (148)
- *dissectum* L. Mai — Sept. Ak. Bergheim, Banacker,
Wolfertshausen. II. 3. (149)
- *columbinum* L. Ak., Hohlwege, zwischen Scherneck
u. Rehling, Wolfertshausen. I. 3. (150)

Geranium molle L. Mai—Jul. Ak., Zäune, Ackerränder,
Kobel, am Wege nach Haunstetten. III. 3. (151)

— *Robertsianum* L. Jun.—Sept. Fcht. schattige Hk., u.
Waldränder. IV. 5. (152)

Erodium L'Herit. Reiherschnabel.

— *cicutarium* L'Herit. Mai.—Jul. Ak. V. 4. (153)

22. BALSAMINEEN.

Impatiens L. Springkraut.

— *Noli tangere* L. Jul. Fcht., schattige Schluchten; Der-
ching, Wolfertshausen; am Wege von Deuringen
nach Diedorf, Grb. vor dem Schwibbogen Thor.
II. 3. (154)

23. OXALIDEEN.

Oxalis L. Sauerklee.

— *Acetosella* L. Mai. Wiesen, Hecken. IV. 5. (155)

— *stricta* L. Jun.—Sept. In Gärten, an Gartenzäunen
unweit der Rosenau. II. 3. (156)

II. Unterlasse:

Calycifloren oder Kelchblüthige.

24. CELASTRINEEN.

Staphylea pinnata L. (Pimpernuss) findet sich in den
Anlagen um die Stadt angepflanzt. (Vor dem Rothen-
und Jakoberthor.)

Eronyimus L. Spindelbaum.

— *europaeus* L. Mai. Wiesen, Hecken. III. 2. (157)

25. RHAMNEEN.

Rhamnus L. Wegdorn.

- *cathartica* L. Jun. W., Hk. IV. 4. (158)
- *saxatilis* L. Jun. Lechauen, Lech- und Wertach-
Ufer. II. 4. (159)
- *Frangula* L. (Faulbaum) Jun. W., Flussuf. IV. 5. (160)

26. PAPILIONACEEN.

Sarothamnus Wimm. Besenginster.

- *vulgaris* W. Jun. Jul. W. der östl. u. westl. Hhn.
(in der Lechebne fehlend.) III. 6. (161)

Genista L. Ginster.

- *tinctoria* L. Jul. W., Gbsch., Hd., Lechfeld, Meringer-
au, Strassbg. III. 4. (162)
- *germanica* L. Jun. W. der östl. und westl. Hhn.
Wöllenberg. Scherneck. II. 3. (163)

Cytisus L. Bohnenstrauch.

C. Laburnum L. wird häufig als Zierstrauch angepflanzt.

- *nigricans* L. Waldränder, Gbsch., Strassbg., Lochhaus,
Scherneck. III. 3. (164)
- *ratibonnensis* Schffr. Mai. Waldränder, Hd. der Lech-
ebne bes. auf d. Lechfeld, Wrtchth. III. 5. (165)
- *sagittalis* DC. Jun., Jul. Waldränder, Hd., sonnige
Hg. IV. 5. (166)

Ononis L. Hauhechel.

- *spinosa* L. Jul. Wd., Wegränder. IV. 5. (167)
- *repens* L. Jul. Trft., Wegränder. III. 4. (168)

Var a inermis Sm.

Anthyllis L. Wundklee.

- *Vulneraria* L. Mai, Jun. Ws. Trft. IV. 5. (169)

Medicago L. Schneckenklee.

- *sativa* L. Jun. Cult. u. verwildert; Ws., Flussufer an der Wertach. II. 4. (170)
- *falcata* L. Jun. fl. Weg- und Ackerränder, Wd. VI. 6 (171)
- *lupulina* L. Mai fl. Ws. Trft. V. 6. (172)

Melilotus Tournef. Steinklee.

- *macrorhiza* Pers. Jul. Flussuf. Schutt. IV. 6. (173)
- *alba* Desr. Jul. Aug. Ak., Wegränder. V. 3. (174)
- *officinalis* Desr. Jun. Ak., Flussuf., Hk. VI. 4. (175)
- *parviflora* Desf. Jul. Grasplatz am Alphüttchen an der Strasse nach Pfersee. I. 1. (176)

Trifolium L. Klee.

- *pratense* L. Mai — Sept. Ws., Ak., Cult. V. 6. (177)
- *medium* L. Jul. W., Gbsch., Ablass, Scherneck, Wöllenberg. III. 4. (178)
- *alpestre* L. Jul. Gbsch., W., zwischen Scherneck und Au, Lohe. I. 3. (179)
- *rubens* L. Jul. Waldrand an dem Abhang bei Anwalding, Loh-W. I. 2. (180)
- *arvense* L. Jul. Aug. Ak. IV. 6. (181)
- *fragiferum* L. Jul. Aug. Gbsch., Flussuf.; am rechten Lechuf. von der Friedberger Brücke aufwärts; an der Wertach bei Göggingen; am Wege von Lechhausen nach Miedring, Pferseer Mühle. II. 4. (182)
- *montanum* L. Jun., Jul. Ws., Hd., Waldränder. III. 5. (183)
- *repens* L. Jun. Fcht. Ws., uncult. O. V. 6. (184)
- *hybridum* L. Jun. Fcht. Ak., Raine; Anwalding, Wöllenberg, Deuringen, Mühlhausen. III. 3. (185)
- *agrarium* L. Jun. — Aug. Waldws., Gbsch., Wöllenberg, Strassbg. I. 3I. (186)

Trifolium procumbens L. Jul. Aecker. V. 6. (187)

- *filiforme* L. Jun., Jul. Fcht. Ws., Wöllenburg, Leitershofen—Stadtbergen, von Statzling gegen Derching.
II. 4. (188)

Lotus L. Schotenklee.

- *corniculatus* L. Mai. Fcht. Ws., W. IV. 4. (189)
Var. *γ hirsutus* Hd. am Saum des Siebentischw.
— *uliginosus* Schk. Fcht. W., Gbsch., Grb., Giebelthal,
Hard, Lohwäldchen. II. 3. (190)

Tetragonolobus Scop. Spargelerbse.

- *siliquosus* Roth. Jun. Fluss- und Kanalufer der Lechebne. III. 6. (191)

Colutea arborescens L. (Blasenstrauch) sowie *Robinia Pseudacacia* L. (Acacie) sind in den Anlagen um die Stadt häufig angepflanzt.

Astragalus L. Tragant.

- *Cicer* L. Jul. Ak., Raine; Rosenaubg., prot. Gottesacker; zwischen Oberhsn. u. Neusäss. II. 4. (192)
— *glyciphyllus* L. Jun, Jul. W., Hk., Ak. bes. Waldränder der östl. Hhn. IV. 3. (193)

Coronilla L. Kronwicke.

- *vaginalis* Lam. Jun. W., Hd. der Lechebne, Lechfeld, Lechauen. III. 4. (194)
— *varia* L. (Bunte Peltsche) Ak., Hd., Raine. IV. 5. (195)

Ornithopus L. Vogelfuss.

- *perpusillus* L. Zwischen Lechhausen und der Friedberger Brücke; Siebenbrunnen. * (196)

Hippocrepis L. Pferdshuf.

- *comosa* L. Mai, Jun. Tr. Ws., Hd., Flussuf. IV. 5. (197)

Onobrychis L. Esper.

- *sativa* Lam. Jun. Tr. Ws., Hd., Rosenaubg., Friedberger Lechbrücke, Siebenbrunnenfeld, wo sie früher cult. wurde. (198)

Vicia L. Wicke.

- *dumetorum* L. Jul. Hk. bei Wolfertshsn. I. 3. (199)
- *Cracca* L. Jun. Fcht. Hk., Gbsch., Ak. V. 6. (200)
- *tenuifolia* Rth. Jul. Ak. beim prot. Gottesacker, Lechufer in Weidengbsch. II. 4. (201)
- *villosa* Rth. Jun., Jul. Ak. bei Bergheim, Stadtbergen. II. 3. (202)
- *Faba* L. Hin und wieder cultiv.
- *sativa* L. Jun. Cult. u. verwildert. (203)
- *angustifolia* Rth. Jun. Fcht. Ak. der östl. u. westl. Hhn. III. 5. (204)
- *Var. a segetalis* bei Wolfertshausen.

Ervum L. Linsen.

- *hirsutum* L. Jul. Fcht. Ak. IV. 5. (205)
- *tetraspermum* L. Sand. Ak., Wöllenburg, Stadtbergen, Hard. III. 4. (206)
- *Lens* L. Hie und da cultivirt.

Pisum L. Erbse.

- *arvense* L. (Erbse) Cult. u. verwildert.
- *sativum* L. (Stockerbse) Cult. u. verwildert.

Lathyrus L. Platterbse.

- *tuberosus* L. (Erdnuss) Jun., Jul. Ak. IV. 4. (207)
- *pratensis* L. Jun. Gbsch., W. IV. 5. (208)
- *sylvestris* L. Jul. W., Gbsch. an Abhg. der östl. u. westl. Höhen; Strassberg, Wöllenburg, Wolfertshausen. II. 3. (209)

Orobus L. Walderbse.

- *vernus* L. Apr., Mai. L. W. bei Mühlhsn. I. 3. (210)
- *niger* L. Jul. W. auf der Anhöhe zwischen Scherneck und Aach. I. 1. (211)

Phaseolus L. Fasoie.

- *vulgaris L.* (Bohne) als Stock- und Stangenbohnen cultivirt.
- *multiflorus Lam.* (Feuerbohne). Cult.

27. AMYGDALEEN.

Persica vulgaris L. (Pflrsich.) Wird in Gärten als Spalier gezogen.

Prunus L. Pflaume, Steinobst.

P. armeniaca L. (Aprikose). In Gärten als Spalier.

- *spinosa L.* (Dornschlehe). Apr., Mai. W., Hk., tr. Hgl. V. 5. (212)
- *insititia L.* (Haberschlehe). Waldränder; Scherneck. II. 1, (213)
Wird in mehrern Varietäten (Pflaumen, Reine Claude, Mirabelle etc.) cultiv.
- *domestica L.* (Zwetsche). In Grt. cult.
- *avium L.* (Süsskirsche). Apr., Mai. Cult. u. wild in W.; Derching. III. 1. (214)
- *Cerasus L.* Apr., Mai. In mehreren Varietäten cult. (Weichsel, Amarellen etc.) in W.; Kobel. II. 1. (215)
- *Padus L.* (Traubenkirsche). Hk., W. IV. 4. (216)
P. Mahaleb L. Anlagen vor dem Hallthor.

28. ROSACEEN.

Spiraea L. Spierstaude.

S. salicifolia L., *opulifolia L.* und *chamaedrifolia L.* sind in den öffenttichen Anlagen als Ziersträucher cult.

- *Aruncus L.* Jun., Jul. Fcht. W., Gbsch.; Banacker, Wöllenburg. III. 3. (217)
- *Ulmaria L.* Jul. Grb., fcht. Ws. V. 4. (218)
- *Filipendula L.* Jun., Jul. Fcht. u. tr. Moorgründe der Lechebne; am Fusswege von Lechhausen zur Mühle bei Friedberg, Lechfeld, Wrtchthl. III. 3. (219)

Geum L. Nelkenwurz.

- *urbanum* L. Jun., Jul. Hk., W., unten am Rosenaubg.
IV. 4. (220)
- *rivale* L. Mai, Jun. Grb., fcht. Ws. IV. 5. (221)

Rubus L. Brombeere.

- *Idaeus* L. (Himbeere). Jun. W. der östl. u. westl. Hhn.
IV. 6. (222)
- *fruticosus* L. Gbsch., Hk. V. 6. (223)
- *caesius* L. Jul. Flussuf. Br. Ak., Rosenauberg, Lech-
Ufer. III. 5. (224)
- *saxatilis* L. L. W. der westl. und östl. Hhn. Loh-
wäldchen, Strassbg., Gbsch. am Abhg. zwischen
Friedbg. u. Wolfertshausen. III. 2. (225)

Fragaria L. Erdbeere.

- *vesca* L. Jun. Schläge, Gbsch. V. 6. (226)
- *clatior* Ehrh. (Zimmerdbeere). Jun. Hg., Gbsch.,
Rosenaubg., Gersthofen. II. 3. (227)
- *collina* Ehrh. (Knackerdbeere). Hd., Lechfeld bei der
Bleiche. I. 2. (228)

Comarum L. Blutauge.

- *palustre* L. Jul. Smpf. W. Thl. der Westseite;
Banacker, Wöllenbg., Anhauserthl. III. 5. (229)

Potentilla L. Fingerkraut.

- *anserina* L. Apr., Mai. Wd., Wegrand. VI. 6. (230)
- *argentea* L. Jun., Jul. Tr. sand. Hgl. u. Raine der
östl. u. westl. Seite. III. 3. (231)
- *reptans* L. Mai — Jul. Grasplätze, Strassgrb. VI. 6. (232)
- *Tormentilla* L. Jun., Jul. W. IV. 4. (233)
- *verna* L. Apr., Mai. Tr. Hg. u. Grasplätze. V. 6. (234)
- *opaca* L. Mai. Hd., Raine. III. 5. (235)
- *alba* L. Mai. Gbsch., Hd.; Eichelau, jenseitiges Lech-
feld. II. 3. (236)

Potentilla Fragariastrum Ehrh. Apr. Gbsch. im Eichelau.

I. 1. (237)

Agrimonia L. Odermennig.

— *Eupatoria* L. Jul. Aug. An Wegen, Hk. V. 4. (238)

Rosa L. Rose.

— *cinnamomea* L. Jun. Hk. Lechufer. IV. 3. (239)

— *canina* L. Jun. Hecken. IV. 5. (240)

Var. *γ collina* bei Bergheim.

R. tomentosa Smith. findet sich in Hecken zwischen dem Schleifgraben und der Chur'schen Fabrik.

— *arvensis* Huds. wurde früher an einem Grb.* zwischen Pfersee u. Stadtbergen gefunden.* (241)

— *gallica* L. Jun. Jul. Hk., Wegraine; Eichelau, Hainhofen, zw. Haberskirch u. Griesbach, III. 2. (242)

29. SANGUISORBEEN.

Alchemilla L. Sinau.

— *vulgaris* L. Mai, Jun. Trft., Ws., an W. IV. 4. (243)

— *arvensis* Scop. Jun. ff. Ak., Rosenaubg. IV. 6. (244)

Sanguisorba L. Wiesenknopf.

— *officinalis* L. Jul. Fcht. Torfws. IV. 4. (245)

Poterium L. Becherblume.

— *Sanguisorba* L. Jun. Fcht. Ws., Flussuf.; Ablass. IV. 4. (246)

30. POMACEEN.

Crataegus L. Hagedorn, Weissdorn.

— *Oxyacantha* L. Mai. Gebsh., Ws. V. 4. (247)

— *monogyna* L. Mai. Hk. bei Leitershofen. I. 2. (248)

Cydonia vulgaris Pers. (Quitte) wird in Gärten häufig gezogen; verwildert in einer Hecke am Fusse des Schlossberges bei Wöllenburg.

Pyrus L. Kernobst.

- *communis* L. (Holzbirne) Mai. W., Hk. III. 1. (249)
(In vielen Variet. cult.)

- *Malus* L. (Holzapfel). W. III. 1. (Ebenfalls in vielen veredelten Sorten cult.) (250)

Sorbus L. Eberesche.

- *aucuparia* L. (Vogelbeere) Mai, Jun. W., Gbsch.; in Alleen angepflanzt. IV. 3. (251)

31. ONAGRARIEN.

Epilobium L. Weidenröslein.

- *angustifolium* L. Jul. Aug. W. III. 4. (252)

- *hirsutum* L. Jul. Bch., Wssrgrb., Gbsch. IV. 4. (253)

- *parviflorum* Schreb. Jul. Grb., Ufer, Smpf. IV. 5. (254)

- *montanum* L. Jun. ff. W., bes. der östl. u. westl. Hhn. IV. 3. (255)

Var. β *lanceolatum* auf dem Strassberg.

- *palustre* L. Jul. Aug. Grb., Moorgründe hinter Lechhausen III. 3. (256)

Var. β *pilosum* torfige Smpf. bei Strassberg.

Oenothera L. Nachtkerze.

- *biennis* L. Jul. Ufer des Lech u. der Wrtch. II. 3. (257)

Circaea L. Hexenkraut.

- *lutetiana* L. Jul., Aug. Schaff. L. W., Mühlhausen, Derching. II. 2. (258)

- *alpina* L. Jul. Fcht. Waldthäler der Westseite; zw. Leitershofen u. Anhausen; Deuringen. I. 2. (259)

32. HALORAGEEN.

Myriophyllum L. Federkraut.

- *verticillatum* L. Jul. Altwasser, Grb.; an der Wertach, Wolfertshausen. III. 4. (260)

- *spicatum* L. Jul. Grb. an der Wrtch. II. 2. (261)

33. HIPPURIDEEN.

Hippuris L. Tannenwedel.

- *vulgaris* L. Jun., Jul. Wassergräben um die Stadt,
bei Wolfertshausen, Statzling. III. 3. (262)

34. CALLITRICHINEEN.

Callitriche L. Wasserstern.

- *platycarpa* Kütz. Apr. ff. Grb. der Lechebue, Miedring.
II. 4. (263)
— *vernalis* Kütz. Apr. ff. Gräben. V. 5. (264)
— *hamulata* Kütz. Altwasser bei dem Wolfszahn. (Be-
darf noch der Bestätigung.)

35. LYTHRARIEEN.

Lythrum L. Weiderich.

- *Salicaria* L. Jul. ff. An Wegen, Schutt, Grb. VI. 5. (265)
Peplis L. Zipfelkraut.
— *Portula* L. Jul. ff. Eicht, Waldwege zwisch. Strass-
berg u. Banacker, Wöllenbg. u. Engelshof. II. 3. (266)

36. TAMARISCINEEN.

Myricaria Desv. Tamariske.

- *germanica* D. Jul. Kiesbänke des Lech u. d. Wrtch.
III. 4. (267)

37. PHILADELPHEEN.

Philadelphus coronarius L. (Pfeifenstrauch, wilder Jas-
min) wird sehr häufig in Hecken gezogen, u. kommt
hie und da verwildert vor.

38. CUCURBITACEEN.

Cucurbita Pepo L. (Kürbis) u. *C. Melopepo* L. (Türken-
bundkürbis.) werden nur zur Zierde in Gärten ge-
baut.

Cucumis L.

- *sativus* L. (Gurke). Ihre Cultur ist in der Gegend sehr verbreitet.

C. Melo L. kann nur in Mistbeeten gezogen werden.

Bryonia L. Zaunrübe.

- *dioica* Jacq. Jun., Jul. Hecken. V. 5. (268)

39. PARONYCHIEEN.

Herniaria L. Bruchkraut.

- *glabra* L. Jul. Sandige Ak. zwischen Dasing u. Aichach. I. 3. (269)

40. SCLERANTHEEN.

Scleranthus L. Knaul.

- *annuus* L. Jun. Ak. unter der Saat. V. 5. (270)
- *perennis* L. Mai. Ak., Raine der östl. Seite; Dasing II. 2. (271)

41. CRASSULACEEN.

Sedum L. Fettkraut.

- *purpurascens* Koch. Jul. Aug. Waldränder, an Wegen; Haunstetten, Lohe, Mühlhsh., Scherneck. III. 2. (272)
- *villosum* L. Jul., Aug. Smpf. Ws. am Wöllenburger Weiher, Schmutterhäuschen, Banacker. II. 3. (273)
- *album* L. Jul., Aug. M., tr. O. V. 5. (274)
- *acre* L. Jun., Jul. Trockene Hügel. V. 6. (275)
- *sexangulare* L. Jun., Jul. Tr. Hg. bei Oberhausen, Gersthofen, Haunstetten. II. 4. (276)

Sempervivum tectorum L. Hie und da auf Dächern.

42. GROSSULARIEEN.

Ribes L. Johannisbeere.

- *Grossularia* L. (Stachelbeere) Apr., Mai. Hk. (In Gärten cult.) IV. 4. (277)
- Var. *a glanduloso-setosum* an Abhg. b. Derching.
- Var. *β pubescens* sehr verbreitet.

Ribes rubrum L. (Johannisbeere) Apr., Mai. Hk. bei Wörlenburg. II. 3. (278)

— *nigrum* L. (Schwarze Johannisbeere) Apr., Mai. Hk. um Lechhsn., a. d. Paar bei Harthsn. I. 2. (279)

43. SAXIFRAGEEN.

Saxifraga L. Steinbrech.

— *mutata* L. Jun. Auf Lechkies b. Siebenbrunnen. I. 2. (280)

— *aizoides* L. Jul. Auf Lechkies b. Siebenbrunnen. I. 2. (281)

— *Hirculus* L. Jul., Aug. Fcht. Waldthäler; Strassberg, zwischen Leitershofen und Anhausen, Aystetten. II. 2. (282)

— *tridactylites* L. Apr. Ak. der östl. und westl. Hhn.; Kobel, Friedberg, Wolfertshausen. III. 6. (283)

— *granulata* L. Mai, Jun. Tr. Hg. u. Wegränder bes. der östl. Hhn.; Kobel. III. 4. (284)

Chrysosplenium L. Goldmilz.

— *alternifolium* L. Apr. Schattige Quellensmpf. III. 3. (285)

44. UMBELLIFEREN.

Sanicula L. Sanickel.

— *Europaea* L. Mai, Jun. Gbsch., Waldränder; Deuringen, Derching, Wolfertshausen. II. 3. (286)

Astrantia L. Schwarzmeisterwurz.

— *major* L. Jun. Jul. Gbsch., W.; Giebelthal, Meringerau, Siebentischwald. III. 3. (287)

Cicuta L. Schierling.

— *virosa* L. Jul. In Teichen und langsam fliessendem Wasser; Schöppacherhof, Wertach, Sinkel, Schmutter. III. 4. (288)

Helosciadium L.

— *repens* L. Aug., Sept. Quellensümpfe des Wertachthales;

zwischen der Wertach und der Pferseer Mühle,
Bobingen. I. 3. (289)

Falcaria Host. Sichelkraut.

— *Rivini* Host. Jul., Aug. Ak. zwischen dem protest.
Gottesacker und Ziegelstadel. I. 3. (290)

Aegopodium L. Geissfuss.

— *Podagraria* L. Hk. u. fcht. Waldstellen. VI. 5. (291)

Carum L. Kümmel.

— *Carvi* L. Tr. Ws. u. Wegränder. VI. 6. (292)

Pimpinella L. Bibernell.

— *magna* L. Mai, Jun. W., Gbsch.; zwisch. Lechhausen
und Gersthofen. III. 3. (293)

Var. laciniata Koch. im Siebentischwald.

— *Saxifraga* L. Jul. Aug. Tr. Ws. u. Hd. V. 5. (294)

Berula Koch. Berle.

— *angustifolia* K. Jul., Aug. Grb. u. Bäche. IV. 5. (295)

Aethusa L. Gartengleisse.

— *Cynapium* L. Jun. ff. Grt., Ak.; namentl. häufig unter
der Petersilie vorkommend. V. 6. (296)

Foeniculum officinale All. (Fenchel) in Gärten vielfältig,
jedoch nur in geringer Menge cult.

Seseli L. Sesel.

— *coloratum* Ehrh. Jul. Hd.; Lechfeld, Gersthofen.
III. 3. (297)

Silau Bess. Silau.

— *pratensis* B. Jul. Fcht. Ws., Lechhsn. etc. IV. 5. (298)

Selinum L. Silge.

— *Carvifolia* L. Jul., Aug. Smpf. Waldthäler, Lechmoore;
Giebelbach, Derching. III. 3. (299)

Angelica L. Engelwurz.

— *sylvestris* L. Jul. Aug. Fcht. Ws. u. W. IV. 3. (300)

Peucedanum L. Haarstrang.

- *Chabraei* Rb. Aug. Gbsch. am Fusswege von Göggingen nach Bergheim. I. 1. (301)
- *Cervaria* L. Jul. Lechfeld, Gbsch. zwischen Bobingen und Strassberg, Ws. b. Pulvermagazin gegen Mergenthau. II. 2. (302)
- *Oreoselinum* Moench. Jul. Aug. Lechfeld, Lechauen, bei Mergenthau. III. 4. (303)

Thysselinum Hoffm. Ölsenich.

- *palustre* H. Jul. Aug. Gbsch. im Giebelthal, hinter Leitershofen; Smpfws. bei Mühlhausen, III. 4. (304)

Pastinaca L. Pastinak.

- *sativa* L. Jul. Aug. Gbsch. (in Gärten zieml. allgemein cult.) VI. 5. (305)

Heracleum L. Heilkraut

- *Sphondylium* L. Jun. ff. Ws., Hk. VI. 5. (306)

Laserpitium L. Laserkraut.

- *latifolium* L. Jul. Aug. Lechfeld, Meringerau, b. Mergenthau. II. 1. (307)
- *Siler* L. Jul. Aug. Lechfeld. II. 2. (308)
- *prutenicum* L. Jul. Aug. Ficht. Waldthäler der westl. Hlm.; Giebelthal, hinter Leitershofen, II. 2. (309)

Orlaya Hoffm.

- *grandiflora* Hoffm. Jun. Jul. Ak.; Au bei Scherneck, zwischen Bobingen und Neuhaus. I. 4. (310)

Daucus L. Möhre, gelbe Rübe.

- *Carota* L. Jun. ff. Ws., Weg- und Ackerränder, Schnitt (in Gärten cult.) VI. 6. (311)

Torilis Adans. Klettenkörbel.

- *Anthriscus* Gmel. Jun. Jul. Hk., Triften. V. 6 (312)

Anthriscus Hoffm. Körbel.

- *sylvestris Hoffm.* Jun. Hk. u. Gbschws. VI. 6. (313)
A. Cerefolium H. ist die unter dem Namen „Körbel“
in Gärten ziemlich häufig cultivirte Art.

Chaerophyllum L. Kälberkropf.

- *temulum L.* Jun. Jul. Waldränder, Hk. des östl.
Thalrandes von Friedberg bis Scherneck; bei Stadt-
bergen, Leitershofen. IV. 5. (314)
- *bulbosum L.* Jun. Jul. Hk. zwischen Friedberg und
Wolfertshausen. II. 2. (315)
- *aureum L.* Jun. Jul. Hk. im Eichelau, bei Bobingen;
Lohwäldchen. III. 4. (316)
- *hirsutum L.* Jul. Aug. Schatt. fecht. W. der westl. u.
östl. Hhn. zw. Friedberg und Scherneck; Engels-
hof. III. 3. (317)

Conium L. Gelfleckter Schierling.

- *maculatum L.* Jul. Aug. Schutt, an Wegen, M., in
Dörfern; Derching, Wolfertshausen, Wöllenburg
etc. III. 2. (318)

Pleurospermum Hoffm. Rippensame.

- *austriacum Hoffm.* Jun. Jul. Gbsch. der Lech- und
Wertachauen; zwischen Bobingen und Strassberg,
Lochhaus, Wolfszahn, Gersthofen. III. 1. (319)

45. ARALIACEEN.

Hedera Swartz. Epheu.

- *Helix L.* In Wäldern der östlichen Höhen, wo sie
aber nie zur Blüthe kommt (in Gärten im Oktober
blühend und im Frühjahr darauf die Früchte
reifend.) III. 3. (320)

46. CORNEEN.

Cornus L. Cornelstrauch.

- *sanguinea L.* (Rother Hartriegel). Mai, Jun. Hk.
V. 4. (321)

C. Mas L. (Dürlitze). Cult. in Gärten; verwildert am
Saum des Siebentischwaldes beim Ablass.

47. LORANTHACEEN.

Viscum L. Mistel.

- *album L.* Apr. Auf Eichen, Apfelbäumen; in der
Schlossallee bei Scherneck auf Linden. * (322)

48. CAPRIFOLIACEEN.

Adoxa L. Bisamkraut, Moschuskraut.

- *Moschatellina L.* Apr. Hk. u. Gbsch. bei Wolferts-
hausen, Statzling, zwischen Stadtbergen u. Leiters-
hofen. II. 5. (323)

Sambucus L. Hollunder.

- *Ebulus L.* Jul. Aug. W. bei Mühlhausen und Stet-
tenhofen. II. 4. (324)
- *nigra L.* Jun. Jul. Cult. u. wild in W. IV. 2. (325)
- *racemosa L.* Mai. W.; Kobel, Wolfertshausen.
II. 2. (326)

Fiburnum L. Schneeball.

- *Lantana L.* Jun. Hk., Waldränder. III. 4. (327)
- *Opulus L.* Mai, Jun. Hk., Gbsch. III. 3. (328)

Lonicera L. Beinholz.

- *Periclymenum L.* Jul. Aug. Am Saume des W. bei
Leitershofen. I. 1. (329)
- *Xylosteum L.* (Heckenkirsche). Mai, Jun. Hk., W.
IV. 4. (330)

L. Caprifolium L. (Geisblatt) findet sich nur als Zier-
trauchs angepflanzt.

49. STELLATEN.

Sherardia L. Sternkraut.

- *arvensis* L. Mai. Aecker. VI. 6. (331)

Asperula L. Meierich.

- *tinctoria* L. Mai. Jun. Lechfeld; Gbsch. oberhalb der Friedbergerau. I. 2. (332)
- *cynanchica* L. Mai. Jun. Tr. Hg. u. Raine. V. 5. (333)
- *odorata* L. Mai. Jun. L. W.; Derching etc. IV. 5. (334)

Galium L. Labkraut.

- *Cruciata* L. Mai. Ws., Hk. u. Gbsch. V. 5. (335)
- *Aparine* L. Jun. ff. Hk. u. Ak. V. 5. (336)
- *uliginosum* L. Jun. Grb., fcht. Ws. III. 4. (337)
- *palustre* L. Mai. Grb., Smpf. IV. 4. (338)
- *boreale* L. Jul. Aug. Hd., Waldws.; Ablass. III. 4. (339)
- *verum* L. Jun. Jul. Ws., Trft. u. Wegränder. V. 5. (340)
- *sylvaticum* L. Jul. Laubwälder. IV. 4. (341)
- *Mollugo* L. Mai ff. Wiesen, Gbsch. VI. 6. (342)
- *saxatile* L. Jul. Auf Lechkies. I. 2. (343)
- *sylvestre* Poll. Jun. Jul. Hd. u. Waldränder; Wöllenburg, Deuringen, Siebenbrunnen. III. 4. (344)

50. VALERIANEEN.

Valeriana L. Baldrian.

- *officinalis* L. Mai. Jun. Uf., Grb., fcht. Ws. IV. 3. (345)
- *dioica* L. Mai. Fcht. Wiesen. IV. 4. (346)
- *montana* L. Lechauen bei Lechhausen. * (347)

Valerianella Poll. Feldsalat.

- *olitoria* Poll. Apr. Mai. Aecker. VI. 6. (348)
- *dentata* Poll. Jul. Aug. Aecker; bei Anwalding etc. II. 1. (349)
- *Auricula* D C. Apr. Mai. Ak.; am Kobel. I. 3. (350)

51. DIPSACEEN.

Dipsacus L. Karden.

- *sylvestris* L. Jul. Aug. Wegränder, Grb. IV. 4. (351)

D. Fullonum L. (Weberkarden) wurde hie und da versuchsweise gebaut.

Knautia Coult. Krätzkraut.

- *sylvatica* Dub. Jul. Aug. W., bes. der westl. Hhn.;
Meringerau. III. 3. (352)

- *arvensis* Coult. Jul. Aug. Waldränder, Ws. V. 3. (353)

Succisa M. et K. Teufelsabbiss.

- *pratensis* Moench. Aug. Sept. Fcht. Ws. u. W. IV. 5. (354)

Scabiosa Roem et Sch. Grindkraut.

- *Columbaria* L. Jun. fl. Weiden, tr. Hg. und W.
IV. 3. (355)

- *suaveolens* Desf. Jul. Aug. Hd. u. Wegränder; Lechfeld, zwischen Gersthofen u. Batzenhofen, bei der Hafenmühle. II. 2. (356)

52. COMPOSITEN.

Eupatorium L. Berghanf.

- *camabinum* L. Jul. Aug. Gbsch. der Lech- u. Wertschufer. III. 4. (357)

Tussilago L. Huflattig.

- *Farfara* L. Mrz. Apr. Weg- u. Ackerränder, Kiesgruben. V. 6. (358)

Petasites Gaertn. Pestwurz.

- *officinalis* Moench. Mrz. Apr. Bachufer, fcht. Ws.
III. 5. (359)

Aster L. Sternblume.

- *Amellus* L. Aug. Spt. Hd, tr. Hg.; Lechfeld, Scherneck. II. 2. (360)

A. Novi Belgii L. ziemlich constant unter Weidengebüsch am Ufer des Lech bei Leehausen.

A. parviflorus N. ab. E. im Gbsch. am Wertachufer auf dem Wolfszahn.

Bellidiastrum Cass.

- *Michelii* Cass. Jun. Jul. Lechfeld, Lechauen; Siebentisch. II. 5. (361)

Bellis L. Gänseblümchen.

- *perennis* L. Mrz. — Oct. Ws. u. Trft. VI. 6. (362)

Stenactis Cass.

- *bellidiflora* R. Br. Aug. In einem Hohlweg bei Miedring. I. 2. (363)

Erigeron L. Berufkraut.

- *canadensis* L. Jul. Aug. Schutt, Dämme, Flussufer. V. 6. (364)

- *acris* L. Jul. Aug. Flussuf., tr. Ws. u. Wegränder. IV. 5. (365)

- *droebachensis* Mill. Jul. Auf Lechkies (Huber). I. 1. (366)

Solidago L. Goldrute.

- *Virga aurea* L. Jul. Aug. Waldränder, Gbsch.; Lohe, Schmutterthal. III. 3. (367)

Buphtalmum L. Ochsenauge.

- *salicifolium* L. Jul. Aug. Lechfeld, Lech- u. Wertachufer. III. 4. (368)

Var. *β grandiflorum* auf Siebenbrunnen.

Inula L. Alant.

- *salicina* L. Jul. Aug. Fcht. Ws. u. Gbsch.; Wolfszahn, hinter Lechhausen, Lechfeld. III. 2. (369)

- *Conyza* D C. Jul. Aug. W., Siebentisch, Hammelberg, Hohlwege v. Hard gegen Grosaiting. II. 1. (370)

Pulicaria Gaertn. Flohkraut.

- *dysenterica* G. Jul. Fcht. Ws., Gbsch. an Grb. u. Bch. IV. 5. (371)

Bidens L. Zweizahn.

- *tripartita* L. Jul. An Pfützen, fcht. Grb.; Lech-
hausen etc. III. 4. (372)

- *cernua* L. Jul. An Bch. und Grb. III. 3. (373)

Die Form: *B. minima* L. auf Torfgründen im
Schmutterthal.

Helianthus annuus L. (Sonnenblume) wird zwar sehr
häufig, jedoch nur als Zierpflanze angebaut.

H. tuberosus L. (Topinambur) findet sich hin und wie-
der im Kleinen als Kaffee-Surrogat cult.

Filago L. Ruhrkraut.

- *germanica* L. Jul. Aug. Ak.; Rosenauberg, Gerst-
hofen, am Wege zwischen Statzling u. Derching.
III. 4. (374)

Var. β *pyramidata* bei Wöllenburg.

- *arvensis* L. Jul. Aug. Ak., Sandberg, Gersthofen.
III. 6. (375)

- *minima* Fries. Jul. Aug. Ak. bei Friedberg. I. 3. (376)

Gnaphalium L. Rainblume.

- *sylvaticum* L. Jul. Wälder, Wd. IV. 4. (377)

- *uliginosum* L. Jul. Feuchte Aecker. IV. 5. (378)

- *luteo-album* L. Aug. Sandige Ak. bei Schlipsheim.
(Dumler). * (379)

- *dioicum* L. Mai, Jun. Hd.; vor dem Siebentischwald
etc. V. 4. (380)

G. margaritaceum L. an Wegen bei Aystetten.

Helichrysum Gaert. Strohblume.

- *arenarium* D C. Aug. Tr. Raine; Täferlingen, Biber-
bach I. 1. (381)

Artemisia L. Beifuß.

- *Absinthium* L. (Wermuth) Jul. Aug. An Wegen,
Schutt, auf M. bei dem Hallthor (in Gärten cult.)
II. 3. (382)

Artemisia campestris L. Jul. Aug. Sandige Hg. zwisch.

Friedberg u. Mühlhausen, Gailenbach. III. 5. (383)

A. Dracunculus L. (Estragon) wird hin und wieder im
Kleinen cult.

— *vulgaris* L. Aug. An Wegen, Hg. u. U. V. 3. (384)

Tanacetum L. Rainfarn.

— *vulgare* L. Jul. Aug. Gbsch., Hk., Flussufer; an der
Wertach, Schmutter, hinter Schloss Wöllenburg,
gegen Bergheim. III. 2. (385)

Achillea L. Schafgarbe.

— *Plarmica* L. Jul. Aug. An Grb. u. Hk., zwischen
Pfersee und Stadtbergen, Giebelthal, Scherneck.
IV. 4. (386)

— *Millefolium* L. Jul. ff. Wege, Ak. VI. 6. (387)

Anthemis L.

— *tinctoria* L. Jul. Aug. Ak. am Wege nach Haun-
stetten oberhalb des prot. Kirchhofes. I. 1. (388)

— *arvensis* L. (Wilde Chamille). Jun. ff. Ak. an We-
gen, Schutt etc. VI. 6. (389)

Matricaria L. Chamille.

— *Chamomilla* L. Jun. Ak. bes. unt. d. Haber. V. 4. (390)

Chrysanthemum L. Wucherblume.

— *Leucanthemum* L. Jun. Jul. Wiesen. VI. 6. (391)

— *corymbosum* L. Jun. Jul. Gbsch. u. waldige Abhg.
des östl. Thallandes; Wolfertshausen etc. III. 3. (392)

— *inodorum* L. Jul. ff. Ackerränder. an Wegen; Die-
dorf, Burgwalden. I. 1. (393)

Arnica L. Wohlverlei.

— *montana* L. Jun. Jul. Waldws. bei Leitershofen,
Burgwalden, Stettenhofen, Affing. III. 2. (394)

Cineraria L. Aschenpflanze.

— *spathulaefolia* Gmel. Mai Jun. Fcht. Ws. bei En-

gelshof, Statzling, Mühlhausen, auf dem jenseitigen
Lechfeld. II. 2. (395)

Cineraria campestris Retz. Jun. Auf dem Lechfeld. I. 2. (396)

Senecio L. Greiskraut.

— *vulgaris* L. Mrz. — Spt. Gärten, Ak. VI. 6. (397)

— *viscosus* L. Jun. ff. W., Mauern. IV. 5. (398)

— *sylvaticus* L. Jul. Aug. W. der Westseite. III. 4. (399)

— *erucifolius* L. Jul. Aug. Gbsch. am Lech- u. Wer-
tachufer. III. 3. (400)

— *Jacobaea* L. Jul. Aug. Wegränder, Ws. u. Gbsch.
VI. 6. (401)

— *aquaticus* Huds. Jul. Aug. Fcht. Ws. bei Mühlhausen,
Schmutterthal. etc. III. 6. (402)

— *sarracenicus* L. Aug. U. der Schmutter bei Hain-
hofen. I. 3. (403)

Cirsium Tournef. Kratzdistel.

— *lanceolatum* Scop. Jun. ff. An Wegen, Schutt. V. 5. (404)

— *eriphorum* Scop. Jul. Aug. Strassengraben, Hk.;
zwischen Lechhausen und Mühlhausen, Strassberg,
Friedberg. III. 2. (405)

— *palustre* Scop. Jul. Aug. Sumpf. Feld- u. W.-Ws.
IV. 4. (406)

— *Erisythales* Scop. Jul. Aug. Moorgründe hinter
Lechhausen. II. 2. (407)

— *oleraceum* L. Jul. Aug. Fcht. Ws., an Fluss- und
Bachufern. VI. 6. (408)

— *rivulare* Link. Jul. Fcht. Ws. des Lech- und Wer-
tachtals. III. 4. (409)

— *bulbosum* D C. Jul. Aug. Fcht. Torfws., Flussuf.; Sie-
benbrunnen, Lechhausen, Mühlhausen. IV. 3. (410)

Cirsium arvense Scop. Jul. ff. Ak. unter dem Getreide.

VI. 6. (411)

Von Bastarden dieser Gattung wurde bisher nur

C. rivulare-oleraceum (*C. praemorsum* Michx.)

auf feuchten Ws. bei Wolfertshausen beobachtet.

Cynara Scolymus L. wird nur selten cult.

Carduus L. Distel.

— *acanthoides* L. Jul. Aug. Schutt, Wegränder. VI. 6. (412)

— *crispus* L. Aug. An Wegen, Hk. bei Mering, Bomingen. II. 4. (413)

— *defloratus* L. Jun. Jul. Lechfeld, Lechufer; Wolfszahn. III. 3. (414)

— *nutans* L. Jul. Aug. Tr. Wegränder, Hd. V. 6. (415)

Onopordum L. Krebsdistel.

— *Acanthium* L. Aug. An Wegen, Feldrainen; Rosenau-berg, Neusäss. III. 4. (416)

Lappa Tournef. Klette.

— *major* Gaertn. Jul. Aug. An Wegen, Schutt, Grb. IV. 5. (417)

— *minor* D C. Jul. Strassgrb., Schutt. V. 5 (418)

— *tomentosa* L. Jul. Aug. Strassgrb., Schutt. III. 4. (419)

Carlina L. Eberwurz.

— *acaulis* L. Aug. Trft., Hd. u. W.; Siebentischwald, Friedbergerau. IV. 3. (420)

— *vulgaris* L. Aug. Trft., tr. W.-Ws. IV. 4. (421)

Serratula L. Färberdistel.

— *tinctoria* L. Jul. Aug. Waldränder, Strassberg. I. 3. (422)

Carthamus tinctorius L. (Safflor) findet sich selten und nur als Zierpflanze cult.

Centaurea L. Flockenblume.

— *Jacea* L. Jul. ff. Tr. Wiesen, Triften. V. 5. (423)

Centaurea phrygia L. Jul. Aug. W. der westl. Höhen;
Strassberg, Deuringen, Hammel. II. 4. (424)

— *montana* L. Jun. Jul. Gbsch. u. L. W. der westl.
Seite; Strassberg, Wöllenburg, Lohe, Eichelau.
III. 3. (425)

— *Cyanus* L. Jul. Ak. unter dem Gtrd. V. 6. (426)

— *Scabiosa* L. Jul. Aug. Ws. und Ak. IV. 4. (427)

— *maculosa* Lam. (*paniculata* Jacq.) Jul. Aug. Tr.,
sonnige Hg.; Rosenauberg, Derching, am Lech.
III. 4. (428)

Lapsana L. Hasenlattich.

— *communis* L. Jul. Aug. Schutt, Ak. V. 5. (429)

Aposeris Neck. Drahtstengel.

— *foetida* Less. Mai, Jun. In der Meringeran ober-
halb des Jägerhäuschens. I. 2. (430)

Arnoseris Gaertn. Lämmersalat.

— *pusilla* Gaertn. Jul. Sand. Ak. am Kobel. I. 2. (431)

Cichorium L. Wegwarte.

— *Intybus* L. Jul. Aug. Wegränder. V. 5. (432)

— *Endivia* L. (Endivie). Häufig und in verschiedenen
Spielarten als Salatpflanze cult.

Leontodon L. Löwenzahn.

— *autumnalis* L. Jul. — Sept. Raine, tr. Trft. V. 4. (433)

— *hastilis* L. Mai — Aug. Raine, tr. Wd. VI. 5. (434)

— *incanus* Schr. Jun. Trft. der Lechebue; Lechfeld,
Friedbergeran. II. 3. (435)

Picris L. Bitterkraut.

— *hieracioides* L. Aug. Am Rosenauberg bei Göggingen.
I. 2. (436)

Trogopagon L. Bocksbart.

— *pratensis* L. Mai ff. Wiesen. V. 4. (437)

Scorzonera L. Schwarzwurzel.

- *humilis* L. (*latana* Schr.) Mai. Jun. Felt. Moorgründe der Lechebne, des Wertachthales und der westl. Hhn.; tr. Hd. auf dem Lechfeld; Lechufer. IV. 3. (438)
- *hispanica* L. Allgemein in Gärten cult.

Hypochoeris L. Ferkelkraut.

- *radicata* L. Jul. Aug. Wegränder, Flussufer und tr. Wd. IV. 3. (439)
- *maculata* L. Jun. Jul. Torfige Ws. der Lechebne und des Wertachthales; Lechfeld, Wöllenburg, Bergheim. III. 4 (440)

Taraxacum Juss. Pfaffenröhrlein.

- *officinale* Wigg. Mai. Jun. Ws., Wd., uncultiv. O., W. VI. 6. (441)
- Var. *ε lividum* in Sümpfen auf dem Lechfeld.

Chondrilla L. Knorpelsalat.

- *junceae* L. Jul. Sand. Ak. bei Lützelburg. (*Dumler*)* (442)
- *prenanthoides* Vill. Jul. Auf Lechkies. (*Dumler*)* (443)

Prenanthes L. Hasensalat.

- *purpurea* L. Jul. Aug. W. der westl. Hh. zwischen Banacker und Burgwalden. I. 3. (444)

Lactuca L. Salat.

- *saliva* L. Allgemein und in vielen Variet. und Spielarten cult.
- *muralis* Fres. Jul. Aug. W., M., Schutt. IV. 4. (445)

Sonchus L. Gänsedistel.

- *oleraceus* L. Mai ff. Auf cult. Land, Schuttetc. VI. 6. (446)
- *asper* Vill. Mai ff. Cultiv. Land, Ak. III. 3. (447)
- *arvensis* L. Jul. Aug. Ak. unter dem Grd. V. 6 (448)

Crepis L. Pippau.

- *praemorsa* Tausch. Mai. Jun. Lechauen, Ablass, Wolfszahn. III. 4. (449)
- *alpestris* Tausch. Jul. Aug. Lechfeld, Hd. vor dem Siebentischwald, Friedberg, Au. III. 2. (450)
- *biennis* L. Mai. Jun. Weg- und Akerränder, Grasplätze. VI. 6. (451)
- *tectorum* L. Jun. ff. Ak. zwischen Gersthofen und Batzenhofen, Stettenhofen, Eisenbahndamm vor Stierhof. II. 4. (452)
- *virens* Vill. Mai ff. An Wegen, Ak., Trft. VI. 6. (453)
- *paludosa* Moench. Mai. Jun. Nasse Ws. zwischen Statzling und Friedberg, Schmutterthal, Waldthäler der westl. Hhn. III. 5. (454)
- *succisaefolia* Tausch. Jun. Jul. Fchl. Ws. II. 3. (455)

Hieracium L. Habichtskraut.

- *Pilosella* L. Mai ff. Raine, Ws. u. W. VI. 6. (456)
- *Auricula* L. Jun. Jul. Raine, Ws. u. Wd. VI. 6. (457)
- *praealtum* Koch. Jun. Jul. Gbsch. der Lechufer, Lechkies. III. 5. (458)
- *staticifolium* Vill. Jul. Lechfeld, Lechauen, Lechufer; Siebentischwald, Wolfszahn. II. 2. (459)
- *vulgatum* Koch. Jul. Aug. Gbsch. u. W. V. 4. (460)
- *murorum* L. Jun. Jul. Hk., Gbsch. u. W. VI. 4. (461)
- *boreale* Fries. Aug. W.; Wöllenbg., Scherneck. IV. 4. (462)
- *rigidum* Hartm. Jul. ff. Gbsch. und W. der westl. Hhn.; Anhauserthal. IV. 3. (463)
- *umbellatum* L. Aug. ff. Wälder. V. 5. (464)

53. AMBROSIACEEN.

Xanthium strumarium L. (Spitzklette) im Hofraum der Mörz'schen Hammwollgarnspinnerei mit dem Abfall der Wolle ausgestreut und nun gleichsam von selbst sich fortpflanzend.

54. CAMPANULACEEN.

Jasione L. Heilkraut.

- *montana* L. Jun. Jul. Tr. Raine u. Hg; Kobel, Deuringen, Bergheim. III. 3. (465)

Phyteuma L. Rapunzel.

- *orbiculare* L. Jun. Jul. Fcht. Ws. und Hd., vor Siebentisch, Bergheim etc. IV. 4. (466)
- *spicatum* L. Mai. Jun. L.-W., Gbsch. IV. 5. (467)

Campanula L. Glockenblume.

- *pusilla* Haenk. Jul. Lechufer; auf Lechkies u. unter Gbsch. II. 4. (468)
- *rotundifolia* L. Jun. fl. Ws., W. u. M. VI. 5. (469)
- *rapunculoides* L. Jul. Raine, Ak. u. Gbsch. V. 4. (470)
- *Trachelium* L. Jul. Waldränder, Gbsch. IV. 4. (471)
Var. β *dasycarpa* in Hk. bei Stadtbergen, Leitershofen.
- *patula* L. Jun. Jul. Ws u. Waldränder. V. 6. (472)
- *persicifolia* L. Jun. Jul. Waldränder, Waldws.; an den östl. u. westl. Hhn.; von Friedberg bis Scherneck; St. Radegundis. III. 4. (473)
- *Cervicaria* L. Aug. Giebelthal hinter Strassbg I. 3. (474)
- *glomerata* L. Mai. Jun. Ws., Gbsch. u. Waldränder. V. 5. (475)

Specularia Heist. Venusspiegel.

- *Speculum* D C. Jun. — Spt. Aecker. IV. 5. (476)

55. VACCINIEEN.

Vaccinium L. Heidelbeere.

- *Myrtillus* L. Jun. Nadelwälder der östl. und westl. Hhn.; (fehlt in der Lechebue). III. 6. (477)
- *uliginosum* L. Jun. Waldmoore der westl. Hh.;

Abhg. gegen das Wertachthal bei Strassberg,
Giebelthal, Leitershofen. II. 3. (478)

Vaccinium Vitis idaea L. (Preisselbeere). Jun Tr. Nadel-
wälder; Waldsaum im Giebelthal, bei Strassberg.
I. 2. (479)

— *Orycocos* L. Jul. Waldmoore; Giebelthal, Abhg.
gegen das Wertachthal bei Strassberg. I. 2. (480)

56. ERICINEEN.

Arctostaphylos Adam. Bärentraube.

— *officinalis* Wimm. Mai. Meringerau oberhalb des
Jägerhauses. I. 1. (481)

Andromeda polifolia L. ist in der Nähe unseres Floren-
gebietes, auf dem an der Augsburg-Münchner Bahn
liegenden Haspelmoos sehr häufig, wurde aber in
dem Gebiete selbst noch nicht aufgefunden.

Calluna Salisb. Heidekraut.

— *vulgaris* Sal. Aug. Tr. Nadelwälder der östl. und
westl. Hhn. (fehlt der Lechebue) III. 5. (482)

Erica L. Heide.

— *carnea* L. Mrz. Lechauen; Siebentischwald, Merin-
gerau (vertritt in der Lechebue die Stelle der
Calluna vulg) III. 6. (483)

57. PYROLACEEN.

Pyrola L. Wintergrün.

— *rotundifolia* L. Jul. W.; Siebentischwald, Wollen-
burg, Deuringen. III. 2. (484)

— *chlorantha* Sw. Jul. W. der östlichen Hh; zwisch.
Banacker und Strassberg am Abhg., bei Deuringen.
I. 2 (485)

— *media* Sw. Jul. Im W. v. Bergheim gegen Anhausen. *
(486)

Pyrola minor L. Jul. W. zwischen Leitershofen u. Diefendorf. I. 1. (487)

— *secunda* L. Jul. W.; Siebentischwald hinter Deuringen. II. 3. (488)

— *uniflora* L. Jun. In einem Sumpfwaldchen der Lechebue zwischen Miedring und Derching; bei Innigen. * (489)

58. MONOTROPEEN.

Monotropa L. Fichtenspargel.

— *Hypopitys* L. Jul. W. auf Baumwurzeln; Siebentischw. rechts am Fusswege nach dem Ablass, bei Burgwalden. II. 3. (490)

III. Unterlasse:

Corollifloren oder Blumenblattblüthige.

59. OLEACEEN.

Ligustrum L. Hartriegel.

— *vulgare* L. Jun. Jul. W. u. Hecken. VI. 5. (491)

Syringa vulgaris L. findet sich sehr häufig in Hecken gezogen.

S. persica L. in Hecken. doch weniger allgemein als obige,

Fraxinus L. Esche.

— *excelsior* L. Apr. Mai. W.; Meringerau, als Alleebaum häufig angepflanzt. III. 2. (492)

60. ASCLEPIADEEN.

Cynanchum R. Br. Schwalbenwürger.

— *Vincetoxicum* L. Jun. Jul. Hd., tr. Hg.; Lechfeld, Abhg. zwisch. Mühlhausen u. Scherneck, Neuss. III. 4. (493)

61. APOCYNEEN.

Vinca L. Immergrün.

- *minor L.* Mai. W.; Deuringen, Leitershofen, Mühlhausen, Haunstetten. II. 3. (494)

62. GENTIANEEN.

Mentyanthes L. Fieberklee.

- *trifoliata L.* Mai. Sumpfw. u. Grb. bes. der Lechebne, Schmutterthal, Zimmerhof. IV. 5. (595)

Gentiana L. Enzian.

G. lutea L. steigt bis in die Nähe des Gebietes herab (Schwabmünchen, Hiltelfingen).

- *cruciata L.* Aug. Tr. W.-Ws., Hd.; Siebentischwald, Lechfeld, Strassberg. III. 3. (596)
- *asclepiadea L.* Aug. W., Hk. u. Bachufer; Siebentischw. am Brunnenbach, Meringerau, Strassberg. II. 2. (597)
- *Pneumonanthe L.* Jul. Aug. Fcht. Moorws., Waldthäler, Flusssufer. IV. 5. (598)
- *acaulis L.* Mai. Jun. Hd., W. u. sumpfige Moorgr. der Lechebne. III. 4. (499)
- *verna L.* Apr. Hd., Trft. u. Moorws. V. 5. (500)
- *utriculosa L.* Jun. Torfmoore der Lechebne; am Wege nach Statzling. II. 4. (501)
- *germanica Willd.* Aug. Fcht. Ws. u. Hd. IV. 4. (502)
- *ciliata L.* Spt. Lechauen; Siebentischw. I. 2. (503)

Erythraea Pers. Tausendguldenkraut.

- *Centaureum Pers.* Jul. Bach- u. Flusssufer, Trft. u. W. IV. 2. (504)
- *pulchella Fries.* Aug. Flusssufer, fcht. Ws. u. Hd.; an Lech- und Wertach; Lechmoore, Lechfeld. III. 3. (505)

63. CONVOLVULACEEN.

Convolvulus L. Winde.

— *sepium* L. Jul. Hk. u. Weidenghsch. IV. 3. (506)

— *arvensis* L. Jun. Jul. Ak. u. uncult. O. V. 5. (507)

Cuscuta L. Flachsseide.

— *europaea* L. Jul. Aug. Am Wege zwischen Mühl-
hausen und Anwalding, auf Nesseln am Schloss-
berg in Wöllenburg. I. 2. (508)

— *Epithymum* L. Aug. Smpf.-Ws. unter Mühlhausen,
auf Klee bei Neusäss. II. 2. (509)

64. BORAGINEEN.

Echinosperrum Lappula Lehm. (Igelsame) wurde vor
mehreren Jahren an einem Lechkanale gefunden.
Ob daselbst ursprünglich wild?

Cynoglossum L. Hundszunge.

— *officinale* L. Jun. Jul. An Wegen, W.; Stettenhofen,
Siebenbrunnen. III. 3. (510)

Borago officinalis L. (Boretsch) cult. u. verwildert auf
Schutt und in Gärten.

Anchusa L. Ochsenzunge.

— *officinalis* L. Jun. Jul. Ak. und Eisenbahndämme;
Kobel, Neusäss, Gersthofen. II. 4. (511)

Lycopsis L. Krummhals.

— *arvensis* L. Mai. Ak.; Kobel, Statzling etc. IV. 4. (512)

Symphytum L. Beinwell.

— *officinale* L. Jun. Fcht. Ws., Bach- u. Flussuf. IV. 4. (513)

Cerinth L. Wachsblume.

— *minor* L. Jun. Ackerraine bei Kissing. I. 1. (514)

Echium L. Natterkopf.

— *vulgare* L. Jun. ff. Schutt, an Wegen, Hd. VI. 5. (515)

Pulmonaria L. Lungenkraut.

- *officinalis* L. Apr. Mai. Hk. und W. der östl. und westl. Hh. (fehlt in der Leebene). IV. 5. (516)
- *mollis* Wolf. Mai. Anen, Gbsch. u. Grb. der Lech- Wertachebne (vertritt hier die vorhergehende Art). III. 4. (517)
- *angustifolia* L. Apr. Mai. Unter Gbsch. im Eichelau. I. 1. (518)

Lithospermum L. Steinsame.

- *officinale* L. Jun. Gbsch. der Lech- u. Wertachuf. III. 4. (519)
- *arvense* L. Mai. Jun. Auf Aeckern. VI. 5. (520)

Myosotis L. Vergissmeinnicht.

- *palustris* Willh. Jun. Jul. Smpf., Grb. u. fcht. Ws. V. 6. (521)
- *sylvatica* Hoffm. Jun. W.; Statzling bis Wolfertshausen etc. IV. 4. (522)
- *intermedia* Link. Mai. ff. Aecker. V. 6. (523)
- *hispida* Schlechtld. Mai. Jun. Aecker. II. 3. (524)
- *versicolor* Pers. Mai. Jun. Ak. zwischen Derching und Statzling. I. 2. (525)
- *stricta* Link. Mai. Jun. Aecker. V. 6. (526)

65. SOLANEEN.

Lycium europaeum L. wird häufig in Hk. und Garten- zäunen gezogen; am Klinkenberg u. a. O.

Solanum L. Nachtschatten.

- *nigrum* L. Jun. — Spt. Schutt, Gartenland. V. 5. (527)
- *Dulcamara* L. (Bittersüß). Jun. — Aug. Weidengbsch. an Flussuf., fcht. W. bei Derching. IV. 4. (528)
- *tuberosum* L. (Kartoffel). Jun. Jul. Cultivirt.

Atropa L. Tollkirsche.

- *Belladonna L.* Jul. In gelichteten W.; Siebentischw.,
Wolfertshausen etc. IV. 4. (529)

Hyoscyamus L. Bilsenkraut.

- *niger L.* Jun. Jul. Schutt, Bahndämme, Wegränder.
III. 3. (530)

Nicotiana rustica L. Die Cultur dieser Pflanze sowie
der *N. Tabacum L.* hat in unserm Bezirke aufge-
hört, aber in der Nähe desselben, bei Wertingen,
findet ihr Anbau noch statt.

Datura L. Stechapfel.

- *Stramonium L.* Aug. Spt. Gartenland, Eisenbahn-
dämme. II. 2. (531)

66. VERBASCEEN.

Verbascum L. Wollblume.

- *Schraderi Mey.* Jul. Aug. Uncultiv. O., Hg., Acker-
ränder, W. V. 2. (532)
- *thapsiforme Schrad.* Aug. Am Schlossberg von Ober-
griesbach. I. 2. (533)
- *phlomoides L.* Jul. Aug. Schutt; bei der Mörz'schen
Wollspinnerei, b. prot. Stadtjäger. I. 1. (534)
- *Lychnitis L.* Aug. Spt. Hd., tr. Hg. V. 4. (535)
Var. β album häufiger als die gelbe Stammart.
- *nigrum L.* Jul. Aug. Tr., steinige Orte; bei Gerst-
hofen, Diedorf, Lohe etc. IV. 3. (536)
- *Blattaria L.* Jun. Jul. Hd. vor dem Siebentischw.,
prot. Gottesacker; am Kanal von der Lechhauser-
brücke gegen den Wolfszahn. I. 2. (537)

67. ANTIRRHINEEN.

Digitalis L. Fingerhut.

- *purpurea L.* Jul. Aug. W. links von der Strasse vor
Stettenhofen, Hammel. I. 4. (538)

Digitalis grandiflora Lam. Jun. Jul. Lichte L. W. der westl. Hh.; Kobel, Lohe, Strassberg, Engelshof. II. 3. (539)

Antirrhinum L. Löwenkraut.

— *majus* L. Jul. Aug. M; am rothen Thor. I. 2. (540)

Linaria Tourn. Leinkraut.

— *minor* Desf. Jul. Aug. Ak. u. Kiesbänke der Flüsse. III. 6. (541)

— *alpina* Mill. Jul. Aug. Lechkies. I. 1. (542)

— *vulgaris* Mill. Jul. — Sept. An Wegen, Ak. V. 6. (543)

Veronica L. Ehrenpreis.

— *scutellata* L. Jun. ff. Grb. der Lechebne, des Schmutterthales; an der Strasse nach Mühlhausen, zwischen Hainhofen und Westheim, bei Banacker. II. 3. (544)

— *Anagallis* L. Mai ff. Bäche, Grb. IV. 6. (545)

— *Beccabunga* L. Mai ff. Quellen, Bch. u. Grb. V. 6. (546)

— *Chamaedrys* L. Mai. Jun. Ws., Hk. u. W. VI. 5. (547)

— *officinalis* L. Jun. Jul. W., bes. der westl. Hh., Siebentischwald. IV. 5. (548)

— *latifolia* L. Jun. Jul. Waldränder u. Hk. IV. 4. (549)

— *spicata* L. Jul. Aug. Lechfeld, fr. Hg. in der Friedbergerau an der Lechbrücke, am Wege von Oberhausen nach Hirblingen. II. 3. (550)

— *serpyllifolia* L. Apr. ff. Grasplätze, Ws. u. Wd. V. 5. (551)

— *arvensis* L. Mrz. ff. Ws. u. Ak. VI. 5. (552)

— *triphyllos* L. Mrz. — Mai. Aecker. V. 5. (553)

— *agrestis* L. Mrz. u. Spt. Aecker. VI. 5. (554)

— *polita* Fries. Mrz. ff. Auf Aeckern. II. 3. (555)

— *Buxbaumii* Ten. Apr. Mai. Aecker. IV. 6. (556)

— *hederaefolia* L. Mrz. ff. Gartenland u. Ak. VI. 6. (557)

Limosella L. Sumpfling.

- *aquatica* L. Jul. Aug. Auf sumpfig. Holzwegen zw. Bauckacker und Burgwalden, Anhausen u. Engelshof. I. 3. (558)

68. OROBANCHEEN.

Orobanche L. Sommerwurz, Ervenwürger.

- *cruenta* L. Jun. Jul. Hd., Ws. u. Waldtriften auf *Hippocrepis*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Lotus corniculatus* und *Carex glauca* schmarotzend. Schinderhölzchen bei Göggingen, Meringerau etc. IV. 2. (559)
- *Epithymum* DC. Jul. Auf *Thymus Serpyllum*. Raine bei den Lohwäldchen. I. 4. (560)
- *Galii* Dub. Jul. Auf *Galium Mollugo* und *boreale*. Grb. von Neusäss gegen den Kobel. I. 2. (561)
- *rubens* Wallr. Jul. Auf *Medicago falcata*. Karlsberg bei Mühlhshn., Ws. hinter Lechhshn. II. 2. (562)
- *amethystea* Thull. Auf einem Ak. an der Haunstetter Strasse wurde ein Exempl. gefunden. (Deisch). (563)
- *ramosa* L. Jul. Aug. In einem Hanfacker bei Mühlhausen. I. 2. (564)

Lathraea L. Schuppenwurz.

- *Squamaria* L. Apr. Fcht. L. W. auf Baumwurzeln; Deuringen, Wöllenburg, zwischen Derching, und Statzling, Friedberger Sägmühle. III. 2. (565)

69. RHINANTHACEEN.

Melampyrum L. Schwarzwaizen.

- *cristatum* L. Jun. Jul. Gbsch. an Flussuf., W. III. 4. (566)
- *arvense* L. Jun. Jul. Ak. unter dem Gtrd. VI. 5. (567)
- *pratense* L. Jun. Jul. Wälder. V. 5. (568)

Pedicularis L. Läusekraut.

- *sylvatica* L. Mai. — Jul. Sumpfige W.-Ws; Schmutterthal, hinter Leitershofen, Strassberg. II. 4. (569)
- *palustris* L. Jun. Jul. Sumpfw., feht. Flussufer. IV. 5. (570)
- *Sceptrum Carolinum* L. Jun. — Aug. Im feht. Sand der Lechufer; Ablass, Lechhausen, Wolfszahn; und Waldmoose der westl. Hh. b. Strassbg. III. 2. (571)

Rhinanthus L. Klappertopf.

- *minor* Ehrh. Mai. Jun. Feht. Ws. V. 6. (572)
 - *major* Ehrh. Mai. Jun. Ws. u. W. III. 4. (573)
 - *Alectorolophus* Poll. Mai. Jun. Ak. V. 5. (574)
- Eine in Lech- und Wertachauen vorkommende Art, welche im Jul. zur Blüthe kommt, ist wahrscheinlich *R. alpinus* Baumg. und zwar *Var. γ angustifolius* Gaud.; doch bedarf sie noch einer genauern Untersuchung.

Bartsia L. Bartsie.

- *alpina* L. Jun. Jul. Sumpfige Bachufer auf dem Lechfeld. I. 3. (575)

Euphrasia L. Augentrost.

- *officinalis* L. Jul. Aug. Ws. u. Wd. VI. 6. (576)
- Var. γ nemorosa* in sterilen W. bei Stettenhofen.
- *salisburgensis* Funk. Aug. Tr. Hd.; Lechfeld, am Fusswege nach dem Ablass vor dem Siebentschw. II. 4. (577)
- *Odontites* L. Jun. ff. Wegränder, Ak. u. Hd. V. 5. (578)

70. LABIATEN.

Mentha L. Minze.

- *sylvestris* L. Jul. Aug. Grb. u. Bachuf. V. 6. (579)
- Var. ε crispata* am Abhg. zw. Banacker u. Strassbg.

Mentha aquatica L. Jul. Aug. Ufer, Grb. V. 5. (580)

— *Var. γ glabrata* am Bache längs der Strasse von Göggingen nach Bergheim.

— *sativa* L. Jul. Aug. Sumpfige Stellen, Grb.; Bauacker.

II. 2. (581)

— *arvensis* L. Jul. Aug. Ufer, feht. Ak. V. 5. (582)

Lycopus L. Wolfsminze.

— *europaeus* L. Jul. Aug. Grb.; Franzosenwall, Den- ringen, zwisch. Derching u. Mühlhsn. IV. 3. (583)

Salvia L. Salbey.

S. officinalis L. wird fast in allen Gärten zum Küchen- gebrauch im Kleinen cult.

— *glutinosa* L. Grascgarten hinter der Wirthschaft von Mühlhausen. * (584)

S. Sclarea L. Hin und wieder verwildert auf Schutt- haufen, an der Nordbahn.

— *pratensis* L. Jun. Jul. Raine, Ws. VI. 6. (585)

— *verticillata* L. Jul. Aug. Raine, Grb. der Lechebne; Pfersee, Stierhof. II. 4. (586)

Origanum L. Dosten.

— *vulgare* L. Jul. Uncult. O., Hk. V. 5. (587)

O. Majorana L. Im Kleinen als Gewürzpflanze cult.

Thymus L. Quendel.

— *Serpyllum* L. Jul. fl. Tr. Raine, Abhg. u. Hd. VI. 6. (588)

Satureja hortensis L. (Bohnenkraut) als Küchengewürz in Gärten cult.

Calaminta Moench.

— *Acinos Clairv.* Jun. fl. Tr. Abhg., Kiesbänke; zw. Friedbg. u. Wolfertshsn.; Wolfszahn. IV. 4. (589)

Clinopodium L. Wirbeldosten.

— *vulgare* L. Jul. Aug. Waldränder, Hk. und Gbsch. IV. 5. (590)

Nepeta L. Katzenminze.

- *Cataria* L. Aug. Schutt; beim prof. Stadthäger an der Wertach. * (591)

Glechoma L. Gundelrebe.

- *hederacea* L. Apr. Mai. Fcht. Hk. u. Raine, V. 5. (592)

Melittis L. Waldmelisse.

- *Melissophyllum* L. Jul. Aug. L. W; Lohe, Kobel, Wöllenburg, Statzling. III. 3. (593)

Lamium L. Taubnessel.

- *amplexicaule* L. Apr. u. Spt. Ak. V. 4. (594)
 — *purpureum* L. Apr. Mai. Ak., Hk. VI. 5. (595)
 — *maculatum* L. Jul. Gbsch., an Hk. u. Zäunen. V. 6. (596)
 — *album* L. Apr. Mai. Gbsch., an Hk. u. M. VI. 6. (597)

Galeobdolon Huds. Waldnessel.

- *luteum* Huds. Jun. Fcht. Gbsch., Waldränder; Statzling, Derching. II. 4. (598)

Galeopsis L. Hanfnessel.

- *Ladanum* L. Jul. Aug. Aecker. IV. 5. (599)
 — *Tetralix* L. Jul. Aecker. V. 5. (600)
 — *versicolor* Curt. Jul. Aug. Lichte W. der westl. Hb.; Giebelthal. II. 4. (601)
 — *pubescens* Bess. Jul. Aug. Lichte W. u. Gbsch; hinter Deuringen u. Leitershofen, zwischen Mühlhausen und Anwalding. III. 5. (602)

Stachys L. Ziest.

- *sylvatica* L. Jul. Gbsch., Gartenzäune, W. V. 5. (603)
 — *palustris* L. Jul. Sümpfe, Grh. u. fcht. Ak. V. 4. (604)
 — *recta* L. Jun. ff. Tr. Hg u. Hd.; Rosenaubg. III. 4. (605)

Betonica L. Betonie.

- *officinalis* L. Jul. Aug. Lichte W., Hd; Lechfeld. IV. 5. (606)

Ballota L. Mauernessel.

- *nigra* L. Jul. Aug. Hecken, Gbsch. V. 6. (607)

Leonurus L. Wolftrapp.

- *Cardiaca* L. Aug. In Dörfern, an Wegen u. M.;
Anhausen, Leitershofen. I. 2. (608)

Scutellaria L. Helmkraut.

- *galericulata* L. Jul. Fcht. Gbsch., an Flussufern,
Wertach, Lech. III. 5. (609)

- *hastifolia* L. Jul. Fcht. Gbsch., an Flussuf.; Wolfs-
zahn, Meringerau. II. 2. (610)

Prunella L. Brumelle.

- *vulgaris* L. Jul. Ws. u. Weiden. IV. 4. (611)

- *grandiflora* Jacq. Jul. Ws., Weiden. IV. 3. (612)

Ajuga L. Günsel.

- *reptans* L. Mai. Jun. Ws., Gbsch. VI. 5. (613)

- *genevensis* L. Mai. Jun. Ak, Ws., Grb. u. Raine.
V. 5. (614)

Teucrium L. Gamander.

- *montanum* L. Jul. Aug. Hd. u. W. der Lechebne;
Lechfeld, Siebentischw. III. 4. (615)

- *Botrys* L. Jul. Trft. beim Lochhaus am Lechuf. * (616)

71. VERBENACEEN.

Verbena L. Eisenkraut.

- *officinalis* L. Jun. ff. Wegränder, Schutt. VI. 4. (617)

72. LENTIBULARIEEN.

Pinguicula L. Fettkraut.

- *alpina* L. Mai. Fcht. Moorgründe, an Grb.; Lech-
feld. II. 3. (618)

- *vulgaris* L. Mai. Jun. Torfws., an Grb.; Lechfeld.
Statzling, Hd. vor dem Siebentischwald. Wolfszahn.
IV. 4. (619)

Utricularia L. Wasserschlauch.

- *vulgaris* L. Jul. Stehende Wasser, Altwasser; Wertach, Wolfertshausen, Mühlhausen. III. 2. (620)
- *minor* L. Jul. Smpf., Wassergrb.; Mühlhsh., Göggingen, Wöllenberg, Bergheim. II. 2, (621)

73. PRIMULACEEN.

Lysimachia L. Weiderich.

- *thyrsiflora* L. Jun. Jul. Torfstich bei Haberskirch; Smpf. im Anhauserthal. I. 1. (622)
- *vulgaris* L. Jul. Fcht. Hk., W. u. Ufergbsch. IV. 4. (623)
- *Nummularia* L. Jun. Jul. Grb., fcht. Ws. und W. IV. 5. (624)
- *nemorum* L. Jun. Jul. Fcht. W. der westl. Hhn. III. 3. (625)

Anagallis L. Gauchheil.

- *arvensis* L. Jun. ff. Aecker. V. 5. (626)

Primula L. Schlüsselblume.

- *farinosa* L. Jun. Fcht. Moorwiesen, Hd., Flussufer. IV. 6. (627)
- *elatior* Jacq. Apr. Wiesen u. W. VI. 6. (628)
- *officinalis* Jacq. Apr. Mai. Ws., W. V. 4. (629)

Cortusa L.

- *Mathioli* L. Auf Lechkies beim Lochhaus (Schenkhofer). *

74. GLOBULARIEN.

Globularia L. Kugelblume.

- *vulgaris* L. Mai. Jun. Lechfeld, Lechufer, Hd. vor der Insel. III. 3. (631)
- *cordifolia* L. Jun. Lechfeld. II. 2. (632)

75. PLANTAGINEEN.

Plantago L. Wegerich.

- *major* L. Jul. ff. Wegränder, M. VI. 5. (633)
 - *media* L. Jun. Jul. Ws. u. Triften. VI. 6. (634)
 - *lanceolata* L. Mai ff. Ws. u. Trft. VI. 6. (635)
- Var. β capitellata* am Fusswege von Göggingen nach Banacker.

IV. Unterlasse:

Monochlamideen oder Blumenblattlose.

76. AMARANTACEEN.

Amarantus retroflexus L. (Fuchsschwanz) Schutt und Gartenland; in dem Hofraume der Mörz'schen Wollspinnerei (wahrscheinlich mit der Wolle eingeführt).

77. CHENOPODEEN.

Polycnemum L. Knorpelkraut.

- *arvense* L. Jul. Auf sandigen, überschwemmten Stellen des Lechuf. b. Wolfszahn. (*Deisch*) I. 1. (636)

Chenopodium L. Gänsefuss.

- *hybridum* L. Jul. Aug. Schutt, Hk. u. M.; Mühlhshn., Scherneck. III. 4. (637)
- *murale* L. Aug. Schutt, Wegränder, in Dörfern. V. 5. (638)
- *album* L. Jul. ff. Schutt, Wege, Ak. VI. 6. (639)
- *polyspermum* L. Aug. Ak. b. Reinhardshausen. I. 2. (640)
- *Vulvaria* L. Jul. ff. An Wegen, Schutt, Strassenpflaster. IV. 6. (641)

Blitum L. Erdbeerspinat.

- *virgatum* L. Jul. Aug. Schutt u. Gartenland; Lechdamm zwischen der Lechhauser und Friedberger Brücke, Stadlbergen. II. 3. (642)

Blitum bonus Henricus Meyer. Mai ff. Schutt, M., an Strassen. VI. 6. (643)

— *glaucum Koch.* Aug. Spt. Schutt, an Wegen; Lechhausen. III. 5. (644)

Beta L. Mangold.

— *vulgaris L.* Var. β *Cicla* wird als Gemüsepflanze zieml. häufig in Gärten angebaut.

Var. γ *rapacea*. Von dieser Var. werden vorzugsweise die Form: *B. altissima Beckm.* (Runkelrübe) und *B. rubra Rauh.* (rothe Rübe, Raudich) cult.

Spinacia L. Spinat.

— *inermis* und *spinosa Moench.* werden als Gemüsepflanzen häufig angebaut.

Atriplex L. Melde.

— *patula L.* Jul. Aug. Schutt, Wegrander. VI. 6. (645)

A. hortensis L. wird nur hie und da als „gelber und rother Spinat“ cult.

78. POLYGONEEN.

Rumex L. Ampfer.

— *conglomeratus Murr.* Jul. Aug. Strassgrb. und Ufer. VI. 5. (646)

— *sanguineus L.* Jul. Aug. An Bächen bei Friedberg. II. 2. (647)

— *obtusifolius L.* Jul. Aug. An Wegen, Strassgrb. VI. 4. (648)

Var. β *discolor* in Lechhausen.

— *crispus L.* Jul. Aug. Ak., Ws. u. an Grb. IV. 4. (649)

— *aquaticus L.* Jul. Aug. Uf.; am Giebelbach, Altwasser der Wertach bei Göggingen. II. 3. (650)

— *Acetosa L.* Mai, Jun. Ws. (auch cult.) VI. 6. (651)

Rumex Acetosella L. Mai. fl. Ak., Raine. IV. 6. (652)

R. hispanicus L. (Gartensauerampfer) und *R. scutatus* L.
hie und da in Grt. angebaut.

Polygonum L. Knöterich.

— *Bistorta* L. Jun. Jul. Fcht. Ws. der Flussthäler.
III. 4. (653)

— *viviparum* L. Jun. Jul. Moorhaiden des Lech- und
Wertachthales; Lechfeld, Wd. vor dem Spickel, b.
Strassberg. III. 2. (654)

— *amphibium* L. Jun. Jul. In stehendem u. langsam
fliessendem Wasser; Paar, Schmutter, Stadtgrb.
III. 4. (655)

Var. γ terrestre in Göggingen bei dem Halder'-
schen Garten u. a. O. (nie blühend).

— *lapathifolium* L. Jul. fl. Fcht. Grb., Uf. IV. 5. (656)

— *Persicaria* L. Jul. fl. Fcht. Grb. etc. III. 5. (657)

— *Hydropiper* L. Jul. fl. Waldpfützen. IV. 4. (658)

— *minus* Huds. Jul. fl. Waldpfützen, Grb. II. 4. (659)

— *aviculare* L. Jul. fl. An Wegen, Ak., Schutt. V. 6. (660)

— *Convolutus* L. Jul. fl. Ak. unter d. Getrd. IV. 5. (661)

P. Fagopyrum L. (Buchwaizen) nur sehr selten und im
Kleinen angebaut z. B. bei Friedberg.

79. THYMELEEN.

Daphne L. Seidelbast.

— *Mezereum* L. Fbr. Mrz. W., bes. der Lechauen;
Siebentischw., Eichelau, Stadtbergen. IV. 2. (662)

— *Cneorum* L. Jun. Jul. Hd der Lechebne, Lechauen.
III. 5. (663)

80. SANTALACEEN.

Thesium L. Leinkraut.

— *intermedium* Schrdr. Jul. Aug. Lechfeld, II. 4. (664)

Thesium pratense Ehrh. Jun. Jul. Hd., Torfws., unter
Gbsch. der Lechuf. IV. 5. (665)

— *rostratum* M. & K. Jun. Jul. Lechfeld, b. Königs-
brunn, in der Nähe der Sandgruben. I. 4. (666)

81. ELAEAGNEEN.

Hippophaë L. Sanddorn.

— *rhamnoides* L. Apr. Mai. Kiesbänke des Lech und
der Wertach. II. 3. (667)

82. ARISTOLOCHIEN.

Asarum L. Haselwurz.

— *europaeum* L. Apr. Mai. Schutt. W.; Meringerau.
II. 3. (668)

83. EUPHORBIACEEN.

Euphorbia L. Wolfsmilch.

— *helioscopia* L. Jul. — Spt. Ak., Gartenland. VI. 5. (669)

— *platyphylla* L. Aug. Spt. Lichte Waldstellen bei
Anwalding, Gersthofen. II. 2. (670)

— *stricta* L. Jul. Bei der Gögginger Brücke gegen
Wöllenburg. I. 4. (671)

— *verrucosa* Lam. Mai. Jun. Gbsch., Wegränder. V. 5 (672)

— *Cyparissias* L. Mai. An Wegen, Waldränder. VI. 6. (673)

— *Peplus* L. Jul. ff. In Dörfern, Gärten, Schutt. V. 4 (674)

— *exigua* L. Jun. ff. Auf cult. Land, Schutt. V. 5. (675)

Mercurialis L. Ringelkraut.

— *perennis* L. Apr. Mai. Fcht. schatt. W.; Strassbg.,
bei der Friedberger Sägmühle. I. 2. (676)

— *annua* L. Jun. ff. Gbsch.; in den Anlagen vor dem
Klinker-Thor, Wertachuf. II. 2. (677)

84. URTICEEN.

Urtica L. Nessel.

- *urens* L. Jun. ff. Gartenland, Ak. V. 6. (678)
- *dioica* L. Jun ff. Hecken. VI. 6. (679)

Parietaria erecta M. et K. wurde vor längerer Zeit an der innern Klinker-Thor Mauer gefunden. Ob dort spontan?

Cannabis L. Hanf.

- *sativa* L. Wird sehr häufig cultivirt.

Humulus L. Hopfen.

- *Lupulus* L. Jul. Aug. Gbsch., bes. Ufergbsch. a. d. Paar. (Findet sich nur selten angebaut, z. B. am Kobel). III. 4. (680)

Morus L. Maulbeere.

- *alba* L. Wird in Alleen u. Hecken als Futter für die Seidenraupen gepflanzt. Vor dem Oblater-Thor.
M. nigra L. findet sich ebenfalls, aber nur sehr selten angepflanzt.

Ulmus L. Ulme.

- *campestris* L. Apr. In W. nur einzeln (in Anlagen gepflanzt). III. 2. (681)
Var. β suberosa vom Ablass gegen Siebenbrunnen.
- *effusa* Willd. Apr. Am Fusswege über das Moor von Mühlhau. nach Scherneck; in Anlagen. I. 1. (682)

85. JUGLANDEEN.

Juglans L. Welsche Nuss.

- *regia* L. Wird nicht selten angepflanzt; Allee auf dem untern Graben, Au bei Scherneck.

86. CUPULIFEREN.

Fagus L. Buche.

- *sylvatica* L. Mai. Findet sich in W. fast nur einzeln

und bildet in dem Gebiete nirgends grössere Bestände. Am häufigsten ist ihr Vorkommen bei Scherneck, zwischen Anwalding und Mühlhausen, bei Strassberg. (633)

Quercus L. Eiche.

— *sessiliflora* Sm. = *Q. Robur L.* (Steineiche). Mai.

In W. der westl. Hh.; seltener als die folgende und nur in einzelnen Exemplaren vorkommend. (684)

— *pedunculata* Ehrh. (Kern- oder Stieleiche.) Apr. Fehlt, wie die vorhergehende, in der Lechebne ganz, in den W. der west. Hh. bildet sie c. 2 pro Ct. der Waldbestände. (685)

Corylus L. Haselnuss.

— *Arellana L.* Fbr. Mrz. Ghsch., Hk. u. Waldränder, bes. der Hh. IV. 5. (686)

Carpinus L. Hainbuche, Hagebuche.

— *Betulus L.* Apr. Mai. In L. W. nur einzeln; jedoch häufig zu Hk. gezogen. (687)

87. SALICINEEN.

Salix L. Weide.

S. fragilis L. konnte von uns noch nicht aufgefunden werden; es ist übrigens kaum zu zweifeln, dass sie in dem Gebiete vorkommt.

— *alba L.* (Bandweide). Apr. Mai. Uf., Anlagen. VI. 5. (688)

Var. γ vitellina ebenfalls häufig.

— *amygdalina L.* Apr. Mai. Flussufer. IV. 4. (689)

S. babylonica L. (Trauerweide) wird auf Gräbern und in Anlagen doch nicht häufig angepflanzt.

— *daphnoides Vill.* Mrz. Lech- u. Wertachufer. III. 2. (690)

— *purpurea L.* Mrz. Apr. Uf., ficht. Trft. VI. 5. (691)

— *rimonialis L.* Apr. Am rechten Lechuf. von Lechhausen abwärts wurde ein Exemplar gefunden. (Huber). (692)

- Salix incana* Schrank. Apr. Mai. Lech- und Wertach-
ufer. III. 4. (693)
- *cinerea* L. Apr. U., ficht. Gbsch.; Eichelan, Berg-
heim, Derching etc. IV. 3. (694)
- *nigricans* Fries. Apr. Mai. Lech- und Wertachuf.
III. 4. (695)
- *Caprea* L. (Sahlweide). Mrz. Apr. W. u. Hk. V. 3. (696)
- *aurita* L. Apr. Mai. Ficht. Gbsch., an Grb.; Gie-
belthal, Statzling, Zimmerhof. III. 3. (697)
- *repens* L. Apr. Moorgründe u. Hd. der westl. Hh.;
Giebelthal, Statzling, Lechfeld. III. 4. (698)

Populus L. Pappel, Alber.

- *alba* L. Mrz. Apr. Auf dem Jägerhaus angepflanzt;
zwischen Lechhausen u. Gersthofen, am Lechufer
spontan. I. 1. (699)
- *canescens* Sm. wurde nur in einem Exemplare in den
Lechauen unter Lechhausen gefunden. (700)
- *tremula* L. Mrz. Apr. In ficht., tiefen Lagen der
westl. W. oft beträchtliche Strecken überziehend. (701)
- P. pyramidalis* Roz. (Italienische Pappel) als Alleebaum
cultivirt.
- P. balsamifera* L. In der Allee zwischen dem Gögginger-
und Klinkerthor.
- *nigra* L. Apr. Flussufer, an Strassen. III. 2. (702)

88. BETULINEEN.

Betula L. Birke.

- *alba* L. Apr. Mai. In den Lechauen nur einzeln,
auf den westl. Hh. dagegen bildet sie grosse Be-
stände. Auf dem Höhenrücken, zwischen Den-
ringen und Wöllenburg nimmt sie über 50 pr. Ct.
der gesammten Waldfläche ein. (703)

Betula pubescens Ehrh. Apr. Mai. Ficht. Waldthäler hinter Wöllenburg, Banaacker. II. 3. (704)

— *humilis* Schrank. Apr. Waldmoore zwischen Strassberg und Banaacker, Giebelthal. I. 2. (705)

Alnus Tournef. Erle.

— *viridis* DC. Apr. Waldrand b. Wöllengb. I. 4. (706)

— *incana* DC. Febr. Mrz. Lech- u. Wertachuf. III. 4. (707)

— *glutinosa* Gaertn. Mrz. An Bch. und. Smpt., bes. der westl. Hh. IV. 5. (708)

89. CONIFEREN.

Juniperus L. Wachholder.

— *communis* L. Mai. W. u. Hd. V. 5. (709)

Pinus L. Nadelholzbaum.

— *sylvestris* L. (Fohre, Kiefer). Mai. In den Lechauen bildet sie $\frac{1}{3}$ des Waldbestandes, auf den östl. Hh. c. 20 pr. Ct.; auf den westl. Hh. kommt sie nur selten und vereinzelt vor. (710)

— *Larix* L. (Lärche). Mai. In W. nur einzeln; scheint in neuerer Zeit in der Forstkultur mehr Berücksichtigung zu finden. Junge Anpflanzungen sind: im Siebentischwald, b. Deuringen, Leitershofen. (711)

— *Picea* L. (Weisstanne). Mai. In W. der westl. Hh. nur einzeln; auf der östl. Seite z. B. jenseits Statzling bildet sie kleine Bestände. (712)

— *Abies* L. (Fichte, Rothtanne). Mai. ff. Vorherrschender Waldbaum des Bezirkes. In den Lechauen nimmt sie gegen 70, auf den Höhen über 50 pro Ct. der gesammten Waldfläche ein. Ihre Cultur wurde seit einiger Zeit in den W. der westl. Höhen,

wie uns scheint mit Unrecht, auf Kosten der Birke sehr begünstigt. (713)

Anmerkung. Obige Angaben über Menge und Verbreitung der Forstbäume mögen von unsern W. ein Bild geben, zu dessen Vervollständigung wir noch folgendes bemerken: die Wälder der Höhen, besonders der westlichen, sind fast durchgehends gut beforstet. In dem humusreichen Grunde finden alle Bäume ein vortreffliches Gedeihen, und die Abwechslung von Laub- und Nadelholz, von Höhen und Thälern macht eine Wanderung durch dieselben äusserst angenehm. Gerade umgekehrt verhält es sich mit den Auen der Lechebne. Ihre Lage in einer vollkommenen Ebne, der Umstand, dass sie fast ausschliesslich aus Nadelholz bestehen, und besonders der trostlose Zustand, in den manche derselben theils durch Hagelschlag, theils durch frühere schlechte Bewirthschaftung versetzt wurden, geben ihnen ein höchst trauriges, steriles Aussehen. So findet man z. B. in der Meringerau oft Flächen von mehreren Morgen, die nur mit einzelnen wenigen krüppeligen Fichten oder Föhren bewachsen sind. Auch ein Bestand von Eschen, die dort früher ein gutes Gedeihen zeigten und deren Cultur selbst in dem mageren Boden bei gehöriger Pflege günstige Resultate ergeben möchte, ist durch Vernachlässigung sehr herabgekommen.

II. Classe:

MONOCOTYLEDONEN

oder

Pflanzen mit einem Keimblatte.

90. ALISMACEEN.

Alisma L. Froschlöffel.

— *Plantago* L. Jal. Aug. Stehendes Wasser, in Grb.
V. 4. (714)

91. BUTOMEEN.

Butomus L. Wasserliesch.

- *umbellatus* L. Jul. Aug. Grb. u. stehendes Wasser;
Friedbg., Mühlhsh., a. d. Schmutter. II. 2. (715)

92. JUNCAGINEEN.

Triglochin L. Dreizack.

- *palustre* L. Jun. Jul. Auf fecht. Flusssand an Lech
und Wertach, Torfmoore am Wege nach Derching.
III. 4. (716)

93. POTAMEEN.

Potamogeton L. Laichkraut.

- *natans* L. Jul. In Grb., Altwassern. III. 4. (717)
- *rufescens* Schrad. Jul. Langsam fließendes Wasser
bei Reinhardshausen, Derching. II. 3. (718)
- *perfoliatus* L. Jul. Aug. Altwasser der Wertach.
II. 4. (719)
- *crispus* L. Jun. ff. Grb. zwischen Lechhausen und
Gersthofen, Stadtgräben. II. 4. (720)
- *pusillus* L. Jul. Bch. von Hard gegen Reinhardshausen.
I. 3. (721)
- *pectinatus* L. Jul. Grb. und Bch. bes. der Lecheb.
IV. 5. (722)
- *densus* L. Jul. Bch., Grb. u. Altwasser. IV. 6. (723)

94. LEMNACEEN.

Lemna L. Wasserlinse.

- *trisulca* L. Mai. In stehendem Wasser, Pfützen.
II. 4. (724)
- *polyrrhiza* L. Mai. Stehend. Wasser; Wolfszahn.
I. 3. (725)

- Lemna minor* L. Mai. Stehend. Wasser, Grb. V. 6. (726)
 — *gibba* L. Mai. Altwasser der Wertach. II. 4. (727)

95. TYPHACEEN.

Typha L. Rohrkolben.

- *latifolia* L. Jul. Altwasser am Wolfszahn; Weiher
 beim Schöppacher Hof. I. 4. (728)
 — *minima* Hopp. Mai. Auf fecht. Sande der Lechuf;
 Ablass, Wolfszahn. II. 6. (729)

Sparganium L. Igelkolben.

- *ramosum* Huds. Jul. Grb., Flussuf. IV. 3. (730)
 — *simplex* Huds. Jul. In stehend. Wasser; a. d. Wertach. II. 2. (731)
 — *natans* L. Aug. Grb. am Wege nach Wolfertshausen.
 I. 3. (732)

96. AROIDEEN.

Arum L. Aron.

- *maculatum* L. Mai. Fcht. W. am Abhg. der Friedberger Sägmühle, Hk. bei der Mörz'schen Fabrik.
 I. 2. (733)

Acorus L. Kalmus.

- *Calamus* L. Jun. Jul. Stehend. Wasser; Schleifgraben, Hard. Schöppacher Hof, Mühlhshn. II. 3. (734)

97. ORCHIDEEN.

Orchis L. Knabenkraut.

- *militaris* L. Mai. Fcht. Flussufer, und Gbsch. bes. der Lechebne. III. 3. (735)
 — *ustulata* L. Mai. Jun. Hd. u. Trfft. der Lechebne; Lechfeld, vor der Insel. II. 3. (736)
 — *coriophora* L. Jun. Hd.; Lechfeld, Siebenbrunnen, vor der Insel, Bergheim. III. 2. (737)

Orchis Morio L. Mai. Trft. u. Abhg. IV. 4. (738)

— *laxiflora* Lam. Jun. Jul. Smpf. b. Mühlhsh. I. 3. (739)

— *maculata* L. Jun. Smpf. der westl. Hhn.; bei dem
Wöllenburger Weiher, Strassberg. II. 2. (740)

— *latifolia* L. Jun. Fcht. Ws., Smpf. V. 3. (741)

— *incarnata* L. Jun. Smpf. der Lechebne; zwischen
Statzling und Mühlhausen. II. 3. (742)

Anacamptis Rich. Strausständel.

— *pyramidalis* Rich. Jun. Jul. Meringerau, Lechfeld.
II. 2. (743)

Gymnadenia R. Br. Nacktdrüse.

— *conopsea* R. Br. Jun. Hd. u. W. der Lechebne.
III. 4. (744)

— *odoratissima* Rich. Jun. Jul. Lechfeld. I. 2. (745)

Platanthera Rich.

— *bifolia* Rich. Jun. Fcht. W. und Auen. III. 3. (746)

Ophrys L. Ragwurz.

— *muscifera* Huds. Jun. Lechauen; Siebentischwald,
Meringerau. II. 1. (747)

— *aranifera* Huds. Jun. Lechfeld u. Lechauen. II. 2. (748)

— *arachnites* Reich. Jun. Lechfeld u. Lechauen. III. 1. (749)

Herminium R. Br.

— *Monorchis* R. Br. Jun. Hd., Trft.; Lechfeld, Ro-
senauberg. II. 1. (750)

Cephalanthera Rich. Kopfbeutel.

— *pallens* Rich. Jun. Lechauen; Siebentischwald gegen
Siebenbrunnen, Stettenhofen. II. 1. (751)

— *rubra* Rich. Jul. Lohe. (Dr. Körber.) * (752)

Epipactis Rich. Sumpfwurz.

— *latifolia* All. Jul. Aug. W., Gbsch. u. U. IV. 3. (753)

— *palustris* Crantz Jun. Jul. Fcht. Gbsch., sumpfige
Flussuf.; Wolfszahn. III. 4. (754)

Listera R. Br.

- *ovata* R. Br. Mai. Jun. Auen; Meringerau, Siebentischwald, zwischen Lechhausen und Gersthofen. III. 3. (755)

Neottia L. Nestwurz.

- *Nidus avis* Rich. Jun. Lechauen; Siebentischwald, am Fusswege nach dem Ablass. II. 3. (756)

Goodyera R. Brown.

- *repens* R. Br. Jul. Ficht. Waldschatten, Siebentischwald, Insel hinter dem Tanzplatz, am Wege nach Siebenbrunnen. II. 3. (757)

Spiranthes Rich. Drehähre.

- *autumnalis* Rich. Aug. Trockne Waldränder; Oberschönefeld, zwischen Wöllenburg und Bergheim. I. 1. (758)

Sturmia Reichenbch.

- *Loeselii* Rchb. Jul. Smpf. b. Mühlhausen. I. 2, (759)

Cypripedium L. Frauenschuh.

- *Calceolus* L. Mai. Jun. Lechauen; besonders in der Meringerau und bei Gersthofen. II. 3. (760)

98. IRIDEEN.

Gladiolus L. Siegwurz.

- *palustris* Gaud. Jun. Lechfeld. I. 2. (761)

Iris L. Schwerdtlilie.

- *Pseud-Acorus* L. Jul. Grb., Smpf. IV. 5. (762)
— *sibirica* L. Jul. Smpf. im Giebelthal. I. 3. (763)

99. AMARYLLIDEEN.

Narcissus L. Josephsblume.

- *Pseudo-Narcissus* L. Apr. Unter Hecken bei der

Mörz'schen Fabrik. (Ob dort ursprünglich wildwachsend?) I. 2. (764)

Leucojum vernum L. (Schneeglöckchen) kommt nicht wildwachsend vor, obgleich sie im nahen Donauthale nicht selten ist.

Galanthus nivalis L. (Schneetröpfchen) als Flüchtling in Grasgärten z. B. Tivoli.

100. ASPARAGEEN.

Asparagus L. Spargel.

— *officinalis* L. Jul. Lechuf.; an einem Waldrand bei Deuringen (Roger). In Gärten cult. II. 2. (765)

Paris L. Einbeere.

— *quadrifolia* L. Mai. Fcht., schattige W., bes. Lechauen. III. 4. (766)

Convallaria L. Maiblume.

— *Polygonatum* L. Mai. Jun. W. u. Hd.; Lechauen, Siebenbrunnen, Mühlhausen. II. 3. (767)

— *multiflora* L. Mai. Jun. W. u. Hd. IV. 4. (768)

— *majalis* L. Mai. Jun. Laubwälder. IV. 4. (769)

Majanthemum L. Zweiblatt.

— *bifolium* DC. Mai. Jun. W. der westl. Bh., Lechauen. IV. 5. (770)

101. LILIACEEN.

Fritillaria L. Schachblume.

— *Meleagris* L. Apr. Lechauen, bei Gersthofen am rechten Lechufer (mit weisser, ungefleckter Blüthe.) I. 2. (771)

Lilium L. Lilie.

— *bulbiferum* L. Jun. Gbsch. in Lechauen; bei dem Lochhaus, bei Siebenbrunnen. I. 1. (772)

— *Martagon* L. Jul. Gbsch., L.-W.; Eichelau, Lohe, Wolfertshausen. III. 3. (773)

Anthericum L. Spinnenkraut.

- *Liliago* L. Jun. W. der westl. Hh.; Loh-W., Kobel, Strassbg. II. 4. (774)
- *ramosum* L. Jul. Tr. Trft. u. Abb. der Lechebue; Siebenbrunnen, Lechfeld, Mergenthau. II. 4. (775)

Ornithogalum L. Vogelmilch.

- *umbellatum* L. Apr. Mai. Ak. u. Ws.; am Weg über den Pfannenstiel, bei dem städtischen Ziegelstadel, Lechhausen. III. 3. (776)
- *nutans* L. Apr. Hk. bei der Mörz'schen Fabrik. I. 2. (777)

Gagea Salisb. Ackerstern.

- *arvensis* Schult. Apr. Ak.; bei Oberhausen, Pfersee, Derching. III. 3. (778)
- *lutea* Schult. Apr. Baumgarten vor Stadtbergen; schatt. Grasplätze bei Statzling, Derching, Wolfertshausen. II. 2. (779)

Allium L. Lauch.

- *fallax* Don. Jul. Aug. Lechfeld, an der Eisenbahn zwischen Stierhof u. Mering. II. 2. (780)
- *suaveolens* Jacq. Jul. Aug. Smpf. bei Mühlhausen. Statzling. II. 3. (781)
- *sphaerocephalum* L. Wurde nur einmal auf einem Ak. bei Wolfertshausen gefunden. (Zolleis) (782)
- *olraceum* L. Jun. Jul. Hk. auf der Hh. zwischen Friedberg und Wolfertshausen. II. 2. (783)
- *carinatum* L. Jul. Lechauen; Siebentischwald; Moorheide zwischen Lechhsn. u. Mühlhsn. III. 4. (784)
- *sativum* L. (Knoblauch) in Gärten cult.
- *Porrum* L. (Lauch) in Gärten allgemein angebaut.
- *Schoenoprasum* L. Als „Schnittlauch“ in Gärten cult.
Var. β alpinum auf Lechkies. I. 1. (785)

Allium fistulosum L. (Winterzwiebel) häufig cultivirt.

— *ascalonicum* L. (Chalottenzwiebel) weniger allgemein cult. als obige.

— *Cepa* L. (Sommerzwiebel) wird in Gärten am meisten angebaut.

Hemerocallis L. Tagblume.

— *flava* L. Jun. Auf ziemlich erhöhtem Lechufer in der Meringerau seit 4 Jahren beobachtet. I. 2. (786)

Muscari Tournef. Muskathyazinthe.

— *botryoides* Mill. Apr. Mai. Gbsch; Eichelau, Mergenthau, Haunstetten. I. 3. (787)

102. COLCHICACEEN.

Colchicum L. Herbstzeitlose.

— *autumnale* L. Spt. Okt. Ws. u. Wd. VI. 5. (788)

Veratrum L. Germer, weisse Niesswurz.

— *album* L. nebst der Var. β *lobelianum*. Aug. Giebelthal. I. 3. (789)

Tofieldia Huds.

— *calyculata* Wahlbg. Jul. Aug. Fcht. Wd. u. W. III. 4. (790)

103. JUNCACEEN.

Juncus L. Simse.

— *conglomeratus* L. Jun. W., Grb.; Deuringen. II. 3. (791)

— *effusus* L. Jul. Grb., an fcht. O. V. 6. (792)

— *glaucus* Ehrh. Jul. An fcht. Orten. VI. 6. (793)

— *obtusiflorus* Ehrh. Jul. Aug. Grb., Beh.; am Wege nach Derching. III. 3. (794)

— *sylvaticus* Reich. Jul. Aug. Grb., Smpf. IV. 5. (795)

— *lamprocarpus* Ehrh. Jul. Aug. An fcht. O. VI. 6. (796)

- Juncus alpinus* Vill. Jul. Lechkies. II. 3. (797)
 — *supinus* Moench. Jul. Grb. bei dem Stadtberger Ziegelstadel. I. 2. (798)
 — *squarrosus* L. Jul. Zwischen Lechhausen und der Friedberger Brücke. * (799)
 — *compressus* Jacq. Jul. Fcht, Trft., an Wegen. IV. 6. (800)
 — *bufonius* L. Jul. Aug. Fcht. Ak. u. Ws. V. 6. (801)

Luzula DC. Hainsimse.

- *pilosa* Willd. Apr. Mai. Fcht. L.-W. IV. 5. (802)
 — *albida* DC. Jun. Wälder der Höhen. IV. 4. (803)
 — *campestris* DC. Apr. Mai. Hd., Trft. V. 5. (804)

104. CYPERACEEN.

Cyperus L. Cypergras.

- *flavescens* L. Jul. Aug. Smpf.; am Fusswege nach Mühlhausen, Schmutterthal. II. 3. (805)
 — *fuscus* L. Jul. Aug. Smpfws.; am Fusswege nach Mühlhausen, Lechkies. II. 3. (806)

Schoenus L. Knopfgras.

- *nigricans* L. Mai. Jun. Moore der Lechebne; Lechfeld, Mühlhausen. III. 6. (807)
 — *ferrugineus* L. Mai. Jun. Moorws. der Lechebne u. der westl. Ih.; Lechfeld, Leitershofen, Wertachthal. IV. 5. (808)

Cladium Brown. Patr. Sumpfgas.

- *Mariscus* R. Br. Jul. Smpf. in dem Moor zwischen Lechhausen u. Statzling. I. 2. (809)

Heleocharis R. Br. Sumpfbirse.

- *palustris* R. Br. Jul. Sümpfe. V. 6. (810)
 — *orata* R. Br. Jul. Smpf., feht. Flussufer; am Lech bei Lechhausen, Meringerau. I. 2. (811)

Heleocharis acicularis R. Br. Jul. Aug. Fcht. Fluss-
u. Bachuf.; an der Wertach, Wollenburg, zwischen
Göggingen und Bergheim. II. 3. (812)

Scirpus L. Binse.

— *pauciflorus* Lightf. Jun. Fcht. Flussuf. u. Moorgründe;
an Lech u. Wertach, Statzling. III. 5. (813)

— *lacustris* L. Jun. Jul. In stehend. Wssr. IV. 6. (814)

— *sylvaticus* L. Jun. Jul. Grb.; zwischen dem Rosen-
auberg und der Wertach, Lechhausen, Gailenbach.
III. 3. (815)

— *compressus* Pers. Jul. Aug. Fcht. Fluss- und Bach-
ufer; Ablass etc. IV. 5. (816)

Eriophorum L. Wollgras.

— *vaginatum* L. Apr. Früher häufig, jetzt nur noch
selten auf Moorgründen bei Derching. I. 2. (817)

— *latifolium* Hopp. Apr. Fcht. Moorws. V. 5. (818)

— *angustifolium* Rth. Apr. Smpf. in Waldthl. der westl.
Hh.; Strassberg, Anhauser Thal. II. 2. (819)

— *gracile* Koch. Mai. Jun. Smpf.-Moore; Strassberg.
I. 2. (820)

Carex L. Riedgras.

— *dioica* L. Apr. Mai. Sumpfige Bachufer des Lechfeldes.
I. 2. (821)

— *Davalliana* Smith. Apr. Smpf., an Bach., Grb. IV. 6. (822)

— *capitata* L. Mai. Smpf. in den Waldthl. der westl.
Hh.; Giebelthal, zwischen Banacker u. Burgwalden.
II. 4. (823)

— *disticha* Huds. Mai. Grb., Smpf. IV. 5. (824)

— *vulpina* L. Mai. Sumpfige Waldthl.; Anhauser Thal.
II. 4. (825)

— *muricata* L. Mai. Raine, Grasplätze. V. 3. (826)

Var. β virens bei Wolfertshausen.

- Carex teretiuscula* Good. Mai. Smpf.; Lechfeld, bei Haberskirch. II. 2. (827)
- *paniculata* L. Mai. Smpf. Uf.; Wolfszahn, Griesbach. II. 2. (828)
- *paradoxa* Willd. Mai. Smpf. am Strassbg. I. 2. (829)
- *brizoides* L. Mai. W. der westl. Hh. III. 6. (830)
- *remota* L. Mai. W.; Siebentschw., Derching, Anwalding. II. 2. (831)
- *stellulata* Good. Mai. Fcht. Ws., Waldthlr. III. 4. (832)
- *leporina* L. Jun. W. der westl. Hh. III. 6. (833)
- *elongata* L. Mai. Fcht. W.-Ws. der westl. Hh. II. 2. (834)
- *canescens* L. Mai. Smpf. im Anhauserthal. I. 3. (835)
- *stricta* Good. Apr. Mai. Smpf. Uf. IV. 6. (836)
- *vulgaris* Fries. Apr. Mai. Smpf., Grb. VI. 6. (837)
- *acuta* L. Mai. U.; an der Wertach. II. 4. (838)
- *limosa* L. Mai. Smpf. bei Strassberg. I. 2. (839)
- *pilulifera* L. Mai. Smpf. in W.; Strassbg. II. 2. (840)
- *tomentosa* L. Mai. Lechauen. III. 5. (841)
- *montana* L. Apr. W., Lechauen. III. 3. (842)
- *ericetorum* Poll. Apr. Tr. Abh.; bei Mühlhausen, Wöllenburg. III. 4. (843)
- *praecox* Jacq. Apr. Ws., Haiden. VI. 5. (844)
- *polyrrhiza* Walltr. Mai. W. der westl. Hh. III. 5. (845)
- *humilis* Leyss. Apr. Gebesch.; am Abh. des östl. Thalrandes zwischen Statzling und Derching, bei Lechhausen. II. 5. (846)
- *digitata* L. Apr. W.; bei Wolfertshausen II. 3. (847)
- *ornithopoda* Willd. Apr. Hd. der Lechebne; vor der Insel, Schinderhölzchen, Wolfszahn. III. 5. (848)
- *alba* Scop. Apr. Lechauen. III. 6. (849)
- *panicea* L. Mai. Fcht. Ws., Flussufer. V. 6. (850)

Carex glauca Scop. Apr. Fcht. Ws., Gbsch. u. Flussuf.

IV. 4. (851)

— *pallesens* L. Mai. W. der östl. und westl. Rh.

V. 6. (852)

— *sempervirens* Vill. Jun. Lechfeld. II. 5. (853)

— *flava* L. Mai. Fcht. Flussuf., am Lech. III. 4. (854)

— *Oederi* Ehrh. Mai. Smpf., Grb. IV. 4. (855)

— *fulva* Good. Mai. Fcht. Ws.; bei Wolfertshausen,
am Lech. II. 2. (856)

— *Hornschuchiana* Hopp. Mai. Fcht. Ws., an Ufern.

IV. 4. (857)

— *distans* L. Mai. Fcht. Ws. u. Bachufer; Lechfeld,
Wolfertshausen, Meringerau. III. 4. (858)

— *sylvatica* Huds. Jun. W. b. Wolfertshsn. II. 3. (859)

— *ampullacea* Good. Mai. Grb., Weiher, Smpf. V. 6. (860)

— *vesicaria* L. Mai. Grb., Smpf.; bei Leitershofen,
Giebelthal, Anhauserthal. II. 4. (861)

— *paludosa* Good. Mai. Bach- u. Flussuf. IV. 5. (862)

— *riparia* Curt. Mai. Uf.; Fuchsbach b. Pfersee. I. 2. (863)

— *filiformis* L. Mai. Smpf.; Strassberg, Haberskirch.
I. 2. (864)

— *hirta* L. Mai. Flusssand, tr. Grb.; Rosenauerg.
IV. 3. (865)

105. GRAMINEEN.

Zea Mays L. (Türkisch Korn) wird hie und da im Klei-
nen versuchsweise gebaut.

Andropogon L. Bartgras.

— *Ischaemum* L. Jul. Aug. Tr. Hg.; am Weg über
den Pfannenstiel, Mühlhsh., Scherneck. II. 4. (866)

Panicum L. Fennich.

P. ciliare Rtz. fand sich im Hofraum der Mörz'schen
Fabrik — wahrscheinlich mit den Abfällen der Woile
ausgestreut.

Panicum glabrum Gaud. Jul. ff. Br.-Ak. bei Kissing,
zwischen Anwalding und Scherneck. I. 3. (867)

— *Crus galli* L. Jul. Aug. Sandige Ak.; bei Hainhofen,
Wolfertshausen, Mühlhausen. III. 3. (868)

P. Miliaceum L. (Hirse) findet sich äusserst selten ange-
baut.

Setaria Beauv. Borstengras.

— *viridis* Beauv. Jul. Auf cult. Land. IV. 6. (869)

— *glauca* Beauv. Jul. Aecker. IV. 6. (870)

Phalaris L. Glanzgras.

— *arundinacea* L. Jun. Jul. Ufer. IV. 3. (871)

Hierochloa Gmel. Darrgras.

— *odorata* Wahlb. Mai. Gbsch. und Buschws. am Lech;
Wolfszahn, Gersthofen. II. 2. (872)

Anthoxanthum L. Ruchgras.

— *odoratum* L. Mai. Ws., Wd. VI. 6. (873)

Alopecurus L. Fuchsschwanz.

— *pratensis* L. Mai. Jun. Wiesen. VI. 6. (874)

— *agrestis* L. Ak.; zwischen dem protest. Gottesacker u.
dem Ziegelstadel. I. 2. (875)

— *geniculatus* L. Jun. Jul. Grb.; Derching, Neusäss.
I. 3. (876)

— *fulvus* Sm. Jun. Grb., sumpfige Waldwege; Wöllen-
burg, Banacker, Mühlhausen. II. 4. (877)

Phleum L. Lieschgras.

— *Boehmeri* Wibel. Jun. Jul. Hg. zwischen Derching
und Statzling. I. 3. (878)

— *pratense* L. Jun. Jul. Wiesen. VI. 6. (879)

Die Form: *P. nodosum* L. häufig an tr. Abhg.

Agrostis L. Straussgras.

— *stolonifera* L. Jul. Ws., Raine, W., Uf. VI. 6. (880)

— *vulgaris* L. Jul. Tr. Ws., Raine, Flussuf. V. 5. (881)

Apera Adans. Windgras.

- *Spica Venti Beauv.* Jun. Jul. Unter dem Getrd.
VI. 6. (882)

Calamagrostis Roth. Reithgras.

- *littorea* DC. Aug. Lechufer; b. Ablass. II. 3. (883)
- *epigejos* Rth. Aug. Flusssufer. V. 6. (884)
- *montana* Host. Aug. Sumpfige Torfmoore der Lech-
ebne; zwischen Lechhausen u. Derching. II. 5. (885)
- *sytratica* DC. Aug. W. der westl. Hh. III. 4. (886)

Milium L. Hirsegras.

- *effusum* L. Jun. L.-W., bes. der westl. Hh.; Loh-W.,
bei der Friedberger Sägmühle. III. 3. (887)

Phragmites Trin. Schilfgras.

- *communis* Trin. Aug. Ufer, fcht. Ak. V. 6. (888)

Sesleria Ard.

- *coerulea* Ard. Apr. Moore der Lechebne. II. 5. (889)

Koeleria Pers.

- *cristata* Pers. Jun. Jul. Tr. Hg. Wd. u. W. V. 5. (890)

Aira L. Schmele.

- *caespitosa* L. Jun. Jul. Fcht. Ws., W., u. Flusssufer.
V. 4. (891)
Var. β *pallida* in den Lohwäldchen.
- *flexuosa* L. Jun. — Aug. Schattige W.; Mergenthan,
Deuringen. III. 5. (892)

Holcus L. Honiggras.

- *lanatus* L. Jun. ff. Fcht. Ws., Uf. u. W. VI. 6. (893)
- *mollis* L. Jul. Aug. Grb. in W.; Wöllenburg, Deu-
ringen. III. 3. (894)

Arrhenatherum Beauv. Glatthaber.

- *elatus* M. & K. Jun. Jul. Ws., Hd. u. Hk. VI. 6. (895)

Avena L. Haber.

- *sativa* L. Wird sehr häufig angebaut.

Eine Abart mit dunkelbraunen Spelzen findet sich ebenfalls häufig cult.

- *pubescens* L. Mai. Jun. Wiesen. VI. 6. (896)

- *pratensis* L. Jun. Jul. Tr. Hg.; Rosenauberg, Siebentischwald am Fusswege nach dem Ablass, Lohe. II. 3. (897)

- *flavescens* L. Jun. Jul. Wiesen VI. 6. (898)

Melica L. Perlgras.

- *nutans* L. Mai. Jun. W., Auen. IV. 4. (899)

Briza L. Zittergras.

- *media* L. Jun. Jul. Wiesen. VI. 5. (900)

Poa L. Rispengras.

- *annua* L. Mrz. — Spt. Gartenland, Ws., Strassen. VI. 6. (901)

- *bulbosa* L. Mai. Jun. Bisher wurde nur die *Var. β vivipara* auf Ws. an der Einmündung des Fussweges in die Chaussee nach Mühlhausen gefunden. I. 2. (902)

- *nemoralis* L. Jun. Jul. Tr. L.-W. IV. 5. (903)

- *trivialis* L. Jun. Jul. Felt. Ws. VI. 6. (904)

- *pratensis* L. Mai. Jun. Wiesen. VI. 6. (905)

- *compressa* L. Jun. Jul. Abhg., Trft. u. M.; zwisch. Scherneck u. Au, Franzosenwall. II. 3. (906)

Glyceria R. Brown. Süßgras.

- *spectabilis* M. & K. Jun. Jul. Im Wasser; Grb. an der Wertach, Aach, Stadtgrb. III. 5. (907)

- *fluitans* R. Br. Jun. Jul. Grb., Smpf. V. 5. (908)

- *distans* Wahlbg. Jun. Längs des Lechdammes gegen den Wolfszahn. I. 3. (909)

Glyceria aquatica Presl. Jun. Jul. Grb. im Schmutterthal, bei Statzling. II. 3. (910)

Molinia Schrank.

- *coerulea* Mönch. Aug. W., U., Smpf. V. 4. (911)
- Var. *altissima* Link. in W. der Hhn.

Dactylis L. Knaulgras.

- *glomerata* L. Jun. Jul. Wiesen. VI. 6. (912)

Cynosurus L. Kamugras.

- *cristatus* L. Jun. Raine, Ws. u. W. IV. 4. (913)

Festuca L. Schwingel.

- *ovina* L. Mai. Jun. Ws., Wd, Trft. VI. 6. (914)
- *rubra* L. Mai. Jun. Ws., Raine; Rosenauerg. II. 3. (915)
- *gigantea* Vill. Jun. Jul. W.; Scherneck. Wolfertshausen, Hammel. III. 2. (916)
- *arundinacea* Schreb. Jul. Gbsch. der Flussuf., W. III. 3. (917)
- *elatior* L. Jun. Jul. Wiesen. VI. 5. (918)

Brachypodium Beauv. Zwenke.

- *sylvaticum* Roem. & Sch. Jul. W. zwischen Scherneck u. Friedberg, Strassberg. III. 3. (919)
- *pinnatum* Beauv. Jun. Jul. W., Hd. V. 6. (920)

Bromus L. Trespe.

- *secalinus* L. Jun. Jul. Ak. unter der Saat. V. 4. (921)
- Var. β *velutinus* auf dem Rosenauerg.
- *mollis* L. Mai. Jun. Ws., an Wegen. VI. 6. (922)
- *arvensis* L. Jun. Ak. unter der Saat. III. 3. (923)
- *asper* Murr. Jun. Jul. W.; Hammel, v. Friedberg bis Scherneck. III. 2. (924)
- *erectus* Huds. Mai. Jun. Waldws., Gbsch. V. 4. (925)
- *sterilis* L. Jun. ff. An M., Schutt III. 2. (926)

Bromus tectorum L. Mai. Jun. Raine zwischen Mühlhshn.
u. Berg. I. 2. (927)

Triticum L. Waizen.

— *vulgare* L. Wird viel seltener gebaut als die folgende.

— *Spelta* L. (Dinkel, Spelz, Kern). Nebst dem Roggen die wichtigste Culturpflanze unseres Bezirks.

— *repens* L. (Queckengras). Ak, Hk. VI. 6. (928)

— *caninum* Schreb. Jul. Gbsch.; Siebentischwald, am Anhauserbach. II. 3. (929)

Secale L. Roggen.

— *cereale* L. Sehr häufig cultivirt.

Hordeum L. Gerste.

— *vulgare* L. (Gemeine Gerste). Wird nur selten angebaut.

H. hexastichon L. findet sich nur hie und da versuchsweise cult.

— *distichum* L. (Zweizeilige Gerste). Die in dem Bezirk fast ausschliesslich cultivirte Gerstenart.

— *murinum* L. Jul. Aug. An Wegen, M. V. 6 (930)

Lolium L. Lolch.

— *perenne* L. (Englisch Raygras). Jun. ff. Ws., Wd. VI. 6. (931)

— *temulentum* L. Jun. Jul. Ak. unter der Saat; bei dem protest. Gottesacker, zwischen Bergheim und Bannacker. II. 3. (932)

Nardus L. Borstengras.

— *stricta* L. Mai. Jun. Fcht. Wd. hinter Banacker; Leitershofen, Luisensruh, Kobel, Lohwäldchen. II. 3. (933)

Vergleichende Uebersicht

derjenigen Arten des Bezirkes, welche einerseits den Thalebenen des Lech und der Wertach, andererseits den sie begleitenden Höhen eigenthümlich sind.

A. Der **Lech- Wertachebene** *) eigenthümlich sind folgende 150 Arten:

Clematis Vitalba, *Thalictrum aquilegifolium*, *T. galioides*, *T. flavum*, *Ranunculus Lingua*, *R. montanus*, *Aquilegia atrata*, *Aconitum Napellus*, *Fumaria Vaillantii*, *Nasturtium palustre*, *Erysimum cheiranthoides*, *Erucastrum Pollichii*, *Biscutella laevigata*, *Lepidium campestre*, *Hutchinsia alpina*, *Helianthemum Fumana*, *Viola arenaria*, *V. stagnina*, *Gypsophila repens*, *Sagina nodosa*, *Alsine Jacquini*, *Linum flavum*, *L. viscosum*, *Geranium pratense*, *Rhamnus saxatilis*, *Trifolium fragiferum*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Coronilla vaginalis*, *Ornithopus perpusillus*, *Vicia tenuifolia*, *Spiraea Filipendula*, *Fragaria collina*, *Poterium Sanguisorba*, *Oenothera biennis*, *Myriophyllum spicatum*, *M. verticillatum*, *Hippuris vulgaris*, *Myricaria germanica*, *Saxifraga mutata*, *S. aizoides*, *Helosciadium repens*, *Peucedanum Cervaria*, *Laserpitium latifolium*, *L. Siler*, *As-*

*) Wir haben hier nur die Thalsole der beiden Flussthäler im Auge: den höhern, längs der Hochstrass liegenden Theil des Lechfeldes, sowie das Breitfeld (S. d. Einleitung) rechnen wir zu den westlichen Höhen, da sie gleichsam den von der Wertach durchfurchten Fuss derselben bilden.

perula tinctoria, Galium boreale, G. saxatile, Eupatorium cannabinum, Petasites officinalis, Bellidiastrum Micheli, Erigeron droebachensis, Bupthalmum salicifolium, Inula salicina, Cineraria campestris, Senecio erucifolius, Cirsium eriophorum, C. Erisythales, C. rivulare, C. bulbosum, Carduus defloratus, Leontodon incanus, Hypochaeris maculata, Chondrilla prenanthoides, Crepis praemorsa, C. alpestris, Hieracium praealtum, H. staticifolium, Campanula pusilla, Aretostaphylos officinalis, Erica carnea, Gentiana acaulis, G. utriculosa, G. ciliata, Erythraea pulchella, Pulmonaria mollis, Lithospermum officinale, Verbascum Blattaria, Digitalis purpurea, Linaria alpina, L. minor, Bartsia alpina, Euphrasia salisburgensis, Salvia verticillata, Prunella grandiflora, Teucrium montanum, Utricularia vulgaris, U. minor, Globularia vulgaris, G. cordifolia, Polygonum viviparum, Daphne Cneorum, Thesium intermedium, T. rostratum, Hippophaë rhamnoides, Asarum europaeum, Salix daphnoides, S. viminalis, S. incana, S. nigricans, Populus canescens, P. alba, Alnus incana, Butomus umbellatus, Triglochin palustre, Potamogeton natans, P. crispus, P. pectinatus, Typha minima, Sparganium simplex, Sp. natans, Orchis ustulata, O. laxiflora, O. incarnata, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia odoratissima, Ophrys muscifera, O. aranifera, O. arachnites, Cephalanthera pallens, Epipactis palustris, Listera ovata, Neottia Nidus avis, Cypripedium Calceolus, Gladiolus palustris, Fritillaria Meleagris, Lilium bulbiferum, Allium fallax, A. suaveolens, Hemerocallis flava, Juncus alpinus, Cyperus fuscus, Schoenus nigricans, Cladium Mariscus, Heleocharis ovata, H. acicularis, Scirpus pauciflorus, Carex acuta, C. tomentosa, C. ornithopoda, C. alba, C. sempervirens, C. fulva, C. distans, Hierochloa odorata, Calamagrostis littorea, C. epigejos, C. montana, Sesleria coerulea, Glyceria spectabilis, G. distans.

B. Den Höhen *) sind 149 Arten eigenthümlich und zwar:

a. auf den **östlichen und westlichen** Höhen gemeinschaftlich vorkommend folgende 61 Arten:

Ranunculus lanuginosus, *Actaea spicata*, *Papaver Argemone*, *Dianthus deltoides*, *Lychnis Viscaria*, *Hypericum montanum*, *H. humifusum*, *Impatiens Noli tangere*, *Sarothamnus vulgaris*, *Trifolium alpestre*, *T. rubens*, *T. hybridum*, *T. agrarium*, *Astragalus Cicer*, *Lathyrus sylvestris*, *Spiraea Aruncus*, *Rubus Idaeus*, *R. saxatilis*, *Potentilla argentea*, *Circaea luteotiana*, *Sedum sexangulare*, *Saxifraga tridactylites*, *S. granulata*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Sanicula europaea*, *Orlaya grandiflora*, *Chaerophyllum temulum*, *Ch. hirsutum*, *Adoxa Moschatellina*, *Sambucus racemosa*, *Asperula odorata*, *Galium sylvaticum*, *Artemisia campestris*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Senecio sylvaticus*, *Hieracium boreale*, *H. umbellatum*, *Campanula persicifolia*, *Vaccinium Myrtillus*, *Calluna vulgaris*, *Lycopsis arvensis*, *Pulmonaria officinalis*, *Lathraea squamaria*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Mercurialis perennis*, *Alnus glutinosa*, *Convallaria majalis*, *Lilium Martagon*, *Luzula pilosa*, *L. albida*, *Eriophorum angustifolium*, *Carex vulpina*, *C. brizoides*, *C. canescens*, *C. pallescens*, *Andropogon Ischaemum*, *Milium effusum*, *Aira flexuosa*, *Festuca gigantea*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus asper*.

b. Nur **auf den östlichen Höhen** kommen
21 Arten vor:

Cochlearia officinalis, *Stellaria Holostea*, *Acer campestre*, *Geranium columbinum*, *Vicia dumetorum*, *Orobus vernus*,

*) Es versteht sich wohl von selbst, dass die von diesen Höhen eingeschlossenen, untergeordneten Thalbildungen hier mit inbegriffen sind.

O. niger, *Herniaria glabra*, *Scleranthus perennis*, *Chaerophyllum bulbosum*, *Hedera Helix*, *Filago minima*, *Verbascum Thapsiforme*, *Galeobdolon luteum*, *Allium olcraceum*, *Carex ericetorum*, *C. digitata*, *C. sylvatica*, *Panicum Crus galli*, *Phleum Boehmeri*, *Bromus tectorum*.

c. Den **westlichen Höhen** eigenthümlich sind
67 Arten.

Myosurus minimus, *Aconitum Lycoctonum*, *Sisymbrium Thalianum*, *Gypsophila muralis*, *Lepigonum rubrum*, *Alsine stricta*, *Stellaria uliginosa*, *Hypericum pulchrum*, *H. hirsutum*, *Acer Pseudoplatanus*, *Genista germanica*, *Lotus uliginosus*, *Vicia villosa*, *V. angustifolia*, *Comarum palustre*, *Circaea alpina*, *Peplis Portula*, *Sedum villosum*, *Saxifraga Hirculus*, *Laserpitium prutenicum*, *Chaerophyllum aureum*, *Lonicera Periclymenum*, *Chrysanthemum inodorum*, *Senecio sarracenicus*, *Serratula tinctoria*, *Centaurea phrygia*, *C. montana*, *Chondrilla juncea*, *Prenanthes purpurea*, *Hieracium rigidum*, *Jasione montana*, *Campanula Cervicaria*, *Vaccinium uliginosum*, *V. Vitis Idaea*, *V. Oxycoccus*, *Pyrola chlorantha*, *P. media*, *P. minor*, *Anchusa officinalis*, *Digitalis grandiflora*, *Limosella aquatica*, *Pedicularis sylvatica*, *Melittis Melissophyllum*, *Lysimachia nemorum*, *Chenopodium polyspermum*, *Betula pubescens*, *B. humilis*, *Alnus viridis*, *Orchis maculata*, *Spiranthes autumnalis*, *Iris sibirica*, *Anthericum Liliago*, *Veratrum album*, *Juncus conglomeratus*, *Eriophorum gracile*, *Carex capitata*, *C. paradoxa*, *C. leporina*, *C. elongata*, *C. limosa*, *C. pilulifera*, *C. polyrhiza*, *C. vesicaria*, *C. filiformis*, *Calamagrostis sylvatica*, *Holcus mollis*, *Nardus stricta*.

Obige Vergleichung lässt die auffallende Verschiedenheit erkennen, welche zwischen der Flor der Lechebne und derjenigen der angrenzenden

Höhen stattfindet. Die Ursache dieser Verschiedenheit wurde in der Einleitung angedeutet. Eine erschöpfende Darstellung derselben erlaubt uns weder der Plan und die Ausdehnung des vorliegenden Werkchens, noch wären unsre bisherigen Erfahrungen jetzt schon zur genügenden Lösung einer so schwierigen Aufgabe ausreichend. Wir müssen es uns deswegen vorbehalten, später auf diesen wichtigen Gegenstand zurückzukommen.

Die Pflanzenfamilien des Bezirkes und deren Artenzahl. *)

Banunculaceen . . .	55	Acerineen	2
Berberideen . . .	1	Geraniaceen . . .	9
Nymphaeen . . .	2	Balsamineen . . .	1
Papaveraceen . . .	4	Oxalideen	2
Fumariaceen . . .	4	Celastrineen . . .	1
Cruciferen	29	Rhamneen	3
Cistineen	2	Papilionaceen . . .	52
Violarieen	8	Amygdaleen	5
Resedaceen	2	Rosaceen	26
Droseraceen	5	Sanguisorbeen . . .	4
Polygaleen	4	Pomaceen	5
Sileneen	17	Onagrarieen	9
Alsineen	19	HalORAGEen	2
Lincen	5	Hippurideen	1
Malvaceen	5	Callitrichineen . . .	3
Tiliaceen	1	Lythrarieen	2
Hypericineen . . .	7	Tamariscineen . . .	1

*) Es sind nur die wild wachsenden Arten gezählt.

Cucurbitaceen . . .	1	Rhinanthaceen . . .	13
Paronychieen . . .	1	Labiaten	38
Sclerantheen . . .	2	Verbenaceen . . .	1
Crassulaceen . . .	5	Lentibularieen . . .	4
Grossularieen . . .	3	Primulaceen . . .	9
Saxifrageen . . .	6	Globularieen . . .	2
Umbelliferen . . .	34	Plantagineen . . .	3
Araliaceen	1	Chenopodeen . . .	10
Corneen	1	Polygoneen . . .	16
Loranthaceen . . .	1	Thymeleen . . .	2
Caprifoliaceen . . .	8	Santalaceen . . .	4
Stellaten	14	Elacagneen . . .	1
Valerianeen . . .	6	Aristolochien . . .	1
Dipsaceen	6	Euphorbiaceen . . .	9
Compositen . . .	108	Urticeen	5
Campanulaceen . . .	12	Cupuliferen . . .	5
Vaccinieen	4	Salicineen	15
Ericineen	3	Betulineen	6
Pyrolaceen	6	Coniferen	5
Monotropeen . . .	1	Alismaceen	1
Oleaceen	2	Butomeen	1
Asclepiadeen . . .	1	Juncagineen	1
Apocyneen	1	Potameen	7
Gentianeen	11	Lemnaceen	3
Convolvulaceen . . .	4	Typhaceen	5
Boragineen	17	Aroideen	2
Solaneen	5	Orchideen	26
Verbasceen	8	Irideen	3
Antirrhineen . . .	22	Amaryllideen . . .	1
Orobancheen . . .	7	Asparageen	6

Liliaceen	17	Cyperaceen	61
Colchicaceen	5	Gramineen	70
Juncaceen	14		

Dicotyledonen 719 Arten

Monocotyledonen 221 Arten

Summe aller Phanerogamen 940 Arten

Verhältniss der Monocotyledonen zu den Dicotyle-
donen = $1 : 5^{56}_{221}$.

Verzeichniss

solcher Arten, welche nach Angabe älterer Botaniker
in dem Bezirke vorkommen sollen, von uns aber
bis jetzt nicht beobachtet wurden.

Thlaspi alliaceum L., *T. alpestre* L., *T. alpinum* Jacq.
T. montanum L., *Teesdalia nudicaulis* R. Br., *Lepidium ru-*
derale L., *Aethionema saxatile* R. Br., *Rapistrum perenne*
All., *Dianthus plumarius* L., *Saponaria Vaccaria* L., *Silene*
conica L., *S. conoidea* L., *Spergula petandra* L., *Moehringia*
muscosa L., *Stellaria bulbosa* Wulf., *Cerastium semidecan-*
drum L., *Tilia grandifolia* Ehrh., *Sorbus domestica* L., *S. for-*
malis Crantz, *S. hybrida* L., *Epilobium Dodonaei* Vill., *E.*
tetragonum L., *Callitriche autumnalis* L., *Ceratophyllum sub-*
mersum L., *C. demersum* L., *Bryonia alba* L., *Montia fou-*
tana L., *Herniaria hirsuta* L., *Helosciadium nodiflorum* Koch.,
Sium latifolium L., *Bupleurum rotundifolium* L., *B. falcatum*
L., *B. Gerardi* Jacq., *Oenanthe Phellandrium* Lam., *Torilis*

helvetica Gmel, Scandix pecten veneris L., Anthriscus vulgaris Pers., Asperula galioides M. Bieberst., Galium rotundifolium L., Anthemis Cotula L., Hypochaeris glabra L., Crepis aurea Cass., Hieracium alpinum L., H. saxatile Vill., Phyteuma Scheuchzeri All., P. hemisphaericum L., Antirrhinum Orontium L., Linaria spuria Mill., L. arvensis Desf., Veronica prostrata L., V. verna L., Melampyrum nemorosum L., M. sylvaticum L., Stachys germanica L., S. annua L., Marrubium vulgare L., Scutellaria minor L., Ajuga pyramidalis L., A. Chamaepitys Schreb., Teucrium Chamaedrys L., Hottonia palustris L., Blitum capitatum L., Atriplex hastata L., Thesium alpinum L., Euphorbia dulcis Jacq., E. Esula L., E. segetalis L., Salix fragilis L., S. rosmarinifolia L., Typha angustifolia L., Orchis masculina L., O. sambucina L., Cephalanthera ensifolia Rich., Listera cordata R. Br., Iris germanica L., Gagea minima Schult., Muscari comosum Mill., Luzula maxima DC., Rhynchospora fusca Vahl., Scirpus caespitosus L., Carex arenaria L., Carex pilosa Scop., Panicum sanguinale L., Setaria verticillata Beauv., Cynodon Dactylon Pers., Leersia oryzoides Swarz., Agrostis canina L., Lasiagrostis Calamagrostis Link, Avena fatua L., A. caryophyllaea Wigg., A. praecox Beauv., Poa fertilis Host., Festuca bromoides Auct. F. pumila Vill., Bromus inermis Leyss.

Anmerkung. Es wird vielleicht auffallen, dass die frühern Angaben so Vieles enthalten, was unserm Verzeichnisse fehlt. Wir können hierfür drei verschiedene Ursachen anführen. Für's erste dürften manche Arten durch den Einfluss der Cultur oder andre zufällige Umstände für den Bezirk verloren gegangen sein; für's zweite wollen wir die Möglichkeit gerne zugeben, dass ein und das andere übersehen wurde; in den meisten Fällen jedoch beruhen die ältern Angaben auf Irrthümern, deren Schuld vielleicht grösstentheils in den schwankenden und unsichern Diagnosen der frühern Autoren zu suchen sein möchte.

Nachträge und Verbesserungen.

Seite 2 Durch gütige Mittheilung des Herrn Prior Postelmayr sind wir in den Stand gesetzt, der mittlern Jahrestemperatur noch Folgendes beizufügen:

Das Mittel aus den 30 Jahren von 1812/13 bis 1841/42. der mittlern täglichen Temperatur ist
in den Wintermonaten: Dezbr., Jan., Febr. = — 0,26 R.
in den Sommermonaten: Juni, Juli, August = + 13,93 R.

Seite 30. nach *Vicia Faba* L. setze:

— *sepium* L. Mai. Hk., Gbsch. V. 5. (202b)

Seite 34. nach *Epilobium palustre* L. setze:

— *roseum* Schreb. Jul. Aug. An Lechkanälen bei der ehemaligen Fröhlich'schen Fabrik. I. 3. (Roger) (256b)

Seite 37. nach *Cicuta virosa* L. setze:

Apium graveolens L. (Selleri) und *Petroselinum sativum* L. (Petersilie) werden allgemein in Gärten angebaut.

Seite 41. nach *Cornus Mas* L. setze:

C. alba L. In öffentlichen Anlagen: prot. Gottesacker etc.

„ „ Bei *Viscum album* streiche das * und setze dafür I. 2.

Seite 58. nach *Verbascum Blattaria* setze:

Scrophularia L. Braunwurz.

— *nodosa* L. Jun. — Aug. W.; Wolfertshausen, Lohe. III. 3. (537b)

— *Ehrhardti* Stev. (*S. aquatica* Auct.) Jul. — Spt. An Grb., Beh. IV. 5. (537c)

Seite 59. nach *Veronica triphyllus* L.

- *praecox* All. Apr. Ak. zwischen Lechhausen und Statzing, zw. Scherneck u. Affing. (v. Welden.) (553b)

Seite 68. nach *Thesium* L. setze:

- *montanum* Ehrh. Jul. Lechfeld. II. 2. (663b)

Seite 89. nach *B. secatinus* L. setze:

- *racemosus* L. Jun. Ws. und Raine; Wollenburg. II. 4. (921b)

Bei folgenden Arten ist die Blüthezeit nachzutragen:

Ranunculus nemorosus DC. Jun. fl., *Actaea Spicata* L. Jun., *Capsella Bursa pastoris* Moench. Apr. fl., *Neslia paniculata* Desv. Jun. Jul., *Polygala vulgaris* L. Mai. Jun., *Stellaria uliginosa* M. Jun. Jul., *Acer campestre* L. Mai, *Geranium columbinum* L. Jun. fl., *Cytisus nigricans* L. Jun. Jul., *Ereum tetrasp.* L. Jun. Jul., *Prunus insititia* L. Apr. Mai., *P. Padus* L. Mai., *Rubus saxatilis* L. Mai., *Fragaria collina* Ehrh. Jun., *Pyrus Malus* L. Mai., *Aegopodium Podagraria* L. Jun., *Carum Carvi* L. Mai.

R e g i s t e r

der lateinischen Gattungsnamen.

Acer 24	Arnica 46	Carduus 48
Achillea 46	Arnoseric 49	Carex 83
Aconitum 15	Arrhenaterum 87	Carlina 48
Acorus 76	Artemisia 45	Carpinus 71
Actaea 15	Arum 76	Carthamus 48
Adonis 14	Asarum 69	Carum 38
Adoxa 41	Asparagus 79	Centaurea 48
Aegopodium 38	Asperula 42	Cephalanthera 77
Aesculus 25	Aster 43	Cerastium 23
Aethusa 38	Astragalus 29	Cerinthe 56
Agrinonia 33	Astrantia 37	Chaerophyllum 40
Agrostemma 22	Atriplex 67	Chelidonium 16
Agrostis 86	Atropa 58	Chenopodium 66
Aira 87	Avena 88	Chondrilla 50
Ajuga 64	Ballota 64	Chrysanthemum 46
Alchemilla 33	Barbarea 17	Chrysosplenium 37
Alisma 74	Bartsia 61	Cichorium 49
Allium 80	Bellidistram 44	Cicuta 37
Alnus 73	Bellis 44	Cineraria 46
Alopecurus 86	Berberis 15	Circaea 34
Alsine 22	Berula 38	Cirsium 47
Althaea 24	Beta 67	Cladium 82
Alyssum 18	Betonica 63	Clematis 13
Amarantus 66	Betula 72	Clinopodium 62
Anacamptis 77	Bidens 45	Cochlearia 18
Anagallis 65	Biscutella 19	Colchicum 81
Anchusa 56	Blitum 66	Colutea 29
Andromeda 53	Borago 56	Comarum 32
Andropogon 85	Brachypodium 89	Conium 40
Anemone 13	Brassica 17	Convallaria 79
Angelica 38	Briza 88	Convolvulus 56
Anthemis 46	Bromus 89	Cornus 41
Anthericum 80	Bryonia 36	Coronilla 29
Anthoxanthum 86	Bupthalmum 44	Cortusa 65
Anthriscus 40	Butomus 75	Corydalis 16
Anthyllis 27	Calamagrostis 87	Corylus 71
Antirrhinum 59	Calamintha 62	Crataegus 33
Apera 87	Callitriche 35	Crepis 51
Apium 99	Calluna 53	Cucumis 36
Aposeris 49	Caltha 15	Cucurbita 35
Aquilegia 15	Camelina 18	Cuscuta 56
Arabis 17	Campanula 52	Cydonia 33
Arctostaphylos 53	Cannabis 70	Cynanchum 54
Arenaria 23	Capsella 19	Cynara 48
Armoracia 18	Cardamine 17	Cynoglossum 56

Cynosurus 89
 Cyperus 82
 Cypridium 78
 Cytisus 27
 Dactylis 89
 Daphne 68
 Datura 58
 Daucus 39
 Delphinium 15
 Dianthus 21
 Digitalis 58
 Dipsacus 43
 Draba 18
 Drosera 20
 Echinosperrum 56
 Echium 56
 Epilobium 34
 Epipactis 77
 Erigeron 44
 Erica 53
 Eriophorum 83
 Erodium 26
 Erucastrum 18
 Ervum 30
 Erysimum 17
 Erythraea 55
 Eupatorium 43
 Euphorbia 69
 Euphrasia 61
 Evonymus 26
 Fagus 70
 Falcaria 38
 Festuca 89
 Filago 45
 Foeniculum 38
 Fragaria 32
 Fraxinus 54
 Fritillaria 79
 Fumaria 16
 Gagea 80
 Galanthus 79
 Galeobdolon 63
 Galeopsis 63
 Galium 42
 Genista 27
 Gentiana 55
 Geranium 25
 Geum 32
 Gladiolus 78
 Glechoma 63
 Globularia 65
 Glyceria 88
 Gnaphalium 45
 Goodyera 78
 Gymnadenia 77

Gypsophila 21
 Hedera 40
 Helecocharis 82
 Helianthemum 19
 Helianthus 45
 Helichrysum 45
 Helosciadium 37
 Hemerocallis 81
 Heracleum 39
 Herminium 77
 Herniaria 36
 Hesperis 17
 Hieracium 51
 Hierochloa 86
 Hippocrepis 29
 Hippophaë 69
 Hippuris 35
 Holcus 87
 Holosteum 23
 Hordeum 90
 Humulus 70
 Hutchinsia 19
 Hyoscyamus 58
 Hypericum 24
 Hypochaeris 50
 Jasione 52
 Iberis 18
 Impatiens 26
 Inula 44
 Iris 78
 Isatis 19
 Juglans 70
 Juncus 81
 Juniperus 73
 Kerneria 18
 Knautia 43
 Koeleria 87
 Lactuca 50
 Lamium 63
 Lappa 48
 Lapsana 49
 Laserpitium 39
 Lathraea 60
 Lathyrus 30
 Lemna 75
 Leontodon 49
 Leonurus 64
 Lepidium 19
 Lepigonium 22
 Leucojum 79
 Ligustrum 54
 Lilium 79
 Limosella 60
 Linaria 59
 Linum 23

Listera 78
 Lithospermum 57
 Lolium 90
 Lonicera 41
 Lotus 29
 Luzula 82
 Lychnis 22
 Lycium 57
 Lycopus 62
 Lycopsis 56
 Lysimachia 65
 Lythrum 35
 Majanthemum 79
 Malachium 23
 Malva 24
 Matricaria 46
 Medicago 28
 Melampyrum 60
 Melica 88
 Melilotus 28
 Melittis 63
 Mentha 61
 Menyanthes 55
 Mercurialis 69
 Miliun 87
 Moehringia 23
 Molinia 89
 Monotropa 54
 Morus 70
 Muscari 81
 Myosotis 57
 Myosurus 14
 Myricaria 35
 Myriophyllum 34
 Narcissus 78
 Nardus 90
 Nasturium 16
 Neottia 78
 Nepeta 63
 Neslia 19
 Nicotiana 58
 Nuphar 16
 Nymphaea 15
 Oenothera 34
 Onobrychis 29
 Ononis 27
 Onopordum 48
 Ophrys 77
 Orchis 76
 Origanum 62
 Orlaya 39
 Ornithogalum 80
 Ornithopus 29
 Orobanche 60
 Orobis 30

Oxalis 26
 Panicum 85
 Papaver 16
 Parietaria 70
 Parnassia 20
 Paris 79
 Pastinaca 39
 Pedicularis 60
 Peplis 35
 Persica 31
 Petasites 43
 Petroselinum 99
 Peucedanum 39
 Phalaris 86
 Phaseolus 31
 Philadelphus 35
 Phleum 86
 Phragmites 87
 Phyteuma 52
 Picris 49
 Pimpinella 38
 Pinguicula 64
 Pinus 73
 Pisum 30
 Plantago 66
 Platanthera 77
 Pleurospermum 40
 Poa 88
 Polycnemum 66
 Polygala 20
 Polygonum 68
 Populus 72
 Potamogeton 75
 Potentilla 32
 Poterium 33
 Prenanthes 50
 Primula 65
 Prunella 64
 Prunus 31
 Pulicaria 44
 Pulmonaria 57
 Pyrola 53
 Pyrus 34
 Quercus 71
 Ranunculus 14
 Raphanus 19
 Reseda 20

Rhamnus 27
 Rhinanthus 61
 Ribes 36
 Robinia 29
 Rosa 33
 Rubus 32
 Rumex 67
 Sagina 22
 Salix 71
 Salvia 62
 Sambucus 41
 Sanguisorba 33
 Sanicula 37
 Saponaria 21
 Sarothamnus 27
 Satureja 62
 Saxifraga 37
 Scabiosa 43
 Scleranthus 36
 Schoenus 82
 Scirpus 83
 Scorzonera 50
 Scrophularia 99
 Scutellaria 64
 Secale 90
 Sedum 36
 Selinum 38
 Sempervivum 36
 Senecio 47
 Serratula 48
 Seseli 38
 Sesleria 87
 Setaria 86
 Sherardia 42
 Silaus 38
 Silene 21
 Sinapis 18
 Sisymbrium 17
 Solanum 57
 Solidago 44
 Sonchus 50
 Sorbus 34
 Sparganium 76
 Specularia 52
 Spergula 22
 Spinacia 67
 Spiranthes 78

Spiraea 31
 Stachys 63
 Staphylea 25
 Stellaria 23
 Stenactis 44
 Sturmia 78
 Succisa 43
 Symphytum 56
 Syringa 54
 Tanacetum 46
 Taraxacum 50
 Tetragonolobus 29
 Tenebrum 64
 Thalictrum 13
 Thesium 68
 Thlaspi 18
 Thymus 62
 Thysselinum 39
 Tilia 24
 Tofieldia 81
 Torilis 39
 Tragopogon 49
 Trifolium 28
 Triglochin 75
 Triticum 90
 Trollius 15
 Tunica 21
 Turritis 17
 Tussilago 43
 Typha 76
 Ulmus 70
 Urtica 70
 Utricularia 65
 Vaccinium 52
 Valeriana 42
 Valerianella 42
 Veratrum 81
 Verbascum 58
 Verbena 64
 Veronica 59
 Viburnum 41
 Vicia 30
 Vinca 55
 Viola 19
 Viscum 41
 Vitis 25
 Xanthium 51

Druckfehler.

- S. 26 Zeile 3 v. o. l. *Robertianum* st. *Robertsianum*.
S. 28 — 8 v. o. l. *macrorrhiza* st. *macrorhiza*.
S. 29 — 5 v. u. l. *glycyphyllos* st. *glyciphyllos*.
S. 30 — 13 v. o. l. Linse st. Linsen.
S. 32 — 8 v. o. l. *fruticosus* st. *fruticosus*.
S. 32 — 16 v. o. l. *elator* st. *clatior*.
S. 37 — 11 v. u. l. *europaea* st. *Europaea*.
S. 37 — 2 v. u. l. *Helosciadium* st. *Helosciadeum*.
S. 39 — 4 v. o. setze *Lpr.* st. *L*.
S. 42 — 1 v. u. setze Jul. Aug. st. Apr. Mai.
S. 43 — 1 v. u. l. Lechhausen st. Leehsn.
S. 47 — 8 v. u. l. Moorgründe st. Moorgründe.
S. 51 — 11 v. u. setze *Fries* st. *Koch*.
S. 53 — 9 v. o. l. *Arctostaphylos* st. *Arctostaphilos*.
S. 54 — 3 v. u. setze *R. Br.* st. *L*.
S. 69 — 5 v. u. l. Bingelkraut st. Ringelkraut.

Nachträge und Berichtigungen

zu der

Uebersicht der Flora von Augsburg.

Zusammengestellt

von

C. Roger, Custos am Maximilians - Museum.

1860.

Seit dem Erscheinen der Uebersicht der Flora von Augsburg, enthaltend die in der Umgebung Augsburg's wild wachsenden und allgemein cultivirten *Phanerogamen*, bearbeitet von J. F. Caflisch, sind nachfolgende 57 Pflanzenarten als Bürger unserer Flora aufgefunden worden. Wir haben zwar 51 derselben schon in frühern Berichten mitgetheilt, glauben aber der leichtern Uebersicht halber den Freunden der Botanik mit einer Zusammenstellung dieser Funde einen willkommenen Beitrag zum heurigen Jahresberichte vorzulegen.

NB. Die mit Sternchen bezeichneten Pflanzen sind in den zwei frühern Nachträgen noch nicht aufgeführt.

Anemone ranunculoides. L. April. Gbsch. am Abhange bei Friedberg I. (8^b)

Ranunculus paucistamineus. Gaud. April. Grb. der Lechebene II. 5. (11^b)

NB. Der in der Uebersicht aufgeführte *Ranunculus aquatilis* ist zu streichen, da obige Art als solcher bestimmt, der wirkliche *aquatilis* aber bisher noch nicht aufgefunden wurde

Camelina dentata. Pers. Juli. Aecker bei Friedberg, auch um Bobingen. (65^b)

Teesdalia nudicaulis. R. Br. Mai. Juni. Sandige Aecker nördlich von Lützelburg, doch wurden 1850 nur 3 Exemplare aufgefunden. (67^b)

Viola mirabilis. L. Juli. Gbsch. am Lech beim Jägerhaus, Scherneck gegenüber. (82^b)

- Dianthus prolifer*. L. Aug. Halde bei Au nächst Scherneck I. 3. (95^b)
- Saponaria Vaccaria*. L. Juli, auf einem Acker bei Meidingen gefunden, seit 1850 nicht mehr beobachtet. (100^b)
- Cerastium glomeratum*. Huill. Mai. Lechufer am Ablass, Wolfratshausen etc. II. 3. (126^b)
- C. semidecandrum*. L. Mai. Trockene Abhänge gegen das Schmutterthal bei Hirblingen, auch am Kobel. (126^c)
- C. alpinum*. L. Juni. Hochmoor der Wertachleithe beim Strassberg II. 3. (127^b)
- Elatine Hydropiper*. L. Aug. Weiherufer bei Wellenburg I. 1. (128^c)
- * *Tilia grandifolia*. Ehrh. Wald hinter dem Strassberg. (135^b)
- Geranium pyrenaicum* L. Juni, Juli, in einer Hecke in der Friedberger Au, an der nördlichen Seite der Landstrasse II. 2. (147^b)
- Rosa rubiginosa*. L. Juli. Hecken hinter Leitershofen auf dem Wege zur Alp. I. 1. (240^b)
- Epilobium tetragonum*. L. Juli. Grb an dem Wege von Gablingen gegen Hirblingen; Abzugsgraben des Wellenburger Weihers. (256^b)
- * *Ceratophyllum demersum*. L. in der Schmutter bei Gessertshausen, auch in Altwassern der Aach bei Wolfertshausen. (264^c)
- * *Sedum maximum*. Sut., südlicher Waldsaum des Hammelberges, auch in Hecken hinter Gablingen II. 1. (270^b)
- Libanotis montana*. All. *β. nimor*. Koch. Juli. Lechfeld unweit der Bleiche I. 2. (297^b)
- Caucalis daucoides*. L. Aecker bei Lechhausen I. 1. (311^b)
- Inula hirta*. L. Juni. Lechfeld I. 3. (369^b)
- Senecio nemorensis*. L. Aug. Wertachufer I. 2. (402^b)
- Cirsium acaule*. All. Aug. Miedering. Markt etc. (440^b)
- * *Tragopogon orientalis*. L. überall auf Wiesen. (*T. pratensis*. L., den die Uebersicht aufführt, ist noch nicht bestimmt aufgenommen, und daher vorläufig zu streichen.) (437)
- Hieracium pilosellaeforme*. Hopp. Juni. Lechfeld II. 2. (456^b)
- * *H. pratense*. Tausch. unter Fichtenhecken an der Lindauer Eisenbahn I. 1. (458^b)
- H. aurantiacum*. L. Aug. südlich von Haunstetten gegen Königsbronn, zwar schon dreimal dort gefunden, doch wohl ein Alpenflüchtling. (458^c)

- Polemonium coeruleum*. L. Aug. Im Gebüsch eines entlegenen Wald-
Thales zwischen Muttershofen und Feigenhofen und in Hecken des
letztern Ortes II. 3. (505^b)
- Cuscuta Epilinum*. L. August Leinäcker bei Stadtbergen, Edenbergen
III. 4. (509^b)
- Veronica verna*. L. Mai. Trockene Abhänge gegen das Schmutterthal
bei Hirblingen. (552^b)
- Scrophularia Nesii*. Wirtg. Aug. Ufer der Sinkel bei Bobingen I. 2. (537^d)
- * *Orobanche lucorum*. A. Braun. Am Ablass auf *Berberis vulgaris* L. (562^b)
- Rhinanthus alpinus*. Baumg. Juli. Lechfeld II. 2. (574^b)
- * *Galeopsis bifida*. v. Boeningh. Septbr. Am Fusse des Schlossberges von
Markt, am Wege nach Küllenthal. (600^b)
- * *Utricularia intermedia*. L. Septbr. Lechhauser Moos. (620^b)
- Rumex palustris*. Smith. Aug. Weiher bei Hardt I. 4. (645^b)
- R. Hydrolapathum*. Huds. Aug. Graben bei Oberhausen. (649^b)
- * *Polygonum dumetorum*. L. Höhen bei Derching. (661^b)
- Salix fragilis*. L. An der Wertach, von der Pferseer Brücke abwärts. (687^b)
- Platanthera chlorantha*. Cust. Lechfeld, Lechauen II. 3. (746^b)
- Epipactis rubiginosa*. Gaud. Aug. Lechauen III. 2. (753^b)
- Spiranthes aestivalis*. Rich. Aug. Sumpfige Wiese bei Mühlhausen, nörd-
lich von der Landstrasse I. 3. (757^b)
- Convallaria verticillata*. L. Juli. Bei Schloss Guggenberg I. 1. (766^b)
- Tulipa sylvestris*. L. April. Hecke südlich der v. Lotzbeck'schen Tabak-
mühle I. 3. (770^b)
- Luzula multiflora* Lej. Juni. Laubwälder bei Deuringen und an andern
Orten III. 4. (804^c)
- Heleocharis uniglumis*. Link. Sümpfe am Wege von Lechhausen nach
St. Stephan II. 3. (810^b)
- Scirpus setaceus*. L. Juli. Teich- und Bachränder bei Wellenburg, Hardt,
Kutzenhausen etc. II. 2. (813^b)
- Carex pulicaris*. L. Mai. Lechthalmoor, bei Wolfertshausen. (822^b)
- Setaria verticillata*. Beauv. Juli. Im Garten des Stiftes St. Stephan. (870^b)
- Agrostis canina*. L. Heiden und feuchte Wiesen bei Derching. (881^b)
- Avena fatua*. L. Aug. Aug. Auf Aeckern am Rosenauberge III. 3. (895^b)
- Triodia decumbens*. Beauv. Aug. Trockene Wiesen östlich von Friedberg,
bei Gablingen etc. II. 2. (898^b)

- * *Poa alpina*. L. Juni. Auf Kiesbänken des Lechs I. 2. (902^b)
P. sudetica. Haenke. Juni. Waldthal zwischen Deuringen und Diedorf
 I. 1. (903^b)
Festuca heterophylla. Lam. Juli. Lechauen bei St. Stephan II. 2. (915^b)
F. sylvatica. Vill. Juli. Siebentischwald. (915^c)
Triticum monococcum. L. Aug. Cultivirter Acker bei der Bleiche von
 Haunstetten.

- Elymus europaeus*. L. Aug. Waldrand bei Mühlhausen. (929^b)
Lolium arvense. Schrad. Juli. Aug. Leinacker bei Stadtbergen II. 5. (931^b)

Folgende 3 in der Uebersicht als Bürger aufgenommene Pflanzen sind aus dem Gebiete wieder verschwunden:

1. *Helianthemum Fumana*. Mill.
2. *Ornithopus perpusillus*. L.
3. *Pulmonaria azurea*. Besser.

Zweifelhaft möchte es seyn, ob nachstehende 10 Pflanzen als Bürger unserer Flora zu betrachten sind, da ihr Erscheinen nur sporadisch war, und solche nicht mehr aufgefunden wurden.

1. *Dianthus Seguierii*. Vill.
2. *Sagina apetala*. L.
3. *Melilotus parviflora*. Desf.
4. *Galium saxatile*. L.
5. *Chrysanthemum montanum*. L.
6. *Crepis setosa*. Haller fil.
7. *Anthemis tinctoria*. L.
8. *Teucrium. Botrys*. L.
9. *Polycnemum arvense*. L.
10. *Poa bulbosa*. L.

Ebenso sind folgende 4 Arten zu streichen, indem sie wahrscheinlich früher falsch bestimmt wurden:

1. *Cirsium Erisythales*. Scop.
2. *Pulmonaria mollis*. Wolf.
3. *Populus canescens*. Sm.
4. *Muscari racemosum*. Mill.

5771

5771

New York Botanical Garden Library

QK314 .C32

Caflisch, Johann Fr/Uebersicht der Flora

gen

3 5185 00120 8295