Bibliothèque botanique
ÉMILE BURNAT

Catalogue No 412

Provient de Georg libraire.
payé 1.25 en 1877.

650

†QK314
.W5

1818

E. Volke

CAROLI LUDOVICI WILLDENOW

Societ. Natur. Curios. Halens. sodal.

FLORAE BEROLINENSIS
PRODROMUS

secundum

SYSTEMA LINNEANUM

AB

ILLUSTR. VIRO ac Eq. C. P. THUNBERGIO

emendatum conscriptus.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

cum Tabulis VII. aeri incis.

BEROLINI

IMPENSIS WILHELMI VIEWEGII

1787.

KLOPSTOCK.

*Schoen ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht
Auf die Fluren verstreut, schoener ein froh Gesicht,
Das den grossen Gedanken
Deiner Schoepfung noch einmal denkt.*

PATRI PATRIAE

FRIDERICO WILHELMO II.

Borussorum Regi, Marchioni Brandenburgico,

S. Rom. Imper. Archicamerario & Principi

Electori, Supremo Silesiae Duci,

Supremo Principi Araf.

onensi Neocomi

cet. cet.

DOMINO SUO

LONGE CLEMENTISSIMO

HASCE PRIMITIAS LABORUM
SUORUM

submisit offert

TANTI REGIS

devotissimus cultor

C. L. WILLDENOW.

LECTURIS.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

S.

Offero TIBI B. L. *Tentamen Florae Berolinensis*, quo plantas a me visas, & Amicis benigne communicatas recensui. Haud expectes velim omnium *Florae nostrae* civium enumerationem; quum neque regio circum *Berolinum* ex toto investigata est, neque *Flora* harum regionum scripta existit. Minime me fugit, *Celeberrimos Viros* in describendis plantis *Berolinensibus* defudasse, & libros hoc consilio scriptos existere; sed *Eorum* libri, exceptis novissimis, pro nostris temporibus, vix magni momenti sunt. Omnes indicabo nunc libros ad *Floram nostram* respicientes, ut eo magis supra dicta pateant.

Omniū antiquissimū mihi notus est: *Celeber. Joan. Sigism. ELSHOLT M. D. & horti botanici olim Praefectus Berolini*, qui in libro Suo *) ordine alphabetico, plantas spontaneas, ac hortenses, cum nominibus BAUHINI aliorumque Auctorum, absque tamen loco natali indicavit. Observationes nullas neque medicas neque botanicas addidit, nec etiam breviores descriptiones vel nova ab aliis nondum descripta vegetabilia.

Alter equidem *Celeber. Vir Michel Matthias LUDOLFF M. D. Bot. ac Mat. Med. Profess. ord. olim Berolini in usum auditorum Suorum libellum **)* secundum alphabet-

*) *Joan. Sigism. Elsholtii Flora Marchica, sive Catalogus Plantarum, quae in hortis Electoralibus Marchiae Brandenburgicae, primariis Berolinensi, Aurangiburgico & Potsdamensi excoluntur: partim sua sponte passim proveniunt. Berol. 1663. 8vo. min.*

**) *Michaelis Matthiae Ludolff Catalogus Plantarum &c. Berolini 1746, 8vo. min.*

phabethum conscripfit, quo plantas horti botanici, aequaeac vulgatissimas & officinales cum nominibus TOURNEFORTII, LINNEANISQUE descriptionibus absque tamen locis natalibus indicavit. Adjecta est *Tabula Systematis TOURNEFORTIANI* cum generibus.

Prae aliis excellit multis scriptis *Celeberrimi pie colendi Praeceptoris Joan Gottlieb GLEDITSCHII* liber de *Fungis*, ***) ubi omnes tunc notas fungorum species breviter, cum descriptionibus propriis concinnis, observationibus, locisque natalibus, speciatim indicatis, exposuit. Libellus sui generis praestantissimus, quod post secula adhuc tam utilis erit, quam suo tempore fuit.

***) D. Joan Gottlieb Gleditsch Lips. *Methodus Fungorum &c.* Berolini 1753. 8vo. min.

Minus nostro scopo adaequatum videtur, liber ****) *Pharmacopei olim aulici C. F. ARNSTORFF* qui in illo plantas officinales sua sponte provenientes pro Tyronibus Pharmaceuticae artis recensuit, loca natalia, nominaque LINNEANA brevissime indicavit.

Denique liber novissime ab *Amico conjunctissimo Frid. Wilhelmo Ant. LÜDERS M. D. & Practico apud Havelbergenses felicissimo ******) huc pertinet. In illo plantas *Marchicae Brandenburgicae Electoralis* secundum systema *Praeceptoris* nostri *b. m. J. G. GLEDITSCHII* enumeravit. Sed dolendum est, nomina tantum, nec observationes,

****) *Comparatio Nominum Plantarum officinalium cum nominibus botanicis Linnei & Tournefortii. Berolini 1762. 8vo maj. (etiam cum Titulo vernaculo.)*

*****) *Frid. Wilhelm Ant. Lüders M. D. & Pract. Havelberg. Nomenclator botanicus stirpium Marchiae Brandenburgicae, secundum systema Gleditschianum a statiminum situ digestus. Berolini 1786. 8vo maj.*

nes, nec loca natalia eum indicasse. Opto
& mecum forsan omnes *Florae Marchicae*
cultores, eum integrum editurum libellum.

Haec sunt mihi nota scripta, quae ut jam
dixi, ad Floram nostram pertinent, & unde
facile L. B. animadvertes, *Floram* agri *Bero-*
linensis adhuc eo usque desideratam fuisse;
periculum itaque feci in edenda *Flora*. Te-
nuitatem virium ad hunc laborem minus ap-
tam fatis sentio, sed *Amicis* suafus hancce
suscepi libellum. Indulgas itaque LECTOR
AMICE si opinioni hoc de opusculo TIBI
facta, haud respondeam. Mihi sufficiens erit,
si modo quid ad augmentum scientiae feci.

Systema quod elegi est *Systema LIN-*
NEANUM ab *Illustr. Equite & Professore*
C. P. THUNBERGIO emendatum, quo usus
est, quum *Floram Suam Japonicam* ederet.
Perinde semper erit quodnam *Systema* eligi-

mus, nam *Systema* est: *filum Ariadneum*,
cujus ope Labyrinthum facile exire possu-
mus, quo demto semper Chaos erit. Quod
de *Systemate Naturae* nonnulli somniant,
semper pium manebit desiderium. Si vel
omnia terrae nostrae vegetabilia detecta es-
sent, tamen impossibile erit *Systema Na-*
turae investigare. *Alma enim Natura*, in
se spectata, non est *systematica*, non *Ge-*
nera habet, neque *catenam rerum* agnoscit.
Singula Creatura nexu quasi retiformi, ut ita
dicam cohaerent, & Nos singula in lineam
rectam disponere solemus, qua methodo
haud utitur *Natura*. Non ignoro *Systema*
LINNEANUM emendatum adhuc imper-
fectum esse, sed ubi quaeso reperitur *Syste-*
ma omni numero absolutum? *Systema b.*
m. J. G. GLEDITSCHII, *Praeceptoris mei*,
LINNEANO praefendum esse in quibus-
dam

dam agnosco; sed etiam ut LINNEANUM *Systema* sigillum humanitatis prae se fert. Lubenter istud secutus essem, nisi *Ordines* nimis prolixi, & frequentes ob minorem *Classium* numerum essent, & *Tyrone* legenti, cui bono praecipue hunc librum scripsi, facile fastidium crearet. Quodsi *Systema* LINNEI suis cum viginti quatuor *Classibus* elegissem, tres ultimae *Classes*, ejusdem difficultatis causam praebuissent. Ingenue quidem fateor, dari plantas constanter diclinas, quarum sexus nunquam mutatur, e. g. *Quercus*, *Corylus* cet, numerus vero earum tam magnus non est, ut propriam mereantur *Classem*, quum faciliiori modo, secundum staminum numerum aliis in *Classibus* deprehenduntur. Plura de quatuor ultimarum *Classium* inconstantia *Amicus venerabilis noster*, supra jam nominatus *Illustr. C. P.*

THUNBERG in *Flora sua Japonica* adduxit.

In dispositione *Graminum Recentiores Botanicos* secutus sum, & nonnulla genera eo reduxi, ubi locum eorum proprium occupant. Sic *Melicae* genus sub *Airam* posui, ob rudimentum tertii floris rarissime duntaxat observatum; quum etiam nonnullae, & fere omnes *Airae* species, si loco nimis pingui crescunt, tale rudimentum, interdum etiam integrum florem producunt.

Umbelliferarum familiam exceptis nonnullis mutationibus necessariis, cum *Illustr.* LINNEO enumeravi. Novissimae mutationes non tam constantes sunt, ut illas sequi potuissem. Optandum foret, ut observationes certiores de genera eorum instituerentur. Reliquis in Classibus interdum
quac-

quaedam mutavi, ubi necessitas id requirebat, quin tamen difficilis redderetur, methodus electa.

Cryptogamiam praecipue quoad *Muscos*, secundum *Celeberrimi* ac *Amicissimi* D. HEDWIGII detecta disposui. *Filices* vero ad LINNEI systema enumeravi. In *Algis & Fungis*, Recentiorum Botanicorum dispositionem secutus sum. *Lichenum* genus in plura divisi, quum sane non omnes quos LINNEUS *Lichenes* dixit, hujus generis sint; dispositionem *Celeber. WIGGERSII* servavi, licet nonnulla mutaverim, quia *Ille* interdum ob formam externam *Lichenes* novo sub genere complectitur. E Fructu illorum genera disposui, quia optime, ut puto ex illo distinguitur. In fungis GLEDITSCHIIUM & alios secutus sum, servatis vero nominibus LINNEANIS. Lubenter *Celeber.*

ber. BATSGHIUM optimum fungorum scrutatorem elegissem, nisi saepius nomina, jam ab aliis fungis data, deficiente ratione mutasset, & *Synonima* tam pauca adduxisset.

Nomina ab *Illust.* LINNEO vegetabilibus tributa in tantum servavi, in quantum confusio non metuenda. e. g. *Spergulae pentandrae* nomen mutavi, & istam plantulam *Spergulam vernalem* nuncupavi, ob defectum quinque flaminum. Ubi vero LINNEO plantae descriptae deficiebant, nomen antiquissimum assumsi. Novis vero plantis secundum regulas *Philosophiae botanicae* nomina dedi.

Semel necessarium duxi novum nomen pro fructificationis parte conficere, est istud: *Indusium*, quo nomine integumentum, quod totum florem, & postea fructum, tanquam

fac-

sacculo in *Filicibus* v. g. in *Equiseto*, *Polypodio* cet. includit, intelligo. ~

Synonima pauca tantum, & quidem ad plantarum determinationem necessaria citavi. Frequentiora in *Cryptogamia*, ob difficilium hujus Classis studium invenies. Præcipue libros anglicos indicavi, quos ex ditissima Sua bibliotheca benigne mihi communicaverat *Celeber. Profess. J. R. FORSTER*.

In tabulis aeneis plantas partim novas, partim haud satis determinatas pingi curavi. Cetera opus docebit.

Denique omnibus Florae nostrae amicis, qui observationes suas mecum communicarunt, gratias maximas publice solvo. Inter omnes SPRENGELIO *Rectori Scholae Spandaviae* sagacissimo vegetabilium scrutatori, insignem numerum plantarum in regionibus Spandaviensibus sponte nascentium, debeo.

HERMES *Juvenum Nobilium Clementiss.*
REGINAE VIDUAE *Educator*, quem diu
tanquam amicum sincerrimum, conjunctis-
simumque veneror, mihi acutissimas obser-
vationes benigne communicavit. KOCH
fratrum Bohemiae olim Chirurgus, nunc
Præcticus Gnadaviae nonnulla loca planta-
rum specialia mihi suppeditavit.

Tu Benigne Censor, si forsan uno alte-
rove me errasse invenies, memor sis rogo
versiculi *Horatiani*.

Vive, Vale, si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti, si non his utere mecum.

CLASSIS I.
M O N A N D R I A
M O N O G Y N I A.

HIPPURIS *Lin. gen. 11.*

Calyx superus minimus. *Corolla* O. *Stamen*
stigmatē infertum. *Semen*. I.

1. HIPPURIS *vulgaris* foliis octonis subulatis *Lin.*
suppl. p. 81.

In aquis stagnantibus bey den Zeltern; prope
Charlottenburg, *Spandau auf der Freiheit*
passim. Majo.

Planta gynandra. *Calyx* vix absque lente vi-
sibilis.

CHARA *Lin. gen. 1127.*

- ♂ — ♀. ♂. *Calyx* & *Corolla*. O. *Anthera* sphaeri-
ca. *Fil.* O.

♀ *Calyx* 3. 4 phyllus *Cor.* O. *Stigm.* 5 fidum
Capsula polysperma.

2. CHARA *vulgaris* caulibus lævibus, foliis interne
dentatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 90.* *Hedwig*
Theoria pl. crypt. 125. tab 32. 33.

In fossis inter *Strahlow* & *Rummelsburg* inque
Grunewald copiose. Junio. Julio.

DIGYNIA.

CALLITRICHE *Lin. gen. 13.*

♂—♀. *Calyx* 0. *Petala* 2. *Capsula* bilocularis.

3. *CALLITRICHE verna*; foliis apice integris.

Callitriche verna foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 10.*

β. Foliis omnibus lanceolato-ovatis.

In fossis aquisque stagnantibus copiosissime. Varietas β. *in den Papenberggen in via inferiore* frequens & alibi rarius. Vere, interdum autumno.

4. *CALLITRICHE autumnalis* foliis apice bifidis.

Callitriche autumnalis foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis *Lin. syst. ed. R. I. p. 11.*

β. Foliis superioribus ovalibus, inferioribus linearibus, omnibus apice bifidis.

Im *Grunewald* præcipue *in der Hundskæhle* rarius. β. rarissima. Julio. Augusto.

Foliorum apex tantum has species distinguit, quum figura valde variabilis est. Sexus vix etiam ad has distinguendas sufficit, ob flores sæpe monoicos.

CLASSIS II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

a. Flores apetalis.

LEMNA Lin. gen. 1130.

♂—♀. Cal 1. phyllus. Cor. O. Capsula 1 locularis polysperma.

5. LEMNA *trifulca*; foliis lanceolatis petiolatis
Lin. *syft. ed. R.* 4. p. 92.

In aquis quietis *im Thiergarten, Grunewald,*
prope *Spandau* & alibi frequens. Junio.

6. LEMNA *minor*; foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis Lin. *syft. ed R.* 4. p. 92.

In aquis stagnantibus inter sequentem passim.
Julio.

7. LEMNA *gibba*; foliis sessilibus subtus hemisphæricis, radicibus solitariis Lin. *syft. ed. R.* 4. p. 93.

In fossis, lacubus, aquisque quietis, copiose.
Junio. Julio.

8. LEMNA *polyrhiza*; foliis sessilibus radicibus confertis Lyn *syft. ed R.* 4. p. 93.

Iisdem locis, & prope *Spandau* rarius. Julio.

SALIX. *Lin. gen.* 1201.

♂—♀. ♂. *Amentum* imbricatum. *Cal.* squamæ 1
floræ *Cor.* O. *Nectar* glandula baseos.

♀. *Ament.* *Cal.* & *Corolla* maris *Styl.* 2 fidus
Capfula 2 valvis 1 locularis *Semina* papposa.

* *Foliis glabris ferratis.*

9. *SALIX triandra*; foliis oblongo-lanceolatis, ferratis glabris, floribus triandris.

Salix triandra foliis ferratis glabris, floribus triandris *Lin syst. ed. R.* 4. p. 223.

Im *Thiergarten* & prope *Spandau an der Chaussee* rarius. Majo.

Fruticem femineum nondum vidi.

10. *SALIX pentandra*; foliis ovatis, acutis, ferratis, glabris, floribus pentandris.

Salix pentandra foliis ferratis, glabris, floribus pentandris. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 223.

Salix laurea polyandra Gled. vid. *Lüders Nomenclator. fl. march.* p. 4.

Im *Thiergarten* & versus *Falckenhagen* passim. Majo.

Nffic. *Cortex Salicis laureæ.*

11. *SALIX vitellina* foliis ferratis, ovatis, glabris: ferraturis cartilagineis, petiolis calloso punctatis *Lin syst. ed R.* 4. p. 224.

Inter *Pancko* & *Gesundbrunnen*, im *Thiergarten* alibique passim Aprili.

12 *SALIX amygdalina* foliis ferratis, glabris, lanceolatis, petiolatis, stipulis trapeziformibus. *Lin. syst. ed R.* 4. p. 224.

Marem

Im *Thiergarten*, & alibi rarius. Aprili.

Marem nondum legi. Numme femina *Salicis triandræ*?

13. *SALIX fragilis* foliis ferratis, glabris, ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Linn. syst. ed. R. 4. p. 125.*

Prope *Pancko*, *Schænhausen*, *Unterbaum* & alibi frequens. Aprili.

Offic. Cortex *Salicis fragilis*.

14. *SALIX Helix* foliis lineari-lanceolatis ferratis, glabris, armentis tamentosis: floribus monandris.

Salix Helix foliis ferratis, glabris, lanceolato-linearibus: superioribus oppositis obliquis. *Lin syst ed R. 4. p. 226.*

Mas ad fossas versus *Pancko* & *Schænhausen* olim frequens, nunc rarius. Fœmina ad *Spandau* an der *Chaussée* passim. Aprili.

* * *Folii integerrimis villosis.*

15. *SALIX aurita* foliis integerrimis utrinque villosis, obovatis, appendiculatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 230.*

Locis humidis im *Thiergarten*, *Jungfernheyde* & prope *Spandau* frequens. Aprili.

16. *SALIX arenaria* foliis integris, ovatis, acutis, superne subvillosis, subtus tomentosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 231.*

In pratis humidis, arenosis, inter *Pancko*, & *Gesundbrunnen*; prope *Schænhausen*, *Spandau*, & alibi frequens. Aprili.

Autumno præcipue Augusto, Septembri iterum
flores profert.

17. *SALIX incubacia* foliis integerrimis lanceolatis,
subtus villosis nitidis, stipulis ovatis, acutis.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 231.

Ante portam Halensem passim. Aprili.

18. *SALIX rosmarinifolia* foliis integerrimis, lanceolato-linearibus, strictis sessilibus subtus tomentosis *Lin. syst. ed. R. 4. p. 232.*

Ad latera fossarum in der Jungfernheyde, & prope Spandau passim. In turfosis des Grunewaldes frequens. Aprili.

*** *Foliis subserratis villosis.*

19. *SALIX Caprea* foliis, ovatis, rugosis: subtus tomentosis, undatis, superne denticulatis *Lin. syst. ed. R. 4. p. 232.*

In nemorosis humidis copiose. Aprili.

20. *SALIX viminalis* foliis subintegerrimis, lanceolato-linearibus, longissimis, acutis, subtus sericeis, ramis virgatis *Lin syst ed R. 4. p. 233.*

Ad ripas fluminum & humidis locis infrequens.

Plantata frequens in Thiergarten & prope Spandau. Aprili. Majo.

21. *SALIX alba* foliis lanceolatis, acuminatis, serratis, utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 234.*

In viis publicis copiose. Aprili.

Offic. Cortex Salicis albæ. (Folia.)

FRAXINUS *Lin. gen.* 1273.

♂—♀. *Calyx & Corolla O. Sem.* 1. lanceolatum, alatum.

22. FRAXINUS *excelsior* foliolis ferratis, floribus apetalis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 356.*

In via versus *Schoenwald* prope a ponte passim, & in *Thiergarten* frequens. Aprili.

Arber dioica. Nunquam flores hermaphroditos vidi.

Offic. Cortex Fraxini (*Lignum. Folia Semina* sub nomine *Lingua avis.*)

b. Flores petaloidei, rotati.

LIGUSTRUM *Lin. gen.* 18.

Cor. 4 fida. Bacca 4 sperma.

23. LIGUSTRUM *vulgare* foliis ovatis obtusis; panicula simpliciter trichotoma. *Thunb. fl. jap. 17.*

Ligustrum vulgare. Lin. syst. ed. R. 1. p. 18.

In *Thiergarten* passim. Junio.

Offic. (*Folia & Flores Ligustri.*)

SYRINGA *Lin. gen.* 22.

Corolla 4 fida. Capsula 2 locularis.

24. SYRINGA *vulgaris* foliis ovato cordatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 20.*

β. Lilac flore albo *Tournef. inst. 601.*

In dumetis & sepibus frequens. Majo.

CIRCAEA *Lin. gen.* 25.

Cal. 2. phyllus superus. Cor. 2 petala Capsula bilocularis, bivalvis, disperma.

25. *CIRCAEA Lutetiana* foliis cordato-ovatis, subferratis, pubescentibus.

Circaea lutetiana caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 23.*

Locis umbrosis *im Thiergarten* ad viam versus *Chariottenburg* passim. Julio. Augusto.

VERONICA *Lin. gen. 26.*

Corolla limbo quadripartito: lacinia infima angustiore. Capsula bilocularis, obcordata.

* *Spicatae.*

26. *VERONICA maritima* spicis terminalibus, foliis oblongo-lanceolatis, inaequaliter ferratis.

Veronica maritima spicis terminalibus, foliis ternatis, inaequaliter ferratis. *Lin. syst. ed. R. p. 24.*

Prope *Spandau auf dem Werder*, & *hinter dem Gewehrplan*, ad ripas *der Spree* prope *Strahlow* passim. Julio. Augusto.

Variat foliis ternis, quaternis, & simpliciter oppositis. Foliis inaequaliter ferratis, hanc *Veronicae* speciem a *Veronica spuria* distinguit *Linneus*. Interdum vero folia aequaliter serrata, & in *V. spuria* semper incisurae foliorum inaequales sunt. Differt itaque *V. spuria* a. nostra, foliis lineari-lanceolatis, inaequaliter incis, vel si mavis, foliis interrupte pinnatifidis.

27. *VERONICA spicata* spicis terminalibus, foliis oppositis, crenatis, obtusis, caule adscendente simplicissimo. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 25.*

In ericetis *der Jungfernheide*, *des Grunewalds*, *der Papenberge* &c. frequens. Julio. Augusto.

Non

Nonnunquam caulis vix digitalis, & folia pubescentia sunt.

28. *VERONICA officinalis* spicis lateralibus, foliis oppositis, caule procumbente *Lin. syst. ed. R. I. p. 26.*

Locis nemorosis frequens Junio. Julio.

Offic. Herba Veronicae.

*** Corymboso . racemosae.*

29. *VERONICA serpillifolia* racemo terminali subspicato, foliis ovatis, glabris, crenatis *Lin. syst. ed. R. I. p. 29.*

In pratis humidis passim. v. g. prope *Schoenberg, Reineckendorf &c.* Majo.

30. *VERONICA Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis, planis, caule repente. *Lin. syst. ed. R. I. p. 30.*

In fossis inter *portam Halensem & Lipsiensem*, in rivulis *beym Gesurdbrunnen*, & ad scaturigines *in der Jungfernheide* frequens. Junio. Julio.

Offic. Herba Beccabungae recens.

31. *VERONICA Anagallis* racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. I. p. 30.*

β. racemo unico, foliis lanceolatis, crenatis.

In fossis, ante *portam Halensem im Aufstall*, *in der Jungfernheide* aliisque locis frequens.

α. in turfosis inundatis in der Jungfernheide. Junio.

In varietate *β. caulis vix digitalis, glaber, superne parum pilosus; folia lineari-lanceolata ob-*

folete crenata racemus unicus, quadri florus.
Corolla albida, apicibus rubicundis.

32. VERONICA *scutellata* racemis lateralibus alternis, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 30.*

In fossis ad *Reineckendorf*, *Spandau*, alibique frequens. *Hinterm Gesundbrunnen* copiose. Julio.

33. VERONICA *Teucrium* racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis, dentatis, obtusiusculis, caulibus procumbentibus *Lin. syst. ed. R. 1. p. 31.*

In coemeteriis ad *Pancko*, *Lüzow* similibusve locis frequens. Junio,

Variat caule adscendente, & procumbente.

Offic. (Herba Veronicae Teucris folio.)

34. VERONICA *prostrata* racemis lateralibus, foliis oblongo-ovatis ferratis, caulibus prostratis *Lin. syst. ed. R. 1. p. 32.*

In nemorosis frequens, praecipue in *der Juugfernheide* & *Thiergarten*. Majo. Junio.

Petala acuta.

35. VERONICA *Chamaedrys* racemis lateralibus, foliis ovato-fessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 33.*

Iisdem locis copiose. Majo. Junio.

Petala subrotunda.

*** *Pedunculis unifloris.*

36. VERONICA *agrestis* floribus solitariis; foliis cordatis, plerisque fessilibus, incisis, pedunculo brevioribus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 35.*

In

In agris, locisque cultis passim. Aprili.

37. *VERONICA arvensis* floribus solitariis; foliis cordatis, petiolatis, incisfis, pedunculo longioribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 36.*

Iisdem locis rarius. Aprili.

38. *VERONICA heredifolia* floribus solitariis; foliis cordatis planis, quinquelobis *Lin. syst. ed. R. I. p. 36.*

In agris, arvis, hortis, locisque cultis copiose. Aprili. Interdum autumnno.

39. *VERONICA triphyllos* floribus solitariis; foliis digitato partitis, pedunculis calyce longioribus *Lin. syst. ed. R. I. p. 37.*

In agris, versuris, inque hortis vulgaris. Aprili.

40. *VERONICA verna* floribus solitariis; foliis digitato partitis, pedunculis calyce brevioribus *Lin. syst. ed. R. I. p. 37.*

In collibus siccis, agris, & arvis arenosis. e. g. prope *Charlottenburg*, *Spandau*, & ante portam *oranienburgicam* haud infrequens. Aprili.

41. *VERONICA acinifolia* floribus pedunculatis solitariis, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto subpilofo *Lin. syst. ed. R. I. p. 38.*

In agris prope *Spandau* ante portam *Charlottenburgicam* ibidem passim. Aprili. Majo.

c. Flores, nectario calcarato.

ORCHIS. *Lin. gen. 1094.*

Nectarium corniforme pone florem.

* *Bul.*

* *Bulbis indivisis.*

42. *ORCHIS bifolia* bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus *Lin. syst. ed. R. 4. p. 5.*

In nemoribus umbrosis humidis; *in den Papenberg* passim. In pratis humidis apricis ad *Rummelsburg* infrequens. Majo. Junio.

Offic. (Radix Sa'yrii.)

43. *ORCHIS Morio* bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 8.*

In pratis versus *Steglitz* passim. Majo. Junio.

44. *ORCHIS militaris* bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluentibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 10.*

Prope *Spandau* in pratis inter agros *bei der Nachthütung* hinc, inde. Majo.

Offic. Radix Salep.

** *Bulbis palmatis.*

45. *ORCHIS latifolia* bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio trilobo lateribus reflexis, bracteis flore longioribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 12.*

β. *Orchis palmata pratensis maculata Bauh pin. 85.*

γ. *Orchis palmata palustris altera & tertia Bauh pin. 86.*

δ. *Orchis palmata palustris latifolia Bauh pin. 86.*

ε. *Orchis palmata maculata Bauh. pin. 86.*

ζ. Corolla rosea a *Leysser halensj. ed. 2. n. 911.*

In omnibus fere pratis vulgaris. Majo.

46. *ORCHIS maculata* bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus brevior; labio plano; petalis dorsalibus patulis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 13.*

Inter praecedente passim. Majo.

Offic. (Radix Palmatae.)

47. *ORCHIS conopsea* bulbis palmatis, nectarii cornu fetaceo germinibus longior: labio trifido; petalis duobus patentissimis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 14.*

Prope *Spandau* in pratis *hinter der Nachthütung* passim. Majo. Junio.

SATYRIUM Lin. gen. 1095.

Nectarium scrotiforme, f. inflato didymum pone florem.

48. *SATYRIUM repens* bulbis fibrosis, foliis ovatis, radicalibus, floribus secundis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 20.*

β. *Orchis* radice repente, foliis maculis nigris, & albis adsperfis *Mentz pug. t. 3. f. 4. 5.*

In sylvaticis prope *Tegel* passim. Augusto.

OPHRYS Lin. gen. 1096.

Nectarium subtus carinatum.

* *Bulbis ramosis.*

49. *OPHRYS, Nidus avis* bulbis fibroso-fasciculatis caule vaginato aphylo, nectarii labio bifido. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 21.*

In nemorosis umbrosis, ad radices Alnorum & Coryli parasitica, in den Papenbergem passim. Majo. Junio.

50. OPHRYS *spiralis* bulbis aggregatis oblongis, caule subfoliofo, floribus spirali-secundis, nectarii labio indiviso crenulato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 22.*

In pratis ad Rummelsburg rarius Augusto. Julio.

51. OPHRYS *ovata* bulbis fibrosis, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 22.*

β. Ophrys trifolia *Bauh. pin. 87.*

Locis paludosis im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. (Herba Bifolii.)

** *Bulbis rotundis.*

52. OPHRYS *paludosa* bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono, foliis apice scabris, nectarii labio integro. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 24.*

Locis turfosis im Grunewald passim. Julio. Augusto.

Variat, foliis nigro variegatis.

SERAPIAS *Lin. gen. 1097.*

Nectarium ovatum gibbum, labio ovato.

53. SERAPIAS *latifolia* bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 28.*

Im Thiergarten ad venatorem aulicum locis humidis frequens. In den Papenbergem copiose. Junio.

54. *SERAPIAS Louchophyllum* bulbis fibrosis, foliis ovato-lanceolatis, bracteis longitudine capsulae, floribus erectis: nectarium labio obtuso petalis brevior. *Lin. suppl. pl.* 405.

Serapias grandiflora bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarium labio obtuso petalis brevior. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 30. a.*

In pratis versus *Hasenheide* frequens, & prope *Spaudau* passim. Junio.

55. *SERAPIAS rubra* bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis nectarium labio acuto. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 32.*

In den *Papenberg* passim, ad *Tegel* novo in plantario frequens. Julio.

Pinguicula *Lin. gen.* 33.

Calyx 2 labiatus quinquefidus. *Corolla* ringens calcarata. *Capsula* unilocularis.

56. *Pinguicula vulgaris* nectario cylindrico longitudine petali. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 50.*

In pascuis *hinter der Fasanerie* ad viam versus *Grunewald* passim. Majo. Junio.

Utricularia *Lin. gen.* 34.

Cal. 2 phyllus aequalis. *Cor.* ringens calcarata. *Capsula* unilocularis.

57. *Utricularia vulgaris* nectario conico, scapo paucifloro *Lin. syst. ed. R. 1. p. 51.*

Inter *Friedrichsfelde* & *Strahlow*, im *Grunewald* & *Jungfernheide* frequens in fossis. Julio.

58. *Utricularia minor* nectario carinato. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 51.*

Prope

Prope venatorem *Philipp in der Jungfernheide*
locis humidis turfosis frequens, ibidem prope
pontem destructum passim. Junio.

d. Flores monopetali sublabiati.

GRATIOLA. *Lin. gen.* 30.

Calyx 7 phyllus: 2 exterioribus patulis. *Cor.*
irregularis resupinata. *Stam.* 2 sterilia. *Cap-*
sula bilocularis.

59. GRATIOLA *officinalis* foliis lanceolatis ferratis,
floribus pedunculatis. *Lin. syst. ed R. i. p.* 47.
In pratis humidis frequens. v. g. ante portam
Halensem im Aufstall. vorm Unterbaum, prope
Spandau &c. Julio.

Offic. Herba Gratiolae. (*Gratia Dei.*)

VERBENA *Lin. gen.* 35.

Calycis dens unicus truncatus. *Cor.* infundibuli-
formis subaequalis curva. *Stamina* saepius 4
Sem. 4. nuda.

60. VERBENA *officinalis* tetrandra, spicis filiformi-
bus paniculatis, foliis multifido laciniatis, caule
solitario. *Lin. syst. ed R. p.* 55.

Ad pagos, locis ruderatis frequens. Julio.
Augusto.

Offic. Herba Verbenae.

LYCOPUS *Lin. gen.* 36.

Corolla 4 fida: lacinia unica emarginata. *Sta-*
mina distantia. *Semina* 4. retusa.

61. *LYCOPUS europaeus* foliis sinuato-ferratis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 6.

Ad *Schoenberg, Rummelsburg, Charlottenburg, Spandau* & alibi in pratis humidis inque fossis frequens. Julio.

SALVIA *Lin. gen. 42.*

Corolla ringens inaequalis. *Filamenta* transverse pedicello affixa.

62. *SALVIA pratensis* foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 65.*

β. *Horminum pratense*, foliis profunde incis. *Bauh. pin. 238.*

γ. *Flore albo.*

Ad viam versus *Britz, an den Rollbergen, in der Spandauerheide* ad littora der *Havel* & alibi copiose. Variet. β. & γ. rarius. Junio.

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM *Lin. gen. 46.*

Cal. Gluma 2. valvis, 1 flora. *Cor. Gluma* 2. valvis acuminata. *Sem. I.*

63. *ANTHOXANTHUM odoratum* spica oblongo-ovata, flosculis subpedunculatis aristis longioribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 74.*

In pascuis, pratis, locis nemorosis, & alibi copiose. Aprili. Majo.

CLASSIS III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

a. Flores superi.

VALERIANA Lin. gen. 48.

*Cal. O. Cor. I. petal. basi hinc gibba. Semen I.** *Legitimac semine papposo.*

64. VALERIANA *dioica* floribus triandris dioicis, foliis radicalibus subintegris & pinnatifidis, caulinis pinnatis: pinnis integerrimis.

Valeriana dioica floribus triandris dioicis, foliis pinnatis, integerrimis Lin. *syst. ed. R. I. p. 85.*

In pratis humidis *im Thiergarten, Jungfernheide* & alibi copiose. Majo.

Flores apud nos semper dioici, rarissime hermaphroditi. *Celebr. Scopoli* semper hanc plantam, floribus hermaphroditis, uno alterove sexu castrato vidit.

65. VALERIANA *officinalis* floribus triandris foliis uniformibus pinnatis: pinnis dentatis.

Valeriana officinalis floribus triandris, foliis omnibus pinnatis Lin. *syst. ed. R. p. 86.*

In nemorosis humidis, e. g. ante *portam Halensem im Aufstall*, prope *Spandau* & alibi passim. Junio.

Offic. Radix Valerianae minoris.

** *Locustae, caule dichotomo, semine nudo.*

66. *VALERIANA olitoria* floribus triandris, caule dichotomo, foliis oblongis integerrimis, fructu simplici.

Valeriana Locusta olitoria floribus triandris, fructu simplici. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 89. α.*

- β. Foliis superioribus, ad basin versus obsolete dentatis.

In agris, arvis, locisque cultis frequens. Varietas β. rarius. Majo.

67. *VALERIANA dentata* floribus triandris, caule dichotomo, foliis ferratis oblongis, semine tridentato.

Valeriana Locusta dentata caule dichotomo, foliis oblongis subferratis, semine corona tridentata.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 89. ι.

In agris ad *Spandau* frequens. Majo.

Valerianas caule dichotomo, semine pappo destituto, sub nomine *Locustae* amplectitur *Linneus*; etsi omnes ab *Illo* indicatae varietates, specie differunt. Hac de re, nomen hoc delevi, et eo ad genus subdividendum utor. *Perrill Haller, Pollich* & alii sub nomine *Valerianellae* genere separarunt, lubenter eos, haud nego secutus essem, nisi natura ipsa, maximam ob affinitatem, aliis cum speciebus, hoc vetaret.

IRIS. Lin. gen. 65.

Corolla 6. partita: petalis alternis reflexis.

Stigmata 3. partita, petaliformia.

68. *IRIS Pseudacorus* corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 107.*

In paludibus, fossisque uliginosis. v. g. *im Thiergarten, Jungfernheyde* & alibi frequens. Majo.

Offic. (Radix Iridis nostratae. f. Acori palustris.)

69. *IRIS sibirica* corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule tereti, foliis linearibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 108.*

Locis paludosis in den Papenberg passum, & prope Rummelsburg rarius. Majo.

b. Flores inferi.

POLYCNEMUM *Lin. gen. 59.*

Calyx persistens, 5 phyllus; foliolis 2 alternis minoribus. *Corolla* nulla. *Semen* 1. membrana tenuissima vestitum.

70. *POLYCNEMUM arvense* caule diffuso, foliis triangularibus.

Polycnemum arvense. Liu. syst. ed. R. I. p. 96.

In agris editioribus inter den Rollbergen, & Hasenheide frequens. Ante portam Halensem & versus Pancko rarissime. Augusto.

c. Gramina, spicis dense imbricatis.

SCIRPUS *Lin. gen. 73.*

Cal. 1. valvis: glumis paleaceis undique imbricatis. *Cor.* O. *Sem.* 1. imberbe triquetrum, fetis circumdatum.

* *Spica*

* *Spica unica.*

71. *SCIRPUS palustris* culmo tereti nudo, spica subovata terminali. *Lin. syst. ed. R. I. p. 130.*

In fossis, locisque inundatis ante portam Halensem, im Thiergarten, vorm Unterbanm, & alibi frequens. Majo. Junio.

72. *SCIRPUS Boeothryon* culmo tereti striato nudo basi vaginato, vagina truncata, spica terminali pauciflora bivalvi; valvulis ovatis spica brevioribus margine scariosis: exteriori breviori *Lin. suppl. pl. p. 103.*

Ab amico accepi, sed locus natalis me fugit. Forte ante portam Halensem im Aufstall, vel im Grunewald. Junio.

73. *SCIRPUS acicularis* culmo tereti nudo setiformi, spica ovata bivalvi, feminibus nudis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 132.*

Ad paludes in der Jungfernheide bei den Rehbergen frequens. Julio. Augusto.

74. *SCIRPUS caricis* culmo nudo subtriquetro, spica disticha involucri monophyllo. *Retzii prodrom. fl. scand. n. 56.*

Schoenus compressus culmo subtriquetro folioso, spica disticha, spiculis multifloris, involucri monophyllo. *Huds. angl. ed. 2. p. 15. n. 4. Lin. syst. ed. R. I. p. 121.*

In der Jungfernheide, in pratis hinter Staaken, prope Spandau vor Haaks Meyerei, & alibi passim. Junio.

** *Culmo tereti polystachyo.*

75. *SCIRPUS lacustris* culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 132.*

α. *Scirpus palustris altissimus.* Scheuchz. agrost. 354.

β. *Scirpus palustris humilior.* Scheuchz. agrost. 356.

Ad ripas inundatas *der Spree & Havel* frequens v. g. prope *Rummelsburg, Strahlow, Tegel, Spandau* &c. β. *in der Jungfernheide* locis paludosis passim. Julio. Augusto.

76. *SCIRPUS setaceus* culmo nudo setaceo, spica terminali sessili. *Lin. syst. ed. R. I. p. 134.*

In humidiusculis ad *Schoeneberg*, hinter *Falkenhagen*, in via versus *Bredow* passim. Julio. Augusto.

*** *Culmo triquetro, panicula foliacea.*

77. *SCIRPUS sylvaticus* culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 139.*

In den *Papenbergen*, & im *Grunewald* frequens. Majo. Junio.

TYPHA *Lin. gen. 1131.*

♂—♀. ♂. *Ament. cylindricum. Cal. 3 phyllus fetaceus. Corolla nulla.*

♀. *Ament. Cal. & Cor. maris. Semen 1. Pappus inversus capillaris.*

78. *TYPHA latifolia* foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 94.*

In paludibus ad *Tegel, Briselang, & in der Jungfernheide* alibique frequens. Julio.

79. *TYPHA angustifolia* foliis semicylindricis, spica mascula femineaque remotis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 94.*

In der *Jungfernheide, Grunewald*, in parco ad *Doebritz & alibi* frequens. Julio.

ERIOPHORUM. Lin. gen. 74.

Cal. 1. valvis: glumis paleaceis undique imbricatis. Cor. O. Sem. 1. lana longissima cinctum.

80. *ERIOPHORUM vaginatum* culmis vaginatis teretibus, spica scariosa. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 142.*

α. *Juncus alpinus* capitulo tomentoso majori. *Scheuchz. agrost. app. tab. 7. f. 2.*

β. *Juncus alpinus* capitulo lanuginoso, seu *Schoenolagurus*. *Scheuchz. agrost. app. t. 7. f. 1.*

In humidiusculis turfosis in der *Jungfernheide, im Grunewald, Spandauerheide*, prope den *Teufelssee*, inter *Schoeneberg & Fasanerie* abunde. Aprili. Majo.

81. *ERIOPHORUM polystachyon* culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 143.*

β. *Linagrostis* panicula minori. *Vaill. parif. tab. 16. fig. 2.*

7. *Linagrostis pappo rariori*. *Scheuchz. agrost.*
p. 308.

In uliginosis turfosis in der Jungfernheide, Grunewald, & alibi copiose. Aprili. Majo.

SCHOENUS *Lin. gen.* 71.

Cal. 1. valvis: glumis paleaceis congestis. *Cor.* O.
Semen 1. subrotundum.

82. *SCHOENUS albus* culmo subtriquetro folioso,
floribus fasciculatis, foliis setaceis. *Lin. syst.*
ed. R. 1. p. 122.

In turfosis des Grunewalds frequens. Julio.

Calyx universalis unico brevi fit folio. *Glumae*
florales fere tres, aristatae, intra eas semen
piriforme. *Setae* circum semen decem, se-
mine longiores, tertius flosculus serius matu-
ratur. *Haller. helo* 1341.

CYPERUS *Lin. gen.* 72.

Cal. 1. valvis: glumis paleaceis distiche imbrica-
tis. *Cor.* O. *Semen* 1. nudum.

83. *CYPERUS flavescent* culmo triquetro nudo,
umbella triphylla, pedunculis simplicibus
inaequalibus, spicis confertis lanceolatis. *Lin.*
syst. ed. R. 1. p. 127.

Locis uliginosis, paludosis frequens. Julio.
Augusto.

84. *CYPERUS fuscus* culmo triquetro nudo, um-
bella trifida, pedunculis simplicibus inaequa-
libus, spicis confertis linearibus. *Lin. syst.*
ed. R. 1. p. 127.

Lisdem.

Iisdem locis, eodemque tempore. *In der Jung-fernheide* & prope *Reineckendorf* rarius.

Praecedenti simillimus, differt umbellis minoribus magis compressis, spicis linearibus, foliis scabriusculis, culmo minori.

CAREX. *Lin. gen.* 1137.

♂ — ♀. ♂. *Ament.* imbricatum. *Cal.* 1 phyll. *Cor.* O.

♀. *Ament.* *Cal.* & *Cor.* ut in flore mascula. *Nect.* inflatum 2. dendum. *Stigmata* 2. 3. *Sem.* triquetrum intra nectarium.

* *Spicis androgynis.*

85. CAREX *disticha* spica composita subdisticha, spiculis ovatis subimbricatis androgynis, folio longiori instructis, culmo triquetro. *Huds. angl. ed.* 2. p. 403. *ed.* 1. p. 347. *Schreb. spicil. fl. lips.* 63.

Carex spicata spica composita, spiculis ex subrotundo ovatis, numerosis, confertis, in summo scapo cohaerentibus, sessilibus, androgynis nudis. *Pollich. pal. tom.* 2. p. 562. n. 875.

Carex arenaria *Leers herb. born.* 195. t. 14. f. 2.

Versus *Spandau* in pratis paludosis prope *den Stern* & alibi passim. *Majo.*

Stigma bifidum.

Differt a *Carice arenaria*: spicis remotioribus spiculis subdistichis magis obtusis, bractea spica longiori & foliis angustioribus. Non confundenda cum *Carice spicata*. *Huds. angl. ed.* 2. p. 405.

Withering. brittan. 2. p. 566. & Relhan. cantab. n. 686.

86. *CAREX arenaria* spicis compositis, spiculis androgynis ovato-acutis: inferioribus remotioribus, folio longo instructis, culmo triquetro. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 100. Willd. l. c. p. 27.*

In campis arenosis, locisque gramineis *im Thiergart n* & alibi copiose. Majo.

Stigma bifidum.

Radix recens vulnerata, odorem Therebinthinae venetae similem spargit.

Offic. Radix Graminis majoris, seu Caricis arenariae.

87. *CAREX leporina* spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis, androgynis nudis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 101. (ovul.)*

Locis humidis *im Thiergarten* & alibi frequens. Majo. *Willd. l. c. p. 38. 5. 5*

Stigma bifidum.

88. *CAREX praecox* spica composita disticha nudiuscula, spiculis contiguis androgynis teretibus rectis, culmo superne nudo. *Schreb. spicil. 63. n. 1010. Willd. l. c. p. 179. 2. 5. 58*

Prope *Spandau* locis editioribus ante portam *Be. N. 4* rolinensem & in der Jungfernheide passim. Martio. Aprili.

Stigma bifidum.

88. *CAREX vulpina* spica supradecomposita inferne laxiore: spiculis androgynis ovato-glome-

glomeratis superne masculis. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 102. *W. 139*

Locis humidis & ad ripas fluviorum prope *Rum-*
melsburg, Spandau, Schoeneberg & alibi pas-
sim. Majo. Junio.

Stigma bifidum.

90. *CAREX paniculata* racemo composito, spiculis
androgynis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 105.*

Carex spica paniculata. Hall. helv. n. 1368.

Im Elsbruch versus Falkenhagen passim. Majo.
Junio. *W. 139*

Stigma bifidum. *C. para*

91. *CAREX elongata* spiculis oblongis sessilibus,
remotis androgynis, capsulis ovato-acutis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 104.* *Tab. 1 fig. 1*

Carex spicis ovatis, imis remotis, supremis con-
gestis. Hall. helv. n. 1359.

Ibidem passim. Majo. Junio.

Spiculae oblongae 8. 9. 10 florum. Squamae ob-
longae, obtusae, albido flavescentes, nervo
viridi elevato, capsulis minores. Capsulae
oblongae, obsolete trigonae, subconvexae,
acumine longe producto.

Stigma bifidum.

92. *CAREX canescens* spiculis subrotundis sessilibus
obtusis androgynis, capsulis ovatis obtusiuscu-
lis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 104.*

Prope *Spandau* passim. Majo. Junio.

Spiculae subrotundae, inferne remotae, superne
congestae 3. 4. 5. florum. Squamae oblongae
flo.

flavescentes, seta terminatae, nervo viridi, longitudine capsularum.

Capssulae oblongae convexae, acumine brevi.

Stigma bifidum.

93. *CAREX remota* spicis ovatis subsessilibus, remotis, androgynis, bracteis culmum aequantibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 103.*

- β. *Carex axillaris* spiculis ovatis sessilibus remotis androgynis, bracteis culmum aequantibus, *Lin. spec. pl. 1382.*

Prope Tegel & in den Papenbergen ad viam inferiorem passim. Majo. Junio.

Stigma bifidum.

94. *CAREX muricata* spiculis sub-ovatis sessilibus, remotis androgynis, superne masculis, inferne femineis, capsulis acutis bicuspidatis.

Carex muricata spiculis subovatis sessilibus, remotis, androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 102.*

Locis humidis in der Jungfernheide praecipue in der Charlottenburger Allee frequens. Majo. Junio.

Radix fibrosa. Culmi florentes minutissimi, fructu maturo vix digitales. Folia glabra, culmo longiora. Spicae 3. aut. 4. superne masculae. Squamae capsulis minores.

Capssulae compressae, acumine longo bifido.

Stigma bifidum.

95. *CAREX Leerfii* spicis subovatis sessilibus remotis androgynis, inferne masculis, superne femi-

femineis, capsulis acutis simpliciter mucronatis.

Carex muricata, Leers herb. 709. t. 14. f. 8.

Pollich. pal. tom. 2. n. 877. Reilhan. cantab. 682.

Carex spicis ternis echinatis, glumis lanceolatis, capsulis mucrone simplici. Hall, helv. n. 1366.

Ehrhart hanoev. Magaz. 1780. 84. Stück. p. 1330.

Prope Spandau rarius. Majo, Junio.

Stigma bifidum.

Differt a praecedenti: culmo majori, spiculis inferne masculis, & capsulis simpliciter mucronatis.

** *Spicis sexu distinctis: femineis sessilibus.*

96. *CAREX flava* spicis confertis subsessilibus, subrotundis: mascula lineari, capsulis acutis recurvis, Lin. syst. ed. R. 4. p. 106. Leers herb. 714. t. 15. f. 6. (figura non optima, capsulae nimis obesae.)

In pratis prope Spandau hinterm Gewehrplan, ad lacum magnum inter Staaken, & Doebriz, etiamque in pratis prope Ruhleben frequens. Aprili. Majo.

Stigma trifidum.

Squamae obtusae fuscae, capsulis minores.

Capsulae ventricosae striatae, acumine longo apice bifido.

Carex pedunculata 710. t. 15. f. 7. 97.

97. *CAREX digitata* spicis linearibus erectis: mascula brevior inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 106.*

Stigma trifidum.

Im Charlottenburger Schlossgarten, & in den Papenbergen passim. Majo. Aprili.

98. *CAREX montana* spicis femineis subsolitariis sessilibus, ovatis, masculis approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 107.*

In der Jungfernheide & Hasenheide passim. Aprili.

Stigma trifidum.

Spica mascula terminalis erecta oblonga; squamis fuscis, obtusis, nervo luteo. Spicae femineae ovatae sessiles approximatae, plerumque binae rarius unica. Squamae oblongae obtusae, fuscae, interdum filo brevissimo terminatae, margine diaphano, membranaeo. Capsulae subtrigonae, pilis albidis brevissimis obsitae.

99. *CAREX ericetorum?* spica mascula terminali obversa-ovata; obtusa, femineis sessilibus ovatis, capsulis pubescentibus. *Pollich. pal. 2. n. 886.*

In den Papenbergen rarius. Aprili. Majo.

Stigma trifidum.

Descriptio *Celebr. Pollichii* satis bene cum nostra specie convenit; sed synonymum *Scheuchzeri*

et icon illius minime respondent. In nostra specie, caulis digitalis & ultra. Spica mascula terminalis oblongo-ovata; squamis obtusis fuscis nervo luteo. Spicae femineae solitariae vel geminatae, masculae approximatae. Squamae subrotundo-oblongae, acutae. Capsulae pubescentes.

100. *CAREX pilulifera* spicis confertis, mascula oblonga, femineis subrotundis sessilibus, culmo nudo. fig 1

Carex pilulifera spicis terminalibus confertis subrotundis: mascula oblonga. *Lin. syst. ed.* R. 4. p. 109. *Relhan cantab.* n. 689.

In der Spandauerheide frequens, Majo.

Stigma trifidum.

Radix fibrosa. Culmus pedalis, anceps, hinc planus, inde convexus, obsolete triquetrus striatus, glaber, nudus. Folia ad radicem fasciculata, lineari-lanceolata, lata, glabra, nervosa, longitudine dimidi culmi. Spicae confertae, terminales, & globatae; Mascula unica oblonga: squamis oblongo-lanceolatis rufis, nervo luteo, margine membranaceo albo diaphano; Femineae 3. 4. sessiles, spicae masculae approximatae, oblongo subrotundae, infima bractea spica longiori instructa. Capsulae ventricosae obsolete trigonae, hirtae mucronatae; mucrone brevissime bifido. Squamae longitudine capsularum, oblon-

oblongae, flavescentes, seta terminatae, nervo viridi. vid. TAB. I fig. 1.

Carex pilulifera Leyss. fl. halens. ed. 2. n. 951. est longe alia species.

101. *CAREX filiformis* spica mascula oblonga femineis sessilibus inferiore folio proprio brevior.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 108. Leers herborn. 718. t. 16. f. 5.

Cyperoides sylvaticum tenuifolium, spicis parvis tenuibus spadiceo-viridibus. *Scheuchz. agrost. 425. t. 10. f. 11.*

*In der Jungfernheide passim, in den Papenberg
 & ad Spandau copiose. Aprili. Majo.*

Spica mascula: squamis flavescentibus linearilanceolatis apice truncatis. Spicae femineae oblongae geminatae: squamis fuscis oblongis nervo viridi, apice seta instratis. Capsulae hirtae.

Stigma trifidum.

102. *CAREX aspera* spica mascula solitaria longe pedunculata, linearis; femineis remotis subternatis, oblongis, capsulis squamis majoribus, culmo retrorsum hispido.

In pratis prope Spandau hinter den Schülerbergen magnos formans cespites. Majo.

Culmus sesquipedalis, triqueter, striatus, nudus: angulis retrorsum hispidis. Folia linearilanceolata caespitosa. Spica mascula terminalis solitaria, longe pedunculata, subnutans, linearis: squamis albo-flavescentibus oblon,

oblongo lanceolatis, nervis pluribus fuscis. Spicae femineae binae, vel tres cylindricae dense imbricatae, sessiles, erectae, infima maxima $\frac{3}{4}$ unicalis bractea longa instructa, tertia si adest minutissima prope masculana, circiter floribus 4 aut 5. Squamae oblongo-lanceolatae fuscae nervo margineque albido, capsulis minores. Capsulae glabrae subrotundae, acumine brevi. vid. TAB. I. fig. 2.

Stigma trifidum.

103. CAREX *splendida* spicis remotis, mascula sub-solitaria lineari; femineis geminatis ovatis, capsulis bifidis, lana splendida tectis, bracteis longissimis.

In der Spandauerheide versus den Papenberg in palude copiosissime. Majo.

Culmus sesquipedalis & ultra, triqueter, glaber striatus. Spica mascula unica, interdum duplex lineari lanceolata, si altera adest minutissima magis oblonga. Squamae masculae spicae, oblongo lanceolatae, flavescentes, nervis tribus fuscis. Spicae femineae duae sessiles remotae bracteatae. Bractea primae spicae triplo ista longior; infimae omnibus multo longior. Capsulae oblongae obsolete triquetrae, apice bifidae, lana ferruginea splendida tectae. Squamae capsulis minores, ovatae, acutae, atrofuscae, nervo albido. vid.

TAB. I. fig. 3.

Stigma trifidum.

*** *Spicis sexu distinctis, femineis pedunculatis.*

104. *CAREX elegans* spicis pendulis, mascula erecta lineari; femineis geminatis pendulis, capsulis distichis acuminatis, squama minoribus.

Cyperoides spica pendula, brevior, squamis e spadiceo vel fusco rutilante viridibus. *Scheuchz. agrost.* 443. t. 10. f. 13?

Gramen *cyperoides* spica pendula brevior minus.
C. Bauh. theatr. 85?

β. Spica feminea unica.

Locis turfosis humidis *im Grunewald & Jungfernheide* frequens. Aprili. Majo.

Culmus pedalis vel sesquipedalis, obsolete trigonus, striatus, glaber. Spica mascula solitaria linearis erecta: squamis oblongis fuscis acutis, margine membranaceis dense imbricatis. Spicae femineae binae planae pendulae remotae, oblongae. Capsulae oblongae obsolete triquetrae, distichae, glaberrimae, obtusae, mucronatae. Squamae concavae, oblongae, acutae, rufae, capsulis majores. Bractea unica ad infimam spicam subulata, spicis femineis longior. vid. TAB. I. fig. 4.

Stigma trifidum.

105. *CAREX Pseudo Cyperus* spicis pendulis, mascula erecta lineari, femineis geminatis cylindricis pendulis, capsulis sulcatis, mucronatis.

Carex Pseudo Cyperus spicis pendulis, pedunculis geminatis. *Lin. Syst. ed. R.* 4. p. 112.

β. Spi

β. Spicis femineis ternis, quaternisve.

γ. Spica feminea unica.

In fossis locisque paludosis *im Thiergarten*, prope *Tegel*, *Ruhleben*, & *ad Doebriz* frequens. Aprili. Majo.

Spica mascula terminalis erecta; squamis lanceolatis acuminatis, pallidis. Spicae femineae solitariae 2. 3. vel etiam 4. cylindricae. Capsulae oblongae, glabrae, sulcis exaratae, mucronatae, bifidae. Squamae longitudine capsularum setaceae, margine hispidae, virides.

Stigma trifidum.

106. *CAREX pallescens* spicis pendulis; mascula erecta, femineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 110.* *Leers herborn. 721. t. 15. f. 4.*

In pratis prope *Spandau hinterm Gewehrplan*, & *in den Papenbergern*. Majo.

Stigma trifidum.

Spica mascula erecta linearis: squamis stramineis ovatis pilo terminatis. Spicae saepissime geminatae subnutantes; prima bractea subulato setacea spica longiori instructa; altera bractea lineari-lanceolata spicis omnibus longiori donata. Squamae capsulis minores ovato-oblongae stramineae, nervo viridi, acuminatae. Capsulae trigonae glabrae obtusae.

107. *CAREX caespitosa?* spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 112.*

Prope *Spandau* in pratis *hinter den Schülerbergen*. Majo.

Culmus fere pedalis obsolete triqueter, nudus, & glaber. Folia lineari-lanceolata, nervosa, glabra triuncialia, ad radicem posita.

Spica mascula unica terminalis, linearis: squamis stramineis, oblongis, concavis obtusis dense imbricatis. Spicae femineae pedunculatae erectae, cylindricae; infima bractea femineis longiori instructa subulata. Capsulae ventricosae triquetrae spadiceae, mucrone brevissimo: squamis longitudine capsularum, viridibus nervo luteo, ovatis, acutis. vid.

TAB. II. fig. 5.

Stigma trifidum & bifidum.

108. *CAREX panicea* spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 111.*
Leers herborn. 722. t. 15. f. 5.

Locis udis *im Thiergarten, Jungfernheide*, prope *Spandau* in pratis *hinterm Gewehrplan* & alibi copiose. Majo.

Spica mascula oblonga, unica, terminalis: squamis oblongis obtusis pallide fuscis striis duobus spadiceis. Spicae femineae plerumque geminatae, interdum solitariae. Capsulae ventricosae, trigonae, obtusae, remotae: squa-

Fig. 5.

Fig. 6.

Beyel fecit

Beyel pinx.

Happe Scul.

squamis oblongis acutis spadiceis nervo & margine albido, capsulis minores.

Stigma trifidum.

109. *CAREX mutabilis* spica mascula nutante, cylindrica, longissima: femineis cylindricis, capsulis squamis longioribus, culmo acute triquetro.

α. Spica mascula cylindrica nutante; femineis geminatis pedunculatis nutantibus.

β. Spica terminali mascula inferne feminea; femineis quinatis cylindricis subsessilibus minoris.

In pratis & fossis prope *Spandau hinter den Schülerbergen* rarius. Majo.

Culmus bipedalis & ultra, acute triquetus, striatus: angulis retrorsum scabris. Folia lineari-subulata nervosa, costa medio instructa, margine retrorsum hispida, longissima. Spicae valde variabiles. Squamae spicae masculae concavae, lanceolatae, stramineae striis fuscis. Capsulae oblongae, gibbae, glabrae, trigonae, mucrone brevissimo. Squamae capsulis minores, oblongo-lanceolatae spadiceae, nervo viridi. Bractae longissimae.

Stigma trifidum.

In varietate α spica mascula terminalis, quadriuncialis, cylindrica, nutans, rarissime uno alterove flore femineo. Spicae femineae geminatae pedunculatae nutantes, quadriunciales, a mascula remotis, inferne laxioribus:

floribus alternis, superne densioribus: floribus imbricatis. TAA. II. fig. 6.

In varietate β . spica terminalis androgyna cylindrica, 4 uncialis, nutans; floribus inferne femineis, bracteis longissimis instructis; superne masculis dense imbricatis. Spicae femineae quator vel quinque, remotae, subsessiles, cylindricae. Tria superiora 6 linearia sessilia ovata. Bina inferiora uncialia brevissime pedunculata cylindrica. Bractee culmo multo majores. vid. TAB. III. fig. 7.

- III. CAREX *distans* spicis remotissimis subsessilibus bractea vaginali, capsulis angulatis mucronatis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 112.

Stigma trifidum.

Ad Doebriz & in den Papenbergien infrequens. Majo. Junio.

**** Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.

- III. CAREX *acuta* spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 113.

α . Carex *acuta* spicis masculis pluribus, obtusis, squamis obtusiusculis, caule acutangulo. Curtis Flor. Lond. Relhan cantab. 698. Carex *acuta nigra*. Leers herborn. t. 16. f. 1.

β . Carex *riparia* spicis masculis pluribus triquetris nigricantibus, acutis, squamis aristato-acuminatis, capsulis subinflatis, bicornibus. Curtis Flor. Lond. Relhan cantab. 697. Carex *acuta rufa*. Leers herborn. t. 16. f. 2.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald, & alibi copiose. α. in pratis humidis. β. in fossis aquisque stagnantibus. Majo. Junio.

Stigma bifidum.

112. *CAREX glauca* spicis maribus una, pluribus, feminis pendulis, capsulis ovato-triquetris, confertis. *Pollich. pal. 2. p. 594. n. 894. Leysser halensf. ed. 2. p. 237. n. 960.*

Carex glauca culmo subtriquetro; spicis pendulis, pedunculatis, fuscis; capsulis obtusis. *Scop. carn. ed. 1. p. 214. n. 8. ed. 2. tom. 2. p. 223. n. 1157.*

Carex limosa β. pallida. Retz prod. fl. Scand. 180. n. 1045. Oeder dan. 444.

In pratis humidis ad Spandau & in der Jungfernheide passim. Majo. Junio.

Spica mascula saepissime geminata, cylindrica: squamis oblongis, obtusis, fuscis, nervo viridi. Spicae femineae duae pedunculatae. Capsulae oblongae, glabrae, trigonae, virides: squamis ovato-acutis fuscis nervo viridi.

Stigma trifidum.

113. *CAREX vesicaria* spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis striatis glabris inflatis, rostro bifido.

Carex vesicaria spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis, acuminatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 114.

Locis paludosis. v. g. *im Thiergarten, Grunewald, in der Jungfernheide, prope Rummelsburg, Spandau & alibi frequens.* Majo. Junio.

Stigma trifidum.

Capsulae masculae binae, lineari-lanceolatae: squamis oblongo-lanceolatis stramineis, nervo pallido. Spicae femineae tres remotae pedunculatae oblongae. Capsulae oblongae inflatae striatae acuminatae, acumine bifido: squamis oblongis fuscis, nervo viridi, seta terminatis.

114. *CAREX sylvatica* spicis pedunculatis, mascula erecta, femineis filiformibus laxis pedunculo brevioribus, capsulis ovatis aristatis furcatis. *Huds. angl. ed. 2. tom. 2. p. 411. n. 28. Relhan. cantab. 695.*

Carex vesicaria β . culmo longissimo, spicis tenuibus remotis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 114.*

Carex capillaris. *Leers herborn. 720. t. 15. f. 2.*

Carex patula. *Scop. carn. ed. 2. n. 1160. t. 59.* minime hic pertinet, descriptio & figura ad nostram haud quadrant.

Prope *Tegel, & in den Papenbergern* rarius. Majo. Junio.

Stigma trifidum.

Culmus triqueteter striatus inferne glaber, superne scaber. Spica mascula subsolitaria, oblonga: squamis oblongis acutis, membranaceis diaphanis, nervo viridi. Spicae femineae plerumque quatuor lineares longissime pedunculatae. Capsulae triquetrae glabrae ventricosae;

fae; apice longe producto bifido: squamis membranaceis oblongis seta terminatis, nervo viridi, longitudine capsularum.

115. *CAREX hirta* spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 115.*

In campis arenosis, ad vias, prope *Schoeneberg, Charlottenburg, Wedding*, & alibi copiose. Majo. Junio.

Stigma trifidum.

Squamae spicarum mascularum pilosae, fuscae, oblongae, nervo viridi. Capsulae subrotundae, ventricosae, striatae, hirtae, acumine longe producto, bifido. Squamae oblongae glabrae virides, margine fusco, apice setaceae.

Radix repens & ei Caricis arenariae similis, sed recens inodora.

SPARGANIUM. *Lin. gen. 1132.*

♂. *Amentum* subrotundum. *Cal. 3* phyllus. *Cor. O.*

♀. *Ament.* *Cal. & Cor. maris Stigma 2* fidum. *Capsula coriacea 1—2* sperma.

116. *SPARGANIUM erectum* foliis erectis, linearilanceolatis, nervo elevato.

Sparganium erectum foliis erectis triquetris. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 95.*

Sparganium ramosum. *Bauh. pin. 15.*

♂. *Sparganium non ramosum.* *Bauh. pin. 15.*

In paludibus, fossis, similibusve locis frequens.

Variet. β . in fossis inter portam *Halensem* & *Lipsiensem* rarius. Junio. Julio.

117. SPARGANIUM *natans* foliis decumbentibus, linearibus obtusis.

Sparganium natans foliis decumbentibus planis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 95.

In der *Jungfernheide*, fossis innatans. Julio. Augusto.

Caulis nunquam ramosus. Amenta feminea 2, rarius 3; masculum 1. rarius 2.

d. *Gramina spicis gracilibus; floribus sparsis.*

NARDUS. *Lin. gen. 75.*

Cal. O. Cor. 2 valvis. Sem. 1. corolla adnatum.

118. NARDUS *stricta* spica setacea, recta secunda.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 144.

In arenosis sterilibus ad *Schoeneberg*, im *Thiergarten*, *Jungfernheide*, alibique copiose. Junio. Julio.

DIGYNIA.

a. *Gramina floribus unifloris vagis.*

PHALARIS. *Lin. gen. 80.*

Cal. 2 valvis carinatus, longitudine aequalis corollam includens.

119. PHALARIS *canariensis* panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 148.*

Passim culta occurrit, in ruderatis interdum ac si spontanea. Julio. Augusto.

Offic. Semen canariense.

120. *PHALARIS arundinacea* panicula oblonga ventricosa ampla. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 150.*

β. *Phalaris picta*.

In pratis inundatis prope *der Charite* & in fossis *ad Spandau* copiose. β. in hortis culta. Junio.

PANICUM. Lin. gen. 82.

Cal. 3 valvis, valvula tertia minima. *Cor.* 2 valvis.

121. *PANICUM verticillatum* spica verticillata, racemis quaternis, involucellis unifloris bifetis, culmis diffusis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 153.*

In cultis, sepibus atque dumetis rarius. Julio. Augusto.

122. *PANICUM glaucum* spica tereti involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus transversim rugosis, culmo erecto.

Panicum glaucum spica tereti involucellis bifloris fasciculato pilosis, seminibus undulato-rugosis.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 153.

In agris, arvis, locisque cultis copiose. Julio. Augusto.

123. *PANICUM viride* spica tereti involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus ad longum sulcatis, culmo decumbente.

Panicum viride spica tereti involucellis bifloris fasciculato-pilosis seminibus nervosis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 154.*

Locis cultis, in agris arenoso-limosis passim. Julio. Augusto.

124. *Panicum Crus galli* spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quadrangulari. *Lin. syst. ed. R. I. p. 155.*

β. Gramen paniceum, spica divisa, aristas longis armata. *Bauh. pin. 8.*

In hortis, cultis, ruderatis humidis copiose. β. passim. Julio. Augusto.

125. *Panicum sanguinale* spicis digitatis basi interiori nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 157.*

Digitaria sanguinalis. Scop. carn. ed. 2. n. 72.

In agris & campis arenosis copiosissime. Augusto.

Tertia valvula calycis saepius adest, licet minutissima.

126. *Panicum miliaceum* panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis nervosis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 160.*

In agris frequens cultum. Julio. Augusto.

PHLEUM. *Lin. gen. 83.*

Cal. 2. valvis, linearis, truncatus; apice bicuspidato. Cor. inclusa mutica.

127. *PHLEUM pratense* spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 162.

In pratis humidis ad Reineckendorf, Rummelsburg, Tegel, Spandau, im Thiergarten & alibi copiose. Julio. Augusto.

128. *PHLEUM nodosum* spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 163.

In der Hasenheide & Thiergarten frequens. Julio. Augusto.

ALOPECURUS. Lin. gen. 84.

Cal. 2 valvis. Cor. 1 valvis.

129. *ALOPECURUS pratensis* culmo spicato erecto, glumis villosis corollis muticis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 165.

In pratis & pascuis abunde. Majo. Junio.

130. *ALOPECURUS geniculatus* culmo spicato infarcto, corollis muticis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 165.

Im Thiergarten & Jungfernheide copiose. Julio. Augusto.

AGROSTIS. Lin. gen. 86.

Cal. 2 valvis: valvulis acutis. Cor. 2 valvis paulo calyce minor. Stigmata longitudinaliter hispida.

* *Aristatae.*

131. *AGROSTIS spica venti* petalo exteriori aristata recta stricta longissima, panicula patula. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 169.

Inter

Inter segetes ubique copiose ; aestate.

132. *AGROSTIS canina* calycibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis scabriusculis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 173.*

In pratis pascuisque ficcis passim. Julio.

133. *AGROSTIS rubra* paniculae parte florente patentissima, petalo exteriori glabro: arista terminali tortili recurva. *Lin. syst. ed. R. I. p. 173.*

Ad pagos in viis arenosis & agrorum versuris frequens. aestate.

** MUTICAE.

134. *AGROSTIS stolonifera* panicula ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus aequalibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 173.*

In viis arenosis inter *Pancko* & *Gesundbrunnen*, im *Thiergarten* alibique frequens. Junio. Julio.

135. *AGROSTIS capillaris* panicula capillari patente, calycibus subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 174. Leers herborn. 54. t. 4. f. 3.*

β. Calycibus duplo majoribus, corollis in foliola subulata excrecentibus, viviparis. *Leers herborn. p. 20. n. 54.*

Locis nemorosis im *Thiergarten* & alibi passim.

Variet. β ad fossas interm *Gewehrplan* prope *Spandau*. aestate.

136. *AGROSTIS alba* panicula laxa, calycibus muticis aequalibus, culmo repente. *Lin. syst. ed. R. I. p. 175.*

In *Thiergarten*, prope *Spandau* & *Tegel* infrequens. Aestate.

MILIUM. Lin. gen. 85.

Cal. 2 valvis uniflorus: valvulis subaequalibus.
Cor. brevissima. Stigmata penicilli-formia.

137. *MILIUM effusum* floribus paniculatis dispersis muticis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 168.*

Milium paniculis raris, petiolis longissimis. Hall. helv. n. 1525.

In pratis prope *Briselang* passim, ad *Friedrichsfelde* rarius. Julio.

STIPA. Lin. gen. 96.

Cal. 2 valvis uniflorus. *Cor. 2* valvis valvula exteriore terminali, basi articulata.

138. *STIPA pennata* aristis lanatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 218.*

In collibus arenosis versus *Spandau hinterm Stern* & in plantariis versus *Falkenhagen* frequens. Majo.

b. Gramina floribus bifloris vagis.

HOLCUS. Lin. gen. 1252.

♀. *Cal. gluma 1* vel *2* flora, *Cor. gluma aristata. Semen unicum.*

♂. *Cal. gluma 2* valvis, altera valvula infra apicem aristata.

139. *Holcus mollis* glumis bifloris nudiusculis: flosculo hermaphrodito mutico, masculo aristata geniculata. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 308.*

Inter *Spandau & Tegel*, in der *Jungfernheide* locis apricis frequens, prope *Rummelsburg* rarius. Junio. Julio.

140. *Holcus lanatus* glumis bifloris, hermaphrodito mutico, masculo aristata recurva. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 308.*

In pascuis, pratis, agrorum versuris, & nemoribus copiose. Junio. Julio.

141. *Holcus odoratus* glumis trifloris muticis acuminatis: hermaphrodito diandro. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 310.*

In prato unico ad *Henningsdorf* passim. Julio.

Culmus pedalis teres sulcatus, geniculis & foliis tribus, superne nudus. Folia uncialia lanceolata nervosa glabra, vaginis inflatis, superne dimidiatis. Panicula mediocris: racemulis geminatis, alternis longe pedunculatis: glumis trifloris bivalvibus subrotundis acuminatis: medio flosculo hermaphrodito diandro, binis lateralibus masculis triandris.

Facile a congeneribus glumis splendide flavescentibus distinguendus.

AIRA. Lin. gen. 87.

Cal. 2 valvis 2 florus interdum rudimento tertii floris. *Cor.* 2. valvis: altera valvula saepe ad basin aristata.

* *Muticae.*

142. *AIRA caerulea* panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto-subulatis, foliis planis. *Lin. spec. plantar.* 2. p. 95. *Leers herborn.* 58. t. 4. f. 7. *Wiggers primit.* 7. n. 69.

Melica caerulea panicula coarctata, floribus cylindricis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 183.

- β. Gramen paniculatum autumnale, panicula ampliore e viridi nigricante. *Scheuchz. agrost.* 207.

In pratis humidis ad *Schoeneberg*, *Spandau hinterm Gewehrplan*, im *Thiergarten*, *Papenbergen* & alibi frequens. Augusto.

143. *AIRA nutans* panicula indivisa nutante. *Wiggers primit.* 7. n. 68.

Melica nutans petalis imberbibus, panicula nutante simplici. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 182.

In den *Papenbergen* locis umbrosis frequens. Majo. Junio.

Omnes *Melicae* species hic crescentes, ad hoc genus amandavi, quum rudimentum tertii floris rarissime adest, & aliis *Airae* speciebus interdum proprium. *Melica* vero ciliata ad *Arundinis* genus pertinet, hic nondum observata.

144. *AIRA cristata* panicula spicata, calycibus pedunculo longioribus, petalis subaristatis inaequalibus. *Lin. spec.* 94. *Huds. angl. ed.* 2. tom. 1. p. 33.

Poa cristata panicula spicata, calycibus subpilosis subquadrifloris pedunculo longioribus, petalis aristatis. *Lin. syst. ed. R. i. p. 193.*

In pratis siccioribus *im Thiergarten* inque collibus apricis, versuris agrorum & alibi frequens. Majo. Junio.

Culmus in pratis pedalis & sesquipedalis; locis siccioribus digitalis & spithameus. Glumae calycinae biflorae, rarius triflorae, rarissime quadriflorae. Antherae violaceae.

Confer. *Leers herborn. 73. t. 5. fig. 6. (figura non optima.)*

145. *AIRA aquatica* panicula patente, floribus muticis laevibus calyce longioribus, foliis planis. *Lin. syst. ed. R. i. p. 177.*

Ad ripas fluviorum *im Thiergarten* & alibi passim. Julio.

* * *Aristatae.*

146. *AIRA caespitosa* foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque, arista recta brevi. *Lin. syst. ed. R. i. p. 178.*

In pratis locisque humidis frequens. Aestate.

147. *AIRA canescens* foliis setaceis: summo spathaceo paniculam inferne involvente. *Lin. syst. ed. R. i. p. 180.*

Avena diantha, foliis setaceis, panicula stricta, aristis clavatis. *Hall. helv. 1483. Avena canescens. Wiggers primit. 9. n. 99.*

In campis arenosis ubique copiose. Julio.

148. *AIRA praecox* foliis setaceis: vaginis angulatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 180.*

Avena pusilla panicula contracta, calycibus bifloris, aristis subulatis. *Wiggers primit. 9. n. 100.*

In der Jungfernheide in via versus Spandau passim, Aprili.

149. *AIRA coryophyllea* foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 180.*

Avena coryophyllea panicula divaricata, calycibus bifloris aristis subulatis. *Wiggers primit. 10. n. 101.*

In der Hasenheide versus den Rollbergen frequens. Majo.

Non male has ultimas tres species, ad Avenae genus duxit *Celeb. Wiggers.*

c. Gramina floribus multifloris vagis.

POA. Lin. gen. 89.

Cal. 2 valvis multiflorus. Spicula ovata, valvulis margine scariosis acutiusculis.

150. *POA aquatica* panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 184.*

Ad ripas fluviorum frequens. e. g. im Thiergarten &c. Junio. Julio.

Variat spiculis 5 ad 10 floris.

Equis nociva.

151. *Poa trivialis* panicula subdiffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 185.*

In pratis, pascuis, nemoribus, hortis, inque urbe ipsa frequens. Junio.

152. *Poa pratensis* panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 186.*

In pratis fertilibus passim. Julio.

Spiculae ovato-acutae quinqueflorae, glabrae, valvularum apice fuscae. *Leers herborn. 68. t. 6. f. 4.*

Poa pratensis *Leysser fl. halens. 21. n. 91.* est *Poa dubia* *Leers herborn. 69. t. 6. f. 5.*

153. *Poa dubia* panicula diffusa, spiculis ovatis obtusis subtrifloris basi pubescentibus, vaginis foliisque subtus scabris. *Leers herborn. 69. t. 6. f. 5.*

In pratis passim. Junio. Julio.

Spiculae ovato-obtusae 2. 3. vel 4. florum.

154. *Poa annua* panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 187.*

In cultis, hortis, viis, plateis urbis, ubique fere copiosissime. omni tempore.

155. *Poa nemoralis* panicula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 191.*

In nemoribus umbrosis ad *Tegel, im Thiergarten* & alibi passim. Junio. Julio.

156. *Poa bulbosa* panicula secunda patentiuscula, spiculis quadrifloris. *Lin. syst. ed. R. I. p. 191.*
 2. Gramen arvense panicula crispa. *Bauh. pin. 3. (vivipara.)*

In der Hasenheide, Jungfernheide, Thiergarten
aliisque locis passim. Majo.

157. *Poa compressa* panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. *Lin. syst. ed. R. I. p. 190.*

In urbe ipsa versus portam Strahlowianam ad se-
pes rarius. Junio. Julio.

BRIZA. Lin. gen. 90.

Cal. 2. valvis multiflorus. Spicula disticha val-
vulis cordatis obtusis: interiore minuta.

158. *BRIZA media* spiculis ovatis calyce flosculis
 (7.) brevior. *Lin. syst. ed. R. I. p. 194.*

In pratis ficcioribus, nemorosis frequens. e. g.
im Thiergarten, Papenberg, ad Tegel, Rei-
neckendorf &c.

CYNOSURUS. Lin. gen. 93.

Receptaculum proprium unilaterale, foliaceum.

Cal. 2 valvis, multiflorus.

159. *CYNOSURUS cristatus* bracteis pinnatifidis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 198.

In pratis, pascuis locisque humidis satis fre-
quens. Junio.

DACTYLIS. Lin. gen. 92.

Cal. 2 valvis 2 vel 3 florus; altera valvula ma-
jori carinata. Cor. 2 valvis altera valvula
apice aristata.

160. *DACTYLIS glomerata* panicula secunda glomerata. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 197.*

Bromus glomeratus spiculis quadrifloris, glomeratis asperis. *Scop. carn. ed. 2. 1. p. 76. n. 111.*

In nemorosis, locis cultis, ad vias, alibique copiose. Junio. Julio.

FESTUCA. Lin. gen. 94.

Cal. 2 valvis. *Spicula* oblonga teretiuscula glumis acuminatis.

* *Panicula secunda.*

161. *FESTUCA ovina* panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 202.*

Bromus ovinus culmo tenui erecto; foliis setaceis; panicula coarctata erecta; racemis solitariis; calyce flosculis brevioribus; petalo interiore bifido; semine colorato; stylis in lanam fatiscentibus. *Scopol. carn. ed. 2. 1. p. 77. n. 112.*

Locis arenosis ficcis *im Thiergarten, Jungfernhede &c.* copiosissime. Majo. Junio.

162. *FESTUCA rubra* panicula secunda scabra, spiculis sexfloris aristatis: flosculo ultimo mutico, culmo semi tereti. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 203.*

Iisdem locis eodemque tempore passim.

163. *FESTUCA duriuscula* panicula secunda oblonga, spiculis sexfloris oblongis laevibus, foliis setaceis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 204.*

Ad *Fridrichsfelde, Rummelsburg* passim. Junio.

** *Pa.*

**** *Panicula aequali.***

164. *FESTUCA decumbens* panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente. *Lin. syst. ed. R. I. p. 206.*

In der Jungfernheide rarius. Junio.

165. *FESTUCA elatior* panicula secunda erecta, spiculis subaristatis, exterioribus teretibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 207.*

In pratis fertilibus ad Rummelsburg, Schoenhau- sen, Thiergarten, Spandau passim. Aestate.

166. *FESTUCA fluitans* panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 207.*

Festuca amphibia. Lüders Nomencl. fl. march. p. 11.

In aquis stagnantibus, fossis, pratisque udis fre- quens. Aestate.

Offic. (Semina Graminis Mannae.)

BROMUS. *Lin. gen. 95.*

Cal. 2 valvis. Spiculae oblongae distichae: aristis infra apicem.

167. *BROMUS secalinus* panicula patente, spiculis ovatis: aristis rectis, seminibus distinctis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 208.*

In agris secalinis beim Gesundbrunnen & alibi fre- quens. Junio. Julio.

168. *BROMUS mollis* panicula erectiuscula, spicis ovatis pubescentibus aristis rectis, foliis mol- lissime villosis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 209.*

Minutus vix digitalis spiculis quatuor.

Ad vias, inque versuris agrorum copiose.

Varietas β . locis humidis in der Jungfernheide
passim. Majo. Junio.

169. *BROMUS inermis* panicula erecta, spiculis
subteretibus subulatis nudis submuticis. *Lin.*
syft. ed. R. I. p. 210.

Festuca speciosa panicula diffusa, spiculis tereti-
bus subulatis muticis aristatisque. *Schreb. spi-*
cil. fl. lips. 59. n. 1004.

Festuca Leysseri locustis teretibus, multifloris,
glumis semimembranaceis, breviter aristatis.
Moench haff. I. p. 41. n. 82.

Prope *Spandau* ad agrorum margines, ibidemque
auf dem Werder passim. Junio, Julio.

Certo Bromi species, nec *Festuca*.

170. *BROMUS sterilis* panicula patula, spiculis ob-
longis distichis, glumis subulato-aristatis.
Lin. syft. ed. R. I. p. 212.

Im Thiergarten & prope *Spandau* passim. Ae-
state.

171. *BROMUS arvensis* panicula nutante, spiculis
ovato-oblongis. *Lin. syft. ed. R. I. p. 212.*

β . Totus ruber.

Ad margines agrorum, sepes alibique passim.
Aestate.

172. *BROMUS tectorum* panicula nutante, spiculis
linearibus. *Lin. syft. ed. R. I. p. 213.*

In tectis stramineis, locis siccis, ad vias, sepes
inque versuris agrorum copiose. Junio.

173. *BROMUS giganteus* panicula nutante spiculis quadrifloris, aristis brevioribus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 214.*

Ad sepes prope *Fridrichsfelde* & in den *Papenberg* passim. Junio.

174. *BROMUS gracilis* culmo indiviso, spica nutante: spiculis alternis remotis teretibus subulatis glabris aristatis. *Leyss. halens. 26. n. 116.*

Bromus gracilis spica terminali debili, spiculis alternis remotis teretibus subulatis glabris, aristis longioribus. *Weigel. observ. botan. 15. tom. 1. fig. 11.*

In nemorosis umbrosis ad *Tegel* rarius. Julio.

175. *BROMUS pinnatus* culmo indiviso, spiculis alternis subsessilibus teretibus subaristatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 216.*

Bromus pinnatus spiculis sessilibus, culmo indiviso, aristis folliculi gluma brevioribus. *Pollich. pal. 1. p. 117. n. 117.*

In den *Papenberg*, & ad *Tegel* copiose. Junio.

AVENA. *Lin. gen. 97.*

Cal. 2 valvis, multiflorus: arista dorsali tortili in medio geniculata.

176. *AVENA elatior* paniculata, calycibus bifloris, flosculo hermaphrödito submutico, masculo aristato. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 221.*

Holcus avenaceus calycibus bifloris, arista floris masculi dorsali refracta. *Wiggers primit. 72. n. 775.*

In pratis pinguibus ad *Fridrichsfelde*, *Pancko*,
im Thiergarten & alibi frequens. Junio.
 Julio.

177. *AVENA sativa* paniculata, calycibus dispermis,
 feminibus laevibus altero aristato. *Lin. syst.*
ed. R. I. p. 222.

Culta passim occurrit. Aestate.

178. *AVENA orientalis* panicula coarctata secunda,
 spiculis bifloris horizontalibus parallellis, fe-
 minibus laevibus. *Schreb. spicil. 52. n. 987.*

In agris frequens colitur. Aestate.

179. *AVENA fatua* paniculata, calycibus trifloris,
 flosculis omnibus aristatis basi que pilosis. *Lin.*
syst. ed. R. I. p. 223.

Inter segetes, praecipue inter secale frequens.
 Julio. Augusto.

180. *AVENA pubescens* subspicata, calycibus sub-
 trifloris basi pilosis, foliis planis pubescenti-
 bus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 223.*

Circum *Spandau* copiose. Junio.

181. *AVENA flavescens* panicula laxa, calycibus tri-
 floris brevibus, flosculis omnibus aristatis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 224.

In der *Hasenheide* frequens. Junio. Julio.

182. *AVENA pratensis* subspicata, calycibus quin-
 quefloris. *Lin. syst. ed. R. I. p. 225.*

Avena pratensis panicula simplici, glumis quin-
 quefloris, foliis involutis nudis. *Huds. angl.*
ad 2. I. p. 52. n. 3.

Ad viam versus *Staaken* rarissime. Junio.

ARUNDO. *Lin. gen.* 99.

Cal. 2 valvis. *Flosculi* congesti. *Cor.* lanata.

183. ARUNDO *Phragmitis* calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Lin. syst. ed. R. 1. p.* 227.

In fluviis, lacubus, fossis, aquisque stagnantibus copiose. Augusto.

184. ARUNDO *epigejos* calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subtus glabris. *Lin. syst. ed. R. 1. p.* 228.

Im Thiergarten, prope Reineckendorf, Spandau auf den Schülerbergen, in der Spandauerheide ad littora der Spree & alibi copiose. Julio. Augusto.

Differt ab. *Arundine Phragmitide*

1) Panicula coarctata.

2) Aequali nec secunda.

ab. *Arundine arenaria.*

1) Panicula subramosa, nec spicata.

2) Panicula foliis longiore.

185. ARUNDO *Calamagrostis* corollis lanuginosis, calycibus unifloris laevibus, culmo ramoso. *Lin. syst. ed. R. 1. p.* 228.

Ad margines agrorum beim Gesundbrunnen, in pratis paludosis der Spandauerheide, alibi frequens. Julio.

Differt ab. *Arundine epigejos*

1) panicula tenuiori,

2) calycibus obtusis, nec longe acuminatis,

3) calycibus stramineis, nec margine caerulefcente.

186. *ARUNDO Agrostis* panicula oblonga, calycibus unifloris, petalo exteriori basi aristato. *Wiggers primit.* 10. n. 104. *Scop. carn. ed. 2.* n. 126.

Agrostis arundinacea panicula oblonga, petalo exteriore basi villoso aristaque torta calyce longiore. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 171.*

In der Jungfernheide ad viam a *Tegel* ad *Spandau* locis apricis passim. Julio.

Calyx bivalvis muticus glaber, uniflorus. Corolla bivalvis, valvula exterior major glabra, basi aristata: arista longa tortili, valvula interior minor obtusa, extus lanata.

187. *ARUNDO Halleri* panicula incrassata, calycibus unifloris, petalo exteriori bifido, apice aristato, arista brevissima.

Arundo locustis unifloris, ex summa gluma aristatis. *Hall. helv. n. 1521.*

Agrostis Calamagrostis panicula incrassata, petalo exteriore toto lanato apice aristato, culmo ramoso. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 171.* *Leers herborn. app. p. 285.*

In der Jungfernheide rarissime. Julio.

Calyx bivalvis glaber, acuminatus, corolla multo major. Corolla bivalvis valvula exterior major apice bifida, brevissime aristata, tota lana longissima aequali cincta.

LOLIUM, *Lin. gen. 101.*

Cal. 1 phyllus fixus multiflorus.

188. *LOLIUM perenne* spica mutica, spiculis compressis multifloris. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 230.*

β. Gramen loliaceum spica lata ex plurimis spicis duplici versus dispositis constante. *Scheuchz. agroft. 29. t. 2.*

In ambulacris hortorum, pascuis ficcis, ad vias copiosissime. Aestate.

189. *LOLIUM tenue* spica mutica tereti, spiculis trifloris. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 230.*

Unter den Linden in urbe ipsa semel legi. Aestate.

Forte varietas antecedentis.

190. *LOLIUM temulentum* spica aristata, spiculis compressis multifloris. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 231.*

Inter segetes frequens. Junio. Julio.

d. Gramina spicata: receptaculo subulato.

ELYMUS. Lin. gen. 102.

Cal. 2 valvis, lateralis, aggregatus, multiflorus.

191. *ELYMUS europaeus* spica erecta: spiculis bifloris, involucro aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 233.*

Hordeum spicis rigidis cylindricis, calycinis glumis aristatis. *Hall. helv. n. 1527.*

Hordeum cylindricum. Murray prodrom. 43. Reich. fl. moenofr. n. 78.

In

In der Jungfernheide, unico tantum loco copiose. Julio. Augusto.

SECALE. *Lin. gen.* 103.

Cal. oppositus 2 valvis 2 florus solitarius.

192. SECALE *cereale* glumarum ciliis scabris. *Lin. syst. ed. R. I. p. 234.*

Cultum copiosissime obvium. Aestate.

HORDEUM. *Lin. gen.* 104.

Cal. lateralis, bivalvis, uniflorus, ternus.

193. HORDEUM *vulgare* flosculis omnibus hermaphroditis aristatis; ordinibus duobus exterioribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 235.*

Colitur hic frequens. Aestate.

Offic. Semina decorticata sub nomine Hordeum perlatum.

194. HORDEUM *hexastachyon* flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, feminibus sexfariam positus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 235.*

Passim cultum occurrit. Aestate.

195. HORDEUM *murinum* flosculis lateralibus masculis longe aristatis, involucris omnibus scabris, intermediis ciliatis.

Hordeum murinum flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 237. α.*

Ad vias, fossas, in pratis, ubique fere copiosissime. Aestate.

196. *HORDEUM secalinum* flosculis lateralibus masculis breviter aristatis, involucris omnibus scabris, intermediis nudis.

Hordeum secalinum flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris seraceis scabris. *Schreb. spicil.* 148. n. 1167.

Hordeum murinum. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 237. β .
Ad pagos, fepes, inque pratis passim. Julio. Augusto.

TRITICUM. *Lin. gen.* 105.

Cal. 2 valvis solitarius, subtriflorus. *Corolla* 2 valvis obtusa *Receptaculi* basis callosa.

197. *TRITICUM aestivum* calycibus quadrifloris ventricosus, glabris, imbricatis, aristatis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 233.

Colitur hinc inde. Aestate.

198. *TRITICUM hybernium* calycibus quadrifloris ventricosus laevibus imbricatis submuticis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 238.

Cultum passim vidi. Aestate.

199. *TRITICUM repens* calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 241.

In agris, cultis, hortisque copiosissime. Aestate.
Offic. Radix Graminis minoris.

TRIGYNIA.

MONTIA. *Lin. gen.* 107.

Cal. 2 phyllus. *Cor.* 1 petala irregularis, *Caps.* 1 locularis trivalvis.

200. *MONTIA fontana* foliis oblongo-oratis, subcarnosis; pedunculis unifloris, fructiferis deflexis. *Moench. haff. I, n. 109. Lin. syst. ed. R. I. p. 244.*

Locis humidis ad *Stegliz* frequens. Majo.

HOLOSTEUM. Lin. gen. 110.

Cal. 5 phyll. Cor. 5 petala. Caps. 1 locularis subcylindrica, apice dehiscens.

201. *HOLOSTEUM umbellatum* floribus umbellatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 246.*

Ad sepes inque agris & arvis frequens. Aprili. Majo.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA
MONOGYNIA.

a. Flores aggregati, monopetali, monospermî, superi.

DIPSACUS. *Lin. gen.* 120.

Cal. communis polyphyllus: proprius superus.
Receptaculum palcaceum.

202. DIPSACUS pilosus foliis petiolatis appendiculatis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 275.

Ad *Schoeneberg* rarius. Julio. Augusto.

SCABIOSA. *Lin. gen.* 121.

Cal. communis polyphyllus: proprius duplex superus. *Receptacul.* paleaceum. f. nudum.

* *Corollis* quadrifidis.

203. SCABIOSA Succisa corollis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 277.

β. Caule prolifero.

γ. Succisa hirsuta. *Bauh. pin.* 369.

•. Flore albo.

In pratis nemorosis humidis frequens. e. g. prope *Spandau in der Jungfernheide* &c. Julio. Augusto.

Offic. Radix Morfus Diaboli. f. Succifae. (*Herba Succifae.*)

204. *SCABIOSA arvensis* corollis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incis, caule hispido. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 279.*

In versuris agrorum, pascuis, pratis siccis, similibusve locis frequens. Junio. Julio.

Foliorum figura valde variabilis.

Offic. Herba Scabiofae. (*Radix & Flores.*)

* * *Corollis quinquefidis.*

205. *SCABIOSA columbaria* corollis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 280.*

In agris, arvis, pascuis, agrorum versuris passim. c. g. in den Papenberg, versus Schoenberg, Spandau &c. Julio. Augusto.

b. Flores stellati, monopetali, dicocci, superi.

ASPERULA. Lin. gen. 128.

Cor. 1 petala infundibuliformis. *Scm. 2.* globosa.

206. *ASPERULA odorata* foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 294.*

Im Briselang locis nemorosis humidis umbrosis frequens. Majo.

Offic. Herba Matrisylvae, f. Hepticae stellatae.

207. *ASPERULA tinctoria* foliis linearibus: inferioribus senis; intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 295.*

In den Papenberggen frequens. Majo. Junio.

208. *ASPERULA cynanchica* foliis quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto, floribus quadrifidis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 296.*
In collibus apricis ad Fridrichsfelde, Rummelsburg, prope Spandau auf dem Schülerberg & alibi frequens. Aestate.

Offic. (Herba Cynanchica.)

GALIUM. Lin. gen. 132.

Cor. 1 petala plana. Sem. 2, subrotunda:

** Fructu glabro.*

209. *GALIUM palustre* foliis quaternis obovatis inaequalibus; caulibus diffusis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 299.*

Ante portam Halensem; ad Strahlau & alibi humidis uliginosisque locis satis frequens; Junio.

210. *GALIUM uliginosum* foliis senis lanceolatis retrorsum ferratoaculeatis mucronatis rigidis; corollis fructu majoribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 300.*

In pratis paludosis; ad fossas passim. Junio.

211. *GALIUM spurium* foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis geniculis sim-

plicibus, fructibus glabris. *Lin. syst. ed. R.*
I. p. 301.

Im Thiergarten locis nemorosis & alibi passim.
Aestate.

212. *GALIUM verum* foliis octonis linearibus fulcatis, ramis floriferis brevibus. *Lin. syst. ed. R.* I. p. 302.

In nemoribus, pascuis, pratis, dumetis copiose.
e. g. *im Thiergarten, Jungfernheide, Hasenheide, Spandauerheide* &c. Junio. Julio.

Offic. (Herba Galii lutei florens.)

* *Fructu hispido.*

213. *GALIUM boreale* foliis quaternis lanceolatis trinerviis, glabris, caule erecto, feminibus hispidis. *Lin. syst. ed. R.* I. p. 305.

Iisdem locis frequens. Majo. Junio.

214. *GALIUM Aparine* foliis octonis lanceolatis carinis scabris retrorsum aculeatis geniculis villosis, fructibus hispidis. *Lin. syst. ed. R.* I. p. 306.

In sepibus, dumetis, ad pagos inque nemoribus frequens. Majo. Junio.

c. *Flores monopetali, monocarpi inferi.*

PLANTAGO. *Lin. gen.* 148.

Cal. 4 fida corolla brevior. *Cor.* 4 fida: limbo reflexo. *Stam.* longissima. *Caps.* 2 locularis circumscissa.

* *Scapo*

* *Scapo nudo.*

215. *PLANTAGO major* foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricata. *Lin. syst. ed. R. I. p. 319.*

β. *Plantago latifolia* glabra minor. *Bauh. pin. 189.*

γ. Foliis dentatis.

Ad vias, in versuris, pratisque ficcis copiosissime. Aestate.

Offic. Herba Plantaginis. (Semina Radix.)

Varietas γ. & ε. *Linnei (Plantago rosea)* specie a nostra differt, quum *P. major* semper perennis; *P. rosea* vero biennis.

216. *PLANTAGO media* foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. *Lin. syst. ed. R. I. p. 319.*

β. *Plantago latifolia hirsuta* minor. *Bauh. pin. 189.*

In viis, pratis pascuisque copiose. Aestate.

Flores odorati, & ad aquam distillatam meliores, istis *Plantaginis* majoris.

217. *PLANTAGO lanceolata* foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Lin. syst. ed. R. I. p. 321.*

Iisdem locis vulgaris. Aestate.

Offic. (Herba Plantaginis minoris.)

** *Caule ramoso.*

218. *PLANTAGO Psyllium* caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 324.*

In agris arenosis inter fegetes copiose. Julio.
Augusto.

Offic. Semen Pſyllii.

CENTUNCULUS. *Lin. gen.* 151.

Cal. 4 fidus, corolla longior. *Cor.* 4 fida patens.

Stam. brevia: *Capſul.* 1 locularis circumſciſſa.

219. CENTUNCULUS *minimus* foliis alternis ovatis. *Flor. ſuec.* 129. 136. *Lin. ſyſt. ed. R. 1.* p. 326.

Inter Schoeneberg & Faſanerie in colle arenoso, hinter Falkenhagen, in via verſus Bredow paſſim. Augusto.

d. Flores monopetali, monocarpi,
superi.

SANGUISORBA. *Lin. gen.* 152.

Cal. 2 phyllus. *Germen* inter calycem corollamque.

220. SANGUISORBA *officinalis* ſpicis ovatis. *Lin. ſyſt. ed. R. 1.* p. 327.

Im Thiergarten & Papenberg, in pratis humidis frequens. Julio. Augusto.

Offic. (*Radix Pimpinellae italicae. ſ. Sanguisorbae.*)

e. Flores tetrapetali, superi.

TRAPA. *Lin. gen.* 165.

Cal. 4 partit. *Cor.* 4 petala. Nux ſpinis oppoſitis cincta e calyce ortis.

221. *TRAPA natans* nucibus quadricornibus: spinis patentibus. *Lin. suppl. pl.* 128. *Lin. syst. ed. R.* I. p. 341.

Trapa foliis natantibus, petiolis ventricosiss. *Hall. helv.* n. 527.

In der Müggelsee prope Coepnik frequens.
Junio.

Offic. (Nuces aquaticae.)

CORNUS. *Lin. gen.* 155.

Involucr. 4 phyllum. *Petala* supera 4. *Drupa* nucleo 2 locu ari.

222. *CORNUS mascula* arborea, umbellis involu-
crum aequantibus. *Lin. syst. ed. R.* I. p. 331.

Im Thiergarten passim. Martio. Aprili.

Offic. Fructus Corni.

223. *CORNUS sanguinea* arborea, cymis nudis,
ramis rectis. *Lin. syst. ed. R.* I. p. 331.

In den Papenbergen, Thiergarten & alibi frequens.
Majo. Junio.

f. Flores incompleti superi.

VISCUM. *Lin.* 1209.

♀. ♂. *Cal.* 4 partitus. *Cor.* O. *Fil.* O. *Anth.*
calyci adnatae.

♀. *Cal.* 4 phyllus superus. *Cor.* O. *Styl.* O.
Bacca 1 sperma. *Semen* cordatum.

224. *VISCUM album* foliis lanceolatis obtusis, caule
dichotomo, spicis axillaribus. *Lin. syst. ed. R.*
4. p. 240.

Im Thiergarten, Grunewald, Hasenheide, Jungfernheide & alibi in pinis, quercubus aliisque arboribus frequens, parasiticum. Aprili. Majo. Offic. Stipites Visci quercini.

g. Flores incompleti, inferi

ALCHEMILLA. *Lin. gen.* 177.

Cal. 8 fidus. *Cor.* O. *Sem.* 1.

225. *ALCHEMILLA vulgaris* glabra, foliis novem lobatis ferratis.

Alchemilla vulgaris foliis lobatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p.* 349.

In pratis pinguibus ad Schoenhausen, Blankfelde infrequens. Junio. Julio.

Offic. Herba Alchemillae,

226. *ALCHEMILLA Aphanes* hirsuta, foliis trilobis, lobis tri- & bipartitis. *Lcers herborn.* 54. n. 122.

Aphanes arvensis. Lin. syst. ed. R. 1. p. 350.

In agris nach der Hasenheide zu, versus Seeburg & alibi frequens. Julio. Augusto.

URTICA. *Lin. gen.* 1149.

- ♂—♀. ♂. *Cal.* 4 phyllus. *Cor.* O. *Nectar.* centrale cyathiforme.

♀. *Cal.* 4 phyllus, foliis 2 oppositis minutissimis. *Cor.* O. *Stigma* villosum *Sem.* 1 nitidum.

227. *URTICA urens* foliis oppositis ovalibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p.* 130.

In cultis, hortis, ad vias fepes, & dumeta copiose. Aestate,

Offic.

Offic. Herba urticae minoris.

228. *URTICA dioica* foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 130.*

In ruderatis, pascuis, nemoribus, ad vias & sepes ubique copiosissime. Aestate.

Offic. (*Radix, Herba & Semina Urticae majoris.*)

DIGYNIA.

BETULA. Lin. gen. 1147.

- ♂—♀. ♂. *Ament.* squamis 3. 3 floris. *Cor.* 4 partita.

♀. *Ament.* squamis 3. 2 floris. *Cor.* O. *Semen* saepius utrinque alatum.

229. *BETULA alba* foliis ovatis acuminatis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 125.*

α. Foliis ovato-triangularibus, glabris: virgulis pendulis.

β. Foliis acute triangularibus, scabris, virgulis erectis.

In nemoribus copiose. Aprili. Majo.

Offic. Succus Betulae & Folia.

Numne α & β species distinctae?

230. *BETULA Alnus* foliis subrotundis, glutinosis, glabris, obtuse crenatis, pedunculis ramosis.

Betula Alnus pedunculis ramosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 127.*

β. *Betula quercifolia. Lüders nomencl. fl. march. 14.*

In humidis nemorosis pratisque copiosissime.
 Variet. β . *in Thiergarten* rarius. Februario.
 Aprili.

Offic. Cortex Alni.

In varietate β , folia sunt oblonga sinuata, laciniis obtuse dentatis, illis *Quercus Roboris* simillima.

Semina semper absque alis in *Betula Alno*, non pro charactere generico sufficiunt; quum *Betulam americanam* apud *Illustr. a Burgsdorf in Tegel* vidi, cui semina uno latere minutissime alata sunt, & quae *Betulam* & *Alnum* conjungit.

CUSCUTA. *Lin. gen.* 182.

Cal. 4 fidus. *Cor.* 1 petala 4 fida. *Capf.* 2 locularis, circumscissa.

231. *CUSCUTA europaea* floribus sessilibus, confertis, quadrifidis. *Retz. prod. fl. scand.* n. 180.

Cuscuta europaea floribus sessilibus. *Lin. syst. ed.* R. I. p. 352.

In agris praecipue inter linum, ad sepes, in canabe, urtica, aliisque plantis frequens. e. g. ad *Strahlow*, *Spandau* &c. Julio. Augusto.

Offic. (*Herba Cuscutae.*)

TETRAGYNIA.

I L E X. *Lin. gen.* 184.

Cal. 4 dentatus. *Cor.* rotata. *Styl.* O. *Bacca* 4 sperma.

232. *Ilex Aquifolium* foliis ovatis acutis spinosis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 354.

Im Thiergarten prope venatorem aulicum rarius.
Majo.

POTAMOGETON. *Lin. gen. 186.*

Cal. O. Petala 4. Styl. O. Semina quatuor.

233. POTAMOGETON *natans* foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 355.*

In aquis stagnantibus im Thiergarten & alibi frequens. Junio.

234. POTAMOGETON *perfoliatum* foliis cordatis amplexicaulibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 355.*

In der Spree & Havel frequens. Junio.

235. POTAMOGETON *lucens* foliis lanceolatis planis in petiolos descendentibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 356.*

In fluviis & lacubus frequens. e. g. versus Spandau prope den Stern, im Grunewalde & prope Strahlow. Junio.

236. POTAMOGETON *crispum* foliis lanceolatis alternis, oppositisve undulatis ferratis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 356.*

In fossis, aquisque stagnantibus im Thiergarten, Jungfernheide inque fluviis copiose. Majo.

237. POTAMOGETON *compressum* foliis linearibus obrusis, caule compresso. *Lin. syst. ed. R. I. p. 357.*

Im

Im Grunewalde in fossis lacubusque frequens.
Junio.

238. *POTAMOGETON gramineum* foliis lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus.
Lin. syst. ed. R. I. p. 358.

Versus *Spandau* prope *den Stern* in fluviis passim. Junio.

SAGINA. Lin. gen. 188.

Cal. 4 phyll. Cor. 4 petala. Caps. 4 locularis, 4 valvis polysperma.

239. *SAGINA procumbens* ramis procumbentibus.
Lin. syst. ed. R. I. p. 359.

♂. Floribus apetalis.

In pascuis humidis *beim Invalidenhaus*, prope *Rummelsburg, Gesundbrunnen* & alibi frequens.
♂. in ollis hortulanorum. Aestate.

CLASSIS V.

PENTANDRIA
MONOGYNIA.

a. Flores monopetali, inferi, tetraspermi.

MYOSOTIS. *Lin. gen.* 192.

Cor. hypocrateriformis, 5 fida, lobis emarginatis, fauce clausa fornicibus.

240. MYOSOTIS *arvensis* feminibus laevibus, caule ramofo, foliis ovato-lanceolatis hirtis.

Myosotis annua caule ramofo, foliis ovato-lanceolatis. *Moench. haff. n.* 153.

Myosotis scorpioides feminibus laevibus, foliorum apicibus callofis. *Lin. syst. ed. R. 1. p.* 383. variet. α *arvensis*.

In agris, arvis, pascuis ubique vernali tempore.

241. MYOSOTIS *scorpioides* caule subsimplici, foliis lineari-lanceolatis, feminibus laevibus.

Myosotis perennis caule subramoso, foliis ligulatis. *Moench. haff. n.* 154.

Myosotis scorpioides β . *palustris* *Lin. syst. ed. R. 1. p.* 383.

α . Foliis glabris.

β . Foliis subhispidis.

In fossis, paludibus, pratis humidis, locisque uliginosis abunde aestate.

- 242: *MYOSOTIS Lappula* feminibus acuteis glomulosis, foliis lanceolatis pilosis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 384.*

Im Thiergarten rarius. Junio. Julio.

LITHOSPERMUM. Lin. gen. 193.

Cal. 5 partitus. Cor. infundibuliformis, fauce perforata nuda.

- 243: *LITHOSPERMUM arvense* feminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 385.*

In agris & arvis copiose. Majo. Junio.

ANCHUSA. Lin. gen. 194.

Cor. infundibuliformis, fauce clausa fornicibus. Sem. basi insculpta.

- 244: *ANCHUSA officinalis* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 387.*

In ruderatis, ad sepes, dumeta & pagos abunde. Junio.

Offic. Flores, Radices Buglossi. (Herba.)

CYNOGLOSSUM. Lin. gen. 195.

Cor. infundibuliformis, fauce clausa fornicibus. Semina depressa, interiore tantum latere stylo adfixa.

- 245: *CYNOGLOSSUM vulgare* staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 390.*

In ruderatis, nemerosis, ad vias & sepes passim.

Majo. Junio.

Offic. Radix Cynoglossi. (*Herba.*)

PULMONARIA. *Lin. gen.* 196.

Cal. prismaticeo pentagonus. *Cor.* infundibuliformis, fauce pervia pilosa.

246. PULMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato cordatis scabris. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 393.

β. Pulmonaria non maculoso folio. *Clus. hist.* 2. p. 168.

Locis umbrosis *im Briselang* frequens. Majo.

Offic. Herba Pulmonariae maculosae.

SYMPHYTUM. *Lin. gen.* 197.

Corollae limbus tubulato-ventricosus: fauce clausa radiis subulatis.

247. SYMPHYTUM *officinale* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 394.

In fossis, pratis paludosis *im Thiergarten, Jungfernheide* & alibi copiose. Majo. Junio seq.

Offic. Radix Consolidae majoris.

Flores rarissime albi.

BORAGO. *Lin. gen.* 200.

Cor. rotata: fauce coronata prominentiis emarginatis.

248. BORAGO *officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus parentibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 327.

β. Flore albo.

In ruderatis interdum, in hortis frequens.
Junio.

Offic. Herba & Flores Boraginis.

ASPERUGO. *Lin. gen.* 201.

Cal. fructus compressus: lamellis plano-parallelis, sinuatis.

249. ASPERUGO *procumbens* calycibus fructus compressis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 399.

In ruderatis ad pagos v. g. ad *Pancko, Schoenhau-
sen, Reineckendorf* & alibi frequens. Majo.

LYCOPSIS. *Lin. gen.* 202.

Cor. infundibuliformis, tubo incurvato.

250. LYCOPSIS *pulla* foliis integerrimis, caule erecto, calycibus fructescentibus inflatis pendulis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 400.

Im Thiergarten rarissima, semel tantum lecta.
Majo.

251. LYCOPSIS *arvensis* foliis lanceolatis hispidis, calycibus florentibus erectis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 400.

In agris, cultis, inter segetes frequens. Aestate.

ECHIUM. *Lin. gen.* 203.

Cor. irregularis, fauce nuda.

252. ECHIUM *vulgare* caule tuberculato, hispido, foliis caulinis lanceolatis, floribus spicatis lateralibus. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 403.

β. Flore albo.

In ruderatis, ad vias, margines agrorum, in sepibus, dumetis copiosissime: Aestate.

b. Flores monopetali, inferi, angiospermi.

PRIMULA. *Lin. gen.* 210.

Involucrum umbellulae. *Cor.* infundibuliformis; ore patulo. *Stigma* globosum.

253. PRIMULA *veris* foliis dentatis rugosis, scapo multifloro, limbo corollarum concavo. *Huds. angl. ed. 2. tom. 1. p. 84. n. 2.*

Primula veris foliis dentatis rugosis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 411. α. officinalis.*

Im Briscelang copiose, ad *Pancko* passim &c. Majo.

Offic. Flores *Primulae veris* f. *Paralyseos*. (*Radix & Herba.*)

MENYANTHES. *Lin. gen.* 215.

Cor. hirsuta. *Stigma* bifidum. *Caps.* 1. *locularis.*

254. MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 416.*

Im Thiergarten, prope *der Charité* & alibi frequens. Majo.

Offic. Herba *Trifolii febrini.*

HOTTONIA. *Lin. gen.* 216.

Cor. hypocrateriformis. *Stam.* tubo corollae imposita. *Caps.* 1. *locularis.*

255. *HOTTONIA palustris* pedunculis verticillato-multifloris. *Lin. syst. ed. R. I. p. 416.*

In fossis aquisque stagnantibus ad *Schoeneberg*,
im Thiergarten, *Jungfernheide* & alibi co-
piose. Majo. Junio.

ANAGALLIS. Lin. gen. 220.

*Cor. rotata. Stigma capitatum. Caps. 1 locu-
laris circumscissa.*

256. *ANAGALLIS arvensis* caule procumbente, fo-
liis ovato-lanceolatis calycis segmentis lan-
ceolatis. *Hall. helv. 625.*

Anagallis arvensis foliis indivisis, caule procum-
bente. *Lin. syst. ed. R. I. p. 423. β.*

Anagallis phoeniceo flore. *Bauh. pin. 252.*

In agris, arvis, pascuis, cultis, hortisque fre-
quens. Aestate.

Offic. Herba Anagallidis.

257. *ANAGALLIS caerulea* caule procumbente, fo-
liis ovato-lanceolatis, calycis segmentis subu-
latis. *Hall. helv. 626. Schreb. spicil. p. 5.*

Anagallis arvensis α. Lin. syst. ed. R. 423.

In agris ad *Schoeneberg* & ante *portam Halensem*
rarius. Aestate.

Variat corollis integris ac ferratis.

Certo specie distincta, saepius *A. arvensis* &
hanc speciem diversis in ollis variis humi spe-
ciebus repletis feminavi, & semper constanter
manserunt.

LYSIMACHIA. *Lin. gen.* 219.

Cor. rotata. *Stigma* obtusum. *Capsula* 1 locularis, globosa, mucronata, 10 valvis.

* *Floribus racemosis.*

258. *LYSIMACHIA vulgaris* paniculata: racemis terminalibus. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 419.

Lyfimachia foliis ovato-lanceolatis, spicis paniculatis. *Hall. helv. n.* 630:

Ad latera fossarum, paludum, rivulorum, fluvium & aliis locis copiose. Julio. Augusto.

Variat foliis simpliciter oppositis, ternatis, quaternis, usque quinis.

Offic.. (Lyfimachiae Herba.)

259. *LYSIMACHIA thyrsiflora* racemis lateralibus pedunculatis. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 420.

In der Jungfernheide ad viam versus *Spandau* & *in den Papenbergen an der Havel* frequens.

Folia integerrima sessilia lanceolata racemis longiora. Racemi cylindrici axillares pedunculati.

** *Floribus solitariis.*

260. *LYSIMACHIA Nummularia* foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 422.

In nemorosis humidis; im Thiergarten, Jungfernheide alibique frequens. Junio. Julio.

Offic. Herba Nummulariae.

VINCA. *Lin. gen.* 322.

Contorta. Folliculi 2 erecti. *Sem.* nudâ:

261. *VINCA minor* caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 593.*

Im Thiergarten prope venatorem aulicum, ac si spontanea. Aprili. Majo.

Faux corollae pilosa. Styli bini adglutinati; interdum separati. Variat glandulis ad germen 2. 3. usque 4.

Offic. Herba Vincae Pervincae.

CONVOLVULUS. Lin. gen. 231.

Cor. campanulata plicata. Stigmata 2, Capsula 2 locularis: 2 sperma.

262. *CONVOLVULUS arvensis* foliis sagittatis, utrinque acutis, pedunculis unifloris, calyce nudo.

Convolvulus arvensis foliis sagittatis, utrinque acutis, pedunculis subunifloris. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 434.*

In agris, arvis, cultis copiose. Aestate.

Flores rubri solum argillosum indicant.

263. *CONVOLVULUS sepium* foliis sagittatis, postice truncatis, pedunculis unifloris bracteatis: bracteis cordatis calyce longioribus.

Convolvulus sepium foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 434.*

Locis humidis ad sepes, dumeta frequens. Aestate.

VERBASCUM. *Lin. gen.* 262.

Cor. rotata subinaequalis. *Fil.* barbata. *Caps.* bilocularis.

264. VERBASCUM *Thapsus* foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 492.

Ante portam Halenssem & Oranienburgicam in collibus arenosis alibique coiose. Julio, Augusto. *Offic.* Herba & Flores Verbasci.

265. VERBASCUM *Lychnitis* foliis cuneiformibus oblongis. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 493.

Ad vias, sepes, dumeta, inque coemeteriis pagorum frequens. Junio. Julio.

266. VERBASCUM *nigrum* foliis cordato-oblongis petiolatis. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 494.

In nemorosis, ad vias & pagos abunde. Junio. Julio.

Offic. (*Radix Verbasci.*)

Celsiae genus, a Verbasco tantum numero staminum differt, & cum hoc conjungendum.

DATURA. *Lin. gen.* 263.

Cal. tubulosus angulatus, deciduus; basi orbiculata persistente. *Cor.* infundibuliformis pllicata. *Caps.* 2 locularis 4 valvis.

267. DATURA *Stramonium* pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 497.

In ruderatis ad pagos passim. Julio.

Offic. Herba & Semina Stramonii. s. Daturae.

Planta narcotica venenata, nuperrime nos experientia virositatem illius docuit. Aestate 1781. prope *Spandau auf dem Gewehrplan* puer a feminibus comestis delirio vitam finivit.

HYOSCYAMUS. *Lin. gen.* 264.

Cor. infundibuliformis obtusa. *Stam.* inclinata.
Capf. operculata 2 locularis.

268. HYOSCYAMUS *niger* foliis amplexicaulibus sinuatis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 499.

Ad pagos in ruderatis, & coemeteriis copiose.
Junio. Julio.

Offic. Semina Hyoscyami. (*Radix Herba.*)

SOLANUM. *Lin. gen.* 268.

Cor. rotata. *Anth.* subcoalitae, apice poro gemino dehiscentes. *Pomum* biloculare.

269. SOLANUM *Dulcamara* caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 511.

In humidis paludosis, ad fossas *im Thiergarten, Jungfernheide* &c. frequens. Junio. Julio.

Offic. Stripites Dulcamarae, (*Radix.*)

270. SOLANUM *tuberosum* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis subdivisis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 513.

β. Flore violaceo.

In agris & hortis copiose cultum. Julio. Augusto.

271. *Solanum nigrum* caule inermi, herbaceo, ramis subteretibus asperis, foliis ovatis angulatis glabris, racemis nutantibus.

Solanum nigrum caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato angulatis, racemis distichis nutantibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 514. α.*

In ruderatis ad pagos, sepes, locis cultis, ubique. Aestate.

Offic. Herba Solani.

272. *Solanum villosum* caule inermi herbaceo, ramis teretibus villosis, foliis ovatis angulatis subvillosis, racemis nutantibus.

Solanum nigrum γ. *villosum*. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 515.*

In urbe ipsa versus *portam Strahlowianam* ad sepes in ruderatis frequens. Aestate.

Specie a Solano nigro distincta, semper e femine constans. *Solanum virginicum* vero mihi majori jure, varietas Solani nigri esse videtur.

c. *Flores monopetali superi.*

PHYTEUMA. *Lin. gen. 236.*

Cor. rotata 5 partita: laciniis linearibus a basi ad apicem aperientibus. *Stigma* 2 vel 3 fidum. *Capsula* 2 f. 3 locularis polysperma.

273. *PHYTEUMA* ^{nan}*spicata* spica oblonga, capsulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 471.*

Rapunculus foliis radicalibus cordatis, tubis bicornibus revolutis. *Hall. helv.* 684.

In pratis prope *Briselang* passim. Majo. Junio. Semper flore albo.

CAMPANULA 234.

Cor. campanulata, fundo clauso valvis stamiferis. *Stigma* 3 fidum. *Capsula* poris laterilibus dehiscens.

* *Foliis laevioribus angustioribus.*

274. CAMPANULA *rotundifolia* foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 455.

In nemoribus, pascuis, ad vias, versuras & sepes frequens. Aestate.

275. CAMPANULA *patula* foliis strictis radicalibus lanceolato-ovalibus panicula patula. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 455.

In pascuis nemorosis ad *Reineckendorf* & *Tegel* frequens. Junio.

276. CAMPANULA *persicifolia* foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subferratis sessilibus remotis. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 456.

β. Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore. *Bauh. pin.* 93.

In den *Papenberg*en, *Jungfernheide*, prope *Tegel* frequens. Julio. Augusto.

* * *Foliis scabris latioribus.*

277. *CAMPANULA latifolia* foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus solitariis peduncularis, fructibus cernuis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 418.*

In den Papenbergen rarius. Julio.

278. *CAMPANULA rapunculoides* foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis, sparsis, calycibus reflexis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 458.*

In cultis & inter segetes rarius. Julio.

279. *CAMPANULA Trachelium* caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 460.*

In sepibus, dumetis, nemoribus. e. g. ad Tegel, Schoeneberg, Reineckendorf &c. passim. Julio. Augusto.

280. *CAMPANULA glomerata* caule angulato simplici floribus sessilibus, capitulo terminali. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 460.*

In den Papenbergen, ad Tegel & alibi frequens. Aestate.

d. Flores pentapetali inferi.

RHAMNUS. Lin. gen. 284.

Cal. tubulosus: *squamis* oris 5 convergentibus. *Cor. O. Bacca* subrotunda 3 f. 4 sperma.

281. *RHAMNUS catharticus* spinis terminalibus, floribus 4 fidis dioicis, foliis ovatis crenatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 539.*

Ante portam Halensem im Aufstall, im Thiergarten prope venatorem aulicum & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. Baccae Spinae Cervinae.

282. *RHAMNUS Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis, *Lin. syst. ed. R. 1. p. 543.*

Im Thiergarten, prope Reineckendorf & alibi copiose. Majo. Junio.

Offic. Cortex Frangulae.

EVONYMUS. Lin. gen. 291.

Cor. 5 petala. Capsula 5 gona 5 locularis, colorata. Semina arillata.

283. *EVONYMUS europaeus* floribus subquadrifidis, fructibus apteris, foliis ovatis acutis ferratis.

Evonymus europaeus floribus plerisque quadrifidis, foliis sessilibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 554.*

Im Thiergarten, prope Reineckendorf, in via versus Schoenewald trans pontem lapideum ad fossam & alibi frequens. Majo.

VITIS. Lin. gen. 305.

Petala apice cohaerentia, emarcida. Bacca 5 sperma supera.

284. *VITIS vinifera* foliis lobatis sinuatis nudis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 569.*

Fre-

Frequens culta. Junio.

Offic. Succus Baccarum fermentatus.

e. Flores pentapetali superi.

RIBES. *Lin. gen.* 301.

Petala 5 & Stamina calyci inserta. Stylus 2 fidus.
Bacca polysperma.

285. RIBES *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 564.

Im Thiergarten frequens. Aprili. Majo.

Offic. Baccae Ribium rubrorum.

286. RIBES *nigrum* inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 565.

Locis depressis in der Jungfernheide passim. Aprili. Majo.

Offic. Baccae Ribium nigrorum.

287. RIBES *Grossularia* ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis. *Lin. syst. ed. R. 1.* p. 566.

In nemoribus passim, ad sepes vulgaris. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide &c. Aprili. Majo.

HEDERA. *Lin. gen.* 304.

Petala 5 oblonga. Bacca 5 sperma, calyce cincta.

288. HEDERA *Helix* floribus umbellatis, foliis floralibus ovatis, inferioribus lobatis.

Hedera Helix foliis ovatis lobatisque. Lin. syst. ed. R. 1. p. 568.

Im Thiergarten, Papenberg & alibi passim.
 Augusto. Septembri.

Offic. Folia & Resina Hederae arboreae. (Lignum Baccæ.)

Involucrum umbellae minimum.

f. Flores incompleti inferi.

ILLECEBRUM. *Lin. gen.* 313.

Cal. 5 phyllus, cartilagineus. *Cor.* O. *Stigma* simplex. *Caps.* 5 valvis monosperma.

289. ILLECEBRUM *verticillatum* floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p.* 581.

Paronychia serpillifolia palustris. Vaill. parif.
157. t. 15. f. 1.

In pratis humidis ad Reineckendorf, & Fridrichsfelde copiose. Inter Charlottenburg & Grunewald, prope den Gesundbrunnen alibique frequens. Augusto. Septembri.

g. Flores incompleti superi.

THESIUM. *Lin. gen.* 315.

Cal. 1 phyllus, cui stamina inserta. *Nectaria* filiformia calyci inserta erecta. *Sem.* unicum.

290. THESIUM *Linophyllum* panicula foliacea, foliis linearibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p.* 585.

Im Thiergarten passim. Prope Spandau & in den Papenberg frequens. Majo. Junio.

DIGYNIA.

a. Flores monopetali inferi.

ASCLEPIAS. *Lin. gen.* 333.

Contorta. Nectaria 5 ovata, corniculum exserentia.

291. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis cordato-ovatis basi subpilosis, caule erecto, floribus fasciculatis:

Asclepias Vincetoxicum foliis ovatis basi barbatis, caule erecto umbellis proliferis. *Lin. syst. ed. R. t. p.* 611.

In den Papenbergen, auf dem Werder prope Spandau copiose, prope Tegel passim. Junio. Julio.

Offic. Radix Vincetoxici.

GENTIANA. *Lin. gen.* 352.

Cor. 1 petala. *Caps.* 2 valvis unilocularis. *Receptaculis* 2 longitudinalibus.

292. GENTIANA *Pneumonanthe* corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 638:

Pneumonanthe Cordi. Lüders nomcl. fl. march. 60:

In pratis humidis ad Spandau, ante portam Halensem, prope Fridrichsfelde & alibi frequens: Julio. Augusto.

293. GENTIANA *Amarella* corollis quinquefidis hypocrateriformibus; fauce barbatis. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 644:

In pascuis versus *Gruncwald* rarissima. Septembri.

Offic. (*Herba Gentianellae.*)

294. *GENTIANA Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 642.*

β. *Centaurium minus palustre ramosissimum*, flore purpureo. *Vaill. parif. 32. t. 6. f. 1.*

γ. *Centaurium minimum* flore inaperta. *Vaill. parif. 32. t. 6. f. 2.*

In pratis ad *Spandau* frequens, alibi passim. β. & γ. prope *Charlottenburg* versus *Gruncwald* passim. Julio:

Offic. *Herba florens Centaurii minoris.*

b. Flores incompleti.

ULMUS. *Lin. gen. 345.*

Cal. 5 fidus. Cor. O. Capsula 1 sperma alata.

295. *ULMUS campestris* foliis duplicato-ferratis, basi inaequalibus; floribus subsessilibus conglomeratis.

Ulmus campestris foliis duplicato-ferratis basi inaequalibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 631.*

In plateis & ad vias ante urbem, ad pagos inque nemoribus frequens. Aprili. Majo.

Offic. *Cortex Ulmi. (Folia.)*

296. *ULMUS effusa* foliis duplicato-ferratis, basi inaequalibus; floribus longe pedunculatis effusis.

Iisdem

Iisdem locis passim. Aprili. Majo.

Flores 4 plo majores longe pedunculati effusi, a praecedenti diversissimi. *Ulmus hollandica*, scabra, sativa *Milleri* nil nisi varietates campestris sunt, & cultra ortae; ast nostra species primo intuitu diversa, & constanter manet.

HERNIARIA. *Lin. gen.* 336.

Cal. 5 partitus. *Cor.* O. *Stamina* 5 sterilia. *Cap. sula* 1 sperma.

297. *HERNIARIA glabra*, glabra glomerulis multifloris. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 615.

In pascuis siccis, locisque apricis glareosis *beim Unterbaum*, ante *portam Halensem*, prope *Fridrichsfelde* & alibi frequens. Junio. Julio. *Offic.* (*Herba Herniariae s. Millegranae.*)

CANNABIS. *Lin. gen.* 1220.

♂ — ♀. ♂. *Cal.* 5 partitus. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 1 phyllus, integer, hians. *Cor.* O. *Nux* 2 valvis, intra calycem clausum.

298: *CANNABIS sativa* folis digitatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 251.

In ruderatis humidis passim, ante *portam Lipsiensem* frequens. Julio. Augusto.

Offic. Sem. Cannabis.

HUMULUS. *Lin. gen.* 1221.

♂ — ♀. ♂. *Cal.* 5 phyllus. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 1 phyllus oblique patens integer. *Cor.* O. *Sem.* 1 intra calycem foliatum.

299. HUMUEUS *Lupulus*. *Lin. syst. ed. R. 4.*
p. 252.

*In Thiergarten, ante portam Halensem in Auf-
stall, prope Spandau & alibi passim. Plantatus
ad Schoeneberg occurrit. Julio. Augusto.*

Offic. Strobili Lupuli. (Radix.)

ATRIPLEX. *Lin. gen. 1260.*

♂. *Cal. 5 phyllus. Cor. O. Sem. 1. compressum.*

♀. *Cal. 2 phyllus. Cor. & Sem. ut in herma-
phrodito.*

300. ATRIPLEX *rosea* caule herbaceo, foliis inca-
nis ferratis, fructibus quadrangularibus den-
tatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 323.*

*In ruderatis ad pagos passim, ante portam Halen-
sem in coemeterio & prope Spandau frequens.
Julio. Augusto.*

301. ATRIPLEX *hortensis* caule erecto herbaceo,
foliis triangularibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 324.*

β. *Tota rubra.*

*Locis cultis, hortisque frequens, β, passim. Ju-
lio. Augusto.*

Offic. (Herba Atriplicis.)

302. ATRIPLEX *hastata* caule herbaceo: calycinis
valvulis femineis magnis deltoidibus sinuatis,
foliis triangularibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 324.*

β. *Foliis obtusioribus.*

*In sepibus, ruderatis, ad vias & pagos passim;
Julio. Augusto;*

303. *ATRIPLEX patula* caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 325.*
In ruderatis, finetis, ad vias & sepēs frequens.
Augusto.

CHENOPODIUM. Lin. gen. 337.

Cal. 5 phyllus 5 gonus. Cor. O. Sem. 1 lenticulare superum.

* *Foliis angulatis.*

304. *CHENOPODIUM Bonus Henericus* foliis triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 617.*

Ad pagos, sepēs, inque ruderatis vulgaris; e.g. ad *Pancko, Tegel, Reineckendorf, Neuendorf* &c. Junio. Julio.

Offic. Herba Boni Henrici.

305. *CHENOPODIUM urbicum* foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis, cauli approximatis longissimis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 617.*

Ad pagos in ruderatis rarius v. g. ad *Pancko, Spandau* &c. Augusto.

306. *CHENOPODIUM rubrum* foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis, compositis, subfoliofis, caule brevioribus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 617.*

In ruderatis ad sepēs & pagos frequens. Julio. Augusto.

Offic. (Herba Atriplicis sylvestris.)

307. *CHENOPODIUM hybridum* foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 619.

In sepibus, ruderatis, ad pagos vulgaris. Julio. Augusto.

Offic. (Herba Pedis anserini secundi.)

308. *CHENOPODIUM album* foliis rhomboideo-triangularibus crosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 618.*

In cultis, sepibus, ruderatis, plateis urbis, ad pagos copiose. Julio. Augusto.

309. *CHENOPODIUM viride* foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 619.

Iisdem locis, eodemque tempore copiose.

310. *CHENOPODIUM glaucum* foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 621.*

In cultis, finietis, ad fossas, pagos, in urbe & alibi abunde. Julio. Augusto.

*** Foliis integris.*

311. *CHENOPODIUM vulvaria* foliis integerri-
mis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 621.*

Ad muros, sepes, vias inque ruderatis frequens.
Julio. Augusto.

Offic. (Herba Vulvariae.)

312. *CHENOPODIUM polyspermum* foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 621.*

In ruderatis ad *Schoeneberg* rarius, inque hortis ad *Spandau* passim. Junio. Julio.

BETA. *Lin. gen. 338.*

Cal. 5 phyllus. *Cor.* O. *Semen* reniforme intra substantiam bascos calycis.

313. *BETA vulgaris* floribus congestis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 623.*

Inter olera, locisque cultis; in hortis frequens culta. Julio. Augusto.

SALSOLA. *Lin. gen. 339.*

Cal. 5 phyll. *Cor.* O. *Caps.* 1 sperma. *Sem.* cochleata.

314. *SALSOLA Kali* herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 624.*

In campis arenosis ante portam *Oranienburgicam* versus *patibulum* copiosissime. Julio. Augusto.

c. *Flores umbellati.*

HYDROCOTYLE. *Lin. gen. 355.*

Umbella simplex. *Invol.* 4 phyllo. *Petala* integra. *Semina* orbiculato-compressa.

315. *HYDROCOTYLE vulgaris* foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 657.*
Im Thiergarten locis humidis copiose. *In der Jungfernheide*, prope *Tegel* & alibi frequens. Junio. Julio.

CAUCALIS. Lin. gen. 362.

Involucr. integra. Petala inflexo emarginata. Fructus fetis undique hispidis.

316. *CAUCALIS Anthriscus* foliis bipinnatis laciniis latis, feminis ovali aculeis rectis. *Cranz. austr. p. 226.*

Tordylium Anthriscus umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 665.*

Im Thiergarten & alibi frequens, praecipue ad margines nemorum. Junio. Julio.

317. *CAUCALIS Scandicina* foliis tripinnatis feminibus acuminatis. *Wiggers primit. 23. n. 231.*
Scandix Anthriscus feminibus acutis hispidis, corollis uniformibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 706.*
Im Thiergarten & alibi frequens. Majo. Junio.

DAUCUS. Lin. gen. 364.

Cor. subradiatae. Flosculi disci abortivi. Semen in quatuor angulis hispidum.

318. *DAUCUS Carota* involucro universali pinnatifido, flosculo centrali nullo. *Wiggers primit. 23. n. 233.*

Daucus Carota feminibus omnibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 667.*

In

In der Hasenheide copiose, alibique in viis cavis,
nemoribus passim. Aestate.

Offic. Semen Dauci sylvestris.

319. *DAUCUS mauritanicus* involucro univetsali
pinnatifido, flosculo centrali sterili carnosio.

Daucus mauritanicus feminibus hispidis, flosculo
centrali sterili carnosio, receptaculo communi
hemisphaerico. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 668.*

In der Hasenheide passim. Junio. Julio.

Numne potius varietas praecedentis? Talem
florem sterilem rubrum carnosum, in Dauco
lucido & Carota sativa saepius observavi, &
nimio incremento, vel loco argilloso tantum
adscribendum.

CONIUM. *Lin. gen. 367.*

Involucella dimidiata sub 3 phylla. *Fructus* ellip-
ticus. *Semina* striis 4 crenulatis.

320. *CONIUM maculatum* caule maculato hispido,
foliolis pinnatifidis: laciniis dentatis.

Conium maculatum feminibus striatis. *Lin. syst.*
ed. R. 1. p. 672.

In ruderatis ad pagos prope *Wilmersdorf, Schoe-*
neberg & alibi passim. Julio. Augusto.

Offic. Herba Cicutae Stoerkii. (*Semina Conii.*)

SELINUM. *Lin. gen. 368.*

Petala cordata aequalia. *Semen* ovatum, com-
pressum, planus: striis 3 ad 5 elevatis.

- 321** *SELINUM palustre* caule laevi sublaetefcente, radice unica, foliis quadruplicato-pinnatis linearibus.

Selinum palustre sublaetefcens, radice unica. *Lin. syst. ed. R. I. p. 673.*

Locis humidis *im Thiergarten*, prope *Fridrichs-felde* & alibi passim. Julio.

Offic. (Radix Oelsnitii s. Elsnitii.)

- 322.** *SELINUM Carvisfolia* caule fulcato acutangulo, foliis triplicato-pinnatis: pinnis latiusculis simplicibus trifidisve, foliolis apice mucronatis.

Selinum Carvisfolia caule fulcato acutangulo, involucrio universali evanido, pistillis fructus reflexis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 674. suppl. 180.*

In pascuis pratisque subhumidis prope *Schoenberg*, *Fafanerie*, *Reineckendorf* & alibi satis frequens. Julio. Augusto.

Semina trifulcata: fulcis alatis.

ATHAMANTA. Lin. gen. 369.

Petala inflexa emarginata. *Fructus* ovato-oblongus, convexus, striatus.

- 323.** *ATHAMANTA Cervaria* foliis duplicato-pinnatis, foliolis oblongis obtusis trilobis, dentato-ferratis: ferraturis mucronatis.

Athamanta Cervaria foliolis pinnatis decussatis inciso-angulatis, seminibus nudis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 676.*

In den Papenbergen frequens, prope Tegel & Friedrichsfelde passim. Julio. Augusto.

Involucrum parziale polyphyllum longitudine umbellae: foliis reflexis lanceolatis, apice setaceis.

324. *ATHAMANTA Oreoselinum* foliis triplicatopinnatis: foliolis lanceolatis trifidis, integerrimis, divaricatis.

Athamanta Oreoselinum foliolis divaricatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 677.*

Ad Pancko, Rummelsburg, Tegel, Spandau alibi- que in apricis ficcis frequens. Junio. Julio.

Involucrum parziale dimidiatum: foliis lanceolatis.

Offic. Herba Oreoselini, (Radix.)

LASERPITIUM. *Lin. gen. 374.*

Petala patentia emarginata. *Semen* oblongum: angulis membranaceis.

325. *LASERPITIUM prutenicum* foliolis cuneiformi-lanceolatis pinnatifidis integerrimis: extimis coalitis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 685.*

In den Papenbergen frequens. Julio. Augusto.

HERACLEUM. *Lin. gen. 375.*

Petala difformia inflexo-emarginata. *Styli* retroflexi. *Semen* marginatum ellipticum, compressum, emarginatum.

326. *HERACLEUM Sphondylium* foliolis pinnatifidis laevibus, floribus uniformibus. *Lin. syst. ed. R. I. p. 686.*

In sepibus ad pagos passim, inque nemoribus humidis. Julio. Augusto.

Offic. Herba Brancae ursinae.

ANGELICA. *Lin. gen.* 377.

Corollae aequales, petalis incurvis. *Semen* ovatum, angulatum, alatum, tricostratum.

327. ANGELICA *sylvestris* foliis duplicato-pinna-
tis, ovatis, ferratis. *Hall. helv.* 806.

Angelica sylvestris foliolis aequalibus ovato-lanceolatis ferratis. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 691.

In den Papenberggen frequens, alibi rarius. Julio. Augusto.

Offic. (*Radix Angelicae sylvestris.*)

Sium. *Lin. gen.* 378.

Corollae uniformes hermaphroditi. *Petala* cordata. *Semen* ovatum striatum (absque alis, costis & rostro.)

328. SIUM *latifolium* foliis pinnatis argute dentatis, umbellis terminalibus.

Sium latifolium foliis pinnatis, umbella terminali. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 693.

In aquis stagnantibus, fossis, ripis inundatis fluviorum copiose. Julio.

329. SIUM *angustifolium* foliis pinnatis dentatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucrio universali pinnatifido. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 693.

In fossis ad *Fridrichsfelde* rarius. Julio.

330. *Sium nodiflorum* foliis pinnatis : umbellis axillaribus sessilibus. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 694.

In fossis *beim Gesundbrunnen* frequens. Julio. Augusto.

331. *Sium Sisarum* foliis pinnatis : floralibus ternatis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 694.

In hortis & agtis frequens cultum. Julio, Augusto.

332. *Sium Falcaria* foliis linearibus crenulatis, decurrentibus connatis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 694.

Sium foliis firmis, ferratis, pinnatis, nervo folioso latefcente. *Hall. helv. n. 782.*

In agris *beim Gesundbrunnen*, prope *Svandau hinterm Gewehrplan* & vineas versus, frequens. Julio.

OENANTHE. *Lin. gen. 382.*

Flosculi difformes. *Styli* erecti persistentes. *Fructus* ellipticus angulatus, decemstriatus, calyce coronatus.

333. *Oenanthe fistulosa* stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. *Lin. syst. ed. R. I.* p. 699.

Oenanthe foliis radicalibus rotunde lobatis, planis, caulinis fistulosis. *Hall. helv. n. 755.*

In pratis paludosis, fossis, locisque inundatis frequens. e. g. ante *portam Halensem*, in der *Jungfernheide* &c. Junio.

PHELLANDRIUM. *Lin. gen.* 383.

Flosculi disci minores. *Styli* recurvi persistentes.
Fructus oblongus leviter decemstriatus, calyce
 coronatus.

334. PHELLANDRIUM *aquaticum* foliorum rami-
 ficationibus divaricatis. *Lin. syst. ed. R. I.*
 p. 701.

Phellandrium aquaticum caulis dichotomus, aquis
 immerfus, foliorum ramis divaricatis. *Scop.*
carn. ed. 2. n. 363.

In aquis quietis, fossis. e. g. *im Thiergarten*,
 prope *Rummelsburg*, *Reineckendorf* & alibi
 frequens. Julio.

Nostra species semper caule aqua immerso, nun-
 quam caule erecto, occurrit. *Halae Saxo-*
num istam semper caule erecto vidi. Num
 specie differt?

Offic. Semen Phellandrii f. Foeniculi aquatici.

CICUTA. *Lin. gen.* 384.

Flores hermaphroditi uniformes. *Fructus* subo-
 vatus, sulcatus.

335. CICUTA *virosa* umbellis oppositi-foliis, pe-
 tiolis marginatis obtusis. *Lin. syst. ed. R. I.*
 p. 702.

In lacu prope *Reineckendorf* copiosissime, & alibi
 passim. Julio. Augusto.

Offic. Herba Cicutae aquaticae Wipferi.

AETHUSA. *Lin. gen.* 385.

Semen globosum, quatuor fulcis exaratum, inde fructus octogonus.

336. AETHUSA *Cynapium* foliis conformibus.
Lin. syst. ed. R. I. p. 703.

In cultis, nemoribusque humidis passim. Julio.
Involucella dimidiata, longissima pendula.

CORIANDRUM. *Lin. gen.* 386.

Fructus sphaericus absque striis & fulcis.

337. CORIANDRUM *fativum* fructibus globosis.
Lin. syst. ed. R. I. p. 704.

In hortis, locisque cultis, inter olerā rarius.
Junio. Julio.

Offic. Semen Coriandri.

SCANDIX. *Lin. gen.* 387.

Petala cordata. *Styli* recti. *Fructus* oblongus glaber, striatus, rostro terminatus.

338. SCANDIX *Pecten* feminibus rostro longissimo.
Lin. syst. ed. R. I. p. 705.

Myrrhis feminis cornu longissimo. *Hall. helv.* 754.

Ante portam Halensensem semel lecta, in via versus *Rüdersdorf* rarius. Julio. Augusto.

339. SCANDIX *Cerese* folium feminibus nitidis ovato-fubulatis, umbellis sessilibus lateralibus. *Lin. syst. ed. R. I. p.* 706.

Cerese folium foliis glabris, triplicato-pinnatis, lobulis obtusis. *Hall. helv. n.* 747.

In

In cultis, hortis, pomariis frequens. Majo.

Offic. Herba Cerefolii. (*Semina.*)

340. *SCANDIX temula* caule geniculato, scabro: geniculis tumidis, foliis hirsutis, laciniis obtusis. *Wiggers primit.* n. 236.

Chaerophyllum temulum caule scabro, geniculis tumidis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 710.*

In dumetis, sepibus, ruderalis, locisque umbrosis humidis copiose. e. g. *vorn Unterbaum*, prope *Briselang* &c. Aestate.

CHAEROPHYLLUM. *Lin. gen.* 388.

Petala inflexo cordata. *Styli* reflexi. *Fructus* leviter striatus, attenuatus, laevis.

341. *CHAEROPHYLLUM sylvestre* caule striato, geniculis tumidis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 708.*

Cerefolium foliis triplicato-pinnatis, acute dentatis, glabris, nervis hirsutis. *Hall. helv.* n. 748.

In nemorosis umbrosis frequens. e. g. *im Thiergarten bei den Puppen* &c. Majo. Junio.

Offic. (*Herba Cicutariae.*)

SESELI. *Lin. gen.* 390.

Umbellae globosae. *Fructus* ovatus striatus.

342. *SESELI tortuosum* caule alto rigido, foliolis linearibus fasciculatis. *Lin. syst. ed. R. I. p. 715.* *Pollich. pal. I. p. 300. n. 302.*

In den *Papenberg*en passim. Augusto.

PASTINACA. *Lin. gen.* 393.

Petala involuta integra. *Fructus* ellipticus, compressus, marginatus.

343. PASTINACA *sativa* foliis simpliciter pinnatis.

Lin. syst. ed. R. i. p. 719.

Pastinaca sylvestris foliis simpliciter pinnatis hirsutis. *Mill. dict. n. i.*

β. *Pastinaca sativa* foliis simpliciter pinnatis glabris. *Mill. dict. n. 2.*

In pascuis & pratis passim, frequens culta. Aestate.

Offic. (Semina & Radix Pastinacae.)

ANETHUM. *Lin. gen.* 394.

Petala involuta integra. *Fructus* subovatus, compressus, striatus.

344. ANETHUM *graveolens* fructibus compressis.

Lin. syst. ed. R. i. p. 721.

In hortis frequens cultum. Aestate.

Offic. Semina & Herba Anethi.

345. ANETHUM *Foeniculum* fructibus ovatis. *Lin.*

syst. ed. R. i. p. 722.

Frequens cultum occurrit. Aestate.

Offic. Herba & Semina Foeniculi.

CARUM. *Lin. gen.* 395.

Petala carinata inflexo-emarginata. *Fructus* ovato-oblongus, gibbus, striatus.

346. CARUM *Carvi*. *Lin. syst. ed. R. i. p.* 722.

Apium Carvi pinnis conjugatis, pinnis circa costam sese decussantibus. *Cranz austr. p.* 218.

Seseli

Seseli Carum. Scop. carn. ed. 2. n. 361.

In pratis & pascuis ante portam Halensem, prope Rummelsburg, Spandau hinter den Schülerbergen & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. Semina Carvi. (Herba.)

PIMPINELLA. Lin. gen. 396.

Petala inflexa. Styli erecti. Semen ovato-oblongum; striis quinque elevatis.

347. PIMPINELLA *Saxifraga* caule striato glabro, foliis pinnatis glabris: radicalibus foliolis subrotundis argutidentatis: caulinis bipinnatis linearibus.

Pimpinella Saxifraga foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis: summis linearibus.

Lin. syst. ed. R. 1. p. 723.

β. minor absque foliis caulinis.

In der Hasenheide, Jungfernheide, prope Tegel, Fridrichsfelde, Spandau & alibi copiose. β. locis sterilissimis. Julio. Augusto.

Offic. Radix Pimpinellae albae. (Herba, Semina.)

348. PIMPINELLA *nigra* caule striato piloso, foliis pinnatis villosis: radicalibus foliolis obcordatis incisim obtuse dentatis; caulinis bipinnatis: foliolis cuneiformibus dentatis.

Pimpinella Saxifraga. β. Lin. syst. ed. R. 1. p. 723.

Pimpinella Saxifraga major altera. Bauh. pin. 159. Riv. t. 81.

In der Jungfernheide & prope Tegel passim. Julio. Augusto.

Diver-

Diversissima a pracedenti; tota planta villulosa, dentes foliorum obtusissimi, radices caeruleo lactescentes.

Offic. Radix Pimpinellae nigrae.

349. *PIMPINELLA magna* foliis uniformibus pinnatis, foliolis omnibus lobatis, impari trilobo.

Pimpinella magna foliolis omnibus lobatis: impari trilobo. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 723.*

Ad *Spandau* in collibus prope *den Pulvermagazinen* frequens. Junio. Julio.

APIUM, Lin. gen. 397.

Petala aequalia. *Flores* disci masculi. *Semina* minuta, ovata, striata.

350. *APIUM Petroselinum* foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 725.*

In hortis frequens colitur. Julio.

Offic. Sem. Petroselini & Radix.

351. *APIUM graveolens* foliis caulinis cuneiformibus. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 726.*

In hortis copiose cultum. Julio.

Offic. (*Semen Apii.*)

AEGOPodium, Lin. gen. 398.

Flores uniformes. *Styli* longitudine corollae. *Semina* ovato-oblonga, gibba, striata.

352. *AEGOPODIUM Podagraria* foliis caulinis
summis ternatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 726.*

Aegopodium foliis inferioribus biternatis sessilibus, caulinis superioribus ternatis. *Necker gallob. p. 153.*

Ligusticum Podagraria. *Cranz austr. p. 200.*

Seseli Aegopodium. *Scop. carn. ed. 2. n. 359.*

Sium Podagraria. *Wiggers primit. 24. n. 245.*

Ad *Schoeneberg*, *Pancko*, *Schoenhausen*, *Rum-
melsburg*, *Charlottenburg*, *Spandau* & alibi
in hortis, locis cultis, ad sepes dumetaque
copiose. *Junio.*

Offic. (Herba Podagrariae.)

TRIGYNIA.

VIBURNUM. *Lin. gen. 400.*

Cal. 5 partitus superus. *Cor. 5* fida. *Bacca* monosperma.

353. *VIBURNUM Opulus* foliis lobatis, petiolis
glandulosis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 734.*

β. Viburnum roseum.

Locis paludosis ante portam *Halensem*, prope
Reineckendorf, *Spandau* & alibi passim, *β.* in
hortis cultum. *Majo.*

SAMBUCUS. *Lin. gen. 402.*

Cal. 5 partitus. *Cor. 5* fida. *Bacca* trisperma.

354. *SAMBUCUS nigra* cymis quinque partitis,
caule arboreo. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 737.*

In sepibus, dumetis ad pagos vulgaris. Junio.

Offic. Baccæ Sambuci & Flores. (Cortex, Folia, Semina.)

355. *SAMBUCUS Ebulus* cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 736.

Im Thiergarten & alibi rarius. Junio.

Offic. Baccæ & Folia Ebuli. (Cortex, Flores, Semina.)

CORRIGIOLA. Lin. gen. 409.

Cal. 5 phyllus. Petala 5. Semen 1. triquetrum.

356. *CORRIGIOLA littoralis. Lin. syst. ed. R.* 1. p. 743.

Corrigiola caule fasciculis florum terminato, Hort. cliff. 112.

In fossis exsiccatis arenosis in der Jungfernheide, ad viam versus Tegel, prope den Gesundbrunnen, Fridrichsfelde, ante portam Halensem & alibi frequens. Junio. Julio.

ALSINE. Lin. gen. 411.

Cal. 5 phyllus. Petala 5 aequalia. Capsula 1 locularis trivalvis.

357. *ALSINE media* petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 746.

In cultis, hortis, agris ubique copiosissime. Aestate.

Offic. (Herba Alsinæ.)

AMARANTHUS. *Lin. gen.* 1157.

Cal. 3 f. 5 phyllus. *Cor.* O. *Capsula* unilocularis circumscissa. *Semen* unicum.

358. AMARANTHUS *Blitum* glomerulis lateralibus: floribus triandris trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 145.

In plateis urbis, ad sepes, inque ruderatis copiose. Julio. Augusto.

Offic. (*Herba Bliti.*)

359. AMARANTHUS *hypochondriacus* racemis pentandris compositis confertis erectis, foliis ovatis mucronatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 148.

In cultis inter olera passim. Julio. Augusto.

TETRAGYNIA.

SPINACIA. *Lin. gen.* 1218.

♂. ♀. ♂. *Cal.* 5 partitus. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 4 fidus. *Cor.* O. *Semen* 1, intra calycem induratum.

360. SPINACIA *oleracea* fructibus sessilibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 250.

Culta abunde in hortis. Aestate.

PARNASSIA. *Lin. gen.* 415.

Cal. 5 partitus. *Petal.* 5. *Nectur.* 5. squamofoglandulosa, glandulis pedicellatis. *Caps.* 4 valvis.

361. *PARNASSIA palustris*. Lin. *syft. ed.* R. 1. p. 749.

In pratis humidis copiofe. Julio, Augufto.

PENTAGYNIA.

STATICE. Lin. *gen.* 418.

Cal. 1 phyllus integer plicatus, fcariofus. *Petal.* 5. *Semen* unicum, superum; *pappo* cartilagineo.

362. *STATICE Armeria* fcapo fimplici capitato, foliis linearibus. Lin. *syft. ed.* R. 1. p. 750.

In pafcuis ficcis, ad vias, inque collibus apricis graminofis abunde. Junio. Julio.

LINUM. Lin. *gen.* 419.

Cal. 5 phyllus. *Petal.* 5. *Capsula* 5 valvis, decemlocularis. *Semina* folitaria.

* *Foliis alternis.*

363. *LINUM ufitatiffimum* calycibus, capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule fubfolitario. Lin. *syft. ed.* R. 1. p. 758.

In agris frequens colitur. Aeflate.

Offic. Semen Lini.

** *Foliis oppofitis.*

364. *LINUM catharticum* foliis oppofitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. Lin. *syft. ed.* R. 1. p. 765.

In pascuis, pratisque satis frequens. e. g. ante portam Halensem, beim Unterbaum, prope Rummelsburg, Reineckendorf &c. Julio. Augusto.

Offic. (*Herba cathartica.*)

365. *LINUM Radiola* foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragyniis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 765.*

In der Jungfernheide, beim Gesundbrunnen, prope Charlottenburg & alibi frequens. Julio. Augusto.

DROSERA. Lin. gen. 421.

Cal. 1 phyllus *5* fidus. *Petala 5. Capsula 1* locularis, apice *5* valvis. *Sem. plurima.*

366. *DROSERA rotundifolia* scapis radicatis foliis orbiculatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 766.*

Drosera rotundifolia foliis orbiculatis, scapis radicatis, floribus hexagynis. *Huds. angl. ed. 2. tom. 1. p. 135.*

In der Jungfernheide & Grunewald locis turfosis humidis copiose. Julio. Augusto.

Offic. (*Herba Roris Solis s. Rorellae.*)

367. *DROSERA longifolia* scapis radicatis, foliis oblongo-lanceolatis.

Drosera longifolia scapis radicatis, foliis ovali-oblongis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 766.*

Drosera

PENTANDRIA POLYGYNIA. 117

Drosera longifolia foliis oblongis, scapis radica-
tis, floribus hexagynis. *Huds. angl. ed. 2.*
tom. 1. p. 135.

Isdem locis frequens. Julio. Augusto.

POLYGYNIA.

MYOSURUS. *Lin. gen. 426.*

Cal. 5 phyllus, basi adnatus. *Nectar. 5.* ligulata
petaliformia. *Semina* numerosa.

368. MYOSURUS *minimus* foliis integerrimis.
Lin. syst. ed. R. 1. p. 778.

In agris arenosis, ad pagos & vias vulgaris.
Aprili. Majo.

CLASSIS VI.
H E X A N D R I A
M O N O G Y N I A.

a. Flores absque calyce, spathacei.

ALLIUM. *Lin. gen.* 442.

Spatha multiflora. Umbella congesta. Cor. 6 petala patens. Capsula supera.

* *Foliis caulinis planis. Umbella capsuli fera.*

369. ALLIUM *Porram* caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 29.

Cultum in hortis frequens. Aestate.

** *Folia caulina plana. Umbella bulbifera.*

370. ALLIUM *carinatum* caule planifolio bulbifero, staminibus subulatis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 33.

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis carinatis. *Hall. all.* 27. t. 2. f. 2.

Prope *Spandau* in collibus *bei den Pulvermagazinen* frequens. Julio.

*** *Folia caulina teretia. Umbella bulbifera.*

371. ALLIUM *vineale* caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 36.
Inter segetes copiose. Junio. Julio.

**** *Folia radicalia. Scapus nudus.*

372. *ALLIUM senescens* scapo nudo ancipiti, foliis linearibus subtus convexis laevibus, umbella subrotunda staminibus subulatis. *Lin. syst. ed. R. 1. p. 38.*

In hortis cultum frequens. Aestate.

373. *ALLIUM Cepa* scapo nudo inferne ventricoso, longiore foliis teretibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 41.*

Copiose cultum occurrit. Aestate.

Offic. Bulbus recens Cepae.

374. *ALLIUM Schoenoprasum* scapo nudo, adaequante folia teretia subulato floriformia. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 41.*

Colitur hic frequens. Aestate.

b. Flores absque calyce & spatha.

LILIUM. Lin. gen. 443.

Cor. 6 petala campanulata: linea longitudinali nectarifera. *Capsul.* valvulis pilo cancellato connexis.

375. *LILIUM Martagon* foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 45.*

In den Papenberggen frequens. Junio.

Offic. (*Radix Asphodeli.*)

ORNITHOGALUM. Lin. gen. 451.

Cor. 6 petala, recta, persistens, supra medium patens. *Filament.* alterna basi dilatata.

* *Staminibus omnibus dilatatis.*

376. *ORNITHOGALUM luteum* scapo anguloso
diphyлло, pedunculis umbellatis simplicibus.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 53.

In agris, horumque versuris frequens. Martio.
Aprili.

377. *ORNITHOGALUM minimum* scapo anguloso
diphyлло, pedunculis umbellatis ramosis. *Lin.*
syst. ed. R. 2. p. 53.

In agris ad *Ricksdorf & Spandau* passim. Martio.
Aprili.

Binis in speciebus stamina subulata, nec basi dilata sunt.

Forte varietas praecedentis.

** *Staminibus alternis dilatatis.*

378. *ORNITHOGALUM nutans* floribus secundis
pendulis, nectario stamineo campaniformi.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 56.

In pomariis passim. Majo.

ANTHERICUM. Lin. gen. 455.

Cor. 6 petala, patens. Capsula ovata.

379. *ANTHERICUM ramosum* foliis planis, scapo
ramoso, corollis planis pistillo recto. *Lin.*
syst. ed. R. 2. p. 62.

In *Thiergarten & Jungfernhöhe* passim, prope
Tegel frequens. Junio.

380. *ANTHERICUM Liliago* foliis planis, scapo
simplicissimo, corollis planis pistillo declinato.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 63.

In der Hasenheide frequens, ad Fridrichsfelde passim. Majo. Junio.

ASPARAGUS. *Lin. gen. 457:*

Cor. 6 partita, petalis tribus interioribus apice reflexis. Pomum 3 locale dispermum.

381. ASPARAGUS *officinalis* caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 68.*

In pratis atque nemoribus frequens. Ad sepes & pagos passim. Junio.

Offic. (Baccae, Semina & Radices Asparagi.)

CONVALLARIA. *Lin. gen. 459.*

Cor. 6 vel 4 fida. Pomum 3 vel 2 locale ante maturitatem maculosum.

* *Lilium convallium: corollis campanulatis.*

382. CONVALLARIA *majalis* scapo nudo tereti. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 73.*

In den Papenberggen frequens. Majo.

Offic. Flores Lilii convallii.

** *Polygonata: corollis infundibuliformibus.*

383. CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 74.*

3. Floribus plenis.

In der Hasenheide, Jungfernheide, Thiergarten & alibi frequens. 3. rarius. Majo. Junio.

Offic. Radices Sigilli Salomonis.

384. *CONVALLARIA multiflora* foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti pedunculis axillaribus multifloris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 74.*

In der Jungfernheide & Brifelang passim. Majo. Junio.

*** *Smilax: corollis rotatis.*

385. *CONVALLARIA bifolia* foliis cordatis, floribus tetrandris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 75.*

Majanthemum Convallaria. Wiggers primit. 15. n. 141.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Papenberg & alibi abunde. Majo. Junio.

Numero staminum & corollae laciniis quadrifidis, pomoque biloculari, differt; sed hae ad genus distingendum haud sufficiunt.

Offic. (Herba Unifolii.)

ARISTOLOCHIA. Lin. gen. 411.

Cal. O. Cor. 1 petala, ligulata, integra. Styl. O. Stigma glabrum 6 fidum. Capsula bilocularis infera.

386. *ARISTOLOCHIA Clematitis* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 61.*

Prope Spandau ad sepem ante portam Charlottenburgicam pone domicilium sylviarii frequens. Junio. Julio.

Offic. Radix aristolochiae longae, vulgaris.

c. Gramina.

ACORUS. *Lin. gen.* 468.

Spadix cylindricus, rectus flosculis. *Corollae* hexapetae, nuda. *Stylus* nullus. *Capsula* trilocularis.

387. ACORUS *Calamus*. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 92.

Locis paludosis, inque fossis copiose. v. g. *in der Jungfernheide* &c. Junio. Julio.

Offic. Radix Calami aromatici.

JUNCUS. *Lin. gen.* 471.

Cal. 6 phyllus persistens. *Cor.* O. *Capsula* unilocularis, trivalvis.

* *Culmis nudis.*

388. JUNCUS *conglomeratus* culmo nudo stricto, capitulo laterali: floribus triandris. *Ehrhart. hanoev. Magaz.* 1784. *Stück* 8. p. 115. n. 5.

Juncus conglomeratus culmo nudo stricto, capitulo laterali. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 94.

In der Jungfernheide & prope *Spandau* locis depressis humidis passim. Junio. Julio.

389. JUNCUS *effusus* culmo nudo stricto, panicula laterali laxa: floribus triandris. *Ehrhardt. l. c.*

Juncus effusus culmo nudo stricto, panicula laterali. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 94.

Locis humidis depressis, inque pratis frequens. Junio. Julio.

390. *Juncus inflexus* culmo nudo, apice membranaceo, panicula laterali: floribus acuminatis hexandris.

Juncus inflexus culmo nudo, apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 95.*
Cum praecedenti frequens eodem tempore.

** *Culmis foliosis.*

391. *Juncus articulatus* foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 97.*

Juncus articulis compressis, panicula semel ramosa. *Hall. helv. n. 1322.*

β. *Juncus* foliis articulatis teretibus, panicula repetito-ramosa. *Hall. helv. 1323.*

γ. Gramen junceum folio articulofo, cum utriculis. *Bauh. prodr. 12. (viviparus.)*

In pratis humidis, locisque uliginosis & ad fossas copiose α. rarius. γ. *in der Jungfernheide, Spandauerheide ad lacum Diaboli* passim. Junio. Julio.

392. *Juncus Tenageja* annuus, culmo ramoso-paniculato, floribus solitariis, petalis ovato-oblongis, capsulis subglobosis. *Lin. suppl. pl. 208.*

In pratis prope *Schoeneberg* & alibi passim. Junio. Julio.

393. *Juncus bulbosus* culmo compressiusculo, foliis lineari-canaliculatis; corollis capsulisque obtusis; bractea panicula majori.

Juncus bulbosus foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 97.*
Leers herborn. 266. t. 13. f. 7.

Prope

Fig 8.

Prope *Spandau* in pratis copiose. Junio.
Julio.

Bractea interdum panicula minor, sed rarius;
saepius longior, vel ejusdem longitudinis.

394. *JUNCUS* ^{*sparganii*} ~~*Sprengeli*~~ culmo subtriquetro canaliculato; foliis lineari-canaliculatis; corollis acutis, capsulis obtusis, bractea panicula multo minori.

In der Spandauerheide in pratis versus *Falkenhagen* frequens. Julio.

Culmus sesquipedalis & ultra, glaber striatus, hinc convexus, nervo elevato, inde concavus canaliculatus. Folia culmi nulla, nisi bracteas, ita nuncupes; radicalia multa vaginata, lineari-lanceolata externe striata: vaginis glabris striatis margine membranaceis. Panicula trifida elongata; floribus pedunculatis. Bracteae binae vaginatae; vaginis striatis ventricosus margine membranaceis; ultima vagina folio canaliculato minuto instructa; suprema apice subulata absque folio. Corollae acutae persistentes capsularum longitudine. Capsulae oblongae obtusae, acumine brevissimo instructae. TAB. IV. fig. 8.

Differt a *Junco bulboso*:

- 1) culmo triquetro canaliculato.
- 2) bracteis panicula minoribus.
- 3) vaginis bractearum ventricosis.
- 4) corollis acutis &
- 5) quod multo major sit.

395. *Juncus bufonius* caule dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 98.*

α. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis erectum. *Scheuchz. agrost. 327.*

β. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, species altera procerior. *Scheuchz. agrost. 328.*

γ. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, repens. *Scheuchz. agrost. 329.*

δ. Pinheaded cobweb mushroom. *Petiv. gaz. 51. f. 7.*

Isoetes lacustris. Weigel. observ. bot. 36. t. 2. f. 7.

Subularia aquatica. Koelp. suppl. fl. Gryph. 113.

In pratis paludosis, locis depressis humidis, pascuis uliginosis, ad fossas, similibusve locis copiosissime aestate. δ. vere & autumnno.

Semina hujus Junci singulari modo germinant. Primo vere cotylidones apparent oblongae, magnitudine capituli acus, colore splendido-flavae, paulo post folia minutissima accrescunt, & cotylidones fuscae evadunt. Tunc altitudine vix unicam exsuperat gramen, & plantae cryptogamicae haud absimile est. Tali in statu hoc gramen *Celebr. Weigel* legit, depinxitque. Iterata vice tales plantulas ollae imposui, & semper Juncum bufonium ex illis nasci vidi.

396. *Juncus capitatus* foliis setaceis, capitulo terminali, alarique subfolioso, petalis acutis integris, pericarpis aequantibus. *Weigel observ. 28. t. 3. f. 5.*

Juncus

Juncus ericetorum culmo nudo filiformi, foliis linearibus canaliculatis, capitulo subrotundo sessili terminali, triphylo. *Pollich. pal. 1. p. 351. n. 350.*

Ante portam Halensem im Aufstall, inter Pancko & Gesundbrunnen, prope Spandau ad Haaks Meyerey & alibi locis depressis frequens. Junio. Julio.

Culmus bi-vel triuncialis nudus, glaber, striatus. Flores sessiles in capitulum collecti, terminales, bracteis tribus instructi. Petala persistencia, acuta, capsulis longiores.

397. *JUNCUS pilosus* foliis planis pilosis, corymbo ramofo. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 100.*

In nemoribus copiose. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, Hasenheide &c. Majo.

398. *JUNCUS campestris* foliis planis subpilosis spicis sessilibus pedunculatisque. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 104.*

Iisdem locis copiosissime. Majo.

d. Flores cum calyce & corolla.

BERBERIS. *Lin. gen. 476.*

Cal. 6 phyllus. Petala 6 ad ungues glandulis 2. Styl. O. Bacca disperma tunica duplici.

399. *BERBERIS vulgaris* foliis ferratis. *Thunberg. jap. 146.*

Berberis vulgaris pedunculis racemosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 106.*

Im Thiergarten frequens. Majo.

Offic. Baccæ Berberidis.

PEPLIS. *Lin. gen.* 452.

Perianth. campanulatum: ore 12 fido. *Petala*
6 calyci inserta valde caduca. *Capsula* bilocularis.

400. PEPLIS *Portula* floribus hexandris, foliis cuneiformibus obtusis.

Peplis portula floribus apctalis. *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 112.

In der Jungfernheide locis humidis, præcipue
in der Charlottenburger Allee, & post *Falken-*
hagen in via ad *Bredow* frequens. Augusto.
Septembri.

TRIGYNIA.

RUMEX. *Lin. gen.* 485.

Cal. triphyllus. *Petala* 3 conniventia. *Semen*
unicum triquetrum.

* *Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.*

401. RUMEX *sanguineus* floribus hermaphroditis:
valvulis integerrimis: unica granifera, foliis
cordato-lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 115.

Locis cultis inter olera passim. Junio.

402. RUMEX *Britannica* floribus hermaphroditis:
valvulis integerrimis: omnibus graniferis, fo-
liis lanceolatis: vaginis obsoletis. *Lin. syst.*
ed. R. 2. p. 115.

In fossis ad *Spandau* vulgaris. Junio. Julio.

403. *RUMEX crispus* floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 115.*

In pratis humidis, nemorosis passim. e. g. in der Jungfernheide, ante portam Halensem im Aufstall &c. Junio.

404. *RUMEX Nemolapathum* floribus hermaphroditis: valvulis linearibus obtusis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis patentibus, foliis inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis. *Lin. suppl. pl. 212.*

Rumex dubius floribus hermaphroditis, valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis subundulatis basi integris. *Retzii prod. fl. Scand. 64. n. 387.*

Rumex conglomeratus. *Murr. prod. 52.*

Rumex Hydrolapathum. *Wiggers primit. n. 303.*

Ad fossas inque pratis paludosis frequens. v. g. ante portam Halensem im Aufstall, prope Spandau in via ad Haaks Meyerey &c. Julio, Augusto.

Planta bipedalis & ultra: caule ramoso, tereti, sulcato: foliis alternis glabris, margine parum undulatis: verticillis summis nudis.

405. *RUMEX maritimus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 117.*

Im Thiergarten & Jungfernheide locis humidis passim. Junio.

406. *RUMEX acutus* floribus hermaphroditis valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 117.*

In pratis ad *Rummelsburg*, in der *Jungfernheide* & alibi passim. Junio. Julio.

407. *RUMEX obtusifolius* floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 118.*

Iisdem locis passim. Junio.

** *Hermaphroditi: valvulis granulo destitutis.*

408. *RUMEX aquaticus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 119.*

In fossis des *Thiergartens* passim. Julio.
Offic. (Radix Rapontici.)

*** *Floribus declinis.*

409. *RUMEX Acetosa* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 122.*

β. *Acetosa pratensis* flore albo. *Tournef. inst. 502.*

In pratis & pascuis copiose. Majo. Junio.

Offic. Herba recens Acetosae. (Radix & Semina.)

410. *RUMEX Acetosella* floribus dioicis, foliis lanceolatis, hastatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 123.*

α. *Acetosa lanceolata angustifolia repens. Bauh. pin. 114.*

γ. *Acetosa arvensis minima non lanceolata. Bauh. pin. 114.*

δ. *Acc.*

♂ *Acetosa minor erecta*, lobis multifidis. *Bocc. mus.* 164. t. 26.

In agris, arvis, versuris, pascuis, pratis siccis & nemoribus copiosissime. Aestate.

SCHEUCHZERIA. *Lin. gen.* 487.

Cal. 6 partitus. *Cor.* O. *Capsulae* 3. 4. inflatae
I spermae.

411. SCHEUCHZERIA *palustris*. *Lin. syst. ed. R.*
2. p. 126.

In der Jungfernheide & Grunewald locis turfosis
humidis frequens. Aprili. Majo.

Capsulae 3. 4. 5 usque 6. *Semina* 1 usque 2.

TRIGLOCHIN. *Lin. gen.* 488.

Cal. triphyllus. *Petala* 3. calyciformia. *Styl.* O.
Capsula basi dehiscens.

412. TRIGLOCHIN *palustre* capsulis trilocularibus
sublinearibus. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 125.

In pratis prope Schoeneberg copiose, & alibi frequens. Junio.

413. TRIGLOCHIN *maritimum* capsulis sexlocularibus ovatis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 126.

In pratis ad Rummelsburg rarius. Junio.

POLYGYNIA.

ALISMA. *Lin. gen.* 495.

Calyx triphyllus. *Petala* tria. *Semina* plura.

414. ALISMA *Plantago* foliis ovatis acutis, fructibus obtusis trigonis. *Lin. syst. ed. R.* 2.
p. 132.

In aquis stagnantibus, pratis paludosis & fossis copiose. Julio.

Offic. (Herba Plantaginis aquaticae.)

415. *ALISMA Damasonium* foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capsulis subulatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 132.*

Im Grunewald ad fossas rarius. Julio.

Scapi vix spithamei, teretes laevissime striati: verticillis binis rarius tribus, trifloris, squamis tribus vel quatuor subulatis munitis. Flores hexandri, pistillis sex ad octo. Folia cordata acuta septemnervia glabra, unicalia; petioli sesquiunciales glabri.

416. *ALISMA dubia* foliis cordatis obtusis, floribus hexandris, dodecagyniis, feminibus uncinatis.

Alisma cordifolia foliis cordatis obtusis, floribus dodecandris, feminibus uncinato-muricatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 133?*

Im Grunewald praecipue in der *Hundskaehle* frequens. Augusto.

Scapi pedales, sesquipedales & ultra, teretes, striati: verticillis quatuor ad quinque, inferioribus ramosis, superioribus trifloris, squamis binis oblongo obtusis munitis. Flores hexandri, pistilla 10. 11. 12 & 14. Semina immatura uncinata erant, matura non vidi. Folia cordata obtusa novemnervia, glabra, bi ad triuncialia. Petioli pedales teretes striati glabri.

glabri. Num varietas praecedentis? Num
Alisma cordifolia & Damasonium una species?

Differt ab Alisma Damasonio feminibus uncina-
ris; ab Alisma cordifolia floribus hexandris.
Distinguent Autoptae an sit cordifolia, an
Damasonium?

417. *ALISMA natans* foliis ovatis obtusis peduncu-
lis solitariis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 133.*

In fossis *im Grunewald* copiose. Junio. Julio.

418. *ALISMA ranunculoides* foliis lineari-lanceo-
latis, fructibus globosis squarrosis. *Lin. syst.*
ed. R. 2. p. 133.

Ante portam *Halensem* in fossis rarissima.
Julio.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA
MONOGYNIA.

AESCULUS. *Lin. gen.* 498.

Cal. 1 phyllus, 5 dentatus, ventricosus. *Cor.* 4
vel 5 petala inaequalis. *Caps.* 3 locularis.

419. *AESCULUS Hippocastanum* corollis pentapetalis patentissimis.

Aesculus Hippocastanum floribus heptandris. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 137.

In plateis & extra urbem in viis nemoribusque copiose. Majo. Junio.

Offic. (Fructus & Cortex Hippocastani.)

In *Aesculo Pavia* nunquam stamina octo, semper septem vidi. Vera illius differentia erit: corollis tetrapetalis, petalis binis erectis minoribus longe unguiculatis, binis majoribus conniventibus.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA
MONOGYNIA.*a. Flores completi.*

OENOTHERA. Lin. gen. 505.

Cal. quadrifidus. *Corolla* tetrapetala. *Stamina* calycis fauce inserta. *Capsula* cylindrica infera. *Semina* nuda.

420. OENOTHERA
- biennis*
- foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato villosa. Lin.
- syft. ed.*
- R. 2. p. 147.

Ante portam Halensam, in ruderatis beim Moabiterlande, prope Charlottenburg, Spandau auf den Schülerbergen, hinterm Kibitzey & alibi copiose. Junio. Julio.

EPILOBIUM. Lin. gen. 506.

Cal. 4 fidus. *Cor.* 4 petala. *Capsula* oblonga infera. *Semina* papposa.* *Staminibus declinatis.*

421. EPILOBIUM
- angustifolium*
- foliis sparsis lineari-lanceolatis, floribus inaequalibus. Lin.
- syft. ed.*
- R. 2. p. 151.

Epilobium flore difformi foliis lanceolatis, transversim nervosis. Hall. helv. n. 1000.

In der Hasenheide, Thiergarten & Papenberg
passim. Julio.

** *Staminibus erectis regularibus, petalis
bifidis.*

422. *EPILOBIUM hirsutum* foliis oppositis lanceolatis ferratis decurrenti amplexicaulibus.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 152. α.

Epilobium hirsutum foliis ovato-lanceolatis semi-
amplexicaulibus hirsutis, caule ramosissimo,
radice repente. *Curtis lond. t. 117.*

Prope Spandau an der Havel passim. Julio.

423. *EPILOBIUM montanum* foliis oppositis ovatis dentatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 152.*

Epilobium foliis ovato-lanceolatis, glabris, dentatis. *Hall. helv. n. 996.*

Im Thiergarten & alibi passim. Julio.

424. *EPILOBIUM roseum* foliis oppositis, alternisque ovato-lanceolatis petiolatis ferratis glabris. *Retzii prod. 69. n. 408.*

Chamaenerion roseum. *Schreb. spicil. 147. n. 1165.*

Epilobium ramosum foliis lanceolatis ferratis decurrentibus, inferioribus oppositis, caule ramoso. *Huds. angl. ed. 2. t. 1. p. 162.*

Prope Spandau & in der Jungfernheide frequens.
Julio.

425. *EPILOBIUM palustre* foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 153.*

Prope

Prope Reineckendorf ad lacum copiose.

In der Jungfernheide ad fossas, inque humidiusculis frequens. Julio.

VACCINIUM. *Lin. gen.* 523.

Cal. superus. *Cor.* 1 petala. *Filamenta* receptaculo inserta. *Anth.* bicornes. *Pomum* quadriloculare polyspermum.

* *Foliis annotinis.*

426. VACCINIUM *Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis ferratis ovatis deciduis caule angulato. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 164.*

β. Fructu albo.

In nemoribus & sylvis copiose. v. g. im Thiergarten, Grunewald, Jungfernheide &c. β. in der Spandauerheide rarius.

Offic. Myrtillorum Baccae. (*Folia.*)

** *Foliis sempervirentibus.*

427. VACCINIUM *Vitis idaea* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 167.*

Im Grunewald, Spandauerheide, Jungfernheide, Papenbergen & alibi copiose. Majo. Junio.

Offic. (*Baccae Vitis Idaeae.*)

428. VACCINIUM *Oxycoccus* foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 167.*

Im Grunewald, Jungfernheide & Spandauerheide in regione *lacus Diaboli* copiose. Majo, Junio.

Pedunculi 2. 3. terminales. Flores nutantes. Corolla 4 fida: laciniis revolutis.

ERICA. *Lin. gen.* 524.

Cal. 4 phyllus inferus. *Cor.* 1 petala 4 fida. *Filamenta* receptaculo inserta. *Anth.* 2 fidae. *Capsula* 4 locularis.

429. ERICA *Tetralix* aristata; foliis quaternis oblongis ciliatis, subtus tomentosis, floribus umbellatis, calyce ciliato tomentoso. *Thunberg Diss. de Erica* 10. n. 66.

Erica Tetralix antheris aristatis, corollis ovaris, stylo incluso, foliis quaternis ciliatis, floribus capitatis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 174.

Prope *Spandau* unico loco frequens. Inter *Schoeneberg* & *Fasanerie* olim frequens nunc rarius. Julio. Augusto.

430. ERICA *vulgaris* cristata; foliis oppositis sagittatis. *Thunberg Diss. de Erica* 11. n. 74.

Erica vulgaris antheris aristatis, corollis campanulatis subaequalibus, calycibus duplicatis, foliis oppositis sagittatis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 168.

♂. corollis albis.

In campis, pascuis, collibus sterilissimis, nemoribusque copiosissime. ♂, rarius. Augusto.

Offic. (Ericae Herba.)

b. Flo.

*b. Flores incompleti.*POPULUS. *Lin. gen.* 1228.

♂—♀. ♂. *Ament.* laxè imbricatum. *Cal.* squamis laceris. *Cor.* turbinata obliqua integra.

♀. *Ament.* *Cal.* & *Cor.* maris. *Styl.* O. *Stigma* 4 fidum. *Capf.* 2 locularis. *Semina* multa, pappo capillari.

431. *POPULUS alba* foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 262.

Prope *Charlottenburg* frequens, & alibi passim. Aprili. Majo.

432. *POPULUS tremula* foliis subrotundis dentato-angulatis, utrinque glabris. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 262.

In nemoribus & viis copiose. Aprili. Majo.

433. *POPULUS nigra* foliis deltoideis acuminatis ferratis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 263.

In nemoribus, viis & pagis vulgaris, mas prope *Charlottenburg*. Aprili. Majo.

Offic. Oculi Populi.

DIGYNIA.

CORYLUS. *Lin. gen.* 1172.

♂—♀. ♂. *Cal.* 1 phyll. 3 fidus squamiformis, 1 florus. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 2 phyllus lacerus. *Cor.* O. *Nux* ovata.

434. *CORYLUS Avellana* stipulis ovatis obtusis.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 169.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Tegel & alibi
copiose. Martio. Aprili.

Offic. Avellanae Nucces. (Lignum.)

ACER. Lin. gen. 1266.

Cal. 5 fidus. Cor. 5 petala. Capsf. binae mono-
spermae, alatae.

435. *ACER Pseudo-Platanus* racemis pendulis, fo-
 liis quinquelobis obtusis inaequaliter ferratis.
Acer Pseudo-Platanus foliis quinquelobis inae-
 qualiter ferratis, floribus racemosis. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 331.

Im Thiergarten, im Briselang frequens & alibi
passim. Majo.

436. *ACER Platanoides* corymbo simplici erecto:
 foliis quinquelobis dentatis: dentibus acu-
 minatis.

Acer platanoides foliis quinquelobis acuminatis,
 acute dentatis glabris, floribus corymbosis.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 332.

Im Thiergarten copiose ad pagos inque nemori-
bus passim. Majo.

Floret foliis adhuc destitutum.

437. *ACER campestre* corymbo tripartito erecto,
 foliis quinquelobis, integerrimis: lobis infe-
 rioribus emarginatis.

Acer campestre foliis lobatis obtusis emarginatis.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 333.

*Im Thiergarten frequens, prope Tegel, Briselang
& alibi passim. Majo.*

TRIGYNIA.

POLYGONUM. *Lin. gen.* 537.

*Cal. O. Cor. 5 partita calycina. Semen unicum
angulatum.*

* *Bistortae spica unica.*

438. POLYGONUM *Bistorta* caule simplicissimo
monostachyo, foliis ovatis in petiolum decur-
rentibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 204.*

*In pratis versus alten Landsberg, Blankensfelde,
Fridrichsfelde, Biesdorf passim, in den Remi-
sen ad Pancko rarius. Junio.*

Offic. Bistortae Radix.

** *Persicariae pistillo bifido, aut stami-
nibus minus 8.*

439. POLYGONUM *amphibium* floribus pentan-
dris semidigynis, spica ovata. *Lin. syst. ed. R.
2. p. 205.*

α. *aquaticum* foliis glabris, longe petiolatis, spica
subrotunda. *Moench. hass. 328.*

β. *terrestre* foliis hirsutis subsessilibus, spica ob-
longa. *Moench. hass. 328.*

*In der Spree inque fossis im Grunewald & alibi
copiose. β. ante portam Lipsiensem ad fossas
frequens. Junio. Julio.*

440. *POLYGONUM Hydropiper* floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 206.*

In nemoribus humidis ad Coepnick, Tegel, in der Jungfernheide, Thiergarten & alibi copiose. Julio.

Offic. (Persicariae urentis Herba.)

441. *POLYGONUM Persicaria* floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 207.*

♂. foliis angustioribus, spica rubente.

γ. foliis maculosis latioribus.

Locis humidis, ad fossas, vias, in paludibus alibique copiosissime. Aestate.

Offic. (Herba Persicariae.)

*** *Polygona foliis indivisis, floribus octandris.*

442. *POLYGONUM aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 209.*

♂. Polygonum brevi angustoque folio. *Bauh. pin. 281.*

γ. Polygonum oblongo angustifolia. *Bauh. pin. 281.*

δ. Flore albo. *Hall. helv. 1560.*

ε. Foliis rubentibus. *Schwenckfeld. Silensf. 163.*

Ad vias in urbe ipsa, ad agros, inque versuris, sepibus, ubique fere copiosissime. Aestate.

Offic.

Offic. Herba Polygoni. f. Centumnodiae.

**** *Helixine foliis subcordatis.*

443. *POLYGONUM Fagopyrum* foliis cordato-fagittatis, caule erectiusculo inermi, feminum angulis aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 212.*

Hic frequens colitur. Julio. Augusto.

444. *POLYGONUM Convolvulus* foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 213.*

Polygonum caule volubili, foliis sagittatis. *Hall. helv. n. 1561.*

In agris, cultis, nemoribus apricis vulgaris. Julio. Augusto.

445. *POLYGONUM dumetorum* foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato-alatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 213.*

Polygonum caule volubili, foliis sagittatis, valvulis feminalibus alatis. *Hall. helv. n. 1562.*

Ad sepes & pagos, prope *Fridrichsfelde*, *Pancko*, & alibi frequens. Julio. Augusto.

TETRAGYNIA.

MYRIOPHYLLUM. Lin. gen. 1163.

♂—♀. ♂. *Calyx* 1 phyllus 4 dentatus. *Petala* 4 unguiculata, caduca. *Filamenta* capillaria, latere *antherae* infixae.

♀. *Cal.* & *Cor.* maris. *Styl.* O. *Caps.* 4. 1 spermae.

446. *MYRIOPHYLLUM spicatum* caule ramofo, spicis terminalibus nudis, interruptis: floribus bracteatis; foliis pinnatis capillaceis.

Myriophyllum spicatum floribus masculis interrupte spicatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 154.*

In der Jungfernheide & Grunewald in fossis frequens. Julio.

Spicae nudaе superne masculae. Bractae minutae, subrotundae, acutae, sub singulo flore tres; interdum quatuor.

Varietatem semel vidi, foliis superioribus simplicibus, linearibus, integerrimis.

447. *MYRIOPHYLLUM verticillatum* caule simplici, floribus verticillatis, foliis pinnatis, pinnis linearibus carnosiss.

Myriophyllum verticillatum floribus omnibus verticillatis hermaphroditis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 154.*

In der Jungfernheide prope pontem destructum in fossis frequens, etiamque *im Grunewalde*. Julio.

Caulis semper simplex, rarissime uno alterove ramo. Flores in angulis foliorum verticillati, absque bracteis, dioici. Omnes a me perlustratae plantae semper dioicae, nunquam hermaphroditae erant; etsi plura immo centum usque specimina perlustraverim.

ADOXA. *Lin. gen.* 543.

Cal. 2 fidus, inferus. *Cor.* 4 f. 5 fida supera.

Pomum 4 f. 5 locale, calyce coalitum.

448. ADOXA *Moschatellina.* *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 222.

Prope *Pancko* & in den *Papenbergen* locis umbro-
sis passim. *Aprili.* *Majo.*

PARIS. *Lin. gen.* 542.

Cal. 4 phyllus. *Petala* 4. angustiora. *Pomum*
quadrilocale.

449. PARIS *quadrifolia* foliis quaternis. *Lin. syst.*
ed. R. 2. p. 221.

In den *Papenbergen*, prope *Falckenhagen* im *Els-*
bruch, ad *Spandau* auf dem *Eiswerder* passim.

Prope *Fridrichsfelde* rarius, & ad alnorum
truncos post *Rummelsburg* rarissime. *Majo.*
Junio.

Variat foliis quaternis.

Offic. (Radix, Herba, Baccae Paridis.)

CLASSIS IX.
 ENNEANDRIA
 MONOGYNIA.

QUERCUS. *Lin. gen.* 1168.

♂—♀. ♂. *Cal.* 5 fidus. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 1 phyllus, integerrimus, scaber. *Cor.* O.
Styl. 2—5. *Semen* 1. ovatum.

450. QUERCUS *Robur* foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus: angulis obtusis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 163.

α. Quercus foliis deciduis petiolatis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus, angulis obtusis, glandibus subsessilibus. *Du Roi herbk.* 2. p. 237.

β. *Quercus femina* foliis deciduis oblongis obtusis, pinnato sinuatis, subpetiolatis: glandibus pedunculatis subsolitariis. *Du Roi herbk.* 240.

In nemoribus sylvisque copiose. Majo.

α & β. forte species distinctae.

DIGYNIA.

MERCURIALIS. *Lin. gen.* 1230.

♂—♀. ♂. *Cal.* 3 partitus. *Cor.* O. *Anth.* globosae didymae.

♀. *Cal.* & *Cor.* ut in mare. *Caps.* dicocca 2 locularis monosperma.

451. *MERCURIALIS perennis* caule simplicissimo, foliis scabris. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 265.*

Bei der Fasenerie in den Remisen rarius. Aprili. Majo.

452. *MERCURIALIS annua* caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 265.*

Beim Invalidenhaus rarius. Julio. Augusto.

Offic. Mercurialis Herba. (Semina.)

HEXAGYNIA.

HYDROCHARIS. Lin. gen. 1231.

- ♂ — ♀. ♂. *Spatha* 2 phylla triflora. *Cal.* 3 partitus. *Cor.* 3 petala. *Filament.* 3. interiora styliformia.

♀. *Spatha* 0. *Cal.* & *Cor.* maris. *Capsula* infera 6 locularis polysperma.

453. *HYDROCHARIS Morsus ranae. Lin. syst. ed. R. 4. p. 267.*

In fossis, aquisque stagnantibus frequens. e. g. im Thiergarten, prope Spandau hinterm Gewehrplan &c. Julio. Augusto.

BUTOMUS. Lin. gen. 550.

Cal. 0. *Cor.* 6 petala, petalis alternis majoribus. *Capsulae* 6 polyspermae.

454. *BUTOMUS umbellatus. Lin. syst. ed. R. 2. p. 233.*

In fossis, aquisque stagnantibus. Julio.

CLASSIS X.
 DECANDRIA
 MONOGYNIA.

a. Flores polypetali.

MONOTROPA, Lin. gen. 583.

Cal. O. *Petala* 10; horum 5 exteriora basi excavato mellifera, *Caps.* 5 valvis.

455. MONOTROPA *Hypopithys* floribus lateralibus octandris, terminali decandro. Lin. *syft.* ed. R. 2. p. 280.

Im Thiergarten in der grossen Eichenallee, die nach den Zeltern führt passim. In der Jungfernheide hinterm Stern & prope Tegel rarius. Junio. Julio.

LEDUM, Lin. gen. 591.

Cal. 5 fidus. *Cor.* plana 5 partita. *Caps.* 5 locularis basi dehiscens.

456. LEDUM *palustre* floribus terminalibus corymbosis, foliis linearibus subtus ferrugineis, hirsutis.

Ledum palustre. Lin. *syft.* ed. R. 2. p. 289.

Ledum palustre foliis lineari-lanceolatis, subtus ferrugineo tomentosis, staminibus corolla longioribus. Retzii *prod. fl. Scand.* 77. n. 435.

In turfosis *des Grunewaldes* versus *Spandau* frequens. Majo. Junio.

Offic. Rosmarini sylvestris Herba.

PYROLA. *Lin. gen.* 598.

Cal. 5 partitus. *Petala* 5. *Capsula* 5 locularis angulis dehiscens.

457. PYROLA *rotundifolia* staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 299.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel & alibi frequens. Junio.

Offic. Pyrolae Herba.

458. PYROLA *minor* floribus racemosis dispersis, staminibus, pistilloque rectis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 299.

Im Grunewald, Jungfernheide, Thiergarten, prope Tegel & alibi frequens. Junio. Julio.

459. PYROLA *secunda* racemo unolaterali. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 300.

Ad Tegel, Spandau, in den Papenbergern, Thiergarten, Jungfernheide &c. frequens. Junio. Julio.

460. PYROLA *umbellata* pedunculis subumbellatis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 300.

Prope Tegel frequens, im Thiergarten rarius. Junio. Julio.

461. PYROLA *uniflora* scapo unifloro. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 300.

Im Grunewald, Papenbergen, prope Tegel haud infrequens. Im Thiergarten, Jungfernheide rarius. Junio. Julio.

b. Flores monopetali.

ANDROMEDA. *Lin. gen.* 593.

Cal. 5 partitus. *Cor.* ovata: ore 5 fido. *Capsula* 5 locularis.

462. ANDROMEDA *polifolia* pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 293.

Im Grunewald & hinter Tempelhoff lacubus turfosis frequens. Majo.

ARBUTUS. *Lin. gen.* 596.

Cal. 5 partitus. *Cor.* ovata: ore basi pellucida. *Pomum* 5 locale.

463. ARBUTUS *Uva ursi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 298.

In der Jungfernheide haud procul a nemore Tegelenfi unico tantum loco. Majo.

Offic. Uvae ursi Folia.

DIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM. *Lin. gen.* 607.

Cal. 4 f. 5 fidus coloratus persistens. *Cor.* O. *Capsula* 2 rostris unilocularis polysperma.

464. CHRYSOSPLENIUM *alternifolium* foliis alternis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 307.

Prope

Prope dem Invalidenhaus, Pancko, Reineckendorf, Briselang, in nemoribus & ad fossas alibique frequens. Aprili. Majo.

Offic. (*Chrysoplenii* s. *Nasturtii petraei* Herba.)

SAXIFRAGA. Lin. gen. 608.

Cal. 5 partitus. Cor. 5 petala. Capsula birostris, unilocularis, polysperma.

465. *SAXIFRAGA granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. Lin. syst. ed. R. 2. p. 317.

In der Hasenheide ad marginem scrobis limosae copiose. In der Jungferuheide, Thiergarten, prope Tegel & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. (*Saxifragae Radix* sub nomine *Seminis*.)

466. *SAXIFRAGA tridactylides* foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. Lin. syst. ed. R. 2. p. 319.

Saxifraga foliis petiolatis, trilobatis, caule erecto, ramoso & folioso. Hall. helv. 986.

In agris & arvis prope Pancko & Spandau passim. Aprili. Majo.

SCLERANTHUS. Lin. gen. 611.

Cal. 1 phyllus. Cor. 0. Semen 1. calyce inclusum.

467. *SCLERANTHUS annuus* laciniis calycis patulis acutis viridibus.

Scleranthus annuus calycibus fructus patulis. Lin. syst. ed. R. 2. p. 323.

Ad versuras agrorum, inque arvis passim.

In der Jungfernheide ad vias frequens. Aestate.

468. *SCLERANTHUS perennis* laciniis calycis erectis, obtusis, albido marginatis.

Scleranthus perennis calycibus fructus clausis,

Lin. syst. ed. R. 2. p. 323.

In der Hasenheide & Jungfernheide copiose. Aestate.

Offic. (Polygoni cocciferi Herba. Coccionella polonica.)

GYPSOPHILA. Lin. gen. 612.

Cal. 1 phyllus, campanulatus, angulosus, 5 fidus.

Petala 5, ovata, sessilia. *Capsula* globosa, 1 locularis, 5 valvis, polysperma.

469. *GYPSOPHILA muralis* foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 327.*

In der Hasenheide passim. Augusto. Septembri.

SAPONARIA. Lin. gen. 613.

Cal. 1 phyllus nudus. *Petala 5*, unguiculata.

Capsula oblonga unilocularis.

470. *SAPONARIA officinalis* calycibus cylindricis, petalis integris, foliis ovato-lanceolatis.

Saponaria officinalis calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 328.*

In coemeterio ad Pancko & alibi passim. Aestate.

Offic. Saponariae rubrae Radix.

471. *SAPONARIA dioica* floribus dioicis pentagynis, calycibus angulatis subinflatis, petalis bifidis, foliis lanceolatis.

Lichnis dioica floribus dioicis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 397.

In ruderatis ad pagos, vias, inque agris, arvis & nemoribus copiose. Aestate.

Offic. Saponariae albae Radix.

Capsula semper unilocularis, nunquam quinquelocularis, styli quinque quidem saepissime adsunt, tamen cum stylis tribus & quatuor vidi. Numerus in re herbaria nil valet, ea propter ad Saponariam, quum capsula praestantior sit, amandavi.

Interdum tantum flores hermaphroditos proferit. Varietatem vero rubram, nondum Berolini legi. Nescio sane, anne specie sit diversa? In varietate rubra, folia multo obtusiora, & filamenta pilosa sunt.

DIANTHUS. Lin. gen. 614.

Cal. cylindricus monophyllus basi squamis 4.
Petala 5 unguiculata. *Capsula* cylindrica unilocularis.

* *Flores aggregati.*

472. *DIANTHUS carthusianorum* floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum subaequantibus, foliis trinerviis, *Lin. syst. ed. R. 2. p. 332.*

In collibus apricis graminosis, ad agrorum ver-
furas, in pascuis ficcioribus nemoribusque
copiose. Aestate.

473. *DIANTHUS proliſer* floribus aggregatis capi-
tatis ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis,
tubum ſuperantibus. *Lin. ſyſt. ed. R. 2. p. 333.*
Inter *portam Halenſem & Lipſienſem* paſſim. Ju-
lio. Auguſto.

** *Flores ſolitarii plures in eodem caule.*

474. *DIANTHUS deltoides* floribus ſolitariis :
ſquamis calycinis lanceolatis binis, corollis
crenatis. *Lin. ſyſt. ed. R. 2. p. 335.*

*Im Thiergarten, Haſenheide, prope Fridrichs-
felde & alibi frequens. Aestate.*

475. *DIANTHUS ſuperbus* floribus paniculatis,
ſquamis calycinis brevibus acuminatis, corollis
multifido-capillaribus, caule erecto. *Lin. ſyſt.*
ed. R. 2. p. 337. Jacq. obſerv. I. p. 40. t. 25.
Locis graminosis ad *Schoenhausen, Rummelsburg,*
Spandau & alibi paſſim. Julio. Auguſto.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS. Lin. gen. 615.

*Cal. inflatus. Petala 5. unguiculata absque coro-
na ad faucem. Capsula trilocularis.*

476. *CUCUBALUS Behen* calycibus ſubglobosis gla-
bris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus,
corollis ſubnudis. *Lin. ſyſt. ed. R. 2. p. 340.*

Im

Im Thiergarten, Jungfernheide, Papenbergen, prope Tegel, Spandau & alibi passim. In Briselang copiose. Julio. Augusto.

477. *CUCUBALUS chloranthus* scapis subaphyllis, floribus secundis: petalis linearibus bifidis, foliis radicalibus petiolatis oblongis acutis. TAB. V. fig. 9.

In editioribus gramineis prope Spandau bei den Pulvermagazinen passim, hinterm Gewehrplan frequens. Junio. Julio.

Radix perennis. Folia radicalia petiolata glabra oblonga acuta, margine integerrimo retrorsum scabro. Scapus pedalis & ultra, subteres, glaber, geniculatus, subnudus. Geniculae foliis binis oppositis setaceis vaginantibus, vaginis apice sphacilaris, munitae. Flores paniculati secundi; pedunculis unifloris vel bifloris, durante anthesi nutantes, postea erecti. Calyx cylindricus, inflatus: laciniis acutis. Petala fordide viridia linearia bifida. Stamina longitudine corollae. Germen pedicellatum. Styli tres corolla longiores. Capsulae triloculares calyce inclusae.

478. *CUCUBALUS Otites* floribus dioicis, petalis linearibus indivisis. *Lin. syst. ed. R. 2. P. 343.*

In collibus arenosis apricis ad Schoeneberg, Spandau & alibi frequens. Majo. Junio.

SILENE. *Lin. gen.* 616.

Cal. ventricosus. *Petala* 5. unguiculata coronata ad faucem. *Caps.* 3 locularis.

479. *SILENE nutans* petalis bifidis, floribus lateralibus secundis cernuis, panicula nutante. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 347.

In der Hasenheide, Papenberg frequens. *In der Jungfernheide* rarius. Majo. Junio.

STELLARIA. *Lin. gen.* 617.

Cal. 5 phyllus, patens. *Petala* 5. bipartita. *Caps.* 1 locularis polysperma.

480. *STELLARIA Holostea* foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 357.

In nemoribus locis umbrosis humidis frequens. Majo.

481. *STELLARIA graminea* foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 357.

In der Hasenheide, Thiergarten & alibi frequens. Junio.

482. *STELLARIA aquatica* foliis lanceolatis, petalis bipartitis, calycem longitudine aequantibus. *Pölich. pal. I. p.* 429. n. 422.

Stellaria Dilleniana caule flaccido, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis terminalibus bifloris, petalis bipartitis. *Moench. haff. I. p.* 214. n. 364. t. 6.

Alfinae foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Hall. helv.* 1. p. 387.

Alfinae aquatica, folio gratiolae, stellato flore.

Dill giff. p. 58.

In paludibus ad *Spandau* frequens. Junio. Julio.

Non confundenda cum *Stellaria hypericifolia*.

Wiggers primit. 34. n. 364.

ARENARIA. *Lin. gen.* 618.

Cal. 5 phyllus patens. *Petala* 5 integra. *Capsula* unilocularis polysperma.

483. ARENARIA *trinervia* foliis ovatis, acutis, petiolatis, nervosis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 360.

In der *Jungfernheide*, *Thiergarten* &c. passim. Aestate.

484. ARENARIA *serpillifolia* foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 361.

In agris, arvis, pascuis frequens. Aestate.

485. ARENARIA *rubra* foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 362.

Arenaria rubra campestris. α.

Alfinae *spergulae* facie, minor. f. *Spergula* minor, subcaeruleo flore. *Bauh. pin.* 251. prod.

119.

In der *Jungfernheide* hinterm *Stern*, ad *Friedrichsfelde* passim. Julio.

486. *ARENARIA media* foliis linearibus carnosis, stipulis membranaceis, caulibus pubescentibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 363.*

In pascuis sabulosis ad *Spandau* versus *der Jungfernhede* frequens. Aprili. Majo.

Differt a *Spergula pentandra* L.

1) stipulis membranaceis.

2) pistillis tribus.

3) caulibus magis pubescentibus.

487. *ARENARIA tenuifolia* foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 365.*

In agris ante *portam Halensem* & prope *dem Vogtlande* alibique passim. Julio, Augusto.

PENTAGYNIA.

SPERGULA. Lin. gen. 638.

Cal. 5 phyllus. *Petala 5.* integra. *Capsula* ovata unilocularis, 5 valvis.

488. *SPERGULA arvensis* foliis verticillatis, seminibus nudis.

Spergula arvensis foliis verticillatis, floribus decandris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 403.*

In agris, arvis, pascuis, arenosis copiose. Aestate.

489. *SPERGULA vernalis* foliis verticillatis, seminibus marginatis: margine diaphano albo.

Spergula pentandra foliis verticillatis, floribus pentandris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 404.*

In campis sterilissimis arenosis versus *Grunewald* copiose. *In der Hasenheide* passim. Aprili.

Flores, quos vidi, semper decandri erant, nunquam pentandri. Simillima *Arenariae mediae*, quae etiam femina albo marginata possidet.

490. *SPERGULA nodosa* foliis oppositis subulatis laevibus, caulibus simplicibus. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 404.

In pratis humidis *beim Unterbaum*, *in der Jungfernheide*, ante portam *Halensem* & alibi frequens. Julio. Augusto.

CERASTIUM. *Lin. gen.* 637.

Cal. 5 phyllus. *Petala* bifida. *Capsula* unilocularis apice 5 dentato, dehiscens.

* *Capsulis oblongis.*

491. *CERASTIUM vulgatum* foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffusis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 398.

In nemoribus, locisque gramineis frequens. e. g. *In der Jungfernheide* &c. Aestare.

492. *CERASTIUM viscosum* erectum villoso-viscosum. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 399.

Ad sepes, pagos, inque ruderatis passim. Aprili. Majo.

Planta vix digitalis.

493. CERASTIUM *semidecandrum* floribus pentandris, petalis emarginatis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 399.

Ad pagos, vias, sepes in agris frequens. Aprili. Majo.

494. CERASTIUM *arvense* foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 400.

In versuris agrorum frequens. v. g. Prope *venatorem aulicum im Thiergarten*, ad *Reineckendorf &c.* Majo. Junio.

* * *Capsulis subrotundis.*

495. CERASTIUM *aquaticum* foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 402.

Locis humidis nemorosis, ad sepes, in fossis frequens. e. g. *in der Jungfernheide, Thiergarten*, ante *portam Halensem im Aufstall*, ad *Buchholtz &c.* Aestate.

SEDUM. *Lin. gen.* 629.

Cal. 5 fidus. *Cor.* 5 petala. *Squamae* nectariferae 5. ad basin germinis. *Capsulae* 5. polyspermae.

* *Planifolia.*

496. SEDUM *Telephium* foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 380.

β. *Telephium purpureum majus.* *Bauh. pin.* 287.

Prope

Fig. 12

Fig. 11

a

Prope Tegel, Spandau, Pancko, Fridrichsfelde
& alibi frequens. s. rarius. Julio. Augusto.
Offic. (*Fabariae*. s. *Thelephii Radix*.)

** *Teretifolia*.

497. *SEDUM rupestre* foliis subulatis quinquefariam confertis basi solutis, floribus cymosis.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 383.

Retzii prod. fl. Scand. 85. n. 500.

Inter Charlottenburg & Spandau in collibus, oviam versus frequens. Junio. Julio.

Variat Stamina 6 usque 12.

498. *SEDUM album* foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 383.*

In hortis frequens cultum. Junio.

Ad acetaria praecedenti cum specie frequens adhibetur.

499. *SEDUM acre* foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 384.

In campis arenosis, collibus, muris, tectisque stramineis copiosissime. Junio.

Offic. (*Herba Sedi minoris*.)

500. *SEDUM sexangulare* foliis subovatis adnato-sessilibus, gibbis erectiusculis, sexfariam imbricatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 384.*

Iisdem locis passim. Junio.

Costa foliorum elevata, inde folia fere triangularia videntur. Folia in caule florifero dense imbricata, cum in Sedo acri alterna. Cymae pauci-florae.

OXALIS. *Lin. gen.* 634.

Cal. 5 phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Caps.* 5 locularis, angulis dehiscens, 5 gona.

501. OXALIS *Acetosella* scapo unifloro, foliis ternatis obcordatis, radice dentata. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 388.

Prope Tegel, in den Papenberggen frequens, ad Pancko rarius. Aprili. Majo.

Offic. Herba Acetosellae.

502. OXALIS *corniculata* pedunculis umbelliferis, caule ramoso. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 392.

Locis cultis & hortis vulgaris. Junio.

AGROSTEMMA. *Lin. gen.* 635.

Cal. 1 phyllus, coriaceus. *Petala* 5 unguiculata, limbo obtuso indiviso. *Capsula* 1 locularis.

503. AGROSTEMMA *Githago* hirsuta, calycibus corollam aequantibus petalis integris nudis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 393.

Inter segetes copiosissime. Junio.

Offic. (*Lolii Semina.*)

LYCHNIS. *Lin. gen.* 636.

Cal. 1 phyllus, oblongus, laevis. *Petala* 5. unguiculata: limbo subbifido. *Capsula* quinquelocularis.

504. *LYCHNIS Flos cuculi* petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *Linn. syst. ed. R. 2. p. 395.*

In pratis, pascuis paludosis, nemoribusque humidis copiose. Majo. Junio.

505. *LYCHNIS Viscaria* petalis integris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 396.*

Lychnis foliis lanceolatis, floribus verticillatis, spicatis. *Hall. helv. n. 927.*

In den Papenbergen frequens. Majo. Junio.

Variat interdum floribus plenis.

CLASSIS XI.

D O D E C A N D R I A

M O N O G Y N I A.

ASARUM. *Lin. gen.* 642.

Cal. 3 fidus germini connatus. *Cor.* O. *Caps.*
coriacea sexlocularis.

506. ASARUM *europaeum* foliis reniformibus ob-
tusis, binis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 411.

Asarum foliis reniformibus subhirsutis. *Hall.*
helv. n. 1547.

*In den Papenberg*en rarius. *Majo.*
Offic. Asari Radix.

PORTULACA. *Lin. gen.* 659.

Cal. 2 fidus. *Corolla* 5 petala. *Capsula* unilocu-
laris, circumscissa.

507. PORTULACA *oleracea* foliis cuneiformibus,
floribus sessilibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 423.

In ruderatis & cultis frequens. *Julio.*

Flos meridiano sub sole, ad horam duodecimam
apertus.

Offic. Herba Portulacae recens. (*Semina.*)

LYTHRUM. *Lin. gen.* 660.

Cal. 12 dentatus. *Petala* 6. calyci inserta. *Caps.*
bilocularis polysperma.

508. *LYTHRUM Salicaria* foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 426.*

Ad fluviorum ripas, in fossis, paludibus, pratisque inundatis copiose. Julio.

Dentes calycini inaequales. Petala 6. interdum 5. Stamina 6. caeteris longiora.

Offic. Herba florens *Lyfimachiae purpureae*. f. *Salicariae*.

509. *LYTHRUM Hyssopifolia* foliis alternis lineari-bus, floribus hexandris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 428.*

Ante portam *Strahlowianam* locis humidis rarius. Julio. Augusto.

Differt a *Lythro Thymifolia*:

- 1) foliis multo latioribus.
- 2) caule minori.
- 3) floribus hexandris hexapetalis.

DIGYNIA.

AGRIMONIA. Lin. gen. 663.

Cal. 5 dentatus, altero obvallatus. *Petala* 5. *Semina* 2. in fundo calycis.

510. *AGRIMONIA Eupatoria* foliis caulinis pinnatis, impari petiolato, fructibus hispidis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 430.*

In pascuis, coemeteriis, ad pagos, sepes, vias, inque nemoribus frequens. Julio. Augusto.

Offic. *Agrimoniae Herba.*

CARPINUS. *Lin. gen.* 1171.

♂. ♀. ♂. *Cal.* 1 phyllus: squama ciliata. *Cor.* O.

♀. *Cal.* & *Cor.* maris. *Germ.* 2. *Nuces* 2. ovatae.

511. CARPINUS *Betulus* squamis strobulorum planis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 168.

Im Thiergarten, prope *Buchholtz* frequens, alibi in nemoribus passim. Aprili. Majo.

TRIGYNIA.

FAGUS. *Lin. gen.* 1170.

♂ — ♀. ♂. *Cal.* 5 fidus campanulatus. *Cor.* O.

♂. *Cal.* 4 dentatus. *Cor.* O. *Capsula* muricata 4 valvis. *Sem.* 2.

512. FAGUS *sylvatica* foliis ovatis obsolete ferratis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 167.

Im Thiergarten, *Briselang* frequens & alibi passim. Aprili. Majo.

RESEDA. *Lin. gen.* 664.

Cal. 1 phyllus persistens. *Petala* laciniata. *Capsula* unilocularis hians.

513. RESEDA *Luteola* foliis lanceolatis integris, basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 431.

Ad Fridrichsfelde rarius. Julio. Augusto.

EUPHORBIA. *Lin. gen.* 665.

Cal. 1 phyllus. *Cor.* 4. 5 petala, calyci inserta. *Capsula* tricocca.

* *Umbella trifida.*

514. EUPHORBIA *Peplus* umbella trifida, dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 444.*

Tithymalus foliis rotundis, stipulis floralibus cordatis, petalis argute corniculatis. *Hall. helv. n. 1049.*

Locis cultis inque ruderalis frequens. Augusto.

** *Umbella quadrifida.*

515. EUPHORBIA *Lathyrus* umbella quadrifida dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 445.*

Inter olera nonnullis in hortis spontanea. Julio. Augusto.

Offic. (Cataputiae minoris Semina.)

*** *Umbella quinquefida.*

516. EUPHORBIA *segetalis* umbella quinquefida, dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis lineari-lanceolatis: superioribus latioribus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 450.*

Inter segetes ad *Weissensee* passim, prope *Steglitz* frequens. Majo. Junio.

517. EUPHORBIA *helioscopia* umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 450.*

In cultis, ruderalis, ad pagos copiosissime. Aestate.

**** *Umbella multifida.*

518. EUPHORBIA *Esula* umbella multifida: bifida, involucellis subcordatis, petalis bicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 454.*

Ehrhardt. hanoev. Magaz. 18 Stück 1783. p. 273. n. 26.

Ante portam Halensem ad viam versus Schoenberg rarius. Junio.

Simillima Euphorbiae Cajogalae *Ehrhartii*, vel Gerardianae *Jacquini*.

Nostra differt ab illa:

- 1) petalis bicornibus.
- 2) ramis sterilibus.
- 3) foliis venosis nec trinerviis angustioribus.

519. EUPHORBIA *Cyparissias* umbella multifida dichotoma, involucellis subcordatis; ramis sterilibus, foliis fetaceis caulinis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 454.*

β. *Euphorbia degener.* Riv.

Tithymalus cyparissias, foliis punctis croceis notatis. *Bauh. pin. 291.*

Ad vias, agrorum versuras, in pascuis, collibus alibique copiosissime. Majo, Junio.

Offic. (Radix Esulae.)

520. EUPHORBIA *palustris* umbella multifida, subtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 456.*

Tithy.

DODECANDRIA DODECAGYNIA. 169

Tithymalus foliis ellipticis, ramis umbellam
superantibus, capsulis exasperatis. *Hall.*
helv. n. 1054.

Ad fossas prope *Schoenewalde* passim, in *Bri-*
selang hinter dem *Finckenkrug* copiosissime.
Majo, Junio.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM. *Lin. gen.* 667.

Cal. 12 partitus. *Petala* 12. *Capsula* 12 poly-
spermae.

521. *SEMPERVIVUM tectorum* foliis ciliatis, pro-
paginibus patentibus. *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 489.

In tectis pagorum inque hortis copiose. Julio.
Offic. Sedi majoris Herba recens.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

PRUNUS. *Lin. gen.* 675.

Cal. 5 fidus inferus. *Petala* 5. *Drupa* nux futuris prominentibus.

522. PRUNUS *Padus* floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 403.

Im Thiergarten & alibi passim. Majo.

523. PRUNUS *Cerasus* umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 486.

In hortis frequens culta, rarius spontanea. Aprili. Majo.

Offic. Ceraforum acidorum Fructus.

524. PRUNUS *avium* umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis, subtus pubescentibus conduplicatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 487.

Im Thiergarten frequens & alibi passim. In hortis copiose plantatur. Aprili. Majo.

Offic. Ceraforum nigrorum Flores & Nuclei.

525. PRUNUS *domestica* pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis mucosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 468.

Im

Im Thiergarten passim, culta in hortis copiosissime. Majo. Aprili.

Offic. Fructus Pruni.

526. *PRUNUS spinosa* pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinglis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 489.*

Ad Rummelsburg, Tegel, Pancko, Spandau & alibi frequens. Aprili. Majo.

Offic. Fructus & Flores Acaciae nostratis. f. *Prunae sylvestris.* (*Radix, Cortex.*)

DIGYNIA.

CRATAEGUS. Lin. gen. 678.

Cal. 5 fidus. Petala 5. Bacca infera 2 sperma.

527. *CRATAEGUS Oxyacantha* foliis obtusis, subtrifidis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 494.*

In nemoribus frequens, e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel &c. Majo.

Offic. (Spinae albae. f. *Oxyacanthae Folia, Flores, Fructus.*)

TRIGYNIA.

SORBUS. Lin. gen. 679.

Cal. 5 fidus. Petala 5. Bacca infera 3 sperma.

528. *SORBUS aucuparia* foliis pinnatis utrinque glabris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 495.*

In nemoribus, praecipue im Thiergarten, Hasenheide & alibi frequens. Majo.

Offic. Fructus Sorbi.

PENTAGYNIA.

MESPILUS. *Lin. gen.* 681.

Cal. 5 fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera 5 sperma.

529. MESPILUS *germanica* inermis, foliis lanceolatis subtus tomentosis, floribus sessilibus solitariis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 497.

Prope Schoenewald in nemore ad viam versus Pausin rarius. Majo.

Offic. (*Mespili Fructus & Semina.*)

PYRUS. *Lin. gen.* 682.

Cal. 5 fidus. *Petala* 5. *Pomum* inferum 5 loculare polyspermum.

530. PYRUS *communis* foliis ferratis laevibus, floribus corymbosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 500.

Im Thiergarten & alibi passim. Plantata in hortis copiose. Aprili. Majo.

531. PYRUS *Malus* foliis ferratis, umbellis sessilibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 501.

In nemoribus rarius. Plantata copiose. Eodem tempore.

Offic. (*Mali sylvestris Fructus.*)

SPIRAEA. *Lin. gen.* 686.

Cal. 5 fidus. *Petala* 5. *Capsulae* 2 valves, polyspermae.

* *Fruticosae.*

532. SPIRAEA *salicifolia* foliis lanceolatis obtusis ferratis nudis, floribus duplicato-racemosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 520.

Ad sepes & dumeta *im Moabiterlande* ac si spontanea frequens. Junio. Julio.

**** Herbaceae.**

533. SPIRAEA *Filipendula* foliis interrupte pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis interrupte serratis glaberrimis, floribus cymosis. *Lin. suppl. pl. 262.*

Spiraea Filipendula foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus corymbosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 523.*

In nemoribus, pascuis, pratisque ficcis frequens. Junio. Julio.

Germina semper decem, rarius quinque.

Offic. (Filipendulae f. Saxifragae rubrae Radix & Herba.)

534. SPIRAEA *Ulmaria* foliis interrupte pinnatis, foliolis ovatis biserratis subtus canis, floribus cymosis. *Lin. suppl. pl. 262.*

Spiraea Ulmaria foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 523.*

In pratis uliginosis, ad fossas & alibi copiose. Julio. Augusto.

Offic. Flores Barbae Caprinae. f. Ulmariae. (Radix & Herba.)

POLYGYNIA.

ROSA. *Lin. gen.* 687.

Cal. urceolatus, 5 fidus, carnosus, collo coarctatus. *Petala* 5. *Semina* plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa.

* *Germinibus ovatis.*

535. ROSA *rubiginosa* germinibus ovatis: basi pedunculisque aculeatis, caule aculeis recurvis, foliis subtus rubiginosis. *Leysser halensf. ed. 2.* p. 122. n. 495.

Rosa rubiginosa germinibus globosis, aculeatisque, aculeis recurvis, foliis subtus rubiginosis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 525.

Rosa eglanteria. *Mill. dict.* n. 1.

Ad sepes, dumeta, inque nemoribus passim. Junio.

536. ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 530.

In dumetis, sepibus; & nemoribus frequentissima. Junio.

Offic. Cynosbati Fructus (*Rosae sylvestris Flores, Bedeguar vel excrescentiae carnosae insectorum.*)

** *Germinibus globosis.*

537. ROSA *villosa* germinibus globosis, pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 527.

*In der Jungfernheide, prope Spandau, Tegel
& alibi passim. Junio.*

RUBUS. *Lin. gen.* 688.

Cal. 5 fidus. *Petala* 5. *Bacca* composita acinis
monospermis.

* *Frutescentes.*

538. RUBUS *idaeus* foliis quinato pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canalicularis.
Lin. syst. ed. R. 2. p. 532.

Im Thiergarten copiose & alibi frequens. Majo.
Junio.

Offic. Rubi idaei Fructus. (*Folia.*)

539. RUBUS *fruticosus* foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 534.

In nemoribus, sepibus, dumetis abunde.

Offic. Rubi fruticosi Fructus.

540. RUBUS *caesius* foliis ternatis subnudis lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 534.

In agris & arvis frequens. Junio.

** *Herbacei.*

541. RUBUS *saxatilis* foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 536.

Im Thiergarten rarius. Majo.

FRAGARIA. *Lin. gen.* 689.

Cal. 10 fidus. *Petala* 5. *Receptaculum* ovatum
carnosum, deciduum, feminibus obsitum.

542. FRAGARIA *vesca* flagellis reptantibus. *Lin.*
syst. ed. R. 2. p. 537.

In nemoribus copiosissime. Majo.

Offic. Fragariae Radix, Fructus. (*Herba.*)

POTENTILLA. *Lin. gen.* 690.

Cal. 10 fidus. *Petala* 5. *Semina* subrotunda, nu-
da, *receptaculo* parvo exsucco, affixa.

* *Foliis pinnatis.*

543. POTENTILLA *Ansarina* foliis interrupte pin-
natis dentatis, subtus tomentosis, caule re-
pente, pedunculis unifloris.

Potentilla Ansarina foliis pinnatis ferratis, caule
repente, pedunculis unifloris. *Lin. syst. ed.*
R. 2. p. 539.

In pascuis, pratis, ad fossas & vias copiose.
Majo. Junio.

Offic. Ansarinae Herba.

544. POTENTILLA *supina* foliis pinnatis, caule
dichotomo decumbente. *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 542.

In urbe sub salicibus versus portam Strahlowia-
nam frequens. Junio. Julio.

** *Foliis digitatis.*

545. POTENTILLA *argentea* foliis quinatis cunei-
formibus incisus subtus tomentosis, caule
erecto. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 543.

Ad

Ad vias, fepes, inque ruderatis ad pagos frequens. Aestate.

546. *POTENTILLA opaca* foliis radicalibus quinatis cuneiformibus ferratis, caulinis suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 594.*

Im Thiergarten, Papenberg, prope Tegel locis nemorosis umbrosis passim. Majo.

547. *POTENTILLA verna* foliis radicalibus quinatis acute ferratis retusis, caulinis ternatis, caule declinato. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 544.*

In collibus, nemoribusque apricis copiose. e. g. versus *Schoeneberg*, *im Thiergarten*, *Jungfernheide*, *Tegel* &c. Aprili. Majo. Interdum Septembri. Octobri.

548. *POTENTILLA alba* foliis quinatis apice conniventi ferratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 546.*

Im Thiergarten frequens. Majo.

549. *POTENTILLA reptans* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 547.*

In nemoribus, locis subhumidis copiose. Junio. Julio.

Offic. Quinquefolii s. Pentaphylli Radix & Herba.

TORMENTILLA, *Lin. gen.* 691.

Cal. 8 fidus. *Petala* 4. *Semina* subrotunda, nuda, *receptaculo* parvo exsucco affixa.

550. TORMENTILLA *erecta* caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 550.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Friedrichsfelde, Tegel & alibi frequens. Aestate.

Offic. Tormentillae Radix. (*Herba.*)

551. TORMENTILLA *reptans* caule repente, foliis petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 550.

Im Thiergarten passim. Junio. Julio.

GEUM. *Lin. gen.* 692.

Cal. 10 fidus. *Petala* 5. *Sem.* arista geniculata.

552. GEUM *urbanum* floribus erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 551.

In nemoribus ad sepes, dumeta frequens. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, prope Spandau &c. Junio. Julio.

Offic. Caryophyllatae Radix.

553. GEUM *rivale* floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 552.

Locis humidis inque pratis, im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. (*Gei rivali Herba.*)

COMARUM. *Lin. gen.* 694.

Cal. 10 fidus. *Petala* 5 calyce minora. *Recept.*
feminum ovatum, spongiosum, persistens.

554. COMARUM *palustre.* *Lin. syst. ed. R. 2.*
P. 554.

Fragaria foliis pinnatis, petalis ligulatis minimis. *Hall, helv. n.* 1128.

In der Jungfernheide, locis uliginosis copiose.
Aestate.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

*a. Flores tetrapetali.*CHELIDONIUM. *Lin. gen.* 703.*Cal.* 2 phyllus. *Cor.* 4 petala. Siliqua 1 locularis linearis.

555. CHELIDONIUM
- majus*
- pedunculis umbellatis.
- Lin. syst. ed. R.*
2. p. 569.

In ruderatis, ad pagos & sepes copiose. Aestate. *Offic. (Herba & Radix Chelidonii majoris.)*PAPAVER. *Lin. gen.* 704.*Cal.* 2 phyllus. *Cor.* 4 petala. *Capsula* 1 locularis sub stigmate persistente dehiscens.* *Capsulis hispidis.*

556. PAPAVER
- Argemone*
- capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro.
- Lin. syst. ed. R.*
2. p. 571.

Inter segetes ad Tempelhoff, Spandau & alibi sparsim. Junio. Julio.

** *Capsulis glabris.*

557. PAPAVER
- Rhoeas*
- capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incis.
- Lin. syst. ed. R.*
2. p. 572.

Papaver foliis semipinnatis, hispidis, fructu ovato glabro. *Hall. helv. n. 1064.*

In agris inter segetes copiose. Aestate.

Offic. Flores Papaveris Rhocadis vel Erratici.
Semina nigra.

558. PAPAVER *dubium* capsulis oblongis glabris, caule multifloro, fetis adpressis, foliis pinnatifidis incisis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 573.*

Papaver foliis hispidis pinnatis, pinnis lobatis, fructu ovato laevi. *Hall. helv. n. 1063.*

In agris ad *Spandau* frequens. Junio.

559. PAPAVER *somniferum*, calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 574.*

In hortis & inter olera copiose cultum. Junio.
Julio.

Offic. Papaver albi Capita & Semina.

b. Flores pentapetali.

TILIA. *Lin. gen. 717.*

Cal. 5 partitus. *Cor.* 5 petala. *Capsula* coriacea 5 locularis, 5 valvis. *Semen* unicum, caetera abortientia.

560. TILIA *europaea* floribus nectario destitutis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 584.*

α. Tilia foliis acuminatis ferratis subhirsutis, fructibus quadrangularibus subpilosis. *Mill. dict. n. 2. Du Roi harpk. 2. n. 461.*

Tilia platyphyllos foliis magnis subhirsutis. *Scop. carn. ed. 2. n. 641.*

β. *Tilia cordata* foliis cordatis acuminatis inaequaliter ferratis, fructibus quinquelocularibus tomentosis. *Mill. dict.* n. 1.

Tilia ulmifolia foliis durioribus, minoribus, nulli villosis. *Scop. carn. ed.* 2. n. 641.

Im Thiergarten & alibi frequens. β. *im Briselang* rarius. Junio. Julio.

Offic. Flores *Tiliae*.

Cistus. *Lin. gen.* 728. *

Cal. 5 phyllus: foliolis duobus minoribus. *Cor.* 5 petala. *Capsula* subrotunda compressa, calyce obteeta, polysperma.

561. *Cistus Helianthemum* suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 603.

Prope *Fridrichsfelde* in pratis frequens, ad *Doebritz*, *Schoenhausen* passim. *Im Thiergarten* rarius. Junio. Julio.

Capsula unilocularis, trivalvis.

c. *Flores polypetali.*

Nymphaea. *Lin. gen.* 709.

Cal. 4 f. 5 phyllus. *Cor.* polypetala. *Capsula* carnosa multilocularis collo angustata truncata.

562. *Nymphaea lutea* foliis cordatis integerrimis, calyce petalis majore pentaphyllo. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 578.

In der Spree & in lacubus copiose. Junio. Julio.

Offic. *Nymphaea luteae* Flores, (*Radix.*)

563. *NYMPHAEA alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 578.*

In fossis, lacubus *der Jungfernheide* & in *der Havel* abunde. Junio.

Offic. (Nymphaeae albae Radix & Flores.)

d. Flores apetal.

CERATOPHYLLUM. Lin. gen. 1162.

♂—♀. ♂. *Cal. multipartitus. Cor. O. Stamina* duplo plura, quam segmenta calycis.

♀. *Cal. & Cor. maris. Styl. O. Sem. 1. nudum.*

564. *CERATOPHYLLUM demersum* foliis dichotomo bigeminis, fructibus trispinosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 153.*

In *der Jungfernheide* in fossis & paludibus frequens. Junio. Julio.

565. *CERATOPHYLLUM submersum* foliis dichotomo trigeminis, fructibus muticis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 153.*

Beim *Invalidenhanse* aquae immersum frequens. Junio. Julio.

CALLA. Lin. gen. 1121.

Spatha plana. Spadix tectus flosculis. Cal. O. Cor. O. Baccae polyspermae.

566. *CALLA palustris* foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 75.*

In paludibus ad *Gros Glinicke* & im *Grunewalde* copiose. Junio. Julio.

Offic. (Dracunculi palustri s. Callae Radix.)

TRIGYNIA.

DELPHINIUM. *Lin. gen.* 736.

Cal. O. *Petala* 5. *Nectar.* 2 fidum postice cornutum. *Caps.* 3. f. 1.

567. DELPHINIUM *Consolida* nectariis monophyllis, capsula unica, caule subdiviso. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 611.

Inter segetes copiose. Junio. Julio.

Offic. Flores Calcatrippae f. *Consolidae* regalis. (*Herba.*)

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA. *Lin. gen.* 741.

Cal. O. *Petala* 5. *Nectar.* 5. corniculata intra petala. *Caps.* 5. distinctae.

568. AQUILEGIA *vulgaris* nectariis incurvis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 619.

Aquilegia foliis trilobatis, lobis petiolatis tripartitis, subrotundis, obtuse dentatis. *Hall. helv.* n. 1195.

Ad *Friedrichsfelde* passim. In pomariis hortisque frequens. Majo. Junio.

Offic. Flores Aquilegiae. (*Semina.*)

NIGELLA. *Lin. gen.* 742.

Cal. O. *Petala* 5. *Nectar.* 5. trifida intra corollam. *Caps.* 5. connexae.

569. NIGELLA *damascena* pistillis quinis, floribus involucri folioso cinctis. *Lin. syst. ed. R.* 2. p. 621.

In hortis frequens. Aestate.

570. *NIGELLA arvensis* pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 621.

Ad Spandau in agris hinterm Kibitzey passim.
Prope Schoenhausen semel ab amico lecta est.
Julio.

HEXAGYNIA.

STRATIOTES. *Lin. gen. 744.*

Spatha diphylla. *Perianth.* trifidum. *Petala* 3.
Capsula carnosæ sexlocularis, infera.

571. STRATIOTES *Aloides* foliis ensiformi-triangularis ciliato-aculeatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 623.

In der Jungfernheide, beim Unterbaum & in fossis ad Ruhleben frequens. Junio.

Flores dioici, dodecandri, monogyni.

POLYGYNIA.

SAGITTARIA. *Lin. gen. 1164.*

Cal. 3 phyllus. *Cor.* 3 petala. *Sem.* nuda plura, utrinque acuminata, margine membranaceo cincta.

572. SAGITTARIA *sagittifolia* foliis sagittatis acutis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 155.

α. *Sagitta major.* *Scop. carn. ed. 2. n. 1181.*

β. *Sagitta aquatica minor angustifolia.* *Bauh. pin. 194.*

In aquis stagnantibus, fossis frequens. Junio.
Julio.

ANEMONE. *Lin. gen.* 752.

Cal. O. *Petala* 6 9. *Semina* plura.

* *Hepatica*, flore subcalyculato.

573. ANEMONE *Hepatica* foliis trilobis integerrimis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 631.

β. *Hepatica* flore simplici subpurpureo, & rubro. *Rupp jen.* 160.

γ. *Trifolium hepaticum* flore pleno. *Bauh. pin.* 339.

In den Papenberggen frequens. Prope *Schoenhausen*, *Invalidenhaus* & alibi passim. *Aprili.* Majo.

Offic. *Hepaticae nobilis* Herba & Flores.

** *Pulsatilla pedunculo involucrato, seminibus lanatis.*

574. ANEMONE *vernalis* pedunculo involucrato, foliis pinnatis, flore erecto. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 632.

In der Jungfernheide rarissime. *Aprili.* Martio.

575. ANEMONE *Pulsatilla* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 633.

In der Jungfernheide unico tantam loco rarius, Majo.

Offic. (*Herba Pulsatillae.*)

576. ANEMONE *pratensis* pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. *Lin. syst. ed. R. 2. p.* 633.

In

In pascuis nemoribus apricis. e. g. *im Thiergarten, Jungfernheide*, prope *Spandau* & alibi copiose. Aprili. Majo.

Offic. Pulsatillae nigricantis Herba.

*** *Anemonoides flore nudo, seminibus ecaudatis.*

577. *ANEMONE nemorosa* feminibus acutis, foliolis incisiss, caule unifloro. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 637.*

fl. flore extus rubicundo.

Prope *Spandau auf der Katzenbatterie*, in den *Papenbergern* frequens. *Im Briselang* copiose. *Ad Schoenhausen & im Thiergarten* passim. Aprili. Majo.

578. *ANEMONE ranunculoides* feminibus acutis, foliolis incisiss, petalis subrotundis, caule subbifloro. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 638.*

In den Papenbergern, prope *Schoenhausen* passim, prope *Blanckenfelde* & alibi. Aprili. Majo.

Variat pedunculis 1. 2. 3 floris.

THALICTRUM. Lin. gen. 755.

Cal. O. Petala 4. f. 5. caduca. Sem. ecaudata.

579. *THALICTRUM minus* foliis sexpartitis, floribus cernuis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 646.*

Thalictrum foliis patulis imis obtuse trilobis, supremis acutis, panicula diffusa, floribus nutantibus. *Hall. helv. n. 1139.*

In

In pratis & pascuis passim. e. g. ante portam *Halensem*, prope *Rummelsburg*, *Fridrichsfelde*, *Spandau* &c. Junio. Julio.

580. *THALICTRUM flavum* caule folioso fulcato, panicula multiplici erecta. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 648.

Thalictrum foliis erectis, lobulis acute trilobis, spica adscendente. *Hall. helv. 1138.*

Im *Thiergarten*, *Jungfernheide* & alibi in pratis copiose. Julio. Augusto.

Offic. Thalictri Radix.

RANUNCULUS. Lin. gen. 757.

Cal. 5 phyllus. *Petala 5*, ad unges squama mellifera. *Semina nuda.*

* *Foliis simplicibus.*

581. *RANUNCULUS Flammula* foliis elliptico-lanceolatis, petiolatis, crenatis, caule declinato.

α. *Ranunculus Flammula* foliis ovato-lanceolatis, petiolatis, caule declinato. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 653.

β. *Ranunculus palustris*, foliis serratis. *Bauh. pin. 150.*

In pratis humidis, locisque uliginosis frequens. v. g. ante portam *Halensem*, in der *Jungfernheide* &c. Junio. Julio.

Offic. (Flammulae Herba.)

582. *RANUNCULUS Lingua* caule erecto ramoso, foliis lanceolatis subserratis.

Ranun-

Ranunculus Lingua foliis lanceolatis, caule erecto,
Lin. syst. ed. R. 2. p. 653.

β. flore minori.

Prope *Spandau* locis uliginosis inter arundinem
 frequens. β. *in der Jungfernheide* passim.
 Junio. Augusto.

583. *RANUNCULUS Ficaria* foliis cordatis angu-
 latis petiolaris, caule unifloro. *Lin. syst. ed.*
R. 2. p. 656.

Ficaria verna. Hudf. angl. ed. 2. t. 1. p. 244.

In umbrosis humidis ad *Schoenhausen*, *Blancken-
 felde* & alibi passim. *Im Briselang* copiose.
 Aprili. Majo.

Offic. Chelidonii minoris Herba. (Radix.)

Calyx triphyllus. Petala octo. Optime nectariis
 ad apices unguorum petalorum genus *Ranun-
 culi* ab affinibus distinguitur.

** *Foliis dissectis & divisis.*

584. *RANUNCULUS auricomus* foliis radicalibus
 reniformibus crenatis incis; caulinis digitatis
 linearibus, caule multifloro. *Lin. syst. ed. R.*
2. p. 657.

In pratis nemorosis ad *Schoenhausen*, *in der*
Jungfernheide, *Briselang* & alibi frequens.
 Majo.

585. *RANUNCULUS sceleratus* foliis inferioribus
 palmatis; summis digitatis, fructibus oblon-
 gis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 658.*

In pratis paludosis, ad fossas copiose. Majo.
 Junio.

586. *RANUNCULUS bulbosus* calycibus retroflexis, pedunculis fulcatis, caule erecto multifloro, foliis compositis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 662.*

In pratiis, pascuis, locisque nemorosis copiose. Majo. Junio.

Radice bulbosa, & calyce reflexo, facillime ab omnibus distinguendus. In Ranunculo Sardo *Crantzii* vel *Philonitide Ehrhartii* calyx quidem reflexus reperitur; ast radix fasciculata est.

587. *RANUNCULUS repens* calycibus patulis, pedunculis fulcatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 662.*

In nemoribus humidis pratisque vulgaris. Aestate.

588. *RANUNCULUS acris* calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis summis linearibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 663.*

In pratis, pascuisque copiosissime. Majo. Junio. *Offic. (Ranunculi Herba.)*

589. *RANUNCULUS arvensis* seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *Lin. syst. ed. R. 2. p. 665.*

Inter segetes, inque agris copiose. Majo. Junio.

590. *RANUNCULUS hetrophyllus* foliis submersis capillaceis, emerfis reniformi palmatis. *Wiggers primit. p. 42. n. 447.*

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, supremis reniformibus, orbiculatis, palmatis. *Hall. helv.* n. 1163.

Ranunculus aquatilis foliis submersis capillaceis, emerfis peltatis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 667. α .

In fossis, aquisque stagnantibus frequens. e. g. *im Thiergarten im Bassin* & alibi. Majo. Junio.

591. *RANUNCULUS aquatilis* foliis omnibus capillaceis, laciniis divergentibus. *Wiggers primit.* p. 42. n. 448.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Hall. helv.* 1162.

Ranunculus aquatilis γ . *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 668.

β . *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis, circumscriptiōe rotundis. *Roy lugdb.* 492.

Ranunculis aquatilis. *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 667. β .

In lacubus, aquis stagnantibus & fossis copiose. Majo. Junio.

592. *RANUNCULUS fluviatilis* foliis omnibus capillaceis, laciniis paralellis longissimis. *Wiggers primit.* p. 42. n. 449.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaceis, longissimis, laciniis paralellis. *Hall. helv.* n. 1161.

Ranunculus aquatilis. δ . *Lin. syst. ed. R. 2.* p. 668.

In fluviis rivulisque passim. Eodem tempore.

TROLLIUS. *Lin. gen.* 758.

Cal. O. Petala circiter 14. *Nectaria* linearia.
Capsulae plurimae, ovatae, monospermae.

593. TROLLIUS *europaeus* corollis conniventibus,
nectariis longitudine staminum. *Lin. syst. ed.*
R. 2. p. 668.

Prope Schoenhausen rarissime. Ad Blanckenfelde
passim. Junio.

CALTHA. *Lin. gen.* 761.

Cal. O. Petala 5. *Nectar. O. Capsulae* plures
polypermae.

594. CALTHA *palustris*. *Lin. syst. ed. R. 2.*
p. 673.

In pratis paludosis, locisque uliginosis copio-
sissime. Majo.

CLASSIS XIV.

D I D Y N A M I A

G Y M N O S P E R M A.

a. *Calyces subquinquesidi.*AJUGA. *Lin. gen.* 763.*Cor.* labium superius minimum. *Stam.* labio superiore longiora.

595. AJUGA *pyramidalis* tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 8.

In der Hasenheide, Jungferuheide & alibi passim.
Majo. Junio.

Offic. (Consolidae mediae Herba.)

596. AJUGA *reptans* stolonibus reptantibus, *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 9.

Im Thiergarten & alibi copiose. Majo. Junio.

TEUCRIUM. *Lin. gen.* 764.

Corollae labium superius nullum, ultra basin bipartitum, divaricatum.

597. TEUCRIUM *Scorodonia* foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 18.

Im Thiergarten copiose. Julio. Augusto.

- 598 *TEUCRIUM Scordium* foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 18.*

In umbrosis humidis *im Thiergarten, Jungfernheide*, prope *Tegel* & alibi frequens. *Julio.*
Offic. Scordii Herba.

SATUREJA. Lin. gen. 765.

Corollae laciniae subaequales. *Stam. distantia.*

599. *SATUREJA hortensis* pedunculis bifloris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 27.*

In hortis frequens culta, interdum in ruderalis; quisquiliis forte inde dilata. *Julio. Augusto.*
Offic. Saturejae Herba.

HYSSOPUS. Lin. gen. 767.

Corollae labium inferius lacinula intermedia crenata. *Stam. recta distantia.*

600. *HYSSOPUS officinalis* spicis secundis, foliis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 29.*

β. *Hyssopns rubro flore. Bauh. pin. 217.*

γ. *Hyssopus vulgaris alba. Bauh. pin. 218.*

In hortis culta copiose β & γ rarius. *Aestate.*

Offic. Hyssopi Herba.

NEPETA. Lin. gen. 768.

Corollae labium inferius lacinula intermedia crenata, faux margine reflexo. *Stamina* approximata.

601. *NEPETA Cataria* floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 20.*

Ad vias, sepes, pagos, inque ruderalis hinc inde. Aestate.

Offic. Catariae f. Nepetae Herba & Semina.)

LAVANDULA. Lin. gen. 769.

Cal. ovatus subdentatus, bractea suffultus. *Cor.* resupinata. *Stamina* intra tubum.

602. *LAVANDULA Spica* foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 35.*

a. *Lavendula angustifolia. Bauh. pin. 216.*

b. *Lavendula latifolia. Bauh. pin. 216.*

In rusticorum hortis frequens. Julio. Augusto.

Offic. Herba & Flores Lavendulae f. Spicae.

MENTHA. Lin. gen. 771.

Cor. subaequalis, 4 fida: lacinia latiore emarginata, *Stamina* erecta distantia.

* *Capitatae.*

603. *MENTHA crispa* spicis capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam aequantibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 42.*

In hortis copiose culta. Julio. Augusto.

Offic. Menthae crispae Herba.

604. *MENTHA aquatica* floribus capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 43.*

Ad fossas, in pratis humidis, ad lacus & flumina abunde. Julio. Augusto.

Offic. (Menthae aquaticae Herba.)

* * *Verticillatae.*

605. *MENTHA arvensis* floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corollam aequantibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 44.*

In pratis humidis ad fossas copiosissime. Julio. Augusto.

Offic. Menthae equinae. f. sylvestris Herba.)

GLECOMA. Lin. gen. 773.

Antherae laterales reniformes, singulum par in formam crucis connivens.

606. *GLECOMA hederacea* foliis reniformibus crenatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 47.*

Locis humidis umbrosis copiose. Aprili. Majo.

Offic. Hederae terrestris Herba.

LAMIUM. Lin. gen. 774.

Corollae labium superius integrum, fornicatum; labium inferius 2 lobum: faux utrinque margine dentata.

607. *LAMIUM laevigatum* foliis cordatis rugosis, caule laevi, calycibus glabris longitudine tubi corollae. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 48.*

In der Jungfernheide, versus Spandau unico loco frequens. Aprili. Majo.

608. *LAMIUM album* foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 50.*

In cultis, ruderalis, ad pagos & fepes copiose.
Aestate.

Offic. Galeopsidis. f. Urticae mortuae Flores.

609. *LAMIUM purpureum* foliis cordatis obtusis
petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 50.*

In nemoribus umbrosis, ad fepes inque cultis
copiose. Aestate, praecipue Majo.

GALEOPSIS. Lin. gen. 775.

Corollae labium superius subcrenatum, fornicatum,
inferius supra bidentatum.

610. *GALEOPSIS Ladanum* internodiis caulinis
aequalibus, verticillis omnibus remotis caly-
cibus inermibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 51.*

Inter segetes ante portam Halensem & alibi passim.
Julio. Augusto.

611. *GALEOPSIS cannabina* foliis ovato-lanceola-
tis, ferratis, caule hirsuto, flore calyce qua-
druplo majore. *Hall. helv. n. 269. Pollich.
palat. 2. p. 148. n. 560.*

Galeopsis Tetrahit β. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 51.*

Inter segetes ad Friedrichsfelde & alibi passim
Julio. Augusto.

612. *GALEOPSIS Tetrahit* internodiis caulinis su-
perne incrassatis, verticillis summis subcon-
tiguis, calycibus pungentibus. *Lin. syst. ed.
R. 3. p. 51.*

Galeopsis foliis ovato-lanceolatis, ferratis, caule
hirsuto. *Hall. helv. n. 268.*

In agris inter segetes inque sylvis copiose. Julio
Augusto.

POLLICHIA.

Corollae labium superius integrum fornicatum:
inferius bi vel trifidum: faux absque dentibus.

613. *POLLICHIA Galeobdolon* calycibus pungentibus, corollae labio inferiore trifido: foliis omnibus cordatis dentatis, petiolatis.

Pollichia. Franz v. P. Schrank *Centur. bot. Anmerk.* p. 35. n. 29.

Galeobdolon luteum. Wiggers *primit.* p. 44. n. 465.

Lamium Galeobdolon verticillis dimidiatis subsexfloris: ore edentulo. *Crantz austr.* 262. *Scop. carn. ed.* 2. n. 705.

Galeopsis Galeobdolon verticillis sexfloris: involu-
cro tetraphyllo. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 53.

Im Briselang versus *Pausin* frequens & alibi rarius. Aprili. Majo.

614. *POLLICHIA amplexicaulis* calycibus inermibus: corollae labio inferiore bifido, foliis caulinis sessilibus rotundatis incis, radicalibus petiolatis cordato-lobatis.

Lamium amplexicaule foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 51.

Lamium foliis radicalibus petiolatis lobatis, superioribus rotundis amplexicaulibus incis.
Hall. helv. n. 273.

In agris, cultis, ruderatis, sepibusque passim.
Per totam aetatem.

BETONICA. *Lin. gen.* 776.

Cal. aristatus. *Corollae* labium superius adscendens planiusculum; tubus cylindricus.

615. *BETONICA officinalis* spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 53.

Prope *Tegel*, in der *Jungfernheide* & alibi frequens. Julio. Augusto.

Offic. Betonicae Herba.

STACHYS. *Lin. gen.* 777.

Cor. labium superius fornicatum, labium inferius lateribus reflexum: lacinia intermedia majore emarginata. *Stam.* deflorata versus latera reflexa.

616. *STACHYS sylvatica* verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 56.

In nemorosis ad *Potzdamm*, specialis vero locus me fugit. Junio. Julio.

617. *STACHYS palustris* verticillis subsexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 56.

Im *Thiergarten*, *Jungfernheide* & alibi in paludibus, etiamque ad fossas frequens. Junio. Julio.

618. *STACHYS recta* verticillis subspicatis, foliis cordato-ellipticis crenatis scabris, caulibus adscendentibus. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 60.

In versuris agrorum ad *Wilmersdorf*, *Smargendorf*, in littoribus elevatis *der Havel* prope *Gatow* & alibi frequens. Julio.

Offic. Sideritidis Herba.

BALLOTA. *Lin. gen.* 778.

Cal. hypocrateriformis, 5 dentatus, 10 striatus.

Cor. labium superius crenatum, concavum.

619. **BALLOTA nigra** foliis cordatis indivisis serratis, calycibus acuminatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 62.

Ante portam *Lipstensem* in ruderalis copiose, ad pagos & vias alibique passim. Julio. Augusto.

620. **BALLOTA alba** foliis cordatis indivisis serratis, calycibus subtruncatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 63.

In ruderalis ad pagos rarius. Julio.

MARRUBIUM. *Lin. gen.* 779.

Cal. hypocrateriformis, rigidus, 10 striatus. *Cor.* labium superius 2 fidum, lineare rectum.

621. **MARRUBIUM vulgare** dentibus calycinis decem, setaceis uncinatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 65.

In ruderalis, ad vias, pagos, sepes, inque coemeteriis copiose. Aestate.

Offic. Marrubii albi Herba.

CHAITURUS.

Calycis laciniae erectae. *Corollae* labium superius integrum fornicatum: inferius trifidum patens: tubus longitudine calycis. *Stamina* vix tubi longitudine.

622. CHAITURUS *leonuroides*.

Leonurus Marrubiastrum foliis ovatis lanceolatis-
que ferratis, calycibus sessilibus spinosis. Lin.
syst. ed. R. 3. p. 68.

Ehrhardt. hanoev. Magazin 1781. 27 Stück.
p. 421. n. 21.

In nemoribus versus *Rüdersdorf* rarius. Julio.
Augusto.

A Leonuro ob fructificationem valde diversam
separavi.

LEONURUS. Lin. *gen. 780.*

Calycis lacinae patentes. *Corollae* labium supe-
rius planum erectum, inferius trifidum. *Sta-*
mina punctis nitidis adspersa.

623. LEONURUS *Cardiaca* foliis caulinis lanceola-
ris trilobis. Lin. *syst. ed. R. 3. p. 67.*

In ruderalis ad pagos, sepes, & vias vulgaris.
Julio. Augusto.

Offic. (Cardiaca Herba.)

b. Calyces bilobiati.

CLINOPODIUM. Lin. *gen. 783.*

Involucr. multifidum, verticillato-subjectum.

624. CLINOPODIUM *vulgare* capitulis subrotun-
dis hispidis, bracteis seraceis. Lin. *syst. ed. R.*
3. p. 75.

Clinopodium foliis ovato-lanceolatis obiter den-
tatis, stipulis seraceis. *Hall. helv. n. 239.*

In der Hasenheide, Jungfernheide frequens, prope Tegel passim &c. Julio. Augusto.

ORIGANUM. *Lin. gen.* 784.

Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens.

625. ORIGANUM *vulgare* spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 78.*

In den Papenbergen passim. Julio.

Offic. Origani Herba.

626. ORIGANUM *Majorana* foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 79.*

In hortis frequens cultum. Julio. Augusto.

Offic. Majoranae Herba.

THYMUS. *Lin. gen.* 785.

Calycis faux villis clausa.

627. THYMUS *Serpillum* floribus capitatis, caulis repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 79.*

β. *Serpillum vulgare majus. Bauh. pin. 220.*

γ. *Serpillum foliis citri odore. Bauh. pin. 220.*

δ. *Serpillum angustifolium glabrum. Bauh. pin. 220.*

ε. *Serpillum minus flore albo.*

In collibus aridis apricis, agrorum versuris, & nemoribus copiosissime. Aestate.

Offic. Serpilli Herba.

628. *THYMUS vulgaris* erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 80.*

In hortis copiose cultus. Aestate.

Offic. Thymi Herba.

629. *THYMUS Acinos* floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus rectis subramosis, foliis acutis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 81.*

Ad vias, agrorum margines ante portam Halensem, in Thiergarten & alibi frequens. Augusto.

SCUTELLARIA. *Lin. gen. 792.*

Calyx ore integro post florescentiam clauso operculato.

630. *SCUTELLARIA galericulata* foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 98.*

In Thiergarten, Jungfernheide, ad Reineckendorf, Spandau, Coepnick & alibi ad fossas, fluviorumque ripas humidas copiose. Julio. Augusto.

PRUNELLA. *Lin. gen. 793.*

Filamenta bifurca: altero apice antherifera, *Stigma* bifidum.

631. *PRUNELLA vulgaris* foliis ovatis oblongis calycibus superne truncatis. *Hall. helv. 277.*

Prunella vulgaris foliis omnibus ovato-oblongis ferratis petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 101. α.*

In pratis, pascuis, nemoribusque udis copiose.
Julio. Augusto.

Offic. Brunellae vel Prunellae f. Consolidae minoris Herba.

632. *PRUNELLA grandiflora* foliis ovato-oblongis, calycibus superne tridentatis. *Hall. helv.* 278.

Prunella grandiflora foliis subintegris, ex subrotundo ovatis, calycibus superne profunde tridentatis. *Pollich. pal. n.* 578.

Prunella vulgaris β. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 101.

In den Papenberggen rarius. In editioribus ad Rüdersdorf copiose. Julio. Augusto.

ANGIOSPERMIA.

a. Calyces quadrifidi.

RHINANTHUS. *Lin. gen.* 798.

Cal. 4 fidus ventricosus. *Capsula* bilocularis, obtusa, compressa.

633. *RHINANTHUS Cristagalli* corollarum labio superiore compresso brevior. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 106.

Alectorolophys calycibus glabris. *Hall. helv.* 313.

β. *Crista galli angustifolia montana.* *Bauh. pin.* 163.

In pratis & pascuis copiosissime. Aestate.

EUPHRASIA. *Lin. gen.* 799.

Cal. 4 fidus cylindricus. *Capsula* bilocularis ovato-oblonga. *Antherae* inferiores altero lobo basi spinosae.

634. *EUPHRASIA officinalis* foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 108.*

In pratis, pascuisque vulgaris. Junio. Julio.

Offic. (Euphrasiae Herba.)

Corollae labium superius bifidum, laciniis bifidis: labium inferius trifidum, laciniis bifidis. Stamina longitudine labii superioris. Filamenta apice ciliata. Antherae ciliatae uniloculares apice dehiscentes.

635. *EUPHRASIA Odontites* foliis linearibus omnibus ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 109.*

In pascuis & pratis humidis copiose. Aestate.

Corollae labium superius integrum emarginatum: inferius trifidum, lobis integerrimis. Antherae uniloculares apice dehiscentes, infertae mucronatae. In *Euphrasia lutea* etiam Antheras mucronatas vidi.

MELAMPYRUM. *Lin. gen. 800.*

Cal. 4 fidus. *Cor.* labium superius compressum, margine replicato. *Caps.* bilocularis obliqua hinc dehiscens. *Semina* bina gibba.

636. *MELAMPYRUM arvense* spicis conicis laxis bracteis dentato setaceis, coloratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 111.*

Melampyrum foliis integerrimis, bracteis semipinnatis. *Hall. helv. n. 310.*

In agris ad *Spandau* rarissime. Julio.

637. *MELAMPYRUM nemorosum* floribus secundis lateralibus: bracteis dentatis cordato-lanceolatis:

latis : summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 111.*

In nemorosis ad *Schoenhausen*, *Lichtenberg*, in den *Papenberg* & alibi copiose. Junio. Julio.

638. *MELAMPYRUM sylvaticum* floribus secundis lateralibus: conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 112.*

Im *Thiergarten* frequens. Junio. Julio.

LATHRAEA. Lin. gen. 801.

Cal. 4 fidus. Glandula depressa, ad basin futurae germinis. Capsula unilocularis.

639. *LATHRAEA Squamaria* caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 113.*

Ad *Corylorum* truncos prope *Schoenhausen* rarissime. Aprili. Majo.

Offic. (Squamariae s. Dentariae Radix.)

b. Calyces quinquesidi.

PEDICULARIS. Lin. gen. 804.

Cal. 5 fidus. Capsula bilocularis, mucronata obliqua. Semina tunicata.

640. *PEDICULARIS palustris* caule ramoso, calycibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio obliquis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 115.*

In pratis paludosis ad fossas vorm *Gruncwald* frequens. Majo. Junio.

Offic. (Pedicularis Herba.)

641. *PEDICULARIS sylvatica* caule ramoso, calycibus oblongis angulatis laevibus, corollis labio cordato. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 115.*

In der Hasenheide post domum *venatoris Braun*, & ad viam versus *Grunewald*, in pratis passim. Junio. Julio.

ANTIRRHINUM. *Lin. gen. 808.*

Cal. 5 phyllus. Cor. basis deorsum prominens, nectarifera. Caps. bilocularis.

* *Foliis oppositis.*

642. *ANTIRRHINUM minus* foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 134.*

In urbe ipsa, auf den Treppen des Opernhauses & in tegmine arcis regiae frequens. Aestate.

** *Foliis alternis.*

643. *ANTIRRHINUM Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 135.*

In ruderatis, nemoribus glareosis, versuris, ad pagos, fossas exsiccatas, inque coemeteriis copiosissime. Aestate.

Offic. Linariae Flores & Herba.

*** *Corollis ecaudatis.*

644. *ANTIRRHINUM Orontium* corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus digitatis corolla longioribus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 138.*

Prope

Prope *Spandau im Lustgarten* frequens. Aug.
gusto.

SCROPHULARIA. *Lin. gen.* 814.

Cal. 5 fidus. *Cor.* resupinata tubo subglobofo,
lacinia intermedia reflexa. *Capsula* bilocularis.

645. SCROPHULARIA *nodosa* foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 145.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi, ad fossarum latera, inque humidiusculis frequens, Aestate.

Offic. Scrophularie Radix.

646. SCROPHULARIA *aquatica* foliis cordatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranaceo angulato, racemis terminalibus. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 145.

In fossis locisque paludosis ad *Spandau, Friedrichsfelde, Reineckendorf, in der Jungfernheide & alibi* passim. Julio. Augusto.

647. SCROPHULARIA *vernalis* foliis cordatis, caulibus ternis, pedunculis axillaribus solitariis bifidis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 148.

Ad *Schoeneberg* rarius. Majo.

DIGITALIS. *Lin. gen.* 816.

Cal. 5 partitus. *Cor.* campanulata 5 fida, decorum ventricosa. *Capsf.* ovata bilocularis.

648. *DIGITALIS ambigua* corollarum labio emarginato, foliis subtus pubescentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 153.*

In den Pâpenbergen frequens. Junio. Julio.

LIMOSELLA *Lin. gen. 837.*

Cal. 5 fidus. *Cor. 5* fida aequalis. *Stamina* per paria approximata. *Capsula* unilocularis bivalvis polysperma.

649. *LIMOSELLA aquatica* foliis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 181.*

Limosella foliis longe petiolatis, sine spathulatis. *Cranz austr. p. 353.*

In der Jungfernheide ad marginem paludis prope *den Rehbergen* & alibi passim, Augusto.

CLASSIS XV.
TETRADYNAMIA
SILICULOSA.

a. Siliculis integris.

MYAGRUM. *Lin. gen.* 860.

Silicula stylo conico persistente terminata, valvulis concavis, loculo submonospermo.

650. MYAGRUM *sativum* filiculis obovatis, pedunculatis polyspermis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 208.

Inter segetes, praecipue inter *Linum* frequens. Julio. Augusto.

Offic. (Sesami nostratis Semina.)

651. MYAGRUM *paniculatum* filiculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugosis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 209.

Ante portam Oranienburgicam frequens. Julio. Augusto.

DRABA. *Lin. gen.* 864.

Styl. O. *Silicula* integra, ovali-oblonga, valvulis planiusculis dissepimento paralellis.

652. DRABA *verna* scapis nudis, foliis subserratis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 213.

β. foliis cauleque pilosis.

In arvis, agris, collibus apricis copiosissime. Martio. Aprili.

b. Siliculis apice emarginatis.

LEPIDIUM. *Lin. gen.* 865.

Silicula nuda emarginata, cordata, polysperma, valvulis carinatis dissepimento contrariis.

* *Valvulis monospermis.*

653. *LEPIDIUM sativum* floribus tetradynamiis, foliis oblongis multifidis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 218.

In hortis ubique cultum, interdum ad sepes. Aestate.

654. *LEPIDIUM ruderale* floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis ramiferis linearibus integerrimis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 220.

Iberis ruderalis floribus vix conspicuis, foliis imis multifidis, superioribus linearibus integerrimis. *Cranz austr.* 21.

Nasturtium ruderale. *Scop. carn. ed.* 2. n. 801.

Locis ruderatis ad pagos & sepes copiose. Aestate.

** *Valvulis polyspermis.*

655. *LEPIDIUM Bursa pastoris* floribus tetradynamiis, siliculis triangularibus: foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis subintegris.

Thlaspi Bursa pastoris filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 226.

Nasturtium filiquis triangularibus. *Hall. helv.* n. 514.

Bursa pastoris. *Wiggers primit.* p. 47. n. 503.

β. *Bursa pastoris media.* *Bauh. pin.* 108.

γ. *Bursa pastoris major folio non sinuato.* *Bauh. pin.* 108.

In agris, locis cultis, ad sepes, vias, ubique fere copiosissime. Aestate.

Offic. (Bursae pastoris Herba.)

Silicula non alata & dissepimentum valvulis contrarium, a *Thlaspidis* genere separant.

THLASPI. *Lin. gen.* 866.

Silicula alata, emarginata, obcordata, polysperma, valvulis navicularibus dissepimento parerellis.

656. *THLASPI arvense* filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 222.

Inter segetes inque versuris frequens. Aestate.

657. *THLASPI campestre* filiculis subrotundis foliis sagittatis dentatis incanis. *Lin. syst. ed. R. 3.* p. 224.

In urbe versus portam Halensem circum stabulum asininum rarius. Majo. Junio.

IBERIS. *Lin. gen.* 868.

Cor. irregularis: petalis binis exterioribus majoribus. *Silicula* polysperma emarginata.

658. *IBERIS nudicaulis* herbacea, foliis finuatis, caule nudo simplici. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 232.
β. foliis integerrimis.

Im Thiergarten, Jungfernheide, propè Tegel, Spandau & alibi frequens. Aprili. Majo.

In varietate *β.* folia sunt spathulata integerrima, interdum une alterove dente notata.

ALYSSUM. *Lin. gen.* 869.

Filamenta quaedam introrsum denticulo notata.
Silicula emarginata.

659. *ALYSSUM incanum* caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbosis petalis bifidis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 234.

In arenosis aridis apricis ad *Friedrichsfelde, Spandau, Tegel, in der Hasenheide & alibi copiose.* Aestate.

660. *ALYSSUM calycinum* caulibus herbaceis, staminibus omnibus dentatis, calycibus persistentibus. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 234.

Ad *Tempelhoff* rarius. Majo. Junio.

SILIQUOSA.

a. Calyx clausus, foliolis longitudinaliter conniventibus.

ERYSIMUM. *Lin. gen.* 878.

Siliqua columnaris, exacte tetraëdra.

661. *ERYSIMUM cheiranthoides* foliis lanceolatis integerrimis, filiquis patulis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 261.

In agris ad *Spandau* & alibi passim. Julio. Augusto.

CHEIRANTHUS. *Lin gen.* 879.

Calyx clausus foliis duobus gibbis. *Germen* undique denticulo glandulato. *Sem.* plana.

662. *CHEIRANTHUS erysimoides* foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto simplicissimo, filiquis tetragonis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 262.

Ad *Schoeneberg* & *Tegel* rarius. Majo. Junio.

Videtur *Erysimi* species, nisi *calyx* gibbosus adesset.

663. *CHEIRANTHUS scapigerus* caule florifero aphylo, sterilibus simplicibus: foliis lanceolatis integerrimis.

Locis humidis *im Grunewald* rarius. Aprili. Majo.

Radix simplex perpendicularis, forte biennis.

Caulis floriferus glaber, teres, spithameus racemosus, foliis destitutus. Flores alterni pedunculati. Pedunculi floribus duplo longiores teretes. *Calyx* patens, parum gibbus, caducus. Petala calyce longiora lutea integra, longe unguiculata. Stamina lutea longitudine calycis & ultra. Filamenta subulata. Antherae oblongae fulcatae. *Germen* oblongum planum. Stylus nullus. Stigma capitarum, apice

apice divisum. Siliquas maturas non vidi. Caules steriles, florifero minores, glabri, teretes, laevissimi, striati, foliis obfiti. Folia alterna glabra petiolata, oblongo-lanceolata, integerrima, interdum partes prominulas observavi, sed vix dentium nomine dignas.

TAB. V. *fig. 10.*

Possitne locus humidus tantam producere varietatem? Sed praecocitas florendi, & tota inflorescentia dissuadent.

Differt a *Cheirantho erysimoide*:

- 1) caule florifero aphylo.
- 2) foliis integerrimis.

ab *Erysimo cheiranthoide*:

- 1) stigmate diviso.
- 2) calyce gibbo.
- 3) caule florifero nudo.

ARABIS. *Lin. gen. 882.*

Calyx erectus. Glandulae 4. singulae inter calycis foliola, squamae instar reflexae. Siliqua longa compressa.

664. ARABIS *thaliona* foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 272.*

In agris, versuris, locisque ficcis apricis passim. e. g. ante portam Halensem, im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel, Reineckendorf &c. Aprili. Majo.

665. ARABIS *arenosa* foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis sinuato dentatis. *Scop. carn.*

ed. 2. n. 837. t. 40. Wiggers primit. p. 50. n. 522.

Sisymbrium arenosum caule subfoliofo ramoso, foliis lyratis rectangulo-dentatis, hispidis, pilis ramosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 255.*

Prope Tegel & in den Papenbergen hinc inde. Majo. Junio.

Petala semper alba, nunquam violacea, uti *Celeber. Leers* observavit.

TURRITIS. *Lin. gen. 883.*

Calyx connivens erectus. *Cor.* erecta. *Siliqua* longissima angulata.

666. TURRITIS *glabra* foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 274.*

Im Thiergarten & Hasenheide haud infrequens. Majo. Junio.

667. TURRITIS *hirsuta* foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 275.*

Arabis hirsuta. Scop. carn. ed. 2. n. 835.

In der Jungfernheide passim. Majo. Junio.

BRASSICA. *Lin. gen. 884.*

Calyx erectus connivens. *Stylus* brevis crassius germinis.

668. BRASSICA *Napus* radice caulescente fusiformi. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 278.*

Inter segetes rarius, in hortis culta. Majo. Junio.

Offic.

Offic. Semina Napi.

Folia radicalia lyrata; caulina amplexicaulia.

Calyx exacte Sinapis.

669. *BRASSICA Rapa* radice caulescente orbiculari depresso carnosa. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 278.*

Inter segetes in agris & arvis versus *den Grunewald* passim. Culta saepius in agris. Aestate.

670. *BRASSICA oleracea* radice caulescente tereti carnosa. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 278. cum varietatibus.*

Copiose culta, variet. β interdum in ruderalis. Aestate.

RAPHANUS. Lin. gen. 886.

Calyx clausus. *Siliqua* torosa subarticulata, teres.

671. *RAPHANUS sativus* filiquis teretibus torosis bilocularibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 234.*

Frequens in hortis cultus. Majo. Junio.

672. *RAPHANUS Raphanistrum* filiquis teretibus articulatis laevibus unilocularibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 284.*

α . Lampfana flore melino. *Tabernem. 407.*

β . Rapistrum flore albo striato. *Bauh. hist. 2. p. 851.*

Inter segetes in agris copiosissime. Aestate.

b. Calyx hians: foliolis superne distantibus.

SINAPIS. Lin. gen. 885.

Calyx patens. Cor. ungues recti. Stylus longitudine germinis. Siliqua longe rostrata.

673. SINAPIS *arvensis* filiquis multangulis torosis, rostro longioribus: foliis runcinatis, cum caule hispidis.

Sinapis arvensis filiquis multangulis toroso-turgidis, rostro ancipiti longioribus. Lin. *syft.* ed. R. 3. p. 280.

Inter fegetes in agris copiosc. Majo. Junio.

Similis *Sinapi Allioni*. Jacq. *hort. v. 2. t. 168.*

Differt ab illo foliis runcinatis hispidis, lobo exteriori maximo, laciniis obtusis, caule hispido.

SISYMBRIUM. Lin. gen. 877.

Calyx patulus. Cor. patens. Siliqua subangulata dehiscens: valvulis rectiusculis.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

674. SISYMBRIUM *Nasturtium* filiquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis subcordatis. Lin. *syft.* ed. R. 3. p. 249.

Prope den Gesundbrunnen frequens. Julio. Augusto.

Offic. Herba recens Nasturtii aquatici.

675. *SISYMBRIUM sylvestre* filiquis declinatis oblongo-ovatis, foliis lanceolatis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 250.*

Sisymbrium foliis pinnatis, pinnis dentatis diffitis. *Hall. helv. 485.*

Locis depressis ad *Spandau*, in der *Jungfernheide* & alibi passim. Junio. Julio.

676. *SISYMBRIUM amphibium* petalis calyce longioribus, filiquis declinatis oblongo ovatis, foliis integris & pinnatifidis.

Sisymbrium amphibium filiquis declinatis oblongo ovatis: foliis pinnatifidis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 250. β. aquaticum.*

β. *Sisymbrium amphibium.* *Lin. syst. ed. R. 3. p. 251. γ. terrestre.*

In fossis paludibusque β. in pratis & pascuis frequens. Majo. Junio.

677. *SISYMBRIUM palustre* petalis calyce brevioribus, filiquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatis; foliolis dentatis. *Hall. helv. n. 487. Reich. moenof. 472. Pollich. palat. 2. p. 230. n. 625.*

Sisymbrium amphibium. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 250. α. palustre.*

Im *Thiergarten* & *Jungfernheide* in fossis passim. Majo. Junio.

* * *Siliquis longioribus rectis.*

678. *SISYMBRIUM Alliaria* foliis simplicibus cordatis. *Scop. carn. ed. 2. n. 825. Wiggers primit. p. 49. n. 519.*

Erysinum Alliaria foliis cordatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 260.*

Im *Brisclang* hinterm *Finckenkrug* ad fossam, prope *Schoenhausen*, *Tegel* & alibi frequens. Majo.

Offic. (Alliariae Herba.)

Calyx coloratus valde caducus.

679. *SISYMBRIUM officinale* caule ramoso divaricato, siliquis adpressis, foliis runcinatis. *Scop. carn. ed. 2. n. 824. Wiggers primit. p. 49. n. 516.*

Erysinum officinale siliquis spicae adpressis, foliis runcinatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 260.*

In ruderalis, sepibus, ad pagos & vias frequens. Aestate.

Offic. Erysimi Herba.

680. *SISYMBRIUM Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decomposito pinnatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 256.*

In nemoribus siccis, ruderalis, sepibus, ad vias & alibi copiosissime. Majo. Junio.

Offic. (Sophiae Chirurgorum Herba.)

CARDAMINE. *Lin. gen.* 876.

Calyx subhians. *Stigma* integrum. *Siliqua* elastice diffiliens valvulis revolutis.

681. CARDAMINE *pratensis* foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis: caulinis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 248.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald, prope Friedrichsfelde, Schoenhausen, Tegel; Reineckendorf & alibi copiose. Majo. Junio.

682. CARDAMINE *amara* foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 248.

In der Jungfernheide, locis humidis, inque fossis passim. Majo.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

TRIANDRIA.

JUNIPERUS. *Lin. gen.* 1246.

♂ — ♀. ♂. *Ament.* squamosum: squamis 10. 1 flor.
ris. *Cor.* O.

♀. *Calyx* 3 partitus. *Petala* 3. *Styl.* 3. *Bacca*
infera carnosae trisperma.

683. JUNIPERUS *Sabina* foliis oppositis erectis,
decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. *Lin.*
syst. ed. R. 4. p. 277.

Im Thiergarten rarius. Aprili, Majo,

Offic. Sabinae Herba.

684. JUNIPERUS *communis* foliis ternis patentibus
mucronatis bacca longioribus. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 278.

Offic. Juniperi Baccae. Lignum.

PENTANDRIA.

XANTHIUM. *Lin. gen.* 1152.

♂ — ♀. ♂. *Calyx* commun. imbricatus. *Cor.* com-
posita: propria monopetala infundibuliformis.
Recept. paleaceum.

♀. *Calyx* involucrum diphyllum, biflorum. *Cor.*
O. *Styli* 2. *Drupa* sicca muricata bifida. Nu-
cleus bilocularis.

685. *XANTHIUM strumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 137.*
Xanthium foliis semitrilobatis, aculeis uncinatis.
Hall. helv. 1621.

In ruderatis frequens. Augusto. Septembri.

Offic. (Xanthii Semina.)

DECANDRIA.

GERANIUM. Lin. gen. 897.

Monogynia. Stigmata 5. Recept. elongatum, rostratum. Semina 5 arillata: arillo arista tortili donato.

* *Myrrhina. Stam. 5. antherifera. Cal. 5 phyllus. Fructus declinati.*

686. *GERANIUM cicutarium* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisif obtusis, caule ramoso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 317.*

Geranium pimpinellaefolio. Dill. giff. 69.

Ad vias in cultis, ruderatis, arvis, ubique fere copiose. Vere in autumnum usque.

** *Batrachia Staminiibus 10. antheriferis.*

687. *GERANIUM palustre* pedunculis bifloris longissimis declinatis, foliis quinquelobis incisif, petalis integris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 323.*

Geranium caule diffuso, foliis rugosis semiquinquelobis, lobulis trifidis, floribus sparsis, petalis integerrimis. *Hall. helv. 933.*

Ante portam Halensem im Aufstall, in der Jungfernheide, ad Tegel & alibi locis paludosis inque fossis frequens. Junio. Julio.

688. *GERANIUM pratense* pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 324.*

Geranium caule erecto, foliis rugosis, hirsutis, multilobis, lobis trifidis, lobis semipinnatis floribus umbellatis. Hall. helv. n. 931.

β. albo flore.

Ad Tegel & alibi rarius, β. rarissime. Junio. Julio.

**** Staminibus 10. antheriferis. Pedunculis bifloris, annua.*

689. *GERANIUM robertianum* pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 325.*

Geranium foliis duplicato-pinnatis, pinnis ultimis confluentibus, calycibus striatis hirsutis. Hall. helv. n. 943.

In nemorosis umbrosis passim. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel &c. Majo. Junio.

Offic. (Geranii robertiani Herba.)

690. *GERANIUM molle* pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erectiusculo. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 326.*

MONADELPHIA POLYANDRIA. 225

In ruderatis, sepibus, ad vias & pagos frequens. Aestate.

691. GERANIUM *rotundifolium* pedunculis bifloris, petalis subintegris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 328.*

In cultis ad pagos, vias, sepes & alibi copiose. Aestate.

Offic. (Pedis columbae Herba.)

692. GERANIUM *pusillum* pedunculis bifloris, petalis emarginatis, caule depresso, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 328.*

In ruderatis, sepibus ad *Spandau* copiose. Aestate.

**** *Staminibus 10. antheriferis. Pedunculis unifloris.*

693. GERANIUM *sanguineum* pedunculis unifloris foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 329.*

In den Papenberggen frequens. Junio. Julio.

POLYANDRIA.

ALTHAEA. *Lin. gen. 904.*

Calyx duplex exterior 9 fidus. Arilli plurimi monospermi.

694. ALTHAEA *officinalis* foliis simplicibus tomentosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 340.*

In pratis post *Staaken* frequens. Julio. Augusto.

Offic. Althaeae Herba, Radix. (*Semina.*)

MALVA. *Lin. gen.* 906.

Calyx duplex exterior triphyllus. *Arilli* plurimi monospermi.

695. MALVA *rotundifolia* caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 346.

In ruderatis, viis, ad sepes & pagos copiosissime. Aestate.

696. MALVA *sylvestris* caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis, petiolisque pilosis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 347.

Locis nemorosis in *Thiergarten* & alibi frequens. Majo. Junio.

Offic. Malvae Radix, Flores. (*Herba.*)

697. MALVA *mauritiana* caule erecto herbaceo, foliis quinquelobatis obtusis, pedunculis, petiolisque glabriusculis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 347.

In ruderatis passim. Inter olera inque rusticorum hortis frequens. Peregrinae forte originis. Junio. Julio.

698. MALVA *Alcea* caule erecto, foliis multo partitis scabriusculis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 348.

Ad Doebritz passim. Aestate,

Offic. Alceae Radix.

PINUS. *Lin. gen.* 1175.

♂ — ♀. ♂. *Calyx* 4 phyllus. *Cor.* O.

♀. *Calyx* strobilus: squama biflora. *Cor.* O.

Pistillum 1. Nux ala membranacea.

* *Foliis pluribus ex eodem basi vaginali.*

699. PINUS *sylvestris* foliis geminis: primordiis solitariis glabris. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 172.

Circum Berolinum copiosissime, magnas constituens sylvas. Majo.

Offic. Pini Turiones & Resina.

700. PINUS *Larix* foliis fasciculatis obtusis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 175.

Im Thiergarten passim, in der Jungfernheide frequens plantata. Majo.

Offic. Therebinthina veneta.

** *Foliis solitariis & basi distinctis.*

701. PINUS *Picea* foliis solitariis emarginatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 175.

Pinus Abies. Du Roi *harbk.* 2. p. 95.

Im Thiergarten passim. Majo.

Offic. Resina.

702. PINUS *Abies* foliis solitariis subulatis mucronatis laevibus bifariam versis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 177.

Pinus picea. Du Roi *harbk.* 2. p. 110.

Im Thiergarten frequens. Majo.

Offic. Resina.

TAXUS. *Lin. gen.* 1241.

♂. ♀. *Calyx* 4 phyllus gemmae. *Cor.* O. *Antherae* peltatae octofidae. *Styl.* O. *Semen* unicum in calyce baccato, apice dehiscente.

703. TAXUS *baccata* foliis approximatis. *Lin. syst.* ed. R. 3. p. 279.

Im Thiergarten passim. Majo.

CLASSIS XVII.

D I A D E L P H I A

H E X A N D R I A.

FUMARIA. *Lin. gen.* 920.

Cal. diphyllus. *Cor.* ringens. *Filament.* 2. membranacea, singula: *Antheris* 3.

704. FUMARIA *Halleri* radice bulbosa, caule simplici, bracteis cuneiformibus apice incis. Cultus in herb. Hall.

Fumaria radice bulbosa, solida, caule simplici multifloro, bracteis digitatis. *Hall. helv.* n. 349.

Fumaria bulbosa caule simplici, bracteis longitudine florum 3. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 378.

β. radice cava.

Prope *Schoenhausen*, *Friedrichsfelde* & alibi passim. Aprili. Majo.

Offic. Aristolochiae rotundae fabaceae Radix.

Distinctissima bracteis incis a *Fumaria bulbosa* α *Linnei.* Radix aetate cava evadit.

705. FUMARIA *officinalis* pericarpis monospermis racemosis, caule diffuso. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 380.

Fumaria foliis multifidis subrotunde lanceolatis, fructibus monospermis. *Hall. helv.* 346.

In agris, cultis, ad vias copiose. Aestate.
Offic. Fumariae Herba.

OCTANDRIA.

POLYGALA. *Lin. gen. 921.*

Calyx 5 phyllus: foliolis duobus alaeformibus coloratis. *Legumen* obcordatum biloculare.

706. *POLYGALA vulgaris* floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 383.*

β. flore rubro.

γ. flore variegato.

δ. foliis inferioribus obtusis.

In nemoribus frequens. v. g. *in Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald &c.* Majo. Junio seq.

Offic. Polygalae vulgaris Radix. (Folia.)

Varietas δ. cum *Polygala amara* in nonnullis convenit, tamen valde diversa.

DECANDRIA.

α. *Calyce bilabiato.*

SPARTIUM. *Lin. gen. 929.*

Calyx bilabiatus. deorsum productus. *Stigma* longitudinale, supra villosum. *Filamenta* gemini adhaerentia.

707. *SPARTIUM scoparium* foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 403.*

Bei dem Quappenkrüge copioſe. Im Thiergarten, prope Spandau & alibi frequens. Majo. Junio. Offic. Geniſtae Flores. (Semina.)

GENISTA. Lin. gen. 930.

Calyx bilabiatus. Vexillum oblongum deorſum reflexum. Piſtill. deprimens carinam. Stigma involutum.

* *Inermes.*

708. GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. Lin. ſyſt. ed. R. 3. p. 406.

Prope Tegel, Spandau, im Thiergarten & alibi copioſe. Junio. Julio.

Offic. (Geniſtae tinctoriae Herba.)

709. GENISTA *pilosa* foliis lanceolatis obruſis, caule tuberculato decumbente. Lin. ſyſt. ed. R. 3. p. 407.

In der Haſenheide, Jungfernheide, Grunewald & alibi frequens in ericetis. Majo. Junio.

** *Spinosae.*

710. GENISTA *germanica* ſpinis compoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. Lin. ſyſt. ed. R. 3. p. 408.

In der Haſenheide, Papenberg & alibi paſſim. Junio. Julio.

PHASEOLUS. Lin. gen. 940.

Carina cum ſtaminibus ſtyloque ſpiraliter torta.

711. *PHASEOLUS vulgaris* caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pedicellatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 441.*

In hortis vulgaris cultus. Aestate.

712. *PHASEOLUS nanus* caule erecto laevi, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis compressis rugosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 444.*
In agris & hortis frequens colitur. Aestate.

CORONILLA. Lin. gen. 956.

Calyx bilabiatus: dentibus superioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* isthmis interceptum, rectum.

713. *CORONILLA varia* herbacea, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 493.*
Im *Thiergarten* passim. Prope *Wedding*, *Reineckendorf* & alibi frequens. Junio. Julio.

b. Calyce quinquepartito.

ONONIS. Lin. gen. 935.

Calyx 5 partitus: laciniis linearibus. *Vexillum* striatum. *Filamenta* connata absque fissura. *Legumen* turgidum sessile,

714. *ONONIS arvensis* floribus racemosis geminis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus. *Retz prod. fl. Scand. n. 781. Ob-serv. bot. fasc. 1. p. 23. n. 78. & fascicul. 2. p. 21. n. 67.*

Ononis arvensis α . *mitis*. *Lin. syst. ed. R. 3.*
p. 424.

Prope *Tegel* & ad margines nemorum rarius.
Julio. Augusto.

Sequenti simillima; differt tam ramis semper
inermibus, caule herbaceo & majori.

715. *ONONIS spinosa* floribus racemosis solitariis,
foliis ternatis solitariisque ramis spinosis.
Retzii prod. fl. Scand. p. 137. n. 782. Observ.
botan. fascicul. 1. p. 23. n. 78. & fascicul. 2.
p. 2. n. 6.

Ononis arvensis β . *spinosa*. *Lin. syst. ed. R. 3.*
p. 424.

β . Junior planta non spinosa. *Hall. helv. 356.*

γ . flore albo. *Hall. helv. n. 351.*

In agris, arvis copiose γ . rarius. e. g. in der *Ha-*
senheide, *Jungfernheide*, prope *Tegel* &c.
Aestate.

Offic. (Ononidis Herba.)

Junior planta spinis destituta, adulta vero donata.
Cum praecedenti specie feminavi, & haec spi-
nas accepit, illa semper spinis destituta erat.

PISUM. Lin. gen. 944.

Cal. lacinae superiores 2 breviores. *Stylus* trian-
gulus, supra carinatus. *Stigma* villosum.

716. *PISUM sativum* petiolis teretibus, stipulis in-
ferne roduntatis crenatis, pedunculis multiflo-
ris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 457.*

In agris & hortis copiose cultum. Aestate.

717. *PISUM arvense* petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunculis unifloris. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 457.

Rarius inter segetes. Aestate.

Flores nunquam albi.

LATHYRUS. Lin. gen. 946.

Calycis lacinae superiores 2. breviores. *Stylus* planus, supra villosus, superne latior.

718. *LATHYRUS pratensis* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis: foliolis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 467.

Lathyrus scapis multifloris, foliis lanceolatis, capreolis simplicibus. *Hall. helv. n. 436.*

In pratis prope *Charlottenburg, Tegel, in der Jungfernheide*, ad *Reineckendorf* & alibi frequens. Junio.

719. *LATHYRUS sylvestris* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 467.

Lathyrus caule alato, foliis geminis ensiformibus. *Hall. helv. n. 434.*

In der *Hasenheide* frequens. Junio. Julio.

720. *LATHYRUS palustris* pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 468.

Lathyrus foliis senis, floribus racemosis. *Hall. helv. n. 431.*

In pratis propter *Hennigsdorf*, ad fossam *hinterm Gewehrplan* prope *Spandau* &c. frequens.

ERVUM. *Lin. gen.* 948.

Cal. 5 partitus longitudine fere corollae: laciniis subaequalibus.

721. ERVUM *Lens* pedunculis subbifloris, feminibus compressis convexis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 476.

Frequens cultum in agris. Aestate.

722. ERVUM *tetraspermum* pedunculis subbifloris, feminibus globosis quaternis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 476.

Inter segetes in agris passim. Aestate.

723. ERVUM *hirsutum* pedunculis multifloris, feminibus globosis binis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 477.

Inter segetes in agris copiosissime, inque hortis & pratis passim. Aestate.

HEDYSARUM. *Lin. gen.* 961.

Cor. carina transverse obtusa. *Legumen* articulis monospermis.

724. HEDYSARUM *Onobrychis* foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calycem aequantibus, caule elongato. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 514.

In agris passim colitur. Junio. Julio.

LOTUS. *Lin. gen.* 969.

Cal. tubulosus femiquinquefidus. *Alae* fursum longitudinaliter conniventes. *Filamenta* cuneiformia apice truncata. *Antherae* minimae.

725. LOTUS *corniculatus* capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 568.

β. LOTUS pentaphyllos flore majore luteo, splendente. *Bauh. pin.* 332.

In agris, versuris, pratis, pascuis, nemoribus copiose. β. locis humidis. Aestate.

MEDICAGO. *Lin. gen.* 971.

Pistillum incurvatum e carina elastice exsiliens, eandemque deflectens. *Legumen* compressum cochleatum.

* *Floribus spicatis. Caule saepius erecto, absque stipulis.*

726. MEDICAGO *sativa* pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 574.

In der Jungfernheide unico loco & in coemeterio ad Tegel frequens. Culta passim. Julio. Augusto.

727. MEDICAGO *falcata* pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 574.

Prope Friedrichsfelde, Reineckendorf, Tegel & alibi frequens. Aestate.

728. *MEDICAGO lupulina* spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulibus procumbentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 575.*

In agris, pascuis, pratis siccis, arvis, nemoribus apricis copiose. Aestate.

** *Polymorphae. Pedunculis paucifloris, caule diffuso: stipulis munito.*

729. *MEDICAGO minima* caule diffuso, stipulis integris, leguminibus ternatis cochleatis: aculeis uncinatis.

Medicago polymorpha leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 575. variet. λ. minima* leguminibus cochleatis subternatis, spinulis uncinatis, stipulis integris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 578.*

In agris versus *Hasenheide* rarius. Majo, Junio.

Varietates *Medicaginis polymorphae* a *Perill. Linneo* indicatae, verae species sunt, licet in nonnullis conveniant. Cultura non unam in alteram mutat, semper observavi.

c. *Calyce quinquedentato.*

ANTHYLLIS. *Lin. gen. 936.*

Cal. ventricosus 5 dentatus, Legumen subrotundum calyce tectum.

730. *ANTHYLLIS Vulneraria* herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 403.*

In der *Hasenheide* passim. In pratis vor *Falcken-hagen* copiose &c, Junio.

OROBUS. *Lin. gen.* 945.

Cal. cylindricus, basi obtusus 5 dentatus: laciniis superioribus profundioribus, brevioribus. *Stylus* linearis.

731. OROBUS *vernus* foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 459.*

In den Papenbergen rarissime. Majo.

732. OROBUS *tuberosus* foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 460.*

In der Hasenheide, Jungfernheide, Thiergarten & alibi frequens. Majo. Junio.

733. OROBUS *niger* caule ramoso, foliis sexjugis, ovato-oblongis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 460.*

In den Papenbergen frequens. Junio. Julio.

VICIA. *Lin. gen.* 947.

Stigma obtusum sub apice transverse barbatum.

* *Pedunculis elongatis.*

734. VICIA *cassubica* pedunculis subsexfloris, foliis denis ovatis, acutis, stipulis integris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 470.*

In der Hasenheide frequens. Junio.

735. VICIA *Cracca* pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 471.*

Vicia foliis linearibus sericeis, racemis multifloris reflexis, stipulis integerrimis. *Hall. helv. n. 424.*

In pratis & pascuis copiosissime. Junio. Julio.

737.

736. *Vicia Gerardi* pedunculis multifloris, foliis linearibus obtusis trinerviis, stipulis integris, caule erecto.

Vicia Gerardi pedunculis multifloris, foliolis oblongis, subpubescentibus, stipulis integris, caule erecto. *Murr syst. ed. 14. p. 664? Jacq. aust. vol. 3. t. 229?*

In der Hasenheide rarius. Junio.

Flores semper violacei nec caerulei. Foliola linearia obtusa trinervia mucrone minutissimo, subpubescentia. Stipulae superiores lineares, inferiores subhaustatae.

Adhuc incertus sum, an vera sit *Vicia Gerardi*; quum splendidissimum opus *Perill. Jacquini* non possideo.

*** Floribus axillaribus, subsessilibus.*

737. *Vicia sativa* leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis retusis, stipulis notatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 472.*

Inter segetes passim. Saepius culta. Junio. Julio.

738. *Vicia monantha* pedunculis unifloris aristatis, foliolis lanceolatis obtusis, stipulis bifidis. *Retzii observ. botan. fascicul. 3. p. 39. n. 81.*

In agris passim. e. g. prope *den Fasanengarten, Tegel &c.* Majo. Junio.

739. *Vicia lathyroides* leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis senis: inferioribus obcordatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 473.*

Inter

Inter *Pancko & Schoenhausen in der Allee, im Thiergarten bei den Puppen, prope Spandau & alibi passim.* Majo.

Cirrhis instruitur & destituitur, *Retzii Observ. botan. fasc. I. p. 24. n. 83.* Semper absque cirrhis vidi.

740. *Vicia sepium* leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrescentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 474.*

In pratis ad pagos & sepes locis humentibus passim. e. g. prope *Buchholtz, Reineckendorf &c.* Majo. Junio.

741. *Vicia Faba* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 475.*

In hortis frequens colitur. Aestate.

ORNITHOPUS. Lin. gen. 957.

Legumen articulatum, teres, arcuatum.

742. *ORNITHOPUS perpusillus* foliis pinnatis, leguminibus incurvatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 494.*

Ornithopodium caule prostrato, foliis pinnatis, filiquis umbellatis, articulatis. *Hall. helv. n. 393.*

Ornithopodium minus. Bauh. pin. 350.

β. *Ornithopodium majus. Bauh. pin. 350.*

γ. *Ornithopodium radice tuberculis nodosa. Bauh. pin. 350.*

In agris *bei der Hasenheide* copiose. Ad *Pancko, Blanckenfelde &c.* frequens, β, rarius. Majo. Junio.

ASTRAGALUS. *Lin. gen.* 965.

Legumen biloculare gibbum.

743. *ASTRAGALUS glycyphyllus* caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 529.*

In der Hasenheide passim. Junio. Julio.

744. *ASTRAGALUS arenarius* caulescens ramosus erectus tomentoso albus, foliolis complicatis, pedunculis subquadrifloris. *Retz observ. botan. fascicul. 3. p. 41. n. 87. tab. 3.*

Astragalus arenarius subcaulescens procumbens, floribus subracemosis erectis, foliolis tomentosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 533.*

In der Hasenheide rarius. Prope Wedding copiose. Junio. Julio.

TRIFOLIUM. *Lin. gen.* 968.

Flores subcapitati. Legumen vix calyce longius, non dehiscens, deciduum.

* *Meliloti leguminibus nudis polyspermis.*

745. *TRIFOLIUM officinale* leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 547.*

♂. *Melilotis officinarum germaniae, flore albo. Tournef. inst. r. herb. 407.*

In ruderatis, sepibus, coemeteriis, ad pagos & alibi passim. Aestate.

Offic. Meliloti citrinae & albae Herba florens.

** *Lotoidea leguminibus tectis polyspermis.*

746. *TRIFOLIUM hybridum* capitulis umbellari-
bus, leguminibus tetraspermis, caule adscen-
dente. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 549.*

Locis cultis, in agris, ad vias inque pratis passim.
e. g. ad *Schoeneberg, Reineckendorf &c.* Majo.
Junio.

747. *TRIFOLIUM repens* capitulis umbellaribus,
leguminibus tetraspermis, caule repente. *Lin.*
syst. ed. R. 3. p. 549.

α. foliis maculatis.

In agris, arvis, locis cultis copiosissime; per to-
tam aestatem.

Offic. (Trifolii albi Flores.)

*** *Lagopoda calycibus villosis.*

748. *TRIFOLIUM pratense* spicis globosis subvil-
losis, cinctis stipulis oppositis membranaceis,
corollis monopetalis. *Lin. syst. ed. R. 3.*
p. 552.

β. foliis albo maculatis.

γ. foliis viridibus.

In pratis, pascuis ubique copiosissime. Ae-
state.

749. *TRIFOLIUM alpestre* spicis subglobosis villo-
sis terminalibus, caule erecto, foliis lanceola-
tis ferrulatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 553.*

*Im Thiergarten rarius. In der Hasenheide & Pa-
penbergen frequens. Junio. Julio.*

750. *TRIFOLIUM arvense* spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis sericeis villosis aequalibus.

Lin. syst. ed. R. 3. p. 555.

In agris post messem copiose.

Offic. (Lagopi Flores.)

**** *Vesicaria calycibus inflatis ventricosis.*

751. *TRIFOLIUM fragiferum* capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 559.*

Trifolium caule repente, spicis glabris, calycibus sericeis, ampullescentibus. *Hall. helv. n. 370.*

In pratis versus *Hasenheide*, *hinterm Thiergarten*, ante portam *Halensem im Aufstall* & alibi frequens. Julio. Augusto.

***** *Lupulina vexillis corollae inflexis.*

752. *TRIFOLIUM montanum* spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarescentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 560.*

Trifolium cauliculo paucifloro, foliis elliptico-lanceolatis, nervosis, subtus subhirsutis. *Hall. helv. n. 372.*

In der *Hasenheide*, *Papenberg*, in via inter *Seeburg* & *Dalgow* alibique frequens. Junio. Julio.

753. *TRIFOLIUM aureum* spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caly-

cibus nudis, stipulis lanceolatis nudis, foliolo impari fessili, caule erecto. *Pollich. pal. tom. 2. p. 344. n. 708.*

In der Spandauerheide in plantariis passim. Julio.

754. *TRIFOLIUM agrarium* spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 560.*

Trifolium agrarium spicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexis persistentibus, calycibus subpubescentibus, stipulis cordatis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuso. *Pollich. pal. tom. 2. p. 342. n. 707.*

In agris, arvis, cultis, pratis siccis, ad vias copiose. Aestate.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA

POLYANDRIA.

HYPERICUM. *Lin.* 981.

Cal. 5. partitus inferus. *Petala* 5. *Filamenta* multa in 5 phalanges basi connata *Capsula*.

* *Trigyna*, *calycibus*, *bracteisque glabris*.

755. *HYPERICUM quadrangulare* floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 595.

Im Thiergarten & prope Spandau passim. Julio.

756. *HYPERICUM perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis pellucido-punctatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 595.

In nemoribus & pratis nemorosis, inque versuris agrorum copiosissime. Aestate.

Offic. Hyperici Flores, Herba. (Semina.)

757. *HYPERICUM humifusum* floribus trigynis axillaribus solitariis, caulibus ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 596.

Hypericum caule prostrato, foliis ovatis, calycibus ferratis punctatis. Hall. helv. n. 1039.

Im Grunewald frequens. Julio. Augusto.

** *Trigyna: calycibus bracteisque serrato-glandulosis.*

758. *HYPERICUM montanum* floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 597.

Hypericum foliis ovatis, ora punctata, calycibus lanceolatis ferratis glanduligeris. *Hall. helv. n. 1042.*

In nemorosis umbrosis ad *Tegel* frequens. Julio. Augusto.

759. *HYPERICUM dubium* floribus trigynis, caule subquadrato herbaceo, foliis ovatis, calycibus obtusissimis. *Leers herborn. p. 165. n. 594.*

Im *Brifelang & Papenberg* frequens. Julio. Augusto.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA

AEQUALIS.

a. *Semiflosculosi, corollis omnibus
ligulatis.*

TRAGOPOGON. *Lin. gen.* 984.

Receptaculum nudum. Cal. simplex. Pappus stipitatus plumosus.

760. TRAGOPOGON *pratensis* calycibus corollae
radium aequantibus, foliis integris strictis.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 611.

In pratis, pascuis, nemoribus apricis humidis frequens. Junio. Julio.

Offic. (Barbae Hirci Radix.)

761. TRAGOPOGON *major* calycibus corolla radio
longioribus, foliis integris strictis, pedunculis
superne incrassatis, corollis ad apicem rotundatis.
Murr. syst. 14. p. 710. Jacq. austr. v. 1. t. 29.

Prope Spandau passim. Julio.

SCORZONERA. *Lin. gen.* 985.

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus, squamis margine scariosis. Pappus stipitatus plumosus.

762. *SCORZONERA humilis* caule subnudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervosis planis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 615.*

Scorzonera caule unifloro nudo, foliis lanceolatis. *Hall. helv. n. 10.*

In der Jungfernheide passim. Majo. Junio.

763. *SCORZONERA purpurea* foliis lineari-subulatis integris canaliculato-triquetris pedunculis cylindricis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 616.*

In der Jungfernheide rarissime. Junio. Julio.

SONCHUS. Lin. gen. 987.

Receptaculum nudum. *Cal.* imbricatus conicus. *Pappus* pilosus sessilis.

764. *SONCHUS palustris* pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi sagittatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 620.*

Locis uliginosis paludosis ad *Spandau*, *Reineckendorf* rarius. Julio. Augusto.

765. *SONCHUS arvensis* pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis acute dentatis, amplexicaulibus basi obtusis.

Sonchus arvensis pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 621.*

In pratis, pascuis agris humentibus frequens. Aestate.

766. *SONCHUS oleraceus* foliis amplexicaulibus dentatis integris & semipinnatis calycibus laevibus. *Hall. helv. n. 21.*

Sonchus oleraceus pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 621. varietas* α & β *laevis*.

Sonchus laevis. *Jacob. Catalog. plant. Faverh. 109.*

β . *Sonchus laevis* minor paucioribus laciniis. *Jacob. Catalog. plant. Faverhamiens. p. 109.*

Ad sepes, in ruderatis cultis oleraceis copiosissime. Aestate.

Offic. (Sonchi laevis Herba.)

767. *SONCHUS asper* foliis amplexicaulibus rigidis integris & semipinnatis, dentatis, calycibus laevibus. *Hall. helv. n. 22.*

Sonchus oleraceus γ & δ *asper*. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 621.*

Sonchus asper laciniatus. *Jacob. Cat. pl. Faverh. 109.*

β . *Sonchus asper* non laciniatus. *Jacob. Cat. pl. Faverh. 109.*

In ruderatis, ad sepes inque cultis passim. Aestate.

Cum *Celeber*, *Hallero* hanc speciem ab oleraceo separavi, quum diversissima & constans,

LACTUCA. *Lin. gen. 988.*

Receptaculum nudum. *Cal.* cylindricus imbricatus, squamis margine membranaceis. *Semina* laevia. *Pappus* stipitatus pilosus.

768. *LACTUCA sativa* foliis rotundatis caulinis cordatis, caule corymbofo. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 625.*

In hortis copiose colitur. Aestate.

Offic. (Semen Lactucae.)

769. *LACTUCA Scariola* foliis verticalibus carina aculeatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 625.*

Lactuca foliis semipinnatis, nervo spinoso. *Hall. helv. n. 14.*

Im Thiergarten, ante portam Halensem, in ruderatis rarius. In urbe auf der langen Brücke frequens. Aestate.

Offic. (Semen Scariolae.)

CHONDRILLA. Lin. gen. 989.

Receptaculum nudum. Calyx cylindricus strictus, calyculatus. Anthodii flores duplici serie. Semina muricata. Pappus stipitatus pilosus.

770. *CHONDRILLA juncea* foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 627.*

Chondrilla juncea foliis radicalibus eroso-pinnatifidis lyratis, caule basi aculeato, floribus spicatis. *Gouan illustr. 54.*

Ante portam Oranienburgicam copiose & alibi passim. Julio. Augusto.

PRENANTHES. Lin. gen. 990.

Receptaculum nudum. Calyx calyculatus. Anthodii flores simplici serie. Pappus pilosus subsessilis.

771. *PRENANTHES muralis* floribus paniculatis, anthodiis quinquefloris; foliis runcinatis: lobis acutis serratis, terminali triangulari-trilobo.

Pre-

Prenanthes muralis flosculis quinis, foliis runcinatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 630.*

Im Thiergarten, Jungfernheide, Papenberg
& alibi passim. Julio. Augusto.

Pappus stipitatus.

Offic. (Chondrillae Herba.)

TARAXACUM.

Receptaculum convexum nudum. *Calyx* oblongus, calyculatus duplici foliorum serie. *Pappus* stipitatus plumosus.

772. *TARAXACUM officinale* squamis calycinis exterioribus reflexis, foliis runcinatis acute dentatis glabris.

Taraxacum officinale. Wiggers primit. n. 595.

Hedypnois Taraxacum calyces squamae exteriores & imae reflexae. *Scop. carn. ed. 2. n. 957.*

Leontodon Taraxacum calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis laevibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 631.*

β. Dens leonis angustiore folio. *Bauh. pin. 126.*

γ. folio latiore & parum inciso.

In pratis, pascuis, pomariis ubique copiosissime.
Aestate praecipue Junio.

Offic. Radix & Herba recens Taraxaci.

LEONTODON. *Lin. gen. 991.*

Receptaculum planiusculum nudum. *Calyx* imbricatus. *Pappus* plumosus sessilis.

773. *LEONTODON autumnale* caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis denta-

tis integerrimis glabris. *Lin. syst. ed. R. 3.*
 ° p. 633.

Picris caule nudo brachiato, foliis glabris semipinnatis. *Hall. helv. n. 28.*

In der Hasenheide, Thiergarten, ad Spandau & alibi passim. Augusto.

774. *LEONTODON hispidum* calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis: pilis furcatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 634.*

In der Hasenheide versus den Rollbergen passim. Julio.

775. *LEONTODON hirtum* calyce toto recto, foliis dentatis hirtis: fetis simplicissimis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 634.*

Crepis foliis lanceolatis dentato sinuatis hispidis, fetis subulatis, scapo unifloro. *Sp. pl. I. p. 799.*

Cum praecedenti *in der Hasenheide. Julio, Augusto.*

HIERACIUM. Lin. gen. 992.

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus ovatus. Pappus pilosus sessilis.

* *Scapo nudo unifloro.*

776. *HIERACIUM Pilosella* foliis integerrimis ovatis subtis tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 638.*

In pascuis aridis arenosis, collibus, nemoribusque apricis copiosissime. Per totam aestatem.

Offic. Pilosellae f. Auriculae muris Herba & Flores.

** *Scapo nudo multifloro.*

777. *HIERACIUM dubium* foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 638.*

Hieracium caule nudo paucifloro, stolonibus reptantibus, foliis longe pilosis lanceolatis. *Hall. helv. n. 53.*

In pratis humidis *vor der Hasenheide* & prope *Spandau* passim. Junio. Julio.

778. *HIERACIUM cymosum* foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus subumbellatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 639.*

Hieracium caule subnudo, foliis hirsutis, lanceolatis, floribus umbellatis, petiolis ramosis. *Hall. helv. n. 51.*

Im *Briselang* in plantariis copiose. Junio. Julio.

*** *Caule folioso.*

779. *HIERACIUM sylvaticum* caule ramoso folioso, foliis radicalibus ovatis petiolatis, caulinis sessilibus, pedunculis multifloris. *Gouan illustr. p. 56. Retzii observ. botan. fascicul. 1. p. 27. n. 90.*

Hieracium murorum caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis caulino minori. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 643. var. β.*

Im *Thiergarten* & *Jungfernheide* passim. Julio. Augusto.

Offic. (Pulmonariae gallicae Herba.)

Varie-

Varietatem α . *Hieracii murorum* Lin. hic nondum observavi, diversissima est & *Celchr. Gouanius* istam recte separavit.

780. *HIERACIUM paludosum* caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 643.

Hieracium foliis glabris dentatis, imis petiolatis, superioribus amplexicaulibus, calycibus hirsutis. *Hall. helv.* n. 45.

Im Elsbruch versus *Falkenhagen* passim. Junio.

781. *HIERACIUM sabaudum* caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 647.

Hieracium foliis hirsutis, dentatis, inferioribus ellipticis, superioribus ovato-lanceolatis. *Hall. helv.* n. 35.

In den Papenberg passim. Julio. Augusto.

782. *HIERACIUM umbellatum* foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 647.

α . foliis pene ovatis, vix dentatis, caule humili, pene unifloro. l. c. p. 648.

γ . angustissimis, quasi lineariae foliis. *Ibid.*

Ante portam *Halensem*, prope *Tegel*, *Spandau*, *Friedrichsfelde* & alibi frequens. α , rarius, β . & γ . vulgares. Julio. Augusto.

CREPIS. Lin. *gen.* 993.

Receptaculum nudum. *Calyx* calyculatus, squamis deciduis. *Pappus* pilosus.

783. *CREPIS tectorum* foliis lanceolato runcinatis
fessilibus laevibus, inferioribus dentatis. *Lin.*
syst. ed. R. 3. p. 652.

In nemoribus, pratis, pascuis ubique fere co-
piofissime. Julio. Augusto.

Planta polymorpha.

784. *CREPIS Dioscoridis* foliis radicalibus runci-
natis, caulinis hastatis, calycibus subtomento-
sis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 654.*

Ante portam Halensem im Aufstall passim. Julio.
Augusto.

Calyces externe pilis minutissimis albis obsiti,
Pappus fessilis.

HYOSERIS. Lin. gen. 995.

Receptaculum nudum. *Cal.* subaequalis. *Pappus*
pilosus calyculatusque, (vel nullus.)

785. *HYOSERIS minima* caule diviso nudo, pe-
dunculis incrassatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 658.*

Lapsana foliis ovatis dentatis, caulibus nudis sub
flore tumentibus. *Hall. helv. n. 4.*

In agris arenosis inter segetes frequens e. g. pro-
pe *Friedrichsfelde, Charlottenburg &c.* Julio.
Augusto.

Pappus nullus.

Lapsanae adsociavit *Celeber. Haller & idem* fe-
cisse, nisi calyx diversissimus esset.

LAPSANA. Lin. gen. 998.

Receptaculum nudum. *Cal.* calyculatus, squamis
singulis interioribus canaliculatis. *Pappus* nullus.

786. *LAPSANA communis* calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 663.*

Lapsana caule brachiato, foliis ovatis, longe petiolatis, petiolis pinnatis. *Hall. helv. n. 6.*

In nemoribus, cultis, hortisque copiose. Aestate.

CICHORIUM. Lin. gen. 1000.

Receptaculum subpaleaceum. *Cal.* calyculatus. *Semina* corona 5 dentata, obsolete pilosa.

787. *CICHORIUM Intybus* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 665.*
Ad agrorum margines, sepes, inque ruderalis passim. In hortis frequens colitur. Julio, Augusto.

Offic. Cichorii sylvestris & hortensis Radix.

788. *CICHORIUM Endivia* floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 665.*

β. *Endivia* crispa. *Bauh. pin. 125.*

Cultum in hortis frequens. Aestate.

Offic. (*Endiviae Herba.*)

Varietas β. ad acetaria pertinet.

HYPOCHAERIS. Lin. gen. 997.

Receptaculum paleaceum. *Cal.* subimbricatus. *Pappus* stipitatus plumosus.

789. *HYPOCHAERIS maculata* caule subnudo: ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 661.*

Hy.

Hypochaeris caule unifloro, foliis dentatis hirsutis. Hall. *helv.* 2. n. 2. t. 1.

Achyrophorus maculatus. Scop. *carn.* 2. p. 116. n. 986.

β. foliis immaculatis.

Ad Doebritz, in den Papenberggen, versus Coepnick in nemorosis umbrosis passim. Junio. Julio.

Offic. (Costae Herba.)

790. *HYPOCHAERIS glabra, glabra, calycibus imbricatis, caule ramoso nudo, foliis dentato-sinuatis.* Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 662.

Hypochaeris foliis glabris, semipinnatis. Hall. *helv.* n. 3.

Ante portam Halensem & alibi passim. Julio. Augusto.

791. *HYPOCHAERIS radicata foliis runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo laevi, pedunculis squamosis.* Lin. *syst. ed. R.* 3. p. 662.

Hypochaeris foliis semipinnatis hirsutis, caule nudo brachiato. Hall. *helv.* n. 3.

In pascuis, versuris, nemoribusque apricis frequens. e. g. im Thiergarten, Hasenheide &c. Aestate.

b. Capitati.

ONOPORDON. Lin. *gen.* 1006.

Receptaculum nudum favosum. Cal. imbricatus subrotundus ventricosus; squamis mucronatis. Pappus sessilis pilosus.

792. *ONOPORDON Acanthium* calycibus squarrosis, squamis patentibus, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 690.*

In ruderatis, ad sepes, pagos, inque cœmeteriis passim. Julio. Augusto.

Offic. (Acanthii vulgaris Herba & Semina.)

CARDUUS. Lin. gen. 1004.

Receptaculum pilosum. *Cal.* ovarus imbricatus; squamis spinosis. *Pappus* sessilis pilosus.

793. *CARDUUS nutans* foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis: squamis calycinis superne patentibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 675.*

Carduus foliis semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, floribus solitariis nutantibus. *Hall. helv. n. 167.*

Ad vias, pagos, in versuris agrorum, arvis, pascuisque ficcis copiose. Julio. Augusto.

794. *CARDUUS acanthoides* foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 675.*

Carduus foliis ovatis & semipinnatis, subtus tomentosis spinosis, calycibus molliter spinosis. *Hall. helv. n. 165.*

In agris, arvis, cœmeteriis ad *Tempelhof*, *Schoenhansen* & alibi infrequens. Julio. Augusto.

795. *CARDUUS crispus* foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis, floribus aggregatis terminatis.

minalibus, squamis calycinis inermibus subaristatis patulis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 676.*

In agris locisque cultis rarius. Julio. Augusto.

796. *CARDUUS marianus* foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis, *Lin. syst. ed. R. 3. p. 682.*

In der Jungfernheide passim. Julio. Augusto.

Offic. Cardui mariae Semina.

CNICUS. Lin. gen. 1005.

Receptaculum pilosum. Cal. ovatus imbricatus squamis spinosis. Pappus scissilis plumosus.

797. *CNICUS oleraceus* calyce bracteis cincto: squamis ramoso-spinosis, bracteis concavis integris subcoloratis; foliis glabris amplexicaulibus pinnatifidis,

Cnicus oleraceus foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis concavis integris subcoloratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 687.*

Ad sepes prope *Pancko*, inque nemorosis humidis versus *Falckenhagen* passim. Julio. Augusto.

798. *CNICUS lanceolatus* foliis decurrentibus pinnatifidis, pinnis bilobis, spinosis, calycibus nudis, oblongis, spinosis, villosis.

Carduus lanceolatus foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis, villosis, caule piloso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 674.*

In ruderalis, pascuis ficcis, ad vias, sepes & pagos vulgaris. Julio. Augusto.

799. *CNICUS palustris* foliis decurrentibus pinnatifidis margine spinosis, floribus rectis fasciculatis, calycibus inermibus.

Carduus palustris foliis decurrentibus dentatis, margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 677.*

β. flore albo.

In pratis, pascuis & agris humentibus frequens. Julio. Augusto.

Affinis nimium *Serratulae arvensi*, quae certo hujus generis foret; nisi calyx cylindricus, optimus *Serratulae* character adesset.

800. *CNICUS acaulis* acaulis foliis pinnatifidis: pinnis incisis, margine spinosis; calyce conico glabro.

Carduus acaulis acaulis, calyce glabro. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 686.*

β. caule biunciali.

In pratis humidis ad *Schoeneberg* frequens, alibi-que. Julio. Augusto.

Calyx conicus: squamis muticis. In varietate β. caulis tantum biuncialis vix triuncialis glaber.

801. *CNICUS dubius* caule villosissimo, folioso, pedunculis unifloris, foliis petiolatis pinnatifidis: pinnis trilobis margine spinosis; calyce cylindraceo glabro.

In

In der Jungfernheide in via versus Tegel rarissime. Julio. Augusto.

Caulis subteres, striatus, pilis albidis dense tectus, ramosus, pedalis. Folia petiolata pinnatifida: pinnae trilobae integrae, margine spinis albis rigidis munitae, costa uti caulis villosa. Pedunculi uniflori. Calyx cylindraceus: squamae oblongae acutae, superiores muticae, inferiores spina alba apice armatae. Corollae purpureae. Semina compressa. Pappus plumosus apice pilosus. TAB. VI, fig. 11.

Cirsium Halleri aliorumque auctorum a *Cnico Linnei* nullo modo differt; bracteae nimirum calycem obvallantes, quae essentialem *Cnici* characterem constituunt, non omnibus a *P. illust. Linneo* indicatis speciebus, propriae sunt. *Cnicum* & *Cirsium* itaque uno sub genere complector, & pappo plumoso a *Carduis* distinguo, quum pappus in Syngenesia praestantissimus.

SERRATULA. *Lin. gen.* 1003.

Receptaculum setosum. *Calyx* subcylindricus muticus. *Pappus* sessilis.

802. *SERRATULA tinctoria* foliis lyrato-pinnatifidis; pinna terminali maxima, flosculis conformibus. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 668.

α. *Serratula* foliis omnibus incis. *Hall. helv.* 163.

β. *Serratula* foliis inferioribus integris, superioribus incis. *Hall. helv.* 163.

- γ. *Serratula* foliis omnibus integris. *Hall. helv.* 163.

In nemoribus, pratisque prope *Tegel*, *Spandau* & alibi frequens. Julio. Augusto.

Offic. *Serratulae* Herba.

803. *SERRATULA arvensis* foliis dentatis spinosis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 673.*

Carduus caule anguloso, ramoso, foliis semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, calycibus inermibus, cylindricis. *Hall. helv. n. 171.*

In pratis, pascuis, locisque cultis copiose. Julio. Augusto.

Pappus plumosus.

ARCTIUM. *Lin. gen. 1002.*

Receptaculum paleaceum. *Cal.* globosus: squamis apice inflexo-hamatis. *Pappus* simplex minutus.

804. *ARCTIUM Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 667.*

β. *Lappa* major montana, capitulis tomentosis. *Bauh. pin. 198.*

In ruderalis, sepibus & coemeteriis abunde. Julio. Augusto.

Offic. *Bardanae* Radix.

CARLINA. *Lin. gen. 1008.*

Receptaculum paleaceum. *Cal.* radiatus: squamis interioribus longissimis coloratis nitidis. *Pappus* plumosus.

805. *CARLINA vulgaris* caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albis. *Lin. ſyſt. ed. R. 3. p. 694.*

In ſylvis arenofis ſterilibus vulgaris, e. g. *im Grunewald, Jungfernheide, Haſenheide*, prope *Spandau* & alibi. Julio. Auguſto.

Offic. (Heracanthae Radix.)

c Discoidei.

BIDENS. Lin. gen. 1012.

Receptaculum paleaceum. *Calyx* erectus, polyphyllus, baſi radiis patentibus cinctus. *Cor.* ſcloſculo uno alterove radiante inſtruitur. *Pappus* ariſtis rectis 2 vel 3 ſcabris.

806. *BIDENS tripartita* foliis trifidis petiolatis laciniis lanceolatis, dentatis; radiis calycinis corollis majoribus.

Bidens tripartita foliis trifidis, calycibus ſubſoſiſis, ſeminibus erectis. *Lin. ſyſt. ed. R. 3. p. 703.*

In paludibus, pratis, ad foſſas copioſe. Julio. Auguſto.

Radius corollae nullus. Folia recentia trita, odorem Anethi vel Foeniculi ſpargunt.

807. *BIDENS minima* foliis lanceolatis ſeſſilibus, floribus ſeminibusque erectis. *Lin. ſyſt. ed. R. 3. p. 703.*

Im Grunewald, locis turfoſis humidis frequens. Julio. Auguſto.

Certo varietas frequentis, specimina possideo, quae sensim in *Bidentem cernuam* degenerant.

808. *BIDENS cernua* foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis feminibus erectis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 704.*

α. *Bidens* foliis sessilibus, floribus nutantibus, circumvallatis. *Hall. helv. n. 120.*

β. *Coreopsis Bidens* foliis lanceolatis ferratis oppositis, amplexicaulibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 891.*

In der Jungfernheide, Grunewald, prope Spandau & alibi locis paludosis ad fossas frequens. Julio. Augusto.

Bidens & Coreopsis unum constituunt genus, quum nonnullae *Bidentis* species in *Coreopsidem* trans-eunt. e. g. *B. cernua, pilosa &c.* Radius in Syngenesia nunquam fidendus.

EUPATORIUM. Lin. gen. 1015.

Receptaculum nudum. *Cal.* imbricatus oblongus. *Stylus* semibifidus. *Pappus sessilis.*

809. *EUPATORIUM cannabinum* foliis digitatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 717.*

Eupatorium foliis ovato-lanceolatis, tripteris. *Hall. helv. n. 136.*

Locis paludosis ad fossas frequens. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide, prope Spandau &c. Julio. Augusto.

Pappus sessilis pilosus, nec plumosus, ut in congeneribus.

Offic. Eupatorii cannabini Herba.

SUPERFLUA.

a. Discoidei.

TANACETUM. *Lin. gen.* 1024.

Receptaculum convexum nudum. *Cal.* imbricatus hemisphaericus. *Cor.* radii obsoletae trifidae, (interdum nullae, omnesque flosculi hermaphroditi.) *Pappus* submarginatus.

810. TANACETUM *vulgare* foliis bipinnatis incis ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p.* 736.

Ad agrorum versuras, ripasque fluviorum rarius. Julio. Augusto.

Offic. Tanaceti Flores & Herba.

GNAPHALIUM. *Lin. gen.* 1026.

Receptaculum nudum. *Cal.* imbricatus: squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis. *Pappus* sessilis pilosus.

* *Chrysocoma.*

811. GNAPHALIUM *arenarium* herbaceum foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, corymbo composito, caule simplicissimo. *Lin. syst. ed. R. 3. p.* 754.

In agris, arvis, & collibus arenosis copiosissime. Junio. Julio.

Offic. Stoechadis citrini Herba florens.

812. GNAPHALIUM *luteo-album* herbaceum, foliis semiamplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis, utrinque pubescentibus, floribus conglomeratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p.* 755.

Filago foliis mollissimis, tomentosis, obtusis, umbellis convexis, electrinis. *Hall. helv.* 147.

Ante portam Halensem, in arvis versus Grunewald, in der Jungfernheide, prope Spandau & Reineckendorf frequens. Julio, Augusto.

** *Argyrocomae.*

813. *GNAPHALIUM dioicum* sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 759.

♂. Floribus brevioribus & elegantioribus. *Hall. helv.* 157. a.

♀. Flosculis omnibus femineis ob pappum & tubas longiori. *Hall. helv.* 157. b.

In aridis apricis in der Hasenheide, Grunewald, Jungfernheide, Spandauerheide & alibi copiose. Majo. Junio.

Planta mascula, floribus rubris; feminea, albis. *Offic. (Pedis cati Flores.)*

*** *Filaginoidea.*

814. *GNAPHALIUM sylvaticum* caule herbaceo simplicissimo, floribus sparsis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 761.

Filago foliis linearibus, alis spiciferis. *Hall. helv. n.* 148.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel, Spandau &c. in sylvis arenosis passim. Julio, Augusto.

815. *GNAPHALIUM uliginosum* caule herbaceo ramo-
so diffuso, floribus confertis terminalibus.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 762.

Filago caule ramosissimo, diffuso, umbella sessili
terminato. *Hall. helv. n. 151.*

α. foliis tomentosis.

β. foliis nudis.

Locis humidis uliginosis frequens. Julio. Au-
gusto. Varietas β. foliis tomento destitutis
semel vidi, rarissima est.

ARTEMISIA. *Lin. gen. 1025.*

Receptaculum subvillosum vel nudiusculum. *Cal.*
imbricatus: squamis rotundatis conniventibus.
Cor. radii nullae. *Pappus* nullus.

* *Receptaculo nudo.*

816. *ARTEMISIA campestris* foliis multifidis, li-
nearibus, caulibus procumbentibus virgatis.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 740.

β. rubens.

In campis aridis arenosis, versuris agrorum, ne-
moribus apricis copiosissime. Augusto. Sep-
tembri.

817. *ARTEMISIA vulgaris* foliis pinnatifidis pla-
nis incisfis subtus tomentosis, racemis simpli-
cibus recurvatis, florum radio quinquefloro.
Lin. syst. ed. R. 3. p. 744.

β. *Artemisia rubra*. *Tabern. p. 7.*

In ruderatis, ad pagos, sepes inque coemeteriis
frequens. Julio. Augusto.

Offic.

Offic. Artemisiae Herba.

*** Receptaculo piloso.*

818. ARTEMISIA *Abinthium* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis; receptaculo villoso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 743.*

Ad pagos in ruderatis passim. e. g. *beim Gesundbrunnen, Spandau &c.* Julio. Augusto.

Offic. Absinthii vulgaris Herba.

b. Radiati.

SENECIO. *Lin. gen. 1033.*

Receptaculum nudum. Cal. cylindricus, calyculatus: squamis apice sphacelatis. Pappus pilosus.

** Floribus flosculosis.*

819. SENECIO *vulgaris* corollis nudis, foliis pinnatis sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 789.*

In hortis locisque cultis vulgaris. Aestate.

Offic. (Senecionis Herba.)

*** Floribus radiatis: radio revolutis.*

820. SENECIO *viscosus* corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis: squamis calycinis laxis, longitudine perianthii. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 791.*

Senecio foliis viscidis, pinnatis, pinnis semipinnatis, angulosis, calycibus hirsutis. *Hall. helv. n. 60.*

In nemoribus, praecipue *im Thiergarten* & alibi frequens. Julio. Augusto.

821. *SENECIO sylvaticus* corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymbofo erecto. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 792.*

Senecio foliis pinnatis, pinnis alternis majoribus, semipinnatis, angulosis, calycibus laevibus, radiis brevissimis revolutis. *Hall. helv. n. 59.*

Im Grunewald & Spandauerheide passim. Julio, Augusto.

*** *Floribus radiatis; radio patente. Foliis pinnatifidis.*

822. *SENECIO erucifolius* corollis radiantibus, foliis pinnatifidis dentatis subhirtis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 794.*

In nemorosis hinter Tegel rarius, versus *Rüdersdorf* frequens. Augusto.

Forte varietas sequentis.

A Senecione tenuifolio Jacq. diversissimus.

823. *SENECIO Jacobaea* corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 796.*

β . *Jacobaea vulgaris* flore nudo. *Raj. angl. 2. p. 82.*

In der Hasenheide frequens. Varietas β . rarissima. Julio. Augusto.

Offic. (Jacobaeae Herba florens.)

**** *Floribus radiatis: radio patente. Foliis indivisis.*

824. *SENECIO paludosus* corollis radiantibus, foliis ensiformibus acute serratis, subtus subvillosis, caule stricto. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 797.*

Senecio

Senecio foliis linearibus ferratis, floribus umbellatis. Hall. helv. n. 66.

In den Papenbergien locis humidis frequens. Junio. Julio.

ERIGERON. *Lin. gen. 1031.*

Receptaculum nudum. Cal. oblongus cylindricus: squamis erectis. Cor. radii lineares, angustissimae. Pappus pilosus.

825. *ERIGERON canadense* caule floribusque paniculatis, hirtis, foliis lanceolatis, ciliatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 779.*

Erigeron canadense racemis lateralibus; foliis imis lanceolatis, dentatis: superioribus linearibus ciliatis. *Scop. carn. ed. 1. p. 386. n. 3. Ed. 2. p. 159. n. 1060.*

In agris, hortis, ruderalis, nemoribus, locis cultis copiosissime. Aestate.

826. *ERIGERON acre* caule alterne ramoso, petiolis unifloris, semi-flosculis pappum aequantibus. *Hall. helv. n. 58.*

Erigeron acre pedunculis alternis unifloris. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 781.*

In ruderalis & sylvis apricis frequens. e. g. In der Jungfernheide, ad Spandau, Tegel &c. Julio. Augusto.

Radius caeruleus.

Offic. Conyzae Herba.

SOLIDAGO. *Lin. gen.* 1035.

Receptaculum nudum. *Cal.* squamæ imbricatæ, clausæ. *Cor. radii* circiter 5—10 remotæ. *Pappus* pilosus.

827. *SOLIDAGO Virgaurea* caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Lin. syst. ed. R. 3. p.* 817.

Solidago caule angulato, hirsuto, foliis ovato-lanceolatis dentatis, racemis multifloris spicatis. *Hall. helv. n.* 69.

In nemoribus frequens. c. g. *im Thiergarten, Grunewald, Jungfernheide*, versus *Coepnick, Spandau &c.* Augusto.

Chrysocoma a *Solidagine* solo radio differt. Interdum una alterave *Chrysocomæ* species radio instruitur, & tunc *Solidaginis* species est. Numne bonum bina genera in unum conjungere?

Offic. *Consolidæ Sarracenicæ* f. *Virgæ aureæ* Herba florens.

CINERARIA. *Lin. gen.* 1036.

Receptaculum nudum. *Cal.* simplex, polyphyl-
lus, æqualis. *Pappus* pilosus.

828. *CINERARIA palustris* floribus corymbosis, foliis radicalibus petiolatis lanceolatis serrato-sinuatis, caulinis amplexicaulibus integris.

Cineraria palustris floribus corymbosis, foliis lato-lanceolatis dentato-sinuatis, caule villoso. *Lin. syst. ed. R. 3. p.* 820.

In pratis *beim Gesundbrunnen*, ad *Doebritz* & in valle *zwischen den Morellenbergen* ad *Spandau* passim. Junio. Julio seq.

INULA. *Lin. gen.* 1037.

Receptaculum nudum. *Anth.* basi in fetas 2 definites? *Pappus pilosus.*

829. INULA *britannica* foliis amplexicaulibus lanceolatis distinctis ferratis subtus villosis, caule ramoso erecto villoso. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 824.

In pratis humidis *hinter Schoeneberg* & alibi passim. Julio. Augusto.

830. INULA *dyssenterica* foliis amplexicaulibus cordato-oblongis subtomentosis, caule villoso paniculato, squamis calycinis setaceis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 825.

After foliis amplexicaulibus, undulatis, subtus tomentosis. *Hall. helv. n.* 79.

Ante portam *Coepenickeanam*, & *Halensem* in *Aufstall*, versus *Spandau* alibique in nemorosis humidis passim. Julio. Augusto.

Offic. (Arnica Suedensis.)

831. INULA *Pulicaria* foliis amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis: radio brevissimo. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 826.

After foliis amplexicaulibus undulatis, hirsutis, radiis brevissimis. *Hall. helv. n.* 80.

Ante portam *Strahlowianam*, & prope *Spandau* frequens, ad *Tegel* rarius. Julio. Augusto.

832. *INULA salicina* foliis lanceolatis recurvis serrato-scabris, ramis angulatis, floribus inferioribus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 828.*

In pratis humidis, ad fossas *hinter Schoeneberg*, versus *Grunewald*, in der *Jungfernheide* & alibi passim. Julio. Augusto.

833. *INULA hirta* foliis sessilibus lanceolatis recurvis subserrato-scabris, caule teretiusculo subpiloso, floribus inferioribus altioribus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 828.*

In pratis, pascuis, ad ripas fluviorum, fossas copiose. Junio. Julio.

Interdum pro *Arnica* flores exsiccati venduntur.

BELLIS. *Lin. gen. 1042.*

Receptaculum nudum conicum. *Cal.* hemisphaericus: foliolis aequalibus, *Sem.* obovata. *Pappus* nullus.

834. *BELLIS perennis* scapo nudo. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 838.*

In pascuis, pratis, pomariis, viis, versuris, & ubique fere copiosissime. Omni tempore, etiam sub nive.

Offic. Bellidis Flores & Herba.

CHRYSANTHEMUM. *Lin. gen. 1048.*

Receptaculum nudum convexum. *Cal.* haemisphaericus imbricatus: squamis margine scariosis, interioribus diaphanis membranaceis. *Pappus* nullus.

* *Leucanthema.*

835. CHRYSANTHEMUM *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis, inferne dentatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 845.*

Matricaria foliis radicalibus petiolatis, ovatis, crenatis, caulinis amplexicaulibus dentatis. *Hall. helv. n. 98.*

In pratis, nemoribusque frequens. c. g. in der *Hasenheide* &c. Junio. Julio.

Offic. (Bellidis majoris Herba, Flores.)

836. CHRYSANTHEMUM *inodorum* foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 847.*

In agris circum *Spandau* frequens. Julio. Augusto.

** *Chrysanthemum.*

837. CHRYSANTHEMUM *segetum* foliis amplexicaulibus, superne laciniatis; inferne dentato-ferratis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 849.*

In agris versus *Grunewald* rarissime. Julio. Augusto.

MATRICARIA. *Lin. gen. 1049.*

Receptaculum nudum. *Cal.* hemisphaericus imbricatus: squamis interioribus subaequalibus opacis. *Pappus* nullus.

838. MATRICARIA *suaveolens* receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 853.*

In

In ruderatis ad pagos, sepes frequens. Aestate.

839. *MATRICARIA Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, feminibus nudis, squamis calycinis margine aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 853.*

In ruderatis ad sepes passim. Aestate.

Num varietas praecedentis?

Offic. Chamomillae Herba. Flores.

ANTHEMIS. Lin. gen. 1052.

Receptaculum paleaceum. *Cal.* hemisphaericus, subaequalis. *Flores* radii plures, quam 5. *Pappus* nullus.

840. *ANTHEMIS arvensis* receptaculis conicis, paleis setaceis, feminibus coronato-marginatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 862.*

Chamaemelum foliis glabris, duplicato-pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, femine laevi. *Hall. helv. n. 103.*

In agris, arvis frequens. Aestate.

841. *ANTHEMIS Cotula* receptaculis conicis: paleis setaceis, feminibus nudis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 863.*

Chamaemelum foliis glabris, duplicato pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, femine exasperato. *Hall. helv. n. 104.*

In ruderatis prope *Spandau* abunde. Junio. Julio.

Offic. (Chamomillae foetidae s. Cotulae Flores & Herba.)

ACHILLEA. *Lin. gen.* 1053.

Receptaculum paleaceum. *Cal.* ovatus imbricatus.

Flores radii 5-10. *Pappus* nullus.

842. ACHILLEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute-ferratis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 869.
 Achillea foliis linearibus lanceolatis acutissime ferratis. *Hall. helv. n.* 117.

Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel & alibi passim. Junio. Julio.

Offic. (Ptarmicae Flores, Herba, Radix.)

843. ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis; laciniis linearibus dentatis, caulibus superne fulcatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 871.

β. Millefolium purpureum majus. Bauh. pin. 140.

In pascuis, pratis, versuris, viis, nemoribus, ubique fere copiosissime. Aestate.

Offic. Millefolii Herba & Flores.

FRUSTRANEA.

CENTAUREA. *Lin. gen.* 1066.

Receptaculum setosum. *Cor.* radii longiores, irregulares, infundibuliformes. *Pappus* pilosus.

* *Cyani calycibus squamis serrato-ciliatis.*

844. CENTAUREA *Cyanus* calycibus ferratis: foliis linearibus integerrimis infimis dentatis. *Lin. syst. ed. R.* 3. p. 901.

β. flore albo & rubro.

Inter segetes copiosissime. Junio. Julio.

Offic. Flores Cyani.

845. *CENTAUREA paniculata* calycibus ciliatis : squamis planis, foliis bipinnatifidis, rameis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 901.*

In versuris, collibus, muris, agris, nemoribus apricis frequens. Junio. Julio seq.

846. *CENTAUREA Scabiosa* calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis : pinnis lanceolatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 904.*

Cyanus foliis pinnatis, pinnis dentatis obtusis, squamis calycinis triangularibus. *Hall. helv. n. 186.*

In versuris agrorum inque arvis passim. e. g. versus *Schoeneberg, Charlottenburg &c.* Junio. Julio.

*** Rhaponticum: calycinis squamis aridis scariosis.*

847. *CENTAUREA Jacea* calycibus scariosis, lacris, foliis lanceolatis : radicalibus sinuato-dentatis : ramis angulatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 906.*

In nemorosis, pratis, pascuis, arvis copiose. Julio. Augusto.

Pappus setis brevissimis, paucis, mox deciduis constat. *Leers herb. p. 185. n. 674.*

NECESSARIA.

TUSSILAGO. *Lin. gen.* 1032.

Receptaculum nudum. Cal. squamae aequales, discum aequantes, submembranaceae. Pappus pilosus.

848. TUSSILAGO *Farfara* scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis, denticulatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 786.*

Prope *Spandau, Smargendorf & Wilmersdorf* passim. Martio. Aprili.

Offic. Farfarae, f. Tussilaginis Flores & Herba.

849. TUSSILAGO *hybrida* thyrsis oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 787.*

Petafitis floribus spicatis, pendulis, petiolis multifloris, calycibus aequalibus, flosculis paucissimis androgynis. *Hall. helv. n. 140.*

Im Thiergarten rarius. Aprili. Majo.

850. TUSSILAGO *Petafitis* thyrsis ovato, flosculis, femineis nudis paucis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 787.*

Petafitis floribus dense spicatis, flosculis androgynis. *Hall. helv. n. 138.*

Prope *Schoenhausen, Spandau, & alibi* in humidiusculis passim. Aprili. Majo.

Offic. (Petafitidis Radix & Flores.)

Quod ad observationem *Cel. ber. Ehrhartii* spectat, (vid. *hanouv. Magaz. 1784. 8 Stück p. 123.* ingenue fateor, me nondum veritate convictum esse,

esse, quod *Tussilago hybrida* & *Petasitis* unam speciem constituent. Forma externa, & loca dissita eorum, ubi sponte enascuntur, hanc opinionem fat refutant, puto. Est, ut cum semine maturo experimenta instituantur.

CALENDULA. *Lin. gen.* 1073,

Receptaculum nudum. *Cal.* polyphyllus aequalis. *Semina* disci membranacea. *Pappus* nullus.

851. *CALENDULA arvensis* feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis: extimis erectis protensis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 924.*

Calendula foliis lanceolatis, amplexicaulibus, dentatis, floribus concoloribus. *Hall. helv. n. 94.*

In agris rarissime. Aestate.

852. *CALENDULA officinalis* feminibus cymbiformibus muricatis, incurvatis omnibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 924.*

In hortis frequens aestate.

Offic. Calendulae Flores. (Herba, Semina.)

FILAGO.

Receptaculum nudum. *Cal.* imbricatus. *Flores* feminei inter squamas calycis locati. *Pappus* pilosus.

853. *FILAGO germanica* panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirsutis, foliis acutis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 939.*

Filago caule dichotomo, corymbo sphaerico, in angulis sessili. *Hall. helv. n. 153.*

In der Hasenheide, Jungfernheide, beim Wedding & alibi frequens. Julio. Augusto.

854. *FILAGO montana* caule subdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 940.*

Filago caule dichotomo, floribus glomeratis spicatis. *Hall. helv. n. 115.*

Prope den Gesundbrunnen, im Thiergarten, ad Tegel, Jungfernheide, Spandau & alibi passim. Julio. Augusto.

855. *FILAGO arvensis* caule paniculato, foliis conicis lateralibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 940.*

Filago caule erecto ramosissimo, foliis motissimis, tomentosis, florum acervis sessilibus in spicas continuatis. *Hall. helv. n. 154.*

In agris, arvis frequens. e. g. ad Reineckendorf &c. Julio. Augusto.

Semen floris hermaphroditi absque pappo. *Leers herborn. n. 679.*

MONOGAMIA.

JASIONE. Lin. gen. 1090.

Cal. comun. polyphyllus; proprius quinquefidus, persistens. Cor. 5. petala regularis. Capsula infera bilocularis polysperma.

856. *JASIONE montana*, *Lin. syst. ed. R. 3.*
p. 953.

Rapunculus foliis linearibus subasperis, spica planiuscula, petalis liberis. Hall. helv. n. 678.

β. flore albo.

In collibus arenosis, inque versuris agrorum copiose β. rarius. Aestate.

VIOLA. Lin. gen. 1092.

Cal. 5 phyllus. Cor. 5 petala irregularis, postice cornuta. Capsula supra trivalvis, unilocularis.

* *Acaules.*

857. *VIOLA hirta* acaulis, foliis cordatis pilosissimis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 963.*

In den Papenbergen & Jungfernheide rarius. Aprili. Majo.

858. *VIOLA palustris* acaulis, foliis reniformibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 963.*

Viola foliis subrotundo-cordatis: pedunculis radicatis. Fl. lapp. 278.

Im Thiergarten, Grunewald, Jungfernheide & Papenbergen frequens. Aprili. Majo.

859. *VIOLA odorata* acaulis, foliis cordatis stolonicibus reptantibus. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 964.*

β. *Viola martia alba. Bauh. pin. 199.*

γ. flore rubente.

In hortis, pomariis copiose. Martio. Aprili.

Offic. Violae Flores. (Semina Herba.)

** *Caulescentes.*

860. *VIOLA canina* caule adultiore adscendente, foliis oblongo-cordatis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 964.*

Viola caule procumbente ramoso, foliis petiolatis cordatis. *Hall. helv. n. 563.*

In nemoribus copiose. Aprili. Majo.

*** *Stipulis pinnatifidis; Stigmate urceolato.*

861. *VIOLA tricolor* caule angulato diffuso, foliis oblongis retusis, stipulis pinnatifidis, corolla calyce multo majori.

Viola caule anguloso, diffuso, foliis ovatis dentatis, flore calyce duplo longiore. *Hall. helv. n. 568.*

Viola tricolor caule triquetro diffuso, foliis oblongis incis, stipulis pinnatifidis. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 967. B.*

In cultis, agris, hortis frequens. Aestate.

Offic. (Floris trinitatis Herba.)

862. *VIOLA arvensis* caule inferne angulato, diffuso, foliis oblongis retusis, stipulis pinnatifidis, corolla calycis fere longitudine.

Viola arvensis. *Murr. prod. 73. Reich fl. moenof. n. 640.*

Viola caule diffuso, ramoso, foliis ovatis, dentatis, flore calyce paulo majori. *Hall. helv. n. 569.*

Viola tricolor. *Lin. syst. ed. R. 3. p. 767. var. α. bicolor.*

In agris, arvis, nemoribus copiose. Aestate.

BRYONIA. *Lin. gen.* 1194.

Cal. 5. dentatus. *Cor.* 5. partita. *Filamenta* 3.
Anth. 5. *Styl.* 3 fidus. *Bacca* subglobofo poly-
lyperma.

863. BRYONIA *alba* foliis palmatis utrinque cal-
loso-scabris, floribus monoicis. *Syst. ed. M.*
14. p. 869. n. 1.

In dumetis ad *Spandau* frequens. Junio. Julio.
Baccae nigrae.

Offic. Bryoniae Radix.

864. BRYONIA *dioica* foliis palmatis utrinque cal-
loso-scabris, floribus dioicis. *Syst. ed. M.* 14.
p. 870.

In dumetis & sepibus frequens, e. g. ad *Pancko*,
& alibi. Junio. Julio.

Baccae rubrae.

C L A S S I S X X .
C R Y P T O G A M I A
F I L I C E S .

a. Spiciferae.

EQUISETUM. *Lin. gen.* 1284.

‡. *Receptaculum* peltatum stipitatum. *Indusia* subcylindrica, corniculata. *Filamenta* bina: apicibus binis antheriferis. *Semen* unicum nudum.

865. EQUISETUM *sylvaticum* frondibus compositis; spica terminali flaccida.

Equisetum sylvaticum caule spicato, frondibus compositis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 372.

In pratis nemorosis ad *Reineckendorf*, *Tegel* & in *den Papenbergen* frequens. Aprili usque, Junio.

Vere appropinquante scapi nudi spiciferi terra efurgunt, postea squamulae dejiciuntur, & scapus in frondem ramosissimam mutatur; tunc spica marcescit, fit nutans, & paulo-post ex toto evanescit.

Confer. *Hedwig Theor. pl. crypt.* p. 33. t. I & 2.

866. EQUISETUM *arvense* scapo fructificante nudo: fronde sterili verticillato-ramosa decumbente.

Equi-

Equisetum arvense scapo fructificante nudo; sterili frondoso. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 372.*

β. fronde sterili erecto.

In agris, arvis, pascuis siccis e. g. ad *Schoeneberg*, *Ricksdorf*, *Reineckendorf*, im *Thiergarten* & alibi copiose. Martio. Aprili.

Verticilli frondis 12 ad 15.

Non confundendum cum *Equiseto Telmateja Ehrhartii*.

Offic. (Equiseti minoris Herba.)

867. *EQUISETUM palustre* caule angulato, frondibus simplicibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 373.*

Equisetum caule sulcato; ramis multifloris, foliis indivisis. *Hall. helv. n. 1677. var. a.*

In fossis, pratis paludosis, *hinter Schoeneberg*, beim *Unterbaum*, im *Thiergarten*, *Jungfernheide* & alibi frequens. Majo. Junio.

868. *EQUISETUM Heleocharis* caulibus aequalibus, subramosis, teretibus, striatis, fistulosis, viridibus; ramis subsimplicibus, quinquefulcatis, sterilibus; dentibus vaginalum plurimis, subulatis, acutissimis: vaginalium quinis dorso minime fulcatis. *Ehrhart hanoev. Magazin 1783. 18 Stück p. 286. n. 30.*

α. *Equisetum fluviatile* caule striato, frondibus subsimplicibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 373.*

β. *Equisetum limosum* caule subnudo laevi. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 373.*

In fossis, pratis paludosis, locisque inundatis frequens. Majo. Junio.

869. *EQUISETUM hyemale* caule nudo scabro, basi subramoso. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 374.*

Equisetum caule subnudo, asperrimo, vaginis caulinis indivisis, ramis stoliatis. *Hall. helv. n. 1679.*

In den Papenbergen rarius. Majo. Junio.

Offic. (Equiseti majoris vel mechanici Herba.)

LYCOPodium. Lin. gen. 1302.

Cal. squama oblonga. Capsulae reniformes dehiscentes polyspermae sessiles.

870. *LYCOPodium clavatum* foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 442.*

Lycopodium ramis prolixis, spicis petiolatis gemellis, foliis linearibus pilo cristatis. *Hall. helv. n. 1722.*

Im Grunewald, Spandauerheide, Jungfernheide & alibi copiose. Julio. Augusto.

Offic. Lycopodii Semen.

871. *LYCOPodium inundatum* foliis sparsis integerrimis, spicis terminalibus foliosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 442.*

Lycopodium spicis sessilibus, foliis linearibus confertissimis, incurvis. *Hall. helv. 1721.*

Locis paludosis im Grunewald & Jungfernheide frequens. Augusto. Septembri.

872. *LYCOPodium annotinum* foliis sparsis quinquefariis, subserratis, furculis annotinis articulata-

culatis, spicis terminalibus glabris erectis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 443.

Lycopodium ramis prolixis, spicis sessilibus, foliis linearibus subferratis. Hall. helv. n. 1720.

In der Jungfernheide & hinter Tegel frequens. Augusto. Septembri.

873. *LYCOPODIUM complanatum* foliis bifariis connatis: superficialibus solitariis, spicis geminis pedunculatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 445.*

Lycopodium spicis petiolatis quaternis, caulibus complanatis, foliis adpressis. Hall. helv. n. 1723.

In der Jungfernheide, hinter Tegel copiose. Julio. Augusto.

Spicae semper quaternae.

Lycopodium Selaginem hic crescere audivi, sed locus natalis me fugit, & ipse istud non inveni.

OPHIOGLOSSUM. Lin. gen. 1288.

Indusium totam tegens spicam. Capsulae imbricatae plurae polyspermae.

874. *OPHIOGLOSSUM vulgatum* fronde ovata. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 377. Hedwig Theor. 41. t. 4.*

Ophioglossum folio unico, ovato-lanceolato obtuso. Hall. helv. n. 1685.

In der Jungfernheide, Thiergarten, Papenberg locis umbrosis humidis frequens. Majo. Junio.

Offic. (Ophioglossi Herba.)

OSMUNDA. *Lin. gen.* 1289.

Indusum capulas arcte in forma globi tegens.

* *Spicae latere frondis insidentes.*

875. OSMUNDA *Lunaria* scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 379.

α. Osmunda spicis lateralibus, fronde solitaria, pinnata: pinnis lunulatis.

β. Osmunda spicis lateralibus, frondibus geminatis bipinnatis: pinnis incisfis.

Lunaria racemosa ramosa major. *Bauh. pin.* 355.

Inter *Charlottenburg* & *Spandau* in collibus ovariam versus, *auf den Rollbergen*, inter *Doebritz* & *Dalgow* in der Heide frequens.

Varietas β. in umbrosis ad *Pancko*, in horto botanico & inter *Doebritz* & *Dalgow* in der Heide, rarissime. Majo. Junio.

Varietas β. certo specie differt, cum semper locis paludosis umbrosis nascitur, & nunquam in collibus apricis, ut α.

Offic. (Lunariae Herba.)

** *Spicae apice frondis insidentes.*

876. OSMUNDA *regalis* frondibus bipinnatis: apice racemiferis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 381.

Locis paludosis hinter *Charlottenburg* frequens, im *Grunewald* passim, prope *Tegel* olim copiose nun rarius. Junio. Julio:

b. Epi.

b. *Epiphyllöspermae*.ACROSTICHUM. *Lin. gen.* 1290.*Capsulae* totam inferiorem frondis partem tegentes, *indusio* tectae.

877. ACROSTICHUM *Spicant* fronde fructificante pinnata, sterili, pinnatifida: laciniis lanceolatis obtusis integerrimis.

Struthiopteris Spicant frondibus sterilibus pinnatifidis: pinnulis densis oblongis fulcatis; fructificantibus majoribus laxius pinnatis; pinnulis angustioribus. *Weiss. crypt.* 287.

Osmunda Spicant frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciniis confluentibus integerrimis parallelis. *Lin. syst. ed. R. 4. p.* 383.

β. fronde apice fissa.

In der Jungfernheide & prope Tegel passim.

Offic. (Spicanti Herba.)

PTERIS. *Lin. gen.* 1291.

♂ — ♀. *Capsulae* lineam marginalem formantes, *indusio* tectae.

878. PTERIS *aquilina* frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, inferioribus pinnatifidis: superioribus minoribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p.* 396.

Cincinulis aquilina Lüders nomencl. fl. march. p. 76.

β. Monstrosa, lineis atris planis in medio folii.

In sylvis copiosissime. Julio. Augusto.

T

ASPLE.

ASPLENIUM. *Lin. gen.* 1295.

♂ — ♀. *Capsulae* in lineolis disci frondis sparsae;
lineis *indusio* tectis.

879. ASPLENIUM *trichomanoides* frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 404.*

In fossis exsiccatis muscosis in *der Jungfernheide* rarius. Martio. Aprili.

Offic. (Adianthi rubri. f. Trichomanis Herba.)

880. ASPLENIUM *Rutamuraria* frondibus alternim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 406.*

Asplenium fronde laxa ramosa, ramis secundis trifoliis, superioribus semitrilobis rhomboideis, circumferratis. *Hall. helv. n. 1691.*

In *moenis Spandavianis* & in muris ad *alten Landsberg.* Martio. Aprili.

Offic. Adianthi albi. f. Ruta murariae Herba.

POLYPODIUM. *Lin. gen.* 1298.

♂ — ♀. *Capsulae* in glomerulos dispositae, *indusio* tectae & per inferiorem frondis partem sparsae.

* *Fronde pinnatifida.*

881. POLYPODIUM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 412.*

Polypodium foliis pinnatis, radice squamata. *Hall. helv. n. 1696.*

In den Papenbergen, ad Tegel, in der Jungfernheide, & alibi passim in arborum truncis putridis, inque viis cavis. Vere & autumn.

Offic. Polypodii Radix.

*** Fronde subbipinnata, cujus pinnae confluunt basi, ut semipinnata potius, quam perfecte duplicato-pinnata sit.*

882. *POLYPODIUM Phegopteris* frondibus subbipinnatis: pinnis oppositis, superioribus pinnula trapeziformi conjunctis, infimo pari deflexo: pinnulis obtusis; glomerulis capsularum dimidiam marginis partem occupantibus.

Polypodium Phegopteris frondibus subbipinnatis: foliolis infimis reflexis: paribus, pinnula quadrangulata coadunatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 418.*

In sylvis umbrosis ad Tegel passim. Julio. Augusto.

Stipes glaber, hinc sulco exaratus, inde convexus. Frondes pilis albis sparsis obsitae. Rachis pilis fuscis tecta. Pinnulae integerrimae obtusae, extimae confluentes, & terminans lanceolata: infimae vero praecipue in superiore frondis parte quadrangulares cum oppositis conjunctae. Glomeruli capsularum nunquam usque ad apicem positi, semper dimidiam marginis partem occupant.

883. *POLYPODIUM montanum* frondibus subbipinnatis: pinnis alternis, pinnulis integerrimis

mis lanceolatis obtusiusculis, glomerulis marginalibus.

Polypodium montanum frondibus subbipinnatis, foliolis inferioribus parvis triangularibus remotis, superioribus lanceolatis approximatis, pinnis oblongis obtusis obliquis integerrimis, punctis floriferis marginalibus. *J. A. Vogler* *Diff. de Polypod. mont. Gissae* 1781.

Polypodium Oreopteris *Ehrhardt. pl. crypt. decas* 3. n. 22.

In nemorosis humidis ad *Tegel* passim. Julio. Augusto.

Stipes glaber bifurcatus. Frondes pedales. Pinnulae integerrimae. Glomeruli totam pinnulae marginem occupant.

Differt a *Polypodio Phegopteride*:

- 1) pinnis alternis.
- 2) pinnulis acutioribus.
- 3) glomerulis totam marginem occupantibus.
- 4) quod omnes pinnulae lanceolatae, nec infimae trapeziformes sint.
- 5) pinnis omnibus erectis.

a *Polypodio Thelypteride* fructificationibus marginalibus.

Plura vide in Dissertione *J. A. Vogleri*.

884. *POLYPODIUM Thelypteris* frondibus subbipinnatis: pinnulis integerrimis: glomerulis capsularum undique tectis.

Polypodium Thelypteris fronde bipinnata, pinnis pinnatifidis integerrimis, subtus undique poliline tectis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 421.*

Ante portam Halensem im Aufstall, prope Spandau in plantariis versus den Papenberg & alibi in umbrosis passim. Julio. Augusto.

Minor praecedenti, & semper pinnulae glomerulis rectae sunt.

A genere *Acrostichii* differt glomerulis capsularum.

885. *POLYPODIUM cristatum* frondibus subbipinnatis: pinnulis oblongis, obtusis ferratis: ferraturis ciliatis; glomerulis capsularum duplici serie dispositis.

Polypodium cristatum frondibus subbipinnatis: foliolis ovato-oblongis: pinnis obtusiusculis apice acute ferratis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 420.*

Polypodium Filix femina cristata δ. frondibus subtripinnatis: pinnis summis pinnatifidis, imis pinnatis; pinnulis repetito pinnatifidis, omnibus undique ferratis, ferraturis spinosis. *Weiss. crypt. 317. & variet γ. spinosa.*

In der Jungfernheide, Spandauerheide, in plantariis etiamque prope Tegel & alibi frequens. Julio. Augusto.

Superior frondis pars tantum capsulas gerit, inferior sterilis. Pinnulae inferiores pinnatifidae. Apex semper dentibus binis terminatur. Indusium peltatum.

886. *POLYPODIUM Filix mas* frondibus bipinnatis; pinnis oblongis obtusis crenatis, glomerulis duplici serie dispositis, stipite superne paleaceo.

Polypodium Filix mas frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis stipite paleaceo. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 421. Gunner. norweg. 1. p. 4. n. 4. t. 1. f. 4.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi copiose. Julio.

Offic. Filicis Radix. (Herba.)

887. *POLYPODIUM Filix femina* frondibus bipinnatis: pinnatis lanceolatis pinnatifidis, acutis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 421.*

Polypodium Filix femina dentata β . frondibus bipinnatis; pinnis pinnatis confertis, pinnulis pinnatifidis, primis majoribus, lacinulis acute bifidis. *Weiss crypt. p. 315.*

In der Jungferuheide, Thiergarten, Grunewald &c. frequens. Julio. Augusto.

888. *POLYPODIUM rhaeticum* frondibus bipinnatis: foliolis pinnisque remotis lanceolatis: serraturis acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 422.*

Im Thiergarten frequens. Julio. Augusto.

Cel-ber. Weiss cum *Polypodio* regio hanc speciem confundit, licet longe diversa sit.

*** *Fronde supradecomposita.*

889. *POLYPODIUM Dryopteris* frondibus triplicato-bipinnatis: pinnulis oblongis obtusis integerrimis; glomerulis marginalibus.

Poly

Polypodium Dryopteris frondibus supradecompositis: foliolis ternis bipinnatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 427.*

Prope *Tegel* haud infrequens. Augusto.

Pinnulae obtusae superiores integrae, inferiores pinnatifidae. Glomeruli marginales.

c. *Rhizospermae.*

MARSILEA. *Lin. gen. 1299.*

Capula radicalis unilocularis polysperma.

390. MARSILEA *natans* foliis oppositis simplicibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 437.*

— *Marsilea salvinoides* foliis oppositis, utrinque pilosis, longe radicatis, globiferis. *Neck. act. pal. v. 3. phys. 297. t. 21.*

Salvinia vulgaris aquis innatans, foliis subrotundis punctatis lacte virentibus. *Michel gen. 107. t. 58.*

Prope *Spandau* ubi bina flumina junguntur, *Spree* nimirum & *Havela*, in loco collibus cincto, inter lignum natans. Floret Junio, Augusto semina profert.

MUSCI.

A. FRONDOSI.

a. *Peristomate nullo.*

PHASCUM. *Lin. gen. 1305.*

♂—♀. *Theca* cum rudimento operculi, nunquam adscendente, sed inaperta de serula decidente.

891. *PHASCUM subulatum* caulescens, foliis lanceolato-linearibus patulis. *Schreb. de Phasco* p. 8, n. 1.

Phascum subulatum acaule anthera sessili, foliis subulato-fetaceis patulis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 451.

Bryum ericetorum capitulis subsessilibus ovoideis, calyptra conica, primordialibus plumosis. *Necker meth. musc.* p. 231. n. 43.

Ad latera fossarum exsiccatarum *in der Hasenheide & Jungfernheide* frequens. Martio. Aprili.

892. *PHASCUM piliferum* caulescens, foliis oblongis piliferis erectis. *Schreb. de Phasco* p. 8. n. 2. *tab. 1. fig. 6. 7.*

Iisdem locis *in der Jungfernheide* rarius. Vernali tempore.

893. *PHASCUM cuspidatum* caulescens, foliis mucicis concavis conniventibus. *Schreb. de Phasco:* p. 8. n. 3. *tab. 1. fig. 1. 2.*

Phascum acaulon α . acaule anthera sessili, foliis ovatis, acutis, conniventibus. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 450.

Bryum bulbiferum capitulis subglobosis nitidis, calyptra basi dilatata, primordialibus bulbosis. *Necker method. musc.* p. 230. n. 42.

In hortis, locis cultis, coemeteriis, & agris frequens. Autumno praecipue vero, vernali tempore.

894. *Phascum muticum* acaule, foliis ovaris muticis concavis conniventibus. *Schreb. de Phasco* p. 8. n. 4. t. 1. f. 11. 12.

Phascum acaulon. β . *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 450.

Sphagnum acaulon bulbiferum minus. *Dill. musc.* 252. tab. 32. fig. 12.

In fimento putrido ad margines vaporariorum in hortis, inque fossis exsiccatis & alibi. Vere,

b. Peristomate nudo.

SPHAGNUM. *Lin. gen.* 1304.

♂ — ♀. *Masculus flos* clavaeformis. *Anth. planae ellipticae* filo succulento cinctae. *Peristoma nudum.*

895. *SPHAGNUM palustre* furculo ramoso: ramulis dependentibus; thecis terminalibus.

Sphagnum palustre ramis deflexis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 448.

Hypnum cubile ramis lateralibus deflexis, primordialibus subrotundis terminalibus congestis. *Necker method. musc.* 188. n. 45.

Sphagnum palustre molle deflexum, squamis cymbiformibus. *Dill. musc.* 240. tab. 32. f. 1.

β . *Sphagnum palustre molle* deflexum, squamis capillaceis. *Dill. musc.* 243. t. 32. f. 2.

Im Grunewald, Jungfernheide, hinter Tempelhof, prope Tegel, Spandau &c. copiosissime magnas obducens paludes. *Junio.*

In varietate α . folia sunt concava oblonga obtusa, in β . plana subulata acuta.

Numne distinctae species? quum α . in aquis & fossis fluentibus. β . vero in paludibus stagnantibus occurrit.

GYMNOSTOMUM. *Hedwig* 2. p. 87. n. 4.

σ . φ . *Masculus flos disciformis. Peristoma nudum.*

896. GYMNSTOMUM *pyriforme* foliis explanatis oblongis acutis; thecis pyriformibus.

Bryum pyriforme antheris erectis obovatis, furculis acaulibus, foliis ovatis muticis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 474.*

Bryum serpillifolium, capsulis pyriformibus. *Dill. musc. 345, t. 44. f. 6.*

In der Jungfernheide, prope Spandau, Buchholtz, Charlottenburg &c. in fossis exsiccatis & hortis frequens. Februario, Martio seq.

897. GYMNSTOMUM *Heimii* trunco erecto, foliisque spatulato-acuminatis, ad apicem denticulatis; thecis oblongis erectis. *Hedwig stirp. crypt. I. fascil. 3. pag. 80. tab. 30.*

In fossis ad Spandau rarius. Vere.

898. GYMNSTOMUM *truncatulum* foliis explanatis apiculatis; thecis truncatis. *Hedwig stirp. crypt. I. fascil. 1. t. 5, p. 13.*

α . *Bryum truncatulum* antheris erectis subrotundis: operculo mucronato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 481.*

Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. musc. 347. tab. 45. fig. 1. Hedwig, l. c. fig. 1. 2. 5. 6. 12. &c.*

β . cap-

♂. capsulis axillaribus. *Hedwig. l. c. fig. 7. 14. &c.*

Ad fossas, in pratis, hortis vulgaris. Vere & autumno.

In varietate α. capsulae terminales, operculum: acumine brevi incurvo; folia mucronata. In β. capsulae axillares folia angustiora mucrone breviori, & acumine operculi longiori magis erecto.

899. *GYMNOSTOMUM ovatum* foliis ovatis, concavis piliferis; thecis ovatis. *Hedwig stirp. crypt. I. fascicul. 1. pag. 16. t. 6.*

In agris limosis, & tumulis coemeteriorum passim. Vere.

c. *Peristomate figurato, ordine simplici.*

TETRAPHIS. *Hedwig musc. 2.*

p. 87. n. 5.

♂.. ♀. *Mascul. flos* capituliformis pulverulentus. *Peristoma* dentibus quatuor pyramidalibus.

900. *TETRAPHIS pellucida* furculo simplici, foliis ovatis; thecis cylindricis.

Georgia Mnemosynum. Ehrhart hanoev. Magaz. 1780. 59. Stück. pag. 931.

Mnium pellucidum caule simplici, foliis ovatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 457.*

Im Grunewald, Thiergarten, Jungfernheide & alibi passim. Februario. Martio.

LEERSIA. *Hedwig musc.* 2. p. 88. n. 7.

♂ — ♀. *Mascul. Fl. geminaeformis in foliorum alis. Peristoma dentibus 16. angustis erectilibus integris.*

901. *LEERSIA pulvinata* furculo ramoso foliis oblongis piliferis: thecis subrotundis nutantibus: calyptris minutis.

Bryum pulvinatum antheris subrotundis pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 480.

Bryum pulvinatum furculo caespitoso aggregato, foliis piliferis, setaceis, capitulis ovatis intra folia sepultis. *Necker method. musc.* p. 200. n. 9.

In tectis, rigulis, inque lapidibus magnis, muris, sepibusque copiose. Autumno & vere.

902. *LEERSIA cirrhata* furculo ramoso, foliis lanceolatis acutis; thecis oblongis, operculo acuminato, calyptris dimidiatis.

Mnium cirrhatum foliis arefactione revolutis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 46.

Bryum cirratum furculo ramoso, foliis linearibus, siccitare contortis, capitulis erectis cuspidatis. *Necker method. musc.* p. 213. n. 25.

In collibus aridis arenosis inter *Pancko* & *Gesundbrunnen*, prope *Schoeneberg* & alibi passim. Autumno. Rarius capsulas profert.

903. *LEERSIA vulgaris* furculo simplici, foliis lanceolatis; thecis cylindricis: calyptris campaniformibus margine integris, thecis longioribus.

Lær.

Leersia vulgaris calyptra laxa conica aequali, vaginulae membrana pileiformi. *Hedwig stirp. crypt. I. fascil. 2. pag. 46. t. 18.*

Bryum exstinctorium anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 474. α.*

Bryum calyptra exstinctorii forma minus. *Dill. musc. 349. tab. 45. fig. 8.*

In moeniis *Spandavianis*, inque truncis arborum putridis in *der Jungfernheide*, versus *Papenberg* rarius. Autumno.

GRIMMIA. *Hedwig musc. 2. p. 89. n. 8.*

♂. ♀. *Mascul. Fl.* in foliorum alis gemmaeformis, in summitate disciformis. *Peristoma* dentibus 16, latiusculis, reflexis, integris.

904. GRIMMIA *Polyodon* furculo ramoso, foliis lanceolatis carinatis; thecis ovatis terminalibus, sessilibus: operculo acuminato: calyptris glabris minimis.

Grimmia Polyodon. *Ehrhart. hanoev. Magazin 1781. 69. Stück. p. 1092.*

Bryum apocarpum antheris sessilibus terminalibus, calyptris minimis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 471. variet. α.*

Bryum apocarpum furculo ramoso, foliis carinatis acutis, capitulis sessilibus, ovatis, terminalibus. *Neck. method. musc. 199. n. 8. α.*

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis. *Dill, musc. 245. tab. 32. fig. 4.*

In saxis & ad falices prope *Spandau* passim.
Vere.

905. GRIMMIA *striata* furculo ramoso, foliis lanceolatis, acutis; thecis oblongis sessilibus, axillaribus, terminalibusve: operculo acuminato: calyptris pilosis.

Bryum striatum antheris subsessilibus, sparsis, calyptris striatis fursum pilosis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 473. α.

Polytrichum striatum capitulo laterali ovato subsessili, foliis integerrimis exappendiculatis, primordialibus gemmofis. *Neck method. musc.* p. 121. n. 4. α.

Polytrichum bryoides α. *striatum*. *Weiss crypt.* 175.

Weissia polytrichoides. *Wiggers primit.* p. 76. n. 821.

Polytrichum brii ruralis facie, capsulis sessilibus majus. *Dill musc.* 430. tab. 55. f. 8.

In arboribus vulgaris. Vere & autumnno.

906. GRIMMIA *sylvatica* furculo ramoso: foliis lanceolatis; thecis oblongis pedunculatis terminalibus axillaribusve: operculo mucrone obtuso; calyptris villosis.

Bryum striatum. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 473. δ.

Polytrichum striatum. *Neck. method. musc. l. c.* γ.

Polytrichum crispum capillaceum, calyptris acutis pilosissimis. *Dill. musc.* 433. t. 55. fig. 11. a. b. c.

In der Jungfernheide, Grunewald, Thiergarten, arboribus, locis umbrosis insidens passim.
Hyeme.

Diversissima a praecedenti, ut pro varietate declarare nequeam. Differt praecipue thecis pedunculatis. Varietas vero rupestris ad priorem speciem pertinet, & modo loco orta videtur; hic nondum vidi.

WEISSIA. *Hedwig musc.* 2. p. 90. n. 9.

♂..♀. *Mascul. fl.* terminalis capituliformis. *Peristoma* dentibus 16 integris.

907. WEISSIA *Dicksoni* furculo ramoso, foliis lineari-lanceolatis; thecis oblongis: operculo acuminato: calyptris dimidiatis.

Bryum virens capsulis erectis oblongis, foliis subulatis strictis. *Dickson fascicul. crypt. pag.* 4.

Bryum capillaceum breve, pallide & laete virens, capsulis ovatis. *Dill musc.* 380. t. 48. f. 43.

Bryi viriduli. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 476. synonyma nec planta.

In der Jungfernheide, Grunewald, Thiergarten & alibi frequens. Hyeme.

Cespites hemisphaericos format, & folia exsiccatione crispa evadunt.

Celeber. *Dickson* verum *Bryum viridulum* in herbario *Linnei* vidit, & differentiam ejus indicavit. vide *EjUSD. Fascicul. pag.* 3. *tab.* 1. *fig.* 5.

908. WEISSIA? *paludosa* acaulis, foliis setaceis lanceolatis; thecis oblongis: operculo acuminato: calyptris dimidiatis.

Bryum paludosum acaulon, foliis setaceis, antheris obtusissimis, patulis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 476.

Bryum

Bryum trichodes acaulon palustre minimum, fetis & capsulis brevissimis. *Dill musc.* 387. tab. 49. fig. 53.

In der Jungfernheide, in fossis humentibus umbrosis rarius. Vere.

Nunquam caespitosa semper solitaria sparsa.

909. *WEISSIA recurvirostra* foliis lanceolatis, imbricato-patulis; theca gracili: operculi rostellulo recurvo. *Hedwig stirp. crypt.* I. fascic. I. pag. 19. tab. 7.

Versus *Spandau bei der Steinmühle*, & in plantariis der *Jungfernheide* versus *Tegel* rarius. Hyeme.

POLYTRICHUM. *Lin. gen.* 1309.

♂..♀. *Mascul.* flos disciformis. *Peristoma* dentibus 32 integris membrana apicibus adglutinata.

* *Thecis cum apophysi.*

910. *POLYTRICHUM commune* furculo simplici, prolifero, foliis lineari-lanceolatis ferrulatis; thecis oblongis tetraëdris: calyptris villosis.

Polytrichum commune capsulis paralellipipedis, foliis ferrulatis acutis. *Schreb. spicil.* pag. 73. n. 733.

Polytrichum commune caule simplici. *Lin. syst. ed.* R. 4. p. 455. a.

Polytrichum commune furculo capitulifero simpliculo: stellifero annotino articulato, capitulis adultis tetraëdris obliquis. *Necker method. musc.* 125. n. 7.

Poly.

Polytrichum commune α . *majus*. *Weiss. crypt.* 168.

Polytrichum quadrangulare vulgare, *Juccae foliis ferratis*. *Dill. musc.* pag. 420. *fig.* 1.

Im Grunewald frequens. Vere.

911. *POLYTRICHUM juniperinum* furculo simplici prolifero: foliis lineari-lanceolatis integerrimis mucronatis; thecis oblongis tetraëdris, calyptris villosis.

Polytrichum commune. β . *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 456.

Polytrichum commune β . *minus*. *Weiss. crypt.* 171.

Polytrichum. *Schreb. spicil.* 73. n. 734.

Polytrichum quadrangulare, *juniperi foliis brevioribus & rigidioribus*. *Dill. musc.* 464. t. 54. f. 2.

In der Jungfernheide, Thiergarten, Grunewald & alibi copiose. Vere & autumno.

Offic. (Adianti aurei Herba.)

912. *POLYTRICHUM piliferum* furculo simplici, foliis lanceolatis integerrimis, apice piliferis; thecis oblongis tetraëdris; calyptris villosis.

Polytrichum piliferum capsula paralellipipeda, foliis integerrimis, piliferis, caule simplici.

Schreb. spicil. 74. n. 1031.

Polytrichum commune γ . *pilosum*. *Weiss. crypt.* 172.

Polytrichum commune γ . *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 456.

Polytrichum quadrangulare minus juniperi foliis pilosis. *Dill. musc.* 426. tab. 54. *fig.* 3.

In collibus apricis graminosis, & in ericetis sterilibus copiose. e.g. *in der Jungfernheide, Spandauerheide, ad Schocneberg &c.* Hyeme & vere.

* * *Thecis absque apophysi.*

913. *POLYTRICHUM nanum* furculo simplici, foliis lanceolatis apice subferratis; thecis subrotundis: calyptris villosis.

Polytrichum nanum foliis obscure ferratis; theca subrotunda, nutante. *Hedwig stirp. crypt. I. fasc. 2. pag. 35. tab. 13.*

Mnium polytrichoides calyptra villosa. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 464. α.*

In der Jungfernheide, Grunewald, Hasenheide & alibi frequens. Hyeme.

914. *POLYTRICHUM aloides* furculo simplici, foliis lanceolatis, apice ferrulatis; thecis cylindricis: calyptris villosis.

Polytrichum aloides foliis versus apicem evidenter ferrulatis; theca cylindrica obliquata. *Hedwig stirp. crypt. I. fasc. 2. pag. 37. tab. 14.*

Mnium polytrichoides. β. Lin. syst. ed. R. 4. p. 464.

In der Jungfernheide passim. Vere.

915. *POLYTRICHUM undulatum* furculo simplici, foliis lanceolatis ferratis, undulatis; thecis cylindricis: operculi acumine longe producto: calyptris dimidiatis glabris.

Polytrichum undulatum foliis lanceolatis ferratis, undulatis, patentibus; calyptra ad apicem paraphysiphora, theca cylindrica cernua. *Hedwig stirp. crypt. I. fascicul. 2. pag. 43. t. 16. 17.*

Catharinea Callibryon. Ehrhart hanoev. Magaz. 1780. 59 Stück pag. 934.

Bryum

Bryum undulatum antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ferratis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 477.

β. *Polytrichum undulatum* β. minus, thecis foliisque erectioribus. *Hedwig. l. c. pag. 43. t. 17. fig. 13 & 14.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi copiose. Hyeme.

TRICHOSTOMUM, *Hed. musc. 2.*

p. 90. n. 11.

♂ — ♀. Flos mascul. genimiformis. *Peristoma* dentibus 16 bifidis longis erectis.

916. TRICHOSTOMUM *hypnoides* furculo ramoso decumbente, foliis oblongis apice piliferis; thecis oblongis: calyptris integris.

Bryum hypnoides antheris erectis, furculo erectiusculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 477. α.*

Bryum hypnoides α. hirsutum. Retz prod. fl. Scandinav. 2. p. 213. n. 1234.

Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum. Dill. musc. 372. t. 47. fig. 34. B.

Prope Falckenhagen rarius. Hyeme.

Cum capsulis nondum legi.

917. TRICHOSTOMUM *pallidum* furculo simplici brevissimo, foliis capillaceis subulatis vaginantibus; thecis cylindricis: operculis conicis: calyptris dimidiatis.

Trichostomum pallidum humile, foliis capillari-
bus; theca ovato-cylindrica; operculo coni-
co. *Hedwig stirp. I. fascic. 3. p. 69. tab. 27.*

Bryum pallidum capsulis urceolatis erectis, pecti-
ne spirali, foliis capillaceis, furculis acauli-
bus. *Schreb. spicil. 80. n. 1029.*

Prope Spandau & in der Jungfernheide in plan-
tariis sparsim. Vere.

918. *TRICHOSTOMUM pusillum* furculo simplici,
brevissimo, foliis subulatis vaginantibus; the-
cis oblongis: operculis conicis: calyptris di-
midiatis.

Trichostomum pusillum foliis ex ovato-concavis,
basi subulatis, thecis erectis oblongis. *Hedwig
stirp. crypt. I. fascicul. 3. pag. 74. tab. 28.*

Locis arenosis in plantariis & fossis exsiccatis der
Jungfernheide passim. Autumno.

Dentes peristomatis ad basin usque divisi, nec
torti, ut in praecedenti specie.

FISSIDENS. Hedwig musc. 2. p. 91. n. 12.

♂ — ♀. *Flos mascul. gemmiformis. Peristoma* den-
tibus 16. brevioribus inflexis.

919. *FISSIDENS bryoides* fronde simplici pinnata,
apice setifera: pinnis oblongis acutis; thecis
oblongis: operculis acutis.

Hypnum bryoides fronde simplicissima pinnata lan-
ceolata apice pedunculifera. *Lin, syst. ed. R.
4. p. 483.*

Hyp.

Hypnum taxiforme exiguum versus summum
capsuliferum. *Dill musc.* 262. t. 34. f. 1.

In der Jungfernheide & Papenbergen rarius ad
emortuarum arborum truncos. Hyeme.

920. *FISSIDENS taxifolius* fronde pinnata simpli-
ci, basi fetifera: pinnis oblongis acutis; thecis
oblongis: operculo acuminato.

Hypnum taxifolium fronde simplicissima pinnata
lanceolata basi pedunculifera. *Lin. syst. ed. R.*
4. p. 482.

Hypnum taxifolium: furculo simplicissimo basi
stipitifero, capitulis incurvis, apice subulatis,
foliis imbricatis acutis. *Necker method. musc.*
p. 151. n. 1.

Inter *Grunewald & Fasanerie* in pratis humidis
turfosis passim. Hyeme.

921. *FISSIDENS adianthoides* fronde pinnata sub-
ramosa, medio fetifera: pinnis oblongis acu-
tis; thecis subcylindricis: operculi acumine
brevis.

Hypnum adianthoides fronde pinnata ramosa
erecta medio pedunculifera. *Lin. syst. ed. R.*
4. p. 484.

Hypnum adianthoides: furculo ramoso, erecto,
medio stipitifero, capitulis obliquis subulatis,
foliis imbricatis acutis. *Necker method. musc.*
p. 153. n. 3.

Inter *Grunewald & Fasanerie* in pratis udis tur-
fosis frequens. Hyeme.

922. *FISSIDENS denticulatus* fronde pinnata simpliciter, basi fetifera: pinnis cuneiformibus acutis, conjugatis; thecis cylindricis: operculo obtuso.

Hypnum denticulatum fronde pinnata simplici: pinnis duplicatis basi pedunculiferis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 413.*

Hypnum denticulatum: furculo simpliciusculo deumbente, basi fetifero, capitulis obliquis; foliis ordine duplici acutis, recurvatis. *Neck. method. p. 154. n. 5.*

Locis udis nemorosis, inque arborum truncis. c. g. im *Thiergarten*, *Jungfernheide*, *Papenberg* & alibi frequens. Hyeme.

DICRANUM. *Hedwig musc. 2. p. 91. n. 13.*

♂. ♀. *Mascul. flos* capituliformis terminalis. *Peristoma* dentibus 16 brevibus bifidis inflexis.

923. *DICRANUM purpureum* furculo ramoso, foliis oblongis acutis carinatis; thecis subcylindricis, fetis axillaribus.

Mnium purpureum caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 460.*

Bryum purpureum capsulis inclinatis striatis, operculo conico, foliis lineari-lanceolatis carinatis, caule subdiviso. *Schreb. spicil. 79. n. 738.*

In viis, sylvis, nemoribus & alibi copiosissime. Vere.

924. *DICRANUM scoparium* furculo ramoso, foliis lineari-lanceolatis recurvis secundis; thecis erectis oblongo-cylindræis: operculis conicis acuminatis.

Bryum scoparium antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 477.*

Hypnum scoparium foliis falcatis heteromallis, vaginis multifloris. *Hall. helv. n. 1777. Weiss. crypt. 213.*

In der Jungfernheide, Thiergarten & alibi copiose. Vere.

Sæpius uno ex Perichaetio plures nascuntur fetas.

925. *DICRANUM heteromallum* furculo subsemplifici, foliis setaceis recurvis secundis, thecis ovatis: operculis acuminatis recurvis.

Dicranum heteromallum foliis e membranacea basi subulatis, secundis; theca ovata, operculo rostrato. *Hedwig stirp. 1. fasc. 3. p. 68. tab. 26.*

Bryum heteromallum antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 480.*

Im Thiergarten, Hasenheide, Jungfernheide in fossis exsiccatis arenosis copiose. Hyeme.

926. *DICRANUM glaucum* furculo ramoso, foliis ovatis acutis imbricatis; thecis oblongis: operculis acuminatis recurvis.

Bryum glaucum antheris erectiusculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, furculis ramosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 472.*

Bryum glaucum: furculo ramoso, fragili, imbricato, foliis lanceolatis, operculo capitulorum rostrato. *Necker method. musc.* 226. n. 37.

In der Jungfernheide, Grunewald & alibi frequens. Vere.

TORTULA. *Hedwig musc.* 2. p. 92. n. 14.

♂—♀. *Mascul. flos* gemmiformis. *Peristomat.* spiraliter convolutis.

927. TORTULA *muralis* furculo brevissimo, subdiviso, foliis ovatis, acutis, apice piliferis; thecis oblongis: operculis conicis acutis.

Bryum murale antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, furculis simplicibus caespitosis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 476.

Bryum murale capitulis oblongis erectis, cuspidatis, foliis oblongis concavis piliferis. *Neck. method.* 196. n. 5.

In muris, tegulis, lapidibus &c. copiose. Vere.

728. TORTULA *subulata* furculo brevissimo simplici, foliis ovatis obtusiusculis; thecis cylindraceis: operculo conico, acuto.

Bryum subulatum antheris erectis subulatis, furculis acaulibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 475.

Bryum subulatum capitulis subulatis, foliis superioribus acutis patentibus primordialibus subradicalibus. *Necker method.* p. 194. n. 2.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi passim in fossis humidiusculis. Vere.

BARBULA. *Hedwig musc.* 2. p. 92. n. 15.

♂. ♀. *Mascul. flos capituliformis. Peristoma ciliis spiritaliter convolutis.*

929. BARBULA *ruralis* furculo ramoso, foliis reflexis obovatis, obtusis, apice piliferis; thecis cylindricis: operculis conicis acutis.

Bryum rurale antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 475.

Bryum rurale capsulis subnutantibus; pedunculis annotinis lateralibus; foliis supra medium dilatatis, piliferis, patulis. *Scop. carn. ed.* 1. p. 145. n. 17. *ed.* 2. n. 1308.

In campis, nemoribus, tectis stramineis, ligneisque, muris &c. copiosissime. Hyeme.

930. BARBULA *unguiculata* furculo subramoso, foliis lineari-lanceolatis, carinatis; thecis subcylindricis: operculo conico.

Barbula unguiculata foliis lineari-lanceolatis, carinatis, surrectis, perigonalibus masculi floris cum fasciculo, theca obliqua. *Hedwig stirp.* I. fasc. 3. p. 59. t. 23.

Bryum unguiculatum antheris erectis oblongis, pedunculis axillaribus, foliis erectis, acutis, carinatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 479.

Bryum unguiculatum capsulis urceolatis, operculo longo obliquo, foliis lanceolatis tortilibus, cauliculis erectis. *Schreb. spicil.* 78.

In fossis, tumulis coemeteriorum & alibi frequens. Hyeme.

d. *Peristomate figurato, ordine duplici*

NECKERA. *Hedwig musc.* 2. p. 93. n. 16.

♂..♀. *Mascul. fl. gemmiformis. Peristoma* dentibus 16. ciliisque apice liberis.

931. NECKERA *crispa* furculis ramosis erectiusculis, foliis distichis oblongis obtusis rugosis; thecis oblongis: operculo rostrato, rostro reflexo.

Hypnum crispum furculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis planis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 487.

Hypnum crispum furculo ramofo vago erectiusculo stipitifero, capitulis obliquis acuminatis, foliis undatis obtusis distichis. *Necker method.* p. 153.

Prope *Falkenhagen* rarissime. Hyeme.

932. NECKERA *dendroides* furculo erecto inferne nudo, superne fasciculato-ramoso, folioso, foliis lineari-lanceolatis imbricatis; thecis subcylindricis erectis: operculis rostello incurvo.

Hypnum dendroides furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 496.

Hypnum dendroides sericeum, setis & capsulis longioribus erectis. *Dill. musc.* 313. *tab.* 40. *fig.* 48.

β. furculo ramofo, ramis fasciculatis.

In nemorosis humidis *im Thiergarten, Jungfernheide, Papenberg* &c. frequens. Hyeme.

In varietate β . furculus nudus non simplex est, sed in tres vel quatuor ramos dividitur.

933. *NECKERA curtispindula* furculis ramosis erectis teretibus foliosis, foliis oblongo-ovatis, acutis, imbricatis; thecis nutantibus ovatis: operculis acuminatis.

Hypnum curtispindulum furculis vagis, teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 497.

Hypnum dentatum curtispindulum, viticulis rigidis. *Dill. musc. 333. t. 43. f. 69.*

Im Briselang & alibi rarius. Hyeme.

934. *NECKERA viticulosa* furculis ramosis decumbentibus, foliis oblongis acutis patulis; thecis oblongis: operculis conicis.

Hypnum viticulosum furculis repentibus, ramis vagis teretibus; foliis patulis acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 494.*

Hypnum furculo germinante crassiore: adulto graciliore, reptante capitulifero, primordialibus pilosis. *Necker method. 169. n. 23.*

In den Papenberg, Briselang & alibi in arborum truncis rarius. Majo.

935. *NECKERA serpens* furculis ramosis decumbentibus vagis, filiformibus, foliis minutissimis oblongis acuminatis; thecis oblongo-cylindricis: operculis obtusis.

Hypneum serpens furculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 500.

Hypnum serpens furculis repentibus, ramis filiformibus: foliis oblitteratis, capsulis cylindraceis inclinatis, mucrone brevissimo erecto. *Schreb. spicil. 99. n. 760.*

In arborum truncis vulgaris. Autumno.

936. *NECKERA cupressiformis* furculis ramosis decumbentibus, foliis oblongo-lanceolatis recurvis secundis; thecis cylindricis: operculo acuminato recto.

Hypnum cupressiforme furculis subpinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 492.*

Hypnum cupressiforme furculo pinnato, ramis apice deflexis, remotis, capitulis ovatis, erectis. *Necker method. 166. n. 19.*

α. furculis latis, brevibus.

β. *Hypnum crispum cupressiforme*, foliis aduncis. *Dill. musc. 287. t. 37. f. 23.*

γ. furculis apice filiformibus, longe repentibus.

In terra & arborum truncis copiosissime. Autumno.

937. *NECKERA adunca* furculo ramofo erecto, foliis lineari-lanceolatis falcatis carinatis apice setaceis, secundis; thecis obliquis oblongis; operculis conicis obtusis.

Hyp-

Hypnum aduncum furculis erectiusculo-subramosis, foliis secundis recurvis subulatis, ramis recurvatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 493.*

Hypnum aduncum furculo erecto simpliciusculo, ramis recurvis, capitulo obliquo apice obtuso, *Necker method. 167. n. 20.*

In der Jungfernheide, Papenberg &c. frequens, locis udis. Majo.

938. *NECKERA sericea* furculo ramoso repente, foliis oblongis, seta terminatis, arcte imbricatis; thecis cylindricis erectis: operculis acuminatis recurvis.

Hypnum sericeum furculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris erectis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 499.*

Hypnum sericeum: repens, ramis anotinis ramosis erectis, capitulo erecto, acuminato, primordialibus acuminatis. *Necker method. musc. 173. n. 17.*

Hypnum vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. *Dill. musc. 323. tab. 42. fig. 59.*

In arborum truncis vulgaris. Vere.

939. *NECKERA lutescens* furculis ramosis vagis, foliis oblongis acuminatis; thecis oblongis, obliquis: operculis acuminatis recurvis.

Hypnum lutescens furculis vagis procumbentibus, foliis subulatis, antheris obliquis. *Huds. angl. ed. 1. p. 421. In editione novissima varietas Hypni sericei p. 506.*

Hyp-

Hypnum lutescens furculis vagis procumbentibus, foliis ovatis lanceolaris subulatis striatis, capsulis obliquis. *Schreb. spicil.* 98. n. 1071.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi passim. Vere.

940. *NECKERA albicans* furculo ramoso adscendente, foliis oblongo-lanceolatis, apice setaceis; thecis oblongis obliquis: operculis conicis obtusis.

Hypnum albicans furculo adscendente, ramis teretibus arcte imbricatis, foliis ovatis, mucronatis, capitulis axillaribus obliquis. *Necker method. musc.* 180. n. 36. *Withering britan.* 2. p. 688. n. 36.

Hypnum sericeum gracile *albicans*, capsulis subrotundis. *Dill. musc.* 328. t. 42. f. 63. (*figura non optima.*)

Hinter Spandau versus Falkenhagen passim ad terram. Vere.

LESKIA. *Hedwig musc.* 2. p. 93. n. 17.

♂.. ♀. *Mascul* flos geminiformis. *Peristoma extern.* dentibus 16 acutis; *intern.* ciliis uniformibus, basi membranacea connexis.

941. *LESKIA trichomanoides* furculo ramoso, foliis distichis oblongis subulatis obtusis; thecis subcylindricis: operculi rostello reflexo.

Hypnum trichomanoides fronde ramosa: foliis distichis imbricatis acinaciformibus obtusis. *Schreb. spicil.* 88. n. 1053.

Hypnum pennatum trichomanoides splendens ramosum. *Dill musc.* 269. t. 34. f. 8.

Im Thiergarten, Grunewald, Papenberg, Jungfernheide &c. ad arborum radices locis humidis umbrosis passim. Vere.

942. *LESKIA polyantha* furculis ramosis, ramis brevissimis, foliis subulatis acutis, thecis oblongis, operculis conicis obtusis.

Hypnum polyanthos, furculis ramosissimis, ramis erectis teretibus multifloris, capsulis erectis. Schreb. spicil. 97. n. 1070.

Im Thiergarten & Jungfernheide in arborum truncis rarius. Hyeme.

943. *LESKIA palustris* furculis repentibus vagis, ramosis, foliis ovatis acutis secundis; thecis cylindraceis: operculis obtusis.

Hypnum palustre furculis repentibus, ramis confertis erectis, foliis ovatis secundis, antheris erectiusculis. Lin. syst. ed. R. 4. p. 495.

Hypnum heterophyllum furculo repente simplici, ramis erectis fetas subaequantibus: operculo mucronato. Necker method. 168.

Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. Dill musc. 293. t. 37. f. 27.

In fossis udis, ad falicum truncos passim. Autumno.

944. *LESKIA marchica* furculo ramoso erecto, foliis ovatis acuminatis; thecis subrotundis obliquis: operculis mucrone crasso adunco.

*Iisdem locis ubi *Marsilea natans* reperitur, in ligno putrido natante. Majo. Junio.*

Surcu-

rid. p. 10
fig. 12

Surculus erectus ramosus, inferne fuscus, radicibus fibrosis minutissimis dense obsitus: ramis brevibus teretibus.

Folia ovata acuminata carinata obscure virentia laxè imbricata. Flos masculus gemmiformis terminalis. Setae rubrae sesquiunciales, axillares, filiformes. *Perichaetium* vaginatum, inferne ventricosum, superne truncatum, margine integro, foliis lanceolatis apice setaceis cinctum. Theca subrotunda obliqua gibba striata. Operculum minutum planum, mucrone umbilicato obtuso parum deflexo. *Tab. VI. fig. 12. a. b. c.*

Habitu externo in nonnullis cum *Mnio fontano* convenit, differt tamen:

- 1) Foliis ovatis acuminatis, quae in *Mnio fontano* apice setacea sunt.
- 2) Ramis brevioribus.
- 3) Floribus gemmiformibus, nec disciformibus.
- 4) Theca minori gibbosa.
- 5) Peristomate.

HYPNUM. *Lin. gen. 1312.*

♂..♀. Flos mascul. gemmiformis. *Peristoma extern.* dentibus 16. acutis; *intern.* ciliis e membrana difformibus.

* *Surculis pinnatis.*

945. HYPNUM *flicinum* surculo simpliciter pinnato, foliis oblongis acuminatis reflexis secundis; thecis subcylindricis: operculis convexis.

Hyp.

Hypnum filicinum furculis pinnatis: ramulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 483.*

Hypnum filicinum α . *spicatum* furculis pinnatis: pinnis foliosis, simplicibus, distantibus, versus apicem approximatis in spicam: foliis imbricatis, falcatis. *Weiss. crypt. 228.*

Hypnum repens filicinum crispum. *Dill musc. 282. t. 36. f. 19.*

Prope *Tegel* haud infrequens, in *den Papenberg* rarius. Martio. Aprili.

946. *HYPNUM proliferum* furculis duplicato-pinnatis, proliferis, foliis lanceolatis imbricatis; thecis oblongis; operculis acuminatis incurvis.

Hypnum proliferum furculis proliferis, plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 489.*

Hypnum parietinum furculo pinnato, ramis arcuato-subulatis teretibus, capitulis aggregatis obliquis, operculo subulato. *Necker method. 157. n. 8.* (synonymum *Linnei* a *Perill. Neckero* citatum, falsum est, & ad sequentem speciem pertinet.)

Hypnum filicinum, *Tamarisci* foliis majoribus splendentibus. *Dill. musc. 274. t. 35. f. 13.*

In nemoribus & sylvis inque fossis exsiccatis copiose. Vere.

947. *HYPNUM delicatulum* furculis duplicato-pinnatis proliferis apice cuspidatis, foliis oblongis,

acuminatis; imbricatis thecis cylindraceis: operculi rostello obtuso incurvo.

Hypnum delicatulum furculis subproliferis plano-pinnatis cuspidatis, pedunculis aggregatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 489.*

Hypnum filicinum, tamarisci foliis minimis non splendentibus, fetis capsulis brevioribus. *Dill. musc. 546. t. 83. f. 6.*

Inter Grunewald & Fasenerie, in den Papenbergen & alibi locis udis passim. Hyeme.

Setae solitariae vel geminatae, rarius aggregatae.

948. *HYPNUM parietinum* furculis subtriplicato pinnatis proliferis, foliis ovatis acutis imbricatis; thecis cylindraceis: operculi rostello incurvo.

Hypnum parietinum furculo plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 490.*

Hypnum tamariscifolium furculo repente, ramis planiusculis proliferis, capitulis confertis incurvis. *Necker method. 158. n. 9.*

Hypnum filicinum, Tamarisci foliis minoribus, non splendentibus. *Dill. musc. 276. t. 35. f. 14.*
In nemoribus & fossis exsiccatis umbrosis frequens. Vere.

Rarius theciferum.

949. *HYPNUM praelongum* furculis subsimpliciter pinnatis, subproliferis, foliis lanceolatis laxè imbricatis; thecis oblongis: operculis conicis, rostro subulato longo incurvo.

Hyp.

Hypnum praelongum furculis subpinnatis decumbentibus; ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 490.*

Hypnum praelongum furculo reptante, ramis subaequalibus setis axillaribus, capitulis subcernuis, foliis ferrulatis patulis. *Necker method. 174. n. 28.*

In der Jungfernheide, Thiergarten & alibi in arborum truncis & ad terram frequens. Hyeme. Cum thecis nondum legi, a Clariss. ac Amiciss. D. Hedwig specimen cum thecis accepi, unde descriptionem deprompsi.

950. *HYPNUM abietinum* furculis simpliciter pinnatis, ramosis, filiformibus, foliis oblongis obtusis dense imbricatis.

Hypnum abietinum furculis pinnatis teretiusculis remotis inaequalibus. *Lin. syst. ed. R. 4 p. 491.*

Hypnum abietinum primordialibus obtusis, ramis teretibus subulatis, foliis ovatis, acutis, rachis ficcata appressis. *Necker method. 163. n. 15.*

In arenosis sterilibus ad Schoeneberg, inter Pancko & Gesundbrunnen alibique frequens, Thecas nunquam vidi.

* * *Sarculis erectis.*

951. *HYPNUM triquetrum* furculis ramosis, foliis oblongis acutis subreflexis patulis; thecis oblongis: operculis obtusis.

Hypnum triquetrum ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 487.*

Hypnum triquetrum furculo adscendente: ramis supremis recurviusculis setiferis: infimis repantibus, foliis imbricato patulis. *Necker method.* 185. n. 43.

In nemoribus, sylvis, pratisque copiose. Vere. Thecas rarius observavi.

952. *HYPNUM squarrosum* furculis ramosis, foliis lanceolatis acutis reflexis; thecis oblongis: operculis acutis.

Hypnum squarrosum ramis vagis, foliis lanceolatis, complicato carinatis, quinquefariam recurvatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 494.

Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, minus. *Dill. musc.* 304. t. 39. f. 39.

In nemoribus subhumidis, inque pratis frequens. e. g. *Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald &c.* Vere.

Hypnum. *Dill.* t. 38. f. 38, nondum legi, & differe videtur.

953. *HYPNUM purum* furculis ramoso-pinnatis, apice subulatis, foliis ovatis obtusis dense imbricatis; thecis oblongis: operculis acuminatis.

Hypnum purum furculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis conniventibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 497.

Hypnum purum furculo adscendente ramoso setifero: ramis incurvo-subulatis teretibus, foliis conniventibus, obtusis, mucronatis. *Necker method.* 160. n. 11.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens.
Hyeme.

954. *HYPNUM illecebrum* furculis ramoso pinna-
tis suberectis, apice obtusis, foliis oblongis
obtusis mucronatis, dense imbricatis.

Hypnum illecebrum furculis ramisque vagis tere-
tibus erectiusculis obtusis. *Lin. syst. ed. R. 4.*
p. 498.

Hypnum illecebrum furculo vago procumbente,
ramis teretibus arcte imbricatis, foliis conca-
vis obtusis, mucrone terminali. *Necker me-
thod. 178. n. 34.*

*Im Thiergarten, Jungfernheide, prope Tegel,
Papenberg & alibi passim, sed semper abs-
que thecis.*

955. *HYPNUM Schreberi* furculis pinnato-ramosis
apice subulatis, foliis oblongis acutis, laxè im-
bricatis; thecis oblongis; operculis conicis.

Hypnum compressum ramis apice attenuatis, foliis
ovato-lanceolatis, setis elongatis, capsulis in-
clinatis, operculo conico. *Schreb. spicil. 96.*
n. 1067.

Hypnum compressum furculo erecto, ramoso, ra-
mis basi setiferis, planis recurviusculis, stipite
triplo brevioribus. *Necker meth. 159. n. 10.*

Hypnum cupressiforme tenuius & compressius.
Dill musc. 312. t. 40. fig. 47.

Im Thiergarten, Jungfernheide &c. frequens.
Hyeme.

Non confundendum cum *Hypno compresso* Linnei.

956. *Hypnum cuspidatum* furculis pinnato-ramosis apice longe cuspidatis, foliis oblongo-acuminatis; thecis cylindraceis: operculis conicis.

Hypnum cuspidatum furculis vagis: apice foliis convolutis acuminatis. *Lin. syst. ed. R. 4.*
p. 499.

Hypnum cuspidatum furculo erectiusculo, ramis summis pungenti-cuspidatis, fetis axillaribus longissimis. *Necker method. 163. n. 16.*

Locis udis nemorosis inque pratis abunde. Vere.

*** *Surculis vagis.*

957. *Hypnum fluitans* furculis ramosis vagis, foliis ovatis acutis patulis; thecis oblongis obliquis: operculis conicis.

Hypnum fluitans foliis lanceolatis alternis remotis. *Schreb. spicil. 92. n. 1060. Weiss. crypt. p. 226.*

Hypnum fluitans furculo longissimo, ramoso, foliis inferioribus lanceolatis, remotis: superioribus approximatis, imbricato-patulis. *Necker method. musc. 185. n. 42.*

α. ramis longissimis apice acutis.

Hypnum erectum f. *fluitans*, foliis oblongis, acutis perangustis. *Dill musc. 299. tab. 38. fig. 33.*

β. furculis ramisque minoribus.

Varietas α. in lacu horti botanici prope Schoenberg & β. in arborum truncis, locis humidis in der Jungfernheide. Vere.

Semel varietatem β . cum theca adhuc immatura inveni, cujus descriptionem addam. Perichæti folia erant oblonga apice setacea. Seta uncialis rubra filiformis. Theca oblonga obliqua; operculum conicum obtusum.

958. *HYPNUM rutabulum* furculis ramosis vagis, foliis ovatis acutis, mucronatis patulis; thecis oblongis obliquis: operculis conicis acutis.

Hypnum rutabulum ramis vagis subrepentibus, foliis ovatis mucronatis imbricatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 488.*

Hypnum rutabulum ramis vagis erectiusculis, foliis ovatis acutis mucronatis patulis, operculis conicis. *Schreb. spicil. 90. n. 1057.*

Hypnum dentatum vulgatissimum, operculis obtusis. *Dill. musc. 295. t. 38. f. 29.*

In arborum truncis, sepibus & alibi copiosissime. Hyeme.

Valde variat.

959. *HYPNUM striatum* furculis ramosis vagis, foliis ovatis acutis patulis; thecis oblongis obliquis: operculo mucronato, mucronè incurvo.

Hypnum striatum ramis vagis recurvis, foliis ovatis lineatis acutis undique patentibus, operculis mucronatis. *Schreb. spicil. 91. n. 1058.*

Hypnum vulgare dentatum, operculis cuspidatis. *Dill. musc. 297. t. 38. f. 30.*

In der Jungfernheide, Papenbergen &c. infrequens. Vere.

960. *HYPNUM velutinum* furculis ramosis repentibus, foliis ovatis acuminatis; thecis oblongis: operculis conicis obtusis.

Hypnum velutinum furculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris subnulantibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 500.*

Hypnum velutinum reptans, ramis erectis teretibus seta duplo brevioribus, capitulis ovatis subcernuis. *Necker method. 172. n. 26.*

In arborum truncis passim. c. g. in der *Jungfernheide*, prope *Tegel*, *Papenberg* &c. Vere.

961. *HYPNUM intricatum* furculis ramosis, ramis brevibus, foliis lanceolatis acutis patulis; thecis oblongis obliquis: operculis conicis acutis.

Hypnum intricatum? furculis repentibus, ramis brevibus: foliis laxis lanceolatis acuminatis, capsulis obliquis cernuis mucrone obliquo. *Schreb. spicil. 99. n. 1072.*

In fossis exsiccatis, arborum truncis in der *Jungfernheide*, *Thiergarten* & alibi frequens. Vere.

Convenit cum *Hyp. intricato Schreberi*, sed mucronem in operculo nunquam vidi. Operculi semper conici acuti, in speciminibus a me perscrutatis, erant.

BRYUM. *Lin. gen. 1311.*

- ♂..♀. *Mascul. flos capituliformis. Peristoma externi. dentibus 16 acutis: inter. e membrana carinata ciliis difformibus.*

962. *BRYUM androgynum* furculo ramoso erecto, foliis lanceolatis patulis; thecis cylindricis: operculis acuminatis, seta terminali.

Mnium androgynum caule ramoso, androgynum.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 458.

Mnium angustifolium capitulo pulverifero ovato, glabro: foliato, globoso, furculis simplicibus ramosisque. *Necker method. 234. n. 2.*

Mnium perangustis & brevibus foliis. Dill. musc. 230. t. 31. f. 1.

Im Thiergarten, Grunewald, Jungfernheide &c. ad arborum radices passim. Hyerne & vere.

963. *BRYUM argenteum* furculo ramoso, erecto, foliis oblongis apice subulatis, dense imbricatis; thecis nutantibus oblongis: operculis convexis, seta axillari.

Bryum argenteum antheris pendulis, furculis cylindricis imbricatis laevibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 479.*

Bryum argenteum furculo nitido arcte imbricato, foliis ovatis concavis, capitulis ovatis nutantibus, stipite subradicali. *Necker method. 201. n. 10.*

In tegulis, tectis, sepibus, hortis, agris, nemoribusque copiose. Vere.

964. *BRYUM fissum* furculis repentibus subsimplicibus, foliis distichis trapeziformibus, apice bifidis.

Mnium fissum foliis distichis bifidis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 470.*

Mnium trichomanis furculo repente pennato apice globulifero, foliis bidentatis. *Necker method.* 236. n. 5.

Jungermannia fissa. *Scop. carn. ed.* 2. n. 1345.

Im Thiergarten & Jungfernheide in fossis frequens.

Frustrationes nondum vidi.

MNIUM. *Lin. gen.* 1310.

♂. ♀. *Mascul.* flos disciformis. *Peristoma* extern. dentibus 16 acutis; *intern.* e membrana ciliis difformibus.

965. *MNIUM fontanum* furculo subramoso erecto, foliis lanceolatis, apice setaceis incurvis; thecis subrotundis obliquis, operculo conico umbilicato obtuso.

Mnium fontanum caule simplici geniculis inflexis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 459.

Bryum fontanum furculo simplici tereti, capitulis obliquis subrotundis. *Necker method.* 209. n. 21.

Bryum palustre scapis teretibus, stellatis, capsulis magnis, subrotundis. *Dill. musc.* 340. t. 44. f. 2.

In der Jungfernheide rarius. Majo. Junio.

966. *MNIUM palustre* furculo ramoso dichotomo, foliis subulatis acutis carinatis; thecis oblongis: operculis conicis.

Mnium palustre caule dichotomo, foliis subulatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 459.

Bryum

Bryum palustre furculo erecto dichotomo, stipitibus axillaribus capituliferis, capsulis obliquis. *Necker method.* 210. n. 22.

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. *Dill. musc.* 233. t. 31. f. 3.

In der Jungfernhöhe & prope Spandau rarius.
Majo.

967. *Mnium hornum* furculo subsimplici, foliis oblongis obtusiusculis; thecis oblongis nutantibus: operculis convexis: calyptris rectis.

Mnium hornum antheris pendulis, pedunculo curvato, furculo simplici, foliolis margine scabris. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 462.

Bryum hornum furculo capitulifero ramosiusculo: stellifero simplici, primordialibus plumosis. *Necker method.* 215. n. 26.

Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis nutantibus. *Dill. musc.* 402. t. 51. f. 71.

In der Jungfernhöhe passim. Aprili. Majo.

968. *Mnium crudum* furculo simplici, foliis lanceolatis acutis; thecis nutantibus ovatis: operculis conicis: calyptris recurvatis.

Mnium crudum antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 463.

Bryum crudum furculo simplici, capitulis nutantibus, foliis intermediis latioribus: summis linearibus. *Necker method.* 223. n. 34.

Bryum pendulum molle, foliis lanceolatis & gramineis. *Dill. musc.* 401. t. 51. f. 70.

Iisdem locis, eodemque tempore rarius.

969. *MNIUM serpillifolium* furculo simplici, foliis obovatis obtusis; thecis nutantibus ovatis: operculis conicis acutis.

Mnium serpillifolium pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 467. *α. punctatum.*

Bryum punctatum capsulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis integerrimis obtusis punctatis. *Schreb. spicil.* 89. n. 755.

Bryum serpillifolium furculo simpliciusculo, capitulis subaggregatis cernuis, foliis obovatis, obtusis, nitidis, integerrimis. *Necker method.* 216. n. 27.

Bryum pendulum, serpilli folio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 416. t. 53. fig. 81.

In nemoribus umbrosis fossis subhumidis frequens. Vere.

Variat pedunculis solitariis & aggregatis, & furculo fructificante erecto, sterili repente.

970. *MNIUM cuspidatum* furculo subsimplici, foliis ovatis acutis ferratis; thecis nutantibus oblongis: operculis convexis.

Mnium serpillifolium β. cuspidatum. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 467.

Bryum cuspidatum capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis ovatis acutis ferratis. *Schreb. spicil.* 84. n. 1049.

Bryum polymorphum furculo reptante pennato: capitulifero erecto; simplici, foliis mucronatis ferratis. *Necker method.* 218. n. 29.

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 413. t. 53. f. 79.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens. Vere.

Variat furculis sterilibus reptantibus & erectis, apice ramosos emittens furculos; fructificantibus fetis solitariis ac aggregatis. Folia mucrone donata sunt.

971. *Mnium roseum* furculo simplici prolifero, foliis oblongis acutis; thecis nutantibus oblongis: operculis convexis.

Mnium serpillifolium γ. *proliferum*. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 468.

Mnium roseum furculis simplicibus & proliferis, foliis rosaceo congestis, lanceolatis, acutis, tenuissime argute crenulatis, pedunculis aggregatis. *Weiss. crypt.* 157.

Bryum roseum capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis lanceolatis acutis. *Schreb. spicil.* 84. n. 1048.

Bryum stellare roseum majus, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 411. t. 52. f. 77.

Im Grunewald, Jungfernheide, Papenberg & alibi locis umbrosis passim. Vere.

Surculi steriles non repentis.

972. *MNIUM ligulatum* furculo subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis ferrulatis, undulatisque; thecis nutantibus oblongis: operculis convexis.

Mnium serpillifolium δ. *undulatum*. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 468.*

Mnium undulatum furculis erectis, ramis fasciculatis, foliolis ellipticis, undulatis, argute dentatis, pedunculis aggregatis. *Weiss. crypt. 158.*

Bryum ligulatum capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis ferrulatis. *Schreb. spicil. 84. n. 753.*

Bryum dendroides. *Necker method. 218. n. 28.*

Bryum dendroides polycephalon, phyllindis folio undulato pellucido, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc. 410. t. 52. f. 76.*

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald, prope Tegel & alibi in pratis frequens. Vere.

Variat furculis simplicibus & apice ramosis.

973. *MNIUM caespitium* furculis subramosis, ramis brevissimis, foliis lanceolatis apice setaceis; thecis ovatis nutantibus: operculis convexis.

Bryum caespitium antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 480.*

Bryum

Bryum caespititium foliis lanceolatis acuminatis, nitidis, stipite subradicali, capitulis ovatis obtusis. *Necker method.* 228. n. 40.

Bryum pendulum ovatum caespititium pilosum-que seta bicolori. *Dill musc.* 396. t. 50. f. 66.
In der Jungfernheide, Thiergarten & alibi in locis graminosis ficcis frequent. Martio, Aprili.

KOEHLREUTERA. *Hedwig musc.* 2. p. 95.

♂—♀. *Mascul. flos* disciformis. *Peristoma extern.* dentibus 16. apice cohaerentibus obliquis: *intern.* cilia totidem membranacea plana.

974. KOEHLREUTERA *hygrometrica* furculo subsimplici, foliis oblongis acuminatis, thecis ovatis nutantibus: operculis planis.

Mnium hygrometricum acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 460.

Bryum hygrometricum acaule, capitulis turbina-
tis, obtusis siccitate tetragonis, seta arcuata,
primordialibus aggregatis. *Necker method.*
221. n. 31.

In fossis umbrosis humidis abunde. Martio.
Aprili.

WEBERA. *Hedwig musc.* 2. p. 95. n. 22.

♀. *Peristoma extern.* dentibus 16. acuminatis: *intern.* membranaceo carinato, cum & absque ciliis.

975. *WEBERA pomiformis* furculo ramoso, foliis lineari-lanceolatis seta terminatis, imbricato-patulis; thecis sphaericis: operculo plano.

Bryum pomiforme antheris erectis sphaericis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 473.*

Bryum pomiforme furculo erecto, capitulis lateralibus globosis. *Necker method. 208. n. 19.*

Inter *Charlottenburg & Spandau* in colle ovariam versus rarius. *Vere.*

976. *WEBERA pyriformis* furculo subsimplici foliis linearibus; thecis pyriformibus nutantibus: operculis conicis.

Webera pyriformis caule simplicissimo, foliis perichaetii capillaribus longissimis recurvis, capsula pyriformi. *Hedwig stirp. I. fascicul. 1. p. 5. t. 3.*

Mnium pyriforme antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, floribus femineis setiferis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 464.*

In der *Jungfernheide* rarius. *Junio.*

977. *WEBERA nutans* furculo simplici, foliis ovato-lanceolatis conniventibus; thecis cylindraceis: operculis conicis mucronatis.

Webera nutans foliis lanceolatis, capsulis oblongis nutantibus. *Hedwig stirp. I. fascicul. 1. pag. 9. tab. 4.*

Bryum nutans foliis lanceolatis subulatis, capsulis urceolatis cernuis, operculo conico. *Schreb. spicil. 81. n. 1043.*

In der Jungfernheide & alibi passim. Majo.
Junio.

RUXBAUMIA. *Lin. gen.* 1307.

♂ — ♀. *Mascul. flos discoides. Peristoma extern. dentibus 16. truncatis; intern. membranaceo plicatum.*

978. *BUXBAUMIA aphylla* furculis foliisque nullis; theca ovata dimidiata: operculo conico obliquo.

Buxbaumia aphylla. Lin. syst. ed. R. 4. p. 453.

Buxbaumia caulescens bulbo villis tecto. *Schmidel diff. de Buxb. 25. n. 1.*

In sylvis acerosis declivis & fossis exsiccatis. e. g. in der Jungfernheide, prope Tegel & alibi frequens. Per hyemem.

979. *BUXBAUMIA foliosa* furculo nullo, foliis linearibus obtusis; theca sessili ovata dimidiata: operculo conico obliquo.

Buxbaumia foliosa acaulis, capsula subsessili, foliis cincta. *Lin. jun. Diff. Method. muscillast. 33. tab. 1. f. 4. a. b.*

Buxbaumia sessilis. Schmidel Diff. de Buxb. 26. n. 2.

Bryum hallerianum acaule, capitulis sessilibus, foliis extimis patentibus obtusis: intimis erectis mucronatis. *Necker method. 233. n. 44.*

Sphagnum acaulon maximum foliis in centro ciliaribus. *Dill. musc. 253. t. 32. f. 13.*

Webera diphyscium. Ehrhart hanoev. Magaz. 1779.

17. Stück pag. 257.

In ericetis der Jungfernheide rarius. Hyeme.

Folia perichaetii aristata.

FONTINALIS. Lin. gen. 1306.

♂ — ♀. Mascul. flos gemmiformis. Peristoma extern. dentibus 16, intern. reticulatum.

980. FONTINALIS antipyretica furculo ramoso vago, foliis lanceolatis laxè imbricatis; thecis subcylindricis: operculis planis mucronatis.

Fontinalis antipyretica foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. Lin. *lyst. ed. R.* 4. p. 451.

Hypnum antipyreticum furculis trifariis, capitulis subsessilibus axillaribus; primordialibus oblongis teretibus. *Necker method.* 191. n. 48.

In aquis hinter Spandau passim.

Rarius cum thecis.

MEESIA. *Hedwig musc.* 2. p. 97. n. 25.

♀ — ♂ — ♀. Mascul. flos disciformis. Peristoma extern. dentibus 16. curtis; intern. reticulatum.

981. MEESIA longifeta furculo ramoso, foliis lanceolatis acutis carinatis patulis; thecis obliquis oblongo-cylindricis: operculis conicis.

Meesia longifeta foliis ovato-lanceolatis patulis; theca cernua in pedunculo praelongo: operculo conico. *Hedwig stirp.* I. fasc. 3. pag. 56. tab. 21. 22.

Mnium

Mnium triquetrum foliis trifariis parulis, subulato-lanceolatis carinatis. *Lin. spec. II. p. 1578.* (exclusis synonymis ac varietatibus.) *Pollich pal. 3. p. 70.* (optima descriptio, ast synonyma falsa.)

In turfosis humidis, *in der Jungfernheide* haud procul venatorem *Philipp* frequens, & prope *Spandau* passim. Majo. Junio.

982. *MEESIA uliginosa* furculo subsimplici, foliis oblongo lanceolatis obtusis; thecis obliquis pyriformibus: operculis conicis umbilicatis.

Meesia uliginosa foliis lineari ligulatis, obtusis, capsula pyriformi cernua. *Hedwig stirp. I. fasc. 1. p. 1. t. 1 & 2.*

Bryum trichodes antheris erectiusculis: ore ciliato absque annulo, pedunculo longissimo. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 478.*

In der Jungfernheide rarius. Majo.

983. *MEESIA nutans* furculo subramoso, foliis ovatis acutis; thecis pyriformibus nutantibus: operculo convexo.

Mnium triquetrum γ. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 469.*

Bryum triquetrum γ. *Huds. angl. 2. p. 491.*

Bryum palustre complicatum rubens, capsulis turbinatis pendulis. *Dill musc. 406. t. 51. f. 74.*

Cum *Marsilea* natante, & *Leskia* marchica ad *Spandau* in ligno natante putrido. Junio.

B. HEPATICI.

JUNGERMANNIA. *Lin. gen.* 1313.♂—♀. *Capsula* 4 valvis. *Semina* filo instructa.* *Frondibus pinnatis secundis.*

984. JUNGERMANNIA *asplenoides* frondibus simpliciter pinnatis, foliolis ovatis subciliatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 503.*

Jungermannia foliis pinnatis, subrotundis, serratis, apice floriferis. *Hall. helv. n. 1868.*

Lichenastrum asplenii facie, pinnis laxioribus. *Dill musc. 482. t. 69. f. 5.*

In den Papenbergen rarius.

Capsulas nondum vidi.

985. JUNGERMANNIA *lanceolata* frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis, apice floriferis, foliolis integerrimis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 504.*

Jungermannia foliis pinnatis ovatis confertis, ex apice florifera. *Hall. helv. n. 1871.*

Lichenastrum trichomanis facie minus, ab extremitate florens. *Dill musc. 486. t. 70. f. 10. e.*

In fossis exsiccatis in der Jungfernheide & versus Tegel passim. Vere.

986. JUNGERMANNIA *bidentata* frondibus simpliciter pinnatis, foliis bidentatis; capsulis terminalibus.

Jungermannia *bidentata* frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 505.

Jungermannia bidentata furculis procumbentibus ramosis, apice floriferis, foliis ovatis bicuspidatis, stipulis lanceolatis quadridentatibus. *Schreb. spicil.* 104. n. 1081.

Im *Thiergarten*, *Jungfernheide* & alibi in fossis exsiccatis frequens.

987. *JUNGERMANNIA bicuspidata* frondibus simpliciter pinnatis, foliis bicuspidatis, medio capsuliferis.

Jungermannia bicuspidata frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 505.*

Jungermannia bicuspidata furculo procumbente, foliis distichis quadratis bidentatis, stipulis nullis. *Schreb. spicil.* 105. n. 1082.

Cum praecedenti in fossis frequens.

* * *Frondibus imbricatis.*

988. *JUNGERMANNIA complanata* furculis repentibus: foliis inferne auriculatis duplicato imbricatis, ramis aequalibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 509.*

Jungermannia complanata furculo reptante, foliis subrotundis serie duplici ordinatis, subtus appendiculatis; vaginis ramorum plano truncatis. *Necker method.* 142. n. 21.

In fagorum truncis im *Thiergarten*, & alibi frequens. Hyeme & vere.

989. *JUNGERMANNIA dilatata* furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-im-

bricatis, ramis apice latioribus. *Lin. syst. ed.*

R. 4. p. 509.

Jungermannia dilatata furculo reptante imbricato, foliis serie duplici orbiculatis: ramorum apice latiusculo. *Necker method. 140. n. 19.*

In arboribus iunioribus *im Thiergarten* & alibi copiose. Vere.

990. *JUNGERMANNIA tamariscifolia* furculis decompositis apice floriferis, foliis subrotundis subtus auriculatis, stipulis ovatis emarginatis. *Schreb. spicil. 108. n. 1086.*

Jungermannia tamarisci foliis imbricatis serie duplici: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo majoribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 510.*

In fagorum truncis passim. Vere.

991. *JUNGERMANNIA platiphylla* furculis procumbentibus subtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 510.*

Jungermannia platiphylla furculo decumbente imbricato, appendicibus subtus ordine duplici cordatis acutis. *Necker method. 142. n. 22.*

In fagorum truncis *im Thiergarten* & prope *Spandau* rarius.

In hac & praecedenti specie capsulas haud vidi.

992. *JUNGERMANNIA pulcherrima* furculis erectiusculis confertis, foliis ovatis imbricatis subbifidis ciliatis. *Lin. jun. Diff. Method. musc. illustr. p. 35.*

Jun.

Jungermannia pulcherrima furculis erectiusculis, foliis duplicato imbricatis inferne auriculatis, ciliatis: ciliis articulatis. *Weber spicil. fl. goett.*

214.

Lichenastrum scorpioides pulchrum villosum.

Dill. musc. 811. t. 69. f. 3. (non optima.)

In der *Jungfernheide* inter muscos, praecipue inter *Dicranum scoparium* passim.

Nondum capsulas observavi.

*** *Acaules frondibus simplicibus.*

993. *JUNGERMANNIA epiphylla* acaulis, foliolo frondi innato. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 513.

Jungermannia epiphylla sublobata apice latior capitulo globofo: primordialibus frondosis obrufissimis marginalibus. *Necker method.*

127. n. 2.

Im *Grunewald* & *Jungfernheide* in fossis umbrosis subhumidis frequens. Aprili. Majo.

994. *JUNGERMANNIA pinguis* acaulis, fronde oblonga sinuata pinguis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 513.

Jungermannia foliosa lacera, ex oris florifera. *Hall. helv.* n. 1884.

Jungermannia pinguis sinuata, obtusiuscula ex lateribus capitulifera: primordialibus convolutis linearibus frondosis. *Necker method.*

126. n. 1.

Cum praecedenti in fossis, ast rarius, semper absque capsulis.

995. *JUNGERMANNIA furcata* acaulis; fronde lineari ramosa: extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 514.*

Jungermannia foliis linearibus dichotomis, inferne florifera. *Hall. helv. 1885.*

Jungermanni furcata lineari-ramosa, dichotoma basi capitulifera: primordialibus frondosis terminalibus. *Necker method. p. 128. n. 3.*

In fossis subudis inque arborum truncis in *der Jungfernheide* passim.

Semper absque capsulis vidi.

MARCHANTIA. Lin. gen. 1315.

♂—♀. *Receptaculum* peltatum inferne feminiferum. *Cyathi* vivipari.

996. *MARCHANTIA polymorpha* foliis obtuse lobatis; receptaculis planis, orbiculatis.

Marchantia polymorpha calyce communi decemfido. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 515.*

α. Receptaculis decem vel duodecimfidis, laciniis liberis, linearibus.

Marchantia stellata pileus laciniatus: laciniis teretiusculis, apice dilatatis, sub quibus globuli pilosi. *Scop. carn. ed. 2. n. 1354.*

Lichenis fontani majoris, & domestici minoris Varietates. *Dill. musc. p. 523. 527. tab. 76. fig. 6. E. F. Tab. 77. fig. 7. B. C. E.*

β. Receptaculis decemfidis, laciniis conjunctis, oblongis, obtusis.

Marchantia umbellata pileus planus, crenulatus, sub quo globuli imberbes. *Scop. carn. ed.* 2. n. 1355.

Lichenis fontani majoris, & domestici minoris Varietates umbellatae. *Dill. musc.* 523. 527. *tab.* 76. *fig.* 6. A. B. C. D. *tab.* 77. *fig.* 7. A. D. Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald, prope Tegel & alibi, in fossis humidis umbrosis copiose. Hyeme & vere.

Celeber. Scopoli varietates nostras α & β . distinguit, sed ut videtur una in alteram sensim transeat.

ALGAE.

a. Terrestres.

RICCIA. *Lin. gen.* 1317.

♂ — ♀. *Capsulae* subrotundae in superficie frondis.

997. RICCIA *crystallina* frondibus superficie papillofis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 519.

Riccia fronde reticulata aequabili, lobis denticulatis, obtusis, simplicibus, & cordatis. *Hall. helv.* n. 1896.

Lichen palustris, rutae folio. *Dill. musc.* 355. t. 78. f. 12.

Locis humidis in via versus Pancko passim. Vere.

998. RICCIA *glauca* frondibus glabris canaliculis bilobis obtusis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 520.

Riccia fronde sulco divisa, lobis bifurcatis, lobulis lanceolatis obtusis. Hall. helv. 1897.

Lichen minimus, foliis venosis bifariam, vel trifariam dividendo progredientibus. Dill. musc. 533. t. 78. f. 10.

In der Jungfernheide versus Tegel rarius. Autumnno.

999. *RICCIA fluitans* frondibus dichotomis lineari-filiformibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 520.*

Riccia fluitans fronde dichotoma lineari-ramosa, plana: primordialibus obtusis. *Necker method. 41. n. 1.*

Lichenastrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. Dill. musc. 231. t. 74. f. 47.

Prope Tegel in palude bei der Schencke frequens. Vere & autumnno.

ANTHOCEROS. Lin. gen. 1318.

♂—♀. *Capsula linearis bivalvis. Semina dissepimento adhaerentia.*

1000. *ANTHOCEROS punctatus* frondibus sinuatis, crispis punctatis.

Anthoceros punctatus frondibus indivisis sinuatis punctatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 521.*

Anthoceros foliis minoribus, magis laciniatis. *Dill. musc. 476. t. 68. f. 1.*

In fossis umbrosis im Thiergarten passim. Martio.

1001. *ANTHOCEROS laevis* frondibus sinuatis laevibus.

Antho-

Anthoceros laevis frondibus indivisis sinuatis laevibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 522.*

Anthoceros laevis fronde sinuata integra obtusa. *Necker method. 44. n. 3.*

Anthoceros foliis majoribus, minus laciniatis. *Dill. musc. 476. t. 68. f. 2.*

Cum praecedenti eodem tempore.

PELTIGERA.

Receptaculum seminum oblongum peltiforme.

1002. *PELTIGERA aphtosa* fronde obtuse lobata, superne verrucosa, inferne alba villosa.

Lichen aphtosus coriaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 544.*

Lichen aphtosus fronde lobata repente supra verrucata: peltis oblongis marginalibus adscendentibus. *Necker method. 80. n. 46.*

In der Jungfernheide rarius. Hyeme.

1003. *PELTIGERA canina* fronde obtuse lobata, subtus venoso-villosa, peltis oblongis adscendentibus.

Lichen caninus coriaceus repens lobatus, obtusus planus subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 535.*

α. *Lichen caninus* fronde simplici obtusa sinuato-lobata, subtus venoso-villosa: peltis ovalibus adscendentibus. *Necker method. 79. n. 44.*

β. Lichen rufescens fronde lobata obtusa, avenia margine sinuata subtus villosa, peltis subrotundis. *Necker method.* 79. n. 45.

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald & alibi copiose. α. rarius. Hyeme.

Offic. Musci canini herba.

α. superne venosa; β. vero absque venis superne est. Num specie differunt?

LICHEN. *Lin. gen.* 1319.

Receptaculum seminum subrotundum subconvexum, saepius marginatum, scutiforme.

* *Crustacei.*

1004. LICHEN *aurantiacus* leporosus, albidocinereus, scutellis aurantiacis. *Hoffmann lich.* n. 55. *Lightfoot scot.* 2. p. 810. n. 19.

In sepibus, truncisque arborum, praecipue Populi tremulae. Passim omni tempore.

Crusta in nostro vix conspicua cinerea.

1005. LICHEN *subfuscus* crustaceus albicans, scutellis subfuscis: margine cinereo subcrenato. *Hoffmann lich.* 51. n. 67. t. 5. f. 3. *Lin. spec. pl.* 2. p. 1601.

β. minor crusta subcinerea, scutellae margine albo integerrimo. Hoff. l. c.

γ. crusta cinerea scutellae lutescens tenuissime marginatae. Ibid. l. c.

In truncis fagorum im Thiergarten, Falkenhagen & alibi frequens. Omni tempore.

1006. *LICHEN* *ater* crustaceus albicans rugosus, scutellis atris margine albo subcrenato. *Huds. angl. ed. 2. p. 530. n. 32. Hoffmann lich. n. 68.*

Lichen subfuscus crustaceus albicans, scutellis nigris: iunioribus arceolatis cavis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 530.*

In fagorum cortice, inque lapidibus magnis passim. Omni tempore.

1007. *LICHEN* *pallefcens* crustaceus albicans, scutellis pallidis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 529.*

In arborum cortice praecipue salicum copiose.

Crusta grisea tenuissima. Scutellae juniores convexae virides, postea pallide flavescentes, denique fuscae planae. *Celeber. Schreber* hanc speciem cum *murali* suo conjungit, a quo tamen longe diversus. In *L. murali* crusta semper margine foliacea est, ast in hac specie nunquam foliola marginalia observantur. Longissime ab illo differt *Lichen pallidus* & *pallefcens Hoffmanni*.

1008. *LICHEN* *angulosus* crustaceus albidus, scutellis confertis albidis in tubercula demum abeuntibus. *Schreb. spicil. 136. n. 1137.*

In arborum cortice frequens.

Scutellae admodum confertae, ut mutua pressione angulosae videantur.

1009. *LICHEN* *androgynis* crustaceus albicans, tuberculis pulverulentis, scutellis pallidis; margine

gine albo, crenulato-pulverulento. *Hoffmann lich.* n. 70. t. 7. fig. 3.

In arborum truncis in den Papenberg & prope Falkenhagen rarius. Hyeme.

Crusta obscure grisea tuberculis & scutellis obfita. Tubercula subpedunculata albidocinerea pulverulenta. Scutellae spadiceae margine griseo crenulato, juniores margine crassiore integro.

** *Crustacei imbricati.*

1010. *LICHEN candelarius* crustaceus flavus, scutellis luteis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 528. *Hoffmann lich.* n. 72. t. 9. f. 3.

Lichen fulvus fronde subrotunda: germinante asperiuscula, primordialibus nudis crustaceo-pulverulentis. *Necker method.* 51. n. 12.

In tectis, muris antiquis, lapidibus, sepibusque frequens.

1011. *LICHEN muralis* imbricatus flavo-virescens, scutellis concoloribus demum lutescentibus: margine pallido. *Schreb. spicil.* 130. n. 126. *Hoffmann lich.* n. 81. t. 11. f. 1.

In asseribus, trabibus, tectis, tegulis, lapidibusque copiose.

Interdum crusta marginalis foliacea evanescit, & tunc *Lich. pallescenti* simillimus, verumtamen figura orbiculari facillime distingendus.

1012. *LICHEN granosus* imbricatus: foliolis oblongis lobatis, incisis, cinereis, laevibus, scutellis

tellis nigris margine crenulato. *Schreb. spicil.*
128. n. 1122.

In salicibus aliisque arboribus ad *Spandau* passim.
Scutellae in disco confertae, & acervatae, juniores margine tumido, adultiores margine crenato, granulae griseae saepius inter illas, interdumque in margine scutellarum ipso observantur.

1013. *LICHEN crispus* imbricatus; foliis lobatis truncatis crenatis atro viridibus, scutellis concoloribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 533.*

Lichen crispus gelatinosus, foliis imbricatis lobatis truncatis crenatis atroviridibus, scutellis crenulatis. *Schreb. spicil.* 127. n. 1121.

Lichen murorum fronde imbricata: frondulis eximis latioribus obtuse crenatis, scutellis concoloribus. *Necker method.* 85. n. 53.

Locis nudis circum quercus magnas in *der Jungfernheide* rarius. Hyeme & vere.

Madidus gelatinosus est, siccus vero calcarens.
Scutellae badiae.

*** *Imbricati foliacei.*

1014. *LICHEN stellaris* imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 535.*

β. laciniis angustioribus scutellis cinerascens.
γ. pulverulentus.

In arborum truncis ramisque, & asseribus frequens. Hyeme.

1015. *LICHEN pulverulentus* imbricatus; foliolis lobatis crenatis obtusis viridibus, polline confersis, scutellis nigris margine crenatis. *Screb. spicil.* 128. n. 1123.

In truncis arborum praecipue salicum inque sepibus frequens.

Celeber. Hoffmann cum *L. omphalode* perperam conjunxit.

Scutellae nigrae pulvere griseo tectae, margo crenulatus pulverulentus.

1016. *LICHEN centrifugus* imbricatus, foliolis obsolete multifidis laevibus albidis centrifugis, scutellis rufo fuscis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 531.* *Hoffmann lich.* n. 95. t. 10. f. 3.

Lichen centrifugus fronde germinante pulverulenta, subrotunda subtus villosa-atra: frondulis interioribus centrifugis. *Necker method.* 99. n. 67.

β. fronde pulverulenta viridi.

In lapidibus terminalibus majoribus *hinter Spandau* rarius.

1017. *LICHEN caperatus* pallide viridis, rugosus, margine undulatus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 342.*

Lichen caperatus fronde juniore supra rugosiuscula: germinante pulverulenta, frondulis extremis laevibus, latioribus obtusis. *Necker method.* 95. n. 64.

In truncis quercuum *im Thiergarten* & alibi passim. Vere.

Scutellas rarissime observavi, semel unicam vidi, color illius erat spadiceus, ceterum iis praecedentis speciei similis.

1018. *LICHEN quercinus* frondibus obtuse lobatis glaucis glabris; scutellis badiis margine crenato. Dill. 5

Sub ramulis quercuum annosarum *im Thiergarten* & prope *Tegel* rarius. Hyeme & vere.

Frons oblonga, subimbricata, glabra, albogrisea, vel glauca, plana, ligno arcte adpressa, lobi bifidi obtusissimi & brevissimi; frons subtus nigerrimis atque brevissimis radiculis dense obsita. Scutellae in disco frequentes, ad marginem versus parciore, badiae planae, marginatae, orenatae. TAB. VII. fig. 13.

Non confundendus cum *Lichene querno Dicksoni*. Similis *Licheni Burgessii* a quo differt;

1) scutellis sessilibus nudis.

2) fronde adpressa adiaphana.

a *Lichene saxatili* differt:

1) fronde adpressa, nec lacunosa.

2) margine scutellarum crenato.

1019. *LICHEN saxatilis* imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis badiis, *Lin. syst. ed. R. 4. p. 572.*

Lichen saxatilis fronde lacunata laevi scutellifera: germinante asperiuscula, primordialibus pulverulentis. *Necker method. 90. n. 59.*

Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum lacunofum & cirrhosum. *Dill. musc. 188. t. 24. f. 83.*

In arboribus copiosissime, rarius in lapidibus.
Scutellae rarissime reperiuntur.

1020. *LICHEN physodes imbricatus*, laciniis angustis apice inflatis; scutellis pedicellatis.

Lichen physodes imbricatus: laciniis subinflatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 534.

Lichen physodes fronde scutellifera laevi: frondulis subtubulosis apice dilatiusculis fariniferis.

Necker method. 91. n. 60.

Lichen laciniatus β . *physodes*. *Weiss. crypt. 57.*

In arborum truncis frequens. Hyeme.

Diversissimus a praecedenti:

1) laciniis apice inflatis.

2) scutellis pedicellatis, quae in praecedenti sessiles.

1021. *LICHEN parietinus imbricatus*, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 534.*

Lichen fronde rugosa, rotunde lobata, flava concolore. *Hall. helv. n. 2021.*

In arborum truncis, sepibusque copiosissime.

1022. *LICHEN olivaceus imbricatus*, foliolis lobatis nitidis olivaceis, scutellis crenatis. *Schreb. spicil. 131. n. 1128.*

Lichen olivaceus imbricatus: foliolis lobatis nitidis lividis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 530.*

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus verrucosis. *Dill. musc. 184. t. 24. f. 78.*

β . pulverulentus.

In arboribus passim.

1023. *LICHEN pallus* imbricatus, foliolis lobatis olivaceis, scutellis integerrimis. *Schreb. spicil.* 131. n. 1127.

Lichen pullus fronde laevi scutellifera: germinante distorta, primordialibus granulosis. *Necker metnod.* 94. n. 63.

Lichenoides olivaceum scutellis laevibus. *Dill. musc.* 182. t. 24. f. 77.

In ramulis arborum frequens. Hyeme.

Ab hac specie satis diversi sunt: *Lichen pullus* *Jacq. musc.* v. 2. t. 9. f. 3. & *Lichen pullus* *Lichtfoot scot.* v. 2. p. 825. n. 37.

1024. *LICHEN hispidus* foliaceus laciniatus albidus: laciniis apice obtusis inflatis, ciliatis; scutellis nigris sessilibus.

Lichen hispidus foliaceus laciniatus albus: laciniis adscendentibus obtusis pilosis, scutellis sessilibus. *Schreb. spicil.* 126. n. 1120.

Lichen terellus. *Scop. carn. ed.* 2. n. 1406.

Lichen ciliaris β . *albidus.* *Weiss. crypt.* 63.

In truncis arborum, fruticum, inque sepibus asseribus, trabibusque frequens. Hyeme.

Apices foliorum semper tumidi pulverulenti ciliati. Variat ciliis albis & nigris. Scutellae nigrae margine integro griseo.

**** *Foliacei erecti.*

1025. *LICHEN ciliaris* foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 535.

In arboribus copiose,

1026. *LICHEN glaucus* foliaceus depressus glaber: margine crispo farinaceo. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 542.*

Lichen glaucus fronde laciniata, nitida, margine crispo-farinosa subtus atra: punctis scutelliformibus brunneis. *Necker method. 100. n. 69.*

Lichenoides endiviae foliis crispis & splendentibus. *Dill. musc. 192. t. 25. f. 96.*

In betularum truncis rarius.

1027. *LICHEN fraxineus* foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunofus glaber, scutellis subpedunculatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 540.*

Lichen fraxineus fronde oblonga, erecta utrinque lacunata scutellataque: scutellis sessilibus & stipitatis. *Necker method. 105. n. 75.*

In arboribus, praesertim salicibus copiose.

1028. *LICHEN calicaris* foliaceus erectus ramosus lacunofus glaber, scutellis terminalibus, apicibus reflexis corniculatis.

Lichen calicaris foliaceus erectus linearis ramosus lacunofus convexus mucronatus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 539.*

Lichen rostratus mas. *Scop. carn. ed. 2. n. 1382.*

In arborum truncis passim.

Variat frondibus minoribus tenuissimis subtus albicantibus, sed facile scutellis albidis planis a *Lichene prunastri* distingendus.

1029. *LICHEN farinaceus* foliaceus erectus compressus ramosus: verrucis marginalibus farinosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 539.*

Lichen lacunofus, complanatus, ramis acutissimis, orbiculis farinosis marginalibus frequentissimis. *Hall. helv. n. 1981. Lichen rostratus femina. Scop. carn. ed. 2. n. 1382.*

In pinibus aliisque arboribus frequens.

Nunquam scutellas vidi, semper tubercula farinosa ad latera frondis observavi. *Celeber. Scopoli* non male cum praecedenti conjunxit.

1030. *LICHEN prunastri* foliaceus erectus lacinia-
tus, subtus candidus; scutellis fuscis concavis.

Lichen prunastri foliaceus erectiusculus lacunofus: subtus tomentosus albus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 541.*

β. margine albo verrucoso.

In arboribus copiose. Vere.

Rarius scutellas vidi.

1031. *LICHEN furfuraceus* foliaceus erectus, lacinia-
tius, subtus niger pulverulentus, apicibus
abidis; scutellis fuscis concavis.

Lichen furfuraceus foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis subtus lacunosis atris.
Lin. syst. ed. R. 4. p. 538.

Lichen cornubus planiusculis ovatis, superne farinosis, inferne atris & reticulatis. *Hall. helv. n. 1976.*

β. totus pulverulentus.

In arboribus frequens, rarius cum scutellis. Vere & autumno.

Aetate ex toto pulverulentus fit, & apices albescunt.

1032. *LICHEN pulmonarius* foliaceus laciniatus obtusus glaber; supra lacunofus: subtus tomentosus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 537.*

Lichen pulmonarius foliaceus, laciniatus, repens supra reticulato-lacunofus; scutellis sparsis. *Scop. carn. 1. p. 101. n. 32. ed. 2. n. 1392.*

Im Thiergarten & prope Tegel passim, in den Papenbergen frequens.

Offic. Pulmonariae arboreae Herba.

***** *Umbilicati.*

1033. *LICHEN carneus* umbilicatus laevis, superne carneus lacunofus, inferne niger.

Sub annosarum quercuum ramulis *im Thiergarten*, prope *Tegel* & *in den Papenbergen* passim. Hyeme & vere.

Uberiorem descriptionem dedi *in den Beschaeftigungen der Berliner Gesellschaft Naturforsch. Freunde 7 Theil* cum incone.

Scutellas nondum vidi, sed tubercula ut in aliis umbilicatis observavi.

Aqua conspersus gelatinofus fit, & colorem fuscescentem induit.

***** *Filamentosi.*

1034. *LICHEN plicatus* filamentofus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 558.*

Usnea

Ufnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. musc.*
56. t. 11. f. 1.

In den Papenbergen & Brifelang passim, absque
scutellis.

1035. *LICHEN floridus* filamentosus ramosus
erectus, scutellis radiatis. *Lin. syst. ed. R. 4.*
p. 561.

Lichen floridus fronde ramosa erecta tereti solida
apice scutellifera: scutellis ciliatis. *Necker me-*
thod. 69. n. 27.

β. *Lichen hirtus* filamentosus ramosissimus erec-
tus, tuberculis farinaceis sparsis. *Lin. syst. ed.*
R. 4. p. 560.

Lichen hirtus fronde ramosissima lævi verruco-
fave tereti: verrucis farinaceis congestis spar-
sisque. *Necker method.* 69. n. 28.

Variet. α *im Grunewald*, prope *Tegel* & *in den*
Papenbergen frequens. β. *in pinibus* sepibus-
que copiose.

Offic. (Ufneae carni humani Herba.)

1036. *LICHEN jubatus* filamentosus: axillis com-
pressis. *Lin. syst. ed. R. 4.* p. 559.

Lichen barbatus, pendulus, filamentis nigris
prolixis. *Hall. helv.* 1968.

Ufnea jubata nigricans. *Dill. musc.* 64. t. 12. f. 7.

In pinibus laricibusque im Thiergarten & in der
Jungfernheide passim. Vere.

Sentellae miutissimae nudae.

1037. *LICHEN chalybeiformis* filamentosus ramifus divaricatus decumbens implicato-flexuosus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 560.*

Lichen fruticosus diffusus, caulibus vagis; flexuosis, rigidis, teretibus. *Hall. helv. 1969.*

Usnea rigida horsum vorsum extensa. *Dill. musc. 66. t. 13. f. 10.*

In arborum truncis in der Jungfernheide & Grunewald passim.

1038. *LICHEN hippotrichodes* filamentosus teres niger apice divisus.

Lichen hippotrichodes teres capillaris, niger, subsimplex, extremitatibus divisus. *Weber spicil. 232. n. 266.*

Lichen setosus filamentosus simplex subcompressus nigricans, tuberculis globosis acuminatis atris.

Leyss. halens. 1171.

Locis depressis im Thiergarten, Jungfernheide in Pinuum foliis dejectis copiose.

Tubercula nondum vidi.

1039. *LICHEN radiciformis* filamentosus, teres, ramosissimus, glaber, radiciformis. *Lin. jun. Diss. method. musc. illust. 37.*

Lichen radiciformis longissimus ex fusco nigricans glaber radiciformis. *Weber spicil. 282.*

n. 267.

α. ramis teretibus.

β. ramis planis.

Sub falicum aliorumque arborum cortice putrescente versus Spandau passim. Vere.

1040. *LICHEN subterraneus* filamentosus, ramosus, teres, albidus, versus basin lutescens, & ubi adhaeret rubro fucatus. *Beschaestig. der Berl. Gesellschaft Naturf. Freunde. 6. Band. p. 156. t. 1. f. 2.*

Infra terram, praecipue solo arenoso, in Glosfatarum (Lepidopterorum) chrysalidibus putrescentibus. Vere.

Difficile dictu an Lichen, an forsan Byssi species? Num *Byssus radiciformis* Scopoli idem? certe simillimus.

Huic generi omnes Lichenes *Linnei* scutelliferi adnumerantur.

CLADONIA. *Wiggers primit. 90.*

Receptaculum feminum in tuberculum elevatum.

Corpus fistulosum, saepius ramosum.

* *Scyphiferae.*

1041. *CLADONIA coccifera* scyphifera simplex tuberculis coccineis.

α. *Lichen cocciferus* scyphifer simplex integerri-
mus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 550.

Coralloides scyphiforme, tuberculis coccineis.

Dill. musc. 82. t. 14. f. 7.

β. *Lichen cornucopioides* scyphifer simplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Lin. syst. ed. R.*

4. p. 951.

Coralloides scyphiforme: marginibus radiatis & foliatis. *Dill. musc. 85. t. 14. f. 9.*

Im Thiergarten, Jungfernheide, Grunewald & alibi frequens. Hyeme & vere.

Offic. (Musci pyxidati herba. f. Herba ignis.)

1042. *CLADONIA polymorpha* scyphifera subsimplex, tuberculis fuscis.

α. *Lichen pyxidatus* scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 551.*

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill. musc. 79. t. 14. f. 6. A. B. C.*

β. *Lichen pyxidatus* prolifer, β. caule simplici, calyce turbinato: centro simpliciter prolifero. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 552.*

Coralloides scyphiforme tuberculis fuscis. *Dill. musc. 79. t. 14. f. 6. D. F. G. H. I. L. M.*

γ. *Lichen fimbriatus* scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 552.*

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus serratis. *Dill. musc. 84. t. 14. f. 8. 9.*

δ. *Lichen cornutus* scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus integris. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 553.*

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill. musc. 90. t. 15. f. 14.*

In der Jungfernheide, Thiergarten, Hasenheide, Grunewalde &c. copiose. Vere, hyeme & autumno.

1043. *CLADONIA radiata* scyphifera subramosa, radiata, tuberculis fuscis.

Lichen

Lichen radiatus scyphifer subramosus, cylindraceus, elongatus, scyphis inaequaliter dentatis radiatisque. *Schreb. spicil.* 122. n. 1114.

Coralloides scyphiforme cornutum. *Dill. musc.* 92. t. 15. f. 16.

Im Grunewald & Jungfernheide passim. Vere.
Rarissime tubercula vidi.

1044. *CLADONIA foliacea* scyphifera: scyphis simplicibus, foliis multifidis, subtus candidis.

Lichen foliaceus foliis adscendentibus multifidolaciniatis, subtus niveis scyphiferis: scyphulis conicis brevissimis. *Schreb. spicil.* 122. n. 1115.

Lichen foliaceus foliis suberectis laciniatis crispis scyphiferis, scyphis brevissimis conicis. *Huds. angl. ed.* 1. p. 457. n. 62.

Lichen pyxidatus *δ. foliaceus*. *Huds. angl. ed.* 2. p. 552. n. 86.

In der Jungfernheide, Hasenheide, inque collibus arenosis ad *Schoeneberg*, inter *Pancko & Gesundbrunnen* alibique passim. Vere.

Tubercula nondum observavi. Folia semper subtus candida, scyphi simplicissimi minuti.

1045. *CLADONIA gracilis* scyphifera dichotomoramosa, tuberculis fuscis.

Lichen gracilis scyphifer ramosus denticulatus filiformis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 553.

Coralloides scyphiforme ferratum elatius, caulibus gracilibus glabris. *Dill. musc.* 88. t. 14. f. 13.

In der Jungfernheide rarius. Vere.

** *Fru.*

* * *Fruticulosae.*

1046. *CLADONIA rangiferina* fruticulosa, ramosissima glauca, ramulis nutantibus.

Lichen rangiferinus fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 554. β. sylvaticus.*

In sylvis arenosis e. g. im *Thiergarten*, *Hasenheide*, *Grunewald*, *Jungfernheide* &c. copiose. Vere.

1047. *CLADONIA uncialis* fruticulosa, virescens dichotomo-ramosa, apicibus acutis.

Lichen uncialis fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis, *Lin. syst. ed. R. 4. p. 555.*

Coralloides perforatum minus molle & tenue. *Dill. musc. 99. t. 16. f. 22.*

Inter praecedentem frequens. Vere.

1048. *CLADONIA aculeata* fruticulosa, fusca, compressa, ramosissima, diffusa, aculeata.

Lichen aculeatus foliaceus diffusus compressus ramosissimus; ramulis furcatis spinulosis. *Schreb. spicil. 125. n. 1119.*

Coralloides fruticuli specie fuscum spinosum. *Dill. musc. 112. t. 17. f. 31.*

In der *Jungfernheide*, *Hasenheide*, inque collibus arenosis ad *Schoeneberg* frequens.

Semper absque tuberculis.

1049. *CLADONIA paschalis* fruticulosa ramosa, crusta obducta, tuberculis fuscis.

Lichen paschalis fruticulosus solidus tectus foliis crustaceis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 557.*

Coral-

Coralloides crispum & *botryoides alpinum*. *Dill. musc.* 114. t. 17. f. 33,

In collibus arenosis ad *Schoeneberg* passim, im
Grunewald frequens.

1050. *CLADONIA subulata* fruticulosa ramosa apicibus simplicibus subulatis.

Lichen subulatus fruticulosus sudichotomus, ramis simplicibus subulatis, *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 556.

Coralloides corniculis longioribus & rarioribus. *Dill. musc.* 102. t. 16. f. 26.

In der *Jungfernheide* & *Grunewald* passim.

1051. *CLADONIA botrytes* fruticulosa, subramosa, tuberculis terminalibus sphaericis flavo-brunneis maximis.

Lichen botrytes subramosus, ramulis fungulo luteo-fuscescente terminantibus. *Hagen lich.* 121. n. 64. t. 2. f. 9.

In den *Papenberg*en rarius. Hyeme.

Fere omnium elegantissima tuberculis maximis. Variat stipite simplici ac ramoso, altitudine sesquiunciali ad uncialem, immo semiuncialem usque.

VERRUCARIA. *Wiggers.*

Receptaculum feminum elevatum verruciforme.

* *Stipitatae.*

1052. *VERRUCARIA Beomyces* crusta glauco-virescens tuberculis carneis stipitatis.

Lichen

Lichen Beomyces leporosus albicans, tuberculis stipitatis carneis. *Lin. suppl. pl.* 450. *Hoffmann lich.* 45. t. 8. f. 3.

In der Jungfernheide & Grunewald passim. Hyme. Vere.

1053. *VERRUCARIA fungiformis* crusta glauco-virescens, tuberculis fuscis stipitatis.

Lichen fungiformis crusta e glauco virescens; tuberculis stipitatis constanter fuscis. *Weber spicil.* 196. n. 252. *Hoffmann lich.* n. 46. tab. 8. fig. 2.

In der Jungfernheide rarius. Vere.

Tubercula multo minora sphaerica, quae in praecedenti planiora.

** *Sessiles.*

1054. *VERRUCARIA Icmadophila* crusta glauco-virescens, tuberculis planis carneis sessilibus.

Lichen Icmadophila leporosus cinereus, tuberculis sessilibus planis carneis. *Lin. suppl. pl.* 450.

In der Jungfernheide rarius. Vere.

Tubercula interdum brevissime stipitata.

1055. *VERRUCARIA Elveloides* crusta virescens, tuberculis convexis, aetate concavis.

Lichen elveloides crustaceus glauco virescens, tuberculis sessilibus, planis, adultioribus undulatis. *Weber spicil.* 186. n. 243.

α. tuberculis aurantiacis.

β. tuberculis rubicundis.

In

In falicum truncis ad *Spandau* rarius. Autumno. Diversissima a praecedenti tuberculis minoribus aetate concavis. Ad terram istam hic nondum observavi, sed in rupibus terra tectis in *Thuringia* tuberculis paullo majoribus fuscescentibus hanc speciem saepius vidi. Crusta semper tenuissima, in arboribus laete virens, ad terram glauco-virescens.

1056. *VERRUCARIA sanguinea* cinereo-virescens, tuberculis atris.

Lichen sanguinarius leporosus cinereo-virescens, tuberculis atris. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 525.*

• *Lichen limitatus* crusta glauca aut cinereo-virens; linea marginali, repanda, nigra. Tubercula piurima nigra. *Scop. carn. ed. 2. n. 1370.*

β. crusta vix conspicua, tuberculis nitidis nigris. In arborum cortice copiose, β. in lapidibus passim.

Perperam sanguinea dicitur, ob tubercula intus sanguinea.

1057. *VERRUCARIA nigra* crusta atra, tuberculis planis concoloribus.

Lichen niger leporosus ater, tuberculis subrotundis concoloribus. *Lin. suppl. pl. 449. Hudf. angl. ed. 2. p. 524. n. 4. Hoffmann lich. n. 26. tab. 3. f. 6. (non optima.)*

In lapidibus coemeteriorum, praecipue in code passim. Vere.

1058. *VERRUCARIA fuscoatra* crusta fusca, tuberculis planis atris.

Lichen fuscoater leporosus fuscis, tuberculis atris.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 525.

In coemeteriorum lapidibus sparsim. Vere.

Crusta grumosa brunneo fusca, tubercula convexa planiuscula atra.

1059. *VERRUCARIA pertusa* crusta albicans, tuberculis impressis atris.

Lichen pertusus leporosus: verrucis subteffellatis laevigatis pertusis, poro uno alterove cylindrico. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 524. Hoffmann lich.*

16. n. 18. t. 3. f. 4.

In arborum cortice passim. Hyeme.

Crusta albovirescens, tubercula impressa niger-rima.

1060. *VERRUCARIA faginea* crusta albicans, tuberculis planis farinosis concoloribus.

Lichen fagineus leporosus albus, tuberculis albis farinaceis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 526.*

β . crusta orbiculari, tuberculis minimis.

γ . crusta grisea tuberculis magnis concavis.

In fagis aliisque arboribus frequens.

1061. *VERRUCARIA tuberculosa* crusta orbicularis cinerea tuberculosa, tuberculis minimis fuscescentibus.

Lichen tuberculosus pulverulento crustaceus, verrucosus subcinereus. *Hoffmann lich. p. 9. n. 11.*

t. 2. f. 1.

In arborum truncis *in der Jungfernheide & Papenbergen* rarius.

1062. *VERRUCARIA rugosa* albicans, tuberculis minutissimis, in lineas & punctas confertas, dispositis.

Lichen rugosus leporosus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 525.*

In fagorum cortice frequens.

Tubercula nudis oculis invisibilia, per lentem vero oblonga videntur. Lineae atrae & punctae confertissimae.

1063. *VERRUCARIA scripta* albicans, tuberculis atris planis linearibus varie flexis.

Lichen scriptus leporosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 522.*

In truncis fagorum aliarumque arborum frequens. Lineae atrae, (Tubercula) ramosae & varie flexae, adhuc semine farctae convexae sunt, post emissionem vero illius medio sulco exaratae videntur.

1064. *VERRUCARIA hebraica* albicans, tuberculis planis linearibus apice divisis.

Lichen hebraicus leporosus albicans, lineolis nigris divaricatis. *Hoffmann lich. 13. n. 15. t. 3. f. 2. e. Lichtfoot scot. 2. p. 800. 1. a.*

In fagis & quercubus passim.

Crusta tenuissima albicans, lineolae apice divisae furciformes, atrae.

1065. *VERRUCARIA pulicaris* albicans tuberculis planis linearibus brevissimis.

Lichen pulicaris leporofus albicans lineolis nigris brevissimis simplicibus. *Hoffm. lich.* p. 14. n. 16. t. 3. f. 2. f. *Lichtfoot scot.* 2. p. 801. n. 1. 3.

In arborum truncis passim.

Crusta albonigricans.

1066. *VERRUCARIA typographica* albicans lineolis planis atris rectis.

In prunorum, cerasorum juniorum truncis.

Crusta oblonga tenuissima albovirescens.

Lineae atrae planae rectae absque ulla flexione.

TAB. VII. f. 14.

LEPRA, *Wiggers.*

Pulvis subtilissimus, per lentem a glebis varie formatis constans.

1067. *LEPRA antiquitatis* pulvis ater.

Byssus antiquitatis pulverulenta atra. *Lin. syst.* ed. R. 4. p. 595.

Lichen antiquitatis. *Hoffmann lich.* 1. t. 3. f. 5.

In muris asseribus, sepibus, tectis ubique fere.

1068. *LEPRA flava* pulvis flavus.

Lichen flavus pulverulentus flavus. *Schreb. spicil.*

139. n. 1145. *Hoffmann lich.* 2. n. 2. t. 1. f. 4.

Byssus candelaris pulverulenta flava ligna adnascens. *Lin. syst.* ed. R. 4. p. 596.

In sepibus truncisque arborum abunde.

1069. *LEPRA incana* pulvis incanus.

Byssus incana pulverulenta incana, farinae instar strata. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 596.*

Lichen incanus pulverulentus albus, glebulis rotundatis. *Schreb. spicil. 139. n. 1147.*

In der Jungfernheide ad terram inque fossis passim.

Pulvis post pluvias virescens, sicca vero tempestate albido-griseus, aetate paullo flavescens.

1070. *LEPRA lactea* pulvis candidus.

Byssus lactea pulverulento-crustacea albissima, *Lin. syst. ed. R. 4. p. 597.*

Lichen lacteus pulverulento-crustaceus, albiissimus. *Schreb. spicil. 139. n. 1148.*

In arborum truncis inque muscis frequens, Aetate grisea evadit.

1071. *LEPRA rubens* pulvis ruber.

Lichen rubens pulverulentus ruber. *Hoffm. lich. 4. n. 5. t. 1. f. 5.*

α. *Lichen croceus* pulverulentus croceus. *Schreb. spicil. 139. n. 1146.*

β. pulvis ruber sparsus in glebis majoribus.

In arborum cortice, sepibusque passim. β. in betularum epidermide.

1072. *LEPRA rosea* pulvis e glebis maximis sparsis roseis constans.

Lichen roseus pulverulentus conglomeratus roseus. *Schreb. spicil. 140. n. 1150.*

In cortice tiliarum, falicumque passim. e. g. ad
Schoeneberg, Pancko &c.

1073. *LEPRA botryoides* pulvis acervatim sparsus
 luteoviridis.

Byssus botryoides pulverulenta viridis. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 596.

Tremella botryoides pulverulenta viridis. *Schreb.*
spicil. 141. n. 1153.

Lichen botryoides. *Hagliche p. 40. n. 6.*

Ad terram in hortis frequens.

Color constans eluteo viridis. Glebae acervatim
 dispositae.

1074. *LEPRA viridis* pulvis laete viridis.

Lichen viridis pulverulentus viridis. *Schreb. spi-*
cil. 139. n. 1149.

In quercuum annosarum cortice inque sepibus
 passim.

Byssus. Lin. gen. 1324.

Lanugo per lentem filis innummeris constans.

1075. *Byssus Flos aquae* filamentis plumosis na-
 tantibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 593.*

In aquis frequens.

Num vera planta, aut putredine orta?

1076. *Byssus phosphorea* lanuginosa violacea lig-
 nis adnascens. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 594.*

In arborum truncis putridis, praecipue in quer-
 cu. Vere & autumnno.

1077. *Byssus velutina* filamentosa viridis: fila-
 mentis ramosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 594.*

Ad

Ad terram inque hortulanorum ollis frequens.
Vere & autumnø.

1078. *Byssus coriacea* perennis densissima albicans. *Schreb. spicil.* 144. n. 1161.

In quercuum truncis passim.

Aetate flavescit.

1079. *Byssus barbata* filamentis erectiusculis summitatibus ramosis subfastigiatis fulvis. *Huds. angl. ed.* 2. p. 606. n. 9.

Byssus arborea barbata fulvi coloris. *Dill. musc.* 9. t. 1. f. 19.

In truncis arborum putridis rarius.

1080. *Byssus candida* filamentis ramosissimis, ramis fasciculatis albidis. *Huds. angl. ed.* 2. p. 607. n. 10.

Byssus tenerrima villosa & elegantissima ramulosa. *Dill. musc.* 7. t. 1. f. 15.

In foliis dejectis quercuum putrescentibus, frequens.

Recens allii instar olet.

1081. *Byssus bombycina* lanuginosa albissima, filamentis longioribus implexis lignis adnascens. *Retz prod. fl. Scand.* p. 244. n. 1518.

Byssus floccosa evanida floccosa nivea. *Schreb. spicil.* 144. n. 1160. *Dill. musc.* 5. t. 1. f. 9.

In cellis ad trabes, asseres &c. passim.

1082. *Byssus sceptica* capillacea mollissima parallela fragilissima pallida. *Lin. syst. ed.* R. 4. p. 592.

Byffus tenerrima murina doliaris. *Dill. musc.* 6.
t. 1. f. 12.

In cellis, locisque suffocatis passim.

b. Aquaticae.

CONFERVA. *Lin. gen.* 1323.

Tubercula inaequalia, in fibris capillaribus longissimis.

* *Filamentis simplicibus, aequalibus, geniculis destitutis.*

1083. CONFERVA *rivularis* filamentis simplicissimis aequalibus longissimis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 587.

Conferva fluviatilis sericea vulgaris & fluitans.
Dill. musc. 12. t. 2. f. 1.

In der Spree versus Spandau beim Stern frequens.
Aestate.

1084. CONFERVA *fontinalis* filamentis simplicissimis aequalibus digito brevioribus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 587.

Conferva minima, byssi facie. *Dill. musc.* 14.
t. 2. f. 3.

In fossis passim, Aestate.

** *Filamentis ramosis aequalibus.*

1085. CONFERVA *bullosa* filamentis aequalibus ramosis, aëreas bullas includentibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 587.

Conferva palustris bombycina. *Dill. musc.* 18.
t. 3. f. 11.

In fossis paludibusque frequens. c. g. *im Thiergarten, Jungfernheide &c.* Aestate.

1086. *CONFERRA canalicularis* filamentis aequalibus basin versus ramosioribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 588.*

Conferva rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis. Dill. musc. 21. t. 4. f. 15.

In der Pancke frequens. Aestate.

*** *Filamentis anastomosantibus.*

1087. *CONFERRA reticulata* filamentis reticulato-coadunatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 589.*

Conferva reticulata. Dill. musc. 20. t. 4. f. 14.

In aquis stagnantibus, fossis, ad fluviorum litora copiose. Aestate.

**** *Filamentis nodosis.*

1088. *CONFERRA gelatinosa* filis ramosis moniliformibus: articulis globosis gelatinosis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 590.*

Chara batrachosperma caule ramoso filamentoso; ramis foliaceis capillaceis, in glomeres lubricos geniculatos articulatim circa caulem dispositis. *Weiss. crypt. 32. c. tab. aen.*

Conferva fontana nodosa, spermaris ranarum instar lubrica, major & fusca. Dill. musc. 36. t. 7. f. 42.

In der Pancke & in fossis limpidissimis passim. Aestate.

F U N G I.

AGARICUS. *Lin. gen.* 1325.

Capsulae in lamellas dispositae.

* *Acaules & dimidiati.*

1089. AGARICUS *quercinus* acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 607.

Agaricus coriaceus, durus, sessilis, squamosus & multiplex, lamellis ramosis, sinuosis & sibi invicem implexis. *Gled. method.* 134. n. 30. *Schaeffer fung.* 57.

In quercuum aliarumque arborum truncis emortuis frequens. Omni tempore.

Variat colore albido griseo, & albidus striis zonalibus variis. Lamellae semper albidae.

1090. AGARICUS *antiquus* acaulis fuscus, lamellis pallidioribus labyrinthiformibus.

Battara fung. t. 38. f. A. B. (*optima.*)

In asseribus truncisque putridis. Superne obscure fuscus glaber, absque striis zonalibus. Lamellae lutescentes ramoso sinuatae, inter se conjunctae, & anastomosantes.

Non confundendus cum *A. asserculorum Batschii*. *Schaeffer* 76, a quo differt lamellis flavescens & labyrinthiformibus, etiamque pileo superne fusco, nec zonis ornato.

1091. AGARICUS *pectinatus* acaulis coriaceus, lamellis simplicibus sinuatis. *Huds. angl. ed.* 2. p. 623. n. 48.

In

In arboribus rarius.

Lamellae tenuissimae albae.

1092. *AGARICUS alneus* acaulis lamellis bifidis pulverulentis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 607. Weigel observ. 41. ob. 35. t. 2. f. 6. (bona.)*

Agaricus sessilis squamosus, lobatus & villosus; lamellis dissectis. Gleditsch method. 134. n. 31.

In arboribus rarius. e. g. im Thiergarten, Jungfernheide.

1093. *AGARICUS depluens* acaulis albidus villosus lamellis fuscescentibus interruptis.

Agaricus depluens pileo dimidiato cano sericeo; lamellis subcarneis, fusco-rubellis, latis, laxis, quadruplici ordine digestis. *Batsch. fung. cant. 1. p. 167. t. 24. f. 122.*

In arborum truncis passim. Autumno.

1094. *AGARICUS lateralis* substipitatus, pileo albidulo laevi, lamellis subsimplicibus pallidis, stipite laterali. *Huds. angl. ed. 2. p. 624.*

Agaricum squamosum rufescens, pediculo donatum, subtus lamellis densis. Mich. gen. 123. t. 65. f. 7?

In arborum truncis emortuis frequens. Autumno. Vere.

Stipes brevissimus albidus, aetate lutescens planus. Pileus dimidiatus planus concolor. Lamellae fuscae dense tenues apice bifidae.

1095. *AGARICUS ochraceus* acaulis flabelliformis, supra pulvinatus ochraceus, lamellis albidis,

marginē cinerascētib. *Syst. ed. M.* 14. p. 977. n. 39. *Jacq. Miscel. vol. 2.* p. 110. t. 16. f. 2.

3. *Agaricum cespitosum*, fordide luteum, Cochlearis seu Spatulæ forma, glabrum. *Michel gen.* 123. n. 19. t. 65. f. 6.

7. *Agaricum cespitosum*, fulvum, Cochlearis seu Spatulæ forma, hirsutum. *Mich. gen.* 123. n. 20. t. 65. f. 5.

In arborum emortuarum truncis in den Papenbergē passim. Autumno.

** *Stipite annulato.*

1096. *AGARICUS fimetarius stipitatus*, pileo campanulato albo subsquamoso, lamellis nigricantibus, stipite albo fistuloso, annulo fugaci.

Agaricus fimetarius pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite fistuloso. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 604.

Agaricus Mitella pileo oblongo campanulato albo, floccis latiusculis, dense imbricatis, squamoso-squarroso; stipite subelongato, valido, albo, lamellis nigris. *Batsch fungi* 63. n. 65. *Schaeffer fung. tab.* 7. 8.

β. pileo albo minus squamoso striato, apice rubicundo, lamellis rufescentibus.

Agaricus ovatus cespitosus; pileo ovato striato; lamellis defluentibus; stipite cylindrico fistuloso, annulato, longo, annulo fugaci. *Scop. carn. ed. 1.* p. 23. n. 28. *ed. 2.* p. 425. n. 1479.

Agaricus Chamaeleo pileo oblongo campanulato albo caesio floccoso-squamoso, floccis distantibus, sparsis, flaventibus; lamellis nigro flaventibus; stipite subelongato valido albo. *Batsch. fung. 63. n. 64. Schaeffer fung. t. 46. 47.*

In cellis, pomariis, fimetis passim. Autumno.

Agaricus fimetarius Batschii, diversissimus a nostro & nova species.

1097. *AGARICUS campestris stipitatus*, pileo convexo squamato-albido, lamellis rufis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 601. Schaeff. fung. t. 310. 311.*

Agaricus pileolo amplo, hemisphaerico, fornicato; petiolo brevi, annulo permanente cincto. Gleditsch method. 115. n. 21.

β. *Agaricus candidus, pileolo fornicato, squamoso, petiolo annulato, cylindrico & crasso. Gleditsch method. 117. d.*

Agaricus pellitus pileo pallido cano, maculis magnis piloso-squamiformibus, extrorsum acutis, laxè sparsis, imbricato radicato, stipite crassiusculo, concolore, integro; lamellis subbrunneis. *Batsch fung. 55. n. 41. Schaeffer fung. t. 33.*

In hortis, locis cultis, suburbanis frequens, inque pratis & pascuis passim. Augusto ad Octobrem usque.

Locis siccis crescens esculentus, locis vero humidis fit nocivus.

1098. *AGARICUS fascicularis* stipitatus, pileo convexo luteo, lamellis virescentibus, stipite flavo (annulo fugaci.) *Huds. angl. ed. 2. p. 615. n. 20. Schaeffer fung. 49.*

Agaricus carneolus. Batsch fung. 83. n. 116.

- β. *Agaricus jenensis* pileo convexo-conico, luteo, medio ferrugineo: stipite elongato, lineari, valido, concolore subsquamuloso, volva pulverulenta, striata, adnata, brunnea; lamellis olivaceis. *Batsch fung. 83. n. 113. t. 7. f. 29.*

Ad arborum praecipue salicum putridarum truncos copiose. Autumno.

1099. *AGARICUS equestris* stipitato, pileo pallide flavo, disco obscuriore, lamellis sulphureis, annulo fugaci.

Agaricus equestris stipitatus, pileo pallido: disco stellatim luteo, lamellis sulphureis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 602. Schaeff. fung. t. 79. Sterb. fung. t. 21. fig. c.*

In pratis ad *Spandau* rarius. Autumno.

1100. *AGARICUS squarrosus* stipitatus, pileo umbonato lutescente, squamoso, squamis fuscis squarrosis, stipite infra annulum squarroso, lamellis pallidis.

Agaricus squarrosus pileo ferrugineo, squamulis piloso-furfuraceis revolutis, imbricato; stipite valido subclavato concolore, inferne usque ad volvam laceram reflexopatentem squamosam furfuraceo squarroso; lamellis cinereis.

Batsch

Batsch. fung. 86. n. 123. t. 8. f. 31. Schaeffer fung. 61. 80.

In den Papenbergern rarius. Autumno.

1101. *AGARICUS procerus* stipitatus annulo mobili, pileo convexo albido squamoso, squamis fuscescentibus, lamellis albis stipite bulbofo.

Agaricus procerus stipitatus, pileo hemisphaerico lacerato squamoso rufescente cinereo, lamellis albis, stipite longo, cylindrico acetabulo inferto. *Huds. angl. ed. 2. p. 612. Schaeff. fung. tab. 22. 23.*

Agaricus clypeatus stipitatus, pileo hemisphaerico viscido acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 603?*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi copiose. Autumno.

Esulentus sub nominē Buberitze.

1102. *AGARICUS Mappa* stipitatus, annulo fixo inverso, pileo planiusculo flavo, fusco variegato, lamellis albidis, stipite bulbofo volvato.

Agaricus Mappa pileo flavo cinerascēte, pallido, maculis inaequalibus fuscescentibus plerumque picto; stipite elongato lamellisq̃ue subconcoloribus albis. *Batsch fung. 57. n. 50. Schaeffer tab. 20.*

In der Jungfernheide passim. Autumno.

1103. *AGARICUS verrucosus* stipitatus pileo planiusculo fuscescente, albo maculato, lamellis albis, stipite bulbofo.

Agaricus verrucosus stipitatus, pileo convexo cinereo verrucoso, verrucis lamellisque albis, stipite basi bulboso. *Huds. angl. ed. 2. p. 613. Schaeffer t. 90. 91.*

In der Jungfernhede & ad Tegel rarius, versus Autumnum.

1104. *AGARICUS conspurcatus* stipitatus, pileo fordide albo, disco fuscescente squamoso, squamis concoloribus, lamellis ullis, annulo, stipiteque concolore.

Agaricus exiguus, candidus, pileolo in vertice papillato & squamis atrorufis lacero; lamellis candidis, petiolo fistuloso, crasso, brevi & annulato. *Gleditsch method. 130. b. & 129. a.*

Fungus minimus, pileolo in medio papillato, undique atro-rufescente, cute lacera & veluti squamosa, lamellis albis, pediculo vix fistuloso & annulato, medii coloris. *Micheli gen. 176. t. 78. f. 8.*

Cum praecedenti passim. Autumno.

Stipes uncialis.

1105. *AGARICUS muscarius* stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis, stipite volvato; apice dilatato basi ovato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 599. Schaeffer fung. t. 27.*

Agaricus imperialis. Batsch fung. 59. n. 55.

In sylvis copiose. Autumno.

** *Stipite nudo, pileo umbonato.*

1106. *AGARICUS giganteus* stipitatus, pileo infundibuliformi umbonato maximo albo, lamellis interruptis, stipite brevissimo crasso.

Agaricus giganteus stipitatus pileo maximo albo in medio depresso umbonato, stipite brevissimo. *Leysser fl. halens. 1213.*

In der Jungfernheide & Thiergarten passim. Autumno.

Omnium maximus, pileus diametro pedali, stipes vero nncialis.

1107. *AGARICUS lividus* stipitatus, pileo convexo livido, lamellis albidis, stipite longo albo. *Huds. angl. ed. 2. p. 616. Schaeffer 14.*

In den Papenbergern & alibi passim. Autumno & vere.

1108. *AGARICUS clypeatus* stipitatus, pileo hemisphaerico viscido acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo. *Huds. angl. ed. 2. p. 619. Schaeffer fung. tab. 52. fig. 7. 8. 9.*

In nemorosis humidis, lignisque putrescentibus frequens. Autumno.

Pileus fordide fuscescens margine striatus, umbone obscuriore. Lamellae albae, stipesque concolor.

1109. *AGARICUS aquosus* stipitatus, pileo campanulato obtuso fusco flavescente, lamellis atrogriseis, stipite fistuloso griseo villosus. *Huds. angl. ed. 2. p. 619. Schaeffer fung. t. 6.*

In

In truncis arborum putrescentibus frequens.
Autumno.

- IIIO. *AGARICUS conicus* stipitatus, pileo campanulato acuto striato livido nitido, lamellis albis, stipite fistuloso cinereo. *Huds. angl. ed.* 2. p. 620. *Schaeffer tab.* 52. f. 1-6.

In lignis putridis copiose. Autumno.

- IIII. *AGARICUS esculentus* stipitatus, pileo convexo argillaceo, stipite gracili fistuloso, ex albo fordide flavescente, lamellis albis. *Jacq. Miscel. vol.* 2. p. 103. t. 14. f. 4. *Murr. Syst.* 14. p. 976. n. 29. *Schaeffer fung.* t. 59?

In nemorosis etiamque in agrorum versuris haud infrequens. Vere.

Sub nomine *Kroesling* notus.

- IIII2. *AGARICUS alliaceus* stipitatus, pileo convexo opaco supra fusco subtus albo, stipite fistuloso nigro nudo. *Jacq. austr.* t. 82. *Murr. Syst. ed.* 14. p. 976. n. 26.

Agaricus plicatus stipitatus, pileo planiusculo margine luteo rufo, lamellis pallidioribus, stipite longo rufo. *Huds. angl. ed.* 2. p. 621. n. 43. *Schaeffer fung.* t. 99.

Im Thiergarten, Hasenheide & alibi frequens.
Autumno & vere.

Pileus fordide fuscus, interdum albicans; lamellae albidae; stipes niger tenuis, etiamque rufescens.

Sub nomine *Mouceron esculentus*.

- III3. *AGARICUS caesius* stipitatus, pileo albo glaucescente convexo oblongo, lamellis subramosis, stipite concolore substuloso.

Agaricus caesius griseo-caesius, semidiaphanus pileo laxo conico, stipite lineari elongato validiusculo, basi lanoso villosa, lamellis lanceolatis duplici, triplicive ordine digestis, pileo propriis. *Batsch. fung. cont.* I. p. 113. n. 94. t. 18. f. 94.

In foliis acerofarum arborum dejectis in der *Jungfernheide* rarius. Octobr. Novemb.

Minutus, altitudine 6 lineari.

- III4. *AGARICUS integer* stipitatus, pileo planiusculo rubro, lamellis albis integris aequalibus, stipite concolore.

Agaricus integer stipitatus, lamellibus omnibus magnitudine aequalibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 598. *Schaeffer fung.* t. 58 & 65, *malae figurae*.

Omphalomyces coccineus. *Baattra fung.* 37. t. 15. f. E. bona.

Im Thiergarten, *Jungfernheide* & alibi passim. Autumno.

*** *Stipite nudo, pileo absque umbone.*

- III5. *AGARICUS coccineus* stipitatus pileo hemisphaerico stipiteque substuloso coccineis, lamellis aurantiacis. *Murr. syst. ed.* 14. p. 975. n. 21. *Jacq. Misc.* v. 2. p. 106. *Schaeff. fung.* 302.

In der *Jungfernheide* rarius. Autumno.

- III 16. *AGARICUS violaceus* stipitatus, pileo fuscescente convexo vertice depresso; margine violaceo, lamellis violaceis, stipite caerulefcente.

Agaricus violaceus stipitatus, pileo rimoso: margine violaceo tomentoso, stipite caerulefcente, lana ferruginea. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 602.*
Schaeffer fung. t. 34.

In der Jungfernheide & Papenbergien infrequens.
Autumno.

- III 17. *AGARICUS farinaceus* stipitatus, pileo convexo, vertice subdepresso rubro violaceo, lamellis violaceis, stipite fuscescente.

Agaricus farinaceus stipitatus, pileo convexiusculo purpurafcente fusco, lamellis convexis distantibus incarnatis pulverulentis, stipite longo. *Huds. angl. ed. 2. p. 616. n. 26.*
Schaeffer fung. 13.

In der Jungfernheide frequens. Autumno.

Variat pileo fusco & rubro-violaceos, lamellis obscurioribus & pallidis.

- III 18. *AGARICUS Chantarellus* stipitatus, pileo infundibuliformi luteo lamellis venosis ramosis decurrentibus.

Agaricus Chantarellus stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 597.*

Schaeffer fung. t. 82. non optima figura.

In der Jungfernheide & versus Spandau passim.
Autumno.

Esculentus sub nomine *Pfefferling*.

1119. *AGARICUS deliciosus* stipitatus, pileo vertice depressio luteo-fuscescente, lamellis luteis subdecurrentibus, succo luteo farctis.

Agaricus deliciosus stipitatus, pileo testaceo: succo lutescente. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 600.*
Schaeffer fung. t. 11.

In sylvis ad Spandau & Coepnick frequens. Autumno.

Esculentus sub nomine *Reitzker* vel *Ritschke*.

1120. *AGARICUS cinnamomeus* stipitatus pileo convexo fusco, lamellis luteis, stipite concolore.

Agaricus cinnamomeus stipitatus, pileo sordide flavo, lamellis luteo-rufis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 602.* *Schaeffer fung. t. 4.*

In der Jungfernheide & Thiergarten passim.
Autumno.

1121. *AGARICUS striatus* stipitatus, pileo campanulato cinereo striato glabro, lamellis griseis margine crispis, stipite fistuloso. *Huds. angl. ed. 2. p. 617.* *Schaeffer fung. 17. 68.*

In ruderatis ad sepes passim. Autumno.

Pileus fuscescens. Lamellae aetate nigra. Stipes semper albus.

1122. *AGARICUS adustus* stipitatus, pileo campanulato striato, griseo, vertice fusco, lamellis albis, stipite fuscescente.

Agaricus adustus pileo convexo, conico, plicis latis, plicato-fulcato, fusco, marginem versus pallente-griseo; lamellis pallidis, stipiteque elongato lineari subconcoloribus. *Batsch fung.* 67. n. 70. *Schaeffer fung.* t. 32.

In lignis putrescentibus passim. Autumno.

1123. *AGARICUS variabilis* stipitatus, pileo subcampanulato fusco, striato, lamellis pallidioribus, stipite concolore.

Agaricus variabilis. *Batsch fung.* 67. n. 73. *Schaeffer fung.* t. 63.

Im Thiergarten & Jungfernheide passim. Autumno.

1124. *AGARICUS lignorum* stipitatus, pileo campanulato flavo fuscescente striato, lamellis griseis, stipite subulato albo.

Agaricus lignorum. *Scop. carn. ed. 2.* n. 1482. *Schaeffer fung.* 66.

In lignis putrescentibus passim.

1125. *AGARICUS piperatus* stipitatus, pileo planiusculo lactescente, margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 600. *Schaeffer fung.* t. 83.

Agaricus piperatus pileo concavo saepius lactescente, lamellis ramosis, stipite nudo cylindrico. *Scop. carn. ed. 1.* p. 33. n. 39. *ed. 2.* p. 450. n. 1550.

Agaricus pileo pulvinato integerrimo, & in centro profundius depresso, lamellis connexis, angustis & compactis; petiolo continuo, cylindrico & crasso. Gleditsch method. 97. n. 10.
 In pratis, pascuis &c. *im Thiergarten, Jungfernhede* alibique passim. Septemb. Octobr.

1126. *AGARICUS excavatus* stipitatus, pileo concavo albo, lamellis, stipiteque flavescentibus.

Agaricus pileo orbiculari integerrimo candido, in vertice concavo, lamellis cum petiolo dilute flavescentibus. Gleditsch method. 107. d. Leysser fl. hal. n. 1215.

In foliis dejectis sylvarum passim. Octobr. Novembr.

1127. *AGARICUS umbelliferus* pileo convexo, plicato membranaceo, tenero: lamellis remotis; stipite procero, capillaceo, nudo, lamellis concolore. *Scop. carn. ed. 1. p. 30. c. ed. 2. p. 457. n. 1571.*

Agaricus umbelliferus stipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis basi latioribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 605.*

In foliis dejectis in sylvis passim. Autumno.
 Pileus albus.

1128. *AGARICUS Androsaceus* stipitatus albus, pileo plicato membranaceo; stipite nigro. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 606.*

Agaricus pileo convexo plicato membranaceo; lamellis remotis; stipite nigro procero capil-

laceo nudo. *Scop. carn. ed. 1. p. 29. ed. 2. n. 1570.*

In der Jungfernheide in foliis dejectis pini sylvestris passim. Autumno.

1129. *AGARICUS rosellus* stipitatus, pileo planiusculo ochraceo, lamellis rubicundis, stipite concolore torto.

Agaricus rosellus pileo ochraceo, subcarneo; stipite solido fibroso torto; lamellis fulvello-roseis, majoribus stipiti adnatis. *Batsch fung. cont. 121. n. 99. t. 19. f. 99.*

In der Jungfernheide & Papenberg locis graminosis rarius. Autumno.

1130. *AGARICUS clavularis* stipitatus, pileo hemisphaerico glaucescente, lamellis concoloribus aequalibus, stipite bulboso.

Agaricus clavularis tener, subcaesius, pileo umbilicato, obsolete plicato; laminis paucis; stipite gracili, basi distincte bulbosa, bulbo confluyente dilatato. *Batsch fung. cont. 89. n. 81. t. 17. f. 81.*

In arborum praecipuo annosarum tiliarum cortice passim. Autumno.

Minutissimus fungus vix semiuncialis.

BOLETUS. Lin. gen. 1326.

Capsulae in pileo latentes, apice apertae.

* *Acaules & dimidiati.*

1131. *BOLETUS fomentarius* acaulis pulvinatus inaequalis obtusus, poris teretibus aequalibus glaucis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 608.*

In arborum truncis *in den Papenberg* infrequens. Omni tempore.

Stipes nullus. Pileus dimidiatus planus obtusus, superne cervinus pulverulentus fulcis concentricis inaequalis; inferne pallide griseus, margine albus. Pori aequales teretes.

1132. *BOLETUS igniarius* acaulis pulvinatus laevis, poris tenuissimis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 608. Schaeffer fung. t. 137. 138.*

In arborum truncis passim. Persistens.

Superne convexus griseus: margine lutescente; inferne albidus poris tenuissimis.

1133. *BOLETUS hepaticus* acaulis convexus sublobatus rufis laevis poris teretibus flavis. *Huds. angl. ed. 2. p. 625. n. 5. Schaeffer fung. 116-120.*

In arborum truncis passim.

Edulis.

1134. *BOLETUS fulvus* acaulis totus fulvus inaequalis, poris tenuissimis aequalibus teretibus. Agaricum durum, crassum, assulatum, Ilicibus innascens griseum. *Michel gen. 121. tab. 62.*

In arboribus vulgaris.

1135. *BOLETUS suberosus* acaulis pulvinatus laevis, poris acutis difformibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 608.*

In arborum truncis emortuis passim.

Pori inaequales flexuosi confluentes.

1136. *BOLETUS coriaceus* acaulis coriaceus convexus lobatus flavus laevis, poris tenuissimis. *Huds. angl. ed. 2. p. 625. n. 4. Schaeffer fung. t. 131. 132.*

In arborum emortuarum truncis.

1137. *BOLETUS versicolor* acaulis fasciis discoloribus, poris albis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 609.*

In arborum truncis copiose.

Color valde variabilis.

1138. *BOLETUS adustus* acaulis fuscescens margine nigro, poris tenuissimis reticulatis.

In truncis arborum putrescentibus frequens.

Gregarius durus minutus margine quasi adusto nigro. Pori tenues reticulati subplani.

1139. *BOLETUS suavcolens* acaulis totus albus, superne laevis, poris inaequalibus.

Buletus suaveolens acaulis, superne laevis, salicinus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 609. Enstin Diss. de Bolet. suaveol. Erlang, 1784. c. tab. (figura optima.)*

In arborum truncis passim.

Offic. (Fungus salicis.)

Odorem *Anisi* vel *Radicis Iridis florentinae* recens, praecique post pluvias spargit. Pori inaequales interdum confluentes.

1140. *BOLETUS Medulla panis* crustaceus albus effusus difformis. *Murr. syst. ed. 4. p. 977. n. 11. Jacq. Miscel. v. 1, p. 141. t. 11.*

In

In den Papenbergern ad arborum truncos passim.

1141. *BOLETUS Buglossum* acaulis utrinque granulato-papillofus, papillis poruliferis, superne convexiusculus carneus, inferne planus subalbidus, substantia fibroso-gelatinosa. *Retz. prod. fl. scand. 2. p. 250. n. 1576.*

Boletus lucidus stipitatus, pileo coriaceo-castaneo lucido sulcis circularibus, poris minutissimis albis, stipite laterali. *Curt. lond. 4. t. 224. Leyffer halsenf. n. 1245.*

In truncis arborum putridis in den Papenbergern rarius. Autumno.

Esculentus, prae aliis laudatur.

* * *Stipitati.*

1142. *BOLETUS perennis* stipitatus perennis pileo utrinque planiusculo. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 609. Schaeffer fung. t. 125.*

In der Jungfernheide infrequens.

Stipes apice attenuatus fuscus. Pileus planus superne fuscus, striis concentricis atro fuscis, disco cinereo; inferne fuscus, poris inaequalibus saepe confluentibus. Aetate fit infundibuliformis, & exsiccatu cinerascit.

1143. *BOLETUS luteus* stipitatus, pileo convexo viscido fusco, poris rotundatis flavis, stipite cylindrico annulato.

Boletus luteus stipitatus, pileo pulvinato subviscido, poris rotundatis convexis flavissimis,

stipite albido. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 610.*
Schaeffer fung. t. 114.

In der Jungfernheide, Spandauerheide & alibi
passim. Autumno.

Esulentus.

1144. *BOLETUS bovinus* stipitatus, pileo convexo pulvinato glabro, poris angulatis, stipite attenuato.

Boletus bovinus stipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compositis acutis: porulis angulatis brevioribus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 610. Schaeffer fung. t. 103. 104.*

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens.
Autumno.

Esulentus.

1145. *BOLETUS crassipes* stipitatus, pileo convexo glabro, poris subangulatis, stipite medio crassiore reticulato. *Schaeffer fung. t. 105. 107. 134.*

Iisdem locis passim. Autumno.

Diversissimus a praecedente, stipite medio crassiore.

Esulentus.

HYDNUM. Lin. gen. 1327.

Capsulae acuminatae prominentes.

1146. *HYDNUM imbricatum* stipitatum, pileo subconvexo squamoso; squamis imbricatis suberectis.

Hydnum

Hydnum imbricatum stipitatum, pileo convexo imbricato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 612. Schaeffer fung. t. 140.*

In der Jungfernheide rarius. Autumno.

Esculentum.

Stipes brevis crassus glaber fordide flavescens nunquam in medio, semper magis lateralis.

Pileus orbiculatus subconvexus saepius uno latere incisus, fordide flavus; squamis in centro imbricatis, apice reflexis; inferne capsulis acutissimis fordide flavis densissime obsitus.

1147. *HYDNUM repandum* stipitatum, pileo convexo rufo subtus albo, stipite ad basin incrassato.

Hydnum repandum stipitatum, pileo convexo laevi flexuoso. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 612.*

In den Papenberggen passim. Autumno.

Esculentum.

1148. *HYDNUM auriscalpium* stipitatum, pileo dimidiato hirsuto fusco, inferne albicante, stipite fusco.

Hydnum auriscalpium stipitatum, pileo dimidiato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 613. Schaeffer fung. t. 143.*

In strobulis pini sylvestris dejectis in der Jungfernheide, Papenberggen haud infrequens. Autumno. vere.

1149. *HYDNUM parasiticum* acaule arcuato-rugosum tomentosum. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 613?*

Echinus nigricans, squamis ellipticis, longissimis aculeis. *Hall. helv. n. 2318.*

In ligno putrido inque asseribus & trabibus frequens.

Lamina tenuis squamis apice divisis longis dense obsita, cum descriptione *Halleri* convenit, an Linneana species fit, me fugit?

1150. *HYDNUM gelatinosum* stipitatum gelatinosum, pileo dimidiato supraglaberrimo. *Murr. syst. 14. p. 978. Jacq. austr. v. 3. t. 239.*

Echinus crystallinus gelatinosus. Hall. helv. n. 2319.

In lignis putridis passim. Autumnno.

Saepe absque stipite.

1151. *HYDNUM coralloides* ramosissimum, candidum, aculeis longis terminalibus.

Hydnum coralloides stipes ramosus; ramis ultimis subtus echinatis. *Scop. carn. ed. 2. n. 1602.*

Clavaria ramosa; extremis ramulis teretibus, subulatis, recta deorsum descendentibus. *Scop. carn. ed. 1. p. 61. n. 5. Schaeffer fung. t. 142.*

Semel in ligno betulino, pro foco destinato istud vidi. Autumnno.

THAELAEPHORA.

Fungus inferne papillas loco foraminum vel lamellarum proferens.

1152. *THAELAEPHORA mesenteriformis* compli-
cata lacera scabra fusca. *Sterb. fung. t. 27.*
f. k?

In pinetis arenosis in der Jungfernhede passim.
Autumno.

Stipes fere nullus, toto hoc in genere. Laminae
contortae fuscae superne squamis concolori-
bus minutis obsitae, margine lacerae; externe
pulverulentae per lentem papillofcae. TAB.
VII. fig. 15.

1153. *THAELAEPHORA hirsuta* explanata, flava,
extus hirsuta.

An *Helvella pineti*. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 616?*

Helvella agaricus. *Withering brittan. 2. p.*
773.

In ligno putrido frequens. Persistens.

Agarico vel Boletto acauli similis, sed nunquam
poros vel lamellas vidi, loco vero eorum pa-
pillas observavi.

1154. *THAELAEPHORA glabra* explanata, laevis
fordide albida.

Helvella corrugata. *Withering brit. 2. p. 773?*

Marsilii de generat fungor. fig. 27, in nonnullis
cum nostra specie convenit.

In lignis putridis vulgaris.

PHALLUS. *Lin. 1328.*

Capsulae reticulatim dispositae.

1155. *PHALLUS esculentus* pileo ovato celluloso, stipite nudo rugoso. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 613. Schaeffer tab. 199.*

In sylvis circa *Berolinum* rarius, in foro interdum venalis exstat, sed locum natalem, specialem nondum scio. Vere.

Esculentus sub nomine *Spitz morchel*.

1156. *PHALLUS impudicus* volvatus stipitatus, pileo celluloso. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 614. Schaeffer fung. t. 196. 197. 198.*

In nemorosis umbrosis sub *Corylo avellana* ad *Pausin*, *Schoenewald hinter Spandau* & prope *Coepnick* passim. Autumno.

HELVELLA. Lin. gen. 1330.

Pileus plicatus. Capsulae latentes.

1157. *HELVELLA Mitra* stipite integro, pileo deflexo adnato rugoso brunneo.

Helvella Mitra pileo deflexo adnato lobato difformi. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 615. Schaeffer fung. t. 158. 160. 161.*

In sylvis prope *Spandau*, *Coepnick*, inque locis suburbanis &c. frequens. Vere.

Esculenta sub nomine *Morchel, Maurache*.

1158. *HELVELLA fulcata* stipite sulcato, rimoso, pileo plicato adnato crispo nigricante.

Elvela petiolata, lamina in formam capituli deorsum plicato-laciniata & crispa; petiolo fistuloso striato & rimoso, *Gleditsch method. 36.*

n. 1. *Michel gen. pl. 204. tab. 86. fig. 7.*
Schaeffer fung: tab. 154.

β. *Tota alba.*

Prope Spandau, in der Jungfernheide sparsim.

β. *rarius. Vere & autumnno.*

Esculenta.

CYATHUS. *Haller helv. 127.*

*Fungus cyathiformis intus capsulas lentiformes
 planas proferens.*

1159. CYATHUS *laevis* campanulatus externe vil-
 losus, interne laevis.

Peziza lentifera campanulata lentifera. *Lin. syst.*
ed. R. 4. p. 616.

*Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti feri-
 ceum. Michel gen. 222. t. 102. f. 1.*

*In ligno putrido im Thiergarten, ad terram in
 hortis alibique passim. Auctumno, vere.*

1160. CYATHUS *striatus* campanulatus externe
 hirsutus, interne striatus.

Peziza striata campanulata lentifera villosa, in-
 terne striata. *Huds. angl. ed. 2. p. 634. n. 2.*

*Cyathoides cyathiforme, obscurum externe hir-
 sutum interne plumbeum glabrum & striatum.*
Michel gen. 222. t. 181. f. 2.

Ad terram in hortis inque ligno putrido passim.
Autumno, vere.

1161. CYATHUS *cylindricus* cylindricus arhizus
 totus glaber.

Cya.

Cyathoides luteum crucibuliforme. Michel gen.
222. t. 102. f. 3.

Peziza crucibuliformis. Scop. carn. ed. 2. n. 1630.
In asseribus trabibusque putrescentibus in hortis
passim. Autumno, vere.

Peziza laevis Hudsoni a *Cyatho* nostro differt,
quod ventricosa sit, & figura *Schaefferi* no-
stram speciem haud exprimat.

PORONIA. *Gleditsch syst. n. 1217.*

Fungus patelliformis. Semina in superficie exter-
na per puncta minutissima ejaculans.

1162. PORONIA *Gleditschii.*

Peziza punctata turbinata truncata, disco puncta-
to. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 617.*

In stercore bovino prope *Spandau* & versus *Gru-
newald* passim. Hyeme.

*Fungus stipitatus: stipite fusco cylindrico. Pi-
leus orbiculatus utrinque planus, inferne fuscus,
superne albus, disco nigro punctato.*

PEZIZA. *Lin. gen. 1331.*

*Fungus saepius concavus, absque visibilibus
fructificationibus; Semina minutissima pulve-
ris instar, elastice explodens.*

1163. PEZIZA *cornucopioides* infundibuliformis,
disco patente sinuato punctato. *Lin. syst. ed.*
R. 4. p. 617.

α. fusca. *Schaeffer fung. t. 165.*

β. rufescens. *Schaeffer fung. t. 166.*

γ. monstrosa,

In den Papenbergen rarius. Autumno.

Semina in superficie externa ejaculans.

1164. *PEZIZA stipitata*, stipitata hemisphaerica, externe fusco hispida, stipite cylindrico. *Huds. angl. ed. 2. p. 636. Schaeffer fung. t. 167.*

In den Papenbergen rarius. Autumno.

Stipes subulatus fuscescens, hispidus. Pileus externe hemisphaericus hispidus albido-fuscescens, interne concavus glaber obscurior.

1165. *PEZIZA copularis* stipitata lutea, stipite brevissimo, campanulata margine crenata.

Peziza copularis globoso-campanulata: margine crenato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 618.*

Inter muscos *in der Jungfernheide* rarissima, Autumno.

1166. *PEZIZA lacera* fessilis campanulata albicans margine lacero. 2 430

In truncis putridis in den Papenbergen infrequens. Hyeme.

Semiuncialis campanulata externe albicans, interne flavescens gelatinosa, margo inaequaliter lacerus, laciniis acutis longis. TAB. VII. fig. 16.

1167. *PEZIZA cochleata* turbinata cochleata, interne aurantiaco coccinea, externe albicans.

Peziza cochleata turbinata cochleata. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 619.*

Fungoides auriculum judae referens, intus rufus, extus candicans, & quasi farinosum.

Vaill. parif. 57. t. 11. f. 8.

Im Thiergarten passim. Autumno.

Semina externa in superficie, ut in *Peziza cornu-copioide* ejaculans.

1168. *PEZIZA crenata* turbinata margine crenulata interne fusca externe albido pulvere conspersa.

Peziza cochleata β . *Batsch fung. cont. 123. n. 157. t. 28. f. 157.*

In truncis putridis & ad terram passim *in der Jungfernheide*. Autumno.

Differt a praecedenti:

- 1) margine crenato.
- 2) colore interne fusco, &
- 3) quod semina interne ejaculet.

1169. *PEZIZA leporina* coriacea spathulata concava fusca externe pallida.

Peziza leporina sessilis; elongata, spathulata, spathiformis, erecta; inferne cylindrica, angustior, semiclausa; superne dilata oblonga, lateraliter patens tota, ore deorsum in rimam manubrii decurrente. *Batsch fung. 117. n. 6. Schaeffer fung. t. 156.*

In den Papenberg passim. Autumno.

1170. *PEZIZA rhizophora* hemisphaerica convexa fusca sessilis, inferne albida concava, radicibus simplicibus teretibus donata.

Phallus

Phallus acaulis convexus glaber; subaggregatus; ovalis vel rotundatus, crassius; supra fuscus, infra albus, radicibus disci pluribus, crassis, albis. *Batsch fung.* 129. n. 1. *Schaeffer fung.* t. 153.

In pinetis arenosis im *Grunewald* & *Jungfernheide* passim. Autumno.

Singularis fungus, ob radices crassas.

1171. *PEZIZA scutellata* sessilis plano-convexa, margine piloso.

Peziza scutellata plana; margine convexo piloso. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 618.*

In der *Jungfernheide* in truncis putrescentibus, ad pontem destructum. Junio in autumnum usque.

Sessilis plano-convexa violaceo-coccinea, margine integro, pilis longis nigerrimis obsito.

1172. *PEZIZA nivea* sessilis nivea; planata tota, vel margine angusto cincta. *Batsch fung.* 117. n. 1. t. 12. f. 56.

In truncis putridis. Autumno passim.

1173. *PEZIZA cinerea* sessilis plana diaphana cinerea.

Peziza cinerea sessilis, cinerea, reflexa, margine crispo sinuato lobato. *Batsch fung. cont.* 197. n. 137. tab. 26. f. 137.

In truncis arborum putridis passim. Autumno.

1174. PEZIZA *calyciformis* stipitata convexa, intus
fulcescens extus cinerascens.

Peziza calyciformis pileo ochraceo, glabro, sub-
tus cum stipite carneo-furfurosa. *Batsch*
fung. cont. 195. n. 135. t. 26. f. 135.

In arborum truncis, ramulisve dejectis putref-
centibus. Autumno.

Variat colore albo saepissime.

1175. PEZIZA *flava* sessilis plana orbiculata
flava.

In truncis arborum putridis frequens. Au-
tumno.

Paullo major, quam *P. cinerea*, tota plana absque
margine elevato, flava.

CLAVARIA. *Lin. gen.* 1332.

Fungus glaber saepius claviformis, absque visi-
bilibus fructificationibus.

* *Indivisae.*

1176. CLAVARIA *lignea* simplicissima claviformis
dura nigra.

In lignis putridis *in den Papenberg* rarissime.
Autumno.

Figura externa cum *Cl. pistillari* a *Michelio* tab.
87. f. 1. depicta exacte convenit, utinullo mo-
do diversa videatur, at substantia ejus lignea
immo durissima est, interne alba externe ni-
gerrima. Num fortassin varietas?

Distinguent, qui recentem *Clavariam pistillarem*
examinarunt.

1177. *CLAVARIA ophioglossoides* clavata integerima compressa obtusa. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 620.*

In der Jungfernheide bei den Rehbergen frequens. Aestate & autumnno.

Semper nigerrima coriacea compressa.

1178. *CLAVARIA parasitica* clavata, nigra, simplicissima, stipite tereti, corpore oblongo tereti obtuso papilloso. p. 230

Im Thiergarten beim Hofjaeger passim. Autumnno.

Singularis fungus semper *Lycoperdoni* mox descripturo insidens. Simillima *Clavariae ophioglossoidi* differt tamen substantia molliori, duratione minori, & quod nunquam compressa & corpus semper papillosum fit. Aetate apice excavatur. *TAB. VII. fig. 17.*

1179. *CLAVARIA granulata* clavata alba simplicissima; teres, corpore fistuloso, radice granulata nigra. p. 230

Clavaria gyrans stipite elongato, capillari; clavula terminali sub-elongata, cylindrica, termino utrinque oblongata. *Batsch. fung. cont. 235. n. 164. t. 28. f. 164.*

In fruticetis umbrosis in der Jungfernheide rarius. Autumnno.

Omniū minutissima alba. Stipes capillaris, corpus clavatum cylindricum. Radix capil-

laris granulata, granulae sphaericae nigrae.

TAB. VII. fig. 18.

1180. *CLAVARIA simplicissima*, simplicissima flava subulata, teres, apice fusca.

Iisdem locis passim. Autumno.

1181. *CLAVARIA cespitosa* cespitosa, caulibus simplicissimis, basi nonnunquam unitis, oblongo-clavatis farctis aquose luteolis. *Murr. syst.* 14. p. 980. *Jacq. Misc.* v. 2. p. 98. t. 12. f. 2.

In graminosis in der Jungfernheide passim. Autumno; vere.

** *Ramosae.*

1182. *CLAVARIA Hypoxylon* ramosa cornuta compressa. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 621. *Weigel observ.* 50. t. 3. f. 5.

In lignis putridis im Thiergarten, Jungfernheide, Papenberg & alibi frequens. Autumno. vere.

Nigra apicibus albicantibus.

1183. *CLAVARIA coralloides* ramis confertis ramissimis inaequalibus. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 621. *Schaeffer fung.* t. 175. 177.

Clavaria caule crassissimo, ramis innumeris, cespitosis, breviter dentatis. *Hall. helv.* n. 2201.

Im Thiergarten, Jungfernheide & alibi frequens. Autumno.

Esculenta.

1184. *CLAVARIA muscoides* ramosa inaequalis corniculata, apicibus acutis.

Clavaria muscoides ramis ramosis acuminatis inaequalibus luteis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 622.*
Schaeffer fung. t. 173.

Inter Muscos *in der Jungfernheide* passim.

1185. *CLAVARIA cornea* subdivisa minuta fuscescens.

Clavaria cornea. Batsch fung. cont. 229, n. 161.
t. 28. f. 161.

In lignis putridis *in den Papenbergern* passim.
Hyeme.

Minuta, 3 linearis, fuscescens apice bifido obtuso obscuriore. Interdum simplex etiamque trifida.

PUCCINIA. *Michel. gen. 213.*

Corpus cylindraceum feminibus caudatis radiatim positis, elastice exsiliantibus, farctum.

1186. *PUCCINIA simplex* corpore cylindrico simplicissimo obtuso.

Puccinia non ramosa major pyramidata. *Michel. gen. 213. tab. 92. f. 1.*

In arborum truncis praecipue Pruni armeniacae rarius. Autumno.

STEMONITIS. *Gleditsch syst. n. 1219.*

Fungus volva discendente filis reticulatis factus, seminaque nuda elastice ejaculans.

1187. *STEMONITIS typhina* stipite nigro capitulo cylindrico fusco rubente. *Wiggers primit.* 110. n. 1154.

Clathrus nudus stipitatus, capitulo oblongo axi longitudinali adnato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 615.*

Clathroidastrum. Michel g. n. 214. tab. 94.

In arborum truncis putridis rarius. Autumno.

1188. *STEMONITIS fusca* stipite nigro, capitulo cylindrico fusco maturitate fisso.

Clathrus pertusus. Batsch fung. cont. 263. t. 30. fig. 176.

In truncis arborum putridis in den Papenberg
& Jungfernheide haud infrequens. Autumno.

Capitulum semper fuscum multo minus & acutiusculum, aetate finditur.

1189. *STEMONITIS crocata* tota crocea stipitata capitulum cylindricum obtusum rudimento volvae circumdatum.

Clathrus crocatus capitulo cylindrico oblongo, cute fugaci, confecto e lana stipata, molli, elastica, pulvere fusco croceo referta; insistente caliculi circumscisso terminali stipitis validiusculi una cum calyculo, fulvo-crocei, nitidissimi & striati. *Batsch fung. cont. 265. n. 177. t. 30. fig. 177.*

In ligno putrido & inter muscos in den Papenberg passim.

- Rudimento calyciformi a praecedentibus distincta.

1190. *STEMONITIS pyriformis* sessilis pyriformis
volva difficile discedente tota fulva.

Arcyria pyriformis gregaria sessilis pyriformis
flava. *Wiggers primit.* 110. n. 1153.

Trichia gregaria sessilis, pyriformis, flava. *Hall.*
hist. n. 2168. t. 48. f. 7.

In truncis arborum putridis *in der Jungfern-*
heide infrequens. Autumno.

Nostra fere duplo major, quam ista in opere *Cel.*
Halleri depicta. Volva difficile discedit.

LYCOPERDON. *Lin. gen.* 1333.

Fungus feminibus filo instructis interne ex toto
repletus.

* *Solida, subterranea absque radice.*

1191. LYCOPERDON *cervinum* globosum solidi-
usculum lacerum centro farinifero radice de-
stitutum. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 623.

Ad radices arborum infra terram *in der Jung-*
fernheide passim.

Offic. Tubera cervina.

Cortex glaber nec asper.

1192. LYCOPERDON *scabrum* subterraneum fus-
cescens, scabrum subglobosum.

Infra terram *im Thiergarten beim Hofjaeger* pas-
sim. Autumno, hyeme.

Oblongum vel subglobosum mox magnitudine
Nucis Juglandis mox Pruni spinosae fructus,
tusco-luteum, scabrum, per lentem squamis
angulosis truncatis obsitum. Squamae figura

valde irregulares, & mutua pressione interdum planae, vel compressae, interdum tri-vel quadrangulae, apex earum semper truncatus, in junioribus obtusus. Substantia interna nigra est, & e glebis oblongis ut in L. cervino composita; aetate deliquescere videtur. TAB. VII. fig. 19.

Radix *Clavariae parasiticae* n. 1179. certo non est, nam interdum absque Clavariis hunc fungum observavi, & cui bono substantia nigra glebosa, qua cum farcta est, si radix esset? Quod adhuc magis, eum radiceis partem non esse, refutat, est: quod Clavaria nunquam cum radiculis substantiam penetret; semper radiculae externam superficiem circumdant.

Differt a *Lycoperdone Tubere* squamis truncatis multo minoribus, saepius planis; quae in *Tubere* cristallis similes fere semper pentagonae & magis dissitae sunt.

** *Pulverulenta, radicata supra terram.*

1193. *LYCOPERDON Bovista* subrotundum: lacerto-dehiscens. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 623.*

α. maximum glabrum. *Schaeffer tab. 191.*

β. oblongum subscabrum minor. *Schaeffer fung. t. 186.*

γ. oblongum verrucosum. *Schaeffer fung. 189.*

δ. oblongum maculatum. *Schaeffer fung. 190.*

ε. elongatum stipitatum. *Schaeffer fung. 187.*

In pascuis, versuris, pratis ficcis, collibus, & ad
margines nemorum copiose. Autumno.

Offic. Crepitus lupi. Fungus chirurgorum.

1194. *LYCOPERDON muricatum* sessile pyriforme,
superficie externa muricata, subrotundo ore.

Lycoperdon muricatum sessile globoso-pyriforme,
depressum, totum pyramidibus validis
acutioribus polyedris subdistantibus muricatum. *Batsch fung.* 145. n. 4. *Schaeffer fung.* t. 84.

In graminosis, versuris agrorum passim. Autumno.

1195. *LYCOPERDON gemmatum* stipitatum subglobosum, aculeis acutis dense obsitum.

Lycoperdon gemmatum stipitatum subglobosum,
utrinque subdepressum, pyramidibus validis
distantibus muricatum; stipite subelongato,
valido, incrassato, etiam muricato, distincto,
lineari. *Batsch. fung.* 147. n. 14. *Michel gen.* t. 97. f. 1.

In der Jungfernheide passim. Autumno.

1196. *LYCOPERDON pyriforme* stipitatum subglobosum umbonatum glabrum, subrotundo ore.

Lycoperdon pyriforme stipitatum, globosum, acuminatum, scabrum, stipite incrassato confluyente, acumine aptero dehiscens. *Batsch fung.* 147. n. 12. *Schaeffer fung.* t. 185.

In nemoribus passim. Autumno.

1197. *LYCOPERDON pedunculatum* stipite longo, capitulo globoso glabro: ore cylindrico integerrimo. *Lin. Syst. ed. R. 4. p. 625.*

Prope *Spandau* & ante portam *Halensem* rarius. Autumno.

1198. *LYCOPERDON equinum* stipitatum stipite cylindrico, capitulo sphaerico pulverulento circumscisso.

In ungulis equorum putridis frequens.

Album magnitudine tuberculi *Verrucariae Beomycis*. Stipes fere cylindricus. Capitulum exacte globosum pulvere albido rectum circumscissum. Semina fusca. *TAB. VII. fig. 20.*

*** *Stellata.*

1199. *LYCOPERDON stellatum* volva multifida capitulo subrotundo sessili ore integro.

Lycoperdon stellatum volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. *Lin. Syst. ed. R. 4. p. 624. Michel gen. t. 100. fig. 4. 6.*

Im *Grunewald* & *Papenberg* rarius. Autumno.

1200. *LYCOPERDON Geaster* volva multifida, capitulo oblongo sessili acuminato, ore piloso. *Batsch fung. 151. n. 22. Michel gen. t. 100. fig. 1.*

In der *Jungfernheide* rarius. Autumno.

1201. *LYCOPERDON pedicellatum* volva multifida, capitulo oblongo acuminato pedicellato, ore fimbriato. *Batsch fung. 151. n. 25. Michel gen. t. 100. f. 2.*

In der Jungfernheide rarius. Autumno.

**** *Parasitica.*

1202. *LYCOPERDON Epidendrum subglobosum* purpurascens ore lacero, feminibus rubris.

Lycoperdon Epidendrum cortice farinaque purpurea. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 626.*

In der Jungfernheide versus Spandau in truncis arborum passim. Vere & autumno.

1203. *LYCOPERDON vesparium* gregarium cylindricum rufescens, ore integerrimo subrotundo, feminibus rufis.

Lycoperdon vesparium gregarium, cellis dense connatis, scariosis, membranaceis, croceo-fulvellis, semen bombycinum saturate croceum continentibus. *Batsch fung. cont. 253. n. 172. t. 30. f. 72.*

In arborum truncis putridis in den Papenbergern rarius. Autumno.

1204. *LYCOPERDON favogineum* gregarium, globulis subrotundis luteis, feminibus luteis.

Lycoperdon favogineum gregarium; globulis dense approximatis vesicularibus, semen bombacinum luteum recondentibus. *Batsch fung. cont. 257. n. 173. t. 30. f. 173.*

In truncis putridis frequens. Autumno.

1205. *LYCOPERDON lumbricale* filiforme teres reticulatum luteum, seminibus luteis.

Lycoperdon lumbricale teres, ramosum & proserpens; constans tunica vesiculari pellucida, semen luteum bombacinum continente. *Batsch fung.* 259. n. 174. t. 30. f. 174.

In der Jungfernheide ad arborum cortices rarissime. Autumno.

CARPOBOLUS. *Michel. gen.* 221.

Fungus volvatus capsulam globosam ejaculans.

1206. *CARPOBOLUS albicans.*

Lycoperdon Carpobolus volva multifida, fructu globoso ex feminibus combinatis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 624.

Carpobolus. *Michel. gen.* 221. n. 1. tab. 101. fig. 1.

In lignis putridis im Thiergarten & Papenberg rarissime. Autumno.

NAEMASPORA.

Fungus oblongus semina filo instructa ore emittens.

1207. *NAEMASPORA glabra* oblonga fusca glabra.

Sphaeria bombard gregaria; oblonga, nigro fusca, apice poro tenerrimo semen album exprimente. *Batsch fung. cont.* 271. n. 181. tab. 30. f. 181.

In betularum truncis putrescentibus im Thiergarten frequens. Vere.

Hujus

Hujus generis est forte *Lichen colliculosus*. Hoffmanni lich. tab. 2. f. 2?

SPHAERIA Halleri.

Fungus sphaericus seminibus ecaudatis farctus, per poros in superficie sparsos saepius emittens.

1208. SPHAERIA *lycoperdoides* convexa nigra sparsa, medulla atra.

Sphaeria lycoperdoides composita convexa subfolitaria, medulla farinosa atra. Weigel observ. botan. 47. n. 10. t. 3. f. 2.

Lycoperdon variolosum parasiticum sessile subrotundatum, cortice exteriori fulvo deciduo; farina atra compacta. Lin. syst. ed. R. 4. p. 626.
 B. cortice fulvo.

In arborum emortuarum ramulis frequens. Hyeme.

1209. SPHAERIA *rubra* convexa rubra tota exasperata. Wiggers primit. 84. n. 935.

In ligno fagorum putrescente. Hyeme.

Tota fusco-rubra exasperata.

1210. SPHAERIA *tremelloides* subglobosa purpurea glabra sparsa.

Sphaeria tremelloides composita solitaria subpedunculata subglobosa purpurea subgelatinosa. Weigel observ. bot. 46. n. 8. tab. 3. f. 1.

Tremella purpurea subglobosa sessilis, solitaria glabra, Lin. syst. ed. R. 4. p. 564.

In ramulis arborum fruticumque emortuis copiose. Autumno. vere.

1211. *SPHAERIA olivacea* solitaria oblonga convexa olivacea pulverulenta, carne concolore.

In foliis Daturae stramoniae, caulibus plantarum, inque fructibus Daturae, Cucurbitae Peponis, lagenariae aliarumque plantarum frequens. Autumno.

Pulverulenta junior laetius virefcit, aetate nigrescit, fit olivacea, pulvis interne contentus olivaceus. An *Sphaeria Brassicae Dicksoni*?

1212. *SPHAERIA confluens* oblonga fusca depressa confluens.

In ligno putrescente in der Jungfernheide & alibi haud infrequens. Hyeme.

Fusca oblonga pulverulenta depressa saepius in lineas longas confluens. TAB. VII. fig. 21.

1213. *SPHAERIA globularis* gregaria globosa atra.

Sphaeria globularis gregaria globata clausa nigra, nitoris expers, indurata. *Batsch fung. cont.* 271. n. 180. t. 30. f. 180.

In den Papenbergen passim. Autumno.

In ligno putrido.

1214. *SPHAERIA mammosa* solitaria mammiformis olivacea. *Dickson fascicul. crypt.* p. 22. *Hall. hist. helv.* 2181.

Lichen Agaricus crustaceus, initio subhirsutus & oleae conditae coloris, per siccitatem glaber niger,

niger, & veluti deustus, receptaculis florum
mammiformibus elegantissimis. *Michel gen.*
104. *ord.* II. t. 55. f. 1.

In ligno putrido *in den Papenberg* rarius.
Hyeme,
Nostra tota nigra.

TREMELLA. *Lin. gen.* 1320.

Corpus gelatinosum partibus frutificaulibus in
illo latentibus.

1215. TREMELLA *Agaricoides* stipitata nigra in-
quinans, pileo subconvexo. *Retz. prod. fl.*
scand. 2. p. 235. n. 1424.

Peziza brunnea interne atra absque nitore; exter-
ne rugulosa, fuscobrunnea carnosissima polymor-
pha. *Batsch fung.* 125. n. 26. t. 11. f. 50.
Schaeffer fung. t. 158.

Peziza sessilis, infundibuliformis, extus hirsuta
umbrina, intus nigerrima. *Hall. helv.* n. 2219.
t. 48. f. 8.

Lycoperdon truncatum parasiticum subrotundum
truncatum. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 626. Ju-
nior planta.

Auf den Holzplaetzen in ligno fagi putrido fre-
quens. Autumno.

1216. TREMELLA *rufa* longitudinaliter dimidiato-
infundibuliformis. *Murr. syst.* 14. p. 965.
Jacq. Misc. v. 1. p. 143. t. 14.

In truncis putridis *in der Jungfernheide & Papenbergen* rarius. Autumno.

Tota rubescens vel rufescens. Nostra semper minor figura *Jacquini*.

1217. *TREMELLA Auricula* subrotunda concava plicata nigrescens.

Peziza Auricula concava rugosa auriformis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 619.*

Ad Sambuci nigrae truncos aliarumque fruticum passim. Vere & autumno.

Offic. Auricula Judae. Fungus sambuci.

1218. *TREMELLA Noftoc* sessilis subrotunda plicata undulata fusco virens. *Huds. angl. ed. 2. p. 564. n. 5.*

Tremella Noftoc plicata undulata. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 562.*

Tremella terrestris sinuosa pinguis & fugax. *Dill. musc. 52. t. 10. f. 14.*

Ad terram passim post pluvias. Autumnali tempore & vere.

1219. *TREMELLA arborea* sessilis subrotunda undulata nigrescens. *Huds. angl. ed. 2. p. 563.*

Tremella sagarum sessilis membranacea difformis venosa subfusca. *Retz. prod. fl. scand. n. 1422.*

Tremella nigricans. *Withering brit. 2. p. 732.*

Tremella arborea nigricans, minus pinguis & fugax. *Dill. musc. 54. t. 10. f. 15.*

In arborum ramulis dejectis inque afferibus sepi-
busque putrescentibus. Autumno & vere.

1220. *TREMELLA mesenteriformis* sessilis subro-
tunda plicato-rugosa flava.

Tremella mesenteriformis in plicas multiplices in-
torta. *Murr. syst.* 14. p. 965. *Jacq. Miscel.*
v. I. p. 142. t. 13.

In arborum truncis putridis in den Papenbergem
rarius. Autumno.

1221. *TREMELLA crispa* terrestris tenera crispa,
Schreb. spicil. 140, n. 1151. *Dill. musc.* 52.
t. 10. f. 12.

Tremella tenerima. *Withering brit.* 2. p. 732.
Ad terram sub quercubus magnis, inque locis
suburbanis post pluvias.

1222. *TREMELLA viridis* oblonga laete viridis
convexa.

Tremella viridis hemisphaerica viridis lubrica
faxis adnata. *Retz. prod. fl. scand.* n. 1428.

In lacu ad Reineckendorf & alibi plantis insidens
aquaticis. Aestate.

Simillima *Tremellae hemisphaericae* L. & *litho-*
philae nostrae in den Schriften der Gesellsch.
Naturf. Freunde zu Berl. descripta.

Ita inter se differunt: 1) *Tremella hemisphaerica*
magis rotunda, e luteo virescens est, punctis.
que adsperfa. 2) *Tremella lithophila* vero
fusco viridis, magis plana, & per lentem viri-
dis disco fusco semper observatur. 3) *Tre-*

mella viridis denique laete viridis absque punctis, per lentem absque disco fusco reperitur & nunquam tam regularis quam reliqui, interdum oblonga interdum vero subrotunda.

1223. *TREMELLA granulata* gelatinosa sphaerica aggregata viridis. *Huds. angl. ed. 2. p. 566.*
Ulva granulata sphaerica aggregata. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 586.*

Ulva radicata sphaerica aggregata; radicibus ramosis, viridis. *Retz prod. fl. scand. 2. n. 1492.*

In paludosis humidis prope *Spandau* ubi *Marisia* natans reperitur. Junio.

1224. *TREMELLA moniliformis* globosa pallide viridis, in lineas disposita.

Post pluvias in hortis. Aestate.

Valde fugax sempex globosa in lineas reticulatim disposita.

1225. *TREMELLA stipitata* stipitata, tota rubra diaphana, corpore cylindraceo.

In arborum truncis putridis ad *Falkenhagen* rarius. Hyeme.

Figura externa *Tremonitidi typhinae* similis, sed tota gelatinosa diaphana rubra.

MUCOR. *Lin. gen. 1334.*

Fungus filiformis capsulis globosis.

* *Perennis.*

1226. *MUCOR furfuraceus* perennis viridis, foliis furfuraceis, stipite filiformi capitulo globoso.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 628.

Lichen capitatus. Schreb. spicil. 134. n. 1134.

In truncis betulorum *im Thiergarten* frequens, ad terram inque quercuum truncis *in der Jungfernheide* passim.

** *Fugaces.*

1227. *MUCOR Mucedo* stipitatus, capsula globosa.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 628.

In pane, aliisque esculentis.

1228. *MUCOR leprosus* fetaceus, feminibus radicalibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 628.*

In cellis locisque suffocatis. Autumno.

1229. *MUCOR glaucus* stipitatus, capitulo subrotundo aggregato. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 629.*

In fructibus variis copiosissime.

1230. *MUCOR crustaceus* stipitatus, spicis digitatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 629.

In esculentis variis etiamque fructibus.

1231. *MUCOR cespitosus* stipite ramoso, spicis ternatis. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 629.*

In variis putrescentibus.

1232. *MUCOR scepticus* unctuosus flavus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 620.*

In fimetis, locis suburbanis, inque sylvis passim.

1233. *MUCOR Lycogala* capitulo aquico, gelatinofo, pellucido, fugaci, globofo, fessili. *Scop. carn. ed. 1. p. 67. n. 6. ed. 2. n. 1645.*

In arboris trunco putrido semel observavi. Augusto.

1234. *MUCOR urceolatus* stipitatus fugax, stipite superne ventricoso pellucido rorido, capitulo subrotundo elastico nigro. *Dickson fascicul. crypt. pl. 25. t. 3. f. 6.*

In stercore equino in pratis nemorosis rarius. Aestate.

TANTUM.

INDEX GENERUM.

A.

Acer 435-437.
 Achillea 842-843.
 Acorus 387.
 Acrostichum 877.
 Adoxa 448.
 Aegopodium 352.
 Aesculus 419.
 Aethusa 336.
 Agaricus 1089-1130.
 Agrimonia 510.
 Agrostemma 503.
 Agrostis 131-136.
 Aira 142-149.
 Ajuga 595-596.
 Alchemilla 225-226.
 Alisma 414-418.
 Allium 369-374.
 Alopecurus 129-130.
 Alfine 357.
 Althaea 694.
 Alyssum 659-660.
 Amaranthus 358-359.
 Anagallis 256-257.
 Anchusa 244.
 Andromeda 462.
 Anemone 573-578.
 Anethum 344-345.
 Angelica 327.
 Anthemis 840-841.
 Anthericum 379-380.
 Anthoceros 1000-1001.
 Anthoxanthum 63.
 Anthyllis 730.
 Antirrhinum 642-644.

Apium 350-351.
 Aquilegia 568.
 Arabis 664-665.
 Arbutus 463.
 Arctium 804.
 Arenaria 483-487.
 Aristolochia 386.
 Artemisia 816-820.
 Arundo 183-187.
 Asarum 506.
 Asclepias 291.
 Asparagus 381.
 Asperugo 249.
 Asperula 206-208.
 Asplenium 879-880.
 Astragalus 743-744.
 Athamanta 323-324.
 Atriplex 300-303.
 Avena 176-182.

B.

Ballota 619-620.
 Barbula 929-930.
 Bellis 834.
 Berberis 399.
 Beta 313.
 Betonica 615.
 Betula 229-230.
 Bidens 806-808.
 Boletus 1131-1145.
 Borago 248.
 Brassica 668-670.
 Briza 158.
 Bromus 167-175.
 Bryonia 863-864.
 Dd 4

Bryum

Bryum 962-964.
 Butomus 454.
 Buxbaumia 978-979.
 Byssus 1075-1082.

C.

Calendula 851-852.
 Calla 566.
 Callitriche 3-4.
 Caltha 594.
 Campanula 274-280.
 Cannabis 298.
 Cardamine 681-682.
 Carduus 793-796.
 Carex 85-115.
 Carlina 805.
 Carpinus 511.
 Carpobolus 1206.
 Carum 346.
 Caulalis 316-317.
 Centaurea 844-847.
 Centunculus 219.
 Cerastium 491-495.
 Ceratophyllum 564-565.
 Chaerophyllum 341.
 Chaiturus 622.
 Chara 2.
 Cheiranthus 662-663.
 Chelidonium 555.
 Chenopodium 304-312.
 Chondrilla 770.
 Chrysanthemum 835-837.
 Chrysofenium 464.
 Cichorium 787-788.
 Cicuta 335.
 Cineraria 828.
 Circaea 25.
 Cistus 561.
 Cladonia 1041-1051.
 Clavaria 1176-1185.
 Clinopodium 624.

Cnicus 797-801.
 Comarum 554.
 Conferva 1083-1088.
 Conium 320.
 Convallaria 382-385.
 Convolvulus 262-263.
 Coriandrum 337.
 Cornus 222-223.
 Coronilla 713.
 Corylus 434.
 Crataegus 527.
 Crepis 783-784.
 Cucubalus 476-478.
 Cuscuta 231.
 Cyathus 1159-1161.
 Cynoglossum 245.
 Cynofurus 159.
 Cyperus 83-84.

D.

Dactylis 160.
 Datura 267.
 Daucus 318-319.
 Delphinium 567.
 Dianthus 472-475.
 Dieranium 923-926.
 Digitalis 648.
 Dipfacus 202.
 Draba 652.
 Drosera 366-367.

E.

Echium 252.
 Elymus 191.
 Epilobium 421-425.
 Equisetum 865-869.
 Erica 429-430.
 Erigeron 825-826.
 Eriophorum 80-81.
 Ervum 721-723.
 Erysimum 661.

Eupa-

Eupatorium 809.
Euphorbia 514-520.
Euphrasia 634-635.
Evonymus 283.

F.

Fagus 512.
Festuca 161-166.
Filago 853-855.
Fissidens 919-922.
Fontinalis 980.
Fragaria 542.
Fraxinus 22.
Fumaria 704-705.

G.

Galeopsis 610-612.
Galium 209-214.
Genista 708-710.
Gentiana 292-294.
Geranium 686-693.
Geum 552-553.
Glecoma 606.
Gnaphalium 811-815.
Gratiola 59.
Grimmia 904-906.
Gymnostomum. 896-899.
Gypsophila 469.

H.

Hedera 288.
Hedysarum 724.
Helvella 1157-1158.
Heracleum 326.
Herniaria 297.
Hieracium 776-782.
Hippuris 1.
Holcus 139-141.
Holoosteum 201.
Hordeum 193-196.
Hottonia 255.

Humulus 299.
Hydnum 1146-1151.
Hydrocharis 453.
Hydrocotyle 315.
Hyoferis 268.
Hyoferis 785.
Hypericum 755-759.
Hypnum 945-961.
Hypochaeris 789-791.
Hyssopus 600.

I.

Jasione 856.
Iberis 658.
Ilex 232.
Illecebrum 289.
Inula 829-833.
Iris 68. 69.
Juncus 358-368.
Jungermannia 984-995.
Juniperus 683-684.

K.

Koehltreutera 975.

L.

Lactuca 768-769.
Lamium 607-609.
Lapsana 786.
Laserpitium 325.
Lathraea 639.
Lathyrus 718-720.
Lavandula 602.
Ledum 456.
Leerfia 901-903.
Lemna 5-8.
Leontodon 773-775.
Leonurus 623.
Lepidium 653-655.
Lepra 1067-1074.
Leskia 941-944.

Id 5

Lichen

Lichen 1004-1040.
 Ligustrum 23.
 Lilium 375.
 Limosella 649.
 Linum 363-365.
 Lithospermum 243.
 Lolium 188-190.
 Lychnis 504-505.
 Lycoperdon 1191-1205.
 Lycopodium 870-873.
 Lycopsis 250-251.
 Lycopus 61.
 Lyfimachia 258-260.
 Lythrum 508-509.

M.

Malva 695-698.
 Marchantia 996.
 Marrubium 621.
 Marfilea 890.
 Matricaria 838-839.
 Medicago 726-729.
 Meefia 981-983.
 Melampyrum 636-638.
 Mentha 603-605.
 Menyanthes 254.
 Mercurialis 451-452.
 Mespilus 529.
 Miliun 137.
 Mnium 965-973.
 Monotropa 455.
 Montia 260.
 Mucor 1226-1234.
 Myagrurn 650-651.
 Myofotis 240-242.
 Myofurus 368.
 Myriophyllum 446-447.

N.

Naemaspora 1207.
 Nardus 118.

Neckeria 931-940.
 Nepeta 601.
 Nigella 569-570.
 Nymphaea 562-563.

O.

Oenanthe 333.
 Oenothera 420.
 Ononis 714-715.
 Onopordon 792.
 Ophioglossum 874.
 Ophris 49-52.
 Orchis 42-47.
 Origanum 625-626.
 Ornithogalum 376-378.
 Ornithopus 742.
 Orobus 731-733.
 Osmunda 875-876.
 Oxalis 501-502.

P.

Panicum 121-126.
 Papaver 556-559.
 Paris 449.
 Parnassia 361.
 Pastinaca 343.
 Pedicularis 640-641.
 Peltigera 1002-1003.
 Peplis 400.
 Peziza 1163-1175.
 Phalaris 119-120.
 Phallus 1155-1156.
 Phascum 891-894.
 Phaseolus 711-712.
 Phellandrium 334.
 Phleum 127-128.
 Phyteuma 273.
 Pimpinella 347-349.
 Pinguicula 56.
 Pinus 699-702.
 Pifum 716-717.

Plan-

Plantago 215-219.
 Poa 150-157.
 Pollichia 613. 614.
 Polycnemum 70.
 Polygala 706.
 Polygonum 438-445.
 Polypodium 882-889.
 Polytrichum 910-915.
 Populus 431-433.
 Poronia 1162.
 Portulaca 507.
 Potamogeton 233-238.
 Potentilla 542-549.
 Prenanthes 771.
 Primula 253.
 Prunella 631. 632.
 Prunus 522-526.
 Pteris 878.
 Puccinia 1186.
 Pulmonaria 246.
 Pyrola 457-461.
 Pyrus 530. 531.

Q.

Quercus 450.

R.

Ranunculus 581-592.
 Raphanus 671. 672.
 Refeda 513.
 Rhamnus 281. 282.
 Rhinanthus 633.
 Ribes 285-287.
 Riccia 997-999.
 Rosa 535-537.
 Rubus 538-541.
 Rumex 401-410.

S.

Sagina 239.
 Sagittaria 572.

Salix 9-21.
 Salsola 314.
 Salvia 62.
 Sambucus 354. 355.
 Sanguisorba 220.
 Saponaria 470-471.
 Satureja 599.
 Satyrium 48.
 Saxifraga 465-466.
 Scabiosa 203-205.
 Scandix 338-340.
 Scheuchzeria 411.
 Schoenus 82.
 Scirpus 71-77.
 Scleranthus 467-468.
 Scorzonera 762. 763.
 Scrophularia 645-647.
 Scutellaria 630.
 Secale 192.
 Sedum 496-500.
 Selinum 321. 322.
 Sempervivum 521.
 Senecio 819-824.
 Serapias 53-55.
 Serratula 802. 803.
 Sefeli 342.
 Silene 479.
 Sinapis 673.
 Sifymbrium 674-680.
 Sium 328-332.
 Solanum 269-271.
 Solidago 827.
 Sonchus 764-767.
 Sorbus 528.
 Sparganium 116-117.
 Spartium 707.
 Spergula 488-490.
 Sphaeria 1208-1214.
 Sphagnum 895.
 Spinacia 360.
 Spiraea 532-534.

Stachys

Stachys 616-618.
 Statice 362.
 Stellaria 480-482.
 Stemonitis 1187-1190.
 Stipa 138.
 Stratiotes 571.
 Symphytum 247.
 Syringa 24.

T.

Tanacetum 810.
 Taraxacum 772.
 Taxus 703.
 Tetraphis 900.
 Teucrium 597-598.
 Thaelaephora 1152-1154.
 Thalictrum 579-580.
 Thesium 290.
 Thlaspi 656-657.
 Thymus 627-629.
 Tilia 560.
 Tormentilla 550-551.
 Tortula 927-928.
 Tragopogon 760-761.
 Trapa 221.
 Tremella 1215-1225.
 Trichostomum 916-918.
 Trifolium 745-754.
 Triglochin 412-413.
 Triticum 197-199.

Trollius 593.
 Turritis 666-667.
 Tussilago 848-850.
 Typha 78-79.

U.

Ulmus 295-296.
 Urtica 227-228.
 Utricularia 57-58.

V.

Vaccinium 426-428.
 Valeriana 64-67.
 Verbascum 264-266.
 Verbena 60.
 Veronica 26-41.
 Verrucaria 1053-1067.
 Viburnum 353.
 Vicia 734-741.
 Vinca 261.
 Viola 857-862.
 Viscum 224.
 Vitis 284.

W.

Webera 975-977.
 Weissia 907-909.

X.

Xanthium 685.

I N D E X

SYNONYMORUM, NOMIMUM TRI-
VALIUM & OFFICINALIUM.

A.

Abies 701. 702.
 Absynthium 818.
 Acacia 526.
 Acanthium 792.
 Acanthoides 794.
 Acerofa 409. 410.
 Acetofella 410. 501.
 Achyrophorus 789.
 Acinos 629.
 Acorus 68.
 Adianthoides 921.
 Adiantum 879. 880. 911.
 Agaricoides 1215.
 Agaricum 1094. 1095.
 Agrostis 186. 187.
 Alcea 698.
 Alliaria 678.
 Alnus 230.
 Aloides 571. 915.
 Amarella 293.
 Anagallis 31.
 Androsaceus 1128.
 Anfarina 543.
 Anthriscus 316. 317.
 Antipyretica 980.
 Aparine 214.
 Aphanes 226.

Apium 346.
 Arabis 667.
 Arcyria 1190.
 Argemone 556.
 Aristolochia 704.
 Armeria 362.
 Arnica 830. 833.
 Asphodelus 375.
 Asplenoides 984.
 Aster 830. 831.
 Atriplex 306.
 Auricomus 584.
 Auricula 776-1217.
 Auriscalpium 1148.
 Avellana 434.
 Avena 147-149.

B.

Barba caprina 534.
 — hirci 760.
 Bardana 804.
 Batrachosperma 1088.
 Beccabunga 30.
 Bedeguar 536.
 Behen 476.
 Bellis 836.
 Beomyces 1052.

Betulus

- Betulus 511.
 Bifolium 51.
 Bistorta 438.
 Blitum 358.
 Bocothryon 72.
 Bonus Henericus 304.
 Botryoides 1073.
 Botrytes 1051.
 Bovista 1193.
 Branca urfina 326.
 Britannica 402.
 Bromus 160. 161.
 Brunella 631.
 Bryoides 919.
 Bryum 891. 893. 896. 898.
 901-908. 915-917. 923-
 930. 965-975. 977-979.
 982. 983.
 Buglossum 244. 1142.
 Eufra pastoris 655.
 Byssus 1067-1070. 1073.
- C.
- Calamagrostis 185-187.
 Calamus 387.
 Calcatrippa 567.
 Callibryon 915.
 Caprea 19.
 Cardiaca 623.
 Carduus 798-800. 803.
 Carota 318.
 Carvi 346.
 Carvi folia 322.
 Caryophyllata 552.
 Cataria 601.
 Catharinea 915.
 Centaurium 294.
 Centumnodia 442.
 Cepa 373.
 Cerasus 523. 524.
- Cerefolium 339. 341.
 Cervaria 323.
 Chacrophyllum 340.
 Chamaedrys 35.
 Chamaeleo 1096.
 Chamaemelum 840. 841.
 Chamaenerion 424.
 Chamomilla 839. 841.
 Chantarellus 118.
 Chara 1088.
 Cheiranthoides 661.
 Chelidonium 583.
 Chloranthus 477.
 Chondrilla 771.
 Cicuta 320.
 Cicutaria 341.
 Cicutarium 686.
 Cincinalis 878.
 Clathroidastrum 1187.
 Clathrus 1187-1189.
 Clavaria 1151.
 Clematidis 386.
 Coccinella 468.
 Columbaria 205.
 Consolida major 247.
 — — media 595.
 — — minor 631.
 — — regalis 567.
 — — ferracenea 827.
 Convolvulus 444.
 Conyza 826.
 Coralloides 1041-1043.
 1045. 1047-1050. 1151.
 1183.
 Coreopsis 808.
 Cornucopioides 1163.
 Costa 791.
 Cotula 841.
 Cracca 735.
 Crepis 775.
 Crepitus lupi 1193.

Crista galli 633.
 Crus galli 124.
 Cyanus 844-846.
 Cyathoides 1160. 1161.
 Cynanchica 208.
 Cynapium 336.
 Cynosbati 536.
 Cyparissias 519.
 Cyperoides 101. 104.

D.

Damaſonium 415.
 Dendroides 932-972.
 Dens leonis 772.
 Dentaria 639.
 Digitaria 125.
 Diphyſcium 970.
 Dryopteris 889.
 Duicamara 269.

E.

Ebulus 355.
 Echinus 1149. 1150.
 Elſnitium 321.
 Elvela 1158.
 Elveloides 1055.
 Endivia 788.
 Epidendrum 1202.
 Eryſimoides 662.
 Eryſimum 677. 678.
 Eſula 518. 519.
 Eupatoria 570.

F.

Faba 741.
 Fabaria 496.
 Fagopyrum 443.
 Falcaria 332.

Farfara 848.
 Feſtuca 169.
 Ficaria 583.
 Filago 812. 814. 815.
 Filipendula 533.
 Filix femina 885. 887.
 — mas 886.
 Flammula 581.
 Flos aquae 1075.
 — cuculi 504.
 Foeniculum 334. 345.
 Fragaria 554.
 Frangula 282.
 Fungus 1104. 1139. 1193.
 1217.

G.

Galeobdolon 613.
 Galeopſis 608-613.
 Geaſter 1200.
 Geniſta 707.
 Gentianella 293.
 Georgia 900.
 Githago 503.
 Glycyphyllus 743.
 Gramen arvenſe 156.
 — — cyperoides 104.
 — — junceum 391.
 — — loliaceum 188.
 — — majus 86.
 — — minus 199.
 — — nemoroſum 395.
 — — paniceum 124.
 — — paniculatum 142.
 Gratia Dei 59.
 Groſſularia 287.

H.

Hedera 606.
 Hedypnois 772.

Heleo-

Helcocharis 868.
Helianthemum 561.
Helioscopia 517.
Helix 14. 288.
Helvella 1153. 1154.
Hepatica 206. 572.
Heracantha 805.
Herba cathartica 264.
 ——— *ignis* 1041.
Hippocastanum 419.
Holcus 176.
Holostea 488.
Hordeum 191.
Horminum 62.
Hydrolapathum 404.
Hydropiper 440.
Hypnoides 916.
Hypnum 895. 919 - 922.
 924. 931 - 943. 980.
Hypopithys 455.
Hypoxylon 1182.
Hyssopifolia 509.

I.

Jacea 847.
Jacobaea 823.
Iberis 654.
Iemadophila 1054.
Intybus 787.
Isoetes 395.
Juncus 80.
Jungermannia 952.

K.

Kali 314.

L.

Ladanum 610.
Lagopus 750.

Lamium 613. 614.
Lampfana 672.
Lappa 804.
Lappula 242.
Lapfana 785.
Larix 700.
Lathyris 515.
Lens 721.
Leontodon 772.
Leonuroides 622.
Leonurus 622.
Leucanthemum 835.
Lichen 996 - 998. 1002.
 1003. 1041 - 1065. 1067.
 1074. 1226.
Lichenastrum 984. 985.
 992 - 999.
Lichenoides 1019. 1022.
 1023. 1026.
Ligusticum 352.
Lilac 24.
Liliago 380.
Lilium convallium 382.
Linagrostis 81.
Linaria 643.
Lingua 22. 582.
Linophyllum 290.
Lolium 503.
Lenchophyllum 54.
Lunaria 875.
Lupulus 299.
Luteola 513.
Lychnis 471.
Lychnitis 265.
Lycogala 1233.
Lycoperdoides 1208.
Lycoperdon 1206. 1208.
 1215.
Lyfimachia 508.

M.

Majanthemum 385.
Majorana 626.
Malus 531.
Mappa 1102.
Marrubiastrum 622.
Martagon 375.
Matricaria 835.
Matrifylva 206.
Medulla panis 1141.
Melica 142. 143.
Melilotus 745.
Millefolium 843.
Millegana 297.
Mitella 1096.
Mitra 1157.
Mnemosynum 900.
Mnium 900. 902. 913.
914. 923. 964. 974. 976.
981. 983.
Morio 43.
Morsus Dioboli 203.
— ranac 453.
Moschatellina 448.
Mucedo 1228.
Muscoides 1184.
Musculus 1003. 1041.
Myrtillus 426.

N.

Napus 668.
Nasturtium 464. 654. 655.
674.
Nemolapathum 404.
Nidus avis 49.
Noctoc 1218.
Nummularia 260.
Nux aquatica 221.

O.

Odontites 635.
Oelsnitium 321.
Onobrychis 724.
Ophioglossoides 1177.
Opulus 353.
Orchis 48.
Oreopteris 883.
Oreoselinum 324.
Ornithopodium 742.
Orontium 644.
Osmunda 877.
Orites 478.
Oxyacantha 527.
Oxycoccus 428.

P.

Padus 522.
Palmata 46.
Paralyfis 253.
Paronychia 289.
Pecten veneris 338.
Pentaphyllum 549.
Peplus 514.
Perficaria 441.
Pervinca 261.
Pes anserinus 307.
— cati 813.
— columbae 691.
Petasitis 849. 850.
Petroselinum 350.
Peziza 1159-1162. 1215.
1217.
Phallus 1170.
Phegopteris 882.
Phragmitis 183.
Picea 701. 702.
Pieris 773.
Pilosella 776.

E e

Pimpi-

Pimpinella 220.
 Pinheaded 395.
 Plantago 414.
 Platanoides 436.
 Pneumonanthe 292.
 Poa 144.
 Podagraria 352.
 Polygonatum 383.
 Polygonum 468.
 Polyodon 904.
 Polytrichoides 913. 914.
 Polytrichum 905. 906.
 Porrum 369.
 Portula 400.
 Pseudacorus 68.
 Pseudocyperus 105.
 Pseudoplatanus 435.
 Psyllium 218.
 Ptarmica 842.
 Pulmonaria arborea 1032.
 — — gallica 779.
 Pulsatilla 575. 576.

Q.

Quinquefolium 549.

R.

Radiola 365.
 Ranunculoides 418. 578.
 Rapa 669.
 Raphanistrum 672.
 Rapistrum 672.
 Rapunculoides 278.
 Rapunculus 273. 276.
 Rhaponticum 408.
 Rhizophora 1170.
 Rhoeas 557.
 Robur 450.
 Rorella 366.

Rosmarinus 456.
 Ros folis 366.
 Ruta muraria 880.
 Rutabulum 958.

S.

Sabina 683.
 Sagitta 572.
 Salep 44.
 Salicaria 508.
 Salvinia 890.
 Salvinoides 890.
 Satyrium 42.
 Saxifraga 347. 348. 533.
 Scabiosa 846.
 Scandix 317.
 Scapigerus 663.
 Scariola 769.
 Schoenolagurus 80.
 Schoenoprasum 374.
 Schoenus 74.
 Scoparium 707.
 Scordium 598.
 Scorodonia 597.
 Sedum 521.
 Semen canariense 119.
 Serpens 935.
 Serpillum 627.
 Sesamum 650.
 Sefeli 346. 352.
 Sideritis 618.
 Sigillum Salomonis 383.
 Sifarum 331.
 Sifymbrium 665.
 Sium 352.
 Sophia 680.
 Sphaeria 1207.
 Sphagnum 894. 904. 979.
 Sphondylium 326.
 Spica 602.

Spicant

Spicant 877.
 Spicaventi 131.
 Spina cervina 280.
 Squamaria 639.
 Stoechas 811.
 Stramonium 267.
 Strumarium 685.
 Struthiopteris 877.
 Subularia 395.
 Succisa 203.

T.

Tamarisci 990.
 Tenageia 392.
 Tetrahit 611. 612.
 Tetralix 429.
 Teucrium 33.
 Thaliana 664.
 Thapsus 264.
 Thelypteris 884.
 Therebinthina 700.
 Thlaspi 655.
 Tithymalus 514. 519. 520.
 Tordylium 316.
 Trachelium 279.
 Tremella 1210.
 Tremelloides 1210.

Trichia 1190.
 Trichomanis 964.
 Trichomanoides 879. 941.
 Trifolium 254.
 Trinitatis flos 861.
 Tubera cervina 1191.

U.

Ulmaria 534.
 Ulva 1223.
 Urtica 608.
 Usnea 1034. 1037.
 Uva urfi 463.

V.

Vincetoxicum 291.
 Virgaurea 827.
 Viscaria 505.
 Vitis Idaea 427.
 Vulneraria 730.
 Vulvaria 311.

W.

Webera 979.
 Weissia 905.

EXPLICATIO TABULARUM.

TABULA I. Figura 1.			<i>Carex pilulifera</i> . n. 100.		
—	—	—	2.	—	<i>aspera</i> . n. 102.
—	—	—	3.	—	<i>splendida</i> . n. 103.
—	—	—	4.	—	<i>elegans</i> . n. 104.
—	II.	—	5.	—	<i>caespitosa</i> . n. 107.
—	—	—	6.	—	<i>mutabilis</i> . α . n. 109.
—	III.	—	7.	—	<i>mutabilis</i> . β . n. 109.
—	IV.	—	8.	<i>Juncus Sprengeli</i> . n. 394.	
—	V.	—	9.	<i>Cucubalus chloranthus</i> . n. 477.	
				a. panicula deflorata.	
—	—	—	10.	<i>Cheiranthus scapigerus</i> . n. 663.	
—	VI.	—	11.	<i>Cnicus dubius</i> . n. 801.	
				a. folium radicale.	
—	—	—	12.	<i>Leskia marchica</i> . n. 944.	
				a. folium magnitudine auctum.	
				b. Perichaetium auctum.	
				c. Theca lente aucta.	
—	VII.	—	13.	<i>Lichen quercinus</i> . n. 1018.	
—	—	—	14.	<i>Verrucaria typographica</i> .	
				n. 1066.	
—	—	—	15.	<i>Thaetaephora mesenterisfor-</i>	
				mis. n. 1152.	
—	—	—	16.	<i>Peziza lacera</i> . n. 1166.	
—	—	—	17.	<i>Clavaria parasitica</i> . n. 1178.	
—	—	—	18.	—	<i>granulata</i> . n. 1179.
—	—	—	19.	<i>Lycoperdon scabrum</i> . n. 1192.	
—	—	—	20.	—	<i>equinum</i> . n. 1198.
—	—	—	21.	<i>Sphaeria confluens</i> . n. 1212.

Fig. 21.

Fig. 13.

Fig. 20.

Fig. 15.

Fig. 18.

Fig. 14.

Fig. 17.

Fig. 16.

Fig. 19.

Fig. 19.

A D D E N D A.

1235. *CHARA tomentosa* aculeis caulinis ovatis.

Lin. syst. ed. R. 4. p. 89.

In fossis in der Jungfernheide prope Spandau rarissima. Aestate.

Caulis albido-tomentosus.

1236. *CAREX crassa* spicis masculis pluribus, femineis brevissime pedunculatis cylindricis, capsulis ventricosis striatis acuminatis.

Carex crassa. Ehrhardt. gram. Dec. VI, n. 59.

In der Jungfernheide passim. Majo.

Culmus triquetrus, striatus, bipedalis & ultra, foliosus. Bracteae inferiores culmo longiores. Spicae masculae quatuor, inferiores subpedunculatae oblongae; squamis fuscis oblongis acuminatis. Spicae feminae quatuor, brevissime pedunculatae, cylindratae. Squamae oblongae acutae virides, fusco marginatae, capsulis paulo majores. Capsulae triquetrae ventricosae striatae. Stigma trifidum.

1237. *ROSA mollissima* germinibus subglobosis glabris, pedunculis hispidis, caule, petiolisque aculeatis, foliis tomentosis.

Prope Spandau passim. Junio.

Caulis fruticosus altitudine Rosae villosae, glaber teres striatus, aculeatus: aculeis alternis oppositisque. Folia bijuga, cum impari pin-

nata; foliola oblonga ferrata, pilis densissimis albicantibus tecta. Petioli aculeati. Pedunculi uniflori terminales hispidi solitarii. Germen glabrum subglobosum. Calyx hirsutus. Corolla incarnata. Simillima *Rosae villosae* differt vero germinibus glabris. Anne varietas?

n. 684. adde.

Im Thiergarten rarius, prope *Coeppnick* frequens. Martio. Aprili.

n. 739. adde sequentem observationem:

Nostri planta etiam cirrhos possidet, licet minutissimi sint.

1238. *AGARICUS betulinus* acaulis coriaceus villosus: margine obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. *Lin. syst. ed. R. 4. p. 607.*

Im Thiergarten & alibi in arborum truncis persistens.

1239. *BOLETUS cinnabarinus* acaulis pulvinatus, totus intus & foris ruber. *Murr. syst. ed. 14. p. 477. n. 6. Jacq. austr. t. 304.*

In emortuarum arborum truncis *hinter Spandau* rarius. Hyeme.

Totus ruber coriaceus, sessilis, pileo oblongo adglutinato glabro. Pori oblongi irregulares.

1240. *BOLETUS subsquamosus* stipitatus pileo dimidiato, ochraceo: squamis fuscis subreflexis, poris inaequalibus.

Boletus subsquamosus deformis, lateralis, dilatatus, carneo suberosus, semipetiolatus, ochraceus,

ceus, tergo glabro subunctuoso, fuscescente, maculis obscuris saepe revolutis, squamoso; tubis latis, brevibus, margine acutis, pallidioribus. *Batsch fung.* I. p. 97. n. 3, t. 10, f. 41, *Schaeff. fung.* t. 101. 102.

In den Papenbergen haud infrequens. Autumno.

1241. *BOLETUS rugosus* stipitatus perennis, pileo dimidiato rubro, croceo marginato nitido, poris tenuissimis flavescentibus.

Boletus rugosus stipitatus perennis, pileo dimidiato. *Jacq. aust.* t. 169. *Murr. syst. ed.* 14. p. 977. Prope *Stolpe* rarissime. Persistens.

1242. *HYDNUM zonatum* stipitatum pileo plano fusco, striis obscurioribus concentricis, aculeis albido-griseis.

Hydnum zonatum pileo conico-excavato, coriaceo, spadiceo vel nigro, fasciato; stipite brevi, valido in pileum diffuso, concolore, aculeis griseo-albis. *Batsch fung.* I. p. 111. n. 1. *Schaeffer fung.* 139. 272.

Prope *Doebritz* rarius. Autumno.

1243. *CLAVARIA pistillaris* clavaciformis simplicissima lutea. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 620.

In der Jungfernheide rarius. Autumno.

Distinctissima a. *Clavaria lignea*.

Sphalmata typographica.

Pag. 1. lin. 6. stigmati. p. 9. l. 18. Gesundbrunnen.
 p. 13. l. 26. Ophrys Nidus avis. p. 31. l. 20. dimidi.
 p. 33. l. 5. masculam. p. 39. l. 6. femineis. p. 66. l. ult.
 Hepaticae, p. 74. l. 10. americanam. p. 75. l. 16. defi-
 nentibus. p. 78. l. 3. aculeis. p. 78. l. 26. officinale.
 p. 79. l. 1. nemorosus. p. 85. l. 8. copiose. p. 94. l. 9.
 inaperto. p. 95. l. 5. cultura. p. 101. l. ult. planum.
 p. 132. l. 13. uncialia. p. 144. l. ult. specimina. p. 135.
 l. 7. fauci. p. 153. l. 4. Lychnis. p. 175. l. 13. fruticosus.
 p. 181. l. 17. Papaveris. p. 184. l. ult. Nymphaeae.
 p. 183. l. 9. palustris. p. 188. l. 13. unguis. p. 189. l. 16.
 apices unguium. p. 190. l. 4. pratis. p. 215. l. 22. tha-
 liana. p. 220. l. 5. Erysimum. p. 230. l. 24. germini.
 p. 233. l. 5. tamen. p. 252. l. 24. subtus. p. 260. l. 4.
 erectis. p. 272. l. 13. dysenterica. p. 290. l. 21. sparsae.
 p. 292. l. 26. dissertatione. p. 294. l. 26. pinnulis. p. 299.
 l. 5. dele:.. p. 304. l. antepenult. simpliciusculo. p. 304.
 l. ult. 124. p. 328. l. 23 & 24. opercula semper conica
 acuta. p. 335. frequens. p. 341. l. 14. bidentatis. p. 345.
 l. 12. transit. p. 349. l. 6. urceolatis. ibid. l. 28. andro-
 gynus. p. 355. l. 11. misc. p. 358. l. 22. icone. p. 368.
 l. 3. fuscus. p. 376. l. 21. conjunctae. p. 377. l. 14. dele
 cant. p. 382. l. 9. albis. p. 386. l. 20. violaceo. p. 391.
 l. 14. rufus. p. 393. n. 1141. dele synonyma.

Nachrichten die Berliner flor. betreffend
C. L. Willdenow in Römer & Nöferi bot.
Magazin Tom 2 St. 5 p 12-13

Juncus Sprengeli = *J. squarrosus* L.
Stellionia dubia }
" *Danajonium* } = *A. parnassii* L.
Rosa molissima = *R. villosa* var.
Chiranthus scapigerus = *C. erysimoides* ^{monstr.}
Epilobium roseum Schreb. var. *magz.* Trautv.
Syringium *E. ramiflorum* Hudf. *Cyrtanthus* *guss.*
guss. *E. obscurum* Schreb.

Limnæa borealis ist hier nicht selten
ganz und nicht in Ostpreußen & Litauen.

Sur les espèces de *Carex* qui croissent
sans culture dans les environs de Berlin
par Mr. Charles Willdenow. lu a l'Acad.
le 3 Juillet 1794. in

Memoires de l'Academie Royale de
Sciences. pour les Ann. 1794 & 95. Berl.
1798 = 4th pag 32-58 & Tab 1-3.

New York Botanical Garden Library

QK314 .W5

gen

Willdenow, Karl Lud/Caroli Ludovici Will

3 5185 00122 3815