A. DE BREVANS
^{LA}
MIGRATION DES OISEAUX

HACHETTE ET C^{IE}
PARIS

BIBLIOTHÈQUE
DES MERVEILLES

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION
DE M. ÉDOUARD CHARTON

LA MIGRATION
DES OISEAUX

---

21 210. — PARIS, TYPOGRAPHIE LAHURE
Rue de Fleurus, 9

BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES

LA MIGRATION DES OISEAUX

PAR

A. DE BREVANS

OUVRAGE

ILLUSTRÉ DE 89 VIGNETTES SUR BOIS

PAR RIOU ET A. MESNEL

ET ACCOMPAGNÉ D'UNE CARTE

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE ET C^{ie}

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

1878

Droits de propriété et de traduction réservés

A TOUSSENEL

MAITRE,

Après la nature, notre reine souveraine, vous avez été le grand inspirateur de ce livre : Veuillez en agréer l'hommage.

LA

MIGRATION DES OISEAUX

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

Ce n'est pas une des moindres curiosités ou des moindres merveilles de la nature que la translation bisannuelle du monde des oiseaux des contrées du Nord vers celles du midi, et de celles-ci vers les premières. Quelques espèces parmi les quadrupèdes, les poissons et les insectes, sont aussi soumises à des migrations; mais la généralité et la régularité de ce double mouvement de va-et-vient chez les oiseaux, comme s'il était astreint aux oscillations d'un vaste pendule; la puissance de locomotion qu'il suppose chez ces

êtres, en apparence si frères, pour accomplir leurs vastes parcours ; la sagacité qu'il implique pour prévoir les saisons, les conditions de l'atmosphère et la direction dans l'espace, étonnent l'imagination, et la surprise diminue à peine lorsqu'on cherche à approfondir les choses, à déterminer les causes, les lois, les péripéties de ce grand phénomène.

Ce qu'il y a de clair, tout d'abord, c'est qu'ils suivent le soleil, les heureux mortels ; échappant ainsi aux froidures et aux tristesses de l'hiver.— Ah ! si l'homme avait des ailes et pouvait se contenter de ce léger bagage, combien d'entre nous suivraient leur exemple !

*
* *

Le fait de la migration des oiseaux nous est révélé, au printemps et à l'automne, par les grands vols que nous voyons passer et se perdre à l'horizon, par tous les volatiles, souvent étrangers à la contrée, que nous rencontrons dans les bois, dans les champs, à des époques déterminées et qui, quelques jours après, ont tous disparu. Mais de là à savoir d'où ils viennent, là où ils vont, quel mobile les pousse, il y a loin ! Il a fallu bien des observations ; il a fallu surtout que les

communications s'établissent entre les contrées les plus éloignées; en un mot, que l'histoire naturelle ait eu le temps et la possibilité de se constituer, pour que nous arrivions à une connaissance tant soit peu précise. Jusque-là et dans tous les

siècles passés, que de fables, que de contes ont été émis sur ce sujet, comme sur bien d'autres. En voyant les oiseaux disparaître aux approches de l'hiver, on a supposé qu'ils se métamorphosaient en quelques autres espèces animales, ou qu'ils se refugiaient dans des trous et s'y engourdissaient à la manière des loirs et des marmottes. Des charmantes hirondelles, les *filles de l'air* par excellence, on a osé dire qu'elles s'immergeaient dans les marais et s'y

enfouissaient dans la vase, comme de hideux batraciens : donnant pour preuve à l'appui que des pêcheurs, en ayant ramené dans leurs filets et les ayant mises à cuire avec d'autres captures, ranimées par la chaleur elles avaient repris leur vol.

Les Filles de l'air.

Et ce conte-bleu a eu tellement cours, qu'il y a quelques années à peine, un journal sérieux de Paris le rapportait encore comme tout récent — *Risum teneatis*.

Or, nous savons pertinemment aujourd'hui,

par les témoignages de nombreux voyageurs-explorateurs, que tandis que nous nous pressons autour de nos foyers, en hiver, l'hirondelle se chauffe gaiement au brillant soleil des oasis d'Afrique. Dès le milieu du siècle dernier, le naturaliste Adanson écrivait à Buffon que, dans son long séjour au Sénégal, il avait toujours vu cet oiseau y arriver à l'époque où il quitte la France, et en partir au temps où il nous revient. D'autre part, son passage dans les contrées intermédiaires est constaté partout, comme nous le constatons nous-mêmes lorsque nous voyons les sujets de l'espèce se rassembler en foule pour se préparer au départ, puis disparaître et passer en octobre en rasant le sol d'un vol continu et en cinglant droit au Sud. Le continent africain est donc leur lieu de station hivernale, comme l'Europe est leur point de station estivale. Et ainsi des autres oiseaux qui, purement et simplement, changent de climats, grâce aux moyens de locomotion dont la nature les a pourvus, et plus ou moins au loin, selon leur tempérament et leurs conditions d'existence.

*
* *

Les contes fantastiques du passé ont eu, sans doute, pour origine le manque d'observations suivies et généralisées, ainsi que l'ignorance des faits et gestes des oiseaux, par la rareté des communications précédentes sur la surface du globe ; mais bien aussi la difficulté pour l'esprit humain de se rendre compte des moyens d'action qui leur sont dévolus pour accomplir de si longs voyages. L'homme moderne a, comme moyens de locomotion, la vapeur, les navires ; comme direction, la boussole, le calcul sidéral, la topographie ; comme connaissance du temps, le calendrier, le chronomètre ; comme prévision de l'état atmosphérique, le baromètre, le thermomètre, l'hygromètre et les observations météorologiques : autant de moyens factices, produits de la science, qui s'ajoutent à ceux qui lui sont naturels et qui les centuplent. L'oiseau n'a que ces derniers ; mais portés à une puissance dont nous ne pouvons nous faire idée à première vue. Il importera donc, pour se rendre compte de la migration, qu'après en avoir déterminé les causes et les motifs, on en pose la possibilité, la facilité même, pour les oiseaux. Le travail est facile ; car la science est faite sur ce point : Notre grand naturaliste Buffon

en a lui-même tracé les bases dans son excellent *Discours sur la nature des oiseaux*, et il n'y a qu'à les rappeler.

Il y développe longuement la nécessité de l'étude de cette phase importante de la vie des êtres volatiles, comme complément de l'histoire naturelle ; par cette raison que tant que nous ne connaissons pas leurs agissements dans cette période, nous ne saurons d'eux que la moitié de leur existence ; et il s'était promis d'y consacrer un traité spécial ; mais là, comme dans l'exécution de son vaste plan de l'histoire entière du règne animal, le temps lui a fait défaut. Il est douteux, d'ailleurs, que dans l'état des connaissances d'alors et la difficulté des communications sur une assez vaste étendue, il eût pu y apporter d'autres lumières précises que celles de sa grande intuition des choses de la nature. Lui-même le reconnaît par cette réflexion d'un sens plus général, mais aussi modeste que vrai : « *Ce n'est qu'avec le temps, et je puis dire dans la suite des siècles, qu'on pourra donner une histoire complète des oiseaux.* » — Il n'y a donc pas à critiquer quelques incertitudes ou erreurs de son œuvre ; mais à suivre son exemple en rassemblant, en précisant, en développant, les notions acquises au temps présent. C'est le but de ce livre, qui laissera une

large marge aux explorateurs de l'avenir ; car, bon gré mal gré, nombre de points resteront encore dans la pénombre.

Depuis Buffon, et, pour une bonne part, à l'aide de ses données plus certaines, les observations se sont multipliées en raison de l'activité des esprits dans toutes les branches de l'histoire naturelle et des relations sans cesse croissantes entre toutes les contrées de notre globe. Toussenel, un chasseur naturaliste, qui a puisé ses connaissances sur le vif tout autant que dans la science, a jeté un grand jour sur la migration dans son livre du *Monde des oiseaux*, aussi charmant et humouristique dans la forme que savant et judicieux dans le fond ; et on peut dire qu'à lui seul il a formulé le second pas dans l'étude de la question.

Comme cet excellent ami des bêtes et des gens, et le mien personnel à ce double titre, j'ai beaucoup couru les champs et les bois, et je les cours encore avec grand enchantement, chassant et pourchassant la gent volatile, et par conséquent obligé, autant que désireux, de m'enquérir de ses faits et gestes. J'en avais rapporté un contingent d'observations, lorsque sentant l'insuffisance de l'étude individuelle et forcément locale sur un fait d'une si vaste étendue — aucun observateur n'ayant le don d'ubiquité — l'idée me vint d'ouvrir, en quel-

que sorte, un observatoire général et permanent. Le journal *La Chasse Illustrée*, qui me fait l'honneur de me compter au nombre de ses collaborateurs, m'en offrait l'occasion et le moyen. Je conviai tous ses lecteurs de bon vouloir à une collaboration commune, les priant d'envoyer à ce bureau central des bulletins détaillés de la migration locale, comprenant le commencement et la fin des passages, leur direction et leur intensité, l'état atmosphérique, la direction du vent, le degré de température, et tous les renseignements particuliers qu'ils pourraient recueillir.

L'attrait du sujet en lui-même, par ce temps d'investigations et de recherches de connaissances positives en toutes directions; la certitude que dorénavant les observations individuelles auraient leur organe et leur utilisation, eurent assez d'action pour qu'un certain nombre de correspondants répondissent à cet appel et voulussent bien envoyer, de points fort divers, des communications fréquentes et suivies. Il est résulté de ces documents, pris sur nature, un ensemble de notions plus précises et dont quelques-unes ont le mérite d'une complète originalité. C'est l'occasion de féliciter et de remercier ici-même ces honorables collaborateurs, dont les noms et les avis seront souvent cités comme autorités et références.

Telles sont les bases de ce travail qui réunira, dans une étude spéciale, les connaissances acquises précédemment et celles recueillies à ce jour sur la migration des oiseaux.

*
* *

Une dernière considération est nécessaire. Les migrations des diverses espèces varient naturellement de date selon la latitude des lieux; on pourrait dire plus exactement, suivant leur ligne isothermique; par la raison bien simple que quelle que soit la vitesse des oiseaux, il leur faut un temps pour franchir les espaces, surtout en tenant compte des stationnements sinon constants du moins habituels. Il convient donc de fixer la ligne à laquelle se rapportent les indications données, sous peine de manquer de précision. Cette ligne ou cette zone, pour prendre une marge suffisante, sera comprise entre le quarante-sixième et le cinquantième parallèle Nord, ce qu'on peut appeler la zone de Paris; et, pour restreindre le sujet à ses données les plus certaines, il sera surtout fait mention des espèces principales et les plus intéressantes des oiseaux d'Europe, qui se voient communément entre les Alpes et l'Atlantique.

Enfin, aucun homme, quelque nomade qu'ait été son existence, n'étant assez cosmopolite pour que ses idées, ses connaissances, ses appréciations et ses observations n'aient, pour ainsi dire, un *goût de terroir*, le cachet de la contrée où il a passé sa jeunesse et la plus grande part de sa vie active, forcément mes propres considérations auront surtout pour point de départ ce qui se passe dans l'Est de la France, mon pays natal; bien que je sache et que je doive même prévenir que dans le monde des oiseaux, comme dans celui des humains, les us et coutumes changent ou se modifient selon les lieux, d'après l'adage : *Autre pays, autres mœurs!*

CHAPITRE II

MIGRATION GÉNÉRALE

Les oiseaux font leur nourriture, pour l'universalité des espèces, d'abord des insectes et des vers, ensuite des graines, des fruits et des plantes elles-mêmes; et quelques-uns, des oiseaux ou autres animaux vivants et morts. Pour leur part, dans l'ordre général de la nature, ils remplissent la fonction de compensateurs ou d'éliminateurs de l'exubérance vitale, semée avec une si grande profusion sur la surface de la terre pour assurer la persistance des races, et d'expurgateurs des détritus insolubles et nuisibles, en accomplissant la grande loi de la sustention de la vie par son propre ressort, selon un orbe de circulation qui part du sol et qui y retourne.

On conçoit, dès lors, que cette généralité des oiseaux serait condamnée à périr de faim, lorsque

les contrées septentrionales sont dépourvues d'insectes et de vers, dans l'atmosphère refroidi, sur le sol couvert de neige et dans les eaux prises par les glaces; que le règne végétal a achevé son évolution annuelle; que les bestioles ont disparu ou se sont enfouies. Il aurait fallu, pour qu'il en fût autrement, qu'ils eussent, comme les animaux à sang froid, la faculté de s'enfouir et de s'engourdir, ainsi qu'on l'a supposé dans le passé; mais la chaleur du sang, qui est un complément de leur existence, y met obstacle; ou qu'ils puissent passer une longue période dans le jeûne et l'abstinence; ce qui serait à l'inverse de l'ordre physique où toute force active exige une alimentation. Si quelques espèces et quelques individus isolés résistent et demeurent sous ces climats, de plein gré ou forcément, c'est qu'ils trouvent à glaner un reste de nourriture qui serait insuffisant pour la masse; et encore bien des privations, bien des angoisses sont leur partage. La preuve en est qu'on ne les retrouve pas plus nombreux ni en meilleur embonpoint, à la fin de l'hiver, que ceux qui nous reviennent après avoir subi les fatigues d'un long voyage, et qu'ils sont réduits souvent à venir chercher à nos portes un peu de nourriture.

Un parti, donc, leur restait à prendre : émigrer

en masse vers de plus chaudes contrées où toute vie n'a point cessé. La nature leur en a donné le moyen, et ils en profitent.

La subsistance ! telle est donc la cause première de la migration des oiseaux. Sans aucun doute, l'abaissement de la température n'est pas insensible à leur constitution nerveuse et impressionnable ; néanmoins , chaudement vêtus pour la plupart, ils le supportent jusqu'à un certain degré, pourvu qu'ils aient le vivre ; mais il ne s'y exposent point de gaieté de cœur, et la chaleur est leur vrai milieu. Dans mon enfance, j'avais une passion pour les charmants petits cinis ou serins d'Europe. Comme il m'était pénible de les voir perpétuellement enfermés dans une cage étroite, je leur donnais souvent la liberté. Je dus y renoncer par les froids vifs : leur première préoccupation était de voler droit au foyer où ils se grillaient les pattes, indifférents à la souffrance, tant ils étaient charmés de sentir une chaude température.

Le froid n'est en réalité qu'un point secondaire par rapport à eux ; bien qu'il soit le premier en ce qu'il détermine le précédent. L'une et l'autre causes, en tout cas, étant simultanées, sont largement suffisantes pour motiver la migration et il est inutile de chercher ailleurs. C'est pour la géné-

ralité des oiseaux une question de vie ou de mort.

*
* *

Les oiseaux d'Europe, en comprenant sous ce nom tous ceux qui nichent plus ou moins dans

Perdrix.

notre continent, s'élèvent à environ cinq cents espèces. Sur ce nombre, tout au plus trente ou quarante, telles que les perdrix, le moineau franc, etc. sont sédentaires et demeurent à poste fixe sur les lieux qui les ont vues naître. Toutes les autres émigrent plus ou moins au Sud : les unes se contentant de la limite des grands froids, les autres gagnant les contrées plus tempérées du midi de l'Europe ou celles plus chaudes de l'A-

frique septentrionale ; d'autres, enfin, s'avancant jusque sous les tropiques ou n'hésitant pas à franchir l'équateur pour retrouver dans l'hémisphère austral un climat analogue à celui qu'elles vien-

Moineaux francs.

nent de quitter. On a l'indication de ces divers parcours par des observations suivies et bien déterminées aujourd'hui, comme on l'a déjà vu pour l'hirondelle, et, spécialement pour la transmigration équatoriale, par la présence de quel-

ques-unes de nos espèces d'Europe dans l'autre hémisphère; ensuite par quelques faits particuliers, notamment celui-ci : Vers 1820, un naturaliste de Bâle, voyant une cigogne de passage qui portait un trait par le travers du corps, ne put résister à la curiosité de savoir ce que pouvait être ce phénomène anormal et tua l'oiseau. Ce trait n'était autre qu'une flèche qui fut reconnue comme particulière aux peuplades sauvages qui habitent les contrées voisines du Cap de Bonne-Espérance. Ainsi cette cigogne avait été blessée dans ces parages, et, néanmoins, grâce à la puissance de locomotion des oiseaux, elle avait pu accomplir un immense trajet malgré sa blessure et l'obstacle du trait.

Cette même simultanéité de quelques-unes de nos espèces sur le continent américain a fait qu'on s'est demandé si les mieux doués comme vol ne pouvaient point passer directement de l'un à l'autre des deux continents, soit des côtes de France, d'Espagne ou d'Afrique, et réciproquement.

La grande Frégate, le maître-voilier parmi les oiseaux, le petit Pétrel ou l'oiseau des tempêtes, se rencontrent en plein océan. Le naturaliste Cotesby rapporte y avoir vu également un hibou. Mais un vol de douze cents lieues d'une traite va au delà de notre imagination, et, en

La Frégate, page 19.

attendant des preuves positives, il est plus naturel de penser que les espèces communes à l'ancien

Pétrels.

et au nouveau monde ont passé et passent à leur volonté de l'un à l'autre par le Nord, là où les

terres se rapprochent, au point de se toucher presque au détroit de Bering.

L'homme, attaché à la terre et ne pouvant quitter sa surface par ses moyens naturels, a bien trop de peine à concevoir ces grands parcours aériens et la merveilleuse faculté de direction qu'ils impliquent, pour qu'il ne lui soit pas nécessaire de s'en rendre un compte exact. L'examen rapide de l'organisme de ces êtres, si frêles et si puissants, néanmoins, nous donnera le mot de l'énigme.

La puissance du vol des oiseaux, leur facilité d'évolutions, nous apparaissent chaque jour. Les Martinets de nos cités que nous voyons, le soir, prendre leurs ébats par familles et décrire de grands et rapides circuits, passent comme des traits ; à peine pouvons-nous distinguer leur forme. L'alouette mignonne, tout en chantant sa joyeuse chanson, monte, monte dans le ciel et disparaît à nos yeux. Elle s'élève ainsi à près d'un kilomètre, toujours chantant à pleine poitrine, et sa voix nous arrive encore claire et distincte à l'oreille. Le pigeon-messager, si fort de mode aujourd'hui, fait de vingt à trente lieues à l'heure, dans ses grandes courses, etc, etc.

C'est que le vol est l'attribut par excellence de

l'oiseau qui doit, dans ses types les plus caractéristiques, parcourir l'atmosphère et y remplir sa mission. La nature a concentré dans cette faculté toute son action. Elle a construit le volatile en taille-vent, ou pour mieux dire en plan horizontal, comme notre cerf-volant; de telle sorte, qu'il n'a besoin que d'un minime effort pour prendre son point d'appui sur l'air, quelque mobile et peu résistant que soit ce fluide, et que toute sa puissance reste libre pour l'évaluation. Sa légèreté spécifique, c'est-à-dire son poids, par rapport à son volume, est sans proportion avec celle de tous les autres animaux, car son épaisse enveloppe de plumes n'a qu'une pesanteur infime : d'autre part, sa charpente osseuse, très-résistante néanmoins, est réduite à sa plus simple expression, à des lamelles ou à de légers tubes creux ; ses muscles, strictement éconómisés, n'ont de développement que sur la poitrine, centre d'action des ailes, où ils représentent un volume plus considérable que ceux de tout le reste du corps, pris ensemble. Sa respiration est double ; ce qui explique chez un grand nombre l'action simultannée du vol et du chant. Enfin, la chaleur de son sang est le foyer indispensable de sa vélocité.

Quant à l'application de cette force mécanique,

elle n'est pas moins judicieusement combinée. Elle repose sur la forme elliptique très-allongée du corps et le plan horizontal, en quelque sorte rectiligne, des ailes, qui offrent le moins de résistance possible au milieu ambiant, c'est-à-dire à l'air ; sur la conformation de ces dernières, rames ou voiles motrices, à la fois résistantes et souples, dont les surfaces hélicoïdales inférieures multiplient les points d'appui et décrivent, dans leur double mouvement de haut en bas et d'avant en arrière, deux spires de propulsion rassemblant la force et la convergeant dans l'axe général ; sur la mobilité du centre de gravité, soit latéralement pour le maintien de l'équilibre, par la souplesse des articulations qui unissent le corps aux ailes ; soit longitudinalement pour le mouvement ascensionnel et descensionnel, par l'allongement ou le retrait du cou et la position en avant ou en arrière des ailes ; et, finalement, sur la queue, gouvernail pivotant, également à double effet, latéral et vertical.

De toutes ces actions réunies, résulte la force et l'aisance de propulsion que nous constatons et que quelques naturalistes estiment à quatre-vingts lieues à l'heure pour les plus fins voiliers, comme le Martinet en plein essor, et qu'on évalue communément de quinze à vingt lieues, pour toutes les

espèces bien douées, dans les grandes excursions. Buffon cite à l'appui deux exemples devenus légendaires : le faucon d'Henry II qui, s'étant emporté après une outarde canepetière à Fontainebleau, fut pris le lendemain à Malte et reconnu à son collier ; celui envoyé au duc de Lerm, des îles Canaries, et qui revint en seize heures, d'Andalousie à Ténériffe ; ce qui fait, pour un trajet de deux-cent cinquante lieues, près de seize lieues à l'heure.

A cette rapidité, souvent vertigineuse il fallait, sous peine de mésaventures perpétuelles, un guide sûr et certain ; c'est-à-dire, une vue rapide, pénétrante dans ses impressions. La nature n'a point

Faucon de Henri II.

manqué d'y pourvoir. L'œil de l'oiseau, proportionnellement au volume de la tête, est grand et largement ouvert. Indépendamment des deux paupières qui fonctionnent verticalement, une troisième, située en-dessous, dans le grand angle de l'organe, se meut transversalement : semi-diaphane, son office est d'atténuer l'intensité de la lumière dans les moments de repos, et de polir, de lubrifier constamment la cornée pour la délicatesse de la vision. Une quatrième membrane supplémentaire, placée au fond de l'œil, paraît être un épanouissement du nerf optique développant la puissance des impressions. Le globe lui-même est doué d'une certaine élasticité qui lui permet de se bomber ou de s'aplatir selon le besoin ; de telle sorte, que l'oiseau est, à son gré, myope ou presbyte, pour voir de près ou de loin ; ce qui revient à dire qu'il porte avec lui son microscope et son télescope.

Buffon déclare, et son dire n'a rien d'exagéré, que la portée de la vue des rapaces de haut vol est de vingt fois plus grande que celle de l'homme. On en peut conclure que l'oiseau, en général, embrasse d'une façon précise et certaine l'espace qu'il est susceptible de parcourir en un jour, et s'y diriger d'autant mieux qu'à la perfection de l'organe correspondent forcément des perceptions

plus nettes pour son entendement, en même temps qu'une mémoire des lieux stimulée par des sensations plus vives.

Notre grand naturaliste ne considère pas que le sens du toucher soit très-développé chez l'oiseau. En ceci, il semble avoir trop restreint le tact aux conditions de cette faculté dans l'homme et particulièrement dans sa main; c'est-à-dire, à la notion de la forme et de l'état des corps. La sensibilité nerveuse de l'oiseau est extrême; la délicatesse de toute sa structure l'indique, et il ne faut que voir l'appréhension qui le saisit au moindre contact pour n'en pouvoir douter. Il a surtout un genre de sensibilité extérieure développée à un degré énorme et qui lui est propre; c'est celle de l'état calorifique, hygrométrique et électrique de l'atmosphère. Ses plumes, composées d'une tige sur laquelle s'implantent de fines barbes portant elles-mêmes une quantité infinie de barbules tenues et légères, sont autant d'hygromètres et d'électromètres qui lui transmettent leurs impressions, et on peut dire que l'oiseau est un appareil météorologique vivant et des plus complets.

Chacun de nous ressent plus ou moins, et les rhumatisés en savent des nouvelles, les influences de l'état et des mouvements de l'atmosphère : le vent d'Est est frais et léger; celui du Sud, sec et

chaud ; celui d'Ouest, humide et froid ; celui du Nord, froid et sec. Mais combien l'exquise impressionnabilité de l'oiseau doit en être mise en éveil et y saisir de nuances qui nous échappent. La plus légère modification lui est aussitôt révélée : c'est là son baromètre ! La plus légère brise lui indique sa provenance, c'est là sa boussole ! Il porte donc avec lui tout un observatoire instantané. — Et ce n'est point tout encore !

Le sens de l'ouïe est également poussé chez lui au raffinement ; la pureté de la voix des oiseaux chanteurs en serait à elle seule la preuve manifeste, si nous n'étions perpétuellement à même de le constater. Cette sensibilité d'audition, utile pour la sauvegarde de tous, est, chez les migrateurs nocturnes, autres que les Hiboux et les Chouettes qui voient dans les ténèbres, le complément de la vue : elle leur révèle l'état des lieux qu'ils parcourent par les bruissements du vent dans les forêts, dans les plaines ; par le murmure des ondes dans les fleuves et les cours d'eau ou la voix des flots sur les rives ; par tous les bruits de la terre, en un mot. pour ces géographes praticiens tout est indication.

La connaissance des saisons, des jours, des heures, leur est donnée par leurs propres impulsions intérieures, l'amour, la mue, etc ; par les astres, par la température, les évolutions des

plantes et des insectes ; par tous les signes de la nature ; ne nous étonnons plus de la sagacité des oiseaux ! — Le sauvage humain, qui n'a point comme nous, civilisés, les renseignements et les moyens pratiques que la science met à notre usage, est bien forcé de compter sur ses organes et sur ces mêmes données physiques, comme moyens d'appréciation ; et nous savons le degré de perspicacité qu'il y acquiert !

C'est à ce point, chez l'oiseau, que ce développement de ces maîtres sens, la vue, l'ouïe, le tact, ainsi que sa facilité d'évolution qui en fait un explorateur perpétuel, l'aurait constitué en être supérieur dans la nature, si le centre commun des sensations et des impressions, le cerveau, avait reçu chez lui une ampleur proportionnelle. Il n'en est point ainsi. Petite tête et peu de cervelle ! Et les notions si vives que l'oiseau reçoit se circonscrivent, quant au résultat, à la fonction qui lui est dévolue, sans contribuer à l'entendement général. C'est un voyageur magnifiquement doté pour la locomotion et la direction, un observateur à l'œil subtil pour tout ce qui concerne la conservation et l'entretien de l'existence ; hors de là, le moindre mammifère lui en remontrerait en intelligence et en sagacité. Ce n'est donc pas tout à fait sans motif qu'un certain nombre de locutions, peu

honorifiques pour les oiseaux, sont passées dans le langage usuel : *Tête de linotte, bête comme une oie*, etc., etc. Assez d'autres belles qualités leur sont reconnues ! Mais restons dans notre sujet et n'anticipons point sur le domaine de l'histoire naturelle générale. Ce qu'il fallait établir, c'était, d'une part, les causes de la migration ; de l'autre, les moyens mis à la disposition des oiseaux pour l'accomplir. Cela fait, voyons la marche qu'ils suivent.

Si tous avaient le même genre d'existence et le même régime, s'ils étaient sensibles au même degré aux influences du froid, tous n'auraient qu'une direction et les mêmes zones de stationnement aux deux points extrêmes de leur course. Il est loin d'en être ainsi dans l'ordre universel, qui a pour but au contraire de les disséminer sur toute la surface de la terre, pour l'accomplissement de leur mission. Les uns sont tout à fait aquatiques ; les autres habitent les marais et les terres humides ; ceux-ci, les bois ou les champs ; ceux-là les lieux élevés. Beaucoup sont chaudement vêtus d'un épais édredon et ne redoutent pas la froidure ; beaucoup d'autres, au plumage plus clairsemé, ont besoin de chaleur. La même

variété règne dans le régime. Tous, ou à peu près, se repaissent d'insectes, mais d'une façon plus ou moins exclusive ; les uns en font la base de leur nourriture ; les autres, l'accessoire, en y ajoutant, qui les plantes aquatiques et les poissons, qui les herbes, les graines, les fruits et les plantes terrestres, qui la chair des oiseaux et des animaux ; et un certain nombre, les omnivores, s'accommodent de tout. Les parcours et les directions sont donc indispensablement réglés par les subsistances, par l'état des lieux et par la température des différentes contrées.

Il s'en faut de beaucoup que la température, qui, en définitive, régit l'alimentation des oiseaux, soit régulière et proportionnelle à la latitude. Les diverses altitudes topographiques, comme il tombe sous le sens, et les influences atmosphériques la modifient considérablement. Ainsi, l'humidité que la masse liquide de l'océan émet constamment donne à la région occidentale de notre continent, un climat sensiblement plus tiède que dans les contrées de l'Est sur les mêmes parallèles, sans compter l'action du *Gulf-stream*, le grand courant océanique qui entraîne les eaux, échauffées, par le soleil de l'équateur vers la froide région du pôle. Si bien que la ligne isothermique de Paris, par exemple, remonte de bon

nombre de degrés sur le littoral, tandis qu'elle s'abaisse au Sud en se prolongeant à l'Est.

Il en résulte que les oiseaux qui vivent sur les eaux ou les terres humides infléchissent leur vol de migration non directement au Sud, mais vers le Sud-Ouest où ils trouvent plus promptement et mieux leurs conditions d'existence. Du reste, en jetant un simple coup d'œil sur un globe terrestre et en remarquant l'inclinaison des rivages d'Europe et d'Afrique dans cette même direction, on devra en augurer que l'ensemble des oiseaux qui cherchent un plus chaud climat doit également appuyer de ce côté, sans quoi les contrées de l'Ouest-Sud seraient complètement dépourvues de migrateurs venant du Nord, ce qui n'est point.

Mais, à l'inverse des précédents, les oiseaux abstreints à une nourriture végétale produite par des plantes auxquelles une zone latitudinale est assignée, comme le chêne, le chataignier, etc, devront prendre une direction opposée; c'est-à-dire, tendre à l'Est; car l'Océan leur barre le chemin et leur coupe les vivres de l'autre côté.

Les résidants des lieux élevés n'ont pour changer de température, qu'à descendre dans de plus basses altitudes et généralement s'en contentent.

Enfin, d'autres, qui trouvent constamment leur nourriture dans des graines résistantes, telles que

celles des conifères résineux, n'émigrent qu'autant que cette subsistance vient à leur manquer par cause accidentelle, ou peut-être que lorsque l'excès de leur population dépasse une certaine limite.

Il est donc possible, dans ce mouvement complexe, d'établir des divisions naturelles de direction, qui le simplifieront d'autant pour la plus grande clarté, en distinguant, par exemple : les migrants du Sud-Ouest, les migrants du Sud, les migrants du Sud-Est, les migrants d'altitude et les accidentels, C'est l'ordre qui va être suivi.

*
* *

Un grand nombre d'oiseaux pourrait accomplir leur migration en quelques grandes traites, comme l'indique la puissance de locomotion qui leur est dévolue. Il en est ainsi, lorsque la saison s'avance ou que les intempéries et les gros temps menacent ; mais, communément, la généralité n'est pas aussi pressée. Les jeunes ont à parfaire leur développement, tous à acquérir des forces pour les longs vols ; d'ailleurs, plus ils approchent du terme de leur voyage, moins ils ont de hâte. En conséquence, ils sont guidés par les conditions de la saison et la convenance des lieux : les uns

voyageant par étapes, les autres, de plaines en plaines, de forêts en forêts, de buissons en buissons, de tertres en tertres, car la variété de marche est considérable; mais tous picorant à qui mieux mieux la large provende qu'ils trouvent en chemin, et l'embonpoint qu'ils y acquièrent est le combustible nécessaire, la réserve en quelque sorte, pour les grandes évolutions. Mais encore faut-il, pour trouver cette plantureuse existence, qu'ils sachent les contrées où elle existe et dans lesquelles ils pourront stationner à l'aise. Sans aucun doute, ils ont la latitude de *brûler* les étapes dans les contrées stériles pour eux : les exemples en sont fréquents; mais, encore, pour des êtres doués de tant de prévision, l'existence ne peut être livrée à l'incertitude. Et de fait, en tout pays où la nourriture de prédilection d'une ou plusieurs espèces est copieuse, on peut dire, par avance, que les passagers seront abondants. Nous en avons une preuve frappante dans le Jura, à ses différentes altitudes. Si la sécheresse a sévi dans la plaine, si le sol est dénudé, sans couverts, sans nourriture, le passage des cailles, à l'automne, y est nul; tandis que dans la montagne, où les céréales achèvent tardivement leur maturité, elles sont en tel nombre que mon père et un de ses frères, il y a longtemps, en

tuai cent à eux deux dans une matinée. Le point de stationnement habituel des deux Nemrod était assez curieux : c'était un hermitage fort confortable, ma foi ! où un vieux parent, ancien Bernardin et fort bon vivant, avait pris sa retraite. La chapelle servait de réceptacle au gibier, méthodiquement rangé sur les bancs. La chronique ne dit point si on chantait le *requiem* aux victimes ; mais, pour sûr, elles avaient de beaux *alleluia* aux festins qui s'ensuivaient.

Pour les oiseaux qui voyagent de jour et à haut vol, l'étendue de leur vue et toutes les indications que la nature des lieux leur fournit, ici des eaux vives ou marécageuses, là des forêts, là des plaines, des terres en tel ou tel état, nues ou couvertes de telle ou telle nourriture, etc., etc. ; on peut dire qu'ils ont sous les yeux, dans toute l'acception du mot, *un plan à vol d'oiseau*, et leur feuille de route paraît facilement tracée. Mais, quant à ceux qui s'élèvent peu au-dessus du sol, ou qui voyagent de nuit, souvent par les plus obscures, d'où leur proviennent les renseignements nécessaires pour agir avec certitude?... — Ce n'est pas le dernier des points d'interrogation que nous aurons à nous poser ; car l'observation la plus soutenue est loin encore d'avoir résolu tous les problèmes du fait compliqué dont nous nous

entretenons. — Mais, enfin, nous avons vu une première indication dans le tact merveilleux des fluctuations atmosphériques que possèdent les oiseaux, puis le langage des bêtes, c'est-à-dire, la communication des idées, des impressions, par tels ou tels genres de sons ou de signes, bien que très-obscur pour nous, n'en existe pas moins d'une façon très-réelle et très-palpable. Les cris d'appel et les chants variés des oiseaux, dont nous sommes loin de saisir toutes les nuances; une foule de moyens qu'ils possèdent et que nous pouvons observer, sont largement suffisants pour nous le prouver. La sentinelle qui veille, tandis qu'une bande repose, sait certainement se faire entendre et comprendre, quand un péril menace; l'oiseau qui *réclame* au haut d'un arbre est compris de ses semblables qui passent, car ceux-ci s'arrêtent ou poursuivent leur route, selon qu'ils le jugent à propos. On peut donc penser que les expérimentés instruisent ou guident les jeunes; que tous reçoivent en chemin des indications des stationnaires; qu'eux-mêmes se communiquent leurs avis sur la route à tenir, et, qui sait! que des émissaires partent à la découverte, comme nous pourrions l'augurer de nombreux exemples de migrations partielles anticipées, et comme le croit Toussenel, ce grand observateur du monde vivant des oiseaux.

Chasse aux cailles, page 56.

*
* *

Nous venons d'avoir une première raison de l'abondance plus ou moins grande, d'une année à l'autre, des passages des diverses espèces dans un même lieu ou dans plusieurs, par les conditions d'existence et de bien être qu'ils offrent constamment ou accidentellement. Mais ce n'est pas la seule.

Il tombe sous le sens que le nombre des sujets aux points de départ, soit par la réussite des nichées, soit par toute autre cause, y a sa part dans toute la zone longitudinale correspondante. D'un autre côté, la conformation géographique de ces mêmes lieux de partance, comme il en sera rapporté un fait important, de même que l'obstacle des hautes montagnes dans les parcours, doivent déterminer des veines, des courants de migration, plus considérables ici que là. Il pourrait en résulter un trouble dans la dissémination des oiseaux, voulue par la nature, si une troisième influence ne venait à l'encontre : c'est celle de la direction des vents aux époques de la migration. Ceci demande quelques explications théoriques sur le vol des oiseaux.

L'oiseau, par sa conformation en plan horizontal, prend aisément son point d'appui sur la

couche d'air inférieur à lui. Si cet air est animé, dans la direction du vol, d'un mouvement égal ou supérieur, l'assise fait défaut à l'oiseau parce que la résistance manque, et son vol forcément s'abaisse. C'est l'histoire du cerf-volant qu'on voudrait entraîner selon le courant du vent. La corde de traction représente exactement la force motrice de l'oiseau et elle devient sans action, parce qu'elle n'a pas de point d'appui. La condition normale du vol est donc d'être dirigé droit dans le vent. Les chasseurs qui battent les champs en ont une preuve fréquente; si on lève une alouette sous un vent un peu fort, au premier instant elle profite du courant qui l'entraîne pour s'éloigner; mais si on observe attentivement, on voit que son vol est surbaissé, embarrassé, parce que le gouvernail, la queue, ne peut agir, et qu' aussitôt qu'elle se juge en sûreté, elle s'empresse de faire volte-face; c'est alors seulement qu'elle s'élève, comme si elle glissait sur un plan incliné.

Cette condition du vol nous donne de nombreuses explications; car c'est dans les grands parcours que son influence se fait surtout sentir. En premier lieu, si, en temps voulu, l'oiseau ne trouve pas des courants atmosphériques à sa guise, et on sait si les variations en sont multiples, il attend, ou, si le temps presse, il dévie

à droite ou à gauche pour trouver un vent plus favorable, au besoin, il s'abrite des hautes montagnes. Ainsi le groupe des Alpes est un point de bifurcation des migrations de l'Europe centrale, selon le vent qui règne d'un côté ou de l'autre. Plus encore il y a lieu de penser, comme il sera dit, que les oiseaux de haut vol, avec la perspicacité qui leur est donnée des choses de la nature, mettent à profit les contre-courants supérieurs de l'atmosphère.

On voit donc l'importance de cette troisième considération. Elle motive à elle seule la variété des veines de migrations annuelles dans les mêmes lieux ; d'autre part, elle indique, de concert avec les précédentes, le mode de dispersion des oiseaux ; et, enfin, elle donne la raison pratique des variations d'intensité au début, au milieu ou à la fin des passages, et, parfois, de la suppression subite de ces derniers.

*
* *

Après la subsistance, la sécurité est une des grandes préoccupations de l'oiseau, car il est exposé à bien des périls, et de nombreux ennemis le menacent sans cesse sur terre et dans l'air. A ses ennemis terrestres, il échappe par la vigilance et par le vol ; mais il en a beaucoup d'autres parmi

ses semblables, doués des mêmes moyens volatiles, souvent à un degré supérieur, et c'est de ceux-ci surtout qu'il a à se garer, principalement dans ses longues traites de voyages.

Les petits oiseaux des buissons et des bois, Rouges-gorges, Fauvettes, etc., passent généralement de jour, isolément, mais de fourrés en fourrés, et ne s'éloignant jamais de leurs abris. D'autres, au vol plus fort, émigrent par familles, le père et la mère guidant les jeunes, et tous veillant au salut commun. D'autres se réunissent en troupes, souvent innombrables ; de cette façon, ils ne sont pas décimés un à un par leurs ennemis, les rapaces ailés. L'Étourneau est de ce nombre, et sa tactique est des plus savantes ; les grandes bandes tourbillonnent sur elles-mêmes tout en poursuivant leur vol, chaque oiseau décrivant un cercle du centre à la surface. Dans ce tourbillon perpétuel, l'oiseau de proie ne sait lequel happer et reste coi, absolument comme nous autres, les rapaces humains, lorsque nous nous trouvons au milieu d'un vol considérable qui passe de tous côtés : nous ajustons de ci de là, en haut, en bas, et, finalement, le gibier est hors de portée que nous n'avons pu placer un coup de fusil. D'autres se disséminent et passent sournoisement. Puis un certain nombre voyage exclusivement la nuit, soit

que leur vol plus lourd ait besoin de la fraîcheur de la nuit pour se soutenir, soit qu'ils aient plus particulièrement à redouter les déprédations des rapaces diurnes. Là encore la variété est grande ; chaque espèce a son mode et ses lois de migration dont il ne nous est pas toujours donné de comprendre le sens.

Les époques sont elles-mêmes aussi diverses et fort variables comme précision ; car certains oiseaux agissent avec la régularité d'un chronomètre, pour ainsi dire, tandis que d'autres doivent attendre un état déterminé de l'atmosphère.

Telles sont les conditions les plus générales de la migration ; d'autres non moins intéressantes, trouveront plus naturellement leur place dans l'étude spéciale des groupes qui va suivre, et nous les y ajournerons,

*
* *

Néanmoins, il faut encore observer que les deux migrations du printemps et de l'automne, c'est-à-dire le départ des oiseaux et leur retour parmi nous, ont une certaine différence. A l'automne, ils nous arrivent multipliés par la reproduction ; ils sont donc plus nombreux, et ils passent aussi plus lentement, retenus qu'ils sont par l'abondance de la victuaille et la nécessité de parfaire leur embonpoint, véritable

réserve de route.- C'est par conséquent l'époque dans laquelle nous pouvons recueillir les plus amples renseignements sur leurs agissements, et celle qui doit éveiller le plus notre attention, d'autant qu'il s'y rattache un double attrait : celui d'un fin gibier souvent, et celui d'un exercice agréable et salulaire à l'arrière-saison. Au printemps, après leur longue absence et leurs longues pérégrinations pendant lesquelles ils ont été soumis à bien des vicissitudes : les fatigues, le jeûne parfois, les intempéries subites ou prolongées, les spoliations d'une foule d'ennemis, la mort naturelle elle-même qui a fauché dans leurs rangs durant ce long espace de temps, ils nous reviennent bien diminués et légers d'embonpoint; l'impérieuse loi de la reproduction hâte leur vol et leur dissémination, et, à tous égards, nos observations ne peuvent être que plus limitées. Mais un fait général domine ces deux époques, c'est que les passages ont lieu à peu près dans un ordre inverse dans chacune d'elles, et par les mêmes motifs de température et de nourriture, à savoir : que les premiers émigrants de l'automne sont les derniers arrivants du printemps et *vice-versa*.

Cela dit et avec ces données, entrons dans le monde des oiseaux en voyage.

CHAPITRE III

MIGRATEURS DU SUD-EST

Si ce livre était écrit uniquement au point de vue de la chasse, l'ordre le plus pratique serait de prendre les passagers à leurs époques successives, en commençant par les premiers migrants pour terminer par les derniers. De son côté, l'histoire naturelle réclamerait qu'on procédât selon la série des espèces établies par sa classification. Mais, dans cette étude spéciale, l'une ou l'autre marche entraînerait forcément à une grande confusion, soit de direction, soit de temps. L'ordre qui paraîtrait le plus logique, au premier coup d'œil, serait de suivre les deux grandes divisions de la migration d'automne et du printemps ; mais là encore, obligés que nous serions de traiter deux fois des mêmes oiseaux, nous tomberions forcée-

ment dans des redites et souvent dans la sécheresse d'une simple nomenclature, sans toutefois sortir des difficultés précédentes.

Dans cette perplexité, il est à penser que ce grand mouvement bisannuel de la migration se localisera mieux dans l'esprit par les divisions tout aussi naturelles de la direction : de telle sorte que dans ce tableau général, on verra les espèces comme s'entrecroisant d'elles-mêmes, les unes inclinant à l'Ouest, les autres tendant droit au Sud, les troisièmes à l'Est, par leur propres conditions d'existence ; et la besogne en sera d'autant simplifiée. C'est cette méthode que nous adopterons. Et pour procéder du simple au composé, nous commencerons précisément par les dernières espèces, fort peu nombreuses d'abord, et dont la principale est soumise à des intermittences qui nous éclaireront d'autant mieux sur les causes et motifs de la migration dans son ensemble. Nous continuerons par les migrateurs du Sud-Ouest, bien que les plus tardifs ; mais là encore les indications que nous recueillerons allégeront le lourd chapitre des migrateurs du Sud, de beaucoup les plus considérables en espèces et en sujets. Une quatrième case sera réservée aux migrateurs d'altitude qui descendent des hautes montagnes dans les plaines, et aux accidentels qui appa-

raissent de loin en loin ou sur quelques points seulement par des causes plus ou moins connues.

Commençons donc par un oiseau assez peu intéressant en lui-même, mais fort curieux par ses us et coutumes.

Le GEAI (*Garrulus*), universellement connu en

Le geai.

Europe, est le type le plus caractéristique des migrants du Sud-Est, et la raison en est simple. Bien qu'omnivore, c'est-à-dire se nourrissant de tout, insectes, larves, vers, graines, chair, fruits, œufs et oisillons; car il ne se gêne point, à

l'exemple de tous ses collègues corvirostres, corbeaux, pies et autres, pour dévaster les nids ; il a en grande prédilection les glands et les châtaignes dont il fait très-bien des réserves pour prolonger sa satisfaction. Comme les arbres qui produisent ces fruits sont limités par la nature dans une veine latitudinale comprise à peu près entre le trente-cinquième et le cinquante-cinquième parallèle, il est bien obligé de suivre cette zone, lorsqu'il émigre, et cela en se dirigeant à l'Est, puisqu'elle lui est coupée à l'Ouest par l'Océan, Il craint peu le froid, et, quoi qu'il arrive, il laisse toujours des représentants à l'état sédentaire parmi nous. Ce dont il a souci, c'est la pâture, doué qu'il est d'un robuste appétit ; puis de sa tranquillité, car c'est un épicurien qui aime à digérer et à dormir tranquille. Qu'un bruit insolite se produise, qu'un animal circule furtivement dans le hallier où il a élu domicile, ce sont aussitôt des vociférations, de véritables cris.... *de geai en colère*. Cette remarque, sur laquelle j'insiste, sert souvent aux chasseurs à leur signaler le passage du gibier. Dans ces conditions d'être peu frieux, peu délicat, mais de grand appétit, il n'y a pas lieu de s'étonner que ses migrations soient fort variables ; car il a le vol lourd et ne se déplace que par force majeure. Il passe des geais générale-

ment tous les ans, vers le commencement d'octobre ; mais un peu, beaucoup et quelquefois.... pas du tout ! puis, à des laps de temps plus ou moins longs, des quantités formidables. D'où on peut conclure qu'il leur faut des motifs spéciaux pour quitter leurs habitudes casanières et se mettre en voyage : soit la pénurie de nourriture, soit la trop grande multiplication de l'espèce ; car bien que vivant en famille jusqu'au temps de la reproduction, ils supportent mal le voisinage trop rapproché de leurs semblables, hors la question de sécurité durant la migration ; soit encore un autre motif qui va être dit dans un instant. Ils voyagent en troupes assez nombreuses, peu compactes, en traînants, par le temps sec et beau ; un temps humide allourdirait encore leurs ailes peu déliées. C'est habituellement de dix heures à midi que leur mouvement de marche est le plus accentué, et, chaque jour, il augmente d'intensité jusque vers le 22 octobre, après quoi il cesse complètement. Ils passent par courts vols, de forêts en forêts, de bocquetaux en bocquetaux, d'arbres en arbres, escaladant les escarpements en biais et de gaules en gaules, piallant, braillant, bagueaudant en chemin et se riant des passants, quand ils n'ont rien à en craindre. Un certain jour de mon enfance, j'en vis un se pendre par

les pattes à une branche pour me regarder passer. Je lui lançai mon bâton et il partit en me gouaillant : « *Geaigeai.... Kouaï!....* » Et tous ses camarades de répéter. « *Geai-geai.... Kouaï!... Kouaï* » !

Voilà l'usuelle coutume. Or, en 1872, j'ai été témoin d'un de ces formidables passages dont je viens de parler. Contrairement à tous les usages traditionnels de l'espèce, le passage commença le 1^{er} septembre. C'était jour d'ouverture de la chasse, et je signalai le premier vol de quatre à cinq à deux confrères en saint Hubert qui, comme moi, battaient l'estrade dès l'aurore, et qui ne voulurent pas me croire, tant l'époque était insolite à leurs yeux. L'air étant très-chaud, les pauvres diables, qui n'étaient point surchargés de graisse, selon toute apparence, volaient très-haut pour trouver un peu de fraîcheur, à longue portée, presque sans arrêt ; ils avaient pour cela un juste motif : pas un gland, pas un fruit, ne pendaient aux arbres de nos forêts ; et le sol, durci par une longue sécheresse, ne pouvait leur offrir ni larves, ni vermisseaux. Ils fuyaient donc dare-dare vers des contrées plus plantureuses. Ils continuèrent ainsi, augmentant de nombre et abaissant de jour en jour leur vol ; l'air devenant plus frais ; jusqu'à la fin de septembre. Si bien qu'un beau matin,

Si bien qu'un beau matin.... page 50.

débrouillant la piste d'un lièvre sur une crête, j'en vis un vrai torrent passer dans la gorge au-dessous de moi. Les chasseurs du pays, mis en éveil par les passages des jours précédents, s'étaient portés en foule sur une côte située en face, par delà la vallée, où les geais venaient forcément buter et reprendre haleine sur les arbres. Ce fut un feu roulant toute la matinée et on en fit des abattis monstres. Deux tireurs, à eux seuls, en rapportèrent quatre-vingts ; encore avaient-ils manqué de munitions. De mémoire d'homme, on n'avait vu pareille abondance, et il fallait remonter jusqu'à l'année 1854, pour se rappeler quelque chose d'approchant.

Disons en passant que la chair du geai est loin d'être merveilleuse : le gland ne lui communique ni saveur agréable, ni tendreté ; on dit que les châtaignes la rendent meilleur ; mais, enfin, on en fait des salmis qui, fortement relevés, sont mangeables. En revanche, sa chasse est très-amusante et on court volontiers sus à cet oiseau vorace, querelleur, curieux, braillard et gouailleur. Puis il donne à tous les pièges, à tous les appeaux comme un nigaud ou un écervelé, bien qu'à l'état sédentaire il soit des plus défiants et rusés. Les cris d'un de ses pareils que l'on provoque en pressant les articulations des ailes l'une contre l'autre, l'imi-

tation du cri de la chouette, même le bruit du tambour le font accourir de très-loin.

Tout cela ne nous donne pas la raison de cette migration si anormale, qui pour ma part me rendit fort perplexe. Mais voici ce qui suivit : à peine cet oiseau avait-il achevé son passage, que toutes les *cataractes du ciel* se précipitèrent sur la terre comme au temps du déluge. Pendant un grand mois la pluie tomba par torrents et le vent d'ouest ne cessa de souffler et de faire rage, au point que des inondations survinrent partout, mais particulièrement en Belgique où elles causèrent de graves désastres. Voilà un premier fait !

A l'automne de l'année 1876, un très-fort passage de geais eut encore lieu, mais à une époque plus régulière. En rendant compte de ce second exemple, je demandais s'il fallait s'attendre au même temps postérieur qui avait marqué la migration fabuleuse de 1872. La réponse ne se fit pas attendre. Dès le mois de novembre suivant, de semblables ouragans se répétèrent tout du long et particulièrement sur le littoral de France et de Belgique ; cette fois ce fût la Bretagne qui eut notablement à souffrir.

D'après ces deux faits précis et en considérant que ces oiseaux nous viennent du Nord-Ouest, que par conséquent leur départ commence depuis

Pendant un grand mois.... page 54.

ce même littoral océanique, ne pouvons-nous pas y voir une indication, en attendant de plus nombreuses observations, que les gros temps et les bourrasques qui menacent cette région et la zone correspondante, devant infailliblement pourrir les graines, submerger la pâture du sol, bouleverser l'atmosphère, c'est-à-dire, couper les vivres et troubler la tranquillité de ces volatiles pointilleux sur ces deux chapitres, sont la cause première de leur migration en masse. Pour ma part, cette prévision du temps à venir ne me surprend pas, tant j'ai de confiance dans la perspicacité des oiseaux, en général, ou, pour mieux dire, dans la raison d'être de leurs agissements; et j'en citerai de nombreux autres exemples. Si cette hypothèse, déjà sérieusement motivée, devenait, par la suite, une certitude, nous aurions ainsi dans le geai un précieux avertisseur.

De toutes façons, il poursuit sa migration jusqu'à ce qu'il rencontre des contrées plus riches en victuaille et moins menacées des grandes intempéries. On nous dit qu'il va jusqu'en Perse où, du reste, on le retrouve à l'état indigène, sans doute après s'être fort disséminé en route, car son retour au printemps est problématique, les sédentaires, bon gré malgré, suffisant à la reproduction; ce qui expliquerait d'une autre

manière, par la lenteur de l'accumulation de population, les migrations phénoménales à longs intervalles. Dans tous les cas, ce retour est peu apparent et ne se manifeste plus par de grandes bandes, comme à l'automne. Une seule fois dans ma vie, il m'est arrivé de voir un réel passage de printemps; et encore, avec des circonstances à dérouter toutes les prévisions. Ces geais venaient de l'Ouest et se dirigeaient à l'Est en un long ruban ou en un mince filet continu qui vint se heurter à la première rampe du Jura. Ils la suivirent et la contournèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrassent un vallon, par lequel ils s'élevèrent sur le plateau supérieur. J'étais précisément à ce point d'escalade, à peindre une charmante source de ma vallée, dite du *Gros caillou*, d'un bloc de rocher éboulé des roches qui dominent. Cela dura trois matinées, identiquement dans les mêmes conditions et dans le même ordre. — Où allaient ces oiseaux? Quel mobile leur traçait cet itinéraire nouveau? — Autant de problèmes! — et on voit combien ils sont fantaisistes, mais instructifs, dans leurs marche.

*
* *

Après le geai, à la chair coriace, par compen-

sation nous avons l'Ortolan, délice des gourmets, dont une partie migre à l'Est.

L'ORTOLAN (*Emberiza hortulana*; en provençal, *l'ourtouran*) est un petit granivore de la famille des bruants des naturalistes qui se caractérise par un bec conique dont la mandibule inférieure débordé légèrement la supérieure et forme un léger hiatus dans les coins. Son plumage, sur le dos, rappelle de très-près celui du bruant des haies (la verdière des départements de l'Est), mais partout ailleurs le jaune est remplacé par une couleur fauve cendrée, très-claire. Cet oiseau a cela de très-particulier qu'il se cantonne en France, pendant l'été, exclusivement dans l'ancienne province du Languedoc. Comme il est tout à fait inconnu plus au Nord, on le confond souvent avec certains becs-fins ou avec le torcol, oiseau du Nord, un peu plus gros qu'une alouette, surtout reconnaissable à sa longue langue qui lui sert à happer les fourmis. Celui-ci est aussi un fin petit gibier, malheureusement trop rare. Nous le trouvons quelquefois isolément dans les haies et les buissons, au mois d'octobre.

L'ortolan arrive, dans sa contrée d'élection, au commencement de mai. Il niche à terre dans les vignes et dans les blés. Il en repart du 15 août au 15 septembre. Une partie traverse les Pyrénées

pour gagner l'Espagne ; l'autre se dirige droit à l'Est pour passer en Italie par les gorges des Basses-Alpes et à une certaine distance du littoral, car on en voit peu sur les bords de la Méditer-

Torcol.

rannée. C'est ainsi qu'il est de passage en Provence où on le chasse, comme en Languedoc, aux grands filets-battants avec l'aide des appelants.

On sait que son embonpoint, qui le rend comme une pelote de graisse, est tout à fait factice ; il

est pris vivant et généralement vendu à un spécialiste, qui le renferme dans une chambre obscure dont le sol est jonché de millet. On ne l'en sort pour la consommation que lorsqu'il est devenu assez gras et lourd pour ne pouvoir plus s'enlever et se percher.

*
* *

Tous les naturalistes s'accordent à dire, sans citer de faits à l'appui que le ROSSIGNOL (*Sylvia luscinia*) émigre aussi à l'Est par les contrées méridionales de l'Europe, passe l'Archipel et va hiverner en Syrie et même en Égypte. C'est, il est vrai, un des oiseaux très-mystérieux dans leur migration, voyageant silencieusement dans l'ombre des buissons ou des bois et probablement la nuit, dont il est difficile de suivre la marche. Cependant nous savons que les rossignols arrivent en bon nombre dans le Midi de la France où les Provençaux en font d'excellentes brochettes, car il est très-délicat, comme tous ses congénères, les charmantes fauvettes. « C'est abominable » ! diront les âmes sensibles du Nord, région, en effet, où on aurait un remords d'immoler de gaieté de cœur ces mélodieux muscisiens. — Mais le gibier sédentaire et sérieux est si rare en Provence, que les

habitants se précipitent avec frénésie sur toute provende ailée qui passe à leur portée. Ajoutons, pour leur excuse, ce principe gastronomique : c'est

Rossignol.

que plus les oiseaux avancent dans leur migration, plus ils ont acquis d'embonpoint et plus excellents ils sont, et ces fins gourmets de Provençaux résistent difficilement à un régal de petits-pieds.

Mais de là, où et comment se dirigent-ils ? — Nous savons encore qu'ils sont très-répandus en Algérie, et rien n'empêche de penser, qu'après s'être disséminés en Espagne, en Italie, et dans l'Est-Sud, une partie, tout au moins, passe en Afrique, comme plusieurs autres représentants de la famille des fauvettes.

Ils quittent régulièrement notre latitude ou pour mieux dire notre zone isotherme, ce qui est bien plus exact en tout ce qui concerne les évolutions des oiseaux, vers le 15 août. Dans l'instant où je préparais ce chapitre, assis dans un bosquet de jardin, j'avais autour de moi toute une famille de rossignols fort affairés, allant et venant, picorant çà les vermissaux, là les baies du sureau-corail, tout ce qu'ils rencontraient à leur convenance. On voyait clairement qu'ils se hâtaient de prendre des forces pour le grand voyage, et que le jour était proche. J'intriguais fort les jeunes en contre-faisant leur cri, « *K'â-K'â !.... K'â-K'â !* », qui est loin, ainsi que celui de leurs parents à cette saison, « *Krrr!.... Krrr!.... !* » du charme de leur chant printannier, et ils me regardaient avec de grands yeux — a partir du 16, je n'en revis plus aucun.

Ils nous reviennent, avec non moins de ponctualité, du 12 au 15 avril, à un jour près, selon la

température régnante. C'est à ce moment précis, qu'on prend les mâles pour les mettre en cage : Quelques jours plus tard, ils sont appariés, et se

laissent mourir sentimentalement de chagrin dans leur prison.

Là se termine la très-courte nomenclature des migrateurs du Sud-Est.

CHAPITRE VI

MIGRATEURS DU SUD-OUEST

Ainsi qu'il a été dit précédemment, les oiseaux qui prennent cette direction du Sud-Ouest sont les aquatiques ou palmipèdes et, généralement, les oiseaux de rivage, ainsi que les paludéens; certains qu'ils sont de trouver de ce côté un climat relativement doux et humide, et en somme, plus immédiatement toutes leurs conditions d'existence. Tant que l'excès de froidure ne les atteint pas dans leurs cantonnements, ils stationnent avant que d'aller plus loin, et, fort nombreux en espèces, en variétés, plus encore en sujets; car la race est prolifique au suprême; c'est par myriade qu'on les voit, à certains jours et en bons points, sur la surface des eaux ou des terres marécageuses.

*
* *

Les premiers en date de migration, sauf une exception qui sera dite plus loin, sont les BÉCASSINES, fins gibier et fin voiliers véritablement prédestinées aux voyages de long cours : aussi peut-on être assuré, par avance, qu'on les trouvera du nord au sud, jusque sous les tropiques et sans doute par delà, partout où il y aura des marais, des vases, des terres humides à sonder de leur bec effilé pour en extraire les larves et les vers, et des ajoncs, des herbes, pour se remiser. Que leur importe une traite de cinq cents lieues : c'est peut-être pour elles l'affaire d'une nuit ou d'un jour !

On compte en Europe trois espèces de bécassines.

La DOUBLE BÉCASSINE (*scolopax major*), la plus grosse et la plus précoce dans ses passages. Elle arrive dès les premiers jours de septembre ; par contre, elle est tardive au printemps et ne remonte qu'en avril et mai.

La BÉCASSINE ORDINAIRE (*scolopax gallinago*), la plus abondante, est le type de la famille. Elle voyage de nuit, préférant même les plus obscures, alors que la lune est dans ses premiers et derniers

quartiers ou complètement masquée par d'épais

Double bécassine.

nuages ; quelques fois aussi dans les matinées

Bécassines.

fraîches, peut-être simplement en excursion de

victuaille. On l'entend sans la voir, car son vol est très-élevé, à une façon de petit bêlement, « *Mè-è-è-e.....* », produit par une rapide trépidation du guidon terminal de l'aile. Si l'on se trouve dans l'endroit du marais où elle a résolu de se poser, on la voit plonger en quelques zigzags rapides comme l'éclair, et tomber à proximité ; dans cette descente vertigineuse, l'impression visuelle n'a pas eu le temps de lui révéler votre présence. Son passage, qui commence dans le courant de septembre, se prolonge généralement jusqu'au premier décembre, selon le plus ou moins de précocité des frimas ; mais le fort a lieu du 15 octobre au 15 novembre. Elle nous revient dès le commencement de février et la migration printannière dure jusqu'au 1^{er} avril.

LA PETITE BÉCASSINE (*scolopax gallinula*), surnommée la *sourde*, par l'apathie qu'elle met à se lever, attendant presque qu'on lui marche dessus, est aussi la plus lente à migrer et son vol est moins rapide. Des trois, c'est la plus sédentaire en France ; c'est-à-dire, qu'elle y niche en nombre de lieux.

La migration des bécassines, très-régulière en fait, l'est très-peu en réalité, quant à la quotité dans les mêmes lieux : car il arrive souvent que le sol n'y est point préparé à leur guise ; les marais

étant trop inondés, les remises sont rares ; trop secs, elles ne peuvent y picorer ; et de leurs fines ailes, elles ont bientôt fait de filer plus loin ; mais elles passent néanmoins , quoiqu'on en voie peu. M. Pellicot, un observateur provençal dont le nom sera souvent cité, nous en fournit

Petite bécassine.

une preuve, dans son livre de la migration sur les côtes de Provence, en rapportant qu'il suffit de répandre de l'eau courante dans une prairie pour être sûre d'y trouver des bécassines le lendemain. De son côté, M. A. della Faille de Leverghem, d'Anvers, mon honorable correspondant, me citait un autre exemple : en 1875, les étangs de sa chasse étaient amplement pourvus d'eau ; passage insignifiant ! Mais à une lieue de là, on avait fait écou-

ler les étangs; passage abondant, parce que la vase, mise à sec et non desséchée encore, promettait une ample pâture.

Quoique bien fins voiliers et pouvant toujours dominer les vents calmes, les bécassines préfèrent néanmoins le vent debout, soit le sud-ouest à l'automne, soit le nord-est au printemps, c'est toujours sous cette influence qu'il faut s'attendre aux meilleurs passages; il y a longtemps que les chasseurs du Nord l'ont constaté. Ceci prouve la vérité de la théorie pour tous les oiseaux en général. Aussi M. della Faille fut-il fort surpris de constater, un certain matin de printemps, que les bécassines avaient subitement disparu, bien que le droit vent d'ouest régnât alors. En jetant les yeux sur le tableau-bulletin qu'il venait de m'envoyer, je crus en entrevoir la cause. A deux jours de là, le vent de Nord-Est se mit à souffler avec continuité: or en bonne météorologie, on comprend qu'un courant inverse agit d'abord sur les couches supérieures moins denses, puis peu à peu refoule toute la masse de celui qui lui est opposé. Est-il alors, bien étrange de penser, la sagacité dévolue aux oiseaux étant donnée, que les bécassines, averties de cet état de chose et sachant que le vent favorable soufflait à une faible hauteur, se soient élevées jusqu'à lui et en aient profité pour gagner

le but qu'elles avaient hâte d'atteindre? — En rassemblant ainsi tous les éléments de la question, on arrivera sans aucun doute à trouver nombre d'explications qui sont encore à chercher.

Lorsqu'on considère les vastes espaces de reproduction de la bécassine qui s'étendent depuis notre zoné jusqu'à l'extrême nord, son immense champ de parcours sur la surface du globe, l'élévation et la puissance de son vol qui la met à l'abri des rapaces les plus rapides, il est difficile d'admettre que l'espèce aille en diminuant, surtout du fait de l'homme dont les grands moyens de destruction sont mis ici en défaut et qui n'a d'autres recours contre elle que son adresse et son arme de chasse : or, on sait la difficulté du tir de ce gibier, et ce qu'on parvient à en abattre n'est qu'un léger tribut perçu sur la masse. Et cependant, surtout dans l'intérieur des terres, on se plaint perpétuellement de sa disparition. C'est qu'on ne tient aucun compte des dessèchements, des assainissements, etc. etc.; en un mot, de ce fait, qu'un pays assaini, qu'une agriculture plus perfectionnée plus productive, enlèvent forcément aux bécassines leurs demeures et leurs points de stations; et il en est ainsi pour beaucoup d'autres espèces. Mais qu'on aille dans les vastes plaines humides ou marécageuses de la Somme ou mieux encore

dans celles de la Hollande, et on y apprendra par les exploits des chasseurs de ces contrées que l'espèce n'est pas près de s'éteindre.

Cet intéressant oiseau aura eu une longue notice. En voici un autre, son proche, mais grand parent, qui ne lui cède point.

Bécasse.

La BÉCASSE ! A ce nom, le chasseur et le gastronome, se découvrent ; car c'est un gibier béni, au bois comme à table. A l'automne, sa chasse est une des plus agréables récréations cynégétiques ; mais elle est attristée par la perspective

des mauvais jours qui vont venir. Au printemps, il n'en est plus ainsi, et aux premiers rayons du soleil, après une longue réclusion, c'est un véritable charme ! J'ai cherché à en peindre la scène dans la fantaisie qui suit.

BÉCASSE, MA MIE.

Dès qu'arrive ce satané mois de mars, qui vous a une senteur printannière, mêlée de bises et de giboulées, je suis pris, dans mon cabanon de Paris (ce que d'aucuns appellent leur appartement), d'un insupportable bourdonnement d'oreilles, à me rendre sourd comme une cruche.

— *Crow-Crow.... P'sit-P'sit!...—Crow-Crow.... P'sit-P'sit!* — Et ainsi de suite.

Eh ! parbleu !... C'est la bécasse qui passe, et moi je suis entre quatre murs, chassant... les gais souvenirs, tirant... des lignes noires sur du papier. — Triste ! Triste !!!....

C'est pourtant bien tentant là-bas. Pas n'est besoin de devancer l'aurore, à moins qu'on ait la passion de la passée du matin, et sur le coup de neuf heures, selon la distance de la forêt, on se met en marche, en amateur. — Attention aux lisières, aux pointes de bois ! La bécasse qui a picoré dans les champs la nuit, est remisee là au matin.

Attention aux bas-fonds, aux coteaux exposés au soleil, si le temps est sec ou chaud ; aux pentes abritées, si le vent est aigre. — Eh ! le grelot de Médor se ralentit.... Bonne chance ! Une piste.... — « *Tout-beau !* » — .

Je crois avoir fait cette remarque : les jeunes bécasses inexpérimentées montent en fusée, et, volontiers, papillonnent un instant à vous regarder, vous et votre chien : c'est un moment propice ! Les vieilles, rusées commères, filent sous bois et s'empres-sent de se masquer de tous les obstacles. — Mais, soit l'une, soit l'autre, quelle agréable émotion quand au.... piff ! de votre rifle, répond cette autre note sourde : Pouf!!!... de la bécasse qui tombe sur le sol. — « *Apporte !* » — Et d'une dans le sac ! C'est victoire ; car il ne faut pas s'attendre à en tuer à la douzaine, comme simples mauviettes.

Voilà l'action en train, avec toutes ses péripéties de cépées et d'épines, de surprises et de réussites ; voyons maintenant le décor : — Entre temps, vous jetez un coup d'œil autour de vous. Sur le ton bleu des fourrés, le premier soleil scintille le long des plantes ; des mousses, qui reverdissent, pointent les anémones, les narcisses jaunes et de mignonnes jacinthes bleues ; des ronciers émerge le bois-joli ; et de fines gouttelettes d'émeraude

Le chasseur, jambe deci, jambe delà... (Page 77.)

semblent pendre aux branches des buissons précoces. La saine senteur de la sève qui remonte, l'air frais et pur, dilatent votre poitrine. — Dieu! comme on respire bien ici! — Les fanatiques de cette chasse ont mille fois raison.

Passé midi, les bécasses, en bestioles douillettes, se remettent et font une sieste. Plus de *frais*! Il faut suspendre la partie.—«Tiens! Médor, sur cet épais tapis de feuilles sèches, en plein soleil au pied de ce grand chêne, nous ne serons point trop mal non plus ». Le chasseur s'assied, jambe deci jambe delà, il étale ses vivres; le sobre, une modeste corne de fromage; d'autres, des victuailles plus sérieuses. Le chien, sur son bienséant, suit tous les mouvements, attentif, mais sans impatience; car il sait bien qu'il aura sa part. Après la dernière accolade à la gourde, on allume une pipe : quel pipe! Dans ses spirales bleuâtres, tourbillonnent tout un essaim de gentes dames au long bec, voletant, papillonnant, et.... la somnolence venant, on s'étend dans le pays des songes. Médor en fait autant; mais lui ne dort que d'un œil : au moindre bruit, il relève la tête, son œil brille et semble dire : — « *Quel est l'intrus qui vient troubler le repos du maître?* » — Brave bête, va!

A trois heures, frais et dispos, on reprend

l'action : la bécasse a terminé son somme et vague à ses affaires. C'est le moment de lui redire quelques mots d'amitié. Et les émotions recommencent jusqu'au déclin du jour. — Nouvelle station jusqu'à la passe. A cette heure plus fraîche, une souche est le fauteuil de rigueur, et on *philosophie* à l'aise dans la solitude des bois, ou bien on suppute les victimes, si le sort a été propice.

Mais voici l'acte final de l'*opéra* qui prélude. Le ciel s'illumine des feux du couchant ; la grive, le *maestro-soprano* du printemps, entonne du haut du chêne sa mélodieuse *cantilène*. — Quelle ampleur de voix ! l'air sonore en retentit. — Le pinson lui riposte en *contralto*, et le frétilant rouge-gorge fait sa partie de haut-bois dans les buissons. — Attention ! Attention !... La bécasse donne aussi sa note de basse-taille : l'orchestre est complet ; c'est le grand morceau ! — « *Crow-Crow ! P'sit-P'sit !...* » — En cadence comme les joyeux *fron-fron* de nos pères. C'est la passe ! Debout et l'œil au guet. —

— « *Crow-Crow.... P'sit-P'sit !* » —

Un couple amoureux, folâtrant, entre-croisant leurs becs, arrive sur vous.... Pauvres chers ! — Un double coup de tonnerre éclate.... *Pin!!!.... Pan!!!....* — Roméo et Juliette ont mordu la pous-

sière. — Bravo ! au chasseur. — C'est un dénouement triste, mais bien émouvant.

— *O povero caro mio !* Je voudrais bien y être. —

Et dire qu'un affreux ânier de mon voisinage a jugé à propos de prendre le grelot de mon chien pour le pendre au cou de sa bête et me donner chaque matin une aubade ; que le merle du Luxembourg lance, dès l'aube, ses éclatantes vocalises.... — Mes pauvres oreilles, laissez-moi tout au moins en paix !

— « *Crow-Crow.... P'sit-P'sit !!!...* » —

-- « *Crow-Crow.... P'sit-P'sit !!!...* » —

C'est à en devenir fou, ma parole d'honneur !

Je termine cette note gaie en laissant à ceux qui en voudront la dénomination de *scolopax rusticola* dont la science a affublé notre oiseau. Le nom de Bécasse, très-explicite, *abondance de bec, long bec*, nous suffit largement et a le bon sens d'être français. Mais si les savants ne parlaient point grec.... ils ne seraient point savants ! — Ce coup de patte, en passant, du chasseur naturaliste aux naturalistes de cabinet.

Buffon fait simplement migrer les bécasses en altitude ; c'est-à-dire, qu'elles stationneraient, selon lui, pour la nichée, sur les hautes montagnes de la zone tempérée, comme les Pyrénées, les Alpes,

le Jura, etc., et que de là, la mauvaise saison venant, elles se contenteraient de descendre dans les plaines et de s'y promener deci delà. Mais il admet qu'elles sont répandues dans tout notre continent, et rapporte qu'Adamson en a vu également au Sénégal. Nous sommes aujourd'hui mieux fixés à leur sujet. Qu'à leur migration de printemps, elles laissent quelques représetants, dans les lieux élevés, ceci n'est point douteux. M. de la Faille en a trouvé un couple en été, même en Italie, sur les Apennins, et il n'y pas d'année où l'on ne découvre quelques couvées sur les plateaux du Jura; mais le nombre en est infime. Leur véritable station estivale est le Nord; les renseignements les plus précis l'établissent et leurs conditions d'existence suffiraient à le démontrer.

Plus encore, M. della Faille, un chasseur-cosmopolite, a posé, d'après ses nombreuses observations, une théorie des plus judicieuses de leurs parcours que je m'empresse de rapporter; ce sera une des primeurs de ce livre. — Une carte de l'Europe sous les yeux et considérant la direction doublement obligatoire des bécasses au sud-ouest; par l'humidité et la disposition des terres, autrement, si elles émigraient directement au sud, on n'en verrait que quelques rares spécimens dans toute la partie occidentale de notre continent, il

dit : Un premier groupe de migration part de la pointe isolée de la Norvège et aborde en Écosse ; il a, pour preuves à l'appui, les rapports des navigateurs de la mer du Nord, qui rencontrent fréquemment des bécasses dans leurs traversées. De là, ce groupe longe les côtes d'Angleterre jusqu'à la pointe du Norfolk où il se divise en deux parts : l'une arrivant sur les côtes de Belgique et de France pour suivre la voie qui va être dite : cette double particularité lui est indiquée, d'une part, par la rareté des bécasses sur les côtes occidentales de l'Angleterre et en Irlande, comme il l'a constaté lui même ; d'autre part, par leur passage plus précoce à Bruges qu'à Anvers situé plus au Nord et à l'Est. La deuxième portion continue par les côtes anglaises, passe sur celles de Normandie et de Bretagne où, en effet, leur importante station est depuis longtemps signalée. Le groupe, plus ou moins réuni, côtoie le golfe de Gascogne ou le traverse obliquement pour gagner le littoral nord de l'Espagne et se répandre dans l'ouest de ce pays : les nombreuses bécasses qui se brisent la tête chaque saison contre les phares d'Oléron et de Cordouan, à la grande satisfaction des gardes-sédentaires, ne laisse aucun doute sur l'abondance du passage dans cette direction.

Un deuxième groupe, doublé des bécasses de la

Finlande, part de la presqu'île Suédoise, descend en Danemark, en Hollande : ce sont ces bécasses-là qui apparaissent à Anvers plus tardivement que celles de passage à Bruges. Puis elles se répandent dans le centre de la France et arrivent au pied des Pyrénées, excellente station encore, d'où elles passent en Espagne.

Un troisième groupe part des côtes russes de la Baltique, passe en Allemagne et arrive dans le bassin du Rhône, pour suivre de là la côte orientale hybérique.

A cet ordre de marche, il faut ajouter un quatrième et immense groupe, composé de toutes les bécasses du nord de la Russie, se répandant sur toute la zone méridionale de l'Est européen, et couvrant l'Italie par l'aile droite, la Grèce par l'aile gauche.

A partir de notre zone isotherme de Paris, et selon l'intensité de l'hiver, l'ensemble des bécasses commence à laisser des retardataires qui, souvent, ne vont pas plus loin. Cette arrière-garde augmente de plus en plus en avançant au midi, et les marais Pontins, en Italie, sont pour eux un lieu de repos si favorable, que les chasseurs du pays en font des abattis superbes, quelque chose comme trois ou quatre cents par hiver. Le surplus passe en Afrique par les points le plus à sa convenance,

et se dissémine en deçà du Sahara, ou va se remiser sous le Tropique.

Je résume sommairement la théorie de M. della Faille pour la rendre simple et claire, en la complétant de mes propres renseignements de l'Est et d'ailleurs. Cette conception, si logique qu'elle tombe sous le sens après un léger examen, en même temps qu'elle jette un jour tout nouveau sur la migration générale, n'a pas tardé à recevoir une éclatante consécration de l'observation suivie. Au printemps de 1877, je recevais de trois correspondants : MM. A. della Faille de Leverghem, d'Anvers, De Cugnac, du Gers, P. Petitclerc, de la Haute-Saône, un tableau détaillé des passages de la saison, dans leurs contrées respectives. J'y vis que le plein de la migration des bécasses avait eu lieu, à Anvers, *du 9 au 19 mars*; dans le Gers, *du 11 au 26*; dans la Haute-Saône, *du 5 au 16*. Évidemment les bécasses du Gers n'étaient point les mêmes que celles de Belgique et de Vesoul; c'est-à-dire que le groupe du centre des Pyrénées était en retard sur les deux autres; et la cause en devenait manifeste en comparant les températures, cotées jour par jour, de ces différents lieux. Tandis que, dans le courant de mars, le thermomètre ne s'abaissait pas à plus de 2° au

dessus de zéro, à Anvers, pour s'élever à 18°; dans le Gers, par suite d'influences météorologiques particulières, il descendait jusqu'à 8° au-dessous de zéro, pour ne s'élever qu'à 11 au-dessus, au dernier jour du mois. — C'est un des beaux résultats de notre bureau d'observation de la *Chasse Illustrée*.

Quelques bécasses nous arrivent dès la fin de septembre, de même qu'il en passe encore en décembre; mais la vraie migration a lieu du 20 octobre au 20 novembre. Au printemps, le mois de mars est le temps consacré, de toute éternité, pour leur retour. Le papillon jonquille, cher au chasseur et qui éclot aux premiers rayons de soleil, semble être leur émissaire. Elles voyagent par vols épars, et il est sage, lorsqu'on en trouve une au bois, de battre les alentours; la certitude est grande qu'on en trouvera plusieurs. Comme leur vue est très-sensible à la grande lumière, c'est au crépuscule et à l'aube qu'elles prennent leurs grands ébats, quittant les fourrés pour verroter en plaine et faire leurs ablutions, en personnes propres, aux mares et aux flaques d'eau. A la nuit close, elles se mettent en voyage, préférant, elles, les nuits les plus claires; à ce point que les chasseurs, par longue expérience, appellent la pleine lune de novembre la lune des

bécasses. On les distingue généralement en deux variétés, la grosse et la petite, celle-ci quelquefois de taille minuscule; mais tous les naturalistes s'accordent à n'en reconnaître qu'une seule et unique espèce, les petites étant les mâles, à taches plus larges et plus foncées, ou même les tard-venues n'ayant pas encore atteint leur complet développement.

Nos anciens nous ont rebattu les oreilles d'histoires merveilleuses de bécasses. Mon père, par exemple, de tout une poudrière usée à amorcer son fusil (c'était le bon temps des fusils à pierre), par un brouillard des plus humides, sur une nuée de dames au long bec qui lui partaient entre les jambes, de tous côtés : un de mes vieux amis, de vingt-cinq bécasses occises en un jour. Belle aubaine, en vérité! etc., etc. — A tout prendre, et par ce que nous connaissons déjà des éventualités des migrations, c'étaient là des chances heureuses, mais accidentelles, de passages spéciaux ou d'accumulations dans un même lieu. Selon l'usuelle coutume, on en conclut tout droit à l'extinction prochaine de la race.

Je ne suis pas aussi humoriste, et pour rassurer les attristés, mon ami Toussenel en tête, voici un renseignement précis. Mon honorable correspondant de la Haute-Saône, M. Petitclerc, grand chas-

seur de bécasses devant le Seigneur, ne se contente pas d'affirmations vagues, il note jour par jour ses rencontres. J'ai sous les yeux un de ses relevés pour une période de douze ans, de 1862 à 1874 ; j'examine, et je vois que l'avantage est précisément à la dernière année. Autre détail instructif : les chiffres les plus élevés se retrouvent de cinq en cinq ans ; ils vont en diminuant, puis remontent, et ainsi de suite : avis aux amateurs ! — Avant de se désoler, il faudrait considérer le vaste champ des espèces, leur nombre formidable, et bien se rendre compte des causes et des motifs, ainsi que de leurs effets.

*
* *

J'indique sommairement en passant les BARGES (*Limosa*), qu'on pourrait surnommer les grosses bécasses des marais, les RALES D'EAU (*Rallus aquaticus*), les MAROQUETTES (*Gallinula porzana*), les POULES D'EAU (*Gallinula chloropus*), les FOULQUES (*Fulica atra*), les MARELLES, MOCROULES, etc. : population des marécages, pour la plupart migrateurs d'arrière-saison, assez peu communs dans les terres sèches de l'intérieur, mais abondants sur le littoral.

Il faudrait tout un volume sur ces races palu-

déennes, ainsi que sur les aqualiques, mais écrit

Barges.

Rale.

par un praticien de longue date, et je décline

toute compétence, en ma qualité de *terrien* des hautes terres. Je m'en tiens donc aux groupes les plus connus du commun des mortels, et bien suffisants pour fixer la théorie.

Poule-d'eau.

*
* *

LES PLEVIERS (*Charadrius*) et les VANNEAUX (*Vannellus*) confondent trop souvent leurs rangs en voyage, et leurs habitudes sont tellement semblables, qu'il est vraiment inutile de les séparer; ce qui sera dit des uns s'appliquant aux autres.

Ces grands migrants des terres humides ni-

chent assez avant au nord, dans les grandes plaines d'en-deçà de la Baltique. Les œufs de vanneaux, d'un vert très-foncé et de la grosseur d'un

Foulque.

très-petit œuf de poule, sont en grande réputation gastronomique : on en consomme et on en expédie, de Hollande principalement, des quantités considérables ; le haut prix auquel ils sont cotés sur place, 0 fr. 50 la pièce, est bien fait pour allécher la convoitise. C'est là un genre de destruction plus ou moins recommandable d'un oiseau utile au premier degré. Les Hollandais, qui sont

très-friands de cet aliment, disent pour se disculper que les vanneaux, ne valant rien par eux-mêmes, contrairement au proverbe, sujet à caution, il est vrai : *Qui n'a mangé pluviers ni vanneaux ne sait ce que gibier vaut* ; c'est bien le

Pluvier.

moins qu'ils se dédommagent sur leurs œufs ; que, du reste, ils n'enlèvent que la première ponte, et que les femelles, très-prolifiques de leur nature, ont bien vite réparé le mal. Il est de fait que, dans les immenses plaines de leurs stations estivales, la destruction n'agit guère que sur une part infime, et nous les voyons toujours apparaître

en nuées, chaque année, sur les points à leur convenance. A certains temps, les arrivages à Paris en sont formidables.

La saison de pluie, assez générale à l'équinoxe

Vanneaux huppés.

d'automne, est pour eux le signal du départ. Ils savent que c'est l'époque où les vers de terre, les lombrics, émergent du sol, à la nuit, pour l'accouplement, et que la pâture sera plantureuse. Ils passent de jour, par grandes bandes transversales, et à peu de hauteur, pour bien inspecter

les lieux. Leur itinéraire est tracé par les grandes plaines où ils font de fréquentes stations, pâturent surtout la nuit, avec cette curieuse habitude, que les pêcheurs mettent aussi en usage, de battre le sol avec leurs pattes pour comprimer les bestioles et les obliger à sortir; mais régulièrement, chaque matin, ils se rendent aux grèves pour y faire leurs ablutions. C'est un instant propice pour les affuter, car, hors de là, ils sont toujours en éveil, et des sentinelles font le guet pour les avertir de tout danger. Dans les lieux de grands passages, on les chasse aux filets battants et on en prend des quantités considérables. Après avoir séjourné tout le long de leur route et surtout dans les contrées méridionales, leur vol rapide et soutenu les porte en Afrique, où ils font de longues excursions.

Leur retour s'effectue de la même manière, dès les premiers jours de mars ou mieux après le dernier dégel; car ils sont de ceux d'entre les migrateurs dont on peut présager, lorsqu'on les revoit, que l'hiver est bien fini.

*
* *

La grande tribu des oiseaux de rivage renferme bien des genres et nombre de familles dont les

Combattants — (Page 95.)

membres sont pour la plupart exclusivement maritimes et, par suite, sont peu connus et fort peu susceptibles d'être observés, sauf quelques exceptions, partout ailleurs que sur les littoraux. Du reste, leurs habitudes de migration sont aussi à peu près les mêmes : arrivée avec les premiers froids, ^{et} vie errante sur les rivages, en suivant l'abaissement de la température ; retour dans les mêmes conditions dès que l'hiver cède. En voici les principaux genres, hors quelques beaux spécimens exotiques et de migration rare ou accidentelle dont il sera parlé ultérieurement.

Les BÉCASSEAUX (*Tringa*) qui comptent sept variétés dont le plus beau type est le COMBATTANT (*Tringa pugnax*), ainsi nommé de son humeur querelleuse.

Les CHEVALIERS (*Totanus*, en provençal le *Charlo*), le genre type et le plus élégant parmi les élégants de cet ordre ; excellent gibier, d'ailleurs, comme tous ses congénères. Six genres : le *Chevalier gambette*, le *Chevalier stagnatile*, le *Chevalier sylvain*, le *Chevalier guignette*, le *Chevalier aboyeur* et le *Chevalier cul-blanc*. Je dirai quelques mots de ce dernier qui diffère complètement par son habitat et ses mœurs.

Le CHEVALIER CUL-BLANC (*Totanus Ochropus*, *Graveline* en divers pays du centre : le *Bécasseau* de

Buffon) est indigène comme d'autres, du reste, et

Chevaillers.

habite les rives de nos rivières et de nos laes. Il

Chevaliers cul-blanc.

est beaucoup plus modeste de forme, de toilette

et de volume que tous les autres ; sa taille est celle d'une bécassine ordinaire, et il est beaucoup plus précoce aussi dans sa migration. Dès le mois de juillet, réuni en famille, il commence ses vols d'entraînement, en décrivant de grandes évolutions à la surface des eaux et en poussant des cris

Courlis.

aigus, à la manière des martinets. C'est un fin petit gibier qu'on a le tort généralement de ne pas chasser en France. Dès le milieu d'août, il se met en route ; on le trouve, alors, le long de nos plus petits cours d'eau vive, par groupe, par couple ou isolément. Il doit revenir assez tardivement, en avril, je suppose.

Les COURLIS (*Scolopax arquata*), façon d'ibis de nos climats, qui, bien que préférant les plages du littoral, sont aussi de passage dans l'intérieur des terres, stationnant dans les prairies humides et le long des cours d'eau, mais en petit nombre et tout à fait en camps volants, à leurs deux migrations d'octobre et de mars. Ils vont en Afrique et fort au loin, car on les retrouve identiques à Madagascar.

Je laisse de côté de nombreuses espèces plus rares ou exotiques, dont il sera fait mention dans le chapitre des migrants accidentels.

A elle seule, la race immense des oiseaux aquatiques proprement dits ou des *palmipèdes* demanderait un *in-folio* en quatre-vingt-dix-neuf chapitres, pour être traité *in extenso*. Comme nous le savons, leur épais et chaud vêtement de duvet et de plumes, imperméable à l'eau, à l'humidité, au froid, de même que la grande vertu prolifique dont la nature les a dotés, marquent leur haute destination : peupler, animer, exploiter la région arctique. Là, ils trouvent des eaux vives ou stagnantes toujours abondantes et amplement pourvues de végétaux, de bestioles, de *frais* et de

fretin de poisson. C'est leur patrie, leur contrée d'élection, qu'ils ne quittent que contraints par la force des choses, lorsque l'excès d'abaissement de température leur ferme la surface des eaux, leur champ d'existence. Ils émigrent alors, mais à regret et se hâtent de revenir dès que la température se relève ; par les hivers d'alternances de froid et de tiède, c'est un va-et-vient perpétuel fort apprécié des chasseurs. Telle est leur loi commune.

Le cercle polaire, voilà leur domaine. Bons voiliers pour la plupart, ils y circulent à leur convenance ; passant d'Europe ou d'Asie en Amérique, soit par le détroit de Behring, soit par le Spitzberg ou les Ferroë et l'Islande, avec autant de facilité que les migrateurs du Sud traversent la Méditerranée, et plus encore ; car ils ont, eux, la latitude de se reposer sur les flots quand bon leur semble. Il en résulte que toutes les espèces sont à peu près communes à la superficie de notre hémisphère, et que, bien qu'une espèce de canard, le *Col-vert* des chasseurs, l'*Anas boschas* des savants, soit plus spécial à notre continent, nous en voyons apparaître, chaque hiver, un nombre considérable de variétés.

Après ces considérations générales, l'histoire de leur migration particulière sera simple.

Le CYGNE (*Anas cygnus*), par la magnificence de

la forme et l'ampleur de son vol, tient la tête de l'ordre. Tout à fait indigène du Nord, il s'acclimata très-bien, comme on sait, sous le climat de

Cygnés.

notre zone tempérée. Sur le lac de Genève, après quelques tentatives et avec des soins, les cygnes sont devenus aujourd'hui sédentaires et à demi civilisés. C'est un exemple de compensation, qui peut s'étendre à d'autres espèces et parer à la

pénurie des oiseaux dont on se plaint. Dans leur région natale, très-farouches de leurs cantonnements envers leurs semblables, ils vivent par couples solitaires ; mais à l'automne, ils se réunissent en troupe. Très-bons physiciens de leur nature, ils ont reconnu de longue date que l'agitation de l'eau empêchait la congélation ; chaque matin et chaque soir, à l'heure où le froid est le plus intense, ils se livrent à des mouvements d'ailes vigoureux qui probablement leur sont nécessaires pour combattre l'engourdissement, mais qui agitent fortement la surface de l'onde et retardent d'autant le moment où ces oiseaux devront suivre la règle générale. Les cygnes en voyage se disposent en longues lignes régulières ; seulement ils n'arrivent guère sous notre zone qu'isolément ou deux par deux, ce qui ne les empêche point de s'avancer assez loin au sud.

L'espèce des OIES (*Anas auser*), qui comprend plusieurs variétés, est caractérisée chez nous par l'Oie sauvage proprement dite (*Anas segetum*), la plus abondante. Il m'est arrivé d'en voir des vols accidentels à la mi-septembre, par de gros temps ; mais c'est en novembre qu'on a chance de les rencontrer. Elles stationnent et pâturent le jour dans les champs et gagnent le soir les grands étangs ; seulement bien malin le chasseur qui peut

les approcher à distance propice ; ce n'est guère que le hasard qui donne cette aubaine. Une fois, je manquai une belle occasion. Je revenais de chasse à la chute du jour, et, approchant du logis,

Oie sauvage.

je déchargeai mon vieux fusil à baguette sur des corbeaux. Cent mètres plus loin, *pin !!!... pan !!!...* dans la plaine ; en même temps, je vis se lever une magnifique troupe d'oies qui vint passer droit sur ma tête, à dix mètres de hauteur. Mon espingole vide, je dus me contenter de les regarder passer. Lorsqu'elles se lèvent, elles partent en bande confuse, et ce n'est que plus tard qu'elles prennent leur vol spécial, par file indienne, si elles sont peu

nombreuses, en angle et espacées régulièrement si elles le sont davantage. Ce vol géométrique, commun à nombre de palmipèdes, a de quoi surprendre. On a dit vaguement jusqu'ici que cette disposition était plus favorable pour fendre l'air ; mais la question n'est que déplacée, car pourquoi tous les oiseaux volant en troupe n'en font-ils point usage ? — On a ajouté que l'oiseau de tête avait seul à supporter le premier effort et que les autres en étaient d'autant allégés ; que, lorsque ce chef de colonne était fatigué, il cédait la place au second, et ainsi de suite. — M. le comte d'Esterno, un chasseur-naturaliste autorisé, démontre, dans un livre d'une observation rigoureuse sur le *Vol des oiseaux*, que, s'il en était ainsi, l'oiseau de ligne, trouvant devant lui un air tourmenté, troublé par les mouvements de celui qui le précède, serait incapable de voler parce qu'il manquerait de point d'appui ; qu'à l'inverse, chaque oiseau vole parallèlement à tous les autres et non dans un axe commun, de telle sorte qu'il a perpétuellement devant lui sa portion d'air intacte. Ceci est plus positif et plus conforme à la réelle théorie du vol, mais ne nous dit pas encore la solution dernière, la raison d'être de cette locomotion bizarre. Nous avons déjà vu que tous les oiseaux voyageant en troupe ont, en y regardant de près,

leur ordre particulier de marche, dont le plus étonnant est certainement le vol tourbillonnant des étourneaux. J'en recherche la cause, qui ne peut être, à mes yeux, que la résultante des conditions du vol propre à chacune de ces espèces, et, aidé par l'observation de M. d'Esterno, j'en conclus, dans l'exemple présent, que les palmipèdes à queue courte, manquant par conséquent d'un gouvernail suffisant, à long cou qu'ils sont obligés d'étendre pour maintenir leur équilibre, n'ont pas relativement le vol aussi souple dans leur direction que la généralité des autres espèces et sont astreints à cet ordre de marche régulier sous peine de s'entraver, de se gêner mutuellement. Ceci ouvrira la voie, je crois, à d'autres explications.

On a fait cette remarque que les oies, comme bien d'autres oiseaux, volaient haut par le temps clair et sec, volaient bas par les temps brumeux, et on a pensé qu'elles agissaient de la sorte, dans cette dernière circonstance, pour se guider, à défaut de l'horizon, par les configurations du sol. Comme tous les autres volatiles, elles sont elles-mêmes leur propre boussole, et il y avait une raison physiquement plus simple, c'est que l'air humide et moins dense alourdit leurs ailes et forcément abaisse leur vol. — Maintenant, jusqu'à quelle latitude méridionale s'avancent-elles ?

Fort loin, à leur convenance, selon toute probabilité; car l'espèce, comme celles d'autres de leurs congénères, se retrouve identique dans l'hémisphère austral. — Elles remontent définitivement, lorsqu'elles sont assurées que leurs pénates de l'extrême nord sont libres pour les recevoir, en

Canards sauvages.

mars, même en avril; mais elles sont pressées alors, voyagent par grandes étapes, et on les entend passer la nuit plus qu'on ne les voit de jour.

La famille des canards est si nombreuse en variétés et d'une si grande puissance de prolifération, qu'elle pourrait à elle seule peupler la surface de la terre.

Le CANARD SAUVAGE proprement dit (*Anas boschas*), le beau *Colvert* des chasseurs et le type primitif de nos canards domestiques, niche dans toute notre zone tempérée et s'étend jusqu'aux régions polaires. La femelle couve de 10 à 25 œufs et recommence plusieurs fois. Il faut un froid sérieux, de 5 à 6° au-dessous de zéro, c'est-à-dire assez vif pour congeler la surface des eaux tranquilles pour le décider à émigrer. Il s'éloigne alors, se dispersant partout où il rencontre des eaux ou sources chaudes qui lui permettent de vivre, mais il revient bien vite, dès que le froid cesse. C'est ainsi que nous le rencontrons jusqu'au fond de nos vallées montagneuses, et ce qui fait que les temps variés d'hiver, les alternances de gel et de dégel, sont les plus favorables à sa chasse ; il passe et il repasse sans cesse, alors. A la fin de la saison, le passage est encore assez variable ; mais, dès le mois de mars, tous regagnent leurs pénates et, en avril, ils sont en plein travail de reproduction.

Au colvert se joignent un nombre infini d'espèces diverses : le TADORNE (*Anas tadorna*), le CHIPEAU ou *Ridenné* (*Anas strepera*), le PILET ou *Canard à longue queue* (*Anas acuta*), le SIFFLEUR (*Anas penelope*), le SOUCHET (*Anas clypeata*)¹, le MILOUIN (*Anas ferina*), le MORILLON, la MACREUSE (*Anas nigra*), le HARLE (*Mergus*), les SARCELLES D'ÉTIÉ ET D'HIVER, etc.,

sans compter quelques types exotiques qui viennent d'on ne sait où, d'Amérique, d'Asie, car toute la terre leur appartient d'un pôle à l'autre.

Leurs habitudes de voyage sont les mêmes que celles des grandes espèces des cygnes et des oies, sauf un détail : les canards se remettent en mer ou

Canards Pilets.

sur les grands étangs pendant le jour et vont pâturer dans les champs ou les eaux peu abondantes la nuit. Comme c'est un beau et bon gibier, la difficulté et la rudesse du métier aidant même, leur chasse a ses adeptes fanatiques. Le chien d'arrêt, l'affût, les appelants, les engins de toute sorte, tout est bon pourvu qu'on soit patient et habile, car la vigilance des oiseaux est de ces plus grandes.

Chaque année on voit apparaître, dans les journaux, ce cliché consacré : « on a vu passer de grands vols d'oies, de canards, signe certain d'un

Macreuse.

hiver précoce et rigoureux ». Nous venons de voir ce qu'il en faut penser : c'est-à-dire que l'hiver sévit ou va sévir dans l'extrême nord tout sim-

plement ; mais ce n'est point là une raison pour qu'il vienne jusque chez nous. On pourrait tout aussi bien dire, et souvent à tort, de leurs allées

Chasse aux canards

et venues, que la fin de l'hiver est proche. Les migrateurs du Sud sont plus positifs dans leurs agissements, comme nous en verrons de nombreux exemples.

CHAPITRE V

MIGRATEURS DU SUD

La migration directe au sud, en tenant compte de la réserve qui a été faite d'une inclinaison forcée à l'ouest, déterminée par la disposition des terres des deux continents européen et africain dans cette dernière direction, est la plus normale, et devait comprendre la grande part de nos espèces migratrices. En face de cette multiplicité de sujets qui vont passer rapidement, à tire-d'aile, devant nos yeux, un ordre rigoureux est nécessaire pour éviter la confusion et conserver à ce grand mouvement son aspect le plus pittoresque. Voici celui que je crois devoir adopter : prendre, par ordre de date, les premiers migrateurs de l'automne de tous les genres de cette multitude d'oiseaux ; grouper immédiatement à leur suite tous

leurs congénères, et passer successivement ainsi toutes les principales espèces en revue ; et encore je ne réponds pas d'en omettre, un peu volontairement, quelques-unes des moins intéressantes, pour alléger ce long chapitre.

Cela dit, ce sera un groupe de l'ordre des *passereaux* qui ouvrira la marche. La classification scientifique comprend sous ce nom un nombre considérable d'espèces dont elle ne savait probablement que faire, comme l'insinue spirituellement Toussenel, car elles sont souvent bien dissemblables. Comment comparer, par exemple, et réunir dans une même catégorie, un corbeau et un colibri, un martinet et une fauvette de buisson ? Ce nom a été inspiré sans doute d'un vieux mot français, *passeret* ou *passerot* (du latin *passer*, passer, circuler, être toujours en mouvement), encore en usage dans certaines provinces pour désigner le merle de roche ou solitaire, et aussi le rossignol de muraille. Car si cette désignation avait la prétention de spécifier l'action d'émigrer, elle serait des plus fausses, en ce sens que cette action est commune à tous les ordres, à tous les genres, et qu'elle n'est la loi d'aucune en particulier. Cette distinction était dictée par notre sujet.

Mais Toussenel a épuisé la critique de la clas-

sification officielle avec une verve des plus gauloises et en observateur judicieux de la nature sous son véritable aspect, la *vie*, apportant en même

Martinets.

temps le remède au mal. Nous n'avons donc pas à y revenir, sinon lorsque l'occasion forcera le larron.

LES MARTINETS de nos cités (*Cypselus murarius*), ou *martinets noirs*, avec la régularité d'un chronomètre, quittent notre zone d'observation du 28 au 30 juillet, et nous reviennent du 2 au 4 mai. Cette régularité et cette précocité de migration ont, il me semble, une commune origine. Le martinet fait sa pâture des insectes qu'il happe, dans son vol, de sa gueule visqueuse et fendue jusqu'aux oreilles. Ce vol étant habituellement très-élevé, l'oiseau doit s'en prendre surtout aux insectes qui s'élèvent le plus haut dans l'atmosphère, et qui sont précisément soumis les premiers au refroidissement qui hâte leur évolution aérienne; de même qu'au printemps ils sont des derniers à sortir de leurs larves pour trouver dans les hautes régions de l'air la température dont ils ont besoin; et les martinets doivent naturellement compter sur les phases d'existence de ces insectes sous peine d'abstinence.

Dès que les jeunes sont sortis du nid où ils ont demeuré longtemps pour permettre à leurs ailes, leur seul moyen de locomotion, de prendre leur entier développement, la famille, réunie en groupe compacte, commence ses entraînements de voyage, le matin et le soir, par de grandes circonvolutions et en poussant des cris aigus. Après quoi, toute la tribu d'un même lieu se rassemble en bande,

tournoyant dans le ciel avec des cris fort différents, assez semblables à celui de la crécerelle; et un beau jour, le temps étant venu, tous ont disparu simultanément, sans qu'on ait pu préjuger de leur direction, absolument comme ils nous sont venus au printemps.

Buffon nous dit que, redoutant beaucoup la chaleur (la preuve en est, à ses yeux, qu'ils se tiennent blottis dans leurs trous de rochers ou de murailles au milieu du jour), ils se dirigent d'abord au nord pour redescendre ensuite au sud à l'arrière-saison. Il cite à l'appui quelques vols revus en septembre et même en novembre. Or, voici ce que j'ai vu moi-même récemment : à la fin d'octobre de l'année 1875, au soleil couchant, une troupe nombreuse tournoyait au-dessus de moi, en poussant ses cris de crécerelle qui précisément me firent relever la tête, et s'éloignait au sud ; à l'inverse, le 18 août 1877, vingt jours après la disparition des indigènes du pays, deux martinets, évidemment des retardataires, passaient sur ma tête à sept heures du matin, décrivant de grandes orbes qui allèrent se perdre droit au nord. Plus encore, un grand vol, *crécellant*, prenait, le 20 septembre, la même direction. J'écrivis immédiatement à mon correspondant d'Anvers pour lui communiquer ces observations et le prier de

me dire comment se comportaient les martinets dans sa contrée et plus au nord, si possible. Il me répondit qu'il ne s'était jamais bien rendu compte des agissements de ces oiseaux; mais que, dans sa localité, on en voyait encore au 15 août généralement. Ce simple renseignement suffit à démontrer que ce n'est pas l'appréhension du froid qui les fait fuir de notre latitude, et qu'il est dès lors probable qu'ils vont d'abord à la recherche des générations d'insectes de leur choix, nécessairement plus tardives en avançant au nord, pour revenir ensuite au sud, leur vraie direction de migration. Le même fait va se représenter à propos des hirondelles : il touche à une question plus générale qui a été soulevée souvent, à savoir si un certain nombre d'espèces ne suit point d'abord la maturité des graines, des fruits, ou l'apparition d'autres nourritures, en remontant au nord, pour redescendre ultérieurement. Nous aurons occasion d'y revenir.

La variété du martinet noir, le MARTINET A VENTRE BLANC (*Gyselius albinus*), plus forte de taille, au vol plus puissant et plus élevé encore, a besoin de la plaine campagne pour s'ébattre à l'aise; elle fuit nos villes et niche dans les rochers, et peut-être dans les vieux arbres. Ses allures de migration sont encore plus obscures; mais il

est probable qu'elles sont les mêmes que celles de leurs confrères.

Toussenel rapporte que le naturaliste italien Spallanzani a calculé que les martinets faisaient quatre-vingts lieues à l'heure, ce qui fait un vol de quatre-vingt-neuf mètres à la seconde. En plein élan, ce n'est peut-être pas exagéré. On conçoit alors la facilité de locomotion de ces êtres privilégiés et la difficulté d'observation de leur marche. En quelques heures, ils peuvent franchir toute la zone tempérée; en quelques autres, se transporter à l'Équateur et par de là, si bon leur semble, car l'espèce est répandue sur les deux hémisphères. Mais, néanmoins, cette vélocité hors ligne n'est pas suffisante pour admettre leur passage direct des côtes de France ou d'Afrique sur le continent américain, où ils existent également, si ce n'est par la route plus courte de l'extrême nord; car cette traversée exigerait un vol soutenu de soixante heures et de cette même vitesse; bien que nous sachions que ces oiseaux se sustentent, dorment, se livrent à tous les actes de la vie dans l'atmosphère, leur véritable séjour.

Une troisième famille se rattache à ce premier groupe du genre CHÉLIDON (dont la signification grecque est purement et simplement *Hirondelle*),

c'est celle des ENGOULEVENTS (*Caprimulgus europæus*). Or, ici, le larron a la main forcée par l'occasion. Guéneau de Montbelliard, le collabo-

Engoulevent.

rateur de Buffon et un père de la science, dit : « Lorsqu'il s'agit de nommer un animal, ou, ce qui revient presque au même, de lui choisir un nom parmi tous les noms qui ont été donnés, il faut, ce me semble, préférer celui qui présente une idée plus juste de la nature, des propriétés, des habitudes de cet animal, et surtout rejeter impitoyablement ceux qui tendent à accréditer de fausses idées et à perpétuer des erreurs. C'est en

partant de ce principe que j'ai rejeté les noms de Tette-chèvre, de Crapaud-volant.... donnés par le peuple ou par les savants, à l'oiseau dont il s'agit. Le premier de ces noms a rapport à une tradition, fort ancienne à la vérité, mais encore plus suspecte; car il est aussi difficile de supposer à un oiseau l'instinct de têter une chèvre que de supposer à une chèvre la complaisance de se laisser têter par un oiseau; et il n'est pas moins difficile de comprendre comment, en la tétant réellement, il pourrait lui faire perdre son lait.... » — Et c'est précisément sur cette fable que la science a basé ce nom générique de *Caprimulgus europæus*, littéralement *tetteur de chèvre d'Europe*. Passant sous silence le nom de *Gypselus* (plâtreux), donné aux martinets noirs, et qui n'exprime rien, le larron dit carrément que c'est abuser du grec et du latin.

L'*Engoulevent*, ainsi nommé habituellement par sa large gueule, niche en France. Son habitat est sur les coteaux pierreux exposés au soleil. On l'y rencontre fréquemment au mois de septembre, en chassant la perdrix ou le lièvre, étalé ou endormi aux chauds rayons du milieu du jour. Mais que nos confrères en saint Hubert l'épargnent : c'est un oiseau utile au premier chef, et ils seraient mal récompensés de leur exploit. Il

m'est arrivé, dans une circonstance pareille, d'en tuer un, surpris que j'étais de ces deux grandes ailes et d'un vol insolite qui passait devant mes

Hirondelles de fenêtre.

yeux à l'improviste, et, sur la foi des anciens, de le joindre à un salmis de menus volatiles. *Pouah!....* Je compris alors son surnom de *cra-*

Rassemblement des hirondelles, page 125.

paud-volant : il avait empesté tout le reste, qui fut bon pour les chats¹.

Myope de nature et n'y voyant qu'au demi-jour, il descend dans les plaines, au crépuscule et à l'aube, pour capturer les insectes, sa seule nourriture. Quant à sa migration, il disparaît à la fin de septembre et nous revient aussi mystérieusement en avril ou en mai.

Passons aux vraies HIRONDELLES, qui sont représentées en Europe par quatre variétés : l'HIRONDELLE DE FENÊTRE, ou à *cul-blanc* (*Hirundo urbica*); l'HIRONDELLE DE CHEMINÉE, à *gorge rousse* (*Hirundo rustica*); l'HIRONDELLE DE ROCHERS (*Hirundo montana*); l'HIRONDELLE DE RIVAGE (*Hirundo riparia*).

Dès la seconde quinzaine d'août, les hirondelles de fenêtre commencent à se rassembler et à se concerter. Ce sont généralement les toits de nos grands édifices qui servent de points de réunion. Les assemblées deviennent de jour en jour plus nombreuses, au fur et à mesure que les dernières nichées prennent leur vol ; on presse celles en retard et qui deviennent alors l'objet de soins empressés pour hâter leur essor ; jeunes et vieilles, ainsi que les voisines compatissantes, s'en mêlent

1. Cependant une dame digne de foi, chasseresse et gastronome, m'affirme qu'ailleurs, dans la forêt d'Orléans par exemple où il abonde, il est très-mangeable et même fort bon.

et apportent la pâture. Les *meetings* s'animent de plus en plus : les oiseaux ont alors un pépiement spécial; quleques-uns volent à l'entour, ou vont et viennent au loin. Puis un beau jour, aux environs du 20 septembre, un peu plus tôt, un peu plus tard, suivant la température et le temps de la saison, on n'en revoit plus.

Une observation, ancienne pour moi, m'intriguait fort. Lorsque nous chassons l'alouette au miroir, à la fin d'octobre, nous voyons passer journellement de grands vols épars d'hirondelles, tirant droit au sud, d'un vol égal et soutenu, en rasant les champs; et je me demandais si les habitantes du nord, plus aguerries, prolongeaient ainsi leur séjour. L'automne de 1877, très-varié de temps et de température, devait encore m'apporter, de même que pour les martinets, un grand éclaircissement. En raison des conditions atmosphériques, pluvieuses et froides, de septembre, le départ avait été très-précoce dans ma localité. Le 17, alors qu'il n'en paraissait plus, depuis plusieurs jours, j'en revis quelques couples dans la journée volant rapidement au nord. Les jours suivants mêmes observations; plus encore, des volées entières; et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. De son côté, M. Pellicot nous dit qu'elles ne quittent la Provence qu'en octobre. Il n'y a donc

plus à hésiter : les hirondelles, elles aussi, remontent au nord pour redescendre ensuite ; du moins celles dites *culs-blancs*, de beaucoup les plus nombreuses et les mieux observées.

L'*Hirondelle de cheminée* annonce moins son

Hirondelles de cheminée.

départ par ses rassemblements ; elle nous quitte quelques jours avant sa sœur et nous revient plus tardivement.

L'*Hirondelle grise de rochers* n'est répandue en France que plus au sud, où elle habite les roches et les hautes falaises. Elle arrive vers le 10 mars et repart la dernière ; un certain nombre demeure

sédentaire même dans les rochers bien exposés du littoral méditerranéen.

L'*Hirondelle de rivage*, la plus petite, niche dans

Hirondelles de rivage.

les trous qu'elle creuse elle-même dans les berges. Il ne faut point la confondre avec l'oiseau d'assez grande taille que l'on nomme communément *Hirondelle de rivière*, et qui n'est autre qu'un oiseau maritime, aux pattes demi-palmées et se nourrissant de poisson, égaré sur nos grands

cours d'eau. La véritable disparaît en même temps que celle de fenêtre et revient en avril : ce pourrait être celle-ci qui, par quelques faits exceptionnels, aurait donné lieu aux fables anciennes des pêcheurs.

Les hirondelles sont d'excellents observateurs de la ligne isothermique, à leur retour du printemps. Ainsi, elles s'installent à Paris bien avant que dans des contrées plus méridionales où des conditions locales retardent la température printanière, ainsi que j'ai eu l'occasion de le voir. Mais voici un fait plus caractéristique et qui prouve en même temps l'intelligence de ces oiseaux.

Au mois d'avril 1874, un manufacturier du Pas-de-Calais m'écrivait l'intéressante lettre qui suit :

« Dans ma fabrique, il y a plusieurs centaines d'hirondelles qui vont, viennent, chantent, se posent sur les métiers, si près des ouvriers que ceux-ci, s'ils le voulaient, pourraient les prendre à la main. Elles ont là leurs nids, elles y pondent, y élèvent leurs petits, à deux mètres de n'importe quel ouvrier. Et, chose étrange, on dirait que ces charmants oiseaux savent que les déjections de leurs oisillons pourraient gâter l'ouvrage ; on ne voit jamais d'ordures sous leurs nids. Ils emportent

tout. Ils rentrent, ils sortent des milliers de fois dans une journée peut-être, en ne passant jamais que par la porte. Ils ne veulent pas se servir des fenêtres ouvertes. A cinq heures et demie du matin la cloche sonne pour la rentrée des ouvriers, on leur ouvre la porte, et elles s'en vont en poussant de petits cris. A sept heures et demie du soir, quand la cloche sonne la sortie, toutes nos hirondelles rentrent au plus vite, de peur de coucher dehors, et je suis sûr qu'il en manque rarement à l'appel.

« Mais ces doux messagers du printemps sont d'une férocité rare pour n'importe quel oiseau qui se permet d'entrer dans les ateliers. Seules les hirondelles qui y sont nées ont le droit de cité. S'il survient une hirondelle étrangère, un malheureux pierrot, etc., toute la bande pousse des cris furieux, au point de dominer le bruit des métiers, et, en deux ou trois minutes, l'intrus est entouré et tombe mourant à nos pieds.

« D'autres savent peut-être comment dans une telle foule elles peuvent se reconnaître, mais ce qui étonnera surtout, c'est que, quand vous n'avez pas d'hirondelles à Paris, moi qui suis ici tout au nord de la France, à quelques lieues de la mer, dans un pays froid et humide, j'ai déjà les *miennes*. Peu nombreuses, il est vrai, ce sont

les fourrières, et dans le pays il n'y en aura pas peut-être avant trois semaines.

« A leur arrivée elles se perchent sur les métiers et entonnent un chant qui dure dix minutes au moins sans s'arrêter ; jamais leur voix n'est aussi vibrante, aussi forte qu'alors. Ce sont des roulements à n'en plus finir, elles semblent exprimer le bonheur de nous revoir, et d'être enfin arrivées au but de leur lointain voyage. »

Cette lettre exprime surtout à merveille le sentiment d'affection, de respect, qu'on a dans le Nord pour les hirondelles. Il peut arriver que des amateurs, comme exercice de tir, en abattent quelques-unes ; mais jamais pour en faire victuaille ; on les regarde même comme immangeables. Il n'en est point de même dans le Midi : ont-elles acquis en route de plus grandes qualités gastronomiques ? Je ne sais ! Mais, profitant de leur habitude de se remiser le soir dans les joncs des marais ou du bord des fleuves, c'est par milliers qu'on les capture. On me dit même qu'on les réexporte par tonnes d'Italie dans le Nord. Ce fait, je l'avoue, serait bien capable de me ranger dans le camp des protecteurs à outrance de tous les oiselets.

Logeons à la suite de ce groupe, pour n'y point revenir, deux oiseaux insectivores dont la classification européenne est elle-même assez embarrassée, car ils sont les seuls représentants de leur

Le Coucou.

genre dans notre zone tempérée : je veux parler du *Coucou* et de la *Huppe*.

Le Coucou (*cuculus canorus*) est en effet un oiseau ambigu difficile à classer. Par le plumage zébré transversalement et par son vol, il ressem-

ble à l'épervier ; par le bec et les pattes au merle ou à la tourterelle. Ses mœurs sont encore plus étranges : comme on sait, il ne fait point de nid et charge d'autres espèces du soin de couvrir, nourrir et élever sa progéniture. C'est fort commode. Cette manière d'agir, ainsi que ses allures sauvages, mystérieuses, l'ont fait accuser d'un grave méfait : celui de gober au préalable les œufs ou les petits auxquels il donne pour remplaçant son propre œuf. Il n'en est rien, et ce conte est venu sans doute de ce que la femelle, pondant à l'écart, transporte dans sa gorge, suffisamment développée à cet effet, son propre œuf pour le déposer dans le nid qu'elle a choisi ; et pousse la prévoyance si loin que, comme elle ne s'adresse généralement qu'à de petites espèces, rouge-gorge, bergeronnette, etc., qui ne pourrait nourrir plusieurs de ses rejetons, elle n'en place qu'un seul par chaque nid, bien qu'elle en ponde cinq ou six. Mais ce rejeton, une fois éclos, rejette forcément au dehors par son volume les autres œufs ou les autres petits et reste communément seul : voilà où est le mal. Le coucou se nourrit particulièrement de chenilles poilues, et il a la faculté d'en dégorger les peaux, comme les rapaces. Il émigre fin août et commencement de septembre, fort sournoisement ; il revient en avril. Il est aux premiers

jours moins sauvage, erre dans les vignes, dans nos vergers : sa chair est à cet instant très-délicate. A quoi cela tient-il ? — Je l'ignore.

La HUPPE (*upupa*), comme le coucou, tire son nom de son cri caractéristique : « *Hup-hup-hup!!!... Hup-hup-hup!!!...* » cadencé et souvent répété ; et non pas de l'aigrette de plumes qu'elle porte sur la tête et dont le nom dérive lui-même de celui de l'oiseau. Son beau plumage, fauve rosé, en fait un des plus remarquables volatils d'Europe. Il se nourrit à terre d'insectes mous et de mollusques. Il est de passage dans notre zone en septembre ; mais il y niche aussi à son retour d'avril ; il n'est point rare en été aux environs de Paris. On a fait également porter sur lui les méfaits de ses enfants, à savoir, qu'il construit son nid avec de la fiente pour le sauvegarder. Ce sont ses petits qui, enfermés dans le creux d'un arbre et ne pouvant rejeter leurs ordures, ont causé cette erreur ancienne. A l'automne, la Huppe est très-grasse et ne fait point mal à la broche.

Avec la même ponctualité que le martinet, la CIGOGNE BLANCHE à ailes noires (*ciconia alba*) se met en route le 14 ou le 15 août, par grandes troupes confuses, à plus ou moins de hauteur, selon l'état hygrométrique de l'atmosphère, et dans la mati-

née comme le soir. Elle va droit au sud, *craquant* en chemin de son long bec ; c'est son langage

La Iluppe.

de voyage. Mais son passage est moins subit et se prolonge un certain temps. Ses cantonnements

d'été s'étendent jusque par delà la mer Baltique, partout où elle est assurée de trouver une ample pâture de serpents, de lézards et de batraciens. Elle ne niche en France que dans l'ancienne pro-

La Cigogne.

vince d'Alsace. Les cigognes migrent en Afrique où un grand nombre s'arrêtent en deçà de l'équateur; mais d'autres poursuivent et passent dans l'hémisphère austral, comme on l'a vu par l'exemple de la flèche révélatrice, cité précédemment.

Ici se pose une question au sujet de ces derniè-

La Grue.

res, comme à celui de tous les oiseaux soupçonnés ou convaincus de prendre le même itinéraire trans-équatorial. Elles retrouvent dans cette autre région le printemps et la saison des amours : y subissent-elles la loi commune du lieu et s'y livrent-elles à une nouvelle reproduction? — Notre vieux naturaliste du seizième siècle, Belon, qui avait parcouru l'Orient, incline à le penser, et Adanson affirme avoir vu des cigognes nicher en Egypte pendant l'hiver. C'est là un intéressant problème sur lequel nous ne tarderons pas à revenir.

La CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) est plus rare et plus sauvage; car loin d'habiter les villes et les demeures de l'homme, elle se retire au loin; elle a les mêmes habitudes de migration et revient également en mars et en avril.

La GRUE (*Grus cinerea*), le plus grand et le plus beau type de ces échassiers d'Europe, est beaucoup plus tardive dans sa migration et nous donne rarement occasion de la voir dans notre latitude, attendu que sa station estivale est fort loin au nord et qu'elle migre la nuit, sans aucun doute par la peur de l'aigle, son ennemi acharné, et à grandes étapes, ne nous révélant son passage que par ses clameurs ou ses cris de ralliement. Elle adopte, elle aussi, l'ordre de vol triangulaire des grands palmipèdes.

Le nom seul de cet oiseau a le don de me rappeler un temps lointain, celui où à la rentrée du collège, saison froide et brumeuse précisément à laquelle la grue émigre, je commençais ou recommençais l'explication de l'*Illiade* et somnolais, plus souvent que le bon Homère (*quæcumque bonus dormitat Homerus*, réminiscence classique), sur le texte grec. J'ai tant répété ou entendu répéter ce passage de début du troisième chant qui nous intriguait fort, qu'il s'est incrusté dans ma mémoire :

« A peine les deux armées, leurs chefs à leur
« tête, sont rangées en bataille ; les Troyens, tels
« que des nuées d'oiseaux, s'avancent avec des cris
« perçants : ainsi s'élève jusqu'au ciel la voix écla-
« tante du peuple ailé des grues, lorsque, fuyant
« les frimas et les torrents célestes, elles traversent
« à grands cris l'impétueuse mer, et, portant la
« destruction et la mort à la race des pygmées,
« livrent, en descendant des airs, un combat ter-
« rible! »

Charitablement, et pour nous mettre sur la voie, le professeur aurait pu nous donner la simple explication de Buffon, à savoir que les singes qui vivent en grandes troupes en Afrique et dans l'Inde et qui sont très-friands d'œufs d'oiseaux, font aux grues une guerre acharnée. On sait avec quelle

Combat de Pongos et de Grues, page 141.

satisfaction un singe en captivité tord le cou à un perroquet qui lui tombe sous la main et le plume dextrement. Les grues, à leur arrivée, trouvent probablement ces ennemis rassemblés en grand nombre pour attaquer cette proie qui leur tombe du ciel. De là des combats terribles où les quadrumanes n'ont pas toujours le dessus, mais qui, vus de loin et avec l'imagination native des Orientaux, ont pu paraître livrés par les grues à une race humaine de petite taille. Le grand Alexandre lui-même, avant ou après son entrée à Babylone, je ne sais, faillit se laisser prendre à une semblable illusion et allait envoyer sa phalange d'élite contre une armée de singes *Pongos*, lorsque le roi Taxile lui fit remarquer que cette multitude qu'on voyait sur les hauteurs n'était autre qu'une troupe d'animaux inoffensifs attirés par la curiosité « mais, à la vérité...., ajoute Buffon ou un de ses continuateurs, moins insensés, moins sanguinaires que les déprédateurs de l'Inde ! »

Les grues partant tard, en octobre et novembre, remontent de bonne heure en mars.

Je ne cite que pour mémoire un autre bel échassier, le Héron indigène qui niche en Europe par grandes colonies ou *Héronnières* ; il n'est qu'erratique en hiver, cherchant un peu dans tous les recoins sa pâture journalière.

Le Héron.

Les BUTORS (*Ardea stellaris*), dégénérescence des précédents, sont un peu plus migrateurs ; encore s'arrêtent-ils à la limite des froids susceptibles de congeler le bord des étangs.

Le Butor.

Et j'arrive, en suivant l'ordre de date de la migration, à la CAILLE (*Perdix coturnix*), oiseau doublement intéressant par toutes les questions qu'il fait naître et comme gibier fin et délicat. Nous nous y arrêterons donc le temps nécessaire.

La caille commence à quitter nos champs où elle a fait ses nichées, lorsqu'ils se dépouillent de leurs récoltes vers le 15 août ; mais comme ces mêmes récoltes s'échelonnent jusqu'aux dernières

stations des cailles au nord, que les nichées plus lentes et plus tardives s'y prolongent, la migration se continue très-tard, jusqu'au milieu d'octobre, et même il n'est point rare de rencontrer de ces oiseaux, empêchés ou trop jeunes, après le premier novembre. Ils nous reviennent à partir du commencement de mai, lorsque les herbes des prairies sont assez hautes pour leur donner un abri ; tous les observateurs s'accordent à dire, en deux passages : le premier composé des mâles que, par les belles nuits des environs du 10 mai, on entend passer à leur cri répété : « *Carcaia !!! carcaia !!!...* », cri de ralliement et d'indication des vols épars, dont les dégradations donnent la direction des oiseaux droit au nord en même temps que l'intensité de leur vol égal, soutenu et à longue portée ; le second passage, composé des femelles et qu'on ne peut guère constater que par l'observation sur le terrain, a lieu vers le 1^{er} juin.

Elles ont pour la migration nocturne deux raisons : profiter de la température plus fraîche qui favorise leur vol ; éviter la voracité des rapaces diurnes. Quant à celle des rapaces nocturnes elles y échappent par une élévation qu'on ne peut estimer à moins de deux cents mètres.

Ainsi voilà un oiseau, au corps lourd, surtout en automne, lorsqu'il est surchargé d'embonpoint,

Famille de cailles.

aux ailes courtes et arrondies, qui, lorsque nous le faisons lever en plein jour, ne nous paraît doué que d'un vol abaissé et à courte portée, et qui la nuit fait preuve d'une puissance de locomotion que nous n'aurions pu soupçonner. C'est qu'alors, — indépendamment de l'influence de la fraîcheur, tellement manifeste pour les chasseurs qu'ils ont coutume de dire, chaque fois que le temps est frais et vif, *que les cailles volent comme des hirondelles*, — elles n'ont plus, timides et sans défense, la crainte de leurs nombreux ennemis, crainte qu'elles portent de jour à surbaissier leur vol et à chercher au plus vite un abri sous tous les couverts à leur proximité. Nous pouvons en tirer cette conséquence immédiate que si la sécheresse a sévi dans une contrée ou que toute autre cause ait dénudé les champs, on peut y pronostiquer par avance que le passage et le stationnement des cailles y seront peu abondants; elles vont plus loin, là où elles trouveront de meilleures conditions de sécurité et de réfection.

Elles nichent partout en Europe, avec une fécondité considérable et à plusieurs reprises, depuis le littoral de la Méditerranée jusqu'au cercle polaire, au dire de la généralité des naturalistes. Néanmoins, M. della Faille assure qu'au nord de la Hollande elles deviennent déjà rares et que, dans la contrée d'Anvers, le passage est presque nul ;

mais elles pullulent dans ce dernier lieu à un tel point, que dans son seul terrain de chasse, les gardes ont constaté, en une saison, douze cents nids détruits par la fauchaison des prairies artificielles. A l'automne, les plus libres et les plus dispos de ces oiseaux prennent les devants ; les autres suivent selon l'âge et la force des jeunes. Un dernier passage a lieu vers la mi-octobre, composé en majeure partie des mères qui ont été retenues par les soins à donner à leurs derniers rejetons et par la nécessité de se ravitailler elles-mêmes. Toutes ont eu alors le temps de se mettre en bel état ; aussi cette passée est-elle dite des *Cailles grasses*. Suivant leurs conditions d'activité ou à leur convenance, elles commencent à s'arrêter dans les pays à température humide et tiède, le sud de l'Angleterre, la Bretagne, où quelques-unes hivernent, et le nombre de ces stationnaires précoces va en augmentant jusqu'au littoral. La masse passe en Afrique, et M. Pellicot, de Toulon, est d'avis qu'elles ménagent leurs forces en calculant leurs étapes de façon que la dernière aboutit juste au rivage. Il en donne pour preuve que, par les jours de bon passage, tandis qu'on les trouve en abondance sur la côte, on n'en rencontre que fort peu dans l'intérieur des terres, à courte distance.

Ici se présente la grande question de la traversée de la Méditerranée qui étonne l'esprit, il est vrai, mais qu'il faut bien admettre, même pour des espèces plus chétives et plus faibles. La plus grande distance qui sépare le continent africain de l'Europe, soit de Marseille à Alger, est d'environ 650 kilomètres. La caille n'a pas sans doute l'aile dégagée de beaucoup d'autres oiseaux, du ramier, par exemple, mais les mouvements en sont beaucoup plus rapides, à ce point qu'ils échappent à l'œil dans son vol de jour. En se basant sur l'opinion d'un vol de 80 lieues à l'heure pour le martinet, de 60 pour l'hirondelle, et de 25 à 30 pour le pigeon voyageur, on peut sans exagération admettre un vol de 16 lieues pour la caille. La traversée directe lui demanderait donc dix heures, c'est-à-dire l'espace d'une nuit; et M. Pellicot estime que beaucoup exécutent ce trajet directement et d'une traite. Mais il ne faut pas oublier que les points intermédiaires ne leur manquent pas: c'est, à partir de l'ouest, le détroit de Gibraltar, large seulement de quinze kilomètres; la ligne des îles Baléares qui coupe l'espace en diagonale et par le milieu; la Corse et la Sardaigne qui se suivent, et, par leur droite direction, semblent une route toute tracée de l'un à l'autre continent; la Sicile, dont la pointe occidentale est à peine

éloignée de 150 kilomètres de la côte de Tunis ; Malte, les îles de l'archipel, sans parler d'une multitude d'îles et d'ilots à leur disposition et dont elles profitent, à en juger par les captures formidables qu'on y fait aux époques des passages. Le merveilleux disparaît donc de ce grand parcours ; néanmoins, l'effort donné par l'oiseau n'est pas léger et ce n'est pas sans motif que la nature l'a pourvu, au départ, d'un supplément de graisse, véritable aliment de son foyer de locomotion forcée, car, à son arrivée à la côte d'Afrique, on constate qu'il n'a plus le même embonpoint. D'autre part, de nombreuses vicissitudes peuvent l'atteindre dans le trajet, soit qu'il ait trop présumé de ses forces, soit qu'il ait été surpris par une saute de vent défavorable ou par des bourrasques, car un bon nombre, bon gré, mal gré, tombe à la mer. Ce fait est certifié par un exemple curieux que rapporte M. Pellicot, qui a fait une étude spéciale des mœurs et de la migration de la caille sur le littoral. Un matin de mai, à La Ciotat, il vit rentrer des bateaux de pêche qui avaient à bord une dizaine de petits requins : ceux-ci furent ouverts devant lui ; « *il n'y en avait aucun qui n'eût de huit à douze cailles dans le corps.* » — Ces tribulations qui menacent les oiseaux migrants, même sur terre, ne sont point rares. On m'a

parlé, il y a déjà longtemps, de bandes entières précipitées dans le Rhône par les gros temps et qu'on pêchait le lendemain à la surface. A Genève, on m'a conté qu'un immense vol de grives avait été jeté dans les rues mêmes, probablement par une de ces rafales verticales, communes dans les pays de montagnes; on en ramassait dans tous les coins et recoins, et les Gênevois en firent bombance.

Naturellement on a fait beaucoup de fables sur ce passage transméditerranéen des cailles, sans qu'aucune soit fondée sur une observation positive. Une surtout a encore cours: c'est qu'elles auraient la faculté de se reposer sur la mer en prenant la précaution de tenir une aile élevée, soit en guise de voile, soit pour reprendre plus facilement leur vol. Ce qui y a donné lieu, c'est qu'on a pu voir des cailles tombées à la mer, se débattant et cherchant à se relever; mais il leur faut, comme à bien d'autres oiseaux, l'élan de leurs pattes pour prendre leur vol, et ici le point d'appui leur fait défaut. Notre observateur du Midi ajoute judicieusement que si elles avaient cette faculté, elles commenceraient par s'en servir pour se garer de ce terrible amateur de leur chair, paraît-il, le requin.

Le fait certain, c'est qu'elles arrivent en Afrique.

Un bon nombre hiverne en deçà du Sahara, car on les rencontre et on les chasse tout l'hiver en Algérie. Beaucoup d'autres franchissent le désert : ce fait est certifié par l'observation bien précise qu'elles sont en plein passage de retour, sur le littoral algérien, au mois de mars. Belon et le naturaliste anglais Cotesbyn n'hésitent pas à faire passer ces dernières, en tout ou partie, au delà de l'équateur, dans l'autre hémisphère. La même question d'une reproduction nouvelle qui s'est posée d'elle-même pour les cigognes, se rencontre donc encore ici, et il faut s'y arrêter.

La transmigration équatoriale est basée sur ce retour au printemps dans la région du littoral nord de l'Afrique, d'une part ; de l'autre, sur la présence de l'espèce identique dans l'hémisphère austral. Étant donné le tempérament ardent, passionné des cailles, ainsi que leur grande fécondité, l'hypothèse d'une seconde reproduction, dans des conditions favorables, devient assez naturelle. Buffon, fort circonspect sur ces deux points, constate néanmoins qu'elles ont deux mues annuelles qui précèdent leurs départs : grave indice qu'elles partagent du reste avec d'autres espèces. Pour ma part, je serais porté à voir dans le fait de nouvelles amours, l'explication de la rage de migration, c'est le mot ! qui saisit ces oiseaux,

même en captivité, aux époques déterminées. Tous les autres sont, il est vrai, inquiets, agités, aux mêmes instants; mais ceux-ci poussent la passion jusqu'à braver des chocs et des blessures répétés qui les assommeraient, comme chacun sait, dans leurs pointes ascensionnelles nocturnes, si on n'avait la précaution de garnir de toile ou de filet le plafond de leur prison; et cela, quelles que soient la température et la provende dont on les entoure. Cette passion semblerait indiquer un mobile plus puissant, plus impérieux encore que le vivre. On objecte qu'il ne nous en revient pas de jeunes au printemps. Mais il est probable qu'il serait également difficile de constater une grande différence de taille et d'âge parmi celles qui arrivent, à l'automne, en Afrique; par la première raison qu'il est à présumer que ce sont les individus complètement adultes qui se livrent à ces grandes migrations; et par cette seconde, que tous ont alors accompli au moins une mue, ainsi qu'il vient d'être dit, et qu'il est peu aisé, à première vue, d'établir une distinction. Cependant, un de mes amis qui a longtemps habité l'Algérie, me dit avoir vu les arabes prendre des quantités de *jeunes cailles*, au retour de mars, en les acculant à l'extrémité des fossés et en les couvrant simplement de leur burnous. De son côté, M. della Faille, qui a habité,

chassé et observé en Italie, m'écrivit « *qu'il est en mesure, d'affirmer de visu, qu'à l'arrivée des cailles sur le littoral de ce pays, il y en a d'âge différent, comme l'atteste leur plumage.* » — Tels sont les renseignements que j'ai pu rassembler sur ce point de la transmigration équatoriale, d'un certain intérêt en histoire naturelle, et qui ne pourra être précisé que par des observations à venir faites sur les lieux mêmes et bien déterminées.

Je m'étends longuement, et encore, pour être plus bref, avec beaucoup de sécheresse, sur le chapitre de la caille : c'est que c'est un sujet bien intéressant et qui nous permet d'étudier divers problèmes sur lesquels nous n'aurons plus à revenir ; à ce point même que plusieurs considérations sont encore nécessaires.

En examinant la conformation du littoral nord du continent africain, il est naturel de penser, conformément à la théorie émise précédemment au sujet des bécasses, que les cailles se divisent pareillement, à leur retour, en quatre groupes, ou mieux, en quatre veines centrales, dont l'une part de la pointe du Maroc pour se répandre en Espagne et dans l'Europe occidentale ; la suivante, de la pointe de la Tunisie pour aborder en Italie et se disséminer dans l'Europe centrale ; la troisième, du promontoire du Benghazi dans la

régence de Tripoli pour se répandre, par l'île Crète, dans l'Archipel et le centre de la Russie ; la quatrième, du delta du Nil, par le littoral de l'Asie et l'île de Chypre, gagne la Russie orientale et les parages des monts Oural. Ces groupes et leurs vols successifs infléchissent leur marche à l'Ouest ou à l'Est, selon la direction du vent régnant ; selon Buffon, cette remarque a été faite depuis longtemps et d'une manière précise aux passages de l'île de Malte. D'une part, elle explique la variété des arrivages en telle ou telle contrée ; de l'autre, elle est un nouvel exemple du mode de dispersion des oiseaux sur la surface du globe, indépendamment de leur sagacité à juger des contrées où ils trouveront les conditions d'existence les plus favorables. Nous aurons à revenir sur ce fait dans une appréciation plus générale.

Cette théorie des groupes ou des veines, est particulièrement justifiée ici par le nombre considérable des cailles qui abordent dans les îles et sur le littoral de l'Italie. On connaît, de longue date, les captures immenses qui s'y font chaque année. Au siècle dernier, on en prenait jusqu'à 100 000 en un jour à Nettuno, dans le royaume de Naples, sur une étendue de côte d'une lieue ou deux. L'évêque de Capri se faisait vingt-cinq mille

livres de rente avec la location de la chasse dans son île, d'où lui venait le surnom d'*évêque des cailles* : et il faut dire, pour se rendre compte de l'importance des captures, que ces oiseaux [se vendaient alors, à Rome, environ huit francs de notre monnaie le cent. Cette industrie des côtes italiennes n'a fait qu'augmenter avec les facilités de transport et la valeur croissante de ce gibier. Aujourd'hui on exporte dans toutes les directions et jusqu'au Nord des cailles vivantes en cage, par pleins wagons. Si bien que M. della Faille terminait un des bulletins qu'il a l'obligeance de m'envoyer, par cette plaisanterie : « On signale quelques rares cailles ; mais un certain nombre nous sont déjà arrivées.... *par le chemin de fer.* » On se demande, après ces massacres réguliers du littoral, si les restrictions apportées dans l'intérieur des terres ont un grand sens et une grande efficacité ; mais cette question reviendra, plus complète et plus générale, à la suite de cette étude, dans le chapitre des conclusions.

La caille est assurément un des oiseaux qui s'accommodent le mieux des progrès de notre agriculture : nos défrichements, nos terrains couverts de hautes récoltes régulières, le développement de nos cultures de céréales, lui offrent d'excellents abris où elle se complait à merveille. Mais

il y a un revers de médaille : les prairies artificielles, source de richesse pour les agriculteurs, sont pour elle, comme pour beaucoup d'autre gibier vivant sur le sol, une demeure traîtresse qui la séduit par ses fourrés, sa fraîcheur et les nombreux insectes qu'elle y trouve à picorer ; puis, comme le prouve l'exemple cité plus haut, vient la tonte précoce et les tontes successives qui détruisent le travail de la reproduction. Grâce à la prodigieuse fécondité de la caille, qui couve d'une fois quinze ou vingt œufs et recommence jusqu'à trois reprises ; les mâles y mettent bon ordre en expulsant les petits dès qu'ils sont en état de se sustenter ; l'inconvénient est atténué, et on peut dire que la compensation s'établit.

On s'est demandé, enfin, si cet oiseau suivait aussi les récoltes ; c'est-à-dire les céréales en maturité, sa subsistance plus spéciale de l'automne. Dans les pays de montagnes, à moissons échelonnées selon l'altitude, de la plaine aux derniers sommets, on admet généralement le fait, non par l'observation directe ; car les cailles sont complètement muettes alors dans leurs voyages nocturnes et rien ne révèle leurs agissements ; mais par l'accumulation qui se produit sur les hauts plateaux et dont il a déjà été parlé, soit par la venue des cailles de la plaine, soit par le station-

nement des émigrantes du Nord. Quoiqu'il puisse être de ces stations, l'avant-garde des plus pressées poursuit son vol à l'époque déterminée et arrive, notamment en Italie, dès le commencement de la seconde quinzaine d'août.

De tous les *Gallinacés* indigènes, la caille est à peu près le seul migrateur, ou tout au moins le seul émigrant régulier ; car il n'y en a qu'un autre qui suive son exemple et encore bien à l'aventure, sans périodicité, sans époques fixes : c'est la petite perdrix grise, la perdrix à pattes jaunes, autrement dit LA ROQUETTE. Quelques chasseurs, fort compétents, nient son existence ; bien certainement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de la rencontrer ; mais je puis leur assurer en avoir *revu par pieds et par corps*, style cynégétique, vivantes et mortes. Dans le Jura, leurs passages, sans être fréquents, ne sont pas rares. C'est le plus communément en septembre qu'on les trouve, fort au hasard, par bandes de cinquante, de cent, de deux cents : elles ont le pied léger, l'aile rapide, et font de longues remises. J'en ai même vu fort à l'arrière-saison, aux premières giboulées neigeuses. Il est peu habituel qu'on les trouve deux jours de suite dans le même territoire et il est difficile de préciser leur direc-

tion : cependant il me semble qu'elles infléchissent à l'ouest. Le passage du printemps est bien douteux. Maintenant d'où nous viennent-elles, où vont-elles? — Il ne m'a jamais été possible de trouver un seul renseignement à cet égard. J'estimerais que c'est un excès de population des steppes du Nord qui émigre on ne sait encore vers quelle contrée.

Le terme générique de *Gallinacé*, emprunté au nom latin du coq (*Gallus*), n'a pas grande signification. Dans une classification rationnelle, le nom de *coureur terrestre* ou *Dromipède*, selon la désignation proposée par Toussenel, par opposition à celui de *coureur aquatique*, aurait plus de sens et tendrait à rapprocher ce groupe du suivant, les *échassiers terrestres*, dont les deux types européens, *la petite et la grande outarde*, ont singulièrement d'affinité par leurs mœurs et leurs coutumes : aussi ne les séparerons-nous point.

La PETITE OUTARDE ou *Canepetière* (*Otis tetrao*), appelée *Poule de Carthage* en Afrique, a encore l'aile puissante des gallinacés, à l'inverse des coureurs de haut titre ; tels que l'*Autruche* d'Afrique, le *Casbar* de l'Inde, etc., chez lesquels cet appareil du vol n'est plus qu'un appendice de propulsion, ainsi que chez les ultra-nageurs, Pingouins

et autres manchots. Fort craintives et pusillanimes, les Outardes aiment les grandes plaines, peu peuplées, où elles pourront vivre en paix. Autrefois, en France, la Champagne pouilleuse était leur

Outardes canepétières.

terre de prédilection. Depuis cinquante ans, elles en avaient presque disparu, aujourd'hui elles tendent à y revenir. Un observateur local, M. Leroy, bien connu en aviculture, fait coïncider ce retour avec la diminution corrélative des perdrix, qui probablement leur faisait concurrence pour le logement et la nourriture. Un souvenir de jeunesse me prédispose fort à adopter cette opinion. A un

de mes premiers voyages à Paris, vers 1840, je traversais la Champagne en diligence : du haut de l'*impériale*, je vis de loin, dans un vaste guéret d'une propriété particulière, emplanté de bocquets d'arbres verts, une quantité prodigieuse de points noirs, immobiles, par groupes de quinze à vingt, disséminés à vingt-cinq pas les uns des autres, environ. Fort intrigué, je regardais, je regardais, me doutant quelque peu de la vérité, mais ne pouvant en croire mes yeux. Arrivé juste en face, une première compagnie de perdreaux était au repos, à dix pas de la route, et ne se dérangea même pas au bruit du véhicule, tant sa sécurité habituelle était grande ; et toutes ces agglomérations de points noirs étaient autant de compagnies. Il y en avait peut-être deux cents, ainsi réunies sur un même point et sur un espace tout au plus d'un quart de kilomètre carré, et c'étaient de véritables perdrix sédentaires. Évidemment, il n'y avait plus de place pour des espèces analogues au milieu d'une semblable population.

Il est bon de dire, en passant, que ces dépeuplements et ces repeuplements, par des causes qui nous échappent tout d'abord, et dont il est grandement de mode aujourd'hui, pour les premiers, d'accuser l'imprévoyance humaine, ne sont point rares dans le monde des oiseaux. J'ai trouvé, dans

une chronique de ma province, l'époque du siècle dernier où une colonie de coqs de bruyères vint s'implanter sur une montagne des hautes altitudes où, de mémoire d'homme, on n'en avait vu jusque-là. Il y a vingt ans, les gelinotes étaient plus rares dans le département de la Haute-Saône ; aujourd'hui il n'en est plus de même. — Eh ! mon Dieu, il en est bien un peu ainsi dans le monde végétal, base, après tout, du règne animal ! Par exemple, dans le haut Jura, on constate fréquemment que le hêtre succède au sapin dans les bois, à la grande inquiétude des populations qui ont urgemment besoin de ce dernier pour la construction de leurs immenses chalets.

De ce retour imprévu des canepetière dans nos grandes plaines, il résulte que nous sommes fixés maintenant sur leurs faits et gestes de migration. Elles nous arrivent en avril par bandes nombreuses, puis se divisent par couples pour la reproduction. Dès la fin d'août, elles se réunissent de nouveau et partent en octobre. On a été très-incertain longtemps de leur point de station hivernale et on a prétendu qu'elles s'arrêtaient dans les plaines du Midi. Qu'il en soit ainsi pour quelques-unes, c'est possible ; mais leur présence en grand nombre en Afrique, où *elles ne nichent point*, est une indication ; d'autre part, mon correspondant du

La grande Outarde

Gers m'écrit qu'elles ne font qu'une très-courte apparition dans les plaines de la Garonne et qu'elles poursuivent leur vol par delà les Pyrénées. Nul doute, donc, que les canepétières d'Europe ne se rendent en Afrique.

La GRANDE OUTARDE (*Otis tarda*), le plus grand, le plus beau de nos gibiers ailés de plaine, l'analogue en quelque sorte du coq-d'Inde d'Amérique, est malheureusement de plus en plus rare chez nous, et on se demande s'il en niche encore en Champagne, comme autrefois. Néanmoins, il nous en vient chaque hiver soit du Nord, soit de l'Est, ainsi que d'aucuns disent. Il y a peu d'années qu'on annonçait de Picardie qu'un heureux chasseur en avait tué une pesant dix-huit kilogrammes : beau gibier, en vérité ! — Et, naturellement, à un si bel animal, il faut une vie plantureuse et un domaine suffisant où il règne en souverain. C'est sans doute la raison pour laquelle il a quitté nos plaines, dorénavant livrées à une culture active et intensive. Comme la précédente espèce, il vit d'herbes, de gros insectes, de sauterelles ; mais je doute que toutes deux ne soient point quelque peu granivores à la saison, et qu'elles ne suivent pas les mêmes errements à la migration.

La caille a pour compagnon de voyage le RALE DE GENÊT (*Gallinula crex*), plus communément

appelé par les chasseurs le *Roi de caille*, qui a le même habitat qu'elle dans nos champs, et dont la migration coïncide tellement avec la sienne qu'on prétend qu'ils traversent la Méditerranée de concert. Ce qu'il y a de bien positif, c'est qu'il migre en Afrique; et pour qui connaît cet oiseau, bon coureur, il est vrai, mais dont cette faculté semble être le véritable moyen de locomotion, tant il se décide à contre-cœur à se lever et tant son vol est alourdi par la forme allongée de son corps qui l'oblige à prendre une position verticale, le problème de la traversée est plus surprenant que pour la caille. Il faut ou que la fraîcheur de la nuit lui apporte une vigueur toute spéciale, ou que, comme ses voisins des marécages, les râles d'eau, il ait la faculté de se mettre à la nage et de naviguer à petites étapes. Les observations et les indications manquent totalement à son sujet. Généralement, il niche plus au nord; il est beaucoup moins prolifique et par conséquent moins abondant. Son départ est aussi un peu plus tardif; il a lieu au commencement de septembre pour se prolonger jusqu'en octobre.

*
* *

Aux derniers jours d'août ou dès le 1^{er} septembre, en se promenant dans la campagne, au matin,

on entend retentir un petit cri strident : « *B'sie, B'sie!!!...* » ; souvent si haut, si haut, qu'on ne voit pas même l'oiseau : c'est le BECFIGUE !

Sur ce gai sujet des charmants habitants de l'air, il m'est avis qu'il est bon de mêler parfois le plai-

Becfigues.

sant au sévère, et ici l'occasion se présente d'elle-même. La classification scientifique a jugé à propos de grouper une part des oiseaux que j'appellerais volontiers les petits *bec-fins de la plaine*, dont celui-ci est un type, sous le nom de genre *ANTHUS*. Curieux de m'instruire, je cherche dans le dictionnaire latin-français de MM. Noël et Chapsal, le dictionnaire de ma jeunesse, la signification

de ce mot, et je trouve la désopillante définition que voici : « ANTHUS (du grec *anthos*, fleur). BRÉANT, oiseau qui se nourrit des fleurs et qui contrefait le HENNISSEMENT DU CHEVAL. » — Ah ! pour cette fois, me voilà bien renseigné. — Les naturalistes y ajoutent, pour spécifier le becfigue, les surnoms de *Pit-pit des buissons* ou de *Traîne-buissons*. Or il ne hante pas les buissons, se posant de prime-vol à la cime des arbres, ou à l'intérieur, dans le milieu du jour, pour se remiser, et il pâture à terre où il coure avec la prestesse de l'alouette. Cet autre nom de *Pit-pit* ne peut être qu'imitatif du cri, et nous en verrons dans un instant l'origine probable ; mais le becfigue, en dehors de son ramage du printemps, n'a que deux cris d'appel très-nettement caractérisés : « *B'sie... B'sie!!!...* », en volant, et un petit « *you... you!!!...* », lorsqu'il est posé.

Je connais cet oiseau, et pour cause, depuis mon enfance ; voici son portrait de mémoire et à grands traits : Taille de la bergeronnette, forme fine et élégante qui rappelle celle de la Grive avec laquelle il a d'autres ressemblances, manteau olivâtre strié de noir, plastron blanc grivelé de taches noires et citron à la gorge chez le mâle, queue un peu fourchue, ongle du doigt postérieur long, à l'imitation de l'alouette. Il est insectivore au premier

chef, aimant spécialement les sauterelles à l'automne; mais on doute qu'il picore les figues, et par ainsi que son nom vulgaire lui soit bien adapté. Je n'ai pas assez habité le Midi pour constater si cette dernière assertion est vraie : ce que je sais, c'est qu'il a une prédilection marquée pour les vignes et qu'il s'y remise de préférence à tout autre lieu; plus encore, qu'il s'y engraisse au point de tripler de volume; double rapprochement qui lui a valu dans le Jura le surnom de *demi-grive*, et en Bourgogne celui de *vinette*. D'où je suis disposé à croire qu'il n'est pas indifférent au jus de la treille, perforant les grains du raisin de son bec effilé, comme le rouge-gorge, par exemple, ce qui l'amène à cet embonpoint qui en fait un fin petit gibier, à distancer la graisse factice de tous les ortolans du monde. De là à picorer les figues, il n'y a pas loin.

Les becfigues sont complètement indigènes dans notre zone; ils y nichent partout dans les lieux frais et élevés, à la lisière des bois et dans les prés boisés; mais dans le Nord, ils doivent être des plus abondants, car leur passage d'automne est considérable. Ce passage commence, dès la fin de juillet, par une première avant-garde plus ou moins nombreuse; mais il ne prend réellement son cours qu'au 1^{er} septembre, va en augmentant jusqu'au

20, pour cesser à peu près le 25. Ces oiseaux passent par grands vols très-épars, depuis le lever du soleil jusqu'à ce que la chaleur soit forte, et un peu le soir.

Autre ressemblance avec l'alouette : ils viennent très-bien au miroir et, comme c'est un fin petit-pied, on en profite pour lui faire une chasse amusante. Dans mon enfance, c'était aux gluaux tendus sur des arbustes factices, plantés en plein champ, et au centre desquels nous placions le miroir : un petit sifflet spécial nous servait d'appât ; mais le talent est de savoir en bien jouer. Aujourd'hui on remplace les gluaux par le fusil chargé à quart de poudre ; on choisit, en bon point de passage, un arbre isolé que l'on surmonte de quelques branches sèches, excellents perchoirs bien à découvert, et l'on dispose une cahute de feuillage à une douzaine de pas ; le reste va comme précédemment. C'est tout à fait la chasse au poste de Provence, et les habiles y tuent vingt-cinq, quarante, jusqu'à quatre-vingts becfigues en une matinée, dans les bons jours. Avis aux amateurs : la plaine de Paris est un excellent lieu de passage de cet oiseau, comme de beaucoup d'autres, et dans les environs ils pourraient se donner cette récréation.

Après le 25 septembre, il ne passe plus que des becfigues isolés ou par couples. Ce sont ceux-là

On choisit, en bon point de passage..... (Page 170)

qui s'attardent plus volontiers dans les vignes, alors qu'elles sont en maturité dans l'Est, et qui y acquièrent l'obésité dont il a été parlé; malheureusement, ils sont rares et on n'en tue ou on n'en prend plus que par occasion. D'où je suis tenté de croire que c'est là une variété de l'espèce, de régime et d'habitude différents; mais sans aucune preuve à l'appui de mon dire, je l'avoue.

Ajoutons, qu'ils migrent en Afrique, selon toute probabilité, et qu'ils nous reviennent en avril.

J'ai bien envie, pour faire niche à messieurs les naturalistes, de conserver à l'espèce qui suit le nom de FIFI, exacte reproduction de son cri de passage, et qu'on lui donne communément dans les départements de l'Est, où elle est très-abondante à l'automne. Les savants ont cru devoir la baptiser PITPIT-FARLOUSE : ce nom de *Pitpit*, qui a ici son origine, n'est nullement l'expression du cri qui vient d'être dit, et il a le tort de prêter à la confusion avec d'autres espèces. Quant au mot de *Farlouse*, pour cette fois, il n'est pas grec, il est anglais; et comme il n'a ni signification directe ni racines dans cette langue, il doit être purement imitatif. Connaissant parfaitement l'oiseau, je ne vois nullement à quoi cela peut se rapporter, et je suis obligé de supposer qu'il y a encore ici confu-

sion avec un autre oiseau, l'*Alouette lulu*, comme il sera rapporté plus loin. — Je prie le lecteur d'excuser ces diatribes contre la classification scientifique; mais c'est une revanche, car j'ai eu trop de peine, moi naturaliste des champs, à me reconnaître dans ce grimoire par trop fantaisiste; et, il est bien temps, aujourd'hui que les matériaux sont sinon complets, du moins suffisamment nombreux, de procéder à une simplification et à une précision qui rendraient l'histoire naturelle des oiseaux plus intelligible pour les esprits : voilà le but de cette critique!

Cela dit, la désignation de l'espèce dont il s'agit est facile : Oiseau d'une grande similitude de forme et de plumage avec le précédent, mais plus petit. Il niche plus au nord que notre région, passe en grand nombre à l'arrière-saison, avec les gelées blanches, par troupe à vol peu élevé, et faisant retentir perpétuellement son cri : « *Fifi!!!... Fi-Fi-Fi!!!....* Il est complètement arvestre, c'est-à-dire qu'il vit constamment à terre et se perche rarement. Il en demeure toujours dans nos contrées un certain nombre en hiver, qui se cantonnent le long des rivières et des ruisseaux, là où ils trouvent encore à pâture. Peu frileux, comme on voit, et fort sobre, cet oiseau ne doit pas s'éloigner beaucoup au Midi, et il nous revient de bonne

heure. Comme l'alouette aussi, dont il est contemporain de migration, il *donne* en passant au miroir. On en tue quelques-uns, par passe-temps ; mais son vol à soubresauts, irrégulier, en rend le tir difficile, et cette proie, chétive et maigre, ne vaut pas le coup de fusil : mieux vaut la laisser à son rôle utile d'insectivore.

Cette famille comprend plusieurs autres variétés, moins communes et peu commodes à distinguer en pleins champs : le *Pitpit* ou le *Fifi rousseline*, le *Pitpit* ou le *Fifi Richard* (la *Corydolle* des ultrà savants), le *Pitpit* ou le *Fifi spioncelle*, etc.

Comme bec fin des champs et par une certaine analogie d'habitat, de coutumes, de nourriture, même de cri avec le *Fifi* dont il vient d'être parlé, il faut placer à la suite une mignonne famille, celle des BERGERONNETTES (*Motacilla*), qui comprend deux espèces, la *Bergeronnette* proprement dite et la *Lavandière*, ainsi nommée de son amour pour les eaux vives. Toutes deux émigrent plus particulièrement après la saison des pluies de l'automne qui leur procure en plus grande abondance les vermisseaux et les insectes dont elles se repaissent. Ce sont, par leurs hautes jambes, la vélocité et l'élégance de leur démarche toujours cadencée d'un hochement de queue qui souvent sert à les

désigner, de véritables *chevaliers* en miniature.

Les LAVANDIÈRES, qui se distinguent par leur beau poitrail jaune, nichent un peu partout le long des cours d'eau petits et grands, leur domicile d'élection ; elles sont les plus précoces à la migration, mais les moins abondantes. On les voit, de

Bergeronnettes.

temps à autre apparaître jusque sur les toitures de nos maisons, où elles viennent picorer les insectes qui cherchent là un dernier rayon de soleil et un abri sous les tuiles. Un certain nombre hiverne.

Les BERGERONNETTES, à poitrail blanc, nichent plus au nord et nous arrivent en plus grand

nombre et par vols serrés, jusque dans le mois d'octobre, selon l'état hygrométrique de l'atmosphère. Celles-ci s'arrêtent volontiers dans les prairies, au milieu des bestiaux, pour y piper les insectes que les animaux y attirent, et ces bonnes bêtes les laissent faire, sachant fort bien qu'elles leur rendent service, de là le nom de *Bergeronnettes*. Elles suivent aussi, avec grande passion, le laboureur qui retourne son champ et met à découvert les larves qui s'y sont enfouies. Leurs points de station favoris sont les grandes plaines humides, et comme en chemin elles acquièrent un certain embonpoint, on leur fait dans le midi une chasse lucrative au filet-battant. On les vend à Paris, à pleins paniers, sous le nom pompeux de *Becfigues*, bien que la saison de passage de ceux-ci soit depuis longtemps terminée ; mais les marchands et le *bonhomme public* n'en savent pas plus long.

* Retour en avril.

*
* *

Avant d'arriver à la grande migration d'octobre, il faut élaguer quelques groupes, importants néanmoins, et plus ou moins migrateurs de septembre. Le tableau bien rempli qui suivra en sera d'autant simplifié.

Le premier, en ordre de date, est celui des PIGEONS (*Columba*) ou des COLOMBINS, comme dit Toussenel, qui veut, et avec raison, des noms harmoniques pour les oiseaux. Il se compose de trois espèces, les *Tourterelles*, les *Ramiers*, les *Bizets*. Il y en a bien une quatrième, les *Pigeons de roches*; mais je suis tenté de les regarder comme de simples réfractaires des colombiers domestiques.

La TOURTERELLE (*Columba turtur*), sur laquelle on a fait beaucoup d'élégies et qui ne les mérite point tant pour l'innocence prétendue de ses mœurs, suit de près la caille, lorsqu'elle a bien picoré nos moissons et ce qu'il en reste aux premiers jours sur le sol; c'est-à-dire à la fin d'août et au commencement de septembre.

Ses cousins les BIZETS (*Columba livia*) et les RAMIERS (*Columba palumbus*), sont un peu moins pressés. Ils commencent par se rassembler, ce que ne fait point la première qui voyage par couple ou par famille; puis ils se mettent en route fin septembre et courant d'octobre, en troupes serrées, à peu de hauteur, mais d'un vol rapide et soutenu. Il paraît que la grande masse de ces deux espèces établit, pour l'Europe occidentale, son grand courant de migration par les gorges des Pyrénées, car l'on sait les chasses formidables

qui s'y font de ces oiseaux de temps immémorial. J'en ai sous les yeux des descriptions fort intéressantes; mais elles seraient un peu longues et un peu trop spéciales à la contrée pour être rappor-

Ramier.

tées. J'aime à croire que ce gibier gagne beaucoup en qualité dans son voyage, car sous notre latitude, il est assez insignifiant.

Les trois espèces migrent en Afrique, non sans laisser quelques représentants en chemin. Elles nous reviennent en avril et en mai.

★
* *

Ici encore doit se placer une nombreuse et farouche tribu, les *Rapaces diurnes et nocturnes*,

qui ont un double rôle dans la migration, celui de participants et d'exploitants. Car il faut bien qu'ils émigrent aussi, sous peine de périr de misère lorsque leur provende habituelle a disparu, les oiseaux pour gagner le sud, les quadrupèdes rongeur et autres bestioles pour s'enfouir sous terre et se garer du froid. Mais ces rusées et méchantes bêtes, qui hélas ! ne font qu'exécuter le décret de la souveraine nature, la sustention des êtres vivants les uns par les autres ; connaissent parfaitement les époques des passages des oiseaux, plus encore, en excellents géographes, les points de stationnement des espèces qu'ils préfèrent,

Le plus petit moule de la race et celui qui offre les représentants les plus hâtifs dans l'ordre de la migration, est la PIE-GRIÈCHE (*lanius*, boucher ; nom judicieux, pour cette fois) : genre ambigu, car s'il n'a point encore la serre puissante, son bec robuste, recourbé du bout, acéré, échancré, indique bien sa fonction de dépeceur de chair et de buveur de sang. Très-amateur de gros insectes, guêpes, frelons, bourdons, mais très-avivore aussi, il comprend deux espèces, la *Pie-grièche* proprement dite et la *Pie-grièche-écorcheur*.

Nous sommes déjà en retard avec celle-ci, car dès la fin d'août et le commencement de sep-

tembre elle se met en route, par famille et d'une façon très-occulte, comme elle nous est venue au commencement de mai : pour ma part, je n'en ai jamais vu passer. L'Écorcheur habite la lisière

Pie-grièche.

des bois, les haies, les buissons des terrains vagues. C'est un bel et fier petit oiseau qui porte gravement sa moustache. Comme ses congénères, il a une passion pour les insectes hyménoptères, et lorsque son appétit en est rassasié, pour se distraire ou s'en faire un garde-manger, on ne sait, il les pique aux épines des buissons. On est fort surpris de rencontrer souvent ces insectes ainsi

empallés : c'est l'Écorcheur qui a fait cette plaisanterie ! Toussenel dit avoir vu en Algérie des

Pic-grièche écorcheur.

accacias épineux garnis de ces suppliciés. Sa passion pour les jeunes oisillons n'est pas moindre,

Aigles.

mais pour la satisfaire il pousse la ruse jusqu'à la fourberie : il contrefait la voix des pères et mères ; les petits, attendant la becquée, poussent leurs pépiements et se décèlent. Plus tard il les *pipe* ; c'est-à-dire qu'il imite le cri d'un oiseau pris au piège : *Kic-Kie-Kic-Kie.....!!!* : les oisillons attirés par la curiosité s'approchent et tombent sous sa griffe. Là encore le prend sa manie de pendaison, car il s'empresse d'accrocher les peaux aux épines, d'où son nom très-bien trouvé d'*écorcheur* et probablement aussi, son sobriquet jurassien de *Panguillard*. Autrefois, dans cette dernière contrée où il est abondant, on lui faisait la chasse au mois d'août. J'ai voulu tenter l'aventure, mais je ne m'y suis pas retrouvé : sa chair est moins qu'agréable.

La PIE-GRIÈCHE-GRISE et ses variétés, *la rousse*, *la méridionale*, etc., sont beaucoup plus rares, et je soupçonne la première surtout d'être beaucoup plus avivore qu'apivore. Toutes ne sont guère qu'erratiques et suivent la limite des grands froids ; car on en voit à peu près tout l'hiver, isolément ou par couples.

Le grand type et le plus haut titré des rapaces, l'AIGLE, est sédentaire. Mais comme il faut à ces grands voraces un terrain de chasse assez étendu, le père et la mère se hâtent d'expulser de leur

canton leur propre progéniture, dès qu'elle est d'âge à pourvoir à sa subsistance. C'est ainsi que chaque automne, on rencontre, même dans les plaines les plus éloignées de leur lieu d'habitat,

Faucon.

de jeunes aigles errants, à la recherche d'un nouveau domicile.

La nombreuse famille des FAUCONS (*Falco*), qui comprend trois groupes principaux, les *Faucons* proprement dits, les *Éperviers* et les *Buses*, est entièrement migratrice.

Les faucons et les éperviers connaissent parfaitement les bons lieux de passage : on peut s'en fier à eux. Dès la fin de septembre, ils viennent camper en ces points : on s'en aperçoit ai-

Buses.

sément en les voyant tournoyer dans le ciel en nombre insolite, et on peut dire alors que la grande passe d'octobre approche. J'en ai chaque année un exemple sous les yeux. Cette même côte abrupte, où j'ai conté qu'on avait fait un si bel abatis de geais en 1872, et qui coupe trans-

versalement la route des migrants du sud, est un de ces stationnements, avec bons motifs à l'appui. Les oiseaux de cette direction viennent, en effet, y buter, et trouvant là l'abri des grands bois, un sol humide et riche en insectes, une campagne voisine et plantureuse, ils s'y reposent ou escaladent lentement la pente : c'est une belle occasion pour les forbans, et ils ne la manquent point. Ce qui ne les empêche pas de piquer des pointes en plaine, pour varier leur ordinaire, regagnant chaque soir leur gîte, gorgés de nourriture et volant lourdement. J'en vis un, un jour, retournant ainsi à son perchoir habituel : un oisillon le poursuivait avec acharnement, évidemment lui demandant compte du meurtre de son fils ou de son compagnon. La vilaine bête, sans se détourner, lui allongea un coup de bec, et le pauvre hère tomba à pic d'une centaine de pieds. Que les jeunes chasseurs ne se fassent donc point faute d'occire en toute occasion ces braconniers de l'air, dont nous avons intérêt à restreindre la race. Pour les y engager, je puis leur dire, après tout, qu'un salmis d'éperviers, gras à l'automne, en vaut un autre. J'en ai quelquefois régaté des délicats qui les prenaient pour d'excellents pigeons domestiques ; à l'exemple d'un *loustic* de ma connaissance, qui fit avaler à des amateurs un pâté

de corbeaux pour un fin pâté de bécasses, par quelques traitres becs qui dépassaient le dôme.

Hiboux.

Les rapaces nocturnes, les HIBOUX et les CHOUETTES (*Strix*), sont bien obligés aussi de suivre les

mêmes errements. Une partie des chouettes qui habitent nos fermes et nos édifices, et qui y trouvent le couvert et le vivre — car la population de nos petits rongeurs n'a pas lieu de s'engourdir ou de s'enfouir — sont devenues sédentaires; mais les autres gagnent le sud.

Les *Moyens-Ducs*, nous dit-on, accompagnent les cailles dans leur traversée de la Méditerranée; ils en sont bien capables, pour vivre à leurs dépens : il serait, en effet, illusoire de croire que ces nocturnes bêtes se contentent de rats et de souris, ils ne se privent point de menu gibier à plume et à poil; comme le prouvent leurs repaires ou les pelottes qu'ils dégorgent après la digestion, et tout aussi bien la fureur que leurs cris excitent en plein jour, même en imitation, dans le monde des oiseaux des bois. Certains amateurs ne font point fi de ce gibier, et au marché de Toulon on vend fort bien des ducs gras et plumés, de même que poulardes du Mans ou de Bresse.

Les Rapaces sont de méchantes bêtes, je n'en disconviens pas; mais que les humains ne les maudissent point trop, si ce n'est comme concurrents; car ils ont leur utilité. Ils détruisent nombre de gros insectes, nombre de rongeurs, et plus, les reptiles venimeux, la vipère en tête. Voici

comment s'y prennent pour cette dernière les faucons et les éperviers : lorsqu'ils découvrent ces

Chouette.

reptiles endormis au soleil, ils se laissent choir à proximité et d'un vigoureux coup d'aile étourdis-

sent la bête, après quoi ils lui fendent le crâne, et emportent la proie.

Voici, à leur tour, deux groupes d'une complète utilité, les *Pics* et les *Mésanges*, qui me fournissent un aphorisme sinon absolu, du moins d'une grande vérité relative, à savoir : que la nature nous a révélé elle-même, dans le merveilleux équilibre de ses lois, l'utilité approximative des oiseaux par la qualité de leur chair. Elle nous dit, avec plus de certitude que Moïse dans son *Deutéronome* : « *tu mangeras ceux-ci et tu épargneras ceux-là* » ; par un précepte bien simple, c'est que les uns sont excellents, gastronomiquement parlant, et les autres détestables. Application immédiate : les pics et les mésanges sont immangeables, donc ils sont utiles au premier chef.

Et de fait, les Pics sont d'infatigables éliminateurs des insectes qui rongent nos forêts dans leur fibres mêmes ; sans cesse, ils cognent, ils sapent : *Toc-toc-toc !!!*... ; jusqu'à ce qu'ils aient extirpé le ver rongeur. Comme chaque chose a son revers dans ce bas monde, les forestiers pourraient leur reprocher de faire leur part de mauvaise besogne ; je connais une belle allée de forêt, décorée du

nom pompeux d'*avenue du Roi de Rome*, dont les grands arbres de lisière sont perforés comme des écumoirs par ces intrépides charpentiers, pour y loger leur progéniture. C'est un bilan d'utilité et de dégâts à établir.

Pic.

Le PIC NOIR (*Picus martius*) est rare dans notre latitude ; il niche plus au Nord et, dans sa migration, va peu au loin. Il en est de même du GRIMPEUR DE MURAILLE (*Certhia muraria*) que nous apercevons quelques fois en octobre et en avril, inspectant les rochers et les vieilles murailles : oiseau solitaire, au plumage lugubre gris foncé

Pic noir.

ou noir cendré avec des gouttelettes de sang aux ailes, au vol de papillon nocturne, que l'imagination

Grimpereau de muraille.

populaire a baptisé du nom d'*oiseau de la mort*.

Le PIC-VERT (*Picus viridis*), le PIC ÉPEICHE (*Picus major*), l'ÉPEICHETTE (*Picus minor*), etc., sont indigènes dans notre zone et émigrent en partie seu-

lement. Je pourrais en dire plus long sur cette curieuse tribu ; mais je coupe au court, pour m'apaiser sur les espèces qui nous intéressent plus spécialement.

Les *Mésanges* forment une petite nation assez nombreuse en espèces, et très-abondante en sujets : mangeuses insatiables des insectes des arbres, autour de nous comme au fond des bois, toujours en mouvement, visitant, furetant partout, sous les feuilles, autour des branches ; toutes migrateurs, parce que les insectes ailés ou complets sont une part de leur nourriture et que les larves ne leur suffiraient point. Bien qu'elles aient une certaine inclination pour les graines oléagineuses et pour quelques baies, celles du sureau, par exemple, comme aussi pour la viande fraîche et la cervelle des petits oiseaux, les méchantes petites bêtes ! la nature les a marqué d'un haut titre d'utilité par deux caractères : la coriacité de leur propre chair et leur prolifération qui s'élève jusqu'à dix-huit et vingt-cinq petits par nichée, et cela à plusieurs reprises dans la saison. Voyons les espèces les plus communes,

La CHARBONNIÈRE compte deux variétés, la GROSSE (*Parus major*, on se représenterait à ce nom un gros capitaine de cavalerie) et la PETITE (*Parus mi-*

nor). Toutes deux sont d'excellents indicateurs du mauvais temps, et j'ai dans l'oreille, depuis mon enfance, leur satanée petite ritournelle de circonstance. Pas plus loin qu'un matin de cette

Charbonnières.

année, j'étais à travailler devant ma fenêtre, grande ouverte sur un ciel magnifique qui promettait un beau temps et de longue durée : « *Titi-tu !!!... Titi-tu !!!...* », se mit à siffler la grosse charbonnière, ma voisine. Je tressautai sur ma chaise ! « *Titi-tu !!!... Titi-tu !!!...* » : et elle

avait raison ; trente-six heures après, il pleuvait en déluge. — La petite a une variante qui imite fort bien la musique d'une lime sur une scie : « Z'raï!!!... Z'raï!!!... Z'raï!!!... » : et ainsi de suite ; d'où le nom de *sarrayié*, serrurier, fort bien trouvé, qu'on lui donne en Provence.

L'une et l'autre nichent à peu près partout dans la zone tempérée ; mais il en vient considérablement du Nord, en septembre et octobre, par grandes volées, surtout quand le gros temps menace ou que l'époque est tardive. Elles nous reviennent de bonne heure, fin mars.

La mignonne MÉSANGE BLEUE (*Parus cœruleus*) est très-commune ; mais moins abondante aux passages que les précédentes.

La MÉSANGE A LONGUE QUEUE, en quelque pays *Bénédictin*, ainsi nommée de son plumage noir et blanc, est plus sauvage et habite le fond des bois ; mais très-prolifique, c'est par troupes nombreuses qu'elle passe, à en couvrir les arbres. Elle est un peu plus tardive au départ.

*
* *

Dans cette foule de migrants du Sud, il est difficile d'observer un ordre parfait, et j'élague, un peu pêle-mêle, les groupes secondaires, avant d'arriver à la grande migration d'octobre. Mais

voici une petite tribu de migrants de septembre, et même des premiers jours, qu'il faut mettre à sa place, les *Traquets* (*saxicola*), que l'on divise en deux espèces : les *Traquets* proprement dits et les *Traquets-motteux*.

Le TRAQUET qui donne son nom, tiré de son cri,

Mésanges bleues.

au genre, et qui n'est point *saxicola* ou habitant des rocailles, du tout, se tient dans les buissons et surtout dans les vignes. Là, perché sur la cime des échaldas, il se livre à une gymnastique continue, faisant la cabriole, voletant de droite et de gauche pour picorer les insectes, sans cesser de faire retentir son petit cri comique : « *Traque ! Traque ! ! !... Ouist - tra - tra ! ! !... Ouist - tra - tra ! ! !...* ». C'est un charmant petit oiseau, au

plumage noir, blanc et fauve, rondelet, gai, alerte. Il émigre fort clandestinement, probablement par famille et nous revient de même en avril.

Comme je l'ai dit, et j'en demande pardon à MM. les savants, je me perds souvent dans leurs écrits relativement à nombre de petites espèces. Il m'est arrivé, il y a peu d'années, de voir un fort passage, en octobre, d'un petit oiseau ayant de grands rapports avec le traquet, comme plumage, taille, bec et pattes noirs ; un peu plus petit cependant. Il se tenait dans les haies et les buissons, vif, alerte, toujours voletant de ci de là, en haut en bas, pour gober les insectes. Je l'avais peu vu, même dans mon enfance où je faisais l'école buissonnière plus souvent que depuis, j'ignore son nom ; mais il me fait bien l'effet d'un Traquet et la syllabe bien articulée de son cris : « *Pit-pit !!!...* » : lui mériterait, à juste titre, le surnom de *Pit-pit des buissons* ; d'autant mieux que je soupçonne, à son bec effilé mais robuste, qu'il ne dédaigne pas les petits fruits rouges de l'aubépine et d'autres.

Le TRAQUET MOTTEUX, le vrai *saxicola*, ressemble de fort loin au précédent ; il est plus gros, plus allongé et assez muet. Son plumage est gris cendré sur le dos, blanc sous le ventre et au crou-

pion ; dernière particularité qui le fait appeler communément *cul blanc de taupières*. Il se tient constamment sur les rocailles des champs et des pâtures, sur les taupières et les mottes des labours, guettant, de ces éminences, les larves, les chenilles et les vers. Il devient fort gras à l'automne, et c'est alors un excellent petit gibier. Il a plusieurs variétés moins communes, dont l'une est connue sous la dénomination de *Tarier*, qui lui est quelquefois appliquée à lui-même. Il passe en grand nombre en septembre, dans certaines localités de son choix ; à mon estime sur les plateaux élevés et rocailleux ; de buttes en buttes, de mottes en mottes ; ce qui ne l'empêche pas de traverser la mer, ainsi que l'autre traquet, car on les retrouve en Afrique, et comme le prouve l'exemple du garde du Sémaphore de Toulon, qui en prenait, au retour d'avril, six cents vingt-cinq en deux jours.

*
* *

En septembre, il y a de nombreux temps d'arrêt dans les passages ; mais, dès qu'octobre approche, comme la saison s'avance et que les fraîches matinées se font sentir, c'est un défilé perpétuel, on pourrait dire de tous les jours et par tous les temps ; néanmoins, la loi du vent debout

persiste, et nous en signalerons de remarquables exemples. La nombreuse peuplade des petits habitants des champs ouvre la marche.

Pour ma part, je ne fais point fi de ces petits oisillons; car ils sont très-instructifs sur le sujet qui nous occupe. En effet, ils passent en plein jour, on pourrait dire *coram populo*, à la portée de tout le monde, et aussi bien sur nos villes, si elles se trouvent dans leur itinéraire, qu'en pleine campagne, en tel nombre et si fréquemment, qu'ils sont faciles à observer. Il en résulte que souvent par eux nous pouvons conclure des agissements des espèces plus importantes, mais plus sauvages, dans leurs migrations soit diurnes, soit nocturnes; puis, enfin, ils sont si plaisants à voir, si gais, si alertes, que forcément ils nous intéressent.

Lorsque le passage du becfigue commence à diminuer sensiblement, c'est-à-dire vers le 25 septembre, le PISON (*Fringillus*) nous arrive. Tout le monde connaît ce charmant hôte de nos jardins, de nos bois, comme de nos champs; mais pullulant en telle abondance dans le Nord, qu'il nous vient à l'automne en quantité considérable: son langage d'amour est éclatant; c'est le clairon de la gent oviale; ses allures et sa toilette ne manquent point d'une certaine *respectabilité*, en même

temps qu'il est d'humeur allègre, si bien que la sagesse des nations lui a consacré un dicton : *gai comme pinson*.

Dès le début de septembre, les indigènes se sont

Pinson.

mis en préparatifs de voyage; ils vont, ils viennent et s'agitent : les jeunes pour achever leur développement et leur éducation; les vieux pour se mettre en bon point de migration. Ce sont les jeunes qui ouvrent le branle sous la conduite de quelques anciens; probablement parce qu'ils sont plus sensibles aux intempéries et qu'ils ont besoin d'une nourriture plus abondante. Ils n'ont pas

encore la livrée de l'âge adulte, et mâles et femelles se confondent par leur plumage. Mais ces jeunes étourdis sont si peu circonspects en voyage, malgré les sages avis des pères-conscrits qui les guident, qu'ils tombent dans tous les pièges : au bois, l'appau de chouette, ou simplement d'oiseau en péril, les fait venir sur votre tête ; en plaine, le ramage des vieux, aveuglés et mis en mue à contre-saison, les fait se précipiter dans les nappes du filet-battant. Je tiens à déclarer que, dans ma passion d'enfance pour l'oisellerie, je n'ai jamais commis cette barbarie préméditée d'aveuglage des pinsons et d'autres pour une minime satisfaction : je me contentais de simples appelants.

Les pinsons passent par troupes, sinon pressées, du moins assez compactes, de douze, vingt, trente individus, par vol cadencé et en répétant souvent leurs petits « *pio-pio!!!*... » caractéristiques, dans la matinée et un peu le soir, surtout si le temps menace. Par le beau fixe, volontiers ils s'arrêtent, passant d'arbre en arbre, et lorsqu'ils se posent, poussant d'énergiques : « *quin-quin!!!*.... » leur cri de ralliement.

Qu'on nous permette une observation qui s'applique à toute la migration de cette époque : dans le bassin du Rhône (mes renseignements man-

quent pour ailleurs), il règne en ce temps, un peu plus tôt, un peu plus tard, une série de vents du sud venant directement d'Afrique, secs et chauds, souvent en brise carabinée : on dirait un reste de sirocco mitigé par la mer. C'est ce vent qui, dans le haut du bassin, fait mûrir les raisins et les fruits au point de leur donner une saveur méridionale ; et il y est si connu, qu'il a un nom, le *vent-blanc*. Depuis mon enfance, j'ai perpétuellement vu qu'il était le véhicule de tous les migrants réguliers du sud ; si bien qu'à certains jours, particulièrement lorsqu'il doit être suivi de gros temps, ce sont des veines, des défilés formidables de passereaux. Les petits oisillons, nos grands maîtres en fait de vol, piquent droit dans sa direction avec aisance et facilité, et cette remarque a été précisément pour moi le point de départ de la théorie du vol normal de l'oiseau à vent debout, en glissant sur la couche d'air qui le porte et qui lui laisse tous ses moyens d'action pour la propulsion.

La migration des pinsons se prolonge dans tout le mois d'octobre ; à partir du 15, ce sont les vieux qui se mettent en voyage ; mais ceux-ci sont madrés et donnent peu dans les pièges ; il n'y a plus que le cri d'appel de leurs semblables, mis en cage, qui les fasse s'arrêter. Comme la géné-

ralité des espèces qui vont suivre leur exemple, à peu près dès le début ou successivement, ils s'éparpillent dans les contrées méridionales de l'Europe, et un petit nombre seulement doit passer en Afrique : voire même, il en reste toujours quelques-uns non-seulement dans notre latitude, mais dans le Nord, où est née la charmante coutume de la *gerbe de Noël*, placée dans les champs et destinée à donner un peu de pâture à ces pauvres sédentaires. Quant aux pinsons émigrés, ils s'empressent bien vite de nous revenir, et, à peine le premier rayon de soleil de février annonce-t-il de loin l'approche du renouveau, qu'ils nous font entendre leur joyeuse chanson.

Sous le nom de *Fringilles*, l'histoire naturelle a groupé avec sens une nombreuse tribu de granivores ayant certaines analogies de caractères et de mœurs. Le premier type est celui des pinsons, proprement dits, à bec robuste à la base, mais aigu du bout et pinçant bien, comme l'indique le nom vulgaire. Indépendamment de quelques variétés, peu communes dans la zone tempérée, et dont il sera parlé dans le chapitre suivant, un des congénères les plus immédiats est le beau PINSON DU NORD ou des *Ardennes*, au plumage fauve et noir. Habitant l'extrême Nord, sa migration est

beaucoup plus tardive. Il n'apparaît qu'à la fin d'octobre pour prolonger son passage jusqu'en novembre, alors en vols serrés et très-nombreux. Ce qu'il y a de particulier, c'est que son cri de ralliement ressemble assez bien au miaulement d'un jeune chat : « *Miè-è-è*, » ce qui lui a fait donner dans l'Est le sobriquet de *Mianard*. Son retour est précoce aussi, mais peu apparent.

Les autres espèces sont à peu près rangées dans l'ordre suivant :

Le GROS-BEC spécialement habitant des bois, où, de son bec solide et vigoureux, il se nourrit de noyaux de cerises et de graines des arbres. Il passe en septembre et octobre, par familles, et revient en avril.

Le VERDIER est oiseau des plaines. Il est caractérisé par son bec trapu et solide, ainsi que par son plumage vert cendré, mêlé de jaune citron sur la tête, au poitrail et aux arêtes des ailes. Chez le mâle, ces taches jaunes sont très-vives et produisent un bel effet. Son cri ordinaire est assez monotone : « *Bru-u-u!!!....* », et son ramage de printemps est un autre *bruement* beaucoup plus sonore, terminé par deux notes douces et harmonieuses : « *Bré-é-é-é...zi-a!!!.....* » ce qui le fait appeler dans l'Est *Bruant*, nom qui me semble

beaucoup mieux lui convenir qu'au groupe qui suivra, appelé *Bruant* par les naturalistes, je ne sais pour quel motif, et dont il a été dit déjà quelques mots à propos de l'ortolan, qui a été forcé-

Gros-becs.

ment détaché du groupe par l'époque et la particularité de sa migration. Le verdier est répandu dans toute l'Europe; bien qu'il soit de mœurs sauvages, de physionomie peu spirituelle, il se

prête à la captivité et s'apprivoise à merveille. Il passe par petits groupes d'abord, et, à l'arrière-saison, par grands vols. Il hiverne dans les contrées méridionales, et revient en mars et avril.

La SOULCIE, ou *Moineau des bois*, est beaucoup moins commune. Il m'est arrivé une seule fois d'en prendre au filet-battant, et, à quelques kilomètres de là, dans mon pays de chasse habituel, je n'en ai jamais vu un seul. Toussenel, dans son pays de Lorraine, n'en a pas vu davantage.

C'est autre chose du FRIQUET, qu'on pourrait appeler le *Moineau des champs*, répandu partout, je crois. Il passe durant tout le mois d'octobre et même en novembre par petites troupes pressées, turbulentes, piaillantes. C'était la grande récréation des oiseleurs au temps du filet-battant en France. Si un friquet venait à se poser sur le buisson fatal, tous se précipitaient en masse et étaient englobés dans les pans du piège. Mais les avoir en sa possession était autre chose : agiles comme des anguilles et espiègles à l'avenant, ils *gillaient* par les moindres issues, au besoin faisaient les morts et s'envolaient de plus belle ; et, en définitive, si on récoltait la moitié de la prise, c'était tout. Ils vont assez loin au midi, un peu deci delà, à leur fantaisie, et reviennent en mars.

Le SERIN d'Europe, ou le charmant petit *Cini*, est l'hôte par excellence de nos jardins. Les pommiers sont ses arbres de prédilection pour la nichée. Le mâle, en belle toilette de printemps à plastron jaune tendre, papillonne à l'entour, en débitant tous les airs de sa sérinette pour charmer sa compagne. Comme d'autres oiseaux, du reste, il a une zone longitudinale : très-abondant dans le bassin du Rhône, il devient rare du côté de l'ouest, et un ornithologiste a signalé que la dernière famille se voyait à Paris dans la partie est du Jardin des Plantes : je l'y ai vue moi-même. Il en résulte qu'il est peu connu à Paris : c'est dommage, il y remplacerait avec avantage son lourdeau de congénère des îles Canaries ; car il s'apprivoise fort bien, et il est vif et coquet à voir. Il nous arrive par immenses volées du nord, en octobre ; mais il est peu curieux ou fort circonspect, et on en prend peu, quels que soient les pièges employés. Sa migration se prolonge jusqu'en Afrique, où on le retrouve. Quelques naturalistes l'ont même appelé *Cini d'Afrique* ; mais il est tout aussi bien indigène d'Europe. Il nous revient fin avril ou au commencement de mai, lorsque les fleurs éclament : c'est le cadre nécessaire à ce mignon petit musicien de nos jardins pour lequel je conserve une vive affection d'enfance.

La LINOTTE, ou le *Linot*, et ses variétés, sont d'autres charmants chanteurs des champs et des vignobles qui s'acclimatent très-bien de la captivité. Réunies en famille dès la fin de l'été, gazouillant sur la cime des tiges de maïs, les linottes se groupent peu à peu en grandes bandes, composées de toutes les habitantes du canton, auxquelles viennent encore s'adjoindre les arrivantes du nord, et parcourent les plaines, d'un vol capricieux, sans se hâter d'émigrer : on les voit encore en novembre. Les naturalistes se sont creusé l'imagination pour trouver l'étymologie de leur nom, et le font provenir de la graine du lin, dont elles seraient très-avides. Elles croquent toutes les menues graines avec plaisir, ainsi que la verdure, sans parler des insectes ; et ce nom est purement imitatif de leur chant, un doux petit « *Lino!....* », suivi de quelques ritournelles. Un jour, j'avais mis, à une jeune nichée qui voltigeait en liberté dans mon logis, des branches de mélèze, comme perchoir et pour égayer leur captivité : elles n'y laissèrent pas la moindre foliole verte. J'aurais pu, alors, les appeler *Verdurettes*, si elles n'avaient pas été parfaitement baptisées. La linotte hiverne, partie dans le midi de la France et partie au delà, dans les contrées plus méridionales encore. Quoiqu'on dise, en mau-

vaïse part, *tête de linotte*, de leur vol léger et qui paraît étourdi, elles sont futées comme de petites commères et se prennent difficilement. Elles viennent au miroir d'alouettes, mais passent rapidement, seulement pour satisfaire leur curiosité.

Chardonnerets.

Le beau et coquet CHARDONNERET, qui gazouille aussi fort agréablement, a le bec plus allongé et plus pointu que les deux espèces précédentes, et

ce bec dénonce sa fonction d'amateur forcené des graines du chardon. Preuve incontestable de son utilité, c'est que sa chair est amère et coriace plus que celle de tous les autres fringilles, et c'est doublement dommage de détruire cette charmante petite bête. Lui aussi migre par troupes souvent très-nombreuses en octobre.

Son voisin en espèce, le TARIN, l'extirpateur des graines des arbres, est beaucoup plus tardif à la migration. Enfant du Nord, il n'émigre que lorsque le froid se fait sentir, à la fin d'octobre ou en novembre, même assez peu régulièrement. Il passe en grandes bandes, quelquefois fort haut et on entend seulement ses petits « *Tulie!!!... Tulie!!!...* »; mais il vient fort bien à l'appelant. Il remonte de bonne heure.

Les naturalistes sont assez embarrassés de loger le BOUVREUIL, (*Pyrrhula vulgaris*); mais l'ornithologie vivante n'hésite pas à le rapprocher des Fringilles, par ses formes, son plumage et toutes ses habitudes. Il aime peu la chaleur et niche loin au nord, si ce n'est, dans notre latitude, sur les montagnes ou dans les contrées à température peu élevée, telles que la Bretagne où je l'ai vu très-nombreux en été. Il passe en octobre par bandes;

mais ne va pas loin et on en voit rarement sur le littoral de la Méditerranée. Il revient en Mars.

Je passe sous silence quelques autres Fringilles moins communs.

Simultanément à ceux-ci, passent en plaine, les BRUANTS des naturalistes (*Emberiza*), que les oiseli-ers de Paris, qui ont aussi leur langage, nomment *Bréants* : de là sans doute la confusion de MM. Noël et Chapsal ; mais je n'en connais pas un seul parmi ces oiseaux qui *hennisse comme le cheval*. Ils forment une petite famille, dont nous avons déjà détaché le fameux *Ortolan* des gourmets qui migre en partie à l'Est. Les quatre espèces les plus répandues sont :

Le BRUANT JAUNE ou des *haies*, que l'on nomme *La Verdière* dans l'Est, le type du genre, qui se distingue par le bec à mandibule inférieure évasée sur la supérieure et laissant entre celle-ci, à la base, un certain vide, et par son habitude de nicher à terre, à l'inverse des Fringilles qui nichent sur les arbres. C'est un assez bel oiseau, presque de la grosseur de l'alouette avec laquelle il se confond souvent dans les brochettes des rotisseurs de Paris, fauve strié de noir sur le dos,

à plastron et à calotte jaune éclatant chez le mâle ; mais très-farouche. Son ramage de printemps, qu'il fait entendre du haut des grands arbres, est triste : « *Dine-Dine-Dine-Dine....Die-e-e...!!!* » ;

Ortolan de roseaux.

et son cri d'appel, une façon de « *strelitz* » sec qui, je crois, est l'origine de son nom allemand. Il vient assez volontiers au miroir. Il commence à passer en septembre isolément ou par petits groupes, et ensuite, surtout à l'arrière-saison, en bandes nombreuses. Dès la fin de mars on entend son chant de retour.

Le BRUANT zizi, ainsi nommé de son cri d'appel,

est un peu plus sauvage et moins nombreux que le précédent.

Le PROYER, ami des grandes plaines, comme la Champagne, et des vignobles.

Le BRUANT ou l'*Ortolan des roseaux* qui passe en octobre, mais qui est assez difficile à observer.

*
* *

Il faut parler maintenant, pour épuiser la longue série des oiselets, d'un groupe de petits oiseaux des bois, presque tous migrateurs d'octobre et, pour la plupart, charmants petits êtres ailés et des plus plaisants par leur chant varié et agréablement modulé. C'est la jolie tribu des becs fins ou des Fauvettes (*sylvia*, un des rares noms bien réussis de la classification scientifique.)

Nous en avons déjà détaché le *maestro soprano* par excellence, le *Rossignol*, que l'on fait généralement migrer à l'Est : je ne voudrais point le certifier, tant cette marche est peu semblable à celle de tous les autres membres de la famille qui se répandent plus ou moins en chemin en allant au Midi et dont un certain nombre passe en Afrique.

La FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*sylvia atricapilla*), ainsi que la GRISE (*sylvia orphea*), habitantes de nos jardins, ne tardent pas à le suivre ; cependant, elles ne

sont pas aussi ponctuelles au départ, et, selon la saison, attendent volontiers la maturité des baies de sureau dont elles sont très-friandes. Leur voyage est tout à fait *incognito*, elles apparaissent et disparaissent comme le précédent, et leur marche est difficile à observer; mais on les retrouve en Afrique où un de mes amis, grand observateur des oiseaux, m'atteste y avoir entendu chanter la Fauvette à tête noire, en hiver. Et tous nous avons trop présentes à l'esprit les notes mélodieuses de ce chant pour que nous puissions nous y tromper. Je connais, de par ce monde, un hémicycle de grands rochers et de pentes de bois qu'arrose une belle source des plus pittoresques : charmante solitude qu'affectionne une fauvette, sa voix y résonne et y prend une ampleur que je ne retrouve nulle part ailleurs. Guidé par l'exemple, aux jours où j'habitais le voisinage, j'y amenais une jeune amie, douée, elle aussi, d'une voix merveilleuse : elle aimait à nous y chanter une romance d'alors et bien de circonstance :

O fauvette,
Joliette,
Reine de nos buissons,
Redis-moi tes chansons,
Sous l'ombrage,
Du bocage,
Oiseau, donne-moi tes leçons!
Oiseau, apprends-moi tes chansons !....

L'écho reprenait le chant dans une octave supérieure et avec une suavité de sons à ravir les archanges. C'était un concert, un opéra sur nature, et quel décor!... Je ne puis plus passer dans ce lieu sans que cette voix angélesque me chante encore à l'oreille.

La FAUVETTE BABILLARDE (*sylvia garula*), qui constamment babille dans les haies et les buissons, a des habitudes semblables de migration.

Je passe sous silence de nombreux sujets de cette famille des Fauvettes proprement dites, moins communs, plus ou moins hâtifs et dont quelques-uns même, comme le petit Pouillot, attendent la venue des froids pour gagner de plus chaudes contrées.

Le beau ROSSIGNOL DE MURAILLE, (*sylvia phœnicurus*), qui habite le toit de nos demeures et de nos édifices, passe en septembre et quelque peu en octobre pour nous revenir en avril.

La FAUVETTE ROUGE-QUEUE ou la *Queue-Rousse* (*sylvia tythis*), passe davantage en octobre.

Le charmant ROUGE-GORGE (*sylvia rubecula*) s'attarde volontiers en chemin, attendant la maturité des baies des buissons et des raisins des vignes dont il est très-amateur. La saison des pluies au-

J'y amenai une jeune amie.... (Page 217.)

tomnales est son temps de prédilection pour se mettre en voyage, parce qu'elle lui prépare une ample pâture de vermisseaux. Malheureusement pour lui, cette abondante provende le transforme en véritable pelotte de graisse et il fait alors de délicieuses brochettes. Il émigre sans se presser, de buissons en buissons, hochant la queue et répétant ses joyeux « *Tit-ri-ti* ». Il s'arrête un peu partout, se rapprochant de nos maisons, des bois ou des champs pour y trouver un abri et quelque nourriture, et ne s'en va pas loin, pour revenir dès le mois de février. C'est l'oiseau des légendes des charbonniers et des bûcherons ; chaque forêt a la sienne. Dans mon enfance, on me contait qu'il ensevelissait, en les couvrant de feuilles mortes, les pauvres égarés morts de fatigue ou de froid. C'est beaucoup de sentimentalité ; mais je soupçonne que l'intérêt personnel y entre pour quelque chose. Il sait, le petit rusé, que sous ces feuilles naîtront des myriades de larves et qu'il y aura grande picorée pour lui et les siens. C'est moins poétique !

Les mignons petits ROITELETS (*sylvia régulus*), passent pendant tout l'automne et même l'hiver en se pendant aux arbres pour les débarrasser de leur vermine et en poussant de petits « *zi-zi-zi* »

lorsque la proie est abondante. Et j'en passe nombre d'autres de cette grande tribu des becs fins des bois et des buissons.

Roitelets

Mais voici une autre et intéressante famille dont quelques-uns des membres ont le double attrait

Loriots.

gastronomique d'un certain volume et d'une esculence de chair qui ne le cède qu'à peu de gibier ; ils sont, en plus, des maîtres chanteurs par excellence : ce sont les *Grives*.

Avant d'en parler, néanmoins, il faut placer ici

La Grive.

un de leurs voisins en espèce et le dernier oiseau avec lequel nous soyons en retard, car sa migration est précoce, c'est le LORIOT (*Oriolus galbula*), au beau plumage et aux mœurs curieuses, mais difficile à classer parmi nos oiseaux d'Europe, tant il est exotique parmi tous : lorsqu'il passe comme un trait dans la verdure des bois, d'un vol

droit et rapide, il ressemble à un rayon de soleil par son corsage d'un jaune éclatant ; son nid, savamment construit, a l'air d'une callebasse suspendue à l'extrémité de la branche qu'il a choisie. Comme les grives, il élit domicile dans les bois humides et tranquilles où il pourra picorer en paix les insectes du sol, sa pâture de fondation ; mais il doit peu s'aventurer au nord de notre latitude, de même qu'il n'a pas une prédilection pour les grandes altitudes. Il nous arrive en mai, lorsqu'il fait chaud et que les arbres sont revêtus de leur frondaison ; on le voit peu au passage, seulement il a soin de nous signaler son arrivée par les trois notes sonores de son chant de printemps, dont son nom de *Loriot* est une pâle imitation ; il y a du soleil jusque dans la voix de cet oiseau des tropiques égaré dans notre région. Ce n'est que lorsque les cerises sont mûres qu'il perd de sa sauvagerie ; mais, alors, pris par son faible, il vient jusque dans nos jardins gruger les baies rouges et affriolantes, amenant avec lui toute sa progéniture à la picorée, et il s'en donne et il s'en gave.

La saison de ce fruit étant passée, le loriot songe au départ : les plus pressés de l'espèce se mettent en route vers le 15 août, les plus tardifs au commencement de septembre. Ils ont perdu alors leur belle voix de printemps et passent silencieusement

par petits groupes de famille. Ils trouvent dans le Midi les fruits du mûrier et recommencent leurs picorées. En Italie, et dans les contrées les plus méridionales, ce sont les figes, et ils s'y engraisent à doubler de volume, au dire d'un correspondant; c'est alors un bon manger. De là ils vont en Afrique et probablement poussent jusqu'aux tropiques, leur véritable patrie; mais ils passent si peu de temps parmi nous, pas plus de trois mois, qu'on s'est demandé ce qu'ils faisaient tout le reste de l'année: on n'a pas encore pu le savoir.

Les contes bleus n'ont point manqué sur ce bel oiseau. En voyant ses petits horriblement contrefaits de nature, la tête grosse, l'ossature saillante, on a dit qu'ils naissaient par briques et morceaux que les parents recollaient avec une herbe spéciale. Voilà un genre de procréation qui ne ferait pas honneur à la nature.

La GRIVE (*Turdus*) est une de mes amies d'enfance, et on me permettra de m'étendre plus longuement à son sujet. Elle comprend quatre espèces parfaitement déterminées, plus les *Merles* qui forment une famille dans le genre.

La première en date de migration est la GRIVE COMMUNE, la *Grive de vigne*, si l'on veut (*Turdus*

musicus, la *Tourde* en provençal), qui niche en France dans tous les bois frais ou élevés à partir de la latitude moyenne, particulièrement à l'est où elle est très-abondante et où elle se multiplie encore par plusieurs nichées successives. Les grives commencent d'abord leur migration en altitude des montagnes dans les bois inférieurs, lorsque les matinées fraîches commencent à venir ; puis le gros de l'espèce se met en route à l'époque où, dans notre zone d'observation, les baies des bois et des buissons, ainsi que les raisins des vignes, entrent en maturité, car elles ont une passion pour tous ces fruits, de même que pour les cerises, qu'elles ajoutent aux vers, aux petits escargots et aux insectes terrestres, leur régime habituel en été. C'est, par conséquent, vers les premiers jours d'octobre que commence réellement leur migration, et le plein du passage a lieu généralement la semaine de la pleine lune de ce mois pour se terminer aux derniers jours. Elles passent par grands vols épars. La nuit, lorsque les courses matinales de la chasse font sortir les Nemrod avant l'aube, ils les entendent passer à leurs « *T'sic* » stridents ; mais non sans qu'elles fassent de nombreuses stations dans les buissons les mieux garnis en petits fruits ou mieux encore dans les vignes, pour peu que la saison leur soit favorable et

qu'elles n'aient point à redouter les gros temps ou les rafales du nord-ouest ; autrement toutes décampent en une nuit. Dans le bassin du Rhône, qui forme comme un long vignoble de son sommet à la mer, la veine de migration est considérable. Dans le Jura, par exemple, où la vendange est très-tardive, les grives trouvent à leur arrivée les raisins en maturité et tous encore pendants aux ceps ; elles s'en donnent à cœur-joie. Or, un rôti de belles tourdes, blanches de graisse et onctueuses de raisin, est une des friandises de l'automne, et les habitants du pays, qui en ont une passion, font une terrible guerre à ce fin gibier. Il a coutume de passer la journée aux vignes, et le soir, au soleil couchant, de regagner les grands bois pour la nuitée ; c'est l'instant le plus favorable. Sur le territoire de la ville d'Arbois, renommé par ses vins et qui pourrait l'être pour ses grives, cette chasse est nationale ; on n'y manquerait point à l'époque voulue. Une côte, couronnée par une grande forêt, est la remise privilégiée de la nuit ; les grives y *remontent* en quantité, et tout du long du plateau sont échelonnés les chasseurs qui les reçoivent par une fusillade des mieux nourries dans les bons jours de passage ; au-dessous d'eux s'étendent de petits bois aménagés tout exprès et tendus soit de *collets en perche*,

soit de *pantières* ou *pantennes*, grands filets tendus verticalement et aujourd'hui perfectionnés, c'est-à-dire faits à tramail, dans lesquels les grives s'embourcent successivement jusqu'à la fin de la *passé*. La chasse au fusil est quelque peu anodine, car la grive a le vol tellement rapide que c'est un tir difficile, mais avec la pantenne à tramail surtout on fait de fort belles *razzia*.

Les grives, de stations en stations, arrivent dans le Midi à la fin d'octobre et au commencement de novembre, déjà fort bien lestées en esculence, et trouvent là une nouvelle victuaille : nouvelles séances d'engraissement qui donnent la *grive aux olives*, deuxième édition revue et perfectionnée. Les Provençaux, qui n'en sont pas moins friands, comme de toutes les proies possibles, du reste, leur tendent d'autres embûches. Chez eux, c'est la *chasse au poste à feu*, composée de quelques arbres verts, surmontés de *cimeaux* ou branches sèches pour perchoir, au pied desquels on place des appelants en cage ; par les meurtrières d'un cabanon, toutes les malheureuses qui ont le travers de se laisser séduire et de se percher sont traîtreusement fusillées. On en fait encore ainsi de fort belles hécatombes. Au temps où j'habitai la Provence, un pâtissier d'Aix s'était fait une réputation par ses merveilleux pâtés de tourdes, qu'il

ornait d'une belle citation latine de je ne sais quel auteur, pour prouver leur antique valeur gastronomique; car, dans l'ancienne Rome, les Apicius, les Lucullus et autres fameux gourmets de ce temps, prisaient tellement les grives qu'on les engraisait à leur usage, comme encore de nos jours les ortolans, et en si grande quantité, que le *guano* ou la fiente constituait une branche de commerce et était vendu à haut prix aux horticulteurs. Des régions méridionales où elles se disséminent en partie, les grives passent en Afrique, soit directement, leur vol rapide et soutenu leur en donne toute facilité, soit en suivant les contrées les plus avancées dans cette direction.

On a agité aussi, à leur sujet, la question de savoir si, avec cette grande propension pour les fruits, elles ne suivaient point les récoltes, c'est-à-dire si, après être descendues au midi à la recherche des primeurs, elles ne remontaient point au nord en suivant les maturités successives, pour reprendre ensuite leur réelle direction du sud. J'ai été témoin d'un fait qui me l'aurait donné à penser.

Etant en stationnement, au mois de juillet, dans les grandes forêts de sapins du haut Jura, lieu de reproduction par excellence, j'y voyais sur les lisières des nuées de grives et de *grivets* pâturent dans les prés ou venant se désaltérer aux abreu-

voirs, et je m'étais bien promis d'en venir faire quelques massacres; une fois la chasse ouverte. Aux premiers jours de septembre, toutes avaient disparu, probablement contrariées par les fraîches nuits, précoces dans ces parages. Où étaient-elles allées, car dans les bois inférieurs, elles n'étaient pas plus en abondance que de coutume?... Je ne sais. — Mais il est de vieille expérience, dans notre pays, qu'elles n'arrivent dans le vignoble que tout à fait maigres, et qu'il leur faut un certain temps de séjour pour se mettre en embonpoint. Puis, nous les voyons arriver, c'est-à-dire s'arrêter d'abord sur les bords des bois de la direction du nord, et, de là, plonger dans les vignes. A l'inverse, elles parviennent, en novembre, sur le littoral, en fort bel état d'engraissement et ne font que s'y compléter. Je ne puis donc admettre la remontée au nord, spéciale jusqu'ici, paraît-il, aux martinets et aux hirondelles, que lorsque des faits positifs viendront à la démontrer,

Après leur longue mais rapide pérégrination, les grives communes ont hâte de nous revenir, et dès la fin de février ce sont, avec leurs sœurs les *Mauvis* et leurs frères les *Merles*, les chanteurs et les enchanteurs de nos bois, comme il a été dit dans un précédent chapitre. En mars, on voit

déjà l'ébauche des premiers nids de celles qui se sont cantonnées dans nos parages ; les autres poursuivent leur route fort loin dans le Nord. Il manque encore à l'histoire naturelle de pouvoir préciser les points extrêmes de la migration des espèces, aussi bien dans la direction de l'équateur que dans celle du pôle, mais cela viendra peu à peu.

Quoique j'aurais pu en dire davantage sur cet intéressant oiseau, la véritable grive de l'Europe centrale, cette notice abrégera d'autant celle des espèces qui vont suivre.

La GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) ou *Grive du Nord* et plus mal dénommée *Grive de montagne* ; car elle ne niche que fort au nord de notre latitude ; l'est encore plus mal par son nom scientifique d'*iliacus* ou d'*ileosus* qui veut dire vomisseur, dégorgeur, comme si elle avait la faculté, à l'instar d'autres oiseaux dont nous avons parlé, de dégorger les parties indigestes de ses aliments, ce dont, à ma connaissance, aucun auteur ne parle. Cependant elle est facile à caractériser par ailleurs : plumage identique, taille moindre et plus amincie que la précédente espèce ; signes particuliers, large tache rousse à l'aisselle, cri de rappel plus prolongé : « zie-e-e », qui lui fait donner en Provence le surnom de *Siblaïré*, grive

siffleuse. On dit encore qu'elle passe en plein jour par volées compactes, et que sa chair est plus exquise. Quant à moi, je l'ai toujours vue suivre les mêmes errements de migration que la tourde, avec cette seule différence que, plus tardive et beaucoup moins nombreuse, elle commence à passer lorsque l'autre achève son évolution, et comme elle séjourne peu, on n'a guère le temps de s'apercevoir de la différence comme gibier.

La DRAINE (*Turdus viscivorus*), ou *Grosse Grive*, passe aux derniers jours d'octobre et aux premiers de décembre, isolément ou par petits groupes : c'est le signal de la fin du passage des deux espèces précédentes. Celle-ci niche partout, depuis les contrées méridionales, mais de préférence dans les bois élevés. Comme elle se nourrit spécialement à l'arrière-saison de baies amères de sorbes ou de gui, sa chair est tout à fait maussade. Retour également dès la fin de février.

Le LITORNE (*Turdus pilaris*), vulgairement *Tia-tia*, ou *Chia-chia*, de son cri habituel au passage d'automne, et *Chinche* dans l'est. C'est le plus bel oiseau de l'espèce, de taille un peu supérieure à la tourde et de plumage plus coloré, avec de belles taches fauves et blanches au plastron. Elle ne nous

arrive qu'aux derniers jours qui précèdent les frimas, par vols serrés et de plein jour, recherchant les sources chaudes dans les prairies, là où la neige n'a pu prendre pied, pour y picorer les vers et les larves. Elle engraisse néanmoins à ce pauvre régime, et j'ai d'elle un bon souvenir. Un jour, un triste hôte de passage aussi, la *grippe*, avait fait station chez moi, me condamnant à la tisane pour toute réfection. Une bonne âme eut l'ingénieuse pensée de m'apporter un belle litorne, blanche de graisse. La grippe recula d'effroi à sa vue, et moi je ressentis se réveiller mes papilles dégustatives. La grande affaire était de la faire cuire promptement et convenablement à mon appétit; la casserole me paraissait peu plaisante, le tourne-broche prétentieux pour cette seule bestiole. J'y remédiai avec mes instincts d'homme des bois. De mon tisonnier je l'embrochai par le travers et la présentai à un foyer ardent, sans oublier une belle tartine en dessous. Ce fut fait en un tour de main. Sel et poivre, puis quelques verres de haut Arbois, stimulant et généreux : le tout passa comme une lettre à la poste, et oncques ne revit la grippe. Je lègue la recette à l'Académie de médecine.

La litorne s'arrête à la limite des grands froids et apparaît rarement sur le littoral. Elle nous re-

vient de très-bonne heure, et son passage de printemps, moins nombreux et plus rapide, est peu observé.

*
* *

La famille des *Merles* compte, de son côté, cinq variétés, dont la plus nombreuse, bien qu'elle le soit beaucoup moins que la grive commune, est celle du MERLE A BEC JAUNE (*Turdus merula*), au beau plumage noir de jais, chez le mâle adulte; brun roussâtre, chez la femelle et les jeunes. Comme mœurs et comme époque de mise en route à ses deux migrations, il se rapproche de la grive commune; mais il a l'aile plus lourde et s'attarde bien davantage en chemin, *caquetant* dans les cépées et les buissons. Quelques-uns même commencent à hiverner dans notre latitude, et de plus en plus en allant au sud. Mais ils subissent en chemin la loi commune de l'embonpoint, à la plantureuse pâture de l'automne, et, bien qu'ils ne valent pas cher encore dans l'Est, selon l'adage : *Faute de grives, on mange des merles*; j'en ai tué dans les gorges du Var, qui, par la délicatesse de leur chair, équivalaient à nos bonnes grives de vignes. De là, ils poussent plus avant dans les contrées méridionales et dans les îles de la Méditerranée, particulièrement en Corse, où les *maquis*, jeunes bois drus et touffus, périodiquement brûlés pour

être mis en culture, sont parfaitement à leur convenance. Ils y trouvent, comme pâture, à la fin de l'hiver, le fruit savoureux de l'arbousier, dont ils se gavent, plus la baie du myrthe qui les parfument en quintescence; ce sont alors les *Merles*

Le Merle.

de Corse, qu'on réexpédie, par petites barriques et à haut prix, aux gourmets de l'Europe.

Dans nos bois, ils font concurrence de chant, à leur retour, avec les tourdes et les mauvis; mais eux, comme les beaux ramiers, bien farouches cependant, ne dédaignent point les jardins de Pa-

ris. Ils y trouvent de frais bosquets, de vertes pelouses, une sécurité complète, au milieu d'une population bien active, c'est vrai, mais plus polie et aimant les oiseaux pour leurs propres char-

Le Merle à collier.

mes. Ils s'y plaisent, ils y chantent, ils y nichent; preuve certaine, comme dirait Toussenel, que nombre d'autres espèces se rallieraient également à nous, si nous savions leur donner un asile convenable et une protection efficace.

Les quatre autres espèces de merles sont peu communes; c'est dommage, car ce sont tous de beaux et agréables oiseaux; d'autre part, leur migration est des plus fantaisistes. C'est en pre-

mier lieu le beau MERLE A PLASTRON OU A COLLIER (*Turdus torquatus*), le plus gros des merles, dont quelques couples nichent un peu partout dans le pourtour des Alpes. Son passage est très-accidentel. Comme beaucoup d'oiseaux, même le corbeau, il est sujet à l'albinisme ; c'est alors le *Châtre* de Provence, ou le *Merle blanc*, dont Alexandre Dumas a fait une façon de mythe, mais qui existe bien réellement.

Le MERLE BLEU (*Turnus cyaneus*), c'est-à-dire à plumage gris ardoise, et qui n'est pas non plus un mythe, est le plus petit et le plus rare encore à la migration. Il paraît originaire du versant oriental des Alpes.

Enfin, le MERLE DE ROCHE, *passeret solitaire* en quelques contrées (*Turdus saxatilis*), devient de moins en moins commun dans notre zone. Il est plus abondant dans la haute Italie. C'est un oiseau au charmant ramage qui se plaît dans les ruines.

*
* *

En ornithologie vivante et parmi nos espèces d'Europe, on peut sans crainte faire suivre le groupe des grives et des merles, que nous avons fait débiter par le type ambigu du loriot, du type également très-transitoire des ÉTOURNEAUX (*Sturnus vulgaris*), que les naturalistes savants logent

dans une catégorie à part. Il s'en rapproche par la forme, par les grivelures du plumage, par sa passion pour les raisins, par son gazouillement perpétuel qui voudrait être un chant, et qui lui a

Étourneau.

fait donner le surnom de *Sansonnet*. Il s'en distingue en ce qu'il est oiseau des plaines et des prairies humides et non pas des bois. Il est bien nommé, ou plutôt le qualificatif humain tiré de son nom est bien appliqué, car ses allures et son vol sont si fantasques, qu'il faut une longue observation pour connaître sa marche de migration. Aussitôt le temps de la nichée accompli, il vit par

famille et commence ses courses vagabondes ; son vol rapide et puissant lui en donne la faculté. Au temps où j'habitais l'extrémité de ma vallée, j'entendais chaque matin, aux premières lueurs du jour, passer comme un coup de vent devant ma fenêtre : « *Frrrrrr!!!* » — Certain matin que j'étais debout plutôt que de coutume, je vis ce que c'était : une famille d'étourneaux, ayant son gîte sur la montagne, se précipitait chaque jour dans la plaine pour pâturer, revenant le soir à son cantonnement. — Peu à peu, les familles d'un canton se rejoignent, puis les bandes d'arrivants du nord se réunissent à elles, et en octobre on en voit de véritables nuées, d'un kilomètre de long parfois, évoluant et fluctuant dans l'atmosphère comme une banderolle d'étoffe emportée par le vent. C'est alors qu'ils sont dangereux pour les vignes, car si une ou plusieurs de ces troupes immenses se mettent dans un vignoble, elles ont bientôt fait de le vendanger. Mais cette coutume est encore soumise à leur caprice, car elle n'est pas constante ; c'est probablement lorsque leur pâture d'arrière-saison, les sauterelles et autres bestioles, larves et limaces, n'est pas suffisante dans les prairies, et ils rachètent ce défaut d'aimer le jus du raisin, par une grande utilité. C'est alors aussi, qu'ils prennent leur vol en tourbillon dont il a été déjà

parlé : ce qui porte à penser qu'à côté de la question de sécurité qui a été dite se place la condition de leur vol spécial dans les grandes agglomérations. Du reste, leur instinct de sociabilité est si développé à cette époque, que lorsque quelques-uns d'entre eux sont isolés, ils se joignent à tous les oiseaux qui volent en troupes, alouettes, vanneaux, corbeaux et petits passeréaux. Une partie erre ainsi, de plaines en plaines, jusqu'en hiver, en suivant la limite des grands froids, là où la gelée ou la neige ne leur coupe pas les vivres. D'autres poursuivent leur vol, passent en Afrique, où ils sont répandus en deçà et au delà de l'Équateur. On dit même qu'ils poursuivent leurs courses vagabondes jusqu'en Australie, pays où ils ne sont point indigènes et où, néanmoins, ils apparaissent parfois en grandes bandes.

Au retour du printemps, ou mieux de la fin de l'hiver, ils sont aussi fantaisistes, et remontent aussitôt qu'ils préjugent que la saison rigoureuse est passée, c'est-à-dire que le sol mou et humide leur permettra de picorer. Le 6 janvier 1874, je voyais passer au-dessus de Paris un vol immense d'étourneaux, allant droit au nord. J'en augurai une fin d'hiver complètement tiède, et le pronostic eut raison, au détriment de beaucoup de vignobles où les gelées printanières furent dé-

sastreuses, après cette fin d'hiver trop bénigne. Et ce n'est pas la seule preuve de sagacité dans la prévision du temps que m'aient donné les étourneaux, tout *étourneaux* qu'ils soient. Un certain soir d'automne, par une saison des plus variables, et dont je désirais très-fort la fin pour mon propre compte, je vis passer, comme un trait, un vol de ces oiseaux qui regagnaient la montagne à tire-d'aile : dans la nuit, il pleuvait à verse, et, le lendemain, la plaine était inondée, détrempée ; les étourneaux étaient allés se remiser au sec. A quelques jours de là, je vis le même vol, exécutant la même manœuvre ; je le fis remarquer à un touriste qui projetait de se mettre en route le lendemain : il ne voulut pas s'en rapporter à leur conseil, et mal lui en prit.

Les étourneaux remontent au Nord ; mais pas tellement loin, paraît-il, qu'ils puissent passer d'Europe en Amérique, car ils ne sont représentés sur ce dernier continent que par des variétés fort différentes.

*
* *

Abordons maintenant le groupe des alouettes, dont le nom seul éveille d'agréables souvenirs, et qui est fort instructif au point de vue de la migration.

Pour l'ornithologiste des champs, l'alouette, par ses mœurs, son habitat et son genre de nourriture, est le plus petit de nos gallinacées; mais un type ambigu, par son vol élevé en plein jour et par son chant. Ces deux facultés sont trop bien peintes par

Alouettes.

quelques vers cités par Toussenel, dans le *Monde des Oiseaux*, pour qu'on n'ait plaisir à les rappeler :

La gentille alouette avec son tirelire,
Tirelire, relire et tirelant, tire
Vers la voûte des cieux; puis son vol en ce lieu
Vire et semble nous dire : adieu, adieu, adieu!...

C'est de l'alouette commune (*Alanda arvensis*), le type de l'espèce, dont il est question, et c'est par elle que nous commencerons.

Cette petite personne si coquette tient peu à se déranger; mais elle n'aime pas le froid, et si on l'assurait qu'elle n'aura pas les pattes gelées, elle resterait volontiers parmi nous. Les plus frileuses prennent les devants à la mi-octobre; les autres stationnent dans nos grandes plaines, beaucoup y demeurent jusqu'aux véritables gelées ou plutôt jusqu'à la neige, qui a le grave tort de les condamner au jeûne. Aussi la bourrasque hivernale s'annonce-t-elle à ces fins météorologistes, toutes celles qui restent partent à l'unisson. Un certain jour de chasse au chevreuil, par un magnifique soleil de novembre, j'en ai vu passer une véritable nuée qui ne désapondit point depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures après midi : elles passaient dare-dare à cent pieds de hauteur, et toutes les séductions du miroir eussent été sans attraits pour elles. Dès le soir, j'en eus l'explication : le vent sauta du sud au nord-ouest, en pleine rafale, et le lendemain, une épaisse couche de neige nous annonça que le bonhomme Frimas était venu. Que de fois, en plein Paris, en voyant passer de grands vols d'alouettes vers le soir, j'ai averti les dames de préparer leurs manteaux et leurs fourrures. Elles vont ainsi jusqu'à ce qu'elles trouvent un climat plus clément. D'aucunes hivernent dans le midi de la France, beaucoup en Italie, en Espa-

gne, etc.; mais le plus grand nombre passe en Afrique, le chauffoir général de la gent aviale.

Excellent et abondant petit gibier, comme on sait; on lui fait une chasse infernale, aux filets, aux collets, au fusil, Celle-ci est bien la moins destructive, mais non pas la moins agréable. Au matin, on plante son miroir en un pré, on s'assoie à quelque distance, un aide tire la ficelle, et, pour peu que le temps soit propice et la chance heureuse, on commence une fusillade nourrie. Cette chasse est souvent le prétexte de charmantes parties de campagne; voici la description d'une de ces scènes qui fut plus pittoresque que productive.

« Généralement les dames raffolent de la chasse aux alouettes, soit modestement pour tourner le miroir, soit pour faire, elles aussi, le coup de fusil, et, vives et alertes de leur nature, elles y réussissent très-bien. Pas de longues marches et contre-marches, un gai soleil qui met l'esprit en joie; peut-être ce mot de *miroir* les charme-t-il aussi; en fin de compte, ce sont les derniers beaux jours et il faut se hâter d'en profiter.

« Si bel et si bien qu'il n'y a qu'un mot à dire : « *On va demain aux alouettes* » ; et aussitôt toutes les jeunes et jolies ladies se mettent en émoi : on va, on vient, et on entasse dans les paniers provi-

sions sur provisions, comme pour un campement de six mois ou une noce de Pantagruel. — Précaution fort sage : faites au préalable une bonne réserve d'alouettes, plumées, bardées, prêtes à mettre à la broche : de cette façon, vous serez sûres qu'elles ne manqueront pas à la fête.

« Les messieurs prennent, dès l'aube, les devants. Les dames se mettent en route plus tard, lorsqu'elles ont entr'ouvert la paupière, fait un brin de toilette de circonstance, et que la rosée matinale ne courra plus risque de mouiller la semelle de leurs chaussures.

« Telle est la scène qui se préparait sur nos côtes, par un temps magnifique, certain matin de fin octobre.

« Tout alla bien au début, et nous espérions bonne chance ; mais lorsque la voiture des dames émergea sur le plateau, un triste brouillard de la plaine, qui tous les jours précédents s'était tenu discrètement au pied des rampes, jugea à propos, pour leur faire niche, sans doute, de monter tout doucement et de s'étendre de son long sur les pelouses. Un instant après, éclipse totale de soleil à ne pas se voir à dix pas ; réintégration des miroirs dans les sacs, et déconvenue générale. — Que faire?... Contre mauvaise fortune bon cœur ! c'était le plus sage. — Aussi bien la misère n'était

pas dans le camp, et nous procédâmes incontinent au second acte, puisque le premier était manqué, c'est-à-dire aux après du festin.

« Tous les hommes, transformés en bûcherons, récoltèrent le bois sec des haies et des buissons, et, en un clin-d'œil, un immense foyer s'éleva tout à fait à propos pour rassénérer quelques minois chiffonnés par le froid. Une somptueuse broche d'alouettes, venues comme vous savez, se mit à tourner à la flamme. Le plus jeune de la bande, muni d'une cuiller à pot emmanchée d'une gaule, eut l'importante mission de les arroser méthodiquement. A quelques pas, la nappe s'étendit sur le gazon et se couvrit de pâtés, de volailles, de salaisons de haut goût, de gâteaux et de friandises; le tout flanqué de dives bouteilles dont nous humâmes bien quelques coups par avance, pour chasser l'humide radical. Tout à l'entour, des coussins et des bottes de paille.

« Comme silhouette pittoresque, le vénérable d'entre nous, un octogénaire blanchi sous le harnais de saint Hubert, heureux de se retrouver sur le théâtre de ses anciens exploits, profitait de l'occasion et chassait quand même. Assis sur son pliant comme sur une chaise curule, le fusil en arrêt et l'œil au guet, il attendait avec toute l'illusion du jeune âge. D'autorité, une de ses brus ou

Le plus jeune de la bande.....(Page 248)

son petit-fils étaient condamnés à tirer la ficelle. — « *Ça va venir ! ça va venir !* » disait-il toujours. — Va-t-en voir s'ils viennent, Jean ! C'était le brouillard qui venait... de plus en plus épais. — Bien à regret, il lui fallut se rendre à l'évidence et présider au banquet.

« *Bone Deus !* Quelle noce ! — Raconter tous les beaux coups de fourchette qui se donnèrent serait une entreprise homérique ; j'y renonce. Mais dire qu'aucune de ces dames n'eut une aigrette à son toquet, que tous ces messieurs eurent la langue aussi déliée que ces dames, serait s'aventurer. Le brouillard est si traître !

« Le tableau final compléta la fête. Les bestiaux étaient à la pâture, comme de coutume. Par l'odeur alléchés, sans doute, ils s'approchèrent pas à pas et, au dessert, un cercle de bêtes à cornes, braquant sur nous leurs gros yeux ébahis, formait galerie. Hilarité sur toute la ligne ! — Quelques croûtes de pain saupoudrées de sel les firent participer à la fête. C'est si facile de faire le bonheur d'autrui, lorsqu'on ne manque de rien ! Un loustic, au cœur plus ému et plus compatissant, voulut même leur offrir son verre ; mais il reçut une belle leçon de tempérance de ces bêtes : toutes refusèrent à la ronde. Une rasade au berger n'eut pas le même sort.

« A peine levions-nous l'ancre, affreux guignon ! que le brouillard redescendait comme il était venu, et que le soleil resplendissait de toutes ses escarboucles. C'était une revanche à prendre. »

L'attrait de l'alouette pour l'instrument que nous appelons *miroir*, parce qu'il est pour l'ordinaire parsemé de petites glaces, attrait qui va jusqu'à la fascination, elle se précipite dessus, voltigeant au plus près, en extase, et faisant le *Saint-Esprit*, selon l'expression consacrée, a mis fort en éveil les imaginations. On a dit, pendant longtemps, prenant le mot au pied de la lettre, que l'alouette venait coquettement s'y mirer ; c'est plus qu'invraisemblable. Toussenel dit très-poétiquement que l'oiseau est attiré par les brillants reflets du soleil, son ami. Mais l'emploi, à ces derniers temps, du miroir sans glaces, met à néant cette hypothèse. Si nous considérons que l'alouette *donne* tout aussi bien sur une chouette vivante ou empaillée ; que, d'autre part, le miroir, tournoyant sur son pivot et vu de haut, simule assez bien un oiseau battant des ailes ; nous concluerons plus positivement que ce leurre est pris, par quelques espèces d'oiseaux, et particulièrement par celle qui nous occupe en ce moment, pour un des rapaces ennemis de leurs races, pris au piège, et du sup-

plice duquel elles viennent se réjouir. J'estime aussi que la curiosité n'y est point étrangère, car on est badaud en voyage, tout aussi bien dans l'espèce emplumée que dans celle habillée, et qu'une bûche, tournant sur un axe, produirait le même effet, sauf l'éclat qui, par tout pays et en toutes nations, a le don de fasciner les yeux. J'en ai pour preuve que l'alouette de passage *donne* très-bien sur la queue d'un chien qui frétille dans la *quête*, sur un soc de charrue oublié dans les champs, sur un brin d'herbe dont les gouttelettes de rosée étincellent au soleil, sur tous les objets insolites qu'elle n'a pas l'habitude de voir on qui l'étonnent. Mais les habitantes du pays sont plus fûtées. Un chasseur expérimenté les a bien vite reconnues ; une jeune inexpérimentée vient-elle à être séduite par le leurre, une ancienne se précipite à l'entour, et, par une gaie chansonnette, l'entraîne au loin. — *Va-t-en voir si elles viennent, Jean !* répéterai-je à mon tour.

L'alouette est bien certainement l'oiseau qui m'a révélé le mieux la loi du vol de migration, *droit dans le vent*. J'ai pour point d'observation, depuis ma jeunesse, un val, ou pour mieux dire une *combe*, selon l'expression locale, mot dont la lacune au dictionnaire a été constatée, il y a longtemps, par mon compatriote Charles Nodier, un

pur linguiste ; une combe ouverte du nord au midi sur le plateau où se passait la scène qui vient d'être dite, excellent point de passage par le bon vent, mais nullement de stationnement en raison de l'altitude. Le passage s'y fait en une veine qui, selon la variation du vent de sud, infléchit à droite ou à gauche, et il est sage, lorsqu'on y chasse, de transporter son miroir sous le courant, si on veut bien faire. Cette loi donne l'explication d'une bien ancienne remarque des chasseurs spéciaux, à savoir : que les alouettes que l'on prend ou que l'on tue par le vent de sud sont bien plus grasses que celles capturées par les autres vents. La raison en est simple : c'est que, par le vent de sud, on prend ou on tue les alouettes de plein passage, c'est-à-dire en suffisant embonpoint pour se mettre en voyage, tandis que les autres jours ce sont les alouettes en stationnement et qui attendent le supplément de graisse, indispensable pour alimenter leurs longs vols.

La migration d'automne nous trace par avance la marche du retour au printemps. Les alouettes les plus aguerries qui ont hiverné dans le midi de la France, nous reviennent dès que l'hiver s'éloigne, c'est-à-dire au commencement de mars, et les autres suivent successivement. Malheureusement, elles sont encore soumises alors à une terrible

destruction. De véritables industriels, échelonnés dans la zone méridionale, se livrent à une guerre acharnée sous l'égide de la loi, et, néanmoins l'espèce est tellement prolifique, que les vides dans les rangs n'y sont pas encore bien constatés. Mais il y a là un vice cependant qui sera plus particulièrement signalé dans le chapitre des conclusions.

Cette intéressante famille est représentée en Europe par plusieurs variétés. C'est, en premier lieu, la CALANDRE ou *Grosse Alouette*, presque de la taille d'une grive mauvis (*Alauda calandra*), qui n'habite que les contrées méridionales et qui est peu commune.

L'ALOUETTE COCHEVIS (*Alauda cristata*) ou *Alouette huppée*, moins sauvage que les autres espèces et se rapprochant volontiers des chaumières et des grands chemins, dans les grandes plaines sablonneuses et sèches, de la Champagne, par exemple, mais inconnue dans l'est.

Le CUGELIER ou *Alouette des bois* (*Alauda arborus*), petite alouette à queue courte et qui perche sur les arbres, douée d'une voix charmante dont elle n'est point avare, car le mâle chante des heures entières son mélodieux ramage de printemps, tout en tournoyant en grands cercles au-dessus du nid

de sa compagne ou perché au haut d'un arbre à sa proximité. Son cri d'automne est un doux petit « *Luli!...Luli!...* » qui lui a fait donner le surnom d'*Alouette Lulu*. C'est elle précisément qui fait entendre, lorsqu'on la lève dans les vignes ou les terres sèches, son habitat ordinaire, ainsi qu'il

Alouettes huppées.

a été dit, un *farlousement*, mêlé de pépiements, qui, à mon estime, a dû jeter la confusion dans la classification des naturalistes par ce nom de *Farlouses*, donné à un autre groupe. Elle migre depuis la fin de septembre jusqu'à la fin d'octobre et revient de fort bonne heure, toujours chantant au passage ou en stationnement son gai petit refrain : « *Luli-luli!... fi-fi... fio-fio-fio!...* »

Je termine cette longue, mais gaie série des migrants du sud, pour faire ombre ou *repoussoir* au tableau, comme disent les peintres, par l'oiseau des mauvais augures, le *Corbeau*, non qu'il soit aussi noir de caractère que son plumage ou que le fait la chronique, car c'est un fort bon vivant en domesticité, pas difficile, s'apprivoisant et s'attachant facilement ; à l'occasion, buvant sec par-dessus le marché. On m'a conté que mon grand-père en possédait un qui connaissait fort bien le chemin de la cave, y débouchait prestement une bouteille à coup de bec, et, après boire, restait sur le carreau. En sa qualité d'omnivore, le corbeau est utile comme éliminateur des gros insectes et particulièrement du ver blanc, l'antécédent du hanneton ; on lui reproche de se repaître des cadavres de toute sorte ; en ceci, il remplit encore sa haute mission d'expurgateur des immondices de la surface de la terre. Son plus grand défaut est d'avoir un faible pour les œufs des nids et même pour les oisillons. En cela, il a tort ; mais qui est parfait dans ce monde ?

On appelle communément corbeau tous les oi-

seaux noirs de l'espèce; mais il faut distinguer. Nous avons en premier lieu :

Le GRAND CORBEAU, le *Corvus corax* de la science. Remarquez que ces deux mots ont exactement la même signification, et que c'est absolument comme si on disait en latin et en grec, le *Corbeau-corbeau*. Le dictionnaire de MM. Noël et Chapsal, plus jovial que je ne croyais dans ma jeunesse, nous apprend qu'on donnait ce nom de *Corax* aux prêtres de Mythra, dans l'ancienne mythologie; c'était probablement en raison de leur coutume de s'habiller de noir à l'instar de l'oiseau en question. Le *Corvus corax*, puisque telle est sa désignation, est tout à fait sédentaire, vivant isolé, c'est-à-dire par couple, dans les rochers et au fond des bois.

Nous avons ensuite les CORNEILLES NOIRES ET MANTELÉES (*Corvus corone* et *Corvus-cornix*), les CHOU-CAS (*Corvus monedula*), qui vivent en colonies dans nos contrées et émigrent régulièrement en octobre et novembre; ils vont probablement jusqu'en Afrique. Le FREUX (*Corvus frugileus*) est originaire du Nord et se distingue par sa tête un peu chauve, C'est celui-ci que nous voyons arriver, en plein hiver, par bandes nombreuses qui couvrent quelquefois un kilomètre carré de terrain. Plus aguerri

contre le froid, il ne va pas loin et généralement ne dépasse pas le littéral européen.

Le Freux.

Là finira cette longue énumération des migrants du Sud que nous avons écourtée autant que possible.

CHAPITRE VI

MIGRATEURS ACCIDENTELS

Pour compléter cette étude des espèces, il faut encore y ajouter les principaux oiseaux qui se montrent moins régulièrement parmi nous, et le nombre en est grand; il n'y a pas d'années où, dans toutes les contrées, on ne signale des spécimens rares ou totalement inconnus, en plus ou moins grande abondance. Nous avons déjà cité un certain nombre de ces oiseaux qu'il était à propos de réunir à leur groupe naturel; mais il en est d'autres intéressants qui se font voir soit périodiquement, soit localement seulement, et dont les agissements appartiennent encore à l'histoire de la migration. Ils peuvent se diviser en trois catégories : les migrants en altitude ou les habitants des hautes montagnes que les grandes chutes de

neiges et la rigueur du froid obligent à chercher un refuge dans les bas-fonds et qui généralement ne s'écartent pas au loin de leur pays d'élection ; les migrateurs à grandes intermittences que l'on voit par périodes indéterminées, souvent en très-grand nombre, probablement délogés de leur pays de séjour par la disette ou l'excès de population ; enfin, les migrateurs exotiques qui viennent visiter quelques-unes de nos contrées.

Tous les animaux sauvages qui habitent les hautes régions, à peu d'exceptions près, émigrent plus ou moins en hiver ; c'est-à-dire, descendent sur les versants ou dans les plaines environnantes ; par la souveraine raison qu'ils périraient de misère et de froid sur un sol recouvert d'un épais manteau de neige, à moins qu'ils n'aient la faculté accordée à quelques espèces de s'enfouir et de s'engourdir pour un laps de temps. Les oiseaux de ces régions, n'ayant pas cette latitude, sont bien obligés de suivre la loi commune ; mais comme ils sont par avance accoutumés à une température peu élevée, ils n'ont pas besoin de chercher au loin un climat plus élément et se contentent d'abaisser leur lieu d'habitation.

La vaste chaîne des Alpes, comme d'autres, du reste, possède plusieurs espèces de ces migrants.

Le PINSON DES NEIGES ou *Niverolle* (*Fringilla nivalis*) assez semblable au Pinson ordinaire, plus pâle de couleur et qui est assez commun dans la haute Provence; mais il ne s'avance pas même jusqu'au littoral. On le voit également, au commencement de l'hiver, dans le nord-est de la France venant de l'extrême nord.

Pinson des neiges.

Le GAVOÛÉ et le MYTHÈNE, deux espèces de Bruants rares et peu connus. Je ne sais s'il faut rattacher à l'une des deux l'ALPIN, oiseau estimé à l'égal de l'Ortolan dans la ville de Grenoble, mais qui est rare néanmoins et descend peu au-dessous de cette ville. Il m'était inconnu, n'ayant jamais eu occasion de passer dans l'Isère à la saison favo-

nable et, sur la foi de plusieurs naturalistes, j'étais porté à le considérer comme un Fringille, lorsque tout récemment, au 21 décembre dernier, un obligeant correspondant voulut bien m'en adresser deux spécimens qui m'ont permis de l'apprécier au naturel et gastronomiquement. En voici d'abord la description : taille plus forte et plus allongée que celle des Pinsons, longueur, de l'extrémité du bec à celle de la queue, 48 centimètres ; envergure, 55 centimètres ; bec noir, conique et peu trapu, aplati latéralement et rentrant sur les bords pour laisser un interstice à la jointure ; plumage gris cendré sur la tête, roux écaillé de brun sur le dos, ailes noires, longues et effilées avec une large tache blanche qui, dans le développement, couvre plus de la moitié de la surface ; gorge gris perle, poitrail et ventre d'un blanc peu vif qui se prolonge jusqu'au bout de la queue dont les pennes supérieures seules sont noires ; pattes de cette dernière couleur.

Par ces deux caractères d'un corps allongé et surtout d'un bec aplati sur les côtés, il faut le ranger indubitablement dans le genre *Bruant* des naturalistes. Par les larges parties blanches de son plumage, il indique une tendance à l'albinisme, bien naturelle chez un habitant des altitudes neigeuses et quasi sibériennes.

Restait à savoir s'il méritait la haute réputation gastronomique dont il jouit à Grenoble. Pour m'en assurer, je procédai, moi-même, de la même manière que pour la Litorne dont j'ai parlé, et je dois avouer que les Grenoblois ont fort bon goût; c'est un fin et succulent petit gibier et, en somme, un fort bel oiseau.

Il faut citer encore l'ACCENTEUR DES ALPES, qui se rapproche de la famille des Fauvettes, avec un bec plus fort, et qui apparaît également dans la haute Provence où, dans quelques localités, on lui donne aussi le nom d'*Alpin*.

Tous ces petits migrants, sans compter ceux d'autres régions probablement, circonscrits dans un espace restreint, sont assez peu nombreux, et il suffit de les signaler comme exemple de migration spéciale.

La catégorie des migrants accidentels est un peu plus importante et offre, d'autre part, un certain intérêt, car on ne se rend pas toujours compte de leurs motifs d'évolution, faute d'observations suffisantes sur les lieux d'origine ou assez suivies dans leur parcours. Elle compte notamment deux espèces qui nous arrivent par

vols considérables, mais à des périodes souvent très-éloignées et toujours très-incertaines : Le beau JASEUR DE BOHÈME, espèce de Gros-bec à bec court et trapu, gorge et moustache noires, huppe relevée, ailes noires marquées de taches jaunes. Il

Le Jaseur.

niche dans l'extrême Nord et n'en descend que par les hivers les plus rigoureux pour venir jusqu'en Alsace, son point d'arrêt. — Le BEC-CROISÉ (*Loxia curvirostra major*), autre bel oiseau plus gros que le précédent, à plumage très-variable de couleur selon l'âge et le sexe, et caractérisé par son bec en cisaille ; anomalie étrange qui a évi-

demment pour but le déchiquetage des cônes des arbres résineux. Il niche dans le Nord, à partir de la latitude de la Belgique. Ses migrations sont des plus incertaines et de longues années se passent

Becs-croisés.

sans qu'on n'en aperçoive un seul. Puis il arrive. dès le début de l'automne, par vols nombreux, et pousse ses courses jusqu'au littoral méditerranéen ; mais il remonte de fort bonne heure, au mois de janvier.

Une troisième espèce, le CASSE-NOIX (*Nucifraga caryocatactes* : je cite les noms scientifiques souvent à simple titre de curiosité et on avouera que ce dernier surnom est assez peu harmonieux), est plus régulière dans ses migrations; mais cet oiseau

Casse-noix.

1
passe isolément ou par couple, et il est rare. Sa taille est un peu plus forte que celle du merle, son plumage fauve est marqué de blanc, et son bec, long et robuste, le fait ranger en histoire naturelle après les Pies et les Geais, dans l'ordre des *corvirostrés*.

Enfin, de nombreux oiseaux exotiques des con-

Flamants.

trées méridionales ; peut-être eux, à l'inverse, fuyant l'extrême chaleur ou, ce qui est plus dans l'ordre des choses, allant à la recherche d'une plus abondante provende que celle de leur pays d'origine qui devient rare, visitent annuellement nos côtes et s'avancent plus ou moins loin dans les terres. Tels sont :

Le ROLLIER (*Corraccias garrula*), espèce de Geai, au plumage azuré du plus bel effet, originaire d'Afrique et un peu d'Espagne, qui vient quelquefois dans le midi de la France, mais isolément et en se cachant dans le plus profond des bois, comme s'il se sentait dépaysé.

Le MARTIN-ROSELIN (*Turnus roseus*), un étourneau au plumage rose et noir : fort bel oiseau dont le pays d'origine est très-obscur. Il arrive aussi dans le Midi en automne ; mais plus fréquemment il voyage, comme son confrère indigène, par grandes bandes, et est peu sauvage. Il reprend sa route au printemps.

Le plus beau des visiteurs exotiques de notre littoral est, sans contredit, le FLAMMANT (*Phœnicopterus ruber*), oiseau de l'Orient par excellence qui, néanmoins, pousse des promenades ou des reconnaissances jusque dans nos contrées occidentales, à peu près chaque année en hiver et au printemps, y faisant même un certain séjour. On

en cite quelques-uns qui se sont avancés jusqu'à la Loire, jusqu'en Champagne, dévoyés de leur route par des vents contraires, disent les naturalistes. Pour ma part, je crois peu à ces déviations for-

Spatule.

cées; les oiseaux sont plus maîtres de leurs moyens d'action que cela; et je préférerais l'attrait d'une nourriture nouvelle, la curiosité de voir, d'explorer d'autres contrées où, peut-être,

ils pourraient établir des colonies : car un fait à noter pour les Flamants, c'est qu'ils sont également indigènes dans l'Amérique méridionale et on se demande comment ils ont pu se disperser à si longue distance. Il est peu probable qu'ils aient pris la route du Nord, en effet ; mais ils ont le vol puissant, et leurs pattes palmées leur permettent de se mettre à la nage pour se reposer, puis de reprendre leur élan ; et pour ceux-ci la grande traversée de l'Océan est moins incompréhensible.

Quelques autres grands échassiers de rivage, les Spatules, plusieurs espèces d'Ibis, etc., viennent encore jusqu'à nous ; mais la longue énumération que nous venons de parcourir suffit largement à donner une idée détaillée de la migration générale, et il est temps d'en déduire les conclusions qui peuvent être intéressantes ou utiles.

CHAPITRE VII

CONCLUSIONS

Tous les oiseaux, sauf un petit nombre de sédentaires, migrent chaque année, aux approches des frimas, les uns plus ou moins à l'est ou à l'ouest, les autres directement des contrées du nord vers celles plus tempérées ou plus chaudes du sud : la nature, en leur en faisant une loi à la fois obligatoire et utile, leur en a donné les moyens de locomotion et de direction ; et chaque espèce, selon ses besoins et son genre d'existence, a son mode de voyage, ses époques, ses parcours, aussi bien au départ de l'automne qu'au retour du printemps. Il n'y a plus d'hypothèses à faire sur ce sujet.

Maintenant pour apprécier ce grand mouvement, bis-annuel qui transporte le monde des oi-

seaux du cercle polaire vers l'équateur et réciproquement, il suffit de jeter un coup d'œil sur une carte d'Europe ou mieux sur un globe terrestre, pour concevoir facilement : 1° que la conformation des points de départ, les hautes chaînes de montagnes, telles que les Alpes, doivent déterminer des veines ou des courants plus abondants ici que là, selon l'ingénieuse conception de M. della Faille de Leverghem ; 2° que ces courants sont, d'une part, accélérés ou ralentis par les vents favorables ou défavorables, et, d'autre part, souvent déviés dans leur marche par les conditions météorologiques et topographiques perpétuellement variables d'un lieu à un autre. Ces deux conditions sont la base de la dispersion infinie des oiseaux sur toute la surface de la terre, qu'a voulue la nature, et, en y ajoutant les conditions du sol, de la température, de la nourriture, qu'offrent les différents lieux, elles nous donnent une idée précise de l'extrême variabilité que subissent les passages dans une même contrée, d'une année à l'autre, en même temps que du peu de fixité souvent du nombre des sujets qui restent en un lieu pour la reproduction.

Il en ressort un grand enseignement ! Si, en effet, nous nous représentons la masse innombrable des oiseaux qui peuplent l'Europe, de

l'Océan aux monts Ourals, et même par delà; car autant vaudrait dire l'hémisphère boréal; et qui, deux fois l'an, vont et viennent du nord au midi, se dispersant sur toute l'étendue de ce vaste espace, partout où les conditions d'existence, propres à chaque espèce, sont assurées, on comprendra que, quelle que soit l'action de l'homme sur la nature, il n'en a pas autant qu'on serait tenté de le croire sur le monde des oiseaux. Il peut, dans une certaine mesure modifier les choses qui sont à sa portée, sol, végétaux et animaux sédentaires; restreindre, annihiler même certaines espèces de ces derniers; c'est ainsi qu'on nous dit qu'il a supprimé un jour le moineau franc dans un espace fermé de toute part, la Grande-Bretagne; mais il ne supprimerait pas aussi facilement le Moineau friquet, son voisin en espèce, pas plus que la Caille, la Bécasse et tous les autres oiseaux migrateurs; par la bien simple raison que cette masse mobile échappe à son action, dans sa généralité, par sa mobilité même. Il peut se faire qu'il détruise ou modifie les lieux de station, mais elle passe outre, car elle a l'espace pour domaine; et quant aux déprédations humaines, avec une certaine réserve et sans trop d'optimisme pourtant, la féconde nature, qui les a prévues, sait les combler.

Ceci a spécialement pour but de rassurer les âmes inquiètes, Toussenel en tête, qui, par quelques méfaits exagérés de destruction, ou par les modifications locales, voient en perspective la prochaine disparition des oiseaux, du moins dans notre monde civilisé. Cette crainte, à mon estime, tient beaucoup à l'imagination : on a entendu parler, on a vu soi-même, à de lointains intervalles, des foules d'oiseaux de passage, et, comme il n'en est pas annuellement ainsi dans une même contrée, on en conclut trop vite que la race est en dégénérescence. Les récents exemples de formidables migrations qui ont été cités, ainsi que la théorie sur la dissémination des volatiles, prouvent que les mêmes faits d'exubérance ne discontinuent pas de se produire à leurs intervalles, et que, selon toutes probabilités, il en sera encore ainsi pendant longtemps ; et on peut ajouter à l'appui que cette crainte date de loin, sans que les oiseaux aient pour autant disparu. Les satyriques latins, Lampride, Suétone, Martial, reprochaient déjà aux Romains leurs goûts et leurs appétits destructeurs : et ils n'avaient point tort, si on se rappelle les festins d'alors, où les mets recherchés étaient des langues de Flamants, des cervelles de Faisans, etc., etc. Nous n'en sommes point là, en fait d'exagération ou mieux de dé-

vergondage du goût! — Au temps de Buffon, les mêmes plaintes étaient formulées et se motivaient par les destructions qui se commettaient, et cela depuis un temps immémorial, comme elles se commettent encore aujourd'hui, sur le littoral de la Méditerranée. — Et néanmoins les oiseaux subsistent, probablement sans avoir beaucoup diminué de nombre, si ce n'est localement par les nouvelles dispositions du sol.

Mais cette question touche de trop près à celle, fort en vogue aujourd'hui, de l'*utilité et de la protection des oiseaux*, pour que nous ne parlions pas de celle-ci comme conclusion finale.

*
* *

Dans l'espèce, comme disent les légistes, il faut considérer l'action de l'homme sous deux aspects : directement et indirectement.

Indirectement, lorsqu'il dessèche un marais, il détruit par le fait un point de station ou un lieu d'habitat pour toutes les espèces qui y faisaient leur repos de migration ou qui s'y installaient pour la reproduction : il ne faut donc pas qu'il s'étonne de n'en plus revoir ou que fort peu, dans cette localité; ces oiseaux ont passé outre, comme il vient d'être dit, sans être annihilés pour autant.

Lorsqu'il défriche une forêt, un espace buissonneux, une haie; qu'il coupe un arbre là où il y en a peu ou pas, il supprime le logis, le domicile de tous les oiseaux qui s'y arrêtaient ou y demeuraient. Plus, si on considère le développement de sa propre population, l'extension et la dispersion de ses habitations, il tombe sous le sens que l'espace et les ressources se limitent d'autant pour d'autres êtres : il est bien certain que lorsque la plaine de Paris, excellent point de passage, soit dit en passant, était déserte d'habitants humains, elle était mieux peuplée en animaux sauvages, et cela du petit au grand. — Eh ! bien, que là encore on se console : la civilisation, qui multiplie l'action de l'homme, est plus qu'une compensation, et, dans le même espace, la population des animaux domestiques, autrement et doublement utile, est aujourd'hui bien plus considérable. D'autre part, les oiseaux dont l'existence est compatible avec la sienne, rassurés par des mœurs plus policées, reviennent d'eux-mêmes dans ses murs, dans ses jardins; témoins les ramiers, si sauvages de leur naturel, qui ont élu domicile aux Tuileries et au Luxembourg. A son tour, le progrès agricole multiplie les animaux domestiques ; puis, lorsque l'homme replante, lorsqu'il reboise, parce que cela lui est profitable, il reconstruit des abris,

des demeures pour les oiseaux percheurs. Grand nombre d'autres, qui vivent à terre, trouvent d'excellentes conditions d'existence dans ses cultures de hautes tiges : malheureusement il en est une, la prairie artificielle, base d'utilité et de richesse pour lui, qui fait ombre au tableau. Mais, que tout en prélevant le tribut sur les espèces que lui accorde la nature, il respecte la reproduction, et le monde des oiseaux n'est pas près de finir.

Voyons maintenant l'action directe ou la destruction volontaire.

Tous les êtres animés, même les plantes, sont soumis à la loi fatale de sustenter leur existence les uns par les autres et de se limiter réciproquement, mais non de se supprimer, afin que le domaine commun, la terre, ne devienne pas l'apanage d'une seule et unique espèce. La nature y a pourvu par l'extrême abondance des générations, et elle seule les fait disparaître lorsque leur utilité générale a cessé.

Les oiseaux, dans cet ordre de chose, limitent la plante, les insectes, les bestioles et autres animaux : à leur tour, morts ou vivants, ils servent

de nourriture à toutes ces espèces, même aux leurs.

L'homme, égoïste comme tous ses congénères en animalité, ne considère leur utilité que par rapport à lui. Celle des oiseaux est de trois sortes, avec une part de détriment : indirecte, directe et d'agrément. Examinons ces divers points ; ils doivent nous conduire à la conclusion ; autrement nous ne saurions où la chercher.

Tous les oiseaux sont insectivores, depuis les grands rapaces qui ne dédaignent point de croquer les gros insectes, quand ce ne serait que pour se mettre en appétit (et nous avons dans l'espèce des premiers sujets, tels que la Bondrée apivore et les Pie-grièches) jusqu'aux plus petits des passereaux ; mais à des degrés différents : les uns un peu, les autres beaucoup, d'autres complètement. Les Pics, les Hirondelles, sont dans ce dernier cas : les granivores et les baccivores le sont seulement la moitié ou les trois quarts de l'année, sous peine de mourir de faim. Les oiseaux, dans leur généralité, sont donc particulièrement les éliminateurs de cette race.

Les insectes sont nuisibles à l'homme de diver-

ses manières : mais, pour rester dans la simplicité de la question, ne parlons que des dégâts qu'ils causent à ses plantes, à leurs graines ou à leurs fruits. N'oublions point toutefois qu'ils ont aussi leur part d'utilité, quand ce ne serait que comme propagateurs de la fécondation.

Une grande partie d'entre eux, des myriades de microscopiques et de minuscules, néfastes à l'économie végétale comme à l'économie animale, exemple, le terrible *phylloxera*, échappe à l'atteinte de l'oiseau.

D'autres sont à l'abri de la destruction par leur extrême fécondité et la préservation qui est accordée à leur descendance. Depuis que le monde est monde, les oiseaux n'ont jamais arrêté l'invasion des sauterelles dans le Sud, l'apparition périodique des plaies de hannetons dans le Nord, ni d'autres fléaux d'insectes.

De même pour tous les autres, les oiseaux peuvent bien éliminer, mais non annihiler ; autrement leur raison d'être cesserait le lendemain, et ils disparaîtraient eux-mêmes.

Ainsi donc, à ce point de vue, ils nous donnent un concours, non un remède : telle est leur utilité indirecte. Et je suis singulièrement de l'avis de M. Pellicot, doublement autorisé dans la question comme observateur et comme agro-

nome, Président du Comice agricole de Toulon, lorsqu'il dit, dans son livre des OISEAUX MIGRATEURS DE PROVENCE : « *Plus j'avance dans la vie et plus je demeure convaincu qu'en l'état de la société, les oiseaux ne sauraient opposer une digne efficacité à l'envahissement des insectes nuisibles; il faut que l'homme se défende lui-même!* »

Il faut que l'homme avise lui-même : voilà le mot! et ne compte point trop sur le secours d'un auxiliaire bienveillant et tout à fait fortuit, dans l'attente duquel s'endormirait son apathie. C'est comme s'il attendait un aide pour se débarrasser des puces, des punaises et autres vermines qui envahissent son domicile et sa propre personne, ou pour purger ses champs des herbes parasites. Eh bien! à tout prendre, la civilisation, le progrès agricole, sont encore leurs propres éliminateurs. De ces derniers temps, je vois les hirondelles devenir rares dans les rues de Paris depuis l'établissement des égouts souterrains; elles y manquent d'insectes. Du jour où l'intérieur de l'Afrique serait cultivé, disparaîtrait le fléau des sauterelles; la charrue, qui met à découvert des milliards d'œufs et de larves, fait plus de besogne que des légions d'oiseaux qui séjourneraient des mois sur le sol. Les enfants de nos écoles, embrigadés et encouragés, détruiraient plus de hannetons que tous

Poulailler roulant. (Page 287.)

les oiseaux du canton réunis : leur passion pour ce coléoptère est une précieuse indication.

Les oiseaux eux-mêmes nous en donnent une autre. Ils suivent en grand nombre nos labours ; c'est un des grands mérites qu'on leur fait. Mais nous avons sous la main, et à notre complet vouloir, un oiseau aussi qui est glouton de toutes les vermines : c'est la Poule ! Utilisons-la, et selon l'utilitaire pensée d'un agriculteur méritant de ce siècle, M. Giot, faisons suivre toutes nos charrues de *poulaillers roulants*. Mettons la Poule partout, tant qu'elle n'est pas nuisible : c'est l'insectivorerie organisée, et la réalisation du rêve de Henri IV : *la Poule au pot* !

L'oiseau, considéré comme insectivore, a surtout cette spécialité au printemps, alors qu'il nous revient maigre et affamé par le voyage, que les autres nourritures lui font défaut et qu'il va avoir à fournir à celle de toute sa progéniture. Par contre, à l'automne, son utilité est mitigée par un détriment à nos récoltes, quelquefois dans une proportion sensible. Exemple : l'étourneau dans les vignobles.

DONC : RESPECT A L'OISEAU AU PRINTEMPS !

L'homme, comme tous les autres êtres vit de la plante et des animaux, même parfois de ses semblables, à l'origine des sociétés, lorsqu'il n'a ni l'agriculture, ni l'industrie, qui multiplient ses ressources alimentaires. Il mange quelques sauterelles dans le désert, faute de mieux : on a essayé, dans ces derniers temps, de lui faire manger les vers blancs du hanneton, l'ennemi fieffé de ses récoltes ; mais cela n'a pas pris ; et, par son peu de goût pour les mouches dans le potage, sa répugnance pour une foule d'autres, il doit être déclaré *insectiphobe*. Il n'en est pas de même à l'égard des oiseaux qui, par la délicatesse et l'esculence de leur chair, excitent au plus haut degré sa gourmandise. C'est là leur utilité directe, un appoint très-apprécié de nourriture ; et la nature ne pouvait dire plus clairement que l'homme est à ses yeux un éliminateur de la gent aviale. Mais comme elle est la source de sagesse et le grand enseignement, elle lui a indiqué en même temps ses restrictions. Nous en avons vu un premier exemple dans ce fait approximatif jusqu'ici, que ceux qui lui sont indirectement le plus utiles, sont le moins agréables à son palais, et cela selon certaines nuan-

ces qui deviendront des données positives lorsque la vie intime des oiseaux, pour ainsi dire, nous sera mieux connue. La nature va plus loin encore : ces auxiliaires utiles au premier chef dans le Nord, le devenant moins dans le Midi, y sont moins coriaces et d'une assimilation meilleure. Puis, c'est à l'automne que ceux qui peuvent lui devenir nuisibles ou inutiles sont dans tout leur embonpoint, dans toute leur qualité.

Ces considérations et cette autre, d'une observation constante, que les oiseaux migrateurs ayant à subir, dans leurs longues pérégrinations, des avaries de toutes sortes : fatigues, intempéries, abstinence, spoliations de leurs ennemis, mort naturelle ; reviennent au printemps en nombre bien inférieur à celui du départ : nous en avons pour preuve manifeste les Martinets, oiseaux de grand et haut vol, des mieux organisés pour échapper à tous les périls ; ils sont partis augmentés de tous leurs descendants de la saison, et, néanmoins au retour, l'espèce n'est pas plus abondante : cet ensemble de considérations, dis-je, m'a conduit à établir depuis longtemps ce calcul que je crois au-dessous de la vérité, à savoir qu'un oiseau que nous détruisons à l'automne représente à peine le tiers d'un de ceux qui nous reviennent au printemps ; tandis que celui-ci représente une unité

entière, plus la part de reproduction à laquelle il va coopérer ; c'est-à-dire, en moyenne, plus de dix sujets.

La nature pouvait-elle nous dire plus nettement : « USEZ DE L'OISEAU A L'AUTOMNE, RESPECTEZ-LE AU PRINTEMPS ! »

Je demande mille excuses pour ce langage sec et positif ; mais on a écrit et dit, on dit et on écrit encore tant de choses étranges, inconscientes, sur ce sujet, que je tiens à être précis et bref.

Les oiseaux peuplent et animent la nature. Ils nous charment et nous égayent par leurs grâces, la délicatesse de leurs formes et la vivacité de leurs allures, leur belle toilette et leurs coquetteries, leurs chants et leurs caquetages. Pour en jouir de plus près et plus constamment, nous les rapprochons de nous, nous efforçant de leur faire oublier la captivité par des soins assidus, par tout ce que nous pensons devoir leur être agréable, sans aucune pensée d'utilité ou de profit. C'est encore au printemps qu'ils sont dans tout l'éclat de leur parure, qu'ils ont les plus doux chants ; eux-mêmes, heureux de vivre dans toute la plénitude de leur existence, confiants dans l'intérêt

qu'ils sentent qu'ils nous inspirent, ils perdent leur sauvagerie et viennent dans nos murs, sous nos toits, dans nos jardins, à notre portée, abriter leurs nids. A l'automne, il n'en est plus ainsi : préoccupés seulement de leurs besoins matériels, comme de pauvres diables qui voient la misère venir, ils redeviennent farouches ; le charme est rompu ; et, par leur défiance, ils semblent nous inciter à les poursuivre. La convoitise ou, si l'on veut, l'intérêt direct aidant, l'agrément se transforme et devient la chasse, avec ses entraînements, ses plaisirs et ses salutaires exercices.

Ainsi, par l'attrait, la nature nous dit encore et pour la troisième fois : « RESPECTEZ L'OISEAU AU PRINTEMPS ET N'EN USEZ QU'À L'ARRIÈRE-SAISON ! »

Telle est la loi ! La réelle protection des oiseaux que nous avons à traduire, dans l'enseignement, dans la législation, par la suppression de toute destruction printanière. — Mais ne nous illusionnons pas encore ; tant que cette maxime ne sera pas d'une application générale dans l'ensemble de notre continent, elle sera vaine pour les oiseaux migrants !

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I ^{er} . — INTRODUCTION. Historique.	
— II. — MIGRATION GÉNÉRALE. Causes. Moyens. Con- ditions. Modes. Époques.	13
— III. — MIGRATEURS DU SUD-EST. Geai. Ortolan. Ros- signol.	45
— IV. — MIGRATEURS DU SUD-OUEST. Bécassine. Bé- casse. Paludéens. Aquatiques. Palmi- pèdes	65
— V. — MIGRATEURS DU SUD. Hirondelles. Cigognes. Cailles. Becfigues. Pigeons. Pics. Frin- gilles. Bruants. Fauvettes. Grives. Alouettes. Corbeaux, etc.	111
— VI. — MIGRATEURS ACCIDENTELS. Exotiques. . . .	261
— VII. — CONCLUSIONS. Marche générale. — Utilité et protection des oiseaux.	275

PARIS — TYPOGRAPHIE LAHURE

Rue de Fleurus, 9