59,82 (4)
2

FOR THE PEOPLE
FOR EDVCATION
FOR SCIENCE

LIBRARY
OF
THE AMERICAN MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Bound a
A.M.N.H.

CATALOGUE
DES
OISEAUX D'EUROPE

Librairie Trochu
17, rue de la Harpe

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

POUR SERVIR

DE COMPLÉMENT ET DE SUPPLÉMENT

A L'ORNITHOLOGIE EUROPÉENNE

De DEGLAND et GERBE (1867)

PAR

E.-L. TROUESSART

PROFESSEUR DE ZOOLOGIE AU MUSÉUM NATIONAL DE PARIS

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINCKSIECK

LÉON LHOMME, SUCCESSEUR

3, RUE CORNEILLE, 3

1912

Tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous pays.

MAV 6 1963
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
CINCINNATI, OHIO

38-143503-221

PRÉFACE

L'Ornithologie Européenne de Degland et Gerbe, publiée en 1867, est entre les mains de tous les Ornithologistes et leur a rendu, — leur rend encore, — des services inappréciables. Cependant, l'ouvrage n'est plus au courant de la science et aurait besoin d'une refonte complète. En attendant qu'une nouvelle édition, revue et corrigée, soit publiée par les Éditeurs, nous avons pensé qu'une mise au point en un seul volume, servant de complément et de supplément à la première édition, serait bien accueillie des Ornithologistes et n'encombrerait pas trop leur bibliothèque.

La question des sous-espèces est encore très controversée à notre époque. Nous ne pouvions nous dispenser de les admettre dans un livre comme celui-ci, car elles sont la conséquence du progrès moderne de la science. Ceux qui les condamnent, le font bien souvent de parti pris et sans avoir suffisamment étudié la question.

Dans l'Introduction qui suit cette préface, nous nous sommes efforcé de montrer quelle est l'utilité et la valeur réelle de ces subdivisions de l'Espèce. Si le lecteur veut bien se donner la peine de lire cette Introduction, nous avons la conviction qu'il reconnaîtra que ces formes existent réellement dans la nature, et qu'il admettra les services que cet échelon taxonomique nouveau peut rendre à la Zoologie, envisagée dans sa plus large acception, comme l'étude de plus en plus complète des êtres vivants.

INTRODUCTION

Qu'est-ce qu'une sous-espèce ? — L'introduction de ce terme, en Zoologie, est relativement récente. Elle est due aux naturalistes américains qui, faisant remarquer combien l'expression de « Variété » est vague, proposèrent de lui substituer celle de « sous-espèce » pour désigner exclusivement les *Variétés locales* ou *géographiques*.

En effet, le terme de « Variété » s'applique indifféremment aux Races domestiques, aux variations accidentelles (albinisme et mélanisme, par exemple), même aux simples aberrations, ce qui peut donner lieu à de nombreuses confusions. De plus, c'est un terme vulgaire que les personnes étrangères aux sciences naturelles emploient souvent comme synonyme de celui d'« Espèce ».

« Sous-espèce », au contraire, a l'avantage de désigner une variation bien définie, celle que l'on était obligé naguère de caractériser par l'épithète de « locale ». Dans le cadre de nos classifications, ce terme avait sa place marquée d'avance, puisque l'on admettait depuis longtemps des Classes et des Sous-Classes, des Ordres et des Sous-Ordres, des Familles et des Sous-Familles, des Genres et des Sous-Genres.

Du moment que les Naturalistes ont reconnu et admis la variabilité de l'Espèce sous l'influence des conditions variables du milieu ambiant, ils ont dû se préoccuper de la meilleure manière de formuler les différences qui en résultent, pour en tenir compte dans les traités de Zoologie descriptive. Des « formes » différentes comme taille, comme plumage, comme proportions, ne peuvent être caractérisées dans une description unique ; elles exigent autant de paragraphes différents, et chacune de ces formes doit avoir un titre nominatif particulier, mais rappelant ses affinités avec l'espèce dont on l'a détachée. C'est ainsi qu'est née la *nomenclature trinominale*, conséquence forcée de l'admission des sous-espèces.

En quoi une sous-espèce diffère-t-elle d'une « bonne espèce » ? — En principe on doit dire que « toute forme qui se distingue nettement d'une autre forme du même genre, SANS PRÉSENTER DE FORMES INTERMÉDIAIRES, est une bonne espèce » ; au contraire : « toute forme nouvelle qui PRÉSENTE DES FORMES INTERMÉDIAIRES entre elle et une autre espèce du même genre plus anciennement connue, n'est qu'une sous-espèce de celle-ci ».

La forme la plus anciennement connue restera le « type », la forme nouvelle sera une sous-espèce de ce type, et dans la nomenclature trinominale se distinguera par le troisième nom ajouté à la suite des noms du genre et de l'espèce. Par exemple : *Aquila maculata maculata* est le type de l'Aigle tacheté ; *Aquila maculata clanga* est la sous-espèce qui remplace le type dans l'Europe orientale et *Aquila maculata fulvescens* celle qui les remplace toutes deux en Asie ; mais comme on trouve des formes intermédiaires, il est impossible d'en faire trois espèces distinctes.

Néanmoins, si le principe est net et simple au premier abord, son application dans la pratique n'est pas toujours des plus faciles. C'est pourquoi les anciens naturalistes, Pallas et Gray, créateurs des formes *clanga* et *fulvescens*, à une époque, d'ailleurs, où l'on n'admettait pas de sous-espèces, les ont présentées comme de bonnes espèces ; d'autres, au contraire, même parmi les modernes, se sont refusés à admettre toute distinction nominale entre ces trois formes géographiques. L'avantage des sous-espèces est précisément de permettre de distinguer les trois formes sans les élever au rang d'espèce, et de se rapprocher ainsi, autant qu'il est possible de le faire, de la nature qui, dans sa complexité, se joue souvent de tous nos artifices de classification.

Qu'on nous permette, à ce point de vue, de citer les paroles d'un savant illustre qui, au cours de recherches d'une haute portée philosophique, a su comprendre et mettre en lumière l'utilité de la morphologie systématique :

« Un grand nombre de naturalistes adonnés à l'étude de la morphologie systématique, dit le professeur Giard, ont accueilli avec méfiance l'idée de la variabilité des espèces, pensant que cette idée minait les principes sur lesquels reposait leur science de prédilection. Les événements n'ont pas tardé à prouver combien ces craintes étaient chimériques. Pour démontrer scientifiquement la réalité des variations souvent très légères à leur début, il était nécessaire en effet de préciser plus qu'on ne l'avait fait jusqu'alors et

de POUSSER PARFOIS JUSQU'À LA MINUTIE les descriptions des formes en discussion. La conservation des types dans les collections et les musées, leur représentation graphique et leur comparaison attentive avec les espèces voisines, s'imposaient de plus en plus, et certainement, les progrès de l'histoire naturelle systématique ont été fortement stimulés par les contestations des partisans et des adversaires de la théorie de la descendance.

« La recherche des formes nouvelles, la poursuite des types de transition, des aberrations, des variétés locales, n'ont plus pour but unique aujourd'hui la satisfaction d'un sentiment de vague curiosité. La connaissance des moindres modifications de structure, et celle des moindres écarts de la morphologie normale, deviennent des éléments précieux pour l'établissement des arbres phylogéniques (1)... »

Les procédés par lesquels se forment les sous-espèces varient beaucoup suivant le type zoologique auquel elles appartiennent. Chez les Mammifères terrestres qui n'émigrent guère et restent attachés au sol qui les a vu naître, on conçoit facilement que l'action du climat, le changement de nourriture et d'habitudes, modifient les caractères au point que telle forme du Sud de l'Espagne, par exemple, ne ressemble plus à la forme qui la représente dans le Nord-Est de la Russie, et que l'on serait tenté de décrire les deux formes comme deux espèces distinctes. Mais ces deux formes se relient l'une à l'autre par des formes intermédiaires qui habitent la France, la Suisse, l'Allemagne, la Russie centrale, et établissent la continuité de l'espèce : par suite on est amené à décrire ces différentes formes comme de simples sous-espèces. Chez les Mammifères, on peut établir en axiome que *deux sous-espèces d'un même type ne peuvent exister simultanément dans la même localité parce qu'elles se fusionneraient forcément l'une dans l'autre par des alliances continuelles*. Quand deux formes très voisines existent dans le même pays, — comme la Marte et la Fouine, par exemple (*Mustela martes* et *Mustela foina*) — c'est qu'il s'agit de deux espèces bien distinctes (2).

Il en est autrement chez la plupart des Oiseaux, puisque nous voyons

(1) A. GIARD, *Les Tendances actuelles de la Morphologie*, Conférence faite à l'Exposition l'Universelle de Saint-Louis, en 1904, et reproduite dans les *Œuvres diverses* (publication posthume) de Giard, 1911, p. 155-156.

(2) Les Oiseaux qui n'émigrent pas, les Cincles (*Cinclus*), par exemple, attachés aux eaux douces, paraissent sous ce rapport, et jusqu'à un certain point, dans les mêmes conditions que les Mammifères.

que deux sous-espèces d'un même type peuvent vivre dans le même pays, au moins pendant une partie de l'année (on en trouvera de nombreux exemples dans ce Catalogue).

C'est surtout dans les îles de la Méditerranée et dans les îles Atlantiques (Açores, Canaries), que l'on peut constater ce fait. La Corse, notamment, dont la faune ornithologique a été étudiée récemment par M. C. Parrot, et par d'autres, nous en offre un bon exemple. A côté des formes migratrices qui, passant d'Europe en Afrique, à l'automne, ne font que traverser l'île, il s'est constitué des formes locales plus ou moins distinctes des précédentes, et qui, séjournant toute l'année dans l'île, s'y sont acclimatées et ont perdu l'habitude de la grande migration.

Le climat de la Corse, que l'on compare à celui de Ténériffe, se prêtait admirablement à ce changement de mœurs. On décrit ce climat comme « un printemps et un été perpétuels » ; l'écart d'une saison à l'autre est moindre qu'en Provence, et les hautes montagnes du centre (2,710 m.), couvertes de forêts, lui donnent toute la variété désirable.

Comment ces formes locales, décrites comme des sous-espèces, se sont-elles constituées ? Bien que des recherches précises n'aient jamais été faites à cet égard, il est facile de se l'imaginer.

Les grandes bandes d'Oiseaux migrants qui, chaque année, passent d'Europe en Afrique ont, comme les armées, leurs trainards fournis par les blessés et les malades, par les couvées tardives ou mal venues, qui ne peuvent suivre le gros de la troupe et s'arrêtent dès la première étape à travers la Méditerranée. Cette première étape est la Corse, qui, leur offrant un climat favorable et une nourriture suffisante, les invite à s'y installer pour y passer l'hiver. Au printemps suivant, lorsque commence la migration de retour, les Oiseaux de Corse sont déjà accouplés et dès lors ne se mêlent plus à ceux du Continent : la sous-espèce est constituée ; elle tend de plus en plus à s'éloigner du type, aussi bien par ses mœurs sédentaires que par les particularités de taille et de plumage qui résultent bientôt de cette *ségrégation*. Cependant de nouveaux trainards viennent chaque année se mêler aux Oiseaux de Corse, et c'est ce qui empêche ceux-ci de constituer des espèces distinctes qui se formeraient facilement sans cela.

La démonstration de ce fait, d'un haut intérêt en zoologie, n'a pu être

réalisée que par l'étude, toute moderne, des sous-espèces, et c'est ce qui légitime cette étude.

On voit en même temps combien est fragile la barrière qui sépare ce qu'on est convenu d'appeler les « bonnes espèces », de ce qu'on nomme sous-espèce. Il suffirait que le grand flot de la migration prit une autre route (1), et la sous-espèce deviendrait une bonne espèce. C'est pour cette raison que les colonies plus ou moins éloignées des espèces « disjointes » (*Cyanopica cooki* et *Sitta whiteheadi*, par exemple), ont toujours été considérées par les anciens ornithologistes comme de bonnes espèces. La nomenclature trinominale nous permet de les rattacher à leur type et de mettre en évidence des affinités naturelles qui nous échappaient autrefois.

Règles d'après lesquelles doivent être fondées les sous-espèces. — Ce qui a soulevé le plus de critiques contre la nomenclature trinominale, c'est l'abus que quelques personnes en ont fait. Pour éviter cet abus, il serait bon d'instituer certaines règles, faute de l'observation desquelles toute sous-espèce nouvelle serait sans valeur. En se basant sur l'expérience, ces règles pourraient être formulées de la façon suivante :

1° *Un ou deux spécimens sont insuffisants pour instituer une sous-espèce nouvelle;*

2° *Tout naturaliste qui suppose qu'une forme locale est assez distincte pour être décrite comme sous-espèce, devra réunir au moins quinze spécimens adultes des deux sexes de cette forme, capturés aux deux principales époques de l'année, et les comparer avec un nombre égal de spécimens du type (2).* C'est d'après la comparaison de ces deux séries, si elles sont nettement distinctes, que sa diagnose devra être faite.

Limites de la Faune Ornithologique d'Europe. — Devant calquer le plan de notre Catalogue sur celui de l'Ornithologie Européenne de Degland et Gerbe, nous n'avons pas présenté ici une *Faune Paléarctique*, mais une Faune simplement Européenne. Cependant nous avons cru devoir comprendre dans cette Faune les Oiseaux des îles Atlantiques (Açores, Madère et Canaries), qui se rattachent manifestement à la Faune d'Europe. Ces îles, d'ailleurs, sont sur le chemin des migrations régulières de notre

(1) Par suite de quelque révolution géologique, par exemple.

(2) Ce chiffre de quinze est approximatif, et n'a, comme on le conçoit, rien d'absolu. Les deux époques de l'année seront l'automne (après la mue) et le printemps au moment de la parade.

faune ornithologique continentale. Par ailleurs, les limites de l'Europe sont nettement tracées, au Nord, à l'Ouest et au Sud par des Océans et des Mers, à l'Est par les Monts et le fleuve Oural, au Sud-Est par la Caspienne et le Caucase. C'est de ce dernier côté que la limite est la moins précise, le pourtour septentrional de la Caspienne étant, pour les Oiseaux, une porte ouverte plutôt qu'une barrière.

Comme conséquence, on constate qu'un certain nombre d'Oiseaux appartenant à la faune asiatique, — sans parler des Syrrhaptès, — s'égarèrent assez fréquemment jusque dans l'Europe Occidentale. — Par contre, on est tombé d'accord que la plupart des Passereaux de la faune Nord-Américaine admis naguère, comme des visiteurs accidentels, dans la faune d'Europe, devaient en être écartés (1) : c'est seulement à la suite de violentes tempêtes que ces Oiseaux sont poussés sur nos côtes de l'Océan ; bien plus, un certain nombre de ceux qui figurent dans les collections à ce titre, présentent un plumage usé qui dénote un séjour plus ou moins long en captivité. C'est là une erreur facile à commettre, même et surtout lorsqu'il s'agit d'Oiseaux asiatiques, et contre laquelle il convient de se tenir toujours en garde, le nombre des Oiseaux importés en cage, et susceptibles de s'échapper, devenant de jour en jour plus considérable.

PLAN DU CATALOGUE

Dans un Catalogue faunique, les questions de Classification n'ont qu'une importance secondaire. Aussi avons-nous suivi, au moins dans ses grandes lignes, la classification adoptée par Degland et Gerbe en 1867.

L'ouvrage que nous citons en première ligne pour l'iconographie est celui de DRESSER, *Birds of Europe*, 8 vol. in-4° et 1 vol. de *Supplément* (1871-81 et 1895-96), dont le seul défaut est d'être d'un prix élevé. L'ouvrage de NAUMANN, *Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas* (Nouvelle Édition, par Blasius, Hennicke, etc.), 12 vol. in-folio, avec 446 pl. col. (1900-1905), peut suppléer le précédent, et présente l'avantage d'être d'un prix très abordable. Le premier de ces recueils a des planches plus artistiques, mais les figures du second sont également très exactes.

(1) Ceci ne s'applique pas aux Échassiers, souvent cosmopolites.

La disposition typographique que nous avons adoptée sera facilement comprise du lecteur :

Nous avons placé en regard et sous les mêmes numéros les dénominations génériques et spécifiques du livre de Degland et Gerbe et celles adoptées par les Ornithologistes modernes : les premières sont inscrites sur les pages à numéro pair; les secondes sur celles à numéro impair. Nous ne décrivons que les espèces et sous-espèces dont il n'est pas fait mention dans le traité de 1867, sauf dans le cas où la description de Gerbe a besoin d'être modifiée en tout ou en partie. Il est donc indispensable, pour l'usage du présent Catalogue, d'avoir sous les yeux les deux volumes de l'*Ornithologie Européenne*.

On n'a numéroté que les espèces d'un même genre. Les sous-espèces sont désignées par une lettre grasse (**a**, **b**, **c**, etc.), suivie d'un trait (—) qui remplace le nom spécifique sous-entendu. Dans un petit nombre de cas, notamment quand le type de l'Espèce est étranger à l'Europe, on a mentionné en toutes lettres la nomenclature trinomiale, mais en plaçant entre parenthèse le nom spécifique.

En ce qui concerne la valeur des espèces, nous avons suivi, toutes les fois que cela nous a été possible, l'appréciation du Dr ERNST HARTERT dans son grand ouvrage, en cours de publication : *Die Vögel der paläarktischen Fauna* (1903-1912), dont le premier volume (renfermant les Passereaux), est seul publié jusqu'à ce jour. Cet Ornithologiste a visité presque tous les Musées et les Collections particulières d'Europe avant de rédiger son livre, ce qui lui donne une compétence considérable dans la matière. Pour les ordres autres que les Passereaux, nous avons suivi Dresser. Les sous-espèces les plus récemment décrites, et dont beaucoup ne sont pas fondées sur des caractères bien stables, ont dû être reléguées à l'*Appendice* qui termine le volume.

TABLE DES MATIÈRES

ACCIPITRES

	Pages.
Vulturidæ.	3
Vultur	3
Otogyps	3
Gyps.	3
Neophron.	5
Gypaetidæ	5
Gypaetus	5
Falconidæ	5
Aquila	5
Nisaetus	13
Haliaetus	13
Pandion	15
Circæetus.	15
Buteo	15
Archibuteo	17
Pernis	19
Milvus	19
Elanus	21
Elasas	21
Hierofalco	21
Falco	23
Tinnunculus	27
Erythropus	27
Astur	27
Accipiter	29
Circus	29
Strigidæ	33
Surnia	33
Nyctea	33
Glaucidium.	35
Athene.	35
Nyctala.	35
Syrnium	37
Ula	37
Strix.	37

	Pages.
Asio	39
Bubo.	41
Scops.	41

PASSERES

Picidæ	43
Picus.	43
Dendrocopus	43
Picoides	49
Gecinus	51
Yunx	53
Cuculidæ	53
Cuculus	53
Coccytes.	53
Coccyzus.	55
Coraciidæ.	55
Coracias	55
Meropidæ	57
Merops.	57
Alcedinidæ	59
Alcedo	59
Ceryle	59
Halcyon	61
Certhiidæ	61
Sitta	61
Certhia.	65
Tichodroma.	69
Upupidæ	69
Upupa	69
Corvidæ	69
Corvus.	69
Coleus.	75
Pyrhocorax.	77
Nucifraga.	77
Pica	79

	Pages.		Pages.
Cyanopica	79	Cinclus	173
Garrulus	81	Oriolidæ	179
Perisoreus	83	Oriolus	179
Laniidæ	85	Turdidæ	179
Lanius	85	Pycnonotus	179
Telephonus	89	Turdus	181
Sturnidæ (1)	91	Erithacus	193
Sturnus	91	Luscinia	197
Pastor	93	Cyanecula	201
Fringillidæ	95	Phœnicurus	203
Passer	95	Monticola	207
Petronia	97	Saxicola	207
Pyrrhula	99	Pratincola	213
Erythropsiza	101	Prunella	217
Carpodacus	103	Sylvia	221
Pinicola	103	Melizophilus	229
Loxia	105	Agrobates	231
Coccothraustes	109	Hippolaïs	233
Chloris	109	Acrocephalus	237
Fringilla	111	Locustella	243
Montifringilla	115	Luscinola	245
Carduelis	117	Herbivocula	247
Chrysomitris	119	Cisticola	249
Citrinella	121	Cettia	249
Serinus	121	Troglodytidæ	251
Cannabina	123	Troglodytes	251
Linaria	125	Phylloscopidæ	255
Emberiza	127	Phylloscopus	255
Plectrophanes	139	Regulus	267
Calcarius	139	Paridæ	271
Alaudidæ	141	Parus	271
Alauda	141	Panurus	293
Lullula	143	Ægithalus	295
Calandrella	143	Anthoscopus	301
Eremophila	147	Ampelidæ	303
Melanocorypha	151	Bombycilla	303
Certhilauda	151	Muscicapidæ	305
Chersophilus	153	Muscicapa	305
Galerida	153	Hirundinidæ	309
Motacillidæ	157	Chelidon	309
Anthus	157	Hirundo	311
Motacilla	165	Riparia	311
Cinclidæ	173	Cypselidæ	313
		Apus	313
		Chætura	317
		Caprimulgidæ	319

(1) Page 91, le nom de la famille (Sturnidæ) a été omis avant *Sturnus*.

	Pages.		Pages.
Caprimulgus	319	Numenius	381
COLUMBÆ		Limosa	383
Columbidae	323	Terekia	385
Columba	323	Macrorhamphus	385
Turtur	327	Gallinago	387
Pteroclidæ	331	Calidris	389
Pterocles	331	Tringa	389
Syrhaptes	335	Limicola	397
GALLINÆ		Tringites	397
Tetraonidae	337	Bartramia	399
Lagopus	337	Pavonella	399
Tetrao	341	Totanus	401
Bonasa	347	Actitis	407
Tetraogallus	349	Symphenia	407
Francolinus	349	Phalaropus	409
Caccabis	351	Recurvirostridae	409
Perdix	353	Recurvirostra	409
Coturnix	357	Himantopus	411
Turnicidae	359	Rallidae	411
Turnix	359	Rallus	411
Phasianidae	359	Crex	413
Phasianus	359	Porzana	413
GRALLÆ		Gallinula	415
Otididae	361	Porphyrio	415
Otis	361	Fulica	417
Houbara	363	Gruidae	419
Glaucolidae	365	Grus	419
Glaucola	365	Anthropoides	419
Charadriidae	367	Balearica	421
Oedienemus	367	Ardeidae	421
Cursorius	369	Ardea	421
Pluvianus	369	Herodias	423
Charadrius	369	Bubulcus	423
Squatarola	371	Ardeola	425
Eudromias	371	Ardetta	425
Ægialites	373	Botaurus	427
Oxyechus	375	Nycticorax	427
Hoplopterus	377	Ciconia	429
Chroctusia	377	Platalea	429
Vanellus	379	Ibis	431
Hematopus	379	Falcinellus	431
Streptilas	381	Phœnicopteridae	433
Scolopacidae	381	Phœnicopterus	433
		PALMIPEDES	
		Pelecanidae	435

	Pages.		Pages.
Pelecanus.	435	Chenalopex.	479
Sula.	435	Tadorna.	481
Phalacrocorax.	437	Spatula.	481
Tachypetes.	437	Anas.	481
Phaëton.	439	Chauelasmus.	483
Procellariidæ.	439	Mareca.	483
Diomedea.	439	Dafila.	483
Procellaria.	441	Querquedula.	485
Cestrelata.	441	Nettion.	485
Bulweria.	443	Eunetta.	487
Puffinus.	443	Marmaronetta.	487
Thalassidroma.	447	Aythya.	487
Oceanites.	447	Clangula.	491
Oceanodroma.	449	Cosmonetta.	491
Pelagodroma.	449	Harelda.	493
Laridæ.	451	Eniconetta.	493
Stercorarius.	451	Somateria.	493
Rhodostethia.	453	Ædemia.	495
Pagophila.	455	Erismatura.	497
Larus.	455	Mergus.	497
Rissa.	463	Podicipidæ	499
Xema.	463	Podiceps.	499
Anous.	465	Colymbidæ	501
Sterna.	465	Colymbus.	501
Hydrochelidon.	471	Alcidæ	505
Anatidæ	473	Uria.	505
Cygnus.	473	Mergulus.	507
Anser.	475	Fratercula.	507
Branta.	477	Alca.	509
Chen.	479		

CATALOGUE
DES
OISEAUX D'EUROPE

Ordre I — OISEAUX DE PROIE

Famille I — VULTURIDÉS

Genre VAUTOUR

1. *Vultur monachus* Linn.

VAUTOUR MOINE ou ARRIAN

Degland et Gerbe, I, p. 5.

Genre OTOGYPS

1. *Otogyps auricularis* (Daud.)

OTOGYPS ORICOU

D. et G., I, p. 7.

Genre GYPS *Savigny* 1809

1. *Gyps fulvus* (Brisson)

GYPS FAUVE ou GRIFFON

D. et G., I, p. 9, et *G. occidentalis*, Bp. ex Schleg., p. 11.

I — ACCIPITRES

I — VULTURIDÆ

VULTUR *Linne* 1766

1. *monachus* Linn., Syst. Nat., 1766, I, p. 122;
Dresser, V, p. 383, pl. 321; *cinereus* Gmel.,
1788.

Europe Sud, acci-
dentel dans le
Centre et le Nord;
Afrique Nord;
Asie jusqu'à l'Inde
et la Chine.

OTOGYPS *Gray* 1841

1. *auricularis* (Daudin), Ornithol., 1800, II, p. 10.

Europe Sud-
Ouest,
accid. en Espagne
et France Sud,
Afrique Nord et
tropicale.

GYPS *Savigny* 1810

1. *fulvus* (Gmel.), Syst. Nat., 1788, I, p. 249;
Dresser, V, p. 373, pl. 319, 320; *hispaniolensis*
Sharpe, 1874; *occidentalis* Schlegel, 1844;
Bonap., 1854.

Europe Sud,
accidentel dans le
Centre et le Nord
de l'Europe :
Asie
jusqu'au Népal
et au Sikkim.

Genre NEOPHRON *Savigny* 1809

1. *Neophron percnopterus* (Linné)

NÉOPHRON PERCNOPTÈRE

D. et G., I, p. 12.

Famille II — GYPAÉTIDÉS

Genre GYPAÈTE

1. *Gypaetus barbatus* (Linné)

GYPAÈTE BARBU

D. et G., I, p. 16.

Famille III — FALCONIDÉS

Genre AIGLE

1. *Aquila fulva* (Linné) et *A. chrysaetos* L.

AIGLE FAUVE ET AIGLE DORÉ

D. et G., I, p. 20 et 23.

NEOPHRON *Savigny* 1810

1. **percnopterus** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 123 ;
Dresser, V, p. 391, pl. 322.

Europe Sud ; acci-
dentel au Nord
jusqu'en
Angleterre ;
Afrique et Asie
jusqu'à
l'Inde Ouest.

II — GYPAETIDÆ

GYPAETUS *Storr* 1780

1. **barbatus** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 123 ;
Dresser, V, p. 401, pl. 323, 324, 325 ; *occi-*
dentalis Schlegel.

Europe Sud, dans
les montagnes
(Espagne, France,
Sardaigne ;
éteint en Suisse ;
Bosnie, Balkans,
Grèce, Caucase) ;
Asie jusqu'en
Chine.

III — FALCONIDÆ

AQUILA *Brisson* 1760

1. **chrysaetus** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 125 ;
Dresser, V, p. 533, pl. 345 ; *fulva* L., 1766 ;
melanotos Gmel., 1788 ; *canadensis* Gmel. ;
barthelemyi Jaub., 1852 ; *nobilis* Pall. (juv.).

Europe
de la Laponie
et des
Iles Britanniques
jusqu'en Asie Est ;
Afrique Nord ;
Amérique Nord
jusqu'au Mexique.

2. *Aquila imperialis* (Bechst.)

AIGLE IMPÉRIAL

D. et G., I, p. 24.

3. Espèce nouvelle, Aigle impérial (des Espagnols)

AIGLE D'ADALBERT

4. Espèce nouvelle,

AIGLE DES STEPPES

2. **heliaca** Savigny, Ois. d'Égypte, 1809, p. 82, pl. 12; *imperialis* Bechst., 1812; ? *mogilnik* Gmel., Nov. Com. Petr., 1771, XV, p. 445; Dresser, V, p. 521, pl. 343, 344.

Europe Sud-Est;
Asie
jusqu'en Chine;
Afrique Est
jusqu'en Nubie
et Abyssinie.

3. **adalberti** Brehm, Ber. Ver. Deutsch. Orn. Gesellsch., 1860, XIII, Beitr. VII, p. 55; Dresser, V, p. 517, pl. 342, 343; *leucolena* Dresser, P. Z. S., 1872, p. 864.

Europe Sud-
Ouest et Afrique
Nord-Ouest
(où il remplace
le précédent);
Espagne
et Portugal.

Diffère d'*A. heliaca* par sa tête d'un brun foncé sur le front et le sommet; le derrière de la tête et la nuque d'un brun clair; les petites couvertures formant une large bande blanche sur l'aile; les scapulaires d'un brun foncé; les côtés de la face et du cou d'un brun clair lavé de roux. — Le jeune est isabelle teinté de roux et sans raies brunes.

4. **nipalensis** Hodgson, As. Res. 1832, XVIII, part. 2, p. 13, pl. 1; *bifasciata* Gray, 1830-34 (nec Brehm); *mogilnik* Sharpe, 1874 (nec Gm.).

Europe Sud-Est;
steppes russes;
Asie jusqu'à
l'Inde
Nord-Ouest.

Parties supérieures d'un brun terreux plus foncé sur la tête, les scapulaires et les rémiges secondaires; plus pâle sur la nuque; rémiges et les plus grandes scapulaires d'un brun noirâtre. Queue d'un brun noirâtre, avec l'extrémité étroitement bordée de brun clair et portant des bandes obsolètes marbrées de gris cendré. Parties inférieures d'un brun terreux teinté de roux sur la partie postérieure de l'abdomen. Bec d'un bleu corné; cire et pieds jaune pâle. Longueur de l'aile du mâle, 52 centimètres; la femelle plus grande. — *Jeune*: d'un brun terreux foncé avec une faible teinte pourprée dessus et dessous, deux bandes d'un roux ocreux bien marquées sur l'aile, les couvertures supérieures de la queue d'un fauve ocreux et la queue largement terminée de roux ocreux foncé. — Les narines sont en ovale vertical (ce qui distingue l'espèce d'*A. bomerina* où elles sont rondes).

a. **Sous-espèce nouvelle,**
AIGLE ORIENTAL

b. **Sous-espèce nouvelle,**
AIGLE DE GLITSCH

5. ***Aquila nævia* (Gmel.)**
AIGLE TACHETÉ
D. et G., I, p. 26 (1).

(1) L'*Aquila nævia* de Gmelin étant indéterminable, le nom de l'espèce a été changé en *maculata*, qui est également de Gmelin.

a. (nivalensis) orientalis Cabanis, J. f. Orn., 1854, p. 369; id., 1874, p. 93-94; Taczanowski, id., 1874, p. 317; *mogilnik* (partim), Alleon, Rev. et Mag. Zool., 1866, p. 273, pl. 20; Sharpe, 1874 (nec Gmel.); *nivalensis* Dresser, V, pl. 340 (1).

Steppes du Sud
de la Russie
et de l'Asie Occi-
dentale;
accidentel
en Sardaigne.

D'un brun obscur uniforme avec une tache nuchale fauve chez l'adulte. Dans toutes ses proportions, il est plus grand et plus fort qu'*A. nevia* (*maculata*), avec lequel on l'a confondu à cause de son mode de coloration. — *Jeune* : d'un brun de terre passant au fauve pâle sur le bas du dos, les scapulaires moyennes, les couvertures petites et moyennes, la poitrine et l'abdomen. Les grandes couvertures de l'aile et les rémiges secondaires ont l'extrémité fauve; les couvertures supérieures et inférieures de la queue sont fauves. Narines ovales.

b. (nivalensis) glitschi Severtzow, Stray Feath., 1875, p. 422.

Steppes du Sud
de la Russie
et de
l'Asie occidentale.

Adulte : d'un brun de terre avec une bande nuchale fauve et une tache transversale fauve pâle sur le bas du dos. Rémiges primaires, secondaires et rectrices tachetées de fauve. — *Jeune* : presque entièrement d'un brun de terre uniforme avec une tache terminale fauve sur quelques grandes couvertures de l'aile. Rémiges secondaires et rectrices terminées de fauve, les plus externes rayées irrégulièrement de brun. La tache nuchale fauve et le fauve pâle du bas du dos se montrent après la 3^e ou la 4^e mue. Narines ovales.

5. maculata (Gmel.), Syst. Nat., I, 1788, p. 258; *nevia* Gmel. (?), Naumann, Gould, Lillford; *clanga* Pallas, 1811; Naumann; Dresser, V, p. 499, pl. 339.

Europe Centrale
et Sud; accidentel
dans le Nord
et les Iles Britan-
niques;
Afrique Nord
et Asie
jusqu'à la Sibérie
Sud-Est.

(1) Cette sous-espèce n'est pas considérée comme distincte du type asiatique (*A. nivalensis*), par Dresser et d'autres ornithologistes.

a. *Aquila clanga* (ex Pall.)

AIGLE CRIARD

Variété d'*A. nevia*, D. et G., I, p. 28 (exclus synonym. *A. pomarina*).

b. Sous-espèce nouvelle,

AIGLE ISABELLE

6. *Aquila pomarina* Brehm

AIGLE DE POMÉRANIE

Cité comme synonyme douteux d'*A. clanga*, D. et G., I, p. 28.

- a. (*maculata*) **clanga** (Pallas), Zoogr. 1811-1831, I, p. 351; Degland et Gerbe, Ornith. Europ., 1867, I, p. 28 et 30 (1). Europe Sud-Est et Asie Sud-Ouest.
- b. (*maculata*) **fulvescens** Gray, Ill. Ind. Zool., 1832, I, pl. 29; Rothschild, Bull. Brit. Orn. Club, X, p. 51; *boeckii* Homeyer. Russie, Sibérie Occidentale, Altai, Turkestan, Inde Nord-Ouest.

Semblable au type, mais à teintes plus pâles (forme désertique de *maculata*). — *Jeune* : en-dessous d'un brun cendré ; l'*Adulte* : fauve pâle ou isabelle.

6. **pomerina** Brehm, Vög. Deutschl., 1831, p. 27 ; Dresser, V, p. 491, pl. 338; *maculata* Sharpe, 1874 (nec Gm.); *rafouuchalis*, Brooks, 1875.

Europe Est, accidentel dans l'Europe Centrale-Occidentale ; Asie-Mineure et Afrique Est jusqu'à la Nubie (en hiver).

Plus petit qu'*A. maculata*, d'un brun terreux avec les plumes plus pâles à leur pointe, le sommet de la tête et le cou d'un fauve crème vif, la queue d'un brun foncé, les rectrices externes terminées de gris foncé et présentant des bandes claires obsolètes ; plumes du tarse d'un brun foncé mêlé de brun clair. Longueur de l'aile (mâle) : 45 centimètres. — *Jeune* : brun, avec une teinte chocolat, et beaucoup moins tacheté que le jeune d'*A. maculata* ; sommet de la tête et derrière du cou marqués de petites taches d'un roux ocreux, la nuque portant une large tache rousse, le dos et les petites couvertures finement tachetées ; les rémiges secondaires terminées de gris, les internes avec une large tache grise terminale irrégulièrement ovale. Queue d'un brun noirâtre lavé de gris et terminée de gris cendré. Dessous rayé de roux ocreux ; tarses présentant des taches éparses d'un blanc crème ; couvertures inférieures de la queue d'un ocre crémeux.

(1) Cette sous-espèce n'est pas admise comme distincte du type par les ornithologistes modernes.

7. *Aquila nævioides* (Cuv.)

AIGLE NÉVIOIDE ou RAVISSEUR

D. et G., I, p. 30.

Genre AIGLE (partim.)**1. *Aquila fasciata* (Vieill.)**

AIGLE A QUEUE BARRÉE, AIGLE BONELLI

D. et G., I, p. 32.

2. *Aquila pennata* (Briss.)

AIGLE BOTTE

D. et G., I, p. 36.

Genre PYGARGUE**1. *Haliaetus albicilla* (Linné)**

PYGARGUE ORDINAIRE ou A QUEUE BLANCHE

D. et G., I, p. 39.

***Haliaetus leucocephalus* (L.)**

PYGARGUE A TÊTE BLANCHE

D. et G., I, p. 42.

2. *Haliaetus leucoryphus* (Pallas)

PYGARGUE LEUCORYPHE

D. et G., I, p. 45.

7. **rapax** (Temm.), Planches Col., I, 1828, liv. 76, pl. 445; Dresser, V, p. 513, pl. 341; *naevioides* Cuv., 1829; *albicans* Rüpp., 1835; *belisarius* Levaill. jun., 1858.

Europe Sud
(très accidentel),
Turquie, France
Sud, Palestine et
toute l'Afrique.

NISAETUS Hodgson 1836

Entolmactus Blyth, 1845; *Hieraeus* Kaup, 1844.

1. **fasciatus** (Vieill.), Mém. Soc. Linn. Paris, 1822, p. 152; Dresser, V, p. 575, pl. 351, fig. 1, 352, 353; *bonellii* (Temm.), Pl. Col, I, 1824, pl. 288.

Europe Sud,
Afrique jusqu'au
Damara; Asie
jusqu'à l'Inde.

2. **pennatus** (Gmel.), Syst. Nat., I, 1788, p. 272; Dresser, V, p. 481, pl. 336, 337, 351, fig. 2; *minutus* (Brehm), Vög. Deutschl., 1831, p. 29, pl. 2, fig. 2.

Europe Sud.
rare dans l'Europe
Centrale; Afrique
tout entière,
Asie jusqu'en
Birmanie.

HALIAETUS Savigny 1809

1. **albicilla** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 123; Dresser, V, p. 551, pl. 347, 348.

Europe en général
jusqu'à la
Nouvelle-Zemble;
Afrique Nord;
Asie jusqu'au
Japon.

[Espèce de l'Amérique boréale étrangère à l'Europe.]

2. **leucoryphus** (Pallas), Reise Russ. Reichs., I, 1771, p. 454; Dresser, V, p. 545, pl. 346; *macei* Temm., 1824.

Russie Centrale
et Sud, Turquie;
Asie jusqu'à la
Chine.

Genre BALBUZARD

1. *Pandion haliaetus* (L.)

BALBUZARD FLUVIATILE

D. et G., I, p. 47.

Genre CIRCAËTE

1. *Circaetus gallicus* (Gmel.)

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC

D. et G., I, p. 50.

Genre BUSE

1. *Buteo vulgaris* (L.)

BUSE VULGAIRE

D. et G., I, p. 53.

(1)

(1) Sous-espèces nouvelles : *Buteo buteo lanzarote* Polatzek (Iles Canaries); *B. b. insularum* Flerike (Iles Açores). — Voyez l'APPENDICE.

PANDION (1) Savigny 1809

1. *haliaetus* (L.), Syst. Nat., I, 1766, p. 129; Dresser, VI, p. 139, pl. 386, 387; *fluviatilis* Savigny, 1809.

Europe jusqu'en Laponie, de passage seulement en Irlande; Asie jusqu'au Japon; Afrique, Australie, Nouv.-Zélande; Amérique (sub-cosmopolite).

CIRCAETUS Vieill. 1816

1. *gallicus* (Gmel.), Syst. Nat., I, 1788, p. 295; Dresser, V, p. 363, pl. 349, 350; *brachydactylus* Wolf, 1810.

Europe Sud et Centrale (plus rare); accidentel dans le Nord; Afrique Nord; Asie jusqu'à la Chine Nord.

BUTEO Cuvier (1799) 1800

1. *vulgaris* Leach, Syst. Cat., 1816, p. 10; Dresser, V, p. 449, pl. 331; *buteo* (L.), Syst. Nat., I, 1766, p. 127; Naum., Sharpe, 1899; *desertorum* (partim), Blanford (nec Daudin).

Europe entière, Iles Britanniques, Madère, Canaries; Afrique Nord; Asie jusqu'au Japon.

(1) En raison de ses caractères très particuliers, ce genre doit être séparé des *Falconidae* pour former une famille à part (*Pandionidae*) à placer à la suite de celle-ci.

a. **Sous-espèce nouvelle,**
BUSE DE MÉNÉTRIÈS

b. **Buteo desertorum** Daudin
BUSE DES DÉSERTS
D. et G., I, p. 55.

2. **Buteo ferox** (S. G. Gmel.)
BUSE FÉROCE
D. et G., I, p. 57.

Genre ARCHIBUSE

1. **Archibuteo lagopus** (Brünn.)
ARCHIBUSE PATTUE
D. et G., I, p. 59.

- a. menetriesi** Bogdan., Trans. Soc. Kasan, VIII, 1879, p. 45; Ehmeke, Journ. Ornith., 1898, p. 140; *Zimmermannæ* (1) Ehmeke, J. O., 1893, p. 117, 1898, p. 140; Shalow, J. O., 1900, p. 249; Kleinschmidt, Orn. Monats., 1898, p. 214, pl. 10.

Allemagne Est
et Russie Nord
jusqu'à
Arkhangel.

Diffère de *B. vulgaris* adulte par sa taille plus petite, ses teintes d'un roux prononcé; — de *B. desertorum* par son abdomen et ses couvertures caudales inférieures blanches, barrées de roux et sa queue barrée. Les jeunes des trois sous-espèces ne diffèrent pas. (Ces caractères s'appliquent à *B. zimmermannæ*, d'après Dresser.)

- b. desertorum** Daudin, Traité d'Orn., 1800, II, p. 162; Dresser, V, p. 457, pl. 332; *cirtensis* Levaill. jun., 1850.

Europe Sud-Est;
accidentel dans le
Sud-Ouest;
Afrique; Asie
jusqu'à l'Inde.

- 2. ferox** (S. G. Gmel.), Nov. Comm. Petrop., 1769, XV, p. 442, pl. 10; Dresser, V, p. 463, pl. 333; *rufinus* Cretzschm., *leucurus* Naum.; *nigricans* Severtz.

Europe Sud-Est;
Afrique
Nord-Est;
Asie jusqu'aux
monts Himalaya.

ARCHIBUTEO *Brehm* 1828

- 1. lagopus** (Gmel.), Syst. Nat., 1788, I, p. 260; Dresser, V, p. 471, pl. 334, 335.

Europe Nord
et Asie jusqu'à
l'extrême Nord;
de passage (en
hiver) dans
le Centre et le
Sud de l'Europe.

(1) Ehmeke (1893) maintient la distinction de *B. zimmermannæ*, et Dresser (1903) considère *B. menetriesi* comme identique à *B. desertorum*. Sharpe et Dubois (1902) admettent trois sous-espèces, non compris le type.

Genre BONDRÉE

1. *Pernis apivorus* (Linné)

BONDRÉE APIVORE

D. et G., I, p. 61.

Genre MILAN

1. *Milvus regalis* Briss.

MILAN ROYAL

D. et G., I, p. 64.

2. *Milvus niger* Briss.

MILAN NOIR

D. et G., I, p. 65.

3. Espèce nouvelle (pour l'Europe).

4. *Milvus ægyptius* (Gmel.)

MILAN ÉGYPTIEN ou PARASITE

D. et G., I, p. 66.

PERNIS *Cuvier* 1817

1. **apivorus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 130 ; Dresser, VI, p. 3, pl. 364, 365, 368 ; *orientalis* Tacz. Europe entière jusqu'en Laponie ; Afrique Nord (en hiver).

MILVUS *Cuvier* 1817

1. **milvus** (L.), Syst. Nat., I, 1766, p. 126 ; *ictinus* Savig., Ois. d'Égypte, 1810, p. 28 ; Dresser, V, p. 643, pl. 361 ; *regalis* Vieill., 1821 ; *vulgaris* Flem., 1828. Europe jusqu'à la Scandinavie, rare en Grande-Bretagne, en Finlande et dans l'Est ; Madère, Canaries, Afrique, Asie Mineure.
2. **migrans** (Bodd.), Pl. Enlum., 1783, p. 28 ; Dresser, V, p. 651, pl. 362 ; *ater*, Gmel., 1788, p. 262 ; *niger* Bp. (ex Briss.), 1838 ; *korschun* Sharpe, 1874 (nec Gmel.). Europe Sud et Centrale, accidentel dans le Nord ; Afrique, Madagascar, Asie jusqu'à l'Afghanistan.
3. **melanotis** Temm. et Schleg., Faun. Jap. Aves, 1850, p. 14, pl. 5 et 5b ; Dresser, IX, p. 277 ; *major*, Hume, 1870. Russie (gouvernement de Perm). Asie jusqu'en Sibérie, Corée et l'Inde (en hiver).
4. **ægyptius** (Gmel.), Syst. Nat., I, 1788, p. 261 ; Dresser, V, p. 657 ; *forskähli* Gmel., 1788 ; *parasiticus* Daud., 1800. Dalmatie, Grèce, Cyclades (accidentel) ; Afrique, Asie Mineure.

Genre ÉLANION

1. *Elanus caeruleus* (Desfont.)

ÉLANION BLAC

D. et G., I, p. 68.

Genre NAUCLER

1. *Nauclerus furcatus* (Linné)

NAUCLER MARTINET

D. et G., I, p. 70.

Genre GERFAUT³

1. *Hierofalco candicans* (Gmel.)

GERFAUT BLANC

D. et G., I, p. 73.

2. *Hierofalco islandicus* (Briss.)

GERFAUT D'ISLANDE

D. et G., I, p. 74 (Race).

3. *Hierofalco gyrfalco* (Schleg.)

GERFAUT DE NORVÈGE

D. et G., I, p. 76.

ELANUS Savigny 1809

1. *cæruleus* (Desf.), Mém. Acad. Sc., 1787, p. 303, pl. 15; Dresser, V, p. 663, pl. 363; *melanopterus*, Daudin, 1800.

France, Espagne, Portugal, Grèce (accidentel), plus rare en Belgique, Allemagne, et jusqu'en Irlande: Asie jusqu'en Birmanie.

|ELASAS Heine 1890

1. *furcatus* (Linné); les ornithologistes modernes ne font plus figurer cette espèce dans la faune d'Europe.]

(Amérique: poussé deux fois par les tempêtes sur les côtes des Iles Britanniques).

HIEROFALCO Cuvier 1817

1. *candicans* (Gmel.), Syst. Nat., I, 1788, p. 275; Dresser, VI, p. 21, pl. 368, 369; *islandicus* Lath., 1790, Ridgway (nec Gmel.); *holboelli* Sharpe, 1873 et 1874.

Groënland, étendant ses voyages jusque dans l'Europe Nord-Ouest, l'Amérique Nord et même l'Asie Nord.

2. *islandicus* (Gmel.), Syst. Nat., I, 1788, p. 271; Dresser, VI, p. 25, pl. 370, 371; *rusticolus*, Ridgw.

Islande et Groënland Sud; accidentel dans les Iles Britanniques, l'Europe Continentale, et l'Amérique Nord-Est.

3. *gyrfalco* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 130; Dresser, VI, p. 15, pl. 367.

Scandinavie Nord et Laponie, accidentel dans l'Europe Centrale et l'Angleterre; Amérique Arctique.

4. Falco sacer (Brisson)

FAUCON SACRÉ

D. et G., I, p. 79.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

GERFAUT A PIEDS DE MILAN

Genre FAUCON**1. Falco lanarius** Schleg. (nec L.) 1844

FAUCON LANIER

D. et G., I, p. 80.

2. Falco communis Gmel.

FAUCON COMMUN ou PÈLERIN

D. et G., I, p. 81.

3. Falco barbarus Linné

FAUCON DE BARBARIE

D. et G., I, p. 84.

4. **cherrug** (*Falco*) Gray, in Hardw., Ill. Ind. Zool., 1833-34, II, pl. 25; *sacer*, Gmel., Syst., Nat., I, 1788, p. 273 (nec Forster); Dresser, VI, p. 59, pl. 376; *lanarius*, Pallas, 1811 (nec Gmel., nec Schleg.); *cyanopus*, Thienem., 1846.
- Europe
Est et Sud-Est;
accidentel
à l'Ouest (une fois
en Scandinavie);
Afrique Nord-Est;
Asie jusqu'à
l'Inde Nord
et la Chine.
5. **milvipes** (*Falco*) Hodgs., in Gray, Zool. Misc., 1844, p. 81; Dresser, IX, p. 281, pl. 377; *bendersoni* Hume, 1871.
- Très accidentel
en Grèce;
Asie Mineure
et Asie Centrale
jusqu'en
Mongolie.

Diffère de *H. sacer* par ses parties supérieures rousses barrées de brun foncé, la queue également barrée, et non tachetée. — Le *jeune* a les barres irrégulières et mal définies, celles de la queue plus ou moins imparfaites.

FALCO Linné 1766

1. **feldeggi** Schlegel, Abh. Geb. Zool., 1841, p. 3, pl. 10, 11; Dresser, VI, p. 51, pl. 375; *lanarius* Schlegel, Rev. Crit., 1844, p. 2 (nec Pall.); *erlangeri*, Kleinschm., 1901.
- Europe Sud,
accidentel
plus au Nord;
Afrique Nord,
Asie Mineure
(rare).
2. **peregrinus** Tunstall, Orn. Brit., 1771, p. 1; Dresser, VI, p. 31, pl. 372; *communis* Gmel., 1788; *anatum*, Bp., 1838; *peregrinus britannicus* Erlanger; *p. caucasicus* Kleinschm. — Voyez l'Appendice.
- Europe,
de la Laponie
à la Méditerranée,
Iles Britanniques,
Canaries;
Afrique; Asie
jusqu'au Japon;
Amérique,
Antilles.
3. **barbarus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 125; Dresser, VI, p. 47, pl. 347; *pelegrinoïdes* Temm., 1824; *babylonicus* Gurney, 1861; *barbarus germanicus* Erlanger. — Voyez l'Appendice.
- Accidentel
au Nord de la
Méditerranée;
Afrique Nord;
Asie jusqu'à l'Inde
Nord-Ouest.

4. **Falco punicus** Levaill. jun.

Synonyme du FAUCON DE BARBARIE (part.)

D. et G., I, p. 84.

5. **Falco subbuteo** Linné

FAUCON HOBÉREAU

D. et G., I, p. 85.

6. **Falco eleonoræ** Géné

FAUCON D'ÉLÉONORE

D. et G., I, p. 86.

7. **Falco lithofalco** Gmel.

FAUCON ÉMERILLON

D. et G., I, p. 91.

4. *punicus* Levaill. jun., Expl. Algérie Atlas, 1850, pl. 1; *minor*, Dresser, VI, p. 13, pl. 373 (nec Bp.); *brookei* Sharpe, 1873; *barbarus* (part.), Degl. et Gerbe.

Très accidentel
au Nord
de la Méditerranée
et en
Asie Mineure;
Afrique Nord.

Diffère de *F. peregrinus* par sa taille moindre, le dessous d'une couleur plus vive, les pattes et les pieds plus grêles. — Le jeune ressemble à celui de *F. peregrinus*, mais le dessus est plus pâle et les rayures, sur les parties inférieures, sont plus étroites et plus nombreuses.

5. *subbuteo* Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 127; Dresser, VI, p. 69, pl. 378, 379.

Europe
jusqu'au 65° Nord
(de passage en
hiver),
Iles Britanniques,
Canaries;
Afrique; Asie
jusqu'au Japon.

6. *eleonoræ* Génè, Rev. Zool., 1839, p. 105; Dresser, VI, p. 103, pl. 383; *arcadicus* Linderm., 1843; *dichrous* Ehrhard, 1858.

Iles de la
Méditerranée,
plus rare dans le
Sud de l'Europe
Continentele;
Afrique,
Madagascar,
Syrie.

7. *æsalon* Tunstall, Orn. Brit., 1771, p. 1; Dresser, VI, p. 83, pl. 380, 381; *regulus*, Pall., 1773; *lithofalco*, Gmel., 1788; *merillus* Gerini, Sharpe, 1899 (1).

Europe.
de l'Islande
et de
la Scandinavie;
à la Méditerranée;
Afrique Nord;
Asie
jusqu'au Japon.

(1) *Falco concolor* Temm., signalé (dans Degland et Gerbe, I, p. 88) comme trouvé en Dalmatie et dans l'Archipel Grec, n'est plus admis comme européen par les ornithologistes modernes. Les captures signalées sont fondées sur quelque erreur. L'espèce est exclusivement africaine.

Sous-genre CRESSERELLE**1. Falco tinnunculus** Linné

FAUCON CRESSERELLE

D. et G., I, p. 93.

2. Falco cenchris Naum.

FAUCON CRESSERINE

D. et G., I, p. 94.

Sous-genre KOBZ**1. Falco vespertinus** Linné

FAUCON KOBZ

D. et G., I, p. 89.

Genre AUTOUR**1. Astur palumbarius** (Linné)

AUTOUR ORDINAIRE

D. et G., I, p. 96.

(1)

(1) Sous-espèces nouvelles : *Astur gentilis arrigoni* Kleinschm. (Sardaigne); *A. g. wolterstoffs* Kleinschm. (Sardaigne). — Voyez l'APPENDICE.

TINNUNCULUS *Vicill.* 1807

1. **tinnunculus** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 127 ;
Dresser, VI, p. 113, pl. 384 ; *alaudarius*
Gmel., 1788 ; *canariensis*, Koenig, 1890.

Europe
de la Laponie
à la Méditerranée,
Madère, Canaries,
Açores ;
Afrique ; Asie
jusqu'au Japon.

2. **cenchris** Naum., Vög. Deutschl., I, 1822, p. 318,
pl. 29 ; Dresser, VI, p. 125, pl. 385 ; *tinnun-*
culoïdes, Temm., 1822 ; *naumannii* Fleisch,
Sharpe, 1874 et 1899.

Europe Sud,
très accidentel
dans les
Iles Britanniques ;
Afrique ; Asie
jusqu'à la Chine.

ERYTHROPUS *Brehm* 1828

1. **vespertinus** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 129 ;
Dresser, VI, p. 93, pl. 382 ; *rufipes* Beseke,
1792.

Europe
jusqu'en Suède
et Russie Nord,
plus rare
dans l'Ouest
(Angleterre,
Irlande,
Canaries) ;
Afrique ;
Asie Mineure
et Asie Centrale
jusqu'au lac
Baïkal.

ASTUR *Lacép.* 1800

1. **palumbarius** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 130 ;
Dresser, V, p. 587, pl. 354 ; *gentilis* Linné,
1758 (aurait la priorité).

Europe, au Nord
jusqu'à la
limite des forêts,
rare en
Grande-Bretagne,
Afrique
(en hiver) ; Asie
jusqu'au Japon.

2. Espèce nouvelle
(pour l'Europe)
AUTOUR AUX PIEDS COURTS

Genre ÉPERVIER

- 1. *Accipiter nisus* (Linné) et *A. major* Beck**
ÉPERVIER ORDINAIRE
D. et G., I, p. 99 et 101.

Genre BUSARD

- 1. *Circus æruginosus* (Linné)**
BUSARD HARPAYE OU DES MARAIS
D. et G., I, p. 105.

2. **brevipes** Severtz., Bull. Soc. Nat. Mosc., 1850, t. XXXIII, p. 234, pl. 1-3; Dresser, V, p. 633, pl. 359, 360; *gurneyi* Bree, 1863.

Europe Sud-Est,
Grèce,
Russie Sud,
Asie jusqu'à
la Perse
et le Turkestan.

Dessus d'un gris ardoisé; rémiges noirâtres à leur pointe; dessous des rectrices barré de noir; côtés de la tête teintés de roux; menton blanc; parties inférieures d'un roux vif barré de blanc; bec noir; cire, pieds et iris jaune. Diffère de l'espèce asiatique (*A. badius*) par sa taille plus forte et sensiblement la même dans les deux sexes, par ses parties inférieures plus largement et plus fortement barrées de blanc, et tranchant sur un fond brun et non roux (chez l'adulte).

ACCIPITER *Brisson* 1760

1. **nisus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766; Dresser, V, p. 599, pl. 355, 356, 357, 358; *fringillarius* Savig., 1809; *pallens*, Stejn., 1893; *granti*, Sharpe, 1890; Var. *major*, Becker, 1815.

Europe jusqu'au
cercle arctique;
Afrique Nord
(en hiver);
Asie
jusqu'à l'Inde
et le Japon.

CIRCUS *Lacép.* 1800

1. **ærginosus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 130; Dresser, V, p. 415, pl. 326, 327; *rufus* Gmel., 1788; Naum.

Europe
jusqu'en Suède
Sud, rare en
Norvège
et Finlande.
Grande-Bretagne;
Afrique; Asie
jusqu'au Japon
et à Ceylan;
Philippines
(en hiver).

2. *Circus cyaneus* (Linné)

BUSARD SAINT-MARTIN

D. et G., I, p. 107.

a. Sous-espèce nouvelle.

3. *Circus cineraceus* Montagu

BUSARD CENDRÉ OU DE MONTAGU

D. et G., I, p. 109.

4. *Circus swainsoni* Smith.

BUSARD DE SWAINSON

D. et G., I, p. 111.

2. **cyaneus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 126 ;
Dresser, V, p. 431, pl. 329 ; *pygargus* Naum.
(ex Linné), nec Sharpe.

Europe,
de la Laponie
à la Méditerranée,
Iles Britanniques ;
Afrique Nord ;
Asie
jusqu'à l'Inde
et le Japon.

- a. — **unicolor**, Radde, Orn. Caucas., 1884, p. 106,
pl. 3 ; *abdulle*, Floericke, Orn. Monatsb., IV,
1896, p. 152, Sharpe, 1899.

Caucase.

Entièrement d'un gris foncé, tirant sur la couleur café,
notamment sur les parties inférieures. (Ce mélanisme in-
complet s'observe sur plusieurs espèces du genre *Circus*.)

3. **cineraceus** (Montagu), Orn. Dict., 1802, I, sheet
K, 3 ; Dresser, V, p. 423, pl. 328 ; *montagui*
Vieill., 1819 ; *pygargus*, Sharpe, 1874 et 1899
(nec Linn.).

Europe Sud,
Iles Britanniques
et Europe Nord
(en hiver),
accidentel
en Suède et
Finlande ;
Afrique : Asie
jusqu'à la Chine.

4. **swainsoni** Smith, S. Afr. Quart. Journ., I, 1830 ;
Dresser, V, p. 441, pl. 330 ; ? *macrurus* (S. G.
Gmel.), N. Com. Petr., 1771, XV, p. 439 ;
Sharpe, 1874 et 1899 ; *pallidus* Sykes ; Naum.

Europe Centrale
et Sud-Est,
accidentel
en Scandinavie
et l'Inde ;
Afrique
(en hiver) ;
Asie
jusqu'à la Chine.

Famille IV — STRIGIDÉS

Genre SURNIE

1. *Surnia funerea* (Linné) et *ulula* (L.)

SURNIE CAPARACOH

D. et G., I, p. 117.

a) **Sous-espèce** (américaine) non distinguée du type

D. et G., I, p. 117.

Genre SURNIE (partim)

1. *Surnia nyctea* (Linné)

SURNIE HARFANG

D. et G., I, p. 118.

IV — STRIGIDÆ

SURNIA *Duméril* 1806

1. *ulula* (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 133; Dresser, V, p. 301, pl. 311; *funerea* Dum., Zool. Anal. 1806, p. 34 (partim); *nisoria* Meyer, 1809.

Europe Nord
et Asie jusqu'à
la Laponie,
le Kamtchatka;
accidentel en
Allemagne Nord;
rare dans les
Iles Britanniques.

- a. — *funerea* (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 133 (partim); Dresser, V, p. 309, pl. 312; *caparoch* Müller, 1766; Sharpe, 1874 et 1899; Ridgway.

Accidentel en
Grande-Bretagne;
représente
le type dans
l'Amérique Nord.

Diffère de *S. ulula* par ses teintes plus foncées et les barres des parties inférieures plus larges, plus foncées et teintées de marron.

NYCTEA *Stephens* 1826

1. *nyctea* L. et *scandiaca*, L., Syst. Nat., I, 1766, p. 132; Dresser, V, p. 287, pl. 309, 310; *nivea*, Thurn., 1798; *arctica*, Bartr.; *erminea* Steph., 1826; *scandiaca*, Dresser (loc. cit.).

Europe, Asie
et
Amérique Nord;
de passage
accidentel (en
hiver) dans les
Iles Britanniques,
la France,
l'Allemagne,
et en
Asie Centrale.

Genre SURNIE (partim)

1. *Surnia passerina* (Linné)

SURNIE CHEVÊCHETTE

D. et G., I, p. 120.

(1)

Genre CHEVÊCHE

1. *Noctua minor* (Briss.)

CHEVÊCHE COMMUNE

D. et G., I, p. 122.

a. *Noctua persica* (Vicill.), variété de la Chevêche

D. et G., I, p. 123.

Genre NYCTALE

1. *Nyctale tengmalmi* (Gmel.)

NYCTALE DE TENGMALM

D. et G., I, p. 125.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Glaucidium passerinum scitipes* Madarasz (Hongrie). — Voyez l'APPENDICE.

GLAUCIDIUM Boie 1826

1. *passerinum* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 133;
Boie, Isis, 1826, p. 976; Dresser, V, p. 349,
pl. 316; *arcadica* (Strix), Naum. ex Temm.

Europe
Nord et Centrale,
de la Laponie
à la Suisse,
à la Syrie,
au Caucase;
Asie Nord
jusqu'à
la Daourie.

ATHENE Boie 1822

1. *noctua* (Scop.), Ann. Hist. Nat., I, 1822; *passerina* Boie, Isis, 1822, p. 549; *noctua* Dresser, V, p. 357, pl. 317; *nudipes* Nills., 1817.

Europe
Continentele
jusqu'à
la Méditerranée,
accidentelle
en Suède
et en Angleterre,
Maroc.

- a. — *glaux* (Savigny), Syst. Ois. Egypt., 1809, p. 45;
Dresser, V, p. 367, pl. 318; *persica* Vieill.,
1817; *meridionalis*, Risso, 1826.

Europe Sud
(Espagne, Grèce),
Afrique Nord
(Algérie, Égypte);
Asie Sud-Ouest
jusqu'à
l'Afghanistan.

NYCTALA Brehm 1828

1. *tengmalmi* (Gmel.), Syst. Nat., I, 1788, p. 291;
Dresser, V, p. 349, pl. 313; *dasypus* Bechst.,
1805; *richardsoni* Bp., 1838.

Scandinavie
et Russie Nord
jusqu'à la limite
des forêts;
au Sud jusqu'aux
Pyrénées,
les Alpes et les
Carpathes.
la Caspienne;
accidentel
en Angleterre;
Sibérie;
Amérique Nord,

Genre HULOTTE

1. *Syrnium aluco* (Linné)

HULOTTE CHAT-HUANT

D. et G., I, p. 127.

[Genre PTYNX Blyth.]

2. *Ptynx uralensis* (Pallas)

PTYNX DE L'OURAL

D. et G., I, p. 129.

Genre CHOUETTE

1. *Ulula lapponica* (Retzius)

CHOUETTE LAPONNE

D. et G., I, p. 131.

Genre EFFRAYE

1. *Strix flammea* (Linné)

EFFRAYE COMMUNE

D. et G., I, p. 133.

SYRNIUM Savigny 1809

Strix [partim] L., Dresser.

1. **aluco** et *stridula* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 132 et 153; Dresser, V, p. 271, pl. 306. Europe entière, plus rare dans le Nord; Afrique Nord; Asie Ouest (Kirghis).
2. **uralense** (Pallas), Reis. Russ. Reich., I, 1771, p. 445; Dresser, V, p. 277, pl. 307; *liturata* Tengm., 1793; *fuscescens* Temm. et Schleg., 1850. Europe Nord et Centrale, de la Laponie à la Styrie, (accidentel); Sibérie jusqu'au Japon.

ULULA Cuvier 1817; Lesson 1831

Scotiaptex Swains., 1837; Sharpe, 1874.

1. **lapponica** Retzius, Faun. Suec., 1800, p. 79; Cuvier, Reg. Anim., 1817, I, p. 342; Dresser, V, p. 281, pl. 308; *barbata* Pall., 1811 (1). Europe Nord, Laponie, Finlande, Russie Nord; accidentelle en Allemagne; Sibérie Nord.

STRIX Linné 1766

Aluco Fleming, 1822; Dresser; Sharpe.

1. **flammea** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 133; Dresser, V, p. 237, pl. 302; *pratincta* Bp., 1838; *africana*, Bp., 1854. Europe, du Danemark à la Méditerranée, Açores, Canaries, Madère; Asie et Afrique (sub-cosmopolite).

(1) La *Strix cinerea* de Gmelin représente cette espèce dans l'Amérique du Nord, et constitue une espèce distincte.

Genre HIBOU

1. *Otus brachyotus* (Gmel.)

HIBOU BRACHYOTE

D. et G., I, p. 137.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

HIBOU DU CAP.

3. *Otus vulgaris* (Fleming.)

HIBOU VULGAIRE

D. et G., I, p. 138.

Otus ascalaphus (Savig.)

HIBOU ASCALAPHE

D. et G., I, p. 139.

ASIO *Brissou* 1760*Otus* Cuvier, 1799.

1. **accipitrinus** (Pall.), Reis. Russ. Reich., 1771, p. 455; Dresser, V, p. 257, pl. 304; *brachyotus*, Forst., Phil. Trans., t. LXII, 1772, p. 384; Gmel., 1788.

Europe jusqu'au
cercle arctique;
Asie
jusqu'au Japon;
Afrique,
Amérique (sub-
cosmopolite).

2. **capensis** Smith, S.-Afr. Quart. Journ., 1835, sér. 2, II, p. 316; Dresser, V, p. 265, pl. 305; *nisus* Daud.; Sharpe.

Accidentel
en Espagne;
Maroc, Algérie,
toute l'Afrique.

Dessus brun teinté de chocolat et strié de brun pâle; rémiges d'un roux ocreux barrées de brun foncé, les plus internes terminées de blanc. Rectrices médianes brun foncé avec cinq bandes d'un fauve vif, les autres d'un fauve vif barrées de brun foncé et terminées de blanc. Touffes des oreilles petites; face blanc sale tiquetée de brun foncé, les plumes bordant les yeux noires; tour des disques brun foncé strié de roux ocreux. Dessous d'un brun pâle, tacheté et vermiculé de fauve clair et de blanc sale; abdomen en arrière, couvertures inférieures de la queue et pattes d'un fauve ocreux. Doigts presque nus; bec et pieds noirâtres; iris bleu-noir. Femelle semblable au mâle.

3. **otus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 132; Dresser, V, p. 251, pl. 303; *vulgaris* Flem., 1828.

Europe jusqu'au
60° latitude Nord;
accidentel
aux Açores,
Canaries
et Afrique Nord;
Asie
jusqu'au Japon.

[Espèce africaine qui n'est plus considérée comme européenne. — A placer dans le genre *Bubo*.]

Afrique.

Genre GRAND-DUC

1. *Bubo maximus* (Flem.)

GRAND-DUC

D. et G., I, p. 141.

Genre PETIT-DUC

1. *Scops aldrovandi* (Willug.)

SCOPS D'ALDROVANDE

D. et G., I, p. 142.

BUBO *Cuvier* 1817

1. **bubo** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 131; *ignavus* Forst., 1817; Dresser, V, p. 339, pl. 315; *maximus* Flem., 1828.

Europe,
du cercle arctique
à la Méditerranée;
accidentel
en Angleterre;
à l'Est
jusqu'à l'Oural
et dans les
monts Himalaya;
rare dans
l'Afrique Nord.

SCOPS *Savigny* 1809

1. **scops** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 132; *giu* Scopoli, Ann. Nat. Hist., 1769, p. 19; Dresser, V, p. 329, pl. 314; *zorca* Gmel., Syst. Nat., I, 1788, p. 19; *aldrovandi* Flem., 1828.

Europe
Centrale et Sud,
plus rare
dans le Nord.
accidentel
en Angleterre;
Afrique Nord;
Asie
jusqu'à la Perse.

Ordre II — PASSEREAUX

(comprenant les *Grinpeurs*)

Famille V — PICIDÉS

Genre DRYOPIC

1. *Dryopicus martius* (Linné)

DRYOPIC NOIR

D. et G., I, p. 148.

Genre PIC

1. *Picus major* (Linné)

PIC ÉPEICHE

D. et G., I, p. 150.

(1)

(1) Sous-espèces nouvelles : *P. m. pinctorum* Brehm (Allemagne); *P. m. barterti* Arrigoni (Sardaigne); *parroti* Hart. (Corse); *hispanus* Schlüter (Espagne); *thanneri* Le Roi (Grande Canarie); *brevirostris* Reich. (Russie). — Voyez l'APPENDICE.

II — PASSERES

V — PICIDÆ

PICUS Linné 1766 (1)

Dryocopus Boie, 1826.

1. **martius** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 173 ;
Dresser, V, p. 3, pl. 274.

Europe,
de la Laponie
aux Pyrénées
et à la Sicile,
accidentel
en Espagne ;
Asie
jusqu'au Japon.

DENDROCOPUS Brehm 1826

Picus p., Linné ; Degland et Gerbe.

Dendrocopus et *Dendrocoptes* Sharpe, Hargitt.

Dryobates Boie, 1826.

1. **major** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 176 ; Dresser,
V, p. 19, pl. 275 ; *purus* Stenj., 1884.

Europe.
du 70° latitude
Nord
à la Méditerranée.

(1) Dans le *Systema naturæ* la première espèce du genre en est le type ; c'est pourquoi les ornithologistes modernes appliquent au genre actuel le nom de *Picus*, qui rend *Dryopicus* inutile. Cependant Hartert applique ce nom à notre genre *Gecinus*.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

2. Espèce nouvelle,

PIC DE POELZAM.

3. *Picus leuconotus* (Bechst.)

PIC LEUCONOTE

D. et G., I, p. 151.

a. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **canariensis** Koenig, J. f. Orn., 1890, p. 351.

Canarie.

Parties inférieures d'un roux terne plus foncé que le type.
Le bec est plus grêle, la taille moindre.

- b. — **anglicus** Hartert, Nov. Zool., VII, 1900, p. 528.

Iles Britanniques.

Plus petit que le type, dessous d'un roux obscur plus foncé que le type.

- c. — **cissa** Pallas, Zoogr. Ross.-Asiat., 1831, I, p. 412.

Russie Nord-Est
et Sibérie.

Dessous d'un blanc pur; le blanc des rectrices latérales plus étendu que le type, les bandes noires étant plus étroites.

2. **poelzami** (Bogd.), Trans. Soc. Kazan, 1879,
p. 121; Dresser, IX, p. 255, pl. 688; Radde,
1884.

Massif
du Caucase.

Plus petit que *D. major*, le bec plus grêle, les parties inférieures d'un brun foncé tirant sur la teinte chocolat, le blanc des couvertures internes de l'aile moins étendu. La femelle, plus petite que le mâle, n'a pas la bande occipitale cramoisie.

3. **leuconotus** (Bechst.), Naturg. Deutschl., II, 1805,
p. 1034, pl. 25; Dresser, V, p. 39, pl. 279.

Europe
Nord et Centrale
jusqu'à l'Italie,
la Corse,
la Turquie
et la Russie Sud.

- a. — **cirris** Pallas, Zoogr. Ross.-Asiat., 1811, I, p. 410,
412 (confondu avec *uralensis* Malherbe; V.
l'APPENDICE).

Russie Nord
et Sibérie.

Semblable au type, mais le blanc du dos plus étendu que dans le type.

b. Sous-espèce nouvelle,

PIC DE LILFORD

4. *Picus medius* (Linné)

PIC MAR

D. et G., I, p. 152.

a. Sous-espèce nouvelle.**5. *Picus minor* (Linné)**

PIC ÉPEICHETTE

D. et G., I, p. 153.

(1)

a. Sous-espèce nouvelle.

(1) Sous-espèces nouvelles : *P. minor hortorum* Brehm (Europe moyenne); *comminutus* Hartert (Europe Sud); *burturlini* Hartert (France Sud et Italie); *colchicus* Buturlin (Caucase Nord). — Voyez l'APPENDICE.

- b. — **ilfordi** Sharpe et Dresser, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1871, VIII, p. 436 ; Dresser, V, p. 45, pl. 280.

Dalmatie, Bosnie, Grèce, Turquie, Iles Ioniennes; accidentel jusqu'à Ancône et Gênes; Asie Mineure (Taurus).

Diffère de *D. leuconotus* par le bas du dos barré de noir; le rouge des parties inférieures est plus riche et plus foncé. La *femelle* a le sommet de la tête noir (et non rouge comme le mâle).

4. **medius** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 176 ; Dresser, V, p. 47, pl. 281 (type du genre *Dendrocoptes* Cab. et Heine, 1863, adopté par Hargitt et Sharpe).

Europe Centrale Ouest et Est, de la Suede Sud à la Méditerranée, la Russie Sud et le Caucase.

- a. — **sancti-johannis** Blanford, Ibis, 1873, p. 226 ; Dresser, IX, p. 257 ; Radde, Orn. Cauc., p. 313, pl. 19, fig. 3.

Europe Sud-Est, Caucase, Asie Mineure, Perse.

Diffère du type par ses parties inférieures plus richement teintées de jaune et de rouge, et plus fortement rayées de noir; sommet de la tête d'un rouge brillant; les deux rectrices latérales ont les barres blanches plus étroites, les barres noires plus larges et plus marquées. La *femelle* est seulement moins brillamment colorée.

5. **minor** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 176 ; Dresser, V, p. 53, pl. 282.

Europe, de la Laponie à la Méditerranée; Açores; Algérie; Asie Ouest.

- a. — **quadrifasciatus** (Radde), Orn. Cauc., 1884, p. 315, pl. 19, fig. 3.

Russie Sud, Caucase (mais non sur le versant Nord?).

Plus petit que le type; l'aile fermée ne porte que quatre bandes blanches (au lieu de cinq). *Femelle* sans rouge sur le sommet de la tête.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

Genre PICOIDE

1. Picoïdes tridactylus (Linné)

PICOIDE TRIDACTYLE

D. et G., I, p. 154.

(1)

(1) Sous-espèces nouvelles : *Picoïdes t. crissoleucus* Reich. (Russie); *P. t. alpinus* Brehm (Alpes, Carpathes). — Voyez l'APPENDICE.

- b. **pipra** (Pallas), Zoog. R.-As., 1811, I, p. 414 ;
Dresser, V, p. 65, pl. 283 ; *kamtchatkensis*
Bp., 1854 ; *immaculatus*, Stenj., 1884.

Monts Oural
Nord, Sibérie
jusqu'au
Kamtchatka.

Diffère du type par les parties blanches moins étendues ; le dos n'est pas régulièrement barré, mais ne présente que des indications irrégulières de barres ; les rectrices sont beaucoup moins faiblement barrées ; les parties inférieures sont d'un blanc pur, avec quelques faibles indications de stries noires sur les côtés de la poitrine.

- c. **danfordi** (Hargitt), Ibis, 1883, p. 172 ; Dresser,
IX, p. 259, pl. 689, fig. 2.

Caucase Nord,
Asie Mineure.

Diffère du type en ce que les branches latérales de la bande malaire noire passent en se recourbant derrière la région auriculaire et se rejoignent sur l'occiput ; les parties inférieures sont plus foncées et un peu moins nettement barrées.

PICOIDES Lacép. (1799) 1801

1. **tridactylus** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 177 ;
Dresser, V, p. 69, pl. 284 (1).

Europe Nord et
Centrale,
et montagnes
du Sud ;
accidentel
en Danemark ;
manque plus
à l'Ouest.

(1) Arrigoni (in *Atlante Ornith.*, 1902, p. 81), propose le nom de *P. trid. alpinus* pour les spécimens des montagnes de Suisse et d'Italie qui ont le dessous d'un blanc moins pur, ou sale, et les flancs avec un plus grand nombre de stries noires.

a. Sous-espèce nouvelle.

Genre GÉCINE

1. *Gecinus viridis* (Linné)

PIC-VERT

D. et G., I, p. 156.

(1)

2. Espèce nouvelle,

PIC-VERT DE SHARPE

3. *Gecinus canus* (Gmel.)

GÉCINE CENDRÉ

D. et G., I, p. 157.

(1) Sous-espèces nouvelles : *Gecinus v. pictorum* Brehm (Allemagne, France); *G. v. pluvius* Hartert (Angleterre); *promus* Hart. (Italie). — Voyez l'APPENDICE.

- a. — **septentrionalis** Brehm, Vög. Deutschl., 1831, p. 195.

Europe
sub-arctique,
Norvège.

Diffère du type par la plus grande étendue du blanc dans son plumage; les flancs présentent moins de stries noires (passe au *P. trid. crissoleucus* Bp., 1854, de Sibérie qui se montrerait dès la Laponie).

GEVINUS Boie 1831

Picus (L.) Hartert, 1912.

1. **viridis** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 175; Dresser, V, p. 77, pl. 285; *karelini* Brandt, 1842; *saundersi*, Tacz., 1878.

Europe entière
(sauf
le Sud-Ouest);
pas en Finlande;
rare en Écosse
et très rare
en Irlande;
Asie Mineure
jusqu'à la Perse.

2. **sharpei** Saunders, P. Z. S., 1872, p. 153; Dresser, V, p. 89, pl. 286 (sous-espèce pour Hartert).

Espagne
et Portugal
jusqu'à la chaîne
de Guadarrama.

Diffère du précédent par les côtés de la face d'un gris ardoisé, n'ayant qu'une tache noire dans la région des lores; la bande malaire écarlate sans bordure noire. — La femelle a la bande malaire noire et les jeunes ont les côtés de la face gris.

3. **canus** (Gmel.), Syst. Nat., 1788, I, p. 434; Dresser, V, p. 95, pl. 288.

Europe,
de la Scandinavie
et la Laponie,
au Sud où il est
plus rare
(Espagne);
Caucase, Asie
jusqu'au Japon.

Genre TORCOL

1. *Yunx torquilla* (Linné)

TORCOL VULGAIRE

D. et G., I, p. 159.

(1)

Famille VI — CUCULIDÉS

Genre COUCOU

1. *Cuculus canorus* Linné

COUCOU GRIS

D. et G., I, p. 161.

(2)

Genre OXYLOPHE

Oxylophus Swains. 1837.

1. *Oxylophus glandarius* (Linné)

OXYLOPHE GEAI

D. et G., I, p. 472.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Yunx t. tchusii* Kleinschm. (Italie, Corse, Sardaigne). — Voyez l'APPENDICE.

(2) *Cuculus c. kleinschmidti* Schiebel (Corse); *minor* Brehm (Espagne, Algérie). — Voyez l'APPENDICE.

YUNX *Linne* 1766

Jynx Auct.

1. **torquilla** (Linne), Syst. Nat., 1766, I, p. 172 ;
Dresser, V, p. 103, pl. 289.

Europe jusqu'au
63° latitude Nord
(pas en Laponie);
Afrique
(en hiver);
Asie
jusqu'au Japon.

VI — CUCULIDÆ

CUCULUS *Linne* 1766

1. **canorus** Linne, Syst. Nat., 1766, I, p. 168 ; Dres-
ser, V, p. 199, pl. 299 ; *hepaticus* Sparrm.,
1789.

Europe jusque
près du cercle
arctique ;
Canaries ;
Madère ; Afrique ;
Asie
jusqu'au Japon
et aux
Philippines.

COCCYSTES *Gloger* 1832

Ciamator Kaup, 1829.

1. **glandarius** (Linne), Syst. Nat., 1766, I, p. 167 ;
Dresser, V, p. 219, pl. 300.

Europe
Sud-Ouest et Sud,
rare à l'Est ;
accidentel dans
l'Europe Centrale
et l'Angleterre ;
Afrique ;
Asie Ouest
jusqu'à la Perse.

Genre COULICOU

1. *Coccyzus americanus* (Linné)

COULICOU AMÉRICAIN

D. et G., I, p. 166.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe).

Famille VII — CORACIADIDÉS

Genre ROLLIER

1. *Coracias garrula* Linné

ROLLIER ORDINAIRE

D. et G., I, p. 169.

COCCYZUS *Vieillot* 1816

1. **americanus** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 170 ;
Dresser, V, p. 227; pl. 301, fig. 2. Espèce américaine
très accidentelle
en Europe
(Angleterre,
Islande, Belgique,
France, Italie).

2. **erythrophthalmus** (Wilson), Ann. Orn., 1811,
p. 16, pl. 28, fig. 2; Dresser, V, p. 231, IV,
pl. 301, fig. 1. Espèce américaine
prise une fois
en Irlande
et une fois en
Italie.

Dessus, avec la queue, d'un vert olivâtre métallique, le devant de la tête d'un gris ardoisé; ailes d'une teinte cuivrée faible, les rémiges faiblement teintées de cannelle; rectrices médianes portant une bande subterminale d'un brun foncé et étroitement terminées de blanc. Dessous blanc, la poitrine d'un fauve jaunâtre, les côtés du cou et de la gorge gris; dessous de la queue d'un gris blanchâtre. Bec noir avec la base de la mandibule inférieure bleue. Pieds d'un gris plombé clair; iris brun; tour des yeux nu et d'un rouge vermillon. Longueur de l'aile : 14 centimètres et demi. Les sexes sont semblables.

VII — CORACIADIDÆ

CORACIAS *Linné* 1766

1. **garrulus** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 159 ;
Dresser, V, p. 141, pl. 293. Europe jusqu'au
60° latitude Nord;
accidentel
en Angleterre
et en
Écosse; Afrique;
(en hiver);
Asie
Ouest et Centrale.

2. Espèce nouvelle
(pour l'Europe)

ROLLIER INDIEN

(1)

Famille VIII — MÉROPIDÉS

Genre GUÉPIER

1. *Merops apiaster* Linné

GUÉPIER VULGAIRE

D. et G., I, p. 172.

(1) Cette espèce, admise comme accidentelle en Europe par Dresser (*loc. cit.*), n'est mentionnée que comme asiatique par Hartert (*Pal. l'ég.*, II, 1912, p. 874).

2. **indicus** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 159; Dresser, V, p. 149, pl. 294; *bengalensis* L., 1766.

Espèce asiatique
très accidentelle
en Turquie
(un spécimen en
Angleterre?)

Face et menton roux clair; sommet de la tête et nuque d'un riche bleu-vert; côtés et derrière du cou d'un vineux foncé. Scapulaires et une grande partie des rémiges secondaires d'un brun verdâtre; croupion bleu-vert; couvertures caudales supérieures bleu d'outremer. Rémiges d'un bleu-vert pâle, les primaires avec une bande centrale d'outremer terminées de bleu noirâtre, les secondaires avec leur portion terminale d'un riche outremer; les couvertures bleu-vert, les petites outremer. Rectrices médianes vert foncé, les autres bleu d'outremer avec la base et la pointe bleu pâle. Poitrine et gorge d'un pourpre vineux rayé de flave crémeux, le bas de la gorge roux clair; le reste du dessous vert-bleu. Bec noir avec la base de la mandibule inférieure rougeâtre. Pattes d'un jaune orangé foncé; peau de l'orbite et paupière orangées. Aile : 18 centimètres. Les sexes sont semblables.

VIII MEROPIDÆ

MEROPS Linné 1766

1. **apiaster** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 182; Dresser, V, p. 155, pl. 295.

Europe Sud,
plus rare
dans le Centre,
accidentel
en Scandinavie
et
Iles Britanniques;
Canaries,
Madère; Afrique;
Asie
jusqu'à l'Irtisch.

2. *Merops ægyptius* Forsk.

GUÉPIER D'ÉGYPTE

D. et G., I, p. 173.

Famille IX — ALCÉDINIDÉS**Genre MARTIN-PÊCHEUR****1. *Alcedo hispida* Linné**

MARTIN-PÊCHEUR VULGAIRE

D. et G., I, p. 175.

Genre CÉRYLE**1. *Ceryle rudis* (Linné)**

CÉRYLE PIE

D. et G., I, p. 177.

2. *Ceryle alcyon* (L.)

CÉRYLE ALCYON

D. et G., I, p. 178.

2. **persicus** Pall., Reis. Russ. Reichs., II, Anhang, 1773, p. 708; Dresser, V, p. 165, pl. 296; *egyptius* Forsk., 1775; *savignyi* Audouin, 1825.

Accidentel
au Nord
de la Méditerranée
(Sicile, Italie,
bords
de la Caspienne);
Afrique; Asie
jusqu'à l'Inde.

IX — ALCEDINIDÆ

ALCEDO Linné 1766

1. **hispida** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 179; Dresser, V, p. 113, pl. 290.

Europe,
au Nord jusqu'à
Gelle en Suède
(mais non
en Finlande);
Madère, Canaries;
Afrique Nord;
Asie.

CERYLE Boie 1828

1. **rudis** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 181; Dresser, V, p. 125, pl. 291.

Grèce
et les Cyclades
(rare);
Asie Mineure
jusqu'au
Golfe Persique;
Afrique

[Espèce américaine dont on a signalé deux captures en Irlande, mais qui n'est plus admise comme européenne.]

[Amérique Nord].

Genre NOUVEAU

(pour l'Europe)

1. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

HALCYON DE SMYRNE

Famille X — CERTHIIDÉS**Genre SITTELLE****1. *Sitta europæa* Linné**

SITTELLE D'EUROPE

D. et G., 1, p. 181.

a. Sous-espèce nouvelle.

HALCYON *Swinson* 1820

1. **smyrnensis** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 181 ;
Dresser, V, p. 133, pl. 292 ; *fusca* Bodd.,
1783.

Tête, cou et côtés des parties inférieures d'un roux marron, le milieu de la gorge et de la poitrine blanc pur ; manteau et couvertures de l'aile et de la queue d'un bleu cobalt à reflets verts. Base des rémiges primaires blanche, le reste noir avec les barbes externes bleues. Bec et pattes rouges. Taille un peu supérieure à celle du précédent. Les sexes semblables.

Espèce asiatique
s'égayant
jusque dans le
Caucase Russe
(Lenkoran) ;
vu (une fois) mais
non capturé,
sur le Rhin (Ems) ;
Ile de Chypre ;
Asie
jusqu'à la Chine.

X — CERTHIIDÆ

SITTA *Linné* 1766 (1)

1. **europæa** Linné, Syst. Nat., 1766, p. 177 ; Dresser,
III, p. 169, pl. 118.

Europe Nord.
Scandinavie,
Russie Nord,
Danemark insu-
laire.

- a. — **homeyeri** Hartert (ex Seebohm), Ibis, 1892,
p. 364.

Russie Orientale,
Prusse, Pologne.

Semblable au type, mais les parties inférieures plus fortement lavées de jaune d'ocre. Le mâle adulte (qui a ces parties entièrement blanches chez le type) les a ici d'un flave crémeux, et la femelle les a d'un roux foncé jusque près de la région céphalique.

(1) Les ornithologistes modernes rapprochent ce genre et les deux suivants, des mésanges (*Paridæ*).

b. *Sitta cæsia* Meyer et Wolf

SITTELE TORCHEPOT

D. et G., I, p. 182.

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

SITTELE DE WITEHEAD

- b. — **cæsia** Meyer et Wolf, Taschenb. Deuts. Vogelk., 1870, I, p. 128; Dresser, III, p. 175, pl. 119. Europe Centrale, du Jutland à la Méditerranée et à l'Est) à la Roumanie.
- c. — **britannica** Hartert, Nov. Zool., 1900, p. 526; Lilford, Col. Fig. Brit. Birds, II, pl. 51. Angleterre et Écosse (pas en Irlande).

Semblable à *S. e. cæsia*, mais le brun châtain des flancs moins foncé, le dessous du corps plus clair ou même très pale, le bec plus grêle, plus pointu, l'arête plus haute et plus tranchante.

- d. — **caucasica** Reichenow, Orn. Monats., 1901, p. 53. Caucase Nord (Terek).

Semblable à *S. e. cæsia*, mais le bec plus court de 2 à 3 millimètres, à pointe très émoussée; une raie blanche plus ou moins marquée allant du front aux yeux; le dessous plus foncé.

2. [**canadensis**] (1) **witeheadi** Sharpe, Proc. Zool. Soc. Lond., 1884, p. 233, 414, pl. 36; Dresser, IX, pl. 662 (considérée comme espèce par ces deux naturalistes). Corse (sédentaire dans les plus hautes montagnes).

Sommet de la tête, nuque et une ligne passant sur les oreilles d'un noir profond; une raie sourcilière, les côtés de la tête et les parties inférieures blancs; manteau et rectrices médianes d'un bleu ardoisé pâle, ces dernières avec une bande subterminale noire; les latérales noires avec l'extrémité blanche; rémiges noirâtres bordées en dehors de bleu ardoisé. Bec noirâtre, bleu clair à sa base; pieds plom-

(1) La présence d'une sous-espèce de la *S. canadensis* (Linné), qui habite l'Amérique du Nord, dans l'île de Corse, peut sembler étrange, mais on connaît d'autres exemples d'échange (ou mieux de *disjonction*) entre les deux continents. Une autre sous-espèce (*S. canadensis villosa*, Verr.), habite l'Asie nord-est, et d'autres espèces asiatiques se rattachent au même type.

3. *Sitta syriaca* Temm. (ex Ehrenberg, m: s.)

SITTELE SYRIAQUE

D. et G., I, p. 183.

Genre GRIMPEREAU

1. *Certhia familiaris* Linné

GRIMPEREAU FAMILIER

D. et G., I, p. 186.

a. Sous-espèce nouvelle.

bés; iris brun. Taille inférieure à celle de *S. cesiæ*. La femelle est plus sombre et a le sommet de la tête gris ardoisé teinté de noir.

3. **neumayeri** Michahelles, Isis, 1830, p. 814; Dresser, III, p. 183, pl. 120; *rupestris* Temm., 1835; *rufescens*, Gould, 1837; *saxatilis* Schinz, 1840.

Europe Sud-Ouest,
Dalmatie,
Croatie, Grèce;
Asie Mineure.

(La sous-espèce, à laquelle on conserve le nom de *S. n. syriaca* Temm., 1835, et qui remplace le type dans le Turkestan et la Perse, est seulement plus forte et à teintes plus pâles que ce type.)

CERTHIA Linné 1766

1. **familiaris** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 184; Dresser, III, p. 195, pl. 122; *scandulaca* Pallas, 1827; *jam. caudata*, Hartert, 1887.

Europe Nord et Est, jusqu'à l'Allemagne Nord-Ouest (à l'Est de l'Oder), et de là dans les Carpathes, en Russie jusqu'au Caucase; Asie Septentrionale.

- a. — **macrodactyla** Brehm, Handb. Nat. Deutschl., 1831, p. 208; ? *nattereri* Bp., 1838; *costae* Bailly, 1847; *rhenani* Kleinschm., 1900.

Europe Ouest (Allemagne à l'Ouest de l'Oder), Belgique, France, Alpes, Autriche, Herzégovine, Italie Nord (jusqu'aux Apennins).

Diffère du type par son manteau de couleur plus foncée et la couleur également plus foncée de la base des plumes; par la moindre extension et l'apparence obsolète de la tache médiane des plumes, particulièrement sur le milieu du dos.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

2. *Certhia brachydactyla* Brehm

GRIMPEREAU BRACHYDACTYLE

D. et G., I, p. 187.

a. Sous-espèce nouvelle.

- b. — britannica** Ridgway, Proc. U. S. Nat. Mus., V, 1882, p. 113.

Grande-Bretagne,
Ile de Man,
Irlande.

Semblable à *C. f. macrodactyla*, mais les couvertures caudales d'un roux rouge plus vif, et tout le dessus plus roux chez les spécimens frais. Le bec notablement plus long (13,5 à 17 millimètres). Sur le dessous de l'aile, pas de tache foncée en avant de la première rémige, ou seulement des indications de cette tache; la quatrième rémige portant toujours une grande tache rousse.

- c. — corsa** Hartert, Vög. Palearct. Fauna, I, 1905, p. 320.

Corse,
dans les forêts
de montagnes.

Semblable à *C. f. macrodactyla*, mais un peu plus forte, le bec plus long et les raies blanches du dessus plus longues et plus nettement circonscrites. Ongle du doigt postérieur comme chez le type; la quatrième rémige avec une grande tache rousse, et le dessous de l'aile portant, en avant de la première, l'indication d'une tache foncée.

- 2. brachydactyla** Brehm, Beitr. z. Vögelk., 1820, I, p. 570; *longirostris*, *megarhynchos*, *paradoxa*, etc., Brehm, 1831-1856.

Allemagne,
Hollande, France,
Suisse (dans les
parties basses).
Autriche.

- a. — ultramontana** Hartert, Vög. Palearct. Fauna, I, 1905, p. 324.

Europe au Sud
des
grandes chaînes
de montagnes;
Italie, Espagne.
Dalmatie Sud,
Grèce.

Diffère du type par ses parties supérieures d'un brun plus foncé. Par suite, le bord d'un brun foncé des plumes manque du liseré blanchâtre habituel. Les couvertures caudales supérieures sont d'un roux-brun (couleur tabac). Le dessous est d'un flave crémeux (et non d'un blanc bleuâtre comme chez le type). Les flancs et le ventre sont lavés de gris-brun plus foncé. La quatrième rémige est marquée d'une tache rousse, quelquefois obsolète, plus rarement absente.

Genre TICHODROME

1. *Tichodroma muraria* (Linné)

TICHODROME ÉCHELETTE

D. et G., I, p. 190.

Famille XI — UPUPIDÉS

Genre HUPPE

1. *Upupa epops* Linné

HUPPE VULGAIRE

D. et G., I, p. 193.

Famille XII — CORVIDÉS

Genre CORBEAU

1. *Corvus corax* Linné

CORBEAU ORDINAIRE OU GRAND CORBEAU

D. et G., I, p. 196.

TICHODROMA *Illiger* 1811

1. **muraria** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 184; Dresser, III, p. 207, pl. 123.

Europe
Centrale et Sud
(dans les régions
montagneuses);
accidentel en
Grande-Bretagne;
de passage dans
la France Ouest.

XI — UPUPIDÆ

UPUPA *Linné* 1766

1. **epops** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 183; Dresser, V, p. 179, pl. 298.

Europe
Centrale et Sud,
s'étendant
jusqu'en
Scandinavie,
Angleterre,
Irlande
(même au
Spitzberg);
Afrique Nord,
Asie
jusqu'au Japon.

XII — CORVIDÆ

CORVUS *Linné* 1766

1. **corax** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 155; Dresser, IV, p. 567, pl. 262, fig. 3; 265, fig. 1.

Europe entière,
Asie
jusqu'au Thibet;
Amérique Nord
jusqu'au Mexique.

a. *Corvus leucophæus* Vieill.

CORBEAU LEUCOPHÉE

D. et G., I, p. 197.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **varius** Brünnich, Orn. Bor., 1764, p. 8; *leucophæus* Vieill., 1817; *leucomelas* Wagler, 1827; *ferroensis* Schleg., 1858; *corax varius* Hart. et Kleinschm., Nov. Zool., 1901, p. 44, fig.

Iles Feroë
(où *C. corax* ne
se trouve pas);
Groënland (?)

Semblable au type, mais atteint d'un albinisme partiel qui se montre d'ordinaire sur la tête, le dessus du corps, les ailes et la queue, la peau étant aussi moins pigmentée sur ces points. Longueur de l'aile : 44 centimètres (1).

- b. — **hispanus** Hartert et Kleinschm., Nov. Zool., 1901, p. 45.

Espagne (Aguilas
près Murcie).

Se distingue du type par son bec gros, élevé, recourbé vers la pointe, ses plumes lancéolées, surtout celles recouvrant le talon, sa taille en général moindre, surtout ses ailes plus courtes, ne dépassant pas 43 centimètres. — Forme la transition entre *C. c. corax* et *C. c. tingitanus*.

- c. — **sardus** Kleinschm., Orn. Monats., 1903, p. 92; *tingitanus* (part.), Irby.

Sardaigne
(et autres îles de
la Méditerranée).

Voisin de la sous-espèce précédente par la forme de son bec élevé, comprimé, mais l'aile est plus longue. Forme la transition au *C. c. tingitanus*, du Maroc, à bec très court (2).

(1) Deux autres sous-espèces ont été récemment décrites : 1^{re} *C. corax islandicus* Hantsch, Orn. Monats., Ber., 1906, XIV, p. 130 (dos d'un noir-bleu profond, rémiges tertiaires plus pâles, presque blanches), d'Islande; et 2^e *C. cor. valachus* Tschusi, Orn. Jahrbuch, 1903, XV, p. 121, de Valachie, forme orientale du *C. corax* (identique au *C. balcanicus* Usakov).

(2) C'est cette sous-espèce africaine qui est représentée, sous le nom de *C. leptonyx*, par Dresser, IV, pl. 262, fig. 4 à 6. Il n'y a pas de Corbeau à Madère, mais *C. c. tingitanus* peut s'y égarer. S'il était prouvé que *C. leptonyx* (Peale, U. S. Expl. Exp., VIII, 1848, p. 105) de Madère est identique à *C. tingitanus*, le premier de ces noms aurait la priorité.

d. Sous-espèce nouvelle.

2. *Corvus corone* Linné

CORBEAU CORNEILLE

D. et G., I, p. 198.

3. *Corvux cornix* Linné

CORBEAU MANTELÉ

D. et G., I, p. 200.

a. Sous-espèce nouvelle.

(1)

4. *Corvus frugilegus* Linné

CORBEAU FREUX

D. et G., I, p. 201.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Corvus cornix christophi* Alphéraky (région de la mer d'Azow, Russie Sud). — Voyez l'APPENDICE.

- d. **canariensis** Hart. et Kleins., Nov. Zool., 1901, p. 15; *leptonix* (part.) Dresser, IV, p. 563 (nec pl. 262).

Iles Canaries
Occidentales
(Palma).

Forme du bec comme celle du type d'Europe centrale, mais cet organe est plus petit, et toutes les proportions de l'oiseau sont moindres; aile : 39 à 41 centimètres.

2. **corone** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 155; Dresser, IV, p. 531, pl. 262, fig. 2, 263, fig. 1.

Europe,
de la
Grande-Bretagne
et du Danemark
à la Méditerranée,
plus rare à l'Est
et en Suede;
Asie
jusqu'à la Chine.

3. **cornix** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 156; Dresser, IV, p. 543, pl. 263, fig. 2.

Europe
Nord et Est
(principalement);
Irlande,
Grande-Bretagne
Nord; Feroë;
accidentel en
Islande; Asie;
Égypte.

- a. — **sardonius** Kleinschm., Orn. Monats., 1903, p. 92.

Sardaigne
et Corse.

Plus petit que le type, et le gris des parties supérieures et inférieures ayant un léger reflet brun clair.

4. **frugilegus** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 105; 1766, p. 156; Dresser, IV, p. 551, pl. 264 (type du genre ou sous-genre *Trypanocorax* Kaup, nec Vieillot).

Europe,
du 60° latitude
Nord (en été),
à la Méditerranée
(en hiver);
Afrique Nord;
Asie
jusqu'au Punjaub.

[Genre **CORBEAU** (part.) D. et G.]

1. Corvus monedula Linné

CORBEAU CHOUCAS

D. et G., I, p. 202.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

COLÆUS *Kaup* 1829*Lycos* Boie (nom préoccupé).

- 1. monedula** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 106 ;
1766, p. 156 ; Dresser, IV, p. 523, pl. 261 ;
septentrionalis, Brehm.

Europe Nord.
Scandinavie
jusqu'au 63° 5
latitude Nord.

- a. — spermologus** Vieill., Nouv. Dict. Hist. Nat.,
VIII, 1817, p. 40 ; *turrium*, Brehm, 1831 ;
arborea Brehm, 1831.

Europe
Occidentale, des
Iles Britanniques
à l'Espagne
(Gibraltar),
et à l'Est,
les Alpes, l'Italie,
la Sardaigne,
l'Autriche-
Hongrie, Malte ;
les Canaries
et l'Afrique Nord.

Semblable au type du Nord, mais le plumage du jeune
est plus foncé, particulièrement sur les parties inférieures ;
exceptionnellement une tache blanche sur les côtés du cou.

- b. — collaris** Drummond, Ann. and Mag. Nat. Hist.,
XVIII, 1846, p. 11.

Russie entière,
Macédoine,
Bulgarie, Serbie,
Grèce, Caucase ;
Asie
jusqu'à l'Inde.

Diffère de *C. m. spermologus* par ses parties inférieures
plus claires (comme chez le type de Suède), et de celui-ci
par une tache blanche plus ou moins développée, en forme
de demi-collier, près du pli de l'aile. — Cette tache n'existe
pas chez la forme occidentale, est à peine indiquée chez le
type scandinave, est rarement indiquée chez les spécimens
d'Allemagne, mais est bien marquée chez ceux de l'Alle-
magne orientale et des régions plus à l'est.

Genres CHOCARD et CRAVE

1. *Pyrrhocorax alpinus* Vieill.

CHOCARD DES ALPES

D. et G., I, p. 204.

2. *Coracia gracula* (Linné)

CRAVE ORDINAIRE

D. et G., I, p. 205.

Genre CASSE-NOIX

1. *Nucifraga caryocatactes* (Linné)

CASSE-NOIX VULGAIRE

D. et G., I, p. 207.

PYRRHOCORAX Vieill. 1816

Graculus Koch ; *Coracia* Vieill. ; *Fregilus* Cuv.

1. **pyrrhcorax** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 158 ;
alpinus Vieill., 1816 ; Dresser, IV, p. 445,
pl. 251, fig. 2.

Europe Sud
(dans
les montagnes,
de l'Espagne
à l'Oural Sud ;
accidentel
en Angleterre ;
Asie
jusqu'au Bhoutan.

2. **graculus** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 158 ;
eremita L., loc. cit., p. 159 ; *graculus* Dresser,
IV, p. 437, pl. 251, fig. 1.

Europe Occi-
dentale et Sud,
Angleterre,
France, Espagne,
Suisse, Italie,
Sicile, Grèce,
Monts Oural ;
Canaries ;
Afrique Nord ;
Asie
jusqu'à la Chine.

NUCIFRAGA Brisson 1760

1. **caryocatactes** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 157 ;
Dresser, IV, p. 451, pl. 252 ; Var. *brachyrhyn-*
cha Brehm ; Degland et Gerbe, I, p. 209.

Europe
Nord et Moyenne
(dans les régions
forestières) ; rare
en Scandinavie,
accidentel
en Angleterre,
en Espagne ;
Russie
Occidentale.

a. Sous-espèce nouvelle.

(1)

Genre PIE**1. *Pica caudata* (Linné)**

PIE ORDINAIRE

D. et G., I, p. 211.

a. Sous-espèce nouvelle.**Genre PIE (part.)****1. *Pica cyanea* (Pall.)**

PIE BLEUE

D. et G., I, p. 213.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Nucifraga caryocatactes relicta* Donner. — Voyez l'APPENDICE.

- a. — **macrorhynchus** Brehm, Lehrb. Naturg. Europ. Vögel, I, 1823, p. 103.

Se distingue du type par son bec plus long, plus grêle et très pointu et par le blanc de l'extrémité de la queue plus étendu (ayant de 2^{cm},5 à 3^{cm},25 au lieu de 1^{cm},5 à 2 centimètres et rarement 2^{cm},5 chez le type).

Sibérie
jusqu'à la Corée;
s'avance (en hiver)
à l'Ouest jusqu'en
Allemagne,
Suède,
Danemark,
France,
Angleterre.

PICA Brisson 1760

1. **Pica** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 157; *rustica* Scopoli, Ann. Hist. Nat., 1769, p. 38; Dresser, IV, p. 509, pl. 260, fig. 2.

Europe entière,
de la Norvège
à la Méditerranée
(mais non
l'Espagne);
Asie Mineure
jusqu'à la Perse.

- a. — **melanotos** Brehm, Journ. f. Ornith., 1858, p. 174.

Semblable au type, mais le dos tout entier et le croupion uniformément noirs, ou avec une faible indication d'une bande claire sur le croupion. (Le croupion est blanc chez le type du nord de l'Europe.)

Espagne
et Portugal.

CYANOPICA Bonap. (1838) 1850

Cyanopolus Bp. (1).

1. (**cyanea**) **cooki** Bonap., Proc. Zool. Soc. Lond., 1850, p. 86; Dresser, IV, p. 503, pl. 259 (2).

Ne diffère que par la taille et l'étendue de la tache blanche terminale des rectrices, du type asiatique; elle est plus petite que celui-ci et la tache blanche est moins étendue. Le dos est plus foncé.

Espagne
Moyenne et Sud,
Portugal;
accidentel
dans la France
Sud-Ouest.

(1) D'après Bonaparte lui-même, *Cyanopica* (déjà indiqué dans Bourjot Saint-Hilaire, t. III, pl. 58 [1838.] des *Oiseaux d'Afrique*) aurait la priorité sur *Cyanopolus* Bp., 1849.

(2) Le type de cette sous-espèce (*C. cyanea cyanea*, Pallas, *Reis. Russ. Reichs.*, III, 1776, p. 694), est de Sibérie (Daourie) et du Japon. — Cette espèce présente donc un exemple typique de disjonction.

Genre GEAI

1. *Garrulus glandarius* (Linné)

GEAI ORDINAIRE

D. et G., I, p. 215.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

GARRULUS *Brisson* 1760

1. **glandarius** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 106; 1766, p. 156; Dresser, IV, p. 181, pl. 254.

Europe
Continentale,
du 64° latitude
Nord
à la Méditerranée,
à l'Est
jusqu'à l'Oural.

- a. — **rufitergum** Hartert, Vög. der Palearct. Fauna, 1903, I, p. 30.

Grande-Bretagne
et Irlande.

Parties supérieures presque uniformément d'un rouge vineux, le brun-rouge clair du dos non lavé de gris de fer, et, par suite, ne différant pas de la partie postérieure du cou, le devant de la poitrine presque toujours sans teinte ombrée. Dessous plus clair.

- b. — **kleinschmidtii** Hartert, Vög. Pal. Fauna, 1903, I, p. 30.

Espagne Sud
(Sierra-Nevada).

Bec notablement plus gros, la mandibule supérieure un peu recourbée, la base du crochet terminal renflée et d'un gris de fer foncé, le sommet de la tête très large mais rétréci en arrière. Ailes courtes : mâle, 180-181 millimètres; femelle, 175 millimètres.

- c. — **ichnusæ** Kleinschm., Ornit. Monatsb., 1903, p. 92; *gl. sardus*, Tchusi, 1903.

Sardaigne.

Plus petit que le type du Continent, le bec surtout plus faible; devant de la tête blanchâtre mais moins que chez le type. Nuque et derrière du cou rougeâtre, mais le dos passablement grisâtre, lavé seulement très faiblement de rouge vineux, comme sur les spécimens du nord. Dessous médiocrement clair, sensiblement de la teinte du dessus, mais beaucoup moins grisâtre. Devant de la poitrine lavé de gris cendré ou ardoisé. Milieu du ventre blanc. Aile (sur 5 spécimens) : 170-181 millimètres.

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Garrulus krynicki (Kal.)

GEAI DE KRYNICK

D. et G., I, p. 216.

Genre MESANGEAI

1. Perisoreus infaustus (Linné)

MESANGEAI IMITATEUR

D. et G., I, p. 218.

d. — caspius Seebohm, Ibis, 1883, p. 8.

Russie Sud-Est
(Lenkoran sur la
mer Caspienne).

D'un rouge vineux intense (comme le *G. gl. hyrcanus* de Perse), avec les taches noires sur le dessus et le derrière de la tête très confluentes; plus grand que l'*hyrcanus*. Aile : 180-185 millimètres.

e. — krynicki Kaleniczenko, Bull. Soc. Nat. Moscou, XII, 1839, p. 319, pl. 9; Dresser, IV, p. 495, pl. 256, fig. 1 et 257; *atricapillus anatolicæ* Seebohm, 1883.

Caucase
(Georgievsk),
Crimée,
Turquie Est;
Asie Mineure.

Devant de la tête d'un blanc grisâtre, chaque plume portant une tache noire qui se prolonge presque jusqu'à l'extrémité de la plume; la région des oreilles, les côtés de la face et le cou d'un rouge vineux; la nuque et le dos grisâtres, lavés de roux vers le croupion. Aile : 186-205 millimètres. La huppe, très fournie et longue, semble entièrement noire.

PERISOREUS Bonap. 1838

Cractes Bilberg (1828) Ridgway, 1904.

1. infaustus (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 138; Dresser, IV, p. 471, pl. 253.

Scandinavie
Nord, Laponie,
occidentel
en Danemark et
Allemagne Nord;
Asie
jusqu'à l'Amour.

Famille XIII — LANIIDÉS

Genre PIE-GRIÈCHE

1. *Lanius excubitor* Linné

PIE-GRIÈCHE GRISE

D. et G., I, p. 221.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. *Lanius meridionalis* Temm.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE

D. et G., I, p. 223.

c. Sous-espèce nouvelle.

XIII — LANIIDÆ

LANIUS *Linne* 1766

1. **excubitor** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 135 ;
Dresser, III, p. 375, pl. 145.

Europe
Nord et Centrale
jusqu'aux
Pyrénées,
aux Alpes et
à la Hongrie.

- a. — **homeyeri** Cabanis, Journ. d. Ornith., 1873, p. 75.

Diffère du type du nord par ses couvertures caudales plus claires (gris blanchâtre au lieu de gris) et par deux grands miroirs blancs sur l'aile. Taille un peu plus forte (112 à 120 millimètres au lieu de 110 à 116 millimètres).

Europe Sud-Est,
Roumanie,
Bulgarie, Russie
(Volga, Crimée);
Asie
Occidentale;
accidentel
en Allemagne
Sud-Est.

- b. — **meridionalis** Temm., Man. d'Orn., Ed. II,
1820, I, p. 143, Pl. Col., 143; Dresser, III,
pl. 147, p. 387.

France Sud-Est
et Sud-Ouest;
Espagne,
Portugal.

- c. — **kœnigi** Hartert, Nov. Zool., 1901, p. 309; *fallax*
Dresser, IX, p. 163 (nec Finsch).

Canaries.

Semblable à la sous-espèce algérienne (*L. e. algeriensis*), ayant comme elle le dessus d'un gris de fer foncé, mais plus petite (Aile : 99 à 105 millimètres, au lieu de 104-112 millimètres). Bec, relativement à sa taille, plus long, plus gros, à crochet plus fort. Une raie blanche, plus ou moins développée, passant sur l'œil (1).

(1) Le véritable *L. fallax* (Heuglin) et Finsch, 1872, d'Afrique nord-est et de Perse, est rapporté par Hartert (Vög. Pal., p. 430), à *L. exc. auberi*, Bonap., 1853.

2. *Lanius minor* Gmel.

PIE-GRIÈCHE D'ITALIE

D. et G., I, p. 224.

3. *Lanius rufus* Gmel.

PIE-GRIÈCHE ROUSSE

D. et G., I, p. 225.

a. Sous-espèce nouvelle.**4. *Lanius nubicus* Licht.**

PIE-GRIÈCHE MASQUÉE

D. et G., I, p. 227.

5. *Lanius collurio* Linné

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR

D. et G., I, p. 228.

2. **minor** Gm., Syst. Nat., 1788, I, p. 308; Dresser, III, p. 393, pl. 119; *italicus*, Lath., 1790; Bonap., 1853.
- Europe Sud-Est et Centrale (accidentelle jusqu'en Angleterre), Italie, France Centrale et Sud; Corse, Sardaigne, Hongrie, Russie Sud; Sibérie; Afrique (en hiver).
3. **senator** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 94; Hartert, Vög. Palæarct., 1907, p. 434; *auriculatus* Müller, 1776; Dresser, III, p. 407, pl. 151; *rufus*, Gm., Syst. Nat., I, 1788, p. 302, et Auct. Rec.
- Europe Sud, de l'Espagne à la Grèce; Italie, France, Europe Centrale et Sud-Est jusqu'au Caucase.
- a. - **badius** Hartlaub, Journ. f. Ornith., 1854, p. 100; 1906, pl. H, fig. 4 (rouge de la tête peu exact).
- Corse et Sardaigne; émigre en hiver dans l'Afrique Ouest.
- Diffère du type par l'absence du miroir blanc sur l'aile. Le bec est plus fort. Le rouge-brun de la tête, chez le mâle âgé, en plumage nouveau, est très foncé, mais devient très clair en été. La bande blanche du croupion paraît plus étroite; cette partie et le dessous du corps sont d'un roux-jaune plus foncé. Aile (plus longue que chez le type) : 98 à 104 millimètres.
4. **nubicus** Licht., Verz. Doubl., 1823, p. 47; Dresser, III, p. 417, pl. 153; *personatus* Temm., 1824.
- Europe Sud-Est, (Grèce), Asie Mineure, Afrique Nord-Est.
5. **collurio** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 136; Dresser, III, p. 399, pl. 150.
- Europe Nord (Scandinavie), Europe Centrale (rare au Sud-Ouest); Asie Ouest; Afrique (en hiver).

a. Sous-espèce nouvelle.

(1)

6. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PIE-GRIÈCHE ISABELLINE

Genre TÉLÉPHONE**1. Telephonus tschagra** Le Vaill.

TÉLÉPHONE TSCHAGRA

D. et G., I, p. 230.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Lanius collurio jourdaini* Parrot (Corse). — Voyez l'APPENDICE.

- a. **kobylini** Buturlin, Ibis, 1906, p. 416 ; *collurio*
Var. « *fuscatus* » Sarudny, 1903 (nec Lesson).

Caucase Sud,
Perse,
Arabie Sud,
Grèce ?

Diffère du type en ce que le rouge-brun chatain du croupion est moins étendu ou seulement indiqué (la distinction de cette forme reste douteuse, les spécimens d'Europe, en été, présentant souvent cette particularité).

6. (**cristatus**) **isabellinus** Hempr. et Ehrenb., Symb.
Phys., fol. c, 1828, Ann. ; ? *phanicurus* Pallas,
1776 ; *speculigerus* Tacz., 1874.

Asie,
du Turkestan,
à la Mongolie
(un individu pris
à Hélioland
en 1854) ;
Afrique Nord-Est.

Diffère du *L. crist. phanicuroïdes* Severz., du Turkestan et de la Perse (avec lequel on l'a souvent confondu) par les caractères suivants : le sommet de la tête n'est pas rouge-brun, mais sensiblement de la couleur du dos, c'est-à-dire d'un gris-brun isabelle plus pâle ; la queue est d'un rouge brun ; les ailes brunes bordées de fauve ; les lores ne sont noires qu'en avant des yeux et au-dessous, et les plumes de cette région ont plus ou moins l'extrémité blanche. Les parties inférieures sont d'un roux isabelle, ainsi que la gorge ; le ventre blanc sale ; la poitrine passe au jaune crème. Le miroir blanc de l'aile est obsolète ou est à peine indiqué. (La figure de Dresser, III, pl. 152, représente le *phanicuroïdes* et non la présente sous-espèce.) — Le type (*L. cristatus* Linné) est de l'Inde.

TELEPHONUS *Swains.* 1837

1. (**senegalus**) **cucullatus** Temm., Man. d'Orn.,
2^e éd., 1840, IV, p. 600 ; *erythropterus* (nec
Shaw), Dresser, III, p. 423, pl. 154 ; *tschagra*
Schlegel, 1844 (1).

Afrique Nord
(Algérie, Maroc).
? Espagne.

(1) La capture de cette espèce en Espagne et « dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne » (Degland et Gerbe), est mise en doute par les ornithologistes modernes. — Le type (*T. senegalus* [L.]) est du Sénégal.

Genre ÉTOURNEAU

1. *Sturnus vulgaris* Linné

ÉTOURNEAU VULGAIRE

D. et G., I, p. 232.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

STURNUS *Linne* 1766

1. **vulgaris** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 167 ;
Dresser, IV, p. 405, pl. 246, 247 ; *sophiae*
Bianchi.

Europe,
de la
Norvège Nord
à la Méditerranée
(dans l'Ouest) ;
émigre
jusqu'à Madère
et les Canaries.

- a. — **granti** Hartert, Vög. Palearct. Fauna, I, 1903,
p. 43.

Archipel
des Açores.

Semblable au type de l'Europe moyenne, mais la première rémige encore plus réduite, n'ayant que 10 à 13 millimètres de long (soit 2 millimètres de moins). Le bec est moins large, souvent plus court, dans son ensemble plus petit. Les pattes sont plus courtes. La tête et la gorge sont vertes, sans reflets pourprés. Le dos présente des reflets pourprés comme chez le type.

- b. — **faroensis** Feilden, Zoologist, 1872, p. 3257.

Iles Féroé.

Bien distinct par ses caractères : plus grand que le type ; la première rémige rudimentaire plus longue et plus large ; ailes et queue un peu plus longues. Tête et gorge vertes, rarement à reflets pourprés. Dessus du corps en général plus foncé et plus obscur que chez le type. Aile : 134 à 136 millimètres ; première rémige : 16 à 20 millimètres (au lieu de 12 à 14 chez le type). Bec : 25 à 30 millimètres. — Les *jeunes* sont plus foncés et davantage d'un brun grisâtre, la gorge moins blanche, le dessous faiblement rayé de blanc, très différents de l'adulte.

c. Sous-espèce nouvelle.

2. *Sturnus unicolor* La Marmora (var. A)

ÉTOURNEAU UNICOLORE

D. et G., I, p. 234.

Genre MARTIN

1. *Pastor roseus* (Linné)

MARTIN ROSELIN

D. et G., I, p. 235.

- c. — **purpurascens** Gould, P. Z. S., 1868, p. 219;
Dresser, IV, p. 419, pl. 249.

Diffère du type par ses couvertures alaires, ses scapulaires et son croupion d'un pourpré brillant; la poitrine bronzée, l'abdomen et les flancs pourprés ou d'un pourpré bronzé. Couvertures inférieures de l'aile noirâtres avec une bordure rose clair. — *St. v. menzbieri* Tacz et *caucasius* Lorenz n'en diffèrent que par les nuances du plumage (1).

Europe Sud-Est,
Péninsule
des Balkans,
Dobrukscha,
Caucase; Chypre,
Asie Mineure
jusqu'à l'Inde
Nord-Ouest.

2. **unicolor** Temm., Man. d'Orn., 1820, p. 133;
Dresser, IV, p. 415, pl. 248.

Europe Sud
(Espagne,
Portugal; rare en
France Sud;
Corse, Sardaigne,
Sicile, Italie,
Malte);
Afrique Nord
(mais non en
Asie).

PASTOR *Temminck* 1815

1. **roseus** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 170;
1766, I, p. 294; Dresser, IV, p. 423, pl. 250.

Europe Sud,
rare ou accidentel
en
Grande-Bretagne,
Scandinavie,
dans l'Europe
Centrale et
Ouest;
plus commun
dans l'Est;
Asie Mineure
et Centrale;
accidentel
en Afrique Nord.

(1) Buturlin (*Ornith. Jahrb.*, XV, 1904, p. 203-213), distingue encore, aux dépens de *Sturnus vulgaris*, les formes suivantes : *St. lauricus* (Crimée), *St. saturnini* (Caucase), *londoni* (Russie est), *balkanicus* (Péninsule de Balkans), *jirkovi* (Russie Trans-Volga), etc., toutes plus ou moins voisines de *St. purpurascens*.

Famille XIV — FRINGILLIDÉS

Genre MOINEAU

1. *Passer domesticus* (Linné)

MOINEAU DOMESTIQUE

D. et G., I, p. 241.

2. *Passer italiae* (Vieill.) [var. A]

MOINEAU CISALPIN

D. et G., I, p. 242.

3. *Passer hispaniolensis* (Temm.) [var. B]

MOINEAU ESPAGNOL

D. et G., I, p. 244.

a. *Sous-espèce nouvelle.*

XV — FRINGILLIDÆ

PASSER *Brisson* 1760*Fringilla* L., 1766.

1. **domesticus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758,
p. 183; Dresser, III, p. 387, pl. 176, fig. 1.
Europe entière
(moins l'Italie);
Sibérie
et Daourie,
Maroc.
 2. **italiae** (Vieill.), Nouv. Dict. H. Nat., XII, 1817,
p. 199; Dresser III, p. 385, pl. 176, fig. 2;
cisalpina Temm., 1820.
Italie (à partir
du versant Sud des
Alpes), France
Sud-Est (Nice),
Corse, Sicile
(de passage
jusqu'à Lyon,
en automne).
 3. **hispaniolensis** Temm., Man. d'Ornith., 1820,
p. 353; Dresser, III, p. 393, pl. 177, *salici-*
cola, Vieill., 1828.
Espagne, Grèce,
Turquie,
Bulgarie, France
Sud-Est (?),
Canaries;
Afrique Nord;
Asie Mineure.
 - a. — **arrigoni** Tschusi, Orn. Jahrb., 1903, p. 8.
Corse
et Sardaigne
(? accidentel en
France Sud-Est).
- Semblable au type, mais un peu plus petit; aile : 75 à
78 millimètres (au lieu de 76-82 millimètres chez le type
d'Espagne).

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

4. *Passer montanus* (Linné)

MOINEAU FRIQUET

D. et G., I, p. 246.

Genre PASSER (partim)

1. *Passer petronia* (Linné)

MOINEAU SOULCIE

D. et G., I, p. 247.

b. — **maltae** Hartert, Nov. Zool., 1902, p. 332.

Malte et Sicile.

Semblable au type, mais les flammèches des flancs très espacées ou manquant complètement. Aile plus courte (caractère non constant), environ 74 à 79 millimètres. — Les individus sans flammèches peuvent être confondus avec *P. italic.*

c. — **brutius** Fiore, Mater. Avifauna Calabria, 1890, p. 28, 29.Italie Sud-Est,
Calabre, Tarente.

Les flammèches des flancs font complètement défaut. (Cette forme a besoin d'être comparée de nouveau à la forme *maltae*, et pourrait être considérée comme résultant d'un croisement entre *P. italic.* et *P. hispaniolensis* [Hartert].)

4. **montanus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, I, p. 183; 1766, p. 324; Dresser, III, p. 597, pl. 178.

Europe entière,
du 68° 30' latitude
Nord
à la Méditerranée
(manque en
Portugal,
dans les îles
de la Méditerranée
et en Afrique);
Asie Nord
jusqu'au Japon.

PETRONIA Kaup 1829

1. **petronia** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 322;
stulta, Gmel., 1788; Dresser, III, p. 607,
pl. 180, fig. 2.

Europe
Centrale et Sud
(de l'Allemagne
Moyenne
à l'Espagne,
la Grèce
et Smyrne).

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

(1)

Genre BOUVREUIL

1. *Pyrrhula coccinea* Sélys.

BOUVREUIL PONCEAU

D. et G., I, p. 251.

a. *Pyrrhula vulgaris* Temm.

BOUVREUIL VULGAIRE

D. et G., I, p. 250.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Petronia p. exiguus* Hellmayr (bords du Don et Caucase Nord).
— Voyez l'APPENDICE.

- a. **madeirensis** Erlanger, Journ. f. Ornith., 1899, p. 182, pl. 13; *ide* Floericke, 1902.

Madere
et les Canaries.

Dessus plus foncé que chez le type du Continent; les taches pâles des côtés du dos moins claires, d'un brun tirant sur la teinte sépia; le sommet de la tête et le croupion sont particulièrement foncés; le dessous plus terne, d'un gris brunâtre. Aile : 90 à 97^{mm}5 (plus courte que chez le type).

- b. **hellmayri** Arrigoni, Avicula, VI, 1902, p. 104.

Corse
et Sardaigne.

Diffère du type du Continent par ses parties supérieures un peu plus foncées, d'un brun olivâtre et grisâtre (moins rougeâtre), avec les mèches blanchâtres moins marquées. L'aile varie de 92 à 98 millimètres.

PYRRHULA *Brisson* 1760

1. **pyrrhula** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 171; 1766, p. 300; *major* Brehm, 1831; Dresser, IV, p. 97, pl. 198; *coccinea* Sélvs, 1842.

Europe Nord :
Scandinavie,
Allemagne Nord,
Russie, Sibérie
Ouest; émigre (en
hiver) dans
l'Europe Centrale
et Occidentale :
Angleterre Est,
France, plus rare
en Italie, Grèce,
Asie Mineure.

- a. **europæa** Vieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., IV, 1816, p. 286; Dresser, IV, p. 101, pl. 199; *vulgaris* Temm., 1820 (1).

Europe
Centrale et Ouest
jusqu'à
l'Italie Nord,
le Portugal Nord ;
Angleterre ;
rare en Ecosse ;
Hébrides,
Orcaïdes, et
Shetlands.

(1) Macgillivray distingue, sous le nom de *P. pileata*, le Bouvreuil de la Grande-Bretagne (Voyez : Hartert, *Bull. Orn. Club*, XXI, 1902, p. 107).

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

Genre ERYTHROSPIZE

1. *Erythrospiza githaginea* (Temm.)

ÉRYTHROSPIZE GITHAGINE

D. et G., I, p. 252.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. — **murina** Godman, Ibis, 1866, p. 97, pl. 3.

Agères
(San Miguel).

Semblable à la femelle de *Pyrh. europaa* (par son ventre gris). Le bec est plus long et plus fort. Les parties supérieures sont lavées de brun orangé terne et le croupion n'est pas blanc, mais de la couleur du dos. Les parties inférieures sont d'un brun cendré teinté de brun orangé. La femelle est plus petite, moins teintée de brun orangé, surtout sur les parties inférieures qui sont plus grises et plus pâles que chez le mâle. Aile (du mâle) : 88 à 90^{mm}, 5.

c. — **rossicowi** Derjugin, Ann. Mus. Zool. Pétersb., V, 1900, p. 285.

Accidentel
au Nord
du Caucase ;
Transcaucasie
et Transcaspie.

Diffère du *P. p.* typique par ses parties inférieures d'une teinte moins rose et plutôt rouge brique (ou terre cuite) chez le mâle, et le bec un peu plus épais.

ERYTHROSPIZA Bonap. 1838

1. **githaginea** (Licht.), Verz. Doubl. Mus. Berl., 1823, p. 24; Dresser, IV, p. 85, pl. 196; *payraudai*, Audouin, 1825.

Accidentel dans
l'Europe Sud :
Malte, Italie,
Grèce, France
Sud ; Afrique
Nord, d'Algérie
à l'Égypte.

a. — **amantum** Hartert, Vög. Palæarct. Fauna, I, 1903, p. 89.

Iles Canaries
(Fuertaven-
tura, etc.).

Se distingue du type d'Afrique Nord par son bec plus renflé et plus massif, ses parties supérieures plus foncées, brunâtres et, paraît-il, par ses teintes roses plus vives (ce qui ne se voit bien que sur l'oiseau frais). Taille un peu moindre ; aile : 83 à 87 millimètres.

Genre ROSELIN

1. *Carpodacus rubicilla* (Güldenst.)

ROSELIN RUBICILLE

D. et G., I, p. 254.

2. *Carpodacus roseus* (Pallas)

ROSELIN ROSE

D. et G., I, p. 257.

3. *Carpodacus erythrinus* (Pallas)

ROSELIN CRAMOISI

D. et G., I, p. 254.

Genre DUR-BEC

1. *Corythus enucleator* (Linné)

DUR-BEC VULGAIRE

D. et G., I, p. 258.

CARPODACUS Kaup 1829

1. **rubicilla** (Güldenst.), Nov. Comm. St-Petersb., XIX, 1775, p. 463, pl. 12; Dresser, IV, p. 69, pl. 193; *caucasicus* Pall., 1811 (*Coccothraustes*).
Caucase
(dans les hautes montagnes).
2. **roseus** (Pallas), Reis. Russ. Reich., 1776, III, p. 699; Naum., IV, p. 418, pl. 113, fig. 3.
Espèce asiatique
très accidentelle
(en hiver)
en Hongrie
(d'autres captures
se rapportent à
l'espèce suivante).
3. **erythrinus** (Pallas), Nov. Comm. Acad. Saint-Petersb., XIV, 1770, p. 587, pl. 23, fig. 1; Dresser, IV, p. 75, pl. 195.
Europe
Nord-Est et Est;
accidentel
dans
l'Ouest et le Sud
et en
Grande-Bretagne;
Asie jusqu'au
Kamchatka,
Chine et Inde
(en hiver).

PINICOLA Vieill. 1807

Corythus Cuv. 1817

1. **enucleator** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 171; Dresser, IV, p. 111, pl. 201.
Europe Nord
(Scandinavie,
Russie); émigre
(en hiver)
dans
l'Europe Centrale
et Méridionale,
rare
en Angleterre.

Genre BEC=CROISÉ

1. *Loxia curvirostra* Linné

BEC-CROISÉ ORDINAIRE

D. et G., I, p. 261.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

LOXIA *Brissou* 1760

- l. curvirostra** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 171; Dresser, IV, p. 127, pl. 203; *rubri-jasciata* Bp. et Schleg., Mon. Lox., 1850, pl. 5; Dresser, IX, p. 208, pl. 679.

Europe entière,
de la Laponie
à la Corse,
la Grèce
et la Russie;
Asie
jusqu'au Japon.

- a. — hispana** Hartert, Vög. Palearct. Fauna, 1904, p. 119, p. 116, fig. 27.

Espagne
(Aguilas près
Murcie).

Semblable au type, mais bien distinct par son bec plus allongé et plus grêle.

- b. — anglica** Hartert, Vög. Pal. Fauna, 1904, p. 119.

Angleterre
et Irlande.

Semblable au type, mais la couleur rouge du plumage atténuée (avec plus de gris et moins d'orangé); le bec plus court et plus épais.

- c. — scotica** Hartert, Vög. Pal. Fauna, 1904, p. 119; p. 116, fig. 24.

Écosse, émigre
en hiver
en Angleterre.

Semblable à *L. c. anglica* par sa couleur terne, mais le bec très fort, à mandibule supérieure très haute, l'inférieure plus courte, à crochet faiblement croisé, se rapprochant de la forme de *L. pityopsittacus*. Aile un peu plus longue : 100 à 104 millimètres.

d. Sous-espèce nouvelle.

e. *Loxia pityopsittacus* Bechst.

BEC-CROISÉ PERROQUET

D. et G., I, p. 263.

2. *Loxia bifasciata* (Brehm)

BEC-CROISÉ BIFASCIÉ

D. et G., I, p. 264.

d. — **balearica** Homeyer, Journ. f. Orn., 1862, p. 256.

Iles Baléares,
Majorque.

D'après Homeyer, le bec se rapproche de celui de *L. pityopsittacus*, étant « très long et crochu, la mandibule inférieure courte et épaisse ». Mais, d'après Hartert, les mesures prises sur les deux types contredisent cette assertion. S'ils diffèrent du type du Continent, ils se rapprochent plutôt de *L. c. polygyna* d'Algérie, avec un bec un peu plus long et des ailes plus courtes. La femelle et le jeune présentent une coloration nettement grise.

e. — **pityopsittacus** Bechst., Orn. Taschenb., 1802, p. 106; Dresser, IV, p. 121, pl. 202; Hartert, Vög. Pal., 1904, p. 116, fig. 23.

Europe Nord.
Scandinavie.
Russie Nord.
Pologne (émigre
en automne
et en hiver
dans les Alpes
et le
Sud de l'Europe).

Ne diffère de *L. curvirostra* que par son bec fortement renflé (bec de perroquet), et, comme il existe plusieurs formes intermédiaires (notamment *L. c. scotica*), celle-ci est considérée par les ornithologistes modernes comme une simple sous-espèce de *L. curvirostra* (voyez Hartert, *loc. cit.*, p. 116, fig. 23 à 27).

2. (**leucoptera**) **bifasciata** Brehm, Orn. III, 1827, p. 85; Dresser, IV, p. 141, pl. 205; *tænioptera* Gloger, 1827.

Europe Nord,
Scandinavie,
Laponie
(zone des forêts),
émigre en hiver
vers le Sud
de l'Europe
jusqu'aux
Iles Britanniques,
l'Italie
la Hongrie.

Considéré aujourd'hui comme une sous-espèce de *L. leucoptera* Gmel., 1788, qui habite l'Amérique du Nord et qui s'est répandu par le Kamtchatka et la Sibérie jusqu'en Laponie (espèce circumpolaire).

a. Sous-espèce nouvelle.

Genre GROS-BEC

1. *Coccothraustes vulgaris* Vieill.

GROS-BEC VULGAIRE

D. et G., I, p. 266.

Genre VERDIER

1. *Ligurinus chloris* (Linné)

VERDIER ORDINAIRE

D. et G., I, p. 269.

a. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **elegans** Homeyer, Journ. f. Orn., 1879, p. 180 ;
amurensis Dubois, 1882 ; *leucoptera* Dresser,
 IV, p. 137, pl. 204, fig. 2.

Asie Nord.
 Sibérie,
 de l'Amour
 à Archangel ;
 accidentel (?)
 en Suède,
 Angleterre,
 Allemagne.

Mâle paré d'un rouge carminé très brillant. Bec court et obtus. (La distinction de cette forme ne semble pas fondée, jusqu'à présent, sur des caractères constants.) — Forme probablement de transition entre le type de l'Amérique du Nord et la sous-espèce d'Europe.

COCCOTHAUSTES *Brisson* 1760

1. **coccothraustes** (Linné), S. N., Ed. X, 1758,
 p. 171 ; 1766, p. 299 ; *vulgaris* Pall., 1811 ;
 Dresser, III, p. 575, pl. 175.

Europe, du Sud
 de la Suède
 à l'Espagne
 et la Grèce ; Asie
 Occidentale ;
 Egypte.

CHLORIS *Cuvier* 1800

Ligurinus Koch 1816

1. **chloris** (Linné), S. N., Ed. X, 1758, p. 174 ;
 1766, p. 304 ; Dresser, III, p. 567, pl. 174 (1).

Europe (sauf
 le Sud-Ouest).
 de la Norvège
 et de l'Oural
 à l'Italie,
 la péninsule
 des Balkans ;
 Asie Mineure,
 Perse, Turkestan
 Nord-Ouest.

- a. — **aurantiventris** Cabanis, Mus. Hein., 1850, I,
 p. 158.

France Sud-
 Ouest.
 Espagne, Açores
 (San-Miguel) ;
 Afrique Nord.

Les parties inférieures sont d'un vert-jaune plus foncé et plus uniforme, passant au jaune d'or sur le milieu de la poitrine ; le dessus est également d'un vert-jaune plus uniforme et la bande frontale d'un jaune d'or plus vif. Le bec est un peu plus renflé et les ailes, d'ordinaire, un peu plus courtes.

(1) Sarudny (*Orn. Mon.-Ber.*, XV, 1907, p. 63), distingue les spécimens de Russie centrale sous le nom de *Chl. chl. rossicus*.

Genre PINSON

1. *Fringilla cœlebs* Linné

PINSON ORDINAIRE

D. et G., I, p. 271.

(1)

a. *Fringilla spodiogena* Bp.

PINSON SPODIOGÈNE

D. et G., I, p. 273.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

(1) Sous-espèces nouvelles : *Fringilla cœlebs gengleri* Kleinschm. (Angleterre); *F. c. tyrrhenica* Schiebel (Corse). Voyez l'APPENDICE.

FRINGILLA Linné 1758

1. **cælebs** (Linné), S. N., Ed. X, 1758, p. 179 ;
1766, p. 318 ; Dresser, IV, p. 3, pl. 182 ;
spiza, Pall. (1811) 1831.

Europe,
du Cap Nord
jusqu'à
la Méditerranée ;
Afrique Nord
(en hiver) ;
Sibérie Ouest,
Asie Sud-Ouest
jusqu'à la Perse.

- a. — **spodiogena** Bonap., Rev. Zool., 1841, IV, p. 146
(*spodiogenys* corrigé en *spodiogena* Bp., 1856) ;
Dresser, IV, p. 13, pl. 183, fig. 2, 3.

France Sud-Est
(très accidentel).
Afrique Nord,
(Maroc, Algérie,
Tunisie).

- b. — **moreleti** Pucheran, Rev. et Mag. Zool., 1859,
p. 409, pl. 16.

Archipel
des Açores.

Parties supérieures d'un bleu ardoisé, le sommet de la tête plus foncé ; une bande frontale assez large d'un noir ardoisé ; le dos, le croupion et les couvertures supérieures de la queue vert pomme ; la *femelle* semblable à celle de *canariensis* (= *tintillon*).

- c. — **maderensis** Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus., XII,
1888, p. 175.

Ile de Madère.

Diffère de *F. c. moreleti* par ses parties inférieures moins fauves et présentant une teinte rosée, son bec plus robuste et plus long. La *femelle* est semblable à celle de *moreleti*.

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Sous-espèce nouvelle.

2. Espèce nouvelle,
PINSON TÉYDÉE

- d. — **canariensis** Vieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., XII, 1817, p. 232; *tintillon*, Webb. et Berth., Orn. Can., 1836-44, p. 21, pl. 4, fig. 1; Dresser, IV, p. 9, pl. 183, fig. 1 (partim), IX, p. 190.

Archipel
des Canaries
(Ténériffe, etc.).

Diffère de *F. caelebs* (type d'Europe) par le sommet de la tête bleu noirâtre, le dos d'un bleu ardoisé foncé, le croupion et les couvertures supérieures de la queue d'un vert pomme, les parties inférieures d'un flave ou fauve clair, et par l'absence d'une bande frontale distincte. — La *female* a les parties supérieures plus foncées et les parties inférieures plus claires que *F. caelebs*, ces dernières ne présentant pas trace de teinte rousse. Aile : 85 à 88 millimètres.

- e. — **palmae** Tristram, Ann. Nat. Hist., 1889, III, p. 489; Dresser, IX, p. 188, pl. 674.

Iles Palma et
Ile de fer (Hierro),
où il remplace
F. c. canariensis.

Diffère de *F. c. canariensis* (= *tintillon*) par ses parties supérieures plombées ou d'un bleu ardoisé, sans vert sur le dos ou le croupion, et l'abdomen d'un blanc pur (sans trace de fauve). *Female* semblable, mais les parties supérieures plus pâles et l'abdomen d'un blanc pur.

2. **teydea** Webb, Berth. et M. Taud., Orn. Canar., 1836-1844, p. 20, pl. 1; Dresser, IV, p. 25, pl. 185.

Pic de Ténériffe
(sur les flancs Sud-
Sud-Ouest
et Nord), à 2,300
et 2,600 mètres
d'altitude.

Parties supérieures d'un bleu ardoisé, le devant de la tête et les lores lavés de noir; ailes et queue noires, bordées de bleu ardoisé, l'extrémité des couvertures alaires, primaires et secondaires d'un gris bleuâtre. Les parties inférieures plus pâles, passant, sur l'abdomen, au blanc bleuâtre; couvertures inférieures de la queue blanches. Bec d'un bleu corné, blanc à la base en dessous; pieds couleur de corne pâle. — *Female* dessus d'un brun-gris foncé; ailes et queue brun foncé bordées de brun clair; le dessous brun clair lavé d'ardoisé, l'abdomen et les couvertures inférieures de la queue d'un blanc sale, ces dernières lavées de fauve pâle. Aile : 103-105 millimètres.

a. Sous-espèce nouvelle.

3. *Fringilla montifringilla* Linné

PINSON D'ARDENNES

D. et G., I, p. 274.

Genre NIVEROLLE

1. *Montifringilla nivalis* (Briss.)

NIVEROLLE DES NEIGES

D. et G., I, p. 277.

a. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **polatzeki** Hartert, Ornith. Monatsb., XIII, Grande Canarie.
1905, p. 164.

Plus petit que le type : l'aile mesure seulement 96 à 97 millimètres (au lieu de 101 à 105 chez *leyden*). Les bandes de l'aile qui traversent l'extrémité des grandes et moyennes couvertures alaires sont très larges et d'un gris blanchâtre, presque blanches, tandis que chez le type, surtout sur les grandes couvertures, cette bande est étroite et d'un gris de cendre bleuâtre. Bec plus petit que le type.

3. **montifringilla** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758,
p. 179; 1766, p. 318; Dresser, IV, p. 15,
pl. 184.

Europe Nord,
de la Grande-Bre-
tagne et
de la Scandinavie
à l'Europe
moyenne (en hi-
ver); Asie
jusqu'au Japon.

MONTIFRINGILLA *Brehm* 1828

Plectrophenax (Stejneger) Sharpe, 1888.

1. **nivalis** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 321; Dres-
ser, III, p. 617, pl. 181.

Hautes montagnes
des Alpes,
Pyrénées et
Apennins.

- a. — **alpicola** Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat., 1831, II,
p. 20; Dresser, IX, p. 187, pl. 673; *leucura*,
Bp., 1855; *fringilloïdes* Dresser, 1875.

Massif du Cau-
case (3.300 mètres
d'altitude en été,
à 1.600 et 1.300
en hiver);
Perse, Afghanis-
tan, Turkestan.

Bec plus grêle et plus long que le type; tête et nuque gris brunâtre (au lieu de gris cendré). En hiver, les plumes noires prennent une bordure blanche. Bec brun, la mandibule inférieure blanchâtre à sa base.

Genre CHARDONNERET

1. *Carduelis elegans* Steph.

CHARDONNERET ÉLÉGANT

D. et G., I, p. 279.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

CARDUELIS *Brisson* 1760

Acanthis, p., Hartert 1903 (*Carduelis*, 1904).

1. **carduelis** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 180; 1766, p. 318; *elegans* Steph. in Shaw, 1826; Dresser, III, p. 527, pl. 166.

Europe,
de la Suède Cen-
trale à la
Méditerranée.

- a. — **britannicus** Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1903, p. 68.

Iles Britanniques
(sédentaire
et de passage).

Semblable au type, mais le dessus plus sombre avec un lustre d'un brun olivâtre; la tache blanche de la nuque, en plumage de noce, peu développée; les côtés de la tête, notamment la région auriculaire, le croupion et les couvertures caudales présentant également un reflet brun olivâtre, les côtés du corps plus foncés et d'un brun uniforme. Le rouge de la tête nettement plus clair.

- b. — **tchusii** Arrigoni, Avicula, 1902, p. 104.

Corse
et Sardaigne.

Diffère du type par ses parties supérieures d'un brun olivâtre plus sombre, la tache de la nuque à peine marquée, les côtés et la poitrine foncés, les oreilles nettement brunâtres, le bec un peu plus grêle et sa taille moindre. Très semblable à *C. c. britannicus*, il en diffère par son bec plus grêle, sa taille moindre et le rouge plus foncé de sa tête. Aile du mâle : 78 à 79 millimètres (au lieu de 79 à 84 chez le type).

- c. — **parva** Tchusi, Orn. Monatsb., 1901, p. 129; *nana* Hartert, 1902 (*lapsus calami*).

Madère, Canaries,
Açores.

Plus petit et d'un brun plus foncé que le Chardonneret d'Europe. Bec plus petit, ailes plus courtes, la tache de la nuque obsolète. Aile : 74 à 78 millimètres (la plupart 75 à 76). Les spécimens de Ténériffe ont le bec encore plus fin que ceux de Madère, mais non d'une façon constante.

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Sous-espèce nouvelle.

(1)

Genre TARIN

1. Chrysomitris spinus (Linné)

TARIN ORDINAIRE

D. et G., I, p. 281.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Carduelis card. rumanicus* Tschusi (Roumanie). — Voyez l'APPENDICE.

- d. — **africana** Hartert, Vög. Pal. Fauna, 1903, p. 69;
meridionalis Brehm, 1855 (nomen nudum).

Espagne Sud
 (Aguilas), Maroc,
 Algérie, Tunisie.

Diffère de la sous-espèce de Madère par son bec plus fort et plus épais, surtout à la base, ses ailes plus longues, ses parties inférieures d'un roux-brun moins foncé, tirant sur le gris ou le brun olivâtre, et la tache blanche de la nuque mieux marquée; — de *carduelis* et *britannicus*, par une taille moindre et le dessous d'un gris-brun plus foncé. Aile : 78 millimètres, rarement 79.

- e. — **major** Taczan., P. Z. S., 1879, p. 672.

Accidentel en Europe (Russie, Pologne, Prusse); Oural, Sibérie Ouest, Turkestan, Perse.

Diffère du type par sa taille plus forte, particulièrement son bec plus gros et le blanc plus pur et plus étendu de son croupion qui s'avance jusque sur la partie postérieure du dos; celui-ci est blanc avec de grandes taches grises; les flancs sont plus clairs; les plus grandes couvertures de la queue sont d'un blanc pur. Aile : 83 à 89 millimètres (1).

CHRYSOMITRIS Boie 1828

Acanthis p., Hartert; *Spinus* Koch.

1. **spinus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 181;
 1766, p. 322; Dresser, III, p. 541, pl. 169.

Europe, de la zone des forêts au Nord, à l'Europe Centrale, France, Suisse, Italie, Caucase, émigrant (en hiver) sur le pourtour de la Méditerranée et l'Afrique Nord; Asie jusqu'au Japon.

(1) *Carduelis carduelis volgensis* Buturlin (Ibis, 1906, p. 424, 736), de Russie Centrale et Orientale, ne semble pas différer de *C. c. major*.

Genre VENTURON

1. *Citrinella alpina* Scop.

VENTURON ALPIN

D. et G., I, p. 283.

a. Sous-espèce nouvelle.

Genre SERIN

1. *Serinus meridionalis* Bp.

SERIN MÉRIDIONAL OU CINI

D. et G., I, p. 285.

CITRINELLA Bonap. 1838

Serinus p., Brisson ; *Acanthis* p., Hartert.

1. **citrinella** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 320 ;
Dresser, III, p. 535, pl. 168.

Europe Centrale
et Sud (dans
les montagnes) ;
émigre, en au-
tomne et en hiver,
vers le Sud.

- a. — **corsicana** Koenig, Orn. Monatsb., 1899, VII,
p. 120 ; *citrinella* Dresser, p. 536, pl. 167
(nec L.).

Corse.

Diffère du type par son dos brun pâle (et non vert), rayé
de brun foncé ; le croupion plus vert ; les parties inférieures
jaunes (ce n'est pas, comme on l'a supposé, le plumage
d'hiver du type).

SERINUS Koch 1816

1. **serinus** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 320 ; *hor-
tulanus* Koch, Baier. Zool., 1876, p. 229 ;
Dresser, III, p. 549, pl. 172 ; *canaria serinus*
Hartert, 1903.

Europe Sud,
de l'Espagne à la
Grèce et à l'Asie
Mineure ; Afrique
Nord (Atlas) ;
s'avance dans l'Eu-
rope Centrale
jusqu'à l'Angle-
terre et
le Danemark.

a. Sous-espèce nouvelle
(pour l'Europe)

SERIN DES CANARIES

2. Serinus pusillus (Pallas)

SERIN NAIN

D. et G., I, p. 286.

Genre LINOTTE

1. Cannabina linota (Gmel.)

LINOTE VULGAIRE

D. et G., I, p. 288.

a. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **canarius** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 181; Webb et Berth., Orn. Canar., p. 21, pl. 2; Dresser, III, p. 557, pl. 172.

Iles Canaries (excepté Fuerteventura et Lanzarote), Madère et les Açores.

Diffère de *S. serinus* par sa taille un peu plus forte, par le manque du jaune vif sur la tête, le sommet et les côtés de cette partie étant vert-pomme, finement striés de brun noirâtre; croupion vert-pomme avec des stries à peine visibles. Dessous d'un jaune d'or passant au blanc sur l'abdomen et les couvertures inférieures de la queue; les flancs seuls striés de brun sale. — La *femelle* a beaucoup moins de jaune-vert; le sommet de la tête est gris strié de noir, à peine teinté de vert-pomme; le dessous est d'un blanc fauve lavé de jaune-pomme sur la poitrine et l'abdomen. Aile : mâle 71 à 76; femelle 67 à 70 millimètres.

2. **pusillus** Pallas, Zoog. Rosso-As., II, 1811, p. 28, pl. 43, fig. 1; Dresser, III, p. 561, pl. 173.

Caucase, accidentel à Heligoland; Turkestan, Asie Mineure, Perse jusqu'au Sud de l'Himalaya.

CANNABINA *Brehm* 1828

Acanthis, *Linota* et *Linaria* p., Auct.

1. **cannabina** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 182; 1766, p. 322; Dresser, IV, p. 31, pl. 186.

Europe, du 64° latitude Nord au Sud du Continent; Iles Canaries.

- a. — **mediterranea** Tschusi, Ornith. Jahrb., 1903, p. 139.

Côtes Septentrionales de la Méditerranée Dalmatie, Italie Sud, Espagne Sud.

Taille moindre que chez les spécimens du Nord de l'Europe (ce qui n'est bien visible qu'en comparant de nombreuses séries des deux provenances). Teintes du plumage plus vives. (Cette forme semble peu distincte.)

b. Sous-espèce nouvelle.**2. *Cannabina flavirostris* (Linné)**

LINOTE A BEC JAUNE

D. et G., I, p. 290.

Genre SIZERIN**1. *Linaria borealis* Vieill.**

SIZERIN BORÉAL

D. et G., p. 293, 296.

(1)

a. *Linaria holböllii* Brehm

SIZERIN DE HOLBÖLL

D. et G., I, p. 295.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Acanthis* (*Linaria*) *linaria islandica* Hantz (Islande). — Voyez l'Appendice.

- b. — **nana** Tschusi, Orn. Monatsb., 1901, p. 130;
meadewaldoi Hart., 1901.

Madère
 et Ténériffe.

Bien distincte par sa taille beaucoup moindre. Aile : 75 à 80 millimètres (au lieu de 82 à 85). Quelques spécimens de Ténériffe ont le bec plus gros, mais on trouve tous les intermédiaires.

2. **flavirostris** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 182; Dresser, III, p. 59, pl. 191; *montium* Gmel., 1788.

Europe Nord-Ouest (Écosse et ses îles, Irlande, Angleterre, Norvège Ouest, rare en Suède et Russie); émigre dans l'Europe Centrale; plus rare en Espagne, Italie, Russie Sud.

LINARIA Vieill. 1816

Linota p., Auct; *Acanthis* p., Hartert.

1. **linaria** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 182; 1766, p. 322; Dresser, IV, p. 37, pl. 187; *canescens* Gould (nec Auct.), 1834; *flammea flammea* Hartert (ex Linné), Vög. Pal., 1903, p. 77.

Europe (et Amérique) Septentrionales; Laponie, Norvège, Islande.

- a. — **holböllli** Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deuts., 1831, p. 280; *brunnescens* Homeyer, 1879.

Ne diffère du type que par sa plus grande taille (ailes plus longues, bec plus long et plus fort).

Europe (et Amérique), plus au Nord que le type; émigre en grandes bandes (mêlé au type) vers l'Europe Centrale, l'Asie jusqu'au Japon.

b. *Linaria rufescens* Vicill.

SIZERIN CABARET

D. et G., I, p. 297.

2. « *Linaria canescens* Gould »

Degland et Gerbe (nec Gould),

SIZERIN BLANCHATRE

D. et G., I, p. 296.

a. Sous-espèce nouvelle.

**Genres PASSERINE, FRINGILLAIRE, PROYER
et BRUANT (1)**

1. *Passerina aureola* (Pallas)

PASSERINE AURÉOLE

D. et G., I, p. 301.

(1) Les caractères sur lesquels sont fondés ces divers genres étant artificiels et inconstants, on a dû refondre le genre *Emberiza* de Linné dans son intégrité primitive.

b. — **cabaret** P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl., 1776, p. 165 ; *rufescens* Vieill., Mém. R. Acc. Torino, Sc. Phys., 1816-1818, p. 202 ; Dresser, IV, p. 47, pl. 188 ; *linaria* Hewitson.

Europe Ouest et Centrale (dans les Montagnes) ; Écosse, Angleterre, Irlande, dans les plaines.

2. **hornemanni** Holböll, Naturk. Tidskr., IV, 1843, p. 398 ; Dresser, IV, p. 55, pl. 189, fig. 2, 190 ; *canescens* Auct. plurim., nec Gould.

Europe Arctique, Spitzberg, Islande, Groenland, Jan Mayen ; accidentel en Angleterre et en France.

a. — **exilipes** (Coues), Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 1861, p. 385 ; Dresser, IV, p. 51, pl. 189, fig. 1 ; *canescens* Auct., nec Gould ; *sibirica* et *pallascens* Homeyer, 1879 et 1880.

Europe, Asie, Amérique Septentrionales ; Laponie, émigre (en hiver) dans l'Europe Centrale.

Diminutif du type, dans son ensemble plus foncé, le croupion peu strié mais le blanc moins étendu, les flancs et les couvertures inférieures de la queue plus striés, le rouge du dessous, en général, plus étendu. Aile : mâle 74 à 77,9 ; femelle 69,6 à 74,6 millimètres.

EMBERIZA Linné 1758

Passerina Degl. et Gerbe (nec Vieill.) ; *Miliaria* Brehm ; *Fringillaria* Swains. ; *Cynchramus* Boié ; *Fringilloïdes* Buturlin.

1. **aureola** (Pallas), Reis. Russ. Reichs., II, 1773, p. 711 ; Dresser, IV, p. 223, pl. 218 ; *dolichouia* Bp., 1845.

Russie Nord, au Sud jusqu'à Moscou ; Asie jusqu'au Japon ; accidentel dans l'Europe Ouest et Sud, Bohême, Italie, France Sud, Heligoland.

2. Passerina melanocephala (Scop.)PASSERINE MÉLANOCÉPHALE (*Bruant crocote*)

D. et G., I, p. 304.

3. Fringillaria striolata (Licht.)

FRINGILLAIRE STRIOLÉ

D. et G., I, p. 306.

4. Miliaria europæa Swains.

PROYER D'EUROPE

D. et G., I, p. 308.

a. Sous-espèce nouvelle.

(1)

(1) Sous-espèces nouvelles : *Emberiza m. græca, obscura* (= *insularis*), Parrot; — *E. m. caucasica* (= *minor*). — Voyez l'APPENDICE.

2. **melanocephala** Scopoli, Annus I Hist. Nat., 1769, p. 142; Dresser, IV, p. 151, pl. 206; *crocea* Vieill., 1805.

Europe Sud-Est, de la Russie Sud à la France Sud, Heligoland, rare en Angleterre; Asie Mineure, jusqu'à l'Inde (en hiver).

- ? 3. **striolata** Licht., Verz. Doubl. Mus. Berl., 1823, p. 24; Dresser, IV, p. 197, pl. 213 (type oriental de l'espèce).

Afrique Nord, Maroc, Algérie, Tunisie; Afrique Nord-Est et Asie jusqu'à l'Inde Nord-Ouest.

La présence de la sous-espèce *E. str. sahari* Levaill. jun., 1850 (qui représente l'espèce orientale dans le Nord-Ouest de l'Afrique) dans le *Sud de l'Espagne* est considérée comme douteuse par les ornithologistes modernes. Le type n'est pas européen.

? Très accidentel dans l'Espagne Sud.

4. **miliaria** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 308 (nomen mutatum ex : *calandra* Linné, S. N., Ed. X, 1758, p. 176); *miliaria* Dresser, IV, p. 163, pl. 208; *europæa* Swains., 1837.

Europe, du Sud de la Suède et des Îles Britanniques à la Méditerranée; Afrique Nord; Asie Ouest.

- a. — **thanneri** Tschusi, Orn. Jahrb., 1903, p. 162.

Îles Canaries (Ténériffe).

Diffère du type par les larges taches foncées des parties supérieures, notamment par celles de la tête qui est presque noire, ainsi que les raies des flancs. Dessus brunâtre, dessous jaunâtre comme chez le type du Continent. — Ne semble pas différer nettement du type.

(1)

(1) *Emberiza luteola* Sparrm., 1789, est une espèce Asiatique caractérisée par ses teintes orangées, variées de marron et de noir (Dresser, IX, p. 211, pl. 680), qui a été prise deux fois à Heligoland, et qui est, par suite, très accidentelle en Europe. Forme avec *melanocephala* le nouveau genre *Fringilloides* de Buturlin.

5. *Emberiza citrinella* Linné

BRUANT JAUNE

D. et G., I, p. 310.

a. Sous-espèce nouvelle.**6. *Emberiza cirrus* Linné**

BRUANT ZIZI

D. et G., I, p. 311.

(1)

7. *Emberiza cia* Linné

BRUANT FOU

D. et G., I, p. 312.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Emberiza cirrus nigrostriata* Schiebel (Corse). — Voyez l'APPENDICE.

5. **citrinella** Linné, Syst. Nat., 1758, p. 177; Dresser, IV, p. 171, pl. 209.

Europe, du 70^e
latitude Nord au
Sud de l'Europe,
plus rare
(en hiver) dans
la région
Méditerranéenne
et l'Afrique Nord,
Canaries.

- a. — **erythrogenys** Brehm, Vogelfang, 1855, p. 411;
mollesoni Sarudny, Orn. Jahrb., 1902, p. 58.

Russie (à l'Ouest
jusqu'à
la Prusse Est);
Asie, de la Sibirie
Ouest
à l'Asie Mineure
et la Perse.

Les plumes des parties supérieures sont bordées de gris-brun clair, la bordure des rectrices est plus claire, de sorte que le plumage de l'oiseau est, dans son ensemble, moins foncé que celui du type. Les spécimens de l'Altaï sont surtout très clairs et ont l'aile longue (61 à 64 millimètres).

Des spécimens à teinte claire se montrent comme oiseaux de passage (en hiver), jusqu'en Italie. — Le nom de *E. mollesoni* s'applique à des spécimens d'Orenbourg et du Ienisséï à gorge entièrement d'un rouge brun. (Forme insuffisamment connue).

6. **cirlus** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 311; Dresser, IV, p. 177, pl. 210; *clæothorax* Bechst., 1803.

Europe Sud,
sur le pourtour de
la Méditerranée;
remonte jusque
dans l'Europe
moyenne (France)
et l'Angleterre;
Afrique
Nord-Ouest.

7. **cia** Linné, Syst. Nat., 1766, I, p. 310; Dresser, IV, p. 205, pl. 214.

Europe Sud, de
l'Espagne à l'Asie
Mineure
(France Sud);
remonte jusqu'en
Allemagne;
Afrique Nord
(en hiver).

a. Sous-espèce nouvelle.

8. *Emberiza pithyornus* Pallas

BRUANT PITHYORNE

D. et G., I, p. 314.

9. *Emberiza hortulana* Linné

BRUANT ORTOLAN

D. et G., I, p. 316.

10. *Emberiza cæsia* Cretzsch.

BRUANT CENDRILLARD

D. et G., I, p. 318.

11. *Emberiza chrysophrys* Pallas

BRUANT A SOURCILS JAUNES

D. et G., I, p. 319.

a. — par Hartert; Vög. Pal. Fau a, 1904, I, p. 184.

Semblable au type mais les parties supérieures notablement plus claires (ce qui se voit nettement sur la plume arrachée); l'extrémité des couvertures alaires d'un roux brunâtre, et non blanchâtre. Aile (mâle): 88 à 91 millimètres.

(1)

8. *leucocephala* (*leucocephalos*) Gmel., Nov. Comm. Acad. Petrop., 1771, XV, p. 480, pl. 23, fig. 3; Dresser, IV, p. 217, pl. 217; *pithyornis* Pallas, 1773.

Caucase Nord, Turkestan, jusque dans l'Inde Nord (en hiver).

Accidentel dans l'Europe moyenne et Sud (France, etc.); niche en Sibérie, s'avance jusqu'en Mongolie.

9. *hortulana* Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 177; Dresser, IV, p. 185, pl. 211 et 215, fig. 1.

Europe, du Cercle Arctique à la Méditerranée; accidentel dans les Iles Britanniques; Afrique Nord-Ouest, Abyssinie (en hiver); Asie jusqu'en Mongolie.

10. *cæsia* Cretzschmar, Atlas Rüpp. Reis., Vög., 1826, p. 17, pl. 10; Dresser, IV, p. 213, pl. 215, fig. 2 et 216.

Europe Sud-Ouest (France, Italie, Dalmatie, Heligoland), jusqu'en Asie Mineure; Afrique Nord-Est et Arabie (en hiver).

11. *chrysophrys* Pallas, Reis. Russ. Reichs., III, 1776, p. 698; Dresser, IV, p. 193, pl. 212.

Très accidentel en Europe (pris trois fois en Belgique, Luxembourg, France Nord, Lille); habite la Sibérie, la Chine Nord.

(1) *Emberiza cioides castaneiceps* Moore, forme plus petite et plus rousse d'E. *cioides* Brandt de Sibérie (Dresser, IX, pl. 683), qui hiverne en Chine, s'est égarée jusqu'en Angleterre en novembre 1886.

12. *Cynchramus schœniclus* (Linné)

CYNCHROME SCHÉNICOLE

D. et G., I, p. 323.

a. Sous-espèce nouvelle.**b. Sous-espèce nouvelle.****c. Sous-espèce nouvelle.**

12. **schœniclus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 182; Dresser, IV, p. 241, pl. 221 et 222, fig. 1; Hartert, Vög. Pal., I, 1904, p. 197, fig. 37.

Europe (excepté le Sud-Est), des Iles Britanniques jusqu'à la Hongrie Nord-Ouest; Sibérie; hiverne dans l'Europe Sud, l'Afrique Nord, l'Asie jusqu'à l'Inde.

- a. — **canneti** (Brehm), Vogelfang, 1855, p. 115; Naumann, Nouv. Édit., III, pl. 26; Hartert, Vög. Pal., fig. 39.

Europe Sud-Est, Dalmatie, Hongrie, Bulgarie, Serbie, Bosnie, Grèce.

Semblable au type, mais le bec plus voûté, plus épais, la mandibule supérieure à peu près aussi haute que l'inférieure, la première très renflée, sans l'être cependant autant que celles de *E. pyrrhuloides* ou *E. palustris*. Dos foncé, les plumes noires avec une bordure d'un roux-brunâtre clair. Croupion gris clair. Aile (male) : 81 à 83 millimètres.

- b. — **tchusii** Reiser et Almásy, Aquila, V, 1898, p. 122; Hartert, Vög. Pal., 1904, p. 197, fig. 40.

Europe Sud-Est, du Nord de la Dobrudscha jusque dans la Russie Sud-Est au Nord du Caucase.

Bec encore plus haut et plus épais que celui d'*E. s. canneli*, les parties supérieures plus claires. Aile : 81 à 82 millimètres. — Les spécimens de cette forme figurent souvent dans les collections sous le nom d'*E. pyrrhuloides*, mais le bec est moins obtus et moins massif que chez ce dernier.

- c. — **othmari** Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1904, p. 198.

Remplace le précédent plus au Sud, en Bulgarie Est; va passer l'hiver en Égypte (Delta du Nil).

Semblable à *E. s. tchusii*, mais à bec plus gros et parties supérieures plus foncées. Se distingue d'*E. pyrrh. palustris* par son bec plus pointu et plus long et ses parties supérieures d'un brun moins foncé.

13. Cynchramus pyrrhuloïdes (Pallas)

CYNCHROME PYRRHULOÏDE

D. et G., I, p. 325.

(Exclus. synonym. : *Emberiza palustris* Savi, sous-espèce b, classée ci-après.)**a. Sous-espèce nouvelle.**

•

b. Sous-espèce nouvelle.**14. Cynchramus pusillus** (Pallas)

CYNCHROME NAIN

D. et G., I, p. 327.

13. **pyrrhuloides** Pallas, Zoogr. Rosso-As., II, 1831, p. 49; Dresser, IV, p. 249, pl. 222, fig. 2, 3; *caspia* Menetriès, 1832 (genre *Pyrrhulorhyncha* Sharpe).

Russie Sud-Est, Astrakan et du Volga au Caucase; Turkestan; pris une fois à Heligoland.

Dresser considère cette forme comme une sous-espèce de *E. scharnichus* auquel elle se relie par *E. s. tchusii* (Voyez les fig. 37 à 42, dans Hartert, Vög. Pal. Fauna, 1904, I, p. 197-198).

- a. **reiseri** Hartert, Vög. Pal. Fauna, 1904, I, p. 199.

Thessalie (où il serait sédentaire).

Bec aussi gros et bombé que le type, mais les parties supérieures plus foncées, la bordure des plumes n'étant pas d'un gris-roux jaunâtre, mais d'un roux-brun, les couvertures de l'aile d'un roux-brun foncé, le croupion gris foncé. Flancs faiblement mais distinctement et régulièrement rayés. Ailes et queue plus courtes de 2 à 4 millimètres.

- b. **palustris** Savi, Orn. Toscana, II, 1829, p. 91; Naumann, Nouv. Éd., III, pl. 26.

Italie, France Sud, Sicile, Espagne.

Semblable au type mais plus grand. (Aile : 83 millimètres.) Bec épais, haut et très court, la mandibule supérieure très bombée. Les flancs rayés d'un riche roux-brun foncé; teinte générale d'un brun foncé. — Cette forme à bec court du *pyrrhuloides* se rapproche de la forme à long bec (*olbmari*) de *scharnichus*.

14. **pusilla** Pallas, Reis. Russ. Reichs., III, 1776, p. 697; Dresser, IV, p. 235, pl. 220; *durazzi* Bonap., 1832; *vinops* (*Ocyris*) Hodgson, 1845.

Russie Nord, Sibérie, Turkestan; en hiver émigre dans l'Europe Centrale et Occidentale; France, Angleterre, Italie; Afrique Nord.

15. Cynchramus rusticus (Pallas)

CYNCHROME RUSTIQUE

D. et G., I, p. 329.

Genre PLECTROPHANE**1. Plectrophanes nivalis** (Linné)

PLECTROPHANE DES NEIGES

D. et G., I, p. 332.

1. Plectrophanes lapponicus (Linné)

PLECTROPHANE LAPON

D. et G., I, p. 334.

15. **rustica** Pallas, Reis. Russ. Reichs., III, 1776, p. 698; Dresser, IV, p. 229, pl. 219; *lesbia* Gmel., 1788 (errore); *borealis* Zetterstedt, 1822.

Europe et Asie Nord; émigre dans l'Europe Centrale et Sud; Allemagne, Angleterre, France Sud, Italie, etc.

PLECTROPHANES (1) Meyer et Wolf 1810-1822

Passerina (Vieill.) Hartert, 1904;

Plectrophenax Stejneger.

1. **nivalis** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 176; 1766, p. 308; Dresser, IV, p. 261, pl. 224, 225, fig. 2.

Régions Arctiques des deux Continents; du Spitzberg aux Shetlands et à l'Écosse, Islande et Féroë; en hiver s'avance dans l'Europe Continentale jusqu'à la Méditerranée, les Canaries, les Açores, l'Afrique Nord.

CALCARIUS Bechst. 1803

1. **lapponicus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 180; 1766, p. 317; Dresser, IV, p. 253, pl. 223, 225, fig. 1; *calcaratus* Pall., 1773.

Régions Arctiques et Sub-arctiques des deux Continents; Laponie, Jan-Mayen, Nouvelle-Zemble, Norvège (dans les hautes montagnes), Ile Fair. Émigre en automne dans l'Europe Centrale Est, plus rare dans l'Ouest, jusque dans l'Italie Nord.

(1) En face de l'indécision qui semble régner au sujet de l'application du nom générique « *Passerina* », qui aurait probablement la priorité, il semble préférable de conserver le nom de *Plectrophanes*.

Famille XVI — ALAUDIDÉS

Genre ALOUETTE

1. *Alauda arvensis* Linné

ALOUETTE DES CHAMPS

D. et G., I, p. 339.

(1)

a. Sous-espèce nouvelle

(Donnée par D. et G. comme synonyme de *A. arvensis*).

b. Sous-espèce nouvelle.

(1) Sous-espèces nouvelles : *Alauda sordida* et *A. subtilis* Ehmeke ; — *A. arvensis scotica* Tschusi (Écosse). — Voyez l'APPENDICE.

XVI — ALAUDIDÆ

ALAUDA Linné 1758

- 1. arvensis** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 165 ;
1766, p. 287 ; Dresser, IV, p. 307, pl. 231.

Europe entière,
du cercle arctique au Nord de
l'Italie ;
Madère, Canaries.

- a. — cantarella** Bonap., Icon. Fauna Ital., Unelli,
1832-41, Introd. p. 5 ; *intercedens*, *balcanica*,
minuta Ehmeke, Ann. Mus. Nat. Hung., 1904,
p. 296-298.

Italie Sud
(Apulie), Sicile,
Corse, Sardaigne,
Dalmatie, Hon-
grie Sud, Turquie,
Grèce, Russie
Sud, Caucase.

Diffère du type par ses teintes moins rousses et moins brunes, la bordure des plumes sur le dessus du corps plus grise, donnant à cette partie une teinte plus claire, des taches larges et noires au jabot, le dessous presque blancâtre, et une taille plus faible.

- b. — cinerea** Ehmeke, Journ. f. Orn., 1903, p. 149 ;
cinerascens Ehmeke, 1904.

Sibérie, Turkes-
tan, au Nord
du Caucase (en
hiver) ;
Afrique Nord.

Plus petite et notablement plus claire et plus grise que *cantarella*. (Certains spécimens sont difficiles à distinguer, et la distribution géographique de cette forme n'est pas encore nettement établie.)

ALAUDA (partim), D. et G.**1. Alauda arborea** Linné

ALOUETTE LULU

D. et G., I, p. 340.

a. Sous-espèce nouvelle.**ALAUDA** (partim), D. et G.**1. Alauda brachydactyla** Leisler

ALOUETTE CALANDRELLE

D. et G., I, p. 341.

2. Alauda lusitana ex Gmel.

ALOUETTE ISABELLINE

D. et G., I, p. 344.

LULLULA Kaup 1829

1. **arborea** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 166 ;
1766, p. 287 ; Dresser, IV, p. 321, pl. 232.

Les spécimens de Corse et de Sardaigne sont beaucoup moins roux dessus, avec le croupion d'un gris olivâtre. (Il y aura lieu d'en faire une sous-espèce quand on connaîtra exactement leur lieu de reproduction.)

- a. — **flavescens** Ehmeke, Journ. f. Orn., 1903, p. 152.

Bordure des plumes du dessus du corps pâle, jaunâtre, contrastant nettement avec le milieu noirâtre de la plume.

Europe,
de la Scandinavie
moyenne à
la Méditerranée,
Corse, Sardaigne,
Asie jusqu'en
Perse.

Roumanie,
Dalmatie, Herzé-
govine, Grèce.

CALANDRELLA Kaup 1829

1. **brachydactyla** (Leisler), Ann. Wetteronisch. Ge-
sells., 1814, III, p. 357, pl. 19 ; Dresser, IV,
p. 341, pl. 235.

Europe Ouest
et Sud, France,
Espagne, Italie,
Herzégovine,
Grèce ;
Russie Sud ;
Afrique Nord ;
Palestine ; acci-
dentel en Angle-
terre, Heligoland,
Suisse.

2. **minor** Cabanis, Mus. Hein., I, 1851, p. 123 ; Dres-
ser, IV, p. 349, pl. 236, fig. 1 ; *reboudia* Loche,
1858 ; Tristram, I bis, 1859, p. 58 ; *deserti*
Tristram, I bis, 1866, p. 286.

Diffère de *brachydactyla* par l'absence des taches confluentes brunes au bas et de chaque côté du cou, cette partie étant étroitement rayée de brun foncé ; les rémiges secondaires notablement plus courtes que la plus longue primaire (de plus de 20 millimètres).

Afrique Nord,
Palestine et Asie
jusqu'à
Golfe Persique ;
accidentel à Malte
et en Italie (Es-
pagne ? Grèce ?).

a. *Alauda pispoletta* (1) Pallas

ALOUETTE PISPOLETTE

D. et G., I, p. 343.

b. Sous-espèce nouvelle.**c. Sous-espèce nouvelle.**

(1) D'après Hartert (Vög. Pal. Fauna, I, p. 219, — article de *Species* 341) le nom de « *pispoletta* » est une corruption, due à Pallas, du nom de « *spinoletta* » — donné par Linné à une « *Alauda* » qui appartient actuellement au genre *Anthus*, — et doit être remplacé par « *minor* ». — Reste à savoir si *rufescens* Vieillot, 1820, n'a pas la priorité sur *minor* Cabanis, 1851, et s'il ne faudrait pas dire « *rufescens minor* », au lieu de « *minor rufescens* » ?

- a. (minor) **heini** Homeyer, Journ. f. Orn., 1873, p. 197; *pispoletta* Pallas, Zoog. Ross.-As., I, p. 526, et Auct. plurim.; Dresser, IV, pl. 237.

Russie Sud
(steppes
du Volga);
Transcaspié
et Asie Mineure,
très accidentel
à Heligoland.

Diffère du type par ses parties supérieures moins isabelles, plutôt grisâtres; le croupion moins roux, plutôt isabelle; taille supérieure: (mâle) 95 à 100 millimètres. Bec: 9 à 10 millimètres.

- b. (minor) **rufescens** (Vicill.), Tabl. Encycl. et Méthod., 1820, I, p. 322; *tigrina* Bp., 1854; *pispoletta rufescens* et *canariensis* Hartert, 1901.

Pics de Ténériffe
et de Laguna.

Se distingue de toutes les autres formes de l'espèce, par le roux-brun cannelle de ses parties supérieures. La tache médiane des plumes est très étendue, les taches de la gorge plus grandes et plus foncées (moins grandes cependant que chez *baetica*). Le blanc du ventre est presque toujours coloré en rouge brun par le sol sur lequel vit l'oiseau, sauf au premier plumage du printemps. Aile (mâle): 88 à 91,5 millimètres.

- c. (minor) **polatzeki** Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1904, p. 217; *minor distincta* Sassi, Orn. Jahrb., 1908, p. 30.

Iles Canaries Est,
Lanzarote
et Fuerteventura.

Les spécimens des Canaries Orientales se distinguent de ceux de Ténériffe par leurs parties supérieures plus claires (et non cannelle), d'un roux isabelle, et une taille moindre que celle de *rufescens*. Aile (mâle): 87 à 88 millimètres. Le jeune a les plumes du dessus de couleur crème à leur pointe.

d. Sous-espèce nouvelle.

Genre OTOCORIS

1. *Otocoris alpestris* (Linné)

OTOCORIS ALPESTRE

D. et G., I, p. 346.

b. *Otocoris bilopha* (Temm.)

OTOCORIS BILOPHE

D. et G., I, p. 349.

d. (minor) *bætica* Dresser, *Birds of Europe*, IV, 1873, p. 351, pl. 236, fig. 2.

Espagne Sud,
Andalousie, Gre-
nade, Murcie,
Valence.

Se distingue de *minor* et *beini* par ses parties supérieures d'un brun plus foncé, et par les taches allongées de la gorge plus grandes, plus foncées, d'un brun-noir, et qui se prolongent presque jusqu'au bec et sur les côtés du corps. La couleur du dessus varie, comme dans les autres formes de l'espèce, mais sans s'écarter de la teinte foncée caractéristique. Taille semblable à celle du type.

EREMOPHILA Boie 1828

Otocorys Bonap., 1839.

1. *alpestris* (Linné), *Syst. Nat.*, Ed. X, 1758, p. 166; 1766, p. 289; *rufescens* Brehm, 1855.

Le type de l'es-
pèce de Linné est
de l'Amérique
du Nord.

a. — *flava* Gm., *Syst. Nat.*, I, 1788, p. 800; *nivalis* Pall., 1827; *alpestris* Dresser, IV, p. 387, pl. 243 (de Laponie); *alpestris* Degland et Gerbe, p. 347 (Observation).

Europe Nord
presque jusqu'au
Cercle arctique
(zone des forêts
et des tundras);
émigre dans
l'Europe Centrale
jusqu'en Italie;
Sibérie
et Chine Nord.

Dresser (*Mau. of Pal. Birds*, I, 1902, p. 378) ne distingue pas la forme de l'Ancien Continent de celle de l'Amérique du Nord, même comme sous-espèce.

b. — *bilopha* Temm., *Pl. Col.*, 1823, pl. 244; Dres-
ser, IV, p. 399, pl. 245.

Afrique Nord,
de l'Algérie
à l'Arabie; acci-
dentel
en Espagne.

[**Otocoris albigula** (Bonap. ex Brandt.)

OTOCORIS A GORGE BLANCHE

D. et G., I, p. 348].

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

[Cette forme asiatique est considérée actuellement comme étrangère à la faune d'Europe. Elle a généralement été confondue avec *O. a. penicillata*.]

Perse Nord,
Turkistan (dans
les montagnes)
jusqu'au Pamir.

c. — **penicillata** Gould, P. Z. S., 1837, p. 126 (la figure de Dresser, IV, pl. 244, représente *O. a. albicula* et non la présente sous-espèce); *larvata* Filippi, 1863.

Russie Sud-Est,
Caucase,
Asie Mineure.

Diffère des autres formes en ce que le noir des côtés de la gorge se confond avec celui des flancs. Le dos est gris avec des flammèches d'un roux brunâtre. Par l'usure du bord des plumes, le dessus devient plus foncé, la tache noire du milieu de chaque plume s'étendant; le dessus de la tête et le derrière du cou sont plus roux. Les plumes des côtés de la tête au-dessous du noir, celles du creux de la gorge et du front, en automne et en hiver sont d'un jaune de soufre, tandis qu'au printemps elles passent au blanc. La cravate blanc-jaunâtre de la gorge est plus étroite que chez les autres formes. La bordure des rectrices médianes est d'un gris brunâtre. Les huppées des oreilles sont très longues et étroites, recourbées en dedans. Aile (mâle) : 117 à 122 millimètres.

d. — **balcanica** Reichenow, Orn. Monatsb., 1895, p. 42.

Péninsule des
Balkans (dans les
montagnes) :
Bosnie, Bulgarie,
Turquie, Grèce.

Semblable à *penicillata*, mais s'en distinguant, en plumage frais après la mue, par la claire teinte grise des parties supérieures, notamment sur la bordure des rectrices médianes, ainsi que par le jaune plus vif du front et de la gorge. Ce jaune s'atténue au printemps et passe au blanc jaunâtre, de telle sorte qu'au milieu de l'été la distinction entre les deux formes devient difficile.

Genre MELANOCORYPHE

1. *Melanocorypha calandra* (Linné)

CALANDRE ORDINAIRE

D. et G., I, p. 350.

2. *Melanocorypha sibirica* (Gmel.)

CALANDRE SIBÉRIENNE

D. et G., I, p. 352.

3. *Melanocorypha tatarica* (Pallas)

CALANDRE NÈGRE

D. et G., I, p. 353.

Genre SIRLI

1. *Certhilauda desertorum* (Stanl.)

SIRLI DES DÉSERTS

D. et G., I, p. 355.

MELANOCORYPHA *Boie* 1828

1. **calandra** (Linné), Syst. Nat., 1766, 1, p. 288 ;
Dresser, IV, p. 365, pl. 238, fig. 1 et 239.
Europe Sud,
de la France Sud
sur tout le pour-
tour de la Médi-
terranée (et
ses îles); l'Asie
Mineure,
l'Égypte et le Nord
de l'Afrique.
2. **sibirica** (Gmel.), Syst. Nat., 1788, I, p. 799 ;
Dresser, IV, p. 373, pl. 240 ; *leucoptera* Pallas,
1811.
Russie Sud-Est,
Transcaspié,
Turkestan ; acci-
dentel en automne
et hiver en
Turquie et Europe
Centrale
et Occidentale ;
Heligoland.
3. **yeltoniensis** (Forster), Phil. Trans., 1767, 57,
p. 350 ; Dresser, IV, p. 377, pl. 241 ; *tarta-
rica* Pall., 1773.
Russie Sud-Est,
du Volga
au Turkestan et à
la Sibérie Ouest ;
en hiver, acci-
dentel en Galicie
Nord-Est, Belgi-
que, Heligoland.

CERTHILAUDA *Savains*. 1827

Alamon Keys. et Blas., 1841.

1. **alaudipes** Desfont., Mém. de l'Acad., 1787, p. 504 ;
Dresser, IV, p. 273 ; *desertorum* Stanley, 1814 ;
Dresser, IV, p. 275, pl. 226 ; *bi'asciata* Licht.,
1823.
Afrique Nord,
Sahara, du Rio de
Oro à l'Égypte ;
accidentel
dans l'Europe Sud
(Espagne, Sicile,
France Sud).

Genre nouveau

1. *Certhilauda duponti* (Vieill.)

SIRLI DE DUPONT

D. et G., I, p. 356.

Genre COCHEVIS

1. *Galerida cristata* (Linné)

COCHEVIS HUPPÉ

D. et G., I, p. 357.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

CHERSOPHILUS *Sharpe* 1890

1. **duponti** Vieill., Faune Franç., 1820, p. 173, pl. 76, fig. 2; Dresser, IV, p. 279, pl. 227; *d. lusitanica* Bocage, 1887; *ferruginea* v. d. Mühle, 1844.

Afrique Nord;
très accidentel en
France Sud,
Espagne Sud, Ba-
léares, Toscane.

GALERIDA *Boit* 1828

Corydus Dresser, 1902.

1. **cristata** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 166; 1766, p. 288; Dresser, IV, p. 285, pl. 228, 229.

Europe, du Sud
de la Suède
à l'Italie, aux Py-
rénées, aux Bal-
kans, à la Russie
Sud

- a. — **tenuirostris** Brehm, Naumannia, 1858, p. 208.

Russie Sud
et Roumanie.

Plumage plus gris que celui du type, presque aussi gris que chez *caucasica*, et bec plus grêle.

- b. — **caucasica** Taczanowski, Bull. Soc. Zool. France, 1887, p. 621; *magda* Loudon et Sarudny, 1903.

Caucase
et bords Ouest
de la Caspienne.

Semblable au type, mais les parties supérieures présentant, en plumage frais, une teinte grise si marquée qu'elles semblent couvertes de poussière (ce qui se voit bien en comparant deux séries de chacune de ces formes). Aile (mâle) : 106 à 110; (femelle) : 99 à 104 millimètres. Bec plus foncé que chez le type (au moins sur les peaux préparées).

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

(1)

**2. Espèce nouvelle,
COCHEVIS DE THÉKLA**

(1) Sous-espèce nouvelle : *Galerida cristata neumanni* Hilgert (Romagne). — Voyez l'APPENDICE.

- c. — **meridionalis** Brehm, Isis, 1811, p. 124, 126;
c. balcanica Arrigoni, 1902; *crist. madaraszi*
 Herman, 1903.

Péninsule des Bal-
 kans, Dalmatie,
Herzégovine,
 Montenegro,
 Grèce.

En plumage frais à l'automne, le dessus est d'un brun clair avec une légère teinte rousse, les barbes externes des rectrices latérales très rousses, le dessous d'un roux-brun très clair; en plumage de printemps déjà fané, l'oiseau est très différent, devenant plus clair et plus grisâtre.

- d. — **pallida** Brehm, Naumannia, 1858, p. 207; *ru-
 jescens, maculata*, etc., Brehm, 1855 à 1866.

Espagne et
 Portugal.

Semblable au type, mais le dessus plus clair, avec la bordure des plumes très claire, ce qui s'observe aussi bien dans le plumage frais de l'automne que dans celui du printemps.

2. **theklæ** Brehm, Naumannia, 1858, p. 210; *mira-
 maræ* Homeyer, 1882.

Espagne, de
 Murcie et Valence
 jusque dans le Sud
 et partie du Por-
 tugal (plusieurs
 sous-espèces habi-
 tent l'Afrique
 Nord).

Diffère de *G. cristata* par son bec plus court et plus épais, par sa gorge fortement tachetée en forme de flammèches (comme chez les espèces du *G. Lullula*), et non d'un roux isabelle, mais d'un gris terreux sale, les couvertures inférieures de l'aile nettement grises. La première rémige n'est pas plus courte que les petites couvertures de l'aile mais aussi longue ou de 1 à 2 millimètres plus longue. Le dessus est semblable à celui de *G. cristata* d'Europe centrale, mais plus pâle, moins brun, un peu grisâtre, mais plus foncé que chez *G. c. pallida*. Le dessous n'a pas trace de teinte rousse; il est blanc avec une très faible teinte jaune sale. La gorge est comme le reste des parties inférieures sans trace de roux, ce qui dessine d'autant plus nettement les taches noires. Les couvertures inférieures de la queue sont d'une teinte uniforme. Bec : 14 à 15,5 millimètres; aile : 100 à 104 millimètres, la femelle un peu plus petite.

Famille XVII — MOTACILLIDÉS

Genres AGRODROME, CORYDALLE et PIPI (1)

1. *Agrodroma campestris* (Briss.)

AGRODROME CHAMPÊTRE

D. et G., I, p. 361.

2. Espèce nouvelle,

PIPI DE BERTHELOT

(2)

a. Sous-espèce nouvelle.

(1) Nous suivrons Dresser et Hartert en réunissant tous ces genres dans le G. *Anthus* de Bechstein.

(2) Sous-espèce nouvelle : *Anthus bertheloti lanzarotæ* Tschusi (Ile Lanzarote). — Voyez l'APPENDICE.

XVII — MOTACILLIDÆ.

ANTHUS *Bechst.* 1802*Agrodroma* Swains. ; *Corydalla* Vigors.

1. **campestris** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 166 ;
1766, p. 283 ; Dresser, III, p. 317, pl. 137.

Europe, de la
Suède Movenne
la Méditerranée ;
Afrique Nord ;
à l'Est jusqu'à la
Russie Moyenne
et Sud et
l'Asie Centrale.

2. **bertheloti** Bolle, Journ. f. Orn., 1862, p. 357 ;
Dresser, III, p. 291, pl. 133.

Iles Canaries,
de Lanzarote
à Hierro.

Ressemble à première vue à *A. pratensis* mais en diffère par ses parties supérieures plus pâles, d'une couleur plus uniforme, teintées de gris, les taches du cou, de la poitrine et des flancs formant d'étroites stries d'un brun foncé. Pattes d'un brun très pâle. Le jeune a les plumes du dessus bordées de roux et les pattes presque blanches. — Cet oiseau, que l'on a voulu rapprocher de *A. spinoletta*, en diffère nettement par son dos franchement tacheté, la gorge fortement striée, son bec et ses jambes plus gros, ses ailes très courtes, etc. etc., caractères qui en font une espèce bien distincte.

- a. — **madeirensis** Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1905,
p. 271.

Madère
et Porto-Santo.

Semblable au type des Canaries mais le bec plus long (de 1 à 2, d'ordinaire 1,5 millimètres), ce que l'on constate en comparant deux séries provenant de ces deux localités.

3. *Corydalla richardi* (Vieill.)

CORYDALLE DE RICHARD

D. et G., I, p. 363.

4. *Anthus arboreus* (Briss.)

PIPI DES ARBRES

D. et G., I, p. 366.

5. Espèce nouvelle,

PIPI DE GUSTAVE OU DE LA PETCHORA

3. **richardi** Vieill., Nouv. Dict. H. Nat., 26, 1818, p. 491; Dresser, III, p. 325, pl. 138.

Sibérie (où il niche); émigre en Europe Centrale et Ouest, France, Heligoland, Italie, Espagne, Angleterre; Afrique Nord.

4. **trivialis** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 166; 1766, p. 288; Dresser, III, p. 309, pl. 132, fig. 2; *arboreus* Bechst., 1807.

Europe, du 69° latitude Nord aux Pyrénées, la Haute-Italie, la Crimée; le Turkestan; en hiver émigre dans la région Méditerranéenne, jusque dans l'Afrique Sud et l'Inde.

5. **gustavi** Swinhoe, P. Z. S., 1863, p. 90; *seeborni* Dresser, III, p. 295, pl. 134.

Russie et Asie Nord, de la Petchora au Kamtchatka, au Sud jusqu'à l'Altaï; émigre jusqu'aux Philippines et à Célèbes.

Parties supérieures d'un fauve vif richement strié de noir et de blanc; parties inférieures comme celles d'*A. trivialis*; la partie pâle des rectrices d'un fauve enfumé, non blanche. Ailes comme celles d'*A. trivialis* mais la couleur du fond plus noirâtre. Bec brun de corne, plus pâle à la base de la mandibule inférieure. Pattes brun pâle. Iris brun foncé. Les sexes semblables. Aile (mâle) 82 à 85 millimètres. En hiver, le dessus est plus olivâtre, les stries blanches sont plus distinctes et les parties inférieures lavées de fauve. Le *jeune* a la poitrine plus fortement tachetée, les taches noires s'étendant jusqu'au-dessous du menton qui reste blanc.

6. Anthus pratensis (Linné)

PIPI DES PRÉS

D. et G., I, p. 367.

7. Anthus cervinus (Pallas)

PIPI A GORGE ROUSSE

D. et G., I, p. 369.

8. Anthus spinoletta (Linné)

PIPI SPIONCELLE

D. et G., I, p. 371.

6. **pratensis** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 166 ; 1766, p. 287 ; Dresser, III, p. 285, pl. 132, fig. 1.
Europe, de l'Islande et des Pyrénées, à l'Italie, les Carpathes ; à l'Est jusqu'à la Sibérie, le Turkestan ; émigre dans la région méditerranéenne, l'Afrique Nord et l'Asie Mineure.
7. **cervinus** (Pallas), Zoogr. Rosso-As., I, 1827, p. 511 ; Dresser, III, p. 299, pl. 135, 136 ; *rufogularis* Brehm, 1831.
Europe et Asie Nord, de la Scandinavie au Kamtschatka et même à l'Alaska ; émigre à l'automne à travers l'Europe Centrale et Sud, jusque dans l'Afrique Nord et la Perse.
8. **spinoletta** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 166 ; 1766, p. 288 ; Dresser (*spipoletta*), III, p. 335, pl. 140 ; *aquaticus* Bechst., 1807.
Europe Centrale et Sud (dans les montagnes), Vosges, Alpes (jusqu'à 2.500 mètres), Harz, Monts Sudètes, Pyrénées, Carpathes, Balkans, Espagne, Italie, Sardaigne ; en hiver émigre dans l'Afrique Nord.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. *Anthus obscurus* (Penn.)

PIPI OBSCUR

D. et G., I, p. 373.

c. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **blakistoni** Swinhoe, P. Z. S., 1863, p. 90; *neglectus* Brooks, 1876.

Asie Centrale,
Turkestan
(paraît s'étendre
jusqu'au
Caucase).

Plumage d'automne beaucoup plus clair que celui du type, plus pâle, moins jaune ou roux brunâtre que celui de *A. sp. coutelli* (de la Transcaucasie et Asie Mineure), le dessous d'un blanc sale, comme le type. Au premier printemps le dessous jusqu'au ventre est d'un jaune brunâtre lavé de rose, plus vif au-devant de la poitrine et au cou, et sans taches. La taille (variable) est en général plus faible que chez l-type et *coutelli*. Aile : (mâle) 89 à 90, rarement 92 à 93 millimètres ; (femelle) 81 à 83 millimètres.

- b. — **obscurus** (Latham), Index Ornith., 1790, II, p. 494 ; Dresser, III, p. 343, pl. 141 ; *immutabilis* Degland, 1849.

Iles Britanniques
(sur les côtes),
Jersey et Guernesey,
Normandie,
Bretagne ; en
hiver visite toute
la côte Ouest
jusqu'à la Biscaye
et l'intérieur
du pays.

- c. — **kleinschmidti** Hartert, Vög. Pal. Fauna, 1905, I, p. 284.

Iles Feroë
(Nolsø).

Semblable à *obscurus* en pelage d'automne, mais le dessus plus sombre, le dessous plus obscur avec les taches plus étendues et même confluentes sur la ligne médiane. Le bec constamment aussi long que chez les spécimens à bec le plus long d'*obscurus*. Base de la mandibule inférieure pâle. Plumage du premier printemps semblable à celui de l'automne, mais le bec entièrement noir.

d. Sous-espèce nouvelle.

Genres BERGERONNETTE et HOCHEQUEUE
(réunis)

1. Budytes flava (Linné)
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE
D. et G., I, p. 376.

a. Sous-espèce nouvelle.

- d. — *littoralis* Brehm, Handb. Naturg. Deuts., 1831, p. 331; *rupestris* (partim) Nilsson, Orn. Suec., I, 1817, p. 245, pl. 9, fig. 1, 2.

Côtes de Scandinavie,
Mer Blanche;
en hiver émigre
au Sud (Héligo-
land, côtes d'Alle-
magne, Hollande,
Belgique,
France Nord,
Angleterre).

Plumage d'automne ne différant pas de celui d'*obscurus*. —
Plumage du premier printemps présentant à la gorge une
teinte rousse et dépourvue de taches, ou n'en présentant que
des vestiges.

MOTACILLA Linné 1758

Budytes Cuv., 1817.

1. *flava* (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 185;
Dresser, III, p. 261, pl. 129, fig. 1, 2.

Europe,
de la Scandinavie
moyenne à
l'Espagne Nord
et l'Italie Nord, à
l'Est jusqu'au
Danube; émigre
au Sud jusqu'à la
Colonie du Cap.

- a. — *dombrowskii* Tschusi, Orn. Jahrb., XIV, 1903,
p. 161.

Roumanie, Vala-
chie, Dobrudscha,
Herzégovine.

Semblable au type mais la région auriculaire noirâtre
comme chez *M. fl. cinereocapilla*, le sommet de la tête plus
foncé, comme chez *borealis* et variable comme chez cette
dernière, mais la raie sourcilière blanche comme chez *flava*,
exceptionnellement obsolète. Gorge jaune, le menton seul
blanc. Dessous jaune, orangé chez les très vieux mâles.
Aile : 82 à 84 millimètres (Les spécimens de la Dobrudscha
sont tout à fait intermédiaires entre cette forme et le type).

b. Sous-espèce nouvelle.

c. *Budytes cinereocapilla* (Savi)

BERGERONNETTE A TÊTE CENDRÉE

D. et G., I, p. 379.

d. *Budytes rayi* Bonap.

BERGERONNETTE DE RAY

D. et G., I, p. 378.

- b. — **borealis** Sundev., Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh., 1840 (1842), p. 53; *melanocephalus* Brehm, Isis, 1842, p. 566 (nec Licht., 1823); *viridis* Gm., 1788; Dresser, III, p. 269, pl. 129, fig. 3.

Europe
et Asie Nord,
de la Scandinavie
à la Mer
d'Ochotsk;
émigre en Europe
(rare
dans l'Ouest),
dans l'Afrique
Nord et l'Inde.

Le mâle adulte se distingue du type par la région auriculaire plus foncée, ardoisée ou presque noire, le sommet de la tête d'un gris plus foncé; la raie sourcilière manque ou est à peine indiquée, plus rarement elle est aussi nette que chez le type. Sur la gorge on voit quelques ombres foncées, qui manquent rarement, et souvent forment de grosses taches olivâtres foncées. Les *jeunes* ressemblent à ceux du type. La taille est la même.

- c. — **cinereocapilla** (Savi), Nuov. Giorn. Litt., 1831, n° 57, p. 190; *dalmatica* Sundev., 1842; *megarhynchos* Brehm, 1842.

Italie, Sicile,
Péninsule
des Balkans, de la
Dalmatie
au Monténégro;
Espagne; émigre
en Afrique jus-
qu'au Sénégal
et au Lado.

- d. — **rayi** Bonap., Geogr. et Comp. List of B. of Europe et N. Amer., 1838, p. 18; Dresser, III, p. 277, pl. 131; *campestris* Keys. et Blas., 1840 (nec Pallas).

Angleterre
et Écosse Sud,
Irlande Nord-Est,
France Ouest,
Portugal; émigre
dans l'Europe
Ouest, l'Espagne,
Héligoland, rare
en Allemagne;
Afrique Ouest
jusqu'au Congo.

e. Sous-espèce nouvelle.

f. *Budytes melanocephala* (Licht.)

BERGERONNETTE A TÊTE NOIRE

D. et G., I, p. 380.

2. *Budytes citreola* (Pallas)

BERGERONNETTE CITRINE

D. et G., I, p. 381.

(1)

3. *Motacilla alba* Linné

HOCHEQUEUE GRISE

D. et G., I, p. 383.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Budytes citreola weræ* (Russie Est). — Voyez l'APPENDICE.

- e. — **campestris** Pallas, Reis. Russ. Reichs., III, 1776, p. 696; *flavifrons* Sewertzow, 1875.

Semblable à *M. fl. rari* mais la tête présentant plus de jaune, la région auriculaire presque entièrement de cette couleur. Au printemps, le mâle adulte a le sommet de la tête entièrement jaune, mais avec des ombres vertes, de telle sorte que la raie sourcilière est à peine visible, ou fait complètement défaut.

- f. — **melanocephala** (Licht.), Verz. Doubl. Zool. Mus. Berl., 1823, p. 36; Dresser, III, p. 273, pl. 160; *feldeggi* Michah., 1830; *paradoxa* Brehm, 1855.

Russie Sud,
Steppes, du Volga
à la Transcaspie;
émigre en Perse,
Arabie,
Afrique Est jus-
qu'au Transvaal
(pris une fois en
Hongrie).

Péninsule des Bal-
kans, de la Dal-
matie à la Grèce,
Russie Sud,
Caucase, Asie Mi-
neure; s'égare
à l'Ouest jusqu'à
Héligoland;
émigre en Italie,
Afrique Nord-Est
et Arabie.

2. **citreola** (Pallas), Reis. Russ. Reich., III, 1876, p. 696; Dresser, III, p. 245, pl. 127.

Russie Nord
et de Moscou
à Orembourg;
Sibérie et Mongo-
lie; émigre dans
l'Asie Centrale;
s'égare quel-
quefois en Italie,
à Héligoland,
dans la Prusse Est
et (?) les Pyrénées.

3. **alba** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 185; Dresser, III, p. 233, pl. 125 et 126.

Europe, de l'Is-
lande et de la
Scandinavie Nord
à la Méditerranée
et à l'Oural;
Angleterre,
Écosse (acciden-
tel); émigre en
Afrique jusqu'au
Niger et à l'Ou-
ganda; exception-
nellement à Ma-
dère, les Canaries,
les Açores.

-
- a. *Motacilla yarrelli* Gould.**
HOCHEQUEUE DE YARRELL
D. et G., I, p. 384.

- 4. *Motacilla sulfurea* Bechst.**
HOCHEQUEUE BOARULE
D. et G., I, p. 385.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **lugubris** Temm., Man. d'Orn., I, 1820, p. 253 ;
Dresser, III, p. 239, pl. 125, fig. 3 ; 126,
fig. 2.

Iles Britanniques,
Hollande Ouest,
Belgique, France
Nord-Ouest ;
Suède Sud-Ouest,
Danemark, Héli-
goland ; émigre
en France Sud,
Espagne, Maroc
(sédentaire en An-
gleterre Centrale
et Sud).

4. **boarula** Linné, Mantissa plantarum, 1771, p. 527
(nec Scop.) ; **melanope** Dresser, III, p. 251,
pl. 128 ; **sulfurea** Bechst., 1807 ; ? **canariensis**
Hartert, Nov. Zool., 1901, p. 322.

Europe,
de la Suède Sud
à la Méditerranée ;
Iles Britanniques,
Espagne, Oural
Sud, Iles Cana-
ries, Afrique
Nord ; émigre jus-
qu'au Sénégal
et à l'Ouganda.

- a. — **melanope** Pallas, Reis. Russ. Reich., III, 1776,
p. 696 ; **bistrigata** Raffles, 1820, *novæ-guinææ*
Meyer, 1875.

Diffère du type par sa queue plus courte (seulement 88 à 95 millimètres). La rectrice externe a très souvent un peu de brun dans le milieu de sa tige, la plus voisine un peu de brun sur son bord interne et la troisième presque toujours plus ou moins de noir sur son bord interne.

De l'Oural
et du Caucase
au Kamtschatka
et aux Kouriles ;
émigre dans
l'Inde, la Malaisie,
Célèbes,
jusqu'à la
Nouvelle-Guinée.

- b. — **schmitzi** Tchusi, Orn. Jahrb., XI, 1900, p. 223.

Madère
et les Açores
(sédentaire).

Se distingue à première vue du type par la région auriculaire d'un ardoisé foncé, ses lores noires, les raies sourcilière et malaire plus ou moins obsolètes, et le gris foncé des parties inférieures. La troisième rectrice (en partant de la plus externe) passe à une teinte foncée et, presque toujours, présente une large bordure noire (rarement les barbes internes sont entièrement blanches), et cette plume est, sur

Famille XVIII — HYDROBATIDÆ**Genre AGUASSIÈRE (ou CINCLE)****1. *Hydrobata melanogaster* (Brehm)**

AGUASSIÈRE A VENTRE NOIR

D. et G., I, p. 391.

a. Sous-espèce nouvelle.

la moitié de sa longueur ou sur toute son étendue, entièrement noire. Le jaune des parties inférieures est très vif chez les vieux mâles, la gorge d'un beau noir. La *female* adulte a beaucoup de noir à la gorge. Les *jeunes* sont plus foncés que ceux du type.

XVIII — CINCLIDÆ

CINCLUS *Borkb.* 1797

Hydrobata Vieill., 1816.

1. **cinclus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 168 ; *melanogaster* Brehm, 1823 ; Dresser, II, p. 177, pl. 20, fig. 2 ; *septentrionalis* Brehm, 1823.

Europe Nord,
Scandinavie,
Russie,
Prusse Est ;
Poméranie ;
en hiver émigre
vers le Sud.

Adulte. — Tête et nuque d'un brun noirâtre ; ailes et queue de même couleur, bordées en dehors de gris ardoisé ; dos d'un gris ardoisé foncé écaillé de noirâtre ; poitrine et gorge ainsi qu'une petite tache au-dessus et au-dessous des yeux, d'un blanc pur, le reste des parties inférieures d'un brun noirâtre, les flancs lavés de gris ardoisé. Bec noirâtre, pieds bruns. — Le *jeune* est en dessus d'un brun ardoisé terne, les rémiges terminées de blanc ; le dessous blanc, barré de brun, les flancs et la région anale d'un brun ardoisé. Aile : 94 à 98 millimètres.

- a. — **britannicus** Tschusi, Orn. Jahrb., XIII, 1902, p. 69 ; *gularis* Lath., 1801 (juv.).

Grande-Bretagne.

Dessus semblable au type, mais la partie antérieure du dessous teinte plus ou moins de roux cannelle jusqu'aux couvertures de la queue ; exceptionnellement le dessous est presque aussi foncé que chez certains spécimens du Nord

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

(non typiques). — Diffère de *C. c. aquaticus* par son dessus foncé avec des bordures noires plus larges. Quelques spécimens très foncés sont très semblables à *C. c. cinclus*; exceptionnellement, les plus clairs sont difficiles à distinguer des plus foncés d'*aquaticus*, quand on n'a pas de séries assez nombreuses sous les yeux.

b. — hibernicus Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1910, p. 790.

Irlande.

Se distingue des deux formes précédentes par la largeur plus grande de la bordure d'un noir enfumé des plumes du dessus, de telle sorte que le dos, en plumage nouveau après la mue, paraît entièrement noir. Diffère en outre de *britannicus* par moins de roux-brun à la poitrine, la teinte du dessous étant intermédiaire entre celle de *cinclus* et celle de *britannicus*.

c. — pyrenaicus Dresser, Ibis, 1892, p. 382.

Chaîne des Pyrénées (Basses et Hautes-Pyrénées).

Diffère de *C. c. cinclus* (ou *melanogaster*) par ses ailes plus courtes, les parties supérieures d'un brun pâle, surtout sur la tête et le cou, les parties inférieures plus pâles et d'une teinte plus brune. Aile : 85 à 95 millimètres.

d. — (cinclus) subsp? Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1910, p. 790.

Espagne, Sierras Nevada et Guadarrama.

Les spécimens d'Espagne ne semblent pas appartenir à la sous-espèce précédente, la partie antérieure du dessus est plutôt d'un rouge-brun et le dessus de la tête est d'un rouge brunâtre, le dos également brunâtre. Aile : 94 à 100 millimètres.

e. Sous-espèce nouvelle.

f. **Hydrobata cinclus** (*partim*)

AGUASSIÈRE CINCLE

D. et G., I, p. 389.

g. Sous-espèce nouvelle.

h. Sous-espèce nouvelle.

- e. — **sapsworthi** Arrigoni, *Atlante Ornith.*, 1902, p. 150; *sardus* Hartert, 1901.

Corse
et Sardaigne.

Dessous comme chez *cinclus* (du Nord), dessus également, mais le dessus de la tête et le derrière du cou plus clairs, non d'un brun chocolat, mais grisâtres (Quelques spécimens d'*aquaticus* sont semblables, mais la présente forme est nettement plus petite). Aile : (mâle) 88 à 92, rarement 95 à 96; (femelle) 81 à 83 millimètres.

- f. — **aquaticus** Bechst., *Orn. Taschen.*, I, 1803, p. 206; Dresser, II, p. 167, pl. 19 (*partim*, excepté les spécimens d'Écosse); *tebusii* Kleinschm. et Hilg., 1907.

Europe Centrale.
Allemagne, Belgique, France
(sauf le Sud-Ouest et le Sud-Est),
Carpathes et Roumanie Nord.

Diffère de *C. c. cinclus* par la partie antérieure du dessous, en arrière du plastron blanc, plus ou moins teintée de rouge-brun, ou d'un roux cannelle. En outre, le dessus de la tête et la nuque sont moins foncés; le dos est aussi d'ordinaire plus clair, la bordure noire des plumes étant plus étroite. Aile : (mâle) 85 à 97,5; (femelle) moins de 90 millimètres.

- g. — **meridionalis** Brehm, *Naumannia*, 1856, p. 186; *albicollis* Vieill., 1816 (*partim*); Dresser, II, p. 181, pl. 20, fig. 1; *rufipectoralis* Brehm, 1856.

Europe Sud-Est.
Alpes, Italie,
Dalmatie, Bosnie,
Serbie, Bulgarie,
Turquie, Grèce.

Diffère d'*aquaticus* par ses parties supérieures plus pâles et la poitrine d'un roux plus vif, cette couleur s'étendant jusque sur l'abdomen.

- h. — **caucasicus** Madarasz, *Mus. Hung.*, I, 1902, p. 560.

Caucase Nord
et Sud,
Asie Mineure,
Perse.

Diffère de *C. c. aquaticus* par ses parties inférieures qui sont d'un brun cannelle sombre (et non rouge-brun), cette région étant tout entière d'un brun foncé et passant seule-

Famille XIX — ORIOIIDÉS**Genre LORIOI****1. *Oriolus galbula* Linné**

LORIOI JAUNE

D. et G., I, p. 392.

Famille XX — TURDIDÉS**Genre TURDOÏDE****1. *Ixos obscurus* Temm.**

TURDOÏDE OBSCUR

D. et G., I, p. 396.

ment vers la poitrine au brun cannelle foncé; diffère de *melus* par ses parties supérieures moins foncées et la partie antérieure du dessous brunâtre, moins grise également sur les côtés. — Aile : (mâle) 89 à 94, rarement 97 (en général 90 à 92 millimètres); (femelle) 84 à 87,5 millimètres.

XIX — ORIOLIDÆ

ORIOLOUS *Linne* 1766

1. *galbula* (Linne), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 107; 1766, p. 160; Dresser, III, p. 365, pl. 144; *garrulus* Brehm, 1831.

Europe, du 63° latitude Nord à la Méditerranée et au Caucase, à Madère et aux Açores; émigre en hiver en Afrique jusqu'au Sud et Madagascar; en Asie jusqu'à la Perse.

XX — TURDIDÆ

PYCNONOTUS (1) *Boit* 1828

Ixos Temm., 1840.

1. *Turdus barbarus* Desf., Mém. Acad. Roy. Sciences, 1787 (1789), p. 500, pl. III; Dresser, III, p. 353, pl. 142; *obscurus* Temm., 1840.

Afrique Nord, du Maroc à la Tunisie; pris une ou deux fois dans l'Espagne Sud (?).

(1) Ce genre appartient, pour les modernes, à la famille des *Brachypodidae* dont la grande majorité des représentants est des régions chaudes de l'ancien continent.

Genre MERLE

1. *Turdus merula* Linné

MERLE NOIR

D. et G., I, p. 399.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

TURDUS Linné 1758

Merula Boié, 1822.

1. merula Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 170 ;
Dresser, II, p. 91, pl. 13.

Europe, du
Cercle Arctique
aux Pyrénées,
l'Italie
et la Russie ;
Iles Britanniques,
etc.

a. — hispaniæ Kleinschmidt, Falco, 1909, p. 22.

Espagne.

Se distingue du type par ses ailes obtuses (les rémiges 3 à 5 étant plus courtes que chez le type) et sa queue relativement plus allongée. Aile (mâle) : 120,3 à 120,7 millimètres.

b. — cabreræ Hartert, Nov. Zool., VIII, 1901, p. 313 ;
1902, p. 326 ; *canariensis* Madarasz, 1903.

Madère, Canaries
Ouest (l'Énériffe,
Grande Canarie,
Palma,
Hierro, Gomera).

Diffère du type par le noir plus foncé et plus brillant de son plumage, ses ailes remarquablement courtes, sa queue plus courte et plus forte, son bec d'ordinaire moins long, d'un orangé plus vif à l'époque de la reproduction. Aile 121 à 128 ; queue 100 à 110 millimètres. *Femelle*, dessus d'un brun plus enfumé que celle du type, plus foncé dessous. Le devant de la poitrine est olivâtre (non roussâtre), le bec souvent orangé comme celui du mâle. Aile (femelle) : 115 à 124 ; queue : 94 à 108 millimètres.

c. — azorensis Hartert, Nov. Zool., XII, 1905, p. 116.

Iles Açores
(Santa-Cruz, Gra-
ciosá), de la côte
jusque dans
les montagnes.

Voisin du *cabreræ*, mais la queue notablement plus courte, les ailes plus massives et plus arrondies. Aile : 117 à 125 ; queue : 90 à 102 millimètres. — *Femelle* ayant comme la précédente le dessus d'un brun enfumé, mais la gorge en

d. Sous-espèce nouvelle.

2. *Turdus torquatus* Linné

MERLE A PLASTRON

D. et G., I, p. 401.

a. Sous-espèce nouvelle.

partie blanchâtre, rayée de plus foncé, le devant de la poitrine lavé de roux-brun avec des taches plus foncées, l'abdomen d'une couleur moins uniforme et plutôt d'un brun ardoisé. Bec supérieur plus ou moins brun, le reste comme celui de *cabreræ*. Aile : (femelle) 112 à 122 ; queue : 90 à 100 millimètres.

d. — aterrimus Madarasz, Orn. Monatsber., XI, 1903, p. 186.

Mâle distinct du type de Suède par son plumage d'un noir plus pur et plus brillant et son bec plus grêle, jaune comme chez celui-ci. Aile : 123 à 134 ; queue 105 à 115 millimètres.

— *Femelle* distincte à première vue par ses parties inférieures plus ternes et plus pâles. La gorge est d'un blanc plus pur et les raies brunes plus régulières et plus nettes, avec une tache blanche, sans raies, sur le milieu du gosier. Le devant du cou est d'un roux brunâtre avec très peu de taches. La poitrine et le ventre sont d'un gris ardoisé sombre, les plumes de la poitrine avec des bordures claires. Aile : 118 à 125 ; queue : 95 à 110 millimètres.

2. torquatus Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 170 ; Dresser, II, p. 113, pl. 14 ; *montana* et *collaris* Brehm, 1831.

Europe Sud-Est,
Péninsule
des Balkans, Rou-
manie, Grèce,
Caucase ; Chypre,
Asie Mineure,
Perse Nord.

Europe Nord.
Scandinavie,
Grande-Bretagne,
Irlande, Iles Or-
cades ; émigre
jusqu'à la Médi-
terranée
et dans l'Afrique
Nord-Ouest.

a. — orientalis Seebohm, Ibis, 1888, p. 311.

Semblable au type, mais la bordure blanche des plumes du dessous et du dessus du corps encore plus large (ce qui est loin d'exister chez *alpestris*), mais surtout la bordure blanche des rémiges et des grandes couvertures alaires plus large, ce qui fait paraître l'aile plus blanche. La bordure brillante du bord interne des rémiges est aussi plus marquée. Aile (mâle) : 137 à 147 millimètres.

Caucase Nord
et Sud. Perse
Nord et parties
montagneuses de
la Transcaspië.

b. Sous-espèce nouvelle.

[**Turdus pallidus** Gmel.

MERLE PALE

D. et G., I, p. 402.]

[**Turdus olivaceus** Linné

MERLE OLIVE

D. et G., I, p. 405.]

[**Turdus migratorius** Linné

MERLE ERRATIQUE

D. et G., I, p. 406.]

3. Turdus pilaris Linné

MERLE LITORNE ou GRIVE LITORNE

D. et G., I, p. 407.

- b. **alpestris** Brehm, Isis, 1828, p. 1281; Handb. Naturg. Vög. Deuts., 1831, p. 377.

Diffère du type par les plumes des parties inférieures qui sont plus largement bordées de blanc, et qui ont dans leur milieu une tache blanche, grande ou petite, allongée en fer de lance; les couvertures inférieures de la queue portent de larges raies blanches. — La plupart des spécimens sont faciles à reconnaître à première vue, mais lorsque les taches blanches sont étroites et peu accusées, on peut confondre cette forme avec *torquatus*.

Europe Centrale et Sud (dans les montagnes, des Pyrénées et Sierras d'Espagne aux Alpes, Sudètes, Carpathes, Balkans, Monténégro (mais non en Grèce, où la forme du Nord vient en hiver); Asie Mineure; signalée en Belgique, Luxembourg, pres d'Osnabrück, etc.

[Cette espèce n'est plus admise comme européenne par les Ornithologistes modernes.]

Sibérie et Japon (espèce exclusivement asiatique).

[Espèce africaine qui n'est plus considérée comme européenne par les Ornithologistes modernes.]

Afrique Australe, Abyssinie.

[Espèce américaine qui n'est plus considérée comme européenne par les Ornithologistes modernes.]

Amérique du Nord.

3. **pilaris** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 168; Dresser, II, p. 11, pl. 4, 5.

Europe et Asie Nord, des Tundras à la Pologne et la Thuringe; émigre en hiver dans toute l'Europe jusqu'aux Canaries, l'Afrique Nord, l'Asie Mineure et l'Inde Nord-Ouest.

4. *Turdus fuscatus* Pallas

MERLE BRUN

D. et G., I, p. 409.

5. *Turdus naumanni* Temm.

MERLE DE NAUMANN

D. et G., I, p. 410.

6. *Turdus ruficollis* Pallas

MERLE A COU ROUX

D. et G., I, p. 412.

7. *Turdus atrigularis* Temm.

MERLE A GORGE NOIRE

D. et G., I, p. 415.

8. *Turdus sibiricus* Pallas

MERLE SIBÉRIEN

D. et G., I, p. 416.

4. **fuscatus** Pallas, Zoogr. Rosso-As., I, 1827, p. 451, pl. 12; ? *dubius* Bechst., Naturg. Deuts., 1795, IV, p. 240; Dresser, II, p. 63, pl. 7.
- Sibérie Nord; en hiver émigre vers le Sud de l'Asie; s'égare en Europe Sud, Italie, France Sud, Allemagne, Norwège, Angleterre, etc.
5. **naumanni** Temm., Man. d'Orn., I, 1820, p. 170; Dresser, II, p. 59, pl. 6.
- Sibérie Nord; en hiver émigre vers le Sud de l'Asie, s'égare en Europe, Allemagne, Hollande, Italie, France Sud, etc.
6. **ruficollis** Pallas, Reis. Russ. Reichs., III, 1776, p. 694; Dresser, II, p. 67, pl. 8.
- Sibérie Est; en hiver émigre dans l'Asie Centrale et jusqu'en Allemagne et à Hëlîgoland.
7. **atrîgularis** Temm., Man. d'Orn., I, 1820, p. 169; Dresser, II, p. 83, pl. 2.
- Sibérie Ouest; en hiver émigre dans l'Asie Centrale et jusqu'en Arabie; en Europe, Finlande, Norwège, Allemagne, Autriche, Ecosse, Angleterre, France, Italie.
8. **sibiricus** Pallas, Reis. Russ. Reichs., III, 1776, p. 694; Dresser, II, p. 19, pl. 12; *atrocyaneus* Homeyer, 1843.
- Sibérie Nord; en hiver émigre dans l'Asie Centrale et Méridionale, les îles Malaises; en Europe s'égare en Allemagne, Hollande, France, Angleterre, Bulgarie.

9. *Turdus viscivorus* Linné

MERLE DRAINE

D. et G., I, p. 418.

10. *Turdus aureus* Hollande

MERLE DORÉ

D. et G., I, p. 420.

11. *Turdus iliacus* (1) Linné

MERLE MAUVIS

D. et G., I, p. 421.

12. *Turdus musicus* Linné

MERLE GRIVE

D. et G., I, p. 422.

(1) D'après Hartert (Vög. Pal. Faun., 1910, p. 653), cette espèce est (d'après la description) le véritable *T. musicus* de Linné dans la 10^e édition de 1758.

9. **viscivorus** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 168; Dresser, II, p. 3, pl. 1; *major*, *arboreus*, *meridionalis* (part.) Brehm, 1855.
- Europe Nord et Centrale et dans les Montagnes du Sud-Europe. Corse, Sardaigne, Sicile, Oural; passe l'hiver sur le pourtour de la Méditerranée.
10. **aureus** Hollandre, Faune de la Moselle, 1825, p. 60; Seebohm, Mon. Turd., pl. 1; *dauma* (1) *aureus* Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1910, p. 642; *whitei* Eyton, 1836 (*Oreocinclu* des Auteurs); *varius* Pallas, 1827.
- Sibérie Est jusqu'au Japon; émigre en Chine, Formose, Philippines; Europe, Russie, Scandinavie, Autriche, Italie, France, Îles Britanniques, Héligoland, Allemagne.
11. **musicus** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 169; *iliacus* Linné, 1766 (nec 1758); Dresser, I, p. 35, pl. 3; *musicus* Hartert, 1910; *coburni* Sharpe, 1901.
- Europe et Asie Nord. Islande, Spitzberg, Scandinavie, Russie Nord, Allemagne, Pologne Nord, montagnes de l'Europe Centrale; émigre en Europe Sud, Madère, Canaries; Afrique Nord et Asie Sud.
12. **philomelos** Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deuts., 1831, p. 382; *musicus* Linné 1766 (nec 1758) et Auctorum Recent.; Dresser, II, p. 19, pl. 2.
- Europe entière et Sibérie, du 60° latitude Nord jusqu'aux Pyrénées, aux Monts Cantabriques, aux Alpes, aux Apennins, au Caucase, à la Grèce; émigre au pourtour de la Méditerranée, aux Canaries, en Afrique Nord, en Perse.

(1) Le type de l'espèce (*T. dauma dauma* Latham, 1790) est des hautes montagnes de l'Himalaya. Il est plus petit, avec seulement douze rectrices.

a. Sous-espèce nouvelle.

[**Turdus minor** Gm.

MERLE GRIVETTE

D. et G., I, p. 424.]

[**Turdus solitarius** Wils. et **Turdus swainsoni** Cab.

D. et G., I, p. 426 et 427.]

13. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

MERLE OBSCUR

a. — **clarkei** Hartert, Bull. Brit. Orn. Club., XXIII, 1909, p. 54.

Grande Bretagne
et ses îles,
Irlande.

Le dessus du corps est d'un brun plus chaud et plus roussâtre, particulièrement sur le croupion (les spécimens du Continent ont cette partie d'un brun-olivâtre avec le croupion gris-verdâtre). Le roux-jaunâtre de la gorge s'étend jusque sur les flancs. Le dessous est plus richement tacheté (ce qui frappe surtout sur une partie des oiseaux qui nichent aux Hébrides et qui ont en outre le dessus plus foncé; quand on aura des séries plus complètes, il y aura peut-être lieu de faire de ces derniers une sous-espèce distincte).

[Espèce américaine qui n'est plus considérée comme européenne par les Ornithologistes modernes.]

Amérique du
Nord.

[Ces deux espèces américaines ne sont plus admises dans la faune européenne.]

Amérique du
Nord.

13. **obscurus** Gmel., Syst. Nat., 1789, I, 2, p. 816; Dresser, II, p. 71, pl. 8; *rufulus* Drapiez, Dict. Class., 1826, X, p. 443; *pallens* Pall., 1827; *wernerii* Géné, 1834; *dauidianus* A. M.-Edw., 1865; *pallidus* Temm. (nec Gm.).

Sibérie,
du Ténisséi
au Kamchatka;
émigre en Asie
Sud, Japon,
Malaisie, Philip-
pines, Inde, Tur-
kestan, Europe :
Italie, France
Sud, Hollande,
Allemagne,
Héligoland ?

Tête et cou d'un brun ardoisé; le reste des parties supérieures d'un brun olivâtre; ailes et queue brunes, les rectrices externes terminées de blanc; une raie sourcilière blanchâtre. Menton et une tache sous les yeux blancs; poitrine et flancs d'un fauve orangé; le reste du dessous blanc. Plumes axillaires et couvertures alaires grises. Bec brun avec la mandibule inférieure jaune pâle; iris brun. Aile : 123 à 130 millimètres. — La *female* est plus terne avec la tête et le cou bruns, la raie oculaire d'un blanc fauve, le menton, la poitrine et les côtés du cou d'un blanc sale. — Le *jeune* est

Genre ROUGE-GORGE

1. *Rubecula familiaris* Blyth.

ROUGE-GORGE FAMILIER

D. et G., I, p. 429.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

en dessus olivâtre tacheté d'ocre, les plumes noires à leur pointe; le dessous blanc, tacheté de brun sur la gorge et la poitrine; les flancs d'un orangé sale; la raie sourcilière indistincte.

ERITHACUS *Cuvier* 1801

Rubecula Brisson, 1760; *Dandalus* Kléinschmidt.

1. **rubecula** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 188; 1766, p. 337; Dresser, II, p. 329, pl. 51; *dandalus* Brehm, 1828.

Europe, du 68° latitude Nord à la Méditerranée et de l'Atlantique à l'Oural; Sibérie Ouest, Turkestan.

- a. — **microrhynchus** Reichen., Journ. f. Orn., 1906, p. 153.

Madère.

Diffère du type par son bec plus petit, la nuance moins verte, plus brunâtre des parties supérieures. Aile : 69 à 72 millimètres.

- b. — **superbus** Kœnig, Journ. f. Orn., 1889, p. 183; 1890, pl. III.

Ténériffe et la Grande Canarie (de 130 à 700 mètres).

Dessus plus foncé, d'un brun plus olivâtre que le type d'Europe (non roux-brun comme *melophilus*); le plastron rouge de la gorge bordé d'une bande grise qui se prolonge sur les côtés du cou; d'ordinaire aussi, une grande partie du dessus du corps présente une teinte d'un gris cendré. Le roux du plastron très foncé, encore plus rougeâtre que chez *melophilus*. Flancs très clairs. Dessous jusqu'à la poitrine blanc sans teinte crème, qui se montre seulement sur le ventre. Bordure interne des rémiges d'un ocre jaunâtre vif. Deuxième rémige à peine plus longue que les rémiges

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

secondaires, les 4^e à 6^e rémiges à peu près égales, la 7^e moins longue que la 6^e et presque aussi longue que la 3^e, de sorte que l'aile est obtuse. Aile : 65 à 72 millimètres. — Les spécimens des Canaries Ouest (Gomera, Palma, Hierro), examinés par Hartert, appartiennent peut-être à cette forme, mais sont de plus grande taille. Aile : 70 à 75 millimètres (Les spécimens de Fuerteventura ne sont que de passage, et se rattachent au type d'Europe).

c. **melophilus** Hartert, Nov. Zool., 1901, p. 317.

Diffère du type par ses parties supérieures plus foncées, tirant sur le roux-brun, sa gorge d'un roux plus brunâtre. Les flancs sont d'un roux-brun plus foncé, de telle sorte qu'il y a très peu de blanc sur les parties inférieures. Couvertures inférieures de l'aile d'un roux-jaunâtre, tachetées sur le bord de roux-rouge. Couvertures inférieures de la queue roux clair. Bec plus épais et plus massif. La pointe de l'aile obtuse, arrondie, mais variable. Aile : 71 à 76 millimètres.

Iles Britanniques, y compris l'Irlande, les Orcades, les Hébrides.

d. — (**dandalus**) **sardus** Kleinschm., Falco, 1906, p. 71.

Dessus plus foncé que le type, plus olivâtre (et moins roux-brun). Taille du type. Gorge et poitrine presque aussi rouge-brun que chez *melophilus*. Couvertures supérieures de la queue et base des rectrices à peine ou pas plus rousses que le dos. — (Sédentaire en Sardaigne où le type du continent se montre en hiver.) — Aile 70 à 74 millimètres (1).

Sardaigne, Corse (dans les montagnes, à 750 et 1.000 mètres).

(1) Il est possible que les spécimens du Sud de l'Espagne se rattachent à *E. r. whiterbyi* Hartert d'Algérie, qui ressemble à *melophilus* par sa gorge d'un roux-brun foncé. D'ailleurs, le *rubidus* type est de passage en Algérie.

e. Sous-espèce nouvelle.

Genre ROSSIGNOL

1. *Philomela luscini* (Linné)

ROSSIGNOL ORDINAIRE

D. et G., I, p. 131 (1) (*partim*).

(1) Les deux espèces de Rossignol semblent confondues ou mal délimitées géographiquement dans Degland et Gerbe.

e. — **caucasicus** Buturlin, Orn. Monatsb., 1907, p. 9.

Caucase,
versant Nord
et versant Sud.

Intermédiaire entre le type d'Europe continentale et *E. r. hyrcanus* (de Perse). Semblable à ce dernier (qui est d'un roux foncé dessus), mais en différant par la base de la queue d'un roux-rouge moins vif et moins étendu, la teinte plus brune, moins intense du dos (qui se rapproche de celle du type), et le plastron plus pâle, d'un roux ocracé. Bec plus long que *rubecula* mais plus court qu'*hyrcanus*. — Les spécimens en habit de noces usé sont difficiles à distinguer de *rubecula*.

LUSCINIA Forster 1817

Philomela Selby, 1833; *Daulias* Boié, 1831;
Calliope Gould.

1. **luscinia** Linné Syst. Nat., Ed. X, 1858, p. 184;
Dresser, II, p. 363, pl. 56, fig. 1 et 2; *philomela* Bechst., 1795; *luscinia* B., *major* Gm., 1789.

La première rémige est toujours plus courte que les couvertures primaires (tectrices antérieures).

Europe Nord,
du Sud de la Finlande au Nord-Est de l'Allemagne, la Pologne, la Russie jusqu'à l'Oural, la Crimée, le Caucase Nord; Sibérie, Turkestan. A l'automne, émigre dans l'Afrique Est; s'égare rarement dans l'Europe Ouest.

2. *Philomela major* (Shewenck) ?

ROSSIGNOL PROGNÉ

? D. et G., I, p. 432 (partim).

(1)

3. *Calliope camtschatkensis* (Gm.)

CALLIOPE DU KAMTSCHATKA

D. et G., I, p. 464 (2)

(1) Sous-espèce nouvelle : *Luscinia megarhynchos corsa* Parrot (Corse). — Voyez l'APPENDICE.

(2) Cette espèce, type du genre *Calliope* de Gould, classée par Degland et Gerbe près du genre *Saxicola*, doit être placée ici, dans le genre *Luscinia* et près du genre *Cyanecula* qui diffère à peine de *Luscinia*.

2. **megarhynchus** Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deuts., 1831, p. 356; *media*, *okeni*, *peregrina*, *minor*, *vera* Brehm, 1831-1855; *schuchii* Schinz, 1810.

La première rémige est plus longue que les couvertures primaires, ou tout au moins aussi longue. Bec plus long et plus grêle que celui de *lusciniæ*.

Europe Centrale, de la Mer du Nord à la Méditerranée; Angleterre (pas en Ecosse ni en Irlande), Europe Ouest et Sud, Iles de la Méditerranée; Afrique Nord-Ouest, Asie Mineure, Grèce, Crète, Russie Sud, Grèce; en hiver s'avance jusqu'à la Côte d'Or et l'Abyssinie.

3. **calliope** Pallas, Reis. Russ. Reichs., III, 1776, p. 697; *camtschatkensis* Gm., 1789; *lathamii* Gould, 1837; *ignigularis* Dubois, 1862; *camtschatkensis* (*Calliope*) Dresser, II, p. 341, pl. 52.

Dessus brun teinté d'olivâtre, la tête plus foncée; une ligne passant du front sur l'œil et une moustache blanches; lores et dessous de l'œil noirs; devant du cou et gorge d'un rouge vif bordé de gris ardoisé foncé; haut de la poitrine d'un gris brunâtre; bas de la poitrine et flancs d'un fauve gris; le reste du dessous blanc. Bec brun, blanchâtre à la base; pieds d'un brun plombé, iris brun — La *femelle* n'a pas la gorge rouge mais d'un blanc sale, et n'a pas de moustache blanche; le reste du dessous est brun clair, le ventre blanc. Le *jeune* est tacheté. — Aile (mâle) : 74 à 83 millimètres.

Sibérie jusqu'aux îles Kouriles, Mongolie; émigre en hiver dans l'Asie Méridionale jusqu'au Japon et aux Philippines; s'égare en Europe; Oural, Grèce, Caucase, France Sud, Italie et même Angleterre.

Genre GORGE-BLEUE

1. *Cyanecula suevica* (Linné)

GORGE-BLEUE SUÉDOISE

D. et G., I, p. 334.

et

Var. *Cyanecula caerulecula* (1) Pallas

GORGE-BLEUE ORIENTALE

D. et G., I, p. 437.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

(1) D'après Hartert, « *caerulecula* » Pallas n'est qu'un nouveau nom pour la *suevica* de Linné, et non une forme distincte.

CYANECULA *Brehm* 1828

Luscinia (part.) Hartert, 1910; *Erythacus* Auct.

1. **suecica** (ou **suevica**) Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 187; Dresser, II, p. 317, pl. 49 et 50, fig. 2; *cerulecula* Pallas, 1811-1831; *orientalis* Brehm, 1831.

La tache de la gorge est variable du rouge au blanc, ou blanche avec le milieu rouge ou presque obsolète, mais la gorge n'est jamais complètement bleue.

- a. — **gaetkei** Kleinschm., Journ. f. Orn., 1904, p. 302.

Diffère du type par une plus grande taille, notamment la pointe de l'aile plus longue, le dessus du corps d'un brun plus foncé, et dans son ensemble tout le plumage plus foncé. Aile (mâle) : 76 à 81 millimètres (Pointe de l'aile : 17 à 20, au lieu de 15 à 17 millimètres chez le type).

- b. — **cyanecula** Wolf, in Meyer et Wolf, Taschenb. d. Deuts. Vögl., 1810, I, p. 240; *wolffi* Brehm, 1822; Dresser, II, p. 311, pl. 47, 48 et 50, fig. 1; *suecica* Naum., II, p. 414, pl. 75, fig. 3, 4 (nec L.).

Dessus brun, lores et région auriculaire d'un brun foncé; une raie sur l'œil d'un blanc fauve; ailes, rectrices médianes et partie terminale des latérales brun foncé avec la base châtain. Joues, menton, gorge et haut de la poitrine d'un riche bleu d'outremer avec une large tache centrale blanche, quelquefois également bleue, bordée en-dessous de noir et de bai. Le reste des parties inférieures, les flancs et les cou-

Laponie, Suède, Russie Nord; Sibérie Ouest jusqu'au Lémissé; en hiver émigre dans l'Est de l'Europe, la Transcaspie et l'Inde Ouest.

Norvège (dans les montagnes); émigre au Sud: Laponie, Hollande, Allemagne Ouest, Grande Bretagne, France, Espagne; hiverne en Afrique Nord.

Europe Centrale, France, Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne, Pologne, Autriche, Hongrie, Russie Est jusqu'à Pétersbourg; émigre en Espagne, France Sud, Italie; Afrique Nord-Ouest, plus rare à l'Est.

c. Sous-espèce nouvelle.

Genre ROUGE=QUEUE

1. *Ruticilla phœnicura* (Linné)

ROUGE-QUEUE DE MURAILLE

D. et G., I, p. 438.

vertures inférieures d'un blanc fauve. Bec, pieds et iris brun.

— *Femelles* plus pâle, le dessous d'un blanc fauve avec une bande d'un brun foncé en travers de la poitrine; les vieilles femelles ont cependant des taches bleues sur la gorge et la poitrine. — *Jeunes* semblables aux femelles. Aile (mâle) : 71 à 81 millimètres.

c. — *volgæ* Kleinschm., Falco, III, 1907, p. 47.

Tache médiane de la gorge ordinairement blanche (cependant variable et quelquefois rousse avec une bordure blanche, ou tout entière d'un rougeâtre foncé). Les spécimens à tache rouge se confondent avec *suevica* sauf que la tache est plus petite, surtout plus étroite. Le bleu de la gorge, au premier printemps, est plus pâle; en été, plus foncé. Les lores ont quelquefois un reilet bleuâtre. Aile : 70 à 74 millimètres.

Russie Sud,
Volga inférieur
(au Nord
jusqu'à Moscou),
Transcaspie
Ouest; émigre
en Égypte.

PHÆNICURUS *Forster* 1817

Ruticilla Brehm, 1828.

1. *phœnicurus* (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 187; Dresser, II, p. 227, pl. 41; *ruticilla* Gould, Birds of Eur., II, pl. 95; *erithacus* et *tithys* Linné, 1758 (la femelle); *nigra* Giglioli (mélanisme accidentel).

Europe,
du Cap Nord
à la Méditerranée
(au Sud seulement
dans les mon-
tagnes); Russie
sauf les Steppes
et la Crimée;
Sibérie; émigre à
travers le Cau-
case, en Asie Mi-
neure et Afrique
Nord et Ouest.

a. Sous-espèce nouvelle.

2. *Ruticilla tithys* (Scop.)

ROUGE-QUEUE TITHYS

D. et G., I, p. 440 (partim).

a. Sous-espèce occidentale

(*Ruticilla tithys*, D. et G., partim).

3. *Ruticilla erythrogastra* (Güldenst.)

ROUGE-QUEUE A VENTRE ROUX

D. et G., I, p. 444.

(1)

(1) Sous-espèce nouvelle : *Ruticilla semenowi* Sarudny (Russie Est, Orenbourg). — Voyez l'APPENDICE.

- a. — **mesoleuca** Hempt. et Ehreimb., Symbol. Phys., 1832, fol. cc; Dresser, II, p. 285, pl. 42.

Diffère du type par une tache alaire blanche (miroir) très nette; les parties supérieures plus foncées, les parties inférieures d'un orangé plus vif. Aile (mâle) : 77 à 83 millimètres.

Crimée, Caucase, Asie Mineure, Perse; s'égare en Turquie, Grèce, Hongrie, très rarement à Hëlîgoland et à Alger.

2. **ochruros** (Gmel.), Reis. d. Russl., 1775, III, p. 101, pl. 19, fig. 3; *tilys* Scop. (nec Linné), 1769; Dresser, II, p. 39, pl. 642.

Caucase, Arménie, Perse Nord-Ouest (race orientale du *Tithys* d'Europe).

Diffère de la Sous-Espèce a par son dos noir (non ardoisé), cette couleur s'étendant jusque sur la poitrine, et par son abdomen d'un roux châtain (et non gris).

- a. — **gibraltariensis** (Gmel.), Syst. Nat., I, 1789, p. 987; *tithys* Dresser, II, p. 293, pl. 29; *cairei* Gerbe, 1848; *tithys* Auctorum plurim. (nec Linné).

Europe, de la Mer du Nord et de la Baltique à la Méditerranée et à la Russie et la Roumanie, accidentel en Crimée; de passage en Corse et Sardaigne, en Angleterre; émigre dans l'Afrique Nord-Ouest, la Nubie, l'Asie Mineure; s'égare jusqu'en Scandinavie et en Islande.

C'est à cette forme occidentale que se rapporte la description de *Ruticilla tithys* (1) dans Degland et Gerbe (p. 440).

3. **erythrogastra** (Göld), Nov. Comm. Petrop., XIX, 1775, p. 469, pl. 16, 17; Dresser, IX, p. 43, pl. 643; *rufigularis* Moore, 1854; *ceramnia* Pall., 1811-1831.

Caucase, Transcaucasie et Asie jusqu'au Nord de la Chine.

(1) La *Motacilla tilys* de Linné paraît être la femelle de *Phœnicurus phœnicurus*, si l'on s'en rapporte à sa description.

Genre PÉTRROCINCLE

1. *Petrocincla saxatilis* (Linné)

PÉTRROCINCLE DE ROCHE

D. et G., I, p. 446.

2. *Petrocincla cyanea* (Linné)

PÉTRROCINCLE BLEU

D. et G., I, p. 447.

Genre TRAQUET

1. *Saxicola œnanthe* (Linné)

TRAQUET MOTTEUX

D. et G., I, p. 450.

MONTICOLA *Boie* 1822*Petrocincla* Vigors, 1825.

1. *saxatilis* (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 294 ;
Dresser, II, p. 129, pl. 16, 17.

Europe Centrale
et Sud (dans
les montagnes),
Harz, Taunus,
etc., Vosges, Jura,
Alpes, Pyrénées,
Corse, Sicile,
Caucase, etc. ;
Afrique Nord,
Asie Mineure
jusqu'en
Chine Nord.

2. *solitarius* (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 170 ;
cyanus (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 296 ;
Dresser, II, p. 139, pl. 18.

Europe Centrale
et Sud (dans
les montagnes),
Alpes de Suisse,
Croatie, Dalmatie,
Monténégro,
Grèce, îles de
la Méditerranée,
Caucase ; s'égare
plus au Nord
(Belgique) : Perse,
Afrique Nord,
Oasis du Sahara.

SAXICOLA *Bechst.* 1802

1. *œnanthe* (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 186 ;
1766, p. 332 ; Dresser, II, p. 187, pl. 21.

Europe entière,
des Îles Britanniques à la mer
de Behring et à
l'Alaska ; au Sud
jusqu'aux Monts
Cantabres ; Asie
Mineure, Perse ;
émigre jusque
dans l'Afrique
tropicale.

a. Sous-espèce nouvelle.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

TRAQUET DÉSERTIQUE

3. *Saxicola saltator* Ménétr.

TRAQUET SAUTEUR

D. et G., I, p. 452.

a. **leucorrhœa** Gm., Syst. Nat., I, 2, 1789, p. 966.

Diffère du type par ses parties inférieures, particulièrement la gorge et le haut de la poitrine en costume d'automne, d'un roux vif, et ne devenant pas, à l'époque de la reproduction, aussi clair que chez le type. Taille supérieure. Aile de 5 à 12 millimètres plus longue (soit 98 à 111 millimètres). Patte plus longue de 2 millimètres; mais le bec n'est pas plus long. Les bordures brunes des rémiges sont presque abolies.

Groenland et Amérique Nord, Spitzberg, Islande, Iles Feroe; émigre à travers l'Europe Ouest (Angleterre, Hollande, etc., Canaries, Açores, Algérie), jusqu'au Sénégal.

2. **deserti** Rüpp., in Temm., Pl. Col., 1825, pl. 359, fig. 2; Dresser, II, p. 215, pl. 27.

Sommet de la tête, nuque, dos, scapulaires et grandes couvertures alaires isabelles; face, sourcils, croupion, couvertures inférieures de l'aile, poitrine et abdomen blancs; ailes noires, les rémiges bordées d'isabelle et de blanc; queue noire avec l'extrême base blanche; côtés de la tête, cou et gorge d'un noir brillant; flancs et poitrine lavés d'isabelle; bec et pieds noirs. — Aile : 87 à 92 millimètres. — *Femelle*, en dessus, plus grise et plus terne, le croupion lavé d'isabelle, les ailes brunes, la gorge et le dessous isabelle. — En hiver, le *mâle* est, en dessus, plus gris, et le noir de la gorge est atténué par la bordure crémeuse des plumes. — Cette espèce est bien caractérisée par le peu de blanc qu'elle porte à la base de la queue, en dessous.

Afrique Nord. Sahara, du Cap Blanc à l'Égypte et l'Arabie; Algérie; s'égare vers le Nord jusque sur les côtes d'Angleterre (Norfolk) et en Italie.

3. **isabellina** Cretzschm., Atlas zu Rüpp. Reis. Vög., p. 52, pl. 34, b; Dresser, II, p. 199, pl. 22; *saltator* Ménétr., Cat. Rais. Caucase, 1832, p. 30.

Russie Sud-Est, Asie Mineure jusque dans la Chine Nord-Ouest; émigre en Afrique, Arabie, Inde, Algérie; accidentel en Europe Sud-Est et jusqu'en Angleterre.

4. **Saxicola stapazina** (Gm.)

TRAQUET STAPAZIN

D. et G., I, p. 454.

a. **Saxicola aurita** Temm.

TRAQUET OREILLARD

D. et G., I, p. 455 (*partim*).

5. **Saxicola leucomela** (Pallas)

TRAQUET LEUCOMÈLE

D. et G., I, p. 457.

4. *hispanica* (Linné), Syst. Nat., Ed. X, I, 1758, p. 186; *stapazima* (Linné), Syst. Nat., 1766, p. 331; Dresser, II, p. 207, pl. 21 et 25, fig. 2; *rufa* Stephens, 1817; *aurita* (part.) Temm., 1820; *caterine* Whitaker, 1898.

Europe Sud-Ouest, dans la région méditerranéenne, France Sud, Savoie, Espagne, Italie, Istrie, îles de la Méditerranée; Afrique Nord-Ouest; émigre jusqu'au Sénégal; accidentel à Heligoland et en Angleterre.

- a. — *xanthomelaena* Hempr. et Ehr., Symb. Phys. Aves, 1833, fol. c, aa. n° 6; *eurymelaena* H. et E., loc. cit., 1833, n° 9; *melanoleuca* (part.) Dresser, II, p. 211, pl. 26 et 25, fig. 1 (specimens ex Asia minori, nec ex Georgia [1], Persia); *aurita* var. *libyca*; *amphileuca* H. et E., 1833, n° 4; *albicilla* Müller, 1851.

Russie Sud, Crimée, Bulgarie, Turquie, Monténégro, Grèce, Dalmatie, Croatie, Italie Sud; Asie Mineure, Palestine; émigre en Afrique Nord-Est, Égypte, Abyssinie, Soudan Est, s'étendant jusqu'en Algérie.

5. *pleschanka* Lepechin, Nov. Comm. Petrop., 1770 (1771), XIV, p. 503, pl. 24; *leucomela* Pall., l. c., 1771, p. 584, pl. 22, fig. 3; *morio* Hempr. et Ehr., 1828; Dresser, II, p. 235, pl. 33, fig. 1; *somalica* Sharpe, 1896, Dresser, IX, pl. 637 (V. pour la synonymie : Hartert Vög. Pal. Fauna, I, p. 688) [2].

Russie Sud, d'Orenbourg et du cours moyen du Volga à la Crimée, Caucase; Transcaspië, Perse jusqu'en Chine Nord; émigre en Afrique Nord-Est; s'égare en Italie, à Heligoland.

(1) Le véritable *Saxicola melanoleuca* Gûldenst. ne se montre pas au Nord du Caucase, et c'est à tort qu'on a appliqué ce nom à la forme orientale d'*hispanica*, qui est la présente sous-espèce.

(2) *Saxicola lugens* Licht., 1823 (Degland et Gerbe, I, p. 158), est une forme asiatico-africaine (Algérie, Égypte, Syrie), qui n'appartient pas à la faune d'Europe, et qui a pu être confondue avec d'autres espèces; elle est figurée par Dresser, II, pl. 33, 2 (sous le nom de *leucomela*).

6. Saxicola leucura (Gmel.)

TRAQUET RIEUR

D. et G., I, p. 459.

Genre TARIER**1. Pratincola rubetra** (Linné)

TARIER ORDINAIRE

D. et G., I, p. 461.

a. Sous-espèce nouvelle.

6. **leucurus** (Gmel.), Syst. Nat., I, 2, 1789, p. 820 ;
Dresser, II, p. 247, pl. 36 ; *cachinnans* Temm.,
1820.

Espagne, Portugal, France Sud,
Italie, Sicile.

PRATINCOLA Koch 1816

1. **rubetra** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, I,
p. 186 ; 1766, p. 332 ; Dresser, II, p. 255,
pl. 37, 38.

Europe, du 70^e
latitude Nord,
Scandinavie, Russie,
Iles Britanniques, à la Méditerranée (mais
ne dépassant pas
les chaînes de
montagnes d'Espagne
Nord et d'Italie) ; émigre
en Grèce,
Afrique Nord et
tropicale.

- a. **spatzi** Erlanger, Journ. f. Orn., 1900, p. 101 ;
dalmatica Kollibay, 1903.

Dalmatie (où
il niche) ; émigre
dans le Sud
de l'Algérie.

Plumage plus clair que celui du type, la bordure des plumes du dessus plus pâle, plutôt jaune-brun que rouge-brun ; le dessous plus clair. Cette différence se voit déjà immédiatement après la mue ; les spécimens du type du Nord en plumage d'été fané sont aussi plus clairs, mais, par suite de l'usure du bord des plumes, le noir prédomine sur le dos. Quelques spécimens en plumage nouveau sont cependant assez pâles, et se rapprochent de la teinte de *P. r. spatzi*.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

2. *Pratincola rubicola* (Linné)

TARIER RUBICOLE

D. et G., I, p. 462.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. — **noskæ** Tschusi, Orn. Jahrb., 1902, p. 234.

Caucase Nord
(vraisemblable-
ment
aussi en Perse
Nord Ouest).

Semblable à *P. r. spatzi* mais le bord des plumes du dessus encore plus clair et d'un jaune-gris brunâtre. En outre, les taches allongées d'un brun noirâtre sur le dos paraissent plus grandes, et l'oiseau, en général, a toutes ses dimensions plus grandes. Aile (mâle) : 80 à 81 et 82 millimètres.

c. — **dacotiæ** Meade-Waldo, Ibis, 1889, p. 504, pl. 15; Dresser, IX, 1895, p. 37, pl. 640.

Ile Fuerteventura
(Canaries Est).

Dessus d'un brun noirâtre, les plumes ayant leur bordure plus claire; sommet de la tête et nuque plus foncés; lores et côtés de la tête noirs; une raie sourcilière blanche. Ailes et queue brunes avec une bordure blanche; une tache alaire blanche. Dessous blanc avec une tache d'un roux pâle à la poitrine. Bec et pieds noirs. Aile : 60 à 63 millimètres. — La femelle est plus pâle et plus terne surtout sur la tête, et la tache de la poitrine est presque obsolète.

2. (**torquata**) [1] **rubicola** (Linné), Syst. Nat., 1766, p. 332; Dresser, II, p. 263, pl. 39 et 40.

Europe Continen-
tale du Sud
de la Suède à la
Méditerranée avec
ses îles; émigre
en Afrique Nord
et Palestine.

a. — **hibernans** Hartert, Journ. f. Orn., 1910, p. 173.

Iles Britanniques
(où elle est
sédentaire).

Diffère de *rubicola* en plumage d'automne par la bordure des plumes du dessus qui est plus foncée, d'un rouge-brun; par la couleur du dessous plus foncée, d'un brun châtain pur sur la poitrine; cette couleur rouge-brun se montre déjà sur les jeunes encore au nid. Le plumage d'été ne devient pas plus clair, mais conserve la bordure d'un rouge-

(1) Le type (*Muscicapa torquata* L.) est africain, et le nom de « *torquata* » a la priorité (de quatre pages) dans le *Systema naturæ* de 1766.

b. Sous-espèce nouvelle.

3. Espèce nouvelle
(pour l'Europe).

Genres ACCENTEUR et MOUCHET

1. *Accentor alpinus* (Gmel.)

ACCENTEUR DES ALPES

D. et G., I, p. 466.

brun sur les plumes du dessus, et les côtés du corps ne deviennent pas aussi clairs que chez *rubicola*. Aile (mâle) : 66 à 68 millimètres.

- b. — **maura** (Pallas), Reiss. Russ. Reichs., II, 1773, p. 708; Gould, Birds of Asia, IV, pl. 34.

Diffère de *rubicola* par ses couvertures supérieures de la queue qui sont d'un blanc pur, sans taches, par ses couvertures caudales inférieures et axillaires plus noires, et par sa taille un peu moindre. Aile (mâle) : 68,5 à 72,5, exceptionnellement 74 à 78 millimètres.

3. (**caprata**) **rossorum** Hartert, Journ. f. Orn., 1910, p. 180; Dresser, IX, 1895, pl. 641.

Dessus, toute la tête, le cou, la gorge, la poitrine et les flancs, les ailes et la queue d'un noir brillant (mâle). Grandes couvertures de l'aile, couvertures caudales supérieures et inférieures et dessous du corps blancs. Les plumes de la poitrine, en plumage frais après la mue, ont une bordure d'un brun blanchâtre. Aile : 73 à 78 millimètres. — *Femelle*, dessus d'un brun plus ou moins foncé avec le milieu des plumes plus foncé, les couvertures caudales roussâtres. Ailes brun foncé à bordure d'un roux pâle. Dessous brun clair, la gorge d'un brun blanchâtre.

Russie Sud-Est, Oural inférieur jusqu'à Orenbourg, Caucase; Transcaucasie, Perse; émigre en Afrique Nord-Est, Abyssinie et en Arabie Sud.

Espèce asiatique (Transcaspië), signalée une seule fois en Russie, près la rivière Sakmara, affluent de l'Oural.

PRUNELLA Vieill. 1816

Accentor (1) Bechst., 1802.

1. **collaris** (Scop.), Annus I Histor.-Natur., 1769, p. 131; Dresser, III, p. 29, pl. 99; *alpinus* Gm., 1789; Naumann et Auct.

Montagnes d'Europe Sud; Pyrénées, Alpes, Carpathes, Monts des Géants, Apennins, Sicile, Espagne; en hiver s'avance jusqu'en Belgique, Angleterre, Heligoland.

(1) Ce nom, préoccupé, a dû être remplacé par *Prunella*.

a. Sous-espèce nouvelle.

(1)

b. Sous-espèce nouvelle.**2. *Prunella modularis* (Linné)**

MOUCHET CHANTEUR

D. et G., I, p. 168.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Accentor collaris tschusii*, Schiebel (Corse). — Voyez l'APPENDICE.

- a. — **subalpina** Brehm, Handb. Naturg. Vog. Deuts., 1831, p. 1009; *reiseri* Tschusi, Orn. Monatsb., 1901, p. 131.

Dalmatie
et Péninsule des
Balkans jusqu'à
la Grèce.

Diffère du type par son dessus plus franchement gris, presque sans mélange de brun. La partie tachetée du dos est un peu moins étendue. Poitrine plus claire, franchement grise, les taches d'un rouge-brun des côtés s'étendant moins sur la poitrine et un peu plus pâles. Ordinairement la 4^e rémige aussi longue que la 3^e (chez le type, elle est, le plus souvent, plus courte de 1 à 2 millimètres).

- b. — **caucasica** Tschusi, Orn. Mon., 1902, p. 186;
hypanis Tschusi, l. c., 1903, p. 135.

Caucase Nord,
Asie Mineure
(Taurus).

Dessus aussi clair que chez *subalpinus* mais avec une légère teinte jaunâtre; les taches presque limitées à la partie antérieure du dos, à l'automne manifestement; en plumage de noce plus faiblement marquées et presque obsolètes. Scapulaires plus pâles. Bordure des couvertures supérieures de la queue jaunâtre, et non blanche. Le roux des flancs plus ou moins étendu.

2. **modularis** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 184;
Dresser, III, p. 39, pl. 100; *plumbea* Pall.,
1764; *pinetorum* Brehm, 1831.

Europe, du 70^o
latitude Nord à
la Méditerranée,
à l'Oural et la
Mer Noire; Corse
et Sardaigne
(dans les monta-
gnes); émigre
l'hiver en Afrique
Nord, Asie Mi-
neure; accidentel
seulement dans
l'Angleterre Est.

a. Sous-espèce nouvelle.

3. *Prunella montanella* (Pallas)

MOUCHET MONTAGNARD

D. et G., I, p. 470.

Genres FAUVETTE et BABILLARDE

1. *Sylvia atricapilla* (Linné)

FAUVETTE A TÊTE NOIRE

D. et G., I, p. 473.

a. Sous-espèce nouvelle.

a. **occidentalis** Hartert, Brit. Birds, 1910, p. 313.

Gorge et haut de la poitrine gris foncé; milieu du dessous du corps moins manifestement blanchâtre que chez le type; couleur fondamentale des flancs plus foncée, de telle sorte que les larges raies brunes qui les barrent se détachent moins nettement. Le dessus est, en général, moins vivement coloré en rouge-brun. — Chez la *femelle* ces différences sont moins accusées. Le bec est plus épais et plus robuste. L'aile est plus obtuse (Les spécimens du continent provenant de Suisse, des Pyrénées, par exemple, sont difficiles à distinguer par leurs teintes, mais n'ont pas l'aile aussi obtuse).

Iles Britanniques (y compris l'Irlande, les Orcades, les Hébrides); sédentaire.

3. **montanella** Pallas, Reis. Russ. Reichs., 1776, II, 1, p. 695; Dresser, III, p. 35, pl. 100; *temminckii* Brandt, 1848.

Asie Nord, Sibérie de l'Oural à la mer de Behring; émigre en Chine et Corée; s'égare en Europe, monts Oural, Crimée, Autriche, Italie.

SYLVIA Scop. 1769

Curruca Boié, 1822.

1. **atricapilla** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 187; 1766, p. 332; Dresser, II, p. 421, pl. 66; *ruficapilla* Naumann, 1853; *paulucci* Arrigoni, Avicula, VI, 1902, p. 103.

Europe, du 60° latitude Nord à la Méditerranée; Açores, Afrique Nord, Asie Mineure jusqu'à la Perse.

a. — **heineken** Jardine, Edimb. Journ. Nat. and Geogr., I, 1830, p. 243; *obscura* Tschusi, 1901; *capriote* Floerike, 1905.

Madère (les spécimens des Canaries sont plus clairs, probablement simplement de passage).

Plumage plus sombre que celui du type, ce qui est surtout

2. *Sylvia hortensis* « (Gm.) »

FAUVETTE DES JARDINS

D. et G., I, p. 474.

3. *Curruca garrula* Briss.

BABILLARDE ORDINAIRE

D. et G., I, p. 477.

4. Espèce nouvelle

(pour l'Europe).

marqué sur le dessus de la *femelle*, dont la tête et le dos sont plus foncés, de telle sorte que le noir de la coiffe se détache moins nettement. Les flanes sont plus bruns que sur le type. Chez le *mâle*, le dessus, très foncé, est olivâtre et les flanes d'un brun foncé. Aile : (*mâle*) 69 à 72, (*femelle*) 68 à 71 millimètres.

2. **borin** (Bodd.), Table Pl. Enlum., 1783, p. 35, ex Pl. Enl., 579, 2; *hortensis* Auctorum (nec Gmelin); Dresser, II, p. 429, pl. 53; *passerina* Gmel., 1788.

Europe, des Îles Britanniques, de la Scandinavie et de la Russie Nord, au Sud (où elle est plus rare); Sibérie et Perse; émigre dans la région méditerranéenne et hiverne en Afrique jusqu'au Sud.

3. **curruca** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 184; Gmel., 1788, p. 954; Dresser, II, p. 383, pl. 58; *garrula* Briss., 1760; Bechstein, 1807.

Europe, de la Grande-Bretagne et de la Norvège à la Méditerranée et à l'Oural; Caucase; Asie Mineure, Perse; hiverne dans l'Afrique Nord.

4. (**nana**) | 1 | **deserti** (Loche), Rev. et Mag. Zool., 1858, p. 394, pl. XI, fig. 1 (*Stoparola*).

Sahara algérien et tunisien jusqu'à la Tripolitaine; pris une fois à Porto-Santo (Madère) et une fois en Italie (Crémone).

Diffère du type (oriental) par sa teinte isabelle se rapprochant beaucoup plus du roux que du gris-brun. Les ailes sont d'un brun pâle bordées de roux-isabelle, les rémiges internes de la couleur du dos. Croupion et couvertures supérieures de la queue roussâtres. Dessous blanc avec une légère teinte crème, les flanes lavés d'isabelle clair. Iris d'un jaune vif. Bec d'un brun de corne, la mandibule inférieure

(1) Le type (*Curruca nana* Hempr. et Ehr., 1833) figuré par Dresser, IX, p. 63, pl. 648, est des steppes du Turkestan et s'étend jusqu'au Sinaï, à l'Arabie, au Somali.

5. *Curruca orphea* (Temm.)

BABILLARDE ORPHÉE

D. et G., I, p. 479.

a. Sous-espèce nouvelle.**6. *Curruca cinerea* Briss.**

BABILLARDE GRISETTE

D. et G., I, p. 480.

7. *Curruca subalpina* (Bonelli)

BABILLARDE SUBALPINE

D. et G., I, p. 482.

et le bord des mandibules d'un brun-jaune pâle. Aile : 56 à 59 millimètres.

5. **hortensis** (Gm. nec Auctorum), Syst. Nat., 1788, I, p. 955, ex Buff. et Daub., Pl. Enlum., 579, 1; *orphea* Temm., Man. Orn., 1815, p. 107, et Auct. plurim; Dresser, II, p. 411, pl. 64; *grisea* Vieill., 1817.

Europe Sud Ouest et Afrique Nord Ouest, Portugal, Espagne, France Centrale et Sud, Suisse, Italie, Corse, Sardaigne, Sicile, rare en Angleterre et à Heligoland.

- a. — **crassirostris** Cretzschm., Atlas Reise Rüpp., 1826, p. 49, pl. 33, fig. a; *jerdoni* (Blyth) Kollibay, 1904.

Europe Sud-Est, de la Dalmatie à la Grèce; l'Asie jusqu'à la Perse et au Turkestan; hiverne en Nubie, Somali, Arabie, Inde cétérieure.

Diffère du type occidental par un bec plus long (arête de 18 à 20,5 millimètres, au lieu de 16 à 18); le dessous du corps est plus blanchâtre et prend à l'automne une teinte rose qui passe ensuite au roux jaunâtre. L'aile a la même longueur que celle du type, exceptionnellement jusqu'à 85 millimètres.

6. **communis** Latham., Gen. Syn. Suppl., I, 1787, p. 287; ? *rufa* Bodd., 1783; *cinerea* Bechst., 1803; Dresser, II, p. 377, pl. 57.

Europe, du 65° latitude Nord à la Méditerranée, d'Arkangel à l'Oural en Russie; hiverne en Afrique; émigre aux Canaries.

7. **subalpina** Temm., Man. Orn., 2^e Éd., 1820, I, p. 214; Dresser, II, p. 389, pl. 59; *leucopogon* Meyer, 1822.

Italie et Alpes à partir de la Savoie, France Sud, Espagne, Corse, Sardaigne, Sicile (probablement sédentaire); pris une fois à Saint-Kilda.

a. Sous-espèce nouvelle.

8. *Curruca conspicillata* (Marmora)

BABILLARDE A LUNETTES

D. et G., I, p. 484.

a. Sous-espèce nouvelle.

9. *Curruca nisoria* (Bechst.)

BABILLARDE ÉPERVIÈRE

D. et G., I, p. 485.

- a. **albistriata** (Brehm), Vogelfang, 1855, p. 229;
leucopogon orientalis Brehm, 1866.

Ailes plus longues que celles du type. La raie blanche de la barbe plus large, le rouge-brun de la gorge tirant davantage sur le châtain, plus claire sur les côtés; le milieu du dessous plus nettement blanc, les couvertures inférieures de la queue avec une très légère teinte rousse. La bordure externe des rémiges, en pelage nouveau, plus claire et plus pâle. Taille plus grande; aile (mâle) : 59 à 65, rarement 67 millimètres.

Dalmatie
et Péninsule des
Balkans, Grèce;
Asie Mineure,
Égypte, Oasis
du Sahara.

8. **conspicillata** Temm., Man. Orn., 2^e Éd., 1820, I,
p. 210; Dresser, II, p. 393, pl. 60.

Europe Sud,
Espagne, France
Sud-Est, Italie,
Corse, Sardaigne,
Sicile, Malte;
Ile Fuerteventura;
Afrique Nord-
Ouest, Oasis du
Sahara.

- a. — **bella** Tschusi, Orn. Monatsb., 1901, p. 130.

Diffère du type d'Europe par le dessus de la tête d'un gris plus foncé, le dos d'un brun plus foncé, la bordure des rémiges plus châtain chez le mâle, et le dessus d'un brun plus foncé chez la femelle.

Madère, Canaries;
Iles du Cap-Vert
(sédentaire).

9. **nisoria** (Bechst.), Gem. Naturg. Deuts., IV, 1795,
p. 580; Dresser, II, p. 435, pl. 68; *undata*
Brehm, 1831 (nec Bodd., 1783).

Europe, de
la Suède Sud et
du Golfe de Fin-
lande au centre
du continent jus-
qu'à la Haute-Ita-
lie et la Péninsule
des Balkans;
niche rarement en
France; acci-
dentel en Angle-
terre; de passage
dans le Nord de
l'Italie; hiverne
dans l'Afrique
Nord-Est.

10. *Curruca melanocephala* (Gm.)

BABILLARDE MÉLANOCÉPHALE

D. et G., I, p. 487.

a. Sous-espèce nouvelle.**11. *Curruca ruppelli* (Temm.)**

BABILLARDE DE RÜPPEL

D. et G., I, p. 488.

Genre PITCHOU**1. *Melizophilus provincialis* (Gm.)**

PITCHOU PROVENÇAL

D. et G., I, p. 490.

10. *melanocephala* (Gm.), Syst. Nat., I, 2, 1788, p. 970; Dresser, II, p. 401, pl. 62; *ruscicola* (part.), Vieill., 1817; *ochrogenion* Linderm., 1843; *luctuosa* et *nigricapilla* Brehm.

Espagne, France Sud, Balears, Italie, Corse, Sardaigne, Sicile, Péninsule des Balkans, Grèce et Cyclades, Canaries Est; Asie Mineure et Afrique Nord jusqu'à la Nubie.

- a. — *leucogastra* (Ledru), Voy. à Ténériffe, 1810, I, p. 182.

Canaries Ouest (Ténériffe, Grande-Canarie, Palma, Hierro).

Mâle plus petit que le type; la tache terminale claire des barbes internes des rectrices latérales étroite et non d'un blanc pur, mais teintée de gris. Aile : 55 à 58 millimètres. Femelle plus foncée en dessus, la tache des rectrices externes comme chez le mâle.

11. *ruppelli* (Temm.), Pl. Color., 1823, pl. 245, fig. 1; Dresser, II, p. 417, pl. 65; *guttata* Landbeck, 1849; *melandiros* Krüper, 1861.

Grèce; Asie Mineure, Palestine; hiverne en Afrique Nord-Est.

MELIZOPHILUS (1) *Leach* 1816

Sylvia (partim) Hartert, 1909.

1. *undatus* Bodd., Tabl., Pl. Enlum., 1783, p. 40, ex Buff. et Daub., pl. 655; Dresser, II, p. 441, pl. 69; *provincialis* Gm., 1789; *ferruginea* Vieill., 1817; *obsoleta* Brehm, 1855.

Europe Sud-Ouest, France Sud, Pyrénées, Espagne, Italie Sud, Corse, Sardaigne; de passage dans le Nord de l'Italie; signalé à Heligoland?

(1) Hartert (Vög. Pal. Fauna, I, p. 377) rattache ce petit genre au genre *Sylvia* — *S. conspicillata* formant la transition entre les deux subdivisions génériques.

a. Sous-espèce nouvelle.

2. *Melizophilus sardus* (Marmora)

PITCHOU SARDE

D. et G., I, p. 492.

Genre AGROBATE

1. *Ædon galactodes* (Temm.)

AGROBATE RUBIGINEUX

D. et G., I, p. 495.

a. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **dartfordiensis** (Latham), Ind. Orn., II, 1790, p. 517; *ulicicola* Blyth, 1833; *armoricus* Cretté de Palluel, Orn., 1899, p. 42.

Angleterre Sud, au Nord jusqu'à la vallée de la Tamise (Suffolk) et dans le Shropshire; îles Normandes; France Nord-Ouest (Bretagne).

Parties supérieures d'un brun-chocolat terne sauf le dessus de la tête qui passe au gris ardoisé et se distingue assez nettement de la teinte du dos. La teinte brune s'étend sur toute la partie visible des plumes, et n'est pas produite par l'usure. — (Chez le type du Sud-Europe, le dos est gris ardoisé, et présente, seulement par suite de l'usure, surtout chez les vieux oiseaux, une faible teinte brune). — Les flancs sont ici teintés de brun et non de gris. La taille est un peu moins forte. Aile (mâle) : 52 à 55 millimètres.

2. **sardus** Temm., Man. Orn., 2^e Éd., I, 1820, p. 204 (ex Marmora M. S.); Dresser, II, p. 447, pl. 70.

Îles de la Méditerranée, Baléares, Corse, Sardaigne, Capri, Sicile; Ligurie; Tunisie, Algérie.

AGROBATES Swains. (1837) 1838

Ædon Boië, 1826.

1. **galactodes** (Temm.), Man. Orn., 2^e Éd., I, 1820, p. 182; Dresser, II, p. 547, pl. 85, fig. 1; *rubiginosus* Meyer, 1822; *pallens* Brehm, 1856.

Espagne Sud, Portugal; accidentel en Italie, Irlande, Angleterre; Afrique Nord; Palestine.

- a. — **syriaca** Hempr. et Ehr., Symb. Phys., 1833, fol. bb; *bruchii* Brehm, 1856.

Diffère à première vue du type par ses parties supérieures d'un gris-brun rougeâtre, qui sur le croupion passe au brun-roux des couvertures supérieures de la queue; par ses rectrices médianes d'un gris-brun rougeâtre en tout ou en

Grèce, Herzégovine et Dalmatie Sud, Cyclades; s'égare en Italie; Asie Mineure, Syrie; hiverne en Arabie, Somali, British East Africa (Mombaza).

b. **Sous-espèce** (rangée dans la synonymie du type).

Genre HYPOLAÏS

1. Hypolaïs icterina (Vieill.)

HYPOLAÏS ICTÉRINE

D. et G., I, p. 498.

partie (et non d'un rouge-brun comme celles du type). La bande subterminale noirâtre des rectrices est plus large et s'étend jusqu'au bord externe. Les rémiges sont d'un gris-brun et leur bordure est d'un gris-brun et plus étroite, presque blanchâtre sur les rémiges secondaires. Le dessous est lavé de gris-brun pâle. La 1^{re} rémige (au lieu de dépasser les couvertures primaires de 3 à 5 millimètres comme chez le type), ne les dépasse que de 1 millimètre, ou même atteint à peine leur extrémité.

- b. **familiaris** Ménétr., Cat. Rais. des Obj. du Caucase, 1832, p. 32; Dresser, II, p. 553, pl. 85, fig. 2.

Semblable à *A. g. syriaca* mais le dessus encore plus clair avec une teinte grisâtre très nette quand on a une série de spécimens sous les yeux. Le croupion est tant soit peu moins roux, et le dessous encore plus pâle.

Asie Mineure, du Caucase à la Mésopotamie, Turkestan, Beloutchistan; hiverne dans l'Inde Nord-Ouest; pris une fois à Heli-goland.

HIPPOLAIS *Brehm* 1828

1. **icterina** (Vieill.), Nouv. Dict. Hist. Nat., 2^e Éd., XI, 1817, p. 185; Dresser, II, p. 521, pl. 81; *mollesoni* Zarudn. et Nasar., 1888.

Europe, du Cercle Arctique à la Méditerranée et l'Oural (mais répartition locale-ment); rare en Sardaigne, Grèce, Asie Mineure (fait défaut dans l'Ouest de la France et s'égare rarement en Angleterre); hiverne dans l'Afrique tropicale.

2. Hypolaïs polyglotta (Vieill.)

HYPOLAÏS POLYGLOTTE

D. et G., I, p. 502.

3. Hypolaïs olivetorum (Strickl.)

HYPOLAÏS DES OLIVIERS

D. et G., I, p. 504.

4. Hypolaïs pallida Hemp. et Ehr.
et *H. elaeica* Linderm.

HYPOLAÏS PALE ET AMBIGU

D. et G., I, p. 506, 509.

a. Sous-espèce nouvelle.

- 2 **polyglotta** (Vieill.), Nouv. Dict. Hist. Nat., XI, 1817, p. 200; Dresser, II, p. 517, pl. 80, fig. 2; *italica* Baldest., 1827.
- France entière (sauf le Nord et le Nord-Est), Espagne, Portugal, Italie, Tyrol Sud; s'égare en Angleterre, Heligoland, Bohême, etc.; Maroc jusqu'au Rio de Oro; hiverne au Sénégal et en Guinée.
3. **olivetorum** (Strickl.), in Gould, Birds of Europe, II, 1837, pl. 107; Dresser, II, p. 527, pl. 82, fig. 2.
- Grèce, Dalmatie Sud, Cyclades, Asie Mineure, Palestine; rare en Roumélie, Italie, Algérie; hiverne en Afrique (Abyssinie).
4. **pallida** Hemp. et Ehr., Symb. Phys., 1833, fol. bb (et Var. *andromeda* et *maxillaris*); Dresser, III, p. 537, pl. 80, fig. 1; *clavica* Lindermayer, Isis, 1843, p. 342; *ambigua* Schleg., 1844; *preglii* Frauenfeld, 1852.
- Grèce, Turquie, Dalmatie, Roumanie; rare en Italie, pris une fois à Heligoland; Turkestan, Asie Mineure, Perse, etc.; Ténériffe? hiverne en Arabie et Afrique Nord-Est.
- a. — **opaca** Cab., Mus. Hein., 1851, I, p. 36; *arigonis* Brehm, 1857; *cinerascens* Brehm, 1866; *jucescens* Selys in Loche, 1867.
- Espagne Moyenne et Sud; Afrique Nord; hiverne dans l'Afrique Ouest jusqu'au Niger; accidentel en France Sud (Nice).

Plus grand que le type. Aile : 66 à 71,5 millimètres; bec plus fort et surtout plus large.

5. Hypolaïs caligata (Licht.)

HYPOLAÏS BOTTÉ

D. et G., I, p. 510.

Genres ROUSSEROLLE et PHRAGMITE (1)**1. Calamoherpe turdoïdes (Meyer)**

ROUSSEROLLE TURDOÏDE

D. et G., I, p. 515.

a. Sous-espèce nouvelle.

(1) Le genre *Calamodyta* (Phragmite) admis par Gerbe (p. 532) comme distinct, est réuni au G. *Acrocephalus* par les ornithologistes modernes, et ses deux espèces doivent prendre place ici.

5. **caligata** Licht., in Eversmann, Reise von Orenb. nach Buch., 1823, p. 128; Dresser, II, p. 151, pl. 84; *scita* Eversm., 1842.

Russie Est (de Moscou jusqu'en Sibérie Ouest), Turkestan, Cachemir; hiverne dans l'Inde Nord et Centrale.

ACROCEPHALUS Naum. 1819

Calamoberpe Boié, 1822;

Calamodyta Mey. et Wolf, 1822.

- 1 **arundinaceus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 170; Dresser, II, p. 579, pl. 88; *turdoïdes* Meyer, Vög. Livl. and Esth., 1815, p. 116.

Europe Moyenne et Sud, de l'Espagne à la Grèce et au Caucase; au Nord jusqu'au Jutland et au golfe de Finlande; accidentel en Angleterre et Suède Sud; Afrique Nord-Ouest; hiverne en Afrique jusqu'au Natal.

- a. — **zarudnyi** Hartert, Bull. Brit. Orn. Club., 1907, p. 26.

Turkestan: à l'Ouest jusqu'à l'embouchure du Volga (Russie Sud-Est).

Diffère de type par ses parties supérieures moins rousses, plutôt olivâtres, surtout sur le croupion; les couvertures inférieures de la queue et les flancs sont plus pâles.

2. Calamoherbe arundinacea (Gm.)
(nec Linné.)

ROUSSEROLLE EFFARVATE

D. et G., I, p. 516.

3. Calamoherbe palustris (Bechst.)

ROUSSEROLLE VERDEROLLE

D. et G., I, p. 518.

4. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

ROUSSEROLLE DES BRUYÈRES

2. **streperus** (Vieill.), Nouv. Dict., 2^e Éd., 1817, XI, p. 182; Dresser, p. 567, pl. 87, fig. 1; *arundinacens* Auctorum (nec Linné); *calamoherpe* Kleinschm., 1903.

Europe, du 58^o latitude Nord (Suède), à la Méditerranée et Afrique Nord; à l'Est jusqu'au delta du Volga; Angleterre Sud; s'égare jusqu'aux Orcades et Shetland; hiverne en Afrique jusqu'à Zanzibar.

3. **palustris** Bechst., Orn. Taschenb., 1803, p. 186; Dresser, II, p. 573, pl. 27, fig. 2; *philomela* Brehm, 1855; *obsкуроcapilla* Dubois, 1856; *frumentarius* Kleinschm., 1903.

Europe, du Danemark à l'Espagne Sud, l'Italie, le Monténégro, la Bulgarie, la Russie Sud-Est; Afrique Nord-Ouest; rare et locale en Angleterre Sud; hiverne en Afrique jusqu'au Natal.

4. **dumetorum** Blyth., Journ. As. Soc., XVIII, 1849, p. 815; Dresser, II, p. 561, pl. 86, fig. 2; *magnirostris* Lilljeb., 1850; *macronyx*, *eurhyncha*, *sphenura*, *ilensis* Sewertz., 1879; Var. *affinis* Sarudny, 1890.

Espèce asiatique (Sibérie Ouest, Turkestan, Himalaya) qui fait une pointe en Europe (Russie), jusque près Saint-Petersbourg; et de Moscou à Orenbourg, au Nord jusqu'à Arkangel; hiverne dans l'Inde, Ceylan, Pégou.

Dessus d'un brun olivâtre teinté de roussâtre, plus foncé et plus olivâtre que chez *A. agricola*. Au premier printemps la couleur est plus pâle et moins rousse. Les jeunes oiseaux sont plutôt roux-brun. — La 1^{re} rémige à peu près égale aux couvertures primaires; la 2^e intermédiaire entre la 5^e et la 6^e ou entre la 6^e et la 7^e; les 3^e et 4^e égales et les plus longues. Barbes externes des 3^e et 4^e rémiges plus étroites à partir de leur partie moyenne. Barbes internes de la 2^e présentant une entaille bien nette; celles de la 3^e et surtout de la 4^e ont cette entaille indistincte.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

ROUSSEROLLE DES STEPPES

6. *Calamodyta* (1) *phragmitis* (Bechst.)

PHRAGMITE DES JONCS

D. et G., I, p. 533.

7. *Calamodyta aquatica* (Lath.)

PHRAGMITE AQUATIQUE

D. et G., I, p. 535.

(1) Comme nous l'avons indiqué plus haut, le genre *Calamodyta* est réuni par les modernes au genre *Acrocephalus*.

5. *agricola* Jerdon, Madras Journ. Litt. and Sci., XIII, 1845, p. 131; Dresser, II, p. 559, pl. 86, fig. 1; *brevipennis* et *capistrata* Sewertz., 1873.

Parties supérieures d'un roux-brun clair assez vit, plus foncé sur la tête, plus clair sur le croupion. Rémiges et rectrices bordées de fauve brun. Une raie sourcilière claire. — Dessous blanc, les flancs et l'abdomen lavés de fauve pâle. Bec à mandibule supérieure brun foncé, l'inférieure d'un jaune chair. Pattes d'un brun rosé. Iris jaune, paupières d'un gris plombé. Ailes courtes et arrondies : la 1^{re} rémige étroite, plus longue que les couvertures primaires (de 1 millimètres); la 2^e intermédiaire entre la 6^e et la 7^e; la 3^e et la 4^e égales et les plus longues. Queue très arrondie. — Le jeune a le dessus plus clair et le dessous lavé de fauve ocreux.

Russie Sud-Est; Crimée et Steppes des Kirghis; delta du Danube; Oural Moyen et Sud; Turkestan, Perse, Asie Centrale jusqu'au Tibet; hiverne dans l'Inde.

6. *schœnobæus* (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 184; 1766, p. 329; Dresser, II, p. 597, pl. 90, fig. 2; *phragmitis* Bechst., 1803; *tritici* Brehm, 1831.

Europe, du 70^o latitude Nord jusqu'à l'Espagne, l'Italie, la Grèce; Irlande; Sibérie, Turkestan; de passage dans l'Afrique Nord; hiverne en Asie Mineure et Afrique jusqu'au Danara et au Transvaal.

7. *aquaticus* (Gm.), Syst. Nat., 1788, p. 953 (ex Scop., Annus I, Hist. Nat., 1769, p. 158); Dresser, II, p. 591, pl. 89; *cariceti* Naum., 1821; *paludicola* Vieill., 1817; *striata* et *limicola* Brehm, 1822 et 1828.

Europe Moyenne et Sud, du Danemark à la Sicile, à l'Oural et la Russie Sud; rare en Angleterre, Helligoland, Belgique, Grèce; hiverne en Afrique tropicale.

**Genres LUSCINIOLE (Gerbe nec Gray)
et LOCUSTELLE**

1. Lusciniopsis luscinioides (Savi)

LUSCINIOLE LUSCINIOÏDE

D. et G., I, p. 520.

2. Lusciniopsis fluviatilis (Meyer et Wolf)

LUSCINIOLE FLUVIATILE

D. et G., I, p. 521.

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

LUSCINIOLE CERTHIOLE

LOCUSTELLA Kaup 1829

Luscinioptis Bp., 1842 ; *Pseudoluscinia* Bp., 1838.

1. **luscinioides** (Savi), Nuov. Giorn. Litt. e Sc., VII, 1824, p. 341 ; Dresser, II, p. 627, pl. 93 ; *albata* Shauer, 1873 ; *geyri* Kœnig, 1908.

France Sud jusqu'à Nantes, Espagne, Algérie, Italie, Pologne, Russie Sud et tout le pourtour de la Méditerranée ; Angleterre Est ; hiverne en Afrique tropicale.

2. **fluviatilis** Wolf, Meyer et Wolf, Taschenb. Deuts. Vög., I, 1810, p. 229 ; Dresser, II, p. 621, pl. 92, fig. 1 ; *stagnatilis* Naum., 1811 ; *streptans* Brehm, 1855 ; *gryllina* Schauer, 1873 ; *cicada* Hausmann, 1873.

Europe Est, de la Finlande et de la Russie Nord (Oural, 60°) à la Hongrie, la Silesie, etc. A l'Ouest jusqu'au Rhin ; accidentel en Hollande, Hélioland ; Asie Mineure ; hiverne en Afrique jusqu'au Zambèze.

3. **certhiola** (Pallas), Zoogr. Rosso-As., I, 1827, p. 509 ; Dresser, II, p. 633, pl. 94.

Sibérie ; hiverne dans l'Inde et la Malaisie ; pris une seule fois (1856) à Hélioland ; de passage douteux en Russie Sud.

Dessus de la tête et nuque brun foncé rayé de gris fauve ; parties supérieures d'un brun ocreux vif tacheté de brun noirâtre, le croupion plus uni. Ailes et queue brunes, les plumes portant une bordure externe claire, celles de la queue plus foncées à l'extrémité et terminées de blanc grisâtre. Sourcil d'un blanc-gris. Dessous blanc, la poitrine, les flancs, les couvertures inférieures de la queue lavées de fauve pâle, ces dernières terminées de blanc. Bec brun avec la mandibule inférieure jaunâtre à la base ; pieds d'un blanc rosé ; iris brun. Aile : 64 à 69 millimètres. — Les sexes semblables. Les *jeunes* sont plus foncés dessus ; le dessous est jaunâtre et la gorge striée.

4. *Locustella naevia* (Bodd.)

LOCUSTELLE TACHETÉE

D. et G., I, p. 529.

a. Sous-espèce nouvelle.**5. *Locustella lanceolata* (Temm.)**

LOCUSTELLE LANCÉOLÉE

D. et G., I, p. 531.

Genre AMNICOLE**1. *Amnicola melanopogon* (Bp.)**

AMNICOLE A MOUSTACHES NOIRES

D. et G., I, p. 527.

4. *nævia* (Bodd.), Tabl. Pl. Enl., 1783, p. 35, ex Bufl. et Daub., Pl. Enl. 531, fig. 3; Dresser, II, p. 611, pl. 91; *locustella* Lath., 1790; *gryllus* Hausmann, 1873.

Europe Moyenne et Sud;
Iles Britanniques,
Europe continentale, de la Hollande à la Russie;
Suisse, France,
Espagne Nord,
Italie Nord;
de passage dans l'Espagne Sud;
hiverné dans l'Afrique Nord.

- a. — *straminea* Sewertz., Turkest. Jevotn., 1873 (nom. nud.); Seebohm, Cat. Birds Brit. Mus., V, 1881, p. 117; Dresser, IX, pl. 652.

Remplace le type à l'Est, de l'Oural (Orenbourg) à l'Altai et dans le Caucase; hiverné dans l'Inde.

Plus petit que le type (Aile : 57 à 60 millimètres); le bout de l'aile moins aigu, la 2^e rémige étant plus courte que la 1^{re}. Dessus du corps plus olivâtre et moins brunâtre. La disposition des taches est la même.

5. *lanceolata* (Temm.), Manuel Orn., 2^e Éd., 1840, IV, p. 611; Dresser, II, p. 617, pl. 92, fig. 2.

Sibérie entière, rare en Russie (jusqu'au lac Onéga); hiverné dans le Sud de l'Asie et la Malaisie.

LUSCINIOLA Gray 1841 (nec Gerbe)

Amnicola Gerbe, 1867.

1. *melanopogon* (Temm.), Pl. Col., 1823, pl. 245, fig. 2; Dresser, II, p. 605, pl. 90, fig. 1; *bonelli* (*Caricicola*) Brehm, 1855.

Espagne Est et Sud-Est,
France Sud,
Italie et ses îles,
Dalmatie, Hongrie, péninsule des Balkans,
Grèce; Égypte dans le delta du Nil

a. Sous-espèce nouvelle.

Genre NOUVEAU
(pour l'Europe).

1. Espèce nouvelle
(pour l'Europe).

a. — *mimica* Madarasz, Vorläuf. über e. neuen Rohrsäng., 1903.

Russie Sud-Est
(delta de la Volga),
Turkestan,
Perse; hiverné
dans l'Inde.

Plus grand que le type, à bec plus long. Pelage plus serré, moins rouge-brun, plutôt brun olivâtre en dessus; flancs plus pâles. Aile (mâle) : 61 à 65,5 millimètres.

HERBIVOCULA *Swinhoe* 1871

Luscinola Dresser.

CARACTÈRES. — Voisin du *G. Phylloscopus*, mais à bec plus court, plus épais, plus robuste, avec de fortes soies à la commissure de la bouche et un doigt postérieur très robuste. 1^{re} rémige large et longue, environ deux fois aussi longue que les couvertures primaires, ayant à peu près la moitié de la longueur de la 2^e qui vient, pour la longueur, entre la 7^e et la 8^e ou la 8^e et la 9^e. La 1^{re} est la plus longue, la 5^e presque aussi longue, la 3^e un peu plus courte. Queue presque arrondie, les rectrices latérales plus courtes de 3 à 4 millimètres. Les pattes, très robustes, sont couvertes par devant de grosses écailles qui tombent seulement chez les très vieux oiseaux. — Il ne semble y avoir qu'une seule mue annuelle, comme chez *Phylloscopus*. — Genre asiatique (une espèce très accidentelle en Europe).

1. *schwarzi* Radde, Reis. Süd. v. Ost-Sibérie, II, 1863, p. 260, pl. IX; *incerta* David et Oust., 1877.

Espèce asiatique
(Sibérie Est).
hiverné
en Chine Sud.
Indo-Chine;
pris une seule fois
en Angleterre
(Lincolnshire, à
l'embouchure
de l'Humber).

Parties supérieures d'un brun olivâtre sombre, le croupion teinté de brun de tan; ailes et queue brunes, bordées de brun olivâtre sur les barbes externes. Sourcil blanchâtre nettement défini et s'étendant jusqu'à la nuque; lores et dessous des yeux brun foncé; région auriculaire fauve pâle et brune. Dessous blanc teinté de fauve pâle. Bec couleur

Genre CISTICOLE

1. *Cisticola schœnicola* Bp.

CISTICOLE ORDINAIRE

D. et G., I, p. 537.

•

Genre BOUSCARLE

1. *Cettia cetti* (Marmora)

BOUSCARLE CETTI

D. et G., I, p. 524.

a. Sous-espèce nouvelle.

de corne, blanc rosé à la base ; pieds jaune chair ; iris brun. Aile : 61 à 65 millimètres. — Après la mue d'automne, le dessus est d'un brun de tan olivâtre et le dessous lavé de fauve tanné.

CISTICOLA Kaup 1829

1. *cisticola* Temm., Man. d'Orn. 1820, I, p. 228 ;
curstitans Franklin, P. Z. S., 1831, p. 118 ;
 Dresser, III, p. 3, pl. 96 ; *schanicola* Bonap.,
 1838.

Europe Sud :
 Espagne, Portugal, France Sud,
 Corse, Sardaigne,
 Italie Sud,
 Grèce ;
 Asie Mineure,
 Égypte.

CETTIA Bonap. 1838

1. *cetti* (Marmora), Mem. Accad. Torino, 1820, XXX,
 p. 254 ; Dresser, II, p. 639, pl. 95 ; *sericea*
 Temm., 1820 ; *altisonans* Bp., 1838.

Europe Sud :
 France Sud (sédentaire),
 Espagne, îles Baléares, Corse,
 Sardaigne,
 Italie Sud, Sicile,
 péninsule des Balkans, Crimée,
 Caucase ;
 Asie Mineure,
 Palestine.

- a. — *cettioïdes* Hume, Stray Feath., I, 1873, p. 194 ;
albiventris Sewertz., 1873, et *scaenura* Sew.,
 1873.

Russie Sud,
 de l'Oural et de
 la Volga inférieure jusqu'au
 Turkestan
 et à la Perse ;
 hiverne dans le
 delta de la Volga
 et dans l'Inde.

Diffère du type par une taille supérieure, le dessus d'un brun plus clair et le dessous plus pâle. Aile (mâle) : 70 à 72,5 millimètres. — (D'après Dresser et Hartert, les formes orientales de *C. cetti* varient beaucoup, et les différences signalées pourraient être purement individuelles).

Famille XXI — TROGLODYTIDÉS

Genre TROGLODYTE

1. *Troglodytes parvulus* Koch

TROGLODYTES MIGNON

D. et G., I, p. 540.

(1)

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

(1) Sous-espèce nouvelle : *Troglodytes parvulus kenigi* Schiebel. — Voyez l'APPENDICE.

XXI — TROGLODYTIDÆ

TROGLODYTES Vieill. 1807

1. **trogodytes** (Linné), Syst. Nat., 1758, Ed. X, p. 188; *parvulus* Koch; Dresser, III, p. 219, pl. 124, fig. 1; *europa* Vieill., 1819; *regulus* Meyer, 1822; *linnei* Malm, 1877; *bergensis* Stejn., 1884.

Europe, du Nord de la Scandinavie à la Méditerranée, et des Îles Britanniques à l'Oural (sédentaire ou erratique dans le Centre et le Sud).

- a. — **islandicus** Hartert, Bull. Brit. Orn. Club, 1907, p. 25.

Islande.

Semblable à *T. t. borealis* (des Féroë) mais encore plus grand : Aile (mâle) 57,5 à 61 millimètres. Le dessus, surtout la tête, d'un brun plus foncé. Pieds d'un gris roussâtre.

- b. — **zetlandicus** Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1910, p. 777.

Îles Shetland.

Plus grand que le type, comparable pour la taille à *islandicus*. Bec aussi fort que chez celui-ci. Ailes plus courtes : 52 à 53,3, et même 48,1 millimètres. Diffère de *borealis* par son dessus plus foncé, surtout le sommet de la tête, ses ailes plus foncées et son dessous plus sombre, mais surtout par son bec plus épais ; — d'*hirtensis*, par ses teintes foncées, surtout sur les parties inférieures. Rayures transversales larges et foncées.

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Sous-espèce nouvelle.

- c. — **borealis** Fischer, J. f. Orn., 1861, p. 14, pl. 1 ;
Dresser, II, p. 229, pl. 124, 2.

Ile Leroc.

Se place entre *islandicus* et *trogodytes* type. Plus grand que ce dernier ; le brun du dessus moins rouge-brun, d'un brun terreux foncé ; dessous variable. Aile (mâle) : 49 à 55 millimètres. Pieds plus robustes ; doigt postérieur plus fort et plus long que celui du type. Forme de l'aile variable. — Les Trogodytes des Hébrides et de l'île Fair, paraissent former la transition au *T. t. trogodytes* d'Angleterre.

- d. — **hirtensis** Seebohm, Zoologist, 1884, p. 333.

Ile Saint-Kilda
(à l'Ouest
des Hébrides).

Semblable à *borealis* par ses parties supérieures foncées, mais le dessous plus blanchâtre ; les couvertures inférieures de la queue ne présentent pas la teinte d'un roux-brun ordinaire, mais sont rayées de blanc sale et de brun-noir.

- e. — **hyrcanus** Sarudny et Loudon, Orn. Monatsb.,
1905, p. 107 ; *talyschensis* Buturlin, 1908.

Caucase Nord
et Sud,
Perse Nord (pro-
bablement aussi
Crimée Sud).

Intermédiaire entre *T. t. trogodytes* et *pallidus* (du Turkestan), par ses teintes ; moins roussâtre que le premier et plus foncé que *pallidus*.

Famille XXII (1) — PHYLLOPNEUSTIDÉS

Genres **POUILLOT** et **RÉGULOÏDE**

1. **Phyllopneuste trochilus** (Linné)

POUILLOT FITIS

D. et G., I, p. 545.

a. Sous-espèce nouvelle.

(1) Hartert (*Vög. Pal. Fauna*, I, p. 469) rattache cette famille, ainsi que celles des *Turdidæ*, *Sylviidæ* et *Timeliidæ*, à la famille des *Muscicapidæ*. — Cette famille aurait dû être nommée par Gerbe « *Regulidæ* », le nom de *Regulus* ayant la priorité.

XXII — PHYLLOSCOPIDÆ

ou mieux *Regulidæ*.

PHYLLOSCOPUS Boie 1826

Phyllopneuste Mey. et Wolf, 1822 (1);

Reguloïdes Blyth., 1847.

1. **trochilus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 188; 1766, p. 338; *acredula* Linné, l. c., 1758, p. 189; *trochilus* Dresser, II, p. 491, pl. 75, fig. 2, 76, fig. 2; *fitis* Bechst., 1793; *tamaricis* Crespon, 1844; *arborea* Brehm, 1831.

Europe,
de la Laponie et
de la Russie Nord
à la Méditerranée
et au Caucase;
de passage en
Grèce; hiverne au
pourtour de
la Méditerranée
et dans
l'Afrique Sud.

- a. — **eversmanni** Bonap., Consp. Av., I, 1850, p. 289; *gracilis* Brehm, 1855.

Russie Nord-Est
le long
des Monts Oural
(Orenbourg);
Sibérie jusqu'à
la Kolyma;
de passage en Rou-
manie; hiverne
en Égypte et dans
l'Afrique Sud.

Forme orientale du type, distincte par ses ailes plus longues (mâle : 68 à 72,1; femelle 64 à 66 millimètres); plus grise au printemps et en été, moins verdâtre. A l'automne, la différence de teinte est beaucoup moins sensible.

(1) Le nom de « *Phyllopneuste* » n'est pas pris par les auteurs dans un sens générique.

2. Phyllopneuste rufa (Briss.)

POUILLOT VÉLOCE

D. et G., I, p. 546.

a. Sous-espèce nouvelle.**b. Sous-espèce nouvelle.**

2. collybita (Vieill.), Nouv. Dict. Hist. Nat., 2^e Ed., 1817, p. 235; Dresser, II, p. 185, pl. 75, fig. 1, et 76, fig. 1; *brehmi* Homeyer; *rufus occidentalis* Flöricke, 1892; *rufus splendens* Tschusi, 1906; *rufus* Auctorum (le nom de *Ph. rufus* Bechst., 1795, basé sur *Motacilla rufa* Gmelin, ne peut s'appliquer à un *Phylloscopus*).

Europe Ouest, des Iles Britanniques aux Pyrénées, à l'Espagne, la France Sud, l'Italie, la Corse, la Sardaigne, la Sicile; sédentaire dans la région méditerranéenne; de passage dans l'Europe Occidentale et Moyenne; hiverne en Afrique Nord-Ouest, à Fuertaventura, etc.

a. — abietina (Nilsson), Kgl. Vet.-Akad. Handl., 1819, p. 115; *brevirostris* Strickl., 1836; *rufus pleskei* Flöricke, 1892.

Diffère du type occidental par ses ailes plus longues, son plumage plus clair, du moins au premier printemps. Aile : (mâle) 62 à 67,3; (femelle) 56 à 60 millimètres (forme encore mal connue).

Europe Est, de la Scandinavie et de la Russie (65° Nord) au Monténégro et au Caucase; hiverne en Grèce, Asie Mineure, Afrique Est.

b. — canariensis Hartwig, Journ. f. Orn. 1886, p. 486; *fortunatus* Tristram, 1889.

Diffère du type par une taille plus faible, ses parties supérieures plus foncées, d'un olive brunâtre; le dessous est également plus brunâtre; même à l'époque de la reproduction, le plumage est plus foncé que le plumage frais de l'automne chez le type. Aile plus large, plus courte, moins aiguë, arrondie, la différence de longueur entre les rémiges primaires et secondaires étant moindre. Aile : (mâle) 53,5 à 56; (femelle) 48 à 50 millimètres.

Iles Canaries Ouest (Ténériffe, Grande Canarie, Palma et Hierro), sédentaire.

c. **Sous-espèce nouvelle.**

d. **Sous-espèce nouvelle.**

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

POUILLOT DE LORENZ

c. — **exsul** Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1907, p. 505.

Ile Lanzaote (des Canaries Est).

Diffère de la forme des Canaries Ouest par sa taille plus faible, ses parties supérieures plus pâles (moins d'un olive brunâtre), et ses parties inférieures moins rousses, d'un jaune très pâle. Aile : (mâle) 50 à 52; (femelle) 47 à 48,5 millimètres.

d. — **tristis** Blyth, Journ. As. Soc. Bengal, XII, 1843, p. 966; Dresser, II, p. 177; Gould, Birds of Asia, IV, pl. 59; *fulvescens* (et var. *nervia*) Sewertz., 1873.

Russie Est (de la Petchora au Sud de l'Oural), et en Asie jusqu'à l'Inde (Calcutta); s'égare jusque dans l'Europe Occidentale : Héligoland, Orcades.

Plus petit que le type, le dessus plus brun et le dessous plus blanchâtre, le bec et les pieds plus foncés. La 1^{re} rémige courte, à peine plus longue que les couvertures primaires; la seconde plus courte que la 3^e et notablement plus courte que la 7^e; les 3^e, 4^e et 5^e presque égales, la 4^e étant la plus longue. Le *femelle* est un peu plus petite. Le plumage d'automne est plus brun et plus foncé que celui de l'été. Aile : (mâle) 60 à 67; (femelle) 55 à 60 millimètres.

3. (**neglectus**) **lorenzi** Lorenz, Beitr. Kennt. Orn. Fauna Nordseite Kaukasus, 1887, p. 28, pl. 2.

Caucase Nord (où il niche à une altitude de 1.300 à 2.300 mètres); hiverne probablement en Transcaucasie.

L'espèce (voisine de *Ph. collybita*) est asiatique (du Turkestan au Punjab). Elle est caractérisée par ses rémiges, de la 3^e à la 6^e, rétrécies comme chez *collybita*, mais le rétrécissement presque insensible sur la 6^e. La 1^{re} rémige proportionnellement plus longue que chez *Ph. coll. tristis* (qui habite le même pays). Elle en diffère par ses couvertures inférieures de l'aile qui ne sont pas jaunes mais couleur crème, presque blanches, et sa taille moindre.

La sous-espèce *lorenzi* diffère du type (*Ph. neglectus neglectus*) par sa taille plus forte, ses parties supérieures plus foncées, d'un brun tirant davantage sur le rouge (et non gris-brun). Aile : (mâle) 62 à 63; (femelle) 48 millimètres.

4. *Phyllopneuste sibilatrix* (Bechst.)

POUILLOT SIFFLEUR

D. et G., I, p. 548.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

POUILLOT BRILLANT

a. Sous-espèce nouvelle.

4. *sibilatrix* (Bechst.), Naturf., 1793, XXVII, p. 47 ; Dresser, II, p. 497, pl. 77, fig. 2 ; *sylvicola* Montagu, 1798 ; *megarhynchos* Brehm, 1831.

Europe, des Iles Britanniques, de la Finlande Sud et d'Arkangel à l'Europe moyenne (France Centrale) et à la Hongrie ; Russie Sud (?) ; hiverne en Afrique, au Congo et dans l'Arabie Sud.

5. *nitidus* Blyth., Journ. As. Soc. Bengal, XII, 1843, p. 965 ; Dresser, IX, p. 83, pl. 651, fig. 2.

Sommet de la tête et parties supérieures d'un vert brillant ; parties inférieures et raie sourcilière d'un jaune soufre ; ailes portant deux bandes jaunes. Bec brun, la base de la mandibule inférieure couleur chair ; pieds d'un brun plombé ; iris brun foncé. La 2^e rémige primaire plus courte que la 6^e. Aile : 60 à 66 millimètres.

Caucase et Crimée (où il niche), Transcaspië, Perse ; hiverne dans l'Inde et à Ceylan ; pris une fois à Hëlîgoland.

- a. — *viridanus* Blyth, Journ. As. Soc. Beng., XII, 1843, p. 967 ; Dresser, IX, p. 87, pl. 651, fig. 1.

Plus foncé que le type, le vert du dessus tirant sur l'olivâtre ; la raie sourcilière fauve, les ailes ne portant qu'une seule bande d'un blanc sale ; le dessous d'un blanc lavé de vert-jaune pâle. A l'automne le dessus est d'un vert plus franc et le dessous plus jaune. La 2^e rémige est de longueur intermédiaire entre la 7^e et la 8^e ; les 3^e, 4^e et 5^e les plus longues. Aile : 57 à 65, rarement 66 millimètres.

Prusse Est, Esthonie, Livonie, Courlande Nord, Moscou, Kasan, Perm, Oural ; Sibérie Ouest, Turkestan, Cachemyr ; hiverne dans l'Inde, de l'Himalaya à Ceylan ; pris trois fois à Hëlîgoland.

6. *Phyllopneuste bonellii* (Vicill.)

POUILLOT BONELLI

D. et G., I, p. 549.

a. Sous-espèce nouvelle.**7. Espèce nouvelle**

(pour l'Europe)

POUILLOT BORÉAL

6. **bonellii** Vieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., 2^e Ed., XXVIII, 1819, p. 91; Dresser, II, p. 503, pl. 77, fig. 1, et 78; *nattereri* Temm., 1820; *montana* Brehm, 1831; *prasinopyga* Gloger, 1834.

Europe moyenne et Sud (dans les montagnes), de la Bavière et de la France Nord (Metz, Paris), la Belgique jusqu'à l'Espagne, l'Italie, la Sicile; Afrique Nord (Atlas); hiverne au Sud de l'Atlas et en Sénégambie.

- a. — **orientalis** Brehm, Vogelfang, 1855, p. 332; ? *platystoma* Hempr. et Ehr., 1833.

Grèce, Crimée; Chypre, Asie Mineure; hiverne dans la vallée du Nil.

Forme orientale différant du type de l'Ouest par ses ailes plus longues (mâle 66 à 71,5; femelle 64 à 67 millimètres).

7. **borealis** Blasius, Naumannia, 1858, p. 313; Dresser, II, p. 509, pl. 79.

Europe sub-arctique, de la Norvège et de la Russie Nord à travers la Sibérie jusqu'à l'Alaska; a été pris à Héli-goland; hiverne dans le Sud de l'Asie et la Malaisie jusqu'aux Moluques.

Parties supérieures d'un brun grisâtre teinté de vert pâle; croupion d'un vert jaunâtre; ailes portant deux bandes d'un blanc jaunâtre. Raie sourcilière large, jaunâtre. Dessous d'un blanc grisâtre, la poitrine et les flancs plus gris et lavés de jaunâtre. Bec brun avec la mandibule inférieure plus pâle. Pattes brunes, iris brun foncé. Aile : (mâle) 64 à 70, rarement 72; (femelle) 62 à 65 millimètres. Les 3^e et 4^e rémiges primaires sont les plus longues, la 5^e beaucoup plus courte; la rémige bâtarde très courte, pointue. — A l'automne le dessous est jaune pâle, la poitrine et les flancs lavés de gris. La femelle est semblable.

8. *Reguloïdes superciliosus* (Gm.)

RÉGULOÏDE A GRANDS SOURCILS

D. et G., I, p. 551.

9. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

POUILLOT ROITELET

10. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

POUILLOT COURONNÉ

8. **superciliosus** (Gm.), Syst. Nat., 1788, p. 975 ;
Dresser, II, p. 469, pl. 74.

Sibérie, de l'Obi
à l'Est
du Continent ;
hiverné
dans l'Asie Sud ;
de passage irrégu-
lier en Europe :
Russie, Autriche,
Italie, Hollande,
Allemagne,
Héligoland, Îles
Britanniques,
île Fair (au Nord
de l'Écosse).

9. **proregulus** (Pall.), Zoog. Ross.-As., I, 1827,
p. 499 ; Dresser, IX, p. 73, pl. 650, fig. 1 ;
modestus Gould, 1837 ; *pallasi* Dubois, 1863.

Sibérie Est ;
hiverné dans la
Chine Sud ;
de passage régu-
lier à l'automne
près d'Orenbourg
(Russie Est,
Oural) ;
pris à Héligoland,
en Angleterre,
en Dalmatie.

Parties supérieures d'un vert olive, la tête plus foncée ;
croupion jaune ; dessous blanc lavé de gris sur les flancs ;
une raie médiane et une raie sourcilière d'un jaune soufre
bien définies. Ailes portant deux bandes distinctes d'un blanc
jaunâtre. Bec brun, la mandibule inférieure jaunâtre à sa
base. Pattes d'un brun verdâtre et brun foncé. La 1^{re} rémige
primaire est plus courte que la 2^e, qui est égale à la 8^e ou à
peine plus longue ; la 4^e la plus longue. Aile : (mâle) 52 à 56 ;
(femelle) 48 à 50 millimètres.

10. (**occipitalis**) **coronatus** Temm. et Schl., Fauna
Jap., Aves, 1847, p. 48, pl. 18.

Sibérie Sud-Est,
Corée, Japon ;
hiverné
dans l'Indo-Chine
et la Malaisie ;
pris à Héligoland.

Semblable au précédent, plus grisâtre en dessus, la raie
médiane irrégulière, mais la raie sourcilière bien marquée,
se prolongeant jusqu'à la nuque ; deux bandes sur l'aile ;
dessous lavé de jaune sur la poitrine et les flancs. Couver-
tures inférieures de l'aile jaunes. Aile 58 à 60 et même
62 millimètres. 1^{re} rémige courte, en lancette, de 2 à 5 mil-
limètres plus longue que les couvertures primaires ; la 2^e
intermédiaire pour la longueur entre la 6^e et la 7^e. En hiver,
le plumage est plus clair et plus jaunâtre.

Genre ROITELET

1. *Regulus cristatus* Charleton

ROITELET HUPPÉ

D. et G., I, p. 553.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

REGULUS (*Cuvier* 1800) *Vicill.* 1807

- l. regulus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 188 ; 1766, p. 338 ; Dresser, II, p. 453, pl. 71, 72, fig. 2 ; *cristatus* Koch, 1816 ; *aureocapillus* Meyer, 1822 ; *flavicapillus* Naum., 1823 ; *septentrionalis* et *chrysocephalus* Brehm, 1831.

Europe, de la zone des forêts à la Méditerranée, au Caucase et l'Asie Mineure (sédentaire, erratique et de passage) ; ne niche pas en Angleterre, à Hélioland, ni en Espagne et Portugal (où les petites bandes s'égarent à l'époque de la reproduction).

- a. — anglorum** Hartert, Bull. Brit. Orn. Club, XVI, 1905, p. 11.

Angleterre, Écosse, Irlande, île de Wight (niche dans ces pays).

Diffère du type par ses parties supérieures plus foncées, plus olivâtre, ce qui se remarque surtout sur le front, la nuque et le croupion. Le dessous est aussi plus foncé. Aile plus courte : d'ordinaire 53 à 54, souvent seulement 51,5 à 52, exceptionnellement 54 à 57 millimètres.

- b. — azoricus** Seebohm, Hist. Brit. Birds, I, 1883, p. 454.

Açores.

Bec plus long que celui du type (11,8 à 13 millimètres, au lieu de 10 à 11). Dessus plus foncé, plus olivâtre. La couleur du dessous est très variable : les spécimens de San Miguel l'ont brunâtre, ceux des autres îles l'ont plus pâle, blanchâtre, sauf quelques exceptions.

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

2. *Regulus ignicapillus* Licht.

ROITELET A TRIPLE BANDEAU

D. et G., I, p. 555.

a. Sous-espèce nouvelle.

- c. — **teneriffæ** Seebohm, Hist. Brit. Birds, I, 1883, p. 459; Dresser, II, p. 92; *satelles* Koenig, 1889.

Canaries Ouest
(Ténériffe).

Diffère du type par la raie noire qui borde le sommet de la tête, qui est ici plus large et se continue sur le devant du front, et par la ligne frontale bordant le bec, qui est d'un blanc grisâtre.

- d. — **interni** Hartert, Bull. B. Orn. Club, XVI, 1906, p. 45.

Corse
et Sardaigne.

Diffère du type par les côtés de la tête et la nuque gris, et la teinte d'un vert terne, moins jaune, du dessus du corps. Aile : (mâle) 54,5 à 55 millimètres. — En hiver, le type du Continent se trouve dans les deux îles conjointement avec la présente forme, qui est sédentaire.

2. **ignicapillus** (Temm.), Man. Orn., 2^e Ed., I, 1820, p. 231; Dresser, II, p. 459, pl. 72, fig. 1, et 73, fig. 1; *mystaceus* Vieill., 1822; *pyrocephalus* Brehm, 1822.

Région méditerranéenne,
Europe, de la Baltique et la mer du Nord à la Méditerranée;
Afrique Nord;
Angleterre Est et Sud (de passage);
Asie Mineure.

- a. — **madeirensis** Harcourt, Sketch of Madeira, 1851, p. 118; Dresser, II, p. 465, pl. 73, fig. 2.

Ile de Madère
(dans les montagnes).

Couronne de la tête moins richement colorée, les raies pâles au-dessus et au-dessous de l'œil plus courtes, les côtés de la tête et le cou, la nuque et la partie antérieure du dos d'un beau gris ardoisé; le tarse plus long et le pied plus grand que celui du type. Aile : (mâle) 55 à 57 millimètres; (femelle) 52 à 53 millimètres. — La femelle est plus terne et sa couronne est plus pâle.

Famille XXIII — PARIDÉS

Genres MÉSANGE et NONETTE

1. Parus major Linné
MÉSANGE CHARBONNIÈRE
D. et G., I, p. 558.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

(1)

(1) Sous-espèce nouvelle : *Parus major peloponensis*, Parrot (Grèce Sud). — Voyez l'APPENDICE.

XXIII — PARIDÆ

PARUS Linné 1758

Pæcile et *Cyanistes* Kaup, 1829; *Lophophanes* Kaup, 1829.

1. **major** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 189; 1766, p. 341; Dresser, III, p. 79, pl. 106; *fringillago* Pallas, 1827; *robustus*, *cyanotus*, etc., Brehm.

Europe,
du cercle arctique
à la Méditerranée
et à la Sibérie
(Altai) [mais non
les Iles Britan-
niques].

- a. — **newtoni** Prazak, Orn. Jahrb., V, 1894, p. 239.

Angleterre,
Écosse, Irlande.

Bec plus gros, plus massif mais non plus long que celui du type. Par ailleurs, les teintes du plumage ne diffèrent pas de celles des Mésanges du Nord de l'Europe.

- b. — **corsus** Kleinschm., Orn. Monatsb., 1903, p. 6.

Corse et Sardai-
gne (où le type du
Continent
est seulement de
passage).

Aile plus courte de 2 à 3 millimètres. Taille plus faible, couleurs plus sombres, le jaune du dessous plus terne, la tache blanche triangulaire des barbes internes des rectrices plus étroite et semblant en train de disparaître.

(1)

(1) *P. major aphrolite* Madarasz (Term. Füzetek, 1901, p. 272), à dessous couleur crème (type de Chypre), paraît habiter aussi la Grèce et l'Asie Mineure.

2. *Parus ater* Linné

MÉSANGE NOIRE

D. et G., I, p. 560.

a. Sous-espèce nouvelle.**b. Sous-espèce nouvelle.****c. Sous-espèce nouvelle.**

2. **ater** Linné, S. N., Ed. X, 1758, p. 190; 1766, p. 341; Dresser, III, p. 87, pl. 107, fig. 3; *carbonarius* Pall., 1827; *schwederi* Loudon et Tschusi, Orn. Jahrb., 1904, p. 110.

Europe, du 65° latitude Nord jusqu'e dans les montagnes de l'Espagne, de l'Italie et de la Sicile; Sibérie jusqu'au Kamichanka.

Espèce très variable sous le rapport de la longueur de l'aile, de la grosseur du bec, du développement de la huppe, des teintes du plumage (flancs, dessous du corps, croupion, etc.), caractères sur lesquels sont fondées les sous-espèces *P. a. abietum* Brehm; *P. a. sardus* Hartert (1903), dont il est difficile de fixer la répartition géographique avec quelque certitude.

- a. — **britannicus** Sharpe et Dresser, Ann. Nat. Hist., 1871, VIII, p. 437; Dresser, III, p. 93, pl. 107, fig. 2.

Iles Britanniques (Angleterre, Écosse, Irlande).

Diffère du type par son dos d'un gris olivâtre, le croupion d'un fauve pâle, les flancs et les couvertures inférieures de la queue d'un fauve brunâtre. Aile (mâle), 60 à 62 millimètres (en moyenne, plus courte que chez le type).

- b. — **sardus** Kleinschm., Orn. Monats., 1903, p. 186.

Sardaigne (sédentaire).

Le dos n'est pas d'un gris bleuâtre, comme chez *P. a. ater* du continent, mais lavé d'un ton roux jaunâtre moins prononcé néanmoins que chez *P. a. britannicus*. Flancs d'un roux brunâtre prononcé, plus roux que chez *britannicus*. Aile encore plus courte que chez ce dernier.

- c. — **moltchanovi** Menzb., Bull. Brit. Orn. Club, 1903, XIII, p. 49.

Crimée Sud (dans les montagnes).

Semblable au type, mais le gris du dessus plus clair. Dessous presque sans trace de roux sur les flancs. Aile et queue

3. *Parus cæruleus* Linné

MÉSANGE BLEUE

D. et G., I, p. 561.

a. Sous-espèce nouvelle.**b. Sous-espèce nouvelle.**

plus longues ; le bec plus long et plus grele (culmen :
11,9 millimètres).

(1)

3. *cæruleus* Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 190 ;
Dresser, III, p. 131, pl. 113, fig. 1, 2 ; *erectus*
Müller, 1776 ; *pallidus* Grote, 1902 ; *languidus*
Grote, 1904.

Europe, du 64^e
latitude Nord
à la Méditerranée
et au Caucase
(mais non dans
l'extrême Ouest) ;
de passage
seulement (en
hiver)
en Angleterre.

- a. *obscurus* Prazak, Orn. Jahrb., 1894, p. 246.

Grande Bretagne
et Irlande.

Diffère du type par son dessus plus foncé, plus verdâtre,
par l'extrémité blanche des rémiges secondaires internes plus
étroite et coupée plus carrément, surtout par ses dimensions
moindres et son bec notablement plus épais. Aile (mâle). 61
à 64, rarement 65 à 66 millimètres.

- b. — *ogliastræ* Hartert, Vög. Pal. Fauna, I, 1905,
p. 349.

Corse et Sar-
daigne
(sédentaire).

Diffère du type par ses teintes plus foncées (dessus vert
foncé, dessous d'un jaune plus terne, plus verdâtre). Se rap-
proche d'*obscurus*, mais le bec est moins épais et l'extrémité
blanche des rémiges secondaires internes est plus arrondie
(comme chez le type), et non coupée carrément (comme
chez *obscurus*). — Le *P. c. cæruleus* typique se montre seule-
ment pendant l'hiver dans ces îles.

(1) *Parus ater phaeonotus* Blanford ne paraît pas se montrer au Nord du
Caucase, mais seulement en Perse et dans la Transcaspié Sud.

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Sous-espèce nouvelle.

- c. — **meridionalis** Brehm, Verz. Sammlung, 1866, p. 7 (nomen nudum); *subsp. nov.* Hartert, Vög. Pal. Fauna, 1905, p. 349.

Espagne, Madrid,
Sierra Nevada
et Grenade.

Voisin de *obscurus* et surtout de *ogliastræ* par son dos vert (peut-être identique à ce dernier). Dessous d'un jaune vif; bec plus fort (Ne peut être rapproché d'*ultramarinus* (1), mais a besoin d'être mieux étudié, sur une série de spécimens en plumage frais d'automne, avant d'être définitivement admis).

- d. — **degener** Hartert, Nov. Zool., 1901, p. 309, 322; *ultramarinus insularis* Bianchi, 1902.

Iles Fuerteventura
et Lanzarote.

Très semblable à *ultramarinus*, mais les parties supérieures sont d'un bleu-gris plus pâle, le dessous d'un jaune clair. Taille moindre que celle d'*ultramarinus*, mais non d'une façon constante.

- e. — **teneriffæ** Lesson, Traité d'Ornith., 1840 (?), p. 456; Dresser, IX, p. 127, pl. 660, fig. 2; Bolle, Journ. f. Ornith., 1854, p. 455.

Pic de Ténériffe,
Grande Canarie
et Gomera
(dans le même
groupe).

Semblable à *ultramarinus*, mais sans extrémité blanche aux rémiges secondaires et sans bande sur l'aile (les grandes couvertures alaires n'ayant pas la pointe blanche); c'est seulement sur les très jeunes oiseaux que l'on trouve une indication de cette bande blanche.

(1) *Parus cæruleus ultramarinus* Bp., d'Algérie, Tunisie et Maroc, se distingue à première vue par ses parties supérieures d'un bleu intense (sans trace de vert); voyez Dresser, III, p. 139, pl. 113, fig. 2.

f. Sous-espèce nouvelle.

g. Sous-espèce nouvelle.

h. Sous-espèce nouvelle.

(1)

(1) Sous-espèce nouvelle : *Parus caeruleus orientalis* Sarudny et Loudon (Russie Est, Orenbourg, Kazan). — Voyez l'APPENDICE.

- f.** — **ombriosus** Meade-Waldo, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1890, V, p. 103; Dresser, IX, p. 131, pl. 661.

Ile Hierro
(groupe des Canaries).

Derrière du cou et nuque d'un bleu-gris, le reste du dessus d'un vert olivâtre (plus foncé que chez *obscurus*); couvertures supérieures de la queue d'un gris verdâtre. Dessous sans trace blanche médiane, mais avec des taches noirâtres sur la poitrine.

- g.** — **palmensis** Meade-Waldo, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1889, III, p. 490; Dresser, IX, p. 129, pl. 660, fig. 1; Ibis, 1889, pl. 16.

Ile de Palma
(groupe des Canaries).

Sommet de la tête d'un bleu-noir foncé, dessus plus foncé que chez *teneriffæ*, non d'un bleu-gris pur, mais plutôt gris-ardoisé, les grandes couvertures alaires et les rémiges secondaires internes présentant une étroite extrémité d'un blanc pur. Devant de la poitrine, flancs, croupion et couvertures inférieures de la queue d'un jaune soufre pur, assez clair. Poitrine et dessous du corps d'un blanc qui passe sur les côtés au gris avec un reflet crème; le milieu de la poitrine porte des taches noires allongées peu développées ou même indistinctes.

- h.** — **pleskei** Cabanis, Journ. f. Orn., 1877, p. 213; *flavipectus pleskei* Dresser, IX, p. 125, pl. 659; *pleskei pallescens* Hellmayr, 1901 (hybride de *pleskei* $\times$ *cyanus*); *pallidus* Grote, 1902.

Russie Nord-Est
(automne et hiver), Orenbourg, Moscou, Saint-Petersbourg (lieu de reproduction encore inconnu).

Dessus comme chez le type (*P. c. ceruleus*) mais dont le jaune serait éliminé, par conséquent non verdâtre mais d'un gris-bleu pâle; en plumage frais, avec une très légère teinte verte. Dessus de la tête et bande du cou comme *ceruleus* mais le bleu plus pâle et plus terne. Rémiges secondaires internes à pointe blanche plus large, mais ne présentant pas

4. *Parus cyanus* Pallas

MÉSANGE AZURÉE

D. et G., I, p. 562.

a. Sous=espèce nouvelle.**5. *Parus cristatus* Linné**

MÉSANGE HUPPÉE

* D. et G., I, p. 563.

de bordure blanche externe comme *cyanus*. Dessous d'un blanc de crème, plus terne et plus jaune sur les flancs, d'un blanc pur sur la ligne médiane, la gorge avec des taches noires plus étroites que chez le type, la tache du haut de la gorge petite ou nulle. Le devant de la poitrine d'un jaune soufre, souvent très pâle ou présentant des taches allongées ardoisées. Taille moindre que celle du type. Queue comme chez celui-ci, moins longue que celle de *cyanus*. — (Les hybrides de *cyanus* et *pleskei* ne sont pas rares, ce qui permet de supposer que les deux espèces se reproduisent dans les mêmes localités.)

4. ***cyanus*** Pallas, Nov. Comm. Acad. Petrop., 1770, XIV, I, p. 588, pl. 23, 1; Dresser, III, p. 143, pl. 114; *sacbiensis* Sparrm., 1786; *elegans* et *major* Brehm.

Russie Est
et Sibérie Ouest :
émigre (en hiver)
en Russie Ouest,
Suède,
Pologne, Silésie,
Prusse,
rarement plus
à l'Ouest.

- a. — ***tianschanicus*** Menzbier (ex Severzow, nom. nud.), Bull. Soc. Zool. France, 1884, IX, p. 276.

Sibérie
et Turkestan ;
émigre l'hiver en
Europe
(pris près de
Gotha).

Plus petit que le type. Sommet de la tête et tache de la nuque lavés de gris bleuâtre ; dos plus sombre, gris ardoisé, les rectrices externes avec une bordure grise étroitement liserée de blanc ; les rémiges secondaires internes étroitement bordées de blanc.

5. ***cristatus*** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 189 ; Dresser, III, p. 151, pl. 115 ; *septentrionalis* Brehm, 1866.

Europe Nord,
de la Scandinavie
et Russie Nord
aux Carpathes,
Pologne
et Prusse Est, au
Caucase, et
accidentel jusqu'à
l'Angleterre
Sud.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

6. *Pæcile sibirica* (Gm.)

MÉSANGE SIBÉRIENNE

D. et G., I, p. 568.

- a. — **mitratus** Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deuts., 1831, p. 467; *rufescens* Brehm, 1855; *brunnescens* Prazak, 1897.

Allemagne,
Jutland, Hollande,
France.
Alpes, Pyrénées,
Autriche,
Hongrie, pénin-
sule des Balkans,
Espagne
jusqu'à Gibraltar.

Diffère du type du Nord par ses parties supérieures moins grises, plus brunâtres, teintées de roux-brun. Le croupion et les couvertures supérieures de la queue notamment, sont roux-brun. Les côtés blancs de la tête ont d'ordinaire une teinte crème bien marquée. Les flancs sont colorés d'un roux-jaune plus vif et plus foncé. Le bec est légèrement plus long. Les ailes ont la même longueur que celles du type. — (Ces différences sont bien sensibles quand on compare deux séries assez nombreuses des deux provenances.)

- b. — **scoticus** Prazak, Journ. f. Orn., 1897, p. 347.

Ecosse Nord.

Se distingue des formes continentales de l'espèce par ses parties supérieures plus foncées, teintées de brun olivâtre. Taille moindre; aile : 60 à 63 millimètres. Ventre plus brunâtre (Forme bien distincte).

6. **cinctus** Bodd., Tableau des Pl. Enl. de Buffon, p. 44, pl. 708; Dresser, III, p. 125, pl. 112; *sibiricus* Gm., 1788; *lapponicus* Lundahl, 1848; *septentrionalis* Brehm; *microrhynchos* Brehm.

Scandinavie
Nord, Laponie,
Russie Nord
et Sibérie Ouest;
émigre (en hiver)
jusqu'à
Saint-Petersbourg
et Moscou.

Sommet de la tête et nuque d'un brun foncé; poitrine noirâtre. Dos d'un brun doré pâle, légèrement lavé de roux; ailes et queue noirâtres, les rémiges avec une étroite bordure blanche; la queue lavée de gris, les rectrices externes bordées et terminées de blanc sale. Plumes du bas de la gorge étroitement bordées de blanc; poitrine et milieu de l'abdomen blancs; le reste des parties inférieures d'un roux pâle. Bec noirâtre, pieds plombés. Les sexes semblables. Aile (mâle) : 68 à 70 millimètres.

7. Pœcile palustris (Linné)

NONETTE DES MARAIS

D. et G., I, p. 564.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Pœcile communis (Baldenst.)

NONETTE VULGAIRE

D. et G., I, p. 567.

c. Sous-espèce nouvelle.

7. **palustris** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 190 ; 1766, p. 341 ; Dresser, III, p. 99, pl. 108, 109, fig. 1 ; *meridionalis* (part.) Liljeb., 1852 ; *fruticeti* Wallengr., 1854 ; *vera* Brehm, 1856.

Scandinavie
moyenne et Sud,
provinces russes
de la Baltique,
Prusse Est.

- a. — **stagnatilis** Brehm, Vogelfang, 1855, p. 242.

Dos plus brunâtre et bordure des plumes de l'aile plus brune que chez le type ; bec plus long et plus fort, la mandibule supérieure très recourbée, plus large à la pointe que chez le type (Ces différences ne sont bien sensibles que lorsqu'on peut comparer deux séries en plumage frais).

Péninsule des
Balkans,
Russie Sud,
Caucase,
Asie Mineure.

- b. — **communis** Baldenst., Neue Alpina, II, 1827, p. 31 ; *subpalustris* Brehm, 1855 ; *sordida* et *vulgaris* Brehm.

Diffère des deux formes précédentes par ses parties supérieures plus foncées, plus brunâtres. Les côtés de la tête sont couleur crème ou roux clair, les rémiges secondaires plus brun olivâtre. Aile longue (mâle) : 65 à 67, plus rarement 69 millimètres.

Allemagne
(à l'exception de la
région rhénale
et de la
Prusse Est) ;
Alpes (1.000 à
1.200 mètres) ;
Autriche,
Hongrie, Croatie.

- c. — **longirostris** Kleinschm., Orn. Jahrb., 1897, p. 65.

Région rhénale,
France, Belgique,
Hollande.

Semblable à la sous-espèce précédente, mais le dos, surtout la région interscapulaire et le croupion plus foncés, plus olivâtres. Taille de la précédente. Aile (mâle) : 65 à 67, rarement 68 millimètres. Bec variable, mais plutôt gros et long, sans que ce caractère soit constant.

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Sous-espèce nouvelle.

8. Espèce nouvelle (1)
(pour l'Europe)

NONETTE DES SAULES

(*P. salicarius* Brehm, cité comme synonyme de *communis* par Degland et Gerbe).

(1) Le type (*Parus atricapillus* Linné) est de l'Amérique du Nord.

- d. **dresseri** Stejneger, Proc. U. S. Nat. Mus., IX, 1886, p. 200; Dresser, pl. 109, fig. 2.

Angleterre et Sud
de l'Ecosse;
de passage en
Irlande.

Parties supérieures encore plus foncées et proportionnellement d'un rouge-brun plus ou moins marqué, beaucoup moins olivâtre que chez *longirostris*; la teinte vive crème ou presque rousse des côtés plus étendue, les côtés du cou également plus sombres. Taille moindre que celle de *longirostris* et des formes précédentes. Aile : (mâle) 62 à 65, exceptionnellement 66 millimètres; (femelle) 58 à 60. Bec en général épais et court.

- e. — **italicus** Tschusi et Hellmayr, Orn. Jahrb., 1900, p. 201; *tschusii* Hellm., 1901.

Italie entière,
Sicile
et (?) Sardaigne.

Semblable à *communis* mais les parties supérieures plus rousses et plus vivement colorées, ainsi que la bordure des plumes de l'aile; les côtés du cou et les flancs d'un brun crémeux pur.

8. (**atricapillus**) **salicarius** Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deuts., 1831, p. 465; *accedens* et *murinus* Brehm; *musicus* Homeyer; *communis* Olphe-Gaillard; *alpestris* Bailly, 1851.

Allemagne
moyenne, Autri-
che (jusqu'à
1.000 mètres dans
les montagnes).

Diffère des autres « Nonettes » par sa tête noire, sans reflets brillants, à plumes faiblement pigmentées, allongées, peu compactes, à barbes presque décomposées. La tache noire de la gorge presque obsolète. Bec plus allongé, comprimé. Queue plus étagée, les deux paires de rectrices externes nettement plus courtes. Dos d'un gris-brun teinté de roux. Côtés du cou jusqu'à la région auriculaire d'un blanc crémeux sale. Flancs lavés de roux plus vif que chez *P. palustris communis*. Aile (mâle) : 59,5 à 65,5; (femelle) : 57 à 60 millimètres. (Quelquefois le mâle n'est pas plus grand que les plus grosses femelles).

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

a. (*atricapillus*) *rhenanus* Kleinschm., Orn. Monatsb., 1900, p. 168.

Région du Rhin
(de Worms
et Mainz à Wesel),
Hollande,
Belgique, France.

Ne diffère de *P. a. salicarius* que par ses parties supérieures plus sombres et son aile un peu plus courte ; environ 58 à 63 millimètres.

b. (*atricapillus*) *kleinschmidti* Hellm., Orn. Jahrb., 1900, p. 212.

Angleterre et
Ecosse
(sédentaire).

Très voisin de *rhenanus* mais les parties supérieures sont encore plus foncées et plus brunes, et la taille est moindre ; aile : 57 à 61 millimètres dans les deux sexes. Le dessous est plus roux, la région auriculaire est teintée plus vivement de roux crémeux. Le bec est plus gros.

c. (*atricapillus*) *borealis* Sélys, Bull. Ac. Sc. Bruxelles, X, 1843, 2, p. 28 ; *salicarius* Dresser, III, p. 107, pl. 109, fig. 3 ; *colleti* Stejneger, 1889 ; *minor* Kleinschm., 1897.

Scandinavie (Nor-
vège *neq* Islande),
Russie Nord,
Prusse Est ; en
hiver, erratique en
Pologne
et Russie Sud
(Orenbourg).

Mâle : sommet de la tête d'un noir profond plus foncé que chez les autres sous-espèces, et présentant des reflets satinés. Joues, oreilles et côtés du cou d'un blanc pur qui s'étend jusque sur les côtés de la nuque. Dos, scapulaires et couvertures supérieures de la queue, d'un gris brunâtre assez variable, quelquefois presque gris, parfois brunâtre, ce qui est la règle. Bordure des rémiges primaires d'un blanc grisâtre, la bordure des rémiges secondaires plus large. Dessous d'un blanc pur, les flancs teintés d'un crémeux brunâtre. Aile (mâle) : 63 à 67, rarement 68 millimètres. *Femelle* semblable mais un peu plus petite ; aile : 60 à 63 millimètres. Bec petit (Couleur plus claire, plus grise, taille plus forte que celles de *salicarius*).

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Sous-espèce nouvelle.

f. Sous-espèce nouvelle.

9. *Pæcile lugubris* (Natterer)

NONETTE LUGUBRE

D. et G., I, p. 569.

d. (*atricapillus*) *assimilis* Brehm, Vogelfang, 1855,
p. 242.

Semblable à *borealis*, mais le bec plus comprimé, plus grêle, un peu plus long. Aile aussi longue ou plus longue. Flancs d'un roux-jaune vif, plus clair vers le dos mais avec plus de roux, ce qui fait paraître cette région plus brunâtre que chez *borealis*. Aile (mâle) : 66 à 69,5 ; (femelle) : 63 à 65 millimètres.

Carpathes,
Alpes de Trans-
silvanie,
montagnes de
Bosnie
et de Serbie.

e. (*atricapillus*) *bianchii* Zarudny et Härms, Orn.
Monatsb., 1900, p. 67 ; *salicaria neglecta* Z. et
H. (antea, nec Ridgway).

Russie Ouest
(Pleskau),
de passage en
hiver.

Très semblable à *assimilis*, mais le dessus, avec les couvertures supérieures de la queue, brunâtre, d'un brun vif ; le bec plus court et plus massif. Les flancs semblent plus pâles.

f. (*atricapillus*) *montanus* Baldenst., Neue Alpina,
II, 1827, p. 31 ; *alpestris* Bailly, 1851 ; *alpina*
Brehm ; *baldensteini* Salis, 1861.

Alpes de Suisse
et de Savoie,
de 1.200 à
2.000 mètres d'al-
titude.

Nettement plus grand que les autres formes de l'espèce. Dessus plus foncé, brunâtre, les rectrices plus larges. Sommet de la tête plus teinté de brun que chez *borealis*. Le dos est d'un brun foncé, plus pur que chez *assimilis*, plus clair que chez *salicarius* et ses formes occidentales. Aile (mâle) : 70 à 71 ; (femelle) : 64 millimètres.

g. *lugubris* Temm., Man. d'Ornith., 2^e Éd., 1820, I,
p. 293 ; Dresser, III, p. 121, pl. 111.

Péninsule
des Balkans (dans
le Nord),
Istrie, Illyrie,
Dalmatie, Bosnie,
Herzégovine,
Serbie, Hongrie
Sud,
exceptionnelle-
ment dans le Nord
de l'Italie.

a. Sous-espèce nouvelle.

Genre PANURE

1. **Panurus biarmicus** (Linné)

PANURE A MOUSTACHES

D. et G., I, p. 573.

a. Sous-espèce nouvelle.

- a. — **lugens** Brehm, Vogelfang, 1855, p. 243; *gracilis* Reiser, 1901.

Grecce (Asie)
et Turquie.

Semblable au type, mais plus petit; aile : 70 à 73 (au lieu de 72 à 76) millimètres. Le sommet de la tête plus terne et plus brumâtre.

PANURUS Koch 1816 (1)

Calamophilus Leach, 1816.

1. **biarmicus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 190; Dresser, III, p. 49, pl. 102; *barbatus* Pallas, 1827; *arundinaceus* (part. ?) Brehm, 1831, et *dentatus* Brehm; *occidentalis* Tschusi, 1904.

Europe
Sud-Ouest,
de l'Espagne Est
à la Grèce
(France, Italie,
Angleterre, Hol-
lande, Holstein,
Mecklembourg).

- a. — **ruissicus** Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deuts., 1831, p. 472; *raddei* Prazak, 1897.

Europe Sud-Est,
de la Galicie
à travers la Hon-
grie, la Rou-
manie,
la Russie Sud;
jusqu'en
Asie Mineure
et l'Asie Centrale.

Plumage plus clair et plus pâle que celui du type occidental; le dos est particulièrement plus pâle. Couvertures supérieures de la queue teintées de rose. Bordure interne des rémiges secondaires internes d'un blanc presque pur.

(1) Hartert classe ce genre près de *Paradoxornis* (qui bâtit un nid également ouvert par le haut), malgré la grande différence dans la forme du bec, d'ailleurs très variable chez les *Paride*.

Genre ORITE

1. *Orites caudatus* (Linné)

ORITE LONGICAUDE

D. et G., I, p. 571.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

ÆGITHALUS Hermann 1804

Acredula Koch, 1816 ;*Orites* Mœhring, 1752 ; *Mecistura* Leach, 1816.

- 1. caudatus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 190 ;
1766, p. 342 ; Dresser, III, p. 67, pl. 104 ;
macrura Seebohm, 1883 ; *pinetorum* Brehm
(partim).

Europe Nord
et Est, Sibérie et
Japon Nord ;
du milieu de l'Al-
lemagne
à la Roumanie et
au Caucase (en
hiver) ; accidentel
en Belgique,
France, et plus ra-
rement
en Angleterre.

- a. — europæus** Hermann, Obs. Zool., 1804, p. 214
(Pipra) ; *longicaudus* Brehm, 1831 ; *pinetorum*
(part.) Brehm.

Europe Sud,
de la Hollande, de
la France
et de l'Allemagne
Ouest, à travers
l'Italie Nord,
jusqu'à la pénin-
sule des Balkans.

Semblable au type du Nord, mais le plumage moins riche
et moins abondant. Les côtés de la tête portant, à partir des
yeux, des raies noires ou brunes plus ou moins larges.
Région auriculaire plus sombre ; le devant de la poitrine
portant une raie de taches brunes plus ou moins marquées ;
rémiges primaires présentant à peine une légère bordure
blanche, plus souvent sans trace de cette bordure ; queue
présentant (sur les rectrices externes) une extrémité blanche
au plus de 5 millimètres, ou souvent plus courte encore.
Aile : 62 à 67 millimètres.

- b. — roseus** Blyth, in : White, Nat. Hist. Selborne,
1836, p. 17 ; Dresser, III, p. 63, pl. 103 ; *lon-
gicaudata* Macgilliv., 1839.

Grande-Bretagne
et Irlande,
France Ouest
jusqu'aux Pyré-
nées.

Diffère d'*europæus* par ses ailes plus courtes (58 à 62 milli-
mètres) et sa queue un peu plus courte. Raies noires des

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Sous-espèce nouvelle.

côtés de la tête plus larges, de telle sorte que le blanc du milieu de la tête est plus réduit et de plus tacheté souvent de brun-noir. Le haut de la poitrine porte d'ordinaire une raie de taches noires ; la région auriculaire est d'un brun sombre et même tachetée de brun foncé. Le bord de la paupière, chez les adultes, est orangé (et non jaune), et chez l'oiseau vivant, d'un rose vif.

c. **tauricus** Menzb., Bull. Brit. Orn. Club, 1903, XIII, p. 49.

Crimée (torêts des montagnes de Yala).

Semblable à *rosens*, mais le milieu de la tête d'un blanc pur, et les scapulaires fortement teintées de gris. La raie de taches de la poitrine très peu distincte. — Diffère de *macedonicus* en ce que le noir des côtés de la tête ne s'étend pas jusqu'au bec ; en outre le noir du dos est plus étendu.

d. — **macedonicus** Dresser, Bull. Brit. Orn. Club., I, 1892, p. 15 ; i.d., Suppl. IX, pl. 655, fig. 1.

Grèce, Macédoine (Mont Olympe), Thessalie jusqu'à Monastir (en Turquie), mais non dans le Péloponèse.

Diffère de *rosens* en ce que le noir profond et plus étendu de la tête s'avance jusqu'à la base du bec et jusqu'au devant des yeux. Dans le milieu de la gorge, une tache grise qui tranche sur le blanc du menton. Bord des paupières d'un beau jaune soufre.

e. — **irbyi** Sharpe et Dresser, Proc. Zool. Soc. Lond., 1871, p. 312 ; Dresser, III, p. 73, pl. 103, fig. 1.

Espagne (Gibraltar), Portugal, France Sud, Italie, Vénétie et côtes de l'Adriatique, Corse, Sardaigne, Ile d'Elbe ; s'égare jusque dans le Tyrol, et pris (une fois) près Paris.

Plumes du front brun clair ; sommet de la tête également plus ou moins lavé de brun ; les raies des côtés de la face, très larges, brun-noir, se réunissant sur la nuque pour former une large tache noire. *Dos gris* ; scapulaires d'un rose vineux qui s'étend souvent sur le dos, les plumes latérales de cette région et celles du croupion ayant leur extrémité d'un rose vineux. Couvertures supérieures de la queue noires à extré-

f. Sous-espèce nouvelle.

g. Sous-espèce nouvelle.

mité grise. Côtés de la tête d'un blanc brunâtre ; région auriculaire rayée de brun, côtés du cou rayés de noir. Dessous d'un blanc sale. Poitrine tachetée de brun sombre, le rose vineux des côtés s'étendant jusque sur cette région. Aile : 58 à 62 millimètres. — Le noir du dos est quelquefois plus étendu, certains spécimens formant la transition entre *europæus* et *roseus*.

f. *siculus* Whitaker, Bull. Brit. Orn. Club, XI, 1901, p. 52 ; Ibis, 1902, p. 54, pl. 2.

Sicile.

Semblable à *Æ. c. major* (du Caucase), mais plus petit, l'aile n'ayant que 56 à 57 millimètres. Sommet de la tête fortement obscurci par du brun, de sorte qu'aucune raie d'un blanc pur n'y apparaît ; la partie noire du dos très réduite. Les rectrices sont nettement plus étroites et la queue plus courte (73 millimètres). Tour de l'œil jaune.

g. *major* Radde, Ornith. Caucas., 1884, p. 144, pl. 6, fig. 1 ; *caucasica* Lorenz, 1887 ; Dresser, IX, p. 113, pl. 655, fig. 2 ; *dorsalis* et *senex* Madarasz, 1900 ; *major* Buturlin, Ibis, 1906, p. 420.

Caucase Nord
(Kura-Tal).

Diffère d'*irbyi* par les raies des côtés de la tête qui ne sont pas noires mais brun clair ; ces raies deviennent plus foncées en arrière et se fusionnent, sur le derrière du cou, en une large tache noire. Sur la gorge, il existe souvent une tache grise indistincte. Aile : 60 à 63 millimètres. — Un spécimen à raies céphaliques très pâles et étroites, à bandes du dos très étroites, a été décrit sous le nom de « *senex* » ; un autre à raies céphaliques très foncées, à dos fortement teinté de noir, sous celui de « *dorsalis* ». La présence de trois formes distinctes dans la même localité (Pjatigorsk). est tout à fait invraisemblable, ces deux dernières formes surtout n'étant connues chacune que par un seul spécimen.

h. Sous-espèce nouvelle.

Genre RÉMIZ

1. *Ægithalus pendulinus* (Linné)

RÉMIZ PENDULINE

D. et G., I, p. 575.

a. Sous-espèce nouvelle.

- h. — tephronotus** Günther, Ibis, 1865, p. 95, pl. 4;
Dresser, III, p. 75, pl. 105, fig. 2.

Turquie Sud-Est
(environs de
Constantinople).
Perse, etc. ;
Asie Mineure,
Perse, Grèce (à
l'automne).

Semblable à *A. irbyi*, mais en différant par une large tache d'un gris noirâtre sur le milieu de la gorge ; le blanc du sommet de la tête est teinté de brun ; le dessous est d'un blanc sale avec quelques raies indistinctes sur la poitrine ; les flancs, le bas-ventre et les couvertures inférieures de la queue sont (comme chez les autres formes) lavés de rose. Bec et pattes noirs ; iris d'un rouge brunâtre avec un cercle extérieur d'un blanc bleuâtre ; bord des paupières orangé. Les sexes sont semblables. Aile : 58 à 61,5 millimètres. Rectrices très étroites.

ANTHOSCOPUS *Cabanis* 1851

Ægithalus (part.) Boie ; *Pendulinus* Brehm.

- 1. pendulinus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 189 ; Dresser, III, p. 159, pl. 116 ; *narbo-nensis* Gm., 1788 ; *polonicus* Brehm, 1831 ; *medius* et *macrourus* Brehm ; *minimus* Gloger, 1842 ; *raddei* Prazak, 1897.

Europe Sud,
de l'Espagne Est,
France Sud,
Italie et le Sud-Est
de l'Europe
(sauf la Russie),
au Nord
jusqu'à l'Autriche
(Vienne),
la Pologne,
la Russie Sud,
l'Asie Mineure,
s'égare jusqu'en
Allemagne.

- a. — caspius** Poelzham, Protok. Kasan Univ., I, 1870, p. 141 ; *castaneus* Sewerz., 1873 ; Dresser, III, p. 165, pl. 117 ; *galliardi* d'Hamonville, 1876.

Russie Sud-Est
dans les environs
de la Caspienne
(delta
de la Volga),
au Nord jusqu'à
Orenbourg.

Diffère du type par le sommet de la tête, la nuque et les côtés du cou d'un roux-marron ; le dos d'un marron plus

Famille XXIV — AMPELIDÉS

Genre JASEUR

1. *Ampelis garrulus* Linné

JASEUR DE BOHÈME

D. et G., I, p. 577.

foncé; la bordure blanche des penes de l'aile plus large, et plus de marron sur la gorge. — La *femelle* a le sommet de la tête et la nuque d'un isabelle terne teinté de marron et moins de marron sur la gorge. Les vieilles femelles prennent le plumage du mâle.

XXIV — AMPELIDÆ

BOMBYCILLA Vieillot 1807

Ampelis L., 1735.

1. *garrulus* Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 95; Dresser, III, p. 429, pl. 155; *bombycilla* Pallas, 1827; *lientericus* et *poliocalia* Meyer; *brachyrhynchus* Brehm, 1855.

Zone arctique des deux continents (où il niche); émigre en hiver au Sud, plus ou moins suivant les années : Prusse, France, Italie, etc. : de passage régulier en Angleterre.

Famille XXV — MUSCICAPIDÉS

**Genres GOBE-MOUCHE, BUTALIS
et ERYTHROSTERNE**

1. *Muscicapa nigra* Brisson

GOBE-MOUCHE NOIR

D. et G., I, p. 580.

a. Sous-espèce nouvelle.

XXV — MUSCICAPIDÆ

MUSCICAPA Linné (*ex Brisson*) 1766

Butalis Boie, 1826; *Erythrosterina* Bonap., 1838.

1. **atricapilla** Linné, Syst. Nat., 1766, p. 326; Dresser, III, p. 453, pl. 157, 158, fig. 2; *luctuosa* Scopoli, 1769; *maculata* Müll., 1776; *muscipeta* Bechst., 1794; *obscura*, *alticeps*, etc., Brehm.

Europe, du 65° latitude Nord jusqu'à l'Espagne, la France, l'Italie, la Sardaigne; à l'Est jusqu'à l'Oural, au Sud-Est jusqu'à l'Autriche; en Angleterre très local (Galles Nord, Écosse, de passage en Irlande); hiverne en Afrique (Benué, Congo, Nil).

- a. — **semitorquata** Homeyer, Zeits. ges. Orn., II, 1885, p. 185, pl. 10; Dresser, IX, p. 173.

Caucase, Asie Mineure, Perse et Grèce (où il niche); en hiver sur les bords du Golfe Persique.

Cette forme n'a pas de véritable collier, mais le blanc des côtés du cou forme un chevron blanc de 1 demi-centimètre à 1 centimètre et demi, plus étroit en avant. Les rectrices externes ont sur leur bord externe plus de blanc que chez le type; les barbes externes sont ordinairement entièrement blanches, les barbes internes blanches avec des taches noires près de leur extrémité, quelquefois avec du noir sur une plus grande étendue. Quelquefois le noir s'étend sur les rectrices externes autant ou même plus que chez beaucoup de spécimens du type, si bien que les barbes sont noires des deux côtés de la plume, les barbes externes portant seulement une longue bordure blanche. La base blanche des rémiges primaires forme un miroir sur l'aile. Aile : 81 à 84 millimètres.

2. *Muscicapa collaris* Bechst.

GOBE-MOUCHE A COLLIER

D. et G., I, p. 581.

3. *Butalis grisola* (Linné)

BUTALIS GRIS

D. et G., I, p. 583.

4. *Erythrosterna parva* (Bechst.)

ERYTHROSTERNE ROUGEATRE

D. et G., I, p. 584.

2. *collaris* Bechst., Gem. Naturg. Deuts., 1795, IV, p. 195; Dresser, III, p. 459, pl. 158, fig. 1; *albicollis* Temm., 1815; *streptophora* Vieill., 1828; *albifrons* Brehm, 1831; *melanoptera* Heckel, 1833.

Espèce très voisine de *M. atricapilla*, à laquelle elle se rattache par *M. a. semitorquata*, et que l'on pourrait considérer comme une simple sous-espèce d'*atricapilla*.

Ile Gotland, Danemark,
Allemagne, Pologne; Europe
Sud-Est, de la Galicie à la Grèce
et ses îles;
Italie et ses îles;
France, Suisse,
Corse, etc.;
hivernent en Egypte
et dans
l'Afrique tropicale
(Côte d'Or).

3. *striata* (Pallas), Vroeg, Catal. Versam. Vogelen, 1764, p. 3; *grisola* Linné, Syst. Nat., Ed. XII, 1766, p. 328; Dresser, III, p. 447, pl. 156; *montana*, *pinetorum*, etc., Brehm; *jinschi* Bock, 1878.

Europe,
de Tromsø et Arkangel à
la Méditerranée;
Afrique Nord
(Atlas); hivernent
en Afrique
tropicale et Sud.

D'après Hartert, cette espèce ne présente qu'une seule mue annuelle.

4. *parva* (Bechst.), Latham, Allg. Uebers. d. Vög., 1794, II, p. 356; Dresser, III, p. 465, pl. 159; *rufogularis* Brehm, 1831; *laïs* Hempr. et Ehrenb., 1834.

Europe Nord et
moyenne,
de Saint-Petersbourg aux Alpes
et à la Sibérie
Ouest; sporadique
en Allemagne
et en Autriche;
de passage
à Hélioland;
accidentel dans les
Iles Britanniques
et en France;
rare en Italie, en
Grèce, en Egypte;
hivernent dans
l'Inde Ouest.

Famille XXVI — HIRUNDINIDÉS

Genre HIRONDELLE

1. *Hirundo rustica* Linné

HIRONDELLE RUSTIQUE ou DE CHEMINÉE

D. et G., I, p. 587.

[a. Sous-espèce étrangère à l'Europe

(*Hirundo cabirica*, D. et G.).]

2. *Hirundo rufula* (1) Temm.

HIRONDELLE ROUSSELINE

D. et G., I, p. 590.

(1) *Hirundo daurica* Savi, 1831, a la priorité sur *H. rufula* Temm., 1835. — Le type (*H. daurica daurica* Linné) est de Sibérie et de l'Asie Centrale.

XXVI — HIRUNDINIDÆ

CHELIDON *Forster* 1817*Hirundo* (part.) Linné ; Pallas et Auct.

1. **rustica** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 191 ;
 Dresser, III, p. 477, pl. 160, fig. 1 ; *domestica*
 Pall., 1827 ; *pagorum* et *stabulorum* Brehm ;
sawitzkii Loudon, 1904.

Europe entière
 et Afrique Nord
 jusque dans les
 oasis du Sahara :
 Sibérie Ouest
 et Asie Sud-Ouest
 jusqu'au
 Beloutchistan ;
 hiverne dans toute
 l'Afrique
 jusqu'au Cap,
 en Asie jusqu'à
 l'Inde
 et la Malaisie.

- [a. — **savignyi** Stephens, 1817 ; *cabirica* Licht., 1823.]

Cette sous-espèce est strictement africaine. Les spécimens pris en Europe qui lui ont été rapportés, paraissent appartenir à une variété à ventre foncé de *rustica* typique.

[Afrique Nord-
 Est, Égypte
 et Nubie, où elle
 est sédentaire.]

2. (**daurica**) **rufula** Temm., Man. d'Orn., 2^e Éd.,
 1835, III, p. 298 ; Dresser, III, p. 487,
 pl. 161 ; *temminckii* (Lillia) Hume, 1877.

Turkestan, Perse,
 Asie Centrale,
 Palestine,
 Égypte, Asie
 Mineure, Chypre,
 Grèce, Italie,
 Sicile ; accidentel
 à Hélioland,
 dans les Iles Bri-
 tanniques,
 la France Sud ;
 Afrique Nord.

Genre CHELIDON *Boie***1. Chelidon urbica** (Linné)

HIRONDELLE DE FENÊTRE

D. et G., I, p. 592.

[Progne purpurea (Linné)

PROGNÉ POURPRE

D. et G., I, p. 594].

Genres COTYLE *Boie* 1822 **et BIBLIS** *Lesson* 1837**1. Cotyle riparia** (Linné)

COTYLE RIVERAINE

D. et G., I, p. 596.

HIRUNDO Linné 1758*Chelidon* Boie, 1822 (nec Forster, 1817).

1. **urbica** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 192 ;
 Dresser, III, p. 495, pl. 162 ; *domestica* Leach,
 1816 ; *fenestrarum* Brehm, 1831 ; *lectorum*
 Brehm, 1855.

Europe, du 70°
 latitude Nord
 jusqu'à
 la Méditerranée ;
 Sibérie Ouest,
 Turkestan ;
 hiverne dans
 l'Afrique Sud-Est
 (Mossamedès),
 et l'Inde Nord-
 Ouest.

[Espèce de l'Amérique Nord, considérée actuellement
 comme étrangère à l'Europe.]

[Amérique Nord ;
 prise deux
 ou trois fois dans
 les Iles
 Britanniques.]

RIPARIA Forster 1817

Cotile Boie, 1822 ; *Cotyle* Boie, 1827 ;
Biblis Lesson, 1837.

1. **riparia** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 192 ;
 Dresser, III, p. 505, pl. 163 ; *europaea* Forster,
 1817 ; *cinerea* Vieill., 1817 ; *fluviatilis* Brehm.

Europe, du 70°
 latitude Nord
 (péninsule de Kola
 en Russie),
 à la Méditerranée,
 îles Baléares ;
 Afrique Nord ;
 Sibérie, Perse ;
 émigre en Afrique
 Est et Sud
 et dans l'Inde.

2. Biblis rupestris (Scopoli)

BIBLIS RUPESTRE

D. et G., I, p. 597.

Famille XXVII — CYPSELIDÉS**Genre MARTINET****1. Cypselus apus** (Linné)

MARTINET NOIR

D. et G., I, p. 601.

a. Sous-espèce nouvelle.

2. **rupestris** (Scop.), Annus I Historico-Nat., 1769, p. 167; Dresser, III, p. 513, pl. 164; *montana* Gm., 1789; *obsoleta sarda* Arrigoni, 1902.

Afrique Nord (Atlas), pourtour de la Méditerranée et ses îles; Europe Sud jusqu'aux Pyrénées, France Sud, Alpes, Balkans; Asie Mineure jusqu'au Tibet; émigre dans l'Afrique Nord-Est et l'Inde.

XXVII — CYPSELIDÆ

APUS Scopoli 1777

Cypselus Illig., 1811.

1. **apus** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 192; 1766, p. 344; Dresser, IV, p. 58, pl. 266; *murarius* Wolf, 1810; *vulgaris* Stephens, 1817; *balstoni* Bartlett, 1879.

Europe, du 70° latitude Nord (Scandinavie et Russie), jusqu'à l'Oural (remplacé en partie dans l'Europe Sud par la sous-espèce suivante); hiverne dans l'Afrique Sud et à Madagascar.

- a. — **kollibayi** Tschusi, Orn. Jahrb., XIII, 1902, p. 234.

Dalmatie Sud et île Curzola; Italie (Toscane), Portugal (Cintra). La forme type se trouve aussi en Dalmatie.

Un peu plus gros que le type et en plumage frais d'un noir un peu plus foncé, mais devenant, en été, également brunâtre. Tache du menton large et presque d'un blanc pur (mais quelquefois aussi petite et brune). Aile un peu plus longue : 174 à 185 millimètres.

2. *Cypselus melba* (Linné)

MARTINET ALPIN

D. et G., I, p. 602.

3. Espèce nouvelle (1)
(pour l'Europe)

MARTINET MURIN

a. Sous-espèce nouvelle.

(1) Le type (*A. murinus murinus* Brehm) est d'Égypte et de Perse où il est sédentaire (figuré par Dresser, IV, pl. 268).

2. **melba** (Linné), Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 192 ; 1766, p. 345 ; Dresser, IV, p. 603, pl. 269 ; *alpina* Scop., 1769 ; *tuneti* Tschusi, 1904.

Europe Sud, Pyrénées, Alpes, îles de la Méditerranée, Afrique Nord-Ouest, Crimée, Caucase, Asie jusqu'à l'Inde Sud et Ceylan ; accidentel dans le centre de l'Europe, à Hélioland et en Angleterre.

3. (**murinus**) **brehmorum** Hartert, in Naumann, Naturg. Vög. Mitteleurop., 2^e Éd., IV, 1901, p. 233.

Madère, Canaries, Espagne Sud, Maroc, Algérie, Tunisie ; hiverne au Benguela et au Damara.

Très voisin de *A. apus* mais plus pâle, d'un gris-brun, clair surtout sur le front, les rémiges, la queue et ses couvertures inférieures ; le blanc de la gorge est plus étendu, la queue plus courte et moins fourchue. Les plumes de la poitrine et du dessous du corps ont de larges bordures subterminales foncées et en outre une bordure terminale très étroite, mais très nette et constante, de couleur blanche. La 1^{re} rémige est aussi longue que la 2^e (quelquefois plus longue), tandis que chez *A. apus* cette 1^{re} rémige est de 1 demi-centimètre plus courte que la 2^e. — Aile : 164 à 175, quelquefois 180 millimètres.

- a. (**murinus**) **illyricus** Tschusi, Orn. Jahrb., XVIII, 1907, p. 29 ; *apus pallidus* Brehm, 1866 (nomen nudum).

Dalmatie Sud, côtes de Croatie ; France Sud-Est (jusqu'à Lyon) ; Espagne ; Chypre ; Italie Sud (Tarrente).

Semblable à *A. m. brehmorum*, mais plus foncé surtout sur le front, le dos et les rémiges primaires, ainsi que sur la poitrine et le dessous du corps. — La différence se constate facilement quand on compare des séries suffisamment nom-

4. Espèce nouvelle
(pour l'Europe)
MARTINET UNICOLE

Genre CHÉTURE

1. Espèce nouvelle
(pour l'Europe)
CHÉTURE A QUEUE POINTUE

breuses, bien que certains spécimens (de Madère et d'Algérie) soient difficiles à distinguer de ceux de Dalmatie. Les deux formes se relient l'une à l'autre et leurs distributions géographiques s'entremêlent.

4. **unicolor** Jardine, Edinb. Journ. Nat. et Geogr. Sc., 1830, I, p. 242, pl. 6; Dresser, IV, p. 601, pl. 268.

Madère et les Canaries Ouest, avec Fuerteventura.

Semblable à *A. apus*, mais plus petit, la queue plus profondément fourchue, le menton et la gorge un peu plus pâles que le reste des parties inférieures, et celles-ci finement rayées transversalement de blanc brunâtre, la bordure des plumes étant de cette couleur. Aile : 150 à 155, rarement 157,5 millimètres.

(1)

CHÆTURA *Stephens* 1826

Acanthylis Boie, 1826; Dresser et Auct.

1. **caudacuta** (Latham), Ind. Orn., Suppl., 1801, p. I.VII; Dresser, IV, p. 613, pl. 270; *fusca* et *australis* Stephens, 1817 et 1826; *ciris* Palas, 1827; *macroptera* Swains., 1829.

Sibérie Est, Mongolie, Japon; de passage en Chine; émigre en Australie et Nouvelle-Zélande; très accidentel en Europe (pris deux fois en Angleterre).

Le genre est caractérisé par sa queue égale et dont les rectrices, dépourvues de barbes à l'extrémité, se terminent en pointe aiguë sur une étendue de 3 à 5 millimètres.

Tête et nuque noires à reflets verdâtres, face blanche. Dos et croupion bruns, passant au brun blanchâtre sur le milieu du dos. Ailes, couvertures supérieures de la queue et queue

(1) *Apus affinis galilejensis* (Antinori, 1855). d'Afrique Nord et de Palestine, à queue égale ou très faiblement échancrée, a été pris une seule fois en Italie. — Figuré par Dresser, IV, pl. 285.

Famille XXVIII — CAPRIMULGIDÉS

Genre ENGOULEVENT

1. *Caprimulgus europæus* Linné

ENGOULEVENT D'EUROPE

D. et G., I, p. 694.

a. Sous-espèce nouvelle.

noires, à reflets vert-bouteille, les rémiges secondaires internes blanches sur leurs barbes internes. Menton, gorge, ventre et couvertures inférieures de la queue blancs. Le reste des parties inférieures d'un brun de suie, mais les flancs blancs, lavés de bleu-noir brillant. Pattes d'un pourpre livide. Aile : 196 à 211, rarement 214 millimètres.

XXVIII — CAPRIMULGIDÆ

CAPRIMULGUS *Linne* 1758

1. **europæus** Linné, Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 193 ; Dresser, IV, p. 621, pl. 271 ; *vulgaris* Vieill., 1828 ; *punctatus* Wolf, 1810.

Europe,
de la Finlande et
d'Arkangel
à la Méditerranée,
sauf au Sud
(où il est remplacé
par la sous-
espèce suivante) ;
hiverné
en Afrique jus-
qu'au Cap.

- a. — **meridionalis** Hartert, Ibis, 1896, p. 370.

Semblable au type, mais plus petit, et d'ordinaire la teinte des parties supérieures plus vive ou plus claire. (On trouve les deux livrées dans la même couvée, comme c'est aussi le cas pour le type). Aile (mâle) : 174 à 186, rarement 189 et 190 millimètres.

Europe Sud
et Afrique Nord ;
Espagne, Corse,
Sardaigne, Italie,
péninsule des
Balkans jusqu'en
Hongrie, Grèce,
Caucase, Crimée ;
Asie Mineure ;
hiverné
en Afrique (mais
ne s'avance pas
jusqu'au Sud).

2. *Caprimulgus ruficollis* Temm.

ENGOULEVENT A COLLIER ROUX

D. et G., I, p. 605.

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

ENGOULEVENT D'ÉGYPTE

2. *ruficollis* Temm., Man. d'Orn., 2^e Ed., 1820, I, p. 438; Dresser, IV, p. 633, pl. 273; *rufitorquis* et *rufitorquatus* Vieill., 1822 et 1828.

Europe Sud, Portugal, France Sud, Maroc; exceptionnellement à Malte, en Sicile, à Madère, en Dalmatie, en Angleterre; hiverne dans le Sahara.

3. *ægyptius* Licht., Verz. Doubl. Mus. Berlin, 1823, p. 59; Dresser, IV, p. 629, pl. 272; *isabellinus* Temm., 1825; *arenicolor* Sewertz., 1875.

Asie Ouest, du Turkestan et de la Transcaspie à la Perse; Egypte et Nubie; accidentel en Europe Sud (Malte, Sicile, Hélioland, Angleterre).

D'un gris de sable isabelle, vermiculé et barré de noir; barbes internes des rémiges primaires en grande partie blanches, mais sans taches blanches sur les ailes ou sur la queue; queue vermiculée et barrée de noir. Dessous isabelle, finement barré de noirâtre; une tache blanche sur la gorge. Pieds d'un brun rougeâtre; bec brun foncé, iris noir. La femelle est un peu plus obscurément rayée et n'a pas de blanc aux ailes. — Aile : 195 à 212 millimètres.

Ordre III — PIGEONS

Famille XXIX — COLOMBIDÉS

Genre COLOMBE

1. *Columba palumbus* Linné

COLOMBE RAMIER

D. et G., II, p. 6.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

III — COLUMBÆ

XXIX — COLUMBIDÆ

COLUMBA Linné 1758

1. **palmus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 282 ;
Dresser, VII, p. 3, pl. 454 ; *torquata* Leach,
1816.

Europe, du 65^e
latitude Nord
à la Méditerranée
et à ses îles ;
Afrique Nord ;
Asie
jusqu'à Bagdad.

- a. — **madeirensis** Tschusi, Ornith. Jahrb., XV,
1904, p. 227.

Ile de Madère
(sédentaire).

Les caractères de cette sous-espèce ne nous sont pas connus. Elle est très voisine du type, et surtout caractérisée par son habitat sédentaire dans l'île où elle niche, le type y étant seulement de passage.

- b. — **azorica** Hartert, Nov. Zool., XII, 1905, p. 93.

Iles Açores
(sédentaire).

Diffère du type d'Europe par sa poitrine plus foncée et tirant davantage sur la teinte vineuse, par la couleur d'un gris ardoisé plus foncé de la tête et du croupion. L'extrémité des couvertures supérieures de la queue est moins brunâtre, et les couvertures inférieures, ainsi que les couvertures alaires ont une teinte plus foncée. Ces caractères bien visibles chez le mâle, le sont moins chez la femelle. Aile plus courte de 5 à 10 millimètres que chez le type.

2. Columba ænas Linné

COLOMBE COLOMBIN

D. et G., II, p. 8.

3. Espèce nouvelle

COLOMBE DES CANARIES

4. Espèce nouvelle

COLOMBE DE BOLL

2. *ænas* Linné, Fauna Suecica, 1761, p. 75 ; Dresser, VII, p. 23, pl. 458.

Europe, du 61°
latitude Nord
à la Méditerranée
et ses îles ;
Afrique Nord-
Ouest,
Asie Mineure et
Turkestan.

3. *laurivora* Webb et Berth., Orn. Canar., 1841, p. 26, pl. 3 (fig. inf.) ; Dresser, VII, p. 31, pl. 460.

Iles Canaries
(Palma
et Gomera).

Tête, cou et dos d'un bleu ardoisé assez terne, le sommet de la tête et la nuque à reflets verts et pourprés. Dessus des ailes d'un brun ardoisé, les rémiges d'un brun foncé. Queue d'un brun pâle tirant sur le gris cendré, devenant plus pâle vers son milieu, et d'un gris blanc à l'extrémité. Gorge à plumes d'un rouge bordé de vert ; le reste des parties inférieures d'un rouge de cuivre, les couvertures inférieures de la queue bleu ardoisé. Bec blanc, couleur de chair à la base ; pattes d'un rouge foncé ; iris jaune. *Femelle* semblable au mâle. Aile : 220 millimètres.

4. *bolli* Godman, Ibis, 1872, p. 217 ; Dresser, VII, p. 29, pl. 459.

Canaries (Té-
nériffe,
Palma, Gomera).

Diffère de *C. laurivora* par ses parties supérieures plus bleues et plus foncées ; la gorge jusqu'à la poitrine d'un bleu ardoisé à faibles reflets verts, la poitrine et les parties inférieures d'un rouge vineux foncé, les flancs, l'abdomen en arrière et les couvertures inférieures de la queue d'un bleu d'ardoise foncé. Queue noirâtre, largement terminée de bleu-tourterelle (1) foncé, mais avec l'extrémité d'un ardoisé sale. Bec rouge, blanc à sa pointe. Pattes, iris et cercle des paupières d'un rouge corail. Aile : 210 millimètres.

(1) Le « bleu-tourterelle » est un gris cendré bleuâtre, plus clair que le bleu ardoisé.

5. Espèce nouvelle

COLOMBE TROCAZ

6. *Columba livia* Briss.

COLOMBE BISET

D. et G., II, p. 9.

(1)

Genre TOURTERELLE**1. *Turtur auritus* Ray.**

TOURTERELLE VULGAIRE

D. et G., II, p. 14.

(1) Le Pigeon migrateur (*Ectopistes migratorius* L.), de l'Amérique du Nord, très accidentel en Europe, actuellement en voie d'extinction, n'est plus considéré comme devant figurer dans la faune d'Europe.

5. **trocax** Heinck., in Brewst. Journ. Science, 1829, p. 228; Dresser, VII, p. 33, pl. 461.

Ile de Madère.

D'un bleu-tourterelle plus pâle sur la tête, le devant du cou, le bas du dos, le croupion et les parties inférieures; plumes des côtés et du derrière du cou terminées de gris argenté; derrière du cou et partie antérieure du cou à reflets verts et pourprés. Petites couvertures et rémiges d'un noir ardoisé, celles-ci présentant une étroite bordure grise. Queue d'un bleu plombé foncé avec une large bande bleu ardoisé subterminale. Poitrine d'un rouge vineux. Bec et peau nue autour de l'œil d'un rouge corail, le bec noirâtre à sa pointe. Pattes rouge corail; iris jaune paille. *Femelle* semblable au mâle. Aile : 234 millimètres.

6. **livia** Bonnaterre, Encycl. Method., I, 1790; Dresser, VII, p. 11, pl. 457.

Europe Ouest,
au Nord jusqu'aux
Iles Féroë
(ne se trouve pas
en Scandinavie
ni dans l'Europe
Est); Afrique
Nord; Asie Sud
jusqu'à
la Perse Nord.

TURTUR *Selby* 1835

1. **turtur** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 284; *communis* Selby, Nat. Lib., Pig., 1835, p. 153, 171; *vulgaris* Eyton, 1836; Dresser, VII, p. 39, pl. 462.

Europe, de la
Scandinavie (rare
au Nord)
à la Méditerranée
et ses îles;
Madère, Cana-
ries; Afrique Nord
jusqu'à Choa;
Asie
jusqu'à Yarkand

2. *Turtur rupicola* (Pall.)

TOURTERELLE RUPICOLE

D. et G., II, p. 15.

(1)

3. Espèce nouvelle

TOURTERELLE A COLLIER

(1) Les caractères donnés par Gerbe étant erronés, nous donnons ici une nouvelle description de l'Espèce.

2. *orientalis* (Lath.), Ind. Ornith., 1790, II, p. 606 ; Dresser, VII, p. 45, pl. 463 ; *rupicola* Pall., 1811 ; *gelastes* Temm., 1835.

Asie Nord
(de la Sibérie au
Japon) ;
Himalaya, Inde ;
très accidentel
en Europe
(Suède, Angle-
terre).

Plus grande et plus foncée que la Tourterelle d'Europe ; le front d'un bleu cendré foncé, le reste de la tête, le cou et les parties supérieures d'un brun cendré, la pointe des plumes noires sur les côtés du cou, et celle des rectrices, d'un bleu cendré (et non blanche). Parties inférieures d'un brun vineux, passant au rose vineux sur le milieu de l'abdomen. Bec brun teinté de vineux à la base de la mandibule inférieure. Pattes d'un rouge vineux ; iris orangé ; paupières bleu pâle avec le bord rouge. Aile : 190 millimètres.

C'est par erreur que Gerbe dit (*loc. cit.*, p. 16), que cette espèce diffère de la Tourterelle vulgaire « par l'absence de taches sur les côtés du cou ».

3. *decaocto* Frivaldsky, Balkanyi Termes. Utaz., 1838, p. 30, pl. VIII ; ? *risorius* (part.) Linné, 1766 ; Dresser, VII, p. 51, pl. 464, fig. 2 ; *torquata* Bogd., 1881.

Europe Sud-est
(Turquie) ;
Asie Mineure et
Asie Centrale
jusqu'à l'Amour
et le Japon.

Tête, cou et poitrine d'un gris vineux pâle, le sommet de la tête teinté de gris-bleu ; parties supérieures d'un brun terne, les côtés du croupion bleu-tourterelle. Rémiges bleu cendré à la base, le reste d'un bleu noirâtre ; les rémiges secondaires et les couvertures supérieures bleu-tourterelle. Rectrices médianes d'un brun foncé, les autres bleu-tourterelle, passant au blanc à leur extrémité. Un collier noir bordé de blanc, partant du dos, forme un demi-tour au cou. Dessous d'un vineux pâle passant au bleu-tourterelle sur le bas-ventre et les couvertures inférieures de la queue ; flancs lavés de gris-bleu. Bec noir. Pattes rose chair ; iris cramoisi ; peau de l'orbite blanche. Sexes semblables. Aile : 183 millimètres. — (C'est, très probablement, la souche de la *Tourterelle à collier* domestique.)

4. *Turtur senegalensis* (Linné)

TOURTERELLE DU SÉNÉGAL

D. et G., II, p. 16.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

TOURTERELLE DE CAMBAYE

Famille XXX — PTEROCLIDÉS (1)**Genre GANGA****1. *Pterocles alchata* (Linné)**

GANGA GATA

D. et G., II, p. 23 (part.).

(1) La majorité des ornithologistes modernes rattache cette famille à l'Ordre des PIGEONS.

4. *senegalensis* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 283 ;
Dresser, VII, p. 55, pl. 465 ; *ægyptiacus* Lath.,
1790.

Turquie, Grèce,
Palestine,
Iles Canaries :
Afrique,
de l'Égypte
au Cap ;
Ile de Socotora.

5. *cambayensis* (Gm.), Syst. Nat., II, 1788, p. 779 ;
Dresser, IX, p. 305.

Turquie,
Asie Mineure,
Turkestan
et l'Inde.

Semblable à *senegalensis*, mais les parties supérieures, avec le croupion, d'un brun terreux pâle sans trace de teinte rouge. Bec noirâtre ; pattes d'un rouge de laque ; iris brun foncé avec un cercle interne blanchâtre. Aile : 144 millimètres.

XXX — PTEROCLIDÆ

PTEROCLES Temm. 1813-1815

Pteroclidurus Bp., 1856 ; *Bonasa* Brisson, 1760.

1. (*alchata*) *setarius* Temm., Pig. et Gall., III, 1815,
p. 256 ; *pyrenaicus* Briss., 1760 ; *alchata* Dres-
ser, VII, p. 67, pl. 467.

Région méditer-
ranéenne,
de l'Espagne à la
Sardaigne,
la Sicile, Malte
et Chypre
accidentel en
Italie
(Émilie, Ligurie,
Toscane
Napolitaine).

Forme occidentale du type asiatique (1), caractérisée par un plumage plus chaudement coloré en brun jaunâtre et la bande subterminale des couvertures de l'aile fauve ou jaunâtre (non blanche). *Femelle* ayant la gorge blanche bordée

(1) Le type (*P. alchata*), de teinte gris-isabelle, à bande alaire blanche, habite l'Asie (de l'Asie Mineure et du Caucase à l'Inde) et l'Afrique Nord.

2. Pterocles arenarius Pallas

GANGA UNIBANDE

D. et G., II, p. 25.

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

GANGA DU SÉNÉGAL

d'un collier noir, la bande noire marginale de la 2^e rémige interne et des couvertures moyennes séparée de la partie blanche par une large bande fauve. Aile : 215 millimètres.

D'après Dresser, on trouve tous les passages entre les deux formes.

2. **arenarius** Pallas, Nov. Com. Petrop., 1774, p. 418, pl. 8; Dresser, VII, p. 61, pl. 466; *fasciatus* Desfont., 1787.

Europe Sud-Ouest, Espagne, Canaries; s'égare dans le reste de l'Europe Sud; Afrique Nord; Asie Sud-Ouest, Inde Nord (en hiver).

3. **senegalus** Linné, Mantissa, 1771, p. 526; Dresser, IX, p. 309, pl. 699; *guttatus* Licht., 1823.

Espèce africaine (de l'Algérie à l'Égypte et l'Arabie) et asiatique (de la Palestine à l'Inde); très accidentelle en Europe Sud (Sicile).

Dessus d'un isabelle foncé, les couvertures supérieures de la queue teintées de jaune; côtés de la tête jusqu'au-dessous de l'œil, nuque et derrière du cou gris-bleu; rémiges primaires grisâtres ou brun-isabelle; les secondaires d'un brun bordé d'isabelle; les grandes couvertures grisâtres à la base, puis d'un brun chaud avec la pointe isabelle. Les longues rectrices médianes d'un jaune isabelle à la base, puis d'un brun foncé à l'extrémité, les autres brunes à la base, puis noirâtres et terminées de blanc. Côtés de la face et gorge jaune d'ocre, le bas de la gorge gris-bleu. Parties inférieures isabelle avec le milieu de l'abdomen noir; couvertures inférieures de la queue d'un blanc crémeux mais noires à la base. Bec gris-bleu; pattes d'un blanc bleuâtre; iris brun, orbites jaunâtres. Aile : 22 millimètres. *Femelle* ayant les parties supérieures et la gorge avec la poitrine d'un isabelle tacheté de noir; les côtés de la tête au-dessous des yeux, le menton et le haut de la poitrine d'un jaune d'ocre.

4. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

GANGA BRULÉ

Genre SYRRHAPTE**1. Syrrhaptès paradoxus (Pall.)**

SYRRHAPTE PARADOXAL

D. et G., II, p. 28.

4. *exustus* Temm., Pl. Col., 1825, n° 354, 360 ;
elliotti Bogd., 1881.

Tête, gorge et parties supérieures isabelle, la face et le cou teints de jaune, le dos, de brun ; scapulaires et quelques-unes des couvertures moyennes terminées de brun rougeâtre ; quelques-unes des grandes couvertures présentant une tache blanche subterminale ; rémiges, petites couvertures et rectrices médianes d'un brun noirâtre, les latérales d'un brun foncé et terminées de blanc ou de fauve pâle. Poitrine d'un fauve vif croisé par un collier noir bordé de blanc fauve. Abdomen et flancs brun foncé, le milieu de l'abdomen noirâtre. Couvertures inférieures de la queue d'un fauve pâle. Bec et pattes d'un gris ardoisé ; iris brun ; orbite jaunâtre. Aile : 180 millimètres. *Femelle* d'un fauve-isabelle tacheté et barré de noir en dessus ; les côtés de la tête, la gorge et le haut de la poitrine d'un fauve-isabelle, tacheté de noir sur le bas de la gorge ; un double collier assez étroit en travers de la poitrine ; abdomen barré de brun foncé et de roux, le milieu plus foncé.

Especie africaine et asiatique (du Sénégal à l'Asie Centrale et à l'Inde) ; tres accidentelle en Europe (se joint aux migrations des *Syrrhaptès* ; prise à Szany [Hongrie], lors de la grande migration de 1863).

SYRRHAPTES *Illiger* 1811

1. *paradoxus* (Pall.), Reis. Russ. Reichs., II, 1773, App., p. 712, pl. F ; Dresser, VII, p. 75, pl. 468.

Habite les steppes de la Russie Sud et de l'Asie jusqu'à la Chine Nord et le lac Baïcal ; émigre en Europe à intervalles irréguliers (en grandes bandes) ; a niché sur plusieurs points : Angleterre, Danemark, etc.

Ordre IV — GALLINACÉS

Famille XXXI — TETRAONIDÉS

Genre LAGOPÈDE

1. *Lagopus scoticus* (Briss.)

LAGOPÈDE D'ÉCOSSE

D. et G., II, p. 35.

2. *Lagopus albus* (Gm.)

LAGOPÈDE BLANC

D. et G., II, p. 37.

a. Sous-espèce nouvelle.

IV — GALLINÆ

XXXI — TETRAONIDÆ

LAGOPUS *Brisson* 1760

1. **scoticus** Latham, Ind. Orn., 1790, II, p. 641 ;
Dresser, VII, p. 165, pl. 479.

Iles Britanniques
(Écosse,
Angleterre,
Galles, Irlande);
introduit sur
quelques points
du Continent.

2. **albus** Gm., Syst. Nat., 1788, p. 750; Dresser, VII,
p. 183, pl. 483, 484, fig. 1, et 485; *lagopus*
(part.) L., 1766.

Europe Nord,
du cercle arctique
à la Scandinavie
Centrale (mais
ni en Islande, ni
en Grande-
Bretagne); Asie
Nord jusqu'à
l'Amour et l'Amé-
rique arctique.

- a. — **major** Lorenz, Orn. Monatsb., XII, 1904,
p. 177.

Russie Est,
steppes
d'Orenbourg.

Plumage d'été plus pâle que celui du type; tige des grandes rémiges plus foncée, presque noire; ces grandes rémiges ont d'habitude l'extrémité noire ou sont entièrement de teinte foncée (ce qui est rare chez le type). Le croupion est d'un noir moins foncé. Chez les spécimens qui portent encore un reste de plumage d'hiver, si l'on arrache une des plumes blanches on voit qu'elles sont à leur base, d'un brun-rouge tacheté de noir, ou brunes avec une large bordure blanche. Aile : 243 millimètres.

3. *Lagopus mutus* (Martin)

LAGOPÈDE MUET

D. et G., II, p. 40 (exclus synonym. *L. rupestris* Gm.).**4. *Lagopus rupestris* Jenyns.**

LAGOPÈDE RUPESTRE

(Considéré par Degland et Gerbe comme synonyme du précédent).

a. Sous-espèce nouvelle.

3. **mutus** (Martin), Physiogr. Sällsk. Handl. Lund., I, 1776-86, p. 155; Dresser, VII, p. 157, pl. 478, 484, fig. 2; *lagopus* Scop. (nec Linné), 1769; *alpinus* Nilss., 1817.

Europe Nord et Moyenne, dans les montagnes (Scandinavie, Ecosse, Oural, Pyrénées, Alpes, Styrie, Carinthie, etc.).

4. **rupestris** Gm., Syst. Nat., 1788, I, p. 751; Dresser, VII, p. 175, pl. 480, 481; *islandorum* Faber, 1822.

Islande, Groenland; Sibérie Nord, îles de la mer de Behring et Amérique Nord.

Diffère du *L. mutus*, en plumage d'été en ayant la tête, le cou, les parties supérieures et la poitrine d'un brun noirâtre barré et vermiculé de brun rougeâtre; crête sourcilière d'un vermillon clair; bec d'un brun de corne; iris noisette. — A l'automne le plumage est plus brun que celui de *mutus*. La *female* est plus jaunâtre et d'une teinte ocreuse plus marquée. En hiver, les deux sexes sont entièrement blancs. — Aile : 200 millimètres.

- a. — **hyperboreus** Sundev., in Gaimard, Voy. Scand., Atlas, pl. livr. 38 (1838); *bemileucurus* Gould, 1858; Dresser, VII, p. 179, pl. 482.

Spitzberg.

Diffère de *L. rupestris* par sa queue blanche à la base et à l'extrémité, noire seulement dans son milieu, les deux rectrices médianes étant blanches avec une marque, en ovale irrégulier, noire, dans leur milieu, les latérales largement bordées de blanc. Aile : 194 millimètres.

Genre TÉTRAS

1. *Tetrao urogallus* Linné

TÉTRAS UROGALLE

D. et G., II, p. 44.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

TETRAO *Linné* 1758

Lyrurus Swains.

- 1. urogallus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 273; Dresser, VII, p. 223, pl. 489, fig. 2, et 490; *urogallus lugens* Lönnberg (mâle mutilé de ses organes génitaux); plusieurs formes hybrides avec *T. tetrix*, *Lagopus albus* et *Phasianus colchicus*; *T. medius* Meyer est dans ce cas.

Europe Nord (forêts d'essences variées), Scandinavie, Russie Nord; éteint mais réintroduit en Écosse; Pyrénées, Alpes, Carpathes; Asie Nord, au Sud jusqu'au Turkestan.

- a. — pinetorum** Lönnberg, Orn. Monatsb., 1904, XII, p. 105.

Suède (dans les forêts de conifères).

Plumage plus foncé que celui du type, très foncé, presque noir en hiver. Dessus d'un noir uniforme avec des reflets bleu foncé sur la croupe et le bas du dos, la mince bordure des plumes étant seule striée de roux et de blanchâtre. La bande transversale rousse de la partie basale, non visible, de la plume, est presque obsolète. La couleur noire envahit aussi tout le dessous, les rayures noires prédominant sur les rousses. — Cette forme est plutôt une variété topographique qu'une sous-espèce géographique, d'après l'auteur lui-même.

- b. — uralensis** Menzbier, Ibis, 1887, p. 303; Dresser, IX, p. 331, pl. 705.

Monts Oural Sud.

Diffère du type par ses teintes plus pâles et plus grises, la queue largement marquée de blanc, l'abdomen blanc mais légèrement marqué sur les côtés et en avant de noirâtre. — *Femelle* plus pâle que celle du type, les plumes des parties supérieures bordées largement de blanc, l'abdomen blanc avec quelques marques noires et d'un roux pâle, le bas-ventre d'un blanc pur. Aile : 390 millimètres.

c. Sous-espèce nouvelle.

2. Tetrao tetrrix Linné

TÉTRAS LYRE

D. et G., II, p. 47.

a. Sous-espèce nouvelle.

- c. — **volgensis** Buturlin, Ornith. Monatsb., 1907, p. 81.

Russie Sud,
gouvernement de
Simbirsck,
vallée de la Volga.

Le mâle diffère d'*uralensis* par la prédominance du noir sur le blanc à la région ventrale; il diffère du type (*T. mongallus*) par la teinte plus claire des parties supérieures. Le dos et le croupion sont plus bruns, moins noirâtres, et les rayures grises prennent plus de place. Entre les épaules on remarque un dessin très serré de couleur rousse, les scapulaires et les couvertures alaires étant d'un roux pâle et sale tacheté de gris. La tête est presque entièrement d'un gris cendré ainsi que le cou, même en avant. Barbe à reflets verts, mais non bleus; flancs gris foncé. Rectrices étroites (la 2^e paire, à son extrémité, a d'ordinaire moins de 55 millimètres de large).

2. **tetrix** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 274; Dresser, VII, p. 205, pl. 487.

Europe, du 67^o
latitude Nord,
en Scandinavie, à
l'Italie Nord
et à la Syrie, et
de la Grande-
Bretagne
à la Sibérie Est
et à la Chine
Nord (La limite
des sous-espèces
suivantes
est mal connue).

- a. — **juniperorum** Brehm, Handb. Vög. Deuts., 1831, p. 509; Lönnerberg, Orn. Monatsb., 1904, p. 105-106.

Allemagne.

Diffère du type de Suède par les caractères suivants: chez la femelle, la bande blanche des rémiges primaires s'étend (comme chez *viridanus*) jusqu'à 25 ou 30 millimètres de leur pointe; en outre, il y a une tache blanche à la base des rémiges bâtarde, et une seconde tache blanche à la base des rémiges primaires (ces deux taches manquent chez la femelle du type, et la bande blanche des rémiges s'arrête à 45 ou 55 millimètres de la pointe de la plume).

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

- b. — **viridanus** Lorenz, Journ. f. Ornith., 1891, p. 366.

Russie Sud-Est,
dans les steppes
(Tambow,
Saratow, Oren-
bourg);
Sibérie Ouest.

Reflets du cou, de la gorge et du dos passant du bleu au vert (et non du bleu au violet). Miroir blanc des rémiges secondaires plus large, formant au repos une très large bande blanche. Partie blanche des rémiges primaires s'étendant jusque vers l'extrémité, de sorte que sur l'aile étendue le blanc est visible sur les barbes internes de la 6^e et même de la 5^e assez loin. *Femelle* présentant le même miroir très large, et de plus le rouge-brun de son plumage passant au gris et au roux pâle. La poitrine presque entièrement blanche, la gorge jaunâtre avec des taches foncées confluentes sous le bec; les couvertures alaires et caudales largement terminées de blanc.

- c. — **milokosiewicz** Taczan., Proc. Zool. Soc., 1875, p. 266; Dresser, VII, p. 219, pl. 488; *acatoptricus* Radde, Orn. Caucas., p. 358, pl. 23.

Chaîne du Cau-
case (Géorgie).

Diffère de *tetrix* par l'absence de blanc sur le dessus des ailes; par ses couvertures inférieures de la queue noires, et par sa queue recourbée vers le bas et un peu en dehors; les parties soyeuses du plumage ont des reflets vert-bouteille. — *Femelle* grisâtre, finement vermiculée de brun noirâtre et de brun de rouille, le dessus plus roux que le dessous, la poitrine blanche; les rémiges secondaires et les couvertures inférieures de la queue blanches à leur extrémité. Queue longue, presque carrée, d'un brun noirâtre, étroitement rayée de roux et de jaune-sable; le milieu de l'abdomen marqué de noir. Aile 200 millimètres.

Genre GÉLINOTTE

1. *Bonasa* (1) *sylvestris* (Brehm)

GÉLINOTE DES BOIS

D. et G., II, p. 52.

2. Espèce nouvelle

GÉLINOTE A VENTRE GRIS

(1) Le genre *Bonasa* ayant pour type *B. umbellus* (L.), espèce américaine, Keyserling et Blasius ont créé le genre *Tetrastes* pour celles d'Eurasie.

BONASA *Stephens* 1819*Tetrastes* Keys. et Blas., 1840.

1. **bonasia** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 275 ; *europea* Gould ; *betulina* Scop., 1769 ; Dresser, VII, p. 193, pl. 486 ; *septentrionalis* Seeböhm, 1884 (subspecies).

Les spécimens du Nord (*B. septentrionalis*) sont seulement plus gris, — ceux du Centre et du Sud de l'Europe plus roux.

Europe Nord et Moyenne, du 67° latitude Nord (Laponie, Russie Nord), aux Pyrénées, Jura, Alpes, Carpathes ; Asie Nord jusqu'au Japon.

2. **griseiventris** Menzbier, Bull. Nat. Moscou, 1880, LV, pars 1, p. 105, pl. 4 ; Dresser, IX, p. 329, pl. 704.

Russie, à l'Ouest de l'Oural (gouvernements de Perm et d'Olonetz).

Plus foncé que *B. bonasia* : dessus d'un gris foncé, la tête et le dos barrés de noir, plus foncé sur la tête. Croupion et couvertures supérieures de la queue d'un gris foncé avec des barres plus foncées indistinctes. Queue comme celle de *bonasia*, mais la bande subterminale à peine indiquée et sans extrémité blanche. Menton et une raie sous l'œil blancs. Gorge noire légèrement marquée de roux foncé ; cou et poitrine d'un gris barré de noir et marqué de roux ; le reste du dessous gris avec des barres noires indistinctes. Flancs teintés de roux ; bec d'un noir de corne ; pattes et iris bruns. Aile : 170 millimètres. *Femelle* plus brune et moins grise, les plumes noires de la gorge largement terminées de fauve pâle.

Genre TÉTRAGALLE

1. *Tetraogallus caspius* (Gm.)

en synonymie *T. caucasica* Pall.

TÉTRAGALLE DU CAUCASE (partim)

D. et G., II, p. 55.

Genre FRANCOLIN

1. *Francolinus vulgaris* Steph.

FRANCOLIN VULGAIRE

D. et G., II, p. 59.

TETRAOGALLUS Gray 1833

1. *caucasicus* (Pallas), Zoogr. Rosso-As., 1811, II, p. 76, avec pl.; Dresser, VII, p. 237, pl. 491, 492.

Le Grand Caucase (sur la limite entre l'Europe et l'Asie), à la limite des neiges perpétuelles.

Les *T. caspius* et *T. caucasicus*, confondus par Degland et Gerbe, constituent deux espèces distinctes, la seconde seule pouvant être considérée comme européenne. C'est cette dernière que Gerbe a décrit sous le nom de *T. caspius*. Elle a le sommet de la tête, la nuque et le derrière du cou gris cendré; une large bande cendrée couvrant les côtés de la tête descend sur les côtés du cou qui est blanc ainsi que la gorge (1).

FRANCOLINUS Stephens 1819

1. *francolinus* Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 275; *vulgaris* Dresser, VII, p. 123, pl. 473.

Exterminé en Corse, en Espagne et en Sicile (2); Turquie d'Europe (?); Chypre, Asie Mineure, Afrique Nord.

(1) Le *T. caspius* (Gm.) a le dessus plus pâle, teinté de fauve, les côtés de la tête et du cou d'un blanc crème avec la bande des côtés du cou d'un gris-bleu; les grandes couvertures plus bleues et moins vermiculées à leur base, etc. Ne se trouve qu'au Sud du Caucase, en Transcaspie, et de là jusqu'en Perse et dans le Taurus.

(2) Sharpe (*Handlist of Birds*, 1899, I, p. 23) indique l'« Europe Nord-Est » comme la patrie de cet oiseau, ce qui est une erreur. Tous les francolins sont d'Asie et d'Afrique (région intertropicale) et le *F. francolinus* aurait été introduit en Sicile à l'époque des Croisades, ou en Toscane au quinzième siècle par les Médicis. Le *G. francolinus* est un type de la région éthiopienne.

2. Espèce nouvelle
FRANCOLIN ORIENTAL (1)

Genre PERDRIX

1. *Perdix græca* Brisson
PERDRIX GRECQUE, BARTAVELLE
D. et G., II, p. 64.

2. *Perdix chukar* (Gray)
PERDRIX CHUKAR
D. et G., II, p. 66.

3. *Perdix rubra* Brisson
PERDRIX ROUGE
D. et G., II, p. 69.

(1) Le type (*P. orientalis* Gray) ou *P. pondicerianus* (Gm.), habite l'Asie Mineure et la Palestine; d'autres sous-espèces s'étendent jusqu'à l'Inde et l'Arabie.

2. (*orientalis*) *europæus* Buturlin, Ornith. Monatsb., 1907, p. 81.

Europe Sud,
Grèce (?)
(peut-être intro-
duit).

Collier étroit, d'un roux clair; dessus rayé de plusieurs couleurs: la bordure jaune des plumes étroite et moins nette que sur le type asiatique; le centre des plumes brun. Dessous fortement tacheté de blanc. Les rémiges secondaires foncées: la bandelette transversale brune plus large que la jaune. Tache des oreilles teintée d'ocre. Les bandelettes foncées du croupion, près de deux fois plus larges que les blanches. Taille faible. Aile: 160 à 165 millimètres.

CACCABIS Kaup 1829

Perdix Degl. et Gerbe, 1867.

1. *saxatilis* Meyer et Wolf, Naturg. Vög. Deuts., 1805, p. 87, pl. 48; Dresser, VII, p. 93, pl. 470, fig. 1; *græca* Steph., 1819.

Europe Sud,
dans les monta-
gnes, Pyrén-
nées Orientales,
Alpes, Jura,
Apennins, Carpa-
thes, Balkans,
Sicile.

2. *chukar* Gray, Ill. Ind. Zool., I, 1830-32, p. 54; Dresser, VII, p. 97, pl. 470, fig. 2; *saxatilis* Brandt, 1843.

Europe Sud-Est,
Iles Ioniennes,
Crète,
Asie Mineure
et de là jusqu'en
Chine
et le Punjab.

3. *rufa* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 276; Dresser, VII, p. 103, pl. 471, fig. 1; *rubra* Temm., 1815,

Europe Ouest
et Sud,
France, Italie,
Suisse,
Autriche Sud
(introduite en An-
glettre).

a. Sous-espèce nouvelle.

4. *Perdix petrosa* Lath.

PERDRIX DE ROCHE OU GAMBRA

D. et G., II, p. 71.

a. Sous-espèce nouvelle.

Genre STARNE

1. *Sterna cinerea* (Charlet.)

STARNE GRISE

D. et G., II, p. 73.

a. Sous-espèce

(admise comme variété locale)

STARNE DE DAMAS

D. et G., II, p. 75.

- a. — **hispanica** Scoane, Mém. Soc. Zool. de France, VII, 1894, p. 93.

Espagne Nord
et Nord Ouest.

Teinte générale plus foncée que celle du type (*C. rufa*) du centre de la France; taille plus forte, formes plus trapues. Gorge de couleur *gris-perle*.

4. **petrosa** (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 758; Dresser, VII, p. 111, pl. 471, fig. 2.

Sardaigne, Corse,
Sicile;
accidentelle dans
la France Sud;
Afrique Nord.

- a. — **kœnigi** Reichen., Orn. Monatsb., 1899, p. 189.

Ile de Ténériffe.

Nettement plus grande et plus foncée que le type du Nord de l'Afrique.

PERDIX *Brisson* 1760

Starna Bonap., 1838.

1. **perdix** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 276; *cinerea* Lath., 1790; Dresser, VII, p. 131, pl. 474, 475; *montana* Briss., 1760.

Europe,
de la Scandinavie
moyenne
et de la Grande-
Bretagne
à la Méditerranée;
Asie
jusqu'à l'Altai.

- a. — **damascena** Brisson, Ornith., I, 1760, p. 223.

Très semblable au type, mais plus petite, à bec, pattes et doigts plus courts (Erratique, ou de passage, nichant rarement, dans les localités où elle est signalée).

Europe Ouest
(France,
Belgique, Alle-
magne);
Égypte (?).

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

- b. — **hispaniensis** Reichenow, Journ. f. Orn., 1892, p. 226; *charrcola* Seoane, Bull. Soc. Zool. France, VII, 1894, p. 94.

Espagne
(de préférence
dans
les montagnes).

Plus foncée que le type. Dos châtain clair avec les vermiculations et les raies d'un châtain presque noir ou tout à fait noir. Dessous gris foncé, avec la tache en fer à cheval châtain foncé ou noire (chez le *mâle* et quelquefois la *fenelle*). Chez celle-ci la tache est généralement blanche avec ou sans taches irrégulières plus foncées. Poitrine portant de nombreuses taches rondes ou rhomboïdales, qui remontent sur le tour du cou et le haut du dos, à l'extrémité du trait jaunâtre ou blanchâtre formé par la tige des plumes.

- c. — **robusta** Homeyer et Tancré, Mittheil. Orn. Verein in Wien, VII, 1883, p. 92, pl. 1.

Europe Est,
Russie,
Sibérie Sud.

Plus trapue que le type d'Europe Ouest, avec dix-huit rectrices, dont les quatre médianes sont rayées en zigzag de gris et de noir, d'ordinaire sans trace de roux; les latérales d'un roux-rouge clair très vif. Le plumage, en général, plus gris et plus pâle que celui du type.

- d. — **caucasica** Reichenow, Journ. f. Orn., 1903, p. 543.

Caucase Ouest
et Nord.

Diffère de *Perdix perdix* par ses parties supérieures plus pâles, plus grises, et son plumage, en général, teinté de roux-isabelle (tandis que, chez le type, il est d'un brun-cannelle passant au brun-jaune sur la face et la gorge).

Genre CAILLE

1. *Coturnix communis* Bonnat.

CAILLE COMMUNE

D. et G., II, p. 80.

(1)

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle

(pour l'Europe)

CAILLE DU CAP

(1) Le *Synotus lodoisia* Verr. et Des Murs, 1862, décrit par Gerbe, p. 78, n'est qu'une aberration individuelle de *Coturnix communis*.

COTURNIX *Macbring* 1752*Ortygion* Keys. et Blas., 1840.

1. **coturnix** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 278; *communis* Bonnat., 1790; Dresser, VII, p. 143, pl. 476.

Europe, de la Scandinavie et de la Grande-Bretagne à la Méditerranée et l'Afrique Nord; émigrant dans l'Afrique Sud (en hiver); Asie Mineure et Asie, de la Sibérie à l'Inde.

- a. — **baldami** (Brehm), Madarasz, Aquila, III, 1896, pl. 2.

Espagne.

Les caractères de cette forme, propre à l'Espagne, ne nous sont pas connus.

- b. — **africana** Temm. et Schleg., Fauna Japon., Aves, p. 103; *capensis* Licht.; Ogilvie Grant, Cat. Birds Brit. Mus., XXII, 1893, p. 229.

Afrique, au Sud du 15° latitude Sud; Iles Canaries, Madère, Açores; Madagascar et Maurice.

Semblable à la Caille d'Europe, mais le *mâle* ayant la gorge d'un roux-châtain vif avec une tache noire en forme d'ancre dans le milieu.

Famille XXXII — TURNICIDÉS (1)

Genre TURNIX

1. *Turnix sylvaticus* (Desfont.)

TURNIX SAUVAGE

D. et G., II, p. 84.

Famille XXXIII — PHASIANIDÉS

Genre FAISAN

1. *Phasianus colchicus* Linné

FAISAN DE COLCHIDE

D. et G., II, p. 87.

(1) Le genre *Turnix* n'ayant aucun rapport avec le genre *Crypturus* (Timamou), type des CRYPTURINÆ de Bonaparte et de Gerbe, il est indispensable de changer le nom de cette famille.

XXXII — TURNICIDÆ

TURNIX *Bonnaterre* 1791*Hemipodius* Temm., 1815.

1. *sylvaticus* (Desfont.), Mém. Acad. Sc. de Paris, 1787, p. 500, pl. 13; Dresser, VII, p. 249, pl. 494; *andalusicus* Gm., 1788; *africanus* Bonn., 1790; *tachydromus* Temm., 1815.

Portugal,
Espagne, Sicile,
rare dans
la France Sud
et l'Italie;
Afrique Nord.

XXXIII — PHASIANIDÆ

PHASIANUS *Linne* 1766

1. *colchicus* Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 271; Dresser, VII, p. 85, pl. 469; *septentrionalis* Lorenz, 1888 (subspecies). — D'après Dresser, cette forme septentrionale (Caucase Nord) ne diffère en rien du type de Transcaucasie et d'Europe (1).

Europe Sud-est,
(Grece, Turquie).
Russie entre
la Volga et le Cau-
case; Asie
Mineure (intro-
duit et naturalisé
dans la plupart
des contrées de
l'Europe tempé-
rée, jusqu'à
l'Angleterre).

(1) Le *Phasianus torquatus* Gm., 1788, de Mongolie, également intro-
duit et acclimaté dans l'Europe Occidentale, se croise avec *Pb. colchicu*.

Ordre V — ÉCHASSIERS

Famille XXXIV — OTIDIDÉS

Genre OUTARDE

1. *Otis tarda* Linné

OUTARDE BARBUE

D. et G., II, p. 95.

2. *Otis tetrax* Linné

OUTARDE CANEPETIÈRE

D. et G., II, p. 100.

V — GRALLÆ

XXXIV — OTIDIDÆ

OTIS *Linne* 1758*Tetrax* Leach, 1816.

1. **tarda** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 264; Dresser, VII, p. 369, pl. 508; *major* Brehm, 1831.

Europe Moyenne et Sud (rare en Suède Sud, occidentale en Angleterre); Afrique Nord. Asie jusqu'à l'Inde Nord-Ouest.

2. **tetrax** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 264; Dresser, VII, p. 383, pl. 509; *campestris* Leach, 1816.

Europe Moyenne et Sud (accidentelle en Suède et Grande-Bretagne); Afrique Nord; Asie jusqu'à l'Inde Nord-Ouest.

Genre HOUBARA

1. *Houbara undulata* (Jacquin)

HOUBARA ONDULÉ

D. et G., II, p. 104.

a. Sous-espèce nouvelle.

2. *Houbara macqueeni* Gray

HOUBARA DE MACQUEEN

D. et G., II, p. 105.

HOUBARA Bonap. 1832

Chlamydotis Lesson, 1839.

1. **undulata** (Jacquin), Beitr. Gesch. Vög., 1784, p. 24, pl. 9; Dresser, VII, p. 391, pl. 510; *houbara* Desfont., 1787.

Accidentel dans l'Europe Sud, Espagne, France Sud, Italie, Grèce, Afrique Nord, Palestine, Arménie.

- a. — **fuerteventurae** Rothschild et Hartert, Nov. Zool., I, 1891, p. 689.

Ile Fuerteventura, Madère.

Diffère du type d'Afrique Septentrionale par la couleur des parties supérieures qui présente plus de noir et moins d'isabelle; les bandes foncées de la queue sont plus larges, au nombre de quatre (au lieu de cinq) et les stries que portent les bandes claires sont plus nombreuses. Aile : 380 millimètres.

2. **macqueeni** Gray et Hardw., Ill. Ind. Zool., II, 1834, pl. 47; Dresser, VII, p. 395, pl. 511.

Accidentel en Europe (Pologne, Finlande, Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre); niche dans l'Inde Nord-Ouest, l'Asie Centrale, la Perse.

Famille XXXV — GLAREOLIDÉS**Genre GLARÉOLE****1. *Glareola pratincola* (Linné)**

GLARÉOLE PRATINCOLE

D. et G., II, p. 110.

2. *Glareola melanoptera* Nordm.

GLARÉOLE MÉLANOPTÈRE

D. et G., II, p. 112.

XXXV — GLAREOLIDÆ

GLAREOLA *Brisson* 1760*Hirundo* (part.) L.

1. **pratincola** (Linné), *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 345 ;
Dresser, VII, p. 411, pl. 513, fig. 1 ; *torquata*
Meyer, 1816.
Europe Sud et Est,
pourtour de
la Méditerranée
(accidentel jus-
qu'aux Shetland) ;
Afrique Nord
(jusqu'au Natal en
hiver) ; Asie
jusqu'à l'Inde
Nord-Ouest.
2. **melanoptera** Nordm., *Bull. Nat. Moscou*, II, 1842,
p. 314 ; Dresser, VII, p. 419, pl. 513, fig. 2 ;
nordmanni Fischer, 1842.
Europe Sud-Est,
Russie, du
56° latitude Nord
au Caucase ;
Afrique jusqu'au
Natal ; Asie
Mineure et Asie
jusqu'aux
Monts Altaï.

Famille XXXVI — CHARADRIIDÉS**Genre ÆDICNÈME****1. *Ædicnemus crepitans* Temm.****ÆDICNÈME CRIARD**

D. et G., II, p. 115.

a. Sous-espèce nouvelle.

XXXVI — CHARADRIIDÆ

ÆDICNEMUS Temm. 1815

Fedoa Leach, 1816.

1. **ædicnemus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 255;
scolopax S. G. Gm., 1774; Dresser, VII,
p. 401, pl. 512; *crepitans* Temm., 1815.

Europe tempérée
et Sud
(émigrant au
Nord, mais d'or-
dinaire séden-
taire); Grande-
Bretagne,
rare en Irlande,
accidentel
en Scandinavie;
Afrique Nord,
Abyssinie,
Asie Ouest et
Centrale.

- a. — **insularum** Sassi, Ornith. Jahrb., XIX, 1908,
p. 32.

Iles Canaries.

Diffère du type par la teinte d'un roux-isabelle de son plumage, teinte qui se montre particulièrement sur le dos, sans que l'ensemble paraisse plus clair que chez ce type. Les stries foncées de la poitrine sont, en général, plus marquées. Les grandes couvertures de l'aile, en avant de la bande foncée, sont blanches. La rangée supérieure des couvertures moyennes est à la même place, plus particulièrement sur leur bord, plus ou moins isabelle, et leur pointe blanchâtre, d'ordinaire un peu teintée d'isabelle. L'aile est plus courte et la jambe un peu plus courte. — Cette forme diffère d'*Æ. w. sabaræ* par sa teinte générale plus foncée, sa carrure plus forte, et les taches de la tête plus serrées. Les deux formes ont la même teinte isabelle, mais cette teinte est plus pâle chez la sous-espèce d'Afrique.

Genre COURTVITE

1. *Cursorius gallicus* (Gm.)

COURTVITE GAULOIS

D. et G., II, p. 118.

Genre PLUVIAN

1. *Pluvianus ægyptius* (Linné)

PLUVIAN D'ÉGYPTE

D. et G., II, p. 121.

Genre PLUVIER

1. *Pluvialis apricarius* (Linné)

PLUVIER DORÉ

D. et G., II, p. 123.

CURSORIUS *Latham* 1799

1. **gallicus** (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 692; Dresser, VII, p. 425, pl. 514; *europæus* Lath., 1790; *isabellinus* Meyer, 1810; *i.* var. *bogobubovi* Zarudn., 1885.

Afrique Nord ;
accidentel en Europe jusqu'à
la Grande-Bretagne, Finlande,
Danemark,
Iles Canaries ;
Asie jusqu'à l'Inde
Nord-Ouest et
l'Arabie.

PLUVIANUS *Vieill.* 1816

Cursorius p. Schleg., 1865.

1. **ægyptius** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 254 ; Dresser, VII, p. 521, pl. 527 ; *melanocephalus* Gm., 1788.

Afrique jusqu'à
l'Angola ;
Algérie ; très accidentel au Nord
de la Méditerranée
(Espagne ;
Suède ?) ; Palestine.

CHARADRIUS *Linné* 1758

Pluvialis Barrère, 1745 ; Gerbe, 1867.

1. **pluvialis** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 254 ; Dresser, VII, p. 435, pl. 515, fig. 1 ; 518, fig. 1, 2 ; 519, fig. 2 ; *apricarius* Linné, S. N., Ed. X, 1758, sp. 7 ; *auratus* Suckow, 1801.

Europe entière,
du Cap Nord
à l'Europe
moyenne (émigrant jusqu'au Sud
de l'Afrique en
hiver) ;
niche en Islande ;
s'égare au
Groënland ; Madère ; Asie
jusqu'au Ténisséi,
accidentel
dans l'Inde.

2. *Pluvialis fulvus* (Gm.)

PLUVIER FAUVE

D. et G., II, p. 125.

Section B**1. *Pluvialis varius* (Briss.)**

PLUVIER VARIÉ

D. et G., II, p. 127.

Genre GUIGNARD**1. *Morinellus sibiricus* (Lepech.)**

GUIGNARD DE SIBÉRIE OU PLUVIER GUIGNARD

D. et G., II, p. 130.

(1)

(1) Le *Morinellus asiaticus* (Pall.) placé ici par Gerbe, appartient au genre *Aegialites* (Voyez ci-après).

2. **dominicus** (1) Müller, *Natursyst. Suppl.*, 1776, p. 116; *fulvus* Gm., 1788; Dresser, VII, p. 443, pl. 516, 517, fig. 2, 3; *virginicus* Licht., 1823.

Acc dentel en Europe (Grande-Bretagne, Héligoland, Malte, Pologne, Espagne, Italie); Asie Nord, l'Est de l'Énisséï jusqu'au Japon et les deux Amériques; en hiver dans l'Inde, l'Afrique Est, l'Australie.

SQUATAROLA *Leach* 1816

1. **squatarola** (Linné), *Syst. Nat.*, Ed. X, 1758, sp. 13; *helvetica* Linné, S. N., 1766, I, p. 250; Dresser, VII, p. 455, pl. 515, fig. 2; 517, fig. 1; 518, fig. 3; 519, fig. 1; et *squatarola* L., 1766, p. 252; *hypomelas* Pall., 1778; *pardala* Pall., 1831; *grisea* Leach, 1816; *varia* Boie; *cinerea* Fleming.

Europe Nord (Arctique où il niche); Asie et Amérique Nord; émigre en hiver à travers l'Europe, en Afrique, Asie Sud, Australie et les deux Amériques.

EUDROMIAS *Brehm* 1831

1. **morinellus** (Linné), *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 254; Dresser, VII, p. 507, pl. 526; *minor* et *anglicanus* Brisson; *sibiricus* Lepechin, 1771.

Europe Arctique et Nord, Spitzberg, Nouvelle-Zemble, Grande-Bretagne; émigre, en hiver, à travers l'Europe, en Afrique; Asie Nord; en hiver Turkestan et Perse.

(1) A l'exemple de Sharpe et de Dresser, nous ne distinguons pas ici le type d'Amérique (*dominicus*) de celui d'Europe (*fulvus*). Si ce dernier devait être considéré comme distinct, il devrait s'appeler *Charadrius dominicus fulvus*, comme le font les Américains.

Genre GRAVELOT

1. *Charadrius hiaticula* (Linné)

GRAVELOT HIATICULE OU PLUVIER A COLLIER

D. et G., II, p. 134.

2. *Charadrius philippinus* (Scop.)

GRAVELOT DE PHILIPPINES OU PETIT PLUVIER A COLLIER

D. et G., II, p. 136.

3. *Charadrius cantianus* Lath.

GRAVELOT DE KENT OU PLUVIER A COLLIER INTERROMPU

D. et G., II, p. 138.

ÆGIALITES Boie 1822

Charadrius Degl. et Gerbe, 1867; *Hiaticula* Gray, 1840.

1. **hiaticula** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 253; Dresser, VII, p. 497, pl. 525; *torquatus* Leach, 1816; *annulata* Gray, 1844.

Europe,
du Spitzberg
à la Méditerranée;
émigre, en hiver,
en Afrique
jusqu'au Cap;
Asie, du 74° lati-
tude Nord
jusqu'à l'Inde;
Groenland
et Amérique
Nord-Est.

2. **dubius** (Scopoli) et *philippinus* Scop., Ann. I, Hist. Nat., 1769, n° 147; *curonica* Gm., 1788; Dresser, VII, p. 491, pl. 524; *minor* Wolf et Meyer, 1805; *alexandrinus* Thien. (nec Linné).

Europe, du Sud
de la Scandinavie
à la Méditerranée
(très accidentel
en Angleterre);
émigre en
Afrique en hiver;
Asie jusqu'au
Japon
et de la Daourie
au Nord de l'Inde;
en hiver Malaisie,
Moluques,
Nouvelle-Guinée.

3. **alexandrinus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 253; *cantianus* Latham, Ind. Orn., Suppl., 1801, p. 66; Dresser, VII, p. 483, pl. 525.
(1)

Europe moyenne
et Sud,
du Sud de l'An-
gleterre et
de la Scandinavie
à la Méditerranée;
émigre, en hiver,
en Afrique
jusqu'au Cap;
Asie jusqu'au
Japon, en hiver,
Inde, Chine et
Australie.

(1) Une sous-espèce (*Ægialites alexandrinus nivosus* Baird) s'est installée sur les côtes de l'Amérique Occidentale chaude et y est devenue sédentaire, de la Californie au Chili.

4. *Charadrius mongolicus* Pall.

GRAVELOT MONGOL

D. et G., II, p. 139.

5. *Morinellus asiaticus* Pall.

GUIGNARD ASIATIQUE

D. et G., II, p. 132.

Genre NOUVEAU

(pour l'Europe)

1. Espèce nouvelle

GUIGNARD VOCIFÈRE

4. (*mongolus*) *geoffroyi* (1) Wagler, Syst. Av. (*Charadrius*), 1827, n° 19; Dresser, VII, p. 475, pl. 520, fig. 2, et 521; *leschenaulti* Lesson, 1828.

Europe Sud-Est, Russie;
Asie Centrale, Japon, Chine : émigre
en Afrique Sud, Madagascar, Inde, Malaisie, Philippines, Australie.

5. *asiaticus* (Pall.), Reis. Russ. Reichs., II, 1773, p. 715; Dresser, VII, p. 479, pl. 520, fig. 2, et 522; *caspius* Pall., 1811.

Tres accidentel en Europe ;
Russie à l'Ouest de la Volga (Odessa), Héligoland, Angleterre, Italie ;
Transcaspie et Asie Centrale, Inde : émigre en Afrique jusqu'au Cap.

OXYECHUS *Reichenb.* 1852

Ægialites (part.) Dresser, 1903.

1. *vociferus* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 253; Dresser, IX, p. 345, pl. 708.

Espèce américaine très accidentelle en Europe Ouest (Angleterre, Hants, Îles Scilly).

Devant de la tête, une raie au-dessous et en arrière de l'œil, menton, gorge, collier autour du derrière du cou et parties inférieures blanches; sommet de la tête, raie allant des lores à l'œil, collier au bas du cou en avant et une bande à travers la poitrine noirs. Parties supérieures d'un brun chaud; grandes couvertures de l'aile terminées de blanc. Rectrices médianes brunes, les autres orangées à la base, puis noires et terminées de blanc, les plus externes blanches teintées de

(1) Le type (*Charadrius mongolus* Pall.) est de l'Asie Orientale, et plus petit que la forme européenne.

Genre HOPLOPTÈRE

1. *Hoplopterus spinosus* (Linné)

HOPLOPTÈRE ÉPINEUX OU PLUVIER ARMÉ

D. et G., II, p. 142.

Genre CHÉTUSIE

.

1. *Chetusia gregaria* (Pallas)

CHÉTUSIE SOCIABLE

D. et G., II, p. 144.

.

2. *Chetusia leucura* (Licht.)

CHÉTUSIE ALBICAUDE

D. et G., II, p. 146.

roux et barrées de noir. Couvertures supérieures de la queue rousses. Bec noir; pattes d'un vert sombre; iris brun; paupières d'un rouge orangé. Les sexes semblables. Le jeune a les plumes du dessus bordées de roux pâle. Aile : 160 millimètres.

HOPLOPTERUS Bonap. 1831

1. **spinosus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 256; Dresser, VII, p. 539, pl. 530.

Afrique Nord
jusqu'au Kordofan
et au Niger;
accidentel en Eu-
rope Sud
(Turquie, Russie
Sud, Grèce,
Malte, Italie);
Palestine
et Asie Mineure.

CHÆTUSIA Bonap. 1841

Eubyas Sharpe, 1896 (nec Fitzing., 1843).

1. **gregaria** (Pallas), Reis. Russ. Reichs., I, 1771, p. 456; Dresser, VII, p. 527, pl. 528; *keptuschka* Lepechin, 1774; *fasciata* Gm., 1784; *wagleri* Gray, 1834.

Europe Sud-Est,
steppes de
Russie et d'Asie;
accidentelle en
Hongrie, Italie,
France Sud, Espa-
gne, Angleterre
Sud; Afrique
(en hiver) jusqu'au
Kordofan;
Asie Mineure,
Inde,
Ceylan, Arabie.

2. **leucura** Licht., Verz. Doubl., 1823, p. 70; id., Eversmann, Reise Buch., 1823, p. 137; Dresser, VII, p. 531, pl. 529; *villotari* Savig., 1825; *flavipes* Less., 1831.

Russie Sud et
Turkestan;
accidentelle dans
la France Sud,
Malte; Afrique
Nord (en hiver),
Perse
et Inde Nord.

Genre VANNEAU

1. *Vanellus cristatus* (Wolf et Mayer)

VANNEAU HUPPÉ

D. et G., II, p. 148.

Genre HUITRIER

1. *Hæmatopus ostralegus* Linné

HUITRIER PIE

D. et G., II, p. 151.

.

2. Espèce nouvelle

HUITRIER DES CANARIES

VANELLUS *Brisson* 1760*Tringa* (part.) L.

1. **vanellus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 248; *vulgaris* Bechst., Orn. Taschenb., II, 1803, p. 313; Dresser, VII, p. 545, pl. 531; *crissatus* Wolf et Meyer, 1805; *capella* Schœff., 1789.

Europe entière,
du cercle arctique
à la Méditerranée;
émigre
en Afrique Nord,
Canaries, Madère,
rare aux Açores;
Asie jusqu'au
Japon; en hiver
Chine Sud et
Inde Nord-Ouest.

HÆMATOPUS *Linné* 1758

1. **ostralegus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 257; Dresser, VII, p. 567, pl. 533; *osculans* Swinhoe, 1871.

Europe, du cercle
arctique et de
l'Islande
à la Méditerranée;
hivérne en
Afrique jusqu'au
Mozambique;
Asie jusqu'au
Japon.
l'hiver dans l'Inde
et Ceylan.

2. **moquini** Bonap., Comptes Rendus Acad. Sc. de Paris, t. 43, 1856, p. 1020; Dresser, IX, p. 359, pl. 711; *capensis* Licht. (nomen nudum).

Iles Canaries
(Graciosa, Lanza-
rote, Fuerte-
ventura), Madère;
Afrique Sud,
de la Mer Rouge
et du Gabon
jusqu'au Sud.

Plumage entier d'un noir de suie; bec et peau nue autour de l'œil d'un rouge corail; pieds d'un rouge foncé; iris rouge clair. Sexes semblables. Aile : 250 millimètres.

Genre TOURNE=PIERRE

1. *Strepsilas interpres* Linné

TOURNE-PIERRE VULGAIRE

D. et G., II, p. 154.

Famille XXXVII — SCOLOPACIDÉS

Genre COURLIS

1. *Numenius arquatus* (Linné)

COURLIS CENDRÉ

D. et G., II, p. 159.

STREPSILAS Illiger 1811

Arenaria Brisson, 1760.

1. **interpres** et *morinella* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 248 et 249; Dresser, VII, p. 555, pl. 532; *collaris* Meyer et Wolf, 1810.

Europe, de l'Islande et de la Nouvelle-Zemble à la Méditerranée; Canaries, Madère, Açores; émigre l'hiver en Afrique jusqu'au Cap et Madagascar (cosmopolite); Asie jusqu'au Japon, émigre dans l'Inde, la Malaisie, l'Australie, la Nouvelle Zélande; Amérique entière et Polynésie.

XXXVII — SCOLOPACIDÆ

NUMENIUS Mæhr. 1752

1. **arquatus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 242; Dresser, VIII, p. 243, pl. 578; *lineatus* Cuvier 1829.

Europe, presque du cercle arctique à la Méditerranée; en hiver, toute l'Afrique jusqu'au Cap, Madagascar; Asie jusqu'au Japon, en hiver l'Inde et ses îles.

2. Numenius tenuirostris Vieill.

COURLIS A BEC GRÊLE

D. et G., II, p. 160.

3. Numenius phæopus Lath.

COURLIS CORLIEU

D. et G., II, p. 162.

4. Numenius hudsonicus Lath.

COURLIS DE LA BAIE D'HUDSON

D. et G., II, p. 163.

Genre BARGE**1. Limosa ægocephala** [1] (Linné)

BARGE ÉGOCÉPHALE

D. et G., II, p. 167.

(1) C'est probablement l'espèce suivante qui est la véritable *Scolopax ægocephala* de Linné.

2. **tenuirostris** Vieill., Nouv. Diet. H. Nat., VIII, 1817, p. 302; Dresser, VIII, p. 237, pl. 577. Europe Sud, accidentel en France, Belgique, Hollande; Afrique Nord; Transcaspie.
3. **phæopus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 213; Dresser, VIII, p. 227, pl. 576. Europe, de l'Islande et la Laponie (où il niche), émigrant à travers l'Europe Sud en Afrique et Madagascar; Açores, Madère, Canaries; Asie jusqu'à l'Inde et la Malaisie.
4. **borealis** Forster, Phil. Trans., t. 62, 1772, p. 441; Dresser, VIII, p. 221, pl. 575. Espèce américaine, du cercle arctique à l'Amérique Sud (en hiver); très accidentelle en Europe Ouest (Islande, Grande-Bretagne).

LIMOSA Brisson 1760

1. **limosa** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 245; *aegecephala* Dresser (nec Linné), VIII, p. 211, pl. 574; *belgica* Gm., Syst. Nat., 1788, I, p. 663; Dresser, 1903; *melanura* Leisl., 1813; *brevipès* Schleg. (nec Gray), 1864. Europe, de l'Islande à la Méditerranée; en hiver émigre en Afrique jusqu'à l'Abessinie; Asie jusqu'au Japon, en hiver dans l'Inde, la Malaisie et l'Australie.

2. *Limosa rufa* Brisson

BARGE ROUSSE

D. et G., II, p. 169.

Genre TÉRÉKIE**1. *Terekia cinerea* Güldenst.**

TÉRÉKIE CENDRÉE

D. et G., II, p. 171.

Genre MACRORAMPHE**1. *Macroramphus griseus* (Gm.)**

MACRORAMPHE GRIS

D. et G., II, p. 174.

2. *lapponica* et *agoccephala* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 246; Dresser, VIII, p. 203, pl. 573, fig. 1, 2; 574, fig. 2; *meyeri* Leisl., 1815; *rufa* Temm., 1820.

Europe Nord, Laponie et Sibérie; émigre en hiver dans l'Europe Sud et l'Afrique jusqu'à la Sénégambie; Îles Canaries; Asie, en hiver jusqu'au Sind.

TEREKIA Bonap. 1838

1. *cinerea* (Güldenst.), Nov. Comm. Petrop., XIX, 1774, p. 473, pl. 19; Dresser, VIII, p. 195, pl. 572; *terek* Lath., 1790.

Russie Nord, à l'Ouest jusqu'à la Finlande; rare en Allemagne et en Italie; en hiver, émigre à travers l'Europe Sud-Est jusque dans l'Afrique Sud; Sibérie Nord et Japon jusqu'à l'Inde et l'Australie.

MACRORAMPHUS Leach 1816

1. *griseus* (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 658; Dresser, VIII, p. 187, pl. 571 (nec *Totanus griseus* [Briss.])

Espèce de l'Amérique Septentrionale, accidentelle en Grande-Bretagne, en Suède, en Allemagne, en France et en Danemark; Sibérie Nord-Est et Japon.

Genre BÉCASSE

1. *Scolopax rusticula* Linné

BÉCASSE ORDINAIRE

D. et G., II, p. 177.

Genre BÉCASSINE

1. *Gallinago major* (Gm.)

BÉCASSINE DOUBLE

D. et G., II, p. 181.

2. *Gallinago scolopacinus* Bp.

BÉCASSINE ORDINAIRE

D. et G., II, p. 183.

SCOLOPAX Linné 1758

1. **rusticula** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 243; Dresser, VII, p. 615, pl. 540; *major* Leach, 1816; *scoparia* Bp., 1856.

Europe Nord et Asie, du 66° ou 67° latitude Nord à la Méditerranée, les Açores, Canaries, Madère; émigre en Europe Sud, rarement en Afrique, Himalaya, Inde, Chine, Japon; accidentel dans l'Amérique Nord-Est.

GALLINAGO Leach 1816

1. **major** (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 661; Dresser, VII, p. 631, pl. 541.

Europe Nord, du 69° latitude Nord en Norvège (65° en Suède et Russie, 62° en Finlande); émigrant, en hiver, dans l'Europe Sud et l'Afrique jusqu'au Cap; Asie jusqu'au Léniisséi et Perse; de passage régulier en Angleterre.

2. **gallinago** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 244; *cælestis* Frenzel, Beschr. Vög. Wittenb., 1801, p. 58; Dresser, VII, p. 641, pl. 542, 543; *scolopacina* Bp., 1838; *sabinei* Vigors, 1825 (Var. mélanique).

Europe Nord, du 69° latitude Nord, Islande; émigre, en hiver, dans l'Europe Sud, Madère, Canaries, Açores; Afrique Nord; Asie jusqu'au Japon; en hiver, Chine, Inde, Ile Batchian; accidentel aux Bermudes.

3. Gallinago gallinula (Linné)

BÉCASSINE GALLINULE ET SOURDE OU PETITE BÉCASSINE

D. et G., II, p. 185.

Genre SANDERLING**1. Calidris arenaria** (Linné),

SANDERLING DES SABLES

D. et G., II, p. 188.

Genre MAUBÈCHEou *Bécasseau***1. Tringa canutus** Linné

MAUBÈCHE CANUT OU BÉCASSEAU MAUBÈCHE

D. et G., II, p. 190.

3. **gallinula** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 244 ;
Dresser, VII, p. 653, pl. 544 ; *minor* Briss.,
1760. •

Europe Nord et
Asie, du
cercle arctique
au Sud ; émigre,
en hiver, en
Grande-Bretagne,
dans la région
méditerranéenne
et l'Afrique Nord,
l'Inde, la Chine ;
rare au Japon.

CALIDRIS *Illiger* 1811

1. **arenaria** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 251, et
calidris (Charadrius), Linné, l. c., p. 255 ;
Dresser, VIII, p. 101, pl. 559, 560 ; *tridactyla*
Pallas, 1831.

Europe, Asie
et Amérique aré-
tiques ; émigre,
en hiver, à travers
toute l'Europe
jusqu'à l'Afrique
Sud ; Inde, Chine,
Japon,
Iles Laquedives,
Australie, Chili.

TRINGA *Linné* 1758

Calidris Cuv., 1817 ; *Canutus* Brehm ; *Pelidna* Cuvier ;
Arquatella Baird.

1. **canutus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 251 ; Dres-
ser, VIII, p. 77, pl. 555, 556 ; *islandica* L.,
1767.

Europe et Asie
arctiques ; émigre,
en hiver, à
travers l'Europe,
jusqu'en Afrique
Sud, Asie Sud,
Australie ;
Amérique Nord
jusqu'au Brésil ;
Japon (mais
non dans l'Inde).

2. *Tringa maritima* Brunn.

MAUBÈCHE MARITIME

D. et G., II, p. 192.

3. *Pelidna subarquata* (Güldenst.)

PÉLIDNE COCORLI

D. et G., II, p. 195.

4. *Pelidna cinclus* (Linné)

PÉLIDNE CINCLE

D. et G., II, p. 197.

5. *Pelidna maculata* (Vieill.)

PÉLIDNE TACHETÉE

D. et G., II, p. 200.

2. **striata** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 248; Dresser, VIII, p. 69, pl. 554; *maritima* Gm., 1788; *maritima* et *undata* Brünn., 1764; *arquatella* Pall., 1831; *schinzi* Roux, Orn. Prov., pl. 284 (nec Brehm).
Europe Nord, du Cap Nord, Spitzberg, Islande, en hiver jusqu'à la Méditerranée; Amérique Nord, en hiver aux États-Unis; Asie Nord jusqu'à la péninsule Taimyr.
3. **subarquata** (Güld.), Comm. Nov. Acad. Petrop., 1775, XIX, p. 471, pl. 18; Dresser, VIII, p. 59, pl. 558.
Asie arctique, émigre, en hiver (printemps, automne), en Europe, Afrique jusqu'au Sud, Madagascar; Inde, Chine, Australie; accidentel en Amérique Nord-Ouest.
4. **alpina** et *cinclus* Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 249 et 251; Dresser, VIII, p. 21, pl. 548; *variabilis* Meyer, 1809; *schinzi* Brehm, 1831 (nec Roux); *torquata* Degland, Orn. Europ., 1849, II, p. 330 (1).
Europe Nord, de la Nouvelle-Zemble (mais non du Spitzberg), Grande-Bretagne, Danemark; émigre dans l'Europe Sud et l'Afrique jusqu'au Zanzibar; Iles Canaries; Asie jusqu'à l'Inde; accidentel en Amérique Nord-Ouest.
5. **maculata** (Vieill.), Nouv. Dict. Hist. Nat., t. 34, 1819, p. 465; Dresser, VIII, p. 11, pl. 546; *pectoralis* Say, 1823.
Amérique arctique et Nord, émigre dans le Sud; Groënland; accidentel en Angleterre.

(1) Cette variété, admise par Gerbe (p. 199), n'est pas considérée comme une sous-espèce distincte par les Ornithologistes modernes.

6. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉLIDNE A QUEUE POINTUE

7. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉLIDNE DE BAIRD

6. **acuminata** Horst., Trans. Linn. Soc., XIII, 1821, p. 192; Dresser, IX, p. 363, pl. 712; *australis* Gould (nec Gm.).

Sommet de la tête d'un roux de rouille rayé de noir; parties supérieures plus rousses que chez *maculata*; tige des rémiges entièrement blanche sur une partie de leur longueur; rectrices noirâtres bordées de blanc, les médianes allongées et bordées de roux, toutes les rectrices pointues. Une raie sur l'œil blanche tachetée de noir. Dessous blanc, la gorge et la poitrine tachetées de noir; la poitrine et les flancs lavés de roux; le reste du dessous écaillé de noir. Bec olivâtre à la base, le reste brun noirâtre; pattes d'un jaune olivâtre; iris brun-noisette. Sexes semblables. Aile: 133 millimètres. — En hiver la tête est roux de rouille, le dessus d'un brun-gris rayé de plus foncé; la raie sourcilière et le dessous blancs; la poitrine d'un fauve grisâtre avec des raies foncées indistinctes. — Le jeune est semblable à l'adulte en livrée d'hiver, mais plus foncé en dessus.

7. **bairdi** Coues, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 1861, p. 194.

Dessus noirâtre avec les plumes bordées de roux et d'isabelle; sommet de la tête d'un roux grisâtre rayé de brun foncé; croupion et couvertures supérieures de la queue noires marquées de roux-isabelle vif, les latérales blanches rayées de brun foncé. Queue d'un brun grisâtre, les rectrices médianes plus foncées et plus longues. Dessous blanc, la gorge, la poitrine et les flancs lavés de fauve pâle et finement rayés de brun; bec noir; pattes d'un noir ardoisé; iris brun. — Le jeune a les plumes dorsales étroitement bordées de blanc sale; les raies de la gorge moins distinctes. Aile: 120 millimètres.

Asie et Amérique Nord: pris deux fois en Angleterre (se mêle aux bandes de l'espèce précédente); émigre en Malaisie, Polynésie, Australie, Nouvelle-Zélande.

Espèce américaine, du Canada au Chili: Sibérie Nord: s'égare jusqu'au Damara; pris une fois en Angleterre.

8. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉLIDNE DE BONAPARTE OU A COU BRUN

(? *Pelidna melanotos* Gerbe

PÉLIDNE A DOS NOIR

D. et G., II, p. 201).

9. *Pelidna minuta* (Leisl.)

PÉLIDNE MINUTE

D. et G., II, p. 203.

10. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉLIDNE MINUTILLE

8. *fuscicollis* Vieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., t. 34, 1819, p. 461; Dresser, VII, p. 15, pl. 547; *bonapartei* Schlegel, 1844.

Espèce américaine, du Canada aux Iles Falkland; accidentel en Angleterre et en Irlande.

Diffère des espèces voisines par ses couvertures supérieures de la queue blanches. Dessus d'un gris brunâtre varié de roux créneux ou de roux de rouille, et rayé de noir. Dessous blanc; bas de la gorge, poitrine et flancs tachetés de brun noirâtre. Bec noirâtre, d'un vert foncé à la base; pattes d'un vert foncé; iris brun-noir. Sexes semblables. — Le jeune a les plumes du dos bordées de blanchâtre, le cou et la poitrine lavés d'un fauve grisâtre, les taches mal définies.

9. *minuta* Leisler, Nachtr. zu Bechst. Naturg. Deuts., I, 1811, p. 74; Dresser, VIII, p. 29, pl. 549, 550, fig. 1; 552, fig. 1.

Europe Nord et Nord-Est; émigre à travers toute l'Europe, jusque dans l'Afrique Sud; Asie Nord, émigre dans l'Inde et Ceylan.

10. *minutilla* Vieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., t. 34, 1819, p. 466; Dresser, VIII, p. 61, pl. 552, fig. 2 et 3.

Amérique arctique et subarctique, émigrant en hiver dans l'Amérique Sud; accidentel en Angleterre Sud-Ouest.

Diffère de *minuta* par sa taille moindre, ses parties supérieures plus noires, moins variées de roux, le derrière du cou moins cendré; le croupion et les couvertures supérieures de la queue d'un brun noirâtre, les plumes les plus externes blanches. La tige de la première rémige est seule blanche; les grandes couvertures de l'aile sont bordées de blanc. Gorge blanche; devant du cou et poitrine cendrés, rayés de brun; le reste du dessous blanc. Bec d'un brun noirâtre; pattes d'un brun jaunâtre; iris brun foncé. Sexes semblables. — En hiver, le dessus est d'un gris cendré terne, rayé de brunâtre, la poitrine grisâtre avec des raies foncées indistinctes, le reste du dessous blanc. Aile : 85 millimètres.

11. *Pelidna temmincki* (Leisl.)

PÉLIDNE DE TEMMINCK (1)

D. et G., II, p. 205.

Genre PÉLIDNE (partim)**1. *Pelidna platyrhyncha* (Temm.)**

PÉLIDNE PLATYRHYNQUE

D. et G., II, p. 206.

Genre ACTITURE**1. *Actiturus* (2) *rufescens* (Vieill.)**

ACTITURE ROUSSATRE OU ROUSSET

D. et G., II, p. 209.

(1) Le nom de « temmia » est incorrect, n'étant qu'une corruption de « Temminck ».

(2) *Actiturus* Bonap., 1850, étant synonyme de *Bartramia* Lesson, 1831, ne peut être adopté pour le genre actuel.

11. **temmincki** (Leisl.), Nachtr. zu Bechst. Naturg. Deuts., I, 1811, p. 64; Dresser, VIII, p. 45, pl. 550, fig. 2, et 551.

Europe Nord,
émigre, en hiver,
à travers
l'Europe, dans
l'Afrique Nord;
Asie Nord,
émigre en Chine
et dans l'Inde.

LIMICOLA Koch 1816

1. **platyrhyncha** (Temm.), Man. d'Orn., 1815, p. 398; Dresser, VIII, p. 3, pl. 545; *pygmaea* Koch (nec Lath.), 1816.

Europe Nord
(surtout
Nord-Est), jus-
qu'au Cerele
Arctique;
émigre, en hiver,
dans l'Europe Sud
et
l'Afrique Nord;
de passage (rare)
en Grande-
Bretagne; Asie
jusqu'à
la Sibérie Ouest.

TRINGITES Cabanis 1856

1. **subruficollis** (Vicill.), Nouv. Dict. Hist. Nat., XXIV, 1819, p. 465 (1); *rufescens* Vicill., loc. cit., p. 470; Dresser, VIII, p. 109, pl. 561.

(1) Le nom spécifique « *subruficollis* », figurant à la page 465, tandis que « *rufescens* » n'est inscrit qu'à la page 470, c'est le premier qui a la priorité.

Amérique arcti-
que, émigre
jusqu'au Pérou et
au Paraguay;
accidentel en Eu-
rope (Angleterre,
Irlande, Héli-
goland, France,
Suisse).

Genre BARTRAMIE

1. *Bartramia longicauda* (Bechst.)

BARTRAMIE LONGICAUDE

D. et G., II, p. 231.

Genre COMBATTANT

1. *Machetes pugnax* (Linné)

COMBATTANT ORDINAIRE

D. et G., II, p. 211.

BARTRAMIA Lesson 1831

Actiturus Bonap., 1850.

1. **longicauda** (Bechst.), Kurze Uebers. Latham, 1811, p. 453, pl. 184; Dresser, VIII, p. 119, pl. 562.

Amerique Est et Centrale,
émigre jusqu'au Brésil et au Pérou;
accidentel en Europe (Angleterre, Allemagne, Hollande, Malte, Italie);
s'égare en Australie.

PAVONCELLA Leach 1816

Machetes Cuvier, 1817.

1. **pugnax** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 247; Dresser, VIII, p. 87, pl. 557, 558.

Europe, du Cap Nord au Danemark, rarement dans l'Est de l'Angleterre;
émigre, en hiver, jusque dans l'Afrique Sud;
Asie jusqu'au Kamtchatka,
émigre jusque dans l'Inde, Bornéo;
rare au Japon;
accidentel en Amérique Nord-Est.

Genre CHEVALIER

1. *Totanus griseus* (Brisson)

CHEVALIER GRIS

D. et G., II, p. 215.

2. *Totanus fuscus* (Linné)

CHEVALIER BRUN

D. et G., II, p. 216.

3. *Totanus calidris* (Linné)

CHEVALIER GAMBETTE

D. et G., II, p. 218.

TOTANUS *Bechst.* 1809

Glottis Koch; *Gambetta* Kaup.; *Helodromas*
et *Rhyacophilus* Kaup.

1. **glottis** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 245; *canescens* Gm., 1788; Dresser, VIII, p. 173, pl. 570; *nebularius* Ganner, 1767.

Europe,
du Cap Nord
et des montagnes
d'Écosse,
émigre, en hiver,
dans l'Europe
Sud et l'Afrique
jusqu'au Cap;
Asie jusqu'au Ja-
pon, émigre
jusque dans l'Inde
et l'Australie;
accidentel
en Amérique Est.

2. **fuscus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 243; Dresser, VIII, p. 165, pl. 567, fig. 2; 568, fig. 2, 3; 569, fig. 1.

Europe, du cercle
arctique ou du
69° latitude Nord
et de l'Asie Nord,
émigre, en
hiver, dans l'Eu-
rope Sud et
l'Afrique jusqu'au
Cap; en Asie,
Japon, Chine.
Inde; de passage
en
Grande-Bretagne.

3. **calidris** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 245; Dresser, VIII, p. 157, pl. 567, fig. 1; 568, fig. 1; 569, fig. 2.

Europe, de la
Laponie à
la Méditerranée;
sédentaire
en France Sud;
émigre en Afrique
jusqu'au Cap;
Iles Canaries;
Asie jusqu'au Ja-
pon, émigre en
Chine,
Inde et Malaisie.

4. Totanus stagnatilis Bechst.

CHEVALIER STAGNATILE

D. et G., II, p. 221.

5. Totanus glareola (Linné)

CHEVALIER SYLVAIN

D. et G., II, p. 223.

6. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

CHEVALIER SOLITAIRE

4. **totanus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 245; *stagnatilis* Bechst., Orn. Taschenb., II, p. 292; Dresser, VIII, p. 151, pl. 566; *guinetta* Pall., 1831.
- Europe moyenne et Sud, surtout dans l'Est; accidentel dans le Nord; Héligoland; émigre en Afrique jusqu'au fleuve Orange; Asie jusqu'au Japon, émigre dans l'Inde, la Malaisie, l'Australie.
5. **glareola** (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 677; Dresser, VIII, p. 143, pl. 565; *grallatorius* Steph., 1824.
- Europe, de la Laponie à la Méditerranée, émigre en Afrique Sud; Asie jusqu'au Japon, Chine, Inde, Malaisie, Australie.
6. **solitarius** Wilson, Amer. Ornith., VII, 1813, p. 53, pl. 58, fig. 3; Dresser, IX, p. 373, pl. 714; *chloropygius* Vieill., 1816.
- Espèce de l'Amérique Nord, très accidentelle en Grande-Bretagne.

Diffère de *T. glareola* par son croupion et ses couvertures caudales médianes ainsi que les rectrices correspondantes d'un brun-vert foncé, les autres rectrices et les couvertures latérales blanches, avec des barres noirâtres. Les couvertures alaires inférieures et les axillaires blanches, avec des bandes étroites d'un brun verdâtre. Bec verdâtre à sa base, le reste noirâtre; pattes d'un gris-vert foncé; iris brun. Sexes semblables. — En hiver, le dessus est plus gris, les taches blanches moins distinctes, et le devant du cou moins nettement rayé. Aile : 133 millimètres.

7. Totanus ochropus (Linné)

CHEVALIER CUL-BLANC

D. et G., II, p. 225.

8. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

CHEVALIER AUX PIEDS JAUNES

7. **ochropus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 250 ;
Dresser, VIII, p. 135, pl. 564.

Europe, du cercle
arctique
(pas en Laponie),
émigre, en hiver,
à travers l'Europe
Sud, jusque
dans l'Afrique Sud
(Cap); Asie
jusqu'au Japon,
émigre jusque
dans l'Inde,
la Malaisie; acci-
dentel en
Nouvelle-Écosse.

8. **flavipes** (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 659 ; Dres-
ser, IX, p. 377, pl. 715.

Espèce de
l'Amérique Nord
jusqu'au
Groënland, très
accidentelle
en Angleterre.

Sommet de la tête, nuque et derrière du cou d'un brun noirâtre rayé de blanc ; dessus d'un brun noirâtre, nettement tacheté de blanc et de gris fauve ; couvertures supérieures de la queue blanches barrées de noirâtre ; rémiges d'un brun noirâtre, la tige de la première blanche, des autres brunes. Rectrices médianes d'un cendré foncé, les autres blanches, toutes barrées de noirâtre. Dessous blanc, les côtés de la tête, du cou et la poitrine rayés de noirâtre, les raies plus larges sur le bas du cou et la poitrine ; flancs barrés de noir ; plumes axillaires d'un brun cendré. Bec d'un noir verdâtre ; pattes jaunes ; iris brun foncé. — En hiver, le dessus est plus foncé et les taches réduites en dimension et en nombre ; couvertures supérieures de la queue, menton, haut de la poitrine presque blancs ; flancs moins marqués de brun grisâtre. Aile : 155 millimètres.

Genre GUIGNETTE

1. *Actitis hypoleucos* (Linné)

GUIGNETTE VULGAIRE

D. et G., II, p. 227.

2. *Actitis macularius* (Linné)

GUIGNETTE GRIVELÉE

D. et G., II, p. 229.

Genre SYMPHÉMIE

1. *Symphemia semipalmata* (Gm.)

SYMPHÉMIE SEMIPALMÉE

D. et G., II, p. 233.

ACTITIS *Boie* 1822*Totanus* p. Auct., Dresser, etc.

1. **hypoleucus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 250;
Dresser, VIII, p. 127, pl. 563.

Europe, du Cap Nord à la Méditerranée (niche dans toute l'Europe); Afrique Nord, émigre jusqu'au Cap; Asie jusqu'au Japon, la Chine et l'Inde, émigre en Australie.

2. **macularius** (Linné), Syst. Nat. I, 1766, p. 249;
Dresser, IX, p. 367, pl. 713.

Espèce américaine nichant dans le Nord, émigre au Sud jusqu'au Brésil; très rarement accidentelle en Grande-Bretagne (très douteuse sur le continent européen).

SYMPHEMIA *Rafinesque* 1819

1. **semipalmata** (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 659;
crassirostris Vieill., 1815; *atlantica* Rafin., 1819; *speculiferus* Cuv., 1828.

Amérique Nord, émigre au Sud. Antilles: très accidentel en Europe Nord-Ouest (France Nord).

Genre PHALAROPE

1. *Phalaropus fulicarius* (Linné)

PHALAROPE DENTELÉE

D. et G., II, p. 236.

2. *Lobipes hyperboreus* (Linné)

LOBIPÈDE HYPERBORÉE

D. et G., II, p. 239.

Famille XXXVIII — RECURVIROSTRIDÉS

Genre AVOCETTE

1. *Recurvirostra avocetta* Linné

AVOCETTE A NUQUE NOIRE

D. et G., II, p. 243.

PHALAROPUS *Brisson* 1760

Lobipes Cuvier, 1817.

1. **fulicarius** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 249 ;
Dresser, VII, p. 605, pl. 538, 539, fig. 1 ;
platyrhynchus Temm., 1815 ; *lobatus* Hewitson
(nec Linné).

Groenland, Islande, Spitzberg (pas en Norvège) et l'extrême Nord des deux continents ; émigre en Europe jusqu'à la Méditerranée, en Asie jusqu'à la Chine, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, le Chili.

2. **hyperboreus** (Linné), Syst., Nat., I, 1766, p. 249 ;
Dresser, VII, p. 597, pl. 537, 539, fig. 2 ;
lobatus L., 1766 ; *angustirostris* Naum. ; *cinereus* Meyer, 1810.

Europe, du Cap Nord, Islande, jusque dans l'Europe Sud en hiver ; rare en Afrique Nord ; Asie jusqu'au Japon, Inde et Malaisie ; Amérique Nord, émigre jusqu'au Guatemala.

XXXVIII — RECURVIROSTRIDÆ

RECURVIROSTRA *Linné* 1758

1. **avocetta** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 256 ; Dresser, VII, p. 577, pl. 534 ; *fissipes* Brehm, 1831.

Europe, du Sud de la Suède (accidentel en Angleterre) à la Méditerranée ; émigre en Afrique jusqu'au Cap ; Asie jusqu'à la Chine Nord, en hiver dans l'Inde.

Genre ÉCHASSE

1. *Himantopus candidus* Bonnat.

ÉCHASSE BLANCHE

D. et G., II, p. 246.

Famille XXXIX — RALLIDÉS

Genre RALE

1. *Rallus aquaticus* Linné

RALE D'EAU

D. et G., II, p. 251.

HIMANTOPUS *Brisson* 1760*Charadrius* (part.) *Linné*.

1. **himantopus** (*Linné*), *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 255 ;
candidus *Bonnat.*, 1791 ; *Dresser*, VII, p. 587,
 pl. 535, 536 ; *melanopterus* *Meyer*, 1814.

Europe Sud
 (nîche dans la
 région méditerranéenne jusque
 dans la Russie
 Sud) ; de passage
 en Angleterre,
 Danemark,
 France Nord,
 Suisse, Hongrie ;
 émigre dans
 toute l'Afrique ;
 Asie moyenne et
 Sud jusqu'au
 Sud de l'Inde.

XXXIX — RALLIDÆ

RALLUS *Linné* 1766

1. **aquaticus** *Linné*, *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 262 ;
Dresser, VII, p. 257, pl. 495.

Europe, de
 la Norvège à
 la Méditerranée ;
 Angleterre,
 sédentaire en Is-
 lande ; émigre,
 en hiver, dans
 l'Afrique Nord ;
 Asie Mineure jus-
 qu'à Yarkand ;
 émigre dans l'Inde
 Nord-Ouest
 (rare).

Genre CREX

1. *Crex pratensis* Bechst.

RALE DE GENÊT OU DES PRÉS

D. et G., II, p. 253.

Genre PORZANE

1. *Porzana maruetta* (Brisson)

PORZANE OU POULE D'EAU MAROQUETTE

D. et G., II, p. 256.

2. *Porzana bailloni* (Vieill.)

POULE D'EAU DE BAILLON

D. et G., II, p. 258.

CREX *Bechstein* 1803

Ortygometra et *Rallus* L.

1. **crex** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 261; Leach, 1816; *pratensis* Bechst., 1803; Dresser, VII, p. 291, pl. 499.

Europe, du cercle arctique et des Hébrides à la Méditerranée; émigre en Afrique jusqu'au Cap; Asie jusqu'au Lé-nisséi, émigre jusqu'en Arabie et en Perse; s'égare au Groenland et dans l'Amérique du Nord.

PORZANA *Vicill.* 1816

Ortygometra et *Zaporna* Leach, 1816.

1. **porzana** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 261; *maruetta* Leach, 1816; Dresser, VII, p. 267; pl. 496.

Europe, de la Norvège et d'Arkangel à la Méditerranée (en hiver); Canaries (rare); Afrique Nord jusqu'en Abyssinie; Asie moyenne jusqu'à l'Inde Nord.

2. **bailloni** (Vicill.), Nouv. Dict. Hist. Nat., t. 28, 1819, p. 548; Dresser, VII, p. 275, pl. 497; *pygmaea* Brehm, 1824; Bonap., 1842.

Europe moyenne et Sud, du 54^e latitude Nord à la Méditerranée; de passage irrégulier en Angleterre; Afrique et Madagascar; Asie Mineure, Perse.

3. Porzana minuta (Pall.)

POULE D'EAU POUSSIN

D. et G., II, p. 259.

Genre GALLINULE**1. Gallinula chloropus** (Linné)

POULE D'EAU ORDINAIRE

D. et G., II, p. 262.

Genre PORPHYRION**1. Porphyrio caesus** Barrère

PORPHYRION BLEU OU TALÈVE, POULE SULTANE

D. et G., II, p. 265.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PORPHYRION D'ALLEN

3. **parva** (Scop.), Ann. I, Hist. Nat., 1769, p. 108; Dresser, VII, p. 283, pl. 498; *minuta* Montagu (nec Pallas), 1813; *pusilla* Bechst. (nec Pallas), 1803.

Europe moyenne et Sud, de passage irrégulier en Suede et en Angleterre; émigre en Afrique Nord; Asie Mineure jusqu'à l'Inde Nord-Ouest.

GALLINULA Brisson 1760

Fulica, p., Linné.

1. **chloropus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 258; Dresser, VII, p. 313, pl. 503.

Europe, de la Scandinavie à la Méditerranée; Afrique entière; Asie jusqu'au Japon, Inde et Ceylan.

PORPHYRIO Barrère 1745

Fulica, p., Linné; *Gallinula*, p., Lath.

1. **cæruleus** Vandelli, Flora et Fauna Lusit., I, 1797, p. 37; *veterum* Dresser, VII, p. 299, pl. 500 (nec Gmelin); *hyacinthinus* Temm., 1820.

Espagne et Portugal Sud, rare en France Sud et Italie; Sardaigne, Sicile, Iles Ioniennes, plus rare à l'Est; Afrique Nord-Ouest.

2. **alleni** Thompson, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1842, X, p. 204; Dresser, VII, p. 307, pl. 502.

Espèce d'Afrique et de Madagascar, accidentelle en Italie, en Espagne, à Madère et aux Canaries.

Sommet de la tête, nuque et côtés de la tête noirs, teintés de bleu indigo; derrière du cou et parties supérieures d'un

Genre FOULQUE

1. *Fulica atra* Linné

FOULQUE NOIR OU MACROULE

D. et G., II, p. 268.

2. *Fulica cristata* Gmel.

FOULQUE A CRÊTE

D. et G., II, p. 270.

olivâtre foncé à reflets vert-perroquet. Rémiges et rectrices d'un noir-bleu; couvertures alaires bleu-cobalt teinté de vert; dessous bleu foncé passant au noirâtre sur l'abdomen et les cuisses. Couvertures inférieures de la queue blanches (sauf les postérieures). Bec rouge foncé; plaque frontale noirâtre; pattes cramoisies; iris rouge-brun. — *Femelle* semblable. — *Jeune* d'un brun roussâtre, les plumes du dessus bordées de jaune, le croupion bleu verdâtre, le dessous jaunâtre, les couvertures inférieures de la queue rousses, les cuisses d'un noir-bleu. — Aile : 155 millimètres.

FULICA Linné 1758

Lupha Reichenb.

1. **atra** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 257; Dresser, VII, p. 327, pl. 504, fig. 2.

Europe,
de la Scandinavie
(rare au Nord) à
la Méditerranée;
Açores,
Madère, Cana-
ries; Afrique
Nord; Asie jus-
qu'au Japon;
en hiver jusqu'aux
Philippines.

2. **cristata** Gm., Syst. Nat., I, 1788, p. 704; Dresser, VII, p. 323, pl. 504, fig. 1; *mitrata* Licht., 1842.

Afrique entière
jusqu'au Cap;
niche en Espagne
et Portugal,
aux îles Baléares;
accidentel
en France Sud,
Italie,
surtout Sardaigne.

Famille XL — GRUIDÉS

Genre GRUE

1. **Grus cinerea** Bechst.

GRUE CENDRÉE

D. et G., II, p. 274.

2. **Grus leucogeranus** Pallas

GRUE LEUCOGÉRANE

D. et G., II, p. 277.

3. **Grus antigone** Pall.

GRUE ANTIGONE OU GRUE A COLLIER

D. et G., II, p. 276.

Genre ANTHROPOÏDE

1. **Anthropoïdes virgo** (Linné)

ANTHROPOÏDE DEMOISELLE OU DEMOISELLE DE NUMIDIE

D. et G., II, p. 279.

XL - GRUIDÆ

GRUS Pallas 1767

Ardea L.; *Megalornis* Gray; *Sarcogeranus* Sharpe.

1. **grus** (Linné) Syst. Nat., I, 1766, p. 234; *communis* Bechst., 1793; Dresser, VII, p. 337, pl. 505; *cinerea* Bechst., 1809.
Europe, de la Laponie jusqu'à l'Espagne: accidentel en Angleterre; Asie jusqu'au Japon, dans l'Inde en hiver.
2. **leucogeranus** Pallas, Reis. Russ. Reichs., II, 1773, Anhang, p. 714, tab. F; Dresser, VII, p. 359, pl. 507.
Europe Est (Russie), Asie jusqu'au Japon, Inde Nord-Ouest en hiver.
3. **collaris** Bodd., Tabl. Pl. Enlum., 1783, p. 52; *antigone* (1) Tegetm. et Blyth (nec Linné); Dresser, IX, p. 337, pl. 707.
Inde, accidentel en Russie Sud, d'Astrakan et de Guriéff à la mer Caspienne.

ANTHROPOIDES Vieill. 1816

1. **virgo** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 234; Dresser, VII, p. 353, pl. 506.
Europe Sud et Sud-Est, s'égarant rarement jusqu'aux Orcades, à Héligoland, en Suède; émigre en Afrique jusqu'à Natal; Asie Mineure et Centrale, Chine, Inde.

(1) *Ardea antigone* de Linné paraît être indéterminable, en raison des confusions auxquelles sa description a donné lieu.

Genre BALÉARIQUE

1. *Balearica pavonina* (Linné)

BALÉARIQUE PAVONINE

D. et G., II, p. 282.

Famille XLI — ARDÉIDÉS

Genre HÉRON

1. *Ardea cinerea* Linné

HÉRON CENDRÉ

D. et G., II, p. 286.

2. *Ardea melanocephala* Vigors

HÉRON A TÊTE NOIRE

D. et G., II, p. 289.

3. *Ardea purpurea* Linné

HÉRON POURPRÉ

D. et G. II, p. 290.

BALEARICA *Brisson* 1760

Espèce africaine qui n'est plus comprise dans la faune d'Europe par les Ornithologistes modernes.

Afrique Nord ;
accidentelle
naguère en Eu-
rope Sud,
Iles Baléares,
Malte, Sicile.

XLI — ARDEIDÆ**ARDEA** *Linné* 1758

Pyrrherodias Finsch. et Hartl.

1. **cinerea** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 236 ; Dresser, VI, p. 207, pl. 395.

Europe,
de la Scandinavie
moyenne, des
Iles Britanniques
à la Méditer-
ranée ; Afrique et
Madagascar ;
Asie jusqu'au Ja-
pon, Inde,
Malaisie, Austra-
lie ; s'égare
jusqu'en Islande.

2. **melanocephala** Vigors et Childr., in Denham and Clapp. Voy., 1826, II, App., p. 201 ; Dresser, VI, p. 225, pl. 397 ; *atricollis* Wagler, 1827.

Afrique entière,
Madagascar ;
accidentel en Es-
pagne et
France Sud.

3. **purpurea** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 236 ; Dresser, VI, p. 217, pl. 396.

Europe,
de la Scandinavie
et l'Angleterre
(rare) à
la Méditerranée ;
Madère, Ca-
naries ; Afrique,
Madagascar ;
Asie jusqu'au
Golfe Persique

Genre AIGRETTE

1. *Egretta alba* (Linné)

AIGRETTE BLANCHE

D. et G., II, p. 294.

2. *Egretta garzetta* (Linné)

AIGRETTE GARZETTE

D. et G., II, p. 295.

Genre GARDE-BŒUF

1. *Bubulcus ibis* (Hasselq.)

GARDE-BŒUF IBIS

D. et G., II, p. 298.

2. *Espèce nouvelle*

(pour l'Europe)

HERODIAS Boie 1822

Garzetta Kaup, 1829; *Egretta* Bp., 1838.

1. **alba** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 239; Dresser, VI, p. 231, pl. 398; *egretta* Bechst., 1793 (nec Gm.).

Europe Sud et Sud-Est, rare au Nord (Suède, Angleterre); Afrique jusqu'au Natal; Asie jusqu'en Birmanie.

2. **garzetta** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 237; Dresser, VI, p. 239, pl. 399.

Europe Sud, très accidentel dans le Nord et l'Angleterre; Açores, Canaries; Afrique jusqu'au Cap; Asie jusqu'au Japon, Malaisie, Philippines.

BUBULCUS (*Pucheran*) Bonap. 1857

1. **ibis** (Linné), Hasselq., Iter., 1857, p. 248; *bubulcus* Audouin, 1825; Dresser, VI, p. 245, pl. 400, fig. 1; *russata* Wagl., 1827; *lucidus* (Rafin. ?) Sharpe.

Europe Sud, accidentel jusqu'en Angleterre, Madère, Canaries; Afrique, Madagascar; Asie jusqu'à l'Asie Centrale.

2. **coromanda** (Bodd.), Tabl. Planches Enl., 1783, p. 54.

Diffère de *B. ibis*, en plumage de noces, par sa tête, son cou, sa gorge et ses plumes pectorales d'un orangé vif, les plumes du dos d'un gris vineux, teintées de jaune d'or et plus courtes que celles de *B. ibis*, dépassant à peine la queue. Aile : 254 millimètres.

Asie Sud-Est, de l'Inde au Japon, Philippines, Moluques; pris accidentellement en Italie.

Genre CRABIER

1. **Buphus comatus** (Linné)

CRABIER CHEVELU

D. et G., II, p. 300.

Genre BLONGIOS

1. **Ardeola sturmi** (Wagl.)

2. **Ardeola minuta** (Linné)

BLONGIOS NAIN

D. et G., II, p. 305.

ARDEOLA Boie 1822

Buphus Boie, 1826; *Cantrophagus*, p., Kaup.

1. **ralloides** Scop., Ann. I, Hist. Nat., 1769, p. 88; Dresser, VI, p. 251, pl. 400, fig. 2; *comata* Pall., 1773; *andax* Lapeyr., 1799.

Europe Sud-Est jusqu'à la mer Caspienne; accidentel dans l'Europe Centrale et Nord jusqu'à l'Angleterre; Afrique jusqu'en Transvaal.

ARDETTA Gray 1842

Ardeola et *Ardetta* Bp., 1831; *Ardeiralla* Verr., 1855; *Botaurus*, p., Boie, 1822.

1. **sturmi** (Wagler), Syst. Avium, 1827, sp. 37; *gut-turalis* Smith, Ill. Zool. South Afr., 1836, pl. 91.

Afrique entière; Canaries (Laguna), très accidentel dans l'Europe Sud (Pyrénées).

2. **minuta** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 240; Dresser, VI, p. 259, pl. 401.

Europe moyenne et Sud (accidentel en Scandinavie, Angleterre et jusqu'aux Féroé et à l'Islande); Madère, Açores; en hiver, Afrique Nord; Asie jusqu'à l'Inde Nord.

Genre BUTOR

1. *Botaurus stellaris* (Linné)

BUTOR ÉTOILÉ

D. et G., II, p. 308.

2. *Botaurus freti-hudsonis* (Briss.)

BUTOR DE LA BAIE D'HUDSON

D. et G., II, p. 309.

Genre BIHOREAU

1. *Nycticorax europæus* Steph.

BIHOREAU D'EUROPE

D. et G., II, p. 312.

BOTAURUS *Stephens* 1819

1. **stellaris** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 239 ;
Dresser, VI, p. 281, pl. 403. Europe, plus rare
dans le Nord ;
accidentel en An-
gleterre ; Afrique
Nord en hiver ;
Asie jusqu'au
Japon, Chine Sud,
Ceylan.
2. **lentiginosus** (Montag.), Orn. Dict., Suppl., 1813,
avec pl. ; Dresser, VI, p. 289, pl. 404 ; *minor*
Wilson, 1814. Amérique Nord
jusqu'au
Guatemala ; acci-
dentel dans les
Iles Britanniques.

NYCTICORAX *Stephens* 1819

Nyctiardea Swains., 1837.

1. **nycticorax** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 235 ;
griseus Linné, loc. cit., p. 239 (juv.) ; Dresser,
VI, p. 269, pl. 402 ; *europæus* Steph., 1819. Europe moyenne
et Sud ; acciden-
tel dans le Nord
(Iles Britanni-
ques, Suède, Da-
nemark, Iles
Feroë) ; Afrique
entière ; Asie
jusqu'au Japon et
aux Moluques ;
Iles Sandwich ;
Amérique sauf
dans l'extrême
Nord.

Genre CIGOGNE

1. *Ciconia alba* Willugh.

CIGOGNE BLANCHE

D. et G., II, p. 316.

2. *Ciconia nigra* (Linné)

CIGOGNE NOIRE

D. et G., II, p. 318.

Genre SPATULE

1. *Platalea leucorodia* Linné

SPATULE BLANCHE

D. et G., II, p. 321.

CICONIA *Brisson* 1760

1. **ciconia** (Linné), *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 235; *alba* Bechst., 1793; Dresser, VI, p. 297, pl. 405.
Europe moyenne et Sud (rare en Angleterre, Suède, Finlande et dans la France Ouest); émigre en Afrique jusqu'au Transvaal; Asie moyenne jusqu'à l'Inde Nord.
2. **nigra** (Linné), *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 235; Dresser, VI, p. 309, pl. 406.
Europe moyenne et Sud (rare dans la Suède Sud et l'Angleterre, de passage en France); s'égare jusqu'aux Féroë; Açores, Canaries, Madère; Afrique jusqu'au Zanzibar; Asie jusqu'au Japon.

PLATALEA *Linné* 1758

1. **leucorodia** Linné, *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 231; Dresser, VI, p. 319, pl. 407; *major* Temm. et Schleg., 1850.
Europe moyenne et Sud (accidentel en Angleterre et en Suède); s'égare jusqu'aux Féroë; Açores, Madère, Canaries; Afrique jusqu'à Zanzibar; Asie jusqu'au Japon.

Genre IBIS

1. *Ibis religiosa* Cuvier

IBIS SACRÉ

D. et G., II, p. 326.

Genre FALCINELLE

1. *Falcinellus igneus* (Gm.)

FALCINELLE ÉCLATANT

D. et G., II, p. 329.

IBIS Illiger 1811

Tantalus, p., Lath., 1790.

1. *æthiopica* (Latham), Ind. Orn., II, 1790, p. 706 ;
Dresser, IX, p. 285, pl. 694.

(1)

Afrique entière,
rare en Égypte et
en Algérie ;
Perse Sud ; acci-
dentel dans
le Caucase et en
Grèce.

FALCINELLUS Bechst. 1802

Plegadis Kaup, 1829.

1. *falcinellus* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 241 ;
Dresser, VI, p. 335, pl. 409 ; *igneus* et *viridis*
Gm., 1770.

Europe moyenne
et Sud, s'éga-
rant rarement au
Nord jusqu'aux
Iles Feroë et Or-
cades ; Afrique
jusqu'au Natal ;
Asie moyenne,
Inde, Chine,
Malaisie jusqu'à
l'Australie ;
Amérique du
Nord.

(1) Je signale ici, pour mémoire, l'*Ibis cremita* (Linné) qui habitait, paraît-il (d'après Gesner), la Suisse au seizième siècle, et ne se trouve plus qu'en Asie Mineure et dans l'Afrique Nord-Est (Voyez Dresser, VI, p. 329, pl. 408).

Famille XLIV — PHÉNICOPTERIDÉS

Genre PHÉNICOPTÈRE

1. *Phœnicopterus roseus* Pallas
PHÉNICOPTÈRE ROSE, FLAMANT
D. et G., II, p. 334.
-

XLIV — PHÆNICOPTERIDÆ

PHÆNICOPTERUS *Linne* 1766

1. *roseus* (Pallas), Zoogr., 1811-31, t. II, p. 207 ;
Dresser, VI, p. 343, pl. 410; *antiquorum*
Temm., 1820.

Europe Sud.
s'égarant rarement
dans l'Europe
moyenne et en
Angleterre ;
Afrique jusqu'au
Cap ; Asie
jusqu'à l'Inde.

Ordre VI — PALMIPÈDES

Famille XLV — PÉLÉCANIDÉS

Genre PÉLICAN

1. *Pelecanus onocrotalus* Linné

PÉLICAN ONOCROTALE OU BLANC

D. et G., II, p. 342.

2. *Pelecanus crispus* Bruch.

PÉLICAN FRISÉ

D. et G., II, p. 344.

Genre FOU

1. *Sula bassana* (Linné)

FOU DE BASSAN

D. et G., II, p. 347.

VI — PALMIPÈDES

XLV — PELECANIDÆ

PELECANUS *Linne* 1735

1. **onocrotalus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 215 ;
Dresser, VI, p. 193, pl. 393 ; *roseus* Everson.,
1835 ; *minor* Rüpp., 1837.

Europe Sud et
Sud-Est ; s'égare
rarement
dans l'Europe
moyenne, jusqu'à
la Suède
et la Finlande ;
Afrique Nord ;
Asie jusqu'à
l'Inde Nord.

2. **crispus** Bruch, Isis, 1832, p. 1109 ; Dresser, VII,
p. 199, pl. 394.

Europe Sud,
surtout Sud-Est
(Dalmatie, Grèce,
Russie Sud) ;
Afrique Nord ;
Asie jusqu'à
la Chine, en hiver
dans l'Inde
Nord-Ouest.

SULA *Brisson* 1760

Pelecanus p., Linné.

1. **bassana** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 217 ;
Dresser, VI, p. 181, pl. 392 ; *alba* Meyer et
Wolf, 1810 ; *major* Brehm, 1831.

Europe Occiden-
tale, côtes
atlantiques (de
l'Islande
à la France Nord),
émigre dans
l'Afrique Nord-
Ouest ; côtes
américaines, de
l'extrême Nord
au Mexique Sud.

Genre CORMORAN

1. *Phalacrocorax carbo* (Linné)

CORMORAN ORDINAIRE

D. et G., II, p. 352.

2. *Phalacrocorax cristatus* (Fabr.)

CORMORAN HUPPÉ

D. et G., II, p. 354.

3. *Phalacrocorax pygmæus* (Pallas).

CORMORAN PYGMÉE

D. et G., II, p. 356.

Genre FRÉGATE

1. *Fregata marina* Barr.

FRÉGATE MARINE

D. et G., II, p. 359.

PHALACROCORAX *Brisson* 1760

Pelecanus p., Linné.

1. **carbo** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 216; Dresser, VI, p. 151, pl. 388; *cormoranus* Meyer et Wolf.
Europe, de l'Islande à la Méditerranée; Afrique jusqu'au Cap; Asie jusqu'au Japon, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande.
2. **graculus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 217; Dresser, VI, p. 163, pl. 389; *cristatus* Müller, 1776; *desmaresti* Payraud., 1826.
Europe, sur les côtes de l'Atlantique (pas dans la Baltique), Islande, Feroë; Méditerranée, Mer Noire, Caspienne.
3. **pygmæus** Pallas, Reise, II, 1773, p. 712; Dresser, VI, p. 173, pl. 391.
Europe Sud et Sud-Est, rare au Nord jusqu'en Pologne; Afrique Nord; Asie moyenne jusqu'à l'Afghanistan.

TACHYPETES *Vieill.* 1816

Pelecanus p., Linné.

1. **aquilus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 216.
(Espèce intertropicale qui n'est plus considérée actuellement comme européenne.)
Régions intertropicales - de l'Atlantique (une capture en janvier 1792, sur les bords du Weser).

Genre PAILLE-EN-QUEUE

1. *Phaëton æthereus* Linné

PAILLE-EN-QUEUE ÉTHÉRÉ

D. et G., II, p. 361.

Famille XLVII — PROCELLARIDÉS

Genre ALBATROS

1. *Diomedea exulans* Linné

ALBATROS HURLEUR

D. et G., II, p. 366.

(1)

2. *Espèce nouvelle*

(pour l'Europe)

(1) Le *Diomedea chlororhynchus* Gm., pris une fois en Norvège (Gerbe, l. c., p. 368), est encore plus douteux comme espèce européenne.

PHAETON *Linne* 1766

1. *æthereus* L., Syst. Nat., I, 1766, p. 219.

(Espèce des régions intertropicales qui n'est plus considérée comme européenne.)

Côtes de l'Atlantique inter-tropical (aurait été pris sur les côtes de Norvège, à Heligoland et en Angleterre).

XLVII — PROCELLARIDÆ

DIOMEDEA *Linne* 1758

1. *exulans* L., Syst. Nat., I, 1766, p. 214.

(Espèce des régions intertropicales qui s'est égarée très rarement en Europe.)

Côtes de l'Atlantique inter-tropical (pris très accidentellement sur les côtes de France et de Norvège).

2. *melanophrys* Boie, in Temm. Pl. Col., 1828, p. 456.

Atlantique et mers du Sud (pris en Angleterre et aux Îles Féroë).

Blanc avec une bande d'un noir ardoisé passant sur l'œil; dos et scapulaires ardoisés, ailes brun foncé; queue ardoisée; bec jaune, plus foncé à la pointe; pieds jaunes. Aile : 510 millimètres.

Genre PÉTREL

1. *Procellaria glacialis* Linné
PÉTREL GLACIAL OU FULMAR
D. et G., II, p. 371.

2. *Procellaria capensis* Linné
PÉTREL DU CAP
D. et G., II, p. 372.

Genre ESTRÉLATE

1. *Procellaria hasitata* Kuhl
PÉTREL HASITE
D. et G., II, p. 374.

2. *Espèce nouvelle*
(pour l'Europe)
PÉTREL A PLUMAGE MOU

PROCELLARIA Linné 1758

Fulmarus Steph., 1826.

1. **glacialis** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 213; Dresser, VIII, p. 535, pl. 617; *minor* Kjerf., 1854. Côtés de l'Atlantique Nord, des mers polaires à la Grande-Bretagne; accidentel dans l'Europe moyenne (jusqu'en Suisse).
2. **capensis** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 213. Atlantique Sud (côtes d'Afrique), très accidentel sur les côtes de la Méditerranée (France Sud).

ÆSTRELATA Bonap. 1855

1. **hæsitata** Kuhl, Beitr., 1820, p. 142; Dresser, VIII, p. 545, pl. 618. Mer des Antilles; accidentel en France, en Angleterre, en Hongrie.
2. **mollis** Gould, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1844, XIII, p. 363; Dresser, IX, p. 411, pl. 721. Mers du Sud et Atlantique Nord jusqu'à Madère.

Dessus d'un gris ardoisé, plus foncé sur la tête, les plumes du front bordées de blanc; une tache d'un gris noirâtre en avant et au-dessous des yeux; ailes d'un brun noirâtre; queue grise, les rectrices latérales tachetées de blanc. Les lores, la gorge et le dessous blancs, les côtés de la poitrine gris, les flancs tachetés de gris. Bec noirâtre; torse et partie basale du pied couleur chair, le reste noirâtre; iris brun. Aile 265 millimètres.

3. Espèce nouvelle
(pour l'Europe)
PÉTREL A PIEDS COURTS

Genre BULWÉRIE

- 1. Thalassidroma Bulweri** (Jard.)
THALASSIDROME DE BULWER
D. et G., II, p. 388.

Genre PUFFIN

- 1. Puffinus cinereus** (Kuhl)
PUFFIN CENDRÉ
D. et G., II, p. 375.

3. **brevipes** Peale, U. S. Expl. Exped., 1848, VIII, p. 294, pl. 80; *leucoptera* Salvin, 1876.

Blanc, avec le dessus d'un gris ardoisé, le sommet de la tête plus pâle, le dos, les grandes couvertures alaires et celles de la queue grises. Queue d'un gris noirâtre, les rectrices latérales gris pâle; côtés de la poitrine ardoisés; couvertures inférieures de la queue et axillaires blanches. Bec noir; tarse et base des deux doigts internes jaunâtres, le reste noir. Aile : 220 millimètres.

Océan Pacifique Ouest, Nouvelles Hébrides, etc. (pris une fois sur les côtes d'Angleterre, pays de Galles).

BULWERIA Bonap. 1842

1. **columbina** Webb et Berth., Orn. Canar., 1841, p. 44, pl. 4, fig. 2; Dresser, VIII, p. 551, pl. 614, fig. 2; *bulweri* Jard. et Selb., 1825-43.

D'un noir fuligineux plus foncé dessus, passant au brun pâle dessous; ailes d'un brun noirâtre, les grandes couvertures d'un brun clair à leur pointe. Queue noire, étagée. Bec noir; pieds brun; iris brun. Les plumes latérales de la queue plus courtes de 38 millimètres que les médianes. Aile : 197 millimètres.

Atlantique Nord tempéré, dans les parages des Canaries et de Madère; s'étend jusqu'aux Îles Britanniques.

PUFFINUS Brisson 1760

1. **kuhli** Boie, Isis, 1835, p. 257; Dresser, VIII, p. 513, pl. 615, fig. 2; *cinerens* Gould; *borealis* Cory, 1881; *major* Hewitson (nec Temm.).

Méditerranée et Atlantique sur les côtes d'Afrique Nord; Madère, Canaries; côtes de l'Amérique Nord; Île Kerguelen.

2. Puffinus major Faber

PUFFIN MAJEUR

D. et G., II, p. 376.

3. Puffinus anglorum Gm.

PUFFIN DES ANGLAIS

D. et G., II, p. 378.

a. Puffinus yelkouan Acerbi

PUFFIN YELKOUAN

D. et G., II, p. 379.

4. Puffinus obscurus Gm.

PUFFIN OBSCUR

D. et G., II, p. 380.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PUFFIN SEMBLABLE

2. **gravis** O'Reilly, Voy. to Greenland, 1818, p. 140, pl. 12, fig. 1; Dresser, VIII, p. 527, pl. 616, fig. 2; *major* Faber, 1822; *cincereus* Nuttall, 1834 (nec Kuhl).
Atlantique, du Groenland et de l'Islande au Hébrides, Féroë, Angleterre, France; Afrique Sud et Iles Falkland.
3. **anglorum** Temm. (ex Ray, 1713), Man. Ornith., II, 1820, p. 807; Dresser, VIII, p. 517, pl. 615, fig. 1; *puffinus* L., 1766; *arcticus* Faber, 1822.
Atlantique Nord, Islande, Féroë, Iles Britanniques; accidentel dans l'Europe Centrale, surtout Ouest; Madère, Canaries, Maroc; côtes d'Amérique.
- a. — **yelkouanus** Acerbi, Bibl. Ital., 1827, t. 140, p. 294; *baroli* Bonelli.
Méditerranée, accidentel sur les côtes d'Angleterre (Sardaigne, Archipel Grec, Bosphore, Mer Noire).
4. **obscurus** Gm., Syst. Nat., I, 1788, p. 559; Dresser, IX, p. 403, pl. 720; *auduboni* Finsch, 1872; *tenebrosus* Natt., 1873.
Atlantique tropical et subtropical; accidentel sur les côtes d'Angleterre, de France, de Hollande.
5. **assimilis** Gould, Proc. Zool. Soc., 1837, p. 156; Dresser, IX, p. 407; *nugax* (Solander) Bp., 1856; *bailloni* Bp., 1856.
Atlantique, au Nord jusqu'aux Canaries et Madère; accidentel sur les côtes d'Angleterre; mers du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.

Diffère d'*obscurus* par ses parties supérieures d'une teinte plus bleue, le blanc s'étendant davantage autour de l'œil et sur les lores. Couvertures inférieures de l'aile, axillaires et couvertures inférieures de la queue d'un blanc pur. Partie externe des barbes internes des rémiges primaires blanche, sauf à leur pointe. Bec couleur de corne foncée; tarses et doigts d'un jaune verdâtre, la membrane orangée; iris brun. Aile : 180 millimètres.

6. Puffinus fuliginosus Strickl.

PUFFIN FULIGINEUX

D. et G., II, p. 381.

Genre THALASSIDROME

1. Thalassidroma pelagica (Linné)

THALASSIDROME TEMPÊTE

D. et G., II, p. 384.

Genre OCÉANITE

1. Thalassidroma oceanica (Kuhl)

THALASSIDROME OCÉANIQUE

D. et G., II, p. 386.

6. **griseus** Gm., Syst. Nat., I, 1788, p. 364; Dresser, VIII, p. 323, pl. 616, fig. 1; *fuliginosus* Strickl., 1832; *stricklandi* Ridgw.

Atlantique, de Feroë et de Terre-Neuve au Cap et au détroit de Magellan; Océan Pacifique; accidentel en France et en Angleterre.

THALASSIDROMA Vigors 1825

Procellaria p., L.; Dresser.

1. **pelagica** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 212; Dresser, VIII, p. 491, pl. 613, fig. 1.

Atlantique Nord, Iles Feroë, Orcades, Shetland; rare en Suède, aux Iles Lofoden; Méditerranée, Afrique jusqu'au Cap; Océan Indien; Amérique Est.

OCEANITES Keys et Blas. 1840

Procellaria Kuhl; *Thalassidroma* p., Gerbe.

1. **oceanicus** Kuhl, Beitr., 1820, pl. 10, fig. 1; Dresser, VIII, p. 305, pl. 614, fig. 1; *wilsoni* Bp., 1823.

Atlantique Nord, Iles Britanniques, Madère, Canaries, Açores; Atlantique Sud et Océan Antarctique; Océan Indien.

Genre OCÉANODROME

1. *Thalassidroma leucorrhoa* (Vieill.)

THALASSIDROME CUE-BLANC

D. et G., II, p. 387.

2. *Espèce nouvelle*

(pour l'Europe)

OCÉANODROME DE CASTRO

Genre PELAGODROME

1. *Espèce nouvelle*

(pour l'Europe)

PELAGODROME MARINE

OCEANODROMA Reich. 1852

Thalassidroma p., Gerbe.

1. **leucorrhoa** (Vicill.), Nouv. Dict., 1817, t. 25, p. 122; Dresser, VIII, p. 497, pl. 613, fig. 2; *leachi* Temm., 1820.

Atlantique Nord; émigre, en hiver, sur les côtes de l'Europe Continentale jusqu'à la Méditerranée; rare en Scandinavie; Sibérie jusqu'au Japon; côtes Est d'Amérique.

2. **castro** Harcourt, A Sketch of Madeira, 1851, p. 123; *cryptoleucura* Ridgw., 1882; Dresser, IX, p. 395, pl. 718.

Océans Atlantique et Pacifique Sud, remontant pour nicher jusqu'à Madère; très accidentel en Angleterre et en Danemark.

Diffère de *leucorrhoa* par ses teintes plus brunes, la queue moins profondément fourchue, toutes les rectrices, sauf les médianes, blanches à leur quart basal; couvertures supérieures de la queue blanches avec la pointe noire. Aile : 150 millimètres.

PELAGODROMA Reichenb. 1852

1. **marina** (Latham), Ind. Orn., II, 1790, p. 826; Dresser, IX, p. 399, pl. 719.

Océan Atlantique Sud, au Nord jusqu'aux Canaries et aux Salvages; pris deux fois sur les côtes d'Angleterre.

Dessus brun ardoisé, plus foncé sur la tête et le bas du dos, plus gris pâle sur le milieu du dos, les plumes présentant une étroite bordure pâle. Bas du croupion et couvertures supérieures de la queue ardoisé pâle, ces dernières bordées de blanc. Ailes et queue d'un brun noirâtre; rémiges secondaires et couvertures alaires bordées de blan-

Famille XLVIII — LARIDÉS

Genre STERCORAIRE ou LABBE

1. *Stercorarius catarractes* (Linné)

STERCORAIRE CATARRACTE

D. et G., II, p. 392.

2. *Stercorarius pomarinus* (Temm.)

STERCORAIRE POMARIN

D. et G., II, p. 394.

châtre; une tache sous l'œil et au-dessus de l'oreille brun ardoisé. Front, sourcil et parties inférieures blanches. Bec et pieds noirs, membrane de ceux-ci jaune avec une bordure foncée. Les rectrices médianes plus courtes que les latérales. Aile : 152 millimètres.

XLVIII — LARIDÆ

STERCORARIUS *Brisson* 1760

Lestris Illig., 1811.

1. **catarrhactes** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 226 ; Dresser, VIII, p. 457, pl. 609 ; *skua* Retz., 1800.

Islande, l'Irœe, Shetlands; rare en Scandinavie; en hiver dans l'Europe Sud (Gibraltar); accidentel en Allemagne, Suisse, Italie Nord, Méditerranée.
2. **pomathorinus** Temm., Man. Orn., 1815, p. 514 ; Dresser, VIII, p. 463, pl. 610.

Régions boréales des deux Continents; en hiver Iles Britanniques et Europe Continentale jusqu'à la Méditerranée et l'Afrique Ouest; Asie jusqu'au Japon; Australie Nord; Amérique du Nord jusqu'aux Grands Lacs et la Baie de Callao.

3. Stercorarius parasiticus (Linné?)

STERCORAIRE PARASITE

D. et G., II, p. 397.

4. Stercorarius longicaudus Briss.

STERCORAIRE A LONGUE QUEUE

D. et G., II, p. 399.

Genre RHODOSTÉTHIE**1. Rhodostethia Rossi Macgill. (1)**

RHODOSTÉTHIE DE ROSS

D. et G., II, p. 403.

(1) C'est par erreur que le nom de « Rossi » est attribué par Gerbe à Macgillivray; ce nom est de Richardson, et « rosca » a la priorité (*Larus rosca* Macgill., 1824).

3. **crepidatus** Banks, in Cook' Vog., 1773, II, p. 15; Gm., Syst. Nat., 1788, I, p. 602; Dresser, VIII, p. 471, pl. 611, 612, fig. 2; *parasiticus* Bodd., 1783 (nec Linné); *richardsoni* Swains., 1831; *cepphus* Brünn, 1764.
- Regions borcales du Globe, Islande, Feroë, Scandinavie, Russie Nord, Grande-Bretagne: en hiver, Europe Sud jusqu'à la Méditerranée et l'Afrique Ouest; Asie jusqu'à l'Australie et la Nouvelle-Zélande; Amérique jusqu'au Brésil.
4. **parasiticus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 226; Dresser, VIII, p. 481, pl. 612, fig. 1; *longicaudus* Vicill., 1819; *crepidata* Naum. (nec Gm.); *buffoni* Boie, 1822.
- Régions arctiques du Globe, Europe boréale, en hiver émigre jusqu'à Gibraltar (rare dans la Méditerranée): Asie jusqu'aux Philippines; Amérique jusqu'à la Floride et la Californie.

RHODOSTETHIA Macgill. 1842

1. **rosea** (Macgill.), Mém. Werner Soc., V, 1824, n° 13, p. 249; Dresser, VIII, p. 343, pl. 594; *rossi* Richards., 1825.
- Océan Glacial Arctique. Terre François-Joseph: Islande: en hiver Iles Feroë, Héligoland, Angleterre: Asie arctique et Alaska.

Genre PAGOPHILE

1. *Pagophila eburnea* (Gm.)

PAGOPHILE BLANCHE

D. et G., II, p. 405.

Genre GOÉLAND ou MOUETTE

1. *Larus glaucus* Brünn.

GOÉLAND BOURGUEMESTRE

D. et G., II, p. 409.

2. *Larus leucopterus* Faber

GOÉLAND LEUCOPTÈRE

D. et G., II, p. 411.

3. *Larus marinus* Linné

GOÉLAND MARIN ou A MANTEAU NOIR

D. et G., II, p. 413.

PAGOPHILA *Kaup* 1829

1. **eburnea** (Phipps), Voy. North Pole, App., 1774, p. 187; Dresser, VIII, p. 349, pl. 595; *albus* Gunnerus, 1767.

Régions arctiques, Spitzberg en hiver, Europe Nord jusqu'en France Nord et en Suisse; Asie et Amérique Boréales.

LARUS *Linne'* 1758

1. **glaucus** Fabricius, Fauna Groenl., 1780, p. 100; Dresser, VIII, p. 433, pl. 605.

Régions arctique du Globe: en hiver, les côtes d'Europe jusqu'à la Méditerranée, la Mer Noire, la Caspienne; Asie Nord et Amérique Nord-Est.

2. **leucopterus** Faber, Prodr. Isl. Orn., 1822, p. 91 (nec Vieill.); Dresser, VIII, p. 439, pl. 606; *islandicus* Edmonst., 1823.

Ile Jan Mayen et Groenland: en hiver Islande, Feroë, Grande-Bretagne, Scandinavie et jusqu'au Golfe de Gascogne; Amérique Nord-Est.

3. **marinus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 225; Dresser, VIII, p. 427, pl. 604.

Europe Nord jusqu'à la Petchora; Islande, Feroë; Grande-Bretagne: en hiver, Europe jusqu'à la Méditerranée, les Canaries, l'Égypte, le Volga; l'Amérique Nord-Est.

4. Larus fuscus Linné

GOÉLAND BRUN

D. et G., II, p. 415.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

GOÉLAND DE SIBÉRIE

6. Larus argentatus Brünn.

GOÉLAND ARGENTÉ

D. et G., II, p. 417.

4. *fuscus* Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 225 ; Dresser, VIII, p. 421, pl. 603.

Europe Nord jusqu'à la Dvina ;
Iles Féroé,
Grande-Bretagne,
Europe jusqu'à
la Méditerranée ;
Canaries,
Madère, Afrique
jusqu'à la
Sénégalie ; rare
sur la Caspienne,
Golfe Persique.

5. *affinis* Reinhardt, Vid. Meddel., 1853, p. 78 ; Dresser, VIII, p. 417.

Europe
et Asie Nord, de
la Dvina à l'Élé-
nissé ; en hiver
Asie Sud,
Afrique Nord-
Est ; accidentel à
Héligoland.

Diffère de *L. fuscus* par sa taille plus grande, ses ailes proportionnellement plus courtes, le manteau plus pâle, d'un bleu ardoisé foncé. Rémiges noires avec une tache d'un gris ardoisé foncé sur les barbes internes, la première présentant une tache blanche près de sa pointe, plusieurs autres légèrement terminées de blanc ; les rémiges secondaires largement terminées de blanc. Bec et pattes comme chez *L. fuscus* ; tour de l'orbite d'un orangé foncé. Aile : 440 millimètres.

6. *argentatus* Gm., Syst. Nat., I, 1788, p. 600 ; Dresser, VIII, p. 399, pl. 602, fig. 1.

Europe Nord,
du Cap Nord à la
Mer Blanche,
en hiver jusqu'à la
Méditerranée,
la Mer Noire et la
Caspienne ;
Amérique Nord
jusqu'à Cuba
et la Californie
Sud.

a. Sous-espèce nouvelle.

7. **Larus audouini** Payraud.

GOÉLAND D'AUDOUIN

D. et G., II, p. 420.

8. **Larus gelastes** Thienem.

GOÉLAND RAILLEUR

D. et G., II, p. 422.

9. **Larus canus** Linné

GOÉLAND CENDRÉ

D. et G., II, p. 424, et *Larus niveus* Pall., p. 426.

- a. — **cachinnans** Pall., Zoogr. Ross. As., II, p. 318; *leucophæus* Licht., 1851; Dresser, VIII, p. 411, pl. 602, fig. 2; *michabellesi* Bruch, 1855.

Diffère du type par son manteau plus foncé, le tour de l'œil et la commissure du bec d'un rouge orangé; le bec d'un jaune plus vif; les pattes jaunes. Aile : 470 millimètres.

Europe Sud,
du Golfe de Gas-
cogne à la Dvina
et toute
la Méditerranée
Açores, Madère,
Canaries;
Mer Noire, Cas-
pienne; Afrique
jusqu'à l'Angola;
Inde Nord;
très accidentel en
Angleterre.

7. **audouini** Payraudeau, Ann. Sc. Nat. Zool., 1826, VIII, p. 462; Dresser, VIII, p. 395, pl. 601, fig. 1.

Iles de la Méditer-
ranée Occiden-
tale, rare sur
les côtes du Con-
tinent;
Gibraltar; rare
dans l'Archipel
Grec.

8. **gelastes** Licht., in Thieneman, Fortpflanz. Vög. Europ., V, 1838, p. 22; Dresser, VIII, p. 389, pl. 601, fig. 2.

Côtes de la Médi-
terranée
et Mer Rouge;
Afrique Nord,
Mer Noire,
Caspienne, Asie
jusqu'au Golfe
Persique.

9. **canus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 224; Dresser, VIII, p. 381, pl. 600; *niveus* Pall., 1811 (nec Bodd.).

Dresser n'admet pas la distinction de *L. niveus*, même comme sous-espèce.

Europe, du 53°
latitude Nord
(rare en Islande),
à la Méditer-
ranée et l'Égypte;
Asie jusqu'au
Japon; l'hiver
dans
le Golfe Persique.

10. *Larus minutus* Pall.

MOUETTE PYGMÉE

D. et G., II, p. 441.

11. *Larus ichthyæus* Pall.

GOÉLAND ICHTHYAÈTE

D. et G., II, p. 433.

12. *Larus bonapartei* Richards.

GOÉLAND BONAPARTE

D. et G., II, p. 439.

13. *Larus melanocephalus* Natt.

GOÉLAND A TÊTE NOIRE

D. et G., II, p. 437.

(1)

(1) *Larus atricilla* L., de l'Amérique Nord, cité par Degland et Gerbe, II, p. 431, comme pris plusieurs fois en Europe, n'est plus admis comme espèce européenne par les ornithologistes modernes. D'après Dresser, ces captures se rapportent à *Larus melanocephalus*.

10. **minutus** Pall., Reis. Russ. Reichs., III, 1771, p. 702; Dresser, VIII, p. 373, pl. 599, 599 A. Europe Nord-Est, rare en Scandinavie, Finlande et Russie jusqu'à Arkangel; accidentel aux Feroë, en Grande-Bretagne; en hiver jusqu'à la Méditerranée, Afrique Nord; Asie jusqu'en Chine et dans l'Inde.
11. **ichthyæus** Pall., Reis. Russ. Reichs., II, 1773, p. 713; Dresser, VIII, p. 369, pl. 598. Europe Sud-Est, Suisse (?), Hongrie, Sardaigne, Grèce, Angleterre Sud-Ouest (rare); Afrique Nord-Est, Asie Mineure jusqu'au Thibet; Inde, Ceylan.
12. **philadelphia** Ord, in Guthrie's Geogr. Qnd Amer., Ed. II, 1815, p. 319; Dresser, IX, p. 387, pl. 717; *bonapartei* Swainson in Richards., 1831. Amérique Nord jusqu'aux Bermudes; très accidentel en Grande-Bretagne et à Héligoland.
13. **melanocephalus** Natterer, Isis, 1818, p. 816; Dresser, VIII, p. 365, pl. 597, fig. 2. Méditerranée et Mer Noire, Espagne, France Sud, accidentel en Angleterre et France Nord; l'hiver en Afrique, Nubie.

14 ? *Larus leucophthalmus* Temm. (1)

GOÉLAND LEUCOPHTHALME

D. et G., II, p. 430.

15. *Larus ridibundus* Linné

MOUETTE RIEUSE

D. et G., II, p. 435.

Genre RISSE**1. *Larus tridactylus* Linné**

MOUETTE TRIDACTYLE

D. et G., II, p. 428.

Genre XÊME**1. *Larus sabinei* (Leach)**

MOUETTE DE SABINE

D. et G., II, p. 443.

(1) Cette espèce n'a plus été revue dans les limites de l'Europe depuis l'époque de Temminck.

14. **leucophthalmus** Temm., Pl. Col., 306; *masadunus* Henglin.

Europe Sud-Est (?),
Iles Ionniennes,
Mer Rouge.

15. **ridibundus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 225; Dresser, VIII, p. 357, pl. 596, 597, fig. 1; *capistratus* Temm., 1820.

Europe,
des Feroe, de la
Baltique et
d'Arkangel à
la Méditerranée;
l'hiver en
Afrique; Asie jus-
qu'au Japon,
l'hiver en Chine,
Inde,
Philippines.

RISSA *Stephens* 1826

1. **tridactyla** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 224; Dresser, VIII, p. 447, pl. 607, 608; *rissa* Linné, 1766 (ex Brünn, 1764).

Régions arctiques
du Globe,
Europe Nord
jusque dans le
Nord-Ouest
de la France; en
hiver, Méditer-
ranée, Caspienne,
Canaries;
Amérique Nord
jusqu'aux
Bermudes.

XEMA *Leach* 1819

Larus p., Sabine.

1. **sabinei** (Sabine), Trans. Linn. Soc., 1818, XII, p. 520, pl. 29 (sans nom spécifique); Leach, in Ross. Vog., 1825, App., p. 57; Dresser, VIII, p. 337, pl. 593.

Régions arctiques
du Globe;
émigre en Eu-
rope, des Iles Bri-
tanniques
et de la France à
la Hongrie;
Amérique Nord
jusqu'aux
Bermudes.

Genre NODDI

1. *Anoüs stolidus* (Linné)

NODDI NIAIS

D. et G., II, p. 445.

Genre STERNE

1. *Sterna caspia* Pallas

STERNE TSCHEGRAVA

D. et G., II, p. 448.

2. *Sterna anglica* Montagu

STERNE HANSEL

D. et G., II, p. 450.

ANOUS *Leach* 1825

1. **stolidus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 227 ;
Gould, Birds of Europe, V, pl. 421.

Mers tropicales et
subtropicales,
Pacifique et At-
lantique ;
s'égare jusque
sur la côte Sud-
Est d'Irlande,
et sur les côtes de
France.

STERNA *Linne* 1758

1. **caspia** Pall., Nov. Comm. Petrop., 1770, XIV,
p. 582, pl. 22, fig. 2 ; Dresser, VIII, p. 289,
pl. 584.

Europe, du Golfe
de Bothnie
à la Méditerranée
et la Caspienne ;
Afrique et Asie ;
Australie et
Nouvelle-
Zélande ; Amé-
rique Nord.

2. **anglica** Montagu, Orn. Dict., 1813, Suppl. fig. ;
Dresser, VIII, p. 295, pl. 585 ; *nilotica* Gm.,
1788 ; *macrotarsa* Gould, 1837.

Europe, du 55°
latitude Nord
(rare en Grande-
Bretagne,
mais niche dans
l'île de Sylt,
côtes de Dané-
mark), jusqu'au
Sud ; Afrique,
Asie tempérée ;
en hiver,
Inde et Australie
(où elle
se reproduit).

3. *Sterna cantiaca* Gm.

STERNE CAUGEK

D. et G., II, p. 452.

(1)

4. *Sterna affinis* Rüpp.

STERNE VOYAGEUSE

D. et G., II, p. 454.

5. *Sterna hirundo* Linné

STERNE HIRONDELLE OU PIERRE GARIN

D. et G., II, p. 456.

6. *Sterna paradisca* Brünn.

STERNE PARADIS

D. et G., II, p. 458.

(1) *Sterna bergi* Licht., indiquée par Gerbe comme d'Europe (îles de la Méditerranée), n'est plus considérée comme européenne par les ornithologistes modernes.

3. *cantiaca* Gm., Syst. Nat., I, 1788, p. 606; Dresser, VIII, p. 301, pl. 586; *acutifluida* Cabot, 1847.
Europe, de la Grande-Bretagne et du Danemark. (Très rare en Suède), jusqu'au Sud et aux Canaries; Afrique, Asie, Amérique Nord-Est, Antilles et Brésil.
4. *media* Horsf., Trans. Linn. Soc., 1820, XIII, p. 198; Dresser, VIII, p. 285, pl. 583; *affinis* Cretzsch. in Rüpp., 1826; *bengalensis* Lesson, 1831.
Méditerranée, de Gibraltar à l'Égypte (Bosphore, bouches du Danube, Caspienne); Mer Rouge et Océan Indien jusqu'à l'Australie Nord.
5. *fluviatilis* Naum., Isis, 1819, p. 1847; Dresser, VIII, p. 263, pl. 580; *hirundo* (partim) Linné, 1766.
Europe, mais non l'extrême Nord, jusqu'au Sud; en hiver, l'Afrique Sud; Asie tempérée jusqu'à l'Inde et Malacca; Amérique, du Labrador au Brésil.
6. *macrura* Naum., Isis, 1819, p. 1847; *paradisea* Brunn., 1764; *hirundo* (partim) Linné, 1766; Müller, 1774; Dresser, VIII, p. 255, pl. 579; *arctica* Temm., 1820.
Régions arctiques du Globe, du 82° latitude Nord au Sud; en hiver, l'Afrique Sud, l'Asie Sud et l'Amérique Sud, jusqu'au 66° latitude Sud.

7. *Sterna dougalli* Montagu

STERNE DE DOUGALL

D. et G., II, p. 459.

8. *Sterna minuta* Linné

STERNE NAINÉ

D. et G., II, p. 461.

a. Sous-espèce nouvelle

(pour l'Europe).

9. *Sterna fuliginosa* Gm.

STERNE FULIGINEUSE

D. et G., II, p. 462.

(1)

(1) Une espèce voisine de *S. fuliginosa*, mais plus petite, et qui habite également les mers tropicales (*Sterna anæstbæta* Scop., *panaya* Lath.), a été prise une fois à l'embouchure de la Tamise.

7. **dougalli** Montagu, Orn. Dict., Suppl., 1813; Dresser, VIII, p. 273, pl. 581; *paradisea* Keys. et Blas. (nec Brünn.); *gracilis* Gould, 1815.

Europe, de la Grande-Bretagne au Sud (où elle est plus rare); Açores; Afrique Sud; Asie, du Nord à l'Australie et la Nouvelle-Calédonie; Amérique Est jusqu'aux Antilles.

8. **minuta** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 228; Dresser, VIII, p. 279, pl. 582.

Europe, de la Suède Sud à la Méditerranée; rare au Nord; Angleterre en été; Afrique jusqu'au Cap; Asie jusqu'à l'Inde et Java.

- a. — **saundersi** Hume, Stray Feath., 1877, V, p. 324; Suskin, Mat. Faun. Flor. Ross., 1908, VIII, p. 128.

Asie Sud-Ouest, Mer Rouge, Golfe Persique, Ceylan; s'égare jusque dans la Russie Sud.

Diffère de *S. minuta* par son manteau plus pâle, le croupion et la queue d'un gris plus foncé. Les trois rémiges externes sont noires en dehors, y compris la tige, ce qui contraste nettement avec le blanc pur des barbes internes. Bec grêle, sans courbure du maxillaire supérieur. Aile : 168 millimètres.

9. **fuliginosa** Gm., Syst. Nat., I, 1788, p. 605; Dresser, VIII, p. 307, pl. 587.

Atlantique, surtout sur les îles du Sud; accidentel en Europe et en Angleterre; côtes d'Afrique, de la Mer des Indes jusqu'à l'Australie; rare dans le Pacifique.

Genre GUIFETTE

1. *Hydrochelidon fissipes* (Gray ex Linné)

GUIFETTE FISSIPÈDE OU NOIRE

D. et G., II, p. 465.

2. *Hydrochelidon nigra* (Gray ex L.)

GUIFETTE NOIRE OU LEUCOPTÈRE

D. et G., II, p. 466.

3. *Hydrochelidon hybrida* (Pall.)

GUIFETTE HYBRIDE OU MOUSTAC

D. et G., II, p. 468.

HYDROCHELIDON Boie 1822

1. **nigra** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 227; Dresser, VIII, p. 327, pl. 592; *fissipes* Lath., Ind. Orn., II, 1790, p. 810 (nec Linné); *nigra* Boie, 1822; *fissipes* Gray, 1844.
Europe, du 60° latitude Nord (rare de passage en Angleterre) à la Méditerranée; l'hiver, en Afrique jusqu'au Loango; Asie Ouest.
2. **leucoptera** (Schinz), in Meiner et Schinz, Vög. der Schweiz., 1815, p. 264; Dresser, VIII, p. 321, pl. 590, 591; *nigra* Gray, 1844; *fissipes* Pall., 1811.
Europe Moyenne et Sud (accidentel en Angleterre); l'hiver, en Afrique jusqu'au Transvaal; Asie, Australie et Nouvelle-Zélande; accidentel en Amérique.
3. **hybrida** (Pall.), Zoogr. Ross. As., II, 1811, p. 338; Dresser, VIII, p. 315, pl. 588, 589; *leucoparcia* Natt. in Temm., 1820; *fluviatilis* Gould, 1842.
Europe Moyenne, Sud et Sud-Ouest (rare de passage en Angleterre et Allemagne Nord); l'hiver en Afrique jusqu'au Cap; Asie, Malaisie, Australie; très accidentel aux Antilles.

Famille XLIX — ANATIDÉS

Genre CYGNE

1. *Cygnus ferus* Ray

CYGNE SAUVAGE

D. et G., II, p. 173.

2. *Cygnus minor* Pall.

CYGNE DE BEWICK

D. et G., II, p. 474.

3. *Cygnus mansuetus* Ray et *Cygnus immutabilis* Yarrell.

CYGNE DOMESTIQUE

D. et G., II, p. 475 et 476.

XLIX - ANATIDÆ

CYGNUS *Linne* 1758

1. **musicus** Bechst., Gem. Naturg. Vög. Deuts., III, 1809, p. 830, pl. 35; Dresser, VI, p. 433, pl. 419, fig. 4; *férus* Leach, 1816; *xanthorhinus* Naum., 1842.
Europe Nord, Laponie, Islande, Sibérie; émigre en hiver jusqu'à la Méditerranée; Asie Moyenne jusqu'au Japon; accidentel dans l'Inde.
2. **bewicki** Yarrell, Trans. Linn. Soc., 1830, XVI, 2, p. 453; Dresser, VI, p. 441, pl. 419, fig. 3; *minor* Keys. et Blas., 1840; *melanorhinus* Naum., 1842.
Europe Nord-Est et Asie; en hiver émigre en Scandinavie, Grande-Bretagne, Europe Continentale, Chine, Japon.
3. **olor** (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 502; Dresser, VI, p. 419, pl. 418; *mansuetus* Salerne, 1767; *immutabilis* Yarrell, 1838; Dresser, VI, p. 429, pl. 419, fig. 1, 2.
Suède Sud, Danemark, Europe Sud-Est; Asie moyenne; en hiver accidentel dans l'Inde; de passage en Afrique Nord (domestique dans toute l'Europe).

Genre OIE

1. *Anser cinereus* Meyer

OIE CENDRÉE

D. et G., II, p. 479.

2. *Anser sylvestris* Brisson

OIE SAUVAGE OU DES MOISSONS

D. et G., II, p. 481.

3. *Anser brachyrhynchus* Baillon

OIE A BEC COURT

D. et G., II, p. 482.

4. *Anser albifrons* Bechst.

OIE A FRONT BLANC OU RIEUSE

D. et G., II, p. 483, et *Anser pallipes* Sélvs, p. 485.

ANSER *Brisson* 1760

1. **anser** (Gm.), Syst. Nat., 1788, I, p. 510; *ferus* Schæff., Mus. Orn., 1789, p. 67; *cinereus* Meyer, Tasch., 1910, II, p. 552; Dresser, VI, p. 355, pl. 411.
Europe, du Cap Nord à la Méditerranée (niche dans l'Écosse Nord, l'Islande, les Péroe); en hiver, Afrique Nord-Ouest; Asie jusqu'à la Chine et l'Inde Nord.
2. **fabalis** (Lath.), Gen. Synop., Suppl., 1787, I, p. 297; *segetum* Gm., Syst. Nat., 1788, I, p. 512, fig. 2; Dresser, VI, p. 363, pl. 412.
Europe, de la Laponie et la Nouvelle-Zemble au Sud; en hiver dans l'Afrique Nord; Madère; Asie, dans la Sibérie Ouest.
3. **brachyrhynchus** Baillon, Mém. Soc. d'Emul. d'Abbeville, 1833, p. 74; Dresser, VI, p. 369, pl. 413.
Spitzberg et Islande (où elle niche), émigre en Angleterre, France, Scandinavie, Allemagne; Inde (?).
4. **albifrons** (Scop.), Ann. I. Hist. Nat., 1769, p. 69; Dresser, VI, p. 375, pl. 414; *medius* Temm., 1840; *bruchii* Bp. ex Brehm, 1850; *roseipes* Schleg., 1855; *pallipes* Scélys, 1855 (Variété domestique).
Europe, de la Norvège Nord à la Méditerranée; rare en Finlande, en Islande; en hiver, Afrique Nord; Madère; Asie jusqu'au Japon et l'Inde Nord; Amérique Nord, Cuba.

5. *Anser erythropus* (Linné)

OIE NAINÉ

D. et G., II, p. 486.

Genre BERNACHE**1. *Bernicla leucopsis* (Bechst.)**

BERNACHE NONETTE

D. et G., II, p. 488.

2. *Bernicla brenta* Steph.

BERNACHE CRAVANT

D. et G., II, p. 489.

3. *Bernicla ruficollis* (Pallas)

BERNACHE A COU ROUX

D. et G., II, p. 490.

5. **erythropus** (Linné), Syst. Nat., 1766, I, p. 197;
Dresser, VI, p. 383; *temmincki* Boie, 1822;
minutus Naum.

Scandinavie
Nord, rare dans
l'Ouest; en hiver,
rare dans l'Eu-
rope Moyenne et
Sud; Égypte;
Asie jusqu'au
Japon; accidentel
dans l'Inde.

BRANTA Scopoli 1769

Bernicla Steph., 1824.

1. **leucopsis** (Bechst.), Orn. Taschenb., II, 1803,
p. 424; Dresser, VI, p. 397, pl. 415, fig. 1;
erythropus Gm. (nec Linné), 1788.

Europe Arctique,
émigre en hiver
dans les
Iles Britanniques,
l'Europe Conti-
nentale Nord,
rare dans le Sud;
accidentel
sur les côtes de
l'Amérique Nord.

2. **bernicla** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 198; *tor-
quata* Naum. (nec Gm.); *brenta* Tunst., 1771;
Dresser, VI, p. 389, pl. 415, fig. 2.

Europe Nord,
émigre en hiver
au Sud jusqu'à
la Méditerranée;
Asie et
Amérique Nord.

3. **ruficollis** (Pallas), Spicil. Zool., fasc. VI, 1769,
p. 21, pl. 4; Dresser, VI, p. 403, pl. 416.

Sibérie Nord;
en hiver émigre
au Sud jus-
qu'en Égypte;
accidentel en Eu-
rope Conti-
nentale et en
Grande-Bretagne.

Genre CHEN

[**Bernicla canagica** (Sewastian)

BERNACHE CANAGICA

D. et G., II, p. 492.

1. **Chen hyperboreus** (Pallas)

CHEN HYPERBORÉ OU OIE DES NEIGES

D. et G., II, p. 493.

[Genre CHÉNALOPEX

1. **Chenalopex ægyptiaca** (Linné)

CHÉNALOPEX D'ÉGYPTE

D. et G., II, p. 495.

CHEN *Boie* 1822*Bernicla* (part.), Gerbe, 1867.

[Cette espèce, indiquée, avec doute, par Gerbe comme accidentelle dans le Sud de la Russie, n'est plus considérée comme européenne.]

[Sibérie Nord-Est et Amérique Nord-Ouest, Alaska.]

1. **hyperboreus** (Pallas), Spicil. Zool., VI, 1767, p. 20; Dresser, VI, p. 413, pl. 417, fig. 1; *albatus* Cassin, 1856; Dresser, VI, p. 409, pl. 417, fig. 2.

Amérique Arctique; émigre au Sud en hiver; accidentel en Europe (Grande-Bretagne, Hollande, Allemagne, Scandinavie, Russie Nord); rare en Sibérie Nord-Est et Japon.

CHENALOPEX *Steph.* 1824*Alopochen* Stejn., 1885.

[Cette espèce, indiquée par Gerbe comme de passage régulier en Grèce, Mer Noire, et accidentelle en France, Allemagne, Angleterre, n'est plus admise comme européenne par les modernes, notamment par Dresser.]

[Afrique Nord-Est Palestine.]

Genre TADORNE

1. *Tadorna Beloni* Ray

TADORNE DE BELON

D. et G., II, p. 499.

2. *Tadorna casarca* (Linné)

TADORNE CASARCA

D. et G., II, p. 501.

Genre SOUCHET

1. *Spatula clypeata* (Linné)

SOUCHET COMMUN

D. et G., II, p. 503.

Genre CANARD

1. *Anas boschas* Linné

CANARD SAUVAGE

D. et G., II, p. 506.

TADORNA *Fleming* 1822

1. *tadorna* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 195; *cornuta* S.-G. Gm., Reis. Russl., II, 1774, p. 185, pl. 19; Dresser, VI, p. 451, pl. 420.

Europe,
des Iles Lofoden
à la Méditer-
ranée et les Iles
Britanniques;
Afrique Nord,
Asie jusqu'au
Japon,
l'Inde en hiver.

2. *casarca* (Linné), Syst. Nat., 1768, III, App., p. 224; Dresser, VI, p. 461, pl. 421; *rutila* Pall.

Europe Sud et
Sud-Est,
rare dans l'Ouest
ou accidentel;
Afrique Nord,
Asie jusqu'au Ja-
pon, l'hiver dans
l'Inde
et l'Indo-Chine.

SPATULA *Boie* 1822

1. *clypeata* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 200; Dresser, VI, p. 497, pl. 425.

Europe, du
Cercle arctique à
la Méditerranée;
en hiver
Afrique Nord et
Centrale; Asie;
Amérique Nord.

ANAS *Linné* 1758

1. *boschas* Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 205; Dresser, VI, p. 469, pl. 422.

Europe, de la
Laponie (rare) à
la Méditerranée;
Canaries, Ma-
dère, Açores;
Afrique Nord;
Asie;
Amérique Nord.

Genre CHIPEAU

1. *Chaulelasmus strepera* (Linné)

CHIPEAU BRUYANT

D. et G., II, p. 510.

Genre MARÈQUE

1. *Mareca penelope* (Linné)

MARÈQUE PÉNÉLOPE OU CANARD SIFFLEUR

D. et G., II, p. 512.

2. *Mareca americana* (Gm.)

MARÈQUE AMÉRICAINE

D. et G., II, p. 514.

Genre PILET

1. *Dafila acuta* (Linné)

PILET ACUTICAUDE

D. et G., II, p. 515.

CHAULELASMUS *Gray* 1838

1. **streperas** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 200 ;
Dresser, VI, p. 187, pl. 124.

Europe, de
l'Islande et de la
Scandinavie
Moyenne (rare en
Angleterre) au
Sud ; en hiver
Afrique Nord jus-
qu'à l'Orange ;
Asie ;
Amérique Nord.

MARECA *Stephens* 1824

1. **penelope** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 202 ;
Dresser, VI, p. 541, pl. 432, 433.

Europe Arctique,
émigre au Sud
jusqu'à l'Abyssie-
nie et Madère ;
Asie
jusqu'à Bornéo ;
accidentel
dans l'Amérique
Nord-Est
et Nord-Ouest.

2. **americana** (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 526 ;
Dresser, IX, p. 289, pl. 707.

Amérique Nord
jusqu'à Cuba ;
niche en Islande
Nord ; très
accidentel en
Grande-Bretagne.

DAFILA *Leach* 1824

1. **acuta** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 202 ; Dresser,
VI, p. 551, pl. 430, 431 ; *caudacuta* Pall.,
1811.

Europe,
de la Laponie
à la Méditerranée.
l'hiver en Afri-
que ; Asie ;
Amérique Nord
jusqu'à
Panama et Cuba.

Genre SARCELLE

1. *Querquedula circia* (Linné)

SARCELLE D'ÉTÉ

D. et G., II, p. 518.

2. *Querquedula discors* (Linné)

SARCELLE SOUCROUROU

D. et G., II, p. 520.

Genre NETTION

1. *Querquedula crecca* (Linné)

SARCELLE SARCELLINE OU D'HIVER

D. et G., II, p. 521.

a. *Sous-espèce nouvelle* (pour l'Europe).

QUERQUEDULA *Stephens* 1824

1. *querquedula* et *circia* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 203 et 204; Dresser, VI, p. 513, pl. 427. Europe, du Cercle arctique à la Méditerranée; Afrique Nord jusqu'au Somali; Asie jusqu'à Célèbes.
2. *discors* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 205; Audub., Birds Am., VI, p. 287, pl. 393. Amérique Nord et Centrale jusqu'à l'Équateur; très accidentel en Écosse et en Danemark.

NETTION *Kaup* 1829

Querquedula p., Gerbe.

1. *crecca* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 204; Dresser, VI, p. 507, pl. 426. Europe, de l'Islande et la Laponie Nord au Sud; Açores, Canaries; Afrique jusqu'à l'Arabie; Asie; accidentel en Amérique Nord-Est.
- a. — *carolinensis* Gm., Syst. Nat., I, 1778, p. 533; Audub., B. Am., VI, p. 281, pl. 392. Amérique Nord jusqu'au Honduras; Groënland; accidentel en Europe (Grande-Bretagne).

Diffère de *N. crecca* par ses scapulaires qui ne sont pas rayées de blanc et de noir, par sa poitrine qui présente de chaque côté une large bande en croissant, et par les vermiculations de son plumage qui sont plus fines. *Femelle* très semblable à celle de *N. crecca*.

2. *Querquedula formosa* (Georgi)

SARCELLE FORMOSE

D. et G., II, p. 523.

Genre EUNETTE

1. *Querquedula falcata* (Pall.)

SARCELLE A FAUCILLES

D. et G., II, p. 526.

Genre MARMARONETTE

1. *Querquedula angustirostris* (Ménétr.)

SARCELLE MARBRÉE

D. et G., II, p. 528.

Genres BRANTE et FULIGULE

1. *Branta rufina* (Pallas)

BRANTE ROUSSATRE OU CANARD SIFFEUR HUPPÉ

D. et G., II, p. 530.

2. **formosa** (Georgi), Reis. Russ. Reich., 1775, p. 168 ;
Dresser, VI, p. 521, pl. 428.

Asie Nord-Est,
émigre au Japon,
en Chine,
rare dans l'Inde ;
accidentel en
Europe
(France, Italie).

EUNETTA Bonap. 1856

Querquedula p., Gerbe.

1. **falcata** (Georgi), Reis. Russ. Reich., I, 1775,
p. 167 ; Dresser, VI, p. 525, pl. 429.

Asie Nord,
en hiver émigre
en Chine,
Japon, Inde ;
accidentel en Eu-
rope (Hongrie).

MARMARONETTA Reichenb. 1852

Querquedula p., Gerbe.

1. **angustirostris** (Ménétr.), Cat. Rais. Caucase, 1832,
p. 58 ; Dresser, VI, p. 479, pl. 425.

Europe Sud,
Afrique Nord,
Canaries ;
Asie Sud-Ouest
jusqu'à
l'Inde Nord.

AYTHYA (1) Boie 1822

Branta Boie, 1822 ; *Fuligula* Steph., 1824.

1. **rufina** (Pallas), Reise, II, 1773, App., p. 713,
n° 28 ; Dresser, VI, p. 559, pl. 435.

Europe Sud,
accidentel en
Grande-Bretagne
et Danemark ;
Russie Sud ;
Afrique Nord,
Turkestan,
Inde Centrale.

(1) *Æthya*, ou *Aythya*, ou *Aethya* ; cette dernière orthographe serait la plus correcte, mais la seconde est celle de Boie lui-même.

2. *Fuligula cristata* (Steph. ex Linné)

FULIGULE MORILLON

D. et G., II, p. 533.

(1)

3. *Fuligula marila* (Linné)

FULIGULE MILOUINAN

D. et G., II, p. 536.

4. *Fuligula ferina* (Linné)

FULIGULE MILOUIN

D. et G., II, p. 538.

5. *Fuligula nyroca* (Güldenst.)

FULIGULE NYROCA

D. et G., II, p. 540.

6. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

FULIGULE DE BOER

(1) *Fuligula collaris* (Donovan), de l'Amérique du Nord, n'est plus admise comme s'égarant en Europe.

2. **fuligula** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 207 ;
cristata Leach, 1816 ; Dresser, VI, p. 573,
 pl. 137.
 Europe, de la Laponie et des Hébrides au Sud ; Afrique Nord, en hiver jusqu'à l'Abyssinie ; Asie jusqu'à la Polynésie.

 3. **marila** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 196 ; Dresser, VI, p. 565, pl. 436.
 Europe, de l'Islande et de la Laponie au Sud ; l'hiver en Afrique Nord ; Asie jusqu'au Japon.

 4. **ferina** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 203 ; Dresser, VI, p. 551, pl. 434.
 Europe, de la Suède Moyenne (rare en Islande) et l'Angleterre au Sud ; Afrique Nord en hiver ; Canaries ; Asie jusqu'à l'Inde Nord.

 5. **nyroca** (Gtild.), Nov. Comm. Petrop, 1769, XIV, p. 403 ; *ferruginea* Gm., 1788 ; Dresser, VI, p. 581, pl. 438 ; *leucophthalma* Bechst., 1802.
 Europe Moyenne et Sud (rare en Angleterre) ; Canaries ; Afrique jusqu'à l'Abyssinie ; Asie Ouest jusqu'à l'Inde.

 6. **boeri** Radde, Reise S.-O. Siber., 1863, II, p. 376, pl. 15.
 Asie Nord-Est, émigre au Japon, en Chine et dans l'Inde ; pris une seule fois en Angleterre.
- Diffère de *nyroca* par sa tête et son cou noirs, à reflets vert-bouteille ; bec bleuâtre, la base et le crochet noirs ; pieds gris de plomb. *Femelle* diffère de celle de *nyroca* par sa tête et son cou brun-noir à reflets très faibles ; lores d'un brun-roux. Aile : 202 millimètres.

Genre GARROT

1. *Clangula glaucion* (Linné)

GARROT VULGAIRE

D. et G., II, p. 542.

2. *Clangula islandica* (Gm.)

GARROT ISLANDAIS

D. et G., II, p. 544.

3. *Clangula albeola* (Linné)

GARROT ALBÉOLE OU SARCELLE RELIGIEUSE

D. et G., II, p. 545.

Genre GARROT (partim)

1. *Clangula histrionica* (Linné)

GARROT HISTRION

D. et G., II, p. 546.

CLANGULA *Fleming* 1822

1. *glaucion* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 201 ;
Dresser, VI, p. 595, pl. 440 ; *clangula* L.,
1766 ; *vulgaris* Flem., 1822.
Europe, de
l'extrême Nord,
émigre en hiver
dans le Sud
jusqu'à l'Afrique
Nord ; Asie
jusqu'au Japon,
Inde en hiver ;
Amérique Nord
jusqu'à Cuba.
2. *islandica* (Gm.), Syst. Nat., I, 1788, p. 541 ;
Dresser, VI, p. 603, pl. 441.
Groënland, Is-
lande, accidentel
sur les côtes
d'Europe jusqu'en
Espagne (Va-
lencia) ;
Amérique Nord.
3. *albeola* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 199 ; Dres-
ser, VI, p. 589, pl. 439.
Amérique Nord,
très accidentel en
Grande-Bretagne
et aux Hébrides.

COSMONETTA *Kaup* 1829

1. *histrionica* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 204 ;
Dresser, VI, p. 609, pl. 442 ; *torquata* Brehm,
1855.
Groënland, Is-
lande, très acci-
dentel en
Grande-Bretagne,
et Europe
Continentale ;
Asie jusqu'au
Japon ;
Amérique Nord.

Genre HARELDE

1. *Harelda glacialis* (Linné)

HARELDE GLACIALE

D. et G., II, p. 549.

Genre ÉNICONETTE

1. *Eniconetta stelleri* (Pall.)

ÉNICONETTE DE STELLER

D. et G., II, p. 553.

Genre EIDER

1. *Somateria mollissima* (Linné)

EIDER VULGAIRE

D. et G., II, p. 555.

HARELDA *Leach* 1824

1. **glacialis** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 203; Dresser, VI, p. 617, pl. 443, 444; *hyemalis* L., 1766.

Europe, Asie
et Amérique Arctique, émigre
en hiver dans les
Iles Britanniques
et l'Europe
Continentele jus-
qu'en Italie;

Asie
jusqu'au Japon;
Amérique
jusqu'à la Caro-
line du Sud.

ENICONETTA *Gray* 1841

Somateria (partim) Dresser.

1. **stelleri** (Pall.), Spic. Zool., 1769, fasc. VI, p. 35, pl. 5; Dresser, VI, p. 649, pl. 447 (*Somateria*); *dispar* Sparrm., 1786.

Sibérie Nord
et Amérique Arctique, Groënland
(rare);
accidentel en
Grande-Bretagne,
Danemark,
France Nord;
plus commun en
Norvège.

SOMATERIA *Leach* 1819

1. **mollissima** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 198; Dresser, VI, p. 629, pl. 445.

Europe Arctique,
Spitzberg, Is-
lande, Iles Feroe,
Laponie;
émigre en hiver
au Sud jusqu'à
la Méditerranée;
Asie Nord
jusqu'à l'Énisei.

2. Somateria spectabilis (Linné)

EIDER A TÊTE GRISE

D. et G., II, p. 557.

Genre MACREUSE**1. Oidemia nigra** (Linné)

MACREUSE ORDINAIRE

D. et G., II, p. 560.

2. Oidemia fusca (Linné)

MACREUSE BRUNE OU GRANDE

D. et G., II, p. 562.

3. Oidemia perspicillata (Linné)

MACREUSE A LUNETTES

D. et G., II, p. 563.

2. *spectabilis* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 195 ;
Dresser, VI, p. 643, pl. 446.

Europe Arctique,
Asie, Amérique ;
accidentel
en hiver sur les
côtes de l'Europe
Nord jusqu'à
l'Allemagne
Nord, la France
Nord et même
Venise ;
rare au Spitzberg.

ŒDEMIÆ Fleming 1822

Oidemia Gerbe.

1. *nigra* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 196 ; Dresser,
VI, p. 663, pl. 449.

Europe Nord,
Islande, Laponie,
émigre en hiver
jusqu'à
la Méditerranée
et l'Afrique Nord ;
Asie Nord-Est.

2. *fusca* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 196 ; Dresser,
VI, p. 657, pl. 448.

Europe Nord,
Laponie,
rare au Groënland
(pas en Islande) ;
émigre jusqu'à
la Méditerranée et
la Caspienne ;
Asie Nord
jusqu'à l'Énisséi.

3. *perspicillata* (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 201 ;
Dresser, VI, p. 669, pl. 450.

Amérique Arcti-
que, émigre
jusqu'à
la Jamaïque ; ac-
cidentel
en Scandinavie,
Grande-Bretagne,
Europe Conti-
nentale et
Asie Nord-Est.

Genre ERISMATURE

1. *Eristatura leucocephala* (Scop.)

ÉRISMATURE LEUCOCÉPHALE OU COURONNÉ

D. et G., II, p. 566.

Genre HARLE

1. *Mergus merganser* Linné

HARLE BIÈVRE

D. et G., II, p. 569.

z

2. *Mergus serrator* Linné

HARLE HUPPÉ

D. et G., II, p. 570.

3. *Mergus cucullatus* Linné

HARLE COURONNÉ

D. et G., II, p. 572.

ERISMATURA Bonap. 1838

1. **leucocephala** (Scop.), Ann. I, Hist. Nat., 1769, p. 65; Dresser, VI, p. 677, pl. 451; *merca* Bonap., 1838.

Europe Sud
et Afrique Nord,
accidentel
en Allemagne
et France Nord.
Asie Centrale,
Turkestan,
Inde en hiver.

MERGUS Linné 1758

1. **merganser** et *castor* Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 208 et 209; Dresser, VI, p. 685, pl. 452; *comatus* Salvad.

Europe et Asie
Arctiques;
émigre en Angle-
terre et Europe
Continental jusqu'à la Médi-
terranée, Japon,
Chine, Inde.

2. **serrator** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 208; Dres-
ser, VI, p. 693, pl. 453.

Europe, du
Cap Nord et de
l'Islande, l'Ecosse
et l'Irlande
à la Méditerranée
et l'Afrique Nord;
Asie jusqu'au
Japon, Inde Nord;
Amérique du
Nord.

3. **cucullatus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 207;
Dresser, IX, p. 296, pl. 696.

Amérique Nord
jusqu'à Cuba;
très accidentel
au Groënland.
S'égare dans les
Iles Britanniques
(et en France?).

4. *Mergus albellus* Linné

HARLE PIETTE

D. et G., II, p. 573.

Famille L — PODICIPIDÉS**Genre GRÈBE****1. *Podiceps cristatus* (Linné)**

GRÈBE HUPPÉ

D. et G., II, p. 577.

2. *Podiceps griseigena* (Bodd.)

GRÈBE JOUGRIS

D. et G., II, p. 579.

a. *Podiceps holboelli* (Reinh.)

GRÈBE DE HOLBÖLL

D. et G., II, p. 581.

(1)

(1) *Podiceps longirostris* Bp., prétendu propre à la Sardaigne, est fondé sur un spécimen d'*Echmophorus major* Bodd., espèce de l'Amérique Méridionale, spécimen échappé très certainement de captivité.

4. **albellus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 209; Dresser, VI, p. 609, pl. 454, 455.

Europe Nord,
de la Laponie fin-
noise, en hiver
émigre en
Grande-Bretagne
et Europe jus-
qu'à la Méditerranée; Asie
jusqu'au Japon,
Inde en hiver.

L — PODICIPIDÆ

PODICEPS *Latham* 1790

Colymbus Linné; *Podicipes* Dresser (ex Lath.).

1. **cristatus** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 222; Dresser, VIII, p. 629, pl. 629; *australis* Gould, 1844.

Europe Moyenne
et Sud,
de la Scandinavie
et de l'Angleterre
au Sud; Afrique
jusqu'au Cap;
Asie jusqu'au
Japon et l'Inde;
Australie et Nou-
velle-Zélande.

2. **griseigena** (Bodd.), Tabl. Pl. Enl., 1783, p. 55; Dresser, VIII, p. 639, pl. 630; *rubricollis* Gm., 1788.

Europe Nord,
émigre en hiver
dans les Iles Bri-
tanniques et
jusqu'en Afrique.

- a. — **holboelli** Reinhardt, Vidensk. Meddel., 1853, p. 76.

Groenland et
Amérique Nord,
Asie Est, Japon;
très accidentel
dans
l'Europe Nord.

3. Podiceps auritus (Linné)

GRÈBE OREILLARD

D. et G., II, p. 584.

4. Podiceps nigricollis Sundev.

GRÈBE A COU NOIR

D. et G., II, p. 585.

5. Podiceps fluviatilis (Briss.)

GRÈBE CASTAGNEUX

D. et G., II, p. 587.

Famille LI — COLYMBIDÉS**Genre PLONGEON****1. Colymbus glacialis** Linné

PLONGEON IMBRIM

D. et G., II, p. 590.

3. *auritus* Syst. Nat., I, 1766, p. 222; Dresser, VIII, p. 645, pl. 631; *cornutus* Gm., 1788.
Groenland
et Europe Nord.
de l'Islande
à la Méditerranée
et la Caspienne;
Asie jusqu'au
Japon;
Amérique Nord
jusqu'aux
Etats-Unis.
4. *nigricollis* E. L. Brehm, Vög. Deuts., 1831, p. 963;
Dresser, VIII, p. 651, pl. 632; Sundev., 1848;
auritus Lath., 1790 (nec Linné).
Europe Moyenne
et Sud, de la
Finlande et la
Grande-Bretagne
au Sud;
Afrique en hiver;
Asie jusqu'au
Japon et à l'Inde.
5. *fluviatilis* (Tunstall), Orn. Brit., 1771, p. 3; Dres-
ser, VIII, p. 659, pl. 633; *minor* Gm., 1788.
Europe, de la
Scandinavie et la
Grande-Bretagne
à l'Afrique Nord;
Asie Mineure
jusqu'au Japon
Sud.

LI — COLYMBIDÆ

COLYMBUS Linné 1758

Urinator Lacép.

1. *glacialis* et *immer* Linné, Syst. Nat., I, 1766,
p. 221; Dresser, VIII, p. 609, pl. 626; *tor-*
quatus Keys. et Blas., 1840.
Groenland,
Islande, Nou-
velle-Zemble,
Féroë; émigre
en hiver
jusqu'à la Médi-
terranée;
Amérique Nord
jusqu'au Golfe du
Mexique.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PLONGEON A BEC BLANC

3. *Colymbus arcticus* Linné

PLONGEON LUMME

D. et G., II, p. 592.

4. *Colymbus septentrionalis* Linné

PLONGEON CAT-MARIN

D. et G., II, p. 594.

2. **adamsi** Gray, P. Z. S., 1859, p. 167; Dresser, IX, p. 413, pl. 722.

Semblable à *C. glaucilis* mais en différant par les taches du dos et des ailes plus larges, le collier supérieur de la gorge ayant des raies moins nombreuses et plus larges, le bec long, droit et d'un blanc jaunâtre. Aile : 382 millimètres (un peu plus courte que celle de *C. glaucilis*).

Amérique Nord-Ouest et Asie Nord-Est, s'avancant jusqu'en Norvège et très accidentel en Grande-Bretagne; émigre en hiver au Japon.

3. **arcticus** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 221; Dresser, VIII, p. 615, pl. 627.

Nord des deux Continents (pas en Islande); émigre dans l'Europe Sud jusqu'à la Méditerranée, la Caspienne; en Asie jusqu'au Japon, en Amérique jusqu'aux États-Unis Est.

4. **septentrionalis** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 220; Dresser, VIII, p. 621, pl. 623; *lumme* Brünn., 1764.

Nord des deux Continents, Groënland, Islande, émigre en hiver jusqu'à la Méditerranée, la Mer Noire, l'Égypte; Asie jusqu'au Japon; Amérique jusqu'aux États-Unis.

Famille LII — ALCIDÉS

Genre GUILLEMOT

1. *Uria troile* (Linné)

GUILLEMOT TROÏLE

D. et G., II, p. 598.

a. *Uria ringvia* Brünn.

2. *Uria arra* (Pall.)

GUILLEMOT ARRA

D. et G., II, p. 602.

3. *Uria grylle* (Linné)

GUILLEMOT GRYLLE

D. et G., II, p. 603.

LII — ALCIDÆ

URIA *Brisson* 1760

1. **troile** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 220 ; Dresser, VIII, p. 567, pl. 621 ; *lomvia* Keys. et Blas., 1840 (nec Pall.) ; *californica* Bryant, 1861.

Mers du Nord
(Arctique, Atlan-
tique Nord,
Baltique Sud),
en hiver, Europe
et Amérique,
sur le versant At-
lantique
jusqu'au 30° :
Océan Pacifique
jusqu'au Japon
et à la Californie.

- a. — **ringvia** Brünn., Ornith. Bor., 1764, p. 28.

Islande, Féroë,
Terre-Neuve, ac-
cidental sur les
côtes septentrio-
nales de France.

2. **lomvia** (Pall.), Zoog. Ross.-As., II, 1811, p. 345 ;
arra Pall., loc. cit., 1811, p. 347 ; *bruennichi*
Sabine, 1817 ; Dresser, VIII, p. 575, pl. 622.

Océan Arctique
et
Atlantique Nord :
accidental
en Norvège, rare
en Angleterre,
Danemark, Alle-
magne, Hollande ;
Pacifique Nord
jusqu'au Japon.

3. **grylle** (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 220 ; Dres-
ser, VIII, p. 581, pl. 623.

Atlantique Nord,
Mer Blanche,
Grande-Bretagne,
Baltique,
Scandinavie, Al-
lemagne,
France Nord ;
Amérique Nord,
du Groënland
et du Labrador
à New-Jersey.

a. *Uria mandti* Licht.

Genre Mergule

1. *Mergulus alle* (Linné)

GUILLEMOT NAIN

D. et G., II, p. 605.

Genre Macareux

1. *Fratercula arctica* (Linné)

MACAREUX ARCTIQUE

D. et G., II, p. 608.

- a. — **mandti** Licht., in Mandt, *Observ. (Diss. Inaug.)*, 1822, p. 30; Dresser, VIII, p. 587.

Côtes de l'Océan
Glacial Arctique :
Terre François-
Joseph,
Spitzberg, Nou-
velle-Zemble ;
Groënland,
Amérique Arcti-
que, Sibérie Est.

MERGULUS *Picill.* 1816

1. **alle** (Linné), *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 211; Dresser, VIII, p. 591, pl. 624.

Océan Arctique,
de la Terre
François-Joseph
et la Nouvelle-
Zemble à la Baie
de Balfin ;
émigre en hiver en
Grande-Bretagne,
Scandinavie,
Golfe de Bothnie,
Mer du Nord,
Atlantique jus-
qu'aux Açores
et aux Canaries.

FRATERCULA *Brissou* 1760

Mormon Temm.

1. **arctica** (Linné), *Syst. Nat.*, I, 1766, p. 211; Dres-
ser, VIII, p. 599, pl. 625; *fratercula* Temm.,
1815; *glacialis* Steph., 1826.

Atlantique Nord,
du Groënland
et de la Nouvelle-
Zemble
à la France Nord
(où il niche);
en hiver jus-
qu'aux Canaries.

2. Fratercula corniculata (Naum.)

MACAREUX A CROISSANT

D. et G., II, p. 609.

Genre PINGOUIN**1. Alca torda** Linné

PINGOUIN TORDA OU MACROPTÈRE

D. et G., II, p. 612.

2. Alca impennis Linné

PINGOUIN BRACHYPTÈRE OU GRAND PINGOUIN

2. **corniculata** (Naum.), Isis, 1821, p. 782, pl. VII, fig. 3, 1 (1).

Pacifique Nord
et Atlantique au
Nord du 71°
latitude boreale :
du Kamtschatka à
la Colombie
britannique ;
Spitzberg ? , Nor-
vege ?
(tres accidentel).

ALCA Linné 1758

Utamania Leach.

1. **torda** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 210 ; Dresser, VIII, p. 557, pl. 619.

Atlantique Nord,
du 73° latitude
Nord à la Médi-
terranée ; Açores
et Canaries ;
Amérique Est
jusqu'à
la Nouvelle-An-
gleterre.

2. **impennis** Linné, Syst. Nat., I, 1766, p. 210 ; Dresser, VIII, p. 563, pl. 620.

Atlantique Nord
au Sud du Cercle
arctique ;
Groënland, Is-
lande, Orcades ;
accidentel
en Europe Conti-
nentale, notam-
ment en France
(complètement
éteint
depuis 1810).

(1) Il n'est pas certain que cette espèce soit européenne, même à titre très accidentel, bien que Gerbe l'indique au Spitzberg et même en Norvège.

APPENDICE

NOTA. — Pour un certain nombre de sous-espèces il n'a pas été possible d'indiquer les caractères, soit que le recueil où ces formes sont décrites ne soit pas à notre disposition, soit que cette description ait été rédigée dans une langue qui ne nous est pas familière. Pour la plupart de ces formes, l'indication de l'habitat ou de la répartition géographique, toujours exactement donnée, peut suffire à les caractériser.

Addenda et Corrigenda.

Page 15.

Buteo buteo lanzaretæ Polatzek.

Ornith. Jahrb., 1908, XIX, p. 113. — Plus petite que la Base des îles occidentales (*B. b. insularum* Flerke), et de coloration différente. Les intervalles clairs qui séparent les bandes foncées des rectrices (sauf lorsque ces plumes sont très usées) sont d'un bleu ardoisé, sans mélange de brun, et toutes les plumes ont, en dessous de la tige, une petite tache d'un roux presque triangulaire. L'ensemble du plumage a une teinte plus brillante et plus vive, contrastant avec la teinte terne des autres formes. Le corps est moins trapu. — Aile 343 millimètres. — Ile Lanzarote (Canaries orientales). — D'après Dresser et Reichenow, cette forme serait identique à *Buteo b. menetrieri*.

Page 23.

Falco peregrinus britannicus Erlanger.

Journal f. Ornith., 1903, p. 296. — Intermédiaire entre le Faucon de Suède et Russie (*F. p. griseiventris* Brehm) et celui de l'Europe moyenne (Allemagne). Le dessus est de la teinte du premier, plus clair que chez ce dernier, surtout sur le front, le sommet de la tête et les raies du dos. Le dessous est un peu plus clair que chez le Faucon d'Allemagne, et la teinte grise du fond est remplacée par du blanc pur sur les flancs et la culotte. — Grande-Bretagne.

Page 23.

Falco barbarus germanicus Erlanger.

Journ. f. Ornith., 1903, p. 294. — ? *F. cornicum* Brehm, 1831. — La teinte rousse de la nuque est à peine indiquée. Le mâle diffère de *F. b. babylonicus* (du Caucase) par les étroites bandes d'un gris de fer foncé qui couvrent le dos, deviennent confluentes par le croupion, et se détachent nettement sur le fond du plumage d'un gris bleuâtre clair. Les bandes noires de la queue sont étroites et bien limitées dessus et dessous. Le dessous de l'oiseau n'est pas entièrement couvert de taches noires allongées se sui-

vant en forme de bandes interrompues; ces bandes n'existent que sur les flancs; le milieu présente des taches bien séparées. Bec plus large à la base, dans son ensemble plus massif. Aile plus courte. — Allemagne (Heldra près Treffurt).

Page 27.

Tinnunculus tinnunculus canariensis (Kœnig).

Journ. f. Ornith., 1889, p. 263. — Le mâle a des couleurs plus vives que le type du continent tandis que la femelle est plus foncée. La taille est moindre et les formes plus élancées. Aile : mâle 225 mm. — Iles Canaries, Ténériffe, Palma, Madère.

Page 27.

Astur gentilis (= palumbarius) wolterstoeffi Kleinschmidt.

Ornith. Monatsb., IX, 1901, p. 168. — Plus petit que le type du continent, plus foncé dessus, et les taches du dessous plus larges. — Sardaigne (Lanusei).

Page 27.

Astur gentilis (= palumbarius) arriçoni Kleinschm.

Ornith. Monatsb., XI, 1903, p. 152. — Plus petit que le type et plus foncé, surtout sur les ailes (l'aile, le bec, le squelette sont manifestement plus petits). L'adulte est plus élégant que l'Autour du Continent. — Sardaigne (Malgré la ressemblance avec *A. g. wolterstoeffi*, l'auteur maintient la distinction des deux formes).

Page 29.

Astur badius græus Madarasz.

Ornith. Monatsb., XVIII, 1910, p. 65. — Ressemble à *poliopsis*, de l'Inde, par ses teintes claires et sa forte taille, mais tandis que chez ce dernier l'adulte a les plumes des jambes entièrement blanches, sans barres transversales, ces plumes sont barrées chez les spécimens âgés de la présente sous-espèce. — Grèce. — (Le type est Asiatique.)

Page 35.

Glaucidium setipes Madarasz.

Magyar Madarai, 1900, p. 203, fig. — Hongrie.

Page 35.

Athene (Carine) noctua caucasica Zarudny et Loudon.

Ornith. Jahrb., XV, 1904, p. 56. — Caucase.

Page 35.

Nyctala caucasica Buturlin.

Ornith. Monatsb., 1907, p. 80. — Caucase.

Page 35.

Nyctala (Cryptoglaux) tengmalmi transvolgensis Buturlin.

Narva Oskola, IV, 1910, p. 9. — Russie Sud-Est.

Page 35.

Nectua (Strix) athene sarda Kleinschmidt.

Falco, III, 1908, p. 63. — Ile de Sardaigne.

Page 37.

Strix flammea gracilirostris Hartert.

Bull. Ornith. Club, XVI, 1905, p. 31. — Iles Canaries.

Page 39.

Asio accipitrinus pallidus Zarudny et Loudon.

Ornith. Monatsb., XIX, 1906, p. 151. — Diffère du type par la teinte pâle du fond du plumage à tous les âges. — Russie Est, Orenbourg, Turkestan; en hiver Perse orientale.

Page 41.

Bubo hube norwégicus Reichenow.

Journ. f. Ornith., 58, 1910, p. 412. — Le fond du plumage présente une teinte grise (non rousse comme chez le type de Suède et d'Allemagne); couvertures supérieures de l'aile sans tache noire à la base. — Norvège.

Page 41.

Bubo hube hungaricus Reichenow.

Journ. f. Ornith., 58, 1910, p. 412. — Barres de la poitrine plus étroites que chez le type; fond du plumage plus roux. — Hongrie.

Page 41.

Bubo hube turcomanus Reichenow.

Journ. f. Ornith., 58, 1910, p. 412. — Fond du plumage plus pâle, jaunâtre. — Région du Volga, Caucase, et de là dans l'Asie moyenne.

Page 41.

Scops scops tchusii Schiebel.

Ornith. Jahrb., XXI, 1910, p. 102. — La teinte d'un jaune argileux est plus intense que chez le type; la gorge, surtout chez le mâle, est d'un jaune argileux très vif. — Corse.

Page 41.

Scops (Piserhina) scops græca Tschusi.

Ornith. Jahrb., XV, 1904, p. 102. — Grèce.

Page 43.

Dendrocepus major pinetorum Brehm.

Picus pinetorum Brehm, *Handb. Vög. Deuts.*, 1831, p. 187; *alpestris* Reich., 1854; *Dendrocepus major tenuirostris* But., 1906; *Dryobates m. pinetorum* Hart., 1912. — Diffère du type par son bec plus grêle et sa taille moindre. Aile : 130 à 138 millimètres. — Europe moyenne et Ouest jusqu'aux Pyrénées, aux Alpes, l'Italie Nord, l'Autriche, la Péninsule des Balkans, la Crimée, le Caucase, l'Asie Mineure.

Page 43.

Dendrocepus major harterti Arrigoni.

Avicula, VI, 1902, p. 103; *sardus* But., 1910. — Semblable à la forme d'Angleterre (*D. major anglicus* Hart.), mais le dessous et la région des oreilles encore plus d'un brun foncé, tirant sur la couleur chocolat chez les spécimens frais; le rouge de la région anale et des couvertures inférieures de la queue plus vif, rouge ardent. Aile : 130 à 138 millimètres. — Sardaigne.

Page 43.

Dendrocepus major parreti Hartert.

Orn. Monatsb., 1911, p. 191. — Semblable à la forme de Sardaigne, mais le bec plus long, plus comprimé. Aile plus longue : 133 à 139 millimètres. — Corse.

Page 43.

Dendrocepus major hispanus (Schlüter).

Falco, IV, 1908, p. 11. — Semblable à la forme d'Angleterre, mais la bande blanche transversale de l'aile plus étroite, le rouge profond de la région anale presque aussi vif que sur le reste du dessous. Aile : 124 à 133 millimètres. — Espagne et Portugal.

Page 43.

Dendrocepus major thanneri (Le Roi).

Orn. Monatsb., 1911, p. 81. — Dessous plus clair que sur les spécimens de Ténériffe (*D. m. canariensis*), et très uniformément d'un brun clair (forme douteuse, les spécimens de Ténériffe étant plus variables que ne le suppose Le Roi, d'après Hartert). — La Grande Canarie.

Page 43.

Dendrocepus major brevirostris (Reichenbach).

Picus brevirostris Reich., *Handb. Scansores*, 1844, p. 365, fig. 4212. — Taille du type, mais le blanc des côtés de la tête et du dessous très pur, sans teinte brune sauf sur le front qui est généralement brun. Les ailes sont un peu plus longues, le rouge de la région anale plus vif. Aile : 139 à 146 millimètres. — Forme de Sibérie qui s'égare en hiver jusque dans le Sud-Est de la Russie d'Europe.

Page 47.

Dendrocepus minor hortorum (Brehm).

Picus hortorum Brehm, *Handb. Vög. Dents.*, 1831, p. 192; *Dryobates minor hortorum* Hart., 1912. — Diffère de *P. minor minor* Linné, par ses parties inférieures plus pâles et plus fortement striées, et d'ordinaire par son aile un peu plus courte (87 à 93 millimètres). — C'est le Pic épeichette de l'Europe moyenne jusqu'aux Alpes et jusqu'en Roumanie (Celui des Açores n'a pas encore été distingué).

Page 47.

Dendrocepus minor buturlini (Hartert).

Dryobates minor buturlini Hartert, *Vög. Pal. Fauna*, II, 1912, p. 921. — Dessous plus largement strié, les bandes transversales noires des rectrices latérales plus larges, les ailes en général un peu plus courtes, ou à peu près comme celles du *minor hortorum*. Le dessous est brunâtre, souvent même plus foncé. Aile : 82 à 88 millimètres. — France Sud-Est (Nice) et toute l'Italie; Pyrénées; Péninsule des Balkans et Grèce (La forme d'Espagne n'est pas connue).

Page 47.

Dendrocepus minor comminutus Hartert.

Brit. Birds, I, 1907, p. 221. — Semblable à *D. m. hortorum* mais plus petit, le dessous entièrement brunâtre, plus foncé que chez celui-ci, s'en rapprochant cependant par l'étroitesse des bandes transversales des rectrices latérales, et la très faible striation des parties inférieures. Aile : mâle 85 à 88,5; femelle 86 à 90 millimètres. — Angleterre moyenne et Sud; rare en Irlande; Hollande.

Page 49.

Dendrocepus minor danfordi (Hargitt), est étranger à l'Europe et doit être remplacé par la sous-espèce suivante :

Dendrocepus minor colchicus (Buturlin).

Ann. Mus. Zool. Petersb., 1908, XIII, p. 249. — Voisin du *P. m. danfordi* Harg. (d'Asie Mineure), mais la bande arquée noire de la région auriculaire moins développée, à peine indiquée ou manquant complètement. Les bandes transversales du dos et des rectrices latérales moins larges et moins nettes. Aile : 88 à 91 millimètres. Le dessous est largement strié. — Caucase Nord et Sud.

Page 49.

Picoïdes tridactylus crissoleucus (Reichenbach).

Apternus crissoleucus Reich., *Handb. Scans. Picinæ*, 1854, p. 362, pl. 631, fig. 4197-98; *uralensis* Buturlin, 1907. — Diffère du type par la plus grande extension du blanc. La bande blanche du dos est plus large; les couvertures supérieures de la queue ont des taches blanches plus larges; le dessin blanc des ailes est plus large; les rectrices externes ont d'ordinaire (mais non constamment) plus de blanc. L'iris de l'adulte serait rouge. — Forme de Sibérie qui s'égare en hiver en Russie jusqu'à Moscou.

Page 49.

Picoïdes tridactylus alpinus Brehm.

Picoïdes alpinus Brehm, *Handb. Vög. Deuts.*, 1831, p. 194. — Diffère du type par les particularités suivantes : le bec est plus grêle; le dos est moins blanc; le haut du dos noir avec quelques taches blanches; le bas du dos et le croupion richement tachetés de noir. Le dessus de la tête portant des plumes avec une petite tache terminale blanche au lieu de raies. Flancs en grande partie noirs, le ventre présentant autant de noir que de blanc; les raies noires sur les côtés de la poitrine notablement plus larges. Ailes de la longueur de celles du type, atteignant quelquefois jusqu'à 132 millimètres. — Alpes et Carpathes, de la Savoie à la Bosnie et l'Herzégovine (pas dans le Jura ni les Pyrénées).

Page 51.

Gecinus viridis pinetorum Brehm.

Gecinus pinetorum Brehm, *Handb. Vög. Deuts.*, 1831, p. 197; *saundersi* Tuzcan., 1878. — Le « Pic vert » type étant la forme de Suède, la présente sous-espèce se distingue par un bec et des ailes plus courts. Aile : 132 à 167,5 millimètres (d'ordinaire 164-167). — Europe moyenne (France, Suisse, Allemagne, Autriche, Péninsule des Balkans, Caucase, Taurus).

Page 51.

***Gecinus viridis pluvius* (Hartert).**

Picus viridis pluvius Hartert, *Brit. Birds*, V, 1911, p. 125. — Très semblable à la forme du continent, mais l'aile encore plus courte (mâle : 159 à 161 et même 157 millimètres; femelle : 158 à 163). Bec plus court mais non plus grêle, paraissant ainsi comparativement plus épais. — Angleterre Sud et Galles, plus rare dans le Nord, ainsi qu'en Écosse et en Irlande.

Page 51.

***Gecinus viridis pronus* (Hartert).**

Picus viridis pronus Hartert, *Brit. Birds*, V, 1911, p. 125. — Semblable au *P. v. pluvius* pour les dimensions, mais le bec plus grêle et plus faible. Aile : 156 à 161 millimètres. — Italie, depuis le Sud de la Suisse, et de là jusqu'en Grèce.

Page 53.

***Yunx torquilla tchusii* Kleinschmidt.**

Yunx torquilla tchusii Kleinsch., *Falco*, 1907, p. 103. — Plus petit et plus foncé que le type, se rapprochant par ses teintes de *Y. t. mauretanica* (d'Afrique), mais plus clair sur les parties supérieures, et intermédiaire pour la taille entre les deux formes. Aile : 82 à 85 millimètres. — Italie, Dalmatie, Sardaigne et probablement aussi la Corse.

Page 53.

***Cuculus canorus kleinschmidtii* Schiebel.**

Ornith. Jahrb., 1910, XXI, p. 103. — Diffère du type très nettement par ses parties inférieures plus foncées, gris de fer (Cette forme réclame de nouvelles recherches). — Corse (peut-être aussi Sardaigne?).

Page 53.

***Cuculus canorus minor* A. E. Brehm.**

Allg. D. Naturh. Zeitung, Neue Folge III, 1857 (1858), p. 444. — Semblable au type mais notablement plus petit. Aile : mâle 217, femelle 190 millimètres (moyenne : 200 à 210 millimètres). Bec plus petit. — Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie; de passage irrégulier à Ténériffe et Madère.

Page 69.

***Upupa epeps fuerteventuræ* Polatzek.**

Ornith. Jahrb., 1908, XIX, p. 165, 166. — Couleurs du plumage plus vives et bec plus long (mâle 6,5 au lieu de 5,8; femelle 5,8 au lieu de 5,25 centimètres) que chez

les types d'Europe et d'Afrique (Sous-espèce distincte si elle est réellement sédentaire).
— Îles Canaries.

Page 73.

***Corvus cornix christophi* Alphéraky.**

Mess. Ornith. Mosk., I, 1910, p. 164. — Bords de la mer d'Azov.

Page 87.

***Lanius collurio jourdaini* Parrot.**

Ornith. Monatsb., 1910, p. 154. — Mâle ayant la teinte des flancs plus foncée et plus étendue, d'un roux-brun vineux. Taille moindre. Le brun du dos est souvent plus obscur et sans trace de rcux; presque toujours la bande terminale noire des rectrices latérales prend une largeur considérable. Aile : 87 à 92 millimètres. — Corse.

Page 97.

***Petronia petronia exigua* (Hellmayr).**

Passer petronius exiguus Hellmayr, *Ornith. Jahrb.*, 1902, p. 128. — Semblable au type mais le dessus d'un gris poussiéreux, et non d'un brun argileux, les raies foncées de la tête plus claires, le bec un peu moins fort. Aile : 96 à 99 millimètres. — Bouches du Don, Caucase (jusqu'à Erzeroum en Arménie).

Page 109.

***Chloris chloris madaraszi* Tschusi.**

Ornith. Jahrb., 1911, page 145. — En général plus foncé que le type, l'ensemble du plumage saturé de brun (et non de gris). Aile (mâle) 82 à 85; (femelle) 81 millimètres. — Corse.

Page 109.

***Chloris (Liéguinus) chloris meridionalis* Härms.**

Ornith. Monatsb., 1910, p. 121. — Mâle : dessus plus brun que chez le type (sans trace de gris), surtout sur la tête, tirant sur la teinte chocolat au lait. Bas du dos et croupion d'un vert-jaune plus clair. Dessous plus clair et plus jaune (sans trace de gris ou de brun). Couvertures inférieures de la queue brunes et non grises. — Femelle : Dessus d'un brun plus clair et plus vif que chez le type (non brun noir terne). Bas du dos et croupion plus pâles et plus jaunâtres (non verdâtre sombre). Dessous plus clair, d'un jaune peu intense. Flancs avec du brun très foncé (non du gris mêlé de brun). — Roumanie.

Page 109.

Chloris chloris rossica Zarudny.

Ornith. Monatsb., 1907, p. 63. — Diffère du type d'Allemagne par l'intensité de la teinte grise du plumage en général et spécialement sur la poitrine, où cette teinte ne s'affaiblit pas en plumage de noces. — Russie moyenne.

Page 111.

Fringilla caelebs gengleri Kleinschmidt.

Falco, V, p. 13. — C'est le Pinson de la Grande-Bretagne.

Page 111.

Fringilla caelebs tyrrhenica Schiebel.

Ornith. Jahrb., 21, 1910, p. 102. — Semblable au type, mais les ailes d'un noir foncé (et non d'un brun noir). La teinte générale du plumage est plus vive (surtout en plumage usé). Le vert du croupion tire sur le jaunâtre en paraissant plus foncé. Les rectrices sont souvent plus larges à leur extrémité. — Corse.

Page 117.

Carduelis carduelis rumaniæ Tschusi.

Ornith. Jahrb., XX, 1909, p. 76. — Teintes foncées : dessus d'un brun-roux, les taches de la nuque plus larges ; les côtés d'un brun roussâtre sans mélange de gris. Couvertures de la queue, excepté les plus longues, teintées de roux-brun. Dessous blanc, poitrine et flancs d'un roux-brun clair ; côtés de la tête blancs, sauf la région des oreilles qui est un peu teintée de brunâtre. Aile : 79 à 84 millimètres. — Roumanie.

Page 117.

Carduelis carduelis volgensis Buturlin.

Ibis, 1906, p. 424. — Diffère du type par le blanc plus pur de ses joues, la plus grande étendue du blanc sur la nuque et le croupion, la plus grande largeur du miroir jaune de l'aile, et surtout la taille plus forte et le bec plus robuste. — Ne peut être confondu avec *C. major* Tacz., des Kirghis, car il est encore plus grand, et le croupion et le bas du dos d'un blanc pur contrastent nettement avec la couleur foncée de la région antérieure du dos. — Aile : 83,5 chez le mâle ; 82 millimètres chez la femelle. — Russie moyenne et Sud-Est.

Page 123.

Acanthis (Linaria) linaria islandica Hantzsch.

Ornith. Monatsb., 1904, p. 32. — Dessus très foncé, plutôt gris noirâtre que brun noirâtre, fortement strié ; dessous d'un gris blanchâtre. La tache noire de la mandibule petite ou obsolète. Ventre sans tache, blanc ou d'un blanc jaunâtre. Poitrine (chez le

mâle seul) rose pâle, cette teinte peu visible sur certains spécimens en plumage de noces. Croupion blanchâtre, teinté de rose très faiblement chez le mâle, et présentant de fines stries brunes. Aile 82 à 76 millimètres. — Niche dans le Nord de l'Islande; en hiver se répand dans toute l'île.

Page 129.

***Emberiza miliaria (calandra) græca* Parrot.**

Ornith. Monatsb., 1905, p. 101; 1910, p. 153. — Parties supérieures d'un ton plus vif et plus chaud que chez le type, tirant sur le jaune-brun-olivâtre, la région de la gorge plus trapue et d'une teinte vive d'un jaune roux. Toutes les proportions par ailleurs plus faibles. Aile : mâle 90 à 94,5; femelle 89 à 92 millimètres. — Grèce, Roumélie Est.

Page 129.

***Emberiza miliaria (calandra) insularis* Parrot.**

Ornith. Monatsb., 1910, p. 153. — Diffère du type continental d'Europe par le fond du plumage des parties supérieures plus foncé; d'un gris-brun-olivâtre, la proportion plus robuste du tronc, les taches de la gorge plus noires et plus larges. Ces taches sont d'un roux-jaune plus foncé sur le bas des flancs et au menton, mais elles pâlisent plus ou moins en février de l'année suivante. Aile : mâle 94 à 99; femelle 87 millimètres. — Corse.

Page 129.

***Emberiza miliaria (calandra) caucasica* Buturlin.**

Nava Ochota, 1909, 3, p. 90 (nom nouveau pour *Emberiza calandra minor*, dont le nom est préoccupé). Cette forme du Caucase ne nous est pas connue.

Page 131.

***Emberiza cirrus nigrostriata* Schiebel.**

Ornith. Jahrb., XXI, 1910, p. 103. — Comparé à la forme des Balkans, les taches des flancs sont ici, non brunâtres, mais d'un noir plus foncé, et passent au roux de rouille sur les côtés de la poitrine, donnant à l'oiseau un aspect plus riche. — Corse.

Page 131.

***Emberiza citrinella rumaniensis* Gengler.**

Ornith. Jahrb., 1911, p. 177-182. — Diffère d'*E. c. palake* Dombrowski, par ses teintes plus vives, ses taches plus claires, le front orangé, le jaune du dessus plus pur et se détachant nettement des flancs tachetés. Aile (plus longue) : 93 millimètres. — Roumanie.

Page 141.

Alauda arvensis scotica* Tschusi.Ornith. Jahrb.*, XIV, 1903, p. 162. — Écosse.

Page 141.

***Alauda subalpina* Ehmeke.**

Journ. f. Ornith., 1902, p. 149. — Semblable à *A. arvensis*, mais le corps plus grêle, avec le plumage mou et serré. — Dessus, avec la queue, d'un brun-noir foncé relevé de taches d'un gris jaunâtre formées par le bord clair des plumes. Dessous gris blanchâtre avec quelques petites taches allongées foncées sur la gorge et le haut de la poitrine. Aile : 105 millimètres. — Alpes de Savoie.

Page 141.

***Alauda flavescens* Ehmeke.**

Journ. f. Ornith., 1903, p. 151. — Corps robuste et ramassé ; tête et bec petits. — Dessus avec la tête d'un brun-noir, les plumes bordées de gris jaunâtre, plus clair sur la nuque où la bordure des plumes est plus large. Dessous blanc lavé de jaunâtre et présentant, chez les vieux oiseaux, des taches brunes plus ou moins prononcées sur le haut de la poitrine. Aile : 114 millimètres. — Roumanie.

Page 141.

Alauda sordida* Ehmeke.Ann. Mus. Hung.*, II, 1904, p. 300. — Hongrie.

Page 141.

Alauda subtilis* Ehmeke.Ann. Mus. Hung.*, II, 1904, p. 301. — Monténégro.

Page 143.

***Lullula arborea familiaris* Parrot.**

Ornith. Monatsb., 1910, p. 153. — Diffère du type du Continent par ses parties supérieures plus foncées, moins roussâtres. Le bord des plumes est d'un brun-olive clair, le croupion et les couvertures supérieures de la queue d'un gris-brun-olivâtre ; la base de la gorge est plus trapue et plus foncée. — Corse, Sardaigne.

Page 143.

Calandrella minor distincta* Sassi.Ornith. Jahrb.*, 1908, XIX, p. 30. — Bec plus épais que chez les autres formes

atlantiques. La teinte du plumage d'un isabelle moins roux que chez celles-ci, mais moins gris que chez le type de Tunisie. Taches des parties inférieures plus larges et plus courtes (comme chez *C. m. rufescens*). — Aile : mâle 85 à 85,5; femelle 80,5 à 81,25 millimètres. — Grande Canarie.

Page 153.

Galerida cristata neumanni Hilgert.

Ornith. Monatsb., 1907, p. 63. — Dessus très foncé (d'une teinte chocolat), lavé d'un rouge-brun très chaud; dessous lavé de roux avec une teinte plus vive au voisinage de la tête et sur les flancs. — Italie centrale, Romagne (Les spécimens du Nord de l'Italie se rapportent au type).

Page 157.

Anthus bertheloti lanzaroteæ Tschusi et Polatz.

Ornith. Jahrb., 1908, XIX, p. 191. — Dessus plus gris-brun que chez le type (de la Grande Canarie), sans trace de jaune, les taches plus petites, par suite plus distantes du bord des plumes; en plumage usé ces taches sont peu visibles, se confondant avec la teinte générale foncée ou d'un brun rougeâtre. — Lanzarote, Fuerteventura, Graciosa.

Chez le type en plumage usé les taches restent nettement distinctes et bien limitées.

Page 169.

Motacilla (Budytes) citreola weræ Buturlin.

Ornith. Monatsb., 1907, p. 197. — Semblable au type, mais beaucoup plus petite. Aile : 77,5 à 82 millimètres (au lieu de 87 à 92 millimètres chez le type).

Page 173.

Cinclus gularis Latham, 1801, bien que décrit d'après le jeune, a la priorité sur *Cinclus cinclus britannicus* Tschusi.

Page 181.

Turdus merula schiebeli Tschusi.

Ornith. Jahrb., 1911, p. 144. — Mâle adulte d'un noir profond dessus et dessous, ne passant au brunâtre qu'à la pointe de l'aile. Bec orangé. Tarses et ongles brun foncé. Aile : 127 millimètres. — Femelle d'un brun olivâtre plus ou moins foncé dessus, ainsi que les ailes et la queue; le front et le sommet de la tête seuls d'un brun plus foncé. Poitrine, ventre et flancs variant du gris au châtain. Aile : 120 à 123 millimètres. — Corse.

Page 199.

Luscinia megarhyncha corsa Parrot.

Ornith. Monatsb., 1910, p. 515. — Diffère du type du Continent par ses parties supérieures plus foncées et plus ternes, ce qui se remarque aussi sur la bordure des remiges, et par la teinte d'un gris-brun clair plus accusé. L'aile est un peu plus courte : 78 à 84 millimètres. — Corse.

Page 215.

Pratincola torquata insularis Parrot.

Ornith. Monatsb., 1910, p. 155. — Semblable à *P. t. rubicola*, mais le mâle en costume de noces a les parties supérieures d'un noir plus foncé et plus vif, le bord des remiges plus pâle, d'un roux-olivâtre. Les parties inférieures sont plus vivement colorées jusque sur l'abdomen et les couvertures inférieures de la queue : le roux-brun est plus foncé sur la gorge et les flancs. Taille moindre. Aile : mâle 63 à 65,5 ; femelle 61 à 66 millimètres. — Corse et probablement les autres îles de la mer Tyrrhénienne.

Page 217.

Prunella collaris tchusii Schiebel.

Ornith. Jahrb., XXI, 1910, p. 102. — Voisin de la forme des Balkans (*subalpina*), mais le dessus notablement plus foncé. Les taches foncées du dos plus larges et d'une couleur plus intense que chez les spécimens du Continent. — Corse, dans les hautes montagnes.

Page 231.

Melizophilus (Sylvia) sardus affinis Parrot.

Ornith. Monatsb., 1910, p. 156. — Semblable au type de Sardaigne mais, chez le mâle, le gris du dessus et du dessous plus foncé, la teinte d'un roux-vineux de la poitrine atténuée. Taille moindre. Aile : 51 à 56,5 millimètres. — Corse (sédentaire).

Page 249.

Cettia cetti reiseri Parrot.

Ornith. Monatsb., 1910, p. 155. — Diffère du type de Sardaigne par une taille supérieure (longueur totale : mâle 61 à 66 ; femelle 58 à 62 millimètres) ; la teinte des flancs est moins vive, d'un brun plus foncé et s'étend jusque sur le milieu du bas de la poitrine. Aile : 54,5 à 59 millimètres. — Herzégovine, Grèce Sud, peut-être toute la péninsule des Balkans.

Page 251.

Troglodytes troglodytes kœniigi Schiebel.

Ornith. Jahrb., 1910, p. 102. — Diffère du type d'Europe centrale par la teinte des

parties supérieures qui n'est pas d'un roux aussi prononcé, mais d'un brun foncé. Le bec un peu plus long. — Corse.

Page 270.

Parus major peloponesius Parrot.

Journ. f. Orn., 1905, p. 545 et 667. — Plus petit que le type, la teinte noire empiétant sur les parties plus claires; le blanc des barbes internes de la première rectrice plus étroit. Aile (mâle) 71 à 73,4 millimètres (au lieu de 74 à 77 millimètres); femelle, 67 millimètres (au lieu de 71,5 à 73). — Grèce.

Page 279.

Parus (Cyanistes) caeruleus orientalis, Zarudny et Loudon.

Ornith. Monatsb., 1905, p. 105. — Russie Est, Orenbourg, Kazan.

Page 307.

Muscicapa striata tyrrhenica Schiebel.

Ornith. Jahrb., XXI, 1910, p. 102. — Diffère du type d'Autriche en ce que les taches du dessous sont très indistinctes et ne marquent pas nettement chaque plume. — Corse et Sardaigne.

Page 351.

Caccabis rufa corsa Parrot.

Ornith. Monatsb., 1910, p. 156. — Semblable à *C. r. hispanica*, mais plus petite. Aile du mâle 140 millimètres (au lieu de 150). — Corse.

Page 367.

Œdicnemus œdicnemus insularum Sassi.

Ornith. Jahrb., 1908, XIX, p. 32. — Diffère du type par sa teinte d'un roux isabelle, surtout sur les parties supérieures; les rayures des parties inférieures sont plus prononcées. Les grandes couvertures de l'aile, en avant de la bande foncée sont blanches; la rangée antérieure des couvertures moyennes est, à la même place, surtout sur leur bord, plus ou moins isabelle, leur pointe blanchâtre avec une légère teinte isabelle. Aile plus courte, pattes plus courtes. — Iles Canaries.

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

- abietina (Phyllosc.) 357.
Acanthis 117, 123.
Acanthylis 317.
Accentor 217.
Accipiter 29.
Accipitres 3.
accipitrinus (Otus) 39.
Acredula 295.
Acrocephalus 237.
Actitis 407.
Actiturus 399.
acuminata (Tringa) 393.
acuta (Dafila) 483.
adalberti (Aquila) 7.
adamsi (Colymb.) 503.
Ædon 231.
Ægialites 273.
Ægithalus 295.
ægocephala (Limosa) 383, 385.
egyptiaca (Chenal.) 478.
egyptius (Caprim.) 321.
egyptius (Merops) 58.
egyptius (Milvus) 19.
egyptius (Pluvian.) 369.
æruginosus (Circus) 29.
æsalon (Falco) 25.
æthereus (Phaet.) 439.
æthiopica (Ibis) 131.
affinis galilejensi (Apus) 317.
affinis (Larus) 457.
affinis (Sterna) 465.
africana (Carduelis) 117.
africana (Coturn.) 357.
agricola (Acroceph.) 241.
Agrobates 231.
Agrodroma 156, 157.
Alauda 141.
Alaudidæ 141.
alaudipes (Certhil.) 151.
alba (Ciconia) 428.
alba (Herod.) 423.
alba (Motacilla) 169.
albeola (Clang.) 491.
albellus (Mergus) 499.
albicilla (Haliæetus) 13.
albifrons (Anser) 475.
albigula (Otocoris) 148.
albiatriata (Sylvia) 227.
albus (Lagopus) 337.
Alca 509.
alchata (Pterocl.) 331.
Alcedinidæ 59.
Alcedo 59.
aleyon (Ceryle) 58.
aldrovandi (Scops) 40.
alexandrinus (Ægial.) 373.
alle (Mergulus) 507.
alleni (Porph.) 415.

Alcemon 151.
 Alopochen 479.
 alpestris (Eremoph.) 147.
 alpestris (Turdus) 185.
 alpicola (Montifr.) 115.
 alpina (Citrinella) 120.
 alpina (Tringa) 391.
 alpinus (Accentor) 216.
 alpinus (Picoïdes) 516.
 alpinus (Pyrrhocorax) 77.
 Aluco 37.
 aluco (Syrnium) 37.
 amantum (Erythros.) 101.
 americana (Marec.) 483.
 americanus (Coccyzus) 55.
 Amnicola 245, 244.
 Ampelidæ 303.
 Ampelis 303.
 Anas 481.
 anæsthea (Sterna) 468.
 Anatidæ 473.
 anglica (Loxia) 105.
 anglica (Sterna) 465.
 anglicus (Dendrocopus) 45.
 anglorum (Puff.) 445.
 anglorum (Regulus) 267.
 angustirostris (Marm.) 487.
 Anous 465.
 Anser 475.
 anser (Ans.) 475.
 Anthoscopus 301.
 Anthropoïdes 419.
 antigone (Grus) 418, 419.
 Anthus 157.
 aphrodite (Parus) 271.
 apiaster (Merops) 57.
 apivorus (Pernis) 19.
 apricarius (Pluvialis) 368.

Apus 313.
 apus (Apus) 313.
 aquaticus (Acroceph.) 241.
 aquaticus (Anthus) 161.
 aquaticus (Cinclus) 177.
 aquaticus (Rall.) 411.
 Aquila 5.
 aquilus (Tachyp.) 437.
 arborea (Lullula) 143.
 arboreus (Anthus) 158.
 Archibuteo 17.
 arctica (Fratere.) 507.
 arcticus (Colymb.) 503.
 Ardea 421.
 Ardeidæ 421.
 Ardeiralla 425.
 Ardeola 425.
 Ardetta 425.
 arenaria (Calidr.) 389.
 arenarius (Pterocl.) 333.
 argentatus (Larus) 457.
 Arquatella 389.
 arquatus (Numen.) 381.
 arra (Uria) 504.
 arrigoni (Astur) 512.
 arrigoni (Passer) 95.
 arundinacea (Calamoh.) 238.
 arundinaceus (Acroceph.) 227.
 arvensis (Alauda) 141.
 ascalaphus (Otus) 38.
 asiaticus (Egial.) 375.
 Asio 39.
 assimilis (Parus) 291.
 assimilis (Puff.) 445.
 Astur 27.
 ater (Parus) 273.
 aterrimus (Turdus) 183.
 Athene 35.

atra (Fulica) 417.
 atricapila (Muscic.) 303.
 atricapilla (Sylvia) 221.
 atricapillus (Parus) 287.
 atricilla (Larus) 460.
 atrigularis (Turdus) 187.
 audouini (Larus) 459.
 aurantiiventris (Chloris) 109.
 aureola (Emberiza) 127.
 aureus (Turdus) 189.
 auricularis (Otogyps) 3.
 aurita (Saxicola) 210.
 auritus (Podic.) 501.
 auritus (Turtur) 326.
 avocetta (Recurv.) 409.
 Aythya 487.
 azorensis (Turdus) 181.
 azorica (Columba) 323.
 azoricus (Regulus) 267.

B

badius (Lanius) 87.
 bailloni (Porz.) 413.
 bairdi (Tringa) 393.
 balcanica (Eremoph.) 149.
 balcanicus (Sturnus) 93.
 baldani (Coturn.) 357.
 Balearica 421.
 balearica (Loxia) 107.
 barbarus (Falco) 23.
 barbatus (Gypaetus) 5.
 Bartramia 396.
 bassana (Sula) 435.
 bella (Sylvia) 227.
 beloni (Tad.) 480.
 Berniela 476.
 berniela (Branta) 477.

bertheloti (Anthus) 157.
 bewicki (Cygnus) 473.
 bianchii (Parus) 291.
 biarmicus (Panurus) 293.
 Biblis 310, 311.
 bifasciata (Loxia) 107.
 bilopha (Eremoph.) 147.
 blakistoni (Anthus) 163.
 boarula (Motacil.) 171.
 boeri (Ayth.) 489.
 boetica (Calandr.) 147.
 bolli (Columba) 325.
 Bombycilla 303.
 bonapartei (Larus) 460.
 Bonasa 347.
 bonasia (Bonasa) 347.
 bonellii (Phyllosc.) 263.
 borealis (Linaria) 124.
 borealis (Motacilla) 167.
 borealis (Num.) 383.
 borealis (Parus) 289.
 borealis (Phyllosc.) 263.
 borealis (Trogl.) 253.
 borin (Sylvia) 223.
 boschas (Anas) 481.
 Botaurus 427.
 brachydactyla (Calandr.) 143.
 brachydactyla (Certhia) 6-7.
 brachyotus (Otus) 38.
 Brachypodidae 179.
 brachyrhynchus (Ans.) 475.
 Branta 477.
 brehmorum (Apus) 315.
 brevirostris (Picus) 515.
 britannica (Certhia) 67.
 britannica (Sitta) 63.
 britannicus (Carduel.) 117.
 britannicus (Cinclus) 173.

britannicus (Falco) 511.
 britannicus (Parus) 273.
 brenta (Bernicla) 476.
 brevipes (Astur.) 29.
 brevipes (Æstel.) 443.
 brutius (Passer) 97.
 bubo (Bubo) 41.
 Bubulcus 423.
 Budytes 165.
 bulweri (Thalass.) 442.
 Bulweria 443.
 Buphus 424.
 Butalis 305.
 Buteo 15.
 buturlini (Picus) 515.

C

cabaret (Linaria) 127.
 cabreræ (Turdus) 181.
 Caccabis 351.
 cachinnans (Larus) 459.
 cælebs (Fringilla) 111.
 cærulecula (Cyanecula) 200.
 cæruleus (Elanus) 21.
 cæruleus (Parus) 275.
 cæruleus (Porph.) 415.
 cæsia (Emberiza) 133.
 cæsia (Sitta) 63.
 cæsia (Porph.) 414.
 cahirica (Hirundo) 308.
 Calamodyta 237.
 Calamoherbe 237.
 Calamophilus 293.
 calandra (Emberiza) 129.
 calandra (Melanocor.) 151.
 Calandrella 143.
 Calcarius 139.

Calidris 389.
 calidris (Totanus) 401.
 caligata (Hippol.) 237.
 Calliope 197, 198.
 calliope (Luscinia) 199.
 cambayensis (Turtur) 331.
 campestris (Anthus) 157.
 campestris (Motacil.) 169.
 camtschatkensis (Call.) 198.
 canadensis (Sitta) 63.
 canagica (Bernicla) 478.
 canariensis (Calandr.) 145.
 canariensis (Corvus) 73.
 canariensis (Dendrocopus) 45.
 canariensis (Fringilla) 113.
 canariensis (Phyllosc.) 257.
 canariensis (Tinn.) 512.
 canarius (Serinus) 123.
 Cancrophagus 425.
 candicans (Hierofalco) 21.
 candidus (Him.) 411.
 canescens (Linaria) 126.
 Cannabina 123.
 cannabina (Cannab.) 124.
 canneti (Emberiza) 135.
 Canorus (Cuculus) 53.
 capensis (Asio) 39.
 capensis (Procell.) 441.
 caprata (Prat.) 217.
 Caprimulgida 319.
 Caprimulgus 319.
 cantarella (Alauda) 141.
 cantiaca (Sterna) 467.
 cantianus (Charad.) 372.
 canus (Gecin.) 51.
 canus (Larus) 459.
 Canutus 389.
 canutus (Tringa) 389.

carbo (Phalac.) 437.
 Carduelis 117.
 carduelis (Card.) 117.
 Caricicola 245.
 carolinensis (Nett.) 485.
 Carpodacus 103.
 caryocatactes (Nucifraga) 77.
 casarea (Tad.) 481.
 caspia (Sterna) 465.
 caspius (Anthosc.) 301.
 caspius (Garrulus) 83.
 caspius (Tetraog.) 349.
 castaneiceps (Emberiza) 133.
 castor (Mergus) 497.
 castro (Oceanod.) 449.
 catarrhactes (Stereor.) 451.
 caucasica (Athene) 512.
 caucasica (Ember.) 520.
 caucasica (Nyctala) 513.
 caucasica (Galerida) 133.
 caucasica (Perd.) 355.
 caucasica (Prunella) 219.
 caucasica (Sitta) 63.
 caucasicus (Cinclus) 177.
 caucasicus (Rubec.) 195.
 caucasicus (Tetraog.) 349.
 caudacuta (Chat.) 317.
 caudata (Pica) 78.
 caudatus (Ægithalus) 295.
 cenchris (Falco) 27.
 Certhia 65.
 Certhiide 61.
 Certhilauda 151.
 certhiola (Locust.) 243.
 cervinus (Anthus) 161.
 Ceryle 59.
 cetti (Cettia) 249.
 Cettia 249.

cettioides (Cettia) 249.
 Chætura 317.
 Charadriide 367.
 Chaulelasmus 483.
 Chelidon 309, 310.
 Chen 479.
 Chenalopex 479.
 cherrug (Hierofalco) 23.
 Chersophilus 153.
 Chlamydotis 363.
 Chloris 109.
 chloris (Chloris) 109.
 chlororhynchus (Diom.) 438.
 Choetusia 377.
 christophi (Corvus) 518.
 chrysactus (Aquila) 5.
 Chrysomitris 119.
 chrysophrys (Emberiza) 133.
 chukar (Caccabis), 351.
 cia (Emberiza) 131.
 circia (Querq.) 485.
 Cinclide 173.
 cinclus (Cinclus) 173, 176.
 cinclus (Pelidna) 390.
 cinctus (Parus) 283.
 cineraceus (Circus), 30.
 cinerea (Alauda) 141.
 cinerea (Ardea) 421.
 cinerea (Curruca) 224.
 cinerea (Grus) 419.
 cinerea (Sterna) 352.
 cinerea (Terek.) 385.
 cinereocapilla (Motacil.) 167.
 cinereus (Anser) 474.
 cinereus (Puffin.) 442.
 cioides (Emberiza) 133.
 Circaetus 15.
 Circus 29.

- cirrus (Emberiza) 131.
 cirris (Dendrocopus) 45.
 cissa (Dendrocopus) 45.
 Cisticola 249.
 cisticola (Cistic.) 249.
 Citrinella 121.
 citrinella (Citrinel.) 121.
 citrinella (Emberiza) 131.
 citreola (Motacil.) 169.
 Clamator 53.
 clanga (Aquila) 11, 9.
 Clangula 491.
 clarkei (Turdus) 191.
 clypeata (Spatula) 481.
 coccinea (Pyrrhula) 98.
 Coccothraustes 109.
 coccothraustes (Cocc.) 109.
 Coccytes 53.
 Coccyzus 55.
 Colæus 75.
 colchicus (Picus) 516.
 Columba 323.
 Columbidae 323.
 columbina (Bulwer.) 443.
 collaris (Colæus) 75.
 collaris (Fulig.) 489.
 collaris (Grus) 419.
 collaris (Muscic.) 307.
 collaris (Prunella) 217.
 collurio (Lanius) 87.
 collybita (Phyllosc.) 257.
 Colymbidae 501.
 Colymbus 501.
 comatus (Buph.) 424.
 comminutus (Picus).
 communis (Falco) 22.
 communis (Cot.) 356.
 communis (Parus) 285.
 communis (Sylvia) 225.
 concolor (Falco) 25.
 conspicillata (Sylvia) 227.
 cooki (Pica) 79.
 Coracias 55.
 corax (Corvus) 69.
 corniculata (Fratere.) 509.
 cornix (Corvus) 73.
 coromanda (Bubulc.) 423.
 coronatus (Phyllosc.) 265.
 corone (Corvus) 73.
 corsa (Certhia) 67.
 corsicana (Citrinella) 121.
 corsus (Parus) 271.
 Corvus 69.
 Corydalla 157.
 Corydus 153.
 Corythus 103.
 Cosmonetta 491.
 Cotyle ou Cotyle 311.
 Coturnix 357.
 coturnix (Coturn.) 357.
 Cractes 83.
 crassirostris (Sylvia) 225.
 crecca (Nettion) 485.
 crepidatus (Sterc.) 453.
 Crex 413.
 crex (Crex) 413.
 crispus (Pelec.) 435.
 crissoleucus (Picoïdes) 516.
 cristata (Fulica) 417.
 cristata (Fulig.) 486.
 cristata (Galerida) 153.
 cristatus (Lanius) 89.
 cristatus (Parus) 281.
 cristatus (Phalac.) 436.
 cristatus (Podic.) 499.
 cristatus (Regulus) 266.

cristatus (Vanell.) 378.
 Cuculidæ 53.
 cucullatus (Mergus) 197.
 cucullatus (Telephonus) 89.
 Cuculus 53.
 Curruca 221.
 curruca (Sylvia) 223.
 Cursorius 369.
 curvirostra (Loxia) 105.
 cyanea (Petroc.) 206.
 cyanea (Pica) 79.
 Cyanecula 201.
 cyanecula (Cyanec.) 201.
 cyaneus (Circus) 30.
 Cyanistes 271.
 Cyanopica 79.
 Cyanopoliis 79.
 cyanus (Parus) 281.
 Cynchramus 127, 134, 136, 138.
 Cypselidæ 313.
 Cypselus 313.

D

dacotæ (Pratinç.) 215.
 Dafila 483.
 damascena (Perdix) 353.
 Dandalus 193.
 danfordi (Dendrocopus) 49, 516.
 dartfordiensis (Meliz.) 231.
 Daulias 197.
 dauma (Turdus) 189.
 daurica (Chelidon) 309.
 decaocto (Turtur) 329.
 degener (Parus) 277.
 Dendrocoptes 43.
 Dendrocopus 43.
 deserti (Saxicola) 209.

deserti (Sylvia) 223.
 desertorum (Buteo) 17.
 desertorum (Certhil.) 150.
 Diomedea 439.
 discors (Querq.) 485.
 distincta (Calendrella) 521.
 dombrowskii (Motacil.) 165.
 domesticus (Passer) 95.
 dominicus (Charadr.) 371.
 dougalli (Sterna) 469.
 dresseri (Parus) 287.
 Dryobates 43.
 Dryocopus 43.
 Dryopicus 42.
 dubius (Ægial.) 373.
 dumetorum (Acroceph.) 239.

E

eburnea (Pagoph.) 455.
 Ectopistes 326.
 Egretta 423.
 elæica (Hippol.) 234.
 Elanus 21.
 Elasas 21.
 elegans (Carduelis) 116.
 elegans (Loxia) 109.
 eleonora (Falco) 25.
 Emberiza 127.
 Eniconetta 493.
 Entolmaetus 13.
 enucleator (Pinicola) 103.
 eremita (Ibis) 431.
 Eremophila 147.
 Erismatura 497.
 Erithacus 193.
 erithacus (Phœnic.) 203.
 Erythacus 201.

erythrinus (Carpodacus) 103.
 erythrogaster (Phoen.) 205.
 erythrogenys (Emberiza) 131.
 erythrophthalmus (Coccyzus) 55.
 Erythropus 27.
 erythropus (Anser) 477.
 Erythrospiza 101.
 Erythrosterna 305.
 Eudromias 371.
 Euhyas 377.
 Eunetta 487.
 europæa (Miliaria) 128.
 europæa (Pyrrhula) 99.
 europæa (Sitta), 61.
 europæus (Ægithalus) 295.
 europæus (Caprim.) 319.
 europæus (Francol.) 351.
 evermanni (Phyllosc.) 255.
 excubitor (Lanius) 85.
 exigua (Petronia) 518.
 exilipes (Linaria) 127.
 exsul (Pylosc.) 259.
 exulans (Diom.) 439.
 exustus (Pterocl.) 335.

F

fabalis (Anser) 475.
 falcata (Eunett.) 487.
 falcinellus (Ibis) 431.
 Falco 23.
 Falconidæ 5.
 fallax (Lanius) 85.
 familiaris (Agrob.) 233.
 familiaris (Certhia) 65.
 familiaris (Erithacus) 193.
 familiaris (Lullula) 521.
 fairoensis (Sturnus) 91.
 fasciatus (Nisaetus) 13.
 Fedoa 367.
 feldeggi (Falco) 23.
 ferina (Ayth.) 489.
 ferox (Buteo) 17.
 ferus (Cygnus) 472.
 fissipes (Hydroch.) 470.
 flammea (Strix) 37.
 flava (Eremoph.) 147.
 flava (Motacilla) 165.
 flavescens (Lullula) 143.
 flavipes (Totan.) 405.
 flavirostris (Cannabina) 125.
 fluviatilis (Locust.) 243.
 fluviatilis (Podic.) 501.
 fluviatilis (Sterna) 467.
 formosa (Nett.) 487.
 Fratercula 507.
 Francolinus 349.
 francolinus (Francol.) 349.
 Fregilus 77.
 freti-hudsonis (Bot.) 426.
 Fringilla 111.
 Fringillaria 127, 128.
 Fringillidæ 95.
 Fringilloïdes 127, 129.
 frugilegus (Corvus) 73.
 fuerteventuræ (Houb.) 363.
 fuerteventuræ (Upupa) 517.
 Fulica 417.
 fulicarius (Phal.) 409.
 fuliginosa (Sterna) 469.
 fuliginosus (Puff.) 446.
 Fuligula 487.
 fuligula (Ayth.) 489.
 Fulmarus 441.
 fulva (Aquila) 4.
 fulvescens (Aquila) 11.

fulvus (Gyps) 3.
 fulvus (Pluvialis) 370, 371.
 funerea (Surnia) 31, 33.
 furcatus (Nauclerus) 20.
 fusca (Edem.) 495.
 fuscatus (Turdus) 187.
 fuscicollis (Tringa) 395.
 fuscus (Larus) 157.
 fuscus (Totanus) 401.

G

gaetkei (Cyanecula) 201.
 galactodes (Agrob.) 231.
 Galerida 153.
 gallicus (Circæetus), 15.
 gallicus (Cursor.) 369.
 Gallinago 387.
 gallinago (Gall.) 387.
 gallinula (Gallinag.) 389.
 Gambetta 401.
 garrula (Sylvia) 220.
 Garrulus 81.
 garrulus (Bombyc.) 303.
 garrulus (Coracias) 55.
 Garzetta 423.
 garzetta (Herod.) 423.
 Gecinus 51.
 gelastes (Larus) 459.
 gengleri (Fring.) 519.
 geoffroyi (Ægial.) 375.
 germanicus (Falco) 511.
 gibraltariensis (Phœn.) 205.
 githaginea (Erythros.) 101.
 glacialis (Colymb.) 501.
 glacialis (Hareld.) 493.
 glacialis (Procell.) 441.
 glandarius (Coccytes) 53.

glandarius (Garrulus) 81.
 Glarcola 365.
 glarcola (Totan.) 403.
 Glaucidium 35.
 Glaucion (Clang.) 491.
 glaucus (Larus) 155.
 glaux (Athene) 35.
 glitschi (Aquila) 9.
 Glottis 401.
 glottis (Totanus) 401.
 gracilirostris (Strix) 513.
 Graculus 77.
 graculus (Phalac.) 437.
 graculus (Pyrrhocorax) 77.
 græca (Ember.) 520.
 græca (Perdix) 350.
 græca (Scops) 514.
 Grallæ 361.
 granti (Sturnus) 91.
 gravis (Puff.) 445.
 gregaria (Chœtus.) 377.
 griseigena (Podic.) 499.
 griseiventris (Bonasa) 317.
 griseus (Macroch.) 385.
 griseus (Puff.) 447.
 griseus (Totanus) 400.
 grisola (Butalis) 306.
 Gruidæ 419.
 Grus 419.
 grus (Grus) 419.
 grylle (Uria) 505.
 gustavi (Anthus) 159.
 Gypæctus 5.
 Gyps 3.
 gyrfalco (Hierofalco) 21.

H

Hæmatopus 379.

hæsitata (Cestrel.) 441.
 Halcyon 61.
 Haliaetus 13.
 haliaetus (Pandion) 15.
 Harelda 493.
 haterti (Picus) 514.
 heineken (Sylvia) 221.
 heini (Calandr.) 145.
 heliaca (Aquila) 7.
 hellmayri (Petronia) 99.
 Helodromas 401.
 Hemipodius 359.
 Herbivocula 247.
 Herodias 423.
 Hiaticula 373.
 hiaticula (Ægial.) 373.
 hibernans (Pratincl.) 215.
 hibernicus (Cinclus) 175.
 Hieractus 13.
 Hierofalco 21.
 Himantopus 411.
 himantopus (Him.) 411.
 Hippolais 233.
 hirtensis (Trogl.) 253.
 Hirundinidae 309.
 Hirundo 311, 308.
 hirundo (Sterna) 466.
 hispana (Loxia) 105.
 hispaniæ (Turdus) 181.
 hispanica (Caccab.) 353.
 hispanica (Saxic.) 211.
 hispaniensis (Perd.) 355.
 hispaniolensis (Passer) 95.
 hispanus (Corvus) 71.
 hispanus (Picus) 514.
 hispida (Alcedo) 59.
 histrionica (Cosmon.) 491.
 holboelli (Podic.) 499.

holbölili (Linaria) 125.
 homeyeri (Lanius) 85.
 homeyeri (Sitta) 61.
 Hoplopterus 377.
 hornemanni (Linaria) 127.
 hortensis (Sylvia) 220, 225.
 hortulana (Emberiza) 133.
 hortorum (Picus) 515.
 Houbara 363.
 hudsonicus (Num.) 382.
 hungaricus (Bubo) 513.
 hybrida (Hydroch.) 471.
 Hydrobata 172, 173.
 Hydrochelidon 471.
 hyperboreus (Chen) 479.
 hyperboreus (Lagop.) 339.
 hyperboreus (Phal.) 409.
 Hypolais 232.
 hypoleucus (Actit.) 407.
 hyrcanus (Trogl.) 253.

I J K

Ibis 431.
 ibis (Bubulcus) 423.
 ichnusæ (Garrulus) 81.
 ichthyæus (Larus) 461.
 icterina (Hippol.) 233.
 igneus (Falcin.) 430.
 ignicapillus (Regul.) 269.
 iliacus (Turdus) 188.
 illyricus (Apus) 315.
 immutabilis (Cygnus) 472.
 impennis (Alca) 509.
 imperialis (Aquila) 6.
 indicus (Coracias) 57.
 infaustus (Perisoreus) 83.
 insularum (Edicn.) 367.

interni (Regulus) 269.
 interpres (Strepsilas) 381.
 irbyi (Egithalus) 297.
 isabellina (Saxic.) 209.
 isabellinus (Lanius) 89.
 islandica (Acanthis) 519.
 islandica (Clang.) 491.
 islandicus (Corvus) 71.
 islandicus (Hierofalco) 21.
 islandicus (Trogl.) 251.
 italiae (Passer) 95.
 italicus (Parus) 287.
 lxs 179.
 jirkowi (Sturnus) 93.
 jourdaini (Lanius) 518.
 juniperorum (Tetr.) 343.
 Jynx 53.
 kleinschmidti (Anthus) 163.
 kleinschmidti (Cucul.) 517.
 kleinschmidti (Garrulus) 81.
 kleinschmidti (Parus) 289.
 kobylini (Lanius) 89.
 koenigi (Caccabis) 353.
 koenigi (Lanius) 85.
 koenigi (Trogl.) 523.
 kollibayi (Apus) 313.
 krynicki (Garrulus) 83.
 kuhli (Puff.) 443.

L

Lagopus 337.
 lagopus (Archibuteo) 17.
 lanarius (Falco) 22.
 lanceolata (Locust.) 245.
 Laniidæ 85.
 Lanius 85.
 lanzarotæ (Anthus) 522.

lanzarotæ (Buteo) 511.
 lapponica (Lim.) 385.
 lapponica (Ulula) 37.
 lapponicus (Calcarius) 139.
 Laridæ 451.
 Larus 155.
 laurivora (Columba) 325.
 lentiginosus (Bot.) 427.
 leptonyx (Corvus) 71.
 Lestris 451.
 leucocephala (Emberiza) 133.
 leucocephala (Erism.) 497.
 leucocephalus (Haliaetus) 13.
 leucogastra (Sylvia) 229.
 leucogeranus (Grus) 419.
 leucomela (Saxic.) 210.
 leuconotus (Dendrocopus) 45.
 leucophæus (Corvus) 70.
 leucophthalmus (Larus) 463.
 leucopsis (Branta) 477.
 leucoptera (Hydroch.) 471.
 leucoptera (Loxia) 107.
 leucopterus (Larus) 455.
 leucorodia (Plat.) 429.
 leucorrhœa (Oceanod.) 449.
 leucorrhœa (Saxic.) 209.
 leucoryphus (Haliaetus) 13.
 leucura (Chæetus) 377.
 leucurus (Saxic.) 215.
 Ligurinus 108.
 lilfordi (Dendrocopus) 47.
 Limicola 397.
 Limosa 383.
 limosa (Limosa) 383.
 Linaria 125, 123.
 linaria (Linaria) 125.
 Linota 123.
 linota (Cannabina) 122.

lithofalco (Falco) 24.
 littoralis (Anthus) 165.
 livia (Columba) 327.
 Lobipes 409.
 lomvia (Uria) 505.
 longicauda (Bartr.) 399.
 longicaudus (Stere.) 452.
 longirostris (Parus) 285.
 longirostris (Podic.) 498.
 Lophophanes 271.
 lorenzi (Phyllosc.) 259.
 loudoni (Sturnus) 93.
 Loxia 105.

M

macedonicus (Ægith.) 297.
 Machetes 399.
 macqueeni (Houb.) 363.
 macrodactyla (Certhia) 65.
 Macrorhamphus 385.
 macrorhynchus (Nucifr.) 79.
 macrura (Sterna) 467.
 macularius (Actit.) 407.
 maculata (Aquila) 9.
 maculata (Tringa) 391.
 madaraszi (Chloris) 518.
 madeirensis (Anthus) 157.
 madeirensis (Columba) 313.
 madeirensis (Petronia) 99.
 madeirensis (Regul.) 269.
 maderensis (Fringilla) 111.
 maltæ (Passer) 97.
 mandti (Uria) 507.
 mansuetus (Cygnus) 472.
 major (Accipiter) 29.
 major (Carduelis) 119.
 major (Ægithalus) 299.

major (Gallinag.) 387.
 major (Lagopus) 337.
 major (Luscinia) 198.
 major (Parus) 271.
 major (Picus) 43.
 major (Puff.) 444.
 major (Pyrrhula) 99.
 Mareca 483.
 marila (Ayth.) 489.
 marina (Preg.) 436.
 marina (Pelagod.) 449.
 marinus (Larus) 455.
 maritima (Tringa) 390.
 Marmaronetta 487.
 martius (Picus) 43.
 maruetta (Porz.) 413.
 maura (Pratincola) 217.
 maximus (Bubo) 40.
 Mecistura 295.
 media (Sterna) 467.
 mediterranea (Cannabina) 123.
 medius (Dendrocopus) 47.
 Megalornis 419.
 megarrhynchus (Lusc.) 199.
 melanocephala (Ard.) 421.
 melanocephala (Ember.) 129.
 melanocephala (Motac.) 169.
 melanocephala (Sylv.) 229.
 melanocephalus (Larus) 461.
 melanogaster (Cinclus) 172.
 melanoleuca (Saxic.) 211.
 Melanocorypha 151.
 melanope (Motacil.) 171.
 melanophrys (Diom.) 439.
 melanopogon (Luscin.) 245.
 melanoptera (Glar.) 365.
 melanotis (Milvus) 19.
 melanotos (Pelidna) 394.

melanotos (Pica) 79.
 melba (Apus) 315.
 Melizophilus 229.
 melophilus (Rubec.) 195.
 menetriesi (Buteo) 17.
 merganser (Merg.) 497.
 Mergulus 507.
 Mergus 197.
 meridionalis (Caprim.) 319.
 meridionalis (Chloris) 518.
 meridionalis (Cinclus) 177.
 meridionalis (Galerida) 155.
 meridionalis (Lanius) 85.
 meridionalis (Parus) 277.
 meridionalis (Serinus) 120.
 Meropidae 57.
 Merops 57.
 Merula 181.
 merula (Turdus) 181.
 mesoleuca (Phœnic.) 205.
 microrhynchus (Rubec.) 193.
 migrans (Milvus) 19.
 migratorius (Turdus) 184.
 Miliaria 127, 128.
 miliaria (Emberiza) 129.
 milokosiewiczzi (Tetr.) 345.
 milvipes (Hierofalco) 23.
 Milvus 19.
 milvus (Milvus) 19.
 mimica (Luscinol.) 247.
 minor (Calandrella) 143, 145.
 minor (Cuculus) 517.
 minor (Cygnus) 472.
 minor (Dendrocopus) 47.
 minor (Lanius) 87.
 minor (Noctua) 34.
 minor (Turdus) 190.
 minuta (Ardetta) 125.

minuta (Porz.) 114.
 minuta (Sterna) 169.
 minuta (Tringa) 395.
 minutilla (Tringa) 395.
 minutus (Larus) 461.
 mitratus (Parus) 283.
 modularis (Prunella) 219.
 mogilnik (Aquila) 7, 9.
 mollesoni (Emberiza) 131.
 mollis (Gestrel.) 441.
 mollissima (Som.) 193.
 moltchanovi (Parus) 273.
 monachus (Vultur) 3.
 monedula (Colceus) 75.
 mongolicus (Egial.) 375.
 montanella (Prunella) 221.
 montanus (Parus) 291.
 montanus (Passer) 97.
 Monticola 207.
 Montifringilla 115.
 montifringilla (Fring.) 115.
 moquini (Hemat.) 379.
 moreleti (Fringilla) 111.
 morinellus (Eudrom.) 371.
 Mormon 507.
 Motacilla 165.
 Motacillidae 157.
 murina (Pyrrhula) 101.
 murinus (Apus) 315.
 Muscicapa 305.
 Muscicapidae 305.
 musicus (Cygnus) 473.
 musicus (Turdus) 188, 189.
 mutus (Lagop.) 339.

N

nævia (Aquila) 8.

nævia (Locustel.) 245.
 nævioïdes (Aquila) 12.
 nana (Cannabina) 125.
 nana (Carduelis) 117.
 nana (Sylvia) 223.
 Nauclerus 20.
 naumanni (Turdus) 187.
 neglectus (Phyllosc.) 259.
 Neophron 5.
 Nettion 485.
 neumanni (Galerida) 522.
 neumayeri (Sitta) 65.
 newtoni (Parus) 271.
 niger (Milvus) 18.
 nigra (Ciconia) 429.
 nigra (Hydroch.) 470, 471.
 nigra (Muscicapa) 304.
 nigra (Œdem.) 495.
 nigricollis (Podic.) 501.
 nigrostriata (Ember.) 520.
 nipalensis (Aquila) 7.
 Nisaetus 13.
 nisoria (Sylvia) 227.
 nisus (Accipiter) 29.
 nitidus (Phyllosc.) 261.
 nivalis (Montifr.) 115.
 nivalis (Plectroph.) 139.
 noctua (Athene) 35.
 norwegicus (Bubo) 513.
 noskæ (Pratincl.) 215.
 nubicus (Lanius) 87.
 Nucifraga 77.
 Numenius 381.
 Nyctala 35.
 Nyctea 33.
 nyctea (Nyctea) 33.
 Nyctiardea 427.
 nycticorax 427.

nycticorax (Nyct.) 427.
 nyroca (Ayth.) 489.

O

obscurus (Anthus) 163.
 obscurus (Parus) 275.
 obscurus (Puff.) 445.
 obscurus (Turdus) 191.
 occidentalis (Prunella) 221.
 occipitalis (Phyllosc.) 265.
 Oceanites 447.
 oceanicus (Oceanit.) 447.
 Oceanodroma 449.
 ochropus (Totan.) 405.
 ochruros (Phœnic.) 205.
 Œdemia, Oidemia 495.
 Œdicnemus 367.
 œdicnemus (Œdicn.) 367.
 œnanthe (Saxicola) 207.
 œnas (Columba) 325.
 Œstelata 441.
 ogliastræ (Parus) 275.
 olivaceus (Turdus) 184.
 olivetorum (Hippol.) 235.
 olor (Cygnus) 473.
 ombriosus (Parus) 279.
 onocrotalus (Pelec.) 435.
 opaca (Hippol.) 235.
 Oreocinclæ 189.
 orientalis (Aquila) 9.
 orientalis (Francol.) 351.
 orientalis (Parus) 524.
 orientalis (Phyllosc.) 263.
 orientalis (Turdus) 183.
 orientalis (Turtur) 329.
 Oriolidæ 179.
 Oriolus 179.

Orites 294.
 orphea (Carruca) 224.
 Ortygion 357.
 Ortygometra 413.
 ostralegus (Hemat.) 379.
 othmari (Emberiza) 135.
 Otididae 461.
 Otis 361.
 Otocoris 146.
 Otogyps 3.
 Otus 39.
 otus (Asio) 39.
 Oxyechus 375.

P Q

Pagophila 455.
 pallida (Galerida) 155.
 pallida (Hippol.) 235.
 pallidus (Asio) 513.
 pallidus (Turdus) 184.
 palmae (Fringilla) 113.
 palmensis (Parus) 279.
 Palmipedes 435.
 palumbarius (Astur) 27.
 palumbus (Columba) 323.
 palustris (Acroceph.) 239.
 palustris (Emberiza) 137.
 palustris (Parus) 285.
 Pandion 15.
 Panurus 293.
 par (Emberiza) 133.
 paradisea (Sterna) 466.
 paradoxus (Syrhapt.) 335.
 parasiticus (Stere.) 452, 453.
 Paridae 271.
 parroti (Picus) 514.
 Parus 271.

parva (Carduelis) 117.
 parva (Muscic.) 307.
 parvulus (Trogil.) 251.
 Passer 93.
 Passeres 43.
 Passerina 126, 127, 139.
 passerina (Surnia) 34.
 passerinum (Glaucidium) 35.
 Pastor 93.
 Pavoncella 399.
 pavonina (Bal.) 120.
 pelagica (Thalass.) 447.
 Pelagodroma 449.
 Pelecanidae 435.
 Pelidna 359.
 peloponesius (Parus) 524.
 Pendulinus 301.
 pendulinus (Anthosc.) 301.
 penelope (Mareca) 483.
 penicillata (Eremoph.) 149.
 pennatus (Nisaetus) 13.
 Perdix 350, 353.
 perdix (Perd.) 353.
 perenopterus (Neophron) 5.
 peregrinus (Falco) 23.
 Perisoreus 83.
 Pernis 19.
 persica (Noctua) 34.
 persicus (Merops) 59.
 perspicillata (Eidem.) 495.
 Petrocincla 206, 207.
 Petronia 97.
 petronia (Petronia) 97.
 petrosa (Caccabis) 353.
 Phaeton 439.
 Phalacrocorax 437.
 Phalaropus 109.
 Phasianidae 359.

- Phasianus 359.
 philadelphia (Larus) 461.
 philippinus (Charad.) 372.
 Philomela 197.
 philomelos (Turdus) 189.
 Phœnicopterus 433.
 Phœnicurus 203.
 phœnicurus (Phœnic.) 203.
 phœonotus (Parus) 275.
 phœopus (Num.) 383.
 phragmitis (Calamod.) 240.
 Phyllopneuste 255.
 Phyllopneustidæ 254.
 Phylloscopidæ 255.
 Phylloscopus 255.
 Pica 79.
 pica (Pica) 79.
 Picidæ 43.
 Picoïdes 49.
 Picus 42, 51.
 pilaris (Turdus) 185.
 pileata (Pyrrhula) 99.
 pinetorum (Gecinus) 516.
 pinetorum (Picus) 514.
 pinetorum (Tetr.) 341.
 Pinicola 103.
 pipra (Dendrocopus) 49.
 pispoletta (Alauda) 144, 145.
 pityopsittacus (Loxia) 107.
 pithyornus (Emberiza) 132, 133.
 Platalea 429.
 platyrhyncha (Limic.) 397.
 Plectrophanes 139.
 Plectrophenax 115, 139.
 pleschanka (Saxic.) 211.
 pleskei (Parus) 279.
 Pluvialis 368.
 pluvialis (Charadr.) 369.
 Pluvianus 369.
 pluvius (Gecinus) 517.
 Podiceps 499.
 Pœcile 271, 282.
 poelzami (Dendrocopus) 45.
 polatzeki (Calandr.) 145.
 polatzeki (Fringilla) 115.
 polyglotta (Hippol.) 235.
 pomathorinus (Stercor.) 451.
 pomerina (Aquila) 11.
 Porphyrio 415.
 Porzana 413.
 porzana (Porz.) 413.
 pratensis (Anthus) 161.
 pratensis (Crex) 413.
 Pratincola 213.
 pratincola (Glar.) 365.
 Procellaria 441.
 Procellaridæ 439.
 Progne 310.
 pronus (Gecinus) 517.
 proregulus (Phyllosc.) 265.
 provincialis (Melizoph.) 228.
 Prunella 217.
 Pseudoluscinia 243.
 Pterocles 331.
 Pteroclidæ 331.
 Pteroclidurus 331.
 Puffinus 443.
 pugnax (Pavonc.) 399.
 punicus (Falco) 25.
 purpurascens (Sturnus) 93.
 purpurea (Ard.) 421.
 purpurea (Progne) 310.
 pusilla (Emberiza) 137.
 pusillus (Serinus) 123.
 Pycnonotus 179.
 pygmæus (Phalac.) 437.

pyrenaeus (Cinclus) 173.
 Pyrrherodias 421.
 Pyrrhocorax 77.
 pyrrhocorax (Pyrrhoc.) 77.
 Pyrrhula 99.
 pyrrhuloides (Emberiza) 137.
 quadrifasciatus (Dendrocopos) 47.
 Querquedula 485.
 querquedula (Querq.) 485.

R

ralloides (Ard.) 123.
 Rallus 411.
 rapax (Aquila) 13.
 rayi (Motacilla) 167.
 Recurvirostra 409.
 regalis (Milvus) 18.
 Regulidae 255.
 Reguloïdes 255, 264.
 Regulus 267.
 regulus (Regul.) 267.
 reiseri (Emberiza) 137.
 religiosa (Ibis) 430.
 rhenanus (Parus) 289.
 Rhodostethia 453.
 Rhyacophilus 401.
 richardi (Anthus) 159.
 ridibundus (Larus) 463.
 ringvia (Uria) 505.
 Riparia 311.
 riparia (Riparia) 311.
 Rissa 463.
 robusta (Perd.) 355.
 rosea (Rhodos.) 452.
 roseus (Agithalus) 295.
 roseus (Carpodacus) 103.
 roseus (Pastor) 93.

roseus (Phoenix.) 433.
 rossi (Rhodos.) 452.
 rossica (Chloris) 519.
 rossicowi (Pyrrhula) 101.
 rossicus (Chloris) 519.
 rossorum (Prat.) 217.
 Rubecula 193.
 rubecula (Rubecc.) 193.
 rubetra (Pratine.) 213.
 rubicilla (Carpodacus) 103.
 rubicola (Pratine.) 215.
 rubra (Perdix) 350.
 rudis (Ceryle) 59.
 rufa (Caccabis) 351.
 rufa (Limosa) 384.
 rufa (Phyllopn.) 256.
 rufescens (Calandr.) 144, 145.
 rufescens (Linaria) 126.
 rufescens (Tringit.) 397.
 ruficollis (Branta) 477.
 ruficollis (Caprim.) 321.
 ruficollis (Turdus) 187.
 rufina (Ayth.) 487.
 rufitergum (Garrulus) 81.
 rufula (Chelidon) 309.
 rufus (Lanius) 86.
 rumaniae (Carduel.) 519.
 rupestris (Lagop.) 339.
 rupestris (Riparia) 313.
 rupicola (Turtur) 328.
 ruppelli (Sylvia) 229.
 russicus (Panurus) 293.
 rustica (Chelidon) 309.
 rustica (Emberiza) 139.
 rusticula (Scelopoz.) 387.
 Ruticilla 203.

S

- sabinei (Xema) 463.
 sacer (Hierofalco) 22.
 sahari (Emberiza) 129.
 salicarius (Parus) 287.
 saltator (Saxicola) 209.
 sancti-johannis (Dendrocopus) 47.
 sapsworthi (Cinclus) 177.
 Sarcogeranus 419.
 sarda (Noct.) 513.
 sardonius (Corvus) 73.
 sardus (Cinclus) 177.
 sardus (Corvus) 71.
 sardus (Garrulus) 81.
 sardus (Melizoph.) 231.
 sardus (Parus) 273.
 sardus (Rubec.) 195.
 saturnini (Sturnus) 93.
 saundersi (Sterna) 469.
 savignyi (Chelidon) 309.
 saxatilis (Caccabis) 351.
 saxatilis (Montic.) 207.
 Saxicola 207.
 scandiaca (Nyctea) 33.
 schoenicius (Emberiza) 135.
 schoenicola (Cisticola) 248.
 schoenobaenus (Acroc.) 241.
 schiebeli (Turdus) 522.
 schmitzi (Motacil.) 171.
 schwarzi (Herbiv.) 247.
 Scolopacidae 381.
 scolopacinus (Gallin.) 386.
 Scolopax 387.
 scops (Scops) 41.
 Scotiaptex 37.
 scotica (Alauda) 521.
 scotica (Loxia) 105.
 scoticus (Lagop.) 337.
 scoticus (Parus) 283.
 semipalmata (Symph.) 407.
 semitorquata (Muscic.) 305.
 senator (Lanius) 87.
 senegalensis (Turtur) 331.
 senegalus (Pterocl.) 333.
 senegalus (Telephonus) 89.
 septentrionalis (Colymb.) 503.
 septentrionalis (Picoïdes) 51.
 Serinus 121.
 serinus (Serinus) 121.
 serrator (Mergus) 497.
 setarius (Pterocl.) 331.
 setipes (Glaucid.) 512.
 sharpei (Gecinus) 51.
 sibilatrix (Phyllosc.) 261.
 sibirica (Melanocor.) 151.
 sibirica (Pœcile) 282.
 sibiricus (Pluv.) 370.
 sibiricus (Turdus) 187.
 siculus (Ægith.) 209.
 Sitta 61.
 smyrnensis (Halcyon) 61.
 solitarius (Montic.) 207.
 solitarius (Totan.) 403.
 solitarius (Turdus) 190.
 Somateria 493.
 Spatula 481.
 spatzi (Pratin.) 213.
 spectabilis (Som.) 496.
 spermologus (Colæus) 75.
 spinoletta (Anthus) 161.
 spinosus (Hopl.) 377.
 Spinus 119.
 spodiogena (Fringilla) 111.
 Squatarola 371.
 squatarola (Squat.) 371.

stagnatilis (Parus) 285.
 stagnatilis (Tot.) 402.
 stapazina (Saxic.) 210.
 Sterna 352.
 stellaris (Bot.) 127.
 stelleri (Enic.) 493.
 Stercorarius 451.
 Sterna 465.
 stolidus (Anous) 465.
 straminea (Locust.) 245.
 Strepsilas 381.
 strepera (Chaulel.) 483.
 streperus (Acroceph.) 239.
 striata (Muscic.) 307.
 striata (Tringa) 391.
 Strigidæ 33.
 striolata (Emberiza) 129.
 Strix 37.
 sturmi (Arde.) 125.
 Sturnus 91.
 subalpina (Prunella) 219.
 subalpina (Sylvia) 225.
 subarquata (Tringa) 391.
 subbuteo (Falco) 25.
 subruficollis (Tringit.) 397.
 subtilis (Alauda) 521.
 suecica (Cyanecula) 201.
 suevica (Cyanecula) 201.
 Sula 435.
 sulfurera (Motacilla) 170.
 superbus (Rubec.) 193.
 superciliosus (Phyllosc.) 265.
 Surnia 33.
 sylvaticus (Turnix) 359.
 sylvestris (Ans.) 474.
 sylvestris (Bonasa) 347.
 Sylvia 221.
 Symphemia 407.

Synoicus 356.
 syriaca (Agrob.) 231.
 swainsoni (Circus) 30.
 swainsoni (Turdus) 190.
 syriaca (Sitta) 64, 65.
 Syrnium 37.
 Syrrhaptès 335.

T

Tachypetes 437.
 Tadorna 481.
 tadorna (Tad.) 481.
 tarda (Otis) 361.
 tatarica (Melanoc.) 150.
 tauricus (Ægithalus) 297.
 tauricus (Sturnus) 93.
 techusii (Carduelis) 117.
 techusii (Emberiza) 135.
 techusii (Scops) 514.
 techusii (Prunella) 523.
 techusii (Yunx) 517.
 Telephonus 89.
 temmincki (Tringa) 397.
 teneriffæ (Parus) 277.
 teneriffæ (Regulus) 269.
 tengmalmi (Nyctala) 35.
 tenuirostris (Galerida) 153.
 tenuirostris (Num.) 383.
 tephronotus (Ægith.) 301.
 Terekia 385.
 Tetrao 341.
 Tetraogallus 349.
 Tetraonidæ 337.
 Tetrastes 347.
 Tetrax 361.
 tetrax (Otis) 361.
 tetrax (Tetrao) 343.

teydea (*Fringilla*) 113.
Thalassidroma 447.
thanneri (*Emberiza*) 129.
thanneri (*Picus*) 515.
theklae (*Galerida*) 155.
thyrrhenica (*Fring.*) 519.
thyrrhenica (*Muscic.*) 524.
tianschanicus (*Parus*) 281.
Tichodroma 69.
Timeliidae 254.
tingitanus (*Corvus*) 71.
Tinnunculus 27.
tinnunculus (*Falco*) 27.
tintillon (*Fringilla*) 113.
titithys (*Phœnic.*) 203, 204, 205.
torda (*Alca*) 509.
Totanus 401.
totanus (*Totan.*) 403.
torquata (*Pratine.*) 215.
torquata (*Tringa*) 391.
torquatus (*Turdus*) 183.
torquilla (*Yunx*) 53.
transvolgensis (*Nyct.*) 513.
tridactyla (*Rissa*) 463.
tridactylus (*Picoïdes*) 49.
Tringa 389.
Tringites 397.
tristis (*Phyllosc.*) 259.
trivialis (*Anthus*) 159.
trocax (*Columba*) 327.
trochilus (*Phyllosc.*) 255.
Troglodytes 251.
Troglodytes (*Trogl.*) 251.
Troglodytidae 251.
troile (*Uria*) 505.
Trypanocorax 73.
tschagra (*Telephonus*) 88.
turcomanus (*Bubo*) 513.

Turdidae 179.
Turdoïdes 178.
turdoïdes (*Calamoh.*) 236.
Turdus 181.
Turnicidae 359.
Turnix 359.
Turtur 327.
turtur (*Turt.*) 327.

U V W

ultramarinus (*Parus*) 277.
ultramontana (*Certhia*) 67.
Ulula 37.
ulula (*Surnia*) 33.
undatus (*Melizoph.*) 229.
undulata (*Houbara*) 363.
unicolor (*Apus*) 317.
unicolor (*Circus*) 30.
unicolor (*Sturnus*) 93.
Upupa 69.
uralense (*Syrnium*) 37.
uralensis (*Tetrao*) 341.
urbica (*Hirundo*) 311.
Uria 505.
urogallus (*Tetr.*) 341.
Utamania 509.
valachus (*Corvus*) 71.
Vanellus 379.
vanellus (*Vanell.*) 379.
varius (*Corvus*) 71.
varius (*Pluv.*) 370.
vespertinus (*Erythropus*) 27.
virgo (*Anthr.*) 419.
viridanus (*Phyllosc.*) 261.
viridanus (*Tetr.*) 345.
viridus (*Gecin.*) 51.
viscivorus (*Turdus*) 189.

vociferus (Oxyech.) 375.
 volge (Cyanecula) 203.
 volgensis (Carduelis) 119.
 volgensis (Tetr.) 343.
 vulgaris (Bufo) 13.
 vulgaris (Coecothr.) 109.
 vulgaris (Otus) 38.
 vulgaris (Pyrrhula) 98.
 vulgaris (Sturnus) 91.
 Vultur 3.
 Vulturide 3.
 weræ (Motacilla) 522.
 witheadi (Sitta) 63.
 whiterbyi (Rubec.) 195.

wolsterstolli (Astur) 512.

X Y Z

xanthomelaena (Saxic.) 211.
 Xema 163.
 yarrelli (Motacil.) 170.
 yelkouanus (Puff.) 445.
 yeltonensis (Melanocor.) 151.
 Yunx 53.
 Zaporna 113.
 zarudnyi (Acroceph.) 237.
 zetlandicus (Trog.) 251.
 zimmermannæ (Buteo) 17.

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

POUR SERVIR

59.82 (4)

DE COMPLÈMENT ET DE SUPPLÉMENT

A L'ORNITHOLOGIE EUROPÉENNE

De DEGLAND et GERBE (1867)

PAR

E.-L. TROUESSART

PROFESSEUR DE ZOOLOGIE AU MUSÉUM NATIONAL DE PARIS

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINCKSIECK

LÉON LHOMME, SUCCESSEUR

3, RUE CORNEILLE, 3

—
1912

Tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous pays.

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINCKSIECK

Léon LHOMME, Succ^r — 3, Rue Corneille, 3 — PARIS

GUINIER

ATLAS DES ARBRES

Arbustes, Arbrisseaux et Sous-Arbrisseaux

Croissant spontanément en France et dans les régions limitrophes.

Paraît en 28 livraisons, contenant chacune 5 fascicules. Chaque livraison comprend 32 pages de texte, 5 planches coloriées reproduites par le procédé de trichromie et 5 ou 6 planches noires.

Cet ouvrage, qui ne comptera pas moins de 900 pages de texte et de 280 planches, dont 140 en couleurs, est mis à la portée de tous par le prix très réduit de la souscription.

Prix de souscription à l'ouvrage entier : 18 francs.

Ce prix sera augmenté dès que la souscription sera terminée.

Un spécimen est envoyé sur demande.

MASCLEF

Histoire Naturelle Cynégétique de France

ET DES PAYS LIMITROPHES

*Gibier et Sauvagine — Animaux auxiliaires de la Chasse
Ennemis du Gibier*

100 planches en couleurs et de nombreuses figures dans le texte.

Prix de souscription : 24 francs.

En deux versements égaux de 12 francs.

Une remise de 4 francs est faite aux souscripteurs qui paient la souscription entière en une seule fois. Dès que la souscription sera close, le prix de l'ouvrage sera augmenté.

Demander prospectus et une planche spécimen.

KEHRIG

L'Oiseau et les Récoltes

La destruction en masse des petits oiseaux a rompu l'harmonie de la nature, les insectes qui leur servaient de nourriture détruisent maintenant nos récoltes ; il est temps d'arrêter le carnage et de permettre à l'oiseau de se reproduire en paix : c'est vers ce résultat que tend l'ouvrage de M. KEHRIG.

In-8, 101 pages de texte, 30 figures. Prix : 1 fr. 50

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINCKSIECK

Léon LHOMME, Succ^r — 3, Rue Corneille, 3 — PARIS

BIBLIOTHÈQUE DE POCHE DU NATURALISTE

Pour la vulgarisation des sciences naturelles

Je signale aux naturalistes embarrasés pour indiquer à des débutants ou à des gens du monde des ouvrages d'histoire naturelle simples et compréhensibles, ma **Bibliothèque de Poche du Naturaliste**, dont le but est de faire connaître au grand public ce qui l'intéresse surtout, c'est-à-dire les plantes et les animaux *les plus répandus* de la France et des pays avoisinants.

Grâce au format, aux nombreuses planches en couleurs et au texte attrayant et instructif, ces volumes ont conquis rapidement la faveur du public. *Voici les titres parus :*

Plantes des Champs, des prairies et des bois.

Série	I.	Texte et 151 planches coloriées et noires,	6 ^e édition.
—	II.	— 151 — — — —	3 ^e —
—	III.	— 128 — — — —	2 ^e édition et Table des 3 séries.
—	IV.	— 128 — — — —	1 ^{re} — — — 4 —

Plantes des Alpes.

Série	I.	325 espèces sur 144 planches coloriées ou en noir.
—	II.	265 — — 140 — — —
—	III.	183 — — 144 — — —

Oiseaux de France, Belgique et Suisse.

Série	I.	Texte et 76 planches coloriées et noires,	2 ^e édition.
—	II.	— 89 — — — —	—

Insectes de France, utiles ou nuisibles.

Texte et 322 figures coloriées sur 72 planches, 2^e édition.

Papillons de France, Suisse et Belgique.

Texte et 280 figures coloriées sur 72 planches, 2^e édition.

Coquilles des côtes de France.

Texte et 235 figures coloriées et noires sur 72 planches, 2^e édition.

Poissons des eaux douces de France, etc.

Texte et 110 figures coloriées et noires sur 72 planches.

Plantes utiles des Pays chauds.

Texte et 100 planches coloriées et noires.

Flora du Littoral méditerranéen.

Texte et 96 planches coloriées et 4 noires.

Fleurs des Jardins les plus faciles à cultiver.

Texte et 128 planches coloriées, 2^e édition.

Arbustes et Arbrisseaux les plus faciles à cultiver.

Texte et 128 planches coloriées.

Champignons de France.

Série	I.	Texte et 64 planches coloriées.
—	II.	— 64 — — — et 4 noires.

Poissons de mer, de France et Belgique.

Texte et 72 planches coloriées.

Mammifères de France, Suisse et Belgique.

Texte et 48 planches coloriées, figures noires.

Chaque volume, relié toile, se vend 7 francs franco.

Demander Prospectus et Spécimens à M. Léon LHOMME, 3, rue Corneille, PARIS

Trousseart, E. L.
1912 58

870. blue c10

870.

AMNH LIBRARY

100104428