QK

257

.H522

1919

Hicken

Estudos Botánicos

CRISTÓBAL M. HICKEN

ESTUDIOS BOTÁNICOS

PRESENTADOS EN LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE LA SOCIEDAD*

ARGENTINA DE CIENCIAS NATURALES : TUCUMÁN, 1916

(SECCIÓN BOTÁNICA, PÁG. 187, 233, 238)

La migración de los helechos en la flora de Tucumán.

Vanilla Argentina Hicken.

Calyceracearum Argentinarum catalogus.

BUENOS AIRES

IMPRENTA Y CASA EDITORA « CONI »

684, PERÚ, 684

1919

(Enero)

CRISTÓBAL M. HICKEN

ESTUDIOS BOTÁNICOS

PRESENTADOS EN LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE CIENCIAS NATURALES : TUCUMÁN, 1916

(SECCIÓN BOTÁNICA, PÁG. 187, 233, 238)

La migración de los helechos en la flora de Tucumán.
Vanilla Argentina Hicken.
Calyceracearum Argentinarum catalogus.

LIBRA
NEW Y
BOTAN
GAR

BUENOS AIRES
IMPRESA Y CASA EDITORA «CONI»
684, PERÚ, 684

1919

(Enero)

LA MIGRACIÓN DE LOS HELECHOS EN LA FLORA DE TUCUMÁN

DISERTACION INAUGURAL
DE LA SECCIÓN BOTÁNICA POR SU PRESIDENTE CRISTÓBAL M. HICKEN

I

INTRODUCCIÓN

Recordemos, señores, y no lo perdamos de vista en ningún momento, que este congreso representa el triunfo de los estudiantes de ciencias naturales, que en su modestia derivada menos de la edad que de la índole de los estudios, los lleva a reconocerse miembros de la naturaleza y no entes pretenciosos colocados fuera o sobre ella destinados a recibir el homenaje y servidumbre de todo el mundo, ya procedan del brillo de las gemas, del perfume de las flores o de los encantos de la vida animal. Con este congreso proclaman ellos su convencimiento de ser individuos por quienes no pueden pasar sin dejar sus huellas los agentes exteriores, de ser vasallos de la energía y esclavos sumisos de la verdad natural, que los lleva a ser tolerantes, pacíficos y modestos sin afectación ni vanidad. Y es esta modestia la que los ha llevado a pedir, para este certamen, la compañía de sus profesores y la asistencia de los que guiaron sus primeros pasos, y éstos aceptaron gustosos porque como maestros que fueron les convenía contemplar la mies próxima a cosechar; como consejeros alentarlos en sus aspiraciones y como amigos contemplar con orgullo el primer

LIBR
REV. Y
BOT. ARG.
1907

ALB. IX 107

triunfo público y nacional que representa este certamen, el primero en su género que se realiza en nuestro país y en toda la América latina. Bien han hecho de elegir esta ciudad de Tucumán en donde proclamada hace una centuria la independencia argentina, que fué principio de influencia política, proclama ahora la capacidad y suficiencia para abordar con provecho los problemas que fueron siempre base de la prosperidad material y origen de especulaciones filosóficas del más enumbrado vuelo.

Mas el estudiante que triunfa hoy con esta fiesta de la inteligencia y del talento no nos pide a nosotros los que fuimos sus maestros, la dilucidación de tan magnos problemas cuya solución relega a las lumbreras del saber, sino que pide con insistencia honrosa la indicación del rumbo y la dirección de la senda que pueda conducir con el tiempo a los laboratorios de Fansto, pidiendo a los elegidos la palabra mágica que cual nuevo *sésamo* haga hendir la roca que les permita a ellos también participar de las joyas y tesoros acumulados durante siglos.

La senda es la *perseverancia*, el rumbo es la *investigación*, pero sin reatos, sin preocupaciones, sin prejuicios, y la palabra mágica, esa no existe, como no existen tesoros acumulados, porque la ciencia no es avara, no es egoista, no es ambiciosa. Los tesoros y joyas existen dispersos al borde del camino, bastando tener ojos para ver y brazos para recogerlos. La palabra hace tiempo que perdió su fuerza creadora y transformadora que le fuera arrebatada por la labor individual, perseverante y desapasionada. Ya en ciencia no tienen cabida los conjuros ni las invocaciones, y el trabajo es el único *sésamo* que puede transformar la arena en brillantes, los eriales en jardines y rendir sumisas y obedientes a las fieras del bosque.

Mas, si la palabra es un mito, si no hay secretos insondables ni tesoros que distribuir, existe, en cambio, un bagaje necesario e indispensable que debe llevar el viaudante por la senda indicada; carga o bagaje que los elegidos pueden y deben dar y es el cariño, pero el cariño desinteresado, generoso, amplio, robusto, por la naturaleza. Y ¿cómo se podría comunicar este amor por la naturaleza, si se le cantara en idiomas herméticos y sibilinos o publicara sus triunfos en lenguas ajenas a la nuestra? ¿Cómo se podría cultivar ese amor sembrando la duda de la insuficiencia individual al proclamar que la naturaleza tiene sus iniciados a quien entregarse? No, señores, a los estudiantes hay que decir la verdad, proclamando que la naturaleza se ofrece a todos, que no hay ungidos, que no hay sacerdotes, porque no

hay palabras sacramentales que pronunciar, ni rituales que cumplir que todos pueden oficiar ante el altar de la ciencia, pues ésta no reconoce ni iniciados, ni pontífices, ni dogmas, ni misterios, y que no hay más elegidos o preferidos que los que se acercan a ella con la investigación perseverante y cariñosa. Todos, todos pueden ofrendar ante ese altar con sólo llevar en el corazón la fe en sus propias fuerzas y el amor a la naturaleza.

Y los estudiantes que han hecho este congreso han triunfado, porque han tenido fe en sus fuerzas y harán obra útil porque aman a la naturaleza. Pero esta fuerza y este amor hay que conservarlo en los que lo posean y desarrollarlo en los que quieran alistarse en la falange de los hombres útiles y libres, y es éste el objeto primordial a que deben tender estas reuniones que con tanto éxito inicia la Sociedad de Ciencias Naturales. Y es este objeto, esta finalidad, que he clasificado como un triunfo, el que debemos perseguir los que con sobrado orgullo acompañamos a los que siendo alumnos y discípulos nuestros vienen a ofrendar aquí, en Tucumán, ante el altar de la naturaleza.

Señores : Al declarar inaugurados los trabajos de la sección Botánica, me es altamente satisfactorio abrir la discusión con un tema local y que servirá, así lo espero, para demostrar que no es necesario poseer costosos laboratorios ni deslumbrantes bibliotecas para contribuir al adelanto científico del país, sino que la observación y la paciencia exteriorizadas en humildes colecciones pueden ser base para fundar sobre ellas pilares útiles, sino necesarios, para el sostén y ornato de nuestro incipiente edificio científico nacional. Creo que podré demostrar así la *utilidad y conveniencia de fomentar el conocimiento de las Floras locales*, tema que ha sido propuesto para nuestra sección y el que podrá realizarse sin erogaciones de ninguna clase por parte de cualquiera que sienta alguna inclinación hacia el estudio de la naturaleza. Será tan sólo menester que el profesor tenga la suficiente prudencia para guiar al estudioso en sus primeros pasos y éste es, en resumen, el objeto del congreso que iniciamos.

II

Sin pretensiones de que conozcamos por ahora la totalidad de las polipodiáceas que crecen en la provincia de Tucumán, podemos presen-

tar como muy cerca de la realidad la enumeración que ofrece la lista que sigue y que abarca 83 especies distribuídas en 20 géneros.

Polipodiáceas de Tucumán

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée.

Adiantum chilense Kaulf.

— *euneatum* Langsd. Fisch.

— *Lorentzii* Hieron.

— *pentadaetylon* Langsd. Fisch.

— *tenerum* Sw.

Asplenium abscissum Willd.

— *depauperatum* Fée.

— *formosum* Willd.

— *Gilliesii* Hook.

— *Lorentzii* Hieron.

— *lunulatum* Sw.

— *lunulatum* var. *major* Mett.

— *micropteron* Bak.

— *monanthes* L.

— *praemorsum* Sw.

— *sulcatum* Lam.

— *sulcatum* var. *recognitum*.

— *trichomanes* L.

— *trichomanes* var. *anceps* (Sol.) Milde.

— *triphyllum* Presl.

— *tucumanense* Hieron.

Athyrium decurtatum (Kze.) Presl.

— *filix-foemina* (L.) Roth. var. *Dombeyi* (Desv.) Hieron.

Blechnum occidentale L.

— *Sprucei* Christ.

Ceropteris calomelanos (L.) Und. var. *chrysophylla* (Sw.) Link.

Cheilanthes marginata H. B. Kth.

— *micropteris* Sw.

— *myriophylla* Desv.

— *myriophylla* var. *elegans*.

— *pilosa* Goldm.

— *Poeppigiana* Mett.

- Cheilanthes pruinata* Kaulf.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
 — *fragilis* var. *anthriscifolia* (Hoffm.) Koch.
 — *fragilis* var. *canariensis* (Willd.) Milde.
Dennstaedtia tenera (Presl.) Mett.
 — *tenera* var. *dentata* Hieron.
Doryopteris concolor (Langsd. Fisch.) Kuhn.
 — *Lorentzii* (Hieron.) Diels.
Dryopteris aechalense (Hieron.) Christ.
 — *argentina* (Hieron.) Christ.
 — *argentina* var. *major* Hicken.
 — *filix-mas* (L.) Schott var. *paleacea* Sw.
 — *Lilloi* Hicken.
 — *oligocarpa* (Willd.) O. Ktze. var. *crassistipitata*.
 (Hieron.) Hicken.
 — *parasitica* (L.) O. Ktze.
 — *patens* (Sw.) O. Ktze.
 — *patula* (Sw.) Undw.
 — *siambonense* (Hieron.) Christ.
 — *submarginalis* (Langsd. Fish.) Christ.
 — *villosa* (L.) O. Ktze.
Elaphoglossum Gayanum (Fée) Moore.
 — *Jamesoni* (Hook. Grev.) Moore.
 — *Lorentzi* (Hieron.) Christ.
 — *muscosum* (Sw.) Moore.
 — *petiolatum* (Sw.) Urb.
 — *scolopendrifolium* (Raddi) J. Sm.
Notholaena bonariensis (Willd.) Christ.
 — *Fraseri* (Mett.) Bak.
 — *Fraseri* var. *robusta* Hicken.
 — *hypoleuca* Kze.
 — *Lilloi* Hicken.
 — *obducta* (Mett.) Bak.
 — *scariosa* (Sw.) Bak.
 — *sinuata* (Sw.) Kaulf.
Pellaea flexuosa (Kaulf.) Link.
 — *nivea* (Poir.) Prantl.
 — *nirca* f. *flarens* Hieron.
 — *nirca* f. *tenera* Hieron.
 — *ternifolia* (Cav.) Link.

Polypodium angustifolium Sw.

- *aureum* L.
- *aureum* var. *arcolatum* Kth.
- *chrysolepis* Hook.
- *Gilliesii* Christ.
- *lanccolatum* L.
- *Lorentzii* Hieron.
- *lycopodioides* L.
- *pectinatum* L.
- *peruvianum* Desv.
- *polypodioides* (L.) Hitch.
- *pyenocarpum* Christ.
- *squamulosum* Kaulf.
- *tucumanense* Hieron.
- *Twcedianum* Hook.

Polystichum monteridense (Spreng.) Rosenst.

- *monteridense* f. *imbricata* Hieron.
- *platyphyllum* (Willd.) Presl.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. *esculentum* Forst.*Pteris erecta* L.

- *deflexa* Link.
- *denticulata* Sw.
- *longifolia* L.

Trismeria trifoliata (L.) Diels.*Woodsia monteridensis* (Spreng.) Hieron.

Las exploraciones realizadas en los últimos años por Lillo, Castiellón, Rodríguez, Joergensen, Dinelli y otros, revelan que estas cifras no han de ser fundamentalmente modificadas, y por los conocimientos que tenemos de las floras del Chaco, Salta, Jujuy, Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero, es decir, de las provincias más inmediatas y a las que se pueden añadir las de la puna andina, podemos prever cuáles serían las especies más probables de ser añadidas al catálogo anterior, que, como he dicho, no van a modificar ni por su número ni por su carácter la enumeración referida ni las conclusiones a que ella permite llegar.

Las especies citadas no tienen, dentro del territorio de la provincia, una distribución uniforme, ni tampoco están dispersas al acaso, observándose, al contrario, una relación estrecha entre la topografía y las vinculaciones de ésta con la correspondiente a la de las provincias

inmediatas o sea a la geografía en general, vineulaciones que nos lleven a explicar las causas de la dispersión hallada y que sirvan de clave para conocer el origen de los helechos tucumanos.

Podemos reconocer con toda facilidad que hay ciertos helechos que no salen de la parte baja, o que apenas llegan a recostarse a los flancos de las sierras; otros que prefieren los bosques de éstas y algunos que predominan en los prados de las alturas; división o agrupamiento que no tiene nada de absoluto, pues las especies suelen salir de estos límites para invadir las zonas adyacentes, si bien, como he dicho, suelen preferir una zona u otra con tan marcada predilección que pueden servirles de característica.

De acuerdo con esta predilección, podríamos distribuir todos los helechos catalogados y de acuerdo con su relativa frecuencia en tres grandes grupos, que serían los siguientes :

- I. Helechos que suelen hallarse en el llano;
 - II. Helechos que suelen hallarse en los bosques de las sierras;
 - III. Helechos que predominan en los prados altos.
- Vamos a pasar revista rápida a cada grupo.

I

Helechos que suelen hallarse en el llano

Adiantopsis chlorophylla.
Adiantum cuneatum.
Asplenium lunulatum.
Athyrium decurtatum.
 — *filix-foemina.*
Blechnum occidentale.
Cystopteris fragilis.
Dryopteris parasítica.
Elaphoglossum gayanum.
Polypodium angustifolium.
 — *lycopodioides.*
 — *polypodioides.*
 — *pycnoearpum.*
 — *squamulosum.*
Polystichum monteridense.
 — *platyphyllum.*

Pteris denticulata.

Trismeria trifoliata.

Woodsia monteridensis.

Estudiemos someramente las especies citadas.

Adiantopsis chlorophylla, americano, pero muy difundido en todos los trópicos y subtrópicos, predominando sobre todo hacia el W. (Méjico, Colombia, Ecuador, Paraguay, Montevideo). En la República Argentina ocupa la faja boreal de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones, desde donde sale hacia el sur por el río Paraná, que la llevó hasta el Tigre. El río Salado lo saca del Chaco y las sierras de Tucumán le sirven de camino para llegar hasta las de Córdoba.

Adiantum cuneatum, también es helecho americano del Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y de toda la parte central de la República Argentina, viviendo donde halla humedad y reparo suficiente; por eso suele crecer en las grutas sombreadas de los peñascos, en los bosques, a orillas de zanjones y dentro de los pozos. Pero como las sierras le ofrecen mayores probabilidades de vida, es allí donde predomina, sin que esto, para Tucumán, signifique que su origen sea serrano.

Asplenium lunulatum, muy común en todos los trópicos y subtrópicos (Indias, Ceylan, Hawai, Guinea, Antillas, Paraguay, Bolivia, Chile, islas de Juan Fernández, Brasil, etc.).

En Tucumán lo encontramos sobre todo (en el llano) al borde de las acequias y en los bosques más sombreados; pero es muchísimo más frecuente en los bosques de las sierras.

Athyrium filix-foemina, es casi cosmopolita y de análoga distribución que la anterior (Europa, África, Japón, Himalaya, Antillas, Perú, Paraguay, Uruguay, etc.), habiéndose hallado en la República Argentina, en Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Salta, etc. La variedad *Dombeyi* se conoce de las sierras de Córdoba y Tucumán.

Athyrium decurtatum, es de las regiones cálidas y húmedas del Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En la República Argentina predomina en Misiones, Corrientes y Chaco.

Ambas especies de este género han llegado a nuestro territorio desde el norte, habiéndose detenido en Tucumán, porque la sequedad del clima de las provincias centrales le ofrecieron una valla eficaz y logrando sólo la segunda llegar hasta las islas del Tigre, merced a las aguas templadas del río Paraná y a ser menos delicada que la primera.

Blechnum occidentale, vive desde Méjico hasta el Uruguay y desde el Pacífico al Atlántico. En la República Argentina llega hasta el río Colorado, pero no trepa a grandes alturas.

Cystopteris fragilis, es verdaderamente cosmopolita en la más amplia acepción de la palabra, llegando hasta las regiones frías de todo el globo. En la República Argentina, vive desde la puna de Jujuy hasta Ushuaia y desde el nivel del mar hasta la zona de las nieves permanentes, faltando sólo donde la sequedad del clima es muy pronunciada.

Dryopteris parasítica, es cosmopolita en todos los trópicos y subtrópicos del orbe (Méjico, Cuba, Himalaya, Nueva Zelandia, Brasil, Paraguay, etc.).

Elaphoglossum gayanum, si bien es sudamericano, su dispersión es vastísima. Ocupa toda esta parte continental llegando por el norte más allá de Panamá y por el sur hasta el paralelo del lago Nahuel-Huapí; pero sale de la tierra firme para vivir en las islas de Juan Fernández y aun en las islas de Pascua. Es tan afín al *E. conforme* del África austral, que quizá no represente ésta sino una forma *africana* de la primera.

Polypodium angustifolium, es epífita en todos los trópicos y subtrópicos americanos, desde Méjico, Antillas y Venezuela hasta el Paraguay y Brasil.

Polypodium lycopodioides, casi cosmopolita, pues se halla en Java, Hawaii, el África, etc., y en toda América desde el Canadá hasta la latitud de Buenos Aires.

Polypodium polypodioides, epífita y casi cosmopolita (África, toda América desde el Canadá hasta Buenos Aires).

Polypodium pycnocarpum, suele hallarse epífita en los árboles de la llanura; pero es helecho propio de los prados altos. Ha bajado, pues, de la sierra. (Cf. pág. 202.)

Polypodium squamulosum, epífita que suele hallarse entreverada con las anteriores. Su área es igualmente extensa y propia de las regiones templadas de América.

Polystichum monteridense y *Polystichum platyphyllum*, ambas de distribución muy grande en Sud América y la segunda aun hasta Méjico. No representan sino variedades del *P. aculeatum*, que es verdaderamente cosmopolita.

Pteris denticulata, de gran extensión americana (Antillas, Brasil, Paraguay), pero con predominio hacia el este del continente. En la República Argentina es muy abundante en Misiones y Chaco y ha

venido de Bolivia y del Brasil, penetrando en la formación chaqueña y misionera.

Trismeria trifoliata, muy abundante en las regiones húmedas de los trópicos americanos (Méjico, Cuba, Ecuador, Paragnay, Bolivia, Brasil). En la República Argentina la hallamos en la faja norte que comprende Misiones, Corrientes, Chaco, Orán, Jujuy y Tucumán, habiendo bajado por el Paraná hasta las islas del Tigre. Dentro de América, predomina hacia el W., donde prefiere los bosques del llano, y siendo muy rara en las sierras, donde nunca llega a grandes alturas. Castellón la recogió en la sierra de Ambato y se la conoce de las serranías de Córdoba, de donde seguramente llegó a Río IV.

Woodsia monteridensis, suele hallarse entre las piedras a orillas de los torrentes y es planta que ha bajado de las sierras (v. pág. 204).

Como se ve, los helechos del llano de Tucumán deben su presencia, en su inmensa mayoría, a razones de cosmopolitismo (*Asplenium lunulatum*, *Athyrium filix-foemina*, *Cystopteris fragilis*, *Dryopteris parasitica*, *Polypodium lycopodioides*, *P. polypodioides*) o de difusión vastísima en América (*Adiantopsis chlorophylla*, *Adiantum euneatum*, *Athyrium decurtatum*, *Blechnum occidentale*, *Elaphoglossum gayanum*, *Polypodium angustifolium*, *P. squamulosum*, *Pteris denticulata*, *Trismeria trifoliata*, *Polystichum monteridense* y *P. platyphyllum*). Algunos de los anteriores pueden considerarse como variedades americanas de tipos cosmopolitas, como ya se dijo referente a los *Polystichum*, del *Elaphoglossum gayanum*, y como se indicará más adelante respecto del *Adiantum euneatum*.

El problema de la presencia en Tucumán de estos helechos se reduce, pues, al problema de las especies cosmopolitas y no exige, por consiguiente, mayor dilucidación en estas páginas.

Finalmente, una pequeñísima cantidad (*Polypodium pyenocarpum*, *Woodsia monteridensis*) han bajado de la sierra llegando hasta la llanura.

Si excluimos a estas últimas especies, cuya presencia, por otra parte, no es muy común, podemos resumir lo anterior diciendo que los helechos del llano representan especies cosmopolitas o americanas, sin que siquiera hayan originado variedades locales. Todas sus especies se hallan comprendidas dentro de la zona tropical y subtropical sudamericana, de la que Tucumán forma una parte de la franja o borde austro-occidental y es lógico suponer que representan especies inmigradas desde el Chaco boliviano.

II

Helechos que suelen hallarse en los bosques serranos

Adiantopsis chlorophylla.

Adiantum chilense.

— *cuneatum.*

— *Lorentzi.*

— *tenerum.*

Asplenium abscissum.

— *depauperatum.*

— *formosum.*

— *lunulatum.*

— *micropteron.*

— *monanthes.*

— *prae-morsum.*

— *sulcatum.*

— *tucumanense.*

Athyrium decurtatum.

— *filix-foemina.*

Blechnum occidentale.

— *Sprucei.*

Cystopteris fragilis.

Dennstaedtia tenera.

Doryopteris concolor.

— *Lorentzi.*

Dryopteris aychalense.

— *argentina.*

— *filix-mas* var.

— *Lilloi.*

— *oligocarpum.*

— *parasiticum.*

— *patens.*

— *patulum.*

— *siambonense.*

— *submarginale.*

— *villosum.*

Elaphoglossum gayanum.

— *Lorentzi.*

Elaphoglossum muscosum.

— *petiolatum.*

— *scolopendrifolium.*

Pellaea nireca.

Polypodium angustifolium.

— *aureum.*

— *chrysolepis,*

— *Gillesii.*

— *lanceolatum*

— *Lorentzii.*

— *lycopodioides.*

— *pectinatum.*

— *polypodioides.*

— *pycnocarpum.*

— *squamulosum.*

— *tneumanense.*

— *Tweddianum.*

Polystichum monteridense.

— *platyphyllum.*

Pteridium aquilinum var.

Pteris eretica.

— *deflexa.*

— *denticulata.*

— *longifolia.*

Woodsia monteridensis.

Eliminando de la lista anterior las especies cosmopolitas y las que lo son, por lo menos, en los trópicos y subtrópicos cuya, presencia en Tucumán no causa, por lo tanto, dificultad, nos quedará un resto compuesto de las especies acerca de las cuales podremos hacer las consideraciones que van a continuación.

A. HELECHOS COSMOPOLITAS

(Por lo menos en los trópicos y subtropicos de ambos hemisferios)

Asplenium formosum.

— *lunulatum.*

— *monanthes.*

— *prae-morsum.*

Asplenium sulcatum.
Athyrium filix-foemina.
Cystopteris fragilis.
Doryopteris concolor.
 — *parasitica.*
 — *patens.*
Elaphoglossum petiolatum.
Polypodium lanceolatum.
 — *aureum.*
 — *lycopodioides.*
 — *polypodioides.*
Pteridium aquilinum.
Pteris cretica.
 — *longifolia.*

A esta lista podemos añadir los que tienen distribución vastísima y uniforme en toda Sud América tropical y subtropical y que son :

B. HELECHOS SUDAMERICANOS

(Tropicales y subtropicales)

Adiantopsis chlorophylla.
Asplenium abscissum.
Blechnum occidentale.
Dryopteris filix-mas var. *paleaceum.*
 — *submarginale.*
Elaphoglossum gayanum.
Polypodium angustifolium.
 — *pectinatum.*

C. HELECHOS DE TUCUMÁN

Adiantum chilense.
 — *cuneatum.*
 — *Lorentzi.*
 — *tenerum.*

Estas especies, a las que podrían añadirse los *A. Poiréti*, *A. crenatum*, *A. imbricatum* y *A. Orbignyannum* (las dos últimas de Bolivia), se

parecen muchísimo y son a veces muy difícil de separar, representan al *Ad. capillus-veneris* de extensión casi cosmopolita, el que ocupa toda la Europa, toda el África, el Asia desde Siberia hasta el Himalaya y desde los Urales hasta el Japón, y que no falta en América, donde ocupa la faja que se extiende desde la Florida hasta el valle amazónico. Esta especie ha producido en el sur africano al *Ad. aethiopicum* y en Sud América a varias que son justamente las que he indicado y que podrían aumentarse con el *Ad. concinnum* de Méjico hasta Perú y Brasil y que es otra variedad del *A. capillus-veneris*, como el *Ad. colpodes* del Ecuador y Perú. El *Ad. glaucophyllum* y el *fragile* de Centro América, son apenas diferentes del *cuneatum*.

El *Ad. Lorentzi* de Tucumán, Salta y Chaco ha sido hallado en Bolivia y lo considero como un representante tropical del *cuneatum* al que se liga por toda clase de formas intermediarias. Considerados así los *Adiantum*, pierden su aparente independencia, para surgir como derivaciones locales, o descendientes inmediatos de una especie casi cosmopolita que ha encontrado en la América del Sur y sobre todo andina, condiciones muy favorables para diferenciarse en forma múltiple. Añadiré, de paso, que el *Ad. sulphureum*, tan común en las provincias centrales de la República Argentina y en los Andes chilenos, representan a su vez una mera diferenciación del *Ad. chilense*.

El *Asplenium depauperatum* y *A. micropteron* son casi idénticos y quizá no representen sino nuevas formas de adaptación locales de una especie genuinamente andina.

El *Asplenium tucumanense* se parece muchísimo al *Aspl. squamosum* que caracteriza los bosques del Ecuador y que se extiende en el Brasil occidental hasta llegar a Río Grande do Sul. Igualmente se vincula con los *Aspl. Jamesoni*, *angustatum* y *pseudonitidum* que viven todos en los bosques andinos ecuatoriales. No me sorprendería que un estudio más detenido nos llevara a considerar al *Aspl. tucumanense* como simple variedad del *Aspl. squamosum*; mientras tanto queda aquella especie íntimamente vinculada a sus afines más inmediatos, que hay que buscarlos en los bosques cálidos y húmedos de la falda oriental andina del Ecuador y Perú. Su origen, pues, es manifiesto.

Athyrium decurtatum, ya fué considerado en la página 194 y, siendo de los trópicos y subtrópicos americanos, es el que más avanza hacia el sur. En Tucumán se halla tanto en los bosques serranos como en los de la llanura.

Blechnum Sprucei, es de los Andes del Ecuador, donde vive a grandes alturas, pues ocupa generalmente el límite superior de los bosques

desde 2000-2300 m. Se le halla en idénticas condiciones de vida en el Perú y Bolivia, y su presencia en Tucumán, queda, por lo tanto, bien explicada admitiendo que estos bosques no representan sino el extremo sur de los que se extienden sin interrupción por toda la falda oriental desde Colombia hasta el Aconquija.

Dennstaedtia tenera, es de toda la América tropical.

Dryopteris Lorentzi, es una derivación inmediata del *D. concolor*, que es cosmopolita (China, Ecuador, Madagascar, etc.); quizá no merezca ni siquiera la consideración de *variedad*.

Dryopteris achalense y *D. siambouense*, tienen sus vinculaciones inmediatas con los *D. Sprengelii* y *D. conformis* de los bosques andinos del Ecuador y Méjico. Considero muy posible que se hallen en Bolivia formas intermediarias que hagan insensible el paso de las especies tropicales a los endemismos argentinos.

Dryopteris argentina, vive en las sierras de Córdoba, Catamarca y Tucumán y se le puede seguir por Jujuy hasta Bolivia, junto con *D. Galanderi* y *D. Lorentzi*, que apenas difieren entre sí; representan derivaciones inmediatas del *D. oligocarpum* o mejor del *D. conterminum*, que es de distribución vastísima en toda Sud América.

Dryopteris? Lilloi representa, por su aspecto y género de vida, un helecho genuino de los bosques tropicales. De confirmarse mis sospechas de que esta especie deba figurar en el género *Diplazium* (lo que no he podido verificar aún por carecer de material abundante), nada quitaría a las conclusiones de que hay que buscar sus parientes más próximos en la falda oriental andina, donde tanto abundan los *Dryopteris* del grupo *villosum* y *connexum*, en cuya inmediación lo he colocado, o con los *Diplazium* de aspecto parecido, que son igualmente abundantes y característicos.

Dryopteris patulum, es un helecho de los bosques andinos de los que ha salido para extenderse por los bosques de las llanuras inmediatas: por eso su difusión en América es de preferencia o predominio occidental.

Dryopteris villosum, es planta genuinamente de los bosques andinos.

Elaphoglossum Lorentzii, sólo se encuentra en las partes más altas y es planta que corresponde al grupo III.

Elaphoglossum muscosum y *scolopendrifolium*, son ambos representantes de grupos diversos que comprenden en el Ecuador y Colombia numerosísimas formas íntimamente ligadas. No queda duda que ambas especies se han deslizado a lo largo de los bosques andinos hasta llegar a Tucumán.

Pellaea nivea, es planta que ha bajado de las alturas. (Cf. III.)

Polypodium chrysolepis. (Cf. III.)

Polypodium Gilliesii. (Cf. III.)

P. Lorentzii y *tucumanense*, son endemismos locales; pero íntimamente vinculados al *P. Phyllitidis*, que tiene vastísima distribución, pues ocupa el área americana desde la Florida hasta el Uruguay, pasando también al África occidental.

Polypodium pectinatum, es de Méjico, Australia, Perú, Brasil, etc.

Polypodium pycnocarpum. (Cf. III.)

Polypodium squamulosum, es de los trópicos y subtrópicos americanos.

Polypodium tucumanense, ver *P. Lorentzii*.

Polypodium Tucedianum, lo considero como una forma grande del *P. pycnocarpum*. (Cf. III.)

Polystichum monteridense y *platyphyllum*, que se consideran sistemáticamente como buenas especies, no representan, a los efectos de las consideraciones geograficas, sino formas directamente derivadas del *P. aculeatum*, que es cosmopolita y sumamente polimorfo.

Pteris deflexa, es uno de los helechos más comunes en toda América tropical y subtropical. Su presencia en Tucumán se explica, por consiguiente, con toda facilidad.

Pteris denticulata, ya lo consideramos en la página 195 y su crecimiento en los bosques serranos, queda explicado sin otras consideraciones.

Woodsia monteridensis, es planta que descendió de las alturas serranas. (Cf. III.)

Por las breves consideraciones que anteceden, vemos que todos los helechos citados crecen dentro del área tropical o subtropical americana, área que en forma de extensa elipse se extiende con su eje mayor desde Méjico hacia Sao Paulo, en el Brasil austral, y con su eje menor de la boca del Amazonas hacia las Yungas de Bolivia.

Para esta elipse representa Tucumán uno de sus bordes, lo que explica su pobreza relativa en ciertos helechos comparados con los de otras naciones que caen dentro del área indicada.

Es así como, salvo uno u otro endemismo, los encontramos todos sin excepción en Bolivia, Perú y Ecuador, donde viven también en los bosques de las cordilleras; pero sin que falten tampoco en los vastos bosques de la zona extraandina. Es difícil, pues, asegurar cuáles son las especies que han llegado exclusivamente por las montañas

y cuáles por las regiones boliviano-chaqueña o brasileño-paraguaya. Sin embargo, estudiando las preferencias de algunas especies, su género de vida y su frecuencia de dispersión dentro de la elipse tropical, podemos reconocer que las especies que podríamos llamar *occidentales* serían, sin duda algunas, las siguientes :

Asplenium formosum, hallada, es verdad, en el Paraguay y sierras del Brasil; pero de mucha mayor frecuencia en los Andes, donde también se hallan varias especies que le son muy afines.

Blechnum occidentale y *Sprucei*, los *Elaphoglossum* citados, los mismos *Adiantum* como lo prueban las numerosas especies estrechamente afines, que predominan todos hacia la América occidental; los *Dryopteris aekalense*, *siambonense* y los del grupo *conterminum* (*argentina*, *Galanderi*, *Lorentzii*): el *Asplenium tucumanense*, que tiene sus parientes en el Ecuador y Perú; *Dryopteris villosum* y *patulum* y quizá alguno más serían especies que han corrido desde el norte por los bosques de las faldas oriental andina hasta terminar su carrera en la sierra de Aconquija.

Las otras especies han podido quizá también haber venido por la misma ruta o haber penetrado en los bosques viniendo desde el este sin que se pueda asegurar su procedencia en forma definitiva. Tales serían los *Polystichum*, *Pteris deflexa* y *denticulata*, *Asplenium depauperatum* y *micropteron*, y *Polypodium pectinatum*.

Quedan, por fin, algunas especies que han provenido de las alturas mayores y que, penetrando en los bosques, han adquirido hábitos preferentemente epifíticos (*Polypodium Treedeanum*, originado del saxícola *P. pyenocarpum*, *Elaphoglossum Lorentzii* del *E. Jamesoni* o del *E. piloselloides*, y el *Polypodium ehrysolepis*) o que continuando con su género de vida se han limitado sólo a aumentar su área de dispersión (*Pellaea nireca*, *Polypodium Gilliesii*, *Woodsia monteridensis*, etc.).

111

Helechos que suelen hallarse en las regiones altas o secas de la sierra

Asplenium Gilliesii.

— *Lorentzii*.

— *trichomanes* var. *anceps*.

— *triphyllum*.

Cheilanthes marginata.

Cheilanthes micropteris.

— *myriophylla.*

— *pilosa.*

— *Poeppigiana.*

— *pruinata.*

Ceropteris ealomeganos var. *chrysophylla.*

Cystopteris fragilis.

Elaphoglossum Gayanum.

— *Jamesoni.*

— *Lorentzii.*

Notholaena bonariensis.

— *Fraseri.*

— *hypoleuca.*

— *Lilloi.*

— *obducta.*

— *scariosa.*

— *sinuata.*

Pellaea flexuosa.

— *nivea.*

— *ternifolia.*

Polypodium chrysoplepis.

— *Gillicsii.*

— *peruvianum.*

— *pyenocarpum.*

Woodsia monteridensis.

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, de eliminar las especies que viven en la provincia, ya sea por su cosmopolitismo, ya sea por pertenecer a la elipse trópico-subtropical americana, llegaremos a conocer las que son propias de Tucumán por inmigración especial o por endemismo local.

Así, nos quedaremos con la lista que se acaba de citar, pues con excepción de dos cosmopolitas (*Asplenium trichomanes* y *Cystopteris fragilis*) todas las demás son genuinamente andinas, no hallándose ninguna que pueda ser clasificada como perteneciente a la elipse subtropical. Si bien es cierto que algunas (muy pocas) se pueden hallar en las sierras del Paraguay y de Minas Geraes, su presencia aquí es relativamente escasa comparada con la de los Andes del Perú y del Ecuador, que es donde adquieren su mayor desarrollo y donde tiene cada especie de las catalogadas muchas otras que le son inmediata-

mente afines, hasta tal punto de poder constituir series enteras estrechamente vinculadas entre sí.

Asplenium Gilliesii, muy frecuente en el Ecuador y Perú, se extiende por los Andes hasta el Tapungato en Mendoza y por el Aconquija hasta Córdoba.

De él deriva inmediatamente y como forma local el *Asplenium Lorentzii* hallado en Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco y Córdoba.

Asplenium triphyllum, propia del Ecuador y Perú, sólo se conoce hasta ahora del Aconquija (1). Su invasión del norte, es evidente.

Cheilanthes marginata, se extiende desde Arizona hasta las sierras del Tandil y de la Ventana.

Cheilanthes micropteris, desde el Ecuador hasta las sierras de Buenos Aires.

Cheilanthes myriophylla, desde Méjico al Tandil y Mendoza.

Cheilanthes pilosa, desde el Ecuador hasta las Sierras de San Luis.

Cheilanthes Poeppigiana, en los Andes del Perú y Bolivia hasta Salta, Tucumán y sierras de Córdoba.

Cheilanthes pruinata, desde el Ecuador hasta Córdoba. También en Misiones.

Ceropteris calomelanos, var., en los Andes de Bolivia, en Salta, Jujuy, sierra de Achala y en las montañas de Río Grande do Sul.

Elaphoglossum Jamesoni, se debe considerar como mera forma más o menos local derivada del *piloselloides*, ambas son típicas de los Andes ecuatorianos y el *E. Lorentzii*, de Córdoba y Tucumán, se halla tan íntimamente ligado a los anteriores y al *spathulatum* hallado en Salta y Jujuy que no puede negarse su procedencia inmediata.

Notholaena bonariensis y *Fraseri*, son difíciles de separar. La primera vive desde Méjico hasta las sierras de Buenos Aires y la segunda sólo desde el Ecuador hasta el mismo lugar en el Tandil y Ventana.

Notholaena sinuata y *scariosa*, desde Méjico hasta Catamarca la primera, y hasta la Ventana, la segunda.

Notholaena hypoleuca y *obducta*, tienen un área más reducida que las anteriores, pero siempre muy vasta en la parte ecuatorial. Desde Colombia hasta la Rioja, la última; y desde Bolivia y Atacama por Tucumán y Córdoba hasta la Ventana, la primera.

Notholaena Lilloi, es un endemismo de las sierras de Córdoba y Tucumán; pero íntimamente ligado a la *N. scariosa*.

(1) La indicación de « Entre Ríos », en mi *Polypodiacearum Catalogus* (ver *Rev. Mus. Nac. de La Plata*, XV, página 244, 1908, es un error.

Pellaea flexuosa, es muy abundante en el Ecuador y Perú; algo rara en Jujuy, perdiéndose ya en el Aconquija. Su área de dispersión está comprendida entre este último punto y Méjico, siendo genuinamente andina, como lo son también las dos siguientes.

Pellaea nireá, de fácil adaptación y bastante variable, ha engendrado múltiples formas entre las que se pueden mencionar la var. *flavens* con secreción de cera amarilla y la var. *tenera* sin tal indumento.

Pellaea ternifolia, va por los Andes desde Méjico hasta las sierras de la Ventana, Uruguay y aun hasta las de Minas Geraes, no faltando tampoco en las provincias andinas, donde llega por el sur hasta el Tupungato, habiendo salido hasta del continente para ocupar los volcanes de las islas Hawai.

Polypodium chrysolepis, es de las cumbres andinas del Ecuador y Bolivia y no se ha hallado al sur de Catamarca (Ambato) y Aconquija.

Polypodium Gilliesii, tiene distribución más vasta, pues alcanza los límites comprendidos entre el Perú y San Luis y aun sierra de la Ventana y Balcarce. Mayor extensión tiene el

Polypodium peruvianum, que viene desde Venezuela hasta las sierras de San Luis y de la Ventana, extensión que es aún superada por el

Polypodium pycnocarpum, que abarca las alturas andinas desde Méjico hasta la provincia de Buenos Aires.

Todas estas especies andinas tienen otras varias muy afines en la zona comprendida por el Ecuador y Perú, que aparece como el centro de dispersión desde donde han ido para el norte como para el sur.

Woodsia monteridensis, se halla desde el Perú hasta el Uruguay, pero siguiendo siempre el encadenamiento de las sierras del Aconquija, Córdoba y Buenos Aires.

La mayor parte de las especies que se han enumerado pueden hallarse, sin duda alguna, en los bosques de las sierras, donde han llegado desde las cumbres merced a los torrentes; pero su origen andino es incontestable, como lo es el avance curioso que han efectuado y aún efectúan desde el Ecuador hacia la Argentina y dentro de este territorio.

No todas han corrido con la misma rapidez; pues mientras unas han marchado con lentitud, otras han avanzado hasta salir de nuestro territorio para llegar a países limítrofes.

Asplenium triphyllum, *Cheilanthes Poeppigiana*, *Notholaena sinuata*

Fig. 1. — Estadio : Ecuador-Jujuy
p. ej. *Cheilanthes pilosa*

Fig. 2. — Estadio : Ecuador-San Luis
p. ej. *Asplenium Gilliesianum*

Fig. 3. — Estadio : Colombia-Minas Geraës
p. ej. *Cheilanthes micropteris*

Fig. 4. — Estadio : México-Minas Geraës
p. ej. *Pellaea ternifolia*

Camino seguido por los helechos andinos

y *obducta*, *Pellaea flexuosa* y *Polypodium chrysolepis*, se han detenido en Tucumán o mejor aun, siendo más exigentes, su marcha ha sido más lenta y han quedado rezagadas, con respecto al *Asplenium Gilliesii*, *Notholacua hypoleuca*, *Cheilanthes pilosa*, *Polypodium Gilliesii* y *peruvianum* que han podido aleanzar las sierras de Córdoba. San Luis y aun de la Ventana, en cantidad exigüa, es cierto, y donde han llegado en mayor cantidad las otras y que, por lo tanto, debieron haber llegado primero y que son :

- Cheilanthes marginata*.
- *myriophylla*.
- Notholacua bonariensis*.
- *Fraseri*.
- *scariosa*.
- Polypodium pyenocarpum*.

Cruzó el río para invadir el Uruguay la *Woodsia monteridensis* y sólo llegaron por las sierras costaneras del Brasil hasta Minas Geraes las *Cheilanthes micropteris* y *pruinata* y la *Pellaea ternifolia*, que se han mostrado así como las más resistentes y, por lo tanto, las más rápidas en su propagación.

Con las consideraciones anteriores, se destaca la línea de invasión andina con toda nitidez y se puede observar cómo sobre este camino se van empobreciendo los géneros en especies a medida que vamos hacia el sur.

El camino de los Andes al penetrar por Jujuy y Atacama en la República Argentina se bifurca, pues las especies indistintamente siguen hacia Mendoza por la cordillera sin haber pasado en general más allá del Tupungato o han tomado el camino hacia San Luis y sierra de la Ventana, sin poder avanzar más hacia el sur, por impedírsele la llanura pampeana, que no ofrecía condiciones ventajosas de refugio a los helechos en general.

En cambio, desde el sur continental, no ha penetrado en Tucumán ninguna especie, ni siquiera el *Blechnum penna-marina*, que se ha hallado en la sierra de Achala, ni el *Polystichum mohrioides* que se extiende por toda la cordillera desde el cabo de Hornos hasta California; ni el *Polystichum adiantiforme* que es tan abundante en la Ventana, Tandil, Brasil y Misiones; ni el *Polystichum multifidum* que se encuentra en los Andes desde Ushuaía hasta Perú, ni tampoco el *Blechnum capense* de Mendoza, Ventana, Córdoba y Misiones.

Esto mismo pone de manifiesto que la parte alta de las sierras de Tucumán representa una fracción mínima de un camino que va sin solución de continuidad desde California por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta las sierras de Buenos Aires, camino que ha quedado sin ser utilizado por los helechos que desde la región magallánica han ido avanzando hacia el norte y sería muy interesante analizar desde este punto de vista las plantas fanerogámicas que han acompañado a las polipodiáceas en estas migraciones.

Resumen

Los helechos de Tucumán son todos de las regiones tropicales o subtropicales de vastísima distribución sudamericana y han ocupado el territorio viniendo por la sierra de Aconquija; unos, eligiendo los bosques de sus faldas; otros por los prados altos, desde donde han descendido para mezclarse en los bosques o en el llano con las especies cosmopolitas.

Ninguna especie ha venido del sur y las poquísimas endémicas corresponden a grupos o parientes de distribución casi cosmopolita (I), (ver *cuadros complementarios*) a plantas andinas muy afines entre ellas (II) o a especies de los bosques serranos de vastísima distribución (III).

CUADROS COMPLEMENTARIOS

I

Doryopteris Lorentzi, es apenas una forma del *D. concolor*, que es cosmopolita.

II

Asplenium Lorentzi, var? del *A. Gilliesii*.

Elaphoglossum Lorentzi, var? del *E. Jamesoni* o del *E. piloselloides*.

Notholaena Lilloi, var? del *N. obducta*.

Densidad de distribución de los helechos andinos

III

Adiantum Lorentzi, var? del *Ad. cuneatum*.

Asplenium tucumanense, afin con el *A. squamosum*.

Dryopteris achalense siambonense, var? del *D. Sprengeli*.

Dryopteris ? *Lilloi*, afin al *D. connexum*.

Polypodium Lorentzi y *tucumanense*, afines con el *P. Phyllitidis*.

Polypodium Tweedianum var? del *P. pycnocarpum*.

VANILLA ARGENTINA HICKEN

Utilizada la *vainilla* por los Aztecas para aromatizar el chocolate, su uso se extendió rápidamente, aplicándose en las frutas azucaradas, en licores y en postres. También la perfumería la buscaba y hubo un tiempo en que era muy conocida en la farmacopea como estimulante del sistema nervioso.

De las 66 especies que hoy se conocen, sólo dos son las cultivadas por sus frutos: éstas son la *V. planifolia* Andr., que es la más apetecida, y la *V. pompona* Schiede: ambas son de Méjico, extendiéndose su área de dispersión por todas las Indias occidentales y llegando la de la segunda hasta Venezuela; pero se cultivan hoy en todos los trópicos de ambos hemisferios, donde el calor, unido a la humedad de lluvias frecuentes, pero no excesivas, las hace desarrollar fácilmente, dando lugar a un comercio de mucha importancia.

En efecto, en 1910 la cosecha mundial subió a 390.000 kilogramos, de los que correspondieron 122.000 a la Polinesia, 92.000 a Méjico, 65.000 a las islas Reunión, 40.000 a las Seychelles, y el resto a los cultivos de Java, Tahití, Fidji, Guayanas, Honolulu, etc.

Si se tiene en cuenta que los precios han ido siempre en aumento y que la demanda ha crecido también notablemente, podemos deducir la ventaja que habría en estudiar la nueva especie y tentar su cultivo en forma racional, tanto más cuanto que ya conocemos la bondad del fruto y la facilidad de su desarrollo, para el que la planta no es muy exigente.

En Bolivia se conocen algunas *vainillas* y su existencia la sabemos por el doctor Rafael Peña, quien, en su *Flora cruceña* (1901), 277, menciona tres especies distintas que él designa como *V. aromática* (*V. aromatica* Swartz), *V. claviculada* (*V. claviculata* Swartz) y *V.*

amarilla (*V. lutea* Wright). Las descripciones que trae son tan breves, que es difícil reconocerlas y tengo motivos para sospechar que ninguna corresponda a las determinaciones específicas. Ni Rusby, a quien debemos un buen catálogo de plantas tropicales de Bolivia, ni Buchtien, mencionan este género.

Hassler, en su *Flora del Chaco argentino-paraguayo*, no trae ninguna *vainilla*, ni tampoco Kerr, quien herborizó a orillas del río Pilcomayo.

Los herbarios de Fiebrig y Hassler, que tengo en mi colección particular, no traen ninguna especie del Paraguay, para cuyo territorio se han mencionado dos especies: la *V. organensis* Rolfe, citada por Krenzlin de la colonia Presidente González (1) y la clasificada como *V. pompona* en el libro que el Paraguay publicó en 1910 con motivo del centenario.

Teniendo en cuenta el área de dispersión de esta última especie y la circunstancia, bien sugerente por cierto, de que la que se vende en Asunción se importa de la zona del Pilcomayo, para lanzarla después al comercio con el nombre de « Vainillón del Paraguay », no es difícil suponer, como muy probable, de que tal especie no sea sino la mía, cuya descripción puedo dar basado en los ejemplares floridos que recibió el señor E. A. Holmberg (h.), jefe de la sección Bosques y yerbales, y que a fines de 1914 me fueron pasados para que los identificara científicamente. Con este motivo, al contestar la nota en que se me pedía la determinación, le decía con fecha 4 de diciembre de 1914, entre otras cosas referentes a la *Vainilla*: « ... cabe, pues, al señor Ulpiano Cáceres, inspector de bosques de la sección que usted dirige con el celo y competencia que todos le reconocen, la satisfacción de haber sido el primero que ha *recogido, reconocido y cultivado* una *Vainilla* en nuestro país, género de orquídea, que aún no se había catalogado dentro de nuestros límites políticos por botánico alguno ». Más tarde recibió el profesor J. A. Domínguez, director del Museo farmacológico de la Facultad de medicina, numerosas muestras de frutos y algunas plantas, que entregó al Jardín botánico, donde se hallan en cultivo.

Con todo este material me ha sido fácil llegar a la conclusión de que se trata de una especie nueva a la que doy el nombre de

(1) KRENZLIN, *Beiträge zur Orchideenflora Südamerikas*, en *Kunigl. Sv. Vet. Akad. Handl.*, volumen 46, número 11 (1911), 17.

Vanilla argentina

Diag.: *Caule robusto, tereti, longissimo, flexuoso usque ad 1-1 1/2 cm. crasso, viride. Foliis crassis internodiis saepius duplo longioribus, utrinque viridibus 12-20 cm. longis, 4-5 cm. latis, lanceolatis, in petiolum crassum late profundeque canaliculatum abrupte attenuatis. Ax. inflorescentiae 5-8 mm. crasso, arcuato, patulo, 7-10 cm. longo, 5-12-floro. Bracteis concavis deltoideis, 6-12 mm. longis, 3-7 mm. latis. Sepalis 4-5 mm. longis, 10 mm. lat. Petalis similibus sed paullo brevioribus, carinatis. Labello fundo aureo, margineque late rufescente, 4-5 mm. longo. Columna subrecta 2-3 mm. longa. Fructu calde aromatico, recto, plano, atrofusco, 10-22 cm. longo, 2-2 1/2 cm. lato.*

Obs.: *In silvis prope río Porteño in territorio argentino Formosa vocato ubi in mense decembris ad februarium usque floret.*

El tallo es verde, robusto, cilíndrico, muy largo, flexuoso, de 1-1 1/2 centímetros de diámetro. Las hojas coriáceas, gruesas, verdes, en ambas caras tienen a menudo una longitud que sobrepasa el doble de la distancia internodial, pues miden desde 12 hasta 20 centímetros de largo por 4-5 de ancho; son lanceoladas y en la base rápidamente estrechadas en un pecíolo ancho y acanalado. El eje floral es grueso, 5 a 8 milímetros diámetro, algo encorvado, hasta 7 ó 10 centímetros de longitud y 5-10-floro, con brácteas cóncavas, triangulares, de 6-12 milímetros longitud y 3-7 latitud. Las flores tienen un ovario de 3-4 centímetros longitud y 3-4 milímetros latitud, que se extiende lateralmente. Los sépalos planos o algo cóncavos, son gruesos y llegan a 4-5 milímetros longitud por 10 latitud. Los pétalos son semejantes a los sépalos, pero algo más breves y con una quilla gruesa y bien pronunciada. El labelo es de 4-5 milímetros longitud, de color chocolate hacia los bordes y amarillo de oro en el interior. La columna es casi derecha y de 2 1/2-3 centímetros longitud. El fruto es muy aromático, de color rojizo casi negro, aplanado, muy variable de tamaño, desde 10 centímetros hasta 22 de largo y 2-2 1/2 de ancho.

Fué recogida en los bosques que bordean al río Porteño, algo más arriba de su desembocadura en el Pilcomayo, donde vive sobre los laureles (*Nectandra* sp.) y timbóes (*Enterolobium timboursa* Mart.). Florece desde diciembre hasta febrero.

Los ejemplares del profesor Domínguez proceden también del territorio de Formosa, de la proximidad del río Pilcomayo, sin que se pueda precisar mejor la localidad.

El señor U. Cáceres me dice que el fruto suele llegar a ser tan ancho como la hoja, adquiriendo entonces un contorno bien elíptico y que ha criado algunos ejemplares sostenidos por troncos de duraznos donde se desarrollaban muy bien.

Como creo que puede ser de interés conocer las vinculaciones de la nueva especie con las de Centro y Austroamérica, doy a continuación una clave de las *rainillas*, basada principalmente en la que trae Cognianx en la *Flora brasiliensis* de Martins y que he modificado en gran parte.

CLAVE DE LAS VAINILLAS AMERICANAS

1. Ovario de sección circular.

A. Columna con pelos en su cara anterior.

1. Labelo retuso o escotado.

a. Labelo más corto que los sépalos.

†. Sépalos de 50-60 mm. long. y labelo de 40-50 mm. long. *V. planifolia* Andr.

††. Sépalos de 70 mm. long. y labelo de 65 mm. long. *V. Gardneri* Rolfe.

aa. Labelo igual o más largo que los sépalos.

†. Sépalo y labelos iguales.

△. Flores de un solo color en el labelo.

○. Color amarillo: labelo 40 mm. long.

V. Lindmaniana Krenzl.

○○. Color blanco verdoso (Alto Amazonas).

V. Sprucei Rolfe.

△△. Flores con dos colores en el labelo 45 mm. long.: color chocolate y oro (Chaco).

V. argentina Hicken.

††. Labelo más largo que los sépalos.

△. Pétalos en el dorso con una carena y con alas; no apiculados. *V. pompona* Schiede.

△△. Pétalos sin alas en el dorso; apiculados en el ápice. *V. Chamissonis* Klotzsch.

2. Labelo no escotado, sino triangular-obtus.

a. Labelo 65-70 mm. long., sépalos 60 mm. long.

V. bicolor Lindl.

aa. Labelo 45 mm. long.; sépalos 50-55 mm. long.

V. carinata Rolfe.

B. Columna glabérrima.

1. Inflorescencia solitaria

a. Labelo provisto de láminas enteras y paralelas.

$\frac{1}{4}$. Ovario y fruto coronado por una especie de cáliz: hojas de 15-20 cm. long. y 5-7 cm. lat.

V. bertonensis Bert.

$\frac{1}{4}$. Ovario y fruto sin cálculo; hojas de 5-11 cm. long. y 3-4 cm. lat.

$\triangle$ Sépalos 5 cm. long.; labelo de 4 cm. long.

V. parvifolia Barb. Rodr.

$\triangle \triangle$ Sépalos 2 $\frac{1}{2}$ -3 cm. long.; labelo 2 $\frac{1}{2}$ cm. long.

- *V. perexilis* Bert.

b. Labelo con una línea central de verrugas.

V. verrucosa Haum. (1)

2. Inflorescencia en espigas pauci- o multifloras.

a. Labelo apenas trilobado, acuminado; sépalos y pétalos largamente acuminados. *V. aromatica* Swartz.

aa. Labelo manifiestamente trilobado; sépalos y pétalos obtusos o agudos.

$\frac{1}{4}$. Labelo 50-55 mm. long.; pétalos sin carena.

V. guianensis Splitg.

$\frac{1}{4}$. Labelo 30-37 mm. long.; márgenes de sépalos y pétalos onduladas.

V. organensis Rolfe.

II. Ovario de sección triangular o trialado.

A. Labelo 50 mm. long.

V. palmarum Lindl.

B. Labelo 24-25 mm. long.

V. Dietschiana Edw.

(1) Cuando se presentó este trabajo al congreso aún no había sido publicada esta especie, que puede ahora ser incorporada a la clave general, conjuntamente con las de Bertoni, cuyo trabajo me fué remitido por el autor recién a principios del año en curso.

CALYCERACEARUM ARGENTINARUM CATALOGUS

CATÁLOGO DE LAS CALICERÁCEAS ARGENTINAS

Por el Dr. CRISTÓBAL M. HICKEN

Ocupado desde hace algún tiempo, por indicación de la Comisión de la Flora Argentina, en el estudio de las Caliceráceas argentinas, he juzgado conveniente ofrecer desde ya el catálogo de las especies conocidas en nuestro país, cosa que hago con la presente publicación.

Los libros que me han servido para este trabajo son de mi biblioteca particular y se hallan indicados al tratar cada especie. No cerraré estas líneas de introducción sin agradecer muy sinceramente a todas las personas e institutos que me han suministrado el material de herbario indispensable para estudios de esta índole. Con esta ayuda desinteresada he podido consultar los herbarios del Museo nacional de Santiago de Chile, donde se conservan las valiosas colecciones de Philippi y Reiche, al enñado actualmente del señor F. Fuentes, quien con toda diligencia me atendió en las repetidas visitas que hice a ese museo. Al profesor Carlos E. Porter debo importante material conseguido entre sus numerosas vinculaciones de la república vecina.

En Buenos Aires estuvieron a mi disposición las colecciones del Museo Farmacológico creado por el profesor J. A. Domínguez; las del Ministerio de agricultura y las del Museo nacional. En La Plata pude estudiar el rico herbario del doctor C. Spegazzini y por la gentileza del profesor A. Scala conseguí las del Museo de La Plata.

En Tucumán me fué dado revisar los herbarios de M. Lillo y del padre L. Castillón, mientras de Mendoza recibía los ejemplares juntados por R. Sanzin.

Con todo ese material, al que se añade el recogido por mí mismo dentro y fuera del país y el de varias colecciones depositadas en mi

Cont.

herbario particular, entre las que puedo mencionar las de Fiebrig, Hassler, Rodríguez, Buchtien, Carette, Pastore y Seala, para no citar sino las más importantes, me ha sido posible dilucidar numerosas dudas, establecer nuevas equivalencias y crear una especie nueva.

Acanthosperma

Acanthosperma littorale Vell. = **Acicarpa spathulata** R. Br.

Acarpha

Acarpha australis Griseb. = **Boopis australis** Deesn.

ACICARPHA

Acicarpa crassifolia Miers. = **Calycera crassifolia** (Miers) Hicken.

— *lanata* Lag. = **Calycera leucanthema** (Poepp.) Reiche.

— **laxa** Fries. — Fries in *Arkiv*, VI, 11 (1907), 2, tab. I, fig. 1-5: Jujuy; Fries in *Fedde, Repert.*, III (1907), 202: Jujuy.

— *pinnatifida* Miers. = **A. tribuloides** R. Br. v. **pinnatifida** (Miers) O. Ktze.

— **procumbens** Less. — Less., *Limnæa*, VI (1831), 527; Miers, *Contrib.* (1860), 40, tab. 51, C.; Griseb., *Symb.* (1879), 162: ER.; Arechav., *Fl. Urug.*, III (1908), 80, tab. 18.

— — var. **viridifolia** Müll. — Arechav., *l. c.*, 80: Concep. d. Urug.

— *rosulata* N. E. Brown. = **Moschopsis rosulata** (N. E. Br.) Dusen.

— **spathulata** R. Br. — *Linn. Trans.*, XII (1817), 129; Richard, *Mém. Mus.*, VI (1820), 49, tab. 3 et 78; Hicken, *Chloris* (1910), 235: Bahía Blanca; *Buphtalmum bonaerense* Pers., Spreng., *Syst.*, III (1826), 605: Buenos Ayres; *Acanthosperma littorale* Velloz., *Fl. Flum.*, VIII (1817), tab. 152; *Cryptocarpa spathulata* Cass. in *Bull. Soc. philom.* Paris (1817), 34.

- Acicarpa tribuloides* Juss. — *Anal. Mus.*, II (1803), 347, tab. 58, fig. 1 : ex Bonaria; Richard, *Mém. Mus.*, VI (1820), 45, tab. 2 et p. 78: ad Bonariam: Bettfr., *Fl. Argent.*, II (1899), 157, tab. 103; citadas por Grisebach (T.): Miers (C.); Speg. (Río Negro); Macloskie (N. Patag.): Hicken (BA., T.); Fries (S.): etc. *Cryptocarpa tribuloides* Cass.
- — var. *dentata* O. Ktze. — in *Rev. Gen.*, III, 2 (1898), 126 : Buenos Aires: Hicken, *Chloris* (1910), 235 : Palermo, S. Isidro.
- — var. *pinnatifida* (Miers) O. Ktze. — *l. c.*, 126 : Buenos Aires, Santa Fe: Hicken, *Chloris* (1910), 236 : BA., SF.: *Acicarpa pinnatifida* Miers in *Contrib. to Bot.*, II (1860), 41, tab. 52, B: Buenos Ayres: Grisebach, *Pl. Lorentz.*, 115 : C.: Grisebach, *Symb.*, 162 : ER., C.

Anomocarpus

- Anomocarpus eryngioides* Miers. = **Calycera eryngioides** Remy.
- *leucanthemus* Miers. = **Calycera leucanthema** (Poepp.) Reiche.
- *pulvinatus* Miers. = **Calycera pulvinata** Remy.
- *tenuifolius* Miers. = **Calycera leucanthema** (Poepp.) Reiche.
- *tenuis* Miers. = **Calycera leucanthema** (Poepp. Reiche.)

BOOPIS

- Boopis alpina* Speg. (non Poepp. Endl.) = **B. patagonica** Speg.
- *alpina* Poepp. et Endl. = **Gamocarpa Poeppigii** DC.
- *Ameghinoi* Speg. = **Moschopsis Ameghinoi** (Speg.) Hicken.
- *anthemoides* Juss. — in *Ann. Mus.*, II (1803), 350, tab. 58, fig. 2a: ex Bonaria; Richard, *Mém. Mus.*, VI (1820), 41 et 78, tab. 2 : ad Bonariam; DC., *Prodr.*, V (1836), 2 : in Bonaria ad Río de la Plata: citada por Grisebach (C., Ct., T.): Miers (C.); Speg. (Lima y Neuquen); Ball (Bahía Blanca): Reiche

(Andes patagónicos argentinos); O. Ktze. (C., SF., Pat.); Reiche, Höck, Macloskie, Hicken, etc.

- Boopis anthemoides* var. **andina** Hieron. — in *Sert. sanj.* (1881), 32 : Leoncito. — Sierra de Famatina (Hieronymus; Flossdorf in herb. Hickeni).
- — var. **rigidula** (Miers) Griseb. — Griseb., *Symb.*, 161 : C., Ct., T.; Hieron., *Sert. sanj.*, 33; *Boopis rigidula* Miers, *Contrib. Bot.*, 23, tab. 46, fig. A : Andibus mendoziinis; Chod. Wilez. : Vallée de l'Atuel; Macloskie 760 : Patag.
- — var. **rigidula**, f. **patagonica** (Hieron.) Hicken. (nov. comb.) *Boopis rigidula* Miers var. *patagonica* Hieron. in *Sert. pat.* (1880), 352 : RN.; Speg., *Fl. Pat. austr.*, 526 : Río Chico, Golfo S. Jorge; Macloskie, 761 : N. Patag., Río Negro, Río Chubut. — Mendoza austral (Gerling, in herb. Hickeni).
- — var. **subintegrifolia** Hicken nov. var. — SJ., Sierra Famatina, C., T., SL., Ct.

Diag. : *ramosa, 30-40 cm. alta, foliis inferioribus denticulatis vel incisís aut partitis, cacteris linearibus, 2-3 cm. long., 1-2 mm. lat., integris.*

Tucumán (Rodríguez, n° 215, Tapia 700 m.; v. Baer, n° 108; Lillo, n° 7134, Saladillo; n° 543, Vipos; Rodríguez, n° 1198, Trancas; Monetti, n° 1205, Leales).

Catamarca (Castillón, Valle del Rodeo, n° 1249, 1909, 2022, 3597).

Santiago del Estero (Chaves, Estación Tacanas, n° 35.215).

Córdoba (Dique de San Roque).

San Luis (Bruch-Carette, n° 244, Gigantes; n° 186, Laguna Seca; n° 61, 62, 64, Alto Pencoso).

Boopis anthemoides Juss. var **subscandens** Speg. — *Nor. add. A. S. C. A.*, 48 (1899), 176 : Río Negro; Macloskie (1905), 758 : by Río Negro.

- **australis** Decsn. — *Voy. Pol. Sud* (1845), 87, tab. 18, fig. B; Miers, *Contrib.*, 25, tab. 47, B; citada por Speg. (Fueguia, Sta. Cruz, Chub., Río Chico); Dusen : Fueguia orient. : O. Ktze., etc.; *Acarpha australis* Griseb. in *Bemerk. Pflz. Phil. u. Lechl.* (1854), 38; Walp., *Ann.*, V (1858), 142.

Boopis australis var. **leptophylla** (Speg.) Hicken (nov. comb.). — Río Coyle (Hicken); *Boopis leptophylla* Speg. *Nor. add.* 176: Río Chico; *l. c.* (1902), 301: Golfo de S. Jorge; Rendle, 371: Lago Argentino.

No difiere del tipo sino por los numerosos escapes bien desarrollados, arqueados o erectos que alcanzan hasta 20 ó 30 centímetros de alto y por las hojas proporcionalmente más largas, algo más anchas y más variables.

Bastante frecuente en la parte sur de la Patagonia, desde el mar hasta la región de los lagos.

Boopis australis var. **squarrosa** (Miers) Reiche; *Boopis squarrosa* Miers, *Contrib.*, II (1860), 25, tab. 47, fig. A: ad fretum magellanicum; Speg., *Nor. add.*, *A. S. C. A.*, 178: Río Chico; Speg., *Myctes argent.* (1899), 8: Río Chico; Macloskie (1905), 761: Magellan.

— *bicolor* Phil. = **Boopis gracilis** Phil.

— **chubutensis** Speg. — in *Nor. add.*, IV (1902), 300: Río Chubut; Macloskie (1905), 758: Chubut.

— *crassifolia* A. Gray. = **Calycera crassifolia** (Miers) Hicken.

— — var. *spinuligera* Speg. = **Calycera crassifolia** (Miers) Hicken var. **spinuligera** (Speg.) Hicken.

— *Diazi* Phil. = **Nastanthus Diazii** (Phil.) Reiche.

— *filifolia* Speg. — in *Nor. add.*, *A. S. C. A.*, 48 (1899), 176: Río Sta. Cruz, Río Chico; id., *l. c.*, IV (1902), 301: San Julián et Río Deseado; *Boopis Prichardi* Spencer le Moore in *Jour. of Bot.* (1904), 372: Lago Argentino.

— **gracilis** Phil. — in *Linnaea*, 28 (1856), 707; Speg., *Nor. add.*, IV (1902), 301 (Chub.); Neger, *An. Un. Chil.* (1899), 958: Pilolil (Neuquen); *Boopis bicolor* Phil., *An. Un. Chil.*, 85 (1893), 813; O. Ktze., *Rev. Gen.*, III, 2 (1898), 127: Paso Cruz.

— — var. **decumbens** Chod. et Wile. in *Bull. Herb. Boiss.* (1902), 541: Valle del Atuel.

— — var. **pozoeformis** (Phil.) Hicken (nov. comb.). — San Rafael (Mendoza); *Boopis pozoeformis* Phil., *An. Un. Chil.*, 41 (1872), 736; Reiche, *Fl. Chil.*, III, 195.

Planta más robusta, ramificada con mayor regularidad; hojas más irregularmente divididas, capítulos mayores, con abundantes páleas

lanceoladas o espatuladas; corolas algo mayores, hasta 4 milímetros longitud.

- Boopis graminea** Phil. — in *Linnaea*, 28 (1856), 105; Miers, *Contrib. to Bot.*, II (1860), 26, tab. 47, C., Neuquen; Reiche, *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 115: in andibus 36-38°.
- — var. **bracteata** Reiche. — *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 115; id. in *Fl. Chil.*, III (1902), 196: Cholila.
- *laciniata* Ball. = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **laciniatus** (Miers) Reiche.
- *leptophylla* Speg. = **Boopis australis** Decsn. var. **leptophylla** (Speg.) Hicken.
- *leucanthema* Poepp. = **Calycera leucanthema** (Poepp.) Reiche.
- *Miersii* Phil. = **Nastanthus spathulatus** Miers.
- **multicaulis** Phil. — in *Linnaea*, 28 (1856), 706; Miers, *Contrib.*, 24, tab. 46, C.; Speg., *Nor. add.*, IV, 301: Río Chubut; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 196.
- — var. **patagonica** O. Ktze., in *Rev. Gen.*, 127: Patag.; Macloskie (1905), 760.
- **oocaulis** O. Ktze., in *Rev. Gen.*, III, 2 (1898), 127: Paso Cruz.
- **patagonica** Speg., in *Nor. add.*, IV (1902), 301: Río Chico et inter S. Julián et Río Deseado; Dusen, *Gefässpfl.* (1907), 38, tab. 3, fig. 6 et tab. 8, fig. 16-19: Lago Tar.; *Boopis alpina* Speg. (non Poepp. Endl.), in *Nor. add.*, I, n° 185.
- *pozoaeformis* Phil. = **Boopis gracilis** Phil. var. **pozoaeformis** (Phil.) Hicken.
- *Prichardi* Spencer le Moore. = **Boopis filifolia** Speg. *B. Prichardi* Spencer le Moore, en Rendle, *Journ. of Bot.* (1904), 372: Lago Argentino. — La descripción concuerda tan bien con la *B. filifolia* Speg. (1901), que no vacilo en considerarlas como idénticas.
- *rigidula* Miers. = **Boopis anthemoides** Juss., var. **rigidula** (Miers) Griseb.
- — var. *patagonica* Hieron. = **Boopis anthemoides** Juss. var. **rigidula** (Miers) Griseb., f. *patagonica* (Hieron.) Hicken.
- *sanjuanina* Hieron. = **Nastanthus sanjuaninus** (Hieron.) Hieron.
- *scapigera* Phil. (non Remy) = **Nastanthus ventosus** (Mey.) Miers.

- Boopis scapigera** Remy. = **Nastanthus scapigerus** Miers.
 — *spathulata* Phil. = **Nastanthus spathulatus** (Phil.) Miers.
 — *squarrosa* Miers. = **Boopis australis** Decsn., v. *squarrosa* (Miers) Reiche.
 — *ventosa* O. Ktze. = **Nastanthus ventosus** (Mey.) Miers.

Buphtalmum

- Buphtalmum bonaerense* Pers. = **Acicarpa spathulata** R. Br.

CALYCERA

- Calycera andina* Miers. = **Nastanthus agglomeratus** Miers.
 — **boopidea** Hicken nov. spec. Confluencia del Limay. (Cfr. p. 251.)
 — **calcitrata** Griseb. — in *Pl. Lorentz.* (1874), 115 : Ct.; id., in *Symb.*, 161 : Ct.
 — **Castilloni** Hicken. — in *Physis*, I (1914), 386 : Ct.
 — *Cavanillesi* Rich. = **Calycera herbacea** Cav.
 — **crassifolia** (Miers) Hicken. — Hicken, *Pl. Fisch.* in *Physis*, II (1916), 117; *Acicarpa crassifolia* Miers, *Contrib. Bot.*, II (1860-69), 40, tab. 51. A; *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray, *Proceed. Amer. Acad.*, V, 321; Hook., *Icon. Pl.*, 18 (1888), tab. 1752 : in Patagonia; Ball, *Furth. Contrib.*, 486 : Patagonia to the Straits of Magellan. — Recogida en Río Negro y Puerto Pirámides (Hicken-Hauman Merck), Recoleta (Cap. Federal) (Spegazzini); *Calyceera foliosa* Phil. (in shed.), Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 207 : Valle del Tunuyán; id., *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 117; in *Andibus* 34°.
 — — var. **spinuligera** (Speg.) Hicken (nov. comb.); *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray, var. *spinuligera* Speg., *Nor. add. in An. Soc. Cient. Arg.*, 48 (1901), 174 : Río Negro et Bahía San Blas.
 — *crenata* R. Fries. = **Calycera pulvinata** Remy, f. **crenata** (R. Fries) Hicken.
 — **eryngioides** Remy. — in *Ann. Sc. Nat.*, VI (1846), 254; in Gay, *Fl. Chil.*, III (1847), 254; Weddell, *Chlor.*

- and.*, II (1857), 6, fig. 43, A., recogida en Mendoza por Kurtz: *Anomocarpus cryngioides* Miers, in Miers, *Contrib. Bot.*, II (1860), 29, tab. 48, C.
- Calyceera foliosa* Phil. = **Calyceera crassifolia** (Miers) Hicken. *Obs.*: Consultando el herbario del Museo de Santiago (Chile) me he podido convencer que la especie de Philippi asignada como *C. foliosa* no es sino la *C. crassifolia* (Miers) Hicken.
- **herbacea** Cav. — in *Icon.*, IV (1797), 35, tab. 358: Mendoza: Phil., *An. Univ. Chil.* (1862), 396: Portillo; O. Ktze., *Rev. Gen.*, III, 2 (1908), 127: Paso Crnz; *Calyceera Caranillesi* Rich., in *Mém. Mus.*, VI (1820), 34 et 77, tab. 1: Weddell, *Chlor. and.*, II (1857), 7; Reiche, *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 116: in andibus 30-38°; frecuente en el valle Uspallata, desde Punta de Vacas hacia la cumbre.
- **horrida** Hicken — in *Physis*, III (1913), 129: Neuquen.
- **intermedia** Phil. — in *A. U. Chile* (1870), 173: in andibus mendocinis; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 208: Mendoza: id., *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 117: in andibus 32°, species potius argentina quam chilensis.
- **involucrata** Phil. — in *A. U. Chile* (1870), 174: Portezuelo del Portillo; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 207: Mendoza; Reiche, *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 117: in andibus 32°, species potius argentina quam chilensis. El Cajón, Catamarca (nº 3339, Castillón).
- **leucanthema** (Poepp.) Reiche, in *Fl. Chil.*, III (1902), 204: *Boopis leucanthema* Poepp., in *Nor. Gen.*, I (1835), 21, tab. 34; Lessing, *Limnæa*, VI (1831), 259; Remy, in Gay, *Fl. Chil.*, III (1847), 250; DC., *Prodr.*, V (1836), 2; Weddel, *Chlor. and.*, II (1857), 8; Neger, *A. U. Chile*, 57 (1899), 922: Pilolil (Neuquen): *Anomocarpus leucanthemus* Miers, in *Contrib. Bot.*, II (1860), 31, tab. 49; *Leucocera annua* Turcz., in *Flora*, 31 (1848), 712; Walp., *Ann.*, II (1852), 807; *Acicarpa lanata* Lag., Pers., *Enum.*, II (1819), 438; DC., *Prodr.*, V (1836), 3; *Anomocarpus tenuis* Miers,

in *Contrib. Bot.*, II (1860), 32, tab. 49, B; *Anomocarpus tenuifolius* Miers, in *Contrib. Bot.*, II (1860), 33.

Calycera nudicaulis Phil. = **Calycera viridiflora** (Phil.) Miers.

- **pulvinata** Remy — in *Ann. Sc. Nat.*, 3^{me} série, VI (1846), 352; Walp., *Ann.*, I (1848), 382; Weddell, *Chlor. and.*, II (1857), 6, tab. 43, B; *Anomocarpus pulvinatus* Miers, *Contrib. to Bot.*, II (1860), 31, tab. 49, A; recogida en T. (Lillo), J. (Gerling, Lillo), Puna de Atacama (E. A. Holmberg).
- — f. **cauligera** Hicken. nov. f. (cfr. p. 253) — Tucumán : La Ciénaga, Lillo, 1331; Tafí, Lillo, 8309; Castellón, 2714; Lara, Rodríguez, 295. Jujuy : Maimará, Budin, 4894; Malamala, Lillo, 3432.
- — f. **crenata** (R. Fries) Hicken nov. comb. — *Calycera crenata* R. Fries, *Zur alp. Fl. Argent.* (1905), 98, tab. 6, fig. 11-12 : Jujuy. Tucumán : Tafí, Lillo, 5919; Cumbres calchaquies, Lillo, 5519, 8307, 5518, 2643, 3075; Cerro Muñoz, Lillo, 4189; El Pelado, Rodríguez, 438; Tafí, Castellón, 2713, 3187, 13120.
- *sinuata* Miers = **Calycera viridiflora** (Phil.) Miers, f. **sinuata** (Miers) Hicken.
- **spinulosa** Gill. — Miers, *Contrib. to Bot.*, II (1860), 37, tab. 50, D : Prov. Mendocae; Griseb., *Symb.* (1879), 161 : M., Ct.; Chod. et Wile., in *Bull. Herb. Boiss.* (1902), 541 : Saint Raphaël.
- — var. **serratifolia** Miers — in *l. c.*, 37 : in andibus mendocinis.
- *squarrosa* Miers = **Calycera viridiflora** (Phil.) Miers, var. **squarrosa** (Miers) Hicken.
- *ventosa* Mey. = **Nastanthus ventosus** (Mey.) Miers.
- **viridiflora** (Phil.) Miers. — *Contrib. to Bot.*, II (1860), 36, tab. 50, fig. C; Chod. et Wilc., in *Bull. Herb. Boiss.* (1902), 541 : Atuel; Burkhill, in Fitz Gerald's, *Erped.* (1899), 364, c. tab. : Puente del Inca; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 207; *Calycera nudicaulis* Phil., Burkhill, *l. c.*, 361 : Puente del Inca; *Gymnocaulus viridiflorus* Phil., *Linnaea*, 28 (1856), 706; *Boopis* (sic) *viridiflora* Miers, Chod.

- et Wilcz., in *Bull. Herb. Boiss.* (1902), 451 : Atuel.
- Calyccera viridiflora* f. **sinuata** (Miers) Hicken. (nov. comb.) — *Calyccera sinuata* Miers, *Contrib. to Bot.*, II (1860), 35, tab. 50, B : Puente del Inca : Hieron., *Sert. sanj.* (1881), 33 : Cerro del Tontal; O. Ktze., *Rev. Gen.*, III, 2 (1898), 127 : Paso Cruz; Reiche, *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 117 : in andibus 32°, species argentina; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 206 : Puente del Inca. — Frecuente en el valle de Uspallata, desde Punta de Vacas hacia la cumbre.
- — f. **squarrosa** (Miers) Hicken. (nov. comb.) — *Calyccera squarrosa* Miers, *Contrib. to Bot.*, II (1860), 35 : Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 206 : Reiche, *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 117 : in andibus 32-33°, species argentina.

Cryptocarpha

- Cryptocarpha spathulata* Cass. = **Acicarpha spathulata** R. Br.
- *tribuloides* Cass. = **Acicarpha tribuloides** Juss.

Gamocarpha

- Gamocarpha Ameghinoi* Speg. = **Moschopsis Ameghinoi** (Speg.) Hicken.
- *breviscapa* Phil. = **Gamocarpha Gilliesii** Miers.
- *caespitosa* Phil. (in colecc. Buchtien, n° ?) = **Gamocarpha Selliana** Reiche var. **multicaulis** Dus. (ap. Hicken). — Philippi no ha publicado ninguna planta con el nombre de *G. caespitosa*.
- *caleofuensis* Speg. = **Moschopsis caleofuensis** (Speg.) Dusen.
- **dentata** Phil., in *Anal. Univ. Chil.*, 41 (1872), 735; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 201. *Gamocarpha subandina* Speg. (1902), in *Nov. add.*, IV (1902), 305; Carrenleofú; Macloskie (1905), 762. — *Obs.* : Confrontando especies auténticas de Spegazzini con las típicas de Philippi, he podido comprobar la identidad de ambas.

- Gamocarpha dentata* Phil., var. **glaucescens** (Speg.) Hicken (nov. comb.); *Gamocarpha subandina* Speg., var. *glaucescens* Speg. (in schedae); Chubut.
- **Gilliesii** Miers — in *Contrib. to Bot.*, II (1860), 20, tab. 45, B; Reiche, *Engl. Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 117; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 202; Chod. et Wilcz, in *Bull. Herb. Boiss.* (1902), 542; Piedra de Burro; *Gamocarpha breviscapa* Phil., in *Anal. Univ. Chil.*, 85 (1894), 818.
- *patagonica* Speg. (1902) = **Gamocarpha Selliana** Reiche (1900). — Comparando los ejemplares del herbario chileno con los de Spegazzini he hallado que son idénticos.
- **Poeppigii** DC. — in DC., *Prodr.*, V (1836), 2; Remy, in Gay, *Fl. Chil.*, III (1847), 247; Weddell, *Chlor. and.*, II (1857), 8, tab. 44, B; Miers, *Contrib. to Bot.*, II (1860), 19, tab. 45, A; Neger, *An. Un. Chil.*, 57 (1899), 912: faldas orientales de la sierra de Villarica; Hicken, *Physis*, III (1913), 129; Neuquen; *Boopis alpina* Poepp. et Endl., en *Nor. Gen.*, I (1835), 21, tab. 33; Less., in *Linnaea*, VI (1831), 258.
- **Selliana** Reiche — in Engl., *Bot. Jahrb.*, 29 (1900), 117: Patagonia 42°25'; id., in *Fl. Chil.*, III (1902), 200; *Gamocarpha patagonica* Speg., in *Nor. add.*, IV (1902), 303; Chubut.
- — var. **multicaulis** Dus., in *Gefässpfl. Ost. u. Südpat.* (1907), 39, tab. 8, fig. 1-5: Río Cholila; *Gamocarpha caespitosa*, inolec. Buchtien, n° ?
- *subandina* Speg. = **Gamocarpha dentata** Phil.
- — var. *glaucescens* Speg. — in shed. = **Gamocarpha dentata** Phil. var. **glaucescens** (Speg.) Hicken.

Gymnocaulus

Gymnocaulus viridiflorus Phil. = **Calycera viridiflora** (Phil.) Miers.

Leucocera

Leucocera annua Turcz. = **Calycera leucanthema** (Poepp.) Reiche.

MOSCHOPSIS

Moschopsis Ameghinoi (Speg.) Hicken, nov. comb. — *Boopis Ameghinoi* Speg., en *A. S. C. A.* 48 (1901), 175; *Gamocarpa Ameghinoi* Speg., in *An. Mus. Bs. As.* (1902), 302.

— **caleofuensis** (Speg.) Dusen — in *Gefüßpfl. Ost. u. Südpat.* (1907), 41; *Gamocarpa caleofuensis* Speg., in *An. Mus. Bs. As.* (1902), 303.

— **Leyboldii** Phil. — in *An. Un. Chil.*, 27 (1865), 335; Chod. et Wilcz., in *Bull. Herb. Boiss.* (1902), 542: col Tinguiririca. — San Rafael (Hicken).

— **rosulata** (N. E. Br.) Dusen — in *Gefüßpfl. Ost. u. Südpat.* (1907), 42 [in nota]; *Acicarpa rosulata* N. E. Br., Hook., *Icon. Pl.*, 27 (1900), tab. 2636, B: Cerro Toro; Dusen, *Gefüßpfl. Magellansl.*, III, 1 (1900), 122: Cerro Toro; id., *Zur Kennt. d. Gefüßpfl.* (1901), 236: Cerro Toro; Macloskie, *Princeton Exped.*, (1905), 764, tab. 96.

— **spathulata** Dus. — in *Gefüßpfl. Ost. u. Südpat.* (1907), 41, tab. 5, fig. 7-8 et tab. 8, fig. 13-15: Río Fósiles. Lago Viedma (in herb. Hicken).

— **trilobata** Dus. — in *Gefüßpfl. Ost. u. Südpat.* (1907), 40, tab. 5, fig. 5-6 et tab. 8, fig. 6-12: Río Fósiles.

NASTANTHUS

Nastanthus agglomeratus Miers — in *Contrib. to Bot.*, II (1860), 13, tab. 43. Reiche *Fl. Chil.* III (1902) 190. Chod. et Wilcz., in *Bull. Herb. Boiss.* (1902), 541: Cajón del Burro; *Calycera andina* Miers, in *Trav. Chil.*, II (1826), 531.

— — var. **laciniatus** (Miers) Reiche, in Reiche,

Fl. Chil., III (1902), 190; *Nastanthus laciniatus* Miers, *Contrib. to Bot.*, II (1860), 14, tab. 44; *Boopis laciniata* Ball, in *Contrib.* (1884), 220: Río Negro, Chubut; Macloskie, *Princeton Exped.*, (1905), 759.

Nastanthus agglomeratus var. **pinnatifidus** (Miers) Reiche — in *Fl. Chil.*, III (1902), 190; Hicken, *Physis*, III (1913), 129: Nenquen; *Nastanthus pinnatifidus* Miers, *Contrib. to Bot.*, II (1860), 15, tab. 44.

— **bellidifolius** (Phil.) Reiche. — in *An. Un. Chil.* 41 (1872) 736. El tipo no se ha citado aún para la RA.

— — var. **chubutensis** (Speg.) Hicken (nov. comb.); *Nastanthus chubutensis*, in *An. Mus. Bs. As.*, (1902), 306: Carren-leofí.

— **caespitosus** (Phil.) Reiche — in *Fl. Chil.*, III (1902), 191; *Boopis caespitosa* Phil., in *Viaje del Des. Atac.* (1860), 200. — Cordilleras de Mendoza austral (in herb. Hicken).

— *chubutensis* Speg. = **Nastanthus bellidifolius** Phil., var. **chubutensis** (Speg.) Hicken.

— **Diazi** Phil. — *Boopis Diazii* Phil., in *Anal. U. Chil.* (1862), 396: id. in. *Linnaea*, 33 (1864), 106: in latere mendocino Andium (Portillo); Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 189: es de la RA.

— *laciniatus* Miers = **Nastanthus agglomeratus** Miers, var. **laciniatus** (Miers) Reiche; *Nastanthus laciniatus* Miers, in *Contrib. to Bot.*, II (1860), 16; Chod. et Wilez., in *Bull. Herb. Boiss.* (1902), 542: Tinguiririca; Ball, *Contrib.* (1884), 220: Río Negro, Chubut; *Boopis laciniata* Ball, l. c., 220: Río Negro, Chubut; Macloskie (1905), 759.

— **patagonicus** Speg. — in *Nor. add.* IV (1902), 307: Tekachoiq; Macloskie, *Princeton Exped.* (1905), 763.

— *pinnatifidus* Miers = **Nastanthus agglomeratus** Miers, var. **pinnatifidus** (Miers) Reiche.

— **sanjuaninus** (Hieron.) Hieron., in *Sert. sanj.* (1881), 31; Kurtz, *Dos viaj.* (1893), 201; *Boopis* (*Nas-*

tanthus) *sanjuanina* Hieron., l. c., 31 : Leoncito.

- Nastanthus scapigerus** Miers — in *Contrib. to Bot.*, II (1860), 16, tab. 49. D; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 152; *Boopis scapigera* Remy, en Gay, *Fl. Chil.*, III (1847), 250; Weddell, *Chlor. and.*, II (1857), 7, tab. 44, A; Macloskie, *Princeton Exped.*, (1905), 761, tab. 26 (color.); Phil., *An. U. Chil.*, 85 (1893-94), 816 : Santa Cruz (Dusen, n° 5604).
- **spathulatus** Miers — in *Contrib. to Bot.*, II (1860-64), 17; Reiche, *Fl. Chil.*, III (1902), 192; *Boopis spathulata* Phil., in *Linnaea*, 28 (1856), 708; Neger, *An. Un. Chil.*, 57 (1899), 925 : cerca de Junín de los Andes.
- **ventosus** (Mey) Miers. — *Calycera ventosa* Mey, *Reise um die Erde*. I (1835), 356. Hieron., *Bol. Acad. Córdoba*, IV (1881), 32; Remy, in Gay, *Fl. Chil.*, III (1847), 256; *Boopis ventosa* OK., *Rev. Gen.*, III, 2 (1898), 127; *Boopis Miersii* Phil. (según O. Ktze., l. c.); *Boopis scapigera* Phil. (non Remy).

SUPLEMENTO

Calycera boopidea Hicken (nov. spec.)

Planta 20-30 cm. alta, erecta, ramosa, glaberrima. Caulibus teretiusculis, longitudinaliter striatis, parce foliatis. Foliis glaberrimis pinna-tifidis, rache centrale usque ad 3 cm. longo 1-1 1/2 mm lato ; 3-4-5 laci-niis linealibus fere 1 mm. latis utroque latero instructo, integris vel pau-cibus dentibus munitis. Foliorum ambitu lanceolato usque ad 3 cm. longo et 1,5 cm. lato. Capitulis ad apicem ramulorum corymbum laxum for-mantibus. Pedunculis ad 15 mm. long. involuero gamophyllo, ad medium lobulis deltoideis, inaequalibus, marginibus integris acutis vel subulatis diriso. Paleis receptaculi liberis linealibus-ellipticis sat numerosis 3-4 mm. longis floribus pedicellatis, corolla pentamera infundibuliforme 2 mm. longa ; antheris omnino liberis, filamentis tantum apice, solutis, in

tubo staminale coalitis. Stylo exserto filiforme apice globoso. Achaeniis profunde 5 sulcatis, primaticis aut pyramidatis, 2 mm. longis 1,25 mm. latis, laevibus, dimorphis: aliis sepalis brevissimis rotundatis aliis sepalis subulatis vel spinulentibus ad 1 mm. long. ornatis.

Obs.: Ad confluentiam fluminum Limay et Neuquen inventa.

Planta de 20 a 30 centímetros de alto, erecta ramificada, glabérri-ma en todas sus partes. Tallos cilíndricos, longitudinalmente estria-dos, con pocas hojas, de cuyas axilas salen las ramitas que van a ter-minar en capítulos. Hojas glabérrimas, profundamente partidas o pi-natífidas. Raquis central hasta 3 centímetros de longitud. 1 a 1 1/2 mi-límetro ancho, con 3-4-5 lacinias lineales de cada lado y que apenas tienen 1 milímetro de ancho, enteras o con pocos diente-cillos en sus bordes. El contorno de las hojas es lanceolado hasta 3 centímetros de longitud y 1,5 centímetro de latitud. Capítulos en los extremos de las ramitas formando una especie de corimbo. Pedúnculos hasta 15 milíme-tros de longitud; involuero gamofilo, dividido hasta cerca de la mitad en lóbulos triangulares, desiguales en ancho y longitud, de margen íntegro, agudos y aun algunos subulados. Receptáculo con páleas li-bres, lineal-elípticas, bastante abundantes de 3-4 milímetros de lon-gitud; flores muy numerosas, con un pedicelo bien marcado filiforme de medio milímetro de longitud. Corola embudada de 2 milímetros de longitud, dividida hasta la mitad en cinco lóbulos lineales. Anteras libres en toda su extensión, filamentos soldados en tubo estaminal de tres cuartos de milímetro de longitud. Estilo muy saliente con el ex-tremo globoso. Aquenios fuertemente surcados, prismáticos o apenas piramidados, de 2 milímetros de longitud y 1 a 1,25 milímetro de la-titud, completamente lisos y coronados por los restos de los sépalos que pueden ser redondeados en algunos aquenios y subulados y aun espinescentes en otros. Estas espinas que alcanzan un milímetro de longitud se hallan bien marcadas y son bastante rígidas.

Confluencia del Limay (territorio del Neuquén) en terrenos secos.

Obs.: He podido comparar mis ejemplares con las especies afines del herbario de Santiago de Chile sin hallar nada parecido. Por sus hojas coincide exactamente con la *Boopis pozoaciformis*, pero difiere por la forma de las brácteas involucrales. El dimorfismo de sus aque-nios la lleva al género *Anomocarpus* cuyas especies han sido incluidas en *Calycera*.

Calycera pulvinata Remy f. **cauligera** Hicken (nov. f.)

Por los numerosos ejemplares que tengo a la vista, considero la especie *C. pulvinata* como muy variable. Insensiblemente se puede pasar desde la forma típica a la *C. crenata* Fries y a formas ramificadas que recuerdan mucho a la *C. intermedia* Phil., formas que quizá haya que identificar con esta última. Considero prudente por ahora separar la *C. intermedia* de la *pulvinata*; pero no puedo menos que reducir la *C. crenata* a una mera forma de la *C. pulvinata* Remy y a crear otra forma que tiende a ligar, como he dicho, a ésta con la *intermedia* Phil. y que designaré con el nombre de f. *cauligera*, y que se diferencia por su aspecto ramificado, tendido, con aquenios más espinosos que en la *crenata* y por lóbulos corolinos más profundamente incisos, hasta algo más allá de la base de las anteras.

Tucumán: Lara, 3200 metros (Rodríguez, 295). Entre estas muestras las hay desde formas muy parecidas a la *crenata* hasta las que recuerdan a las *intermedia* Phil.

Jujuy: Cumbre de Malamala, 3400 metros (Lillo, n° 3432). Maimará, 4000 metros (Lillo, n° 4894).

Catamarca: Andalgalá (Joergensen, n° 1178).

Territorio de los Andes (Holmberg, n° 972).

Tucumán: Tafi del Valle, 4200 metros (Dinelli, n° 512) [ejemplares de ramas cortas que tienden a la *crenata*].

Jujuy: Cochinoca (Gerling, n° 91): dos ejemplares, uno con ramas tan breves que podría ser clasificado como *crenata* y otro con ramas más pronunciadas y que nos llevan a la forma *cauligera* bien pronunciada.

El estudio comparativo de mis ejemplares me lleva a creer que la forma *crenata* y la especie *pulvinata* no son sino adaptaciones a la Puna, de la forma *cauligera*, la que a su vez podría ser una mera modificación de la *intermedia* Phil.

En el mismo aquenio se pueden hallar sépalos ovalado-mucronados y lanceolado-subulados, con lo que desaparece la diferencia principal entre *crenata* y *pulvinata*, que quizá resulten idénticas.

New York Botanical Garden Library

QK 257 .H522 1919

Hicken, Cristobal M/Estudios botanicos : gen

3 5185 00052 1599