2

932
M

COLEOPTERA NEERLANDICA

DE SCHILDEVLEUGELIGE INSECTEN

VAN

NEDERLAND

EN HET

AANGRENZEND GEBIED

DOOR

JHR. ED. EVERTS, PHIL. DR.

*Leeraar in de Nat. Historie aan de Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage
Lid van de Nederlandsche en andere Entomologische Vereenigen*

DEEL I

Met 62 houtsnedefiguren in den tekst

EERSTE GEDEELTE

'S GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF
1898

U. S. NATIONAL MUSEUM

LIBRARY OF
Henry Guernsey Hubbard
AND
Eugene Amandus Schwarz

DONATED IN 1902

ACCESSION NO. *177574*

Verlag von MARTINUS NIJHOFF, Haag (Holland).

COLEOPTERA NEERLANDICA

DE SCHILDEVLEUGELIGE INSECTEN VAN NEDERLAND
EN HET AANGRENZEND GEBIED

DOOR

Jhr. Ed. EVERTS, Phil. Dr.

In zwei Bänden, Lexikon 8°.

(IN HOLLANDISCHER SPRACHE.)

Ein praktisches, analytisches Handbuch zum Determinieren der in den Niederlanden vorkommenden Käferarten giebt es bis heute nicht. Neben den ausgezeichneten Werken von Dr. S. C. Snellen van Vollenhoven für die niederländischen Hemiptera-Heteroptera, von P. C. T. Snellen für die Lepidoptera und von F. M. van der Wulp für einen Teil der Diptera wird dieses Werk von Dr. Everts über die niederländischen Coleoptera gewiss einen Ehrenplatz einnehmen.

Diese Arbeit wird enthalten, 1°. die Beschreibung aller in den Niederlanden, *sowie auch in Belgien und dem Grenzgebiete Deutschlands* bekannten Käferarten; 2°. eine Uebersicht der Morphologie und Physiologie der Coleopteren; 3°. eine Litteratur-Uebersicht.

Die erste Abteilung (ungefähr die Hälfte) des ersten Bandes enthält eine tabellarische Uebersicht der Unterarten und der Familien sowie auch die analytische Bearbeitung der Cicindeliden bis inclusive die Staphyliniden.

Die zweite Abteilung, die Fortsetzung der analytischen Bearbeitung bis zu den Lucaniden enthaltend, wird im Herbst 1898 erscheinen. Damit wird der erste Band (mit 62 Holzschnittfiguren im Text) vollständig sein.

Die erste Abteilung des ersten Bandes, 23 Bogen oder 368 Seiten
enthaltend, mit 27 Holzschnitten im Text, ist erschienen.

Der Preis ist **Mk. 11.—**.

Der Verleger

MARTINUS NIJHOFF.

HAAG, April 1898.

BESTELL-ZETTEL

Unterzeichneter wünscht durch Vermittlung des Buchhändlers

in

EVERTS, Coleoptera Neerlandica. 1er Bd. Erste Abteilung.
Preis **Mk. 11.—**.

Datum.

Name und Wohnort.

COLEOPTERA NEERLANDICA

1775-74

COLEOPTERA NEERLANDICA

DE SCHILDVLEUGELIGE INSECTEN

VAN

NEDERLAND

EN HET

AANGRENZEND GEBIED

DOOR

JHR. ED. EVERTS, PHIL. DR.

*Leeraar in de Nat. Historie aan de Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage
Lid van de Nederlandsche en andere Entomologische Vereenigingen*

EERSTE DEEL

Met 62 houtsneêfiguren in den tekst

'S GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF

1898.

'S GRAVENHAAGSCHE BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ
VOORHEEN GEBR. GIUNTA D'ALBANI.

VOORREDE.

Toen in 1887 de *Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen* te Haarlem de uitgave mijner „Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Schildvleugelige Insecten” welwillend op zich nam, beschouwde ik deze als den grondslag voor eene Handleiding tot het bestudeeren der in Nederland voorkomende kevers. Sedert zijn meer dan 10 jaren verstreken en het aantal der in ons land waargenomen soorten is voortdurend grooter geworden. Ook thans is de grens nog niet bereikt, en is het te verwachten, dat nog menige keversoort aan de Nederlandsche Fauna zal worden toegevoegd. Toch meen ik dat nu de tijd gekomen is om gevolg te geven aan het plan om die Handleiding, waartoe ik reeds gedurende vele jaren de bouwstoffen verzamelde, het licht te doen zien. Immers een praktisch, analytisch handboek, waarmede men de hier te lande voorkomende keversoorten kan determineeren, bestaat tot nu toe niet. Naast de uitnemende werken van onze gevierde entomologen, wijlen Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven voor de Nederlandsche Hemiptera-Heteroptera en mijne vrienden P. C. T. Snellen voor de Lepidoptera en F. M. van der Wulp voor een deel der Diptera, hoop ik dat mijne poging om een dergelijk werk over de Coleoptera het licht te doen zien, als een niet onwaardige tegenhanger van die geschriften zal kunnen gelden.

Wat de inrichting van mijn boek betreft, heb ik gemeend niet beter te kunnen doen, dan de algemeen als praktisch erkende „Fauna Austriaca” van Ludwig Redtenbacher zooveel mogelijk, ook wat de schikking der te bewerken stof en zelfs de keuze der lettertypen aangaat, als model te gebruiken. De grootste afwijking is wel, dat ik bij iedere familie alles bijeengehouden heb, nl. de beschrijving met de daarbij behoorende tabellen der genera en species. Over het gebruik van het werk zal ik niet uitweiden, daar de gevolgde analytische methode algemeen toepassing gevonden heeft en dus voldoende bekend mag verondersteld worden.

Voor het wetenschappelijke gedeelte heb ik, behalve uit de werken van oudere meesters onzer wetenschap, vooral geput uit die van erkende corypheeën van lateren tijd. Als zoodanig noem ik L. Bedel, A. Fauvel, L. Ganglbauer, George H. Horn, G. Kraatz, Edm. Reitter, G. Seidlitz, D. Sharp, C. G. Thomson en J. Weise ¹⁾.

Ten opzichte der nomenclatuur houd ik mij aan de opvatting, die ik

1) Over de titels der werken van deze en andere schrijvers zie men het 2de deel.

reeds in mijne „Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Schildvleugelige Insecten” 1887 op blz. 10, noot 1, ontwikkelde. Zoo kan ik mij geenszins vereenigen met de in lateren tijd, door enkele auteurs verkregen resultaten der hardnekkig doorgevoerde prioriteits-jagerij (vooral voor generieke namen), wat niet anders dan verwarring te weeg brengt en bij slot van rekening toch eigenlijk het minst wetenschappelijk gedeelte onzer wetenschap is. Is de wetenschap er door gebaat, dat de naam *Cistela* eigenlijk blijkt gegeven te zijn aan dieren, die bij iederen Coleopteroloog als *Byrrhus* bekend zijn, terwijl *Byrrhus* daarentegen op de bekende dood-kloppertjes (*Anobium*) zou duiden? Wat te denken van *Melolontha*, niet meer op den Meikever doelende, maar op het Chrysomeliden-genus *Clytra*; *Peltis* voor *Phosphuga*, *Silpha* voor *Necrophorus*, *Liodes* met *Anisotoma* omgewisseld, *Bruchus* voor *Ptinus*, *Mylabris* voor *Bruchus*, *Ips* voor *Tomicus* enz.? — Zoo bepleit o. a. G. von Seidlitz de *Cistela*—*Byrrhus*-kwestie (Naturgesch. d. Ins. Deutschl. begonnen v. Erichson, I Abth. Coleoptera, 5er Band, 2e Hälfte, 1e Liefer., Berlin 1896, *Alleculidae*) ongetwijfeld op zeer schrandere wijze, doch zou dit m. i. ook allicht met een contra-pleidooi kunnen bestreden worden.

Zeer terecht zegt de bekende kruidkundige Prof. W. D. J. Koch in de voorrede van de eerste uitgave van zijn welbekend „Taschenbuch der Deutschen und Schweizer Flora”, Leipzig 1844: „Es ist bei dem vielfachen Wechsell der Namen in unserer Zeit gewiss sehr wünschenswerth, dass in Büchern, wie die meinigen, solche gebraucht werden, die Jeder sogleich versteht. Mit Namen, welche oft gewechselt haben, ist jetzt ohnehin kein Heil mehr; ich weiss aus Erfahrung, welchen Commentar seinen begleitenden Zuhörern man auf Excursionen zu geben hat, wenn man eine Pflanze mit dem Namen benennt, welchen im Jahre vorher eine andere trug. Wenn es mit Dank anerkannt werden muss, dass man die von früheren Schriftstellern aufgestellten Arten aufklärte, so ist doch die praktische Anwendung eines solchen Namens noch manchen Bedenklichkeiten unterworfen, und zwar weil diese Umänderung oft nur auf einer individuellen Ansicht beruht und nicht auf einem strengen Beweis, hauptsächlich aber, weil es in das Reich der Unmöglichkeiten gehört, zu bewirken, dass die jetzt lebenden Botaniker über einen solchen Namen einig werden, den nach wie vor der eine für die jetzt als die echte angenommene, der andere für die früher so benannte Pflanze gebraucht.” Hetzelfde geldt ook voor de *Entomologie*.

Daar ook namen, na lang gebruik, het burgerrecht verkregen hebben, zoo begrijp ik niet, waarom sommige schrijvers zich zooveel haarkloverijen getroosten, om eigenlijk de nomenclatuur in de war te brengen. Het hoofddoel

der wetenschap is en blijft toch, de verschillende vormen in de natuur te leeren kennen.

Het kan zijn nut hebben, hier kortelijk mijne zienswijze aan te geven omtrent: *aberratie*, *form*, *variëteit* of *ras*.

1^o. Onder *aberratie* versta ik, wanneer onder eene bepaalde *kleur* of *sculptuur* zich enkele afwijkingen voordoen, die niet aan eene constante localiteit of voedingsplant moeten worden toegeschreven. Zoo onderscheid ik met Dr. A. Fleischer (zie bldz. 27, noot 1), *aberratio coloris* en *aberratio sculpturae*.

2^o. Onder *form*, eene inconstante variëteit, door continueerende overgangen met den typischen vorm verbonden; b. v. de *gerleugelde* en *ongevleugelde* vorm eener soort, de *macropter*- en *brachypter* vorm; de vormen van *Atemeles* met verschillend halsschild, enz.

3^o. Onder *variëteit*, wanneer eene tamelijke constante, scherp aangeduide variatie zich onder het type vertoont; b. v. de var. *rufosemoratus* Letzn. van *Carabus granulatus* L.; de var. *consitus* Panz. van *Carabus monilis* F.; de var. *tibialis* Dej. van *Chlaenius nitidulus* Schrk. enz.

4^o. Onder *ras* eene gelocaliseerde variëteit, die meer streng gebonden is aan eene bepaalde plaats of plant; b. v. het ras *riparia* Latr. van *Cicindela hybrida* L.; het ras *sanguinicollis* Steph. van *Paederus ruficollis* F. enz.

Voor de kleinere soorten is de beschrijving doorgaans uitvoeriger dan voor de groteren, hetgeen noodig was om de verschillen zoo scherp mogelijk te karakteriseeren.

Ten einde ruimte te sparen, heb ik bij de auteurs geen citaten gevoegd, maar geef aan het einde van het 2e deel een literatuur-overzicht. Ook hoop ik alsdan in een afzonderlijk hoofdstuk de *Morphologie* en *Physiologie* der *Coleoptera* te behandelen.

Mijn arbeid zou stellig minder volledig zijn, indien ik daarbij niet hulp en steun had ondervonden van de Coleopterologen in de verschillende deelen van ons land. Niet alleen vertrouwden zij hunne vangsten aan mij toe ter determinatie of revisie, doch meestal stonden zij ook met zeldzame welwillendheid alle in mijne verzameling ontbrekende soorten aan mij af; daardoor werd ik in staat gesteld eene standaard-collectie der Nederlandsche Coleoptera te vormen, die tot grondslag diende voor dit werk. Ik kon nu alle inlandsche soorten nader onderzoeken en meten, iets wat dikwerf bleek noodig te zijn, daar vele schrijvers de lengtematen onjuist opgeven. Gaarne breng ik dan ook een hartelijk woord van dank aan die zoozeer gewaardeerde medewerkers. In de eerste plaats gedenk ik hier mijne vrienden Mr. A. F. A. Leesberg en Dr. H. J. Veth, met wie ik reeds meer dan 25 jaren de verschillende provinciën

van ons vaderland doorzocht heb en verder zoo velen, die mij allen in meerder of minder mate aan zich verplicht hebben. Ik rangschik hen naar de provinciën, met opgaaf van de plaats waar zij vooral hebben verzameld.

Noord-Holland. De Heeren J. Jaspers Jr., J. Kinker, Dr. J. Th. Oudemans en J. Versluys Jr. (Amsterdam); H. W. Groll (Haarlem); C. J. Dixon (Kolhorn); K. J. W. Kempers, C. Ritsema Cz., wijlen W. Roelofs en Dr. H. J. Veth (eilanden Texel, Vlieland en Terschelling).

Zuid-Holland. J. Bolten, Dr. A. W. M. van Hasselt, K. J. W. Kempers, Mr. A. F. A. Leesberg, F. M. van der Wulp (den Haag); C. J. Dixon, D. van der Hoop, M. M. Schepman, P. C. T. Snellen, Dr. H. J. Veth (Rotterdam); Dr. D. Mc. Gillavry, Dr. W. F. Koppeschaar, C. Ritsema Cz., wijlen Emile Seipgens en wijlen Dr. S. C. Snellen van Vollenhoven (Leiden).

Zeeland. Mr. A. J. F. Fokker (Zierikzee); H. L. Gerth van Wijk, N. H. Lafontijn, Dr. J. G. de Man en Dr. H. J. Veth (Walcheren).

Utrecht. G. A. Six (Zeist-Driebergen); J. R. H. Neervoort van de Poll (Doorn); wijlen W. Roelofs (Amerongen).

Friesland. Dirk ter Haar (Warga); J. Jaspers Jr. (Heerenveen); Dr. A. C. Oudemans (Sneek).

Overijssel. G. de Vries van Doesburgh (Oldenzaal).

Gelderland. Wijlen A. B. van Medenbach de Rooij, Dr. A. C. Oudemans en Dr. H. J. Veth (Arnhem); Dirk ter Haar (Nijmegen); H. J. Groll (Vorden); E. Gerdes (Doetinchem); wijlen Emile Seipgens (Zutphen en Tiel); H. A. de Vos tot Nederveen Cappel (Apeldoorn); Mr. D. L. Uyttenbogaart (Tiel); Prof. Dr. J. Ritzema Bos, Dr. H. Bos en K. J. W. Kempers (Wageningen); K. J. W. Kempers (Nijkerk); Vinc. Mar. Aghina (Huissen).

Noord-Brabant. Dr. J. Bosscha Jzn. en F. J. M. Heylaerts (Breda); Dirk ter Haar (Cuyk).

Limburg. Wijlen Mr. A. H. Maurissen, Baron O. de Heusch en E. Schols (Maastricht); A. van den Brandt (Venlo); H. J. H. Latiers en Erich Wassmann S. J. (Roermond); H. Verheggen (Roosteren).

Sommige provinciën werden door onze Coleopterologen met bijzondere voorliefde onderzocht, hetzij doordat er daar meer woonden dan in andere streken, hetzij omdat de natuur of de aard van den bodem hen er heen trok. Dit laatste geldt vooral voor Zuid-Limburg, waar de oudere gronden met hunne belangrijke Flora telkens nieuwe merkwaardigheden opleverden, getuige o. a. het voorkomen van de meer uit het zuiden bekende *Donacia appendiculata* Ahr. en *Chaetocnema arenacea* All. Het is vooral tengevolge van dezen van het overige gedeelte van ons land zoozeer afwijkenden bodem van Zuid-Limburg, dat de

studie der Nederlandsche Coleoptera slechts dan met vrucht kan geschieden, wanneer de grenzen der Fauna verder Oost- en Zuidwaarts buiten de politieke grenzen worden getrokken.

Behalve de in Nederland voorkomende Coleoptera heb ik daarom ook de mij bekend geworden soorten uit België en het aangrenzend gedeelte van Duitschland in mijn werk opgenomen. Als grens voor de behandelde Fauna trek ik eene lijn van Hamburg langs Bremen, Osnabrück, Münster, Dortmund, Elberfeld, langs den Eifel, om de oostelijke en zuidelijke grens van België, over Rijssel tot Calais 1). Veie der als zoodanig opgevoerde soorten zullen vroeger of later nog wel binnen onze grenspalen worden aangetroffen. De analytische tabellen kunnen dus dienst doen, om alle soorten van het hierboven beschreven gebied te determineeren, wat evenwel niet wegneemt, dat er zeker nog leemten overblijven.

Voor zoover mij mogelijk was heb ik de mij bekende vindplaatsen uit het aangrenzend gebied vermeld. De gegevens daarvoor vond ik vooral in de bekende Kever-Fauna's van C. H. Preller (Hamburg), F. Brüggemann (Bremen), A. Metzger (Oost-Friesland, Norderney en Juist), C. F. Wiekens (Oldenburg), Fr. Westhoff (Westfalen), C. Verhoeff (Soest en Norderney), C. Cornelius (Elberfeld), A. Förster en M. Bach (Rijnprov.), A. Preudhomme de Borre e. a. (België), A. de Norguet (Depart. du Nord). Ook leerde ik eenige merkwaardige soorten kennen door Dr. O. Schneider op het eiland Borkum verzameld.

Wat in het bijzonder België betreft, werd ik voor een groot deel in de gelegenheid gesteld het materiaal zelf te zien. In de eerste plaats werd mij door de hulpvaardigheid van den heer G. Severin, conservator van de afdeeling Entomologie aan het Kon. Museum van Nat. Hist. te Brussel, alles uit de rijke verzamelingen dezer inrichting, wat mij wenschelijk voorkwam, steeds met de meeste bereidwilligheid ter inzage toegezonden. Hetzelfde ondervond ik ook van andere Belgische collega's, vooral van de Heeren Baron P. de Moffarts, A. Preudhomme de Borre, H. Verheggen, A. Bivort e. a. Aangenaam is het mij genoemde heeren voor hunne medewerking mijn oprechten dank te betuigen.

Voor de in het aangrenzend gebied bekende, doch niet in Nederland aangetroffen soorten, beschikte ik over een vrij volledig materiaal uit België, Duitschland en Frankrijk. Slechts zeer enkele, niet in mijne verzameling voorhanden soorten, kon ik bestudeeren naar exemplaren, welke mij welwillend toevertrouwd werden door den Conservator der afdeeling Entomologie aan het Weener Hofmuseum, den heer Ludwig Ganglbauer, alsmede door den heer

1) De Sous-Région Rhénane van de Région Septentrionale door A. Fauvel in zijne Faune Gallo-Rhénane etc. Caen 1868, blz. 27, valt grootendeels binnen dit gebied.

J. R. H. Neervoort van de Poll. Ook hun betuig ik daarvoor mijn dank.

Nog is het mij aangenaam te gedenken de Heeren Albert Fauvel te Caen, die mij jaren lang met de determinatie van *Staphyliniden* behulpzaam was, en Edmund Reitter, die zoo vele moeilijkheden bij de determinatie van verscheidene andere *Staphylinidea* en *Clavicornia* wist op te helderen.

Voorts mag ik niet verzuimen een woord van dank uit te spreken tot de Nederlandsche Entomologische Vereeniging voor de geldelijke tegemoetkoming, die zij aan het verschijnen van het werk verleende. En ook is het hier de plaats om aan de firma Martinus Nijhoff mijne erkentelijkheid te betuigen voor de bereidwilligheid, waarmede zij tot de uitgave is overgegaan en een woord van lof uit te brengen jegens de 's Gravenhaagsche Boek- en Handelsdrukkerij, voorheen Gebr. Giunta d'Albani, voor hare voortreffelijke uitvoering.

Ten slotte zij nog een hartelijk woord van dank gebracht aan mijne vrienden Dr. H. J. Veth en F. M. van der Wulp voor de hulp, mij bij de correctie der proeven verleend.

Daar toch nog enkele misstellingen overbleven, noodig ik den welwillenden lezer uit, de weinige errata en addenda maar dadelijk in den tekst aan te brengen.

Ik houd mij aanbevolen voor gegronde opmerkingen en zal die dankbaar aanvaarden, daar ik, niettegenstaande alle zorg daaraan besteed, te zeer bewust ben van de vele gebreken die mijn werk aankleven.

Moge het aan veler wenschen te gemoet komen en menig jeugdig natuurvriend opwekken tot de studie van een onderdeel der systematische Zoölogie, waarvan de beoefening zoowel voor den wetenschappelijken onderzoeker als voor den eenvoudigen verzamelaar, boeiend en verrassend mag heeten.

Moge eene welwillende beoordeeling het loon zijn voor den aan dit werk besteden arbeid.

Den Haag, Maart 1898.

ED. EVERTS.

SYSTEMATISCHE RANGSCHIKKING DER COLEOPTERA.

Overzicht der Sub-Orden 1).

- 1 Kop gewoon, slechts bij uitzondering snuitvormig verlengd 2), of met eene rudimentaire aanduiding daarvan 3), of alleen de mond een weinig snuitvormig verlengd 4). Bovenlip duidelijk aanwezig, bij uitzondering onder den clypeus min of meer verborgen. Tasters lang, soms zeer lang, en bewegelijk. Sprietten van allerlei vorm, doch nimmer zooals bij de Rhynchophora. Prothorax met meer of minder duidelijke naden tussehen het pronotum en de episterna, welke laatste door een naad van het prosternum afgescheiden zijn (Fig. 4); soms zijn deze naden door vergroeiing bijna uitgewischt. Gewrichtsholten der voorpooten aan de achterzijde al of niet door takken van de epimeren van den prothorax gesloten; deze takken sluiten echter nooit volkomen tegen elkaar aan en zijn derhalve ook nimmer met elkaar vergroeid. Achterlijf met vijf tot negen vrije sterniten; of wel zijn de drie eersten vergroeid, zeldzamer de vier eersten onbewegelijk 5), of wel de twee eersten van de vijf sterniten vergroeid 6). Tarsen meestal vijledig, ook wel schijnbaar vierledig, daar het 4de lid rudimentair en in het 3de verscholen is 7), in welk geval de sprietten draad-, borstel- of snoervormig, getand, gezaagd of gekamd, naar het uiteinde min of meer verdikt of gezaagd of wel van 5 grootere eindleedjes voorzien zijn 8); ook is soms het 1ste tarslid moeilijk zichtbaar (enkele Cleridae). De voor- en middel-tarsen alleen zijn bij uitzondering schijnbaar vierledig, doordat het 4de lid uiterst klein en moeilijk zichtbaar is (sommige Dytiscidae 9)), of wel alleen de voor- en middel-tarsen duidelijk 4-ledig (enkele Staphylinidae 10)), of alleen de voortarsen 4-ledig en de middel- en achtertarsen 5-ledig (enkele Staphylinidae 11) en bij enkele Melyridae 12)). Bij de Heteromera zijn de voor- en middel-tarsen 5-, de achtertarsen 4-ledig. Bij uitzondering zijn de voortarsen 5-, de middel- en achtertarsen 4-ledig (het Staphylinen-genus *Tanygnathus*). Wanneer alle tarsen duidelijk 4-ledig zijn, dan zijn de tergten grotendeels chitineus en niet door de dekschilden bedekt 13), of de sprietten zijn herzij onregelmatig (Heteroceridae Fig. 59 I) of naar het uiteinde geleidelijk verdikt, knopvormig of met grootere eindleedjes (Georyssidae, Tritomidae, Colydiidae, Cioidae, Corylophidae, Clambidae 14) en eenige Anisotomidae). Ook kunnen de tarsen schijnbaar 3-ledig zijn, daar de beide eerste leedjes meer of minder verbreed en aan de onderzijde viltig, het uiterst kleine derde lid benevens de helft van het klawlid in het lobvormig verbreed tweede ingesloten zijn (Endomychidae, Coccinellidae). Bij uitzondering zijn alle tarsen duidelijk drie- 15), tweeledig 16) of onduidelijk tweeledig (wellicht drieledig 17) 2

Kop vóór de oogen snuitvormig verlengd (Fig. 115 I en 119), slechts bij de in schors of in hout gravende Scolytidae (Fig. 122) en Platypidae is de snuit rudimentair of ontbrekend. De bovenlip ontbreekt geheel, behalve bij enkele Scolytidae, waar zij rudimentair is en bij de Platyrrhinidae en Nemomychidae, waar zij duidelijk ontwikkeld is. Tasters kort en stijf, rudimentair en onbewegelijk, met in grootte afnemende leedjes; slechts bij de Platyrrhinidae en Nemomychidae zijn zij, als bij de overige Coleoptera, slank en buigzaam. Sprietten duidelijk geknikt (Fig. 115 I) 18), in een groeffje ingeplant, dat veelal naar achteren in den

- 1) De in deze tabel aangehaalde houtsneefiguren zijn van 1 tot 62 in het 1ste deel en die van 63 tot 124 in het 2de deel van dit werk tusschen den tekst geplaatst.
- 2) Bij enkele genera van de families der Curculionidae, Pythidae (Fig. 101 II) en Oedemeridae is de kop tot een platten snuit verlengd.
- 3) Bij de fam. der Bruchidae (Fig. 112).
- 4) Bij vele Lycidae.
- 5) Bij de fam. der Heteroceridae.
- 6) Bij de fam. der Buprestidae.
- 7) Bij de fam. der Bruchidae, Cerambycidae en Chrysomelidae.
- 8) Bij Lamprosoma en Prasocuris onder de Chrysomelidae.
- 9) Bij de Hydrophilini.
- 10) Bij de Bolitocharini en Mylaenini.
- 11) Bij de Myrmedoniini en Pronomacini.
- 12) Het mannetje van de nog niet in Nederland aangetroffen genera *Troglops* en *Calates*.
- 13) Bij enkele Staphyliniden-genera (*Hygrocoma*, *Oligota* en *Hypocryptus*).
- 14) Bij het genus *Calymenus* zijn de voortarsen 4-, de achtertarsen 3-ledig.
- 15) Bij enkele Staphylinidae, o. a. bij een aantal *Oxytelini*, bij nagenoeg alle *Pselaphidae*, bij de *Micropeptidae* en *Trichopterygidae*.
- 16) Bij het met inlandse Staphyliniden-genus *Thinobius* en het Pselaphiden-genus *Panaphantus*.
- 17) Bij de nog niet in Nederland vertegenwoordigde fam. der *Sphaeridae*.
- 18) Behalve bij de Curculioniden-genera *Rhaphus* en *Apron*, de *Attelabini* (Fig. 117) en de *Nemomychidae*.

vorm van eene sleuf verlengd is; het eerste lid (scapus) meestal lang en met de daarop volgende leedjes (pedicellus en funiculus) gewoonlijk een elleboog vormend, aan het uiteinde met eene vaste, onduidelijk gelede knots 1). Prothorax zonder naad tusschen het pronotum en de episterna (Fig. 115 II), slechts bij uitzondering aan weerszijden van een meer of minder scherpen rand voorzien (Fig. 113 I) 2). Gewrichtsholten der voorpooten aan de achterzijde door takken van de epimeren van den prothorax gesloten; deze takken stooten aan een en zijn samengegroeid (Fig. 115 II) 3). Op de binnenzijde der dekschilden bevindt zij h eene bijzondere groef, waarin de opgerichte rand der epimeren van den metathorax, alsook die van de sterniten passen, waardoor het achtergedeelte van het lichaam eene groote vastheid en stevigheid verkrijgt; deze groef ontbreekt zelden 4). Achterlijf met vijf sterniten, van welke de twee eersten veelal vergroeid zijn. De schenen vertoonen slechts bij uitzondering bewegelijke doornen aan het uiteinde en zelden meer dan een onbewegelijken doorn; bij die soorten bij welke de tarsen zijdelings nabij den top ingeplant staan, is deze doorn meestal verlengd en gebogen; de andere tophoek is dan in eene min of meer vingervormige voortzetting verlengd. Daar waar de achterschenen aan den top afgeknot en uitgerand zijn, vormt zich eene oppervlakte, het „korfje” (fig. 118) genaamd, hetwelk glad of beschubd is 5). Tarsen allen schijnbaar 4-ledig, daar het 4de lid altijd rudimentair en slechts zelden zichtbaar is 6). Bij het genus *Anoplus* ontbreekt het geheele klauwld. — De wijfjes hebben veelal een langeren smit dan de mannetjes, daar zij dien gebruiken om gaten te boren in plantendeelen en de eieren met den weeken ovipositor daarin gelegd, dieper in te schuiven. Een ander sexueel verschil is een bijkomend klein tergiet bij de mannetjes, dat intusschen niet altijd duidelijk zichtbaar is, wijl het soms geheel teruggetrokken en door het pygidium bedekt kan zijn. In andere gevallen is van een bijkomenden ring alleen de onderzijde zichtbaar en deze doet zich dan voor als een zesde sterniet. Er komen in deze groep nimmer soorten voor met weeke huid of met weke of verkorte dekschilden of zonder dezen, dus meer met eene larven-vormige gedaante. De achtervleugels (Fig. 121) zijn volgens *Roger* goed ontwikkeld, doch de nervatuur is in 't oogvallend arm aan dwarsverbindingen. De verschillende familiën vertoonen volgens *J. Redtenbacher* in de details der nervatuur zulke verschillen, dat behalve de lancetvormige gedaante en de steeds onvertakte vena interno-media nauwelijks een gemeenschappelijk kenmerk is aan te wijzen. — Volgens *Roger* bestaat er ook eene zeer aanzienlijke concentratie der abdominale ganglienketen, welke bij de *Cureulioniden* en *Bostrychiden* een harer hoogste graden onder alle *Coleoptera* bereikt heeft 7). — De belangrijke verschilpunten tusschen deze sub-orde en alle overige *Coleoptera* werden door de onderzoekingen van de Amerikaansche Entomologen *John L. Leconte* en *George H. Horn* duidelijk aangetoond.

De larven zijn bij alle *Rhynchophora* van denzelfden bouw. Zij voeden zich, evenals de imagines, met plantenkost en kunnen dikwerf schadelijk zijn; alleen de soorten van het genus *Brachytarsus* voeden zich met schildluizen.

XI. RHYNCHOPHORA.

- 2 Alle tarsen in den regel 5-ledig, zelden de voor- en middeltarsen 4- en de achtertarsen 5-ledig, of alleen de voortarsen 4-ledig en de middel- en achtertarsen 5-ledig, bij uitzondering de voortarsen 5-, de middel- en achtertarsen 4-ledig, of alleen bij het *g* de achtertarsen 4-ledig, of de voor- en middeltarsen 5- en de achtertarsen 4-ledig, of wel alle tarsen duidelijk 4-ledig, in welke vier laatste gevallen de meeste tergieten van het achterlijf chitineus en niet door de dekschilden bedekt zijn (sommige *Staphylinidae*, zie de noten 10 en 11 op pag. 1); of wel zijn bij 4-ledige tarsen de sprietten onregelmatig (Fig. 59 I) (*Heteroceridae*), of naar het uiteinde verdikt, knopvormig of met groote eindleedjes. Ook kunnen de tarsen schijnbaar 4-ledig zijn, daar het 1ste lid moeilijk zichtbaar is, of wel het 4de lid slechts een aanhangsel is aan de basis van het klauwld of in het tweelobbige 3de lid verscholen zit (*Cleridae* Fig. 86 II), bij welke de tarsleedjes aan de onderzijde van vliezige lapjes voorzien zijn; nog kunnen zij schijnbaar of duidelijk 3-ledig, ook wel 2-ledig zijn 3

Alle tarsen schijnbaar 4-ledig, daar het 4de lid rudimentair is en in het tweelobbige 8) derde lid verscholen zit; de leedjes zijn aan de onderzijde van eene breede, viltige of sponsige zool voorzien. Sprietten draad-, borstel- of snoervormig, getand, gezaagd, gekamd,

- 1) Behalve bij de niet in Nederland voorkomende fam. der *Brentidae*, bij welke de sprietten snoervormig zijn.
- 2) Bij verscheidene *Platyrhynchidae*, de *Berelomini* onder de *Cureulionidae* en eenige *Scolytidae* (*Scolytus*).
- 3) Dit kenmerk komt, behalve bij de *Rhynchophora*, onder de overige *Coleoptera* slechts als eenige uitzondering voor bij het Zuid-Europeesche genus *Cossyphus*, bij het Amerikaansche genus *Nematidium* (*Colydiidae*) en bij *Leimus rugicollis* Ol. (*Lathrididae*).
- 4) Bij de overige *Coleoptera* komt deze groef slechts bij enkele *Buprestidae* voor.
- 5) Bij de overige *Coleoptera* altijd glad en bij het Braziliaansche *Cerambyciden*-genus *Hypoccephalus* dicht behaard.
- 6) Bij het met inlandse *Cureulioniden*-genus *Dryophthorus* en bij de fam. der *Platypidae*.
- 7) Deze concentratie wordt reeds bij *Cureulioniden*-larven waargenomen.
- 8) Bij het in het gebied om de Kaspische zee vertegenwoordigde *Cerambyciden*-genus *Parandra* is het 3e tarsld gewoon.

naar het uiteinde min of meer verdikt of gezaagd, of van vijf groote eindleedjes voorzien. De vleugels (Fig. 106) vertoonen bij de meeste vertegenwoordigers dezer sub-orde groote overeenkomst met die der Malacodermata. Bij de Bruchidae daarentegen komt de nervatuur meer met die der Rhynchophora overeen. Larven en imagines leven van plantenkost en kunnen dikwerf schadelijk zijn.

X. PHYTOPHAGA.

- 5 Achtertarsen evenals de voor- en middeltarsen 5-ledig, of wel hebben zij evenals de voor- en middeltarsen minder leedjes 1), bij uitzondering zijn zij 4-ledig bij 5-ledige voor- en middeltarsen, wat dan of alleen bij het ♂ het geval is (de meeste Cucujidae en Cryptophagidae en enkele Nitidulidae 2)), of wel zijn alsdan de dekschilden afgeknot (een enkele Histeride 3)), of hebben alsdan de sprieten eene los gelede knots, terwijl tevens de achtercoxae tegen elkander aansluiten (eenige Cleridae 4)). Nog kunnen bij vele Staphylinidae de voortarsen 4-ledig en de middel- en achtertarsen 5-ledig of wel de voor- en middeltarsen 4-ledig en de achtertarsen 5-ledig zijn; bij uitzondering de voortarsen 5-ledig, de middel- en achtertarsen 4-ledig; in deze gevallen zijn de dekschilden zeer verkort 4
- Achtertarsen 4, voor- en middeltarsen 5-ledig. Dekschilden nimmer recht afgeknot 5). Sprieten snoer- of borstelvormig, gezaagd, gekamd, geleidelijk verdikt of onregelmatig, zelden met eene los gelede knots bij ver vaneenstaande achtercoxae 6). — De nervatuur der vleugels komt in hoofdzaak overeen met die der Malacodermata; bij enkele familiën is zij echter meer eenvoudige, tergevolge van het zeer blauw aangeduid zijn der meeste dwarsverbindingen; toch blijft hier ook het topgedeelte zeer klein, daar het gewricht nabij de vleugelpunt gelegen is. — Volgens Roger is onder alle Coleoptera deze sub-orde het naast verwant aan de Malacodermata. Ook stemt de zeer ontwikkelde abdominale ganglienketen overeen; bij Diaperis (Tenebrionidae) is deze daarentegen zeer geconcentreerd, waardoor dit genus zich tot de overige Tenebrionidae verhoudt, als de Gyrinidae tot de Dytiscidae bij de Caraboidea. — De tot deze afdeeling behoorende dieren hebben de meest uiteenlopende levenswijze en komen overal voor, behalve in water.

IX. HETEROMERA.

- 4 De voorcoxae steken meer of minder kegelvormig uit en stooten meestal tegen elkaar aan, zelden zijn zij cylindervormig en zeer in de breedte ontwikkeld of eenigszins vierhoekig (Micropeplidae en Histeridae); bij uitzondering zijn zij kogelvormig en steken niet uit, in welk laatste geval de laatste tergieten chitineus zijn en er geene sprietgroeven op de onderzijde van het balsschild voorhanden zijn (enkele Staphylinidae 7)). Eenige weinige soorten kunnen het lihaam geheel tot een kogeltje samenrollen 5
- De voorcoxae in den regel kogelvormig of cylindervormig en in de breedte ontwikkeld, door het prosternum van elkaar gescheiden, in de gewrichtsholten ingesloten en daarin meestal draaibaar 8), zelden steken zij kegelvormig uit en stooten meer of minder tegen elkander aan, in welk geval de sprieten korter zijn dan de kaaktasters (vele Hydrophilidae); of wel zijn de sprieten van eene doorbladerde knots voorzien (verscheidene Scarabaeidae), of wel kunnen alsdan de pooten min of meer in groeven ingelegd worden (Dermestidae). Bij vele Dermestidae zijn de min of meer kegelvormige voorcoxae door eene prosternale voortzetting gescheiden 6
- 5 Sprieten draad- of snoervormig of naar het uiteinde geleidelijk verdikt, of aan het uiteinde knotsvormig, of van een dichten eindknop voorzien, of wel zijn zij haarlijn, onregelmatig of geknikt. Dekschilden veelal afgeknot en alsdan de onbedekte tergieten chitineus. Niet zelden zijn de voorpooten tot graven geschikt. Achtertarsen gewoon en dun; voortarsen zelden verbreed en behaard; aan alle tarsen dikwerf minder dan vijf leedjes. — Bij de achtervleugels (Fig. 40) bevindt zich volgens Roger het gewricht meer naar de basis, ongeveer in het eerste derde

1) O.a. bij de Staphyliniden, Dinopsis en vele Oxytelinen met 3 tarsleedjes, Hygennoma, Oligota en Hypocyrtus, alsmede de him. der Curidae, Heteroceridae en Georyssidae met 4 tarsleedjes, het Staphyliniden-genus Lindorus met 2 leedjes, nagenoeg alle Pselaphidae en de Micropeplidae en Erochtopterygidae met 3 tarsleedjes en eindelijk zijn de Endomychidae en Coceutellidae pseudotrimar.

2) Rhizophagus.

3) Aerritus.

4) Opiloen Cleroides, bij welke de achtertarsen schijnbaar 4-ledig zijn, omdat het zeer kleine eerste lid door het tweede bedekt is.

5) Bij de Mordellidae steekt veelal het pygidium als een stekel buiten de dekschilden uit, doch zijn deze laatste aan den top afgerond (Fig. 94).

6) Bij het Melandryiden-genus Tetratoma staan de achtercoxae zeer dicht bijeen (Fig. 93 F).

7) Piestini (Stagonitum).

8) Bij de Curidae puden de voorcoxae slechts een weinig uit, doch staan met hunner dan het daartoe schen gelegen prosternum, slechts bij den tribus der Rhopalodontini puden zij kegelvormig uit en stooten bijna samen.

gedeelte. De vena externo-media vertakt zich op de hoogte van het gewricht in twee tot aan den achterrand doorlopende takken. Dwarsaders ontbreken of zijn nauwelijks aangeduid. De vleugel wordt, tengevolge van de ligging van het gewricht, onder de dekschilden tweemaal in de breedte gevouwen, d. i. zoo samengelegd dat het middengedeelte naar voren, het topgedeelte weder naar achteren omgeslagen wordt; ook bestaat er neiging tot insnoering van den achterrand, n.l. tot de vorming van een lobje aan de basis, alsook tot bewimpeling van den achterrand. — Larven en imagines leven grootendeels in rottende stoffen.

II. STAPHYLINOIDEA (*NECROPHAGA*, *SILPHOIDEA*).

Sprieten borstelvormig, gezaagd, gekamd of snoervormig en met groote, platte eindleedjes of naar het uiteinde bijna onmerkbaar dikker wordend. Dekschilden nimmer recht afgeknut. Tarsen slechts bij hooge uitzondering met minder dan vijf leedjes 1) of schijnbaar 4-ledig (sommige *Cleridae*). De vleugels (Fig. 77 III) vertoonen een rijk adernet en zijn van een zeer kort topgedeelte voorzien. — De abdominale ganglienketen is necistal lang gestrekt. Volgens *Roger* zou deze sub-orde het naast verwant zijn aan de uitgestorven stamvormen der *Coleoptera* en als de onmiddellijke voortzetting van den gemeenschappelijken stamvorm kunnen beschouwd worden. — De soorten leven grootendeels van roof, eenigen boren in hout of bewonen fungi, of knagen aan verdroogde dierlijke stoffen en worden dan soms schadelijk.

VIII. MALACODERMATA 2).

6 Er zijn 3 paar tasters (2 paar kaak- 3) en 1 paar liptasters) voorhanden; het eene paar der kaaktasters is soms rudimentair, in welk geval de middel- en achterpoeten tot zweemmen zijn ingericht (*Gyrinidae*). De monddeelen duiden op eene roofzuchtige natuur. Sprieten bijna altijd lang, borstelvormig, 10- of 11-ledig, bij de *Dytiscidae* naar verhouding iets korter dan bij de *Carabidae*; bij de *Gyrinidae* zijn zij in 't oogvallend verkort (Fig. 17), wat ook volgens *Roger* samengaat met eene aanzienlijke concentratie van de abdominale ganglienketen, doordat de ganglien van meso- en metathorax versmolten zijn en alle abdominale ganglien eene enkele, met het ganglion metathoracicum versmolten massa vormen. Tusschen de *Gyrinidae* en de van lange sprieten voorziene *Cicindelidae* en *Carabidae*, bij welke de abdominale ganglienketen tot aan het uiteinde van het achterlijf reikt, staan als overgangsvormen de *Halipidae*, *Hygrobiidae* en *Dytiscidae*, bij welke de ganglienketen vrij kort is en het uiteinde van het achterlijf nauwelijks bereikt; toch zijn 6 abdominale ganglien zichtbaar. Het achterlijf bestaat uit 6 tot 8 sterniten, van welke de drie eersten met elkaar vergroeid zijn; het eerste tegenover het tweede tergiet liggend sterniet is door de achtercoxae volkomen doorsneden en vertoont zich zelden als een smal driehoekig gedeelte tusschen de achtercoxae. Loop- of zwempooten. Alle tarsen 5-ledig, slechts bij eenige *Dytiscidae* 4) zijn de voortarsen schijnbaar 4-ledig. — De *Caraboidea* vertoonen ook groote overeenstemming in de nervatuur der vleugels. De vleugels (Fig. 5) zijn volgens *Roger* scalpelformig en in 't oogvallend door de aan de basaal helft naar binnen gekromde vena externo-media, welke aan het gewricht eindigt, het uiteinde daarvan is door eene gewone of gevorkte dwarsader met de mediane langsader der area externo-media verbonden; verder door de drie door de dwarsverbindingen tusschen de vena scapularis en de vena externo-media gevormde ruitvormige vakjes aan het gewricht en vooral door het als „oblongum” geduide vakje aan de vena externo-media, door het wigvormige vakje aan de vena interno-media en de liss der vena analis. — Van deze sub-orde zijn de *Cicindelidae* het hoogst ontwikkeld. De ongevlugelde *Carabiden*-vormen zijn uit gevlugelden ontwikkeld. De *Dytiscidae* en naverwanten zijn voor het waterleven aangepaste wijzigingen van den gemeenschappelijken stamvorm. De *Gyrinidae* kunnen wederom als een zijtak, uit de *Dytiscidae* ontwikkeld, beschouwd worden, bij welke de concentratie der verschillende deelen het meest is doorgevoerd. — De *Caraboidea* zijn als de hoogst ontwikkelde vormen onder de *Coleoptera* te beschouwen; zij leven, evenals hare larven, van roof 5). De zeer bewegelijke, langgestrekte larven jagden haren buit na, bezitten ocellen, voornutstekende monddeelen, een zeer kort of ontbrekend geleedingsstelsel der achterkaken, geen bovenlip en van spieren voorziene tarsen met één of twee klauwtjes.

I. CARABOIDEA (*ADEPHAGA*, *CARNIVORA*).

Er zijn slechts 2 paar tasters (1 paar kaak- en 1 paar liptasters) aanwezig. Het achterlijf bestaat uit 5, zelden uit 6 sterniten 7

1) Het manneke van de *Melyriden*-genera *Troglops* en *Colotes*.

2) Deze benaming is minder juist, daar een groot aantal vormen, welke de *Teredites* van *Latreille* bevatten, eene harde huidbekleding hebben.

3) De buitenste achterkaaklob (Fig. 1, 2 en 7) is bewegelijk, 2-ledig en vormt daardoor het tweede paar kaaktasters, behalve bij het *Carabiden*-genus *Callistus*, waar dit deel uit een stuk bestaat en de binnenste lob in de rust opneemt. De tweede kaaktaster is 4-ledig.

4) De tribus der *Hydroporini*.

5) Enkele soorten der *Carabiden*-genera *Amara*, *Ophonus* en *Zabrus* zijn phytophaag.

- 7 Sprieten zeer kort of onregelmatig, meestal met 3- of meerledige knots (Fig. 57 tot 61), zelden draadvormig, in welk laatste geval het klauwlied der tarsen in 't oog vallend groot is (vele Parnidae 1)). Bij de fam. der Georyssidae is het prosternum vóór de vooreoxae vliezig. Achterpooten soms tot zwemmen ingericht (Fig. 60); alle tarsen 5- of 4-ledig. Vleugels nagenoeg als bij de Clavicornia, doch bij de grootere Hydrophilidae (Fig. 62) daarvan meer afwijkend en door hunne scapelvormige gedaante, alsmede door de aanwezigheid der, de zoogen. „ruiten” vormende, dwarsverbindingen meer of minder aan die der Caraboidea herinnerend. In andere opzichten vertoonen de vleugels der Hydrophilidae eenige verwantschap met die der Malacodermata. — De tot deze sub-orde behoorende vormen leven in water, slib, modder en op vochtig zand; de Sphaeridiinae in mest.

V. HYGROPHILI.

- Sprieten veel langer dan de tasters, van verschillende vorm, doch nimmer onregelmatig. Prosternum altijd chitineus. Zweempooten komen nimmer voor. Landdieren. 3
- 8 Sprieten met een meer of minder lang grondlid (scapus), een daarop volgend verbindingslid (pedicellus) en eenige daarop volgende leedjes (de funiculus), van welke de laatste van langere of kortere bladachtige uitsteeksels voorzien zijn en zoodoende eene soort doorbladerde knots vormen (Fig. 63 I, 66 en 67). De krachtig ontwikkelde voorpooten zijn tot graven ingericht, doordat de schenen aan den buitenrand getand zijn (Fig. 65 I); de vooreoxae zijn in de breedte ontwikkeld, zeldzamer steken zij kegelvormig uit. Alle tarsen 5-ledig, bij uitzondering met minder leedjes 2); tusschen de klauwtjes bevindt zich niet zelden een tuschenklauwtje (onychium), waarop 2-, 4- of meer borstelharen staan ingeplant (Fig. 63 II). — De vertegenwoordigers dezer sub-orde bezitten volgens Roger krachtig ontwikkelde, meestal lichter of donkerder gepigmenteerde vleugels (Fig. 64), met zeer ontwikkelde langsaders, doch zij zijn zeer arm aan dwarsaders; de tophelt is naar verhouding groot. Hiermede gaat ook eene buitengewone concentratie van de abdominale ganglienketen gepaard; bij de Lucanidae is deze echter tamelijk lang gestrekt. — Evenals de Caraboidea de hoogst ontwikkelde carnivoren zijn, zoo zijn de Lamellicornia de hoogst ontwikkelde phytophagen; over het algemeen hebben zij eene plompe gestalte. Ook behoorren hiertoe de zwaarste van alle bekende Coleoptera. Zij zijn voor een deel aan de Histeridae naverwant. — De larven („engerlingen”) zijn dik en week, bezitten een ronden, harden, chitineusen kop en voeden zich met plantenkost of mest, waarbij zij altijd, meestal in den grond, verborgen leven. De kevers voeden zich met bovenaardsche plantendeelen, vooral met bloemdeelen of met boomsappen en zijn niet zelden schadelijk; anderen leven in mest, vooral van gchoelde zoogdieren.

VI. LAMELLICORNIA.

- Sprieten zonder eene uit bladachtige uitsteeksels gevormde knots. 9
- 9 Achtercoxae dicht aaneenstaande, van dekstukken voorzien, die de dijbasen in de rust meer of minder bedekken (Fig. 71 II) en zelden ontbreken, in welk laatste geval de sprieten gezaagd zijn (Cerophytum) (Fig. 72 I). Alle tarsen 5-ledig. Dekschilden nummer afgeknot. . . 10
- Achtercoxae meestal cylindervormig en in de breedte ontwikkeld of rondachtig, in de gewrichtsholten meer of minder bewegelijk ingesloten, gewoonlijk ver van elkaar afstaande en waartusschen het eerste sterniet breed tegen het metasternum aanstoot 3); zonder dekstukken. Sprieten meestal naar het uiteinde knotsvormig verdikt of met een eindknop, zelden draad- of snoervormig (enkele Cucujidae 4)). Tarsen veelal minder dan 5-ledig. Dekschilden niet zelden afgeknot. — Volgens Roger is het gewricht der gewoonlijk langwerpige-ovale of lancetvormige vleugels (Fig. 42) vóór, soms achter, zeldzamer in het midden of nabij den top gelegen. De vena externo-media, welke evenals de vena scapularis, gewoonlijk tamelijk rechtlijnig verloopt, splitst zich op de hoogte van het gewricht niet, doch geeft een haakvormig teruglopenden tak af, welke tegen de basis van den vleugel verdwijnt. De vena interno-media en de bijaders in de area analis zijn meestal door dwars-anastomosen verbonden. In dit opzicht komen de Clavicornia, alsook de Brachymera en de Hygrophili met de Malacodermata overeen, evenzoo ook met de meeste overige familiën, alleen niet met de Caraboidea. De achterrand van den vleugel vertoont neiging tot de vorming van een lobje. — Volgens Roger zou deze sub-orde eerder in twee groepen te verdeelen zijn, 1°. de Phalacridae en Nitidulidae, welke door het verdwijnen der dwars-anastomosen en de eigenaardige vorming van het gewricht zich meer aan de Staphylinoidae aansluit, 2°. de Golydiidae, Cryptophagidae, Engidae, Lathridiidae, Tritomidae, alsook de Dermestidae en Byrrhidae (hier in navolging van

1) Tribus der Elmidae Fig. 58 II.

2) Zie bij de fam. der Scarabaeidae.

3) Uitzonderend eenige Golydiidae (Golydiini en Dytomini), Psammoechus (Cucujidae), de Byturidae, Trogositidae, Tritonidae en Phalacridae.

4) Bij Hylota draadvormig, bij Cucujus snoervormig en bij Psammoechus geleidelijk naar het einde verdikt.

Scidlitz als sub-orde *Brachymera*), benevens de hier tot de *Hygrophili* gerekende *Par-nidae*. De tweede dezer groepen vertoont, door het tamelijk aantal bij- en dwarsaders meer verwantschap tot de *Malacodermata*. De vleugels der *Coccinellidae* komen meer met die der *Chrysomelidae* (*Phytophaga*) overeen; ook wijken de *Endomychidae* door den vleugelbouw zeer af; toch meen ik met *Scidlitz* dat deze beide familiën hare ware plaats vinden bij de *Clavicornia*. — De soorten van deze sub-orde hebben allerlei levenswijze, doch komen nimmer in het water voor.

III. CLAVICORNIA (*PILICORNIA*).

- 10 Dijen, schenen en tarsen niet inlegbaar in daartoe bestemde groeven, slechts bij de *Throscidae* zijn de pooten min of meer in uithollingen intrekbaar. Prosternum met eene naar achteren gerichte voortzetting, een „borststekel”, welke in eene uitholling van het mesosternum ingrijpt. Spriet en snoervormig, gezaagd, gekamd, soms waaierachtig (Fig. 72 I en 74 I), zeer zelden met 3-ledige knots (*Throscidae*) of bijna draadvormig. De voorcoxae steken nimmer kegelvormig uit. Ocellen komen nimmer voor. — In het aderbeloop der vleugels, alsook door de larven, naderen de *Buprestidae* tot de *Lamellicornia*; de *Throscidae* en de *Elaterridae* (Fig. 75) zijn echter het naast verwant aan de meeste *Malacodermata*; daarentegen wijken de *Eucnemidae*, evenals de *Melyridae* onder de *Malacodermata*, in nervatuur der vleugels tamelijk in 't oogvallend van de overigen af. — De larven leven meestal in hout en in stengels; de imagines gewoonlijk op planten, zelden achter schors.

VII. STERNOXIA.

Schenen in daartoe bestemde groeven aan den onderrand der dijen en meestal ook de dijen zelf aan de onderzijde van het lichaam inlegbaar (Fig. 56). Bij velen 1) zet zich het prosternum tusschen de voorcoxae als een „borststekel” tot in eene uitholling van het mesosternum voort. Spriet naar het uiteinde verdikt of met eene knots (Fig. 54). De voorcoxae steken soms kegelvormig uit. Ook komt bij velen een ocel op het voorhoofd voor. Vleugels als bij de *Clavicornia*, bij welke een tamelijk aantal bij- en dwarsaders voorkomen (Fig. 55). — Larven en kevers aan droge dierlijke stoffen en in mos.

IV. BRACHYMERIA.

Overzicht der Familiën.

Sub-Orde I. CARABOIDEA (*ADEPHAGA*, *CARNIVORA*) 2).

- 1 Metasternum met een dwarsnaad vóór de achtercoxae, waardoor een ante-coxaalgedeelte voorhanden is (Fig. 6, 9 en 10) 2
- Metasternum zonder dwarsnaad vóór de achtercoxae, dus zonder ante-coxaalgedeelte (Fig. 12, 13 en 18). 5
- 2 De dwarsnaad doorsnijdt de geheele breedte van het metasternum (Fig. 6 en 9). Het ante-coxaalgedeelte van het metasternum is even zoo breed als het voorste gedeelte en vormt eene driehoekige voortzetting tusschen de achtercoxae. 5
- De dwarsnaad doorsnijdt slechts het midden van het metasternum (Fig. 10). Het ante-coxaalgedeelte van het metasternum is tot een klein, van achteren afgeknot middenstuk gereduceerd; de achtercoxae raken elkaar aan. Spriet aan den zijrand van het voorhoofd, vóór de oogen ingeplant, 11-ledig, draadvormig, alle leedjes onbehaard. Buitenste lob der achterkaken 2-ledig, de binnenste lob naar den scherpen top gekromd, aan den binnenrand niet bewimperd. Achterlijf met 6 sterniten; de naden der drie eerste met elkaar vergroeide sterniten duidelijk zichtbaar. Schenen en tarsen met zweemharen bezet. — De soorten leven in water.

Fam. IV. HYGROBIIDAE.

- 3 Spriet 11-ledig, de laatste leedjes viltig of behaard. Achterlijf met 6—8 sterniten; de naden der drie eerste met elkaar vergroeide sterniten duidelijk aangeduid. Achtercoxae niet plaatvormig verbreed. Looppooten 4
- Spriet 10-ledig, alle leedjes glad, onbehaard. Achterlijf met 6 sterniten; de naden der drie eerste met elkaar vergroeide sterniten duidelijk. Achtercoxae tot zeer grootte, onbewegelijke, breede, elkaar aanrakende en de 3 tot 5 eerste sterniten benevens de basis der achterdijen volkomen bedekkende platen verbreed (Fig. 9). Buitenste lob der achterkaken 2-ledig, tastervormig; de binnenste lob naar het uiteinde gekromd en aan de binnenzijde bewimperd. Zwempooten. — De soorten leven in water.

Fam. III. HALIPLIDAE.

1) De meeste *Dermestidae*.

2) Tot deze sub-orde behooren nog de familiën der *Pansidae*, *Amphizoridae* en *Rhyssodidae*.

- 4 Spriet en op het voorhoofd, naar binnen, boven de basis der voorkaken ingeplant (Fig. 1 I.) Clypeus zijwaarts over de sprietbasis uitgebreid. Achterkaken (Fig. 1 II) met de buitenste lob zeer smal en in 't midden geled, zoodat deze den vorm van een taster heeft. De binnenste lob is eveneens geled en het bovenlid scherp als een klauw en bewegelijk. Lichaam slank en krachtig gebouwd. — De soorten van deze familie jagen al vliegende en loopende hare prooi na.

Fam. I. CICINDELIDAE.

Spriet en aan de zijden van den kop, onmiddellijk achter de basis der voorkaken ingeplant (Fig. 2 I.) Clypeus zijwaarts niet over de sprietbasis uitgebreid. Achterkaken (Fig. 2 II) met de binnenste lob bewimperd of gedoornd, zonder bewegelijk klauwachtig bovenlid; de buitenste lob is tastervormig en 2-ledig (behalve bij het genus *Callistus*). Lichaam in den regel slank en krachtig ontwikkeld. — De soorten van deze familie leven op den grond van roof, slechts enkelen zijn phytophaag.

Fam. II. CARABIDAE.

- 5 Oogen ongedeeld. Spriet en 11-ledig, aan den zijrand van het voorhoofd, vóór de oogen ingeplant, dun, draad- of borstelvormig, zeer zelden de middelste leedjes iets verdikt of geheel onregelmatig (♂) (Fig. 11), nimmer behaard. Voor- en middelpooten korter dan de tot zwemmen 1) ingerichte achterpooten. Achterlijf met 6 sterniten; de naden der 3 eerste met elkaar vergroeide sterniten zijn zeer duidelijk. Lichaam schijfvormig, meer of minder dorsuventraal platgedrukt. — Kevers die in het water van roof leven en aan de oppervlakte een voorraad lucht onder de dicht sluitende dekschilden medeneemen.

Fam. V. DYTISCIDAE.

Oogen volkomen gedeeld (Fig. 16), zoodat de kop aan weerszijden een bovenste en een onderste oog vertoont. Spriet en (Fig. 17) van afwijkenden vorm, zeer kort en onregelmatig, het 1ste lid halfkogelvormig en bekervormig uitgehold, het 2de oörfvormig en aan den rand bewimperd, de 9 volgende leedjes zeer kort en breed, eene gedrongen spoelvormige knots vormend. Voorpooten lang, de middel- en achterpooten kort en samengedrukt, allen tot zwemmen ingericht. Achterlijf met 7 sterniten, van welke de 3 eersten vergroeid zijn en slechts naast de achtercoxae door een rudimentairen naad gescheiden blijven; daardoor schijnt het alsof slechts twee vergroeide sterniten voorhanden zijn 2). — De soorten van deze familie leven in helder water en draaien meestal aan de oppervlakte snel rond.

Fam. VI. GYRINIDAE.

Sub-orde II. STAPHYLINOIDEA (*NECROPHAGI*, *SILPHOIDEA*).

- 1 Spriet en (Fig. 39 I) duidelijk knievormig gebogen, 11-ledig, het 1ste lid (scapus) lang en dik; met sterk ingedrongen 3-ledigen eindknop, welke veelal in een daartoe bestemd groefje aan de onderzijde van het halschild inlegbaar is; bij het genus *Heterius* zijn de spriet en 9-ledig en is de eindknop cilindervormig, zonder duidelijke leedjes (Fig. 39 II). Achterlijf met 5 sterniten. Voorcoxae groot, cilindervormig en zeer in de breedte ontwikkeld of eenigszins vierhoekig, niet ver uiteenstaande. Pooten gewoonlijk kort, breed en sterk ineengedrongen, meestal in daarvoor bestemde groeven inlegbaar; vooral zijn de voorpooten tot graven geschikt en vertoonen de voorschenen op de binnenzijde gewoonlijk eene groef tot het inleggen der tarsen. Tarsen zeer dun, kort, 5-ledig; soms alleen de achtertarsen 4-ledig (genus *Acrilus*). Eerste sterniet zeer lang. Dekschilden afgeknot, het pygidium en propygidium onbedekt latend (Fig. 38). Lichaam gewoonlijk breed, gedrongen en meer of minder vlak en glad. — Deze familie kan als een uit den stam der Staphylinidae voortgesproten tak beschouwd worden. — Door den larvenvorm nadert zij tot de Lamellicornia. — De soorten leven in mest en aas, eenigen achter boomschors en in mierennesten.

Fam. XIX. HISTERIDAE.

- Spriet en niet knievormig gebogen, slechts bij de Staphylinid-genera *Acylophorus* (Fig. 24) en *Cryptobium* (Fig. 25) is het 1ste sprietlid (scapus) lang; daardoor is de spriet iets gebroken, doch vertoont alsdan geen eindknop. 2
- 2 De spriet en zijn geheel in diepe groeven aan de onderzijde van den prothorax inlegbaar, 9-ledig; de sprietknop is kogelvormig, scherp afgescheiden en ongeled. Dekschilden verkort, de 4 laatste tergieten onbedekt latend. De ringen van het achterlijf zijn nagenoeg even zoo vast-

1) D. i. pooten die alleen in horizontale richting bewegelijk en meestal met zwemharen bezet zijn.

2) Bij het exotische genus *Euchydrus* is het tweede sterniet van het eerste door een doorlopenden naad gescheiden.

aaneenvverbonden als bij de *Pselaphidae*. Tarsen 3-ledig. — De larve heeft veel overeenkomst met die van het genus *Syntomium* onder de *Staphylinidae*, doch herinnert ook aan die van sommige *Silphiden*.

Fam. VIII. MICROPEPLIDAE

- De sprieten zijn niet in groeven inlegbaar. 3
- 3 Dekschilden niet of slechts een weinig verkort, hoogstens een paar tergiten onbedekt latend. 4 Dekschilden zeer verkort 1), de tergiten allen of bijna allen chitineus. 12
- 4 Achtercoxae niet kegelvormig uitstekende. Dekschilden soms een weinig afgeknot. 5
- Achtercoxae kegelvormig uitstekende en van elkander afstaande. Sprieten (Fig. 30) aan de zijden van den kop vóór de oogen ver van elkaar of dicht bijeen op het voorhoofd ingeplant, 11-ledig, naar het uiteinde geleidelijk verdikt, of met eene zwak afgescheiden knots, of met 2, 3 of 4 grootere eindleedjes. Kaaktasters lang, 4-ledig, het 4de lid gewoonlijk zeer klein, priemvormig, als een uiterst klein kegeltje dicht op het voorlaatste lid ingeplant en daardoor nauwelijks zichtbaar. Kop meestal met eene steelvormige verbinding aan het halsschild gehecht. Dekschilden het achterlijf geheel of nagenoeg geheel bedekkend. In den regel ongevlengeld. Tarsen 5-ledig. — De soorten van deze familie herinneren in habitus en door de geringe grootte zeer aan de *Pselaphidae*, doch zijn het meest verwant aan de *Silphidae* (sub-fam. *Cholevinae*). Het genus *Cephennium* herinnert eenigszins aan *Atomaria* onder de *Cryptophagidae*. — De meeste soorten leven tusschen vergane planten en dorre bladeren, eenigen in rottend hout, vochtig mos en enkelen bij mieren.

Fam. X. SCYDMAENIDAE.

- 5 Achtercoxae van elkaar verwijderd 6
- Achtercoxae tegen elkaar aanstaande 8
- 6 Tarsen 3- of 4-ledig. Lichaam uiterst klein 7
- Tarsen duidelijk 5-ledig. Lichaam glad en glanzig, tamelijk breed en dik, spoelvormig. Sprieten haarlijn of dun, hetzij duidelijk 11-ledig, met 5-ledige, los gelede, doch duidelijk afgescheiden knots of wel onduidelijk 11-ledig met 5 grootere eindleedjes (*Scaphisoma*). Dekschilden aan het uiteinde afgeknot, een of meer tergiten onbedekt latend. Voorcoxae kegelvormig uitstekend. — Deze familie is door de iets verkorte dekschilden en door de plaatsing der pooten verwant aan de *Histeridae*, de nervatuur der vleugels is echter eenvoudiger. Ook is zij verwant aan de *Silphidae*. — De soorten leven in Fungi.

Fam. XVIII. SCAPHIDIIDAE.

- 7 *Episterna* van den metathorax zichtbaar. Kop geheel of grootendeels door het halsschild bedekt. Achterlijf vrij lang. Lichaam gewelfd. Sprieten 9-, 10- of 11-ledig, met 3 of 5 tot eene knots vereenigde eindleedjes. Tarsen 4-ledig. Vleugels lang bewimperd. Zij herinneren in habitus aan de *Clambidae*. — Het zijn kleine, in rottende plantengestoffen levende kevertjes.

Fam. XVI. CORYLOPHIDAE.

Episterna van den metathorax niet zichtbaar. Kop niet door het halsschild bedekt. Het grootste gedeelte der oogen is naar onderen gericht. Tarsen (Fig. 36 II) 3-ledig, het 1ste lid is rudimentair, zeer dun vliezig en meestal in eene uitholling der scheen ingeplant, het 2de lid is meestal duidelijk aangeduid, het 3de lang; tusschen de klauwtjes bevindt zich een hechtbaar, welke bij *Ptenidium* in een uiterst klein ovaal eindknopje eindigt. Dekschilden hetzij niet verkort en hoogstens het pygidium onbedekt latend, hetzij verkort en min of meer afgeknot, waardoor 3 tot 5 tergiten onbedekt blijven. Sprieten 11-ledig, met 2 of 3 grootere eindleedjes; de 3 laatste leedjes met een haarkrans (Fig. 36 I). Vleugels (Fig. 37) met zulke geringe rudimenten van aders, dat zij nagenoeg aderloos schijnen; meestal zijn zij vederachtig behaard. Achterlijf zeer kort, uit 6 of 7 sterniten bestaande. — Deze familie is naverwant aan de *Corylophidae* en *Scaphidiidae* en is ook als eene van den stam der *Staphylinidae* afwijkende groep te beschouwen. Tot haar behooren de kleinste onder alle bekende *Coloptera*; zij leven in rottende plantengestoffen achter schors en onder droge mest.

Fam. XVII. TRICHOPTERYGIDAE.

- 8 Achtercoxae plaatvormig verbreed, de achterdijen meer of minder bedekkend 9
- Achtercoxae niet plaatvormig verbreed. Prosternum meestal, soms zeer sterk verkort; de voorste coxae, welke kegelvormig uitsteken, nemen alsdan gewoonlijk zijne geheele lengte in. Schenen met einddoornen. 11

1) Slechts bij de *Omalini* onder de *Staphylinidae*, zijn de dekschilden lang en overschrijden zelfs bij hooge uitzondering het achterlijf

- 9 Tarsen 4- of 3-ledig, soms schijnbaar 1-ledig. Lichaam zeer klein 10

Tarsen 5-ledig. Lichaam langwerpig-eirond, naar het uiteinde versmald. Sprietten 11-ledig. Prosternum achter de voorcoxae niet ontwikkeld, waardoor deze familie vooral onderscheiden is van de *Cholevinae* (*Silphidae*). De plaatvormige verbreding der achtercoxae is smal. Achterlijf bij ♂ met 7-, bij ♀ met 6 sterniten.

Fam. XIV. EUCINETIDAE.

- 10 Lichaam zonder kogelvermogen. Mesosternum en metasternum tot eene groote schildvormige plaat vereenigd. Sprietten 11-ledig, met 3-ledige knots. Achterlijf met drie sterniten. Alle tarsen 3-ledig, doch schijnbaar 1-ledig. — Deze familie vertoont stamverwantschap met de *Clambidae*, *Corylophidae*, *Trichopterygidae* en ook eenigszins met het genus *Ephistemus* onder de *Cryptophagidae*. (Fam. *Sphaeriidae*, 1))

Lichaam meestal met kogelvermogen; de groote kop kan, hetzij alleen of ook met het halsschild, tegen de onderzijde van de borst teruggeslagen worden. Achterlijf met 5- of 6 sterniten. Sprietten 9- of 10-ledig, met twee grootere eindledjes; bij het Zuidenop. genus *Loricaster* 8-ledig, met 3 grootere eindledjes. Voorcoxae meer of minder verbreed. Schenen zonder einddoornen. Alle tarsen 4-ledig, bij *Calyptomerus* de achtertarsen slechts 3-ledig. Gevleugeld. — De soorten leven in vochtig hout en tusschen vergane plantendeelen.

Fam. XV. CLAMBIDAE.

- 11 *Episterna* van den metathorax breed en duidelijk. Lichaam zelden onbehaard. Kop in de voorste uitranding of onder den voorrand van het halsschild vrij bewegelijk of wel vast tegen het halsschild aangesloten, hetzij door den voorrand stevig omsloten, hetzij achter de oogen (welke bij de *Leptinini* en *Bathyscini* ontbreken) door eene sleuf ingesneden en met den scherpen schedelrand over den voorrand van het halsschild grijpend (*Cholevinae*). Sprietten (Fig. 32) 11- of schijnbaar 10-ledig, daar het 2de lid zeer klein en min of meer in het eerste verscholen zit (*Necrophorus*), hetzij geleidelijk naar het uiteinde verdikt, of met 4 of 5 iets grootere eindledjes, welke eene min of meer los gelede knots vormen, hetzij met 3-ledige, groote, langwerpige, dichte knots (*Sphaerites*), of met een dikken, 4-ledigen, doorbladerden, rondachtigen eindknop (*Necrophorus*) (Fig. 32 III), zelden nagenoeg draadvormig. Bovenlip afgeknut of meer of minder diep uitgerand, bij *Leptinus* als eene smalle strook met den clypeus samengegroeid. Dekschilden zelden het achterlijf niet geheel bedekkend. Gevleugeld, behalve bij de *Leptinini* en *Bathyscini*. De nervatuur der vleugels als bij de *Staphylinidae*. Achterlijf in den regel uit 7 tergiten, van welke de twee of drie eersten min of meer vliezig zijn, en uit 5- of 6, zelden uit 4 (de meeste *Colona* ♀) vrij bewegelijke sterniten samengesteld. Alle tarsen 5-, zelden de voortarsen 4-ledig (*Bathyscia*). De grootere soorten (*Silpha* en *Necrophorus*) kunnen als het naast stamverwant aan de *Staphylinidae* (*Staphylinus*, *Philonthus*) beschouwd worden.

Fam. XII. SILPHIDAE.

Episterna van den metathorax zeer smal, veelal lijnvormig, geheel of bijna geheel door de epipleuren der dekschilden bedekt. Lichaam min of meer rondachtig, kort ovaal, eivormig of langwerpig eirond, meer of minder sterk gewelfd, soms nagenoeg half kogelvormig of met volkomen kogelvermogen. Bovenzijde nagenoeg altijd onbehaard. Sprietten 11-ledig, met 3 5-ledige knots. Tarsen allen 5-ledig, of wel de voor- en middel-tarsen 5- en de achtertarsen 4-ledig, of de voortarsen 5- en de middel- en achtertarsen 4-ledig; of alle tarsen 4-ledig, of eindelijk de voortarsen 4- en de middel- en achtertarsen 3-ledig. — Deze familie is door de genera *Triarthron* en *Hydnobius* met de *Silphidae* (*Agyrtini*) en door de *Agathidiini* aan de *Clambidae* verwant. — De meeste soorten schijnen zich uit de onderaardsche deelen van fungi te ontwikkelen.

Fam. XIII. ANISOTOMIDAE.

- 12 Achterlijf met 10 tergiten en 7 sterniten, welke onderling vrij bewegelijk zijn; het eerste duidelijk ontwikkelde sterniet is de onderzijde van het derde der tergiten. Bij de *Oxytelini* daarentegen is reeds een sterniet tegenover het 2de tergiet volkomen ontwikkeld, waardoor 8 sterniten tegenover de 10 tergiten geplaatst staan. De tergiten zijn allen verhoord of wel zijn slechts de eersten meer lederachtig, in welk geval de kop van één of twee ocellen voorzien is. Sprietten 11-ledig, bij uitzondering 10-ledig (*Oligota* en *Hypocyrtus*), gewoonlijk draadvormig of naar het uiteinde verbreed of knotsvormig verdikt, bij uitzondering van af het 1ste lid iets gebroken (*Acylophorus* en *Cryptobium*) (Fig. 24 en 25). Het lichaam is meestal langgestrekt, smal, soms bijzonder plat of meer cilindervormig. Vooral zijn in't oogvallend de zeer verkorte, het metasternum niet of slechts weinig overschrijdende dekschilden, welke

11 Deze familie is niet in Nederland vertegenwoordigd

gewoonlijk slechts de twee eerste tergiten, zeldzamer een grooter gedeelte of zelfs bijna het geheele achterlijf bedekken; bij de ♀♀ van enkele Anthobium-soorten overschrijden zij zelfs het achterlijf. Tarsen meestal 5-, soms 4- of 3-ledig, zelfs bij uitzondering (*Thinobius*) slechts 2-ledig; soms zijn de voortarsen 4-ledig, de middel- en achtertarsen 5-ledig, of wel de voort- en middeltarsen 4-ledig en alleen de achtertarsen 5-ledig, of eindelijk in een enkel geval de voortarsen 5-, de middel- en achtertarsen 4-ledig. Tengevolge van de aanzienlijke verkorting der dekschilden, ligt het gewricht der achtervleugels vóór het midden, dichtër naar de basis en bevindt zich tusschen den top en het gewricht een tweede, soms nog een derde gewricht, waardoor de vleugel alsdan driemaal dwarsgevouwen wordt. — Larven en kevers leven grootendeels van rottende dierlijke en plantaardige stoffen; zij komen overal, behalve in water voor. — Deze familie is het naast verwant aan de Silphidae, doch herinneren sommige vormen aan enkele Carabidae, Pselaphidae, Anisotomidae en Nitidulidae.

Fam. VII. STAPHYLINIDAE.

Achterlijf met 6 onderling bewegelijke ringen, van welke het eerste tergiet door de uiteinden der verkorte dekschilden bedekt wordt; van het eerste sterniet zijn alleen de hoeken zichtbaar, daar het overige gedeelte door de epinieren van den metathorax bedekt wordt. Kop als eene breede plaat gevormd, zonder oogen. De V-vormig gebogen achterrand van den kop met een kam van korte, dikke, naar achteren gerichte stekels. Sprietën 8-ledig, onregelmatig; de eindledjes kunnen in eene groef aan den zijrand van het halsschild gelegd worden. Kin zeer groot en vlak. Prosternum groot. Ongeveugeld. Tarsen 5-ledig. Sprietën, achterhoeken van halsschild, borst en pooten met lange zwemharen bezet. — De eenige soort van deze familie leeft parasitisch op den bever en vertoont groote verwantschap met den tribus der Leptini (fam. Silphidae), doch heeft ook eenige overeenkomst door den vorm der sprietën, met de Gyrinidae en Parnidae (Fig. 31).

Fam. XI. PLATYPSYLLIDAE.

Achterlijf met onderling onbewegelijke, stijf samenhangende, volkomen verhoorde, onbedekte ringen; met 5 of door versmelting slechts met 3 of 2 onbedekte tergiten. Sprietën zeer veranderlijk in het aantal (van 2 tot 12) en in den vorm der leedjes, in den regel 11-ledig, gewoonlijk naar het uiteinde verdikt en meestal met eene meer of minder duidelijke 3-ledige knots; bij vele genera is slechts het eindlid zeer groot. Kaaktasters (Fig. 28 1) in den regel zeer lang en zeer veranderlijk in vorm, meestal 4-ledig; het eindlid aan den top altijd van een zeer klein, vliezig, priemvormig aanhangsel voorzien; bij enkele genera zijn de kaaktasters 2- of 3-ledig; bij de Clavigerinae zijn zij daarentegen zeer klein, slechts 1-ledig en nauwelijks zichtbaar. Dekschilden verkort, slechts de twee eerste tergiten van het achterlijf bedekkend, aan den naad rechtlijnig aaneensluitend. Tarsen altijd 3-ledig 1), het eerste lid zeer klein, het eindlid groot en met twee dunne, gelijke of ongelijke klauwen, of slechts van een enkelen klauw voorzien.

Fam. IX. PSELAPHIDAE.

Sub-Orde III. CLAVICORNIA (*PILICORNIA*).

- 1 Voorcoxae groot, cilindervormig en zeer in de breedte ontwikkeld 2
- Voorcoxae rondachtig, of slechts iets verbreed; zelden zeer verbreed, in welk geval echter de tarsen schijnbaar 3-ledig (het derde lid in het tweede verborgen) zijn (*Coccinellidae*). 4
- 2 Achtercoxae ver uiteenstaande, door eene breede voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Sprietën (Fig. 41) 11-ledig, met 3 grootere eindledjes, of 10-ledig en het eindlid als een scherp afgescheiden, dichten, gewoonlijk aan het uiteinde geringden eindknop (*Rhizophagus*); slechts het eerste lid kan in eene groef aan de onderzijde van den kop opgenomen worden. Tarsen 5-ledig, zelden bij het ♂ de achtertarsen 4-ledig (*Rhizophagini*), meestal de eerste leedjes breed en het vierde lid veel kleiner dan het derde; bij de *Cybocephalini* zijn alle tarsen 4-ledig en is het lichaam kogelvormig. — Deze familie, benevens die der *Phalacridae*, sluiten aan de eene zijde aan de Staphylinidae en aan de Micropeplidae; aan de andere zijde zijn aan haar verwant de *Trogositidae*, welke (ten minste bij *Trogosita*) wederom door den rijkdom aan dwars- en bijaders zich nauw aan de Dermestidae aansluiten. De Nitidulidae vormen in zekere mate het middelpunt der Clavicornia. — Zij leven grootendeels op bloemen, eenigen achter boomschors, in fungi en ook op dierlijken afval.

Fam. XXI. NITIDULIDAE.

1) Behalve bij het Zuid-europesche gen. *Paraphantus*.

Achtereoxae nagenoeg tegen elkaar aanstootende, slechts door eene smalle toegespitste voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Sprietten met 3-ledige knots of naar het uiteinde geleidelijk verbreed 3

- 3 Tweede en derde lid der 5-ledige tarsen breed, gelobd en aan de onderzijde zoolig, het eerste lid duidelijk, het vierde zeer klein en met de basis van het lange klauwlid in het derde verborgen. De nervatuur der vleugels komt het meest overeen met die der Tritomidae en ook met die van *Corynetes* onder de Cleridae. — Deze familie is het naast verwant aan de Nitidulidae (*Cycheamus*) en kan als een afwijkenden vorm daarvan beschouwd worden; ook is er verwantschap met Telnatophilus onder de Cryptophagidae. Nog zou zij als overgangsvorm tot de Melyridae (vooral het genus *Danacaea*) kunnen beschouwd worden.

Fam. XXXII. BYTURIDAE.

Tarsen gewoon, 5-ledig, het eerste lid zeer klein of rudimentair en moeielijk zichtbaar; het klauwlid groot, met een onychium tusschen de klauwtjes. De nervatuur der vleugels (ten minste bij *Trogosita*) vertoont groote overeenkomst, niet alleen met die der Dermestidae, doch ook met die der Malacodermata. — Deze familie is het naast verwant aan de Nitidulidae (*Rhizophagini*) en sluit ook aan de Colydiidae en Cucujidae.

Fam. XXVI. TROGOSITIDAE.

- 4 Achtereoxae in 't midden bijna tegen elkaar aanstootende, slechts door eene smalle, toegespitste voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Achterlijf met 5 vrij bewegelijke sterniten. Tarsleedjes gewoon 5
- Achtereoxae meer of minder ver van elkaar verwijderd en door eene breede voortzetting van het eerste sterniet gescheiden, zelden dicht aaneenstaande (bij eenige Colydiidae en *Psammoechus* onder de Cucujidae), in welk geval echter de drie eerste sterniten onbewegelijk zijn, of wel het klauwlid is zeer groot, of het lichaam is lang en vlak 6
- 5 Tarsen 4-ledig, bij het ♂ de voortarsen gewoonlijk 3-ledig; klauwlid veel korter dan de overigen te samen. Metasternum tusschen de middelcoxae diep liggend en smal. Lichaam eenigszins langwerpig, vlak gewelfd en op de bovenzijde min of meer behaard. Sprietten 11-ledig, geleidelijk verdikt, of met 4 of 5 duidelijk grootere eindleedjes (*Tritoma*), of wel met meer of minder duidelijk gescheiden 3-ledige knots 1). Clypeus bijna altijd door eene diepe dwarsgroef of duidelijke dwarslijn van het voorhoofd gescheiden, bij *Litargus* is deze dwarslijn zeer onduidelijk. De vleugels van *Tritoma* hebben veel overeenkomst met die van *Sarrotium* (Colydiidae) en *Engis* (Erotylidae). — Deze familie is het naast verwant aan de Erotylidae, Colydiidae en Cryptophagidae (*Diphyllus*), doch vertoont ook eenige aansluiting aan de Dermestidae. — De soorten leven hoofdzakelijk in lungi en achter boomschors.

Fam. XXXIII. TRITOMIDAE.

Tarsen 5-ledig, het vierde lid klein 2). Sprietten met 3-, (zelden 4- of 5-ledige 3)) knots. Metasternum tusschen de middelcoxae eene hooge en breede voortzetting vormende, met eene korte langspleet aan den achterrand tusschen de achtereoxae. Lichaam eivormig, hoog gewelfd, de bovenzijde glanzig. — Deze familie is navrwant aan de Nitidulidae door den bouw der sprietten en tarsen, doch onderscheidt zich vooral door de kogelvormige voor- en dicht aaneenstaande, verbrede achtereoxae. Ook is er eenige verwantschap met de Erotylidae, door den bouw der sprietten en tarsen. — Kleine, op bloemen levende kevertjes.

Fam. XX. PHALACRIDAE.

- 6 Tarsen 5- 4), of duidelijk 3- of 4-ledig, of schijnbaar 4-ledig, daar het vierde lid zeer klein en evenals de basis van het klauwlid in het derde ingesloten is 7
- Tarsen schijnbaar 3-ledig, het tweede lid neemt steeds in eene uitholling het zeer kleine, meestal minder goed zichtbare derde lid, benevens de helft van het klauwlid op (pseudotrimer), de twee eerste leedjes zijn zeer breed, aan de onderzijde viltig. Sprietten geleidelijk verdikt of met meerledige knots 16
- 7 Achtertarsen smal, eenigszins cylinderrond, aan de onderzijde hoogstens met haren bezet. Bij *Psammoechus* (Cucujidae) is het derde lid tweelobbig 3

1) Bij het met in ons gebied voorkomende genus *Berginus* slechts met 2 grootere eindleedjes.

2) De achtertarsen bij een paar Noordafrikaansche genera 4-ledig, doordat twee leedjes versmolten zijn.

3) Bij Noordafrikaansche genera.

4) Soms de achtertarsen bij het mannetje 4-ledig.

De drie eerste tarsleedjes tamelijk breed, aan de onderzijde dicht viltig 1); alle tarsen 5-ledig, het vierde lid gewoonlijk zeer klein en verborgen. Eindlid der kaaktasters min of meer bijlvormig. De twee eerste sterniten onbewegelijk met elkaar verbonden. Lichaam onbehaard, glad. — Deze familie is door de Engini het naast verwant aan de Cryptophagidae en heeft door de Triplacini ook eenige verwantschap met de Endomychidae. — De soorten leven grootendeels in fungi.

Fam. XXV. EROTYLIDAE

- 8 Voorcoxae kogelvormig, klein. Tarsen meestal 4- of 5-ledig, zeldzamer 5-ledig (bij het ♂ soms de achtertarsen 4-ledig). 9
- Voorcoxae iets verbreed 14
- 9 Tarsen 5-ledig, het eerste of vierde lid klein, bij ♂ soms de achtertarsen 4-ledig. Achterlijf uit 5 vrij bewegelijke sterniten bestaande, de twee eersten zijn meestal nagenoeg even lang. Lichaam gestrekt en meestal zeer vlak; geen sprietgroeven aan de onderzijde van den kop. Sprieten draadvormig of met 2- of 3-ledige knots 10
- Tarsen 3- of 4-ledig, meestal het klauwld even lang of langer dan de overige onderling gelijke leedjes te zamen. 11
- 10 Sprieten 11-ledig, hetzij draadvormig of naar het uiteinde geleidelijk, doch slechts weinig verdikt, of met 2, 3, zelden 4 tot eene meer of minder scherp afgescheiden knots, vereenigde eindleedjes. Tarsen in den regel 5-ledig; het eerste of het vierde lid meestal klein, bij de meeste Cucujini zijn bij het ♂ de achtertarsen 4-ledig. Ook kunnen alle tarsen 4-ledig (Prostomis) of onduidelijk 5-ledig zijn, daar het eerste lid zeer klein en moeilijk zichtbaar is (Laemotmetus). Bij Psammoechus is het derde lid der 5-ledige tarsen breed, met tweelobbighe zool, het vierde is daarin opgenomen. De twee eerste sterniten nagenoeg even lang. De coxae staan gewoonlijk tamelijk ver van elkaar verwijderd (bij Psammoechus dicht aaneen). Lichaam gewoonlijk lang gestrekt en meestal zeer vlak. — Deze familie heeft eenige verwantschap met de Colydiidae, Trogositidae, Cryptophagidae, alsook met de Nitidulidae. — De soorten leven voor het meerendeel achter boomschors.

Fam. XXIX. CUCUJIDAE.

Sprieten 11-ledig, met 2 grootere eindleedjes. Clypeus met een dwarsindruk, de zijrand boven den sprietwortel stompkantig opgericht. Tarsen 5-ledig, het eerste lid zeer klein en grootendeels in de scheen verborgen. Van de 5 sterniten is het eerste het langst. — Deze familie heeft de meeste verwantschap met de Cucujidae, doch ook enkele kenmerken gemeen met de Colydiidae, Cioidae, Anobiidae en Apatidae. — Zij leven met hare larven in houtwerk en in drogerijen.

Fam. XXXI. LYCTIDAE.

- 11 Alle tarsen slechts 3-ledig. Sprieten 11-ledig, met meer of minder duidelijk afgescheiden 3-ledige knots, bij uitzondering is deze slechts 2-ledig, of wel zijn de sprieten 10-ledig met een grooten 1-ledigen geringden eindknop (Anommatus); bij Holoparamesus zijn de sprieten, hetzij in beide sexen 11-ledig of wel bij het ♂ 9- en bij het ♀ 10-ledig, met 2-ledige knots. Achterlijf met 5, bij het ♂ van Corticaria met 6 vrij bewegelijke sterniten; bij Melanophthalma in beide sexen met 6 sterniten. Voorcoxae dicht aaneenstaande of slechts door eene lijne kiel gescheiden, meer of minder in de gewrichtsholten ingesloten. Lichaam min of meer gestrekt. Dekschilden aan het uiteinde gewoonlijk afgerond. — Deze familie is het naast verwant aan de Colydiidae, Monotomidae, alsook aan de Mycetacidae. — De soorten leven achter boomschors, in fungi, vermolmd hout en tusschen plantenoverblijfselen.

Fam. XXVIII. LATHRIDIIDAE.

- Alle tarsen 4-ledig 2). Sprieten 10- of 11-ledig, hetzij spoelvormig of draadvormig met geringden eindknop, of met twee of drie grootere eindleedjes, bij uitzondering 8- of zelfs 4-ledig 3). . . 12
- 12 Sprieten 10-ledig, bij uitzondering 11-ledig, ook wel 8- of 4-ledig 3). 13
- Sprieten 11, bij uitzondering 10-ledig (Alexia), naar het uiteinde geleidelijk verdikt of met 2 (Leistes), meestal 3 of ook wel 4 (Myrmecoxenus) grootere eindleedjes, hetzij op het voorhoofd vrij vóór de oogen of vóór de oogen onder den zijrand van den kop ingeplant. Lichaam meer of minder gewelfd of kogelvormig. Tarsen 4-ledig 2). Alle sterniten vrij

1) Behalve bij Engis, bij welke alle tarsen gewoon zijn, het onbehaarde, gladde lichaam is oorzaak dat dit genus tot de Erotylidae wordt gebracht.

2) Slechts bij het met in ons gebied voorkomende genus Clemenus (Mycetacidae) 3-ledig.

3) Bij de met in ons gebied voorkomende genera Decimus en Pleganophorus zijn de sprieten 8- en 4-ledig.

bewegelijk. — Deze familie is het naast verwant aan de Endomychidae, doch nadert ook tot de Cryptophagidae.

Fam. XXXV. MYCETAEIDAE.

- 13 Spriet en 10-ledig, vrij dik, met een grooten, onduidelijk geringden eindknop. Alle tarsen 4-ledig. Lichaam gestrekt, op de bovenzijde ruw. — Deze familie is naverwant aan de Lathridiidae en Cucujidae.

Fam. XXX. MONOTOMIDAE.

Spriet en 10-, bij uitzondering 11-ledig, spoelvormig of wel draadvormig met geringden eindknop, of met twee of drie grootere eindleedjes 1). Achterlijf met 5 2) sterniten, van welke de 3 of 4 eersten onbewegelijk zijn. — Deze familie vertoont eenige verwantschap met de Trogositidae, doch is vooral onderscheiden door de 4-ledige tarsen. Ook heeft zij door de Murmidiini eenige aansluiting aan de Histeridae. Bij de Murmidiini zijn de achtercoxae buitengewoon ver van elkaar verwijderd, vertoonen de voorhoeken van het halsschild op de onderzijde eene diepe groef tot opnemng van de sprieknoot en heeft het prosternum eene breede kinyoortzetting, welke den mond van onderen bedekt; ook bevinden zich op het eerste sterniet dijlijnen en heeft men evenals ook bij Colobius, onder aan den kop duidelijke sprietgroeven, welke echter bij de overige soorten ontbreken. Zij leven met hare larven vooral achter boomchors, in houtgangen en tusschen planterafval, een enkele in waren.

Fam. XXVII. COLYDIIDAE.

- 14 Tarsen duidelijk 5-ledig, slechts bij de Diphyllini en Telmatophilini (Cryptophagidae) is het vierde lid zeer klein en gedeeltelijk of geheel in het derde opgenomen; bij β veelal de achtertarsen 4-ledig, de voortarsen soms verbreed. Achterlijf met 5, meestal onderling bewegelijke sterniten, van welke het eerste langer is dan de overigen 15

Tarsen 4-ledig, het klauw lid veel grooter dan de overige, zeer korte, smalle leedjes te zamen. Voorcoxae eenigszins verreed en een weinig kegelvormig uitpuilend, doch door een even zoo hoog prosternum gescheiden, slechts bij de Rhopalodontini steken zij kegelvormig uit en stooten bijna aaneen. Spriet en 9—10-ledig, met 2—3-ledige knots, onder den meer of minder verbreedten zijrand van den clypeus ingeplant, het eerste lid in eene groef langs het oog inlegbaar. Kop door het overwelfde halsschild meer of minder bedekt. Achtercoxae dicht aaneenstaande. Deze familie is door den tribus der Cisini verwant aan de Cryptophagidae, door de Rhopalodontini aan de Apatidae en Anobiidae. — De soorten leven vooral in harde zwammen op hout en aan boomstronken.

Fam. XXIV. CIOIDAE.

- 15 Voorhoofd niet door eene dwarslijn van den clypeus afgescheiden. Tarsen gewoon, 5-ledig, bij de Diphyllini en Telmatophilini het vierde lid zeer klein en gedeeltelijk of geheel in het derde opgenomen; het derde en vierde lid gewoonlijk weinig in grootte verschillend. Het β heeft meestal 4-ledige achtertarsen. Spriet en 11-ledig, in den regel met 3- (Fig. 45 II), bij uitzondering (Diphyllus) met 2-ledige knots. Lichaam in den regel behaard 3). De vleugels zijn als bij de Nitidulidae. De larven der Cryptophagini gelijken meer op die der Colydiidae, die der Atomarini op die der Endomychidae. De Telmatophilini naderen door den bouw der tarsen tot de Nitidulidae en hebben ook verwantschap met de Erotylidae. De Diphyllini vormen de aansluiting der Cryptophagidae aan de Engini (Erotylidae) en vooral aan de Cucujidae (Phloeostichus); door den vleugelbouw naderen zij tot de Tritomidae. — De soorten leven vooral in allerlei planterafval, onder dorre bladeren, op bloesems, enkelen in dierlijke stoffen en in mieren- en hommelnesten.

Fam. XXII. CRYPTOPHAGIDAE.

Voorhoofd door eene verdiepte, gebogen, naar voren concave dwarslijn tusschen de oogen, als een scherp begrensde gedeelte van den clypeus afgescheiden. Spriet en (Fig. 46) 10-ledig, tamelijk ver uiteen en meer of minder vrij staande. Het eerste sterniet dubbel zoo lang als het tweede. Tarsen 5-ledig. — Deze familie heeft de naaste verwantschap met de Cryptophagidae en Cioidae, doch nadert ook tot de Tritomidae. — De soorten leven in zwammen.

Fam. XXIII. SPINDIDAE.

1) Zie noot 3 op blz. 12

2) Bij het met in ons gebied voorkomende genus *Peganophorus* met 6 sterniten

3) Bij *Diphyllus* dat en niet, bij *Phloeostichus* onduidelijk behaard

16 Sprieten 11-ledig, op het voorhoofd tusschen de oogen ingeplant, niet terugtrekbaar, naar het uiteinde geleidelijk verdikt of met twee iets vergrootte eindleedjes (*Lycopodiina*) of wel met 3 iets vergrootte (*Dapsa*) of duidelijk grootere eindleedjes (*Endomychus*, *Mycetina*). Eindlid der kaaktasters meestal kegel- of eivormig en toegespijsd, hoogstens scheef afgeknot en daardoor iets bijlvormig (*Endomychus*, *Mycetina*). Lichaam gestrekt en tamelijk vlak, met duidelijken inham tusschen halsschild en dekschilden. — Deze familie is het naast verwant aan de *Coccinellidae* en door de fam. der *Mycetacidae* aan de *Erotylidae* (*Triplacini*), *Cryptophagidae* en *Tritomidae*. — De soorten leven in fungi en achter vermolmde boomschors.

Fam. XXXIV. **ENDOMYCHIDAE.**

Sprieten vóór de oogen, meestal onder den zijrand van den clypeus ingeplant, onder den kop teruglegbaar, 11-, soms 10-ledig (doordat de twee eerste leedjes onduidelijk gescheiden zijn), zelden 9- of 8-ledig, naar het uiteinde geleidelijk verdikt of in eene 3-ledige knots eindigend. Eindlid der kaaktasters groot, nagenoeg vierhoekig, scheef afgeknot of meer of minder bijlvormig (*securipalpes*). Lichaam meestal tamelijk hoog gewelfd, in vele gevallen meer of minder halfkogelvormig; het halsschild met de dekschilden in eene vlucht gewelfd. De vleugels vertoonen volgens *Roger* groote verwantschap met die van *Melasoma* en *Phytodecta* onder de *Chrysomelidae*; ook heeft de larve groote overeenkomst met die der genoemde *Chrysomelidae*. Nog is er eene groote centralisatie der abdominale ganglien, als gevolg van eene verkorting van de keten en versmelting der achterste ganglien tot eene dichte massa. — Deze familie zou volgens *Roger* kunnen beschouwd worden als een uit de Fam. der *Chrysomelidae* (*Melasoma* en *Phytodecta*) voortgesproten zijtak, doch zij vertoont niettemin eene in 't oog vallende verwantschap met vele andere *Clavicornia*, o.a. met de *Phalacridae*. — Larven en kevers leven op planten en voeden zich met blad- en schildluizen; bij uitzondering zijn zij phytophaag. — De poppen hangen aan de bladeren.

Fam. XXXVI. **COCCINELLIDAE.**

Sub-Orde IV. BRACHYMERA.

Voorhoofd in den regel met een ocel; wanneer deze echter ontbreekt (*Dermestes*), dan stooten de kegelvormige voorcoxae nagenoeg tegen elkaar aan, zonder dat, zooals bij de overige *Dermestidae*, een tandvormig uitsteeksel van het prosternum als een „borststekel” zich naar achteren voortzet tot in eene uitholling van het mesosternum. Het vermogen om de pooten in groeven te leggen is weinig ontwikkeld (slechts bij *Anthrenus* meer, doch niet wat de tarsen betreft). Lichaam cylindervormig, eenigszins gewelfd of min of meer ovaal en eenigszins vlak gedrukt. De 3 eerste sterniten zijn niet samengegroeid. Sprieten in den regel 11-, zelden 10-ledig (*Hadrotoma*), gewoonlijk met 3-, zelden met 4- of 5 ledige (sommige *Trogoderma*-soorten) knots; bij het ♂ van sommige *Trogoderma*-soorten is de knots 6-7 ledig; bij een paar *Anthrenus*-soorten zijn de sprieten of 8-ledig met 2-ledige knots of 5-ledig met buitengewoon lang knotsvormig eindlid. Tarsen 5-ledig. — De larven leven in droge dierlijke stoffen en worden dikwerf schadelijk.

Fam. XXXVII. **DERMESTIDAE.**

Voorhoofd zonder ocel. Voorcoxae niet kegelvormig uitstekende, doch in de breedte cylindervormig ingesloten, altijd door eene voortzetting van het prosternum duidelijk gescheiden, welke echter met eene breede voortzetting tegen het mesosternum aanstoot. Het vermogen om de pooten in groeven te leggen is meestal sterk ontwikkeld en bepaalt zich veelal tot de schenen en tarsen (Fig. 56). Lichaam hoog gewelfd. De 3 eerste sterniten zijn samengegroeid. Sprieten 10- of 11-ledig, geleidelijk verdikt of met 2, 3 of zelfs verscheidene grootere eindleedjes. Tarsen 5-ledig, het vierde lid veelal kleiner dan het voorafgaande. — Deze familie heeft de cylindervormige voorcoxae met de *Histeridae* en *Nitidulidae* gemeen, doch onderscheidt zich van eerstgenoemde familie vooral door den sprietvorm en van de tweede door de vergroeiing der drie eerste sterniten. De vleezige larven doen denken aan die der *Lamellicornia*. De soorten leven in mos, aanspoelsel of gras.

Fam. XXXVIII. **BYRRHIDAE (CISTELIDAE.)**

Sub-Orde V. HYGROPHILA.

- 1 Prosternum voor de voorcoxae vliezig en door de plaatvormig verbrede trochanters der voorpooten bedekt; dit kenmerk is bij geene andere Coleoptera-familie waargenomen. Voorcoxae kegelvormig tegen elkaar aanstaande. Sprietten (Fig. 57 II) 9-ledig, de twee eerste leedjes groot en nagenoeg kogelrond, met 3-ledige, groote, eivormige, dichte knots, welke in eene groef aan de onderzijde van het halsschild kan ingelegd worden. Achterlijf met 5 sterniten. Alle tarsen 4-ledig. De soorten zijn zeer kleine, kortgedrongen, min of meer kogelvormige kevertjes, wier neergebogen langwerpige kop door het halsschild bedekt is (Fig. 57 I). — Zij leven op vochtige oevers onder aanspoelsel.

Fam. XXXIX. GEORYSSIDAE.

Prosternum en trochanters der voorpooten gewoon gevormd 2

- 2 Laatste tarslid en klauwen in 't oog vallend groot. Alle tarsen 5-ledig. — Deze familie is vooral gekenmerkt, doordat het groote prosternum als een schild den mond bedekt; slechts bij *Potamophilus* blijft de onderzijde van den kop geheel vrij. Sprietten dicht tegen de oogen of op het voorhoofd ingeplant, in den regel 11-ledig (bij *Dryops* 9, bij *Macronychus* 6-ledig), hetzij draadvormig of geleidelijk naar het uiteinde iets verdikt (*Elmini*) of wel zeer kort en onregelmatig (*Parnini*, Fig. 58 I) en gewoonlijk gedeeltelijk in eene voorhoofdsgrøef inlegbaar. Prosternum naar achteren in eene kortere of langere, spitse voortzetting verlengd, welke in het mesosternum grijpt en in dit geval ongeveer als bij de *Elatridae* als een „borststeker” in eene diepe groef wordt opgenomen. Voorcoxae in de breedte cylinder- (*Parnini*), of kogelvormig (*Elmini*). Achtercoxae groot, bij de *Parnini* tot dijplaten ontwikkeld, bij de *Elmini* daarentegen klein. Achterlijf met 5 sterniten. De vleugels van *Potamophilus* vertoonen groote overeenkomst met die van *Byrrhus*. — Deze familie is het naast verwant aan de *Hydrophilidae*, doch heeft ook eenige kenmerken gemeen met de *Gyrinidae*, waardoor de sub-orde der *Hygrophili* ook aan die der *Caraboidea* aansluit. — De soorten leven in water en bezitten overal of slechts gedeeltelijk eene viltige haarbekleding, welke het water afstoot en voeren haren luchtvoorraad als een luchtbel om het lichaam mede.

Fam. XL. PARNIDAE.

Laatste tarslid en klauwen niet in 't oog vallend groot 3

- 3 Alle tarsen 4-ledig; de voorpooten (Fig. 59 II) tot graven ingericht, doordat de schenen plat en breed en aan den buitenrand met tandjes bezet zijn. Sprietten (Fig. 59 I) kort, aan de zijden van den kop, vóór de oogen ingeplant, 10—11-ledig, de eerste twee leedjes groot, het derde en gewoonlijk ook het vierde klein, de overigen gekamd of met het afgerond eindlid eene spoelvormige knots vormend. Halsschild niet volkomen tegen de dekschilden aansluitend, welk laatste kenmerk eigen is aan vele gravende kevers. Het prosternum is eenigszins naar voren ontwikkeld, zoodat de onderzijde van den kop voor een deel bedekt is, naar achteren vertoont het een klein uitsteeksel, dat in eene uitholling van het mesosternum grijpt. Achterlijf met 5 sterniten, van welke de eerste 4 onbewegelijk zijn; op het eerste sterniet meestal een dijlijn. Voorcoxae in de breedte ontwikkeld, cilindervormig. — Deze familie is het naast verwant aan de *Parnidae*, vooral ook door de waterafstootende beharing van het lichaam. — De soorten leven in slib, klei en zand langs oevers, waar zij dicht aan de oppervlakte gangen graven.

Fam. XLI. HETEROCERIDAE.

- Alle tarsen 5-ledig, soms het eerste lid weinig zichtbaar. Voorcoxae meestal kegelvormig uitstekend en tegen elkaar aanstaande. Lichaam langwerpig-ovaal, elliptisch, rondachtig of kort eivormig, min of meer gewelfd, zeldzamer lang gestrekt en weinig gewelfd of tamelijk vlak, bij uitzondering met kogelvermogen. Achterpooten al of niet tot zwemmen ingericht, in welk eerste geval de middel- en achtertarsen van zwembaren voorzien zijn; zelden zijn de schenen tot graven ingericht en met kraachtige, soms ook wel met fijne doorntjes bezet. Tasters 4-ledig, buitengewoon ontwikkeld, meestal even lang of langer dan de sprietten. Sprietten onder den zijrand van den clypeus ingeplant, 7-, 8- of 9-, bij uitzondering (*Spercheini* Fig. 61) 6-ledig, het eerste lid is lang, terwijl de 3, 4 of 5 laatste leedjes eene behaarde knots vormen; zij kunnen meestal in eene groef onder den zijrand van den kop, zeldzamer in eene groef van den omgeslagen zijrand van het halsschild (*Ochthebius*) ingelegd worden. Sternum in vele gevallen, hetzij geheel of gedeeltelijk over het midden gekield (Fig. 60). Achterlijf met 5—7 sterniten. Onderzijde van het lichaam bij de in het water levenden geheel of gedeeltelijk met een waterafstootend viltkleed bedekt. Er bestaat volgens *Roger* overeenkomst in de nervatuur der vleugels van de

Philhydrini met die der Clavicornia, alsook tusschen die der Elephorini en de Malacodermata. — Ook heeft deze familie eenige verwantschap met de Lamellicornia en zelfs met de Caraboidea. — Zij leven deels in water, deels in modder, vochtig zand of slib, zeldzamer in vette aarde of in mest.

Fam. XLII. HYDROPHILIDAE (PALPICORNIA) 1).

Sub Orde VI. LAMELLICORNIA.

Sprieten (Fig. 63 I) sterk geknikt, 10-ledig, het eerste lid (scapus) lang, steelvormig, de knots gekamd, uit 3 tot 6 2), onbewegelijke, smalle blaadjes samengesteld. Voorkaken meestal sterk vooruitstekend, vooral bij de mannetjes (Fig. 63 I). De dekschilden bedekken het geheele lichaam. Achterlijf met 5 sterniten. Alle coxae cilindervormig, zeer in de breedte ontwikkeld. Tarsen 5-ledig. — De larven ontwikkelen zich achter schors of in moolm van oude boomen. — De kevers leven meestal aan nitvloeiende sappen van boomen en onder geveld hout.

Fam. XLIII. LUCANIDAE.

Sprieten (Fig. 66 en 67) kort, slechts zwak geknikt, 7—11-ledig 3), het eerste lid (scapus) vrij kort en dik, de knots knop- of waaiervormig, meestal uit 3, bij uitzondering uit 4, 5, 6 of 7 4) bewegelijke, platte leedjes samengesteld, welke soms bij de mannetjes sterk doorbladerd zijn; soms is het aantal knotsleedjes in beide sexen verschillend (o. a. bij Melolontha). De voorkaken steken weinig of niet over de bovenlip uit. De dekschilden laten gewoonlijk het pygidium en soms ook het propygidium vrij. Achterlijf gewoonlijk met 5, soms met 6 sterniten. De voorecoxae verschillend gevormd, doch meestal cilindervormig en zeer in de breedte ontwikkeld. Tarsen 5-ledig 5). — De soorten van deze familie leven op allerlei planten, op bloesems of in mest, sommigen in boommoolm; zij ontwikkelen zich hoofdzakelijk in den grond of in boommoolm. — Eenigen zijn als larven („engerlingen”) schadelijk aan plantenwortels of vernielen als imago het loof. — Slechts de soorten van het genus *Trox* leven van dierlijke overblijfselen.

Fam. XLIV. SCARABAEIDAE.

Sub-Orde VII. STERNOXIA.

- 1) Halsschild onbeweegbaar, met de dekschilden in eene vlucht gewelfd. Het metasternum staat gewoonlijk met de voorzijde onmiddellijk tegen de voortzetting van het prosternum aan 6), zoodat de kever den prothorax niet benedenwaarts kan bewegen en daardoor geen springvermogen heeft (Fig. 71 II). Mesosternum slechts aan weerszijden als een smal gedeelte zichtbaar. Episterna van het metasternum breed, meestal met driehoekige epimeren 7). Kop zonder sprietgroeven of bijaldien deze aanwezig zijn, is de oppervlakte van het lichaam metallisch gekleurd. Sprieten 11-ledig, draadvormig of gezaagd. Achterlijf met 5 sterniten, van welke de twee eersten min of meer vergroeid zijn. Voorecoxae kogelvormig. In de nervatuur der vleugels is volgens *J. Redtenbacher* deze familie niet aan de Elateridae verwant, doch nadert ook door den larven-vorm meer tot de Lamellicornia; toch is volgens *Roger* ook in den vleugelvorm meer en meer een overgang door de Eucnemidae naar de Elateridae waar te nemen. — De larven leven meestal achter schors, in hout of in weekke stengeldeelen. — De kevers op planten, veelal bij zonneschijn rondvliegend, enkelen onder steenen.

Fam. XLV. BUPRESTIDAE.

Halsschild in vertikale richting meer of minder beweegbaar, gewoonlijk tamelijk gewelfd en naar de basis der dekschilden afhellend of veelal tusschen halsschild en dekschilden met eene diepe inzinking, of wel zijn de sprieten waaiervormig, of heeft de kop sprietgroeven, zonder dat de bovenzijde van het lichaam metaalkleurig is. Episterna van den metathorax smal, meestal

- 1) De Hydrophilidae kunnen volgens *Roger* beschouwd worden, als Clavicornia welke zich tot het waterleven hebben aangepast en aangezien het gangstelsel der op het land levende Sphaeridiini eene grotere concentratie vertoont dan bij de in het water levenden, zoo zijn vermoedelijk de Sphaeridiini met het waterleven wederom tot het landleven aangepast.
- 2) Bij het exotische genus *Syndesmus* Mac L. zelfs met 7 blaadjes.
- 3) 7-ledig bij een paar exotische genera, 8-ledig o. a. bij *Sisyphus*, 9-ledig o. a. bij de Copriini en Aphodiini, 10-ledig o. a. bij *Trox*, de Melolonthini en de Gecorini, 11-ledig bij de Gecorini.
- 4) Zelfs met 8 leedjes bij het exotische genus *Megistophylla* Burm.
- 5) Bij een paar exotische genera minder leedjes, bij het Zuid-europese genus *Atenichus* onttrekken de voortarsen geheel.
- 6) Behalve bij de Zuid-europese genera *Julodis* en *Venaeodera*.
- 7) De epimeren onttrekken bij *Chrysomothris* en eenige *Agrius*-soorten.

zonder epimeren (behalve bij enkele Eucnemidae), zoodat alsdan de achtercoxae naar buiten tot aan de dekschilden reiken. 2

- 2 Kop aan weerszijden van den clypeus met een groefje tot het inleggen van het eerste sprietlid, of wel de dekstukken voor de dijbasis ontbreken aan de achtercoxae (*Cerophytum*). Sprieten 11-ledig, meestal op het voorhoofd ingeplant. De inzinking tusschen halsschild en dekschilden is meestal zwak aangeduid of ontbreekt nagenoeg, ook is het halsschild slechts zeer weinig beweegbaar en bestaat daardoor meestal geen springvermogen. 3

Kop zonder sprietgroeven. Bovenlip duidelijk ontwikkeld. Sprieten (Fig. 74 I) 11-ledig 1), in zijdelingsche groefjes van het voorhoofd nabij den voorrand der oogen ingeplant, naar binnen gezaagd of gekamd, zeldzamer bijna draadvormig, bij uitzondering bij het ♂ waaiervormig. Halsschild kussenvormig gewelfd, met spits uitgetrokken achterhoeken, aan den achterrand zoodanig met een diepen inham tegen de basis der dekschilden aangesloten, dat het in verticale richting zeer beweegbaar en dienengevolge het springvermogen bij deze kevers bijzonder ontwikkeld is, daar zij, op den rug liggende (Fig. 73 I), den borststekel uit de uitholling van het mesosternum naar buiten brengen, daarop plotseling het lichaam zoodanig krommen, dat de stekel weder in de holte schiet, waardoor tegelijk de rug van den kever met zooveel kracht tegen den grond gedreven wordt, dat hij tot op eene tamelijke hoogte in de lucht springt. Aan de onderzijde van het halsschild zijn de verbindingsnaden tusschen het prosternum en de breede pleurae, van voren, zeldzamer over de geheele lengte, tot sprietgroeven verdiept. Achterlijf met 5 sterniten. — De geheel chitineuse larven („ritualden" of „koperwormen") leven in stammen en takken van boomen, of in stengels en vooral in wortels van kruidachtige planten. De kevers leven op hout, bloemen, struiken en in gras. — Deze familie is naverwant aan de Malacodermata.

Fam. XLVIII. ELATERIDAE.

- 3 Bovenlip duidelijk ontwikkeld. Sprieten dicht nabij de bovenlip vóór de oogen ingeplant, met 3 grootere eindledjes, het tweede lid evenals het eerste verdikt en op zijnen recht afgeknotten top ingeplant. Achtercoxae met dekstukken voor de dijbasis. Prosternum met eene tamelijk breede voortzetting, welke in eene uitholling van het mesosternum past; de verbindingsnaden met de breede pleurae naar voren tot sprietgroeven verdiept. Sprieten en pooten min of meer in uithollingen intreikbaar. Tarsen 5-ledig. De larven gelijken evenals die der Eucnemidae op die der Buprestidae. — De kevers leven op de bladeren van boomen en heesters en hebben evenals de Elateridae springvermogen.

Fam. XLVI. THROSCIDAE.

Bovenlip onduidelijk of niet zichtbaar. Sprieten tusschen de oogen meer of minder dicht bijeen geplaatst, gezaagd of gekamd, bijna draadvormig, zelden parelsnoervormig, bij uitzondering bij het ♂ waaiervormig (Fig. 72 I), het tweede lid met de versmalde basis naast den scheef afgeknotten top van het eerste lid ingeplant. Achtercoxae met dekstukken voor de dijbasis, welke slechts bij *Cerophytum* ontbreken, evenals de sprietgroef aan den clypeus vóór de oogen, welke bij de overige genera aanwezig is; ook is bij *Cerophytum* eene kinplaat voorhanden. Bij *Eucnemis* (Fig. 72 II) zijn de naden tusschen de pleurae van den prothorax en den scherpen zijrand van het pronotum, tot opnemering der sprieten diep uitgehold, overigens zijn ook de naden tusschen het prosternum en de pleurae duidelijk voorhanden. De voortzetting van het prosternum is in eene uitholling van het mesosternum inlegbaar. — Larven en kevers leven grootendeels achter boomschors en in hout, enkele imagines op de bladeren van boomen en heesters. De kevers hebben geen springvermogen.

Fam. XLVII. EUCNEMIDAE.

Sub-Orde VIII. MALACODERMATA.

- 1 Achtercoxae met dekstukken over de dijbasis. Voorcoxae met zichtbare trochantinen (Fig. 76). Halsschild niet over den kop gewelfd. Kop veel kleiner dan het halsschild. Dekschilden het achterlijf tot over de randen der sterniten omsluitend. Sprieten 11-ledig, draadvormig, aan de voorzijde van het voorhoofd nabij den binnenrand der oogen ingeplant. Achterlijf met 5 sterniten. Tarsen 5-ledig. 2
- Achtercoxae zonder dekstukken over de dijbasis, of indien deze voorhanden zijn, is het halsschild over den kop gewelfd. Kop meestal groot, bij uitzondering tamelijk klein. 3
- 2 Voorkaken krachtig ontwikkeld, cenigszins sikkelvormig gebogen en tamelijk ver uitstekend. Het tweede tot vierde tarslid aan de onderzijde met een lobvormig aanhangsel. Lichaam ellip-

1) Bij enkele niet in ons gebied voorkomende soorten schijnbaar 12-ledig, dan het eindlid ingesnoerd is.

tisch. Sprieten draadvormig. — De larven, welke eenigszins op die der *Lamellicornia* gelijken, leven in de aarde aan plantenwortels, de kevers op bloemen.

Fam. XLIX. DASCILLIDAE.

Voorkaken meer teeder gebouwd, gewoonlijk een weinig uitstekend. Slechts het vierde tarslid tweelobbig; bij *Eubria* zijn de tarsen gewoon. Sprieten draadvormig of naar binnen gezaagd (*Eubria*). — De larven gelijken min of meer op die der *Silphidae*, en leven in het water, onder steenen en aan planten; zij ondergaan hare metamorfose in het water of op het land. De kevers leven vooral op bloeiende waterplanten, of ook op andere planten die op vochtige plaatsen groeien.

Fam. L. CYPHONIDAE.

- 3 Achtercoxae kegelvormig uitstekende, dicht tegen elkaar aanstaande, zonder dekstukken over de dijbasis. Dekschilden meestal dun en buigzaam; de achtervleugels steken in vele gevallen buiten het uiteinde der dekschilden uit 1) 4
- Achtercoxae niet kegelvormig uitstekende, meer of minder van elkaar verwijderd. Dekschilden stevig en evenals gewoonlijk bij de *Coloptera*, tamelijk vast en onbuigzaam 8
- 4 Tarsenleedjes allen of voor een deel driehoekig of hartvormig, slechts bij het *Melyriden*-genus *Phloeophilus* dun, draadvormig. Lichaam gestrekt en eenigszins vlak, of wel tamelijk verkort en meer gedrongen, het huidskelet gewoonlijk meer of minder dun, week en buigzaam. Tarsen 5-ledig, zelden bij het ♂ de voortarsen 4-ledig 2) 5
- Tarsenleedjes dun, draadvormig. Tarsen zeer lang, 5-ledig; klauwen aan de basis stomphoekig of getand. Kaaktasters bij het ♂ (Fig. 85) op het derde lid met een kwastvormigen bundel van samenhangende, smalle, langwerpige blaadjes of wel met een lidvormig aanhangsel, zoodat het derde lid alsdan vorksgewijs vertakt schijnt. Sprieten aan den zijrand van het voorhoofd vóór de oogen ingeplant, 11-ledig, draadvormig of in 't midden iets verdikt, gezaagd of waaiervormig. Lichaam (Fig. 85) lang, cylindervormig, de dekschilden aan het uiteinde divergeerend en het achterlijf meer of minder onbedekt latend. — De larven boren in hout en zijn soms schadelijk. De kevers leven op geveld hout, timmerhout en paalwerk. — Deze familie is het naast verwant aan de *Cleridae*.

Fam. LV. LYMEXYLONIDAE.

- 5 Sprieten in den regel niet zeer ver van elkaar, soms vrij dicht bijeen op het voorhoofd ingeplant, slechts bij de *Drilini* (*Telephoridae*) aan de zijden van het voorhoofd ingeplant, gewoonlijk borstel-, of draadvormig, zeldzamer gezaagd of gekamd. Voorkaken met gewonen top. Clypeus niet scherp van het voorhoofd afgescheiden. Geen uitstulpbare blaasjes aan de zijden van het lichaam. Tarsklauwen zonder vliezig lobje. Achterlijf met 7, bij het ♂ soms met 8, zeldzamer met 6, bij het ♀ bij uitzondering met 5 sterniten. 6
- Sprieten tamelijk ver van elkaar afstaande, 11-ledig 3), aan de zijden van het voorhoofd, iets vóór de oogen ingeplant, draadvormig, of geleidelijk naar het uiteinde verdikt, gezaagd of gekamd, bij uitzondering snoervormig, met 3-ledige knots (*Phloeophilus*). Voorkaken met gespleten top 4) en met een smallen vliezigen zoom aan den binnenrand tot aan het midden. Clypeus meestal tamelijk scherp van het voorhoofd afgescheiden. Bovenlip duidelijk zichtbaar. Halsschild min of meer vierhoekig of breed ovaal. Tarsklauwen in den regel aan de basis met een vliezig lobje (Fig. 84 II), zeldzamer met een tand of gewoon. Halsschild en achterlijf aan de zijden van roode blaasjes voorzien, welke door aandrang van bloed kunnen worden uitgestulpt (Fig. 84 I); deze ontbreken bij de *Dasytini*. Achterlijf met 5 of 6 sterniten. Bij vele soorten 5) zijn bij het ♂ de dekschilden aan den top ingeknepen. De kevers leven meest op bloemen. — Deze familie, welke het naast verwant is aan de *Telephoridae*, sluit door het genus *Phloeophilus* aan de *Melandryidae* (*Tetratoma*) aan.

Fam. LIV. MELYRIDAE.

- 6 Kop geheel of grotendeels onder het aan de zijden bladachtig verbrede halsschild verborgen (Fig. 78 I). Bovenlip duidelijk zichtbaar. Sprieten meestal kort, vrij dicht bijeenstaande. Oogen bij het ♂ in den regel zeer groot. De pleurae van den metathorax zijn breed en van parallelle zijden voorzien; ook zijn de epimeren van den metathorax duidelijk ontwikkeld (Fig. 78 II). De dijen staan scheef tegen het uiteinde der trechanters ingeplant. Epipleuren der dekschilden van voren

1) O. a. bij *Malthodes*.

2) Bij de *Melyriden*-genera *Troglops* en *Colotes*.

3) Bij het met in ons gebied voorkomende genus *Hapalochrus* schijnt 10-ledig, daar het tweede lid klein en in het eerste verborgen is.

4) Behalve bij *Danaea*.

5) O. a. bij een aantal *Malachius*-soorten en bij *Axiotarsus*.

zeer breed. Bij de ♀♀ ontbreken de dekschilden en de achtervleugels; bij het ♂ van *Phosphænus* ontbreken de achtervleugels. — De soorten leven meestal in gras en tusschen lage planten, enkelen onder hout en steenen; het zijn nachtdieren, welke, hetzij alleen de ♀♀ of ook de ♂♂, aan het uiteinde van het achterlijf phosphoresceeren. — Deze familie is het naast verwant aan de *Lyceidae* en *Telephoridae*.

Fam. LI. LAMPYRIDAE.

Kop vrij uit het halsschild vooruitstekend, bij uitzondering door den opgerichtten voorrand bedekt, doch niet overwelfd. De pleurae van den metathorax smal, naar het uiteinde versmald, met weinig zichtbare epimeren. Oogen in den regel in beide seksen slechts matig groot. . 7

- 7 Dekschilden naar het uiteinde meer of minder verbreed 1) en meestal met eene eigenaardige sculptuur, uit een door langs- en dwarsnerven gevormd tralieachtig netwerk bestaande (Fig. 80). Kop hoogstens door het van voren opgerichte, naar achteren meestal verbreed halsschild bedekt, doch niet overwelfd. De mond bij vele soorten iets smuitvormig verlengd. Bovenlip duidelijk zichtbaar. Sprieten meer of minder dicht bijeenstaande. De dijen staan recht op het uiteinde der trochanters ingeplant (Fig. 79 1). Achterlijf bij het ♂ met 6, 7 of 8, bij het ♀ met 5 of 6 sterniten. Beide seksen gevleugeld. Het huidskelet is vaster dan bij de *Telephoridae*. — De kevers leven meest op bloemen.

Fam. LII. LYCIDAE.

Dekschilden met parallel zijden, nimmer bladachtig verbreed en met gewone sculptuur. Kop geheel vrij, hoogstens tot aan de oogen in het meer of minder vierhoekige of breed ovale halsschild verzonken. Sprieten niet zeer ver van elkaar afstaande, bij de *Drilini* aan de zijden naast den iets opgerichtten zijrand van het voorhoofd ingeplant. Bovenlip bijna niet zichtbaar of geheel verborgen, bij de *Drilini* daarentegen duidelijk en sterk naar onderen gericht. De dijen staan scheef tegen het uiteinde der trochanters ingeplant (Fig. 81 1). Achterlijf in beide seksen met 7, bij het ♂ van *Telephorus* met 8 sterniten. Beide seksen gevleugeld, behalve bij de *Drilini*, bij welke het ♀ larvenvormig is en ook de dekschilden ontbreken. Het huidskelet is over het algemeen dun, buigzaam en eenigszins week. Bij enkele soorten (*Malthodes*) zijn de laatste achterlijfsegmenten bij het ♂ tot grijporganen voor de copulatie vervormd. — De kevers leven van roof en houden zich meest op bloemen op. Zij vliegen zeer goed, vooral bij zonneschijn.

Fam. LIII. TELEPHORIDAE.

- 8 Tarsleedjes aan de onderzijde van vliezige lapjes voorzien (Fig. 86 II). Tarsen 4- of 5-ledig of schijnbaar 4-ledig, daar het uiterst kleine vierde lid in het gelobde derde verscholen zit, of wel het eerste lid is moeilijk zichtbaar; minstens het voorlaatste lid tweelobbig. Achtercoxae zonder dekstukken boven de dijbasis. Kop gebogen, niet in het halsschild terugtrekbaar, de schedel van boven goed zichtbaar. Sprieten 11-ledig, eenigszins snoervormig of naar binnen gezaagd, hetzij in eene knots eindigend of naar het uiteinde bijna onmerkbaar dikker wordend. Achterlijf met 6 sterniten. Lichaam langgestrekt, zeldzamer kort en meer gedrongen, meestal langharig (Fig. 86 I). — De larven maken in het hout van boomen jacht op andere larven, eenigen leven in bijennesten, anderen in dierenhuiden en op aas. De kevers leven op bloemen en op hout. — Deze familie is het naast verwant aan de *Melyridae*.

Fam. LVI. CLERIDAE.

- Tarsen zonder vliezige lapjes aan de onderzijde. Kop geheel naar onderen gericht, van boven niet zichtbaar, meer of minder in het halsschild terugtrekbaar 2). 9
- 9 Dijen tegen de kleine trochanters scheef aangelegd. Tarsen 5-ledig, het eerste lid zeer klein, veelal moeilijk zichtbaar 3), het tweede en vijfde het langst. Kop klein, verticaal geplaatst, meer of minder door het grootte halsschild overwelfd en daarin gedeeltelijk teruggetrokken (Fig. 87 2). Sprieten aan de zijden van het voorhoofd ingeplant, met 3 grootere eindleedjes. Lichaam min of meer cilindervormig. — De larven en kevers leven in hout, enkelen in waren. — Deze familie, welke ook met de *Cioidae* punten van overeenkomst vertoont, is het naast verwant aan de *Ptinidae* en *Anobiidae*.

Fam. LVII. APATIDAE.

Dijen op den recht afgeknotten top der soms sterk verlengde trochanters, recht ingeplant. Tarsen duidelijk 5-ledig. Sprieten draadvormig, gezaagd, gekamd of met 3 grootere eindleedjes. Kop groot, door het halsschild overwelfd. 10

1) Bij exotische vormen zijn de dekschilden, vooral bij de wijfjes, veelal sterk bladachtig verbreed.

2) Behalve bij het niet in ons gebied voorkomende genus *Psora* (*Apatidae*).

3) Bij *Psora* schijnt het rudimentaire eerste lid met het tweede vergroeid te zijn.

- 10 Sprieten 11-ledig, dicht bijeen op het voorhoofd ingeplant, draadvormig of gezaagd, zonder grootere eindledjes. Kop verticaal geplaatst, in het halsschild gedeeltelijk weggedoken. Achtercoxae zonder dekstukken boven de dijbasis. De achterdijen zijn meestal knotsvormig verdikt en overschrijden den zijrand der dekschilden. Tarsen dun (Fig. 83 I). Lichaam tusschen halsschild en dekschilden ingesnoerd, gewoonlijk min of meer eivormig of kogelrond, sterk gewelfd, de mannetjes meestal meer of minder cylindervormig. Gevleugeld; slechts enkele soorten zijn ongevleugeld. — Larven en kevers in hout, waren, leder, drogerijen enz.

Fam. LVIII. PTINIDAE.

Sprieten (Fig. 89) min of meer aan de zijden van het voorhoofd, ver van elkaar vóór de oogen ingeplant, bij *Dryophilus* dichter bijeenstaande op het voorhoofd, gezaagd, gekamd of met 3 langere of bredere eindledjes, bij uitzondering draadvormig (*Hedobia*). Achtercoxae met meer of minder ontwikkelde dekstukken boven de dijbasis; deze zijn zeer klein bij *Hedobia*. Lichaam meestal cylindervormig, zelden kort en dik, tusschen halsschild en dekschilden niet of slechts weinig ingesnoerd. Kop groot, meestal door het halsschild overwelfd (Fig. 89 I). De achterdijen zijn gewoon en overschrijden zelden den zijrand der dekschilden. Tarsen meestal verbreed. — Larven en kevers in hout.

Fam. LIX. ANOBIIDAE.

Sub-Orde IX. HETEROMERA.

- 1 Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten 1). Voorcoxae bij uitzondering tegen elkaar aanstootend. Middelcoxae kogelvormig 2
Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren open. Voorcoxae meestal tegen elkaar aanstootend. 4
2 Voorcoxae kogelvormig, bij uitzondering slechts iets verbreed, doch nimmer kegelvormig uitstekend en tegen elkaar aanstootende (Fig. 90 I). Klauwen gewoon. Sprieten onder den zijrand van den kop ingeplant, draad- of snoervormig of naar het uiteinde geleidelijk verbreed, bij uitzondering met 3 grootere eindledjes, doch nimmer met een geringden eindknop. Halsschild in den regel met duidelijken scherpen zijrand. Achterlijf met 5 sterniten. Het huidskelet is veelal zeer hard. Tarsen in den regel dun, bij uitzondering de tarsledjes tweelobbig. — De larven gelijken eenigszins op die der *Elatерidae* en leven in dierlijke en plantaardige stoffen, veelal in den grond. De imagines, welke bijna allen donker gekleurd 2) en in vele gevallen ongevleugeld zijn, zijn meest nachtdieren, welke bij dag onder steenen, minder dikwijls in vermolmd hout of in zwammen, zeldzamer op planten en soms in waren worden aangetroffen.

Fam. LX. TENEBRIONIDAE. 3)

- Voorcoxae min of meer kegelvormig en eenigszins uitpuilend, hetzij tegen elkaar aanstootend of van elkaar gescheiden, zelden meer kogelvormig, in welk geval de klauwen gezaagd of gekamd zijn. Sprieten aan de zijden vóór de oogen ingeplant, doch vrij wel onbedekt. . . 3
3 Klauwen gezaagd of gekamd. Halsschild altijd met een duidelijken, meer of minder scherpen zijrand, weinig of niet smaller dan de dekschilden. Voorcoxae eenigszins kegelvormig uitpuilend of kogelvormig. Tarsen op de onderzijde slechts met zeer weinige borstelhaartjes bezet. Sprieten 11-ledig, draadvormig, zelden borstelvormig of gezaagd. — De larven leven in vermolmd hout en in boomzwammen, de kevers vooral op bladeren en bloemen, eenigen achter schors. — Deze familie is het naast verwant aan de *Tenebrionidae* (tribus *Helopini*).

Fam. LXI. CISTELIDAE (ALLECULIDAE).

Klauwen gewoon. Halsschild zonder scherpen zijrand, veel smaller dan de dekschilden. Voorcoxae kegelvormig, tegen elkaar aanstootend. Tarsen aan de onderzijde met viltige zool, het voorlaaste lid breed tweelobbig 4), het eerste lid der achtertarsen zeer lang. Sprieten 11-ledig, draadvormig, met tamelijk korte ledjes 4). De kevers leven op planten. — Deze familie is naverwant aan de *Cistelidae*, doch grenst door het genus *Agnathus* aan de *Anthicidae*.

Fam. LXII. LAGRIIDAE.

- 4 Halsschild met een duidelijken scherpen zijrand, zoo breed als of slechts weinig smaller dan de dekschilden. 5

1) Betreft bij het met in ons gebied voorkomende *Tenebrioniden*-genus *Borus*.

2) Alleen de *Diaperinae* en *Helopini* o. a. zijn veelal hout of metaalisch gekleurd.

3) Deze groote familie is vooral in het Zuiden van Europa vertegenwoordigd door een menigte ongevleugelde vormen.

4) Bij het in Zuid-Europa voorkomende genus *Agnathus* is het voorlaaste tarslid gewoon en eindigen de sprieten in drie verbrede ledjes.

Halsschild zonder scherpen zijrand, in den regel smaller dan de dekschilden 1) 6

- 5 Kop tot aan de oogen in het halsschild terugtrekbaar en veelal daardoor iets overwelfd. Sprieten 11-ledig, zelden 10-ledig (Conopalpini) (Fig. 93 III), draadvormig, of in het midden of naar het uiteinde verdikt, of met iets grootere eindleedjes, bij *Tetratoma* met 4 verbreede eindleedjes (Fig. 93 I). Kaaktasters gewoonlijk zeer lang. Pooten meestal kort, het eerste lid der achterscheten veelal zeer lang. Tarsklauwen in den regel gewoon, zeer zelden gespleten of voor het uiteinde getand 2). Voorcoxae kegelvormig uit de gewrichtsholten uitpuilend, slechts bij de *Tetratomini* en *Orchesiini* door het prosternum gescheiden (Fig. 93 I, II). Larven evenals vele imagines in oud en vernolmd hout, achter schors en in boomzwammen. Sommige soorten aan boomstammen en op heesters. — Deze familie is het naast verwant aan de *Tenebrionidae* (tribus *Tenebrionini*).

Fam. LXIII. MELANDRYIDAE.

Kop verticaal staande en tegen het halsschild aangedrukt, doch nimmer daarin opgenomen, de mond meer of minder tegen de voorcoxae aangedrukt en de schedel eenigszins bultig opgericht of gewelfd. Sprieten 11-ledig, draadvormig, niet zelden naar binnen iets gezaagd of naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Halsschild zoo breed als of breeder dan de dekschilden, naar voren versmald. Achterpooten lang; de achterscheten in den regel korter dan de tarsen, het voorlaatste tarslid gewoon. Bij de *Scraptiinae* zijn de achterscheten even lang als de tarsen en steekt het voorlaatste tarslid lobvormig onder het laatste uit. Achtercoxae meestal plaatvormig verbreed; voorcoxae kegelvormig, ver uit de gewrichtsgroeven uitstekend. Klauwen gewoon of onduidelijk getand, of wel gespleten, gezaagd of aan den wortel met een vliezig lapje. Lichaam meestal tot springen geschikt. Het pygidium is bij velen in een langen stekel uitgetrokken (Fig. 94 I). — De soorten van deze familie zijn meest kleine, buitengewoon bewegelijke kevertjes, welke zich gaarne op bloemen ophouden en zich bij gevaar door spartelende bewegingen zoeken te redden. Zij vliegen zeer goed. — Deze familie is door de *Scraptiinae* naverwant aan de *Melandryidae*.

Fam. LXIV. MORDELLIDAE.

- 6 Kop achter de opgeblazen slapen of onmiddelijk achter de oogen sterk ingesnoerd en als met een steel aan het halsschild verbonden, zelden ongesteeld 3), in welk geval de kop echter sterk op de onderzijde gebogen en de schedel meestal sterk gewelfd is. 7

Kop achter de oogen geleidelijk versmald en in het halsschild min of meer terugtrekbaar, ongesteeld, vooruitstekend, met vlakken schedel, soms snuitvormig verlengd 10

- 7 Halsschild aan de basis even zoo breed als de dekschilden, naar voren versmald. Kop met bultig verheven of zeer hoog gewelfden schedel, of wel op de onderzijde gebogen. Sprieten 11-ledig, bij het ♂ gekamd of in twee rijen waaivormig, bij het ♀ gezaagd, zelden gekamd of in ééne rij waaivormig, zeer zelden draadvormig, in welk geval het ♀ noch dekschilden, noch vleugels heeft 4). De larven leven parasitisch, meestal bij *Hymenoptera* (bijen en sociale wespen), bij welke zij nog eene afzonderlijke metamorphose (hypermetamorphose) ondergaan 5). Ook leven de kevers aldaar en treft men ze slechts zelden buiten de nesten aan (Fig. 95 I).

Fam. LXV. RHIPIPHORIDAE. 6)

Halsschild aan de basis veel smaller dan de dekschilden 8

- 8 Tarsklauwen meestal in twee ongelijke deelen gespleten, een dunner en een dikker gedeelte, welk laatste in vele gevallen getand of gekamd is. Kop van achteren sterk ingesnoerd en tegen het halsschild aangedrukt, de schedel meestal hoog gewelfd. Dekschilden dun, meer of minder smal en lang, veelal divergeerend of korter dan het weeke achterlijf. Sprieten 11-ledig, zelden 9-ledig 7), borstel-, draad- of snoervormig, of met naar het uiteinde verdikte leedjes of onregelmatig verbreed (Fig. 96 II). — Alle soorten van deze familie bezitten in het lichaam eene scherpe, blaartrekkende stof („cantharidine”). Zij leven deels op planten, dikwerf in groot aantal bijeen, deels op den grond. De larven leven voor een deel parasitisch in de nesten van *Hymenoptera* (bijen en sociale wespen) en doorloopen eene merkwaardige dubbele metamorphose (hypermetamorphose).

Fam. LXVI. MELOIDAE.

1) Alleen niet bij de *Rhipiphoridae*.

2) Bij niet in ons gebied voorkomende soorten.

3) Bij het niet in ons gebied voorkomende genus *Phytocenus*.

4) Bij het niet in ons gebied voorkomende genus *Rhipidius*.

5) De larve van de niet in ons gebied bekende *Rhipidius peccinicornis* Hüb. (de *Lattarum* Sund.) leeft parasitisch in kakkerlakken (*Periplaneta americana*).

6) Aan deze familie is naverwant de orde der *Strepsiptera* (*Stylopoda*), welke door sommige onderzoekers als *Schubli*, *Lucordaire* en later *Sharp*, *Fowler* en *Matthews* tot de *Coleoptera* worden gerekend. Door de onderzoekingen van *Lapeyrolle du Val* is voldoende gebleken, dat deze insecten aanmerkelijk van het ware kevertype afwijken.

7) Bij het niet in ons gebied vertegenwoordigde subgenus *Coryna* (genus *Zonalus*).

- Tarsklauwen gewoon 9
- 9 De kin zit op eene steelvormige voortzetting van de keel (Fig. 97). Kop met tamelijk breed halsgedeelte, vooruitstekend, met matig gewelfden schedel. Sprieten 11-ledig, gekamd of gezaagd, vooraan nabij de uitranding der niervormige oogen ingeplant. Klauwen slechts aan de basis eenigszins tandvormig verbreed. Voorcoxae kegelvormig uit de gewrichtsholten uitstekend. Lichaam vlak en breed, met geen bijzonder vast huidskelet. — Larven en kevers achter boomshors; de kevers veelal ook op bloemen en heesters.

Fam. LXVII. PYROCHROIDAE.

De kin zit niet op eene steelvormige voortzetting van de keel. Kop, halsschild en dekschilden meer of minder gewelfd. Lichaam eenigszins cylindervormig en smal (Fig. 98). Kop met een gewoonlijk zeer dun steelvormig halsgedeelte, vooruitstekend en in vertikale richting gemakkelijk beweegbaar, of wel naar onderen gericht en meer dicht tegen het halsschild aanliggend, bij uitzondering in 't geheel niet gesteeld 1). Sprieten 11-ledig, draadvormig, meestal naar het uiteinde slechts zeer weinig, soms duidelijk verdikt. — De kevers leven op bloemen en in plantenalval.

Fam. LXVIII. ANTHICIDAE.

- 10 Sprieten op het voorhoofd, meestal op eenigen afstand vóór de oogen, ingeplant, 11-ledig, zelden bij het ♂ 12-ledig, minstens zoo lang als het halve lichaam, draad- of borstelvormig, zeer zelden gezaagd, in welk geval echter de kop niet door een dunnen hals met het halsschild verbonden is. Kop vooruitstekend, veelal iets snuitvormig verlengd. Voor- en middelcoxae kegelvormig uitstekend en tegen elkaar aanstootend (Fig. 99 1). Achtercoxae tegen elkaar aanstaande. Dekschilden smal, in vele gevallen naar het uiteinde sterk versmald en meer of minder divergerend. Lichaam gewoonlijk lijn behaard. Pooten lang. Klauwen gewoon, zelden scherp getand of in twee ongelijk dikke helften gespleten. — De larven leven in hout; de kevers meestal op bloemen of tegen boomstammen; sommigen vliegen in den zonneschijn snel rond, enkelen zijn nachtdieren. — Deze familie heeft eenige verwantschap met de Telephoridae, alsook met de Cerambycidae.

Fam. LXIX. OEDMERIDAE.

Sprieten aan de zijden van den meer of minder snuitvormig 2) verlengden kop ingeplant, niet bijzonder lang, 11-ledig, snoervormig of naar het uiteinde iets verdikt. Voorcoxae iets kegelvormig uitstekende en tegen elkaar aanstootend. Middelcoxae iets meer kogelvormig en dicht aaneenstaande. Achtercoxae min of meer van elkaar verwijderd. Klauwen gewoon. Lichaam onbehaard. — De larven gelijken op die der Pyrochroidae. — De soorten leven achter schors, zelden op bloemen.

Fam. LXX PYTHIDAE.

Sub-Orde X. PHYTOPHAGA.

- 1 Kop niet snuitvormig verlengd. Voorcoxae meestal kogelvormig, achtercoxae smal en van elkaar verwijderd 2
- Kop met rudimentairen snuit (Fig. 112), achter de oogen meestal halsvormig ingesnoerd. Sprieten op het voorhoofd in eene uitranding der oogen ingeplant, samengedrukt, gezaagd, gekamd of geleidelijk verdikt. Pygidium in den regel vrij, onbedekt. Voorcoxae meer of minder kegelvormig en meestal tegen elkaar aanstootende; achtercoxae breed. Achterpooten langer dan de voorpooten, met lange tarsen, waarvan het eerste lid zeer lang en evenals het tweede smal, het derde daarentegen tweelobbig is. Dijen veelal getand of verdikt. De vleugels zijn over 't algemeen als bij de Curculionidae gevormd; zij vertoonen eene groote armoede aan dwarsverbindingen, een grooten eenvoud in het bijader-systeem der vena interno-media en hebben het gewricht vóór het midden. — Deze familie is ook met betrekking tot de concentratie van het abdominale gangliensysteem naverwant aan de Rhynchophora. De larven zijn meestal pootloos en voeden zich met de zaden van Papilionaceën. De kevers leven op bloemen en vliegen snel. — Deze familie vormt den overgang tusschen de Chrysomelidae en de sub-orde der Rhynchophora.

Fam. LXXIII. BRUCHIDAE (MYLABRIDAE).

- 2 Sprieten (Fig. 102 en 103) meestal borstelvormig of wel draadvormig, zeldzamer gezaagd of gekamd, bij hooge uitzondering naar het uiteinde verdikt of bij het ♂ waaivormig 3), zelden

1) Bij het met in ons gebied voorkomende genus *Phytobacnus*.

2) Bij *Pytho* steken alleen de monddeelen wat naar voren uit, bij *Rhinosinus* is de kop in 't oog vallend snuitvormig verlengd (Fig. 101 II).

3) O. a. bij het Braziliaansche genus *Phoeniceerus*.

snoervormig, in welk geval zij in de uitranding der meestal niervormige of sterk uitgerande 1) oogen ingeplant staan, 11-; bij uitzondering 12-ledig (*♂ Prionus*), gewoonlijk langer dan het halve lichaam; dikwijls overtreffen zij in lengte het geheele lichaam, vooral bij de *♂♂*; het eerste lid is gewoonlijk groot, het tweede kort, veelal knoopig gezwollen; in rust kunnen zij over den kop teruggeslagen worden. Lichaam mees al lang gestrekt en gewoonlijk fijn behaard. Halsschild zonder scherpen zijrand, behalve bij verscheidene *Prionini*. Dekschilden zonder stippellijnen. Pooten gewoonlijk lang en slank, in den regel ver buiten den zijrand van het lichaam uitstekende. De nervatuur der vleugels vertoont groote verwantschap met die der *Malacodermata*, van welke zij zich hoofdzakelijk door grooten eenvoud in het stelsel der bijaders van de vena interno-media onderscheidt. In dit opzicht herinneren de vleugels meer aan die der *Lucanidae*, doch bij deze laatste familie is o. a. het topgedeelte zeer groot, terwijl het bij de *Cerambycidae* in 't oogvallend klein is, zoodat de meestal diagonaal door den vleugel verloopende vena externo-media als hoofdader van den geheelen vleugel geldt. — De grootendeels weeke larven, welke hetzij pootloos of van zeer kleine voetstompjes voorzien zijn, vreten gangen in hout, enkelen in stengels en wortels van kruiden; enkelen leven onderaardsch 2). De kevers leven op bloemen, heesters, op versch geveld hout, enkelen op den grond. — Deze familie heeft ook eenige verwantschap met de *Oedemeridae*.

Fam. LXXI. CERAMBYCIDAE.

Sprieten draad- of snoervormig, of naar het uiteinde iets verdikt, bij uitzondering met dikkere eindleeftjes, zeldzamer gezaagd of gekamd, op het voorhoofd of vóór de slechts zelden uitgerande oogen ingeplant, hoogstens even lang als het halve lichaam, zelden langer, in welk geval het halsschild aan de zijden niet buitig is en de oogen niet uiterand zijn. Halsschild met meer of minder scherp gerande zijden. Dekschilden veelal met stippellijnen. Lichaam veel meer glad dan behaard. Pooten bijna altijd korter en krachtiger ontwikkeld. Volgens *J. Redtenbacher* komen de vleugels in hoofdzaak geheel met die der *Cerambycidae* overeen, het gewricht ligt meer in 't midden, bij de *Cerambycidae* daarentegen meer naar het uiteinde. De larven, welke steeds van pooten voorzien zijn, leven meestal vrij op planten, enkelen in plantendeelen en sommigen onder water. De kevers verschijnen soms in massa en zijn dan schadelijk. — Deze familie is zeer naverwant aan die der *Cerambycidae*, doch nadert ook door de *Galerucini* tot de *Malacodermata*.

Fam. LXXII. CHRYSOMELIDAE. 3)

Sub-Orde XI. RHYNCHOPHORA.

- 1 Kaaktasters gewoon, buigzaam. Bovenlip meer of minder duidelijk aanwezig. Sprieten recht. Pooten niet tot graven ingericht 2
- Kaaktasters abnormaal, kegelvormig, stijf; de leeftjes geleidelijk in grootte afnemende. Bovenlip slechts bij uitzondering duidelijk, in welk geval de pooten tot graven zijn ingericht. 3
- 2 Voorcoxae klein, kogelvormig. Pygidium meer of minder vrij, onbedekt. Sprieten onder den zijrand van den snuitvormig verlengden kop ingeplant (behalve bij *Choragus*) en van de oogen verwijderd, met los gelede knots. Snuit meestal breed, zelden smaller dan de kop. — Deze familie heeft door het genus *Choragus* eenige verwantschap met de *Scolytidae* en is de hoogst ontwikkelde groep der *Rhynchophora*. — De soorten leven achter boomschors, op dood hout, zelden op bloemen of in zaden, enkelen leven van schildluizen.

Fam. LXXIV. PLATYRRHINIDAE.

Voorcoxae vrij groot, kegelvormig. Pygidium door de dekschilden bedekt. Sprieten op den snuit ingeplant, met 3 grootere eindleeftjes. Snuit veel smaller dan de kop. — De soorten leven op bloeiende planten, vooral op dennen.

Fam. LXXV. NEMONYCHIDAE.

- 3 Pooten ongeschikt tot graven, daar de voorschenen langs den buitenrand niet van tandjes voorzien zijn 4). Tarsen met viltige of sponsigeuse zool en met meer of minder verbrede leeftjes,

1) Soms zijn de oogen in tweeën gedeeld (*Tetrops*).

2) Die der met in ons gebied voorkomende genera *Dorcadion* en *Vesperus*.

3) De tribus der *Donaciini*, welke ten onrechte als overgang van de *Cerambycidae* tot de overige *Chrysomelidae* werd beschouwd, is volgens *Roger* veelal als een uit den stam der *Chrysomelidae* (*Galerucina*) voortgesproten rijk te beschouwen, met meer gereduceerde nervatuur der vleugels, met langere sprieten en met het langgestrekte abdominale gaafstelsel der *Malacodermata*, terwijl bij de overige *Chrysomelidae* het centrale zenuwstelsel meer of minder geconcentreerd is, ofschoon nimmer zoo sterk als bij de *Lamellicornia* of *Rhynchophora*.

4) Bij enkele exotische *Curculionidae* zijn de voorschenen aan den buitenrand getand, doch deze vertoonen een zeer ontwikkelden snuit.

van welke het derde tweelobbig is; zelden zijn alle tarsleedjes smal, cylinderrond of zonder zolige onderzijde. Snuit duidelijk, van zeer verschillende lengte (Fig. 115, 119 en 120). De vleugels vertoonen in het algemeen veel overeenkomst met die der Bruchidae; zij zijn vooral in 't oog vallend door den eenvoud in nervatuur en door de plaatsing van het gewricht in of vóór het midden. De tribus der Brachyrrhini (Otiorrhynchini), vertoont eenige overeenkomst met de Tenebrionidae. De Cossonini, alsook eenigermate de Cryptorrhynchini vertoonen groote verwantschap tot de Hylesiniinae (Scolytidae). Eene zeer groote familie van phytophage kevers, welke dikwerf in massa optreden en dan schadelijk kunnen zijn; zij leven voor het meerendeel op bladeren en bloemen, slechts weinigen onder steenen. De larven leven meest in plantendeelen.

Fam. LXXVI. CURCULIONIDAE.

Pooten tot graven geschikt, platgedrukt; de voorschenen meestal aan den buitenrand getand of gekarteld (Fig. 122). Snuit niet ontwikkeld of slechts rudimentair. Larven en kevers leven achter schors of in het spint van verschillende boomen, enkelen in vruchten en zaden. De meesten zijn schadelijk. 4

- 4 Eerste tarslid veel korter dan de 3 volgende te zamen (Fig. 122). Kop weinig vooruitstekend, slechts met zeer geringe snuitvormige voortzetting, of wel kogelvormig, zonder eenige aanduiding van den snuit en geheel in het halsschild terugtrekbaar, waardoor dit laatste alsdan den kop kapvormig overwelft (Tomicini). Spriet en aan de zijden van den snuit, bij uitzondering op het voorhoofd 1), bij de Tomicini dicht vóór de oogen ingeplant; de eindknop hetzij geringd, rimpelig of ongeleed, veelal ongeveer de halve sprietenlengte innemend (Fig. 123). Tarsen 4-ledig, het derde lid tweelobbig, bij de Tomicini gewoon. Voorcoxae hetzij dicht aaneerstaande of door eene voortzetting van het prosternum gescheiden. Onderzijde van het achterlijf gelijkmatig gewelfd of naar het uiteinde geleidelijk opgaande, of meer of minder steil afhellend. De vleugels stemmen volkomen overeen met die der Curculionidae, het gewricht is vóór het midden, waardoor het topgedeelte grooter dan het basaalgedeelte is. Dwaarsverbindingen ontbreken geheel. De larven gelijken op die der Curculionidae.

Fam. LXXVII. SCOLYTIDAE.

Eerste tarslid bijna even lang als de 3 volgende te zamen (Fig. 124); het vierde lid is aan de basis van het klauwblad duidelijk zichtbaar. Halsschild aan weerszijden met een indruk, tot het opnemen der voorschenen. Spriet slechts met 6 leedjes. De soorten leven in het hout van oude boomen. (Fam. Platypidae. 2))

1) Bij het niet in ons gebied voorkomende genus *Phloeotribus*, bij welke de eindknop 3-bladig is.

2) Deze familie is niet in Nederland vertegenwoordigd

Sub-orde I. CARABOIDEA.

I. Familie CICINDELIDAE.

Vrij groote, slank gebouwde kevers, met langwerpig, min of meer plattedrukt of slechts iets gewelfd lichaam; zeer in 't oog vallend door de groene, licht- of donkerbruine kleur, benevens de witachtige vlekjes op de dekschilden (*Cicindela*). — Kop groot, met sterk uitpuilende oogen. Clypeus door een naad van het voorhoofd afgescheiden. — Sprietten 11-ledig, borstelvormig, op het voorhoofd, naar binnen boven de basis der voorkaken ingeplant (Fig. 1 I), de 4 eerste leedjes onbehaard. — Bovenlip zeer groot, minstens de basis der voorkaken bedekkend. Voorkaken sikkelvormig, met eenige krachtige tanden achter het zeer scherpe uiteinde. De achterkaken (Fig. 1 II) dragen twee tasters of liever zij zijn als het ware ingescheurd en het buitenste gedeelte is zeer smal en in het midden geleed, zoodat het den vorm van een taster aanneemt. Het binnenste gedeelte is eveneens geleed en het bovenleedje scherp als een klauw en bewegelijk. De eigenlijke kaaktaster is 4-ledig. Kin zeer diep uitgesneden, in de uitsnijding gewoonlijk met een middentand. Tong hoornachtig, zeer kort, achter de kin verborgen. Liptasters 3-ledig, schijnbaar 4-ledig, daar de tasterdragende stukken der onderlip niet met de tong samenhangen en zich in de uitsnijding van de kin als basaal leedjes der liptasters voordoen; geen paraglossen. — Episternen en epimeren van den prothorax duidelijk aangeduid. Metasternum met een gedeelte vóór de achtercoxae, dat door eene duidelijke dwarsgroef van het

Fig. 1. *Cicindela campestris* L.

I. Inplanting der sprietten. Orig. II. Achterkaak. Naar Ganglbauer. Gewijzigd.

overige gedeelte afgescheiden is; dit gedeelte zet zich voort in een driehoekig uitsteeksel tusschen de beide achtercoxae. — Achterlijf bij het ♂ gewoonlijk met 8 tergiten en 7 sterniten, bij het ♀ met 7 tergiten en 6 sterniten; de 3 eerste sterniten zijn vergroeid, de naden intusschen zijn duidelijk zichtbaar. Tegenover het eerste tergiet ligt geen sterniet. Het eerste sterniet is door de achtercoxae geheel doorsneden en in twee deelen verdeeld. Bij de Europeesche Cicindelidae is het zesde sterniet bij het ♂ in het midden uitgesneden, zoodat het kleine zevende sterniet zichtbaar is. Bij het ♀ is het achtste tergiet onder het zevende teruggetrokken. — Pooten zeer lang en slank, uiterst geschikt om snel te loopen. Voor- en middelcoxae kogelvormig; achtercoxae verbreed, elkaar aanrakende en zijwaarts tot aan de episternen van den metathorax doorlopende, van binnen in eene naar achteren gerichte voortzetting verlengd. Tarsen 5-ledig. — Bij het ♂ zijn gewoonlijk de 3 eerste leedjes der voortarsen verbreed en op de onderzijde zolig behaard. — In de nervatuur der vleugels vertoonen de Cicindelidae groote overeenstemming met de Carabidae, doch, althans bij *Cicindela*, is het uiteinde der vena externo-media met de mediane langsader der area externo-media niet door eene gevorkte, maar door eene gewone dwarsader verbonden, waardoor het bij de Carabidae zoo eigenaardige „oblongum” ontbreekt. Van den wortel dezer dwarsader verloopt eene gebogen straalader naar den vleugelrand.

De Cicindelidae zijn landkevers, welke gewoonlijk in aantal bijeen, zandige gronden bewonen, die sterk aan de zon zijn blootgesteld. Zij jagen hare prooi na, met verbazende snelheid loopende en telkens opvliegende. Eene soort (*C. germanica*) vliegt zelden op. — Wanneer de zon verdwijnt, verbergen zij zich; bij slecht weder en des nachts kruipen zij in zelf gegraven hollen. Wanneer men ze aanvat, verspreiden zij, vooral gedurende den paartijd, een eigenaardigen geur.

De larven zijn langwerpig. Kop hoornachtig, donker, iets metallisch gekleurd, van boven uitgehöld, aan weerszijden met 4 ocellen, waaronder 2 bijzonder groote. Sprietten 4-ledig, draadvormig, aan de basis der voorkaken ingeplant. Voorkaken krachtig ontwikkeld, sikkelvormig en zeer scherp, van binnen met een driehoekigen tand aan de basis. Achterkaken met een 3-ledigen taster. Liptasters 2-ledig. Borstsegmenten op de bovenzijde hoornachtig; prothorax zeer groot, halvemaanvormig. Achterlijf uit 9 segmenten samengesteld, van boven en van onderen met hoornachtige platen bedekt, behalve de onderzijde van het laatste segment; vijfde segment op de rugzijde met twee buities, welke elk voorzien zijn van een naar voren gekromd haakje, waarmee de larve zich tegen den wand der gangen waarin zij leeft, aandrukt en door het naar voren buigen van dit haakje steeds dieper kan dalen. Aan weerszijden der eerste 8 achterlijfssegmenten bevindt zich een stigma, het 9de segment

zonder cerci. Het achterlijf eindigt in eene voor de beweging dienende anaalbus. De Cicindeliden-larven verschillen zeer van die der Carabidae, o. a. door het aantal ocellen en door de twee ongelijke klauwen der tarsen. In volwassen staat zijn zij ongeveer 2½ cM. lang. Zij leven terzelder plaatse met de imagines, doch in loodrechte gangen in den grond, ter dikte van eene penne-schacht, van 6-18 cM. diepte. Bij het uitgraven dragen zij telkens de aardkluitjes in de uitholling van den kop naar buiten. In deze gangen loeren zij, op de wijze van de mierenleeuw-larve, op voorbijgaande insecten, die zij aangrijpen en op den bodem verslinden. Gedurende warme nachten schijnen zij haar gewone verblijf te verlaten en rondlopende hare prooi te vervolgen. De overblijfselen der verslonden insecten worden telkens, zoo ook de uitwerpselen, naar buiten geworpen, zoodat deze gangen steeds zuiver gehouden worden.

Tegen half Augustus verpoppen de larven op den bodem dezer gangen. Vele larven zijn eerst tegen het einde van September volwassen.

De poppen, welke evenals alle keverpoppen zeer beweeglijk zijn, onderscheiden zich van die der Carabidae door kegelvormige, aan het uiteinde met een haarbundel bezette buikjes, aan de zijden der eerste 4 tergiten, door twee zeer lange, divergeerende, schuin afstaande aanhangselen van het vijfde tergiet, door de niet aanwezige zijborstels van het achterlijf en door de ontbrekende cerci aan het negende segment. — Na 4 weken rust, klemt de pop de aanhangselen van het vijfde segment tegen den wand van den gang en kruipt de kever uit, in den beginne nog week en onuitgekleurd. De kever blijft nog eenige dagen in zijnen schuilhoek en zwemt dan op bovenbeschreven wijze rond, om tegen de naderende koude het winterkwartier op te zoeken.

In April legt het overwinterde ♀ eieren, in niet zeer groot aantal.

Door hare roofzucht zijn de larven en de imagines zeer nuttig, daar zij ook menig schadelijk insect verslinden.

De Cicindelidae vormen eene natuurlijke familie, verwant aan de Carabidae, doch zij zijn zeer onderscheiden door de plaats van implanting der sprieten. Het inwendig maaksel duidt geheel op het gebruik van dierlijk voedsel. Wat hare organisatie betreft, zijn het de hoogst ontwikkelde Coleoptera.

In Nederland is slechts één genus 1) vertegenwoordigd, n.l.:

1. *Cicindela* L.

Kop groot, met de groote rondachtige, zeer sterk uitpuilende oogen breeder dan het halsschild, op de wang en slapen en op het voorhoofd, ten minste naast de oogen met eene langsstreepige sculptuur. Bovenlijf verbreed, slechts de basis der voorkaken bedekkend, aan den voorrand gewoonlijk met een of meer tanden, die bij het ♀ in den regel krachtiger ontwikkeld zijn dan bij het ♂. Voorkaken aan de binnenzijde met een grooten, in tweeën verdeelden basaaltand en daarvoor met drie kleinere, doch krachtige scherpe tanden. Eindlid der kaaktasters naar het uiteinde iets geleidelijk verbreed, en afgerond afgeknot, langer dan het voorlaatste lid. Kin met een langen smallen, scherpen tand in de diepe uitranding. Eerste lipstaster-lid zeer kort, het tweede zeer lang en aan de binnenzijde met tal van borstelharen bezet, het cindlia korter dan het tweede en evenals dat der kaaktasters gevormd. Halsschild veel smaller dan de dekschilden te zamen, achter den voorrand en voor de basis met eene dwarsgroef, daartusschen met eene middengroef. Dekschilden gewoonlijk met witte vlekken en banden. Vleugels altijd ontwikkeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden uitgesneden, waardoor het kleine zevende sterniet zichtbaar wordt. Ook zijn bij het ♂ de eerste 3 voortarsenleedjes verbreed en aan de onderzijde zolig behaard. — De soorten van dit genus, onder den naam van „Zandtorren” bekend, zijn fraai groen, blauwgroen, bruin, zwartachtig of bronskleurig. — De larve van *C. campestris* is beschreven door Desmarest, Westwood, Erichson e. a., de pop door Schmidt, Blisson en Schiödte; die van *C. hybrida* door Chapuis & Candèze en Schiödte; die van *C. maritima* door Schmidt. — Van de ± 50 europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

1) Episterna van den prothorax wit behaard (subgen. *Cicindela* i. sp.). Dekschilden in het midden nabij den naad met een wit vlekje of dwarsband. 2

Episterna van den prothorax kaal (subgen. *Cylindera* Westwood). Dekschilden in het midden nabij den naad ongevlekt. Bovenzijde in den regel dof groen, met min of meer koperkleurigen kop en halsschild, soms de dekschilden fraai blauw en kop en halsschild groenachtig (abc.

1) Van een tweede genus (*Tetracha* Hope) komt eene soort in Spanje voor.

**cyanea* Hrbst.) 1) of de bovenzijde geheel blauw (ab.c. **cyanea* Hrbst.), zelden koperkleurig-roodbruin (ab.c. **cyanea* Westh.), bruinachtig-bronskleurig (ab.c. **fusca* Dalla Torre) of zwartachtig (ab.c. *obscura* F., St. Anna bij Nijmegen). De witte teekening der dekschilden bestaat uit eene kleine schouderplek, eene grootere zijdelingsche middenvlek en eene topvlek; soms is de witte teekening weinig ontwikkeld of wel zijn de midden- en topvlek grooter en breeder. Bij ab.c. **deuteros* Dalla Torre ontbreekt de schouderplek, bij ab.c. **protos* Dalla Torre de vlek aan den zijrand, bij ab.c. **hemichloros* Dalla Torre de schouder- en middenvlek, bij ab.c. **Jordani* Beuth. is de middenvlek met de topvlek tot een in het midden smalleren zoom versmolten; bij ab.c. **bipunctata* Kr. bevindt zich bovendien eene kleine witte stip tusschen de middenvlek en den naad; bij de blauwe ab.c. **Stevani* Dej. ontbreken de zijvlekken. Lengte 9—11 mm. Zeer zeldzaam op akkers en stoppelvelden in de heidestrecken en vooral op kalk- en leemgrond; zij loopt snel rond, doch vliegt zelden op. Ruurlo en omstreken van Maastricht; zou ook bij Utrecht, Ede, Nijmegen en Groningen voorkomen en bij Wageningen gezien zijn 5. *germanica* L.

2 Bovenlip wit 2), niet rimpelig, noch scherp gekield. Bovendeelen van het lichaam groen of bruin. 3

Bovenlip zwart, rimpelig en in de lengte vrij scherp gekield. Bovendeelen van het lichaam zwartachtig, soms met bronskleurigen of groenachtigen weerschiin, met eene geelachtig witte teekening der dekschilden, bestaande uit eene C-vormige, meestal in tweeën gedeelde (ab.c. *similis* Westh.) 3) schouderplek, een iets achter het midden uitgezakt dwarsband en eene rondachtige zijvlek naar het uiteinde. Lengte 14—17 mm. Gemeen in heideachtige streken, vooral op zandwegen, bij voorkeur in dennembossen. Zij bewoont volgens de waarnemingen van Dr. J. Bosscha Jr. uitsluitend het grinddiluvium. Zij vliegt hooger en sneller dan de andere soorten en rust soms op boomen 4. *silvatica*. L.

3 Liptasters geheel metaalkleurig. Bovendeelen bij het type fraai groen, met 5 witte zijvlekjes, eene witte stip gewoonlijk op een bruin vlekje achter het midden en bij de wijfjes meestal met eene zwartachtige stip vooraan nabij den naad. Soms ontbreekt de tweede vlek (ab.c. *5-maculata* Beuthin), soms de derde vlek (ab.c. *protos* Dalla Torre), soms ontbreekt de tweede en derde vlek. Bij ab.c. **affinis* Fisch. (in België bij Fleurus) ontbreken de witte vlekjes geheel of nagenoeg geheel. Bij ab.c. *conjuncta* Dalla Torre is de vierde randvlek met de vijfde tot een zoom verbonden en bij ab.c. *connata* Heer zijn de beide middelste witte vlekjes groot en door een fijnen tak met elkaar verbonden. Ook is de grondkleur zeer veranderlijk; soms zijn de bovendeelen grotendeels fraai blauw (ab.c. *coeruleus* Schilsky), of wel zijn kop en halsschild groenachtig of met eenigszins roodachtigen weerschiin en de dekschilden bruinrood of levendig koperkleurig-bruin (ab.c. **rufipennis* Beuthin, in Noord-Duitschland bij Harburg); bij ab.c. *Saxeneni* Endrulat, *Jareleusis* Graëlls (bij Apeldoorn, Steenberg en Roermond), is de geheele bovenzijde roodbruin-koperkleurig, bij ab.c. **nigrescens* Heer zeer donkergroen, bij ab.c. *funbris* St. (Oisterwijk, Breda, Winterswijk, Eerbeek en Wolfhezen) zwartgroen. Lengte 11—14 mm. Gemeen op heidevelden en zandwegen. Volgens de waarnemingen van Dr. J. Bosscha Jr. uitsluitend op diluvialen zandgrond. Ook op Texel. Bij Breda werd een exemplaar gevangen dat slechts 10 mm. lang is. 1. *campestris*. L.

Voorlaatste lid der liptasters in den regel niet metaalkleurig (bij het ♂ bleekgeel, soms donkerder, bij het ♀ soms zelfs metallisch-zwart.) Dekschilden gewoonlijk metallisch-bruin, zelden groenachtig-bruin of groenachtig, min of meer bronskleurig, met eene schoudervlek, een gebogen dwarsband in het midden en eene vlek aan het uiteinde wit. 4

4 Het afhellend voorste gedeelte van het voorhoofd met lijne dicht opeen staande langsstreepjes, bij het type meestal iets behaard, bij het ras *riparia* Latr. meestal onbehaard; voorhoofd van voren duidelijk bultig. Middenvlek op de dekschilden gewoon uitgerand, niet als bij *maritima*. Deze soort komt in twee vormen voor. Bij den typischen vorm der zandstreken zijn de dekschilden, vooral bij het ♂, achter het midden slechts weinig verbreed. De kleur der bovendeelen is koperkleurig-bronzig, soms groen-bronskleurig (ab.c. *virescens* Letzn.); behalve de gewone granularie nog meestal duidelijk blauw bespikkeld; eenige vlekken op den kop en de dwarsgroeven van het halsschild zijn blauwgroen of blauwviolet. Kleine exemplaren met groene dekschilden vormen de ab. *xylicola* Curtis (nec Latr.). Eene onafgebroken schoudervlek, een dwarsband, welke naar buiten verbreed en naar binnen hakig gekromd is en eene onafgebroken topvlek wit. Bij Katwijk werd een exemplaar gevangen met een paars en een groen dek-

1) De kleur-varianten zijn zooveel mogelijk met de daaraan gegeven namen vermeld en steeds aangeduid door ab.c. (aberratio coloris), de sculptuur-varianten zijn aangeduid door al.s. (aberratio sculpturae). Zie hierover Dr. A. Fleischer in Wien. Ent. Zeits. VI 1892. De met een * gemerkte rassen, varianten, aberraties en vormen zijn mij uit Nederland niet bekend.

2) Eene enkele maal komen exemplaren voor, bij welke de bovenlip donker gekleurd is, vermoedelijk ten gevolge van een kleuring door de zwarte digesteve stof uit den mond, welke onder de dunne chitinehuid is ingestort. Hetzelfde vond ik ook eenmaal bij *C. hybrida*.

3) Volgens Walther Horn beschreef Linne de soort op exemplaren met in tweeën verdeelde schoudervlek.

schild. Soms is de middenband verbreed (ab.c. *integra* St., *monasteriensis* Westh.) Soms hebben de ♀♀ in het voorste derde gedeelte der dekschilden naast den naad een zwart vlekje (ab.c. *punctata* Letzn.). Wijfjes met geheel donker metaalkleurige liptasters (ab.c. *palpalis* Dokhtour.) zijn zeldzaam. Hoogst zelden is de witte middenband zoodanig in twee deelen verdeeld, dat behalve het korte zijstuk nog slechts de eindknop van den band overblijft (de *humeralis*- of *dilacerata*-vorm van Roeschke, bij Oldenzaal) Ook zag ik een exemplaar uit Gelderland, bij welke het uitgezakte gedeelte van de schouderlek zich sterk verbreed en met den dwarsband samenvloei. Soms is alleen het buitengedeelte van den middenband ontwikkeld. Bij het ras *riparia* Latr., welke langs rivieroevers en bergbekken voorkomt, is het lichaam doorgaans iets grooter, de dekschilden bij het ♀ vrij sterk naar het uiteinde verbreed; de bovendeelen donker grauwgroen, soms iets vuilgroen of bruin, zelfs eenigszins zwartachtig; de schouderlek is gewoonlijk in tweeën gedeeld, de middenband in den regel niet verbreed. De dekschilden zijn gewoon korrelig, de fijne bespikkeling onduidelijker of geheel uitgewischt. De liptasters bij de ♀♀ bijna altijd donker metaalkleurig. Bij den vorm *transversalis* Latr. is de middenband smaller en naderd den zijrand niet. Lengte 12–15 mm. Het type zeer gemeen in droge zandige streken, als duinen en diluvialen zandgrond. De vorm *transversalis* van het ras *riparia* eenmaal in Limburg bij Blijenbeek 2. *hybrida* L.

Het afhellend voorste gedeelte van het voorhoofd in den regel met duidelijke haardragende groefjes voorzien. Voorhoofd van voren veel minder bultig dan bij *hybrida*. Voorlaatste lid der liptasters bleekgeel; de twee eerste kaaktasterleedjes bij het ♂ gewoonlijk, bij het ♀ bijna nimmer geelachtig. Achttertarsen in 't oog vallend korter in verhouding tot de schenen, dan bij *hybrida*. Middenvlek op de dekschilden zigzagvormig, doordat twee, door een langsstreepje verbondene vlekken, rechthoekig op elkaar staan. Kleur der bovendeelen even veranderlijk als bij *hybrida*, gewoonlijk bruin, zeer zelden groen (bij Scheveningen en den Hoek van Holland). Het uiteinde van den penis is volgens Kraatz te vergelijken met eene gewoon gesneden schrijflpen, terwijl deze bij *hybrida* veel langer en soms uitgetrokken is. Lengte 12–15 mm. Gemeen op de laatste duinerrij en op de stranden. De localvar. *obscura* Schilsky, welke iets kleiner dan het type en donkerder gekleurd is, werd bij Zeist op diluvialen zandgrond gevangen; deze vorm komt ook in België op de zandheuvels van Calmpthout voor. Wellicht is deze soort slechts een ras van *hybrida* 3. *maritima* Latr.

II. Familie CARABIDAE.

Deze onder den naam van „Loopkevers” bekende familie, bevat meestal slank gebouwde insecten, met langwerpig, weinig geweldig of tamelijk vlak lichaam; zelden zijn zij meer ovaal of rondachtig, meestal eenkleurig zwart, metaalglanzig, bruin, rood- of geelachtig, zeldzamer met lichtere of donkere vlekken. — Kop in den regel klein, ovaal of langwerpig, met 1 of 2 haarstippen tegen den oogrand aan. Oogen rond, meer of minder uitpuilend, bij uitzondering rudimentair of ontbrekend 1). Clypeus in den regel door een duidelijken naad van het voorhoofd afgescheiden, gewoonlijk aan weerszijden met een borstelhaar. Regel is, dat bij die genera, welke twee haarstippen tegen den oogrand hebben, de borstelharen van den clypeus gelegen zijn in het midden aan de zijden, op eenigen afstand van den zijrand, terwijl bij die genera, welke ééne haarstip tegen den oogrand hebben, de borstelharen van den clypeus meer nabij de voorhoeken staan. Bij sommige *Anisodactylus*-soorten treft men meer dan eene haarstip aan, ter weerszijden van den clypeus 2). — Sprietten 11-ledig, draad- of borstelvormig, zelden snoervormig, gewoonlijk zoo lang als het halve lichaam, op de zijden van den kop tusschen de basis der voorkaken en de oogen ingeplant (Fig. 2 I); de eerste leedjes zijn gewoonlijk onbehaard, de volgende daarentegen met fijne, neerliggende haarstjes, bij het genus *Loricera* met large afstaande borstelharen, bezet. — Bovenlip duidelijk ontwikkeld, meestal sterk verbreed, zelden tweelobbig (*Cychrus*), in den regel

Fig. 2. *Carabina cyclophanta* I.

Oog

I Inplanting der sprietten

II Achterkaken

1) Bij niet-inlandsche soorten.

2) Van groot gewicht voor de systematiek zijn de haarstippen, welke in constant aantal hier en daar op de elytrachuid van verschillende lichaamsdeelen worden aangetroffen en geenszins als iets toevalligs mogen beschouwd worden, doch voornamelijk een nog onbekende betekenis schijnen te hebben.

afgeknot of uitgerand. Voorkaken krachtig ontwikkeld, scherp, gewoonlijk met een scherpen tand, bij uitzondering met 3 zeer kleine tandjes aan de basis (*Clivina*), of wel met twee kraaijge tanden achter het uiteinde (*Cychrus*). Achterkaken (Fig. 2 II) met het naar binnen gekeerde gedeelte bewimpert of gedoord, zonder bewegelijken haak aan het uiteinde; het naar buiten gekeerde gedeelte is tastervormig en 2-ledig (behalve bij *Calistinus*). Kaaktasters 4-ledig, het eindlid veelal naar het uiteinde verbreed, min of meer bijlvormig, in vele gevallen cilindervormig of naar het uiteinde versmald, bij de *Bembidini* zeer klein, priemvormig (Fig. 3 I). Kin uitgerand, veelal met een middentand; tong en paraglossen verschillend gevormd, de paraglossen niet altijd aanwezig. Liptasters 3-ledig. — Halsschild ovaal, hartvormig of vierhoekig, met voor de systematiek gewichtige haarstippels aan den zijrand. — De dekschilden bedekken het achterlijf volkomen, slechts zelden zijn zij afgeknot en blijft het laatste segment zichtbaar (*Dromius* en verwante genera); gewoonlijk met verscheidene duidelijke stippellijnen of stippelrijen, soms met gewone langsstrepen of langsrillen. — Episternen en epimeren van den prothorax bijna altijd duidelijk door naden van elkaar ge-

Fig. 3. I. Kaaktaster van *Bembidium*. Orig.

II. Voorscheen en tars van *Carabus* ♀. Orig.

III. Voorscheen van *Dyschirius*. Orig.

scheiden (Fig. 4) 1). Metasternum als bij de *Cicindelidae*, vóór de achtercoxae over de geheele breedte van een dwarsnaad voorzien, met eene driehoekige voortzetting tusschen de achtercoxae. — Achterlijf

met 8 tergiten en 6 sterniten, van welke de eerste 3 sterniten vergroeid zijn, ofschoon de naden duidelijk in het oog vallen. Het door de achtercoxae geheel middendoor gedeelde eerste sterniet staat tegenover het tweede tergiet. Bij het ♀ der groote *Carabini* en bij het ♂ der *Brachynini* bevindt zich achter het achtste tergiet nog een negende, de anaalplaat. Het tegenover het achtste tergiet gelegen zevende sterniet, is in het midden vliezig of in twee zijstukken verdeeld en behalve bij de *Brachynini* onder het zesde sterniet volkomen teruggetrokken. Bij het ♂ der *Brachynini* bestaat nog een achste sterniet tegenover de anaalplaat. Op het laatste sterniet heeft men een sexueel verschil in het aantal haarstippels. — Pooten lang, krachtig ontwikkeld, tot loopen ingericht. De voorschienen vertoonen in haren bouw twee hoofdvormen. Haar binnenrand is tot aan het uiteinde recht, in welk geval de beide eindsporen geheel aan het uiteinde staan (Fig. 3 II), of wel de binnenrand is achter het uiteinde diep uitgesneden en de binnenste eindspoor is aan de basis der uitsnijding geplaatst. Aldus zijn de graafpooten der *Scaritini* (Fig. 3 III) en vindt men overgangsvormen bij de *Elaphrini* en *Omphronini*. Tarsen met 5 leedjes. Voor- en middelecoxae kogelvormig, de achtercoxae in de breedte ontwikkeld en tot aan de episternen of epimeren van den metathorax doorlopend 2), aan de binnenzijde naar achteren in eene voortzetting verlengd, in den regel elkaar aanrakende, bij *Cychrus* daarentegen gescheiden door een klein driehoekig gedeelte van het eerste sterniet; bij *Pterostichus* stooten zij slechts in een punt aaneen. De trochanters der achterpooten zitten tegen de binnenzijde der achterlijven als aanhangsels, bij de voor- en middelpooten daarentegen op de gewone wijze in het verlengde der dijen. — De vleugel van *Calosoma sycophanta* (Fig. 5), welke als het type voor alle *Caraboidea* kan gelden, heeft volgens *Roger* min of meer de gedaante van een scalpel. De voorrand is in het basaalgedeelte zeer flauw naar binnen gebogen en verloopt vanaf het gewricht in eene gebogene richting tot aan de eenigszins scherphoekige vleugelpunt. De achterrand verloopt daarentegen van uit den afgeronden basaalhoek, zeer flauw gebogen tot aan de vleugelpunt. De meeste *Caraboidea*-vleugels zijn glashelder, zelden zwart- of bruinachtig getint; de lichter- of donkerder bruine aders vallen zeer scherp in het oog. Het gewricht bevindt zich ongeveer op het 2/3 gedeelte vanaf de basis, zoodat het basaalgedeelte der vleugels ongeveer tweemaal zoo groot is als het topgedeelte. De eerste 3 aders (*vena marginalis*, *mediastina* en *scapularis*), vereenigen zich reeds vóór het midden van het basaalgedeelte, tot eene dikke, den voorrand begrenzzende, van lijne dwarsribjes voorziene hoorlrijst, welke geleidelijk dunner wordt en in 't midden tusschen het gewricht en de vleugelpunt eindigt, zoodat het overige gedeelte van den

Fig. 4. Kop en prothorax van *Carabus*. Orig.

1) Behalve bij het Zuidenropesche genus *Apotomus*.
2) Behalve bij het in Noordelijk Europa voorkomende genus *Trachypachys*, waar de achtercoxae tot aan den zijrand van het lichaam doorloopen.

Fig. 5. Mangel van *Calosoma sycophanta* L.
Naar Ganglbauer. Gewijzigd.

- I. Vena marginalis (= costa). II Vena mediana (= subcosta).
III Vena scapularis (= radius). V Vena externo-media (= sector).
VII Vena cubitalis (= cubitus). IX Vena interno-media.
XI Vena analis. 1. Voorste ruit. 2. Binnenste ruit. 3. Achterste ruit.
5. Oblongum. 6. Wigvormig vakje. 7. Area externo-media.
8. Area interno-media.

punt gericht hoek. De zigzaggewijze tegen elkaar verlopende dwarsstakken omsluiten zoodoende drie onderling samenhangende ruitvormige cellen, van welke de binnenste het grootst is. Deze cellen worden nu zoodanig aangeduid, dat de grootere de binnenste ruit en van de twee kleinere, die welke naar de vleugelbasis gelegen is de voorste, en de andere de achterste ruit heet. Gedeeltelijk treft men deze ruiten nog wel bij andere Coleoptera aan, doch zelden zijn zij zoo karakteristiek als bij de Carabiden. Eene andere cel (het „oblongum”) wordt meestal nog gevormd door de beide dwarsstakjes, welke aan het gewricht van de vena externo-media tot haar recurrens gaan en veelal aan haar begin nog als een enkele tak vereenigd zijn. In het topgedeelte van de area externo-media verlopen, behalve de voortzetting der reeds genoemde halveerende zijader, nog twee dergelijken, n.l. eene (wellicht het topgedeelte der vena scapularis) nabij den voorrand en daaraan als eene breede pigmentstreek tot aan de vleugelpunt evenwijdig en eene tweede van af de achterste der beide dwarsstakjes als eene dunne ader uitgaande tot aan den achterrand. De vena interno-media verloopt nagenoeg rethlijnig tot den achterrand. In de area interno-media verloopt eene zijader, welke uit twee korte, convergeerende, uit de vena externo-media ontspringende takjes ontstaat en ongeveer in het midden der area zich met eene tweede, verder naar voren uit de vena externo-media ontspringende, licht gekleurde zijader, lisvormig vereenigt; uit den ongeveer in 't midden der area gelegen, hoekigen top dezer lis, ontspringen twee tot den vleugelrand divergeerende zijaders; achter den top ontspringen twee korte dwarsstakjes tot de vena interno-media, welke een wigvormig vakje vormen. In de areaanalis ontspringt uit de vena interno-media een zijtak, welke tot aan den vleugelrand verloopt. De vena analis vormt eene groote ellipsvormige lis, wier achterhelft het basaalgedeelte van den vleugelrand begrenst. Bij alle Carabidae beantwoordt de nervatuur aan de hierboven gegeven beschrijving. De verschillen betreffen vooral den vorm en de grootte der zoogen. „ruiten”, van het „oblongum” en van het „wigvormig vakje”. Dit laatste ontbreekt bij de Lebiini. In vele gevallen zijn de vleugels rudimentair (o. a. bij *Dyschirius globosus*) en bij vele genera ontbreken zij geheel, in welk geval de dekschilden in het geheel niet kunnen opgelicht worden (*Carabus*) en dus meer dienen om het weeke bovengedeelte van het achterlijf te beschutten. Bij zeer enkele soorten heeft men gevleugelde en ongefleugelde individuen. — Tarsen 5-ledig. Bij de mannetjes zijn gewoonlijk de eerste ledjes der voortarsen, soms ook der middeltarsen verbreed en op de onderzijde zolig. Gewoonlijk zijn 3 of 4, zeldzamer slechts 2 leden, zeer zelden slechts het eerste lid der voortarsen verbreed. De tot het vasthouden der wijfjes dienende borstelachtige, viltige, zwammige, schabachtige of vederachtig toetschijnende zool bestaat uit zeer verschillend gevormde hechttharen, welke door *Simmermacher* nader onderzocht zijn. De wijfjes bezitten twee zeer ontwikkelde, hoornachtige, twee-ledige vaginaalkleppen. Het copulatieorgaan der mannetjes „de forceps” is asymmetrisch gebouwd en naar links gekromd.

De Carabidae zijn kevers, die nagenoeg uitsluitend van roof leven en o. a. insecten, larven, wormen en slakken verslinden. Enkel en leven van plantentoffen (*Zabrus*, sommige *Amara*- en *Ophonus*-soorten). De meeste soorten zijn nachtdieren, doch er zijn ook velen die overdag en zelfs in den felsten zonneschijn rondloopen. Men vindt ze gewoonlijk op de aarde, in velden, bosschen, tuinen, weilanden en heidevelden, langs rivieren, meren en plassen, snel rondlopende, of onder steenen, afgevalen bladeren, mos en achter boomschors verborgen. Bij uitzondering treft

vleugelrand dun en vliezig is. De vena externo-media verloopt eenigszins naar binnen gebogen en eindigt op de hoogte van het gewricht, zonder zich verder tot aan den achterrand voort te zetten. De area externo-media is midden doorgedeeld door eene teruglopende zijader, welke nabij het gewricht zoowel naar de vena scapularis als naar de vena externo-media korte dwarsstakjes afgeeft en dan als eene breede donkere streek, evenwijdig aan de bocht van den voorrand, tot aan den achterrand doorloopt. De tusschen deze zijader en de vena scapularis gelegen helft van het basaalgedeelte der area externo-media, is donker bruinachtig gekleurd. De eerste van de teruglopende ader, tegen de vena scapularis uitgetreden korte dwarsstak vereenigt zich met een dergelijk van de vena scapularis uitgetredend dwarsstakje (hetwelk bij andere Coleoptera-groepen nog als een volledig ontwikkelde „ramus recurrens” der vena scapularis zal geduid worden), onder een rechten met den top naar de vleugel-

men ze vliegende aan of op boomen (*Calosoma*) of op lage planten en struiken (*Lebia* en sommige *Harpaliden*). Enkele soorten graven gangen, waarin zij hare prooi vervolgen (*Clivina*, *Dyschirius*); nog anderen loeren op prooi in loodrechte gaten (*Broscus*).

De larven houden haar verblijf onder steenen en in de aarde en zijn evenals de imagines nuttig voor den landbouw, door het verdelgen van schadelijke insecten. — De meeste *Carabidae* zonderen, wanneer zij gevangen worden, uit den aars, eene bruine, bijtende en scherp riekende vloeistof af, welke zelfs in een enkel geval (*Brachynus*) tot op eenigen afstand uitgespoten kan worden. Wanneer zij door hun snelle loopen aan de vervolging trachten te ontsnappen en zich te verbergen onder een steen of aardkluit, doch geen kans zien aan het dreigend gevaar te ontkomen, dan dient dit afscheidingsproduct tot verdedigingsmiddel. Bij *Brachynus* gaat deze afscheiding gepaard met een hoorbaren knal en ontwikkeling van damp. Dit vocht wordt afgescheiden uit twee anaalklieren, welke met eene lange afvoerbuis, waaraan een reservoir, aan weerszijden in den aars eindigen; door samentrekking van genoegend reservoir wordt de inhoud uitgespoten. — Verder bezitten de *Carabidae*, evenals de *Cicindelidae* een vlokkingen chylusdarm, een krop aan het einde van den slokdarm en eene spierachtige kauwmaag, welke aan de binnenzijde vier met borstels bezette hoornachtige langsplooven vertoont.

De *Carabidae* kunnen lang honger lijden, doch hebben behoefte aan water, vandaar dat zij meestal vochtige plaatsen tot hun verblijf kiezen. Bij gebrek aan dierlijk voedsel schijnen sommigen ook wel plantaardigen kost te gebruiken. — Tegen den winter verbergen zich de meeste soorten, om beschut te zijn tegen de koude; de grooteren (*Carabus*, *Nebria*, *Feronia* enz.) kiezen daartoe vermoldde boomstronken, waarin men ze dikwerf in aantal bijeen aantreft; de kleineren kruipen in de aarde, meestal aan boomwortels of tusschen dorre bladeren en stro of in dood riet. De eieren leggen zij in den grond, in mos of onder steenen.

De larven zijn langwerpig; het lichaam bestaat behalve uit den kop, uit 12 segmenten, welke met hoornachtige platen bedekt zijn; de aars steekt buisvormig uit en dient tevens voor de beweging. De eerste 8 sterniten elk met een paar stigmata, het 9de met twee cerri. Kop met twee 4-ledige sprieten en aan weerszijden met 6 duidelijk ontwikkelde, in twee rijen geplaatste ocellen. De voorkaken steken ver uit en zijn sikkelvormig, met een rand van binnen voor de basis; de mondopening is klein en dient tot uitzuigen van het voedsel, dat met de kaken gegrepen en doorboord wordt. Verder hebben zij 6 pooten, elk voorzien van twee ongelijke of even lange klauwen, zeldzamer slechts met ééne klauw (*Dyschirius*, *Broscus*, *Bembidium*, *Gyllenum* en *Sphodrus*). Zij zijn evenals de imagines zeer vraatzuchtig en bewegelijk en jagen op hare prooi onder steenen, bladeren of in aardholten en gangen; slechts die der *Calosoma*'s klimmen met gemak op boomen en struiken om rupsen te vervolgen. — De larven verpoppen in de aarde in zelfgemaakte holten, veelal onder steenen. De poppen zijn in den regel te herkennen aan de twee zijdelingsche aanhangsels van het laatste abdominaalsegment, welke dienen om door te steunen tegen de wanden dezer aardholten, het uitkruipen van het imago uit de pophuid te vergemakkelijken. Sommigen (*Amara*) hebben twee generaties in het jaar; vele soorten leven als larve twee of drie jaren alvorens te verpoppen. Meestal overwinteren de imagines, veel minder de larven; soms ook de poppen.

De *Carabidae* vormen eene der grootste keverfamiliën. Zij zijn naverwant aan de *Cicindelidae* en sluiten door de familie der *Haliplidae* aan de *Dytiscidae*.

De door mij gevolgde indeling is in navolging van *L. Ganglbauer's* „die Käfer von Mitteleuropa“. I. Band (*Caraboides*) 1892. Zij berust vooral op de meer rationele kenmerken aan het hiidskelet ontleend.

Overzicht der Sub-Familiën en Tribus.

- 1 Epimeren van den mesothorax tusschen de zijwaartsche voortzettingen van meso- en metasternum tot aan de middelcoxae reikend (Fig. 6 I). I. Sub-Fam. CARABINAE. 2
- Epimeren van den mesothorax niet tusschen de zijwaartsche voortzettingen van meso- en metasternum ingeschoven en niet tot aan de coxaalholten reikend (fig. 6 II). Voorste coxaalholten van achteren gesloten. Voorschenen naar het uiteinde, van binnen diep uitgesneden of uitgerand. II. Sub-Fam. HARPALINAE. 3
- 2 Voorste coxaalholten van achteren open. Mesosternum van voren in de middellijn gekield. 3
- Voorste coxaalholten van achteren gesloten. Mesosternum in de middellijn niet gekield. Binnenste eindspoor der voorschenen nimmer aan het uiteinde geplaatst. 5
- 3 Zijgroef der voorkaken zonder borstelbaren. Dekschilden aan de basis niet gerand. Voorschenen van binnen zonder uitranding; beide eindsporen geheel aan het uiteinde geplaatst. I. Carabini.
- Zijgroef der voorkaken van voren met een borstelhaar. Dekschilden aan de basis gerand 4

Voorkaken kort en krachtig, aan het uiteinde uitgerand of afgestompt. Voorhoofd kort. Clypeus verdiept, dikwerf asymmetrisch uitgerand, de wortelmembran der bovenlip vrijlatend.

XVI. *Licinini*.

- 17 Voorlaatste lid der lipstasters op de binnenzijde slechts met twee borstelharen. XII. *Pterostichini*.
Voorlaatste lid der lipstasters op de binnenzijde met verscheidene borstelharen . XIII. *Amarini*.
- 18 Buitenste gedeelte der achtercoxae van achteren schuin of steil tegen het achterlijf afhellend. 19
Buitenste gedeelte der achtercoxae vlak uitgebreid 20
- 19 Zijrand der dekschilden naar het uiteinde, achter de epipleuren, met eene naar binnen gerichte plooï. Voortarsen van het ♂ slechts met 3 verbrede leedjes. XIV. *Zabrinii*.
Zijrand der dekschilden achter de epipleuren gewoon. Voortarsen van het ♂ met 4 verbrede leedjes, of wel gewoon. XV. *Harpalini*.
- 20 De verdiepte randstreep der dekschilden loopt om het uiteinde door tot aan den naad als eene scherp begrensde groef XVII. *Oodini*.
De verdiepte randstreep of randgroef der dekschilden normaal gevormd, niet tot aan den naad doorlopend. XVIII. *Chlaenini*.
- 21 Schenen van buiten gedoord, met lange eindsporen XX. *Masoreini*.
Schenen van buiten niet gedoord, met korte eindsporen 22
- 22 Halsschild breed of hartvormig, aan de zijden volkomen gerand XXI. *Lehiini*.
Halsschild nagenoeg cylindervormig, aan de zijden onvolkomen gerand. Kop breder dan het halsschild, naar achteren verlengd, met lange convergeerende slapen, voor de basis ingesnoerd, met een korten min of meer kogelvormigen hals XXII. *Odacanthini*.

I. Sub-Familie CARABINAE.

I. Tribus CARABINI.

- 1 Achtercoxae tegen elkaar aanstootend. Epipleuren der dekschilden tamelijk smal, tussen de episternen van den metathorax en het eerste sterniet stomphoekig verbreed 2
Achtercoxae van elkaar gescheiden. Dekschilden met buitengewoon breede, tussen de episternen van den metathorax en het eerste sterniet niet uitstekende epipleuren, het geheele achterlijf omvattend. Kop lang en smal, snuitvormig naar voren verlengd. Bovenlip nagenoeg tot aan den wortel in twee lange smalle lobben gedeeld. Eindleedjes der tasters zeer sterk bijlvormig, op de bovenzijde lepelachtig uitgehold 3. *Cychrus*.
- 2 Bovenkaken op de bovenzijde schuin gerimpeld, met een zwak uitgeranden, aan de basis geplaatsten en door de bovenlip, ten minste gedeeltelijk, overdekten binnentand. Tweede sprietlid zeer kort, het derde zeer lang, beiden samengedrukt en op de bovenzijde naar de basis toe scherpkantig 1. *Calosoma*.
- Bovenkaken op de bovenzijde niet gerimpeld, met een tweepuntigen of uitgeranden, vóór de bovenlip geplaatsten binnentand. Tweede sprietlid wat langer, het derde wat korter, beiden cylindervormig of slechts weinig samengedrukt 2. *Carabus*.

II. Tribus NEBRIINI.

- Voorkaken zijwaarts in eene breede lamel verbreed. Achterkaken van buiten met 5 of 6 aanhangselen, van welke op elk een bewegelijke stekelborstel ingeplant staat (Fig. 7). 4. *Leistus*.
Voor- en achterkaken gewoon 5. *Nebria*.

III. Tribus NOTIOPHILINI.

- Bevat slechts het genus 6. *Notiophilus*.

IV. Tribus OMOPHRONINI.

- Bevat slechts het genus 7. *Omophron*.

V. Tribus ELAPHRINI.

- Dekschilden aan de basis geraand, met enigszins onregelmatige stippellijnen; de derde en vijfde tusschenruimte door groote groeven onderbroken. Halsschild breed, met breed afgezetten en opgebogen zijrand. 8. *Blethisa*.
Dekschilden aan de basis niet geraand, zonder stippellijnen, maar met 3 of 4 langstrijen van groote oogstippen. Halsschild hartvormig, gewelfd, met smal gerande zijden . 9. *Elaphrus*.

VI. Tribus LOROCERINI.

Bevat slechts het genus 10 **Lorocera**.

VII. Tribus SCARITINI.

Halschild aan de zijden van het versmalde basaalgedeelte niet gerand. Dekschilden naast den smal afgezetten zijrand, slechts van voren en van achteren met eenige haarstippels. Tasters bij het ♂ en het ♀ verschillend gevormd. Intercoxaal-voortzetting van het eerste sterniet aan het uiteinde gerand 11. **Dyschirius**.

Halschild aan de zijden tot aan de basis gerand. Dekschilden naast den breeder afgezetten zijrand met eene onafgebroken rij haarstippels. Tasters bij het ♂ en het ♀ gelijk gevormd. Intercoxaal-voortzetting van het eerste sterniet aan het uiteinde niet gerand 12. **Clivina**.

II. Sub-Familie HARPALINAE.

VIII. Tribus BROSCINI.

Bevat slechts het genus. 13. **Broscus**.

IX. Tribus BEMBIDIINI.

- 1 Buitenrand der voorschenen naar het uiteinde recht doorgaande 2
- Buitenrand der voorschenen naar het uiteinde scheef afgeknot of uitgerand. Dekschilden zonder scutellairstreep. 6
- 2 Dekschilden met neerliggende vlekkege beharing, geheel verward bestippeld 14. **Tachypus**.
Dekschilden kaal, met bestippelde of gladder langstrepen of ten minste met eene volkomen naadstreep en eene korte scutellairstreep. 3
- 3 Vierde voortarsen-lid op de onderzijde met een gekromden doorn. Kop dik, met weinig uitpuilende oogen. (Linnaeum.)
Vierde voortarsen-lid van onderen zonder gekromden doorn. 4
- 4 Kop dik, van achteren niet versmald. Sprietten kort. Derde tussenruimte der dekschilden met 4 diepe haarstippels. Eerste voortarsen-lid aan het uiteinde met een doornetje aan de buitenzijde 17. **Cilenus**.
Kop niet verdikt, van achteren versmald. Sprietten langer. Derde tussenruimte der dekschilden met 2 haarstippels, of slechts met één diepe haarstippel 5
- 5 Derde tussenruimte der dekschilden met twee haarstippels. Zijrand van het halschild smal omzoomd en opgericht 15. **Bembidium**.
Derde tussenruimte slechts met een achter het midden gelegen haarstippel. Zijrand van het halschild naar de achterhoeken zeer breed omzoomd en opgericht 16. **Oeys**.
- 6 Het omgebogen uiteinde der naadstreep (de z.g. apicaal-streep) loopt door, tot in of tot iets buiten het midden van het uiteinde der dekschilden en divergeert met de naar achteren verdiepte submarginale (achtste) streep 18. **Tachys**.
Het omgebogen uiteinde der naadstreep is van de naar achteren verdiepte submarginale (achtste) streep slechts door eene smalle, ploovormige tussenruimte gescheiden en verloopt daarmede nagenoeg parallel 19. **Tachyta**.

X. Tribus TRECHINI.

- 1 De dekschilden bedekken niet het geheele achterlijf, zijn elk afzonderlijk aan haar uiteinde afgerond en even lang als kop en halschild te zamen. Achterdijen aan de binnenzijde behaard. (Aëpus.)
De dekschilden bedekken het geheele achterlijf en zijn aan haar uiteinde te zamen afgerond, veel langer dan kop en halschild te zamen 2
- 2 Eindlid der kaaktasters zeer dun, priemvormig, veel smaller en korter dan het verdikte voorlaatste lid. Naadstreep der dekschilden aan het uiteinde niet naar voren omgebogen. Vierde lid der voortarsen aan de onderzijde met een gekromden doorn. 20. **Blemus**.
Eindlid der kaaktasters aan de basis nagenoeg even zoo breed als het uiteinde van het voorlaatste lid en daarvan weinig in lengte verschillend. Naadstreep der dekschilden aan het uiteinde naar voren omgebogen. Vierde lid der voortarsen van onderen zonder doorn 3
- 3 Basis der dekschilden tot aan het schildje (Thalassophilus.)
Basis der dekschilden hoogstens tot aan den wortel van de derde stippellijn gerand 4

- 4 Kintand gespleten of door eenen langsindruk gedeeld. Halsschild hartvormig of verbreed, aan de basis recht afgeknot of aan weerszijden iets scheef afgesneden 21. **Trochus**.
 Kintand gewoon. Halsschild breed schijfvormig, sterk gewelfd, aan weerszijden van de basis sterk uingerand, met breed afgeronde achterhoeken 22. **Epaphius**.

XI. Tribus POGONINI.

- Dekschilden aan de basis tot aan het schildje gerand. Tarsen op de bovenzijde gegroefd. Kop van achteren niet of slechts zeer weinig ingesnoerd. Tong aan het uiteinde afgeknot, met vooruitstekende zijhoeken. Voorlaatste kaaktaster-lid naar het uiteinde met eenige borstelharen bezet, het eindlid meer of minder toegespitst. (Groep Pogoni). 23. **Pogonus**.
 Dekschilden aan de basis niet gerand. Tarsen op de bovenzijde niet gegroefd. Kop van achteren sterk ingesnoerd, met diepe, naar achteren verlengde voorhoofds-groeven. Tong aan het uiteinde stomp afgerond. Voorlaatste kaaktaster-lid onbehaard, het laatste lid aan het uiteinde afgestompt of afgeknot. (Groep Patrobi) 24. **Patrobus**.

XII. Tribus PTEROSTICHINI.

- 1 Voorkaken van normale lengte. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. 2
 Voorkaken zeer ver vooruitstekend. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde slechts zwak gekromd. Eerste sprietlid lang, als het ware een scapus vormend 35. **Stomis**.
 2 Voortzetting van het prosternum van achteren in een scherpe, naar het mesosternum afvallende kiel samengedrukt. Achterrand der dekschilden gewoon 3
 Voortzetting van het prosternum van achteren stomp 7
 3 Tarsen op de bovenzijde behaard. 25. **Laemostenus**.
 Tarsen op de bovenzijde kaal 4
 4 Klauwen gewoon 26. **Sphodrus**.
 Klauwen getand of kamvormig gezaagd 5
 5 Eindlid der liptasters evenzoo gevormd als dat der kaaktasters. Voortzetting van het prosternum aan het uiteinde gerand. Eerste lid der middel- en achtertarsen aan den buitenrand met twee diepe langsgroeven. 6
 Eindlid der liptasters bijlvormig. Voortzetting van het prosternum aan het uiteinde niet gerand. Middel- en achtertarsen aan den buitenrand slechts zwak gegroefd . 29. **Synuchus**.
 6 De eerste 3 leedjes der voortarsen bij het ♂ driehoekig of hartvormig verbreed, zelden gewoon. Kintand in den regel dubbel 27. **Calathus**.
 De 3 verbreedde leedjes der voortarsen bij het ♂ lang, het tweede en derde rechthoekig. Kintand gewoon 28. **Dolichus**.
 7 Kin-uitranding zonder tand 30. **Olisthopus**.
 Kin-uitranding met een gewonen, gespleten of dubbelen tand 8
 8 Kintand gewoon. Voorschenen slank, naar het uiteinde weinig verbreed. Achterrand der dekschilden gewoon 31. **Platynus**.
 Kintand gespleten of in tweeën gedeeld. Voorschenen krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde verbreed. Aan het uiteinde van de epipleuren der dekschilden, treedt in den regel de tot aansluiting der dekschilden aan den zijrand van het achterlijf dienende binnenste scherpe kant te voorschijn. 9
 9 Tarsen op de bovenzijde kaal. Sprietten van af het vierde lid behaard. 10
 Tarsen op de bovenzijde behaard. Sprietten van af het derde lid behaard 34. **Molops**.
 10 Dekschilden in de derde tusschenruimte minstens met één haarstip 32. **Pterostichus**.
 Dekschilden zonder haardragende rugstippen 33. **Abax**.

XIII. Tribus AMARINI.

- Bevat slechts het genus 36. **Amara**.

XIV. Tribus ZABRINI.

- Bevat slechts het genus 37. **Zabrus**.

XV. Tribus HARPALINI.

- 1 De ooggen staan, op de onderzijde van den kop, van de uitranding voor de achterkaken verwijderd. Voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde met verscheidene borstelharen 2

- De oogen staan, op de onderzijde van den kop, tegen de uitranding voor de achterkaken. Voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde slechts met twee borstelharen 5
- 2 Tarsen op de bovenzijde behaard 3
- Tarsen op de bovenzijde kaal 4
- 3 Halsschild in de achterhoeken met een borstelhaar. Voorschenen nabij de groote eindspoor, nog met eene tweede doch kleinere eindspoor. Voortarsen-leedjes aan de onderzijde bij het ♂ met eene dichtbehaarde zool 41. *Diachromus*.
- Halsschild in de achterhoeken zonder borstelhaar. Voorschenen behalve de gewone eindspoor, zonder spoorvormige voortzetting aan het uiteinde 38. *Ophonus*.
- 4 De verbrede voortarsen-leedjes bij het ♂ op de onderzijde met eene zool van dicht opeenstaande borstels. Paraglossen aan de zijden niet bewimperd. Kop (bij de inlandsche soorten) met twee roode voorhoofdslekken 1) 40. *Anisodactylus*.
- De verbrede voortarsen-leedjes bij het ♂ op de onderzijde met twee langsrijen van schubachtige dwarsplaatjes. Paraglossen aan de zijden bewimperd. Kop zonder roode voorhoofdslekken 39. *Harpalus*.
- 5 Halsschild in de achterhoeken met een haarstip. Dekschilden zonder scutellairstreep. Tarsen op de bovenzijde behaard 42. *Dichiotrichus*.
- Halsschild in de achterhoeken zonder haarstip. Dekschilden in den regel met goed ontwikkelde scutellairstreep. Tarsen op de bovenzijde kaal 6
- 6 Achtertarsen-leedjes aan de buitenzijde niet gegroefd 7
- Achtertarsen-leedjes aan de buitenzijde gegroefd of gekield. Kin zonder middentand. 44. *Stenolophus*.
- 7 Kin met een middentand. Prosternum van voren gerand 43. *Bradycellus*.
- Kin zonder middentand. Prosternum van voren niet gerand 45. *Acupalpus*.

XVI. Tribus LICININI.

- Slechts de eerste twee sprietleedjes kaal, de eindleedjes der tasters toegespitst, de kaaktasters veel langer dan de liptasters. Bovenlip tot aan de basis tweelobbig. Tarsen op de bovenzijde gekield. Tusschenruimten der strepen op de dekschilden onbestippeld, de derde tusschenruimte met twee diepe haarstippels. Aan de voortarsen van het ♂ zijn 3 leedjes verbreed. 46. *Badister*.
- De eerste 3 leedjes der sprieten kaal, de eindleedjes der tasters bijlvormig. Bovenlip van voren nitgerand. Tarsen op de bovenzijde ongekiel. Dekschilden in de tusschenruimten der strepen bestippeld. Aan de voortarsen van het ♂ slechts twee leedjes verbreed. 47. *Licinus*.

XVII. Tribus OODINI.

- Bevat slechts het genus 48. *Oodes*.

XVIII. Tribus CHLAENINI.

- Achterkaken met eene tweeledige buitenlob. Laatste lid der tasters afgeknot. Schenen zonder neerliggende beharing. 49. *Chlaenius*.
- Achterkaken met eene ongelede buitenlob. Eindlid der tasters spoelvormig, toegespitst. Schenen neerliggend behaard. 50. *Callistus*.

XIX. Tribus PANAGAEINI.

- Bevat slechts het genus 51. *Panagaeus*.

XX. Tribus MASOREINI.

- Bevat slechts het genus 52. *Masoreus*.

XXI. Tribus LEBIINI.

- 1 Halsschild verbreed, dubbel zoo breed als lang, aan weerszijden van de basis diep hoekig uitgesneden, de basis aan weerszijden binnen de achterhoeken nagenoeg recht afgeknot, in het midden tot een korten breedten steel naar achteren verlengd 53. *Lebia*.
- Halsschild min of meer hartvormig, aan de basis recht afgeknot of aan weerszijden scheef afgesneden of uitgerand. 2

1) Bij de Zuidenropesche *A. laticus* F. is de kop geheel rood

- 2 De zijrand van het halsschild zet zich voort als eene lijne lijn, schuin naar de basis, binnen de ver van de basis afstaande, kleine tandvormige achterhoeken. Het achtergedeelte der epipleuren van het halsschild van boven zichtbaar (Lionychus.)
Halsschild aan de zijden en in de achterhoeken gewoon gerand. Epipleuren van het halsschild van boven niet zichtbaar 3
- 3 Eindlid der liptasters toegespitst of naar het uiteinde versmaald 4
Eindlid der liptasters bijl- of cylindervormig, aan het uiteinde breed afgeknot 7
- 4 Voorlaatste tarslid gewoon 5
Voorlaatste tarslid diep tweelobbig 57. *Demetrius*.
- 5 Kin in het midden van de uitranding met een tand 54. *Metabletus*.
Kin in het midden van de uitranding zonder tand. 6
- 6 Basis van het halsschild aan weerszijden eenigszins scheef uitgerand 55. *Blechnus*.
Basis van het halsschild recht afgesneden of naar de achterhoeken eenigszins afgerond.
56. *Dromius*.
- 7 Halsschild verbreed, aan de basis recht afgeknot. Tarsen op de bovenzijde onbehaard.
58. *Plocionus*
Halsschild hartvormig, aan de basis aan weerszijden scheef afgeknot of uitgerand. Tarsen op de bovenzijde behaard 59. *Cymindis*.

XXII. Tribus ODACANTHINI.

- Bevat slechts het genus 60. *Odacantha*.

XXIII. Tribus BRACHYNINI.

- Bevat slechts het genus 61. *Brachynus*.

I. Sub-Familie CARABINAE.

I. Tribus CARABINI.

1. *Calosoma* Weber.

Sprieten van af het vijfde lid behaard; het tweede lid zeer kort, het derde zeer lang, beide leedjes en veelal ook het vierde sterk samengedrukt en op de bovenzijde naar de basis toe scherpkantig. Bovenlip diep uitgerand. Voorkaken breed, op de bovenzijde schuin rimpelig. Kin met een korten middenrand in de uitranding. Tong kort en stomp, aan het uiteinde met talrijke borstelharen bezet. De vrije uiteinden der paraglossen vormen driehoekige, de tong niet overschrijdende en met een dicht haarvilt bekleede rliezige lobben. Tasters krachtig ontwikkeld, hunne eindleedjes slechts weinig naar het uiteinde verbreed, het voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde met verscheidene borstelharen bezet. Dekschilden breed, bij het ♂ van achteren meer breed afgerond, bij het ♀ iets toegespitst, met stippellijnen; de epipleuren tamelijk smal, tusschen het episternum van den metathorax en het eerste sterniet stomphoekig verbreed. De coxae der achterpooten stooten tegen elkaar aan. Aan de voortarsen bij het ♂ zijn de eerste 3 of 4 leedjes verbreed en op de onderzijde zolig behaard. Alle soorten zijn gevlugeld.

De larve van C. inquisitor is beschreven door Erichson en Schiodte; die van C. sycophanta door Réaumur, Burmeister en Ratzburg, met eene afbeelding van de pop door Ratzburg; de larve van C. auropunctatum is beschreven door Lucas en Schiodte, met eene afbeelding van de pop door Lucas.

Van de 7 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor en een in het aangrenzende gebied. Een paar soorten (sycophanta en inquisitor) bekend onder den naam van „rupsenjager“ of „poppenroover“ jagen op boomen en struiken op rupsen, eene derde soort (auropunctatum) jaagt op zandige vlakten en in velden.

- 1 De zijgroeven van de prosternaal-voortzetting reiken niet tot aan haar uiteinde 2
- De zijgroeven van de prosternaal-voortzetting zetten zich tot aan haar uiteinde voort. Halsschild aan de zijden volkomen scherp gerand. Aan de voortarsen van het ♂ zijn slechts drie leedjes verbreed en aan de onderzijde zolig 3

- 2 De scherpe zijrand van het halsschild eindigt op eenigen afstand voor de basis. Aan de voortarsen van het ♂ zijn 4 leedjes verbreed en aan de onderzijde zolig. Bovenzijde van het lichaam lichter of donkerder bronskleurig of bruinachtig, met lichtere, eenigszins groenachtige zijranden, zelden zwartachtig-violet (ab.e. *violaceum* Westh.). Lengte 16—21 mm. Verbreed in eikenbosschen der diluviale streken. Mei en Juni. Men vangt ze meestal 's avonds door boomen te schudden. De ab.e. *violaceum* bij Apeldoorn en bij Valkenburg (Limburg). 1. *inquisitor* L.

De zijden van het halsschild naar de basis wel zwakker, doch nog duidelijk gerand. Aan de voortarsen van het ♂ zijn slechts drie leedjes verbreed en aan de onderzijde zolig. Blauw of zwartachtig-blauw, de dekschilden goudgroen, meer of minder met roodachtig-gouden weerschijn. Lengte 22—29 mm. De „rupsenjager, poppenroover of muskustor.” In eikenbosschen der diluviale streken; over het algemeen zeldzaam. Mei en Juni. Larve en imago jagen op Bombyx-rupsen, vooral op de processierups; ook treft men ze soms op wilgen en elzen aan, op rupsen jagend. Eene enkele maal in de duinstreek gevangen. Ook bij Sneek. Zij vliegt overdag en riekt gevangen naar bittere amandelolie.

2. *sycophanta* L. 1)

- 3 Vijfde spriettlid aan alle zijden dicht behaard. Halsschild in verhouding tot de dekschilden klein. Dekschilden lang, met schubachtige sculptuur en met 3 rijen, meestal goudkleurige groefjes. Middel- en achterschelen bij het ♂ sterk, bij het ♀ veel zwakker gekromd. (Sub-gen. *Campalita* Motsch.). Kleur der bovenzijde bruin of met iets groenachtigen bronsglans. Lengte 22—25 mm. Eenmaal in eenige exemplaren bij Putten in N.-Brab. gevangen. Zij jaagt op zandige vlakten en velden; zij schijnt ook in beetwortelvelden voor te komen. Ook bij Rheine en in België bij Beverloo (*sericeum* F.) 3. *auripunctatum* Hbst.

Vijfde spriettlid aan twee zijden kaal. Halsschild breed, met sterk afgeronde zijden. Dekschilden breed en kort, met grof dwarsrimpelige tussenruiten (Sub-gen. *Callisphaena* Motsch.). Bovendeelen prachtig smaragdgroen, lichter of donkerder bronsgroen of zwart, de zijden der borst en de epipleuren der dekschilden met sterken groenen glans. Middelschelen bij het ♂ slechts zeer zwak gekromd. Lengte 21—24 mm. Deze soort zou eenmaal bij Postel in de Belgische prov. Antwerpen gevangen zijn 2) (*reticulatum* F.)

2. Carabus L.

Sprieten van af het vijfde lid behaard, het tweede lid is iets langer, het derde iets korter dan bij Calosoma, beide leedjes zijn cilindervormig of slechts weinig samengedrukt. Bovenlip met een indruk in het midden, aan den voorrand min of meer diep uitgerand, zelden nagenoeg recht afgesneden, soms tweemaal uitgerand. Voorkaken op de bovenzijde glad of fijn bestippeld, met een dubbelen of uitgeranden binnentand; de tand der rechter voorkaak is kleiner dan die der linker. Bij het Sub-gen. Procrustes Bon. is de linker voorkaak van een dubbelen, de rechter van een gewonen tand voorzien. Kin in de nitranding met een korten, min of meer spitsen, ook veelal langen en de zijlobben soms zelfs overschrijdenden, aan het uiteinde dikwijls uitgeranden, middenrand. Eindleedjes der kaaktasters bij uitzondering slechts een weinig naar het uiteinde verbreed, meestal zeer sterk driehoekig-bijlvormig. Het voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde met 2 borstelharen of met verscheidene in twee rijen of groepen geplaatste borstelharen bezet. Halsschild min of meer hartvormig. Dekschilden bij het ♂ van achteren stomper afgerond dan bij het ♀ en voor het uiteinde hoogstens zwak uitgebogen, bij het ♀ echter soms zeer diep en hockig uitgesneden; sculptuur zeer veranderlijk; de epipleuren der dekschilden zijn tamelijk smal, tusschen het episternum van den melathorax en het eerste sterniet stomphockig verbreed. De achtercoxae stooten tegen elkander aan. Bij het ♂ van vele soorten zijn de middelste spriettleedjes op de onderzijde uitgebogen en aan het uiteinde knoepig naar onderen verbreed. Aan de voortarsen bij het ♂ zijn vier, zeldzamer drie leedjes verbreed en op de onderzijde met eene dichte haarzool bedekt; ook zijn de middelschelen aan de buitenzijde met roodachtige franjes bezet. De forceps is zeer verschillend van vorm en daardoor voor de karakteristiek der soorten van beteekenis. Alle Caraben zijn ongeleugeld, behalve enkele exemplaren bij weinige soorten (C. clathra-

1) Volgens Suffern is de tot het Sub-gen. *Charnosta* Motsch. behoovende C. investigator III eenmaal in Westfalen bij Rodenkirchen aan de Weser gevangen.

2) Het exemplaar is niet meer in het Brusselsch museum aanwezig.

tus, granulatus). Zij zijn deels zwart of violetachtig, deels metaalkleurig, hetzij fraai groen of bronzig gekleurd. — De soorten van dit genus, bekend onder den naam van „schalebijters of scharrebijters” zijn met die van het genus *Calosoma* de grootste inlandsche Carabidae. Zij leven op velden, in tuinen en bosschen, verbergen zich overdag onder steenen, boomschors en mos en verschijnen bij nacht of in den morgenstond. Zij voeden zich hoofdzakelijk met insectenlarven, regenvormen en slakken; vele soorten worden door het verdelgen van rupsen zeer nuttig. Bij aanraking scheiden zij eene stinkende, bijtende vloeistof uit den anus af. De vloeistof, welke zij uit den mond afscheiden is slechts eene gedigestieerde stof.

Van vele soorten zijn de larven en van enkelen ook de poppen bekend geworden, als van: *C. coriaceus* door Brulle en Schiodte, van *irregularis* door Letzner, van *intricatus* door Schiodte, van *violaceus* door Bouché en Schiodte, van *variolosus* door Claudon, van *catenulatus* door Fawcett, van *auronitens* door Heer, van *granulatus* door Schiodte, van *cancellatus* door Schiodte, Lucas en Géhin, van *clathratus* door Schiodte, van *auratus* door Voet en Snellen van Vollenhoven, van *glabratus* door Schiodte, van *hortensis* door W. Kolbe en van *nemoralis* door Heer, Schiodte en K. Kolbe. — Van de $\pm$ 160 Europeesche soorten komen 16 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde met verscheidene (4 tot 7) in twee rijen of twee groepen gerangschikte borstellaren. 2

Voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde slechts met twee, zeer zelden met drie borstellaren. 6

- 2 Eerste sprietlid naar het uiteinde zonder borstelhaar. Bovenlip drielobbig. Kintand aan het uiteinde uitgerand (Sub-gen. *Procrustes* Bon.). Geheel zwart, met weinig glans. Dekschilden onregelmatig, grof en dicht rimpelig bestippeld, hoogstens langs den zijrand en aan het uiteinde met duidelijke scherpe korreltjes bezet; de 3 rijen primaire groefjes zijn niet of slechts onduidelijk herkenbaar; soms vertoont zich eene blauwe aanduiding van langsrribben. Bij de kleinere var. **spretus* Dej. vindt men op het voorste gedeelte der dekschilden in het geheel geen in elkaar vloeiende stippels, daartusschen zijn de ruimten vlakker; bovendien zijn vrij duidelijk ontwikkelde primaire rijen van groefjes aanwezig 1). Lengte 33–40 mm. Vooral op leem- en kalkgrond gemeen, ook hier en daar op diluviale gronden, o. a. bij Arnhem en Nijmegen niet zeldzaam 1. *coriaceus* L.

Eerste sprietlid van boven, nabij het uiteinde met een borstelhaar. Bovenlip tweelobbig. Kintand nagenoeg altijd gewoon 3

- 3 Keel zonder haarstippels. Kintand groot, even lang of iets langer dan de zijlobben der kin (Sub-gen. *Megodontus* Sol.). Zwart, zijrand der dekschilden en meestal ook de zijden van het halschild, ten minste naar de achterhoeken, goudachtig-purper, violet, blauw of groen, veelal de geheele bovenzijde met violetten, blauw- of groenachtigen weerschijn. Dekschilden gelijkmatig en dicht gekorrelt, korreltjes in rijen komen in 't geheel niet voor, daarentegen zijn de primaire stippels veelal eenigszins herkenbaar. Lengte 25–34 mm. Deze typische vorm der soort zou eenmaal bij den Haag gevangen zijn. Zij is in Oost-Friesland, Oldenburg en Noordelijk Westfalen verbreid. Bij het ras *purpurascens* F. vertoonen de dekschilden 13–15 diepe en regelmatig bestippelde strepen, wier tusschenruimten als gladde, scherpe, naar het uiteinde meer of minder in korrels opgeloste lijnen vervormd zijn. In de primaire tusschenruimten, d. i. in de vierde, achtste en twaalfde 2), zijn in den regel wijd uiteenstaande diepe stippels, als primaire groefjes, duidelijk zichtbaar; overigens zijn de secundaire (2, 6 en 10) en de tertiaire (1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13) tusschenruimten als de primaire gevormd. Lichaam meer gestrekt en met langere dekschilden dan bij het type. Forceps van het β lang en slank, aan het uiteinde niet verbreed. Zeer verbreid in de provinciën Utrecht, Gelderland, Limburg en N.-Brabant. Van genoemd ras bestaat nog de var. *exasperatus* Dfts. 3), bij welke de dekschilden 6 of 3 duidelijke korrellijnen vertoonen, tusschen welke zich, tot mazen samenhangende of geïsoleerde korreltjes bevinden; de tertiaire tusschenruimten lossen zich soms in twee aan twee verwarde korrellijnen op (abs. **subcrenatus* Géhin). Wanneer zich ook de secundaire tusschenruimten in onregelmatige korrellijnen oplossen, doch de korreltjes netsgewijze rimpelig met elkaar verbonden blijven, dan heeft men den door Kraatz als abs. **asperulus* (in Westfalen) aangeduiden vorm; isoleren zich de korreltjes, zoo verkrijgen wij de typische var. *exasperatus* Dfts. (*psilopterus* Kr.), bij welke secundaire

1) Deze in Croatie en Dalmatie voorkomende variëteit zou in België bij Ruempst gevangen zijn, ik betwijfel echter de juiste determinatie.

2) Deze tusschenruimten zijn het, die normaal door primaire groefjes onderbroken of in keurribben opgelost worden.

3) In België (Groenendael, zool. Duvivier) zou een exemplaar van de var. *Germari* St. (door Fawcett als zodanig herkend) gevangen zijn. Ik betwijfel zeer het voorkomen van deze variëteit in ons gebied.

- korrellijnen veelal nog duidelijk optreden. De typische var. *exasperatus* bij Wageningen, Lienden en Tiel verzameld. Ook in België (prov. Luik) 2. *violaceus* L.
- Keel aan weerszijden met eene haarstippel. Kintand klein en spits 4
- 4 Eindleedjes der tasters op de bovenzijde niet gegroefd. De voorlaatste tasterleedjes aan het uiteinde zonder borstelharen 5
- Eindleedjes der tasters op de bovenzijde platgedrukt en langs den buitenrand diep gegroefd. De voorlaatste tasterleedjes aan het uiteinde met eenige borstelharen bezet (Sub-genus *Chaetocarabus* Thoms.). Bovendelen blauwachtig of violetblauw, zelden iets groenachtig-blauw, aan de randen van halsschild en dekschilden gewoonlijk meer levendig gekleurd. Halsschild smal en meer of minder hartvormig, niet breeder dan één dekschild. Dekschilden meer of minder vlak, elk met 3, niet altijd even duidelijke, primaire rijen bultjes, waartusschen de aanduiding van 3, meestal verwarde en veelvuldig onderbroken tusschenruimten van langsstrepen. Lengte 26—38 mm. Zeldzaam in bosschen, vooral in het najaar en gedurende den winter onder mos, aan boomwortels en onder losse beukenschors. Uitsluitend in de omstreken van Arnhem, Nijmegen en Venlo en bij Putten op de Veluwe gevangen. (*cyaneus* F.) 4. *intricatus* L.
- 5 Prosternaal-voortzetting aan het uiteinde vlak. Achterdijen op de onderzijde niet diep, doch duidelijk in de lengte gegroefd. Lichaam gewelfd. Halsschild vóór de achterhoeken en vóór het midden met een randborstel (Sub-gen. *Mesocarabus* Thoms.). Zwart, bovenzijde violetachtig-zwart met blauw- of violetachtigen zijrand van halsschild en dekschilden, of wel de geheele bovenzijde violetachtig met wat lichter gekleurde zijranden. Halsschild breeder dan lang, met naar achteren breed en sterk opgebogen zijden. Dekschilden langer of korter ovaal, met 15 tusschenruimten, van welke de 3 primaire (4, 8 en 12) als ketenribben gevormd, of wel door groefjes onderbroken zijn. Zelden schijnen de primaire groefjes te ontbreken. De strepen der dekschilden zijn, hetzij in lijne, niet volkomen regelmatige langsrijen gekorrelld, of gekerfd bestippeld, of wel van slechts zwakke dwarsrimpels voorzien; de tusschenruimten der strepen zijn, hetzij gladde verhevene, slechts naar achteren gekorrelde lijnen, of wel zij worden uit langsrijen van scherpe, naar achteren gerichte kielvormige korreltjes gevormd. Bij den typischen vorm zijn de verdiepte strepen fijn gekorrelld, de primaire tusschenruimten als ketenribben ontwikkeld en de secundaire en tertiaire tusschenruimten over hare geheele lengte in korrelrijen opgelost; dit is de vorm *gallicus* Géhin. — De abs. *Harcyniae* St. bezit lijn gekorrelde strepen, ketenvormige primaire tusschenruimten en gladde secundaire en tertiaire tusschenruimten (bij Arnhem, Nijmegen en den Haag aangetroffen). De abs. *austriacus* Megerle (*cyaneus* St.) met nagenoeg geheel ontbrekende drie rijen bultjes, met meer dwarsrimpelige langsstrepen, met niet ontwikkelde primaire groefjes en met smalle, niet dicht aaneen in rijen geplaatste langwerpige korrels bestaande tusschenruimten (bij Bergen-op-Zoom en Breda). Lengte 21—27 mm. Gemeen in bosschen onder mos van boomwortels 3. *catenulatus* Scop.
- Prosternaal-voortzetting aan het uiteinde gewelfd. Achterdijen op de onderzijde slechts aan het uiteinde gegroefd. Dekschilden meer of minder vlak, met 3 rijen van ronde groefjes (Sub-gen. *Platycarabus* Moraw.). De linker voorkaak, ten minste bij het ♂, achter het uiteinde boekig gekromd. Kop van achteren verdikt, vooral bij het ♀ zeer groot en dik. Bovenzijde bruin-koperkleurig, de zijrand van het halsschild en der dekschilden benevens de groefjes der laatste niet zelden groenachtig. Sprietwortel roodbruin, pooten zwart of pekbruin. Dekschilden voor het uiteinde bij het ♂ zeer zwak, bij het ♀ duidelijk uitgebogen, van achteren platgedrukt, met iets dakvormig verheven naad, lijn en dicht, van voren zwakker en meer of minder verward, op de achterhelft in tamelijk regelmatige langsrijen gekorrelld, met 3 rijen grootere, ronde en diepe, in aantal en plaatsing veranderlijke groefjes. Lengte 17—26 mm. Deze in de bergstreken van Middel- en Zuid-Duitschland en over de Jura verbreide soort, is in de Belgische provincie Luik bij Baraque Michel (Hautes-Fanges) gevangen 1). Ook in Westfalen bij Haarbrück aan de Weser (*irregularis* F.).
- 6 Voorkaken lang (de soorten *auronitens* en *variolosus*) 7
- Voorkaken kort 8
- 7 Voorkaken met zeer oppervlakkige en korre, den voorrand der bovenlip niet bereikende zijgroef. Zijrand der dekschilden niet gekerfd (Sub-gen. *Chrysocarabus* Thoms.). Dekschilden met eene verhevene naadrib en met drie primaire ribben, de tusschenruimten rimpelig bestippeld. Zwart, bovenzijde prachtig goudgroen, met sterker goudglans op het halsschild en met zwarte ribben en zwarten naad der dekschilden; zeer zelden tot op den naad en de ribben na, van boven geheel varig goudkleurig (abs. **ignifer* Haury). Veelal zijn de dekschilden groen zonder goudglans (abs. **viridis* Letzn.), zeldzamer blauwachtig-groen of groenachtig-blauw

1) Het gelukte mij niet, Belgische exemplaren te zien.

(ab. **coerulescens* Letzn.). Bij ab. **versicolor* Letzn. zijn kop en halsschild roodkoperkleurig en slechts langs de randen en in de uithollingen groen. Het 1e sprietlid, de dij en veelal ook de schenen geheel of alleen aan de basis lichtrood; bij ab. **picipes* Letzn. zijn de dij en ook de schenen bruin of zwartachtig. Bij ab. **subcaenulatus* Westh. zijn de langsschouwen door stippels onderbroken (in Westfalen, mij onbekend). Dekschilden voor het uiteinde bij het ♂ nauwelijks merkbaar, bij het ♀ iets duidelijker uitgebogen. Bij het ♂ zijn 4 leedjes aan de voortarsen verbreed en aan de onderzijde zolig. — In België (Forêt de Saignes) komt de var. **Putzeysi* Mors voor, met geheel zwartgroene of eenigszins violetachtige dekschillen. Lengte 20—24 mm. In bosschen onder mos van boomstronken, onder stukken hout enz. Deze in België en in Westfalen niet zeldzame soort, zou eenmaal bij Groningen gevangen zijn. Ook komt zij bij Aken voor. 5. *auronitens* F.

Voorkaken met eene diepe, tot aan den voorrand der bovenlip reikende zijgroef. Zijrand der dekschillen van voren gekerfd. Dekschillen met vier rijen grootere groeven. (Sub-gen. *Hygrocarabus* Thoms.). Geheel zwart. Dekschillen voor het uiteinde bij het ♂ uitgebogen, bij het ♀ veel dieper uitgesneden, elk met 3 rijen groote, op den bodem fijn en dicht gekorrelde groeven, benevens eene rand-serie van kleinere, dichter opeenstaande groeven. Tusschen de groeven der 3 primaire rijen zijn duidelijke keten-elementen ontwikkeld. Tusschen de groeven en de meer of minder gladde langsverhevenheden, zijn de dekschillen rimpelig gekorrelde. Soms zijn tusschen de rijen groeven zwakke secundaire lijnen herkenbaar. Aan de voortarsen bij het ♂ slechts de 3 eerste leedjes verbreed en zolig. Lengte 23—28 mm. Op moerassige plaatsen en in vochtige bosschen. Niet inlandsch. Zou bij Aken voorkomen. Verbreid in Westfalen (nodulosus Creutz.) (variolosus F.)

3 Buitentophoek der voorschouwen tandvormig uitgetrokken. Vijfde sprietlid aan den wortel kaal (Sub-gen. *Hemicarabus* Gêhin). Zwart, kop groen of evenals het halsschild fraai roodkoperkleurig; dekschillen prachtig metaalgroen, met roodkoperkleurigen zijrand en zwarte langsschouwen. Soms zijn de dekschillen geheel roodkoperkleurig (ab. **aureomicans* Letzn., **cupreus* Westh.) of is de geheele bovenzijde donker zwartgroen gekleurd (ab. **niger* Semenov, bij Hockay in België). Bij ab. **virescens* Letzn. is het halsschild in het midden groenachtig. Dekschillen tamelijk kort ovaal, aan den zijrand van voren met eenige zaagtandjes, met eene gemeenschappelijke, sterk verhevene naadrib en elk met 3 sterke primaire ribben, waartusschen dicht en krachtig dwarsrimpelig gekorrelde. De primaire ribben en vooral de beide buitensten, zijn veelal hier en daar, althans naar het uiteinde onderbroken (ab. **interruptus* Westh.). Bij ab. **fennicus* Gêhin. zijn alle primaire ribben in buities opgelost. Lengte 14—16 mm. Niet zeldzaam door het geheele land, op diluviale, zeldzamer op alluviale gronden. Eenmaal bij Wassenaar. Ook op Texel. De ab. **aureomicans* Letzn. werd enkele malen in Gelderland aangetroffen (pulchellus Brüggen.) 6. *nitens* L.

Buitentophoek der voorschouwen niet tandvormig uitstekende. Vijfde sprietlid geheel behaard. (Sub-gen. *Carabus* isp.) 9

9 Dekschillen met 3 breede, onafgebroken primaire ribben 1), daartusschen zeer fijn rimpelig of korrelig (*Autocarabus* Seidl.). Goudgroen, zelden iets roodkoperkleurig of de dekschillen blauwachtig-groen of groenachtig-blauw (ab. **coerulescens* Letzn.), de dekschillen met koperkleurigen zijrand, de onderzijde zwart, het prosternum en de epipleuren der dekschillen met sterken groen-metallischen weerschijs; de eerste 4 sprietleedjes, de mond, de tasters en de pooten (behalve de tarsen) geheel of gedeeltelijk rood, zelden de pooten geheel bruin of zwartachtig (ab. **picipes* Letzn., **nigripes* Dalla Torre 2). Bij ab. **obscuricornis* Beuthin zijn de eerste 4 sprietleedjes donkerbruin, het midden der leedjes nagenoeg zwart, de dij en schenen lichtbruin. Dekschillen lang-ovaal, nabij het uiteinde bij het ♂ iets, bij het ♀ dieper uitgerand. Lengte 20—27 mm. Deze soort is bekend onder den naam van „gouden loopever“. Zeer gemeen door het geheele land op klei-, leem- en kalkbodem, vooral in velden, bouwland en op dijken. Zij jaagt overdag, vooral bij zonneschijs op meikevers, slakken enz. De ab. **picipes* zeldzaam (bij Wateringen en Dirksland). Bij Zutphen werd een roodachtig, monstrueus exemplaar gevangen, bij welke de langsschouwen dwarsrimpelig zijn (ab. **Brullei* Gêhin). 7. *auratus* L. 3).

Dekschillen met 3 primaire ketenribben en met meer of minder ontwikkelde secundaire- of ook nog met tertiaire ribben, of wel met 3 rijen groote primaire groeven, door onduidelijke keten-elementen met elkaar verbonden, of wel met vele dicht bijeen geplaatste langsschouwen of langsschouwen van dicht opeenstaande korreltjes, welke door 3 rijen meer of minder diepe, soms onduidelijke groefjes of stippen onderbroken zijn 10

1) Eene enkele maal komen exemplaren voor, bij welke zich deze ribben of daarvan slechts 2, in een punt vereenigen (ab. **contortus* Letzn.).

2) In Noord-Frankrijk en in den Harz komt eene geheel zwarte var. voor, welke slechts een geringen metaalglans vertoont.

3) De uit België opgegeven var. **fusserei* Dene, welke donker olivkleurig is, met elfen dekschillen en nagenoeg zonder langsschouwen, is vermoedelijk een abnormaal exemplaar.

- Dekschilden gelijkmatig gekorrelld, zonder eenige aanduiding van ketenrijen, langstrijen of langlijnen. Geheel zwart, op de bovenzijde, nl. aan den zijrand der dekschilden meestal met zwakken blauwachtigen, zelden met groenachtigen weerschijn. Het 6de — 8ste sprietlid bij het ♂ op de onderzijde uitgebogen en aan het uiteinde knoepig verdikt. Lengte 24 — 29 mm. In bosschen van de diluviale streken, onder mos en dorre bladeren; zeldzaam. In de omstreken van Arnhem, Apeldoorn, Dieren, Roermond en Venlo. 16. *glabratus* Payk.
- 10 Episternen van den metathorax langer dan breed 11
Episternen van den metathorax even lang als of korter dan breed 12
- 11 Dekschilden met 3 rijen groote primaire groeven. Lichaam zwart, van boven donker bronskleurig, de groeven der dekschilden en veelal ook de indrukken van het halsschild koperkleurig of goudachtig-rood. Bij ab.c. *cyaneus* Schilsky is de bovenzijde lichter bronskleurig of meer koperkleurig. Ook is soms de bovenzijde nagenoeg zwart. De primaire groeven zijn door meer of minder duidelijke keten-elementen met elkaar verbonden, de tussenruimten tusschen de ribben en rijen groeven zijn fijn en tamelijk dicht korrelig. Vleugels zijn soms ontwikkeld. Lengte 22 — 28 mm. Vooral op moerassige plaatsen, door het geheele land verbreid, doch over het algemeen zeldzaam; onder mos aan de wortels van wilgen en langs heideplassen. Het meest aangetroffen in de omstreken van Amsterdam en in den nazomer gemeen op Texel, op laag gelegen vochtig hooiland, onder hooistapels. 8. *clathratus* L.
- Dekschilden met 3 primaire ketenribben. Lichaam zwart, van boven donkerbruin-bronskleurig, groenachtig (ab.c. *viridescens* Letzn.), zelden meer zwartachtig met geringen bronsglans (ab.c. *nigrescens* Letzn.) of geheel zwart (ab.c. **niger* Letzn.). Pooten zwart, zeldzamer de dijën, behalve de knieën, bruinrood of rood (var. *rufosemoratus* Letzn., *haematomerus* Kraatz, *rubripes* Géh.). Dekschilden tamelijk gestrekt, achter het midden het breedst, voor het uiteinde bij het ♀ sterk, bij het ♂ slechts zwak uitgebogen; tusschen de 3 primaire ketenribben met twee doorlopende secundaire ribben; naast den naad mer eere zwakkere, naar het uiteinde verdwijnende secundaire rib, tusschen de ketenribben en de secundaire ribben dicht rimpelig gekorrelld. Vleugels zijn zeer zelden aanwezig en ook dan nog eenigszins rudimentair. Exemplaren met sterkere secundaire ribben vormen de ab.s. **forticostis* Kraatz. Lengte 17 — 20 mm. Gemeen in bosschen, vochtige weilanden en tuinen, vooral nabij den waterkant. Overwintert onder mos en boomschors. De var. *rufosemoratus* Letzn., welke over het algemeen zeer zeldzaam is, bij Zutphen en Arnhem, doch zeer gemeen op Texel, waar het type nagenoeg ontbreekt. Bij sommige exemplaren zijn de dijën alleen in 't midden donkerrood; ook komen van deze variëteit zeer donkere exemplaren voor. 9. *granulatus* L.
- 12 Keel met eene in de breedte geplaatste verdikking. Lichaam zwart, halsschild gewoonlijk aan de zijden violet- of purperkleurig, de dekschilden meestal bruin-bronskleurig, al of niet met purperkleurigen zijrand. Soms is de geheele bovenzijde bruinzwart (ab.c. *nigrescens* Letzn., *listis* Dal. Tor.) of eenigszins groenachtig (ab.c. *viridescens* Letzn.). Dekschilden bij het ♂ meer of minder langwerpig-ovaal, bij het ♀ meer buikig-eivormig en van achteren meer toegespitst, dicht langrimpelig gekorrelld, met 3 rijen van 8 — 12 matig groote groefjes. Tusschen de groefjes zijn niet zelden aanduidingen van verhevene primaire lijnen ontwikkeld. Dikwerf is ook in het midden tusschen twee rijen groefjes, eene secundaire lijn zichtbaar. Lengte 21 — 26 mm. Overal zeer gemeen, vooral in tuinen op vochtige plaatsen, onder steenen en in bosschen onder mos en boomschors. . . . (hortensis Panz.) 13. *nemoralis* Müll.
- Keel niet in de breedte verdikt 13
- 13 Laatste lid der kaaktasters langer dan het voorlaatste. Bij het ♂ is dit lid naar het uiteinde zeer sterk, dat der lipstasters nog sterke verbreed, ongelijkzijdig driehoekig. Bij het ♀ zijn de eindledjes der tasters naar het uiteinde veel zwakker verbreed. Lichaam geheel zwart (ab.c. *niger* Letzn.), de zijrand der dekschilden gewoonlijk met zwakken, blauw- of violetachtigen weerschijn, aan de zijden van het halsschild levendiger blauw-, violet- of groenachtig (ab.c. *violaceo-marginatus* Letzn. en *viridi-marginatus* Letzn.). Dekschilden kort-eivormig, naar het uiteinde niet uitgebogen, fijn en zeer dicht gestreept, de tussenruimten als rijen van kleine, langwerpige korreltjes, welke vooral naar het uiteinde, eenigszins naar achteren geriikt zijn; de 7de, 14de en 21ste tussenruimte door kleine, soms onduidelijke stippen onderbroken. Zeldzamer zijn de strepen der dekschilden op de voorhelt zeer duidelijk bestippeld en hare tussenruimten van voren slechts zeer zwak en onduidelijk gekerld of onderbroken, de dekschilden zijn dan gladder (ab.s. *simplicipennis* Dej., bij Valkenburg in Limburg). Lengte 15 — 18 mm. Zeldzaam op velden en aan boschranden, onder steenen; meer algemeen op de kalkgronden van Zuid-Limburg. 15. *convexus* F.
- Laatste kaaktaster-lid even lang als of korter dan het voorlaatste 14
- 14 Dekschilden met 3 primaire ketenribben; 3 meer of minder ontwikkelde secundaire ribben en soms nog bovendien met duidelijke tertiaire ribben. 15
- Dekschilden zeer dicht en diep gestreept; de strepen fijn, doch scherp bestippeld; de tussen-

ruimten als scherpe en gelijkmatig verhevene, zeer regelmatige, slechts naar het uiteinde gekorrelde strepen ontwikkeld, de 7de—9de, de 15de—17de en de 23ste—25ste tussenruimte elk door 3—11 groote, diepe groefjes onderbroken (*Orinocarabus* Kraatz). Zwart, op het halsschild en op de dekschilden meestal met bruinachtigen bronsglans; op de dekschilden met 3 rijen goud- of koperkleurige, zelden groenachtige of met de dekschilden gelijk gekleurde groefjes en gewoonlijk met roodachtig-koperkleurigen, zelden groenachtigen zijrand. Bij het ♂ is het 6de—8ste sprietlid aan de onderzijde vrij sterk, het 5de en 9de zwakker en minder duidelijk uitgerand en onbehaard. Dekschilden nabij het uiteinde niet uitgebogen. Lengte 23—27 mm. Niet inlandsch. Eenmaal bij Bentheim gevonden. Ook in Oldenburg (*gemmatus* F.) (*hortensis* L.).

- 15 Tweede sprietlid aan den wortel niet of slechts onduidelijk samengedrukt. Dekschilden met sterk opgerichte, meer of minder vooruistekende schouders (*Eucarabus*, *Eutelicarabus* Géhin) 16

Tweede en derde sprietlid aan den wortel duidelijk samengedrukt. Dekschilden langwerpig, met sterk afgeronde schouders (*Morphocarabus* Géhin). Deze soort is zeer veranderlijk in kleur der bovenzijde, bruinachtig-bronskleurig, lichter of donkerder metallisch-groen, of wel blauw- of violelachtig, zwartblauw, zwartviolet, zeldzamer zwartachtig, hetzij met of zonder koperkleurigen, groen-, blauw- of violelachtigen zijrand. Ook zijn exemplaren bekend met bruinrooden sprietwortel en dijen (var. **femoratus* Géhin, in Noord-Frankrijk bij Calais). Naar de sculptuur der dekschilden, zijn twee hoofdvormen te onderscheiden: 1^o de typische vorm. Dekschilden met stippellijnen, 3 primaire ketentussenruimten, waartussen drie volkomen gelijk ontwikkelde, gladde, scherpkantige tussenruimten (secundaire- en tertiaire tussenruimten). Bij sommige exemplaren zijn de secundaire tussenruimten naar het uiteinde hier en daar onderbroken. 2^o De var. *consitus* Panz., bij welke de secundaire tussenruimten tusschen de ketenrijen sterker ontwikkeld zijn dan de tertiaire, of wel deze laatste verdwijnen geheel, terwijl zich de secundaire tussenruimten als krachtiger ribben ontwikkelen. Bij den typischen *consitus* (*Kroni* Hoppe 1), *interpositus* Géhin, zijn de tertiaire tussenruimten nog volkomen ontwikkeld. Bij de var. **interruptus* Beuthin uit het Rijngebied, zijn de secundaire ribben grootendeels in bultjes opgelost. Lengte 24—28 mm. Type en variëteit op vele plaatsen gemeen, o. a. op rivierdijken, diluviale zand- en grindgronden en op de mergelgronden van Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg werden aangetroffen fraaie violelachtige en zwartblauwe exemplaren met violetten zijrand, deels tot het type (*abc. ?affinis* Pz.), deels tot de var. *consitus* behoorend. Ook vindt men daar donker violette of zwartachtige exemplaren, met koperkleurigen of fraai groenen zijrand, behoorende tot de typische var. *consitus* (*abc. versicolor* Goerin, *?regularis* Wissm.) 13. **monilis** F.

- 16 Dekschilden bij het ♀ nabij het uiteinde sterk en eenigszins hoekig-, bij het ♂ veel zwakker uitgerand. Sprietten van het ♂ gewoon. Halsschild breder dan lang, met vrij sterk naar achteren gerichte lobvormige achterhoeken. Dekschilden langwerpig-ovaal, elk met 3 primaire ketenribben en 3 doorlopende secundaire ribben, de rib naast den naad zwakker aangeduid en naar het uiteinde geleidelijk uitgewischt. Eene in grootte, vorm, kleur en sculptuur zeer veranderlijke soort. — In ons gebied komen de navolgende vormen voor. Het type, met roodachtig eerste sprietlid en geheel zwarte pooten; de var. *rufipes* Kr. (*femoralis* Géh.), met tot op de knieën na, roode of bruinroode dijen. Bovenzijde koperkleurig, bronzig, zeldzamer bronzig-groen (*abc. viridis* Letzn.) of zelfs zwartachtig-bruin. Dekschilden met tamelijk scherp aangeduide langwerpige bultjes in de ketenribben en met vrij krachtige secundaire ribben, waartussen uiterst fijn geclagrineerd. De *abc. *carinatus* Charp. (*fusus* Palliardi) onderscheidt zich door zwak ontwikkelde, soms zelfs bijna uitgewischte bultjes der ketenrijen en zeer krachtig ontwikkelde secundaire ribben; eerste sprietlid rood, de dijen zwart. Van dezen vorm zag ik een groenachtig Belgisch exemplaar uit de Hautes Fanges; ook bij Fleurus 2). De *abc. tuberculatus* Dej. is onderscheiden door de zeer sterk uitpuilende, gewoonlijk korte bultjes der ketenrijen, de sterke secundaire ribben, de duidelijker gekorrelde tussenruimten, het iets korter, zeer dicht rimpelig bestippeld halsschild en de iets kortere en wat meer gewelddige dekschilden; doorgaans wat kleiner dan het type, meestal donker-koperkleurig en donker; eerste sprietlid en dijen rood. In Drenthe gevonden. 19—24 mm. Deze soort is zeer verbreid, behalve in de alluviale streken; op velden, wegen, onder steenen, aardkluiten en korenschooven. Zoowel het type als de var. *rufipes* Kr. Ook op Texel 10. **cancellatus** Illig.

Dekschilden van het ♀ nabij het uiteinde slechts zwak uitgerand. De middelste sprietleedjes van het ♂ aan het uiteinde knoepig naar onderen verdikt 17

1) De var. *Kroni* Hoppe is volgens *Günthauer* beschreven op een fraai groen, tamelijk vlak exemplaar met opvallend kleine bultjes der ketenrijen.

2) Van deze aberratie komen ook overgangsvormen voor naar het type.

- 17 De kantig opgerichte zijrand van het halsschild eindigt aan het uiteinde der vrij sterk uitgetrokken achterhoeken. Deze soort lijkt op *cancellatus*, doch is onderscheiden door de steeds geheel zwarte sprieten en pooten, de aan het uiteinde bij het ♀ zwak, bij het ♂ bijna niet uitgerande dekschilden, de van de naadrib veel verder afstaande en daaraan evenwijdig loopende en evenzoo ontwikkelde en tot aan het uiteinde doorlopende eerste secundaire rib, alsmede door het ontbreken van eene haarstippel achter op de basis der achtercoxae. Het in ons gebied voorkomende type is donker bronskleurig-bruin, niet sterk glanzig. Halsschild veel breder en aan de zijden sterker gerand dan bij den typischen *cancellatus*, met breede, tamelijk korte en meer of minder lobvormige, afgeronde achterhoeken. De dekschilden zijn veel breder en meer gewelfd en hunne sculptuur is veel krachtiger ontwikkeld dan bij *cancellatus*; op de derde ketenrij volgt nog eene vierde, doch zwakkere en naar voren verdwijnende secundaire rib. Lengte 24—28 mm. 1). Alleen bij Arnhem gevangen. In België bij Renver en Verviers. Ook in Oldenburg en Westfalen.

(*morbillosus* Panz.) 11. **Ulrichii** Germ.

De kantig opgerichte zijrand van het halsschild kromt zich naar achteren om den top der weinig uitgetrokken achterhoeken. Bovenzijde van het lichaam lichter of donkerder koperkleurig bronzig (het type = ab.e. *cupreo-aeneus* Letzn.), groen of blauwachtig-groen, hetzij eenkleurig (ab.e. *viridis* Letzn., bij Roermond), hetzij met meer of minder koperkleurig halsschild (ab.e. *virescens* Dalla Torre, in Gelderland), soms violetachtig (ab.e. **purpurascens* Letzn., bij Angleur in België), of zwartachtig, min of meer bronzig, met geheel zwarte sprieten (ab.e. **nigrescens* Westh., bij Angleur in België), of met geelrood eerste sprietlid (ab.e. **nigrinus* Westh.), geheel zwart (ab.e. **Schröckelli* Dej., *niger* Letzn.), of wel zwart met bronzige of groene randen der dekschilden (ab.e. **marginatus* Letzn.). Pooten zwart, de dijen, met uitzondering der knieën, soms rood (var. **pomeraunus* Oliv., bij Baraque Michel en La Reid (Spa) in België 2)). Dekschilden ovaal, nabij het uiteinde bij het ♀ zwak, bij het ♂ nagenoeg in het geheel niet uitgebogen, regelmatig gestreept, de primaire tussenruimten der strepen (4, 8 en 12) breder dan de overigen en ketenvormig onderbroken, de secundaire en tertiaire gelijk ontwikkeld of wel de eersten sterker verheven. Bij abs. *sylvaticus* Dej. (bij Zutphen), bij welke de pooten in den regel zwart zijn, zijn de secundaire tussenruimten als gladde ribben, sterker ontwikkeld dan de tertiaire tussenruimten. Lengte 12—20 mm. Niet zeldzaam in de diluviale streken, in bosschen onder mos en plagen.

12. **arvensis** Hbst.

3. *Cychnus*. Fabr.

Sprieten van af het vijfde lid behaard. Kop lang en smal, snuitvormig naar voren verlengd. Bovenlip nagenoeg tot aan de basis in twee lange smalle lobben gedeeld. Voorkaken zeer lang, aan het uiteinde scherp naar binnen gekromd, aan de binnenzijde met twee lange scherpe tanden. Binnenste achterkaakstob tot op de zeer spitse eindhaak na, op de onderzijde door het groote en vlakke, mesvormig verbreede tweede lid der buitenste lob overdekt. Kin zeer diep uitgesneden, met lange zijlobben, zonder tand in het midden der uitsnijding. Tong spits, aan het uiteinde met twee borstelharen; de rliezige paraglossen door eene zeer diepe uitranding van de tong gescheiden, deze overschrijdend, iets naar binnen gekromd en van buiten dicht bewimperd. Tasters lang en dun, het eindlid bijtormig en op de bovenzijde lepelvormig uitgehoud, bij het ♂ sterker verbreed; het tweede zeer lange liptaster-lid op de binnenzijde met verscheidene borstelharen. Halsschild meer of minder hartvormig. Schildje klein. Dekschilden hoog gewelfd, aan den naad met elkaar vergroeid, het achterlijf geheel omvallend, met buitengewoon breede, tusschen het episternum van den metathorax en het eerste sterniet niet uitstekende epipleuren. Bij het ♂ is het laatste sterniet iets breder afgerond en in 't midden flauw uitgerand, bij het ♀ gewoon en volkomen afgerond. Achtercoxae van elkaar gescheiden. Ongeleugeld. Bij het ♂ 3) zijn de voortarsen niet verbreed; de eerste 4 leedjes (het eerste slechts aan het uiteinde) aan de onderzijde zelig behaard. Bij het ♀ aan het uiteinde van het tweede en vierde voortarsen-lid met eenige geringe

1) In Hongarie komen zeer fraaie variteiten voor.

2) Door Putzeys genoemd var. *Sedleri* Heer Volgens Benthin zou deze var. (— *ruficornis* Gebin) zich van *pomeraunus* onderscheiden, doordat de secundaire en tertiaire tussenruimten schubachtig gekorrelt of rimpelig zijn, terwijl bij *pomeraunus* de secundaire tussenruimten glad zijn. Wellicht komt de var. *Sedleri* Heer ook in België of in ons gebied voor.

3) Bij de palaearctische soorten.

behaving. Door wrijving van den zijrand van het achterlijf tegen de dekschilden, kunnen de dieren van dit genus een stridulatie-geruisch maken. — De soorten leven in boschrijke streken; zij verslinden aardslakken en steken hun langen kop in de monding der slakkenhuisjes. — De larve van *C. rostratus* is door Heer en Schiödt beschreven. Ook is de pop van deze soort door Heer bekend geworden.

Van de 14 Europeesche soorten komt een in Nederland en een in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam en pooten geheel zwart. Kop zonder indruk tusschen de oogen. Dekschilden tamelijk eenvormig gechagrineerd, zonder ketenvormige verhevenheden. Lengte 16—19 mm. In vochtige bosschen onder mos en steenen, zeldzaam 1)

(? caraboides L., elongatus Serv.) 1. *rostratus* L.

Lichaam bronskleurig-bruin, schenen geelrood. Kop met een diepen dwarsindruk tusschen de oogen. Dekschilden aan de basis met vele langstrepen, verder op met 3 ketenvormige langstrepen, waartusschen lederachtig gerimpeld. Lengte 13—17 mm. In groote bosschen onder mos en in oude stronken, op vochtigen leem- of mergelbodem. Niet inlandsch. In België op vele plaatsen aangetroffen. Ook in de Rijnprov. bij Elberfeld en Aken . (*attenuatus* F.)

II. Tribus NEBRINI.

4. *Leistus* Fröhlich.

Fig. 7. Achterkaak van *Leistus*. Orig.

Sprieten van af het vijfde lid behaard. Bovenlip van voren afgerond. Voorkaken naar buiten in eene zeer breede, sterk afgeronde lob uitgebreid. De stam der achterkaken is eveneens verbreed en aan den buitenrand in 5 of 6 ahangsels uitgetrokken, van welke op elk een bewegelijken stekelborstel ingeplant staat; ook bezit het tasterstuk achter het voortlid der tasters eene nog langere en smallere voortzetting, waarop een paar stekelborstels staan. (Fig. 7). Tasters zeer lang en dun; het eindlid is naar het uiteinde eenigszins knotsvormig verbreed, het eindlid der liptasters is op de bovenzijde in de lengte gegroefd. Kintand kort en breed, diep en breed uitgerand. De tong is naar de basis breed, dan geleidelijk doch voorbij het midden plotseling versmald en aan het uiteinde driecellig; het iets langere en stompere middengedeelte draagt nabij het uiteinde de beide tongborstels. De paraglossen zijn niet langer dan het breede basaalgedeelte der tong en zijn daarmee volkomen vergroeid. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsenleedjes

verbreed en op de onderzijde zelig behaard. — De soorten van dit genus leven onder steenen, boomschors, aan boomwortels, onder dood riet en in vochtige bosschen onder mos. — De larven van *L. spinibarbis*, *rufomarginatus* en *rufescens* zijn door Schiödt beschreven. Ook is de pop van *L. rufescens* door Schiödt bekend geworden.

Van de 27 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

1 Bovenzijde blauw of zwartblauw 2

Bovenzijde zwart of zwartbruin, veelal met eenigen uiterst geringen purperaartigen weersbijn, de zijden en de achterrand van het halsschild, benevens de zijrand der dekschilden, de sprieten en pooten rood. Dekschilden $2\frac{1}{2}$ maal zoo lang en slechts weinig breeder dan het halsschild, met tamelijk evenwijdige zijden, sterke stippelijnen en tamelijk gewelfde tusschenruimten. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Bij Arnhem, Lochem, Apeldoorn, Oldenzaal en in groot aantal aan de Grebbe onder een gevelden boom. 3. *rufomarginatus* Dfts.

1) De uit België opgegeven var. *elongatus* Hoppe, waarvan ik exemplaren zag uit Lobbes en Waterloo (coll. Romp), lieden typische exemplaren te zijn. Deze variëteit is een alpenvorm.

- Bovenzijde roestkleurig-rood of geelachtig. 3
- 2 Halsschild achter het midden naar de basis, met zeer sterk convergerende en gelijkmatig uitgebogen zijden, de zijranden breed afgezet en sterk opgebogen. Vertex met eene ondiepe dwarsgroef. Bovenzijde gewoonlijk fraai staalblauw, zelden iets blauwgroen met eenigszins roodachtig doorschijnenden randzoom. Pooten en sprietten gewoonlijk meer of min bruin, de dijen meer pekkwart; bij ab.c. *rufipes* Chaud. zijn de sprietten en pooten geheel lichtrood. Lengte 8½ – 10 mm. In den Bosch der heides reken, vooral onder afgestoken plaggen. De ab.c. *rufipes* bij Maastricht (coeruleus Latr.) 1. *spinibarbis* F.
- Halsschild voor de basis plotseling ingesnoerd, zoodat het basaalgedeelte scherp en met evenwijdige zijden afgezet is, de zijrand is vrij smal en slechts weinig opgebogen. Vertex met zeer diepen dwarsindruk. Lichaam pekkwart of pekbruin, kop en halsschild met zwakken, de dekschilden met sterk blauwen weerschijn. Sprietten en pooten roodgeel. Lengte 7 – 8 mm. In bossen langs de duinenrij, niet zeldzaam onder dorre bladeren. 2. *fulvibarbis* Dej.
- 3 Kop evenals halsschild en dekschilden lichter of donkerder roestkleurig-rood. Achterhoeken van het halsschild volkomen recht. Lengte 6 – 6½ mm. Zeer gemeen. (spinilabris Panz.) 4. *ferrugineus* L.
- Kop zwart; uiteinde der dekschilden en van het achterlijf bruin. Achterhoeken van het halsschild stomp. Dekschilden iets korter, in de strepen minder dicht bestippeld. Lengte 6 – 6½ mm. Zeer verbreid, doch zeldzamer dan *ferrugineus*. Deze en de vorige soort sleept men soms van lage planten (terminatus Panz.) 5. *rufescens* F.

5. Nebria. Latr.

*Sprietten van af het vijfde lid behaard. Bovenlip recht afgeknot of uitgerand. Voorkaken kort, geveeën. De stam der achterkaken aan de buitenzijde met 4 of 5 stijve borstelharen bezet. Tasters slank, hunne eindledjes naar het uiteinde iets verbreed en afgeknot, het voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde met 3 borstelharen. Kin diep uitgerand, in het midden der uitranding met een zeer korten, uitgeranden, scherp en stompen, dubbelen tand; de zijlobben van de kin zijn aan de buitenzijde breed afgerond, haar binnenrand zet zich als een scherp tand naar voren over den binnenhoek voort. Halsschild min of meer hartvormig. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsenledjes weinig of slechts matig verbreed en op de onderzijde zelig behaard. — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen en langs oevers. — De larve van *N. livida* is door Schiödte, van *N. brevicollis* alsook de pop door Blisson en Schiödte en de larve van *N. picicornis* door Lée beschreven.*

Van de 80 Europeesche soorten komen twee in Nederland en één in het aangrenzende gebied voor.

- 1 Tarsen op de bovenzijde kaal, pooten geel. Lichaams-lengte 13 – 16½ mm. 2
- Tarsen op de bovenzijde behaard; pooten evenals de geheele bovenzijde van het lichaam zwart. Bij niet geheel uitgekleurde exemplaren zijn de pooten, evenals de geheele bovenzijde licht bruinachtig. Lengte 10 – 12 mm. Overal zeer gemeen onder steenen, dorre bladeren enz. 1). (cursor Bedel.) 2. *brevicollis* F.
- 2 Halsschild en dekschilden geel; kop, voor- en achterrand van het halsschild, benevens eene gemeenschappelijke groote vlek op de dekschilden zwart. Kop met twee roode voorhoofdsvlekjes. Dekschilden bij de var. *lateralis* F. bijna geheel zwart, slechts met een smallen gelen randzoom. Lengte 13½ – 16½ mm. Het type bij Nijmegen en Arnhem. De variëteit op enkele plaatsen langs zandige oevers in de duinstrcken, onder steenen, stukken hout en tusschen wortels van grassen. Ook in België bij Ostende en in Westfalen bij Rheine. (sabulosa F.) 1. *livida* L.
- Lichaam zwart, kop en uiteinde van het achterlijf roodachtig. Lengte 13 – 15½ mm. Langs rivieroevers. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Dusseldorf en in Westfalen. (*picicornis* F.).

1) Kleine exemplaren in België (bij Dinant en la Hulpe) gevonden, worden door den Heer Preudhomme de Borre als var. *dubia* Sahlb. gedacht.

III. Tribus NOTIOPHILINI.

6. *Notiophilus* Dinnénil.

Kop groot, met zeer sterk gewelfde, groote oogen, waartusschen een aantal, meer of minder evenzijdige langskielen. Sprieten van af het vijfde lid behaard. Bovenlip ver vooruitstekend, de voorkaken nagenoeg geheel bedekkend, van voren afgerond. Tasters vrij kort, hunne eindledjes naar het uiteinde versmald, het voorlaatste liptaster-lid aan de binnenzijde met 2 borstelharen. Kin in het midden van de uitranding met een korten, breed uitgeranden tand. Tong breed, met afgeronden, vooruitstekenden top; de paraglossen overschrijden met hare vrije, smalle uiteinden de tong. Halsschild breed. Dekschilden met eene zeer breede tweede tusschenruimte. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsenledjes en meestal ook het eerste lid der middeltarsen zwak verbreed en op de onderszijde zolig behaard. — De soorten van dit genus zijn allen bronskleurig-bruin. Zij leven op vochtige plaatsen, in bosschen, onder steenen, op mos, tusschen dorre bladeren en in plantenaafval. — De larven van *N. biguttatus* en *aquaticus*, alsook de pop van *N. biguttatus*, zijn door Schmidt beschreven.

Van de 12 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Alle tusschenruimten der dekschilden glanzig en glad. 2
Langs den naad en in de buitenste smalle tusschenruimten uiterst lijn gechagrineerd, dofglanzig.
Slechts de eerste breede tusschenruimte glanzig en glad. Lengte 4½—5 mm. Niet zeldzaam,
vooral in dennerbosschen (punctulatus Schaum) 3. **substriatus** Waterh.
- 2 Dekschilden geheel bronskleurig 3
Dekschilden aan het uiteinde geel. 6
- 3 De buitenste tusschenruimten der stippellijnen veel breeder dan de lijnen zelf. 4
De buitenste tusschenruimten der zeer grove stippellijnen hoogstens even zoo breed als de
lijnen zelf. Pooten gewoonlijk geheel roodachtig. Uiteinde der dekschilden uiterst lijn
gechagrineerd, dof. Lengte 5—6 mm. Verbreid, doch vrij zeldzaam. 3. **rufipes** Curt.
- 4 Kop matig groot. Lichaam tamelijk vlak. Pooten geheel zwart. 5
Kop groot, iets breeder dan het halsschild. Lichaam meer gewelfd. Schenen geheel of alleen in
't midden geelrood. Halsschild achter het midden veel sterker uitgerand, met scherpere
achterhoeken. Strepen der dekschilden veel grover bestippeld dan bij *aquaticus*, de derde
en vierde tusschenruimte weinig breeder dan de volgende. Soms zet zich de tweede streep
tot aan het uiteinde voort en is de zevende in 't midden niet onderbroken. Lengte 4½—6
mm. Gemeen. 2. **palustris** Dfts.
- 5 Bovenzijde koperkleurig-bronsbruin, soms iets staalblauw. Wortel der sprieten en tasters
gewoonlijk meer of min roodachtig. Dekschilden smaller dan bij de andere inlandsche soor-
ten, de strepen, behalve de naadstreep, verdwijnen naar het uiteinde. Lengte 4½—6 mm.
Gemeen 1). (semipunctatus F.) 1. **aquaticus** L.
Iets kleiner en smaller dan *aquaticus*, onderscheiden door het bij het ♂ duidelijk bijlvormig
taster-eindlid, den gelen wortel der liptasters, de verder naar het uiteinde doorlopende strepen
en de verspreid bestippelde tusschenruimten der dekschilden, door de aanwezigheid van twee
voor elkaar staande navelstippen nabij het uiteinde der dekschilden en door het niet verbreede
eerste lid der middeltarsen bij het ♂. Lengte 4½ mm. Niet inlandsch. Noord- en Middel-Europa.
(bigeminus Thoms.).
- 6 Dekschilden aan het uiteinde tamelijk glanzig; derde tusschenruimte bijna gelijk aan de tweede
en de vierde, met één groefje op het eerste derde gedeelte. Zijden van het halsschild naar
de basis uitgerand. Lengte 5—5½ mm. Overal zeer gemeen.

(semipunctatus St.) 4. **biguttatus** F.

Dekschilden aan het uiteinde tamelijk dof; derde tusschenruimte veel breeder dan de tweede
en de vierde, met twee groefjes, het eerste nabij het eerste derde gedeelte, het tweede nabij
het midden. Zijden van het halsschild bijna recht. Lengte 5—5½ mm. Niet inlandsch.
In België en in Westfalen bij Dortmund en Munster. Ik zag een Belgisch exemplaar uit
Jette (ex coll. Remy). (punctulatus Wesm.) (quadripunctatus Dej.).

1) Bij Calanphout in België zou eene staalblauwe variëteit met roode schenen gevangen zijn. Ik vermoed dat dit een exem-
plaar van *palustris* is geweest.

IV. Tribus OMOPHRONINI.

7. Omophron Latr.

Kop groot, diep in het halsschild teruggetrokken. Sprieten van af het vijfde lid behaard. Bovenlip zeer flauwe uitgerand. Tasters slank, hoonc eindledjes aan het uiteinde smal afgeknot. Voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde met verscheidene borstelharen bezet. Kin in de uitranding met een gewonen tand. Tong van voren recht afgeknot of afgerond, met twee borstelharen. Paraglossen hetzij korter dan de tong en daarmede geheel vergroeid, of iets langer en van voren vrij. Lichaam rondachtig-ovaal, van boven vrij, hoog gewelfd. Halsschild trapezoidaal, volkomen tegen de dekschilden aansluitend. Schildje door den achterrand van het halsschild overdekt. Bij het ♂ zijn gewoonlijk de beide eerste voertarsen-ledjes en het eerste lid der middentarsen, soms echter alleen het eerste voertarsen-lid verbreed en aan de onderzijde zolig behaard. Van de 3 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Okergeel, de schedel, eene groote vlek in 't midden aan de basis van het halsschild, de naad en drie daarmede samenhangende gegolfde banden op de dekschilden bronzig-groen. Bij het ♂ is het eerste voertarsen-lid even lang als de 3 volgenden te zamen. Lengte 5—6 mm. Op zandige oevers verbreed, soms in massa bijeen; gewoonlijk in het oeverzand ingegraven. April tot Juni. Volgens Huppe zou dit dier een duidelijk geluid voortbrengen. Larve en pop zijn door Schiödt beschreven. 1. *limbatus* F.

V. Tribus ELAPHRINI.

8. Blethisa Bonelli.

Monddeelen als bij *Elaphrus*, behalve dat het eindlid der kaaktasters weinig langer dan het voorlaatste lid is. Halsschild breed, met breed afgezetten, opwaarts gebogen zijrand. Dekschilden aan de basis gerand, met eenigszins onregelmatige stippellijnen, de derde en vijfde tusschenruimte door groote groeven onderbroken. De 3 laatste sterniten aan de basis met eene scherp aangeduide dwarslijn. Het voorlaatste tergiet aan weerszijden van den achterrand met eene gekerfde dwarslijst, welke volgens Westring als stridulatie-orgaan dienst doet. Bij het ♂ zijn de eerste 4 voertarsen-ledjes zwak verbreed, het eerste is slechts aan het uiteinde zolig behaard. Van de twee Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Donker bronskleurig-bruin, met lijne stippellijnen op de dekschilden en 4 of 5 groote stippen op de tweede en 2 of 3 dergelijke stippen op de vierde tusschenruimte. Lengte 11—13 mm. Langs oevers en in vochtige weilanden; over het algemeen zeldzaam . 1. *multipunctata* L.

9. Elaphrus Fab.

Kop met groote zeer sterk uitpuilende oogen, welke aan den voorrand, achter den spricwortel eene zwakke uitranding vertoonen. De eerste 4 spricledjes kaal. Bovenlip van voren afgeknot. Rechter voerkaak aan de binnenzijde nabij de basis met een stompen tand, welke met eene insnijding der linker voerkaak overeenkomt. Eindlid der kaaktasters dubbel zoo lang als het voorlaatste lid, naar het afgeknotte uiteinde iets versmald. Kinnuitranding met een grooten, dubbelen tand. Tong breed, van voren in het midden in eene stompe punt uitgetrokken en met twee borstelharen bezet. Paraglossen met de vrij liggende, zeer smalle, naar binnen gebogen uiteinden, de tong ver overschrijdende. Voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde met twee borstelharen. Halsschild hartvormig, gewelfd, met smal gerande zijden. Dekschilden aan de basis niet gerand, zonder stippellijnen, maar met 3 of 4 langsrijen van groote oogstippen. De laatste 3 sterniten achter de basis met eene scherp aangeduide dwarslijn. Het voorlaatste tergiet met een stridulatie-orgaan, als een gekartelden rand, waarover eene langsrib aan de onderzijde der dekschilden heen en weer strijkt, en daardoor een zacht geluid wordt voortgebracht. Bij het ♂ zijn de eerste 3 of 4 voertarsen-ledjes verbreed en aan

de onderzijde zolig. Gerlengeld. — De soorten van dit genus, welke in habitus aan *Cicindela* en *Tachypus* herinneren, zijn bronskleurig, zwilgroen of gedeeltelijk fraai smaragdgroen. Zij leven langs plassen, vijvers, poelen en rivieren, waar zij zeer snel rondloopen. — De larven van *E. cupreus* en *riparius*, benevens de pop van *E. cupreus*, zijn door Schiödte beschreven.

Van de 10 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Tarsen blauw of violet. Voortarsen van het ♂ met 4 verbrede leedjes. Dekschilden met omwalde oogstippen en daartusschen meer of minder verspreid bestippeld. Halsschild met een haarstip in de achterhoeken. 2
- Tarsen metallisch-groen. Voortarsen van het ♂ met 3 verbrede leedjes. Dekschilden met vlakke oogstippen, daartusschen meer of minder dicht bestippeld 3
- 2 Kop met de oogen zoo breed als het halsschild. Schenen staalblauw. Bovenzijde bruinbronskleurig, de uithollingen vooral op kop en halsschild gewoonlijk groen. Lengte 8—9 mm. Verbreid doch zeldzaam 1. **uliginosus** F.
- Kop met de oogen breeder dan het halsschild. Schenen grootendeels roodgeel. Bovenzijde gewoonlijk lichter bronskleurig. Halsschild met kleinere groefjes op het midden. Dekschilden met grootere oogstippen en meer verspreid bestippelde tusschenruimten. Lengte $7\frac{1}{2}$ —9 mm. Overal zeer gemeen 2. **cupreus** Dfts.
- 3 Prosternum met fijne, afstaande, witte haren bezet en zeer dicht bestippeld. Dof bronzig-groen, zelden koperkleurig, meestal hier en daar smaragdgroen getint. Lengte 5 $\frac{1}{2}$ —7 mm. Overal zeer gemeen. 3. **riparius** L.
- Prosternum kaal en minder dicht bestippeld 4
- 4 Halsschild met de gewone haarstip in de achterhoeken, aan de zijden volkomen gerand. Deze soort gelijkt veel op *riparius*, doch het lichaam is meer gestrekt, met veel grovere, minder dicht en eenigszins rimpelige bestippeling van kop en halsschild. Dekschilden gewoonlijk veel sterker en minder dicht bestippeld, met minder scherp begrensde oogstippen, welke nauwelijks dichter dan hare tusschenruimten bestippeld zijn en zonder middelpunt, daartusschen met duidelijke spiegelvekken. Lengte 6 $\frac{1}{2}$ —7 mm. Niet inlandsch. Leeft meestal op leem- en mergelgrond. Deze soort zou in de Belgische Ardennen, alsook bij Osnabrück, Crefeld, Aken, Dusseldorf en Rheine voorkomen Ik betwijfel zeer het voorkomen bij Calmthout en Westmalle in België. (*litoralis* Dej.) (*aureus* Müll.)
- Halsschild zonder haarstip in de achterhoeken, aan de zijden onvolkomen gerand. Smaragd-groen, de gewelfde plekken op kop en halsschild en de tusschenruimten der oogstippen koperkleurig of bronzig. zeldzamer geheel metaalgroen met helder smaragdgroene zijranden der dekschilden. Kop en halsschild sterker en minder dicht bestippeld dan bij *riparius*, doch fijner en dichter dan bij *aureus*. Halsschild en dekschilden langer dan bij *riparius* en *aureus*. Lengte 7—7 $\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Langs heideplassen bij Arnhem, Zutphen, Ruurlo en Winterswijk. In Westfalen bij Rheine 4. **Ulrichii** W. Redt.

VI. Tribus LOROCERINI.

10. Lorocera Latr.

Kop met zeer sterk uitpuilende oogen. Het eerste spriettlid is nagenoeg even zoo lang als de 3 volgende te zamen, de 4 eerste, onbehaarde spriettleedjes zijn veel dikker dan de volgende, het tweede tot vierde lid iets knoepig verdikt, het tweede tot zesde met lange wimperharen bezet. Bovenlip trapezoidaal, met eene kleine uitranding in het midden. De kleine voorkaken zijn voor de basis, aan den buitenrand diep ingesneden en verbreeden zich voor de insnijding in eene vlakke, naar buiten sterk afgeronde plaat; de binnenrand is voor het midden getand. De stam der achterkaken draagt aan de buitenzijde eene aan den buitenrand afgeronde en met lange krachtige wimperharen bezette plaat, welke zijwaarts zoover vooruitsteekt, dat zij bij het van boven bezien van den kop, buiten de voorkaken duidelijk zichtbaar is. Voor deze plaat is de stam der achterkaken in een eveneens van boven zichtbaren hoek verbreed, welke van voren eenige lange borstelharen draagt. Tasters slank, hunne eindleedjes voor het midden iets

verbreed, aan het uiteinde iets afgeknot. Het voorlaatste liptaster-lid met twee borstel-haren op de binnenzijde. Kin-uitranding in het midden met een stompen tand; tong van voren in eene stompe spits uitgetrokken en met twee borstel-haren bezet. Paraglossen hoornachtig en geheel met de tong vergroeid. De keel is met lange afstaande wimperharen bezet. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes sterk verbreed en op de onderzijde zelig behaard.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zij herinnert in habitus aan een *Leistus*, is bronskleurig, met fijne stippellijnen en met 3 groote diepe groefjes op de vierde tusschenruimte der dekschilden. Schenen en tarsen roodgeel. Lengte 7—8 mm. Vooral op vochtige plaatsen gemeen; langs poelen, onder mos, steenen, afgevallen bladeren en boomschors. De larve is bekend geworden door von Gernet en Schüdte; ook de pop door Schüdte 1. **pilicornis** F.

VII. Tribus SCARITINI.

11. Dyschirius Bonelli

Sprieten van af het derde lid behaard. Bovenlip naar voren iets verbreed en diep uitgerand. Voorkaken aan de binnenzijde ongetand. Eindlid der tasters bij het ♂ bijkvormig en op het scheef afgeknote uiteinde uitgehoud, bij het ♀ spoelvormig. Kin met een gewonen, zeer korten tand. Tong van voren afgeknot en met twee borstel-haren bezet. Paraglossen van af de basis vrij, slank en de tong ver overschrijdende. Hals-schild min of meer kogel- of eivormig, aan de zijden van het versmalde basaalgedeelte niet gerand. Dekschilden gewelfd, cylinder- of eivormig, naast den smal afgezetten zijrand slechts van voren en van achteren met eenige haarstippen. Intereoxaal-voort-zetting van het eerste sterniet aan het uiteinde gerand. Mesothorax in een vrij liggenden steel verlengd, waarop het schildje geplaatst is. Voorpooten tot graven ingericht. Voortarsen bij het ♂ niet verbreed. — De soorten van dit genus zijn bronskleurig, meestal sterk glanzig; van sommige soorten komen roodbruine exemplaren voor. Zij leven op vochtige of zandige plaatsen in gangen en loopen in den zonneschijn rond. Zij vervolgen de *Bledius*- en *Heterocerus*-soorten. — De larve van *D. thoracicus* is door Schüdte, die van *D. salinus* door Thomson beschreven.

Van de 44 Europeesche soorten komen 13 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Zijden van het halsschild minstens tot aan de achterste stip gerand. 2
- Zijden van het halsschild slechts van voren of tot aan het midden gerand 12
- 2 Eindspoor der voorschenen even zoo lang en krachtig als de einddoorn, aan het uiteinde zeer sterk hakig naar binnen gekromd. Clypeus bij het ♂ met een krachtigen, bij het ♀ met een zeer kleinen middentand of zonder aanduiding daarvan. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Niet inlandsch. In Noord- en Middel-Duitschland. (digitatus Dej.)
- Eindspoor der voorschenen recht of slechts zeer weinig gekromd 3
- 3 Clypeus met een middentand. Dekschilden aan de basis gerand. Voorschenen aan den buitenrand met een krachtig ontwikkeld tandje aan den wortel van den einddoorn en met een zwakker tandje nabij het midden 4
- Clypeus zonder middentand 5
- 4 Bronskleurig of zwart, blinkend, het ♀ niet zelden dofzwart of roodachtig. Dekschilden met duidelijke stippellijnen. Lengte 4—4 $\frac{1}{2}$ mm. Overal zeer gemeen. 1. **thoracicus** Rossi.
- Dekschilden dof, doordat zij uiterst lijn lederachtig gerimpeld zijn, met diepe strepen welke niet of slechts onduidelijk bestippeld zijn. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam in de duinstreken. 2. **obscurus** Gyllh.
- 5 Voorschenen aan den buitenrand met twee zeer zwakke, veelal onduidelijke, gelijke tandjes. 6
- Voorschenen aan den buitenrand met een krachtig ontwikkeld tandje aan de basis van den einddoorn en met een zwakker nabij het midden. 9
- 6 Dekschilden met onduidelijk bestippelde, diepe strepen en met duidelijk gewelfde tusschenruimten. Gewoonlijk fraai bronskleurig, doch veelal naar het rood trekkend en soms geheel rood.

- Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Niet zeldzaam langs duinplassen en in afzonderijen. Ook bij Hilversum gevangen 3. **impunctipennis** Daws.
- Dekschilden met zeer duidelijk bestippelde strepen en met weinig gewelfde of vlakke tussenruimten 7
- 7 Naadstreep der dekschilden naar de basis zeer sterk verdiept. Voorhoofd meestal met eene korte middenkiel. Deze soort gelijkt op *nitidus*, doch is grooter. Halsschild naar voren sterker en meer rechtlijnig versmald. Dekschilden met meer parallele zijden en naar het uiteinde lijner gestreept; op de derde streep slechts met twee stippen. Lengte 5—6 mm. Op zeeklei. Eenmaal bij Bergen-op-Zoom langs de Schelde, in Mei. In België bij Ostende en Nieuwpoort. Ook op Norderney 4. **chaleus** Er.
- Naadstreep der dekschilden naar de basis gewoon verdiept. Voorhoofd niet gekield 3
- 8 Dekschilden langwerpig-ovaal, aan de zijden iets afgerond, nagenoeg in 't midden het breedst; op de derde streep met 3, soms slechts met 2 stippen. Glanzig bronskleurig of zwart met groenachtigen weerschijn. Pooten bruinrood, de dijën donkerder. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Langs rivieroevers. Alleen bij Arnhem en Amsterdam gevangen. Ook in Westfalen, in de Rijnprov. bij Dusseldorf, op Norderney en bij Anrich 5. **nitidus** Schaum.
- Dekschilden veel langer en smaller, met meer evenwijdige zijden, minder diep gestreept en in de strepen meer wijd uiteen bestippeld; op de derde streep gewoonlijk slechts met twee stippen. Halsschild langer en smaller, achter het midden minder verbreed en met eene fijnere middengroef. Pooten geheel bruinrood. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam, vooral in afzonderijen der duinen. 6. **politus** Dej.
- 9 Basis der dekschilden zeer duidelijk gerand. Lichaam lang en smal. Kop rimpelig. Zwart of bruin, met bronsglans. Uiteinde der dekschilden veelal bruinrood. Lengte 3— $3\frac{1}{4}$ mm. Alleen bij Zutphen gevangen. In de Rijnprov. bij Dusseldorf. (pusillus Er.) 7. **angustatus** Ahl. 1)
- Basis der dekschilden niet of slechts zeer lijn gerand 10
- 10 Clypeus door eene rechte dwarsgroef van het voorhoofd gescheiden 11
- Clypeus door een hoekigen dwarsindruk van het in 't midden stomp gekield voorhoofd gescheiden. Bovenzijde bronskleurig, veelal met groenachtigen weerschijn, zelden glanzig- of dofzwart. Dekschilden tot aan het uiteinde vrij diep gestreept, in de strepen tot over het midden tamelijk sterk bestippeld. Bij de var. *remotepunctatus* Putz. 2) is het halsschild smaller en loopt vooral naar achteren smaller toe, ook is het minder gewelfd; de strepen der meer verlengde dekschilden zijn zeer lijn en van zeer kleine stippels voorzien. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Zeer verbreed en op sommige plaatsen gemeen. De varieteit door *Putzeys* langs den Moerdijk gevangen. Een exemplaar uit Kolhorn (N.-Holl.) beantwoordt vrij wel aan de beschrijving 9. **aeneus** Dej. 3)
- 11 Dekschilden aan de basis, in de voortzetting van de derde streep, boven de gewone stip met een klein scherpkantig bultje; met tot over het midden vrij sterk bestippelde, diepe strepen. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam langs de zeekust op zeeklei. Ook eene enkele maal bij Scheveningen gevangen. 8. **salinus** Schaum.
- Dekschilden aan de basis zonder dit bultje. Deze soort gelijkt op *aeneus*, het halsschild is langer en smaller, ook zijn de dekschilden veel langer en aan de schouders meer afgerond, met fijnere en lijner bestippelde strepen en met eene naar voren afgekorte tweede streep. Bovendien bevinden zich slechts twee stippen aan den zijrand achter de schouders. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Bij Breda in Februari en bij Roermond, langs de Maas, in Juni. 10. **intermedius** Putz.
- 12 Dekschilden aan de basis, in de voortzetting der naadstreep, met eene duidelijke diepe stip . . . 13
- Dekschilden aan de basis zonder deze stip. Habitus van *globosus*, doch grooter. Dekschilden aan de schouders minder sterk afgerond, de derde tussenruimte met twee stippen. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Op de grens van Staats-Vlaanderen bij Selzaete gevangen. Ik ontving destijds een exemplaar van *Putzeys*. Ook in Westfalen. 13. **laeviusculus** Putz.
- 13 Dekschilden langwerpig. Buitenste einddoorn der voorschenen langer dan de eindspoor. Dekschilden met zeer sterk bestippelde strepen, aan het uiteinde over een tamelijk groot gedeelte glad. Lengte bijna 4 mm. Eenmaal bij Warnsveld in Juli . . . 11. **semistriatus** Dej.
- Dekschilden ovaal. Buitenste einddoorn der voorschenen korter dan de eindspoor. Metallisch-

1) De opgave van *D. substriatus* Dfts. uit België (Bandour in Henegouwen), berust vermoedelijk op eene onjuiste determinatie. Deze soort komt in de Alpen voor.

Volgens de *La Brèlère* zou *D. remotepunctatus* Putzeys, een abnormaal exemplaar zijn.

3) De destijds opgegeven *D. apicalis* Putz. welke onjuist gedetermineerd was, is *aeneus* Dej.; vermoedelijk behoort ook het in Westfalen gevangen exemplaar tot deze laatste soort.

zwart; mond, tasters (behalve het laatste lid), sprietwortel en pooten bruinrood; voordijen meestal iets donkerder. Soms is het halsschild bruinrood (ab.c. *ruficollis* Kolenati) of wel het geheele lichaam roodachtig. Eene mij onbekende ab.c. **subaeneus* Suffr. zou sterk bronskleurig zijn (in Westfalen). Dekschilden met sterke stippellijnen, welke behalve de eerste naar het uiteinde verdwijnen. Lengte 2—2½ mm. Overal zeer gemeen langs oevers, op moerasbodem en tusschen vochtige bladeren. . . . (gibbus F.) 12. **globosus** Hrbst. 1).

12. *Clivina* Latr.

Voorkaken met 3 tanden aan de basis. De kintand is in den regel weinig korter dan de zijlobben van de kin, de tong is naar voren min of meer versmald, soms toegespitst. Tasters bij het ♂ en het ♀ gelijk gevormd. Halsschild aan de zijden tot aan de basis gerand. Mesothorax in een vrij liggenden steel verlengd, waarop het schildje geplaatst is. Dekschilden langs den breeder afgezetten zijrand met eene onafgebroken rij haarstippels bezet. Intercoxale voortzetting van het eerste sterniet aan het uiteinde niet gerand. Voorpooten tot graven ingericht; middelschenen aan den buitenrand getand, voor het midden veelal met een doorn bewapend. Voortarsen in beide seksen gewoon. Laatste sterniet met 4 haarstippen, bij het ♀ staan de twee binnenste verder van elkaar dan van de buitenste, bij het ♂ daarentegen op gelijken afstand. De beide soorten zijn gemeen, vooral op vochtige zandgronden, op klei, langs oevers onder steenen en stukken hout; zij leven in gangen die zij met hare voorschenen graven.

Van de 7 Europeesche soorten komen twee in Nederland voor.

Pekzwart of lichter of donkerder roodbruin. Dekschilden langwerpig, doch niet met geheel evenwijdige zijden, met fijne strepen en breede, vlakke tusschenruimten. Lengte 5½—6½ mm. (arenaria F.) 1. **fossor** L.

Kop en halsschild pekzwart of bruin, de dekschilden licht roodbruin of geelbruin, gewoonlijk met zwartachtigen naad of met eene groote gemeenschappelijke zwarte naadvlek (ab.c. *discipennis* Megerte i. litt.); soms is het geheele lichaam geelrood (ab.c. *sanguinea* Leach i. litt.). De kortere dekschilden hebben meer evenwijdige zijden, krachtiger strepen en eenigszins gewelfde tusschenruimten. Achterlijf veel vlakker gewelfd. Lengte 5—5½ mm. Wellicht eene varieteit van fossor. 2. **collaris** Hrbst.

Sub-Familie HARPALINAE.

VIII. Tribus BROSCINI.

13. *Broschus* Panz.

Kop groot en dik. Bovenlip van voren in het midden slechts zeer flauw uitgerand. Voorkaken lang, sterk vooruitstekend. Tasters vrij slank, het eindlid niet naar het uiteinde versmald, aan het uiteinde afgeknot, van het voorlaatste lid weinig in lengte verschillend. Kin in het midden der uitranding met een vrij korten, gewonen tand. De binnenste lob der achterkaken aan de binnenzijde dicht bewimperd. De paraglossen liggen met hare korte, vrije uiteinden dicht tegen de tong aan en overschrijden deze niet of slechts weinig. Sprieten van af het vijfde lid behaard. Lichaam langgestrekt en tamelijk gewelfd. Prothorax door een korten mesothorakaal-steel, op welke het schildje beperkt blijft, van den metathorax gescheiden. Halsschild eenigszins hartvormig, naar achteren sterk versmald. Pooten krachtig ontwikkeld, de voorschenen naar het uiteinde verbreed. Bij het ♂ zijn de eerste 3 leedjes der voortarsen verbreed en op de onderzijde zolig behaard.

Van de 4 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Zwart, weinig glanzig, slechts het uiteinde der tasters en sprieten roodachtig. Dekschilden ongeveer driemaal zoo lang als het halsschild, met zeer fijne stippellijnen. Gevlengeld. Lengte 18—21 mm. Gemeen op zandgrond, in duin- en heidestrecken onder steenen, waar zij gewoonlijk in gaten verscholen zit, veelal twee bijeen, doch iedere sekse in een eigen gang, loerende op buit. De larve en de pop zijn door Schödté beschreven.

(vulgaris Dej.) 1. **cephalotes** L.

1) Ik vermoed dat de door Mützger uit Helgoland opgegeven *D. rufipes* Dej. een roodpootige *globosus* Hrbst. is.

IX. Tribus BEMBIDIINI.

14. *Tachypus* Laporte de Castelbau.

Kop breed, met groote, sterk uitpuilende oogen. Halsschild hartvormig. Dekschilden met neerliggende, vlekkege beharing, geheel verward bestippeld, met twee groefachtige haarstippen. Bij het ♂ is het eerste voortarsen-lid sterk, het tweede zwak verbreed. — Kleine geelengeelde kevers, welke in habitus eenigszins aan *Elaphrus* herinneren. — Zij leven op vochtige plaatsen, langs poelen, plassen en tusschen gras.

Van de 7 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Eerste sprietlid en voorlaatste tasterlid donker gekleurd. Bovenzijde licht bronskleurig, op de dekschilden licht groenachtig gevlekt en met eenige zwakke aanduiding van langsstrepen langs den naad. Dijen op de bovenzijde metallisch groen. Kop met de weinig uitpuilende oogen niet breeder dan het midden van het halsschild; halsschild lijn rimpelig bestippeld. Lengte 5—5½ mm. Zeldzaam 1. *pallipes* Dfts.

Sprieten, tasters en pooten geheel geelbruin. Bovenzijde bronskleurig, op de dekschilden licht groenachtig gevlekt en met eenige aanduiding van langsstrepen langs den naad. Kop met de sterk uitpuilende oogen breeder dan het midden van het halsschild; halsschild duidelijk bestippeld. Lengte 4—4½ mm. Gemeen 2. *flavipes* L.

15. *Bembidium* Latr.

Kop naar achteren versmald. Sprieten tamelijk lang. Bovenlip van voren recht afgeknot of slechts iets uitgerand. Voorlaatste kaaktaster-lid zeer groot, aan het uiteinde knotsvormig verdikt, het eindlid zeer kort en zeer fijn, priemvormig. Kintand gewoonlijk veel korter dan de zijlobben van de kin, aan het uiteinde zelden afgeknot of iets uitgerand. Tong van voren afgerond en in het midden met twee dicht naast elkaar staande borstelhaaren bezet. De paraglossen overschrijden met hare vrije uiteinden de tong. Eindlid der lipstasters gelijk aan dat der kaaktasters. Lichaam onbehaard. Zijrand van het halsschild smal omzoomd en kantig opgericht. Dekschilden met bestippelde of onbestippelde langsstrepen, of ten minste met eene volkomen naadstreep en eene korte scutellairstreep; de derde tusschenruimte met 2 diepe stippen. Bij het ♂ zijn de eerste twee voortarsen-leedjes verbreed en op de onderzijde zelig beschud; het eerste lid is groot, lang vierhoekig, het tweede veel kleiner; de binnenhoek der beide leedjes is naar voren uitgetrokken. Het laatste sterniet heeft bij het ♂ aan het uiteinde twee, bij het ♀ 4 haarstippen. Kleine, in habitus eenigszins veranderlijke, metaalglanzige of bronskleurige kevertjes, welke vooral in den zonneschijn zeer snel rondloopen, langs oevers, in weilanden en tuinen, en zich tusschen plantentwortels, gras, afgevallen bladeren, dood riet en onder steenen verbergen. — De larve van *B. bipunctatum* L. is door Schiodte en Xamben, de pop door Xamben beschreven; de larve van *B. pallidipenne* Ill. door Schiodte, van *ustulatum* L. (volgens Fauvel van *varium* Ol.) door Thomson beschreven.

Van de 156 Europeesche soorten komen 53 in Nederland en 9 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De achtste en de langs den zijrand verloopende negende streep der dekschilden zijn evenals de overigen bestippeld en naar achteren door eene tamelijk breede tusschenruimte van elkaar gescheiden. Halsschild met vooruitspringende voorhoeken, aan de basis aan weerszijden naar de achterhoeken scheef afgeknot en gerand. Basaalrand der dekschilden onder een duidelijken hoek met den zijrand samenstootend (Sub-gen. *Bracteon* Bedel) 2

De achste en de langs den zijrand verloopende negende streep der dekschilden zijn anders gevormd dan de overigen, de achste is van achteren sterk verdiept, glad en de randstreep genaderd, van voren met de randstreep versmolten of aldaar uitgewischt. 5

- 2 Derde tusschenruimte der dekschilden zoo breed als de overigen en evenals deze lijn gechagrineerd, met twee stippen. Bovenzijde dof bronskleurig. Eerste sprietlid en de wortel der 3 volgende, de dijkworcel en de schenen roodgeel. Lengte 5½ - 6½ mm. Zeldzaam, langs de groote rivieren (*Orichalcium* Dfts.) 1. *striatum* F.

Derde tusschenruimte der dekschilden in het midden breeder dan de overigen, met twee breede, daffe, gechagrineerde, veelal zilverglanzige, eenigszins ingedrukte vlekjes 3

- 3 Halsschild veel breder dan lang 4
 Halsschild weinig breder dan lang. Bovenzijde dof bronskleurig, de binnenste tusschenruimten der dekschilden en eenige vlekken daarbuiten meer koperkleurig. Spriet en tasters en pooten donker, de dijkwortel meer of minder roodgeel. Onderzijde van het eerste sprietlid veelal roodgeel. Van de verwante soorten onderscheiden door het veel smallere halsschild met stompe achterhoeken. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam langs heideplassen; en rivieroever. Zeldzamer langs duinplassen. (paludosum Pz.) 4. **litorale** Oliv.
- 4 Pooten rood-geelachtig, knieën en tarsen iets donker metaalglanzig. Bovenzijde licht bronskleurig of koperkleurig bruin, zeer dicht gehagrineerd en daardoor dofglanzig. Sprietwortel en tasters geelachtig. Dekschilden met tamelijk fijne stippellijnen. Lengte 5—6 mm. Zeldzamer langs rivieroever. Eenmaal in groot aantal langs de Maas bij Cuijk. (impressum Pz.) 2. **velox** L.
- Pooten alsook de spriet en tasters donker metaalglanzig. Bovenzijde veel meer glanzig bronskleurig. Lichaam grooter en breder. Stippellijnen der dekschilden krachtiger en met bredere zilverglanzige vlekjes. Eerste sprietlid grootendeels, de dijkwortel en de schenen rood-geelachtig. De ab.c. *chalybeum* St. (*azureum* Gebl.) is op de bovenzijde blauw of blauwgroen. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Gemeen langs rivieroever en duinplassen. De ab.c. *chalybeum* bij Tiel; in België bij Calmthout 3. **argenteolum** Ahr.
- 5 De basaalrand der dekschilden stoot hoekig met den zijrand samen 6
 De zijrand der dekschilden gaat boogsgewijze in den, gewoonlijk slechts tot aan den wortel van de vijfde streep reikenden, korten basaalrand over 9
- 6 De basaalrand der dekschilden vormt met den zijrand een scherpen hoek. Dekschilden met zeer fijne stippellijnen, welke naar het uiteinde verdwijnen (Sub-gen. Neja Motsch.). Bovenzijde bronskleurig, soms met groenachtigen weerschijs; de dekschilden voor het uiteinde veelal met eene roodgele vlek (ab.c. *bilunulatum* Bielz.). Spriet en tasters en pooten grootendeels donker, de schenen en veelal ook de dijkwortel roodgeel. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Type en var. bij Amsterdam. Ook in België bij Calmthout. De var. bij Cleef, in aanspoelsel van den Rijn. (orichalcum Panz., orichalcum Ill.) 5. **pygmaeum** F.
- De basaalrand der dekschilden vormt met den zijrand een stomperen hoek 7
- 7 Halsschild hartvormig, met rechte achterhoeken (Sub-gen. Metallina Motsch.) 8
 Halsschild naar achteren nagenoeg rechtlijnig versmald, met stompe achterhoeken (Sub-gen. Phila Motsch.). Pekzwart of pekbruin, op de bovenzijde meestal met geringen metaalglans. De wortel der spriet en tasters, benevens de pooten geelrood. Halsschild met vrij groote, diepe basaal-indrukken. De basale voortzetting van den zijrand der dekschilden is onder een stompen hoek afwaarts gericht tegen de basis van de vijfde stippellijn. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen onder steenen en dood riet. 47. **obtusum** Sturm.
- 8 Halsschild sterk naar de basis versmald. Dekschilden langwerpig-eirond; de zesde stippellijn zwak aangeduid, soms nog de zevende duidelijk aanwezig (ab.s. *properans* Steph., *velox* Er., 14—*striatum* Thoms.). Eerste sprietleedjes gedeeltelijk, benevens de schenen geelrood. Bovenzijde licht bronskleurig, zeer zelden metallisch-groen of blauwgroen, sterk glanzig. Lengte 3—4 mm. Overal zeer gemeen (velox F.) 6. **lamps** Hrbst.
- Halsschild meer geleidelijk naar de basis versmald. Dekschilden gewoonlijk meer kort-eirond. Spriet geheel zwart. Schenen bruin. Stippellijnen der dekschilden fijner. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Uiterst zeldzaam in dennenbosschen der diluviale streken 7. **nigricorne** Gylh.
- 9 Halsschild hartvormig, naar achteren uitgebogen, zelden nagenoeg rechtlijnig versmald 10
 Halsschild breed schijfvormig, de zijden tot aan de achterhoeken gelijkmatig afgerond, aan de basis aan weerszijden uitgerand, uitgesneden of scheef afgeknot, zoodat het midden der basis verder naar achteren getrokken is dan de achterhoeken (Sub-genus Philochthus Steph.) 56
- 10 Voorhoofdsgroeven zeer oppervlakkig of onduidelijk 11
 Voorhoofdsgroeven duidelijk 14
- 11 Dekschilden tot aan het uiteinde diep gestreept (Sub-gen. Principium Motsch.) 12
 Strepen der dekschilden naar het uiteinde veel zwakker aangeduid, min of meer uitgewischt. 13
- 12 Kop en halsschild overal vrij dicht en grof bestippeld. Lichaam geheel glanzig bronskleurig, zeer zelden blauwzwart of zwart. Eerste sprietlid meer of minder en de pooten (behalve de knieën en tarsen) roodgeel. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Gemeen langs de groote rivieren. De blauw-zwarte aberratie bij Cuijk langs de Maas 8. **punctulatum** Drap.
- Halsschild slechts aan voor- en achterrand bestippeld. Lichaam geheel rood-geelachtig, hier en daar met groenachtig-bronskleurigen weerschijs. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Zou bij Crefeld en Elberfeld gevangen zijn (ruficollis Gylh.).

- 13 Halsschild binnen de achterhoeken zonder basaalgroefje en zonder langsplooi (Sub-gen. *Actedium* Morsch.). Bronsgroen, kop en halsschild veelal koperkleurig. Dekschilden bleekgeel, om het schildje en een dwarsband achter het midden gewoonlijk donkerder met metaalachtigen weerschijn. Sprieten, tasters en pooten roodgeel. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen langs duinplassen en stranden (Andreac Gylh) 9. **pallidipenne** Ill.
- Halsschild binnen de achterhoeken met een duidelijken, naar buiten door eene langsplooi begrensden indruk (Sub-gen. *Testedium* Morsch.). Bovenzijde lichter of donkerder bronskleurig, soms *blauwzwart of *zwart. Sprieten, tasters en pooten zwart; de eerste sprietleedjes aan de bovenzijde en de pooten veelal metallisch gekleurd. Halsschild aan de randen zeer grof, in 't midden fijner en meer verspreid bestippeld. Derde tussenruimte op de dekschilden met 2, zeer zelden met 3 (ab.s. **sexpunctatum* Heer) stippen. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Over het algemeen zeer zeldzaam; in groot aantal echter in de omstreken van Amsterdam. Ik ving bij den Haag een exemplaar met groenachtige dekschilden . . . 10. **bipunctatum** L.
- 14 Voorhoofds-groeven naar buiten door een gewoon, of slechts van voren gevorkt, langsgroefje begrensd 15
- Voorhoofds-groeven over hare geheele lengte, naar buiten, door eene dubbele langsplooi begrensd (Sub-gen. *Campa* Morsch.). 54
- 15 Voorhoofds-groeven evenwijdig of slechts zeer zwak naar voren convergeerend, over hare geheele lengte door een gewoon langsgroefje begrensd 16
- Voorhoofds-groeven naar voren, herzij zwak convergeerend en dan van voren aan weerszijden door eene dubbele plooi begrensd, of wel naar voren sterk convergeerend 46
- 16 Dekschilden tot aan het uiteinde gelijkmatig diep gestreept 17
- Minstens de buitenste strepen der dekschilden naar het uiteinde fijner of uitgewischt. 22
- 17 Dekschilden geel gevlekt of geheel geel (Sub-gen. *Notaphus* Steph.) 18
- Dekschilden eenkleurig donker getint (Sub-gen. *Plataphus* Morsch.). Bovenzijde donker metallisch-zwartgroen. Sprieten, tasters en pooten zwartachtig. Eerste sprietlid min of meer en gewoonlijk ook de diwortel bruinrood. Gemakkelijk te herkennen aan de onbestippelde strepen der dekschilden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Langs de Maas bij Maastricht en Roermond; ook in de Rijnprovincie bij Dusseldorf 16 **prasinum** Dfts.
- 18 Kop en halsschild uiterst fijn gechagrincerd, dof. Sprieten minstens naar het uiteinde donker. 19
- Kop en halsschild glanzig, glad. Sprieten, tasters en pooten geheel bleekgeel. Dekschilden bleekgeel, achter het midden, soms ook om het schildje bruinachtig. Kop en halsschild glanzig metallisch-groen of bronzig. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam op zeeklei, tusschen steenen en wieren (pallidipenne Dej.) 15. **ephippium** Mrsh.
- 19 De voorste tegen den binnenrand der oogen staande haarstip van binnen door eene kleine verhevene plooi begrensd. Kop en halsschild donker bronskleurig met groenen weerschijn; dekschilden bruingeel, met metallischen weerschijn en zwartachtige, uitgezakte dwarsbanden. Basis der eerste vier sprietleedjes, de tasters en de pooten bruingeel. Lengte 5— $5\frac{1}{2}$ mm. Gemeen, vooral langs oevers der groote rivieren (*flammulatum* Clairv.) 11. **dentellum** Thumbg.
- De voorste tegen den binnenrand der oogen staande haarstip is gewoon 20
- 20 Dekschilden met krachtige stippellijnen, aan het uiteinde bruingeel. Pooten en sprietwortel licht gekleurd 21
- Dekschilden met veel fijnere stippellijnen, aan het uiteinde donker. Sprieten behalve de geelroode onderzijde van het eerste lid benevens de pooten donker gekleurd. Bovenzijde donker bronskleurig, de dekschilden gewoonlijk slechts met twee uitgezakte bruingele dwarsbanden, zelden bijna of geheel ongevekt (ab.c. **immaculatum* Sahlbg.). Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Verbreid, doch overal zeldzaam 14. **obliquum** Sturm. 1)
- 21 Stippellijnen der dekschilden naar het uiteinde fijner. Dekschilden langwerpig-eirond, grootendeels donker gekleurd, bruin- of groenachtig bronskleurig, met in kleine langsvlekjes opgeloste, bruingele dwarsbanden. Wortel der tasters en sprieten, alsook de pooten bruinrood; dijen gewoonlijk met bronzigen weerschijn. De gele teekening op de dekschilden varieert zeer en kan ook ontbreken. Lengte 4—5 mm. Zeer gemeen langs rivieren, plassen, meren enz. (*ustulatum* L.) 12. **varium** Oliv.
- Stippellijnen tot aan het uiteinde zeer diep. Dekschilden kort-eirond, meer geel gevlekt, waardoor de donkere teekening zich min of meer als drie uitgezakte dwarsbanden voordoet. Tasters, sprietwortel en pooten licht roodgeel. Kop en halsschild lichter bronzig groen. Lengte 3—4 mm. Gemeen langs de groote rivieren. (*ustulatum* Panz., *fumigatum* Dej.)

13. **adustum** Schaum.1) *Fauna* beschouwt deze soort als een ras van *varium*.

- 22 De achtste streep der dekschilden is slechts op de achterhelft ontwikkeld en hier zeer diep, naar voren uitgewischt of slechts door eene stippelrij aangeduid (Subgen. *Synechostictus* Motsch.) 23
- De achtste streep der dekschilden is geheel ontwikkeld en van voren met de randstreep versmolten 26
- 23 Schouders der dekschilden uitpuilend. 24
- Schouders der dekschilden volkomen afgerond 25
- 24 Dekschilden tamelijk breed, ongevekt. Kop smaller dan het halsschild. Bovenzijde metallisch-groen of blauwgroen, op de dekschilden soms wat roodachtig aangelopen. De strepen der dekschilden reiken ver naar het uiteinde. Sprietwortel roodgeel, pooten geelrood. Voorhoofds-groeven nagenoeg glad. De achtste streep op de dekschilden alleen op de achterhelft ontwikkeld, naar voren slechts zwak aangeduid. Lengte 5½–6 mm. Niet inlandsch. In het omliggend gebied (basale Mill., ruficornae var. Schaum) (*Millerianum* Heyd.)
- Dekschilden smal, elliptisch, met een rood rond vlekje naar het uiteinde aan den zijrand. Kop even breed als het halsschild. Bovenzijde metallisch-groen, de dekschilden naar het uiteinde iets roodachtig aangelopen. Sprietwortel en pooten roodgeel. Lengte 4–4½ mm. Uiterst zeldzaam. Eenmaal bij Vorden en vele exemplaren bij Breda in de Rijnprovincie bij Aken; in Belgisch Limburg bij Hasselt en Munster-Bilsen 32. *elongatum* Dej.
- 25 Voorhoofd glad. Deze soort gelijkt zeer op *Millerianum*, doch is onderscheiden door de duidelijk bestippelde voorhoofds-groeven, de kortere sprieten, het meer gewelfde en aan de zijden sterker afgeronde halsschild en door de kortere en meer gewelfde dekschilden. De achtste streep der dekschilden is vóór het midden veelal als eene met de randstreep samenhangende stippelrij aangeduid. Lengte 5½–6 mm. Bij Houthem in Limburg. In België bij Hockai, Munster-Bilsen en in de Rijnprovincie bij Aken, Crefeld en Dusseldorf.
- (*stomoides* Dej., *rulipes* var. Jacq. Duval) 33. *atroviolaceum* Dufour. 1)
- Voorhoofd tusschen de groeven bestippeld. Deze soort gelijkt op *elongatum*, doch is minder gestrekt en zonder rood vlekje naar het uiteinde. Bovenzijde metallisch-groen, de dekschilden veelal naar het uiteinde roodbruin aangelopen. Sprietwortel en pooten roodgeel. Kop breder, met minder uitpuilende oogen. Halsschild korter. Lengte 4–4½ mm. Niet inlandsch. Zou in de Belgische provincie Luxemburg, bij Orsinlaing gevangen zijn.
- (*albipes* St.) (*decoratum* Dfs.).
- 26 Lichaam zeer klein, ongeveer 3 mm. 27
- Lichaam grooter, ongeveer 4–7½ mm 29
- 27 Bovenzijde glanzig, glad (Sub-gen. *Emphanes* Motsch.) 28
- Dekschilden uiterst fijn gegagrineerd, dof (Sub-gen. *Talanes* Motsch.). Bovenzijde blauw-achtig-groen. Dekschilden met eene groote, gemeenschappelijke, roodgele vlek aan het uiteinde, soms is zelfs de geheele achterhelft roodgeel. Sprietwortel, tasters en pooten roodgeel. Kop en halsschild overal duidelijk bestippeld. Lengte 2–2½ mm. Leeft op ziltigen bodem. Niet inlandsch. Komt in Noord-Duitsland (eiland Sylt) voor. (*aspericollis* Germ.)
- 28 Halsschild breed hartvormig. Stippellijnen der dekschilden fijner dan bij *normannum*. Sprieten en pooten donker gekleurd, de schenen veelal iets lichter. Bovenzijde metallisch-zwart, meestal met groen- of blauwachtigen weerschijn, de dekschilden hoogstens aan het uiteinde roodbruin. Lengte 2½–3 mm. Gemeen langs de zeekust onder wier en aanspoelsel. (*pusillum* Gylh.)
34. *minimum* F.
- Halsschild smal hartvormig. Strepen der dekschilden krachtiger en aan de basis zeer grof bestippeld. Sprieten minstens aan de basis, benevens de pooten roodbruin. Bovenzijde bronzig-zwart, uiteinde der dekschilden gewoonlijk roodbruin. Lengte 3–3½. Niet zeldzaam op zeeklei. 35. *normannum* Dej.
- 29 Dekschilden slechts op de voorhelft met eenige stippelrijen (Sub-gen. *Nepha* Motsch.) . . . 30
- Dekschilden minstens tot over het midden met stippellijnen, zelden slechts met uiterst fijne, ook op de voorhelft onduidelijke stippellijnen (Sub-gen. *Peryplus* Steph.) 31
- 30 Eerste sprietlid en de basis der 3 volgende bruinrood. De groefjes aan de basis van het halsschild zonder langsplooi. Metallisch zwart of groen, met eene groote driehoekige schouder-vlek en eene groote roodachtige vlek naar het uiteinde der dekschilden bleekgeel. Pooten bleekgeel, het uiteinde der dijën en de basis der schenen min of meer bruinachtig. Dekschilden met grove stippelrijen op de voorhelft. Lengte 4–4½ mm. Zeer gemeen. Bij een exemplaar uit Kolhorn (Noord-Holl.) is de topvlek der dekschilden weinig ontwikkeld. 36. *quadriguttatum* F.
- Slechts de basis en de onderzijde van het eerste sprietlid roodachtig. De groefjes aan de basis

1) Deze soort werd uit België opgegeven als *B. ruficornis* St. De bij Houthem gevangen exemplaren waren eerst als *Millerianum* Heyd. gedetermineerd.

van het halsschild naar buiten door eene duidelijke langsplooi begrensd. De dekschilden met fijnere stippelijnen, de schouderplek aan de zijden, naar achteren verlengd en meer of minder met de achterste vlek verbonden. Lengte 4 mm. Niet inlandsch. Komt in Westelijk-Europa voor (*callosum* Küst.) (*laterale* Dej.)

- 31 Tweede streep der dekschilden tot aan het uiteinde gelijkmatig verdiept 32
Tweede streep der dekschilden naar het uiteinde lijner, soms uitgewischt 35
32 Slechts het eerste sprietlid rood of roodgeel 33

De eerste 3 sprietleedjes roodgeel. Dekschilden met 4 gele vlekken. Deze soort komt in kleur overeen met *ustulatum*, het lichaam is smaller en vlakker; vooral zijn de dekschilden langer en smaller; de binnenste strepen zijn tot aan het uiteinde diep en de vlekken meer rond en minder scheef geplaatst. Dijen veelal bruinachtig. Lengte 4—5 mm. Niet inlandsch. Zou op het eiland Borkum en bij Elberfeld voorkomen. Komt meer in Engeland voor. (*saxatile* Gyll.)

- 33 Dekschilden langwerpig, met nagenoeg parallelle zijden, naar het uiteinde iets toegespijst, eenigszins platgedrukt en met diepe, matig sterk bestippelde langsstrepen. Bovenzijde metallisch zwartgroen, met of zonder meer of minder duidelijken, breedten, uitvloeiend roodbruinen langsgang op de dekschilden. Eerste sprietlid, basis en top der dijnen, de schenen en soms ook de knieën bruinrood. Halsschild aan weerszijden van de basis scheef afgesneden. Naar kleine exemplaren met eenkleurig zwart-groene dekschilden is de var. *aeoeruleum* Dej. beschreven. Deze komt in het Middellandsche zeegebied voor 1). Lengte $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Langs de Maas bij Maastricht. Ik zag van deze localiteit vele zeer groote exemplaren, bij welke in een enkel geval slechts eenige aanduiding van den bruinen langsgang zichtbaar is. Uit België zag ik ook exemplaren met een goed ontwikkelden bruinen langsgang. Ook bij Aken en Dusseldorf 17. *fasciolatum* Dfts.

Dekschilden meer verkort, ovaal. Bovenzijde eenkleurig blauw- of groenachtig. 34

- 34 Dekschilden iets gewelfd, met diepe, vrij sterk bestippelde strepen. Bovenzijde groen, blauwachtig-groen of blauw. Eerste sprietlid, de schenen en tarsen en soms ook de knieën rood- of geelachtig. Halsschild met scherp aangeduide rechte achterhoeken, de basis aan weerszijden tegen de achterhoeken nagenoeg recht of slechts iets scheef afgesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —6 mm. Bij Amsterdam en langs de Maas bij Maastricht. Ook in België en in de Rijnprov. bij Aken en Dusseldorf. 18. *tibiale* Dfts.

Dekschilden vlakgedrukt, met ondiepe, fijn bestippelde strepen. Bovenzijde blauwachtig of groenachtig-blauw; soms het halsschild groenachtig en de dekschilden blauw. Lengte 4—5 mm. Niet zeldzaam langs de Maas bij Maastricht. Ook in België en in Westfalen. (*cyaneus* Wesm., *cumatilis* Schiödte). 19. *atrocoeruleum* Steph. 2)

- 35 Halsschild binnen de achterhoeken hoogstens met geringe aanduiding eener langsplooi, welke de basis niet bereikt 36
Halsschild binnen de achterhoeken met eene zeer duidelijke, kleine langsplooi 39
36 Schedel tussen of tegen de voorhoofds-groeven bestippeld. 37
Schedel binnen de voorhoofds-groeven niet bestippeld. 38
37 Dekschilden met eene groote, roode dwarsvlek achter het midden. Bovenzijde metallisch blauwgroen. Sprietwortel en pooten roodgeel. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Zeer zeldzaam. Arnhem, Ellecom, Oosterbeek en bij Westervoort langs den Rijn. Ook eenmaal langs het strand bij Scheveningen in Maart 26. *modestum* F.

Dekschilden eenkleurig. Bovenzijde zwartachtig-blauw of groenachtig-blauw. Sprietwortel en pooten roodgeel, de dijnen in den regel aan de basis bruinachtig. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Gemeen langs de Maas bij Maastricht. Ook bij Roermond, Tiel, Ellecom en Amsterdam. 27. *decorum* Panz.

- 38 Halsschild hartvormig, duidelijk breder dan lang. Dekschilden langwerpig-eirond, vlakgedrukt, de langsstrepen van voren vrij sterk bestippeld, naar het uiteinde, behalve de eerste en de vijfde, uitgewischt. Kop en halsschild metallisch-groen, dekschilden geelrood met donkerder naad en achter het midden met een bruinachtigen, zeer onduidelijk begrensden, donkeren, aan den naad naar achteren getrokken dwarsband, welke twee lichtere, scheve vlekken, aan de voorzijde begrenst. Sprietwortel, tasters en pooten roodgeel, het voorlaatste kaaktasterlid veelal donker gekleurd. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Zeldzaam langs de groote rivieren. Ook in Westfalen 3) (*obsoletum* Dej.) 20. *testaceum* Dfts.

1) Alle Belgische (Pepinster, Tras-Pantst) exemplaren van de var. *aeoeruleum* Serv. die ik zag, behooren tot *B. tibiale* en *atrocoeruleum*. Ik betwijfel ook het voorkomen in Westfalen.

2) *Lucyphen Duvet* en *Farral* beschouwen *B. tibiale* en *atrocoeruleum* als afwijkende vormen van *fasciolatum*.

3) Volgens *Ganglbauer* zou deze soort slechts eene variëteit zijn van de Zuid-Europesche *B. ripicola* Dfts. De variëteiten *sculpture* Dej. en *ablongum* Dej. zouden als overgangsvormen van het type tot onzen *B. testaceum* Dfts. moeten beschouwd worden.

- Halsschild veel langer en smaller dan bij *testaceum*, aan de basis nauwelijks breeder dan de schedel. Dekschilden veel langer en meer gewelfd, in de strepen veel sterker bestippeld. Bovenzijde metallisch-groen, elk der dekschilden met twee roodgele vlekken, de eene aan den schouder, de andere naar het uiteinde. Sprietwortel, tasters en pooten roodgeel. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Niet inlandsch. Zou in België voorkomen. Twee Belgische (Droogebosch en Papignies) exemplaren uit het Brusselsch museum die ik zag, behooren tot *B. ustulatum*. (*fluviale Dej.*)
- 39 Dekschilden met eene gele of bruingele schoudervlek en eene evenzoo gekleurde scheve vlek voor het uiteinde, soms met uitgebreide gele kleur, zoodat slechts een dwarsband of eene naadvlek achter het midden en een deel van den naad donker blijven 40
- Dekschilden geheel metallisch-blauw of groen, voor het uiteinde hoogstens iets bruinrood doorschijnend, of wel roodgeel en aan het uiteinde meer of minder donker 43
- Dekschilden op de voorhelft ongevlekt, voor het uiteinde met eene scheve roodgele vlek. Bovenzijde metallisch-groen. Sprietwortel, tasters en pooten roodgeel. Veelal zijn de dekschilden over de geheele oppervlakte eenigszins roodachtig aangeloopt. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam langs de Zuiderzee, o. a. bij Amsterdam; ook bij Driebergen en bij Meerssen (Limburg) 25. *lunatum* Dfts.
- 40 Basis van het halsschild zwak en onduidelijk bestippeld 41
- Basis van het halsschild zeer duidelijk bestippeld 42
- 41 Kop en halsschild metallisch-groen, dekschilden bruinachtig-geel, met een breeden, de 3 binnenste tusschenruimten innemenden, op het laatste vierde gedeelte afgekorten, zwartgroenen naadband, welke zich in het midden slechts over de vierde of ook de vijfde tusschenruimte uitbreidt, aan de zijden echter de gele grondkleur niet onderbreekt. Sprietten, tasters en pooten roodgeel, de sprietten soms naar het uiteinde iets donkerder. De dekschilden zijn langer, smaller en meer parallel en van sterker bestippelde strepen voorzien dan bij *femoratum*. Lengte 5 mm. Uitsluitend langs de zeekust, vooral op de zeedijken.
(*maritimum Steph.*, *dorsarium Bedel.*) 21. *concinnum* Steph.
- Kop en halsschild donker bronskleurig; de bruingele teekening der dekschilden bepaalt zich tot 4 vlekken; de naad, de zijrand, een dwarsband achter het midden en het uiteinde der dekschilden zijn zwartachtig-bronskleurig. Aan de sprietten zijn de twee eerste leedjes geheel geelrood, het voorlaatste kaaktaster-lid en de dijen meer of min bruinachtig. Bij de var. *Bualei* Duv. (*anglicanum* Sharp) (bij Nijmegen) zijn kop en halsschild metallisch-groen, is ook het derde sprietlid nagenoeg geheel rood en het voorlaatste kaaktaster-lid donkerder. Lengte 4—5 mm. Gemeen, vooral langs rivieroevers 1). 22. *femoratum* St.
- 42 Kop en halsschild metallisch-groen, de dekschilden gewoonlijk donkerder, elk met twee bruingele vlekken, de eene aan den schouder, de tweede nabij het uiteinde. Sprietwortel, tasters en pooten roodgeel, het voorlaatste kaaktaster-lid gewoonlijk naar het uiteinde bruinachtig, soms ook de dijen iets gebruind. Lengte 5—6 mm. Overal zeer gemeen.
(*litorale Oliv.*, *rupestre F.*) 23. *ustulatum* L.
- Veel kleiner en donkerder dan *ustulatum*, aan de sprietten slechts het eerste lid en de wortel der volgende roodgeel, de tasters donkerder, het voorlaatste kaaktaster-lid zwart. Dijen bruin of zwart. De bruingele vlekken op de dekschilden zijn kleiner. Halsschild aan de zijden meer afgerond, de dekschilden meer gewelfd en met iets minder diepe stippellijnen. Deze soort gelijkt op *B. femoratum*, doch de dekschilden zijn van sterkere stippellijnen voorzien. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen (*Bruxellense Wesm.*) 24. *rupestre* L.
- 43 Voorlaatste kaaktaster-lid pekwart, bij uitzondering nagenoeg geheel roodgeel. Lengte $4\frac{1}{2}$ —6 mm. 44
- Tasters geheel roodgeel of wel het voorlaatste kaaktaster-lid slechts aan het uiteinde iets gebruind. Deze soort gelijkt op *B. nitidulum*, doch is iets kleiner en veel sneller. Sprietten en tasters zijn lichter gekleurd. De ab.c. *Milleri* Duval onderscheidt zich door de rood-bruine kleur van het uiteinde en de epipleuren der dekschilden, veelal ook van de onderzijde van het halsschild. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Van deze soort, welke in oostelijk Middel-Europa gemeen is op de vochtige terreinen nabij pottbakkerijen, werd een typisch exemplaar bij Houthem en de ab.c. *Milleri* bij St. Pieter gevangen 30. *brunnicorne* Dej.
- 44 Bovenzijde sterk glanzig 45
- Bovenzijde matglanzig. Dekschilden meer gestrekt en vlakker dan bij *nitidulum*, met veel fijne stippellijnen. Gewoonlijk alleen het eerste sprietlid (soms meerdere sprietleedjes) en de geheele pooten roodgeel. Halsschild veel langer en smaller, aan de zijden minder

1) Volgens *Ganglbauer* zou deze soort slechts eene variëteit zijn van de Zuid-Europese *B. Andreae* F. De var. *Bualei* Duv. zou als overgangsvorm moeten beschouwd worden. Belgische exemplaren uit Roumont en Hemixen van *B. Andreae* waren *B. concinnum* Steph. Volgens *Westhoff* komt zij in Westfalen voor, volgens *Bach* bij Aken; hoogstwaarschijnlijk onjuist.

- afgerond en met minder duidelijke plooi in de achterhoeken. Bovenzijde blauwachtig-groen. Lengte 4½—5 mm. Bij Houthem in Juni. Op vele plaatsen in België en Westfalen niet zeldzaam 31. *monticola* St.
- 45 Sprietwortel, de tasters, behalve het voorlaatste kaaktaster-lid en de pooten geelrood, de dijkwortel gewoonlijk meer of minder zwartachtig. Bovenzijde metallisch-groen of blauwgroen. Dekschilden langwerpig ovaal, tamelijk gewelfd, met sterke stippellijnen, waarvan de 3 binnenste zeer diep zijn. Lengte 4½—5 mm. Niet zeldzaam in de mergelgroeven van Zuid-Limburg. Ook bij Oldenzaal (*rufipes* Gyll., *brunnipes* St. nec Dej.) 28. *nitidulum* Mrsh.
- De eerste 3 sprietleedjes en de wortel van het vierde lid, de geheele tasters en pooten rood-geel. Deze soort gelijkt zeer op *nitidulum*, doch is wat grooter en heeft vooral naar de basis fijnere stippellijnen op de dekschilden. Lengte 5½—6 mm. Eenmaal in eene mergel-groef bij Meerssen in Limburg. In België bij Fleurus. Ik vermoed dat dit slechts eene aberratie van *nitidulum* is 1). (affine Steph.) 29. *Stephensii* Crotch.
- 46 Voorhoofds-groeven matig diep en niet volkomen rechtlijnig (Sub-gen. *Lophia* Steph.) 47
- Voorhoofds-groeven zeer diep en volkomen rechtlijnig, zeer sterk convergeerend en van voren in den regel in een punt samenkomend (Sub-gen. *Trepanes* Motsch.) 52
- 47 Halsschild aan weerszijden van de basis zeer scheef afgesneden of uitgerand, met tandvormig uitstekende achterhoeken 48
- Halsschild met rechte achterhoeken 50
- 48 Dekschilden met eene gele schouderplek en eene gele vlek voor het uiteinde 49
- Dekschilden slechts met eene geelroode schouderplek, op de achterhelft ongevlekt. Metallisch-zwart, met groenachtigen weerschijn. Spriet en dijen zwartbruin, de schenen behalve haren wortel roodgeel. Deze soort heeft den habitus van *tenellum*, het halsschild is korter en breder en de stippelrijen zijn fijner. Lengte 2½—3 mm. Zeer zeldzaam, vooral langs de stranden. Hoek van Holland en Valkeveen langs de Zuiderzee. Ook in België bij Hoekai en in Oldenburg 39. *humerales* St.
- 49 Spriet en dijen geheel bronzig-zwart. Bronzig-zwart, de dekschilden met gelijke, doch kleinere gele vlekjes dan bij *quadriguttatum*. Schenen bruingeel. Halsschild korter en breder dan bij *quadriguttatum*. De stippelrijen der dekschilden verdwijnen eerst tegen het laatste derde gedeelte. Lengte 4 mm. Langs de Maas bij Maastricht. Ook in de Rijnprov. bij Aken, in Westfalen en in België 37. *quadripustulatum* Serv.
- Eerste sprietleedjes en pooten roodgeel. Donker metallisch-groen, de aan het uiteinde iets bruinachtige dekschilden met gele vlekken als bij *quadriguttatum*. Halsschild eveneens korter en breder dan bij *quadriguttatum*. De stippelrijen der dekschilden verdwijnen eerst tegen het laatste derde gedeelte. Lengte 2¾—3¼ mm. Overal gemeen.
38. *quadrimaculatum* L.
- 50 Halsschild sterk gewelfd, aan den achterrand veel smaller dan aan den voorrand, aan de zijden smal gerand, voor de basis aan weerszijden met een snallen langsdruk. Zwart met groen- of blauwachtigen weerschijn, de dekschilden gewoonlijk met eene ronde, geelroode vlek achter het midden naast den zijrand, zeldzamer eenkleurig (*abac. atratum* St., *triste* Schilsky). Sprietwortel min of meer, de schenen en tarsen geheel bruin- of geelrood, soms ook de dijen roodachtig. Lengte 2½—3 mm. Langs rivieroeveren. Een typisch exemplaar bij Amsterdam. Ook in Westfalen, in de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld en in België langs de Schelde.
40. *tenellum* Er.
- Halsschild minder gewelfd, aan de basis niet of slechts weinig smaller dan aan den voorrand, aan de zijden breder gerand, voor de basis aan weerszijden met een breedend indruk 51
- 51 Halsschild naar de basis sterk versmald en daardoor meer hartvormig. Dekschilden langwerpig-eirond, met grove stippellijnen. Zwart, bovenzijde soms met bronsgroenen of blauwachtigen weerschijn. Dekschilden aan het uiteinde soms roodbruin. De eerste 2 of 3 sprietleedjes en de pooten roodgeel. Lengte 2½ mm. Niet zeldzaam onder steenen en dood riet. 41. *gilvipes* St.
- Halsschild kort en breed, naar de basis niet bijzonder sterk hartvormig versmald. Dekschilden eirond, meer buikig dan bij *gilvipes*, met fijnere stippellijnen. Zwart, bovenzijde met groen- of blauwachtigen weerschijn. De eerste 2 sprietleedjes en de basis der beide volgende roodgeel, de dijen bruin, de schenen en tarsen lichter of roodgeel. Lengte 3 mm. Niet inlandsch. Komt bij Oldenburg en in Westfalen voor. . . (Schüppelii Dej.)
- 52 Halsschild lang, even lang of nagenoeg even lang als breed, aan de basis veel smaller dan aan den voorrand 53

1) Volgens Ganglbauer eene goede soort, volgens Bedel en Fauvel slechts eene variëteit van *B. nitidulum*.

Halsschild breed, veel breeder dan lang, aan de basis weinig smaller dan aan den voorrand. Kop en halsschild metallisch-zwart, de dekschilden lichter of donkerder pekkruin, een aantal kleine langsvlekjes op de voorheft, het uiteinde en eene groote vlek daarvoor bruingeel. Sprietwortel roodgeel, pooten bleekgeel. Dekschilden vrij kort en breed, met sterke en diepe, achter het midden verdwijnende stippellijnen. Lengte 2½ mm. Bij Roosteren langs de Maas. Ook in België en in de Rijnprov. bij Crefeld en Dusseldorf.

(Sturmi Panz.) 44. *octomaculatum* Goeze.

- 53 Metallisch-zwart, eene rondachtige vlek voor het uiteinde der dekschilden en gewoonlijk ook het uiteinde zelf geelrood, soms de geheele dekschilden of alleen de achterheft bruinrood met eene lichtere ronde vlek (ab.c. *aquaticum* Panz.). Eerste lid en basis der beide volgende leedjes der sprieten, alsook de geheele pooten bruin- of geelrood. Dekschilden met matig sterke, naar het uiteinde verdwijnende stippellijnen. Lengte 3—3½ mm. Zeldzaam, vooral in bosschen langs poelen op Sphagnum. De ab.c. *aquaticum* bij Breda 42. *Doris* Gylh.

Kop en halsschild metallisch-groen; dekschilden van voren bruingeel, op de achterheft lichter of donkerder bruin, met eene gele scheve dwarsvlek op het laatste derde gedeelte. Sprietwortel en pooten bruingeel. Dekschilden met vrij sterke, op de achterheft verdwijnende stippellijnen. Lengte 3—3½ mm. Overal zeer gemeen. 43. *articulatum* Gylh.

- 54 Dekschilden bruinachtig-geel met zwartbruine, soms met blauw- of groenachtigen weerschijsn voorziene, meer of minder incenvloeiende langsvlekken, welke 3 uitgezakte onregelmatige dwarsbanden vormen; daardoor zijn de dekschilden met vele gele vlekjes bezaaid. Sprietwortel, tasters en pooten roodgeel. Lengte 3½—4 mm. Zeer zeldzaam, vooral op ziltigen bodem 45. *fumigatum* Dfts.

Dekschilden eenkleurig zwartachtig-bronsgroen of blauwgroen en slechts het uiteinde of ook eene rondachtige vlek daarvoor geelrood 55

- 55 Donker bronsgroen of blauwgroen. De eerste sprietleedjes, de pooten, eene vlek voor het uiteinde der dekschilden en gewoonlijk ook het uiteinde zelf, soms zelfs het geheele derde gedeelte naar het uiteinde roodgeel. Halsschild aan weerszijden van de basis met een diep, naar buiten door eene langsplooi begrensd groefje. Lengte 3—3½ mm. Vrij gemeen onder steenen, in gras en onder dood riet 46. *assimile* Gylh.

Na verwant aan *assimile*. Het eerste sprietlid alleen roodachtig. Halsschild aan de basis veel breeder, de basaalgroefjes vertoonen op den bodem twee duidelijke langstrepen. Op de dekschilden ontbreekt de roodgele vlek voor het uiteinde. Lengte 3½—3¾ mm. Niet inlandsch. Zou in België bij Angleur (Luik) gevangen zijn. Gemeen bij Rijssel in Noord-Frankrijk.

(Clarkii Daws.)

- 56 Basis van het halsschild aan weerszijden weinig of slechts iets uitgerand 57
Basis van het halsschild aan weerszijden diep uitgerand of zeer scheef afgesneden. 58

- 57 Halsschild smaller dan de dekschilden. Dekschilden langwerpig-ovaal, langs de zijden weinig gebogen, met eene duidelijke, geelroode, ronde vlek voor het meestal roodbruine uiteinde. Bovenzijde van het lichaam pekkruin, met blauwachtigen of metallischen weerschijsn. Kop matig groot. Eerste sprietlid en pooten roodgeel. Dijwortel niet zelden bruinachtig. Voorlaatste tasterlid donker. Lengte 3—3½ mm. Zeer gemeen. (bipustulatum Redt.) 48. *guttula* F.

Halsschild en dekschilden nagenoeg even breed op hunne grootste doorsnede. Dekschilden korter en meer gewelfd, zonder duidelijke vlek aan het meer of minder roodbruine uiteinde. Bovenzijde van het lichaam zwart of zwartbruin, nagenoeg zonder metallischen weerschijsn. Kop groot. Lengte 3—3½ mm. Zeer zeldzaam, op vochtige plaatsen onder dorre bladeren.

49. *Mannerheimii* Sahlb.

- 58 Dekschilden met 7 stippellijnen. Bovenzijde metallisch groen- of blauwachtig, met eene duidelijke geelroode vlek nabij het roodachtige uiteinde der dekschilden. Eerste sprietlid en pooten roodgeel. Lengte 3½—4 mm. Gemeen. . . (vulneratum Dej.) 50. *biguttatum* F.

Dekschilden slechts met 6 stippellijnen. Bovenzijde pekkruin, soms met metaalglans. Sprietwortel en pooten donker gekleurd. 59

- 59 Halsschild aan de zijden niet gehagrineerd, overal zeer glanzig, met sterk gebogen zijranden en scherp begrensd zijgroef. 60

Halsschild aan de zijden zeer fijn gehagrineerd en daardoor dof, met zwak gebogen zijranden en naar binnen zwak begrensd zijgroef. Bovenzijde van het lichaam bronzig zwart, kop en halsschild gewoonlijk met groenachtigen weerschijsn; de dekschilden naar het uiteinde veelal bruinachtig, doch zonder vlekje. Pooten en sprieten zwartachtig of donkerbruin. Lengte 3½—4 mm. Langs de zeekust, vooral in 't voorjaar niet zeldzaam.

(marinum Schödt.) 53. *aeneum* Germ.

- 60 Derde tot tiende sprietlid ongeveer driemaal zoo lang als breed. Bovenzijde pekkruin, de

dekschilden iriseerend. De binnenste stippellijnen tot aan het uiteinde aangeduid. Uiteinde der dekschilden meer of min bruinachtig en met een al of niet duidelijk geelachtig vlekje. Lengte 4—5 mm. Langs brak water en op ziltige gronden verbreid. . . . 51. *iricolor* Bedel.

Derde tot tiende sprietlid niet meer dan twee-en-een-hallmaal langer dan breed. Bovenzijde bruin- of zwartachtig-bronskleurig, met eene min of meer duidelijke, roodachtige vlek voor het uiteinde der dekschilden. De binnenste stippelrijen verdwijnen naar het uiteinde; aan de basis is de bestippeling grover dan bij *iricolor*. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Verbreid en niet zeldzaam. . . . (*riparium* Oliv., *biguttatum* Gylh., *guttula* Redt.) 52. *lunulatum* Fourer.

16. Ocys Stephens.

Halschild binnen de breed omgebogen achterhoeken zonder langsgroefje, de zijrand naar de achterhoeken zeer breed omzoomd en opgericht. Dekschilden onbehaard, met bestippelde of gladde langsstrepen, of ten minste met eene volkomen naadstreep en eene korte scutellalairstreep; de derde tusschenruimte slechts met ééne achter het midden gelegen haarstip, aan het uiteinde met eene zeer krachtig ontwikkelde, dicht aan den zijrand staande langsplooi. Overigens als bij Bembidium. — De soorten van dit genus hebben in habitus iets met Trechus gemeen. Zij leven vooral achter boomschors en tusschen rottende plantenstoffen.

De beide Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Achterhoeken van het halschild met scherp aangeduiden top. Sprieten, tasters en pooten geheel geelachtig-rood. Bovenzijde van het lichaam rood, de dekschilden veelal langs de randen gebruind. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch overal zeldzaam.
(rufescens Guér.) 1. *harpaloides* Serv.

Achterhoeken van het halschild aan den uitersten top stomp en iets opgericht. Pekzwart of rood-bruin, met donkerder dekschilden; op de bovenzijde of ten minste op de dekschilden met blauw- of groenachtigen weerschiin. Dekschilden iets langer en met veel sterkere stippellijnen dan bij *harpaloides*. Sprieten, tasters, behalve het gewoonlijk donkere voorlaatste kaak-rasterlid, en de pooten roodgeel. Lengte 4—5 mm. Op sommige plaatsen niet zeldzaam, veelal vliegende of achter de schors van populieren en platanen.
(pumilio Dfts.) 2. *quinguestriatus* Gyll.

Limnaeum Stephens.

Onderscheiden van Bembidium door den Trechus-achtigen habitus, den grooten, dikken kop en de zeer weinig uitpuilende oogen. Het vierde voortarsen-lid van onderen met een gekromden doorn; middel- en achterschenen iets gebogen. Van Cilleus onderscheiden door de veel langere, slankere sprieten, den naar achteren iets versmalden kop, de veel kortere voorkaken, de aanwezigheid van slechts twee haarstippen in de derde tusschenruimte der dekschilden en door het voorhanden zijn van een doorn aan de onderzijde van het vierde voortarsen-lid. — De soorten van dit genus leven langs de zeekust.

Van de twee Europeesche soorten zou één op Norderney voorkomen, doch is nog niet in Nederland waargenomen.

Habitus van een slanken Trechus, met grooten dikken kop. Pekzwart, meestal met groen-achtigen weerschiin. Sprieten en pooten geheel roodachtig. Ongevlengeld. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm.
(nigropiceum Marsh.)

17. Cilleus Samouelle.

Kop groot en dik, naar achteren niet versmald. Voorkaken lang, ter uitstekend. Sprieten kort, eenigszins parelsnoervormig. Dekschilden gestrekt, kaal, tot aan het uiteinde met diep gegroefde langslijnen, de derde tusschenruimte met 4 diepe haarstippen. Eerste voortarsen-lid aan het uiteinde met een doortje aan de buitenzijde, het vierde voortarsen-lid van onderen zonder gekromden doorn. Bij het ♂ zijn de eerste twee voortarsen-leedjes aan de onderzijde met papillen bezet.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze heeft een metallisch-groenen of bronskleurigen kop en halsschild, gele, soms eenigszins groenachtig glanzig dekschilden en gele sprieten en pooten. Op zeekei, onder steenen en kleikluiten zeldzaam. Op het Duitsche Noordzee-eiland Juist gemeen. De larve is door *Fairmaire* beschreven. 1. *lateralis* Sam.

18. Tachys Stephens.

Bovenzijde van het lichaam onbehaard. Dekschilden zonder scutellairstreep, het omgebogen uiteinde der naadstreep (de zoogen. apicaal-streep) loopt door tot in of tot iets buiten het midden van het uiteinde der dekschilden en divergeert met de naar achteren verdiepte sub-marginale (achtste) streep. Buitenrand der voorschenen naar het uiteinde scheef afgeknot of uitgerand en in een kleinen, van een doortje voorzien hoek verbreed. — Kleine aan Bembidium naverwante kevertjes. Bij de mannetjes zijn gewoonlijk de twee eerste leedjes der voortarsen verbreed; bij enkele soorten zijn deze in beide seksen gelijk. — De meeste soorten leven langs oevers.

Van de 20 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Voorhoofds-groeven oppervlakkig, aan de buitenzijde niet plooivormig begrensd. Basis van het halsschild aan weerszijden naar de achterhoeken scheef afgesneden, de achterhoeken sluiten daardoor niet volkomen tegen de basis der dekschilden aan. Lichaam vlak. Voortarsen bij het ♂ met twee verbrede leedjes. (Sub-gen. *Tachys* isp.) 2

Voorhoofds-groeven diep, aan de buitenzijde door eene duidelijke langsplooi begrensd. Basis van het halsschild recht of nagenoeg recht, waardoor de rechte achterhoeken tegen de basis der dekschilden volkomen aansluiten. Lichaam meer of minder gewelfd. Voortarsen bij het ♂ niet verbreed. (Sub-gen. *Tachyura* Motsch.) 4

- 2 Apicaal-streep der dekschilden aan het vooreinde hakig teruggekromd. Kop en halsschild bruin of zwart, de dekschilden bleekgeel, eene groote, gemeenschappelijke, driehoekige vlek aan het schildje zwartachtig en eene onduidelijk begrensde, soms met de scutellairvlek verbonden of ook wel uitgewischte vlek achter het midden, bruinachtig. Sprietwortel en pooten bleekgeel. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Langs de Zeeuwsche stroomen op zeekei . . . 3. *scutellaris* Steph.

Apicaal-streep der dekschilden aan het vooreinde hoogstens zwak tegen den naad gekromd. . . 3

- 3 Achterhoeken van het halsschild stomp. Lichter of donkerder pekbruin, halsschild en dekschilden soms roodgeel (ab.c. *rufulus* Rey.). Sprietwortel, tasters en pooten bleekgeel. Sprieten vrij kort, de middelste leedjes ongeveer dubbel zoo lang als breed. Donkere, iets grootere en langere exemplaren vormen de var. **elongatulus* Dej. Lengte 2 mm. Bij Middelburg, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Maastricht. De ab.c. *rufulus* bij Zierikzee.

1. *bistriatus* Dfts.

Achterhoeken van het halsschild scherp rechthoekig. Deze soort lijkt zeer op *bistriatus* en is onderscheiden door de roodachtige of bruingele kleur, welke slechts op het voorhoofd of ook aan den naad der dekschilden bruinachtig is. De middelste sprietleedjes zijn veel korter en de zijden van het halsschild voor de achterhoeken sterker uitgebogen. De var. *luridus* Rey heeft iets minder korte sprietleedjes en aan de zijden iets meer afgeronde, geheel bleekgele dekschilden. Lengte 2 mm. Bij Arnhem en Maastricht. De var. *luridus* bij Amsterdam. Ook in de Belgische prov. Henegouwen. (*nigrifrons* Fauv.) 2. *gregarius* Chaud.

- 4 Zijrand van het halsschild tot aan de achterhoeken zeer smal omzoomd 5

Zijrand van het halsschild van achteren breed omzoomd en breed opgericht. Lichaam eenkleurig roodgeel, met lichtere sprieten en pooten. Dekschilden breed ovaal, met sterk bestippelde binnenste strepen. Lengte 3 mm. Uiterst zeldzaam, onder stukken hout langs oevers; ook wel vliegende. Arnhem, Rotterdam, Capelle a/d. IJssel. In België bij Luik.

(Fockii Hummel) 5. *bisulcatus* Nicol.

- 5 Lichaam lang gestrekt, glanzig zwart, soms bruin. Dekschilden met 4 of 5 onduidelijk bestippelde, ver doorlopende strepen. De sub-marginaalstreep ook in het midden diep. Pooten geheel geelrood. Lengte 2 mm. Zeldzaam. Warnsveld en langs de Maas bij Maastricht. Ook in de Belgische prov. Namen en Henegouwen 4. *parvulus* Dej.

Lichaam korter ovaal. De sub-marginaalstreep in 't midden zeer lijn of niet aangeduid. Dijkwortel gewoonlijk gebruind. 6

- 6 Glanzig zwart, veels met groenachtigen weerschijn. Dekschilden met eene geelachtige schouder-vlek en eene, soms uitgewischte, gele vlek voor het uiteinde en met vier vrij sterk bestippelde, ver naar de basis reikende en naar het uiteinde verdwijnende strepen. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm.

Niet inlandsch. In België en in de Rijnprov. bij Aken. Ik zag verscheidene exemplaren uit de valleien van de Ourthe en de Vesdre. (quadrisignatus Dfts.)
 Bovenzijde eenkleurig zwart 1), met min of meer groenachtigen weerschijn. Dekschilden behalve de naadstreep slechts met twee diepe, naar voren en naar achteren sterk verkorte strepen. Eene vierde streep is soms iets aangeduid. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch. Zou in België in de valleien van de Ourthe en de Vesdre aangetroffen zijn. (sexstriatus Dfts.)

19. Tachyta Kirby.

Sprieten kort en dik, eenigszins parelsnoervormig. Dekschilden zonder scutellair-streep, het omgebogen uiteinde der naadstreep is van de naar achteren verdiepte submarginale (achtste) streep slechts door eene smalle, plooivormige tusschenruimte gescheiden en verloopt daaraan nagenoeg evenwijdig. Buitenrand der voorschenen naar het uiteinde scheef afgeknot of uitgerand. Bij het ♂ zijn twee leedjes der voortarsen verbreed.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart, op de bovenzijde uiterst fijn gechagrineerd en weinig glanzig. Sprietwortel, uiteinde der dijen, de schenen en tarsen bruinrood. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Leeft achter boomschors, in de gangen van Bostrychiden. Een paar maal in Rotterdam o. a. op dennebrandhouw. Ook in België in de prov. Luik. Larve en pop zijn door Perris beschreven. 1. *nana* Gyll.

X. Tribus TRECHINI.

Aëpus Samouelle.

Kop groot, even breed als het hartvormige halsschild, met twee diepe voorhoofds-groeven. Oogen klein en vlak. De slapen lang. Bovenlip diep uitgerand. Kin-uitranding met een vrij langen middentand. Voorlaatste tasterlid iets langer en veel dikker dan het eindlid. Dekschilden even lang als kop en halsschild te zamen, vlak, met tamelijk parallelle zijden, elk afzonderlijk aan het uiteinde afgerond, het achterlijf niet geheel bedekkend. Lichaam fijn verspreid behaard, ongeteugeld. Achterdijen aan de binnenzijde behaard. Bij het ♂ zijn twee leedjes der voortarsen zwak verbreed, het vierde lid met een langen, gekromden doorn aan het uiteinde. — De soorten van dit genus zijn zeer kleine, ongeveer 2 mm. lange, bleekgele kevertjes, welke langs de zee-kusten diep onder groote steenen, in aantal bijeen, leven.

Van de twee bekende Europeesche soorten, zou Aëpus marinus Ström, ook langs de Belgische (†) kust aangetroffen zijn. Mogelijk komt deze, alsmede de tweede soort, ook bij ons voor. — De larve van A. Robinii is door Coquerel en Laboulbène beschreven.

Halsschild vlak, met eene diepe middellijn. Dekschilden lang, met parallelle zijden, op het midden met eene rij kleine stippels, waarin zeer korte haren. Langs de Deensche en Engelsche kust (marinus Ström).

Halsschild gewelfd, zonder duidelijke middellijn. Dekschilden vrij kort, naar het uiteinde iets verbreed, op het midden met 2 of 3 groote stippen, waarin lange haren. Langs de Noord-Fransche kust (Robinii Laboulbène).

20. Blemus Laporte de Cast.

(Perileptus Schaum).

Eindlid der kaaktasters zeer dun, priemvormig, veel smaller en korter dan het verdikte voorlaatste lid. Kintand gewoon. Oogen behaard. De dekschilden bedekken het geheele achterlijf, zijn veel langer dan kop en halsschild te zamen en aan het uiteinde te zamen afgerond; de naadstreep is aan het uiteinde niet naar voren omgebogen. Voorlaatste lid der voortarsen op de onderzijde met een gekromden doorn. Bij het ♂ zijn de eerste twee leedjes der middeltarsen verbreed. — Dit genus vormt den overgang tusschen de Bembidiini en de Trechini.

De enige Europeesche soort werd ook in Nederland waargenomen.

1) In Zuid- en Oost-Europa komen geel gevlekte variëteiten voor.

Zeer plat, fijn behaard, donker bruin, Sprietwortel, pooten en eene groote, min of meer samenhangende vlek over de dekschilden rood. Halsschild hartvormig met spitse achterhoeken. Lengte 2—2½ mm. Leeft langs stroomend water, tusschen kiezelsteentjes rondlopend en van tijd tot tijd opvliegend. Roosteren (Limburg) langs de Maas. Ook in België in de valleien van de Ourthe en de Vesdre, in het oeverzand van beekjes. 1. *areolatus* Creutz.

Thalassophilus Wollaston.

Eindlid der kaaktasters aan de basis nagenoeg zoo breed als het uiteinde van het voorlaatste lid en van dit weinig in lengte verschillend. De dekschilden bedekken het geheele achterlijf, zijn aan het uiteinde te zamen afgerond en veel langer dan kop en halsschild te zamen; de basis tot aan het schildje gerand; de naadstreep is aan het uiteinde naar voren omgebogen en met de derde streep verbonden. Vierde lid der voertarsen aan de onderzijde zonder doorn. Bovenzijde van het lichaam kaal.

Van dit genus komt ééne soort in Europa voor, welke nog niet in Nederland is aangetroffen.

Gevleugeld. Halsschild en dekschilden roodachtig-geelbruin. Kop donkerder, sprieten en pooten lichter gekleurd. Sprieten zeer lang. Halsschild met bijna rechte achterhoeken. Dekschilden smal, met parallele zijden, diep gestreept en aan de basis met een doorlopenden scherpen rand. Lengte 3½—4 mm. Langs rivieren en bergbecken. In België, in de Rijnprov. en in Westfalen. Ik zag exemplaren uit de prov. Luik (Pétinne en Herstal) en uit Düsseldorf.

(*longicornis* St.)

21. Trechus Clairville.

Kop in den regel met lange, van achteren naar buiten gekromde en de slapen omsluitende voorhoofdsgroeven. Bovenlip vrij kort, meer of minder diep uitgerand, soms eenigszins tweelobbig. Voorkaken van binnen aan de basis met een krachtig, meestal in 2 of 3 tanden verdeeld uitsteeksel. Eindlid der kaaktasters toegespitst, aan de basis nagenoeg zoo breed als het uiteinde van het voorlaatste lid en van dit weinig in lengte verschillend. Eindlid der lipstasters nagenoeg gelijk aan dat der kaaktasters. Kin diep uitgesneden, de middentand gespleten of door een langsindruk gedeeld. Paraglossen vrij, zeer lang en smal, iets gebogen, aan den binnenrand dicht bezwimpeld, de tong ver overschrijdend. Halsschild hartvormig of verbreed, aan de basis recht afgeknot of aan weerszijden iets scheef afgesneden. De dekschilden bedekken het geheele achterlijf, zijn veel langer dan kop en halsschild te zamen en zijn aan het uiteinde te zamen afgerond; de basis is hoogstens tot aan den wortel der derde stippellijn gerand; de naadstreep is aan het uiteinde naar voren omgebogen. Vierde lid der voertarsen aan de onderzijde zonder doorn. Bij het ♂ zijn de eerste twee voertarsen-ledjes verbreed en op de onderzijde zellig beschubd. — De soorten van dit genus zijn kleine zwart, rood- of geelachtig gekleurde kevertjes, die uiterst snel in hunne bewegingen zijn en op vochtige plaatsen leven.

Van de 109 Europeesche soorten 1) komen 4 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Lichaam minstens gedeeltelijk behaard 2
- Lichaam onbehaard (Sub-gen. *Trechus* i.sp.) 3

- 2 De geheele bovenzijde behaard. Het omgebogen uiteinde der naadstreep met de derde streep verbonden (Sub-gen. *Trechoblemus* Ganglb.). Bruinachtig of roodgeel, de schedel en een onduidelijke veeg op de achterhelft van elk der dekschilden, gewoonlijk donkerder bruinachtig, deze met zeer zwakke strepen. Gevleugeld. Lengte 4—5 mm. Op sommige plaatsen niet zeldzaam onder steenen 1. *micros* Hrbst.

Slechts de dekschilden behaard. Het omgebogen uiteinde der naadstreep verloopt in de richting der vijfde streep naar voren (Sub-gen. *Lasiotrechus* Ganglb.). Geelrood, voorhoofd bruinachtig; de dekschilden met een zwarten, gewoonlijk blauwachtig glanzigen dwarsband achter het midden, met sterke stippellijnen. Gevleugeld. Lengte 4½—5½ mm. Over het algemeen zeldzaam, langs oevers, onder steenen en in aanspoelsel 2. *discus* F.

1) De vele soorten van het subgenus *Anophthalmus* Schmidt met medegerekend

- 3 Tweede streep der dekschilden tot aan het uiteinde volkomen recht verloopend. De derde tusschenruimte ver van het uiteinde, ongeveer in het $\frac{2}{3}$ der lengte van de dekschilden met eene haarstip. Lichter of donkerder roodbruin, de dekschilden tot op den zijrand na pekszwart met blauwachtigen weerschijs, behalve den naar achteren iets verheven naad met 3 zeer diepe, zwak bestippelde strepen, de vierde is slechts zwak aangeduid. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. Eene zeer zeldzame soort, welke in Duitschland en Engeland voorkomt. Ik zag een exemplaar uit Finland (rivularis Gyll.) 1)

Tweede streep der dekschilden voor het uiteinde meer of minder naar buiten gebogen. De derde tusschenruimte nabij het uiteinde, aan de kromming der tweede streep, met eene diepe haarstip 4

- 4 Basis van het halsschild aan weerszijden scheef afgeknot. Achterhoeken van het halsschild stomp, doch de top steekt als een zeer kleine hoek uit. De buitenste strepen der dekschilden ontbreken. Bovenzijde lichter of donkerder roodbruin, soms met uiterst geringen blauwachtigen weerschijs, de kop pekszwart of pekbruin. Bij het type zijn de vliegels goed ontwikkeld. Bij de var. *obtusius* Er. zijn de vliegels rudimentair of ontbreken geheel, de achterhoeken van het halsschild zijn stomper en de dekschilden zwakker gestreept; ook zijn zij meer ovaal. Type en variëteit gaan overigens in elkaar over. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Overal zeer gemeen (minutus F., rubens Dej.) 3. **quadristriatus** Schrk.

Basis van het halsschild nagenoeg recht afgeknot. Achterhoeken van het halsschild scherp rechtehoekig of spits. Gevleugeld. Lichter of donkerder roodbruin, de dekschilden gewoonlijk lichter rood, veelal met eenigen blauwachtigen weerschijs. Dekschilden lang gesrekt, met tamelijk parallele zijden en met goed ontwikkelde stippellijnen; de achtste streep naar voren duidelijk ontwikkeld. Lengte 5— $5\frac{1}{2}$ mm. Op vochtige plaatsen onder steenen. Zeldzaam. Bij Rotterdam, Münster, Nootdorp, Driehuizen bij Velzen en Amerongen.

(paludosus St.) 4. **rubens** F.

22. Epaphius Leach.

Findlid der kaaktasters aan de basis nagenoeg zoo breed als het uiteinde van het voorlaatste lid en daarvan weinig in lengte verschillend. Kinland gewoon, kort, afgerond. Halsschild breed-schijfvormig, sterk gewelfd, aan weerszijden van de basis sterk uitgerand, met breed afgeronde achterhoeken. De dekschilden bedekken het geheele achterlijf, zijn veel langer dan kop en halsschild te zamen en aan het uiteinde te zamen afgerond, de basis is hoogstens tot aan den wortel der derde stippellijn gerand; de naadstreep is aan het uiteinde naar voren omgebogen. Het vierde lid der voortarsen aan de onderzijde zonder doorn.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichter of donkerder roodbruin. Halsschild naar achteren sterk versmald, met nagenoeg afgeronde achterhoeken. Dekschilden ovaal, gewelfd, met 4 grove stippellijnen, de overige nog lier en daar flauw aangeduid. Ongevlengeld. Lengte 3—4 mm. Op enkele plaatsen in Gelderland, in aantal onder vochtige bladeren, in uitgedroogde slooten en greppels. 1. **secalis** Payk.

XI. Tribus POGONINI.

23. Pogonus Dejean.

Kop van achteren niet of slechts zeer weinig ingesnoerd. Voorkaken tamelijk klein. Findlid der kaaktasters min of meer toegespitst, het voorlaatste kaaktaster-lid naar het uiteinde met eenige borstelharen bezet. Kinland tweepuntig, korter dan of even lang als de zijlobben van de kin. Tong aan het uiteinde afgeknot, met vooruitstekende zijhoeken. Dekschilden tamelijk gestrekt, en met nagenoeg parallele zijden, aan de basis tot aan het schildje gerand. Tarsen op de bovenzijde gegroefd. Van de beide verbrede en aan de onderzijde zellig behaarde voortarsen-leedjes bij het ♂, is het eerste veel grooter dan het tweede; bij het ♀ is het laatste sterniet van 4 haarstippen voorzien, van welke de twee middelste gescheiden zijn door een oppervlaktkigen indruk. — De soorten van dit genus herinneren in habitus aan Bembidium. Zij leven op ziltigen

1) Ik betwijfel zeer het voorkomen van *E. palpalis* Dej. in Westfalen.

bodem, vooral op zeeklei. — Over de larve van de niet in ons gebied voorkomende P. iridipennis Nicol. deelt Zimmermann iets mede.

Van de 20 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Kop en halsschild bronzig-groen; de dekschilden, sprieten en pooten geelachtig; de dekschilden slechts met zwakken, groenachtigen weerschijn. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen op de Zeeuwsche schorren onder steenen, kleikluiten en tusschen grassen. 1. **luridipennis** Germ.
Geheele bovenzijde van het lichaam bronskleurig, zeldzamer blauwachtig. Sprieten donker gekleurd. 2
- 2 Dekschilden driemaal zoo lang als het halsschild, met parallele zijden, met naar de zijden en naar het uiteinde even duidelijk aangeduide stippellijnen. De basis van het halsschild in het midden meer of minder langsrimpelig. Middelste sprietleedjes tweemaal zoo lang als breed. Pooten bruinrood, de dijen gewoonlijk bronzig, soms geheel donker bronskleurig. Lengte $7\frac{1}{2}$ mm. Uitsluitend in Zeeland gevangen. 2 **litoralis** Dfss.
Dekschilden $2\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, min of meer ovaal, met naar de zijden en naar het uiteinde zwakkere stippellijnen. Middelste sprietleedjes driemaal zoo lang als breed. Deze soort gelijkt overigens op litoralis. Fraai blauwe exemplaren vormen de ab.c. *cyaneus* Verhoeff. Lengte $5\frac{1}{2}$ —7 mm. Gemeen op zeeklei, onder steenen en tusschen plantwortels. (halophilus Nic.) 3. **chalcus** Mrsh.

24. Patrobus Dejean.

Kop van achteren sterk ingesnoerd, met diepe naar achteren verlengde voorhoofds-groeven. Bovenlip van voren recht afgeknot. Voorkaken matig lang. Eindlid der kaaktasters aan het uiteinde afgestompt of afgeknot en iets langer, dat der lip-tasters nauwelijks langer dan het voorlaatste lid, hetwelk onbehaard is. Kintand korter dan de zijlobben van de kin, aan het uiteinde in tweeën gedeeld. Tong aan het uiteinde afgerond. Dekschilden aan de basis niet gerand. Tarsen op de bovenzijde niet gegroefd. Bij het ♂ zijn de twee eerste tarsleedjes verbreed.

Van de 5 Europeesche soorten komt een in Nederland voor.

Glanzig pekschwart, soms roodbruin (onuitgekleurd), ongevleugeld. Sprieten, tasters en pooten rood. Lengte $7\frac{1}{2}$ —8 $\frac{1}{2}$ mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam onder steenen, langs oevers en op vochtige plaatsen onder bladeren, vooral in uitgedroogde slooten en greppels. Larve en pop zijn door Schödtte beschreven. 1. **excavatus** Payk.

XII. Tribus PTEROSTICHINI.

25. Laemostenus Bonelli.

Derde spriettlid even lang als of iets langer dan het vierde lid. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. Voortzetting van het prosternum naar achteren in eene scherpe, naar het mesosternum afvallende kiel samengedrukt. Tarsen op de bovenzijde behaard. Middel- en achtertarsen van buiten niet gegroefd. Klauwen aan de basis veelal getand, bij onze inlandsche soort zwak getand. Overigens als bij Sphodrus.

Van de ± 50 Europeesche soorten komt een van het sub-gen. Pristonychus Dej. in Nederland voor.

Zwart, met donkerblauwe, weinig glanzige dekschilden en rudimentaire vleugels. Middelsche-nen bij het ♂ zeer duidelijk, bij het ♀ zwakker gekromd. Lengte 13—17 mm. Niet zeldzaam in huizen, vooral in kelders, stallen en pakhuizen. Ook in grotten van den mergelsteen om Maastricht. De larve is door Chapuis en Candèze beschreven. (subcyaneus Ill., inaequalis Panz.) 1. **terricola** Hbst.

26. Sphodrus Clairville.

Bovenlip van voren afgeknot of zwak uitgebogen. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. Eindlid der tasters aan het uiteinde afgeknot, het eindlid der kaaktasters in den regel veel korter dan het voorlaatste. Kin met een gespleten middentand. Zijlobben van de kin met tandvormig uitstekende binnenhoeken.

Tong van voren afgeknot. Paraglossen door eene diepe uitranding van de tong gescheiden en deze overschrijdend. Voortzetting van het prosternum naar achteren in eene scherpe, naar het mesosternum afvallende kiel samengedrukt. Tarsen op de bovenzijde kaal en glad. Middel- en achtertarsen van buiten slechts matig diep gegroefd. Klauwen gewoon. Bij het ♂ zijn de 3 eerste leedjes aan de voortarsen matig verbreed en op de onderzijde in twee langsrijen zolig beschubd.

Van de 7 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Dofzwart; gevleugeld. Bij het ♂ zijn de trochanters der achterpooten lang toegespitst, bij het ♀ aan den top gewoon spits. Lengte 20-24 mm. In kelders van groote gebouwen, in bakkerijen en in holen der bergstreken. Zij schijnt in Nederland zeldzaam te zijn, doch komt in België op vele plaatsen voor. Ik zag inlandse exemplaren uit Den Haag, Vorden en Roermond. De larve is door von Gernot beschreven. (planus F.) 1. *leucophthalmus* L.

27. Calathus Bonelli.

Bovenlip recht afgeknot of iets uitgerand. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. Kintand in den regel uitgerand en tweepuntig, zelden gewoon. Tong van voren zwak afgerond of afgeknot, de paraglossen van deze slechts door eene uitranding aan den top gescheiden en deze in den regel slechts weinig overschrijdend. Tasters lang, de eindleedjes staafvormig en aan het uiteinde breed afgeknot of naar het uiteinde iets versmald en minder afgeknot. Achterrand der dekschilden gewoon. Voortzetting van het prosternum aan de zijden en aan het uiteinde gerand, achter de voorcoxae tot eene loodrechte tegen het mesosternum afvallende kiel samengedrukt. Eerste lid der middel- en achtertarsen aan den buitenkant met twee diepe langsgroeven. Tarsen op de bovenzijde onbehaard. Klauwen krachtig getand of kamvormig gezaagd. Bij het ♂ zijn de drie eerste leedjes der voortarsen driehoekig of hartvormig verbreed en op de onderzijde in eene dubbele rij zolig beschubd, zelden zijn de voortarsen in beide seksen gewoon (*C. piceus* Marsh.). — De soorten van dit genus zijn op de bovenzijde vlakgedrukt, gewoonlijk zwart- of bruinachtig, of wel het halsschild is roodachtig. Van de meesten komen gevleugelde en ongevleugelde exemplaren voor. Zij leven onder steenen, mos enz. en loopen zeer snel. — De larve van *C. luctuosus* is door Laboulbène beschreven.

Van de 32 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 Schouderhoek der dekschilden op gelijke hoogte als de scutellairhoek gelegen. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsenleedjes verbreed en van onderen geschubd (*Calathus* l. sp.). Achterhoeken van het halsschild duidelijk aangeduid, hetzij scherp of stomp afgerond. 2

Schouderhoek der dekschilden meer naar voren gericht en daardoor niet op gelijke hoogte als de scutellairhoek gelegen. Tarsen in beide seksen gewoon (Sub-gen. *Amphigynus* Haliday). Achterhoeken van het halsschild breed afgerond. Pekbruin, de zijranden van het halsschild roodbruin doorschijnend. Sprieten, tasters en pooten bruinrood, de dijen veelal pekbruin. Ongevleugeld. De derde tussenruimte op de dekschilden met 4-5 stippen. Lengte 8½-10 mm. Niet zeldzaam in bosschen onder mos en dorre bladeren.

(rotundicollis Dej.) 7. *piceus* Marsh.

2 Dekschilden met eene rij groote stippen op de derde en vijfde tussenruimte. Lichaam zwart, bij het ♀ dof, de pooten bruin- of geelrood, soms ook zwartachtig (*ab. c. frigidus* F.) Achterdijen aan den binnenrand met 4 of 5 haarstippels. Sprieten roodachtig, voorbij de basis meer of minder gebruid. Eenigszins veranderlijk in vorm, in bestippeling en kleur. Ongevleugeld. Lengte 10-14 mm. Zeer gemeen, vooral op zonnige plaatsen op velden en in de duinen, onder steenen en aardkluiten. (*cisteloides* Panz.) 1. *fuscipes* Goeze.

Dekschilden zonder eene rij stippen op de vijfde tussenruimte, alleen op de derde tussenruimte of derde streep is eene rij stippen aanwezig. 3

3 De stippelrij op de derde streep is gevormd uit een 10-15tal lijne ingestoken stippen. Sprieten bruinachtig, met roodachtig eerste lid. Episternen van den metathorax zeer kort, breeder dan lang, trapeziumvormig. Achterdijen met 4 haarstippels aan den binnenrand. Zwart, veelal met zwakken, groenachtigen weerschijn, dekschilden bij het ♀ dof, tasters en pooten pekzwart of donkerbruin. Lengte 10-13 mm. Niet inlandsch. Deze soort, welke in den Elzas

- voorkomt, zou wellicht in de Belgische Ardennen tot in Nederlandsch Limburg kunnen gevonden worden (gallicus Fairm. et Lab.) (luctuosus Latr.)
- Derde tusschenruimte met 2 of 3 stippen. Spriet en pooten roodachtig. Achterdijnen aan den binnenrand met 2, zeldzamer met 3 haartippels. 4
- 4 Eerste lid der achtertarsen op den binnenrand met eene duidelijke langsgroef. Basaalrand der dekschilden zeer weinig gebogen. Episternen van den metathorax naar achteren wat meer uitgetrokken dan bij *erratus*. Halsschild nagenoeg alleen naar voren versmald. Breder en meer gewelfd dan *erratus*, de bovenzijde pekkruin, de zijranden en gewoonlijk ook de voor- en achterrand van het halsschild roodbruin doorschijnend. Spriet en tasters en pooten licht bruin-geel. Gevleugeld of met rudimentaire vleugels. Lengte 8½—11½ mm. Vrij gemeen onder steenen (ambiguus Payk. ex parte) 3. **fuscus** F.
- Achtertarsen op den binnenrand zonder langsgroef. Basaalrand der dekschilden duidelijk gebogen. 5
- 5 Top der achterhoeken van het halsschild scherp aangeduid; de zijden van het halsschild naar achteren iets versmald. Episternen van den metathorax vrij kort. Dekschilden bij het ♂ glanzig met groenachtigen weerschijn, bij het ♀ dof. Spriet en tasters en pooten geelrood. Onge- vleugeld 1). Lengte 8½—11 mm. Zeer gemeen onder steenen. (crocopus Steph., fulvipes Gylh., flavipes Dfts.) 2. **erratus** Sahlb. 2)
- Top der achterhoeken stomp en afgerond. Lengte 5—8 mm. 6
- 6 Episternen van den metathorax naar achteren verlengd, veel langer dan aan den voorrand breed. Lichaam meer gestrekt, smaller en vlakker dan bij *melanocephalus*. Kop evenals het halsschild en de dekschilden rood- of pekkruin. Gevleugeld, zeldzamer ongevlugeld. Lengte 6—9 mm. Gemeen in droge zandstreken onder steenen . (ochropterus Dfts.) 4. **mollis** Mrsh.
- Episternen van den metathorax vrij kort, niet of slechts weinig langer dan aan den voorrand breed. Kop zwart. 7
- 7 Halsschild niet naar achteren versmald, nagenoeg even breed als de dekschilden aan de schou- ders. Dekschilden zwart, soms met zwakken, groenachtigen weerschijn, bij het ♂ glanzig, bij het ♀ dof. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de dekschilden bruinrood. Basaalrand der dekschilden weinig gebogen. Halsschild geelrood, zelden op het midden of geheel bruin-achtig (abc. *parisiensis* Gautier des Cottes, bij Arnhem). Zelden gevleugeld. Lengte 6—8 mm. Zeer gemeen onder steenen, vooral op zandgrond. 5. **melanocephalus**. 3)
- Halsschild naar achteren duidelijk versmald, aan de basis daardoor minder breed dan de dek- schilden aan de schouders. Basaalrand der dekschilden duidelijk gebogen. Bovenzijde van het lichaam pekkruin, de randen van het halsschild roodachtig. Spriet en tasters en pooten roodgeel. Ongevlugeld. Op het Duitse Noordzee-eiland Langeroog zou eene 6½ mm. lange var. of abc. **maritimus* Schilsky voorkomen, bij welke het halsschild meer of minder een- kleurig bruinrood is, zoo ook meestal het sternum. Dekschilden bruinachtig, met gewoonlijk lichter zijrand en naad. Onder dorre bremstruiken, gemeen aan de Waddenzijde. Lengte 7—8 mm. Verbreid in de heidestreken onder plaggen, doch over het algemeen vrij zeldzaam. 6. **micropterus** Dfts.

28. Dolichus Bonelli.

Kintand gewoon. Eindlid der tasters naar het uiteinde niet versmald, aan het uiteinde breed afgeknut; het voorlaatste lid der tasters merkbaar langer dan het laatste. Van Calathus vooral onderscheiden door den vorm der verbrede voortarsen bij het ♂. Het eerste voortarsen-lid bij het ♂ is lang en smal driehoekig, het tweede en derde lid smal rechthoekig en aan het uiteinde iets scheef afgeknut. De onderzijde der 3 verbrede ledjes is met twee langrijen van schubjes en aan weerszijden met eene langrij van lange krachtige borstelharen aan den rand bezet.

Dit genus bevat slechts eene enkele Europeesche soort, welke ook in Nederland eene enkele maal op korenvelden onder steenen en aardkluiten gevangen is.

Bovenzijde van het lichaam pekkruin, de zijrand van het halsschild roodgeel. Dek- schilden eenkleurig zwart, meestal met eene groote, smalle, driehoekige, naar achteren gerichte, gemeenschappelijke roodgele basaalvlek (var. *maculatus* Letzner, *triangulatus* Schilsky). Voorhoofd veelal met twee bruinroode vlekken. Spriet en tasters en pooten geel. Lengte 13—17 mm. Ik zag slechts twee inlandse exemplaren van de var. *maculatus* uit Ede en Nijmegen (flavicornis F.) 1. **halensis** Schall.

1) Er schijnen ook gevleugelde exemplaren voor te komen.

2) *C. fuscus* en *erratus* schijnen hier en daar bastaardvormen voort te brengen, welke ongevlugeld zijn. Verhooff doet daarentrent interessante mededeelingen van het eiland Norderney.

3) De uit België (Cahnpouth en Hermeton) opgegeven exemplaren van de var. *alpinus* Dej., welke variëteit in de Alpen voorkomt, behooren tot de abc. *parisiensis*.

29. *Synuchus* Gyllh.

(Taphria Dej.)

Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. Eindlid der liptasters eenigszins bijtormig; kinland gespleten. Voortzetting van het prosternum aan het uiteinde niet gerand, in eene scherpe naar het mesosternum afvallende kiel samengedrukt. Middel- en achtertarsen aan den buitenrand slechts zwak gegroefd. Tarsen op de bovenzijde kaal. Klauwen kamvormig gesaagd. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-ledjes verbreed.

Dit genus bevat slechts ééne Europeesche soort, welke ook in Nederland voorkomt.

Glanzig zwart of pekbruin, de zijranden van het halsschild gewoonlijk roodachtig. Onderzijde lichter roodbruin. Sprietten, tasters en pooten geelrood. Lengte 6—8 mm. Niet zeldzaam op vochtige plaatsen onder steenen, mos en dorre bladeren . . . (vivalis Hlig.) 1. *nivalis* Panz.

30. *Olisthopus* Dejean.

Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. Eindledjes der tasters spoetvormig, toegespitst. Kin-uitranding zonder tand of deze is slechts door een zwak, hoekig uitsteeksel aangeduid. Voortzetting van het prosternum van achteren stomp. Dekschilden ovaal. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-ledjes vrij sterk verbreed; het laatste sterniet is afgerond en van twee ter van elkaar staande haarstippen voorzien; bij het ♀ is het laatste sterniet iets afgeknot en van 4 op bijna gelijken afstand staande haarstippen voorzien.

Van de 6 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het omliggend gebied voor.

Bovenzijde eenigszins gewelfd. Halsschild met een lijnen scherpkantigen randzoom. Dekschilden voor het uiteinde niet uitgerand. Donkerbruin, met bronzen weerschijn op de bovenzijde. Eerste spriethlid, de tasters en pooten roodgeel. Dekschilden ovaal, met gladde strepen. De derde tusschenruimte met 3 stippen. Lengte 5 mm. Niet inlandsch. In Westfalen. (Sturmii Dits.)

Bovenzijde weinig gewelfd. Halsschild met naar achteren breeder omgebogen zijrand. Dekschilden voor het uiteinde uitgerand. Pekbruin, de bovenzijde, vooral der dekschilden met bronzen weerschijn, de epipleuren der dekschilden, niet zelden de geheele onderzijde roodbruin, de basis der naar het uiteinde meer bruinachtige sprietten, de tasters en de pooten bleek roodgeel. Dekschilden langwerpig-ovaal, met diepe, fijn bestippelde strepen, de derde tusschenruimte met 3 stippen. Lengte 6—7 mm. In bosschen en heiden der diluviale streken onder dorre bladeren, plaggen en steenen, ook in mergelkuilen. Verbreed doch overal tamelijk zeldzaam. Ook op Texel 1. *rotundatus* Payk.

31. *Platynus* Bonelli.

*Bovenlip van voren afgeknot of zwak uitgerand. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. Tasters slank, de eindledjes naar het uiteinde min of meer versmald, aan het uiteinde afgeknot, soms nagenoeg toegespitst. Kin in de uitranding met een geveen, min of meer spitsen tand; de binnenhoek der zijlobben van de kin steekt tandvormig uit. De tong is van voren breed afgeknot. De paraglossen zijn aan het uiteinde vrij, smal en gewoonlijk langer dan de tong. Voortzetting van het prosternum van achteren stomp. Voorschenen slank, naar het uiteinde weinig verbreed. Bij het ♂ zijn de eerste 3 ledjes der voortarsen matig verbreed en op de onderzijde in twee langsrijen zelig beschubd. — De soorten leven op koele of vochtige plaatsen onder steenen, mos, langs oevers, in bosschen onder bladeren enz. — De larven van *P. assimilis*, *marginatus* en *viduus* de var. *moestus*, zijn door Schiodt beschreven.*

Van de 54 Europeesche soorten komen 21 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprietten van af het vierde lid behaard 2
Het derde sprietlid reeds aan het uiteinde in meerdere of mindere mate behaard 18
- 2 Alle tarsen aan de bovenzijde over het midden gegroefd (Sub-gen. *Anchomenus* Bon.). Pekbruin of bruinzwart, bij onuitgekleurde exemplaren roodbruin, het midden van den kop, de zijranden en veelal ook de naad der dekschilden meer of minder roodbruin; de epipleuren der dekschilden rood of geelachtig. Sprietten, tasters en pooten bleekgeel. Dekschilden langwerpig-ovaal, dubbel zoo breed als het halsschild, met gladde strepen. 7—8 mm. Gemeen op vochtige plaatsen onder steenen, langs poelen, duimplassen en rivieren.
(*albipes* F.) 1. **ruficornis** Goeze.
- Tarsen op de bovenzijde over het midden zonder langsgroef 3
- 3 Kop van achteren ingesnoerd, met eene duidelijke dwarsgroef op den schedel 4
Kop achter de oogen niet ingesnoerd (Sub-gen. *Agonum* Bon.) 6
- 4 Lichaam gewelfd. Halsschild lang hartvormig, met een zeer smallen, scherp randzoom. Dekschilden met zeer grof bestippelde strepen (Sub-gen. *Anchus* Lec.). Pekbruin, de dekschilden lichter roodbruin, soms het geheele lichaam geelbruin. Sprietten, tasters en pooten licht roodgeel. Lengte 5—6 mm. In de heidestroken niet zeldzaam in Sphagnum en tusschen dorre bladeren, vooral in uitgedroogde greppels en ook soms achter populierschors en onder aangespoeld riet langs rivieren (*oblongus* F.) 2. **obscurus** Hbst.
- Lichaam vlak. Halsschild met meer of minder breed gegroefde en opgerichte zijranden. Dekschilden in de strepen fijn bestippeld of glad 5
- 5 Achterhoeken van het halsschild scherp (Sub-gen. *Limodromus* Motsch.). Glanzig zwart, de sprietten, tasters en pooten roodachtig-pekbruin, zelden lichter rood. De middellijn van het halsschild bereikt bij enkele exemplaren niet de basis, in den regel wel. Lengte 10—12½ mm. Zeer gemeen op vochtige plaatsen, onder mos, schors, dorre bladeren en aan boomwortels. Een klein exemplaar bij Tiel. Kleine exemplaren uit België (Bois de la Cambre), bij welke het halsschild naar achteren meer versmald is, de zijden breeder omzoomd en de achterhoeken spits en meer opgericht zijn, werden beschreven als var. *Putzeysii* de Borre. Dergelijke kleine exemplaren komen meer voor, doch vormen geene variëteit.
(*angusticollis* F., *juncus* Daws.) 3. **assimilis** Payk. 1)
- Achterhoeken van het halsschild afgerond (Sub-gen. *Batenus* Motsch.). Lichter of donkerder pekbruin, het voorhoofd met twee roodachtige vlekken; onderzijde roodbruin. Sprietten, tasters en pooten roodachtig geelbruin. Lengte 8—10 mm. Langs rivieren en poelen, onder mos en in boomstronken. Blijkenbeek (Limburg), Bergen-*p-Zoom* langs de Schelde en Maarsbergen. Ook in België op vele plaatsen en in de Rijnprov. bij Dusseldorf.
(*memnonius* Ncll.) 4. **livens** Gylli.
- 6 Halsschild voor de stompe achterhoeken iets uitgerand. Dekschilden oppervlakkig gestreept, in de derde tusschenruimte met 3—5 groote ronde groefjes. Bovenzijde zwart, dof brons-glanzig. Lengte 5—5½ mm. Niet inlandsch. Bij Aken, Oldenburg, in Westfalen en ook in België. Ik zag een Belgisch exemplaar uit de coll. Wesmæl. (*quadripunctatus* de Geer).
- Halsschild schijfvormig, voor de stompe of geheel afgeronde achterhoeken niet uitgerand. Dekschilden met scherp aangeduide, lijne of krachtige langsstrepen 7
- 7 Basaalindrukken van het halsschild grof rimpelig bestippeld 8
Basaalindrukken van het halsschild glad of slechts zwak rimpelig bestippeld 11
- 8 Zijrand van het halsschild minstens van achteren tamelijk breed afgezet en omgebogen . . . 9
Zijrand van het halsschild tamelijk smal en ook van achteren slechts smal afgezet en omgebogen. Kop en halsschild in den regel goudkleurig of vuurrood, de dekschilden groen 2). Lengte 8—8½ mm. Op vochtige plaatsen en in uitgedroogde slooten. In Zuid-Limburg en bij Ruurlo gevangen. Ook op vele plaatsen in België en bij Aken.
(*modestus* St.) 7. **viridicupreus** Goeze.
- 9 Halsschild aan de zijden sterk en tamelijk gelijkmatig afgerond, met zeer breed afgeronde achterhoeken 10
- Halsschild aan de zijden minder sterk afgerond en naar achteren eenigszins versmald, met meer stompe en minder sterk afgeronde achterhoeken. Naverwant aan *sexpunctatus*, doch kleiner, met eenkleurige, licht groenachtig-bronzige, koperkleurige, zelden zwartachtig-

1) De naverwante *P. longivenis* Mannh. zou in de omstreken van Hamburg gevonden zijn.

2) Bij het meer in Zuid-Oostelijk Europa (en in Westfalen?) voorkomende ras *austricus* F. is de naad der dekschilden koperkleurig, bij de var. *alutinus* Dej. de geheele bovenzijde koperkleurig-bronsachtig.

groene of bronzig-zwarte bovenzijde. De basaalindrucken van het halsschild zijn breeder, meer oppervlakkig en grover rimpelig bestippeld, op het midden van het halsschild veelal aan weerszijden met een rond groefje. In de derde tussenruimte der dekschilden bevinden zich 3 tot 7 ronde groefjes. Lengte $6\frac{1}{2}$ –7 mm. Niet inlandsch. In België in het kleine subalpine gebied van „les Hautes Fanges”. Ook in Oldenburg onder heideplaggen. Ik zag uitsluitend donkere exemplaren uit de coll. Putzeys en Remy. Bij Calmthout zou een exemplaar gevangen zijn met dof koperroode dekschilden (de Borre); ik zag dit niet. . . . (ericeti Panz.).

- 10 Bovenzijde koperkleurig of bronzig, meestal de kop en gewoonlijk ook het midden van het halsschild en de zijranden der dekschilden metallisch-groen. De dekschilden bij het ♂ glanzig, bij het ♀ mat. Onderzijde en de dijen zwartachtig-groen. Sprieten, tasters, schenen en tarsen zwart. Dekschilden met fijn bestippelde strepen en met 5–7 groote stippen op de derde tussenruimte. Lengte 8–9½ mm. Uiterst zeldzaam. Dieren en Amsterdam. . . . 5. *impressus* Pz.

Kop en halsschild metallisch-groen of goudkleurig (abc. *auratocollis* Westh.), soms rood-koperkleurig gerand (abc. *rubrocinctus* Westh.); de dekschilden vurig goudkleurig-koperrood met groenachtigen zijrand. Zelden is de bovenzijde donker groenachtig, blauwachtig of zwartachtig (abc. *montanus* Heer, bij Roermond), soms de geheele bovenzijde iriserend (bij Roermond). Onderzijde en de dijen donker metallisch-groen. Sprieten, tasters, schenen en tarsen zwart. Dekschilden met duidelijk bestippelde strepen, in de derde tussenruimte gewoonlijk met 6 of 7, zeldzamer met 4, 5 of 8 stippen. Lengte 7–9½ mm. Zeer verbreid en op vele plaatsen vrij gemeen, vooral in uitgedroogde slooten onder bladeren. Ook onder steenen langs weilanden 6. *sexpunctatus* L.

- 11 Bovenzijde licht metallisch-groen (abc. *prasinus* Letzn.) of groenachtig-koperkleurig (abc. *cuprescens* Letzn.), de dekschilden met tamelijk breeden gelen zijrand. Sprieten, behalve het roodachtige wortelid, en de tasters pekzwart, de pooten roodgeel, de dijen en tarsen meer of minder bruin. Lengte 8–9½ mm. Gemeen langs rivieroevers, meren en duinplassen. Ook in uitgedroogde slooten. 8. *marginatus* L.

Hoogstens de epipleuren der dekschilden lichter gekleurd 12

- 12 Achterhoeken van het halsschild duidelijk aangeduid, naar buiten min of meer uitstekend . . . 13

Achterhoeken van het halsschild volkomen afgerond of slechts zwak aangeduid. 15

- 13 Bovenzijde bronskleurig. Achtertarsen op de bovenzijde glanzig, in de middellijn zonder fijne langskiel 14

Bovenzijde zwart, eenigszins dof. Achtertarsen op de bovenzijde dof, in de middellijn fijn gekield. De basis van het eerste sprietlid en de pooten, alsook de epipleuren der dekschilden soms roodachtig. Dekschilden langwerpig-ovaal. Lengte 8–9½ mm. Niet inlandsch. Deze soort zou in België en Westfalen voorkomen. Twee Belgische exemplaren, die ik zag uit de collectie van den Baron de Moffarts, waren assimilis en Dahlii. . . . (lugens Dfts.)

- 14 Bovenzijde bruin-bronskleurig, onderzijde zwartgroen, het eerste sprietlid, de schenen en tarsen bruinrood. Halsschild nagenoeg even lang als breed, met zeer stompe doch duidelijk naar buiten uitstekende achterhoeken. Dekschilden lang gestrekt, fijn en glad gestreept, de tussenruimten vlak, de derde met 4 of 5, zeldzamer met 6 stippen. Pooten lang en slank. Lengte $7\frac{1}{2}$ –8½ mm. Zeer zeldzaam. Bij Rotterdam en aan den Hoek van Holland. Ook in België in de Hautes-Fanges en op Norderney. . . . (elongatus Fisch.) 10. *gracilipes* Dfts.

Bovenzijde licht bronskleurig. Halsschild breeder dan lang, met stompe, weinig aangeduide achterhoeken. Dekschilden ovaal. Pooten roodbruin of roodgeel. Gelijkt overigens op *versutus*. Lengte $6\frac{1}{2}$ –7½ mm. Zeer zeldzaam onder afgevallen bladeren. Breda, den Bosch, Zutphen, den Haag en Katwijk. Ook in België 11. *dolens* Sahlb.

- 15 Tegen den kielvormigen zijrand van het halsschild van voren nog duidelijk gegroefd . . . 16

De zijgroef tegen den kielvormigen zijrand van het halsschild zeer smal. Glanzig zwart, het eerste sprietlid, de tasters, de pooten of ten minste de schenen benevens de epipleuren der dekschilden lichter of donkerder rood- of geelbruin. Van *P. viduus* var. *moestus* onderscheiden door de kleur der sprieten, tasters, pooten en epipleuren der dekschilden, de dunne sprieten, het smallere, eenigszins naar achteren versmalde halsschild, de minder sterk afgeronde, stompere achterhoeken en den veel smalleren en minder sterk omgebogen zijrand; eindelijk nog door de minder geweldige, veel fijner gestreepte dekschilden en de veel fijnere stippen in de derde tussenruimte. Deze soort gelijkt overigens op *versutus* en op *viduus* var. *moestus*. Lengte 7–8 mm. Op moerassige plaatsen, langs brakwaterpoelen. Eenmaal bij Katwijk. Zou ook bij St. Pieter (Maasricht) gevangen zijn. In België op verscheidene plaatsen o. a. in de omstreken van Antwerpen en bij Luik.

(atratus Fairm. et Lab., pusillus Schaum) 14. *Dahlii* Prendhomme de Borre 1).

1) *P. atratus* Dfts. (*lateralis* Redt.) is eene Zuid-europesche soort.

- 16 Dekschilden fijn gestreept, met vlakke tussenruimten 17
 Dekschilden diep gestreept, met duidelijk gewelfde tussenruimten. Zwart, de bovenzijde bij den typischen vorm donker bronskleurig, zeldzamer bronzig-groen of wel skaalblauw (ab. **cyanescens* Preller) 1). De var. *moestus* Dfts. is glanzig koolzwart; de achterrand van het halsschild volkomen afgerond, de dekschilden ovaal, tamelijk gewelfd. Abnormale exemplaren met opgeblazen schouders en diep uitgerande basis der dekschilden, zijn beschreven als ab. *emarginatus* Gylh. Lengte $7\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$ mm. Het type vrij zeldzaam, de var. *moestus* zeer gemeen op vochtige plaatsen onder afgevallen bladeren. (afer Dfts., lugubris Dej.) 13. *viduus* Panz.
- 17 Eerste sprietlid grootendeels rood. Schenen rood of geelachtig. Gewoonlijk kop en halsschild bronzig-groen, de dekschilden bruinachtig-bronskleurig of groenachtig (ab. c. *virescens* Letzner), soms de geheele bovenzijde donker bronskleurig (ab. c. *tibialis* Heer). Een exemplaar uit België (Angleur) is geheel iriserend blauwachtig. Dekschilden met zeer zwak bestippelde strepen en vlakke tussenruimten, de derde met 3, zelden met 4 duidelijke stippen. Lengte 7—9 mm. Overal zeer gemeen. (parumpunctatus F.) 9. *Mülleri* Hbst.
- Eerste sprietlid zwart, niet zelden roodbruin. Pooten zwart, soms meer roodbruin. Bovenzijde donker bronskleurig, zelden zwartachtig met geringen metallischen weerschijn; het achtergedeelte van de epipleuren der dekschilden niet zelden roodbruin. Dekschilden iets korter dan bij *viduus*, veel fijner gestreept, met volkomen vlakke tussenruimten, in de derde tussenruimte met 3 stippen. Lengte 7—8 mm. Verbreid en niet zeldzaam op vochtige plaatsen onder afgevallen bladeren. (lugubris Dfts.) 12. *versutus* St.
- 18 Halsschild aan de zijden afgerond, met afgeronde achterhoeken (Sub-gen. *Europhilus* Chaud.) 19
 Halsschild lang hartvormig, met scherp aangeduide achterhoeken (Sub-gen. *Clibanarius* Guzi). Kop en halsschild groen, de dekschilden gewoonlijk roodgeel met eene groote gemeenschappelijke blauwgroene vlek op de achterhelft. De 3 of 4 eerste sprietleedjes, de tasters en pooten roodgeel. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen op vochtige plaatsen, vooral op klei- en kalkbodem, onder steenen, afgevallen bladeren en dood riet, meestal in aantal bijeen. (prasinus Thunb.) 21. *dorsalis* Pontopp.
- 19 Tarsen op de bovenzijde in de middellijn gegroefd. Pekzwart, de zijranden van het halsschild roodachtig doorschijnend, de dekschilden, het eerste sprietlid, de tasters en de pooten bruin-geel, veelal de naad der dekschilden wat donkerder. Bij de var. *puellus* Dej. is het halsschild nagenoeg geheel zwart, de dekschilden pekzwart of donkerbruin, hunne epipleuren, het eerste sprietlid, de tasters en pooten lichter of donkerder roodbruin. Het halsschild is smaller, meer gewelfd en heeft zwakker aangeduide basaalindrucken dan bij *puellus*. Dekschilden lang gestrekt, iets meer gewelfd, even fijn gestreept, met geheel vlakke tussenruimten, in de derde met 4 of 5 stippen. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Het type bij Rotterdam, Oisterwijk en Hillegersberg. De var. *puellus* Dej. zeer verbreid onder dood riet en bladeren langs oevers. (pelidus Steph.) 20. *Thoreyi* Dej.
- Tarsen op de bovenzijde in de middellijn niet gegroefd 20
- 20 Dekschilden kort, ovaal, duidelijk doch niet diep gestreept, hun basaalrand niet bijzonder diep uitgerand. 21
 Dekschilden lang gestrekt, zeer fijn gestreept, met sterk uitgebogen basaalrand 23
- 21 Zijrand van het halsschild van achteren breeder afgezet en omgebogen. 22
 Zijrand van het halsschild over de geheele lengte zeer smal afgezet en omgebogen. Pekzwart, de dekschilden gewoonlijk lichter of donkerder bruin, de pooten en meestal ook het 1ste sprietlid en de tasters roodbruin, de dijen gewoonlijk donkerder. Halsschild zeer weinig naar achteren versnald, met duidelijke basaalindrucken. Lengte 6— $6\frac{1}{2}$ mm. Op vochtige weilanden, langs rivieren, tussen Sphagnum, in droge slooten en aan vochtige boomstammen onder mos, zeldzaam. Zutphen, Venlo, Arnhem, Rotterdam, Maarsbergen, Mook en Oisterwijk 17. *fuliginosus* Panz.
- 22 Bovenzijde bronzig zwart, met min of meer groen- of blauwachtigen weerschijn, sprieten en tasters pekzwart, de pooten pekbruin, de dijen gewoonlijk zwartachtig. Halsschild iets breeder dan lang, naar achteren duidelijk versnald, met duidelijke naar buiten gekromde, niet zeer diepe basaalindrucken. Dekschilden tamelijk fijn gestreept, in de strepen onduidelijk bestippeld, met vlakke tussenruimten, de derde gewoonlijk met 5 stippen. Lengte 6 mm. Zeer zeldzaam langs rivieroevers, Gorkum en Slijskil. 15. *scitulus* Dej.
- Bovenzijde donker bronzig, gewoonlijk iets groenachtig, de dekschilden soms bruinachtig met groenen weerschijn; de epipleuren der dekschilden, het eerste sprietlid, de tasters en de pooten bruin-geel, de dijen veelal bruin. Halsschild weinig breeder dan lang, naar achteren zeer weinig versnald, met vrij diepe basaalindrucken. Dekschilden tamelijk fijn gestreept,

1) Van twee exemplaren van ab. **cyanescens* uit België die ik zag, was het eene een typisch exemplaar van deze soort, het andere een *P. Mülleri*.

de strepen nagenoeg onbestippeld, met zeer zwak gewelfde tusschenruimten, de derde gewoonlijk met 5 stippen. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Gemeen langs rivieroevers, vooral onder aanspoelsel en dood riet (pelidius Dts.). 16. *micans* Nicol.

- 23 Pekzwart, de dekschilden bruinegeel, met zwakken, bronzigen metaalglaas, de zijrand van het halsschild roodbruin doorschijnend. Eerste sprietlid en de tasters pekbruin, pooten bruinegeel. Halsschild langer en smaller dan bij *fuliginosus*, even lang als breed. Dekschilden smaller en gestrekter dan bij *micans*, aan de basis veel dieper uitgerand, met lijne en gladde strepen en volkomen vlakke tusschenruimten; in de derde met 4 of 5 stippen. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam, onder dood riet en soms aan de wortels van wilgen. (picipes F.) 18. *piceus* L.

Geheel zwart, met zwartbruine of zwarte pooten. Overigens met *piceus* overeenkomende en wellicht als eene varieteit van deze soort te beschouwen. Lengte 6—7 mm. Verbreid doch zeldzaam langs oevers onder dorre bladeren, ook tusschen Sphagnum in moerasstreken.

19. *gracilis* Gyll.

32. *Pterostichus* Bonelli.

(*Feronia* Latr.).

*Sprietten van af het vierde lid behaard. Bovenlip meestal recht afgeknut, zelden uitgerand. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. Eindleedjes der tasters staafrormig en aan het uiteinde afgeknut, soms naar het uiteinde versmald en dan slechts smal afgeknut. Kin met eene breede, diepe uitranding, waarin een sterke, aan het uiteinde min of meer uitgerande of in tweeën gedeelde en ongeveer tot aan het midden der zijlobben reikende middentand; de binnenhoek der zijlobben min of meer tandvormig uitgetrokken. Tong van voren breed afgeknut. De paraglossen zijn van de tong veelal slechts door eene korte uitranding aan den top, soms echter door eene diepere uitranding afgescheiden; in den regel overschrijden zij de tong slechts weinig, soms zijn zij echter veel langer, zelden korter dan deze. Dekschilden in de derde tusschenruimte minstens met één haarstip. Aan het uiteinde der epipleuren van de dekschilden, bevindt zich in den regel een tot aansluiting der dekschilden aan den zijrand van het achterlijf dienende scherpe binnenkant. Voortzetting van het prosternum van achteren stomp. Voorschienen krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde verbreed. Tarsen op de bovenzijde kaal. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes meer of minder sterk hartvormig verbreed en op de onderzijde in twee langsrijen zolig beschubd. De soorten leven op velden, wegen en moerasige plaatsen, in bosschen, onder steenen, bladeren, mos enz. — De larven van *P. vulgaris*, *nigrita* en *oblongopunctatus* zijn door Schödlte beschreven, ook de pop van *nigrita*; de larve van *P. cupreus* en de pop van *P. vulgaris* door Rupertsberger.*

Van de ± 250 Europeesche soorten komen 21 in Nederland en 5 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Episternen van den metathorax langer dan aan den voorrand breed. 2
- Episternen van den metathorax niet of slechts zeer weinig langer dan breed, in den regel breeder dan lang. 23
- 2 De eerste 3 sprietleedjes of minstens het tweede en derde samengedrukt, zoodat hun bovenrand een scherpen kant vormt 3
- De eerste leedjes der sprietten niet samengedrukt en ook niet van boven kantig 9
- 3 Strepen der dekschilden zeer oppervlakkig, slechts door de stippels aangeduid. Slechts het eerste lid der achtertarsen aan de buitenzijde gegroefd (Sub-gen. *Sogines* Steph.). Indrukken aan de basis van het halsschild breed en zeer oppervlakkig aangeduid. Dekschilden in beide seksen dof zwart; de derde tusschenruimte met 3 stippen. Lengte 12—14 mm. Op zandgrond en in weilanden, veelal aan vertrapte slakken en meikevers. Niet inlandsch. Niet zeldzaam in het omliggend gebied, o. a. gemeen bij Brussel. Ik zag vele exemplaren uit de Antwerpsche Campine. Ook in de Rijnprovincie (punctulatus Schaller).
- Strepen der dekschilden diep, met eenigszins gewelfde tusschenruimten. Minstens de eerste 2 leedjes der achtertarsen aan de buitenzijde gegroefd (Sub-gen. *Poecilus* Bon.). Halsschild aan weerszijden van de basis met twee langsgroefjes 4
- 4 Zijranden van het halsschild, vooral naar achteren, duidelijk vlak en geleidelijk breeder afgezet. Derde tusschenruimte der dekschilden zonder stip op het voorste derde gedeelte. De twee eerste sprietleedjes roodachtig 5

Zijranden van het halsschild smal afgezet en gelijkmatig omgebogen. Derde tusschenruimte op het voorste derde gedeelte van een stip voorzien. De eerste sprietleedjes gewoonlijk aan de bovenzijde zwart. 6

- 5 Kop dicht bestippeld. De gootvormige uitholling langs de zijden van het halsschild, is naar de basis meer genaderd tot den zijrand dan tot den binnensten indruk. Achterschelen met 8 of 9 haarstippen aan den binnenkant. Bovenzijde koperkleurig, bronzig, metallisch-groen (ab.c. *viridis* Preller), blauwachtig (ab.c. *cyaneus* Letzn., *beryllinus* Preller, bij Zierikzee), blauw- of groenachtig-zwart (ab.c. **nigrovirens* Letzn.) of nagenoeg geheel zwart (ab.c. **niger* Letzn., in België bij Brussel), soms iriserend (ab.c. *iridicolor* Westh.). Pooten zwart 1). Lengte 10½—13½ mm. Overal zeer gemeen, vooral onder steenen en op wegen. . . 3. **cupreus** L.

Kop sterk glanzig, zonder duidelijke bestippling. De gootvormige uitholling langs de zijden van het halsschild staat op gelijken afstand van den binnensten indruk als van den zijrand. Achterschelen met 6 of 7 haarstippen aan den binnenkant. In kleur even veranderlijk als *cupreus*, van groen (ab.c. *iridicolor* Westh.) tot zwart (ab.c. *tenebricosus* Westh., in Limburg). Soms in het groen- en roodkoperkleurige iriserend (ab.c. *tricolor* Letzn.). Zeer kleine groenachtige exemplaren vormen *cupreoides* Heer. Pooten altijd zwart. Lengte 9—12 mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam onder steenen.

(versicolor St., pauciseta Thoms.) 4. **coerulescens** L.

- 6 De buitenste langsindruk aan de basis van het halsschild is diep en lang, naar buiten door eene zeer krachtige langsplooi begrensd. 7

De buitenste langsindruk aan de basis van het halsschild is vrij kort en ondiep, naar buiten niet scherp begrensd. Bovenzijde sterk glanzig, donker blauwgroen. Sprietten, tasters en pooten pekswart, de eerste 3 sprietleedjes niet zelden bruinachtig. Dekschilden veel breeder dan het halsschild, in de diepe strepen zeer sterk bestippeld. Episternen van het metasternum langer en smaller dan bij *coerulescens*. Lengte 11—12 mm. Niet inlandsch. In Midden-Europa. . . (*coeruleovirens* St., *subcoeruleus* Schaum) (*striatopunctatus* Dfts.)

- 7 Zijden van het halsschild tot aan de achterhoeken geleidelijk afgerond. 8

Zijden van het halsschild voor de achterhoeken recht of uiterand. Bovenzijde lichter - (ab.c. *ferreus* Letzn.) of donkerder bronskleurig (ab.c. *nigrocupreus* Letzn.), metallisch-groen (ab.c. *virens* Müll., *viridis* Letzn., *viridulus* Prell.), blauwachtig-groen, fraai blauw (ab.c. *cyaneus* Letzn., *azurescens* Dalla Torre), violet (ab.c. *violaceus* Letzn.), veelkleurig o. a. rood, groen en blauwachtig (ab.c. *tricolor* Letzn.), zelden zwart (ab.c. *niger* Letzn.), — soms roodachtig-bronskleurig, zelden met meer groenachtig halsschild. Bij het ♀ zijn de dekschilden dof. Onderzijde, sprietten, tasters en pooten zwart. De doorntjes der schenen en tarsen roodachtig. De eerste 3 tarsleedjes aan de buitenzijde gegroefd. Lengte 11—13½ mm. Gemeen op diluvialen zandgrond in allerlei kleur-aberraties. 2. **lepidus** Leske 2)

- 8 Strepen der dekschilden duidelijk bestippeld. Zwart, kop en halsschild gewoonlijk glanzig koperrood, de dekschilden groen, bij het ♀ minder glanzig dan bij het ♂, soms de gehele bovenzijde bronzig-groen (ab.c. **viridis* Letzn.), zwartachtig-groen (ab.c. *obscurus* Letzn.) of geheel zwart (**niger* Letzn.). De eerste twee sprietleedjes minstens aan de onderzijde bruinrood. Halsschild om de basaalindrucken sterk bestippeld. De doorntjes der schenen en tarsen zwartachtig. Aan de achtertarsen gewoonlijk alleen de eerste twee leedjes aan de buitenzijde gegroefd. Lengte 12—14 mm. Uiterst zeldzaam; onder steenen in velden en weilanden. Oosterbeek, Rotterdam en in Limburg. De ab.c. *obscurus* bij Rhenen. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf en in België bij Postel. 1. **dimidiatus** Oliv.

Strepen der dekschilden volkomen glad of slechts zeer onduidelijk bestippeld. Zwart, meestal met blauwachtigen zijrand van halsschild en dekschilden, soms de gehele bovenzijde blauw-zwart of violetachtig, bij uitzondering groenachtig. Sprietten geheel zwart. Tusschenruimten der strepen op de dekschilden naar het uiteinde duidelijk gewelfd. Halsschild om de basaalindrucken gewoonlijk slechts zwak bestippeld. Deze soort onderscheidt zich van de evenzoo gekleurde aberratie van *lepidus*, door de tot aan de achterhoeken van het halsschild duidelijk afgeronde zijden en de van den zijrand verder afstaande buitenste langsgroef, door de iets kortere en bredere dekschilden en het sterker uitstekende schouder tandje. Lengte 11—13 mm. Niet inlandsch. In België zou een ♀ bij Orsinfaing (prov. Luxemburg) gevangen zijn. Ik zag nimmer Belgische exemplaren.

(Royi Germ. var., viaticus Dej. var.) (*marginalis* Dej.)

1) In Westfalen komen exemplaren voor met geelroode lippen (var. *affinis* St.). Ook vindt men in Duitsland exemplaren met geheel geelroode pooten (var. *erythropus* Fald.), in welk geval gewoonlijk ook het derde sprietlid geelrood is.

2) De uit België opgegeven var. *arescens* Dej., welke volgens Ganglbauer eene goede soort is, komt in de Alpen voor. Een exemplaar uit Schaefferhoek (coll. Remy) is het type.

- 9 Vierde tot zesde sterniet achter de basis met eene scherp ingesneden dwarsgroef. Halsschild hartvormig, de zijden naar de basis uitgerand. Dekschilden zonder scutellair-streep (Sub-gen. *Pedius* Motsch.). Pekbruin met bruinroode sprieten, tasters en pooten; soms geheel bruinrood of roestrood. Dekschilden met zeer krachtige stippellijnen. Lengte 5—6 mm. Langs de zeekust, vooral op zeekei niet zeldzaam 5. *inaequalis* Mrsh.
- De sterniten zonder scherp ingesneden dwarsgroeven 10
- 10 Tarsleedjes op de bovenzijde met eene langsgroef in 't midden (Sub-gen. *Lagarus* Chaud.). Glanzig zwart, de dekschilden veelal iets iriserend. Eerste sprietlid, de schenen en tarsen roodbruin. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen op wegen, onder mos en steenen. Op ziltige gronden zou een grootere vorm (*cursor* Dej.) voorkomen, welke mij echter uit ons land onbekend is. (*crenatus* Dfts.). 6. *vernalis* Panz.
- Tarsleedjes op de bovenzijde niet gegroefd 11
- 11 Klauwlid op de onderzijde zonder borstelharen 12
- Klauwlid op de onderzijde aan weerszijden met eenige borstelharen. 21
- 12 Achterhoeken van het halsschild afgerond (Sub-gen. *Lycerosomus* Motsch.). Zwart, met sterken glans, als verlaakt. De derde tusschenruimte met 3 ronde groefjes. Lengte 12—15 mm. In vochtige bosschen, onder plaggen en dorre bladeren; ook langs vennen. Bij Breda en Oosterwijk. In de Rijnprov. bij Crefeld. In België bij Calmpthout . . . 8. *aterimus* Hrbst.
- Achterhoeken van het halsschild scherp rechthoekig aangeduid. 13
- 13 Oogen gewelfd, uitpuilend 14
- Oogen zeer zwak gewelfd, nagenoeg niet uitpuilend (Sub-gen. *Argutor* Steph.). Pekzwart. Sprieten, tasters en pooten bruinrood. Basis van het halsschild aan weerszijden binnen de achterhoeken met eene zeer diepe langsstreep en in den regel nog bovendien met een zeer kort streepje daarbuiten; de omgeving dezer streepjes is krachtig bestippeld. Prosternum van voren matig sterk en tamelijk verspreid bestippeld. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Meerssen en Roosteren in Limburg. In België bij Calmpthout, Blankenberghe en Selzaete. Ook in Westfalen en bij Aurich (*ovoideus* St.). 17. *interstinctus* St.
- 14 Dekschilden op de derde tusschenruimte met eenige groote, groefachtige, diepe stippen (Sub-gen. *Bothriopterus* Chaud.). 15
- Dekschilden op de derde tusschenruimte met eenige fijne ingestoken stippen. 16
- 15 Derde tusschenruimte der dekschilden met 4—6, in den regel met 5 groote stippen. Episternen van het metasternum aan den buitenrand slechts $\frac{1}{2}$ langer dan aan den voorrand breed, naar achteren slechts matig versmald, vrij zwak, veelal slechts onduidelijk bestippeld. Bovenzijde donker bronskleurig, soms met groenachtigen weerschijn. Tasters, schenen en tarsen roodbruin. Lengte 10—12 mm. Gemeen in bosschen onder dorre bladeren, mos en aan boomwortels 9. *oblongopunctatus* F.
- Derde tusschenruimte der dekschilden slechts met 3 groote stippen. Episternen veel langer, naar achteren veel meer versmald en sterker bestippeld. Van de vorige soort onderscheiden door den korteren vorm, door het kortere, aan weerszijden van de basis zeer scheef afgesneden halsschild, met spitsere achterhoeken en naar achteren breeder omzoomde zijden. Dekschilden veel korter, voor het uiteinde sterker uitgebogen en in de strepen wat duidelijker bestippeld. Lengte 8—10 $\frac{1}{2}$ mm. In bosschen onder dorre bladeren, stukken hout, geveld boomen en onder losse boomstochs. Zeldzaam in de diluviale streken. Arnheim, Ginneken, Oosterwijk, Ossendrecht en Heerenveen. Ook bij Dusseldorf en in België. 10. *angustatus* Dfts.
- 16 Halsschild hartvormig versmald, met van achteren zeer sterk uitgerande zijden, aan weerszijden van de basis met eene diepe langsgroef en gewoonlijk nog met een kort, zwak aangeduid, buitenste langsgroefje (Sub-gen. *Adelasia* Steph.). Bovenzijde pekzwart, pekbruin of roodbruin. Sprieten bruin, de tasters en pooten lichter bruinrood. Dekschilden langwerpig, vrij lang, met parallelle zijden en gladde of slechts zwak bestippelde, ondiepe strepen; de derde tusschenruimte met 3 stippen. Lengte 12—13 $\frac{1}{2}$ mm. Langs de zeekust. Scheveningen en langs het Y bij Amsterdam. Deze soort komt in de aangrenzende landen op kalkheuvels onder steenen voor. Ook langs de Belgische kust bij Nieuwpoort, Blankenberghe enz. Ook bij Calmpthout (*picinanus* Dfts.). 7. *macer* Mrsh.
- Halsschild naar achteren slechts weinig versmald, achter het midden niet of slechts zeer weinig uitgebogen, aan weerszijden van de basis met twee langsgroefjes. 17
- 17 Sprieten lang en zeer slank. Dekschilden enigszins dof, met tamelijk breed afgezetten zijrand (Sub-gen. *Platysma* Bon.). Geheel zwart. Dekschilden met diepe strepen en gewelfde tusschenruimten en met eene gootvormige randgroef, welke naar het uiteinde even breed is als de negende tusschenruimte. Laatste sterniet bij het ♂ in de lengte kielvormig verheven.

- Lengte 16—21 mm. Niet zeldzaam, vooral in bosschen, in boommoln en onder stukken hout 11. *niger* Schall.
- Sprieten vrij kort. Dekschilden tamelijk glanzig, met smal afgezetten zijrand. Lichaam middelmatig groot of klein (Sub-gen. *Pseudomaseus* Chaud.) 18
- 18 Halsschild met tot aan de tandvormig naar buiten uitstekende achterhoeken, afgeronde zijden, breeder dan lang, aan weerszijden van de basis met eene groote, diepe, dicht rimpelig bestippelde, naar buiten door eene kleine plooi begrensde groef, op welker bodem twee langsstreepjes meer of minder duidelijk in 't oog vallen. De zijden van het sternum vrij grof, die van het achterlijf fijn en vrij dicht bestippeld. Laatste sterniet bij het ♂ met een hultje in 't midden, dat zich soms kielvormig tot aan den achterrand voortzet. Bij sommige exemplaren zijn de dekschilden om het schildje ingedrukt en de schouders opgeblazen. (ab. *excavatus* Boud.) 1). Lengte 9—11 mm. Zeer gemeen 13. *nigrita* F.
- Halsschild naar de achterhoeken rechthoekig of flauw uitgebogen versmald 19
- 19 Onderzijde van het achterlijf aan de zijden duidelijk bestippeld. Deze soort gelijk op *nigrita*, doch is onderscheiden door de rechte achterhoeken en de daarvoor flauw uitgerande zijden van het halsschild, met duidelijker langsstreepjes in de basaalgroeven. Zij heeft iets meer gestrekte en vlakke dekschilden, welke bij het ♀ aan den naadhoek in een scherp tand uitgetrokken zijn. Ook heeft het ♂ een in 't midden gegroefd laatste sterniet. Lengte 10—11 mm. Vrij gemeen in vochtige bosschen 14. *anthracinus* Illig.
- Onderzijde van het achterlijf dof, fijn lederachtig gerimpeld, aan de zijden nagenoeg onbestippeld 20
- 20 De groeven in de achterhoeken van het halsschild dicht bestippeld, de binnenste indruk daarvan minder scherp aangeduid dan de buitenste. Deze soort gelijk zeer op *anthracinus*, doch is kleiner, met pekbriune sprieten, tasters en pooten. In beide seksen is de naadhoek der dekschilden gewoon. De zijden van het prosternum zijn fijner-, die van het meso- en metasternum veel grover bestippeld. Laatste sterniet bij het ♂ gewoon. Lengte 9 mm. Verbreid, doch overal vrij zeldzaam, vooral langs oevers onder steenen en mos. 15. *gracilis* Dej.
- De groeven in de achterhoeken van het halsschild minder diep en meer verspreid bestippeld, de binnenste indruk daarvan scherper aangeduid. Pekzwart of pekbriin. Sprieten, tasters en pooten roodbruin. De zijden van het prosternum zijn nagenoeg even grof en dicht bestippeld als die van het meso- en metasternum. Laatste sterniet bij het ♂ met eene zeer fijne langskiel. Lengte 7—7½ mm. Vrij gemeen in bosschen, langs slooten en tusschen plantenaafval. 16. *minor* Gylh.
- 21 Halsschild met breed afgezetten en sterk omgebogen zijrand; aan weerszijden voor de basis met twee langsstreepjes (Sub-gen. *Omascus* Dej.). Geheel zwart, matig glanzig. In den regel ongeveugeld. Geveugelde exemplaren maken den vorm *pennatus* Dej. uit. Soms is het halsschild naar de basis sterker versmald (ab. *nigerrimus* Letzn.). Lengte 13½—17½ mm. Overal zeer gemeen, onder steenen, mos en losse boomschors. De vorm *pennatus* bij Loosduinen (melanarius Illig.). 12. *vulgaris* L.
- Halsschild aan de zijden slechts fijn en smal gerand (Sub-gen. *Argutor* Steph.) 22
- 22 Prosternum geheel onbestippeld. Halsschild kort, veel minder naar achteren versmald en voor de basis zwakker bestippeld dan bij *strenuus*. Dekschilden met veel fijner bestippelde binnenste strepen. Pekzwart, de sprieten, tasters en pooten donkerder dan bij *strenuus*. Lengte 5½—6 mm. Op sommige plaatsen gemeen, o. a. in aanspoelsel en tusschen vochtige bladeren en dood riet 19. *diligens* St.
- Prosternum grof en dicht bestippeld. Pekzwart, de sprieten, tasters en pooten bruinrood. Lengte 5—6 mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren, mos en steenen 13. *strenuus* Panz.
- 23 Achterhoeken van het halsschild scherp aangeduid recht. Lichaam meer vlak (Sub-gen. *Pterostichus* Esp.) 24
- Achterhoeken van het halsschild afgerond. Lichaam gewelfd. Dekschilden ovaal of langwerpig-ovaal (Sub-gen. *Steropus* Dej.) 25
- 24 Glanzig zwart, de dekschilden gewoonlijk iets iriserend. Halsschild iets veranderlijk in vorm, niet of slechts weinig breeder dan lang, hartvormig. Dekschilden langwerpig, diep gestreept, de tusschenruimten gewelfd. Laatste sterniet bij het ♂ met eene kielvormige verhevenheid. Lengte 13—15 mm. In bosschen onder steenen. Ik zag een exemplaar dat waarschijnlijk bij

1) Volgens Dr. Flach komt deze naam die onder de in moerassen levende Carabiden veelvuldig voor. Hij trof zulks aan bij verschillende *Platynus* soorten, bij *Pterostichus nigrita*, *diligens*, *Oodes heloptoides* en ook bij *Carabus auratus* en beschouwde het als een aan den bodem gebonden ontwikkelingsproces. Ik bezit ook een dergelyk exemplaar van *Pt. anthracinus*.

Maastricht gevangen is. Niet zelden in België, o. a. bij Namen, Luik, Groenendaal, Fleurus, Boisfort, Dinant, Hastière enz. Ook in de Rijnprov., bij Dusseldorf en Elberfeld.

(parumpunctatus Germ.) 21. **cristatus** Dufour.

Bovenzijde licht roodkoperkleurig, veelal met groenachtigen weerschijn, vooral langs de zijranden der dekschilden. Spriet en onderzijde en pooten zwart, de tasters en schenen bruinrood. Halschild veel breder dan lang, aan de basis even smal als voor het midden. Dekschilden zeer kort, met uiterst fijne stippellijnen, de tusschenruimten volkomen vlak. Laatste sterniet bij het ♂ met eene kielvormige verhevenheid. Lengte 12—14 mm. In bosschen van bergstreken, onder dorre bladeren en steenen. Niet inlandsch. In Westfalen; in België zeer twijfelachtig.

(metallicus F.)

- 25 Basaalgroeven van het halschild naar buiten door eene langsplooi begrensd. Dekschilden langwerpig-eirond. Glanzig zwart, de dijen, soms ook de schenen en tarsen bij het type rood; bij de var. *concinus* St. zijn de pooten geheel zwart. Laatste sterniet bij het ♂ in 't midden met eene scherpe dwarslijst, daarachter ingedrukt. Lengte 13—16 mm. Niet zeldzaam in de heidestrekken en op kalkbodem onder steenen en dorre bladeren. De variëteit komt meer voor dan het type 20. **madidus** F. 1)

Basaalgroeven van het halschild naar buiten niet door eene langsplooi begrensd. Dekschilden korter, meer gedrongen. Glanzig zwart, pooten zwart. Laatste sterniet bij het ♂ voor het uiteinde dwars ingedrukt, het voorlaatste sterniet met eene sterk kielvormige verhevenheid. Lengte 12—13 mm. In bergstreken onder dennenschors en steenen. Komt in België, in de Rijnprov. bij Dusseldorf en in Westfalen voor. Ik zag exemplaren uit de Hautes-Fanges (prov. Luik) in de coll. Putzeys (aethiops Panz.)

33. Abax Bonelli.

Dit genus onderscheidt zich van *Pterostichus* door het ontbreken der haarstippen in de derde tusschenruimte der dekschilden. De dekschilden zijn diep gestreept en vertoonen van achteren, tusschen de met oogstippen bezette achtste streep en den zijrand, twee verdiepte strepen. Alle soorten van dit genus zijn zwart en zeer plat. Bij het ♂ zijn de drie sterk verbrede voortarsen-leedjes aan de onderzijde zelig beschubd; het laatste sterniet heeft twee haarstippen, bij het ♀ 4. — Levenswijze als bij *Pterostichus*. — De larven van *A. ater* en *ovalis* zijn door Schiodte beschreven.

Van de 14 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halschild aan de basis het breedst, slechts naar voren versmald. Lichaam kort ovaal. Dekschilden te zamen weinig langer dan breed, in beide seksen glanzig. Lengte 12—15 mm. Niet inlandsch. In het geheele aangrenzende gebied, in België bij Brussel en Calmpthout en in de Rijnprov. bij Dusseldorf (*ovalis* Dfts.)

Halschild naar de basis iets versmald. Lichaam langwerpig. Dekschilden te zamen de helft langer dan breed, met eenigszins parallele zijden, bij het ♂ glanzig, bij het ♀ meer of minder dof 2

- 2 Dekschilden met diepe, duidelijk bestippelde strepen; de zevende tusschenruimte over de geheele lengte als eene scherpe kiel verheven. Basaalindrukken van het halschild bestippeld. Lengte 14—17 mm. Alleen in Limburg bij Roermond gevangen 3. **carinatus** Dfts.

De strepen der dekschilden bijna niet of slechts onduidelijk bestippeld; de zevende tusschenruimte weinig of niet of slechts aan de basis kielvormig verheven. Basaalindrukken van het halschild glad 3

- 3 Het uiteinde van den scherpen basaalrand aan de schouders der dekschilden loopt over den randzoom heen; de zevende tusschenruimte naar de basis scherp gekield. Dekschilden bij het ♀ dof. Lengte 17—19 mm. Niet zeldzaam in de heidestrekken en in Zuid-Limburg onder steenen, plaggen en afgevalen dennenschors (*striola* F.) 1. **ater** Villers.

De basaalrand der dekschilden loopt niet over den randzoom heen; de zevende tusschenruimte naar de basis stomp gewelfd. Dekschilden bij het ♀ minder glanzig dan bij het ♂. Lengte 14—17 mm. Niet zeldzaam, als *ater* 2. **parallelus** Dfts.

1) Volgens Hardy zou deze soort ook plantaardig voedsel eten

34. *Molops Bonelli*.

*Sprieten reeds van af het derde lid behaard. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde hakig gekromd. Kintand in tweeën gespleten of gedeeld. Aan het uiteinde van de epipleuren der dekschilden bevindt zich in den regel een tot aansluiting der dekschilden aan den zijrand van het achterlijf dienende scherpe binnenkant. Voortzetting van het prosternum van achteren stomp. Voorschenen krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde verbreed. Tarsen op de bovenzijde met borstelhaartjes bezet. Achtertarsen van buiten niet gegroefd. Overigens als bij *Pterostichus*. Bij het ♂ zijn de 3 verbrede voortarsen-leedjes aan de onderzijde zelig beschud. Het laatste sterniet vertoont bij het ♀ twee haarstippen en bij het ♂ gewoonlijk 4 twee aan twee geplaatste haarstippen; het tegendeel dus van *Aba*x.*

Van de 27 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Achterhoeken van het halsschild kort afgezet. Forceps recht toegespitst. Lichaam glanzig zwart.

Tasters en tarsen roodbruin. Achterschenen op de rugzijde met vele doornjes bezet. Lengte 14—17 mm. Eenmaal bij Huissen gevangen. In de Rijnprov. bij Crefeld en Dusseldorf en in Westfalen op droge zonnige kalkbergen 1. *elata* F.

Achterhoeken van het halsschild lang afgezet. Uiteinde van den forceps gedraaid en van onderen tandvormig uitstekende. Pekbruin of pekswart. Sprieten, tasters, pooten en de onderzijde lichter of donkerder roodbruin. Achterschenen op de rugzijde met een doornje. Bij het ♀ is elk dekschild aan het uiteinde meer of minder boogvormig uitgesneden. Lengte 11—14 mm. In bosschen onder steenen en dorre bladeren, in steengroeven en in grotten. In Limburg bij Valkenburg, Houthem, Wijnandsrade en Roosteren. (*terricola* F.) 2. *picea* Panz. 1)

35. *Stomis Clairv.*

Sprieten van af het vierde lid behaard, het eerste lid lang, als het ware een schaft vormend, even lang als de beide volgende leedjes te zamen. Voorkaken zeer ver naar voren uitstekend, met een lange buitenste groef, welke voorbij de diep uitgerande bovenlip naar voren reikt. De rechter voorkaak vertoont van binnen achter het midden een scherphoekige uitranding en is daarvoor veel breeder dan de linker voorkaak, die op de plaats der uitranding een klein uitsteeksel bezit. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde slechts iets gekromd. Het tweede kaak- en liptasterlid zeer lang. Eindlid der kaaktasters veel langer dan het derde lid, in het midden zwak verbreed, aan het uiteinde duidelijk afgeknot. Eindlid der liptasters veel korter dan het tweede, evenals het eindlid der kaaktasters gevormd. Kintand gewoon. Paraglossen lang en smal, de aan het uiteinde met twee borstelharen bezette tong overschrijdend. Halsschild lang hartvormig. Tarsen op de bovenzijde kaal of met schuin afstaande haartjes bezet. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes vrij sterk verbreed en op de onderzijde zelig beschud; het laatste sterniet met 2, bij het ♀ met 4 haarstippen.

Van de 3 Europeesche soorten komt een in Nederland voor.

Glanzig pekswart of bruinzwart, met roode sprieten en pooten. Lengte 6—7½ mm. Verbreed op vochtige plaatsen onder steenen en dorre bladeren 1. *punicatus* Panz.

XIII. Tribus AMARINI.

36. *Amara Bonelli*.

*Sprieten vrij kort, van af het vierde lid behaard. Bovenlip van voren min of meer uitgerand. Eindlid der tasters naar het uiteinde versmald en aldaar slechts iets afgeknot. Kin als bij *Pterostichus*, de kintand gewoonlijk uitgerand, zelden gewoon; de binnenhoeken der zijlobben steken tandvormig uit. De tong is van voren afgeknot of iets uitgerand. Paraglossen vliezig, aan het uiteinde vrij, de tong niet of slechts weinig*

1) Van deze soort heit ik een zwart exemplaar met geheel zwarte pooten uit Weimar. Naar het schijnt was deze variëteit niet bekend. Ik noemde deze *obscuripes*.

overschrijdend. Bij het ♂ zijn de eerste voortarsen-leedjes driehoekig- of hartvormig verbreed en op de onderzijde in twee rijen zelig beschubd. De soorten van dit genus zijn eivormig (zeldzamer meer langwerpig), eenkleurig, hetzij bronsachtig, bruin, zwartachtig of okergeel. — Zij leven op droge plaatsen onder steenen en aan plantenvoetels. Zij loopen gaarne in den zonneschijn en klimmen soms op verschillende planten als: Gramineën, Cruciferen en Compositen. Zij zijn deels phytophaag, deels voeden zij zich met insectenlarven. — De larven van *A. familiaris*, *livida*, *aulica*, *convexiuscula* benevens de pop, van *apricaria* en *equestris* zijn door Schiodte beschreven. De larve en de pop van *A. familiaris* is nog door Beling, de larve van *apricaria* door Xambou, de pop van *equestris* door Xambou en de larve van *ovata* door Zimmermann beschreven.

Van de ± 125 Europeesche soorten komen 31 in Nederland en 8 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Voortzetting van het prosternum tusschen de voorcoxae aan het uiteinde gerand 2
- Voortzetting van het prosternum aan het uiteinde niet gerand; habitus van een *Harpalus* (Sub-gen. *Cyrtanotus* Steph.) 37
- 2 Einddoorn der voorschenen groot, breed, in drie punten uitlopend (Sub-gen. *Triena* Leconte) 3
- Einddoorn der voorschenen gewoon 3
- 3 Voorrand van het halsschild niet of slechts zeer zwak uitgerand. Voorhoeken van het halsschild niet of nauwelijks vooruitspringend 4
- Voorrand van het halsschild duidelijk uitgerand 6
- 4 Voorrand van den clypeus verdikt en door eene dwarsgroef afgezet. Dijen donker. Lichaam tamelijk gestrekt, donker of zwartachtig bronskleurig, de eerste drie sprietleedjes en de basis van het vierde lid, benevens de schenen en tarsen bruinrood. Dekschilden met diepe stippellijnen, welke naar het uiteinde nog dieper gegroefd zijn. Lengte 9—11 mm. Bij Roermond en Venlo, Mei en Sept. Op vele plaatsen in België, o. a. bij Calmpthout, in de prov. Luik en in de duinstreek van Vlaanderen. (striatopunctata Dej.) 1. **fulvipes** Serv.
- Voorrand van den clypeus niet verdikt. Pooten geheel geelrood of rood 5
- 5 Lichaam tamelijk gestrekt, donker bronskleurig, op de bovenzijde soms met groen- of blauwachtigen weerschijn, de eerste 3 sprietleedjes en de wortel van het vierde lid geelrood. Halsschild aan de basis gewoonlijk sterk en vrij dicht bestippeld, aan weerszijden met een diepen en korten, binnensten langindruk en meestal ook met een zwakken buitensten indruk. Dekschilden met diepe stippellijnen, welke naar het uiteinde nog dieper gegroefd zijn. Middelse tand van den driedeeligen einddoorn der voorschenen slank en spits. Lengte 8—9 mm. Twijfelachtig of deze soort wel in ons gebied voorkomt. Een uit België bij Lillo verzameld exemplaar, was *A. fulvipes* (lepida Fairm.) (rufipes Dej.)
- Lichaam korter, bronskleurig, soms met groenachtigen weerschijn, de eerste 3 sprietleedjes en de epipleuren der dekschilden geelrood. Halsschild iets korter dan bij *rufipes*, met scherpere achterhoeken, zonder aanduiding van een buitensten basaalindruk; de binnenste indruk zwak, slechts door weinige stippen omgeven. De strepen der dekschilden tamelijk fijn, naar het uiteinde iets dieper, onduidelijk bestippeld. Middelse tand van den driedeeligen einddoorn der voorschenen kort en spits. Lengte 7—8 mm. Niet inlandsch. In vochtige weilanden op zandgrond. In België op vele plaatsen gevonden. Ik zag exemplaren van Brussel en Charleroi (♀ *lepida* Zimm.) (*concinna* Zimm.)
- 6 Halsschild op het midden zonder zijdelingschen, scheven indruk. Voorhoeken van het halsschild slechts weinig vooruitstekend 7
- Halsschild aan weerszijden op het midden scheef ingedrukt. Voorhoeken van het halsschild sterk vooruitstekend. Licht bronskleurig, de eerste 3 sprietleedjes, de wortel van het vierde benevens de schenen geelrood; dijen soms bruinrood, meestal donker. Dekschilden tamelijk fijn gestreept, de strepen fijn bestippeld of glad, naar het uiteinde sterker verdiept. Lengte 6—6½ mm. Overal zeer gemeen. Veelal aan grashalmen 4. **plebeja** Gyll.
- 7 Dwarsnaad van den clypeus scherp aangeduid en aan weerszijden door een getogen, scherp groefje begrensd. De twee eerste sterniten meer of min bestippeld. Lichaam langwerpig-ovaal, licht bronskleurig. De eerste 3 sprietleedjes, de wortel van het vierde benevens de schenen geelrood. Dekschilden langer en smaller dan bij *trienspidata* en lijner gestreept, in de strepen duidelijk bestippeld. Lengte 8—9 mm. Zeer zeldzaam op moerassige plaatsen. Loosduinen, Mei. In België bij Charleroi, in de Rijnprov. bij Crefeld en Cleef, ook in Westfalen en in Oost-Friesland 2. **strenua** Zimm.

Dwarsnaad van den clypeus slechts flauw aangeduid en meer recht. Alle sterniten nagenoeg onbestippeld. Lichaam ovaal, zwart of zeer donker bronskleurig-groen. De eerste 4 sprietleedjes roodgeel, het vierde sprietlid echter veelal aan het uiteinde donkerder. Dijen bruin of roodbruin-bronzig, schenen roestrood. Dekschilden met diepe strepen, welke naar voren onduidelijk bestippeld en naar het uiteinde diep gegroefd zijn. Halsschild naar voren sterker versmald. Lengte 7—9 mm. Zeer zeldzaam, vooral in korenvelden. Bergen-op-Zoom, Oirschot, Breda, Zutphen, Bunde en St. Pieter 3. *tricuspidata* Dej.

3 Sprieten geheel rood of geelachtig, soms naar het uiteinde roodbruin 9

Sprieten zwart, hoogstens de eerste 3 leedjes roodachtig. Bij het ♂ zijn de achterschenen aan de binnenzijde, behalve met de rij gewone borstelharen, dicht viltig behaard (Sub-gen. *Amara* i. sp.) 22

Sprieten behalve gewoonlijk de onderkant van het eerste lid, benevens de tasters en pooten geheel zwart (Sub-gen. *Celia* Zimm.). Bij het ♂ zijn de achterschenen niet dicht viltig behaard. Bovenzijde gewoonlijk koperkleurig, groenachtig, bronskleurig, blauw-violet of minstens de schenen bruinrood. Dekschilden van de basis met twee niet of slechts zwak bestippelde indrukken, van welke de buitenste meestal scheef naar de achterhoeken gericht is. Dekschilden met fijne stippellijnen. Middelschenen bij het ♂ duidelijk gekromd. Laatste sterniet bij het ♂ met één, bij het ♀ met twee haarstippen. Lengte 7—8 mm. Deze in het hooge Noorden en in de Alpen levende soort, zou door den heer de *Fries van Doesburgh* bij Emden aangetroffen zijn. Ik ben niet zeker van de juistheid der determinatie. (erratica Dfts.)

9 Voortzetting van het prosternum zonder wimperharen aan het uiteinde, bij uitzondering met hoogstens twee wimperharen aan weerszijden. Dijen der achterpooten met twee haarstippen aan den binnenrand. 10

Voortzetting van het prosternum ter weerszijden aan het uiteinde met drie tot vier wimperharen. Dijen der achterpooten met 3 of 4 haarstippen aan den binnenrand (Sub-gen. *Percosia* Zimm.). Eene in grootte en bestippeling zeer veranderlijke soort. Bovenzijde pekwart, de zijrand van het halsschild en de onderzijde roodbruin. Sprieten en pooten of minstens de schenen bruinrood. Dekschilden bij het ♂ glanzig, bij het ♀ dof. Dekschilden breed, gewelfd, sterk gestreept, de strepen meer of minder sterk bestippeld, naar het uiteinde meer verdiept. Laatste sterniet bij het ♂ aan weerszijden met één, zelden met twee, bij het ♀ met 2, zelden met 3 haarstippen. Middelschenen bij het ♂ zwak gekromd. Voortarsen-leedjes bij het ♂ breed hartvormig. Lengte 7—11 mm. Verbreed, doch zeldzaam, op diluviale gronden onder steenen. (*patricia* Dfts.) 21. *equestris* Dfts.

10 Sprieten kort, het vierde tot tiende lid langwerpig-ovaal. Het streepje op de dekschilden, nabij het schildje ontbreekt of is onduidelijk (Sub-gen. *Amara* i. sp.). Lichaam vrij sterk gewelfd, zeer donker bronskleurig. Halsschild naar achteren duidelijk versmald, veelal met roodachtig doorschijnenden zijrand. Prosternum bij het ♂ in 't midden bestippeld. Laatste sterniet bij het ♂ aan weerszijden met één, bij het ♀ met twee haarstippen. Lengte 4½—5 mm. Verbreed en op sommige plaatsen niet zeldzaam in de diluviale streken (Sub-gen. *Celia* Zimm.)

24. *infima* Dfts.

Sprieten langer, het vierde tot tiende lid verlengd. Het streepje nabij het schildje zeer duidelijk 11

11 Zijden van het metasternum en de episternen van den metathorax sterk bestippeld 12

Deze deelen niet of zeer onduidelijk bestippeld 15

12 Clypeus aan den voorrand bultig opgericht en daardoor van een verheven rand voorzien. Bij het ♂ zijn de achterschenen aan de binnenzijde, behalve met de rij gewone borstelharen, nog dicht behaard (Sub-gen. *Bradyrus* Steph.) 13

Clypeus niet bultig opgericht. Bij het ♂ zijn de achterschenen niet dicht behaard. Halsschild naar voren versmald, aan de basis minstens even breed als de dekschilden. Deze soort is in grootte en bestippeling zeer veranderlijk, aan het grootte, breede halsschild en aan het bezit van een navelstip aan de basis der scutellair-streep herkenbaar. Pekbruin of roodbruin, de zijrand van het halsschild en de epipleuren der dekschilden lichter; de bovenzijde meer of minder (veelal iets groenachtig) metaalglanzig. Sprieten, tasters en pooten geelrood. Laatste sterniet bij het ♂ met één, bij het ♀ met twee haarstippen (Sub-gen. *Celia* Zimm.). Lengte 6—7 mm. Zeer zeldzaam, in heidestrecken onder plaggen . . . (*rufocincta* Dej.) 25. *praetermissa* Sahlb.

13 Lichaam geheel lichter of donkerder okergeel, met zeer zwakken, bronzigen weerschijn. Het tweede sprietlid is half zoo lang als het vierde. Prosternum bij het ♂ in het midden met een groefje. Laatste sterniet bij het ♂ aan weerszijden met één, bij het ♀ met twee haarstippen. Lengte 7½—9½ mm. Gemeen op zandgronden onder steenen en tusschen plantenwortels. (*ferruginea* Payk.) 28. *fulva* de Geer.

- Lichaam donkerbruin of bronzig. De lengte van het tweede sprietlid bedraagt het $\frac{1}{2}$ van het vierde. 14
- 14 Halsschild naar de basis sterk versmald; de zijrand naar achteren duidelijk uitgerand en met een tot aan de basis scherp aangeduiden randzoom; de langsplooi in de achterhoeken loopt tot aan den achterrand door. Bovenzijde pekkruin, gewoonlijk met bronzigen weerschiin. Sexueel verschil als bij *fulva*. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Gemeen, vooral op diluviale zandgronden en op kalkbodem. Ook op Texel 27. *apricaria* Payk.
- Halsschild naar de basis niet uitgerand en nagenoeg van gelijke breedte, met een naar de basis verdikten randzoom; de langsplooi in de achterhoeken eindigt voor den achterrand in eene diepe haarstippel. Bovenzijde pekkruin, sterk glanzig, met zwakken bronzigen weerschiin. Sexueel verschil als bij *apricaria*. Lengte 8—9 mm. Gemeen in de diluviale zandstreken en ook op kalkbodem. 29. *consularis* Dfts.
- 15 Kin-uitranding met een gewonen tand. Achterhoeken van het halsschild zeer stomp, meer of min afgerond (Sub-gen. *Acrodon* Zimm.) 16
- Kin-uitranding met een gespleten tand. Achterhoeken van het halsschild scherp aangeduid (Sub-gen. *Celia* Zimm.) 17
- 16 Streepje nabij het schildje zonder navelstip aan de basis. Dekschilden met diepe stippellijnen. Halsschild duidelijk breeder dan de dekschilden, met afgeronde zijden. Deze soort gelijkt zeer op *A. praetermissa*, doch is vooral onderscheiden door den ongedeelten kintand en het breeder, aan de zijden sterker afgerond, naar achteren versmald halsschild. Lichaam pekkruin, met bronzigen weerschiin; het achtergedeelte van de zijden en de basaalrand van het halsschild, soms het geheele halsschild alsook de epipleuren der dekschilden roodbruin. Lengte $5\frac{1}{2}$ mm. Bij Oldenzaal. Ook in de Rijnprov. bij Cleef, Crefeld en Aken.
26. *brunnea* Gylh.
- Streepje nabij het schildje met eene navelstip aan de basis. Deze soort gelijkt overigens op *brunnea*, doch heeft een iets breederen vorm, iets dikkere sprieten, minder uitstekende voorhoeken, rechte achterhoeken en diepe basaalgroeven van het halsschild. Van *praetermissa* onderscheidt zij zich door het meer gewelfd, van voren veel breeder halsschild en de sterker bestippelde basis der dekschilden. Lengte $5\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In België bij Diest. Ik zag de beide eenige exemplaren in de collectie *Putzeys* . . . (indivisa Putz.)
- 17 Lichaam ovaal. Dekschilden eenigszins gewelfd. Prosternum bij het ♂ in 't midden voor de voorcoxae een weinig bestippeld en gegroefd. 18
- Lichaam meer langwerpig. Dekschilden duidelijk afgeplat. Prosternum bij het ♂ niet bestippeld en zonder groefje. Roodbruin, op de bovenzijde bronskleurig. Sprieten, pooten, de zijranden van het halsschild en de epipleuren der dekschilden roodgeel. Laatste sterniet bij het ♂ aan weerszijden met één, bij het ♀ met twee haarstippen. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen op zandgrond (livida Schiödte). 23. *bifrons* Gylh.
- 18 Achterschenen bij het ♂ aan de binnenzijde, behalve de gewone borstelharen, met enkele verspreide haren. Lichaam bronskleurig, meer of min donkerbruin. Halsschild naar voren of ook naar achteren duidelijk versmald. Dekschilden duidelijk gestreept 19
- Achterschenen bij het ♂ slechts met de gewone borstelharen. Lichaam roodbruin, met eenigen bronzigen weerschiin. Halsschild alleen naar voren sterk versmald. Dekschilden zeer lijn gestreept. De voortzetting van het prosternum gewoonlijk met vier haarstippen. Lengte 7—8 mm. Niet inlandsch. In België. Ik zag exemplaren van Calmpthout en Sutendaal bij Hasselt. Deze soort leeft op zandigen heidegrond. (*silvicola* Zimm.)
- 19 Achterhoeken van het halsschild recht 20
- Achterhoeken van het halsschild eveneens recht, doch de top als een klein tandje uitgetrokken. Bovenzijde bruinachtig-bronskleurig, soms met groenachtigen weerschiin, bij het ♀ dofser. Sprieten roodbruin, de eerste leedjes benevens de pooten en de epipleuren der dekschilden rood. Lengte 7—8 mm. Niet inlandsch. In België op kalkbodem. Ik zag vele exemplaren uit Flémalle (*cursitans* Zimm.)
- 20 Eerste sprietlid lichter rood dan de volgende leedjes. Halsschild naar voren en naar achteren duidelijk versmald. Dijen donkerrood. Na verwant aan *fusca* en *cursitans*, doch kleiner, met korter en kleiner halsschild. Lengte 6— $6\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Ik zag een exemplaar uit Comblain-au-Pont in België. Ook bij Aken en in Westfalen. . . (*municipalis* Dfts.) 19

1) Een Belgisch exemplaar als *A. Quensellii* Schönh. gedetermineerd, dat ik zag uit Hockai (ex coll. de *Mefferts*).
A. praetermissa

- Sprieten geheel licht rood. Halsschild slechts naar voren versmald. Pooten geheel rood. 21
- 21 Oogen sterk uitpuilend. Kop smal, zijne grootste breedte veel korter dan de lengte van het halsschild op de zijden. Dekschilden veel korter en minder gewelfd dan bij *ingenua*, met fijnere stippellijnen en vlakkeren tusschenruimten. Lengte $7\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$ mm. Alleen bij Nijmegen en Rotterdam gevangen. Ook in Westfalen. 22. **fusca** Dej. 1)
- Oogen weinig uitpuilend. Kop breed, zijne grootste breedte nagenoeg even lang als de lengte van het halsschild op de zijden. Bovenzijde bruinachtig bronskleurig, bij het ♀ dof. Sprieten, pooten, epipleuren der dekschilden en veelal ook de uiterste zijrand van het halsschild bruinrood. Laatste sterniet in beide seksen met 2, bij het ♂ dichter aaneenstaande haarstippen. Lengte 9—10 mm. Niet inlandsch. In Westfalen en bij Crefeld. Zou ook in België 2) voorkomen. (ingenua Dfts.)
- 22 Dijen zwart of gebruind. 23
- Dijen helderrood. 35
- 23 Dekschilden tot aan het uiteinde even fijn gestreept. 24
- Dekschilden naar het uiteinde met dieper strepen. 28
- 24 Het streepje nabij het schildje gewoon of ontbrekend. 25
- Het streepje nabij het schildje vertoont eene duidelijke haarstip aan de basis. Tusschenruimten der stippellijnen een weinig gewelfd. Schenen zwart, de bovenzijde bronskleurig, groen- of zwartachtig, het ♀ met zijdeachtigen weerschijs. De eerste 3 sprietleedjes en de wortel van het vierde geelrood. Laatste sterniet bij het ♂ met één, bij het ♀ met 2 haarstippen. Lengte 9—11½ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam op zandgrond, onder steenen en afval. (acuminata Payk.) 16. **eurynota** Panz.
- 25 Het streepje nabij het schildje ontbreekt of er is slechts eene geringe aanduiding van zichtbaar. De beide langsindrukken aan weerszijden der basis van het halsschild diep. Bovenzijde gewelfd, donker bronskleurig, soms met groenachtigen weerschijs. De eerste 3 sprietleedjes en veelal ook de wortel van het vierde geelrood. Laatste sterniet bij het ♂ met één, bij het ♀ met 2 haarstippen. Prosternum bij het ♂ met een groefje. Lengte 4½ mm. Verbreid, doch over het algemeen zeldzaam, onder plantenafval. 20. **tibialis** Payk.
- Het streepje nabij het schildje duidelijk. Bovenzijde weinig gewelfd. 26
- 26 De eerste twee sprietleedjes of alleen het eerste rood. Zijden van het halsschild met een scheeven indruk; de buitenste langsindruk aan de basis duidelijk. 27
- De eerste drie sprietleedjes rood. Zijden van het halsschild niet ingedrukt; de buitenste langsindruk aan de basis is weinig of niet ontwikkeld. Bovenzijde gewoonlijk licht bronskleurig, bij het ♀ met zijdeachtigen glans, zelden metallisch groenachtig, iets blauwachtig, zwartbruin (ab.c. *nigro-picea* Letzn.) of zwartachtig (ab.c. *atrata* Steph.). Laatste sterniet bij het ♂ aan weerszijden met één, bij het ♀ met 2 haarstippen. Lengte 6½—8 mm. Overal zeer gemeen; op zonnige voorjaarsdagen op wegen en in straten. (trivialis Gylh., vulgaris Dfts.) 13. **aenea** de Geer.
- 27 Bronskleurig of groenachtig (ab.c. *viridis* Schilsky), de schenen en de eerste twee sprietleedjes rood. Halsschild aan weerszijden van de basis met twee langsgroefjes en duidelijk bestippeld. Het ♂ en het ♀ met één haarstip op het laatste sterniet. Lengte 7½—8½ mm. Zeer gemeen, vooral op zandgrond. 14. **spretta** Dej.
- Donker bronskleurig, pooten geheel zwart, het eerste sprietlid en soms de onderzijde van het tweede rood. Halsschild aan de basis niet bestippeld, slechts met twee diepe langsgroefjes aan weerszijden. Het ♂ met één, het ♀ met twee haarstippen op het laatste sterniet. Lengte 7½—8½ mm. Zeer zeldzaam. Den Haag, Breda, Oosterwijk, Cuijk, Roermond, Arnhem, Steenwijk, Heerenveen, Utrecht en in Limburg. Ook in België. (contrusa Schiödt) 15. **famelica** Zimm.
- 28 Voorhoeken van het halsschild afgerond, niet vooruitstekend; de basis hier en daar een weinig bestippeld; eene stip in de achterhoeken vlak tegen de basis aan, doch van den zijrand afstaande. Streepje nabij het schildje met of zonder navelstip. Schenen rood. Deze soort is na verwant aan *montivaga*, doch vooral onderscheiden door de roestroode schenen en de stompere voorhoeken van het halsschild. Laatste sterniet bij het ♀ met twee haarstippen. Lengte 7—7½ mm. In de omstreken van Maastricht en Roermond. Ook in België op vele plaatsen. 8. **nitida** Sturm.

1) De bij Rotterdam gevangen *A. montana* Dej. komt in habitus en grootte met *A. fusca* overeen; het halsschild is naar de basis duidelijk versmald, wat bij *fusca* en *livida* niet het geval is. Deze soort is waarschijnlijk uit eene lading van Zuid-Europa gekomen.

2) Alle exemplaren (Hockai, Calmpthout en Melsbroek) die ik zag, behooren tot *consularis* Dfts.

- Voorhoeken van het halsschild meer spits vooruitstekend 29
- 29 Het streepje nabij het schildje met eene groote stip aan de basis 30
- Het streepje nabij het schildje zonder stip. 32
- 30 Haarstip in de achterhoeken van het halsschild vlak tegen de basis aan, doch van den zijrand verwijderd; de basis zonder duidelijke indrukken en nagenoeg onbestippeld. De navelstippen op de negende tusschenruimte der dekschilden staan in 't midden op zeer ongelijken afstand van elkander. Bij het ♂ zijn de middelschenen aan de binnenzijde niet dicht behaard. Bovenzijde metallisch-groen, zelden bronskleurig of zwart; de schenen zwart of pekbruin. Laatste sterniet bij het ♂ aan weerszijden met één, bij het ♀ met twee haarstippen. Lengte 7—8½ mm. Bij Grave en op verscheidene plaatsen in de prov. Limburg gevangen. In bouwland en o. a. niet zeldzaam in mergelkuilen en op kalkgrond 7. *montivaga* Sturm.
- Haarstip in de achterhoeken van het halsschild vlak tegen den zijrand aan. De navelstippen op de negende tusschenruimte der dekschilden eene meer aaneengesloten rij vormende. Middelschenen van het ♂ aan de binnenzijde, behalve de gewone borstelharen, dicht behaard 1). 31
- 31 Schenen roodachtig, altijd lichter gekleurd dan de dijën. Lichaam langwerpig-ovaal, de bovenzijde bronskleurig, veelal met groenachtigen weerschijn, zelden zwartachtig (ab.c. *nigra* Letzn.). Halsschild aan de basis om de indrukken duidelijk bestippeld. Laatste sterniet in beide seksen met 2 haarstippen. Lengte 8—9½ mm. Gemeen. (obsoleta Dfts.) 5. *similata* Gyll.
- Pooten geheel zwart. Lichaam breeder, meer ovaal en meer gewelfd. Halsschild iets breeder, voor de basis bijna niet bestippeld. Strepen der dekschilden dieper. Bovenzijde gewoonlijk donker bronskleurig of zwart (ab.c. *nigra* Letzn.). Lengte 8—10 mm. Als de vorige.
(obsoleta Dej.) 6. *ovata* Fabr.
- 32 Schenen zwart; uiteinde der voorschenen tusschen den einddoorn en het eerste tarslid scherphoekig. De eerste twee sprietleedjes, veelal alleen aan de onderzijde, rood. Deze soort gelijkt overigens zeer op *communis*, ook in kleur. Lengte 7—8 mm. Niet zeldzaam. Ook in aanspoelsel der rivieren. (vulgaris Panz.) 11. *lunicollis* Schiödt.
- Schenen geel- of bruinachtig, die der voorpooten zonder scherphoekige voortzetting. 33
- 33 De eerste drie sprietleedjes rood. Halsschild met rimpelige indrukken aan de basis en met hoekstippen dicht tegen de basis aan, doch van de zijden verwijderd. 34
- De eerste twee sprietleedjes rood. Halsschild met elfen indrukken en met bijna geheel in de achterhoeken staande haarstippen. Lichaam donker bronzig. Laatste sterniet bij het ♂ aan weerszijden met één, bij het ♀ met twee haarstippen. Lengte 6—7 mm. Gemeen op zandgrond.
12. *curta* Dej.
- 34 De navelstippen op de negende tusschenruimte der dekschilden vormen eene aaneengesloten rij zonder grootere afstanden in het midden. Lichaam donker bronskleurig, meestal groenachtig. Dekschilden ovaal. Deze soort is na verwant aan *communis*, het halsschild is voor de basis sterker en over eene grootere oppervlakte bestippeld. Lengte 7—7½ mm. Zeldzaam, doch verbreid (continua Thoms.) 10. *convexior* Steph.
- De navelstippen op de negende tusschenruimte staan in het midden ver van elkander, aan de basis en aan het uiteinde dicht opeen. Lichaam bronskleurig, zelden iets groenachtig of zwart (ab.c. *atrata* Letzn.). Laatste sterniet in beide seksen aan weerszijden slechts met één haarstip. Dekschilden iets meer langwerpig-ovaal. Lengte 6—8 mm. Niet zeldzaam . 9. *communis* Panz.
- 35 Streepje nabij het schildje met eene navelstip aan de basis. Deze soort gelijkt zeer op *familiaris*, heeft meer uitpuilende oogen en minder uitgesneden voorrand van het halsschild. Lengte 6—7 mm. Niet zeldzaam, vooral op zandgrond 18. *anthobia* Villa.
- Streepje nabij het schildje zonder deze stip 36
- 36 Voorrand van het halsschild uitgesneden, met uitstekende voorhoeken. Bovenzijde bronskleurig, gewoonlijk met groenachtigen weerschijn, zelden blauwachtig-zwart. Laatste sterniet bij het ♂ met één, bij het ♀ met twee haarstippen. Lengte 5½—7 mm. Overal zeer gemeen.
(laevis St.) 17. *familiaris* Dfts.
- Voorrand van het halsschild recht afgesneden van den eenen hoek naar den anderen. Kleur als bij *familiaris*, doch kleiner en met meer uitpuilende oogen. Lengte 4½—5½ mm. Niet zeldzaam (gemina Zimm.) 19. *lucida* Dfts.
- 37 De scherpe randzoom van het halsschild verliest zich vóór de achterhoeken in eene groote haarstip. Bij het ♂ de middelschenen langs den binnenrand met drie tandjes. De grootste soort van het genus, vooral onderscheiden door het hartvormige halsschild. Bovenzijde pekzwart, met

1) Volgens Ganglbauer komen in Oost-Europa ook mannetjes met onbehaarde schenen voor.

zwakken metaalglaans; onderzijde roodbruin. Spriet en pooten roestrood. Lengte 11—14 mm. Niet zeldzaam. Soms op distels zittend . . . (picca F., spinipes Schiödte) 30. *aulica* Panz.

De scherpe randzoom van het halsschild eindigt niet in de hier veel kleinere haarstip, maar loopt geheel tot den achterhoek door. Bij het ♂ de middelschenen langs den binnenrand met twee tandjes. Van *aulica* onderscheiden door het veel smaller en slanker lichaam; overigens evenzoo gekleurd. Lengte 10—12 mm. Gemeen nabij de zeekust op ziligen kleigrond onder steenen en plantenstoffen . . . 31. *convexiuscula* Mrsh.

XIV. Tribus ZABRINI.

37. Zabrus Clairv.

Bovenlip weinig breder dan lang, van voren min of meer uitgerand of nagenoeg afgeknot. Tasters tamelijk slank, de eindledjes naar het uiteinde iets versmald, aan het uiteinde afgestompt, korter dan de voorlaatste ledjes; het eindlid der kaaktasters meestal slechts half zoo lang als het voorlaatste. Kin diep uitgesneden, met een gewonen of aan het uiteinde gedeelden tand. Tong van voren afgeknot of uitgerand, met twee borstelharen bezet; de paraglossen aan het uiteinde vrij, de tong niet of slechts weinig overschrijdend. Pooten vrij kort, doch krachtig ontwikkeld, de schenen aan het uiteinde verbreed, de middel- en achterschenen aan de buitenzijde sterk gedoorn. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-ledjes verbreed en op de onderzijde zelig beschubd.

Van de 57 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Pekzwart of pekbruin, veelal met uiterst zwakken bronsglans; de onderzijde lichter pekbruin. Spriet en schenen en tarsen bruinrood. Dekschilden met tandvormig uitstekende schouderhoeken en lange scutellair-streep. De zijden van het prosternum zijn fijn, die van het meso- en metasternum en de sterniten zeer krachtig bestippeld. Gevleugeld. Het ♂ is wat meer glanzig dan het ♀. Lengte 12½—15 mm. In de diluviale streken en vooral in Limburg gemeen. In bouwland en korenvelden onder steenen en aardkluiten. De larve knaagt aan de jonge korenscheuten boven den grond, de kevers zijn schadelijk door het vreten aan de nog onrijpe korrels van tarwe-, rogge- en gerstaren. Larve en pop zijn door Germar beschreven. (gibbus F.) 1. *tenebrioides* Goeze.

XV. Tribus HARPALINI.

38. Ophonus Steph.

Voorlaatste liftaster lid op de binnenzijde met verscheidene borstelharen bezet. De oogen zijn, op de onderzijde van den kop, van de uitranding der achterkaken duidelijk afgescheiden. Halsschild in de achterhoeken zonder borstelhaar. Voorschienen binnen de gewone eindspoor zonder spoorvormige voortzetting. Dit genus is vooral van *Harpalus* onderscheiden door de op de bovenzijde behaarde tarsen. De achtertarsen zijn op de onderzijde in de middellijn onbehaard. Bij het ♂ zijn de 4 verbrede ledjes der voor- en middeltarsen op de onderzijde in twee langsrijen zelig beschubd, zeer zelden zijn de middeltarsen gewoon. — De soorten van dit genus zijn gevleugeld, bij *O. azureus* zijn de vleugels soms rudimentair. — Zij leven meestal overdag, in gangen onder steenen op dorre of zandige plaatsen. Dikwerf vliegen zij rond op warme avonden. — De larve van *O. pubescens* is door Schiödte beschreven.

Van de ± 40 Europeesche soorten komen 12 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Slapen met een bundeltje afstaande haartjes tegen den buitenrand der oogen 2
- Slapen volkomen onbehaard. Kop onbestippeld 13
- 2 Eerste lid der achtertarsen even lang als de twee volgende te zamen (Sub-gen. *Paraphonus* Ganglb.). Dekschilden geelachtig-grijs, liggend behaard. Kop fijn en verspreid bestippeld. Bovenzijde van het lichaam pekzwart of donkerbruin, soms de dekschilden lichtbruin. Halsschild met roodachtig doorschijnenden zijrand. Spriet en pooten licht bruingeel, de middelste sprietledjes gewoonlijk bruinachtig. De var. **complanatus* Dej. is veel grooter, het midden van het halsschild is zeer verspreid bestippeld en de spriet en pooten zijn gewoonlijk geheel geel. (In Westfalen). Lengte 5½—6½ mm. Op klei- en kalkgrond. Zierikzee, Oldenzaal en in

- Zuid-Limburg. Ook bij Aken en in België soms vrij gemeen langs de Maas na overstroomingen 9. *maculicornis* Dfts.
- Eerste lid der achtertarsen duidelijk korter dan de twee volgende te zamen. De zeer korte beharing der dekschilden is recht opgericht en van ter zijde beschouwd, duidelijk zichtbaar (*Ophonus* l.sp.) 3
- 3 Kop duidelijk bestippeld. Pooten geheel rood. 4
- Kop onbestippeld. Dijen gebruint. Halsschild op het midden bijna glad, aan de basis gerand. Pekzwart, de sprieten, schenen en tarsen geelrood; de middelste sprietleedjes bruin. Lengte 6—7 mm. Niet inlandsch. In België bij Ixelles, Leuven en Baudour; ik zag exemplaren uit de coll. *Hesmael*. Ook in de Rijnprov. bij Aken (*signaticornis* Dfts.)
- 4 Halsschild zonder aanduiding van eenigen randzoom aan de basis. 5
- Halsschild langs de geheele basis, of ten minste naar de achterhoeken, zeer fijn gerand. 11
- 5 Halsschild met afgeronde of zeer stompe achterhoeken. Bovenzijde blauw of groen 6
- Halsschild met scherp aangeduide, nagenoeg rechte achterhoeken 9
- 6 Achterhoeken van het halsschild stomp, duidelijk aangeduid. Halsschild breeder dan lang, op het midden grof en tamelijk verspreid, voor de basis echter fijner en veel dichter bestippeld; op de onderzijde aan de zijden grof bestippeld. Dekschilden voor het uiteinde slechts zeer zwak uitgerand, in de tussenruimten vrij sterk en dicht bestippeld. Kop en halsschild pekzwart of pekbruin, de dekschilden metallisch-blauw of groenblauw. Onderzijde roodbruin, de sprieten en pooten rood. De korte, opgerichte beharing der bovenzijde van het lichaam is bruingeel. Lengte 12—15 mm. Op kalkheuvels onder steenen. Niet inlandsch. Niet zeldzaam in België. Ik zag exemplaren uit Maeseyck, Dinant, Marche en Rochefort. Ook bij Aken en in Westfalen (*sabulicola* Panz.)
- Achterhoeken van het halsschild meer breed afgerond. 7
- 7 Halsschild enigszins vierhoekig, de zijranden niet cirkelboogsgewijs in den achterrand overgaande; met afgeronde achterhoeken 8
- Halsschild breed schijfvormig, met als in een cirkelboog zeer breed afgeronde achterhoeken, naar de basis sterk versmald en daardoor van voren veel breeder dan van achteren. Kop en halsschild pekzwart of pekbruin met blauwen weerschijs, de dekschilden meer of minder levendig blauw; bij de abe. *discollis* Walt is de bovenzijde geheel bruin of slechts met uiterst zwakken blauwachtigen weerschijs. Onderzijde roodbruin. Sprieten en pooten geelrood. Deze soort is van *diffinis* onderscheiden, door de uiterst korte, moeilijk zichtbare beharing, de meer breed afgeronde achterhoeken, de sterker afgeronde zijden en het meer gewelfde en fijner bestippelde midden van het halsschild, alsook door het meer duidelijk uitgerande uiteinde der lijner gestreepte dekschilden. De tussenruimten der dekschilden zeer dicht en lijner dan bij *diffinis* bestippeld. Lengte 10—12½ mm. Niet inlandsch. Zou bij Marche in de Belg. prov. Luxemburg voorkomen 1). (*rotundicollis* Fairm. et Laboulb.)
- 8 Bovenzijde donkergroen of zwartachtig-groen, met korte opstaande zwarte beharing. Onderzijde roodbruin. Sprieten en pooten geelrood of bruinrood. Kop iets minder grof en wat dichter dan bij *sabulicola* bestippeld. Halsschild op het midden grof en tamelijk dicht, voor de basis iets lijner en dichter bestippeld. Dekschilden meer gestrekt en met meer parallele zijden dan bij *sabulicola*, voor het uiteinde veel sterker uitgerand; in de tussenruimten lijner en dichter bestippeld. Lengte 13—15 mm. Deze soort jaagt op *Umbelliferen*, o. a. op *Pastinaca sativa*. Eenmaal bij Oud-Vroenhoven nabij Maastricht. Ook in Westfalen en in België bij Leuven. 1. *obscurus* F.
- Kop en halsschild bruinzwart, met blauwachtigen weerschijs; de dekschilden blauw of groenachtig-blauw. Van *obscurus* onderscheiden door de kleur, de geringere grootte, de iets meer afgeronde achterhoeken van het halsschild, de aan het uiteinde veel minder merkbaar uitgerande dekschilden, door de iets krachtiger en wat minder dichte bestippeling der tussenruimten en door de korte, opstaande, bruingele beharing der bovenzijde. Halsschild van voren slechts weinig breeder dan aan de basis. Kop en halsschild grof bestippeld. Dekschilden diep gestreept, de tussenruimten dicht en krachtig bestippeld. De beharing is duidelijker en langer dan bij *rotundicollis*. Lengte 10—12 mm. Op zeelei, langs rivieroeveren en op kalkgronden; dikwerf op de schermen van *Daucus carota*. Roosteren (Limburg); meermalen bij Kolhorn (N.-Holl.). In België bij Blankenberghe en Strée 2. *diffinis* Dej.
- 9 Bovenzijde groen, blauwachtig of blauwachtig-violet (abe. **laticollis* Mannh.). Halsschild op het midden krachtig en verspreid, de dekschilden tamelijk fijn en vrij dicht bestippeld. Sprieten en pooten roodgeel. Lengte 9—10 mm. Op klei- en kalkgrond verbreid,

1) Belgische exemplaren uit Blankenberghe en Strée die ik zag, waren *diffinis*.

doch zeer zeldzaam. Meermalen in Gelderland aangetroffen. Een exemplaar uit Arnhem heeft donker roodbruine sprieten en pooten. Ook in de Rijnprov. bij Aken en Dusseldorf.

3. *punctatulus* Dfts.

Bovenzijde lichter of donkerder bruin 10

- 10 Tweede sprietlid duidelijk korter dan het vierde. Dekschilden langwerpig, vlakgedrukt, de fijne scherpe zijrand om den schouder afgerond. Bij het ♀ is de achterrand van het laatste sterniet in 't midden tot een klein bultje opgericht. Deze soort is na verwant aan *rufibarbis*, doch smaller en meer gestrekt en grover bestippeld. Halsschild meer hartvormig. Kop en halsschild veelal licht bruinrood. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam, onder steenen. Vlissingen en St. Pieter (Limburg). (subcordatus Dej.) 4. *rupicola* St.

Tweede sprietlid slechts iets korter dan het vierde. Dekschilden ovaal, tamelijk gewelfd, de lijne scherpe zijrand hoekig op den basaalrand stootende. Bij het ♀ is de achterrand van het laatste sterniet gewoon. Bovenzijde bruinzwart, de kop en het halsschild soms lichter of donkerder roodbruin. Sprieten en pooten licht bruinrood. Lengte 6—8 mm. Overal gemeen, onder steenen en dorre bladeren (brevicollis Dej.) 5. *rufibarbis* F.

- 11 Bovenzijde blauw of groen (ab.c. *chlorophanus* Pz.). Sprieten, tasters en pooten geelrood. De var. **cribricollis* Dej. is donker-violet of zwartachtig met bruinroode sprieten, tasters, schenen en tarsen, benevens zwartachtige dijen. Achterhoeken van het halsschild stomp of min of meer afgerond. Dekschilden dichter bestippeld dan het halsschild. Bij de var. *cribricollis* Dej. zijn kop en halsschild veel dichter, de dekschilden veel fijner en veel dichter bestippeld dan bij het type. Lengte $6\frac{1}{2}$ —8 mm. Zeldzaam op klei- en kalkgrond. Breda, Zierikzee en in Limburg. Ook in België op vele plaatsen 8. *azureus* F.

Bovenzijde lichter of donkerder bruin, of wel kop en halsschild lichter dan de dekschilden gekleurd. Achterhoeken van het halsschild nagenoeg recht 12

- 12 Halsschild in vorm veranderlijk, bij de typische exemplaren min of meer hartvormig, aan de zijden van voren sterker afgerond en achter het midden sterker uitgerand; bij de kleinere var. *parallelus* Dej. (*Melleti* Heer) van voren veel smaller en minder afgerond, naar achteren minder versmald en daardoor meer vierhoekig; de top der achterhoeken is in de as van de zesde streep der dekschilden gelegen. Deze soort gelijkt overigens op *rufibarbis*, doch heeft een iets kleineren kop, een minder kort en minder breed, aan de basis gewoonlijk duidelijk gerand en op het midden grover bestippeld halsschild en over het algemeen dichter bestippelde tusschenruimten der dekschilden. De beharing der bovenzijde van het lichaam is zwart. Wellicht eene varieteit van *rufibarbis*. Lengte 6— $8\frac{1}{2}$ mm. Op leem- en kleigrond verbreid, doch zeer zeldzaam, onder steenen en soms op *Daucus carota*. De var. *parallelus* bij Middelburg en in de omstreken van Maastricht. 6. *puncticollis* Payk.

Halsschild naar achteren veel sterker uitgerand en versmald, aan de basis scherp gerand; de top der achterhoeken in de as van de vijfde streep der dekschilden gelegen; minder verspreid bestippeld en voor de basis aan weerszijden met een duidelijken langsindruk. Bovenzijde geheel donkerbruin of wel de dekschilden met roodachtigen naad en zijrand, veelal ook de kop en het halsschild, soms de geheele bovenzijde lichter of donkerder bruinrood. Strepen der dekschilden zichtbaar bestippeld. De beharing der bovenzijde van het lichaam is bruingeel. Lengte $6\frac{1}{2}$ —9 mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam onder steenen 7. *cordatus* Dfts.

- 13 Alle tusschenruimten der dekschilden bestippeld en behaard (Sub-gen. *Pseudophonus* Motsch.). Pooten roodachtig 14

Tusschenruimten der dekschilden glad en onbestippeld, de negende en ook een gedeelte van de achtste zeer fijn bestippeld en zwak behaard (Sub-gen. *Pardileus* Gozis). Pekzwart, de sprieten, tasters en tarsen bruinrood; de dijen en schenen donker gekleurd. Lengte 12—13 mm. Op velden onder steenen en aardkluiten, op zand- en kalkbodem. Niet zeldzaam in de diluviale streken en in Zuid-Limburg 12. *calceatus* Dfts.

- 14 Achterhoeken van het halsschild met een scherp uitstekenden top. Achterlijf in 't midden glad en onbehaard, aan den omtrek bestippeld en eenigszins behaard. Pekzwart, de sprieten, tasters en pooten geelrood. Lengte 13—15 mm. Overal zeer gemeen; zij schijnt soms plantaardige stoffen te eten en was o. a. eenmaal schadelijk aan aardbeziën (*Ritzema Bos*).

(*ruficornis* F.) 10. *pubescens* Müll.

Achterhoeken van het halsschild niet uitstekende, met eenigszins afgeronden top. Achterlijf op het midden bestippeld en eenigszins behaard, aan den omtrek glad en onbestippeld. Deze soort gelijkt zeer op *pubescens*, doch is veel kleiner. Halsschild op het midden niet of slechts mierst zwak bestippeld. — Lengte 8—11 mm. Niet zeldzaam in de heidestrekten.

11. *griseus* Panz.

39. Harpalus Latr.

Bovenlip aan den voorrand recht afgeknot of zwak uitgerand. Voorkaken kort en krachtig, met vrij stomp uiteinde. Eindlid der tasters spoelvormig. Voorlaatste lip-tasterlid op de binnenzijde met verscheidene borstelharen bezet. Kintand klein, spits of stomp, soms onduidelijk. Tong aan het uiteinde met twee borstelharen bezet. Paraglossen aan het uiteinde afgerond, aan de zijden beweimperd. Sprieten tamelijk kort, van af het derde lid behaard. De oogen zijn, op de onderzijde van den kop, van de uitranding der achterkaken duidelijk afgescheiden. Tarsen op de borenzijde kaal. Bij het ♀ zijn de dekschilden in den regel dof. Bij het ♂ zijn de eerste 4 leedjes der voor- en middeltarsen verbreed en op de onderzijde in twee langsrijen zelig beschubd. De voortarsen zijn in den regel sterker verbreed dan de middeltarsen. — De soorten van dit genus zijn verdeeld, soms zijn de vleugels rudimentair (*H. neglectus*, *atratus*). Levenswijze als bij *Ophonus*. — Larve en pop van *H. aeneus* zijn door Schiodte beschreven. Zimmermann deelt iets mede omtrent de larve van *H. serripes*.

Van de 85 Europeesche soorten komen 24 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De buitenste tusschenruimten der dekschilden geheel dicht bestippeld en lijn behaard. Kleur veranderlijk, metallisch-groen (ab.e. *viridis* Schilsky), bronskleurig, koperrood, bruin-eritskleurig, blauw (ab.e. *azureus* Dfts., *coerulescens* Schilsky, bij Rotterdam en op Texel), of zwartachtig (ab.e. **melas* Dalla Torre). Sprieten, tasters en gewoonlijk ook de pooten geelrood; bij den vorm *confusus* Dej. zijn de pooten zwartbruin. Bij het doffere ♀ is de buitenrand der dekschilden nabij den top, evenals bij het ♂ diep uitgerand. Bij het type zijn slechts de 2 of 3 buitenste tusschenruimten bestippeld, bij abs. *limbopunctatus* Fuss loopt de bestippling in meerdere of mindere mate ook op de binnenste tusschenruimten door (bij Steenwijk), bij abs. **interstitialis* Gredl. zijn slechts de afwisselende binnenste tusschenruimten meer of minder dicht bestippeld. Lichtbruin- of groenachtig-bronskleurige, niet volkomen uitgekleurde wijfjes met smal geel omzoomde dekschilden, werden als *elegans* Preller geduid. Lengte 8–10½ mm. Overal zeer gemeen, vooral de ab.e. *viridis* Schilsky., de vorm *confusus* Dej. zeldzamer 1. *aeneus* F.
- De buitenste tusschenruimten der dekschilden onbestippeld en onbehaard, met uitzondering van de normale stippen op de negende tusschenruimte en aan het uiteinde der achtste tusschenruimte. 2
- 2 Voorschenen niet aan haren buitentophoek uitgetrokken. 3
- Voorschenen aan haren buitentophoek duidelijk lobvormig uitgetrokken. Achterdijen aan de binnenzijde met een aantal haarstippen. Bij het ♀ is de naadhoek der dekschilden in een tand uitgetrokken. Lichaam geheel roestrood of roestgeel. Op zandgrond, tusschen plantewortels. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland, Westfalen en België. Ik bezit een exemplaar uit Maesijck. Ook bij Genck. Lengte 10–13 mm. . (ferrugineus F.) (*rufus* Brüggenm.) 1)
- 3 Uiteinde van de achtste tusschenruimte der dekschilden zonder stippelij. 4
- Uiteinde van de achtste tusschenruimte der dekschilden met eene stippelij. Zijden van het halsschild scheef naar de achterhoeken ingedrukt. Achterdijen met een groot aantal haarstippen. Bovenzijde zwart of roodbruin (ab.e. **lecolor* Fairm.), de tasters en sprieten roestrood, de wortel der tasterleedjes en van het tweede en vierde sprietlid meestal zwartachtig; pooten pekkbruin met roodachtige tarsen. Dekschilden bij het ♀ dof. Lengte 9–10½ mm. Zeer zeldzaam in de duinstreken. Bij den Haag en IJmuiden. Ook in België bij Heijst en Blankenberghe 16. *melancholicus* Dej.
- 4 Halsschild aan de geheele basis bestippeld, in 't midden daarvan soms onduidelijk 5
- Halsschild aan de basis slechts in de indrukken of nog in de onmiddellijke omgeving van dezen bestippeld (vergelijk ook sommige exemplaren van *luteicornis* en *attenuatus*). . . . 16
- 5 Vierde en vijfde sterniet, behalve met de beide normale borstelharen aan weerszijden op het midden, nog met eenige kleinere haarstippen of in grootere uitbreiding behaard 6
- Vierde en vijfde sterniet behalve de beide normale borstelharen zonder verdere beharing. . . 8
- 6 Zevende tusschenruimte der dekschilden voor het uiteinde zonder rij stippen 7

1) Ik betwijfel het voorkomen van *H. ferripes* Panz. (III.?) bij Dusseldorf, denkelyk is dit *H. ferripes* Dts. syn. *dimidiatus* Rossi).

Zevende tusschenruimte der dekschilden voor het uiteinde met eene rij stippen. Zwart, halsschild gewoonlijk blauwgroen, blauw of violet, niet zelden ook de dekschilden met blauwen weerschijn. Sprietwortel rood. Uiteinde der taster-leedjes of de geheele tasters geelrood. Pooten pekzwart of pekbruin, zeer zelden de sprieten, tasters en pooten geelrood (in België). Uiteinde van de vijfde tusschenruimte der dekschilden met eene rij van 2—4 stippen. Lengte 12—14 mm. Op kalkbergen onder steenen. Meermalen in de omstreken van Maastricht. Ook bij Roermond op zandgrond. In België bij Maeseijck.

(caspinus Stev., semiviolaceus Dej.) 4. **dimidiatus** Rossi.

- 7 Pooten en sprieten geheel helder rood. Halsschild met een duidelijken scheeven zij-indruk naar de rechte, duidelijk aangeduide achterhoeken. Pekzwart, de zijranden van het halsschild in den regel roodachtig doorschijnend. Dekschilden bij het ♂ glanzig groenachtig of blauw-violet, bij het ♀ dof bruin, bij uitzondering gedeeltelijk roodbruin. Lengte 9—11 mm. Verbreed, doch zeldzaam. Op zandgrond onder steenen. . . . (discoides Er.) 3. **smaragdinus** Dfts.

Pooten en sprieten grootendeels bruin, het eerste sprietlid rood, de dijen pekzwart, de schenen en tarsen pekbruin of roodbruin. Halsschild zonder aanduiding van een scheeven zij-indruk, de achterhoeken bijna recht, slechts aan den top iets afgerond en daarvoor veel zwakker uitgerand dan bij *aeneus*. Kleur zeer veranderlijk, de bovenzijde metallisch-groen (ab.c. *virens* Schilsky), koperkleurig, bronskleurig, blauw of violet (ab.c. **coeruleus* Schilsky, bij Brussel), soms zwartachtig. Bij onuitgekleurde exemplaren is de onderzijde en zijn de pooten geelrood. Lengte 8—11 mm. Overal vrij zeldzaam op velden en wegen, op leem- en kleibodem en op diluvialen zandgrond. Het meest de ab.c. *virens* Schilsky.

(? psittaceus Fourc.) 2. **distinguendus** Dfts.

- 8 Episternen van den metathorax smal en zeer verlengd. Basis van het halsschild buiten de indrukken meer of minder duidelijk bestippeld. Achterdijen met 4 of 5 haarstippen . . . 9

Episternen van den metathorax kort of slechts iets verlengd . . . 10

- 9 Schenen, tarsen en sprieten lichtrood. Halsschild zonder zij-indruk nabij de scherpe of rechte achterhoeken; de basis buiten de indrukken verspreid van een scheeven zij-indruk. Bovenzijde zwart, de zijranden van het halsschild veelal roodachtig doorschijnend. Bij het ♀ is de naadhoek der dolf de dekschilden iets uitgetrokken. Lengte 8—9 mm. Zeer zeldzaam op dorre plaatsen onder steenen. Bergen-op-Zoom, Roosteren, Roermond en Gorssel. Ook in België bij Blankenberghe en Enghien (attenuatus Steph.) 12. **consentaneus** Dej.

Schenen pekzwart, de sprieten roodachtig, de basis der middelste sprietleedjes gebruind. Halsschild gewoonlijk met een duidelijken zij-indruk, de achterhoeken eenigszins stomp, aan den top afgerond. Lichaam zwart, op de bovenzijde gewoonlijk met geringen blauwachtigen weerschijn. Uiteinde van de vijfde en zevende tusschenruimte der dekschilden met eene rij stippen (var. *Solieri* Dej.), of alleen de zevende tusschenruimte met eenige stippen. Lengte $9\frac{1}{2}$ —10 mm. Niet inlandsch. In België. Ik zag exemplaren uit Mons en uit de vallei van de Ourthe.

(tenebrosus Dej.)

- 10 Zevende tusschenruimte der dekschilden voor het uiteinde met eene rij stippen. Kop en halsschild zwart, meestal met blauwachtigen weerschijn, de zijrand van het halsschild roodachtig doorschijnend, de dekschilden bij het ♂ glanzig, meestal metallisch-blauw of blauw-groen, zeldzamer glanzig zwart (ab.c. *fulvipes* Dfts., bij Bussum en Putten (N.-Brab.)), bij het ♀ dofzwart, meestal met uiterst zwakken blauw-of groenachtigen weerschijn. Sprieten, tasters en pooten geelrood; bij de var. *sobrinus* Dej. zijn de dijen pekzwart, de schenen en tarsen bruinrood. De vijfde tusschenruimte der dekschilden zelden voor het uiteinde met 1 of 2 stippen. Lengte $8\frac{1}{2}$ —11 mm. Gemeen onder steenen op zand- en kalkgrond. De var. *sobrinus* bij Goor 5. **rubripes** Dfts.

Zevende tusschenruimte der dekschilden voor het uiteinde zonder eene rij stippen . . . 11

- 11 Zijden van het halsschild achter het midden duidelijk uitgerand 12

Zijden van het halsschild achter het midden niet uitgerand 13

- 12 Halsschild ongeveer $\frac{1}{3}$ breder dan lang, tusschen het midden en de rechte achterhoeken zeer duidelijk uitgerand, aan de basis in de indrukken lijn en dicht, daarbuiten meer verspreid en soms onduidelijk bestippeld. Dekschilden met tandvormig uitstekende schouderhoeken. Zwart, de sprieten, tasters, schenen en tarsen roestrood, de dijen donker gekleurd; soms zijn de pooten geheel geelrood (var. **subsinnatus* Dfts.); bij het ♀ zijn de dekschilden doffer. Eerste lid der achtertarsen ongeveer tweemaal zoo lang als het derde. Lengte $10\frac{1}{2}$ —12 $\frac{1}{2}$ mm. Eenmaal bij Maastricht gevangen. Type en var. in België bij Maeseijck, Namen, Dinant, Ixelles, Ridderborn en Fleurus. Ook in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld.

(hottentotta Dfts.) 10. **atratus** Latr.

Halsschild veel breder dan lang, naar achteren aan de zijden sterk uitgerand en versmald, hartvormig. Dekschilden met afgeronde, niet tandvormig uitstekende schouderhoeken, vlak

gewelfd en in beide seksen glanzig. Glanzig pekbruin of roodbruin, de zijranden van het halsschild veelal roodachtig, soms is dit geheel roodachtig. Sprietwortel, tasters en pooten roodgeel, bij de in den regel iets grootere zwarte var. *nitens* Heer zijn de dijen pekzwart. Eerste lid der achtertarsen ongeveer driemaal zoo lang als het derde. Lengte $6\frac{1}{2}$ —8 mm. In bosschen onder dorre bladeren. Bij Oldenzaal. De var. *nitens* in Zuid-Limburg bij Wijnandsrade. Ook in de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld en op vele plaatsen in België.

11. *laevicollis* Dfts.

- 13 Voorrand van het halsschild slechts zwak uitgesneden. 14

Voorrand van het halsschild tamelijk diep uitgesneden. Halsschild evenals het geheele lichaam, geheel zwart, de dekschilden bij het ♀ dof. Sprieten en tasters roestrood, de dijen pekzwart of pekbruin, de schenen en tarsen roodbruin of roestrood. Soms zijn de dijen rood en over een groot gedeelte van het midden bruin. Achterdijen van binnen meestal slechts met 3 haarstippen. Lengte $8\frac{1}{2}$ —10 mm. Zeer zeldzaam. Bij de Bilt, Venlo en Roermond. Ook in Westfalen en op vele plaatsen in België 9. *fuliginosus* Dfts.

- 14 Dekschilden in de derde tussenruimte slechts met één stip. Zijrand van het halsschild roodachtig doorschijnend. 15

Dekschilden in de derde tussenruimte met 2 of 3 stippen. Zijrand evenals de rest van het halsschild gekleurd. Deze soort is naverwant aan *latus*, doch gewoonlijk veel grooter en meer gestrekt. Halsschild met diepere basaal-indrukken. Sprieten en pooten geelrood; soms zijn de pooten donkerbruin, alsook de middelste sprietleedjes donkerbruin gevlekt. Lengte 10—11½ mm. Uiterst zeldzaam. Een ♀ bij den Haag; ook op den St. Pietersberg bij Maastricht. 7. *quadripunctatus* Dej.

- 15 Middenrand der kin zeer duidelijk. Basis van het halsschild dicht bestippeld, aan de achterhoeken slechts smal roodachtig. Bovenzijde zwart, soms de kop en het halsschild roodbruin; de dekschilden bij het ♂ glanzig, bij het ♀ dof. Sprieten, tasters en pooten geelrood. Lengte 8—10 mm. Niet zeldzaam in bosschen onder steenen en mos.

(*fulvipes* F., *limbatus* Dfts.) 6. *latus* L.

Middenrand der kin bijna ontbrekend. De basis van het halsschild zwakker bestippeld, aan de achterhoeken iets breder roodachtig; in den regel ook aan de basis roodachtig gerand. Deze soort is naverwant aan *latus*, doch veel kleiner. De achterhoeken bij het ♂ zijn scherper rechthoekig, de basaal-indrukken iets dieper. De dekschilden iets lijner gestreept. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7½ mm. Zeldzaam onder steenen en mos. 8. *luteicornis* Dfts.

- 16 Dekschilden in de derde tussenruimte tegen de tweede streep aan, achter het midden, met één stip, zelden met nog een of meer stippen daarvoor. 17

Dekschilden in de derde tussenruimte zonder stip (vergelijk ook sommige exemplaren van *H. servus*, *anxius* en *modestus*). Halsschild met breed afgeronde achterhoeken (Subgen. *Actephilus* Steph.). De kleinste soort van het genus. Pekzwart of pekbruin, de zijranden van het halsschild gewoonlijk roodachtig doorschijnend. Sprieten en tasters roodgeel, pooten roodbruin, de dijen gewoonlijk en soms ook de schenen pekbruin. Lengte $3\frac{1}{2}$ —6 mm. Zeer gemeen op zandgrond, vooral in de duinen. 24. *picipennis* Dfts.

- 17 Halsschild naar achteren duidelijk rechthoekig, of iets uitgerand versmald. 18

Halsschild aan de zijden, tot aan de achterhoeken, iets afgerond, naar achteren bijna niet versmald. 20

- 18 Achterdijen met 4—6 haarstippen aan den binnenrand. Vierde en vijfde sterniet, behalve met de beide normale haarstippen, hoogstens met eenige weinige kleinere haarstippen. Achterhoeken van het halsschild hetzij recht, hetzij iets stomp, met zeer smal afgeronden top . 19

Achterdijen met 8—9 haarstippen aan den binnenrand. Derde tot vijfde sterniet aan weerszijden met een groot aantal afstaande borstelharen. Achterhoeken van het halsschild stomp, aan den top breder afgerond. Zwart, de dekschilden bij het ♀ tamelijk dof. Sprieten zwartachtig, het eerste lid rood, de 3 volgende aan de basis zwartachtig, de tarsen roodbruin of roestrood. Bij het ♀ is de naadhoek der dekschilden in een korten tand uitgetrokken. Lengte 6—8 mm. Niet zeldzaam, vooral in duinstreken. Ook bij Maastricht en Venlo.

(*piger* Gyllb.) 15. *neglectus* Dej.

- 19 Bovenzijde koolzwart, de tasters en de sprieten, behalve de wortel van het tweede en derde of ook der volgende leedjes roestrood, de dijen zwartbruin, de schenen pekbruin en de tarsen roodachtig. Halsschild naar achteren versmald, met nagenoeg rechte zijden en stompe, iets afgeronde achterhoeken. Bij het ♀ zijn de dekschilden dof, de naadhoek is gewoon. Lengte 8—10 mm. Zeer zeldzaam op zandgrond onder steenen. Arnhem, IJmuiden, Tiel, St. Pieter. Ook in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld en in België bij La Roche, Beverloo en Herenthals.

(*ignavus* Dfts.) 13. *rufitarsis* Dfts.

Naverwant aan *rufitarsis*, doch onderscheiden door de blauwzwarte, blauwe, groene of blauwgroene bovenzijde van het ♂ en de tandvormig uitgetrokken naadhoek der dekschilden

bij het ♀. Het ♀ vertoont veelal slechts een geringen blauwen weerschijn. De achterhoeken van het halsschild zijn bijna recht en de zijden naar achteren iets uitgerand. Lengte 8—10 mm. Onder steenen zeer zeldzaam. Bij Utrecht, Ede en Dieren. Ook in de Rijnprov. en in Westfalen (ignavus Schaum, nitidus St.) 14. **honestus** Dfts.

20 Derde en vijfde sterniet aan weerszijden slechts met een groot aantal haarstippen 21

Vierde en vijfde sterniet aan weerszijden slechts met één haarstip 22

21 Deze soort gelijkt zeer op *tardus*, doch zij is meer gewelfd, het halsschild is naar voren wat meer versmald, de achterdijen en de zijden van het achterlijf zijn bewimperd. Van *fuscipalpis* is zij onderscheiden door het veel kortere en meer gewelfde lichaam en de geheel geelroode sprieten en tasters. Lengte $8\frac{1}{2}$ —10 mm. Verbreed op zandgrond, doch overal zeer zeldzaam. (seguis Dej., *tardus* Bedel) 17. **Frölichii** St.

Zwart, op de bovenzijde soms met uiterst geringen groenachtigen weerschijn. Dekschilden soms bruinachtig. Sprieten en tasters bruinzwart, het eerste, soms ook het tweede sprietlid en het uiteinde der taster-leedjes geelrood. Deze soort gelijkt overigens op *anxius*, doch is het halsschild naar voren meer versmald en zijn de dekschilden minder smal en dieper gestreept. Achterdijen met vele lange wimperharen. Lengte 7—8 mm. Niet inlandsch. Zij zou bij Crefeld en in België bij Hasselt en in Henegouwen voorkomen. Ik zag geen Belgische exemplaren (*fuscipalpis* St.)

22 Uiteinde van de zevende tusschenruimte der dekschilden zonder eenige aanduiding van eene stippelrij; de derde tusschenruimte slechts met één duidelijke stip naar het uiteinde 1). Minstens de dijen pekwart of pekbruin. Voorrand van het halsschild duidelijk uitgesneden. 23

Uiteinde van de zevende tusschenruimte met eene rij stippen; de derde tusschenruimte met twee of meer bijkomende stippen vóór de gewone stip. Voorrand van het halsschild recht afgesneden. Lichaam pekwart of pekbruin, de zijranden en de achterhoeken van het halsschild roodachtig doorschijnend. Sprieten en pooten geheel geelrood. Lengte $7\frac{1}{2}$ —9 mm. Zeldzaam onder steenen op zandige akkers en in droge bosschen, in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Ook bij Aken, Crefeld en in Belgisch Limburg. (impiger Dfts.) 18. **autumnalis** Dfts.

23 Achterrand van het halsschild nagenoeg recht of slechts zeer zwak boogsgewijs uitgesneden, de achterhoeken recht, aan den top min of meer duidelijk afgerond. 24

Achterrand van het halsschild sterk boogsgewijs uitgesneden, de achterhoeken duidelijk spits. Lichaam tamelijk breed ovaal, weinig gewelfd. Pekzwart of donker bruin, de randen van het halsschild benevens de dekschilden veelal roodbruin. Sprieten en tasters, de basis der schenen en de tarsen roestrood. Achterdijen nabij den binnenrand met eene rij van 6—8 haarstippen. Lengte $7\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen op zandgronden, vooral op de duinen onder steenen 21. **servus** Dfts.

24 Lichaam tamelijk gewelfd. Episternen van den metathorax kort, naar achteren slechts matig versmald. 25

Lichaam vlakker. Episternen van den metathorax langer, naar achteren sterker versmald 26

25 Eerste sprietlid geelrood, de 3 volgende, evenals de taster-leedjes, aan de basis zwart, de overige sprietleedjes min of meer zwart gevlekt. Deze soort is van *tardus* onderscheiden door het meer gewelfde en iets langere lichaam, het naar voren meer versmalde halsschild en de veel bredere eindspoor der voorschenen. Op de bovenzijde vertoont zich veelal een uiterst zwakke blauwachtige weerschijn. Tarsen pekbruin. De dekschilden bij het ♀ zijn minder glanzig dan bij het ♂, doch niet zoo dof als bij *tardus*. Lengte 9—11 mm. Niet zeldzaam, vooral op de duinen onder steenen. 19. **serripes** Quensl.

Sprieten en tarsen geheel geelrood, de wortel der schenen min of meer roestrood. Zwart, de dekschilden bij het ♂ glanzig, soms met uiterst geringen blauwachtigen weerschijn, bij het ♀ dof. Achterdijen aan den binnenrand met eene rij van 4 of 5 haarstippen. Kleine kleine exemplaren vormen *H. angustior* J. Sahlb. Lengte $8\frac{1}{2}$ —10 $\frac{1}{2}$ mm. Overal zeer gemeen op zandgrond. (rullimannus Mrsh.) 20. **tardus** Panz.

26 Sprieten vrij lang, het derde tot tiende lid tweemaal zoo lang als breed, veelal gebruind, zoo ook gewoonlijk de taster-leedjes aan de basis. Deze soort, welke eenigszins den habitus van eene *Amara* vertoont, is tamelijk smal, zwart; de dekschilden van het ♀ dof. De basis der schenen en de tarsen gewoonlijk roodbruin. Halsschild $\frac{1}{2}$ breeder dan lang, met rechte, aan den top min of meer afgeronde achterhoeken. Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als het halsschild. Zeer kleine exemplaren vormen *H. pumilus* Dej. Lengte 6 $\frac{1}{2}$ —8 mm. Gemeen, vooral op de duinen; ook in de heidestroken . . . (piger Dfts.) 22. **anxius** Dfts.

Sprieten vrij kort, het derde tot tiende lid $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, evenals de tasters en de tarsen geheel roestrood. De schenen aan de basis min of meer roodbruin. Overigens op

1) Bij enkele exemplaren van *H. servus*, *anxius* en *modestus* kan deze stip ontbreken of is zeer onduidelijk.

anxius gelijkende, doch korter en breeder; het halsschild is breeder, met meer afgeronde zijden en sterker afgeronde achterhoeken, ook zijn de dekschilden korter. Zwart, de zijranden in de achterhoeken van het halsschild gewoonlijk roodachtig doorschijnend. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel rood. Lengte 6—7 mm. Verbreed, doch overal vrij zeldzaam. Vooral in heidestroken (Havitsarsis Dej.) 23. **modestus** Dej.

40. Anisodactylus Dejean.

Kop bij de inlandsche soorten met twee, veelal met elkaar versmolten roode voorhoofds-plekken. De voorhoofds-groeven zetten zich veelal duidelijk voort in eene lijne, naar den binnenrand der oogen gerichte schuine lijn. Kintand slechts zwak aangeduid of geheel ontbrekend. Paraglossen aan de zijden niet bewimpeld. Halsschild in de achterhoeken sterk bestippeld en iets ingedrukt. Bij het ♂ is het tweede, derde en vierde lid der voor- en middeltarsen sterk verbreed en aan de onderzijde met eene zool van dicht opeenvolgende borstelharen bezet. Overigens als bij *Harpalus*. De wijfjes hebben iets minder glanzige dekschilden. — Levenswijze als bij *Harpalus*. — De larve van *A. binotatus* is door Rupertsberger beschreven.

Van de 7 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

- 1 Eindspoor der voorschienen gewoon, slechts in het midden iets stomphoekig verbreed. Clypeus aan weerszijden van den voorrand slechts met één haartip. Achterhoeken van het halsschild duidelijk aangeduid. Dijen der voorpooten bij het ♂ gewoon (Sub-gen. *Anisodactylus* isp.) 2
- Eindspoor der voorschienen driepuntig. Clypeus aan weerszijden van den voorrand met 2—4 haartippen. Achterhoeken van het halsschild afgerond. Dijen der voorpooten bij het ♂ met een meer of minder duidelijken stompen tand aan de onderzijde (Sub-gen. *Dichirus* Mannh.). Zwart, bovenzijde groen, zwartgroen, blauw of zwartblauw (abc. *coeruleus* Schilsky). Eerste sprietlid minstens aan de onderzijde geelrood. Voorschienen bij het ♂ aan de basis sterk ingesnoerd. Schedel uiterst fijn en onduidelijk bestippeld, nagenoeg glad. De var. *confusus* Ganglb. heeft een breeder, aan de zijden minder afgerond halsschild met minder afgeronde achterhoeken, en zwakker gestreepte, in de strepen vrij duidelijk bestippelde dekschilden 1). Lengte 9½—11 mm. Zeldzaam op zeeklei onder steenen, ook wel eens aangespoeld langs de stranden. Het type met de abc. *coeruleus* bij Nunspeet, Nijkerk en Middelburg. De var. *confusus* bij Vlissingen, Bergen-op-Zoom en Scheveningen.
(virens Dej.) 4. **poeciloides** Steph.
- 2 Voorhoofdsgroefjes door een fijn streepje met den oogrand verbonden. Epiplenren der dekschilden evenals het overige gedeelte van het lichaam zwart. De achtste streep verloopt parallel aan de zevende; de derde tusschenruimte met een stip achter het midden. Het eerste of ook nog het tweede sprietlid rood. 3
- Voorhoofdsgroefjes niet door een streepje met den oogrand verbonden. Epiplenren der dekschilden roodbruin. De achtste streep is in het midden wat dichter tot de zevende genaderd. De derde tusschenruimte zonder stip achter het midden. Lichaam zwart, de dekschilden bij het ♂ meestal met zwakken, bronzigen weerschijn. Sprietten geheel zwartachtig. Lengte 11½—13 mm. Onder steenen op vochtige plaatsen zeldzaam. Utrecht, Lochem en Zutphen. Ook in België en in de Rijnprov. Bij Genck in de Belgische prov. Limburg zou een exemplaar met roode dijnen gevangen zijn (*Petzeys*) 3. **signatus** Panz.
- 3 Zijgroef van het halsschild naar voren tamelijk breed. Dekschilden met meer parallele zijden, aan het uiteinde minder uitgerand en aldaar zeer fijn bestippeld en bij verse exemplaren vrij duidelijk behaard. Lichaam zwart. Eerste sprietlid en veelal ook het tweede geheel of slechts aan het uiteinde roodbruin. Pooten pekzwart met roodbruine tarsen, bij de var. *spureticornis* Dej. geelrood. Een kleine ♂ mm. lange vorm uit Engeland vormt de var. **atricornis* Steph. (*nigricornis* Steph.). Lengte 9—11½ mm. Zeer gemeen onder steenen en afgevallen bladeren, de var. *spureticornis* Dej. wat zeldzamer 1. **binotatus** F.
- Zijgroef van het halsschild naar voren sterk versmald. Dekschilden aan de zijden meer afgerond, aan het uiteinde sterker uitgerand en aldaar niet fijn bestippeld of behaard. Deze soort is kleiner dan *binotatus* en steeds met geelroode pooten. Lengte 8—9 mm. Zeer zeldzaam. Buiksloot bij Amsterdam en niet zeldzaam in Zuidelijk Limburg. In de Rijnprov. bij Dusseldorf en Elberfeld, in België bij Neerhaeren en in West-Vlaanderen 2. **memorivagus** Dltz.

1) Deze varietet werd ten onrechte door Schaum als *A. pseudoaeneus* Dej. geduid, welke soort in Zuid-Rusland voorkomt en uit de West-Europeesche fauna vervalt.

41. *Diachromus* Erichson.

Onderscheiden door de dicht bestippelde en behaarde bovenzijde van het lichaam. Het voorlaatste liftaster-lid op de binnenzijde met verscheidene borstelharen bezet. Paraglossen breed, van buiten onbewimperd, aan het uiteinde afgerond, de tong nauwelijks overschrijdend. Halsschild in de achterhoeken met een borstelhaar. De oogen zijn, op de onderzijde van den kop, van de uitranding der achterkaken duidelijk verwijderd. Voorschenen aan de binnenzijde, nabij de zeer groote en breede eindspoor, nog van eene tweede, doch kleinere eindspoor voorzien. Tarsen op de bovenzijde behaard. Bij het ♂ zijn de voortarsen-leedjes aan de onderzijde van eene dicht behaarde zool voorzien.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Kop roodgeel; halsschild blauw of blauwgroen, met zeer lijnen gelen zijrand; schildje zwart; de dekschilden bruingeel, op de achterhelft met eene gemeenschappelijke blauwe vlek. Onderzijde zwart. Wortel der bruinachtige sprieten, de tasters en de pooten geelrood. Bovenzijde van het lichaam dicht bestippeld en roodachtig behaard. Bij het ♂ zijn de eerste 4 tarsen-leedjes der voor- en middelpooten verbreed. Bij het ♀ staan de middelste haarstippen van het laatste sterniet verder van den achterrand verwijderd dan bij het ♂. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen op leemgrond, in mergelgroeven en aan gras- en korenhalmen. Uiterst zeldzaam. Bij Nijmegen en in Limburg aangetroffen. Ook in Belgisch Limburg en bij Aken, Dusseldorf en in Westfalen 1. **germanus** L.

42. *Dichirotrichus* Jacq. Duval.

Voorlaatste liftaster-lid op de binnenzijde slechts met twee borstelharen bezet. Oogen behaard; zij reiken, op de onderzijde van den kop, tot nagenoeg aan de onderkaaks-uitranding. Halsschild in de achterhoeken met een borstelhaar. Dekschilden zonder scutellair-streefje. Tarsen op de bovenzijde behaard. Bij het ♂ zijn de middeltarsen niet verbreed. Overigens als bij *Bradycellus*. — Zij leven deels langs de zee kust op zeeklei, deels onder dorre bladeren in bosschen. — De larve en pop van *D. pubescens* zijn door Schiodte beschreven.

Van de 9 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

- 1 Achterhoeken van het halsschild recht of eenigszins stomp. Alle tusschenruimten der dekschilden bestippeld en behaard. Voortarsen bij het ♂ met borstelachtige zool (Sub-gen. *Dichirotrichus* isp.) 2
- Achterhoeken van het halsschild afgerond. Voortarsen bij het ♂ op de onderzijde met twee rijen schubjes bezet (Sub-gen. *Trichocellus* Ganglb., *Tachycellus* Seidl. nec Moraw.) 3
- 2 Bestippeling van de tusschenruimten der dekschilden zoodanig, dat er één of twee stippels in de breedte staan. Lichaam smaller dan bij *obsoletus*. Halsschild aan de basis sterker versmald dan bij *obsoletus*. De geheele oppervlakte is veel grover en veel meer verspreid bestippeld. Kop en halsschild grof, in 't midden meer verspreid bestippeld. Het ♂ is soms geheel pekbriin, gewoonlijk geelbruin, met eene vlek op den kop, eene grootere vlek op het midden van het halsschild en eene langsvlek op elk der dekschilden zwartachtig; het ♀ is meestal eenkleurig geelbruin, soms met een zwartachtigen veeg op elk der dekschilden. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen op zeeklei, onder steenen en aardkluiten. 1. **pubescens** Payk.
- Bestippeling van de tusschenruimten der dekschilden zoodanig, dat er 3 of 4 stippels in de breedte staan. Bruingeel of roodgeel, kort geelachtig behaard, elk dekschild in den regel met eene zwartachtige langsvlek over het midden. Kop en halsschild matig sterk en matig dicht bestippeld. Halsschild hartvormig, veel breeder dan lang. Een iets kleinere en minder gewelfde vorm, met lijner en dichter bestippelde dekschilden is de var. **pallidus* Dej. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Als de vorige soort, doch zeldzaam 2. **obsoletus** Dej.
- 3 Pekzwart, de zijden van het halsschild en de dekschilden, behalve een meestal verbreedte zwarte langband naast den naad, roodachtig-geelbruin; het eerste sprietlid en de pooten roodgeel, de dijen soms zwartachtig. Halsschild naar achteren matig versmald, achter den voorrand en voor de basis hier en daar en vrij krachtig bestippeld. De twee buitenste tusschenruimten der dekschilden lijn bestippeld en behaard. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Deze meer in het Noorden van Europa voorkomende soort, werd eenmaal bij Roermond in Februari gevangen. Zij komt ook in België voor, bij Hockai. (Duitsch Sailbg.) 3. **cognatus** Gyll.

Kop pekkruin of zwart, aan weerszijden roodachtig; halsschild geelrood, veelal met eene zwartachtige vlek op het midden. Dekschilderen bruingeel, meestal met een zwartachtigen veeq naast den naad. Onderzijde, behalve het gele uiteinde van het achterlijf, zwart. Strietwortel en pooten roodgeel. Halsschild naar achteren vrij sterk versmald, achter den voorrand zwakker, soms onduidelijk bestippeld. De twee buitenste tusschenruimen der dekschilden nauwelijks merkbaar bestippeld en evenals het uiteinde zeer fijn behaard. Lengte 4 $\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam onder mos en dorre bladeren in bosschen 4. **placidus** Gylh.

43. *Bradycellus* Erichson.

Borenlijp aan den voorrand hoogstens zwak uitgerand. Eindlid der tasters spoelvormig, toegespitst; het laatste lid der kaaktasters veel langer dan het voorlaatste; het voorlaatste lipstaster-lid is van het laatste lid nauwelijks in lengte verschillend en op de binnenzijde slechts met twee borstelharen bezet. Kintand duidelijk ontwikkeld en spits. Tong smal, aan het uiteinde zwak uitgerand en met twee borstelharen bezet. Paraglossen vliezig en door eene diepe uitranding van de tong gescheiden en deze iets overschrijdend, van buiten onbetwimperd. De oogen reiken, op de onderzijde van den kop, tot aan de onderkaaks-uitranding. Halsschild in de achterhoeken zonder haarstip. Dekschilden in den regel met eene goed ontwikkelde scutellairstreep. Prosternum van voren gerand. Achterlijf aan de basis met een vlakken, dicht bestippelden en behaarden midden-indruk. Tarsen op de borenzijde kaal; de ledjes der achtertarsen op de buitenzijde niet gegroefd. Bij het ♂ zijn de 4 verbrede voortarsen-ledjes op de onderzijde in twee rijen schubachtig behaard, het verbrede 4e lid is aan het uiteinde sterk gelobd, de middeltarsen bij het ♂ zijn in den regel gewoon. — De soorten leven vooral in boschrijke streken, langs oevers, onder steenen, mos, afgevallen bladeren, enkelen onder heidekruid en plaggen.

Van de 6 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Middeltarsen bij het ♂ gewoon (*Sub-gen. Bradycellus* isp.). Roodbruine of licht rood-roode soorten van 3—4½ mm. lengte. 2
- Middeltarsen bij het ♂ zwak verbreed en op de onderzijde met twee rijen schubjes bezet (*Sub-gen. Tachycellus* Moraw.). De kleinste soort van het genus. Pekzwart of pekkruin, de naad en de zijrand der dekschilden roodbruin. Sprieten, tasters en pooten geelrood. Dekschilden meer gestrekt dan bij *collaris*, met goed ontwikkelde scutellair-streep. Achterhoeken van het halsschild afgerond, de zijden duidelijk uitgebogen. Oogen weinig uitpuilend. Lengte 2½—3 mm. Verbreed in duin- en heidestrecken onder steenen en tassen heidekruid.
4. *similis* Dej.
- 2 Achterhoeken van het halsschild duidelijk, hetzij stomp of scherp 3
- Achterhoeken van het halsschild volkomen afgerond 4
- 3 Deze soort, welke zeer op *verbasci* gelijkt, doch wat donkerder gekleurd en meer gewelfd is, heeft scherpere, meer uitstekende achterhoeken van het halsschild, met krachtiger bestippling achter den voorrand en aan de basis. Ook ontbreekt de stip in de derde tussenruimte der dekschilden. Lengte 4—4½ mm. Niet inlandsch. Op vele plaatsen in België, o. a. bij Knoeke, Groenendaal, Fleurus en Boisfort. (*distinctus* Dej.)
- Licht roodrood, de naad en de zijrand der dekschilden meestal lichter roodgeel. Sprieten en pooten roodgeel. Halsschild met stompe, doch duidelijke achterhoeken, achter den voorrand slechts lijn en onduidelijk, in de vrij diepe basaal-indrukken krachtig bestippeld. Derde tussenruimte der dekschilden met een stip achter het midden. Lengte 4—4½ mm. Op sommige plaatsen niet zeldzaam onder dood riet, stroo en steenen 1. *verbasci* Dfs.
- 4 Donker roodbruin, met lichtere randen van halsschild en dekschilden of wel geheel licht roodbruin gekleurd. Sprieten en pooten roodgeel. Basaal-indrukken van het halsschild zeer krachtig bestippeld. Dekschilden ½ maal zoo lang als breed, vrij diep gestreept, met goed ontwikkelde scutellair-streep. Lengte 3½—4½ mm. Gemeen op zandgrond onder steenen.
2. *harpalinus* Dej.
- Roedrood, de dekschilden niet zelden donkerder roodbruin. Deze soort is naverwant aan *harpalinus*, doch heeft iets sterker afgeronde zijden en smallere, minder dicht bestippelde basaal-indrukken van het halsschild, kortere dekschilden met iets meer gewelfde tussenruimten en met kortere, veelal onduidelijke of geheel ontbrekende scutellair-streep. Ongeveelseld. Lengte 3—3½ mm. Vrij gemeen onder steenen en plaggen 3. *collaris* Payk.

44. *Stenolophus* Latr.

Bovenlip aan den voorrand recht afgesneden. De stam der achterkaken aan het uiteinde uitgetrokken en het eerste kaaktaster-lid overschrijdend; de binnenste lob der achterkaken lang, naar het uiteinde slechts weinig gekromd; het tweede lid van de buitenste lob der achterkaken verlengd, iets langer dan het eerste. Eindlid der kaaktasters spoelvormig. Voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde met twee borstelharen. Kin zonder middentand. Tong van voren afgeknot, afgerond of in 't midden iets vooruitstekend, met twee borstelharen; de paraglossen vliezig, van buiten onbewimperd, de tong overschrijdend. Oogen als bij *Bradycellus*. Halsschild in de achterhoeken zonder haarstip. Dekschilden in den regel met goed ontwikkelde scutellair-streep. Tarsen op de bovenzijde kaal; de eerste 2 of 3 ledjes der achtertarsen aan de buitenzijde met eene langskiel. Bij het ♂ zijn de eerste 4 voortarsen ledjes en in den regel ook die der middeltarsen verbreed en op de onderzijde in twee rijen zedig beschuld; het vierde verbrede voortarsen-lid is bij het ♂ diep tweelobbig. — De larve en de pop van *S. teutonius* zijn door Schiödte beschreven.

Van de 9 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Halsschild geelrood 2
Halsschild zwart, met bruingelen zijrand. Dekschilden bruingeel, elk met eene groote blauwachtig-zwarte langsvlek; bij de ab.c. *Ziegleri* Panz. zijn de dekschilden, behalve de naad en de zijrand, zwart. Eerste sprietlid en pooten bleek roodgeel. Lengte 5½—6 mm. Type en aberratie gemeen onder steenen en dorre bladeren . . . (vespertinus Pz.) 3. *mixtus* Hrbst.
 - 2 Dekschilden langwerpig, de tussenruimten der strepen naar het uiteinde plotseling versmald en aldaar kielvormig gewelfd. Kop, meso- en metasternum, alsook het achterlijf zwart. Bij de ab.c. *abdominalis* Géné is het achterlijf roodgeel. Halsschild geelrood. Dekschilden geelrood, met eene groote gemeenschappelijke, blauwzwarte, iriserende vlek, welke den zijrand en het voorste derde gedeelte vrijlaat, bij de ab.c. *hirticornis* Kryn. echter tot nabij de basis reikt. De eerste twee sprietledjes en de pooten licht roodgeel. Lengte 5½—6½ mm. Verbreed en niet zeldzaam onder steenen, mos en dood riet, vooral in weilanden (vaporariorum F.) 1. *teutonius* Schrk.
- Naverwant aan de vorige soort. De dekschilden zijn korter, de tussenruimten geleidelijk versmald en naar het uiteinde slechts iets gewelfd. De dekschilden zijn eenkleurig roodgeel, min of meer iriserend of op de achterhelft met eene niet scherp aangeduide, donkere, blauwachtig iriserende en door den naad gedeelde vlek (ab.c. *affinis* Bach). Halsschild mat, korter dan bij *teutonius*. Lengte 6—7 mm. Verbreed, doch overal zeldzaam. In België bij Antwerpen. De ab.c. *affinis* bij den Haag. . (melanocephalus Heer) 2. *skrimshiranus* Steph. 1)

45. *Acupalpus* Latr.

De eindledjes der tasters veel meer toegespitst en het eindlid der kaaktasters veel langer dan bij *Stenolophus*. Voorlaatste liptaster-lid op de binnenzijde slechts met twee borstelharen bezet. Kin zonder middentand. De oogen reiken, op de onderzijde van den kop, tot aan de achterkaaks-uitranding. Halsschild in de achterhoeken zonder haarstip. Dekschilden in den regel met eene goed ontwikkelde scutellair-streep. Prosternum van voren niet gerand; het uiteinde der prosternaal-voortzetting niet met borstelharen bezet. Achtertarsen-ledjes aan de buitenzijde niet gegroefd. Tarsen op de bovenzijde kaal. — De soorten leven meestal op vochtige plaatsen, onder steenen, aanspoelsel en plantenafval.

Van de 28 Europeesche soorten komen 8 in Nederland voor.

- 1 Achterhoeken van het halsschild afgerond. Achterlijf kaal of slechts onduidelijk behaard . . . 2
Achterhoeken van het halsschild recht. Achterlijf dicht behaard (Sub-gen. *Anthracus* Motsch.). Kop zwart. Halsschild geelrood of roodbruin, in 't midden veelal zwartachtig, zelden pekkwart en slechts aan de randen roodachtig; dekschilden bruingeel, elk met eene gewoonlijk vrij groote, zwarte langsvlek. De eerste twee sprietledjes en de pooten geel. Lengte 4—5 mm. Zeldzaam op vochtige plaatsen en onder dorre bladeren. Rotterdam, de Bilt, Middel-

1) De uit het «Bois de la Coudre» bij Brussel vernielde *S. discoloratus* Fisch. zal vermoedelijk zijn *S. skrimshiranus* ab.c. *affinis* Bach

burg, Roermond en Zierikzee. In België bij Calmthout, Dourne en in het Bois de la Cambre.

3. *consputus* Dfts. 1)

- 2 Vierde lid der voortarsen bij het ♂ vrij diep uitgerand, met korte divergeerende lobben (Sub-gen. *Manicellus* Motsch.). Halsschild en dekschilden geelrood, de laatste met eene groote zwarte, blauwachtig iriserende vlek op het midden, die den naad niet bereikt en zich naar achteren verder uitbreidt dan naar voren. De eerste twee sprietledjes en de pooten roodgeel. Dekschilden met een stip achter het midden op de derde tusschenruimte. Bij de abe. *ephippium* Dej. is de zwarte vlek op de dekschilden naar voren meer uitgebreid en ook het midden van het halsschild zwart. Bij een exemplaar van deze kleur-aberratie uit Zierikzee, zijn de pooten bijna geheel pekzwart. Lengte 4—4½ mm. Op zeeklei. Zierikzee en Amsterdam.

1. *elegans* Dej.

Vierde lid der voortarsen bij het ♂ minder diep uitgerand, hartvormig (Sub-gen. *Acupalpus* isp.). Kleinere soorten van 2—3½ mm. lengte. 3

- 3 Dekschilden zonder stip in de derde tusschenruimte 4

Dekschilden in de derde tusschenruimte, met een stip achter het midden 5

- 4 Halsschild geelrood. Deze soort komt in kleur eenigszins met *elegans* overeen, doch is veel kleiner; met minder afgeronde zijden, minder afgeronde achterhoeken en onbestippelde basaal-indrukken van het halsschild. Lengte 3½—3¾ mm. Gemeen op akkers en langs oevers onder steenen en in aanspoelsel. Een exemplaar uit Oldenzaal heeft nagenoeg geheel donkere dekschilden, met geelrooden naad. 2. *flavicollis* St.

Geheel pekzwart, het eerste sprietlid en de pooten bruingeel, de naad der dekschilden naar het uiteinde gewoonlijk smal roodbruin. Lengte 3½ mm. Verbreed doch vrij zeldzaam, onder steenen en langs poelen 3. *brunnipes* St. 2)

- 5 Halsschild met eene fijne, naar achteren meer of minder uitgewischte middengroef. 6

Halsschild met eene scherp aangeduide, diepe, tot aan voor- en achterrand gewoonlijk doorlopende middengroef. Zwart, eene groote, driehoekige, de gehele basis der dekschilden innemende vlek, de naad der dekschilden en soms ook de zijranden bruingeel. Sprietwortel en pooten roodgeel. Het halsschild is meestal bruin, soms roestrood; zelden is de kop rood. Er komen onuitgekleurde exemplaren voor, bij welke de dekschilden geheel of grootendeels bruingeel zijn. Lengte 3—3¾ mm. Gemeen onder steenen en vooral op de duinen rondlopende; ook aan grashalmen 7. *meridianus* L.

- 6 Kop met de oogen duidelijk smaller dan het halsschild. Zwart, halsschild en dekschilden bruingeel, het midden van het halsschild gewoonlijk met eene meer of minder uitgebreide bruine vlek, soms nagenoeg geheel bruin en slechts aan de randen bruingeel; de dekschilden met eene zwartachtige, grootere of kleinere langsvlek, welke van voren soms een tak naar den schouder uitzendt (abe. *maculatus* Schaum). Sprietwortel en pooten bruingeel. Deze soort heeft in kleur veel overeenkomst met *elegans* var. *ephippium*, doch is veel kleiner. Lengte 3—3¾ mm. Langs poelen onder steenen en afgevallen bladeren. Niet zeldzaam. 4. *dorsalis* F.

Kop met de oogen weinig smaller dan het halsschild 7

- 7 Geelbruin, de kop donkerder, de naad en de zijranden der dekschilden, gewoonlijk ook het geheele halsschild lichter. Spriet en minstens de wortel, benevens de pooten geelachtig. Halsschild smaller en naar achteren veel sterker versmald dan bij *dorsalis*, in de basaal-indrukken slechts onduidelijk bestippeld. Lengte 2½—2¾ mm. Verbreed, doch vrij zeldzaam. (luridus Dej.) 5. *luteatus* Dfts.

Zeer naverwant aan de vorige soort, gewoonlijk iets kleiner, pekzwart, de naad en de zijranden der dekschilden gewoonlijk naar achteren smal roodbruin. Sprietwortel en pooten geelbruin. Lengte 2—2½ mm. Niet zeldzaam op vochtige plaatsen, onder dood riet en dorre bladeren.

6. *exiguus* Dej.

XVI. Tribus LICININI.

46. *Badister* Clairv.

Bovenlip tot aan de basis tweelobbig. Clypeus kort, asymmetrisch uitgesneden, de basaal-membraan der bovenlip vrijlatend. Kaaktasters lang en slank, hun eindlid smal,

1) Naverwant is de mij onbekende A. *Wimmeri* Reitter, bij welke het halsschild langer is dan bij *consputus*. Dekschilden langs de zijden met vele stippen, waarin zijwaarts lang afstaande haren staan. Halsschild licht roestrood met iets lichtere randen, de dekschilden vuil geelbruin met lichtere naad en lichtere zijden.

2) Een exemplaar uit Calmthout (coll. Puteys), als A. *naturalis* Dej. gedeterminéerd, is *brunnipes*.

naar het uiteinde versmald, stomp toegespitst of iets afgeknut. Lijftasters slechts half zoo lang als de knaklasters, met veel korter en dikker, stomp toegespitst eindlid, het voorlaatste lid met twee borstelharen. Kin in de uitranding zonder tand. Sprieten van af het derde lid behaard. Tusschenruimten der dekschilden onbestippeld, de derde tusschenruimte met twee haarstippen. Middel en achtertarsen gekield. Bij het ♂ de eerste 3 voortarsen-ledjes sterk verbreed en op de onderzijde zolig. — De soorten leven onder steenen en plantenaafval. — De larve van *B. bipustulatus* is door Schiödte beschreven. De 4 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

1 Rechter voorkaak aan de binnenzijde van den top sterk uitgerand. Linker voorkaak gewoon (Sub-gen. *Badister* isp.) 2

Linker voorkaak aan de binnenzijde van den top sterk uitgerand. Rechter voorkaak gewoon (Sub-gen. *Baudia* Ragusa). Zwart, de bovenzijde met blauwachtigen of metallischen weerschijn, de zijranden van halsschild en dekschilden, het eerste sprietlid, de tasters en de pooten bruinachtig-geel. Soms zijn de dekschilden om het schildje ingedrukt (ab. **dilatatus* Claud.) Lengte 5 mm. Onder steenen en vochtige bladeren. Zeldzaam.

4. *peltatus* Panz.

2 Halsschild roodachtig. Dekschilden roodachtig, elk met eene groote zwarte vlek, welke te zamen eene hoefijzervormige teekening vormen 3

Halsschild zwart, geel gerand. Dekschilden zwart, met gele schoudervlek en gelen zijrand. Soms ontbreekt de schoudervlek nagenoeg geheel. Enkele malen komen groote exemplaren voor met een zeer grooten kop, welke zoo breed als het halsschild is (ab. *dorsiger* Dfts., bij Leiden). Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Vrij zeldzaam onder dorre bladeren. (humeralis Bonelli) 3. *sodalis* Dfts.

3 Episternen van den mesothorax rood. Schildje altijd rood. Kop veel grooter dan bij *bipustulatus*. Halsschild naar achteren veel meer versmald. De hoefijzervormige vlek op de achterhelft der dekschilden kan volkomen in twee vlekken opgelost zijn, zeer zelden is de geheele achterhelft der dekschilden, op den naad- en zijrand na, zwart (ab. **teutonoides* Preudh. de Borre, in België bij Anderlecht). Gelijkt overigens veel op de volgende soort. Lengte 7—8 mm. Onder vochtige bladeren. Uitsluitend bij Zutphen en Maarsbergen gevangen. In de Rijnprov. bij Aken. De ab. *teutonoides* is mij niet bekend. (Cephalotes Dej.) 1. *unipustulatus* Bon.

Episternen van den mesothorax zwart. Schildje zwart of geelrood (ab. *lacertosus* St.). Kop, meso- en metasternum en achterlijf zwart, prothorax en dekschilden geelrood, de lasten op de achterhelft gewoonlijk met eene groote hoefijzervormige zwarte vlek. Sprieten, behalve de middelste ledjes, en de pooten roodgeel. De hoefijzervormige vlek der dekschilden is soms in twee vlekken opgelost (ab. **microcephalus* Steph.), eene groote dwarsvlek achter het midden en eene kleinere voor het uiteinde. Bij ab. *vinotatus* Fisch. (den Haag en Arnhem) is de voorste dwarsvlek tot eene kleine vlek gereduceerd. Zeer zelden is de geheele achterhelft der dekschilden tot op den naad en den zijrand na zwart (ab. *satyralis* Steph., bij Loosduinen, den Haag en Amsterdam). Kop in breedte iets veranderlijk. Lengte 5—7 mm. Gemeen met de ab. *lacertosus* onder dood riet en dorre bladeren 2. *bipustulatus* F.

47. *Licinus* Latr.

Bovenlip van voren min of meer asymmetrisch uitgerand. Clypeus van voren diep boegsgewijs uitgerand, de vliezige of de meer of minder verhoornde basaalmembran der bovenlip vrijlatend. Eindledjes der tasters sterk bijtormig, van de voorlaatste ledjes weinig in lengte verschillend. Kin zonder tand in het midden van de diepe vierhoekige uitranding. Vierde lijftaster-lid aan de binnenzijde met twee borstelharen bezet. Sprieten van af het vierde lid behaard. Dekschilden in de tusschenruimten der strepen bestippeld. Tarsen op de bovenzijde ongekield. Bij het ♂ zijn slechts de eerste twee voortarsen-ledjes zeer sterk verbreed en op de onderzijde zolig. — De larve van *L. granulatus* is beschreven door Mulsant et Mayet en Schiödte; de pop door Schiödte.

Van de 14 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

1 Uiteinde der prosternaal-voortzetting gerand. Dekschilden met lijne stippellijnen. Eerste sprietlid weinig dikker dan de volgende. Bovenzijde meer of minder dof (Sub-gen. *Licinus* isp.). 2

Uiteinde der prosternaal-voorzetting ongerand. Dekschilden diep gestreept en in de tussenruimten slechts uiterst lijn en verspreid bestippeld. Eerste sprietlid duidelijk dikker dan de volgende. Bovenzijde meer of minder glanzig. In habitus aan een *Pterostichus* herinnerend (Sub-gen. *Orescius* Bedel). Lichaam geheel glanzig zwart. Lengte 10—13 mm. Niet inlandsch. In België, in de Ardennen. Ik zag exemplaren uit Jemelle, Izel en St. Hubert. (Hoffmannseggii Panz.)

2 Voorrand van het halsschild geheel of grootendeels scherp gezoomd. 3

Voorrand zonder eenig spoor van een randzoom. De strepen der dekschilden vertoonen zeer lijne stippels, welke weinig verschillen van de verspreid staande stippels der tussenruimten. Lengte 13—15 mm. Deze soort zou in België, in de Ardennen, gevangen zijn. Ik zag nimmer Belgische exemplaren (*cassideus* F.)

3 Lichaam breed. Tussenruimten der dekschilden met eene enkele rij groote stippen, de derde, vijfde en zevende naar voren eenigszins gewelfd. Randzoom van den voorrand van het halsschild geheel aangeduid. Lengte 13—17 mm. Niet inlandsch. In België, in kalksteengroeven onder steenen. Ik zag exemplaren uit Flémalle en Nan-sur-Lesse. (silphoides F.) (*granulatus* Dej.) 1)

Lichaam langwerpig. Tussenruimten der dekschilden vlak, met vele verspreide stippen, welke even groot zijn als die der strepen. Randzoom van den voorrand van het halsschild in het midden niet aangeduid. Halsschild glanzig. Lengte 9—10 mm. In bosschen onder steenen en afgevalen bladeren, in zandige terreinen. Eenmaal op Walcheren. In België bij Rochefort, Arlon en in de duinen van West-Vlaanderen 1. *depressus* Payk.

XVII. Tribus OODINI.

48. Oodes Bonelli.

Sprieten van af het vierde lid behaard. Clypeus door een fijnen naad van het voorhoofd afgescheiden, van voren flauw uitgerand. Bovenlip van voren afgeknot. Eindlid der tasten van het voorlaatste lid weinig in lengte verschillend, nagenoeg cilindervormig. Kin diep uitgerand, in de uitranding met een korten, gewonen tand. Tong naar voren verbreed, aan den voorrand afgeknot en met twee borstelharen bezet. Paraglossen aan het uiteinde vrij, de tong niet of slechts weinig overschrijdend. Dekschilden met eene om het uiteinde tot aan den naad doorlopende, zijrand-kiel, welke eene scherp begrensde groef vormt; de achtste streep staat tegen den zijrand aan en vormt de binnenste grens der randkiel. Lichaam onbehaard, in habitus aan *Amara* herinnerend. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes vierhoekig verbreed en op de onderzijde van eene dichte haarzool voorzien.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Geheel zwart. De zijden van het metasternum en de episternen van den metathorax zeer duidelijk bestippeld. Lengte 8—8½ mm. Zeer verbreed, doch vrij zeldzaam onder steenen, dorte bladeren en in aanspoelsel der rivieren. 1. *helopioides* F.

XVIII. Tribus CHLAENIINI.

49. Chlaenius Bonelli.

Sprieten van af het vierde lid behaard, soms ook het derde lid iets behaard. Bovenlip recht afgeknot of uitgerand. Tasten matig lang, de eindledjes aan het uiteinde afgeknot, cilindervormig of naar het uiteinde verbreed en bijkvormig; het voorlaatste liptaster-lid van binnen meestal met 2 of meer borstelharen. Kintand korter dan de zijlobben van de kin, aan het uiteinde in den regel uitgerand. Tong aan den voorrand iets uitgerand of afgeknot, in het midden met twee borstelharen bezet. Paraglossen vliezig, aan het uiteinde van de tong afgescheiden en deze overschrijdend. Dekschilden gewoonlijk neerliggend behaard. Schenen zonder neerliggende beharing.

1) De door Westhoff uit Westfalen opgegeven *L. agricola* Ol. doelt ongetwyfeld op *granulatus* Dej.

Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes verbreed en op de onderzijde zolig behaard; het tweede en derde lid vierhoekig. — De soorten leven langs oevers, onder steenen en afgevallen bladeren. — De larve van *C. vestitus* is door Beling en Schiödt, de pop door Beling en de larve van *C. nigricornis* door Schiödt beschreven.

Van de 38 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 2 in het omliggend gebied voor.

- 1 De zijrand van het halsschild als eene lijne, scherp verheven lijn, al of niet naar de basis eenigszins opgericht (Sub-gen. *Chlaenius* l.sp.) 2

De zijrand van het halsschild dikker, de scherpe randlijn van achteren breeder, naar voren geleidelijk versmald en over de geheele lengte sterker omgebogen. Het midden van het halsschild van 3 dorsaal-groeven voorzien. Tusschenruimten der dekschilden gelijkmatig dicht korrelig (Sub-gen. *Agostenus* Motsch.) 6

- 2 Halsschild hartvormig versmald, naar achteren aan de zijden uitgerand. Bovenzijde metallisch-groen, de dekschilden dicht neerliggend behaard, met een gelen randzoom, welke aan het uiteinde plotseling verbreed is en onregelmatig wordt. Halsschild verspreid bestippeld, met een zeer smallen gelen randzoom. Spriet en pooten geheel roodgeel. Lengte 9—11 mm. Niet zeldzaam langs rivieroevers, zeldzamer langs duinplassen. (*viridipunctatus* Bedel) 1. **vestitus** Payk.

Halsschild breed vierhoekig, naar de basis meer of minder geleidelijk versmald, aan de zijden afgerond, doch naar de basis niet uitgerand 3

- 3 Dekschilden met gele epipleuren en gelen zijrand. Halsschild bijna vierhoekig, zeer dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. Bovenzijde fraai groen, de kop en het halsschild min of meer met zwakken goudachtigen weerschijn. De dekschilden dicht neerliggend grauwegeel behaard. Het achterlijf geel gerand. De eerste 3 leedjes der bruine spriet, de tasters en de pooten roodgeel. Lengte 11—12 mm. Niet inlandsch. In Oostelijk België niet zeldzaam. Ik zag exemplaren uit Angleur, Hastière en Jemeppe. Ook in de Rijnprov.

(*agrorum* Ol.) (*variegatus* Fourc.) 1)

Dekschilden eenkleurig. 4

- 4 Bovenzijde metallisch-groen of blauwgroen. Kop en halsschild meestal goud- of koperkleurig . 5

Bovenzijde zwart, de kop donker bronskleurig of groenachtig. Het halsschild en de dekschilden dofzwart, meestal met uiterst geringen bronskleurigen weerschijn, dicht neerliggend bruinachtig behaard. Lengte 11—12 mm. Langs oevers. Ik vond eenmaal een broekstuk tussehen plantenaafval langs een duinplas bij Loosduinen. In België (Mechelen, Herenthals, Groenendaal, Nieuwpoort), niet zeldzaam. Ook in de Rijnprov. bij Elberfeld.

(*holosericeus* F.) 4. **tristis** Schall.

- 5 De eerste 2 of 3 sprieteedjes roestkleurig. Het halsschild naar achteren versmald, met duidelijk aangeduide achterhoeken. Pooten geheel rood of bruinzwart, met geelroode schenen (var. *tibialis* Dej.). Bovenzijde meer of minder fraai groen, kop en halsschild gewoonlijk goud- of koperglanzig. Lengte 10—12 mm. Verbreed langs rivieroevers. De var. *tibialis* terzelfder plaatse (Schränkii Dfts.) 2. **nitidulus** Schrk.

Eerste sprieteed alleen lichtrood of bruinrood, soms bruin. Het halsschild weinig of niet naar achteren versmald, met min of meer afgeronde achterhoeken. Pooten pekbrown, bij de var. *melanocornis* Dej. geelrood. Overigens als *nitidulus* gekleurd, met groene dekschilden (abc. *viridis* Westh.), of met blauw-groene dekschilden (abc. *aeruginosus* Dalla Torre). De abc. *cupreomicans* Letzn. (*Wesmaelii* de Borre) is donker bronskleurig. Lengte 10—11½ mm. Zeer gemeen op vochtige plaatsen, onder dorre bladeren en langs slooten. De var. *melanocornis* zeldzamer, zoo ook de abc. *cupreomicans* 3. **nigricornis** F.

- 6 Zwart, de dekschilden dof glanzig. Het halsschild breed, iets smaller dan de dekschilden, op het midden met 3 dorsaal-groeven, van welke de middelste verder naar voren reikt, aan de basis dicht rimpelig bestippeld en van voren van gladde plekken voorzien, welke met grove stippels bezaaid zijn. Dekschilden tamelijk fijn gestreept, dicht bruinachtig behaard, met ingestrooide goudglanzige hartjes. Lengte 14—15 mm. Op moerasige plaatsen. Eenmaal een ♂ bij Venlo. In België bij Mons, in Westfalen bij Dorsten . . . 5. **sulcicollis** Payk.

Naverwant aan *sulcicollis*, onderscheiden door de diepere dorsaal-groeven en de grovere bestippeling van het halsschild, alsook door de kortere, aan de schouders sterker afgeronde dekschilden, welke op de tweede, vierde, zesde, achtste en negende tusschenruimte bruinachtig goudgeel, op de overige tusschenruimten fijner zwartbruin behaard zijn. Boven-

1) Ik betwijfel zeer het voorkomen van *C. velutinus* Dfts. langs den «Unter Mosel» in de Rijnprov.

dien is de naad der dekschilden van voren dakvormig opgericht, glad en glanzig. Lengte 13½—14 mm. Deze in Noord-Oostelijk Duitsland voorkomende soort zou bij Rheine gevangen zijn (♀ *sulcicollis* Payk., *caelatus* Weber) (*quadrisulcatus* Payk.)

50. *Callistus* Bonelli.

Sprieten van af het tweede lid behaard, doch het tweede en derde lid minder dicht behaard dan de volgende ledjes. Dit genus is vooral gekenmerkt door de ongelede buitenste lob der achterkaken. Bovenlip van voren zwak uitgerand. Eindlid der tasters spoelvormig toegespijst, dat der kaaktasters langer, dat der liftasters korter dan het voorlaatste lid. Voorlaatste liftaster-lid op de binnenzijde met verscheidene borstelhaaren bezet. Kintand gewoon, spits. Tong naar voren verbreed, aan den voorrand afgeknoot en met twee borstelhaaren bezet, door de vrije uiteinden der tot aan haar uiteinde aangegroeide paraglossen, ver overschreden. Lichaam en pooten neerliggend behaard. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-ledjes vierhoekig verbreed en op de onderzijde zelig behaard.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam lijn behaard. Kop blauw of blauw-groen. Sprieten zwart, met rooden wortel. Halschild en schildje bruinachtig-rood. Dekschilden elk met drie blauwachtig-zwarte vlekken, de voorhelft en het gedeelte langs den naad tusschen de beide zwarte middenvlekken, steenrood; het gedeelte van de zijden, gelegen tusschen de zwarte middenvlek en den achtersten dwarsband, alsmede het uiteinde der dekschilden grauwwit. Bij gedroogde exemplaren worden de lichte kleuren der dekschilden geelachtig. Pooten geelachtig, het uiteinde der dij en der schenen zwartachtig, de tarsen gedeeltelijk bruinachtig. Lengte 6½—7 mm. Uitsluitend gevangen in het kalkgebied om Maastricht; niet zeldzaam onder steenen langs zonnige boschranden 1. *lunatus* F.

XIX. Tribus PANAGAEINI.

51. *Panagaeus* Latr.

Fig. 8 Kaaktaster van *Panagaeus* Orig.

*Kop klein, met zeer sterk uitpuilende, half-kogelvormige oogen. Bovenlip zeer kort, driemaal zoo breed als lang, de voorrand niet of slechts zeer zwak uitgerand. Eindlid der kaaktasters op den scheef naar buiten afgeknotten top van het voorlaatste lid excentrisch en iets gebaad ingeplant (Fig. 8); de eindledjes der tasters zijn sterk bijlvormig. Kin naar voren sterk versmald, matig diep uitgerand, in het midden van de uitranding met een breeden, van voren iets uitgeranden tand. Tong aan het uiteinde breed; de paraglossen met de zijden van de tong vergroeid, deze niet of slechts zeer weinig overschrijdend. Lichaam afstaande behaard. Dekschilden met 4 roode vlekken. Bij het ♂ zijn de eerste twee voortarsen-ledjes zeer sterk verbreed en op de onderzijde dicht zelig behaard. — De larve van *P. crux-major* is door Schiodte beschreven. De beide Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.*

Zwart, op elk der dekschilden twee groote roode vlekken; de voorste vlek neemt de voorhelft der dekschilden tot nabij het schildje en de eerste tusschenruimte in, de achterste vlek vormt een tot aan de eerste streep en tot aan den zijrand doorloopenden dwarsband tusschen het midden en het uiteinde der dekschilden. Zeer zelden is de achterste vlek, evenals bij *P. bipustulatus*, van den zijrand gescheiden (ab.c. **Schaumii* Wencker). Soms zijn de beide vlekken op elk der dekschilden in het midden met elkaar verbonden, zoodat de zwarte middelste dwarsband in drie vlekken opgelost is (ab.c. **trimaculatus* Dej.). Halschild breeder dan lang, de zijden niet geleidelijk afgerond, voor de afgeronde achterhoeken iets uitgebogen 1). Lengte 7½—8 mm. Niet zeldzaam op vochtige plaatsen, onder steenen en dorre bladeren. De ab.c. *trimaculatus* in België bij Deurne, Boislort en Anderlecht. De ab.c. *Schaumii* in de Belg. prov. Namen en bij Fleurus. Ik ving bij Maastricht een

1) Eene varietet *Putzeysi* de Borge, uit België, ziet een vorm van het halschild hebben als bij *P. bipustulatus*.

exemplaar, dat de *abc. trimaculatus* nadert, de verbinding der roode vlekken is echter onvolledig 1. *crux-major* L.

Kleiner en slanker dan de vorige, met kortere spritleeftjes; de kop achter de oogen iets meer ingesnoerd. Halsschild even lang als breed, bijna cirkelrond. Tusschenruimten der dekschilden veel krachtiger bestippeld. De tweede roode vlek is rond en van den zijrand gescheiden, doch nadert in enkele gevallen den zijrand, wat zou blijken uit de var. *Putzeysii* Preudh. de Borre van *P. crux-major*, welke volgens Ganglbauer, naar den vorm van het halsschild te oordeelen, tot *bipustulatus* behoort. Ik zag deze varieteit niet 1). Bij *abc. conjunctus* Everts vloeien de beide vlekken op elk der dekschilden volkomen ineen, zoodat de dekschilden geheel rood zijn, behalve aan den naad en aan het uiteinde (bij Goor gevangen). Lengte $7-7\frac{1}{2}$ mm. Zeldzamer, op droge, zandige plaatsen, onder steenen en afgevallen bladeren (*4-pustulatus* St.) 2. *bipustulatus* F.

XX. Tribus MASOREINI.

52. Masoreus Dej.

Sprieten van af het vierde lid behaard. Bovenlip van voren recht afgeknot of zwak uitgerand. Eindlid der tasters staafvormig, naar het uiteinde iets versmald en afgeknot. Kin zonder tand in de uitranding. Tong driehoekig, aan het uiteinde afgeknot. Paraglossen de tong ver overschrijdend. Schenen van buiten gedoorn, met lange eindsporen. Klauwen met 3 of 4 kleine tandjes. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voertarsen-leedjes zwak verbreed.

Van de 3 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Glanzige kastanje-rood, gewoonlijk de kop, het midden van het halsschild en een veeg over de dekschilden donker gekleurd. Sprieten, tasters en pooten lichtrood. Halsschild sterk verbreed, met sterk afgeronde zijden en stomp afgeronde achterhoeken, de basis aan weerszijden uitgerand, met eene fijne middellijn. De dekschilden met fijne stippellijnen en een eenigszins dakvormig opgerichten naad. Lengte 4—5 mm. Vrij zeldzaam, vooral in het voorjaar op de duinen, onder plantenalval en langs de zeekust in zandkuilen. Ook op vele andere plaatsen aangetroffen (*laticollis* St.) 1. *Wetterhali* Gyll.

XXI. Tribus LEBIINI.

53. Lebia Latr.

Lichaam breed afgeplat. Sprieten van af het vierde lid behaard. Bovenlip afgeknot. Eindlid der tasters naar het uiteinde min of meer versmald, afgeknot of afgestompt. Kin in het midden der uitranding met een breeden meer of minder stompen tand, die door een naad van de kinplaat gescheiden en met deze beweeglijk verbonden is. Tong aan den voorrand afgerond. Paraglossen volkomen met de tong vergroeid en deze niet overschrijdend, aan de zijden en aan het uiteinde met haren bezet. Halsschild verbreed, dubbel zoo breed als lang, aan weerszijden van de basis diep hoekig uitgesneden, de basis aan weerszijden binnen de achterhoeken nagenoeg recht afgeknot, aan de basis in het midden in een korten breeden steel verlengd. Klauwen getand. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voertarsen-leedjes verbreed en op de onderzijde zelig. Ook zijn de middel-schenen bij het ♂ aan den binnerrand voor het uiteinde van eene kleine uitranding voorzien. — De soorten leven op lage planten en heesters, onder schors en steenen, jagende op larven, bladluizen enz.

Van de 13 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden eenkleurig, blauw of groen. De zijlobben van de kin van binnen gerand (Sub-gen. *Lamprias* Bon.). 2
- Dekschilden tweekleurig, niet metallisch. De zijlobben van de kin van binnen niet gerand. (Sub-gen. *Lebia* i. sp.) 3

1) Preudhomme de Borre beschrijft uit België eene var. *trimaculatus*, die getrekkend zou zijn als de gelijknamige varieteit van *P. crux-major*.

- 2 Slechts het eerste sprietlid rood. De dekschilden zeer fijn en verspreid, nauwelijks merkbaar behaard. Metallisch-blauwgroen of blauw, zelden groen; de prothorax en de pooten, behalve de knieën en tarsen, geelrood. Schildje donker gekleurd. Bij ab.c. **annulata* Brullé zijn de middelste sprietleedjes aan de basis roodachtig. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Uiterst zeldzaam, vooral op zand- en kalkbodem onder steenen, aan boomwortels, langs wegen, ook in droge slooten. Den Haag, Breda, Oirschot en in Limburg. In de Rijnprovincie bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 1. *cyanocephala* L.

De eerste 2 sprietleedjes en de wortelhelft van het derde lid roodgeel. Deze soort gelijkt zeer op de vorige, gewoonlijk zijn de dekschilden meer groen en glad, het schildje, het meso- en metasternum en de geheele dijen en schenen geelrood. De kop is wat sterker, doch meer verspreid bestippeld. De tusschenruimten der dekschilden zijn veel fijner en meer verspreid bestippeld. Lengte 5 — $7\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch over het algemeen vrij zeldzaam, aan boomwortels, onder steenen, ook aan de wortels van *Sarothamnus vulgaris* en in velden onder aardkluiten 2. *chlorocephala* Hoffm.

- 3 Tasters zwart. Kop zwart, het halsschild rood. De dekschilden oranjekleurig, met een breeden zwarten band, welke de geheele achterhelft inneemt, behalve 2 groote vlekken bijna aan den top, en gewoonlijk eene zwarte scutellair-vlek; voorste gedeelte der epipleuren en de pooten, behalve de knieën en tarsen, roodgeel 1). Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Op zand en mergelgrond, onder steenen en op planten. In Limburg bij Roosteren, St. Pieter en Bemelen. Ook in België bij Maeseyck en in de prov. Luik. In de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf.

3. *crux-minor* L.

Tasters roodgeel, zoo ook de sprietten en het schildje. Lichaam geelrood, de dekschilden, behalve een roodgelen dwarshand aan het uiteinde, glanzig zwart. Lengte 4 — $4\frac{1}{2}$ mm. Op heidekruid, varens, brem enz. Niet inlandsch. Verbreid in het omliggend gebied. Ik bezit een Belgisch exemplaar uit Ridderborn nabij de Limburgsche grens.

(*Chaemorrhoidalis* F.) *marginata* Fourcr.

Lionychus Wissmann.

Sprietten van af het tweede lid behaard. De voorrand van den clypeus is iets verdikt. Eindlid der tasters stomp toegespitst, het voorlaatste kaaktaster-lid is nauwelijks half zoo lang als het eindlid. Kin in 't midden van de uitranding met een gezwollen, door een naad gescheiden tand. Tong naar voren verbreed, aan den voorrand zwak uitgerand. Paraglossen voor het uiteinde der tong door een breeden vliezigzen zoom verbonden. Halsschild sterk hartvormig, aan de basis recht afgeknot of aan weerszijden scheef afgesneden of uitgerand; de zijrand zet zich voort als eene fijne lijn, schuin naar de basis toe, binnen de vier van de basis afstaande, kleine tandvormige achterhoeken; het achtergedeelte van de epipleuren van het halsschild is van boven zichtbaar.

Van de 4 Europeesche soorten zou één in Nederland kunnen worden aangetroffen.

Bronzig zwart, de dekschilden elk met twee witgele vlekjes, het eene nabij den schouder, veranderlijk in vorm, het tweede, kleinere, dat soms ontbreken kan (ab.c. *bipunctatus* Heer), op de achterhelft nabij den zijrand. De binnenste strepen der dekschilden zijn duidelijk ontwikkeld; de tusschenruimten in rijen bestippeld. Klauwen gewoon. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Deze soort gelijkt eenigszins op eene kleine *Bembidium*, ook in de wijze van snel rondloopen langs stroomend water. Zij zit ook onder steenen op zandplaten in beken. Ik zag een Belgisch exemplaar uit de provincie Luik (coll. *Wesmael*). Zij komt ook bij Aken en Gulik voor. De ab.c. *bipunctatus* bij de „Porta Westalica”. . . (*quadrillum* Dfts.).

54. Metabletus Schmidt-Göbel.

Eindlid der tasters toegespitst. Kin in 't midden van de uitranding met een tand, die aan het uiteinde uitgerand of gespleten is. Paraglossen van voren afzonderlijk afgerond, niet met elkaar vergroeid; de tong vrij en van voren afgerond. Het derde sprietlid is bijna kaal. Halsschild min of meer hartvormig, aan de basis recht afgeknot of aan weerszijden scheef afgesneden of uitgerand, aan de zijden en in de achterhoeken gewoon gerand. Epipleuren van het halsschild van boven niet zichtbaar. Voor-

1) In Zuid-Europa komt eene variëteit met zwarte pooten voor (var. *nygripes* Dej.).

laatste tarslid gewoon. Klauwen duidelijk getand. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes matig verbreed en aan de onderzijde met eenige witachtige schubjes voorzien. Bij het ♀ is het uiteinde van het laatste sterniet in 't midden een weinig uitgerand. — De soorten leven aan boomwortels, tusschen plantwortels en onder steenen.

Van de 15 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Gevleugeld. De dekschilden vrij lang gestrekt en vlak, achter de schouders en voor het uiteinde gewoonlijk met eene vuilgele vlek. Zwart, met geringen bronzigen weerschijn, de dekschilden donkerbruin. De schouderplek zet zich dikwerf als een langsband langs den naad naar achteren voort en is veelal met de topvlek verbonden. Bij *ab.c. impressus* Dej. is alleen de schouderplek voorhanden, bij *ab.c. atratus* Dej. zijn de dekschilden eenkleurig bronzig-zwart. Lengte 3—3½ mm. Niet inlandsch. 1) Bij Aken.

(*obscuroguttatus* Dfts.).

Ongevleugeld. De dekschilden korter en meer gewelfd, eenkleurig of slechts aan de schouders min of meer bruinachtig 2

- 2 De derde tusschenruimte der dekschilden met twee fijne of onduidelijke stippen 3

De derde tusschenruimte der dekschilden met twee grootere, groefachtige stippen. Bovenzijde donker bronskleurig, veel sterker gechagrineerd dan bij *truncatellus*, met brederen kop en langere, aan het uiteinde sterker uitgerande dekschilden. Lengte 3—3½ mm. Zeer gemeen op droge zonnige plaatsen, o. a. op de duinen tusschen helm en dorre bladeren. (*foveola* Gyll., *punctatellus* Dfts.) 3. **foveatus** Fourcr.

- 3 Bruinzwart, met geringen bronzigen weerschijn. Sprietwortel bruinrood. De epipleuren der dekschilden bruinagel, de pooten bleekgeel. De dekschilden zijn aan de schouders meestal min of meer bruinachtig. Van *truncatellus* nog onderscheiden, door de aan het uiteinde sterker uitgerande dekschilden en door de wat duidelijker stippen in de derde tusschenruimte. Lengte 2½—3 mm. Eenmaal bij Nootdorp in dood riet. 1. **pallipes** Dej.

Zwart, met onduidelijken metallischen weerschijn, het eerste sprietlid, de knieën, schenen en tarsen bruinachtig. Derde tusschenruimte der dekschilden, zonder duidelijk in het oogvallende stippen. Lengte 2½—3 mm. Zeer gemeen, o. a. in duinstreken onder helm en dorre bladeren. 2. **truncatellus** L.

55. Blechrus Motsch.

Eindlid der tasters naar het uiteinde versmald en aan den top iets afgeknot. Kin zonder tand in het midden. Tong van voren diep driehoekig uitgesneden. Derde sprietlid behaard. Halsschild min of meer hartvormig, aan de basis aan weerszijden eenigszins scheef uitgerand, aan de zijden en in de achterhoeken gewoon gerand; de epipleuren van voren niet zichtbaar. Voorlaatste tarslid gewoon. Sexueel verschil als bij *Metabletus*. — De soorten leven aan den voet van boomen onder dorre bladeren, ook achter boomschors en onder steenen.

Van de 8 Europeesche soorten komen twee in Nederland voor.

Glanzig zwart, met geringen bronzigen weerschijn. Schenen en tarsen niet zelden bruin. De dekschilden tamelijk gestrekt, naar het uiteinde iets verbreed, met eenige zwak aangeduide strepen. Klauwen fijn, doch scherp en duidelijk getand. Lengte 3—3½ mm. Verbreed doch overal zeldzaam (*glabratus* Dfts.) 1. **minutulus** Goeze.

Naverwant aan de vorige, doch kleiner, meer zwart gekleurd, met kleineren kop, iets minder uitpuilende oogen, naar achteren wat meer versmald halsschild, waarvan de basis in 't midden iets meer afgerond en iets uitgetrokken is; ook is zij door de in 't oogvallend kortere, naar het uiteinde sterker verbreed dekschilden en door de onduidelijk getande klauwen onderscheiden. Sommige schrijvers beschouwen deze soort als eene varieteit van *minutulus*. Lengte 2—2½ mm. Zeer zeldzaam. Op Walcheren, bij Zierikzee, Rotterdam en Breda.

2. **maurus** St.

56. Dromius Bonelli.

Sprieten van af het vierde lid behaard. Eindlid der tasters toegespitsd. Geen kindant. Tong naar voren verbreed, aan den voorrand met 6 borstelharen. Paraglossen

1) De oorspronkelijke in de «Bouwstoffen» door Stellen van Vollekeren, berust op onjuiste determinatie.

smal, met de tong volkomen vergroeid en in den regel aan het uiteinde door een vlieziggen, soms lederachtigen zoom met elkaar verbonden. Halsschild min of meer hartvormig, aan de basis recht afgesneden of naar de achterhoeken eenigszins afgerond, aan de zijden en in de achterhoeken gewoon gerand; de epipleuren van boven niet zichtbaar. Voorlaatste tarslid gewoon. Klauwen getand. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes verbreed. — De soorten leven achter boomschors, in dood riet en onder aanspoelsel. — De larve van *D. 4-notatus* is door Perris, de larven van *4-maculatus* en *agilis* zijn door Schödtle beschreven.

Van de 25 Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Kop zeer lang en smal, tot aan den voorrand van den clypeus veel langer dan breed (Sub-gen. *Paradromius* Fowler). Lichaam zeer lang gestrekt, in habitus aan *Demetrius* herinnerend, bleek roodgeel, de kop bruinrood of pekbruin, de dekschilden met zwartachtigen naad, het achterlijf aan de zijden gewoonlijk bruin. Lengte $5\frac{1}{2}$ - 6 mm. Uitsluitend bij Rotterdam en Hillegersberg, onder dood riet aangetroffen. Zij komt ook achter wilgenschors voor 1. *longiceps* Dej.
- Kop niet of slechts weinig langer dan met de oogen breed (Sub-gen. *Dromius* isp.). 2
- 2 Dekschilden in de strepen zeer diep bestippeld; het scutellair-streepje ontbreekt. Bovenzijde van het lichaam bruinachtig, gewoonlijk naar de beide uiteinden donkerder. Sprieten, tasters en pooten bleekgeel. Het voorhoofd dicht langsrimpelig. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen, vooral op de duinen tusschen helm 2. *linearis* Oliv.
- Dekschilden in de strepen weinig of niet bestippeld 3
- 3 Zesde streep der dekschilden met eenige stippen. Kop smaller dan het halsschild 4
- Zesde streep der dekschilden zonder stip. Kop niet of slechts weinig smaller dan het halsschild. 9
- 4 Dekschilden ook op de derde streep met eenige stippen. Kop donker roodbruin of pekzwart, het halsschild bruinrood of pekbruin, met roodbruine randen, de dekschilden bruinzwart. Sprieten en pooten licht roodgeel. Bij ab.c. **bimaculatus* Dej. (in België) vertoonen de dekschilden op de voorheft eene lichtere, en voor het uiteinde eene kleine, ook veelal ontbrekende vlek. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Gemeen achter boomschors, in mos en aan boomwortels. 4. *agilis* F.
- Dekschilden op de derde streep slechts met één stip voor het uiteinde 5
- 5 Kop bruinrood, in 't midden van het voorhoofd niet rimpelig. Roestrood, de dekschilden niet zelden geheel, of slechts langs de zijden donkerder roodbruin. Sprieten en pooten lichter roodgeel. De zijden van het halsschild zijn minder breed gezoomd en de dekschilden langer gestrekt dan bij *agilis*. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch vrij zeldzaam achter boomschors, vooral van platanen, dennen en appelboomen. . . (testaceus Er.) 3. *angustus* Brullé.
- Kop zwart of pekbruin 6
- 6 Dekschilden bruingeel, met een zwartachtigen, naar achteren verbreedten randzoom. Het halsschild geelrood, in 't midden veelal bruin. Lengte 5— $5\frac{1}{2}$ mm. Achter dennenschors. Niet inlandsch. In Westfalen en bij Aken (marginellus F.)
- Dekschilden pekbruin of pekzwart, eenkleurig of met bleekgele vlekken 7
- 7 Dekschilden ongeklekt. Deze soort gelijkt op *agilis*, doch is wat breeder; de kop is in het midden van het voorhoofd duidelijk langsrimpelig; het halsschild veel breeder en naar achteren veel minder versmald. Dekschilden meer gestrekt, meer gewelfd en met iets meer parallelle zijden dan bij *agilis*; met 5 of 6 stippen op de zesde streep, doch slechts met één stip voor het midden op de derde streep. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Niet inlandsch. Deze soort komt in Westelijk Midden-Europa voor. Wellicht ook in de Belg. provincie Luxemburg te vinden. (meridionalis Dej.)
- Dekschilden met 1 of 2 bleekgele vlekken. 8
- 8 Pekzwart, de zijden, de achterrand en soms ook het midden van het halsschild bruinrood; de dekschilden met eene gele langsvlek voor het midden. Sprieten en pooten licht roodgeel. Dekschilden meer glanzig dan bij *agilis*. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Achter boomschors en onder mos. Niet inlandsch. Bij Aken en in België. Ik bezit een exemplaar uit Strée (prov. Luik) (fenestratus F.)
- Kop pekzwart of pekbruin; het halsschild bruinrood, in 't midden niet zelden pekbruin; de dek-

- schilden bruinzwart, met 4 bleekgele vlekken. Spriet en pooten bleekgeel. Lengte 5—5½ mm. Zeer gemeen achter boomschors en boommos. 5. **quadrinotatus** L.
- 9 De scherpkantige randzoom der dekschilden om den schouder gebogen en tot aan het schildje doorlopende. Achterhoeken van het halsschild scherp. 10
- De scherpkantige randzoom der dekschilden om den schouder gebogen en slechts tot aan de basis der tweede of derde streep doorlopende 11
- 10 Derde tot elfde sprietlid verlengd. Het halsschild donkerbruin, met roodbruine randen, soms geheel roodbruin. Spriet en pooten roodgeel. Dekschilden pekkruin, met 4 bleekgele vlekken. Bij ab.c. **biplagiatus* Heyd. vloeien de beide vlekken ineen. Lengte 3½—4 mm. Gemeen achter boomschors en boommos. 6. **quadrinotatus** Panz.
- Vierde tot tiende sprietlid kort. Het halsschild lichtrood. De dekschilden bleekgeel, met een bruinen, aan het uiteinde uitgesneden dwarsband. Spriet en pooten bleek roodgeel. Lengte 3—3½ mm. Achter boomschors. Niet inlandsch. In West-Europa, o. a. in den Elzas. Wellicht ook in de Belg. provincie Luxemburg te vinden. (*bifasciatus* Dej.)
- 11 Kop achter de oogen geleidelijk versmald, met vrij lange, naar achteren convergeerende slapen. Het derde tot elfde sprietlid verlengd 12
- Kop breed, achter de oogen plotseling versmald, met zeer korte slapen. Het vijfde tot tiende sprietlid vrij kort. Spriet en pooten bleek roodgeel. Het halsschild breed vierhoekig, bruinrood. De dekschilden bruinzwart, eene groote, van achteren uitgezakte en naar voren in eene voortzetting naar den schouderhoek verbrede vlek op de voorhelft en eene topvlek geel. Lengte 3—4 mm. Achter boomschors, zeer zeldzaam. Alleen bij den Haag gevonden. 7. **quadrinotatus** Dej.
- 12 De schouders der dekschilden duidelijk aangeduid. De vleugels zijn ontwikkeld, wat reeds te zien is, tengevolge van de doorschijnendheid der dekschilden, waardoor eene donkere driehoekige vlek om het schildje zichtbaar is. De dekschilden bleekgeel, de kop zwart; overigens roodgeel. Lengte 2½—3½ mm. Gemeen onder dorre bladeren, oud stroo en dood riet. 8. **melanocephalus** Dej.
- Schouders afgerond. Ongevlugeld. De dekschilden bleekgeel, met eene donkere vlek of teekening. Kop zwart, het halsschild geelrood of bruinrood. 13
- 13 Onderzijde geel; de uitgezakte bruine dwarsband achter het midden der dekschilden zeer duidelijk. Het halsschild naar achteren sterker versmald dan bij *nigri-ventris*. Lengte 3—3½ mm. Langs oevers onder aanspoelsel en dorre bladeren. Zeldzaam. (*fasciatus* F.) 10. **sigma** Rossi.
- Onderzijde gebruint; de donkere vlek der dekschilden onduidelijk. Lengte 3—3½ mm. Zeer zeldzaam achter boomschors en onder dorre bladeren. Den Haag, Muiderberg, Amsterdam, Rotterdam en Middelburg (*fasciatus* Dej., *notatus* Schaum) 9. **nigri-ventris** Thoms.

57. *Demetrias* Bonelli.

Eindlid der tasters toegespitst. Halsschild min of meer hartvormig, aan de basis recht afgeknot of aan weerszijden scheef afgesneden of uitgerand, aan de zijden en in de achterhoeken gewoon gerand; de epipteren van boven niet zichtbaar. Voorlaatste tarslid diep tweelobbig, nagenoeg tot aan den wortel gedeeld.

Van de 4 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Klauwen ongetand. Kin zonder tand. Eindledjes der tasters in 't midden iets verdikt, die der kaaktasters 1½ maal zoo lang als het voorlaatste lid (Sub-gen. *Aetophorus* Schmidt-Göhel). Gevlugeld, bleek roodgeel, de kop zwart of aan de basis roodachtig, zeer zelden geheel roodachtig (ab. **ruficeps* Géné). De dekschilden bleekgeel, met eene gemeenschappelijke, ruitvormige naadvlek en met twee zwarte zijvlekken, meer naar achteren; de strepen blauw aangeduid. Lengte 5—5½ mm. Op vele plaatsen gemeen op riet en 's winters onder dood riet. 1. **imperialis** Germ.
- Klauwen met 1 of 3 tandjes. Kin met een kleinen, veelal vliezigen tand. Eindledjes der tasters slanker en langer (Sub-gen. *Demetrias* f.sp.) 2
- 2 De slapen van eenige borstelbaren voorzien. De dekschilden met een groot aantal opgerichte haartjes, welke van ter zijde gezien, duidelijk in 't oog vallen. Gevlugeld. Klauwen met 3 tandjes. Roodgeel, de kop zwart, de dekschilden bleekgeel, hetzij cenkleurig of aan den naad en soms ook aan het schildje of voor het uiteinde gebruint. Lengte 4½—5 mm. Gemeen, vooral op riet; zij overwintert in dorre rietstengels en tusschen oud stroo.

3. **atricapillus** L.

De slapen niet behaard. De dekschilden met enkele haartjes bezet. Ongevlugeld. Klauwen met een tand. Licht roodgeel. Kop zwart, dekschilden bleekgeel, met eene gemeenschappelijke ruitvormige zwarte vlek voor het uiteinde, veelal ook aan den naad bruinachtig. Lengte 4—4½ mm. Gemeen, vooral op de diinnen tusschen helmzoden.
(unipunctatus Germ.) 2. **monostigma** Samouelle.

58. Plocionus (Ploebionus) Dej.

Eindlid der kaaktasters cilindervormig, aan het uiteinde afgeknut, dat der lip-tasters zwak bijlvormig, aan het uiteinde breed afgeknut. De buitenrand der voorkaken van onderen boogvormig verbreed. Kintand krachtig ontwikkeld; de paraglossen zijn, voor den met 4 borstelharen bezetten top der tong, vliezig verbonden. Lichaam breed en plat. Halsschild min of meer hertvormig, verbreed, aan de basis recht afgeknut, aan de zijden en in de achterhoeken gewoon gerand, de epipleuren van boven niet zichtbaar. Tarsen breed, op de bovenzijde onbehaard, het vierde tarslid uitgerand. Klauwen kamvormig getand.

Van dit genus komt de eenige in Europa waargenomen soort ook in Nederland voor.

Lichaam geheel licht roodbruin. Sprietten kort en dik. Halsschild veel breder dan de kop, voor het midden meer dan 1½ maal zoo breed als lang, naar achteren weinig versmald, van voren en van achteren nagenoeg recht afgeknut, over het midden tamelijk fijn dwars-rimpelig en met eene verdiepte middellijn. Dekschilden breeder en driemaal zoo lang als het halsschild, de zijrand vrij sterk opgebogen, met diepe, doch slechts zeer fijn bestippelde strepen en met zeer fijne, verspreide bestippling in de tusschenruimten, van welke de alwisselenden iets smaller en sterker gewelfd zijn. Middelschenen bij het ♂ op de binnenzijde, boven het midden, diep uitgerand. Lengte 7½—9½ mm. Deze soort, welke over de geheele aarde verbreid schijnt te zijn, en in Fransche havenplaatsen als Marseille en Rouen werd waargenomen, ontving ik uit Rotterdam, waar zij in een pakhuys, tusschen Arachidennoten gevangen werd (Bonfilsii Dej.) 1. **pallens** F.

59. Cymindis Latr.

Sprietten van af het derde lid dicht behaard, de eerste 2 leedjes veel minder behaard of bijna kaal. Bovenlip breed vierhoekig, van voren afgeknut. Eindlid der kaaktasters veel langer dan het voorlaatste lid, aan het uiteinde afgeknut of stomp afgerond. Eindlid der lip-tasters aan het uiteinde afgeknut, bij het ♂ van de meeste soorten zeer sterk bijlvormig, het voorlaatste lip-taster-lid gewoonlijk met verscheidene borstelharen. Kin in 't midden der uitranding met een vrij grooten, gezeenen, tot aan het midden der zijlobben reikenden tand. Tong tamelijk breed en van voren afgeknut, met twee lange borstelharen; de paraglossen vliezig en kaal, met de tong geheel vergroeid en deze niet of slechts zeer weinig overschrijdend, aan het uiteinde afgerond. Halsschild min of meer hertvormig, aan de basis recht afgeknut of aan weerszijden scheef afgesneden of uitgerand, aan de zijden en in de achterhoeken gewoon gerand; de epipleuren van boven niet zichtbaar. Klauwen gezaagd. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes zwak verbreed en op de onderzijde zolig beschubd.

Van de ± 40 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De basaalrand der dekschilden zet zich tot aan de scutellair-streep voort (Sub-gen. *Cymindis* Lsp.). 2

De basaalrand der dekschilden reikt slechts tot aan de basis der derde streep (Sub-gen. *Menas* Motsch.). Pekbruin of donker roodbruin, de zijrand van het halsschild lichter doorschijnend. De basis en de zijrand der dekschilden roodachtig. Sprietten en pooten geelachtig of bruinrood. De dekschilden in de tusschenruimten tamelijk sterk en vrij dicht bestippeld, duidelijk behaard. Eindlid der lip-tasters als bij *maenularis*. Lengte 8—9 mm. Niet inlandsch. In België, Oldenburg en Westfalen. Ik zag Belgische exemplaren uit de Hautes-Fanges, Fleurus en Munster-Bilsen (*vaporariorum* L.)

- 2 Eindlid der lip-tasters bij het ♂ sterk bijlvormig, bij het ♀ naar het uiteinde iets verbreed . 3

Eindlid der lipstasters bij het ♂ naar het uiteinde weinig, bij het ♀ in 't geheel niet verbreed. Lichter of donkerder bruin of roodbruin, kop en achterlijf veelal meer zwartachtig, de zijrand van het halsschild lichter doorschijnend, de zijrand der dekschilden en eene groote daarmede min of meer samenhangende schoudervlek, alsmede gewoonlijk ook de naad en dikwerf eene kleine vlek aan het uiteinde roodbruin of roodgeel. Spriet en pooten geel. De dekschilden behaard, eenigszins dof, met zeer dicht bestippelde tusschenruimten. Lengte $8\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam in de heidestrecken op zandige plaatsen, in den Bosch en onder steenen en mos; ook onder gevelde boomen. Dieren, Arnhem, Venlo, Lochem, Enschedé, Roermond en Ossendrecht. Ook in België en in de Rijnprovincie. 2. *macularis* Dej.

3. Halsschild zwart, met roodachtig doorschijnenden zijrand en veelal ook aan voor- en achterrand roodachtig doorschijnend. Lichaam onbehaard, glanzig zwart. De zijrand der dekschilden en eene groote langwerpige, met deze grootendeels samenhangende, naar binnen niet of slechts weinig over de vijfde tusschenruimte overgrijpende schoudervlek roodgeel. Spriet en pooten roodgeel. Achterhoeken van het halsschild duidelijk uitstekende. Lengte $8\frac{1}{2}$ — $10\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam langs zonnige boschranden, onder steenen en aan graswortels. Oosterbeek, Wolfhezen, Ede, Breda, Venlo en Roermond. Ook in België en in de Rijnprovincie.

1. *humeralis* Fourer.

Halsschild bruinrood of geelrood, zoo ook de geheele borst. Het halsschild met minder uitstekende achterhoeken; de dekschilden met meer vlakke, veel sterker bestippelde tusschenruimten. Bij het in het omliggend gebied voorkomend type 1) is de bovenzijde geheel kaal, de kop donker bruinrood, lijn en verspreid, aan weerszijden naast de oogen grover en dichter bestippeld. Het halsschild in 't midden lijn en verspreid, aan de randen veel sterker en meer of minder rimpelig bestippeld. De roodgele schoudervlek neemt slechts de zesde en zevende tusschenruimte in en hangt slechts aan de basis samen met den evenzoo gekleurden, naar het uiteinde versmalen, doch tot aan den naad reikenden zijrand. Lengte 8—9 mm. Niet inlandsch. Op verscheidene plaatsen in België. Ik zag exemplaren uit Aisneux en Flémalle-Haute. Ook bij Aken en Rheine . . . (homagrica Dfts.) (axillaris F.)

XXII. Tribus ODACANTHINI.

60. *Odacantha* Payk.

Spriet en van af het vierde lid dicht behaard. Kintand gewoon. Tong van voren nagenoeg recht afgeknut, de paraglossen van het uiteinde der tong door eene uitranding gescheiden, de tong overschrijdend en naar binnen gekromd. Lichaam smal en gestrekt. Kop breder dan het halsschild, naar achteren verlengd, met lange convergerende slapen, voor de basis ingesnoerd en met een korten min of meer kogelvormigen hals. Halsschild nagenoeg cylindervormig, aan de zijden onvolkomen gerand. Klauwen gewoon. Bij het ♂ zijn de voortarsen bijna onmerkbaar verbreed.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Kop en halsschild blauwgroen, de dekschilden geelrood, aan het uiteinde blauwzwart; meso- en metathorax geelrood, het achterlijf blauwzwart. De eerste 3 sprietleedjes en de wortel van het vierde, de wortel der tasters en de pooten, behalve de knieën en de tarsen, roodgeel. Kop veel breder dan het halsschild, nagenoeg glad. Halsschild met eene diepe middellijn, grof en verspreid bestippeld en vrij sterk dwarsrimpelig. Dekschilden met lijne, naar het uiteinde nog fijnere of uitgewischte stippelrijen. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Op vele plaatsen gemeen op riet en Typha. Zij overwintert in rietstengels 1. *melanura* L.

XXIII. Tribus BRACHYNINI.

61. *Brachynus* Weber.

Bovenlip van voren recht afgeknut of zwak uitgerand. Eindleedjes der tasters in den regel naar het uiteinde versmald en aldaar afgeknut, zelden zwak bijlvormig. Kin in het midden der uitranding zonder tand. Tong aan den voorrand met twee of meer borstelhaaren. Paraglossen rliezig, met de tong geheel vergroeid en haren top niet of slechts weinig overschrijdend. De eerste twee sprietleedjes slechts weinig, de volgende dicht behaard, het derde lid veel langer dan alle overigen. De dekschilden aan het uiteinde recht afgesneden. Het achterlijf bij het ♀ met 7, bij het ♂ met 8 sterniten.

1) In Zuid-Europa komen van deze soort verscheidene variëteiten voor.

Het zevende sterniet bij het ♂ is nagenoeg tot aan de basis hoekig uitgesneden en zoo onder het zesde teruggetrokken, dat slechts de zijstukken vrij liggen. Het achtste sterniet bij het ♂ als eene driehoekige plaat uit de uitranding van het zevende uitkomende. Bij het ♂ is ook het negende tergiet zichtbaar als eene halve maan-vormige, naar onderen omgebogen plaat; het ♀ met 7 sterniten en 8 tergiten. Het zevende sterniet bij het ♀ kort en in het midden gedeeld. De eerste 5 tergiten zijn vliezig, de volgende hoornachtig. Foortarsen bij het ♂ zwak verbreed. Bij de inlandsche soorten van dit genus zijn kop, halsschild, schildje en voeten rood en de dekschilden blauw, blauw-groen of blauwzwart. — De soorten leven meestal in aantal bijeen onder steenen, vooral op kalkgronden. De twee inheemsche soorten zijn slechts sporadisch aangetroffen, langs rivieroeveren. Wanneer zij gestoord worden, ontlasten zij met een hoorbaren knal eene blauwachtig-witte, rookende vloeistof, welke uit anaal-klieren wordt afgescheiden; vandaar den naam van „bombardeerkevers”.

Van de 30 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden zeer duidelijk, doch ondiep gestreept. Derde en vierde sprietlid bijna altijd zwartachtig gevlekt of geheel zwart. De dekschilden zeer dicht en fijn gechagrineerd, dof, lijn en tamelijk verspreid bestippeld, neerliggend geelachtig behaard; de tusschenruimten der strepen zwak, doch duidelijk gewelfd. De achterhoeken van het halsschild puntig uitstekende. Kleine, met *B. explodens* in grootte weinig onderscheiden exemplaren, met ongevlekte sprieten, vormen de var. *strepitans* Dfts. (bij Amsterdam). Lengte $6\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ mm. Amsterdam, Bergen-op-Zoom, Terheyden, Zierikzee. Zij zou ook bij Leiden gevangen zijn. Verbreid in Westfalen en ook hier en daar in België 1. *crepitans* L.
- Dekschilden niet of slechts uiterst zwak gestreept 2
- 2 De naad der blauwe dekschilden van af de basis tot over het eerste derde gedeelte van de lengte, met eene min of meer verbreedte roode langsvlek. Lichaam overigens geheel roest-rood, zoo ook de sprieten. Lengte 6—7 mm. Niet inlandsch. Op vele plaatsen in België, o. a. bij Brussel, Dinant, Mons, Namen en Arlon. (*sclopetia* F.).
- Dekschilden geheel blauw of blauwgroen. Roestrood of roestgeel, de metathorax en het achterlijf pekzwart, zelden dit laatste roodbruin. Het derde en vierde sprietlid gewoonlijk zwart gevlekt (de vorm *bombarda* Dfts.), zeldzamer eenkleurig roestrood (abc. *strepens* Fisch. in Holland). De achterhoeken van het halsschild minder uitstekende; de dekschilden veel korter en meer gewelfd, naar het uiteinde meer verbreed, glanzig, sterker bestippeld, doch zeer onduidelijk of niet gestreept. Lengte 5— $6\frac{1}{2}$ mm. In velden en langs oevers onder steenhoopen, vooral op kalkgronden. In Holland (?), bij Doetichem en bij Vaals (Limburg). 2. *explodens* Dfts.

III. Familie HALIPLIDAE.

Fig. 9. Onderzijde van *Haliploa*.
Naar Ganglbauer. Gewijzigd

In het water levende, min of meer ovale of langwerpig-eironde, bruine, roodbruine of gele kevertjes, met of zonder zwarte tekening op de bovenzijde. Kop klein, met min of meer uitpuillende grootte, rondachtige oogen. — Sprieten 10-ledig, draadvormig, aan de voorzijde van het voorhoofd tusschen de oogen ingeplant en evenals bij de Dytiscidae onbehaard. — Voor-kaken kort en breed, met twee tandjes aan het uiteinde en een tand in het midden aan de binnenzijde. Buitenste lob der achterkaken 2-ledig, tastervormig. Binnenste lob der achterkaken naar het uiteinde gekromd en aan de binnenzijde bewimperd. Kaaktasters 4-ledig, liptasters 3-ledig. Kin breed, diep uitgerand, met een scherpen of stompen middentand. De deelen der onderlip welke de tasters dragen, liggen met de tong vrij in de uitranding van de kin. De tong is naar voren verbreed en aan het uiteinde breed afgeknut of uitgerand. De paraglossen zijn met de tong vergroeid. — Halsschild eenigszins trapeziumvormig of met meer evenwijdige zijden; het sluit met den achterrand volkomen tegen de basis der dekschilden aan en is aldaar in het midden hoekig naar achteren

uitgetrokken, waardoor het schildje onzichtbaar wordt. — Dekschilden min of meer toegespitst, meer of minder sterk gewelfd en in rijen bestippeld; de epipleuren zijn van af de basis tot aan de achtercoxae zeer breed en daarna hoekig inspringend versmald. — De vleugel gelijkt op die der *Dytiscidae*, doch ontbreekt (bij *Peltodytes*) de vierhoekige pigmentvlek in de area interno-media en het wigvormige vakje. — Het prosternum is vóór de coxae bultig opgericht en zet zich ver tussehen de voorcoxae naar achteren voort in eene aan het uiteinde zeer breede voortzetting. De voorste coxaalholten zijn van achteren open. Het mesosternum is door de, met de intercoxaal-voortzetting van het metasternum samenstootende prosternaal-voortzetting, volkomen bedekt. Het metasternum is zeer breed, naar voren weinig versmald en aan de zijden ver voorbij de middelecoxae naar buiten uitgebreid. De voortzetting van het metasternum tussehen de middelecoxae is veel breeder dan het prosternum tussehen de voorcoxae. Tussehen de achtercoxae vormt het metasternum eene breede, in 't midden hoekige voortzetting. De dwarsnaad van het metasternum is in den regel door eene stippelrij aangeduid; bij *Brychius* als eene lijn. — Het achterlijf bestaat uit 8 tergiten en 6 sterniten, waarvan de eerste 3 sterniten met elkaar vergroeid en aan weerszijden breed uitgehoud zijn, om de aan de basis knotsvormig verdikte achterdijen vrij te kunnen bewegen. Het eerste sterniet staat tegenover het tweede tergiet. — Voor- en middelecoxae kogelvormig. De achtercoxae zijn tot zeer groote, onbewegelijke, in de middellijn samenstootende, sterk verbrede platen uitgebreid (Fig. 9). Zij bedekken de eerste 3 tot 5 sterniten, alsook de basis der achterdijen volkomen en grijpen aan de basis, met haren tandvormigen buitenhoek, in eene kleine uitsnijding van de epipleuren der dekschilden. — De achterdijen zijn aan de basis en aan het uiteinde knotsvormig verdikt en in 't midden dun. — Het zwemmen geschiedt door afwisselende beweging der achterpooten en dus niet zooals bij de *Dytiscidae*, waar de achterpooten ware zwempooten zijn, d. w. z. platgedrukt en als roerriemen ingericht. De voor- en middelschenen, zoo ook alle tarsen, zijn met zwemharen bezet. De 5-ledige tarsen zijn slank en vooral bij de mannetjes met lange zijdeachtige haren bezet. Bij het ♂ zijn de eerste 3 leedjes der voor- en middel-tarsen zwak verbreed en aan de onderzijde met hecchtharen bezet. Bij de wijfjes van enkele *Haliplus*-soorten zijn de dekschilden tussehen de stippelrijen, behalve met de gewone zichtbare bestippling, nog uiterst fijn en dicht bestippeld en daardoor dof.

De *Haliplidae* leven in stilstaande- of langzaam stroomende wateren tussehen wier en andere waterplanten, waar zij zich met allerlei kleine diertjes voeden. Zij houden zich ook gaarne op nabij den oever en zitten bij warm weder in aantal op oeverplanten. Eene enkele soort (*Brychius elevatus*) leeft vooral langs beken, in het mos verscholen. Zij zwemmen zonder vaardigheid en slechts om van het eene plantendeel tot het andere te geraken.

De larven onderscheiden zich zeer van die der *Dytiscidae*. Kop gebogen, aan weerszijden met 6 ocellen. Sprieten op het voorhoofd tussehen de voorkaken ingeplant. Voorkaken verbreed en van eene zuigbuis voorzien. Tarsen slechts met één klauw. Achterlijf niet tot zwemmen geschikt, alle sterniten zijn chitineus. Het achterlijf bestaat uit 10 of 9 ringen, van welke bij *Haliplus* de eerste 8 elk een paar stigmata bezitten, de tiende ring is in een lang staartachtig, aan het uiteinde gevorkt, aanhangsel uitgetrokken; geen cerci. De tergiten van den thorax en van het achterlijf loopen in doornen uit, doch bezitten geen kieuw-aanhangsels. Bij *Peltodytes*, waar het achterlijf uit 9 ringen bestaat, draagt de laatste ring twee zeer lange gelede cerci; geen functioneerende stigmata. Op de tergiten van den thorax en van de eerste 7 ringen van het achterlijf, bevinden zich 4-, op den achtsten ring twee lange aanhangsels, elk met een lang, geleed borstelhaar bezet, dat als tracheekieuw dienst doet, daar het inwendig een tracheetakje bezit.

De *Haliplidae* werden het eerst door *Thomson* als eene zelfstandige familie van de *Dytiscidae* afgescheiden en ofschoon met deze in habitus overeenkomende, verschillen zij vooral door de abnormale ontwikkeling der achtercoxae, de 10-ledige sprieten en de niet volkomen tot roeien ontwikkelde pooten.

In Nederland zijn drie genera vertegenwoordigd.

1. Eindlid der tasters klein, priemvormig. De dekschilden zonder fijne streep dicht langs den naad. Sprieten vrij lang. Achtercoxae zonder tand aan den achterrand, de eerste drie sterniten bedekkend 2

Eindlid der tasters langer dan het voorlaatste lid. Dekschilden met eene fijne streep dicht langs den naad. Sprieten zeer kort. Halsschild gewelfd en naar voren sterk versmald, zonder langstreepjes. Achtercoxae met een duidelijken tand aan het achterende, het achterlijf tot aan de basis van het laatste sterniet bedekkend 3. *Peltodytes*.

2. Halsschild vlak, naar voren niet sterk versmald, doch met nabij de voorhoeken afgeronde zijden, aan weerszijden met eene tot aan den voorrand reikende, diepe langstreep. Leedjes der achtertarsen even lang. 1. *Brychius*.

Halsschild duidelijk gewelfd en naar voren sterk versmald, hoogstens aan weerszijden met een kort langstreepje. De eerste vier leedjes der achtertarsen in lengte afnemende.

2. *Haliplus*.

1. *Brychius* Thoms.

Sprieten vrij lang. Eindlid der tasters klein, priemvormig. Halsschild vlak, naar voren niet sterk versmald, doch met nabij de voorhoeken afgeronde zijden; aan weerszijden met eene tot aan den voorrand reikende diepe langsstreef, waartusschen de basis dwars ingedrukt is. Dekschilden zonder fijne streef dicht langs den naad; met eene kantig verheven lijst langs de tweede stippelrij; de stippelrijen staan op zwarte lijnen. Achtercoxae zonder tand aan den achterrand, de eerste 3 sterniten bedekkend. Leedjes der achtertarsen even lang. Klawen lang.

Van de 3 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Bleekgeel, voor- en achterrand van het halsschild zeer smal zwartachtig, de dekschilden met zwarte, veelal gedeeltelijk incenvloeiende langsstrepen, waarop de vrij krachtige stippelrijen staan; de derde tusschenruimte tot over het midden kielvormig verheven en over het midden fijn en dicht bestippeld. Lengte 4 mm. Langs stroomend water tusschen mos en waterplanten. Zij zwemt zeer slecht. In groot aantal in de Geul bij Valkenburg en Houthem gevangen. Ook in België 1. *elevatus* Panz.

2. *Haliplus* Latr.

*Sprieten vrij lang. Eindlid der tasters klein, priemvormig. Kintand scherp. Halsschild meer of minder duidelijk gewelfd en naar voren sterk versmald, hoogstens aan weerszijden met een kort langsstreepje. Dekschilden zonder fijne streef dicht langs den naad. Achtercoxae zonder tand aan den achterrand, de eerste 3 sterniten bedekkend. De eerste 4 leedjes der achtertarsen in lengte afnemende. Klawen klein. Bij het ♂ zijn de dikkere voortarsen-leedjes zijdelings samengedrukt en aan de onderzijde met kleine witachtige haarbundeltjes bezet. Bij sommige soorten bezit het ♀ naar het uiteinde doffere dekschilden, tengerolge van eene, met den microscoop zichtbare, dichte bestippeling. Het zijn kleine, gele of roodachtige kevertjes, met zwarte vlekjes, streepjes of lijnen op de dekschilden. — De soorten leven in zoet- of brakwater, bij voorkeur tusschen Conferreen; zij zwemmen vrij slecht en zetten zich gaarne bij groote hitte op de boven het water groeiende plantendeelen of tegen grashalmen langs slooten en rivieren. — De larven van *H. ruficollis*, *variegatus* en *fulvus* zijn door Schödde, de larve van *fluvialis* door v. Gernet beschreven.*

Van de 25 Europeesche soorten komen 13 in Nederland voor.

- 1 Dekschilden met uiterst fijne stippelrijen, de tusschenruimten zeer dicht en fijn bestippeld, weinig glanzig. Epipteren dicht en fijn bestippeld, zonder grove stippels. 2
- Dekschilden met min of meer krachtige stippelrijen, de tusschenruimten glad en glanzig, met meer of minder regelmatige rijen van kleine stippeltjes. Epipteren met rijen van grove stippels 4
- 2 Halsschild aan weerszijden van de basis zonder langsstreepjes of slechts met zeer geringe aanduiding daarvan. Voortzetting van het prosternum niet gerand. 3
- Halsschild aan weerszijden van de basis met een duidelijk langsstreepje; eenkleurig geel, zelden van voren en van achteren donker gezoomd (bij Leiden). Prosternaal-voortzetting aan weerszijden duidelijk gerand en fijn bestippeld. Van de zwarte langslijnen, op welke de fijne stippelrijen staan, zijn gewoonlijk slechts de buitenste min of meer onderbroken, soms zijn zij uiterst fijn aangeduid en daardoor de dekschilden bijna eenkleurig geel. Bij een exemplaar uit de omstreken van Maastricht zijn de zwarte langslijnen zoodanig incenvloeid, dat de dekschilden grootendeels zwart zijn. Deze soort lijkt zeer op *anous*, doch is wat korter en meer glanzig. Lengte 3,5—3½ mm. Verbreid in slooten, doch overal vrij zeldzaam (*lineatus* Aubé) 13. **confinis** Steph.
- 3 Prosternaal-voortzetting fijn bestippeld. De stippelrijen op de dekschilden zijn regelmatig en staan op zwarte lijnen, van welke de binnenste 4 gewoonlijk niet, de buitenste 4 daarentegen in den regel driemaal onderbroken zijn; zeldzamer vloeien zij langs den naad en hier en daar tot zwarte vlekjes samen. Halsschild aan voor- en achterrand met een scherp afgezetten, zwarten zoom. Aan de basis van het halsschild bevindt zich soms aan weerszijden een klein onduidelijk langsstreepje. Onderzijde geelwit. Deze soort lijkt zeer

op amoenus, doch is wat kleiner en meer witachtig-geel van kleur. Lengte 3 mm. In zoet- en brakwater. Zeer zeldzaam. Rhon en IJsselmonde bij Rotterdam, Breda, Vorden, Middelburg (maritimus Fairm. et Lab.) 12. **varius** Nicolai.

Prosternaal-voortzetting grof bestippeld. De stippelrijen op de dekschilden onregelmatig en hier en daar onderbroken; van de zwarte lijnen, op welke zij staan, zijn gewoonlijk de binnenste tweemaal, de buitenste driemaal onderbroken. Langwerpig-eirond; licht roodgeel, de schedel en gewoonlijk de voorrand van het halsschild in 't midden bruin. Dekschilden met zwarten naad. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. In helder stilstaand water, doch vrij zeldzaam.

(obliquus Aubé) 11. **amoenus** Oliv.

4 Halsschild zonder langsstreepje aan weerszijden van de basis 5

Halsschild aan weerszijden van de basis met een korter of langer ingegraven langsstreepje . . 9

5 Kop groot, iets breeder dan de halve basis van het halsschild. Lichaam elliptisch, met meer evenwijdige zijden, glanzig roestrood. Halsschild naar voren matig versmald, de voorrand in 't midden iets uitgetrokken, op de voorheft sterk en dicht bestippeld, voor de basis met eene dwarsrij van grovere stippels. Dekschilden met tamelijk krachtige stippelrijen; in de tusschenruimten met eene rij zeer fijne stippels. Metasternaal-voortzetting tusschen de middelcoxae zonder groefje. Lengte $4-4\frac{1}{2}$ mm. In zoet- en brakwater, zeldzaam. Zandvoort, Loosduinen, den Haag, Zierikzee en Koudekerke op Walcheren. In België bij Heyst (badius Aubé) 1. **mucronatus** Steph.

Kop klein, iets smaller dan de helft der basis van het halsschild. Lichaam langer of korter eivormig, meer geleidelijk toegespitst. 6

6 Metasternaal-voortzetting met een groefje tusschen de middelcoxae. Zijrand der dekschilden, van boven gezien, tegen den schouderhoek rechtlijnig doorlopende in den rechtlijnigen of slechts zeer zwak uitgebogen zijrand van het halsschild. Langs de geheele basis van het halsschild met eene rij grove stippels 7

Metasternum tusschen de middelcoxae vlak ingedrukt, zonder groefje. Zijrand der dekschilden, van boven gezien, tegen den schouderhoek sterk afgerond en met den afgeronden zijrand van het halsschild een duidelijken hoek vormend. De stippels aan de basis van het halsschild weinig grooter dan die aan den voorrand. Bovenlip duidelijk uitgerand. Bovenzijde bleekgeel; de vrij sterke stippelrijen der dekschilden staan gewoonlijk op zwarte lijnen 1). Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Vooral in stroomend water. Den Haag, Arnhem, Laag-Soeren en Houthem (Limburg). (cinereus Aubé, ? affinis Steph.) 5. **laminatus** Schaller.

7 Bovenlip van voren duidelijk uitgerand. Voorrand van het halsschild in 't midden een weinig uitgetrokken. Bovenzijde roestrood, de dekschilden in den regel zwart gevlekt . . 8

Bovenlip van voren recht afgesneden. Voorrand van het halsschild in 't midden niet uitgetrokken. Kleiner, korter en in de schouders breeder dan fulvus. Bovenzijde geel, de dekschilden geheel ongevlekt, zelden met een paar vlekjes op het midden, alleen zijn de * stippels, evenals die van het halsschild, zwart. Lengte $3\frac{1}{2}-4$ mm. Niet zeldzaam in helder water (impressus F.) 4. **flavicollis** St.

8 Eivormig, roestrood of roodgeel, de dekschilden met bruinen naad en onregelmatige, gedeeltelijk met den naad samenhangende bruine vlekken. Dekschilden met rijen van krachtige en vrij dicht opeenstaande stippels; in de tusschenruimten met enkele fijne stippeltjes. Lengte $3-3\frac{1}{2}$ mm. Over het algemeen zeldzaam in slooten 2. **variegatus** St. 2)

Lang eivormig, langer gestrekt en aan de zijden minder afgerond dan variegatus, roestrood of roodgeel, de dekschilden met zwarte of bruine, niet samenvloeiende, in aantal zeer veranderlijke langsvlekken, zelden ongevlekt. Dekschilden met rijen van vrij krachtige, iets minder dicht opeenstaande stippels; in de tusschenruimten met enkele fijne stippeltjes. Lengte $4-4\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam in stilstaande wateren.

(ferrugineus Gylh.) 3. **fulvus** F.

9 Halsschild hoogstens tusschen de basaalstreepjes met een zwakken dwarsindruk, aan de zijden lijn gerand. 10

Halsschild voor de geheele basis met een dwarsindruk en met diepe, naar binnen gebogen, tot aan het midden reikende basaalstreepjes, van achteren aan de zijden dik gerand. Kop zwart of donkerbruin; het halsschild bruingeel met eene zwarte of bruine langsvlek in het midden; de dekschilden bruingeel, met zwarten naad en gewoonlijk met eenige meer of minder duidelijke, donkere vlekken, soms ongevlekt en slechts de grove stippels der rijen

1) W. Redtenbacher beschreef als *H. ater* een abnormaal exemplaar met geheel zwart lichaam, en gele sprieten, mond, schenen en tarsen.

2) In Westfalen zou eene mij onbekende var. *obscurus* Westh. voorkomen, welke dat is, met donkerder grondkleur, bijna onthrekende vlekken en fijnere bestippeling.

- zwart, in de tusschenruimten met enkele kleinere stippeltjes. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer gemeen in stilstaande wateren tusschen drijvende waterplanten . . . 10. *lineatocollis* Mrsh.
- 10 Lichaam kort en breed, met sterk uitpuilende schouders, naar achteren wigvormig versmald. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, met sterk convergeerende zijden. Roodgeel, de schedel en de voorrand van het halsschild bruinachtig, de dekschilden donker gestreept en gevlekt. Dekschilden met meer of minder krachtige stippelrijen, in de tusschenruimten met enkele stippeltjes. Prosternum gegroefd. Bij het type zijn de basaalstreepjes op het halsschild kort en fijn, de basis daartusschen vlak; de dekschilden met niet zeer grove stippelrijen, bij het ♀ naar het uiteinde dof. De var. *multipunctatus* Wehncke is iets grooter, aan de schouders nog breeder en onderscheiden door langere, diepere, rechte basaalstreepjes op het halsschild, waartusschen de basis eenigszins dwars ingedrukt is; de dekschilden met veel krachtiger stippelrijen; bij het ♀ geheel glanzig. De var. *Heydenii* Wehncke is iets kleiner, korter en naar het uiteinde sterker versmald, met langere gebogen basaalstreepjes op het halsschild, waartusschen de basis eenigszins dwars ingedrukt is; dekschilden met zeer krachtige stippelrijen, welke aan de basis met eene veel grootere, onregelmatige stip beginnen, bij het ♀ geheel glanzig. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen, zoowel het type als de var. *Heydenii* in stilstaande wateren. De var. *multipunctatus* enkele malen bij den Haag, Rotterdam, Baarn en Leiden aangetroffen . . . 6. *ruficollis* de Geer.
- Lichaam smaller, met minder uitpuilende schouders, naar achteren meer geleidelijk versmald. Halsschild iets langer, ongeveer dubbel zoo breed als lang, met minder convergeerende zijden. 11
- 11 Dekschilden als bij *variegatus* geteekend, met bruinen naad en eenige bruine vlekken; met niet zeer grove stippelrijen. Langsstreepje aan weerszijden van de basis van het halsschild lang en recht, ongeveer $\frac{1}{2}$ der lengte van het halsschild bedragend. Lichaam smaller dan bij *ruficollis*, met minder uitpuilende schouders; roestrood of bruinrood, de schedel en de voorrand van het halsschild bruin. Prosternum niet gegroefd 1). Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Leiden, Utrecht, Roermond en Breda. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf, in België bij Antwerpen. 7. *fulvicollis* Er.
- Dekschilden ongevlekt, slechts met donkere strepen, op welke de stippelrijen staan, zelden nagenoeg geheel eenkleurig geel, of wel bij uitzondering de donkere langsstrepen hier en daar tot vlekjes samengevloeid. 12
- 12 Het basaal-streepje van het halsschild is zeer kort, de fijne zwarte lijnen op de dekschilden zijn hier en daar onderbroken, doch vloeien nergens te zamen. Deze soort is smaller dan *ruficollis*, met iets grooteren kop. Bleekgeel, de schedel en de voorrand van het halsschild min of meer bruinachtig. Bij het ♀ zijn de dekschilden naar het uiteinde dof. Prosternum weinig of niet gegroefd. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Langs stroomend water niet zeldzaam.

8. *fluviatilis* Aubé.

Het basaal-streepje van het halsschild is langer, reikt tot op $\frac{1}{2}$ der lengte van het halsschild en is soms iets naar binnen gebogen. De zwarte lijnen op de dekschilden zijn iets breeder en loopen geheel door (bij de abc. *lineolatus* Wehncke zijn zij onderbroken); gewoonlijk zijn zij op een paar plaatsen iets verbreed, doch zonder samen te vloeien. De dekschilden bij het ♀ geheel glanzend. Prosternum altijd gegroefd. Kleur der bovenzijde iets meer roodgeel. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Verbreed en op sommige plaatsen niet zeldzaam. Ook op het eiland Borkum (immaculatus Gerh.) 9. *striatus* Sharp. 2)

3. Peltodytes Régimbart.

(Cnemidotus Erichs. (non Illiger.) 3)

Eindlid der tasters langer dan het voorlaatste lid. Sprieten zeer kort. Halsschild gewelfd en naar voren sterk versmald, zonder langsstreepjes. Dekschilden met eene

1) Bij de in Oostelyk Duitschland voorkomende *H. punctatus* Seidlitz, welke door Ganglbauer als eene variëteit van *fulvicollis* wordt beschouwd, zijn de streepjes aan de basis van het halsschild lichter en iets naar binnen gebogen en is eene gladde, van achteren vorksgewijs naar achteren gedeelde prosternaalgrêtel voorhanden.

2) Een vrij groot onderzoekingsmateriaal heeft mij de zekerheid gegeven, dat *H. striatus* Sharp en *immaculatus* Gerh. synoniem zijn en goed van *H. fluviatilis* is te onderscheiden. Overigens heerscht bij de bewerkers der Haliplidae groot verschil in opvatting en komt het mij niet onwaarschijnlijk voor, dat *H. striatus* en *fluviatilis*, evenals *H. Heydenii* en *multipunctatus* slechts rassen of variëteiten van *H. ruficollis* zijn. Volgens Fauselton *H. immaculatus* Gerh. de echte *fluviatilis* Aubé zijn.

Volgens Ganglbauer zou *H. striatus* Sharp eene variëteit van *fluviatilis* zijn, bij welke de basaal-streepjes van het halsschild langer en de zwarte lijnen op de dekschilden niet onderbroken zijn, zoo ook *immaculatus* Gerh., bij welke de basaalstreepjes kort en iets naar binnen gebogen en de nagenoeg niet onderbroken zwarte langslippen van de, ook bij het wijfje aan het uiteinde glanzige, dekschilden, gewoonlijk op twee plaatsen iets verbreed zijn, zonder echter ineen te vloeien.

3) De naam *Cnemidotus* moet vervallen, omdat zij door Illiger gegeven is aan Haliplus-soorten.

fijne streep dicht langs den naad. Achtercoxae met een duidelijken tand aan het achter-einde, het achterlijf tot aan de basis van het laatste sterniet bedekkend. Klauwen klein. Van de 3 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Ovaal, stroogeel, de schedel donker, de dekschilden met eene donkere naadylek iets achter het midden en bovendien met eenige kleinere onduidelijke donkere vlekjes. Halschild voor de basis eenigszins dwars ingedrukt en met zeer grove stippels bezet; achter den voorrand met veel fijnere stippels. Dekschilden met regelmatige, aan de voorzijde krachtige, naar het uiteinde en naar de randen met fijner wordende stippelrijen. De eerste stippel van elke rij is in 't oogvallend grover dan de volgende. Achtercoxae aan den achterrand met een stompen tandvormigen hoek. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Niet zeldzaam in staande wateren, tusschen drijvende waterplanten, als: *Batrachium*, *Callitriche*, *Eloëa* en wier. De larve is door *Schödtte* bekend geworden 1. *caesus* Dfts.

IV. Familie HYGROBIIDAE.

Fig. 10. Onderzijde van *Hygrobia tarda* Hbst.
Naar Ganglbauer Gewyzigd.

Eene zeer kleine familie, welke slechts één genus met ééne enkele Europeesche soort bevat. Lichaam sterk gewelfd, vooral de onderzijde. Kop niet in het halschild teruggetrokken, met sterk uitpuilende oogen. Clypeus door een meer of minder duidelijken, hoekigen naad van het voorhoofd gescheiden, evenals bij de Carabidae naar voren versmald. — Sprieten aan den zijrand van het voorhoofd, voor de oogen ingeplant, 11-ledig, draadvormig; het eerste lid veel grooter dan de overige leedjes, alle leedjes onbehaard. — Voorkaken breed en kort, aan het uiteinde met twee tanden. Buitenste lob der achterkaken 2-ledig, de binnenste lob naar den scherpen top gekromd, aan den binnenrand niet met haren bezet. Kaaktasters 4-ledig. Kin zeer kort, van voren breed en diep uitgerand, met een breeden uitgeranden middenrand, over welke de zijlobben slechts weinig uitstekten. De tasterdragende stukken van de onderlip liggen met de tong vrij in de uitranding der kin. De tong is chitineus, breed en kort, zeer stomp toegespitst. De paraglossen zijn met de tong vergroeid. Lip-tasters 3-ledig. — De basis van het halschild sluit volkomen tegen de basis der dekschilden aan. Het schildje is bij de eenige Europeesche soort vrij en duidelijk zichtbaar. — Dekschilden eivormig, de epipleuren tot aan de achtercoxae breed en van daar naar achteren versmald. Tot aansluiting aan den zijrand van het eerste sterniet, bezitten de dekschilden op de onderzijde eene lobvormig ver-

breede langsplooi. — Vleugels als bij de Carabidae en Dytiscidae. — Prosternum zeer hoog gewelfd, naar voren in eene sterke welving nagenoeg loodrecht afhellend, van achteren in eene lange, toegespitste voortzetting tot tusschen de middelcoxae verlengd. De voorste coxaalholten zijn door de, van de episternen slechts onduidelijk gescheiden, epimeren van den prothorax gesloten. Het zeer korte, in het midden door de prosternaal-voortzetting overdekte mesosternum helt van voren loodrecht af. De episternen van den mesothorax zijn breed, de epimeren zeer smal en reiken tusschen de zijstukken van het meso- en metasternum tot aan de middelste coxaalholten. De metathorax helt dakvormig naar de zijden af. Het metasternum is kort, de zijvleugels zijn naar buiten verbreed en strekken zich zijwaarts, ver voorbij de middelcoxae, uit. De tusschen de middelcoxae geschoven, aan het uiteinde vorksgewijs uitgerande intercoxaal-voortzetting van het metasternum is lang, doch bereikt echter niet de gevorkte voortzetting van het mesosternum. Vóór de binnenste lobben der achtercoxae is een kort, van achteren afgeknot middenstuk, van het metasternum door een dwarsnaad afgescheiden. In verband met de hoog gewelfde borst zijn de voor- en middelcoxae kegelvormig verlengd. De breede achtercoxae zijn zijwaarts tot aan den zijrand van het lichaam uitgebreid en scheiden het metasternum en de episterna van den metathorax volkomen van het eerste sterniet af. Aan den voorrand zijn zij een weinig uitgerand en in tegenstelling tot de Dytiscidae, niet ten koste van het metasternum naar voren verbreed. In het midden stooten de hoog opgerichte binnenste lobben der achtercoxae rechtlijnig tegen elkaar, divergeeren naar achteren

en zijn aan het uiteinde diep uitgerand. Pooten slank, de schenen samengedrukt en op den boven- en onder- rand met zwemharen bezet. Voorschenen met twee lange, rechte, dikke einddoornen. Tarsen 5-ledig, het vierde lid der voor- en middeltarsen klein. De voor- en middeltarsen zijn krachtig ontwikkeld en bovenop lang bewimperd; de achtertarsen zijn lang en slank, iets samengedrukt en op de boven- en onderzijde lang bewimperd. Bij het ♂ zijn de eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen iets verbreed en aan de onderzijde zolig. — Achterlijf met 8 tergiten en 6 sterniten; de naden der eerste 3 met elkaar vergroeide sterniten duidelijk zichtbaar. Het eerste sterniet staat tegenover het tweede tergiet.

De larve is spoelvormig en hoog gewelfd. Zij komt volgens *Schüdte* met die der Dytiscidae in het aantal achterlijfsringen overeen, doch verschilt zeer door de, evenals bij de Carabiden-larven gesloten, d. i. niet van eene zuigbuis voorziene voorkaken, door de aanwezigheid van draad-vormige kieuw-aanhangsels aan de onderzijde der drie thoracaal-ringen en der eerste drie sterniten, alsook door het ontbreken der stigmata aan den achtsten achterlijfsring. Kop zeer groot, aan weers-zijden met 6 ocellen. Achterlijf uit 8 segmenten bestaande, van welke het laatste in een zeer lang aanhangsel uitgetrokken is; bovendien bezit het twee lange cerci. Pooten met zwemharen bezet, de tarsen met twee klauwen.

Deze kleine familie werd het eerst van de Dytiscidae afgezonderd door *G. Horn*. Het voornaamste onderscheid treft men in den bouw van het metasternum, dat bij de Hygrobidae vóór de binnenste lobben der achtercoxae een dwarsnaad vertoont, welke een kort middenstuk van het metasternum afsnijdt, terwijl bij de Dytiscidae daarvan geen spoor aanwezig is. Bovendien is de kop niet in het halsschild teruggetrokken, zijn de achtercoxae niet naar voren verbreed en geschiedt de beweging der achterpooten, evenals bij de Haliplidae en Carabidae, afwisselend, bij de Dytiscidae daarentegen tegelijk.

1. Hygrobia Latr.

(Hydrachna F., Pelobius Schönh.)

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Roestrood of bruinachtig geel; op de bovenzijde dicht en grof bestippeld. Halsschild aan den voor- en achterrand, alsook eene groote, gemeenschappelijke, aan voor- en zijrand uitgezakte vlek op de dekschilden zwartachtig. Op de onderzijde der dekschilden bevindt zich een stridulatie-orgaan, bestaande uit eene kantige verhevenheid met dicht openstaande dwarsriggels, aan het uiteinde langs den naad, waar tegenaan de kantige, dunne hoornrand van den laatste achterlijfsring gewreven wordt. Volgens *Landois* zou bovendien een gehid voortgebracht worden, doordat de sterk geriggelde randader van den ondervleugel tegen een scherp uitstekenden kant op de onderzijde der dekschilden aangestreeken wordt. Lengte 9—11 mm. In poelen en slooten op kleigronden, verbreed en soms niet zeldzaam. Zij zwemt zeer snel. De larve en de pop zijn door *Schüdte* beschreven. (Hermann Oliv.) 1. *tarda* Hrbst.

V. Familie DYTISCIDAE.

De Dytiscidae („Water-roofkevers” of „Zwemtorren”) vervangen de Carabidae in het water, daar zij, alsmede hunne larven, van roof leven en hunne prooi al zwemmende vervolgen. Zij zijn vooral gekenmerkt door den vorm der middel- en achterpooten, die zeer plat zijn, met zwemharen bezet en derhalve uiterst geschikt zijn tot voortroeven.

Fig 11 Spruit van *Noterus*
Mannelijc Orig

Van de Cicindelidae, Carabidae, Haliplidae en Hygrobidae zijn zij onderscheiden door de afwezigheid van het ante-coxaal gedeelte van het metasternum. Hun bouw is in alle opzichten geschikt om het water te doorklieven; zij zijn in den regel onbehaard, de kop, het halsschild en de dekschilden vormen meestal te zamen een geheel, dat min of meer ovaal is. Kop kort en breed, diep in het halsschild verzonken, met groote, weinig uitpuilende oogen, welke zich ver op de onderzijde van den kop uitbreiden. Sprieten aan den zijrand van het voorhoofd vóór de oogen ingeplant, dun, draad- of borstelvormig, zeer zelden (*Noterini*) de middelste leedjes iets verdikt of geheel onregelmatig (Fig. 11), nimmer behaard, 11-ledig. Bovenlip klein, aan de voorzijde min of meer uitgerand en met wimperharen bezet, zelden recht afgesneden en niet bewimperd (*Noterus*). Voorkaken kort en krachtig, met verbreed en tweetandigen top. De binnenste lob der achterkaken is naar het zeer scherpe uiteinde gekromd en aan den binnenrand dicht en krachtig bewimperd. De buitenste lob is slank en 2-ledig. Kaaktasters 4-ledig. Kin breed en diep uitgerand, in het midden der uitranding met een tand, welke scherp, stomp, afgerond of uitgerand is. De hoornachtige tong is breed, vierhoekig; de paraglossen zijn volkomen daarmee vergroeid. De deelen van de onderlip, waaraan de tasters gezeten zijn, steken in de uitranding der kin aan weerszijden uit. Liptasters 3-ledig. De tasters zijn nimmer met

borstellaren bezet. — Het halschild sluit met den achterrand volkomen tegen de basis der dekschilden aan en omvat met de meer of minder vooruitstekende voorhoeken den kop. — De dekschilden omvatten het achterlijf volkomen; op hunne onderzijde bevindt zich gewoonlijk aan de binnenzijde van den zijrand eene plooi of lijst, die tot aansluiting aan den zijrand van het achterlijf dient. Bij eenige *Hydroporini* gaat van deze plooi eene tongvormige voortzetting uit, welke in eene zakvormige verdieping van het laatste sterniet ingrijpt. — De vleugels zijn goed ontwikkeld 1) en komen in nervatuur, behoudens kleine verschillen, zeer met die der *Carabidae* overeen. Naar verhouding zijn zij breeder en onderscheiden zich door de, ofschoon zeer smalle, tot aan het gewricht reikende area scapularis, door eene in den regel voorhanden vierhoekige pigmentvlek aan de voorste cubitaalader in de area interno-media en door het groote „oblongum”, dat door twee

Fig. 12. Onderzijde van *Noterus*
Naar Ganglbauer, Gewijzigd.

zeer ontwikkelde dwarsaders gevormd is. Het wigvormige vakje is eveneens groot en de vena analis zeer ontwikkeld. Het prosternum zet zich naar achteren voort in een verlengstuk, dat in den regel tusschen de middelcoxae tot aan de intercoxaal-voortzetting van het metasternum doorloopt en het mesosternum over het midden bedekt. De episternen van den prothorax zijn van het prosternum in den regel duidelijk, van de epimeren echter slechts onduidelijk afgescheiden. De voorste coxaholten zijn van achteren open. De prosternaal-voortzetting sluit in eene diepe uitholling van het middengedeelte van het mesosternum. Het metasternum vertoont vóór de achtercoxae niet de geringste aanduiding van een dwarsnaad; naar het uiteinde zet het zich tusschen de achtercoxae voort als een breed, hoekig gedeelte, naar voren tusschen de middelcoxae als een intercoxaal-uitsteeksel, dat in den regel de uitholling van het mesosternum bereikt. Aan het uiteinde is dit metasternaal uitsteeksel gewoonlijk tot opname der prosternaal-voortzetting gegroeofd of gevorkt. De buitengewone ontwikkeling van het metasternum ten koste van het pro- en mesosternum is een gevolg daarvan, dat de achterpooten hoofdzakelijk alleen de zwembeweging daarstellen. De voor- en middelcoxae zijn kegel- of kogelvormig en steeds van elkaar gescheiden. De achtercoxae zijn buitengewoon ontwikkeld en aan den geheelen voorrand met het metasternum schijnen te vormen. Bij *Bidessus* zijn de achtercoxae ook met het eerste sterniet onbewegelijk vergroeid. Zij bestaan uit eene vrij smalle binnenste lob en eene zeer groote, vlak uitgebreide buitenste plaat. De beide binnenste lobben der achtercoxae stooten rechtlijnig tegen elkaar en vertoonen niet zelden eene uitranding of spleet aan haar uiteinde. — Voor- en middelpooten over het algemeen vrij kort en weinig samengedrukt. De voor- en middeltarsen hetzij duidelijk 5-ledig, of schijnbaar 4-ledig (*Hydroporini*), doordat het vierde lid uiterst klein en moeilijk zichtbaar is. In dit laatste geval zijn de eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen in beide seksen breed en aan de onderzijde vlak en zolig; het derde lid bovendien aan het uiteinde uitgerand of tweelobbig. De achterpooten zijn tot zwemmen ingericht; zij zijn nl. platgedrukt en de schenen en tarsen met zwemharen bezet. Het meest zijn deze zwempooten ontwikkeld bij *Cybister*. Bij enkele *Hydroporini*-genera zijn de achterpooten bijna niet platgedrukt en slechts met weinige zwemharen bezet. De klawven zijn krachtig ontwikkeld, weinig of niet bewegelijk, niet zelden ongelijk. — Bij het ♂ zijn gewoonlijk de eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen, of alleen de voortarsen verbreed en op de onderzijde met gesteelde hechtplaatjes of zuignapjes bezet. De verbreding der leedjes is of gewoon, of wel zijn de eerste 3 leedjes der voortarsen zoo buitengewoon verbreed en sluiten boven-

Fig. 13. Onderzijde van *Dytiscus*
Naar Ganglbauer, Gewijzigd.

1) Bij een Noord-Amerikaansche *Agabus*-soort zijn zij rudimentair.

dien zoodanig aaneen, dat zij te zamen eene groote, rondachtige zuigschijf vormen (Dytiscini). Deze inrichting schijnt te dienen tot vasthechten aan het lichaam der wijfjes bij de paring. — Achterlijf met 8 tergiten en 6 sterniten. De naden der eerste 3 met elkaar vergroeide sterniten zijn duidelijk. Het eerste sterniet staat tegenover het tweede tergiet. — Bij sommige soorten zijn de beide seksen te onderscheiden, behalve door den eigenaardigen bouw der voortarsen, door het al of niet gegroefd, of glanzig of dof zijn der dekschilden (Dytiscus en Acilius). In enkele gevallen komen dimorphe wijfjes voor. De forceps is in tegenstelling der asymmetrie bij de Carabidae, symmetrisch.

De Dytiscidae zijn nimmer metaalkleurig, wel soms een weinig bronzig, doch gewoonlijk zwart, olijfgroen, bruin, geelachtig, zelden gevlekt, meestal eenkleurig of met lichter randzoom.

Zij vliegen voortreffelijk, doch 's nachts, en leggen alsdan soms groote afstanden af, om bij uitdroging van slooten en plassen andere wateren op te zoeken; vandaar dat men ze dikwerf in den morgenstond op wegen ziet voortkruipen of zelfs in woningen kan aantreffen. Soms vallen zij op den bij helderen maneschijn, schitterende glas-oppervlakten van broeikassen, die zij voor een waterspiegel aanzien, of komen terecht in regentonnen en gasmeter-waterreservoirs. — Hun ware verblijf is zoet- en brakwater, waarin zij met groot gemak zweemmen, daar de achterpooten ver naar achteren staan, waardoor de kracht, die zij er mede aanwenden, vermeerderd wordt. Zij zweemmen onder gelijkzijdige beweging der achterpooten, daarbij den kop schuin naar onderen gericht, waardoor den van onderen naar boven werkenden en tegen het lichaam als tegen een hellend vlak gerichtten aandrang van het water, de door het roeien verkregen voorwaartsche beweging ondersteunt (Dytiscus). — Zij verslinden andere waterdieren, vooral wormen, slakken en larven, maar ook hun gelijken en zelfs grootere dieren, als vi-schen en kikvorschen; derhalve kunnen zij ook schadelijk worden, althans de grootere soorten (Dytiscus). Ook vreten zij aan aas, als verdrinken honden en katten. — Met korte tusschenpoozen komen zij aan de oppervlakte van het water, om adem te halen; dit geschiedt bij de grootere Dytisciden aldus: de kever komt bij het ademen loodrecht, met den kop omlaag, tot aan de oppervlakte, steekt het achterlijf daaruit en licht de dekschilden een weinig op, zoudat er lucht komt in de holte tusschen het achterlijf en de dekschilden; deze hoeveelheid lucht wordt langzamerhand door de stigmata ingedeemd. De kleinere soorten als Agabus, Ilybius enz., nemen de lucht in den vorm van een blaasje aan het achterlijf mede. — Bij ruw weder zijn de Dytisciden minder levendig en verschijnen dan meestal aan de oevers of tusschen plantenmassa's. — Gevangen zijnde, zonderen de grootere soorten, aan den voor- en achterrand van het halsschild, eene melkachtige, onaangenaam riekende vloeistof af, waarvan de betekenis nog niet geheel is opgehelderd. — Naar het schijnt kunnen de meeste Dytiscidae eenig gehuid voortbrengen, op dezelfde wijze veroorzaakt als door *Landois* voor *Hygrobia* is aangegeven.

De larven zijn over 't algemeen zeer verwant aan die der Carabidae, doch verschillen vooral door het aantal achterlijfs-segmenten en door de van eene zuigbuis voorziene voorkaken. Lichaam lang gestrekt, cylindervormig, naar voren en naar achteren dunner. Kop groot, door eene soort hals van het halsschild gescheiden, met (Hydroporini) of zonder hoorn van voren. Sprietten aan de zijden, achter de basis der voorkaken ingeplant, in den regel 4-ledig, bij de volwassen larven van Acilius, Dytiscus en Cybister 6—8-ledig. Voorkaken groot, sikkelvormig en scherp, bij de Hydroporini opwaarts gekromd, bij de overigen horizontaal tot elkaar gericht, van binnen hol en aan het uiteinde met eene kleine opening tot zuigen ingericht; de mond overigen gesloten. Aan weerszijden van den kop 6, meesal in twee rijen geplaatste ocellen. Kaaktasters 3-ledig, schijnbaar veelal 4-ledig, daar de meer of minder ontwikkelde tasterdrager zich als wortelid voordoet. Bij volwassen larven van Acilius, Dytiscus en Cybister zijn de kaaktasters 4—8-ledig. Liptasters 2-ledig, bij de uitgegroeide larven van Dytiscus en Cybister echter 4-ledig. Achterlijf uit 8 segmenten bestaande, met 8 paar stigmata, van welke het alleen functioneerende laatste paar aan het uiteinde van het laatste segment zit. De cerci zijn gewoonlijk lang en slank, borstelvormig, bij Acilius en Dytiscus kort; bij Cybister ontbreken zij. De pooten zijn lang en slank; de tarsen met een afzonderlijk klauwlied, met bijna altijd twee lange, slanke klauwen. Er komen bij de Dytisciden-larven twee hoofdvormen voor, nl. die der Hydroporini en die der overige Dytiscidae. Zij zijn zeer vraatzuchtig en leven hoofdzakelijk van waterinsecten en weekdieren, die zij met hare voorkaken uitzuigen. Zij verpoppen in eene, in de nabijheid van het water gemaakte aardholte.

Wat betreft den inwendigen bouw, zoo verschillen de Dytiscidae van de Carabidae vooral door het meer geconcentreerde zenuwstelsel.

Eene indeeling volgens *Sharp* in twee hoofdgroepen, nl. Dytisci fragmentati en Dytisci complicati schijnt niet in overeenstemming met de in 't oogvallende tweërlei hoofdvormen der door *Schödt* bekend geworden larven-typen. Eene meer natuurlijke indeeling laat ik hier volgen, in navolging van *L. Ganglbauer's* „Käfer von Mittel-Europa“.

Overzicht der Tribus.

- 1 Voor- en middelarsen schijnbaar 4-ledig, daar het vierde lid zeer klein en zelden duidelijk herkenbaar is; de eerste 3 ledjes bij het ♂ en ♀ verdikt. Schildje in 't geheel niet of slechts als een zeer klein puntje zichtbaar. Prosternum sterk in de lengte gekromd, zoodat de voortzetting in een ander vlak gelegen is, dan het gedeelte vóór de voorcoxae.

1. Hydroporini.

- Voor- en middel-tarsen duidelijk 5-ledig. Prosternum volkomen of nagenoeg geheel in een zelfde vlak volgens de lengteas ontwikkeld 2
- 2 Schildje niet zichtbaar. De binnenhoek der episternen van den metathorax bereikt de middelste coxaalholten niet (Fig. 12). 3
- Schildje zichtbaar. Achter-tarsen steeds sterk gecompri-meerd. De episternen van den metathorax bereiken de middelcoxae (Fig. 13). 4
- 3 Achtercoxae niet naar voren uitgebreid, de zijstukken van het metasternum groot, driehoekig. De binnenste lobben der achtercoxae over hare geheele lengte in een hooger vlak gelegen dan de buitenste en zijwaarts plaatvormig verbreed, zoodat zij eene ver naar voren doorlopende dijgroef overwelen II. **Noterini.**
- Achtercoxae zeer ver naar voren uitgebreid, de zijstukken van het in 't midden lange metasternum daardoor zeer smal. De binnenste lobben der achtercoxae slechts van achteren opgericht; zij overwelen aan weerszijden eene slechts korte, weinig naar voren uitgebreide dijgroef III. **Laccophilini.**
- 4 De voorrand van den clypeus grijpt over de oogen, deze zijn daardoor van voren uitgerand. Voortarsen bij het ♂ soms verbreed en met zuignapjes of borstelharen bezet, doch niet tot eigenlijke zuigschijven verbreed IV. **Colymbetini.**
- De voorrand van den clypeus grijpt niet over de oogen, deze zijn van voren niet uitgerand. Voortarsen bij het ♂ tot groote zuigschijven verbreed (Fig. 15) V. **Dytiscini.**

I. Tribus HYDROPORINI.

- 1 Epipleuren der dekschilden aan de basis, onder den schouderhoek, met eene scherp omrande groef of uitholling, om het uiteinde der middeldijen op te nemen 2
- Epipleuren der dekschilden zonder scherp omrande uitholling aan de basis 5
- 2 Voortzetting van het prosternum achter de voorcoxae driehoekig of ruitvormig verbreed. Middelcoxae ver van elkaar afstaande. Middeltarsen zeer kort, met rondachtige leedjes en even lange klauwen. Lichaam zeer kort en breed 1. **Hydrovatus.**
- Voortzetting van het prosternum achter de voorcoxae smal. Middelcoxae dicht bij elkaar geplaatst. 3
- 3 Achter-tarsen sterk samengedrukt, met 2 zeer ongelijke klauwen; de een is duidelijk ontwikkeld, de ander buitengewoon klein en moeilijk zichtbaar. De voortzetting der achtercoxae boven de basis der achterdijen zonder lobvormige verbreding, waardoor de dijen naar alle richtingen bewegelijk zijn. Aan de voor- en middeltarsen is het eindlid zeer klein. Achterdijen tamelijk ver van elkaar geplaatst. Lichaam zeer kort en breed, aan de onder- en bovenzijde hoog gewelfd. Op de onderzijde vertoonen de dekschilden naar het uiteinde eene, aan den zijrand evenwijdig verlopende, scherp verheven lijst, welke vóór het uiteinde in eene lange, tongvormige voortzetting verbreed is en voor de stevige aansluiting der dekschilden aan den zijrand van het achterlijf dient 2. **Hyphydrus.**
- Achter-tarsen weinig samengedrukt, met twee gelijke klauwen. De voortzetting der achtercoxae boven de basis der achterdijen kort lobvormig verbreed. Achterdijen dicht bij elkaar geplaatst. 4
- 4 Clypeus van voren gerand. Lichaam kort, breed en hoog gewelfd 3. **Hygrotus.**
- Clypeus van voren ongerand. Lichaam vlakker en in den regel meer langwerpig 1). 4. **Coelambus.**
- 5 Achtercoxae met het eerste sterniet onbewegelijk vergroeid. Halsschild aan weerszijden van de basis met een langsgroefje, dat zich meestal ook op de basis der dekschilden voortzet. De kleinste kevertjes onder de Dytiscidae 5. **Bidessus.**
- Achtercoxae niet met het eerste sterniet vergroeid. Dek-schilden zonder langsgroefje, zelden met eene langsrib, welke zich echter nimmer op het halsschild voortzet 6
- 6 Het gedeelte van het mesosternum, tusschen de middelcoxae gelegen en onder de prosternaalvoortzetting verborgen, reikt niet tot aan de metasternaalvoortzetting. Het halsschild is meestal naar de basis sterk vernald. De bestippeling der bovenzijde van het lichaam is of duidelijk, lijn en grof dooreen gemengd, in welk geval het lichaam eenkleurig is, of wel de bestippeling is uiterst fijn en dicht en nagenoeg gelijk, in welk geval de bovenzijde van het lichaam geel met zwarte langsbanden geteekend is 6. **Deronectes.**
- Het gedeelte van het mesosternum, tusschen de middelcoxae gelegen en onder de prosternaal-

1) *Coelambus confluent* F. nadert in habitus meet den *Hygrotus*-vorm.

voortzetting verborgen, stoot tegen het metasternum aan. Halschild in den regel in het geheel niet naar de basis versmald. De bestippeling der bovenzijde is gewoon, nimmer lijn en grof dooreen. Kleur der bovenzijde zelden geel met zwarte langslijnen, meestal eenkleurig zwart of bruin 7. **Hydroporus**.

II. Tribus NOTERINI.

Bevat slechts het genus 8. **Noterus**.

III. Tribus LACCOPHILINI.

Bevat slechts het genus 9. **Laccophilus**.

IV. Tribus COLYMBETINI.

- 1 Achterdijen op de onderzijde aan den binnen-tophoek met een groefje, waarin een aantal borstelharen gezeten zijn 2
- Achterdijen op de onderzijde aan den binnen-tophoek zonder dit groefje met borstelharen 4
- 2 De buiten-tophoek van de eerste vier leedjes der achtertarsen lobvormig uitgetrokken. Achterkluwen zeer ongelijk 10. **Ilybius**.
- De buiten-tophoek van de eerste vier leedjes der achtertarsen niet lobvormig uitgetrokken. Achterkluwen in den regel even lang 3
- 3 Epipleuren der dekschilden langs het tweede tot zesde sterniet zeer smal 11. **Agabus**.
- Epipleuren der dekschilden tot aan de basis van het voorlaatste sterniet tamelijk breed 12. **Platambus**.
- 4 Achterkluwen even lang. De omgeslagen, door de dekschilden overdekte, dorsale zijrand van het eerste sterniet glad 13. **Copelatus**.
- Achterkluwen zeer ongelijk. De omgeslagen, door de dekschilden overdekte, dorsale zijrand van het eerste sterniet dwars-rimpelig 5
- 5 Metasternaal-voortzetting tusschen de middelcoxae aan het uiteinde, tot opname van het prosternaal-uitsteeksel, diep gegroefd. Halschild aan de zijden meer of minder duidelijk gerand. Dekschilden glad, uiterst lijn gehagrinced 14. **Rhantus**.
- Metasternaal-voortzetting tusschen de middelcoxae aan het uiteinde slechts oppervlakkig gegroefd. Halschild aan de zijden ongerand. Dekschilden met duidelijke, dichte, dwars-rimpelige sculptuur 15. **Colymbetes**.

V. Tribus DYTISCINI.

- 1 De eerste vier leedjes der achtertarsen aan den geheelen toprand dicht met korte wimperharen bezet 2
- De eerste vier leedjes der achtertarsen aan den toprand niet bewimperd 4
- 2 Zijvleugels van het metasternum nabij het uiteinde niet verbreed, de buitenrand nagenoeg recht. Achterschenen vrij lang, met toegespitste eindsporen. Derde sprietlid nagenoeg even lang als het tweede 16. **Hydaticus**.
- Zijvleugels van het metasternum nabij het uiteinde naar binnen duidelijk verbreed en aan den buitenrand sterk afgerond. Achterschenen kort, hare eindsporen aan den top afgeknut en meer of min uitgerand of iets gevorkt. Derde sprietlid bijna dubbel zoo lang als het tweede 3
- 3 Dekschilden in beide seksen glad, bij het ♀ niet gegroefd 1). Middeltarsen bij het ♂ duidelijk verbreed en met duidelijke zuignapjes bezet 17. **Graphoderes**.
- Dekschilden in beide seksen dicht bestippeld, bij het ♀ met breede, lang behaarde groeven (Fig. 14). Middeltarsen bij het ♂ niet of slechts zeer zwak verbreed, met weinige, uiterst kleine zuignapjes bezet 18. **Acilius**.
- 4 Eindsporen der achterschenen lang en slank. Achterkluwen nagenoeg even lang en gelijk gevormd. Stigmata zeer groot, het laatste stigma zeer breed. Epipleuren der dekschilden gewoon 19. **Dytiscus**.
- De onderste eindspoor der zeer korte achterschenen zeer sterk verbreed, veel breeder dan de bovenste. Achtertarsen bij het ♂ slechts met één klaw. Stigmata klein, rond, de beide laatste kleiner dan de voorafgaanden. Epipleuren der dekschilden op het midden enigszins omgebogen 20. **Cybister**.

1) In Noord-Europa komen soms dimorphe wijfjes voor, wier dekschilden al of niet dicht korrelig zijn

I. Tribus HYDROPORINI.

1. *Hydrovatus* Motsch.

(Oxygnathus Schaum).

Voortzetting van het prosternum achter de voorcoxae driehoekig of ruitvormig verbreed. Middelcoxae ver van elkaar verwijderd. Middeltarsen zeer kort, met rond-achtige leedjes en even lange klauwen. Epipleuren der dekschilden aan de basis onder den schouderhoek met eene scherp omrande groef of uitholling, om het uiteinde der middeldijen op te nemen. Lichaam zeer kort en breed, sterk gewelfd. — Kleine kevertjes welke op *Hygrotus*-soorten gelijken. Het ♂ is tamelijk glanzig, het ♀ dof. Bij sommige soorten schijnt een stridulatie-orgaan aanwezig te zijn, langs den naad tusschen de achtercoxae en het metasternum, bestaande uit eene rij kleine dwarsstreepjes. — De soorten van dit genus leven in stilstaande wateren, gewoonlijk in aantal bijeen.

Van de 3 Europeesche soorten komt één in Nederland en één in het aangrenzend gebied voor.

Clypeus in beide seksen vlak, boogsgewijs afgerond en fijn gerand. Bruingeel of bruinrood, de achterrand van het halsschild donkerder bruinachtig; de dekschilden bruinachtig, de zijrand en twee groote, met dezen samenhangende dwarsvlekken bruingeel. Bovenzijde uiterst fijn gechagrineerd, het halsschild zeer fijn en verspreid, voor de basis sterker bestippeld. De dekschilden verspreid en tamelijk fijn, naar de zijden en naar het uiteinde zwakker bestippeld. Metasternum, achtercoxae en de basis van het achterlijf grof en dicht bestippeld. Het stridulatie-orgaan weinig aangeduid. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam in vijvers en slooten 1. *cuspidatus* Kunze.

Clypeus bij het ♀ afgerond, bij het ♂ in het midden iets uitgetrokken en breed afgeknut. Deze soort gelijkt zeer op *cuspidatus*, doch is kleiner en doakerder gekleurd; de dekschilden zijn onduidelijk lichter gevlekt. De geheele bovenzijde is fijn en soms eenigszins onduidelijk bestippeld; de sprieten zijn korter en dikker. Metasternum en achtercoxae grof en verspreid bestippeld, het achterlijf ook aan de basis zonder duidelijke bestippling. Het stridulatie-orgaan zeer duidelijk. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In België bij Commies en in Noord-Frankrijk bij St. Quentin. (Clypealis Sharp)

2. *Hyphydrus* Illiger.

Lichaam zeer kort en breed, op de boven- en onderzijde hoog gewelfd. Achtertarsen sterk samengedrukt, met twee zeer ongelijke klauwen, de een duidelijk ontwikkeld, de ander buitengewoon klein en moeilijk zichtbaar. De voortzetting der achtercoxae boven de basis der achterdijen zonder lobvormige verbreding, waardoor de tamelijk ver van elkaar afstaande achterdijen naar alle richtingen bewegelijk zijn. Aan de voor- en middeltarsen is het eindlid zeer klein. Op de onderzijde vertoonen de dekschilden naar het uiteinde eene aan den zijrand evenwijdig verloopende, scherp verheven lijst, welke vóór het uiteinde in eene lange, tongvormige voortzetting verbreed is en voor de sterige aansluiting der dekschilden aan den zijrand van het achterlijf dient. Voortzetting van het prosternum achter de voorcoxae smal. Middelcoxae dicht bijeen staande. Epipleuren der dekschilden aan de basis, onder den schouderhoek, met eene scherp omrande groef of uitholling, om het uiteinde der middeldijen op te nemen. — De soorten van dit genus zijn gladde, bruine of roodachtige, al of niet zwart gevlekte kevers, welke in stilstaande wateren leven. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voor- en middeltarsen-leedjes sterk verbreed, bij het ♀ samengedrukt; het ♂ is glanzig en duidelijk bestippeld, het ♀ dofser en zeer zwak bestippeld.

Van de 2 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Roestrood, de dekschilden over het midden donker bruinrood. Soms bevinden zich twee zwartachtige vlekken aan de basis van het halsschild en vertoonen de dekschilden eenige gele vlekken en een gelen zijrand (abc. *variegatus* Steph.) 1). Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Zeer gemeen.

De abc. *variegatus* bij Bloemendaal en Loosduinen. De larve is door Schädte beschreven.

(ovatus L.) 1. *ferrugineus* L.

1) Het is vermeldelijk deze aberratie, welke met H. Aubert Ganglb. (*variegatus* Aubert) verward werd en als zoonding uit België (Schaeffer) werd opgegeven.

3. Hygrotus Stephens.

Clypeus van voren gerand. Lichaam kort, breed en hoog gewelfd. Achtertarsen weinig samengedrukt, met twee gelijke klauwen. De voortzetting der achtercoxae boven de basis der achterdijen kort lobvormig verbreed. Achterdijen dicht bijeen geplaatst. Voortzetting van het prosternum achter de voorcoxae smal. Middelfoxae dicht bijeen geplaatst. Epipleuren der dekschilden aan de basis, onder den schouderhoek, met eene scherp omrande groef of uitholling, om het uiteinde der middeldijen op te nemen. Kort ovale, gladde kevertjes met lichte teekening of vlekken op de dekschilden. — De soorten leven in stilstaande wateren.

Van de 6 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Zijrand der dekschilden van voren tot aan den schouderhoek in eene sterke bocht opgaande; de dekschilden, van boven gezien, aan de schouders iets breeder dan de basis van het halsschild en daardoor iets vooruitspringend. De teekening der dekschilden bestaat uit onderbroken of samenvloeiende zwarte langsbanden. Kleur van het lichaam roodgeel. 2
- Zijrand der dekschilden van voren tot aan den schouderhoek geleidelijk in eene zwakke bocht opgaande. Dekschilden aan de schouders niet breeder dan de basis van het halsschild en niet vooruitspringend. Tusschenruimten der zeer verspreid staande, krachtige bestippeling der dekschilden, met verstrooide, fijnere stippeltjes bezet. Kop en halsschild bruinrood. Dekschilden pekkruin, de zijden en twee dwarsvlekken geelachtig rood. Lengte 2 mm. In de omstreken van Amsterdam en bij 's-Graveland. Ook in België en in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 3. *decoratus* Gylh.
- 2 Dekschilden dicht met grove, iets ongelijk groote stippels bezet; daartusschen niet fijner bestippeld. Kop en halsschild nagenoeg gelijk bestippeld. Het halsschild aan voor- en achterrand zwart. De zwarte langsbanden op de dekschilden hangen altijd samen en zijn in de regel in 't geheel niet onderbroken, zoodat slechts een breede, bochtige gele randzoom overblijft. Lengte 3 mm. Zeer gemeen. 1. *inaequalis* F.
- Tusschenruimten der meer of minder verspreid staande, grove bestippeling der dekschilden met vele fijne stippeltjes bezet. De zwarte langsbanden meer onderbroken dan wel samenhangend. 3
- 3 De fijnere bestippeling tusschen de grove stippels der dekschilden is zeer dicht. Halsschild zeer dicht en uiterst fijn bestippeld. Lichaam kort eivormig, roodgeel, de naad en 3 breede, meer of minder onderbroken, soms samenhangende of zelfs geheel ineenvloeiende langsbanden op elk der dekschilden, zwart. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen.
(reticulatus F.) 2. *versicolor* Schall.

De fijnere bestippeling tusschen de grove stippels der dekschilden is tamelijk verspreid. Halsschild meer verspreid en grover bestippeld. Lichaam meer langwerpig eifond, roodgeel, de naad en 2 breede langsbanden op elk der dekschilden zwart; de buitenste band is naar het uiteinde dubbel en onderbroken. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Deze meer boreale soort zou in België bij Laeken gevangen zijn. Ik zag het exemplaar niet.

(quinquelineatus Zetterst.)

4. Coelambus Thomson.

Clypeus van voren ongerand. Het lichaam is vlakker en in den regel meer langwerpig dan bij Hygrotus. Overigens hetzelfde. Bij de wijfjes van sommige soorten komt dimorfisme voor. — De larve van C. parallelogrammus is door Schiodtte beschreven.

Van de 16 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

- 1 Zijrand der dekschilden van voren, in eene zwakke bocht naar den schouderhoek, opwaarts gericht; epipleuren duidelijk en breed afgezet. 2
- Zijrand der dekschilden van voren, in eene sterke bocht naar den schouderhoek, opwaarts gericht; epipleuren zeer smal en slechts onduidelijk van de overige velving der dekschilden afgescheiden. Kort eivormig, sterk gewelfd, roodgeel. De schedel van achteren en aan weerszijden naast de oogen bruinachtig; de naad en vier, naar voren sterk en ongelijk afgekorte, van achteren dikwerf samenhangende lijnen op de dekschilden zwart. Bovenzijde fijn en dicht bestippeld, de dekschilden bovendien op de binnenhelft met talrijke, onregel-

matig in rijen geplaatste grovere stippels bezet. Dekschilden met meer of minder tandvormig uitgetrokken naadhoek. Deze soort herinnert in habitus eenigszins aan *Hygrotus versicolor* en vormt het verbindingslid tusschen de genera *Hygrotus* en *Coelambus*. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Verbreid in stilstaande wateren, doch overal zeldzaam. 1. *confluens* F.

- 2 Lengte $3\frac{2}{3}$ —4 mm. Bovenzijde roodgeel, de kop van achteren donker, naast de oogen aan weerszijden met eene zwartachtige vlek, eene middenvlek op het halsschild, de naad en vier langsbanden op elk der dekschilden zwart; de langsbanden bereiken noch de basis noch het uiteinde der dekschilden, de vierde is dikwerf in het midden onderbroken en soms is nog een vijfde langsstreepje aanwezig. Bovenzijde bij het ♂ glanzig, bij het ♀ dof (1). Kop en halsschild bij het ♂ tamelijk fijn en vrij dicht, bij het ♀ zwakker en minder dicht bestippeld. Halsschild in het midden met een klein groefje, de achterhoeken aan den top iets afgerond. Dekschilden dicht en gelijkmatig, bij het ♀ iets zwakker bestippeld. Deze soort herinnert aan *C. parallelogrammus*, doch is in het oogvallend kleiner, de achterhoeken van het halsschild zijn meer stomp afgerond en de tweede zwarte langsband der dekschilden bereikt niet de basis. De beide seksen bij Apeldoorn, een ♀ op Terschelling. In België bij Calmthout. 2. *novemlineatus* Steph.

Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. 3

- 3 Onderzijde benevens de epipleuren der dekschilden zeer grof bestippeld. Bovenzijde bruingeel. Achterrand van den kop, twee voorhoofdsvlekken, benevens de achter- en voorrand van het halsschild in den regel zwartachtig. Dekschilden met zwartachtigen naad en 4 of 5, bij het ♂ en het glanzige ♀ gewoonlijk onduidelijke, zwartachtige langsbanden. Het ♂ op de bovenzijde glanzig, de kop tamelijk lijn, het halsschild aan voor- en achterrand grof, in 't midden fijner en meer verspreid bestippeld. Dekschilden van het ♂ met 4 diepe, achter het midden uitgewischte stippellijnen, op de voorhelft zeer grof bestippeld en daartusschen met verstrooide, zeer kleine stippeltjes; op de achterhelft fijner, zeer dicht en gelijkmatig bestippeld. Het ♀ in sculptuur en kleur, hetzij met het ♂ overeenstemmend of (♀ var. *lineellus* Gylh., *alternans* Kunze) dof, in sculptuur en kleur met het dofle ♀ van *parallelogrammus* overeenstemmend, op de dekschilden echter duidelijk grover bestippeld. Bij de dofle wijfjes is de onderzijde minder grof en meer verspreid bestippeld en ontbreken de 4 diepe stippellijnen op de dekschilden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Verbreid in slooten en vijvers. Ik zag uit ons gebied alleen dofle wijfjes. De glanzige wijfjes schijnen uiterst zeldzaam te zijn. (picipes F.) 4. *impressopunctatus* Schall.

Onderzijde benevens de epipleuren der dekschilden fijner bestippeld. Bovenzijde roodgeel. Achterrand van den kop en eene vlek aan weerszijden naast de oogen gewoonlijk zwartachtig, eene middenvlek op het halsschild, de naad en 5 langsbanden, van welke de tweede de basis der dekschilden bereikt en de beide buitenste min of meer onderbroken kunnen zijn, op elk der dekschilden zwart. Bovenzijde bij het ♂ glanzig, bij het ♀ dof of glanzig. Kop lijn, van achteren krachtiger bestippeld. Halsschild met grovere en fijnere bestippeling, aan voor- en achterrand krachtiger bestippeld, in het midden met een klein groefje. Dekschilden dicht en vrij krachtig bestippeld, aan de basis met grovere en fijnere stippeltjes dooreen. De glanzige ♀♀ zijn als de ♂♂, de dofle ♀♀ daarentegen fijner bestippeld, op kop en halsschild meer verspreid, op de dekschilden veel dichter en achter de basis ook gewoon bestippeld. Bij het dofle ♀ is de onderzijde fijner en meer verspreid bestippeld. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Vooral in brakwater-poolen in aantal bijeen. Ik zag uit ons gebied alleen dofle wijfjes. In Zuidelijk-Europa schijnt het glanzige ♀ meer voor te komen.

3. *parallelogrammus* Ahr.

5. *Bidessus* Sharp.

Halsschild aan weerszijden van de basis met een langsgroefje, dat zich meestal ook op de basis der dekschilden voortzet. Epipleuren der dekschilden zonder scherp omrande uitholling aan de basis. Achtercoxae met het eerste sterniet onbewegelijk vergroeid. — Dit genus bevat de kleinste kevertjes onder de Dytiscidae.

Van de 12 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De naadstreep der dekschilden is onvolkomen en reikt slechts tot aan het midden der dekschilden 2

De naadstreep der dekschilden loopt van af de basis tot aan het uiteinde geheel door. Kop bruin, van voren roodachtig, het halsschild bruinachtig of roodgeel, aan voor- en achterrand

1) Volgens Sharp komen ook glanzige wijfjes voor.

bruinachtig; dekschilden geel, het binnenste gedeelte der basis, de naad en eene zeer veranderlijke, gemeenschappelijke, uitgezakte middenvlek bruin. Sprieten, behalve naar het uiteinde, en de pooten geel. Meestal is de gemeenschappelijke bruine middenvlek der dekschilden zoodanig uitgebreid, dat slechts twee langsvlekken achter de basis, benevens de zijrand geel blijven. Bovenzijde duidelijk behaard. Het ♂ wat meer glanzig dan het ♀. Lengte 2—2½ mm. Niet zeldzaam in heidepoeltjes tussehen wieren. Ook eenmaal bij den Haag.

(? minimus Scop., pusillus F., pygmaeus Oliv.) 2. *geminus* F.

- 2 Bovenzijde zeer duidelijk bestippeld en lijn behaard. Lichaam kort eivormig, aan de zijden duidelijk afgerond, tamelijk gewelfd. Kop roodbruin, halsschild roodgeel, aan den achterrand en meestal ook aan den voorrand zwartachtig. Dekschilden bruin, aan de zijden min of meer roodachtig of met eenige roodachtige vlekken. Sprieten bruin, met gele wortelleedjes, de pooten roodgeel. Het ♂ glanzig, het ♀ dimorph, dan eens glanzig, dan eens dof. Lengte 2 mm. Verbreid in poelen, vooral in bosschen.

(? parvulus Müll., parvulus Panz.) 1. *unistriatus* Illig.

Bovenzijde zeer fijn en dicht, slechts bij zeer sterke vergrooting duidelijk zichtbaar bestippeld.

Lichaam met meer parallele zijden, bovenop vlak 3

- 3 Lang-eivormig, geelachtig, de schedel donkerder, het halsschild aan voor- en achterrand zwartachtig; de dekschilden met zwarten naad en met drie zwarte dwarsbanden. Achtercoxae tamelijk verspreid en grof bestippeld. Lengte 1½ mm. Niet inlandsch. In Westelijk Middel-Europa.

(*minutissimus* Germ.)

Smaller en langer gestrekt, de dekschilden met aan de zijden afgekorten, zwarten basaalband, nog fijner bestippeld dan *minutissimus* en de achtercoxae met kleine stippeltjes bezet.

Lengte 1½ mm. Niet inlandsch. Ik bezit een exemplaar, in het Ahrdal (Rijnprov.) gevangen.

(*delicatus* Schaum)

6. *Deronectes* Sharp.

*Halsschild meestal naar de basis sterk versmald. Dekschilden zonder langsgroefje, zelden met eene langsrib, welke echter nimmer zich op het halsschild voortzet; de epipleuren sonder scherp omrande uitholling aan de basis. De bestippeling der bovenzijde van het lichaam is of duidelijk fijn en grof doorengemengd, in welk geval het lichaam eenkleurig is, of wel de bestippeling is uiterst fijn en dicht en nagenoeg gelijk, in welk geval de bovenzijde van het lichaam geel met zwarte langsbanden geteekend is. Het gedeelte van het mesosternum tussehen de middencoxae gelegen en onder de prosternaal-voortzetting verborgen, reikt niet tot aan de metasternaal-voortzetting. Achtercoxae niet met het eerste sterniet vergroot. — De larve van *D. depressus* is door Schödlte beschreven.*

Van de 33 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Achterschenen aan de buitenzijde dicht bestippeld of lijn korrelig gechagrineerd 2
Achterschenen aan de buitenzijde glad, slechts met eene stippelrij 4

- 2 Bovenzijde fijn en dicht bestippeld en bovendien met grove en verspreide stippels bezet; zwart of roodbruin. Prosternaal-voortzetting smal en bewimpert. Zijstukken van het metasternum driehoekig toegespits. Achterschenen aan de buitenzijde grof bestippeld 3

Bovenzijde zeer fijn en dicht bestippeld, met geringe aanduiding van iets grovere stippels; roodgeel, kort en dun behaard, weinig glanzig, de voorrand en twee met elkaar samenhangende vlekken aan de basis van het halsschild, de naad, een langsband en 6 vlekken op elk der dekschilden zwart; in den regel zijn de zwarte langsbanden en vlekken zoodanig ineengevloeid, dat op elk dekschild 6 gele vlekken overblijven. Bij een exemplaar uit Katwijk is de versmelting der zwarte teekening op de dekschilden zoodanig, dat slechts 3 kleine roodgele randvlekjes en 2 kleine roodgele middenvlekjes op de achterhelft overblijven. Prosternaal-voortzetting vlak verbreed, onbewimpert. Zijstukken van het metasternum smal tongvormig. Achterschenen aan de buitenzijde lijn en dicht korrelig gechagrineerd. Voor- en middelschenen bij het ♂ iets gekromd, de voorschenen naar het uiteinde naar binnen verbreed. Lengte 5¼—6 mm. Verbreid in helder water, doch overal zeer zeldzaam.

2. *duodecimpustulatus* F.

- 3 Halsschild zonder zijdelingsche indrukken. Lichaam bruin of roodbruin. Kop van voren en van achteren, benevens de schouders, lichter gekleurd, soms de geheele basis der dekschilden lichter. Sprieten en pooten roestrood. Bovenzijde zeer fijn en dicht bestippeld en

met zeer grove en tamelijk verspreide, op kop en halsschild wat minder grove stippels, bezet. Halsschild zeer breed, meer dan dubbel zoo breed als lang, voor de basis met een oppervlakkigen dwarsindruk, naar voren algerond versmald, bij het ♀ ook onmiddellijk voor de basis iets versmald. Dekschilden in het midden iets buikig verbreed, bij het ♀ op de achterhelft naast de zijden met eene langspleet. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. In bergbekken. In aantal bij Houthem (Limburg) in de Geul gevangen. Ook bij Leuven en in de „Hautes-Fanges” in België en bij Aken en Elberfeld in de Rijnprov. (ovatus Sturm) 1. *latus* Steph.

Halsschild aan weerszijden met een breeden langsindruk. Lichaam dof zwart of bruin, de sprieten en de pooten roestrood. Bovenzijde zeer fijn en dicht bestippeld en zeer fijn behaard, op het halsschild en op de dekschilden met grove verspreide stippels. Halsschild driemaal zoo breed als lang. Dekschilden zeer kort, slechts $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed, over het midden met twee oppervlakkige langsgroeven. Lengte 4 mm. In bergbekken. Niet inlandsch. In Westfalen en in de Rijnprov. bij Elberfeld. . . . (platynotus Germ.) 1)

- 4 Lichaam langwerpig, weinig gewelfd. Roodgeel, een lijne voor- en achter-randzoom van het halsschild, twee vlekken in het midden aan de basis, de naad en 6 meer of minder samen-vloeiende langsstrepen op elk dekschild, van welke de eerste en meestal ook de beide buitenste onderbroken zijn, zwart. Soms vloeien de zwarte strepen der dekschilden min of meer tot eene enkele groote zwarte vlek te samen. Onderzijde niet zelden gedeeltelijk of nagenoeg geheel zwartachtig of zwart. Bovenzijde uiterst fijn en dicht bestippeld, zeer fijn behaard, tamelijk dof. Halsschild bij het ♀ naar achteren meer versmald. Dekschilden voor het uiteinde met een duidelijk tandje. Klauwen der voortarsen bij het ♂ sterk verlengd, ongelijk, naar het uiteinde gekromd. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ mm. Over het algemeen zeldzaam in riviertjes en beken. Breda, Apeldoorn, Utrecht, Arnhem, Zutphen, Tiel, Maastricht en Houthem. 3. *depressus* F. 2)

Lichaam kort eivormig, sterk gewelfd. Bruingeel, de achterrand van kop- en halsschild, twee vlekken in het midden aan de basis van het halsschild, de naadzoom en 7 langsstrepen op elk der dekschilden zwart. Meso- en metasternum, benevens het achterlijf, bruinrood of zwart. De zevende langsstreep der dekschilden bepaalt zich nagenoeg altijd tot 1 of 2 langsvlekken; dikwerf is ook de zesde onderbroken. Soms zijn de dekschilden, op den buitenrand en eenige gele lijnen na, zwart (ab. *frater* Zett.). Bovenzijde uiterst fijn en dicht bestippeld en zeer zwak en kort behaard, zeer weinig glanzig. Dekschilden voor het uiteinde met een soms onduidelijk tandje (ab. *hyperboreus* Gyll.). Klauwen der voortarsen bij het ♂ verlengd, de binnenste voor de basis verbreed. Lengte 4 mm. In de bergstreken van Noord- en Middel-Europa. Zij zou in België bij Dinant en in de prov. Luxemburg gevangen zijn. Ik zag geen Belgische exemplaren. Ook bij Elberfeld. (assimilis Payk.)

7. Hydroporus Clairv.

Halsschild in den regel in het geheel niet naar de basis versmald. De bestippeling der bovenzijde van het lichaam is gewoon, nimmer fijn en grof dooreen. Kleur der bovenzijde zelden geel met zwarte langstijnen, meestal eenkleurig zwart of bruin. Het gedeelte van het mesosternum tusschen de middelcoxae gelegen en onder de prosternaalvoortzetting verborgen, staat tegen het metasternum aan. Het overige als bij Deronectes. De sexuele verschillen varieren zeer bij de onderscheidene soorten, bij enkelen zijn de wijfjes dimorph. — De soorten leven eenzels die der aanverwante genera in zoet en brak water. — De larven van H. palustris en halensis zijn door Schiedte beschreven.

Van de ± 80 Europeesche soorten komen 27 in Nederland en 9 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De nitsteekels der achtercoxae divergeerend, hare uiteinden door eene gemeenschappelijke, breede, hockige insnijding gescheiden. 2

1) Het voorkomen van *D. moestus* Fairm. (insuspectus Leprieur) bij La Hulpe en Groenendaal in België, zal wel onjuist zijn. Deze soort is eigen aan het gebied der Middellandsche Zee.

2) Volgens Ganglbauer is *D. elegans* Panz. (heavis St.) een afzonderlijke soort, welke in Oostelijk Duitschland voorkomt. De dekschilden zijn naar achteren korter en stomper toespitst. De klauwen der voortarsen bij het mannetje zijn weinig verlengd en gelijkmatig gekromd. De kleur is bleekgeel, de onderzijde altijd geel, de zwarte strepen der dekschilden vloeien gewoonlijk weinig meer en de twee buitenste zijn gewoonlijk in drie dubbelvlekken opgelost. Soms echter vloeien zij allen meer. Zeer zelden is de geheele bovenzijde, behalve een lijnen voor- en achter-randzoom van het halsschild en de naadzoom der dekschilden, geel (de *marginatus* Aubl.). Lengte $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ mm.

- De uitsteeksels der achtercoxae aan het uiteinde gemeenschappelijk afgeknut, slechts door eene smalle insnijding gescheiden 10
- 2 Halsschild aan weerszijden met een verdiept, soms zeer kort, doch altijd duidelijk langstreepje 3
- Halsschild zonder dit langstreepje 3
- 3 Halsschild aan weerszijden voor de basis met een meer of minder duidelijken dwarsindruk (Sub-gen. *Oreodytes* Seidl.). Lichaam zeer kort eivormig, op de bovenzijde licht bruingeel. Halsschild met een bruinen, in 't midden veelal onderbroken dwarsband op het midden. Dekschilden met zwarten naad en zeven zwarte langsbanden, van welke de 2 of 3 buitenste zeer verkort en onderbroken zijn. Onderzijde zwart. Spriet en pooten roodgeel. Uiteinde der sprieten en de tarsen bruinachtig. Bij ab.c. *rivalis* Gylb. is het midden van het halsschild meer uitgebreid zwart en vloeien de zwarte langsbanden der dekschilden grootendeels samen. Lengte 3 mm. In bergbekken. — In aantal bij Houthem (Limburg) in de Geul gevangen. Ook de ab.c. *rivalis* Gylb. 1) . . . 1. *Sanmarkii* Sahlb.
- Halsschild voor de basis zonder dwarsindruk (Sub-gen. *Graptodytes* Seidl.) 4
- 4 Onderzijde dof. Lengte 3 mm. De verdiepte zijstreep van het halsschild is zeer kort en bereikt noch de basis noch den voorrand en is soms onduidelijk. De zijden van halsschild en dekschilden vormen, van boven gezien, eene geleidelijke kromming, zonder hoekige insnoering. Lichaam hoog gewelfd, vrij kort en breed, naar het uiteinde kort toegespitst. Halsschild en dekschilden even duidelijk bestippeld en fijn, goudglanzig behaard. Zwart, de zijden van het halsschild roodachtig; de zijrand, een veranderlijke, met den zijrand samenhangende, uitgezakte band op de voorhelft, een onregelmatig uitgezakte band en eenige met dezen en den zijrand samenhangende vlekken op de achterhelft der dekschilden geel. Sprietwortel en pooten roodgeel, het uiteinde der sprieten zwartachtig, de achterschienen en de tarsen bruinachtig. De voorste gele band omsluit eene zwarte schoudervlek. Ik bezit een niet volkomen uitgekleurd Belgisch exemplaar uit Herstal, van den Baron de Moffarts in Luik. (Lepidus Oliv.)
- Onderzijde glanzig. Lengte 2—2½ mm. 5
- 5 Lichaam sterk gewelfd, kort en breed, naar achteren toegespitst. Kop rood, halsschild zwartachtig of bruin, met roode zijden, de dekschilden zwart, de zijrand, eene dwarsvlek aan de basis en eene vlek achter het midden, welke beide gewoonlijk door eene langstreep verbonden zijn, geel. Bij het ♂ zijn de klauwen der voortarsen ongelijk en vertoont het laatste sterniet twee gele haarbundels aan de basis en een groefje aan het uiteinde. Lengte 2—2½ mm. Niet zeldzaam in heidepoeltjes en slooten 2. *pictus* F.
- Lichaam zwak gewelfd of vlak, langwerpig eirond. Dekschilden donker gekleurd, met regelmatige, soms onderbroken langlijnen. Kop zwart. Halsschild zwart, met lichte randen. . . 6
- 6 Dekschilden met gelen zijrand, eene van voren daarmede samenhangende zijstreep en eene rechte rugstreep 7
- Dekschilden met gelen zijrand en 4 of 5, niet zelden gedeeltelijk onderbroken of gedeeltelijk samenvloeiende langsbanden. Sprietwortel en pooten roodgeel. Klauwen der voortarsen bij het ♂ niet verlengd. Lengte 2½ mm. Niet zeldzaam in heidepoeltjes . . . 5. *flavipes* Oliv.
- 7 Langwerpig-eirond, zwart, de kop en de zijden van het halsschild roodachtig, de zijrand der dekschilden, eene aan de voorzijde met dezen samenhangende, voor het uiteinde verbrede zijstreep en een, de basis niet bereikende, aan de voorzijde naar buiten verbrede en aan het uiteinde de zijstreep gewoonlijk aanrakende rugband, bleek bruingeel. Sprietwortel en pooten roestrood. Soms zijn de bruingele banden geheel met elkaar versmolten, zoodat slechts eene breede naadstreep zwart blijft (ab.c. *suturalis* Müll.). Bij ab.c. *funestus* Schilsky ontbreekt de gele rekening geheel; ook zijn hier de sprieten en pooten veel donkerder. Klauwen der voortarsen bij het ♂ weinig verlengd, ongelijk. Lengte 2—2½ mm. Vrij gemeen in heidepoeltjes. De ab.c. *suturalis* ook enkele malen gevangen. De ab.c. *funestus* eenmaal bij Baexem in Limburg 3. *granularis* L.
- Deze soort gelijkt zeer op *granularis*, doch is meer gestrekt en minder gewelfd. De rugband der dekschilden reikt tot aan de basis, is van voren bijna niet verbreed en van achteren ver voor het uiteinde afgekort; de gele zijstrepen zijn voor het uiteinde niet verbreed. De dekschilden zijn bij het ♂ sterker bestippeld en de klauwen der voortarsen bij het ♂ sterk verlengd. Lengte 2½ mm. Volgens *Beckl* zou dit het ♂ van *granularis* zijn. Zeldzaam. Op Texel en bij Amby in Limburg. 4. *bilineatus* St.
- 8 Halsschild aan de zijden dik en glanzig gerand. Dekschilden uiterst fijn en dicht bestippeld, voor het uiteinde iets uitgebogen, waardoor het uiteinde zelf eenigszins snaveloornig uitsteekt.

1) Bij de in Spanje voorkomende ab.c. *ulmus* Sharp ontbreken de zwarte langsbanden nagenoeg geheel.

Lichaam vrij breed, aan de onderzijde glanzig, grof en dicht bestippeld. Bovenzijde geel, het halsschild met twee zwarte vlekken, de dekschilden met 4 zwarte langstrepen en 2 of 3 zijdelingsche dubbelvlekken, welke dikwerf gedeeltelijk ineenvloeien. Achterlijf bij het ♂ aan het uiteinde, bij het ♀ geheel bruinrood. Lengte 4—4½ mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam, o. a. in duinplassen 6. **halensis** F.

Halsschild aan de zijden lijn gerand 9

- 9 De zijrand der dekschilden verloopt nagenoeg rechtlijnig tegen den basaalhoek aan. Lichaam lang-elliptisch, naar het uiteinde toegespitst, matig gewelfd. Kop roodbruin met donkeren schedel, het halsschild bruin met roodachtige zijden, de dekschilden geelbruin of kastanjebruin. Meso- en metasternum en achterlijf zwart. Sprietten, tasters en pooten roestrood, de sprieteedjes met zwart uiteinde. Bovenzijde glanzig, nagenoeg geheel kaal. Halsschild in het midden lijn en verspreid, aan de randen veel krachtiger bestippeld. Dekschilden lang, tot op $\frac{2}{3}$ der lengte met nagenoeg evenwijdige zijden, tamelijk grof en niet dicht bestippeld. Lengte 4—4½ mm. Niet inlandsch. In Duitschland, Noord-Frankrijk en Engeland. Ik ken deze soort naar een exemplaar uit het Weener museum (*oblongus* Steph.)

De zijrand der dekschilden van voren in eene duidelijke bocht naar den basaalhoek opwaarts gekromd. Lichaam ovaal, tamelijk gewelfd, roodgeel; de dekschilden bruinachtig, de zijrand en vier, soms onduidelijke langstrepen op elk geel; de sprietten naar het uiteinde bruinachtig. Halsschild en dekschilden duidelijk en vrij dicht bestippeld en behaard. Voor- en middel-tarsen bij het ♂ verbreed. Voorschenen bij het ♂ aan de basis van binnen uitgebogen. Lengte 3—3½ mm. Gemeen in slooten in de kleistreken. (*quadrilineatus* Drap.) 7. **lineatus** F.

- 10 Zijrand der dekschilden naar voren, in eene duidelijke bocht, naar den basaalhoek opwaarts gekromd. 11

Zijrand der dekschilden naar voren, in eene zeer zwakke bocht, schuin of nagenoeg rechtlijnig tegen den basaalhoek verloopend en daarachter gewoonlijk iets uitgebogen 20

- 11 Halsschild in het midden het breedst, naar de basis eenigszins versmald en voor de basis met een vrij diepen dwarsindruk. Lichaam vrij sterk gewelfd. Kop bruinrood; het halsschild zwartachtig, zijne zijden en gewoonlijk een in 't midden onderbroken dwarsband bruinrood. Dekschilden bruinzwart, de zijden en veelal ook een meer of minder onderbroken dwarsband achter de basis, alsmede soms een langstreepje langs den zijrand naar het uiteinde bruinrood of bruingeel. Sprietten en pooten roestrood, het uiteinde der sprietten bruinachtig. Soms breidt zich de bruingele kleur der dekschilden zoodanig uit, dat slechts het binnenste gedeelte van de basis, de naad, eene schoudervlek, eene achterste kleine vlek aan den naad en eene langstreep van achteren naast den zijrand bruinzwart blijven (*abc. figuratus* Gyll.). Bovenzijde bij het ♂ eenigszins glanzig, bij het ♀ tamelijk dof. Halsschild en dekschilden vrij lang neerliggend behaard. Bij het ♂ zijn halsschild en dekschilden iets krachtiger en minder dicht bestippeld dan bij het ♀; het halsschild voor de basis bij het ♂ met een, binnen de achterhoeken sterker verdiepten, bij het ♀ minder diepen en in 't midden veelal onderbroken dwarsindruk. Buitenste klauw der voortarsen bij het ♂ krachtiger ontwikkeld dan de binnenste, in 't midden met een tand. Lengte 4½—5 mm. Niet zeldzaam in slooten. De *abc. figuratus* in de omstreken van Maastricht 8. **dorsalis** F.

Halsschild het breedst aan de basis, slechts naar voren versmald, voor de basis niet of slechts zwak dwars ingedrukt. Lichaam vlakker gewelfd en kleiner. 12

- 12 Voortzetting van het prosternum tusschen de voorcoxae zonder bultje 13

Voortzetting van het prosternum tusschen de voorcoxae met een scherp, half-cirkelvormig omrand, bultje. 15

- 13 Lengte 1½—2 mm. Bovenzijde glanzig, geheel roodbruin. Dekschilden grof en zeer verspreid bestippeld. Soms zijn de dekschilden bovenop donkerder. Onderzijde zwartachtig. Derde voortarsen-lid zeer lang. Klauwen der voortarsen bij het ♂ verdikt en verlengd, eenigszins ongelijk en aan het uiteinde gespleten. Meermalen in de omstreken van Amsterdam en bij 's Graveland gevangen. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld.

(*pygmaeus* St.) 9. **scalesianus** Steph.

Lengte 2½ 2½ mm. Bovenzijde weinig glanzig. Halsschild zwart, dekschilden roodbruin 14

Lengte 3 mm. Bovenzijde tamelijk glanzig en duidelijk behaard. Kop en halsschild roestrood, de dekschilden iets donkerder bruinrood of bruin. Meso- en metasternum en achterlijf zwart. Sprietwortel en pooten roestrood. Halsschild achter den voorrand en voor de basis vrij sterk en dicht, in 't midden zeer verspreid bestippeld, aan weerszijden voor de basis met een oppervlakkigen dwarsindruk of groefje. Dekschilden matig sterk en matig dicht bestippeld. Derde voortarsen-lid zeer lang. Klauwen der voortarsen bij het ♂ verlengd en aan het uiteinde gespleten. Achterdijen bij het ♂, van binnen in 't midden, stomphoekig verbreed en tusschen het midden en het uiteinde met korte borstelhaarjes bezet. Niet zeldzaam in boschslooten. 11. **angustatus** St.

- 14 Lang en smal eivormig. Kop rood, naast de oogen aan weerszijden met eene bruinachtige vlek. Halsschild zwart, met smallen roodachtigen zijrand, de dekschilden bruinrood en de onderzijde zwart. Sprietten, behalve het bruinachtige uiteinde, en de pooten roestrood. Bovenzijde weinig glanzig, fijn behaard. Kop bijna niet bestippeld. Halsschild naar voren matig versmald, aan de lijne doch duidelijk gerande zijden iets afgerond, in 't midden fijn en zeer verspreid-, aan den voor- en achterrand krachtiger en dichter bestippeld; voor de basis veelal met een duidelijken dwarsindruk. Dekschilden matig fijn en zeer verspreid bestippeld. Derde voortarsenlid zeer lang. Klauwen der voortarsen bij het ♂ verlengd en verdikt, eenigszins ongelijk en aan het uiteinde gespleten. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In België. Ik zag een exemplaar uit Ploegstaert (ex coll. Severin). Ook in Westfalen (neglectus Schaum)
- Langwerpig-eirond, zwart, de kop van voren en van achteren bruinrood. Dekschilden roodbruin, bovenop donkerder. Sprietwortel en pooten roestrood. Bovenzijde zeer weinig glanzig, duidelijk behaard. Kop zeer fijn en verspreid bestippeld. Halsschild naar voren versmald, aan de zeer onduidelijk gerande zijden zeer zwak afgerond, aan de randen vrij dicht en krachtig, in het midden fijn en zeer verspreid bestippeld. Dekschilden matig fijn en matig dicht bestippeld. Klauwen der voortarsen bij het ♂ slank en gewoon. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Op enkele plaatsen aangetroffen, o. a. in aantal nabij Roermond 10. *umbrosus* Gyll.
- 15 Dekschilden fijn of slechts matig grof bestippeld, duidelijk fijn behaard 16
- Dekschilden zeer grof bestippeld, nagenoeg geheel kaal. Elliptisch, tamelijk gewelfd. Kop bruinrood, over het midden donkerder. Halsschild en dekschilden bruin, aan de zijden lichter. Onderzijde zwart. Sprietten, tasters en pooten bruinrood, de laatste sprietleedjes aan het uiteinde bruinachtig. Bovenzijde glanzig, nagenoeg geheel onbehaard. Halsschild voor de basis en achter den voorrand krachtig-, in 't midden fijner en meer verspreid bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. In heide- en duinpoelen. (Gyllenhalii Schiödte). 16. *piceus* Steph.
- 16 Dekschilden pekbrown of zwartbruin, aan de basis en aan de zijden meer of minder scherp begrensd bruingeel of geelbruin 17
- Dekschilden roodbruin, over het midden donkerder, tamelijk grof en verspreid bestippeld. De zijden van het halsschild fijn, doch duidelijk gerand. Langwerpig, tamelijk gestrekt. Kop bruinrood, naast de oogen gewoonlijk donkerder. Halsschild en onderzijde zwart. Sprietten, behalve het bruine uiteinde en de pooten licht bruinrood. Bovenzijde tamelijk glanzig, spaarzaam behaard. Kop vrij groot, fijn en verspreid bestippeld. Lengte 3 mm. Verbreid in slooten 15. *tristis* Payk.
- 17 Kop van normale grootte 18
- Kop opvallend groot en breed, slechts een weinig smaller dan het halsschild. De zijden van het halsschild fijn, maar duidelijk gerand. Langwerpig, matig gewelfd. Kop bruinrood, tusschen de oogen bruin. Halsschild bruinzwart met roodachtige zijden. Dekschilden bruinzwart, de zijranden, eene van voren en van achteren daarmede versmolten zijstreep en eene meer of minder duidelijke, met den zijrand versmolten dwarsvlek achter de basis, bruingeel. Meso- en metasternum en het achterlijf zwart. Sprietwortel en pooten geelrood. Kop fijn en verspreid bestippeld. Halsschild in 't midden fijn en zeer verspreid-, achter den voorrand en voor de basis sterker en dichter bestippeld; voor de basis met een meer of minder duidelijken dwarsindruk en daarvoor sterker gewelfd. Dekschilden verspreid en matig fijn bestippeld. Lengte 3 mm. Niet inlandsch. Deze soort zou bij Crefeld voorkomen. (notatus Sturm)
- 18 Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Pooten geheel geelrood of roestrood 19
- Lengte 3 mm. Tarsen bruinachtig. Naverwant aan *palustris*, doch veel kleiner en donkerder gekleurd. Kop en halsschild bruin; de kop van voren en van achteren, het halsschild aan de zijden roodachtig; dekschilden zwartbruin, de zijranden, eene van voren en van achteren daarmede versmolten zijstreep, welke op de achterhelft geene verbreedingen vertoont, benevens eene dwarsvlek achter de basis donker geelbruin. De dekschilden zijn naar verhouding smaller en meer gewelfd dan bij *palustris*. Zeldzaam. Katwijk, Weesp, Laag-Soeren, 's Graveland, Breda, Rhoon, den Haag en Baexem 14. *vittula* Er.
- 19 Kop en halsschild bruingeel of bruinrood, twee voorhoofdsvlekken en het midden van het halsschild, meer of minder uitgebreid, bruinachtig. Dekschilden bruinzwart, de zijranden, eene van voren en van achteren daarmede samenhangende, soms in twee vlekken opgeloste zijstreep en een meestal met den zijrand samenhangende, den naad niet bereikende en van binnen meer of minder naar achteren gerichte scheeve dwarsband achter de basis, bruingeel of bruinrood. Meso- en metasternum en het achterlijf zwart. Sprietwortel en pooten roestrood of geelrood. Bovenzijde behaard, bij het ♀ doffer en fijner bestippeld dan bij het ♂. Soms vertoont het halsschild aan weerszijden voor de basis een meer of minder duidelijken dwarsindruk. Exemplaren bij welke het geel op de dekschilden eene ongewone uitbreiding verkrijgt, vormen de ab. *lituratus* Panz. Klauwen der voortarsen bij het ♂ ongelijk, de binnenste dikker en sterker gebogen. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Overal zeer gemeen. (sexpustulatus F.) 12. *palustris* L.

- Lichaam breeder dan bij *palustris*, doch overigens zeer daarmede overeenkomende. De gele teekening der dekschilden is meer onduidelijk. De bovenzijde is in beide seksen minder dof en minder behaard. Het prosternaal-uitsteeksel is slanker, de achtercoxae zijn tamelijk glanzig en krachtig en dicht bestippeld. Tarsen slanker; de klauwen der voortarsen bij het ♂ zeer weinig verschillend. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{8}$ mm. Verbreid door het geheele land, doch veel zeldzamer. (discedens Régimb.) 13. **incognitus** Sharp.
- 20 De zijden van het halsschild fijn of onduidelijk gerand 21
De zijden van het halsschild krachtig gerand 23
- 21 Sprietten zeer kort, de middelste leedjes slechts weinig langer dan breed. Elliptisch, roodbruin, de onderzijde donkerder of zwartachtig. Sprietten naar het uiteinde bruin. Bovenzijde uiterst fijn gechagrineerd, weinig glanzig en uiterst zwak behaard. Kop uiterst fijn en verstrooid, nauwelijks merkbaar bestippeld. Halsschild naar voren vrij sterk versmald, met lijne doch duidelijk gerande, zeer zwak afgeronde zijden; langs de randen duidelijk bestippeld, in het midden nagenoeg geheel glad. Dekschilden vrij grof en matig dicht bestippeld, de zijranden nagenoeg rechtlijnig tegen den basaalhoek verloopend. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Verbreid in heidepoelen 17. **obscurus** Sturm.
- Sprietten langer, de middelste leedjes veel langer dan breed 22
- 22 Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Deze soort gelijkt in kleur en habitus op *tristis*, doch is iets grooter, breeder en iets minder geweldig; het halsschild is aan de zijden zwakker gerand; de zijrand der dekschilden verloopt schuin tegen den basaalhoek aan en is daarachter uiterst zwak uitgebogen. De prosternaal-voortzetting tusschen de voorcoxae zonder bultje. Bij Amsterdam en Kortenhoeve. Ook in de Rijnprov. bij Crefeld en Dusseldorf 18. **elongatulus** Sturm. 1)
- Lengte 4—4½ mm. Langwerpig-eirond, tamelijk geweldig. Kop bruinrood, naast de oogen met eene donkere vlek; halsschild zwart, aan de zijden roodachtig. Dekschilden roodbruin, op de bovenzijde donkerder, het meso- en metasternum en het achterlijf zwart, dit laatste naar het uiteinde meer of minder bruin; prosternum, sprietten en pooten bruinrood, het uiteinde der sprietten bruinachtig. Bovenzijde dicht behaard, in beide seksen iets glanzig of bij het ♀ dof, veel fijner bestippeld en nog sterker behaard (♀ var. *deplanatus* Gyll.) Kop zeer fijn en verspreid bestippeld; het halsschild in het midden fijn en zeer verspreid, aan de randen vrij dicht en krachtig bestippeld. Dekschilden gelijkmatig, vrij sterk en dicht bestippeld, de zijrand verloopt schuin tegen den basaalhoek aan en is daarachter uiterst zwak uitgebogen. Gemeen in stilstaande wateren. De ♀ var. *deplanatus* zeldzamer 19. **erythrocephalus** L.
- 23 Lichaam ovaal, aan de zijden sterker afgerond 24
Lichaam langwerpig, aan de zijden weinig afgerond of nagenoeg met evenwijdige zijden 31
- 24 Dekschilden uiterst fijn en uiterst dicht bestippeld, met drie duidelijke stippelrijen. Onderzijde lijn en uiterst dicht bestippeld. Lichaam weinig geweldig, zwart, de kop van voren en gewoonlijk ook van achteren, het halsschild aan de zijden bruinrood of roodgeel. Dekschilden bruin, de basis, de zijranden en eenige onregelmatige vlekken en strepen voor het uiteinde bruingeel. Sprietten, mond en pooten geelrood. Uiteinde der laatste sprietleedjes en der tasters en gewoonlijk ook het midden der dijen bruinachtig. Bovenzijde tamelijk dof. Lengte 4—4½ mm. Niet inlandsch. In België. Ik zag exemplaren uit Carlsbourg. Ook bij Elberfeld in de Rijnprov. (marginatus Dfts.)
- Dekschilden en onderzijde grover en minder dicht bestippeld 25
- 25 Dekschilden tusschen de bestippeling niet gechagrineerd 26
Dekschilden tusschen de bestippeling fijn, doch duidelijk gechagrineerd. Lichaam zwart, de kop aan den achterrand roodachtig, de dekschilden veelal met eene geelbruine schoudervlek of met roodbruine zijden. De basis der sprietten en tasters benevens de pooten bruinrood, de dijkwortel gewoonlijk bruin. De geheele bovenzijde is mat glanzig, dun en onduidelijk behaard. Halsschild in 't midden fijn en zeer verspreid, aan de randen veel krachtiger en dichter, aan de zijden iets rimpelig bestippeld. De zijrand der dekschilden is nagenoeg rechtlijnig tegen den basaalhoek gericht. Lengte 3 mm. Verbreid in helder water, doch niet gemeen. 25. **nigrita** F.
- 26 Dekschilden zonder langstrijen van grovere stippels 27
Dekschilden met twee of drie langstrijen van grovere stippels, welke ten minste in zekere richting, vooral naar het uiteinde, waarneembaar zijn 28
- 27 Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Kop bruin, van voren en van achteren bruinrood. Halsschild zwart, aan de zijden gewoonlijk roodachtig; de dekschilden bruin, aan de basis en aan de zijden meestal

1) Het voorkomen van *H. morio* Germ. en Harold (*melanocephalus* Gyll.) in de Rijnprov., Westfalen en Oldenburg is twijfelachtig.

lichter geelbruin; het meso- en metasternum en het achterlijf zwart, dit laatste naar het uiteinde veelal bruinachtig; prosternum, sprieten en pooten bruinrood; het uiteinde der sprieten bruinachtig. Bovenzijde zwak glanzig, weinig dicht behaard. Kop fijn en verspreid bestippeld. Halsschild voor de basis en aan de zijden krachtig-, in het midden fijn en verspreid bestippeld. Zeer zeldzaam. Amsterdam, Breda, Roermond en Oldenzaal. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld 20. *rufifrons* Dfts. 1)

Lengte 3—3½ mm. Zwart, de dekschilden roodbruin of bruin, de mond, de sprietwortel en de pooten bruinrood. Bovenzijde tamelijk glanzig, duidelijk behaard. Kop lijn en verstrooid bestippeld. Halsschild vrij krachtig- en matig dicht-, in het midden fijner bestippeld. Dekschilden gelijkmatig, matig sterk en matig dicht bestippeld. Niet inlandsch. Deze soort zou in België bij La Hulpe en Woluwe-St. Pierre, alsook op het eiland Borkum gevangen zijn. Een Belgisch exemplaar uit Munster-Bilsen (coll. *Miedel*) bleek *H. obscurus* te zijn. Ook in de Rijnprov. bij Elberfeld (*piceus* St.) (*fuscipennis* Schaum)

- 28 Lengte 4—4½ mm. Ovaal, weinig gewelfd, zwart, de kop aan voor- en achterrand meestal smal roodachtig, bij abe. *nigrifrons* Prell. geheel zwart. Dekschilden donkerbruin, aan de schouders of aan de geheele basis min of meer rood- of geelachtig; zoo ook de zijden min of meer lichter gekleurd. Sprietwortel, mond en pooten bruinrood, de dijen in het midden veelal bruinachtig. Bij abe. *pallescens* Seidl. zijn de dekschilden geheel bruingeel. Bovenzijde tamelijk glanzig, lang en vrij dicht behaard. Zeer zelden komen wijfjes voor met dofte, uiterst fijn bestippelde dekschilden (Ridderborn in Belgisch Limburg). Halsschild in het midden tamelijk fijn en matig dicht-, voor de basis en aan de zijden sterker en iets dichter bestippeld. Dekschilden tamelijk fijn en dicht bestippeld. Overal zeer gemeen. De abe. *pallescens* bij Zandvoort en Wageningen 21. *planus* F.

Lengte 3—3½ mm. 29

- 29 Laatste sterniet grof en vrij dicht bestippeld. Deze soort is zeer naverwant aan *planus*, doch is kleiner, heeft kortere middelste sprietleedjes, krachtiger bestippelde dekschilden, en eene veel grovere bestippeling op het metasternum, de achtercoxae, de basis van het achterlijf en op het laatste sterniet, bovendien een smaller derde voortarsen-lid. Zwart, de kop aan den achterrand meer of minder roodachtig, de dekschilden donkerbruin, aan de basis en aan de zijden gewoonlijk lichter, de sprietwortel, de mond en de pooten bruinrood; bij sommige exemplaren zijn de dekschilden geheel roodbruin. Bovenzijde tamelijk glanzig, lang en vrij dicht behaard. Dekschilden met drie zwak aangeduide langsrijen van wijd uiteenstaande grove stippels. Lengte 3½ mm. Zeer gemeen in staande wateren 22. *pubescens* Gylh.

Laatste sterniet fijn en verspreid bestippeld 30

- 30 Dekschilden bruin, het naar achteren meer of minder uitgezakte basaalgedeelte, de zijrand, eene daarmede van voren versmolten randstreep en eenige vlekken op het midden en voor het uiteinde bruingeel. De teekening der dekschilden is overigens zeer veranderlijk, veelal is slechts de basis en de zijrand onbepaald bruingeel. Overigens is deze soort naverwant aan *pubescens*, doch onderscheiden door de veel meer verspreide en fijnere bestippeling van het halsschild en de dekschilden, alsook door de fijnere en minder dichte beharing der bovenzijde. Zwart, de voor- en achterrand van den kop en soms ook de zijrand van het halsschild roodachtig. Basis der sprieten en tasters, alsmede de pooten roodgeel; de dijswortel gewoonlijk bruinachtig. Lengte 3¼—3½ mm. Zeldzaam in staande wateren. Katwijk, Zierikzee en in de omstreken van Rotterdam. Ook in België op vele plaatsen.

(*lituratus* Brull., *xanthopus* Steph.) 23. *tessellatus* Drap.

Dekschilden evenals het geheele lichaam zwart, alleen de kop aan voor- en achterrand soms roodachtig. Sprietwortel en wortel der tasters, benevens de pooten roestrood, de dijswortel bruinachtig. Sprieten met tamelijk korte, dikke middelste leedjes. Bovenzijde vrij glanzig, fijn behaard. Halsschild tamelijk krachtig en vrij dicht, aan de zijden iets rimpelig, in het midden lijner en meer verspreid bestippeld. Dekschilden dicht en vrij krachtig bestippeld, met twee duidelijke langsrijen van grovere stippels. Achterlijf naar het uiteinde fijn en verspreid, het laatste sterniet aan het uiteinde dichter, doch altijd lijner en meer verspreid bestippeld dan bij *pubescens*. Deze soort gelijkt overigens op *pubescens*, doch heeft meer de grootte van *nigrita*. Lengte 3 mm. Tusschen Wylré en Valkenburg (Limburg) in een kuilje nabij de Genl. In België bij Leuven, Roumont, d'Elvi en Mariemont.

24. *discretus* Fairm.

- 31 Kop van normale grootte. 32
Kop zeer groot en breed. 34

1) *Seidlitz* beschrijft in zijn «Bestimmungs-Tabelle» een *Hydroporus convexus*, welke bij Byssel in Noord-Frankrijk zou voorkomen. Deze soort zou korter en breder zijn dan *rufifrons*, zeer fijn behaard en zwartbruin met lichte zijden. Onderzijde iets grover bestippeld en nauwelijks behaard. Lengte 3 mm.

- 32 Halsschild aan weerszijden voor de basis met een diepen, grof en zeer dicht bestippelden dwarsindruk. Langwerpig, vlak gewelfd. Kop en halsschild bruinrood, in het midden bruinachtig. Dekschilden bruingeel, aan de basis en aan de zijden lichter. Meso- en metasternum en het achterlijf gewoonlijk pekbruin of zwartachtig, dit laatste naar het uiteinde roodbruin. Sprietten, tasters en pooten roodgeel. Bovenzijde glanzig, uiterst zwak behaard. Halsschild krachtig gerand, in het midden zeer fijn bestippeld of nagenoeg geheel glad. Dekschilden vrij krachtig, doch zeer verspreid- en eenigszins ongelijkmatig, naar de zijden fijner bestippeld. Voorscheneen aan de basis dun, naar het uiteinde sterk verbreed. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. In Westelijk Middel-Europa. Niet inlandsch. Ik ken deze soort naar een exemplaar uit het Weener museum (obsoletus Aubé)
- Halsschild aan weerszijden voor de basis hoogstens met een oppervlakkigen, slechts weinig dichter dan de rest van de basis bestippelden, indruk 33
- 33 Voorscheneen naar het uiteinde zeer sterk verbreed. Sprietten met korte, dikke middelste leedjes. Pekzwart, de schedel bruinrood, de dekschilden veelal naar het uiteinde of langs de geheele zijden roodbruin, soms de geheele bovenzijde bruin. Sprietten, tasters en pooten roestrood. Bovenzijde uiterst fijn gechagrineerd, tamelijk glanzig, soms echter vrij dof, uiterst fijn behaard. Halsschild aan weerszijden voor de basis met een duidelijken, eenigszins scheeven dwarsindruk, waarin evenals aan de zijden, vrij sterke stippels staan, in het midden daarentegen lijn en verspreid bestippeld. Dekschilden vrij sterk- en niet dicht, aan de zijden en naar het uiteinde fijner bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$ mm. In Westelijk Middel-Europa. Niet inlandsch. Ik ken deze soort naar een exemplaar uit het Weener museum. (celatus Clark) (longulus Muls.) 1)
- Voorscheneen naar het uiteinde matig verbreed. Sprietten langer, met slankere middelste leedjes. Pekzwart of donkerbruin, de schedel roodachtig, de zijden van het halsschild en het uiteinde of ook de zijden der dekschilden meer of minder pekbruin of roodachtig. Sprietten, tasters en pooten roestrood. Bovenzijde nagenoeg onbehaard, in beide seksen glanzig; bij een veel fijner en dichter bestippelden en grover gechagrineerden vorm van het ♀ (♀ var. *castaneus* Aubé) daarentegen geheel dof. Halsschild aan weerszijden voor de basis met een oppervlakkigen dwarsindruk, aan de randen vrij sterk, in het midden fijn en verspreid bestippeld. Dekschilden vrij sterk en verspreid-, naar de zijden en naar het uiteinde fijner bestippeld, met twee duidelijke langrijen van grovere stippels. Bij het ♂ is het eerste lid der voor- en middelarsen groot. Lengte 4—4 $\frac{1}{2}$ mm. Verbreid in helder water. 26. *memnonius* Nicolai.
- 34 Langwerpig, met tamelijk parallele zijden, matig gewelfd, zwart. Kop gewoonlijk bruinrood met bruin voorhoofd, de zijrand van het halsschild en het uiteinde der dekschilden niet zelden roodbruin, soms de geheele bovenzijde bruin; sprietten, tasters en pooten geheel roestrood. Bovenzijde nagenoeg onbehaard, zeer fijn en dicht gechagrineerd en daardoor dof glanzig 2). Halsschild voor de basis en aan den voorrand vrij krachtig-, in het midden lijn en zeer verspreid bestippeld. Dekschilden zeer verspreid en matig sterk-, naar de zijden en het uiteinde veel fijner bestippeld, gewoonlijk zonder duidelijke rijen van grovere stippels; de zijrand tamelijk rechtlijnig tegen den basaalhoek gericht en daarachter in het oogvallend uitgebogen. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. In poeltjes en in uitgedroogde slooten, in boschrijke heidestrecken. Breda, Oisterwijk en Maarsbergen. Ook in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld 27. *melanarius* St.
- Korter en iets breeder, vlak. Bovenzijde roestbruin, de kop tussen de oogen donkerder, de basis en eenige vlekken voor het uiteinde der dekschilden lichter, bruingeel. Onderzijde zwart. Sprietten, tasters en pooten roodgeel. Bovenzijde zeer dun behaard, lijn gechagrineerd, weinig glanzig. Halsschild voor de basis dwars ingedrukt, aan de zijden verspreid en vrij krachtig-, in het midden lijn en verspreid bestippeld. Dekschilden in het midden iets buikig verbreed, verspreid en vrij krachtig bestippeld, met 3 duidelijke rijen van grovere stippels; de zijrand iets bochtig tegen den basaalhoek gericht en daarachter in 't oogvallend uitgebogen. Lengte 4 mm. In bergstreken van Middel-Europa, o. a. in Westfalen. Niet inlandsch (victor Aubé) (ferruginus Steph.)

II. Tribus NOTERINI.

8. *Noterus* Clairv.

Bovenlip sterk voort uitstekend, van voren afgeknot. Sprietten kort, in beide seksen verschillend gevormd; bij het ♀ van af het eerste tot het zevende lid zwak ver-

1) Verwant aan *longulus* is nog *H. cantabricus* Sharp, welke in Noord-Frankrijk voorkomt. Deze soort is meer gewelfd, duidelijker gechagrineerd en krachtiger bestippeld. De basis van het halsschild is binnen de achterhoeken niet of slechts onduidelijk dwars ingedrukt, de dekschilden zijn veel grover- en meer verspreid bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Ik zag exemplaren uit Calvados (Favrel).

2) Volgens Sharp zouden ook sterker glanzige en krachtiger bestippelde exemplaren voorkomen.

breed, naar het uiteinde versmald, het eindlid toegespitst, bij het ♂ van af het vijfde lid sterk en onregelmatig verbreed (Fig. 11). Kin in de uitranding met een dubbelten middenland. Halsschild aan de zijden dik gerand. Achtercoxae niet naar voren uitgebreid, de zijstukken van het metasternum, dat in het midden door een zeer fijnen, hoekigen naad slechts onduidelijk van de achtercoxae gescheiden is, daardoor groot en driehoekig. Voor- en middeltarsen duidelijk 5-ledig. De achterschenen en de achtertarsen op den boven- en onderrand met lange zweemharen bezet. Aan de voor- en middeltarsen bij het ♂ zijn de eerste 3 ledjes min of meer verbreed en op de onderzijde slechts met eenige weinige zuignapjes bezet; het eerste voortarsen-lid is buitengewoon groot en heeft aan de binnenzijde een krachtigen, stompen tand. Bij het ♂ zijn de dijnen aan de binnenzijde van een sterken stompen tand voorzien en tusschen dezen tand en het uiteinde diep uitgerand; bij het ♀ is deze uitranding zwakker aangeduid en niet tandvormig begrensd. De voorschenen zijn aan den buitenrand kort en dicht bezwimperd, bij het ♀ zijn deze zeer breed en van binnen tandvormig verbreed. Ook is bij het ♂ het prosternum nabij de oogen, benevens een gedeelte der poten zwart geklekt.

Van de 3 Europeesche soorten komen twee in Nederland voor.

Prosternum bij het ♂ vlak of iets ingedrukt, bij het ♀ stomp dakvormig gewelfd. Bij het ♂ slechts het vijfde en zesde sprietlid groot en aan de onderzijde uitgehold. Lichaam roodachtig-geelbruin, de dekschilden met krachtige, van voren in rijen geplaatste stippels. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Gemeen in stilstaande wateren. Een exemplaar uit Texel heeft donkere dekschilden (capricornis Hrbst., clavicornis Sharp) 1. **crassicornis** Müll.

Prosternum bij het ♂ en ♀ scherp dakvormig gekield. Bij het ♂ het vijfde tot tiende sprietlid verbreed en aan de onderzijde uitgehold. Deze soort is wat grooter en donkerder gekleurd dan de vorige, de dekschilden met meer verwarde bestippeling. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Even gemeen.

(semipunctatus F., sparsus Mrsh., crassicornis St., capricornis Sharp) 2. **clavicornis** de Geer.

III. Tribus LACCOPHILINI.

9. Laccophilus Leach.

Bovenlip in 't midden uitgerand; kintand zeer kort en afgerond. Sprieten dun, draadvormig. Halsschild aan de zijden ongerand. Achtercoxae zeer ver naar voren uitgebreid, de zijstukken van het, in het midden lange metasternum daardoor zeer smat. Voor- en middeltarsen bij het ♂ zwak of matig verbreed en op de onderzijde met eenige gesteelde plaatjes bezet. De soorten leven in stilstaande wateren. Uit het water genomen spartelen zij en springen met snelheid op, om te ontsnappen. — De larve van *L. hyalinus* is door Schödlte beschreven.

De drie Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

1 Voortzetting van het prosternum achter de voorecoxae zeer lang en spits uitgetrokken, langer dan het overige gedeelte van het prosternum. Laatste sterniet aan weerszijden uitgebogen, zoodat het midden van den achterrand nagenoeg snavelvormig uitsteekt. Basis van het halsschild in 't midden duidelijk driehoekig uitgetrokken. Geen stridulatie-orgaan. Kop en halsschild geel, de voor- en achterrand van het halsschild, alsmede de dekschilden zwart, een uitgezakte of in vlekken opgeloste dwarsband aan de basis, een tweede dergelijke nabij het uiteinde en de zijrand geel. Voortarsen bij het ♂ vrij sterk verdikt. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. In helder stilstaand water, zeer zeldzaam. Doetichem, Oisterwijk, Roermond en St. Pieter 3. **variegatus** Germ.

Voortzetting van het prosternum tusschen de middelcoxae eindigend, korter dan het overige gedeelte van het prosternum. 2

2 Basis van het halsschild in 't midden duidelijk driehoekig uitgetrokken. Op de achtercoxae geen stridulatie-orgaan. Voor- en middeltarsen bij het ♂ sterker verdikt dan bij *hyalinus*. Bovenzijde groenachtig, bruin- of geelachtig, met onduidelijk gevlekte dekschilden. De ab. *Strochmii* Thoms. is zeer donker gekleurd, met iets meer gewelfde en iets duidelijker bestippelde dekschilden. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Gemeen in slooten, ook de aberratie. (hyalinus Er., minutus Mrsh.) 2. **obscurus** Panz.

Basis van het halsschild in 't midden zeer weinig naar achteren uitgetrokken. Op het midden der achtercoxae bevindt zich een, uit dicht oopenstaande en in een boog geplaatste krasjes

bestaand, stridulatie-orgaan. Voortarsen bij het ♂ zwak verdikt. Bovenzijde geelachtig, de dekschilden lichter of donkerder bruin, de zijrand en vier daarmede samenhangende vlekken geel; ook meestal met eenige gele langslijnen over het midden. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ mm. Gemeen in slooten (interruptus Pz., minutus F.) 1. **hyalinus** de Geer.

IV. Tribus COLYMBETINI.

10. Ilybius Erichs.

Lichaam gewoonlijk op de bovenzijde sterk gewelfd, uiterst fijn netsgewijze gechaggrineerd. Dekschilden meestal met eene duidelijke, roodachtige langsvlek in 't midden nabij den buitenrand en met eene tweede roodachtige vlek voor het uiteinde. De buiten-tophoek van de eerste 4 leedjes der achtertarsen is lobvormig uitgetrokken. Klauwen der achtertarsen zeer ongelijk. Achterdijen op de onderzijde aan den binnen-tophoek met een groefje, waarin een aantal borstelharen gezeten zijn. Het laatste sterniet bij het ♂ naar het uiteinde langsrimpelig en in de middellijn meestal gekield, bij het ♀ aan het uiteinde hoekig uitgesneden en naar het uiteinde dakvormig gewelfd of gekield. Bij het ♂ zijn de eerste 3 voortarsen-leedjes krachtiger ontwikkeld en aan de onderzijde met vrij lange witachtige hartjes bezet; de eerste 4 leedjes der achtertarsen zijn aan den buitenkant gerand, behalve bij *I. fenestratus*. — De larve en de pop van *I. fenestratus* zijn door Schmidt beschreven.

Van de 12 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Achtereoxae naar voren zeer sterk en eenigszins hoekig verbreed, niet ver van de middelcoxae verwijderd. Zijvleugels van het metasternum slechts als een zeer smal, haakvormig teruggebogen gedeelte (Sub-gen. *Idiolybius* Gozis). Achtertarsen bij het ♂ niet gerand. Bruinrood, de bovenzijde bronskleurig met roodachtige randen. De dekschilden naast de zijden, iets achter het midden, met eene roodachtige, soms onduidelijke langsvlek. Soms zijn de dekschilden geheel licht bronskleurig, nagenoeg zonder roodachtige randen (ab.c. *aeneus* Panz.), of wel is de geheele bovenzijde bruinrood (ab.c. *Prescottii* Mannerh.). Lengte 11—11½ mm. Zeer gemeen in stilstaande wateren. De ab.c. *aeneus* zeldzaam, de ab.c. *Prescottii* eenmaal, waarschijnlijk bij den Haag 1. **fenestratus** F.

Achtereoxae naar voren weinig verbreed en van de middelcoxae ver verwijderd. Zijvleugels van het metasternum driehoekig toegespitst (Sub-gen. *Ilybius* isp.) 2

- 2 Achtertarsen bij het ♂ van buiten niet gerand; de buitenste klauw der achtertarsen bij het ♂ aan het uiteinde gebogen en toegespitst. Klauwen der voortarsen bij het ♂ gewoon. Bovenzijde geheel zwart. De lichaamsvorm is als bij *obscurus*, doch de omtrek is in 't midden iets breeder en naar het uiteinde der dekschilden met een wat minder uitgebogen top. Lengte 10½ mm. Niet inlandsch. Zij zou in Noord-Duitschland o. a. bij Harburg en ook in Westfalen voorkomen. (similis Thoms.)

Achtertarsen bij het ♂ van buiten gerand 3

- 3 De zijden der dekschilden met een breeden, vrij scherp begrensden bruingelen zoom, welke naar achteren door eene bruine langstreep gedeeld is. De buitenste klauw der achtertarsen bij het ♂ is naar het uiteinde iets gekromd. De klauwen der voortarsen bij het ♂ zijn iets verlengd, de buitenste is voor de basis zwak uitgebogen. Lichaam bruinrood, van boven bronskleurig, vlakker en smaller dan bij alle overige soorten. Het voorste gedeelte van den kop, twee schedelvlekken en de zijden van het halsschild roodachtig. Lengte 10 mm. Zeer gemeen in stilstaande wateren 7. **fuliginosus** F.

De zijden der dekschilden hoogstens smal- en onduidelijk bruinachtig gezoomd, meestal eenkleurig donker. 4

- 4 Laatste sterniet bij het ♂ iets uitgerand, zonder langskiel, slechts met langsrimpels, bij het ♀ sterk uitgerand en met eene korte langskiel aan het uiteinde. De buitenste achterklauw van het ♂ aan het uiteinde tamelijk scherp en iets gekromd. De grootste breedte van het lichaam ligt nagenoeg in het midden. Bovenzijde bronskleurig, tamelijk glanzig. Lengte 11—11½ mm. Zeer zeldzaam in vijvers en poelen. Amsterdam, den Haag en Maastricht. Ook in de Belgische prov. Antwerpen en Limburg 4. **subaeneus** Er.

Laatste sterniet bij het ♂ niet uitgerand, bij ♂ en ♀ met eene duidelijke langskiel, bij het ♀ uitgerand en aan het uiteinde dakvormig verheven 5

- 5 Buitenste achterklauw bij het ♂ aan het uiteinde scherp en gekromd. Laatste sterniet bij het ♂ en ♀ met eene sterke langskiel. De grootste breedte van het lichaam ligt achter het midden. Bovenzijde zwart, met geringen bronsachtigen weerschijn. De dekschilden naar het uiteinde krachtiger geclagrineerd. Lengte 13—14 mm. Gemeen in stilstaande wateren en rivieren. 3. *ater* de Geer.
- Buitenste achterklauw bij het ♂ recht en stomp. 6
- 6 Klauwen der voortarsen bij het ♂ met eene tandvormige verbreding in 't midden; de buitenste klauw der achterpooten bij het ♂ breed en kort, volkomen stomp; soms is ook de buitenste klauw der middelvoeten in 't midden getand (var. *sexdentatus* Schiöde). Laatste sterniet bij het ♂ met eene scherpe langskiel en duidelijke langsrimpels. Lichaam zeer hoog gewelfd, meestal naar achteren meer toegespitst. Bovenzijde zwart, zonder metaalglaans. Lengte 11—11½ mm. Niet zeldzaam in slooten. Ook de var. *sexdentatus*.
(*quadriguttatus* Lac.) 2. *obscurus* Mrsh.
- Klauwen der voortarsen bij het ♂ gewoon. Lichaam vlakker gewelfd 7
- 7 Langskiel op het uiteinde van het laatste sterniet bij het ♂ en ♀ sterk verheven, bij het ♀ als een stompe doorn, in 't midden van de sterke intrandiging van den achterrand, enigszins uitstekend. Bovenzijde geheel zwart. Deze soort gelijkt op *obscurus*, doch is kleiner, smaller en vlakker gewelfd. Lengte 9—9½ mm. Zeldzaam in poelen.
5. *guttiger* Gyll. 1)
- Langskiel op het uiteinde van het laatste sterniet bij het ♂ en ♀ zeer fijn en kort aangeduid. Bovenzijde zwart met sterken, bronzenigen weerschijn. Deze soort gelijkt overigens op *guttiger*, doch is iets kleiner, meer gewelfd en aan de zijden iets meer afgerond. Lengte 8½ mm. Niet zeldzaam, vooral in heidepoelen. 6. *aenescens* Thoms.

11. Agabus Leach

Lichaam meer of minder gewelfd, op de bovenzijde netsgewijze gerimpeld, soms zoo fijn, dat zij bijna glad schijnt, soms met tamelijk grove mazen; zijn de netmazen sterk in de lengte uitgetrokken, zoo schijnt de bovenzijde met samenhangende langsstreepjes bezet te zijn. Epipleuren der dekschilden langs het tweede tot aan het zesde sterniet zeer smal. Achterdijen op de onderzijde, aan den binnen-tophoek, met een groefje, waarin een aantal borstelhaartjes zitten. De buiten-tophoek der eerste 4 achtertarsen-leedjes niet lobvormig uitgetrokken. Klauwen der achtertarsen in den regel even lang. Bij het ♂ zijn de eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen meer of minder sterk verbreed, op de onderzijde met grootere of kleinere zuigplaatjes en veelal ook met borstelharen bezet. Bij het ♀ zijn de klauwen der voortarsen gewoon en gelijk, bij het ♂ veelal verlengd en ongelijk. Bij sommige soorten vertoonen de vijfjes dimorfisme. — De larven en poppen van *A. bipustulatus* en *chalconotus* zijn door Xamben beschreven.

Van de 56 Europeesche soorten komen 13 in Nederland en 8 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Lichaam in het midden sterk gewelfd, naar het uiteinde veel vlakker afvallend dan naar voren. Prosternum tot aan het uiteinde van de voortzetting gekield, tusschen de voorcoxae hoekig opgericht. Zijvleugels van het metasternum smal toegespitst. Achterpooten lang en slank, het eerste lid der achtertarsen weinig korter dan de 3 volgende leedjes te zamen (Sub-gen. *Acatodes* Thoms.). Kop en halsschild pekzwart of pekbruin; de clypeus, twee vlekjes op den schedel en de zijden van het halsschild bruinrood of bruineel, de dekschilden bruin met lichtere randen of geheel geelbruin; de onderzijde, behalve de achterranden der sterniten, zwart. Mond, sprieten en pooten bruinrood. De geheele bovenzijde is uiterst fijn geclagrineerd en tamelijk glanzig. Dekschilden met zeer fijne stippeellijen. De eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ verbreed en op de onderzijde met vele zuignapies bezet. Klauwen der voortarsen bij het ♂ lang en slank, voor de basis naar binnen gebogen en naar het uiteinde gekromd. Laatste sterniet bij het ♂ naar het uiteinde langsrimpelig. Lengte 10 mm. In Noord-Duitschland. Niet inlandsch. (*fuscipennis* Payk.)
- Lichaam tamelijk gelijkmatig gewelfd. 2
- 2 Voorrand der achtercoxae boogsgewijze gekromd (Sub-gen. *Gaurodytes* Thoms.) 3

1) Bij Harburg in N-Duitschland komt nog voor *A. Kiesenwetteri* Wehncke, welke als *guttiger* gekleurd, doch iets korter en meer gewelfd is, en bij welke de buitenste achterklauw van het ♂ aan het uiteinde haakvormig gekromd is.

- Voorrand der achtercoxae zeer sterk naar voren getrokken en nagenoeg hoekig gekromd. Zijvleugels van het metasternum zeer smal (Sub-gen. *Eriglenus* Thoms.) 20
- 3 Dekschilden met langsrimpelige sculptuur 4
- Dekschilden netsgewijze lederachtig gechagrineerd of nagenoeg glad 5
- 4 De geheele bovenzijde is langsrimpelig en bestaat uit fijne, dicht opeengedrongen, samenhangende langsstreepjes. Eivormig, naar het uiteinde toegespitst, tamelijk gewelfd. Zwart, op de bovenzijde gewoonlijk met duidelijke, vooral bij het ♂ in het oog vallende bronskleur; de schedel gewoonlijk met twee roode vlekjes, de mond, de sprieten en het uiteinde der tarsen roestrood. Bij versch uitgekomen exemplaren zijn de pooten geheel roodgeel. Bij het ♀ is de bovenzijde dofser zijdeglanzig en dichter gestreept dan bij het ♂. Clypeus van voren volkomen gerand. De drie stippeellijnen der dekschilden bestaan uit tamelijk kleine stipfels. Bij het ♂ zijn de klauwen der voor- en middel-tarsen zeer ongelijk. Aan de voortarsen vertoont de kleinere klauw aan de basis een scherp tand; de grootere klauw is in het midden naar binnen lancetvormig verbreed. De klauwen der middel-tarsen zijn gewoon. Lengte 10—11 mm. Overal zeer gemeen in staande wateren 1. **bipustulatus** L.
- Alleen de dekschilden langsrimpelig. Langwerpig, aan de zijden slechts zeer weinig afgerond, vlak gewelfd. Zwart, weinig glanzig, de schedel met twee roode vlekjes, de zijrand van het halsschild naar de voorhoeken roodachtig. Mond, sprieten en pooten roestrood, de dijen en de schenen der achterpooten bruinachtig. Kop en halsschild met dicht netsgewijze sculptuur; de dekschilden als bij *bipustulatus* langsrimpelig, doch minder dicht en naar het uiteinde meer netsgewijze. Clypeus aan den voorrand slechts zeer onduidelijk gerand. De drie verwarde stippeellijnen der dekschilden zijn vrij duidelijk. Bij het ♂ zijn de klauwen der voor- en middel-tarsen even lang en gewoon. Lengte 7—7½ mm. Eenmaal bij Oisterwijk in Juli, onder vochtige bladeren in eene uitgedroogde greppel. In de Rijnprov. bij Elberfeld en Crefeld, in België bij Ploegsteert 2. **striolatus** Gyll.
- 5 De achtercoxae reiken met hare verste uitbreiding naar voren, ver buiten het midden van de halve onderzijde 6
- De achtercoxae reiken met hare verste uitbreiding naar voren, weinig buiten het midden van de halve onderzijde 8
- 6 Dekschilden glanzig, tusschen de lijne en dichte mazen glad, bij zeer sterke vergrooting bezien niet gechagrineerd. Zwart, op de bovenzijde sterk bronzig. De voorrand van den kop en twee vlekjes op den schedel roodachtig. De randen van het halsschild en der dekschilden meer of minder bruinrood. Sprieten en tasters roestrood, het laatste sprietlid aan het uiteinde zwartachtig. Voor- en middel-pooten, behalve het zwartachtige midden der dijen, bruinrood, de achterpooten grootendeels pekswart. De drie verbrede leedjes der voor- en middel-tarsen bij het ♂ op de onderzijde met eene borstelachtige zool bekleed. Voorklauwen bij het ♂ matig lang en gewoon. Laatste sterniet bij het ♂ slechts tegen den achterrand langsrimpelig. Lengte 7½—8½ mm. Niet zeldzaam, vooral in heidepoeletjes 3. **chalconotus** Panz.
- Dekschilden dof zijdeglanzig, tusschen de lijne en dichte mazen, bij zeer sterke vergrooting bezien, zeer fijn gechagrineerd 7
- 7 Dekschilden fijn, doch zeer duidelijk bestippeld, en zeer fijn gereticuleerd. Deze soort gelijkt zeer op *chalconotus*, doch is iets breder en onderscheidt zich, behalve door de hierboven opgegeven verschillen, door de veel fijnere reticulatie der dekschilden, het geheel bruinroode laatste sprietlid, de van binnen voor de basis uitgebogen klauwen der voortarsen bij het ♂, en door het krachtiger en meer uitgebreid langsrimpelige laatste sterniet bij het ♂. Lengte 8 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld. Zij zou ook in West-Vlaanderen gevangen zijn (neglectus Er.)
- Dekschilden slechts zeer fijn gereticuleerd, zonder duidelijke fijne bestippeling. Deze soort is grooter en langer gestrekt dan *chalconotus*. Bij het ♂ zijn de eerste vier achtertarsen-leedjes langs den buitenrand gegroefd en het laatste achtertarsen-lid van anderen in het midden vrij sterk uitgebogen, de achterklauwen bij het ♂ zeer kort. De binnenste klauw der voortarsen bij het ♂ tot over het midden verbreed en veelal voor de basis met eene kleine uitranding, de buitenste klauw tusschen de basis en het midden uitgebogen en in het midden hoekig uitstekend. Lengte 9½—10½ mm. Niet inlandsch. Deze soort komt in Noordelijk en Noord-Westelijk Europa voor. Exemplaren uit België (Groenendael en Tervueren, ex coll. Remy) die ik zag, behooren tot *A. melanarius*. In de Rijnprov. bij Elberfeld. Zij zou ook in Oldenburg en op het eiland Wangeroog voorkomen.
- (Erichsoni Bedel 1), nec Gemm. & Harold) (*subtilis* Er.)
- 8 Voorrand der achtercoxae naar buiten slechts zwak en onduidelijk uitgebogen 9

1) Het is deze soort welke door Bedel *Erichsoni* Gemm. & Harold (*nigroneneus* Er.) genoemd wordt; zij komt echter in Noord-Oostelijk Europa voor, n. a. bij Belgyn.

Voorrand der achtercoxae naar buiten sterker en duidelijk uitgebogen. 11

- 9 Dekschilden grof, netsgewijze gereticuleerd. Langwerpig, vlak gewelfd, zwart, de bovenzijde bij het ♂ glanzig, bij het ♀ dofser. De schedel met twee roode vlekken, de mond en de sprieten roestrood, de pooten bruin, de knieën en tarsen roodachtig. Dekschilden op de achterhelft naast de zijden, gewoonlijk met eene onduidelijke, bruinachtige langsstreep. Op de voorhelft der dekschilden zijn de mazen duidelijk en eenigszins in de lengte uitgetrokken. Halsschild achter den voorrand met eene doorlopende stippelrij. Voor- en middel-tarsen bij het ♂ slechts zwak verbreed. De buitenklauw der voortarsen bij het ♂ is voor de basis iets hoekig naar binnen verbreed. Lengte 9 mm. Niet inlandsch. Ik zag exemplaren uit Groenendaal en Tervuren in België. (tarsatus Thoms.) (melanarius Aubé).

Dekschilden fijn gechagrineerd of nagenoeg glad. 10

- 10 Dekschilden zeer duidelijk gechagrineerd en ten minste naar het grover gechagrineerde uiteinde duidelijk en vrij dicht bestippeld. Klauwen der voortarsen bij het ♂ gewoon. Zwart, zeldzamer donkerbruin; de schedel met twee roode vlekken, de zijden van het halsschild meer of minder roodachtig, de dekschilden naast den zijrand met eene meer of minder duidelijke, geelroode vlek achter het midden en eene tweede voor het uiteinde. Mond, sprieten en pooten roestrood, de dijen en de achterschenen meer of minder pekkbruin. Bij het ♂ zijn de dekschilden meer glanzig en op de voorhelft minder duidelijk gechagrineerd dan bij het ♀. De dekschilden zijn voor het uiteinde eenigszins plooivormig opgericht, met 3, soms groefachtige, onregelmatige rijen van vrij groote stippels. Bij het ♂ is het eerste lid der voor- en middel-tarsen sterker, het tweede zwakker verbreed. Lengte 8—8½ mm. Vooral in bergstreken in stroomend water; ook op kalkbodem en in kleine steenrijke boschbeken, veelal gezellig bijeen, onder steenen. Bij Breda in den Vuchtpolder en bij Amsterdam langs het Y. In de Rijnprov. bij Düsseldorf, Aken en Crefeld. In België bij Brussel.

4. *guttatus* Payk.

Dekschilden uiterst fijn gechagrineerd, bijna glad, voor het uiteinde zonder duidelijke, dichte, lijne bestippeling. Binnen-voorklauw bij het ♂ in het midden met een grooten, spitsen tand. Zwart, sterk glanzig, de schedel met twee meer of minder duidelijke roode vlekken, de dekschilden naast de zijden met eene geelroode vlek, iets achter het midden, en met eene tweede, veelal slechts onduidelijke, voor het uiteinde. Mond en sprieten roestrood, de taster-ledjes in het midden bruinachtig, de pooten, op de roodachtige knieën en tarsen na, pekkzwart. Het halsschild is van af de basis naar voren veel sterker versmald dan bij *guttatus*; ook zijn de dekschilden iets smaller en aan het uiteinde wat meer toegespitst. Aan voor- en middel-tarsen bij het ♂ zijn de eerste drie ledjes verbreed en op de onderzijde met eene borstelachtige zool bekleed. Lengte 8½—9 mm. Niet inlandsch. Deze soort komt in Middel-Europa voor. Zij zou in België op verscheidene plaatsen gevangen zijn. Ik zag geen enkel Belgisch exemplaar. (fontinalis Steph., melas Aubé, silesiacus Letzn.) (nitidus F.).

- 11 De stippelrij achter den voorrand van het halsschild is aan weerszijden slechts aangeduid. Breed-eivond, sterk gewelfd; de bovenzijde glanzig roodbruin, de onderzijde, met uitzondering van de zijden van het prosternum en den achterrand der sterniten, zwart. Sprieten, benevens de voor- en middel-pooten, behalve het bruinachtige midden der dijen, roestrood; de achterpooten veelal geheel pekkbruin. Klauwen der voortarsen bij het ♂ niet langer dan bij het ♀. Lengte 8½—9 mm. Niet inlandsch. Deze soort komt in België voor, o. a. bij Neufchâteau, Munster-Bilsen, Sliderloo enz. Ik bezit een exemplaar uit Herbeumont. (rufulus Fairm.) (brunneus F.).

De stippelrij achter den voorrand van het halsschild loopt in het midden onafgebroken door. 12

- 12 Halsschild aan de basis nagenoeg recht afgesneden. Binnen-voorklauw bij het ♂ met een scherpen tand. 13

Halsschild aan de basis boogsgewijze afgerond 14

- 13 Lichaam langwerpig, aan de zijden zeer weinig afgerond, tamelijk gewelfd, zwart, met zeer geringen metaalgans. De schedel met twee roode vlekken, de dekschilden aan de zijden gewoonlijk met eene korte, roodachtige streep achter het midden en met eene roodachtige vlek voor het uiteinde; mond, sprieten en pooten, behalve de meestal zwartachtige dijen, roestrood. De bovenzijde is bij beide seksen uiterst zwak gechagrineerd. Dekschilden met zeer diepe, op de voorhelft tot 3 onregelmatige rijen gerangschikte, naar achteren verstrooide stippels. Bij het ♂ zijn de eerste drie ledjes der voor- en middel-tarsen op de onderzijde met kleine zuignapjes bezet. Klauwen der voortarsen bij het ♂ kort, de binnenste voor de basis met een scherpen tand. Het derde sterniet bij het ♂ aan weerszijden met een stridulatie-orgaan, bestaande uit eene dwars geriggelde, boogvormige verhevenheid. Lengte 6—7 mm. Op Texel, en bij Oisterwijk in Juli, onder vochtige bladeren in eene uitgedroogde greppel aangetroffen. Ook bij Aken en Crefeld en in België in de „Hantes-Fanges.”

11. *affinis* Payk.

Lichaam aan de zijden in 't oog vallend meer afgerond dan bij *affinis* en op de bovenzijde

uiterst fijn gechagrineerd. Overigens naverwant aan *affinis* en bij het ♂ met dezelfde sexuele kenmerken, doch onderscheiden door de, nagenoeg als bij *femoralis*, zeer smalle, tongvormige, sterk teruggekromde zijvleugels van het metasternum. Lengte 6—6½ mm. Niet inlandsch. Deze soort zou bij Bremen voorkomen. Mij onbekend. (*unguicularis* Thoms.).

- 14 Dekschilden tamelijk grof, lederachtig geaderd, met drie zeer onduidelijke, onregelmatige stippeellijen. Kop en halsschild zwart, twee vlekken op den schedel roodachtig, de zijden van het halsschild tamelijk breed bruingeel, de dekschilden bruin, aan de basis en aan de zijden lichter geelbruin. De onderzijde is, met uitzondering van de roestroode achterranden der sterniten, zwart. Mond, sprieten en pooten roestrood, de achterdijen en soms de geheele achterpooten bruinachtig. De bovenzijde is slechts weinig glanzig. De eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ verbreed en op de onderzijde met zuignapjes bezet. Klauwen der voortarsen bij het ♂ lang en slank, voor de basis naar binnen uitgebogen. Laatste lid der middeltarsen bij het ♂ zeer lang. Lengte 8—8½ mm. Zeer gemeen in slooten 10. *Sturmii* Gyll.
- Dekschilden zeer fijn gechagrineerd of nagenoeg geheel glad 15
- 15 Halsschild en dekschilden geel, het halsschild veelal met twee zwarte vlekken op het midden, de dekschilden zwartachtig gespikkeld of met samenhangende donkere vlekken 16
- Halsschild hoogstens aan den zijrand geelbruin of roodachtig 17
- 16 Halsschild met twee zwarte vlekken op het midden; de dekschilden door talrijke kleine, onregelmatige, veelal ineenvloeiende vlekjes zwart gespikkeld, achter het midden aan weerszijden naast den buitenrand gewoonlijk met een ongevlekt veldje. Onderzijde, behalve de roodachtige zij- en achterranden der sterniten, zwart 1); de mond, sprieten en pooten roodgeel. Klauwen der voortarsen bij het ♂ slank, de buitenste naar binnen voor de basis getand. Kop zwartachtig, de clypeus en twee vlekjes op den schedel roodgeel. Bovenzijde uiterst fijn gechagrineerd, glad en glanzig. De eerste drie leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ verbreed en op de onderzijde met zuignapjes bezet. Lengte 8½ mm. Niet zeldzaam in duin- en heidepoelen (*bipunctatus* F.) 8. *nebulosus* Forster.
- Halsschild ongevlekt; de dekschilden met samenhangende of uitgewischte donkere vlekken. De sterniten in den regel slechts aan den uitersten achterrand roodachtig; de dijnen minstens gedeeltelijk donker. Bij het ♂ is de buitenste der beide voorklauen van binnen, nagenoeg in het midden, getand en in de basaalhelft dubbel zoo breed als de binnenklauw. Deze soort gelijkt overigens zeer op *nebulosus*. Lengte 8 mm. In duinpoelen, zeldzamer. Vooral in brak water (*subnebulosus* Steph.) 9. *consersus* Mrsh.
- 17 Dekschilden achter het midden aan den zijrand met eene gele dubbelylek en een tweede, rondachtig, geel vlekje voor het uiteinde. Zwart, sterk bronsglanzig, de schedel met twee roode vlekken, de zijden van het halsschild en de epipleuren der dekschilden roodbruin; de mond en de sprieten roestrood, de tasters aan het uiteinde bruinachtig; de vier voorpooten bruinrood, het midden der dijnen en de middelschenen bruinachtig; de achterpooten, behalve het uiteinde der schenen, de trochanters, de knieën en het uiteinde der tarsen, pekzwart. De geheele bovenzijde is uiterst fijn gechagrineerd, nagenoeg glad. De drie verbrede leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ zijn op de onderzijde met kleine zuignapjes bezet. Klauwen der voortarsen bij het ♂ slank, iets verlengd, even lang. Lengte 7½—8 mm. In bosch-slooten onder gezonken bladeren, ook onder steenen langs slooten en vijvers. Verbreid in de diluviale streken en in Limburg. (?*bipunctatus* Müller) 5. *didymus* Oliv.
- Dekschilden zonder roodgele zijvlek, bruin of roodbruin, aan de basis en aan de zijden lichter. 18
- 18 De langere eindspoor der achterschenen is even lang of langer dan het eerste lid der achter-tarsen 19
- De langere eindspoor der achterschenen is korter dan het eerste lid der achtertarsen. Ovaal, zwak gewelfd, zwart, de schedel met twee roodachtige vlekken, het halsschild veelal met roodachtigen zijrand, de dekschilden bruin of roodbruin, aan de basis en aan de zijden lichter; de mond, sprieten en pooten, behalve de zwartachtige dijnen, roestrood. Kop en halsschild uiterst fijn, netsgewijze gechagrineerd; de dekschilden bij het ♂ uiterst fijn gechagrineerd en glanzig, bij het ♀ in sculptuur zeer veranderlijk, dan eens als bij het ♂ nagenoeg glad, dan eens zeer duidelijk en uiterst dicht gechagrineerd en dof 2). De drie verbrede leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ zijn aan de onderzijde met zuignapjes bezet. Klauwen der voortarsen bij het ♂ verlengd, slechts weinig gekromd. Lengte 7—8½

1) Bij een mannetje, bij den Haag gevangen, is het geheele achterlid roodgeel.

2) Bij de in Silesie voorkomende var. *lunula* Sord. is het lichaam smaller en grof, netsgewijze gestreept en glanzig. In de Westelijke Alpen komen nog een paar andere variëteiten voor.

mm. Niet inlandsch. Ik zag exemplaren uit Hockai in België. Ook in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld. (congener Payk.).

- 19 Middelcoxae door eene tamelijk breede voortzetting van het metasternum gescheiden; de zijvleugels van het metasternum tamelijk smal driehoekig. Achterdijen kort, weinig meer dan dubbel zoo lang als de trochanters. Klauwen der voortarsen bij het ♂ gewoon. De langere eindspoor der achterschenen is even lang als het eerste lid der achtertarsen. Lichaam tamelijk gewelfd, zwart, het voorste gedeelte van den kop, twee vlekken op den schedel en de zijden van het halsschild roodbruin; de dekschilden licht kastanjebruin, aan de basis en aan de zijden geelbruin; de mond en de sprieten roestrood, de voor- en middelpooten, behalve de dijen bruinrood; de achterpooten pekkwart, met roodachtige trochanters, knieën en tarsen. Bovenzijde glanzig en bijna glad. De 3 verbrede leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ zijn op de onderzijde van zuignapjes voorzien. Lengte 7 mm. Zeldzaam, in helder water. Middelburg, Wolfhezen, Breda, Leiden, Roermond, Amsterdam en Amby (Limburg). Ook in België en in de Rijnprov. 6. **paludosus** F.

Middelcoxae door eene korte, smalle, toegespitste voortzetting van het metasternum gescheiden; de zijvleugels van het metasternum meer breed driehoekig. Achterdijen langer dan bij *paludosus*. Bij het ♂ is de binnenste klaw der voorpooten dubbel zoo breed als de buitenste en in het midden hoekig of tandvormig verbreed. De langere eindspoor der achterschenen is iets langer dan het eerste lid der achtertarsen. Lichaam sterk gewelfd, bruinzwart, op de bovenzijde met zwakken metaalglans. De voorrand van den clypeus, twee schedelvlekken en de zijden van het halsschild roodachtig; de dekschilden bruin, aan de basis en aan de zijden lichter; de mond, sprieten en pooten roestrood. Bovenzijde zeer lijn gechagrineerd en lijn en verspreid bestippeld, glanzig. Zeer zelden komen wijfjes voor met dof gechagrineerde dekschilden (♀ var. **dispar* Bold). Bij het ♂ zijn de drie verbrede leedjes der voor- en middeltarsen met zuignapjes bezet. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. In duin- en heideplassen doch zeldzaam. 7. **uliginosus** L.

- 20 Bovenzijde bruin-bronskleurig, het voorste gedeelte van den kop, twee vlekken op den schedel en de zijden van het halsschild roodachtig. Dekschilden langs de randen lichter, met geelbruine epipleuren. Mond, sprieten en pooten roestrood. Voordijen bij het ♂ smal, met rechten, dicht geel bewimperden onderrand, bij het ♀ breed, met gekromden, weinig bewimperden onderrand. Bij het ♂ zijn de drie verbrede leedjes der voor- en middeltarsen op de onderzijde met eene borstelachtige zool bekleed. Klauwen der voortarsen bij het ♂ verlengd, nagenoeg recht en gewoon. Lengte 6 mm. Verbreid, doch meestal zeldzaam. Cuyk, Zutphen, Breda, Oldenzaal, Apeldoorn en Terschelling. Gemeen bij Roermond. 12. **femoralis** Payk.

Kop en de zijden van het halsschild roodachtig. Dekschilden zwartbruin of bruin met geringen metaalglans, de zijranden behalve naar het uiteinde, een daarmede samenhangende, uitgezakte, golvende, niet tot aan den naad doorlopende dwarsband achter de basis, eene uitgezakte, soms gedeelde randvlek achter het midden en eene kleine vlek voor het uiteinde roodgeel. Mond, sprieten en pooten roestrood, het uiteinde der sprieten en tasters zwartachtig. Voordijen bij het ♂ en ♀ breed, met sterk gekromden, weinig bewimperden onderrand. De verbrede leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ aan het uiteinde met eenige kleine zuignapjes. Klauwen der voortarsen bij het ♂ nagenoeg als bij het ♀. Lengte $7\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen in slooten . . . (abbreviatus F., Hermannii Bedel, nec F.) 13. **undulatus** Schrank.

12. *Platambus* Thoms.

Dit genus onderscheidt zich van Agabus, door de minder naar achteren versmalde, tot aan de basis van het voorlaatste sterniet tamelijk breede epipleuren der dekschilden en door de breedere metasternaal-voortzetting, welke de middelcoxae verder van een scheidt. Overigens als bij Agabus.

Van de 2 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Bovenzijde geel of roodgeel, het achtergedeelte van den kop, behalve twee schedelvlekken, de voor- en achterrand van het halsschild, de basaalrand, de naad, het uiteinde en vier onvolkomen, deels onderbroken langsstrepen op elk der dekschilden zwartachtig bronzigbruin; onderzijde en pooten roestrood. De teekening is zeer veranderlijk. Gewoonlijk begint de eerste langsstreep der dekschilden in het voorste vierde gedeelte en bereikt meestal de topvlek; de tweede begint dicht achter de basis, is van voren verbreed, naar achteren versmald en verkort; de derde langsstreep is in twee of drie langsvlekken opgelost; de vierde naar voren en naar achteren sterk verkort en veelal in het midden onderbroken. Dikwerf vloeien de langsstrepen meer of minder ineen, zoodat in het sterkste geval de gele of roodachtige grondkleur slechts aan den zijrand en als eene basaalvlek naast het schildje

overblijft (ab.c. **inaequalis* Panz.). Bovenzijde zeer fijn, netsgewijze gechagrineerd, bij het ♂ soms nagenoeg glad, bij het ♀ veelal sterker en dichter gechagrineerd en tamelijk dof. De eerste drie leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ zwak verbreed en op de onderzijde met zeer kleine zuignapjes dicht bezet. Lengte $7\frac{1}{2}$ –8 mm. Zeer gemeen in helder water. De bijna geheel zwarte ab.c. *inaequalis* zag ik nog niet uit ons land, wel zeer donkere, alsook zeer sterk gevlekte exemplaren. De larve is door Schödte beschreven.

1. *maculatus* L.

13. Copelatus Erichs.

(*Liopternus* Steph.)

Achterklauwen even lang. De omgeslagen, door de dekschilden overdekte, dorsale zijrand van het eerste sterniet is glad. Dit genus onderscheidt zich van Agabus, door het ontbreken van een groefje met borstelharen aan den binnen-tophoek der achterdijen en door de zeer dicht tegen elkaar aanstaande of elkaar nagenoeg aanrakende coxaallijnen, voor de aanhangsels der achtercoxae. — De soorten hebben den habitus van een grooten Hydroporus.

Van de twee Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Langwerpig, aan het uiteinde toegespitst, weinig gewelfd, de bovenzijde roodbruin en matig glanzig, de zijden van het halsschild en der dekschilden lichter. Kop van achteren gewoonlijk zwartachtig; de onderzijde, behalve het prosternum, zwart; sprieten en pooten roestrood. Halsschild fijn-, bij het ♂ aan de zijden dichter en eenigszins rimpelig bestippeld, bij het ♀ aan de zijden dicht langstreepig. De eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ sterk verbreed en op de onderzijde met zuignapjes bezet. Lengte 7–8 mm. Verbreid, doch overal zeldzaam. In het voorjaar dikwerf langs de stranden. . (agilis F.) 1. *ruficollis* Schall.

14. Rhantus Lacordaire.

Bovenzijde van het lichaam uiterst fijn en dicht netsgewijs gerimpeld. Halsschild aan de zijden meer of minder duidelijk gerand. De omgeslagen, door de dekschilden overdekte, dorsale zijrand van het eerste sterniet, dwarsrimpelig. Metasternaal-voortzetting tusschen de middecoxae aan het uiteinde, tot opname van het prosternaal-uitsteeksel, diep gegroefd. Achterdijen op de onderzijde, aan den binnen-tophoek, met een groefje, waarin een aantal borstelharen zitten. De achterklauwen zijn zeer ongelijk, de buitenste is veel korter dan de binnenste. De eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ zijn meer of minder sterk verbreed, soms zijdelings samengedrukt en op de onderzijde met zuigplaatjes bezet. Bij het ♀ zijn de voorklauwen gelijk, bij het ♂ verlengd en veelal zeer ongelijk. Bij enkele wijfjes komt dimorfisme voor. — De soorten leven in stilstaande wateren.

Van de 10 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 2 in het omliggend gebied voor.

- 1 Dekschilden evenals het overige lichaam dof zwart; de voorrand van den kop, eene schedelvlek en de zijrand van het halsschild roodachtig, de dekschilden naar den zijrand veelal bruinachtig; de mond en de sprieten geelrood, de trochanters, knieën, voorschenen, het uiteinde der middelchenen en de voor- en middeltarsen bruinrood. De geheele bovenzijde is uiterst dicht en zeer fijn gechagrineerd. De drie stippelrijen der dekschilden zijn zeer duidelijk ontwikkeld; de buitenste stippelrij is dubbel en onregelmatig. De eerste drie leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ zijn slechts matig verbreed en zijdelings samengedrukt. De klauwen der voortarsen bij het ♂ zijn slechts weinig verlengd en tamelijk slank. Aan de middeltarsen van het ♂ is de buitenste klauw veel breeder en iets langer dan de binnenste. Lengte 11–11½ mm. Zeldzaam in boschslooten; zij overwintert onder mos. (niger Lac.) 1. *Grapei* Gyll.

Dekschilden geel, tot op den naad en den zijrand na, zeer dicht, zwart gespikkeld 2

Halsschild met eene zwarte, dwars geplaatste middenvlek 3

Halsschild zonder zwarte, middenvlek 5

- 3 Prosternum zwart. Bovenzijde geel, de achterrand van den schedel, twee uitgerande voorhoofdsvlekken en eene dwars geplaatste middenvlek op het halsschild zwart; de dekschilden op den naad en den zijrand na, dicht ineenvloeiend zwart gespikkeld; de onderzijde geheel zwart, hoogstens het prosternaal-uitsteeksel en de achterranden der sterniten rood-

achtig. De mond, de geheele sprieten en de voor- en middelpooten roodgeel; de achterpooten grootendeels pekkruin. De eerste drie leedjes der voor- en middel-tarsen bij het ♂ matig verbreed en zijdelings samengedrukt. Klauwen der voortarsen bij het ♂ zeer ongelijk, de buitenste veel kleiner dan de binnenste. De klauwen der middel-tarsen bij het ♂ iets langer dan de klauwen der voortarsen, de binnenste iets korter dan de buitenste en van binnen duidelijk tweemaal gebogen. Lengte $11\frac{1}{2}$ –12 mm. Vrij zeldzaam in slooten, vijvers en poelen. (consersus Gylh., pulverosus Steph.) 2. **punctatus** Fourcr.

Prosternum geel 4

- 4 Dekschilden, op den naad en den zijrand na, zoodanig ineenvloeiend zwart gespikkeld, dat drie lichte langslijnen van de grondkleur duidelijk zichtbaar blijven. Achterlijf bij het ♂ zwart met roodachtige achterranden der sterniten, bij het ♀ geel en aan weerszijden zwart gevlekt. Sprieten en pooten roodgeel; de laatste sprietleedjes met bruinachtig uiteinde. De drie verbrede leedjes der voor- en middel-tarsen bij het ♂ breed, zijdelings niet samengedrukt. Voorklauwen bij het ♂ zeer ongelijk, de binnenste veel langer dan de buitenste en vlak aan de basis naar binnen krachtig getand. Aan de middel-tarsen bij het ♂ is de binnenste klauw slanker en korter dan de buitenste. Achtergedeelte van den kop, op de twee schedelvlekken na, het midden van de basis van het halsschild, eene dwarsgeplaatste middenvlek en veelal eene kleinere vlek aan weerszijden van deze, op het midden van het halsschild, zwart. Dekschilden bij het ♂ en het ♀ gewoonlijk glad, soms bij het ♀ echter op de voorhelft of tot achter het midden in meerdere of mindere uitbreiding met korte, diep ingekraste streepjes (♀ var. *virgulatus* Ill., *vermicularis* Fauvel). Lengte 10– $11\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam in slooten en op overstroemde weilanden. De ♀ var. *virgulatus* niet zeldzaam. (notatus F.) 3. **suturalis** Lacord.

Dekschilden zonder de geringste aanduiding van lichte langslijnen. Achterlijf geheel zwart. Sprieten geheel roodgeel. De voor- en middel-tarsen bij het ♂ verbreed en zijdelings samengedrukt, zoo ook het ♂ met even lange, slanke voorklauwen en zeer ongelijk breede middelklauwen. De buitenste klauw der middelpooten is bij het ♂ langer en nagenoeg dubbel zoo breed als de binnenste. Deze soort gelijkt overigens op *suturalis*. Lengte $10\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Noord- en Middel-Europa. In Westfalen bij Soest. (*infuscatus* Er.) (*notaticollis* Aubé)

5 Onderzijde geheel geel 6

Onderzijde grootendeels zwart 8

- 6 Lengte 10– $10\frac{1}{2}$ mm. Lichaam ovaal; de dekschilden zonder lichte langslijnen. Voor- en middel-tarsen bij het ♂ slank en zijdelings samengedrukt. De voorklauwen bij het ♂ veel langer dan het vijfde tarslid. Middelklauwen bij het ♂ veel korter dan het vijfde tarslid 7

Lengte 12–13 mm. Lichaam veel grooter en veel breeder rond; de dekschilden veelal met geringe aanduiding van drie gele langslijnen. De eerste 3 leedjes der voor- en middel-tarsen bij het ♂ veel sterker verbreed en zijdelings veel minder samengedrukt. De voorklauwen bij het ♂ korter dan het vijfde tarslid, slank en nagenoeg even lang; de middelklauwen breed en vrij kort, de binnenste smaller en sterker gekromd dan de buitenste. Niet inlandsch. Deze soort komt in Duitschland (Westfalen) en in Frankrijk voor . . . (conspatus St.)

- 7 Bovenzijde geel, de achterrand van den schedel en twee halvemaa-vormige voorhoofdsvlekken, bij ab.c. *insolatus* Aubé ook de basis van het halsschild in het midden zwart. Dekschilden, op den naad en den zijrand na, dicht zwart bestippeld. De geheele onderzijde, de mond, de sprieten en de pooten geel. Meestal zijn de sprietleedjes aan het uiteinde zwart. Voor- en middel-tarsen bij het ♂ matig verbreed en zijdelings samengedrukt. Klauwen der voortarsen bij het ♂ zeer lang en slank, even lang als de laatste 3 tarsleedjes tezamen of ten minste even lang als het vijfde lid, de binnenste iets korter dan de buitenste en van binnen een weinig dubbel gebogen. De middelklauwen bij het ♂ veel korter dan het vijfde tarslid, slank, slechts zeer weinig in breedte verschillend, de binnenste iets korter dan de buitenste. Zeer gemeen in slooten . . (adpersus Panz., collaris Payk.) 5. **exoletus** Forst.

Naverwant en wellicht slechts eene variëteit van *exoletus*. Het ♂ heeft veel kortere, slechts zeer weinig verlengde voorklauwen, kortere en breedere, nagenoeg even lange, doch ongelijk breede middelklauwen; het ♀ heeft altijd eene zwarte vlek in het midden van de basis van het halsschild. Bij Laag-Soeren, Nijmegen, Utrecht en Wolfhezen. Ook in België.

6. **latitans** Sharp.

- 8 Langwerpig-ovaal, de dekschilden achter het midden niet veel breeder dan aan de schouders. Habitus van *exoletus*. Bovenzijde geel, het achtergedeelte van den kop, behalve twee schedelvlekken, het midden van den voorrand en een naar de zijden versmalde of verkorte dwarsband aan de basis van het halsschild, zwart. De dekschilden, op den naad en den zijrand na, zeer dicht ineenvloeiend zwart gespikkeld, zonder lichte langslijnen. Prosternum geel, het meso- en metasternum en het achterlijf, behalve de roodachtige achterrand der sterniten, zwart. Sprieten en pooten roodgeel; het uiteinde der sprietleedjes bruinachtig. Voor-

en middeltarsen bij het ♂ matig sterk verbreed en zijdelings iets samengedrukt. Klauwen der voortarsen bij het ♂ lang en slank, nagenoeg even lang; aan de middeltarsen bij het ♂ zijn de klauwen veel korter en is de buitenste dubbel zoo breed en iets langer dan de binnenste. Bij een ♀ uit Nijmegen zijn kop en halsschild slechts aan de basis een weinig donker gekleurd en de sprieten geheel geel. Bij enkele wijfjes bemerkt men eenige aanduiding van langsstrepen aan de basis, naar de schouders toe, welke langsstrepen gevormd worden door eene meer grove sculptuur. Lengte 10—10½ mm. Verbreed, vooral in beidepoelen gemeen.

(bistriatus Er.) 4. **suturellus** Harris.

Kort en breed eivormig, de dekschilden naar achteren verbreed. Bovenzijde geel, het achtergedeelte van den kop, behalve twee schedelvlekken, en ook het midden van de basis van het halsschild, zwart. De dekschilden, op den maad en den zijrand na, zeer dicht ineenvloeiend zwart bespikkeld. Prosternum, behalve de epipleuren, geel; meso- en metasternum en de achtereoxae, behalve het midden, zwart; het eerste sterniet bruinrood, de volgende zwart met roodachtigen achterrand. Sprieten en pooten roodgeel, de laatste sprietleedjes aan het uiteinde bruinachtig. De eerste drie leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ vrij sterk verbreed, zijdelings weinig samengedrukt. Klauwen der voortarsen bij het ♂ vrij lang, de buitenste langer dan de binnenste en aan de basis sterk gekromd. Middeldklauwen bij het ♂ vrij kort en breed, de binnenste korter, smaller en sterker gekromd dan de buitenste. Lengte 9—9½ mm. Zeldzaam. Zutphen, Voorst en in de omstreken van Maastricht. Ook in België bij Antwerpen en Ridderborn.

(adspersus Fab.) 7. **bistriatus** Bergstr.

15. Colymbetes Clairv.

Halsschild aan de zijden niet gerand. Dekschilden met duidelijke, dichte dwarsrimpelige sculptuur. Metasternaal-voortzetting tusschen de middelcoxae aan het uiteinde slechts oppervlakkig gegroefd. Het overige als bij Rhantus. — De larve en de pop van C. fuscus zijn door Schödlé beschreven.

Van de 5 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

1 Tweede sterniet aan den achterrand zonder bijzondere sculptuur, doch zeer fijn en gewoon dicht langsrimpelig 2

Tweede sterniet aan weerszijden aan den achterrand, met korte, scherpe langsgroefjes, welke naar buiten door scherpkantige, naar het midden van het sterniet door breeder wordende tusschenruimten gescheiden zijn (stridulatie-orgaan?). Kop pekzwart, van voren roodachtig-geelbruin, het voorhoofd met twee roodachtige vlekjes. Halsschild roodachtig-geelbruin, in het midden met een meer of minder uitgebreiden, donkeren dwarsband. Dekschilden donker geelbruin, aan den basaalrand en aan de zijden geel. Epipleuren geel, zelden bruinachtig. Onderzijde, behalve de bruinroode achterranden der sterniten, zwart. Sprieten roodgeel, de leedjes gedeeltelijk bruin gevlekt, de tasters naar het uiteinde bruin. Voor- en middelpooten bruinrood, met pekbruine dijen, de achterpooten grootendeels pekzwart. De eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ matig verbreed, zijdelings samengedrukt en op de onderzijde met ronde zuignapjes bezet. Lengte 16—17 mm. Overal zeer gemeen 1. **fuscus** L.

2 Halsschild gewoonlijk bruinrood, aan den voor- en achterrand zwart, alsook meer of min in het midden met een zwarten dwarsband; bij uitzondering is het halsschild bruinrood met een dubbel, zwarten dwarsband in het midden. Dekschilden bruin, aan den basaalrand en aan den zijrand bruingeel. Epipleuren en onderzijde zwart. De wortel der sprieten en tasters rood. Pooten pekbruin. De dekschilden in beide seksen tamelijk fijn en dicht dwarsstrepig, glanzig. De eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ sterk verbreed, zijdelings niet samengedrukt, op de onderzijde van eene dichte, borstelige zool voorzien. Lengte 18—19 mm. Niet inlandsch. In Noord- en Middel-Europa; zij zou o. a. bij Hamburg en Düsseldorf voorkomen (striatus Payk., fuscus Aubé) (Paykulli Erichs.)

Halsschild in het midden met een vrij scherp begrensden, zwarten dwarsband. Smaller, vlakker en lichter gekleurd dan de beide vorige soorten. Epipleuren en pooten geheel geel. Het midden van het halsschild bij het ♂ lijner, bij het ♀ krachtiger, dicht en verward rimpelig. De dekschilden bij het ♂ en ♀ met ongelijke sculptuur, bij het ♂ duidelijk krachtiger dwars-gestreept dan bij de vorige soorten, glanzig, bij het ♀ met veel krachtiger, met het ongewapende oog duidelijk zichtbare dwarsstrepen, zijdeglanzig. De eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen bij het ♂ vrij sterk verbreed en slechts weinig samengedrukt, op de onderzijde met ronde zuignapjes bezet. Lengte 17—18 mm. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland, o. a. bij Bremen (Bogmanni Gyll.) (striatus L.)

V. Tribus DYTISCINI.

16. Hydaticus Leach.

Derde sprietlid nagenoeg even lang als het tweede. Zijdelengels van het metasternum smal, hun buitenrand nagenoeg recht. Achterschenen vrij lang, met toegespitste eindsporen. De eerste 4 leedjes der achtertarsen aan den geheelen toprand dicht met korte wimpers bezet. Bij het ♂ zijn de voorschenen zeer kort, driehoekig, zonder eindsporen. De zuigschijven bij het ♂ met niet zeer vele, vrij groote, naar het uiteinde kleiner wordende zuignapjes bezet; aan de basis der zuigschijven bevinden zich 3 of 4 in 't oog vallend grootere zuignappen. De eerste drie leedjes der middeltarsen bij het ♂ verbreed en op de onderzijde eveneens met vrij groote, ronde zuignapjes bezet.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Basis van het halsschild met een breeden zwarten dwarsband. Lichaam langwerpig ovaal . . . 2

Basis van het halsschild hoogstens met een zeer lijnen, onduidelijken zwarten zoom. Lichaam kort eirond, roodgeel, de achterrand van den schedel zwart. Dekschilden met zwarten naad en met eenige, door gele lijnen gescheiden, zwarte langsstrepen, van welke de buitenste meer of minder geel bespikkeld zijn; 2 of 3 gele langslijnen komen sterker uit. Bij het ♀ is het halsschild aan weerszijden oppervlakkig langsrimpelig. Klauwen der voortarsen bij het ♂ niet langer dan bij het ♀, slank en gekromd. Lengte 11 mm. Niet inlandsch. Deze soort zou in België bij Angleur gevangen zijn. Ik zag het exemplaar niet . . . (grammicus Germ.)

- 2 Dekschilden zonder gelen dwarsband achter de basis, hoogstens naast het schildje met een geel vlekje. Kop en halsschild roodgeel, het achtergedeelte van den kop, behalve twee schedel-vlekken en een zeer breede, naar voren over het midden uitgebreide dwarsband aan de basis van het halsschild zwart. Dekschilden zwart, met een gelen, naar achteren veelal gedeelden zijband, zelden nog naast het schildje met een geel vlekje. Onderzijde grootendeels zwart, het derde tot vijfde sterniet aan weerszijden meer of minder duidelijk rood gevlekt. Voor- en middelpooten bruinrood, de achterpooten pekbruin. Klauwen der voortarsen bij het ♂ matig verlengd, voor de basis sterk gekromd en dan naar het uiteinde tamelijk recht. Bij het ♀ aan weerszijden op het halsschild en aan weerszijden voor het midden der dekschilden met eenige diep gegroefde, onregelmatige rimpeltjes. Lengte $14\frac{1}{2}$ —15 mm. Verbreid doch zeldzaam. Dikwerf op den grond liggende gevangen. . . . (Hübneri F.) 1. **seminiger** de Geer.

Dekschilden achter de basis met een gelen dwarsband, of ook nog met gele langslijnen. . . 3

- 3 Dekschilden zwart, met een gelen, doorlopenden, zelden in vlekjes (abc. *degeneratus* Westh.) opgelosten dwarsband achter de basis, en met een gelen zijband, ongeveer als bij *seminiger*. Deze soort is kleiner dan *seminiger* en onderscheiden door de zeer duidelijke, fijne en verspreide bestippeling der dekschilden. De buitenste klauw der achterschenen is nauwelijks half zoo lang als de binnenste. Bij het ♂ zijn de voorklauwen veel korter dan bij *seminiger* en naar het uiteinde duidelijk gekromd. Bij het ♀ vertoont het halsschild aan weerszijden eenige diep gegroefde, onregelmatige rimpeltjes. Lengte $12\frac{1}{2}$ —13 mm. Gemeen in helder water. De abc. *degeneratus* zeer zeldzaam 2. **transversalis** Pontopp.

Dekschilden zwart, met een breeden, van achteren gedeelden, gelen zijband en vijf gele, achter de basis door een smallen dwarsband vereenigde langslijnen, van welke de buitenste van voren in kleine vlekjes is opgelost. Overigens met *transversalis* overeenkomend. De naadhoek der dekschilden is bij het ♀ duidelijk uitgetrokken. Bij het ♀ aan weerszijden van het halsschild en aan weerszijden op het voorste gedeelte der dekschilden met eenige diep gegroefde, onregelmatige rimpeltjes. Buitenste achterklauw het midden der binnenste nauwelijks overschrijdend. Klauwen der voortarsen bij het ♂ sterk verlengd, voor de basis zeer sterk gekromd, naar het uiteinde recht. Lengte 13—14 mm. Niet inlandsch. In Noord-Duitsland bij Oldenburg; ook in Westfalen (stagnalis F.)

17. Graphoderes Thomson.

Derde sprietlid bijna dubbel zoo lang als het tweede. Dekschilden in beide seksen glad, bij het ♀ niet gegroefd. De zijdelengels van het metasternum, voor het uiteinde naar binnen duidelijk verbreed en aan den buitenrand sterk afgerond. Achterschenen kort, hare eindsporen aan den top afgeknut en min of meer uitgerand of iets gevorkt. De eerste 4 leedjes der achtertarsen aan den geheelen toprand dicht met korte wimperharen

bezet. Bij het ♂ zijn de middeltarsen duidelijk verbreed en met duidelijke zuignapjes bezet. Van de 6 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Epipleuren der dekschilden naast het tweede en derde sternier iets breeder dan naast het eerste. Dekschilden naar achteren met eenigszins vlak uitgebreiden, zeer scherpkantigen zijrand. Lichaam breed-ovaal, achter het midden het breedst, vlak gewelfd, geel. De schedel met zwarten achterrand, twee hoekige, samenkomende dwarsbanden en een zwart vlekje tegen de oogen. Halsschild onmiddellijk aan voor- en achterrand met een smallen, zwarten dwarsband. De dekschilden, behalve de zijrand, dicht, ineenvloeiend zwart bespikkeld. Zuigschijven bij het ♂ met 3 grootere en ongeveer 30 kleinere zuignapjes. De 3 verbreedde leedjes der middeltarsen bij het ♂ met twee rijen, elk van 7 zuignapjes. Lengte 14½ mm. Verbreed, doch niet gemeen. 1. *bilineatus* de Geer.
- Epipleuren der dekschilden naar achteren geleidelijk versmald. 2
- 2 Metasternum tusschen de middel- en achtercoxae smaller dan de middeldijen. De eerste drie leedjes der middeltarsen bij het ♂ verbreed en op de onderzijde met zuignapjes bezet. . . 3
- Metasternum tusschen de middel- en achtercoxae even zoo breed als de middeldijen. Middeltarsen bij het ♂ gewoon, zonder zuignapjes. Deze soort gelijkt overigens op *zonatus* en *cinerus*, doch bij het ♀ zijn de rimpelige langsgroefjes van het halsschild nauwelijks aangeduid. Het lichaam is iets langer eivormig dan bij *cinerus* en de beide zwarte dwarsbanden van het halsschild bevinden zich altijd onmiddellijk aan den voor- en achterrand. Zuigschijven bij het ♂ in het geheel slechts met 15 zuignapjes. Klauwen der voortarsen bij het ♂ verlengd en iets ongelijk. Lengte 13 mm. Niet inlandsch. In Middel-Europa. Zij zou bij Löhne in Westfalen gevangen zijn. Ook in de Rijnprov. (*austriacus* St.).
- 3 Smaller rond en meer gewelfd dan *bilineatus*, de dekschilden naar den zijrand niet vlak uitgebreid. Halsschild met een minder breeden, gelen middenband; de voorste zwarte dwarsband is meestal door een smallen, gelen zoom van den voorrand gescheiden; de achterste zwarte dwarsband is aan de basis, aan weerszijden versmald en afgekort, veelal een smallen, gelen basaalrand vrij latend; de basis van het halsschild aan weerszijden, binnen de meer spits uitgetrokken achterhoeken, iets uitgebogen. Halsschild bij het ♀ aan weerszijden met eenige vrij scherpe, naar het midden meer golvende langsgroefjes. Zuigschijven bij het ♂ met 3 grootere en 32—35 kleinere zuignapjes. De 3 verbreedte leedjes der middeltarsen bij het ♂ met 16—22 zuignapjes, van welke ten minste twee buiten de twee normale, elk uit 7 zuignapjes bestaande rijen staan. De buitenste achterklauw bij het ♀ overschrijdt iets het midden van de binnenste. Lengte 13½—14½ mm. Over het algemeen zeldzaam. Exemplaren, welke alleen aan den voorrand van het halsschild geel gezoomd zijn (*abc. interjectus* Westh.) en zulke met geheel zwarten voorrand, werden met het type gevangen. 2. *zonatus* Hoppe 1)
- Korter en breeder, met de grootste breedte iets meer achter het midden; de basis van het halsschild binnen de stompere achterhoeken slechts zeer weinig uitgebogen. Overigens zeer op *zonatus* gelijkende. De zuigschijven bij het ♂ met wat minder kleinere zuignapjes, ongeveer 28; de middeltarsen bij het ♂ met twee regelmatig rijen, elk van 7 zuignapjes. De buitenste achterklauw bij het ♀ het midden der binnenste overschrijdend. De beide zwarte dwarsbanden van het halsschild bevinden zich gewoonlijk onmiddellijk aan den voor- en achterrand; zelden is de voorrand (*abc. intermedius* Westh.), soms ook de achterrand (*abc. simulator* Westh.) geheel smal geel gezoomd. Lengte 14—15 mm. Niet zeldzaam in helder water. De *abc. intermedius* in Limburg 3. *cinerus* L.

18. Acilius Leach.

Fig. 14. Dekschild van *Acilius*. ♀ Orig.

Dekschilden in beide seksen dicht bestippeld; bij de echte *Acilius*-soorten hebben de wijfjes op de dekschilden dicht behaarde, breede groeven (Fig. 14) 2). De aan den rand lang beweimperde zuigschijven van het ♂ hebben een zeer grooten zuignap aan de basis, twee veel kleinere daarvoor en zeer vele, dicht opeengedrongen, zeer kleine en lang gesteelde zuignapjes aan de hoeken. Middeltarsen bij het ♂ niet of slechts zeer zwak verbreed, hoogstens met uiterst kleine zuignapjes bezet. Overigens als bij *Graphoderes*. Het lichaam der soorten van dit genus is breed-ovaal, zeer vlak gewelfd. — De larve en de pop van *A. sulcatus* zijn door Rösel, de Geer en Schödtle beschreven.

1) Volgens Latreil slechts een variëteit van *G. cinereus*.

2) Bij het niet in Nederland vertegenwoordigde sub-genus *Homoeolytus* Gobert zijn de dekschilden evenals bij het mannetje ongegroefd.

Volgens Meinert zou Rösel niet de larve van *A. sulcatus*, maar van *canaliculatus* beschreven hebben en zou de larve van de Geer niet tot *Acilius* behooren.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Achterlijf zwart, het tweede tot zesde sterniet aan de zijden geel gevlekt en aan den achterrand meer of minder uitgebreid roodgeel gezoomd. Achterdijen geel, aan de basis zwart gevlekt. Halsschild bij het ♀ doffer dan bij het ♂ en aan weerszijden met een dicht behaarden, oppervlakkigen indruk. De vlakke, breede, naadrib der dekschilden bij het ♀ is naar achteren versmald, de tweede en derde rib in het midden nauwelijks naar buiten gekromd. Lengte 16½—17½ mm. Zeer gemeen in staande wateren. Volgens Brischke zou het ♂, wanneer het stil zit, herhaaldelijk door het in- en uitstroomen van lucht door de tracheën, een brommend geluid voortbrengen. 1. *sulcatus* L.

Achterlijf geheel geel of slechts aan de basis der sterniten donkerder; zeldzamer is de geheele onderzijde geel. Achterdijen geheel geel. Halsschild bij het ♀ hoogstens met geringe aanduiding van een behaarden indruk. De naadrib der dekschilden bij het ♀ naar achteren nagenoeg niet versmald, de tweede en derde rib der dekschilden bij het ♀ in het midden naar buiten gekromd, de derde en vierde in het midden elkaar genaderd. Deze soort gelijkt overigens op *sulcatus*, doch is iets kleiner en smaller. De zwarte teekening op het voorhoofd is minder scherp aangeduid. Lengte 14—15 mm. Zeldzamer.

(fasciatus Fr.) 2. *canaliculatus* Nicol.

19. Dytiscus L.

Kop voor de oogen met een duidelijken dwarsnaad. Sprieten lang, draadvormig. Bovenlip van voren min of meer uitgerand. Voorkaken kort en krachtig, aan het einde uitgesneden. Clypeus geheel geel. Oogen groot, eenigszins uitpuilend. Lichaam groot, de dekschilden langwerpige-eivond, de grootste breedte meer in dan achter het midden, vlak gewelfd. Stigmata zeer groot, het laatste stigma zeer breed. Epipleuren der dekschilden gewoon. Eindsproten der achterschenen lang en slank. De eerste 4 leedjes der achtertarsen aan den teprand niet bewimperd. Alle tarsen met twee even lange bewegelijke klauwen. Laatste sterniet aan het uiteinde duidelijk uitgerand. Bij het ♂ zijn de achterschenen aan den binnen- en buitenrand, bij het ♀ slechts aan den buitenrand met lange wimperharen bezet. Achtertarsen bij het ♂ eveneens aan weerszijden, bij het ♀ slechts aan den binnenrand met lange wimperharen bezet. Voor- en middel-dijen bij het ♂ aan de basis met een bundel wimperharen. Middelschenen en middel-tarsen in beide seksen, aan den buitenrand met lange zwemharen bezet. Voorschenen bij het ♂ kort en breed, aan den buitenrand voor de basis sterk gekromd, aan het uiteinde zonder eindsproten, op de rugzijde met eene gladde, driehoekige, door lange wimperharen ingesloten ruimte. Zuigschijven bij het ♂ rondachtig, aan den rand dicht bewimperd, aan de basis met een zeer grooten en een iets kleineren, ronden zuignap; bovendien met een zeer groot aantal zeer kleine, dicht opengedrongen zuignapjes bezet (Fig. 15). De eerste 3 leedjes der middeltarsen bij het ♂ verbreed en op de onderzijde met een zeer groot aantal kleine zuignapjes borstelachtig bezet. Dekschilden bij het ♀ met tien tot aan het midden of tot over het midden reikende langsgroeven. Bij sommige soorten komen naast gegroefde, ook arrhenoïde 1) wijfjes voor. Ook zouden er zijn, die als het ware den overgang vormen tusschen de gladde en de gegroefde vormen, waar nl. de langsgroeven rudimentair zijn; mij is zulks onbekend. Het ♂ zou evenals bij

Fig. 15. Zuigschijf der voortarsen van *Dytiscus* ♂.
Naar Imhoff.

Acilius een brommend geluid voortbrengen. — De soorten van dit genus zijn zwartgroen of olijfgroen, met gele zijranden van halsschild en dekschilden.

In den winter of in het voorjaar planten de *Dytiscus*-soorten zich voort. Het ♀ legt volgens Régimbart een aantal gele eieren aan stengels van waterplanten, in eene insnijding, welke zij met hare hoornachtige legboor maakt. Na 12 dagen kruipen de larven uit, welke veel gelijken op die der *Carabidae* en zeer waatzuchtig

1) D. i. met het kleed der mannetjes.

*zijn. Zij maken slangachtige bewegingen: haar lichaam is lang en naar het uiteinde versmald. Bij gebrek aan voedsel grijpen zij elkander aan. Zij ademen, door het achterlijf boven water te houden. — Merkwaardig is de vorming van den mond; eene eigenlijke monddoening hebben zij niet, doch de voorkaken zijn in de lengte doorboord en vertoonen aan het uiteinde eene spleetvormige opening. Daarmede zuigen zij haren buit uit en de sappen vloeien door eene vereenigingsbuis (de slokdarm) naar het spijsverteringskanaal. — Na eenige vertellingen zijn zij tegen het midden van den zomer, of wel eerst tegen den herfst volwassen. Zij graven dan holen langs oevers en verpoppen daarin. Die larven welke nog gedurende den zomer hare metamorfose voltooien, kruipen na 3 weken uit. — De jonge kever is in 't eerst nog witachtig en blijft nog in zijne holte; na 8 dagen is hij uitgekleurd en hard, gaat dan te water, waarin hij ook overwintert. De poppen welke overwinteren, komen in 't voorjaar uit. De larve en de pop van *D. marginalis* is beschreven door Rösel, Schödtte en anderen. De larven van *D. circumflexus* en *dimidiatus* zijn zeer kort en onvolledig door Altum beschreven. Over de vermoedelijke larve van *D. latissimus* deelde Preudhomme de Borre iets mede.*

Van de 9 Europeesche soorten komen 7 in Nederland voor.

1. Lichaam zeer breed eivormig. Dekschilden aan de zijden zeer sterk afgerond, met sterk verbreedten, scherpkantigen, vlak afgezetten zijrand. Bovenlip slechts zwak uitgerand. (Sub-gen. *Dytiscus* Lsp.). Bovenzijde groenachtig-zwart, de clypeus, de mond en de sprieten geel. Halsschild aan alle randen breed geel omzoomd, de dekschilden binnen den breed afgezetten, aan den buitenrand geel doorschijnenden zijrand met eene, van voren bredere, gele zijstreek en voor het uiteinde met een gelen dwarsband. Bovenzijde bij het ♂ glanzig. Het ♀ is op de bovenzijde tamelijk dof, de dekschilden zijn over het grootste gedeelte gegroefd, de binnenste 4 groeven op den bodem geel. Aanhangsels der achtercoxae toegespitst. Lengte 37—43 mm. In groote heideplassen, vennen en vijvers. Zeer zeldzaam. Nijmegen, Zutphen, Tilburg, Rijsbergen bij Breda, Oosterwijk, 's-Graveland en Ankeveen, Ulenpas bij Hoogkeppel en in de omstreken van Roermond. Ook in België bij Calmthout, Maeseyck en Hasselt en in de Rijnprov. bij Düsseldorf en Elberfeld. 1. *latissimus* L.
- Lichaam lang eivormig. Dekschilden aan de zijden slechts matig afgerond, met smallen of onduidelijk afgezetten zijrand. Bovenlip in het midden dieper uitgerand (Sub-gen *Macrodytes* Thoms.) 2
- 2 Aanhangsels der achtercoxae aan het uiteinde afgerond 3
- Aanhangsels der achtercoxae spits 4
- 3 Onderzijde geheel zwart of pekbruin. Lichaam smal, achter het midden zeer weinig verbreed. Halsschild en dekschilden aan de zijden breed geel gezoomd; halsschild aan den voorrand, zeldzamer ook aan den achterrand zeer smal roodachtig, de dekschilden aan het uiteinde ineenvloeiend geel bespikkeld. Pooten bruin, de voorpooten niet zelden roodbruin. Bij het ♂ is de bovenzijde glanzig, de dekschilden zijn op de achterhelft langs den zijrand iets gegroefd. Het ♀ op de bovenzijde tamelijk dof, de dekschilden tot over het midden gegroefd. Lengte 26—30 mm. Zeer verbreid en in sommige provinciën niet zeldzaam, vooral in de heidestreken. Eenmaal bij den Haag in een duinplasje. 2. *punctulatus* F.
- Onderzijde geelachtig of licht roodbruin. Lang ovaal. Halsschild aan de zijden breed geel omzoomd, aan den voor- of ook aan den achterrand smal roodgeel; de dekschilden met breedten gelen zijrand en met een smallen, bochtigen, geel spikkeligen dwarsband voor het uiteinde. Pooten roodgeel. Bij het ♀ zijn de dekschilden tot over het midden gegroefd. Lengte 32—37½ mm. Verbreid en niet zeldzaam 3. *dimidiatus* Bergstr.
- 4 Aanhangsels der achtercoxae kort toegespitst, met convexen binnenrand. Ovaal. Halsschild aan alle randen breed geel omzoomd; de dekschilden met breedten gelen zijrand en zwak geelachtig spikkelig uiteinde. Onderzijde en pooten geel, het metasternum in het midden bruin of zwartachtig. Bij het ♀ zijn de dekschilden tot aan het laatste derde gedeelte gegroefd; bij een zeldzamer voorkomenden vorm (♀ var. *conformis* Kunze) zijn de dekschilden glanzig en ongegroeft, naar het uiteinde echter iets sterker en dichter bestippeld dan bij het ♂; ook is het halsschild minder dof dan bij het gegroefde ♀ en veel lijner en meer verspreid bestippeld. Lengte 30—33 mm. Overal zeer gemeen. De ♀ var. *conformis* bij den Haag en Wageningen 4. *marginalis* L.
- Aanhangsels der achtercoxae in eene langere of kortere spits uitgetrokken, met concaven binnenrand 5

5 Aanhangsels der achtercoxae in eene korte, niet naaldevormige, spits uitgetrokken, welke van af de inkerving tot aan het uiteinde, niet langer is dan de voortzetting vóór de inkerving breed. Oogen geelrood omzoomd; de onderzijde ongevlekt, het schildje donker. Het ♀ gewoonlijk glad, met dof, zeer fijn verspreid bestippeld halsschild; zelden zijn de dekschilden tot over het midden gegroefd (♀ var. *circumscriptus* Boisd., *dubius* Gyllh.) Lengte 29—35 mm. Over het algemeen zeldzaam. De ♀ var. *circumscriptus* bij Winterswijk, Oisterwijk en Laag-Soeren 5. *circumcinctus* Ahr.

Aanhangsels der achtercoxae in eene naaldevormige spits uitgetrokken, welke van af de inkerving tot aan het uiteinde, even lang of langer is dan de voortzetting vóór de inkerving breed. Schildje geel (zelden onduidelijk) gevlekt. 6

6 Halsschild met nagenoeg rechte zijden en spitse achterhoeken. Aanhangsels der achtercoxae naar achteren weinig divergeerend. Oogen niet geelrood omzoomd. Onderzijde van het lichaam geel, het midden van het metasternum en de achterranden der sterniten zwartachtig; de eerste sterniten aan weerszijden van de basis met een meer of minder uitgebreiden, zwarten dwarsband. Schildje meer of minder duidelijk geel gevlekt. Lichaam lang-ovaal, iets meer gestrekt en vooral naar achteren smaller dan bij *circumcinctus*, op de bovenzijde gewoonlijk meer donker olijfgroen. Het ♀ is eveneens glad en glanzig, met iets dof, zeer fijn verspreid bestippeld halsschild, of wel (♀ var. *dubius* Serv., *perplexus* Lacord.) is het dof, met vrij krachtig en dicht bestippeld halsschild en tot over het midden gegroefde dekschilden. Lengte 29—33 mm. Gemeen in slooten. Ik zag uit Nederland nagenoeg uitsluitend gegroefde wijfjes. Het eenige gladde ♀ dat ik ken, werd bij Wijmandrade in Zuid-Limburg gevangen. De gladde wijfjes schijnen in België gemeen te zijn, de gegroefde daarentegen wat zeldzamer. Ik zag gladde wijfjes uit Ixelles, Grammont, Luik en Ridderborn nabij de Limburgsche grens 6. *circumflexus* F.

Halsschild met iets meer afgeronde zijden en meer rechte achterhoeken. Aanhangsels der achtercoxae naar achteren sterker divergeerend. Oogen breed geelrood gezoomd. Onderzijde van het lichaam geel, het metasternum en de sterniten min of meer zwartachtig gevlekt. Schildje geel of geel gevlekt. Lichaam langwerpig-ovaal, op de bovenzijde olijfgroen of bruinachtig, het halsschild aan alle randen zeer breed geel gezoomd, soms geel met drie zwarte middenvlekken (ab.c. **disjunctus* Camerano), de dekschilden met breeden gelen zijrand en met zeer vele fijne, gele, soms onduidelijke langlijnen. Het ♂ is glanzig en glad, de dekschilden naar het uiteinde vrij sterk en verspreid bestippeld; het ♀ gewoonlijk dof, het halsschild fijn en zeer dicht bestippeld, de dekschilden, op het laatste derde gedeelte na, gegroefd, tusschen de groeven fijn en dicht, aan het uiteinde grof en vrij dicht bestippeld. Zelden is het ♀ (♀ var. **septentrionalis* Gyllh.) op de bovenzijde glanzig, met meer dof, fijner en verspreid bestippeld halsschild en met naar het uiteinde sterker en dichter, dan bij het ♂, bestippelde dekschilden. Lengte 24—28 mm. Eenmaal een ♀ bij Lochem, Juni. Zij komt overigens meer in Noord-Oostelijk Duitschland, Denemarken en Skandinavië voor.

7. *lapponicus* Gyllh.

20. *Cybister* Curtis.

(*Trogus* Leach) 1)

Lichaam omgekeerd eivond, de grootste breedte achter het midden, tamelijk vlak. Sprieten draadvormig, dun. Bovenlijf van voren duidelijk uitgerand. Voorkaken krachtig ontwikkeld, kort, naar het uiteinde tweedandig. Kintand gewoon. Schildje spits driehoekig. Epipleuren der dekschilden op het midden enigszins omgebogen. Voortzetting van het prosternum tegen het metasternum spits. Stigmata klein, rond, de twee laatste kleiner dan de voorafgaande. Achterschienen aan den binnen- en buitenrand, de achtertarsen eveneens aan den binnen- en buitenrand (bij uitheemsche soorten gewoonlijk bij het ♀ alleen aan den binnenrand) met lange zeemharen bezet. Achterschienen zeer kort en breed, nauwelijks half zoo lang als de dijen, de toprand zeer sterk hoekig uitstekend, hare eindsporen zeer ongelijk, de onderste zeer sterk verbreed, meer dan dubbel zoo breed als de bovenste. De eerste 4 ledjes der achtertarsen aan den toptand onbewimpeld. Het laatste lid der achtertarsen bij het ♂ altijd slechts met een onbewegeelijken klauw, bij het ♀ van eenige uitheemsche soorten nog met een rudimentairen tweeden klauw. Voor- en middelschienen en middel-tarsen aan den buitenrand met lange zeemharen bezet. Zuigschijven aan de voortarsen bij het ♂ zeer groot, breed ovaal, aan den rand dicht bewimpeld en op de onderzijde voor de basis met eene dichte, borstelachtige haarzool en daarvoor met

1) De naam *Trogus* werd aan een Hymenoptera-genus gegeven.

4 dwarsrijen van kleine gesteelde zuignapjes bezet. Dekschilden bij het ♂ veelal met een eigenaardige sculptuur, uit fijne, in de lengte gerichte naaldkrassen bestaande.

Van de 4 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Ovaal, achter het midden het breedst, vlak gewelfd, de bovenzijde zwartgroen. Halsschild met breedten gelen zijrand, aan den voor- en achterrand smal roodachtig. Dekschilden met eene gele, naar achteren versmalde en van den, naar het uiteinde smal geel gezoomden, zijrand afstaande zijstreep; de epipleuren, behalve het basaalgedeelte, gewoonlijk donker, soms geheel geel. Spriet en de onderzijde, behalve het bruinachtige midden van het metasternum, en de pooten geel; middelarsen, achterschenen en achtertarsen pekbruin. Bovenzijde bij het ♂ glanzig glad, bij het ♀ op het halsschild met lijne onregelmatige, op de dekschilden, behalve aan het uiteinde, met eene ingekraste langsstreepige sculptuur. Dekschilden met drie, bij het ♂ duidelijke, bij het ♀ zeer zwak aangeduide stippelrijen. Middellauwen bij het ♂ langer dan bij het ♀ en ongelijk. Lengte 29—35 mm. Verbreid, doch overal zeldzaam; in vijvers en groote plassen. De larve is beschreven door Rüsel en Schädte; ook de pop door Rüsel 1). (Roeselii Fuessly, virens Müll.) 1. *laterimarginalis* de Geer.

VI. Familie GYRINIDAE.

De Gyrinidae of „Draaikevertjes” komen in habitus en levenswijze met de Dytiscidae overeen, doch vertoonen in den lichaamsbouw ook eenige verwantschap met de Parnidae, door welke de groep der Caraboidea aan die der Hygrophili aansluit. Het lichaam is eivormig; op de bovenzijde meer of minder sterk gewelfd, zwart of blauwzwart, zelden eenigszins groenachtig, min of meer metaalglanzig of met koperkleurigen weerschijn; meestal met regelmatige stippelrijen op de dekschilden of fijn en dicht bestippeld (*Orectochilus*). — De zijrand van den kop verdeelt de oogen middendoor, zoodat zij eigenlijk in 't geheel 4 oogen hebben, nl. 2 aan de bovenzijde en 2 aan de onderzijde; daardoor kunnen zij gelijktijdig naar boven en in de diepte zien (Fig. 16). De kop is tot aan de onderste oogen in het halsschild verzonken. — Spriet en onder den zijrand van het voorhoofd, achter den wortel der voorkaken ingeplant, zeer kort, 11-ledig, het eerste lid half-kogelvormig en bekervormig uitgehold, het tweede oortvormig en aan den rand bewimperd; de 9 volgende leedjes, een kort gedrongen knots vormend, waarvan de laatste leedjes veelal geheel met elkaar versmolten zijn, zoodat de sprietknots daardoor uit 6 of 7 duidelijke leedjes bestaat (Fig. 17). De spriet knuts in de rust tusschen de beide

Fig. 16. Kop en prothorax van *Gyrinus*, van ter zijde gezien. Naar Ganglbauer-Gewyngd.

Fig. 17. Spriet van *Gyrinus*. Orig.

de tastervormige achterkaakslob. Onderlip diep uitgerand. Kin zeer groot, in het midden breed en diep rechthoekig uitgesneden. Tong groot, hoornachtig, afgeknot of tweemaal uitgebogen. De tasters dragende stukken der lip tasters liggen vrij in de uitsnijding van de kin, aan de basis der tong en doen zich voor als wortelleedjes der 3-ledige, daardoor schijnbaar 4-ledige lip tasters. Het derde lip taster-lid is groot, aan het uiteinde afgestompt of iets bijlvormig met afgeknotten top. — Schildje

Fig. 18. Onderzijde van *Gyrinus*. Naar Ganglbauer.

- 4) Volgens Crotch zou deze soort nog een tweede stridulatie-organ hebben, bestaande uit eenige ribben in de uitholling achter de achtervleugels, waarover een hyst, op de onderzijde der achterdijen, gestreken wordt.

duidelijk zichtbaar, scherp driehoekig, vrij liggend of door de basis van het halsschild overdekt. — De dekschilden sluiten met de epipleuren volkomen aan de zijden van het lichaam, het uiteinde van het achterlijf echter onbedekt latend, aan het uiteinde gewoonlijk afgeknor. De dijgroef, welke schuin over de episternen en epimeren van den mesothorax en over het voorste gedeelte van de episternen van den metathorax verloopt, zet zich op de epipleuren der dekschilden voort. Achter deze groef steekt de binnenrand der epipleuren gewoonlijk als een stompe rand uit, die in eene zakvormige uitholling van de bij gesloten dekschilden overdekte zijden der episternen van den metathorax ingrijpt.

De steeds ontwikkelde achtervleugels komen in nervatuur met die der Dytiscidae overeen, het naast met die van *Laccophilus*. Het gewricht is echter verder van de vleugelpunt verwijderd en de groote „binnenste ruit” is nagenoeg in het midden van den vleugel gelegen. Eene zwarte pigmentvlek bevindt zich boven de binnenste ruit, evenals bij *Laccophilus*. De vena externo-media vormt, alvorens zij de twee, het groote „oblongum” omsluitende dwarstakken afgeeft, een stomp, naar den voorrand open hoek. Het „wigvormige vakje” is niet geheel ontwikkeld. De vierhoekige pigmentvlek in de area interno-media ontbreekt. De anaal-lis is groot. — Onderzijde geheel glanzig, in de middellijn eenigszins dakvormig gewelfd. De voorste coxaal-holten van achteren open. Mesosternum buitengewoon ontwikkeld, ruitvormig. Metasternum evenals bij de Dytiscidae kort, zonder een, door een dwarsnaad afgescheiden, ante-coxaalstuk. Achterlijf met 8 tergiten en 7 sterniten, van welke de eerste drie sterniten vergroeid zijn en slechts naast de achtercoxae door een rudimentaire naad gescheiden blijven; daardoor schijnt het alsof slechts twee vergroeide sterniten voorhanden zijn. Het eerste sterniet staat tegenover het tweede tergiet. Aan het uiteinde van het achterlijf bevinden zich twee uitstekende of min of meer teruggetrokken genitaal-platen met haartjes bezet. De forceps is symmetrisch. — Voorpooten lang en slank, alle tarsen 5-ledig. Voortarsen zijdelings sterk samengedrukt, met dicht opeengedrongen leedjes en met twee slanke, kromme klauwen. Bij het ♂ zijn alle voortarsen-leedjes meer of minder verbreed en aan de onderzijde overal of gedeeltelijk met kleine zuignapjes bezet. De voorpooten zijn geschikt tot vastgrijpen. De middel- en achterpooten zijn tot zwemmen ingericht, kort en sterk samengedrukt, vinvormig, hunne tarsen aan de buitenzijde met zwemharen bezet. De achtercoxae raken aan elkaar en zijn tot aan den zijrand van het lichaam ontwikkeld en daardoor onbewegeijk.

De Gyrinidae leven in zoet water van roof; zij voeden zich met allerlei kleine waterdiertjes als wormen, larven enz. Zij zwemmen met den kop horizontaal. Bij slecht weder en wanneer het donker is houden zij zich in de diepte op tusschen waterplanten en leggen zich als 't ware met hunne voorpooten ten anker. *Orectochilus villosus* leeft in snel stroomend water en houdt zich over dag meestal op onder houtwerk, als molenraden, sluisdeuren enz. — Zij zwemmen reeds in de eerste voorjaarsdagen rond, meestal in groote kringen, zich koesterende in de zon; zij komen dan op eens in aantal bijeen, om daarop weder uiteen te gaan en opnieuw grootere of kleinere kringen te beschrijven. Wil men ze vatten of worden zij op eenige andere wijze gestoord, dan gaan zij uiteen en verdwijnen in de diepte, om spoedig weder terug te keeren en hun spel te hervatten. Deze bewegingen herinneren aan het dansen der muggen. — Wanneer men ze aanraakt, scheiden zij eene vluchtige, onaangenaam riekende, melkachtige vloeistof af. Zij verplaatsen zich soms in massa en verschijnen dan zelfs in bassins, die meermalen in het jaar drooggelegd zijn. — De ademhaling geschiedt geheel anders dan bij de Dytiscidae. Wanneer zij duiken nemen zij de lucht mede, in den vorm van eene aan het uiteinde van het achterlijf zich bevindende zilverglanzige bel, die met de onder de dekschilden zich bevindende lucht in verbinding staat. Tot aanhechting van dit luchtleed zonderen zij eene olieachtige stof af. Is de lucht verbruikt, dan komen zij aan de oppervlakte en roeien met de twee achterste paren der pooten, terwijl de Dytiscidae alleen met het derde pooten-paar roeien. — In het voorjaar leggen de wijfjes, die iets grooter en breeder zijn dan de mannetjes en in 't algemeen iets grovere stippelrijen op de dekschilden en minder ontwikkelde voortarsen hebben, hare witgele eieren in rijen onder water aan waterplanten.

De larven der Gyrinidae zijn volgens *Schindte* scolopender-vormig, hebben lange pooten, elk met twee klauwen. Aan weerszijden van den gestrekten kop met 6, deels op de onderzijde, deels op de bovenzijde staande ocellen en met 4-ledige, borstelvormige sprieten. De mond is gesloten, doch de voorkaken zijn sikkelvormig en uitgehold en dienen tot het uitzuigen van hare prooi. Kaaktasters 4-ledig; liptasters 2-ledig. Achterlijf uit 9 sterniten bestaande, waarvan de eerste 3 aan weerszijden van een lang toegespitst gevederd aanhangsel, het negende sterniet van 2 paar dergelijke aanhangsels voorzien zijn. Deze aanhangsels staan met tracheën-stammen in verbinding en moeten beschouwd worden als de voortgezette randen der stigmata; zij ademen dus door kleinw-tracheën en niet zoals de Dytisciden-larven direct door stigmata. Het lichaam eindigt in eene anaalbuis, welke van 4 hoornhaken voorzien is. Tarsen met twee klauwen.

De larven verpoppen zich aan waterplanten boven het water en spinnen zich in een dicht, eivormig, grauw, papierachtig omhulsel, waarin binnen weinige weken de metamorphose voltooid wordt.

Overzicht der Tribus.

Anaal-segment van achteren breed afgerond, vlak, op de onderzijde zonder wimperharen.

Achterkaken met ongelede, tastervormige buitenste lob 1. *Gyrini*.

Anaal-segment kegelvormig verlengd, op de onderzijde met eene in 't midden verloopende langsrij van wimperharen. Achterkaken zonder buitenste lob. II. **Orectochilini**.

I. Tribus GYRININI.

Halsschild zonder dwarsgroeven. Dekschilden met 10, op den bodem fijn gechagrinceerde, groeven, van welke de buitensten soms met elkaar versmolten zijn. Halsschild en dekschilden met breeden gelen zoom langs den zijrand. I. **Aulonogyrus**.

Halsschild met eene over het midden verloopende, zijdelings afgekorte dwarsgroef en aan weerszijden achter den voorrand met eene gebogen dwarsgroef. Dekschilden met 10 stippelrijen, van welke de binnensten soms nagenoeg uitgewischt kunnen zijn. Bovenzijde van het lichaam zonder gelen randzoom. 2. **Gyrinus**.

II. Tribus ORECTOCHILINI.

Bevat slechts het genus 3. **Orectochilus**.

I. Tribus GYRININI.

1. *Aulonogyrus* Régimbart.

Achterkaken als bij Gyrinus. De achter den sprietwortel zich bevindende uitranding der wangen bereikt niet het midden van het bovenste oog, dat slechts weinig verder naar voren geschoven is dan het onderste. Halsschild en dekschilden met een breeden, gelen zoom langs den zijrand. Halsschild zonder dwarsgroeven. Dekschilden met tien, op den bodem fijn gechagrinceerde, groeven, van welke de buitensten soms met elkaar versmolten zijn.

Van de 2 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Dekschilden aan het uiteinde scheef afgesneden, de buitenste tophoeken afgerond. Kop bronzig, in 't midden donker blauwachtig-groen. Halsschild en dekschilden donker blauwachtig-groen, met breeden gelen zijrand en evenzoo gekleurde epipleuren. Halsschild met een koperkleurigen of bronzig-groenen dwarsband over het midden, de dekschilden met evenzoo gekleurde langsgroeven. Onderzijde en pooten roodgeel of geel, het metasternum, de achtercoxae of ten minste een gedeelte daarvan, benevens het achterlijf, op het anaal-segment na, donker bronskleurig. Soms is de geheele bovenzijde van het lichaam meer dof zwartachtig en zijn de langsgroeven weinig in kleur daarvan onderscheiden (ab.c. *opacinus* Ragusa). Lengte 5½—7 mm. Op vele plaatsen in de provinciën Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant, gewoonlijk in gezelschap van verscheidene *Gyrinus*-soorten aangetroffen. O. a. is zij gemeen in de Mark bij Breda en in de Linge bij Tiel. De larve is door *Schiöde* beschreven (*striatus* Aubé, *strigipennis* Sullr.) 1. **concinus** Klug.

2. *Gyrinus* L.

*Achterkaken met eene ongelede, tastervormige, buitenste lob. De achter den sprietwortel zich bevindende uitranding der wangen reikt minstens tot aan het midden van het bovenste oog, dat veel verder naar voren geschoven is dan het onderste. Bovenzijde van het lichaam zonder gelen randzoom. Halsschild met eene over het midden verloopende, zijdelings afgekorte dwarsgroef en aan weerszijden achter den voorrand met eene gebogen dwarsgroef. Dekschilden met tien stippelrijen, van welke de binnensten soms nagenoeg uitgewischt kunnen zijn. Bij het ♂ zijn de 5 leedjes der voortarsen verbreed en aan de onderzijde met fijne witte papillen bezet. Bij het ♀ is het lichaam grooter, breeder en de dekschilden gewoonlijk doffer. Behalve de sexuele verschillen vertoonen sommige soorten (o. a. *G. marinus* en *natator*) een verschillenden glans, n.l. vindt men ook individuen met doffe oppervlakte (*opacinos*), of ook kunnen de dekschilden gedeeltelijk roodachtig (*rufinos*) zijn (*G. minutus* en *marinus*). — De soorten van dit genus leven in aantal, veelal twee of drie soorten bijeen, aan de oppervlakte van het water, waar zij snel ronddraaien en bij het minste gevaar wegduiken of wegschwemmen, om wat verder wederom zich te verzamelen. — Van *G. marinus* is*

de larve door Schödte, en de metamorfose van *G. natator* door Cl. Mulder beschreven.

Van de 14 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Schildje aan de basis met een kort kielvormig bultje. Mesosternum over de geheele lengte gegroefd. Langwerpig-eirond, gewelfd, de bovenzijde zwart met min of meer blauwachtigen weerschijn; het voorste gedeelte van den kop en de zijden van het halsschild en der dekschilden bronskleurig. Onderzijde met de epipleuren, benevens de pooten, roodgeel. De geheele bovenzijde is uiterst fijn geëtagrinceerd en daardoor slechts matig glanzig. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Verbreed in de provinciën Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Ook eenmaal bij den Haag en meermalen bij Amsterdam. Rufinos zag ik nog niet uit Nederland. 1. *minutus* F.

Schildje niet gekield. Mesosternum slechts op de achterhelft met eene middengroef 2

- 2 Onderzijde geheel geel. Eivormig, tamelijk breed en sterk gewelfd, de bovenzijde zwart-violetachtig; het voorste gedeelte van den kop en de zijden van het halsschild en van de dekschilden bronskleurig. De dekschilden met koperkleurige, veelal iriserende, over de stippelrijen verloopende, smalle langsbanden. Exemplaren met dof zwart bovenzijde en met aan het uiteinde of ook op het midden roodachtige dekschilden vormen de abe. *variabilis* Aubé (rufino). Lengte $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. In Middel-Europa, o. a. in Noord-Frankrijk. Niet inlandsch (*urinator* Illg.).

Onderzijde geheel of gedeeltelijk donker metallisch. 3

- 3 Epipleuren van het halsschild en der dekschilden donker metallisch; de klauwen bruinachtig. Eene zeer veranderlijke soort. Bovenzijde gewoonlijk glanzig zwart met blauwachtig-groenen, violet- of blauwachtigen weerschijn, langs de zijden en aan den naadzoom der dekschilden bronsglanzig, soms op de geheele bovenzijde bronzig of ook wel zwart zonder metaalglans. Ook komen soms geheel doffe exemplaren voor, bij welke gewoonlijk het midden der dekschilden meer of minder uitgebreid of ook nog het midden van het halsschild en van den schedel roodachtig is (abe. *dorsalis* Gyll. rufino). Onderzijde donker bronskleurig, zelden het mesosternum en het laatste sterniet metallisch roodbruin. Bij het ♀ zijn de dekschilden dicht en zeer fijn, onder den microscoop gezien, duidelijk bestippeld. Deze soort komt in twee hoofdvormen voor, die echter in elkaar overgaan. De typische vorm is in 't oog vallend groot, met volkomen afgeronden buitensten tophoek der dekschilden, welke laatsten van grove stippelrijen voorzien zijn; de binnenste stippelrijen zijn van voren slechts weinig fijner, doch naar het uiteinde even zoo krachtig als de buitensten; de twee binnenste stippelrijen zijn aan het uiteinde groefachtig verdiept. De vorm *opacus* Sahlb. is veel kleiner, heeft minder afgeronde buitenste tophoeken der dekschilden en veel fijnere stippelrijen der dekschilden; de binnenste stippelrijen zijn van voren veel fijner dan de buitensten; de beide binnenste zijn van achteren niet of nagenoeg niet groefachtig verdiept. Lengte $4\frac{1}{2}$ —7 mm. Overal zeer gemeen. De vorm *opacus* meer in de heidestrecken. (lembus Schödte) 2. *marinus* Gyll.

Epipleuren van het halsschild en der dekschilden geheel of gedeeltelijk roodgeel 4

- 4 Dekschilden dicht en zeer fijn, doch onder den microscoop gezien duidelijk en dicht bestippeld. Deze soort gelijkt zeer op *natator*, doch is iets langer eirond en minder gewelfd; de buitenste tophoek der dekschilden is minder afgerond. Bij den vorm *distinctus* Aubé is de fijne bestippeling der dekschilden zeer zwak aangeduid. De duidelijk bestippelde vorm komt meer in Oostelijk en Zuidelijk Europa voor. Lengte $5\frac{1}{2}$ —7 mm. Op verscheidene plaatsen waargenomen, doch meestal zeldzaam. In de Rijnprovincie bij Düsseldorf en Crefeld en ook bij Oldenburg (*caspius* Régimb.) 3. *colymbus* Er.

Dekschilden spiegelglad, zonder eenige aanduiding van bestippeling 5

- 5 Lichaam eivormig 6

Lichaam lang gestrekt, aan de zijden slechts weinig afgerond of met nagenoeg evenwijdige zijden. 7

- 6 Eivormig, gewelfd, glanzig zwart, gewoonlijk met violetachtigen weerschijn en duidelijk geelkoper-glanzig aan den zijrand en aan den naad der dekschilden. Dekschilden aan het uiteinde afgerond-afgeknut, aan den buitensten tophoek breed afgerond, voor het uiteinde iets ingedrukt, met tamelijk fijne, naar buiten krachtiger stippelrijen. Van den overal zeer gemeenen, normalen vorm (*mergus* Ahr.) onderscheidt zich de vorm *substriatus* Steph. (*natator* Ahr.) door veel fijnere buitenste en naar voren onduidelijke of bijna geheel uitgewischte binnenste stippelrijen der dekschilden. Lengte $5\frac{1}{2}$ —7 mm. Overal zeer gemeen 4. *natator* L.

Langer eivormig, kleiner, met veel grovere stippelrijen en meer opgericht uiteinde der dekschilden. De buitenste stippelrijen der dekschilden zijn zeer grof en van voren groefachtig verdiept, de binnenste worden steeds fijner, doch blijven altijd nog krachtig ontwikkeld. De in eene ellips gerangschikte stippels aan het uiteinde der dekschilden zijn veelal zwak aangeduid, soms bijna uitgewischt 1). Lengte 4—5 mm. Zeer zeldzaam. Breda, in de Mark. Ook in België bij Vilvoorden, in Oldenburg en op het eiland Borkum.

5. *Suffriani* Scriba.

- 7 Voorrand van het halsschild niet lijstvormig, doch aan weerszijden breed en vlak afgezet. Lichaam zeer lang gestrekt, met evenwijdige of slechts iets afgeronde zijden. Glanzig zwart, aan de zijden geel koperkleurig, de onderzijde zwart, de epipleuren van het halsschild en der dekschilden roodgeel, het mesosternum en het laatste sterniet soms donker roodbruin. Halsschild aan weerszijden achter den voorrand met eene sterk ingebogen, van den voorrand afstaande stippelrij. Dekschilden aan het uiteinde afgerond-afgeknut, met volkomen afgeronden, buitensten tophoek. Stippelrijen der dekschilden matig sterk, de buitensten krachtiger ontwikkeld. Lengte $6\frac{1}{2}$ —8 mm. Zeer zeldzaam. Bij den Haag en Breda.

(*celex* Schiöde, ? *elongatus* Mrsh.) 6. *bicolor* Payk.

Voorrand van het halsschild aan weerszijden lijstvormig afgezet, de stippelrij aan weerszijden daaraan nagenoeg evenwijdig. Lichaamsvorm ongeveer als bij *bicolor*, met nagenoeg evenwijdige zijden en soms in 't midden als het ware iets ingeknepen. Dekschilden aan het uiteinde recht afgeknut, aan den buitensten tophoek weinig afgerond. Mesosternum en het laatste sterniet altijd bruinrood. Lengte 5—7 mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, o. a. op Walcheren en op Texel . . . (*angustatus* Aubé) 7. *elongatus* Aubé.

II. Tribus ORECTOCHILINI.

3. *Orectochilus* Lacord.

Achterkaken zonder buitenste lob. Schildje zichtbaar. Anaal-segment kegelvormig verlengd, op de onderzijde met eene in 't midden verloopende langsrif van wimperharen. Middeldoxae driehoekig, naar buiten versmald. Vijfde voortarsen-lid hoogstens $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het vierde. — De larve is door Schiöde, de pop door Griesbach beschreven. De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Langwerpig-ovaal, zijdelings iets samengedrukt en van voren op de dekschilden hoog gewelfd, de bovenzijde grauwwaart of bruin, met zeer zwakken metallischen weerschijn en korte grauwe zijdeglanzige beharing; onderzijde roestrood of roestgeel, de pooten roestgeel. Halsschild en dekschilden fijn en tamelijk dicht bestippeld. Dekschilden aan het uiteinde scheef afgeknut, met zeer stomp of nauwelijks aangeduiden buitensten tophoek. Het ♂ met scherp rechtehoekigen buitensten tophoek der voorschenen en verlengde en verbrede voortarsen. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6½ mm. In snel stroomend water, waar zij meer tegen den avond dan over dag te voorschijn komt. Volgens *Régimbart* heeft de copulatie buiten het water plaats. Onmiddellijk daarop verslindt het ♂ merkwaardigerwijze de uit zijn achterlijf uitstekende groote spermatophoren-patroon. Niet zeldzaam in Noord-Brabant en Limburg, o. a. in aantal over dag met andere Gyriniden in de Mark bij Breda en in de Geul bij Houthem.

1. *villosus* Müll.

Sub-Orde II. STAPHYLINOIDEA.

VII. Familie STAPHYLINIDAE.

Deze onder den naam van „Kortschildkevers” bekende familie bestaat uit meestal langgestrekte, smalle kevers, met eenigszins vlakgedrukt, soms bijzonder plat lichaam (b.v. *Achenium*), of wel zijn zij meer cilindervormig (b.v. *Stenus*). Zij zijn zeer in het oog vallend door de sterk verkorte, het metasternum niet of slechts weinig overschrijdende dekschilden en door het los gelede, geheel verhoornde achterlijf, dat gewoonlijk slechts over de eerste twee tergieten, zelden over een grooter gedeelte of bijna geheel door de dekschilden bedekt is (b.v. *Lathrimacum*, *Anthobium*, *Protinus*); bij de wijfjes van enkele *Anthobium*-soorten overschrijden zij zelfs het achterlijf. — Kop veelal horizontaal vooruitstekend en van achteren min of meer halsvormig ingesnoerd, of wel eenigszins in het halsschild teruggetrokken, gebogen of verticaal geplaatst of zelfs naar onderen en naar achteren gericht. Oogen hetzij zeer groot en sterk uitpuilend (*Stenus*) of zeer klein en zelfs bij enkele Zuideuropeesche genera geatrophieerd. In enkele gevallen komen een of twee ocellen voor (b.v. *Omalium*,

1) Vermoedelijk, evenals *G. eulymbus*, eene variëteit van *natalor*.

Phloeobium). Sprietten 11-ledig, bij uitzondering 10-ledig (*Oligota*, *Hypocyrtus*), gewoonlijk draadvormig of naar het uiteinde verbreed of knotsvormig verdikt, bij uitzondering van al het eerste lid geknikt (*Acylophorus*); zij zijn of vrij aan den zij- of voorrand van het voorhoofd ingeplant, hetzij aan den binnenrand der oogen of voor de oogen achter de basis der voorkaken, of wel voor de oogen binnen de basis der voorkaken. Soms is de voorhoofdtrand boven de inplanting der sprietten kantig of lobvormig verbreed. Bij de *Stenini* staan de sprietten tusschen de oogen schijnbaar op het voorhoofd, daar de geheel verhoorde, sterk ontwikkelde clypeus met het voorhoofd een samenhangend geheel vormt. — Bovenlip meestal breder dan lang, ongedeeld, uitgerand of tweelobbig, geheel hoornachtig of aan den voorrand vliezig. Eigenaardig zijn bij *Planestomus* en *Aerognathus* de lange, vliezige, aan den binnenrand zeer lang en fijn bewimperde aanhangsels der bovenlip (de z.g. *parachilen*). Voorkaken hetzij lang of kort, krachtig ontwikkeld, aan de binnenzijde al of niet getand en aan den binnenrand meestal met een lijn bewimperden, vliezigen zoom; bij vele *Staphylinen* reikt van af de basis der voorkaken eene smalle, bewimperde lob vrij naar voren. Veelal zijn de beide voorkaken ongelijk en is een van beiden krachtiger getand; in den regel liggen zij in de rust over elkaar, bij *Oxypterus* steken zij naar voren uit. De binnenste lob der achterkaken is aan den binnenrand van den stam ingeplant; gewoonlijk is slechts haar buitenrand verhoord en eindigt veelal in een naar binnen haakvormigen top. Het meestal vliezige binnengedeelte der binnenste kaaklob is dicht behaard of kamvormig gedoord. De buitenste lob bestaat uit een hoornachtig grondstuk en een vliezig, dicht behaard uiteinde. Bij enkele *Aleocharini* (*Diglossa*, *Myllaena* etc.) zijn de achterkaaks-lobben zeer lang gestrekt en is de binnenste geheel verhoord. Kaaktasters 4-ledig, het eindlid is veelal zeer klein, priemvormig, dikwerf nauwelijks zichtbaar, in welk geval het derde lid gewoonlijk krachtiger ontwikkeld en meer verdikt of aangeworven is. Bij *Aleochara* is het vierde kaaktaster-lid zoodanig ingesnoerd, dat de kaaktasters 5-ledig toeschijnen. Kin meestal breed, trapeziumvormig, van voren afgeknot, afgerond, uitgerand of uitgesneden. Het voorste gedeelte van de onderlip, waaraan de lipstasters gezeten zijn, is door een vliezig tusschengedeelte met de kin verbonden. Veelal is dit tusschengedeelte instulpbaar en kan het voorste deel van de onderlip daardoor zoodanig onder de kin teruggetrokken worden, dat slechts de lipstasters uitsteken (*Pronomaea*). Bij *Stenus* is dit tasters-dragende gedeelte van de onderlip buitengewoon lang gestrekt en in de rust in een even lang instulpbaar tusschengedeelte teruggetrokken. Door uitslupping van het tusschengedeelte kan echter de onderlip buitengewoon ver vooruitschoven worden (Fig. 19). De tong is zeer verschillend gevormd, hetzij breed of smal, hetzij onverdeeld, uitgerand of tweelobbig. De paraglossen steken veelal uit met hun vrij, meestal iets naar binnen gekromd uiteinde en zijn aan den binnenrand dicht behaard. Volgens *Kolbe* bevindt zich aan de binnenzijde van de basis der onderlip een als binnenlip te beschouwen gedeelte, hetwelk analoog is aan den hypopharynx bij andere insecten. Lipstasters gewoonlijk 3-ledig; soms zijn de eerste twee leedjes met elkaar vergroeid, zoodat de lipstasters dan slechts twee-ledig schijnen. Bij *Aleochara* is het derde lipstaster-lid aan den top ingesnoerd, waardoor de lipstasters 4-ledig schijnen.

Fig. 19. Kop van *Stenus*, van onderen gezien. Org. *a*. Lipstaster. *b*. Uitslupbaar tusschengedeelte.

Halschild zeer veranderlijk van vorm. — Het gewoonlijk driehoekige schildje ligt meestal vrij en is tusschen de dekschilden ingeschoven. Bij de gravende *Bledius*, bij welke de mesothorax, evenals bij de *Scaritini* en *Broscini* onder de Carabidae, kort steelvormig verlengd is, zit het schildje op den steel van den mesothorax. — De dekschilden stooten aan den naad gewoonlijk rechtlijnig tegen elkaar, bij enkele *Oxytelini* (b. v. *Thinobius*) zijn zij aan den naadhoek sterk afgerond en divergeeren naar achteren. Bij vele *Xantholinini* grijpen de maadranden der dekschilden over elkaar. De epipleuren zijn al of niet ontwikkeld.

De nervatuur der achtervleugels beantwoordt bij alle Staphylinidae aan een zelfden grondvorm. Vooral treft men verschillen aan in de ontwikkeling van het basaal-lobje en in de dikwerf zeer in 't oog vallende pigmentering, welke over de geheele oppervlakte of ten minste aan het topgedeelte lichter of donkerder is. Aangezien de dekschilden zoo bijzonder verkort zijn, moeten de vleugels 2- of 3 maal gevouwen worden en bezitten diensgevolge twee gewrichten, het eene in het eerste derde gedeelte, het tweede nabij het midden; veelal is nog een derde gewricht aanwezig (b. v. bij *Aleochara*). Tusschen de beide gewone gewrichten in bevindt zich aan den voorrand eene pigmentvlek. De vena externo-media verdeelt zich aan het eerste gewricht in twee takken, welke tot aan den achterrand van den vleugel doorloopen. De wortel van den bovensten tak is meestal uitgewischt. Straal-aders tusschen den bovensten tak der vena externo-media en der vena scapularis schijnen te ontbreken. Van de vena cubitalis zijn gewoonlijk overblijfselen van het uiteinde aanwezig. De vena interno-media is gewoon. De vena analis splitst

Fig. 20. Onderzijde van den prothorax van *Lulissus fulgidus* F. Naar Ganglbauer.

epipleuren van den prothorax versmolten en bedekken het stigma volkomen.

Het mesosternum is meestal vrij kort, zelden voor de middelcoxae sterker ontwikkeld of kort steelvormig verlengd; de voorrand is recht afgeknot of meer of minder diep uitgerand of uitgesneden.

Fig. 21. Onderzijde van *Philonthus*. Naar Ganglbauer. Gewijzigd.

Euaesthetini en Stenini is het binnenblad der achtercoxae bijzonder sterk ontwikkeld en steekt kegelvormig naar achteren uit; het buitenblad daarentegen is slechts weinig ontwikkeld en is verticaal op de basis van den buik gericht of wel als eene zeer smalle strook aangeduid (Fig. 23. I). Wanneer wij nu dezen vorm der achtercoxae in de breedte uitgetrokken denken, doch in de lengte verkort, dan verkrijgen wij de zeer in de breedte ontwikkelde achtercoxae der *Oxyporini* en *Oxytelini* (Fig. 23. II). Bij de *Alcocharini*, *Trichophyini* en *Tachyporini* zijn de achtercoxae zeer verbreed, met opgericht binnenblad en breed, vlak uitgebreid buitenblad (Fig. 23. III). Bij *Habrocerus* ziet men aan de driehoekige achtercoxae geene uitwendige afcheiding van een binnen- en buitenblad. De trochanters der achterpooten zijn veel tamelijk groot. De schenen zijn gewoon behaard of gedoorn. Het aantal tarsleedjes is zeer veranderlijk, meestal 5, soms 4 (bij *Hygronoma*, *Oligota* en *Hypocryptus*), of 3 (bij *Dinopsis* en vele *Oxytelini*). Volgens Ganglbauer zijn er bij *Thinobius* slechts 2 leedjes.

zich aan den wortel in twee takken, van welke de voorste den achterrand van den vleugel bereikt en een basaal-lobje begrenst; de achterste is verkort en slechts flauw aangeduid. Bij vele genera (b. v. *Myrmedonia*) zijn de soorten ongevleugeld.

Het prosternum is voor de voorcoxae meer of minder sterk ontwikkeld en soms gereduceerd tot eene smalle dwarslijst. Bij de *Nantholinini* is het voorste gedeelte van het prosternum als eene keelplaat daarvan afgescheiden (Fig. 20). Bij de *Staphylinini* en *Paederini* bevinden zich aan den voorrand van het prosternum twee zijdelingsche uitsteeksels van het binnenskelet, de zoogen. *claviculae*. De epimeren van den prothorax ontbreken of geheel (bij de *Alcocharini*, *Tachyporini* en *Staphylinini*; zie Fig. 20, waar het stigma volkomen vrij is), of zij zijn slechts aangeduid als kleine vliezige of hoornachtige ahangsels (*opercula*) van de epipleuren van het halsschild, welke het stigma van den prothorax niet of slechts onvolkomen bedekken (Fig. 21 en 22). Overigens zijn de epimeren duidelijk ontwikkeld, met de

episternen van den mesothorax zijn meestal met het mesosternum vergroeid, de epimeren daarentegen altijd duidelijk gescheiden. Het metasternum is in verband met het vliegvermogen in grootte zeer veranderlijk. Zijn de achtercoxae in de breedte ontwikkeld, dan is de achterrand van het metasternum aan weerszijden nauwelijks of slechts weinig uitgerand. Puilen zij echter kegelvormig uit, dan staan zij in diepe uitrandingen van het metasternum. De episternen van het metasternum zijn meer of minder smal, naar achteren versmald en toegespitst; de epimeren zijn veelal, op een driehoekig of wigvormig achterstuk na, door de dekschilden bedekt.

De pooten vertoonen zeer groote verscheidenheid in bouw, vooral de groote verschillen in vorm en grootte der voor- en achtercoxae zijn gewichtig voor de systematiek. Zoo puilen o. a. de voorcoxae bij de *Staphylinini* ver uit het prosternum en zijn aldaar bijna even lang als de voordijen, terwijl b.v. bij de *Piestini* de ovaal-kegelvormige voorcoxae weinig of niet uitpuilen en zij bij de *Proteinini* in de

breedte lang cilindervormig ontwikkeld zijn. Bij de

Fig. 22. Gedeelte van de onderzijde van *Quedius*. Naar Ganglbauer. Gewijzigd.

Soms zijn de voortarsen 4-ledig, de middel- en achtertarsen 5-ledig (*Myrmedoniini*, *Pronomacini*) of wel de voor- en middeltarsen 4-ledig en alleen de achtertarsen 5-ledig (*Bolitocharini*, *Myllaenini*). Bij *Tanygnathus* zijn de voortarsen 5-, de middel- en achtertarsen 4-ledig.

Fig. 23. Achtereoxae bij I. *Staphylinus*. II. *Oxyperus*. III. *Aleochara*.
Naar Ganglbauer.

ontwikkelde sterniten. Theoretisch juist ware het, de sterniten met dezelfde nummers aan te geven als de tergiten, ofschoon de buikplaat van het eerste tergiet bij alle Coleoptera ontbreekt. — De vorm van het meestal zeer vrij bewegelijke achterlijf is zeer uiteenlopend. Bij Staphyliniden met sterk verkorte dekschilden is het achterlijf gewoonlijk gestrekt, naar het uiteinde geleidelijk versmald of tot aan den zevenden ring nagenoeg parallel, soms voor het uiteinde verbreed of aan de basis ingesnoerd. Bij die met lange dekschilden (*Omalini*) is het achterlijf gewoonlijk breed en aan het uiteinde kort toegespitst. Zeer vele Staphyliniden kunnen het achterlijf opwaarts krommen, enkelen zelfs zoo, dat zij daarmee het voorlijf bedekken (*Encephalus*); anderen krommen het achterlijf naar onderen (*Tachyporini*, *Xantholinini*). Bij sommigen is het achterlijf weinig bewegelijk en wordt meestal slechts met den top opwaarts gekromd (*Piestini*, *Phloeocharini*, *Omalini*, *Proteinini*).

Ofschoon de Staphyliniden aan de Silphiden het naast verwant zijn, herinneren enkele genera aan vertegenwoordigers van andere familiën. Zoo o. a. *Anthophagus* en *Lesteva* aan *Dromius* (*Carabidae*), *Conosoma* aan *Choleva* (*Silphidae*), *Autalia* aan *Euplectus* (*Pselaphidae*), *Anthobium* en *Protinus* aan *Epuraea* en *Brachypterus* (*Nitidulidae*), *Hypocyptus* aan *Agathidium* (*Anisotomidae*). Ook valt soms in het oog hoe met den overeenkomenden habitus, eenige overeenstemming in levenswijze wordt waargenomen. De inwendige bouw stemt meer overeen met die der Silphiden en Histeriden, dan met die der Carabiden. Zij leggen slechts weinige, vrij groote eieren.

De larven der Staphyliniden, welke in habitus min of meer aan de imagines herinneren, onderscheiden zich vooral door het bezit van meestal 4 ocellen, het ontbreken der bovenlip, door het voorhanden zijn van een zijdelings bijkomend sprietlid, door de 2-ledige, zelden 1-ledige cerci van het negende achterlijfssegment, door het tot naschuiver dienend anaal-segment en door de goed ontwikkelde pooten met 1-ledige, klauwachtige tarsen. Volgens *Schödté* zouden twee typische vormen van Staphyliniden-larven voorkomen, nl. die der *Staphylinini* (o. a. met 4 sprietleedjes, behalve het bijkomend lid) en die der *Oxytelini* (o. a. met 3 sprietleedjes, behalve het bijkomend lid), waartusschen de larven der *Stenini* (o. a. met 4-ledige sprietlen, behalve het bijkomend lid) als het ware instaan. De larven van *Tachinus* en *Tachyporus* komen het meest met die van het tweede type overeen. Ook schijnen de larven der *Aleocharini* hoofdzakelijk met die der *Tachyporini* overeen te komen. De larve van *Syntomium*, welke zich als een kogeltje ineen kan rollen, zou ook tot het tweede type behooren (*Ganglbauer*). — De metamorfose heeft meestal plaats in den herfst, zoodat de kever overwintert. Vele larven zijn nachtdieren; de grootere soorten zijn zeer roofzuchtig en graven gangen om op hare prooi te loeren. Van de meeste soorten zijn de larven intusschen nog niet bekend.

De bouw van het achterlijf is volgens *Ganglbauer* zoodanig, dat van de 7 geheel ontwikkelde sterniten het eerste tegenover het 3de der 10 voorhanden tergiten staat. Bij den tribus der *Oxytelini* is reeds het eerste sterniet tegenover het tweede tergiet geheel ontwikkeld, waardoor 8 sterniten tegenover de 10 tergiten geplaatst staan. *Kraatz*, *Fauvel* en andere schrijvers tellen de buikplaat van het tweede tergiet ook mede en beschouwen dit als het eerste sterniet, of het ontbreekt dan wel rudimentair is. *Ganglbauer* acht het meer doelmatig, vooral met het oog op de beschrijving der sexuele kenmerken, niet den theoretischen bouw van het achterlijf te volgen, doch slechts rekening te houden met de werkelijk

De Staphyliniden leven, benevens hunne larven, vooral in rottende dierlijke en plantaardige stoffen, in mesthoopen, aanspoelsel der rivieren, tusschen dorre bladeren, achter boomschors, in paddestoelen, aas, meststoffen, onder mos en steenen, eenigen op bloemen, velen langs rivier- en zeeoeveren en zelfs enkelen als mierengasten. Zij jagen gedeeltelijk over dag, doch voor het meerendeel 's nachts, op kleine insecten, vooral op larven van Diptera en Lepidoptera en worden daardoor veelal zeer nuttig. Zij zijn zeer snel in hunne bewegingen en verdwijnen meestal plotseling tusschen reten in den grond. Vele soorten scheiden uit stinkklieren, die bij Staphylinus aan het uiteinde van het achtste tergiet als twee uitstulpbare blaasjes zichtbaar worden, een scherp riekend vocht af. — Zij overwinteren veelal in de aarde, in afval, onder mos, steenen, plantenafval en achter boomschors. In 't voorjaar en in den herfst ziet men vele soorten, vooral op het midden van den dag bij fellen zonneschijn, rondvliegen en rondloopen; 's zomers zwermen zij veelal op warme avonden of wanneer een onweder nadert.

Overzicht der Sub-Familiën en Tribus.

- 1 De achtercoxae zijn in de breedte ontwikkeld, hebben een driehoekig of slechts kort kegelvormig binnenblad en een min of meer verticaal of smal uitgebreid buitenblad, of wel zij zijn in de breedte ontwikkeld, met een kegelvormig of lang vierhoekig binnenblad en een vlak uitgebreid buitenblad; ook kunnen zij in de breedte driehoekig ontwikkeld zijn, zonder zichtbare scheiding tusschen een binnen- en buitenblad 2
- De achtercoxae puilen naar achteren sterk kegelvormig uit, hebben een kegel- of trapeziumvormig binnenblad en een diep ingezonken, verticaal of slechts smal uitgebreid buitenblad. 18
- 2 De sprieten staan vrij ingeplant. De achtercoxae met een vlak uitgebreid buitenblad of zonder zichtbare scheiding tusschen een binnen- en buitenblad 3
- De sprieten onder den kantig opgerichten of lobvormig verbreedden voorhoofdsrand ingeplant. De achtercoxae met verticaal of slechts smal uitgebreid buitenblad 12
- 3 Dekschilden zonder zijrand op de grens der epipleuren; bij *Dinarda* is hier een scherp kant, doch geen bepaalde rand 4
- Dekschilden met scherp begrensde, gewoonlijk vrijliggende, zelden naar binnen volkomen omgeslagen en uitwendig niet zichtbare epipleuren 9
- 4 Sprieten aan den binnenrand der oogen (meestal vooraan) ingeplant, nimmer haarlijn.
 - I. Sub-Fam. ALEOCHARINAE. 5
 - Sprieten voor de oogen ingeplant, van af het derde lid zeer dun, haarlijn.
 - II. Sub-Fam. TRICHOPIHYINAE. XI. *Trichophyini*.
- 5 Kop naar voren niet snavelachtig verlengd. De binnenste achterkaakslob van buiten hoornachtig, van binnen vliezig 6
- Kop naar voren min of meer snavelachtig verlengd. De binnenste achterkaakslob geheel hoornachtig, lang gestrekt, van binnen getand en gedoord. 8
- 6 Alle tarsen 5-ledig I. *Aleocharini*.
- Voortarsen 4-ledig, middel- en achtertarsen 5-ledig II. *Myrmedoniini*.
- Voor- en middeltarsen 4-ledig, achtertarsen 5-ledig III. *Bolitocharini*.
- Alle tarsen 4-ledig 7
- 7 Sprieten 10-ledig. IV. *Oligotini*.
- Sprieten 11-ledig. V. *Hygronomini*.
- 8 Alle tarsen 4-ledig VI. *Diglossini*.
- Voortarsen 4-ledig, middel- en achtertarsen 5-ledig VII. *Pronomacini*.
- Voor- en middeltarsen 4-ledig, achtertarsen 5-ledig VIII. *Myllaenini*.
- Alle tarsen 5-ledig. IX. *Gymnusiini*.
- Alle tarsen 3-ledig. X. *Dimopsini*.
- 9 Achtercoxae overdwars driehoekig, vlak, zonder scheiding tusschen een binnen- en buitenblad. Sprieten van af het derde lid zeer dun, haarlijn.
 - III. Sub-Fam. HABROCERINAE. XII. *Habrocerini*.
 - Achtercoxae met opgericht binnenblad en vlak uitgebreid buitenblad. Sprieten niet haarvormig. IV. Sub-Fam. TACHYPORINAE. 10
- 10 Sprieten 10-ledig. Alle tarsen 4-ledig XIII. *Hypocyptini*.
- Sprieten 11-ledig. Alle tarsen 5-ledig 11

- 11 Kop onder de oogen zonder verheven zijlijst. Dekschilden zonder verdiepte naadstreep. De epimeren van het metasternum grootendeels onbedekt. Achtercoxae aan de binnenzijde niet gerand XIV. **Tachyporini**.
 Kop onder de oogen met eene scherp verheven zijlijst. Dekschilden met eene verdiepte naadstreep. De epimeren van het metasternum geheel of tot aan den binnenrand door de epipleuren der dekschilden bedekt. Achtercoxae met smal lijstvormig afgezetten binnenrand XV. **Bolitobiini**.
- 12 Voorhoofd nagenoeg onmiddellijk voor de oogen afhellende. Eindlid der liptasters zeer groot, halve-maan-vormig (Fig. 26). Middelcoxae ver van elkaar afstaande, nagenoeg aan de zijden van het sternum ingeplant IX. Sub-Fam. OXYPORINAE. XXII. **Oxyporini**.
 Voorhoofd voor de oogen min of meer verlengd. Eindlid der liptasters gewoon. Middelcoxae tegen elkaar aanstaande of slechts weinig van elkaar verwijderd.
 X. Sub-Fam. OXYTELINAE. 13
- 13 De trochanters der achterpooten zijn klein en bereiken ter nauwernood het $\frac{1}{2}$ van de lengte der dijnen 14
 De trochanters der achterpooten zijn groot, minstens $\frac{1}{3}$ zoo lang als de achterdijen 15
- 14 Achterlijf aan de basis tusschen de achtercoxae niet gekield. Een sterniet is reeds tegenover het tweede tergiet geheel ontwikkeld, slechts bij *Syntomium*, op eene smalle dwarslijst na, gereduceerd. De voorcoxae zijn vrij groot en puilen sterk uit het prosternum XXIII. **Oxytelini**.
 Achterlijf aan de basis tusschen de achtercoxae gekield. Het sterniet van het tweede tergiet is rudimentair. De voorcoxae zijn tamelijk klein en puilen weinig uit het prosternum.
 XXIV. **Piestini**.
- 15 Voorcoxae kegelvormig uitpuilend 16
 Voorcoxae breed cilindervormig XXVIII. **Proteinini**.
- 16 Kop met twee oellen op den schedel XXVII. **Omalini**.
 Kop zonder oellen 17
- 17 Achterlijf aan de basis tusschen de achtercoxae niet gekield. Kop, halsschild en dekschilden met langribben XXV. **Pseudopsini**.
 Achterlijf aan de basis tusschen de achtercoxae gekield. Kop, halsschild en dekschilden ellen.
 XXVI. **Phloeocharini**.
- 18 Achtercoxae tegen elkaar aanstaande of slechts iets van elkaar verwijderd 19
 Achtercoxae ver van elkaar afstaande, klein, kegelvormig. De voor- en middelcoxae eveneens klein. Sprieten op den voorrand van het voorhoofd tusschen de groote uitpuilende oogen, schijnbaar op het voorhoofd ingeplant, daar de sterk ontwikkelde, volkomen verhoorde en niet afgescheiden clypeus, met het voorhoofd een samenhangend geheel vormt. Eerste kaaktasterlid de helft korter dan het tweede, het eindlid uiterst klein, priemvormig of nauwelijks zichtbaar VIII. Sub-Fam. STENINAE. XXI. **Stenini**.
- 19 Voorcoxae lang kegelvormig, ver uit het prosternum uitpuilend. Tarsen 5-ledig, bij uitzondering (*Tanygnathus*) de middel- en achtertarsen 4-ledig 20
 Voorcoxae kort kegelvormig. Tarsen 4-ledig. VII. Sub-Fam. EUAESTHETINAE. XX. **Euaesthetini**.
- 20 Sprieten aan den voorrand van het voorhoofd, binnen de basis der voorkaken, min of meer vrij ingeplant V. Sub-Fam. STAPHYLININAE. 21
 Sprieten onder de kort lobvormig uitstekende voorhoeken van het voorhoofd boven de basis der voorkaken ingeplant VI. Sub-Fam. PAEDERINAE. XIX. **Paederini**.
- 21 Prosternum zonder keelplaat. De sprieten staan verder van elkaar dan van de oogen 22
 Prosternum van voren met eene afzonderlijke, veelal uitgerande of door een naad gedeelde keelplaat. De sprieten staan gewoonlijk niet verder of minder ver van elkaar dan van de oogen XVIII. **Xantholinini**.
- 22 De voorhoeken van het halsschild reiken naar voren ver voorbij de voorhoeken van het prosternum. Epipleuren van den prothorax zeer sterk omgeslagen en tegen de rugzijde van het halsschild gedrukt, de binnenrand diep ingezonken. Kop aan de onderzijde, aan weerszijden, met eene geheel doorlopende of naar voren afgekorte zijlijst XVI. **Quediini**.
 De voorhoeken van het halsschild reiken naar voren niet of ter nauwernood over de voorhoeken van het prosternum. De epipleuren van den prothorax slechts een weinig omgeslagen, min of meer horizontaal uitgebreid. Kop aan de onderzijde hoogstens aan de basis met rudimentaire zijlijsten XVII. **Staphylinini**.

1. Sub-Familie ALEOCHARINAE.

1. Tribus ALEOCHARINI.

- 1 De kop aan de basis niet ingesnoerd, met de basis in het halsschild min of meer teruggetrokken; de slapen op de onderzijde altijd met eene scherpe randlijn 2
- De kop aan de basis meer of minder sterk ingesnoerd, vooruitstekend; de slapen op de onderzijde al of niet gerand. De omgeslagen zijden van het halsschild, van ter zijde gezien, altijd zichtbaar. De eerste 3 sterniten aan de basis altijd in de breedte gegroefd of ingesnoerd. 16
- 2 De bovenzijde der dekschilden is door een scherp kant van den breedten, doch naar de spitse achterhoeken plotseling versmalden, omgeslagen zijrand begrensd. Halsschild zeer kort en breed, van achteren breeder dan de dekschilden, met spits uitgetrokken, de schouders omvattende achterhoeken, naar voren afgerond versmald, aan den voorrand boogsgewijs uitgesneden, aan de basis en aan de zijden niet gerand. Achterlijf naar achteren sterk versmald 2. **Dinarda.**
- Dekschilden zonder zijkant 3
- 3 Het vierde onbedekte 1) tergiet zeer kort, korter dan de voorafgaanden. Halsschild kort en zeer breed, van achteren breeder dan de dekschilden, aan weerszijden van den achterrand breed uitgebogen, met duidelijke rechthoekige of enigszins spitse, aan weerszijden over de basis der dekschilden een weinig vooruitstekende achterhoeken, naar voren in eene sterke afronding versmald. Achterlijf naar het uiteinde sterk versmald (Homocusa.)
- Het vierde onbedekte tergiet niet korter dan de voorafgaanden. Halsschild even breed of smaller, zelden iets breeder dan de dekschilden, aan de basis niet of aan weerszijden slechts zeer flauw uitgebogen. 4
- 4 Kaaktasters 5-ledig; liptasters 4-ledig, met uiterst klein eindlid. De epimeren van den metathorax den achterrand der dekschilden overschrijdend. Voor- en middelschenen aan den buitenrand lijn gedoord 1. **Aleochara.**
- Kaaktasters 4-ledig, liptasters 3-ledig. De epimeren van den metathorax den achterrand der dekschilden niet of slechts weinig overschrijdend. Middel- en achterschenen zelden gedoord. 5
- 5 Tweede liptaster-lid duidelijk korter en smaller dan het eerste. 6
- Tweede liptaster-lid nagenoeg even lang en even smal als het eerste. Eerste lid der achter-tarsen korter of hoogstens even lang als het eindlid 13
- 6 De epipleuren van het halsschild zeer sterk omgeslagen, van ter zijde gezien niet zichtbaar . 7
- De epipleuren van het halsschild matig omgeslagen, van ter zijde gezien meer of minder duidelijk zichtbaar 11
- 7 De tong gewoon, aan het uiteinde afgerond. Habitus van Aleochara 8
- De tong gespleten 9
- 8 Voor- en middelschenen aan den buitenrand gedoord. Het derde lid der kaaktasters omgekeerd-kegelvormig. Lichaam tamelijk breed en gedrongen 3. **Microglossa.**
- Voor- en middelschenen niet gedoord. Het derde kaaktaster-lid spoelvormig. Lichaam smaller, met nagenoeg parallele zijden 4. **Crataraea.**
- 9 Voorkaken aan den binnenrand achter den top met een krachtigen tand (Dasyglossa.)
- Voorkaken met gewonen top 10
- 10 Kin naar voren weinig versmald, breed trapeziumvormig. Het vijfde onbedekte tergiet langer dan het zesde 5. **Oxypoda.**
- Kin naar voren zeer sterk versmald, driehoekig, met smal afgeknot uiteinde, tamelijk gewelfd. Het vijfde onbedekte tergiet niet langer dan het zesde (Hygropona.)
- 11 Pooten vrij kort, het eerste lid der achtertarsen niet langer dan het eindlid. Kaaktasters vrij kort en dik. 12
- Pooten vrij lang en slank. Het eerste lid der achtertarsen langer dan het eindlid. Kaaktasters slank (Ocyusa.)
- 12 De beide voorkaken aan den binnenrand getand. Kop en halsschild lijn bestippeld. 6. **Mniusa.**
- Slechts een der voorkaken aan den binnenrand getand. Kop, halsschild en dekschilden zeer grof, diep en dicht bestippeld (Poromniusa.)

1) D. i. het zesde tergiet.

- 13 Sprieten met zeer dicht opeengedrongen leedjes. De eerste 3 sterniten aan de basis niet in de breedte ingedrukt. 7. **Thiasophila**.
 Sprieten vrij los geleed. De eerste 3 of 4 sterniten aan de basis meer of minder duidelijk in de breedte ingedrukt 14
- 14 Kin met vooruitstekende voorhoeken. Kaaktasters vrij dik. Bij het ♂ is de naad der dekschilden sterk opgericht, het zevende tergiet voor het midden van den achterrand met een langsbultje 8. **Stichoglossa**.
 Kin aan den voorrand gewoon uitgerand. Kaaktasters vrij slank. Dekschilden en achterlijf bij het ♂ zonder bijzondere kenmerken 15
- 15 Halsschild zoo breed als de dekschilden, de omgeslagen rand, van terzijde gezien, niet zichtbaar. De eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt. Het eerste lid der achtertarsen veel korter dan het eindlid. 9. **Dexiogyia**.
 Halsschild smaller dan de dekschilden, de omgeslagen rand, van terzijde gezien, zichtbaar. De eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt. Het eerste lid der achtertarsen zeer weinig korter dan het eindlid 10. **Ischnoglossa**.
- 16 Het eerste lid der achtertarsen minstens even zoo lang als de twee volgende leedjes te zamen, langer dan het eindlid 17
 Het eerste lid der achtertarsen korter dan de twee volgende leedjes te zamen en korter dan het eindlid. Lichaam smal. Kop van achteren vrij sterk ingesnoerd. De slapen van onderen niet of slechts zeer onduidelijk gerand. Sprieten kort. De eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte gegroefd. Pooten vrij kort 22
- 17 Tong lang en smal, nagenoeg het uiteinde van het tweede lipstaster-lid bereikend. Het tweede lipstaster-lid weinig korter en smaller dan het eerste. Sprieten slank, het eerste lid weinig verdikt. De slapen van onderen krachtig gerand. Het eerste lid der middeltarsen weinig langer dan het tweede. 11. **Oealea**.
 Tong kort, niet of slechts weinig langer dan het eerste lipstaster-lid. Het tweede lipstaster-lid veel korter dan het eerste 18
- 18 De top van het eerste sprietlid aan de bovenzijde voor $\frac{1}{4}$ of $\frac{1}{5}$ der lengte, ter opname van de basis van het tweede lid, duidelijk scheef uitgerand. 14. **Amarochara**.
 Het eerste sprietlid hoogstens aan den uitersten top iets scheef uitgerand 19
- 19 De eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt 20
 De eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt 21
- 20 Kop van achteren sterk ingesnoerd. Sprieten slank, het eerste lid slechts weinig verdikt, de voorlaatste leedjes niet of slechts zwak verbreed 12. **Chilopora**.
 Kop van achteren slechts weinig ingesnoerd. Sprieten krachtig ontwikkeld, het eerste lid kort schafvormig, het vierde tot tiende lid sterk verbreed. (Ityocara.)
- 21 Mesosternum ongekield. De slapen ongerand. Pooten slank 13. **Calodera**
 Mesosternum in het midden gekield. De slapen van onderen sterk gerand. Pooten krachtig ontwikkeld 15. **Ilyobates**.
- 22 Het eerste lipstaster-lid cilindervormig. Het eerste lid der achtertarsen langer dan het tweede. 16. **Phlocopora**.
 Het eerste lipstaster-lid aan het uiteinde verdikt. Het eerste lid der achtertarsen nagenoeg even lang als het tweede (Phloeodroma.)

II. Tribus MYRMEDONINI.

- 1 Achterlijf langs de zijden der eerste 3 onbedekte tergiten met bundels van dicht opeenstaande gele haren bezet 2
 Achterlijf langs de zijden zonder deze haarbundels. 3
- 2 Pooten tamelijk slank, de dijen dezelfde breedte behoudend, gelijkmatig fijn behaard, de schenen bijna recht. De eerste onbedekte tergiten aan weerszijden van den achterrand zonder gele beharing. Het derde kaaktaster-lid cilindervormig, even lang als het slechts weinig bredere tweede lid. Het tweede lipstaster lid is langer dan breed, minstens half zoo lang als het eerste, het eindlid nagenoeg even lang als het tweede. Het eerste lipstaster-lid is kort cilindervormig. 17. **Atemeles**.
 Pooten zeer krachtig ontwikkeld, de dijen aan de basis veel sneller eenigszins ingesnoerd, naar het uiteinde dicht en grof geel behaard; de middel- en achterste dijen slechts gering behaard. De eerste 3 onbedekte tergiten aan weerszijden van den achterrand dicht geel bezet.

- Het derde kaaktaster-lid is naar het uiteinde geleidelijk verdikt, korter dan het dubbel zoo breede tweede lid. Het tweede liptaster-lid is breeder dan lang, slechts een derde zoo lang als het eerste; het eindlid de helft langer dan het tweede. Het eerste liptaster-lid is naar het uiteinde sterk verdikt. 18. **Lomechusa**.
- 3 De bovenkaaks-spleet door tamelijk breede wangen van de oogen gescheiden, naar achteren verder dan de oogen reikend. De binnenste lob der achterkaken, aan den naar binnen gekromden top, met 3 of 4 gebogen tandjes en daarachter lang en dicht behaard. De buitenste lob der achterkaken is zeer lang en slank. De epimeren van het metasternum altijd den achterrand der dekschilden overschrijdend. Het eerste lid der achtertarsen langer dan de twee volgende leedjes te zamen 4
- De bovenkaaks-spleet slechts smal van de oogen afgescheiden en niet zoo ver als deze naar achteren reikend. Binnenste lob der achterkaken aan den binnenrand tegen den gekromden top met eenen kam van lange, gebogen tandjes bezet. De epimeren van het metasternum den achterrand der dekschilden in den regel niet overschrijdend 5
- 4 Lichaam tamelijk breed. De kop van achteren weinig of slechts matig ingesnoerd, het halsgedeelte veel breeder dan de halve kop; de slapen minstens van achteren gerand. Tweede liptaster-lid veel korter en smaller dan het eerste. Halsschild meer of minder sterk verbreed. Gevleugeld 19. **Myrmedonia**.
- Lichaam slank. Kop van achteren sterk ingesnoerd, de hals smaller dan de halve kop; de slapen ongerand. Tweede liptaster-lid niet smaller en slechts iets korter dan het eerste. Halsschild langwerpig-ovaal. Ongevlugeld 20. **Astilbus**.
- 5 Kop met parallelle zijden, van achteren recht afgeknoot, met rechte achterhoeken, aan den achterrand over de geheele breedte gerand (Dadobia.)
- Kop van achteren min of meer afgerond en versmald of halsvormig ingesnoerd, met afgeronde achterhoeken; aan den achterrand niet gerand. 6
- 6 Kop van achteren niet of slechts weinig ingesnoerd 7
- Kop van achteren zeer sterk halsvormig ingesnoerd. De duidelijk vrij liggende hals slechts $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{4}$ zoo breed als de kop. 15
- 7 Derde kaaktaster-lid bijzonder groot en zeer sterk opgeblazen, veel langer en wel dubbel zoo dik als het tweede; het eindlid zeer klein 22. **Callieerus**.
- Derde kaaktaster-lid slechts weinig verdikt 8
- 8 De eerste twee liptaster-leedjes even dik en nauwelijks van elkaar gescheiden. Het priemvormig kaaktaster-eindlid lang, meer dan half zoo lang of slechts weinig korter dan het derde. 21. **Thamiaraea**.
- Liptasters duidelijk 3-ledig, hunne leedjes volkomen gescheiden en geleidelijk in dikte afnemend.
- Het eerste kaaktaster-lid klein, hoogstens half zoo lang als het derde 9
- 9 De eerste sterniten aan de basis niet in de breedte ingedrukt of ingesnoerd. 10
- De eerste twee of drie sterniten aan de basis duidelijk in de breedte gegroefd of ingesnoerd 14
- 10 Het eerste lid der achtertarsen zeer lang, even lang als de 3 volgende leedjes te zamen. Pooten lang en slank. Achtertarsen even lang als de achterschenen. Lichaam naar het uiteinde sterk versmald, de kop met groote, eenigszins uitpuilende oogen. 26. **Brachyusa**.
- Het eerste lid der achtertarsen hoogstens even lang als de twee volgende leedjes te zamen 11
- 11 Voorkaken aan het uiteinde gespleten 23. **Schistoglossa**.
- Voorkaken gewoon 12
- 12 Tong tot aan de basis in twee smalle, divergeerende lobben gedeeld. Derde kaaktaster-lid tamelijk verdikt (Tomoglossa.)
- Tong slechts tot aan het midden of alleen aan den top gespleten 13
- 13 Sprietleedjes zeer dicht aaneengedrongen. De slapen van onderen niet gerand. Achterlijf naar het uiteinde duidelijk versmald. Het eerste lid der achtertarsen korter of hoogstens even lang als het tweede 24. **Notothecta**.
- Sprieten min of meer los geled 25. **Atheta**.
- 14 Eerste lid der achtertarsen korter dan de twee volgende leedjes te zamen 27. **Gnypeta**.
- Eerste lid der achtertarsen minstens even zoo lang als de twee volgende leedjes te zamen. 28. **Tachyusa**.
- 15 Voorkaken veel slanker en meer vooruitstekend dan bij *Falagria*, de rechter voorkaak aan de binnenzijde, achter het midden, met een grooten, krachtigen tand, achter welks top

zich nog een klein tandje bevindt; de linker voorkaak aan de basis sterk verbreed en dan plotseling sterk naar binnen gekromd, aan de binnenzijde ongetand (Borboropora.)

Voorkaken weinig vooruitstekend, de eene in het midden van de binnenzijde slechts met een klein tandje, de andere van binnen ongetand 29. *Palagria*.

III. Tribus BOLITCHARINI.

- 1 Dekschilden met twee diepe, door eene langsplooi gescheiden basaal-groefjes. Halsschild op de achterhelft met twee diepe, ongeveer tot aan het midden reikende, van achteren door eene dwarsgroef verbonden, naar voren iets divergeerende langsgroeven, bovendien met 3 basaal-groefjes. Kop aan de basis zeer sterk halsvormig ingesnoerd, de hals ongeveer $\frac{1}{2}$ van de breedte van den kop innemende. Prosternum voor de voorcoxae minstens half zoo lang als breed 30. *Autalia*.
- Dekschilden zonder basaal-groefjes. Halsschild voor de basis zonder de twee langsgroeven en zonder de 3 basaal-groefjes. Kop aan de basis niet of slechts eenigszins halsvormig ingesnoerd. Prosternum voor de voorcoxae zeer kort 2
- 2 Mesosternaal-voortzetting van achteren toegespitst, de middelcoxae niet ver van elkaar afstaande of tegen elkaar aanstootend 3
- Mesosternaal-voortzetting van achteren breed afgeknot of uitgerand, de middelcoxae ver van elkaar afstaande. Liptasters 2-ledig 15
- 3 Voor- en middelschenen aan den buitenrand gedoorn. Liptasters 3-ledig 4
- Alle schenen ongedoorn 5
- 4 De eerste 4 leedjes der achtertarsen even lang. Tong kort, aan het uiteinde zeer flauw uitgerand. De paraglossen duidelijk, toegespitst. Voor- en middelschenen aan den buitenrand met eene rij vrij krachtige doornjes 34. *Phytosus*.
- Het eerste lid der achtertarsen verlengd, even lang als de twee volgende leedjes te zamen. Tong verlengd, niet uitgerand. De paraglossen bijna niet uitstekend. Alle schenen dicht en lang bewimperd 35. *Arena*.
- 5 Liptasters 3-ledig (bij het genus *Heterota* is het tweede lid zeer onduidelijk van het eerste gescheiden) 6
- Liptasters 2-ledig 11
- 6 De tong gespleten. Het tweede liptaster-lid korter en smaller dan het eerste 7
- De tong niet gespleten. Het tweede liptaster-lid even lang en weinig of niet smaller dan het eerste lid, soms onduidelijk van elkaar gescheiden 8
- 7 Halsschild veel smaller dan de dekschilden, de zijrandlijn van voren sterk benedenwaarts gebogen, de omgeslagen zijden, van ter zijde gezien, zichtbaar 31. *Bolitochara*.
- Halsschild weinig smaller dan de dekschilden, de zijrandlijn nagenoeg rechtlijnig tegen de afgeronde voorhoeken verloopend, de omgeslagen zijden, van ter zijde gezien, niet zichtbaar. Mesosternum aan de basis kort gekield (Phymatura.)
- 8 Sprieten en pooten lang en slank. Het eerste lid der achtertarsen even lang als de drie volgende leedjes te zamen (Tachysida.)
- Sprieten en pooten matig lang en slank. Het eerste lid der achtertarsen hoogstens even lang als de twee volgende leedjes te zamen 9
- 9 De binnenste lob der achterkaken van buiten hoornachtig, van binnen vliezig, aan den binnenrand naar het uiteinde met ongeveer acht geleidelijk korter wordende tandjes bezet, daarachter op het vliezige gedeelte lang en fijn behaard. De tong nagenoeg tot aan den top van het tweede liptaster-lid reikende, welk lid van het eerste liptaster-lid zeer onduidelijk gescheiden is. De paraglossen steken ver uit (Heterota.)
- De binnenste lob der achterkaken nagenoeg geheel hoornachtig, aan den binnenrand matig dicht bezet met vrij lange, gekromde tandjes, welke naar den naar binnen gebogen top geleidelijk in lengte afnemen, daarachter lijn en niet dicht behaard. De tong niet of slechts weinig langer dan het eerste lid der liptasters. De paraglossen steken nauwelijks uit 10
- 10 Halsschild even breed of iets breder dan de dekschilden, aan de zijden gelijkmatig afgerond of wel naar voren iets meer afgerond en versnald dan naar achteren, de zijrand iets naar onderen gebogen, de omgeslagen zijden, van ter zijde gezien, nauwelijks zichtbaar. Lichaam tamelijk breed en zwak gewelfd 32. *Euryusa*.
- Halsschild smaller of hoogstens even breed als de dekschilden, naar achteren gewoonlijk versnald, de zijrand van voren sterk benedenwaarts gericht, de omgeslagen zijden, van ter zijde gezien, zeer duidelijk zichtbaar 33. *Leptusa*.

- 11 Eerste lid der achtertarsen niet of slechts weinig langer dan het tweede. De eerste 3 leedjes der voortarsen even lang. De tong zeer smal en onverdeeld of minder smal en aan den top gespleten. De beide liptaster-leedjes meer of minder gestrekt 12
- Eerste lid der achtertarsen minstens even lang als de twee volgende leedjes te zamen. Het eerste lid der voortarsen duidelijk langer dan het tweede. De tong zeer breed en kort, van voren zeer breed afgerond. Het eerste lid der korte liptasters verdikt 14
- 12 De liptasters zeer lang gestrekt en vooruitstekend, stijf, borstelvormig. De tong zeer smal, onverdeeld, naar het uiteinde meer of minder versmald. Lichaam tamelijk gewelfd. 36. *Silusa*.
- De liptasters matig lang, niet borstelvormig. De tong minder smal en aan het uiteinde gespleten. Lichaam plat 13
- 13 De slapen van onderen fijn gerand. Het derde kaaktaster-lid matig sterk knoetsvormig verdikt. Het eerste liptaster-lid geknikt, aan de basis verbreed . . (Epipeda Rey) 37. *Homalota*.
- De slapen van onderen niet gerand. Het derde kaaktaster-lid zeer sterk verdikt, eenigszins eivormig. Het eerste liptaster-lid recht en van gelijke breedte. 38. *Thectura*.
- 14 Het derde kaaktaster-lid vrij sterk omgekeerd-kegelvormig verdikt. De dekschilden aan den achterrand binnen de achterhoeken vrij sterk uitgerand. Het achtste tergiet in beide seksen gewoon. Lichaam iets gewelfd (Cyphea.)
- Het derde kaaktaster-lid slechts iets verdikt. De dekschilden aan den achterrand binnen de achterhoeken weinig of niet uitgebogen. Het achtste tergiet is bij het ♂ verdeeld in een al of niet in tandjes gespleten middenstuk en in twee zijtanden of zijdoornen. Lichaam vlak. 39. *Placusa*.
- 15 Voorkaken met gewonen top. Het eerste liptaster-lid niet verdikt 16
- Een der voorkaken met twee tandjes aan den top. Het eerste liptaster-lid verdikt. Mesosternaal-voortzetting breed, tot aan den achterrand der middelcoxae reikend, in het midden iets versmald, aan het uiteinde zeer breed en vlak uitgerand. Lichaam kort en breed, sterk gewelfd (Brachida.)
- 16 Kop tamelijk vooruitstekend, van achteren meer of minder sterk versmald. De tong vrij smal. Het halsschild smaller en korter dan de dekschilden. Mesosternaal-voortzetting naar achteren geleidelijk versmald 40. *Gyrophæna*.
- Kop tot aan de oogen in het halsschild teruggetrokken. De tong zeer breed en kort, van voren breed afgerond. Het halsschild nagenoeg even zoo breed als de dekschilden, ongeveer driemaal zoo breed als lang. De dekschilden kort, niet langer dan het halsschild. De mesosternaal-voortzetting aan het uiteinde even zoo breed als in het midden, zeer breed afgeknut. 41. *Encephalus*.

IV. Tribus OLIGOTINI.

- Bevat slechts het genus 42. *Oligota*.

V. Tribus HYGRONOMINI.

- Bevat slechts het genus 43. *Hygronoma*.

VI. Tribus DIGLOSSINI.

- Bevat slechts het genus 44. *Diglossa*.

VII. Tribus PRONOMAEINI.

- Bevat slechts het genus (Pronomæa.)

VIII. Tribus MYLLAENINI.

- Bevat slechts het genus 45. *Myllaena*.

IX. Tribus GYMNUSINI.

- Bevat slechts het genus 46. *Gymnusa*.

X. Tribus DINOPSINI.

- Bevat slechts het genus 47. *Dinopsis*.

II. Sub-Familie TRICHOPHYINAE.

XI. Tribus TRICHOPHYINI.

- Bevat slechts het genus 48. *Trichophya*.

III. Sub-Familie HABROCERINAE.

XII. Tribus HABROCERINI.

Bevat slechts het genus 49. **Habrocerus**.

IV. Sub-Familie TACHYPORINAE.

XIII. Tribus HYPOCYPTINI.

Bevat slechts het genus 50. **Hypocyptus**.

XIV. Tribus TACHYPORINI.

- 1 Eindlid der kaaktasters even lang of langer dan het voorlaatste lid. Het achtste tergiet in beide seksen 3- tot 6-deelig 2
- Eindlid der kaaktasters klein, priemvormig. Het achtste tergiet bij het ♂ gewoon, bij het ♀ vierdeelig 3
- 2 Mesosternum gekield. De epimeren van den prothorax ontbreken. Voortarsen in beide seksen gewoon 51. **Leucoparyphus**.
- Mesosternum ongekield. Epimeren van den prothorax achter de voorcoxae goed ontwikkeld, groot en cenigszins driehoekig. De eerste 3 voortarsen-leadjes bij het ♂ verbreed. 52. **Tachinus**.
- 3 Achterlijf aan de zijden niet of slechts zeer onduidelijk gerand. De geheele bovenzijde van het lichaam fijn neerliggend behaard 55. **Conurus**.
- Achterlijf met scherp opgerichten zijrand. Kop en halsschild onbehaard 4
- 4 Sprieten zijdelings niet samengedrukt. Vierde tarslid zeer klein 53. **Tachyporus**.
- Sprieten zijdelings samengedrukt. Vierde tarslid slechts $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ korter dan het derde lid. 54. **Lamprinus**.

XV. Tribus BOLITOBINI.

- 1 Eindlid der kaaktasters even lang of langer dan het derde lid. 2
 - Eindlid der kaaktasters klein, priemvormig, veel korter en smaller dan het derde lid. 59. **Mycetoporus**.
 - 2 Eindlid der liptasters zeer groot, veel dikker dan de eerste twee leadjes, aan den scheef afgeknotten top uitgehold. Eerste lid der middel- en achtertarsen op de onderzijde met eenige fijne doortjes 56. **Bryocharis**.
 - Eindlid der liptasters gewoon, niet dikker dan het tweede lid. Eerste lid der middel- en achtertarsen aan de onderzijde niet gedoord 3
 - 3 Tweede lid der liptasters weinig korter en smaller dan het eerste lid, het eindlid nagenoeg even lang als de eerste twee leadjes te zamen, weinig smaller dan het tweede lid. 57. **Bolitobius**.
- De eerste 3 leadjes der liptasters aanmerkelijk in dikte afnemende, het tweede lid slechts half zoo lang en half zoo dik als het eerste, het eindlid weinig langer en veel smaller dan het tweede 58. **Bryoporus**.

V. Sub-Familie STAPHYLININAE.

XVI. Tribus QUEDIINI.

- 1 Voortarsen 5-ledig, de middel- en achtertarsen 4-ledig. Kop nagenoeg tot aan de oogen in het halsschild teruggetrokken, zonder halsvormige insnoering. Kaaktasters lang en slank. In habitus aan *Tachyporus* herinnerend. (Tanygnathus.)
- Alle tarsen 5-ledig. Kop met een duidelijk afgescheiden, kort halsgedeelte. 2
- 2 Eerste sprietlid zeer lang, veel langer dan de 4 volgende leadjes te zamen. Sprieten duidelijk geknikt (Fig. 24) 60. **Acylophorus**.
- Eerste sprietlid kort of slechts een weinig verlengd, hoogstens ongeveer even lang als de twee volgende leadjes te zamen 3
- 3 Eindlid der liptasters bijlvormig 4
- Eindlid der liptasters naar het uiteinde versmald of toegespitst 5

Fig. 24. Spriet van *Acylophorus*. Orig.

- 4 Het eerste sprietlid ongeveer even lang als de twee volgende leedjes te zamen. Kop klein. Voortarsen in beide seksen gewoon (Euryporus.)
 Het eerste sprietlid korter dan de twee volgende leedjes te zamen. Kop vrij groot. Voortarsen in beide seksen verbreed (Astrapaecus.)
- 5 Eindlid der kaak- en liptasters klein, smal, priemvormig. De epimeren van den prothorax onthreken. 61. **Heterothops.**
 Eindlid der kaak- en liptasters even lang of langer dan het voorlaatste lid. Epimeren van den prothorax als driehoekige platen (opercula) achter de voorcoxae ontwikkeld en het daaronder gelegen stigma grootendeels bedekkend 6
- 6 Sprietten van af het vierde lid duidelijk gezaagd, doordat het vierde tot tiende lid naar binnen in eene breedte, aan den top uitgerande dwarsplaat verbreed is. De langslijst, aan weerskanten op de onderzijde van den kop, krachtig ontwikkeld en geheel naar voren reikend. 62. **Velleius.**
 Sprietten gewoon. De langslijst, aan weerskanten op de onderzijde van den kop, reikt of geheel naar voren, of wel tot slechts aan het midden der oogen 1) 63. **Quedius.**

XVII. TRIBUS STAPHYLININI.

- 1 Tong in het midden gespleten of uitgerand. De voortzetting van het metasternum tusschen de achtercoxae tamelijk breed uitgerand, met diep ingezonken top. Kop en halsschild in den regel zeer dicht bestippeld en behaard of wel minstens het halsgedeelte aan de zijden dicht bestippeld 2
 Tong onverdeeld. De voortzetting van het metasternum tusschen de achtercoxae smal gespleten of smal uitgerand, horizontaal uitgebreid, schuin afvallend of ingedrukt. Kop en halsschild meestal glanzig, glad en slechts met weinige haarspittels bezet, zelden tot op het midden van het voorhoofd en op eene breede middellijn van het halsschild na, dicht bestippeld 5
- 2 De middelcoxae staan zeer ver van elkaar. De mesosternaal-voortzetting kort en breed, van achteren in een zeer breeden boog afgerond. Mesosternum niet gekield 3
 De middelcoxae staan niet ver van elkaar verwijderd of wel tegen elkaar aan 4
- 3 Kop en halsschild grootendeels glanzig, glad, slechts aan den omtrek bestippeld en behaard; de halsvormige insnoering van den kop van voren nagenoeg glad, van achteren dicht bestippeld. Sprietten van af het zevende lid verbreed en uiterst lijn en dicht bestippeld. Epipleuren van het halsschild ook van voren tamelijk breed, de scherpe lijst aan den buitenrand naar voren uitgewischt. Bij het ♂ zijn de trochanters en schenen der achterpooten gewoon 64. **Creophilus.**
 Kop en halsschild dicht bestippeld en even als het geheele lichaam dicht en lang wollig behaard. Sprietten van af het zesde lid verbreed en uiterst fijn en dicht bestippeld. De buitenrand der epipleuren van het halsschild vereenigt zich met den binnenrand kort voor de voorcoxae. Bij het ♂ zijn de trochanters der achterpooten sterk haakvormig uitgegroeid en de achterschenen gekromd 65. **Emus.**
- 4 Mesosternum in de middellijn gekield. Halsschild met vooruitstekende of spitse voorhoeken. 66. **Ontholestes.**
 Mesosternum niet gekield. Halsschild zonder vooruitstekende voorhoeken 67. **Staphylinus.**
- 5 De zijrandlijn van het halsschild van voren slechts weinig benedenwaarts gebogen. De groote haarspitt aan den zijrand van het halsschild bevindt zich aan de randlijn zelf of is daarvan niet ver verwijderd. Voortarsen met 3-, bij het ♂ veelal zeer sterk, bij het ♀ meestal zwakker verbreed leedjes; bij sommige soorten in beide seksen gewoon 68. **Philonthus.**
 De zijrandlijn van het halsschild voor het midden sterk benedenwaarts gebogen. De groote haarspitt merklijk van den zijrand van het halsschild verwijderd 6
- 6 Mesosternum tusschen de middelcoxae breed afgerond. Eindlid der kaaktasters zeer lang en slank, naaldvormig, nagenoeg dubbel zoo lang als het voorlaatste lid (Hesperus.)
 Mesosternum tusschen de middelcoxae toegespitst 7
- 7 Eerste lid der achtertarsen lang, langer dan het eindlid. Eindlid der kaaktasters geleidelijk versmald 69. **Cafius.**
 Eerste lid der achtertarsen kort, even lang als het eindlid. Eindlid der kaaktasters sterk toegespitst, naar het uiteinde zeer scherp 8

1) Door dit kenmerk zijn de soorten van dit genus het gemakkelijkst van de in habitus overeenkomende *Philonthus*-soorten te onderscheiden, bij welke deze langsljsten hoogstens slechts aan de basis van den kop aangeduid zijn.

- 8 Tweede sprietlid niet verdikt. De epimeren van den prothorax ontbreken. Mesosternum met eene boogvormige dwarslijst 70. **Neobisnius**.
 Tweede sprietlid verdikt, even dik als het eerste en veel dikker dan het derde. Epimeren van den prothorax als vliezige, driehoekige platen ontwikkeld. Mesosternum zonder dwarslijst 71. **Actobius**.

XVIII. Tribus XANTHOLININI.

- 1 Dekschilden met rechte, niet over elkaar grijpende naadransen. Halsgedeelte van den kop even breed of iets breeder dan de halve kop zelf. Het negende tergiet is bij beide seksen in twee helften gedeeld, welke ieder in een lang doornachtig aanhangsel uitgetrokken is . . . 2
 Dekschilden met over elkaar grijpende naadransen. Halsgedeelte veel smaller dan de halve kop. Het negende tergiet bij het ♂ in twee driehoekige of van achteren afgeknotte langshelften gedeeld, bij het ♀ ongedeeld 3
 2 Bovenlip diep tweelobbig. De slapen gelijkmatig gewelfd. Dekschilden met eene oppervlakkig aangeduide of onduidelijke naadstreep. Mesosternum ongekield. Achterschenen gedoord. 72. **Othius**.
 Bovenlip eenigszins hoekig uitgerand. De slapen van onderen door een stompen langskant begrensd. Dekschilden met scherp aangeduide naadstreep. Mesosternum hoog gekield. Achterschenen ongedoord. 73. **Baptolinus**.
 3 Voorkaken aan de buitenzijde slechts aan de basis iets gegroefd. Mesosternaal-voortzetting zeer breed en kort, van achteren breed afgeknot of in het midden iets uitgerand. De zijrandlijn van het halsschild buigt zich reeds in het achterste derde gedeelte op de onderzijde, doch vereenigt zich eerst in de voorhoeken met den binnenrand der epipleuren. 74. **Eulissus**.
 Voorkaken van buiten tot ver over het midden gegroefd. Mesosternaal-voortzetting driehoekig, aan het uiteinde veelal afgerond. 4
 4 De zijrandlijn van het halsschild buigt zich reeds achter het midden op de onderzijde en vereenigt zich onmiddellijk voor de achtereoxae met den binnenrand der epipleuren. 75. **Nudobius**.
 De zijrandlijn van het halsschild buigt zich voor het midden naar beneden en vereenigt zich eerst in de voorhoeken met den binnenrand der epipleuren. 5
 5 De buitenste voorhoofds-groeven zijn lijn en soms onduidelijk, beginnen nabij de binnenste voorhoofds-groeven in eene haarstip en verloop in eene zijwaartsche richting schreef tegen den voorrand der oogen aan. Eindlid der kaaktasters hoogstens iets smaller dan het uiteinde van het derde lid 76. **Xantholinus**.
 De buitenste voorhoofds-groeven diep, met de binnenste naar voren slechts weinig divergerend, in eene iets schuine richting tegen den binnenrand der oogen verloopend. Eindlid der kaaktasters dun, priemvormig, even lang of iets korter, doch slechts half zoo dik als het derde lid 77. **Leptacinus**.

VI. Sub-Familie PAEDERINAE.

XIX. Tribus PAEDERINI.

- 1 Vierde tarslid gewoon, veelal zijn de eerste 4 leedjes der voortarsen, hetzij alleen bij het ♂ of in beide seksen verbreed 2
 Vierde tarslid tweelobbig. 11
 2 Halsschild minstens $\frac{1}{2}$ van de breedte van den kop 3
 Halsschild zeer dun, aan de voorzijde slechts $\frac{1}{4}$ tot $\frac{1}{2}$ zoo breed als de kop. 10
 3 Sprieten sterk geknikt, het eerste lid nagenoeg even lang als de volgende 4 leedjes te zamen (Fig. 25). Halsgedeelte meer dan half zoo breed als de kop. 78. **Cryptobium**.
 Sprieten niet geknikt, het eerste lid korter of slechts iets langer dan de twee volgende leedjes te zamen 4
 4 Eindlid der kaaktasters breed en kort, afgestompt. De halsvormige insnoering van den kop ongeveer $\frac{2}{3}$ zoo breed als de kop zelf . . . (Dolicion.)
 Eindlid der kaaktasters smal, priemvormig 5
 5 Eindlid der achtertarsen even lang als de eerste 4 leedjes te zamen. Lichaam plat. Kop met meer of minder uitstekende slapen 79. **Achenium**.

Fig. 25. Spriet van *Cryptobium*. Opg.

- Eindlid der achtertarsen korter dan de 3 voorafgaande leedjes te zamen 6
- 6 Eerste lid der achtertarsen niet langer dan het tweede. Lichaam min of meer gewelfd. Kop met afgeronde slapen 7
- Eerste lid der achtertarsen langer dan het tweede 8
- 7 Halsschild langwerpig, weinig gewelfd, verspreid doch slechts matig dicht bestippeld, met breede, gladde middellijn 80. **Lathrobium**.
- Halsschild omgekeerd-eirond, sterk gewelfd, niterst dicht rimpelig bestippeld, bij de in Noordelijk West-Europa voorkomende soort zonder gladde middellijn (Domene.)
- 8 Bovenlip tweelobbig of in het midden uitgerand. De eerste 4 leedjes der voortarsen in beide seksen zeer sterk verbreed en van onderen dicht viltig (Pseudobium.)
- Bovenlip in het midden met twee tandjes. De voortarsen niet of weinig, of slechts bij het ♂ sterker verbreed 9
- 9 Prothorax met driehoekige, de stigmata bedekkende, epimeren. Slapen veel langer dan de oogen. 81. **Medon**.
- Prothorax zonder epimeren, met onbedekte stigmata. Slapen slechts even lang als de oogen. 82. **Lithocharis**.
- 10 De middel- en achterschenen aan het uiteinde zeer scheef afgeknot. Lichaam zeer smal. Kop weinig of niet breder dan het halsschild, uiterst fijn bestippeld 83. **Scopaenus**.
- De middel- en achterschenen aan het uiteinde recht afgeknot. De eerste tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt. Kop veel breder dan het halsschild, rimpelig bestippeld. 84. **Stilicis**.
- 11 Eindlid der kaaktasters breed, kort en stomp, wratachtig op het voorlaatste lid gezeten. Vierde tarsaal-lid zonder vliezig aanhangsel. Episternen van den metathorax bedekt. De halsvormige insnoering van den kop $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ zoo breed als de kop zelf. Kop en halsschild glad en glanzig 85. **Paederus**.
- Eindlid der kaaktasters niterst fijn, priemvormig, zeer moeijelijk zichtbaar. Vierde tarsaal-lid op de onderzijde met een vlies, hetwelk de lobben verbindt. Episternen van den metathorax smal, doch zichtbaar. De halsvormige insnoering van den kop $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ zoo breed als de kop zelf. Bovenzijde van het lichaam meer of minder grof of zeer dicht bestippeld. (Sanius). 86. **Astenus**.

VII. Sub-Familie EUAESTHETINAE.

XX. Tribus EUAESTHETINI.

- Bevat slechts het genus 87. **Euaesthetus**.

VIII. Sub-Familie STENINAE.

XXI. Tribus STENINI.

- Oogen matig groot. De slapen duidelijk aangeduid, meer dan half zoo lang als de langsdoorsnede der oogen. Het zevende sterniet van achteren met twee zeer lange, krachtige wimperharen 88. **Dianous**.
- Oogen zeer groot, de zijden van den kop geheel innemend. Het zevende sterniet van achteren slechts met twee zeer fijne onduidelijke wimperharen 89. **Stenus**.

IX. Sub-Familie OXYPORINAE.

XXII. Tribus OXYPORINI.

- Bevat slechts het genus 90. **Oxyporus**.

X. Sub-Familie OXYTELINAE.

XXIII. Tribus OXYTELINI.

- 1 Tarsen 3-ledig, bij *Thinobius* 2-ledig 2
- Tarsen 5-ledig, 9
- 2 Voor- en middelschenen aan de buitenzijde gedoord 3

- Alle schenen ongedoord. 7
- 3 Prothorax door een kort steelvormig verlengsel van den mesothorax van de dekschilden verwijderd. Het schildje beperkt zich tot den steel van den mesothorax en is niet of nauwelijks tusschen de dekschilden ingeschoven. Wangen tot opname van het eerste sprietlid gegroefd. Sprieten sterk geknikt. De middelcoxae staan dicht tegen elkaar of stooten aanen. 91. **Bledius**.
- Prothorax tegen de dekschilden aansluitend of daarvan iets verwijderd, in welk geval het schildje toch tusschen de dekschilden ingesloten is. De wangen meestal zonder sprietgroef. 4
- 4 Middelcoxae van elkaar afstaande 5
- Middelcoxae elkaar aanrakende 6
- 5 Prothorax zonder epimeren, met onbedekte stigmata. Halsschild met eene enkele, soms slechts zwak aangeduide middengroef. Schildje groot. Dekschilden met breed afgeronde naadhoeken en daardoor aan het uiteinde enigszins divergeerend 92. **Platystethus**.
- Prothorax met goed ontwikkelde, de stigmata bedekkende epimeren. Halsschild met drie, soms oppervlakkig aangeduide middengroeven. Schildje klein. Dekschilden met rechten naadhoek, tot aan het uiteinde tegen elkaar aanstootend 93. **Oxytelus**.
- 6 Eindlid der kaaktasters veel korter dan het voorlaatste, dun, priemvormig. Eindlid der tarsen nagenoeg dubbel zoo lang als de eerste twee leedjes te zamen 94. **Haploderus**.
- Eindlid der kaaktasters iets langer en slechts weinig slanker dan het voorlaatste. Eindlid der tarsen niet of slechts weinig langer dan de eerste twee leedjes te zamen. Tarsen 3-ledig, het eerste lid voor de basis ingesnoerd (Planestomus.)
- 7 Prothorax zonder epimeren, met onbedekte stigmata. Dekschilden zonder epipleuren, aan het uiteinde divergeerend, zoodat de vleugels zichtbaar zijn. Vierde kaaktaster-lid zeer klein, priemvormig of geheel ontbrekend. Tarsen 2-ledig. (Thinobius.)
- Prothorax met goed ontwikkelde, de stigmata bedekkende epimeren. Dekschilden met duidelijk ontwikkelde epipleuren, nagenoeg altijd tot aan het uiteinde tegen elkaar stootend 3
- 8 Eindlid der kaaktasters zeer klein, priemvormig 95. **Trogophloeus**.
- Eindlid der kaaktasters langer dan het voorlaatste lid, aan de basis breed, dan sterk toegespitst. 96. **Ancyrophorus**.
- 9 Voor- en middelschenen aan de buitenzijde gedoord. 10
- Alle schenen ongedoord. 11
- 10 Kop van achteren ingesnoerd. Voorkaken lang, sterk vooruitstekend. De voorste coxaalholten van buiten gesloten, de trochantinen der voorcoxae onzichtbaar. (Acrognathus.)
- Kop van achteren niet ingesnoerd. Voorkaken kort, weinig uitstekend. De voorste coxaalholten naar buiten in eene spleet verbreed, de trochantinen der voorcoxae onbedekt. 97. **Coprophilus**.
- 11 Lichaam tamelijk slank en vlak, aan Anthophagus herinnerend. Sprieten lang en slank, naar het uiteinde iets verdikt, het tweede lid veel slanker dan het eerste. Het sterniet van den tweeden achterlijfsring is geheel ontwikkeld, doch kort, slechts $\frac{1}{2}$ van de lengte van het tweede sterniet bedragend. Halsschild half zoo breed als de dekschilden, hartvormig. 98. **Deleaster**.
- Lichaam kort gedrongen en gewelfd, op de bovenzijde bronskleurig. Sprieten kort, met 3 grootere eindleedjes, het tweede lid even dik als het eerste. Het sterniet van den tweeden achterlijfsring is tot eene smalle dwarslijst gereduceerd. Halsschild weinig smaller dan de dekschilden. 99. **Syntomium**.

XXIV. Tribus PIESTINI.

- Tarsen 5-ledig. Dekschilden zonder langsribben. 100. **Siagonium**.
- Tarsen 3-ledig. Dekschilden met langsribben. (Thoracophorus.)

XXV. Tribus PSEUDOPSINI.

- Bevat slechts het genus (Pseudopsis.)

XXVI. Tribus PHLOEOCHARINI.

- Bevat slechts het genus 101. **Phloeocharis**.

XXVII. Tribus OMALINI.

- 1 Eindlid der kaaktasters uiterst klein, zeer dun priemvormig, het voorlaatste lid sterk verdikt, ei- of peervormig. 102. **Coryphium**.

- Eindlid der kaaktasters weinig of niet slanker dan het voorlaatste lid 2
- 2 Eindlid der achtertarsen veel korter dan de overige 4 leedjes te zamen 3
- Eindlid der achtertarsen nagenoeg even lang, of wel iets langer dan de overige 4 leedjes te zamen. 14
- 3 Voorkaken aan de binnenzijde, voor het midden, van een krachtigen, naar voren gericht, veelal gedeelden tand voorzien 4
- Voorkaken aan de binnenzijde, in het midden, slechts van een klein tandje voorzien, of ongetand. 5
- 4 Klauwen aan de basis elk van een vliezig huidlobje voorzien 103. **Anthophagus.**
Klauwen aan de basis zonder dit vliezig huidlobje (Geodromicus.)
- 5 Eindlid der kaaktasters viermaal zoo lang als het voorlaatste lid. Halsschild hartvormig. Mesosternum gekield. Oogen behaard. 104. **Lesteva.**
Eindlid der kaaktasters hoogstens driemaal zoo lang als het voorlaatste lid 6
- 6 Eerste lid der achtertarsen even lang als de volgende drie leedjes te zamen. Lichaam duidelijk behaard 108. **Philorinum.**
Eerste lid der achtertarsen hoogstens even lang als de volgende twee leedjes te zamen 7
- 7 Spriet kort en dik, het tweede lid verdikt, even lang of iets langer dan het derde, de voorlaatste leedjes verbreed. Lichaam smal, met parallelle zijden, vlak gedrukt. Kop met goed ontwikkelde, nagenoeg parallelle slapen 109. **Xylodromus.**
Spriet meer of minder slank 8
- 8 De zijrand der dekschilden achter het midden in eene sterke bocht benedenwaarts gericht. (Orocharcs.)
De zijrand der dekschilden loopt nagenoeg rechtlijnig door. 9
- 9 Vierde en vijfde sprietlid aan elkaar gelijk 10
Vierde sprietlid veel kleiner dan het vijfde (Phyllodrepoidea.)
- 10 Eerste lid der achtertarsen duidelijk langer dan het tweede. 11
Eerste lid der achtertarsen niet of slechts weinig langer dan het tweede 12
- 11 Kop achter de tamelijk uitpuilende oogen zonder duidelijk ontwikkelde slapen, veelal echter met eene uitstekende, de oogen van onderen en van achteren omgrenzende orbitaal-lijst; de schedel dwars ingedrukt. Bovenlip geheel hoornachtig. Spriet krachtig ontwikkeld. Achterlijf sterk bestippeld. 105. **Acidota.**
Kop achter de weinig uitpuilende oogen met goed ontwikkelde, afgeronde slapen, van achteren in de breedte ingesnoerd. Bovenlip aan den voorrand vliezig. Spriet slank. Achterlijf tamelijk fijn bestippeld of nagenoeg onbestippeld. (Arpedium.)
- 12 Schedel niet ingesnoerd. 106. **Olophrum.**
Schedel meer of minder ingesnoerd 13
- 13 Schedel oppervlakkig ingesnoerd. De zijrand van het voorhoofd sterk opgericht. De zijden van het halsschild over de geheele lengte opgericht. Schenen zeer zwak gedoord. 107. **Lathrimaeum.**
Schedel diep en scherp ingesnoerd. De zijrand van het voorhoofd slechts boven den sprietwortel opgericht. Halsschild naast den zijrand met eene langsgroef, welke voor het midden in een meer of minder duidelijk groeffje eindigt. Schenen krachtig gedoord. . (Deliphrum.)
- 14 Dekschilden veel langer dan het halsschild, den metathorax ver overschrijdend. 15
Dekschilden zeer kort, iets korter dan het halsschild, den metathorax niet overschrijdend. Ongevelegd. Spriet naar het uiteinde tamelijk verdikt (Micralymma.)
- 15 Middel- en achtertarsen gewoon 16
Alle tarsen verbreed en aan weerszijden lang bewimperd. Dekschilden bij het ♂ afgeknut, bij het ♀ soms met uitgetrokken naadhoek 114. **Anthobium.**
- 16 Mesosternum niet gekield. 17
Mesosternum gekield 19
- 17 Eindlid der achtertarsen veel langer dan de 4 voorafgaande, zeer korte leedjes te zamen. Eindlid der kaaktasters veel slanker dan het voorlaatste. Bovenlip van voren recht afgeknut. 110. **Phloeonomus.**
Eindlid der achtertarsen even lang of iets korter dan de 4 voorafgaande leedjes te zamen. Eindlid der kaaktasters aan den wortel even dik als het voorlaatste. Bovenlip van voren uitgerand. 18

- 18 Derde sprietlid gewoon. Achtertarsen langer dan de halve achterschenen . . . 112. **Phyllodrepa**.
Derde sprietlid aan de basis zeer dun. Achtertarsen even lang als de halve achterschenen. 113. **Acrolocha**.
- 19 Lichaam langwerpig en vlak. Voorhoofd boven de oogen zonder verheven langsligt. Halsschild aan de zijden gaaf. 111. **Omalium**.
Lichaam kort gedrongen en sterk gewelfd. Voorhoofd boven de oogen met eene scherpe langsligt. Halsschild aan de zijden gekarteld (Acrulia.)

XXVIII. Tribus PROTEININI.

- 1 Kop op het midden van den schedel met een ocel. De zijrand van het voorhoofd boven den sprietwortel in eene vooruitspringende, door eene insnijding van den clypeus gedeelde, lob verbreed. Halsschild met eene verdiepte middellijn 117. **Phloeobium**.
Kop zonder ocellen. De zijrand van het voorhoofd boven den sprietwortel niet lobvormig verbreed 2
- 2 Halsschild zonder middengroef, met gewone achterhoeken 115. **Proteinus**.
Halsschild met eene verdiepte middengroef en met stomp- of rechthoekig uitgesneden achterhoeken. 116. **Megarthus**.

I. Sub-Familie ALEOCHARINAE.

1. Tribus ALEOCHARINI.

1. Aleochara Gravenh.

Lichaam in den regel breed en dik. Kop aan de basis niet ingesnoerd, min of meer in het halsschild teruggetrokken, de slapen op de onderzijde scherp gerand. Sprietten gewoonlijk vrij kort, naar het uiteinde min of meer verdikt of wel tamelijk lang en naar het uiteinde slechts weinig verdikt. Bovenlip sterk verbreed, aan den voorrand recht afgeknot of zwak uitgerand. Voorkaken aan de binnenzijde ongetand. Kaaktasters 5-ledig, daar het uiteinde van het vierde lid duidelijk afgesnoerd is; lipstasters 4-ledig met uiterst klein eindlid. Onderlip met korte vorksgewijs gespleten, de zeer onduidelijke, afgeronde paraglossen overschrijdende, tong. Halsschild niet of slechts weinig smaller dan de dekschilden, aan de basis soms aan weerszijden zwak uitgebogen. Dekschilden kort, even lang of iets korter, zelden duidelijk langer dan het halsschild, zonder aangeduiden zijkant; aan den achterrand binnen de achterhoeken niet of slechts zwak uitgebogen. De epimeren van den metathorax overschrijden altijd den achterrand der dekschilden. Achterlijf met tamelijk parallelle zijden of naar het uiteinde versmald; het vijfde onbedekt tergiet even lang of iets langer dan het vierde, de eerste 3 of 4 onbedekte tergieten aan de basis in de breedte ingedrukt. Gevelengeld. Voor- en middelschenen aan den buitenrand altijd fijn gedoornd. Alle tarsen 5-ledig, het eerste lid der achtertarsen verlengd. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den recht afgesneden of uitgebogen achterrand gewoonlijk onduidelijk gekarteld of soms duidelijk getand; het zesde sterniet is veelal stomp uitgetrokken en bezwimpert. Bij het sub-gen. Cernota is minstens het eerste onbedekt tergiet van een hultje of tandje voorzien. -- De vermoedelijke larve van A. curtula Goeze (fuscipes Grav.) is door Westwood beschreven. -- De soorten van dit genus leven in aas, rottende paddestoelen en andere plantenstoffen, onder vochtige bladeren, in mos en mest. Een paar soorten leven langs de stranden en op zeeklei, vooral onder doode visch.

Van de ± 70 Europeesche soorten komen 23 in Nederland en 8 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Oogen klein en vlak, van den voorrand van het halsschild op meer dan de lengte van de middellijn van het oog verwijderd. De zijden van het halsschild niet sterk neergebogen, de omgeslagen zijrand, van terzijde gezien, ten minste van voren duidelijk zichtbaar en vlak. Epipleuren der dekschilden over de geheele lengte met tamelijk parallelle zijden, met vrij rechten binnenrand en eerst nabij het uiteinde met eene afronding versmald; het onbedekte gedeelte van de episternen van den metathorax daardoor van voren naar achteren met tamelijk parallelle zijden en eerst door de epimeren aan het uiteinde verbreed. . . . 2

- Oogen groot, vlak of iets gewelfd, van den voorrand van het halsschild op minder dan de lengte van de middellijn van het oog verwijderd. De zijden van het halsschild sterk neergebogen, de omgeslagen zijrand, van terzijde gezien, niet zichtbaar, daar hij steil afvalt en iets uitgehold is. Epipleuren der dekschilden van voren naar achteren versmald; het onbedekte gedeelte van de episternen van den metathorax daardoor van voren naar achteren aanmerkelijk verbreed. Dekschilden zoozeer verkort, dat de epimeren van het metasternum van boven min of meer zichtbaar zijn 7
- 2 Sprieten langer dan kop en halsschild te zamen. Dekschilden zoozeer verkort, dat het uiteinde der episternen van den metathorax van boven zichtbaar is. Soorten met roode of kastanje-bruine dekschilden 3
- Sprieten korter dan kop en halsschild te zamen. Het uiteinde der episternen van den metathorax door de dekschilden bedekt. Achterlijf bij het ♂ zonder bultje, de eerste 3 onbedekte tergiten duidelijk ingedrukt. Eenkleurig grauwwarte, vrij sterk behaarde soorten, welke uitsluitend langs de zeekust leven (Sub-gen. *Polystoma* Steph.) 5
- 3 Achterlijf bij het ♂ zonder bultjes, de eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis ingedrukt (Sub-gen. *Rheochara* Muls.). Bovenzijde pekkwart of pekbruin, de dekschilden kastanje-bruin. Sprieten roodbruin, aan den wortel lichter. Kop en halsschild krachtig en eenigszins verspreid bestippeld, kort goudgeel behaard. Halsschild aan de basis eenigszins hoelijzer-vormig ingedrukt, waardoor de basaalrand in het midden iets opgericht is. Dekschilden even lang of slechts iets korter dan het halsschild, vrij dicht en sterk bestippeld, eveneens goudgeel behaard. Achterlijf vrij lang, duidelijk behaard, de eerste tergiten vrij dicht-, de overigen verspreid bestippeld, geel-bruinachtig gerand. Pooten geelachtig-roodbruin. Onuitgekleurde exemplaren zijn meer licht roodbruin. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Deze zeldzame soort werd eenmaal aan de Grebbe in September in menschen-uitwerpselen aangetroffen. Ook in de Rijnprov. (procera Er.) 3. **spadicea** Er.
- Achterlijf bij het ♂ met een bultje of tand op het eerste en veelal ook op het tweede onbedekt tergiet, de eerste 3 onbedekte tergiten en veelal ook het vierde aan de basis min of meer duidelijk ingedrukt. Dekschilden rood (Sub-gen. *Ceranota* Steph.) 4
- 4 Bovenzijde rood, slechts de kop en de basis van het eerste tergiet, soms ook het midden van het halsschild zwart. Bij het ♂ is het eerste onbedekt tergiet van een zeer krachtig bultje voorzien, het tweede met een veel kleiner bultje; soms vertoont ook het derde onbedekt tergiet een zwak bultje. Het vijfde onbedekt tergiet is van eene eenigszins halveaanvormige verhevenheid voorzien. Het zesde sterniet is bij het ♂ aan weerszijden uitgebogen en in het midden iets uitgetrokken. Deze soort herinnert in habitus en door de vrij lange sprieten aan *Myrmedonia*; zij heeft de grootte van *A. fuscipes*, doch is iets smaller. Halsschild vrij dicht en duidelijk bestippeld, evenals de dicht en vrij sterk dwarsrimpelig bestippelde dekschilden goudgeel behaard. Achterlijf tamelijk glanzig, de eerste tergiten tamelijk verspreid en grof-, de laatste verspreid en lijner bestippeld. Sprieten en pooten roodbruin. Lengte 5—6 mm. Zeer zeldzaam onder afgevallen bladeren. Den Haag, Loosduinen, Lisse, Oldenzaal en Maastricht 4. **ruficornis** Grav.
- Bovenzijde glanzig zwart, slechts de dekschilden rood. Bij het ♂ is het bultje op het eerste onbedekt tergiet soms zwak aangeduid. Kleiner en iets meer gewelfd dan *ruficornis*. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, verspreid en zeer fijn bestippeld, aan de randen soms iets bruinachtig. Dekschilden dicht en grof bestippeld, dichter behaard en minder glanzig dan het halsschild. Achterlijf glanzig, verspreid en fijn bestippeld, de randen der afzonderlijke sternieten, benevens het uiteinde rood. Sprietwortel en pooten roodgeel. Het vijfde onbedekt tergiet bij het ♂ voor het midden van den achterrand gewoonlijk met 1 of 2 kleine bultjes. De achterrand van het zesde sterniet bij het ♂ in het midden stomphoekig. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Onder vochtige bladeren en in mos. Niet inlandsch. In Duitschland. (Cerythroptera Grav.)
- 5 Alle tergiten vrij dicht bestippeld en behaard. Kop, halsschild en dekschilden dof, duidelijk gechagrineerd en fijn bestippeld. Halsschild en dekschilden lang, geelachtig, glanzig behaard, langer dan bij *algarum*. De haartjes van het halsschild zijn door de middellijn vaneen gescheiden en naar beide zijden gericht. Dekschilden aan het uiteinde en aan den naad soms iets pekbruin. Sprieten bruin, iets langer dan de kop. Pooten pekbruin, knieën en tarsen roodachtig. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet lijn gekorrelt en aan het uiteinde recht afgesneden; het zesde sterniet is driehoekig uitgetrokken. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Vrij gemeen langs de stranden onder doode visch en in de eierklompen van *Buccinum undatum*. (*punctatella* Morsch.) 1. **obscura** Grav.
- Alle tergiten verspreid bestippeld en behaard. Halsschild en dekschilden lijn grauwwart behaard 6
- 6 Kop, halsschild en dekschilden dof, gechagrineerd en fijn bestippeld. Deze soort onderscheidt

zich van hare beide verwanten, doordat het halsschild naar de basis meer versmald is en de achterhoeken meer aangeduid zijn, alsmede door de in 't oog vallend krachtige, donkere sprieten, welke even lang zijn als kop en halsschild te zamen. Pooten als bij *obscurella*. Bij het kleinere ♂ is het zesde sterniet stomp en aan weerszijden een weinig uitgerand. Lengte $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$ mm. Gemeen langs de Zeeuwsche stroomen op zeeklei, onder algen en tusschen kleine zeeslakjes. Zeldzamer op de stranden onder rotte visch 2. **algarum** Fauvel.

Kop en halsschild lijn, de dekschilden veel grover bestippeld. Lichaam vrij dicht grauw behaard, minder dof dan bij *algarum*. Achterlijf glanzig-zwart, weinig bestippeld. Overigens in kleur met *obscurella* en *algarum* overeenkomende. Het ♂ is als bij *algarum* onderscheiden. Lengte $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Deze soort zou op het eiland Borkum en bij Hamburg voorkomen. Ook langs de Franse kust (*grisea* Kraatz)

7 Mesosternum tusschen de dicht bijeenstaande middelcoxae met eene langskiel of langslijn (Sub-gen. *Baryodma* Thoms.) 8

Mesosternum tusschen de tamelijk ver van elkaar afstaande middelcoxae niet gekield (Sub-gen. *Aleochara* Lsp.) 27

8 Halsschild over het midden met twee onregelmatige langsrijen van grovere stippels, aan de zijden verspreid, in 't midden niet bestippeld, glanzig, met borstelhaaren aan den zijrand. Mesosternum vlak (*Coprochara* Muls.) 9

Halsschild overal gelijkmatig bestippeld 11

9 De twee stippelrijen op het halsschild, minstens aan de basis, duidelijk verdiept 10

De twee stippelrijen op het halsschild niet verdiept, uit zeer weinige stippels bestaande. Veel smaller en gewoonlijk veel kleiner dan *bilineata*. Blinkend zwart, de dekschilden aan het uiteinde naar de binnenhoeken met eene scherp begrensde geelroode vlek, welke soms zeer klein is en zelfs ontbreken kan. De 6 voorlaatste sprietleedjes zijn iets minder sterk verbreed dan bij *bilineata*. Het halsschild is aan weerszijden van de twee stippelrijen ook minder bestippeld. De dekschilden zijn meer verspreid bestippeld en meer bronzig-zwart. Pooten pekswart met roodbruine tarsen. Sexueel verschil als bij *bilineata*. Lengte $1\frac{1}{2}$ – $3\frac{1}{2}$ mm. Eene in grootte zeer veranderlijke soort; ik bezit een exemplaar dat nauwelijks $1\frac{1}{2}$ mm. lang is. Zeer gemeen in menschen-uitwerpselen. Ook in rottende paddestoelen en onder afgevallen bladeren 7. **nitida** Grav.

10 De twee stippelrijen op het halsschild zijn slechts aan de basis duidelijk verdiept en aldaar met meerrijige stippels bezet. Lichaam breed, glimmend zwart. Halsschild ongeveer even breed als de dekschilden, verspreid bestippeld, behalve op het gladde middengedeelte. Dekschilden vrij dicht en grof bestippeld, aan het uiteinde nabij den zijrand soms roodachtig. Achterlijf vrij dicht en grof bestippeld, aan het uiteinde iets zwakker. Pooten zwartbruin, de tarsen roodbruin. Bij het ♂ is de achterrand van het zesde onbedekt tergiert fijn gekarteld. Lengte 4– $4\frac{1}{2}$ mm. Verbreid doch niet gemeen. In mest en rottende paddestoelen.

5. **bilineata** Gyll.

De twee stippelrijen op het halsschild zijn over de geheele lengte verdiept en grootendeels met éénrijige stippels bezet. Lichaam blinkend zwart, de dekschilden met eene minder scherp afgeteekende roode vlek, welke zich meestal tot aan den buitenrand uitbreidt. Overigens met *nitida* overeenkomende, doch iets smaller. Ook zijn de sprieten iets korter en krachtiger ontwikkeld, aan den wortel meestal lichter gekleurd. Achterlijf veel dichter bestippeld en ook dichter en langer behaard. Lengte $2\frac{1}{2}$ – $3\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Den Haag, Leiden en Roermond (*binotata* Kraatz) 6. **verna** Say.

11 Mesosternum aan de zijden vlak of gewelfd, in het midden met eene fijne kiel. Halsschild meestal met randborstels 12

Mesosternum aan de zijden uitgehold, in het midden met eene krachtige kiel. Halsschild aan de zijden zonder borstels (*Baryodma* Lsp. Muls.) 26

12 Mesosternum aan de zijden vlak of zeer zwak gewelfd, de zijrand bijna niet onder de hoogte der middelcoxae neergedrukt, de langskiel aan het uiteinde hoogstens met enkele wimperhaaren. 13

Mesosternum aan de zijden duidelijk gewelfd, de zijrand duidelijk beneden de hoogte der middelcoxae neergedrukt, de langskiel tot aan het uiteinde sterk bewimperd (*Xenochara* Muls.) Dekschilden aan den achterrand naast de buitenhoeken duidelijk uitgebogen, waardoor deze laatste duidelijk aangeduid zijn. Achterlijf vrij dicht en fijn bestippeld. Lichaam zwart, het halsschild aan alle zijden min of meer roodachtig; de dekschilden donkerrood met een breeden, eenigszins driehoekigen, zwarten naadband en zwarte zijstreep; de sternieten roodachtig gerand. De wortel en het uiteinde der sprieten, benevens de pooten roodgeel. Deze soort herinnert in kleur iets aan *A. crassicornis* Boisdu. Lengte $3\frac{1}{2}$ –4 mm. Niet inlandsch. In Duitschland en Frankrijk (*decorata* Aubé) (*puberula* Klug)

- 13 Het eindlid der sprieten bij het ♂ en het ♀ even lang of nauwelijks langer dan de twee voorafgaande leedjes te zamen 14
- Het eindlid der sprieten is bij het ♂ even lang als de 3, bij het ♀ even lang als de 2 voorafgaande leedjes te zamen (*Dyschারা* Muls.). Dekschilden aan den achterrandsrand naast de buitenhoeken zwak uitgebogen, waardoor deze laatste nagenoeg recht zijn. Deze soort is kenbaar aan het nagenoeg onbestippelde achterlijf, waarvan slechts de eerste tergieten op het ingedrukte gedeelte van de basis duidelijk bestippeld zijn. Glanzig zwart, niet dicht maar vrij grof behaard. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, met sterk afgeronde achterhoeken, tamelijk gewelfd en zeer verspreid en fijn bestippeld. Dekschilden vrij dicht en krachtig bestippeld, soms iets zwart-bruinachtig. Pooten pekbruin, de knieën en tarsen roodbruin. Bij het ♂ is de achterrandsrand van het zesde onbedekt tergiet gekarteld. Lengte 2½ mm. Zeldzaam; aan uitvloeiende boomsappen, onder afgevallen bladeren en aan doode vogels. Den Haag, Scheveningen, Doorn, Kralingen, Wageningen, Hilversum, Amsterdam, Cuyk, Maastricht, Arnhem en Breda. 17. *inconspicua* Aubé.
- 14 Het derde kaaktasterlid naar het uiteinde zwak verbreed, het vierde aan de basis niet verdikt, korter dan het derde (*Polychara* Muls.). 15
- Het derde kaaktasterlid naar het uiteinde sterk verbreed, driehoekig, het vierde aan de basis verdikt en even lang als het derde (*Homoeochara* Muls.). Dekschilden aan den achterrandsrand naast de buitenhoeken zeer zwak uitgerand, waardoor deze laatste nagenoeg recht zijn. Achterlijf op de rugzijde zeer weinig of nagenoeg niet bestippeld, sterk glanzig, de eerste 3 onbedekte tergieten aan de basis duidelijk ingedrukt. Lichaam glanzig zwart of pekzwart, de dekschilden geheel of gedeeltelijk donkerbruin. Sprieten donkerbruin, de pooten geelachtig-rood. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet enigszins uitgerand en onduidelijk gekarteld; het zesde sterniet is aan de zijden uitgerand, in het midden sterk hoekig verlengd en aan de randen lang bewimperd. Lengte 2½—3½ mm. Zeldzaam onder rottende plantentoffen, vooral in bosschen; ook in mest. Scheveningen, Den Haag, Amsterdam, Vlissingen, Maastricht, Valkenburg, Oirschot, Roermond, Ede en Groesbeek (*latipalpis* Rey) 16. *succicola* Thoms.
- 15 Dekschilden aan den achterrandsrand naast de afgeronde buitenhoeken een weinig uitgebogen, zoodat de hoeken zelf iets duidelijker zijn 16
- Dekschilden aan den achterrandsrand niet uitgebogen, met volkomen afgeronde buitenhoeken. Alle tergieten tamelijk gelijkmatig bestippeld 24
- 16 Halsschild en dekschilden met eenigszins opgerichte beharing 17
- Halsschild en dekschilden met meer of minder duidelijk neerliggende beharing 19
- 17 Dekschilden zwart, hoogstens aan het uiteinde roodachtig 18
- Dekschilden licht geelrood. Glanzig zwart, de sprietwortel, de pooten, het uiteinde van het achterlijf en de achterrandsrand der sternieten roodbruin. Kop vrij groot, duidelijk doch verspreid bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, nagenoeg dubbel zoo breed als lang, vrij dicht en duidelijk bestippeld, fijn behaard. Dekschilden even lang als het halsschild, om het schildje iets donkerder, dicht en fijn bestippeld. De eerste tergieten vrij dicht bestippeld. Bij het ♂ is de achterrandsrand van het zesde onbedekt tergiet iets uitgerand en zeer fijn gekarteld. Overigens gelijkt deze soort op *A. sanguinea*, doch zijn de sprieten krachtiger ontwikkeld, de dekschilden lichter gekleurd en fijn bestippeld en de eerste onbedekte tergieten dichter bestippeld. Lengte 3½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik (haemoptera Kr.)
- 18 De eerste tergieten aan de basis krachtig en dicht bestippeld. Lichaam eenkleurig zwart, glanzig, vrij lang en dicht, opgericht, grijs behaard. Het uiteinde der dekschilden naar den binnenhoek gewoonlijk iets roodachtig; bij onuitgekleurde exemplaren breidt zich dit rood wat verder uit. Sprieten geheel zwart. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, meer dan de helft breder dan lang, vrij dicht en niet grof bestippeld. Dekschilden ongeveer even lang als het halsschild, vrij grof en dicht bestippeld. Pooten pekzwart, de schenen veelal pekbruin, de tarsen altijd roodbruin. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet in het midden iets uitgerand en fijn doch duidelijk gekarteld. Lengte 3—4½ mm. Overal zeer gemeen in mest, aas en tussen rottende bladeren, vooral in het voorjaar.
8. *lanuginosa* Grav.
- De eerste tergieten verspreid en fijn bestippeld. Lichaam smaller, meer gestrekt en vlakker dan bij *lanuginosa*. Eenkleurig zwart, eenigszins dof. Sprietwortel en pooten pekbruin, de tarsen roodbruin. Sprieten dunner. Halsschild naar verhouding kleiner dan bij *lanuginosa*, smaller en korter dan de dekschilden, niet dicht bestippeld, bruingrijs behaard. Dekschilden vrij dicht en tamelijk grof bestippeld, weinig glanzig, als het halsschild behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde sterker driehoekig ingetrokken. Lengte 4 mm. O. a. in duivennesten. Niet inlandsch. Vooral in de bergstreken van Duitschland en Frankrijk. Zij zou bij Elberfeld en Oldenburg voorkomen. (*alutacea* Muls. & Rey) (*villosa* Mannerh.)

- 19 Sprietten naar het uiteinde zeer weinig verdikt, het zesde tot tiende lid nauwelijks $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang 20
- Sprietten naar het uiteinde vrij sterk verdikt, het zesde tot tiende lid minstens dubbel zoo breed als lang 22
- 20 Dekschilden lichter of donkerder roodbruin, langs de zijden en om het schildje iets donkerder. Lichaam tamelijk breed. Sprietten donkerbruin met roodbruinen wortel. Halsschild vrij dicht en tamelijk fijn bestippeld, geelachtig behaard. Dekschilden even lang als het halsschild, tamelijk dicht en vrij grof, rimpelig bestippeld, geelachtig behaard. Achterlijf overal verspreid bestippeld. Pooten roodbruin. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergtiet iets opgericht. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Op vochtige plaatsen, in paddestoelen, aan uitvloeiende boomsappen en 's avonds aan grashalmen. Zutphen, Ellecom en Roermond.
(*brunneipennis* Kr., *moerens* Thoms.) 9. *sanguinea* L.
- Dekschilden zwart, eenkleurig of met eene roode vlek aan het uiteinde 21
- 21 Dekschilden zwart, met eene roode vlek aan het uiteinde naar den binnenhoek. Glanzig zwart, vrij dicht en fijn geelgrijs behaard. Halsschild aan de zijranden gewoonlijk iets of wat roodbruin, fijn en niet dicht bestippeld. Dekschilden even lang als het halsschild, vrij dicht bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde meer verspreid bestippeld dan op de eerste tergieten. Pooten roodbruin of pekbruin. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam. Loosduinen, April, uit plantenafval nabij konijnenholen gezeefd. Ook in België bij Hollebeke . 10. *cuniculorum* Kr.
- Dekschilden geheel zwart, dof glanzig en zeer dicht en fijn bestippeld. Deze soort gelijkt zeer op *lanuginosa*, doch is iets vlakker, glanzig zwart, vrij lang grijs behaard. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, de helft breeder dan lang, dicht en tamelijk fijn bestippeld. Achterlijf sterk glanzig, de eerste onbedekte tergieten verspreid-, die naar het uiteinde minder bestippeld. Pooten pekzwart, de tarsen roodbruin. Bij het ♂ is de achterrand van het zesde onbedekt tergtiet iets uitgerand en het zesde sterniet driehoekig uitgetrokken. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen en koemest. Niet inlandsch. In de bergstreken van Duitschland en Frankrijk, o. a. bij Elberfeld en Oldenburg (*rufitarsis* Heer)
- 22 De eerste 4 onbedekte tergieten vrij dicht bestippeld. Glanzig zwart, de dekschilden kastanjebruin, het uiteinde van den voorlaatsen achterlijfsring, benevens de pooten lichtrood. Overigen gelijkt deze soort op *moerens*, doch is wat grooter, breeder en naar voren en naar het uiteinde wat meer versmald. Sprietwortel roodgeel; het zesde tot tiende sprietlid, vooral bij het ♂ sterk verbreed en met een groot geleidelijk toegespitst eindlid. Halsschild vrij dicht en zeer fijn bestippeld, geelachtig behaard. Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild, dicht en tamelijk fijn bestippeld, eveneens geelachtig behaard. Bij het ♂ is de achterrand van het zesde onbedekt tergtiet iets uitgerand en zeer fijn gekarteld. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. In boomzwammen. Niet zeldzaam in de diluviale streken. Ook eenmaal bij Den Haag 11. *mycetophaga* Kr.
- De eerste 4 onbedekte tergieten hoogstens aan de basis bestippeld. Lichaam vrij smal. 23
- 23 De eerste 4 onbedekte tergieten aan de basis vrij dicht bestippeld, de overigen weinig bestippeld. Bovenzijde van het lichaam zwart, sterk glanzig, de dekschilden kastanjebruin; het uiteinde van het achterlijf geel. Sprietwortel en pooten roodgeel, zelden donkerder gekleurd. Eindlid der sprietten vrij groot en stomp toegespitst. Halsschild aan de randen gewoonlijk iets bruinachtig, niet zeer dicht fijn bestippeld. Dekschilden ongeveer even lang als het halsschild, dicht en krachtiger bestippeld. Sexueel verschil als bij *mycetophaga*. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. In paddestoelen, onder mos en afgevalen bladeren. Niet zeldzaam in de diluviale streken. Ook bij Amsterdam en bij Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf (*lugubris* Aubé) 12. *moerens* Gyll.
- Alle tergieten nagenoeg geheel onbestippeld, waardoor deze soort ook vooral van *lanuginosa* onderscheiden is. Bovenzijde glanzig zwart, eenigszins ruw behaard. Halsschild vrij grof en niet dicht bestippeld. Dekschilden grof, dichter en eenigszins rimpelig bestippeld. Sprietwortel roodbruin, het eindlid der sprietten niet bijzonder groot, bij het ♀ de sprietledjes minder verbreed dan bij het ♂ en het vierde lid meer vierkant. Achterlijf bij het ♀ met parallele zijden, bij het ♂ naar het uiteinde iets versmald, eenkleurig zwart. Pooten pekbruin, met roodbruine tarsen en veelal ook met roodbruine schenen. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergtiet meer uitgetrokken en aan het uiteinde fijn gekarteld. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam onder rottende bladeren, in paddestoelen, mest en aan uitvloeiende boomsappen. 13. *moesta* Grav.
- 24 Dekschilden even lang als het halsschild, de buitenhoeken niet sterk afgerond. Lichaam smal, glanzig zwart, eene vlek aan den achterrand der dekschilden, nabij den naad, roodgeel. Halsschild verspreid en fijn, de dekschilden vrij dicht en duidelijk dwars-rimpelig bestippeld. De tergieten grof en eenigszins verspreid bestippeld. Overigen in habitus en kleur aan *nitida* herinnerend. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam. In mest en onder

- mos. Den Haag, Haarlem, Roermond en Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. 14. **bisignata** Er.
- Dekschilden korter dan het halsschild, de buitenhoeken meer in eene duidelijke bocht afgerond. 25
- 25 De tergieten zijn dicht en zeer grof en grover dan de dekschilden bestippeld, glanzig. Bovenzijde glanzig zwart, met eene driehoekige geelroode vlek aan den binnenhoek van het uiteinde der dekschilden. Spriet en pooten zwart of donkerbruin, de sprietwortel soms lichter, de tarsen roodbruin. Laatste sprietlid zeer groot, stomp toegespiest. Halsschild iets smaller dan de iets grover en dichter bestippelde dekschilden. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet in het midden een weinig uitgerand. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Niet zeldzaam in mest, aas, rottende paddestoelen en andere plantenstoffen en langs de stranden onder rotte visch. (nigripes Mill.) 15. **tristis** Grav.
- De tergieten zijn uiterst dicht, doch fijner en niet grover dan de dekschilden bestippeld, eenigszins dof-glanzig. Dekschilden ongeveer dubbel zoo breed als lang. Bovenzijde zwart, de dekschilden geelrood, met eene donkere, driehoekige vlek om het schildje en een donker vlekje in het midden van den zijrand; soms breiden zich de donkere vlekken meer uit en hangen samen of wel ontbreken zij geheel. Overigens met *tristis* overeenkomende. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa. (*tristis* Er.) (*crassiuscula* Sahlb.)
- 26 Dekschilden veel korter dan het halsschild, de buitenhoeken breed afgerond. Halsschild met sterk neergebogen, nagenoeg rechte voorhoeken. Bovenzijde zwart, weinig glanzig, de dekschilden met eene roode vlek aan den achterrand. Spriet en pooten vrij kort, de sprietwortel gewoonlijk roodbruin. Pooten rood. Deze soort is bovendien in 't oog vallend door de korte, gedrongen, eenigszins geweldige, naar het uiteinde vrij sterk versmalde gedaante en de zeer dichte bestippeling. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet iets uitgerand en zeer onduidelijk gekarteld. Lengte 3— $4\frac{1}{2}$ mm. Verbreid en niet zeldzaam in mest en rottende paddestoelen in bosschen. Ook onder afgevallen dennennaalden. 18. **bipunctata** Grav.
- Dekschilden iets langer dan het halsschild, de buitenhoeken door eene geringe uitranding van den achterrand duidelijk. Voorrand van het halsschild niet neergebogen, eenigszins stomphoekig afgerond. Bovenzijde geheel zwart, de pooten roodbruin. Het lichaam is van voren breed en versmalt zich naar het uiteinde. Spriet en pooten vrij lang, met iets lichter wortel. Halsschild dubbel zoo breed als lang, dicht en fijn, de dekschilden dicht en vrij sterk dwars-rimpelig bestippeld. Achterlijf op de eerste tergieten dicht-, naar het uiteinde verspreid en fijn bestippeld. Bij het ♂ is de achterrand van het zesde onbedekt tergiet eenigszins uitgerand en fijn gekarteld. De kleinste soort van het genus. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer gemeen onder rottende bladeren, in mest, aas en onder rottend hooi. 19. **morion** Grav.
- 27 Het vijfde sprietlid weinig breder dan het vierde; spriet en pooten naar het uiteinde geleidelijk verdikt, het zesde tot tiende lid hoogstens dubbel zoo breed als lang. Alle tergieten tamelijk grof en niet dicht bestippeld. 28
- Het vijfde sprietlid veel breder dan het vierde; spriet en pooten van af het vijfde dikker en tot aan het uiteinde van gelijke dikte, het zesde tot tiende lid iets meer dan dubbel zoo breed als lang. 30
- 28 Het vierde sprietlid even lang als breed, het zesde tot tiende hoogstens $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. 29
- Het vierde sprietlid iets breder dan lang, het zesde tot tiende dubbel zoo breed als lang. Bovenzijde glanzig zwart, de dekschilden rood met zwarten zijrand. Halsschild niet dicht, fijn bestippeld. Dekschilden iets korter dan het halsschild, dicht en krachtig bestippeld. Achterlijf op de eerste tergieten iets dichter en fijner bestippeld dan naar het uiteinde. Pooten pekkruin, de schenen lichter, de tarsen roodbruin. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet eenigszins uitgerand en zeer fijn gekarteld. Lengte 3— $4\frac{1}{2}$ mm. Vrij zeldzaam, langs rivieroevers onder doode visch, aanspoelsel en in menschen-uitwerpselen. (rulipennis Er., lateralis Heer) 21. **crassicornis** Boisd. & Lacord.
- 29 Achterlijf naar het uiteinde bijna niet versmald. Het vijfde tot tiende sprietlid weinig breder dan lang. Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild, zeer dicht en tamelijk grof-rimpelig bestippeld. Bovenzijde zwart, fijn grauw behaard, de dekschilden eenigszins mat. Sprietwortel roodbruin. Halsschild ongeveer even breed als de dekschilden, vrij dicht en fijn bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde iets meer verspreid bestippeld dan aan de basis, de afzonderlijke sterniten roodbruin gerand. Pooten pekkruin met roodbruine tarsen, of wel nagenoeg geheel roodbruin. Sexueel verschil als bij *bipunctata*. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Onder vochtig mos en dorre bladeren en in den winter onder aanspoelsel der rivieren. Over het algemeen vrij zeldzaam. 20. **brevipennis** Grav.
- Achterlijf naar het uiteinde duidelijk versmald. Het vijfde tot tiende sprietlid merklijk breder dan lang. Dekschilden korter dan het halsschild, fijner bestippeld dan bij *brevi-*

pennis. Bovenzijde zwart, de dekschilden veelal bruin. Deze soort gelijkt overigens op brevipennis, doch is kleiner. De sprieten zijn iets krachtiger ontwikkeld, met geelrooden wortel. Pooten geheel geelrood. Achterlijf iets minder grof bestippeld 1). Lengte 3½ mm. Onder dorre bladeren, in rottende paddestoelen en in aanspoelsel. Niet inlandsch. In Westfalen (curta Sahlb.) (fumata Grav.)

- 30 Bovenzijde glanzig zwart, de dekschilden op de binnenhelft lichter of donkerder roodbruin of wel bijna geheel roodbruin en slechts met een zwarten zijrand. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet duidelijk, doch niet diep uitgerand en niet gekarteld. Deze soort is zeer in 't oogvallend door de zeer breede sprieten, den breedten, naar het uiteinde eenigszins versmalden vorm en de vrij ruwe beharing. Sprietwortel roodbruin; de pooten pekbruin met roodbruine tarsen of wel nagenoeg geheel roodbruin. Halsschild vrij dicht en duidelijk bestippeld. Dekschilden dichter en veel krachtiger, rimpelig bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde, vooral bij het ♂ eenigszins versmald, op de bovenzijde verspreid grof bestippeld, de sterniten gewoonlijk roodbruin gerand. Lengte 4—7½ mm. Gemeen in menschen-uitwerpselen, zeldzamer onder rottende plantenstoffen (fuscipes F.) 22. **curtula** Geze.

Bovenzijde geheel zwart. Lichaam iets breeder en krachtiger gebouwd; de geheel zwarte 2) dekschilden iets grover bestippeld dan bij fuscipes. Bij het ♂ is het eenigszins uitgerande uiteinde van het zesde onbedekt tergiet van 20 à 24 karteltandjes voorzien. Wellicht eene variëteit van fuscipes. Lengte 5—7 mm. Zeer zeldzaam. Laags de Maas bij Maastricht. 23. **lata** Grav.

2. Dinarda Mannerh.

Lichaam tamelijk vlak, van voren breed, naar het uiteinde toegespitst. Kop tamelijk klein, de slapen op de onderzijde scherp gerand. Sprieten kort en krachtig ontwikkeld, met dicht opeengedrongen leedjes, tot over het midden verbreed, naar het uiteinde toegespitst. Bovenlip meer dan driemaal zoo breed als lang, nagenoeg recht afgeknut. Voorkaken tweinig uitstekende, achter het uiteinde aan de binnenzijde met een zeer klein tandje. Binnenste achterkaaks-lob aan het uiteinde met een hoornhaak. Onderlip met vorksgewijs gespleten tong, afgeronde paraglossen en 3-ledige tasters. Halsschild zeer kort en breed, aan de basis breeder dan de dekschilden, met spits uitgetrokken, de schouders omvattende achterhoeken, naar voren afgerond-versmald, aan den voorrand boogsgewijs uitgesneden, aan de basis en aan de zijden niet gerand. De bovenzijde der dekschilden is door een scherp kant van de breede, doch naar de spitse achterhoeken plotseling versmalde, omgeslagen zijden begrensd. Achterlijf naar het uiteinde sterk versmald, de eerste drie onbedekte tergieten aan de basis in de breedte ingedrukt. Tarsen 5-ledig, de leedjes der achtertarsen geleidelijk in lengte afnemende. — De larve van *D. dentata* is door Wasmann bekend geworden. — De soorten van dit genus leven in de nesten van *Formica*-soorten, waarin zij door de mieren indifferent geduld en niet vervolgd worden. Zij leven, zoowel hare larven, van mierenpoppen en doode mieren.

Van de twee Europeesche soorten komt één, in twee sub-species of rassen, in Nederland voor.

Lichter of donkerder steenrood, eenigszins vet-glanzig en zeer fijn behaard, de kop en het midden van het halsschild wat meer uitgebreid, benevens het achterlijf grootendeels zwart-bruin, soms slechts nabij het uiteinde zwartbruin. De wortel en het uiteinde der sprieten, benevens de pooten steenrood. Achterlijf eenigszins verspreid en meer of minder grof bestippeld. De steeds als soorten beschouwde vormen, worden door Wasmann als sub-species of rassen gedruid en als volgt beschreven. — De sub-sp. *Märkelii* Kiew. is de grootste en breedste vorm, 4½—5 mm. lang. De zijden van het halsschild zijn vlak uitgebreid en nauwelijks uitgehold, de zijrand gewoonlijk in een vlakken boog afgerond en de achterhoeken niet zijwaarts uitstekend. De bestippling van het halsschild is verspreid en tamelijk gelijkmatig. Dekschilden donker-rood, de zijden van het halsschild smal licht rood. Sprieten dikker, het vijfde tot negende lid ongeveer dubbel zoo breed als lang. Bij *Formica rufa* L. (= *F. rufa* L. i. sp., pratensis de Geer, truncicola Nyl.). — De sub-sp. *dentata* Grav. i. sp. is slanker, smaller en kleiner dan *Märkelii*, 3½—4½ mm. lang. De zijden van het halsschild zijn uitgehold en iets opwaarts gebogen, de randen gewoonlijk hoekig gebogen en voor de achterhoeken nitgebogen, zoodat deze zijwaarts uitsteken. Het halsschild is dichter en meer

1) Volgens Sharp zou deze soort eene variëteit van *A. brevipennis* zijn.

2) Volgens Mulsant zouden de dekschilden ook soms roodbruin zijn.

ongelijkmatig-, van voren duidelijk dichter en fijner dan aan den achterrand bestippeld. Halsschild en dekschilden lijn-, niet als bij de sub-sp. *pygmaea* ruw raspachtig bestippeld. Het vijfde tot negende sprietlid is de helft breeder dan lang. Dekschilden licht steenrood, de zijden van het halsschild breeder licht rood. Bij *Formica sanguinea* Latr. Overgangsvormen van *Märkelii* tot *dentata* zijn kleiner dan *Märkelii*, op het halsschild dichter en meer ongelijkmatig bestippeld, met sterker uitgeholde en duidelijk uitgerande zijden van het halsschild en met minder dikke sprieten (niet incl.) — De var. *minor* Wasm. van *dentata* is slechts half zoo groot als de typische vorm (bijna $3\frac{1}{2}$ mm.), met dikkere sprieten; zij nadert daardoor de sub-sp. *pygmaea*; de bestippeling en de vorm van het halsschild, alsmede de kleur zijn echter als bij *dentata*, bij welke de zijranden van het halsschild uitgebogen zijn en naar achteren divergeeren; ook is de sculptuur der dekschilden even lijn als bij *dentata*, niet raspachtig. Bij *Exaeten* (Linburg) in aantal in eene kolonie van *Formica rufibarbis*, var. *fusco-rufibarbis* Forel. — De sub-sp. *Hagensii* Wasm. is weinig of niet kleiner en smaller dan *dentata*, $3\frac{1}{2}$ —4 mm. lang. Sprieten dunner (het vijfde tot negende lid nagenoeg vierkant) en lichter bruin; ook is het geheele lichaam iets lichter. De zijden van het halsschild zijn zwakker uitgehold, de zijrand gewoonlijk niet uitgebogen. Halsschild meer verspreid en gelijkmatig, meer als bij de sub-sp. *Märkelii*, bestippeld. De zijden van het halsschild breed geelrood, de dekschilden geelrood, aan de basis iets donkerder. Bij *Formica exsecta* Nyl. (niet incl., in de Rijnprov. bij Homf en Linz). — De sub-sp. *pygmaea* Wasm. (*boica* Fauvel) veel kleiner, smaller en donkerder dan de andere vormen, 3 mm. lang en slechts 1 mm. breed. Halsschild niet breeder dan de dekschilden aan het uiteinde, de zijden nagenoeg recht en min of meer parallel. De bestippeling van het halsschild is dichter, gelijkmatiger en ruwer dan bij *dentata*, ook zijn de dekschilden raspachtig bestippeld. Sprieten dikker, het zesde tot negende lid dubbel zoo breed als lang. Halsschild slechts aan den uitersten zijrand smal roodbruin. Dekschilden roodbruin, met eene driehoekige, zwartachtige basaalvlek om het schildje. Bij *Formica rufibarbis* F., vooral bij de donkere var. *fusco-rufibarbis* Forel (niet incl., in de Rijnprov. bij Linz a/Rh.) 1). Van deze soort, welke alleen in de diluviale streken van ons land voorkomt, is de vorm *Märkelii* minder algemeen, naar het schijnt, dan *dentata* . . . 1. *dentata* Grav.

Homoëusa Kraatz

Lichaam breed, naar achteren sterk versmald. De kop veel smaller dan het halsschild, met de basis vrij diep daarin teruggetrokken, nagenoeg verticaal geplaatst, de slapen op de onderzijde scherp gerand. Sprieten vrij kort, doch krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde sterk verdikt, met dicht opeengedrongen leedjes. Bovenlip van voren breed uitgerand. De linker voorkaak naar de basis breed en in het midden van den binnenrand stomp getand. Halsschild kort en zeer breed, aan de basis breeder dan de dekschilden, aan weerszijden van den achterrand breed uitgebogen, met duidelijk rechte of eenigszins spitse, aan weerszijden over de basis der dekschilden een weinig vooruitstekende achterhoeken, naar voren in eene sterke afronding versmald. Dekschilden even lang als het halsschild, zonder aangeduiden zijkant. Achterlijf naar het uiteinde sterk versmald, aan de zijden zeer duidelijk gerand, de eerste twee onbedekte tergieten aan de basis in de breedte ingedrukt, het vierde onbedekt tergiert zeer kort, korter dan de voorafgaanden, het vijfde ongeveer dubbel zoo lang als het vierde. Alle tarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven bij mieren.

Van de 2 Europeesche soorten komt één in het omliggend gebied voor.

Lichaam licht roodbruin, geelachtig behaard, de kop veelal iets donkerder, het achterlijf nabij het uiteinde meer of minder uitgebreid zwartbruin. Sprieten roodbruin, naar het uiteinde sterk verdikt. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, iets breeder dan de dekschilden, voor het midden sterk afgerond, de basis aan weerszijden sterk uitgebogen, waardoor de achterhoeken duidelijker worden, vrij dicht en fijn bestippeld. Dekschilden iets dichter en grover bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde vrij sterk toegespitsd, zeer fijn en weinig bestippeld. Pooten roodgeel. Lengte 2—2½ mm. In de nesten van *Lasius fuliginosus* Latr., in welke gangen zij soms in aantal schijnt voor te komen. Ook bij *Lasius niger* L. Zij is zeer vlug in hare bewegingen. In het aangrenzend gebied, bij Chaudfontaine in België en bij Elberfeld. 2)

(*acuminata* Märkel)

1) In Oostenrijk komen nog een paar variëteiten van de sub-sp. *pygmaea* Wasm. voor.

2) Ik vond deze soort bij Göttingen (prov. Hannover) onder steenen, in gezelschap van *Claviger testaceus* Preysl

3. *Microglossa* Kraatz.

Lichaam tamelijk breed en gedrongen, met den habitus van *Aleochara*. Kop min of meer in het halsschild teruggetrokken, de slapen op de onderzijde scherp gerand. Bovenlip nagenoeg driemaal zoo breed als lang, van voren afgeknut of zwak uitgerand. Voorkaken kort en breed, ongelijk gevormd, de linker in 't midden van den binnenrand met een tandje en daarvoor meestal fijn getand, de rechter gewoon. Kaaktasters 4-ledig, liptasters 3-ledig, het derde kaaktaster-lid omgekeerd kegelvormig, het tweede liptaster-lid duidelijk korter en smaller dan het eerste. Tong aan het uiteinde afgerond. Halschild aan de basis even breed of slechts weinig smaller dan de dekschilden, aan weerszijden van de basis zeer zwak uitgerand, de epipleuren zeer sterk omgeslagen, van ter zijde gezien niet zichtbaar. Dekschilden aan den achterrand binnen de achterhoeken duidelijk uitgebogen, zonder aangeduiden zijkant. De epimeren van den metathorax overschrijden den achterrand der dekschilden niet of slechts weinig. Achterlijf tamelijk breed, naar het uiteinde weinig versmald, de eerste 3 onbedekte tergieten aan de basis dwars-gegroefd, het vijfde duidelijk langer dan het vierde. Voor- en middelschenen aan den buitenrand gedoorn. Tarsen 5 ledig. — De soorten van dit genus leven bij mieren en in de nesten van de oeverzwaluw.

Van de 6 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en één in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Het derde sprietlid is even lang als het tweede. Kop en halsschild tamelijk fijn en niet zeer dicht bestippeld 2
- Het derde sprietlid is korter dan het tweede. Kop en halsschild grof en zeer dicht bestippeld 3

- 2 Bovenzijde van het lichaam glanzig zwart, de dekschilden aan het uiteinde naar den naadhoeck gewoonlijk roodachtig. De grootste soort van het genus, met den habitus van *Aleochara lanuginosa*, zeer fijn behaard en met zeer dicht bestippeld achterlijf. Sprieten roodbruin, aan den wortel en het uiteinde lichter. Halsschild fijn en niet dicht bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, iets dichter en veel grover bestippeld. Pooten roodbruin. Bij het ♂ is het vijfde onbedekt tergiet fijn korrelig. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Bij *Lasius fuliginosus*. Den Haag, Noordwijk, Renkum, Doorn, Roermond.

1. *gentilis* Lünemann.

Bovenzijde donkerbruin, de zijden van het halsschild, benevens de dekschilden lichtrood, met eene donkere vlek nabij den buitenhoek en eene iets donkere omgeving van het schildje. De achterrand der tergieten rood. Habitus, grootte en beharing als bij *M. pulla*, doch met meer parallele zijden van het achterlijf. Dichter en fijner bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Bij *Lasius fuliginosus* Latr. en *brunneus* Latr. Niet inl. Bij Düsseldorf (*rufipennis* Kr.) (*marginalis* Grav.)

- 3 Het vierde sprietlid nagenoeg even breed als het vijfde. Bovenzijde zwart, weinig glanzig, dicht, kort geelachtig behaard, dicht en vrij grof bestippeld. Sprieten vrij krachtig ontwikkeld, de eerste twee leedjes en het eindlid geelrood. Dekschilden iets langer dan het halsschild, zwartbruin, de naad en de achterrand soms min of meer roodachtig. Achterlijf zwart, de sterniten roodbruin gerand, zeer dicht en krachtig bestippeld. Pooten geelrood. Bij het ♂ is het vijfde onbedekt tergiet krachtiger bestippeld en fijnkorrelig. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeldzaam onder dorre bladeren en in paddestoelen, ook bij *Lasius fuliginosus* en *brunneus*. Den Haag, Renkum, Roermond. In aantal bij Maastricht.

2. *pulla* Gylb.

Het vierde sprietlid iets smaller dan het vijfde. Bovenzijde zwart, veel fijner en dichter bestippeld dan bij *pulla*, iets korter behaard en nog minder glanzig; de dekschilden rood. Overigens aan *pulla* gelijk en wellicht slechts eene variëteit. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Meermalen in afzonderlijken der duinen, in gaten waarin *Hirundo riparia* nestelt. Ook bij Maastricht en in Overijsel gevangen. 3. *nidicola* Fairm.

4. *Crataraea* Thomson.

Dit genus is zeer verwant aan *Microglossa*, doch onderscheidt zich door de niet gedoornde, doch gewoon behaarde voor- en middelschenen, het slanker, spoelvormig derde kaaktaster-lid en het korter, de voorafgaande sterniten in lengte niet

overtreffend, vijfde onbedekt tergiet. Ook is het lichaam smaller en met meer parallele zijden.

De eenige Europeesche, ook in Nederland voorkomende, soort leeft tusschen hooi en stroo in stallen en kelders, ook in bijenkorven en bij mieren.

Glanzig peckzwart of pekbruin, lijn geelachtig behaard. Kop grooter dan bij de andere soorten.

Halsschild met stompe doch duidelijk aangeduide achterhoeken, zeer lijn en onduidelijk bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, eenigszins verspreid en dwarscimpelig bestippeld, aan de randen meestal roodachtig. Achterlijf met nagenoeg evenwijdige zijden, de randen der afzonderlijke ringen en het uiteinde geelrood. Spriet en pooten rood. Het vijfde tot tiende sprietlid duidelijk breeder dan lang, het vierde iets breeder dan het derde en smaller dan het vijfde, het derde korter dan het tweede. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel roodgeel. Lengte $2\frac{1}{2}$ – $2\frac{3}{4}$ mm. Veelal bij mieren (*Lasius fuliginosus* en *brunneus*), onder dorre bladeren en in aantal uit dood riet en hooi. Ook in stallen en kelders.

(praetexta Er.) 1. *suturalis* Sahlb.

Dasyglossa Kraatz.

Kop min of meer in het halsschild teruggetrokken, de slapen op de onderzijde scherp gerand. Spriet langer dan kop en halsschild te samen. Bovenlip aan den voorrand tweemaal flauw uitgebogen. Voorkaken met sikkelvormig gebogen en vorksgewijs gedeeld top. De beide lobben der achterkaken zijn tamelijk breed en aan het uiteinde gebaard. Kaaktasters 4-, lipstasters 3-ledig. Het tweede lipstasterlid is duidelijk korter en smaller dan het eerste. Tong kort, tot aan de basis gespleten. De paraglossen weinig uitstekend, toegespitst. Halsschild iets korter, doch even breed als de dekschilden, dubbel zoo breed als lang, de epipleuren zeer sterk omgeslagen, van terzijde gezien niet zichtbaar. Dekschilden zonder aangeduiden zijkant, aan den achterrand binnen de achterhoeken duidelijk uitgebogen. Achterlijf naar het uiteinde matig versmald, het eerste onbedekt tergiet aan de basis vrij diep-, het tweede en derde slechts zwak in de breedte ingedrukt, het vijfde onbedekt tergiet langer dan het vierde. Alle tarsen 5-ledig. — De eenige Europeesche soort leeft op vochtige plaatsen onder mos.

In habitus en grootte herinnert zij aan de groote soorten van het genus *Oxypoda*; zij is nog niet in Nederland aangetroffen.

Lichter of donkerder bruin, zeer lijn en dicht bestippeld en uiterst dicht en lijn behaard.

De spriet even als de pooten geelachtig roodbruin; het derde sprietlid weinig langer dan het tweede. De kop en het uiteinde van het achterlijf donkerder gekleurd. De zijden van het halsschild, de schouders der dekschilden benevens de achterrand der achterlijfs-ringen geelachtig-roodbruin. Achterlijf naar het uiteinde bijna niet versmald, zonder afstaande randborstels, de eerste tergieten aan de basis bijna niet ingedrukt. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top stomphoekig verlengd. Lengte $3\frac{1}{2}$ – $3\frac{3}{4}$ mm. Op vochtige plaatsen onder mos en bladeren. In Westfalen (prospera Er.)

5. Oxypoda Mannerh.

Kop eenigszins in het halsschild teruggetrokken. Spriet in lengte en dikte zeer veranderlijk. Bovenlip van voren recht afgesneden. Voorkaken vrij kort en krachtig ontwikkeld, de ene in 't midden van den binnenrand met een tandje, de andere gewoon. De binnenste achterkaakslob aan het boveinde, naar binnen, met vrij lange tandjes bezet. Kin naar voren weinig versmald, breed trapezium-vormig. Tong ongeveer tot aan het midden gespleten. Halsschild groot en breed. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, meer of minder sterk uitgerand. Achterlijf tamelijk gestrekt, naar het uiteinde meer of minder sterk of slechts weinig versmald, aan het uiteinde en veelal ook aan de zijden krachtig beweimperd, de eerste 3 onbedekte tergieten aan de basis dwars ingedrukt, het vijfde onbedekt tergiet in den regel duidelijk langer dan de voorafgaanden. Tarsen 5-ledig. — De meeste soorten zijn onderscheiden door de fijne, dichte neerliggende zijde-glanzige beharing der geheele bovenzijde of ten minste van het uiterst fijn en dicht bestippeld achterlijf. Bij uitzondering is de beharing en bestippeling van het achterlijf minder dicht, of wel is het achterlijf niet zijde-glanzig. — De larve

van *O. ferruginea* Er. is door Xambou en de vermoedelijke larve van *O. attenuata* Rey door Rey beschreven. — De soorten van dit genus leven onder vochtige bladeren en mos, in paddestoelen, stalvuil, stroo, drooge mest, tusschen helm op de duinen en op stuifzand, enkelen uitsluitend bij mieren.

Van de ruim 80 Europeesche soorten komen 21 in Nederland en 8 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprieten duidelijk langer dan kop en halsschild te zamen, naar het uiteinde weinig verdikt . 2
 Sprieten niet of nauwelijks langer dan kop en halsschild te zamen, naar het uiteinde meer of minder sterk verdikt, het derde lid duidelijk korter dan het tweede 12
- 2 Sprieten zeer krachtig ontwikkeld, veel langer dan kop en halsschild te zamen, nagenoeg tot aan het uiteinde der dekschilden reikend, het derde lid korter dan het tweede. Achterlijf naar achteren weinig versmald, zonder randborstels, slechts aan het uiteinde lang afstaande behaard (Sub-gen. *Disochara* Thoms.). Lichaam smal en lang, zwartbruin, uiterst dicht en fijn bestippeld en behaard, weinig glanzig. Sprieten bruin, het eerste lid in den regel, benevens de pooten geelrood. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, breeder dan lang, naar voren versmald, met afgeronde zijden en met een dwarsgroefje aan de basis. Sommige exemplaren zijn meer of minder roodbruin. Lengte 2½—3 mm. Verbreid en niet zeldzaam onder dood riet, aanspoelsel der rivieren en op overstromde weilanden . . . 5. *longiuscula* Grav.
 Sprieten slanker, slechts matig langer dan kop en halsschild te zamen, het derde lid minstens nagenoeg even lang als, veelal langer dan het tweede lid. Achterlijf naar achteren meestal duidelijk versmald en naar het uiteinde gewoonlijk met talrijke afstaande randborstelharen bezet 3
- 3 Halsschild korter en niet breeder dan de dekschilden, aan de basis meestal met een meer of minder duidelijk groefje. De eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis niet diep of scherp ingedrukt. Achtertarsen meestal even lang als de schenen (Sub-gen. *Oxypoda* l.sp.) . . . 4
 Halsschild even lang of langer en meestal iets breeder dan de dekschilden, met sterk afgeronde zijden en achterhoeken, gewoonlijk zonder groefje aan de basis. Achtertarsen iets korter dan de schenen (Sub-gen. *Sphenoma* Mannh.) 9
- 4 Het eerste lid der achtertarsen dubbel zoo lang als het tweede, ongeveer even lang als de twee volgende te zamen. Bovenzijde van het lichaam pekwart of zwartbruin, de dekschilden geel of geelbruin, meestal aan het schildje en langs den naad donkerder, de laatste tergiten met opstaande borstelharen bezet en veelal met rood- of geelachtige randen 5
 Het eerste lid der achtertarsen driemaal zoo lang als het tweede, even lang als de drie volgende te zamen. Sprieten hoogstens aan den wortel min of meer geel 6
- 5 Het vierde sprietlid nagenoeg dubbel zoo lang als breed, het zesde tot tiende duidelijk langer dan breed. Achterlijf naar het uiteinde weinig versmald. Sprieten lichtbruin met geelachtigen wortel. Dekschilden nagenoeg geheel roodachtig-geel, soms aan het schildje en nabij de buitenhoeken donker (abc. *spectabilis* Märk.); zeer dicht en fijn bestippeld. Overigens donkerbruin, weinig glanzig, uiterst fijn en dicht, grauw zijdeachtig behaard. Halsschild fijn en zeer dicht bestippeld, met lichtere randen, een dwarsgroefje aan de basis en eene flauw aangeduide middellijn. Alle tergiten roodgeel gerand. Pooten geel. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top, aan weerszijden uitgebogen en in het midden hockig. Lengte 5—6 mm. Onder afgevallen bladeren en bij *Lasius fuliginosus*. Ik vond eenmaal een typisch exemplaar in October in het Haagsche bosch tegen een boomstam. Ook bij Warnsveld. De abc. *spectabilis* in Westfalen . 1. *ruficornis* Gyll.
 Het vierde sprietlid is weinig langer dan breed, het zesde tot tiende even lang als breed. Achterlijf naar het uiteinde duidelijk versmald. Sprieten donker met lichter wortel. Dekschilden geelbruin, om het schildje en aan de zijden naar de buitenhoeken bruinachtig. Halsschild met iets lichtere zijranden. De tergiten min of meer geelachtig gerand. Overigens eenigszins in kleur op *lividipennis* en in grootte en habitus op *vittata* gelijkende, doch van deze laatste onderscheiden door de slankere sprieten en de achtertarsen, waarvan bij *vittata* het eerste lid even lang is als de 3 volgende te zamen, welke onderling in grootte gelijk zijn, terwijl bij *longipes* het eerste lid nauwelijks langer is dan de 2 volgende en het tweede tot vierde lid geleidelijk in grootte afnemen; ook is bij *longipes* het laatste achtertarsen-lid iets korter dan de twee voorafgaande leedjes, terwijl bij *vittata* dit veel langer is dan het derde en vierde lid. — Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden iets scherphoekig verlengd. Lengte 3½—4½ mm. Op mesthoopen, in plantenafval en aan aas; volgens *Mulsant* bij *Lasius fuliginosus*, volgens *Fauvel* niet myrmecophil. Niet inl. In Noord- en Middel-Europa. (metatarsalis Thoms.) (*longipes* Muls. & Rey)

- 6 Het vierde en vijfde sprietlid duidelijk langer dan breed. Lichaam op de bovenzijde tamelijk vlak, zwartachtig, weinig glanzig, dicht en fijn, grauw, zijdeachtig behaard. Halsschild met licht bruinachtigen zijrand, een groefje aan de basis en met meer of minder duidelijke middellijn. Dekschilden iets langer dan het halsschild, okergeel, met eene eenigszins driehoekige, donkerder vlek om het schildje en iets donkerder achterhoeken. Achterlijf uiterst dicht en fijn bestippeld, met geelbruin gerande ringen. Pooten geel. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top, aan weerszijden uitgebogen en in het midden hoekig verlengd. Lengte $3\frac{1}{4}$ —4 mm. Niet zeldzaam onder vochtige bladeren en in rottende paddestoelen. (luteipennis Er.) 2. **lividipennis** Mannh.
- Het vierde en vijfde sprietlid even lang als breed. 7
- 7 Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, bruin of zwartbruin, elk met eene geelachtige scheve vlek, welke van den schouder naar den naadhoek verloopt. Overigens is het lichaam zwartbruin of bruin. Sprieten zwart met roodachtig wortellid. Halsschild aan de basis iets smaller dan de dekschilden, met een klein dwarsgroefje aan de basis en eene zeer flauw aangeduide middellijn, evenals de dekschilden zeer fijn en zeer dicht bestippeld. De achterlijfsringen zijn roodgeel gerand. Pooten roodgeel. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden aan den top sterk hoekig verlengd. Lengte $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam in molen van holle boomen bij *Lasius fuliginosus*, in de diluviale streken. Zeldzamer bij *Formica rufa* en bij uitzondering in de nesten van *Bombus terrestris* en aan uitvloeiend eikensap. 3. **vittata** Märk.
- Dekschilden nauwelijks $1\frac{1}{4}$ maal zoo lang als het halsschild. 8
- 8 Het derde sprietlid iets langer dan het tweede. De basis van het halsschild aan weerszijden naast de achterhoeken recht. Halsschild ruim $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, aan de basis voor het schildje gewoonlijk met een duidelijk groefje en met eenige aanduiding van langsgroef. Lichaam tamelijk breed en eenigszins gedrongen, naar het uiteinde sterk versmald, zwart; dicht en fijn bruin zijdeachtig behaard. Halsschild aan de zijden soms eenigszins roodbruin, uiterst dicht bestippeld. Dekschilden lichter of donkerder bruin, aan het uiteinde meer roodbruin, zeer dicht en dwars-rimpelig en grover dan het halsschild bestippeld. Achterlijf zeer dicht en fijn bestippeld, de randen der eerste ringen roodbruin. Pooten geelrood. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden aan den top iets hoekig verlengd. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Eene der gemeenste soorten, onder afgevallen bladeren en dood riet . . . 4. **opaca** Grav.
- Het derde sprietlid iets korter dan het tweede. De basis van het halsschild aan weerszijden naast de achterhoeken afgerond. Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, zonder groefje aan de basis en zonder middengroef. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden lichter. Lichaam smal, overigens in kleur met *opaca* overeenkomende, doch kleiner. Bij het ♂ is het zesde sterniet hoekig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (umbrata Er.) (humidula Kr.)
- 9 Het eerste lid der achtertarsen driemaal zoo lang als het tweede, even lang als de 3 volgende leedjes te zamen. Het zesde onbedekt tergiet naar het uiteinde verspreid bestippeld. Halsschild nauwelijks $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. Achterlijf naar het uiteinde niet bijzonder sterk versmald. 10
- Het eerste lid der achtertarsen dubbel zoo lang als het tweede, even lang als de 2 volgende te zamen. Het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde nagenoeg glad. Achterlijf naar het uiteinde vrij sterk versmald, zeer fijn behaard. Bovenzijde zwartbruin, halsschild en dekschilden bruin. Sprieten donkerbruin met lichter wortel. Halsschild, evenals de nagenoeg even lange dekschilden, uiterst dicht en duidelijk bestippeld. Achterrand der achterlijfsringen, benevens de anaalring bruinrood. Pooten geelachtig. Lengte $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Uitsluitend bij Zutphen gevonden. (planipennis Thoms., silvicola Kr.) 8. **atricapilla** Mäklin.
- 10 Dekschilden iets korter dan het halsschild, tamelijk gewelfd. Achterlijf naar het uiteinde zeer weinig versmald. Lichaam zwartbruin, tamelijk glanzig, uiterst fijn zijdeachtig behaard. Halsschild en dekschilden licht roodbruin. Sprieten roodbruin met geelachtigen wortel. Halsschild uiterst fijn en dicht bestippeld, de dekschilden dicht en fijn rimpelig bestippeld, om het schildje en langs den naad iets berookt. Achterrand der tergieten van het zwarte achterlijf, donker roodbruin. Pooten geelrood. Bij minder uitgekleurde exemplaren is de basis van het achterlijf lichter gekleurd. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer gemeen, vooral in de duinstreken onder afgevallen bladeren en oud stroo. Ook in bosschen en volgens *Hassmann* bij *Lasius*-soorten. Volgens *Fauvel* niet myrmecophil 6. **togata** Er.
- Dekschilden even lang als het halsschild, vlakker. Achterlijf naar het uiteinde meer versmald. 11
- 11 Bovenzijde geelrood of licht roodbruin, met donkerder achterlijf, dicht zijdeachtig behaard. Sprieten roodbruin met geelbruin wortellid. Halsschild uiterst dicht en iets fijner dan de dekschilden bestippeld. Achterlijf zwartbruin, zeer dicht zijdeachtig behaard, waardoor de uiterst dichte en fijne bestippeling minder zichtbaar is, de achterranden der afzonder-

lijke ringen, benevens de anaalring roodbruin. Pooten geelrood. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Duitschland en Frankrijk. (abdominalis Mannh.)

Bovenzijde donkerbruin, het halsschild en de dekschilden roodbruin. Halsschild en dekschilden dicht en eenigszins rimpelig bestippeld, vrij sterk en dicht geelgrauw behaard. Achterlijf uiterst dicht en fijn bestippeld en dicht, fijn, zijdeachtig behaard, de achterrand der afzonderlijke ringen benevens de anaalring rood. Sprietwortel en pooten geelrood. Lengte $3-3\frac{1}{2}$ mm. Uiterst zeldzaam. Ik bezit twee exemplaren uit Cuyk in Noord-Brabant.

(praecegens Eppelsheim) 7. *rufa* Kr.

12 Dekschilden even lang of langer dan het halsschild. 13

Dekschilden duidelijk korter dan het halsschild. Achterlijf met nagenoeg parallele zijden, aan het uiteinde een weinig versmald (Sub-gen. *Bessopora* Thoms.) 27

13 De eerste 3 onbedekte tergieten zeer zwak ingedrukt 14

De eerste 3 onbedekte tergieten sterk ingedrukt. Achterlijf naar het uiteinde niet bijzonder sterk versmald, zonder randborstels, slechts aan het uiteinde lang afstaande behaard. Het eerste tarslid dubbel zoo lang als het tweede (Sub-gen. *Mycetodrepa* Thoms.). Bovenzijde roodgeel, de kop en een dwarsband voor het uiteinde van het achterlijf zwart. Sprietten even lang als kop en halsschild te zamen, naar het uiteinde sterk verdikt, donkerbruin met gelen wortel. Het midden van het halsschild, benevens de dekschilden om het schildje en aan de buitenhoeken, beroekt. Achterlijf uiterst dicht en fijn bestippeld, zijdeglanzig behaard. Pooten geel. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan weerszijden aan den top uitgerand en in het midden hoekig verlengd. Lengte $3-3\frac{1}{2}$ mm. Gemeen in paddestoelen, vooral in het najaar. 9. *alternans* Grav.

14 Achterlijf naar het uiteinde versmald en met vele randborstels bezet 15

Achterlijf met nagenoeg parallele zijden, zonder afstaande randborstels, slechts aan het uiteinde lang afstaande behaard (Sub-gen. *Demosoma* Thoms.) 23

15 Het voorlaatste lid der achterkaaks-tasters langer dan het eerste sprietlid; het eindlid uiterst klein. Sprietten naar het uiteinde zeer sterk verdikt (Sub-gen. *Bacoglena* Thoms.) . . . 16

Het voorlaatste lid der achterkaaks-tasters niet langer dan het eerste sprietlid; het eindlid meestal meer dan half zoo lang. Sprietten naar het uiteinde niet bijzonder verdikt (Sub-gen. *Podoxya* Muls.) 17

16 Het voorlaatste kaaktaster-lid even lang als het tweede en derde sprietlid te zamen; het derde sprietlid weinig langer dan het vierde en veel korter dan het tweede. Achterlijf naar het uiteinde sterk versmald, het zesde onbedekt tergiet bijna dubbel zoo lang als het vijfde. Overigens aan *annularis* herinnerend, doch kleiner met langere dekschilden en aan het uiteinde van het achterlijf sterk zwart bewimpeld. Bovenzijde geel. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Duitschland. (praeceox Er.)

Het voorlaatste kaaktaster-lid korter dan het tweede en derde sprietlid te zamen; het derde sprietlid veel langer dan het vierde en weinig korter dan het tweede. Achterlijf naar het uiteinde weinig versmald. Lichaam donkerbruin, halsschild en dekschilden, veelal ook de kop bruingeel. Dekschilden iets minder dicht, doch duidelijker bestippeld dan het halsschild, niet zelden eenigszins beroekt. Achterlijf vrij lang, uiterst dicht en fijn bestippeld, iets zijdeglanzig, roodbruin, voor het uiteinde zwartachtig. Sprietwortel en pooten lichtgeel. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel roestkleurig. Deze soort gelijkt door de kleur op *alternans*, doch is veel kleiner. Lengte 2 mm. Vrij zeldzaam onder dorre bladeren en dood riet. Den Haag, Zeeburg bij Amsterdam, Nootdorp. Ook in België 10. *exoleta* Er.

17 Dekschilden aan den achterrand naast de buitenhoeken duidelijk uitgerand. Alle tergieten gelijkmatig, zeer dicht en fijn bestippeld 18

Dekschilden aan den achterrand naast de buitenhoeken bijna niet uitgerand. De laatste tergieten zijn nagenoeg onbestippeld. Bovenzijde zwart, tamelijk glanzig, de dekschilden en veelal ook het halsschild meer bruinachtig, dicht en fijn behaard. Sprietten zwartbruin met roodgelen wortel. Halsschild uiterst fijn en dicht bestippeld, de dekschilden iets dichter en grover bestippeld dan het halsschild, sterker behaard en daardoor eenigszins dof. Uiteinde van het glanzig zwarte achterlijf donker roodbruin. Pooten roodgeel 1). Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top iets stomphoekig verlengd. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam onder vochtige, dorre bladeren en ook bij *Myrmica laevinodis*.

(investigatorum Kr.) 15. *exigua* Er.

18 Het vijfde sprietlid langer dan het vierde en zesde; het eerste lid der achtertarsen langer dan het tweede en derde te zamen. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden bruin 19

1) Deze soort gelijkt eenigszins op *Atheta pygmaea* Grav., doch is kleiner

- Het vijfde sprietlid niet langer dan het vierde en zesde, het zesde tot tiende lid sterk verbreed; het eerste lid der achtertarsen even lang als het tweede en derde te zamen . . . 21
- 19 Halsschild met eene lijne, maar duidelijke middellijn en met eenigszins stompe achterhoeken. Deze soort komt in habitus en kleur met *umbrata* overeen, doch het halsschild is smaller. Een lichter bruin gekleurd exemplaar uit Maastricht heeft het achterlijf geheel roodgeel, behalve naar het uiteinde zwartachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top stomphoekig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Alleen bij den Haag en Maastricht aangetroffen . . . (neglecta Bris.) 11. *induta* Rey.
- Halsschild zonder middellijn, maar met een groeffje aan de basis . . . 20
- 20 Achterhoeken van het halsschild breed afgerond. Sprieten naar het uiteinde zeer weinig verdikt. Habitus en kleur van *umbrata*, doch iets kleiner, met breeder halsschild, minder sterk zijdeglanzig, overal gelijkmatig, uiterst dicht en fijn bestippeld, weinig glanzig, zwart; halsschild en dekschilden soms donkerbruin. Sprieten donker, met lichter wortel. Halsschild iets fijner dan de dekschilden bestippeld. De laatste twee tergiten aan het uiteinde roodbruin. Pooten roodbruin, met iets donkerder dijën. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top eenigszins hoekig verlengd. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Niet inl. In Westfalen. (Jentula Er.)
- Achterhoeken van het halsschild stomp, weinig of niet afgerond. Sprieten naar het uiteinde tamelijk verdikt. Lichaam zwartbruin, uiterst dicht en fijn bestippeld en fijn grauw zijdeachtig behaard. Halsschild geheel bruin of slechts met bruinachtige zijden; de dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, bruin of roodbruinachtig. Achterlijf met roodbruin gezoomde randen der afzonderlijke sterniten. Eerste sprietlid en pooten geelbruin of roodbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top, in het midden, stomphoekig verlengd. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer verbreed onder vochtige bladeren, aangespoeld riet, dood stroo en bij mieren . . . (cuniculina Er.) 12. *umbrata* Gyll.
- 21 Bovenzijde zwart, uiterst fijn en dicht bestippeld, eenigszins dof zijdeachtig behaard. Sprietwortel, pooten en uiteinde van het achterlijf roodachtig of geelrood. Het laatste sprietlid is iets breeder dan de voorafgaande leedjes. Dekschilden meer bruinachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top hoekig verlengd. Lengte 2 mm. Deze soort zou bij *Formica rufa* voorkomen; volgens *Fauvel* echter niet myrmecophil. Arnhem, Venlo en Tiel. Ook in België . . . 13. *sericea* Heer.
- Halsschild en dekschilden lichter of donkerder roodbruin . . . 22
- 22 Achterlijf verspreid bestippeld en aan het uiteinde glanzig. Kop en achterlijf zwartbruin. Halsschild en dekschilden donker roodbruin, zeer fijn en dicht bestippeld. Sprietwortel en pooten geelachtig-roodbruin. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Uiterst zeldzaam. Eenmaal bij den Haag. 14. *parvula* Bris.
- Achterlijf dicht en gelijkmatig bestippeld. Bovenzijde, benevens de sprieten, roodbruin. Kop en eene breede vlek nabij het uiteinde van het achterlijf, donker gekleurd. Sprietwortel en pooten geelachtig. Halsschild en vooral de dekschilden tamelijk grof en rimpelig bestippeld. Lichaam vrij lang gestrekt. Lengte 2 mm. Niet inlandsch. Bij Düsseldorf. (? riparia Fairm.) (*rugulosa* Kr.)
- 23 Bovenzijde eenkleurig roodgeel, fijn geelachtig behaard. De achterhoeken van het halsschild min of meer recht. Dekschilden even lang als het halsschild, tamelijk grof en rimpelig bestippeld. Sprieten en pooten iets lichter gekleurd. De eerste 5 onbedekte tergiten aan de basis iets donkerder. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Eene uiterst zeldzame soort, welke eenmaal bij Doorn in een nest van *Lasius fuliginosus* werd aangetroffen . . . 16. *testacea* Er.
- Bovenzijde zwartbruin, pekbruin of roodbruin. De achterhoeken van het halsschild min of meer stomp of afgerond . . . 24
- 24 Halsschild nauwelijks $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, niet breeder dan de dekschilden, met weinig afgeronde zijden en afgeronde achterhoeken; de basis aan weerszijden niet uitgebogen. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Het uiteinde van het achterlijf roodachtig. . . 25
- Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang, iets breeder dan de dekschilden aan de basis, met sterk afgeronde zijden en aangeduinde achterhoeken; de basis aan weerszijden duidelijk uitgebogen. Sprieten naar het uiteinde sterk verdikt, de voorlaatste leedjes dubbel zoo breed als lang. . . 26
- 25 Sprieten naar het uiteinde zeer sterk verdikt, geelrood, de voorlaatste leedjes meer dan dubbel zoo breed als lang. Bovenzijde pekbruin, dekschilden bruin. Pooten geel. Overigens heeft deze soort de grootte en habitus van *haemorrhoea*, doch is dichter behaard en daardoor minder glanzig. Onuitgekleurde exemplaren zijn meer geelachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Vrij zeldzaam onder vochtige bladeren, in zandkuilen. Den Haag, Amsterdam en Vogelsang. 17. *amoena* Fairm.

Sprieten naar het uiteinde matig verdikt, donker roodbruin met gelen wortel, de voorlaatste leedjes nauwelijks dubbel zoo breed als lang. Bovenzijde zwartbruin of pekbruin, fijn behaard, eenigszins glanzig. Halsschild uiterst fijn en niet bijzonder dicht bestippeld. Dekschilden iets grover en dicht bestippeld, gewoonlijk iets lichter dan de rest van het lichaam. De randen der afzonderlijke tergiten, benevens de anaalring, geelrood. Pooten geel. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top min of meer stomphoekig. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Gemeen in de nesten van *Formica rufa*, *pratensis* en *truncicola*.

18. *haemorrhoea* Sahlb.

26 Achterhoeken van het halsschild stomp. Bovenzijde donkerbruin, soms meer roodbruin. Sprieten roodbruin, aan de basis iets lichter. Kop zwart. Halsschild uiterst dicht en fijn bestippeld, met een onduidelijk groefje aan de basis en eene meer of minder duidelijke middengroef. Dekschilden zeer dicht en fijn rimpelig bestippeld. Achterlijf zeer dicht en fijn bestippeld, vrij lang zijdeachtig behaard, pekbruin, gewoonlijk aan de basis lichter gekleurd en aan het uiteinde altijd geel-roodachtig. Pooten roodgeel. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Gemeen in de nesten van *Formica rufa*, doch niet in die van de duinstreken. 19. *formiceticola* Märk.

Achterhoeken van het halsschild minder stomp. Bovenzijde van het lichaam roodbruin, de kop en de eerste tergiten, behalve de achterrand, zwartbruin. Deze soort is te herkennen aan het zeer sterk bestippelde en aan de zijden lang bewimperde halsschild, alsmede aan de zeer sterk bestippelde dekschilden, de dunne beharing en den eenigszins gedrongen vorm. Sprieten roodbruin met lichter wortel. Dekschilden nog duidelijker dan het halsschild en meer dwarsrimpelig bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde iets meer verspreid bestippeld. Pooten geelrood. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Deze soort zou bij *Crefeld* voorkomen.

(*rufescens* Kr.)

27 Achterlijf met talrijke randborstels. Bovenzijde licht roodgeel, fijn bestippeld; de middelste tergiten min of meer zwartachtig. Sprieten en pooten geel. Dekschilden duidelijk korter dan het halsschild, zeer fijn behaard en iets minder dicht en fijner bestippeld dan het halsschild. Achterlijf uiterst fijn en dicht bestippeld, zijdeglanzig behaard. Bij sommige exemplaren is het achterlijf eenkleurig roodgeel. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. In bosschen onder vochtige bladeren, vrij zeldzaam. Steeg, Delden, Katwijk en op Texel 20. *annularis* Sahlb.

Achterlijf zonder randborstels. Bovenzijde lichter of donkerder roodbruin. 28

28 Achterlijf tot aan het uiteinde uiterst fijn en dicht bestippeld, met geringen zijdeglans. Lichaam zeer fijn en dicht behaard, tamelijk glanzig, roodbruin; de kop en de middelste achterlijfsringen zwartachtig, de sprietwortel en de pooten geelrood. Bij onuitgekleurde exemplaren is de kop eveneens geelrood. Sprieten kort, naar het uiteinde vrij sterk verdikt, het vierde lid verbreed, de volgende geleidelijk sterker verbreed, de voorlaatste dubbel zoo breed als lang. Halsschild even breed als de dekschilden, de helft breeder dan lang, zeer fijn en dicht bestippeld, met een zeer onduidelijk dwarsgroefje aan de basis en eene nauwelijks aangeduide middellijn. Dekschilden duidelijk korter dan het halsschild, iets minder fijn, doch zeer dicht bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Over het algemeen zeldzaam. Den Haag, Scheveningen, Arnhem, Kralingen, Rotterdam, Noordorp, Hoek van Holland. In groot aantal op Texel.

(*misella* Kr., *forticornis* Fairm., *ferruginea* Muls. & Rey) 21. *brachyptera* Steph.

Achterlijf duidelijk sterker en minder dicht dan het halsschild bestippeld, zonder zijdeglans. Lichaam zeer fijn en dicht behaard, tamelijk glanzig, roodbruin. Kop en de middelste achterlijfsringen zwartachtig. Sprietwortel en pooten geelrood. Sprieten naar het uiteinde tamelijk verdikt, het vierde tot tiende lid geleidelijk verbreed, de voorlaatste leedjes bijna dubbel zoo breed als lang. Halsschild even breed als de dekschilden, de helft breeder dan lang, zeer fijn en dicht bestippeld, zonder basaalgroefje of middellijn. Dekschilden veel korter dan het halsschild, vooral bij het ♂, minder fijn dan het halsschild en tamelijk ruw bestippeld. De bestippeling van het achterlijf is veel krachtiger en veel minder dicht dan bij *brachyptera*. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch. In Oldenburg.

(*fuscula* Muls. & Rey, *subrugosa* J. Sahlb.) (*ferruginea* Er.)

Hygropora Kraatz.

Dit genus is naverwant aan Oxypoda, doch onderscheidt zich door de kortere en krachtiger ontwikkelde voorkaken, de naar het uiteinde gelijkmatig met vrij lange tandjes bezette binnenste achterkaaks-lob, de breedere, aan den top met een klein, vrij scherp bultje bezette, slippen van de tong, de zeer sterk naar voren versmalde, driehoekige,

eenigszins gewelfde kin, welke aan het uiteinde slechts smal afgeknut is en door het korter vijfde onbedekt tergiet, dat weinig in lengte met het vierde verschilt.

De enige Europeesche soort, welke ook in het omliggend gebied voorkomt, leeft onder vochtige, afgevallen bladeren.

Dof zwart, op het voorlijf lijn en dicht bestippeld, overal vrij dicht, grauw behaard. Halsschild even breed als de dekschilden; de dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Sprietwortel en pooten bruin geel of rood geel. Achterlijf zeer dicht-, doch iets grover dan het voorlijf bestippeld. Eindlid der sprieten even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, bij het ♂ in 't midden duidelijk ingesnoerd. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Op vochtige plaatsen en langs beken onder dorre bladeren. In Duitschland en Frankrijk. (cunctans Er.)

6. Mniusa Muls. et Rey.

Dit genus is door den bouw der monddelen en pooten navertwant aan Ocyusa, doch wijkt door den vorm der voorkaken en den eenigszins anderen habitus af. De beide voorkaken zijn aan den binnenrand getand. Kaaktasters vrij kort en dik. De kop is smaller dan het halsschild, naar achteren iets verbreed en daarachter iets ingesnoerd. Oogen tamelijk klein, weinig uitpuilend. Kop en halsschild fijn bestippeld. Pooten vrij kort, het eerste lid der achtertarsen niet langer dan het eindlid.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Halsschild met eene dauidelijk verdiepte middellijn en een meer of minder dauidelijk groefje aan de basis. Sprieten korter dan kop en halsschild te zamen. Lichaam zwart, weinig glanzig, lijn grijs behaard. Kop en halsschild lijn en dicht-, de dekschilden grover en eenigszins rimpelig bestippeld. Achterlijf meer verspreid bestippeld. Sprieten en pooten roodachtig, de dijen soms iets donkerder. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam in bosschen, onder bladeren en mos. Bij den Haag, Bergen-op-Zoom, Berg-en-Dal, Arnhem en Lochem.

1. *incrassata* Muls. & Rey.

Poromniusa Ganglbauer.

Dit genus is navertwant aan Mniusa en Ocyusa; van Mniusa door de aan de binnenzijde ongetande linker voorzaak, van Ocyusa door den bouw der kaaktasters, de kortere pooten en het korter eerste lid der achtertarsen onderscheiden. Ook is het voorlijf zeer grof en diep bestippeld. Kaaktasters vrij kort en dik, veel korter dan bij Ocyusa, het derde lid de helft langer dan het tweede en vrij sterk verdikt. Eerste lid der achtertarsen niet langer dan het eindlid.

De enige Europeesche soort is nog niet in Nederland waargenomen.

Lichaam glanzig zwart, de pooten roodbruin of bruinrood. De kop grof, diep en vrij dicht bestippeld. Sprieten vrij kort, de voorlaatste leedjes dubbel zoo breed als lang, het eindlid nauwelijks zoo lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, aan het uiteinde afgerond. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, vóór het midden ongeveer de helft of een derde breeder dan lang, iets grover en iets dichter bestippeld dan de kop, over het midden soms zwak gegroefd, zeer fijn behaard. Dekschilden niet of slechts weinig langer dan het halsschild, nog grover en dichter dan het halsschild bestippeld, zeer lijn behaard. Achterlijf lijn en matig dicht-, naar het uiteinde iets minder dicht bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. In bosschen onder vochtige bladeren en mos. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland.

(prociua Er.)

Ocyusa Kraatz.

Kop dik, weinig smaller dan het halsschild, in het halsschild niet teruggetrokken, doch iets uitstekend, van achteren zeer zwak ingesnoerd, de slapen op de onderzijde scherp gerand. Oogen matig groot. De rechter voorzaak aan den binnenrand in het midden met een kleinen tand, de linker gewoon. De binnenteb der achterkaken van buiten hoornachtig, van binnen vliezig, aan de binnenzijde, naar het uiteinde, met vrij dicht aanstaande, daarachter met eenige verspreid staande lange, gekromde tanden. Kaaktasters slank, 4, liftasters 3 ledig. Het derde kaaktaster-lid nauwelijks langer dan het tweede,

naar het uiteinde matig verdikt. Het tweede liptaster lid duidelijk korter en smaller dan het eerste. Sprietten vrij kort. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, de epipleuren, van terzijde gezien, meer of minder duidelijk zichtbaar. Dekschilden met duidelijk uitpuilende schouders, aan den achterrand binnen de achterhoeken iets uitgerand, zonder aangeduiden zijkant. Achterlijf met tamelijk parallelle zijden, aan het uiteinde iets versmald, de eerste 3 onbedekte tergieten aan de basis dwars ingedrukt, het vijfde onbedekt tergiet niet of slechts weinig langer dan het vierde, de eerste 3 sterniten aan de basis meestal duidelijk dwars gegroefd. Pooten vrij lang en slank. Alle tarsen 5-ledig; het eerste lid der achtertarsen langer dan het eindlid. De soorten van dit genus herinneren in habitus aan *Calodera*. — Zij leven langs rivieroeveren en op vochtige plaatsen onder afgevallen bladeren.

Van de 10 Europeesche soorten komen 2 in het omliggend gebied voor.

Halsschild iets breeder dan lang, vrij dicht bestippeld. Het eerste achtertarsen-lid dubbel zoo lang als het tweede. Sprietten donker met geelrooden wortel. Dekschilden rimpelig bestippeld. Pooten pekbruin, de knieën en tarsen en soms de schenen min of meer geelbruin. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Op vochtige plaatsen onder afgevallen bladeren en langs beekoeveren. Niet inlandsch. Bij Hamburg, Crefeld en in België. (*maura* Er.)

Halsschild nagenoeg even breed als lang, dicht en iets korrelig bestippeld. Het eerste achtertarsen-lid meer dan dubbel zoo lang als het tweede. Sprietten geheel rood, de pooten roodbruin. Deze soort is naverwant aan *maura*, doch iets grooter en wat meer gestrekt, met iets krachtiger ontwikkelde sprietten, dichter en duidelijker bestippeld halsschild en wat meer grauw-glanzig behaarde dekschilden. Achterlijf iets minder dicht, doch duidelijker bestippeld. Lengte 2 mm. Niet inl. In Noord-Duitschland en Noord-Frankrijk. (*ruficornis* Kraatz) (*picina* Aubé)

7. *Thiasophila* Kraatz.

Lichaam gedrongen en iets gewelfd. Kop aan de basis niet ingesnoerd, met de basis min of meer in het halsschild teruggetrokken, de slapen op de onderzijde scherp gerand. Sprietten vrij kort, krachtig ontwikkeld, met zeer dicht opeengedrongen leedjes. Bovenlip van voren recht afgeknut; de rechter voorkaak in 't midden van den binnenrand met een tandje en daarvoor zeer fijn getand. Kaaktasters 4-, liptasters 3-ledig; het tweede liptaster-lid nagenoeg even lang en even smal als het eerste lid. Halsschild sterk verbreed, even breed of iets breeder dan de dekschilden, aan weerszijden van de basis iets uitgerand, met rechte of eenigszins spits naar achteren getrokken achterhoeken, meestal met een duidelijken basaal-indruk, aan den achter- en zijrand slechts zeer fijn gerand. Dekschilden breed, weinig langer dan het halsschild, zonder aangeduiden zijkant, aan het uiteinde, binnen de achterhoeken, vrij sterk uitgerand. Achterlijf tamelijk breed, naar het uiteinde weinig versmald, de eerste 3 onbedekte tergieten aan de basis dwars ingedrukt; de eerste 3 sterniten aan de basis niet dwars ingedrukt. Pooten vrij kort, alle tarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven in mierennesten.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 Het vijfde tot tiende sprietlid $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. Kop lijn en dicht bestippeld. De achterhoeken van het halsschild zijn niet volkomen recht, doch overigens duidelijk . . . 2

Het vijfde tot tiende sprietlid dubbel zoo breed als lang. Kop sterk bestippeld. Achterhoeken van het halsschild, door sterkere uitranding van den achterrand, recht, de top zelf iets afgerond. Deze soort gelijkt zeer op *angulata*, doch is iets kleiner, de sprietten zijn korter en krachtiger ontwikkeld. Kop en halsschild gewoonlijk pekbruin, zoo ook de dekschilden veelal om het schildje en aan de buitenhoeken. Achterlijf gewoonlijk ook iets donkerder gekleurd dan bij *angulata*. Kop en halsschild veel sterker bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet min of meer hoekig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Uitsluitend bij *Lasius fuliginosus*. Bij Roermond en Doorn. In de Rijnprov. bij Cleef.

2. *inquilina* Märkel.

- 2 Sprieten bruinrood, met geelachtigen wortel en uiteinde, het derde lid duidelijk langer dan het tweede, het laatste lid eenigszins verlengd. Lichaam bruinrood, het voorlijf eenigszins dof, het achterlijf glanzig en vrij lang goudgeel behaard. Kop donker. Achterlijf voor het uiteinde pekbruin. Pooten rood. Halsschild voor de basis soms oppervlakkig in de lengte gegroefd en met een meer of minder duidelijken dwarsindruk. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top hoekig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen in de nesten van *Formica rufa* en *pratensis*. 1. *angulata* Er.

Sprieten dunner en nagenoeg geheel lichtrood, het derde lid nagenoeg even lang als het tweede, het laatste lid iets korter, meer langwerpig-ovaal. Kop en halsschild donkerbruin. Dekschilden en achterlijf lichtrood, soms om het schildje en gewoonlijk aan de zijden der dekschilden donkerder. Het vierde en vijfde onbedekt tergiet grootendeels, het zesde aan de basis pekwart. Halsschild iets meer gewelfd en naar voren iets minder versmald dan bij *angulata*, altijd met eene duidelijke, verdiepte langslin. Pooten geelrood. Overigens aan *angulata* verwant, doch kleiner en te herkennen aan de lichter roode kleur van de dekschilden en het achterlijf. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top min of meer hoekig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. In de nesten van *Formica exsecta*. Niet inl. Bij Linz aan den Rijn. Ik zag een ex. uit de collectie *Hasmann*. (*canaliculata* Rey)

8. *Stichoglossa* Fairm. et Laboulb.

Dit genus herinnert in habitus aan *Stenus* en is ook naverwant aan *Ischnoglossa*, doch onderscheidt zich door het bredere halsschild, de kortere kaaktasters, de scherp vooruitstekende voorhoeken van de kin, de niet in de breedte gegroefde basis van het vierde onbedekt tergiet en de nauwelijks dwarsgegroefde basis der eerste 3 sterniten. Kaaktasters vrij dik. Sprieten van af het vierde lid vrij los geleed. Bij het ♂ is de naad der dekschilden sterk opgericht en het vijfde onbedekt tergiet voor het midden van den achterrand van een langsbultje voorzien.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zij heeft den habitus van eene kleine *Aleochara* en is zeer kenbaar aan de lichtroode kleur van halsschild en dekschilden, alsmede aan den zwarten kop en het zwarte, sterk glanzige achterlijf. Dekschilden vrij dicht rimpelig bestippeld. Sprieten roodbruin met lichter wortel. Pooten lichtrood. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam onder dorre bladeren en aan uitvloeiende boomsappen. Loosduinen, Arnhem en Roermond, in het voor- en najaar.

1. *semirufa* Erichs.

9. *Dexiogylia* Thoms.

Dit genus is zeer naverwant aan *Ischnoglossa*, doch onderscheidt zich door het bredere halsschild, waarvan de omgeslagen rand, van terzijde gezien, niet zichtbaar is, door het korter eerstelid der achtertarsen, de niet in de breedte ingedrukte basis van het vierde onbedekt tergiet en de minder diep ingedrukte basis der eerste 3 sterniten. De kaaktasters zijn slanker dan bij *Stichoglossa* en de kin is gewoon uitgerand.

De enige Europeesche soort, welke ook in Nederland voorkomt, leeft achter boomschors.

Lichaam roodbruin of bruinrood, fijn behaard en een weinig glanzig. Kop en een ring aan het lichtere uiteinde van het achterlijf zwartachtig. Sprieten en pooten geelrood. Halsschild meer dan de helft breeder dan lang, met sterk afgeronde zijden, in het midden breeder dan de dekschilden, met duidelijke achterhoeken en veelal niet aangeduid dwarsgroefje aan de basis. Halsschild en dekschilden zeer dicht bestippeld. Achterlijf op de eerste ringen dicht, naar het uiteinde meer verspreid bestippeld. Het vijfde onbedekt tergiet is niet of nauwelijks langer dan het vierde, bij het ♂ van achteren afgeknot en zeer zwak getand, aan de achterhoeken meestal met een duidelijk uitstekend tandje. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Verbreid in de diluviale streken, doch overal zeldzaam 1. *corticina* Er.

10. *Ischnoglossa* Kraatz.

Kop met de basis min of meer in het halsschild teruggetrokken; de slapen op de onderzijde scherp gerand. Sprieten van af het vierde lid vrij los geled, naar het uiteinde matig verdikt. Bovenlip van voren nagenoeg recht afgesneden. Kaaktasters tamelijk slank, 4-, de liptasters 3-ledig, het tweede liptaster-lid nagenoeg even lang en even smal als het eerste. Kin geteoon uitgerand. Tong lang en smal, aan het uiteinde gespleten. Halsschild smaller dan de dekschilden, de omgeslagen rand, van terzijde gezien, zichtbaar. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, uitgerand, zonder aangeduiden zijrand. Achterlijf vrij lang en met parallelle zijden, de eerste 4 onbedekte tergieten aan de basis, in de breedte ingedrukt, de eerste 3 sterniten aan de basis duidelijk in de breedte ingesnoerd. Alle tarsen 5-ledig. Eerste lid der achtertarsen weinig korter dan het eindlid.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam met parallelle zijden, roestrood, glanzig, slechts de kop en het achterlijf voor het uiteinde zwart, soms het midden van het halsschild, eene vlek aan het schildje en eene aan den buitenhoek der dekschilden zwartbruin (ab.e. *rufopicea* Kraatz); fijn behaard. Halsschild iets snaller dan de dekschilden, de helft breeder dan lang, aan de zijden zeer weinig afgerond, met stompe achterhoeken en een meer of minder duidelijk dwarsgroefje aan de basis, fijn en niet dicht bestippeld. Dekschilden duidelijk en vrij dicht rimpelig bestippeld. Sprieten en pooten rood. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top iets verlengd. Lengte 2½—3 mm. Gemeen achter eiken- en beukenschors, vooral in het voorjaar; ook aan uitvloeiende sappen van eiken 1. **prolixa** Grav.

11. *Ocalea* Erichs.

Kop aan de basis ingesnoerd, de slapen aan de onderzijde scherp gerand. Sprieten lang en slank, het eerste lid weinig verdikt. Bovenlip groot en breed, van voren zwak afgerond. Voorkaken sterk gekromd. Tong lang en smal, nagenoeg het uiteinde van het tweede liptaster-lid bereikend; het tweede liptaster-lid weinig korter en smaller dan het eerste. De omgeslagen zijden van het halsschild, van terzijde gezien, zichtbaar. De dekschilden langer dan het halsschild, tamelijk breed, binnen de achterhoeken uitgerand. Achterlijf naar het uiteinde weinig of slechts matig versmald, de eerste 3 onbedekte tergieten aan de basis diep, het vierde meestal slechts zwak, zelden eveneens diep ingedrukt, het vijfde tergiet even lang of langer dan het vierde. De eerste 3 sterniten aan de basis in de breedte ingedrukt. Pooten lang en slank, alle tarsen 5-ledig; het eerste lid der middeltarsen weinig langer dan het tweede; het eerste lid der achtertarsen minstens even lang als de twee volgende leedjes te zamen, langer dan het eindlid. — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen, vooral langs slooten, in uitgedroogde slooten en poelen, onder mos en afgevallen bladeren en langs boschbeekjes.

Van de 16 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

1 Alle tergieten vrij dicht bestippeld, de eerste 4 onbedekte tergieten aan de basis diep ingedrukt. Halsschild niet naar de basis versmald. Het laatste sprietlid langwerpig, eenigszins cilindervormig, even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen (Sub-gen. *Euryalea* Muls.). Glanzig zwart, zeer fijn en verspreid bestippeld en dun grijs behaard. Sprieten en dijen zwartachtig, soms de dijen iets geelachtig, de schenen min of meer, benevens de tarsen geelachtig. Halsschild met een dwarsgroefje aan de basis. Dekschilden veel breeder dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top, in 't midden, eenigszins hoekig verlengd. Lengte 4—4½ mm. Meermalen in de omstreken van den Haag langs duinplassen gevangen. Eveneens bij Rotterdam, Vlaardingen en den Hoek van Holland. Ook in België. Zij komen, evenals de soorten van *Bledius* en *Trogophloeus*, door druk op den bodem te voorschijn 1. **decumana** Er.

Alle tergieten nagenoeg onbestippeld of wel de eerste 4 onbedekte tergieten met enkele stip-peltjes, slechts de eerste 3 onbedekte tergieten aan de basis diep ingedrukt. Halsschild naar de basis meer of minder versmald. Het laatste sprietlid eivormig, korter dan de twee voorafgaande leedjes te zamen (Sub-gen. *Ocalea* isp.) 2

- 2 De omgebogen zijrand van het achterlijf vormt een dikken, bovenop breed gewelfden kant. De eerste 7 sprietleedjes langer dan breed, het achtste tot tiende even lang als breed. Achterlijf in het midden het breedst. Halsschild fijn en onduidelijk bestippeld, met een dwarsgroefje aan de basis, eene uiterst fijne middellijn en met stomp afgeronde achterhoeken. Dekschilden krachtiger en dichter bestippeld. Bovenzijde lichter of donkerder pekbruin of roodbruin, tamelijk glanzig en lijn behaard. Sprietwortel, tasters en pooten geelrood. Achterlijf glanzig zwart, de randen der ringen, benevens de laatste ring nagenoeg geheel, roodbruin. Lengte 4—4½ mm. Uiterst zeldzaam onder zeer vochtige bladeren en mos en aan grashalmen. Rotterdam en Houthem (Limburg) (castanea Er.) 2. **picata** Steph.
- De omgebogen zijrand van het achterlijf vormt eene smalle, sterk opgerichte, scherpkantige lijst. Achterlijf met parallelle zijden, aan het uiteinde versmald. Halsschild duidelijk bestippeld 3
- 3 De eerste 9 sprietleedjes langer dan breed, het tiende even lang als breed. Halsschild dicht en lijn bestippeld. 4
- Hoogstens de eerste 4 sprietleedjes langer dan breed, het vijfde tot zevende even lang als breed, het achtste tot tiende iets breeder dan lang. Halsschild grof en verspreid bestippeld, met een dwarsgroefje aan de basis en eene flauwe aanduiding van de middellijn. Deze soort is doorgaans iets kleiner dan *picata*, iets glanziger en herkenbaar aan de eenkleurige licht-roodgele sprieten en de krachtiger bestippeling; overigens in kleur overeenkomende, de dekschilden gewoonlijk iets lichter dan de kop en het halsschild. Pooten geelrood. Lengte 3½—4 mm. Over het algemeen zeldzaam. Vele exemplaren uit vochtige bladeren gezeefd bij den Haag. Ook bij Haarlem, Amsterdam en Groesbeek. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. 3. **badia** Er.
- 4 Bovenzijde lichter of donkerder pekbruin, zeer dicht en lijn bestippeld, lijn behaard, tamelijk glanzig. Halsschild duidelijk langer dan breed, iets langer dan bij de naverwante *picata* en *badia*; aan de zijden naar het midden eenigszins hoekig verbreed en van daar naar de basis naar binnen gebogen, zoodat de achterhoeken scherp aangeduid zijn. Achterlijf zwartachtig. Het eerste sprietlid, de tasters en de pooten geelachtig-bruin. Lengte 4—4½ mm. Niet inlandsch. Deze soort, welke o. a. in de Rijnprov. voorkomt, leeft langs boschbeken (*rivularis* Miller)
- Bovenzijde geheel zwart, glanzig, de pooten donker roodbruin, de tarsen geelbruin. Halsschild iets breeder dan lang, met een dwarsgroefje aan de basis. Lengte 4—4½ mm. Niet inlandsch. Deze soort komt in Noord-Duitschland en in Frankrijk voor (*concolor* Kiesw.)

12. Chilopora Kraatz.

Dit genus onderscheidt zich van *Ocalea* door den langeren, slankeren vorm, de veel kortere tong, het veel korter tweede liptaster-lid, de nog slankere pooten, het langer eerste lid der middeltarsen en door de uiterst fijne en uiterst dichte, gelijkmatige bestippeling en de neerliggende beharing van het achterlijf. Kop van achteren sterk ingesnoerd. Sprieten slank, het eerste lid slechts weinig verdikt, de voorlaatste leedjes niet of slechts zwak verbreed. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, iets langer dan breed, de omgeslagen zijden, van terzijde gezien, zichtbaar. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, uitgerand. Achterlijf lang gestrekt, met tamelijk parallelle zijden, de eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt, het vijfde onbedekt tergiet langer dan het vierde, de eerste 3 sterniten aan de basis in de breedte gegroefd. Pooten zeer lang en dun, het eerste lid der achtertarsen even lang of nagenoeg even lang als de 3 volgende leedjes te zamen. — De soorten van dit genus hebben de slanke gedaante van *Tachyusa*, doch zijn gemakkelijk te onderscheiden door de zeer slanke sprieten, aan welke het tweede en derde lid even lang is. Zij leven langs oevers van plassen, beken en kanalen, waar zij met snelheid in den zonneschijn rondloopen.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Zwart, uiterst dicht lijn grauw behaard, dof, overal gelijkmatig uiterst dicht en lijn bestippeld. De wortel der lange, slanke, donkere sprieten is, evenals de schenen en de tarsen, roodgeel. Halsschild iets langer dan breed, naar de basis een weinig versmald, aan de zijden voor het midden afgerond, met eenigszins neergebogen voorhoeken, met eene meer of minder duidelijke langsgroef en een dwarsgroefje voor het schildje. Dekschilden veel langer en breeder dan het halsschild. De eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis diep ingedrukt. Eerste achter-

tarsen-lid even lang als de twee volgende leedjes te zamen. Dijen gewoonlijk donkerbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet meer verlengd en aan den top afgerond. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Gemeen langs oevers van rivieren, meren en plassen 1. *longitarsis* Er.

Roodbruin, zeldzamer geelrood, uiterst fijn grijs behaard. Kop en het uiteinde van het achterlijf meer zwartbruin. Halsschild en dekschilden duidelijk en dicht-, het achterlijf uiterst dicht en fijn bestippeld. Sprietten rood met gelen wortel. Halsschild langer dan breed, met eene zeer onduidelijke langsgroef en een duidelijk dwarsgroefje voor de basis. Dekschilden iets langer en breeder en iets minder dicht bestippeld dan het halsschild. Eerste achtertarsen-lid even lang als de 3 volgende leedjes te zamen. Pooten lichtgeel. Deze soort is smaller dan *longitarsis*. Bij het ♂ is het zesde sterniet meer verlengd. Lengte 3—3½ mm. Langs oevers. Eenmaal bij Katwijk, Mei. Ook in de Rijnprov. bij Elberfeld . . . 2. *rubicunda* Er.

Ityocara Thoms.

Dit genus is verwant aan *Calodera*, met denzelfden habitus, doch onderscheiden door den van achteren veel minder ingesnoerden kop, de gerande slapen en de niet in de breedte ingedrukte basis van het vierde onbedekt tergiet. Sprietten krachtig ontwikkeld, het eerste lid als eene korte schaft, het vierde tot tiende lid sterker verbreed dan bij *Chilopora*, waar dit genus overigens eveneens aan verwant is.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam donker bruinrood of zwartbruin, uiterst dicht en fijn bestippeld en mat zijdeglanzig behaard, het eerste lid der bruinroode sprietten en de pooten roodgeel. Onuitgekleurde exemplaren zijn lichter of donkerder roodbruin, met zwartachtigen kop en zwartachtige basis der achterlijfsringen. Sprietten zeer krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde sterk verbreed, het eindlid lang ovaal, even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, in het midden iets gegroefd, voor de basis met een dwarsgroefje. Dekschilden veel langer dan het halsschild, duidelijker en uiterst dicht bestippeld. Deze soort gelijkt eenigszins op *Calodera protensa*, doch onderscheidt zich door den van achteren slechts weinig ingesnoerden kop, het meer verbrede vierde tot tiende spriethid, het breedere, naar achteren nauwelijks versmalde halsschild en de niet dwars ingedrukte basis van het vierde onbedekt tergiet. Lengte 2½—3 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (rubens Er.)

13. Calodera Mannerh.

Kop vooruitstekend, weinig smaller dan het halsschild, van achteren ingesnoerd, de slapen niet gerand. Sprietten matig lang en vrij krachtig ontwikkeld, het eerste lid hoogstens aan den uitersten top eenigszins scheef uitgerand. Bovenlip van voren nagenoeg recht afgeknoot. Voorkaken naar het uiteinde sterk gekromd, aan de binnenzijde niet getand. Tong kort, niet of slechts weinig langer dan het eerste liptaster-lid; het tweede liptaster-lid veel korter dan het eerste. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, met een dwarsgroefje voor het midden der basis, veelal ook met eene middengroef; de omgeslagen zijrand, van terzijde gezien, zichtbaar. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, uitgerand. Achterlijf met tamelijk parallelle zijden, de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt, de eerste 3 sterniten aan de basis in de breedte gegroefd of ingesnoerd. Mesosternum ongekiel. Pooten slank, alle tarsen 5-ledig, het eerste lid der achtertarsen even lang of nagenoeg zoo lang als de 3 volgende leedjes te zamen, langer dan het eindlid. — De soorten van dit genus leven op moerasige plaatsen onder steenen, vochtige bladeren en in *Sphagnum*.

Van de 8 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild met eene meer of minder duidelijke langsgroef over het midden. Bovenzijde zwart, vrij dof, dicht en fijn grauw behaard 2
- Halsschild zonder langsgroef over het midden, slechts met een kleinen indruk aan de basis. Bovenzijde zwart, soms bruin, fijn behaard 3
- 2 Achterlijf naar het uiteinde eenigszins verbreed, minder dicht bestippeld dan halsschild en dekschilden en daardoor iets meer glanzig. Lichaam lang gestrekt, dof grauwzwart door de

dichte, lijne, zijdeachtige beharing. Sprieten langer dan kop en halsschild te zamen, donker bruin, de eerste leedjes soms lichter. Halsschild met vrij duidelijke langsgroef en met een dwarsgroefje aan de basis. Dekschilden veel breeder en de helft langer dan het halsschild. Pooten zwartbruin, de knieën, het uiteinde der schenen en de tarsen geelachtig. Lengte $3\frac{1}{2}$ – $3\frac{3}{4}$ mm. Op zeer vochtige of moerassige plaatsen. Bij Roermond, langs de Maas en bij Zoelen nabij Tiel. Ook in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld . . . 1. *nigrita* Mannrh.

Achterlijf weinig of niet naar het uiteinde verbreed, even dicht en fijn bestippeld en even dof als halsschild en dekschilden. Deze soort gelijk overigens op *nigrita*, doch is kleiner en nog lijner en dichter bestippeld. De middengroef van het halsschild is gewoonlijk minder duidelijk aangeduid, het dwarsgroefje daarentegen duidelijker. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top stomphoekig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Westfalen. (*humilis* Er.) (*protensa* Mannh.)

3 Achterlijf veel meer verspreid bestippeld dan halsschild en dekschilden, glanzig. Het vijfde tot tiende sprietlid iets verbreed, het vijfde iets breeder dan het vierde 4

Achterlijf even dicht en fijn bestippeld en even dof als halsschild en dekschilden. Het vijfde tot tiende sprietlid sterk verbreed, het vijfde aanmerkelijk breeder dan het vierde. Zwartachtig of roodbruin, dicht grijs behaard, onuitgekleurde exemplaren meer geelbruin. Sprieten donkerbruin met lichtere basis. Kop aan de basis sterk ingesnoerd. Halsschild met een dwarsgroefje aan de basis. Dekschilden over den naad een weinig roodachtig. Achterlijf aan het uiteinde gewoonlijk roodbruin. Pooten roodgeel. Bij het ♂ is het zesde sterniet stomphoekig verlengd. Lengte 2 mm. Onder afgevalnen bladeren, langs overstroomde weilanden en langs rivieroevers. Verbreid, doch overal zeldzaam 3. *aethiops* Grav.

4 Sprieten geheel rood, aan de basis geelachtig 5

Sprieten donkerbruin, aan de basis iets lichter. Deze soort is iets kleiner dan *nigrita*, door de dunnere beharing meer zwartachtig schijnend, met meer gewelfd halsschild en iets meer verspreid bestippeld achterlijf. Halsschild iets langer dan breed, veel smaller dan de dekschilden, met een duidelijk dwarsgroefje aan de basis. Dekschilden iets meer verspreid en duidelijker bestippeld dan het halsschild. Pooten zwartachtig, de tarsen roodbruin. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Bij Aken, Crefeld, Oldenburg en Bremen. Ik ken deze soort naar een exemplaar uit het Museum Neervoort v. d. Poll . . . (*aethiops* Gyllh.) (*uliginosa* Er.)

5 Geheel zwart, lijn zijdeachtig behaard. Habitus en kleur van *uliginosa*, doch veel kleiner. Kop, halsschild en vooral de dekschilden nog dichter en lijner bestippeld; achterlijf ook lijner, doch meer verspreid bestippeld. Halsschild met twee kleine, naast elkaar staande, groefjes aan de basis. Dekschilden aan den naad soms iets roodbruin doorschijnend. Pooten zwartbruin met roodgele tarsen of ook nog geelbruine schenen. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top stomphoekig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Roermond in Januari onder mos, Maarsbergen tusschen Sphagnum in Augustus 2. *riparia* Er.

Donker roodbruin, met zwartachtigen kop en achterlijf, met grovere beharing en daardoor meer dofgrauw. Kop, halsschild en dekschilden minder dicht en fijn-, het achterlijf daarentegen, vooral aan de basis, dicht en lijn bestippeld. Pooten roodachtig. Achterrand der afzonderlijke achterlijfsringen roodbruin doorschijnend. Habitus van *riparia*. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top stomphoekig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Bij Crefeld. (*rufescens* Kraatz)

14. *Amarochara* Thoms.

Dit genus is zeer naverwant aan *Calodera* en *Ilyobates* en vooral onderscheiden doordat de top van het eerste sprietlid aan de bovenzijde tot op $\frac{1}{4}$ of $\frac{1}{5}$ der lengte, ter opname van de basis van het tweede lid duidelijk scheef uitgerand is. Tong kort, niet of slechts weinig langer dan het eerste liptasterlid; het tweede liptasterlid veel korter dan het eerste. De omgeslagen zijden van het halsschild, van terzijde gezien, zichtbaar. De soorten van dit genus leven onder vochtige bladeren en mos; eene enkele soort treft men bij *Lasius fuliginosus* en *brunneus* aan.

Van de 6 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

1 De eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte gegroefd. Het derde sprietlid even lang als het tweede. Het mesosternum aan de basis lijn gekield (Sub-gen. *Mniobates* Muls. & Rey). Glanzig pekschwart, de dekschilden kastanjebruin, lijn en verspreid, geelachtig behaard. Halsschild zeer lijn-, de dekschilden sterk en verspreid bestippeld. Achterlijf glanzig zwart, aan het uiteinde roodbruin, weinig of niet bestippeld; de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis diep ingedrukt en in de indrukken grof bestippeld. Sprieten zwartbruin, naar

het uiteinde sterk verdikt. Pooten roodgeel. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets stomphoekig verlengd. Lengte 3—3½ mm. Uiterst zeldzaam. Eenmaal in April langs de Merwede bij Steenwijk in aangespoeld riet. 3. **forticornis** Lac.

Slechts de eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte gegroefd. Het derde sprietlid veel korter dan het tweede. 2

- 2 De slapen fijn gerand (Sub-gen. *Lasiochara* Ganglb.). Glanzig geel- of roodbruin, kop en sprieten iets donkerder, de dekschilden naar het schildje en de naad iets bruinachtig; het achterlijf naar het uiteinde eenigszins zwartachtig, behalve in de ingedrukte basis der eerste onbedekte tergiten nagenoeg onbestippeld. Halsschild en dekschilden zeer fijn en dicht bestippeld en zeer kort geel behaard. Deze soort gelijkt overigens op *forticornis*, doch is kleiner. Lengte 2½ mm. Uiterst zeldzaam. In Juli bij Valkenburg en Aalbeek (Limburg). Zij leeft in de nesten van *Lasius brunneus*. (glabriventris Rye, Sharp) 2. **Bonnairei** Fauvel.

De slapen niet gerand (Sub-gen. *Amarochara* Thoms. isp.). Deze soort heeft den habitus van eene *Atheta* en is kenbaar aan de glanzig zwarte kleur, de buitengewoon krachtig ontwikkelde sprieten en de niet zeer dicht en fijn bestippelde dekschilden en achterlijf. Sprieten donker, weinig lichter aan de basis, met een groot eindlid. Kop aan de basis sterk ingesnoerd. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, nagenoeg vierkant, met afgeronde hoeken. Dekschilden ½ langer dan het halsschild, soms pekkruin of geelbruin. Achterlijf aan het uiteinde gewoonlijk bruin. Pooten geelbruin. Lengte 1½—2 mm. Onder vochtige bladeren, in aanspoelsel en onder drogen koemest. Zeer zeldzaam. In Juli bij Valkenburg (Limburg), Arnhem en Warnsveld. 1. **umbrosa** Er.

15. *Ilyobates* Kraatz.

Kop naar achteren versmald, aan de basis een weinig ingesnoerd, de slapen op de onderzijde krachtig gerand. Sprieten lang en zeer krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Bovenlip van voren nagenoeg recht afgeknut. De monddeelen overigens als bij *Calodera*, de binnenste lob der achterkaken achter aan het uiteinde met meer doortjes bezet en de tong dieper gespleten. Halsschild smaller dan de dekschilden, aan de basis en aan de zijden fijn gerand. Dekschilden langer dan het halsschild, aan den achterrand, binnen de achterhoeken, diep uitgerand. Achterlijf tamelijk gestrekt en met parallelle zijden, de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis zeer diep in de breedte ingedrukt, de eerste 3 sternieten aan de basis dwars ingesnoerd. Mesosternum in het midden gekield. Pooten lang en krachtig ontwikkeld, alle tarsen 5-ledig, het eerste lid der achtertarsen nagenoeg even lang als de 3 volgende ledjes te zamen. — De soorten van dit genus leven in bosschen onder dorre bladeren, vochtig mos of bij mieren.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halsschild nagenoeg vierkant, met afgeronde hoeken, evenals de kop zeer dicht en grof bestippeld. Kop en halsschild zwartbruin. Dekschilden steenrood, iets langer en breeder dan het halsschild, eveneens grof, doch iets minder dicht bestippeld. Achterlijf pekkruin, gewoonlijk nabij het meer geelroode uiteinde donkerder, de afzonderlijke ringen rood gerand en tamelijk fijn bestippeld, de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis diep ingedrukt en in de indrukken zeer grof bestippeld. De krachtig ontwikkelde sprieten en de pooten geelrood. Onuitgekleurde exemplaren zijn lichter gekleurd, doch blijven kop en halsschild altijd iets donkerder. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden sterk hoekig verlengd. Lengte 3½—5 mm. Zeldzaam onder vochtige bladeren, steenen en in het voorjaar in zandkuilen.

1. **nigricollis** Payk.

Halsschild meer aan de zijden afgerond en daardoor min of meer cirkelrond, zeer dicht en fijn bestippeld, met een groefje aan de basis. Dekschilden iets langer en breeder dan het halsschild, dicht en tamelijk grof bestippeld. Achterlijf glanzig, verspreid en fijn bestippeld, de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis diep ingedrukt en in de indrukken zeer grof bestippeld. Lichaam eenkleurig steenrood, met iets lichtere dekschilden en iets donkerder achterlijf, waarvan het uiteinde, evenals de sprieten, geelrood is. Pooten roodgeel. Bij het ♂ is het zesde tergiet stomphoekig verlengd. Lengte 3½—4 mm. Uiterst zeldzaam. Alleen bij Rotterdam en bij Valkenburg (Limburg) gevangen.

(rufus Kraatz) 2. **propinquus** Aubé.

16 Phloeopora Erichs.

Lichaam vrij smal en gestrekt. Kop van achteren vrij sterk ingesnoerd, met breed afgeronde achterhoeken, de slapen op de onderzijde niet of slechts zeer onduidelijk gerand. Sprieten vrij kort, doch krachtig ontwikkeld. Bovenlip meer dan dubbel zoo breed als lang, van voren recht afgeknot. De rechter voorkaak in het midden van den binnenrand getand, de linker ongetand. Het eerste liptaster-lid cilindervormig. De omgeslagen zijden van het halsschild, van terzijde gezien, duidelijk zichtbaar. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, sterk uitgerand. Achterlijf lang gestrekt en met parallelle zijden, de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte diep ingedrukt, de eerste 3 sterniten aan de basis duidelijk in de breedte ingedrukt. Pooten kort, alle tarsen 5-ledig, het eerste lid der achtertarsen langer dan het tweede, doch korter dan de twee volgende leedjes te zamen en korter dan het eindlid. — De soorten van dit genus leven vooral achter de schors van Coniferen, beuken en eiken, waar de larven in de gangen van Tomiciden jacht maken op de larven o. a. van *Tomicus laricis*. De larven van *P. reptans* en *corticalis* zijn door Perris beschreven, ook de pop van *P. reptans*.

Van de 5 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Halsschild slechts weinig smaller dan de dekschilden, breeder dan lang, uiterst fijn gechagrineerd en daardoor dof, met stompe doch duidelijk aangeduide achterhoeken, iets gewelfd, in het midden veelal met twee zeer oppervlakkige, soms versmolten langsgroeven, zeer fijn en dicht bestippeld, evenals de dekschilden met eene fijne en korte, dicht geelachtige beharing; bij het ♂ is de achterrand in het midden iets opgeheven en naar achteren gericht. Kop zwart, iets glanzig, het halsschild zwartbruin of pekbruin, de dekschilden bruinrood, om het schildje niet zelden bruinachtig, het sternum en het achterlijf, behalve het bruinroode uiteinde, zwart, veelal ook de achterranden der eerste ringen roodachtig. De wortel der bruinroode sprieten, de tasters en pooten geelrood. Dekschilden zeer weinig langer dan het halsschild, eenigszins duidelijker- en iets minder dicht dan het halsschild bestippeld. Achterlijf tamelijk glanzig, matig lijn en matig dicht-, naar het uiteinde meer verspreid bestippeld, veel langer en minder behaard dan halsschild en dekschilden; de eerste 4 onbedekte tergiten met eene diepe dwarsgroef aan de basis, het vijfde onbedekt tergiet duidelijk langer dan het vierde. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Gemeen achter schors van eiken, beuken, populieren en vooral van dennen.

1. *reptans* Grav.

Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden 2

- 2 Halsschild veel breeder dan lang, evenals bij *reptans*, uiterst fijn gechagrineerd en daardoor dof, doch evenals de dekschilden minder lijn en minder dicht bestippeld. Dekschilden langer dan bij *reptans*, $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild. Derde kaaktaster-lid bruinachtig. Achterlijf geheel zwart, aan het uiteinde nauwelijks lichter gekleurd, op de eerste onbedekte tergiten vrij sterk en matig dicht-, op het vijfde onbedekt tergiet lijn en zeer verspreid bestippeld. Overigens zeer op *reptans* gelijkend, doch iets smaller. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Zeldzamer dan *reptans*. Eenmaal bij Breda (transita Muls. & Rey) 2. *angustiformis* Baudi.

Halsschild nauwelijks breeder dan lang, lijn en matig dicht bestippeld, niet gechagrineerd, tamelijk glanzig, in het midden meestal met twee oppervlakkige langsdrukken, bij het ♂ het midden van de basis iets opgeheven en naar achteren gericht. Lichaam tamelijk glanzig, zwart. Halsschild zwart of pekbruin, de dekschilden donkerbruin, gewoonlijk slechts aan het uiteinde rood, zelden geheel roodbruin, soms geheel zwart of pekbruin, het uiteinde van het achterlijf donker pekbruin. Sprietwortel, tasters en pooten bruinrood. Dekschilden weinig langer dan het halsschild, minder lijn en minder dicht dan bij *reptans* bestippeld. Achterlijf op de eerste 4 onbedekte, aan de basis diep in de breedte ingedrukte tergiten krachtig en vrij dicht-, op het vijfde onbedekt tergiet veel meer verspreid bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Zeldzamer dan *reptans*. Achter beuken- en plataanschors, ook achter dennenschors.

3. *corticalis* Grav.

Phloeodroma Kraatz.

Dit genus is zeer naverwant aan *Phloeopora*, doch vooral onderscheiden door het aan het uiteinde verdikte eerste liptaster-lid. Ook is het lichaam iets vlakker en iets meer gestrekt, de sprieten zijn iets minder verdikt, de kaaktasters iets korter en de dekschilden naar verhouding langer. Kop op de onderzijde niet gerand. Het eerste lid

der achtertarsen nagenoeg even lang als het tweede en korter dan het eindlid. — De eenige Europeesche, iets aan *Homalota plana* herinnerende soort leeft achter boomschors.

Bovenzijde glanzig zwart, de dekschilden soms pekbruin. Halsschild breder dan lang, naar de basis versmald, met stompe achterhoeken, op de bovenzijde een weinig vlak gedrukt. Dekschilden $\frac{1}{3}$ langer dan het halsschild, langer dan te zamen breed, aan het uiteinde binnen de achterhoeken slechts zwak uitgerand, tamelijk fijn en dicht bestippeld. Achterlijf lang gestrekt, matig fijn en vrij dicht bestippeld, het eerste tot vierde onbedekt tergiet aan de basis in de breedte diep ingedrukt, het zevende tergiet nagenoeg dubbel zoo lang als het zesde. Bij het ♂ zijn de voorlaatste spritleeftjes matig, bij het ♀ sterker verbreed. Pooten pekbruin. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld. Ik ken deze soort naar een exemplaar uit het Weener Hofmuseum (concolor Kr.)

II. Tribus MYRMEDONINI.

17. Ateeles Steph.

Kop klein, de oogen vrij groot, de slapen op de onderzijde niet of slechts stomphoekig gerand. Spruiten vrij lang en krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde iets dunner. Bovenlijf ongeveer dubbel zoo breed als lang, naar voren iets versmald, aan de zijden nagenoeg recht. Voorkaken vrij sterk toegespitst, aan den ongetanden binnenrand met een tamelijk breedten, zeer fijn en dicht bezwimperden vliezigen zoom. De binnenste achterkaaks-lob smaller dan de buitenste, haar hoornachtig gedeelte is aan het uiteinde naar binnen gekromd en loopt in 3 zeer fijne, gekromde tanden uit. Kaaktasters vrij kort, zeer krachtig ontwikkeld, het derde lid cilindervormig, even lang als het slechts weinig breeder tweede lid. Liptasters eveneens krachtig ontwikkeld, 3-ledig, het eerste lid nagenoeg even lang als de twee volgende leeftjes te zamen, kort cilindervormig, het tweede lid ongeveer half zoo lang en half zoo breed als het eerste. Halsschild zeer breed, aan de basis breder dan de dekschilden, eenigszins trapeziumvormig, aan voerszijden van den achterrand diep uitgerand, waardoor de achterhoeken meer of minder spits uitsteken; de ongerande zijden zijn zeer breed opgericht; de weinig omgeslagen, van terzijde gezien, geheel zichtbare, flauw uitgeholde epipleuren zeer breed. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, uitgerand. Achterlijf zeer breed, van achteren sterk opwaarts gekromd, de eerste 3 onbedekte tergieten aan den achterrand zonder gele beharing, doch aan de zeer sterk opgerichte zijden met bundels van dicht opeenstaande goudgele haren bezet en aan de basis in de breedte diep gegroefd. Pooten tamelijk slank, de dijen nagenoeg dezelfde breedte behoudend, gelijkmatig fijn behaard, de schenen tamelijk recht. De voortarsen 4-ledig, de overigen 5-ledig. — Het sexueel verschil is aan het achterlijf nitwendig weinig duidelijk; het laatste sterniet is bij het ♂ iets meer uitgetrokken. — De ontwikkeling en de levenswijze is door Wasmann bekend geworden. Zij leven als imago, van af den nazomer tot in het midden van het voorjaar, bij verschillende *Myrmica*-soorten, door welke zij gevoederd worden. Zelf scheiden zij aan de gele haarbundels van het achterlijf een rocht uit, dat door de mieren gretig afgelikt wordt. Ook voeden de *Ateeles*-soorten zich met doode mieren en mierenpoppen. Zij overwinteren bij *Myrmica* in de diepste gangen van het nest en verhuizen dan, in het einde van April of in het begin van Mei, naar de nesten van *Formica*. Zij paren nog in de nesten van *Myrmica*, doch de ontwikkeling der larven heeft bij *Formica* plaats. De larven worden, evenals die van hare eigen soort, door *Formica* gevoederd, doch zij verslinden de eieren en later ook de poppen der *Formica*'s. Wanneer na eenige dagen de van een stevig omhulsel voorzien *Formica*-poppen verlegd worden en zulks ook plaats vindt met de van een teeder omhulsel voorzien *Ateeles*-larven, dan mislukt daardoor het verpoppen en komen slechts die *Ateeles*-larven tot ontwikkeling, welke door de *Formica*'s vergeeten zijn. In September komen de nieuw ontwikkelde kevers te voorschijn en verhuizen alsdan naar de nesten van *Myrmica*.

Van de 6 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Derde sprietlid slechts $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het tweede. Halsschild aan de zeer spitse achterhoeken aanmerkelijk breder dan voor het midden, eenigszins breed trapeziumvormig, zelden aan weerszijden met een duidelijk groefje (de vorm *foveicollis* Wasm., bij *Myrmica scabrinodis* en *ruginodis*); vrij duidelijk bestippeld en uiterst kort behaard. Dekschilden zeer lijn en dicht bestippeld. Achterlijf nagenoeg onbestippeld, zeer glad, aan de onderzijde zeer verspreid bestippeld. Bovenzijde lichter of donkerder roodbruin, het halsschild veelal iets donkerder dan de dekschilden, bij ab.c. **nigricollis* Kraatz het halsschild zwartbruin en de dekschilden geelbruin (bij *M. scabrinodis* en *ruginodis*). Bij het type is de zijrand van het halsschild geleidelijk in eene blauwe bocht uitgerand, bij den vorm *angulicollis* Wasm. is de zijrand hoekig uitgesneden en meestal ook aan weerszijden van de basis dieper uitgerand (bij *M. scabrinodis*). Bij den vorm *reticollis* Wasm. zijn de zijden van het halsschild nagenoeg rechtlijnig en is meestal ook de basis minder uitgerand (bij *M. scabrinodis*). Eindelijk komt nog een vorm **hirticollis* Wasm. voor, bij welken het halsschild met duidelijk langere gele haartjes bezet is, waardoor deze onder de loupe gezien een eenigszins ruw behaard voorkomen heeft. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Verbreid in de diluviale streken, in de nesten van *Myrmica scabrinodis*, *laevinodis*, *ruginodis* en *rugulosa*; als larve bij *Formica fusca* en bij die soorten, welke *F. fusca* als slaven houden (*F. sanguinea*, *Polyergus rufescens*). Zelden komt zij in de duinstreek voor. Ik zag een exemplaar uit de omstreken van Haarlem. De ab.c. *nigricollis* in de Rijnprov. bij Crefeld.

1. *emarginatus* Grav.

Derde sprietlid ongeveer tweemaal zoo lang als het tweede. Halsschild aan de achterhoeken niet of slechts weinig breder dan voor het midden, eenigszins breed rechthoekig, in den regel met duidelijke zijgroefjes. 2

- 2 Halsschild verspreid en vrij duidelijk bestippeld, in de stippels met duidelijke gele haartjes. De tergiten zeer verspreid bestippeld, de laatste 4 sterniten verspreid bestippeld en zeer kort verspreid geel behaard, welke haartjes niet langer zijn dan die van het halsschild. De zijrand van het halsschild is breed en vlak afgezet en weinig opgericht, met zeer weinig zijwaarts uitstekende achterhoeken; de achterrand in het midden nagenoeg recht afgesneden. Bij den vorm **flexicollis* Wasm. is de zijrand van het halsschild sterker opgericht, steken de achterhoeken meer zijwaarts uit en is de achterrand in het midden afgerond. Bovenzijde van het lichaam donkerder roodbruin, zeldzamer lichter roodbruin (ab.c. **Forelli* Wasm.), de kop, veelal het midden van het halsschild en het achterlijf nabij het uiteinde donkerder 1). Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Eenmaal bij Doorn, Juli, een typisch exemplaar in een nest van *Formica rufa*. Leeft overigens bij verschillende *Myrmica*-soorten en als larve bij *Formica rufa*. Ook in België bij Roumont.

(inflatus Kr.) 2. *pubicollis* Bris.

Halsschild vrij dicht en lijn bestippeld, niet of zeer onduidelijk lijn behaard. De tergiten vrij dicht bestippeld, zoo ook de sterniten dichter bestippeld en met langere en dichtere gele beharing, welke duidelijk langer is dan die van het halsschild. Achterhoeken van het halsschild altijd eenigszins spits, doch minder dan bij *emarginatus*. Bovenzijde van het lichaam gewoonlijk eenkleurig roodbruin, de kop donker. Bij het type is het halsschild tamelijk smal, de achterrand in het midden meer uitgetrokken en smaller afgerond, de zijden zwak uitgerand en de achterhoeken weinig zijwaarts gericht. Bij den iets grooteren vorm *laticollis* Wasm. is het halsschild breder, de achterrand in het midden minder uitgetrokken en voor het schildje meer, zooals bij *pubicollis*, breder afgesneden (bij *M. scabrinodis* en *ruginodis*). Bij den vorm *rhombicollis* Wasm., welke eveneens iets grooter is, zijn de zijden van het iets smaller halsschild nagenoeg recht en meer gelijkmatig en sterker opgericht dan bij het type; de voorhoeken minder breed afgerond (bij *M. ruginodis*). Bij den vorm **acuticollis* Wasm. zijn de zijden van het halsschild sterker uitgerand en de achterhoeken spitscr zijwaarts gericht. Bij de ab. *obsoleticollis* Wasm. ontbreken de groefjes op het halsschild volkomen (bij *M. ruginodis*). Bij ab.c. *picicollis* Wasm. is het halsschild donker gekleurd en daardoor gelijkt deze op *pubicollis* en op de ab.c. *nigricollis* van *emarginatus*; door de dichte bestippeling der tergiten nadert deze tot de niet in ons gebied voorkomende *A. bifoveolatus* Bris., welke echter kleiner en nog dichter bestippeld is. De zijden van het halsschild zijn schuin naar achteren verbreed, met zijwaarts sterker uitstekende achterhoeken, daardoor aan *emarginatus* herinnerend (bij *M. scabrinodis*). Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Verbreid in de nesten van *Myrmica laevinodis*, *scabrinodis*, *ruginodis* en *rugulosa*; als larve bij *Formica rufibarbis*. Vooral in de diluviale streken. Ook eenmaal bij den Haag. De verschillende vormen werden door den heer *Wasmann* bij Exaeten nabij Roermond waargenomen. 3. *paradoxus* Grav. 2)

1) Bij den Scandinavischen vorm *excisus* Thoms. doorsnijdt de middengroef van het halsschild den basaalrand voor het schildje zoo sterk, dat deze als ingesneden schijnt (bij *M. sulcinodis*).

2) Hoogst waarschijnlijk ontstaan enkele vormen van *A. emarginatus* en *paradoxus*, welke beiden bij dezelfde mierensoort leven, door kruising dezer beide soorten.

18. *Lomechusa* Grav.

Dit genus is zeer naverwant aan *Atemeles*, doch onderscheidt zich vooral door de zeer krachtig ontwikkelde pooten, wier dijen aan de basis veel smaller en eenigszins ingesnoerd en naar het uiteinde dicht en grof geel behaard zijn; de middel- en achterschenen zijn iets gekromd. Het voorhoofd is breed gegroefd. De sprieten zijn zeer los geleed, de leedjes van af het tweede gesteld, het toegespitste eindlid slechts even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. De binnenste achterkaaks-lob eindigt slechts in één tandje. Het derde kaaktaster-lid is naar het uiteinde geleidelijk verdikt, korter dan het dubbel zoo breede tweede lid. Het eerste liptaster-lid is zeer krachtig ontwikkeld, langer dan de twee volgende leedjes te zamen, het tweede liptaster-lid is breeder dan lang, slechts $\frac{1}{3}$ van de lengte van het eerste, het eindlid de helft langer dan het tweede. Halschild met veel kortere en stompere achterhoeken. Dekschilden aan den achterrand binnen de achterhoeken slechts zeer zwak uitgerand. De eerste 3 onbedekte tergiten aan weerszijden van den achterrand dicht geel behaard en langs de zijden met bundels van dicht openstaande gele haren bezet. De achterhoeken van het zesde onbedekt tergiet zijn veel korter uitgetrokken dan bij *Atemeles* en aan het afgeronde uiteinde met een bundel gele haren bezet. — De larve van *L. strumosa* is door L. v. Heyden, John Sahlberg en Wasmann beschreven. De levenswijze en de ontwikkelings-geschiedenis werden door Wasmann uitvoerig bekend gemaakt. *L. strumosa* is een echte gast van *Formica sanguinea* en maakt de geheele ontwikkeling bij deze mier door.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Donker roodbruin, de kop en het achterlijf nabij het uiteinde meer zwartbruin; dekschilden lichter roodbruin. Habitus van *Atemeles*, doch veel grooter en krachtiger gebouwd en vooral onderscheiden door den veel lossere samenhang der sprietleedjes, welke iets langer dan breed zijn en aan de basis steelvormig beginnen. Halschild met enkele lijne korreltjes en lijne haartjes bezet, met uitstekende, doch niet toegespitste achterhoeken, eene duidelijke langsgroef in het midden en kantige zijranden. Achterlijf als bij *Atemeles*. Pooten krachtiger ontwikkeld, roodbruin, de dijen aan het uiteinde behaard, de schenen naar het uiteinde versmald. Bij het ♂ is het derde sprietlid iets langer dan bij het ♀, het voorlaatste tergiet dieper uitgerand, met meer uitgetrokken en meer opgerichte buitenhoeken en aan de onderzijde sterker uitgetrokken. Lengte 5—6 mm. In de nesten van *Formica sanguinea* en in gemengde kolonies van deze soort met *F. fusca*, *rufilabris* en *rufa*. Blijvenbeek en Exaeten in Limburg, Mei, Juni en Juli. Doorn, Aug. In België bij Leuven en in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 1. *strumosa* F.

19. *Myrmedonia* Erichs.

Kop van achteren weinig of slechts iets ingesnoerd, het halsgedeelte veel breeder dan de halve kop, de slapen minstens van achteren gerand; de voorkaaks-spleet door tamelijk breede wangen van de oogen gescheiden, naar achteren verder dan de oogen reikende. Bovenlip in 't midden duidelijk uitgerand. De binnenste achterkaaks-lob, ofschoon zeer verlengd, gelijkt in vorm het meest op die van *Lomechusa*, evenzeer zonder enig spoor van tandjes aan den binnenrand, met 3 of 4 dicht naast elkaar liggende haakjes aan het uiteinde en daarachter lang en dicht behaard; de buitenste lob is zeer lang en slank. Tweede liptaster-lid veel korter en smaller dan het eerste. Lichaam meer of minder breed; het achterlijf, hetwelk sterk opwaarts gekromd kan worden, met tamelijk parallelle zijden. Geleugeld. De epimeren van het metasternum den achterrand der dekschilden overschrijdend. Pooten vrij lang en slank. Voortarsen 4-ledig, de middel- en achtertarsen 5-ledig. Het eerste lid der achtertarsen veel langer dan de twee volgende leedjes te zamen. — De meeste soorten van dit genus leven bij mieren, van de Europeesche de meesten bij *Lasius* soorten, die van het sub-genus *Myrmocelia* bij *Tapinoma erraticum*. Zij verslinden de, nabij den ingang van het nest, rondlopende mieren, doch worden in het nest zelf door de mieren aangegrepen en verjaagd. —

De vermoedelijke larve van M. laticollis Märkel is door Rey beschreven. Wasmann deelt een en ander mede over de levenswijze van *M. funesta* en *confragosa*.

Van de 27 Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprieten met lange, afstaande haren bezet. Lichaam zeer sterk glanzig. Kop en halsschild grof en verspreid bestippeld. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, de zijrand van voren sterk afwaarts gebogen, de epipleuren, van terzijde gezien, geheel zichtbaar. Dekschilden grof en verspreid bestippeld. De voortzetting van het mesosternum zeer kort, breed afgerond, grof bestippeld. Pooten slank (Sub-gen. *Zyras* Steph.) 2

Sprieten niet of slechts kort en weinig afstaande behaard. De voortzetting van het mesosternum tot aan het derde of over het derde gedeelte der middelcoxae reikend, aan het uiteinde matig afgerond, afgestompt of tamelijk toegespitst, glad of fijn bestippeld 3

- 2 Halsschild breeder dan lang, grof en verspreid bestippeld. Glanzig zwart, de dekschilden behalve de buitenhoeken, het achterlijf, behalve de twee voorlaatste tergiten en eene middenvlek op het vijfde tergiet, de wortel en het uiteinde der sprieten geelrood. Halsschild smaller dan de dekschilden, naar de basis iets versmald, met een diep groefje voor het schildje en met enkele verspreide, lange, grauwe haartjes. Dekschilden vrij dicht en iets rimpelig bestippeld. Achterlijf met nagenoeg parallele zijden, glanzig en glad. Pooten geel. Bij het ♂ op het midden van het zesde onbedekt tergiet met een bultje en aan het uitgetrokken uiteinde van den achterrand uitgerand. Lengte $5\frac{1}{2}$ —7 mm. Deze soort zou bij *Formica rufa* en *Lasius fuliginosus* leven. Uiterst zeldzaam. Eenmaal bij Rotterdam en bij Houthem (Limburg). Ook in de Rijnprov. 1. **Haworthi** Steph.

Halsschild even lang als breed, naar achteren iets versmald, fijn en zeer verspreid bestippeld. Geelrood. Kop, dekschilden, borst en uiteinde van het achterlijf zwart. Sprieten zwartbruin, de 3 eindleedjes geelrood. Halsschild met een diep dwarsgroefje voor het schildje. Dekschilden niet zeer dicht en grof bestippeld. Achterlijf met parallele zijden, de afzonderlijke tergiten slechts in het ingedrukt gedeelte aan de basis bestippeld. Pooten geel. Bij het ♂ is het naar achteren uitgetrokken uiteinde van het zesde onbedekt tergiet uitgerand of tweelendig. Lengte 4 mm. Zeer zeldzaam onder dorre bladeren, niet bepaald in mieren-nesten. Ook in aanspoelsel. Den Haag, Leiden, Oisterwijk, Brede, Gilze-Rijen en Valkenburg bij Maastricht. Ook in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld 2. **collaris** Payk.

- 3 Voortzetting van het mesosternum toegespitst, iets over het eerste derde gedeelte der middelcoxae naar achteren reikend. Het tweede en derde onbedekt tergiet bij het ♂ door bultjes of tandjes in het ong vallend (Sub-gen. *Myrmoeccia* Muls. & Rey). 4

Voortzetting van het mesosternum aan het uiteinde afgerond of afgestompt, ter nauwer nood tot aan het eerste derde gedeelte der middelcoxae reikend. De eerste tergiten bij het ♂ zonder bultjes of tandjes (Sub-gen. *Pella* Steph.) 5

- 4 De voorlaatste sprietleedjes minstens even lang als breed. Kop zwartbruin, het halsschild en het achterlijf pekbruin, de dekschilden roodgeel. Sprieten lang, donkerrood, de pooten roodgeel. Kop dicht en vrij sterk bestippeld, weinig glanzig. Halsschild nagenoeg even lang als breed, naar achteren smaller, met afgeronde voor- en stompe achterhoeken, evenals de dekschilden zeer dicht en tamelijk grof bestippeld, matglanzig. Achterlijf op de voorhelft geheel dicht bestippeld, op de achterhelft nagenoeg glad, glanzig. Bij het ♂ het eerste onbedekt tergiet aan de basis met eene diepe, gladde dwarsgroef, op de achterhelft vrij dicht bestippeld, in het midden iets gewelfd. Het tweede onbedekt tergiet, aan de basis eveneens met een gladden dwarsindruk, daarachter dicht bestippeld en in een sterken, aan de zijden langer behaarden middenbult opgericht. Het derde en de volgende onbedekte tergiten veel minder bestippeld, het derde in het midden met eene groote driehoekige, door twee naar achteren divergeerende kanten begrensde langsverhevenheid, wier top in een diepen, halfcirkelvormigen basaal-indruk tandvormig uitsteekt en wier achtergedeelte meer of minder sterk driehoekig ingedrukt is. Lengte 4—5 mm. Door den Heer Wasmann bij Valkenburg (Limburg) in Juni bij *Taphinoma erraticum* gevangen. Ik zag deze zeldzame soort in de collectie van den Heer Wasmann. In de Rijnprov. bij Elberfeld. 3. **plicata** Er.

De voorlaatste sprietleedjes breeder dan lang. Lichaam geheel pekzwart. Sprieten roodachtig, het eerste lid en de pooten roodgeel. Kop en halsschild verbreed, dicht en diep bestippeld. Dekschilden langer en iets breeder dan het halsschild, iets lijner en minder dicht bestippeld, met een groefje voor het schildje en ook van voren ingedrukt. Kop ook enigszins ingedrukt. Bij het ♂ het eerste onbedekt tergiet aan de basis met een breeden, gladden dwarsindruk, daarachter iets gewelfd en vrij dicht bestippeld. Het tweede onbedekt tergiet met een van voren uitgerand en geel omzoomd, dicht en zeer fijn bestippeld bultje, het derde onbedekt tergiet met eene breede, gladde, hoelijzer-vormige verhevenheid, welke in het midden van den voorrand een klein tandje of bultje draagt. De overige tergiten lijn

en verspreid bestippeld. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. In de nesten van *Tapinoma erraticum*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf of Ahrweiler.

(Fussli Kraatz, *bituberculata* Ch. Bris.) (*confragosa* Hochh.)

- 5 Halsschild hoogstens $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, de zijden achter het midden tanelijk recht, naar de basis iets convergeerend en voor de achterhoeken zeer flauw uitgebogen, zoodat deze, ofschoon afgerond, toch aangeduid zijn. 6

Halsschild dubbel zoo breed als lang, de zijden sterk afgerond, ook de voor- en achterhoeken afgerond. Alle tergiten onbestippeld. Bovenzijde van het lichaam zwartbruin. Sprietten naar het uiteinde sterk verdikt. 10

- 6 Minstens de eerste tergiten bestippeld. Laatste sprietlid duidelijk langer dan de twee voorafgaande leedjes te zamen. 7

Alle tergiten nagenoeg onbestippeld. Laatste sprietlid nagenoeg even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. 8

- 7 De eerste 4 onbedekte tergiten vrij dicht-, het vijfde verspreid- en het zesde minder duidelijk bestippeld. Eindlid der sprietten zeer groot, even lang als de 3 voorafgaande leedjes te zamen, toegespitst. Bovenzijde bruin, het halsschild aan de zijden iets dichter, de dekschilden naar de basis en min of meer aan de zijranden licht roodbruin of geelrood; gewoonlijk ook het basaalgedeelte van het achterlijf geelrood. Halsschild en dekschilden uiterst dicht en lijn bestippeld en behaard. Sprietten roodbruin, aan de basis en aan het uiteinde lichter. Halsschild bij het ♀ met eene meer of minder duidelijke basaalgroef, bij het ♂ met eene zeer breede, diepe middengroef. Pooten roodgeel. Bij het ♂ is de achterrand van het zesde onbedekt tergiet diep uitgerand, met spits uitgetrokken achterhoeken en in de uitranding zeer fijn getand. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Verbreid onder dorre bladeren in de nabijheid van mierennesten. Ook in aanspoelsel. 4. *limbata* Payk.

De tergiten zeer weinig, slechts aan den achterrand bestippeld, de laatste nagenoeg glad. Eindlid der sprietten minder toegespitst dan bij *limbata*, nauwelijks zoo lang als de 3 voorafgaande leedjes te zamen. Bovenzijde donkerbruin, de schouders der dekschilden, zeldzamer de geheele dekschilden geelbruin. De achterrand der tergiten, benevens de pooten geelrood. Sprietten roodbruin, aan de basis en aan het uiteinde iets lichter. Halsschild en dekschilden uiterst dicht en lijn bestippeld en behaard. Halsschild met een basaalgroefje, hetwelk in eene meer of minder ontwikkelde middengroef uitloopt. Bij het ♂ is de achterrand van het voorlaatste tergiet onduidelijk uitgerand en de langsgroef op het halsschild duidelijker en dieper. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Bij *Lasius fuliginosus*. Zeer zeldzaam. Slechts bij Roermond (Execten) gevangen. 5. *similis* Märk.

De eerste twee onbedekte tergiten lijn en niet dicht bestippeld, de overigen glad. Het eindlid der sprietten naar het uiteinde eenigszins toegespitst, slechts iets langer dan de twee voorafgaande leedjes te zamen. Deze soort gelijkt in habitus en kleur eenigszins op *laticollis*, doch is veel smaller. Sprietten rood, de eerste leedjes iets donkerder, de pooten roodachtig. Lichaam zwart, dekschilden pekkbruin. Kop lijn bestippeld, met gladdemiddlijn. Halsschild met een basaalgroefje, dat in eene langslin overgaat. Dekschilden even lang als het halsschild, dicht bestippeld. Achterlijf glanzig, de randen der ringen iets roodachtig. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Bij Elberfeld in de nesten van *Tapinoma erraticum*. Ik zag een typisch exemplaar van v. *Hagens* uit de coll. *Hassmann*. (*erratica* v. *Hagens*)

- 8 Halsschild aan de basis vrij sterk gerand, vlak voor den achterrand eenigszins opgericht. 9

Halsschild aan de basis zeer lijn gerand, tot aan den achterrand vlak. Bovenzijde zwartbruin, soms de dekschilden aan den schouder lichter. Halsschild en dekschilden uiterst lijn en dicht bestippeld. Kop met een scherp dwarskant voor den achterrand. Halsschild met een basaalgroefje, hetwelk naar voren in eene onduidelijke middengroef uitloopt; aan weerszijden daarvan met een meer of minder duidelijk, scheven indruk. Achterlijfs-ringen roodbruin gerand. Sprietten en pooten roodbruin; het eerste en laatste sprietlid iets lichter. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde iets uitgerand en het zesde sterniet iets meer uitgetrokken. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Bij *Lasius fuliginosus* in de diluviale streken gemeen. Bij uitzondering bij *Lasius niger*. 8. *cognata* Märk.

- 9 Bovenzijde geheel zwart, soms de dekschilden iets meer bruinachtig. Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, met zeer weinig gebogen zijden, bij het ♀ met een zeer oppervlakkigen indruk aan de basis, bij het ♂ met eene ondiepe middengroef. Halsschild en dekschilden minder dicht bestippeld dan bij *cognata*. Sprietten iets slanker, evenals de pooten roodbruin. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde iets uitgerand en het zesde sterniet iets meer uitgetrokken. Onuitgekleurde exemplaren zijn bruinachtig. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Gemeen in de nesten van *Lasius fuliginosus*. 6. *funesta* Grav.

Bovenzijde bruin, de schouders der dekschilden en de basis van het achterlijf geelrood. Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, met meer afgeronde zijden. Halsschild en dekschilden

uiterst dicht en fijn bestippeld en behaard. Sprieten krachtig ontwikkeld, donker bruinrood met lichtere basis. Halsschild met een dwarsgroefje aan de basis en eene onduidelijke langsgroef, welke bij het ♂ zeer breed, doch niet zeer diep is. Pooten roodbruin of geelrood. Bij het ♂ is het voorhoofd ingedrukt, het zesde onbedekt tergiet iets uitgerand en het zesde sterniet sterker uitgetrokken. Lengte 5—6 mm. Niet zeldzaam. Bij *Lasius fuliginosus*, onder dorre bladeren en in *Sphagnum*. In aantal bij Loosduinen, in het voorjaar onder dorre bladeren in de nabijheid van een nest van *Formica rufa* . . . 7. **humeralis** Grav.

- 10 Dekschilden, langs den naad gemeten, langer dan het halsschild, met eene geelachtige schoudervlek, welke zich gewoonlijk over de geheele dekschilden naar den naadhoek uitbreidt. Lichaam zwartbruin, halsschild en dekschilden dicht en fijn bestippeld. Sprieten vrij kort, donker roodbruin, met lichtere basis. Halsschild met een meer of minder duidelijk dwarsgroefje aan de basis en met eene zeer onduidelijke langsgroef. Achterrand der achterlijfsringen, alsook de pooten roodbruin of geelrood. Bij het ♂ is de langsgroef op het halsschild iets duidelijker en de achterrand van het zesde onbedekt tergiet iets uitgerand. Lengte 4 mm. Niet zeldzaam in de nesten van *Lasius fuliginosus*. Soms ook bij andere *Lasius*-soorten, vooral *L. brunneus*. 9. **lugens** Grav.

Dekschilden, langs den naad gemeten, even lang als het halsschild. Bovenzijde eenkleurig zwartbruin. Soms zijn de dekschilden meer bruinachtig. Halsschild en dekschilden zeer dicht en fijn bestippeld. Sprieten roodbruin met lichtere basis. Halsschild bij het ♀ met onduidelijke, bij het ♂ duidelijker middengroef. Pooten rood. Bij het ♂ is gewoonlijk het voorhoofd ingedrukt. Lengte 3½ mm. Eveneens niet zeldzaam bij *Lasius fuliginosus*.

10. **laticollis** Märk.

20. *Astilbus* Stephens.

(*Drusilla* Leach)

Dit genus is aan Myrmedonia naverwant, doch met veel smaller en slanker lichaam. Kop van achteren sterk ingesnoerd, de hals smaller dan de halve kop, de slapen niet gerand. Het tweede liptaster-lid niet smaller en slechts iets korter dan het eerste lid. Halsschild langwerpig-ovaal. Dekschilden zeer kort. Ongevleugeld. — De soorten van dit genus leven onder steenen, dorre bladeren, plantenafval, veelal ook bij mieren, doch niet als regelmatige gast.

Van de 5 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Lichaam zeer smal, licht roodbruin; de kop en het achterlijf, kort voor het uiteinde, zwartachtig. Halsschild en dekschilden dof, fijn behaard, dicht en vrij grof bestippeld; het naar achteren verbrede achterlijf glad en glanzig en slechts aan de basis verspreid bestippeld. Sprieten naar het uiteinde eenigszins verdikt, roodbruin, aan de basis lichter. Halsschild langer dan breed, naar de basis iets versmald, met eene duidelijke, naar achteren dieper wordende, bij het ♂ naar de zijden meer verbrede middengroef. Dekschilden ongeveer de helft korter dan het halsschild. Pooten roodgeel. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet diep-, bij het ♀ zwakker uitgerand. Lengte 4—5 mm. Zeer gemeen op vochtige, zandige plaatsen, onder steenen en dorre bladeren. Ook tusschen gras en aan boomwortels. Bij Roermond zeer gemeen bij *Myrmica laevinodis*, *ruginodis* en *rugulosa*. 1. **canaliculatus** F.

21. *Thamiaraea* Thoms.

Kop vrij groot, doch veel smaller dan het halsschild, de slapen aan de onderzijde gerand, de voorwaaks-spleet slechts smal van de oogen gescheiden en niet zoo ver als deze naar achteren reikende. Bovenlip van voren afgekuot of oppervlakkig uitgerand. De binnenste achterkaaks-lob aan den binnenrand, naar het gebogen uiteinde, met eenen kam van lange kromme tandjes. Het priemvormig eindlid der kaaktasters is lang, meer dan half zoo lang of slechts iets korter dan het slechts weinig verdikte derde lid. De eerste twee liptaster-leedjes zijn even dik en nauwelijks van elkaar gescheiden. De epimeren van den metathorax groot, den achterrand der dekschilden duidelijk overschrijdend.

De 2 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Halsschild met eene lijne, doch niet zeer duidelijke middengroef. De eerste 3 onbedekte tergiten dicht en krachtig-, het vierde verspreid bestippeld, het vijfde nagenoeg glad. Kleiner dan *cinnamomea*. Bovenzijde vuil roodbruin. Sprietten bruin met lichteren wortel. Kop donkerbruin, vrij dicht en zeer fijn bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, nagenoeg dubbel zoo breed als lang, dicht en tamelijk fijn bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, bij het ♂ aan den naad duidelijker dan bij het ♀ gerand, dicht en tamelijk fijn bestippeld, geelbruin, aan de achterhoeken en om het schildje iets donkerder. Achterlijf pekbruin, de achterrand der ringen en de geheele laatste ring veelal geelbruin. Pooten geel. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet in twee dicht naast elkaar staande spitse tandjes uitgetrokken. Lengte 3—3½ mm. Aan uitvloeiende sappen van boomen en in de gangen van *Cossus*-rupsen. Den Haag, Wassenaar, Roermond en bij Maastricht.

1. *hospita* Märk.

Halsschild niet gegroefd. De eerste 3 onbedekte tergiten weinig-, de overigen bijna niet bestippeld. Bovenzijde licht roodbruin. Sprietten donkerbruin, met lichteren wortel. Halsschild niet zeer dicht en fijn bestippeld. De dekschilden iets langer dan het halsschild, om het schildje bruin en soms in de achterhoeken donkerbruin, dichter en duidelijker bestippeld dan het halsschild. Achterlijf glanzig zwart, de achterrand der afzonderlijke ringen en de beide laatsten niet zelden bruinachtig. Pooten geelachtig. Bij het ♂ bevindt zich op het zesde onbedekt tergiet een klein bultje; bovendien is de naad der dekschilden aan de basis eenigszins bultig opgericht of over de geheele lengte kielvormig gerand. Lengte 3½—4 mm. Aan uitvloeiende sappen van eiken, iepen en berken; ook veelal in de boorgaten van *Cossus*-rupsen. Bij Roermond. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf . . . 2. *cinnamomea* Grav.

22. *Callicerus* Gravenh.

Dit genus is vooral gekenmerkt door het zeer groot en sterk verdikt derde kaaktaster-lid en de zeer krachtig ontwikkelde lange sprietten. Bovenlip van voren afgeknot. Voorkaken sterk gekromd. Het vierde kaaktaster-lid zeer klein, priemvormig. De breede epipleuren van het halsschild zijn, van ter zijde gezien, geheel zichtbaar.

Van de 6 Europeesche soorten komt één in Nederland en één in het aangrenzend gebied voor.

Het voorlaatste sprietlid veel langer dan de voorafgaande leedjes (Sub-gen. *Callicerus* i.s.p.)

Lichaam zwart, de dekschilden gewoonlijk pekbruin of ook wel roodbruin, soms ook het halsschild bruin of roodbruin, het achterlijf glanzig zwart, de achterrand der eerste tergiten en het uiteinde meestal bruinachtig; de sprietten bruin of roodbruin, de pooten bruingeel, gewoonlijk met donkere dijen. Vetglanzig, zeer fijn en dicht bestippeld en fijn grijs behaard. Kop weinig smaller dan het halsschild. Halsschild aan de basis meestal met eene ondiepe langsgroef. Bij het ♂ is het voorhoofd in de lengte gegroefd en zijn de twee laatste sprietleedjes nog langer dan bij het ♀. Lengte 2¼—2½ mm. Op vele plaatsen in aantal van lage planten en grassen gesleept. Ook onder dorre bladeren en aangespoeld riet in het voorjaar.

1. *obscurus* Grav.

Het voorlaatste sprietlid nagenoeg even lang als de voorafgaande leedjes (Sub-gen. *Semiris* Heer). Lichaam zwart, het halsschild soms pekbruin; de dekschilden bruin, om den naad roodachtig of geheel bruinrood; het achterlijf pekzwart met bruinrood uiteinde en bruinroode achterrand der eerste ringen; de sprietten roestrood, de pooten roodgeel. Kop veel smaller dan het halsschild. Halsschild over het midden meer of minder duidelijk gegroefd. Bij het ♂ vertoont het eerste onbedekt tergiet in 't midden een scherp langsbultje. Lengte 3½—4¼ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld (*rigidicornis* Er.)

23. *Schistoglossa* Kraatz.

*Dit genus is vooral gekenmerkt en van *Atheta* onderscheiden, door de aan het uiteinde gespleten voorkaken. Sprietten vrij lang en slank, naar het uiteinde iets verdikt, fijn bewimpert. Kaaktasters tamelijk slank, het derde lid duidelijk langer dan het tweede en iets verdikt, het vierde lid klein, priemvormig. Liptasters duidelijk 3-ledig, het tweede lid smaller en veel korter dan het eerste, het derde lid langer en slanker dan het tweede, cylindervormig. De omgestlagen zijden van het halsschild, van ter zijde gezien, een weinig zichtbaar. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, duidelijk uitgebogen. Achterlijf met tamelijk parallelle zijden, de eerste 3 onbedekte tergiten in de breedte ingedrukt. Het eerste lid der achtertarsen duidelijk langer dan het tweede.*

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze soort heeft den habitus van *Atheta angustula*, doch is gemakkelijk te herkennen aan de duidelijke, dichte bestippeling der eerste tergiten, het bij het ♂ vrij dicht en fijn gekarteld uiteinde van het zesde onbedekt tergiet, alsook door het zijdeachtig grijs behaarde, dof grauww-zwarte en weinig glanzige lichaam. Spriet en wortelleedjes roodbruin; de pooten roodbruin, soms iets of wat donkerder. Kop veel smaller dan het halsschild, lijn bestippeld, tamelijk glanzig. Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, weinig of niet smaller dan de dekschilden, met stompe achterhoeken en met eene middengroef, dicht en fijn bestippeld. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, iets dichter en duidelijker bestippeld dan het halsschild. Bij het ♂ zijn de voorlaatste sprietleedjes iets langer dan breed, bij het ♀ even lang als breed. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeldzaam, onder vochtige bladeren en in aanspoel. Uitsluitend bij Breda aangetroffen. Ook in België. 1. *viduata* Er.

Tomoglossa Kraatz.

Dit genus herinnert in habitus aan Phloeopora en is van het aanverwante genus Atheta onderscheiden, door de, tot aan de basis in twee smalle, divergerende lobben, gespleten tong. Bovenlip zeer kort en breed, naar voren verbreed, aan den voorrand flauw uitgerand. Voorkaken met gewoon uiteinde. De achterkaken en de tarsen als bij Atheta gevormd. Derde kaaktaster-lid tamelijk verdikt. De kop is meer ingetrokken dan bij Phloeopora.

De eenige Europeesche soort is pekwart, tamelijk glanzig, het uiteinde of de achterhelft der dekschilden, veelal ook de geheele dekschilden en gewoonlijk ook het uiteinde van het achterlijf roodbruin; de vrij korte, dikke spriet geheel of minstens aan den wortel, benevens de pooten roodgeel. Kop glanzig, vrij sterk en dicht bestippeld. Halsschild fijner en dichter dan de kop bestippeld. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{3}$ langer dan het halsschild, veel krachtiger en minder dicht bestippeld, doch evenals het halsschild matig dicht en tamelijk lijn behaard. Achterlijf meer glanzig en langer behaard dan het voorlijf. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet, eenigszins afgerond, uit. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. In plantenaafval langs oevers. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf (Luteicornis Erichs.)

Dadobia Thoms.

Dit genus is vooral gekenmerkt door het zeer vlakke lichaam, den bijzonder grooten, breed vierhoekigen kop, met parallelle zijden, rechte achterhoeken en recht afgeknotten achterrand, welke over de geheele breedte gerand is; de kop is door een uiterst korten, niet onbedekten hals met het halsschild verbonden. Bovenlip van voren flauw-, aan de zijden en aan de voorhoeken sterk afgerond. De binnenste achterkaaks-lob is aan de binnenzijde, naar den gekromden top, met eenen kam van lange gebogen tandjes bezet. Bovenzijde van het lichaam vlak gedrukt.

De eenige soort van dit genus komt in het aangrenzend gebied voor.

Spriet en wortelleedjes met gelen wortel. Kop even breed als het halsschild, met nagenoeg rechte achterhoeken, zwartachtig, eenigszins verspreid en lijn bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, naar de basis duidelijk versmald, met eene zeer onduidelijke langsgroef, zwart, tamelijk verspreid en lijn bestippeld. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{3}$ langer dan het halsschild, donkerbruin, iets meer glanzig dan kop en halsschild, iets duidelijker, doch niet dicht bestippeld. Achterlijf glanzig zwart, aan het uiteinde iets lichter, de eerste tergiten weinig en lijn bestippeld en aan de basis eenigszins in de breedte ingedrukt, het laatste tergiet geheel onbestippeld. Pooten geelbruin, de dijen zwartbruin. Bij het ♂ zijn kop en halsschild duidelijker gegroefd. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Vooral aan uitvloeiende boomsappen en achter schors. Over geheel Duitschland verbreid, o. a. bij Gulik in de Rijnprov. (immersa Er.)

24. Notothecta Thoms.

Dit genus onderscheidt zich van Atheta door de zeer dicht aaneengesloten sprietleedjes, de dieper gespleten tong en het naar verhouding korter eerste lid der achtertarsen. Ook is het lichaam breeder, de slapen zijn op de onderzijde niet gerand en het achterlijf is naar het uiteinde duidelijk versmald. — De soorten leven als gasten bij mieren.

Van de 6 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Halschild met duidelijke, tamelijk lange borstelbaren aan de zijranden, zonder middengroef, slechts met een groefje aan de basis. Spriet en vrij lang afstaande behaard. Kop en achterlijf weinig en fijn bestippeld. Bovenzijde glanzig, donkerbruin, de dekschilden meer roodbruin. 2
- Halschild met eene duidelijke middengroef en met 3 zeer korte borstelbaren aan de zijranden. Spriet slechts kort afstaande behaard. Bovenzijde dof, eenigszins dwars-rimpelig bestippeld (Sub-gen. *Lyprocorrhe* Thoms.). Dekschilden aan de hoeken iets uitgerand. Lichaam zwartachtig of zwartbruin, de dekschilden soms naar het uiteinde iets meer bruinachtig. Achterlijf glanzig zwart, met eenige randhaartjes, de laatste ringen geelrood gerand. Pooten geelachtig, de dijen soms iets berookt. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen in de nesten van *Formica rufa*, *pratensis* en *truncicola*. 3. **anceps** Er.
- 2 Het vijfde tot tiende sprietlid niet breder dan lang. Het groefje aan de basis van het halschild is onduidelijk. Pooten roodgeel. Halschild aan weerszijden van de basis eenigszins uitgerand, zoodat de achterhoeken duidelijk uitsteken, tamelijk dicht en fijn bestippeld. Dekschilden ongeveer de helft langer dan het halschild, vrij dicht en fijn segrijnachtig bestippeld, licht kastanjebruin, nabij de achterhoeken eenigszins uitgerand. Achterlijf aan het uiteinde nagenoeg geheel onbestippeld, glanzig pekwart, de randen der eerste 3 onbedekte tergieten en het uiteinde roodbruin. Bij het ♂ is de achterrand van het zesde onbedekt tergiert driehoekig uitgesneden. Lengte 3 — $3\frac{1}{4}$ mm. Zeer gemeen in de nesten van *Formica rufa*, *pratensis* en *truncicola*. 1. **flavipes** Grav.
- Het vijfde tot tiende sprietlid vrij sterk verbreed. Het groefje aan de basis van het halschild duidelijk. Pooten rood. Deze soort gelijkt overigens zeer op *flavipes*, doch is doorgaans kleiner, met krachtiger en korter spriet. Het achterlijf is iets dichter bestippeld. Sexueel verschil als bij *flavipes*. Lengte $2\frac{1}{2}$ — 3 mm. In de nesten van *Lasius fuliginosus*, doch veel zeldzamer. Bij Roermond en Doorn. In België bij Leuven; in de Rijnprov. bij Cleef 2. **confusa** Märk.

25. Atheta Thoms.

(*Homalota* sensu Erichson, Kraatz et Sharp, nec Mannerh.)

Kop weinig uitstekend en van achteren slechts weinig versmald, of wel meer vooruitstekend en dan van achteren sterker ingesnoerd; de slapen aan de onderzijde volkomen of onvolkomen gerand, ook wel ongerand. Spriet en min of meer los geleed, overigens zeer veranderlijk, veelal vrij lang beweimerd. Bovenlip aan den voorrand afgeknut of flauw uitgerand. Voorkaken gewoonlijk weinig, zelden (bij het Sub-gen. *Halobrectha* Thoms.) vrij sterk uitstekend, de eene in 't midden van den binnenrand gewoonlijk met een tandje of slechts met eene uitranding. De binnenste achterkaaks-lob aan de binnenzijde, naar het naar binnen gebogen uiteinde, met lange kromme tandjes bezet; de buitenste lob met rliezig en fijn behaard uiteinde. Derde kaaktasterlid langer dan het tweede, matig verdikt, het eindlid hoogstens half zoo lang als het derde, priemvormig. Kin breed trapeziumvormig, aan den voorrand gewoonlijk flauw uitgerand. Tong smal, veel korter en smaller dan het eerste liptasterlid, ongeveer tot aan het midden gespleten. Liptasters duidelijk 3-ledig, het tweede lid veel korter en smaller dan het eerste, het derde veel smaller, doch langer dan het tweede, soms naar het uiteinde iets verbreed. Achterlijf met tamelijk parallelle zijden, of naar het uiteinde meer of minder sterk versmald; gewoonlijk de eerste drie onbedekte tergieten, soms ook het vierde, zelden slechts het eerste alleen, aan de basis in de breedte ingedrukt. De eerste sterniten niet in de breedte ingedrukt of ingesnoerd. De epimeren van den metathorax overschrijden zelden den achterrand der dekschilden. Voortarsen 4 ledig, de middel- en achtertarsen 5-ledig. Het eerste lid der achtertarsen even lang of langer dan het tweede, doch hoogstens even lang als de twee volgende ledjes te zamen. — De larve en pop van *A. celata* zijn door Perris, de vermoedelijke larve van *A. fungi* door Mulsant beschreven. — De soorten van dit genus, welke voor het meerendeel zeer moeilijk te determineren zijn, leven deels onder rottende plantenstoffen, afgevallen bladeren, vergane paddestoeelen, mest en ruchtig mos, deels aan uitvloeiende boomsappen, achter boomschors, enkelen aan aas, sommigen langs oevers van rivieren, kanalen, plassen en slooten, waar zij in den zonneschijn snel rondloopen; enkelen leven langs de zeekust,

velen komen toevallig in miereennesten voor, doch eene soort (*A. talpa*) leeft uitsluitend bij mieren.

Van de bijna 300 Europeesche soorten komen 92 in Nederland en 49 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Het vierde onbedekt tergiet aan de basis in de breedte ingedrukt 2
- 1 Het vierde onbedekt tergiet aan de basis niet ingedrukt. 12
- 2 De slapen geheel ongerand; het achterlijf grof en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde en zesde onbedekt tergiet op de tophelft gekorrelt; het laatste tergiet aan den achterrand met 4 zeer kleine tandjes (Sub-gen. *Pachnida* Muls. & Rey). Lichaam zeer vlak, geheel zwart, soms de dekschilden iets roodbruinachtig, uiterst fijn en dun grijs behaard. Het voorlijf uiterst dicht en fijn bestippeld, eenigszins mat verglanzig. De eerste twee sprietleedjes roodachtig. Halsschild iets breeder dan lang, naar achteren duidelijk versmald, met een duidelijk, breeden langsindruk. Achterlijf tamelijk glanzig. Pooten donkerbruin, de knieën en tarsen lichter gekleurd. Bij het ♂ is het voorhoofd ingedrukt. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Deze soort herinnert in habitus en kleur eenigszins aan *incana*, met welke zij in het eerste voorjaar, niet zeldzaam, onder dood riet voorkomt. 62. *nigella* Er.
- De slapen, ten minste van achteren, gerand. 3
- 3 Het vijfde onbedekt tergiet langer dan het vierde. Bij het ♂ heeft het zesde onbedekt tergiet een kantig opgericht zijrand (Sub-gen. *Bessobia* Thoms.) 4
- Het vijfde onbedekt tergiet niet of nauwelijks langer dan het vierde. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan de zijden niet gerand. 7
- 4 Bovenzijde van het lichaam glanzig. De sprieten naar het uiteinde vrij duidelijk verdikt. Achterrand van het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ niet opgericht. 5
- Bovenzijde van het lichaam vrij dof, slechts het achterlijf glanzig. De sprieten naar het uiteinde zeer zwak verdikt 6
- 5 Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ aan het uiteinde, nagenoeg recht afgesneden en slechts de zijranden iets opgericht. Dekschilden naar het uiteinde bruinachtig. Naverwant aan *occulta*, doch iets kleiner, gewoonlijk iets donkerder gekleurd en op het voorlijf meer glanzig; ook zijn de sprieten iets dikker en sterker behaard. De indruk op voorhoofd en halsschild is, vooral bij het ♂, dieper en breeder. Het halsschild is iets smaller en naar de basis meer versmald. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. In boomzwammen. Niet inlandsch. Zij zou bij Elberfeld gevangen zijn (*gibbera* Rey) (*Fungivora* Thoms.)
- Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ zeer diep driehoekig uitgerand en aan de basis met 4 langsbultjes. Dekschilden donkerbruin. Sprieten eenkleurig zwart. Kop glanzig zwart, dicht en fijn bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, glanzig zwart, gewoonlijk met een duidelijk en diep dwarsgroefje aan de basis en soms ook met flauwe aanduiding van eene langsgroef, matig dicht en fijn bestippeld. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, dicht en tamelijk fijn bestippeld, grijs behaard. Achterlijf glanzig zwart, aan de basis verspreid en fijn bestippeld, naar het uiteinde geheel glad. Pooten pekkbruin. Bij het ♂ is het voorhoofd duidelijk ingedrukt. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Zij zou bij Cleef aan doode kraaien gevangen zijn (*monticola* Thoms.)
- 6 Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Sprieten iets langer dan kop en halsschild te zamen. Achterrand van het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ zeer weinig uitgerand en iets opgericht. Dekschilden donkerbruin. Deze soort komt in habitus eenigszins met *elongatula* overeen. Sprieten geheel zwart. Voorlijf fijn grijs behaard. Kop pekkzwart, uiterst fijn en onduidelijk bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, pekkzwart, dicht en fijn bestippeld, in 't midden van de basis met een oppervlakkig dwarsgroefje en veelal ook met eene langsgroef. Pooten donker geelbruin. Bij het ♂ is het voorhoofd iets ingedrukt. Lengte 3 mm. Zeer verbreid, onder dorre bladeren, dood riet en rottend stroo 58. *occulta* Er.
- Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Sprieten bruin, iets korter dan kop en halsschild te zamen. De zijrand van het zesde onbedekt tergiet is bij het ♂ iets opgericht en aan het uiteinde bevindt zich eene, aan den achterrand evenwijdig loopende, bultige verhevenheid. Dekschilden bruin. Pooten geelbruin. Halsschild met eene middengroef. Achterlijf aan de basis verspreid en fijn bestippeld, aan het uiteinde in het midden glad. Lengte 3 mm. Niet inlandsch. In Duitschland, Frankrijk en Engeland. (*excellens* Kr.)
- 7 Kop vrij groot of zeer groot, weinig of niet smaller dan het halsschild 8
- Kop naar verhouding klein, veel smaller dan het halsschild 10

8 De middelcoxae staan ver van elkaar verwijderd. Achterlijf grofkorrelig bestippeld (Sub-gen. *Alanta* Thoms.). Lichaam geheel loodkleurig-zwart, eenigszins dof-glanzig, vrij dicht en fijn grauw behaard. De eerste 5 sprietleedjes, benevens de tarsen geelroodachtig, het eerste sprietlid soms iets zwartachtig. Kop dicht en tamelijk fijn bestippeld, in het midden soms ingedrukt. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, naar de basis duidelijk versmald, met meer of minder duidelijke middengroef, vrij dicht en fijn rimpelig bestippeld. Dekschilden ongeveer de helft langer dan het halsschild, zeer dicht en fijn rimpelig bestippeld. Achterlijf glanzig, de eerste 3 onbedekte tergieten vrij sterk en dicht korrelig bestippeld, het vierde meer verspreid en grover, het vijfde en zesde nog sterker korrelig en nog meer verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet krachtig en dicht gekorrelt, van achteren in het midden in eene breede lob verlengd, waarvan de gladde achterrand gewoonlijk door eene dwarsrij van krachtiger korreltjes begrensd is. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet fijner gekorrelt en in het midden minder duidelijk lobvormig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Op riet en *Typha latifolia*, vooral aan de implanting der bladen, ook op uitgebloeiide *Typha*-kolven, en gemeen in het voorjaar onder aangespoeld riet. 61. *incana* Er.

De middelcoxae zijn slechts weinig van elkaar gescheiden. Achterlijf meer of minder fijn bestippeld (Sub-gen. *Anopleta* Muls. & Rey) 9

9 Kop zeer groot. Halsschild en dekschilden zeer fijn en verspreid bestippeld. Lichaam zeer smal, zwart, uiterst fijn en dun grijs behaard, de dekschilden soms bruin; de spriewortel en pooten bruinrood, de dijen donkerder. Kop, halsschild en dekschilden uiterst fijn gechagrineerd, met duidelijken verglans. Halsschild iets breeder dan lang, naar achteren duidelijk versmald, met eene lijne, ondiepe langsgroef. Achterlijf glanzig, fijn en verspreid bestippeld, naar het uiteinde zeer onduidelijk bestippeld, bijna glad. Bij het ♂ is het voorhoofd oppervlakkig ingedrukt en het halsschild dieper gegroefd; ook is het vijfde en zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde fijn gekorrelt, het zesde aan den achterrand met twee scherpe tandjes. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam achter boomschors. Arnhem en Breda. In de Rijnprov. bij Barmen 57. *inhabilis* Kr.

Kop matig groot. Halsschild en dekschilden dicht bestippeld. Lichaam zwart, tamelijk glanzig, dekschilden bruin, de sprieten soms met pekkbruinen wortel, de pooten bruingeel. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, fijn en zeer dicht bestippeld. Achterlijf weinig bestippeld, de laatste tergieten nagenoeg onbestippeld. Kop bij het ♂ met eene diepe langsgroef over de geheele lengte, bij het ♀ met een korren midden-indruk achter de sprieten. Halsschild aanmerkelijk smaller dan de dekschilden, fijn en zeer dicht bestippeld, bij het ♂ met eene breede middengroef, bij het ♀ met een onduidelijken indruk of met eene groef voor het schildje. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde zwak afgeknut of iets uitgebogen, het naar het uiteinde versmalde en afgeronde zesde sterniet iets vooruitstekend. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. In paddestoelen, onder dorre bladeren en in plantenafval, vooral in bosschen. Eenmaal bij Utrecht in Maart (lepid. Kr.) 56. *corvina* Thoms.

Tot het Sub-gen. *Anopleta* behoort nog eene soort, welke zeer op *Homalota plana* gelijkt, doch zich vooral daarvan onderscheidt door de 5-ledige middeltarsen en de zeer fijne bestippeling van den kop. Lichaam vrij lang en plat, zwart, dekschilden bruin, uiteinde van het achterlijf bruinachtig, de wortel der roodbruine of roestroode sprieten en de pooten roodgeel. Het voorlijf is uiterst fijn gechagrineerd, vrij dof. De eerste 3 onbedekte tergieten matig fijn en matig dicht-, het vierde veel meer verspreid-, het vijfde weinig bestippeld; het vierde en vijfde onbedekt tergiet aan de basis even diep ingedrukt. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Zij zou bij Elberfeld en in België bij *Fleurus* gevangen zijn. (arcana Er.)

10 Eerste lid der achtertarsen veel langer dan het tweede. Dekschilden bij het ♂ naar het uiteinde met eene langsplooi langs den naad. Het vijfde onbedekt tergiet bij het ♂ in het midden van den achterrand met eene hoefijzervormige verhevenheid (Sub-gen. *Ptychandra* Ganglb.). Bovenzijde van het lichaam pekwart, vrij dicht en grof grijs behaard. Halsschild bruin, de dekschilden lichtbruin. Sprieten roodbruin. Deze groote soort is vooral zeer kenbaar aan de grove bestippeling van het voorlijf. Halsschild duidelijk breeder dan lang, slechts iets smaller dan de dekschilden, met eenige aanduiding van eene breede oppervlakkige langsgroef. Dekschilden langer dan het halsschild, dicht grof dwarsrimpelig bestippeld. Achterlijf glanzig pekwart met roodbruin uiteinde, verspreid en fijn bestippeld, aan het uiteinde nagenoeg geheel glad. Pooten geelrood. Lengte 4 mm. Onder afgevallen bladeren, zeer zeldzaam. Een ♂ bij Loosduinen en een ♀ bij Rotterdam. Ook bij Wijnandsrade in Limburg. 59. *hepatica* Er.

Eerste lid der achtertarsen niet of slechts zeer weinig langer dan het tweede. Bij het ♂ zijn de dekschilden gewoon. Het vijfde onbedekt tergiet met of zonder bultje (Sub-gen. *Plataraea* Thoms.) 11

11 Kop tusschen de bestippeling glad, evenals het halsschild tamelijk glanzig. Het achterlijf geelrood, voor het lichter uiteinde zwartachtig. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet

gewoonlijk een bultje, het zesde aan het uiteinde vier tandjes, van welke de middelste klein zijn en soms ontbreken. Kop zwart of bruin, halsschild en dekschilden geelrood. De sprietwortel en de pooten meer geelachtig. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, de helft breeder dan lang, in 't midden naar de basis, in den regel, met een oppervlakkigen langsindruk, zeer verspreid bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, aan den naad en om het schildje gewoonlijk donkerder, iets minder glanzig dan het halsschild, vrij dicht en duidelijk bestippeld. De eerste onbedekte tergiten vrij dicht en tamelijk sterk-, het vierde verspreid bestippeld, het vijfde glad. Lengte 3—4 mm. Onder mos, dorre bladeren, plantenalval, in boomhol, aan uitvloeiende sappen van boomen, soms op Umbelliferen en ook wel eens bij *Lasius fuliginosus*. Verbreid, doch overal zeldzaam. 60. *brunnea* F.

Kop tusschen de bestippeling fijn gechagrineerd, evenals het geheele voorlijf doffer. Het achterlijf zwartachtig, het eerste en het zesde onbedekt tergiet iets lichter gekleurd, de overigen iets rood gerand. Bij het ♂ is het vijfde en zesde onbedekt tergiet gewoon. Deze soort is naverwant aan *brunnea*, doch iets smaller. De kleur is iets donkerder, pekszwart of donkerbruin, met roodbruin halsschild en lichtbruine dekschilden; het voorlijf is dichter behaard. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, veel breeder dan lang, met eene breede, ondiepe, naar voren smaller wordende langsgroef, aan de zijden iets lichter, niet dicht en fijn bestippeld. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, tamelijk dicht en fijn bestippeld. De eerste onbedekte tergiten vrij sterk en tamelijk dicht-, het vierde meer verspreid bestippeld, het vijfde nagenoeg geheel glad. Het ♂ heeft slankere spriet en een ingedrukt voorhoofd. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder steenen, dorre bladeren en plantenalval, vooral in bosschen. Niet inlandsch. In België bij Verviers (*nigritrons* Er.) (*melanocephala* Heer)

- 12 Dekschilden veel korter dan het halsschild. Oogen klein. De slapen veel langer dan de langsdooersnede der oogen 13

Dekschilden langer, even lang als, of slechts iets korter dan het halsschild 14

- 13 Kop breed, rondachtig, weinig smaller dan het halsschild. Het ♂ zonder bijzonder kenmerk op het vijfde onbedekt tergiet (Sub-gen. *Ousipalia* Gozis). Lichaam glanzig, onduidelijk behaard, zwartachtig, de dekschilden soms meer bruinachtig. Halsschild duidelijk breeder dan lang, iets breeder dan de dekschilden, met een meer of minder duidelijken langsindruk aan de basis, vrij sterk, doch niet dicht bestippeld. Dekschilden naar het uiteinde verbreed, dicht en krachtig bestippeld. Achterlijf aan de basis weinig-, naar het uiteinde bijna niet bestippeld. Pooten geelachtig. Spriet en eerste lid geelachtig, de laatste leedjes verbreed. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde afgeknot, het zesde sterniet steekt ver nit en is aan den top lang behaard. Lengte 1—1 $\frac{1}{2}$ mm. Vooral onder steenen; ook in mos, achter schors, tusschen dorre bladeren en soms bij mieren. In aantal bij Scheveningen in het voorjaar onder steenen op de duinen. Ook op Texel, bij Roermond, Zutphen en Arnhem.

74. *caesula* Er.

Kop klein, rondachtig-ovaal, veel smaller dan het halsschild. Het ♂ op het vijfde onbedekt tergiet met één, zelden met twee langsplooiën of bultjes (Sub-gen. *Geostiba* Thoms.). Lichaam weinig glanzig, duidelijk fijn behaard, bruinachtig, dikwerf meer geelbruin; de kop pekszwart of pekbruin. Het derde en vierde onbedekt tergiet, alsmede de voorhelft van het vijfde pekbruin, de rest van het achterlijf meer roodbruin; bij donkere exemplaren is soms het achterlijf bijna geheel pekbruin. Halsschild nagenoeg even lang als breed, iets snaller dan de zeer korte dekschilden aan het uiteinde, de achterrand in het midden iets stomphoekig uitgetrokken, met een dwarsindruk aan de basis, welke in eene zeer onduidelijke langsgroef overgaat, dicht en uiterst fijn bestippeld. Dekschilden dicht en krachtig bestippeld. De eerste onbedekte tergiten vrij dicht-, het vierde en vijfde zeer verspreid en fijn bestippeld. Pooten geel. Spriet en roodbruin met lichtere basis, de laatste leedjes sterk verbreed. Ongevelegeld. Bij het ♂ bevindt zich op de dekschilden, aan weerszijden van het schildje, een klein roodachtig bultje. Lengte 2—2 $\frac{1}{2}$ mm. Eene der gemeenste soorten, onder mos, afgevallen bladeren en in aanspoelsel 73. *circellaris* Grav.

Hier vindt wellicht eene mij onbekende, niet met zekerheid te duiden, soort eene plaats. Zij zou door den grooten kop en den vorm van het halsschild aan *Phytosus* herinneren en wellicht geen *Atheta* zijn. Lichaam roodgeel, de kop pekszwart, het achterlijf zwartbruin met roodbruin uiteinde en meestal met geelbruine basis. Kop in het midden breeder dan de voorrand van het halsschild, fijn bestippeld. Spriet en naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Halsschild nagenoeg even lang als breed, naar de basis duidelijk versmald, zeer vlak, met zwakke middengroef, vrij dicht en fijn bestippeld, fijn behaard. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ korter dan het halsschild, aan het uiteinde iets uitgebogen, vrij dicht en duidelijk, dwarsriempig bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde iets verbreed, op de eerste drie tergiten fijn en tamelijk verspreid bestippeld. Lengte ongeveer 2 $\frac{1}{2}$ mm. Volgens *Kraatz* in enkele exemplaren bij Crefeld in de Rijnprov. gevangen (*tabida* Kiesw.)

- 14 Oogen tamelijk klein of zeer klein. De slapen veel langer dan de langsdooersnede der oogen. 15

Oogen vrij groot. De slapen niet of slechts iets langer dan de langsdoorsnede der oogen . . . 26

- 15 Derde en vierde sprietlid nagenoeg even lang en eenigszins kogelvormig. Het vijfde tot zevende sprietlid niet of slechts weinig verbreed. Lichaam zeer smal en plat (Sub-gen. *Hydrosmeccina* Ganglb.). Halsschild weinig of niet breder dan lang, iets smaller dan de dekschilden, met rechte zijden, naar de basis iets versmald, de basis naast de achterhoeken uiterst lijn gerand, bij het ♂ met eene diepe, geheel doorlopende langsgroef, uiterst dicht en lijn bestippeld. Bovenzijde van het lichaam bruin, halsschild en dekschilden iets lichter, gewoonlijk de dekschilden geelbruin. Sprietten geelachtig, naar het uiteinde iets verdikt. Kop uiterst dicht en lijn, bijna onmerkbaar bestippeld. Dekschilden ongeveer de helft langer dan het halsschild, eveneens dicht bestippeld, eenigszins glanzig. Achterlijf aan het uiteinde lichter, dicht en lijn bestippeld, lijn behaard. Pooten geelachtig met donkerder dijkwortel. Eene zeer kleine, slanke soort, met uiterst lijn behaard voorlijf. Lengte 1 mm. Langs boschbeken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik (subtilissima Kr.)

Derde sprietlid veel langer dan het vierde. 16

- 16 Slapen niet gerand 17

Slapen minstens van achteren gerand. 21

- 17 Kop naar achteren verbreed. Achterlijf tot aan het uiteinde dicht bestippeld (Sub-gen. *Amischa* Thoms.) 18

Kop naar achteren niet of nauwelijks verbreed. Achterlijf aan het uiteinde glad of weinig dicht bestippeld 20

- 18 Halsschild even breed als de dekschilden, duidelijk breder dan lang, zeer lijn bestippeld, met een breed groefje voor de basis en soms met eene onduidelijke middengroef. Voorhoofd gewelfd. Bovenzijde van het lichaam donkerbruin of zwartachtig, lijn en dicht bestippeld. Achterlijf grof bestippeld, meer of minder dof, naar het uiteinde gewoonlijk geelrood gekleurd. Pooten geelachtig. Deze soort is zeer veranderlijk in kleur, soms zijn halsschild en dekschilden licht roodbruin en de sprietten geelachtig; bij donkere exemplaren zijn de sprietten en pooten donkerbruin. Het zesde onbedekt tergiet is bij het ♂ diep driehoekig uitgesneden, bij het ♀ slechts iets uitgesneden of recht afgeknot (♀ *decepiens* Sharp). Het zesde sterniet steekt bij het ♂ iets meer uit dan bij het ♀. Lengte 1½—2 mm. Eene der gemeenste soorten, in allerlei plantenresten. In het voorjaar in massa rondvliegende.

69. *analis* Grav.

Halsschild iets smaller dan de dekschilden. Voorhoofd min of meer uitgehold of gegroefd . . . 19

- 19 Achterlijf gelijkmatig dicht en lijn bestippeld. Voorhoofd met eene zwakke middengroef. Deze soort lijkt op de donkere exemplaren van *analis*, doch is iets meer glanzig en is onderscheiden door het, vooral naar het uiteinde, dichter en nog grover bestippeld achterlijf. Bij het ♂ is het voorhoofd breder gegroefd dan bij het ♀; het zesde onbedekt tergiet is veel dieper en breder uitgesneden dan bij *analis*; ook steekt het zesde sterniet duidelijk uit. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde afgeknot of slechts iets uitgebogen. Lengte 2—2½ mm. Zeldzaam in mest en in aanspoelsel der rivieren. 70. *soror* Kraatz.

Achterlijf naar het uiteinde iets minder duidelijk en meer verspreid bestippeld. Voorhoofd bij het ♂ met eene breede, diepe uitholling, bij het ♀ met eene middengroef. Dekschilden korter dan bij *analis*, nagenoeg even lang als het halsschild. Deze soort lijkt overigens op kleine exemplaren van *analis*. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet breder en dieper uitgerand dan bij *analis*, het zesde sterniet steekt veel meer uit en is, evenals bij *soror*, aan het afgeronde uiteinde van een haarbundeltje voorzien. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde duidelijk uitgebogen. Lengte 1½ mm. Zeldzaam onder dorre bladeren en oud stroo. Den Haag, Loosduinen, Tiel, Amsterdam, Breda, Arnhem, Zutphen en Vorden.

71. *cavifrons* Sharp.

- 20 Het vijfde onbedekt tergiet veel langer dan het zesde (Sub-gen. *Meotica* Muls. & Rey). Eene zeer kleine, door de krachtige sprietten in 't oog vallende soort. Zwartbruin of roodbruin, tamelijk glanzig en uiterst lijn bestippeld. Sprietten bruinachtig met roodgelen wortel. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, soms met eene geringe aanduiding van eene langsgroef. Dekschilden iets langer dan het halsschild, bruinachtig, iets duidelijker bestippeld dan het halsschild. De eerste onbedekte tergieten niet zelden bruinachtig, het uiteinde roodgeel. De laatste tergieten zijn nagenoeg onbestippeld. Pooten geelachtig. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet iets uit. Lengte 1½ mm. In het voorjaar in massa langs overstroomde weilanden in aanspoelsel en onder dood riet 68. *exilis* Er.

Hieraan verwant is eene soort, welke vooral gekenmerkt is door de zeer kleine oogen en de korte dekschilden en daardoor aan sommige *Leptusa*-soorten herinnert. Lichaam smal, bruingeel, het achterlijf voor het uiteinde gewoonlijk donker gekleurd. Sprietten en pooten geel. Kop veelal met een middengroefje; de slapen ongeveer vijfmaal zoo lang als de

doorsnede der oogen. Halsschild nagenoeg even breed als de dekschilden, uiterst fijn, bijna niet zichtbaar bestippeld. Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild, uiterst fijn en weinig dicht bestippeld. Achterlijf op de eerste 3 onbedekte tergieten vrij dicht en uiterst fijn-, naar het uiteinde zeer verspreid bestippeld. Bij het ♂ steekt het, aan het uiteinde breed afgeknotte, zesde sterniet nauwelijks uit. Lengte $1\frac{1}{5}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Op vochtige plaatsen onder steenen. Niet inlandsch. In Westfalen . . (pallens Redt.) (indocilis Heer)

Het vijfde onbedekt tergiet niet langer dan het zesde (Sub-gen. *Amidobia* Thoms.). Deze soort gelijkt op eene zeer kleine *analis*. Halsschild en dekschilden donker roodbruin, overigens zwart of bruin, iets glanzig. Voorlijf dicht en fijn bestippeld. Sprieten roodbruin met lichter wortel. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets meer gewelfd dan bij *analis*, aan de basis met een dwarsgroefje en met eene oppervlakkige middengroef. Dekschilden weinig langer dan het halsschild. Achterlijf pekwart, tamelijk glanzig, aan de basis veelal bruinachtig en aan het uiteinde roodgeel. De laatste tergieten onbestippeld. Pooten roodgeel. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde zeer zwak uitgebogen. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Gemeen in de nesten van *Formica rufa*, *pratensis* en *truncicola*, bij *Lasius fuliginosus* en *Myrmica laevinodis*. (parallela Mannh.) 72. *talpa* Heer.

Hieraan verwant is eene soort, welke in kleur aan *pallicola* herinnert, en daarvan vooral onderscheiden is door het meer gewelfde lichaam, de iets meerdere grootte, de kortere kop, de kleinere minder uitpuilende oogen, het duidelijk bestippeld halsschild en door de kortere dekschilden. Kop zwart, halsschild en dekschilden geelrood of roodbruin, achterlijf pekwart met roodachtig uiteinde, soms ook aan de basis bruinrood. Sprieten geheel, of alleen aan den wortel, benevens de pooten roodgeel. Bij het ♂ de kop met een klein middengroefje. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld . . . (validiuscula Kr.)

21 Het vijfde onbedekt tergiet niet langer dan het zesde. Dekschilden even lang als of langer dan te zamen breed (Sub-gen. *Alenonota* Thoms.) 22

Het vijfde onbedekt tergiet duidelijk langer dan het zesde 24

22 Halsschild en dekschilden zeer lijn gechagrineerd, weinig glanzig, fijn doch duidelijk bestippeld. 23

Halsschild en dekschilden glanzig, glad, zonder zichtbare bestippling. Lichaam zwart. Sprieten en pooten geel. Dekschilden en uiteinde van het achterlijf roodbruin. Halsschild iets korter dan de dekschilden, met eene middengroef voor de basis. Lengte 2 mm. Niet inlandsch. In Oldenburg en bij Elberfeld (splendens Kr.)

23 Sprieten krachtig ontwikkeld, vrij lang bewimperd, het derde lid veel korter dan het tweede, het vierde tot tiende zeer sterk verbreed, in breedte en lengte geleidelijk iets toenemend, elk 3 maal zoo breed als lang, het eindlid nagenoeg even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, stomp toegespitst. Lichaam smal en lang gestrekt. Kop zwart of bruinrood, het halsschild licht geelrood, de dekschilden roodgeel, het achterlijf bruinrood, voor het roodgele uiteinde met een zwartachtigen ring. Sprieten, tasters en pooten roodgeel. Halsschild smaller dan de dekschilden, ongeveer even lang als breed, uiterst fijn gechagrineerd, zeer fijn en verspreid bestippeld, weinig behaard, meestal met eene lijn middengroef. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, nagenoeg iets langer dan te zamen breed, uiterst lijn gechagrineerd en uiterst fijn en verspreid bestippeld en lijn behaard. Achterlijf bijna niet bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig toegespitst en slechts aan den top afgerond, bij het ♀ van achteren breed afgerond-afgeknot. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld.

(atricapilla Muls. & Rey) (rufotestacea Kr.) 1)

Sprieten naar het uiteinde minder verdikt, het derde lid weinig korter dan het tweede, het vierde nauwelijks de helft breder dan lang, het vijfde tot tiende sterk verbreed, geleidelijk in breedte toenemend, de voorlaatste leedjes meer dan dubbel zoo breed als lang, het eindlid even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, stomp toegespitst. Lichaam smal en lang gestrekt, glanzig, pekwart, de dekschilden bruingeel, het uiteinde van het achterlijf, de sprieten en pooten roodgeel. Onuitgekleurde exemplaren zijn als *rufotestacea* gekleurd. Halsschild smaller dan de dekschilden, iets breder dan lang, bijna niet zichtbaar gechagrineerd, glanzig, zeer fijn en verspreid bestippeld, zeer weinig behaard, in het midden veelal oppervlakkig gegroefd. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, iets langer dan te zamen breed, uiterst fijn gechagrineerd, lijn-, oppervlakkig en weinig dicht bestippeld, spaarzaam behaard. Achterlijf nauwelijks bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde onbedekt tergiet op de achterhelft, in het midden, van twee krachtige evenwijdige langsplooiën voorzien. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Achter boomschors. Eenmaal bij Apeldoorn, in Juni.

67. *gracilenta* Er.

24 Halsschild nauwelijks breder dan lang. De dekschilden iets langer dan te zamen breed (Sub-gen. *Apimela* Muls. & Rey) 25

1) De uit Oldenburg opgegeven *A. elegantula* Bris. is hoogstwaarschijnlijk *rufotestacea* Kr. of *splendens* Kr.

Halsschild breed, veel breeder dan lang. De dekschilden korter dan te zamen breed (Sub-gen. *Parameotica* Ganglb.). Deze kleine soort is zwartbruin, fijn behaard, het voorlijf zeer dicht en fijn bestippeld, eenigszins glanzig. Spriet en naar het uiteinde iets verdikt, geheel lichtbruin. Kop pekwart, uiterst fijn bestippeld. Halsschild sterk verbreed, weinig of niet smaller dan de dekschilden, naar achteren duidelijk versmald, dicht en fijn bestippeld, aan de basis met een onduidelijk dwarsgroefje en soms ook met eene zwakke aanduiding van eene langsgroef. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Achterlijf aan het uiteinde roodbruin, de eerste onbedekte tergiten dicht en zeer fijn-, het vierde verspreid-, het vijfde nagenoeg niet bestippeld. Pooten lichtgeel. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet eenigszins nit en is aan het uiteinde iets driehoekig uitgesneden; bij het ♀ flauw uitgerand. Lengte 14 mm. Onder dood riet, op slijb, langs stilstaande wateren en in aanspoelsel der rivieren. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld. (*laticeps* Thoms.)

- 25 Lichaam zeer smal en lang, roodgeel, de sprietwortel en de pooten bleekgeel. Kop groot, even breed als het halsschild, uiterst fijn en nauwelijks zichtbaar bestippeld, in het midden veelal met een groefje of eene oppervlakkige langsgroef. Spriet kort, naar het uiteinde sterk verdikt, het vijfde tot tiende lid sterk verbreed, de voorlaatste leedjes ongeveer dubbel zoo breed als lang, het eindlid nauwelijks zoo lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, ovaal, stomp toegespitst. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, even lang als breed, naar achteren iets en nagenoeg rechtlijnig versmald, uiterst fijn en dicht-, nauwelijks zichtbaar bestippeld, uiterst fijn behaard, met eene meer of minder duidelijke middengroef. Dekschilden een derde langer dan het halsschild, uiterst fijn en zeer dicht bestippeld, zeer fijn behaard. Achterlijf lang gestrekt, op de eerste 3 onbedekte tergiten duidelijk, zeer fijn en dicht-, van achteren veel minder bestippeld, het vijfde onbedekt tergiet veel langer dan het vierde. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet van achteren afgeknot en zeer zwak uitgebogen, bij het ♀ stomp afgerond. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Op zandige rivieroever. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik. (*macella* Er.)

Naverwant is eene iets grootere soort, met iets breeder, naar achteren nauwelijks versmald halsschild. Bij het ♂ vertoont het eerste onbedekt tergiet, in het midden van den achterrand, een kegelvormig naar achteren gericht bultje. Lengte 2½ mm. Op zandige rivieroever. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik. (*pallens* Muls. & Rey) (*Mulsanti* Ganglb.)

- 26 Achterlijf naar het uiteinde versmald of min of meer toegespitst. 27
Achterlijf met parallele zijden of slechts aan het uiteinde versmald 55

- 27 De omgeslagen zijrand van het halsschild, van terzijde gezien, onzichtbaar. De zijrand van het halsschild loopt, in eene gelijkmatige bocht, tot aan de voorhoeken door en is weinig of niet bewimperd. Halsschild naar voren versmald. Habitus van *Oxypoda*. 28

De omgeslagen zijrand van het halsschild, van terzijde gezien, zichtbaar. De zijrand van het halsschild aan de voorzijde in eene sterke bocht naar onderen gericht, zeer duidelijk bewimperd, behalve bij het sub-gen. *Datomiera* Muls. & Rey, waar de bewimpering fijn en onduidelijk is 39

- 28 Derde sprietlid duidelijk langer dan het tweede (Sub-gen. *Coprothassa* Thoms.) 29
Derde sprietlid korter of hoogstens even lang als het tweede (Sub-gen. *Acrotona* Thoms.) 30

- 29 Mesosternum in het midden lijn gekield. Spriet niet afstaande behaard, het vierde lid duidelijk breeder dan lang. Halsschild met eene zwak aangeduide langsgroef. Bovenzijde zwart, dekschilden okergeel, om het schildje zwart. Sprietwortel, de randen der sternieten en de pooten geelachtig. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *Oxypoda lividipennis*, doch is veel kleiner. Bestippeling op het voorlijf zeer fijn en zeer dicht, op het achterlijf minder fijn en dicht. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde afgerond en steekt eenigszins kegelvormig uit, bij het ♀ is het vrij diep uitgerand. Lengte 3—3½ mm. Zeer gemeen onder mos, plantenaafval, in mesthoopen, paardenmest, onder steenen, in rottende paddestoelen en langs oevers (*lividipennis* Mannh.) 1. **sordida** Mrsh.

Mesosternum niet in het midden gekield. Spriet niet lijner, korter, geheel zwart, kort maar duidelijk afstaande behaard, het vierde lid duidelijk vierkant, even lang als breed. Halsschild zonder langsgroef. Deze soort gelijkt overigens op *sordida*, doch is doorgaans iets kleiner en naar het uiteinde meer versmald. Bovenzijde zwart, de dekschilden elk over het midden met eene driehoekige, okergele vlek, waarvan de top naar den schouder gericht is. Achterlijf geheel zwart, het uiteinde iets bruinachtig. Pooten bruinachtig, de tarsen geelachtig. Bestippeling op het voorlijf veel grover, doch minder dicht. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet kegelvormig uit en is aan het uiteinde afgerond, bij het ♀ slechts iets uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeldzaam onder koe- en paardenmest, steenen en soms in aanspoelsel. Ook bij *Lasius fuliginosus*. Breda, de Bilt, Amsterdam, Haarlem, Warnsveld, Maarsbergen, Roermond, Maastricht en op Terschelling. (*tenera* Sahlb., *testudinea* Er.) 2. **melanaria** Mannh.

- 30 Alle onbedekte tergiten dicht bestippeld en lijn zijdeachtig behaard, het vijfde tergiet veel langer dan het vierde. Halsschild over het midden, ten minste aan de basis, duidelijk of in het geheel niet gegroefd (*Colpodota* Muls. & Rey). 31
- Het vierde en vijfde onbedekt tergiet meer verspreid bestippeld en het gehele achterlijf fijner behaard; het vijfde tergiet weinig langer dan het vierde. Het eerste lid der achter-tarsen weinig of niet langer dan het tweede 34
- 31 Het zevende tot tiende sprietlid zeer weinig of nauwelijks verbreed 32
- Het zevende tot tiende sprietlid sterk verbreed. Bovenzijde zwart, de dekschilden soms bruin, het achterlijf naar het uiteinde roodbruin; zeldzamer is de gehele bovenzijde roodbruin. Sprietten zwart, met lichtere basis. Habitus en kleur van *pygmaea*, doch doorgaans iets kleiner en naar voren iets meer versmald; het halsschild korter en breder, sterker gewelfd, zeer fijn en dicht bestippeld. Het vierde sprietlid vierkant. Halsschild dof, niet gegroefd. Lengte 2—2½ mm. Onder mos, dorre bladeren, rottende paddestoelen en dierlijke overblijfselen. Den Haag, Amsterdam, Hillegom, Doorn. 6. *parens* Muls. & Rey.
- 32 Het eerste lid der achtertarsen duidelijk langer dan het tweede. Halsschild zonder langsgroef. Dekschilden fijn bestippeld 33
- Het eerste lid der achtertarsen nauwelijks langer dan het tweede. Halsschild over het midden, ten minste aan de basis, duidelijk gegroefd, bij de var. *muscorum* Ch. Bris. niet gegroefd. Dekschilden duidelijk grof, dwars-rimpelig bestippeld. Bovenzijde geheel zwart, soms de dekschilden iets bruinachtig. Sprietten zwart met bruinachtigen wortel. Achterlijf glanzig en fijn bestippeld. Vierde sprietlid even lang als breed. Lengte 1½—2 mm. Verbreed in koe- en paardenmest, plantenafval, paddestoelen en onder mos. De var. *muscorum* met het type. (*pilosiventris* Thoms., *stercoraria* Kr.) 5. *parva* Sahlb. 1)
- 33 Sprietten en de gehele bovenzijde zwart, de dekschilden soms iets bruinachtig. Deze soort heeft den habitus van eene kleine, spitse *Oxypoda*; zij is iets breeder dan *pygmaea*, eenigszins vlak gedrukt. Peoten vuil geelbruin, als berookt, de knieën en tarsen geelachtig. Voorlijf zeer fijn en dicht-, het achterlijf zeer dicht bestippeld en sterk toegespitst. Halsschild meer dan de helft breeder dan lang. De sprietten zijn langer en slanker dan bij *pygmaea*. Lengte 1¾—2½ mm. Zeer gemeen in koe- en paardenmest, onder steenen, dorre bladeren en soms in aanspoelsel 4. *aterrima* Grav.
- Sprietten zwart, het eerste lid geel; bij den vorm *obfuscata* Grav. zijn de sprietten geheel roodbruin. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden bruinachtig of roodbruin. Pooten geelachtig. De zijden van het halsschild soms en het uiteinde van het achterlijf meer of minder roodachtig. Habitus van *aterrima*, doch iets smaller en meer gewelfd. Voorlijf fijn en dicht-, achterlijf zeer dicht bestippeld; soms zijn de achterlijfsringen lichter gerand. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen onder mos, dorre bladeren, plantenafval, hoendermest en soms in aanspoelsel (*obfuscata* Grav.) 3. *pygmaea* Grav.
- 34 Het eerste sprietlid iets langer, doch nauwelijks dikker dan het tweede. Halsschild met eene duidelijke middengroef (*Solenia* Muls. & Rey) 35
- Het eerste sprietlid veel langer en dikker dan het tweede. Halsschild met een groefje aan de basis of bovendien met lauwe aanduiding van eene middengroef (*Acrotona* Muls. & Rey) 37
- 35 Het zevende tot tiende sprietlid is weinig breeder dan lang 36
- Het zevende tot tiende sprietlid is sterk verbreed. Deze soort is naverwant aan *melanaria*, doch smaller en met meer parallele zijden, meer bruin, de dekschilden op het midden geelachtig-bruin of wel geheel geelbruin met eene driehoekige, donkere vlek aan het schildje. Pooten geelachtig. Uiteinde van het achterlijf geelachtig. Sprietten donkerbruin, met lichter wortel. Het vierde sprietlid is opvallend klein, vierkant, smaller en korter dan het vijfde, dat langer is dan het zesde. Halsschild smaller en meer gewelfd dan bij *melanaria*, met eene middengroef, met meer afgeronde achterhoeken, soms met lichtere zijden. Dekschilden iets breeder en langer dan het halsschild. Het voorlijf fijner en dichter bestippeld; het achterlijf, vooral aan de basis, meer verspreid bestippeld, minder behaard en minder toegespitst. Lengte 2—2½ mm. Onder doode dieren, paardenmest, in paddestoelen en op mesthoopen. Niet inl. In de Rijnprovincie bij Ahrweiler (*fuscipes* Heer)
- 36 Sprietten roodbruin of bruin met gelen wortel. Bovenzijde donkerbruin, het halsschild met lichtere randen. Dekschilden, behalve aan het schildje, vuil geelbruin. Halsschild zeer verbreed, met duidelijke middengroef, aan weerszijden van de basis duidelijk uitgebogen. Achterlijf naar het uiteinde versmald, aan de basis zeer duidelijk en vrij dicht-, naar het uiteinde verspreid bestippeld, de ringen geelachtig gerand. Lichaam vrij kort

1) Eene uit Elberfeld vermelde *A. nigerrima* Aubé schijnt *parva* Sahlb. te zijn.

en breed, eenigszins gewelfd, grooter en breeder dan de aanverwante fungi. Voorlijf dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. Pooten geelachtig. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiert aan den top van 4 tandjes voorzien, van welke de twee buitenste tamelijk spits zijn. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen in koemest, paddestoelen, mos, onder dorre bladeren, op dierlijken afval, in aanspoelsel en soms bij mieren.

(vernacula Er., fusca Sharp) 11. *laticollis* Steph.

Sprieten geheel zwart. Bovenzijde zwart, de dekschilden eenigszins bruinzwart, het uiteinde van het achterlijf min of meer roodachtig. Habitus van fungi, doch smaller en meer gewelfd, weinig glanzig, behalve op het achterlijf; vooral in 't oog vallend door den kleinen, smallen, eenigszins kogelronden kop. Pooten donker, de knieën en tarsen geelachtig. Voorlijf fijn en zeer dicht-, het achterlijf sterker bestippeld, minder dicht op het vierde en zesde tergiert. Achterlijf geleidelijk en slechts naar het uiteinde sterk versmald. Lengte 2 mm. Zeldzaam onder steenen, mos, paddestoelen en plantenafval. Eenmaal bij Loosduinen.

(limetaria Thoms.) 10. *subsinnata* Er.

37 Achterlijf, ten minste naar het uiteinde, zeer verspreid bestippeld 38

Achterlijf overal duidelijk, doch minder verspreid bestippeld, zelfs op de laatste tergieten. Deze soort is zeer naverwant aan fungi, doch kleiner, met meer parallele zijden, meer gewelfd, minder glanzig en sterker behaard. Pekzwart, de sprieten bruin of roodbruin met lichter wortel, de dekschilden soms bruinachtig. Halsschild zeer dicht en duidelijk-, de dekschilden sterker en eenigszins rimpelig, dicht bestippeld. Pooten donkerder. Lengte $1\frac{1}{2}$ — 2 mm. Vrij gemeen onder dorre bladeren, mos, in mest, vooral op moerassige plaatsen; ook bij *Formica rufa* 7. *orphana* Er.

38 Vierde sprietlid iets langer dan breed. Lichaam glanzig zwart. Sprieten roestkleurig, naar het uiteinde berookt of geheel bruinachtig. Dekschilden veelal over het midden eenigszins bruinachtig. Pooten geelachtig. Kop en halsschild fijn en dicht-, de dekschilden tamelijk fijn en dicht en eenigszins rimpelig-, het achterlijf tamelijk fijn en verspreid bestippeld. Halsschild kort, sterk verbreed, naar voren aanmerkelijk versmald, met stompe achterhoeken, meestal met een basaalgroefje en veelal met flauwe aanduiding van eene middengroef. Achterlijf niet zeer sterk versmald. Bij onuitgekleurde exemplaren is het lichaam geheel geelachtig-rood en slechts hier en daar wat donkerder. Bij de var. *orbata* Er. is het halsschild iets langer en naar voren meer versmald, de dekschilden zijn donker kastanjebruin en de sprieten geheel zwartbruin. De var. *clientula* Kr. is kleiner dan het type, heeft lichter gekleurde dekschilden en bruine sprieten met lichter wortel. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet iets kegelvormig uit en is aan den top afgerond; ook zijn de voorlaatste sprietledjes even lang als breed, bij het ♂ iets verbreed. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen in plantenafval, onder dorre bladeren, dood riet en stroo, mos, paddestoelen, onder zeewier op de stranden en in aanspoelsel, soms ook bij mieren. De var. *orbata*, welke vooral op zand langs de zeekust leeft, is volgens *Ganglbauer* eene goede soort 8. *fungi* Grav.

Vierde sprietlid duidelijk vierkant, even lang als breed. Deze soort is naverwant aan de lichter gekleurde exemplaren van fungi, doch is grooter, breeder, meer gewelfd en sterker glanzig. Sprieten krachtiger ontwikkeld, zwartachtig, veelal met roodachtigen wortel. Lichaam langer doch minder behaard. Halsschild fijn en verspreid-, de dekschilden diechter, krachtiger en rimpelig-, het achterlijf vrij sterk en verspreid bestippeld. Halsschild korter, sterk verbreed, naar voren aanmerkelijk versmald, met aangeduide achterhoeken, over het midden zwart, meestal met bruine zijden, met een groefje aan de basis en het begin van eene onduidelijke middellijn. Dekschilden iets gewelfd, roodachtig-geel, om het schildje en aan de buitenhoeken zwart. Uiteinde van het achterlijf donkerrood. Pooten geelachtig. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder mos en dorre bladeren in vochtige bosschen, in aanspoelsel, keldervuil en soms bij *Formica rufa*. Vrij zeldzaam bij den Haag.

(pulchra Kr.) 9. *clientula* Er.

39 Derde sprietlid duidelijk korter dan het tweede. Halsschild en achterlijf aan de zijden fijn en onduidelijk bewimperd. Kleine zwarte soorten (Sub-gen. *Datomiera* Muls. & Rey). 40

Derde sprietlid niet of slechts zeer weinig korter dan het tweede. Halsschild en achterlijf aan de zijden lang en duidelijk bewimperd. 43

40 Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. Sprieten naar het uiteinde zwak, doch duidelijk verdikt 41

Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang, naar achteren niet sterker dan naar voren versmald, met duidelijke langsgroef. Deze soort is doorgaans iets grooter, breeder, meer platgedrukt, zwarter en minder dof dan *celata*. Ook gelijkt zij op eene zeer kleine *gagatina*, doch is meer platgedrukt en heeft het achterlijf naar het uiteinde iets versmald. Lichaam zwart, eenigszins glanzig, de pooten bruin; vrij dicht en kort-, iets zijdeachtig grijs behaard, fijn bestippeld, duidelijk op de dekschilden, fijn en dicht op het geheele achterlijf. Sprieten krachtig ontwikkeld, lang, het vierde lid even lang als breed, het

zevende tot tiende bij het ♂ nagenoeg vierkant, bij het ♀ een weinig verbreed, het eindlid groot en langwerpig. Kop min of meer gegroefd. De dekschilden iets breeder en ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den top van 4 kleine tandjes voorzien, bij het ♀ iets uitgerand. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Gemeen onder mos, steenen, afgevallen bladeren, plantenafval, in mest en in paddestoelen. Groote exemplaren met langere sprieten en met bij het ♂ ingedrukten kop, vormen *A. hodierna* Sharp, welke door *Ganglbauer* als goede soort wordt aangemerkt. Even verbreed als het type.

(vicina Kr., celata Ths., hodierna Sharp) 13. *zosteræ* Thoms.

- 41 Achterlijf gelijkmatig en zeer dicht bestippeld 42

Achterlijf naar het uiteinde niet dicht bestippeld, eenigszins glanzig, bruin behaard. Deze soort is naverwant aan *gagatina*, doch veel kleiner en met naar het uiteinde versmald achterlijf. Dof bruinzwart, de dekschilden veelal iets lichter. Voorlijf zeer dicht en duidelijk bestippeld. Kop bij het ♂ al of niet duidelijk ingedrukt. Halsschild tamelijk verbreed, naar achteren niet meer versmald dan naar voren, met stompe achterhoeken en meer of minder duidelijke middengroef. Dekschilden iets breeder en weinig langer dan het halsschild. Sprieten kort, weinig naar het uiteinde verdikt, het vierde lid iets breeder dan lang, het vijfde tot tiende vrij sterk verbreed. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den top van 4 meer of minder duidelijke tandjes voorzien. Exemplaren met iets langere dekschilden en met bij het ♂ ingedrukten kop, vormen *A. germana* Sharp, welke door *Ganglbauer* als goede soort wordt aangemerkt. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Verbreed onder steenen, dorre bladeren, drogen koemest, mos, paddestoelen, plantenafval, aas, achter boomschors en soms bij mieren. De vorm *germana* bij Apeldoorn en Zutphen . . . (*germana* Sharp) 16. *celata* Er.

- 42 Dekschilden korter dan of ongeveer even lang als het halsschild. Lichaam verspreid en lang bruinachtig behaard. Deze soort is zeer naverwant aan *sordidula*, doch iets breeder, iets meer gewelfd en met meer parallele zijden, minder dof en vooral minder dicht en iets minder fijn bestippeld, althans op kop en halsschild, die eenigszins gegroefd zijn. Sprieten korter en dunner, het laatste lid kleiner en korter. Halsschild iets meer verbreed, bijna dubbel zoo breed als lang, de dekschilden korter. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 zwakke tandjes aan het uiteinde. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Onder paarden- en varkensmest, in mos en achter eikenschors. Zeer zeldzaam. Zutphen, Arnhem, Nootdorp, Venlo en den Haag.

14. *canescens* Sharp.

Dekschilden langer dan het halsschild. Lichaam fijn grijs berijpt behaard. Eene der kleinste soorten van het genus. Lichaam vrij kort, eenigszins platgedrukt, dofzwart. Het voorlijf is uiterst fijn en dicht, het achterlijf iets minder dicht bestippeld. Pooten beroekt, de tarsen geelachtig. Sprieten vrij krachtig ontwikkeld, het vierde lid breeder dan lang, het vijfde tot tiende aanmerkelijk verbreed. Kop eenigszins gegroefd. Halsschild niet bijzonder sterk verbreed, naar achteren sterker versmald dan naar voren, met afgeronde achterhoeken, duidelijk gegroefd. Dekschilden iets breeder en iets langer dan het halsschild, soms bruinachtig. Lengte 1 — $1\frac{1}{2}$ mm. In drogen koe- en paardenmest, op mesthoopen en in aanspoelsel, ook onder dorre bladeren, in paddestoelen en onder dood riet. Amsterdam, Millegersberg, Den Haag, Vorden en Velsen 15. *sordidula* Er.

- 43 Achterlijf tot aan het uiteinde dicht bestippeld en lang behaard. Sprieten zeer krachtig ontwikkeld, het vierde lid breed, de volgende leedjes tot aan het tiende geleidelijk iets in lengte, doch niet in breedte toenemende (Sub-gen. *Chaetida* Muls. & Rey). Glanzig zwart, de dekschilden lichter of donkerder bruingel, om het schildje en langs de zijden meestal zwartachtig, het uiteinde van het achterlijf bruinachtig. Sprietwortel pekkruin of donker roodbruin, de pooten bruingel. Voorlijf zeer dicht, duidelijk en eenigszins rimpelig bestippeld. Halsschild met een basaalgroefje en met eene lijne middellijn. Pooten lang behaard. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde iets uitgerand, het zesde sterniet is iets afgerond en steekt eenigszins uit; bij het ♀ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgebogen. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Vrij gemeen onder steenen, plantenafval, koemest, aas, op mesthoopen, in paddestoelen, molm en achter boomschors. Ook langs oevers in aanspoelsel 12. *longicornis* Grav.

Achterlijf naar het uiteinde niet of slechts weinig bestippeld. Sprieten vrij slank, het vierde lid niet of slechts zwak verbreed (Sub-gen. *Dimetrota* Muls. & Rey) 44

- 44 De voorlaatste sprietleedjes niet of slechts zeer zwak verbreed 45
De voorlaatste sprietleedjes minstens de helft breeder dan lang 53
45 Lichaam klein, lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. (*Badura* Muls. & Rey) 46
Lichaam grooter, lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. 47
46 Lichaam geheel zwart, vrij sterk glanzig, zeer lijn behaard, de dekschilden soms bruinzwart, de knieën en tarsen roodachtig. Kop lijn en niet dicht korrelig bestippeld. Sprieten naar het uiteinde iets verdikt, zeer duidelijk bewimperd, de voorlaatste leedjes iets verbreed, het

eindlid even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, toegespitst. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, ongeveer de helft breeder dan lang, matig fijn en vrij dicht korrelig bestippeld, aan de zijden bewimperd, over het midden meestal gegroefd. Dekschilden iets langer dan het halsschild, matig fijn en zeer dicht bestippeld. Achterlijf sterk toegespitst, op de eerste 3 onbedekte tergiten fijn en matig dicht, naar het uiteinde veel meer verspreid of weinig bestippeld, lang bewimperd. Bij het ♂ het zesde sterniet afgerond, bij het ♀ uitgerand. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Verbreid onder mos, steenen, plantenafval, paardenmest, soms aan uitvloeiende boomsappen en bij *Formica rufa*.

(cauta Er., parva Sharp, spreta Fairm. et Lab.) 17. **parvula** Mannerh.

Dekschilden lichtbruin, de pooten bruingeel. Kop grover en dichter bestippeld, veelal met eene middengroef. Sprieten langer, naar het uiteinde bijna niet verdikt, van af het zesde lid onbewimperd, de voorlaatste leedjes niet breeder dan lang, het eindlid groot, even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Overigens op *parvula* gelijkend. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Onder steenen, koc- en paardenmest, soms in aanspoelset. Bij Rotterdam en Zutphen.

18. **macrocera** Thoms.

- 47 Sprietwortel roodgeel of licht bruinrood 48
Sprieten geheel donker. 50

- 48 Dekschilden de helft langer dan het halsschild. Bovenzijde van het lichaam zwart, eenigszins glanzig, de dekschilden bruin of bruingeel. Sprieten nagenoeg even lang als het halve lichaam, sterk bewimperd. Voorlijf met geringen bronskleurigen weerschijn en vrij lang en dicht geelachtig behaard. Sprietwortel en pooten roodgeel. Bestippeling zeer fijn en onduidelijk op den kop, niet dicht en eenigszins rimpelig op het halsschild, zeer dicht op de dekschilden. Halsschild weinig verbreed, naar de basis iets versmald, met een basaalgroefje. Dekschilden veel breeder dan het halsschild. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn halsschild en dekschilden vuilgeel. Bij het ♂ is het tweede tot vierde sprietlid sterker bewimperd en het derde sprietlid knotsvormig verdikt. Het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde afgerond-afgeknot; het zesde sterniet weinig of niet kegelvormig verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Onder verrotte paddestoelen, mos, plantenafval, paardenmest en aas. Zeer zeldzaam; alleen bij Zutphen gevangen. Ook in de Rijnprov. bij Crefeld en in België 21. **marcida** Er.

Dekschilden slechts een derde langer dan het halsschild 49

- 49 Halsschild en dekschilden roodbruin of geelrood. Achterlijf op de eerste 3 onbedekte tergiten zeer verspreid bestippeld. De slapen iets langer dan de oogen. Deze soort is door het behaarde achterlijf en de behaarde sprieten eenigszins verwant aan *marcida*. Voorlijf zonder bronzigen weerschijn, de dekschilden smaller, iets breeder en iets langer dan het halsschild. Achterlijf donker, de voorste ringen roodbruin; de zijden van het halsschild veelal lichter. Sprieten aan den wortel geelachtig. De bestippeling op de dekschilden duidelijker en minder dicht. Het halsschild minder kort en minder breed, met sterk afgeronde zijranden. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den top afgeknot of slechts iets uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder dorre bladeren en achter korstmossen van denmen. Vooral in bergstreken. Niet inl. Zij zou bij Hamburg en Elberfeld gevangen zijn. (*livida* Muls. & Rey)

Hieraan verwant is eene soort, welke zich vooral van *livida* onderscheidt, doordat de sprieten met kortere afstaande haartjes bezet zijn, het halsschild breeder en iets vlakker, aan de zijden minder afgerond en veel sterker en dichter korrelig bestippeld is, de dekschilden merkbaar langer zijn, ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, iets dichter korrelig bestippeld en het achterlijf op de eerste drie onbedekte tergiten zeer fijn en veel dichter bestippeld is. Kop en halsschild zwart, met geringen bronzigen weerschijn, de dekschilden vuil geelbruin, het achterlijf diep zwart, aan het uiteinde bruinachtig, het eerste sprietlid bruinrood, de pooten roodgeel. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde scherp afgeknot of zeer zwak uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Elberfeld. Ik ken deze soort naar een exemplaar uit het Weener Hofmuseum. (*putrida* Kr.)

Halsschild pekzwart of pekbruin. Achterlijf op de eerste 3 onbedekte tergiten zeer fijn en zeer dicht bestippeld. De slapen niet langer dan de oogen. Dekschilden geel of roodgeel, iets breeder en duidelijk langer dan het halsschild. Achterlijf naar het uiteinde eenigszins versmald. Het vierde sprietlid slechts iets langer dan breed. Het voorlijf zonder bronsachtigen weerschijn. Sprietwortel geelachtig. Lichaam breed; het halsschild dicht, de dekschilden uiterst fijn en dicht bestippeld. Pooten geel. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet eenigszins kegelvormig uit. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Onder paardenmest, mos en plantenafval. Zeer zeldzaam. In het Bloemendaalsche bosch bij Haarlem, September 22. **intermedia** Thoms.

- 50 Kop en halsschild zonder bronzigen weerschijn 51
Kop en halsschild met duidelijk bronzigen weerschijn 52

- 51 Vierde sprietlid iets smaller dan het vijfde, meestal iets langer dan breed, de eerstvolgende leedjes iets langer dan of even lang als breed, de voorlaatste even lang als breed of iets ver-

breed. Halsschild weinig smaller dan de dekschilden, meer dan de helft breeder dan lang, vrij dicht en fijn korrelig bestippeld, veelal met een basaalgroefje en over het midden meestal zwak gegroefd. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, veel sterker dan op het halsschild ruw en zeer dicht bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde versmald, glanzig, op de eerste onbedekte tergiten fijn en tamelijk verspreid bestippeld, naar het uiteinde nagenoeg glad. Lichaam tamelijk breed, weinig glanzig, zwart, de dekschilden meestal donkerbruin, veelal ook het halsschild en het uiteinde van het achterlijf pekbruin. Spriet en tasters pekzwart of pekbruin, de pooten bruinrood met donker gekleurde dijen. Deze soort gelijkt overigens zeer op *picipennis*, doch is onderscheiden door de niet bronzig-zwarte kleur, het veel bredere, iets meer gewelfde en veel fijner, doch minder dicht bestippelde halsschild, de kortere, iets krachtiger en minder dicht bestippelde, aan weerszijden van het uiteinde iets uitgebogen dekschilden, en door de meer verspreide bestippeling der eerste onbedekte tergiten. Bij het ♂ is het tweede tot vierde sprietlid aan de binnenzijde witachtig behaard en het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde zwak uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. In rottende paddestoelen, onder mos, in plantenalval en aas. Zeldzaam. Den Haag, Loosduinen en Kolhorn (N.-H.). . . 25. *cadaverina* Ch. Brisout.

Vierde sprietlid veel smaller en korter dan het vijfde, even lang als breed of iets verbreed, het vijfde tot tiende lid nagenoeg even lang en iets breeder dan lang. Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, meer dan $\frac{1}{2}$ breeder dan lang, fijn en niet dicht korrelig bestippeld, met een oppervlakkig basaalgroefje en eene meestal onduidelijke middellijn. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, fijn en vrij dicht korrelig bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde weinig versmald, glanzig, op de voorste tergiten fijn en spaarzaam bestippeld, naar het uiteinde bijna glad. Lichaam diep zwart, de dekschilden zwartbruin, de spriet en tasters pekzwart, de pooten bruinrood, de dijen meestal donkerder. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde breed en vrij diep uitgerand, in het midden der uitranding met een kort, stomp, uitgerand uitsteeksel of met twee kleine bultjes; de als sterke, stompe tanden uitstekende zijden van de uitranding, zijn van binnen diep en smal lepelvormig uitgehold of diep gegroefd. Lengte 3 mm. In meststoffen, aas en onder dorre bladeren. Niet inl. In Westfalen en bij Elberfeld . . . (constrictata Kr.)

- 52 Halsschild zeer dicht of uiterst dicht bestippeld. Kop en halsschild eenigszins bronzig zwart, min of meer dof, het achterlijf glanzig zwart. Dekschilden donkerbruin of bruin. Pooten geelachtig of iets berookt. Deze soort gelijkt eenigszins op *laevana*, doch onderscheidt zich vooral door het meer platgedrukt, doffer, fijner en dichter bestippeld voorlijf. Het achterlijf is aan het uiteinde minder verspreid bestippeld. De bestippeling op het halsschild is zeer fijn, zeer dicht en eenigszins rimpelig, op de dekschilden nog fijner en dichter, eenigszins dwarsrimpelig. Spriet en tasters krachtiger ontwikkeld, het vierde lid even lang als breed, iets langer dan het vijfde. Halsschild aanmerkelijk verbreed, met stompe achterhoeken, welke aan weerszijden van de basis scheef afgesneden zijn, met een basaalgroefje en eene onduidelijke middengroef. Dekschilden aanmerkelijk breeder en veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde breed en oppervlakkig uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder steenen, mos, paddestoelen, koe- en paardenmest, aas en plantenalval. Zeer zeldzaam. Een paar maal bij den Haag gevangen. (subrugosa Muls. & Rey). 23. *picipennis* Mannh.

Halsschild niet zeer dicht bestippeld, veel breeder dan lang, duidelijk smaller en korter dan de dekschilden, met stompe achterhoeken en een basaalgroefje, dat zich tot over het midden voortzet. Van *cadaverina* vooral onderscheiden door de eenigszins fijne, minder dichte bestippeling van het halsschild. Achterlijf glanzig zwart, de pooten bruin of zwartachtig, het midden der dekschilden gewoonlijk bruin. Het vierde sprietlid iets langer dan breed, het zevende tot tiende iets verbreed. Dekschilden eenigszins rimpelig en vrij dicht bestippeld. De eerste tergiten weinig, de laatste bijna niet bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde eenigszins driehoekig uitgesneden. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Vrij gemeen onder steenen, mos, plantenalval, koemest, op mesthoopen, in aanspoelsel der rivieren en vooral op ziltigen bodem . . . 24. *atramentaria* Gyll.

- 53 Pooten roodgeel. De dekschilden geel of bruin . . . 54

Pooten en dekschilden zwart of pekbruin. Habitus van *laevana*, diep zwart, tamelijk glanzig, de knieën en tarsen roodachtig. In het oog vallend door de krachtige, rimpelige bestippeling, welke op het voorlijf vrij dicht, op het achterlijf zeer krachtig en meer verspreid is. Spriet kort, naar het uiteinde verdikt. Halsschild weinig verbreed, naar voren duidelijk versmald, met eene ondiepe basaalgroef. Dekschilden aanmerkelijk breeder en langer dan het halsschild. Achterlijf met eenigszins parallelle zijden. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan weerszijden uitgerand en van een zeer fijn doortje voorzien; het zesde sterniet is aan den top iets uitgerand. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet aan den top breed en oppervlakkig uitgerand en aan weerszijden van een klein tandje voorzien; het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgesneden. Lengte 2 mm. Onder koe- en paardenmest, dorre

bladeren en in plantenafval. Zeldzaam. Den Haag, Rotterdam, Arnhem, Amsterdam, Tiel, Hoek van Holland (villosula Kr.) 19. **nigripes** Thoms.

- 54 Halsschild iets smaller dan de dekschilden, ongeveer de helft breeder dan lang, matig fijn en vrij dicht korrelig bestippeld. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, matig fijn, dicht en iets ruw bestippeld. Lichaam zwart, de dekschilden bruin of bruingeel, evenals kop en halsschild, meer of minder bronsglanzig. Sprieten bruin, de wortel iets lichter pekbruin; de pooten bruingeel. Van *atramentaria* is deze soort onderscheiden door het iets kleiner, smaller, meer glanzig lichaam. Sprieten naar het uiteinde meer verdikt, het vijfde lid iets grooter dan het vierde, dat slechts iets langer dan breed is. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet aan den achterrand 4 zeer onduidelijke kleine tandjes, van welke de beide middelste door eene breedere uitranding van elkaar gescheiden zijn. Lengte $2-2\frac{1}{2}$ mm. Onder mos, plantenafval, in mesthoopen, koemest, aas, paddestoelen en in aanspoelsel der rivieren, zeer zeldzaam. Bij Den Haag, Rijswijk en Middelburg . 20. **laevana** Muls. & Rey.

Halsschild veel smaller dan de dekschilden, een derde breeder dan lang, onduidelijk gechagrineerd, uiterst fijn en niet zeer dicht bestippeld, met een klein basaalgroefje en veelal met eene oppervlakkige middengroef. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, uiterst fijn gechagrineerd, zeer fijn, oppervlakkig en niet zeer dicht bestippeld. Lichaam slank, diep zwart, dekschilden licht bruingeel, aan de zijden en veelal ook aan de basis bruinachtig. Sprieten bruin, pooten geel. Sprieten naar het uiteinde verdikt, sterk bewimperd, het vierde lid even lang als breed. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den achterrand zeer zwak gekarteld en steekt het zesde sterniet iets kegelvormig uit. Lengte $2\frac{1}{2}-3$ mm. Niet inlandsch. Zij zou in Westfalen voorkomen. Ik ken deze soort naar een exemplaar uit het Weener Hofmuseum. (procera Kr.)

- 55 Sprieten naar het uiteinde sterk of vrij sterk verdikt, de voorlaatste of middelste leedjes minstens de helft breeder dan lang. Zeer zelden is het tiende lid langer dan het negende en niet of slechts zwak verbreed 56

Sprieten naar het uiteinde niet of slechts zeer weinig verdikt, de voorlaatste leedjes niet of slechts zwak verbreed 97

- 56 De twee eerste sprietleedjes zeer gestrekt, het tweede lid langer dan het eerste, het derde veel korter dan het tweede. Kop, halsschild en dekschilden met zeer grove stippels niet dicht bezet (Sub-gen. *Megaloscapa* Seidl.). Halsschild veel smaller dan de dekschilden. Bovenzijde van het lichaam geheel zwart; dekschilden pekzwart of bruin, sprieten zwart, de wortel van het tweede en derde lid roodachtig, de pooten bruingeel, gewoonlijk met bruine dijen. De eerste tergieten zeer verspreid en zeer fijn bestippeld, de laatste glad. Lengte $2\frac{1}{2}-3$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld. Ik zag een exemplaar uit Elberfeld (*Cornelius*), in het Weener museum voorhanden.

(punctipennis Kr.)

De eerste twee sprietleedjes gewoon, het tweede korter dan het eerste 57

- 57 Voorkaken ver vooruitstekend en eerst naar het uiteinde gebogen. Kop met grove en vrij diepe stippels weinig dicht bezet. Halsschild en dekschilden fijn bestippeld. Mesosternum aan de basis gekield (Sub-gen. *Halobreetha* Thoms.) 58

Voorkaken weinig uitstekend, gewoon gebogen 59

- 58 Dekschilden slechts iets langer dan het halsschild. Bovenzijde loodkleurig-zwart, de dekschilden veelal iets bruinachtig, eenigszins verglanzig, min of meer dof. Kop, halsschild en dekschilden niet dicht, doch grof geelgrauw behaard. Sprieten naar het uiteinde duidelijk verdikt, zwart met lichter wortel. Halsschild iets breeder dan lang, duidelijk smaller dan de dekschilden, niet zeer dicht en veel fijner dan de kop bestippeld. Dekschilden niet zeer dicht, doch zeer duidelijk bestippeld. Achterlijf zwart, iets glanzig, aan het uiteinde geelachtig, zeer weinig bestippeld. Pooten rood-bruinachtig. Bij het ♂ het zesde onbedekt tergiet eenigszins stomp toegespitst. Lengte 3 mm. Niet inlandsch. Deze soort zou op het eiland Borkum voorkomen. Langs de Franche kust en aan de Oostzee onder zeewier.

(atricilla Scribn, algae Hardy ex parte, maritima Waterh., halobreetha Sharp, puncticeps Muls. & Rey) (*Flavipes* Thoms.)

Dekschilden duidelijk langer, doch weinig breeder dan het halsschild. Bovenzijde van het lichaam donkerbruin, meer glanzig, de dekschilden meer geel-bruinachtig of licht roodbruin. Sprieten roodgeel, pooten geel. Bestippeling fijner en dichter. Halsschild ongeveer even lang als breed, fijn en tamelijk dicht-, doch minder duidelijk dan kop en dekschilden bestippeld, met een duidelijk groefje aan de basis. Achterlijf glanzig zwart, met lichter uiteinde; de eerste tergieten weinig bestippeld, het vierde en vijfde onbedekt tergiet onbestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde veel smaller dan bij het ♀. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Langs de kust onder zeewier, zeer zeldzaam. Scheveningen en langs de Schelde bij Bergen-op-Zoom.

(algae Hardy ex parte, halensis Muls. & Rey) 66. **puncticeps** Thoms.

- 59 Mesosternaal-voortzetting kort driehoekig, met bijna rechthoekig uiteinde, slechts tot aan het eerste derde der middelcoxae reikend. 60
- Mesosternaal-voortzetting toegespitst, minstens tot aan het midden der middelcoxae reikend. 61
- 60 Het vijfde onbedekt tergiet niet langer dan het vierde, beiden vlak. Halsschild en dekschilden dicht en fijn bestippeld (Sub-gen. *Hygroecia* Muls. & Rey). Sprieten roodgeel, aan den wortel geel, het eindlid zeer groot. Bovenzijde van het lichaam pekzwart of pekbruin, de dekschilden vuil geelbruin. Halsschild fijn behaard en met eene meer of minder duidelijke middengroef. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, fijn behaard. Achterlijf aan het uiteinde geelachtig, fijn en niet dicht, het vierde onbedekt tergiet verspreid, het vijfde niet bestippeld. Pooten geel. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet eenigszins driehoekig uit, bij het ♀ is het eenigszins afgerond. Ook zijn bij het ♂ de randen der laatste ringen dichter met lange haren bezet. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Langs oevers van rivieren onder dood riet en in aanspoelsel, vrij zeldzaam. Breda, Amsterdam, Zutphen, Arnhem, Gorkum, Hillegersberg, Rotterdam, Sleguwijk, Maastricht 34. *debilis* Er.
- Het vijfde onbedekt tergiet duidelijk langer dan het vierde, evenals dit meer of minder duidelijk, maar zeer oppervlakkig in de breedte ingedrukt. Halsschild en dekschilden verspreid bestippeld (Sub-gen. *Taxicera* Muls. & Rey). Sprieten bruin, korter dan kop en halsschild, zeer dik, het vijfde tot tiende lid veel breder dan lang. Halsschild veel breder dan lang, krachtig en zeer verspreid bestippeld, aan de basis met een rond groefje, dat zich naar voren in eene meer of minder duidelijke middengroef voortzet. Dekschilden $\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, vrij dicht en onduidelijk bestippeld. Bovenzijde van het vlakke lichaam donkerbruin; de kop en het achterlijf, behalve aan de basis en aan het uiteinde, zwartachtig. Dekschilden lichter bruin, pooten geel. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet meer uit en zijn voorhoofd en halsschild niet zelden ingedrukt en sterk glanzig. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Aan rottende dierlijke stoffen. Niet inlandsch. In het Ahrdal (*deplanata* Grav.)
- 61 Slapen geheel ongerand (Sub-gen. *Dinaraea* Thoms.) 62
- Slapen minstens van achteren gerand. 64
- 62 De eerste 4 onbedekte tergiten dicht bestippeld en dof, het vijfde nagenoeg onbestippeld, meer glanzig, bij het ♂ met 8 bultjes, het zesde bij het ♂ met twee tandjes aan den achterrand. Het laatste achtertarsen-lid $\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het eerste. Mesosternum tusschen de middelcoxae scherp toegespitst (*Polyota* Muls. & Rey). De voorlaatste sprietleedjes vrij sterk verbreed. Lichaam tamelijk smal en vlak, van gelijke breedte, eenigszins matglanzig zwart, zeer dicht en fijn bestippeld en dicht, fijn, grijs behaard. Kop bij het ♂ in het midden breed ingedrukt. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets breder dan lang, in 't midden met eene duidelijke, diepe langsgroef, zwartbruin of bruin. Dekschilden slechts iets langer dan het halsschild, licht-roodbruin, om het schildje iets donkerder, eenigszins matglanzig. Pooten roodgeel. Lengte 3 — $3\frac{1}{4}$ mm. Niet zeldzaam, vooral in het voorjaar op vochtige plaatsen onder afgevallen bladeren en in aanspoelsel. 63. *angustula* Gylh.
- De eerste 3 onbedekte tergiten dicht, het vierde en vijfde zeer weinig of niet bestippeld. De voorlaatste sprietleedjes zeer weinig verbreed. Het laatste achtertarsen-lid dubbel zoo lang als het eerste 63
- 63 Het vijfde onbedekt tergiet nagenoeg onbestippeld; bij het ♂ her vierde met 2 tot 6, het vijfde met 8 bultjes en het zesde aan den achterrand met 4 kleine tandjes. Mesosternum tusschen de middelcoxae stomp toegespitst (*Dinaraea* Muls. & Rey). Deze soort is verwant aan *angustula*, doch iets meer gestrekt en onderscheiden door het volkomen doffe halsschild en het minder dicht bestippeld achterlijf. Sprieten bruin, de eerste twee leedjes roodgeel. Voorhoofd bij het ♂, in het midden, breed ingedrukt. Halsschild altijd iets smaller dan de dekschilden, met een breeden, ondiepen langsindruk over het midden. Dekschilden slechts iets langer dan het halsschild, lichter of donkerder bruin, matglanzig. Achterlijf zwart, tamelijk glanzig. Veelal komen lichter gekleurde exemplaren voor, bij welke het achterlijf van voren rood, naar het uiteinde zwart is. Lengte $3\frac{1}{4}$ mm. Achter schors van vochtige boomstronken. Den Haag, Zutphen, Arnhem, Breda, Winterswijk, Utrecht, Rotterdam, Rhoon, Venlo. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 64. *aequata* Er.
- Het vierde en vijfde onbedekt tergiet nagenoeg onbestippeld; bij het ♂ vertoont het vijfde tergiet hoogstens eenige zwakke, korrelachtige bultjes. Mesosternum tusschen de middelcoxae scherp en fijn toegespitst (*Aglypha* Muls. & Rey). Deze soort herinnert door het doffe halsschild aan *aequata*, doch komt in habitus meer overeen met *angustula*. Sprieten roodbruin, de eerste twee leedjes roodgeel. Kop glanzig zwart. Halsschild nagenoeg even breed als de dekschilden, iets breder dan lang, vlak, in 't midden met eene diepe langsgroef, zwart, uiterst fijn en dicht bestippeld. Dekschilden even lang als het halsschild, donker roodbruin, om het schildje iets donkerder, dicht en vrij grof bestippeld, zeer fijn behaard. Achterlijf glanzig zwart, het uiteinde rood-bruinachtig. Pooten geel. Bij het ♂ zijn

voorhoofd en halsschild veel dieper ingedrukt. Geheel zwarte exemplaren met eenkleurige donkere sprieten en bruinroode pooten vormen de var. **melanocornis* Muls. & Rey. Lengte 3 mm. In gras, onder dore bladeren en achter schors van oude boomstronken, zeldzaam. Den Haag, Loosduinen, Scheveningen, Amsterdam, Haarlem, Arnhem, Goor. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 65. *linearis* Grav.

- 64 Derde sprietlid duidelijk korter dan het tweede. 65
 Derde sprietlid niet of slechts weinig korter dan het tweede 74
 65 Sprieten van af het vijfde lid plotseling en zeer sterk verdikt (Sub-gen. *Ceritaxa* Muls. & Rey). 66
 Sprieten naar het uiteinde geleidelijk verdikt. 67
 66 Halsschild sterk verbreed. Bovenzijde pekwart of pekbruin, zeer fijn behaard, het midden der dekschilden roestkleurig of bij onuitgekleurde exemplaren geelachtig. Sprietwortel pekbruin. Pooten geelachtig. Kop zeer fijn, halsschild dicht en fijn, de dekschilden duidelijker, de eerste onbedekte tergieten onduidelijk en fijn, het vierde en vijfde bijna niet bestippeld. Sprieten kort, het vierde tot tiende lid buitengewoon sterk verbreed. Dekschilden iets breeder en $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild. Bij het ♂ vertoont het zesde tergiet aan weerszijden een langen, dunnen, gebogen doorn en twee middentandjes, die door eene kleine uitranding gescheiden zijn. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. In rottende paddestoelen, plantenafval, aas en uitwerpselen. Niet inlandsch. In het Ahrdal (Rijnprov.) en in België.

(*brevicollis* Baudi) (*testaceipes* Heer)

Halsschild tamelijk verbreed. Habitus van *oblita*, smal, met parallele zijden, zwart, weinig behaard en zwak bestippeld. Dekschilden pekbruin, pooten vuilgeel; veelal is de bovenzijde roodbruin, de kop en een dwarsband op het achterlijf donker. Sprieten krachtig ontwikkeld, vooral de eerste leedjes, het vierde tot tiende lid buitengewoon breed en kort. Bestippeling niet dicht op het halsschild, vrij dicht en duidelijk op de dekschilden, fijn en zeer weinig op het achterlijf, het derde tot vijfde onbedekt tergiet bijna glad. Halsschild met een groefje aan de basis. Dekschilden iets breeder en iets langer dan het halsschild. Bij het ♂ steekt het zesde tergiet in 't midden stomphoekig uit, waarop aan weerszijden een klein gebogen en uitgehold bultje zit en daarbuiten een onduidelijk tandje. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. In paddestoelen, achter mos van dennen en soms in de nesten van *Vespa crabro*. Niet inlandsch. Bij Crefeld (*dilaticornis* Kraatz)

- 67 Kop, halsschild en dekschilden grof en zeer diep bestippeld (Sub-gen. *Zoosetha* Muls. & Rey). Lichaam vrij kort en dik. Bovenzijde geheel glanzig pekwart of pekbruin, fijn zijdeachtig behaard. Halsschild gewoonlijk met eene zeer zwak aangeduide middengroef. Dekschilden iets breeder dan het halsschild, even lang als te zamen breed. Alle tergieten nagenoeg even dicht bestippeld en behaard. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en Elberfeld (*inconspicua* Er.)

Kop, halsschild en dekschilden meer of minder fijn, soms bijna onzichtbaar bestippeld . . . 68

- 68 Achterlijf tot aan het uiteinde dicht bestippeld 69

Achterlijf op het vijfde onbedekt tergiet niet of zeer weinig bestippeld (Sub-gen. *Microdota* Muls. & Rey) 70

- 69 Het vijfde onbedekt tergiet niet langer dan het vierde (Sub-gen. *Dochmonota* Thoms.). Lichaam kort, iets gewelfd, weinig glanzig, zwart; sprieten en dekschilden bruin; de basis der dekschilden gewoonlijk, alsook de pooten geelachtig. Halsschild zeer sterk verbreed, zeer fijn en dicht bestippeld, met de aanduiding van een oppervlakkigen indruk, de achterrand naast de eenigszins stompe achterhoeken duidelijk uitgebogen. Dekschilden iets langer en breeder dan het halsschild, duidelijker en eenigszins rimpelig bestippeld. Bij onuitgekleurde exemplaren is de bovenzijde, behalve de kop en het uiteinde van het achterlijf (op den uitersten top na) lichtbruin. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Op vochtige plaatsen onder rottende bladeren, in stallen, onder rottend stroo en soms in mierennesten. Verbreed en niet zeldzaam. (var. *atrata* Kr.) 49. *clancula* Er.

Het vijfde onbedekt tergiet langer dan het vierde (Sub-gen. *Dralica* Muls. & Rey). Bovenzijde bruinzwart, dicht en fijn behaard, weinig glanzig; soms het halsschild en het uiteinde van het achterlijf roodachtig. Sprieten en pooten geelbruin. Halsschild slechts iets verbreed, met een, meestal onduidelijk basaalgroefje, hetwelk zich soms in eene middengroef voortzet. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet uit en is iets afgerond. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch 1). In de Rijnprov. bij Elberfeld (*vilis* Er.)

- 70 Halsschild vrij dicht of zeer dicht bestippeld. 71

1) De opgave van *Atheta* (*Homalota*) *vilis* Er. door *Saellen van Vollenhoven* in de *Bouwstoffen* (1854), berust op eene onjuistheid.

- Halsschild verspreid of bijna onzichtbaar bestippeld 72
- 71 Lichaam $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. lang, zwart, duidelijk en vrij dicht behaard. Sprieten, dekschilden en uiteinde van het achterlijf bruin; pooten geelachtig. Het vierde tot tiende sprietlid iets verbreed. Halsschild met flauwe aanduiding van eene middellijn. Dekschilden iets breder en $\frac{1}{4}$ langer dan het halsschild. Bij het ♂ is de kop gegroefd, het halsschild aan de basis duidelijker gegroefd en soms zelfs op het midden ingedrukt. Ook is het zesde onbedekt tergiet afgeknut en een weinig uitgerand, aan de onderzijde iets meer uitstekend. Niet zeldzaam. Onder mos, dorre bladeren, plantenafval, schors, in mesthoopen, aas, paddestoelen en soms bij mieren en in wespennesten, ook in aanspoelsel.
(sericea Muls. en Rey) 52. *amicula* Steph.
- Lichaam $\frac{2}{3}$ mm. lang, geheel zwart of bruin, zoo ook de sprieten; pooten vuilgeel. De kleinste van alle *Atheta*-soorten, in 't oog vallend door den zeer smallen, parallelen, eenigszins platgedrukten vorm. Sprieten krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde vrij sterk verbreed. Lichaam weinig glanzig, zeer fijn en dicht behaard, dicht en veel lijner dan bij *amicula* bestippeld. Halsschild verbreed, gegroefd. Dekschilden duidelijk breder en veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den top stomp afgeknut. Onder koe- en paardemnest, plantenafval, in mesthoopen, soms in paddestoelen en bij *Lasius niger*. Zeer zeldzaam. Vorden, Venlo, Roermond en Arnhem. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. 53. *inquinula* Grav.
- 72 Lichaam roodgeel, de kop en de voorlaatste achterlijfsringen, soms ook de achterhoeken der dekschilden, zwartachtig. Sprieten geheel geel of naar het uiteinde iets gebruint (Hilara Muls. & Rey). Deze zeer kleine soort is langwerpig met parallele zijden, vrij lang behaard. De bestippeling is op de dekschilden verspreid, op het achterlijf bijna onzichtbaar, het derde en vierde onbedekt tergiet glad. Sprieten kort, het zesde tot tiende lid vrij sterk verbreed. Halsschild zeer verbreed; de dekschilden veel breder en langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde eenigszins afgeknut en aan den iets uitgebogen achterrand uiterst fijn gekarteld. Lengte $1\frac{1}{3}$ mm. In de heidestrecken, vooral in paddestoelen, ook onder dood hout, mos, boomsehors en aan boomwortels in dennenbosschen. Vrij zeldzaam 50. *palleola* Er.
- Lichaam zwart of bruin, slechts bij onuitgekleurde exemplaren, behalve op den kop en de voorlaatste achterlijfsringen, bruinrood of bruingeel 73
- 73 Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ aan den afgeknotten achterrand krachtig gekarteld. Lichaam diep zwart, slechts de knieën en tarsen roodachtig. Deze soort gelijkt zeer op *amicula*, doch is, behalve door de kleur, ook onderscheiden door de meer verspreide, krachtige bestippeling der dekschilden. Kop klein, halsschild zeer kort en aanmerkelijk verbreed. Sprieten fijn, het vierde lid iets breder dan lang. Achterlijf op de eerste 3 onbedekte tergieten weinig bestippeld, de daarop volgende bijna geheel glad. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{3}$ mm. Zeer zeldzaam. Onder koemest, aas, in paddestoelen en in aanspoelsel. Den Haag, Woudrichem, Maastricht, Valkenburg. — Bij Cleef in de Rijnprov. werd zij op doode kraaien gevangen 51. *indubia* Sharp.
- Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ gewoon. Lichaam vuilbruin, iets behaard, de kop en een gedeelte over het midden van het achterlijf donkerder. Sprieten bruin, pooten geelachtig. Sprieten kort, het vierde tot tiende lid vrij sterk verbreed. Halsschild verbreed, met een basaalgroefje. Dekschilden iets breder en $\frac{1}{4}$ langer dan het halsschild. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{3}$ mm. Onder steenen, mos, paddestoelen, in mesthoopen, op oeverzand en soms in aanspoelsel. Niet inl. Ik zag een exemplaar uit Deurne (prov. Antwerpen). Ook in de Rijnprov. bij Elberfeld (aegra Heer)
- Hieraan is nog verwant eene soort, welke in de Rijnprov. bij Elberfeld en in Westfalen zou voorkomen. Lichaam tamelijk smal, met parallele zijden, glanzig zwart, de dekschilden soms bruin, de pooten geelachtig. Kop vrij groot, smaller dan het halsschild. Sprieten kort, naar het uiteinde weinig verdikt, het vierde tot tiende lid geleidelijk iets in breedte toenemende. Halsschild $\frac{1}{2}$ breder dan lang, sterk glanzig, uiterst fijn en zeer weinig bestippeld. Dekschilden ongeveer de helft langer dan het halsschild, glanzig, uiterst fijn en zeer verspreid bestippeld. Achterlijf bijna onzichtbaar fijn bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm.
(atomaria Kr.)
- 74 Halsschild slechts iets verbreed, ongeveer $\frac{1}{2}$ breder dan lang. 75
- Halsschild sterk verbreed, ongeveer de helft breder dan lang 77
- 75 Kop en halsschild glanzig (Sub-gen. *Philhygra* Muls. & Rey). Deze soort herinnert eenigszins aan *angusticollis*, doch is nog smaller, kleiner en met meer parallele zijden. Ook glanziger, vooral op kop en halsschild, welke iets behaard en uiterst fijn en onduidelijk bestippeld zijn. Bovenzijde zwart, de dekschilden zwartbruin. Sprietwortel donkerbruin, pooten geelachtig. Het vierde sprietlid even lang als breed, het vijfde tot tiende breed,

het elfde vrij kort en spits; bij het ♂ is het tweede tot vierde lid binnenwaarts dicht witachtig behaard. Halsschild breder dan lang, naar voren versmald, met een oppervlakkig groefje. Dekschilden duidelijk breder en langer dan het halsschild, aan de buitenhoeken iets uitgerand, fijn en dicht bestippeld. De eerste 3 onbedekte tergiten fijn en matig dicht, het vierde verspreid, het vijfde niet bestippeld. Bij het ♂ is het zesde tergiet breed boogsgewijze uitgerand, het zesde sterniet steekt ver uit en is eenigszins afgeknort. Lengte 2—2½ mm. Zeer verbreid onder plantenaafval en wieren, langs oevers. Ook in boendermest en keldervuil. 54. *palustris* Kiesw.

Kop en halsschild vrij dof (Sub-gen. *Traumoeccia* Muls. & Rey). 76

- 76 Dekschilden ongeveer de helft langer dan het halsschild, zeer fijn en dicht bestippeld. Achterlijf op de eerste 3 onbedekte tergiten zeer fijn en verspreid, naar het uiteinde zeer verspreid en onduidelijk bestippeld. Zwart, de dekschilden bruin, de pooten bruingeel met donkere dijen. Kop weinig smaller dan het halsschild, zeer fijn en veelal onduidelijk bestippeld, bij het ♂ soms in het midden ingedrukt. Spriet en krachtig ontwikkeld, het vierde tot tiende lid geleidelijk in breedte toenemende, de voorlaatste leedjes bij het ♀ ongeveer de helft breder dan lang, bij het ♂ smaller, het eindlid toegespitst en even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, ongeveer ½ breder dan lang, zeer fijn en niet zeer dicht bestippeld, met een basaalgroefje of korte middengroef. Deze soort onderscheidt zich van *palustris* door donkerder pooten, weinig glanzigen kop en halsschild, smaller en naar achteren iets versmalde halsschild, iets langere dekschilden en veel meer verspreide bestippeling der voorste tergiten. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde iets uitgerand, het zesde sterniet iets uitgetrokken en aan het versmalde uiteinde afgerond. Lengte 2—2½ mm. Vrij gemeen in boomzwammen, plantenaafval, boommolm en achter boomsehors, vooral van iepen en dennen; ook onder aas. (ravilla Kr.) 55. *angusticollis* Thoms.

Dekschilden ongeveer ½ langer dan het halsschild, fijn en dicht bestippeld. Achterlijf op de eerste 3 onbedekte tergiten fijn en verspreid, naar het uiteinde zeer weinig of bijna niet bestippeld. Zwart, de dekschilden bruin, het eerste sprietlid en de tasters pekkruin of donker roodbruin. Pooten bruingeel, de dijen soms donkerder. Kop veel smaller dan het halsschild, fijn en tamelijk verspreid bestippeld, bij het ♂ in het midden breed ingedrukt. Het vierde tot tiende sprietlid duidelijk, doch slechts weinig verbreid, het eindlid ongeveer dubbel zoo lang als het voorlaatste, stomp toegespitst; bij het ♂ is het tweede tot vierde sprietlid vrij lang en zacht behaard. Halsschild smaller dan de dekschilden, ongeveer ½ breder dan lang, fijn en matig dicht, iets korrelig bestippeld, bij het ♂ in het midden met een breeden, soms gedeelden langsindruk, welke bij het ♀ zwakker en meestal van achteren meer verdiept is. Deze soort is iets grooter dan *angusticollis*, iets glanziger en zijn bruin behaard. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde breed stomphoekig, bij het ♀ veel smaller driehoekig uitgerand. Het zesde sterniet steekt bij het ♂ tamelijk ver voorbij het zesde tergiet uit, is versmald en aan het uiteinde afgerond, bij het ♀ iets uitgetrokken, naar achteren veel sterker versmald en aan het uiteinde slechts smal afgerond. Lengte 2½—3 mm. Niet inlandsch. Achter schors en aan uitvloeiende boomsappen. In Noord- en Middel-Europa. . . (excavata Muls. & Rey) (*picipes* Thoms.)

- 77 *Middlecoxae* ver van elkaar afstaande. Halsschild naar voren vrij sterk afgerond versmald, aan weerszijden van de basis iets uitgebogen, met zeer duidelijke, slechts aan de uiterste spits afgeronde achterhoeken (Sub-gen. *Alaobia* Thoms.). Lichaam licht roodbruin, de kop en de voorlaatste sterniten zwart. Spriet en krachtig ontwikkeld, donkerbruin, met geelrooden wortel. Het halsschild iets smaller dan de dekschilden, veel breder dan lang, evenals de langere dekschilden dicht en fijn bestippeld. De eerste 3 onbedekte tergiten tamelijk fijn en matig dicht, de twee volgende verspreid en vrij sterk bestippeld, het vijfde onbedekt tergiet nagenoeg glad. Pooten geel. Bij het ♂ is de achterrand van het zesde onbedekt tergiet aan weerszijden in een scherp tand uitgetrokken en heeft in 't midden twee dicht tegen elkaar staande, vrij spitse uitsteeksels. Lengte 3 mm. Niet inlandsch. Bij Crefeld, op het Noordzee-ciland Wangeroo en in België. (ochracea Er.) (*scapularis* Sahlb.)

Middlecoxae weinig van elkaar afstaande. Halsschild naar voren niet of slechts iets versmald, aan weerszijden van de basis niet of slechts zeer zwak uitgebogen, met afgeronde achterhoeken (Sub-gen. *Atheta* isp.) 78

- 78 De eerste 3 onbedekte tergiten zeer verspreid bestippeld 79

De eerste 3 onbedekte tergiten meer of minder dicht bestippeld 80

- 79 Het vijfde tot tiende sprietlid sterk verbreid, het tweede tot vierde binnenwaarts dicht witachtig behaard. Spriet en eenkleurig zwartbruin. Bovenzijde glanzig zwart, dekschilden vuil lichtbruin, aan het schildje en aan de buitenhoeken iets donkerder. Deze soort is iets kleiner en meer gedrongen dan *castanoptera*; het voorlijf is lijner behaard en de dekschilden zijn meestal iets donkerder gekleurd. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, de helft breder dan lang, aan de basis in 't midden met een duidelijk dwarsgroefje en met een min

of meer duidelijke langsgroef. Dekschilden nauwelijks $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, fijn en dichter bestippeld en behaard. Achterlijf lijn en zeer verspreid bestippeld, aan het uiteinde onbestippeld en niet lichter gekleurd. Pooten geelachtig. Bij het ♂ is de achterrand van het zesde onbedekt tergiet afgeknut en uiterst lijn gekarteld, zoodat de enkele tandjes niet, zooals bij *castanoptera*, duidelijk te tellen zijn. De achterrand eindigt aan weerszijden in een iets scherper aangedund tandje. Lengte 3—3 $\frac{1}{2}$ mm. Gemeen aan uitvloeiende sappen van eiken en andere boomen; ook onder mos, dorre bladeren en in paddestoelen.

(*validicornis* Märk., *succicola* Thoms.) 36. *euryptera* Steph.

Het vijfde tot tiende sprietlid weinig verbreed. Lichaam zwart, tamelijk glanzig, dekschilden bruingeel, met eene groote, driehoekige, tot aan het uiteinde reikende zwarte scutellair-vlek en met zwartachtige zijden. Sprietten geheel zwart of bruinzwart, pooten bruingeel met donkerder dijen. Halsschild smaller dan de dekschilden, nauwelijks de helft breeder dan lang, aan de basis in het midden met een onduidelijk dwarsgroefje. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, matig lijn en vrij dicht bestippeld. Achterlijf lijn en zeer verspreid-, aan het uiteinde zeer weinig bestippeld, op het vijfde onbedekt tergiet veelal geheel glad. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet afgeknut en lijn gekarteld, het zesde sterniet iets afgerond en vooruitstekend. Bij het ♀ is het zesde tergiet zeer weinig, het zesde sterniet duidelijk uitgebogen. Lengte 3 $\frac{1}{2}$ mm. Bij Zeeburg (Amsterdam) op zeeklei, Jannari. Ook langs de Oostzee en de kusten van Engeland en Frankrijk (Doinkerken), onder zee-wier. Zij zou ook aan uitvloeiende boomsappen gevonden zijn 37. *triangulum* Kr.

80 Derde sprietlid langer dan het tweede 81

Derde sprietlid niet langer of iets korter dan het tweede 84

81 Dekschilden bruingeel of roodgeel, aan het schildje en in de achterhoeken veelal zwartachtig. 82

Dekschilden zwart of donkerbruin, sprietten zwart, de dijen bruin. Deze soort is iets grooter en breeder dan *crassicornis*, met krachtiger ontwikkelde sprietten. Lichaam lijner en dichter behaard, het voorlijf dichter en duidelijker bestippeld. Het achterlijf is minder dicht bestippeld, het uiteinde bijna onbestippeld. Halsschild breeder, slechts zeer oppervlakkig ingedrukt. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet afgeknut en iets gekarteld, met krachtiger zijtandjes; bij het ♀ is het zesde sterniet aan het uiteinde dicht bewimperd en in het midden vrij diep ingesneden. Lengte 3 mm. In mest, rottende paddestoelen, vooral in bergstreken. Niet inlandsch. Bij Elberfeld en in Westfalen.

(*fungicola* Thoms., *ignobilis* Sharp) (*nitidicollis* Fairm.)

82 Achterlijf eenkleurig of met donker roodbruin uiteinde 83

Het uiteinde van het achterlijf, alsmede de achterhelft van het vijfde onbedekt tergiet geelrood. Sprietten lang afstaande behaard, het vijfde tot tiende lid duidelijk verbreed. Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, 1 $\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, zeer lijn lederachtig gerimpeld en lijn bestippeld, met een onduidelijk basaalgroefje. Bovenzijde zwart, eenigszins glanzig, de dekschilden bruin of geelbruin. Sprietwortel en pooten roodgeel. Dekschilden iets langer dan het halsschild, duidelijk rimpelig bestippeld. De eerste onbedekte tergiten niet zeer dicht bestippeld, de achterrand der sterniten en het uiteinde roestkleurig. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den zeer zwak afgeronden achterrand een weinig verdikt en onduidelijk gekarteld; het zesde sterniet lang gewimperd. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet en het zesde sterniet aan den achterrand uitgebogen. Het zevende sterniet in de uitranding dicht met korte wimperharen bezet. Lengte 3 mm. Zeer zeldzaam, eenmaal bij Leiden gevangen (*pilosa* Kr.) 40. *pilicornis* Thoms.

83 Lichaam zwart, matig glanzig, dekschilden bruingeel, aan het schildje en in de achterhoeken bruinachtig. Sprietten bruin met roodbruinen wortel. Tasters roodbruin, pooten roodgeel. Sprietten naar het uiteinde vrij sterk verdikt, het vijfde tot tiende lid vrij sterk verbreed. Halsschild zeer lijn en verspreid bestippeld, met uiterst geringen bronzen weerschijn, eenigszins glanzig zwart, sterk verbreed, 1 $\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, met eenigszins parallele zijden, in het midden naar de basis breed ingedrukt, bij het ♂ duidelijker dan bij het ♀. Dekschilden veel breeder en veel langer dan het halsschild, zeer dicht en lijn bestippeld. De bestippeling op de eerste 3 onbedekte tergiten lijn en niet dicht, veel meer verspreid op het vierde en vijfde tergiet. Bij het ♂ is het vijfde onbedekt tergiet aan den top lijn gekarteld en aan weerszijden van een scherp tandje voorzien. Deze soort is breeder, korter en vlakker dan *crassicornis*. Lengte 2 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$ mm. Gemeen in paddestoelen, plantenaafval, dorre bladeren, onder mos, steenen, aan boomsappen, in molm en soms in mieren- en wespennesten (*socialis* Thoms.) 38. *trinitata* Kr.

Lichaam zwart, de dekschilden bruinrood of roodbruin, om het schildje en nabij de achterhoeken veelal iets donkerder, de sprietwortel en de tasters geelrood, pooten roodgeel. Halsschild verbreed, matig lijn en vrij dicht-, eenigszins grof bestippeld, lijn neerliggend behaard, aan de basis meestal met een groefje en veelal ook met eene oppervlakkige

langs-groef, soms met bruinachtige randen. Dekschilden iets breeder en iets langer dan het halsschild. De eerste 3 onbedekte tergieten lijn en weinig dicht-, het vierde en vijfde meer verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het derde sprietlid sterk gezwollen, het zesde onbedekt tergiet afgeknut, aan het uiteinde gekarteld en aan weerszijden van een sterk tandje voorzien; het zesde sterniet steekt ver over het zesde tergiet uit en is naar het uiteinde sterk versmald. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde meestal iets uitgebogen, het zesde sterniet breed afgerond of (♀ var. *fulvipennis* Muls. & Rey) uitgerand. Lengte 2½—3 mm. Gemeen in paddestoelen, rotte vruchten, plantenafval, aas, mest, dood stroo, achter boomschors en soms bij *Lasius fuliginosus*.

(sericans Grav., fungicola Kr.) 39. *crassicornis* F.

- 84 Halsschild evenals de rest van de bovenzijde geheel geelrood, de kop en een breede dwarsband op het achterlijf zwart. Deze soort heeft het voorkomen van *dilaticornis*, doch is minder glanzig, de dekschilden zijn meer verspreid en fijner bestippeld. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet, in het midden aan den top, twee zeer stompe, iets uitgeholde, breede tandjes en aan weerszijden een kort, recht doortje. Ook is zij aan restaceipes naverwant, doch kleiner, smaller en meer platgedrukt. Sprieten bruin met roedachtigen wortel, fijner en met kleiner vierde lid. Kop nagenoeg onbestippeld, halsschild korter, zonder duidelijke langs-groef, verspreid bestippeld; de dekschilden langer. Achterlijf krachtiger, doch meer verspreid, bestippeld. Pooten geel. Lengte 2½ mm. Onder mos, dorre bladeren, diep liggende steenen en bij eene soort van het mieren-genus *Atta*, soms vrij diep in het nest. Niet inl. In de Rijnprov. bij Alhrweiler.

(subterranea Muls. & Rey)

- Halsschild zwart of bruin, slechts bij onuitgekleurde exemplaren roodbruin of geelbruin . . . 85
85 Dekschilden bruingeel of roodgeel, veelal aan het schildje en in de achterhoeken zwartachtig. 86
Dekschilden pekzwart of bruin, slechts bij onuitgekleurde exemplaren bruingeel 90

- 86 Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, duidelijk uitgebogen. Glanzig zwart, lijn grijs behaard, dekschilden geelachtig-roodbruin met lichtere schouderhoeken. Sprieten geheel geelrood. Pooten geelachtig. Halsschild met een basaal-groefje, evenals de dekschilden sterk rimpelig- en zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den achterrand iets afgerond en lijn gekarteld, aan weerszijden in de achterhoeken meestal met een sterker uitstekend tandje. Van *nigritula* onderscheiden door de lichtere sprieten, het meer gewelfd, langs de zijden naar voren sterker afgerond halsschild, de meer gewelfde, aan den achterrand, binnen de achterhoeken, duidelijk uitgebogen dekschilden en door de kenmerken van het ♂. Lengte 2½ mm. Achter boomschors en in boomzwammen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Elberfeld (humeralis Kr.) (*pallidicornis* Thoms.)

- Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, nauwelijks merkbaar uitgebogen . . . 87
87 Halsschild tanelijk glanzig, niet zeer dicht bestippeld. 88
Halsschild dof, zeer dicht bestippeld. 89

- 88 Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, hoogstens de helft breeder dan lang, lijn en tanelijk dicht bestippeld, veelal met een basaal-indruk en soms met eene oppervlakkige middengroef. Eindlid der sprieten even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, toegespitst. Lichaam zwart, het halsschild soms pekbruin, de dekschilden licht okergeel, aan het schildje en in de achterhoeken bruinachtig. Sprieten bruin of roestrood, de wortelleedjes en de pooten roodgeel. Overigens gelijkt deze soort zeer op *trinotata*, doch is smaller en heeft meer parallel zijden; ook is het tweede sprietlid korter en niet langer dan het derde. Van *nigritula* is zij onderscheiden door de langere sprieten, het minder verbreed derde tot tiende lid, het langer en minder verbreed halsschild en de kenmerken van het ♂. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den afgeknotten achterrand lijn gekarteld en in de achterhoeken meestal van een duidelijker kerftandje voorzien; het zesde sterniet overschrijdt het zesde tergiet zeer weinig en is breed afgerond. Lengte 3 mm. Verbreid, onder rottende afgevallen bladeren en in rottende paddestoelen.

(sublinearis Kr.) 41. *xanthopus* Thoms.

- Halsschild weinig smaller dan de dekschilden, nagenoeg dubbel zoo breed als lang, matig lijn en vrij dicht, eenigszins ruw bestippeld, tusschen de stippels zeer duidelijk gehagrineerd, veelal met een oppervlakkigen indruk voor het schildje. Eindlid der sprieten ongeveer de helft langer dan het voorlaatste lid, geleidelijk toegespitst. Kop zwart, halsschild pekbruin met lichtere randen of wel geheel roodbruin; dekschilden bruingeel, aan het schildje en in de achterhoeken meestal bruin; achterlijf glanzig zwart, veelal aan het uiteinde en dikwerf ook aan de basis roodbruin. Sprieten zwartachtig, de eerste 2 of 3 leedjes en de pooten roodgeel. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet, aan den afgeknotten achterrand, 4 stompe tandjes, van welke de twee zijdelingsche gewoonlijk iets meer uitstekend. Het zesde sterniet iets afgerond en uitgetrokken. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet in het midden afge-

knot of iets uitgebogen. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{2}{5}$ mm. Verbreid doch niet gemeen in meststoffen, paddestoelen, plantenaalval en aanspoelsel. Gewoonlijk in gezelschap met *crassicornis*.

(pubescens Heer) 42. *nigritula* Grav.

- 89 Sprietten krachtig ontwikkeld, het vijfde tot tiende lid ongeveer dubbel zoo breed als lang; het eindlid nagenoeg even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, stomp toegespitst. Kop zwart, matig fijn en vrij dicht bestippeld. Halsschild pekkwart of bruin. Dekschilden bruingeel, om het schildje en voor de achterhoeken soms donkerder, $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, matig fijn en zeer dicht, iets ruw bestippeld. Achterlijf zwart, met roodbruin uiteinde, soms ook aan de basis roodbruin, op de eerste 3 onbedekte tergieten weinig glanzig, fijn, vrij dicht en ruw bestippeld, op het vierde en vijfde onbedekt tergiet glanziger, op het vierde lijn en verspreid-, op het vijfde weinig en iets korrelig bestippeld. Sprietten bruin, met roodbruinen of roodgelen wortel, soms geheel bruinrood of bruingeel. Pooten roodgeel. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet aan den achterrand vier stompe tandjes. Deze soort is naverwant aan *nigritula* en *liturata*, doch onderscheidt zich door de vrij krachtige, zeer dichte bestippling en de sexuele kenmerken van het ♂. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. In paddestoelen. Noord- en Middel-Europa. Niet inlandsch. Zij zou in Oldenburg voorkomen (*pisciformis* Kr.) (*boletophila* Thoms.)

Sprietten vrij kort en krachtig, het vijfde tot tiende lid zeer sterk verbreed, ongeveer driemaal zoo breed als lang, het eindlid groot, even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, stomp toegespitst. Lichaam zwart, halsschild meestal pekbruin of roodbruin. Dekschilden bruingeel, aan het schildje en in de achterhoeken meestal bruinachtig, $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, matig fijn en zeer dicht bestippeld. Achterlijf aan het uiteinde soms bruin, matig glanzig, op de eerste 3 onbedekte tergieten lijn en niet zeer verspreid-, van achteren slechts zeer weinig bestippeld of glad. Kop fijn en verspreid bestippeld. Sprietten geelbruin, de eerste leedjes, alsook de pooten lichtgeel. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet aan den achterrand 4 krachtige, paarsgewijze tegen elkaar staande tandjes; tusschen de beide middelste, iets naar binnen gekromde tandjes zeer diep uitgerand; het zesde sterniet steekt uit en is aan den top afgerond. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet en het zesde sterniet aan het uiteinde zwak uitgebogen. Deze soort onderscheidt zich van *nigritula* door de geringer grootte, de lichter gekleurde, veel korter en krachtiger sprietten, het zeer sterk verbreed vierde tot tiende lid, het korter, nagenoeg dof en dichter bestippeld halsschild, de minder verspreid bestippelde voorste tergieten en door de sexuele kenmerken van het ♂. Lengte $1\frac{1}{2}$ — 2 mm. In boomzwammen, vooral in den nazomer. Niet inlandsch. In Westfalen (*nigritula* Gylh., *erythroera* Heer) (*liturata* Steph.)

- 90 Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, vrij sterk uitgebogen. Lichaam glanzig zwart, dekschilden donker kastanjebruin of geelachtig-bruin; het uiteinde van het achterlijf pekbruin of roodbruin, sprietwortel en pooten roodgeel. Bij onuitgekleurde exemplaren is ook het halsschild en de basis van het achterlijf roodbruin. Kop zeer sterk glanzig, zeer fijn en verspreid bestippeld. Halsschild smaller dan de dekschilden, ongeveer de helft breeder dan lang, tamelijk fijn en weinig dicht bestippeld, met een breeden, ondiepen, veelal dubbelen indruk aan de basis. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, matig fijn, dicht en eenigszins ruw bestippeld, tamelijk glanzig. Achterlijf op de eerste 3 onbedekte tergieten matig lijn en niet zeer verspreid-, op de 2 volgende zeer verspreid bestippeld of bijna glad. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet breed stomphoekig uitgerand; het zesde sterniet naar het uiteinde versmald en aan den top afgerond. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{2}{5}$ mm. Verbreid in paddestoelen, aan aas, onder steenen, oud hout en soms bij mieren.

43. *sodalis* Er.

Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, niet of slechts onduidelijk uitgebogen. 91

- 91 Dekschilden weinig of niet langer dan het halsschild. Deze soort herinnert in habitus vooral aan *gagatina*. Pekzwart, weinig glanzig, dekschilden en veelal ook het halsschild bruin; sprietten bruin met iets lichter wortel of geheel roestrood of geelrood. Pooten roodgeel. Kop tamelijk klein, uiterst fijn en verspreid bestippeld, veelal met een voorhoofdsgruofje of met eene middengroef. Sprietten veel korter en naar het uiteinde meer verdikt dan bij *gagatina*, de voorlaatste leedjes nagenoeg dubbel zoo breed als lang, het eindlid de helft langer dan het voorlaatste, stomp toegespitst. Halsschild ongeveer de helft breeder dan lang, dicht en matig fijn, eenigszins ruw bestippeld, over het midden bijna altijd zeer duidelijk gegroefd. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, niet uitgebogen, zeer dicht en ruw-, sterker dan op het halsschild, bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde iets versmald, op de eerste 3 onbedekte tergieten lijn en dicht-, van achteren zeer spaarzaam of nauwelijks bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde iets uitgerand, het zesde sterniet iets vooruitstekend en afgerond. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. In boschrijke, bergachtige streken, soms bij *Formica rufa* en *congerens*. Volgens Fauvel niet myrmecophil. Niet inlandsch. In Westfalen (*myrmecobia* Kr.)

Dekschilden $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ langer dan het halsschild 92

- 92 Het laatste lid der achtertarsen driemaal zoo lang als het eerste. Sprieten naar het uiteinde verdikt, het vijfde tot zesde lid sterk verbreed. Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ aan den achterrand zonder zijtandjes 93
- Het laatste lid der achtertarsen hoogstens dubbel zoo lang als het eerste. Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ aan den achterrand, aan weerszijden, met een scherp doornachtig tandje . 94
- 93 Het laatste sprietlid hoogstens dubbel zoo lang als het voorlaatste. Bovenzijde geheel zwart. Halsschild en dekschilden dof. Deze soort is zeer naverwant aan *divisa*, doch onderscheidt zich door het donkerder, meer platgedrukt lichaam, de zwarte sprieten en dekschilden, welke laatste soms donkerbruin kunnen zijn. Dekschilden langer, iets lijner en dichter bestippeld. Beharing zwart, lijner en korter, vooral op de dekschilden. Pooten eenigszins berookt, de knieën, tarsen en gewoonlijk ook de schenen geelachtig. Halsschild iets minder verbreed, met meer aangeduide achterhoeken, bij het ♂ over het midden, evenals de kop, breed uitgehold, bij het ♀ lijn gegroefd. Achterlijf iets lijner en dichter bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den top hoekig en breed uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Gemeen achter boomschors, aan uitvloeiende boomsappen, in molm, onder plantenafval, in aanspoelsel en soms in bijennesten (Thomsonii Jans.) 44. *nigricornis* Thoms.
- Het laatste sprietlid nagenoeg driemaal zoo lang als het voorlaatste. Bovenzijde zwart, dekschilden bruin. Deze soort heeft den habitus en kleur van *gagatina* en is vooral te herkennen aan het zeer lange eindlid der sprieten. Het lichaam heeft meer parallele zijden, veel breeder kop en iets smaller halsschild. Voorlijf dof, langer behaard, veel lijner bestippeld, eenigszins gechagrineerd, zeer dicht op het halsschild en zeer fijn en dicht op de dekschilden. Voorhoofd gegroefd. Halsschild met eene breede middengroef, welke bij het ♂ zeer diep is, bij het ♀ minder aangeduid. Dekschilden iets breeder en iets langer dan het halsschild. Het achterlijf met volkomen parallele zijden. Bij het ♂ het zesde onbedekt tergiet aan den top een weinig uitgerand, iets gekarteld en aan weerszijden van een stomp tandje voorzien. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder steenen, mos, in paddestoelen, aan aas en in boommolm. Meermalen bij Den Haag en Scheveningen gevangen. Ook bij Noordwijk, Oirschot, Zutphen en Maastricht 45. *divisa* Märk.
- 94 Halsschild sterk glanzig, zeer fijn en niet zeer dicht bestippeld. Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ aan den achterrand, tusschen de doornachtige zijtandjes, gekerfd, in het midden met eene kleine insnijding. Lichaam kort, breed en gewelfd, in het oogvallend door de glanzige oppervlakte, vooral van kop en halsschild, wier bestippling, evenals op de dekschilden, zeer fijn is. Achterlijf fijn bestippeld, weinig op de eerste tergieten, het laatste tergiet bijna onbestippeld. Pooten vuilgeel. Halsschild aan de basis met een onduidelijk dwarsgroefje, waaruit eene min of meer duidelijke langsgroef ontspringt, die bij het ♂ aan de basis breeder uitgehold is. Dekschilden vuilgeel, naar de buitenhoeken berookt, veel breeder en langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet in 't midden iets uitgesneden, aan weerszijden van de uitsnijding uitgerand en naar buiten getand. Lengte 2 mm. Onder steenen, rotte vruchten, plantenafval, boomschors en paddestoelen. Zeer zeldzaam. Oisterwijk, Maastricht, Nijmegen, Overveen, Rhederoord en Den Haag.
46. *coriaria* Kr.
- Halsschild weinig glanzig. Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂, tusschen de doornachtige zijtandjes, met twee stompe of kleine tandjes of met eene aan het uiteinde uitgerande middenlob 95
- 95 Sprietwortel pekbrown of bruinrood 96
- Sprietwortel roodgeel. Deze soort heeft den habitus van *oblita*, is dof en eenigszins gechagrineerd, verspreid-, doch aan de zijden van den kop en op het halsschild onduidelijk bestippeld. Kop en halsschild iets gegroefd. De dekschilden duidelijk en vrij dicht-, de eerste onbedekte tergieten lijn en verspreid bestippeld, de beide laatste bijna glad. Sprieten korter en dikker, het vierde tot tiende lid meer verbreed. Halsschild naar verhouding tot den kop smaller, met meer rechte zijden, met breedere basaal- en middengroef. Dekschilden meer vlak gedrukt, zwart of pekbrown. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet aan weerszijden een klein tandje en in het midden eene uitstekende lob, welke iets uitgerand en gekarteld is. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. In eikenmolm, achter schors, vooral van eiken, wilgen en kersenboomen. Niet inlandsch. In het Noorden van Frankrijk nabij de Belgische grens.
- (basicornis Muls. & Rey).
- 96 Lichaam $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. lang. Kop zeer fijn-, verspreid en onduidelijk bestippeld. Sprieten tamelijk slank, naar het uiteinde iets verdikt, het vijfde tot tiende lid matig breed, in breedte toenemend, het eindlid nagenoeg even lang als de twee voorafgaande leedjes tezamen, toegespitst. Halsschild slechts iets smaller dan de dekschilden, meer dan de helft breeder dan lang, tamelijk fijn en dicht bestippeld, veelal met eene zwak aangeduide middengroef. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, aan den achterrand, binnen de achterhoeken, duidelijk uitgebogen, lijn-, zeer dicht- en eenigszins ruw bestippeld. Achterlijf op

de eerste 3 onbedekte tergieten fijn en tamelijk dicht-, op het vierde zeer verspreid-, aan het uiteinde zeer weinig bestippeld. Lichaam zwart, weinig glanzig, het halsschild soms pekbrown, de dekschilden bruin; sprietwortel bruinrood, pooten roodgeel. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet aan den achterrand vier tandjes, van welke de middelste twee stomp, de beide zijdelingsche kort en doornachtig zijn. Gemeen onder afgevalnen bladeren, in rottende paddestoelen en mest; vooral in bosschen 47. *gagatina* Baudi.

Naverwant aan *gagatina* is eene soort, welke in de Rijnprov. bij Ahrweiler ontdekt is. Glanzig zwart, de dekschilden bruin, van achteren bruinrood; uiteinde van het achterlijf bruinachtig. Sprieten pekzwart, met iets lichter wortel; de pooten licht geelachtig, met iets donkerder dijen. Volgens *Kratz* door den vrij grooten kop en het platgedrukte lichaam aan eene *Placusa* herinnerend. Halsschild iets breeder dan de dekschilden, de helft breeder dan lang, fijn en verspreid-, vrij raw bestippeld. Dekskildes iets langer dan het halsschild, dichter en duidelijker bestippeld en behaard, aan den naadhoek meer afgerond dan bij *gagatina*. Achterlijf naar het uiteinde weinig versmald, op de eerste 3 onbedekte tergieten fijn en matig dicht-, op de beide volgende meer verspreid bestippeld. Lengte 1½ mm. Onder rottende plantenstoffen. Ik bezit een exemplaar van *Edm. Reitter* uit de Alpes maritimes. (nitens Fuss)

Lichaam 1½—2 mm. lang. Kop uiterst fijn en zeer dicht bestippeld. Sprieten kort en krachtig ontwikkeld, het vijfde tot tiende lid kort en van gelijke breedte, sterk verbreed, meer dan dubbel zoo breed als lang, het eindlid nagenoeg even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, toegespitst. Halsschild weinig smaller dan de dekschilden, meer dan de helft breeder dan lang, fijn en zeer dicht bestippeld, bijna altijd met eene verdiepte middellijn. Dekskildes nauwelijks ½ langer dan het halsschild, veel duidelijker-, doch tamelijk fijn en zeer dicht bestippeld. Achterlijf op de eerste 3 onbedekte tergieten zeer fijn en weinig dicht bestippeld, aan het uiteinde bijna glad. Lichaam zwart, de dekschilden pekbruin of geelbruin. Sprieten pekzwart of pekbruin, aan den wortel soms roodbruin. Pooten bruingeel of geel. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet, in het midden van den achterrand, twee stompe, aan het uiteinde afgeronde tandjes en aan weerszijden een slanken, iets naar binnen gekromden doorn. Onder steenen, dorre bladeren, plantenafval, paddestoelen en soms in aanspoelsel van overstromingen. Vrij zeldzaam. Den Haag, Oirschot, Zierikzee, Breda, Winterswijk en Maastricht. 48. *oblita* Er.

97 Kop aan de zijden of min of meer op de onderzijde met eene fijne lijst, welke de slapen en wangen naar achteren en van onderen omgrenst, of wel op de onderzijde met lijstvormige verhevenheden. 98

Kop aan de zijden of min of meer op de onderzijde zonder lijsten of zonder lijstvormige verhevenheden. 121

98 De zijlijst van den kop niet tot aan den rand der achterkaaks-groef reikend; daardoor zijn de wangen onvolkomen gerand. Het eerste lid der achtertarsen even lang als het tweede, veel korter dan het laatste. 99

De zijlijst van den kop tot aan den rand der achterkaaks-groef reikend; daardoor zijn de wangen volkomen gerand. 107

99 De eerste onbedekte tergieten aan de basis sterk afhellend en daardoor diep, doch smal ingedrukt; het achterlijf, behalve het vijfde onbedekt tergiet, uiterst fijn en uiterst dicht bestippeld en behaard, en daardoor dofgrauw, zijdeglaanzig. Kop naar achteren versmald (Sub-gen. *Disopora* Thoms.). Halsschild even lang als breed, naar achteren bijna niet versmald, zonder middengroef, doch alleen met een basaalgroefje. Lichaam donkerbruin of pekzwart, op het voorlijf uiterst fijn behaard. Sprieten roodbruin, het eerste lid roodgeel, het eindlid bijna even lang als de beide voorafgaande leedjes te zamen, toegespitst. Halsschild bruin, smaller dan de dekschilden, de helft breeder dan lang, aan de zijden, voor de achterhoeken, een weinig uitgebogen, met duidelijke achterhoeken, dicht en fijn bestippeld. Dekskildes duidelijk langer dan het halsschild, roodbruin, uiterst dicht en fijn bestippeld. Achterlijfsringen roodbruin gerand, het zesde onbedekt tergiet geelbruin. Pooten geel. De var. *longicollis* Rey 1), welke iets aan *elongatula* herinnert, onderscheidt zich door geringer grootte, lichter kleur en de eerste 2 of 3 roodgele sprietleedjes; ook zijn soms de sprieten geheel roodgeel. Het halsschild en de dekschilden zijn naar verhouding langer en iets meer gewelfd dan bij het type. Het halsschild is ongeveer even lang als breed, met meer rechte zijden, slechts met een onduidelijk basaalgroefje. Het achterlijf is nog iets fijner en dichter, dan bij het type, bestippeld. Bij het ♂ bevindt zich op het midden van het vijfde onbedekt tergiet een klein bultje; het zesde tergiet vertoont in het midden van den achterrand 4 kleine tandjes, waarvan de twee buitenste nauwelijks bemerkbaar kunnen

1) *Mulsant & Rey*, alsook *Ganglbauer*, beschouwen *longicollis* als eene goede soort.

zijn; de achterrand van den laatsten ring valt aan weerszijden scheef af en vormt met den zijrand een klein, scherp uitspringend tandje. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Onder vochtige bladeren; zeer zeldzaam. Bij Breda. De var. *longicollis* bij Vianen, Arnhem, Tiel, Kralingen, Roermond en in de omstreken van Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. 87. *languida* Er.

De eerste onbedekte tergiten slechts weinig en naar voren geleidelijk afhellend, daardoor breeder ingedrukt. Achterlijf weinig bestippeld en niet dicht behaard. 100

- 100 Halsschild naar achteren duidelijk versmald (Sub-gen. *Thinobacna* Thoms.), nagenoeg even lang als breed, smaller dan de dekschilden, vrij dicht en duidelijk bestippeld, met eene duidelijke langsgroef. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, dicht en fijn bestippeld. Bovenzijde zwart, weinig glanzig, de dekschilden kastanjebruin, om het schildje donkerder. Deze soort gelijkt eenigszins op *elongatula*, doch is aanmerkelijk groter. Halsschild en dekschilden vrij lang- en dicht grijsachtig, glanzig behaard. Sprieten roodbruin met lichter zeer verspreid. Achterlijf glanzig zwart, aan het uiteinde meestal bruinachtig, de eerste tergiten zeer verspreid en fijn bestippeld, de laatste geheel onbestippeld. Pooten licht roodgeel. Bij het ♂ zijn de sprieten iets slanker, het voorhoofd ingedrukt, de kop duidelijker bestippeld, het halsschild altijd met scherper aangeduide langsgroef, het zesde sterniet kegelvormig uitstekend en aan het uiteinde afgerond, bij het ♀ niet uitstekend en aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Vooral op zeeklei, onder dood riet en tusschen *Salicornia*. Amsterdam, Woensdrecht en Bergen-op-Zoom; ook eenmaal bij Nootdorp. In de Rijnprov. bij Crefeld. 26. *vestita* Grav.

Halsschild naar achteren niet versmald. 101

- 101 Sprieten lang en slank, naar het uiteinde zeer weinig verdikt, de voorlaatste leedjes langer dan breed. Dekschilden bij het ♂ grof-, bij het ♀ veel fijner, korrelig bestippeld (Sub-gen. *Megista* Muls. & Rey). Lichaam glanzig zwart, fijn behaard. Sprieten zwart, het eerste lid roodbruin. Halsschild smaller dan de dekschilden, ongeveer $\frac{1}{2}$ breeder dan lang, in 't midden aan de basis bij het ♂ met een breederen langsindruk, bij het ♀ met een korteren of oppervlakkigen indruk of met een groefje, dicht en uiterst fijn bestippeld. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, donker zwartbruin, zeldzamer bruin (abc. *brunneipennis* Thoms.); vrij dicht en tamelijk lang behaard. Achterlijf aan het uiteinde iets lichter, weinig maar lang behaard, de eerste tergiten verspreid bestippeld, de overigen nagenoeg onbestippeld. Pooten licht bruinachtig, de dijen donkerder. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet op de achterhelft verspreide langwerpige korreltjes, het zesde tergiet is tamelijk verspreid korrelig, aan den achterrand afgeknot of breed uitgerand en duidelijk gekarteld, het zesde sterniet tamelijk ver uitgetrokken en aan het uiteinde driehoekig uitgerand. Ook vertoont gewoonlijk het voorhoofd een groefje, en is het tweede, derde en vierde sprietlid dicht en langer behaard. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam onder afgevalen bladeren, dood riet en in aanspoelsel der rivieren. 27. *graminicola* Grav.

Sprieten korter, naar het uiteinde meer of minder duidelijk verdikt, de voorlaatste leedjes nagenoeg zoo breed als of iets breeder dan lang; bij het ♂ van *pagana* duidelijk langer dan breed (Sub-gen. *Liogluta* Thoms.) 102

- 102 Sprieten minstens aan den wortel roodgeel. Dekschilden bruinrood of bruingeel. 103

Sprieten geheel donker gekleurd. 105

- 103 Het vierde sprietlid langer dan breed, het vijfde even lang als breed, het laatste korter dan of even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet gechagrineerd en met korreltjes bezet. 104

Het vierde sprietlid even lang als breed, het vijfde iets verbreed, het laatste ruim zoo lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet niet gekorrelt, het zesde sterniet min of meer verlengd en aan het uiteinde meer versmald dan bij het ♀. De randlijn der wangen reikt ver naar voren. Halsschild en dekschilden fijn bestippeld. Bovenzijde glanzig zwart, de dekschilden donkerbruin. Sprieten donker roodbruin met geleen wortel. Pooten bruingeel. Halsschild aan de basis gewoonlijk met een groefje. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Achterlijf van voren fijn en verspreid bestippeld, naar het uiteinde glad. Bij het ♂ zou op het eerste onbedekt tergiet in den regel een onduidelijk bultje voorkomen. Lengte 4 mm. Niet inf. In de Rijnprov. bij Cleef en Düsseldorf. (silvicola Fuss) (*hypnorum* Kiesw.)

- 104 De randlijn der wangen reikt ver naar voren. Achterlijf weinig bestippeld en verspreid behaard. Sprieten bruin, het eerste lid geelachtig, het vierde tot tiende lid even lang als breed, bij het ♂ duidelijk langer dan breed, het eindlid bij het ♂ even lang, bij het ♀ iets korter dan de twee voorafgaande leedjes te zamen, bij het ♂ het tweede tot vierde sprietlid vrij dicht met lijne, witte, afstaande haren bezet. Kop zwartachtig, dicht en duidelijk bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, eenigszins

ingedrukt, doch zonder duidelijke aanduiding van eene langsgroef, vrij dicht- en duidelijk, doch zeer fijn bestippeld, donkerbruin. Dekschilden vuil geelbruin, langs den naad iets donkerder, dichter en vrij sterk bestippeld. Achterlijf pekwart, de achterrand der afzonderlijke ringen iets in het bruine overgaande, naar het uiteinde soms meer geelbruin. De eerste 4 onbedekte tergiten verspreid en fijn bestippeld, het vijfde onbestippeld, verspreid en vrij lang behaard. Pooten geel. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet bovendien aan de zijden duidelijk bultig verdikt, bij het ♀ het zesde sterniet aan het uiteinde afgerond. Lengte bijna 4—4½ mm. Zeldzaam, vooral op klei- en leemgrond. Rotterdam, Kolhorn (N.-H.) en Oldenzaal. In de Rijnprov. bij Cleef en Düsseldorf. . . 32. **pagana** Er.

De randlijn der wangen slechts van achteren aangeduid; het vierde en vijfde onbedekt tergiet geheel onbestippeld en bijna niet behaard, de overige tergiten duidelijk en dicht behaard. Eene glanzige, aan *pagana* verwante soort, met vooral naar voren donkerder en meer versmald lichaam. De laatste spriedeeldjes verschillen slechts weinig in lengte, doch worden geleidelijk iets breder. Kop veel smaller dan het halsschild, glanzig zwart, bij het ♂ met een breeden, meestal oppervlakkigen indruk. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, fijn en oppervlakkig bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, geelbruin, naar de basis en naar de zijden donkerder. Achterlijf glanzig pekwart, de ringen min of meer licht gerand. Pooten geel. Bij het ♂ vertoont het halsschild twee langs-indrukken. Lengte 3—3½ mm. Zeer zeldzaam, onder dorre bladeren. Alleen bij den Haag en Maastricht gevangen (Crassicornis Gyll.) 31. **granigera** Kiesw.

105 Kop zeer fijn bestippeld, het voorhoofd gewelfd. Bij het ♂ het zesde onbedekt tergiet korrelig 106

Kop zeer grof bestippeld, het voorhoofd vlak gedrukt. Bij het ♂ het zesde onbedekt tergiet afgeknot of iets afgerond, niet korrelig; het eerste onbedekt tergiet zonder bultje. Bovenzijde pekwart, eenigszins glanzig. Spriet en donkerbruin. Dekschilden bruin, de pooten lichtbruin of geelbruin. Kop bij het ♂ min of meer ingedrukt. Halsschild iets breeder dan lang en iets smaller dan de dekschilden, slechts oppervlakkig ingedrukt. Achterlijf pekwart, verspreid en fijn bestippeld, het vijfde onbedekt tergiet glad. Lengte 3—3½ mm. Zeldzaam. In het Haagsche bosch onder dorre bladeren. Ook bij Brummen.

(oblonguscula Sharp) 28. **oblonga** Er.

106 Bovenzijde glanzig zwart, de dekschilden over het midden geelachtig of geelachtig-bruin. Bij het ♂ vertoont het eerste onbedekt tergiet in het midden een duidelijk bultje; bij het ♀ is dit zeer nauw aangeduid of ontbreekt bijna geheel. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, ongeveer ½ breeder dan lang, in 't midden aan de basis met een diep dwars-groefje en soms met geringe aanduiding van eene verdiepte langlijn, dicht en zeer fijn bestippeld en lijn behaard. Dekschilden ongeveer de helft breeder dan het halsschild, uiterst dicht en fijn bestippeld. Achterlijf overal verspreid en tamelijk fijn bestippeld. Pooten geelbruin met iets donkerder dijnen. Bij het ♀ is het zesde sterniet aan het uiteinde onduidelijk uitgerand. Lengte 3—3½ mm. Op vochtige plaatsen onder mos en in paddestoelen. Verbreid doch overal zeldzaam (umbonata Er.) 29. **vicina** Steph.

Bovenzijde zwart, de dekschilden eenkleurig bruin. Bij het ♂ vertoont het eerste onbedekt tergiet geen bultje. Deze soort is zeer naverwant aan *vicina* en iets grooter en meer gewelfd dan *oblonga*. Spriet en iets langer en slanker. Kop uiterst fijn en weinig bestippeld. Halsschild iets breeder dan lang, in 't midden aan de basis soms met een oppervlakkig dwarsgroefje, dicht en fijn bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, dicht en fijn bestippeld. Achterlijf op de eerste tergiten weinig en lijn bestippeld, naar het uiteinde onbestippeld. Pooten geelachtig-bruin. Overigens moeilijk te onderscheiden. *Ganglbauer* betwijfelt of dit wel eene goede soort is. Lengte 3½—3¾ mm. Op vochtige plaatsen onder mos en afgevallen bladeren, niet zeldzaam 30. **nitidula** Kr.

107 Het laatste lid der achtertarsen tweemaal zoo lang als het eerste 108

Het laatste lid der achtertarsen weinig of niet langer dan het eerste 120

108 De eerste onbedekte tergiten aan de basis afhellend ingedrukt. De slapen meestal korter dan de oogen. Halsschild minstens de helft breeder dan lang. Middelcoxae dicht tegen elkaar aanstaande, doch niet elkaar aanrakende, het mesosternum daartusschen steeds over het midden reikend (Sub-gen. *Atheta* isp.) 109

De eerste onbedekte tergiten naar voren geleidelijk zwak afhellend. De slapen een weinig langer dan de oogen. Halsschild tamelijk vierkant 111

109 Halsschild met duidelijken bronsachtigen weerschijn 110

Halsschild pekwart, glanzig, niet bronsachtig. Naverwant aan *validicornis*. Spriet en bruinachtig, de eerste 2 of 3 leedjes geelachtig, naar het uiteinde geleidelijk iets verdikt, slank, het derde lid iets langer dan het tweede, het vierde lid langer dan breed, de volgende iets in breedte toenemend, de laatste tot en met het tiende iets breeder dan lang, het eindlid bij het ♀ weinig, bij het ♂ merkbaar langer dan de twee voorafgaande leedjes te zamen.

Bovenzijde zwart, lijn geelachtig behaard, de dekschilden meestal eenkleurig geelbruin. Halsschild ongeveer de helft breeder dan lang, aan de basis in 't midden soms met een dwarsgroefje en meestal met eene oppervlakkige langsgroef, vrij dicht en lijn bestippeld. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, vrij dicht en tamelijk lijn bestippeld. Achterlijf aan het uiteinde bruin of geelbruin, de eerste onbedekte tergieten zeer verspreid-, doch duidelijk en lijn bestippeld, de beide volgende geheel onbestippeld. Bij niet goed uitgekleurde exemplaren zijn de achterlijfsringen bruinrood gerand. Pooten geel. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet afgeknot en lijn gekarteld, het zesde sterniet is sterker uitgetrokken en aan het uiteinde meer afgerond dan bij het ♀. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Gemeen in mest, paddestoelen, boomholn, dorre bladeren en rottende plantenstoffen, vooral in bosschen. (Xanthoptera Steph., merdaria Thoms.) 33. *castanoptera* Mannh.

110 Halsschild dicht, niet segrijnachtig bestippeld. Dekschilden vuil geelbruin, naast het schildje, alsook in de achterhoeken berookt. Het achtste tot tiende sprietlid breeder dan lang. Bovenzijde eenigszins glanzig zwart, kop en halsschild met bronsachtigen weerschiin. Uiteinde van het achterlijf bruin. Spriet en brinnachtig, met geelachtigen wortel. Pooten geelachtig. Het voorlijf is lijn en dicht grijs-, het achterlijf meer verspreid behaard. De bestippling is, zeer lijn en dicht, zeer dicht rimpelig op de dekschilden, tamelijk lijn en verspreid op de eerste 3 onbedekte tergieten, bijna niet op het vierde en vijfde tergiet. Spriet naar het uiteinde iets verdikt, het vierde lid iets langer dan breed, het eindlid zeer groot, lang en toegespitst. Halsschild eenigszins gewelfd, verbreed, met een groefje aan de basis, dat zich min of meer tot een langsdruk naar voren voortzet. Dekschilden $\frac{1}{2}$ breeder en veel langer dan het halsschild. Achterlijf duidelijk smaller dan de dekschilden. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde van eenige lijne tandjes voorzien, aan de onderzijde steekt het hoekig uit. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Onder steenen, dood riet, stroo, afgevallen bladeren, achter boomschors, in paddestoelen en in aanspoelsel der rivieren. (aeneicollis Sharp) 34. *Pertyi* Heer.

Halsschild zeer lijn en niet dicht-, doch duidelijk segrijnachtig bestippeld. Dekschilden meer eenkleurig vuilbruin of geelbruin, iets donkerder om het schildje. Het achtste tot tiende sprietlid langer dan breed. Deze soort is iets grooter dan *Pertyi*, tamelijk breed en donker gekleurd. De spriet en zijn weinig naar het uiteinde verdikt, zwart met geelachtig wortel, het vierde lid iets langer dan breed, het eindlid vrij lang en spits, naar verhouding iets korter dan bij *Pertyi*. Halsschild bronskleurig, smaller dan de dekschilden, ongeveer $\frac{1}{2}$ breeder dan lang, met een breeden, ondiepen indruk voor het schildje. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, dicht en duidelijk, eenigszins rimpelig bestippeld en zeer duidelijk behaard. Achterlijf glanzig zwart, de eerste 3 onbedekte tergieten verspreid doch duidelijk bestippeld, het vierde en vijfde bijna onbestippeld. Pooten geelachtig. Van *castanoptera* is deze soort onderscheiden door de donkerder spriet en, het korter eindlid der spriet en, den bronzen weerschiin van kop en halsschild, alsook door de sterker bestippling en iets donkerder gekleurde dekschilden. Bij het ♂ is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet afgeknot en gekarteld. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Op vochtige plaatsen onder mos, dorre bladeren, in paddestoelen en in aanspoelsel der rivieren. Zeer zeldzaam. Den Haag, Loosduinen, Kralingen, Breda, Winterswijk (subaenea Sharp) 35. *aquatica* Thoms.

Naverwant aan *aquatica* is eene soort, bij welke het halsschild breeder is en pekbruin met zeer geringen bronzen weerschiin. Ook zijn de dekschilden meer verbreed. Overigens is deze soort nog meer verwant aan *castanoptera*, doch grooter en breeder; kop en halsschild duidelijker segrijnachtig, doffer, met zeer geringen bronzen weerschiin; dekschilden donker geelbruin. Halsschild breeder, aan de zijden meer afgerond, iets minder dicht bestippeld. Dekschilden iets breeder, korter en iets krachtiger, korrelig bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den achterrand afgeknot of iets uiterand, het zesde sterniet steekt meer uit en is aan het uiteinde sterker afgerond dan bij het ♀. Bij het ♀ is het zesde sterniet eenigszins afgerond-afgeknot of zeer oppervlakkig uiterand. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Onder plantenaalval en in dennestronken. Zij komt in boschrijke streken van het subalpine gebied voor. Een in België bij Fleurus gevangen exemplaar is *castanoptera*. (incognita Sharp)

111 De middelcoxae tegen elkaar aanstootend; het mesosternum daartusschen toegespitst en tot aan het midden der coxae reikend (Sub-gen. *Metaxya* Muls. & Rey). 112

De middelcoxae van elkaar afstaande, het mesosternum daartusschen tot op $\frac{1}{3}$ van de lengte der coxae reikend 119

112 Het vierde en vijfde onbedekt tergiet zeer lijn en verspreid-, of bijna niet bestippeld. 113

Alle tergieten nagenoeg gelijkmatig dicht bestippeld en behaard 118

113 Halsschild weinig verbreed, hoogstens $\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. Het zevende tot tiende sprietlid niet of nauwelijks breeder dan lang. 114

- Halsschild zeer verbreed, $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang 117
 114 Het tweede sprietlid even lang als het derde 115

Het tweede sprietlid langer dan het derde. Deze soort gelijkt veel op *elongatula*, doch onderscheidt zich door de slankere sprieten, die naar het uiteinde weinig of niet verdikt zijn, alle leedjes zijn naar de basis meer versmald. Gewoonlijk is zij iets kleiner dan *elongatula*, doch zijn de even groote exemplaren iets breeder in verhouding tot de lengte, ofschoon de kleinste exemplaren van *melanocera* in verhouding altijd smaller zijn dan *elongatula*. Het halsschild is korter. Ook zijn de sexuele kenmerken bij beide soorten verschillend; bij het ♂ van *elongatula* is het zesde sterniet smal en aanmerkelijk verlengd, terwijl dit bij *melanocera* breeder, korter en meer afgerond is en slechts weinig uitsteekt. Bij het ♀ van *elongatula* is het uiteinde van het zesde onbedekt tergiet in 't midden iets uitgerand, bij *melanocera* niet. Ook vertoont het uiteinde van het achterlijf veel meer borstelbaren dan bij *elongatula*. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam, vooral in het voorjaar onder aanspoelsel der rivieren en rondvliegend (volans Scriba) 80. **melanocera** Thoms.

- 115 Sprieten bruinachtig, met lichter en wortel, of wel met roodgeel eerste lid, naar het uiteinde iets verdikt 116

Sprieten geheel licht roodbruin, naar het uiteinde weinig verdikt. Deze soort gelijkt eenigszins op *elongatula*, doch is iets meer gewelfd en lichter gekleurd. Kop en achterlijf pekwart, halsschild en dekschilden meestal donker roodbruin, zelden licht roodbruin. Kop uiterst fijn en vrij dicht bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, niet naar de basis versmald, iets gewelfd, dicht en uiterst fijn bestippeld, nagenoeg altijd met eene geheel doorlopende langsgroef. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, dicht en fijn bestippeld. Achterlijf met volkomen parallel zijden; de achterrand der ringen, alsmede de laatste ring, geheel roodbruin; de eerste onbedekte tergieten niet dicht, het vierde meer verspreid, het vijfde zeer verspreid bestippeld, bijna glad. Pooten roodgeel. Sexueel verschil als bij *elongatula*. Deze soort is veranderlijk in grootte en kleur, doch altijd te herkennen aan de lichter gekleurde sprieten. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Op vochtige en overstroomde weilanden, ook in aanspoelsel. Eenmaal in April bij den Haag.

81. **terminalis** Grav.

- 116 Sprieten bruinachtig, aan den wortel iets lichter. Kop uiterst fijn-, nauwelijks merkbaar bestippeld. Halsschild naar voren en naar achteren een weinig versmald, in het midden aan de basis veelal met een klein groefje, dat soms in eene steeds zwak aangeduide middengroef uitloopt. Pekzwart, zelden pekbruin, de dekschilden bruinachtig of vuil geelbruin, om het schildje meestal iets donkerder. Achterlijf glanzig pekwart, de laatste ring en de achterrand van den voorlaatsen bruinachtig. Pooten lichtgeel. Deze soort is zeer veranderlijk in grootte en kleur, meestal vrij slank, lang gestrekt en vlak. Dekschilden dicht en uiterst fijn bestippeld. De eerste 3 onbedekte tergieten slechts matig dicht-, doch duidelijk-, het vierde verspreid-, het vijfde nagenoeg niet-, het zesde fijn bestippeld. Bij het ♂ zijn de sprieten slanker, de eerste 4 leedjes fijn bewimperd, de indruk op het halsschild dieper en het zesde sterniet sterk verlengd en versmald; bij het ♀ het zesde onbedekt tergiet meer of minder uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Eene der gemeenste soorten; onder dorre bladeren, steenen, vooral op vochtige plaatsen. In groot aantal in aanspoelsel der rivieren en in het eerste voorjaar, op zonnige dagen, rondvliegende.

79. **elongatula** Grav.

Sprieten bruinzwart, het eerste lid alleen roodgeel. Kop fijn, doch niet dicht bestippeld, met eene duidelijke, korte langsgroef. Halsschild met eene fijne langsgroef in het midden, dicht en fijn bestippeld; zwartachtig, veelal min of meer roodbruin. Dekschilden licht roodachtig. Achterlijf zwart, het uiteinde, evenals de achterrand der ringen, min of meer roodgeel. Pooten lichtgeel. Deze soort gelijkt op eene licht gekleurde *elongatula*, doch is veel breeder. Dekschilden dicht en fijn bestippeld. De eerste 3 onbedekte tergieten dicht en fijn-, het vierde verspreid bestippeld, het vijfde nagenoeg onbestippeld. Pooten lichtgeel. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet uit en is naar het uiteinde versmald, de top zelf is iets uitgerand; het zesde onbedekt tergiet is aan het uiteinde afgeknor. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Op moerassige plaatsen. Zeer zeldzaam. Leiden, Rotterdam.

(londinensis Sharp) 82. **Gyllenhalii** Thoms.

- 117 Halsschild met eene verdiepte middellijn en met een diep groefje aan de basis. Vierde sprietlid iets langer dan breed. Habitus en kleur van *gemma*, doch veel grooter en iets minder dof, de eerste onbedekte tergieten dicht bestippeld. Sprieten langer en krachtiger ontwikkeld, naar het uiteinde weinig verdikt, zwartbruin, met 2 of 3 lichtere wortelleedjes, bij het ♂ het tweede tot vierde lid niet behaard. Kop met een korter of langer langsgroefje, dat bij het ♂ dieper is. Halsschild slechts weinig smaller dan de dekschilden, de helft breeder dan lang, dicht en fijn bestippeld. Dekschilden veel langer dan het halsschild, dicht en fijn bestippeld. Pooten

vuilgeel. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den top iets uitgerand, het zesde sterniet afgerond. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Onder mos en in boomholm. Niet inlandsch. In België bij Ploegsteert (Aubei Ch. Brisout)

Halsschild zonder verdiepte middellijn, met een dubbelen indruk aan de basis. Vierde sprietlid nagenoeg even lang als breed. Lichaam zwart, met weinig glans, zeer fijn behaard. Sprieten bruinachtig met lichter wortel. Halsschild evenals de dekschilden uiterst dicht en fijn bestippeld. Dekschilden ongeveer de helft langer dan het halsschild, donkerbruin, aan het uiteinde in het midden gemeenschappelijk uitgerand. Achterlijf aan het uiteinde lichtbruin, de eerste tergieten vrij dicht en fijn-, de laatste zeer verspreid bestippeld. Pooten geelachtig. Bij het ♂ steekt het voorlaatste sterniet verder uit dan bij het ♀. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Onder dorre bladeren, dood riet, in bosschen en moerassen, zeer zeldzaam. Bij Middelburg en Roermond. In de Belgische prov. Limburg bij Neerhaeren, in de Rijproov. bij Crefeld en Elberfeld 77. *gemina* Er.

118 Het tweede sprietlid langer dan het derde. Sprieten bruin met lichter wortel. Bovenzijde van het lichaam geheel pekwart of pekbruin, de dekschilden gewoonlijk iets lichter. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *gemina*, doch is meer zijdeachtig behaard, de bestippling is veel fijner en veel dichter op het voorlijf. Het achterlijf is vrij sterk en gelijkmatig bestippeld. Kop niet gegroefd. Halsschild weinig verbreed, met een zeer duidelijk groefje aan de basis en met eene zwak aangeduide middengroef. Pooten geelachtig, soms min of meer berookt. Bij het ♂ is het zesde sterniet smaller en aanmerkelijk verlengd; bij het ♀ verbreed en duidelijk uitgerand. Lengte 2 mm. Onder zeewier en aanspoelsel op zeeklei. Bij Amsterdam en Zierikzee 75. *meridionalis* Muls.

Het tweede sprietlid even lang als het derde. Sprieten veel slanker, geheel roodgeel. Bovenzijde van het veel vlakker lichaam pekwart of pekbruin, de dekschilden en het uiteinde van het achterlijf roodbruin. Halsschild in den regel met eene duidelijke middengroef, grover bestippeld dan bij *meridionalis*. Pooten geheel geel. Bij het ♂ is het zesde sterniet veel breeder afgerond, bij het ♀ veel sterker uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Op ziltigen bodem. Langs het Y bij Amsterdam in April onder riet; ook bij Rotterdam en Bergen-op-Zoom op zeeklei. 76. *marina* Rey.

119 Het tweede sprietlid even lang als het derde, het tweede tot vierde lid bij het ♂ binnenwaarts met lange witte haren bezet. De randlijn der wangen duidelijk (Sub-gen. *Pelurga* Muls. & Rey). Eene der grootste soorten, met den habitus van *elongatula*, doch nog vlakker en vooral onderscheiden door de vuil geelbruine, matte kleur der dekschilden. Bovenzijde zwartbruin, vrij dof. Sprieten pekbruin, het eerste lid geelachtig. Kop uiterst dicht en fijn bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, duidelijk breeder dan lang, met een oppervlakkig dwars-groefje aan de basis en dikwerf nog met eene duidelijke aanduiding van eene geheel doorlopende langsgroef, uiterst dicht en fijn bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, zeer dicht en fijn bestippeld, om het schildje iets donkerder. Achterlijf pekwart, de achterrand der ringen, alsook het zesde onbedekt tergiet geheel geelbruin. De eerste onbedekte tergieten dicht en duidelijk-, het vierde verspreid bestippeld, het vijfde nagenoeg onbestippeld. Pooten geel. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet uitgerand, het zesde sterniet ver uitgetrokken, naar het uiteinde sterk versmald en met den breed afgeknotten of iets uitgeranden top sterk opwaarts gekromd. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet een weinig uitgerand, het zesde sterniet nagenoeg niet uitgetrokken en aan den top afgerond. Lengte 3—4 mm. Op vochtige plaatsen onder dorre bladeren en langs rivieroovers. Verbreed doch niet gemeen 83. *luridipennis* Mannh.

Het tweede sprietlid is iets langer dan het derde, het tweede tot vierde lid bij het ♂ gewoon behaard. De rand der wangen naar voren zeer fijn, doch bij goed licht bezien tot aan de achterkaaks-groef berkenbaar (Sub-gen. *Phryogora* Muls. & Rey). Grooter en breeder dan *elongatula*, onderscheiden door de donkere sprieten, waarvan slechts het eerste lid iets lichter is, het mat glanzige, dicht en fijn behaarde voorlijf, de donker grauwbrown dekschilden, wier kleur weinig van die van het overige lichaam afwijkt en het eenkleurig, tamelijk glanzig pekwarte achterlijf. Halsschild breeder dan lang, duidelijk smaller dan de dekschilden, van boven vlak, evenals de kop pekwart, in het midden aan de basis meestal met een klein groefje. Dekschilden iets langer dan het halsschild. De eerste 3 onbedekte tergieten dicht en duidelijk-, het vierde verspreid, het vijfde niet bestippeld. Pooten geelachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet lang-driehoekig toegespitst, de spits zelve iets afgerond. Ook is het voorhoofd iets ingedrukt en het halsschild van een duidelijk groefje voorzien. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam op vochtige plaatsen onder dorre bladeren en steenen. Ook langs rivieroovers (hygrobia Muls. & Rey) 78. *hygrotopora* Kr.

120 Halsschild nagenoeg even breed als lang. Derde sprietlid nagenoeg even lang als het tweede (Sub-gen. *Dilactra* Thoms.). Bovenzijde zwart, fijn en uiterst dicht behaard, dekschilden bruin. Sprieten donkerbruin met lichter wortel. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, met een ondiep basaal-groefje, dat niet zelden geheel ontbreken kan, dicht en uiterst fijn

bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, dicht en uiterst fijn bestippeld. Achterlijf pekzwart, tamelijk glanzig, overal zeer dicht en fijn bestippeld en zeer fijn behaard. Pooten lichtgeel. Sprietten bij het ♂ slanker; bij het ♂ steekt het zesde sterniet uit en is breed afgerond; bij het ♀ is het driehoekig uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Langs oevers, onder vochtige bladeren en vooral langs rivieren onder dood riet en ander aanspoelsel. Zeldzaam. Apeldoorn, Arnhem, Gorkum, den Haag en Houthem.

91. *luteipes* Er.

Halsschild duidelijk breder dan lang. Derde sprietlid merklijk korter dan het tweede (Sub-gen. *Dacryla* Muls. & Rey). Bovenzijde grauwwaart, overal fijn en dicht, zijdeachtig behaard. Dekschilden donkerder of lichter roodbruin. Sprietten bruinachtig, met lichter wortel. Halsschild weinig of niet smaller dan de dekschilden, met een ondiep dwarsgroefje aan de basis en met eene meestal slechts aangeduide langsgroef. Kop vrij groot, iets smaller dan het halsschild. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Achterlijf uiterst fijn en dicht bestippeld, de afzonderlijke ringen soms iets roodachtig gerand. Pooten lichtgeel. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet uit en is afgerond. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Op zee- en rivierklei. Te Diemen bij Amsterdam uit dood riet; ook bij Naarden, Arnhem en Roermond.

92. *fallax* Kr.

- 121 Achtertarsen slechts weinig korter dan de schenen, het eerste lid iets langer dan het tweede, nagenoeg even lang als het vijfde 122

Achtertarsen veel korter dan de schenen (Sub-gen. *Hydrosmeeta* Thoms., *Thinoecia* Muls. & Rey) 129

- 122 De eerste 4 onbedekte tergiten zeer fijn en matig dicht bestippeld en behaard, het vijfde zeer weinig bestippeld of glad. Bij het ♂ is het vierde en vijfde onbedekt tergiet gewoon (Sub-gen. *Glossola* Fowler, *Aloconota* Muls. & Rey). Deze soort herinnert in habitus aan *elongatula*, doch onderscheidt zich door den eigenaardigen dollen glans op het halsschild. Bovenzijde pekzwart of pekbruin, onuitgekleurde exemplaren grotendeels geelbruin, het achterlijf sterk glanzig, de dekschilden bruinachtig. Sprietten roodbruin, het achtste tot tiende lid iets breder dan lang, het eindlid tweemaal zoo lang als het voorafgaande lid, iets toegespitst. Kop fijn zijdeglanzig behaard. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, ongeveer even lang als breed, naar de basis iets versmald, gewoonlijk met een ondiep basaalgroefje, uiterst dicht en fijn bestippeld, donker pekbruin, dof. Dekschilden iets langer dan het halsschild, doch duidelijk korter dan bij *elongatula*, uiterst dicht en fijn bestippeld, fijn zijdeglanzig behaard, bruinachtig, zeldzamer geelbruin. Het ♂ heeft gewoonlijk krachtiger sprietten en meer duidelijke indrukken op kop en halsschild. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Langs rivieroevers, duinplassen en onder afgevallen bladeren. Niet zeldzaam 36. *gregaria* Er.

De eerste onbedekte tergiten zeer dicht of meer verspreid bestippeld en behaard. Bij het ♂ bevindt zich op het vijfde onbedekt tergiet een kielvormig, van achteren tandvormig uitstekend, langsbultje, het zesde tergiet aan den achterrand met 4 tandjes (Sub-gen. *Aloconota* Thoms.) 123

- 123 Dekschilden even lang als te zamen breed 124

Dekschilden te zamen breder dan lang 125

- 124 Sprietten zeer slank, naar het uiteinde bijna niet verdikt, het derde lid even lang als het tweede, het vierde tot tiende lid geleidelijk in lengte iets afnemend, de voorlaatste leedjes minstens even lang als breed. Kop en halsschild pekzwart of pekbruin, dekschilden bruin, achterlijf zwart of zwartbruin. Sprietten bruin of bruinrood, met lichter wortel; pooten roodgeel. Kop uiterst fijn bestippeld, in het midden met een groefje of oppervlakkigen indruk. Halsschild smaller dan de dekschilden, ongeveer even lang als breed, uiterst fijn en dicht bestippeld, met een dwarsgroefje aan de basis en meestal over het midden gegroefd. Dekschilden nagenoeg de helft langer dan het halsschild, iets langer dan te zamen breed, uiterst fijn en dicht bestippeld. Achterlijf glanzig, op de eerste onbedekte tergiten fijn en niet zeer dicht bestippeld, op het vijfde bijna glad. Bij het ♂ het vijfde onbedekt tergiet in het midden met een kielvormig, naar achteren tandvormig uitstekend bultje, het zesde tergiet aan den achterrand in het midden met twee duidelijke, aan de zijhoeken elk met een onduidelijk, nauwelijks zichtbaar tandje. Het zesde sterniet bij het ♂ stomp afgerond en uitstekend. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Op leemgrond en in het van water doortrokken oeverzand, onder steenen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik en langs de Ahr.

(velox Kraatz) (cambrica Wollast.)

Sprietten veel korter en krachtiger ontwikkeld, het derde lid korter dan het tweede, het vierde tot tiende lid nagenoeg even lang, in breedte gelijkmatig iets toenemend, de voorlaatste leedjes zeer weinig verbreed. Lichaam bruinachtig of roodgeel, kop donkerder of roodbruin; achterlijf pekbruin met roodgeel uiteinde of slechts voor het uiteinde zwartachtig.

Spieten en pooten roodgeel. Kop fijn en vrij dicht bestippeld, vooral bij het ♂ met eene duidelijke middengroef. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, uiterst fijn en dicht bestippeld, in het midden meestal oppervlakkig gegroefd. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, even lang als te zamen breed, uiterst fijn en uiterst dicht bestippeld. Achterlijf tamelijk glanzig, op de eerste onbedekte tergiten zeer fijn en weinig dicht bestippeld; het vijfde bijna glad. Bij het ♂ heeft het vijfde onbedekt tergiet in het midden een kielvormig, naar achteren tandvormig uitstekend bultje, het zesde tergiet aan den achterrand 4 kleine, scherpe, van elkaar even ver afstaande tandjes. Lengte 2—2 $\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik in aanspoelsel. Ik zag een typisch exemplaar van *Eichhoff* uit het Weener Hofmuseum (appulsa Scriba)

125 De eerste tergiten dicht bestippeld. 126

De eerste tergiten verspreid bestippeld 128

126 Lichaam 4—4 $\frac{1}{2}$ mm. lang 127

Lichaam 3—3 $\frac{1}{2}$ mm. lang. Kop pekzwart of bruin, halsschild en dekschilden donkerder of lichter bruin; achterlijf pekzwart met roodbruinachtig uiteinde, soms ook de achterrand der eerste ringen roodbruin. Spieten bruin of roestrood met roodgelen wortel; pooten roodgeel. Het voorlijf is uiterst fijn gechagrineerd en zeer fijn en vrij dicht behaard. Kop groot, slechts iets smaller dan het halsschild, naar achteren iets verbreed, uiterst fijn en dicht bestippeld, met een middengroefje of eene langsgroef. Halsschild smaller dan de dekschilden, even lang als breed, naar achteren duidelijk versmald, tamelijk gewelfd, uiterst fijn en dicht bestippeld, met een dwarsgroefje aan de basis, over het midden oppervlakkig en gewoonlijk alleen van achteren gegroefd. Dekschilden weinig of niet langer dan het halsschild, uiterst dicht en duidelijk bestippeld. Achterlijf glanzig, de eerste tergiten zeer fijn en dicht bestippeld en vrij dun behaard, het zevende tergiet nagenoeg glad. Bij het ♂ het vijfde onbedekt tergiet met een kielvormig, naar achteren gericht, tandvormig bultje; het zesde tergiet aan den achterrand met vier onduidelijke tandjes, het zesde sterniet steekt iets uit en is stomp afgerond. Zeldzaam. Onder mos, in paddestoelen, onder afgevalen bladeren en langs oevers. Katwijk, Loosduinen, Kralingen, Rotterdam, Haarlem, Eysden, Houthem, Amsterdam.

(pavens Er.) 89. *sulcifrons* Steph.

127 Het achtste tot tiende sprietlid duidelijk langer dan breed. Lichaam zwart, de dekschilden bruinachtig. Pooten bruingeel, de spieten pekzwart, met lichter wortel. Kop, halsschild en dekschilden uiterst fijn gechagrineerd en vrij dicht geelgrijs zijdeglanzig behaard. Kop in het midden met eene gladde middellijn of met een groefje, de slapen van achteren gerand. Spieten lang en smal. Halsschild smaller dan de dekschilden, ongeveer even lang als breed, meer of minder fijn en dicht, eenigszins grof bestippeld, meestal met een duidelijk groefje aan de basis en eene, den voorrand niet bereikende, middengroef. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, te zamen nauwelijks breeder dan lang, zeer fijn en uiterst dicht bestippeld. Achterlijf glanzig, op de eerste onbedekte tergiten fijn en matig dicht bestippeld en niet dicht en vrij lang behaard; het vijfde tergiet nagenoeg glad en kaal. Bij het ♂ heeft het vijfde onbedekt tergiet in het midden, voor den achterrand, een kielvormig, naar achteren tandvormig uitstekend langsbultje, het zesde tergiet aan den achterrand met 4 kleine tandjes, tusschen de zijdelingsche en de diechter bij elkaar staande middelste tandjes, aan weerszijden zeer fijn gekerfd. Het zesde sterniet steekt uit en is afgerond. Lengte 4—4 $\frac{1}{4}$ mm. Op zandige oevers van bergbekken en rivieren. Niet inlandsch.

(currax Kr.)

Het achtste tot tiende sprietlid breeder dan lang. Eene groote soort, welke aan *sulcifrons* zeer naverwant, doch meestal iets breeder is, met meer glanzigen kop en halsschild. Spieten naar het uiteinde minder verdikt, met langere leedjes, lichtbruin met lichter wortel. Kop en halsschild duidelijk gegroefd, het halsschild iets langer in verhouding tot de breedte, naar de basis meer versmald. Bovenzijde zwart. Kop met een diep langwerpig groefje, fijn bestippeld. Halsschild smaller dan de dekschilden, bijna even lang als breed, dicht en fijn bestippeld en met eene duidelijke middengroef. Dekschilden naar het uiteinde iets verbreed, iets langer dan het halsschild, roodbruin, dicht en fijn bestippeld. Bovenzijde van het achterlijf vrij dicht en fijn bestippeld, het vijfde onbedekt tergiet nagenoeg onbestippeld en glanzig. Pooten geel. Lengte 3 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$ mm. Vrij zeldzaam langs rivieroevers en onder vochtige bladeren in uitgedroogde slooten. Arnhem, Maarsbergen, Giesendam, Rotterdam, Kralingen, Leiden, Maastricht, Eysden. 88. *insecta* Thoms.

128 Lichaam tamelijk vlak gedrukt. Spieten vrij lang en slank, naar het uiteinde slechts iets verdikt, het derde lid ongeveer dubbel zoo lang als het vierde, dit iets korter dan het vijfde, het vijfde tot tiende nagenoeg even lang, het eindlid ovaal, de helft langer dan het voorlaatste lid. Habitus en grootte van *debilis*, doch iets glanziger, pekzwart, de dekschilden bruin of geelbruin; de spieten bruin met lichter wortel of geheel geelrood; de pooten roodgeel. Kop iets smaller dan het halsschild, met een onduidelijken indruk tusschen de

oogen, zeer fijn bestippeld. Halsschild slechts iets smaller dan de dekschilden, ongeveer even lang als breed, naar achteren iets versmald, zeer fijn en dicht bestippeld, met een indruk voor het schildje of met eene korte langsgroef. Dekschilden iets langer dan het halsschild, naar het uiteinde iets verbreed, bijna even lang als breed en minder fijn dan het halsschild bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde iets versmald, op de eerste onbedekte tergiten fijn en tamelijk verspreid-, op het vierde tergiet meer verspreid-, op het vijfde nauwelijks bestippeld. Bij het ♂ heeft het vijfde onbedekt tergiet een spits bultje, het zesde aan den achterrand twee duidelijke tandjes in het midden en aan weerszijden een onduidelijk zijtandje. Deze soort is van *cambrica* onderscheiden door het iets bredere lichaam, den duidelijker glans, den naar voren versmalden kop, de iets krachtiger sprieten en de kortere, lichter gekleurde dekschilden. Lengte 2½—3 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik, in aanspoelsel (*Eichhoffi* Scriba) (*aegyptiaca* Motsch.)

Lichaam minder vlak gedrukt. Sprieten minder slank en korter, naar het uiteinde duidelijk verdikt, het vierde lid duidelijk korter en smaller dan het vijfde, iets langer dan breed, het vijfde tot tiende nagenoeg even lang, doch in breedte iets toenemend, het eindlid de helft langer dan het voorlaatste lid, toegespitst. Kop pekwart, het halsschild pekwart of pekbruin, de dekschilden geelbruin, het achterlijf zwart. Sprieten pekbruin met lichter wortel. Pooten roodgeel. Kop groot, slechts weinig smaller dan het halsschild, uiterst fijn en weinig dicht bestippeld, met eene breede middengroef of met een langsindruk. Halsschild smaller dan de dekschilden, even breed als of iets breeder dan lang, naar achteren duidelijk versmald, fijn en vrij dicht bestippeld, met een breeden langsindruk of eene middengroef. Dekschilden weinig langer dan het halsschild, fijn en zeer dicht-, doch minder fijn en dicht bestippeld dan bij *cambrica*. Achterlijf op de eerste onbedekte tergiten zeer fijn en verspreid bestippeld, het vijfde tergiet bijna glad. Bij het ♂ is het vijfde onbedekt tergiet in het midden van een kielvormig, naar achteren tandvormig uitstekend bultje voorzien, het zesde aan den achterrand met 4 kleine tandjes, van welke de middelste dicht bijeen staan. Deze soort komt in habitus en kleur met *gregaria* overeen, ook in den vorm van den kop met *aegyptiaca*, doch deze is minder ingedrukt; ook is de bestippling duidelijker dan bij *aegyptiaca*. Lengte 2½—3 mm. Zeer zeldzaam langs oevers van rivieren en kanalen. Arnhem, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Cuyk. (*planifrons* Waterh.) 90. *debilicornis* Er.

129 Kop breed, veel breeder dan lang. Lichaam 2—3½ mm. lang. 130

Kop niet of slechts weinig breeder dan lang, nagenoeg vierkant. Lichaam 1½—2 mm. lang . 132

130 Sprieten zeer slank en lang, het derde lid niet of slechts iets korter dan het tweede. Lichaam 3—3½ mm. lang. Bovenzijde zwartbruin, tamelijk glanzig. Dekschilden geelbruin, om het schildje meestal donkerder gekleurd. Eene door de slanke sprieten en het dicht bestippelde achterlijf in 't oog vallende soort. Lichaam zeer plat, op het voorlijf zeer fijn zijdeachtig-, op het achterlijf dichter en tamelijk lang behaard. Kop, ten minste bij het ♂, met een middengroefje of een langsindruk. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, nagenoeg even lang als breed, dicht en uiterst fijn bestippeld, in 't midden van de basis meestal met een klein groefje. Dekschilden uiterst dicht en fijn bestippeld. Achterlijf dicht en grover-, het vierde onbedekt tergiet iets meer verspreid bestippeld. Pooten geelachtig, de dijen meestal donkerder. Bij het ♂ zijn de eerste 4 sprietledjes lang bewimperd, de bestippling van het vijfde onbedekt tergiet is iets minder dicht en grover. Bij het ♀ is het zesde sterniet iets uitgebogen. Op leemgrond, waar zij, evenals de *Tachysa*-soorten, snel rondloopt. Niet inlandsch. In de Rijnprovincie bij Gulik en in het Ahrdal.

(*gracilicornis* Er.)

Sprieten minder lang en slank, het derde lid duidelijk korter dan het tweede. Lichaam 2—2½ mm. lang. 131

131 Halsschild duidelijk breeder dan lang, met afgeronde zijden, smaller dan de dekschilden, met een basaalgroefje en gewoonlijk ook met eene meer of minder verdiepte middellijn. Lichaam smal en vlak gedrukt, pekwart, de dekschilden en het uiteinde van het achterlijf bruin. Sprieten bruinrood, de pooten bruingeel. Kop in het midden meestal met een groefje. Bij het ♂ is het vijfde tot tiende sprietlid iets langer dan breed, bij het ♀ zijn de voorlaatste ledjes nauwelijks breeder dan lang. Dekschilden ¼ langer dan het halsschild, nagenoeg even lang als te zamen breed, uiterst fijn en dicht bestippeld. Achterlijf fijn en matig dicht-, het vijfde onbedekt tergiet minder dicht bestippeld, matig dicht en vrij lang behaard, tamelijk glanzig. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed afgerond, bij het ♀ nagenoeg afgeknot, in het midden soms iets uitgebogen. Lengte 2½—2¾ mm. Op leembodem. Niet inl. In de Rijnprov. bij Gulik en Ahrweiler. (*fluviatilis* Kr.)

Halsschild slechts iets breeder dan lang, met nagenoeg rechte zijden, meestal met een dwarsindruk aan de basis, over het midden veelal oppervlakkig gegroefd, soms breed ingedrukt. Deze soort is kleiner dan *fluviatilis* en heeft langere dekschilden. Pekzwart met bruine dekschilden, soms bruin met zwartachtige middelste achterlijfsringen. Sprieten rood-

bruin, de pooten geel, zelden bruinachtig. Kop in het midden bij het ♂ met een langsindruk, bij het ♀ meestal met een groefje. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, merkbaar langer dan te zamen breed, uiterst fijn en dicht bestippeld. Achterlijf zeer fijn en vrij dicht-, het vijfde onbedekt tergiet minder dicht bestippeld, matig dicht en vrij lang behaard, iets glanzig. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed afgerond, bij het ♀ gewoonlijk oppervlakkig uitgebogen. Lengte 2 mm. Niet inl. In de Rijnprov. langs de Ahr.

(fragilis Kr.)

- 132 Spriet en zeer lang en slank, de middelste leedjes minstens dubbel zoo lang als breed. Lichaam zeer smal en vlak, pekschwart of pekbruin, de dekschilden bruin, de spriet en roodbruin met iets lichter wortel, de pooten roodgeel. Kop, halsschild en dekschilden uiterst fijn en dicht zijdeglanzig behaard. Kop groot, nauwelijks smaller dan het halsschild, nagenoeg vierkant. Halsschild van voren weinig smaller dan de dekschilden, even lang als breed, evenals de kop uiterst fijn bestippeld, met eene oppervlakkige middengroef en met een zwak dwarsgroefje aan de basis. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, even lang als of iets langer dan te zamen breed, evenals het achterlijf uiterst fijn en dicht bestippeld. Lengte 2 mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Gulik en in het Ahrdal (fragilicornis Kr.)

Spriet korter en minder slank, de middelste leedjes weinig langer dan of even lang als breed. Lichaam smal en lang gestrekt, zwart, de spriet pekbruin, de pooten bruingeel, meestal met donkerder dijen. Kop groot, duidelijk breder dan lang, uiterst fijn bestippeld, bij het ♂ met een duidelijk-, bij het ♀ met een zwak of bijna niet aangeduid groefje. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, nauwelijks breder dan lang, uiterst fijn, bijna onzichtbaar bestippeld, met een basaalgroefje en meestal ook met eene duidelijke middengroef. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, even lang als te zamen breed, uiterst fijn en dicht bestippeld, zeer fijn behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde meer afgerond dan bij het ♀. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Langs de Maas bij Maastricht, Juli. — In de Rijnprov. bij Ahrweiler (thinobioides Kr.) 85. **longula** Heer.

Hieraan verwant is eene soort, welke veel smaller en platter is; overal uiterst fijn en dicht behaard, bruin, het achterlijf pekbruin met geelbruin uiteinde, de spriet en pooten geelachtig. Kop langer en smaller, nagenoeg vierkant. Spriet merkbaar korter en dikker, het vijfde tot tiende lid bij het ♂ iets langer dan breed, bij het ♀ de voorlaatste leedjes even lang als breed. Bij het ♂ zijn kop en halsschild breed gegroefd. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In Oldenburg en bij Elberfeld (simillima Muls. & Rey) (delicatula Sharp)

26. Brachyusa Muls. et Rey.

Dit genus onderscheidt zich van Atheta, doordat het eerste lid der achtertarsen zeer lang is, even lang als de 3 volgende leedjes te zamen; van Tachyusa door den habitus, den sterk in het halsschild teruggetrokken kop, het breder halsschild, het naar het uiteinde sterk versmald achterlijf en de niet in de breedte ingedrukte basis der eerste sterniten. Kop met grootte, eenigszins uitpuilende oogen. De slapen op de onderzijde niet gerand. Spriet slank. Pooten lang en slank, de voortarsen 4-ledig, het eindlid even lang als de eerste 3 leedjes te zamen; middel- en achtertarsen 5-ledig, de achtertarsen even lang als de achterschenen.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam zeer vlak, dof zwart, uiterst fijn en dicht bestippeld, uiterst kort en dicht grauwglanzig behaard. Pooten met roodachtige knieën en tarsen of geheel bruingeel. Kop veel smaller dan het halsschild, met zeer grootte uitpuilende oogen. Spriet slank. Halsschild weinig smaller dan de dekschilden, ongeveer de helft breder dan lang, aan weerszijden van de basis iets uitgerand, bij het ♂ met eene oppervlakkige, breede langsgroef. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, aan het uiteinde, binnen de achterhoeken, iets uitgerand. Achterlijf naar het uiteinde sterk versmald, slechts het eerste onbedekt tergiet duidelijk in de breedte ingedrukt. Bij het ♂ is het zesde sterniet zeer groot, het zesde onbedekt tergiet ver overschrijdend, aan den achterrand bewimperd. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam, vooral op klei- en leemgrond, langs oevers en duinplassen.

1. **concolor** Er.

27. Gnypta Thoms.

Dit genus onderscheidt zich van Atheta door de in de breedte ingedrukte basis der twee of drie eerste sterniten en door den met Tachyusa overeenkomenden habitus,

van welk genus het onderscheiden is door het duidelijk korter eerste lid der achtertarsen en de kortere, nauwelijks tot aan het midden der middelcoxae reikende, aan het uiteinde stompe mesosternaal-voortzetting. De slapen zijn ongerand. Achterlijf aan de basis slechts weinig ingesnoerd. — De soorten leven langs oevers, waar zij met opgebogen achterlijf in den zonneschijn snel rondloopen.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild en dekschilden vrij dicht en zeer fijn bestippeld, de tusschenruimten der stippels veel grooter dan de stippels zelf, glanzig. Pooten donker met geelachtige knieën of schenen en tarsen. 2

Halsschild en dekschilden overal uiterst dicht bestippeld, de tusschenruimten niet grooter dan de stippels zelf. Lichaam eenigszins dof, zeer dicht en fijn zijdeglanzig grauw behaard. Pooten geheel geel. Achterlijf uiterst lijn en dicht bestippeld. Sprietten lichtbruin met lichter wortel. Kop uiterst dicht en fijn, bijna niet merkbaar bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, niet naar de basis versmald, met een ondiep basaalgroefje en dikwerf met de aanduiding van eene langsgroef. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{3}$ langer dan het halsschild. Achterlijf veel minder zijdeglanzig. Bij het ♂ is het zesde sterniet smaller en aanmerkelijk verlengd, bij het ♀ verbreed en duidelijk uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Langs rivieroevers op slib, klei en zand. Arnhem, de Steeg, Bergen-op-Zoom, Maastricht en Eysden. In de Rijnprov. bij Crefeld 2. *velata* Er.

- 2 Het derde sprietlid even lang als het tweede, de voorlaatste leedjes langer dan breed. Bovenzijde zwartachtig, meestal met geringen blauwachtigen weerschijs, sterk glanzig, uiterst lijn behaard, zoodat geen grijsachtige zijdeglans aanwezig is. Kop even breed als het halsschild, bij het ♂ breed en diep-, bij het ♀ zwakker ingedrukt. Deze soort is zeer verwant aan *carbonaria*, doch breeder en krachtiger gebouwd. Pooten en sprietten zwartachtig of zwartbruin, de knieën en de tarsen donker geelachtig. Pooten langer dan bij *carbonaria*. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Langs zandige rivieroevers. Zij zou op het eiland Borkum en bij Norden 1) in Hannover gevangen zijn. Ook in Engeland.

(*carbonaria* Sharp) (*ripicola* Kiesw.)

Het derde sprietlid korter dan het tweede, de voorlaatste leedjes iets breeder of nagenoeg even breed als lang. Bovenzijde zwart, door de vrij dichte beharing eenigszins grijs-glanzig. Kop smaller dan het halsschild, soms met een middengroefje, dicht en uiterst lijn bestippeld. Sprietten zwartachtig. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, te zamen iets breeder dan lang, naar de basis iets versmald, met een duidelijk basaalgroefje en soms met aanduiding van eene langsgroef, dicht en uiterst lijn bestippeld, uiterst fijn behaard, glanzig. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{3}$ langer dan het halsschild, dicht en uiterst lijn bestippeld, zeer lijn zijdeglanzig behaard. Achterlijf glanzig zwart, lijn behaard, op de rugzijde overal zeer dicht en lijn bestippeld, de eerste tergiten aan de basis met een dwarsindruk. Pooten zwartachtig, de schenen of alleen de knieën en de tarsen meer geelachtig, zeldzamer de pooten geheel geelachtig. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet eenigszins uit. Lengte $2\frac{2}{3}$ — 3 mm. Gemeen op zand en slib langs rivieroevers en duinplassen, waar zij snel rondloopt. (*labilis* Er.) 1. *carbonaria* Mannh.

28. Tachyusa Erichs.

Kop vooruitstekend, van achteren ingesnoerd, de slapen op de onderzijde niet gerand. Sprietten gewoonlijk zeer slank. Bovenlip van voren afgeknot of zwak uitgerand. Voorkaken naar het uiteinde sterk gekromd, aan den binnenrand in 't midden meestal met een klein tandje. Kaaktasters vrij lang en slank, het derde lid langer dan het tweede, het eindlid zeer klein en dun, prienvormig. Tong als bij *Atheta*, ongeveer tot aan het midden van het eerste liptaster-lid reikend en tot aan het midden gespleten. Liptasters zeer slank, duidelijk 3-ledig, de leedjes in dikte geleidelijk afnemend, het eerste lid even lang als het tweede en derde te zamen. Halsschild smaller dan de dekschilden, met iets omgeslagen, van terzijde gezien, zichtbare epipleuren. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, uitgerand. Achterlijf lang en slank, met parallelle zijden of aan de basis meer of minder sterk ingesnoerd; de eerste twee of drie sternieten, achter de basis, in de breedte ingedrukt of ingesnoerd; gewoonlijk zijn de eerste 3 onbedekte tergiten, aan de basis, in de breedte diep ingedrukt, soms vertoont slechts het eerste tergiet eene duidelijke dwarsgroef aan de basis. Pooten lang en slank.

1) Onder den naam van *G. coerules* Sahlb. opgegeven.

Voortarsen 4-ledig, het eindlid even lang als de eerste 3 leedjes te zamen; de middel- en achtertarsen 5 ledig; het eerste achtertarsen-lid minstens even lang als de twee volgende leedjes te zamen. — De soorten van dit genus leven langs oevers van rivieren, plassen en poelen, waar zij in den zonneschijn, met opgebogen achterlijf, snel rondloopen. Zij verschuilen zich uiterst snel in reuten van den bodem.

Van de 18 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Achterlijf aan de basis slechts weinig versmald 2
Achterlijf aan de basis sterk ingesnoerd (Sub-gen. *Tachyusa* isp.) 6
- 2 Het derde onbedekt tergiet aan de basis slechts zeer zwak in de breedte ingedrukt. Sprieten zeer lang gestrekt, de voorlaatste leedjes dubbel zoo lang als breed. De geheele bovenzijde van het lichaam dof, uiterst dicht en fijn, bijna onzichtbaar, bestippeld en uiterst kort, rijpachtig behaard (Sub-gen. *Thinonoma* Thoms.). Lichaam zwart, lang gestrekt, het achterlijf naar het uiteinde slechts een weinig versmald. Halsschild iets langer dan breed, naar de basis iets versmald, met eene duidelijke middengroef. Dekschilden duidelijk breder, doch weinig langer dan het halsschild. Sprieten zwartbruin. Pooten pekkruin, de knieën en tarsen geelachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet vrij sterk uitgetrokken. Lengte 3 mm. Zeer gemeen in uitgedroogde slooten en langs poelen, in dood riet en tusschen dorre bladeren; ook langs de stranden onder doode visch. *t. atra* Grav.
Het derde onbedekt tergiet aan de basis even diep in de breedte ingedrukt als de twee voorafgaande tergieten. Sprieten minder gestrekt. Bovenzijde zeer fijn en dicht, doch duidelijk bestippeld, minder kort behaard 3
- 3 Sprieten vrij lang, het derde lid minstens even lang als het tweede, de voorlaatste leedjes niet of slechts zeer zwak verbreed (Sub-gen. *Ischnopoda* Thoms.) 4
Sprieten vrij kort, het derde lid korter dan het tweede, de voorlaatste leedjes duidelijk verbreed (Sub-gen. *Cathysa* Muls. & Rey). Voorlijf uiterst dicht en fijn-, het achterlijf nagenoeg even dicht en zeer fijn bestippeld. Zwart, eenigszins blauwachtig, vooral op kop en halsschild, door de vrij dichte, fijne, grauwe beharing, zijdeglanzig. Sprieten bruin met geelrooden wortel. Kop aan de basis diep ingesnoerd. Halsschild smaller dan de dekschilden, iets langer dan breed, naar de basis iets versmald, met eene duidelijke basaalgroef. Dekschilden met parallelle zijden. De tergieten aan de basis in de breedte ingedrukt. Pooten donkerbruin, de knieën en tarsen geelachtig; dikwerf ook de schenen min of meer geelachtig. Lengte 2½ mm. Zeer zeldzaam, langs oevers van rivieren en vaarten. Zutphen, Breda, Den Haag, Arnhem, Roermond, Houthem en Valkenburg. In de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf 3. *scitula* Er.
- 4 Lichaam zwart, gewoonlijk met geringen metaal- of blauwachtigen weerschijn 5
Lichaam geelrood of licht geelbruin, nagenoeg dof, de kop en een ring voor het uiteinde van het achterlijf zwartachtig, de dekschilden om het schildje en in de achterhoeken veelal bruinachtig, de sprieten naar het uiteinde roodbruin. Het voorlijf uiterst fijn en dicht bestippeld en vrij kort, neerliggend, geelachtig behaard. Halsschild met eene langsgroef. Bij het ♂ is de kop in 't midden gegroefd; ook steekt het zesde sterniet iets uit en is afgerond. Lengte 4 mm. Niet inl. Zij zou in Westfalen gevangen zijn . . (exarata Er.)
- 5 Het vijfde spriedlid even lang als het vierde, het zesde en zevende duidelijk langer dan breed, het achtste tot tiende nagenoeg even lang als breed. Het voorlijf uiterst dicht en fijn-, ook het achterlijf fijn en nagenoeg even dicht bestippeld. Bovenzijde zwart, met blauwachtigen weerschijn, dicht, fijn grauwbrown behaard. Sprieten krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde iets verdikt, iets langer dan kop en halsschild te zamen, zwartachtig of donker roodbruin. De kop aan de basis sterk ingesnoerd. Halsschild even lang als breed, duidelijk smaller dan de dekschilden, naar de basis iets versmald, met eene, vooral naar de basis vrij diepe, middengroef. Dekschilden ½ langer dan het halsschild. Achterlijf met nagenoeg parallelle zijden, de eerste tergieten aan de basis in de breedte ingedrukt. Pooten zwart, het uiteinde der schenen en de tarsen geel. Bij het ♂ is het zesde sterniet sterk uitgetrokken, bij het ♀ in 't midden diep driehoekig uitgesneden. Lengte 3—4 mm. Langs rivieroevers. Niet inl. Zij zou in Westfalen en bij Hamburg voorkomen (flavitaris Sahlb., chalybaea Er.) (*leucopus* Mrsh.)
- Het vijfde spriedlid iets langer dan het vierde, het vijfde en zesde ongeveer 1½ maal zoo lang als breed, het zevende tot tiende duidelijk langer dan breed. De sprieten overschrijden aanmerkelijk de basis van het halsschild. Bovenzijde grauwbrown, iets of wat bronsglanzig,

uiterst dicht en fijn bestippeld. Sprieten pekkruin met lichteren wortel. Kop van achteren ingesnoerd. Halsschild iets langer dan breed. Dekschilden naar verhouding minder breed dan bij *leucopus*. Achterlijf met nagenoeg parallele zijden. Pooten roodgeel, de dijen brainachtig. Sexueel verschil als bij *leucopus*. Lengte 3 mm. Niet zeldzaam langs oevers van rivieren en kanalen. In Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg gevangen.

2. *umbratica* Er.

6 Achterlijf geheel zwart of aan de basis bruin of roodbruin 7

De eerste twee of drie achterlijfsringen helder geelrood (Sub-gen. *Caliusa* Muls. & Rey). Bovenzijde overigens zwart of pekkruin, het voorlijf vrij dicht en fijn-, het achterlijf weinig en zeer verspreid bestippeld. Halsschild met een duidelijk basaalgroefje. Sprieten roodbruin, met iets lichteren wortel; de schenen veelal geelachtig. Bij het ♂ steekt het zesde sterniet stomp uit. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Vele exemplaren bij Houthem (Limburg) langs de Geul, in Juni en Juli. In de Rijnprov. bij Aken 6. *balteata* Er.

7 Het derde onbedekt tergiet even lang of nagenoeg even lang als de twee volgende te zamen. Vooral in 't oog vallend door het van voren zeer sterk ingesnoerd achterlijf. Tamelijk glanzig, zwart of pekkruin, op het voorlijf veelal met geringen bronzen weerschijn, de dekschilden veelal bruin, de eerste twee onbedekte tergieten soms roodbruin. Sprietwortel en pooten roodgeel. Voorlijf dicht en fijn bestippeld en lijn behaard. Bij het ♂ zijn de voorlaatste sprietleedjes nauwelijks langer dan breed, bij het ♀ iets verbreed. Halsschild iets langer dan breed, naar de basis iets versmald, met een ondiep basaalgroefje. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, eenigszins buikig en naar het uiteinde iets versmald. De eerste tergieten weinig-, die naar het uiteinde vrij dicht en duidelijk bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet afgerond en verlengd, bij het ♀ aan het uiteinde uitgerand en niet verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Langs rivieren en vaarten op slib en dood riet. Hillegom, Rotterdam, Zutphen, Houthem en Eysden nabij Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken, Creld en Düsseldorf. 4. *constricta* Er.

Het derde onbedekt tergiet veel korter dan de twee volgende te zamen. Zwart, op het voorlijf soms met geringen blauwachtigen weerschijn, veelal ook over de gehele bovenzijde levendig blauw-glanzig (ab.c. *cyanea* Kr.). Sprieten pekkruin of roodbruin met lichtere tarsen. Deze soort is krachtiger gebouwd dan *constricta*, het achterlijf aan de basis iets minder sterk versmald. Voorlijf uiterst dicht en lijn-, het achterlijf iets minder dicht en lijn bestippeld. Halsschild een weinig smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, naar de basis iets versmald, met een zeer onduidelijk dwarsgroefje. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, eenigszins buikig. Bij het ♂ is het zesde sterniet afgerond en uitgetrokken. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Niet zeldzaam. Langs oevers op slib en zand, vooral langs duinplassen, waar de ab.c. *cyanea* het meest voorkomt 5. *coarctata* Er.

Borboropora Kraatz.

Dit genus herinnert in habitus aan *Falagria*. De voorkaken zijn veel slanker en steken meer vooruit, de rechter voorkaak vertoont aan den binnenrand, achter het midden, een grooten, krachtigen tand en aan de basis daarvan nog een klein tandje; de linker voorkaak is aan de basis sterk verbreed en dan plotseling naar binnen gekromd, aan de binnenzijde ongetand. Kop breed vierhoekig, met een dunnen hals; het voorhoofd met eene diepe, van achteren afgekorte, langsgroef. Liptasters 3-ledig, het tweede lid zeer kort en veel dunner dan het eerste, doch duidelijk van dit gescheiden, het derde is nagenoeg even lang als het eerste, nauwelijks half zoo dik en aan het uiteinde iets dunner. Pooten iets korter dan bij *Falagria*, de voortarsen 4-, de middel- en achtertarsen 5-ledig.

Van de twee (?) Europeesche soorten komt één in het aangrenzend gebied voor.

Glanzig pekkruin, op het voorlijf grijs behaard. Dekschilden en pooten geelbruin. Kop zeer groot, vlak, breed vierhoekig, aan den achterrand uitgebogen. Voorhoofd met eene diepe, korte, gladde langsgroef. Halsschild smaller dan de kop en de dekschilden, voor het schildje met een breeden, aan weerszijden dieperen dwarsindruk en bovendien met een oppervlak-kigen langsindruk. Achterlijf gelijkmatig dicht en duidelijk bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Bij Ahrweiler in de Rijnprov. In half verdroogden mest en aan eene doode pad. Niet inlandsch. Mij onbekend (Kraatzii Fuss.)

29. Falagria Mannerh.

Dit genus onderscheidt zich vooral door den grooten, uitstekenden kop, welke aan de basis tot een dunnen, korten, steelvormigen hals ingesnoerd is; het meer of minder hartvormig, naar achteren sterk versmald en geteeld halsschild; het vóór de voorcoxae duidelijk ontwikkeld prosternum en het lange eerste lid der achtertarsen. De voorakken steken weinig uit, de eene vertoont in het midden, aan de binnenzijde, slechts een klein tandje, de andere is ongetand. Pooten vrij lang, de voortarsen 4-ledig, de middel- en achtertarsen 5-ledig. — De metamorphose van *F. sulcata* is door E. Heeger beschreven. — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen onder steenen, plantenafval, dorre bladeren en soms bij mieren.

Van de 12 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Halsschild aan de basis en aan de zijden lijn gerand 2

Halsschild aan de basis en aan de zijden niet gerand. Schildje zonder langsgroef. Halsschild met zwak aangeduide middengroef. Het zichtbare gedeelte van het mesonotum voor het schildje vertoont een langsgroefje 1) (Sub-gen. *Cardiola* Muls.). Halsschild lijn en verspreid bestippeld, de verdiepte middellijn op de voorhelft duidelijker, bij het ♂ breeder en dieper dan bij het ♀. Lichaam bruinrood, met donkeren kop en donker uiteinde van het achterlijf, glanzig. Dekschilden breeder dan het halsschild, te zamen breeder dan lang, zeer fijn bestippeld. Achterlijf dicht en krachtiger bestippeld. Pooten geelachtig of geelbruin. Lengte $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen onder afgevallen bladeren, dood riet, bij *Formica brunnea* en onder steenen. 5. *obscura* Grav.

- 2 Schildje met twee tot aan het uiteinde reikende langskielen, die eene langsgroef insluiten. Halsschild met eene zeer diepe middengroef (Sub-gen. *Falagria* isp.). 3

Schildje zonder langsgroef (Sub-gen. *Anaulacaspis* Ganglb.) 4

- 3 Dekschilden te zamen even lang als breed, slechts iets langer dan het halsschild. De bovenzijde van het lichaam zeer fijn en vrij dicht bestippeld. Sprietten roodbruinachtig, de pooten roodachtig. Lichaam pekwart of pekbruin, glanzig, lijn behaard. Halsschild naar de basis sterk versmald. Lengte $2\frac{1}{4}$ mm. Niet zeldzaam onder dood riet en rottende bladeren.

1. *sulcata* Payk.

Dekschilden te zamen breeder dan lang. De bovenzijde van het lichaam is zeer onduidelijk, lijn en zeer verspreid bestippeld. Sprietwortel en pooten roodgeel. Lichaam pekwart, pekbruin of roodbruin, de dekschilden soms meer geelachtig. Deze soort gelijkt overigens zeer op *sulcata*, doch is iets kleiner en slanker. Lengte 2 mm. Terzelfder plaatse als *sulcata*, doch minder gemeen 2. *sulcatula* Grav.

- 4 Halsschild naar achteren sterk versmald, met eene langsgroef, welke naar achteren dieper en breeder wordt en in een basaalgroefje eindigt. Bovenzijde donker bruinrood, het halsschild lichtrood, glanzig, onduidelijk bestippeld. Sprietwortel en pooten geelachtig. Dekschilden iets langer dan het halsschild, te zamen nagenoeg even lang als breed, uiterst dicht en lijn bestippeld. Achterlijf veelal bruin of roodbruin, soms bijna pekwart, tamelijk lijn en dicht bestippeld. Lengte $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. In paddestoelen, vooral in het voor- en najaar; ook onder mos en langs duinplassen tusschen plantenwortels 3. *thoracica* Curt.

Halsschild met eene onduidelijke middengroef, naar achteren minder sterk versmald, vrij krachtig en dicht bestippeld, met een basaalgroefje, waaruit bij het ♂ eene meer duidelijke, doch fijne langsgroef ontspringt. Bovenzijde zwart, de dekschilden naar het uiteinde soms bruinachtig, niet sterk glanzig. Sprietten donkerbruin. Pooten lichter of donkerder geelachtig. Dekschilden tamelijk verspreid en vrij krachtig, het achterlijf verspreid en lijn bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Bij Maastricht in een leemkuil; bij de Steeg onder dorre beukenbladeren. Ook in België bij Saventhem en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 4. *nigra* Grav.

III. Tribus BOLITOCCHARINI.

30. Autalia Mannerh.

Kop cirkelrond, van achteren zeer sterk halsvormig ingesnoerd, de hals nauwelijks $\frac{1}{5}$ van de breedte van den kop innemend, de slapen lang, op de onderzijde ongerand.

1) Om dit duidelijk te zien moet het halsschild losgemaakt worden.

Bovenlip halfeirkelvormig. Voorkaken vrij kort, de eene in 't midden van den binnenrand met een zeer klein tandje. Tong zeer lang en smal, tot aan het midden van het eindlid der lipstasters reikend, aan het uiteinde in twee zeer dunne takken gespleten, welke zelf weder dichotomisch verdeeld zijn. Halsschild naar voren aanmerkelijk versmald, veel smaller dan de dekschilden, op de achterhelft met twee diepe, ongeveer tot aan het midden reikende, van achteren door eene dwarsgroef verbonden, naar voren iets divergeerende langsgroeven, bovendien met drie basaal-groeffjes. Prosternum vóór de voorcoxae minstens half zoo lang als breed. Pooten slank, de voor- en middeltarsen 4-, de achtertarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus, welke in habitus aan die van het genus *Euplectus* onder de *Pselaphidae* herinneren, leven in paddestoelen, rottende plantenstoffen en onder drogen koemest.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halsschild met eene zwak aangeduide, slechts van voren duidelijke middengroef, aan weerszijden daarvan met een iets scheef staand langsgroeffje en een zwak aangeduiden dwarsindruk aan de basis, welke aan weerszijden in een duidelijk groeffje eindigt. Bovenzijde rood, de dekschilden donkerder, de kop en grootendeels het uiteinde van het achterlijf zwart; glanzig, fijn bestippeld, fijn en dun behaard. Sprietwortel en pooten geelrood. Dekschilden zeer onduidelijk bestippeld, elk aan de basis met twee kielvormige langsplooien. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Gemeen in paddestoelen, vooral in het voor- en najaar . . . 1. *impressa* Oliv.

De middengroef van het halsschild reikt nagenoeg tot aan de basis; aan weerszijden daarvan met een diep ovaal groeffje en met rondachtige zijgroeffjes aan de basis. Bovenzijde glanzig zwart, dun en fijn behaard, soms de dekschilden iets roodbruinachtig. Spriet en donkerbruin, de pooten meer roodachtig. De langsplooien aan de basis der dekschilden iets meer aangeduid dan bij *impressa*. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Vooral in drogen koemest, achter schors, onder steenen en bij mieren. Zij zwermt op warme voorjaars-avonden en na een onweder.

2. *rivularis* Grav.

31. Bolitochara Mannerh.

Kop vooruitstekend, van achteren halsvormig ingesnoerd, de slapen aan de onderzijde gerand. Bovenlip naar voren verbreed, aan den voorrand afgeknot of flauw uitgerand. Tong gespleten. Lipstasters 3-ledig, het tweede lid korter en smaller dan het eerste. Spriet en matig lang, naar het uiteinde geleidelijk verdikt, de eerste 3 leedjes zeer lang, de volgende geleidelijk iets breder wordend. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, van het midden naar voren vrij sterk versmald, aan de zijden en aan de basis duidelijk gerand, de zijrandlijn van voren sterk opwaarts gekromd, de epipleuren, van terzijde gezien, als een driehoekig vlak min of meer zichtbaar. Dekschilden met duidelijk uitpuilende schouders, binnen de achterhoeken uitgerand. Mesosternum gekield. Pooten lang en slank, de voor- en middeltarsen 4-, de achtertarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven in paddestoelen en boomzwammen.

Van de 9 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Kop naar achteren zeer sterk versmald en ingesnoerd, het halsvormige gedeelte smaller dan de helft van den kop, achter den schedel niet gerand, de zijlijsten van den kop naar voren, dicht achter den buitenrand der achterkaaksgroef, duidelijk, naar achteren nauwelijks aangeduid of geheel verdwenen, aan de basis van den kop wederom duidelijker. Halsschild naar voren sterker versmald dan naar achteren, met een basaal-groeffje. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, vrij grof bestippeld, bij het ♂ op de achterhelft, langs den naad, met eene kielvormige langsplooi. Spriet en roodbruin, aan den wortel en aan het uiteinde geel, de voorlaatste leedjes verbreed. Bovenzijde glanzig, geelachtig behaard, rood, de dekschilden om het schildje, eene groote vlek aan de buitenhoeken, benevens een dwarsband voor het uiteinde van het achterlijf zwart. Bij het ♂ het vijfde onbedekt tergiet met eene kielvormige verhevenheid, het zesde met eene zwakke middenkiel. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. Zij zou bij Aken gevangen zijn. (Lucida Grav.)

Kop veel minder ingesnoerd, het halsvormige gedeelte breder dan de helft van den kop, achter den schedel gerand, de zijlijsten over de geheele lengte, van voren naar achteren, duidelijk 2

- 2 Sprieten aan de basis en aan het uiteinde geel. Achterlijf rood, voor het uiteinde zwart. Halsschild geheel geelrood, de dekschilden nabij de buiten-tophoeken met eene groote zwarte vlek, welke zich soms tot aan het schildje uitbreidt. Het vijfde onbedekt tergiet bij het ♂ met eene kielvormige verhevenheid 3
- Sprieten slechts aan de basis roodgeel. Kop en achterlijf zwart, de eerste ringen roestkleurig gerand. Halsschild bruin, meestal met iets lichter gekleurde randen, soms geheel rood. Dekschilden geel of roodachtig, gewoonlijk met eene meer of minder groote vlek achter het schildje en eene groote vlek nabij de buiten-tophoeken, zwart. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet geen langskiel, slechts is het grof en verspreid korrelig en vertoont veelal een iets grooter spits bultje in het midden. Lichaam smaller dan bij *lunulata*, het halsschild naar voren iets minder versmald, duidelijk en dicht bestippeld, met een duidelijk basaalgroefje. Dekschilden dicht en sterk-, het achterlijf lijn en verspreid bestippeld. Pooten geelachtig. Lengte 3 mm. In boomzwammen. Niet inlandsch. In Duitschland. (*obliqua* Er.)
- 3 Halsschild lijn bestippeld. Dekschilden bij het ♂ nabij het uiteinde, langs den naad, met een langsbultje, naast het schildje niet bultig opgericht. Lichaam geelrood, de kop en een deel der dekschilden zwartachtig. Sprieten roodbruin, de eerste 3 leedjes en het uiteinde roodgeel. Halsschild dicht en tamelijk lijn bestippeld, met een duidelijk basaalgroefje. Dekschilden dicht en krachtig bestippeld; de zwarte kleur der achterhoeken breidt zich niet zelden uit tot aan het schildje, waardoor slechts eene gele schoudervlek overblijft. Achterlijf verspreid en grof bestippeld, met een zwarten dwarsband voor het uiteinde. Pooten geel. Het ♂ met eene duidelijke langskiel op het midden van het vijfde onbedekt tergiet. Lengte $3\frac{1}{2}$ – $3\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen in paddestoelen, vooral in dennenbosschen. Zij overwintert onder mos.

1. *lunulata* Payk.

Halsschild grof bestippeld. Dekschilden bij het ♂ nabij het uiteinde, langs den naad, met een minder scherp aangeduid langsbultje, of wel ontbreekt dit geheel; slechts zijn zij achter het schildje, langs den naad, eenigszins bultig opgezet. Deze soort gelijk overigens zeer op *lunulata*, doch is iets kleiner, meer rood gekleurd en met diechter en krachtiger bestippeld voorlijf. Op de dekschilden is gewoonlijk slechts de buiten-tophoek, zeldzamer ook het schildje zwartachtig. Achterlijf met een zwarten dwarsband voor het uiteinde. Pooten roodgeel. Het ♂ met eene scherp aangeduide langskiel op het vijfde onbedekt tergiet. Lengte $2\frac{1}{2}$ – $2\frac{3}{4}$ mm. In zwammen aan boomstronken. In groot aantal bij Gronsveld en Valkenburg (Limburg), Juli. Ook bij Winterswijk, Juli 2. *bella* Märk.

Phymatura J. Sahlb.

Dit genus is naverwant aan Bolitochara, doch onderscheidt zich door den niet vooruitstekenden, met het achtergedeelte in het halsschild teruggetrokken kop en door het anders gevormde halsschild, dat slechts weinig smaller dan de dekschilden en naar voren slechts matig afgerond-versmald is; ook is de zijrandlijn van het halsschild van voren niet beneedenwaarts gekromd, doch loopt recht, door. De epipleuren van het halsschild, van terzijde gezien, niet zichtbaar. In habitus aan Silusa herinnerend. De enige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam pekswart, vrij lang en vrij dicht grauw behaard, de zijden van het halsschild gewoonlijk roodbruin, de dekschilden rood- of geelbruin, met eene groote zwartachtige vlek voor de achterhoeken, veelal ook aan het schildje zwartachtig, de achterrand der eerste onbedekte tergiten en het uiteinde van het achterlijf gewoonlijk roodbruin. Sprieten geheel of minstens aan den wortel en aan het uiteinde, benevens de pooten roodgeel. Sprieten vrij kort, naar het uiteinde sterk verdikt, het eindlid groot, stomp eivormig. Halsschild aan weerszijden van de basis uitgebogen, met tamelijk rechte achterhoeken, met een dwarsindruk aan de basis, dicht en matig lijn bestippeld. Dekschilden langer dan het halsschild, iets sterker, dichter en ruw bestippeld. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet in 't midden voor den achterrand, een klein bultje. Lengte $2\frac{1}{2}$ – $2\frac{3}{4}$ mm. In paddestoelen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Elberfeld (*brevicollis* Kraatz)

Heterota Muls. et Rey.

Dit genus herinnert in habitus aan Atheta (Alianta) incana. Bovenlip meer dan dubbel zoo breed als lang, van voren zeer flauw uitgerand. Voorkaken met scherp naar binnen gekromden top, de eene in het midden van den binnenrand met een tandje. De binnenste lob der achterkaken van buiten hoornachtig, van binnen rliezig,

aan den binnenrand, naar het uiteinde, met eenige geleidelijk korter wordende tandjes bezet, daarachter op het vliezige gedeelte lang en fijn behaard. De tong niet gespleten, nagenoeg tot aan het uiteinde van het tweede liptaster-lid reikend, welk lid van het eerste liptaster-lid zeer onduidelijk gescheiden is. De paraglossen steken ver uit. Sprieten en pooten matig lang en slank. De voor- en middel-tarsen 4-, de achter-tarsen 5-ledig; het eerste lid der achter-tarsen iets korter dan de twee volgende ledjes te zamen.

De eenige Europeesche soort leeft langs de zeekust.

Lichaam dof zwart, met geringen loodglans, fijn en dicht grauw behaard. Sprieten pekbruin of donker roodbruin, de pooten lichter roodbruin met roodgele knieën en tarsen of geheel rood-geel. Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, ongeveer $\frac{1}{2}$ breeder dan lang, met een zwakken basaalindruk, uiterst fijn gechagrineerd, veel fijner en minder dicht bestippeld dan de kop. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, uiterst fijn gechagrineerd en zeer fijn en dicht bestippeld. Achterlijf minder dof en minder dicht behaard dan het voorlijf, uiterst fijn en dicht bestippeld. Lengte 3 mm. Langs de Engelsche kust op kalkbodem onder zee-gras. Wellicht langs onze kust aan te treffen. (plumbea Waterh.)

Tachyusida Muls. et Rey.

Dit genus komt in bouw der monddeelen met *Leptusa* overeen, doch onderscheidt zich door de lange, slanke pooten en vooral door het langgestrekte eerste lid der middel- en achter-tarsen, van welke dat der achter-tarsen even lang is als de 3 volgende ledjes te zamen; zoo ook door de langere, slankere sprieten en het veel slankere lichaam. Kop aan de basis iets versmald. De omgeslagen zijden van het halsschild breed, van terzijde gezien, zichtbaar. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, sterk uitgebogen. Mesosternaal-voortzetting van achteren toegespitst.

De eenige Europeesche soort leeft in mofm van oude boomen.

Lichaam slank, de bovenzijde geelrood, weinig glanzig, fijn geelachtig behaard, de kop, de buiten-tophoeken der dekschilden en het achterlijf voor het uiteinde pekbruin. Halsschild naar achteren merkelyk versmald, met eene duidelijke middengroef en rechte achterhoeken. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild en krachtiger bestippeld. Achterlijf uiterst dicht en en fijn bestippeld. Bij het ♂ het vijfde onbedekt tergiet in het midden met eene korte, van achteren scherp uitlopende middenkiel. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Achter dennenschors en in oude boomstronken. Niet inlandsch. Bij Crefeld in de Rijnprov. (gracilis Er.)

32. Euryusa Erichs.

Lichaam tamelijk breed, zwak gewelfd. Kop van achteren zeer weinig versmald, niet ingesnoerd, de slapen, ver onder de oogen, duidelyk gerand. Boventip aan de voorzijde iets uitgerand. De binnenste achterkaaks-lob nagenoeg geheel hoornachtig, aan den binnenrand matig dicht met vrij lange gekromde tandjes bezet, welke, naar den naar binnen gebogen top, geleidelijk in lengte afnemen, daarachter fijn en niet dicht behaard. De tong niet gespleten en niet of slechts weinig langer dan het eerste liptaster-lid; het tweede liptaster-lid even lang en nagenoeg even dik als het eerste; het eindlid duidelyk smaller dan het tweede, alle 3 duidelyk van elkaar gescheiden. De paraglossen steken nauwelijks uit. Sprieten en pooten matig lang en slank. Halsschild kort en breed, breeder of minstens even breed als de dekschilden, aan de zijden gelijkmatig afgerond of veel naar voren iets meer afgerond en versmald dan naar achteren, de zijrand iets naar onderen gebogen, de omgeslagen zijden breed, van terzijde gezien, nauwelijks zichtbaar. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, diep uitgerand. De eerste drie onbedekte tergieten aan de basis in de breedte ingedrukt. Mesosternaal-voortzetting toegespitst. Pooten tamelijk slank, het eerste lid der achter-tarsen nagenoeg even lang als de twee volgende ledjes te zamen. — De soorten van dit genus leven in boommofm, vooral van oude eiken, bij *Lasius brunneus*; zij worden door de mieren vijandig bejegend en vervolgd. Hoe zij zich voeden schijnt nog niet te zijn uitgemaakt.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halsschild nagenoeg even breed als of slechts iets breeder dan de dekschilden, naar voren en naar achteren iets versmald, de basis aan weerszijden naast de achterhoeken nauw uitgerand en daardoor de achterhoeken eenigszins stomp, dicht en duidelijk-, eenigszins dwarsrimpelig bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, iets krachtiger-, doch minder dicht bestippeld; aan den achterrand, nabij de buitenhoeken, uitgerand. Deze soort is langer en smaller dan *sinuata*, roodbruin, doch ook veelal iets lichter gekleurd, meer geelachtig-roodbruin, de kop en de dekschilden aan de basis donkerder. Achterlijf voor het geelroode uiteinde glanzig pekwart. Pooten geel- of roodachtig. Sprietten iets slanker, het uiteinde zelden lichter gekleurd. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet eene kleine kielvormige verhevenheid. Lengte 3 mm. Deze soort zou hoofdzakelijk leven in de nesten van *Lasius brunneus* en soms ook bij *Lasius niger* en *fuliginosus*. Eenmaal bij Valkenburg, Juli. Ook bij Aken, Cleef en Düsseldorf in de Rijnprov. en bij Humbeek in België. (laticollis Heer, linearis Märk.) 1. **optabilis** Heer.

Halsschild zeer duidelijk breeder dan de dekschilden, meer dan dubbel zoo breed als lang, met breed afgezetten, vlakken zijrand, naar voren versmald, aan weerszijden, nabij de achterhoeken, iets uitgerand, bij het ♂ de achterhoeken recht, bij het ♀ meer afgerond. Lichaam vlak en breed, licht roodbruin; het achterlijf voor het uiteinde pekbruin, lijn geelachtig neerliggend behaard, eenigszins vetglanzig. Sprietten vrij kort, krachtig ontwikkeld, het laatste lid vrij groot, geleidelijk toegespitst, evenals de wortelceeljes lichter gekleurd. Kop en halsschild dicht en lijn bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild, iets sterker bestippeld; aan den achterrand, naast de buitenhoeken, iets uitgerand. Achterlijf vrij lang geelachtig behaard, de eerste tergieten dicht bestippeld, de volgende bijna onbestippeld en sterk glanzig. Pooten roodgeel. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet in het midden eene kleine kielvormige verhevenheid. Lengte 2½ mm. In de nesten van *Lasius brunneus*. Zij zou ook achter eikenschors en in boomholm gevonden zijn. Bij Aalbeek en Gronsvelt (Limburg). Ook bij Crefeld en Düsseldorf in de Rijnprov. (coarctata Märk.) 2. **sinuata** Er.

33. Leptusa Kraatz.

Kop aan de basis niet ingesnoerd. Sprietten vrij kort, naar het uiteinde meer of minder verdikt. Bovenlip aan den voorrand nauwelijks uitgebogen. De binnenste lob der achterkaken nagenoeg geheel hoornachtig, aan den binnenrand matig dicht bezet met vrij lange, gekromde tandjes, welke naar den, naar binnen gebogen, top geleidelijk in lengte afnemen, daarachter fijn en niet dicht behaard. De tong niet gespleten, niet of slechts weinig langer dan het eerste lid der liptasters; de paraglossen steken nauwelijks uit. Liptasters 3-ledig, het tweede lid even lang en weinig of niet smaller dan het eerste. Halsschild smaller of hoogstens even breed als de dekschilden, naar de basis gewoonlijk versmald, de zijrand van voren sterk benedenwaarts gericht, de omgeslagen zijden, van terzijde gezien, zeer duidelijk zichtbaar. De dekschilden langer, even lang als of korter dan het halsschild, met parallelle zijden of naar het uiteinde verbreed. De voortzetting van het mesosternum van achteren toegespitst, de middelboxae van achteren duidelijk gescheiden of nagenoeg geheel tegen elkaar aanstootend. Pooten vrij slank, de voor- en middeltarsen 4-, de achtertarsen 5 ledig, het eerste lid der achtertarsen even lang als of korter dan de twee volgende ledjes te zamen. De vleugels zijn alleen bij het sub-genus *Leptusa* *isp.* ontwikkeld. De larve en de pop van *L. angusta* zijn door Perris, de larve van *L. haemorrhoidalis* door Fautel beschreven. — De soorten van dit genus leven vooral achter boomschors, enkele in Oostelijk en Zuidelijk Europa levende soorten onder mos, dorre bladeren en steenen.

Van de ± 70 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

1 Achterlijf naar achteren niet verbreed. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild (Sub-gen. *Leptusa* *isp.*). 2

Achterlijf naar achteren meer of minder verbreed. Dekschilden nauwelijks langer dan het halsschild (Sub-gen. *Pachygluta* Thoms.). Glanzig pekwart, zeer in 't oog vallend door het roode halsschild. Sprietten roodbruin. Kop even breed als het halsschild. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, de helft breeder dan lang, naar achteren duidelijk versmald, met een basaalgroefje, hetwelk soms in eene onduidelijke langsgroef overgaat, niet zeer dicht bestippeld. Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild, niet zeer dicht, doch vrij

sterk bestippeld, pekbruin of pekwart. Achterlijf aan de basis soms bruinachtig, aan het uiteinde steeds roodachtig, de eerste tergiten verspreid bestippeld, de volgende geheel onbestippeld. Bij het ♂ zijn de dekschilden langs den naad sterk kielvormig opgericht en vertoont het vijfde onbedekt tergiet op het midden eene meer of minder duidelijke, kielvormige verhevenheid. Lengte $1\frac{3}{4}$ —2 mm. Achter boomschors, vooral van den aborn, in beukenmolen en in mos van eiken en berken. Eenmaal een ♂ bij den Haag. Ook in België en in de Rijnprov. bij Aken, Cleef en Crefeld. 1. *ruficollis* Er.

- 2 Bovenzijde donker roodbruin, de kop en een hand op het achterlijf meer zwartachtig. Het vijfde onbedekt tergiet bij het ♂ vertoont eene langskiel. Lichaam smal, cilindervormig, lijn, doch niet zeer dicht behaard. Sprieten roodbruin, naar het uiteinde iets verdikt, het eindlid langer dan breed, toegespitst, het derde lid niet dunner dan het tweede. Kop iets smaller dan het halsschild. Halsschild nagenoeg even breed als de dekschilden, ongeveer de helft breeder dan lang, met geringe aanduiding van eene langsgroef. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, dicht en duidelijk bestippeld. De eerste tergiten iets dichter bestippeld dan die naar het uiteinde. Pooten roodachtig-geel. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2½ mm. Deze soort leeft achter losse beukenschors, soms in aantal. Volgens *Perris* leeft de larve in de gangen van *Tomicus laricis*. Niet inl. In geheel Duitschland, o. a. bij Elberfeld. (anal. Gylh.) (*angusta* Aubé)

Bovenzijde zwartbruin, met roodachtig uiteinde van het achterlijf. Sprieten naar het uiteinde iets verdikt, het derde lid iets dunner dan het tweede. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet in het midden een klein bultje. Deze soort is iets kleiner, korter en meer gedrongen dan *angusta*; glanziger en zeer lijn behaard. Sprieten bruin met geelachtigen wortel. Kop iets smaller dan het halsschild. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, de helft breeder dan lang, met een onduidelijk basaalgroefje, lijn en dicht bestippeld. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, vrij grof en dicht bestippeld. Achterlijf tamelijk glanzig, de eerste tergiten dicht, de volgende veel meer verspreid bestippeld. Pooten geel. Lengte 2—2½ mm. Levenswijze als van *angusta*. De larven leven in aantal bijeen van Mei tot Juli, achter schors van geveldde beuken, in de gangen van *Cerylon deplanatum*. Niet inl. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (*lunida* Er.) (*haemorrhoidalis* Heer)

34. *Phytosus* Curtis.

Dit genus komt in *habitus* met *Leptusa* overeen, doch onderscheidt zich vooral door de aan den buitenrand sterk gedoornde voor- en middelschenen, welke daardoor tot graven geschikt zijn. Kop groot en dik, aan de basis niet ingesnoerd. Tong kort, aan het uiteinde zeer flauw uitgerand. De paraglossen duidelijk toegespitst. Liptasters 3-ledig. De zijrand van het halsschild van voren benedenwaarts gebogen, de omgeslagen zijden, van terzijde gezien, duidelijk zichtbaar. Achterlijf met parallelle zijden of naar het uiteinde iets verbreed, de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt. Prosternum voor de voorcoxae uiterst kort. De voortzetting van het mesosternum kort toegespitst, de middelcoxae raken elkaar aan. De voor- en middel-tarsen 4-, de achter-tarsen 5-ledig. De eerste 4 ledjes der achter-tarsen even lang. — De larve van *P. nigricentris* is door Fauvel beschreven. — De soorten van dit genus leven uitsluitend langs de zee kust onder doode visch, tusschen wier en in de eierklompen van *Buccinum undatum*.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Metasternum zeer kort. De episternen van den metathorax naar achteren verbreed. Dekschilden veel korter dan het halsschild. Halsschild, de dekschilden, alsook de sprieten en pooten geel. De kop iets donkerder, het achterlijf gedeeltelijk zwart of berookt. De mannetjes zijn wat kleiner, smaller en iets donkerder gekleurd. Ongeveugeld (Subgen. *Actosus* Muls.) 2
- Metasternum iets langer. De episternen van den metathorax met parallelle zijden. Dekschilden iets langer dan het halsschild (Sub-gen. *Phytosus* isp.). Lichaam dof zwart, dicht grijs behaard, zeer dicht en lijn bestippeld. Halsschild naar achteren duidelijk versmald, over het midden met eene langsgroef. Dekschilden naar het uiteinde roodbruinachtig. Geveugeld. Sprieten en pooten geelbruin, de dijen donkerder. Bij het ♂ is het vijfde sterniet aan het uiteinde uitgerand en steekt het zesde stomphoekig uit. Lengte 2—2½ mm. Langs de stranden met balticus 2. *spinifer* Curtis.
- 2 Dekschilden even breed als het halsschild, te zamen dubbel zoo breed als lang. De vijfde en zesde achterlijfsring geheel, de zevende alleen op de voorhelft zwart. Lichaam doorgaans

langer en breeder dan bij *balticus*, dof. De kop slechts van achteren berookt. Halsschild naar achteren sterk versmald, met eenigszins stompe achterhoeken en duidelijke middengroef, bijna onmerkbaar bestippeld. Dekschilden aan het uiteinde iets verbreed, ongeveer half zoo lang, doch even breed als het halsschild, dicht en fijn bestippeld, aan het uiteinde gemeenschappelijk uitgerand. Achterlijf naar het uiteinde duidelijk verbreed, zeer fijn bestippeld, elk tergiet aan de basis in de breedte ingedrukt. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet incl. Langs de Fransche kust (nigri-ventris Chevrol.)

Dekschilden smaller dan het halsschild, te zamen niet dubbel zoo breed als lang. Achterlijf grootendeels berookt, aan de basis en aan het uiteinde gewoonlijk iets roodachtig, doch nimmer met een scherp begrensden zwarten band. Lichaam zeer smal, roodachtig-geel behaard. Kop geheel berookt, vooral op de zijden. Dekschilden met parallele zijden, het $\frac{1}{2}$ van de lengte van het halsschild. Achterlijf glanzig, sterk bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 mm. Geene langs de stranden onder rotte visch, in de eierklumpen van *Buccinum undatum* en in zandkuiltjes. 1. *balticus* Kr.

35. *Arena* Fauvel.

Dit genus is naverwant aan Phytosus. De tong is verlengd en niet uitgerand, de paraglossen steken bijna niet uit, de liptasters zijn 3-ledig, met even lange leedjes, van welke de eerste twee vergroeid zijn. Alle schenen lang en dicht bezwimpeld; de voor- en middeltarsen 4-, de achtertarsen 5-ledig, het eerste lid der achtertarsen verlengd, even lang als de twee volgende leedjes te zamen.

De eenige bekende soort leeft langs de zeekust en komt ook in Nederland voor.

Zij gelijkt, vooral in kleur, op *Phytosus balticus*, doch is breeder en plomper; ook heeft zij meer den habitus van eene kleine *Atheta* met parallele zijden. Sprieten, halsschild, dekschilden, uiteinde van achterlijf en pooten roestkleurig, fijn geel behaard. Kop een weinig berookt, achterlijf zwart. Kop groot, aan de zijden duidelijk bestippeld. Halsschild slechts iets breeder dan lang, naar achteren iets versmald, fijn en dicht bestippeld, met stompe, eenigszins afgeronde achterhoeken. Dekschilden korter dan het halsschild, iets grover en minder dicht bestippeld. Achterlijf sterker doch meer verspreid bestippeld. Lengte 2 mm. Een paar maal op het strand te Scheveningen, in Maart en April, in zandkuiltjes.

1. *Octavii* Fauvel.

36. *Silusa* Erichs

Lichaam tamelijk gewelfd, iets aan Aleochara herinnerend. De kop met het achtergedeelte in het halsschild gedoken, de slapen op de onderzijde scherp gerand. Boventip vrij groot, nagenoeg dubbel zoo breed als lang, aan den voorrand niet of slechts zeer zwak uitgerand. Liptasters 2-ledig, zeer lang gestrekt en vooruitstekend, stijf, borstelachtig; de tong zeer smal, onverdeeld, naar het uiteinde min of meer versmald. De voortzetting van het mesosternum toegespitst. De voor- en middeltarsen 4-, de achtertarsen 5-ledig, de eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen even lang, aan de achtertarsen de eerste 4 leedjes nagenoeg even lang of in lengte geleidelijk iets afnemend. — De soorten van dit genus leven aan uitleciende boomsappen, achter boomschors en in paddestoelen.

Van de Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halsschild met scherp aangeduide of nagenoeg rechte achterhoeken, evenals de kop krachtig bestippeld (Sub-gen. *Stenus* Kraatz). Van de grootte van *rubiginosa*, doch iets smaller en met meer parallele zijden, roestrood, fijn behaard. Kop zwart of donkerbruin, de sprieten roodbruin. Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, naar de basis iets versmald, met stompe achterhoeken. Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild. Kop en halsschild grof, de dekschilden zeer grof en rimpelig bestippeld. Achterlijf verspreid en fijn bestippeld, sterk glanzig, kort voor het uiteinde zwartachtig, het uiteinde zelf roodachtig, de afzonderlijke tergieten aan de basis ingedrukt. Pooten roodbruin. Bij het ♂ zijn de dekschilden op de achterhelft, langs den naad, min of meer bultig opgericht; op het vijfde onbedekt tergiet bevinden zich twee evenwijdige, kielvormige langslijnen. Lengte 3—3½ mm. In paddestoelen, zeldzaam. Naarden, Assen, Vorden, Oirschot, Venlo, St. Pieter, Juli tot Sept. In België bij Heure. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. 1. *rubra* Er.

Halsschild met afgeronde of zeer stompe achterhoeken, evenals de kop tamelijk fijn bestippeld (Sub-gen. *Silusa* isp.). Zwart, tamelijk glanzig, lijn geelachtig behaard. Sprieten lichter of donkerder bruinrood met lichter wortel. Kop en halsschild zwart of donker roodbruin, het halsschild gewoonlijk met lichter gekleurde zijden. Dekschilden rood of roodbruin, aan de buitenhoeken en om het schildje zwartachtig, dicht en vrij sterk, eenigszins rimpelig bestippeld, weinig glanzig; soms is de zwarte teekening weinig aangeduid. Achterlijf glanzig zwart, de eerste ringen roodbruin gerand, soms grootendeels roodbruin, op de rugzijde dicht, naar het uiteinde iets meer verspreid bestippeld. Pooten rood. Halsschild dubbel zoo breed als lang, aan de zijden en van achteren iets afgerond. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Bij het ♂ zijn de dekschilden op het achtergedeelte, langs den naad, iets bultig opgericht en is het vijfde onbedekt tergiet, in 't midden, sterk in de lengte gekield. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam aan uitvloeiende sappen van verschillende boomen. In het voorjaar ook achter wilgenschors, op boomzwammen en onder mos 2. *rubiginosa* Er.

37. *Homalota* Mannerh.

(*Epipeda* Muls. & Rey)

Lichaam met tamelijk parallelle zijden, zeer vlak. De slapen op de onderzijde zijn gerand. Bovenlip van voren iets uitgerand. Het derde kaaktaster-lid vrij sterk knotsvormig verdikt, het dunne priemvormige eindlid ongeveer half zoo lang als het derde. Liptasters vrij kort, 2-ledig, het eerste lid een weinig geknikt en aan de basis verbreed. De tong tamelijk smal, aan het uiteinde gespleten. De voor- en middel-tarsen 4-, de achtertarsen 5-ledig. De eerste 4 leedjes der achtertarsen even lang. De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam dofzwart, met bruine dekschilden. Sprieten iets korter dan kop en halsschild te zamen, donkerbruin met weinig lichter wortel, het eerste lid ongeveer even lang als de twee volgende leedjes te zamen, het vierde lid klein en duidelijk verbreed, het vijfde bijna dubbel zoo breed als het vierde. Kop iets smaller dan het halsschild, nagenoeg vierkant, vrij dicht en diep bestippeld. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, iets breeder dan lang, naar de basis duidelijk versmald, met eene breede langsgroef, even fijn en dicht bestippeld als de dekschilden. Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild. Achterlijf aan het uiteinde meestal bruinachtig, vrij sterk glanzig, de eerste tergieten niet zeer dicht, fijn bestippeld, de laatste geheel onbestippeld. Pooten lichtbruin. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet op 't midden een klein bultje. Voorhoofd en halsschild dieper ingedrukt. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Verbreed achter boomschors, o. a. van populieren.

(*arcana* Muls. & Rey) 1. *plana* Gyll.

38. *Thectura* Thoms.

Dit genus is van Homalota vooral onderscheiden, doordat de slapen op de onderzijde niet gerand zijn. De kaaktasters zijn korter en dikker, het derde lid is zeer sterk verdikt, eenigszins eivormig. Het eerste liptaster-lid is recht en niet aan de basis verbreed. De pooten zijn korter en dikker.

Van de 2 Europeesche soorten komt één in Nederland voor.

Eene kleine, zeer vlakke, smalle soort. Zwart, dekschilden en uiteinde van het achterlijf bruin of roodbruin. Sprietwortel en pooten bruingeel. Onuitgekleurde exemplaren zijn, behalve op den kop en de voorlaatste achterlijfsringen, lichter of donkerder bruinrood of bruingeel. Sprieten duidelijk korter dan kop en halsschild te zamen, naar het uiteinde iets verdikt. Kop groot en breed, min of meer vierhoekig, vrij dicht en lijn bestippeld. Halsschild iets breeder dan lang, naar de basis duidelijk versmald, dicht en lijn bestippeld, met een breeden langsdruk. Dekschilden ongeveer de helft langer dan het halsschild, dicht en lijn bestippeld. De tergieten aan de basis in de breedte iets ingedrukt, de eersten dicht en tamelijk fijn-, de laatste niet bestippeld. Bij het ♂ vertoont het tweede tot vierde onbedekt tergiet elk twee, ver van elkaar staande, glanzige bultjes, en is het zesde onbedekt tergiet in een zeer krachtigen, langen middendoorn en in twee kortere, slanke zijdoornen uitgetrokken. Bij het ♀ het tweede tot vierde onbedekt tergiet zonder bultjes, het zesde, als bij het ♂, in drie doornen uitgetrokken, de middelste doorn is echter korter en eindigt in een haakje. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Gemeen achter boomschors, vooral van dennen. Larve en pop zijn door *Perris* beschreven. De larve leeft in de gangen van *Tomicus laricis* . 1. *cuspidata* Er.

Cyphæa Fauvel.

Dit genus, hetwelk in habitus aan Euryusa herinnert, is aan Placusa verwant. Het lichaam is meer gewelfd, de kop is, onder de oogen, krachtiger gerand, de sprieten zijn, van af het vierde lid, geleidelijk verbreed, het derde kaaktaster-lid is veel meer verdikt en omgekeerd-kegelvormig; de dekschilden zijn aan den achterrand, binnen de achterhoeken, duidelijk uitgerand. De epimeren van het metasternum zijn veel grooter. Ook is het zesde onbedekt tergiet in beide seksen gewoon.

De eenige soort leeft achter boomschors.

Lichaam tamelijk breed, een weinig gewelfd, zeer fijn behaard, zwart. Sprietwortel en pooten bruinrood, de dijen gewoonlijk bruin. Kop zeer fijn en dicht bestippeld. Sprieten kort, de achterrand van het halsschild nauwelijks overschrijdend. Halsschild duidelijk breeder dan de dekschilden, achter het midden dubbel zoo breed als lang, met sterk afgeronde zijden, aan weerszijden van de lijn gerande basis breed uitgerand en daarvoor iets ingedrukt, gewoonlijk ook met een basaal-indruk, matig fijn en zeer dicht bestippeld. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, iets sterker en minder dicht bestippeld, aan den achterrand, binnen de achterhoeken, duidelijk uitgerand. Achterlijf matig fijn en tot aan den achterrand van het vijfde onbedekt tergiet dicht bestippeld. Bij het ♂ zijn de dekschilden, aan weerszijden achter het schildje, van een klein bulje voorzien, het vijfde onbedekt tergiet met eene kleine middenkiel. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Achter schors van beuken, berken en populieren. Niet inl. In Noord- en Middel-Europa. De larve is door Fauvel beschreven. (Curtula Er.)

39. Placusa Erichs.

Lichaam meer of minder platgedrukt. Bovenlip zeer sterk verbreed, van voren afgeknot of in 't midden afgerond. Het derde kaaktaster-lid slechts iets verdikt. De omgeslagen zijden van het halsschild, van terzijde gezien, niet of nauwelijks zichtbaar. De dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, weinig of niet uitgebogen. Het zesde onbedekt tergiet is bij het ♂ verdeld in een al of niet in twee tandjes gespleten middenstuk en in twee zijtanden of zijdoornen. Pooten vrij kort, de voor- en middel-tarsen 4-, de achtertarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven uitsluitend achter boomschors. — De larve en pop van P. complanata Er. (pumilio Perris nec Grav.) zijn door Perris beschreven. De larve leeft in de gangen van Tomieus stenographus.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild niet of slechts weinig smaller dan de dekschilden (Sub-gen. Placusa i.sp.) . . . 2
- Halsschild aanmerkelijk smaller dan de dekschilden (Sub-gen. Calpusa Muls. & Rey), aan weerszijden van de basis niet uitgerand, meer dan de helft breeder dan lang, met eenigszins parallele zijden. Sprieten krachtig ontwikkeld, het vijfde tot tiende lid dubbel zoo breed als lang. Lichaam lichter of donkerder bruin, met een breeden scheeven band op elk der dekschilden bruingeel; de bestippling duidelijk, zeer dicht en eenigszins rimpelig op het halsschild, krachtiger en minder dicht op de dekschilden, welke evenals het achterlijf glanziger zijn. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild. Achterlijf lijn en dicht bestippeld. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet een krachtigen doorn in 't midden en aan weerszijden een iets langeren doorn; bij het ♀ steekt dit tergiet in 't midden driehoekig uit en vertoont dezelfde zijdoornjes. Lengte 2—2 $\frac{1}{2}$ mm. Achter eikenschors en aan uytvloeiende boomsappen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. Ook in de Belgische prov. Limburg bij Neerhaeren, nabij Maastricht (adscita Er.)
- 2 Kop en halsschild geheel dof 3
- Kop en halsschild iets glanzig 4
- 3 Halsschild even breed als de dekschilden, dubbel zoo breed als lang, naar voren iets meer dan naar de basis versmald, aan de zijden afgerond, aan weerszijden van de niet gerande basis vrij sterk uitgebogen, op het midden vlakgedrukt, soms met twee onduidelijke langs-indrukken. Lichaam zwart, het halsschild donkerbruin, de dekschilden lichter of donkerder bruin. Sprieten en het uiteinde van het achterlijf roodbruin; de sprietwortel en de pooten geelachtig, de dijen veelal donkerder. Zeer fijn, dicht en rimpelig bestippeld op het voorlijf,

minder dicht op het achterlijf, vooral op de laatste tergiten. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, vlak. Achterlijf iets toegespitst. Bij het ♂ het vijfde onbedekt tergiet minder bestippeld, het zesde met een roodachtig glad bultje in het midden, aan weerszijden met een zeer klein tandje en daarbuiten met twee scherpe doornpjes. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Achter dennenschors, in de gangen van *Tomicus stenographus*; ook aan uytvloeiende sappen. Niet inl. In Noord-Frankrijk bij Rijsel en in de Rijnprov. bij Elberfeld (*complanata* Er.)

Halsschild naar voren meer versmald, iets gewelfd, aan de basis fijn gerand en aan weerszijden slechts zwak uitgebogen. De bestippeling op het achterlijf naar het uiteinde bijna even dicht als op de eerste tergiten. Overigens als *complanata*, doch iets kleiner en slanker. Lengte $1\frac{1}{4}$ —2 mm. Achter beukenschors. Niet inl. In Westfalen. (*humilis* Er.)

- 4 Achterlijf duidelijk, doch niet zeer lijn bestippeld, eenigszins glanzig. Achterhoeken van het halsschild eenigszins afgerond. Deze soort herinnert in habitus aan *Atheta gagarina*, doch is smaller en een weinig gewelfd. Het voorlijf is meer versmald en evenals het achterlijf iets glanzig. Ook is de bestippeling duidelijker. Dekschilden veelal over het midden lichter gekleurd. Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, zeer kort, bijna tweemaal zoo breed als lang, naar achteren meer versmald en aan den achterrand zeer flauw uitgerand, evenals de dekschilden dicht en vrij sterk rimpelig bestippeld. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet op het midden twee kielvormige verhevenheden, daartusschen eene derde verhevenheid, welke op den achterrand een tandje vormt; aan weerszijden van de eerste twee verhevenheden nog een zeer oppervlakkig bultje en naar buiten aan weerszijden een kort doornpje. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Achter schors van dennen en vooral van eiken, meest in het najaar. Bij Arnhem in Juni. In de Rijnprov. bij Crefeld.

1. *pumilio* Grav.

Achterlijf tamelijk dof, zeer dicht bestippeld; de achterhoeken van het halsschild bijna recht. Lichaam breed en meer gewelfd dan bij *pumilio*, gemakkelijk te herkennen aan het veel kortere halsschild en het veel minder dicht-, doch sterker bestippelde voorlijf. Lichaam zwart, iets glanzig. De sprietten, min of meer de zijden van het halsschild, benevens de dekschilden bruin-, soms roodachtig. Eerste sprietlid en de pooten geelachtig, de dijen min of meer bruinachtig. Halsschild tweemaal zoo breed als lang, naar voren merklijk versmald. Dekschilden iets breeder en veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet in het midden twee bultjes en van achteren 4 scherpe tandjes en twee zijddoornpjes. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Achter schors en aan uytvloeiende sappen van eiken, dennen en populieren. Arnhem, Wageningen, Winterswijk en Roermond. In de Rijnprov. bij Düsseldorf; ook bij Norden (*infima* Er.) 2. *tachyporoides* Waltl.

40. Gyrophaena Mannerh.

Lichaam meer of minder kort en dik, de kop tamelijk vooruitstekend, zeer breed, doch smaller dan het halsschild, met sterk uitpuilende oogen en van achteren meer of minder sterk versmald. Bozenlip van voren afgeknot of iets uitgebogen. Voor- kaken met gewonen, scherpen top. Tong tamelijk smal, ongedeeld en aan het uiteinde afgerond of gespleten. Liptasters kort, 2-ledig, het eerste lid niet verdikt, ongeveer cilindervormig. Halsschild korter en smaller dan de dekschilden. De voortzetting van het mesosternum reikt tot over het midden der middelcoxae en is naar achteren geleidelijk versmald. Dekschilden langer dan het halsschild, met eene onduidelijke, verdiepte streep langs den naad. Voor- en middeltarsen 4-, de achtertarsen 5-ledig. — De larve van *G. affinis* is door Rey beschreven. — De soorten van dit genus leven, in aantal bijeen, in Fungi, enkelen ook onder vochtige bladeren.

Van de 18 Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 5 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Het eerste lid der achtertarsen weinig langer dan het tweede. Mesosternum aan het uiteinde iets uitgerand, tot aan het uiteinde der middelcoxae reikend. Tong afgerond. Lichaam niet zeer breed 2

Het eerste lid der achtertarsen dubbel zoo lang als het tweede. Mesosternum aan het uiteinde recht afgeknot, tot op $\frac{3}{4}$ van de lengte der middelcoxae reikend. Tong diep gespleten (Sub-gen. *Agaricochara* Kr.). Lichaam kort ovaal, in grootte en kleur eenigszins op minima gelijkend, doch meer gewelfd en met iets smalleren kop en kleinere oogen. Donkerbruin, weinig glanzig, lijn grijs behaard. Halsschild roestkleurig. Sprietten bruin, de eerste 3 leedjes, alsook de dekschilden, behalve langs den naad en naar de buitenhoeken, benevens het uiteinde van het achterlijf en de pooten geelachtig. Sprietten sterk behaard.

Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, de zijden en de hoeken sterk afgerond, zeer onduidelijk bestippeld. Dekschilden een derde breeder en ongeveer de helft langer dan het halsschild, vrij sterk en dicht rimpelig bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde versmald. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet eene tamelijk breede uitranding, welke aan weerszijden in een gebogen doortje eindigt. Lengte 1 mm. In dennen- en beukenzwammen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Düsseldorf, Crefeld en Aken; ook in België.

(*laevicollis* Kr.)

- 2 Kop korter dan breed, eenigszins ruitvormig, in het halsschild gedeeltelijk teruggetrokken. Oogen zeer groot en uitpuilend 3
- Kop weinig of niet breeder dan lang, meer gestrekt, met eenigszins parallele zijden, of min of meer rondachtig. Oogen klein, weinig uitpuilend (Sub-gen. *Phaenogyra* Rey) . . . 12
- 3 Het vijfde tot tiende sprietlid langer dan breed 4
- Het vijfde tot tiende sprietlid breeder dan lang 5
- 4 Lichaam geelrood, glanzig. Dekschilden zeer fijn en verspreid bestippeld. Sprieten, dekschilden en pooten geelachtig, de kop, de buitenhoeken en min of meer de achterrand der dekschilden zwartachtig; eene meer of minder ontwikkelde vlek op het halsschild en een band op het achterlijf bruin. De bestippling zeer verspreid op den kop, verspreid en bovendien in twee rijen op het halsschild, waarvan de zijden nagenoeg parallel zijn. Dekschilden breeder en veel langer dan het halsschild. Achterlijf spits, de eerste drie onbedekte tergieten aan de basis met een diepen dwarsindruk. Bij het ♂ is het vijfde onbedekt tergiet aan het uiteinde, in 't midden, van een hoelijzervormig bultje voorzien; het zesde vertoont eene uitranding, welke aan weerszijden in een haakje eindigt. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. In het najaar gemeen in paddestoelen, vooral in die welke op vochtige bladerhoopen ontwikkelen. Ook in *Agaricus muscarius*. 1. *pulchella* Heer.
- Lichaam zwartbruin, glanzig. Dekschilden met zeer groote, verspreide stippels. Sprieten, dekschilden, de basis en het uiteinde van het achterlijf bruinachtig-geel. Sprietwortel en pooten geelachtig. Kop en halsschild met grove, verspreid staande stippels, op het midden van het halsschild met twee onregelmatige stippelrijen. Halsschild zeer breed, met eenigszins afgeronde zijden. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer en breeder dan het halsschild. Achterlijf bijna niet bestippeld. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet aan het uiteinde, in 't midden, een klein bultje, het zesde is aan het uiteinde uitgerand en aan weerszijden van de uitranding van twee haakjes voorzien. Soms is het geheele lichaam roodachtig en zijn de kop, de buitenhoeken der dekschilden en een band op het achterlijf bruin. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen in paddestoelen. Ook soms in rottend hout 2. *affinis* Sahlb.
- 5 Halsschild, vooral vooraan op het midden, met twee rijen diepe stippels, welke soms in meer of minder duidelijke langsgroefjes staan. Achterlijf min of meer licht gekleurd met een donkerder band 6
- Halsschild zonder deze stippelrijen, slechts hier en daar met eenige verwarde stippels. Achterlijf geheel zwart. Deze soort heeft den habitus van *bihamata*, doch is kleiner en zeer in 't oog vallend door de diep zwarte kleur, terwijl de eerste 3 sprietleedjes, de dekschilden, behalve langs de zijden en aan de basis, alsook de pooten, geelachtig zijn. Halsschild korter dan bij *bihamata*, meer verbreed en aan de zijden en hoeken meer afgerond. Dekschilden aan de buitenhoeken zeer weinig bestippeld. Voorlijf glanzig, achterlijf eenigszins dof, naar het uiteinde duidelijk bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde onbedekt tergiet naar het uiteinde fijnkorrelig, het zesde met eene diepe uitranding, welke door twee scherpe tandjes begrensd wordt. Lengte 1 — $1\frac{1}{2}$ mm. In paddestoelen, vooral in wilgenzwammen, soms onder dorre bladeren of in aanspoelsel. Vorden, den Haag, Arnhem, Bodegraven, Roermond. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 7. *lucidula* Er.
- Halsschild zonder stippelrijen of langsgroeven, doch vrij dicht en tamelijk gelijkmatig sterk bestippeld 10
- 6 Dekschilden dicht en rimpelig of segrijnachtig bestippeld 7
- Dekschilden niet rimpelig, doch slechts iets gehagrinced of wel glad en alleen in de buitenhoeken fijn bestippeld 8
- 7 Lichaam glanzig zwart. Halsschild zeer kort, met sterk afgeronde zijden en hoeken. Sprieten, de achterrand en soms ook de zijden van het halsschild, de dekschilden (behalve eene driehoekige vlek aan de buitenhoeken), het uiteinde van het achterlijf en de pooten geelrood. Kop weinig bestippeld. Halsschild met eene dubbele rij van weinige stippels, welke meestal in het midden onderbroken is. Dekschilden iets langer en veel breeder dan het halsschild. Achterlijf in 't midden verbreed. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet 6 kleine tandjes, het zesde 3 tandjes, van welke de buitenste langer en iets gebogen zijn, de middelste een weinig gespleten is. Lengte $1\frac{3}{4}$ — 2 mm. Gemeen in de diluviale streken en in Limburg, in paddestoelen van Mei tot Augustus 3. *nana* Payk.

Lichaam bruin of roodachtig. Halsschild minder verbreed, langer, met eenigszins parallelle zijden. Deze soort is naverwant aan *nana*, doch lichter gekleurd. Sprieten langer, het vierde en vooral het derde lid veel langer. Kop dichter bestippeld. Halsschild smaller, uiterst fijn gechagrineerd, naar de basis iets versmald; de dubbele rij komt meer uit en is uit verscheidene stippels samengesteld; ook bevinden zich meer verspreide stippels buiten deze stippelrijen. Dekschilden meer segrijnachtig dan rimpelig bestippeld. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet 4 tandjes, het zesde 4 doornjes, waarvan de middelste twee vrij kort, de buitenste veel langer en gebogen zijn. Lengte $1\frac{3}{4}$ —2 mm. In *Agarici* en *Boleten*, vooral van beuken; zeldzaam. Den Haag, Loosduinen, Breda, Arnhem, Apeldoorn, Roermond, Diemen 4. **gentilis** Et.

8 Dekschilden iets gechagrineerd, aan de buitenhoeken meer bestippeld 9

Dekschilden glad, alleen aan de buitenhoeken onduidelijk gechagrineerd en duidelijk bestippeld. Deze soort is zeer verwant aan *bihamata*, doch grooter en breeder; de kleur is gewoonlijk donkerder. Halsschild slechts iets gechagrineerd, langer en naar achteren smaller, met bijna rechte zijden en minder sterk afgeronde achterhoeken; slechts twee stippels buiten de beide stippelrijen. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet 4 tandjes, het zesde in het midden twee tandvormige driehoekige plaatjes, gescheiden door eene driehoekige insnijding. Lengte 2 mm. In paddestoelen en zwammen van eiken en populieren. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld (*laevipennis* Kr.)

9 Zijden van het halsschild zeer weinig afgerond. Deze soort is zeer verwant aan *bihamata*, doch iets grooter, breeder en vlakker, de kop aan weerszijden iets meer bestippeld, het halsschild naar verhouding iets smaller, naar de basis een weinig versmald en met meer aangeduide achterhoeken. Dekschilden onduidelijk gechagrineerd, gelijkmatiger, naar de buitenhoeken minder duidelijk bestippeld. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet 8 tandjes, waarvan de twee buitenste zeer klein zijn; het zesde een weinig gespleten, met een bultje in 't midden en met twee vrij lange, scheef staande tandjes, welke door eene smalle tusschenruimte gescheiden zijn. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. In paddestoelen en in boomzwammen. Verbreid, doch zeldzaam. (*congrua* Er., *carpini* Muls. & Rey) 5. **fasciata** Mrsh.

Zijden en achterhoeken van het halsschild duidelijk afgerond. Deze soort gelijkt zeer op *affinis*. Glanzig bruinrood, in 't gele overgaande. Kop, eene driehoekige vlek aan de buitenhoeken der dekschilden, benevens een breede band op het achterlijf, zwartbruin. Sprieten min of meer lichtbruin, de wortel benevens de pooten geel. Halsschild in twee rijen bestippeld en bovendien aan weerszijden met eenige verspreide stippels, fijn gechagrineerd, bruinachtig. Dekschilden een derde langer dan het halsschild, een weinig gechagrineerd, met duidelijk bestippelde buitenhoeken. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet zes tandjes, van welke de twee buitenste klein zijn; het zesde met eene breede uitranding, welke aan weerszijden in een haakje eindigt en in 't midden soms met eenige aanduiding van twee kleine bultjes. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Gemeen in paddestoelen, vooral in boomzwammen en ook in rottende boomschors.

(*carpini* Baudi, *despecta* Muls. & Rey) 6. **bihamata** Thoms.

10 Achterlijf min of meer roodachtig-geel, met een bruinen band. 11

Lichaam geheel bruinzwart, de schouders der dekschilden en het uiteinde van het achterlijf roodbruin. Sprieten en pooten bleekgeel. Sprieten kort en dik, het vijfde tot tiende lid sterk verbreed. Halsschild breed, over de geheele oppervlakte vrij sterk en dicht bestippeld, met iets afgeronde zijden en zeer stompe achterhoeken. Dekschilden veel breeder en veel langer dan het halsschild, duidelijk behaard, vrij sterk, dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. Achterlijf zeer fijn bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet breed uitgerand en aan weerszijden van de uitranding met een spits tandje. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. In paddestoelen op weilanden, in boomzwammen en soms vliegende op bladeren van boomen. Gemeen in de omstreken van Maastricht, Juli. 10. **manca** Er.

11 Dekschilden fijn, zeer dicht en gelijkmatig bestippeld; het halsschild ook aan de basis bestippeld. Grootte, habitus en kleur van de lichte exemplaren van *affinis*, doch met smaller bruinen achterlijfs-band. Vooral in 't oog vallend, doordat het halsschild over de geheele oppervlakte sterk en verspreid bestippeld is. Kop aan weerszijden krachtig bestippeld. Basis van het halsschild in de breedte ingedrukt. Achterlijf nagenoeg onbestippeld. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet 4 tandjes, het zesde 4 kleine doornjes, van welke de twee middelste fijner en langer zijn en dichter bijeen staan. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Op zwammen van berken, elzen en populieren. Zeer zeldzaam. Een ♂ bij Nuth nabij Maastricht, Juli. Zij zou in België bij Antwerpen, Izel en Aywaille gevangen zijn. Ook in de Rijnprov. bij Düsseldorf. (*puncticollis* Thoms.) 8. **Poweri** Crotch.

Dekschilden vrij sterk, verspreid en eenigszins rimpelig bestippeld, het halsschild aan de basis niet bestippeld. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de geringe grootte en de behaarde dekschilden; zij heeft den habitus van *affinis* en eenigszins de kleur van *gentilis*, met gewoonlijk eenkleurig geelrood halsschild. Kop aan weerszijden met eenige verspreide

stippels. Halsschild zeer kort, met zeer weinig afgeronde zijden, op het midden krachtig-, doch niet dicht bestippeld, meer verspreid op de zijden. Achterlijf naar het uiteinde iets toegespitst, bijna niet bestippeld. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet 4 duidelijke kielvormige verhevenheden, het zesde 3 tandjes, van welke het middelste iets korter is. Lengte 1—1½ mm. In paddestoelen en rottende boomstems. Eenmaal in Mei in aantal bij den Haag. Ook bij Arnhem en Wageningen 9. *minima* Er.

12 Halsschild met twee gegroefde stippellijnen over het midden 13

Halsschild zonder stippellijnen of groeven. Deze soort heeft den habitus van eene kleine *Atheta*; zij is de kleinste van het genus, te herkennen aan het smalle lichaam met parallelle zijden. Donkerbruin, weinig glanzig, verspreid en vrij lang grijs behaard. Spriet en pooten geel; het uiteinde van het achterlijf roestkleurig. Halsschild tamelijk breed, met iets afgeronde zijden en hoeken, vrij dicht bestippeld. Dekschilden iets breder en langer dan het halsschild, dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. Achterlijf fijn en vrij dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde uitgerand. Lengte ¾ mm. In dennenzwammen; soms rondvliegende. Niet inlandsch. In België bij Verviers; in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld (*punctipennis* Thoms.) (*boleti* L.)

13 Vijfde tot tiende sprietlid eenigszins verbreed. Dekschilden fijn gechagrineerd, de hutenachterhelft duidelijk korrelig bestippeld. Deze soort is als *manca* gekleurd en vooral onderscheiden, doordat de kop veel kleiner en smaller is, de oogen veel kleiner zijn en minder uitpuilen. Halsschild klein, breed en gewelfd, met afgeronde zijden, in eene dubbele, iets gegroefde rij bestippeld en aan weerszijden met eenige verspreide fijne stippels. Dekschilden ½ breder en bijna de helft langer dan het halsschild. Achterlijf breed, zeer fijn bestippeld. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet 6 tandjes, het zesde is breed-, doch niet diep uitgerand en aan weerszijden van een scherp tandje voorzien. Lengte 1;—1½ mm. In zwammen van eiken en populieren. Niet inlandsch. In de Belgische provincie Brabant en in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld. (*strictula* Er.)

Vijfde tot tiende sprietlid sterk verbreed. Dekschilden geheel korrelig bestippeld. Deze soort is zeer verwant aan *strictula*, gewoonlijk iets kleiner en naar voren meer versmald. De spriet en pooten zijn korter en naar het uiteinde meer verbreed. Halsschild kleiner, smaller, met bijna niet afgeronde zijden en minder stompe achterhoeken, op het midden weinig en meer oppervlakkig bestippeld. Achterlijf nagenoeg onbestippeld. Bij het ♂ vertoont het vijfde onbedekt tergiet 6 kleine oppervlakkige korreltjes; het zesde is uitgerand met een klein tandje aan weerszijden van de uitranding. Lengte 1½—1 mm. Vooral in het najaar in boomzwammen en tusschen de lamellen van paddestoelen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en in Westfalen (*polita* Grav.)

41. *Encephalus* Westwood.

Dit genus is naverwant aan Gyrophaena, doch onderscheidt zich vooral door den eigenaardigen vorm, de zeer korte, breede, van voren breed afgeronde tong, het zeer steil afvallend mesosternum, waarvan de voortzetting tot aan den achterrand der middelcoxae reikt en aan het uiteinde even breed als in het midden en zeer breed afgeknot is, alsook door het zeer breede, aan de rugzijde uitgeholde achterlijf, hetwelk op het geheele voorlijf kan teruggeslagen worden. Kop tot aan de oogen in het halsschild teruggetrokken. Halsschild nagenoeg even breed als de dekschilden, ongeveer driemaal zoo breed als lang. Dekschilden kort, niet langer dan het halsschild. De sterniten zijn, tusschen de zeer scherp afgezette en hoog opgerichte zijden geheel vlak.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam ineengedrongen, kort ovaal, zwart, tamelijk glanzig, onbehaard. Spriet en pooten en een gedeelte der dekschilden roodgeel; ook de achterrand van het halsschild soms rood. Spriet zeer kort, naar het uiteinde aanmerkelijk verdikt, het zesde tot tiende lid zeer kort en breed, tot eene soort knots vereenigd. Halsschild naar voren sterk versmald, aan de basis, in het midden, flauw uitgerand. Dekschilden uiterst fijn gechagrineerd. Achterlijf half-cirkelvormig, sterk uitgehold. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet, aan het uiteinde, aan weerszijden van een tandje voorzien. Lengte 1½—2 mm. Wanneer dit diertje gestoord wordt, wordt het sterk uitgeholde achterlijf over den kop gebogen en blijft het, evenals een kleine, ineengerolde *Agathidium*, onbewegelijk liggen. Onder mos, dorre bladeren, plantenafval, vermolmd hout, soms in paddestoelen en in aanspoelsel. Ik sleepte deze soort eenmaal in Juni van lage struiken in de Waalsdorpsche duinen. Ook bij Loosduinen in April, tusschen plantenafval. In de Rijnprov. bij Aken 1. *complicans* Westw.

Brachida Muls. et Rey.

Dit genus onderscheidt zich van de beide vorige genera, doordat de eene voorkaak twee tandjes aan den top heeft en het eerste liptaster-lid sterk verdikt is. Lichaam kort en breed, sterk gewelfd. De voortzetting van het mesosternum is breed en reikt tot aan den achterraand der middelcoxae, is in het midden iets versmald en aan het uiteinde zeer breed en vlak uitgerand.

De eenige Europeesche soort zou ook in Nederland kunnen worden aangetroffen.

Door de korte, breede gedaante herinnert deze soort enigszins aan *Encephalus*; zij is vooral in 't oog vallend door het gewelfde, vrij lang en dicht bruin behaarde, tamelijk glanzige, bruinzwarte lichaam. De eerste 4 sprietleedjes en de pooten roodachtig, de zijden van het halsschild veelal bruin en de tergieten iets roodachtig gerand, soms de eerste achterlijfsringen geheel roodachtig. Spriet en geleidelijk verdikt. Kop, halsschild en achterlijf lijn en dicht-, de dekschilden sterker en dichter bestippeld. Dekschilden iets breeder en even lang als het halsschild. Achterlijf verbreed, breeder dan de dekschilden. Bij het ♂ vertoonen de dekschilden een bultje nabij den naadhoek; ook is het zesde onbedekt tergiet zwak uitgerand. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Onder mos, dorre bladeren, plantenafval, in boomzwammen; soms rondvliegende. Volgens *Sharp* zou dit diertje, evenals *Encephalus complicans* het achterlijf tot over den kop heenbuigen. Niet inl. In Noord-Frankrijk en in de Rijnprov. (Ahrdal) (notha Er.) (exigua Heer)

IV. Tribus OLIGOTINI.

42. Oligota Mannerh.

*Lichaam zeer klein. Spriet 10-ledig, knotsvormig verdikt en samengedrukt. Bovenlip van voren afgeknut of uitgerand. Voorkaken ongelijk, de eene aan de basis sterk verbreed, van buiten in het midden diep ingesneden, van binnen ongetand; de andere slank, in 't midden van den buitenrand minder ingesneden, in 't midden van den binnenrand met een krachtigen tand. Alle tarsen 4-ledig. Gevleugeld. — De larve van *O. flavicornis* is door *Rey*, *Heeger* 1) en *Gangelbauer*, die van *apicata* door *Rey* beschreven. — De soorten van dit genus leven, met hare larven, vooral van *Acariden* en worden veelal gevonden op de bladeren van verschillende planten, die door dezen bewoond zijn.*

Van de 11 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Lichaam kort-ovaal, tamelijk breed. Achterlijf kegelvormig. Habitus van eene kleine *Hypocyptus* (Sub-gen. *Holobus* Sol.) 2
- Lichaam min of meer met parallelle zijden. Habitus van eene zeer kleine *Allochara* (Sub-gen. *Oligota* i.sp.) 3
- 2 Het uiteinde van het achterlijf, evenals het overige gedeelte van het lichaam, sterk glanzig zwart. Spriet en geel, de pooten geelbruin. Sprietknots 3-ledig, scherp afgescheiden. Lichaam breed-ovaal, gewelfd, vrij lang, verspreid grijs behaard, zeer fijn bestippeld; de dekschilden sterk rimpelig-, het achterlijf dichter bestippeld. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild. Lengte ongeveer 1 mm. Onder aanspoelsel, dorre bladeren, mos, in vuil uit dierenbokken, plantenafval en soms bij mieren. Zeer zeldzaam. Zierikzee en Arnhem. 5. *flavicornis* Lacord.
- De laatste achterlijfsringen en de pooten geel. Spriet met eene geleidelijk verdikte 5-ledige knots. Halsschild en dekschilden hetzij zwart, hetzij pekbruin of roestkleurig; fijner en dichter behaard dan *flavicornis*. Ook is de bestippeling van halsschild en dekschilden dichter, op het achterlijf meer verspreid en meer oppervlakkig. Spriet krachtiger ontwikkeld, geelachtig. Lengte bijna 1 mm. In kelders, op zwammig hout en in vuil, onder doode dieren, mos, beukenzwammen en soms in schepen met eene lading aardnoten. Niet inl. In Oldenburg, op eene rotte okkernoot (*apicata* Er.)
- 3 Vrij groote soorten met tamelijk breed lichaam. Sprietknots 4-ledig. 4
- Kleine soorten met tamelijk smal lichaam. Sprietknots 3-ledig. 5
- 4 Lichaam 1 — $1\frac{1}{2}$ mm. lang. Geheel zwart, de spriet en het uiteinde van het achterlijf en de pooten geelbruinachtig, de dijen berookt. Lichaam dicht en lijn behaard; de bestippeling op het

1) *Heeger* beschreef deze larve ten onrechte als die van *Gyrophana manca*.

halsschild zeer dicht, op de dekschilden minder dicht, op het achterlijf vrij dicht en sterk. Sprietten krachtig ontwikkeld. Achter schors, onder dorre bladeren, in keldervuil, op *Mucedo cellaris* en soms bij mieren. Niet inl. In België bij Leuven, in de Rijnprov. bij Crefeld, Aken en Düsseldorf. (granaria Er.)

Lichaam $\frac{1}{2}$ —1 mm. lang. Bruinzwart, minder glanzig, de dekschilden lichter- of donkerder bruin. Lichaam zeer fijn en zeer dicht, eenigszins zijdeachtig behaard; zeer in het oog vallend door het parallele achterlijf, hetwelk, evenals de dekschilden, vrij sterk schubachtig bestippeld is. Halsschild dicht en zeer fijn bestippeld. Sprietknots bruin, de pooten geel, het uiteinde van het achterlijf min of meer donkerrood. Sprietten minder krachtig ontwikkeld dan bij *granaria*. Dekskildes breeder en langer dan het halsschild, gewelfd. Soms zijn de dekschilden en het halsschild geelrood. In oud hout, vuil uit kippenhokken en kelders, onder dorre bladeren, in aanspoelsel en soms in paddestoelen. Niet zeldzaam. Leiden, den Haag, Nootdorp, Diemen, Arnhem. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf.

1. *inflata* Mannerh.

- 5 Lichaam roodbruin- of geelachtig, weinig glanzig. Dekskildes en achterlijf zeer dicht rimpelig bestippeld. Dekskildes roodachtig, de sprietwortel, de laatste achterlijfs-ringen, behalve de basis van het vijfde onbedekt tergiet, benevens de pooten geelachtig. Sprietten kort, met eene duidelijke 3-ledige knots. Lengte $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ mm. In molm en achter schors van doode boomen, onder steenen langs zeedijken, in de doinen en vooral in ladingen aardnoten. Nog niet in Nederland waargenomen, doch wel bij Fransche havenplaatsen en ook in Duitschland. Wellicht door scheepsladingen ingevoerd. (parva Kr.)

Lichaam glanzig zwart. Dekskildes en achterlijf meer of minder dicht bestippeld. 6

- 6 Dekskildes veel langer dan het halsschild, zwart, zeer fijn en dicht bestippeld. 7

Dekskildes kort, weinig langer dan het halsschild, vrij sterk-, doch minder dicht bestippeld. Sprietten en pooten geelachtig. Eene zeer kleine soort. Lichaam gewelfd, zeer smal, met parallele zijden, glanzig zwart, het uiteinde van het achterlijf en soms ook de dekschilden roodbruin. Bestippeling op het halsschild zeer fijn en dicht, op het achterlijf zeer duidelijk en vrij dicht; het vijfde onbedekt tergiet iets minder bestippeld. Sprietten met eene zeer plompe, dikke, 3-ledige knots. Lengte $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ mm. Gemeen in gras, onder mos, dorre bladeren, achter boomschors en in aanspoelsel van rivieren; ook bij *Formica rufa*. Gemeen bij den Haag. Ook bij Amsterdam, Leiden, Katwijk, Nootdorp, Breda, Doorn en Roermond. 4. *pusillima* Grav.

- 7 Sprietten en pooten geelachtig. Deze soort heeft eenigszins den habitus van *inflata*, doch is iets smaller, glanziger en minder behaard. Zwart met bruinachtig uiteinde van het achterlijf. Sprietknots krachtig ontwikkeld. Kop en halsschild zeer breed, het halsschild even breed als de dekschilden, iets fijner bestippeld dan bij *inflata*. Dekskildes iets korter en iets minder dicht bestippeld. Achterlijf, vooral naar het uiteinde, minder duidelijk bestippeld. Lengte bijna 1 mm. Onder plantenaafval, rottend stroo en soms bij mieren. Zeer zeldzaam. Alleen bij den Haag en Amsterdam gevangen. 2. *punctulata* Heer.

Sprietten behalve de wortel, benevens de pooten donker roodbruinachtig. Deze soort is zeer verwant aan *punctulata*, doch iets kleiner en smaller. Sprietknots meer geleidelijk toegespitst, het zevende lid is duidelijk breeder dan bij *punctulata* en maakt bijna deel uit van de knots. Halsschild smaller; de dekschilden iets minder dicht bestippeld, zoo ook het achterlijf, vooral naar het uiteinde. Lengte $\frac{1}{2}$ —1 mm. Gemeen onder plantenaafval, rottend stroo, soms bij mieren en ook wel op waterplanten. 3. *atomaria* Erichs.

V. Tribus HYGRONOMINI.

43. Hygronoma Erichs.

Lichaam smal, lang gestrekt en platgedrukt. Kop even breed als het halsschild, de slapen op de onderzijde niet gerand. Sprietten vrij kort en krachtig ontwikkeld, 11-ledig. Bovenlip driemaal zoo breed als lang, aan weerszijden van den voorrand een weinig uitgebogen. De eene voorkaak in 't midden van den binnenrand met een krachtigen tand, de andere van binnen iets uitgerand. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, naar achteren iets versmald, met sterk neergebogen voorhoeken. Dekskildes de helft langer dan het halsschild, aan het uiteinde bijna recht afgeknut. Pooten zeer kort, de tarsen dik en plat, allen 4-ledig.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam lang en smal, zeer vlak gedrukt, dof-zwart, zeer dicht en fijn geelachtig-grijs behaard, zeer dicht en tamelijk fijn bestippeld. Sprietwortel en pooten roodgeel. Kop nagenoeg even

groot als het halsschild, bij het ♂ op het voorhoofd breed ingedrukt. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, naar de basis een weinig versmald, met eenigszins afgeronde achterhoeken, bij het ♂ over het midden duidelijk-, bij het ♀ zwak gegroefd, gewoonlijk iets fijner dan de kop en uiterst dicht bestippeld. Dekschilden ongeveer 1½ maal zoo lang als het halsschild, lichtgeel, aan de basis zwartachtig. De eerste 4 onbedekte tergiten in de breedte ingedrukt. Tarsen kort en breed. Bij het ♂ is het zesde sterniet afgerond en steekt eenigszins uit. Lengte 2½—2½ mm. Niet zeldzaam langs rivieren, meren en plassen, in de bladoksels van riet, onder aanspoelsel, dood riet en op klei rondlopende. 1. **dimidiata** Grav.

VI. Tribus DIGLOSSINI.

44. *Diglossa* Haliday.

Bovenlip breed, in 't midden van den voorrand iets uitgebogen. Voorkaken ver uitstekend, lang en dun, aan het uiteinde slechts weinig gekromd, de rechter in 't midden van den binnenrand met een stompen tand. Achterkaken met twee lange smalle lobben, de buitenste langer dan de binnenste, in een langen, dunnen, van binnen dicht met lange haren bezetten top uitgetrokken; de binnenste iets gekromd, aan den binnenrand met, naar den top korter wordende doorntjes bezet. Kaaktasters buitengewoon lang en slank, het eindlid uiterst klein. Kin trapezium-vormig, de tong dun vliezig, smal, naar voren geleidelijk versmald. Liptasters zeer lang en dun, borstelachtig, onduidelijk 3-ledig. Halsschild nagenoeg even lang als breed, naar achteren sterk versmald, de epipleuren, van terzijde gezien, duidelijk zichtbaar. Achterlijf aan de zijden sterk gerand. Pooten krachtig ontwikkeld, de voorcoxae zeer groot en sterk uitpuilend, de voorschenen aan den buitenhoek uitgesneden, de tarsen zeer kort en dik, allen 4-ledig. Alle klauwen krachtig en eenigszins hoekig gekromd. — De soorten van dit genus leven op de stranden.

Van de twee Europeesche soorten komt één aan onze kust voor.

Zwart, fijn bestippeld en fijn grijs behaard, de tasters, sprieten en pooten roestkleurig of vuil geelachtig-bruin. Kop zeer groot, halsschild ongeveer van af het midden naar de basis sterk versmald, eenigszins zeshoekig, over het midden eenigszins gegroefd. Dekschilden zeer kort, naar het uiteinde verbreed, bij den iets grooteren macropter-vorm te zamen even lang als breed. Achterlijf naar het uiteinde sterk verbreed, glanzig. Lengte 1½—1½ mm. Over het algemeen zeldzaam langs de stranden, in zandkuiltjes. Eenmaal aan den Hoek van Holland, in April, in zeer groot aantal op stuifzand, in gezelschap van *Phytosus balticus* en *spinifer* 1). De macropter-vorm op Texel gevangen. Ook op Borkum. De larve is door Haliday beschreven. 1. **mersa** Halid.

VII. Tribus PRONOMAEINI.

Pronomaea Erichs.

Dit genus herinnert in habitus zeer aan de soorten van het genus Atheta, doch onderscheidt zich vooral door den snavelachtig verlengden mond en de lange, slanke kaaktasters. Bovenlip niet breder dan lang, van voren sterk afgerond. Voorkaken ver uitstekende, lang en dun, aan het uiteinde hakig naar binnen gekromd, de rechter, in 't midden van den binnenrand, met een tandje. De binnenste achterkaaks-lob geheel hoornachtig, aan den binnenrand van kleine tandjes voorzien. Kin tot aan het midden driehoekig uitgesneden, de tong uiterst dun vliezig, moeilijk te onderscheiden. Liptasters zeer lang, borstelachtig, onduidelijk geleed. Dekschilden aan den achterrand, binnen de achterhoeken, vrij sterk uitgebogen. Achterlijf met tamelijk parallel zijden, de eerste 3 onbedekte tergiten, aan de basis, in de breedte ingedrukt. Voortarsen 4-, de middel- en achtertarsen 5-ledig.

De enige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

1) Onder de vele exemplaren was geen enkel met langere dekschilden; ik betwijfel dan ook of de macropter-vorm wel eenige betrekking heeft op het sexueel verschil bij deze soort (Zie Kraatz, Stett. Ent. Zeit. 1853). In Noord-Frankrijk schijnt deze steeds met den brachypter-vorm voor te komen.

Lichaam gestrekt, met parallele zijden. Halsschild iets breeder dan lang, naar achteren een weinig versmald, met nagenoeg rechte achterhoeken, dicht en lijn bestippeld, met een duidelijk basaalgroefje. Dekschilden iets breeder dan, doch even lang als het halsschild, grover en eenigszins rimpelig bestippeld, aan de buiten-tophoeken sterk uitgerand. Achterlijf verspreid en minder duidelijk bestippeld. Bovenzijde glanzig zwart, vooral op de dekschilden fijn geelachtig behaard en naar het uiteinde gewoonlijk lichter gekleurd. Pooten rood- of geelroodachtig. Soms het geheele lichaam meer pekbruin en ook het eerste sprietlid geelachtig. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Onder rottende plantenstoffen en langs rivieroeveren. Niet inl. Bij Düsseldorf en Crefeld. (rostrata Er.)

VIII. Tribus MYLLAENINI.

45. Myllaena Erichs.

Dit genus herinnert in habitus eenigszins aan de soorten van het genus *Oxypoda* met sterk toegespitst achterlijf en is in 't oog vallend door den eenigszins snuitvormig toegespitsten kop, de ver uitstekende, borstevormige, onduidelijk 3-ledige liptasters en de lange kaaktasters. Bovendien is het lichaam uiterst fijn gechagrineerd en zeer fijn, neerliggend, zijdeachtig behaard. Bovenlijf vrij groot, weinig breeder dan lang, van voren breed afgerond. Voorkaken aan de binnenzijde ongetand. Achterkaaks-lobben zeer lang, geheel hoornachtig. Kin groot, zeer breed en diep vierhoekig uitgesneden; de tong zeer klein, ongedoeld. Halsschild aan den achterrand even breed als de dekschilden en volkomen daartegen aansluitend, aan de zijden afgerond, naar voren versmald, de achterrand, binnen de nagenoeg rechte achterhoeken, iets uitgebogen. Dekschilden aan het uiteinde, te zamen, stomphoekig uitgesneden, binnen de achterhoeken diep uitgerand of hoekig uitgesneden. Gevleugeld. Voor- en middeltarsen 4-, de achtertarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen onder afgevallen bladeren en mos, langs oevers en in aanspoelsel.

Van de 14 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Lichaam $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. lang 2
- Lichaam $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. lang 6
- 2 Lichaam breed en kort; het achterlijf sterk toegespitst. Dekschilden nagenoeg even lang als of slechts iets korter dan het halsschild. Het zevende tot tiende sprietlid zeer verlengd. . . 3
- Lichaam meer gestrekt, tamelijk smal, soms met min of meer parallele zijden; het achterlijf weinig toegespitst 4
- 3 Achterhoeken van het halsschild eenigszins stomp, naar achteren duidelijk uitgetrokken. De grootste soort van het genus, breed en kort gedrongen, gewelfd, dof zwart, zeer dicht zijdeachtig grijs behaard; de dekschilden, bij sterke vergrooting gezien, uiterst fijn gechagrineerd. Het eerste sprietlid, de wortel der tasters, het uiteinde van het vijfde onbedekt tergiet, nagenoeg het geheele zesde onbedekt tergiet, alsmede de pooten roodgeel; de dijen gewoonlijk iets donkerder gekleurd, de randen der achterlijfsringen veelal bruinachtig. Halsschild nagenoeg half-cirkelvormig, breed, aan weerszijden van de basis sterk uitgerand. Dekschilden even lang als, doch iets breeder dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet scherphoekig verlengd, het zesde sterniet afgerond. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Onder plantenafval langs oevers van rivieren, slooten en poelen. Ook in aanspoelsel van overstromingen. Zeer zeldzaam. Eenmaal in Januari bij Breda in aanspoelsel van de Mark. In de Rijnprov. bij Crefeld 1. *dubia* Grav.
- Achterhoeken van het halsschild recht, niet naar achteren uitgetrokken. Deze soort heeft de korte en spitse gedaante van *dubia*, doch is veel kleiner en minder gewelfd. De sprieten zijn veel fijner en gewoonlijk naar het uiteinde geelachtig. Lichaam dicht zijdeachtig-grijs behaard. Halsschild naar voren minder versmald, aan weerszijden van de basis bijna niet uitgerand. Dekschilden iets korter dan het halsschild. Achterlijf langer behaard. Onuitgekleurde exemplaren zijn bruin- of roodbruinachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde stomphoekig verlengd. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Gemeen onder plantenafval, steenen, dood riet en vooral op slib langs oevers 2. *intermedia* Er.
- 4 Dekschilden iets langer dan of nagenoeg even lang als het halsschild. Lichaam diep zwart,

donker grijs behaard; de pooten grootendeels donkerbruin. Deze soort heeft ongeveer de grootte van *dubia*, doch is veel smaller en meer gestrekt. Het eerste sprietlid, de wortel der tasters en het uiteinde van het achterlijf roodbruinachtig; de knieën, benevens het uiteinde der schenen en tarsen roodachtig. Halsschild smaller, doch duidelijk langer dan bij *dubia*, meer als een afgeknotten kegel, aan weerszijden van de basis bijna niet uitgerand, met eenigszins stompe achterhoeken. Bij het ♂ is het zesde tergiet aan het uiteinde sterk afgerond. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Op *Sphagnum* in moerassige streken, onder aanspoelsel, vooral langs ziltige oevers. Niet inh. In Noord-Frankrijk, Duitschland en Engeland.

(*elongata* Kr.) (*gracilicornis* Fairm. et Ch. Bris.)

Dekschilden duidelijk korter dan het halsschild 5

- 5 Lichaam donker roodbruin, vuil groen- of geelachtig-grijs behaard. Deze soort is iets kleiner dan *gracilicornis*. Sprietten, randen der sterniten, uiteinde van het achterlijf en pooten roodachtig; het eerste sprietlid meer geelrood; de naad der dekschilden soms roodachtig. Achterlijf iets lijner behaard dan het voorlijf. Bij het ♂ is het zesde sterniet sterk afgerond en aan het uiteinde bewimperd. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Langs oevers, in aanspoelsel en onder vochtig mos. Bij Roermond, in Mei, onder mos langs heidepoelen; ook bij Houthem, in Juni. In de Rijnprov. bij Düsseldorf . . (? *Kraatzii* Sharp, *glauca* Aubé) 3, *elongata* Matth.

Lichaam geelrood en geelachtig behaard, smal, gelijkmatig toegespitst. Halsschild vrij groot en breed, tamelijk gewelfd, met stompe achterhoeken. Dekschilden veel korter dan het halsschild, duidelijk gechagrineerd. Achterlijf, behalve de randen der ringen en veelal ook de kop beroekt. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde sterk afgerond en bewimperd. Lengte $2-2\frac{1}{2}$ mm. In hoog gelegen, vooral boschrijke streken, onder mos, plantenalval en langs beekoevers. Op Texel in Juli. Ook in het Ahrdal (Rijnprov.).

(*gracilis* Heer) 4, *brevicornis* Matth.

- 6 Dekschilden langer dan het halsschild. Lichaam zwart 7

Dekschilden veel korter dan het halsschild. Lichaam bruinachtig; soms gaat de bruine kleur in het roodbruin over; geel behaard. Het eerste sprietlid, het uiteinde van het achterlijf en de pooten geelachtig. De kleinste soort van het geslacht, naverwant aan *gracilis*, doch iets kleiner en minder dof. Halsschild naar voren meer versmald. Dekschilden duidelijk gechagrineerd. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde stomphoekig verlengd. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam langs duinplassen, poelen en onder dood riet, in het voorjaar. 7, *infusata* Kr.

- 7 Achterlijf sterk toegespitst. Sprietten dun, het zevende tot tiende lid nagenoeg even lang als breed. Deze soort heeft den *habitus*, kleur en beharing van *intermedia*, doch is veel kleiner, het achterlijf is aan het uiteinde donkerder en met minder lange wimperharen bezet. Eerste sprietlid roodbruinachtig. Dekschilden duidelijk gechagrineerd. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top sterk afgerond. Lengte $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ mm. Onder plantenalval en dood riet, langs oevers, ook in aanspoelsel. Verbreed doch niet gemeen. 5, *minuta* Grav.

Achterlijf veel minder toegespitst. Sprietten naar het uiteinde duidelijk verdikt, het zevende tot tiende lid langer dan breed. Overigens naverwant aan *minuta*; het eerste sprietlid en het uiteinde van het achterlijf meer geelrood. Het halsschild is grooter en iets langer, naar voren minder versmald en met meer aangeduide achterhoeken. Dekschilden iets langer en minder duidelijk gechagrineerd. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Onder mos, dorre bladeren, op slib langs oevers, vooral in bosschen. Ook in aanspoelsel. Verbreed doch vrij zeldzaam.

(*forticornis* Kr.) 6, *gracilis* Matth.

IX. Tribus GYMNSINI.

46. *Gymnsa* Gravenh

Dit genus herinnert in *habitus* aan *Aleochara*, doch onderscheidt zich onder de *Aleocharinae* door het bezit van twee haarstippen op het voorhoofd. Kop eenigszins snuitvormig verlengd. Bovenlip door een vliezige huid met den clypeus verbonden. Voorkaken met een grooten tand achter het sterk gekromde uiteinde; daarachter fijn getand en bovendien met een getanden, vliezigen zoom. Achterkaakslobben zeer lang en geheel hoornachtig. Kaaktasters 4-ledig, het vierde lid zeer klein, priemvormig. Kin groot, breed uitgerand, de tong zeer lang, de bovenlip ver overschrijdend, bijna tot aan de basis in twee, aan het uiteinde vliezige, lobben gedeeld. Liptasters zeer lang, het eerste lid 5 of 6 maal langer dan de twee volgende ledjes te zamen. Dekschilden aan het uiteinde, te zamen, boogsgewijze uitgerand, binnen de achterhoeken vrij diep uitge-

rand. Het laatste sterniet bij het ♂ in eene scherpe punt uitgetrokken. Bij het ♀ zijn de cerci (vaginaaltasters) lang doornachtig en overschrijden de anaalstiften zeer. Pooten vrij kort en slank; alle tarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven op moerassige plaatsen.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Sprieten zwartbruin. Dekschilden en achterlijf goudachtig-grauw vlekkelig behaard. Kleiner, het lichaam doorgaans smaller en meer gewelfd dan bij *brevicollis*. Halsschild smaller en glanziger. Sprietleedjes korter. Bestippeling veel sterker en minder dicht, zeer sterk korrelig op de dekschilden, alsmede zeer sterk op het achterlijf. Dekschilden korter dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde breed en stomp, het zesde sterniet drielobbig met eene sterk uitstekende middenlob; bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet iets uitgerand, het zesde sterniet eenigszins stomp uitstekend en aan weerszijden iets uitgerand. De cerci zijn doornachtig en naar buiten gekromd. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Onder vochtig mos en dorre bladeren, soms in aanspoelsel. Niet inh. in de Rijnprov. bij Elberfeld. (*variegata* Kiesw.)

Sprieten zwart, het eerste lid roodachtig. Dekschilden en achterlijf gelijkmatig fijn grijs behaard. Lichaam zwart, halsschild en achterlijf eenigszins glanzig. Tasters en tarsen roodachtig. Kop zeer glad, glanzig; het halsschild eenigszins trapeziumvormig, fijn bestippeld, aan de basis en langs de zijden een weinig ingedrukt, met eenigszins afgeronde achterhoeken. Dekschilden even lang als het halsschild, uiterst dicht rimpelig bestippeld; het achterlijf zeer sterk- en iets minder dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet diep en breed driehoekig uitgesneden, het zesde sterniet aan weerszijden van den top uitgebogen; bovendien vertoonen het vijfde en zesde onbedekt tergiet over het midden eene fijne kielvormige verhevenheid; bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet zeer flauw uitgebogen, het zesde sterniet steekt aan den top iets vooruit en is aan weerszijden iets uitgerand. De cerci zijn lang, slank, doornachtig en aan het uiteinde iets opwaarts gekromd. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Onder vochtig mos, dorre bladeren, dood riet, aanspoelsel en langs vennen en heideplassen. Bij Roermond, Naarden en Tiel. Ook in België bij Calmpthout en in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld. 1. *brevicollis* Payk.

X. Tribus DINOPSINI.

47. *Dinopsis* Matth.

Dit genus heeft den habitus van *Myllaena*, doch is van alle aanverwante *Aleocharinae* vooral onderscheiden door de 3-ledige tarsen. Lichaam fijn en dicht zijdeachtig behaard, naar het uiteinde toegespitst. Boventip meer dan dubbel zoo breed als lang, van voren iets afgerond. Voorkaken aan de binnenzijde, achter het uiteinde, met twee zeer groote tanden. Achterkaakslobben slank en geheel hoornachtig. Kaaktasters zeer lang en dun, schijnbaar 3-ledig, daar het vierde lid uiterst klein, vliezig en moeielijk zichtbaar is. Kin breed uitgerand; de tong groot, in twee afgeronde, vliezige lobben verdeeld. Het eerste liptaster-lid bijzonder groot. Dekschilden, binnen de achterhoeken, vrij diep uitgerand. Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ aan het uiteinde met eene kleine, hockige uitranding, bij het ♀ dieper ingesneden. De anaalstiften en het achtste onbedekt tergiet kunnen duidelijk uitgestoken worden. Klauwen getand.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze soort heeft den habitus van *Myllaena dubia*, doch is veel grooter, dof zwart, uiterst dicht en fijn zijdeachtig grauw behaard. Eerste sprietlid en de knieën min of meer roodbruin. Tarsen geel. Sprieten slank en dun. Lichaam uiterst dicht en fijn rimpelig bestippeld, vooral duidelijk op de dekschilden. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, iets breeder dan de dekschilden, naar voren versmald; de basis naast de rechte, naar achteren uitgetrokken achterhoeken duidelijk uitgerand. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde scherp driehoekig uitgesneden, het zesde sterniet stomp driehoekig. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet eene diepe insnijding en is het zesde sterniet driemaal uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Op slijk langs oevers, in aanspoelsel en soms in den vochtigen mof van oude wilgen. Verbreid, doch over het algemeen zeldzaam (*fuscata* Matth.) 1. *erosa* Steph.

II. Sub-Familie TRICHOPHYINAE.

XI. Tribus TRICHOPHYINI.

48. *Trichophya* Mannerh.

Lichaam eenigszins vlak gedrukt. Sprieten tamelijk ver voor de oogen, onder den zijrand van het voorhoofd, ingeplant, 11-ledig, de eerste twee leedjes groot, de overige haarfijn en in kransen bewimperd. Bovenlip nagenoeg dubbel zoo breed als lang, aan den voorrand afgerond en vliezig. Kaaktasters vrij lang en krachtig ontwikkeld. Kin recht afgeknut; de tong kort en breed, achter het uiteinde ingesnoerd. Liptasters uiterst klein, 3-ledig. Dekschilden den metathorax iets overschrijdend, aan de zijden niet gerand en binnen de achterhoeken zeer zwak uitgerand. Achterlijf op de bovenzijde en langs de zijden bewimperd. Schenen fijn behaard. Alle tarsen 5-ledig.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze soort herinnert eenigszins aan *Phloeocharis*, doch is veel grooter; bruinzwart, vrij dof en tamelijk dicht en lang grijs behaard. Sprieten, het uiteinde van het achterlijf en de pooten roodbruin, de dekschilden soms donkerbruin. Voorlijf dicht en rimpelig, het achterlijf veel lijner en dichter bestippeld. Kop driehoekig, met kleine uitpuilende, dicht aan den achterrand staande oogen. Halsschild sterk verbreed, in 't midden eenigszins hoekig, met zeer stompe achterhoeken en breed ingedrukte zijranden. Dekschilden te zamen nagenoeg vierkant, $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterker verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder steenen en plantenafval langs oevers, onder dorre bladeren, achter boomschors, tusschen vochtige houtspaanders in dennenboschen, in vochtig houtzaagsel, in afzanderijen, ook wel rondvliegende. Deze hoogst zeldzame soort werd eenmaal bij Zutphen gevangen. In België bij Leuven, in de Rijnprov. bij Crefeld, Aken en Elberfeld; ook in Westfalen 1. *pilicornis* Gyllh.

III. Sub-Familie HABROCERINAE.

XII. Tribus HABROCERINI.

49. *Habrocerus* Erichs.

Dit genus komt in habitus met Tachinus overeen, doch onderscheidt zich vooral door de, van af het derde lid, zeer dunne en in kransen bewimperde sprieten, de scheef afgeknutte buitenste tophoeken der dekschilden en de naar buiten sterk versmalde achtercoxae, bij welke geene scheiding tusschen een binnen- en een buitenblad zichtbaar is. Bovenlip eenigszins vierhoekig, van voren hoekig uitgesneden en van een uiterst kort bewimperden, vliezigen zoom voorzien. Voorkaken kort en zeer scherp. Kin recht afgeknut, de tong zeer dun vliezig, ongeveer tot aan het midden gespleten. Halsschild aan voor- en achterrand met 4-, aan den zijrand met 2 haarstippels. Dekschilden den metathorax iets overschrijdend, met scherpe zijrand lijst en daardoor met scherp begrensde epipleuren. Prosternum achter de voorcoxae vliezig, met onbedekte stigmata. Voor- en middelschenen fijn en verspreid-, de achterschenen bijna niet gedoord. Alle tarsen 5-ledig.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwartbruin, sterk glanzig, het voorlijf onbehaard, het achterlijf eenigszins dof, ten gevolge van de uiterst fijne, dichte beharing en de lijne, dichte bestippling. Sprieten, de randen van het halsschild, de randen der achterlijfsringen, het uiteinde van het achterlijf en de pooten geelachtig. De zijden van het lichaam en vooral het uiteinde van het achterlijf met wimperhaaren bezet. Soms is het halsschild meer donker geelbruin. Bij het ♂ is het vijfde onbedekt tergiet aan het uiteinde breed afgerond; het vijfde sterniet in het midden van den achterrand iets uitgerand, het zesde driehoekig toegespitst. Bij het ♀ is het vijfde

onbedekt tergiet eenigszins afgeknot en vóór den achterrand met borstelharen bezet; het vijfde sterniet nagenoeg even zeer verlengd als het vijfde onbedekt tergiet en van achteren breed afgeknot; het zesde sterniet niet verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Vooral in bosschen onder dorre bladeren, o. a. gemeen in de omstreken van den Haag. De larve en pop zijn door Rey beschreven 1. *capillaricornis* Grav.

IV. Sub Familie TACHYPORINAE.

XIII. Tribus HYPOCYPTINI.

50. *Hypocyptus* Mannerh.

Dit genus is zeer in 't oog vallend, doordat het zeer kleine lichaam het vermogen heeft, om tengerolge van het afwaarts buigen van kop en halsschild en het intrekken van het achterlijf, eene min of meer kogelvormige gedaante aan te nemen; daardoor herinnert het eenigszins aan *Agathidium*. De kop is zeer breed en kort, tegen de borst teruggeslagen en aan de onderzijde aan weerszijden, tot aansluiting aan de voor-coxae, uitgehoud. Sprieten 10-ledig. Kaaktasters matig lang, duidelijk 4-ledig, met duidelijk priemvormig eindlid. Halsschild dicht tegen de dekschilden aansluitend, met hoogvormig in den voorrand overgaande zijden. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig uitgesneden. Tarsen 4-ledig, bij het ♂ het eerste lid der voortarsen meer of minder verbreed. — De soorten van dit genus leven tusschen gras, onder plantenaftal, dorre bladeren, rietbundels, vermolmd boomsehors, in aanspoelsel, soms tusschen mieren en eene enkele soms in aantal op de bladeren van *Corylus*.

Van de 11 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Zevende sprietlid iets langer en veel dikker dan het zesde; het achtste tot tiende lid eenigszins tot eene knots verdikt. Glanzig zwart, fijn aschgrauw behaard. Sprieten en pooten geelbruin, de randen van het halsschild breed geel; dekschilden en uiteinde van het achterlijf meer bruin. Achterhoeken van het halsschild bijna recht. Dekschilden iets langer dan het halsschild, uiterst fijn en dicht bestippeld. Achterlijf duidelijker en meer verspreid behaard en bestippeld. Bij het ♂ is het eerste lid der voortarsen iets dikker, het zesde sterniet aan het uiteinde diep driehoekig uitgesneden. Lengte $1-1\frac{1}{2}$ mm. Gemeen onder dorre bladeren, steenen, mos, oud hout, in aanspoelsel, soms bij mieren en in Zuid-Limburg in groot aantal, des zomers, op de bladeren van *Corylus*. 1. *longicoruis* Payk.

Zevende sprietlid niet langer en ook niet dikker, veelal zelfs korter dan het zesde; het achtste tot tiende lid daardoor meer plotseling tot eene duidelijk afgescheiden knots verdikt 2

- 2 Achterhoeken van het halsschild duidelijk aangeduid, bijna recht of eenigszins stomp 3

Achterhoeken van het halsschild volkomen afgerond 4

- 3 Sprieten geheel lichtgeel. Lichaam glanzig zwartbruin, fijn en dicht grijs behaard, vooral op de dekschilden, die eenigszins dof zijn; zeer dicht en uiterst fijn bestippeld. Achterhoeken van het halsschild eenigszins stomp. Dekschilden slechts iets langer dan het halsschild. Achterlijf veel minder bestippeld en behaard. Sprieten en pooten lichtgeel, het uiteinde van het achterlijf roodachtig; halsschild en dekschilden veelal cenkleurig bruin, de randen van het halsschild meestal geelachtig. Bij het ♂ is het eerste lid der voortarsen veel dikker dan het tweede. Lengte 1 mm. Onder steenen, in vermolmd hout en soms bij mieren. Zeldzaam. Den Haag en in Limburg bij Wylré 2. *seminulum* Er.

Sprieten zwart of bruin, met min of meer lichter wortel. Deze soort is zeer verwant aan *seminulum*, doch is geheel zwart. De zijden van het halsschild, de coxae en de tarsen geelachtig-bruin; het uiteinde van het achterlijf soms bruin. Dekschilden op het midden soms bruinachtig; de achterhoeken van het halsschild zijn scherp aangeduid, bijna recht. Bij het ♂ is het eerste lid der voortarsen slechts iets verdikt. Lengte $\frac{1}{2}$ —1 mm. Onder vochtig mos, dorre bladeren, aanspoelsel, soms in paddestoelen op weilanden, of in eikenmolt. Verbreed, doch niet algemeen (nigripes Pandellé) 3. *ovulum* Heer.

- 4 Sprieten geheel geel. Dekschilden over het midden breed rood gevlekt, overigens zwart. Iets grooter dan *seminulum*, dichter behaard, de zijden van het halsschild breed geelachtig. De laatste twee achterlijfsringen en de pooten geelachtig; de 4 achterdijen meer

roodachtig en een weinig berookt. Bij het ♂ is het eerste lid der voortarsen verdikt en het zesde sterniet driehoekig uitgerand. Lengte 1-1½ mm. Niet zeldzaam onder dood riet en in aanspoelsel, zeldzamer in boomholn 4. *discoideus* Er.

Sprieten zwartachtig of bruin, met meer of minder licht gekleurden wortel. Dekschilden ongeklekt. Habitus van ovulum, doch minder diep zwart. Sprieten naar het uiteinde donkerder. Halsschild aan de zijden en aan de volkomen afgeronde achterhoeken breeder geel omzoomd. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig uitgerand en het eerste lid der voortarsen verdikt. Lengte ¾-1 mm. Onder mos, in aanspoelsel en onder steenen in gras. Zeer zeldzaam. Amsterdam, den Haag en Utrecht. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld. 5. *laeviusculus* Mrsh.

XIV. Tribus TACHYPORINI.

51. *Leucoparyphus* Kraatz.

(Cilica Jacq. Dav.)

Dit genus is verwant aan *Tachinus*, doch vooral onderscheiden door het gekielde mesosternum, de niet ontwikkelde epimeren van den prothorax, het zeer lange eerste lid der achtertarsen en de in beide seksen gewone voortarsen. De buitenhoeken der bovenlip en het vliezige uiteinde der buitenste achterkaaks-lob zijn met breede, platgedrukte haren bezet. Het eindlid der kaaktasters is meer dan dubbel zoo lang als het derde lid. De tong is in twee lange, fijn bewimperde lobben verdeeld. Het zesde onbedekt tergiet is bij beide seksen in 6 dunne, naar binnen in lengte toenemende, doornen gespleten; bij het ♂ zijn de middelste doornen door een minder diepe insnijding gescheiden dan bij het ♀; de zijdelingsche doornen dragen elk een lang wimperhaar, de middelsten zijn aan het uiteinde fijn bewimperd. Het zesde sterniet is bij het ♂ door een zeer diepe insnijding in twee lobben gedeeld; bij het ♀ is dit sterniet 6-deelig. Schenen krachtig gedoorn; alle tarsen 5 ledig, de voortarsen in beide seksen gewoon. De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Glanzig zwart, de eerste twee sprietleedjes geel. De zijden van het halsschild breed-, de voor- en achterrand zeer smal geel gezoomd. De dekschilden met een gele vlek over den naad, die zich langs den achterrand voortzet, zich daarop weder naar voren richt en al of niet samenhangt met een gele schouderstreep. De randen der sterniten en ook de pooten lichtgeel. Dekschilden iets langer dan het halsschild, uiterst fijn en eenigszins onduidelijk, rimpelig bestippeld. Achterlijf duidelijk en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde sterniet breed en vrij diep boogsgewijze uitgerand, de zijden der uitranding zijn hoekig uitgetrokken en met een borstelhaar bezet. Bij het ♀ draagt het vijfde sterniet aan den achterrand zes borstelharen. Lengte 3-3½ mm. Zeer verbreid, doch niet algemeen. Vooral in paardenmest, onder plantenalval, vochtig vermolmd hout, in broeikassen en veelal rondvliegend. De larve is door *Laboulbène* beschreven 1. *silphoides* L.

52. *Tachinus* Gravenh.

Lichaam tamelijk breed en eenigszins vlak gewelfd. Bovenlip in 't midden van den voorrand iets uitgebogen. Voorkaken kort en krachtig ontwikkeld. Eindlid der kaaktasters veel langer, veelal dubbel zoo lang als het derde lid. Kin groot, de tong zeer breed, tweelobbig. Mesosternum ongekiel. Epimeren van den prothorax achter de voorcoxae, als groote, driehoekige lobben ontwikkeld. Achterlijf bij de inlandsche soorten, op het midden van het eerste en tweede, soms ook van het derde of ook nog het vijfde onbedekt tergiet met twee zeer kleine witte haarstreepjes. Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ in een breede, naar achteren verlengde, meestal door een uitranding of een insnijding in twee tanden gedeelde midden-lob, en in twee korte, tandvormige of slechts een stompen hoek vormende zijlobben gedeeld. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet door veel diepere zijdelingsche insnijdingen gedeeld. Het vijfde sterniet bij het ♂ aan den achterrand meer of minder diep uitgerand, bij het ♀ afgeknut. Het zesde sterniet bij het ♂ door een zeer diepe insnijding in twee, naar het uiteinde versmalde en meer of minder gekromde lobben gedeeld. Bij het ♀ is het zesde sterniet

zesdeelig. Alle schenen gedoorn; alle tarsen 5-ledig, de eerste 3 leedjes der voortarsen bij het ♂ verbreed. — De larve van *T. laticollis* en *subterraneus* zijn door Rey, die van *rufipes* door Schödte en die van *humeralis* door Perris beschreven. — De soorten van dit genus leven onder allerlei rottende plantenresten en dierlijke stoffen, als aas en mest.

Van de 33 Europeesche soorten komen 12 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Lichaam zeer lang en smal, eenigszins cylindervormig, weinig glanzig. Achterlijf nagenoeg met parallele zijden; het eerste tot derde onbedekt tergiet vertoont op het midden twee kleine witte vlekjes (Sub-gen. *Drymoporus* Thoms.). Lichaam zwartbruin, lijn gehagrineerd. De sprieten, een zeer smalle zoom aan de zijden en aan de basis van het halsschild, een dergelijke zoom aan het uiteinde der dekschilden, welke veelal als een band tot aan de schouders reikt, alsook de randen der achterlijfsringen, het uiteinde van het achterlijf en de pooten lichter of donkerder rood. Halsschild vrij dicht en uiterst fijn bestippeld; dekschilden vrij krachtig, dicht en onregelmatig, hier en daar eenigszins tot langsrijen opeengedrongen, het achterlijf daarentegen lijner en meer verspreid bestippeld. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Achterlijf aan weerszijden geelachtig behaard. Bij het ♂ vertoont het metasternum twee bultjes, het vijfde sterniet eene breede uitranding, het zesde onbedekt tergiet 4 zeer korte, breede tandjes, van welke de middelste iets langer dan de buitenste zijn; het zesde sterniet vertoont twee sterk naar buiten gebogen, lange, spitse lobben. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet aan het uiteinde 4 even lange, smalle, spitse lobben. Lengte 6½—8 mm. Onder steenen, koemest en op mestvaalten. Deze hoogst zeldzame soort werd alleen in Limburg bij Maastricht en Roermond gevangen. Ook in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld; in België in de provincie Luik en in het „Bois de la Cambre” 1. *elongatus* Gyll.

Lichaam niet cylindervormig, eenigszins vlak gedrukt, met meer of minder toegespitst achterlijf; het eerste en tweede, of ook nog het derde en vierde onbedekt tergiet vertoont op het midden twee kleine, witte streepjes (Sub-gen. *Ellipsotomus* Motsch.). 2

- 2 Lichaam tamelijk smal, naar voren en naar achteren gelijkelijk versnald, de gehele bovenzijde lijn maar duidelijk gehagrineerd 3

Lichaam naar voren verbreed en naar achteren versnald, bij uitzondering over de gehele bovenzijde lijn gehagrineerd. 4

- 3 Lichaam glanzig zwart, de dekschilden bruin; de schouders, het uiteinde der dekschilden, de zijden en min of meer de basis van het halsschild, benevens de pooten, roodgeel. Sprieten geheel donker gekleurd. Halsschild uiterst fijn, de dekschilden iets minder fijn en vrij dicht bestippeld en met zeer zwakke sporen van langstrepes; achterlijf tamelijk lijn en dicht bestippeld, met geelgraauw behaarde zijden. Halsschild zeer verbreed, naar voren versnald, met afgeronde achterhoeken. Dekschilden 1½ maal zoo lang als het halsschild. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 scherpe tandjes, van welke de middelste het langst zijn; het zesde sterniet met zeer spits driehoekige slipjes; het vijfde sterniet vertoont eene diepe uitranding aan den top, welke aan weerszijden in een scherpen tand eindigt. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 even lange, spitse tandjes; het zesde sterniet met dicht aaneeuwaarts slipjes. Lengte 4—4½ mm. Zeer verbreed. Onder steenen, dorre bladeren, in paardenmest en soms op bloeiende dennen en andere planten . . . 2. *fimetarius* F.

Lichaam zwart, de dekschilden met eene breede oranjegele schoudervlek, welke zich soms tot bijna over de geheele lengte uitbreidt, zonder enige aanduiding van langstrepes. De eerste 4 sprietleedjes en de randen der achterlijfsringen roodbruin; de tarsen geelachtig. Halsschild veelal naar de achterhoeken of langs den geheelen zijrand breed geel gezoomd. Bij ab.c. *bicolor* Grav. zijn de zijden van het halsschild en de dekschilden op den naad en den achterrand na, geelrood. Bij sommige exemplaren zijn halsschild en dekschilden, behalve de zwarte naad, geheel roodachtig-oranjegeel, ook de pooten rood (ab.c. *ruficollis* Eppelsch.). Halsschild zeer lijn en dicht bestippeld, de dekschilden alsmede het achterlijf vrij sterk en zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ het zesde onbedekt tergiet met 4 stompe tandjes, van welke de middelste scherpe zijn, het zesde sterniet in tweeën gespleten, met lange, gebogen scherpe slipjes; het vijfde sterniet diep en breed uitgerand, aan weerszijden met een sterken, aan den top gespleten doorn, benevens een gekamd slipje. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 doornjes, van welke de middelste veel korter en slanker zijn; het zesde sterniet met bewimperde, vrij lange, smalle slipjes en eene gewone uitranding. Lengte 5—6½ mm. Niet zeldzaam op beenderen en anderen dierlijken afval; ook tusschen rottende plantenstoffen, in oud hout en aan uitvloeiende sappen 3. *subterraneus* L.

- 4 Halsschild en dekschilden sterk glanzig. Halsschild eenkleurig diep zwart, lijn bestippeld, de dekschilden eenkleurig levendig rood, grof en niet zeer dicht bestippeld. Lichaam overigens zwart,

- de tasters, de eerste 4 sprietleedjes en de pooten rood. De sprieten overigens bruin, de dijen en soms het uiteinde en de naad der dekschilden eenigszins berookt. Achterlijf tamelijk krachtig en niet zeer dicht bestippeld, lijn bruin gerand. Halsschild groot en breed, met stompe achterhoeken. Dekschilden iets langer dan breed. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet eene, van stompe tandjes voorziene middenlob, welke tandjes door eene insnijding gescheiden zijn; het zesde sterniet met, als gekromde hoorntjes ontwikkelde, middelste lobben; het vijfde sterniet iets uitgehold en met diep uitgeranden achterrand. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 doortjes en eene diepe insnijding in het midden, de buitenste doortjes zijn zeer lang en krachtig ontwikkeld; het zesde sterniet met bewimperde slipjes, welke door een groefje gescheiden zijn. Lengte 6½—7 mm. Onder koemest, rottende plantenstoffen, aas en aan boomsappen. Niet inlandsch. In België bij St. Gilles nabij Luik, in de Rijnprov. bij Alrweiler en Elberfeld (rufipennis Gylb.)
- Halsschild en dekschilden glanzig. Halsschild meestal aan de randen lichter gekleurd; de dekschilden bij uitzondering eenkleurig rood, in welk geval zij lijn en zeer dicht bestippeld zijn 5
- 5 Lichaam 3—4 mm. lang. Het eerste tot vierde onbedekt tergiet op het midden met witte streepjes 6
- Lichaam 4½—7½ mm. lang 8
- 6 Halsschild en dekschilden krachtig, doch minder dicht bestippeld. Dekschilden slechts aan het uiteinde lijn roodgeel gezoomd. Deze soort gelijkt overigens op *marginellus*. Pekbruin, de sprieten roodbruin met roodgelen wortel. Dekschilden korter, te zamen even lang als breed. Halsschild roodachtig, min of meer over het midden berookt, veelal geheel rood. Achterlijf krachtig bestippeld. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 korte tandjes, van welke de middelste het langst zijn; het zesde sterniet is uitgesneden, met driehoekige, eenigszins toegespitste slipjes; het vijfde sterniet is diep driehoekig ingesneden. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 even lange doortjes. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel licht roodachtig, met berooken kop en halsschild. Lengte 3—3½ mm. Niet zeldzaam onder steenen, mos, dorre bladen; ook in aanspoelsel of bij mieren 4. *collaris* Grav.
- Halsschild en dekschilden lijn en dicht bestippeld. Dekschilden meer of minder scherp geel- of roodachtig omzoomd. 7
- 7 Halsschild 1½ maal zoo breed als lang, nagenoeg even breed als de dekschilden, met stompe achterhoeken. Het eerste sprietlid roodgeel, de overige leedjes donkerder, die naar het uiteinde zwartachtig; het tweede tot vierde sprietlid dun. Glanzig zwart, de zijden en de basis van het halsschild scherp begrensd roodgeel; het uiteinde der dekschilden, de randen der achterlijfsringen, benevens de pooten eveneens roodgeelachtig; bovendien met een donkerrooden band, welke van de schouders ongeveer tot aan het uiteinde der dekschilden verloopt. De bestippeling op het halsschild is fijner dan op de dekschilden. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 lange tandjes, van welke de middelste meer uitstekend; het zesde sterniet is diep ingesneden en van driehoekige slipjes voorzien. Het vijfde sterniet met eene hoekige uitranding in het midden. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet ook 4 tandjes, van welke de zijdelingse lang, smal en spits zijn. Lengte 3—4 mm. Verbreid tusschen rottende plantenstoffen, onder mos, steenen en in aanspoelsel. Vooral in de duinstreken komt deze soort soms in groot aantal voor 5. *marginellus* F.
- Halsschild ongeveer dubbel zoo breed als lang, minstens even breed, gewoonlijk iets breeder dan de dekschilden, met afgeronde achterhoeken. Sprieten bruin, de wortel roodachtig, het tweede tot vierde lid verdikt. Deze soort is naverwant aan *marginellus*, doch korter en breeder. De sprieten zijn korter en krachtiger ontwikkeld. Dekschilden weinig langer dan het halsschild. De lichter gekleurde randen van het halsschild en de dekschilden zijn minder scherp begrensd dan bij *marginellus*, en meer donkerrood. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 tandjes, van welke de tussenruimte der twee middelste ongeveer dubbel zoo breed is als bij *marginellus*; het vijfde sterniet met eene breede half-cirkelvormige uitranding, waarvan het basaalgedeelte korrelig is, bij *marginellus* daarentegen glad. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 vrij lange tandjes, van welke de buitenste krachtiger, doch nagenoeg even lang als de middelste zijn. Bij onuitgekleurde exemplaren is de grondkleur soms min of meer roodachtig. Lengte 3½—4 mm. In koemest, onder mos, aanspoelsel en steenen. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam 6. *laticollis* Grav.
- 8 Het eerste tot derde of vierde onbedekt tergiet met witte streepjes in het midden. Dekschilden lichter of donkerder roodbruin, meestal over het midden berookt 9
- Alleen het eerste en tweede onbedekt tergiet van witte streepjes voorzien. Dekschilden donkerbruin tot zwart 11
- 9 Lichaam tamelijk smal; het halsschild even breed of slechts iets smaller dan de dekschilden.

Sprieten geheel zwart, of slechts het eerste lid gedeeltelijk rood. Deze soort is zeer verwant aan *humeralis*, doch veel kleiner, smaller, meer verlengd en meer glanzig zwart. De zijden van het halsschild, vooral naar de basis, zeer smal donkerrood gezoomd. Dekschilden, de randen der achterlijfsringen en de pooten donkerrood; de dekschilden over het midden beroekt. Halsschild zeer fijn bestippeld; dekschilden tusschen de lijne bestippeling uiterst fijn gechagrineerd; achterlijf iets fijner bestippeld. Bij het ♂ het zesde onbedekt tergiet als bij *humeralis* gevormd, het vijfde en zesde sterniet als bij *rufipes*. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet drielobbig, de middelste breedere lob is scherp toegespitst. Onuitgekleurde exemplaren zijn meer lichtrood of geelachtig. Lengte 5—7 mm. Niet zeldzaam. In koe- en paardenmest, halsschild even breed als de dekschilden, breed roodachtig omzoomd. Sprieten met roodachtigen wortel 7. *flavipes* F.

Lichaam breed; het halsschild even breed als de dekschilden, breed roodachtig omzoomd. Sprieten met roodachtigen wortel 10

- 10 Bestippeling uiterst fijn, doch minder dicht en niet rimpelig. De basis der dekschilden is vooral nabij het schildje lichter gekleurd of vertoont aldaar eene eenigszins geelroode, min of meer driehoekige vlek. Metasternum zonder groefjes. Deze soort is zeer verwant aan *humeralis*, doch doorgaans iets kleiner; ook zijn de dekschilden iets korter. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet aan den top uitgerand, het zesde sterniet met korte tandjes; bij het ♀ eindigt de middenlob in eene lange scherpe punt, welke even lang is als de lijne zijdoortjes. Lengte $5\frac{1}{2}$ —7 mm. In rottende paddestoelen, paardenmest, dorre bladeren, ook rondvliegende. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld en in het Ahrdal 1). (proximus Kr.)

Bestippeling uiterst fijn, dicht en eenigszins rimpelig. De basis der dekschilden is naar het schildje niet lichter gekleurd. Metasternum aan den achterrand met eene diepe middellijn en aan weerszijden daarvan met een langwerpige groefje. Met *rufipennis* de grootste soort van het genus en evenals deze glanzig zwart. De zijden van het halsschild breed, de voor- en achterrand smaller rood gezoomd. Dekschilden roodachtig, over het midden, vooral naar het uiteinde, beroekt, zeldzamer geheel roodachtig. De randen der achterlijfsringen, benevens de pooten, eveneens rood. De bestippeling op het achterlijf minder dicht. Halsschild breed, sterk naar voren versmald, met nagenoeg afgeronde achterhoeken. Dekschilden veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ het zesde onbedekt tergiet aan den top driehoekig uitgerand, het zesde sterniet smal uitgehold en tamelijk breed, hoekig uitgesneden; het vijfde sterniet breed uitgehold. Bij het ♀ het zesde onbedekt tergiet drielobbig, de middelste lob als een breed plaatje, waarvan het uiteinde eenigszins uitgetrokken is; het zesde sterniet met korte, bewimperde slipjes. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7½ mm. Niet zeldzaam. Onder menschen-uitwerpselen, aan aas, onder koemest, op rottende paddestoelen en onder vochtige spaanders van afgehakte boomstronken 8. *humeralis* Grav.

- 11 Halsschild langs alle randen of minstens langs de zijranden, zeer scherp geel of roodachtig-geelbruin gezoomd. Sprieten grootendeels zwart of zwartbruin, het vijfde tot elfde lid verlengd 12

Halsschild zwart, soms langs de zijden een weinig uitvloeiend bruinachtig 14

- 12 De voorlaatste sprit-leedjes niet langer dan breed 13

De voorlaatste sprit-leedjes duidelijk langer dan breed. Lichaam pekwart, de voor- en achterrand van het halsschild smal, de zijden tamelijk breed roodachtig geelbruin, de dekschilden roodachtig geelbruin, langs den naad en aan den buitenrand, voor de achterhoeken, meer of minder uitgebreid, zwartachtig. Spritwortel en pooten roodgeel. Kop en halsschild zeer fijn gechagrineerd en eenigszins verspreid bestippeld. Dekschilden ½ langer dan het halsschild, zeer fijn gechagrineerd, iets sterker en dichter dan het halsschild bestippeld. Achterlijf zeer fijn en vrij dicht bestippeld. Bij het ♂ is de middenlob van het zesde onbedekt tergiet in twee tanden gedeeld, het vierde sterniet in 't midden iets ingedrukt, het vijfde sterker ingedrukt en aan den achterrand oppervlakkig uitgerand, het zesde in twee matig lange, iets gekromde hoornen gedeeld. Bij het ♀ is de middenlob van het zesde onbedekt tergiet in twee zeer lange, smalle, scherpe doornen verdeeld, welke even lang zijn als de smalle, priemvormige zijlobben. Lengte 5—6½ mm. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnprov. bij Elberfeld gevangen zijn (marginatus Gyll.)

- 13 Halsschild aan de zijden en aan de basis breed geelachtig omzoomd. Dekschilden duidelijk langer dan breed, met een klein schouderplekje, dat veelal tot een smallen langband verlengd is, benevens een min of meer breed zoom aan het uiteinde roodachtig. De achterlijfs-ringen zijn roodachtig gerand. Bij niet volkomen uitgekleurde exemplaren is de naad der dekschilden ook min of meer geelachtig. Bij het ♂ steekt de middenlob van het zesde onbedekt tergiet sterk uit, en is door eene hoekige insnijding in twee tandjes gedeeld; het derde, vierde en vijfde sterniet is eenigszins ingedrukt; het vijfde uitgerand en het zesde in twee gekromde hoornen gedeeld. Bij het ♀ is de middenlob van het zesde onbedekt tergiet in twee slanke, scherpe doornen uitgetrokken; het zesde sterniet met bewimperde

1) Een Belgisch exemplaar uit Fleurus (vull. *Biert*) is *humeralis*.

slipjes, welke door eene diepe insnijding, wier basis tandvormig uitsteekt, gescheiden zijn. Lengte 5—5½ mm. Onder dorre bladeren, rottende plantenstoffen, mest en soms aan uitvloeiende sappen van boomen. Verbreid, doch overal vrij zeldzaam . . . 9. **pallipes** Grav.

Halschild langs de zijden smal geel gezoomd. Dekschilden te zamen even lang als breed, met eene uitgerande roodachtige schouderlek. Deze soort gelijkt iets op *bipustulatus*, doch het halschild vertoont niet de duidelijke, dwarsrimpelige sculptuur. Spriet en pooten roodgeel. Dekschilden uiterst fijn en dicht bestippeld, aan het uiteinde soms met een zeer smallen, donkerrooden zoom. Bij het ♂ eindigt het zesde onbedekt tergiet in 4 tandjes, van welke de middelste langer en scherper en door eene diepe insnijding gescheiden zijn; het vijfde sterniet is ingedrukt. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet eene veel smallere insnijding tusschen de middelste tandjes. Lengte 5½—6½ mm. In rottende paddestoelen, aas, koemest en onder steenen. Eenmaal bij den Haag. Ook in België bij Hollogne, Charleroi en Luik (*palliolatus* Kr.) 10. **scapularis** Steph.

- 14 Dekschilden te zamen even lang als breed, elk met eene groote, min of meer driehoekige, roode schouderlek. Spriet kort, geheel roodbruin, het vijfde tot tiende lid iets verbreed. Deze soort heeft den habitus van *rufipes*; het halschild is fijn en duidelijk dwarsrimpelig en bestippeld. Lichaam overigens zwart, een lijne basaalrand van het halschild, de randen der achterlijfsringen, benevens de pooten roodachtig; de zijden van het halschild soms iets bruin- of roodachtig. Halschild korter dan bij *rufipes*, naar voren meer versmald. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn halschild en achterlijf min of meer roodbruin. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet twee scherpe middentandjes, welke door eene kleine hoekige insnijding gescheiden zijn; het zesde sterniet met eene vrij diepe groef, het vijfde met eene breede nitholling, welke zich in eene lijne streep voortzet, die wederom in eene breede uitranding uitloopt. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet 4-tandig, de twee middelste tandjes zijn gescheiden door eene zeer breede, korte uitranding; het zesde sterniet met bewimperde slipjes, welke door eene, in 't midden iets getande uitranding gescheiden zijn. Lengte 4½—5½ mm. In molm van verschillende boomen, achter schors en in 't voorjaar aan uitvloeiende sappen van boomen. Zeer zeldzaam. Den Haag, Leiden, Rotterdam, Arnhem, Oldenzaal 1). In België bij Brussel en Hastière. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld.

11. **bipustulatus** F.

Dekschilden iets langer dan breed, aan den top lijn roodachtig gezoomd en soms met eene bruine schouderstip. Spriet, behalve de roodgale wortel, zwartachtig, het vijfde tot tiende lid zeer verlengd. Lichaam zwart, eenigszins gewelfd, zeer fijn bestippeld, vooral op het halschild. Een lijne zoom aan de basis van het halschild, de randen der achterlijfsringen, benevens de pooten roodgeel. Halschild met stompe achterhoeken. Bij slecht uitgekleurde exemplaren is het halschild meer donker-geelachtig gerand en zijn de dekschilden bruin. Bij het ♂ vertoont het zesde onbedekt tergiet twee vrij lange middentanden, welke gescheiden zijn door eene tamelijk breede insnijding; het zesde sterniet met eene breede groef; het derde en vierde sterniet is uitgehold; het vijfde aan het uiteinde eenigszins driehoekig, met een aantal wimpers. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet drielobbig, de middelste lob als een puntig uitgetrokken plaatje; het zesde sterniet met bewimperde slipjes, welke door eene gewone uitranding gescheiden zijn. Lengte 5½—6 mm. Onder steenen, rottende bladeren en paddestoelen, in mest en aanspoelsel; gemeen. 12. **rufipes** de Geer.

53. *Tachyporus* Grav.

Bovenlip van voren recht afgeknot. Eindlid der kaaktasters klein, priemvormig. Spriet tamelijk slank, naar het uiteinde weinig verdikt, niet zijdelings samengedrukt. Kop en halschild kaal. Achterlijf met scherp opgerichten zijrand en naar het uiteinde krachtig bewimperd. Prothorax zonder epimeren; het mesosternum ongekiel. Het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ gewoon, bij het ♀ in 4 smalle tanden verdeeld. Het zesde sterniet bij het ♂ diep driehoekig uitgesneden. Minstens de middelschenen duidelijk gedoornd. De eerste drie ledjes der voortarsen bij het ♂ sterker-, bij het ♀ slechts zwak verbreed of gevloet. Aan de middel- en achtertarsen is het eerste lid nagenoeg even lang als de drie volgende ledjes te zamen. Aan alle tarsen is het vierde lid zeer klein. De larve van *T. chrysomelinus* is door Schiötte beschreven. — De soorten van dit genus leven onder mos, tusschen dorre bladeren en in aanspoelsel.

Van de 18 Europeesche soorten komen 12 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1) Een eenigszins onuitgekleurd exemplaar uit Oldenzaal, van den heer G. de Vries aan Doetsburgh ontvangen, was door mij ten onrechte als *T. scapularis* gedetermineerd.

- 1 Kop en halsschild rood 1) 2
 Kop zwart of bruin 3
- 2 Dekschilden geelrood, met een zwarten band, die de basaalhelft inneemt; ook het sternum en de laatste achterlijfsringen, behalve de basis van het vijfde onbedekt tergiet, zwart. Lichaam overigens geelrood. Sprietlen lang, naar het uiteinde iets verdikt en weinig of niet berookt. Kop onbestippeld. Halsschild breed, met zeer stompe achterhoeken. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde een weinig versmald, met lange zwarte zijharen. Bestippeling en beharing zeer fijn en dicht. Bij het ♂ zijn de eerste drie leedjes der voortarsen duidelijk verbreed. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Zeer gemeen onder steenen, mos, plantenafval, dorre bladeren en in aanspoelsel 1. **obtus** L.
- Dekschilden geelrood, bij goed uitgekleurde exemplaren met een klein zwart vlekje aan den basaalrand, nabij het schildje. De basis der eerste achterlijfsringen zwart. Deze soort is zeer verwant aan *obtus*; de laatste sprietleedjes zijn iets meer verbreed en bruinachtig; de achterhoeken van het halsschild zijn meer afgerond. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, met veel kortere zijhaartjes. Sexueel verschil als bij *obtus*. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Onder mos en plantenafval, soms op struiken. Zeer zeldzaam. Bij Cuyk, Nieuwer-Amstel, Bunde en Gronsveld. In België bij Hoesselt en Rodenhof.
 (rufus Er.) 2. **formosus** Matth.
- Dekschilden eenkleurig roodgeel, de achterlijfsringen aan de basis zwartachtig; het uiteinde van het achterlijf min of meer geelachtig. Deze soort is zeer verwant aan *formosus*, doch kleiner en geheel licht geelbruin, ongevlekt, slechts de borst en een deel der achterlijfsringen zwart. Sprietlen naar het uiteinde minder verdikt, het tiende lid meer verlengd. Achterhoeken van het halsschild stomp, weinig of niet afgerond. Dekschilden weinig of niet langer dan het halsschild, veel korter dan bij de twee vorige soorten en veel fijner bestippeld. Achterlijf, vooral naar het uiteinde, fijner en dichter bestippeld. Lengte 2;—3 mm. Bij het ♂ zijn de eerste drie leedjes der voortarsen iets verbreed. Onder plantenafval. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld, Düsseldorf en Elberfeld . . . (ruficeps Kr.) (abdominalis F.)
- 3 Halsschild geheel roodgeel, hoogstens op het midden een weinig berookt, of zwart en alleen aan de randen geel 4
- Halsschild alleen op de voorhelft bruinzwart. Dekschilden op de voorhelft zwart, gewoonlijk iets blauwachtig iriserend, op de achterhelft roodgeel. Deze kleine soort is zeer in 't oog vallend door de kleur. Kop zwart, de achterlijfsringen aan de basis zwart, een weinig blauwachtig iriserend. Sprietwortel, de pooten en de sterniten breed geelrood gezoomd. Dekschilden vrij dicht en uiterst fijn-, het achterlijf zeer fijn en veel dichter bestippeld. Bij het ♂ zijn de eerste drie leedjes der voortarsen iets verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2; mm. Vooral in moerasige streken, onder dood riet, mos, aanspoelsel en langs overstroemde weilanden. Zeldzaam. Hillegersberg, Katwijk, Berg-en-Dal, Roermond en Oisterwijk. In België bij Verviers; in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 12. **transversalis** Grav.
- 4 Lichaam eenigszins ovaal, naar het uiteinde sterk toegespitst. Halsschild hoogstens iets breeder dan de dekschilden, welke gewoon- of slechts iets rimpelig bestippeld zijn 5
- Lichaam eenigszins langwerpig, met meer parallele zijden, een weinig platgedrukt. Halsschild duidelijk breder dan de dekschilden, welke duidelijk rimpelig bestippeld zijn. Deze soort is smaller dan de andere soorten. Sprietlen geelachtig; het halsschild met eene bruinachtige, uitvloeiende middenvlek. Dekschilden smal, met parallele zijden, bruin, rood- of geelachtig, om het schildje en aan den naad altijd iets donkerder, soms aan het uiteinde iets lichter, tamelijk ruw bestippeld, grijs behaard en daardoor weinig glanzig. Achterlijf meer verlengd, aan het uiteinde toegespitst, geelrood, de ringen aan de basis zwartachtig, behalve de laatste ring, die geheel geel is. Bij het ♂ zijn de eerste drie leedjes der voortarsen iets verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2; mm. Zeer gemeen tusschen afgevallen bladeren, in gras, onder steenen en dood riet. Veelal bij mieren (brunneus F.) 11. **nitidulus** F.
- 5 Dekschilden geelrood of rood, met eene scutellair-vlek en veelal ook langs den buitenrand grootendeels zwart 6
- Dekschilden grootendeels zwart, bruin of wel geelachtig, zonder driehoekige vlek om het schildje 9
- 6 Lichaam $2\frac{3}{4}$ —4 mm. lang 7
- Lichaam $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. lang. Eene groote scutellair-vlek, welke veelal over een deel van den naad uitgetrokken is, en soms de zijranden der dekschilden zwart. Halsschild dikwijls over

1) Bij onuitgekleurde exemplaren van soorten met zwarten kop, is deze soms min of meer roodachtig; de onvolkomen ontwikkeling der kleuren valt daarbij intusschen gemakkelij in het oog.

het midden iets berookt. Habitus en kleur van *chrysomelinus*, doch veel kleiner, smaller en minder gewelfd. Sprietten bruin, met geelachtigen wortel. Halsschild korter en smaller. Dekschilden iets sterker en meer verspreid-, het achterlijf iets sterker bestippeld. Achterlijf zwart, de ringen geel gerand. Bij het ♂ zijn de eerste drie leedjes der voortarsen iets verbreed. Onder plantenafval, mos en in gras. Verbreed, doch vrij zeldzaam. 6. **tersus** Er.

7 Halsschild geheel geelrood, hoogstens op het midden iets berookt 3

Halsschild zwart, met naar de achterhoeken sterk verbreed, roodgelen zijrand. Dekschilden rood, eene driehoekige scutellair-vlek en een randzoom, welke bijna tot aan het uiteinde reikt, zwart. Achterlijf zwart, de ringen geelachtig gerand. Sprietten langer en dunner dan bij *chrysomelinus*. Halsschild langer, met meer afgeronde achterhoeken. Dekschilden langer. Bij het ♂ zijn de eerste 3 leedjes der voortarsen sterk verbreed. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Zeer gemeen; terzelfder plaatse als *chrysomelinus*. Ook soms bij mieren.

5. **hypnorum** F.

3 Scutellair-vlek der dekschilden klein, niet op den naad uitgetrokken. Dekschilden sterk en verspreid bestippeld, overigens geheel roodgeel. Halsschild geelrood, soms met een donker vlekje op het midden. Kop zwart, de dekschilden roodgeel. Achterlijf zwart of bruin, met geel gerande ringen. Sprietten vrij lang, roodachtig, het vijfde tot elide lid soms iets donkerder. Halsschild iets breder dan de dekschilden, met afgeronde achterhoeken. Dekschilden iets langer dan het halsschild, naar het uiteinde iets versmald, met fijne korte haartjes aan de zijden. Bestippeling op het achterlijf dichter dan op de dekschilden. Bij het ♂ zijn de sprietten langer behaard en de eerste drie leedjes der voortarsen iets verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{2}{3}$ mm. Verbreed en niet zeldzaam onder mos, plantenafval, op vochtige plaatsen.

3. **solutus** Er.

Scutellair-vlek der dekschilden eenigszins driehoekig, zeer groot en min of meer over den naad uitgetrokken. Halsschild eenkleurig roodgeel of slechts op het midden een weinig beoek. Dekschilden dicht bestippeld, meer rood, aan de zijden tot over het midden breed zwart gezoomd. Deze soort is zeer verwant aan *solutus*. Sprietten iets dunner. Halsschild korter, nagenoeg even breed als de dekschilden. Dekschilden langer, naar het uiteinde nauwelijks iets versmald, veel fijner bestippeld, met lange zwarte haren aan de zijranden. Achterlijf meer behaard. Bij het ♂ zijn de eerste drie leedjes der voortarsen vrij sterk verbreed. Lengte $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen onder steenen, plantenafval, mos, in aanspoelsel en soms op bloemen of bij mieren. 4. **chrysomelinus** L.

9 Kop duidelijk bestippeld. Halsschild rood- of geelachtig, ongevekt. Deze soort heeft den habitus van een kleinen *chrysomelinus*, doch is smaller. Sprietten korter. Dekschilden langer dan het halsschild, meer behaard, aan de basis meer of minder uitgebreid zwart of zwartbruin; overigens min of meer lichtrood, of wel eene roodachtige X-vormige vlek bevindt zich over de beide donkere dekschilden te zamen. Soms zijn de dekschilden bijna geheel donker, terwijl dan slechts een breede roode zoom aan het uiteinde overblijft. Bestippeling minder dicht. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn halsschild en dekschilden geelachtig, min of meer bruin gevlekt. Bij het ♂ zijn de eerste 3 leedjes der voortarsen iets verbreed en de middel-tarsen meer behaard. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder steenen, dorre bladeren, dood riet, mos, stukken hout en soms bij mieren. Verbreed doch vrij zeldzaam.

(humerosus Er.) 7. **atriceps** Steph.

Kop niet of zeer onduidelijk bestippeld. 10

10 Lichaam kort en breed. Dekschilden iets korter dan het halsschild, zwart, soms iets iriseerend, aan het uiteinde en soms aan den naad roodachtig, zelden eenkleurig zwart. Halsschild geelrood; de kop zwart; de randen der achterlijfsringen zeer smal roodachtig; de pooten geelachtig. Halsschild met vrij duidelijke achterhoeken. Dekschilden, even als het halsschild, zeer onduidelijk-, het achterlijf daarentegen zeer lijn en dicht bestippeld. Ongeveugeld. Bij het ♂ is het vijfde sterniet uitgerand, het zesde als gewoonlijk hoekig uitgesneden. De eerste 3 leedjes der voortarsen sterk verbreed. Lengte $2\frac{5}{8}$ — $3\frac{1}{4}$ mm. Onder mos, in boschen en duinstreken. Uiterst zeldzaam. Zutphen, Leiden, Roermond, Aalbeek (Limburg). Ook in België en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 8. **ruficollis** Grav.

Lichaam kort-ovaal. Dekschilden langer dan het halsschild, zwart of bruin. Halsschild zwart-achtig of pekkbruin, rood- of geelachtig gerand 11

11 Halsschild, dekschilden en achterlijf zwart. Dekschilden vrij duidelijk-, eenigszins rimpelig bestippeld, met rood- of geelachtigen zoom aan den achterrand, welke zich soms min of meer langs den zijrand voortzet. Lichaam sterk glanzig. De eerste 2 of 3 sprietleedjes geelachtig; de achterrand en de zijranden van het halsschild, vooral naar de achterhoeken, de randen der achterlijfsringen en de pooten geelrood. Halsschild breed, naar voren aanmerkelijk versmald, met afgeronde achterhoeken. Dekschilden iets langer dan het halsschild, lijn behaard. Achterlijf lijn-, naar het uiteinde meer verspreid bestippeld. Bij het ♂ zijn de eerste 3 leedjes

der voortarsen iets verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam in de duinstreken tusschen helm. Ook onder steenen, mos, dorre bladeren, in aanspoelsel en soms bij mieren.

(scitulus Er.) 9. *macropterus* Steph.

Halsschild en achterlijf pekwart; de dekschilden bruin, tamelijk lijn en dicht bestippeld en hier en daar met enkele dwarsrimpeltjes. Deze soort is zeer verwant aan *macropterus*, doch meestal iets plomper, breeder en minder gewelfd. Dekschilden* langer, weinig glanzig, dichter en langer behaard, de maad en de zijden veelal meer zwartachtig, iets lijner en dichter bestippeld; aan het uiteinde slechts zeer smal geelachtig gezoomd. Bij het ♂ zijn de eerste 3 leedjes der voortarsen sterk verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam onder dorre bladeren en allerlei plantenafval 10. *pusillus* Grav.

54. Lamprius Heer.

Dit genus is zeer verwant aan Tachyporus en vooral onderscheiden door de kortere, naar het uiteinde meer verdikte, zijdelings samengedrukte sprieten. Ook zijn de middel- en achtertarsen zijdelings samengedrukt, het tweede tot vierde lid der middel- en achtertarsen neemt in lengte geleidelijk af en het vierde tarslid is slechts $\frac{1}{4}$ of $\frac{1}{3}$ korter dan het derde.

Van de 5 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild geelachtig-rood, breed, eenigszins half-cirkelvormig. Habitus en kleur van *Tachyporus solutus*, doch grooter, breeder en meer gewelfd. Sprieten rood, het knotsvormige uiteinde zeer sterk zijdelings samengedrukt, het zevende tot tiende lid zeer verbreed en eenigszins kegelvormig, het elfde zeer groot en langwerpig. Dekschilden even lang als het halsschild, om het schildje iets donkerder, uiterst fijn en zeer dicht bestippeld. Het achterlijf met meer zwarte haartjes dan bij *T. solutus*, evenzoo bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed driehoekig uitgerand; bij het ♀ het zesde onbedekt tergiet van 4 randjes voorzien. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder steenen, mos en in de nesten van *Myrmica laevinodis*. Uiterst zeldzaam. Loosduinen, Oirschot, Meerssen. Ook in België en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Elberfeld 1. *saginatus* Grav.

Halsschild zwart, aan de zijden naar de achterhoeken min of meer rood 2

- 2 Sprieten knotsvormig, het vierde tot zevende lid niet verbreed. Halsschild half-cirkelvormig. Deze soort heeft de kleur van *Tachyporus hypnorum*, doch is veel grooter en breeder, ook zijn de dekschilden donkerder rood. Sprieten roestkleurig, zijdelings samengedrukt, het elfde lid groot, kort-ovaal. Halsschild zeer groot, breeder en naar voren meer versmald dan bij *erythropterus*, aan de zijranden rood, evenals bij *T. hypnorum*. Dekschilden geheel rood, om het schildje weinig of niet donkerder, iets langer dan het halsschild, lijner en dichter bestippeld dan bij *erythropterus*. Achterlijf meer verspreid bestippeld en meer zwartachtig behaard. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet van 4 tandjes voorzien, waarvan de twee middelste kleiner dan de buitenste zijn. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen bij *Tapinoma erraticum*, onder plantenafval in bosschen; in het najaar. Niet inl. In de Rijnprov. bij Elberfeld en Linz a/R. Ik zag exemplaren uit de coll. *Wasmann* en een typisch exemplaar uit Elberfeld in het Weener Hofmuseum . . . (haematopterus Kr.)

Sprieten spoelvormig, het vierde tot tiende lid verbreed. Halsschild naar voren zeer weinig versmald. Habitus en kleur van *Tachyporus hypnorum*; gemakkelijk te herkennen aan de eenigszins cilindervormige gedaante, de korte roode, zeer verbrede en zijdelings platgedrukte sprieten, van welke het laatste lid langwerpig-ovaal is. Kop veel breeder; halsschild met, vooral naar achteren, rood gekleurde zijden. Dekschilden iets korter dan het halsschild, rood. Achterlijfsringen geelachtig gerand, met zeer fijne gele haartjes bezet. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig uitgesneden. Lengte 3 mm. Bij *Tetramorium caespitum* en *Lasius brunneus*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Cleef. Ook in België (Cerythropterus Panz.)

55. Conurus Steph.

(Conosoma Kraatz)

Bovenlip van voren afgeknut of zeer zwak uitgerand. Voorkaken kort en krachtig ontwikkeld, aan de binnenzijde zeer fijn getand. Eindlid der kaaktasters klein, priemvormig. Kin sterk verbreed, de tong driehoekig uitgesneden. Dekschilden met fijne zijrandlijst. Achterlijf gewelfd, aan de zijden niet of slechts zeer onduidelijk gerand,

aan het uiteinde krachtig bewimperd, het zesde onbedekt tergiet bij het ♂ ongedeeld, bij het ♀ in 4 tandjes gespleten. Het zesde sterniet bij het ♂ uitgerand, bij het ♀ afgerond. Voorschienen aan den buitenrand uiterst dicht met korte doortjes bezet. De eerste 3 leedjes der voortarsen gewoonlijk ook bij het ♀, doch zwakker dan bij het ♂ verbreed. De geheele bovenzijde van het lichaam fijn neerliggend behaard. — De larve van *C. litoreus* is door Perris beschreven. — De soorten van dit genus leven tusschen schimmelende, afgevallen bladeren, rottende plantengestoffen, in vermolmd hout en achter schimmelende boomschors.

Van de 14 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden elk nabij de basis met eene duidelijke rood- of geelachtige vlek 2
Dekschilden zonder lichtere vlek aan de basis 4
- 2 Dekschilden langs de zijranden en aan het uiteinde met lange wimperharen. Bovenzijde zwart, lijn geelachtig behaard. Kop en halsschild tamelijk glanzig. Basis en uiteinde der sprieten, eene schoudervlek, welke zich tot aan het uiteinde van den naad boogsgewijs voortzet, alsook de pooten roodgeel. Halsschild met stompe achterhoeken. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, fijn doch niet zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het eerste lid der voortarsen langer dan de twee volgende leedjes te zamen en dikker dan het tweede lid; het zesde sterniet is driehoekig ingesneden. Bij het ♀ is het zesde sterniet afgerond en bewimperd, het zesde onbedekt tergiet is van 4 tandjes voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Achter boomschors en in vermolmd hout. Eenmaal bij Berkel nabij Delft in Juli. Ook in de Rijnprov. bij Cleef en Düsseldorf en in België in de prov. Brabant 1. *bipunctatus* Grav.

Dekschilden zonder wimperharen. Lengte 4 — $4\frac{1}{2}$ mm. 3

- 3 Lichaam uiterst fijn bestippeld. De oranjegele dwarsvlek aan de basis der dekschilden is kort en breed en reikt nimmer tot aan den naad of den zijrand. Halsschild ongevlekt, doch aan de basis zeer smal roodachtig gezoomd. Deze soort heeft den habitus van *litoreus*, doch de kleur van *bipunctatus*; zij is breeder en meer gewelld dan eerstgenoemde soort. De sprieten zijn korter en reiken niet over de basis van het halsschild. Halsschild breeder, met stompe, niet naar achteren uitgetrokken achterhoeken. Dekschilden iets langer dan het halsschild, evenals het achterlijf geelachtig behaard. Achterlijf fijn en zeer dicht bestippeld, aan den zijrand en vooral naar het uiteinde lang bewimperd, de ringen geelachtig gerand. Bij het ♂ zijn de voortarsen iets meer verbreed dan bij het ♀; het zesde sterniet is sterk driehoekig ingesneden. Bij het ♀ vertoont het zesde onbedekt tergiet 4 tandjes. Lengte 4 — $4\frac{1}{2}$ mm. Onder mos, in vermolmd hout en paddestoelen, ook in kelders. Niet inl. Zij komt in de Rijnprov. bij Crefeld, Düsseldorf en Aken voor (*bipunctulatus* Grav.)
- Lichaam uiterst fijn gehagrineerd. De gele of roodgele vlek op de dekschilden verloopt min of meer in schuine richting van af de basis naar het midden van den naad. Halsschild aan de rechte, eenigszins naar achteren uitgetrokken achterhoeken breed geel gevlekt. Lichaam donkerbruin, tamelijk dof, fijn en zeer dicht zijdeachtig behaard. Basis en uiteinde der sprieten, de randen der achterlijfsringen en de pooten geel. Naad en uiteinde der dekschilden veelal roodachtig gerand. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild. Bij onuitgekleurde exemplaren is de grondkleur licht roodbruin. Bij het ♂ zijn de voortarsen verbreed; het zesde sterniet is diep driehoekig uitgerand. Bij het ♀ steekt het zesde sterniet uit en is het zesde onbedekt tergiet van 4 tandjes voorzien. Lengte 4 — $4\frac{1}{2}$ mm. Verbruid, onder rottende plantengestoffen, in vermolmd hout, achter boomschors en soms bij *Lasius fuliginosus*. 2. *litoreus* L.
- 4 Epipleuren der dekschilden smal en nagenoeg onbehaard. Lichaam $1\frac{1}{2}$ — 2 mm. lang. Deze soort is zeer verwant aan *immaculatus*, doch kleiner, naar verhouding iets korter en breeder en ook iets duidelijker bestippeld. Halsschild zwartbruin, roodbruin of geelachtig, met eenigszins afgeronde achterhoeken. Dekschilden iets korter of even lang als het halsschild, zwartbruin of bruin, aan het uiteinde geelachtig gerand; soms zijn zij nagenoeg geheel licht roodbruin. Zwartbruine exemplaren, bij welke de dekschilden korter dan het halsschild zijn, vormen het ras *pedicularius* Grav.; licht gekleurde exemplaren met langere dekschilden, het ras *lividus* Er. Bij het ♂ zijn de voortarsen iets verbreed. Vooral het ras *lividus* in het voorjaar zeer gemeen onder steenen, dorre bladeren en oud hout. Het ras *pedicularius* zeldzaam; Rotterdam, Valkenburg (*lividus* Er.) 3. *pedicularius* Grav.
- Epipleuren der dekschilden breed en even duidelijk behaard als de bovenzijde. Lichaam $2\frac{1}{2}$ — 4 mm. lang 5
- 5 Bindlid der, naar het uiteinde weinig verdikte, sprieten veel langer dan breed. De zijden van het halsschild voor de zeer stompe, eenigszins afgeronde achterhoeken tamelijk sterk afgerond. Lichaam zwart of zwartbruin, eenigszins dof, vooral de dekschilden en het achterlijf;

vrij lang en dicht grijs behaard; zeer fijn en zeer dicht bestippeld. Sprieten geelrood, in het midden gewoonlijk iets donkerder gekleurd, langer dan kop en halsschild te zamen. Halsschild naar voren sterk versmald, de achterrand fijn roodgeel gerand. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild, naar het uiteinde iets versmald, roodbruin, aan de basis veelal iets berookt. Achterlijfsringen breed roodgeel gerand. Bij onuitgekleurde exemplaren is het geheele lichaam roodgeel. Bij het ♂ zijn de voortarsen verbreed; het zesde sterniet is aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Gemeen onder steenen, dorre bladeren, vermolmd hout, mos, op vochtige plaatsen; ook soms bij mieren. Hare bewegingen zijn eenigszins spartelend. 4. **pubescens** Payk.

Eindlid der naar het uiteinde sterk verdikte sprieten iets breeder dan of even breed als lang. De zijden van het halsschild voor de meer scherp aangeduide stompe achterhoeken weinig afgerond. Dekschilden doorgaans donkerder gekleurd. Overigens in kleur en habitus met *pubescens* overeenkomend, doch veel kleiner. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Verbreed op vochtige plaatsen onder plantenaafval en dorre bladeren. . . . (fuscus Er.) 5 **immaculatus** Steph.

XV. Tribus BOLITOBIINI.

56. *Bryocharis* Boisd. et Lacord.

Dit genus is naverwant aan Bolitobius en vooral onderscheiden door het zeer groote eindlid der liptasters, hetwelk veel dikker dan de eerste twee leedjes en aan den scheef afgeknotten top uitgehold is; ook is het eerste lid der middel- en achtertarsen op de onderzijde met eenige fijne doortjes bezet. Bij het ♂ zijn de eerste drie leedjes der voortarsen meer of minder verbreed. De soorten van dit genus leven onder mos en in molm van oude boomen.

Van de 6 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

- 1 Dekschilden met eenige meer of minder duidelijke stippelrijen, overigens onbestippeld. Halsschild zwart 2
- Dekschilden over de geheele oppervlakte vrij dicht of meer verspreid en sterk bestippeld. . . 3
- 2 Voorcoxae zwartachtig. De eerste 3 en de laatste 2 sprietleedjes geel, het derde en tiende lid soms berookt. De middelste stippels aan den voorrand van het halsschild staan nagenoeg even ver van elkaar als van de buitenste stippels. Lichaam glanzig zwart, de mond en de pooten geelachtig; de dekschilden, de vijfde achterlijfsring, behalve het zwarte basaalgedeelte en de zesde geheel roodachtig. Dekschilden en achterlijf een weinig iriserend. Halsschild naar voren vrij sterk versmald, met stompe achterhoeken. Dekschilden langer dan het halsschild, met eene middenrij van 4 tot 5- en eene naadrij van 4 tot 7 stippels. Achterlijf krachtig doch niet zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterk verbreed. Het laatste sprietlid is meer dan dubbel zoo lang als het tiende; het zesde sterniet is lobvormig verlengd en aan den top bewimperd, met eene sterk behaarde middengroef. Lengte 7—8 mm. Zeer zeldzaam. In rottende boomstronken, tusschen dorre bladeren, onder mos en steenen. Breda, den Haag, Loosdruin, Hilversum, Arnhem, Roermond, Crailoo (Drenthe), Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. . 1. **cingulatus** Mannerh.
- Voorcoxae geelachtig, soms aan de basis iets berookt. De eerste 4 sprietleedjes geel, het laatste lid soms min of meer berookt. De middelste stippels aan den voorrand van het halsschild zijn van elkaar verder verwijderd dan van de buitenste stippels. Deze soort gelijkt zeer op *cingulatus*, doch is kleiner en smaller. Sprieten korter en slanker, met minder verlengde leedjes. Zeer zelden zijn de dekschilden een weinig berookt. Onuitgekleurde (?) exemplaren met geelrood halsschild zijn als *merdarius* Gylh. beschreven. Bij het ♂ zijn de voortarsen iets verbreed. Het elfde sprietlid is bijna gelijk aan de 3 voorafgaande leedjes te zamen; het zesde sterniet is minder lobvormig verlengd en iets bewimperd. Lengte $5\frac{1}{2}$ —7 mm. Onder steenen, mos, plantenaafval, dorre bladeren, achter boomsehors, in aanspoelsel en soms in paddestoelen of bij *Lasius fuliginosus*. Verbreed doch vrij zeldzaam. De vorm *merdarius* zag ik nimmer 2. **analis** F.
- 3 Gevleugeld. Dekschilden sterk en dicht bestippeld, veel langer dan het halsschild. Deze soort heeft den habitus van *cingulatus*. De bestippeling van het achterlijf is iets minder dicht, vooral in 't midden van de eerste tergiten. Lichaam roodachtig. Kop en achterlijf zwart of bruinzwart. Sprieten geelrood. Halsschild langs de zijden afgerond, naar voren aanmerkelijk versmald, de basaalrand aan weerszijden iets uitgerand, met twee stippels dicht bij elkaar in het midden op de voorzijde. Dekschilden, evenals het achterlijf, een weinig iriserend. De achterlijfsringen zijn rood gerand, de laatste geheel roodachtig. Onuitgekleurde exemplaren

zijn geheel geelachtig. Bij het ♂ zijn de eerste twee voortarsen-leedjes, alsook het eerste lid der middeltarsen sterk verbreed. De middelschenen zijn naar het uiteinde driehoekig verdikt en aldaar uitgerand; het zesde sterniet is aan het uiteinde smal uitgesneden. Lengte 7—7½ mm. Onder dorre bladeren, oud hout, soms in aanspoelsel; in boschrijke streken. Deze zeldzame soort werd eenmaal bij Warnsveld nabij Zutphen in Sept. aangetroffen. In België bij Verviers en Fleurus. In de Rijnprov. bij Cleef, Düsseldorf en Elberfeld.

3. *inclinans* Grav.

Ongevlengeld. Dekschilden verspreid bestippeld, slechts weinig langer dan het halsschild. Lichaam lichtrood. Kop en achterlijf zwart; het uiteinde van het achterlijf rood. Deze soort is naverwant aan *inclinans*, doch veel kleiner en minder verlengd. Spriet en pooten geelrood, het midden der spriet en gewoonlijk bruinachtig. Halsschild korter, naar voren meer versmald, breeder dan de dekschilden. Achterlijf een weinig iriseerend, de eerste 5 achterlijfsringen zeer smal rood gerand. Bij het ♂ zijn de spriet langer dan bij het ♀, het eerste voortarsen-lid is korter dan bij het ♂ van *inclinans*, het derde iets breeder; het zesde sterniet met eene breedere, kortere en minder scherpe insnijding. Onuitgekleurde exemplaren zijn geelachtig, de eerste 6 achterlijfsringen voor den achterrand bruin. Lengte 6—6½ mm. In rottende boleten, onder steenen, dorre bladeren, achter eikenschors, in vochtig mos. Bij Blijenbeek nabij Roermond, in Dec. een ♀ onder het mos van een den. Ook eenmaal bij Maarsbergen tusschen *Sphagnum*, Mei. In de Rijnprov. bij Elberfeld.

4. *formosus* Grav.57. *Bolitobius* Mannerh.

Bovenlip even lang als breed of breeder dan lang, van voren afgeknut. Voorkaken tamelijk slank, aan de binnenzijde ongetand. Tweede lid der liptasters weinig korter en smaller dan het eerste, het eindlid nagenoeg even lang als de eerste twee leedjes te zamen, weinig smaller dan het tweede. Kin trapeziumvormig; de tong vliezig en in 't midden driehoekig uitgesneden. Halsschild achter den voorrand en voor den achterrand met 4 stippen, bovendien aan den zeer fijn kantigen zijrand met eenige stippen. Dekschilden langs den naad en langs den scherpen zijkant met eene verdiepte streep; langs de naad- en de zijstreep met eene stippelrij en bovendien met eene soms verdiepte stippelrij, welke als middenrij kan aangeduid worden. Achterlijf naar het uiteinde toegespitst; het zesde onbedekt tergiet in beide seksen gewoon. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde uitgerand of afgeknut, bij het ♀ afgerond. Schenen krachtig en spaarzaam gedeurd. Tarsen 5-ledig. — De soorten leven in paddestoelen.

Van de 11 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Spriet en meer of minder slank, van af het vijfde lid slechts zwak of matig sterk naar het uiteinde verdikt, het vijfde lid hoogstens even breed als lang, de voorlaatste leedjes niet of slechts matig sterk verbreed. Kaaktasters meer of minder slank. Achterlijf naar het uiteinde duidelijk toegespitst. 2
- Spriet kort en dik, van af het vijfde lid zeer sterk naar het uiteinde verdikt, het vijfde lid verbreed, de voorlaatste leedjes meer dan dubbel zoo breed als lang. Kaaktasters dik. Achterlijf naar het uiteinde slechts matig versmald (Sub-gen. *Carphacis* Gozis). Lichaam zwart, het halsschild veelal met roodbruine randen, soms geheel roodbruin, de dekschilden bruinrood, met eene groote zwarte vlek voor de achterhoeken, welke den achterrand en den naad vrijlaat, de achterranden der achterlijfsringen rood- of geelbruin, de eerste 4 leedjes der bruine spriet, de tasters en de pooten geelrood. Halsschild aan de basis lijn gerand. Dekschilden slechts weinig langer dan het halsschild, met eene iets verdiepte middenrij van 4 tot 8 stippels; de stippels van de naadrij zijn iets lijner. Achterlijf sterk behaard, krachtig doch niet zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet van achteren iets ingedrukt en glad, aan het uiteinde zeer zwak tweemaal uitgerand. Lengte 4½—5½ mm. In paddestoelen, rottende boleten, plantenafval, mos, achter boomenschors en soms in mierennesten. Niet inlandsch. In België bij Leuven, in de Rijnprov. bij Düsseldorf (striatus Oliv.)
- 2 Kop duidelijk langer dan breed, achter de oogen met parallelle zijden, zwart. De oogen langwerpig en vlak. Achtertarsen veel langer dan de schenen (Sub-gen. *Bolitobius* isp.). Halsschild en achterlijf roodachtig; pooten geelachtig. De laatste achterlijfsringen en de dekschilden, behalve eene gele vlek aan de basis en het smalle gele uiteinde, iriseerend zwart. 3
- Kop kort, even lang als breed of breeder. De oogen ovaal, eenigszins uitpuilend. Achtertarsen niet veel langer dan de schenen (Sub-gen. *Lordithon* Thoms.). 4

- 3 De basis van het halsschild niet gerand. Het eindlid der sprieten nagenoeg even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Schildje zwart; de beide gele driehoekige dwarsvlekken aan de basis der dekschilden door den breeden, zwarten naad gescheiden. Lichaam sterk toegespitst, glanzig geelrood. Kop, borst, middel- en achtercoxae en het vijfde tot tiende sprietlid zwart. Het achterlijf is geelrood; het uiteinde, behalve de basis en den geelachtigen of breed geel gezoomden achterrand van den zevenden ring zwart. Dekschilden langer dan het halsschild, met eene naad- en middenrij uit 6 tot 8 stippels bestaande. Achterlijf verspreid en sterk-, naar het uiteinde iets dichter bestippeld. Bij het ♂ is het laatste sprietlid iets langer dan de twee voorafgaande leedjes te zamen; het zesde sterniet aan de zijden vrij dicht bestippeld, langs het midden glad, aan den achterrand afgeknut of zwak uitgerand. Lengte 5—6½ mm. Zeer gemeen in paddestoelen, vooral in de heidestroken.

(atricapillus F.) 1. *lunulatus* L.

De basis van het halsschild lijn gerand. Het eindlid der sprieten veel korter dan de twee voorlaatste leedjes te zamen. Schildje geel; de gele dwarsvlekken aan de basis der dekschilden stooten op den naad bijna tegen elkaar. Overigens in habitus en kleur met *lunulatus* overeenkomende, doch doorgaans iets kleiner. Middelcoxae grootendeels geelachtig. De beide rijen der dekschilden uit 4 tot 5 stippels bestaande. Achterlijf iets meer bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top afgeknut. Lengte 4—5 mm. In paddestoelen, onder mos en achter boomschors. Niet inlandsch. In België bij Verviers en in de Rijnprov. bij Crefeld. (*lunulatus* Er.) (*pulchellus* Mannh.)

- 4 Geel- of bruinrood, eene groote driehoekige vlek in de achterhoeken der dekschilden, het metasternum en het achterlijf zwart, de eerste 4 sprietleedjes en de pooten roodgeel, de overige sprietleedjes, behalve het roodachtige uiteinde van het eindlid, zwartbruin. Dekschilden met breed gegroefde middenrijen. Eindlid der sprieten dubbel zoo lang als het voorlaatste lid. Bij het ♂ het zevende sterniet met een kielvormig bultje. Lengte 6—7½ mm. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnprov. gevangen zijn. (*bicolor* Grav.)

Kleur veranderlijk, de kop echter altijd zwart of bruin. De middenrijen der dekschilden niet of slechts smal verdiept 5

- 5 Zevende tot tiende sprietlid langer dan of even lang als breed 6

Zevende tot tiende sprietlid duidelijk breder dan lang. Naverwant aan *exoletus*, doch zeer veranderlijk in vorm en kleur. Kop zwart, het halsschild donkerbruin, geel gerand, de dekschilden geelachtig, aan het uiteinde en om het schildje donker gevlekt. De vlekken der dekschilden ontbreken veelal, evenals die van het halsschild, waardoor het lichaam geheel geelachtig is met zwartachtigen kop en naar het uiteinde berookte sprieten. De kop en de dekschilden zijn iets korter dan bij *exoletus*. Dekschilden met rijen van 3 tot 6 stippels, welke ook soms nagenoeg ontbreken kunnen. Achterlijf dichter bestippeld, op de eerste tergiten wat fijner. Bij het ras *biguttatus* Steph. is het lichaam geelrood, doch neemt de zwarte kleur het geheele halsschild in, behalve aan de zijranden en aan den basaalrand; zoo ook de dekschilden behalve eene scheeve vlek aan de basis, alsook het achterlijf, behalve de randen der ringen. Bij een exemplaar uit den Haag zijn de dekschilden nagenoeg geheel zwart. Bij het ♂ vertoont het zesde sterniet een gladden driehoekigen langsindruk in 't midden, welke aan den top als een klein kielvormig bultje opgericht is. Lengte 2½—4½ mm. Zeer gemeen in paddestoelen 4. *pygmaeus* F.

- 6 Halsschild aan de basis lijn gerand. Dekschilden met eene zwarte scutellair-vlek, welke zich min of meer langs den naad voortzet, en eene zwarte vlek aan den buiten-tophoek, welke niet tot aan den achterrand reikt en ook zelden den zijrand bereikt. Deze soort is ook zeer veranderlijk in kleur en grootte. Lichaam geelachtig, het halsschild iets roodachtig, gewoonlijk met eene meer of minder duidelijke donkere middenvlek, welke echter ook dikwijls ontbreekt. Achterlijfsringen aan de basis min of meer zwartachtig of bruin, of wel geheel roodachtig, behalve de achtste ring, die aan de basis bruinachtig is. Kop zwart. Soms ontbreken de vlekken op het halsschild en de dekschilden nagenoeg geheel. Halsschild naar voren versmald, met stompe achterhoeken. Dekschilden veel breder en veel langer dan het halsschild, met eene, soms iets verdiepte naad- en middenrij van 6 tot 11 stippels. Achterlijf sterk-, doch zeer verspreid-, naar het uiteinde iets dichter bestippeld. Bij het ♂ vertoont het zesde sterniet een langsindruk in het midden en aan de basis eene kielvormige verhevenheid of een bultje. Lengte 4—5 mm. Vrij zeldzaam. In rottende paddestoelen. Breda, Vorden, Roermond en Maastricht. In België bij Leuven en Tervuren.

(trimaculatus Steph.) 2. *trinotatus* Er. 1)

Halsschild aan de basis niet gerand. Dekschilden slechts met eene min of meer uitgebreide zwarte vlek aan den buiten-tophoek, welke tot aan den achterrand reikt. Halsschild eenkleurig

1) De uit Crefeld, Dusseldorf en België verzamelde exemplaren van *B. trimaculatus* Payk., behooren tot *B. trinotatus* Lr. Eerstgenoemde soort wordt meer in Oostelyk Europa aangetroffen.

geel. Deze soort is zeer verwant aan *trinotatus*, doch gewoonlijk kleiner en smaller. De naad- en middenrij met gegroefd, uit ongeveer 12 stippels bestaande. Achterlijf geelachtig, de basis der ringen veelal iets berookt. Bij een exemplaar uit Arnhem breidt zich de zwarte vlek op de dekschilden bijna over de geheele oppervlakte uit. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets ingedrukt en aan het uiteinde uitgerand, zonder bultje aan de basis. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen in paddestoelen, vooral in 't najaar.

(angularis Steph.) 3. *exoletus* Er.

58. *Bryoporus* Kraatz.

Dit genus vormt den overgang tusschen *Bolitobius* en *Mycetoporus*. De eerste 3 liftaster-leeftjes nemen aanmerkelijk in dikte af, het tweede lid is slechts half zoo lang en half zoo dik als het eerste; het eindlid veenig langer en veel smaller dan het tweede. Het laatste kaaktaster-lid is evenals bij *Bolitobius*, zoo lang als of nauwelijks korter dan het voorlaatste, doch aan de basis veel smaller dan het uiteinde van het voorlaatste lid. — De soorten van dit genus leven vooral onder rochtig mos.

Van de 7 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild zwart, zelden roodachtig (ab.c. **merdarius* Oliv.), aan de basis eenigszins rood gezoomd. Deze soort gelijkt op eene kleine *Bryocharis analis*, terwijl zij in kleur veel overeenkomst heeft met *Mycetoporus splendens*, doch zeer onderscheiden is door de uiterst fijne, verspreide bestippling van het halsschild. Dekschilden bloedrood, evenals het zwarte achterlijf min of meer iriserend, met verwarde stippelrijen, welke uit weinige stippels bestaan, en daartusschen met enkele, zeer verspreide, fijnere stippels. Achterlijf krachtig en niet zeer dicht bestippeld. De eerste 3 sprietleeftjes en de pooten geelrood; de randen der achterlijfsringen en het uiteinde van het achterlijf rood. Halsschild met stompe achterhoeken en met twee groote stippels voor op het midden, welke van den voorrand bijna even ver als van elkaar verwijderd zijn. Dekschilden even breed als en veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed ingedrukt, het steekt eenigszins uit en draagt 3 zeer kleine haarbultjes; ook zijn de voorlaatste sprietleeftjes bij het ♂ nauwelijks-, bij het ♀ iets breeder dan lang. Lengte 5— $5\frac{1}{2}$ mm. Onder dorre bladeren, mos, achter dennenschors, in paddestoelen en langs oevers. Eenmaal bij Roermond. In België bij Verviers en in de Rijnprov. bij Cleef en Crefeld. 1. *cernuus* Grav.

Halsschild en dekschilden geheel rood. Halsschild, evenals bij *cernuus*, uiterst fijn en verspreid bestippeld; de twee groote stippels voor op het halsschild staan dicht bij den voorrand dan bij elkaar. Dekschilden met eene midden- en naadrij van 5 of 6 stippels en daartusschen lijn-, hier en daar in onduidelijke rijen bestippeld. Achterlijf grover bestippeld dan bij *cernuus* en iets minder en korter behaard. Lichaam rood, zeer glanzig, de basis der achterlijfsringen en veelal ook de kop donkerder, meer bruin. Sprietwortel en pooten geelrood. Halsschild met sterk afgeronde achterhoeken, naar voren sterk versmald. Lengte 4—5 mm. Aan uityloeiende sappen van eiken, onder dorre bladeren en steenen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Cleef en Crefeld. (*rufus* Er.)

59. *Mycetoporus* Mannerh

Dit genus onderscheidt zich van *Bolitobius* en *Bryoporus*, vooral door het kleine priemvormige eindlid der kaaktasters, hetwelk veel korter en smaller is dan het derde lid. Het tweede liftaster-lid is nauwelijks half zoo lang en half zoo breed als het eerste, het eindlid veel smaller en langer dan het tweede lid. Lichaam langwerpig. De soorten van dit genus leven onder afgevallen bladeren en rochtig mos.

Van de 30 Europeesche soorten komen 9 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprietten zeer lang, ongeveer het eerste derde gedeelte der dekschilden bereikende, alle leeftjes langer dan breed. Achtertarsen zeer lang, de eerste twee leeftjes re zamen even lang als de schenen, het vijfde lid niet langer dan het vierde. Epipleuren der dekschilden naar voren versmald (Sub-gen. *Ischnosoma* Thoms.). Lichaam zeer lang en smal, glanzig roodgeel, de kop grootendeels en de dekschilden aan de basis zwartachtig, zelden grootendeels zwart. Achterlijf zwart, met roode randen der ringen en gewoonlijk rood uiteinde.

Sprieten bruin met geelachtig eerste lid, of wel geelachtig en alleen in het midden berookt. Kop eenigszins langwerpig en naar voren versmald. Kin veel langer dan aan den voorrand breed. Halsschild naar voren duidelijk versmald, aan weerszijden van de basis met twee stippels. Dekschilden veel langer dan of even lang als het halsschild, met eene naad- en middenrij van 5 tot 11 stippels. Achterlijf vrij dicht en tamelijk krachtig bestippeld. Bij de var. *longicornis* Mäkl. is de kop korter, ongeveer even lang als breed, de kin zeer weinig langer dan aan den voorrand breed; de kop en de dekschilden geel, zelden met eene zwarte vlek op de dekschilden; het achterlijf veelal grootendeels geelrood, de voorlaatste ringen aan de basis donkerder. Bij het ♂ is het vijfde sterniet meer of minder diep uitgerand, in de nitranding met gele haartjes in 't midden en zwarte haartjes aan de zijden; het zesde sterniet scherp driehoekig ingesneden, aan weerszijden met een haarbundeltje. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel geel of met eenigszins berookt achterlijf en eene meer of minder duidelijke, donkere vlek aan de basis der dekschilden. Lengte 3-4 mm. Zeer gemeen onder steenen, plantenafval, dorre bladeren, mos, in aanspoelsel en soms bij *Lasius umbratus*. De var. *longicornis* werd nog niet in Nederland waargenomen. Zij zou in Westfalen voorkomen. Volgens *Ganglbauer* is deze eene goede soort.

1. *splendidus* Grav.

- Sprieten vrij kort, zelfs de basis der dekschilden ternaauwernood bereikend, naar het uiteinde verbreed, de meeste leedjes breeder dan lang. Achtertarsen lang, de eerste drie leedjes even lang als de schenen, het vijfde lid langer dan het vierde. Epipleuren der dekschilden naar voren niet versmald (Sub-gen. *Mycetoporus* isp.) 2
- 2 Dekschilden met 2, 3 of 4 langsrijen van stippels over het midden, daaronder niet begrepen eene naad- en eene uiterste randrij. 3
- Dekschilden slechts met eene enkele rij stippels over het midden. 7
- 3 Halsschild, behalve de stippels nabij den voorrand, zonder bijkomende stippels aan weerszijden van het midden. Zie ook bij *punctatus* Gylh. (ab. *semirufus* Heer) 4
- Halsschild, behalve de stippels nabij den voorrand, met twee, bij *bicolor* Mäkl. met drie bijkomende stippels ter weerszijden van het midden; deze zouden ook kunnen ontbreken (**semirufus* Heer). Lichaam geelrood of licht roodachtig, de kop, de omgeslagen zijden der dekschilden gewoonlijk, het sternum en de basis der achterlijfsringen zwart. Sprietwortel en pooten geelachtig. Dekschilden soms over het midden bruin gevlekt, eenigszins iriserend. Sprieten korter dan bij *rufescens*, met breedere leedjes. Halsschild korter, breeder en naar voren meer versmald. Dekschilden eveneens korter, met eene middenrij van 8 tot 10 stippels en daarnaast eene tweede rij, uit weinige stippels bestaande. Achterlijf iets dichter en krachtiger bestippeld. Lengte 4-4½ mm. Onder mos, dorre bladeren, achter dennenschors en in plantenafval. Vrij zeldzaam. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Leiden, den Haag, Brummen, Amerongen, Berg-en-Dal en Roermond. (*punctatus* Fauvel) 4. **punctatus** Gylh.
- 4 Dekschilden, behalve de naad- en rand-stippelrij nog met 4 rijen van 12 tot 14 stippels over het midden. Halsschild niet breeder dan de dekschilden. Lichaam tamelijk breed, glanzig. Kop zwart, de dekschilden en het achterlijf lichter of donkerder bruin of zwartachtig, sterk blanwachtig-iriserend; het midden van het halsschild en de sprieten donkerrood, de eerste twee sprietleedjes, de randen en soms ook het midden van het halsschild, eene schoudervlek en een snalle zoom aan het uiteinde der dekschilden, de randen der achterlijfsringen, benevens de pooten geelachtig. Bij var. **laevicollis* Epp. is het halsschild zwart, met roodachtigen achterrand; de dekschilden rood, de omgeving van het schildje en de omgeslagen zijden zwart. Halsschild kort, met sterk afgeronde achterhoeken en met eene dwarsrij van 4 stippels nabij den voorrand, alsmede 4 stippels aan den achterrand. Dekschilden veel langer dan het halsschild, aan de buitenhoeken met eene plooi. Achterlijf tamelijk lijn en verspreid bestippeld. Lengte 3½-5 mm. Onder mos, dorre bladeren, plantenafval, achter dennenschors, in *Sphagnum* en paddestoelen. Zeer zeldzaam. Den Haag, Arnhem, Maarsbergen en Roermond. In de Rijnprov. bij Crefeld. (Incidus Er.) 2. **rufescens** Steph.
- Dekschilden, behalve de naad- en rand-stippelrij slechts met twee stippelrijen over het midden, van welke de binnenste soms slechts door 2 tot 4 stippels nabij het uiteinde kan aangeduid zijn. 5
- 5 Halsschild zeer kort en breed, iets breeder dan de dekschilden. De binnenste stippelrij der dekschilden slechts nabij het uiteinde aangeduid. Lichaam zwart, de achterrand en soms ook de zijrand van het halsschild, benevens de dekschilden, welke gewoonlijk over het midden donkerbruin zijn, roodachtig. Habitus van *rufescens*, doch in den regel veel grooter; de dekschilden, evenals het achterlijf, sterk iriserend, met 3 duidelijke rijen, elk van 8 tot 12 stippels, eene zij-, eene naad- en eene middenrij, de vierde is bijna niet aangeduid. Dekschilden met parallelle zijden. Lengte 4½-5½ mm. In dennenschors en onder afgevallen dennennaalden. Niet inl. In België bij Luik en in de Rijnprov. bij Düsseldorf (Märkelii Kraatz)

- Halsschild zeer smal en gestrekt, niet breeder dan de dekschilden. De binnenste stippelrij der dekschilden goed ontwikkeld en uit een 6-tal stippels bestaande 6
- 6 Metasternum tusschen de middelcoxae smaller dan de trochanters. Kop berookt, halsschild en dekschilden geelrood. Lichaam smal; de sprieten kort en dik, het zevende tot tiende lid zeer breed. Halsschild zonder bijkomende stippels aan weerszijden van het midden. Dek-schilden nagenoeg even lang als het halsschild, met twee middenrijen, van welke de bui-tenste uit 8 tot 12 stippels bestaat. Achterlijf donkerbruin, dicht en lang behaard, de afzon-derlijke ringen geelrood gerand, tamelijk fijn en niet zeer dicht bestippeld. Sprieten en pooten geelrood, de sprietwortel iets lichter. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Onder mos, achter dennenschors, in aanspoelsel en tusschen dorre bladeren. Niet inl. In Duitschland en Frankrijk.
(Mulsanti Ganglb.) (tenuis Muls. & Rey) 1)
- Metasternum tusschen de middelcoxae iets breeder dan de trochanters. Lichaam zwart, de sprietwortel, de pooten, de achterrand der dekschilden en niet zelden ook de naad bruin-achtig-geel, zelden zijn de dekschilden geheel roodachtig (ab.c. *piculus* Rey). De voor-coxae zijn meestal, de achterdijen zeldzamer pekbruin. Achterlijfsringen roodachtig gerand. Overigens aan tennis verwant. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Onder mos, achter dennenschors, in aanspoelsel en op de duinen in zandkuilen en tusschen dorre bladeren. Zeldzaam.
(Baudueri Muls. & Rey) 3. **nanus** Er.
- 7 Halsschild met 1 tot 4 bijkomende stippels aan weerszijden van het midden. Lichaam lang en smal, glanzig pekzwart of pekbruin; dekschilden rood, om het schildje en langs de zijden zwart (ab.c. *longulus* Mannerh.), soms naar het uiteinde zwart gevlekt of behalve eene geelroode schoudervlek bijna geheel zwart (ab.c. *bimaculatus* Boisd. & Lac.). Sprieten met lichter wortel, soms geheel geelachtig (ab.c. *ruficornis* Kr.). De smalle achterrand van het halsschild, de randen der achterlijfsringen en de pooten lichtrood, de dijen meest bruin. Veelal is de geheele bovenzijde lichter of donkerder roodbruin en zijn de sprieten geel (ab.c. *lepidus* Grav.); donkere, nagenoeg eenkleurige exemplaren vormen ab.c. *tristis* Grav. Halsschild naar voren versmald, met stompe achterhoeken en de 4 gewone stippels aan voor- en achterrand. Dekschilden iets langer dan het halsschild, met eene langsrij van 5 tot 10 stippels nabij het midden en eene tweede langs den naad. Achterlijf dicht en sterk bestippeld en behaard. Onuitgekleurde exemplaren zijn grotendeels licht roodgeel of geel. Lengte 3 — $4\frac{1}{2}$ mm. Deze zeer veranderlijke soort is gemeen tusschen afgevallen bladeren, in mos, aanspoelsel, op bloemen en 's avonds rondvliegende in bosschen en op weilanden. Ook in het voorjaar in zandkuilen op de duinen 5. **brunneus** Mrsh.
- Halsschild zonder bijkomende stippels aan weerszijden van het midden 8
- 8 Dekschilden ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild 9
- Dekschilden slechts weinig langer dan het halsschild 11
- 9 Achterlijf zeer grof en diep bestippeld. Deze soort gelijkt zeer op de ab.c. *longulus* van brunneus. Lichaam glanzig zwart, de dekschilden bloedrood, om het schildje en langs de zijden zwart, de eerste 3 of 4 sprietleedjes en de pooten geelrood; coxae en achterdijen bruin. Sprieten als bij brunneus, doch naar het uiteinde dikker. De voor- en achterrands-tippels van het halsschild meer van den rand verwijderd. Dekschilden met 3 rijen van 5—9 stippels, van welke de eene nabij het midden, de tweede langs den naad en de derde langs den zijrand staat. Bij sommige exemplaren is de achterrand van het halsschild en het achterlijf meer roodachtig. Bij het ♂ is het vijfde en zesde sterniet driehoekig ver-lengd en het uiteinde daarvan kielvormig opgericht. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Onder mos, rottende plantengestoffen, steenen en in aanspoelsel. Meermalen in de omstreken van Maastricht aangetroffen 7. **splendens** Mrsh.
- Achterlijf matig sterk en tamelijk verspreid bestippeld 10
- 10 De twee middelste stippels aan den voorrand van het halsschild, daarvan nauwelijks verder verwijderd dan de twee zijdelingsche. Eene in kleur zeer veranderlijke soort. Kop zwart; het halsschild pekbruin, met roodbruine randen of rood met donker midden of wel eenkleurig rood; de dekschilden zwart, aan de s houders, aan den naad en aan den achterrand rood, of rood met een donkeren dwarsband en om het schildje donker, of rood en slechts aan het schildje en aan den buitenrand bruinachtig; het achterlijf pekzwart of pekbruin met roodbruinen achterrand der ringen; de sprietwortel en pooten roodgeel. Deze soort is het naast verwant aan clavicornis, doch vooral onderscheiden door den zwarten kop, de langere dekschilden en het grooter aantal stippels (8—10) van de middenrij, ook zijn de sprieten naar het uiteinde veel meer verbreed, het achste tot tiende lid nagenoeg dubbel zoo breed als lang en is het eindlid de helft langer dan het voorlaatste. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm.

1) Volgens Fautel is M. tenuis Muls. & Rey niet als soort van nanus, Er. te onderscheiden.

Onder mos en steenen, op vochtige plaatsen. Niet inlandsch. In België bij Luik en Roumont, ook in Westfalen. Ik zag een Belgisch exemplaar uit de collectie *Wesmæl*.

(Reichei Paul.)

De twee middelste stippels aan den voorrand van het halsschild daarvan verder afstaande dan de twee zijdelingsche. Deze soort heeft min of meer den habitus van *nannus*. Glanzig zwart, de sprietwortel, de randen en de basis van het halsschild, eene schoudervlek, het uiteinde van den naad en vooral de buitenhoeken der dekschilden, benevens de randen der achterlijfsringen en de pooten geelachtig. Het zevende tot tiende sprietlid zeer breed, het elfde lid klein en zeer kort. Dekschilden naar het uiteinde verbreed, met rijen van 9—12 stippels. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Onder steenen, mos, dorre bladeren, achter boomschors, in plantenafval en in den zonneschijn vliegende. Eenmaal bij Bunde nabij Maastricht in Mei. Ook in België en in Westfalen. (niger Baudi) 6. **angularis** Muls. & Rey.

- 11 Kop altijd geelachtig-rood. Achterlijf zeer sterk en enigszins verspreid bestippeld. Deze soort gelijkt op *clavicornis*, doch is grooter en breeder en naar voren en naar achteren meer toegespitst. Geelrood, de borst, de zijden der dekschilden en het achterlijf zwartachtig. Het derde sprietlid is breed, iets langer dan het tweede, het vierde en vijfde nagenoeg even lang als breed, het zesde tot tiende geleidelijk korter, het elfde zeer kort en stomp. Halsschild korter, breeder, naar voren meer versmald en met meer afgeronde achterhoeken. Dekschilden even lang als het halsschild, om het schildje iets donkerder, en met eene rij van 4 of 5 stippels. Lengte 4 mm. Bij Roermond, den Haag en Gilze-Rijen.

8. **forticornis** Fauvel.

Kop bruin, rood- of geelachtig. Achterlijf tamelijk fijn en zeer dicht bestippeld. Lichaam geelrood. Het vijfde tot tiende sprietlid en het achterlijf min of meer berookt. Sprietten krachtig ontwikkeld, het derde sprietlid is tamelijk smal en niet langer dan het tweede, het vierde is verbreed, het vijfde sterk verbreed en met de volgende eene knots vormend. Dekschilden even lang als het halsschild, met eene rij van 5 tot 7 stippels. Lengte 3 mm. Niet zeldzaam in de heidestrecken onder dorre bladeren, mos, oud hout, steenen, in paddestoelen, soms bij mieren en in aanspoelsel; ook wel 's avonds vliegende.

(pronus Er.) 9. **clavicornis** Steph.

V. Sub-Familie STAPHYLINAE.

XVI. Tribus QUEDIINI.

Tanygnathus Erichs.

Dit genus herinnert in voorkomen aan *Tachyporus*, doch onderscheidt zich vooral door de lange, dunne kaaktasters en de 4-ledige middel- en achtertarsen. De kop is langwerpig, klein, nagenoeg tot aan de oogen in het halsschild teruggetrokken, onder de oogen fijn gerand. Pooten vrij kort, de middelschenen met vele, de voor- en achterschenen slechts met enkele doorntjes bezet. Voortarsen 5-ledig. Bij het ♂ zijn de eerste drie leedjes der voortarsen verbreed en aan de onderzijde solig.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Deze soort heeft enigszins het voorkomen van *Tachyporus ruficollis*. Glanzig zwart; halsschild geelrood, de voorheft grootendeels bruin gezoomd. Achterrand der dekschilden en der achterlijfsringen roodachtig. Pooten en het eerste sprietlid geelachtig. Sprietten zeer lang en dun, met zeer verlengde leedjes. Kop en halsschild onbestippeld, het halsschild naar voren sterk versmald, met stompe achterhoeken en twee stippels nabij het midden op de schijf. Dekschilden enigszins dol, dicht grijs behaard en duidelijk en dicht rimpelig bestippeld. Achterlijf een weinig iriseerend, grijs behaard en bovendien met vele lange afstaande haren, fijn bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed en vrij diep uiterand. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder dood riet langs oevers. Niet inlandsch. In Frankrijk en Duitschland (terminalis Er.)

60. *Acylophorus* Nordmann.

Dit genus herinnert in habitus zeer aan de soorten van het genus *Quedius* en is vooral onderscheiden door den bouw der sprietten, wier eerste lid zeer lang, schafvormig en veel langer is dan de 4 volgende leedjes te zamen (Fig. 24). Kop tamelijk

klein, ovaal, aan de basis iets ingesnoerd, met een kort dik halsgedeelte. Bovenlip sterk verbreed, in 't midden zwak ingesneden. Voorkaken ongelijk, de rechter lang en slank, in 't midden van den binnenrand scherp getand; de linker kort, aan de binnenzijde met twee groote tanden. De middelschenen met vele, de achterschenen slechts met weinige doornen bezet. Alle tarsen 5-ledig.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Dekschilden krachtig en rimpelig, niet dicht bestippeld, tamelijk glanzig. Achterlijf minder grof, aan de basis der tergiten dichter, aan het uiteinde zeer verspreid bestippeld, niet of onduidelijk iriserend. Mond en pooten zwartachtig, de knieën en tarsen roodachtig. Deze soort heeft min of meer den habitus en kleur van *Philonthus varius*, doch is geheel zwart, sterk glanzig. Dekschilden en achterlijf lang, doch niet zeer dicht grijs behaard. Uiteinde van den zevenden achterlijfsring bij het levende dier roodachtig. De laatste sprietleedjes knotsvormig verbreed. Halsschild kort en breed, naar voren sterk versmald, op het midden met twee stippels. Schildje bestippeld. Lengte 6—7 mm. Onder dorre bladeren, plantenaafval, in aanspoelsel, veenmos, op slib langs oevers en in mos langs beekjes. Niet inlandsch. Volgens *Faavel* in het geheele gebied der Gallo-rhenane fauna.

(*glabricollis* Boisd. & Lac.) (*glaberrimus* Herbst)

Dekschilden krachtig en dicht, eenigszins raw bestippeld, tamelijk dof. Achterlijf minder grof en meer verspreid bestippeld dan de dekschilden, duidelijk bronzig iriseerend. Mond en pooten rood. Halsschild naar voren minder versmald. Sprieten langer en slanker. Overigens aan *glaberrimus* gelijk. Lengte $7\frac{1}{2}$ —8 $\frac{1}{2}$ mm. Onder dorre bladeren, in plantenaafval, mos en op moerassige plaatsen. Deze uiterst zeldzame soort werd eenmaal bij Breda in Aug. onder mos aangetroffen. 1. **Wagschieberi** Kiesw.

Enryporus Erichs.

Dit genus kenmerkt zich vooral door den vorm der sprieten en liptasters en de in beide seksen gevoene voortarsen. Sprieten tamelijk dun, na het eerste lid knievormig gebogen, het eerste lid ongeveer even lang als de twee volgende leedjes te zamen. Kop klein, aan de basis ingesnoerd, met kort en breed halsgedeelte, onder de groote oogen scherp gerand. Bovenlip meer of minder diep ingesneden. Kaaktasters draadvormig, het tweede lid meer dan dubbel zoo lang als het eerste, het derde korter dan het tweede, het eindlid ongeveer even lang als het tweede, min of meer toegespitst. Het eindlid der liptasters is groot, driehoekig-bijlvormig, met zeer breed en scheef afgeknot uiteinde. Schenen weinig gedoorn; alle tarsen 5-ledig.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Habitus en kleur van *Quedius tristis*, doch breeder, sterk glanzig zwart, vooral op kop en halsschild. Kop zeer klein, ovaal, nagenoeg onbestippeld. Dekschilden en achterlijf minder glanzig, met eenige uiterst fijne grijsachtige haartjes bezet. Dekschilden iets korter dan het halsschild, zeer grof, rimpelig bestippeld. Halsschild zeer groot, naar voren sterk versmald, behalve de randstippels nog met 2 stippels aan weerszijden vóór op het midden. Achterlijf sterk iriseerend, zeer grof doch verspreid bestippeld. De mond en de eerste twee sprietleedjes rood, de pooten donkerbruin, iriseerend, de knieën en de tarsen rood. Bij het ♂ is het zesde sterniet zeer breed, doch niet diep ingesneden en daarachter iets ingedrukt; ook is het laatste tasterlid meer bijlvormig. Lengte $8\frac{1}{2}$ —10 mm. In rottende plantenstoffen, onder mos, dorre bladeren, in slakkenhuisjes; in bosschen. Niet inlandsch. In België bij Luik, in de Rijnprov. bij Cleef, Düsseldorf en Crefeld (*picipes* Payk.)

Astrapaeus Gravenh.

Dit genus onderscheidt zich van Quedius vooral door den vorm van het eindlid der kaak- en liptasters. Kop vrij groot, aan de basis ingesnoerd, met zeer kort en breed halsgedeelte, onder de groote oogen scherp gerand. Het eerste sprietlid korter dan de twee volgende leedjes te zamen. Bovenlip in 't midden ingesneden. Voorkaken aan de binnenzijde ongetand. Kaaktasters zeer krachtig ontwikkeld en vrij kort, het eindlid dik, veel langer dan het derde lid, aan het uiteinde recht afgeknot, bij het ♀

naar het uiteinde gelijk breed, bij het ♂ naar het uiteinde sterk verbreed en evenals het listaster-eindlid driehoekig, eenigszins bijvormig. Kin zeer sterk verbreed, breed uitgerand. Alle schenen kort gedoord; de eerste 4 leedjes der voortarsen in beide seksen sterk verbreed, op de onderzijde zelig.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam zwart, sterk glanzig. Kop en halsschild onbestippeld. Dekschilden met eenige zeer fijne verspreide stippeltjes en bovendien met eene naadrij van 5 of 6 en eene middenrij van 3 of 4 stippels. Achterlijf zeer grof en dicht bestippeld en iriseerend. Sprietwortel, dekschilden, de achterhelft van den zesden achterlijfsring, benevens de tarsen rood. Uiteinde der sprieten geelrood, schenen min of meer roodbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet tamelijk breed en ondiep uitgesneden en daarachter met een zeer kleinen indruk. Ook is het eindlid der kaaktasters sterker bijvormig dan bij het ♀. Lengte 11—12 mm. Onder steenen, plantenafval, achter schors en in molen van boomstronken, vooral van iepen; ook aan boomwortels. Niet inl. In België bij Rhisnes (Namen) en in de Rijnprov. bij Aken.

(ulmi Rossi)

61. Heterothops Steph.

Dit genus is verwant aan *Quedius* en vooral onderscheiden door het kleine, priemvormige eindlid der tasters en door het ontbreken der epimeren van den prothorax. Lichaam tamelijk gestrekt, naar voren en naar achteren versmald. Sprieten vrij kort, het eerste lid even lang als of korter dan de twee volgende leedjes te zamen. Pooten vrij kort, de middel- en achterschenen weinig gedoord, de voorschenen in den regel ongedoord. Alle tarsen 5-ledig. De larven van *H. praevia* en *binotata* zijn door Mulsant en Rey beschreven — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen onder afgevalen bladeren, mos en in aanspoelsel.

Van de 6 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 Kop breed, min of meer cirkelrond, met eenigszins aangeduide achterhoeken. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Achterlijf tamelijk dof, ten gevolge eener fijne, dichte beharing 2

Kop tamelijk smal, ovaal of eenigszins langwerpig, met afgeronde achterhoeken. Dekschilden even lang als het halsschild. Achterlijf tamelijk glanzig, lang- doch niet zeer dicht behaard. 3

2 Sprieten langer dan kop en halsschild te zamen, krachtig ontwikkeld, de voorlaatste leedjes even lang als breed. Dekschilden sterk en vrij dicht rimpelig bestippeld. Lichaam glanzig zwart. De eerste 2 tasterleedjes, de eerste 3 sprietleedjes, de pooten en het uiteinde der achterlijfsringen roodachtig, veelal ook met een roodachtigen, smallen zoom aan het uiteinde der dekschilden; ook zijn de pooten meestal min of meer berookt. Bij de mij bekende inlandsche exemplaren zijn de dekschilden geheel donker. Halsschild naar voren sterk versmald, met eenigszins stompe achterhoeken, aan weerszijden van het midden vóór op de schijf met een stippel. Achterlijf fijn en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan weerszijden iets ingedrukt en aan het uiteinde met eene kleine, zeer scherp driehoekige insnijding. Lengte 4½ mm. Langs de zeekust onder wier en aanspoelsel, ook in de duinen. Bij Scheveningen en op Texel. Ook bij Duinkerken in Noord-Frankrijk, en op het eiland Borkum 1. *binotata* Grav.

Sprieten iets korter dan kop en halsschild te zamen, de voorlaatste leedjes iets verbreed. Dekschilden fijner en dichter bestippeld. Deze soort is meer geweldig en glanziger dan *binotata*. Zwart, het uiteinde der achterlijfsringen, benevens de sprietwortel en de pooten, rood. Halsschild meer gewelfd, naar voren minder versmald, met meer rechte zijden en meer afgeronde achterhoeken. Dekschilden iets smaller, bruin met roodachtigen toprand, soms naar het uiteinde voor een groot deel roodgeel. Ook is soms het halsschild min of meer roodachtig. Achterlijf lichter bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet minder scherp-hoekig ingesneden. Donkere exemplaren zijn als *nigra* Kr. beschreven. Lengte 3½—4½ mm. Onder plantenafval, mos, dorre bladeren, in boommolen, stallen, kelders, en in hoenderhokken; soms bij mieren. Rotterdam, Maastricht, den Haag, Noordorp, bij Roermond in de nesten van *Lasius fuliginosus* en *Formica rufa*. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. In België bij Brussel 2. *praevia* Er.

3 Sprieten vrij lang, krachtig ontwikkeld, de leedjes even lang als breed, de sprietwortel geel. Dekschilden fijn en dicht bestippeld, tamelijk glanzig. Lichaam zwartbruin, een zoom aan

het uiteinde der dekschilden, soms ook de schouders, de randen der achterlijfsringen en het uiteinde van het achterlijf roodachtig. Pooten geelachtig. Deze soort is in 't oog vallend door het naar voren en naar achteren sterk toegespitste lichaam en der smallen, eenigszins langwerpigen kop. Halsschild naar voren sterk versmald. Achterlijf fijn en niet zeer dicht bestippeld. Soms is het halsschild roodbruin; onuitgekleurde exemplaren zijn geheel geelbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet minder scherp en breeder ingesneden, dan bij de vorige soorten. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen onder dorre bladeren, mos, in aanspoelsel en op het zand der duinen; soms bij mieren. 3. *dissimilis* Grav.

Sprieten korter en dunner, geheel zwart. Dekschilden meer verspreid bestippeld. Lichaam geheel diep zwart, glanzig. Pooten bruingeel, de achterdijen donkerder. Kop iets korter dan bij *dissimilis*. Achterlijf fijn en weinig dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet niet diep ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder mos, in paddestoelen, aanspoelsel en op vochtige weilanden. Soms bij *Lasius fuliginosus*. Vrij zeldzaam; den Haag, Nootdorp, Breda, Amsterdam 4. *quadripunctula* Grav.

62. Velleius Mannerh.

Dit genus onderscheidt zich van *Quedius*, doordat de sprieten van af het vierde lid duidelijk gezaagd zijn, aangezien het vierde tot tiende lid naar binnen in eene breede, aan den top uitgerande dwarsplaat verbreed is. Bovenlip in twee afgeronde lobben gedeeld. Voorkaken aan den binnenrand van een dubbelen tand voorzien. Onderzijde van den kop met krachtig ontwikkelde en geheel naar voren reikende langslijsten. Halsschild breed schijfvormig, aan de zijden en aan de basis sterk afgerond, in 't midden tamelijk gewelfd en aan de zijden sterk neergedrukt — De larve van *V. dilatatus*, welke het eerst door Henslow in de nesten van *Vespa crabro* werd aangetroffen, werd door Schiödte, Rouget en Fautel beschreven. Over de ontwikkeling en levenswijze berichten Rouget en Erné.

De eenige Europese soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam groot en krachtig gebouwd; glanzig zwart, de kop en de dekschilden iets dofser. Dekschilden en achterlijf dicht behaard. Halsschild veel breeder dan de dekschilden, hoog gewelfd, met vlak uitgebreide zijden, vooral aan den zij- en achterrand sterk iriseerend. Dekschilden ongeveer even lang als het halsschild, tamelijk fijn en dicht, het iriseerende achterlijf sterker en minder dicht bestippeld. Bij sommige exemplaren zijn de pooten en de dekschilden meer roodbruinachtig. Bij het ♂ is de kop grooter; het zesde sterniet aan den top iets uitgerand. Lengte 16—20 mm. Deze soort leeft in de nesten van *Vespa crabro*. Zij bevindt zich ook soms daarbuiten in boomstronken, onder mos of achter boomstochers, aan uitvloeiende sappen van eiken en paardenkastanjes, onder steenen, dorre bladeren, aan rottende dierlijke stoffen en zelfs in keldervuil, of 's avonds *Vespa crabro* navliegende. De larve schijnt in de wespennesten te leven van de uitwerpselen der wespen en hare larven. Eenmaal in Juli op het landgoed „Oranje-Nassau” bij Wageningen. Ook bij Roermond in Mel. Zij zou bij Doetinchem niet zeldzaam zijn. In België bij Maeseyck, in de Rijnprov. bij Cleef, Crefeld en Düsseldorf. 1. *dilatatus* F.

63. Quedius Steph.

Dit genus herinnert in habitus zeer aan *Philonthus*, doch is daarvan gemakkelijker te onderscheiden doordat de langslijsten aan weerszijden op de onderzijde van den kop dan eens geheel naar voren, dan eens slechts tot aan het midden der oogen reiken, terwijl bij *Philonthus* deze langslijsten slechts hoogstens aan de basis van den kop aangeduid zijn. Voorkaken naar het scherpe uiteinde gekromd, in de rust over elkaar gekruist, in 't midden getand. Sprieten gewoon. De middelschenen krachtig, de achterschenen fijner en minder, de voorschenen bijna niet gedoofd. Alle tarsen 5 ledig, aan de voortarsen de eerste 4 leedjes kort en meer of minder sterk verbreed. — De larve van *Q. fulgidus* is door Bouché en Schiödte, die van *cruentus* door Xamben, de larven van *ochripennis* van *nigrocoeruleus*, *cinctus*, *rufipes*, *semiaeneus* en de vermoedelijke larven van *obliteratus* en *boops* zijn door Mulsant en Rey beschreven, de larve en pop van *fuliginosus* door Waterhouse, de larve en pop van *molechinus* door W. Kolbe, de larve van *scintillans* en de pop van *attenuatus* door Perris, de pop van *molechinus* door Riley en Fautel,

de pop van *tristis* door Lesne en die van *cinctus* door Xamheu beschreven. De soorten van dit genus leven meest in bosschen onder afgevallen bladeren, mos en in paddestoelen, enkelen onder dood riet en bij mieren. Onder het loopen richten zij het achterlijf niet op, zooals bij *Philonthus*.

Van de 84 Europeesche soorten komen 24 in Nederland en 10 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Oogen zeer klein, half zoo lang als de slapen, niet uitpuilend. Kop smal, tamelijk verlengd, met eenigszins parallele zijden (Sub-gen. *Edignus* Rey) 2
- Oogen van middelmatige grootte, even lang of slechts iets langer dan de slapen, niet uitpuilend. Kop breed, vrij kort, min of meer rondachtig (Sub-gen. *Microsaurus* Steph., Thoms.) 3
- Oogen groot, 2 tot 3 maal zoo lang als de slapen, min of meer uitpuilend. 15
- Oogen buitengewoon groot, meer dan driemaal zoo lang als de slapen, bijna de geheele zijde van den kop innemend, min of meer uitpuilend (Sub-gen. *Raphirus* Steph.) 27
- 2 Sprieten lang, de leedjes niet verbreed. Halsschild aan de zijden sterk neergedrukt, evenals het schildje weinig glanzig, bij zeer sterke vergrooing gezien uiterst fijn gechagrineerd. Halsschild even breed als de dekschilden, vóór op het midden met twee rijen van 2 of 3 stippels 1). Lichaam donkerbruin, de sprieten, de zijden van het halsschild, de dekschilden, de randen der achterlijfsringen en de pooten roodachtig. Dekskildren nagenoeg even lang als het halsschild, vrij dicht en sterk bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den top iets uitgerand en voor de uitranding iets gegroefd. Lengte 7—8½ mm. Onder steenen en oud rottend hout in bosschen. Zeldzaam. Rotterdam, den Haag, Loosduinen, Kralingen, Roermond 1. *longicornis* Kr.
- Sprieten zeer kort, met sterk verbreedde leedjes. Halsschild aan de zijden niet neergedrukt. Deze soort gelijkt eenigszins op een kleinen boops, donker roodbruin, glanzig. Kop zwart, halsschild met zijdeglanzigen weerschijn. Sprietwortel en pooten geelrood. Halsschild sterk gewelfd, aan weerszijden met twee stippels vóór op het midden. Schildje met enige verspreide stippels. Dekskildren even lang en nagenoeg even breed als het halsschild, vrij sterk en verspreid bestippeld. Achterlijf bij verse exemplaren iriseerend, veel lijner en dichter bestippeld, de randen der ringen geelrood gerand. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed en vrij diep uitgerand en achter de uitranding glad. Lengte 5 mm. In oude boomstronken bij *Lasius fuliginosus*. Niet inl. Zij zou bij Bremen en in Westfalen gevangen zijn (*Chrysurus* Kiesw.) (*Microps* Grav.)
- 3 Halsschild zonder stippelelijnen vóór op het midden, aan de zijden neergedrukt. Deze soort gelijkt op kleine exemplaren van *fulgidus*. Lichaam donkerbruin, tamelijk glanzig. Kop zwart, de tasters, de sprieten, de zijden van het halsschild, de dekschilden, de randen der achterlijfsringen en de pooten roodachtig. Schildje onbestippeld. Kop bijna cirkelrond. Halsschild kort en breed. Dekskildren smaller, doch even lang als het halsschild, sterk en zeer verspreid bestippeld. Achterlijf een weinig iriseerend, vrij dicht en fijn bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig uitgesneden en vertoont achter de insnijding een driehoekigen indruk. Lengte 5½—6½ mm. Gemeen in de nesten van *Formica rufa* en *Lasius fuliginosus*, ook onder dorre bladeren, in mos en achter schors nabij mierenesten 2. *brevis* Erichs.
- Halsschild aan weerszijden vóór op het midden met eene rij van twee stippels (de eerste stippelelijnen aan den voorrand niet medegerekend), bij hooge uitzondering slechts met 1 stippelelijnen 4
- 4 Halsschild aan de zijden neergedrukt. Dekskildren gelijkmatig bestippeld 5
- Halsschild aan de zijden niet neergedrukt. Sprieten krachtig ontwikkeld, verdikt, het zevende tot tiende lid sterk verbreed. 10
- 5 Achterlijf geheel zwart, meestal iriseerend. Pooten zwart of zwartbruin. Schildje onbestippeld. 6
- De randen der achterlijfsringen en de laatste ring roodachtig, bij onuitgekleurde exemplaren het achterlijf soms geheel roodachtig. Schildje onbestippeld 9
- Achterlijf roodachtig, aan de basis min of meer donkerder. Schildje met enkele stippels bezet. Lichaam overigens diep zwart, de tarsen roodachtig. Habitus van *mesomelinus*. Sprieten korter en krachtiger ontwikkeld. Kop aan de achterhoeken bijna niet bestippeld, met 2 zeer groote stippels nabij de oogen. Halsschild iets langer en smaller, aan weerszijden van de gewone

1) Bij het tellen der stippels van de twee rijen op het midden van het halsschild bij *Quedi*us, *Philonthus* en aanverwante genera, rekent de stippelelijnen aan den voorrand niet mede, daar deze tot eene dwarsrij langs den voorrand behoort en ook bij soorten zonder stippelelijnen (lev. *Q. brevis*) aanwezig is.

- stippelrij met 4 stippels in eene gebogen rij geplaatst. Dekschilden minder dicht doch krachtiger bestippeld. Achterlijf sterk iriseerend, naar het uiteinde minder dicht bestippeld. Bij het ♂ is de kop groot, enigszins vierhoekig; het zesde sterniet breed en diep half-cirkelvormig uitgerand, daarachter met eene driehoekige, gladde, ingedrukte ruimte. Lengte 8—9½ mm. Onder mos, achter boomschors, in molm en soms bij *Lasius fuliginosus*. Zeer zeldzaam. Arnhem, Amsterdam. Ook in de Belgische provincie Brabant. . . 8. **ventralis** Arag.
- 6 Sprieten dun, de leedjes niet verbreed. Dekschilden zwart, de omgeslagen randzoom geelachtig-rood. Achterlijf zeer sterk iriseerend. De grootste soort van het genus. Lichaam zwart. Sprieten bruin; het eerste lid, de tasters en de tarsen roodachtig. Kop groot, bijna cirkelrond. Halsschild aan de zijden ingedrukt, naar voren aanmerkelijk versmald, vóór op het midden aan weerszijden met 2 stippels. Dekschilden even lang als het halsschild, sterk en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep en scherp driehoekig uitgesneden, voor de uitranding met een gladden langsindruk; het vijfde sterniet iets uitgerand. Lengte 10—12 mm. In rottende paddestoelen, onder mos, dorre bladeren, spaanders van afgekapte boomstronken en soms in mest. In dennenbosschen. Meermalen in de heidestrekken van Utrecht, Gelderland en N.-Brabant aangetroffen. . . 3. **lateralis** Grav.
- Sprieten krachtig ontwikkeld, de leedjes sterk verbreed. Dekschilden rood, pekwart of groen- of blauwachtig-zwart. . . 7
- 7 Halsschild zonder zijstippels tusschen den zijrand en de gewone stippelrij. Dekschilden krachtig doch niet dicht bestippeld. . . 8
- Halsschild aan weerszijden in het midden tusschen den zijrand en de gewone stippelrij met twee dicht bijeenstaande stippels. Deze soort is zeer verwant aan *fulgidus*. Achterlijf zeer weinig iriseerend, de ringen in den regel niet of slechts zeer onduidelijk roodachtig gerand, meer verspreid bestippeld. Sprieten en pooten zwartbruin. Kop met twee zeer groote stippels nabij de oogen. Dekschilden rood, bij de var. *nigrocoeruleus* Fauvel groen- of blauwachtig-zwart, iets minder dicht bestippeld dan bij *fulgidus*. Bij het ♂ is de kop grooter, het zesde sterniet iets uitgerand, de voorafgaande sterniten aan de basis van een zwart haarbundeltje voorzien. Lengte 7½—8½ mm. Onder plantenaafval en steenen op dorre plaatsen. Ook in kelders, stallen en op de duinen. Zeldzaam. Arnhem, den Haag, Oldenzaal, Maastricht, Putten op de Veluwe (bij *Vespa rufa*), Reermond (bij *Vespa germanica*); de var. *nigrocoeruleus* bij Warnsveld, Lierden en Valkenburg in België bij Boisfort. 5. **ochripennis** Ménétr.
- 8 Dekschilden rood. Deze soort is naverwant aan *fulgidus*, doch doorgaans iets grooter; ook in habitus overeenkomende met kleine exemplaren van *lateralis*. Sprieten kort, met verbrede leedjes. Kop achter de oogen iets meer verbreed. Halsschild korter en breeder. Achterlijf enigszins iriseerend; de ringen niet roodbruin gerand. Bij het grootere ♂ is het zesde sterniet enigszins driehoekig, breed en diep uitgesneden en daarachter iets ingedrukt. Lengte 8½—10 mm. In bosschen achter boomschors. Zeer zeldzaam. Den Haag, Wolfhezen, Maastricht en op Texel. . . 4. **brevicornis** Thoms.
- Dekschilden groen- of blauwachtig zwart. Deze soort lijkt op *mesomelinus* en *xanthopus*. Lichaam diep zwart, glanzig; de tarsen roodachtig. Halsschild aan de zijden neergedrukt. Dekschilden krachtig, doch minder dicht bestippeld. Achterlijf nagenoeg niet iriseerend, lijner en minder dicht bestippeld, zeer dicht zwart behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet van eene kleine, smalle, enigszins stompe uitranding voorzien. Lengte 7½—8 mm. Onder mos en in oude beukenstronken. Niet inl. In de Belg. provincie Luik, bij Baraque Michel. Ik zag twee niet geheel uitgekleurde exemplaren uit de collectie *Hesmael*. (fageti Thoms.) (maurus Sahlb.)
- 9 Dekschilden rood. Halsschild met 3 of 4 zijstippels, welke in eene gebogen rij staan. Lichaam zwart, de achterlijfsringen aan het uiteinde smal, de laatste ringen breed roodachtig gezoomd. Sprieten bruin, aan den wortel gewoonlijk iets roodachtig. Pooten donker roodbruin, de schenen lichter, de tarsen roodachtig. Sprieten vrij krachtig ontwikkeld. Kop achter de oogen vrij sterk bestippeld, met 3 zeer groote stippels in eene gebogen rij tusschen de oogen en den Hals. Halsschild aan de zijden breed ingedrukt. Dekschilden iets langer dan het halsschild, vrij sterk en dicht bestippeld. Het achterlijf lijner en dichter bestippeld, zeer weinig iriseerend. Bij het ♂ is de kop grooter en breeder, het zesde sterniet iets uitgerand, zoo ook het vijfde een weinig. Bij eene abe. **ruficollis* Wesch. (in Westfalen) is het halsschild rood. Lengte 8—9 mm. Onder plantenaafval in tuinen en velden; ook in keldervuil en onder wier langs de zeekust. Over het algemeen vrij zeldzaam. Bij Maastricht gemeen. . . 6. **fulgidus** F.
- Dekschilden zwart of bruinzwart. Halsschild zonder zijdelingsche stippelrij. Dekschilden dicht bestippeld; het achterlijf iriseerend, de randen der ringen min of meer roodachtig. Dekschilden, evenals het overige lichaam, zwart of bruinzwart. Sprieten bruin, aan den wortel zwart. Tarsen roodachtig. Dekschilden en achterlijf lijn grauwwart behaard. Kop vlak achter de oogen niet bestippeld, wel nabij den Hals op de zijden van de basis; met eene groote stip tusschen de oogen en de basis van den kop, en twee andere stippels, in de breedte geplaatst, aan weerszijden nabij den Hals. Achterlijf dicht bestip-

- peld. Veelal zijn ook het halsschild en de pooten, soms ook de dekschilden en het achterlijf min of meer roodachtig. Bij het ♂ is het vijfde sterniet iets-, het zesde aan den top bijna niet uitgerand. Lengte 8—9½ mm. Zeer gemeen onder steenen, mos, afgevallen bladeren, paddestoelen, koemest, enz. Ook niet zeldzaam in keldervuil 9. *mesomelinus* Marsh.
- 10 Dekschilden gelijkmatig bestippeld, zonder rijen van grootere stippels. Achterdijen zonder stekels. 11
- Dekschilden, behalve de gewone sculptuur, nog met enkele rijen van groote stippels. Schildje onbestippeld. Achterdijen aan de onderzijde met vele stekelachtige borstelharen bezet. 14
- 11 Schildje onbestippeld. Lichaam 6½—8½ mm. lang 12
- Schildje duidelijk bestippeld. Lichaam 4½—5 mm. lang. Lichaam donkerbruin of zwartbruin, de dekschilden geelrood, over het midden bruin. Dekschilden en achterlijf verspreid en lang behaard, krachtig bestippeld, op het achterlijf wat dichter dan op de dekschilden. De sprietwortel, de randen der achterlijfsringen en de pooten roodachtig. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn halsschild en dekschilden min of meer roodachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet scherp en diep ingesneden. In oude vogelnesten, Juni, Juli. Niet inl. Zij zou bij Bremen en in Oldenburg gevangen zijn. (*infuscatus* Er.)
- 12 Halsschild zwart. Achterlijf dicht bestippeld. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *fulgidus*, doch het halsschild is niet zijdelings ingedrukt. De tasters, de eerste sprietleedjes, de dekschilden en de pooten geelrood, voorts de eerste 4 achterlijfsringen smal-, de vijfde zeer breed geelrood gerand en de zesde geheel zoo gekleurd. Bij var. *virens* Rottenb. zijn de dekschilden groenachtig-zwart, met min of meer roodachtigen naad. Sprietten kort. Kop slechts met weinige stippels aan de basis, achter de oogen. Halsschild smaller, meer gewelfd, met twee zeer ver van elkaar staande zijstippels. Dekschilden krachtiger en meer verspreid bestippeld. Achterlijf glanziger, iets meer iriseerend en iets sterker-, doch minder dicht bestippeld. Bij het ♂ is de kop kleiner en smaller dan bij *fulgidus* ♂; het zesde sterniet is niet zeer diep-, het vijfde ook iets minder uitgerand. Lengte 7½—8 mm. In boomstronken, mos, boommoln en paddestoelen, onder dorre bladeren en rottend stroo; ook op zeekei onder kluiten. Zeldzaam. Omstreken van Maastricht, Vliссingen. In België bij Leuven, Ridderborn, Visé, bois de la Cambre. De var. *virens* bij Kolhorn in N.-Holland op zeekei met het type; Juni, Juli 7. *cruentus* Oliv.
- Halsschild bruinzwart, min of meer roodachtig gerand of geheel roodbruinachtig. Achterlijf verspreid bestippeld. 13
- 13 Dekschilden pekwart of pekbruin met min of meer groenachtig-metallischen weerschijn en langs den naad en het uiteinde smal roodachtig. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *mesomelinus*, doch is in 't oog vallend smaller. Halsschild niet zijdelings neergedrukt, bruinzwart met lichtere randen of roodbruinachtig. Sprietten roodachtig, de eerste leedjes, de tasters, de pooten en de randen der achterlijfsringen breed geelrood. Dekschilden krachtiger en meer verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet tamelijk breed-, doch niet diep uitgerand. Lengte 7½—8½ mm. Achter boomschors, onder steenen, dorre bladeren, in boomzammen en in vermolde dennestronken. Zeer zeldzaam. Amsterdam, den Haag en Breda. In België bij Mons, Verviers en Tervueren 10. *xanthopus* Er.
- Dekschilden rood, aan den buiten-tophoek breed beroekt. Deze soort gelijkt zeer op kleine exemplaren van *cruentus*. Lichaam bruinzwart, het halsschild donkerbruin, aan de zijden lichter. De monddeelen, de sprietten en de pooten lichtrood. De randen der achterlijfsringen breed rood gezoomd. Kop achter de oogen bijna niet bestippeld. Halsschild breed en kort, niet zijdelings neergedrukt, zonder zijstippels. Dekschilden iets langer dan het halsschild, zeer sterk-, doch niet dicht bestippeld. Achterlijf eenigszins iriseerend. Bij het ♂ is het zesde sterniet ondiep stomphoekig uitgerand, het vijfde iets uitgerand. Lengte 6½—7½ mm. Onder mos, plantenafval, paddestoelen, achter boomschors en in boommoln. Vooral in dennenbosschen. Zeldzaam. Den Haag, Wolfhezen en Wageningen. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. In België bij Verviers 11. *scitus* Grav.
- 14 Dekschilden eenigszins dof, niet bestippeld, maar, bij sterke vergrooting gezien, uiterst lijn gebagrineerd, met eene naad- en eene middenrij van 4 ondiepe stippels (*Quedionuchus* Sharp). Lichaam glanzig zwart, kop, halsschild en achterlijf min of meer groenachtig iriseerend. De sprietwortel, de dekschilden, de randen der achterlijfsringen en de pooten rood; de dekschilden over het midden min of meer beroekt. Kop breed, rondachtig. Achterlijf vrij dicht en lijn bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet niet diep uitgerand. Lengte 7—8½ mm. Achter dennenschors. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. (*laevigatus* Gylh.)
- Dekschilden glanzig, lijn bestippeld, met 3 rijen, elk van 6 tot 9 wijd uiteenstaande stippels, van welke twee over het midden en een langs den naad. Lichaam glanzig zwart, geheel onbehaard. Dekschilden met geringen bronzigen weerschijn, langs de zijden, het

- uiteinde en den naad geelrood gerand; soms grootendeels geelroodachtig. Achterlijf zeer sterk iriseerend, vrij sterk en verspreid bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed- en eenigszins stomp uitgerand. Lengte 7–8 mm. Niet zeldzaam onder steenen, mos, dorre bladeren, in uitwerpselen en rottende paddestoelen (impressus Panz.) 12. **cinctus** Payk.
- 15 Lichaam min of meer cilindervormig, nagenoeg met parallele zijden, het achterlijf slechts aan het uiteinde toegespitst. Dekschilden en achterlijf gewelfd, zeer dicht bestippeld, weinig glanzig onder eene dichte beharing. Bovenlip min of meer afgerond of slechts zeer lauww uitgerand (Sub-gen. *Quedius* Thoms.). 16
- Lichaam spoelvormig, het achterlijf geleidelijk toegespitst. Dekschilden en achterlijf min of meer vlakgedrukt. Bovenlip in het midden gespleten of uitgerand (Sub-gen. *Sauridus* Muls. & Rey). 18
- 16 Voorhoofd, behalve de voorste oogstip, met eene dwarsrij van 4 of 6 stippels, vooraan tusschen de oogen 17
- Voorhoofd zonder dwarsrij van stippels tusschen de oogen; daarachter nabij de basis met een enkele stip. Oogen dubbel zoo lang als de slapen. Sprietten rood, de eerste 3 leedjes op de bovenzijde veelal zwartachtig. Dekschilden zwart of geheel of gedeeltelijk roodachtig. Pooten roodbruin, veelal de schenen of ook de dijen wat donkerder, de tarsen rood. Dekschilden korter dan het halsschild. Halsschild smaller dan bij *fuliginosus*, naar voren minder versmald; het schildje duidelijk bestippeld. Dekschilden iets dichter-, het achterlijf, dat gewoonlijk sterker iriseerend is, fijner en dichter bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet zeer diep, boogvormig uitgerand, het vijfde breed, stomp uitgerand en achter de uitranding ingedrukt en glad. Lengte 9–11 mm. Niet zeldzaam, vooral langs oevers, onder steenen, plantenafval, mos, wier, op zeeklei en in koemest; ook soms in oude boomstronken bij *Lasius fuliginosus* 15. **molochinus** Grav.
- 17 Schildje duidelijk bestippeld. Voorhoofd met 6 stippels tusschen de oogen. Lichaam zwart; kop en halsschild glanzig. Oogen driemaal zoo lang als de slapen. Dekschilden en achterlijf zeer dicht bestippeld, op de dekschilden rimpelig. Sprietten en tarsen roodachtig, de pooten overigens zwart. Voorhoofd, behalve de in de breedte geplaatste stippels, nog met 4 andere stippels achter de oogen nabij de basis. Halsschild langer dan breed, vooraan aan weerszijden met twee stippels. Dekschilden even lang als het halsschild. Achterlijf eenigszins iriseerend. Voortarsen sterk verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep en breed driehoekig uitgerand, achter de uitranding met een gladden indruk; ook is het vijfde sterniet iets uitgerand. Lengte 10–12 mm. Zeer verbreed, doch nergens gemeen. Onder steenen, plantenafval, mos en achter boomschors 13. **tristis** Grav.
- Schildje onbestippeld. Voorhoofd met 4 stippels tusschen de oogen. Deze soort heeft den vorm van *molochinus* en onderscheidt zich van *tristis* door de donkerder sprietten, waarvan de eerste 3 leedjes rood en zwart gevlekt zijn. Voorhoofd, behalve de in de breedte geplaatste stippels, nog met 3 andere stippels achter de oogen. Oogen ongeveer driemaal zoo lang als de slapen. Kop iets korter; het halsschild korter en breder. Dekschilden bijna even lang als het halsschild, iets sterker en wat minder dicht bestippeld. Achterlijf eveneens iets minder dicht bestippeld, eenigszins iriseerend. Pooten zwart, de tarsen roodachtig. Bij het ♂ is de uitranding van het zesde sterniet meer scherp driehoekig, iets minder diep; ook is de indruk duidelijker en dieper. Lengte 9–11 mm. Vrij gemeen. Vooral in tuinen onder steenen en bloempotten; ook in koemest, paddestoelen en langs oevers 14. **fuliginosus** Grav.
- 18 Het eerste lid der achtertarsen duidelijk, langer dan het laatste. Alle sprietleedjes langer dan breed 19
- Het eerste lid der achtertarsen korter of nagenoeg even lang als het laatste. 20
- 19 De halsvormige insnoering van den kop nagenoeg even breed als de afstand der twee achterste haarstippels aan den oogrand. Halsschild weinig of niet smaller dan de dekschilden, naar voren iets versmald, met sterk afgeronde achterhoeken, tamelijk glanzig, roodbruin, met lichter rand of geheel roodachtig. De sprietten, de dekschilden, de pooten en de randen der achterlijfsringen roodachtig. Soms zijn de sprietten naar het uiteinde en de dijen bruin, alsook de dekschilden en weinig berookt. Achterlijf zeer sterk iriseerend. Schildje onbestippeld. Dekschilden even lang als het halsschild. Achterlijf dicht-, naar het uiteinde meer verspreid bestippeld. Bij het ♂ vertoont het zesde sterniet eene kleine driehoekige uitranding en daarachter een zeer kleinen ondiepen indruk. Lengte 7–8 mm. Niet zeldzaam in de heidestroken onder plaggen, mos, dorre bladeren en plantenafval. (praecox Fauv.) 16. **nigriceps** Kr.
- De halsvormige insnoering van den kop zeer breed, veel breder dan de afstand der twee achterste haarstippels aan den oogrand. Halsschild iets breder dan de dekschilden, zwart. Dekschilden, sprietten en pooten lichtrood, de sprietten naar het uiteinde iets meer roodbruin. Overigens glanzig zwart of pekwart. Achterlijf sterk iriseerend. Kop groot. Bij het ♂ is

het zesde sterniet ondiep ingesneden, het vijfde aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 9—10 mm. Verbreid onder steenen, mos, paddestoelen en dorre bladeren. Over het algemeen vrij zeldzaam. 17. *picipes* Mannerh. 1)

- 20 Voorhoofd op het midden tusschen de oogen met twee duidelijke haartippels. Sprieten kort en krachtig ontwikkeld, naar het uiteinde verdikt, de laatste leedjes verbreed. Lichaam bronzig-zwart, sterk glanzig. Dekschilden iets langer dan het halsschild, min of meer groenachtig-metallisch of bronzig-pekbruin, veelal wat lichter gezoomd aan den zij- en achterrand, lijn geelachtig behaard en sterk-, doch niet zeer dicht bestippeld. Sprieten en pooten lichtbruin, de dijen en de tarsen gewoonlijk meer geelachtig. Kop cirkelrond; het halsschild kort en breed, naar voren sterk versmald, van voren aan weerszijden met 2 stippels. Achterlijf fijn en verspreid bestippeld, vrij lang behaard, iriseerend. Bij het ♂ vertoont het zesde sterniet eene zeer kleine insnijding. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam onder steenen, plantenaalval, dorre bladeren en mos 18. *scintillans* Grav.

Voorhoofd op het midden zonder stippels. 21

- 21 Tusschenruimten der stippels op de dekschilden glad en glanzig. 22

Tusschenruimten der niet dicht staande stippels op de dekschilden lijn gechagrineerd, dof. Lichaam in het midden tamelijk breed. Halsschild zeer breed, de dekschilden een weinig langer dan het halsschild. Lichaam bruinzwart, lijn grijs behaard, sprieten, halsschild, dekschilden en de schenen donkerbruin; de zijden van het halsschild en de achterrand der dekschilden iets lichter; de pooten overigens geelbruin. Sprieten lang, met lange leedjes, evenals de zijden van het lichaam, met lange afstaande haartjes. Achterlijf verspreid bestippeld en zeer sterk iriseerend. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep en smal driehoekig ingesneden; het vijfde uitgerand. Lengte $7\frac{1}{2}$ —8 mm. Vooral in bosschen onder dorre bladeren, mos, boomschors, steenen, in oude boomstronken en langs slooten. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam (*peltatus* Er., *praecox* Er.) 20. *fumatus* Steph.

- 22 Achterlijf op de eerste 4 onbedekte tergieten, langs de zijden met dicht grauw behaarde vlekken. Kop door een dunnen hals van het halsschild afgescheiden, sterk ingesnoerd, met eene rij van 3 groote stippels aan weerszijden tusschen de oogen en de basis; de achterhoeken dicht bestippeld. Deze soort heeft den habitus van *Philonthus nigrita*. Zwart; kop, halsschild en schildje sterk glanzig, iets bronzig. Dekschilden en achterlijf vrij dof, kort en dicht geelgrijs behaard, langs de randen der ringen dichter. Sprieten en pooten bruin, de knieën en tarsen roodachtig. Dekschilden iets bronzig, langer en breeder dan het halsschild, dicht en vrij sterk bestippeld. Achterlijf iriseerend, lijner en minder dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde gewoon uitgerand. Lengte $5\frac{1}{2}$ mm. Deze soort leeft in bergstreken onder vochtig mos van beken en watervallen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld en in het Ahldal. (*riparius* Kelln.)

Achterlijf zonder haarvlekken 23

- 23 Dekschilden vrij grof en verspreid bestippeld. Bovenlip vrij sterk gespleten 24

Dekschilden lijn en meer of minder dicht bestippeld. Bovenlip ondiep gespleten of uitgerand. 26

- 24 Halsschild iets breeder dan de dekschilden. Deze soort is iets kleiner dan *nigriceps*, bruinzwart, sterk glanzig, de randen van het halsschild en de dekschilden in den regel bruin. Sprieten en pooten roodbruin; de dekschilden dikwerf langs de zijden en aan den naad roodachtig. Sprieten korter en krachtiger ontwikkeld. Kop breeder, meer rondachtig, met twee groote stippels achter de meer uitpuilende oogen. Halsschild korter, breeder en met niet zoo volkomen afgeronde achterhoeken. Dekschilden korter en smaller dan het halsschild en veel sterker en meer verspreid bestippeld; op het iets iriseerende achterlijf is de bestippling sterker. Soms is het halsschild en het achterlijf meer roodbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet smal driehoekig ingesneden. Lengte 6—7 mm. Onder steenen, mos, boomschors en dorre bladeren. Niet inlandsch. In België bij Leuven en Verviers; in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld en in Oldenburg. (*maurorufus* Gylh.) (*umbrinus* Er.)

Halsschild even breed of slechts iets smaller dan de dekschilden 25

- 25 Dekschilden duidelijk korter dan het halsschild. Halsschild even lang als breed, met volkomen afgeronde achterhoeken. Kop zwart; halsschild lichter of donkerder bruinrood, in 't midden soms bruin; de dekschilden bruin, aan de zijden, aan den naad en aan den achterrand bruingeel; het sterk iriseerende achterlijf pekbruin of roodbruin met lichtere of roodgele achterranden der ringen. Sprieten en pooten roodgeel. Lengte 5—6 mm. In bergstreken onder mos en achter boomschors. Niet inlandsch. In de Rijnprov. (Ahldal).

(*praecox* Gylh., *maurorufus* Er.) (*limbatus* Heer)

1) Een uit Cleef in de Rijnprov. vermelde *Q. ochropterus* Er. is vermoedelijk *picipes* Mannerh.

Dekschilden even lang als het halsschild. Halsschild iets korter en breeder dan bij *limbatus*, met niet volkomen afgeronde achterhoeken. Lichaam zwart, het halsschild pekbruin, aan de zijden lichter roodbruin of geheel roodbruin, de dekschilden pekzwart of pekbruin met groote, bruingele schoudervlek, aan de zijden, aan den achterrand en aan den naad eveneens bruingeel; het achterlijf pekzwart of bruin met bruingele achterranden der ringen. Spriet en pooten roodgeel. Lengte 6—7½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (suturalis Kiesw., marginalis Thoms.) (humeralis Steph.)

- 26 Het tweede en derde sprietlid nagenoeg even lang. Dekschilden pekzwart of bruin, de naad, het uiteinde en een onder den schouder verbreedte zijband geel- of geelroodachtig. Lichaam zwartachtig, tamelijk glanzig. Kop iets langwerpig-ovaal, evenals het halsschild met geringen bronzen weerschijn. Halsschild vrij lang en smal, naar voren sterk versmald, gewelfd. Dekschilden even lang als het halsschild, lijn en dicht geelachtig behaard. De zijden van het halsschild veelal lichter gekleurd. Sprietwortel, de randen der achterlijfsringen en de pooten geelrood. Achterlijf sterk iriseerend. Bij het ♂ is het zesde sterniet tamelijk breed driehoekig ingesneden, het vijfde uitgerand. Lengte 6—6½ mm. Onder steenen en plantenafval. Niet inl. Volgens *Fauvel* vooral in duinstreken. In Noord-Frankrijk bij Calais. (marginalis Kr., suturalis Ths.) (obliteratus Er.)

Het tweede sprietlid duidelijk korter dan het derde. Dekschilden weinig glanzig, aan het uiteinde en aan den naad lijn geelachtig gerand, lijn en zeer dicht rimpelig bestippeld. Lichaam donkerbruin, kop en de dekschilden overigens zwartachtig; halsschild met iets lichtere zijden. Sprietwortel en pooten geelachtig. Kop cirkelrond. Halsschild tamelijk breed, sterk gewelfd. Dekschilden even lang als het halsschild, lijn en dicht behaard. Achterlijf tamelijk lijn en vrij dicht bestippeld, vooral naar het uiteinde sterk iriseerend. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de dekschilden en het achterlijf licht roodbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins breed en stomp-driehoekig ingesneden, het vijfde vrij sterk uitgerand. Lengte 6—6½ mm. Langs oevers onder dood riet, aanspoelsel en steenen. In de provinciën Noord- en Zuid-Holland gevangen; ook op Texel. In België bij Leuven en Tervuren en in de Rijnprov. bij Crefeld. (praeox Lac.) 19. **maurorufus** Grav.

- 27 Schildje glad, onbestippeld. Deze soort is zeer in 't oog vallend, doordat de tergieten aan weerszijden goudgele haarvlekjes vertoonen. Dekschilden gelijkmatig goudgeel behaard. Kop, halsschild en dekschilden groenachtig bronskleurig. Spriet en pooten geelachtig. Achterlijf iriseerend. In habitus komt deze soort overeen met *boops*, doch is iets breeder. Dekschilden sterk-, niet zeer dicht dwarsrimpelig bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet smal driehoekig, diep ingesneden, het vijfde een weinig uitgerand. Lengte 4½—5½ mm. Onder vochtig mos langs beken en watervallen. Niet inl. Zij komt in België voor bij Verviers, in de Rijnprov. bij Düsseldorf en Elberfeld. (auricomus Kiesw.)

Schildje bestippeld en behaard. 28

- 28 Voorrand van de bovenlip in het midden duidelijk ingesneden. Het eerste lid der achtertarsen iets langer dan het laatste. 29

Voorrand van de bovenlip slechts oppervlakkig uitgerand. Kop rondachtig. Het eerste lid der achtertarsen niet langer dan het laatste. 30

- 29 Kop eenigszins langwerpig-ovaal. Achterlijf gewoon behaard. Dekschilden zwartachtig, segrijnachtig bestippeld. Spriet en pooten geelrood. Kop en halsschild glanzig zwart, met zeer geringen bronzen weerschijn; de dekschilden en het achterlijf zeer dicht bruinachtig behaard en daardoor dof. Achterlijf eenigszins iriseerend, zeer dicht en lijn bestippeld. Dekschilden ter nauwernood langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed en diep driehoekig ingesneden. Lengte 7½—8½ mm. Onder dorre bladeren, rottend hooi, drogen mest en steenen. Zeldzaam. Loosduinen, Assen, Kolhorn, Zierikzee, Meerssen, St. Pieter. Ook op vele plaatsen in België. (semiobscurus Mrsh.) 21. **rufipes** Grav.

Kop meer cirkelrond. Achterlijf meer dicht-, bruin zijdeachtig behaard, gewoonlijk met zwartachtig behaarde randvlekjes. Dekschilden geelbruin of bruin, bronzig-koperkleurig, aan het uiteinde lijn geel gerand, lijn dwarsrimpelig bestippeld. Spriet en pooten geelachtig, de achterpooten meer bruin. Kop en halsschild min of meer groen-bronzig zwart. Dekschilden even lang als het halsschild, dicht geel behaard. Achterlijf zeer dicht en lijn bestippeld, min of meer iriseerend. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed en diep driehoekig ingesneden. Lengte 6—6½ mm. Onder steenen, oud hout, aanspoelsel, mos, langs oevers en soms bij mieren. Niet zeldzaam. (semiobscurus Er.) 22. **semiaeneus** Steph.

- 30 Kop cirkelrond, niet verbreed. Het schildje, evenals de dekschilden, duidelijk en dicht bestippeld. Lichaam niet zeer smal, naar achteren meer versmald, zwart, met eenigen groenachtig-bronzen weerschijn. Dekschilden even lang als het halsschild, glanzig, evenals het schildje en het achterlijf zeer dicht lijn bruin behaard. Achterlijf iriseerend. Spriet en pooten geelrood; de middel- en achterschenen en de achterdijen gewoonlijk bruinachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet smal- en scherp driehoekig ingesneden. Lengte 5—5½ mm. Niet zeldzaam onder mos en plantenafval. (picipennis Heer) 23. **attenuatus** Gyll.

Kop rondachtig, sterk verbreed, bijna zoo breed als het halsschild. Het schildje fijner en meer verspreid bestippeld dan de dekschilden. Lichaam zeer smal, zwartachtig of donkerbruin, glanzig, zonder eenigen bronzen weerschijn. Dekschilden langer, even lang als of korter (de vorm *fallaciosus* Kr.) dan het halsschild, duidelijk en dicht, het achterlijf iets meer verspreid bestippeld en gelijkmatig zwart behaard. Soms zijn de dekschilden lichtbruin. De kleinste soort van het genus 1). Lengte 4—5 mm. Vrij gemeen onder steenen, mos en plantenafval. De vorm *fallaciosus* zeer zeldzaam 24. *boops* Grav.

XVII. Tribus STAPHYLININI.

64. *Creophilus* Mannerh.

Kop en halsschild grootendeels glanzig, glad en slechts aan den omtrek bestippeld en behaard; de halsvormige insnoering van den kop is van voren nagenoeg glad, van achteren dicht bestippeld. Sprieten vrij kort, van af het zevende lid verbreed, de eerste 6 leedjes slechts met afstaande haren bezet, de 5 overige bovendien uiterst fijn en dicht bestippeld en behaard. De epipleuren van het halsschild zijn ook van voren tamelijk breed, de scherpe lijst van den buitenrand is naar voren uitgewischt. Mesosternum ongekiëld, tusschen de middelcoxae zeer breed, van achteren in een zeer breedten boog afgerond; de middelcoxae ver van elkaar verwijderd. De voortzetting van het metasternum tusschen de achtercoxae tamelijk breed uitgerand, met diep ingezonken top. Alle schenen gedoornd. Bij het ♂ zijn de trochanters en de schenen der achterpooten gewoon.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam diep zwart. Kop en halsschild sterk glanzig, slechts aan de randen iets behaard, overigens glad. Schildje dicht rimpelig bestippeld. Dekschilden met een breeden, grijzen, viltachtigen band, die zich naar achteren langs den naad en in het midden smal voortzet, waardoor aan het uiteinde der dekschilden 4 zwarte vlekken worden gevormd. Achterlijf op de onderzijde met een grijzen, viltigen band, op de bovenzijde marmerachtig gevlekt en op het midden van elken ring met eene kruisvormige, zwarte vlek. Dekschilden lijn en zeer dicht bestippeld, in 't midden met eenige, min of meer in eene rij geplaatste, zwarte oogstippen. Bij het ♂ is de kop veel grooter en breeder dan bij het ♀, ook zijn de voordijen aan de basis getand en is het zesde sterniet in 't midden scherp driehoekig ingesneden. Lengte 14—19 mm. Zeer gemeen op aas en allerlei dierlijken afval. Ook onder steenen en op mesthoopen. Zij vliegt soms 's avonds en verspreidt eene sterke, muskusachtige lucht. De larve is door *Mulsant & Rey*, de pop door *Schödt* beschreven. Volgens *Meinert* behoort de door *Schödt* beschreven larve vermoedelijk tot *Staphylinus picipennis*.

1. *maxillosus* L.

65. *Emus* Curtis.

Dit genus onderscheidt zich van *Staphylinus*, vooral door de zeer ver van elkaar afstaande middecoxae en doordat het mesosternum tusschen de middecoxae zeer breed boogvormig afgerond is; van *Creophilus* door den vorm der epipleuren van het halsschild. Kop en halsschild dicht bestippeld en evenals het geheele overige lichaam dicht en lang wollig behaard. Kop zeer groot, vóór het halsgedeelte breed vierhoekig; de oogen op de bovenzijde van den kop geplaatst. Sprieten vrij kort, van af het zesde lid verbreed, de eerste 5 leedjes slechts met afstaande haren bezet, de 6 laatste bovendien uiterst fijn en dicht bestippeld en behaard. De buitenrand der epipleuren van het halsschild vereenigt zich, evenals bij *Staphylinus*, met den binnenrand, kort voor de voorcoxae. De epimeren van den prothorax zijn als driehoekige, vliezige lobben achter de voorcoxae ontwikkeld. Alle schenen gedoornd. De eerste 4 leedjes der voortarsen zeer sterk verbreed. Bij het ♂ zijn de trochanters der achterpooten zeer lang, aan het uiteinde sterk haakvormig naar buiten gericht, de achterschenen in de top helft gekromd.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

1) Het ras *picipennis* Fairm. uit Zuid-Europa heeft e'n veel breedere kop en dekschilden, welke korter dan het halsschild zijn, ook zijn kop en halsschild roodbruin.

Lichaam op de bovenzijde bronzig-zwart, op de onderzijde violet. Kop, halsschild, op den achterrand na, de laatste 3 onbedekte tergiten, de zijden van het vierde, en de basis van het vijfde sterniet lang en dicht goudgeel behaard. Dekschilden aan de basis zwart, het overige gedeelte aschgrauw vlekkelig behaard. Het geheele lichaam zeer dicht en lijn rimpelig bestippeld. Bij het ♂ is de kop grooter, de trochanters der achterpooten lang haakvormig verlengd en de achterschenen een weinig gekromd, het zesde sterniet iets uitgerand. Lengte 18—24 mm. Aan aas en vooral in koc- en paardenmest. Ook onder steenen en soms aan uitvloeiende boomsappen. Verbreid doch over 't algemeen zeer zeldzaam. Niet zeldzaam op Texel. Soms vliegt zij rond 1. *hirtus* L.

66. Ontholestes Ganglb.

(*Leïstorrophus* Kraatz, nec Perty).

Dit genus is van Staphylinus vooral onderscheiden door het breedere mesosternum, dat over het midden scherp gekield en aan het uiteinde breed afgerond is. Oogen niet geheel op de bovenzijde van den kop geplaatst. Sprieten tamelijk slank, naar het uiteinde niet verdikt. Halsschild met vooruitstekende of spitse voorhoeken. Schenen gedoord. De eerste 4 leedjes der voortarsen sterk verbreed.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Tasters en pooten roodachtig-geel, de dijen breed zwart gevlekt. Oogen ongeveer even lang als of slechts weinig langer dan de slapen. De eerste spricteedjes roodgeel. Lichaam geheel bedekt met eene zeer dichte, bruinachtig-grijze beharing, in golvende vlekjes op het voorlijf, waarvan de grondkleur min of meer bronzig is. Schildje met eene dubbele fluweelzwarte vlek. De eerste 4 onbedekte tergiten, in eene dubbele rij, fluweelachtig zwart of bruin gevlekt; naar het uiteinde van het achterlijf is de dichte beharing donkerder, de onderzijde is iriserend. De bestippling van het lichaam is zeer dicht; op den kop en het halsschild lijn en rimpelig, op de dekschilden lijn korrelig, op het achterlijf meer verspreid. Bij het ♂ is het zesde sterniet vrij diep uitgerand en voor de uitranding driehoekig neergedrukt en glad. Lengte 13—17 mm. Vrij gemeen in bosschen onder aas, in rottende paddestoelen en plantenafval. Ook in koemest en op mesthoopen (*nebulosus* F.) 1. *tessellatus* Fourcr.

Tasters en pooten zwart, bij abc. *Haroldi* Eppelsb. het uiteinde der dijen, de schenen en tarsen licht roodbruinachtig. Oogen meer dan dubbel zoo lang als de slapen. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *tessellatus*, doch is veel kleiner. De eerste spricteedjes roodgeel. Kop en halsschild minder dof, meer licht bronskleurig en veel sterker bestippeld. Halsschild met meer parallele zijden en meer afgeronde achterhoeken. Achterlijf zwart, veelal de eerste tergiten min of meer bronzig; de eerste 4 onbedekte tergiten gewoonlijk goudbruin behaard, elk in het midden met twee groote fluweelzwarte vlekken, de basis van het vijfde en zesde tergiet met een zilvergrijs, uit convergerende en divergeerende haren bestaanden dwarsband. Bij het ♂ is de kop grooter dan bij het ♀ en de insnijding van het zesde sterniet als bij *tessellatus*. Lengte 10—12½ mm. Gemeen op dierlijke overblijfselen, in rottende plantenstoffen, koemest en onder steenen. Ook veelvuldig op wegen, in den zonneschijn, rondlopende 2. *murinus* L.

67. Staphylinus L.

*Lichaam lang gestrekt, met tamelijk parallele zijden. Bovenlip tweelobbig. Vooraken sterk gekromd, in 't midden van den binnenrand gewoonlijk met 2, 3 of meer tanden, of slechts met 1 tand, ook wel van binnen ongetand en alsdan sikkelvormig. Kin zeer kort en breed, van voren soms meer of minder uitgebreid vliezig en niet scherp van het middelste hoornachtige gedeelte der onderlip afgescheiden. Tong kort, in 't midden gegroefd, aan het uiteinde gespleten of uitgerand. Paraglossen tamelijk breed, divergeerend en gekromd, de tong meestal overschrijdend, aan den binnenrand dicht behaard. Middel- en achterschenen altijd gedoord, de voortarsen in beide seksen verbreed en op de onderzijde zolig. — De larve en pop van *S. olens* zijn door Heer en Pissot beschreven, de larve van *olens* ook door Schödtte, van *caesareus* door Thomson en de larven van *pubescens*, *ophthalmicus*, *chalcoccephalus*, *pedator* en *similis* door Rey. De soorten van dit genus leven in aas, mest, rottende plantenstoffen en onder mos en steenen.*

Van de 47 Europeesche soorten komen 20 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De voorkaken, of ten minste de linker voorkaak, aan den binnenrand met 2, 3 of meer tanden. 2
- De voorkaken, in het midden van den binnenrand, met een gewonen tand of geheel ongetand. De eindleedjes der lipstasters en bij het ♂ ook de eindleedjes der kaaktasters min of meer bijlvormig. 20
- 2 De epimeren van den prothorax, achter de voorcoxae, tot driehoekige vliezige platen ontwikkeld. 3
- De epimeren van den prothorax ontbreken 9
- 3 Kop achter de oogen niet verbreed, vóór de insnoering breed vierhoekig, met breed afgeronde achterhoeken der slapen 4
- Kop achter de oogen verbreed, trapeziumvormig, met weinig afgeronde achterhoeken der slapen (Sub-gen. *Platydracus* Thoms.) 5
- 4 Mesosternum driehoekig, met smal afgeronden top. Sprieten van af het zesde lid duidelijk verbreed. Schildje met een midden door gedeeld fluwelachtig zwart vilt. Metasternum en achterlijf zeer dicht krijwit viltig behaard (Sub-gen. *Trichoderma* Steph., Thoms.) De eerste sprietleedjes roodgeel, zwart gevlekt. Kop bronsglanzig onder eene lange, dichte, geelachtige beharing, dicht bestippeld, met eenige glanzige oogstippen en in het midden van het voorhoofd met eene gladde spiegelvlek. Halsschild en dekschilden fijn en zeer dicht bestippeld, zwart en licht-bruinachtig vlekkelig behaard, de omgeslagen schouder geelrood. Het achterlijf grijs en geel vlekkelig behaard, met een goudgelen middenband en met twee fluwelachtig zwarte vlekjes op het midden van ieder tergiet. Halsschild smaller dan de dekschilden. Pooten zwartbruin, met een roodgelen ring aan de dijen. Bij het ♂ is het zesde sterniet stomp driehoekig ingesneden. Lengte 11—14 mm. Gemeen op dierlijken afval, beenderen, meschoopen, koemest en uitwerpselen; vooral in landerijen en in bosschen. 1. **pubescens** de Geer.
- Mesosternum van achteren scherp toegespitst. Sprieten naar het uiteinde nauwelijks verdikt. Schildje met ongedeeld fluwelachtig zwart vilt. Achterlijf op de onderzijde dun behaard, de sterniten aan de basis dicht grauweel behaard (Sub-gen. *Abemus* Muls. & Rey). Kop en halsschild bruinrood of roodbruin, de slapen en veelal ook het voorste gedeelte van den kop donkerder of zwartachtig, het halsschild meestal op het voorste gedeelte aan weerszijden met eene donkerder zijstreep; de dekschilden bruinrood, in de achterhoeken of over de geheele achterhelft op een lichter grond goudgeel behaard. Het sternum en het achterlijf zwart, de sprieten zwartachtig, met min of meer roodachtige basis der afzonderlijke leedjes. Kaaktasters met roodachtig uiteinde, de dijen zwart, de schenen roodgeel, de tarsen bruin-geel. Kop rondachtig, van achteren gewoonlijk met eene fijne gladde middellijn, fijn geelachtig behaard. Halsschild even lang of iets langer dan breed, evenals de kop uiterst dicht rimpelig bestippeld en fijn geelachtig behaard. Achterlijf op de bovenzijde goudgeel- of bruinachtig vlekkelig behaard, in het midden met twee langrijen fluwelzwarte viltvlekken. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde tamelijk breed en diep driehoekig uitgerand. Lengte 14½—18 mm. Onder steenen, boomschors, mos, koemest en in oude boomstronken, vooral in bosschen. Eenmaal bij Gronsveld in Limburg, Juni. In België bij Luik, Leuven, Nainen en Maeseyck. In de Rijnprov. bij Aken 2. **fossor** Scop.
- 5 De slapen korter dan de oogen. Voorlijf groenachtig-blauw, blauw of blauwzwart, min of meer dof. Sprietwortel, het eindlid der sprieten en de pooten rood, de dijen soms een weinig berookt. Achterlijf zwart, het vijfde en zesde tergiet aan de basis met een goudachtig-geelgrijzen dwarsband. Lichaam zwart behaard. Bestippeling op kop en halsschild grof, op de dekschilden minder sterk en rimpelig. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed en stomp driehoekig ingesneden. Lengte 12—13 mm. Onder steenen, mos en dorre bladeren in bosschen; ook soms in aanspoelsel van overstromingen. Zeer zeldzaam. Utrecht, Baarn, Arnhem, Valkenburg en Roermond. In België bij Hemixem en in de Rijnprovincie bij Crefeld 3. **fulvipes** Scop.
- De slapen even lang als of langer dan de oogen. Kop en halsschild zwart of bronskleurig, de dekschilden roodachtig-geelbruin of bruinrood. 6
- 6 Kop en halsschild zwart, soms met eene geringe blauw- of groenachtige tint, doch zonder metaalglans, donker behaard. De sprietwortel, de dekschilden en de pooten rood, de dijen en de coxae soms bruinachtig. Achterlijf zwart, de tergiten aan weerszijden, de sterniten aan de basis zilvergrijs gevlekt. Bestippeling op het halsschild dichter dan op den kop, ook eenigszins rimpelig, op de dekschilden veel fijner, dicht en rimpelig. Bij het ♂ vertoont het zesde sterniet aan het uiteinde een duidelijken, gladde indruk en is breed driehoekig ingesneden. Lengte 12—14 mm. Onder steenen, aan aas van kleine dieren, in uitwerpselen, koemest en soms bij mieren. Verbreed in de provincien Utrecht, Gelderland en Limburg; ook bij Zierikzee. 4. **stercorarius** Oliv.
- Kop en halsschild bronskleurig, bruingeel of roodgeel behaard. 7

- 7 Sprieten roodgeel, het derde lid weinig in lengte van het tweede verschillend. De eerste 5 onbedekte tergieten met 3 duidelijke, zilverachtig-grijze vlekjes, welke op het vierde en vijfde tergiet, evenals dergelijke vlekjes op de sternieten, gedeeltelijk ineenvloeien. Deze soort is grooter dan *chalcocephalus*, met meer parallele zijden en met iets kortere, krachtiger ontwikkelde sprieten. Zwart, kop en halsschild bronzig, de dekschilden roodachtig-geelbruin. Pooten, behalve aan de basis der dijen, roodgeel. Kop en halsschild minder grof bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets uitgerand en minder diep ingedrukt. Lengte 15—18 mm. In krengen van kleine dieren, koemest en uitwerpselen. Niet inl. Zij zou in België bij Baudour gevangen zijn. Ook in Westfalen.
(lutarius Grav.) (*flavopunctatus* Latr.)
- Sprieten pekbruin of pekwart, het derde lid langer dan het tweede. De tergieten doorgaans met kleine, minder duidelijke zijvlekjes. 8
- 8 Kop duidelijk driehoekig, doordat de slapen naar achteren in 't oog vallend verbreed zijn. Dijen zwartbruin. Schildje en achterlijf zwart, de tergieten met een duidelijk, zilvergrijs behaard middenvlekje en bovendien met eenige aanduiding van een zijvlekje. Het vijfde en zesde onbedekt tergiet breed zilvergrijs gevlekt. De tasters, de dekschilden en de schenen roodachtig, de tarsen donker. Voorlijf rood behaard, de kop en het halsschild grof bestippeld; de dekschilden lijn bestippeld en gechagrineerd. Bij het ♂ is het zesde sterniet stomp driehoekig uitgerand en duidelijk ingedrukt. Lengte 13—15 mm. Onder steenen, uitwerpselen, dorre bladeren, mos, in rottende paddestoelen en op mesthoopen, vooral in bosschen. Niet zeldzaam in Gelderland en Limburg 5. *chalcocephalus* F.
- Kop met nagenoeg evenwijdige zijden, doordat de slapen naar achteren bijna niet verbreed zijn. Dijen roodachtig, de voorsten veelal min of meer bruin gevlekt. Deze soort is naverwant aan *chalcocephalus*, doch veel kleiner en met meer parallele zijden. Kop minder dicht bestippeld. Sprieten zwartbruin, iets krachtiger ontwikkeld. Halsschild smaller. Achterlijfsringen op de boven- en onderzijde aan de basis meer of minder duidelijk gevlekt, de vlekjes op de bovenzijde soms nagenoeg ontbrekend. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep hoekig uitgesneden en daarachter iets ingedrukt en glad. Lengte 10—12 mm. Onder steenen, plantenafval, mos en aan boomwortels; vooral in bosschen en op dorre plaatsen; soms ook bij *Formica rufa*. Zeer zeldzaam. Arnhem, Driebergen, Baarn en Zutphen. In België en in de Rijnprov. zeer verbreid 6. *latebricola* Grav.
- 9 Metasternum tusschen de middelcoxae zonder gebogen of hoekige dwarslijn. Sprieten vrij dik. Dekschilden roodachtig-geelbruin. Het achterlijf minstens op de laatste 3 tergieten met groote, driehoekige goudgele haarvlekken (Sub-gen. *Staphylinus* isp.). 10
- Metasternum tusschen de middelcoxae met eene boogsgewijze of hoekig naar voren gerichte, verheven lijn, welke de lijnen van den achterrand der middelste coxaalholten met elkaar verbindt 1). Sprieten vrij slank 11
- 10 Kop achter de oogen niet- en evenmin het halsschild goudgeel gezoomd. Wortel en uiteinde der sprieten, benevens de pooten roodachtig. Het voorste gedeelte van den kop, de hals, het schildje, het uiteinde der metapleuren en gewoonlijk twee breede vlekken op het vierde, vijfde en zesde onbedekt tergiet goudgeel behaard. Halsschild smaller dan de kop. Bij het ♂ is het zesde sterniet stomp uitgerand. Lengte 13—17 mm. Niet zelden in bosschen onder rottende bladeren en paddestoelen; ook onder steenen en koemest . . . 7. *erythropterus* L.
- Kop achter de oogen met een goudgeelen randzoom; de basis van het halsschild met een goudgeelen haarzoom en aan de voorzijde, nabij de voorhoeken, met eene goudgele haarlijn. Deze soort heeft den habitus van *erythropterus*, doch is grooter. Ook zeer in het oog vallend door de roodachtige sprieten, welke slechts aan het uiteinde iets donkerder zijn. Het goudgeel behaarde schildje aan den top met eene fluweelachtig zwarte vlek. De achterlijfsringen op onder- en bovenzijde aan weerszijden goudgeel gevlekt. Halsschild bijna zoo breed als de kop; de dekschilden iets langer dan bij *erythropterus*. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins half-cirkelvormig uitgerand. Lengte 14—18 mm. Niet zeldzaam. Terzelfder plaatse als de vorige soort; ook op wegen in den zonneshijn rondlopende.
8. *caesareus* Cederh.
- 11 De slapen langer dan de langsdoorsnede der oogen (Sub-gen. *Goërius* Steph., Thoms.) . . . 12
- De slapen hoogstens even lang als de langsdoorsnede der oogen (Sub-gen. *Pseudocypus* Muls. & Rey). 15
- 12 Voorschienen aan de buitenzijde gedoord 13
- Voorschienen aan de buitenzijde niet gedoord. Ongeveugeld; pekwart, roestrood behaard. Kop en halsschild met bronzigen weerschijn, de dekschilden en de pooten donker rood-

1) Om dit te zien moeten de middelcoxae verwijderd worden.

bruin, de tarsen lichter, de sprieten met roodgeel uiteinde. Kop groot, breeder dan het halsschild, met breed afgeronde slapen, tamelijk fijn en dicht bestippeld, tusschen de stippels zeer fijn geëchagrineerd. Sprieten, vooral bij het ♂, vrij lang en slank. Halsschild even lang als breed, evenals de kop tamelijk fijn en vrij dicht bestippeld en zeer fijn geëchagrineerd, met meer of minder duidelijke, naar voren uitgewischte, gladde middellijn. Dekschilden veel korter dan het halsschild, naar het uiteinde verbreed, uiterst fijn en dicht segrijnachtig bestippeld. Achterlijf fijn en tamelijk dicht-, op het zesde onbedekt tergiet veel meer verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets stomphoekig uitgerand. Lengte 18—23 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (*macrocephalus* Grav.)

- 13 Gevleugeld. Dekschilden even lang of nagenoeg even lang als het halsschild. Het vijfde onbedekt tergiet aan den achterrand met een smallen, vliezigen huidzoom 14

Ongevleugeld. Dekschilden korter dan het halsschild. Het vijfde onbedekt tergiet aan den achterrand zonder huidzoom. Lichaam zwart, zwart behaard. Kop vierhoekig, evenals het halsschild uiterst dicht en vrij sterk bestippeld, tamelijk glanzig; op den schedel met eene gladde middellijn. Onderzijde van den kop krachtig en vrij dicht bestippeld. Halsschild meestal met eene geheel doorlopende, fijne, gladde middellijn. Dekschilden korter dan het halsschild, uiterst dicht rimpelig bestippeld, dof. Achterlijf zeer fijn en tot aan het uiteinde dicht bestippeld. Voorschienen aan de buitenzijde slechts naar het uiteinde gedoord. Bij het ♂ zijn de eindledjes der kaaktasters verdikt en is het zesde sterniet diep hoekig uitgesneden. Lengte 13—19 mm. Zeer verbreed, doch overal vrij zeldzaam. Onder steenen, dorre bladeren, plantenafval, vooral op onbebouwde plaatsen. Ook in aanspoelsel van overstromingen (? nitens Schrank) 11. *similis* F.

- 14 Kop en halsschild zeer dicht en fijn bestippeld. Halsschild breeder dan lang, met stomp-afgeronde achterhoeken. Lichaam zwart, zeldzamer bruinachtig behaard, geheel dof zwart, zoo ook de sprieten en de pooten; het uiteinde der sprieten min of meer roestkleurig. Dekschilden even breed en nagenoeg even lang als het halsschild. Achterlijf iets verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde zeer stomp en breed uitgerand. Lengte 19—29 mm. Zeer gemeen in tuinen onder steenen, bloempotten, mos en plantenafval. Ook op wegen in den zonneschijn rondlopende 9. *olens* Müll.

Kop en halsschild dicht en vrij krachtig bestippeld, iets glanzig. Halsschild even lang als breed. Kop, halsschild en dekschilden blauw of groenachtig-blauw; het achterlijf, de onderzijde, de sprieten en de pooten zwart. Kop nagenoeg vierhoekig en ongeveer even breed als het halsschild. Halsschild nagenoeg zonder aanduiding van eene gladde middellijn. Bij het ♂ is het zesde sterniet stomphoekig uitgerand. Lengte 14—19 mm. Niet zeldzaam in de heide-streken en in de omstreken van Maastricht; onder plaggen, mos, plantenafval, steenen, oud hout en op mesthoopen; ook op wegen in den zonneschijn rondlopende. Ook eene enkele maal bij den Haag gevangen (*cyaneus* Payk.) 10. *ophthalmicus* Scop.

- 15 Ongevleugeld. Dekschilden veel korter dan het halsschild. Het vijfde onbedekt tergiet aan den achterrand zonder huidzoom. Lichaam smal, eenigszins gewelfd, zwart. De slapen even lang als de langsdooresnede der oogen. Kop en halsschild glanzig, meer of minder duidelijk-, soms vrij lang, doch verspreid behaard. Sprietwortel lichtrood, de laatste twee of drie sprietledjes geel; tasters en pooten roodgeel. Kop en halsschild sterk en vrij dicht bestippeld. Dekschilden dof, zeer dicht rimpelig-, het achterlijf fijner en eveneens zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het kaaktaster-eindlid verdikt en het zesde sterniet breed hoekig uitgerand. Lengte 10—14 mm. Niet zeldzaam in rottende plantenstoffen, onder mos en steenen; vooral in duinstreken 12. *brunnipes* F.

Gevleugeld. Dekschilden niet of slechts weinig korter dan het halsschild. Het vijfde onbedekt tergiet aan den achterrand met een smallen, vliezigen huidzoom 16

- 16 Halsschild op eene gladde middellijn na, zeer verspreid met grootere en kleinere stippels bezet. Bovenzijde zwart, op het voorlijf bronzig. Kop en halsschild nagenoeg onbehaard, sterk glanzig; dekschilden en achterlijf dof. Sprieten en pooten zwart, de tasters en de tarsen roodachtig. Kop kort-ovaal. Halsschild breeder dan de kop, sterk gewelfd, met parallelle zijden. Dekschilden iets korter dan het halsschild, fijn en zeer dicht rimpelig bestippeld. De bestippeling op het achterlijf nog fijner. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep uitgerand. Lengte 12—14 mm. In mos en mest, vooral in bosschen, ook op veldwegen. Zeer zeldzaam. Brummen, Breda, Roermond, Venlo en Valkenburg (Limburg). In België bij Namen, Leuven, Fleurus en Verviers; in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf.

13. *fuscatus* Grav.

Halsschild min of meer dicht bestippeld 17

- 17 Kop groot, naar achteren iets verbreed, met matig afgeronde achterhoeken der slapen . . . 18
Kop kleiner, naar achteren niet verbreed, met sterker afgeronde achterhoeken der slapen . . 19

- 13 De eerste 4 onbedekte tergiten met eene gele haarylek. Halsschild zonder duidelijke gladde middellijn, doch met twee langsrijen van grootere rugstippels, even lang als breed en zeer dicht bestippeld. Lichaam pekwart of bruinzwart, min of meer bronzig, vooral op kop en halsschild bruinachtig behaard. Uiteinde der sprieten, de tasters, de schenen en de tarsen, of wel de sprieten en de pooten geheel roodbruin. Kop als bij *picipennis* gevormd, tamelijk fijn en dicht bestippeld. Dekschilden even lang als het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet van achteren breed en zeer stomp bochtig uitgerand. Lengte 13—15½ mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Düsseldorf; ook in België (coll. *Wesmael*). Ik zag exemplaren van *Reitter* (Mus. v. d. Poll) en *Gaughbauer* (Weener Hofmuseum). . . . (mus Brullé)

Achterlijf op de bovenzijde met 5 lichter behaarde, geelgrouwe langslijnen en met enkele gladde stippen. Halsschild met eene breede, gladde middellijn en aan weerszijden daarvan met eene rij grootere stippen, even lang als breed, matig fijn en dicht-, aan weerszijden van de middellijn niet of slechts weinig dichter bestippeld. Lichaam zwart of pekwart, bruinachtig behaard. Kop en halsschild glanzig, gewoonlijk met bronsglans; de dekschilden zwartbruin, veelal bruinrood. Het uiteinde der sprieten, de tasters en tarsen roodbruin. Kop vrij groot, weinig smaller dan het halsschild, naar achteren iets verbreed, eenigszins driehoekig, met weinig afgeronde achterhoeken, aan de basis nagenoeg recht afgesneden, in het midden tamelijk fijn en verspreid-, achter de oogen vrij dicht bestippeld. Dekschilden iets korter dan het halsschild, uiterst dicht rimpelig bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden van den achterrand uitgebogen. Lengte 12—17 mm. Niet zeldzaam onder mos, dorre bladeren, steenen, rottende paddestoelen, vooral in bosschen der duin- en heidestrecken 14. *picipennis* F.

- 19 Achterlijf op de bovenzijde met vijf lichtbehaarde langsstrepen en in den regel met vele krachtige, gladde stippen bezet. Deze soort is naverwant aan *picipennis*, doch kleiner en slanker. De kop is kleiner, veel snaller, aan de zijden sterker afgerond en naar achteren niet verbreed. Halsschild smaller en langer, dichter behaard, aan weerszijden van de middellijn duidelijk ingedrukt en dichter bestippeld. Dekschilden iets langer, zeer fijn en eenigszins rimpelig bestippeld. Achterlijf vrij onduidelijk en eenigszins rimpelig bestippeld; soms zijn de randen der tergiten iets roodachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden van den achterrand slechts zeer flauw uitgerand. Lengte 10—14 mm. Niet zeldzaam onder dorre bladeren, mos en steenen (cupreus Rossi) 15. *aeneocephalus* de Geer.

Achterlijf bruin behaard, met enkele, verspreide, lichtere haren; op de tergiten met enkele grootere stippen. Deze soort is naverwant aan *picipennis*, doch onderscheidt zich o. a. door de meer rondachtigen, kleinen kop. Kop en halsschild licht bronskleurig. Tasters, sprieten, dekschilden en pooten roodgeel; soms zijn de sprieten naar het uiteinde meer roodbruin. Kop en halsschild gelijkmatig dicht bestippeld, beiden met eene gladde onbestippelde middellijn. Halsschild met meer parallele zijden, aan weerszijden van de gladde middellijn nog wat dichter bestippeld. Dekschilden korter dan het halsschild, soms wat meer roodbruin met lichtere randen. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets uitgerand en daarachter met een kleinen, gladden indruk. Lengte 11—13 mm. Onder steenen op dorre plaatsen; ook op wegen in den zonneschijn rondlopende. Niet inlandsch. In België bij Brussel, Leuven en Verviers. Ook in Westfalen en in de Rijnprov (fulvipennis Er.)

- 20 De voorkaken in het midden van den binnenrand met een gewonen tand (Sub-gen. *Tasgius* Steph.) 21

De voorkaken van binnen niet getand, zeer slank, sikkelvormig (Sub-gen. *Ocypus* Steph.) 22

- 21 Zwart, de dekschilden meestal donker zwartblauw; de sprieten, tasters en pooten geelrood, zelden bruinachtig. Kop en halsschild glanzig, zeer fijn behaard, tamelijk dicht, grof en fijn dooreen, bestippeld. Schedel en halsschild met gladde middellijn. Dekschilden eenigszins dof, krachtig en zeer dicht-, het achterlijf fijn en dicht bestippeld. Het eindlid der lip-tasters, bij het ♂ ook het eindlid der kaaktasters, sterk verdikt. Het vijfde onbedekt tergiet aan den achterrand zonder vliezigen huidzoom. De epimeren van den prothorax ontbreken geheel. Gevlengeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan den achterrand uiterst zwak uitgebogen. Lengte 15—20 mm. Onder steenen en plantenaafval, in velden en weilanden. Zeer zeldzaam. Breda en Maastricht. In België bij Mons, Hertogenwald en in de duinen van West-Vlaanderen 16. *pedator* Grav.

Glanzig zwart; het uiteinde der sprieten en tasters, benevens de tarsen roodbruin; de dekschilden soms met roodbruinen naad. Kop en halsschild met meer verspreide, uit grootere en kleinere stippen bestaande, bestippling, met gladde middellijn, nagenoeg kaal. Dekschilden matig fijn en uiterst dicht-, het achterlijf nauwelijks fijner, doch iets minder dicht bestippeld. Het eindlid der lip-tasters en bij het ♂ ook het eindlid der kaaktasters sterk verdikt. Het vijfde onbedekt tergiet aan den achterrand met een smallen huidzoom. De epimeren van den prothorax als een smalle, driehoekige huidzoom ontwikkeld. Gevlengeld. Bij het ♂ is

het zesde sterniet van achteren flauw uitgerand. Lengte 13—17 mm. Niet zeldzaam in tuinen, bosschen en weilanden, onder steenen, bloempotten, vochtige matten, dierlijken afval en dorre bladeren 17. *ater* Grav.

- 22 Halsschild krachtig-, hetzij dicht, hetzij meer verspreid bestippeld, met geheel doorlopende of naar voren uitgewischte, gladde middellijn 23

Halsschild fijn en uiterst dicht bestippeld, hoogstens voor de basis met zwakke aanduiding van eene middellijn. Lichaam zwart, vrij dicht neerliggend grijsbruin behaard; de sprieten, behalve gewoonlijk het bruinachtige midden, de tasters en de pooten roodgeel. Bij var. **cerdo* Er. zijn de pooten zwartachtig, met bruine schenen en roodbruine tarsen. Kop breed vierhoekig, merkbaar krachtiger en iets minder dicht dan het halsschild bestippeld. De slape niet langer dan de langsdoorsnede der oogen. Voorkaken en tasters als bij globulifer. Dekschilden fijn en uiterst dicht rimpelig bestippeld, even lang als het halsschild. Het achterlijf fijn en zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet flauw uitgerand. Lengte 11—14 mm. Zeer verbreid; vooral in bosschen der duinstreken, onder dorre bladeren, mos, rottende paddestoelen, geveldc boomen en dood hout; over het algemeen vrij zeldzaam. Ik ken de var. *cerdo* Er. naar een ex. uit het Weener Hofmuseum. 20. *compressus* Marsh.

- 23 De wortel en het uiteinde der sprieten, alsook de pooten geelrood; overigens zwart of bruin-zwart; de dekschilden met smal roodachtigen naad. Kop en halsschild zeer sterk glanzig; het halsschild met eene gladde, iets verheven middellijn. Van *compressus* is deze soort onderscheiden door den sterken glans en den minder fijn en dicht, niet rimpelig bestippelden kop en halsschild. Overigens heeft zij den habitus van globulifer. Bij het ♂ is het zesde sterniet vrij diep en scherp driehoekig ingesneden. Lengte 12—15 mm. Onder steenen, in boschrijke streken. Uiterst zeldzaam. Eenmaal in Juni bij Leiden.

18. *minax* Muls. & Rey.

Sprieten en pooten donker gekleurd, het uiteinde der sprieten en de tarsen roodachtig. Lichaam zwart; kop en halsschild slechts weinig glanzig, soms met geringen bronzigen weerschijn. Kop in den regel breeder dan het halsschild, breed vierhoekig, vrij sterk en dicht, van voren iets meer verspreid bestippeld; op den schedel met eene gladde middellijn. Het eindlid der lip-tasters bij het ♀ zwak-, bij het ♂ sterk bijlvormig, bij het ♂ ook het kaaktaster-eindlid bijlvormig verdikt. Halsschild iets langer dan breed, naar achteren duidelijk versmald, sterk en dicht bestippeld, met gladde, geheel doorlopende of naar voren uitgewischte middellijn. Soms is de bestippeling van kop en halsschild meer verspreid. Dekschilden even lang als het halsschild, fijn en uiterst dicht rimpelig. Achterlijf fijn en zeer dicht bestippeld. Van deze soort komen smallere en bredere exemplaren voor. Overigens herinnert zij in habitus en kleur aan *similis*, doch is dadelijk te onderscheiden door de ongetande voorkaken en het vlakkere lichaam. Bij het ♂ is het zesde sterniet vrij diep driehoekig ingesneden. Lengte 11—17 mm. Gemeen onder dorre bladeren, mos, steenen, in aanspoelsel en soms bij *Lasius fuliginosus* (cedentulus Block, morio Grav.) 19. *globulifer* Fourc.

68. Philonthus Curtis.

Lichaam tamelijk gestrekt, gewoonlijk met glanzigen, gladden kop en halsschild. Boventip in 't midden ingesneden of diep gegroefd. Voorkaken in 't midden van den binnenrand scherp getand. Kin kort en breed, breed trapeziumvormig, aan den voorrand veelal rliezig; de tong kort, ongedeeld, van voren afgerond; de paraglossen de tong overschrijdend, gekromd, van binnen dicht behaard. Halsschild op het midden met twee langsrijen van 3 tot 6 stippen, zelden zonder rugstippen, of met talrijke stippels aan weerszijden van eene gladde middellijn; de zijrandlijn van voren slechts weinig benedenwaarts gebogen; de groote haarstip aan den zijrand bevindt zich aan de randlijn zelf of is daarvan niet ver verwijderd. Het metasternum van achteren, voor het binnenblad der achtercoxae, aan weerszijden diep boogsgewijze uitgerand; de voortzetting van het metasternum driehoekig, tusschen de achtercoxae schuin afvallend of ingedrukt, in de middellijn diep gegroefd, aan het uiteinde gespleten. Middel- en achterschenen altijd gedoornd. De eerste drie leedjes der voortarsen in beide seksen of slechts bij het ♂ verbreed, of in beide seksen gewoon. — De larven van *P. nitidus* en *atratus* zijn door Schödte, de larve van *aeneus* door Westwood, Bouché, Thomson, Mulsant & Rey en Fauvel, de pop van *aeneus* door Schödte, de larve van *politus* door Thomson en Fauvel, de larven van *carbonarius* (?), *sordidus* (?), *immundus* (?), *ventralis*, *fimetarius* (?) en *varius* door Mulsant

& Rey en de larven van *debilis* en *discoidens* door Rey beschreven. — De soorten van dit genus zijn uiterst vlug in hare bewegingen. Zij leven in dierlijke en plant-aardige overblijfselen, langs oevers, in paddestoelen, onder steenen en in mest; ook loopen zij op wegen rond, waar zij op andere insecten jacht maken.

Van de 104 Europeesche soorten komen 44 in Nederland en 17 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Kop min of meer rondachtig of vierhoekig, de slapen korter, even lang als of iets langer, slechts in enkele gevallen duidelijk langer 1) dan de oogen. Het laatste liptaster-lid niet smaller dan het voorlaatste. Dekschilden niet of slechts weinig korter dan het halsschild. 2
- Kop, ten minste bij het ♂, min of meer langwerpig-vierhoekig, bij het ♀ soms meer ovaal, de slapen altijd veel langer dan de oogen. Het laatste liptaster-lid alleen bij het sub-genus *Gefyrobius* Thoms. niet smaller dan het voorlaatste, bij het sub-gen. *Gabrius* Steph. veel smaller dan het voorlaatste. Voortarsen in beide seksen gewoon 43
- 2 Het laatste kaaktaster-lid altijd langer dan het voorlaatste (Sub-gen. *Philonthus* isp.) 3
- Het laatste kaaktaster-lid iets korter dan het voorlaatste, kegelvormig toegespitst. Voortarsen bij het ♂ verbreed (Sub-gen. *Rabigus* Muls. & Rey). Halsschild langer dan breed, naar voren bijna niet versmald, weinig breeder dan de kop, met twee langsrijen van 5 stippels (die aan den voorrand niet medegerekend) op het midden. De slapen iets langer dan de oogen. Lichaam smal 42
- 3 Halsschild zonder stippelrijen op het midden van de schijf, aan den voorrand met een stippel aan weerszijden van het midden 4
- Halsschild met twee langsrijen van meer of minder grove stippels over het midden 6
- 4 De zijden van het halsschild voor de achterhoeken duidelijk uitgebogen; het halsschild naar voren weinig of niet versmald. Kop breed vierhoekig, de slapen korter dan de oogen. Dekschilden glanzig bronskleurig. 5
- De zijden van het halsschild voor de achterhoeken zeer weinig of bijna niet uitgebogen; het halsschild naar voren sterk versmald. Kop rondachtig, de slapen nagenoeg even lang als de oogen. Deze soort herinnert zeer aan *splendens*, doch is minder breed en meer cilindervormig. Glanzig zwart; kop en halsschild sterk glanzig, evenals de dekschilden groenachtig-bronskleurig, de dekschilden soms blauwachtig-groen. Dekschilden vrij sterk en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het vierde sterniet, als eene zeer breede, aan het uiteinde uitgerande plaat, over het eveneens uitgerande vijfde sterniet verlengd; het zesde sterniet aan het uiteinde diep ingesneden. Lengte 10—11 mm. Zeer gemeen, vooral in het voorjaar in bosschen onder mos, steenen, mest, plantenafval en soms in aanspoelsel. Ook veelal in den zonneschijn rondvliegende 3. *laminatus* Creutz.
- 5 Dekschilden grof en verspreid bestippeld. De zijden van het halsschild sterk gebogen. Achterlijf sterk en verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het vierde sterniet niet plaatvormig over het vijfde verlengd. Lichaam glanzig zwart, de dekschilden bronskleurig, zelden blauwachtig (abc. **sideropterus* Kr.). Spriet en pooten zwart. Achterlijf iets iriserend. Bij het ♂ is de kop korter en breeder dan bij het ♀, het vijfde sterniet in het midden zeer stomp driehoekig uitgerand, het zesde zeer diep uitgesneden. Lengte 12—14 mm. Gemeen, vooral in het voorjaar onder aas, paarden- en koemest, plantenafval, op mesthoopen en veelal vliegende op wegen 1. *splendens* F.
- Dekschilden minder grof en verspreid bestippeld. De zijden van het halsschild veel minder gebogen. Achterlijf vrij dicht bestippeld. Bij het ♂ is het vierde sterniet plaatvormig over het vijfde verlengd, het vijfde om de plaatvormige voortzetting ingedrukt. Kop en halsschild groenachtig-bronskleurig, zelden meer geelkoperkleurig. Halsschild smaller, langer en meer gewelfd. Achterlijf gewoonlijk iets bronzig, doch nagenoeg niet iriserend. Ook is deze soort van *laminatus* onderscheiden door den vorm van den kop en de krachtiger en meer verspreide bestippeling der dekschilden. Bij het ♂ is de kop breeder en het zesde sterniet enigszins stomp-driehoekig ingesneden. Lengte 9½—11 mm. Tenzelfder plaatse als *splendens*, doch vrij zeldzaam. Door het geheele land verbreid.
2. *intermedius* Boisd. & Lac.
- 6 Elke langsrij op het halsschild bestaat uit 3 tot 5 stippels (die nabij den voorrand niet medegerekend) en is regelmatig; aan weerszijden naar buiten staan slechts weinige stippels 7
- Elke langsrij is min of meer onregelmatig en bestaat uit een groot aantal stippels; aan weerszijden daarvan staan nog eenige, soms zeer vele verspreide stippels. 40

1) Bij *P. lepidus*, *albipes*, *fuscus*, *cephalotes*, *sordidus* en *funetarius*.

- 7 Elke langsrij bestaat uit 3 stippels 8
 Elke langsrij bestaat uit 4 stippels 27
 Elke langsrij bestaat uit 5 stippels. De voortarsen bij het ♂ zeer sterk-, bij het ♀ weinig verbreed 37
- 8 Kop niet langer dan breed, ten minste bij een der seksen min of meer vierhoekig, soms min of meer rondachtig 9
 Kop in beide seksen iets langer dan breed, min of meer rechthoekig, althans bij het ♂, of wel in beide seksen langwerpig of min of meer ovaal 20
- 9 Kop hetzij zeer sterk verbreed en niet rechthoekig aan de achterhoeken, of wel iets verbreed met volkomen rechte achterhoeken, ten minste bij het ♂ 10
 Kop min of meer rondachtig of iets verbreed, zonder rechte achterhoeken, zelfs bij het ♂ . . . 19
- 10 Groote soorten, $8\frac{1}{2}$ —14 mm. lang. 11
 Middelgroote of tamelijk kleine soorten, 5—7 mm. lang. 17
- 11 Dekschilden rood of blauw 12
 Dekschilden bronskleurig of groenachtig-bronskleurig 13
- 12 Dekschilden lichtrood. Overigens in habitus met *aeneus* overeenkomende, glanzig zwart. Kop achter de oogen dicht bestippeld. Dekschilden fijner en dichter bestippeld. Achterlijf eenigszins iriserend, sterker, dichter en eenigszins rimpelig bestippeld. Bij het ♂ 1) is de kop grooter en breder, het zesde sterniet breed en stomp driehoekig ingesneden. Lengte 10—12 mm. Vooral in bergstreken onder steenen, paarden- en koemest en dorre bladeren. Volgens *Fauvel* berusten de opgaven uit België (Brussel) en uit de Rijnprov. (Crefeld en Elberfeld) op onjuiste determinatie. — Niet inlandsch en zeer onzeker, of deze soort wel in ons gebied aan te treffen is. Het eertijds door *Snellen van Vollenhoven* uit Rotterdam opgegeven exemplaar was eveneens onjuist gedetermineerd (*nitidus* F.)
- Dekschilden fraai blauw of violetachtig-blauw; het lichaam overigens zwart, zoo ook de sprieten en pooten. Halsschild kort en breed, aan de zijden ingedrukt. Dekschilden breed, fijn en dicht bestippeld. Achterlijf iriserend, vrij sterk en niet dicht bestippeld. Bij het ♂ is de kop grooter en breder en het zesde sterniet breed en diep driehoekig ingesneden. Lengte 12—14 mm. In rottende paddestoelen, onder steenen, mos en in oude boomstronken, in boschrijke bergstreken. Niet inl. In België bij Rhinnes nabij Namen; in de Rijnprov. bij Ahrweiler (*cyanipennis* F.)
- 13 De eerste tergiten vertoonen in het midden aan de basis eene dwarslijn, welke zeer duidelijk accoladevormig is. 14
 De dwarslijn op de eerste tergiten is niet accoladevormig. Dekschilden bronskleurig of groenachtig-bronskleurig 16
- 14 Halsschild aan de zijden breed ingedrukt 15
 Halsschild aan de zijden niet ingedrukt. Dekschilden licht bronzig, eenigszins geelkoperkleurig. Achterlijf tamelijk verspreid bestippeld. Deze soort is van *proximus* onderscheiden door de iets langere, eenigszins geelkoperkleurige dekschilden; van *aeneus* door den aan de basis meer afgeronden kop. Halsschild meer gewelfd. Dekschilden en achterlijf zwartachtig behaard, minder dicht bestippeld dan bij *aeneus*. Pooten bruinzwart. Bij het ♂ is het zesde sterniet kort driehoekig ingesneden, zonder langsdruk, doch slechts aan de basis der insnijding iets ingedrukt. Lengte 10—11 mm. In rottende paddestoelen en onder gemaaid gras. Deze hoogst zeldzame soort werd bij Breda, Nuth en Bemelen bij Maastricht en bij Roermond aangetroffen. (*temporalis* Rye.) 6. **addendus** Sharp.
- 15 Dekschilden groenachtig-bronskleurig. Achterlijf verspreid bestippeld. Pooten zwart. Habitus van *aeneus*, doch zeer onderscheiden door de zwarte sprieten en pooten en de zwarte beharing. Sprieten naar het uiteinde meer verdikt. Kop meer afgerond, aan de achterhoeken minder bestippeld. Halsschild aan weerszijden minder uitgerand, naar voren meer versnald, met meer afgeronde achterhoeken en met 2 stippels buiten de middenrijen. Bij het ♂ is de kop breder en korter, het vijfde sterniet flauw uitgerand, het zesde met een vrij diepen indruk en vrij scherp driehoekig ingesneden. Lengte $8\frac{1}{2}$ —12 mm. Niet zeldzaam in rottende paddestoelen, kreuken, rottende bladeren, vooral in bosschen. (proximus Kr.) (*succicola* Ths.) 4. **chalceus** Steph.
- Dekschilden geelkoperkleurig-bronzig. Achterlijf zeer dicht en minder sterk bestippeld. Pooten

1) Een paar door mij bij Cauterets (Pyrenen) gevangen mannetjes hebben nog 1 of 2 kleinere bykomende stippels vooraan in de beide stippelrijen van het halsschild.

lichter of donkerder bruinachtig. Lichaam zwart, minder sterk glanzig op de dekschilden en het achterlijf, tengevolge van eene vrij dichte, lange, rossige beharing. Kop en halsschild iets bronsachtig-zwart. Sprieten zwart, aan de basis bruinachtig. Halsschild met 2 rijen van 3 stippels 1), één stippel daarbuiten en eenige andere stippels op de zijden. Dekschilden vrij sterk en dicht bestippeld. Kop breed en kort, min of meer vierhoekig, met 4 stippels tusschen de oogen en daarachter grof en verspreid bestippeld. Halsschild naar voren iets versmald, aan de zijden sterk uitgerand en met eenigszins aangeduide achterhoeken. Dekschilden iets breeder dan het halsschild. Bij het ♂ is de kop breeder, het vijfde sterniet flauw uitgerand, het zesde met eene zeer scherpe, driehoekige insnijding. Lengte $3\frac{1}{2}$ —12 mm. Zeer gemeen aan aas en in rottende paddestoelen . . . 5. *aeneus* Rossi.

16. Achterlijf sterk en verspreid bestippeld. De basis en de achterhoeken van den kop met eenige verspreide stippels. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de rechte, niet accolade-vormige dwarslijnen aan de basis der eerste tergiten. In habitus en kleur met *proximus* overeenkomende, doch iets kleiner. Pooten bruinzwart. Halsschild naar voren minder versmald en aan de zijden minder uitgerand. Dekschilden fijner en dichter-, het achterlijf sterker en meer verspreid bestippeld. Bij het ♂ is de kop iets breeder en minder afgerond dan bij het ♀, veel smaller dan het halsschild; het zesde sterniet stomphoekig uitgerand, daarachter zonder langsgroefje. Lengte $3\frac{1}{2}$ —10 mm. Niet zeldzaam in rottende paddestoelen, koemest en mos; in bosschen en weilanden; soms ook in aanspoeksel van overstromingen (*tenuicornis* Muls. & Rey) 7. *carbonarius* Gyllh.

Achterlijf dicht rimpelig bestippeld. De basis aan weerszijden en de achterhoeken van den kop dicht bestippeld. Deze soort gelijkt eenigszins op groote exemplaren van *carbonarius*. Sprieten korter en dikker. De dekschilden dichter, krachtiger en rimpelig bestippeld. Vooral de basis der tergiten sterk rimpelig bestippeld en dichter zwart behaard. Sprieten en pooten zwart. Bij het ♂ is de kop als bij het ♀; het vijfde sterniet is minder uitgerand dan bij *carbonarius*, het zesde met eene iets minder diepe insnijding en daarachter met een langsgroefje. Lengte $8\frac{1}{2}$ —10 mm. Onder mos en paardenmest. Niet inlandsch. In de Rijnprov. (*punctiventris* Kr.) (*temporalis* Muls. & Rey)

17. Dekschilden geheel glanzig bronskleurig-zwart 18

Dekschilden zwart of bruin, niet bronzig. Deze soort gelijkt zeer op *ventralis*, doch vertoont op het halsschild rijen van 3 fijnere stippels. Overigens is de geheele bestippeling veel fijner en op de dekschilden dichter. Sprieten en pooten donkerrood, het eindlid der sprieten meer geelrood; ook de laatste achterlijfsring geelrood. Halsschild breeder, naar voren meer versmald. Achterlijf naar het uiteinde dichter bestippeld. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn halsschild en dekschilden, benevens de randen der achterlijfsringen min of meer roodbruin. Voortarsen in beide seksen gewoon. Bij het ♂ is de kop veel breeder, het vijfde sterniet iets uitgerand en het zesde breed driehoekig ingesneden. Lengte $5\frac{1}{2}$ —5 $\frac{3}{4}$ mm. In boleten en in boomholm bij mieren. Zeer zeldzaam. Breda, Heemstede, den Haag. In België bij Brussel, in de Rijnprov. bij Crefeld 11. *fuscus* Grav.

18. Dekschilden krachtig, dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. De pooten en de achterranden der achterlijfsringen min of meer donkerbruin; overigens glanzig zwart. Dekschilden bronskleurig, eenigszins glanzig. Kop iets verbreed, met 4 stippels tusschen de oogen en eenige verspreide stippels op de achterhelft. Dekschilden iets breeder en iets langer dan het halsschild, lijn behaard. Achterlijf vrij dicht bestippeld en lijn behaard. Voortarsen in beide seksen gewoon. Bij het ♂ is de kop korter en breeder, het zesde sterniet tamelijk scherp driehoekig ingesneden. Lengte 6—7 mm. Niet zeldzaam, onder dorre bladeren en mos, vooral in bosschen; ook in keldervuil en soms rondvliegende . . . 8. *cephalotes* Grav.

Dekschilden zeer lijn en dicht bestippeld. Sprieten pekzwart, de pooten geelachtig-bruin. Schildje en dekschilden bronskleurig-zwart. Achterlijf iriseerend. Lichaam zwart, tamelijk glanzig. Kop klein. Sprieten vrij lang en krachtig ontwikkeld. Halsschild zeer breed, lijn en verspreid behaard, met rijen van 3 groote stippels. Dekschilden dicht behaard, aan het uiteinde en aan den naad soms iets bruinachtig, zelden meer roodbruin naar het uiteinde. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterk-, bij het ♀ bijna niet verbreed. Bij het ♂ is de kop grooter en breeder, het vijfde sterniet breed uitgerand en het zesde scherp driehoekig ingesneden. Lengte 5—6 mm. Vrij zeldzaam, onder plantenafval, dorre bladeren, soms bij *Lasius fuliginosus* en onder steenen langs weilanden. 9. *umbratilis* Grav.

Dekschilden zeer grof en verspreid bestippeld. Achterlijf geheel zwart, de ringen niet bruin gerand; de pooten pekzwart. Deze soort is overigens zeer verwant aan *cephalotes*, doch veel kleiner, meer glanzig zwart en minder behaard. Kop smaller, vooral bij het ♂. Sprieten fijner en korter. Voortarsen in beide seksen gewoon. Bij het ♂ is de kop meer

1) By enkele mannetjes komen soms 1 of 2 bykomende kleinere stippels in de rijen voor.

vierhoekig; het zesde sterniet minder diep uitgerand. Lengte 5—5½ mm. Niet zeldzaam onder dorre bladeren en mos (sparsus Lac.) 10. **sordidus** Grav.

- 19 Kop en halsschild overal zeer fijn, doch duidelijk bestippeld. Bij het ♂ is het vierde sterniet plaatvormig over het vijfde verlengd. Deze soort gelijkt in grootte en kleur op *laminatus*. Kop, halsschild en dekschilden licht groenachtig-bronzig, eenigszins geelkoperkleurig. Pooten zwartbruin. Achterlijf dichter en fijner bestippeld, evenals de dekschilden vrij lang en dicht bruin behaard. Voortarsen in beide seksen weinig verbreed. Bij het ♂ is de plaat van het vierde sterniet nog grooter dan bij *laminatus* en bedekt het vijfde nage-noeg geheel. Lengte 8—10 mm. Onder steenen, aanspoelsel en mos, vooral in boschrijke streken. Zeer zeldzaam. Den Haag, Zutphen, Cuyk, Arnhem, Tiel, Roermond en Maastricht. (scutatus Er.) 12. **rotundicollis** Ménét.

Kop en halsschild, behalve de groote stippels, niet zichtbaar bestippeld. Bij het ♂ is het vierde sterniet niet plaatvormig over het vijfde verlengd. Deze soort heeft eenigszins de kleur van *laminatus* en den habitus van *rotundicollis*, doch is kleiner. Sprieten zwartachtig, de pooten zwartbruin. Kop bijna cirkelrond, hier en daar grof bestippeld. Dekschilden en achterlijf meer verspreid bestippeld. Lichaam zwart, kop en halsschild meer of minder bronzig, de dekschilden groenachtig-bronskleurig, bij ab.c. **coerulescens* Boisd. & Lac. helder blauwachtig. Voortarsen in beide seksen sterk verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets stomp driehoekig ingesneden. Lengte 7—9 mm. Vooral langs zandige rivier- en beekoevers onder steenen en uitwerpselen. Verbreid. Langs de Maas bij Maastricht gemeen.

13. **atratus** Grav. 1)

- 20 Kop min of meer rechthoekig, vooral bij het ♂. Deze soort heeft eenigszins den habitus en de kleur van het ♀ van *cephalotes*, doch is glanziger en naar voren meer versmald. Sprieten langer, geheel zwart. Halsschild tamelijk smal, verspreid behaard. Dekschilden fijner en iets minder dicht bestippeld. Achterlijf glanziger, iriseerend. Dijen geelachtig, zelden een weinig berookt. Voortarsen in beide seksen gewoon. Bij het ♂ is de kop breeder; het zesde sterniet met eene kleine stomphoekige insnijding. Lengte 5½—6 mm. Vrij gemeen onder dorre bladeren, steenen, mos, in paddestoelen, achter boomschors, vooral in bosschen; ook in aanspoelsel der rivieren 14. **fimetarius** Grav.

Kop langwerpig of min of meer ovaal 21

- 21 Groote soorten, 9—12 mm. lang. Halsschild bronskleurig 22

Kleinere soorten, 4½—8½ mm. lang 24

- 22 Dekschilden zeer dof, evenals de kop en het halsschild licht bronzig, eenigszins geelkoperkleurig. Kop en halsschild glanzig. Sprieten en pooten zwartachtig of bruin, de tasters en de tarsen roodachtig. Achterlijf zwart, evenals de dekschilden dicht en fijn behaard, de sterniten gewoonlijk roodachtig gerand. Dekschilden dicht, eenigszins rimpelig bestippeld, het achterlijf iets minder dicht bestippeld. Voortarsen in beide seksen gewoon. Bij het ♂ is het vijfde sterniet flauw uitgerand, het zesde breed driehoekig ingesneden. Lengte 10—12 mm. Onder steenen, mos, dorre bladeren, plantenafval en holeten in bosschen. Zeldzaam. Amsterdam, Brummen, Voorst, Warnsveld, 's Graveland, Breda, Arnhem, Maastricht. In België en in de Rijnprov. op vele plaatsen 15. **decorus** Grav.

Dekschilden tamelijk glanzig. 23

- 23 Sprietleedjes vrij lang, het eerste lid op de bovenzijde zwart, op de onderzijde geel. Lichaam tamelijk glanzig, het voorlijf donker bronskleurig, min of meer groenachtig. Achterlijf duidelijk iriseerend. Dekschilden en achterlijf zeer dicht en fijn zwart behaard, de dekschilden dicht rimpelig bestippeld, het achterlijf dicht bestippeld. Sprieten en pooten zwart. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterker verbreed dan bij het ♀ en is het zesde sterniet smal driehoekig ingesneden. Lengte 9—10 mm. Eene der gemeenste soorten van het genus. Onder dorre bladeren, steenen, plantenafval, uitwerpselen, in aanspoelsel, rottende paddestoelen enz.; ook dikwerf rondvliegende (politus F.) 16. **fuscipennis** Mannh.

Sprieten tamelijk kort, de laatste 5 leedjes kort en breed, het eerste lid geheel zwart. Habitus en kleur van *fuscipennis*. Kop en halsschild gewoonlijk groenachtig-bronskleurig, de dekschilden zeer donker, eenigszins zwartachtig-bronskleurig. Dekschilden en achterlijf veel krachtiger en meer verspreid bestippeld dan bij *fuscipennis*. Bij het ♂ is het zesde sterniet minder diep ingesneden. Lengte 9—10 mm. Onder mos, dorre bladeren, plantenafval, in aanspoelsel en bij *Lasius fuliginosus*. Op vele plaatsen gevangen, doch over het algemeen zeldzaam (Mannerheimii Fawc.) 17. **lucens** Er.

- 24 Dekschilden veel korter dan het halsschild. Lichaam zwart, ongevlugeld; het voorlijf sterk glanzig, de dekschilden en het achterlijf meer dof en vrij dicht geelroodachtig behaard.

1) Het voorkomen van *P. laevicollis* Lac. in Westfalen is zeer twijfelachtig.

Het eerste sprietlid, de dekschilden en de pooten roodgeel. Kop zeer klein, langwerpig. Halsschild sterk gewelfd, met twee rijen van 3 zeer fijne stippels. Dekschilden dicht en vrij grof-, eenigszins rimpelig bestippeld, met uiterst geringen bronzen weerschijn. Achterlijf iriseerend, vrij sterk bestippeld. Bij ab.c. **gilvipes* Er. zijn de dekschilden donker bronzig-groen. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterker verbreed dan bij het ♀ en is het zesde sterniet aan het uiteinde scherp driehoekig ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —6 mm. Over het algemeen zeldzaam. Onder steenen, mest, aanspoelsel en op zand, soms bij *Lasius fuliginosus*. Meermalen in het voorjaar in de duinen op het zand van afzanderijen; ook bij Bergen-op-Zoom en Zutphen. Ook in België en in de Rijnprov. 18. *Iepidus* Grav.

Dekschilden minstens even lang als het halsschild 25

- 25 Halsschild sterk gewelfd, eenigszins cylindervormig. Deze soort gelijkt zeer op het ♀ van *ebeninus*, doch de kop is langer, meer ovaal; de sprieten eveneens langer, met meer verlengde leedjes. Dekschilden vrij sterk-, doch niet zeer dicht bestippeld, helder-, min of meer groenachtig-bronskleurig, zelden rood gevlekt, overigens glanzig zwart. Sprieten zwart; de pooten pekszwart, zelden geelbruin (var. **picimanus* Ménér.). Bij een exemplaar uit de omstreken van Maastricht zijn de dekschilden bronzig-roodbruin en ook de pooten roodbruin. Bij het ras *bimaculatus* Grav. vertoonen de bronskleurige dekschilden elk eene grootere of kleinere roode vlek, welke soms zoodanig kan ontwikkeld zijn, dat slechts de naad, de basis en de zijden der dekschilden smal bronskleurig zijn (ab.c. *nitidicollis* Boisd. & Lac.). Bij het ♂ zijn de voortarsen sterker verbreed dan bij het ♀ en is het vijfde sterniet uitgerand en het zesde zeer scherp driehoekig ingesneden. Lengte 6—7 mm. Zeer gemeen onder steenen, mos, plantenaafval, mest, uitwerpselen, in aanspoelsel en rondvliegende. Het ras *bimaculatus* zeer zeldzaam; den Haag, Amsterdam, Deventer, Valkenburg, Doorn, Kratingen en op Texel 19. *varius* Gyll.

Halsschild weinig gewelfd, niet cylindervormig. 26

- 26 Halsschild zwart, met een breeden oranjegeelen randzoom. Lichaam glanzig zwart; de dekschilden eenigszins dof en lang en dicht gongdeel behaard. Het eerste sprietlid gewoonlijk alleen aan de onderzijde, de wortel der tasters en de pooten roodgeel, de achterschenen en de achtertarsen gewoonlijk meer bruinachtig. Schildje en dekschilden bronzig-zwartbruin, vrij sterk en dicht-, eenigszins rimpelig bestippeld. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Achterlijf iriseerend, niet dicht bestippeld. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterker verbreed dan bij het ♀ en is het zesde sterniet zeer diep en breed driehoekig ingesneden. Lengte $7\frac{1}{2}$ —8½ mm. Gemeen, vooral in bosschen, onder mos, afgevallen bladeren, mest, boeten; ook soms in aanspoelsel. 20. *marginatus* Stroom.

Halsschild geheel zwart. Deze soort gelijkt zeer op kleine exemplaren van *varians*. Lichaam zwart, de dekschilden meer donker bruinachtig, ten gevolge van de dichte, bruinachtige beharing; soms langs den naad een weinig roodachtig. Achterlijf iriseerend. Pooten roodgeelachtig, de schenen gewoonlijk donkerder. Sprieten kort, pekszwart, aan den wortel meer peksbruin. Dekschilden en achterlijf vrij krachtig en dicht bestippeld. Halsschild naar voren sterk versnald, met zijdeachtigen weerschijn. Bij het ♂ zijn de voortarsen weinig-, bij het ♀ niet verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet half cirkelvormig uitgerand. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Niet zeldzaam, onder steenen, rottende plantenstoffen en in koemest. 21. *albipes* Grav.

- 27 Kop niet langer dan breed, ten minste bij een der seksen min of meer vierhoekig of soms iets of wat rondachtig 28

Kop langwerpig of wel min of meer ovaal. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterk-, bij het ♀ zwak verbreed. 35

- 28 Kop hetzij zeer sterk verbreed en zonder duidelijke achterhoeken, of iets verbreed en met zeer duidelijke achterhoeken, ten minste bij het ♂ 29

Kop iets of wat rondachtig of een weinig verbreed, zonder duidelijke achterhoeken, zelfs niet bij het ♂ 33

- 29 Dekschilden groenachtig of staalblauw. De coxae en de dijnen der voor- en middelpooten roodgeel. Deze soort heeft den habitus van *sordidus*, doch is iets grooter, smaller en meer verlengd. Lichaam overigens glanzig zwart. Het eerste sprietlid en de basis van het tweede soms roodachtig. Dekschilden langer dan het halsschild, vrij sterk en niet zeer dicht bestippeld; het achterlijf minder grof en verspreid-, aan de basis der tergiten dichter bestippeld. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterk-, bij het ♀ zwak verbreed. Bij het ♂ is de kop zeer weinig verbreed, het vijfde sterniet breed uitgerand en het zesde breed en vrij diep stomp-driehoekig ingesneden. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6½ mm. Onder steenen en op grind langs stroomend water; soms in aanspoelsel, vooral in bergstreken. Niet inl. in de Rijnprov. bij Aken, Elberfeld en in het Alrdal (*rufimanus* Er.)

Dekschilden hetzij eenkleurig zwart of roodachtig, soms in het bruinachtige overgaande of wel met lichtere randen, soms met drie roode vlekjes. 30

- 30 Dekschilden zwart, met eene langwerpige, gemeenschappelijke naadvlek en eene schouderplek rood; zelden hangen deze vlekken te zamen. Lichaam zwart. Kop en halsschild zeer glanzig. Sprieten en pooten zwart- of roodbruinachtig, de voorcoxae geel. Dekschilden tamelijk fijn en dicht bestippeld, weinig glanzig, fijn behaard. Achterlijf zeer dicht bruin behaard, zeer dof. De voortarsen in beide seksen sterk verbreed. Bij het ♂ is het lichaam breder, het zesde sterniet diep en scherp driehoekig ingesneden. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam in uitwerpselen, rottende plantenstoffen, onder mos en langs oevers.

22. *sanguinolentus* Grav.

Dekschilden zwart, soms lichter of donkerder bruin 31

Dekschilden pekkruin, eenigszins glanzig, de naad en de zij- en achterrand roodachtig. Deze soort heeft den habitus van *ventralis*, doch is veel kleiner. Lichaam bruinzwart, de kop zwart. Sprieten kort, roodachtig, het derde lid iets bruinachtig. Pooten roodachtig, de schenen iets donkerder; de randen der achterlijfsringen donkerrood. Kop groot, eenigszins vierhoekig. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de dekschilden roodbruin. Voortarsen bij het ♂ sterk-, bij het ♀ zwak verbreed. Bij het ♂ is de kop breder, het zesde sterniet aan het uiteinde eenigszins stomp driehoekig ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Onder steenen, dorre bladeren en rottende paddestoele. Over het algemeen zeldzaam. In groot aantal in beetwortel-afval van eene suikerfabriek bij Delft. 26. *discoideus* Grav.

31 Dekschilden krachtig bestippeld 32

Dekschilden fijn bestippeld. Zeer verwant aan *ventralis*, doch kleiner. Lichaam zwart; het eerste spriedlid min of meer bruin en de pooten donkerbruin of roodbruin; de dij en de tarsen gewoonlijk lichter gekleurd. Kop tamelijk klein, bij het ♀ smaller dan-, bij het ♂ nagenoeg even breed als het halsschild. Halsschild zwart, de stippels der rijen veel fijner. Achterlijf veel fijner en dichtcr en eenigszins rimpelig bestippeld. Onuitgekleurde exemplaren zijn soms meer donker roodbruin, vooral op de dekschilden. De voortarsen bij het ♂ sterk-, bij het ♀ minder verbreed. Bij het ♂ is de kop veel breder, het zesde sterniet zeer diep en spits driehoekig ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch overal vrij zeldzaam, onder plantenafval, mos, oud hout, in aanspoelsel en bij *Lasius fuliginosus*.

25. *debilis* Grav.

32 Halsschild zonder zijdeachtigen weerschiijn. Achterlijf een weinig iriseerend. Pooten zwart-bruin of donker roodbruin. Deze soort gelijkt veel op *ebenus*. Dekschilden en achterlijf pekkzwart, de dekschilden niet bronskleurig; lichaam overigens glanzig zwart. Knieën en tarsen roodbruin. Sprieten krachtig ontwikkeld. Halsschild naar voren duidelijk versmald, met afgeronde voor- en achterhoeken. Dekschilden iets breder dan, doch even lang als het halsschild, krachtig en vrij dicht bestippeld en vrij dicht geelbruin behaard. Achterlijf veel fijner en veel dichtcr bestippeld, lang en zeer dicht behaard. Voortarsen bij beide seksen sterk verbreed. Bij het ♂ is de kop breed, het vijfde sterniet iets uitgerand en het zesde zeer scherp en diep driehoekig ingesneden. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch overal vrij zeldzaam; in aas, plantenafval, onder mos en steenen. Soms bij mieren.

(*fumigatus* Er.) 23. *immundus* Gyll.

Halsschild met eenigszins zijdeachtigen weerschiijn. Achterlijf niet iriseerend. Pooten geelachtig, de schenen gewoonlijk iets donkerder. Habitus en kleur van *quisquilius*. Lichaam zwart, halsschild min of meer bruinachtig-zwart of bruin. Het eerste spriedlid geelachtig. Halsschild met twee rijen van 4 groote stippels. Dekschilden breder, doch niet langer dan het halsschild, krachtig en vrij dicht bestippeld. Bij minder goed uitgekleurde exemplaren zijn de randen der achterlijfsringen roodbruinachtig. De voortarsen in beide seksen nauwelijks verbreed. Bij het ♂ is de kop breder, even breed als het halsschild; het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 5—6 mm. Niet zeldzaam, onder steenen en mos. Door het geheele land verbreid 24. *ventralis* Grav.

33 Halsschild zonder zijdeachtigen weerschiijn. Dekschilden en achterlijf tamelijk glanzig. De voortarsen bij het ♂ sterk-, bij het ♀ niet of slechts zwak verbreed 34

Halsschild met zijdeachtigen weerschiijn. Dekschilden en achterlijf weinig glanzig. Deze soort gelijkt iets op *ebenus*, doch is smaller en meer verlengd, zwart, of bij onuitgekleurde exemplaren bruinachtig. Sprieten bruinzwart, het eerste lid rood. Pooten bruin of geelachtig. Dekschilden en achterlijf lang- en vrij dicht bruin behaard. Dekschilden veel langer en breder dan het halsschild, groen- of blauwachtig bronzig, krachtig en dicht bestippeld. Van deze soort komt een ras *inquinatus* Steph. (*rubidus* Er.) voor, bij welke de dekschilden, behalve aan de basis en gewoonlijk ook langs den naad, rood zijn. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterk-, bij het ♀ zwak verbreed. Bij het ♂ is het vijfde sterniet iets uitgerand, het zesde lijn driehoekig ingesneden. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam, onder steenen, in aanspoelsel, op mestvaalten, op oeverslib en soms bij *Lasius fuliginosus*. Het ras *inquinatus* zeldzaam; den Haag, Loosduinen, Naarden, Kralingen, Arnhem, Amsterdam, Nootdorp, Maastricht, Roermond 28. *quisquiliarius* Gyll.

- 34 Dekschilden bronzig, met eenigszins groenachtigen-, zeldzamer iets blauw-groenen weerschijn, soms aan het uiteinde iets bruinachtig of grootendeels bronzig-bruinachtig; bij het ras *corruscus* Grav. helder rood, met uiterst geringen bronzigen weerschijn. Achterlijf sterk en dicht bestippeld. De vlegels wit. Pooten zwartachtig of bruingeel (ab.c. *ochropus* Grav.). Halsschild, behalve de rijen van 4 stippels, nog met twee stippels daarbuiten. Dekschilden vrij sterk en dicht bestippeld. De eerste tergiten met eene rechte dwarslijn, welke in het midden eene kleine, stompe uitzakking vertoont; bij den gewoonlijk kleineren vorm *concinus* Grav., bij welke doorgaans het achterlijf dichter bestippeld is en de pooten meer bruinachtig zijn, is deze dwarslijn recht; bij het ras *corruscus* zijn deze dwarslijnen duidelijk accoladevormig. Bij het ♂ is de kop min of meer cirkelrond en het zesde sterniet tamelijk breed driehoekig ingesneden. Volgens *Ganglbauer* zijn *corruscus* en *concinus* goede soorten. Lengte $5\frac{1}{2}$ –8 mm. Deze zeer veranderlijke soort is niet zeldzaam in menschen-uitwerpselen, aas van kleine dieren, onder steenen, dorre bladeren en mos. Het ras *corruscus* zeldzaam; bij Scheveningen, Wassenaar, Doorn, Cuyk, Arnhem, Ellekom, Rotterdam 27. *ebenus* Grav.
- Dekschilden diep zwart. Achterlijf lijn en zeer dicht bestippeld. De vlegels bruin. Deze soort gelijkt op middelmatig groote exemplaren van *ebenus*; zij is geheel diep zwart. Dekschilden en achterlijf zwart behaard. Kop breder en grooter, aan de achterhoeken wat minder afgerond. Halsschild met meer parallel zijden, naar voren minder versnald, met meer afgeronde voorhoeken. De tweede stippel der stippelrijen staat iets binnenwaarts gericht. Dekschilden dichter bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde sterniet iets uitgerand, het zesde driehoekig ingesneden en ingedrukt. Lengte 7–7½ mm. In *Sphagnum* van moerassen. Niet inl. De opgaven uit het omliggend gebied berusten volgens *Fauvel* hoogst waarschijnlijk op onjuiste determinatie. In Engeland en Duitschland. Volgens *Bach* bij Crefeld en Elberfeld (*corvinus* Er.)
- 35 Dekschilden op het midden, nabij den naadhoek, met eene bloedroede, min of meer driehoekige vlek. Lichaam diep zwart, zoo ook de sprieten en pooten. Kop en halsschild sterk glanzig. Dekschilden dicht grijs behaard, dicht en grof rimpelig bestippeld. Achterlijf minder grof en dicht bestippeld. Kop ovaal. Sprieten kort, krachtig ontwikkeld en duidelijk behaard. Halsschild met langsrijen van 4 grove stippels. Dekschilden even lang als het halsschild. Bij het ♂ is het vijfde sterniet in 't midden iets uitgerand, het zesde diep en scherp driehoekig ingesneden. Lengte $6\frac{1}{2}$ –7½ mm. Niet zeldzaam; onder steenen, koemest, en soms in aanspoelsel (*bipustulatus* Panz.) 29. *cruentatus* Gmel.
- Dekschilden eenkleurig, of wel met een rood langsstreepje nabij den schouder. 36
- 36 Achterlijf sterk zijdeachtig iriseerend, lijn, dicht en niet diep bestippeld. Lichaam zwart; kop en halsschild zeer glanzig; de dekschilden en het achterlijf lang en dicht grijsachtig behaard. Coxae en gedeeltelijk ook de dijen der voorpooten, gewoonlijk ook het eerste sprietlid aan de onderzijde, geelroodachtig. Sprieten vrij lang. Dekschilden even lang als het halsschild, vrij dicht en rimpelig bestippeld. De vleugels witachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed driehoekig ingesneden. Lengte 7–7½ mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam onder afgevallen bladeren, steenen, vooral op vochtige plaatsen; ook langs oevers en in den zonneschijn rondvliegende. Te Valkenburg (Limburg) gemeen in cultuur-champignons. (*scybalarius* Nordm.) 30. *longicornis* Steph.
- Achterlijf slechts een weinig iriseerend, vrij sterk en niet zeer dicht bestippeld. Deze soort is zeer verwant aan *longicornis*. Sprieten geheel zwart. De voorcoxae geelachtig met min of meer zwarten rand. Dekschilden lijn en dicht bestippeld, gewoonlijk met een rood langsstreepje op het midden nabij den schouder. Bij minder goed uitgekleurde exemplaren zijn de dekschilden en de pooten geheel roodbruin. De vleugels bruinachtig grijs. Bij het ras *agilis* Grav. zijn de voorcoxae gewoonlijk zwartachtig en de dekschilden grover en minder dicht bestippeld, zonder rood langsstreepje, doch soms aan het uiteinde smal roodbruin gezoomd of geheel roodbruinachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet scherp driehoekig ingesneden. Lengte 4–6½ mm. Gemeen onder steenen, koemest, uitwerpselen, plantafval en in aanspoelsel. Ook veelal rondvliegende. Volgens *Ganglbauer* is *agilis* eene goede soort (*opacus* Gyll.) 31. *varians* Payk.
- 37 Achterlijf glanzig, dekschilden bronskleurig of zwartachtig. Lichaam $6\frac{1}{2}$ –7½ mm. lang . . . 38
- Achterlijf min of meer dof. Dekschilden zwart of rood. Lichaam 5–6 mm. lang 39
- 38 Pooten geelrood, de coxae zwart. Lichaam zwart, sterk glanzig. Dekschilden en achterlijf zeer lijn grijs behaard. De laatste twee achterlijfsringen roodachtig gerand. Sprieten lang en krachtig ontwikkeld. Kop ovaal. Dekschilden bronskleurig, tamelijk lijn, dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. Achterlijf sterk iriseerend. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed en diep driehoekig ingesneden. Lengte $6\frac{1}{2}$ –7½ mm. Vrij gemeen onder aanspoelsel en dood riet langs rivieroevers, ook onder dorre bladeren langs stilstaande wateren . . . 32. *fumarius* Grav.

Pooten zwartbruin, de tarsen roodbruin. Deze soort is kleiner en minder glanzig dan *fumarius*; geheel zwart. Achterlijf zeer weinig iriseerend. De bestippling is fijner en dichter, minder rimpelig op de dekschilden, fijner en dichter op het achterlijf. Halsschild smaller, de dekschilden iets langer. Bij het ♂ is het zesde sterniet als bij *fumarius*, doch minder diep uitgerand. Lengte $6\frac{1}{2}$ mm. Onder mos, dorre bladeren, veenmos, aan boomwortels en soms in aanspoelsel. Zeer zeldzaam. Zutphen, Heerenveen, Amsterdam, Breda, den Haag en Maastricht. 33. *nigrita* Grav.

- 39 Dekschilden evenals het overige lichaam zwart, dof en tusschen de zeer lijne en dichte bestippling gechagrineerd, evenals het dicht en lijn bestippelde achterlijf grijsbruin behaard. Kop en halsschild glanzig. Achterlijf vooral naar het uiteinde iets iriseerend. Halsschild met zijdeachtigen weerschijs. Spriet en eerste lid soms geelbruin. Pooten roodgeel. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets stomp driehoekig uitgerand. Lengte 5—6 mm. Verbreid doch niet gemeen. Onder steenen, tusschen mos aan boomwortels, onder plantenaafval, in aanspoelsel en op oeverslib 34. *micans* Grav.

Dekschilden rood. Lichaam overigens zwart, zeer glanzig. Dekschilden en achterlijf tamelijk dof onder eene vrij dichte roodachtige beharing. De eerste 3 sprietledjes, de voor- en middelcoxae en de pooten helder geelrood. Bij ab.c. **yaripes* Muls. & Rey de sprietwortel, de tasters en pooten bruinrood. Schildje bruin. Dekschilden vrij sterk en vrij dicht-, het achterlijf zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet zeer stomp driehoekig ingesneden. Lengte 5—6 mm. Door het geheele land niet zeldzaam langs rivieren, meren, kanalen en duimplassen, waar zij op het slib of het zand rondloopt. 35. *fulvipes* F. 1)

- 40 Lichaam 8—9 mm. lang. Dekschilden groenachtig-zwart, hetzij eenkleurig of met eene breede roode vlek aan de buitenhoeken (ab.c. *binotatus* Er.), of op eene scutellairvlek na, geheel rood (ab.c. **cphippium* Nordm.). Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de min of meer verwarde of tamelijk regelmatige langsrijen van dicht opeenvolgende stippels op het halsschild; bovendien bevinden zich een groot aantal (30—40) verspreide stippels op de zijden. Lichaam glanzig zwart. Achterlijf iets iriseerend. Kop en halsschild verspreid behaard. Dekschilden en achterlijf vrij dicht en sterk bestippeld en tamelijk dicht behaard. Kop eenigszins vierkant, dicht bestippeld, op het midden glad. Dekschilden duidelijk breeder en langer dan het halsschild. Voortarsen bij het ♂ sterk-, bij het ♀ weinig verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig ingesneden. Zeldzaam langs oevers onder aanspoelsel, dood riet en dorre bladeren; soms in de duinen. De ab.c. *binotatus* Er. bij Amsterdam en op Texel. (punctatus Fauvel, multipunctatus Mannerh.) 36. *punctus* Grav. 2)

Lichaam $4\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. lang 41

- 41 Dekschilden geelkoperkleurig-bronzig. Halsschild met twee rijen van ongeveer 8 stippels en daarbuiten slechts met weinige stippels (8—12). Deze soort gelijkt overigens zeer op *cephalotes*. Lichaam zwart; kop en halsschild iets bronskleurig. Spriet en pooten zwartbruin. Dekschilden korter, breeder en veel dichter bestippeld dan bij *cephalotes*. Voortarsen bij het ♂ matig-, bij het ♀ niet verbreed. Bij het ♂ is de kop breeder dan het halsschild; het zesde sterniet is stomp driehoekig ingesneden. Lengte $7\frac{1}{2}$ mm. Onder plantenaafval, vooral in bergstreken. Niet inl. Zij zou wellicht in Zuid-Limburg kunnen worden aangetroffen (puella Nordm.)

Dekschilden zwart, met eene roodgele vlek, welke ongeveer $\frac{2}{3}$ of $\frac{3}{4}$ der lengte inneemt. Halsschild met twee meer of minder verwarde stippelrijen en aan de zijden eveneens met een aantal stippels. Habitus en kleur van *quisquiliarius* ras *inquinatus*, doch kleiner en smaller. De eerste twee sprietledjes en de pooten roodgeel. Achterlijf dicht en lijn rimpelig bestippeld, voorts zeer dicht en lijn geelbruin behaard en daardoor dof. Bij het ♂ is het zesde sterniet fijn driehoekig ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Deze hoogst zeldzame, aan de Middellandsche zee kust eigene soort, werd in Mei langs het Y bij Sloterdijk op zeeklei en langs de Zeeuwsche stroomen bij Zierikzee en Vlissingen aangetroffen.

37. *dimidiatipennis* Er.

- 42 Halsschild en het overige lichaam zwart. Dekschilden met eenigen bronzigen weerschijs. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *varius*, doch is veel kleiner en smaller. De krachtig ontwikkelde spriet en de pooten zwartbruin of bruin. Dekschilden zoo lang als het halsschild, evenals het achterlijf lijn en dicht bestippeld en lang en dicht behaard. Kop en halsschild glanzig zwart. Bij het ♂ is het vijfde sterniet uitgerand, het zesde driehoekig ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Vooral op zandgrond, onder mos, dood riet, hooi en soms in aanspoelsel. Niet inlandsch. In België bij Leuven, Antwerpen en Rodenhof; in Noord-Frankrijk bij Duinkerken (pullus Nordm.)

1) De uit Elberfeld opgegeven *P. salinus* Kiesw. zal wel *fulvipes* zijn.

2) De opgave van *P. virgo* Grav. als bij Elberfeld gevangen, berust ongetwijfeld op eene onjuistheid.

Halsschild en de dekschilden, behalve de basis of de voorhelft, of slechts het uiteinde (ab.c. **gracilis* Latr.) rood, het eerste sprietlid en de pooten roodgeel, de schenen en tarsen meer bruin. Overigens glanzig zwart, de dekschilden en het achterlijf tamelijk dof, zeer fijn dicht grijs behaard. Het uiteinde van het achterlijf min of meer iriserend. Dekschilden iets korter dan het halsschild. Bij het ♂ is het vijfde sterniet uitgerand, het zesde stomp driehoekig ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Langs duinplassen, meren, rivieren, in gezelschap van *Paederus ruficollis*, snel rondlopende. Ik vond deze soort eenmaal in aantal langs een duinplas bij Waalsdorp in Mei. In België bij Luik, in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. (dimidiatus Panz.) 38. *tenuis* Fabr.

- 43 Het laatste liptaster-lid niet smaller dan het voorlaatste. Dekschilden veel korter dan het halsschild, verspreid bestippeld. Ongevleugeld (Sub-gen. *Gefyrophilus* Thoms.). Habitus en kleur van *nigritulus*. Halsschild met twee rijen van 3 stippels. Dekschilden bronzig zwart of bruinzwart. Sprietten vrij kort, het vijfde tot tiende lid zeer breed. Bij het ♂ is het zesde sterniet ondiep driehoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder steenen op zandige plaatsen, langs rivieren. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf en op Norderney (*nitidulus* Grav.)

Het laatste liptaster-lid veel smaller dan het voorlaatste (Sub-gen. *Gabrieus* Steph.). 44

- 44 Halsschild met twee langsrijen van 4 stippels op het midden (de eerste stippel aan den voorrand niet medegerekend) 45

Halsschild met twee langsrijen van 5 stippels op het midden 47

- 45 Halsschild naar voren duidelijk versmald, duidelijk langer dan de dekschilden en breder dan de kop. Lichaam glanzig zwartbruin, op de dekschilden en het achterlijf dof. Het eerste sprietlid en de pooten roodgeel. Kop lang en smal. Sprietten vrij kort. Dekschilden vrij sterk en dicht, eenigszins rimpelig bestippeld. Achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld en evenals de dekschilden niet zeer dicht en vrij kort behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet zeer diep ingesneden. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Niet zeldzaam. Onder steenen, mos, dorre bladeren, plantenafval, vooral in bosschen en velden; soms bij mieren of in aanspoelsel.

39. *vernalis* Grav.

Halsschild niet naar voren versmald, met nagenoeg parallele zijden. 46

- 46 Kop bij het ♂ even breed als, bij het ♀ iets smaller dan het halsschild. Kop en halsschild glanzig zwart. Dekschilden aan den naad en naar het uiteinde of wel bijna geheel roodbruinachtig. De sprietten, de randen der tergieten, de laatste achterlijfsring en de pooten roodgeel. Dekschilden grof en verspreid bestippeld. Deze soort heeft eenigszins den habitus en de kleur van *nigritulus*. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep ingesneden en in de breedte ingedrukt. Lengte 4—5 mm. In bosschen achter boomschors en in oude stronken van eiken en beuken; ook onder dorre bladeren, in aanspoelsel en soms bij *Formica rufa*. Niet inlandsch. In België bij Brussel en Luik, in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. (*splendidulus* Grav.)

Kop iets smaller dan het halsschild, zwart. Het halsschild en de randen der achterlijfsringen min of meer bruin. Dekschilden en sprietten geelbruin, de eerste twee sprietleedjes en de pooten geelachtig. Overigens het lichaam donkerbruin. De kleinste soort van het genus en op een kleinen *nigritulus* gelijkend. Bij het ♂ is het zesde sterniet fijn en stomp ingesneden. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. In de run van broeikassen en op mesthoopen. Niet inl. Bij Hamburg en Elberfeld. (*thermarum* Aubé)

- 47 Dekschilden bronskleurig, zwartbruin of bruin 48

Dekschilden rood. Halsschild naar voren duidelijk versmald, iets langer dan breed, korter dan de dekschilden. Deze soort gelijkt zeer op *fulvipes*, doch de dekschilden zijn eenigszins dof, ten gevolge van de dichte, geelachtige beharing. Achterlijf zeer dicht bruin behaard, dof. De eerste twee sprietleedjes en de pooten geelachtig. Dekschilden zeer fijn en vrij dicht bestippeld. Kop tamelijk smal, met duidelijk afgeronde achterhoeken. Bij het ♂ is het zesde sterniet vrij diep uitgerand. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. In aanspoelsel en onder dorre bladeren. Zeer zeldzaam. Gorkum, langs de Merwede; Rotterdam en Ruurloo. In de Rijnprov. bij Elberfeld. 44. *rubripennis* Kiesw.

- 48 Halsschild met parallele zijden, bij het ♂ even breed als of smaller dan de kop 49

Halsschild naar voren duidelijk versmald, iets langer dan breed en breder dan de kop. Lichaam glanzig zwart. Dekschilden bronzig, glanzig, even lang als en iets breder dan het halsschild. Sprietten zwart, met lichter wortel. Deze soort heeft den habitus van *vernalis*, doch is kleiner en donkerder gekleurd. Pooten bruin of donker geelachtig, de schenen iets donkerder. Dekschilden iets sterker bestippeld, het achterlijf iets iriserend. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde bijna recht afgeknot en de voortarsen zijn gewoon. Lengte 4—5 mm. Onder mos, dorre bladeren en op slib in moerassige streken. Zeer zeldzaam. Enschedé en Houthem (Limburg). In België bij Zonhoven. 43. *exiguus* Nordm.

- 49 Dekschilden duidelijk korter dan het halsschild. Kop bij het ♂ duidelijk breder dan het halsschild. Overigens in kleur en grootte met *nigritulus* overeenkomende, doch korter en plomper gebouwd; de pooten meer roodgeel. Lengte 4—5 mm. Ik ving een exemplaar met lichtbruine dekschilden onder dood riet bij Hillegersberg in Maart; het stemt geheel overeen met een exemplaar uit IJsland (*Staudinger*) 40. **trossulus** Nordm. 1)
- Dekschilden langer dan het halsschild, zwartbruin. Kop bij het ♂ even breed als, bij het ♀ smaller dan het halsschild. Sprietwortel roodbruin 50
- 50 Derde sprietlid niet langer dan het tweede, het zesde breder dan lang. Dekschilden niet zeer dicht, doch vrij sterk bestippeld. Lichaam glanzig zwart. Sprietwortel en de randen der achterlijfsringen roodbruinachtig. Pooten vuilgeel, de schenen iets donkerder. Dekschilden pekzwart of pekbruin. Achterlijf fijn en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde stomp ingesneden en driehoekig ingedrukt. Lengte 3—4½ mm. Zeer gemeen onder steenen, afgevallen bladeren, mos, op mesthoopen en in aanspoelsel; ook dikwerf rondyliggende. De door *Snellen van Vollenhoven* beschreven *pygmaeus* is slechts een klein exemplaar van deze soort (*aterrimus* Er., *pygmaeus* Sn. v. Voll.) 41. **nigritulus** Grav.
- Het derde sprietlid duidelijk langer dan het tweede; het zesde langer dan breed. Dekschilden tamelijk fijn en dicht bestippeld. Pooten roodachtig-geel, de schenen donkerder. Deze soort gelijkt min of meer op *limetarius*. Het achterlijf is eenigszins dof, iets iriseerend, zeer dicht en fijn bestippeld en dicht behaard. Dekschilden bruinzwart, soms meer bruin of zelfs iets roodachtig en aan de basis eenigszins berookt, met zeer zwakken, bronzigen weerschijn. Bij het ♂ is de kop breder en aan de basis bijna recht afgesneden: het zesde sterniet met eene zeer kleine uitranding en daarachter met een smallen, driehoekigen indruk. Lengte 4½—6 mm. Onder steenen, mos en langs rivieren en duinplassen. Zij komt vooral in bergstreken voor. Zeer zeldzaam. Den Haag, Grebbe, Arnhem en Valkenburg. In België bij Brussel en Verviers 42. **astutus** Er.

Hesperus Fauvel.

Dit genus onderscheidt zich van Philonthus, doordat de zijrand van het halsschild vóór het midden in eene sterke bocht benedenwaarts gebogen, het uiteinde van het mesosternum breed afgerond en het eindlid der kaaktasters zeer lang en slank naaldvormig, nagenoeg dubbel zoo lang als het voorlaatste lid is. De groote haarstip van het halsschild staat op eenigen afstand van den zijrand. Bij het ♂ zijn de eerste 4 ledjes der voortarsen iets verbreed.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Zij herinnert eenigszins in habitus en vooral in kleur aan *Xantholinus fulgidus*. Lichaam zwart, sterk glanzig, gewelfd. Kop en halsschild lang en verspreid, de dekschilden en het achterlijflijner en dichter behaard. Pooten pekbruin; de tasters, de dekschilden, een gedeelte der schenen en de tarsen roodachtig. Het laatste sprietlid geel. Krachtig en verspreid bestippeld op den kop, iets lijner en nog meer verspreid en gedeeltelijk in rijen op het halsschild, over het midden met eene breede gladde ruimte, nog lijner en minder verspreid bestippeld op de dekschilden; krachtig en niet zeer dicht op het achterlijf. Kop eenigszins breed vierhoekig. Halsschild met nagenoeg parallele zijden. Dekschilden te zamen vierkant, iets breder dan het halsschild. Bij het ♂ is de kop grooter en het zesde sterniet aan den top eenigszins driehoekig ingesneden. Lengte 8—9 mm. In holten en molen, ook aan wonden van oude boomen, onder schors en mos, vooral van eiken. Soms in wortelzwammen en bij mieren. Niet inlandsch. In Westfalen (*rufipennis* Grav.)

69 Cafius Steph.

Dit genus is zeer verwant aan Philonthus en herinnert in habitus ook aan Xantholinus. De zijrandlijn van het halsschild is naar voren in eene sterkere bocht benedenwaarts gekromd en de voorste haarstip is veel verder van den zijrand verwijderd dan bij Philonthus. Ook zijn 4 ledjes van de voortarsen verbreed. Kop vóór het zeer scherp en sterk afgesnoerd halsgedeelte vierhoekig, met afgeronde achterhoeken der slapen. Eindlid der kaaktasters naar het uiteinde geleidelijk versmald. Voortzetting

1) Volgens *Fauvel* syn. met *nigritulus*.

van het mesosternum tusschen de middelcoxae toegespitst. Het eerste lid der achtertarsen even lang als de drie volgende leedjes te zamen, langer dan het eindlid. De eerste 4 leedjes der voortarsen bij het ♂ vrij sterk-, bij het ♀ zwak verbreed. — De soorten van dit genus rollen zich op de wijze van *Xantholinus* ineen en leven langs de zeekust.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

- 1 Halsschild met twee middenrijen van 3 groote stippels, naar achteren duidelijk versmald, met een nabij de voorhoeken iets uitgebogen zijrand. Lichaam tamelijk breed, zwart. Kop en halsschild smaller dan de dekschilden, glanzig. Kop vierhoekig met eenigszins hoekig uitstekende slapen, bij het ♂ iets breeder dan het halsschild. Dekschilden veel langer dan het halsschild, evenals het achterlijf fijn en uiterst dicht rimpelig bestippeld, zwartbruin, dof, grauw behaard, de omgeslagen zijrand geelachtig. Achterlijf zeer dicht en kort grijs behaard, met rijen lichter gekleurde haarylekjes. Pooten lichter of donkerder roodbruin. Voortarsen bij het ♂ sterk-, bij het ♀ minder verbreed. Onuitgekleurde exemplaren zijn roodbruin en roestkleurig behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig ingesneden, het vijfde eenigszins half-cirkelvormig uitgerand. Bij sommige mannetjes (var. *variolosus* Sharp) is de kop veel grooter dan gewoonlijk en veel breeder dan het halsschild, dat alsdan van voren nagenoeg even breed als lang en naar de basis sterk versmald is (bij den normalen vorm is het langer dan breed en naar de basis slechts matig versmald). Lengte 6–8 mm. Gemeen langs de zeekust, vooral op zeeklei onder zeewier, rottende zeesterren, visch en in eierklompen van *Buccinum undatum*. De var. *variolosus* zeer zeldzaam 1. *xantholoma* Grav.

Halsschild zeer dicht rimpelig bestippeld, evenals op den dicht bestippelden kop met eene gladde middenlijn, welke op het halsschild gekield is. Lichaam zeer smal (Sub-gen. *Remus* Holmc, *Pseudidus* Muls. & Rey), zwart, dof, vooral op de dekschilden en het achterlijf zeer dicht grijs behaard. Spriet en pooten donkerbruin, de pooten veelal gedeeltelijk roodbruinachtig. Kop eenigszins vierkant, halsschild met nagenoeg parallele zijden. Dekschilden breeder en langer dan het halsschild. Het zesde onbedekt tergiet tamelijk glanzig en verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet scherp driehoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ –5 mm. Onder wieren langs de zeekust. Eenmaal bij Bergen-op-Zoom op zeeklei, Augustus.

2. *sericeus* Holmc.

70. *Neobisnius* Ganglb.

(*Bisnius* Thoms., *Erichsonius* Fauvel, *Actobius* Fauvel ex parte).

Dit genus herinnert in habitus aan *Lathrobium*, de zijrandlijn van het halsschild is vóór het midden sterk benedenwaarts gebogen en de groote haarstip, welke onder de overige groote stippen niet veel in 't oog valt, op eenigen afstand van den zijrand verwijderd. Kop en halsschild, met uitzondering van het gladde midden, met talrijke grove stippels bezet. Eindlid der kauktasters naar het uiteinde zeer scherp toegespitst. Spriet en pooten vrij kort, het tweede lid niet verdikt. De epimeren van den prothorax onthbreken. Mesosternum met eene gebogen dwarslijst en tusschen de middelcoxae toegespitst. Eerste lid der achtertarsen kort, even lang als het eindlid. De eerste 3 leedjes der voortarsen zijn bij het ♂ meer of minder sterk-, bij het ♀ zwakker of nauwelijks verbreed; het zesde sterniet bij het ♂ is aan het uiteinde uitgerand en vóór de uitranding glad. — De soorten van dit genus leven langs oevers.

De 4 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

- 1 Spriet en pooten geheel geelrood. De voorlaatste sprietleedjes duidelijk verbreed. Clypeus driehoekig ingedrukt. Deze soort herinnert in habitus aan *Leptacinus batycheus* en lijkt zeer op de overige *Neobisnius*-soorten. De kop is vierhoekig, sterker en meer verspreid bestippeld. Halsschild vierhoekig, glanzig. Dekschilden iets langer en iets breeder dan het halsschild, bruin of roodbruin, naar het uiteinde lichter, fijner bestippeld en korter behaard dan bij *procerulus*. De eerste 3 tergieten aan de basis duidelijk ingedrukt. Bij het ♂ is de kop iets breeder dan het halsschild en het zesde sterniet aan het uiteinde zeer diep driehoekig ingesneden. Lengte 4 mm. Verbreed, doch vrij zeldzaam langs oevers van slooten en poelen onder plantenalval. (*elongatulus* Er.) 1. *villosulus* Steph.

Spriet en pooten zwart of bruin met geelrooden wortel 2

- 2 Kop achter de oogen iets verdikt, met eenigszins hoekige slapen, breeder dan het halsschild. De eerste 3 tergieten aan de basis zwak ingedrukt 3

Kop met parallelle zijden en afgeronde slapen, nagenoeg even breed als het halsschild. De eerste drie tergiten aan de basis duidelijk ingedrukt. Lichaam slanker dan bij *procerulus*, kop en halsschild iets langer en smaller. De eerste 3 sprietleedjes, de dekschilden, behalve aan de basis en aan de zijden, alsook de pooten rood. Achterdijen min of meer bruin. Soms zijn de dekschilden rood en slechts aan den naadwortel of deze geheel zwart. Dekschilden en achterlijf fijner bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep driehoekig ingesneden. Lengte 4 mm. Zeer zeldzaam, langs rivieroeveren op slib en onder steenen; ook soms rondvliegende. Langs de Maas bij Roosteren en Maastricht. Ook in België en in de Rijnprov.

4. *prolixus* Er.

- 3 Dekschilden krachtig en niet dicht bestippeld, zwartbruin met rood- of geelrood uiteinde. Glanzig zwart, het achterlijf vrij dicht grijs behaard. De eerste 2 of 3 sprietleedjes en de pooten roodachtig. Kop en halsschild grof en vrij dicht bestippeld, over het midden met eene onbestippelde smalle ruimte. Achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld. Sprietleedjes verlengd. Dekschilden veel langer en duidelijk breder dan het halsschild, vrij dicht geelachtig behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets driehoekig ingesneden. Lengte 4—4½ mm. Langs oevers op slib en ook onder zeewier langs de kust. Zeldzaam. Kralingen, Arnhem, St. Pieter.

2. *procerulus* Grav.

Dekschilden fijn en dicht bestippeld, eenkleurig zwartbruin of donkerbruin. Sprieten iets korter, met bredere leedjes. Sprietwortel en pooten lichter of donkerder roodbruin. Dekschilden iets smaller en korter, iets langer behaard. Achterlijf doffer, sterker behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet dieper ingesneden. Lengte 3½—4 mm. Verbreid langs oevers, onder dood riet en ook langs de zeekust onder wier. Volgens *Ganglbauer* eene variëteit van *procerulus* 3. *semipunctatus* Fairm.

71. Actobius Ganglb.

(Remus Thoms. nec Holme, Erichsonius Fanvel, Actobius Fauvel ex parte).

Dit genus onderscheidt zich van Neobisnius door het verdikte tweede sprietlid, door de aanwezigheid van een driehoekig vliezig lobje over het stigma van den prothorax, door het ontbreken eener dwarslijst op het mesosternum en door de 4 verbrede leedjes der voertarsen. Bij het ♂ zijn de voertarsen vrij sterk-, bij het ♀ veel zwakker verbreed. Het zesde sterniet bij het ♂ is aan het uiteinde uitgerand. — De soorten van dit genus, welke zich evenals Xantholinus samenrollen, leven langs oevers.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Kop, behalve over het midden, alsook de dekschilden en het achterlijf uiterst fijn en dicht bestippeld. Lichaam zwart, kop en halsschild glanzig, dekschilden en achterlijf zeer dof, ten gevolge van de zeer dichte, geelgrijze beharing. Sprieten en pooten lichter of donkerder roodbruin, het eerste sprietlid meer geelachtig. Halsschild vrij sterk en niet zeer dicht bestippeld aan weerszijden van eene gladde middenruimte. Kop langwerpig, eenigszins vierhoekig, met zeer stompe achterhoeken. Dekschilden breder en langer dan het halsschild, soms bruinachtig. Soms zijn de randen der achterlijfsringen iets lichter. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets stomp driehoekig ingesneden. Lengte 4—4½ mm. Niet zeldzaam onder dood riet en in aanspoelsel; ook tusschen veenmos 1. *cinerascens* Grav.

Kop krachtig en verspreid bestippeld, de dekschilden eenigszins glanzig. Deze soort heeft den habitus van *Philonthus nigritulus* en gelijkt ook op *Neobisnius villosulus*, doch onderscheidt zich door het tamelijk dofte achterlijf. Sprieten met kortere leedjes, roodachtig, naar het uiteinde meer geel. Halsschild aan weerszijden van het gladde middengedeelte grof en zeer verspreid bestippeld. Dekschilden veel krachtiger bestippeld dan bij *cinerascens*; ook het achterlijf minder dof, duidelijker en minder dicht bestippeld. Pooten roodbruin, de dijnen soms donkerder. Bij het ♂ is het zesde sterniet ondiep uitgerand. Lengte 4—4½ mm. Vrij zeldzaam langs oevers op slib en onder plantenaafval. Den Haag, Rotterdam, Loosduinen, Utrecht, Haarlem en op Texel. In België bij Denderleeuw.

2. *signaticornis* Muels. & Rey.

XVIII. Tribus XANTHOLININI.

72. Othius Stephens.

Lichaam zeer lang en smal. Het halsgedeelte van den kop kort, minstens half zoo breed als de halve schedel, de slapen gelijkmatig gewelfd. Bovenlip diep tweelobbig.

Dekschilden met rechte, niet over elkaar grijpende naadranden, zonder duidelijke naadstreep. Mesosternum ongekiëld. Het zevende onbedekt tergiet is in beide seksen in twee helften gedeeld, welke elk in een lang doornachtig aanhangsel uitgetrokken zijn. Middel- en achterschenen gedoorn. De eerste 4 leedjes der voortarsen meer of minder sterk verbreed. — De larve van Othius fulvipennis is door Fauvel beschreven. — De soorten van dit genus leven vooral op vochtige plaatsen onder dorre bladeren en mos.

Van de 12 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Derde sprietlid veel langer dan het tweede. Halsschild vrij dik gerand. Eene zeer groote aan *Xantholinus glabratus* herinnerende soort. Zwart of bruin, zelden roodbruin, tamelijk glanzig, de sprieten, de zijden van het halsschild, de dekschilden en de pooten rood; het uiteinde van het achterlijf geelrood. Kop eirond, aan weerszijden en aan den achterrand met vele stippels. Halsschild even lang en breed als de lijn gechagrineerde en krachtig, verspreid bestippelde dekschilden. Achterlijf fijn en vrij dicht bestippeld en fijn behaard. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan weerszijden in een langen doorn uitgetrokken. Lengte 9—10 mm. Niet zeldzaam in bosschen onder dorre bladeren, mos, plantenafval en oud hout.

(fulvipennis F.) 1. **punctulatus** Goeze.

Derde sprietlid niet of slechts weinig langer dan het tweede. Halsschild zeer fijn gerand.

Kleine soorten van $4\frac{1}{3}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. 2

- 2 Dekschilden iets korter dan het halsschild. 3

Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Lichaam glanzig zwart; de dekschilden bruin of roodbruin, de naad, de schouders en het uiteinde veelal roodachtig. Sprieten roodachtig, de eerste 3 leedjes zwart gevlekt. Pooten geelachtig, de schenen dikwerf beroekt. Kop iets smaller dan het halsschild, langwerpig-ovaal. Halsschild naar voren iets versmald, met twee stippels in eene rij aan weerszijden en eene voorste stippel onmiddellijk tegen den voorrand aan. Dekschilden krachtig en vrij dicht-, het achterlijf zeer fijn en verspreid bestippeld. Lengte 5— $5\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen, dorre bladeren, boomschors, plantenafval, in boomhol en soms bij *Lasius fuliginosus*. In duinen, bosschen en moerassen. Niet inl. In België bij Izel en Chiny. Ook in de duinen van Duinkerken.

(punctipennis Boisd. & Lac.) (*laeviusculus* Steph.)

- 3 Lichaam met parallele zijden; ook de kop met parallele zijden, iets smaller dan het halsschild. Bovenzijde donkerbruin, met geheel bruine dekschilden en veelal geelbruin halsschild. Onuitgekleurde exemplaren zijn meer geelrood met bruinachtigen kop en midden der dekschilden. Achterlijfsringen roodachtig gerand. Halsschild met parallele zijden en aan weerszijden met eene rij van 3 stippels, van welke de eerste van den voorrand verwijderd is. Dekschilden even breed als het halsschild, krachtig en vrij dicht bestippeld, niet dicht behaard. Achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld en dicht behaard. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren, mos, aan boomwortels, vermolmd hout en bij *Lasius fuliginosus*. 2. **myrmecophilus** Kiesw.

Lichaam naar voren duidelijk versmald; de kop meer ovaal, duidelijk smaller dan het halsschild. Kop zwart, het halsschild, de sprieten, de pooten en het uiteinde van het achterlijf roodgeel, de dekschilden bruin, veelal aan den naad en het uiteinde lichter. Soms is het halsschild in het midden beroekt. Halsschild met minder parallele zijden dan bij *myrmecophilus*, meer ovaal, met twee stippels aan weerszijden op het midden. Dekschilden zeer sterk en niet zeer dicht bestippeld, niet dicht behaard. Achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld en vrij dicht behaard. Lengte 5— $5\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam, onder afgevallen schors van dennen en beuken, onder mos en aan boomwortels. Loosduinen, Oosterwijk, Doorn, Dieren en Bergen-op-Zoom. Ook in België in de prov. Brabant en bij Verviers.

3. **melanocephalus** Grav.

73. *Baptolinus* Kraatz

Dit genus heeft de algemeene kenmerken van Othius. De bovenlip is eenigszins hoekig uitgerand, de slapeu zijn op de onderzijde door een stompen langskant begrensd. Dekschilden met rechten naadrand en scherp aangeduide naadstreep. Mesosternum hoog gekield; achterschenen niet gedoorn. — De larve van B. affinis is door Xambou beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam zwart; sprieten, schouders en naad der dekschilden, de achterrand der ringen en het uiteinde van het achterlijf, benevens de pooten roodachtig. Dekschilden lederachtig gerimpeld, met eenige aanduiding van eene rij van 3 groote stippels. Kop breed, met vele stippels achter de oogen. Halsschild smaller dan de kop, vrij kort en naar de basis iets versmald. Dekschilden plat, iets breeder en iets langer dan het halsschild. Achterlijf langs de randen duidelijk bestippeld, in het midden nagenoeg onbestippeld. Lengte 6—6½ mm. Onder steenen en dennenschors. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf.

(pilicornis Payk.)

Kop, dekschilden en het uiteinde van het achterlijf zwart. Sprieten, halsschild, de basis en de naad der dekschilden, het achterlijf en de pooten roodachtig. Dekschilden uiterst fijn bestippeld. Deze soort is zeer verwant aan pilicornis, doch glanziger. Kop iets langer, met slechts 2 tot 4 stippels achter de oogen. Halsschild langer en meer gewelfd. Dekschilden iets gewelfd. Achterlijf minder bestippeld. Lengte 6½—7 mm. Achter dennenschors en in mos. Zeldzaam. Apeldoorn, Winterswijk en Valkenburg. Ook in België bij Verviers en Vielsalm en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf.

(alternans Grav.) 1. *affinis* Payk.

74. Eulissus Mannerh.

Dit genus komt in habitus met Xantholinus overeen, doch onderscheidt zich doordat de voorkaken aan de buitenzijde slechts aan de basis iets gegroefd zijn, de zijrand-lijn van het halsschild zich reeds in het achterste derde gedeelte op de onderzijde buigt, doch zich eerst in de voorhoeken met den binnenrand der epipleuren vereenigt. Ook is de mesosternaal-voorzetting zeer breed en kort, van achteren breed afgeknot of in 't midden iets uitgerand, over het midden soms gekield. Dekschilden met over elkaar grijpende naadranden. — De larve van E. fulgidus is door Rey beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Glanzig zwart; de dekschilden helderrood. De tasters en de tarsen, soms de geheele pooten, geelrood. Sprieten roodbruin, het eerste lid zwart. Kop breeder dan het halsschild, met volkomen parallelle zijden, zeer grof, hier en daar tot langsgroeven ineenvloeiend bestippeld, met scherp aangeduide achterhoeken. Halsschild met sterk uitgerande zijden en met eene grof bestippelde, gebogen zijstreek. Schildje sterk bestippeld. Dekschilden iets langs den naad bestippeld en met eene stippelrij over het midden. Achterlijf zeer fijn en zeer verspreid bestippeld. De twee laatste achterlijfs-ringen zijn meestal ingetrokken. Het normaal ingetrokken zevende onbedekt tergiet is bij het ♂ in twee smal-driehoekige, van af de basis tot aan het midden aaneensrootende en dan door eene zeer smalle insnijding gescheiden zijstukken gedeeld, bij het ♀ ongedeeld en aan het uiteinde zwak uitgerand. Het achtste onbedekt tergiet steekt bij het ♂ tusschen de zijstukken van het zevende slechts weinig uit, bij het ♀ is het uiterst klein. Lengte 8½—10½ mm. Zeldzaam, onder steenen, dorre bladeren, plantenaafval, langs slooten en op het zand der duinen . . . (pyropterus Grav.) 1. *fulgidus* F.

75. Nudobius Thoms

Dit genus komt in habitus ook met Xantholinus overeen, doch onderscheidt zich vooral daardoor, dat de zijrand-lijn van het halsschild zich reeds achter het midden op de onderzijde buigt en zich onmiddellijk voor de achtercoxae vereenigt met den binnenrand der epipleuren. De voorkaken zijn van buiten tot ver over het midden gegroefd. — De soorten van dit genus leven achter schors en in molm van oude boomen en boomstronken.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Glanzig zwart; sprieten roodachtig, de dekschilden en pooten geelrood. Halsschild fijn verspreid bestippeld, met twee middenrijen van 7—8 tamelijk fijne stippels en aan weerszijden eene dergelijke gekromde rij. Kop ongeveer even lang als en aan de basis duidelijk breeder dan het halsschild, naar voren iets versmald, verspreid, naar voren dichter, grof en fijn dooreen bestippeld. Dekschilden tamelijk grof, verspreid, doch hier en daar in rijen bestippeld. Achterlijf zeer fijn en verspreid bestippeld, bij onuitgekleurde exemplaren bruin. Bij het ♂ is het zevende onbedekt tergiet in twee smal-driehoekige, het achtste onbedekt tergiet dicht aanliggende zijstukken gedeeld, bij het ♀ ongedeeld en aan het uiteinde iets uitgerand.

Lengte $6\frac{1}{2}$ –7 mm. Achter dennenschors, onder dood hout, mos en plantenafval, in bosschen. Eenmaal bij Winterswijk, Juni. In België bij Mons en in de Rijnprov. bij Aken. De larve en de pop zijn door Letzner, Schiödte en Belling beschreven . . . 1. *lentus* Grav.

76. Xantholinus Serville.

Lichaam zeer lang en smal. De buitenste voorhoofds-groeven zijn fijn en soms onduidelijk; zij beginnen nabij de binnenste voorhoofds-groeven in eene haarstijp en verloopen in eene zijwaartsche richting schief tegen den voorrand der oogen aan. Bovenlip tamelijk smal, sterk uitgerand of in twee lobben verdeeld. Voorkaken van buiten tot ver over het midden gegroefd. Eindlid der kaaktasters hoogstens iets smaller dan het uiteinde van het derde lid. De zijrandlijn van het halsschild buigt zich voor het midden benedenwaarts en vereenigt zich eerst in de voorhoeken met den binnenrand der epipleuren. Dekschilden met over elkaar grijpende naadranden. Het zevende onbedekt tergiet is bij het ♂ in twee driehoekige, veelal tot aan het midden tegen elkaar stootende zijstukken gedeeld, tusschen welke het achtste uitsteekt. Bij het ♀ is het zevende onbedekt tergiet ongedeeld en slechts aan het uiteinde iets uitgerand, het achtste klein, aan het uiteinde afgerond. Veelal zijn de twee laatste achterlijfsringen geheel in het zesde teruggetrokken. Schenen gedoord. — De larven van *X. tricolor* en *linearis* zijn door Mulsant & Rey, de larve van *punctulatus* door Bouché en Xamheu, die van *atratus* door Wasmann, die van *glabratus* en *linearis* (de vorm *longicentris*) door Rey, alsmede de pop van *glabratus* door Xamheu beschreven. — De soorten van dit genus leven meendeels onder steenen, mos, plantenafval, dorre bladeren, of in mest, waar zij de *Aphodius*-larven vervolgen en soms bij mieren.

Van de 26 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Kop achter en eenigszins onder de oogen met een iets ingedrukt langwerpig oppervlak, dat evenals het overige gedeelte der slapen grof en dicht bestippeld en dof is; de slapen steken min of meer hoekig uit. Halsschild aan de zijden met eene gebogen rij van krachtige stippels (Sub-gen. *Gyrophynus* Steph.) 2
- Kop achter de oogen gelijkmatig gewelfd of slechts met een oppervlakkigen indruk, steeds glad en glanzig (Sub-gen. *Xantholinus* isp.) 4
- 2 De van de hoeken der kin uitgaande verdiepte lijnen op de onderzijde van den kop vereenigen zich nagenoeg in het midden. Kop met nagenoeg rechte zijden. Het zesde tot negende sprietlid ongeveer de helft breeder dan lang 3
- De van de hoeken der kin uitgaande verdiepte lijnen verloop tot aan de basis van den kop gescheiden. Deze soort is zeer verwant aan *punctulatus*, doch steeds kleiner en veel smaller. De kop is smaller, naar de basis niet verbreed, met flauw gebogen zijden, op de onder- en bovenzijde meer verspreid bestippeld en met eene breede, gladde ruimte op den schedel. Het zesde tot negende sprietlid ongeveer dubbel zoo breed als lang. Dekschilden lijner bestippeld. Het achterlijf naar het uiteinde veel lijner en onduidelijker bestippeld. Lichaam niet diep zwart, maar pekzwart, de dekschilden pekbruin, soms ook het halsschild pekbruin. Spriet en pooten roodbruin, het eerste sprietlid donker. Sterniten geelrood gerand. Lengte $5\frac{1}{2}$ –6 mm. In de nesten van *Formica rufa* en *pratensis* en *Lasius fuliginosus*. Volgens Fauvel niet onderscheiden van *punctulatus*. Niet inl. In de Rijnprov. bij Linz a/d. Rijn.
(*punctulatus* Payk. var. *confusus* Muls. & Rey, *picipes* Thoms.) (*atratus* Heer).
- 3 De slapen zijn grof bestippeld, de min of meer lange stippels hier en daar ineenvloeiend; het voorhoofd veel lijner bestippeld, met eene tamelijk breede, gladde ruimte in het midden. Bij de var. *Thomsonii* Schwarz (*atratus* Thoms.) is de kop naar de basis niet verbreed, aan de zijden veel dichter, grof bestippeld en op het midden van het voorhoofd met eene smalle gladde streep. Kop weinig of niet smaller dan het halsschild, naar achteren duidelijk verbreed, met eenigszins uitstekende achterhoeken. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, met twee langrijen van 4–6 stippels en aan de zijden met eene gebogen rij uit verscheidene stippels bestaande. Dekschilden niet dicht, do h vrij diep bestippeld, naar de zijden gewoonlijk met twee stippelrijen. Achterlijf zeer lijn en niet dicht bestippeld. Lichaam glanzig zwart, de spriet en pooten bruinachtig-zwart, de tarsen rood, de dekschilden min of meer bronzig. Lengte $6\frac{1}{2}$ –7 mm. Gemeen onder steenen, plantenafval, dorre bladeren, mest,

mos en achter boomschors. De var. *Thomsonii* eenmaal bij Groesbeek in Juli; ook op het eiland Borkum. 1. **punctulatus** Payk.

De slapen zijn minder grof bestippeld, de meer ronde stippels vloeien niet ineen; het voorhoofd is verspreid doch grover bestippeld dan bij *punctulatus*. Kop iets langer en smaller, met minder uitstekende achterhoeken. Halsschild met 7 tot 9 stippels in iedere langrij en ongeveer even zoo vele stippels in de zijrijen. Lichaam iets minder glanzig dan *punctulatus*, zwart. Spriet en pooten roodbruin, de dekschilden pekbruin, soms roodbruin; bij onuitgekleurde exemplaren ook het halsschild roodbruin. Dekschilden niet zeer dicht-, naar de zijden min of meer in rijen bestippeld. Achterlijf zeer fijn en verspreid bestippeld. Lengte 6—6½ mm. Gemeen, terzelfder plaatse als *punctulatus*.

(ochraceus Gylh.) 2. **angustatus** Steph.

4 Halsschild zwart, dekschilden rood 5

Halsschild roodbruin, geheel of grootendeels rood, of wel, evenals het overige lichaam, bronzig zwart 6

5 Kop grof en verspreid bestippeld, naar achteren duidelijk verbreed en iets breder dan het halsschild, met een oppervlakkigen indruk achter de oogen. De grootste soort van het genus, glanzig zwart. Het eerste sprietlid en de pooten pekzwart of pekbruin, soms de schenen meer roodbruin of de geheele pooten rood (ab.c. **merdarius* Nordm.). Tarsen, spriet en tasters roodachtig. Halsschild naar achteren versmald, aan de zijden iets uitgerand, met rugrijen van 6—8 grove stippels en bovendien met eene gebogen zijrij van verscheidene stippels. Dekschilden even lang als het halsschild, naar het uiteinde iets verbreed, vrij sterk en verspreid-, hier en daar in rijen bestippeld. Achterlijf fijn en niet dicht bestippeld, in het midden onbestippeld. Bij het ♂ zijn de zijstukken van het volkomen gedeelte zevende onbedekt tergiet tamelijk scherp driehoekig. Lengte 10—12½ mm. Zeer verbreed, doch overal zeldzaam, onder steenen, mest en plantenafval 3. **glabratus** Grav.

Kop fijn en verspreid bestippeld, bij het ♀ naar achteren bijna niet-, bij het ♂ duidelijk verbreed, met afgeronde slapen en slechts bij het ♂ iets breeder dan het halsschild. Lichaam zwart. Spriet en pooten roodbruin, de pooten en de dekschilden rood. Bij ab.c. *angularis* Ganglb. zijn de dekschilden pekbruin en slechts aan de schouders en aan den achterrand rood of bruin-geel (Roosteren in Limburg). Halsschild naar achteren iets versmald, met rugrijen van 7—9 stippels en bovendien met 6 of 7 zijstippels. Dekschilden vrij sterk en verspreid-, op het achterlijf fijn en verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet over de geheele breedte boogsgewijze uitgerand, de achterrand scherp, in het midden veelal met eenige zeer kleine tandjes; de zijstukken van het volkomen gedeelte zevende onbedekt tergiet eenigszins afgerond. Lengte 6½—7 mm. Achter dennenschors, in mof van oude boomen en soms in de nesten van *Vespa crabro*, *Formica rufa* en *Lasius fuliginosus*. Zeer zeldzaam. Den Haag, Loosduinen, Arnhem en in Limburg bij Roosteren, Maastricht, Roermond en Wijnandsrade 4. **glaber** Nordm.

6 Lichaam zonder bronzigen weerschijn 7

Lichaam geheel of gedeeltelijk met zeer duidelijken bronsglans 8

7 Kop langwerpig, veel langer dan breed, naar voren iets versmald, met min of meer parallel zijden, evenals het achterlijf zwart. Dekschilden niet gehagrineerd. Halsschild aan de zijden onregelmatig verspreid bestippeld. Lichaam glanzig, licht roodbruin, de dekschilden soms lichter gekleurd. Spriet en dikwerf ook de basis van het halsschild donkerbruin. Kop zeer groot, tamelijk fijn bestippeld, over het midden glad, met afgeronde achterhoeken. Halsschild naar achteren versmald, met rugrijen van 10—12 stippels. Dekschilden iets korter en iets breder dan het halsschild, sterk en vrij dicht bestippeld. Achterlijf fijn gehagrineerd en tamelijk fijn en vrij dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet recht afgeknot; het zevende door eene breede, scherphoekige uitranding in twee deelen gesplitst; in de uitranding van het zevende onbedekt tergiet steekt het driehoekige, in het midden diep ingedrukte, achtste tergiet uit. Lengte 8½—10 mm. Verbreed, doch over het algemeen vrij zeldzaam onder steenen, dorre bladeren, mos, plantenafval, in drogen mest en in aanspoelsel 5. **tricolor** F.

Kop ovaal, slechts weinig langer dan breed, evenals het achterlijf donkerbruin. Dekschilden tusschen de grove bestippling duidelijk gehagrineerd. Halsschild met eene eenigszins verwarde stipplrij aan de zijden. Deze soort wordt dikwerf verward met onuitgekleurde exemplaren van *linearis* en is ook zeer verwant aan *tricolor*, doch veel kleiner. Lichaam roodbruin, de spriet en pooten rood, de pooten geelrood. Kop korter dan bij *tricolor*, aan de basis meer afgerond en veel minder dicht bestippeld. Dekschilden korter dan het halsschild. Achterlijf zeer weinig en onduidelijk bestippeld. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet niet recht afgeknot, doch diep uitgerand en aan den achterrand lang bewimperd. Lengte 7—7½ mm. Onder steenen, dorre bladeren enz. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en in Oldenburg. (distant Muls. & Rey)

- 8 Halsschild even breed als de kop en de dekschilden. De randen der riingen en het uiteinde van het achterlijf geelrood. Dekschilden krachtig-, dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *distans*, doch is iets grooter en plomper, met bronzigen weerschiin. Kop bronzig pekwart, langs de zijden dichter bestippeld. Halsschild met rugriegen van 13 tot 15 stippels en op de zijden dichter en zeer verward bestippeld. Dekschilden langer, minder grof en veel dichter bestippeld dan bij *distans*. Lengte 8 mm. Zeer zeldzaam. Bij Leiden en Noordwijk. 6. *cribripennis* Fauvel.

Halsschild duidelijk smaller dan de kop en de dekschilden. Achterlijf eenkleurig zwart. Dekschilden tamelijk fijn en niet rimpelig bestippeld. Deze soort is zeer lang en smal, zwart of bruin, bronsglanzig. Spriet en dekschilden meer of minder, benevens de pooten roodbruin; de knieën en de tarsen meer roodachtig. Dekschilden en achterlijf vrij dicht behaard. Kop naar voren bijna niet versmald, tamelijk fijn en niet dicht bestippeld, met eene glatte middenruimte. Halsschild naar de basis duidelijk versmald, met rugriegen van 12—15 zeer fijne stippels en aan de zijden verward bestippeld, soms met eenige aanduiding van verwarde stippelrijen. Dekschilden iets korter dan het halsschild. Achterlijf zeer fijn en tamelijk dicht bestippeld. Bij sommige exemplaren is het halsschild roodbruin en zijn de sprieten en pooten geheel roodgeel. Exemplaren, bij welke het halsschild aan de zijden dicht bestippeld en de bestippeling der dekschilden vrij krachtig is, werden als *multipunctatus* Thoms. geduid. Bij den vorm *longiventris* Heer zijn de dekschilden even lang als het halsschild, bronzig-zwart, lijner en iets meer verspreid bestippeld dan bij het type; ook is het aantal stippels op de rugrij en aan de zijden van het halsschild wat geringer en het lichaam iets grooter en plomper. Bij het ♂ is het zesde onbedekt tergiet recht afgeknut; het zevende door eene diepe, hoekige insnijding in twee driehoekige zistukken gedeeld; het driehoekige achtste onbedekt tergiet vult de uitranding van het zevende geheel aan en is vlak ingedrukt. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren, steenen, mos, op het zand der duinen en in aanspoelsel. 7. *linearis* Oliv.

77. Leptacinus Erichs.

Dit genus herinnert in habitus zeer aan Xantholinus; de buitenste voorhoofds-groeven echter zijn diep, met de binnenste naar voren slechts weinig divergeerend, in eene iets schuine richting tegen den binnenrand der oogen gericht. Het eindlid der kaaktasters is dun, priemvormig, even lang als of iets korter dan, doch slechts half zoo dik als het derde lid. — De larven van L. batychrus en linearis zijn door Mulsant & Rey, die van parumpunctatus door Rey beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor

- 1 Halsschild aan weerszijden op het midden met eene langsrij van 5 tot 6 grove stippels en daarnaast nog eene langsrij van 4 krachtige stippels. Kop aan de zijden zeer grof bestippeld. Bovenzijde glanzig zwart; dekschilden, sprietwortel en pooten roodachtig. Deze soort herinnert zeer aan *Xantholinus punctulatus*. Kop naar voren versmald, van voren met 4 groefjes. Halsschild naar de basis versmald. Dekschilden iets breeder dan het halsschild, nabij den zijrand met twee fijne stippelrijen en eene meer verwarde fijnere stippelrij langs den naad. Achterlijf krachtig en verspreid bestippeld, over het midden onbestippeld. Bij het ♂ is het vijfde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 5— $5\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen, dorre bladeren, plantenafval, achter boomschors, in keldervuil en in broeikassen, soms bij mieren. Niet inlandsch. In België bij Ostende en Calmpthout. (*parumpunctatus* Gyllh.)
- Halsschild aan weerszijden op het midden met eene langsrij van 8 of meer fijnere stippels 2
- 2 Halsschild met twee langsrijen van 8—10 stippels en daarnaast aan weerszijden met eene gekromde zijrij van talrijke stippels. Kop aan de zijden tamelijk fijn bestippeld. Lichaam smal 3
- Halsschild met twee langsrijen van 12—16 stippels en daarnaast aan weerszijden met eene gekromde zijrij van talrijke stippels. Kop aan de zijden vrij sterk bestippeld, naar achteren duidelijk verbreed, aan de voorzijde met 4 diepe langsgroeven. Deze soort gelijkt eenigszins op *Xantholinus linearis*, doch is veel kleiner. Glanzig zwart, de sprieten en pooten roodbruin; de dekschilden bruinachtig, aan de buitenhoeken en bij onuitgekleurde exemplaren de geheele achterhelft bleekgeel, zelden nagenoeg eenkleurig zwart- of roodbruin. Sprieten vrij lang, met verbrede leedjes. Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild, vooral naar de zijden met tamelijk regelmatige stippelrijen, overigens dichter bestippeld dan bij *parumpunctatus*. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins driehoekig ingesneden, het

vijfde zeer breed uitgerand. Lengte 4½—5 mm. Niet zeldzaam onder afgevallen bladeren, mos, steenen, plantenafval, in aanspoelsel en in broeikassen 1. *batychnus* Gyll.

- 3 Kop naar de basis en het halsschild naar voren vrij sterk verbreed. Deze soort is kleiner en slanker dan *batychnus*, overigens in kleur overeenkomende, behalve dat de dekschilden bij goed uitgekleurde exemplaren eenkleurig donkerbruin zijn, zonder bleekgele binnenhoeken en lijner bestippeld. De zijden van den kop zijn lijner en minder dicht bestippeld. Lengte 3½—3¾ mm. Terzelfder plaats als *batychnus*, doch zeldzamer. Den Haag. Volgens *Fauvel* en *Ganglbauer* een kleine *batychnus*, volgens *Kraatz* en *Seidlitz* eene goede soort.

2. *linearis* Grav.

Kop naar de basis weinig verbreed en aan de zijden iets meer verspreid bestippeld. Kleiner en smaller dan *linearis*, met tamelijk korte sprieten, wier leedjes zeer sterk verbreed zijn. Overigens in kleur overeenkomende, doch het halsschild is meestal iets lichter gekleurd en de dekschilden zijn gewoonlijk geelroodachtig met bruinachtige basis. Dekschilden iets korter, krachtiger en minder dicht bestippeld. Sprietwortel, soms de gehele sprieten en de pooten roodgeel. Lengte 3—3½ mm. Gemeen in de nesten van *Formica rufa* en *pratensis*.

3. *formicetorum* Märk.

VI. Sub-Familie PAEDERINAE.

XIX. Tribus PAEDERINI.

78. *Cryptobium* Mannerh.

Bovenlip in 't midden uitgerand en van twee tandjes voorzien. Voorkaken slank, sikkelvormig, in 't midden van den binnenrand gewoonlijk met twee tanden. Sprieten sterk geknikt, het eerste lid nagenoeg even lang als de 4 volgende leedjes te zamen (Fig. 25, blz. 161). Het halsgedeelte van den kop is meer dan half zoo breed als de kop zelf. Het vierde tarstlid is gewoon.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Glanzig zwart; de tasters en sprieten bruin of roodachtig, de pooten geel. Soms is het halsschild, veelal ook de kop en het uiteinde van het achterlijf (ab.c. **collare* Reitt.) of wel het geheele lichaam geelrood (ab.c. *Jacquelinii* Boield.). Achterlijf dicht-, min of meer zijdeachtig behaard, vrij dof. Kop grof en verspreid bestippeld. Halsschild met eene stippelrij aan weerszijden van de gladde middenruimte en aan de zijden verward bestippeld. De bestippeling op de dekschilden vrij sterk, dicht en eenigszins dwarsrimpelig, op het achterlijf zeer lijn en zeer dicht. Kop verlengd, sterk gewelfd. Halsschild langwerpig, gewelfd, met eenigszins parallele zijden, iets breeder dan de kop. Dekschilden duidelijk breeder en even lang als of iets langer dan het halsschild, ook wel duidelijk korter (de vorm *brevipenne* Rey), naar het uiteinde verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet smal en diep ingesneden, het vijfde in het midden iets ingedrukt en aan den top iets uitgerand. Lengte 5—6 mm. Onder steenen, mos en dorre bladeren langs oevers, in vochtige bosschen en moerassen; vooral in aanspoelsel en onder dood riet. Verbreed en op sommige plaatsen niet zeldzaam. De vorm *brevipenne* met het type, doch veel zeldzamer. De ab.c. *Jacquelinii* duidt op onuitgekleurde exemplaren (glaberrimum Hbst.) 1. *fracticorne* Payk.

Dolicaon Laporte.

Dit genus onderscheidt zich van Lathrobium door het zeer breede, korte, wratachtige eindlid der kaaktasters, de halsvormige insnoering van den kop, welke ongeveer ⅔ van zijne breedte bedraagt, en het langere eerste lid der achtertarsen. Bovenlip eenigszins driehoekig uitgerand, aan weerszijden van de uitranding met een tandje. De voerdijen meer of minder verdikt.

Van de 8 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Habitus van *Cryptobium fracticorne*, met meer parallele zijden en zeer weinig gewelfd. Glanzig zwart; de tasters en sprieten, eene groote vlek aan het uiteinde van elk der dekschilden, benevens de pooten geelrood. Lichaam verspreid behaard, tamelijk lijn en dicht bestippeld. Kop ovaal, evenals het halsschild met eene onbestippelde middellijn. Dekschilden iets langer en iets breeder dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep ingesneden, het vijfde aan het uiteinde oppervlakkig ingedrukt. Lengte 5—5½ mm. Onder steenen en dorre bladeren, vooral langs oevers. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf . . (*biguttulus* Lac.)

79. Achenium Curtis.

Dit genus onderscheidt zich van *Lathrobium* door het zeer platgedrukte lichaam, de veel smallere en langere, diep tweelobbighe bovenlip en het lange eindlid der achtertarsen, dat nagenoeg even lang is als de overige 4 leedjes te zamen. Kop groot, naar voren versmald, trapeziumvormig, de hals ongeveer half zoo breed als de schedel. Halsschild op het midden gewoonlijk met twee gewone of dubbele, meer of minder regelmatige stippelrijen; daartusschen in den regel glad en daarbuiten onregelmatig bestippeld. Voordijen sterk verdikt, aan den binnenrand, vóór het midden, stomp getand en daarvoor uitgebogen, de voorschenen ook uitgerand. Tarsen kort, de eerste 4 leedjes der voortarsen zeer sterk verbreed en aan de onderzijde viltig.

Van de 13 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Kop, halsschild, eene groote gemeenschappelijke, driehoekige vlek aan de basis van de helder roode dekschilden, benevens het achterlijf zwart; zelden zijn de dekschilden grootendeels zwart. Sprieten rood, de pooten en soms het uiteinde van het achterlijf lichtrood. Voorlijf sterk glanzig; het achterlijf minder glanzig, fijn en dicht behaard. Bestippeling vrij sterk en niet dicht op den kop, fijner en onregelmatig op het halsschild, waar drie gladde middenruimten overblijven; de dekschilden zijn in meer of minder duidelijke rijen bestippeld. Achterlijf duidelijk en dicht bestippeld. Dekschilden iets breeder en iets langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed driehoekig uitgerand; ook het vijfde sterniet enigszins breed uitgerand. Lengte 7—7½ mm. Vrij zeldzaam op de schorren langs de Zeeuwsche stroomen, onder aanspoelsel. Ook in België. 1. *depressum* Grav.

Kop, halsschild en achterlijf donker roodbruin, de dekschilden meer vuil geelroodachtig, gewoonlijk aan de basis en naar de buiten-tophoeken iets berookt. Sprieten rood; de pooten en het uiteinde van het achterlijf geelachtig-rood. Deze soort is kleiner, smaller en minder bestippeld dan *depressum*. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed en stomp driehoekig ingesneden, het vijfde sterniet iets uitgerand. Lengte 6—7 mm. Zeer zeldzaam onder mos en achter boomsehors; in bosschen, ook in aanspoelsel. Naarden en Arnhem. In België bij Brussel, in de Rijnprov. bij Cleef; ook bij Norden 2. *humile* Nicol.

Pseudobium Muls. & Rey.

Dit genus onderscheidt zich van *Lathrobium* door het langer eerste lid der achtertarsen, dat langer dan het tweede, doch korter is dan de 3 voorafgaande leedjes te zamen. Bovenlip in het midden niet diep uitgerand. De eerste 4 leedjes der voortarsen sterk verbreed, te zamen aan de onderzijde eene viltige schijf vormend.

De enige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Zij gelijkt zeer op een kleinen *Leptacinus* en ook op *Lathrobium longulum*. Zij is kenbaar aan den zeer langen, tamelijk breeden, vrij dicht bestippelden kop. Het halsschild is ongeveer de helft smaller dan de kop, dicht bestippeld, met eene breede, gladde middenstrook, welke aan weerszijden begrensd is door eene rij zeer dicht opeenstaande kleine stippels. Dekschilden elk met 5 of 6 rijen van zeer dicht opeenstaande stippels, welke naar het uiteinde fijner zijn; aan het uiteinde geel- of roodachtig gerand en soms ook op den naad lichter gekleurd. Achterlijf vrij dicht bestippeld. Pooten bruin, de knieën en de schenen lichter; de tarsen geelachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet scherp driehoekig uitgerand. Lengte 3½ mm. Onder steenen, langs rivieroeveren en in aanspoelsel. Niet inl. In de Rijnprov. langs de Ahr (labile Er.)

80. Lathrobium Gravenh.

Lichaam lang gestrekt. Kop met afgeronde slapen. Bovenlip aan den voorrand breed uitgerand, meer of minder diep tweelobbig. Voorkaken krachtig ontwikkeld, sikkelvormig, in 't midden met een krachtigen tand. Eindlid der kaaktasters klein, priemvormig. Halsschild langwerpig, weinig gewelfd, verspreid en slechts matig dicht bestippeld, met breede gladde middellijn. Eindlid der achtertarsen hoogstens even lang als de 3 voorafgaande leedjes te zamen. Bij vele soorten komen gevleugelde en ongevlugelde exemplaren voor. Bij de gevleugelde vormen zijn de dekschilden langer dan of minstens

even lang als-, bij de ongevleugelden meestal korter dan het halsschild. De vier eerste onbedekte tergieten aan de basis meer of minder in de breedte ingedrukt. Het zevende onbedekt tergiet bij het ♂ nagenoeg tot aan de basis gespleten of uitgesneden, bij het ♀ gewoonlijk slechts ondiep uitgesneden. De voordijen zijn sterk verdikt en aan den binnenrand, voor het midden, hoekig of tandvormig verbreed; de voorschienen aan de binnenzijde uitgebogen. De eerste 4 zeer sterk verbreedde voortarsen-leedjes vormen in beide seksen eene ovale, aan de onderzijde dicht villige schijf. — De larve van *L. multipunctatum* is door Key beschreven. — De soorten van dit genus leven onder steenen, afgevallen bladeren, mos, op vochtige plaatsen in bosschen, langs rivieroevers en op riet.

Van de 51 Europeesche soorten komen 15 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden op den omgeslagen rand met de gewone randlijst, daarbinnen zonder eene lijst die de epipleuren begrenst. 2
- Dekschilden op den omgeslagen rand met eene, tegen de basis meestal afgekorte lijst, waardoor de epipleuren duidelijk begrenst zijn. 17
- 2 Het halsvormige gedeelte van den kop ongeveer half zoo breed als de kop zelf. Penis bij het ♂ uit 3 hoornachtige platen gevormd (Sub-gen. *Lathrobium* isp.). 3
- Het halsvormige gedeelte van den kop zeer smal en ongeveer een derde zoo breed als de kop zelf. Penis bij het ♂ uit 4 platen gevormd, aangezien er nog eene onderste steunplaat bijkomt (Sub-gen. *Tetartopeus* Czwalina). 16
- 3 Het laatste tergiet bij het ♀ (tusschen de griffelvormige zijstukken van het voorlaatste tergiet) gekield of dakvormig gewelfd. Bij het ♂ is het vierde en vijfde sterniet over de geheele lengte ingedrukt; de bovenste plaat van den penis is door eene vliezige tusschenruimte van de onderste platen gescheiden. 4
- Het laatste tergiet bij het ♀ vlak, het voorlaatste gewoonlijk meer of minder diep uitgerand (behalve bij *pallidum*). Bij het ♂ is het vijfde sterniet niet of slechts van achteren ingedrukt; de bovenste plaat van den penis ligt, ten minste gedeeltelijk, dicht tegen de beide onderste platen aan. 6
- 4 Het laatste tergiet is bij het ♀ dakvormig gewelfd. Oogen rondachtig, klein. Bovenzijde roodbruin, eenigszins dof. Deze soort heeft den habitus van *brunnipes*. Sprieten, pooten en uiteinde van het achterlijf meer geelroodachtig. Kop en halsschild vrij krachtig en dicht, de dekschilden zeer ondiep bestippeld. Kop eenigszins driehoekig, breeder dan het halsschild. Halsschild zeer lang, met sterk afgeronde voorhoeken. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Ongevleugeld of met rudimentaire vleugels. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets gegroefd en aan het uiteinde zeer diep en breed driehoekig uitgerand; het vierde en vijfde sterniet met eene middengroef of iets ingedrukt; het vijfde sterniet aan den rand gekarteld en van kleine, dicht staande, zwarte winperhaartjes voorzien. Lengte $7\frac{1}{2}$ —8 mm. Onder steenen, op zand en slib langs stroomend water en in aanspoelsel. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik. Ook in Westfalen. (*spadicum* Er.)
- Het laatste tergiet bij het ♀ scherp gekield. Bovenzijde zwart. 5
- 5 Halsschild weinig langer dan breed. Oogen rondachtig. Bij het ♂ is de indruk op het vierde en vijfde sterniet smal en ondiep, bij het ♀ het voorlaatste tergiet diep ingesneden en de kiel op het laatste tergiet in het midden het sterkst opgericht. Lichaam glanzig zwart; het achterlijf eenigszins dof en dicht behaard. Sprieten en pooten lichter of donkerder vuil roodbruin, soms meer helder rood. Kop vrij sterk-, doch zeer verspreid-, het halsschild dichter-, de dekschilden niet zeer dicht en niet diep-, het achterlijf zeer fijn en uiterst dicht bestippeld. Kop kort eirond. Halsschild iets breeder dan de kop, met eene tamelijk breede, gladde middellijn. Dekschilden even lang als, zeldzamer langer (de vorm *heteropterus* Eppelsch.) dan het halsschild, veelal aan het uiteinde met een uiterst fijn rood randje. Bij het ♂ is het zesde sterniet fijn gegroefd en aan het uiteinde eenigszins driehoekig ingesneden. Lengte 6—7 mm. Niet zeldzaam langs rivieroevers onder aanspoelsel en vooral in droge slooten onder vochtige bladeren. 1. **fovulum** Steph.
- Halsschild veel langer dan breed. Oogen duidelijk verbreed en naar onderen versmald. Bij het ♂ is de indruk op het vijfde en zesde sterniet breed en diep, bij het ♀ het voorlaatste tergiet tot aan de basis gespleten en de kiel op het laatste tergiet naar voren het sterkst opgericht. Lichaam glanzig zwart; het achterlijf vrij dof. Sprieten, tasters en pooten geelrood. Achterlijf zeer dicht behaard. Kop en halsschild sterk-, doch niet dicht bestippeld; fijner en veel dichter op de dekschilden; het achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld.

Kop vrij kort, halsschild even breed als of iets smaller dan de kop, met eene breede, gladde middellijn. Dekschilden duidelijk korter dan het halsschild. Vleugels meestal rudimentair of ontbrekend. Bij den vorm *luteipes* Fauvel zijn de dekschilden veel langer dan het halsschild en de vleugels goed ontwikkeld. Lengte $7\frac{1}{2}$ —9 mm. Gemeen, vooral in bosschen onder mos, plantenafval, dorre bladeren, langs oevers, soms in aanspoelsel en onder dood riet. De vorm *luteipes* zeer zeldzaam; Gorkum, Vianen en Breda.

(punctatum Fourcr.) 2. **brunnipes** F.

- 6 Oogen minstens dubbel zoo breed als het eerste sprietlid 7
- Oogen zeer klein, niet of slechts weinig breeder dan het eerste sprietlid. Bovenzijde lichter of donkerder roodbruin, soms geelrood 15
- 7 Sprietten plomp, snoervormig, de middelste leedjes eenigszins rondachtig, weinig langer dan breed 8
- Sprietten slanker, de middelste leedjes kegelvormig, duidelijk langer dan breed. Bovenzijde zwart, een groot gedeelte of alleen het uiteinde der dekschilden, de sprietten en de pooten rood. Het zesde sterniet bij het ♂ zonder langsstrepen van borstelharen 14
- 8 Groote, tamelijk breede soorten, 8—9 mm. lang. Het zesde sterniet bij het ♂ met twee duidelijke langsstrepen, uit dicht bijeen staande zwarte borstelharen bestaande 9
- Middelmatig groote, weinig verbrede of smalle, alsook kleine soorten, $3\frac{1}{2}$ —7 mm. lang. Het zesde sterniet bij het ♂ zonder langsstrepen van borstelharen 11
- 9 Dekschilden tamelijk gewelfd, met eene zeer duidelijke langsgroef langs den naad; aan het uiteinde te zamen vrij diep uitgesneden. Kop tot aan den voorrand der oogen nagenoeg vierkant, breeder en met meer parallele zijden dan bij *elongatum*, op de onderzijde veel fijner en verspreid-, op de bovenzijde iets meer verspreid-, weinig lijner dan het halsschild bestippeld. Dekschilden roodbruin, aan de basis niet scherp zwart begrensd, zelden geheel of nagenoeg geheel zwart (abc. **volgensse* Hochh.). Overigens gelijkt deze soort op *elongatum*. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde, tusschen de zwarte strepen van borstelharen, slechts zeer zwak uitgerand. Lengte 8—9 mm. Vrij algemeen onder dorre bladeren, mos en in aanspoelsel der rivieren 3. **geminum** Kraatz.
- Dekschilden tamelijk vlak, met eene slechts zwak aangeduide langsgroef langs den naad; aan het uiteinde meer in een flauwen boog uitgerand. Bij het ♂ het zesde sterniet zonder eenige uitranding 10
- 10 Kop nagenoeg vierkant, breeder en korter dan bij *elongatum*, naar achteren duidelijk verbreed; op de onderzijde fijn en verspreid-, op de bovenzijde langs de zijden verspreid en veel fijner dan op het halsschild-, op 't midden krachtiger en meer verspreid dan aan de zijden bestippeld. Dekschilden in den regel even lang als het halsschild, matig sterk en dicht bestippeld, rood, slechts aan de basis hoogstens iets meer uitgebreid zwartachtig. Lichaam overigens zwart, sprietten rood, de tasters en de pooten, benevens de coxae geelrood. Het derde sprietlid ongeveer de helft langer dan het tweede, de middelste leedjes nauwelijks langer dan breed. Halsschild grof en vrij dicht bestippeld, met gladde middellijn. Bij het ♂ is het vijfde sterniet over het midden zeer zwak-, het zesde iets duidelijk gegroefd en dit laatste op de achterhelft, aan weerszijden, met zwarte borstelharen bezet, aan den achterrand ternaauwernood uitgebogen. Deze soort onderscheidt zich van *geminum* en *elongatum* door de roodgele coxae, de aan de basis niet of slechts weinig uitgebreid zwartachtige dekschilden, de veel fijnere bestippling van den kop en de minder uitstekende, zwarte borstelstrepen van het, aan het uiteinde bijna recht afgeknotte, zesde sterniet bij het ♂. Lengte $7\frac{1}{2}$ —8 $\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam. Bij Zutphen en Valkenburg (L.). Ook op het eiland Borkum 4. **ripicola** Czwaliņa.
- Kop met meer afgeronde achterhoeken en nagenoeg parallele zijden, even breed als het halsschild, op de onderzijde vrij sterk en dicht-, op de bovenzijde eveneens krachtig en matig dicht-, iets fijner dan het halsschild, bestippeld. Dekschilden met rechte zijden en rechthoekige, iets afgeronde schouder, rood, het eerste derde basaalgedeelte vrij scherp zwart begrensd, bij abc. **fraudentum* Ganglb. de dekschilden geheel zwart. Lichaam overigens zwart; de sprietten bruinrood, de tasters en de pooten, behalve de bruine coxae, geelrood. Halsschild grof en matig dicht bestippeld, met gladde middellijn. Gevleugeld. Dekschilden langer dan het halsschild, matig sterk en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde sterniet over het midden zeer oppervlakkig-, het zesde sterker gegroefd en aan weerszijden op de achterhelft met zwarte borstelharen bezet, aan het uiteinde daartusschen scherp hoekig uitgerand. Lengte 8—9 mm. Vrij gemeen, vooral langs oevers en in aanspoelsel 5. **elongatum** L.
- 11 Lichaam vlak, zwart. Dekschilden, behalve de basis, alsook de sprietten en de pooten rood. 12

Lichaam tamelijk gewelfd, min of meer cilindervormig; de bovenzijde geheel zwart of zwartbruin 13

- 12 Kop tot aan den voorrand der oogen even lang als breed en even breed als het halsschild, met parallelle zijden, zeer grof en dicht bestippeld. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *elongatum*, doch is veel kleiner. Achterlijf minder dicht behaard en daarvoor meer glanzig. Halsschild vrij dicht en sterk bestippeld, met eene tamelijk breede gladde middellijn. Dekschilden eenigszins verspreid en fijn-, het achterlijf minder dicht dan bij *fulvipenne* bestippeld. Sprietten kort, het derde lid nagenoeg even lang als het tweede. Dekschilden veel langer en duidelijk breeder dan het halsschild. Bij het ♂ is het vijfde en zesde sterniet een weinig ingedrukt, het zesde eenigszins driehoekig ingesneden. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Uiterst zeldzaam. Onder dorre bladeren en op slib langs rivieroevers. Uitsluitend bij Breda aangetroffen. In België bij Leuven en in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld.

6. *rufipenne* Gyll.

Kop tot aan den voorrand der oogen breeder dan lang, duidelijk breeder dan het halsschild, fijn en verspreid bestippeld. Bestippeling der dekschilden zeer oppervlakkig en verspreid. Deze soort komt in habitus en kleur met *fulvipenne* overeen, doch onderscheidt zich door het smallere lichaam en den meer vierkanten, korteren, breederen en meer glanzigen kop, welke op het midden minder bestippeld is. Het derde sprietlid is langer dan het tweede. Dekschilden even lang en iets breeder dan het halsschild, zeer vlak, lichtrood, om het schildje iets berooft. Achterlijf wat glanziger en minder bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde en zesde sterniet vrij diep ingedrukt, het vijfde aan het uiteinde iets-, het zesde zeer breed uitgerand en de zijden van den indruk kielvormig opgericht en tandvormig eindigende. Bij het ♀ is het zesde sterniet afgerond. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Zeer zeldzaam onder steenen langs oevers. Arnhem, Breda. Ook in België en in de Rijnprov. bij Düsseldorf.

7. *laevipenne* Heer.

- 13 Dekschilden vrij dicht- en evenals kop en halsschild krachtig bestippeld, gewoonlijk even lang als, zelden iets langer dan het halsschild. Sprietten roodachtig; de pooten zwartbruin, soms meer roodbruin, de tarsen geelrood; lichaam overigens geheel glanzig zwart. Gevleugeld of nagenoeg ongevleugeld. Halsschild met eene vrij smalle, gladde middellijn. Achterlijf dicht behaard en fijn en zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde en zesde sterniet smal ingedrukt, het zesde scherp driehoekig ingesneden; bij het ♀ het zesde sterniet afgerond. Lengte 5—6 mm. Niet zeldzaam langs rivieroevers onder dood riet en in aanspoelsel, zeldzamer in moerassige streken en bosschen langs slooten en vijvers. 8. *filiforme* Grav.

Dekschilden fijn en verspreid-, op kop en halsschild vrij sterk en vrij dicht-, op het halsschild eenigszins in rijen bestippeld. Dekschilden korter, zelden langer dan het halsschild (de vorm *longipenne* Fairm.). Lichaam glanzig zwartbruin, de dekschilden soms meer bruinachtig; sprietten, pooten en het uiteinde van het achterlijf roodachtig. De kleinste soort van het genus, zeer smal. Achterlijf uiterst fijn en dicht bestippeld en dicht behaard, naar het uiteinde iets verbreed. Halsschild iets smaller dan de kop en de dekschilden. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden iets gegroefd en aan het uiteinde, aan weerszijden, flauw uitgehogen. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Verbreed en niet zeldzaam onder steenen, dorre bladeren, plantenafval, mos aan boomwortels, in aanspoelsel en soms bij mieren. De vorm *longipenne* bij Amsterdam 9. *longulum* Grav.

- 14 Halsschild iets smaller dan de kop, slechts iets langer dan breed, vooral naar achteren gewelfd, met eenigszins afgeronde zijden en met breed afgeronde achterhoeken, grof en matig dicht bestippeld, met gladde middellijn. Dekschilden gewelfd, nagenoeg even breed en even lang als- of iets korter dan het halsschild, vrij grof bestippeld. Deze soort gelijkt zeer op *elongatum* en *geminum*, doch is onderscheiden door de veel slankere sprietten en door het ontbreken der zwarte borstelharen op het zesde sterniet bij het ♂. Van *fulvipenne* is zij onderscheiden door den breederen vorm, den veel grooteren, breederen kop, het kortere breedere halsschild en het, in het midden van den achterrand, slechts oppervlakkig uitgerand zesde sterniet bij het ♂. In kleur met *elongatum* overeenkomende. Kop krachtig en bijna even sterk bestippeld als het halsschild, in het midden meer verspreid-, op de onderzijde tamelijk fijn en verspreid bestippeld. Bij het ♂ het zesde sterniet met eene oppervlakkige middengroef en in het midden van den achterrand zwak uitgehogen. Lengte $7\frac{1}{2}$ —8½ mm. Onder steenen en in aanspoelsel. Zeer zeldzaam. Leiden, Breda, Cuyk, Willegersberg.

10. *castaneipenne* Kolen.

Halsschild niet smaller dan de kop, duidelijk langer dan breed, vlak, met rechte zijden. Dekschilden vlak, soms een weinig gewelfd, even breed als- of een weinig breeder en iets korter dan- of even lang (de vorm *Letzneri* Gerh.) als het halsschild. Deze soort komt in kleur met *geminum* overeen, maar is veel smaller; van *castaneipenne* is zij vooral onderscheiden door het meer gestrekte lichaam en den smalleren kop. De ondervleugels zijn rudimentair of ontbreken geheel, bij den niet zeldzamen vorm *Letzneri* zijn zij volkomen ontwikkeld. Dekschilden bruinrood of fraai rood, aan de basis meer of minder smal zwart. Bij het ♂ zijn de twee voorlaatste sterniten oppervlakkig ingedrukt, het zesde sterniet aan het uiteinde breed driehoekig

ingesneden. Bij het ♀ is het zevende onbedekt tergiet vierhoekig ingesneden, welke insnijding even lang als breed is; het zesde sterniet is afgerond. Lengte 7—8 mm. Gemeen onder afgevallen bladeren en steenen; ook langs oevers en soms op lage planten. 11. **fulvipenne** Grav.

- 15 Kop van achteren in eene doorgaande bocht met de achterhoeken afgerond, eenigszins driehoekig, nagenoeg even breed als het halsschild. Achterlijf dof, zeer fijn en uiterst dicht bestippeld en zijdeachtig behaard. Sprieten in beide seksen slank. Licht roodbruin, glanzig, het achterlijf donkerder; de sprieten, pooten en het uiteinde van het achterlijf roodgeel. Dekschilden bij het ongevlugelde type korter dan-, bij den gevlugelden vorm (**Jansoni* Crotch) even lang als het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet van een zeer duidelijk smal groefje voorzien, aan het uiteinde een weinig uitgerand en langs de randen zwart bewimperd; het vijfde sterniet is ingedrukt, aan het uiteinde uitgerand en met twee kleine bundels van zwarte wimperharen. Lengte 5—5½ mm. Zeer zeldzaam, onder steenen, plantenafval, langs oevers, alsmede onder mos in bosschen. Den Haag, Rotterdam, Wageningen, Breda, Kolhorn (N.-Holl.). In België bij Verviers en Hollogne. De gevlugelde vorm is mij niet bekend. 12. **pallidum** Nordm.

Kop van achteren nagenoeg recht afgesneden, met weinig afgeronde achterhoeken, breeder dan het halsschild. Achterlijf eenigszins glanzig, fijn doch niet dicht bestippeld. Sprieten minder slank, de middelste leedjes bij het ♂ langwerpig, bij het ♀ rondachtig. Deze soort heeft den habitus van *pallidum*, doch is onderscheiden door de smallere gedaante. Donker roodbruin, soms geheel geelrood, glanzig; de sprieten, de pooten en het uiteinde van het achterlijf geel. Kop en halsschild veel dichter en fijner-, de dekschilden sterker bestippeld dan bij *pallidum*. Dekschilden korter dan-, bij den gevlugelden vorm (*maurianense* Fauvel) even lang als het halsschild. Bij het ♂ is het vijfde en zesde sterniet een weinig ingedrukt, het zesde aan het uiteinde driehoekig uitgerand. Lengte 4½ mm. Onder plantenafval en in aanspoelsel der rivieren. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf en in Oldenburg. (*dilutum* Er.)

- 16 De achterhoeken van den kop en de voorhoeken van het halsschild, van boven gezien, nagenoeg in een volkomen cirkelboog afgerond. Lichaam tamelijk breed, weinig glanzig, geheel zwart; soms vertoonen de dekschilden aan de buitenhoeken een klein rood vlekje. Achterlijf dof, dicht zijdeachtig behaard en uiterst fijn en dicht bestippeld. De sprieten, het derde tasterlid aan het uiteinde en de pooten donker roodbruin of pekkruin; het eerste sprietlid gedeeltelijk en de tarsen geelrood. Kop, behalve op het midden, tamelijk fijn en dicht-, het halsschild vrij grof en tamelijk dicht-, langs de zijden veel fijner bestippeld, met eene smalle, gladde middellijn. Dekschilden breeder en langer dan het halsschild, vlak gedrukt en eenigszins dwarsrimpelig, fijn bestippeld. Bij het ♂ is het vierde sterniet in het midden zwak- en het vijfde duidelijk gegroefd, het zesde aan het uiteinde smal en diep hoekig ingesneden. Bij het ♀ is de achterrand van het zesde onbedekt sterniet in het midden vrij scherp driehoekig uitgetrokken. Lengte 6½—7 mm. Vrij zeldzaam in moerasige streken onder dorre bladeren, steenen en dood riet; ook langs rivieroevers. . 13. **quadratum** Payk.

De achterhoeken van den kop en de voorhoeken van het halsschild, van boven gezien, in een minder gelijkmatigen boog afgerond. Lichaam smaller, veel meer glanzig zwart; het eerste sprietlid, de pooten en een vlekje aan de buitenhoeken der minder vlakke dekschilden helder roodgeel; zelden ontbreekt dit vlekje; ook zijn de pooten hoogst zelden meer bruin. Achterlijf vrij dof, uiterst dicht zijdeachtig behaard. Bij het ♀ is het zesde onbedekt tergiet meer kort en stomp uitgetrokken. Overigens aan *quadratum* verwant en evenzo bestippeld, doch altijd smaller, iets kleiner en glanziger. De dekschilden bij de gevlugelde exemplaren iets langer dan het halsschild. Bij de ongevlugelde var. **atripalpe* Scriba zijn de dekschilden even lang als of iets korter dan het halsschild en is de kop meer verspreid bestippeld en zeer sterk glanzig. Lengte 5½—6 mm. Zeer verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam; in droge slooten, onder vochtige bladeren, dood riet en langs oevers op slib. Met *Ganglbauer* beschouw ik *terminatum* als eene goede soort. De var. *atripalpe* in Westfalen. 14. **terminatum** Grav.

- 17 Dekschilden zeer grof in duidelijke langsrijen-, aan het uiteinde meer verward bestippeld, slechts iets breeder dan het halsschild. Het halsvormige gedeelte van den kop is ongeveer even breed als de helft van den kop (Sub-gen. *Lobrathium* Muls. & Rey). Lichaam glanzig zwart; de sprieten, de voerpooten, de dekschilden en het uiteinde van het achterlijf roodachtig, de middel- en achterpooten meer geelachtig; de dekschilden aan de basis meer bruinachtig. Soms is het lichaam meer roodbruin of bij onuitgekleurde exemplaren meer geelrood. Kop vrij dicht-, het halsschild grof en tamelijk dicht bestippeld, met eene gladde middellijn; het midden van den kop glad. Achterlijf fijn en vrij dicht bestippeld. Dekschilden bij den typischen, van rudimentaire vleugels voorzien vorm even lang als-, bij den gevlugelden vorm *striatopunctatum* Kiesw. langer dan het halsschild 1). Bij het ♂ is

1) Bij den niet in ons gebied voorkomenden ongevlugelden vorm (*pyrenaicum* Fairm.) zijn de dekschilden ongeveer half zoo lang als het halsschild.

het vijfde sterniet breed gegroefd en met twee duidelijke bultjes bezet, het zesde eveneens gegroefd en breed en diep driehoekig uitgerand. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Niet zeldzaam op slijb, onder dorre bladeren, plantenafval, mos en steenen 15. *multipunctatum* Grav.

Dekschilden fijner en dichter, verward bestippeld, slechts hier en daar met eenige aanduiding van rijen. Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden. Het halsvormige gedeelte van den kop ongeveer even breed als het derde gedeelte van den kop (Sub-gen. *Platydomene* Ganglb.) 18

- 18 Bovenzijde zwart; de dekschilden, behalve een breede band aan de basis, rood. Het achtste onbedekt tergiet bij het ♀, tusschen de griffelvormige zijstukken van het zevende, scherp toegespitst. De sprieten en tarsen roodbruin. Kop en halsschild vrij sterk en zeer dicht bestippeld. Kop zeer breed, eirond, op het midden weinig bestippeld, met twee duidelijke dwarsindrukken. Halsschild met sterk afgeronde voorhoeken en met eene smalle, gladde, iets kielvormig verheven middellijn. Dekschilden $\frac{1}{2}$ breeder en iets langer dan het halsschild, zeer vlak, met parallelle zijden. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins driehoekig ingedrukt, de randen van den indruk zwart bewimperd en het uiteinde fijn uitgerand; het vijfde sterniet iets uitgerand. Lengte 7 mm. Onder steenen langs stroomend water. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Gulik (angusticollis Boisd. & Lac.)

Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden soms bruinachtig. De sprieten en tarsen roestkleurig. Het laatste tergiet bij het ♀ aan het uiteinde afgerond. Deze soort is zeer smal en platgedrukt. Kop en halsschild fijn en zeer dicht-, de dekschilden vrij sterk en dicht-, het achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld. Halsschild ongeveer de helft smaller dan de dekschilden, met eene eenigszins verheven, gladde middellijn. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed gegroefd tusschen twee kielvormig verheven lijnen en aan het uiteinde uitgerand; het vierde en vijfde sterniet in de lengte sterk ingedrukt. Lengte 5 mm. Langs stroomend water onder steenen, ook onder plantenafval en in aanspoelsel. Niet inl. In de Rijnprov. bij Gulik. (*picipes* Er.)

Domene Fauvel.

Dit genus is naverwant aan Lathrobium, doch herinnert in habitus meer aan Stilicus door het meer gewelfde lichaam. Het is vooral onderscheiden door het gewelfde, ovale, uiterst dicht bestippelde halsschild, dat hoogstens eene smalle, gladde middellijn vertoont.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Deze soort heeft het voorkomen van *Stilicus subtilis*. Zwart, kop en halsschild dof, de dekschilden tamelijk glanzig, met geringen bronzen weerschijn. Sprieten en pooten bruinrood. Kop rondachtig, iets breeder dan het halsschild, krachtig en uiterst dicht, min of meer langsrimpelig bestippeld. Halsschild iets breeder dan de dekschilden, omgekeerd eirond, in 't midden dicht-, aan de zijden uiterst dicht langsrimpelig bestippeld, zonder aanduiding van eene gladde middellijn. Dekschilden iets korter dan het halsschild, krachtig en dicht-, het achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld. Ongevlugeld. Bij het ♂ het zesde sterniet met eene oppervlakkige middengroef en aan het uiteinde scherp driehoekig uitgesneden. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Onder vochtig mos in bergstreken. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (*scabricollis* Er.)

81. Medon Steph.

(*Lithocharis* Erichs.)

*Dit genus onderscheidt zich van Lathrobium vooral door den vorm der bovenlip, welke in het midden van den voorrand twee kleine tandjes heeft en daartusschen iets uitgerand is. Ook zijn de voortarsen niet of slechts weinig verbreed, of wel bij het ♂ het tweede en derde lid sterker verbreed. Het eerste lid der achtertarsen is langer dan het tweede. Kop vrij groot, de slapen veel langer dan de oogen. Prothorax met driehoekige, de stigmata bedekkende epimeren. De voordijen meer of minder verdikt, aan den binnenrand naar het uiteinde veelal uitgebogen. — De larven van *M. dilutus*, *apicalis* en *bicolor* zijn door Rey beschreven. — De soorten van dit genus leven onder steenen en dorre bladeren.*

Van de 29 Europeesche soorten komen 9 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De slapen stooten op de onderzijde van den kop nagenoeg tegen elkaar aan. Bovenzijde min of meer glanzig. Het uiteinde van het mesosternum fijn gekield (Sub-gen. *Medon* isp.) 2
- De slapen op de onderzijde van den kop door eene duidelijke, meer of minder breede tusschenruimte gescheiden. Het uiteinde van het mesosternum altijd ongekiel 7
- 2 Achtertarsen zeer slank, even lang als de schenen, het vierde lid lang. Kop rechthoekig. De grootste soort van het genus, roodbruin. De kop, het midden van het halsschild, het schildje en het achterlijf donkerbruin. De randen der achterlijfsringen en het uiteinde van het achterlijf, de sprieten en de pooten roodachtig. Dekschilden en vooral het achterlijf fijn en dicht behaard. De bestippeling is vrij krachtig en dicht op kop en halsschild, fijner en zeer dicht op de dekschilden, uiterst fijn en dicht op het achterlijf. Kop glanzig, met eene gladde middenruimte. Halsschild glanzig, iets smaller dan de kop, naar de basis eenigszins versmald, met eene onduidelijke, gladde middellijn. Dekschilden veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet scherp driehoekig ingesneden, het vijfde sterniet breed uitgesneden en aan weerszijden uitgerand. Lengte 6 mm. Onder steenen en plantenafval op leemgrond en vooral op kalkbodem, soms bij mieren achter boomschors. Zeer zeldzaam. Nijmegen, Zutphen, Roermond. In België bij Leuven en langs de Ourthe en de Vesdre, in de Rijnprov. bij Düsseldorf 1. *castaneus* Grav.
- Achtertarsen minder slank, korter dan de schenen, het vierde lid tamelijk kort. Kop nagenoeg driehoekig of eenigszins vierkant 3
- 3 Kop min of meer glanzig, de stippels vrij diep en van elkaar gescheiden 4
- Kop dof, dicht rimpelig en niet diep bestippeld. Halsschild rood, met duidelijke, gladde middellijn. 6
- 4 Halsschild nagenoeg even krachtig bestippeld als de kop. 5
- Halsschild fijner dan de kop bestippeld. Voortarsen eenigszins verbreed. Kop en halsschild dicht bestippeld, zonder duidelijke gladde middellijn. Bovenzijde licht roodbruin; het achterlijf, behalve aan het uiteinde, bruin; dekschilden naar het uiteinde berookt. Deze soort gelijkt op *fuscus*, doch is iets grooter en breeder; de bestippeling op het tamelijk glanzige voorlijf is veel fijner, minder dicht en niet rimpelig, op het dofte achterlijf zeer dicht en fijn. Bij het ♂ is het tweede en derde lid der voortarsen sterk verbreed, het vijfde sterniet breed uitgerand en aan weerszijden van de uitranding van een zwarten haarkam voorzien; het zesde sterniet is diep driehoekig uitgesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. In eikenmool en onder boommos. Zeer zeldzaam. Bij Roermond. Ook in de Rijnprov. bij Cleef. 2. *dilutus* Er.
- 5 Kop en halsschild met eene scherp begrensde, gladde, iets verheven middellijn. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Voortarsen zeer weinig verbreed. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden en soms ook het halsschild donker roodbruin. Sprieten en pooten geelrood. Deze soort is eveneens zeer verwant aan *fuscus*, doch iets kleiner en met kortere sprieten. Kop en halsschild tamelijk fijn en dicht, niet rimpelig bestippeld. Achterlijf uiterst fijn en dicht bestippeld en behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig uitgesneden; het vijfde aan het uiteinde afgeknot. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel roodachtig. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder mos aan boomwortels, dorre bladeren, drogen mest en soms bij mieren. In vochtige bosschen. Zeldzaam. Bij Beek (Gelderl.) en Roermond. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en Elberfeld 3. *piceus* Kr.
- Kop en halsschild zeer dicht bestippeld, het halsschild met eene minder duidelijke en niet scherp begrensde middellijn. Dekschilden weinig langer dan het halsschild. Voortarsen niet verbreed. Bovenzijde glanzig roodbruin. Deze soort heeft den habitus en kleur van *fuscus*, doch is wat meer gewelfd, minder behaard en veel sterker bestippeld op kop en halsschild. De kop is grooter en breeder dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep hoogsgewijze uitgerand, het vijfde met eene zeer breede ondiepe uitranding, aan weerszijden van de uitranding met een zwarten haarkam. Lengte 4—4½ mm. Onder dorre bladeren en soms bij mieren. Zeldzaam. Beek bij Nijmegen, Maastricht, Bunde en Heerlen in Limburg. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 4. *brunneus* Er.
- 6 Halsschild tamelijk fijn en sterk rimpelig bestippeld. Deze soort gelijkt op *castaneus*, doch is veel kleiner. Kop donkerbruin, halsschild en dekschilden licht roodbruin, het achterlijf lichtrood; sprieten rood, pooten geelrood. Dekschilden en achterlijf fijn, doch niet zeer dicht behaard. Dekschilden iets sterker bestippeld dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed en diep uitgerand; het vijfde breed en hoekig uitgesneden en aan weerszijden daarvan eenigszins tot een zwarten tand verlengd, welke aan den top naar binnen gekamd is. Lengte 4—4½ mm. Onder mos, steenen, dorre bladeren, plantenafval, oud hout en boomschors. Zeer zeldzaam. Bij Tiel, Eethen en Valkenburg (Limburg). Ook in België bij Verviers, Brussel, Brugge enz. 5. *fuscus* Mannerh.
- Halsschild zeer fijn en dicht, doch niet rimpelig bestippeld. Habitus en kleur van *fuscus*, doch slanker en dofser. Kop zwartachtig, het halsschild roodachtig, de dekschilden en het

achterlijf roodbruin; veel fijner en dichter bestippeld, zoowel op het voor- als achterlijf. Kop kleiner en smaller. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep uitgerand; het vijfde zeer breed en stomp driehoekig uitgerand, welke uitranding aan weerszijden zwart bewimpert is. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Langs oevers onder steenen en in aanspoelsel. Meermalen bij Rotterdam; ook bij Arnhem, Amsterdam en Bodegraven 6. *ripicola* Kr.

- 7 De tussenruimte tussen de slapen, op de onderzijde van den kop, tamelijk smal en glad. Bovenzijde min of meer glanzig (Sub-gen. *Hypomedon* Muls.) 8

Deze tussenruimte breed en bestippeld. Bovenzijde min of meer dof (Sub-gen. *Pseudomedon* Muls.). Zwartbruin, matglanzig, dicht zijdeachtig behaard en uiterst fijn en zeer dicht bestippeld. Halsschild en dekschilden veelal min of meer roodbruin. Onuitgekleurde exemplaren grootendeels geelbruin met donkerder kop. De sprieten en de pooten rood- of geelachtig, soms de middelste sprietleedjes iets donkerder. Kop weinig of niet smaller dan het halsschild. Dekschilden langer dan het halsschild. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterk verbreed en is het zesde sterniet meer of minder diep uitgerand. Deze soort is eenigszins veranderlijk in de breedte van den kop en van het halsschild, alsmede in de lengte der dekschilden, doch is dit m. i. geen reden tot het aannemen van twee soorten. Lengte 3—3½ mm. Niet zeldzaam, onder plantenalval, dorre bladeren, op vochtige plaatsen en langs oevers; soms vliegende. (obscurus Er.) 9. *obsoletus* Nordm.

- 8 Kop met volkomen parallelle zijden, tussen de stippels fijn geelagrineerd. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Bovenzijde roodbruin. Kop en achterlijf zwartbruin. Onuitgekleurde exemplaren zijn lichter. Deze soort is zeer verwant aan *melanocephalus*, doch krachtiger gebouwd, breeder en meer gewelfd. Dekschilden glanziger en dichter bestippeld; ook is het achterlijf dichter bestippeld en behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed driehoekig uitgesneden. Lengte 3—3½ mm. Onder steenen, mos, dorre bladeren, plantenalval en ook in aanspoelsel. Niet inl. Volgens *Fauvel* in de geheele „Faune Gallo-rhenane” (*propinquus* Ch. Bris.)

Kop met niet volkomen parallelle zijden, tussen de stippels glad. Bovenzijde roodbruin, de kop en het achterlijf zwartachtig, de dekschilden gewoonlijk min of meer bruin 9

- 9 Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild, met nagenoeg parallelle zijden. De kop en het halsschild langs de zijden vrij dicht bestippeld. Deze soort is zeer verwant aan *melanocephalus*, doch is iets groter, breeder en meer gewelfd; de dekschilden en het achterlijf fijner en dichter bestippeld. Het achterlijf minder glanzig en meer behaard. Kop en halsschild breeder en meer vierhoekig. Bij het ♂ is het zesde sterniet zeer breed en stomp driehoekig uitgesneden, het vijfde over de geheele lengte met een breeden, doch ondiepen indruk, welke aan den top in eene lijne uitranding eindigt. Lengte $3\frac{1}{2}$ —3½ mm. Zeer verbreed, onder dorre bladeren, mos, dood riet, steenen en in aanspoelsel, doch overal vrij zeldzaam (*ruficollis* Kr.) 7. *bicolor* Oliv.

Dekschilden ongeveer even lang als het halsschild, naar het uiteinde een weinig verbreed. Kop en halsschild glanzig, tamelijk grof en verspreid bestippeld, het midden van den kop nagenoeg glad. Halsschild met eene breede gladde middellijn. Deze soort is slanker dan *bicolor*. De dekschilden en het achterlijf fijn behaard. Lichaam zwartachtig, de sprieten en het halsschild lichtrood, de dekschilden grootendeels bruin of zwartbruin, de pooten geelachtig. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de dekschilden geheel rood en het midden min of meer beroekt; ook is de kop soms bruin. Dekschilden dicht en fijn-, het achterlijf uiterst fijn bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep en scherp driehoekig ingesneden, het vijfde vertoont een vrij korten, diepen indruk, welke in eene lijne uitranding eindigt. Lengte 3 mm. Terzelfder plaatse als *bicolor*, doch veel zeldzamer. Rotterdam, Amsterdam, Tiel, Nijmegen, Vlissingen, Zutphen, Roermond en Maastricht. Ook in België bij Ridderborn en Visé. 8. *melanocephalus* F.

82. *Lithocharis* Boisd. & Lacord.

Dit genus onderscheidt zich van Medon door de veel grotere oogen, den prothorax zonder epimeren, welker stigmata onbedekt zijn, en de slapen welke even lang als de oogen zijn.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam zeer dof, geelachtig-roodbruin, zeer fijn zijdeachtig behaard en zeer fijn en uiterst dicht bestippeld. Kop zwart, de dekschilden en het achterlijf min of meer beroekt. Halsschild met eene min of meer verhevene, weinig duidelijke, gladde middellijn. Dekschilden duidelijk breeder en langer dan het halsschild. Bij het ♂ zijn de voortarsen iets verbreed, het zesde sterniet sterk driehoekig ingesneden, het vijfde iets uitgerand en de uitranding met dicht staande zwarte haartjes omzoomd. Lengte 3—3½ mm. Verbreed. Onder steenen, plantenalval, stroo, aanspoelsel, dood riet en soms rondvliegende. De larve is door *Rey* beschreven. 1. *ochraceus* Grav.

83. *Scopaeus* Erichs.

Lichaam zeer smal. De kop weinig of niet breeder dan het halsschild, uiterst fijn bestippeld. Bovenlip met 4 tandjes, tusschen de beide grootere middelste tandjes dieper uitgerand. Voorkaken sikkelvormig, aan de binnenzijde drie- of viertandig. Halsschild zeer dun, aan de voorzijde slechts $\frac{1}{6}$ tot $\frac{1}{3}$ van de breedte van den kop. De middel- en achterschenen aan het uiteinde zeer scheef afgeknot. Aan de voertarsen zijn de eerste 4 ledjes zeer kort, niet of slechts zwak verbreed. — De soorten van dit genus leven vooral langs oevers onder steenen, plantenafval en in aanspoelsel.

Van de 14 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Kop achter de oogen met parallelle zijden, aan de basis min of meer afgerond (Sub-gen. *Scopaeus* s.p.). 2
- Kop achter de oogen geleidelijk verbreed en aan de basis recht afgeknot of iets uitgerand (Sub-gen. *Polyodontus* Sol.). 3
- 2 Achterlijf naar het uiteinde duidelijk verbreed. Kop nagenoeg even lang als breed. Lichaam zwartbruin, iets glanzig en lijn behaard, het uiteinde der dekschilden min of meer roodachtig, het halsschild veelal bruin; de sprieten, het uiteinde van het achterlijf, benevens de pooten geelrood. De bestippling op het voorlijf zeer dicht en duidelijk, op het achterlijf veel fijner. Halsschild ovaal, eenigszins kogelvormig gewelfd, met twee groefjes aan de basis en eene zeer smalle, gladde middellijn. Dekschilden breeder en veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het vijfde sterniet zeer breed uitgerand, het zesde diep vierhoekig ingesneden en aan weerszijden van een scherp tandje voorzien. Lengte 3 mm. Zeer zeldzaam; onder steenen, plantenafval, mos en langs oevers in aanspoelsel. Bij Thorn langs de Maas, Arnhem, Maastricht; ook bij Roermond bij *Lasius niger*. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 1. *laevigatus* Gylh.
- Achterlijf naar het uiteinde weinig of niet verbreed. Kop duidelijk langer dan breed. Lichaam zwartbruin, het uiteinde en de naad der dekschilden soms rood. De grootste soort van het genus, smaller, langer en minder gewelfd dan *laevigatus*, dichter zijdeachtig behaard en vooral op de iets langere dekschilden fijner en dichter bestippeld. Sprieten langer en dunner. Halsschild smaller en iets langer, met minder duidelijke basaalgroefjes. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn kop en halsschild lichter gekleurd en is het uiteinde der dekschilden breed geelachtig of wel het lichaam is roodachtig en de kop en de basis der dekschilden zijn bruinachtig. Lengte $3\frac{1}{2}$ —3 mm. Op oeverzand langs rivieren en in aanspoelsel. Bij Thorn langs de Maas. Ook in Westfalen en in het Ahrdal . . . (Erichsonii Kolenati) 2. *gracilis* Sperk.
- 3 Dekschilden uiterst lijn en zeer dicht bestippeld. Kop iets langer dan breed, voor de oogen aanmerkelijk versmald, de basis nagenoeg recht afgeknot. Lichaam zeer smal, roodbruin met zwartachtig achterlijf, weinig glanzig. Halsschild naar voren eerst verbreed en daarop plotseling versmald, iets smaller dan kop en dekschilden. Sprieten en pooten roestkleurig of geelachtig, de dekschilden soms min of meer gebruid. Bij het ♂ is het vijfde sterniet iets ingedrukt en een weinig uitgerand, het zesde vertoont eene breede langsgroef en is breed driehoekig uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Op moerassige plaatsen onder plantenafval. Zeer zeldzaam. Bij Arnhem; ook bij Roermond bij *Lasius fuliginosus*. In België bij Brussel en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 3. *minimus* Er.
- Dekschilden meer of minder krachtig en zeer duidelijk bestippeld. Kop nagenoeg even lang als breed, de basis iets uitgerand. Bovenzijde tamelijk glanzig. 4
- 4 Dekschilden even lang als het halsschild, krachtig en diep-, eenigszins rimpelig bestippeld. Halsschild ongeveer een vierde langer dan breed, voor het midden weinig smaller dan de dekschilden, voor de basis met twee langsgroefjes, in het midden met eene gladde, iets riekelvormig verheven, van voren en van achteren fijn gegroefde middellijn. Lichaam pekbrown, het halsschild soms roodbruin, het achterlijf zwartachtig, aan de zijden veelal bruinachtig; de sprieten en pooten roodgeel. Kop en halsschild uiterst fijn en dicht bestippeld. Middelschenen sterk verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig uitgesneden, met twee gebogen indrukken om de uitranding. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer zeldzaam; onder steenen, plantenafval en op oeverslib, in tuinen en weilanden en bij *Lasius niger*. Utrecht, Arnhem, Berkel, Leiden en Valkenburg (Limburg) . . . 4. *cognatus* Muls. & Rey.
- Dekschilden even lang als het halsschild, minder sterk dan bij *cognatus* bestippeld; bij den vorm **intermedius* Muls. & Rey, bij welken het halsschild smaller is, zijn de dekschilden langer dan bij het type. Halsschild smaller en langer dan bij *cognatus*, met eene lijne, in 't midden veelal onderbroken middellijn. Lichaam pekzwart of pekbrown, met zwartachtig achterlijf. Kop en halsschild meestal roodbruin, de sprieten en de pooten roodgeel. Kop

en halsschild uiterst fijn en dicht, de dekschilden duidelijk sterker bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet vrij diep driehoekig ingesneden, zonder indrukken. Bij het type zijn de middelschenen slechts zwak verbreed. Kleinere, slankere exemplaren vormen de var. **debilis* Muls. & Rey. Bij de var. *pusillus* Kiesw. (*abbreviatus* Muls. & Rey) zijn de middelschenen vrij sterk verbreed. Lengte 2½—3 mm. Zeer zeldzaam; onder steenen, mos, op oeverslib en soms bij *Formica rufa*. Nijmegen en Maastricht. De var. *pusillus* bij Deventer. In België bij Hastière en Brussel; in de Rijnprov. bij Aken.

(*minutus* Er.) 5. *sulcicollis* Steph.

84. Stiliens Latreille.

*Kop groot, veel breeder dan het halsschild, rimpelig bestippeld, door een zeer dunnen hals slechts los met het halsschild verbonden. Bovenlip groot, zeer breed, in 't midden met twee krachtige tandjes, daartusschen diep uitgerand, aan weerszijden van de middelste tandjes veelal nog met een zwakker tandje. Voorkaken door de bovenlip bedekt, aan den binnenrand met 3 of 4 tandjes. Halsschild van voren tegen den dunnen hals sterk versmald, aan de zijden fijn gerand. De eerste drie of vier tergiten aan de basis in de breedte ingedrukt. De middel- en achterschenen aan het uiteinde recht afgeknut. De eerste 4 ledjes der voortarsen kort, niet verbreed. — De larve van *S. angustatus* is door Rey bekend geworden. — De soorten van dit genus leven onder steenen en afgevallen bladeren.*

Van de 11 Europeesche soorten komen 7 in Nederland voor.

- 1 Bovenlip aan den voorrand slechts met twee lange tandjes. Dekschilden aan het uiteinde meer of minder duidelijk geel gezoomd of gevlekt 2
- Bovenlip aan den voorrand, behalve de twee lange middentandjes, nog met een klein tandje aan weerszijden. Halsschild voor het midden het breedst; de gladde middellijn reikt niet geheel tot aan den voorrand. Oogen rond, korter dan de slapen. Bovenzijde geheel bruinachtig-zwart, de dekschilden eenkleurig 6
- 2 Halsschild rood, het overige gedeelte van het lichaam zwartbruin, de sprieten en pooten donker roodbruin, de voorpooten rood; schildje roodachtig; dekschilden aan het uiteinde geel gevlekt. Overigens in habitus met *subtilis* overeenkomende. Het halsschild is naar voren eenigszins peervormig toegespitst, duidelijk langer dan breed, glanzig, dicht bestippeld met eene smalle gladde middenruimte. Kop en dekschilden zeer dicht en iets rimpelig bestippeld. Achterlijf lijn en zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet stomp driehoekig uitgerand, het vijfde in het midden uitgehold, welke nitholling zeer glad is en in een krachtigen, rood behaarden tand eindigt; het vijfde sterniet met een klein rood bultje en eenige lange haren. Lengte 5½—6 mm. Over het algemeen zeldzaam. Onder steenen, dorre bladeren, plantenafval, dood riet en 's avonds vliegend. In groot aantal bij Arnhem en Rotterdam; ook bij Roermond. In België bij Lanaken en Charleroi en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf (*fragilis* Grav.) 1. *angustatus* Fourcr.
- Halsschild evenals het overige gedeelte van het lichaam zwart of bruinzwart, weinig of niet langer dan breed, naar voren kort toegespitst, met eene kielvormig verheven gladde middellijn, welke tot aan den voorrand duidelijk doorloopt en waarop eene fijne verdiepte langslin zich bevindt. 3
- 3 Oogen rondachtig, korter dan de slapen. Dekschilden gelijkmatig en tamelijk grof bestippeld. 4
- Oogen langwerpig-eirond, langer dan de slapen. Dekschilden lijn bestippeld 5
- 4 Pooten eenkleurig geel. Dekschilden meer donkerbruin, de geheele achterrand, vooral naar de buitenhoeken geel gezoomd. Deze soort is iets kleiner dan *subtilis* en onderscheidt zich vooral door den meer rondachtigen kop, de geheel naar voren doorlopende middellijn van het halsschild en de krachtiger bestippelde dekschilden. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets ingedrukt en diep uitgerand; het vijfde eveneens iets ingedrukt en aan weerszijden van een rood tandje voorzien; het vierde in het midden van den rand iets ingedrukt. Lengte 5—5½ mm. Zeldzaam, onder steenen, mos, dorre bladeren, soms in keldervuil en in aanspoelsel. Zutphen, Arnhem, Roosendaal, Breda, Roermond, Valkenburg en Houthem. Ook in België en in de Rijnprov. op vele plaatsen 2. *similis* Er.
- Pooten geel, de dijnen der middel- en achterpooten met bruin uiteinde. Dekschilden zwart, slechts in de buiten-tophoeken meer of minder duidelijk geelachtig. Deze soort is naverwant aan *similis*, doch o. a. onderscheiden door den meer ovalen kop en de iets langere dekschilden. Bij het ♂ is het zesde sterniet minder diep ingesneden, de indruk op het vijfde breder en dieper en aan weerszijden van een behaarden krachtigen doorn voorzien;

vierde met een klein bultje in het midden nabij den rand. Lengte 5 mm. Zeer zeldzaam. Onder steenen, mos en afgevallen bladeren; op dorre plaatsen. Zutphen, Middelburg, Breda, Roermond en Maastricht. In België bij Brussel en Dietz 3. *geniculatus* Er.

- 5 Kop niet breeder dan de dekschilden. De knieën en de scheren min of meer bruinachtig. Deze soort gelijkt op een kleinen *similis*, doch is onderscheiden door den korten, breedten, van achteren meer hoekigen kop. Het halsschild is korter en breeder, voor het midden hoekig verbreed, met eene breede gladde kielvormige langslin. Dekschilden breeder en korter, glanzig, iets bronzig, fijn en verspreid bestippeld, aan den achterrand duidelijk geel gezoomd. Sprieten roodachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets ingesneden, het vijfde iets uitgerand. Lengte 4-4½ mm. Vrij gemeen, onder dorre bladeren, dood stroo, soms bij mieren en 's avonds rondvliegend. (affinis Er.) 4. *orbiculatus* Payk.

Kop breeder dan de dekschilden. Pooten eenkleurig geel. Deze soort is door den grooten, sterk verbreedten kop naverwant aan *rufipes*, doch veel kleiner; in grootte en kleur overigens met *orbiculatus* het meest overeenkomende. Dekschilden met een geel vlekje in de buiten-ophoeken. Bij het ♂ is het zesde sterniet enigszins driehoekig ingesneden. Lengte 3½ mm. Onder steenen, mos, plantenafval, vooral in vochtige bosschen; soms bij mieren. Verbreid, doch niet gemeen (*orbiculatus* Er.) 5. *Erichsonii* Fauvel.

- 6 Halsschild nabij het vooreinde het breedst, naar voren zeer kort toegespitst; de gladde middellijn zonder verdiepte langstreep. Pooten eenkleurig roodbruin. Deze soort is iets korter en breeder dan *subtilis* en vooral onderscheiden door den meer verbreedten kop. Kop en halsschild zeer grof en dicht rimpelig-, de niet zelden roodbruinachtige, glanzige dekschilden fijn en niet dicht bestippeld, iets korter dan bij *subtilis*. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde driehoekig ingesneden. Lengte 5½-6 mm. Vrij gemeen onder dorre bladeren, dood riet, stroo, plantenafval en in boendermest; ook in aanspoelsel.

6. *rufipes* Germ.

Halsschild naar het midden het breedst, naar voren langer toegespitst, de gladde middellijn met eene verdiepte langstreep. Pooten geel, de dijnen, vooral der middel- en achterpooten, met donker uiteinde. De kop langwerpig ovaal, evenals het halsschild tamelijk dof; de dekschilden enigszins bronsglanzig. Kop en halsschild minder grof dan bij *rufipes*, doch dicht rimpelig bestippeld, de dekschilden zeer fijn en niet dicht-, het achterlijf uiterst fijn en dicht bestippeld. Dekschilden veel langer en breeder dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig uitgerand, Lengte 5½-6½ mm. Gemeen in Zuid-Limburg in leemkuilen, onder stukken mergelsteen en dorre bladeren. Ook bij den Haag, Rotterdam, Zutphen, Goor en Arnhem 7. *subtilis* Er.

85. Paederus Fabr.

Kop groot, met een zeer korten hals, welke minstens $\frac{1}{3}$ van de breedte van den kop bedraagt, evenals het halsschild glad en glanzig. Bovenlip in 't midden van den voorrand uitgerand. Voorkaken in 't midden van den binnenrand met twee krachtige tanden, welke veelal tot één gespleten tand versmolten zijn. Eindlid der kaaktasters breed, kort en stomp, als eene veratuchtige verhevenheid op het voorlaatste lid gezeten. Episternen van den metathorax minstens voor het grootste gedeelte door den zijrand der dekschilden bedekt. Het vierde tarslid tweelobbig. De eerste 4 voortarsen-leedjes kort, in beide seksen vrij sterk verbreed en aan de onderzijde viltig. De larve van *P. riparius* is door Thomson beschreven. — De soorten van dit genus leven op zandige oevers van rivieren, meren en plassen; sommige soorten treft men ook op waterplanten aan.

Van de 15 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Het eerste sterniet met eene kielvormige verhevenheid tusschen de achtercoxae. Achterlijf geelrood met zwart uiteinde. Halsschild rood (Sub-gen. *Paederus* isp.). 2

Het eerste sterniet zonder kielvormige verhevenheid. Achterlijf zwart- of blauwachtig. De sprieten en pooten geheel zwart (Sub-gen. *Paederidus* Muls. & Rey). Lichaam zwart, min of meer blauwachtig, met rood halsschild en blauwe dekschilden. De eerste twee sprietleedjes en het tweede kaaktaster-lid aan de onderzijde meestal geelrood. Halsschild zeer fijn-, weinig duidelijk en verspreid-, de dekschilden tamelijk sterk en vrij dicht bestippeld. Achterlijf over het midden minder dicht dan langs de randen- en vooral het zesde onbedekt tergeet fijn en niet dicht bestippeld; tamelijk gelijkmatig grijs behaard. Bij den kleineren vorm *gemellus* Kr. is de kop meer ovaal, het achterlijf nagenoeg zwart, hoogstens met uiterst geringen blauwachtigen weerschijs, overal nagenoeg even dicht

bestippeld en vooral langs de zijden dichtcr grijs behaard. Ook komt de gele kleur aan de onderzijde van de eerste twee sprietleedjes en van het tweede kaaktaster-lid meer uit; soms is het halsschild gedeeltelijk donker gekleurd. Bij het grootere ras *sanguinicollis* Steph. (*longicornis* Aubé) is de kop iets breeder, de bestippling van halsschild en dekschilden duidelijker en op het zesde onbedekt tergiet dichter; de sprieten duidelijk langer; kop, dekschilden en achterlijf fraai blauw of ook wel zwart en nagenoeg zonder blauwachtige tint. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ mm. Het type is zeer gemeen langs duinplassen, rivieren, vaarten en meren, op oeverzand en slib. De vorm *gemellus* is niet inlandsch, doch komt in de Rijnprov. aan het Laacher-meer voor en zou ook in België en in Westfalen gevangen zijn. Van het ras *sanguinicollis* werden donkere exemplaren langs de Maas bij Maastricht gevangen; ook in België bij Calmpouth, Hastière, Genck, Dolhain en in de Rijnprov. bij Aken 5. *ruficollis* F.

- 2 Halsschild met eene duidelijke lijne zijrandlijn, eenigszins kogelvormig gewelfd. Schildje donker roodachtig. Pooten geelrood met zwarte knieën 3
- Halsschild zonder zijrandlijn 4

- 3 Dekschilden even lang als of iets langer dan het halsschild, met tamelijk parallele zijden, grof en verspreid bestippeld, blauw. Vleugels volkomen ontwikkeld of rudimentair. Sprieten en tasters geelachtig, het vijfde tot negende sprietlid en het uiteinde van het derde kaaktaster-lid beroekt. Kop en voorkaken zwart. Bij het ♂ (*cephalotes* Mots.) is de kop veel grooter en breeder; het zesde sterniet smal- en diep ingesneden. Lengte 7—8 mm. Niet zeldzaam op lage planten, slib, onder dorre bladeren en plantenaafval op vochtige plaatsen.
(?gregarius Scop.) 1. *litoralis* Grav.

Dekschilden korter dan het halsschild, naar het uiteinde te zamen verbreed, vrij grof en dicht bestippeld, blauw. Deze soort is kleiner dan *litoralis*, ongevlengeld, slanker, smaller en platter. Voorkaken roodachtig. Kop en halsschild smaller. Achterlijf in het midden iets verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet minder diep ingesneden. Lengte $6\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen, vochtig mos, in aanspoelsel en langs stroomend water. Niet inlandsch. In België bij Brussel, Dinant, Rommont; in de Rijnprov. bij Cleef, Elberfeld enz.

(*brevipennis* Boisd. & Lac.)

- 4 Voorkaken en het eindlid der kaaktasters, behalve aan den top, geel 5

Voorkaken en het eindlid der kaaktasters geheel zwart. Dekschilden iets langer dan het halsschild, blauw. Schenen en tarsen bruinachtig. Overigens in habitus en kleur met *fuscipes* overeenkomende, doch met minder grof bestippelde dekschilden. Bij het ♂ is het zesde sterniet tamelijk breed-, doch niet diep ingesneden. Lengte $5\frac{1}{2}$ mm. Langs rivieroeveren op klei, onder steenen; vooral in bergstreken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Düsseldorf en Elberfeld. (*limnophilus* Er.)

- 5 Halsschild even breed als de dekschilden, naar de basis sterk versmald. Dekschilden weinig langer dan het halsschild. Mesosternum en schenen geelrood. Schildje roodbruin. Deze soort gelijkt in habitus en kleur op *litoralis*, doch is iets smaller, heeft meer parallele zijden en is vooral onderscheiden door de gele voorkaken en het van voren veel smallere halsschild. Ook is de bestippling der dekschilden iets dichter. Behalve het uiteinde der dijen, is ook de basis der schenen zwartachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet breeder en minder diep ingesneden. Lengte $7\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen langs oevers van rivieren, meren en slooten, onder aanspoelsel en dood riet, ook op waterplanten. 2. *riparius* L.

Halsschild smaller dan de dekschilden. Schildje en meestal ook het mesosternum zwartachtig . 6

- 6 Halsschild naar de basis bijna niet versmald, met eenigszins parallele zijden. Dekschilden tamelijk grof en vrij dicht bestippeld. Schenen geel, gewoonlijk met zwartachtige basis. Mesosternum soms rood, de dekschilden $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Deze soort gelijkt op kleine exemplaren van *riparius*, doch is zeer onderscheiden door den veel smalleren kop, het smallere halsschild en de langere dekschilden. Sprieten langer en slanker. Knieën zwartachtig, die der voorpooten slechts iets beroekt. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed-, doch niet diep ingesneden. Lengte $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Niet zeldzaam op vochtig mos van wilgen, op slib, in plantenaafval en in aanspoelsel der rivieren; soms 's avonds vliegende.

(*longipennis* Er.) 3. *fuscipes* Curt.

Halsschild naar de basis duidelijk versmald. Dekschilden zeer grof en eenigszins verspreid bestippeld, weinig langer dan het halsschild. Schenen en tarsen meestal geheel zwartachtig, zelden met bruinachtig uiteinde. Overigens heeft deze soort den habitus en de kleur van *riparius*, doch is veel kleiner; de kop is zeer weinig verbreed, het schildje zwart en het achterlijf veel fijner en minder bestippeld. Lengte 5—6 mm. Onder steenen, vochtig mos, in plantenaafval en aanspoelsel langs oevers. Zeer zeldzaam. Eenmaal bij Ruurlo. Ook in België bij Brussel en Luik 4. *caligatus* Er.

86. *Astennus* Steph.

(Sinnius Er.)

Bovenlip in 't midden met twee tandjes. Voorkaken lang en zeer slank, sikkelvormig, in 't midden van den binnenrand met een langen, dunnen, krommen tand, waarachter nog 1 of 2 kleine tandjes. Eindlid der kaaktasters uiterst fijn, priemvormig, zeer moeijelijk zichtbaar. Het halsvormige gedeelte van den kop bedraagt $\frac{1}{4}$ tot $\frac{1}{3}$ van de breedte. Bovenzijde meer of minder grof of zeer dicht bestippeld. Episternen van den metathorax zeer smal, lijnvormig, onbedekt. Het vierde lid der tarsen tweelobbig, op de onderzijde met een vlies, hetwelk de lobben verbindt. De voortarsen niet verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde driehoekig ingesneden. — De soorten van dit genus leven onder steenen, afgevallen bladeren en in plantenafval.

Van de 17 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Dekschilden, evenals kop en halsschild, alsook de eerste drie tergiten, dof, het uiteinde van het achterlijf meer glanzig. Halsschild langwerpig-ovaal, naar de basis geleidelijk versmald, duidelijk korter dan de dekschilden. Achterlijf naar het uiteinde weinig of niet verbreed. Bovenzijde zwart, de dekschilden aan het uiteinde smal geel gezoomd, of op $\frac{1}{2}$ gedeelte der lengte geel, soms ook aan de schouders geel gevlekt (ab.c. **humeralis* Gredl.). Sprieten, pooten en min of meer de randen der achterlijfsringen roodgeel. Kop groot, eenigszins rechthoekig, voor de oogen smaller, doch met parallele zijden. De bestippeling is grof en rimpelig, op het achterlijf sterk dwarsrimpelig. Er komen exemplaren voor met roodachtige, op het midden berookte, dekschilden, of met geheel gele dekschilden en halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ mm. In tuinen en weilanden, onder steenen, plantenafval en dorre bladeren. Verbreed, doch niet gemeen 1. *filiformis* Latr.

Dekschilden en het geheele achterlijf glanzig 2

- 2 Dekschilden duidelijk langer en breeder dan het halsschild 3

Dekschilden nagenoeg even lang en breed als het halsschild. 4

- 3 Halsschild ongeveer even lang als breed. Lichaam niet bijzonder smal. Achterlijf naar het uiteinde iets verbreed. Bovenzijde zwart, het uiteinde der dekschilden met eene breede, gele vlek, welke zich gewoonlijk tot aan het midden, langs den naad, voortzet. Zelden is de bovenzijde geelachtig, met bruinachtig achterlijf. Bij een exemplaar uit Kolhorn (N.-Holl.) zijn de dekschilden geheel zwart. Sprieten, pooten en de randen der achterlijfsringen geel. Kop en halsschild dof, lijn en dicht rimpelig, de dekschilden en het achterlijf grover bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet scherp driehoekig ingesneden. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Onder afgevallen boomschors, steenen en dorre bladeren. Niet zeldzaam.

(*gracilis* Payk.) 2. *angustatus* Payk.

Halsschild langer dan breed. Lichaam zeer smal. Achterlijf naar het uiteinde bijna niet verbreed. Bovenzijde zwart, de dekschilden met eene breede gele vlek aan het uiteinde, of bovendien aan den schouder geel gevlekt; zeldzamer geheel roodgeel, met eene zwarte middenvlek. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel geelachtig. Overigens op *filiformis* gelijkende; kop en halsschild iets langer en smaller, het halsschild aan de voorhoeken meer afgerond, naar de basis meer versmald. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen en dorre bladeren, in tuinen en velden. Eenmaal bij den Haag, Maart (*diversus* Aubé) 3. *pulchellus* Heer.

- 4 Dekschilden zeer grof bestippeld, aan het uiteinde slechts zeer smal gezoomd. Achterlijf naar het uiteinde sterk verbreed. Deze soort heeft den habitus van *angustatus*, doch is iets breeder en meer gewelfd. Sprieten en pooten geel. Bij het ♂ is het zesde sterniet scherp driehoekig ingesneden, het vijfde met een ondiepen langsindruk. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen, plantenafval, dorre bladeren en mos; in weilanden en bosschen. Soms bij *Formica rufa*. Bij Zierikzee en Aalbeek (Zuid-Limburg). In België bij Ridderborn.

(*intermedius* Er.) 4. *immaculatus* Steph.

Dekschilden vrij grof bestippeld, aan het uiteinde met eene breede gele vlek, welke zich langs den naad tot aan het midden voortzet. Achterlijf naar het uiteinde weinig verbreed. Deze soort komt in habitus en kleur met *angustatus* overeen, doch is vooral onderscheiden door de duidelijk kortere en krachtiger bestippelde dekschilden. Volgens *Fauvel* zou deze soort slechts een afwijkende vorm van *angustatus* zijn. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Onder mos en bij mieren. Watergraafsmeer en Oud-Vroenhoven bij Maastricht . . . 5. *neglectus* Märkel.

VII. Sub-Familie EUAESTHETINAE.

XX. Tribus EUAESTHETINI.

87. Euaesthetus Grav.

Bovenlip aan den voorrand fijn en dicht getand. Voorkaken lang en slank, voor de basis eenigszins knievormig gebogen, van binnen voor het midden met een naar voren gerichten, krachtigen, scherpen tand. Kaaktasters vrij lang, het eerste lid weinig korter dan het tweede, het eindlid uiterst klein, priemvormig, nauwelijks zichtbaar. Kin groot, breed uitgerand. Tong breed, met uitgetrokken voorhoeken, in 't midden ingesneden; de paraglossen met de tong vergroeid. Liplasters kort, het eerste lid klein, het tweede groot, sterk gezwollen, het eindlid zeer dun, priemvormig. Halsschild min of meer hartvormig, vóór de basis met twee langs-groeven of langs-indrukken. Voorcoxae kort kegelvormig. Alle tarsen 4-ledig. — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen, onder mos, afgevalen bladeren, beschimmeld stroo en in aanspoelsel der rivieren.

Van de 4 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Dekschilden zonder naadstreep. De twee langsgroefjes voor de basis van het halsschild zijn ondiep en tamelijk ver van elkander verwijderd; het halsschild aan de basis zonder langsplooien. Kop, halsschild en dekschilden vrij grof en dicht rimpelig bestippeld, op de dekschilden nog met enkele verspreide grove stippels. Lichaam peckzwart of donkerbruin, tamelijk dof, de kop gewoonlijk meer roodbruin. Spriet en pooten en de randen der achterlijfsringen roodachtig. Dekschilden iets korter dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden breed en diep driehoekig ingesneden, het vijfde iets uitgerand, het vierde met twee kleine bultjes en het derde met eene zeer oppervlakkige verhevenheid. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Verbreed, onder mos, plantenafval en dorre bladeren, langs slooten en vijvers; ook onder afgevalen boomschors en steenen, op dorre plaatsen, vooral na regens; soms in aanspoelsel der rivieren. (scaber Grav.) 1. **bipunctatus** Ljungh. 2
- 2 De twee langsgroefjes voor de basis van het halsschild zijn ondiep en tamelijk ver van elkaar verwijderd, het halsschild niet hartvormig, kort, aan de basis zonder langsplooien. Kop, halsschild en dekschilden glanzig en niet zeer dicht bestippeld. Deze soort is van de beide anderen duidelijk onderscheiden, door den korteren, breederen vorm. Roodachtig, met meer bruinachtig achterlijf; zeldzamer bijna geheel donkerbruin. Dekschilden even lang als of iets korter dan het halsschild. Spriet en pooten lichtrood. Bij het ♂ is het zesde sterniet enigszins ingesneden. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ mm. Terzelfder plaatse als *bipunctatus*, doch veel zeldzamer. Amsterdam, Muiden en Roermond 2. **laeviusculus** Mannh.
- De twee langsgroefjes voor de basis van het halsschild zijn diep en staan dicht bij elkaar; het halsschild duidelijk hartvormig, aan de basis met 3 zeer fijne langsplooien, een in het midden en een in elk der achterhoeken. Kop en halsschild tamelijk dicht en vrij sterk bestippeld, min of meer dof. Dekschilden veel fijner bestippeld en iets meer glanzig. Deze soort, welke zeer op *bipunctatus* gelijkt, is gewoonlijk iets kleiner, iets glanziger, donkerrood, met bruine dekschilden en lichtrooden kop; soms is ook het halsschild meer lichtrood of zooals de dekschilden donkerbruin. Dekschilden even lang als het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden diep ingesneden, het vijfde in de lengte gegroefd en het vierde met twee kleine bultjes bezet; achterschenen minder dicht, doch langer behaard. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ mm. Als de vorige; zeldzaam. Amsterdam, Rotterdam, Breda en op Texel. In België bij Groenendaal; in de Rijnprov. bij Crefeld 3. **ruficapillus** Boisd. & Lac.

VIII. Sub-Familie STENINAE.

XXI. Tribus STENINI.

88. Dianous Samouelle.

Dit genus is zeer verwant aan *Stenus*, doch onderscheidt zich door de veel kleinere oogen, de daarachter goed ontwikkelde slapen, welke meer dan half zoo lang zijn als de doorsnede der oogen, door den bouw der onderlip en door de twee zeer lange,

krachtige zwimperharen van achteren op het zevende sterniet. De kin is breeder dan lang, trapeziumvormig, in 't midden driehoekig opgericht, aan weerszijden van den voorrand zeer zwaar uitgebogen. Het gedeelte van de onderlip, dat de tasters draagt, is kort en kan niet, zooals bij *Stenus*, vooruitgestoken worden. De tong is breed uitgerand en in de uitranding van vier lange doornen voorzien. De met de tong vergroeide paraglossen zijn op hare rugzijde als dicht bewimperde, schuine strepen zichtbaar. Het prosternum is in de lengte dakvormig gekield. Achterlijf aan de zijden breed gerand. Het vierde tarslid aan alle pooten tweelobbig. Gevelegeld.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze soort heeft den habitus van een grooten, rood gevleekten *Stenus*; zwartblauw of staalblauw, weinig glanzig, uiterst lijn witachtig behaard, vooral op de pooten en het achterlijf. Dekschilden elk met eene ronde, oranje-roode vlek, welke violetachtig omzond is. Sprietten zwart, naar het uiteinde meer bruinachtig. Kop lijn bestippeld, met twee langsgroeven op het voorhoofd. Halsschild vrij sterk en dicht bestippeld, met twee indrukken. Dekschilden nagenoeg even sterk bestippeld als het halsschild. Achterlijf zeer lijn en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed uitgerand, het vijfde iets ingesneden en geelachtig behaard. Lengte 4¹/₂—5 mm. Langs bosch-beekjes onder mos. Zeer zeldzaam; uitsluitend op Beekhuizen bij Velp, in Juni aangetroffen. In België bij Verviers, Luik, Hal, Schaerbeek en la Hulpe; in de Rijnprov. bij Aken 1. *coerulescens* Gyll.

89. *Stenus* Latreille.

Lichaam eenigszins cilindervormig, gevelegeld of ongevelegeld. Kop groot en breed, met zeer groote, uitpuilende oogen. Bovenlip zeer verbreed, van voren breed afgerond. Voorkaken slank, sikkelvormig gekromd, van binnen, achter het uiteinde, met een krachten tand, daarachter gekort. Kaaktasters zeer lang en dun, het eerste lid half zoo lang als het tweede, het tweede lang en dun, het derde ongeveer even lang als het tweede, naar het uiteinde geleidelijk knotsvormig verdikt, het eindlid uiterst klein, priemvormig, nauwelijks zichtbaar. Kin eenigszins vierhoekig, naar voren iets versmald, in 't midden van den voorrand met een meer of minder krachten tand. Het gedeelte van de onderlip, dat de tong en de tasters draagt, is buitengewoon lang en smal en met de kin door een als de vinger van een handschoen uitstulpbaar, nagenoeg even lang tusschenstuk verbonden (fig. 19, blz. 149): in rust is dit gedeelte van de onderlip in het scheedevormig tusschenstuk teruggetrokken, zoodat slechts de twee afgeronde lobben der tong en de lip-tasters uitsteken. De paraglossen ontbreken. Lip-tasters zeer klein, tusschen de tong-lobben, dicht bijeen, ingeplant; het eindlid zeer klein, priemvormig. Halsschild in den regel veel smaller dan de dekschillen. Het zesde sterniet is bij het ♂ aan het uiteinde altijd uitgerand of ingesneden, bij het ♀ afgerond of toegespitst. Bij het ♂ van vele soorten is ook het vijfde sterniet, of zijn ook de voorafgaande sterniten, op eenigerlei wijze onderscheiden. Pooten lang en slank, het vierde tarslid gewoon, of meer of minder diep tweelobbig, soms ook het derde tarslid tweelobbig, doch veel zwakker dan het vierde lid. — De larve van *S. bipunctatus* is door Schödtle beschreven. — De soorten van dit genus leven hoofdzakelijk op vochtige plaatsen, langs oevers op zand en klei, onder afgevallen bladeren in bosschen, onder steenen, vochtig mos en soms op lage planten. Eene enkele soort (*aterrimus*) is een mierengast.

Van de 140 Europeesche soorten komen 59 in Nederland en 21 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Achterlijf met duidelijk verdikten zijrand (bij *pallipes* zeer lijn gerand) 2
- Achterlijf zonder verdikten zijrand, nagenoeg cilindervormig; soms vertoont het eerste en vijfde tergiet een uiterst lijn zijrandje, of wel vertoonen alle tergieten aan de basis de blauwe aanduiding van een zijrand 68
- 2 Het vierde tarslid gewoon; of wel iets nitgerand, doch even breed als het derde lid (bij *Argus*, *humilis*, *carbonarius*, *nigritulus* en *brunnipes*) 3
- Het vierde tarslid diep gespleten, tweelobbig, breeder dan het derde 46
- 3 Achtertarsen even lang als de schenen, of wel het $\frac{3}{4}$ van hare lengte innemende; het eerste

- lid meestal langer 1) dan het laatste. De eerste 3 of 4 onbedekte tergiten hoogstens met ééne korte, kielvormige, langs-verhevenheid aan de basis (Sub-gen. *Stenus* isp.) . . . 4
- Achtertarsen niet of slechts iets langer dan de helft der schenen; het eerste lid ongeveer even lang als het laatste. De eerste drie onbedekte tergiten aan de basis veelal met 4 korte, kielvormige verhevenheden of slechts met ééne verhevenheid; ook wel zonder deze verhevenheden (Sub-gen. *Nestus* Rey) . . . 24
- 4 Dekschilden elk met een rood of geelachtig vlekje. 5
- Dekschilden, evenals de rest van het lichaam, eenkleurig zwart 9
- 5 De tergiten zonder kielvormige verhevenheid aan de basis 6
- De eerste 3 of 4 onbedekte tergiten aan de basis met eene korte, kielvormige, verhevenheid. Tasters en pooten grootendeels geelachtig. Halsschild met een klein langsgroefje op het midden 8
- 6 Pooten zwart. Tasters zwart, het eerste lid geel. Bovenzijde bronzig-zwart, uiterst lijn witachtig behaard 7
- Pooten en tasters grootendeels geelachtig, de tophelft der dijen en de schenen aan de beide uiteinden zwart. Het eindlid der kaaktasters bruinachtig. Halsschild met twee gladde langsbultjes. Dekschilden oneffen, evenals het halsschild dicht rimpelig bestippeld. De groote gele vlek op de dekschilden staat iets dichtër bij den zijrand dan bij den naad. Kop en achterlijf lang goudgeel behaard. Bij het ♂ is het vijfde en zesde sterniet aan het uiteinde uitgerand, het vijfde aan weerszijden van de uitranding met een haarbundel. Lengte 4 mm. Terzelfder plaatse als *biguttatus* 3. *guttula* Müll.
- 7 De gele vlek staat iets dichtër bij den naad dan bij den zijrand. Voorhoofd diep uitgehold en lijn gekield. Lichaam slank. Het tweede tasterlid aan den wortel geel. Bovenzijde zeer dicht en diep rimpelig, het achterlijf, vooral naar het uiteinde, fijner bestippeld. Kop met de oogen veel breeder dan het halsschild. Halsschild naar voren en naar achteren bijna evenzeer versmald, met een kort, vrij diep middengroefje. Dekschilden een derde breeder, doch weinig of niet langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde sterk ingesneden, het vijfde in het midden iets uitgerand, met eene gladde uitholling, welke aan weerszijden door eene kielvormige verhevenheid begrensd is. Lengte 4½ mm. Niet zeldzaam; langs oevers op slib, zand en onder plantenaafval en steenen; ook soms aan boomwortels. 1. *biguttatus* L.
- De iets grootere, gele vlek staat meer in het midden, nagenoeg even ver van den naad als van den zijrand. Voorhoofd minder uitgehold. Lichaam iets grooter en krachtiger gebouwd. Het tweede tasterlid geheel zwart. Overigens zeer verwant aan *biguttatus*, gewoonlijk iets minder bronskleurig. Spriet en pooten iets korter en minder slank. Bij het ♂ is het zesde sterniet in de lengte ingedrukt en aan het uiteinde ingesneden, het vijfde vertoont een oppervlakkigen, breeden, gladden indruk, welke aan weerszijden door eene kleine, kielvormige verhevenheid begrensd is. Lengte 5—5½ mm. Terzelfder plaatse als *biguttatus*; zeer gemeen 2. *bipunctatus* Er.
- 8 Dijen geelachtig, slechts de knieën donkerbruin. Lichaam slank en eenigszins vlak. Kop lijn en dicht bestippeld, met minder duidelijke langskiel op het midden van het voorhoofd. Deze soort gelijkt zeer op *bimaculatus*, doch is veel kleiner. De tasters en eene kleine ronde vlek op de dekschilden geel, het derde tasterlid aan het uiteinde, de coxae en de tarsen bruin. Halsschild en dekschilden zeer grof en dicht rimpelig, het achterlijf tamelijk lijn en zeer dicht bestippeld. Halsschild duidelijk langer dan breed, aan weerszijden niet een indruk. Dekschilden even lang als het halsschild, eenigszins oneffen. Achterlijf eenigszins zijdeachtig geelgrauw behaard, de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis gekield. Bij het ♂ is het tweede en derde sterniet in het midden ingedrukt, het vierde met een breeden, diepen indruk, welke aan de zijden eenigszins kielvormig verheven is, het vijfde uitgerand en met een nog dieperen behaarden indruk, het zesde diep driehoekig ingesneden. Lengte 4—4½ mm. Langs rivieroevers op zand en aan wortels van oeverplanten. Zeer zeldzaam. Arnhem. In de Rijnprov. bij Cleef 4. *stigmula* Er.
- Dijen aan het uiteinde meer uitgebreid zwart. Lichaam groot, breed en plomp, minder vlak. Kop uiterst grof en dicht bestippeld, met twee, door eene duidelijk kielvormig verheven tusschenruimte gescheiden, diepe langsgroeven op het voorhoofd. Lichaam dof zwart, lijn zilverwit behaard, het halsschild en de dekschilden uiterst grof, dicht en diep bestippeld. Kaaktasters, behalve het donkere uiteinde van het derde lid, benevens eene ronde vlek op de dekschilden geel; coxae en tarsen zwartachtig. Halsschild iets langer dan van voren breed. Dekschilden iets langer en duidelijk breeder dan het halsschild, eenigszins oneffen. Bij het ♂ is het vierde en vijfde sterniet aan het uiteinde ingedrukt, met een bultje in het midden, het vijfde aan weerszijden van den onbehaarden indruk gekield, het zesde

1) Bij *aterrimus* even lang als het laatste lid

stomphoekig ingesneden en aan de basis getand. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Gemeen onder dood riet, steenen, plantenafval, afgevallen boomschors en in aanspoelsel.

5. *bimaculatus* Gylh.

9 De tergiten zonder kielvormige verhevenheden 10

De eerste 3 of 4 onbedekte tergiten aan de basis met eene korte, kielvormige verhevenheid. 12

10 Pooten geheel zwart. Deze soort heeft den habitus en kleur van ater, glanzig zwart, uiterst grof, dicht en sterk rimpelig bestippeld, vooral op de dekschilden; het achterlijf niet zeer dicht bestippeld en goudachtig behaard. Halsschild iets langer dan breed, voor het midden sterk afgerond-verbreed, in het midden met een kort, ondiep langsgroefje. Dekschilden iets langer en breeder dan het halsschild, nagenoeg effen. Tasters zwartachtig, het eerste lid en de wortel van het tweede geelachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde duidelijk uitgerand, het vijfde in het midden eenigszins in de lengte ingedrukt en langer behaard. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Onder dorre bladeren en steenen, op vochtige plaatsen; zeer zeldzaam. Apeldoorn, Maastricht en Valkenburg (Limburg). In België bij Argenteau en Luik, in de Rijnprov. bij Ahrweiler. 6. *asphaltinus* Er.

Pooten gedeeltelijk roodgeel of roodbruin 11

11 Het eerste achtertarsen-lid even lang als de 3 volgende leedjes te zamen, langer dan het laatste lid. Dekschilden oneffen, om het schildje en aan de zijden ingedrukt. Lichaam zwart, de bovenzijde geelachtig-grijs behaard en daardoor zijdeglanzig. Deze soort gelijkt eenigszins op *providus*, doch heeft den habitus van *biguttatus*. De basaalhelft der dijen, het midden der sprieten en der schenen roodgeel; de tasters geelachtig, het uiteinde van het tweede en derde lid min of meer gebruid. Lichaam dicht rimpelig bestippeld, vooral op het halsschild en de dekschilden; het achterlijf, vooral naar het uiteinde, fijner bestippeld. Halsschild naar voren en naar achteren sterk versmald. De dekschilden langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig ingesneden, het vierde en vijfde vertoont een indruk, die met haren omzoomd is, het vijfde is diep ingesneden en aan de randen eenigszins kielvormig opgericht. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Onder mos van oude boomen, in bosschen; ook onder afval en steenen, vooral op kalkgronden. Winterswijk, Ruurlo, Nijmegen, St. Pieter en Valkenburg (Limburg) in mergelgroeven. In België bij Brussel, in de Rijnprov. bij Crefeld. 7. *fossulatus* Er.

Het eerste lid der achtertarsen korter dan de drie volgende leedjes te zamen, even lang als het laatste lid. Dekschilden slechts een weinig oneffen. Lichaam geheel zwart, weinig glanzig. Halsschild en dekschilden dicht en sterk-, het uiteinde van het achterlijf fijner bestippeld. Sprieten, behalve de eerste twee leedjes, benevens de pooten donker roodbruin. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Gemeen in de nesten van *Formica rufa* en *pratensis*. 8. *aterimus* Er.

12 Pooten geheel zwart 13

Pooten gedeeltelijk rood of geel, soms roodbruin 18

13 Dekschilden niet langer dan het halsschild. Kop zeer breed. 14

Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild 15

14 Lichaam $5\frac{1}{2}$ —6 mm. lang. Deze soort gelijkt zeer op *Junco*, doch onderscheidt zich door de meer parallele gedaante, den veel grooteren kop en de smallere, kortere dekschilden, die nagenoeg even lang zijn als het halsschild. Zwart, weinig glanzig, dicht en grof rimpelig bestippeld. Het eerste lid en de wortel van het tweede lid der tasters geel. Halsschild naar de basis vrij sterk versmald, met een kort middengroefje. Achterlijf dichter en fijner bestippeld. Bij het ♂ zijn de dijen verdikt, de achterschenen met stompen middeltand, het sternum ingedrukt en behaard, de sterniten met een driehoekig glad middenvlak, het vierde, vijfde en zesde uitgehold, uitgerand en met lange, gele, dicht staande randbaren bezet. Langs rivieroevers, zeer zeldzaam. Uitsluitend in de omstreken van Rotterdam, langs de Maas, gevangen. 9. *calcaratus* Scriba.

Lichaam $4\frac{1}{2}$ mm. lang. Deze soort heeft het voorkomen van *asphaltinus*, doch is veel kleiner. Zwart, tamelijk glanzig, vooral op het achterlijf. Het voorlijf met verspreide, korte, witte haartjes, krachtig en vrij dicht bestippeld, op de dekschilden iets minder grof en iets minder dicht; het achterlijf, vooral langs de zijden, vrij dicht grijs behaard, fijn en niet zeer dicht bestippeld. Tasters bruin, het eerste lid en de wortel van het tweede geel. Halsschild bijna zonder aanduiding van eene middengroef. Dekschilden even lang als het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig ingesneden, het vijfde breed ingedrukt en uitgerand, de uitranding met zeer fijn, kielvormig verheven randen. Onder dorre bladeren en tusschen *Sphagnum* in uitgedroogde greppels. Zeer zeldzaam. Oisterwijk, Roermond, verscheidene exemplaren bij Maarsbergen. 10. *gallicus* Fauvel.

- 15 Kop groot, even breed als de dekschilden. 16
 Kop klein, ongeveer de helft smaller dan de dekschilden 17
- 16 Dekschilden zeer breed en zeer oneffen. Zwart, een weinig glanzig, grof en dicht rimpelig bestippeld op het voorlijf, fijner en minder dicht op het achterlijf. Tasters geelachtig, het tweede lid aan het uiteinde berookt, het derde donkerbruin, behalve aan den wortel. Voorhoofd met twee diepe groeven. Halsschild met eenige oneffenheden. Bij het ♂ is het metasternum breed ingedrukt, van voren lang behaard; de achterdijen verdikt, de achterschienen voor het uiteinde eenigszins uitgerand en van een tandje voorzien; de eerste 4 onbedekte sterniten in het midden ingedrukt en gekield; het vijfde diep uitgehold, met sterk kielvormig verheven, onbehaarde zijden en met eene langskiel in het midden; het zesde aan het uiteinde sterk uitgerand. Lengte 5—5½ mm. Eene der gemeenste soorten, onder dorre bladeren, plantenafval, in aanspoelsel en in het voor- en najaar veelal op lage planten. . 11. **Juno** F.
- Dekschilden tamelijk smal, met onduidelijke oneffenheden. Deze soort lijkt zeer op *Juno*, doch is gewoonlijk iets kleiner en slanker en vrij dicht grauw behaard. Kop minder diep uitgehold. Halsschild smaller, langer en minder oneffen, met iets duidelijker middengroef. Het eerste tarslid en de wortel van het tweede geelachtig. Dekschilden iets grover, het achterlijf dichter en fijner bestippeld. Bij het ♂ zijn de achterschienen iets uitgerand en naar het uiteinde getand; het zesde sterniet is sterk uitgerand en aan de basis van twee tandjes voorzien; het vijfde sterniet sterk uitgehold, aan het uiteinde uitgerand en aan de zijden gekield; het vierde breed ingedrukt; de indrukken van het vierde en vijfde sterniet aan de randen duidelijk lang behaard. Lengte 4½—5 mm. Niet zeldzaam onder steenen, dorre bladeren en mos, soms bij mieren. 12. **ater** Mannerh.
- 17 Dekschilden iets oneffen, doch niet met bultige verhevenheden. Deze soort is zeer verwant aan *ater*, doch zeer kenbaar aan den kleinen kop. Lichaam dof zwart, iets minder witachtig behaard, zeer dicht en diep bestippeld. Het eerste tasterlid geelbruin. Voorhoofd dieper uitgehold. Halsschild korter, breeder en meer oneffen, met een kort middengroefje. Dekschilden breeder en iets dichter bestippeld. Achterlijf aan de basis minder sterk, doch dicht bestippeld, vooral ook op de laatste tergiten, die fijner bestippeld zijn. Bij het ♂ zijn de achterschienen gewoon, het metasternum is breed ingedrukt en grijs behaard; het zesde sterniet iets uitgerand; het vijfde met eene kleine, diepe uitholling, waarvan de zijden scherp kielvormig opgericht en door twee tandjes begrensd zijn; het vierde met een smalle, gladden, driehoekigen indruk, welke op de zijden fijn gekield is; het vierde en vijfde sterniet onbehaard. Lengte 4½ mm. In bosschen langs vijvers en beken. Niet inlandsch. In België bij Calmthout (*longitarsis* Thoms.)
- Dekschilden met rimpelige, bultige verhevenheden. Deze soort lijkt eveneens op *ater*, doch is vooral onderscheiden door den smalleren kop en het smallere halsschild. De bestippling op het achterlijf is fijn en dichter. Het halsschild is smaller dan bij *ater* en *longitarsis*, op de zijden minder verbreed, meer oneffen en met duidelijker middengroef. Bij het ♂ zijn de achterschienen over het midden van een scherp tand voorzien; het zesde sterniet is minder scherp uitgerand; het vierde en vijfde met bredere indrukken en aan de zijden minder scherp kielvormig verheven. Lengte 4½ mm. In aanspoelsel en op slib der rivieren. Breda en Roermond 13. **intricatus** Er.
- 18 Dekschilden effen, slechts langs den naad achter het schildje iets ingedrukt 19
 Dekschilden oneffen, hier en daar ingedrukt en daardoor meer bultig 22
- 19 Soorten van 4½—5½ mm. lengte 20
 Soorten van 3—4 mm. lengte 21
- 20 Tasters geheel geel. Pooten licht roodgeel, de coxae en knieën zwartachtig. Deze soort heeft den habitus van *bimaculatus*, doch is kleiner. Dof zwart, zeer dicht rimpelig grof bestippeld, vooral op het halsschild en de dekschilden. Voorhoofd met twee niet zeer diepe groeven. Halsschild even lang als de dekschilden, met eene korte, zwak aangeduide middengroef. Bij het ♂ is het metasternum ingedrukt en lang grijs behaard; het zesde sterniet breed uitgerand, het vijfde in het midden hoefijzer-vormig ingedrukt en uitgerand, welke uitranding aan weerszijden van eene kleine kielvormige verhevenheid voorzien is, welke in een tandje eindigt. Lengte 4½—5½ mm. Zeer gemeen onder steenen, plantenafval, stukken hout en soms bij mieren (*speculator* Boisd. & Lac.) 14. **clavicornis** Scop.

Het geheele eindlid en het uiteinde van het tweede tasterlid bruin. Pooten bruin, de dijen gedeeltelijk roodachtig. Deze soort is verwant aan *clavicornis*, doch iets kleiner en dof. Halsschild korter dan de dekschilden, naar voren meer versmald, met sterk afgeronde voorhoeken en eene oppervlakkige langsgroef. Het zevende en achtste tergiet veel fijner en dichter bestippeld. Bij het ♂ is het sternum iets ingedrukt, onbehaard; het zesde sterniet met veel kleinere, zeer smalle, driehoekige uitranding, het vijfde veel breder

ingedrukt en sterker uitgerand, deze uitranding aan weerszijden met eene veel scherper aangeduide, kielvormige verhevenheid, welke aan den top stomper is; het vierde sterniet duidelijk hoelijzervormig ingedrukt. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Niet incl. In Noord-Duitsland.

(scrutator Er.)

- 21 Kop breeder dan de dekschilden. Voorhoofd diep ingedrukt, met twee zeer diepe, door eene verheven langskiel gescheiden, langsgroeven. Pooten zwartbruin, de dijen slechts aan den wortel roodbruin. Deze soort herinnert in grootte en habitus eenigszins aan *Argus*. Zwart, tamelijk dof, vrij grof en weinig of niet rimpelig bestippeld, zeer fijn verspreid behaard. Het eerste kaaktaster-lid geelachtig, de sprieten zwartbruin. Halsschild met zeer onduidelijk aangeduide middengroef. Dekschilden ongeveer even lang als het halsschild. Achterlijf lijner en niet zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet uitgerand, het vijfde in het midden met een gladden indruk en aan het uiteinde sterk ingesneden, aan weerszijden van deze insnijding met een zeer klein tandje. Lengte 3–3½ mm. Niet incl. Zij zou in Westfalen voorkomen (proditor Er.)

Kop niet breeder dan de dekschilden. Voorhoofd ondiep ingedrukt, met twee weinig diepe langsgroeven. Pooten geheel donker roodbruin. Naverwant aan *proditor*, doch grooter. Zwart, tamelijk glanzig, iets loodkleurig, grof, diep en dicht bestippeld, vrij dicht en lijn, wiclichtig behaard. Het eerste kaaktaster-lid en de wortel van het tweede geel. Dekschilden even lang als het halsschild. Achterlijf lijn en tamelijk verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig uitgesneden, het vijfde breed en oppervlakkig uitgerand, zonder indruk. Lengte 4 mm. Niet incl. Zij zou bij Oldenburg en Barmen voorkomen.

(exenbitor Er.)

- 22 Pooten pekbruin, met roodachtig-geelbruine dijen. Deze soort gelijkt op *clavicornis*, doch is veel kleiner en veel dichter en lijner bestippeld. Zwart, fijn en verspreid behaard. Tasters aan het uiteinde bruin. Voorhoofd iets uitgehold, met twee ondiepe groeven. Halsschild onduidelijk gegroefd. Bij het ♂ zijn de achterdijen aan de basis getand en is het zesde sterniet stomp driehoekig uitgerand, het vijfde met een indruk op het midden en aan het uiteinde uitgerand; het tweede, derde en vierde eveneens iets ingedrukt. Lengte 3½–4 mm. In bosschen onder dorre bladeren; soms langs oevers. Bij Breda. — In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 15. *syvester* Er.

Pooten licht roodgeel, de knieën, het uiteinde der schenen of deze nagenoeg geheel, benevens de tarsen, donkerder 23

- 23 Halsschild langer dan breed. Kop iets snaller dan de dekschilden. Kaaktasters geel, aan den top iets gebruint, zelden geheel geel. Lichaam meer vlak gedrukt. Deze soort gelijkt in habitus en kleur zeer op *clavicornis*; zij is echter iets slanker, minder dof, nog krachtiger en vooral duidelijk rimpelig, doch minder dicht bestippeld. Bij den vorm *Rogeri* Kraatz is de bestippling van het voorlijf nog grover en ongelijk dicht. Pooten roodgeel, de knieën, het uiteinde der schenen en de tarsen donker. Voorhoofd met twee vrij diepe groeven. Halsschild met eene langere, meer duidelijke middengroef. Dekschilden even lang als, bij den veel meer glanzigen vorm *Rogeri* iets korter dan het halsschild. Achterlijf fijner bestippeld. Bij het ♂ is het metasternum ingedrukt en lang geelgrijs behaard; de eerste 5 sterniten eenigszins ingedrukt, het vijfde, tusschen de twee kielvormige verhevenheden, diep uitgerand, doch zonder middenkiel, het zesde breed en stomp driehoekig ingesneden. Lengte 4–4½ mm. Langs oevers op kiezel, onder dorre bladeren in uitgedroogde slooten, tusschen *Sphagnum* en ander vochtig mos, ook onder steenen. Veel minder verbreid dan *clavicornis* en vooral in de diluviale streken, o. a. bij Oisterwijk en Maarsbergen niet zeldzaam; ook een paar malen bij den Haag, Loosduinen en Zierikzee. De vorm *Rogeri* met het type bij Breda, Maarsbergen en Roermond. Volgens *Ganglbauer* is *Rogeri* Kr. eene goede soort 16. *providus* Er.

Halsschild nagenoeg even lang als breed. Kop even breed als de dekschilden. Tasters zwart met gelen wortel. Lichaam meer gewelfd, tamelijk glanzig, overigens eveneens op *clavicornis* gelijkende, doch grover bestippeld en vooral op de dekschilden minder dicht en niet rimpelig, op het achterlijf veel meer verspreid- en over het midden nagenoeg niet bestippeld. Pooten roodgeel, het uiteinde der dijen, de schenen en de tarsen pekbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig ingesneden, het vijfde diep uitgehold, aan weerszijden en in het midden van de uitholling gekield en aan het uiteinde driehoekig ingesneden, het tweede tot vierde breed ingedrukt en aan de randen lang en dicht geelachtig bewimpeld. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Onder dorre bladeren in uitgedroogde slooten en onder plantenafval langs oevers van slooten en plassen. Zeer zeldzaam. Breda en Gilze Rijen. In België bij Kinkempois, in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld . . . 17. *lustrator* Er.

- 24 De eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis slechts met ééne korte, kielvormige verhevenheid of zonder eenige aanduiding van deze 25

De eerste 3 onbedekte tergiten met 4 korte, kielvormige verhevenheden aan de basis . . . 32

- 25 De eerste 3 onbedekte tergiten zonder kielvormige verhevenheid aan de basis 26
 De eerste 3 onbedekte tergiten met eene korte, kielvormige verhevenheid aan de basis. 29
- 26 Pooten geheel zwart 27
 Pooten roodbruin met zwartachtige knieën. Deze soort heeft den habitus van *circularis*, doch is doorgaans iets grooter, meer platgedrukt, dichter en lijner bestippeld en meer aschgrauw behaard. Het eerste tasterlid en de wortel van het tweede geelachtig. Dekschilden effen, veel breeder en langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets ingesneden. Lengte 2—2½ mm. Onder afgevallen bladeren, mos, plantenafval en steenen; soms op lage planten en 's avonds aan grassen; ook in aanspoelsel. Niet gemeen (*declaratus* Er.) 19. **nanus** Steph.
- 27 Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild 28
 Dekschilden niet langer dan het halsschild. Deze soort is zeer verwant aan *pusillus*, doch iets kleiner en smaller. De bestippling veel sterker, vooral op de dekschilden, welke meer rimpelig zijn. Kop dieper gegroefd. Halsschild korter, naar voren en naar achteren gelijkelyk versmald. Dekschilden smal, effen. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het einde uitgerand. Lengte 2—2½ mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld (*exiguus* Er.)
- 28 Halsschild breeder dan lang, dicht rimpelig bestippeld. Dekschilden 1½ maal zoo lang als het halsschild, iets oneffen. Lichaam tamelyk kort en breed, eenigszins platgedrukt. Zwart, tamelyk dof, fijn behaard. Halsschild aan de basis ingesnoerd en met een onduidelijken, V-vormigen indruk. Het eerste tasterlid geelachtig. Bovenzijde zeer dicht-, de kop fijn-, het halsschild en de dekschilden grover en rimpelig-, het achterlijf lijner en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 2½—2½ mm. Niet zeldzaam. Onder plantenafval, vochtig mos, langs oevers en in aanspoelsel.
 18. **pusillus** Steph.
- Halsschild langer dan breed, smal, tamelyk fijn en dicht bestippeld. Dekschilden slechts iets langer dan het halsschild, met zeer flauw aangeduide oneffenheden. Lichaam zeer smal, eenigszins gewelfd, zwart, eenigszins dof, vrij lang en dicht zilverachtig-wit behaard, tamelyk fijn, doch diep en dicht bestippeld. Het eerste tasterlid roodbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins stomp driehoekig ingesneden, het vijfde nauwelijks merkbaar uitgerand. Lengte 2½—3 mm. Op zand langs stroomend water. Niet inlandsch. Op het eiland Borkum en in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld (*ineanus* Er.)
- 29 Pooten geheel zwart of zwartbruin. Dekschilden even lang als het halsschild. Het vierde tarslid iets uitgerand, doch niet breeder dan het derde lid. Deze soort gelijkt zeer op *canaliculatus*, doch is vooral onderscheiden door de platgedrukte, minder grof bestippelde dekschilden, welke te zamen aan het uiteinde diep uitgerand zijn. Lichaam dof zwart, weinig behaard, tamelyk lijn en zeer dicht-, veel fijner en zeer dicht op het achterlijf bestippeld. Het eerste tasterlid en de basis van het tweede geelachtig. Kop met twee zeer onduidelijke langsgroeven. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed ingesneden, het vijfde in het midden van den achterrand uitgebogen en daarvoor neergedrukt en dichter behaard. Lengte 3—3½ mm. Op sommige plaatsen niet zeldzaam onder aanspoelsel en dorre bladeren. 20. **carbonarius** Gylh. 1)
- Pooten geel- of roodachtig 30
- 30 Dekschilden zoo lang als of iets korter dan het halsschild. Halsschild even lang als breed. Het vierde tarslid iets uitgerand, doch niet breeder dan het derde lid. Zwart, iets glanzig, vooral het achterlijf; kort witachtig behaard, zeer grof en dicht rimpelig, de dekschilden minder grof en tamelyk dicht bestippeld. Pooten roodachtig. Tasters geelachtig, het derde lid, benevens de knieën zwartbruin. Ongevleugeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet stomp driehoekig ingesneden; het vijfde smal ingedrukt en geheel onbestippeld. Lengte 3 mm. Verbreed en op sommige plaatsen niet zeldzaam, onder plantenafval langs slooten, mos aan boomwortels en soms in aanspoelsel. Te Rotterdam 's winters achter plataanschors. 21. **humilis** Er.
- Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Halsschild duidelijk breeder of nagenoeg even breed als lang 31
- 31 Lichaam kort en breed, eenigszins vlakgedrukt. Achterlijf zeer lijn bestippeld. Voorhoofd met

1) Verwant aan *S. carbonarius* is *subglaber* Thoms., J. Silb. (het wafje = *glabellus* Thoms.), welke door *Funnel* als eene goede soort beschouwd wordt, terwijl ze door andere schryvers als synoniem met *carbonarius* wordt aangemerkt. In België en in de oostreken van Rijssel. Mij is het niet gelukt eenig verschil waar te nemen tusschen een exemplaar uit Tornea (van J. Silb.), uit het Wiener Hofmuseum en *carbonarius* Gylh. *S. subglaber* zou op de bovenzijde slechts weinig merkbaar behaard en het achterlijf aan het uiteinde meer stomp zijn. Dekschilden even lang als het halsschild, weinig diep- en in 't geheel niet rimpelig bestippeld. Halsschild over het midden iets neergedrukt, dicht en iets rimpelig bestippeld. Achterlijf zeer duidelijk gerand en zeer dicht bestippeld. Het mannetje iets grooter; het zesde sterniet minder diep ingesneden, het vijfde aan den top iets uitgerand, van achteren iets ingedrukt en grays behaard.

twee breede, oppervlakkige langsgroeven. Lichaam zwart, een weinig glanzig, zeer fijn en kort behaard, zeer dicht en diep, grof rimpelig, bestippeld. Halsschild en dekschilden effen. Sprietten, behalve de knots, benevens de pooten, behalve de knieën, geelachtig. Halsschild duidelijk breeder dan lang. Dekschilden veel breeder en duidelijk langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde uitgerand. Lengte 2 mm. Gemeen onder plantenafval, dorre bladeren, afgevalven boomschors en in aanspoelsel . 22. *circularis* Grav.

Lichaam smal, tamelijk verlengd. Achterlijf krachtig bestippeld. Voorhoofd met twee diepere langsgroeven. Lichaam dofzwart, het achterlijf iets glanzig; uiterst dicht en fijn, iets rimpelig, bestippeld, op het achterlijf fijner en minder dicht. Het eerste tasterlid geel, de pooten geelrood met donkerder knieën en tarsen. Halsschild even breed als lang, veel smaller dan bij *circularis*. Dekschilden breeder en duidelijk langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet driehoekig ingesneden, het vijfde iets uitgerand. Lengte 2 mm. Niet inl. Zij zou bij Hamburg en Elberfeld gevangen zijn (pumilio Er.)

32 Achterlijf dik gerand. Pooten zwart, bij uitzondering roodbruin (vafellus) 33

Achterlijf tamelijk fijn of zeer fijn en eenigszins onduidelijk gerand. Pooten roodbruin of bruin. 45

33 Het eerste lid der kaaktasters zwart of bruin 34

Het eerste lid der kaaktasters geel 35

34 Lichaam $3\frac{2}{3}$ mm. lang. Achterlijf dicht bestippeld, met zeer kleine tusschenruimten. Deze soort is zeer verwant aan *palposus*, doch onderscheiden door den kleineren kop en de minder duidelijke, zilverwite beharing. De bestippling van kop, halsschild en achterlijf is fijner en dichter. Halsschild met eene korte, onduidelijke, middengroef. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand; het vierde en vijfde zonder indruk. Langs rivieroevers op zand en slib, in bergachtige streken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld (*ruralis* Er.)

Lichaam $4-4\frac{1}{2}$ mm. lang. Achterlijf minder dicht bestippeld, met grootere tusschenruimten. Habitus van *bupthalmus*, doch grooter. Dofzwart, zeer dicht zilvergrijs, zijdeachtig behaard, behalve op het halsschild. De bestippling is vrij sterk, zeer dicht rimpelig op het halsschild, grover op de dekschilden, vrij dicht en fijner op het achterlijf. Halsschild met eene zeer onduidelijke middengroef. Dekschilden oneffen, vlekkelig behaard. Bij het ♂ is het derde sterniet oppervlakkig ingedrukt; het vierde en vijfde met diepere langsindrukken; het vijfde en zesde sterniet aan het uiteinde stomp ingesneden. Langs stroomend water op zand en slib. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Cleef, Crefeld en Düsseldorf.

(*carbonarius* Gyll., *argentellus* Thoms.) (*palposus* Zett.)

35 Dekschilden met oneffenheden. Voorhoofd met twee langsgroeven. Pooten geheel zwart. . . 36

Dekschilden gelijkmatig gewelfd, zonder oneffenheden. 41

36 Kop even breed als de dekschilden 37

Kop duidelijk smaller dan de dekschilden 38

37 Halsschild nagenoeg even lang als breed, met eene duidelijke middengroef. Voorhoofd, tusschen de diepe langsgroeven, kielvormig opgericht. Dekschilden langer dan het halsschild. Lichaam geheel zwart, sterk glanzig, verspreid en grof bestippeld; duidelijk en verspreid, witachtig behaard. Bij het ♂ is het zesde sterniet een weinig uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ mm. Langs rivieren, onder steenen, plantenafval, aanspoelsel en langs de zeekust onder wier. Over het algemeen vrij zeldzaam (*nitidus* Lac.) 23. *melanopus* Marsh.

Halsschild duidelijk langer dan breed, zonder middengroef. Voorhoofd met zeer ondiepe langsgroeven. Dekschilden even lang als het halsschild. Bovenzijde zwart, weinig glanzig, zeer dicht en krachtig bestippeld, rimpelig op het halsschild en vooral op de dekschilden, fijner en minder dicht op het achterlijf. De beharing is fijn en verspreid, witachtig. Het achterlijf is glanziger. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins driehoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}-3\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen onder plantenafval, dorre bladeren, vochtig mos en in aanspoelsel 24. *bupthalmus* Grav.

38 Kop nagenoeg even breed als het halsschild 39

Kop duidelijk breeder dan het halsschild 40

39 Halsschild niet langer dan breed, van voren sterker afgerond, zeer grof, doch niet rimpelig bestippeld, tamelijk glanzig. Deze soort is zeer verwant aan *melanopus*, doch breeder en bovendien krachtiger bestippeld. Zwart, iets glanzig; dicht, grof en diep bestippeld. Tasters zwart. Het voorhoofd niet verdiept, met zwak aangeduide langsgroeven en eene breede, nauwelijks gewelfde, tusschenruimte. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, langer dan bij *melanopus*, sterk en diep bestippeld. Achterlijf sterk en diep-, doch niet zeer dicht bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Zij zou in Oldenburg voorkomen.

(*foraminosus* Er.)

Halsschild iets langer dan breed, vrij grof en iets rimpelig bestippeld, nagenoeg dof. Deze soort is onderscheiden van *buphthalmus* en *melanarius*, met welke zij overigens zeer verwant is, door den kleinen kop en het in het midden verbreedde lichaam. De kop is zeer weinig ingedrukt, met twee zwak aangeduide groeven. Zwart, dicht en diep bestippeld, met zeer korte, fijne, witachtige, verspreide haartjes bezet. Halsschild niet gegroefd. Dekschilden veel breder en langer dan het halsschild, iets grover en zeer rimpelig bestippeld, vooral naar het uiteinde van den naad. Achterlijf iets dichter bestippeld dan bij *melanarius*. Bij het ♂ is het vijfde sterniet eenigszins ingedrukt en aan het uiteinde een weinig uitgerand, het zesde zijn driehoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. In plantenaafval en langs oevers, zeldzaam. Middelburg, den Haag, Loosduinen en op Texel 25. *incrassatus* Er.

- 40 Halsschild even lang als breed. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Lichaam tamelijk breed en eenigszins gewelfd; zwart, een weinig glanzig, fijn grijs behaard, tamelijk fijn en dicht, op het voorlijf rimpelig, op het meer glanzige achterlijf fijner en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het vijfde en zesde sterniet uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder plantenaafval in moerassige streken, tusschen mos aan boomwortels en langs slooten onder dood riet. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam 26. *atratus* Er.

Halsschild duidelijk langer dan breed. Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild. Deze soort is zeer verwant aan *buphthalmus*, doch kleiner, glanziger, veel minder behaard en fijner bestippeld. Kop en vooral het halsschild veel smaller. Achterlijf veel fijner- en vooral op het zesde tergiet dichter bestippeld. Achterschienen met een doornje aan het uiteinde. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$ mm. Niet zeldzaam, onder plantenaafval en langs oevers op slib. (*Cinerascens* Er.) 27. *melanarius* Steph.

- 41 Voorhoofd nagenoeg zonder langsgroeven. Pooten zwart. 42
Voorhoofd met duidelijke, doch niet zeer diepe langsgroeven. Pooten lichter of donkerder roodbruin. Halsschild even lang als breed, voor het midden iets afgerond. 44

- 42 Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild. Halsschild langer dan breed, met eene duidelijke middengroef 43

Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Halsschild niet langer dan breed, zonder middengroef. Kop duidelijk smaller dan de dekschilden. Deze soort gelijkt zeer op *atratus*, doch is grooter, eenigszins zijdeachtig, dicht grijs behaard. Kop breder dan het halsschild. De bestippling is fijner, dichter en minder rimpelig op kop en halsschild, veel fijner op het achterlijf. Bij het ♂ zijn de achterschienen aan het uiteinde van een doornje voorzien; het zesde sterniet is breed driehoekig ingesneden, het vijfde zwak uitgerand, met een ondiepen indruk achter de uitranding. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. In moerassige streken onder plantenaafval, dood riet, mos en in aanspoelsel. Zeldzaam. Den Haag, Groesbeek en Roermond. 30. *morio* Grav.

- 43 Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed. Kop nagenoeg even breed als de dekschilden. Deze soort heeft den habitus van *Argus*. Zwart, het halsschild over de geheele lengte fijn gegroefd; de kop breder en krachtiger bestippeld. Het voorlijf meer rimpelig, het glanzige achterlijf meer verspreid bestippeld. De kielvormige verhevenheden op de tergiten zijn lang en sterker aangeduid. Bij het ♂ is het vijfde en zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand, het vijfde breed ingedrukt. Lengte $3\frac{1}{2}$ — 4 mm. Zeer zeldzaam, onder plantenaafval, dood riet en in aanspoelsel. Den Haag, Rotterdam, Breda en Gronsveld. (*aemulus* Er.) 28. *nitens* Steph.

Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed. Kop duidelijk smaller dan de dekschilden. Deze soort heeft den habitus van *buphthalmus*, doch is meer gewelfd, minder diep zwart en meer grijs behaard. Het glanzige achterlijf is, vooral naar het uiteinde, fijn bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets uitgerand. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Onder plantenaafval en dood riet langs oevers en onder dorre bladeren in moerassen 29. *canaliculatus* Gylh.

- 44 Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Kop duidelijk breder dan de dekschilden aan de schouders. Deze soort is verwant aan *vafellus*, doch krachtiger gebouwd en meer gedrongen, met donkerder bruinroode pooten. Voorlijf veel grover bestippeld. Halsschild voor het midden meer afgerond verbreed, naar achteren sterker versmald. Achterlijf sterker en minder dicht bestippeld. Bij het ♂ is het metasternum in 't midden veel fijner en dichter bestippeld, het zesde sterniet aan het uiteinde zwak uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Zij zou in Westfalen voorkomen (*macrocephalus* Aubé) (*cautus* Er.)

Dekschilden slechts iets langer dan het halsschild. Kop even breed als de dekschilden. Deze soort is eenigszins verwant aan *Argus*, doch kleiner, korter en iets langer behaard. De bestippling der dekschilden is minder diep. Achterlijf breder gerand. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde zwak uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder plantenaafval, oud hout en vooral in aanspoelsel der rivieren. Zeldzaam. Den Haag, Utrecht, Breda, Roermond, Valkeveen, Gronsveld en Maarsbergen. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. 31. *vafellus*.

- 45 Achterlijf tamelijk fijn, maar duidelijk gerand. Het vierde tarslid is iets, doch duidelijk uitge-
rand. Dekschilden iets langer dan het halsschild. Het derde sprietlid slechts iets langer dan
het vierde. Deze soort heeft het voorkomen van morio, doch is iets slanker en veel minder
behaard. De bestippeling is tamelijk grof en niet zeer dicht, op het achterlijf fijner, vooral
naar het uiteinde. Voorhoofd tamelijk vlak, met twee oppervlakkige indrukken. Halsschild
smal, met minder afgeronde zijden, zonder langsindruk. Pooten roodbruin of bruin, de
basis der dijen gewoonlijk iets lichter gekleurd. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins
driehoekig ingesneden, het vijfde iets uitgerand. Lengte 3—3½ mm. Onder plantenafval,
langs slooten en vooral in aanspoelsel. In aantal bij Breda; ook bij Maarsbergen, Oisterwijk,
Amsterdam, Roermond en Valkenburg. 32. **Argus** Grav.
- Achterlijf zeer fijn en eenigszins onduidelijk gerand, bijna cilindervormig. Het vierde tarslid
gewoon. Dekschilden ongeveer even lang als het halsschild. Het derde sprietlid duidelijk
langer dan het vierde. Lichaam gewelfd, duidelijk behaard, vooral op de dekschilden grof
bestippeld. Pooten roodbruin. Sprieten kort. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde
iets uitgerand. Lengte 2½—2¾ mm. Onder steenen, plantenafval, drogen mest en vooral in
aanspoelsel. Verbreid; o. a. gemeen bij Breda in aanspoelsel van de Mark, met carbo-
narius, vafellus, Argus en opticus. 33. **fuscipes** Grav.
- 46 Achtertarsen slechts weinig of niet langer dan de helft der schenen, de leedjes vlak en naar
het uiteinde geleidelijk verbreed; het eerste lid slechts iets langer dan het laatste. Halsschild
zonder middengroef (Sub-gen. Hemistenus Rey). 47
- Achtertarsen duidelijk langer dan de helft der schenen, smal; het eerste lid veel langer dan
het laatste. Halsschild met eene meer of minder duidelijke middengroef (Sub-gen. Meso-
stenus Rey). 59
- 47 Het derde tarslid breed tweelobbig. Bovenzijde dicht rijpachtig behaard en daardoor iets of
wat als witachtig bepoederd. 48
- Het derde tarslid gewoon of slechts zwak uitgerand. Bovenzijde niet dicht behaard 53
- 48 Lichaam in het midden breed, kop en halsschild tamelijk smal, het achterlijf sterk kegelvor-
mig toegespitst en over het midden weinig of niet bestippeld. Lichaam leikleurig-zwart,
tamelijk dof, vrij lang en dicht witachtig behaard, fijn bestippeld. Tasters zwartachtig, het
eerste lid, de basis en het uiteinde van het tweede roodgeel. Sprieten geel, het eerste lid
en de knots zwartachtig. Kop duidelijk gegroefd. Halsschild naar voren en naar achteren
even sterk versnald, met een diepen, langwerpigen indruk aan weerszijden van het midden.
Dekschilden iets langer dan breed, zeer oneffen en langs de zijden vlekkelig behaard. Bij het
♂ zijn de achterschenen aan het uiteinde van een klein doornetje voorzien; het derde, vierde
en vijfde sterniet in 't midden iets ingedrukt en lang wit behaard; het derde en vierde
sterniet aan het uiteinde iets-, het zesde zeer diep, driehoekig ingesneden. Lengte 5—5½ mm.
Op riet, onder dorre bladeren langs stilstaande wateren, in bosschen en moerassen. Niet
inlandsch. In België bij Brussel (canescens Rosenh.)
- Lichaam niet meer parallelle zijden. De kop breeder, het achterlijf weinig of niet toegespitst. 49
- 49 Tarsen zwartachtig. 50
- Tarsen geelachtig. 52
- 50 De eerste 4 onbedekte tergiten op het midden zeer weinig bestippeld, naar het midden van
den rand nagenoeg glad 51
- De tergiten op het midden zeer dicht bestippeld. Deze soort is zeer verwant aan salinus,
doch iets smaller, minder behaard, iets fijner- en vooral op halsschild en dekschilden
dichter bestippeld. Dekschilden meer effen. Bij het ♂ zijn de achterschenen voor het uiteinde
van een doornetje voorzien; het derde tot vijfde sterniet ingedrukt. Lengte 4½—5 mm. Niet
zeldzaam, vooral onder dood riet en dorre bladeren langs oevers; soms in aanspoelsel.
36. **binotatus** Ljungh.
- 51 Lichaam vlakgedrukt, vooral op de dekschilden. Van canescens onderscheiden door het
langere, meer parallelle lichaam, het langere, naar de basis meer dan naar voren versnalde
halsschild en de minder oneffen, smallere dekschilden. Bij het ♂ zijn de achterschenen
gebogen; het tweede tot zesde sterniet in 't midden ingedrukt, bij het derde en vierde ster-
niet zeer diep en half-cirkelvormig, bij het vijfde zwakker; de indrukken zeer dof en fijn grijs
behaard; het zesde sterniet diep en zeer breed, boogsgewijze uitgerand. Lengte 5½—5¾ mm.
Onder aangespoeld riet, langs slooten, rivieren en duinplassen. Vrij zeldzaam.
- (subimpressus Er.) 34. **pubescens** Steph.
- Lichaam eenigszins cilindervormig, de dekschilden gewelfd. Deze soort gelijkt overigens zeer
op pubescens, doch is kleiner, smaller, glanziger en krachtiger bestippeld, vooral op
het achterlijf en dichter op het halsschild. Sprieten iets donkerder. Bij het ♂ zijn de
achterschenen vóór het uiteinde van een doornetje voorzien; het tweede tot vijfde sterniet

in het midden ingedrukt, het derde en vierde witachtig behaard en de indrukken dieper; het zesde diep driehoekig ingesneden. Lengte 4 mm. Langs rivieroevers; uiterst zeldzaam. Rotterdam, Huissen 35. *salinus* Ch. Bris.

- 52 Lichaam tamelijk breed, met eenigszins parallelle zijden. Dekschilden duidelijk breder dan de kop. Tasters geel, het eindlid aan den top donkerder gekleurd. Deze soort heeft den habitus van pubescens, doch is veel kleiner; ook gelijkt zij op *binotatus*, doch is meer platgedrukt, fijner en minder dicht bestippeld en duidelijker behaard. Bij het ♂ zijn de achterschenen aan het uiteinde gebogen en is het zesde sterniet scherper ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Gemeen langs rivieroevers op riet, onder dood riet en in aanspoelsel. (plantaris Er.) 37. *pallitarsis* Steph.

Lichaam en vooral de dekschilden zeer smal, met volkomen parallelle zijden. Dekschilden nagenoeg even breed als de kop. Deze soort is zeer verwant aan *pallitarsis*, doch kleiner. De kop minder ingedrukt. Tasters geelachtig. Halsschild naar verhouding iets langer, fijner en dichter bestippeld en met minder duidelijke, scheve indrukken. Tarsen iets donkerder geelachtig. Bij het ♂ zijn de achterschenen aan het uiteinde gebogen; het overige als bij *binotatus*. Lengte 4 mm. Tusschen riet op slib in moerassen. Niet inl. In België bij Hoesselt (niveus Fauvel)

- 53 Sprietten geheel zwart. Deze soort gelijkt op *picipes*, doch is veel kleiner, geheel zwart, ook de pooten; slechts het eerste tasterlid geel. De bestippling dichter en fijner. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets ingesneden. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Onder aanspoelsel; soms 's avonds aan gras in drassige bosschen. Niet inl. In Noord-Frankrijk bij Rijnssel en in de Rijnprov. bij Bonn (Leprieurii Cussac)

Sprietten min of meer geel- of roodachtig, behalve gewoonlijk het eerste lid en de knots. 54

- 54 Pooten zwartachtig of roodbruin met zwarte knieën. Lichaam tamelijk breed, naar het uiteinde versmald. 55

Pooten geel, alleen de coxae zwart. Lichaam zeer smal, zwart, weinig glanzig, verspreid en kort behaard. Tasters en sprietten geel; het eerste sprietlid zwart, de laatste twee bruin. Halsschild en dekschilden verspreid bestippeld, het midden van het halsschild onbestippeld. Kop iets ingedrukt, met breede, weinig gewelfde, gladde middenruimte. Dekschilden iets langer dan het halsschild, effen. Tergiten zonder kielvormige verhevenheid aan de basis. Ongevlengeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde driehoekig ingesneden, het vijfde in de lengte ingedrukt. Lengte $3\frac{1}{2}$ —3 mm. Verbreid, doch overal vrij zeldzaam. Op slib, onder plantenafval, dorre bladeren en op lage planten in weilanden en langs slooten.

(tilum Er.) 42. *flavipes* Steph.

- 55 De eerste 3 onbedekte tergiten met eene min of meer duidelijke, kleine, kielvormige langsverhevenheid aan de basis. Pooten zwartachtig, de dijen aan de basis iets lichter, het derde tasterlid bruin. Lichaam zwart, tamelijk glanzig, smaller dan bij *picipes*, weinig doch langer behaard. Het midden van het voorhoofd, eene middellijn op het halsschild en het midden der tergiten aan de basis nagenoeg glad. Halsschild aan weerszijden diep ingedrukt. Dekschilden iets langer dan het halsschild, zeer oneffen. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde driehoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer zeldzaam; onder plantenafval, dood hout en op oeverplanten; vooral in moerassige streken en in vochtige bosschen; soms in aanspoelsel. Sleeuwijk, Oisterwijk, Breda, Lochem, Delden en Venlo.

(planus Er.) 38. *bifoveolatus* Gylh.

De eerste 3 onbedekte tergiten zonder kielvormige verhevenheid aan de basis. Pooten roodbruin of geelrood. 56

- 56 Achterlijf zeer dicht bestippeld. Bovenzijde weinig glanzig. Pooten roodbruin. 57

Achterlijf meer verspreid-, de basis der tergiten soms dichter bestippeld. Dekschilden zeer oneffen, met duidelijke indrukken. Bovenzijde glanzig. Pooten geelrood. 58

- 57 Dekschilden ongeveer even lang als- en slechts weinig breder dan het halsschild, aan het uiteinde sterker uitgerand. Deze soort gelijkt zeer op *picipes*, doch is kleiner, smaller, en vooral op de dekschilden iets minder dicht bestippeld. Pooten bruinrood, het uiteinde der dijen en de basis der schenen bruinachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde driehoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ —3 mm. Onder dorre bladeren in uitgedroogde heidegreppels. Uiterst zeldzaam. Bij Oisterwijk en Putten (N.-B.), in Juli. Ook in België bij Calmpthout (*bifoveolatus* Er.) 39. *foveicollis* Kr.

Dekschilden veel langer en breder dan het halsschild. Deze soort heeft eenigszins den habitus van *tarsalis*, doch is breder, kleiner, meer vlakgedrukt, meer leikleurig-zwart, weinig glanzig en zeer kort en dicht grijs behaard. Het eerste sprietlid zwart, de knots min of meer bruinachtig. Pooten roodbruin; het uiteinde der dijen en der schenen zwartachtig. Bestippling zeer dicht en krachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde drie-

hoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Onder steenen, plantenafval, op lage planten, langs slooten en rivieren en soms in aanspoelsel. Over het algemeen zeldzaam. Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Arnhem, Middelburg, Winterswijk, Assen, Valkenburg en Maastricht. In België bij Boisfort, Tervueren en Brussel; in de Rijnprov. bij Aken.

(rusticus Er.) 40. **picipes** Steph.

- 58 Tergiten aan de basis sterk ingedrukt en tamelijk grof bestippeld. Halsschild iets korter dan breed. Deze soort is breder en korter dan *bifoveolatus*, meer gedrongen, tamelijk glanzig op het voorlijf en sterk glanzig op het achterlijf. Het halsschild en de dekschilden krachtig en vrij dicht-, de tergiten, behalve aan de basis, verspreid bestippeld. Zwart, de tasters, sprieten en pooten geelrood; de sprietknots, het uiteinde der dijen, de basis der schenen en soms de dekschilden bruin. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep driehoekig ingesneden. Lengte 3 mm. Op lage planten langs stroomend water en soms in aanspoelsel. Niet inl. In België bij Brussel en in Belgisch Limburg (Otrange) (*picipennis* Er.)

Tergiten aan de basis een weinig ingedrukt en fijn bestippeld. Halsschild iets langer dan breed. Lichaam glanzig, weinig behaard, vooral op het halsschild tamelijk fijn en verspreid bestippeld. Sprieten, tasters en pooten roodgeel; het eindlid der tasters aan den top, de knieën en de basis der schenen bruin; het eerste sprietlid en de knots zwartachtig. Voorhoofd met twee diepe groeven. Halsschild met zeer duidelijke, scheve indrukken. Dekschilden iets langer dan het halsschild, naar het uiteinde iets verbreed en duidelijk uitgerand. Ongevelegeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde driehoekig ingesneden. Lengte 4 mm. Onder plantenafval, vochtig mos langs beken, dood riet, stroo en steenen. Zeer zeldzaam. Den Haag, Leiden, Arnhem, Breda, Oisterwijk, Laag-Soeren en Brummen. (tempestivus Er.) 41. **nitidiusculus** Steph.

- 59 Achterlijf dik gerand 60

Achterlijf zeer fijn gerand. Sprieten, tasters en pooten geheel geel; de sprietknots iets bruinachtig. Kop even breed als de ellene dekschilden. Deze soort heeft den habitus van *brunnipes*, maar onderscheidt zich door het gewelfde, iets glanzige lichaam. Zwart; zeer kort en vrij dicht behaard, krachtig en dicht bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde driehoekig ingesneden. Lengte 3 — $3\frac{1}{4}$ mm. Onder plantenafval, steenen, dorre bladeren, op vochtige plaatsen en soms in aanspoelsel. Verbreed, doch vrij zeldzaam.

48. **pallipes** Grav.

- 60 Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild. Sprieten korter dan kop en halsschild te zamen 61

Dekschilden nagenoeg even lang als- of iets korter dan het halsschild 64

- 61 Pooten gedeeltelijk bruin en geelrood 62

Pooten nagenoeg geheel lichter of donkerder roodbruin. Lichaam zwart, eenigszins glanzig, kort behaard, op het voorlijf vrij sterk en tamelijk dicht bestippeld. Het eerste tasterlid en de wortel van het tweede geel; het midden der sprieten roodbruin. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde eenigszins scherp driehoekig ingesneden; het vijfde zeer nauw ingedrukt en fijn ingesneden. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer zeldzaam. Op lage planten, onder steenen, langs oevers onder dorre bladeren, aan boomwortels en onder vochtige stukken hout. Den Haag, Breda, Zierikzee, Hillegersberg, Valkenburg en St. Pieter. In België bij Verviers en in de Rijnprov. bij Düsseldorf. 44. **fuscicornis** Er.

- 62 Lichaam min of meer glanzig 63

Lichaam tamelijk dof, zeer dicht en vrij fijn bestippeld, leikleurig-zwart, kort en dicht grauw behaard. De bestippeling van het achterlijf, vooral naar het uiteinde, veel fijner. Tasters, sprieten en pooten donkerbruin; het eerste tasterlid en de basaalhelft der dijen geelrood; het midden der sprieten roodachtig. Dekschilden eenigszins oneffen. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde eenigszins stomp-driehoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Op lage planten langs oevers, onder steenen en plantenafval en soms in aanspoelsel. Niet inl. In België bij Verviers, Hollebeke, Melsbroek en Boendael.

(*impressipennis* Jacq. Duv.) (*ossium* Steph.)

- 63 Pooten zwartbruin, de basis der dijen en het midden der schenen geelrood. Deze soort gelijkt zeer op *impressus*. Zwart, een weinig bronzig, vrij sterk en dicht rimpelig bestippeld. Sprieten geelrood, de knots bruin en de eerste 2 leedjes zwart; het eerste tasterlid en de basis van het tweede geel. Dekschilden met parallelle zijden, eenigszins oneffen. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets ingesneden. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ mm. Op slib langs oevers, onder steenen, vochtig mos, in aanspoelsel en soms bij mieren. Zeldzaam. Scheveningen, Rotterdam, Dordt, Nijmegen, Vianen, Kruijningen, Middelburg, Haarlem en Zierikzee. Een exemplaar uit Dordt is slechts $3\frac{1}{2}$ mm. lang.

(*gonymelas* Steph.) 43. **subaeneus** Er.

Slechts de knieën min of meer berookt. Deze soort gelijkt overigens zeer op *subaeneus*, doch is doorgaans kleiner. Bronzig zwart, veel fijner-, vooral op het achterlijf bijzonder fijn en dicht bestippeld. Sprieten, tasters en pooten geel; het eerste sprietlid en de knots, het uiteinde van het derde tasterlid en de knieën, vooral van de middel- en achterpooten, bruinachtig. Kop groot en breed. Dekschilden zeer oneffen, als 't ware langs den naad in drie kleine bultjes opgericht. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins stomp driehoekig ingesneden. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder steenen en mos, vooral op vochtige plaatsen. Ofschoon deze soort in de geheele „faune Gallo-Rhénane” voorkomt, zag ik nog nimmer Nederlandsche exemplaren. In de duinen van Grevelingen in Noord-Frankrijk, onder dorre struiken van *Hippophaë rhamnoides*. (*Aceris* Steph.) (*aerosus* Er.)

- 64 Halsschild en dekschilden buitengewoon grof, vrij dicht en iets rimpelig bestippeld. Halsschild, behalve de middengroef, nog met enige ondiepe indrukken. Voorhoofd, tusschen de diepe langsgroeven, iets kielvormig opgericht. Kop even breed als de dekschilden. Bovenzijde glanzig, verspreid en lang behaard. Habitus en kleur van *impressus*. Achterlijf naar het uiteinde meer verspreid bestippeld. Sprieten zoo lang als kop en halsschild te zamen, evenals de pooten geelrood; een ring voor het uiteinde der middel- en achterdijen licht-bruin. Dekschilden ongeveer even lang als het halsschild, aan het uiteinde diep uitgerand, eenigszins oneffen en naar het uiteinde iets verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins half-cirkelvormig uitgerand, het vijfde in het midden iets ingedrukt en behaard. Lengte 4—4½ mm. Onder steenen en vochtig mos, in bergstreken. Deze soort zou in de Belgische provincie Luik en in de Rijnprov. bij Ahrweiler gevangen zijn. (*glacialis* Heer)

Halsschild en dekschilden sterk of vrij sterk bestippeld 65

- 65 Pooten met donkere knieën. Het derde tasterlid bruin. De sprietwortel zwart. 66

Pooten en tasters geheel geel; soms de uiterste top der achterdijen en ook der middeldijen een weinig bruinachtig. Sprieten aan den wortel geel. Vleugels rudimentair 67

- 66 Halsschild slechts met eene middengroef. Kop even breed als de dekschilden. Pooten rood-geel, de knieën bruinachtig. Lichaam overigens zwart, vrij dicht, kort, wrachtig behaard, vrij sterk, diep en dicht bestippeld. Dekschilden even lang als het halsschild. Achterlijf vrij krachtig bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets ingesneden. Lengte 4 mm. Op zand, onder steenen, mos en dorre bladeren in bosschen; 's avonds aan grashalmen. Verbreed, doch overal vrij zeldzaam 45. *geniculatus* Grav.

Halsschild met eene middengroef en twee meer of minder duidelijke zijgroeven. Kop iets breeder dan de dekschilden. De helft der dij en nagenoeg de geheele schenen bruin. Deze soort heeft den habitus van *impressus*, doch is wat minder glanzig, een weinig bronskleurig. Zwart, dicht en zeer kort behaard. Halsschild voor het midden vrij sterk afgerond-verbreed. Dekschilden vlakker, naar het uiteinde iets verbreed, slechts een weinig oneffen. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets driehoekig ingesneden. Lengte 3½ mm. In bosschen op moerassige plaatsen tusschen *Sphagnum* en langs oevers onder aangespoeld riet. Niet inl. 1). In Noord-Frankrijk bij Rijssel; in de Rijnprov. bij Crefeld.

(*palustris* Er.)

- 67 Kop even breed als de dekschilden. Halsschild, behalve de middengroef, ook aan de zijden meer of minder duidelijk gegroefd. Dekschilden oneffen. Lichaam bronzig-zwart. Tasters, sprieten en pooten geel; de sprietknots, benevens gewoonlijk de uiterste top der achteren soms ook der middeldijen een weinig bruinachtig. Halsschild breeder, naar voren meer verbreed en minder oneffen dan bij de naverwante *aerosus*. Dekschilden nagenoeg even lang als het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde driehoekig ingesneden; het vijfde vertoont eene zeer smalle middengroef, welke aan de randen wrachtig behaard is. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Gemeen op lage planten, onder mos, dorre bladeren, in bosschen en weilanden. (*Aceris* Lac.) 46. *impressus* Germ.

Kop breeder dan de dekschilden. Halsschild slechts met eene middengroef. Dekschilden effen. Deze soort varieert zeer in lengte, doch heeft gewoonlijk de grootte van *fuscicornis* en gelijkt soms op kleine exemplaren van *impressus*, van welke zij zich onderscheidt door het smallere, minder glanzige en minder bronskleurige lichaam. Sprieten geelachtig, met donkere knots. Halsschild vrij kort, aan de zijden sterk verbreed, naar voren en naar achteren sterk versnald, evenals de dekschilden met korte, schubachtige haartjes bezet. Dekschilden een vierde korter, nagenoeg effen. Achterlijf meer toegespitst. Pooten krachtiger ontwikkeld, met iets opgeblazen dij, het uiteinde der knieën een weinig donkerder. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 3—3½ mm. In meststoffen, onder mos en steenen, in aanspoelsel en soms bij mieren. Zeer zeldzaam. Utrecht, Vorden, Valkenburg en St. Pieter. In België bij Calmpthout.

(*flavipes* Er.) 47. *Erichsonii* Rey.

1) De vroegere opgave als inlandsch berustte op onjuiste determinatie.

- 68 Het vierde tarslid gewoon of slechts iets uitgerand (Sub-gen. *Tesnus* Rey) 69
 Het vierde tarslid diep tweelobbig, breeder dan het derde (Sub-gen. *Hypostenus* Rey) 73
- 69 De eerste 3 onbedekte tergiten aan de basis met 4 korte langs-verhevenheden. Het vierde tarslid gewoon. 70
 De eerste 3 onbedekte tergiten zonder kielvormige verhevenheden aan de basis. Het vierde tarslid slechts iets uitgerand 72
- 70 Het tweede lid der achtertarsen nagenoeg even lang als het eerste. Kop even breed als de dekschilden. Pooten donker roodbruin. Deze soort heeft den habitus van *circularis*, doch is grooter. Dof zwart, alleen het achterlijf tamelijk glanzig. Eerste tasterlid geelachtig. Bestippeling dicht, tamelijk fijn en eenigszins rimpelig, op het achterlijf minder dicht. Kop vlak en niet gegroefd. Halsschild zonder middengroef. Bij het ♂ is het zesde sterniet eenigszins driehoekig ingesneden, het vijfde iets uitgerand. Lengte 2½—2¾ mm. Onder plantenaafval, langs slooten en vooral in aanspoelsel. In aantal bij Breda; ook bij Maastricht. In de Rijnprov. bij Elberfeld. 49. *opticus* Grav.
- Het tweede lid der achtertarsen half zoo lang als het eerste. Pooten zwart 71
- 71 Kop nagenoeg even breed als de dekschilden, duidelijk breeder dan het halsschild. Overigens verwant aan *crassus*, doch kleiner en uiterst dicht en rimpelig bestippeld, dof zwart. Halsschild met de aanduiding eener langsgroef. Achterlijf iets glanzig; dicht en veel fijner bestippeld dan het voorlijf. Lengte 2—2½ mm. Onder vochtig hout, op moerassige plaatsen. Niet inl. Zij zou op Borkum, Norderney en in Westfalen gevangen zijn. Volgens *Fauvel* slechts eene var. van *crassus* en niet *myrmecophilus*.
 (*litoralis* Thoms.) (*formicetorum* Mannh.)
- Kop duidelijk smaller dan de dekschilden en nagenoeg even breed als het halsschild. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *atratus*, glanzig zwart. Halsschild naar voren iets minder versmald dan naar achteren. Dekschilden iets langer dan het halsschild, grover en minder dicht bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde fijner bestippeld. Bij het ♂ is het achterlijf slanker en het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 2½—3 mm. Op slib en kiezel langs oevers, onder dorre bladeren, plantenaafval, dood riet en in aanspoelsel. Niet zeldzaam (*nigritulus* Er., *crassiventris* Thoms.) 50. *crassus* Steph.
- 72 Dekschilden iets langer dan het halsschild, aan het uiteinde iets uitgebogen. Lichaam geheel zwart, min of meer dof; ook de pooten zwart. Het eerste tasterlid geelachtig. Habitus van *carbonarius*. Halsschild en dekschilden grof, dicht, ongelijkmatig en eenigszins rimpelig, het achterlijf, vooral naar het uiteinde, veel fijner bestippeld. Halsschild naar de basis met geringe aanduiding van eene langsgroef. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 3½—4 mm. Verbreed, doch overal zeldzaam. Onder steenen, dorre bladeren, stukken hout en soms in aanspoelsel.
 (*campestris* Er.) 51. *nigritulus* Gylh.
- Dekschilden even lang als of iets korter dan het halsschild, aan het uiteinde sterk boogsgewijze uitgerand. Pooten roodbruin met donkere knieën. Deze soort is zeer verwant aan *nigritulus*, doch het voorlijf is glanziger en duidelijker behaard. Het eerste tasterlid en de basis van het tweede geelachtig. Voorhoofd dieper gegroefd. Halsschild en dekschilden grover, minder dicht en minder rimpelig bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 3—3½ mm. Niet zeldzaam, onder dorre bladeren, plantenaafval en soms in aanspoelsel (*unicolor* Er.) 52. *brunnipes* Steph.
- 73 Het eerste lid der achtertarsen korter dan het laatste. Sprieten donker gekleurd of alleen de twee eerste leedjes en de knots zwartachtig 74
 Het eerste lid der achtertarsen iets langer dan het laatste. Sprieten geel en slechts het eerste lid, of de knots, of wel het eerste lid en de knots zwartachtig 76
- 74 Kop weinig of niet breeder, de dekschilden dubbel zoo breed als het halsschild. Achterlijf naar het uiteinde sterk toegespitsd. Bovenzijde glanzig zwart. De dekschilden sterk gewelfd. Tasters en sprieten bruin, de sprietknots zwart. Het eerste tasterlid en de basis der schenen geel. Bestippeling zeer grof, vrij dicht op halsschild en dekschilden, fijner op kop en achterlijf. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde ingesneden. Lengte 2½ mm. Op waterplanten en langs oevers onder steenen en dood riet. Zeer zeldzaam. Loosduinen, Utrecht, Warnsveld, Breda en Roermond. In België bij Brussel en Leuven; in de Rijnprov. bij Crefeld (*contractus* Er.) 53. *ornicatus* Steph.
- Kop veel breeder, de dekschilden weinig breeder dan het halsschild. Achterlijf naar het uiteinde iets geleidelijk versmald 75
- 75 Dekschilden aan het uiteinde nagenoeg recht afgesneden, duidelijk langer dan het halsschild. Pooten roodbruin met gele tarsen, of bruin met roode tarsen. Tasters geel met bruinachtig

uiteinde. Deze soort herinnert in habitus en kleur aan *Argus* en *brunnipes* en is van de naverwante *latifrons* onderscheiden door het bredere, minder parallelle en meer gewelfde lichaam: ook is zij minder dof en vooral op kop en achterlijf grover, dichter en meer rimpelig bestippeld. Sprieten geelachtig, de eerste twee sprietleedjes en de knots zwartachtig. Halsschild breder en aan de basis meer versmald. Dekschilden eenigszins onellen. Bij het ♂ is het vijfde sterniet aan het uiteinde minder uitgebogen. Overigens als bij *latifrons*. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam, onder plantenaafval, steenen en stukken boomschors; vooral in moerassige streken; soms in aanspoelsel. . . . (paganus Er.) 54. **fulvicornis** Steph.

Dekschilden aan het uiteinde te zamen duidelijk uitgerand, niet langer dan het halsschild. Pooten roodbruin of bruin, de tarsen niet lichter gekleurd. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *brunnipes*. Leikleurig-zwart, weinig glanzig, minder grof en vooral op het achterlijf dichter bestippeld. Het eerste tasterlid en de wortel van het tweede geelachtig. Halsschild aan de basis een weinig ingesnoerd. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde diep ingesneden, het vijfde aan het uiteinde driemaal uitgebogen, met een langsindruk. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam, langs vijvers en slooten, onder dood riet en dorre bladeren, plantenaafval en in aanspoelsel. 55. **latifrons** Er.

76 Pooten zwart, met roodachtige tarsen; de sprieten geel, het eerste lid en de knots zwartachtig. Zwart, tamelijk dof, zeer kort en dicht grijs behaard; dicht en vrij sterk bestippeld. Tasters geelachtig. Kop met twee onduidelijke langsgroeven. Halsschild met een meer of minder duidelijken, V-vormigen indruk achter op het midden. Dekschilden duidelijk breder en langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte $4-4\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen; onder steenen, dorre bladeren, mos en soms in aantal op lage planten 56. **tarsalis** Ljungh.

Pooten geel, met zwarte knieën 77

77 De tergiten aan de basis een weinig ingedrukt, doch zonder langskiel. Bovenzijde door de dichte beharing leikleurig-zwart. 78

De eerste onbedekte tergiten aan de basis sterk ingedrukt en met aanduiding van eene korte langskiel. Halsschild en dekschilden buitengewoon grof bestippeld. Bovenzijde onduidelijk behaard, glanzig zwart. Overigens gelijkt deze soort zeer op *similis*. Achterlijf tamelijk fijn en dicht bestippeld, op het midden nagenoeg glad. Sprieten roodachtig, de knots min of meer berookt. Schenen soms bijna geheel zwartachtig. Kop veel smaller. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde scherp driehoekig ingesneden. Lengte $5-5\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen; onder mos, plantenaafval, langs slooten, soms in aanspoelsel en onder dood riet. 59. **cicindeloides** Schall.

78 Slechts het eerste sprietlid zwart. Achterlijf even grof bestippeld als de dekschilden. Kop breed, met breed en oppervlakkig gegroefd voorhoofd, even breed als de dekschilden, doch veel breder dan het halsschild. Dekschilden iets langer en duidelijk breder dan het halsschild, even lang als te zamen breed, eenigszins onellen. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep ingesneden, het vijfde ingedrukt en aan het uiteinde ingesneden. Lengte $5-5\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen; onder plantenaafval, stroo, dorre bladeren, in aanspoelsel en soms in aantal op lage planten (oculatus Grav.) 57. **similis** Hrbst.

De sprieten geheel geel, alleen de knots bruinachtig. Achterlijf veel fijner bestippeld dan de dekschilden. Deze soort onderscheidt zich van *similis* vooral door de fijnere, dichtere bestippeling van het voorlijf en de bijna onzichtbare bestippeling van het achterlijf. Beharing langer, grijs. Een grooter gedeelte der dijen en schenen van de middel- en achterpooten zwartachtig; aan de voorpooten, behalve de knieën, ook de bovenzijde der dijen naar het uiteinde bruinachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet vrij diep driehoekig ingesneden, het vierde in het midden iets uitgerand. Lengte $4\frac{1}{2}-5$ mm. Onder dood riet en in aanspoelsel, langs rivieren en slooten; ook op waterplanten. Verbreed, doch vrij zeldzaam . . . 58. **solutus** Er.

IX. Sub-Familie OXYPORINAE.

XII. Tribus OXYPORINI.

90. *Oxyporus* Fabr.

Kop groot, de slapen veel langer dan de oogen. Bovenlip tamelijk lang, vrij diep stomphoekig uitgerand. Voorkaken zeer lang en ver vooruitstekend, naar den scherpen top gekromd, in de rust kruislings over elkaar geplaatst. Kaaktasters matig lang,

26. Onderlip met de liptasters van *Oxyporus*. Orig.

het eerste lid zeer kort, het tweede zeer lang, weinig korter dan de twee volgende leedjes te zamen, het derde naar het uiteinde verbreed, het eindlid iets korter dan het derde. Kin naar voren zeer sterk versmald, door eene diepe, tamelijk smalle insnijding in twee evenwijdige lobben verdeeld, over het midden gekield. Tong zeer kort, van voren recht afgeknot; de paraglossen reiken zeer ver voorbij de tong, zijn toegespitst en van binnen lang bewimperd. Liptasters even lang als de kaaktasters, recht naar achteren gericht, met buitengewoon groot, halvemaan-vormig eindlid (fig. 26). Sprieten kort, naar het uiteinde sterk verbreed en platgedrukt. Lichaam vrij kort en dik. De middelcoxae staan op grooten afstand van elkaar en zijn meer op de zijden van het sternum ingeplant. Pooten kort, de schenen met borstelharen bezet. Alle tarsen 5-ledig, het eindlid even lang als de 3 voorafgaande leedjes te zamen. — De larve van *O. rufus* werd

door Heeger ¹⁾ en Thomson, die van *maxillosus* door Schiodte beschreven. — De soorten van dit genus leven in paddestoelen.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Halschild geelrood, zeer kort, min of meer trapeziumvormig, bij het ♂ naar voren iets, bij het ♀ meer versmald; gelijkmatig gewelfd. Dekschilden met twee langsrijen van vrij krachtige stippels, benevens enkele verspreide stippels over het midden. Kop zwart, bij het ♂ grooter dan bij het ♀. De voorkaken zwart; de tasters, de sprieten, eene groote schouderplek op de zwarte dekschilden, benevens de pooten, behalve de dijkwortel, geel; het achterlijf, behalve de twee laatste ringen en eene breede middenvlek op het vierde onbedekt tergiet, geelrood. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets uitgerand. Lengte 6½—9 mm. Gemeen in boleren in bosschen en weilanden, vooral in de diluviale streken; soms rondvliegende. **1. rufus L.**

Halschild zwart, minder kort, enigszins hartvormig, vooral bij het ♀ naar voren bijna even sterk als naar achteren versmald, voor het midden in de breedte iets ingedrukt. Dekschilden breeder en langer dan bij *rufus*, met twee krachtig bestippelde, verdiepte langsrijen en eenige grove stippels daarbuiten. Kop zwart, bij het ♂ grooter dan bij het ♀. De voorkaken lichter of donkerder roodbruin; de tasters, de sprieten, de dekschilden, behalve eene zwarte vlek aan den buiten-tophoek, benevens de pooten geel. Achterlijf geheel bruinachtig-geel, bij *ab.c. angularis* Gebl. zwart; bij *ab.c. Schönherri* Mannerh. bovendien de dijen zwart. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets uitgerand. Lengte 8½—9½ mm. In bosschen in *Agarici*, vooral in *Agaricus pratensis*. Niet inlandsch. In België bij Arlon; in de Rijnprov. bij Elberfeld. (*maxillosus* F.)

X. Sub-Familie OXYTELINAE.

XXIII. Tribus OXYTELINI.

91. *Bledius* Mannerh.

Lichaam min of meer cilindervormig. Kop met gegroefde wangen, tot opname van het eerste spriettlid. Bovenlip gaafrandig of tweelobbig. Voorkaken, hetzij vrij kort en sterk gekromd, in de rust kruislings over elkaar geplaatst, of wel slank, weinig gekromd, ver vooruitstekend en niet of slechts met de uiteinden gekruist; aan de binnenzijde meestal met 1 of 2 tanden, bij het ♀ van eenige soorten ongetand. Kin groot, meestal weinig breeder dan lang, veelal iets uitgehold, van voren recht afgeknot. Tong vlezig, van voren afgeknot of meer of minder uitgerand of tweelobbig, de paraglossen met de tong vergroeid, onduidelijk. Sprieten van af het tweede lid sterk geknikt. Prothorax, door een kort steekvormig verlengsel van den mesothorax, van de dekschilden verwijderd. Het scutellum beperkt tot den steel van den mesothorax en niet of nauwelijks tusschen de dekschilden ingeschoven. Pooten meer of minder kort, de

¹⁾ Volgens Ganglbauer werd de larve door Heeger beschreven, bij vergissing als die van *maxillosus* geduid, dit moest zijn *rufus*.

voorpooten krachtiger ontwikkeld en tot graven geschikt. Voor- en middelschenen, aan den buitenrand gewoonlijk met twee rijen, zelden slechts met ééne rij krachtige doortjes bezet. Tarsen 3-ledig, het derde lid veel langer dan de twee eerste leedjes tezamen. — De larven van *B. tricornis*, *fracticornis*, *pallipes* en *talpa*, benevens de pop van *tricornis*, zijn door Schiödte, de larve en pop van *atricapillus* door Fauvel beschreven. — De soorten van dit genus leven met hare larven in aantal bijeen, meestal op zandige oevers in zelf gegraven gangen, welke als kleine molsritten en hoopjes gemakkelijk te zien zijn. Velen leven uitsluitend langs zeewater. Op warme avonden zwermen zij veelal rond. Zij verspreiden eene eigenaardige, doordringende lucht. In hare gangen worden zij veel door *Dyschirius* vervolgd.

Van de 50 Europeesche soorten komen 15 in Nederland en 7 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Achterhoeken van het halsschild volkomen afgerond, of bij uitzondering slechts stomp aangeduid. 2
- Achterhoeken van het halsschild, door eene meer of minder fijne uitranding of insnoering voor de basis, duidelijk, gewoonlijk recht of wel stomp door het scherp samenkomen van den zij- en den achterrand. Kop en halsschild bij het ♂ nimmer met verhevenheden of hoornen 16
- 2 De trochantinen der voorcoxae zijn door eene spleetvormige opening tot aan den omgeslagen zijrand van het halsschild zichtbaar (Sub-gen. *Bledius* l.sp.) 3
- De trochantinen der voorcoxae zijn bedekt, zonder spleetvormige opening op de onderzijde van het halsschild (Sub-gen. *Tadunus* Schiödte) 10
- 3 Lichaam $4\frac{1}{2}$ —7 mm. lang. 4
- Lichaam $2\frac{1}{2}$ —4 mm. lang. 7
- 4 Kop aan weerszijden tegen de basis der sprieten met een langen of korten, min of meer verbreedten, verticalen hoorn. 5
- Kop aan weerszijden tegen de basis der sprieten met eene min of meer hockige verhevenheid of wel met een naar voren gericht korten hoorn. 6
- 5 Voorschelen niet sterk verbreed, met weinig gebogen buitenkant. De hoornen op den kop bij het ♂ lang, sikkelvormig. Halsschild bij het ♂ met een aan den top sterk behaarden hoorn, op het midden van den voorrand. Lichaam zwart, tamelijk dof, kop en halsschild duidelijk gechagrineerd. Sprieten en schenen roodachtig, de tarsen geelachtig. Voorhoofd bij het ♂ ingedrukt. Bij het ♀ bevindt zich aan weerszijden van den kop eene scherpkantige korte, bultige verhevenheid. Halsschild breed, met iets stomp aangeduide achterhoeken, bij het ♂ met zeer scherpe voorhoeken en met eene ondiepe middellijn, duidelijk en verspreid bestippeld. Dekschilden langer dan het halsschild, zeer dicht en duidelijk bestippeld. Achterlijf fijn gechagrineerd, de tergiten aan weerszijden verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan weerszijden iets uitgerand, bij het ♀ aan weerszijden sterker uitgerand en in het midden meer vooruitstekend. Bij het type zijn de dekschilden donkerrood, bruin of zwartbruin; bij ab.c. *Skrimshiri* Curt. geel of roodachtig, om het schildje en langs den naad min of meer zwartachtig. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 $\frac{1}{2}$ mm. Langs de zee kust. Niet inlandsch. Dr. O. Schneider vond type en ab. in aantal op het eiland Borkum. (taurus Germ.) (furcatus Oliv.)
- Voorschelen korter en breeder, met sterk gebogen buitenkant. De hoornen op den kop bij het ♂ zijn zeer kort en afgeknut, bij het ♀ heeft de kop twee kantige verhevenheden, welke van voren scheef afgesneden zijn. Halsschild bij het ♂ en ♀ zonder hoorn (*Elbidus* Muls. & Rey). Lichaam zwartbruin, de dekschilden langs de zijden en aan het uiteinde roodachtig, soms geelrood met een meer of minder breedten, bevochten naad-band. Sprieten en pooten geelrood. Schedel uitgehold. Halsschild eenigszins vierhoekig, met iets uitgebogen zijranden en eene ondiepe middengroef. Zeer grof verspreid-, op de dekschilden nog grover en dichter bestippeld. Bij het ♂ zijn de uitstekende voorhoeken van het halsschild stomp; het zevende sterniet iets uitgerand, bij het ♀ daarentegen meer uitstekende en zeer flauw uitgebogen. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 $\frac{1}{2}$ mm. Op ziltige gronden, langs de zee kust, op schorren en aan riviermondingen. Bij Domburg, Zierikzee, Katwijk en ter Neuzen . . . 1. *bicornis* Germ.
- 6 Halsschild onregelmatig-, min of meer verspreid bestippeld, met onbestipelde, bultige plekken. Deze soort gelijk zeer op *tricornis*, doch is krachtiger ontwikkeld. De kop bij het ♂ dieper uitgehold, aan weerszijden slechts met eene hockige verhevenheid; bij het ♀ vertoont de schedel eene diepe dwarsgroef. De hoorn op het halsschild bij het ♂ is langer scherper en dieper gegroefd dan bij *tricornis*, doch niet geheel tot aan het uiteinde. Dekschilden bloedrood, gewoonlijk met eene onduidelijk begrensde, driehoekige, zwarte vlek, soms

om het schildje slechts berookt, grover bestippeld. Pooten donkerder gekleurd. Bij het ♂ is het zevende sterniet tweemaal uitgerand; bij het ♀ scherp driehoekig verlengd. Lengte 6–7 mm. Op zeeklei, onder steenen, wier en afval; ook 's avonds rondvliegende. Op Walcheren en bij Bergen-op-Zoom langs de Schelde. 2. *spectabilis* Kr.

Halsschild dicht en eenigszins rimpelig bestippeld, zonder bultige plekken. Lichaam zwart, de dijen roodbruin, de schenen rood; tarsen en dekschilden, behalve eene driehoekige, scherp begrensde, zwarte naadvlek, lichtrood. Kop bij het ♂ met twee naar voren gerichte, korte hoornen; de schedel uitgehold, bij het ♀ met eene dwarsgroef. Halsschild bij het ♂ met een niet zeer langen hoorn, welke tot aan het uiteinde gegroefd is. Dekschilden minder sterk-, doch een weinig dichter bestippeld dan bij *spectabilis*. Bij het ♂ is het zevende sterniet tweemaal diep uitgerand; bij het ♀ scherp driehoekig verlengd. Lengte $5\frac{1}{2}$ – $6\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch over het algemeen vrij zeldzaam, langs rivieroever, brak- en zeewater, langs zeedijken en plassen. Soms 's avonds rondvliegende 3. *tricornis* Hrbst.

- 7 Voorhoofd-bultjes vrij krachtig aangeduid. Halsschild bij het ♂ in het midden van den voorrand met een langen, dunnen hoorn, vrij grof gehagrineerd. Bovenzijde van het lange, smalle lichaam geheel zwart, dof, de dekschilden en het achterlijf glanziger. Spriet, behalve de lichtere wortel, de dijen en het midden der schenen roodbruin, de rest der pooten geelachtig. Bestippeling vrij sterk, onduidelijk op het halsschild, dichter op de dekschilden, fijner en verspreid op het achterlijf. Bij het ♂ is de kop op den schedel sterk uitgehold en tusschen de sprieten met eene fijne groef. Bij het ♀ is de schedel niet uitgehold, met eene diepe, grove stip in het midden. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan weerszijden iets uitgerand; bij het ♀ in eene scherpe punt verlengd; het zesde sterniet driehoekig ingesneden. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de sprieten, de dekschilden en het uiteinde van het achterlijf soms roodachtig. Lengte $3\frac{1}{2}$ –4 mm. Op duinzand en onder wieren langs het strand; 's avonds soms rondvliegende. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk. De opgave van Leuven in België berust ongetwijfeld op eene vergissing (unicornis Germ.)

Voorhoofd-bultjes zeer klein. Halsschild in beide seksen gewoon (*Blediodes* Muls. & Rey). 8

- 8 Achterlijf niet veel langer dan de dekschilden en naar het uiteinde weinig of niet verbreid. Halsschild met eene zeer fijne middengroef en met iets stompe, nagenoeg afgeronde achterhoeden. Dekschilden langer dan het halsschild. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden roodbruin, over den naad meer of minder breed berookt. Sprietwortel, de voorkaken en de pooten geelachtig. Halsschild fijn gehagrineerd, sterk en verspreid bestippeld. Dekschilden vrij sterk en dicht bestippeld. Bij het iets grootere ♀ is het halsschild iets breeder, aan de zijden meer afgerond en aan de basis meer versmald. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan weerszijden uitgebogen, in 't midden iets-, bij het ♀ sterker uitgetrokken. Lengte $3\frac{1}{2}$ –4 mm. Gemeen langs duinplassen, in vochtige zandkuilen, op slib, langs rivieroever en veelal 's avonds rondvliegende 4. *opacus* Block.

Achterlijf dubbel zoo lang als de dekschilden, naar het uiteinde duidelijk verbreid. Dekschilden even lang als- of iets korter dan het halsschild. 9

- 9 Halsschild met eene fijne middengroef. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden geelrood, om het schildje iets berookt. Sprietwortel en pooten geelachtig. Lichaam in 't midden het smalst. Halsschild dof, gehagrineerd, dicht en vrij sterk bestippeld. Dekschilden naar het uiteinde iets verbreid, verspreid en fijn bestippeld. Achterlijf glanzig. Bij het ♂ is het zevende sterniet tweemaal uitgerand en in 't midden in eene scherpe kiel verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ –2½ mm. Zeer zeldzaam. Eenige malen langs duinplassen bij den Haag, in April en Mei.

(*pygmaeus* Fauv. nec Er.) 5. *pusillus* Er.

Halsschild zonder middengroef, slechts met eene breede, gladde ruimte. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden soms roodachtig. Sprietwortel en pooten geelrood. Halsschild nagenoeg niet gehagrineerd, tamelijk glanzig, verspreid en tamelijk grof bestippeld. Dekschilden met parallelle zijden, zeer duidelijk bestippeld. Bij het ♂ is het halsschild aan de basis meer ingesnoerd, het zevende sterniet tweemaal uitgerand en in het midden zeer scherphoekig-, bij het ♀ weinig verlengd. Lengte 2½ mm. Langs stroomend water, vooral in bergstreken. Niet inf. In Duitschland en Frankrijk.

(*agricultor* Heer, *pusillus* Fauv.) (*pygmaeus* Er.)

- 10 Halsschild met eene duidelijke middengroef 11

Halsschild zonder middengroef, slechts met eene, soms iets verheven, onbestipelde middellijn. 14

- 11 Dekschilden even lang als het halsschild. Halsschild en dekschilden vrij grof bestippeld. Bovenzijde zwartbruin. Sprieten bruin met geelachtigen wortel. Kop en halsschild zeer dof. Halsschild vrij grof gehagrineerd. Dekschilden roodbruin, op het midden min of meer roodachtig. Bij het ♂ is het zesde sterniet iets uitgerand. Lengte $3\frac{1}{2}$ –3½ mm. Langs oevers. Niet inf. In West-Duitschland. (*procerulus* Er.)

Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild 12

- 12 Halsschild zeer grof bestippeld. 13
- Halsschild tamelijk fijn en niet zeer dicht bestippeld. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ tot $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Deze soort is verwant aan *opacus*, doch kleiner en smaller. Lichaam zwartbruin, het halsschild bruin. Sprietten roodachtig, de wortel, benevens de dekschilden en de pooten geel. Dekschilden over den naad meer of minder breed gebruint, veelal iets berookt, soms breed zwart. Kop niet bestippeld. Halsschild smaller en langer, met tamelijk regelmatig naar de basis gebogen zijden en fijne middengroef. Dekschilden fijner en dichter bestippeld. Bij het ♂ is de achterrand van het zevende sterniet minder uitgetrokken dan bij het ♀. Lengte 3—3½ mm. Eenmaal langs de Maas bij Maastricht in Juni. Volgens *Fauvel* zou zij ook voorkomen in afzanderijen, onder steenen, in de duinen en langs zout water. Ook in België bij Brussel en Fleurus . . . (nanus Er.) 1) 7. *atricapillus* Germ.
- 13 Sprietwortel rood, de pooten geheel roodachtig. Halsschild zeer fijn gechagrineerd, tamelijk glanzig, met vrij diepe stippels en eene diepe langsgroef. Dekschilden pekwart, of roodbruin en donkerder over den naad. Lichaam pekwart, behalve de kop, tamelijk glanzig. De kop zeer fijn-, het halsschild grof en dicht-, de dekschilden iets fijner en dichter-, het achterlijf zeer verspreid en fijn bestippeld. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan het uiteinde, aan weerszijden iets uitgerand. Lengte 3½—4 mm. Verbreid; op slib van rivier-oevers, klei van steenbakkerijen, in afzanderijen der duinen en soms 's avonds rondvliegende. 6. *fracticornis* Payk.
- Sprietten geheel zwart, de pooten geelachtig-roodbruin, de dijen donker. Halsschild tamelijk grof, doch minder diep bestippeld. Dekschilden pekwart of donker roodbruin. Deze soort is zeer verwant aan *fracticornis*, doch iets kleiner en smaller. Kop nagenoeg onbestippeld, de dekschilden dichter bestippeld. Halsschild minder afgerond, bijna even breed als lang. Bij het ♂ is het zesde sterniet uitgerand, welke uitranding aan weerszijden in een klein tandje eindigt. Lengte 3½ mm. Langs slooten, op zand en slib. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld; ook in Westfalen (femoralis Gylh.)
- Sprietten geheel geelachtig. Halsschild dof, naar de basis iets uitgerand en ingesnoerd. Habitus en kleur van *femoralis*, doch kleiner. Zwart, tamelijk glanzig, de kop dof. Pooten roodgeel, de dijen gebruint. Dekschilden pekbruin. De kop oppervlakkig-, het halsschild vrij krachtig en dicht-, de dekschilden iets fijner en veel dichter bestippeld. Halsschild gechagrineerd, iets breeder dan lang, met eene zeer fijne middengroef. Dekschilden iets langer dan het halsschild, naar het uiteinde een weinig verbreed. Achterlijf naar het uiteinde verbreed, glad. Bij het ♂ is het zevende sterniet tweemaal uitgebogen en in het midden scherphoekig verlengd, bij het ♀ stomp. Lengte 3—3½ mm. Niet inl. In de Belgische prov. Henegouwen. (defensus Fauvel)
- 14 Halsschild tusschen de stippels glad en glanzig, of, bij zeer sterke vergrooting gezien, onduidelijk gechagrineerd. 15
- Halsschild tusschen de dichte, grove bestippeling duidelijk gechagrineerd. Deze soort komt overigens in habitus en kleur veel overeen met *crassicolis* en *cribricollis*. Zij is zeer veranderlijk in grootte, dichter en ruwer behaard, zwart, tamelijk glanzig. De sprietten, de pooten, de voorcoxae en de dekschilden roodachtig; eene driehoekige zwartachtige vlek om het schildje, welke zich veelal over den naad breed uitbreidt. Sprietten dunner dan bij *crassicolis*. Soms zijn de dekschilden bijna geheel zwart (*ab. c. nigricans* Er.). Dekschilden breeder en langer dan het halsschild, dichter en iets minder grof-, het achterlijf fijn en onduidelijk bestippeld. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed uitgerand, welke uitranding aan weerszijden in een min of meer lang, opwaarts en naar binnen gericht doortje eindigt. Lengte 3½—3¾ mm. Op zandige oevers, op klei der steenbakkerijen en langs vaarten en poelen. Zeer zeldzaam. Arnhem, Ellicom en Roermond 10. *dissimilis* Er.
- 15 Halsschild tamelijk grof en vrij dicht bestippeld, bij zeer sterke vergrooting gezien onduidelijk gechagrineerd. Dekschilden weinig of niet langer dan het halsschild. Deze soort herinnert aan *longulus*. Zwart, tamelijk glanzig, vrij dicht en lang behaard. Dekschilden rood, om het schildje iets bruinachtig. Sprietten, pooten en het uiteinde van het achterlijf roodgeel. Dekschilden nagenoeg even sterk en dicht als het halsschild-, het achterlijf fijn en onduidelijk bestippeld en naar het uiteinde verbreed. Bij het ♂ is het zesde sterniet uitgerand, welke uitranding aan weerszijden in een tandje eindigt. Lengte 3½—3¾ mm. Langs vaarten, plassen en rivieren. Zeer zeldzaam. Rotterdam, Karwijk, Scheveningen en Nijkerk. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 8. *crassicolis* Boisd. & Lac.

1) Volgens *Ganglbauer* is *nanus* Er. een goede soort, onderscheiden door geringer grootte en kortere, meer gewelfde, sterker en minder dicht bestippelde dekschilden, welke aan den naad gewoonlijk meer uitgebreid zwartachtig zijn. Volgens *Fauvel* is zij slechts een vorm van *atricapillus*. De Nederlandsche exemplaren die ik zag zijn niet groot, doch met overgangen in kleur; zij wyken m. i. weinig af, zoowel van de *atricapillus* Germ. als van de *nanus* Er.-exemplaren, door *Ganglbauer* aan mij ter bezichtiging gezonden.

- Halsschild zeer grof en verspreid bestippeld, volkomen glad en glanzig. Dekschilden langer dan het halsschild. Beharing verspreid en niet lang. Glanzig zwart, de dekschilden rood, om het schildje beroekt. Sprieten en pooten geelachtig, de sprieten soms naar het uiteinde iets donkerder. Dekschilden grof en vrij dicht bestippeld. Achterlijf fijn en onduidelijk bestippeld, naar het uiteinde minder verbreed. Sexueel onderscheid als bij *crassicolis*. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Op oeverzand, slib, vooral in den zonneshijn; soms op waterplanten. Zeer zeldzaam. Wageningen, Roermond en Houthem. In België bij Luik; in de Rijnprov. bij Aken; ook op Norderney (rufipennis Er.) 9. **cribricollis** Heer.
- 16 Trochantinen der voorcoxae door eene spleet, tot aan den omgeslagen zijrand van het halsschild zichtbaar. Achterhoeken van het halsschild stomp of recht, doch altijd duidelijk (Sub-gen. *Bargus* Schödté) 17
- Trochantinen der voorcoxae niet zichtbaar, geene spleetvormige opening op de onderzijde van het halsschild; deze is in een enkel geval door een verheven naad aangeduid. Achterhoeken van het halsschild recht, de zijden daarvoor plotseling sterk ingesnoerd en eenigszins hoekig uitgebogen. Halsschild veel breder dan lang, met een fijne middengroef 20
- 17 Halsschild zonder middengroef, gechagrineerd en onduidelijk verspreid bestippeld, dof. Dekschilden roodachtig, met donkere basis en naad. Deze soort gelijkt overigens veel op *cribricollis*. Zwart; de sprieten, pooten en het uiteinde van het achterlijf roodgeel; het halsschild donkerbruin, soms langs de randen roodachtig. Halsschild breed, eenigszins hartvormig, met parallelle zijden, naar achteren sterk uitgerand en met nagenoeg rechte achterhoeken, met eene onbestippelde middenruimte. Dekschilden eenigszins glanzig, iets langer dan het halsschild, tamelijk fijn en niet dicht bestippeld. Achterlijf glad en glanzig. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan weerszijden slechts iets uitgerand. Lengte $3\frac{1}{3}$ mm. Op fijn zand langs rivier- en beekoevers, vooral in bergstreken. Bij Aalbeek (Zuid-Limburg). In de Rijn-prov. bij Crefeld en Elberfeld 11. **erraticus** Er.
- Halsschild met eene fijne middengroef 18
- 18 De zijden van het halsschild vóór de achterhoeken niet uitgebogen, doch door het scherp samenkomen van den zij- en achterrand zijn de achterhoeken stomp 19
- De zijden van het halsschild vóór de basis eenigszins uitgebogen, waardoor de achterhoeken nagenoeg recht zijn. Halsschild duidelijk gechagrineerd, vrij dof, tamelijk fijn en verspreid bestippeld. Dekschilden langer dan het halsschild, vrij grof bestippeld, glanzig. Bovenzijde zwart. Deze soort is gewoonlijk iets kleiner, smaller en meer gewelfd dan *subterraneus*. Sprieten naar het uiteinde meer verdikt en evenals de pooten roodgeel; het midden der sprieten en de coxae donkerder. Halsschild iets langer en smaller, met minder afgeronde zijden en scherper aangeduide achterhoeken. Dekschilden korter dan bij *subterraneus*, krachtiger, doch minder dicht bestippeld, iets langer- en meer geelachtig behaard. Bij het ♀ is het halsschild korter, breder en de basis iets minder uitgebogen. Bij het ♂ is het zevende sterniet nauwelijks-, bij het ♀ duidelijk uitgetrokken. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Langs rivieren en duinplassen op zand en slib, vooral bij felle zonneshijn; langs de zeekust en op leemgrond, ook op de klei van steenbakkerijen. In groot aantal bij den Haag; ook bij Houthem. 14. **pallipes** Grav.
- 19 Halsschild grof gechagrineerd, dof, met ondiepe niet zeer duidelijke stippels bezet, de zijden naar de basis versmald, met duidelijke stompe-, bij het ♂ meer rechte achterhoeken en met eene zeer fijne langsgroef. Dekschilden veel langer dan het halsschild. Lichaam geheel zwart, eenigszins glanzig. Sprieten bruin, de wortel benevens de pooten geelrood, de dijen en de coxae donkerder. Dekschilden zeer kort en dicht grijs behaard, dicht en tamelijk fijn bestippeld. Bij het ♀ is het halsschild iets breder en zijn de achterhoeken iets minder duidelijk. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan weerszijden nauwelijks merkbaar uitgerand. Van *pallipes* onderscheiden door de vooruitstekende voorkaken, de tweelobbighe bovenlip en de veel langere, fijner en dichter bestippelde dekschilden. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Langs rivieren en duinplassen, op zand. Verbreed en op sommige plaatsen niet zeldzaam 12. **subterraneus** Er.
- Halsschild zeer fijn en onduidelijk gechagrineerd, tamelijk glanzig, vrij dicht, grof en diep bestippeld. Dekschilden slechts iets langer dan het halsschild. Lichaam glanzig zwart, de sprieten en de pooten roodgeel, de dekschilden rood, aan den naad en om het schildje iets beroekt. Dekschilden vrij sterk en dicht-, het achterlijf zeer onduidelijk bestippeld. Sprieten geleidelijk verdikt, in het midden iets donker. Halsschild met duidelijke, doch stompe achterhoeken en met eene zeer duidelijke langsgroef. Dekschilden naar het uiteinde iets-, zoo ook het achterlijf voor het uiteinde verbreed. Bij het ♂ is het halsschild aan de basis meer versmald; het zevende sterniet in 't midden zwak-, bij het ♀ meer scherp driehoekig verlengd. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Op zand langs rivieren, duinplassen en vijvers in bosschen. Vrij zeldzaam. Den Haag, Velzen, Rotterdam, Wassenaar, Utrecht, Groningen, Bergen-op-Zoom, Roermond, Breda, Arnhem 13. **longulus** Er.

20 Bovenlip diep gespleten. De spleetvormige opening op de onderzijde van het halsschild, naast de voorcoxae, slechts door een verheven naad aangeduid. Achterschenen behaard (Sub-gen. *Astycops* Thoms.). Lichaam zwart, de dekschilden zwartachtig-blauw. Halsschild duidelijk hartvormig, uiterst fijn gechagrineerd, dof, zeer fijn en onduidelijk bestippeld, met zeer fijne middengroef. Dekschilden krachtig en vrij dicht bestippeld, glanzig, breder en langer dan het halsschild en vrij lang verspreid grijs behaard. Achterlijf zeer verspreid bestippeld, glanzig. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan het uiteinde aan weerszijden zwak uitgerand. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Deze soort verspreidt, bij aanraking, eene eigenaardige lucht van juicht-leder. Zij leeft op zandige oevers van rivieren en beken; hare gangen reiken gewoonlijk niet tot aan de oppervlakte; door het trillen van den bodem komen zij te voorschijn. Niet inlandsch. In België bij Mons. (talpa Gyll.)

Bovenlip recht afgesneden. De spleetvormige opening op de onderzijde van het halsschild naast de voorcoxae, is niet aangeduid. Achterschenen met eenige doornpjes bezet (Sub-gen. *Hesperophilus* Thoms.). Halsschild zeer kort vierhoekig, aan de basis fijn ingesnoerd, fijn gechagrineerd en bestippeld, weinig glanzig. Dekschilden fijner en dichter bestippeld, veel langer dan het halsschild. Lichaam zwart, iets glanzig; de dekschilden geel, met meer of minder breeden, zwarten naad en zwarte basis; bij uitzondering zijn de dekschilden grootendeels zwart en slechts aan het uiteinde en gedeeltelijk langs de zijden geel gezoomd. Sprietten grootendeels en de schenen roodachtig, de dijen zwartbruin. Tarsen geel. De sprietten zeer kort. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Gemeen langs de stranden, aan duinplassen, op vochtig zand en in vochtige zandkuiltjes op de duinen, waar zij in gezelschap van enkele *Dyschirius*-soorten hare gangen graaft. Ook bij Nijkerk en een paar maal langs de Maas bij Maastricht. Eene donkere aberratie werd bij Middelburg aangetroffen 15. *arenarius* Payk.

92. *Platystethus* Mannerh.

Kop vooral bij het ♂ groot, met matig groote of tamelijk kleine oogen, de clypeus bij de mannetjes van sommige soorten, met doornachtige voorhoeken. Bovenlip aan den afgeknotten of breed uitgeranden voorrand bewimperd en met een vliezig, tweelobbig, aan den binnenrand dicht gedoorn of bewimperd aanhangsel. Voorkaken eenigszins ongelijk, aan den binnenrand, achter het uiteinde, met 2 of 3 tanden. Kin meer dan dubbel zoo breed als lang, breed uitgerand; de tong breed uitgerand, met divergeerende, eenigszins toegesplitste zijhoeken. De paraglossen steken iets over de zijhoeken van de tong uit. Liptasters klein. Sprietten na het eerste lid geknikt. Halsschild groot, iets van de dekschilden afstaande, met eene in den regel diepe, soms slechts zwak aangeduide middellijn. Schildje groot. Dekschilden met breed afgeronde naadhoeken en daardoor aan het uiteinde eenigszins divergeerend. Prothorax zonder epimeren, met onbedekte stigmata. Middelfcoxae van elkaar verwijderd. Pooten vrij kort, de voor- en middel-schenen aan de buitenszijde gedoorn. Tarsen 3-ledig, het derde lid $1\frac{1}{2}$ tot 2-maal zoo lang als de eerste twee ledjes te zamen. — De larve en pop van *P. arenarius* zijn door Bouché en Schiodte, die van *cornutus* en *spinosus* door Xamheu beschreven. — De soorten van dit genus leven in mest en onder rottende plantenstoffen en zwermen, vooral tegen den avond, over mesthoopen.

Van de 14 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Kop tegen den binnenrand der oogen met eene langsplooi, welke zich achterwaarts over de slapen voortzet; bovendien aan de binnenzijde daarvan een meer of minder ontwikkeld, maar duidelijk langsgroefje (Sub-gen. *Platystethus* isp.) 2

Kop zonder deze langsplooi en zonder het langsgroefje aan de binnenzijde nabij de oogen (Sub-gen. *Pyctoeraerus* Thoms.). Lichaam glanzig zwart, de dekschilden soms roodbruin. Pooten geelrood, de dijen gewoonlijk donkerder. Voorlijf krachtig en verspreid bestippeld en daartusschen met fijne langstreepjes. Achterlijf zeer fijn gechagrineerd. Voorhoofd ingedrukt, dof, de schedel met eene diepe middengroef en daarachter met eene diepe, meer of minder hoekige, dwarsgroef. Halsschild met eene diepe middengroef. Bij het ♂ is de kop veel breder dan bij het ♀, het voorhoofd uitgerand en met een kleinen middenrand; het zevende sterniet is diep driehoekig ingesneden en van twee fijne doornpjes voorzien; bij het ♀ steekt dit sterniet in het midden iets uit. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Gemeen onder rottende plantenstoffen, dorre bladeren, steenen, drogen mest, op klei en 'savonds rondvliegende. (morsitans Payk.) 4. *arenarius* Fourcr.

- 2 Voorlijf fijn gechagrineerd, iets glanzig, fijn en verspreid-, op den kop iets dichter bestippeld. Voorhoofd gewelfd, bij het ♂ met twee lange, naar voren gerichte doortjes aan den voorrand. De schedel met eene dwarslijn en een middengroefje. Deze soort heeft den habitus van *arenarius*, doch is meer gewelfd, zwart met zeer geringen bronskleurigen weerschijn; de dekschilden naar den binnen-tophoek of wel iets meer uitgebreid geelachtig. Bij het meer doffe, vooral op de dekschilden sterker gechagrineerde, ras *alutaceus* Thoms. (*tristis* Rey) zijn de dekschilden geheel zwart; de kop en het halsschild iets meer bronzig. Halsschild met eene diepe middellijn. Dekschilden iets korter dan het halsschild. Pooten roodachtig, de dijen en het midden der schenen donkerder; soms de pooten, behalve de tarsen, geheel zwart. Bij het ♂ is de kop breder; het zesde sterniet iets uitgerand; het zevende in het midden breed ingedrukt en aan het uiteinde afgeknot, bij het ♀ eenigszins driehoekig verlengd. Lengte 2½—3½ mm. Gemeen, langs oevers onder plantenaafval, op slib, onder steenen en drogen koemest. Het ras *alutaceus* 1) zeldzaam. 1. *cornutus* Grav.

Voorlijf tusschen de bestippeling niet gechagrineerd, glanzig 3

- 3 Halsschild en dekschilden zeer grof en meer of minder dicht bestippeld 4

Halsschild en dekschilden fijn en verspreid bestippeld. 5

- 4 De zeer grove stippels van het halsschild vloeien aan de zijden rimpelig ineen. Kop bij het ♂ even breed als-, bij het ♀ smaller dan het halsschild. Lichaam geheel zwart, verspreid behaard, de dekschilden soms roodbruinachtig. Voorhoofd onbestippeld; het achterlijf eenigszins uitgehold, nagenoeg onbestippeld. Pooten bruin, de knieën en tarsen geel; zelden grootendeels roodachtig. Sprietten lang en krachtig ontwikkeld. De schedel met eene dwars- en langsgroef. Halsschild met eene zeer diepe langsgroef. Schildje verdiept. Bij het ♂ zijn de sprietten langer; het zevende sterniet vertoont eene rondachtige middengroef, welke aan weerszijden van een klein doortje voorzien is, bij het ♀ afgerond. Lengte 2½—2¾ mm. Langs rivier- en beekoevers, waar zij, evenals de *Bledius*-soorten, kleine gangen graaft; ook in vochtige zandgroeven. Eemnaal bij Valkenburg langs de Geul, Juli. Ook in België en in de Rijnprov. bij Crefeld. 2. *capito* Heer.

De stippels van het halsschild vloeien nergens ineen. Kop bij het ♂ breder dan-, bij het ♀ even breed als het halsschild. Lichaam geheel zwart, de dekschilden soms bruin. Deze soort is korter en breder dan *capito*, onduidelijk behaard. De indrukken op den schedel minder duidelijk. Halsschild korter en breder. Achterlijf fijn gechagrineerd. De bestippeling op het voorlijf iets minder grof en meer verspreid. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan het uiteinde van twee kielvormige verhevenheden voorzien, bij het ♀ eenigszins driehoekig verlengd. Lengte 2½ mm. Niet inl. In Oldenburg en in de Rijnprov. bij Crefeld.

(*nodifrons* Sahlb.)

- 5 Lichaam 3½ mm. lang. De grootste soort van het genus; platgedrukt, zwart, sterk glanzig. Dekschilden en pooten bruinachtig of roodbruin, de knieën en tarsen lichter. De schedel met eene hoekige dwarsgroef en een langsgroefje in 't midden. Halsschild met eene scherp aangeduide middengroef. Bij het ♂ is de kop breder, het voorhoofd met twee tandjes; het zevende sterniet afgeknot, met twee tandjes aan het uiteinde; bij het ♀ eenigszins driehoekig uitstekende. In plantenaafval, onder drogen mest en op slib langs oevers. Niet inl. Deze soort is in België bij Grammont gevangen; ik zag een exemplaar uit het Brusselsch Museum (*spinus* Er.)

Lichaam 1½—2½ mm. lang. Deze soort heeft den habitus van *capito*, doch is zeer sterk platgedrukt en vooral onderscheiden door de kenmerken van het ♂. Lichaam als *spinus* gekleurd. Kop naar verhouding langer dan bij de aanverwante soorten, bij het ♂ breder dan het halsschild en met twee evenwijdige langsstreepjes naast de langsplooi, tegen den binnenrand der oogen; de hoekige dwarslijn op den schedel eindigt aan weerszijden in eene diepe stippel; bij het ♀ is de kop smaller en ontbreken de twee bijkomende langsstreepjes achter de oogen. Halsschild met eene vrij diepe langsgroef. Bij het ♂ is het zevende sterniet in de lengte ingedrukt, welke indruk, aan weerszijden in 't midden, twee kleine tandjes vertoont; bij het ♀ is dit sterniet eenigszins driehoekig verlengd. Langs slooten en vaarten, onder dood riet, dorre bladeren en steenen; soms op lage planten. Eenmaal in aantal bij den Haag, April en Mei; ook bij Katwijk, Amsterdam, Breda en Vlissingen. 3. *nitens* Sahlb.

93. *Oxytelus* Grav.

Kop groot, van achteren ingesnoerd. Bovenlip aan den uitgebogen voorrand met een tweelobbig, vliezig, aanhangsel. Sprietten na het eerste lid iets geknikt. Halsschild

1) Volgens Ganglbauer een goede soort

met drie, soms oppervlakkig aangeduide middengroeven. Schildje klein. Dekschilden met rechte naadhoeken, tot aan het uiteinde tegen elkaar aansluitend. Prothorax met goed ontwikkelde, de stigmata bedekkende epimeren. Middelcoxae van elkaar verwijderd. Pooten vrij kort en krachtig, de voor- en middelschenen aan den buitenrand gedoord. Tarsen 3-ledig, het derde lid veel langer dan de twee eerste leedjes te zamen. — De larve van *O. sculptus* is door Chapuis & Candèze, die van *piccus* en *complanatus* door Rey, die van *sculpturatus* door Curtis en Rey en die van *tetracarínatus* door Waltl beschreven. — De soorten van dit genus leven in mest, onder rottende plantenstoffen en dierlijke overblijfselen. — De larven kunnen zich, evenals die van *Platystethus*, met den anus aan gladde voorwerpen vasthechten.

Van de 28 Europeesche soorten komen 12 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild met duidelijk gekartelden zijrand; in een enkel geval is de zijrand minder duidelijk gekarteld (*Fulvipes*) (Sub-gen. *Oxytelus* i.sp.) 2
- Halsschild met volkomen gaven zijrand. 4
- 2 Het eindlid der achtertarsen veel langer dan de overige leedjes te zamen. Halsschild met afgeronde, duidelijk gekartelde zijranden. Dekschilden grof en dicht bestippeld, langs de zijden met langsrimpels. 3
- Het eindlid der achtertarsen weinig of niet langer dan de overige leedjes te zamen. Halsschild met naar achteren een weinig uitgebogen zijranden, welke, in eene bepaalde richting gezien, zeer fijn, doch nog duidelijk gekarteld zijn; met 3 diepe middengroeven en gladde tusschenruimten. Dekschilden grof bestippeld, doch zonder langsrimpels langs de zijden. Oogen klein. Voorhoofd van voren iets neergedrukt, glanzig. Deze soort heeft het voorkomen van een kleinen *rugosus*, doch is glanziger en krachtiger, op kop en halsschild verspreid bestippeld. Pekzwart of pekbruin, de dekschilden iets lichter, de spriewortel en de pooten roodgeel. Dekschilden hier en daar, meer naar het midden een weinig rimpelig bestippeld. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan het uiteinde tweemaal uitgebogen, de middenlob langer en aan den top uitgerand; bij het ♀ is het zevende sterniet afgerond. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. In koemest en onder dorre bladeren, vooral in bosschen en weilanden. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld (*Fulvipes* Er.)
- 3 Voorhoofd van voren in het midden ingedrukt, dof en fijn gechagrineerd, van achteren glanzig en aan de zijden langsrimpelig. Lichaam zwart, niet bijzonder glanzig; de spriewortel, de tasters, de randen der laatste twee achterlijfsringen en de pooten rood; grof, dicht en rimpelig, op het halsschild iets krachtiger dan op de dekschilden, bestippeld. Achterlijf zeer dof, fijn gechagrineerd. Halsschild met 3 ondiepe langsgroeven. Dekschilden oneffen. Bij het ♂ is de kop groot en breed; het vijfde sterniet met een bultje aan het uiteinde; het zesde met 3 tandjes; het zevende tweemaal uitgerand, de middenlob driehoekig en langer dan de zijlobben. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn halsschild en dekschilden, of wel het geheele lichaam bruin, roodbruin of roodachtig (*Pulcher* Grav.). Lengte 4—5 mm. Zeer gemeen onder rottende plantenstoffen, als paddestoelen, koolstronken enz., dorre bladeren, mos, steenen en mest; soms 's avonds rondvliegende 1. *rugosus* F.
- Voorhoofd van voren niet verdiept en niet gechagrineerd, overal glanzig en verspreid bestippeld. Deze soort gelijkt overigens op kleine exemplaren van *rugosus*. Lichaam zwart, de sprieten en het halsschild lichter of donkerder roodbruin, de dekschilden, behalve om het schildje lichtrood, de pooten geelrood. Achterlijf minder dof. Bij sommige exemplaren is het halsschild ook lichtrood. Bij het ♂ is de kop groot en breed; het zesde sterniet vertoont een klein oppervlakkig bultje aan het uiteinde; het zevende is tweemaal diep uitgerand, de middenlob iets korter dan de zijlobben; bij het ♀ is de kop veel kleiner en het zevende sterniet in het midden eenigszins driehoekig verlengd. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder steenen, plantenafval, dorre bladeren, drogen mest en afgevallen stukken boomsehors, soms bij mieren; vooral op kleigrond. Amsterdam, Rotterdam, Kolhorn (N.-Holl.), den Haag, Loosduinen, Utrecht, Arnhem en Valkenburg; ook op vele plaatsen in de Rijnprov. en in België 2. *insecatus* Grav.
- 4 Kop tot aan de oogen in het halsschild terugtrekbaar, de slapen zeer weinig ontwikkeld; bij het ♂ van *piccus* zijn de slapen vrij lang, doch de groote oogen, evenals bij het ♀, grof gefacetteerd (Sub-gen. *Caccoporus* Thoms.) 5
- Kop met vrij lange slapen, niet tot aan de oogen in het halsschild terugtrekbaar, de oogen fijn gefacetteerd (Sub-gen. *Anotylus* Thoms.) 6
- 5 Voorhoofd met eenigszins opgericht voorrand, van voren tamelijk glanzig. Schedel met niet ineenvloeiende stippels en bij het ♀ met eene zwak aangeduide-, bij het ♂ duidelijke

langsgroef. Lichaam zwart, tamelijk glanzig; de eerste 4 spritleeftjes, de zijranden van het voorhoofd, de dekschilden behalve om het schildje en over den naad, alsook de pooten geelachtig; soms is het halsschild bruin. Kop en halsschild vrij sterk-, de dekschilden fijner en dichter-, vooral langs de zijden rimpelig bestippeld. Halsschild met 3 niet zeer diepe langsgroeven. De dekschilden aan de zijden met eene langsgroef, welke naar buiten door eene langsplooi begrensd wordt. Achterlijf fijn gechagrineerd. Bij het ♂ is de kop nagenoeg even breed als-, bij het ♀ iets smaller dan het halsschild, bij het ♂ op den schedel met eene sterk hoekig opgebogen-, bij het ♀ nagenoeg rechte, sterk verdiepte dwarslijn, welke de afscheiding tusschen kop en hals vormt. Bij het ♂ zijn de oogen zeer grof gefacetteerd, de slapen vrij lang; het zesde sterniet is tweemaal uitgerand, de middenlob langer dan de zijlobben, afgeknot; het zevende sterniet tweemaal ingesneden, met spitse zijlobben, de middenlob korter en drietandig; bij het ♀ is het zevende sterniet tweemaal uitgerand, de middenlob breed driehoekig. Lengte 4—4½ mm. Onder paardenmest, plantenafval, rottende paddestoelen en veelal 's avonds rondvliegende. Vrij zeldzaam. Den Haag, Warnsveld, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. 3. *piecus* L.

Voorhoofd met vlakken voorrand, van voren tamelijk dof. Schedel met eene diepe langsgroef en aan de zijden met tot rimpels ineenvloeiende stippels. Deze soort heeft het voorkomen van *piecus*, doch is minder glanzig. De kop is in beide seksen klein en driehoekig. Lichaam pekzwart, het midden van halsschild en dekschilden en soms ook van het achterlijf meer roodbruinachtig. Sprietwortel rood-, de pooten geelachtig. De bestippling is veel fijner, vooral op de dekschilden als lijne, dichtstaande langsstreepjes. Sprieten krachtiger ontwikkeld, de leedjes van af het vierde grooter. Halsschild met niet zeer diepe langsgroeven. De dekschilden door eene langsplooi van de omgebogen zijden gescheiden. Bij het ♂ is het zevende sterniet tweemaal diep ingesneden, de middenlob gelijk aan de zijlobben en aan den top uitgerand; bij het ♀ tweemaal een weinig uitgerand (*Epomotylus* Thoms.). Lengte 3½—4 mm. Verbreid, doch niet algemeen onder steenen, plantenafval en 's avonds rondvliegende 4. *sculptus* Grav.

6 Halsschild min of meer glanzig, met 3 langsgroeven in het midden. Sprieten naar het uiteinde sterk verdikt 7

Halsschild dof, hoogstens de tusschenruimten der langsgroeven eenigszins glanzig. Kop geheel dof, bij uitzondering met eene kleine, glanzige plek 11

7 De stippels van het halsschild zijn rond. Kop glanzig, verspreid bestippeld. Voorhoofd door een verheven rand van de oogen afgescheiden. Sprieten minstens aan den wortel roodachtig. 8

De stippels van het halsschild zijn langwerpig en vloeien grootendeels tot langsrimpels ineen. De langsgroeven staan vrij dicht tegen elkaar. Sprieten geheel zwart 9

8 De 3 langsgroeven van het halsschild zijn zeer duidelijk en staan ver uiteen, de tusschenruimten zijn veel breeder dan de groeven. Schedel met 3 langsgroefjes. Sprieten zwart, de eerste leedjes roodachtig. Habitus en kleur van *piecus*, doch glanziger, met veel kleinere, fijner gefacetteerde oogen, meer verdikte sprieten en met meer afgeronde, in het midden eenigszins hoekige zijden van het halsschild. De dekschilden aan de zijden met eene oppervlakkige langsgroef. Bij het ♂ is de kop zeer groot, de voorrand van het voorhoofd eindigt in twee tandjes; het zesde sterniet aan het uiteinde met twee bultjes; het zevende tweemaal uitgerand, de middenlob puntig. Bij het ♀ is de kop klein, driehoekig; het zevende sterniet tweemaal uitgerand, de middenlob afgerond en nagenoeg aan de anderen gelijk (*Tanycrærus* Thoms.). Lengte 4—4½ mm. Niet zeldzaam in aanspoelsel, onder dorre bladeren, drogen koemest en aas (*luteipennis* Er.) 5. *laqueatus* Mrsh.

Slechts de middengroef van het halsschild is duidelijk, de twee andere groeven zijn meer oppervlakkig. Schedel met kleine groefjes. Sprieten geheel roodachtig. Lichaam zwart of bruinzwart. Soms is het halsschild bruin en zijn de dekschilden rood- of geelachtig. Pooten rood, de dijen in het midden bruin. Deze soort is naverwant aan *inustus*, doch meer behaard en grover en meer verspreid bestippeld. Voorhoofd met twee indrukken. Achterlijf fijn bestippeld. Bij het ♂ is de kop breed; het zesde sterniet in het midden met twee bultjes; het zevende sterk uitgerand en met diep uitgebogen zijden; bij het ♀ is de kop kleiner en het halsschild aan de zijden, naar de basis, minder uitgerand. Lengte 3—3½ mm. Niet zeldzaam langs de stranden onder aanspoelsel, doode visch en in eierklompen van *Buccinum*.

(*maritimus* Thoms.) 6. *Perrisi* Fauv.

9 Kop zonder indrukken, gewelfd, fijn verspreid bestippeld, sterk glanzig. Voorhoofd zonder verheven rand naast de oogen. De tusschenruimten der ondiepe langsgroeven op het midden van het halsschild vlak. Lichaam glanzig zwart; soms is het halsschild bruin en zijn de dekschilden min of meer roodbruin. Pooten roodgeel of geel, de dijen bruin. De bestippling op het halsschild is dichter dan op den kop en rimpelig, op de dekschilden vrij sterk en dicht langsrimpelig. Halsschild met diepe zij-indrukken. Bij het ♂ is de kop groot en breed; het zesde sterniet met twee bultjes, het zevende breed en diep uitgerand. Bij het ♀ is de kop zeer klein; het zevende sterniet aan het uiteinde driehoekig en aan weers-

zijden iets uitgerand. Lengte 3—3½ mm. Zeer gemeen in mest, aas en rottende plantenstoffen; ook veelal rondvliegende. 7. *inustus* Grav.

Kop met een langsdruk op den schedel. Voorhoofd naast de oogen met een verheven rand. Tusschenruimten der langsgroeven van het halsschild meer kielvormig verheven. Halsschild sterk langsrimpelig 10

- 10 Voorhoofd van voren vlak en breed ingedrukt, dof en lijn gechagrineerd. Lichaam zwart, weinig glanzig. De sprieten naar het uiteinde bijzonder sterk verbreed. De bestippeling is fijn en dicht en vooral op de dekschilden zeer dicht rimpelig. Halsschild met minder diepe zij-indrukken dan bij *inustus*. Bij sommige exemplaren is het midden der dekschilden bruin of roodbruin. Bij het ♂ is de kop breeder; het zesde sterniet met twee bultjes, het zevende diep uitgerand; bij het ♀ het zevende sterniet als bij *inustus*. Lengte 3—4 mm. Zeer gemeen in aas, koemest, aanspoelsel, rottende paddestoelen en tusschen dorre bladeren; ook veelal rondvliegende. 8. *sculpturatus* Grav.

Voorhoofd met een dwarsindruk tusschen de oogen, daarvoor in het midden bultig gewelfd, geheel glanzig; op den schedel met een kort groefje. Lichaam glanzig zwart, de dekschilden op het midden veelal bruinachtig of geelbruin. Pooten roodgeel, de dijen donkerder. Halsschild en dekschilden dicht langsrimpelig bestippeld. Halsschild met 3 vrij diepe langsgroeven in het midden en met ondiepe zij-indrukken. Bij het ♂ is de kop iets groter en breeder; het zevende sterniet breed uitgerand. Lengte 2—2½ mm. Vrij gemeen in aas, mest, rottende plantenstoffen en langs de zeekust onder zeewier 9. *nitidulus* Grav.

- 11 Voorhoofd tegen den binnenrand der oogen duidelijk kielvormig verheven. Halsschild, behalve op de kielvormige langslijnen, minstens nog aan de zijden duidelijk bestippeld. 12

Voorhoofd niet kielvormig gerand tegen den binnenrand der oogen. Kop, halsschild en dekschilden met uiterst lijne, zeer dichtstaande langsstreepjes, dof, meestal geheel onbestippeld. 13

- 12 Voorhoofd aan de voorzijde tamelijk glad en glanzig. Halsschild overal bestippeld. Lichaam zwart, de dekschilden op het midden min of meer roodbruin. Pooten geelrood, de dijen iets donkerder. Deze soort is breeder en doffer dan *nitidulus*, met eenigszins glanzig en zeer dicht en duidelijk bestippeld achterlijf. Schedel met twee langsgroefjes en een ondiep middengroefje. Halsschild met drie ondiepe langsgroeven en een zeer breed zij-indruk. Bij het ♂ is de kop zeer groot en breed; het zevende sterniet uitgerand. Bij het ♀ is de kop klein, het zevende sterniet in het midden iets puntig. Lengte 2½ mm. In paardenmest. Niet inlandsch. In het Ahrdal (Rijnprov.) en in Oldenburg. (*intricatus* Er.)

De geheele kop is zeer lijn in de lengte gestreept en dof. Halsschild slechts naar de zijden bestippeld. De sprieten van af het vijfde lid sterk verdikt. Deze soort gelijkt zeer op *tetracarinatus*, doch is veel groter en breeder; dof zwart, het achterlijf eenigszins glanzig; de bestippeling zeer lijn en dicht rimpelig, minder dicht op het achterlijf. Halsschild met breede, scherp aangeduide langsgroeven, eenigszins glanzige, kielvormige tusschenruimten en tamelijk breede zij-indrukken. Dekschilden soms bruin. Pooten geelachtig, de dijen gewoonlijk donkerder. Bij het ♂ is de kop zeer groot, eenigszins vierhoekig; het zesde sterniet met twee bultjes, door eene uitranding gescheiden; het zevende breed uitgerand. Bij het ♀ is de kop klein; het zevende sterniet driehoekig. Lengte 2½—3 mm. Vrij gemeen, terzelfder plaatse als *nitidulus* 10. *complanatus* Er.

- 13 Kop dof, slechts het voorhoofd vóór de sprieten tamelijk glanzig. Overigens zeer gelijkende op *tetracarinatus*, doch een weinig groter. Dof zwart, het achterlijf iets glanzig en uiterst lijn en dicht bestippeld. Halsschild met smalle kielvormige verhevenheden. Bij het ♂ is de kop breeder dan bij het ♀; het zevende sterniet in het midden van den achterrand ingedrukt en achter den indruk in een klein lobje verlengd. Lengte 1½—2 mm. Zeldzaam, in koemest, onder dorre bladeren, rottende paddestoelen en in aanspoelsel. Den Haag, Amsterdam en Valkenburg. 11. *clypeonites* Pand.

Kop geheel dof 14

- 14 Voorschienen aan den buitenrand gewoon. Het vijfde sterniet bij het ♂ gewoon. Lichaam dof zwart; pooten geelachtig, de dijen veelal in het midden donker. Achterlijf eenigszins glanzig. Bestippeling op kop en halsschild uiterst fijn en dicht rimpelig, op de dekschilden duidelijk zichtbaar, op het achterlijf vrij dicht. Halsschild met diepe langsgroeven en tamelijk dolle kielvormige langslijnen. Bij het ♂ is de kop in den regel groter dan bij het ♀; het zevende sterniet met eene dwarslijst op het midden, aan het uiteinde tweemaal uitgerand, met eene scherphoekige middenlob. Lengte 1½—1¾ mm. Zeer gemeen onder drogen koemest, rottende plantenstoffen, aas, dorre bladeren, in aanspoelsel en veelal 's avonds rondvliegende. (depressus Grav.) 12. *tetracarinatus* Block.

Voorschienen aan den buitenrand, voor het uiteinde, meer of minder duidelijk uitgebogen. . 15

- 15 Pooten zwart, de knieën en tarsen geel. Overigens gelijkt deze soort zeer op *tetracarinatus*.

Lichaam diep zwart. Halsschild met zeer zwak aangeduide langsgroeven, vooral de buitenste naar achteren onduidelijk. De dekschilden veel sterker en meer rimpelig, het sterk glanzige achterlijf vrij sterk en dicht bestippeld. Bij het ♂ is de kop grooter; het zesde sterniet met twee kleine, kielvormige verhevenheden en daarachter met een indruk; het zevende sterniet breed uitgerand. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. In mos, achter vermolmdedennenschors. Niet inlandsch. In de Belgische prov. West-Vlaanderen bij Melsbroek.

(Fairmairei Pand.)

Pooten geel, de dijen min of meer bruin. Deze soort is kleiner dan *tetracarinatus*,lijner bestippeld, minder rimpelig op de dekschilden en minder duidelijk op het achterlijf. Kop in beide seksen smaller dan het halsschild. Sprieten korter, meer knotsvormig. Halsschild met minder diepe langsgroeven en zeer dolf, kielvormige tusschenruimten. Bij het ♂ is de kop iets breeder dan bij het ♀; het zesde sterniet met een roodachtigen, opgerichten, haakvormigen doorn, een indruk en daarachter met eene dwarskiel aan de basis; het zevende sterniet aan den top gegroefd, met eenigszins verheven kanten. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. In schapen- en varkensmest en rottende plantenstoffen. Niet inl. In België bij Antwerpen en Ridderbom (Belg. Limburg) (hamatus Fairm.)

94. Haploderus Steph.

Dit genus vormt den overgang tusschen *Oxytelus* en *Trogophloeus*. Van *Oxytelus* is het onderscheiden door de elkaar aanrakende middelcoxae en de in 't midden eenigszins gekromde langs-indrukken van het halsschild; van *Trogophloeus* door de meer of minder duidelijk gedoornde voor- en middelschenen en door den vorm der monddeelen, bij welke o. a. de voorkaken niet aan den top gespleten en aan den binnenrand van twee of drie tandjes voorzien zijn. Eindlid der kaaktasters veel korter dan het voorlaatste lid, dun, priemvormig. Kop van achteren ingesnoerd, bij het ♂ met sterk, bij het ♀ met minder ontwikkelde slapen. Pooten vrij kort, de tarsen 3-ledig, het derde lid dubbel zoo lang als de eerste twee leedjes te zamen. — De soorten van dit genus leven in mest en onder vochtige, afgevallen bladeren.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 Voorschenen aan het uiteinde, aan den buitenrand, diep hoekig ingesneden. Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang, de achterhoeken geleidelijk afgerond, weinig of niet aangeduid. Kop met een onduidelijk langsgroefje op het achterhoofd. Deze soort heeft eenigszins het voorkomen van *Oxytelus inustus*. Glanzig zwart, eindlid der tasters en de pooten geelachtig. Kop en halsschild weinig glanzig, uiterst fijn gechagrineerd. De bestippling op kop en halsschild is ongelijkmatig, sterker op het halsschild, waar zij op het midden twee gebogen groefjes vormt; grof, dicht en rimpelig op de dekschilden, verspreid en zeer fijn op het achterlijf. Dekschilden veelal roodbruin of geelbruin, met eene zwarte, driehoekige naadvlek. Bij het ♂ is de kop veel grooter dan bij het ♀, even breed als de dekschilden; het zesde sterniet aan den top tweemaal iets uitgerand; het zevende diep uitgerand, bij het ♀ eenigszins driehoekig verlengd. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Zeldzaam in meststoffen, plantenafval, onder steenen, mos, boomschors, vooral op vochtige plaatsen; ook veelal 's avonds rondvliegende 1. *caelatus* Grav.

Voorschenen aan het uiteinde nagenoeg niet uitgebogen. Halsschild minder verbreed, $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, met duidelijke, doch eenigszins stompe achterhoeken. Kop grover bestippeld, met een diep langsgroefje op het achterhoofd. Kop en halsschild glanzig en niet gechagrineerd. Halsschild dichter, sterker en dieper bestippeld. Dekschilden iets korter. Overigens als *caelatus*. Bij het ♂ is het zesde sterniet niet-, het zevende iets uitgerand, bij het ♀ eenigszins driehoekig verlengd. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. In bosschen onder vochtige bladeren, in het voorjaar. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf en in Westfalen (*caesus* Er.)

95. Trogophloeus Mannerh.

Lichaam meestal lang gestrekt en met parallele zijden; bij uitzondering tamelijk breed, met naar het uiteinde sterk versmald achterlijf. Bovenlip ongeveer dubbel zoo breed als lang, met hoornachtig, van voren oppervlakkig of diep uitgerand, in 't midden gespleten busaalgedecte en ribbezigen, tweelobbigten top. Eindlid der kaaktasters zeer klein, priemvormig. Kin zeer breed, van voren breed en oppervlakkig uitgerand; de tong zeer breed, met eene groote hoornachtige middenplaat en aan weerszijden met eene smalle

zijplaat; aan den vliezigen voorrand in 't midden uitgerand en aan weerszijden daarvan met een lang doorntje. Sprietlen met eene meer of minder afgescheiden drieledige knots. Halsschild meestal met duidelijke indrukken, zonder gegroefde middellijn. Schildje verborgen of als een stipje zichtbaar. Dekschilden met duidelijke epipleuren. Prothorax met goed ontwikkelde, de stigmata bedekkende epimeren. Alle schenen ongedoord, fijn bezwimpeld en behaard. Tarsen 3-ledig, het eindlid meer dan dubbel zoo lang als de eerste twee ledjes te zamen. — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen, vooral langs oevers, en graven in het slib gangen evenals *Bledius*; men vindt ze ook daar ter plaatse tusschen afgevallen bladeren, gras en aanspoelsel, doch nimmer achter boomschors, waarop de naam *Trogophloeus* schijnt te duiden.

Van de 36 Europeesche soorten komen 12 in Nederland en 6 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild hertvormig, aan de basis half zoo breed als de dekschilden aan de schouders; aan de basis met een diepen, hoefijzervormigen indruk (Sub-gen. *Thinodromus* Kr.) 2

Halsschild min of meer verbreed of nagenoeg even breed als lang, zonder hoefijzervormigen indruk aan de basis. Schildje niet zichtbaar. 3

- 2 Schildje zeer klein, doch zichtbaar. Dekschilden duidelijk breeder dan het naar achteren versmald achterlijf. Lichaam breed, leikleurig-zwart, eenigszins glanzig, dicht zijdeachtig grauw behaard, bijna onzichtbaar-, op de dekschilden uiterst fijn en dicht bestippeld. Voorkaken roodachtig, het eerste sprietlid aan de basis, de knieën en soms ook de dijnen eenigszins roodbruin; de tarsen geelachtig. Dekschilden veel langer dan het halsschild, te zamen vierkant, nabij de schouders en het schildje ingedrukt, soms eenigszins bruinachtig. Lengte 3½—3¾ mm. Op slib, onder vochtige steenen langs stroomend en stilstaand water, en in den zonneschijn rondlopende. Niet inlandsch. In de Rijnprov. langs de Ahr en in Westfalen.

(*dilatatus* Er.)

Schildje niet zichtbaar. Dekschilden weinig of niet breeder dan het achterlijf, dat tamelijk parallelle zijden heeft. Halsschild en dekschilden vrij sterk bestippeld. Lichaam zwart, tamelijk glanzig, weinig behaard. Het eerste sprietlid roodbruin; de pooten bruin- of zwartachtig, de knieën, het uiteinde der schenen en de tarsen geelachtig. Halsschild aan weerszijden voor de basis minder sterk uitgerand dan bij *dilatatus*, met twee duidelijke middengroefjes. Dekschilden vierhoekig, naar de basis oneffen. Achterlijf fijn en zeer dicht bestippeld. Bij het ♂ is het vierde tot zevende sprietlid duidelijk langer dan breed. Exemplaren met geheel zwarte sprietlen en pekkruine pooten vormen de ab. *nigricornis* Muls. & Rey. Lengte 3—3½ mm. Langs stroomend water, in aanspoelsel, aan rietwortels en onder steenen. Abcoude en bij Houthem langs de Geul. In België bij Verviers; in Westfalen bij Dortmund.

(*scrobiculatus* Er.) 1. *arcuatus* Steph.

- 3 Kop, achter de uitpuilende slapen, duidelijk ingesnoerd 4
- Kop, achter de niet uitpuilende slapen, niet ingesnoerd (Sub-gen. *Troginus* Muls.) 16

- 4 Het derde sprietlid slechts iets korter dan het tweede, het vijfde tot zevende lid niet verbreed (Sub-gen. *Trogophloeus* isp.) 5

Het derde sprietlid veel korter dan het tweede, het zesde en zevende lid min of meer verbreed (Sub-gen. *Taeniosoma* Rey) 8

- 5 Het vijfde tot zevende sprietlid iets langer dan breed. Halsschild op het midden met twee duidelijke, gebogen, uit twee samenhangende indrukken gevormde langsgroeven, welke tot aan de basis doorloopen, meestal in het verlengde van eene langsgroef op de dekschilden, aan weerszijden van den naad. Halsschild min of meer hertvormig, voor het midden sterk afgerond of eenigszins hoekig verbreed, naar de basis nagenoeg rechtlijnig versmald 6

Het vijfde tot zevende sprietlid even lang als breed. Halsschild veel breeder dan lang, naar de basis rechtlijnig versmald, zonder langsgroeven, slechts met twee onduidelijke groefjes aan de basis, welke zich op de dekschilden voortzetten. Dekschilden uiterst fijn bestippeld. Bovenzijde donkerbruin, soms gedeeltelijk roodbruinachtig, fijn en dicht grauw zijdeglanzig behaard. Sprietwortel en pooten geelrood. Dekschilden langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het vierde tot zevende sprietlid nagenoeg even lang als breed, bij het ♀ iets verbreed; de drie voorlaatste sprietledjes nog meer verbreed. Lengte 2½ mm. Onder mos, vochtige bladeren, plantenaafval, op slib en 's avonds rondvliegende. Zeldzaam; Loosduinen, Breda, Amsterdam, Rotterdam en Valkenburg. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld.

4. *fuliginosus* Grav.

- 6 Halsschild voor het midden eenigszins hoekig verbreed, de voorhoeken scherp aangeduid, rechthoekig, duidelijk bestippeld, langs de zijden rimpelig. Lichaam tamelijk smal, zwart, eenigszins glanzig, lijn aschgrauw behaard; de eerste twee sprietleedjes en de pooten roodachtig, de dijen meestal iets donkerder. Dekschilden veel sterker dan het halsschild-, het achterlijf bijna onzichtbaar bestippeld. Dekschilden soms bruinachtig, veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ is het vijfde tot zevende sprietlid langer dan bij het ♀. Lengte 3 mm. Gemeen langs slooten, rivieren en poelen, onder dood riet, plantenafval, stroo, steenen en in aanspoelsel (riparius Boisd. & Lac.) 2. **bilineatus** Steph.

Halsschild voor het midden afgerond-verbreed, de voorhoeken stomp, de geheele bovenzijde fijner bestippeld, langs de zijden niet rimpelig 7

- 7 De kaaktasters, sprietwortel en pooten roodgeel. De beide langsgroeven op het halsschild naar voren en naar achteren even sterk verdiept. Deze soort is zeer verwant aan riparius, doch kleiner en naar voren smaller. Halsschild naar achteren en naar voren minder versnald. Dekschilden soms bruinachtig. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Vooral langs zandige oevers en in den zonneschijn rondvliegende. Niet zeldzaam.
(bilineatus Er., Erichsonii Sharp) 3. **rivularis** Motsch.

Het voorlaatste kaaktaster-lid, de sprietwortel en de pooten pekwart. De beide langsgroeven van het halsschild naar achteren sterker dan naar voren verdiept. Deze soort heeft den habitus van rivularis, doch is iets breeder, korter, meer diep zwart en glanziger. De oogen zijn grooter. Halsschild van voren veel meer verbreed. Dekschilden krachtiger en dicht-, het achterlijf uiterst fijn en dicht bestippeld. Soms zijn de pooten en het halsschild roodbruinachtig. Bij het ♂ het vierde tot zevende sprietlid veel-, bij het ♀ weinig langer dan breed, de voorlaatste sprietleedjes bij het ♂ niet-, bij het ♀ iets verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Langs stroomend en stilstaand water op slib en in aanspoelsel. Niet inlandsch. In de Belgische prov. Henegouwen. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (obesus Kiesw.) (memnonius Er.)

- 8 Dekschilden meer of minder grof bestippeld 9
Dekschilden fijn, doch duidelijk bestippeld 10

- 9 Kop en halsschild glanzig, slechts iets fijner bestippeld dan de zeer grof bestippelde dekschilden. Halsschild met eene verheven, gladde middellijn. Sprieten en pooten bruin. Het eerste en soms ook het tweede sprietlid, de knieën en de tarsen vuilgeel. Dekschilden duidelijk breeder dan lang, met eenigszins opgerichte haartjes. Achterlijf uiterst fijn bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Onder steenen, op dorre, zandige plaatsen; zij zou ook bij Tetramorium caespitum voorkomen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. langs de Ahr. Ook in België.

(punctatellus Er.)

Kop en halsschild dof, niet bestippeld, slechts uiterst lijn gechagrineerd. Halsschild met 4 groefjes. Dekschilden krachtig en dicht bestippeld. Bovenzijde, de sprieten en de pooten zwart, het eerste sprietlid bruin, de knieën en tarsen geelbruin. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de sprietwortel, de dekschilden, de pooten en soms het halsschild meer of min roodbruinachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Onder plantenafval en dood riet langs oevers; vooral langs zout water. Bij Amsterdam, Nijkerk en op Texel. Ook in Westfalen.

5. **foveolatus** Sahlb.

- 10 Het vierde tot zesde sprietlid slechts iets verbreed, het eerste lid rood. Halsschild met 4 duidelijke groefjes. Lichaam vrij kort en breed, zwart. Kop en halsschild eenigszins dof, uiterst fijn, doch duidelijk en zeer dicht bestippeld, veel sterker en zeer dicht op de dekschilden, uiterst fijn en dicht op het achterlijf. Pooten roodachtig, de dijen en gedeeltelijk ook de schenen bruin. Halsschild kort en breed, eenigszins hartvormig. Dekschilden breed, bijna even lang als breed. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Langs rivieroevers en plassen, op slib en zand, onder afval, vochtige bladeren en dood riet. Vrij zeldzaam; Sleeuwijk, Gorkum, Weesp, den Haag, Amsterdam, St. Pieter. . . . (inquinus Er.) 6. **impressus** Boisd. & Lac.

Het vierde tot zesde sprietlid duidelijk verbreed 11

- 11 Sprieten geheel donker, hoogstens het eerste lid iets roodbruinachtig 12
Sprieten minstens aan den wortel roodgeel 13

- 12 Kop en halsschild uiterst fijn gechagrineerd, doch niet bestippeld. Halsschild aan de basis met ondiepe groefjes, naar achteren afgerond-versnald. Bovenzijde dof, zeer fijn behaard. Dekschilden duidelijk en dicht bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Langs de zeekust op slib en aan graswortels. Bij Naarden langs de Zuiderzee en Zeeburg bij Amsterdam. 7. **halophilus** Kiesw.

Kop en halsschild duidelijk lijn-, dekschilden krachtiger bestippeld. Halsschild met 4 duidelijke, ineenvloeiende groefjes. Bovenzijde zwart, lijn behaard, eenigszins glanzig. Sprieten en pooten donker, de knieën en tarsen roodachtig; de sprietwortel soms meer bruin. Dekschilden tamelijk smal, iets breeder en duidelijk langer dan het halsschild. Bij onuitgekleurde

exemplaren zijn de dekschilden en de pooten soms roodachtig. Lengte 2 mm. Vrij gemeen, vooral langs oevers onder plantenaafval, aanspoelsel, dorre bladeren, steenen en op slib; ook veelal rondvliegende 8. *corticinus* Grav.

- 13 Spriet en pooten geheel roodgeel. Halsschild nagenoeg even breed als lang, naar de basis

weinig versmald, zeer onduidelijk ingedrukt. Lichaam zeer smal, donkerbruin, het halsschild, de dekschilden en het uiteinde van het achterlijf roodbruin; vrij dof. Dekskildes weinig langer dan het halsschild. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Op lijn zand, in aanspoelsel langs rivieren, meren en vaarten. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld (Subtilis Er.)

- 14 Dekskildes nagenoeg even lang als het halsschild. Halsschild met twee zwak aangeduide, uit twee ineenvloeiende indrukken gevormde, langsgroeven. Kop en halsschild zeer dof. Lichaam zeer smal, zwart, lijn en dicht geelgrijs behaard. Sprietwortel en pooten roodachtig, de dijnen gewoonlijk donkerder. Kop en halsschild zeer lijn en dicht bestippeld, de dekschilden veel sterker en minder dicht, het achterlijf uiterst lijn en dicht bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Gemeen onder dorre bladeren, dood riet, op slib, langs oevers en onder aanspoelsel.

9. *elongatus* Er.

Dekskildes veel langer dan het halsschild. 15

- 15 Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, met 4 duidelijke groeffjes. Kop iets smaller dan het halsschild. Deze soort heeft den habitus van *corticinus*, doch is veel kleiner, eenigszins dofzwart, gewoonlijk met licht bruinachtige dekschilden. De bestippling is uiterst lijn en dicht op kop, halsschild en achterlijf, duidelijker op de dekschilden. De beharing is zijdeachtig. Sprietwortel en pooten roodgeelachtig. Kop met twee diepe indrukken. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam, langs oevers, op slib, in aanspoelsel, onder rottende plantstoffen, dorre bladeren, stroo en soms op bloemen. Eenmaal bij Loosduinen schadelijk aan augurkenbladeren 10. *pusillus* Grav.

Halsschild weinig of niet breder dan lang, op het midden van de basis met twee zwak aangeduide indrukken. Kop even breed als het halsschild. Lichaam zeer smal. Bovenzijde zwart, met lichter of donkerder bruine dekschilden, tamelijk glanzig, zeer lijn grauw behaard. Sprietwortel en pooten geelrood. Dekskildes zeer dicht en lijn bestippeld. Soms is het halsschild ook bruinachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam, langs slooten en plassen, in aanspoelsel, onder dorre bladeren en stroo. In groot aantal bij Rijswijk in het voorjaar; ook bij Nootdorp, Nijkerk, Breda, Zierikzee en Maastricht. In België bij Brussel.

(tenellus Er.) 11. *gracilis* Mannerh.

- 16 De geheele bovenzijde zeer dicht grauw behaard en daardoor granzwart. Lichaam smal, lang gestrekt en met parallelle zijden, dof zwart. De voorkaken, de knieën en een weinig en de tarsen roodachtig. Kop even breed als het halsschild, achter de oogen geleidelijk versmald, aan weerszijden, tusschen de sprieten, met een korten langsdruk, uiterst lijn gechagrineerd. Sprieten als bij *exiguus*. Halsschild even breed als de dekschilden, nagenoeg even lang als breed, naar achteren versmald, uiterst lijn gechagrineerd, zonder indrukken. Dekskildes $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, duidelijk langer dan te zamen breed, uiterst lijn en dicht, nauwelijks merkbaar bestippeld. Achterlijf lang gestrekt, nog lijner, doch niet zoo dicht als de dekschilden bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. Door Dr. O. Schneider op het eiland Borkum verzameld. Een exemplaar werd mij welwillend toegezonden.

(Curtipennis Schneid. i. l.) (Schneideri Ganglb.)

Het voorlijf zeer lijn en dun, het achterlijf meer of minder dicht grauw behaard. 17

- 17 Kop zeer groot, nagenoeg even breed als- of iets breder (δ) dan het niet ingedrukt halsschild. Lichaam zwart, eenigszins dof en lijn grijs behaard. Sprieten zwart, met iets lichter wortel. Halsschild nagenoeg even lang als breed, naar de basis versmald. Dekskildes duidelijk langer dan het halsschild, uiterst lijn en dicht bestippeld. Pooten bruinachtig, de knieën, het uiteinde der schenen en de tarsen roodachtig; soms zijn de pooten geheel roodachtig. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn halsschild en dekschilden roodachtig, de sprieten en pooten geelachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Langs rivieroevers onder dorre bladeren en 's avonds rondvliegende. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld (*exiguus* Er.)

Kop iets smaller dan het, van vier zwakke indrukken voorzien, halsschild. Lichaam zwart, eenigszins glanzig, weinig behaard. Sprieten zwart, met roodachtigen wortel. Deze soort onderscheidt zich van *exiguus* door de meer zichtbare bestippling, welke op de dekschilden iets sterker en iets minder dicht is. Dekskildes nagenoeg even lang als het halsschild. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de dekschilden en de pooten lichtrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Langs oevers, in aanspoelsel en op vochtig duinzand. Eenmaal, op een zonnigen Decemberdag, in aantal in een duinplas bij den Haag gewaaid; ook bij Breda in aanspoelsel van de Mark, Februari 12. *despectus* Baudi.

Thinobius Kiesenw.

Dit genus is zeer in 't oogvallend door den zeer fijnen, slanken lichaamsbouw, de geringe grootte en vooral door de aan den naadhoek sterk afgeronde en daardoor zeer divergeerende dekschilden, waardoor de vleugels zichtbaar zijn. Bovenlip breed afgerond, aan den voorrand hoogstens met een zeer smallen, vliezigen zoom; het vierde kaaktasterlid zeer klein, priemvormig of geheel ontbrekend. Halsschild op het midden gewoonlijk zonder indrukken. Dekschilden zonder epipleuren. Prothorax zonder epipleuren, met onbedekte stigmata. Alle schenen ongedoord. Tarsen 2-ledig, het tweede lid twee- tot driemaal zoo lang als het eerste; de klauwen sterk gekromd en zeer sterk divergeerend. — De soorten van dit genus leven vooral op fijn, vochtig oeverzand en vliegen bij de minste stoornis duidelijk op.

Van de 17 Europeesche soorten komen 2 in het aangrenzend gebied voor.

Sprieten slechts iets langer dan kop en halsschild te zamen, de voorlaatste 4 leedjes duidelijk breeder dan lang. De kop zoo breed als het halsschild. Halsschild naar achteren versmald, over het midden iets opgericht, met twee scheve indrukken aan de basis. Dekschilden iets breeder dan- en meer dan $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, de naadhoeken eenigszins scheef afgeknot. Deze soort herinnert in habitus en kleur aan *Homalota inquinula*; zij is van *longipennis* vooral onderscheiden door den breederen, korteren vorm en de zeer dof-zwarte kleur. Lengte ongeveer 1 mm. Onder aanspoelsel en dorre bladeren; in het voorjaar. Niet inlandsch. In Engeland en Duitschland (*brevipennis* Kiesenw.)

Sprieten veel langer dan kop en halsschild te zamen, alle leedjes even lang als- of langer dan breed. Kop smaller dan het halsschild. Dekschilden ongeveer dubbel zoo lang als het halsschild, met zeer scheef afgeknotte naadhoeken. Deze soort heeft eenigszins het voorkomen van *Homalota sordidula*; zij is geheel zijdeachtig behaard, dof, niterst fijn, nagenoeg onzichtbaar bestippeld. Bruinzwart, halsschild en dekschilden lichtbruin; sprietwortel en pooten licht-geelbruin, de dijen iets gebruint. Lengte ongeveer 1 mm. In bergstreken op slib, onder steenen, tot zelfs in het water, langs rivieroevers en in aanspoelsel van overstromingen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. langs de Ahr.

(*longipennis* Heer)

96. Ancyrophorus Kraatz.

Dit genus onderscheidt zich van *Trogophloeus* door het veel langere, aan de basis breede en dan sterk toegespitste eindlid der kaaktasters. Bovenlip van voren breed uitgerand en van een, aan weerszijden driehoekig uitgetrokken, dicht bevoimperden huidzoom voorzien. Halsschild smaller dan de dekschilden, vóór de basis meestal met eene gebogen dwars-verhevenheid, die met de verheven middellijn een ankerform uitmaakt. Schildje duidelijk zichtbaar. Dekschilden met duidelijk ontwikkelde epipleuren, zelden met sterk afgeronde naadhoeken en dan aan het uiteinde divergeerend. Prothorax met goed ontwikkelde, de stigmata bedekkende epimeren. Schenen ongedoord, fijn en weinig behaard. Tarsen 3-ledig, het derde lid meer dan dubbel zoo lang als de twee eerste leedjes te zamen. — De larve van *A. flexuosus* is door Fauré, die van *ovatus* door Muls. & Rey beschreven. — De soorten van dit genus leven, vooral in bergstreken, onder steenen en aanspoelsel langs riviertjes en beken.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild met zeer bochtige zijranden. Lichaam glanzig geelachtig-roodbruin, de kop zwart en het achterlijf over het midden gewoonlijk meer donkerbruin. Sprietwortel, pooten en soms het halsschild meer geelachtig. Halsschild en dekschilden zeer grof en verspreid, het achterlijf fijn bestippeld. Gondachtig behaard, met verspreid staande korte haartjes op de dekschilden. Halsschild eenigszins hartvormig, met zeer scherpe achterhoeken en met eene, door groefjes gevormde, ankervormige verhevenheid. Dekschilden langer en breeder dan het halsschild. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Langs beken en rivieren, onder steenen, plantenaafval, dorre bladeren en dood riet. Bij Honthem langs de Geul, Juni. In België bij Verviers.

1. *flexuosus* Fairm.

- Halsschild met min of meer afgeronde, niet bochtige zijranden 2

- 2 Halsschild bijna even lang als breed. Het vierde tot zesde sprietlid iets langer dan breed. Dekschilden $2\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Deze soort gelijkt iets op een grooten *Trogophloeus*. Zwart, een weinig glanzig, fijn grijs-, op het achterlijf vrij lang behaard; duidelijk en fijn bestippeld, op de dekschilden met vrij sterke, zeer dicht staande, eenigszins langwerpige stippels. Sprietten zwart of bruinachtig, de pooten bruingeel. Halsschild met eene gladde middellijn en aan weerszijden met een ondiepen basaal-indruk. Dekschilden donkerbruin of vuil geelrood. Bij het ♂ is het laatste sterniet boogsgewijze uitgerand, bij het ♀ eenigszins hoekig; ook zijn de sprietten bij het ♂ duidelijk langer dan bij het ♀. Lengte $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Langs beken en rivieren in bergstreken, onder steenen die gedeeltelijk onder water staan, in vochtig mos en aanspoelsel; soms rondvliegende. Niet inlandsch. In België bij Verviers, Polur en Luik; in de Rijnprov. langs de Ahr en bij Gulik. De heer G. Severin ving deze soort in aantal in de grot van Rochefort (België).

(*longipennis* Fairm.)

Halsschild duidelijk breeder dan lang. Het vierde tot zesde sprietlid niet langer dan breed, eenigszins rondachtig. Dekschilden veel breeder dan en ongeveer tweemaal zoo lang als het halsschild. Glanzig pekwart, de dekschilden bruin- of geelbruinachtig, fijn behaard en bestippeld. Sprietwortel en pooten geelachtig. Halsschild met twee ondiepe, door eene gladde middellijn gescheiden indrukken. Dekschilden vrij dicht en fijn bestippeld. Soms zijn de dekschilden bruin en op het midden van elk geelachtig. Sexueel verschil als bij *longipennis*. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Langs rivieren en beken, onder gedeeltelijk in het water liggende steenen. Eenmaal bij Roermond (Exaeten) in Mei. In België bij Luik en Verviers; in de Rijnprov. bij Crefeld en Gulik. 2. *omalinus* Er.

Planeustomus Jacq. Duv.

(*Compsochilus* Kraatz).

Lichaam lang gestrekt, iets gewelfd. Kop groot, gewoonlijk breeder dan het halsschild, tusschen het dikke halsgedeelte en den schedel met eene duidelijke dwarsgroef. Roventlip diep uitgerand. Eindlid der kaaktasters iets langer en eenigszins slanker dan het voorlaatste lid. Middelleedjes elkaar aanrakende. Pooten tamelijk kort, de voor- en middelschenen aan den buitenrand gedoord. Tarsen 3-ledig, het eerste lid een weinig langer dan het tweede en vóór de basis iets ingesnoerd, het eindlid aan de voortarsen iets korter dan-, aan de middeltarsen even lang als-, aan de achtertarsen iets langer dan de eerste twee leedjes te zamen. — De soorten van dit genus leven op moerassige plaatsen en graven gangen, evenals Bledius; 's avonds vliegen zij rond.

Van de 10 Europeesche soorten komen 2 in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild met zeer duidelijke stippelrijen en eene gladde, eenigszins verheven middellijn. Lichaam bruingeel, het achterlijf voor het uiteinde, de borst en het voorhoofd donkerbruin. Kop met iets uitpuilende oogen. Halsschild iets langer dan breed, naar de basis een weinig versmald. Dekschilden veel langer en breeder dan het halsschild, duidelijk en vrij regelmatig in rijen bestippeld. Bij het ♂ is het zevende sterniet spits; bij het ♀ eenigszins afgerond. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Langs helder water, onder plantenalval, op het slib van uitgedroogde vijvers; ook op gras in vochtige weilanden, vooral op warme zomeravonden. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. (*palpalis* Er.)

Halsschild zonder stippelrijen, slechts met eenige verspreide stippels. Naverwant aan *palpalis*, doch iets kleiner, smaller, meer platgedrukt en iets glanziger. Lichtgeel; de sprietten, behalve de eerste 2 leedjes, benevens de dekschilden licht roestkleurig; het achterlijf bruin. De kop minder bestippeld. Sprietten korter, met bredere leedjes. Dekschilden korter, even lang als het halsschild, slechts met eene flauwe aanduiding van stippelrijen aan de basis, overigens verspreid bestippeld. Achterlijf naar het uiteinde meer verbreed. Sexueel verschil als bij *palpalis*. Lengte 2 mm. Niet inl. Deze soort werd in België bij Ramcroij nabij Verviers ontdekt. Mij onbekend (*flavicollis* Fauv.)

Acrognathus Erichs.

Kop achter de groote, behaarde oogen ingesnoerd, met zeer korte slapen. Vooraken lang, sterk vooruitstekend. Halsschild smaller dan de dekschilden. Dekschilden langer dan te zamen breed, veel langer dan het halsschild, met breede, scherp begrensde epiptereën. Achterlijf lang gestrekt, met parallele zijden en dikke, kantig

opgerichte zijden. De voorste coxaalholten van buiten gesloten, de trochantinen der voorcoxae onzichtbaar. Voor- en middelschenen aan den buitenrand vrij sterk gedoornd. Tarsen 5-ledig, de eerste 4 leedjes dicht aaneengesloten, onduidelijk van elkaar gescheiden en te zamen ongeveer even lang als het eindlid.

De eenige Europeesche soort leeft vooral op vochtige grasvelden en langs poelen; zij vliegt tegen zonsondergang rond.

Deze soort heeft eenigszins het voorkomen van een *Bledius*. Lichaam zeer lang en smal, dof. Kop zwart; halsschild donkerbruin of roodbruin, sprieten en achterlijf roodachtig; de dekschilden en pooten geelrood. Kop en halsschild vrij sterk en niet dicht, de dekschilden zeer fijn en dicht bestippeld. Voorkaken sterk vooruitstekende. Sprieten kort en krachtig ontwikkeld. Halsschild eenigszins trapeziumvormig, op het midden iets oneffen en met eene onbestippelde langslin. Dekschilden breder en langer dan het halsschild, aan het uiteinde iets donker gevlekt, met 3 onbestippelde, iets verheven langslijnen. Bij het ♂ vertoont het tweede sterniet aan het uiteinde een buitje; de achterrand van het zevende sterniet is in het midden afgerond, bij het ♀ sterker en hoekig uitgetrokken. Lengte 5½ mm. Langs staande wateren, onder dorre bladeren, in aanspoelsel, op het slib van uitgedroogde poelen, onder steenen in vochtig gras en soms 's avonds aan grashalmen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Cleef (mandibularis Gyll.)

97. *Coprophilus* Latreille.

Kop van achteren niet ingesnoerd. Bovenlip met hoornachtig, van voren min of meer uitgerand basaalgedeelte, aan de zijden vliezig. Voorkaken kort, weinig uitstekend. Sprieten naar het uiteinde aanmerkelijk verdikt. De voorste coxaalholten zetten zich naar buiten in eene spleet voort; de trochantinen der voorcoxae onbedekt. Voor- en middelschenen, aan den buitenrand, zeer weinig gedoornd. Tarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven in mest, rottende plantenstoffen en onder afgevalen bladeren.

Van de 6 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Deze soort heeft den habitus van *Oxytelus rugosus*, doch is veel grooter. Glanzig pekwart, de dekschilden soms iets roodbruinachtig; de sprieten en pooten lichter of donkerder rood. Achterlijf duidelijk behaard. De bestippeling is fijn en verspreid op het voorhoofd, sterker en dicht op het achterhoofd en op het schildje, meer verspreid op het halsschild en iets rimpelig op het achterlijf. Halsschild met eene middengroef, twee indrukken aan de basis en een indruk aan den zijrand. Dekschilden langer dan het halsschild, met eenige stippellijnen; aan het uiteinde rimpelig. Bij het ♂ is het zevende sterniet aan den top iets afgerond, bij het ♀ in 't midden stomphoekig uitgetrokken. Lengte 5—6 mm. Gemeen in rottende plantenstoffen en paddestoelen, vergane bladeren, onder steenen, mest, aas, in aanspoelsel en 's avonds rondlopende; eenmaal bij Wageningen schadelijk aan uitgezaaide maiskorrels 1. *striatulus* F.

98. *Deleaster* Erichs.

Lichaam tamelijk vlak, aan *Anthophagus* herinnerend. Kop met groote, uitpuilende oogen. Bovenlip uitgerand, aan de zijden en aan den voorrand vliezig. Voorkaken krachtig ontwikkeld. Sprieten lang en slank, naar het uiteinde iets verdikt, het tweede lid veel slanker dan het eerste. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, nagenoeg hartvormig. Schildje vrij groot. Dekschilden breed, met nagenoeg parallele zijden. Achterlijf breed, met zeer breed afgezette zijden. Pooten lang en slank, de schenen niet gedoornd, fijn behaard. Tarsen duidelijk 5-ledig, de eerste 4 leedjes te zamen iets langer dan het eindlid.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Licht steenrood, kop zwart, achterlijf zwartbruin, langs de zijden en het uiteinde soms roodbruinachtig. Sprieten donker-roodachtig met iets lichter wortel; pooten roodgeel. Dekschilden en achterlijf dicht geel behaard. Dekschilden en de zijden van het achterlijf fijn en dicht bestippeld. Halsschild klein, aan de basis en aan weerszijden diep ingedrukt. Bij abe. **Leachi* Curt. (*adustus* Küst.) zijn de dekschilden aan het uiteinde beroekt 1). Bij het

1) Bij de in Zuid-Oostelyk Europa voorkomende abe. *Trichsomus* Hochh. zijn de dekschilden meer of minder uitgebreid-, alsook het halsschild, de sprieten en de tasters bruin.

♂ is het zevende sterniet afgeknot en zijn de eerste 4 leedjes der voortarsen verbreed en aan de onderzijde viltig. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Langs oevers onder steenen en plantenaafval; veelal 's avonds rondvliegende. Zeer verbreed, doch over het algemeen zeldzaam. De abt. *Leachii* in de Rijnprov. bij Boppard 1. **dichrous** Grav.

99. Syntomium Curtis.

Lichaam kort gedrongen en gewelfd, op de bovenzijde bronskleurig. Bovenlip sterk uitgerand. Voorkaken kort, ongetand. Sprieten kort, met drie grootere eindleedjes, het tweede even dik als het eerste. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, zeer sterk verbreed, aan de zijden scherp gerand en getand. Het sterniet van den tweeden achterlijfsring rudimentair. Tarsen 5-ledig, de eerste 4 leedjes kort, te zamen ongeveer even lang als het eindlid. — De larve, welke eenigszins op die van een Silphide gelijkt en zich tot een kogel kan samenrollen, is door Schiodte beschreven.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Bronskleurig, eenigszins glanzig. Sprietknots en pooten donkerrood. Voorlijf grof, dicht en rimpelig bestippeld. Halsschild met eene verheven gladder middellijn en twee basaalgroefjes. Dekschilden breeder dan lang. Achterlijf onbestippeld. Lengte 2 mm. Onder mos aan boomwortels, steenen, in zandkuilen, aanspoelsel, beuken- en eikenmolm, soms in mollen- en muizengangen; ook tegen mergelsteen en muren; zij zou ook op de bloemen van *Rubus* voorkomen. Zeldzaam; Amsterdam, Breda, Kratingen en meermalen bij Valkenburg (Limb.). De heer *Leesberg* vond de larve bij Venlo. In België bij Brussel, Leuven en Ridderborno; in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld 1. **aeneum** Müll.

XXIV. Tribus PIESTINI.

100. Siagonium Kirby & Spence.

(Prognatha Latr.)

*Lichaam lang gestrekt en plat; geleugeld. Bij krachtig ontwikkelde mannetjes is de kop groot en zijn de voorhoeken van het voorhoofd tot krachtige, naar voren gerichte hoornen uitgetrokken en de sprieten veel langer dan bij het ♀; bij zwak ontwikkelde mannetjes is de kop nauwelijks grooter dan bij het ♀ en is het voorhoofd afgerond. Bovenlip diep uitgerand. Voorkaken kort, de eene aan de binnenzijde ongetand, de andere met een krachtigen tand. Bij het ♂ is elke voorkauk met een opgericht, sterk naar binnen gekromden hoorn bewapend, welke ook bij zwak ontwikkelde mannetjes veel langer is dan de voorkaken zelf. Halsschild breed hartvormig. Dekschilden met scherp begrensde epipleuren. Pooten vrij kort, de voor- en middel-schenen aan den buitenrand met krachtige doch weinig doornen. Tarsen 5-ledig, het eindlid nagenoeg even lang als de andere leedjes te zamen. — De larve van *S. quadricornis* is door Westwood en Ganglbauer beschreven. — De soorten van dit genus leven achter boomschors.*

Van de 2 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Kop en halsschild vrij krachtig en verspreid bestippeld, daartusschen glanzig glad. Dekschilden nauwelijks de helft langer dan het halsschild, behalve de naadstreep met 4 onregelmatige, min of meer onvolkomen ontwikkelde en iets gebogen stippellijnen. Achterlijf fijn gecha-grineerd, matig fijn- en aan de zijden iets verspreid bestippeld. Lichaam glanzig zwart, de voorrand van den kop meer of minder uitgebreid, eene groote meer of minder uitgebreide schouderlek op de dekschilden, het uiteinde van het achterlijf en de achterranden der voorste achterlijfsringen, de sprieten, monddeelen en pooten bruinrood; veelal is ook het halsschild roodbruin; de dekschilden zijn dikwerf slechts aan het uiteinde zwartachtig. Onuitgekleurde exemplaren zijn bruinrood, met lichtere dekschilden en donkerder basis der achterlijfsringen. Bij krachtig ontwikkelde mannetjes is de kop breeder dan- of minstens even breed als het halsschild, de voorhoeken van het voorhoofd in een krachtigen naar voren gericht, iets gekromden hoorn verlengd, welke, evenals de clypeus, bruinrood gekleurd is. De clypeus door eene lijne dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. De voorkaken elk

met een zeer krachtigen, opgericht en naar voren gebogen, naar het uiteinde sterk naar binnen gekromden hoorn bewapend. De sprieten den achterrand der dekschilden iets overschrijdend, het vijfde tot tiende lid meer dan dubbel zoo lang als breed. Halsschild breeder dan- of minstens even breed als de dekschilden. Zwak ontwikkelde mannetjes (*rufipenne* Blond.) onderscheiden zich slechts van de wijfjes door de gehoornde voorkaken, welke hoornen intusschen korter zijn dan bij de krachtig ontwikkelde mannetjes. Bij het ♀ is de kop smaller dan het halsschild en evenals de voorkaken gewoon; de clypeus van het voorhoofd nauwelijks gescheiden, in een breedten boog afgerond, aan weerszijden met een langsindruk; de sprieten korter, de dekschilden niet overschrijdend, het vijfde tot tiende lid slechts de helft langer dan breed; het halsschild iets smaller dan de dekschilden. Lengte 4—5 mm. Eenmaal in groot aantal bij Arnhem in Juli achter iepenschors, waarschijnlijk azende op de larven van *Scolytus destructor*; ook in Zuid-Limburg aangetroffen. In België bij Brussel en Verviers; in de Rijnprov. bij Düsseldorf. Ook leeft zij achter de schors van wilgen, populieren, platanen, vlier en dennen en vliegt 's avonds rond 1. **quadricorne** Kirby & Spence.

Kop en halsschild overal tusschen de stippels fijn langsrimpelig. Dekschilden meer dan de helft langer dan het halsschild, duidelijk langer dan te zamen breed; behalve de naadstreep met 6 of 7 onregelmatige stippellijnen. Achterlijf zeer fijn en weinig bestippeld. Lichaam zwart, de dekschilden met eene groote, langwerpige, vrij scherp begrensde, geelroode schouder-vlek; het uiteinde van het achterlijf roodbruinachtig; de wortel der bruine sprieten, de tasters en pooten bruinrood. Overigens aan *quadricorne* naverwant. Krachtig ontwikkelde mannetjes als bij *quadricorne*; kop en halsschild vlakker, het voorhoofd en de voorkaakshoornen slanker, evenals de oppervlakte van den kop, zwart; de sprieten langer en dunner, de leedjes van af het derde viermaal zoo lang als breed. Lengte 4—5 mm. Achter vermolde beukenschors. Niet inl. Middel-Europa (*humerales* Germ.)

Thoracophorus Motsch.

(*Glyptoma* Erichs.)

Dit genus is vooral gekenmerkt door de langsribben op kop, halsschild en dekschilden en door het dikke, eenigszins cylindervormige, aan de zijden slechts uiterst fijn gerande achterlijf. Lichaam gestrekt en sterk gewelfd. Bovenlip breed uitgerand. Voorkaken kort en krachtig. Sprieten kort en dik. Pooten kort, de schenen niet gedoord. Tarsen 3-ledig, het eindlid minstens driemaal zoo lang als de eerste twee leedjes te zamen.

De eenige Europeesche soort is in Nederland nog niet aangetroffen.

Lichaam bruin of roodbruin, dof-rimpelig, het achterlijf lichter bruinrood; de sprietwortel en de pooten roestrood. Kop met 4 langsribben, van welke de twee middelste van achteren door twee langsbuilen worden begrensd en naar voren iets divergeeren. Sprieten kort en dik. Halsschild smaller dan de dekschilden, ongeveer $\frac{1}{2}$ breeder dan lang, aan de zijden achter het midden en aan de voorhoeken lobvormig verbreed, met scherp rechthoekige of afgestompte achterhoeken; over het midden met 6 langsribben, van welke de twee middelste naar voren iets divergeeren en tamelijk recht, de overigen gebogen, de zijdelingsche naar voren afgekort zijn. Dekschilden $\frac{1}{2}$ langer dan het halsschild, te zamen breeder dan lang, gewelfd, behalve de naad- en langsrib aan den zijrand, met 5 langsribben, van welke de tweede en vierde veel zwakker is. De eerste 5 onbedekte tergiten langsrimpelig, dof, het uiteinde van het achterlijf glad en glanzig. Lengte 2 $\frac{1}{2}$ mm. In vermolmd hout en achter schors, vooral van oude eiken- en beukenstronken, meestal bij *Lasius brunneus*, niger en *fuliginosus*. Niet inlandsch. In Middel-Europa (*corticinus* Motsch.)

XXV. Tribus PSEUDOPSINI.

Pseudopsis Newm.

Lichaam platgedrukt, naar het uiteinde toegespitst, op het halsschild met vier krachtige langsribben, op elk der dekschilden met twee rugribben en eene rib, welke de breede clypeuren op de omgeslagen zijden begrenst. Bovenlip naar voren iets verbreed, aan den voorrand slechts zeer flauw uitgebogen. Voorkaken vooruitstekend, zeer sterk gekromd, aan den binnenrand met twee krachtige tanden. Sprieten kort,

naar het uiteinde knotsvormig verdikt. Schenen aan den buitenrand zeer fijn en kort gedoorn. Tarsen 5-ledig, het eindlid ongeveer even lang als de overige ledjes te zamen.

De eenige Europeesche soort komt op vele plaatsen in Engeland voor en is ook in Frankrijk (Touraine) gerangen. Zij leeft op vochtige plaatsen tusschen rottend hooi en in lakkbossen.

Roodbruin, dof; kop zwart, halsschild over het midden, de dekschilden grootendeels en het midden der tergiten donkerder. Sprieten en pooten rood. Kop aan weerszijden met eene kielvormige langslin en drie korte, kielvormige verhevenheden in het midden, waarvan de middelste aan den voorrand gelegen is. Halsschild met vier-, de dekschilden elk met twee kielvormige langslijnen; die der dekschilden zijn aan het uiteinde naar binnen gebogen. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. (sulcatus Newm.)

XXVI. Tribus PHLOEOCHARINI.

101. Phloeocharis Mannerh.

Lichaam verlengd, eenigszins platgedrukt, met parallele zijden; op de geheele bovenzijde behaard, in habitus iets aan *Oxygoda* herinnerend. Kop driehoekig, met matig groote oogen 1) en kleine voorkaken. Sprieten zeer kort. Halsschild zoo breed als of breeder dan de dekschilden, aan de zijden gelijkmatig afgerond. Dekschilden zonder afgescheiden epipleuren. Pooten kort, de schenen naar het uiteinde geleidelijk verbreed. Tarsen 5-ledig, het eindlid ongeveer even lang als de voorafgaande ledjes te zamen; de eerste 4 voortarsen-ledjes min of meer verbreed.

Van de 6 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Donkerbruin, eenigszins glanzig en dicht geelachtig behaard. Sprieten, de randen der achterlijfsringen, het uiteinde van het achterlijf, de pooten en gewoonlijk ook de dekschilden roodachtig. Kop en halsschild onduidelijk, de dekschilden vrij sterk-, het achterlijf lijn bestippeld. Halsschild iets breeder dan de dekschilden; de dekschilden iets langer dan het halsschild. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Gemeen en in aantal bijeen, achter droge dennenschors; zij overwintert ook achter schors van platanen en iepen 1. *subtilissima* Mannh.

XXVII. Tribus OMALIINI.

102. Coryphium Steph.

(Harpognathus Wesm., Macropalpus Cussac)

Lichaam langwerpig, eenigszins platgedrukt, aan *Omalium* herinnerend. Kop aan de basis ingesnoerd, met ocellen. Eindlid der kaaktasters niterst klein, zeer dun, priemvormig, het voorlaatste lid sterk verdikt, ei- of peervormig. Halsschild breeder dan de kop, veel breeder dan lang, voor het midden afgerond-verbreed, een weinig gewelfd, met zeer smal, doch duidelijk kantig afgezetten, fijn gekorven zijrand. Tarsen 5-ledig. — De larve en pop van *C. angusticolle* zijn door Perris beschreven en werden achter de schors van *Pinus maritima*, in de gangen van *Tomicus laticis*, aangetroffen.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam zwart, eenigszins glanzig, fijn en dicht grijs behaard; kop, halsschild en dekschilden vrij sterk en dicht-, het achterlijf zeer lijn bestippeld. Sprietwortel en pooten roodgeel. Dekschilden veelal- en soms ook het halsschild bruinachtig. Voorhoofd met twee groeijes. Halsschild zeer kort hartvormig, met naar voren sterk afgeronde zijden; op het midden met twee indrukken, die naar voren en naar achteren min of meer samenhangen. Dekschilden $2\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, bij het ♂ met scherper aangeduide naadhoeken. Bij het ♂ zijn de eerste 4 voortarsen-ledjes iets verbreed; bij het ♀ de eerste twee achtertarsen-ledjes verlengd. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Achter schors van verschillende boomen, o. a. van dennen, waar de larven van de uitwerpselen van *Tomicus laticis* schijnen te leven; ook onder plantenafval en drogen mest; soms 's middags en 's avonds rondvliegende. Zeer zeldzaam; Zierikzee, Kralingen en Capelle a/d. IJssel. In België bij Brussel, Calmpthout en Tellin; in de Rijnprov. bij Düsseldorf en Elberfeld.

(Robynsii Wesm., pallipes Cussac) 1. *angusticolle* Steph.

1) Bij het Sub-gen *Scotodytes* Sauley zijn de oogen klein of rudimentair.

103. Anthophagus Grav.

Dit genus is in 't oogvallend, doordat de klauwen elk aan de basis van een vliezig huidlobje voorzien zijn. Kop met vrij dicht bijeenstaande ocellen. Bovenlip min of meer uitgerand, veelal vliezig gezoomd. Voorkaken aan de binnenzijde, voor het midden, van een krachtigen, naar voren gericht, veelal gedeelden tand voorzien. Findlid der kuaktasters even lang als- of weinig langer dan het voorlaatste lid. Sprieten draadvormig. Halsschild naar de basis meer of minder versmald of duidelijk hartvormig, van achteren veel smaller dan de basis der dekschilden. Dekschilden veel langer dan het halsschild, naar het uiteinde verbreed, met tamelijk breede epipleuren. Zesde sterniet bij het ♂ aan het uiteinde iets uitgerand. Pooten lang en slank, de schenen niet of slechts zwak gedoorn. Het eindlid der achtertarsen veel korter dan de 4 overige ledjes te zamen. — De soorten van dit genus leven vooral op boomen en heesters.

Van de 20 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Kop en halsschild tusschen de stippels zeer fijn maar duidelijk gehagrineerd. Kop fijn en verspreid bestippeld. Prosternum slechts gehagrineerd. Achterlijf geheel of gedeeltelijk zwart (Sub-gen. *Anthophagus* isp.) 2
- Kop en halsschild tusschen de stippels glad. Kop krachtig en vrij dicht bestippeld. Prosternum meer of minder grof en dicht bestippeld. Achterlijf geel, aan het uiteinde min of meer gebruid of berookt (Sub-gen. *Phaganthus* Rey) 3
- 2 Kop bij het ♂ aan weerszijden, boven den sprietwortel, met een naar voren gericht, iets aan den top gebogen hoorn; breeder dan het halsschild, met zeer krachtig ontwikkelde voorkaken. Bij het ♀ is de kop smaller dan het halsschild, zonder hoornen, met gewone voorkaken. Lichaam glanzig zwart; mond, sprieten, kop, halsschild, de zijden der achterlijfsringen, het uiteinde van het achterlijf en de pooten roodachtig; de dekschilden meer okergeel; het voorhoofd, het midden van het halsschild, het schildje en de dijen meer of minder berookt. Kop met twee naar achteren convergerende langsgroeven. Halsschild tamelijk fijn en dicht, de dekschilden krachtiger en vrij dicht, het achterlijf zeer fijn en verspreid bestippeld. Halsschild eenigszins vierhoekig, met rechte achterhoeken en een dwarsgroefje aan de basis. Dekschilden duidelijk breeder en ruim tweemaal zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde verbreed en aan den top rand onbestippeld. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{3}{4}$ mm. Vooral in vochtige bosschen, op boomen, struiken en soms op lage planten; 's avonds rondvliegende. Niet inl. In de Belgische provinciën Namen en Luik zeer verbreid; ook bij Aken. In het Zevengebergte op *Sarothamnus vulgaris*. (armiger Grav.) (*bicornis* Block)
- Kop in beide seksen ongeveer even breed als het halsschild, bij het ♂ zonder hoornen en met gewone kaken. Deze soort is veel kleiner dan *bicornis*. Kop zwart of donkerbruin; de zeer lange sprieten, het halsschild en het achterlijf roodgeel; het achterlijf aan het uiteinde meer of minder zwartachtig of gebruid (♀), of wel bijna geheel donker gekleurd (♂). Halsschild soms op het midden berookt. Dekschilden, pooten en sprietwortel lichtgeel. Halsschild eenigszins hartvormig, met scherper aangeduide rechte achterhoeken, fijn bestippeld, eenigszins dof. Dekschilden sterk en zeer dicht bestippeld. Lengte 3—4 mm. In bosschen op boomen, heesters en struiken. In Zuid-Limburg (Geuldal) zeer gemeen op hazelaars. (*caraboides* Er.) 1. **abbreviatus** F.
- 3 Lichaam geheel steenrood, geelrood of geelbruin, het achterlijf naar het uiteinde gewoonlijk iets berookt, de dekschilden veelal meer geelachtig. Halsschild eenigszins hartvormig, met eene meer of minder duidelijke, onbestippelde middenvlek. Dekschilden naar het uiteinde vrij sterk verbreed, sterk- en hier en daar rimpelig bestippeld. Kop en halsschild soms een weinig berookt. Bij het ♂ is de kop breeder dan bij het ♀. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Op heesters en soms onder mos. Bij Arnheim en Warnsveld. In de Rijnprov. bij Düsseldorf. (*testaceus* Grav.) 2. **caraboides** L.
- Lichaam roodgeel of rood, op het uiteinde der meestal geelachtige dekschilden met eene donkerbruine of zwarte vlek. De geheele bestippeling op het voorlijf is grover en vooral op de dekschilden minder dicht, met vrij lange verspreide haartjes. Kop in beide seksen iets smaller dan het hartvormige halsschild. Achterlijf geelachtig, voor het uiteinde gebruid of berookt. Bij zeer donkere exemplaren zijn soms kop en halsschild een weinig berookt. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel geelachtig en slechts de dekschilden aan het uiteinde een weinig berookt. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Op boomen en heesters, onder steenen en planten-afval, vooral langs oevers; ook soms rondvliegende. Niet inlandsch. In België bij Leuven, Fleurus en Luik; in de Rijnprov. bij Aken. Bij een donkerrood exemplaar, dat ik van den Baron P. de Moffarts uit de prov. Luik ontving, zijn de dekschilden op de geheele achterhelft zwart (*praecustus* Müll.)

Geodromicus Redtenb.

Dit genus onderscheidt zich van Anthrophagus hoofdzakelijk, doordat de klauwen aan de basis niet van een vliezig huidlobje voorzien zijn, alsmede door het korter eindlid der kaaktasters. Bij het ♂ zijn de eerste 4 voortarsen-leedjes verbreed en aan de randen dicht bewimperd. — De soorten van dit genus leven in bergstreken, langs beken en rivieren, onder mos en plantenaafval.

Van de 8 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Deze soort heeft den habitus van eene groote Lesteva; geheel zwart, tamelijk glanzig, fijn grijs behaard. Sprieten zeer lang, met zeer lange leedjes, evenals de pooten zwartachtig of pekkruin. Kop met eene dwarsgroef tusschen de sprieten en met drie langsgroefjes tusschen de oogen, in een tarelijk breeden, vierhoekigen indruk. Halsschild hartvormig, met rechte achterhoeken, een diepen basaalindruk en met de aanduiding van eene middengroef. Schildje onbestippeld. Dekschilden naar het uiteinde verbreed, iets meer verspreid en minder diep bestippeld dan het halsschild; soms bevindt zich op het midden, nabij den naad, eene onduidelijke, donkerroode vlek. Achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld. Bij het ♂ zijn de sprieten langer en krachtiger ontwikkeld en de voortarsen verbreed. Lengte $4\frac{1}{2}$ —6 mm. In bergstreken langs beekoevers onder steenen, op slijb, in mos, plantenaafval en aanspoelsel. Niet inlandsch. In België bij Namen, Verviers, Luik, Vielsalm en Hockai; in de Rijnprov. langs de Ahr. — Slechts het ras nigrita Müll. 1) (plagiatus F.)

104. Lesteva Latr.

Dit genus komt in habitus met Geodromicus overeen. Lichaam langwerpig, eenigszins vlakgedrukt en behaard. Bovenlip met vliezigen, in 't midden uitgeranden voorrand. Voorkaken, in 't midden aan de binnenzijde, van een klein tandje voorzien of ongetand. Eindlid der kaaktasters viermaal zoo lang als het voorlaatste lid. Oogen fijn behaard. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, hartvormig. Mesosternum gekield. Schenen niet gedoord; het eindlid der achtertarsen veel korter dan de voorafgaande leedjes te zamen. — De soorten van dit genus leven vooral langs oevers, onder steenen, mos en plantenaafval.

Van de 11 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 Kop aan weerszijden met een diepen, min of meer rondachtigen indruk 2

Kop aan weerszijden met een zeer breeden, van voren groefachtig verdiepten langindruk. Naverwant aan pubescens, iets smaller, tamelijk glanzig, fijn en kort behaard. Halsschild naar voren iets meer verbreed en naar de basis meer versmald, meer verspreid bestippeld, met eene oppervlakkige basaalgroef, doch zonder midden-indrukken. Dekschilden langer, meer gewelfd, naar het uiteinde aanmerkelijk verbreed en minder dicht bestippeld, bij het ♂ aan het uiteinde naar den naad toe recht afgeknot, bij het ♀ sterk afgerond en met den naad een hoek vormend. De dijen meer geelrood. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. In bergstreken, onder vochtig mos langs beken en bronnen. In België bij Verviers (fontinalis Kiesw.)

2 Voorhoofd, tusschen de beide indrukken, duidelijk gewelfd. Halsschild zonder duidelijke indrukken aan den zijrand. Bovenzijde tamelijk fijn of slechts matig sterk bestippeld. Gevleugeld. 3

Voorhoofd, tusschen de indrukken, nagenoeg vlak. De zijden van het halsschild in het midden met een duidelijken indruk. Bovenzijde zeer grof bestippeld. Ongevleugeld 4

3 Kop en halsschild zeer fijn en dicht, de dekschilden duidelijk grover en minder dicht bestippeld. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde duidelijk verbreed. Lichaam donkerbruin of roodbruin, eenigszins dof, vrij lang en dicht grijs behaard. Sprieten en pooten donkerrood, het midden der dijen en de tarsen meer geelachtig. De indrukken op den kop zetten zich naar achteren in eene minder diepe groef voort. Halsschild met een meer of minder duidelijken, dubbelen indruk op het midden en met rechte achterhoeken. Dekschilden lichter of donker roodbruin. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. In vochtig mos, onder steenen en in aanspoelsel. Zeer zeldzaam; Rotterdam. In België bij Namen, Laroche en Hastière; in Westfalen en in de Rijnprov. bij Elberfeld. De heer G. Severin ving deze soort in groot aantal in de grot van Rochefort (België) op stalactieten.

1. pubescens Mannerh.

1) In het hooge Noorden van Europa en in de Alpen komen nog enkele andere rassen voor, welke in vorm, bestippling en kleur zeer onderscheiden zijn.

Kop en halsschild tamelijk fijn, doch niet dichter bestippeld dan de dekschilden aan de basis. Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde een weinig verbreed. Lichaam zwartbruin, eenigszins glanzig, vrij dicht en kort geelachtig behaard. Sprieten en pooten roodachtig, het eerste sprietlid, de knieën en de schenen soms iets donkerder. Dekschilden bruinachtig of roodbruin. Onuitgekleurde exemplaren zijn grootendeels geelachtig-roodbruin. Bij een gewoonlijk kleineren, fijner bestippelden, donkeren vorm zijn de sprieten en pooten bruin (var. **maura* Er.). De bestippeling is krachtiger, meer gelijkmatig en minder dicht dan bij pubescens. Achterlijf zeer dicht en uiterst fijn bestippeld. Bij het ♀ zijn de sprieten langer. Lengte 4—4½ mm. Niet zeldzaam op vochtige plaatsen onder mos, dorre bladeren, steenen en stukken hout; langs oevers. De var. *maura* zou bij Hamburg gevangen zijn (bicolor F.) 2. **longelytrata** Goetze.

- 4 Kop van achteren duidelijk halsvormig ingesnoerd; de indrukken van het voorhoofd nagenoeg even groot als bij pubescens. Dekschilden slechts iets grover bestippeld dan het halsschild. Halsschild nagenoeg even lang als breed, duidelijk hartvormig, met nagenoeg rechte achterhoeken, aan de zijden voor de basis niet gerand, even glanzig als de dekschilden. Deze soort is slanker dan de vorigen. Donker-roodbruin of pekbruin; het achterlijf zwartachtig, de sprieten en de pooten rood. De beharing is geelachtig. De bestippeling is eenigszins rimpelig op de dekschilden, fijn en tamelijk dicht op het achterlijf. Dekschilden duidelijk breder en langer dan het halsschild. Lengte 3½—4 mm. Onder vochtig mos, langs beken en in aanspoelsel der rivieren. Zeer zeldzaam; Rotterdam. In België bij Verviers en Duffel; in de Rijnprov. bij Aken 3. **punctata** Er.

Kop van achteren zeer breed en slechts iets halsvormig ingesnoerd; de indrukken van het voorhoofd zeer klein. Dekschilden veel grover dan het halsschild bestippeld. Kop en halsschild veel dichter bestippeld dan bij *punctata*, minder glanzig dan de dekschilden. Lichaam kleiner, korter en naar achteren breder dan bij *punctata*, in den regel lichter gekleurd, hetzij roodbruin of rood, of wel bruinachtig met roodachtige dekschilden. Halsschild korter, naar voren en naar achteren minder versmald en met eenigszins stompe achterhoeken, aan de zijden volkomen gerand. Lengte 2½—3½ mm. Onder steenen, mos, vochtige bladeren, langs slooten en greppels in bosschen. Vrij zeldzaam; Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Oisterwijk, Gilze-Rijen, Kolhorn, Nijkerk, Roermond en Hillegersberg. (Heerij Fauvel). 4. **sicula** Er.

105. *Acidota* Steph.

*Kop achter de tamelijk uitpuilende oogen zonder duidelijk ontwikkelde slapen, veelal echter met eene uitstekende, de oogen van onderen en van achteren omgrenzende orbitaal-lijst; op den schedel dwars ingedrukt. Bovenlip geheel hoornachtig, recht afgeknot. Voorkaken kort en krachtig, aan de binnenzijde ongetand. Eindlid der kaaktasters 2 of 3 maal zoo lang als het derde lid. Sprieten krachtig ontwikkeld, het derde lid duidelijk langer dan het tweede. Dekschilden en achterlijf met parallele zijden, de randen van het sterk bestippelde achterlijf opgericht. Schenen aan den buitenrand meer of minder duidelijk gedoornd; het eerste lid der achtertarsen langer dan het tweede. Bij het ♂ de voortarsen verbreed. — De larve en de pop van *A. crenata* is door Beling beschreven. — De soorten van dit genus leven onder afgevallen bladeren, mos en boomschors.*

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Clypeus aan den geheelen voorrand sterk bultig opgericht, vóór de ocellen vlak; de schedel daarachter dwars ingedrukt. Het vierde en vijfde sprietlid duidelijk langer dan breed. De dekschilden langer dan te zamen breed, met regelmatige, grove stippelrijen. Bovenzijde rood, roodbruin of pekbruin, bij onuitgekleurde exemplaren geelachtig, onbehaard, glanzig; de sprieten, de randen van het halsschild, de dijen en tarsen, de zijden en de achterrand der ringen, benevens het uiteinde van het achterlijf lichter gekleurd. Kop en halsschild dicht en sterk-, het achterlijf lijn en verspreid bestippeld. Halsschild met breed omzoomden, ingedrukten, geleidelijk afgeronden zijrand, naar voren meer dan naar achteren versmald, met stompe achterhoeken en een onduidelijk basaalgroefje. Dekschilden en achterlijf eveneens omzoomd. Lengte 6—6½ mm. Achter boomschors, onder mos, steenen en Sphagnum in moerassige streken, soms rondvliegende. Zeer zeldzaam; Amsterdam, den Haag, Venlo, Breda, Gilze-Rijen, Oisterwijk, Valkeveen, Groningen en Roermond 1. **crenata** F.

Clypeus slechts aan weerszijden bultig opgericht, vóór de ocellen aan weerszijden met een ondiepen langsindruk, de schedel daarachter niet dwars ingedrukt. Het vierde en vijfde

sprietlid ongeveer even lang als breed. Dekschilden alleen naar den naad toe in minder regelmatige rijen bestippeld, slechts weinig of niet langer dan te zamen breed. Deze soort onderscheidt zich van *crenata* door den meer platgedrukten vorm en de geelroode kleur. Halsschild langs de zijden weinig afgerond, op het midden met een ondiepen, dubbelen indruk. De bestippling der dekschilden en van het achterlijf is fijner dan bij *crenata*. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. In bosschen onder mos en achter boomschors; ook in den zonneschijn rondlopende; op zachte winterdagen tegen zonnige muren en op wegen. Zeer zeldzaam; Doetinchem en Maastricht; bij Roermond in de nesten van *Formica rufa*. Ook in België en in de Rijnprov., o. a. in groot aantal bij Cleef, gedurende den winter. . . 2. *cruentata* Mannerh.

Arpedium Erichs.

Lichaam langwerpig, eenigszins platgedrukt. Kop achter de weinig uitpuilende ooggen met goed ontwikkelde, afgeronde slapen; van achteren in de breedte ingesnoerd. Bovenlip aan den voorrand vliezig en uitgerand. Voorkaken vrij kort, de linker aan de binnenzijde ongetand, de rechter in 't midden van den binnenrand met een duidelijken tand. Sprieten slank. Achterlijf tamelijk fijn bestippeld of nagenoeg onbestippeld. Pooten min of meer slank, de schenen niet of slechts zeer fijn gedoorned, de achtertarsen langer dan de halve achterschenen, het eerste lid duidelijk langer dan het tweede. — De soorten van dit genus leven onder steenen, mos en in aanspoelsel van rivieren.

Van de 6 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Kop en achterlijf zwartachtig, de sprieten, het halsschild en de dekschilden pekkbruin of geelbruin; de sprietwortel, de randen van het halsschild, de zijden en het uiteinde der dekschilden, benevens de pooten roodgeel of geel. Kop van voren en van achteren met twee diepe groefjes, evenals het halsschild sterk en verspreid, de dekschilden dichter en naar den naad toe min of meer in langsrijen bestippeld. Halsschild smaller dan de dekschilden, met iets afgeronde zijden. Achterlijf nagenoeg onbestippeld. Gevlengeld. Bij het ♂ zijn de voordijen verdikt, de voorschenen vóór het midden van stompe tandjes voorzien en de voortarsen verbreed. Lengte 4—5 mm. Onder steenen, plantenafval, op bloemen en aan aas. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld. . . . (quadrum Grav.)

106. Olophrum Erichs.

Lichaam kort en breed of slechts weinig gestrekt, meer of minder sterk gewelfd. Kop van achteren niet ingesnoerd, op den schedel hoogstens met een zeer oppervlakkigen dwarsindruk. Bovenlip aan den voorrand vliezig en uitgerand. Voorkaken aan het uiteinde sterk gekromd, ongetand of de rechter met een klein tandje vóór het midden. Sprieten tamelijk slank, het vierde en vijfde lid aan elkaar gelijk. Dekschilden naar het uiteinde verbreed. Schenen niet gedoorned, het eerste lid der achtertarsen niet of slechts weinig langer dan het tweede. Bij het ♂ de voortarsen verbreed. — De soorten van dit genus leven onder mos, afgevallen bladeren en steenen.

Van de 9 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild van achteren iets breder dan de dekschilden aan de schouders, met breed afgeronde achterhoeken. Bovenzijde pekkbruin of roodbruin, bij onuitgekleurde exemplaren geelachtig. 2
- 1 Halsschild van achteren iets smaller dan de dekschilden aan de schouders, met minder breed afgeronde achterhoeken. Bovenzijde geelrood, het achterlijf gewoonlijk iets donkerder. Dekschilden naar het uiteinde vrij sterk verbreed. Lichaam zeer weinig gewelfd. Deze soort herinnert zeer aan *Lathrimacum unicolor*. Sprieten en pooten geelachtig. Kop en halsschild vrij sterk-, de dekschilden grover bestippeld. Halsschild tamelijk breed, met naar voren en naar achteren gelijkmatig afgeronde zijden en eenigszins vlakgedrukte zijranden. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Lengte 3—3½ mm. Onder mos en dorre bladeren, in bosschen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld, in België bij Leuven (*assimile* Payk.)
- 2 Dekschilden met parallele zijden, aan het uiteinde nagenoeg recht afgeknut. Halsschild grof-, vooral op het midden meer verspreid bestippeld. Lichaam sterk gewelfd, pekkbruin of roodbruin, glanzig. Sprietwortel en pooten rood. Halsschild zeer breed, met breed

vlakgedrukte zijranden. Dekschilden aan het uiteinde gewoonlijk iets lichter gekleurd, iets grover, dichter en meer gelijkmatig bestippeld. Lengte 4½—5 mm. Onder mos en dorre bladeren, vooral in kuilen en greppels, in vochtige bosschen; ook soms op vochtig duinzand 1. **piceum** Gyll.

Dekschilden naar het uiteinde duidelijk verbreed en aldaar eenigszins scheef naar binnen afgeknut. Halsschild iets fijner en dichter bestippeld. Overigens zeer verwant aan *piceum*, doch smaller en veel minder gewelfd. Pekbruin; de sprietwortel, de randen van het halsschild en de pooten rood. Halsschild naar voren minder versmald. Lengte 4 mm. Onder mos en vochtige bladeren, in bosschen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf; in België bij Brussel. (Museum Grav.)

107 Lathrimaeum Erichs.

Dit genus is naverwant aan Olophrum, doch onderscheiden doordat de kop van achteren oppervlakkig ingesnoerd is, met duidelijke indrukken voor de ocellen, een sterk opgerichten zijrand van het voorhoofd en door kortere, naar het uiteinde meer verbrede sprietten. De zijden van het halsschild zijn over de geheele lengte opgericht. Schenen zeer zwak gedoornd. Bij het ♂ zijn de voortarsen verbreed. — De soorten van dit genus leven in bosschen onder afgevallen bladeren, mos en in fungi.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden tot aan het uiteinde van het vijfde tergiet reikend of bijna het geheele achterlijf bedekkend, zeer grof, meer of minder in langstrepen bestippeld 2

Dekschilden tot aan het uiteinde van het vierde tergiet reikend en daardoor vier tergiten onbedekt latend, niet grof, zeer dicht en verward bestippeld. De ocellen door eene dwarsgroef verbonden. Bovenzijde iets gewelfd en weinig glanzig, donker roodbruin; de zijden van het halsschild en de dekschilden lichter gekleurd. Pooten geelrood. Halsschild met minder sterk afgeronde zijden, fijner bestippeld; met eene fijne middengroef en nabij de basis met een hoekigen indruk, welke tot aan de zijden doorgaat. Dekschilden korter, ongeveer tweemaal zoo lang als het halsschild. Overigens op *atrocephalum* gelijkend. Lengte 2½—2½ mm. Niet inl. De uit de naburige streken, o. a. uit Crefeld opgegeven exemplaren bleken onjuist te zijn. Het is zeer twijfelachtig of deze soort in ons gebied zou voorkomen. (fusculum Er.)

- 2 Halsschild aan den voorrand diep uitgesneden, met eenigszins spits uitstekende voorhoeken; de zijden zijn vóór de scherp aangeduide rechte achterhoeken iets uitgebogen, met eene middengroef, welke tot aan de basaalgroef doorloopt. Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als het halsschild, de afwisselende stippelrijen iets sterker bestippeld. Lichaam roodachtig, glanzig, de kop zwart; sprietwortel en pooten lichtrood. Kop aan weerszijden diep ingedrukt. Lengte 3½—3½ mm. Onder dorre bladeren, mos en in rottende boleten, in bosschen. Niet inlandsch. In België bij Luik, Brussel, Leuven en Verviers; in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. (melanocephalum Ill.)

Halsschild aan den voorrand zeer weinig of niet uitgesneden, met weinig uitstekende, stomp afgeronde voorhoeken, de zijden vóór de meer stompe of bijna rechte achterhoeken niet uitgebogen 3

- Lichaam naar achteren verbreed. Halsschild zonder duidelijke langsgroef en zonder basaal-indruk. Lichaam geheel geelachtig, het achterlijf soms donkerder. Deze soort is overigens zeer verwant aan *melanocephalum*, doch gewoonlijk kleiner. Halsschild aan den voorrand en weinig uitgesneden, met bijna rechte achterhoeken. Dekschilden naar verhouding iets korter en iets grover bestippeld dan bij *atrocephalum*. Lengte 3—3½ mm. Zeer gemeen onder afgevallen bladeren, mos, steenen, rottende paddestoelen, vooral in bosschen. (luteum Er.) 1. **unicolor** Mrsh.

Lichaam met meer parallele zijden. Halsschild met eene meer of minder duidelijke langsgroef en een basaal-indruk. Lichaam geelbruin of geelachtig, met zwarten kop. Deze soort is altijd kleiner en donkerder gekleurd dan *unicolor*. Sprietwortel en pooten geelachtig. Halsschild met zeer stompe achterhoeken. Dekschilden iets dichter bestippeld, 2½ maal zoo lang als het halsschild. Lengte 2½—2½ mm. Even gemeen als *unicolor* en terzelfder plaatse 2. **atrocephalum** Gyll.

Deliphurum Erichs.

Dit genus onderscheidt zich van Olophrum en Lathrimacum vooral door den diep en scherp ingesneden schedel en de krachtig gedoornde schenen. De zijrand van het voorhoofd alleen boven den sprietwortel opgericht. Halsschild naast den zijrand met eene verdiepte langsgroef, welke voor het midden in een meer of minder duidelijk groefje eindigt. — De soorten van dit genus leven onder afgevallen bladeren, mos en in fungi.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, kop en halsschild met geringen bronzen weerschijs, de zijden en de achterrand van het halsschild bruinrood; dekschilden geelbruin, sprietwortel en pooten roodgeel. Sprieten vrij kort, naar het uiteinde duidelijk verdikt. Kop achter de oogen met eene uitspringende lijst, tamelijk lijn en niet dicht bestippeld, voor de oellen met twee kleine groefjes of met twee naar achteren convergeerende groeven, tusschen de sprieten aan weerszijden met een kleinen indruk. Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang, naar voren iets meer versmald dan naar achteren, met afgeronde zijden en achterhoeken, iets sterker en dichter dan de kop bestippeld, naast den zijrand met een langsindruk en over het midden met eene lijne langslin. Dekschilden meer dan $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, naar achteren iets verbreed, krachtiger en dichter bestippeld dan het halsschild, hier en daar in rijen; achterlijf zeer lijn en verspreid bestippeld. Lengte 3—3½ mm. In den herfst en in het eerste voorjaar in boleten, mos, achter schors en aan uitvloeiende boomsappen. In bergstreken. Niet inlandsch. In Westfalen (tectum Payk.)

Phyllodrepoidea Ganglb.

Dit genus herinnert in habitus aan Phyllodrepa salicis. Het vierde sprietlid is veel kleiner dan het vijfde, van af het vijfde lid zijn de sprieten duidelijk verdikt. Kop onmiddellijk achter de oogen versmald en van achteren duidelijk ingesnoerd. Halsschild aan den zijrand, achter het midden, ingedrukt. Dekschilden met gegroefde stippellijnen. Schenen krachtig gedoornd.

De eenige soort van dit genus leeft achter boomschors en komt in het aangrenzend gebied voor.

Pekzwart of pekbruin, de zijden van het halsschild en de schouders roodbruin; de eerste 4 sprietledjes en de pooten roodgeel. Kop tamelijk lijn en verspreid bestippeld, voor de oellen met twee korte, scheeve indrukken, tusschen de sprieten met twee diepere groefjes. Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang, aan de zijden afgerond, naar voren iets meer versmald dan naar achteren, met eenigszins stompe of nagenoeg rechte achterhoeken, tamelijk lijn en eenigszins verspreid bestippeld, in 't midden niet zelden met twee groefjes, aan de zijden naar de basis scheef ingedrukt. Dekschilden ongeveer dubbel zoo lang als het halsschild, met 7 of 8 eenigszins schuine, groefachtig verdiepte, vrij regelmatige stippellijnen, daartusschen verspreid bestippeld. Achterlijf uiterst lijn en verspreid bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Achter schors van eiken en dennen. Niet inlandsch. Bij Antwerpen. (renata Grav.)

Orochares Kraatz.

Lichaam verlengd, eenigszins vlakgedrukt, onbehaard. Bovenlip uitgerand, met een vliezigen zoom in de uitranding. De linker voorkaak gevoon, de rechter met een middentand. Eindlid der kaaktasters meer dan dubbel zoo lang als het derde. Sprieten slank, naar het uiteinde zeer weinig verdikt. De zijrand der dekschilden, achter het midden, in eene sterke bocht benedenwaarts gericht. Schenen fijn gedoornd, het eerste lid der achtertarsen weinig langer dan het tweede.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, glanzig, de sprietwortel, een smalle randzoom van het halsschild, de dekschilden en de pooten geelbruin. Kop en halsschild uiterst lijn gechagrineerd en zeer lijn verspreid, de dekschilden vrij sterk en dicht bestippeld en met flauwe aanduiding van langslin. Kop met twee indrukken tusschen de oogen. Dekschilden ruim tweemaal zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde duidelijk verbreed. Lengte 3—3½ mm. In het eerste voorjaar onder menschelijke uitwerpselen, in paardenmest, rottende plantenstoffen en op bloemen; soms rondvliegende; vooral gedurende den winter, wanneer de sneeuw smelt. Niet inl. In de Rijnprov. bij Cleef en Düsseldorf; ook in België (angustata Er.)

108. *Philorinum* Kraatz.

Lichaam tamelijk smal, platgedrukt, fijn behaard. Bovenlip uitgerand. Voorkaken aan de binnenzijde ongetand, de rechter veelal in 't midden van den buitenrand iets uitgebogen. Eindlid der kaaktasters iets langer dan het voorafgaande lid. Schenen niet gedoord, het eerste lid der achtertarsen even lang als de 3 volgende leedjes te zamen. Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Deze soort herinnert in voorkomen aan *Phyllo Drepa vilis*, doch is iets grooter en breeder, eenigszins platgedrukt en lijn en vrij dicht grijs behaard. Bruinzwart; halsschild en dekschilden gewoonlijk donkerbruin, zeldzamer geelbruin; de sprietwortel en pooten roodgeel. De bestippeling is duidelijk en vrij dicht, op de dekschilden hier en daar een weinig rimpelig, op het achterlijf nimmer fijn. Halsschild naar voren en naar achteren gelijkelijk versmald. Dekschilden veel langer dan het halsschild. Bij het ♂ zijn de sprieten langer en is het eindlid minder verlengd. Lengte 1;—2½ mm. Deze soort leeft gewoonlijk in aantal bijeen op bloemen van *Ulex*, *Genista* en *Sarothamnus*; vooral in bosschen. In Limburg bij Houthem, Juni; ook in Noord-Frankrijk bij Rijssel, in België en in de Rijnprov. in het Zevengebergte. . . (subpubescens Steph., humile Er.) 1. **sordidum** Steph.

Micralymma Westwood.

*Dit genus is zeer in 't oog vallend door de zeer korte dekschilden, welke den metathorax nauwelijks overschrijden en iets korter dan het halsschild zijn. Ongerveu-geld. Kop met zeer kleine ocellen. Bovenlip breed uitgerand. Voorkaken kort, de linker met gespleten top, aan de binnenzijde niet getand, de rechter met gewonen top, aan de binnenzijde getand. Eindlid der kaaktasters 2½—3 maal zoo lang als het voorafgaande lid. Sprieten naar het uiteinde tamelijk verdikt. Achterlijf aan de zijden afgerond-verbreed, naar het uiteinde toegespitst, met breed opgerichte zijden. Dijen tamelijk breed, de schenen niet gedoord, de tarsen vrij kort, het eindlid ongeveer even lang als de eerste 4 leedjes te zamen. — De ontwikkelingsgeschiedenis, levenswijze en anatomie van *M. marinum* is door Laboulbène bekend geworden.*

De enige Europeesche soort, welke langs onze kust nog niet is aangetroffen, leeft in aantal bijeen met Aëpus tusschen Podurellen en Acariden in rotsspleten en naar het schijnt ook aan steenen zeeoeringen onder steenen en algen, die bij vloed onder water staan. Zij werd aangetroffen langs de zeekust van Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië en Denemarken.

Zwart, fijn geachtig behaard, weinig glanzig. Sprietwortel en pooten donker roodbruin. Kop en halsschild lijn en verspreid bestippeld. Halsschild kort hartvormig. Dekschilden duidelijk korter dan het halsschild, naar het uiteinde verbreed, lijn gechagrineerd, verspreid en eenigszins ruw bestippeld. Achterlijf zeer breed, ovaal, vrij dicht en lijn bestippeld. De bestippeling en de lengte der dekschilden varieert een weinig. Het ♀ is grooter en breeder, met langere sprieten en breeder halsschild. Lengte 2½—2¾ mm. Maart tot September; o. a. bij Duinkerken (*marinum* Stroem)

109. *Xylodromus* Heer.

Lichaam langwerpig, smal, met parallele zijden, tamelijk vlak. Kop met goed ontwikkelde, nagenoeg parallele slapen. Bovenlip in 't midden uitgerand. Voorkaken aan de binnenzijde ongetand. Eindlid der kaaktasters veel langer dan het voorlaatste lid. Sprieten kort en dik, het tweede lid verdikt, even lang of iets langer dan het derde, de voorlaatste leedjes verbreed. Dekschilden veel langer dan het halsschild. Achterlijf met nagenoeg parallele, breed opgerichte zijden. Schenen fijn en weinig gedoord, de eerste 4 leedjes der achtertarsen in lengte geleidelijk afnemend, het eindlid korter dan de eerste 4 leedjes te zamen. — De soorten van dit genus leven achter boomschors, onder mos, afgevallen bladeren en allerlei plantenafval.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprieten tamelijk slank, het vierde en vijfde sprietlid niet breeder dan lang. Achterlijf duidelijk breeder dan het halsschild. Bovenzijde glanzig roodgeel; de kop, eene vlek om het schildje en het uiteinde van het achterlijf berookt. Halsschild lijn en niet dicht bestippeld, hier en daar met eenige aanduiding van lijne streepjes, met twee zeer onduidelijke middengroefjes en stompe achterhoeken. Achterlijf uiterst lijn-, de dekschilden iets grover dan het halsschild bestippeld, met geringe aanduiding van langstrijen. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Onder dorre bladeren, mos en eikenschors; in bosschen. Niet inl. 1) In de Rijnprov. bij Cleef en Aken; in België bij Verviers (testaceus Er.)

Minstens het vijfde sprietlid breeder dan lang 2

- 2 Halsschild dicht bestippeld en duidelijk behaard, weinig glanzig. Deze soort is zeer verwant aan *concinus*, doch iets meer verlengd en over het geheele lichaam meer zichtbaar goudgeel behaard, doorgaans een weinig lichter gekleurd. Halsschild iets minder breed, naar de basis wat minder versnald. Dekschilden zeer lijn en dicht-, iets rimpelig bestippeld, zonder duidelijke streepjes aan het uiteinde. Achterlijf uiterst dicht en zeer lijn bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Terzelder plaatse als *concinus*, doch minder verbreid; o. a. gemeen bij Maastricht. Ook soms in rottende boeten. (deplanatus Gyll.) 1. **depressus** Grav.

Halsschild minder dicht bestippeld, weinig behaard of kaal, glanzig. 3

- 3 Zwart of bruinzwart, de sprieten, de zijden en de basis van het halsschild meer of minder, de dekschilden, de zijden van het achterlijf en de pooten lichtrood; de dekschilden om het schildje en aan het uiteinde iets berookt, soms nagenoeg geheel zwartachtig. Lichaam langwerpig, eenigszins platgedrukt. Halsschild met afgeronde zijden, naar de basis duidelijk versnald, met stompe achterhoeken en twee onduidelijke, soms nauwelijks zichtbare middengroeven. Dekschilden veel langer dan het halsschild, dicht en lijn, eenigszins langsrimpelig bestippeld, aan het uiteinde iets gestreept. Achterlijf uiterst lijn en zeer dicht bestippeld, meer of minder duidelijk goudgeelachtig behaard. Onuitgekleurde exemplaren zijn meer roodachtig. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$ mm. Verbreid en niet zeldzaam; onder mos, boomschors, op rottende vruchten, in plantenafval, dakstroo, keldervuil, duiventillen, kippenbokken, tegen muren en op bloeiende *Spiraea*'s 2. **concinus** Marsh.

Glanzig zwart, de sprieten pekbruin met lichter wortel en uiteinde of geheel zwartbruin; de pooten lichtbruin of bruinrood. Kop grooter dan bij de andere soorten, evenals het halsschild lijn en niet dicht bestippeld. Dekschilden veel meer verspreid bestippeld dan bij *concinus*, slechts aan het uiteinde iets langsrimpelig. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$ mm. Deze soort zou in gezelschap van *Lasius fuliginosus* leven. Ik zag een Belgisch exemplaar uit Hoboken bij Antwerpen, in November onder aanspoelsel van de Schelde gevangen (ex coll. Paul J. Roelofs) (affinis Seidl.) (cephalotes Eppelsb.)

110. Phloeonomus Heer.

Dit genus is naverwant aan *Phyllocladpa*, doch onderscheiden doordat het eindlid der achtertarsen veel langer is dan de 4 overige, zeer korte leedjes te zamen; ook is de bovenlip van voren recht afgeknot en het eindlid der kaaktasters veel slanker dan het voorafgaande lid. Lichaam smal en vlak. Kop breed met groote oogen, van achteren halsvormig ingesnoerd. Mesosternum niet gekield. Schenen zeer zwak gedoord. — De larve van *P. pusillus* is door Perris beschreven. — De soorten van dit genus leven vooral achter boomschors.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Kop en halsschild duidelijk bestippeld 2
Kop en halsschild niet of zeer onduidelijk bestippeld, doch zeer dicht gehagrineerd, dof. (Sub-gen. *Phloeonomus* isp.) 3
2 Zesde sprietlid van de volgende leedjes nauwelijks in breedte verschillend, de sprietknots zeer scherp afgescheiden en vrij lang bewimperd. Kop tamelijk breed, naar voren weinig versnald. De randen van het achterlijf sterk opgebogen (Sub-gen. *Xylostiba* Ganglb.). Deze soort heeft den habitus van *planus*, doch is veel grooter, pekzwart of pekbruin, glanzig, de eerste 5 sprietleedjes en de pooten roodgeel. Halsschild veelal met roodachtige randen, de dekschilden veelal met geelbruine schouders of over een grooter gedeelte van de basis geelbruin, soms op eene zwartachtige topvlek na, geelbruin, het achterlijf meestal aan het uiteinde, soms geheel roodbruin. Kop met vier diepe groefjes. Halsschild tamelijk breed, doch smaller dan

1 De uit Rozendal, Berkel en Nootdorp opgegeven exemplaren van deze soort behooren tot *Hapalaraea pygmaea* Payk.

de dekschilden, naar de basis weinig versmald, met rechte achterhoeken, fijn en eenigszins verspreid bestippeld, op het midden met twee oppervlakkige langsindrukken. Dekschilden tweemaal zoo lang als het halsschild, zeer dicht en vrij sterk bestippeld. Lengte 3—3½ mm. Achter boomschors en op *Sorbus aucuparia*. Niet inlandsch. In België bij Luik en Verviers; ook in Westfalen. (*monilicornis* Gyll.)

Zesde sprietlid duidelijk smaller dan de volgende leedjes, de sprietknots minder scherp afgescheiden, gewoon bewimperd. Kop breed en kort, met zeer breed, vlak voorhoofd (Subgen. *Phloeostiba* Thoms.). Lichaam vlak en smal, zwart of zwartbruin, eenigszins glanzig, tamelijk fijn en niet zeer dicht, op het achterlijf zeer fijn bestippeld. Sprietwortel, pooten en meer of minder de dekschilden over het midden roodachtig. Halsschild bijna dubbel zoo breed als lang, met stompe achterhoeken, eene onduidelijke middellijn en veelal nog aan weerszijden met een zeer onduidelijken langsindruk. Dekschilden weinig of niet breder, doch veel langer dan het halsschild. Lengte 2½—2½ mm. Achter boomschors en tusschen eikenplanken, in bosschen. Zeldzaam; bij Arnhem, Winterswijk en Heerlen (Limburg); ook in België bij Luik, Leuven, Verviers en in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 1. *planus* Payk.

3 De zijden van het halsschild achter het midden hoekig verbreed. Dekschilden dicht en duidelijk, eenigszins ruw rimpelig bestippeld, veel grover dan kop en halsschild. Lichaam donkerbruin, de dekschilden veelal lichter; soms geheel geelbruin, met iets donkeren kop. Pooten rood-geel. De kleinste soort van het genus; naverwant aan *pusillus*, doch korter, breeder en veel doffer. Sprieten zeer kort. Halsschild met 4 zeer groote, diepe groeven. Dekschilden veel langer dan het halsschild. Lengte 1¼—1½ mm. Achter eikenschors; ook tusschen eikenplanken, in bosschen. Niet inlandsch. In de Belgische prov. Brabant en bij Mons; in de Rijnprov. bij Crefeld, Düsseldorf en Elberfeld. (*minus* Er.)

De zijden van het halsschild meer afgerond en naar de basis versmald. Dekschilden fijn gegagrineerd en zeer fijn en verspreid bestippeld. Lichaam zeer platgedrukt, lichter of donkerder roodbruin, minder dof dan bij *minus*, het achterlijf iets glanzig. Kop en gewoonlijk het uiteinde der dekschilden meer zwartachtig. Sprieten, behalve veelal het uiteinde, de randen der achterlijfsringen en de pooten geelachtig. Halsschild met twee diepe langsgroefjes op het midden, twee diepe randindrukken en een onduidelijken kleineren indruk van voren. Dekschilden veel langer dan het halsschild. Lengte 1½—2 mm. Gemeen achter dennenschors. 2. *pusillus* Grav.

111. *Omalius* Gravenh.

Lichaam langwerpig en vlak. Kop veel smaller dan het halsschild, van achteren halstvormig ingesnoerd, voorhoofd boven de oogen zonder verheven langsligt. Bovenlip aan den voorrand rliezig, gewoonlijk in 't midden uitgerand. Voorkaken kort, de linker gewoon, de rechter met een kleinen tand in 't midden van den binnenrand. Sprieten naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Halsschild met garen zijrand. Mesosternum gekield. Schenen zeer fijn gedoerd. Eindlid der achtertarsen even lang als of langer dan de eerste 4 leedjes te zamen. — De soorten van dit genus leven achter boomschors, in rottende puddestoelen, aan uitvloeiende boomsappen, onder mos en in plantenaafval, zeldzamer op bloemen.

Van de 24 Europeesche soorten komen 8 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

1 Slapen kort, veel korter dan de langsdoorsnede der oogen. 2

Slapen even lang of nagenoeg even lang als de langsdoorsnede der oogen. 10

2 Halsgedeelte van den kop verspreid en zeer fijn bestippeld. 3

Halsgedeelte van den kop meer of minder dicht en veel duidelijker bestippeld. 5

3 Sprieten donker met roodachtigen wortel. Dekschilden hoogstens aan het uiteinde iets rimpelig bestippeld. 4

Sprieten geheel roodachtig. Dekschilden dicht en grof-rimpelig-, naar het uiteinde iets fijner bestippeld, meer dan tweemaal zoo lang als het halsschild. Deze soort komt in habitus en grootte met *rivulare* overeen, doch onderscheidt zich door de kortere, geheel roodachtige sprieten en de langere, dicht rimpelige dekschilden. Het halsgedeelte en de achterhoeken van het halsschild zijn dof en onduidelijk bestippeld (bij *rivulare* daarentegen glanzig en sterk bestippeld). In vele opzichten nadert deze soort aan *riparium*, doch onderscheidt zich eveneens door de kortere, geheel roodachtige sprieten en de rimpelig bestippelde

dekschilden. De kleur der bovenzijde komt met die van *laeviusculum* overeen, roestkleurig-pekbruin, tamelijk glanzig; de omtrek van het halsschild en de schouders, het uiteinde en de zijden der dekschilden, alsook het uiteinde en de zijranden van het iets donkerder achterlijf, lichter gekleurd. Kop met twee evenwijdige langsgroeven. Halsschild duidelijk breder dan lang, een weinig voor het midden het breedst, iets meer verspreid bestippeld dan de kop, met twee donkere, iets grover bestippelde langsgroeven op het midden en aan weerszijden met eene diepere zijgroef. Schildje dof. Achterlijf dof, zeer onduidelijk bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Deze, alleen uit de omstreken van Londen bekende soort werd door den heer K. Kempers in drie exemplaren op Texel gevangen . . . 1. *rugulipenne* Rye.

- 4 Kop en halsschild tamelijk fijn en verspreid-, de dekschilden veel fijner en tamelijk wijd uiteen-, naar het uiteinde eenigszins rimpelig bestippeld. Kop zwart, halsschild en dekschilden roodbruinachtig, met lichtere schouders en lichter top. Achterlijf bruinachtig, veelal de randen, zoo ook de sprietwortel en de pooten rood. Halsschild naar voren minder versmald, met iets meer van elkaar staande, niet zeer diepe middengroefjes. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Langs de zeekust onder zeewier. Niet inlandsch. Zij zou op Norderney gevangen zijn.

(*fucicola* Kr.) (*laeviusculum* Gylh.)

Kop en halsschild vrij sterk-, de dekschilden tamelijk grof en dicht bestippeld. Deze soort gelijkt zeer op *rivulare*, de sprieten zijn iets langer, geelachtig, behalve de bruine knots. Kop minder glanzig, fijner en meer verspreid bestippeld. Halsschild naar voren en naar achteren minder versmald, fijner bestippeld, met minder uitstekende achterhoeken en minder afgeronde voorhoeken, en met dichter bijeenstaande middengroefjes, welke minder diep zijn dan de zijgroefjes. Dekschilden veel minder diep bestippeld, aan den roodgeranden top iets rimpelig, met eenigszins scheef afgesneden buitenhoeken. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam langs de stranden en op zeeklei onder wieren, steenen en in de eierklompen van *Buccinum*.

2. *riparium* Thoms.

- 5 Kop matig dicht bestippeld 6

Kop uiterst dicht rimpelig bestippeld, eenigszins dof. De dekschilden langs de zijden en aan het uiteinde eenigszins opgericht. Deze soort heeft den habitus en de kleur van *rivulare*, doch is kleiner. Halsschild sterk en rimpelig bestippeld; de middengroeven en de zijden diep ingedrukt. Dekschilden zwart- of bruinachtig, grof, dicht en rimpelig bestippeld. Onuitgekleurde exemplaren zijn roodachtig, de kop en soms ook het achterlijf donkerder; ook zijn de sprieten grootendeels roodachtig. Deze onuitgekleurde exemplaren gelijken eenigszins op *Allardii*, doch zijn dadelijk te onderscheiden door de zeer grove bestippling van den kop. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Vrij gemeen onder steenen, tusschen rottende bladeren, in mest en plantenaafval 7. *caesum* Grav.

- 6 Kop en halsschild tusschen de stippels zeer fijn rimpelig. Deze soort gelijkt zeer op *caesum*, doch is veel fijner bestippeld. Donkerbruin, niet sterk glanzig. Kop zwartachtig, de sprieten, behalve de bruinachtige knots, de zijden en de basis van het halsschild, de schouders en de zijranden van het achterlijf roodgeel. Het voorhoofd grootendeels onbestippeld. Halsschild slechts iets breder dan lang, naar de basis weinig versmald, met rechte achterhoeken, twee diepe, dicht aaneenstaande middengroefjes en met een breeden, diepen zijndruk, tamelijk fijn en dicht bestippeld. Dekschilden van voren dicht en sterk-, naar het uiteinde fijner en duidelijk in rimpelige streepjes bestippeld. Achterlijf zeer fijn en dicht bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. In mest, plantenaafval en dorre bladeren. Den Haag, Rotterdam, Roermond en Amsterdam, Sept., in aantal 3. *Allardii* Fairm. & Bris.

Kop en halsschild tusschen de stippels glad 7

- 7 Lichaam 3—4 mm. lang 8

Lichaam $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. lang 9

- 8 Lichaam zwart, het voorlijf sterk glanzig. Dekschilden roodbruin of bruin; de sprietwortel, schouders en pooten geelachtig; de randen der achterlijfsringen en het uiteinde van het achterlijf veelal roodachtig. Kop met 4 groefjes en vrij sterk bestippeld. Halsschild met rechte achterhoeken, twee dicht bijeenstaande middengroefjes, welke den voorrand bereiken, en een tamelijk diepen zijndruk. Dekschilden breder dan en tweemaal zoo lang als het halsschild, sterk, dicht en eenigszins rimpelig bestippeld, aan het uiteinde recht afgesneden, met afgeronde buiten-tophoeken. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen in rottende plantenstoffen, als koolstronken, paddestoelen, onder dorre bladeren en in drogen mest . . . 4. *rivulare* Payk.

In habitus en kleur zeer gelijkende op *rivulare*, doch onderscheiden doordat de voorlaatste ledjes der gewoonlijk geheel roodachtige sprieten duidelijk breder zijn; zelden is het uiteinde der sprieten iets donkerder. Kop en halsschild fijner en veel dichter bestippeld. Halsschild naar voren en naar achteren meer gelijkelijk versmald, met minder afgeronde zijden, meer rechte achterhoeken en kortere, bredere, dichter bijeenstaande middengroefjes. Dekschilden minder glanzig, dichter dan bij *rivulare* en naar het uiteinde eenigszins rimpelig

stippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch. In West-Duitschland, o. a. bij Elberfeld, en in Engeland (impressum Kr.) (septentrionis Thoms.)

- 9 Halschild breed, aan de zijden gelijkmatig afgerond, met stompe achterhoeken, vrij krachtig en dicht bestippeld, met twee oppervlakkige langsindrukken op het midden. Dekschilden dubbel zoo lang als het halsschild, krachtig en dicht bestippeld, niet of slechts zeer zwak gerimpeld. Kop tamelijk sterk- en vrij dicht bestippeld, op den schedel met twee korte, gebogen langstreepjes. Achterlijf uiterst fijn gechagrineerd en daardoor dof, zeer fijn en verspreid bestippeld. Zwart, kop en halsschild glanzig, de dekschilden bruin, de sprieten geheel of minstens aan den wortel en het uiteinde donker, de pooten roodgeel. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Verbreid, onder aas, in rottende paddestoelen, vergane planten, veelal met rivularen; soms op bloemen 5. *oxyacanthae* Grav.

Halsschild smaller, naar achteren in 't oog vallend meer versmald, met diepere langsindrukken. Kop en halsschild fijner bestippeld. Dekschilden iets korter en veel meer rimpelig bestippeld. Zwart, de fijnere sprieten naar den wortel iets roodbruinachtig. Overigens op *oxyacanthae* gelijkend, doch veel kleiner. Lengte 1;—2 mm. Zeer zeldzaam onder plantenafval en in rottende Agarici. Den Haag 6. *exiguum* Gyll.

- 10 Kop tamelijk verspreid bestippeld. Schildje met eenige diepe stippels. Lichter of donkerder bruinrood, de kop zwart, het midden van het halsschild, om het schildje en het midden der tergiten gewoonlijk bruinachtig; de sprieten, tasters en pooten roodgeel. Kop tusschen de sprieten aan weerszijden met een tamelijk breeden, zwakken langsindruk, op den schedel met twee diepe langsgroeven. Halsschild breed, naar voren iets afgerond-versmald, op het midden met twee tamelijk ver van elkaar verwijderde langsindrukken, vrij sterk en verspreid bestippeld. Dekschilden nauwelijks dubbel zoo lang als het halsschild, zeer grof en dicht-, min of meer rimpelig bestippeld. Achterlijf zeer fijn gechagrineerd, weinig glanzig, bijna niet merkbaar bestippeld. Lengte 4—5 mm. In hommelnesten en ook aan den ingang van grotten. In Westfalen (validum Kraatz)

Kop zeer dicht bestippeld. Schildje glad. Naverwant aan *caesum*, de kop kleiner; het halsschild iets smaller en glanziger, met zeer diep ingedrukte zijden, zeer diepe, dicht tegen elkaar staande middengroefjes, veel fijner bestippeld. Dekschilden veel breeder, korter, minder dicht- en niet rimpelig bestippeld. De tergiten bijna niet zichtbaar gechagrineerd, sterk glanzig en onbestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, in vochtig mos, onder drogen mest, in aanspoelsel en keldervuil (fossulatum Er.) 8. *excavatum* Steph.

112. Phyllodrepa Thoms.

Lichaam min of meer gestrekt, met parallele zijden. Bovenlip van voren nitgerand. Voorkaken kort, de linker aan de binnenzijde ongetand, de rechter aan de binnenzijde met een klein tandje. Eindlid der kauktaster 2 tot 3-maal zoo lang en aan de basis even dik als het voortaatste lid. Sprieten kort, de eerste twee ledjes verdikt, het zevende tot tiende breed. Mesosternum niet gekield. Schenen fijn- of niet gedoorned; de achtertarsen langer dan de halve achterschenen, het eindlid niet of slechts zeer weinig langer dan de eerste 4 ledjes te zamen. — De eenigszins twijfelachtige larve en de pop van *tritici* zijn door Perris beschreven. — De soorten van dit genus leven op bloemen, onder mos, achter boomschors en in paddestoelen.

Van de 15 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Voorhoofd vlak gewelfd, weinig boven de oogen verheven; tusschen de sprieten, aan weerszijden, met een duidelijken indruk. 2

Voorhoofd hoog boven de oogen verheven, van boven vlak; tusschen de sprieten, aan weerszijden, met een zeer zwakken of onduidelijken indruk (Sub-gen. *Hypopyrena* Rey). Geelrood, tamelijk glanzig, het uiteinde van het achterlijf berookt. Kop, halsschild en eene semellairvlek soms iets bruinachtig. Sprieten lichtrood, krachtig ontwikkeld, gelcidelijk naar het uiteinde knoetsvormig verdikt, vrij lang behaard. Pooten meer geelachtig. Halsschild naar achteren versmald, met rechte achterhoeken, op het midden met twee onduidelijke indrukken, voorts met een diepen randindruk, welke zich min of meer op de basis voorzet; vrij dicht en fijn bestippeld. Dekschilden veel langer dan het halsschild, dicht en hier en daar in onduidelijke langsrijen bestippeld. Achterlijf uiterst fijn bestippeld. Lengte 2 mm. Onder mos, stukken hout en achter schors; in boschrijke streken. Niet inlandsch. Zij zou bij Hamburg gevangen zijn (rufula Er.)

- 2 Schedel met twee duidelijke groefjes of verdiepte, schuin staande streepjes (Sub-gen. *Phyllo-*
drepa f.sp.) 3
- Schedel zonder groefjes vóór de ocellen 6
- 3 Bovenzijde van het lichaam geheel zwart of pekbriin 4
- Lichaam lichtrood, tamelijk glanzig; de kop, eene vlek aan het uiteinde van elk der dek-
schilden en het voorlaatste tergiet min of meer bruinachtig, de pooten iets meer geelrood. Kop
en halsschild enigszins verspreid en vrij sterk bestippeld. Halsschild tusschen de stippels
lijn gechagrineerd, met rechte achterhoeken en met twee zeer oppervlakkige middengroefjes.
Dekschilden veel langer dan het halsschild, krachtig, hier en daar in langrijen bestippeld,
en met enkele, onduidelijke langstrepen, zonder dwarsrimpels. Achterlijf uiterst lijn bestip-
peld. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. In boleten, achter beukenschors en soms op appelbloesem. Niet
inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (*brunnea* Payk.) (*melanoccephala* F.)
- 4 De krachtige bestippeling der dekschilden gedeeltelijk in verdiepte langstrepen, de stippels
niet door langs- of dwarsrimpels verbonden. Lichaam zwartachtig, halsschild en dekschilden
meer pekbriin, de randen van het halsschild en van het achterlijf iets lichter. Sprietwortel
en pooten geelrood, de sprietten naar het uiteinde of slechts in het midden iets donkerder.
Halsschild met vrij duidelijke middengroeven, tusschen de bestippeling lijn gechagrineerd.
Dekschilden veel langer dan het halsschild; de tusschenruimten der langstrepen hier en
daar iets gewelfd. Achterlijf zeer lijn en verspreid bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Op
bloeienden meidoorn, soms in mos; ook in den zonneschijn rondvliegend; in boschrijke
streken. Zeer zeldzaam; Arnhem, Huissen, den Haag, Maarsbergen, Leiden, den Bosch en
Roermond 1. *salicis* Gyll.
- De fijnere, dichtere bestippeling der dekschilden slechts hier en daar onduidelijk in strepen
aangeduid, de stippels meer of minder door langs- en dwarsrimpels verbonden 5
- 5 Kop en halsschild tusschen de bestippeling bijna glad, met den microscoop bezien, hier en daar
uiterst lijn gechagrineerd. Dekschilden evenals het halsschild matig sterk- en enigszins ver-
spreid bestippeld. Bovenzijde glanzig zwart; de pooten geelrood, de dijen soms bruinachtig.
Sprietten in den regel zwart, naar het uiteinde niet zelden roodbruin; soms is ook het derde
en vierde lid bruinrood of zijn de sprietten geheel roodgeel (*maculicorne* Heer). Achterlijf
weinig glanzig, zeer lijn en verspreid bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Niet zelden op allerlei
bloeiende planten als: *Crataegus*, *Spiraea*, *Sarothamnus*, *Primula* enz.
2. *floralis* Payk.
- Kop en halsschild tusschen de bestippeling gewoonlijk duidelijk gechagrineerd. Halsschild
krachtiger bestippeld dan bij *floralis*; dekschilden grof-langsrimpelig bestippeld. Bovenzijde
zwart, de zijden en gewoonlijk ook de achterrand van het halsschild, benevens de schouders
der dekschilden, roodbruin. Sprietwortel, tasters en pooten geelrood; soms de sprietten geheel
geelrood. Deze soort, welke iets kleiner is dan *floralis*, zou volgens *Fauvel* slechts een
vorm van deze zijn, met overgangen. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Veel zeldzamer. Maarsricht, Cuyk,
Nijkerk en Doetinchem; ook op het eiland Borkum (*atra* Heer.) 3. *nigra* Grav.
- 6 Halsschild aan de zijden afgerond, slechts vóór de basis zwak uitgebogen. Trochanters en het
zesde sterniet bij het ♂ gewoon (Sub-gen. *Drocephylla* Rey). 7
- Halsschild in 't midden van de zijden iets stomphoekig, van daar naar voren geleidelijk afge-
rond, naar achteren iets versmald en uitgebogen. Trochanters der achterpooten bij het ♂
buitengewoon sterk ontwikkeld, driehoekig-bijlvormig. Het zesde sterniet bij het ♂ met
twee lange tandjes en daarvoor diep half-cirkelvormig ingedrukt (Sub-gen. *Hapalaraea*
Thoms.). Lichaam tamelijk breed en vrij sterk gewelfd, lichter of donkerder vuil roodbruin,
de kop, de randen en het uiteinde der dekschilden, alsook het midden van het achterlijf,
meer bruinachtig. Voorlijf vrij sterk en dicht-, achterlijf uiterst lijn bestippeld. Dekschilden
bijna tweemaal zoo lang als het halsschild. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Achter boomschors, onder
plantenafval en in boleten. Zeer zeldzaam; Roozendaal bij Arnhem, Nootdorp, Berkel en
Grebbe; ook in België, in de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf en in Oldenburg.
7. *pygmaea* Gyll.
- 7 Lichaam iets meer gedrongen en enigszins gewelfd, met minder parallele zijden, sterk glanzig.
Achterlijf iets breeder dan het halsschild. Bovenzijde rood, de kop, de naad of een groot
gedeelte der dekschilden, behalve eene meer of minder ontwikkelde schouderplek, en het
uiteinde van het achterlijf meer of minder uitgebreid zwart. Sprietwortel en pooten, veelal
de geheele sprietten, geelachtig. Voorlijf vrij sterk en dicht-, de dekschilden vrij regelmatig
of slechts iets verward in krachtige rijen bestippeld; achterlijf zeer lijn bestippeld. Hals-
schild met onduidelijke middengroefjes. Dekschilden veel langer dan het halsschild. Lengte
 $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam achter boomschors, onder mos op daken, in boleten, keldervuil,
tegen muren en soms op bloeiende *Crataegus* (*lucida* Er.) 4. *ioptera* Steph.
- Lichaam met meer parallele zijden, tamelijk vlakgedrukt en minder sterk glanzig. 8

8. Achterlijf weinig of niet breeder dan het halsschild, met parallelle zijden. Halsschild met ondiepe indrukken. Bovenzijde roodgeel, slechts aan het uiteinde van het achterlijf iets donkerder. Kop en halsschild tamelijk verspreid en sterk-, de dekschilden grof en eenigszins rimpelig en in rijen bestippeld. Achterlijf lijn bestippeld. Halsschild eenigszins vierhoekig, aan de zijden iets afgerond. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Achter schors van oude dennen, vooral in bergstreken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken (linearis Zetterst.)

Achterlijf duidelijk breeder dan het halsschild, meer ovaal 9

9. Bovenzijde zwartachtig of zwartbruin, de sprieten alleen aan den wortel geelrood; de dekschilden soms, zeldzamer ook het halsschild bruinachtig. Onuitgekleurde exemplaren (*Heerii* Heer, *obsoluta* Rey) zijn grootendeels bruingeel. Pooten geelrood. Kop, halsschild en dekschilden tamelijk lijn en dicht-, op de dekschilden eenigszins in rijen bestippeld. Halsschild aan de zijden iets hoekig, met flauw aangeduide langsgroeven. Lengte $2-2\frac{1}{2}$ mm. Achter boomschors, onder mos, zeldzamer op bloemen. Zeer zeldzaam; bij Doorn en Maarsbergen. In België bij Verviers; ook in Westfalen 5. *vilis* Er.

Bovenzijde geelbruin of geelrood, kop en achterlijf zwartachtig, het midden van het halsschild en het uiteinde der dekschilden gewoonlijk iets berookt. Sprieten en pooten geelachtig, de sprieten veelal naar het uiteinde iets berookt. Het voorlijf is sterker en iets minder dicht bestippeld dan bij *vilis*, op de dekschilden met flauwe aanduiding van stippelrijen. Halsschild aan de zijden volkomen afgerond, nagenoeg zonder middengroeven. Dekschilden ongeveer tweemaal zoo lang als het halsschild. Overigens herinnert deze soort aan *optera* en *Xylodromus testaceus*. Lengte $2\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$ mm. Achter boomschors en in mos. Zeer zeldzaam; bij Arnhem en Loosduinen. In de Rijnprov. bij Cleef.

(hiemale Fuss) 6. *gracilicornis* Fairm.

113. *Acrolocha* Thoms.

Dit genus onderscheidt zich van *Phyllodrepa* door den meer gedrongen, aan *Anthobium* herinnerenden vorm, door de 5 ledige, scherp afgescheiden sprietknots, de zeer dunne basis van het derde spriettlid en door de kortere achtertarsen, welke slechts even lang zijn als de halve schenen. Het eindlid der achtertarsen is iets langer dan de eerste 4 leedjes tezamen. — De soorten van dit genus leven in fungi, drogen mest en onder rottende plantenstoffen.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1. Dekschilden met lijne, eenigszins onregelmatige stippellijnen; daartusschen met fijne dwarsrimpels. Halsschild duidelijk bestippeld. Bovenzijde zwart, tamelijk glanzig; dekschilden zwart of donkerbruin 2
- Dekschilden met zeer duidelijke, regelmatige stippellijnen; daartusschen lijn maar duidelijk-, langs de zijden eenigszins dwarsrimpelig gechagrineerd, doch niet met dwarsrimpels. Halsschild fijner bestippeld en bovendien lijn rimpelig, soms met flauwe aanduiding van eene middengroef. Lichaam pekzwart, weinig glanzig; de sprieten, behalve de donkere knots, het halsschild langs de zijden en veelal op het midden, de dekschilden, de pooten en het uiteinde van het achterlijf geelachtig-roodbruin. Dekschilden tweemaal zoo lang als het halsschild. Deze soort heeft eenigszins het voorkomen van *Anthobium torquatum*. Lengte $2\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$ mm. In Agarici. Niet inlandsch. In Duitschland o. a. bij Hamburg en Elberfeld.

(*amabilis* Heer)

2. Halsschild met twee ondiepe langsendrukken in het midden, niet netsgewijze gerimpeld tusschen de bestippeling. De sprietwortel, behalve het tweede lid, benevens de pooten roodbruinachtig. Bovenzijde zwart; onuitgekleurde exemplaren onderscheiden zich van *sulcatus* door de meer langwerpige-ovale gedaante. Kop aan weerszijden duidelijk gegroefd, evenals het halsschild vrij sterk bestippeld. Halsschild aan den zijrand tamelijk breed-, doch niet diep ingedrukt. Deze soort herinnert in voorkomen zeer aan *Proteinus brachypterus*. Bij het ♂ zijn de voortarsen verbreed en is het zesde sterniet aan de basis van twee langsplooien voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}-2$ mm. In plantenafval en onder drogen koemest. Zeldzaam; Middelburg, Breda, Tiel, Rotterdam, Zierikzee en Arnhem; ook in België en in de Rijnprov. 1. *striata* Grav.

Halsschild zonder langsendrukken, slechts met eene zwak aangeduide middengroef; tusschen de bestippeling duidelijk netsgewijze gerimpeld. De sprietwortel, behalve het tweede lid, benevens de pooten roodgeel. Lichaam zwart of zwartbruin, het halsschild soms pekbruin, de dekschilden meestal roodbruinachtig; ook de zesde achterlijfsring en het uiteinde van het achterlijf licht roodbruin. Kop zonder indrukken, evenals het halsschild veel fijner en dichter bestippeld dan bij *striata*. Halsschild korter, meer gewelfd, met meer afgeronde zijden en

met zeer stompe hoeken. Dekschilden met meer parallel zijden, iets duidelijker gestreept. Bij het ♂ is het zesde sterniet breed uitgerand en in het midden van een vrij langen doorn voorzien. Lengte 2 $\frac{1}{2}$ mm. In paardenmest en soms rondvliegende. Zeldzaam; Middelburg, Woudrichem, Delft, Lienden en Rotterdam; ook in België 2. **sulculus** Steph.

Aerulia Thoms.

Lichaam kort gedrongen en sterk gewelfd. Kop met zeer onduidelijke ocellen, het voorhoofd boven de oogen met eene scherpe langslust. Sprietten kort, met 5 grootere eindledjes. Halsschild aan de zijden gekarteld Mesosternum gekield. Schenen niet gedoornd, het eindlid der achtertarsen langer dan de eerste 4 ledjes te zamen.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Deze soort herinnert in habitus eenigszins aan een zeer kleinen *Lathrimacum*. Het lichaam is kort en sterk gewelfd, donker roodbruin, glanzig. De sprietten, de zijden en de basis van halsschild en dekschilden, het achterlijf, behalve het midden der tergiten, en de pooten lichtrood. Kop verspreid, het halsschild en vooral de dekschilden, dicht en sterk bestippeld. Schildje onbestippeld. Halsschild ongeveer dubbel zoo breed als lang, met hoekig gebogen en iets gekartelde zijden. Dekschilden tweemaal zoo lang als het halsschild, aan den zijrand achter de basis bij het ♂ met een klein doch duidelijk tandje. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Achter schors en in vochtig vermolmd hout van oude beuken en dennen, zeldzamer onder mos. In boschrijke bergstreken. Niet inlandsch. In België in de Hautes-Fagnes . . . (in *lata* Gylh.)

114. Anthobium Steph.

Dit genus onderscheidt zich vooral doordat de eerste vier ledjes van alle tarsen iets verbreed en aan de zijden vrij dicht en lang bewimpert zijn. Lichaam kort of langwerpig, tamelijk vlak of slechts weinig gewelfd. Kop met zeer duidelijke ocellen. Bovenlip min of meer uitgerand. Voorkaken aan de binnenzijde ongetand. Dekschilden groot, in lengte zeer veranderlijk, veel langer dan het halsschild, den metathorax ver overschrijdend, bij het ♂ afgeknot, bij het ♀ soms met uitgetrokken naadhoek. Schenen soms aan den buitenrand iets gedoornd. Eindlid der achtertarsen even lang als of slechts iets korter dan de eerste 4 ledjes te zamen. — De soorten van dit genus leven, veelal in aantal bijeen, op bloemen en op de inflorescenties van boomen, heesters en struiken; zij schijnen zich vooral met stuifmeel te voeden.

Van de 54 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en 9 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden veel korter dan het achterlijf, naar het uiteinde iets verbreed, hetzij in beide seksen recht afgeknot, of bij het ♀ breed afgerond met of zonder hoekige uitranding aan den naadhoek, of wel met een slechts weinig uitstekende of met korter of langer uitgetrokken naadhoek (Sub-gen. *Eusphalerum* Kr.) 2
- Dekschilden zeer lang, slechts weinig korter dan het achterlijf of dit geheel bedekkend; bij het ♀ is de naadhoek spits of duidelijk spits uitgetrokken (Sub-gen. *Anthobium* isp.) 12
- 2 Halsschild geelachtig, met eene meer of minder duidelijke bruine langsvlek 3
- Halsschild zwart, donkerbruin of zwartbruin, bij uitzondering roodachtig gerand 5
- Halsschild eenkleurig geel of roodgeel 3
- 3 Halsschild met twee duidelijke, tamelijk breede langsindrukken op het midden. Lichaam roodachtig-geel, het midden van het halsschild en eene vlek om het schildje bruinachtig, metasternum en achterlijf zwart. Halsschild uiterst lijn gechagrineerd en niet dicht bestippeld. Dekschilden tweemaal zoo lang als het halsschild, dicht en sterk bestippeld, in beide seksen afgeknot. Bij sommige exemplaren is de donkere vlek op het halsschild slechts weinig aangeduid. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Op bloeiende struiken, heesters en boomen als: mei- en sleedoorn, lijsterbes en wilgen. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht gevangen; ook in België en in de Rijnprov. 1. **abdominale** Grav.
- Halsschild zonder langsindrukken of slechts met zeer lauwe aanduiding ervan 4
- 4 Achterhoeken van het halsschild stomp, eenigszins afgerond. Dekschilden geheel licht-geelachtig. Kop en halsschild roodgeelachtig; bij het ♂ is het halsgedeelte van den kop, de middenvlek

op het halsschild en het achterlijf meer zwartachtig. Het metasternum is in beide seksen roodgeel. Uiteinde der sprieten, eene middenvlek op het halsschild en het achterlijf donkerbruin met min of meer lichter en zijrand. Deze soort gelijkt zeer op *abdominale*, doch is doorgaans iets grooter; het halsschild is breder en korter, naar de basis minder versmald, lijner en dichter bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. In bosschen op bloeiende wilgen, lijsterbes, meidoorn, kornoelje, Anemone enz. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht gevangen; ook in oostelijk België en in de Rijnprov. 2. *signatum* Märk.

Achterhoeken van het halsschild, vooral bij het ♂, bijna recht, niet afgerond. Dekschilden om het schildje iets gebruid; metasternum en achterlijf zwartachtig. Overigens in kleur met de beide vorige soorten overeenkomende, doch veel smaller en kleiner. Halsschild eenigszins verspreid en lijn bestippeld, met of zonder eenige aanduiding van langsindrukken. Dekschilden dubbel zoo lang als het halsschild, dichter en lijner bestippeld dan bij *signatum*. Sommige exemplaren zijn iets meer bruinachtig gekleurd. Voortarsen bij het ♂ vrij sterk verbreed. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. In boschrijke, bergachtige streken op bloeiende wilgen en veldbloemen. Niet inlandsch, doch in de Belgische provinciën Limburg (Tellin) en Luik nabij de grens aangetroffen; ook in de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf.

(*limbatum* Er.)

- 5 Halsschild donkerbruin, roodachtig gerand. Sprieten geelachtig, naar het uiteinde gewoonlijk iets donkerder. Dekschilden, behalve het iets donkerder midden, en de pooten roodachtig. Halsschild vrij sterk en verspreid bestippeld, met geringe aanduiding van een basaal-groefje. Dekschilden zeer groot, eenigszins rimpelig, doch niet zeer dicht bestippeld. Achterlijf zwartachtig, zeldzamer roodbruin. Bij het ♂ zijn de zijden van het halsschild naar de basis meer versmald, de dekschilden aan het uiteinde recht afgeknot, de voordijen verdikt en de voortarsen vrij sterk verbreed; bij het ♀ steken de naadhoeken der dekschilden een weinig uit. Lengte $2\frac{1}{2}$ — 3 mm. Op bloeiende wilgen en voorjaarsbloemen als: viooltjes, Primula's, Anemonen enz. Niet inlandsch. In België bij Namen, Luik, Hastière en Verviers; in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. (triviale Er.) (*primulae* Steph.)

Halsschild geheel zwart of bruinzwart 6

- 6 Halsschild aan de zijden voor de achterhoeken met een breed, vrij diepen indruk. Dekschilden in beide seksen recht afgeknot 7

Halsschild met eene meer of minder diepe, smalle randgroef, welke van de basis tot iets over het midden doorloopt. Lichaam zwart; kop en halsschild zeer weinig glanzig; dekschilden glanzig, lichter of donkerder roodbruin. Sprieten, behalve aan het uiteinde, benevens de pooten geelachtig. Halsschild breed, naar de basis weinig versmald, met meer of minder rechte achterhoeken, lijn bestippeld en soms met eene onduidelijke middengroef. Dekschilden vrij sterk en dicht, eenigszins rimpelig, soms hier en daar een weinig in rijen bestippeld; bij het ♂ afgeknot, bij het ♀ iets meer platgedrukt en met uitgetrokken, eenigszins opgericht naadhoek. Bij het ♂ zijn de schenen aan de basis iets gekromd. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Gemeen op allerlei bloeiende planten, veldbloemen, vooral voorjaarsbloemen, grassen en waterplanten 3. *minutum* F.

- 7 Sprieten roodgeelachtig, met bruinachtig uiteinde. Lichaam slanker dan bij *minutum*, glanzig zwart. Dekschilden donkerbruin of bruinzwart. Pooten roodgeel. Halsschild naar voren duidelijk smaller, dicht en grover, op het midden meer verspreid bestippeld, met stompe achterhoeken. Dekschilden naar verhouding tot het halsschild langer dan bij *minutum*, dicht en sterk, grover dan het halsschild bestippeld. Bij het ♂ is het derde tot vijfde sterniet in 't midden van een kielvormig bultje voorzien, het zesde diep hoekig ingesneden en daarvoor ingedrukt. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Op bloeiende heesters en boomen als: wilgen, mei- en sleedoorn en soms onder vochtige bladeren. Niet inlandsch. In België bij Verviers; in de Rijnprov. bij Aken (nigrum Er.) (*atrum* Heer)

Sprieten geheel geelachtig. Deze soort gelijkt zeer op *atrum*, doch is iets breder. De kop is veel minder, het meer gewelfde halsschild veel lijner en meer verspreid bestippeld. Kop en halsschild zeer lijn geelagrineerd, bij het ♂ tamelijk glanzig. Bij het ♂ zijn de eerste drie voortarsen-ledjes vrij sterk, het vierde minder verbreed. Ook zijn bij het ♂ de middelschenen iets gekromd. Lengte $2\frac{1}{2}$ — 3 mm. Op allerlei bloeiende planten als: lijsterbes, meidoorn, heidekruid enz. Niet inlandsch. In België bij Luik, Verviers, Brussel en Angleur; ook in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld (triviale Heer) (*florale* Panz.)

- 8 Kop roodgeel, het halsgedeelte zwart. Deze soort heeft eenigszins den habitus van *minutum*, doch is roodachtig-geel, weinig glanzig, de dekschilden en pooten iets lichter geel; de sprietknus bruin; het scutellum, sternum en achterlijf zwart. Kop en halsschild lijn en dicht, de dekschilden vrij krachtig, dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. Halsschild ongeveer de helft breder dan lang, met eenigszins stompe achterhoeken, soms met eenige aanduiding van eene middengroef. Dekschilden ruim tweemaal zoo lang als het

halsschild, bij het ♂ aan het uiteinde afgeknut, bij het ♀ met kort uitgetrokken naadhoek. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen op allerlei bloeiende heesters, struiken en lage planten. Volgens Dr. Ritzema Bos vreet zij aan de kroonblaadjes, meeldraden, stempels en het stuiwmeel van *Brassica Napus* en *oleracea* . . . (scutellare Er.) 4. **torquatum** Mrsh.

Kop geheel geel 9

9 Kop onbestippeld of met oppervlakkige verspreide bestippeling 10

Kop en halsschild zeer dicht en duidelijk bestippeld. Lichaam eenkleurig roodgeel, eenigszins dof, de dekschilden glanziger. Sprieten, behalve meestal het bruinachtige uiteinde, de dekschilden en de pooten lichter geelachtig. Halsschild zeer breed, met eenige aanduiding van eene middellijn. Dekschilden in beide seksen afgeknut, tweemaal zoo lang als het halsschild, sterker dan dit bestippeld. Lengte 2—2½ mm. Op allerlei bloeiende planten, als: sneeuwal, meidoorn, *Spiraea*, *Umbelliferae*, *Epilobium angustifolium* enz. Niet inlandsch. In België bij Verviers, Neerhaeren bij Maastricht, Chaudfontaine enz. In de Rijnprov. bij Aken; ook op het eiland Borkum (ophthalmicum Payk.)

10 Sternum geheel geel 11

Metasternum en achterlijf zwart of bruinzwart. Deze soort herinnert in habitus en kleur zeer aan *rectangulum*, doch kop en halsschild zijn glanziger en duidelijker bestippeld. Halsschild iets korter, nagenoeg zonder zijndruk, met flauwe aanduiding van eene middellijn. Dekschilden iets lichter geel, meestal om het schildje iets beroekt, in beide seksen afgeknut. Bij het ♂ is het uiteinde van het achterlijf roodachtig en het vijfde sterniet van twee tandjes voorzien. Bij het ♀ is het uiteinde van het achterlijf zwart. Lengte 1½—1¾ mm. In bosschen op bloeiende heesters en boomen, vooral op meidoorn. Niet inlandsch. In België bij Luik; in de Rijnprov. bij Crefeld (Marshamii Fauvel)

11 Achterhoeken van het sterk verbrede halsschild eenigszins afgerond, van achteren langs den zijrand niet ingedrukt. Doorgaans iets kleiner dan *Marshamii* en vooral onderscheiden door den onbestippelden kop en het kortere, bijna onzichtbaar bestippelde halsschild. Bij het ♂ zijn de dekschilden recht afgeknut, met rechten naadhoek en is het achterlijf geheel zwart; bij het ♀ zijn de dekschilden breed afgerond, met eene hoekige uitranding aan den naadhoek; het achterlijf grootendeels roodgeel. Bij het ♂ zijn de dijen vrij sterk verdikt. Lengte 1½—1¾ mm. Op appel- en perchloesem, *Spiraea's*, biezen enz. Eenmaal bij Ambij nabij Maastricht, Juni. In België bij Leuven, Luik, Antwerpen, Verviers; ook in de Rijnprov. en in Westfalen. 5. **sorbi** Gyll.

Achterhoeken van het weinig verbrede halsschild duidelijk, bijna recht, van achteren langs den zijrand ingedrukt. Lichaam iets langer en smaller dan bij *sorbi*, roodgeel; de sprieten (behalve de bruine knots), de dekschilden en de pooten lichter geel. Achterlijf, behalve het uiteinde, zwart. Kop en halsschild eenigszins dof, uiterst fijn-, nauwelijks zichtbaar bestippeld. Dekschilden duidelijk-, dicht en eenigszins rimpelig bestippeld, aan het uiteinde recht afgeknut. Bij het ♀ is het halsschild korter en breeder, de dekschilden aan den top iets afgerond en het achterlijf geelachtig rood, soms op het midden beroekt. Lengte 1½—1¾ mm. In vochtige weilanden op *Umbelliferae*, vooral in bergachtige streken. In de omstreken van Maastricht; ook in België op vele plaatsen en in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld.

6. **rectangulum** Fauvel.

12 Sprieten geheel geel. Lichaam vrij lang, roodgeel, eenigszins glanzig, vooral de dekschilden, welke evenals de pooten met bleekgeel zijn. Kop en halsschild zeer onduidelijk bestippeld. Halsschild met eenigszins stompe achterhoeken en met eene zeer flauwe midden-groef. Dekschilden ongeveer driemaal zoo lang als het halsschild, het achterlijf geheel of bijna geheel bedekkend, zeer dicht en vrij grof bestippeld, in beide seksen afgeknut; de naadhoek bij het ♀ spits, doch niet uitgetrokken; ook zijn de dekschilden bij het ♀ iets smaller. Achterlijf bij het ♂ zwart met geel uiteinde, bij het ♀ geheel geel. Lengte 2½—2¾ mm. Op heesters en lage planten. Niet inlandsch. In België bij Luik en in de Hautes Fagnes; in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. (longipennis Er.)

Sprieten geel met min of meer bruinachtig uiteinde 13

13 Kop geelachtig, op het achterhoofd min of meer gebruint; het sternum en achterlijf zwartbruin, het achterlijf aan het uiteinde geelachtig. Overigens roodgeel, de dekschilden en de pooten bleekgeel, tamelijk glanzig; gewoonlijk de basis van het halsschild en de dekschilden om het schildje beroekt. Halsschild zeer lijn en vrij dicht bestippeld, met bijna rechte achterhoeken. Dekschilden bij het ♂ 2½ maal, bij het ♀ drie maal zoo lang als het halsschild, bijna het geheele achterlijf bedekkend; behalve aan het uiteinde, vrij sterk en dicht bestippeld; bij het ♂ aan het uiteinde afgerond, bij het ♀ aan den naadhoek spits. Het ♀ is iets grooter, naar het uiteinde meer verbreed, met iets gebruint voorhoofd en met iets korter, breeder en aan de zijden meer afgerond halsschild. Lengte 1½—2 mm. In boschrijke bergstreken

in bloemen, vooral 's avonds. Mei, Juni. Niet inlandsch. In België bij Leuven, Tervueren en in de Hautes Fagnes; in de Rijnprov. bij Bonn en in het Ahldal.

(sordidulum Kr.) (montivagum Heer)

Kop, evenals het lichaam, geheel stroogeel; bij het ♂ het achterlijf, behalve het uiteinde, zwartachtig, bij het ♀ slechts aan de basis iets berookt. Deze soort is vooral onderscheiden door de eenigszins doorschijnende, bleekgele, onduidelijk en zeer verspreid-, naar het uiteinde bijna niet bestippelde dekschilden. Kop en halsschild eveneens zeer onduidelijk bestippeld. Bij het ♀ zijn de dekschilden nog onduidelijker bestippeld en aan den naadhoek spits uitgetrokken. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Op bloeiende appelboomen, in bergachtige streken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Bonn en Elberfeld. (stramineum Kr.)

XXVIII. Tribus PROTEININI.

115. Proteinus Latr.

*Lichaam kort ovaal, iets gewelfd. Kop zonder ocellen. Bovenlip aan den voorrand nagenoeg recht afgeknut en met een in 't midden uitgebogen huidzoom. Voorkaken kort, aan de binnenzijde ongetand. Sprieten kort, het eerste en tweede lid zeer groot, de overige leedjes geleidelijk naar het uiteinde verdikt. Halsschild met nagenoeg rechte achterhoeken, zonder middengroef. Bij het ♂ is het zesde sterniet aan het uiteinde min of meer uitgerand, waardoor het zevende sterniet zichtbaar wordt. Schenen zeer fijn behaard. Tarsen 5-ledig. Bij het ♂ zijn de eerste twee leedjes der voortarsen min of meer verbreed. — De vermoedelijke larve van *P. ovalis* is door Chapuis et Candèze, de larve en pop van *limbatus* door Xamben beschreven. — De soorten van dit genus leven in rottende fungi.*

Van de 6 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Halsschild duidelijk glanzig. Lichaam glanzig-zwart, uiterst fijn behaard. Het eerste sprietlid, veelal de achterrand van het halsschild en de dekschilden min of meer zwartbruin of pekbruin. Kop met twee scheeve indrukken. Halsschild uiterst fijn bestippeld en gechagrineerd. Dekschilden tweemaal zoo lang als het halsschild, vrij sterk en tamelijk dicht bestippeld. Pooten geel, met bruinachtige dijen. Bij uitzondering zijn de sprieten roodachtig en het tweede lid der knots bruinachtig. Bij het ♂ zijn de middelschenen aan de basis gebogen en naar het uiteinde doornachtig behaard; de achterschenen in het midden uitgerand; het zesde sterniet iets uitgerand. Overigens gelijkt deze soort zeer op *brachypterus*. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{4}$ mm. Zeldzaam, in rottende boleten en vruchten. Den Haag, Breda, Berkel en in de omstreken van Maastricht 1. *limbatus* Mäkl.
Halsschild dof. 2
- 2 Het eerste sprietlid bruin- of geelachtig, of wel de eerste twee sprietleedjes geelachtig. . . 3
Sprieten geelachtig en alleen de knots bruin. De kleinste soort van het genus. Zwartbruin; halsschild min of meer roodachtig omzoomd. Dekschilden lichter of donkerder roodbruinachtig, met lichter uiteinde; eenigszins verspreid bestippeld. Sommige exemplaren zijn roodbruin, met kop, midden van halsschild en achterlijf zwartachtig. Lengte 1 mm. In rottende boleten en onder mos. Verspreid, doch zeldzaam; in de provinciën Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. (clavicornis Steph.) 5. *atomarius* Er.
- 3 Sprieten zwart, het eerste lid bruinachtig. Halsschild zeer fijn rimpelig bestippeld, dekschilden zeer dicht rimpelig bestippeld, evenals de rest van het lichaam zwartachtig, soms bruinachtig. Pooten geel, de dijen in het midden gebruind. Overigens op *brachypterus* gelijkende. Bij het ♂ zijn de eerste twee tarsleedjes verbreed, de middelschenen in het eerste derde gedeelte gekromd en de binnenrand van de tophelft zeer kort bewimperd. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Onder doode slakken, in boleten en rottende vruchten. Verspreid doch niet algemeen.
(brevicollis Er.) 2. *ovalis* Steph.
Sprieten zwart, alleen het eerste lid geel. Deze soort is door habitus en kleur zeer verwant aan *ovalis*, doch het halsschild is minder verbreed en duidelijk gechagrineerd, de dekschilden zijn korter en minder dicht bestippeld. Onuitgekleurde exemplaren vertoonen een roodachtig gerand halsschild, een iets bruinachtig gekleurd tweede sprietlid en roodbruine dekschilden. Bij het ♂ zijn de eerste twee voortarsen-leedjes verbreed. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer gemeen in rottende paddestoelen en tusschen schimmelende bladeren 3. *brachypterus* F.
Sprieten zwart, de eerste twee leedjes geel. Deze soort is kleiner, iets smaller en meer gewelfd dan *brachypterus*. Het halsschild is zeer onduidelijk gechagrineerd. Dekschilden veel

lijner en dichter bestippeld. Bij het ♂ zijn de eerste twee voortarsen-leedjes zwak verbreed, de middelschenen gebogen; de achterschenen aan de basis verdikt, in het midden uitgerand en naar den top bewimperd; het zesde sterniet is driehoekig uitgerand. Lengte 1½—1¾ mm. Niet zeldzaam in rottende boleten, tusschen schimmelende bladeren en dood riet.

4. *macropterus* Gyll.

116. *Megarthus* Steph.

Dit genus is vooral gekenmerkt door de uitgesneden achterhoeken en de diepe middengroef van het halsschild. Lichaam breed en tamelijk vlak. Kop zonder ocellen. Voorkaken kort en breed, aan de binnenzijde ongetand. Sprietten slank, doch de eerste twee leedjes aanmerkelijk verdikt. Dekschilden met sterk omgeslagen epipleuren. Schenen fijn behaard. Tarsen 5-ledig. Bij het ♂ is het zesde sterniet diep uitgerand. — De vermoedelijke larve van M. affinis is door Rey beschreven. — De soorten van dit genus leven onder mos en schimmelende bladeren, in gras, achter boomschors, in vochtg hooi en paddestoelen.

Van de 7 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprietten geheel zwartachtig 2
Minstens het eerste sprietlid roodachtig. 4
- 2 De zijden van het halsschild afgerond; aan de achterhoeken slechts met eene kleine uitranding, welke door stompe tandjes begrensd is. Zwart; tamelijk dof, de dekschilden gewoonlijk meer bruinzwart of donkerbruin; de pooten lichter of donkerder roodachtig, de dijen bruinachtig; soms de randen van het halsschild iets lichter. Halsschild minstens dubbel zoo breed als lang, aan voor- en achterrand recht afgeknot, met eene lijne diepe middellijn, dicht rimpelig bestippeld. Dekschilden ongeveer dubbel zoo lang als het halsschild, dicht korrelig bestippeld. Bij het ♂ zijn de achterdijen iets verdikt, de achterschenen gebogen en het zesde sterniet diep uitgerand. Onuitgekleurde exemplaren zijn meer bruinachtig. Lengte 2 mm. Niet zeldzaam in rottende boleten, plantanafval, achter schors, in gras en 's avonds rondvliegende 1. *depressus* Payk.
- De zijden van het halsschild uitgebogen of hoekig 3
- 3 De zijden van het halsschild met eene stomphoekige verbreding, daarvoor tot nabij de voorhoeken uitgebogen, waar zich nog een stomp tandje bevindt; de achterhoeken zijn stomphoekig uitgerand. Bestippeling tamelijk fijn. Deze soort heeft den habitus van *depressus*; lichter of donkerder bruin, de zijden van het halsschild en van het achterlijf, gewoonlijk het uiteinde der dekschilden alsook dat van het achterlijf roodgeelachtig. Bij het ♂ zijn de achterschenen in het midden iets uitgerand. Lengte 2 mm. Onder mos, plantanafval en in rottende Agarici. Volgens *Fauvel* in de geheele „Faune Gallo-rhénane”. Niet inlandsch. In België bij Forest en Wavre; in de Rijnprov. bij Düsseldorf (*affinis* Mill.)
- De zijden van het halsschild met eene stomphoekige verbreding, daarachter tweemaal uitgerand. Deze soort is naverwant aan *denticollis*, doch breeder en iets meer gewelfd. Halsschild breeder, met iets roodachtige zijden. Lichaam zwartachtig of zwartbruin, de pooten roodachtig. Halsschild rimpelig, de dekschilden grof korrelig bestippeld. Bij het ♂ zijn de achterdijen verdikt, de middelschenen iets-, de achterschenen sterker gekromd; het zesde sterniet iets uitgerand. Lengte 2½ mm. In molm van dennen en eiken, plantanafval en rottende paddestoelen. Niet zeldzaam 2. *sinuatocollis* Lac.
- 4 Lichaam zwartachtig, of lichter- of donkerder bruin 5
Lichaam geelachtig-roestkleurig, slechts de kop zwart. Sprietten aan den wortel geelroodachtig, naar het uiteinde min of meer donkerder. Lichaam zeer breed; de dekschilden zeer grof korrelig bestippeld. Bij het ♂ de middelschenen iets gekromd, de achterdijen iets verdikt, de achterschenen van binnen, voor het midden, in een sterken tand verbreed, in 't midden zeer diep uitgerand. Lengte 2½—2¾ mm. In boleten, vooral in bosschen. Verbreid in de diluviale streken en gemeen in de omstreken van Maastricht 4. *hemipterus* Ill.
- 5 Clypeus met smallen, doch duidelijk opgerichten zij- en voorrand; de schedel in 't midden duidelijk gekield, aan weerszijden breed ingedrukt. Halsschild minstens 2½ maal zoo breed als lang, met scherp rechthoekig uitgesneden achterhoeken, in 't midden der zijden zeer zwak- of nauwelijks hoekig, in 't midden iets gewelfd, aan de zijden breed ingedrukt, zeer dicht rimpelig bestippeld. Dekschilden krachtig-, zeer dicht en ruw-, het achterlijf ook zeer dicht en

ruw, doch lijner bestippeld. Lichaam pekzwart of pekbruin, de zijden van het halsschild en het uiteinde van het achterlijf, gewoonlijk ook de dekschilden, lichtbruin; het eerste sprietlid en de pooten roest- of geelrood. Bij het ♂ zijn de voor- en middeldijen eenigszins-, de achterdijen zeer sterk verdikt en deze laatste in het midden van den binnenrand uitgebogen; de trochanters der achterpooten zeer groot, aan het uiteinde in een tand uitgetrokken; de middelschenen tot aan het uiteinde gelijkmatig gekromd; de achterschenen aan de basis knievormig gebogen en aan het uiteinde in een gekromden haak uitgetrokken; ook is het zesde sterniet uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam in rottende boleten, plantenaafval en mos. 3. *denticollis* Beck.

Clypeus met nauwelijks opgerichten voorrand, de schedel niet gekield. Halsschild met zeer sterk en scherp tandvormig naar buiten uitstekende achterhoeken. Dekschilden grover en minder dicht bestippeld; achterlijf veel minder dicht bestippeld. Overigens in kleur met *denticollis* overeenkomende, doch breeder en meer gedrongen. Het eerste of ook het tweede en derde sprietlid geelrood. Bij het ♂ zijn de dijen bijna niet verdikt, de trochanters der achterpooten gewoon, de middelschenen iets gekromd, de achterschenen naar de basis getand, in 't midden sterk uitgebogen en gekorven. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld en Ahrweiler. (*nitidulus* Kr.)

117. *Phloeobium* Boisd. & Lacord.

Dit genus komt in habitus met Megarthrus overeen, doch onderscheidt zich doordat de zijrand van het voorhoofd, boven den sprietaortel, in eene vooruitspringende, door eene insnijding van den clypeus gedeelde lob, verbreed is. Bovendien draagt de kop op het midden van den schedel één oed. Halsschild met eene verdiepte middellijn. De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Licht bruinachtig-geel, dof, grof-rimpelig bestippeld; sprieten donker, het eindlid en soms ook het eerste lid geelachtig. Kop groot, van voren ingedrukt en met hoekigen voorrand. Halsschild dubbel zoo breed als lang, met eene verdiepte middellijn en zeer onduidelijk gekartelde zijden, aan de achterhoeken uitgerand. Dekschilden ongeveer tweemaal zoo lang als het halsschild, langs de zijden onduidelijk gekarteld. Achterlijf lijner bestippeld. Bij het ♂ het zesde sterniet met eene gladde middengroef en aan het uiteinde hoekig uitgerand; de middel- en achterschenen iets gebogen. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam in rottende paddestoelen, onder steenen, dorre bladeren, in boomholm en achter boomschors 1. *clypeatum* Müll.

VIII. Familie MICROPEPLIDAE.

Fig. 27. *Micropeplus porcatius* Payk. Orig.

Kleine, eigenaardig gevormde kevertjes (Fig. 27), welke de aansluiting vormen van de Staphylinidae (Proteinini) aan de Histeridae en aan de Nitidulidae. Zij zijn van de Staphylinidae onderscheiden door de aanwezigheid van diepe sprietgroeven aan weerszijden op de onderzijde van kop en prothorax en door de 9-ledige sprieten, welke in een scherp afgescheiden, eenigszins kogelvormig eindlid eindigen. De kop is tot aan de matig groote, half-kogelvormige, eenigszins uitpuilende oogen in het halsschild teruggetrokken, naar voren driehoekig versmald. De vrij groote clypeus is van het voorhoofd door een rechten of gebogen dwarsnaad afgescheiden, van voren afgeknut of afgerond, bij het ♂ van eenige soorten met een middenrandje. De sprieten staan kort voor de oogen, onder den zeer zwak uitspringenden zijrand van het voorhoofd, ingeplant. Bovenlip hoornachtig; de voorkaken tamelijk klein, aan het uiteinde in twee korte tandjes gespleten. De binnenlob der achterkaken is klein en eindigt in een klein haakje; daarachter met eenige onduidelijke tandjes. De buitenste achterkaakslob is veel langer en aan het uiteinde dicht behaard. Het eerste kaaktaster-lid is zeer klein, het tweede zeer sterk gezwollen, het derde veel smaller dan het tweede, het eindlid dubbel zoo lang als het derde, kogelvormig met stomp uiteinde. Kin verbreed, voor het midden zeer sterk ingesnoerd, dan weer

verbreed en aan den afgeknotten of eenigszins afgeronden voorrand smaller dan aan de basis. Tong vliezig. Liptasters zeer kort en breed, de leedjes sterk verbreed, het eindlid met vliezig uiteinde. Halsschild onmiddellijk tegen de dekschilden aansluitend, aan de basis nagenoeg even breed als de basis der dekschilden, naar voren versmald, aan weerszijden van voor- en achterrand uitgebogen,

VOORLOOPIGE VERBETERINGEN EN BIJVOEGINGEN.

- Op bladz. 5, regel 7 v. o. staat: Engidae; lees Engini (Erotylidae).
- „ „ 16, „ 1 v. o. is de b van *Chrysobothris* uitgevallen.
- „ „ 18, „ 10 v. o. na (Fig. 78 1) bij te voegen: Bij het Zuid-Europeesche genus *Luciola* is de kop grootendeels onbedekt en het halsschild aan de zijden slechts smal bladachtig verbreed.
- „ „ 19, regel 1 v. b. moet na achtervleugels volgen: , behalve bij het Zuid-Europeesche genus *Luciola*.
- „ „ 19, regel 31 v. b. staat: Telephoridae; lees Telephoridae.
- „ „ 22, „ 1 v. o. ontbreekt de s aan het einde van *Phoenicocerus*.
- „ „ 34, „ 2 v. o. is achter schildje het woord „gerand” uitgevallen.
- „ „ 38, Van *Calosoma sycophanta* L. zijn bij Berlijn en in Saksen exemplaren gevangen, die melanisme vertoonen.
- „ „ 43, regel 27 v. b. en 3 v. o. staat *Kroni*; moet zijn *Kronii*.
- „ „ 43, „ 28 v. o. staat: *versicolor* Goezin; lees *varicolor* Joerin-Gerber.
- „ „ 51, vóór de tweede noot is het cijfer 2) uitgevallen.
- „ „ 53, regel 19 v. o. staat: *Schiodte*; lees *Schödtte*.
- „ „ 55, „ 7 v. o. achter *ustulatum* L. bijvoegen „ex parte”.
- „ „ 57, „ 19 v. b. staat: *coeruleum* Dej.; lees *coeruleum* Serv.
- „ „ 68, „ 30 v. b. achter *melanocephalus* den auteursnaam L. te voegen.
- „ „ 73, *Pterostichus punctulatus* Schaller Faun. nov. sp., bij Roermond in Mei
- „ „ 81, *Amara silvicola* Zimm. Faun. nov. sp. bij den Haag, Rotterdam en Nijmegen.
- „ „ 82, De vindplaats Rotterdam voor *Amara fusca* Dej. vervalt.
- „ „ 114, Bij *Dytiscus* bevindt zich naast de vleugelbasis nog een klein epauletvormig bijvleugeltje.
- „ „ 127, regel 15 v. b. staat: *nigrifrons*; lees *nigriceps*.
- „ „ 142, Van *Dytiscus punctulatus* F. ontving ik van Dr. *A. C. Oudemans* een bij Arnhem gevangen exemplaar van ab.c. *maurus* Schauf., zijnde een prachtig voorbeeld van melanisme; de kleur is geheel als die van *Hydrophilus piceus*.
- „ „ 172, *Homocusa acuminata* Märk. Faun. nov. sp., bij Valkenburg (Limb.) in Mei, bij *Lasius niger*.
- „ „ 259, *Lamprinus haematopterus* Kr. Faun. nov. sp., bij Valkenburg (Limb.) Mei en Juni, met de larve, bij *Tapinoma erraticum*.
- „ „ 284, regel 5 v. b. staat: 17 in het aangrenzend gebied; moet zijn 10.
- „ „ 292, „ 2 v. b. staat: *gracilis* Latr.; lees *gracilis* Letzn.
- „ „ 323, „ 1 v. o. achter *vafellus* den auteursnaam Er. te voegen.

Bij den Uitgever dezes is verschenen :

DE NEDERLANDSCHE INSECTEN

DOOR

DR J TH. OUDEMANS

AFLEVERING 1—6

MET 18 STEENDRUKPLATEN EN RUIM 200 FIGUREN IN DEN TEKST

PRIJS PER AFLEVERING 90 CENTS

Het werk zal compleet zijn in omstreeks 12 afleveringen met 38 steendrukplaten en ruim 300 figuren in den tekst.

COLEOPTERA NEERLANDICA

DE SCHILDVLEUGELIGE INSECTEN

VAN

NEDERLAND

EN HET

AANGRENZEND GEBIED

DOOR

JHR. ED. EVERTS, PHIL. DR.

*Leeraar in de Nat. Historie aan de Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage
Lid van de Nederlandsche en andere Entomologische Vereenigingen*

DEEL I

Met 62 houtsneëfiguren in den tekst

TWEEDE GEDEELTE

'S GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF

1899

1775

U. S. NATIONAL MUSEUM

LIBRARY OF
Henry Guernsey Hubbard
AND
Eugene Amandus Schwarz

DONATED IN 1902

ACCESSION NO. *177574.*

op het gewelfde midden en binnen de sterk opgerichte zijden met ruitvormige groeven. De dekschilden, welke de eerste drie tergiten bedekken, vertoonen een scherpkantig opgerichten naadrand, een scherpkantig opgerichten rand der epipleuren en zijn bovendien van eenige langsribben voorzien. De vleugels zijn volgens *Roger* ovaal, nagenoeg alleen uit het volkomen pigment- en aderlooze topgedeelte bestaande, waarbij het basaalgedeelte als een rudimentair aanhangsel aanwezig is; het gewricht is gewoon; de aderen zijn rudimentair en de achterrand van vrij lange wimperharen voorzien. Achterlijf kort en breed, naar het uiteinde toegespitst, met breed opgerichte zijden; de ringen zijn nagenoeg even vast aaneen verbonden als bij de *Pselaphidae*; de eerste 4 onbedekte tergiten aan de basis met 4 van elkaar gescheiden, vierhoekige dwarsgroeven. Sterniten aan de basis dwars gegroefd, het zesde sterniet bij het ♂ aan het uiteinde uitgerand. De buikplaat van den tweeden achterlijf-ring ontbreekt; het eerste sterniet vormt tusschen de achtercoxae een breede, van voren afgeknotte voortzetting. Het mesosternum vertoont gewoonlijk drie ruitvormige groeven; het metasternum is groot, door groeven en uithollingen zeer oneffen. Pooten kort en dun. De coxae zijn klein en steken nauwelijks uit; de voorcoxae zijn cilindervormig, de middelcoxae kegelvormig-ovaal en staan ver van elkaar verwijderd, de achtercoxae zeer kort, in de breedte kegelvormig en eveneens ver van elkaar verwijderd. Trochanters der achterpooten groot, minstens 1/2 zoo lang als de achterdijen. Tarsen kort, 3-ledig, de eerste twee leedjes kort, het eindlid twee- of driemaal zoo lang als de eerste twee leedjes te zamen.

De zeer eigenaardig gevormde larve, welke in 't oog valt door de sterk ontwikkelde, geheel verhoorde, in zijstukken uitgetrokken rugschilden van thorax en achterlijf, komt veel overeen met die van sommige *Staphylinidae* (*Syntomium*), herinnert ook aan sommige *Silphiden*-larven, doch wijkt meer af van die der *Nitidulidae*, waartoe *Lubbock* dit genus eerder dan bij de *Staphylinidae* rekent. *Fauvel* en *Ganglbauer* beschouwen de *Micropeplidae* als een onderfamilie van de *Staphylinidae*.

Deze familie is slechts door een enkel genus in Europa vertegenwoordigd.

1. *Micropeplus* Latr.

De soorten van dit genus leven in aantal bijeen in vuilnis, aanspoelsel en schimmelmelende plantenstoffen. Zij vliegen veelal rond na zonsondergang. — De larve van M. staphylinoides is door Lubbock beschreven.

Van de 12 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Tusschenruimten der langsribben op de dekschilden krachtig bestippeld 2

Tusschenruimten der 3 langsribben op elk der dekschilden glad en nagenoeg onbestippeld.

De kleinste soort van het genus. Zwart of donkerbruin. Voorhoofd met twee bultjes; halsschild kort. Lengte 1½ mm. Onder plantenafval, in oude eikenstronken en op lage planten langs oevers; ook in bosschen 's avonds rondvliegende. Niet inlandsch. In Duitschland en Engeland; in Noord-Frankrijk bij Rijssel (*tesserula* Curt.)

- 2 Dekschilden elk met 5 langsribben 3

Dekschilden elk met 4 langsribben 4

- 3 Het vierde onbedekt tergiet met vier even groote, verdiepte vakjes als die der 3 voorafgaande tergiten. Voorhoofd ingedrukt, met opgerichten zijrand. Lichaam donkzwart; sprietwortel en pooten roodachtig. Halsschild bijna dubbel zoo breed als lang, naar voren sterk versmald, aan weerszijden in het midden hoekig verbreed, met verscheidene door verheven lijnen netvormig begrensde vakjes. Onuitgekleurde exemplaren zijn bruin of geelrood met zwarten kop. Bij het ♂ is het laatste sterniet hoekig uitgerand. Lengte 1½–2½ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam; onder steenen, oud hout, dorre bladeren, mos en in droog gras. **1. porcatus** Payk.

Het vierde onbedekt tergiet met 4 kleinere, alleen aan de basis aangeduide, verdiepte vakjes. Voorhoofd niet ingedrukt. Kop en halsschild zeer rimpelig, doch slechts met zeer oppervlakkige indrukken. Deze soort is doorgaans iets kleiner dan *porcatus*, doch evenzoo gekleurd. Lengte 1½ mm. In Noord- en West-Duitschland; in het voorjaar langs overstromende weilanden. Niet inlandsch. (*caelatus* Er.)

- 4 Dekschilden korter dan te zamen breed, duidelijk smaller dan halsschild en achterlijf, aan het uiteinde slechts iets ingedrukt. Voorhoofd met twee bultjes, welke elk van een stippel voorzien zijn. Halsschild korter en breeder dan bij *fulvus*. Achterlijf met een kielvormige middellijn, welke op het vierde onbedekt tergiet hoog opgericht is. Lichaam zwart, de randen van het halsschild roodachtig doorschijnend. Spriet en pooten roodachtig. Onuitgekleurde exemplaren zijn meer geelbruin- of geelachtig, hetzij eenkleurig of met bruinen kop. Bij het ♂ eindigt de clypeus van voren in een korten tand en zijn de schenen ook minder getand dan bij *fulvus*; bij het ♀ zijn deze deelen ongetand. Lengte 2–2½ mm. Op droge plaatsen onder steenen, dorre bladeren in kuilen, in *Agarici* van weilanden,

- bij mieren en soms rondvliegende. Eenmaal bij den Haag, in Maart. In België bij Brussel en in de Rijnprov. bij Bonn. 2. *staphylinoides* Mrsh.
 Dekschilden even lang als te samen breed, weinig of niet smaller dan halsschild en achterlijf, aan het uiteinde duidelijk ingedrukt 5
 5 Schedel in het midden met 5 naar voren convergeerende, kielvormige langslijnen. Middenkiel van het vierde onbedekt tegtiet kamvormig opgericht. Lichaam dofbruin, de zijden van het halsschild, de sprieten en pooten roodachtig. Dekschilden tusschen de 4 langssribben minder sterk en meer verspreid bestippeld dan bij *porcatus*. Onuitgekleurde exemplaren zijn geelachtig met donkeren kop. Bij het ♂ eindigt de clypeus van voren in een puntigen tand; de schenen zijn aan den binnenrand, in het topgedeelte, van een klein tandje voorzien; het laatste sterniet is aan het uiteinde uitgerand. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Onder stroo en stalmest; veelal 's avonds rondvliegende. Zeer zeldzaam; den Haag, April en Mei . . . 3. *fulvus* Er.
 Schedel met eene middenkiel en aan weerszijden met eene bultige verhevenheid. De middenkiel van het vierde onbedekt tegtiet is gewoon en eindigt in het midden. Deze soort is naverwant aan *fulvus*, doch grooter, met grover en meer verspreid bestippelde dekschilden. Bij het ♂ zijn de clypeus en de voorschenen gewoon; de middelschenen daarentegen aan den binnenrand, in het topgedeelte, van een lijn-, de achterschenen dichter bij het midden van een krachtiger tandje voorzien. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet inl. Zij zou in de Rijnprov. voorkomen. Ik ken deze soort naar een ex. uit het Weener Hofmuseum. (Longipennis Kr.)

IX. Familie PSELAPHIDAE.

Kleine of zeer kleine, sierlijke, meestal blinkende kevertjes, met afgekorte dekschilden welke het achterlijf, op de eerste twee tergiten na, onbedekt laten en daarin met de Staphylinidae overeenstemmen. Kop van achteren bijna altijd halsvormig ingesnoerd; de clypeus veelal met bultige of kegelvormig uitstekende zijhoeken; het voorhoofd veelal naar voren in een, meest door eene langsgroef gedecklen bult verlengd, onder welks zijhoeken de sprieten ingeplant staan. Oogen meer of minder grof gefacetteerd; bij de wijfjes van vele soorten zijn de oogen veel kleiner dan bij de mannetjes (*Trimium*) of ontbreken geheel (bij het niet inl. genus *Machaerites*). Bij enkele

genera zijn de beide seksen blind of slechts van rudimentaire oogen voorzien (o. a. het inlandsche genus *Claviger*). Sprieten vóór de oogen, onder den zijrand van het voorhoofd, ingeplant en tengevolge van de meerdere of mindere ontwikkeling van het voorhoofd, verder van elkaar of dichter bijeen geplaatst; zeer veranderlijk in het aantal (van 2 tot 12) en in den vorm der leedjes; in den regel zijn zij 11-ledig; gewoonlijk zijn de sprieten naar het uiteinde verdikt en vormen de laatste 3 leedjes meestal eene meer of minder duidelijke knots; bij vele genera is slechts het eindlid zeer groot 1). Bij vele mannetjes vertoonen enkele of meerdere spriedleedjes een bijzonder afwijkenden vorm. — Bovenlip veelal uitgerand of 2 tot 3-maal oppervlakkig uitgebogen. Voor- kaken gewoonlijk sikkelvormig en zeer scherp toegespijst, aan den binnenrand meestal getand, doch niet, zooals bij de Staphylinidae, van een bewimperd vlies voorzien; soms is de buitenrand verbreed of getand; bij de *Clavigerinae* zijn zij stomp afgeknot en van binnen ongetand. Achterkaken met twee, aan het uiteinde en aan de binnenzijde, bewimperde lobben, van welke de buitenste grooter dan de binnenste is; bij de *Clavigerinae* zijn de beide achterkaakslobben met bundels van lange haren bezet. Kaaktasters zeer veranderlijk in vorm, meestal 4-ledig; het wortellid klein; het tweede lid gewoonlijk aan de basis dun, gekromd en aan het uiteinde knotsvormig verdikt; het derde gewoonlijk kort; het eindlid zeer veranderlijk en veelal zeer groot (fig. 28 I); het eindlid

I. 28 I. Reukter van *Pselaphus* Heister Heister. Naar Imhoff.

II. Trochanter van de achterpooten van *Trichomyx* Heister Heister. Reichb. Orig.

III. Trochanter van de achterpooten van *Pselaphus* Heister Heister. Orig.

vertoont aan den top altijd een zeer klein vliezig, priemvormig aanhangsel; het tweede en derde

I. Bij de Zuid-Aziatische en Australische *Cyathigerina* zijn de 5—11-ledige sprieten, na het zeer lange schafvormige eerste lid, geknukt.

lid is soms van eene zijdelingsche al of niet bewimperde voortzetting of aanhangsel voorzien. Bij enkele genera zijn de kaaktasters 2- of 3-ledig, bij de *Clavigerinae* daarentegen ongeleed. Kin meestal smal, aan het uiteinde afgeknot of iets uitgerand. Tong zeer klein, vliezig, naar het uiteinde verbreed en aan de zijden met de groote, divergeerende paraglossen vergroeid. De paraglossen overschrijden de tong ver en zijn aan de binnenzijde krachtig bewimperd; bij de *Clavigerinae* zijn zij bijzonder groot, verbreed en van lange haarbundels voorzien. De dragers der lipstasters zijn met elkaar vergroeid, bedekken de tong en worden zelf weder door de kin bedekt. Lipstasters zeer klein, 2-ledig; bij de *Clavigerinae* 1-ledig. — Halsschild zeer verschillend gevormd, meestal met basaalgroefjes of ook wel met langsgroeven. — Schildje zeer klein. — Dekschilden meestal met eene geheel doorlopende naadstreep en met eene, zeldzamer met twee afgekorte rugstrepen, welke evenals de naadstrepen achter de basis in een groefje beginnen; dikwerf is van de rugstrepen slechts het basaalgroefje aangeduid. De omgeslagen zijden der dekschilden zijn veelal, door eene kantig begrensde zijstreep, als epipleuren scherp afgescheiden.

De vrij groote, in de rust volkomen onder de dekschilden geborgen achtervleugels zijn zeer dicht en kort behaard en vertoonen geen duidelijk ontwikkeld adernet. Bij *Pselaphus Heisei* zijn zij volgens *Roger* lang-elliptisch en ligt het gewricht ver voor het midden naar de basis; het topgedeelte is daardoor ongeveer driemaal zoo groot als het basaalgedeelte. De weinig duidelijke vena externo-media deelt den vleugel in twee bijna gelijke deelen. De vena interno-media en de vena analis zijn slechts flauw aangeduid; dwarsverbindingen ontbreken. De achterrand is met enkele lange wimperharen bezet en heeft in het midden eene oppervlakkige inbuiging, aan welke de wimperharen ontbreken. Blinde en van rudimentaire of van zeer kleine oogen voorziene soorten zijn ongevlengeld.

De epimeren van den prothorax zijn met het prosternum en de epipleuren volkomen versmolten; de voorste gewrichtsholten zijn daardoor van buiten gesloten, van achteren echter geheel open. De groote episternen van den mesothorax zijn duidelijk van het mesosternum gescheiden, de epimeren daarentegen, zonder eenige aanduiding van eenen naad, vergroeid. Metasternum zeer groot en breed, aan de zijden nagenoeg tot aan den rand der dekschilden doorlopende, zoodat van de episternen van den metathorax meestal slechts een van voren gelegen driehoekig stuk zichtbaar blijft.

De voorcoxae steken kegelvormig uit en stooten tegen elkaar aan. De slechts weinig van elkaar gescheiden middelcoxae zijn kogelvormig of ovaal, zelden kegelvormig 1). De achtercoxae zijn sterk verbreed en reiken tot aan den zijrand van het lichaam. Bij de *Euplectini*, *Trichonychini* en het Zuid-Europeesche genus *Faronus* is het binnenblad naar achteren in een kegel- of lobvormig aanhangsel uitgetrokken. De trochanters zijn bij de *Pselaphinae* *brachyscelidae* aan alle pooten kort, de dijbasis is scheef aan de buitenzijde van den trochanter ingeplant en staat dicht tegen de coxae aan (Fig. 28 II); bij de *Pselaphinae* *macroscelidae* en bij de *Clavigerinae* daarentegen zijn de trochanters, ten minste aan de middelpooten, zeer lang, de dijbasis is min of meer scheef op den top van den trochanter ingeplant en staat van de coxae ver verwijderd (Fig. 28 III). De dijen meestal in het midden verdikt, de schenen aan het uiteinde hoogstens met eene rudimentaire eindspoor. Tarsen 3-ledig; het eerste lid zeer klein, het eindlid groot en van twee dunne, gelijke of ongelijke klauwen of slechts van een enkelen klauw voorzien. Het tweede tarslid, evenals het eerste, veelal klein, doch ook dikwerf langer dan het eindlid.

Achterlijf meestal kort en gewelfd, met afwaarts gericht laatste tergiet, met 7 tergiten en 6 sterniten, van welke het eerste sterniet tegenover het tweede tergiet staat; het eerste der vijf onbedekte, geheel verhoorde tergiten is het derde werkelijke tergiet. Het eerste sterniet is veelal kort en wordt door de achtercoxae bedekt. Bij de mannetjes van enkele genera der *Euplectini*, *Trichonychini* en het Zuid-Europeesche genus *Faronus* is het zesde sterniet ingesneden en vertoont nog een of twee bijkomende sterniten. Bij de mannetjes van *Trichonyx* en van het sub-gen. *Biblopectus* van *Euplectus* volgen op het zesde sterniet nog de zijstukken van een gedeeld zevende en een ongedeeld achtste sterniet. De achterlijfsringen zijn niet onderling bewegelijk, zooals bij de *Staphylinen*, doch vast aangegegroeid. Bij de *Clavigerinae* zijn de eerste drie onbedekte tergiten volkomen met elkaar, zonder naden, tot een enkel zeer groot tergiet versmolten. De buik is bij het ♂ gewoonlijk uitgehold of neergedrukt, bij het ♀ gewelfd.

Volgens *Raffray* zijn 9 paar stigmata voorhanden.

Van de larven is alleen die van *Chennium bituberculatum* door *Xamheu* bekend geworden.

De *Pselaphidae* leven meestal op donkere plaatsen, tusschen rottende plantenstoffen, onder steenen, mos, aan boomwortels, in boomhol, aanspoelsel en sommigen in of nabij mierennesten. Zij schijnen vooral van dierlijke stoffen te leven.

Overzicht der Sub-Familiën en Tribus.

- 1 Sprieten 5—12-ledig, het eindlid nimmer recht afgeknot. De lobben der achterkaken met doortjes of ten minste met krachtige wimpers bezet. Kaaktasters meestal 4-ledig, soms 3-ledig, zeer zelden 2-ledig of ongeleed. Achterlijf met 5 onbedekte tergiten en 6—8 sterniten 2). De basis van het eerste onbedekte tergiet of het uiteinde der dekschilden nimmer met haarborstels bezet 1. Sub-Fam. PSELAPHINAE. 2

1) Bij het Zuid-Europeesche genus *Faronus*.

2) Bij de Zuid-Aziatische en Australische *Gyathigerini* echter slechts met twee onbedekte tergiten en twee sterniten.

Spruiten 2- tot 6-ledig, het eerste lid altijd zeer klein en min of meer verborgen, het eindlid aan den top recht afgeknut 1). De lobben der achterkaken en de paraglossen met bundels van lange haren bezet. Kaaktasters ongeleed. Achterlijf met 3 onbedekte tergiten en 6 sterniten; het eerste onbedekt tergiet zeer groot, tegenover het tweede tot vijfde sterniet staande. Lichaam aan de basis van het groote onbedekt tergiet en gewoonlijk ook aan het uiteinde der dekschilden 2) met gele haarbundels bezet (Fig. 29). Trochanters lang, de aan het uiteinde ingeplante dijkwortel daardoor ver van de coxae afstaande.

Fig. 29. *Claviger testaceus* Payson, Orig.

II. Sub-Fam. CLAVIGERINAE. IX. Clavigerini.

- 2 Trochanters van alle pooten kort; de dijbasis aan de buitenzijde van den trochanter ingeplant, weinig van de coxae afstaande (*Pselaphinae brachyscelidae*) (Fig. 28 II). 3
- Trochanters, ten minste der middelpooten, lang, naar het uiteinde meer of minder knotsvormig verdikt; de dijbasis aan het uiteinde van den trochanter min of meer scheef ingeplant, van de coxae ver afstaande. (*Pselaphinae macroscelidae*) (Fig. 28 III). 7
- 3 Achtercoxae met kegelvormig uitpuilend binnenblad 4
- Achtercoxae met niet uitpuilend binnenblad 5
- 4 Tarsen slechts met één klauw I. **Euplectini**.

Tarsen met twee ongelijke klauwen II. **Trichonychini**.

- 5 Eerste sterniet zeer kort, korter dan de achtercoxae 6

Eerste sterniet langer dan de achtercoxae V. **Bythinini**.

- 6 Tarsen met twee zeer ongelijke klauwen III. **Batrisini**.

Tarsen slechts met één klauw IV. **Bryaxini**.

- 7 Eerste sterniet langer dan de achtercoxae, doch korter dan het tweede sterniet. Tarsen slechts met één klauw. VI. **Pselaphini**.

Eerste sterniet zeer kort, korter dan de achtercoxae. Tarsen met twee klauwen 8

- 8 Bovenzijde schubachtig behaard. Clypeus groot, in het midden gewelfd, veelal met kegelvormig uitgetrokken zijhoeken VII. **Gtenistini**.

Bovenzijde met gewone, gewoonlijk langere, zelden zeer korte, nimmer schubachtige beharing. Clypeus gewoon, aan de zijden niet verbreed. VIII. **Tyrini**.

I. Sub-Familie PSELAPHINAE.

I. Tribus EUPLECTINI.

- 1 Eerste sterniet niet of slechts weinig korter dan het tweede. De eerste onbedekte tergiten nagenoeg even lang 2

Eerste sterniet zeer kort. Het eerste onbedekt tergiet duidelijk langer dan het tweede. (*Trimium*.)

- 2 Kop even breed als het halsschild. Het middelste basaalgroefje van het halsschild met de zijgroefjes verbonden. I. **Euplectus**.

Kop smaller dan het halsschild. Het middelste basaalgroefje van het halsschild met de zijgroefjes niet verbonden; deze zetten zich naar voren in eene fijne groef voort. 2. **Bibloporus**.

II. Tribus TRICHONYCHINI.

Het tweede en derde sterniet, evenals de eerste onbedekte tergiten, even lang. 3. **Trichonyx**.

Het tweede sterniet veel langer dan het derde, het eerste onbedekt tergiet veel langer dan de volgende tergiten (*Amauronyx*.)

III. Tribus BATRISINI.

Bevat slechts het genus 4. **Batrisus**.

1) Bij het Oost-Indische genus *Anaclaviger* Ratray stomp toegespitst

2) Bij *Semioclaviger* Wasm. uit Madagascar alleen het uiteinde der dekschilden met vele haarbundels.

IV. Tribus BRAXINI.

- Halschild voor de basis met eene dwarsgroef, welke de drie basaalgroefjes onderling verbindt.
De omgeslagen zijden der dekschilden met eene diep gegroefde langslijn . . . 5. **Braxis**.
Halschild voor de basis zonder dwarsgroef, doch met drie van elkaar gescheiden basaalgroefjes.
Dekschilden op de omgeslagen zijden zonder gegroefde langslijn . . . 6. **Reichenbachia**.

V. Tribus BYTHININI.

- Het eerste onbedekt tergiet niet of slechts weinig langer dan het tweede. Derde kaaktasterlid zeer kort. Halschild met twee groote zijdelingsche basaalgroeven, welke meestal door eene gebogen dwarsgroef met elkaar verbonden zijn; vlak voor de basis zonder groefje. Dekschilden met breede epipleuren, welke door eene lijne doch scherpe, onder de schouderbuil in een diep groefje eindigende, randstreep begrensd worden . . . 7. **Bythinus**.
Eerste onbedekt tergiet duidelijk langer dan het tweede. Derde kaaktasterlid minstens half zoo lang als het tweede. Halschild met twee zijgroeven en vlak voor de basis met eene dwarsrij van vijf kleine groefjes. Dekschilden zonder gerande epipleuren . . . 8. **Tychus**.

VI. Tribus PSELAPHINI.

- Bevat slechts het genus . . . 9. **Psolaphus**.

VII. Tribus CTENISTINI.

- Kaaktasters drie-ledig, de leedjes zonder spitse aanhangsels . . . 10. **Chonnum**.
Kaaktasters vier-ledig, de laatste 3 leedjes aan de buitenzijde met een lang, doornachtig en aan het uiteinde bewimperd aanhangsel. (Centrotoma.)

VIII. Tribus TYRINI.

- Bevat slechts het genus (Tyrus.)

II. Sub-Familie CLAVIGERINAE.

IX. Tribus CLAVIGERINI.

- Bevat slechts het genus 11. **Claviger**.

I. Sub-Familie PSELAPHINAE.

I. Tribus EUPLECTINI.

1. Euplectus Leach.

Lichaam vrij lang en slank, in habitus aan sommige kleine Staphylinidae herinnerend. Kop zoo breed als het halschild. Sprieten kort, 11-ledig, onder den zijrand van het voorhoofd ingeplant, met groot, eivormig eindlid. Kaaktasters 4-ledig, nauwelijks zoo lang als de kop, met spoelvormig toegespitst eindlid. Liptasters 3-ledig. Halschild hartvormig, aan de basis met drie, door eene gebogen dwarslijn verbonden groefjes. Dekschilden met eene verdiepte naadlijn en een langer of korter langsstreepje in 't midden aan de basis. De eerste vier onbedekte tergieten nagenoeg even lang, het eerste aan de basis meestal met twee, van elkaar gewoonlijk op $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet verwijderde basaalstreepjes. Het eerste sterniet niet of slechts weinig korter dan het tweede. Tarsen 3-ledig, met één klauw aan het eindlid. Bij het ♂ zijn 6, 7 of 8 sterniten zichtbaar. — De soorten van dit genus leven op den grond, in gras, onder stukken hout, in vergane plantenstoffen, op bemeste grond, in boomhol, achter schimmelende boomschors, in aanspoelsel en soms bij mieren.

Van de 41 Europeesche soorten komen 8 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild vóór het middelste basaalgroefje met eene verdiepte middellijn of met een midden-groefje. Dekschilden met eene afgekorte rugstreep 2
- Halsschild vóór het middelste basaalgroefje zonder verdiepte middellijn of middengroefje. Dekschilden in plaats van een rugstreepje, met een basaalgroefje (Sub-gen. *Biblopectus* Reitt.). Pekzwart, de dekschilden soms kastanjebruin; sprieten, tasters en pooten geelrood. Kop zoo breed als het halsschild, op het voorhoofd met twee diepe, naar voren convergerende en van voren met elkaar verbonden, van achteren sterk verdiepte langsgroeven; op den schedel met een middengroefje. Halsschild met 3 groote, diepe, door twee lijne, gebogen dwarsgroeven verbonden basaalgroefjes. De eerste twee onbedekte tergiten met twee niterst korte, onduidelijke basaalstreepjes. Bij het ♂ is het metasternum in het midden iets ingedrukt. Lengte ruim 1 mm. Niet zeldzaam, op vochtige plaatsen, in weilanden en 'savonds aan grashalmen; ook in aanspoelsel en bij *Formica rufa*.

8. *ambiguus* Reichb.

- 2 De eerste twee onbedekte tergiten zonder basaalstreepjes (Sub-gen. *Plectophloeus* Reitt.). 3
- De eerste twee onbedekte tergiten met twee basaalstreepjes (Sub-gen. *Euplectus* isp.) . . 4

- 3 Kop glad, op den schedel zonder groefje, zoo breed als halsschild en dekschilden; met twee lange, diepe, evenwijdige langsgroeven, welke van voren door een boogvormigen dwarsindruk met elkaar verbonden en van achteren sterk verdiept zijn. Lichaam roodgeel, glad en glanzig. Sprieten kort en zeer dun. Halsschild even lang als breed, met tamelijk fijne middengroef, welke noch het middelste basaalgroefje, noch den voorrand bereikt. Dekschilden met tamelijk parallel zijden, de rugstrepen ongeveer $\frac{1}{2}$ van de lengte der dekschilden bereikend. Bij het ♂ is de buik in het midden vlakgedrukt, het laatste sterniet aan de basis sterker dwars ingedrukt en de dijen iets verdikt. Lengte 2 mm. Niet inl. Bij Hamburg. Mij onbekend. (Erichsonii Aubé)

Kop minstens aan de zijden duidelijk bestippeld, op den schedel met een onduidelijk groefje, zoo breed als het halsschild, doch smaller dan de dekschilden; met twee vrij lange, naar voren iets convergerende en met elkaar verbonden, van achteren sterk verdiepte langsgroeven. Lichaam geelrood, matig glanzig. Sprieten met duidelijk afgezette, tamelijk breede knots. Halsschild nauwelijks zoo lang als breed, met eene afgekorte middengroef. Dekschilden aan de zijden iets afgerond, de rugstrepen het midden niet bereikend. Bij het ♂ is het voorhoofd van voren uitgehold en aan den voorrand uitgerand, boven de uitholling van een kort, spits, horizontaal uitsteeksel voorzien; de clypeus met eene opwaarts gerichte, hoornachtige plaat; het metasternum over de geheele lengte ingedrukt, het laatste sterniet met eene diepe langsgroef. Bij het ♀ is de voorrand van het voorhoofd zwak afgerond en steekt in het midden eenigszins stomp uit. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Achter rottende boomschors en wellicht bij *Formica rufa*. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld. (Tischeri Heer) (*Fischeri* Aubé)

- 4 De eerste twee onbedekte tergiten met twee langere, tot over het midden reikende basaalstreepjes, daartusschen aan de basis in de breedte zwak ingedrukt 5
- De eerste twee onbedekte tergiten met twee zeer korte, niet tot aan het midden reikende basaalstreepjes, daartusschen aan de basis zeer duidelijk in de breedte ingedrukt 6

- 5 Pekzwart of pekbruin; de sprieten, tasters en pooten geelrood. Kop zoo breed als het halsschild, doch veel smaller dan de dekschilden, van voren met een in het midden minder diepen dwarsindruk, welke aan weerszijden door een groefje begrensd wordt; tusssen de oogen met twee vrij groote, dicht bijeenstaande, ronde groefjes, welke door twee korte, oppervlakkige langsgroeven met den dwarsindruk verbonden zijn; de achterrand van den schedel in het midden iets uitgebogen en zeer kort gekield. Halsschild met eene, van voren diepere, middengroef. Dekschilden breeder dan het halsschild, aan de zijden iets afgerond, met vrij diepe, tot aan het midden doorlopende rugstrepen. Bij het ♂ de achterdijen verdikt; het metasternum met eene middengroef en aan weerszijden in een scherp bultje opgericht; het vierde sterniet steekt in het midden van den achterrand iets uit, het vijfde met een bultje aan weerszijden van de basis; het zesde aan de basis in de breedte ingedrukt, met eene middengroef en aan den achterrand uitgerand; het zevende steekt aan het einde bultig uit. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam, achter boomschors, tusssen dorre bladeren en oud stroo. Eenmaal bij Delft in October 2. *piceus* Motsch.

Lichaam geheel geelrood. Kop groot, minstens zoo breed als het halsschild, van voren met een breeden dwarsindruk, welke aan weerszijden in een klein, doch diep groefje eindigt; tusssen de oogen met twee grootere, rondachtige, dicht bijeenstaande groefjes, welke met den dwarsindruk door twee oppervlakkige langsgroeven verbonden zijn; van achteren op den schedel met eene kortere, smallere middengroef. Halsschild met van voren afgekorte middengroef; het middelste basaalgroefje is kleiner dan de beide zijdelingse. Dekschilden breeder dan het halsschild, met krachtige schouderbuit en vrij diepe, het midden berei-

kende of iets overschrijdende rugstrepen. Bij het ♂ is het metasternum nagenoeg over de geheele lengte gegroefd, het vierde sterniet in het midden van den achterrand stomphoekig naar achteren getrokken en iets ingedrukt, het vijfde in 't midden met een halfcirkelvormigen indruk, het zesde in 't midden met eene diepe dwarsgroef; de middelschienen nabij het uiteinde naar binnen gebogen. Bij het ♀ zijn halsschild en dekschilden duidelijker bestippeld dan bij het ♂. Lengte 2 mm. Onder afgevallen beukenbladeren, uiterst zeldzaam. Eenmaal bij Valkenburg (Limb.) in Juli 1. **brunneus** Grimmer.

- 6 Schedel met een zeer duidelijk groefje. Kop zoo breed als het halsschild; het voorhoofd aan den voorrand en aan de zijden bultig opgericht, met twee diepe, naar voren convergerende, zeldzamer parallelle, van voren door eene dwarsgroef verbonden, van achteren diepere langsgroeven; aan weerszijden achter de voorhoeken op de zijbult met een klein groefje. Lichter of donkerder roodbruin of roestrood, met donkerder dekschilden; ook wel geheel roestrood; sprieten, tasters en pooten geelrood. Halsschild met eene diepe, breede, naar voren ver doorlopende middengroef. Dekschilden lijn bestippeld, met diepe, tot over het midden reikende rugstrepen; aan de basis met 4, veelal paarsgewijs verbonden groefjes; binnen de rugstreep soms nog met eenige aanduiding van eene korte langsstreep. Bij het ♂ vertoont het vijfde sterniet vlak aan de basis 5 breede groefjes, het zesde is van achteren breed hoogsgewijze uitgesneden, het zevende gewelfd en van eene fijne middengroef voorzien. Bij het ♀ is het laatste tergiet aan het uiteinde in een klein bultje uitgetrokken. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Onder vochtige bladeren, in rottend hout, in boomholm en op mestkuilen. Zeer zeldzaam. Indertijd bij Delft in het eerste voorjaar in den afval van eene suikerfabriek. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 3. **nanus** Reichenb.

Schedel zonder groefje, hoogstens van achteren zwak uitgerand 7

- 7 Kop duidelijk smaller dan de dekschilden, glanzig, slechts aan de zijden bestippeld 8

Kop zoo breed of nagenoeg zoo breed als de dekschilden 9

- 8 Lichaam roodbruin, kastanjebruin of zwartbruin, glanzig; de sprieten, tasters en pooten geelrood. Kop zoo breed als het halsschild en iets smaller dan de dekschilden; evenals bij *nanus*, doch met veel minder diepe voorhoofds-groeven en daardoor met veel vlakkeren en breeder afgezette zijden, ook zonder schedelgroefje. Halsschild met een diep middengroefje. Dekschilden met diepe, het midden niet bereikende rugstrepen. Bij het ♂ vertoont het metasternum eene zwakke-, het zesde sterniet eene zeer diepe, breede middengroef. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Onder rottende plantengestoffen, achter boomschors, in oud stroo, mest van broeibakken voor meloenen, alsook eenmaal gemeen in den afval eener suikerfabriek bij Delft 4. **sanguineus** Denny.

Lichaam geheel roodgeel. Kop en halsschild iets minder breed dan bij *sanguineus*. Bij het ♂ is het zesde sterniet in het midden diep en breed gegroefd en aan weerszijden daarvan in een krachtigen bult opgericht. Van Karstenii is deze soort onderscheiden door den veel smalleren, glanzigen kop en door de kenmerken van het ♂. Overigens aan *sanguineus* zeer verwant. Lengte ruim 1 mm. Onder rottende plantengestoffen, oud stroo enz. In aantal bij Loosduinen uit de zwammige schors van een dooden abeel, Juni en Juli; ook bij Delft, Nootdorp, Arnhem en Groesbeek; bij Roermond in de nesten van *Formica rufa*. Ook in de Rijnprov. 5. **signatus** Reichenb.

- 9 De kop in 't midden veel minder bestippeld dan aan de zijden. Het vierde sterniet bij het ♂ aan den achterrand, aan weerszijden van het midden, met eene halfcirkelvormige uitranding, aan den buitenrand daarvan met een groefje 10

Kop overal even dicht bestippeld. Het vierde sterniet bij het ♂ gewoon. Deze soort is verwant aan *Karstenii*, doch onderscheidt zich door meerdere grootte, den korteren, breederen, veel sterker en overal even dicht bestippelden kop, het iets breedere en sterker bestippelde halsschild met langere middengroef, en door de kenmerken van het ♂. De kop is met de oogen dubbel zoo breed als van den achterrand des schedels tot aan den voorrand lang. Bij het ♂ is het vijfde sterniet in het midden zeer kort-, het zesde zeer diep ingedrukt. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Achter boomschors. Niet inl. In Noord-Frankrijk bij Rijssel (punctatus Muls.)

- 10 Roodgeel. Kop zoo breed als de dekschilden, krachtig en dicht-, in 't midden veel minder bestippeld; van voren met een dwarsindruk, welke aan weerszijden door een klein groefje begrensd is; op het voorhoofd met twee oppervlakkige, parallelle, van voren met elkaar verbonden langsgroeven. Halsschild lijn bestippeld, met een diep middengroefje. Dekschilden met nagenoeg parallelle zijden en diepe, ongeveer tot aan het midden reikende rugstrepen. De eerste twee onbedekte tergieten met twee korte basaalstreepjes, daartusschen in de breedte ingedrukt. Bij het ♂ is het metasternum over het midden oppervlakkig gegroefd, het vijfde sterniet in het midden bijzonder kort, het zesde in het midden van den achterrand stomphoekig uitgesneden en de randen van de uitsnijding bultig verdikt. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm.

Verbreid; onder rottende plantenstoffen, achter boomschors en in molm van oude boomen; ook bij *Lasius fuliginosus*. 6. **Karstenii** Reichenb.

Naverwant aan *Karstenii* en *punctatus*, doch vooral onderscheiden door de kenmerken van het ♂. Grooter, vlakker en met langer en dichter behaarde dekschilden dan bij *Karstenii*; van *punctatus* onderscheiden door den minder breedten kop. Bij het ♂ is het metasternum in 't midden oppervlakkig gegroefd, het vijfde en zesde sterniet nagenoeg over de geheele breedte diep dwars ingedrukt, met opgerichten achterrand. Lengte 1½ mm. Uiterst zeldzaam. Bij den Haag onder dorre bladeren; ook bij Arnhem. 7. **intermedius** Wollast.

2. *Biblorus* Thoms.

Dit genus onderscheidt zich van Euplectus, doordat het middelste basaalgroefje van het halsschild niet met de zijgroefjes verbonden is. De zijgroefjes zetten zich naar voren in eene fijne groef voort. Ook is de kop veel smaller dan het halsschild en zijn de slapen veel korter en convergeeren naar achteren. De dekschilden zijn veel breeder dan het halsschild, tamelijk gewelfd en aan de zijden afgerond.

Van de 7 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Pekzwart, zeer fijn en kort grauw behaard; de sprieten, tasters en pooten geel. Kop smaller dan het halsschild, aan weerszijden achter den sprietwortel met eene kleine bultige verhevenheid; tusschen de oogen met twee vrij diepe groefjes. Halsschild iets voor het midden het breedst, voor het middelste basaalgroefje met eene afgekorte middengroef. Dekschilden veel breeder dan het halsschild, ongeveer even lang als te zamen breed, tamelijk gewelfd, met diepe, ongeveer tot aan het midden reikende rugstrepen. De eerste onbedekte tergieten zonder basaalstreepje of wel het eerste of ook nog het tweede met twee uiterst korte basaalstreepjes. Bij het ♂ is het metasternum in het midden breed ingedrukt; het eerste sterniet in het midden met eene sterk verheven, van boven afgeplatte en iets uitgeholde langskiel; het tweede sterniet iets langer dan het derde, het vijfde in het midden tot op den achterrand onder het vierde teruggetrokken, het zesde zoo lang als het vierde en vijfde te zamen, van achteren breed en diep uitgerand, het zevende in twee smalle, eene langsgroef insluitende zijstukken verdeeld; de trochanters der middelpooten aan den binnenrand der dijen verlengd en in een doorn uitgetrokken, de middeldijen zeer sterk verdikt, aan de binnenzijde uitgerand, de middelschenen in het midden van den binnenrand in een zeer sterken, driehoekigen tand verbreed. Bij het ♀ het metasternum gegroefd; het eerste sterniet met eene als bij het ♂ gevormde langskiel, de volgende sternieten gewoon, het vijfde in het midden tot op den achterrand onder het vierde teruggetrokken; de middelpooten gewoon. Lengte ongeveer 1 mm. Onder afgevallen bladeren, mos en achter boomschors. Zeldzaam; in het voorjaar in het Haagsche bosch en bij Delft onder schimmelmend stroo. In de Rijnprov. bij Crefeld 1. **bicolor** Denny.

Trimium Aubé.

Kop vrij groot, even breed als of slechts weinig smaller dan het halsschild, bij het ♂ met grootere, bij het ♀ gewoonlijk met tamelijk kleine oogen. Kaaktasters matig lang, 4-ledig, met vrij groot spoetvormig eindlid. Sprieten kort, met buitengewoon groot, ovaal eindlid. Halsschild vrij lang, vóór het midden het breedst, met drie basaalgroefjes, van welke het middelste door eene gebogen lijn met de zijdelingsche verbonden is. Dekschilden breeder dan kop en halsschild, tamelijk gewelfd, met doorlopende naadstreep en verkorte rugstrepen, welke beiden in een groefje beginnen. Bij de gevleugelde mannetjes zijn de dekschilden langer dan of minstens even lang als te zamen breed en vertoonen eene krachtige schouderhuil; bij de ongevleugelde wijfjes zijn de dekschilden korter en naar de basis sterk versmald, zoodat eene schouderhuil bijna niet aanwezig is. Het eerste onbedekte tergiet is veel langer dan het tweede, aan de basis van twee basaalstreepjes voorzien. Het eerste sterniet is zeer kort en aan den achterrand dicht met gele haren bezet. Tarsen 3-ledig, met één klauw. — De soorten van dit genus leven onder vochtige bladeren en mos.

Van de 18 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Kop nauwelijks zoo breed als het halsschild, met een van voren zeer diepen, hoelijzer-vormigen indruk en een langsgroefje op den schedel. Halsschild langer dan breed, met drie tamelijk

kleine, door twee gebogen dwarslijnen met elkaar verbonden basaalgroefjes. Het eerste onbedekt tergiet, tusschen de op een vierde van de breedte van elkaar verwijderde korte basaalstreepjes, dwars ingedrukt. Het ♂ lichter of donkerder roodbruin, de dekschilden bruinrood, het achterlijf zwartachtig, de sprieten, tasters en pooten roodgeel; zeldzamer roodgeel met bruin achterlijf, of wel geheel roodgeel; de kop met vrij groote oogen, het halsschild duidelijk langer dan breed; de dekschilden veel breeder dan het halsschild, langer dan te zamen aan het uiteinde breed, met sterk uitpuilende schouderbui; het metasternum van achteren gegroefd, het laatste sterniet zeer zwak en breed ingedrukt. Het ♀ is geheel roodgeel; de kop met zeer kleine oogen, het halsschild weinig langer dan breed, de dekschilden iets korter dan te zamen breed, naar de basis sterk afgerond en versmald, zonder uitpuilende schouderbui. Lengte ongeveer 1 mm. Onder afgevalen bladeren, mos en drogen mest. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf.

(♀ brevipes Chaud.) (brevicorne Reichenb.)

II. Tribus TRICHONYCHINI.

3. Trichonyx Chaud.

Kop breed, met groote, afgeronde slapen. Sprieten matig dik, met verlengde middenleedjes en groot, ovaal toegespitst eindlid; aan de zijden van den kop in eene groef ingeplant. Kaaktasters tamelijk slank, met lang spoekvormig, toegespitst eindlid. Halsschild even breed als of breeder dan de kop, hartvormig, met geheel tot aan de basis doorlopende middengroef en drie basaalgroefjes, van welke het middelste door eene gebogen dwarsgroef met de groote zijgroefjes verbonden is. Dekschilden met geheel doorlopende naadstreep en sterk verkorte, binnen de schouderbui dieper ingedrukte, rugstrepen, welke beiden iets achter de basis der dekschilden in een groefje beginnen; de breed omgeslagen zijden tot dicht achter de schouderbui door een scherpen, naar voren verkorten zijkant van de rugzijde afgescheiden. Het tweede en derde sterniet, evenals de eerste drie onbedekte tergiten, even lang. Het eerste onbedekt tergiet aan de basis hoogstens met twee rudimentaire basaalstreepjes. Bij het ♂ is een, in twee driehoekige zijstukken gedeeld, zevende en een elliptisch achtste sterniet zichtbaar. Tarsen met twee ongelijke klauwen. — De soorten van dit genus leven bij mieren; zij vliegen op warme zomeraavonden rond.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Roodachtig-geelbruin, dicht neerliggend geelachtig behaard. Kop smaller dan het halsschild, bijna onbestippeld. Halsschild breeder dan lang, uiterst lijn bestippeld. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, lijn en dicht bestippeld, tusschen naad- en rugstreep met eene korte, oppervlakkige, soms bijna niet aangeduide langsgroef. Bij het ♂ zijn de dijen en de middelschenen dikker; ook zijn de middelschenen aan de binnenzijde, nabij het uiteinde, van een doorn voorzien. Lengte 2½ mm. In oude boomstronken en achter boomchors, bij *Lasius brunneus* en *Ponera contracta*. Rotterdam, Arnhem, Zutphen, Valkenburg en Bemelen bij Maastricht. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf.

1. *sulcicollis* Reichenb.

Amanronyx Reitter.

Dit genus is naverwant aan Trichonyx, doch onderscheiden door het veel langer tweede sterniet en eerste onbedekt tergiet. De sprieten zijn meer ineen-gedrongen, de middelste leedjes min of meer verbreed. De middengroef op het halsschild loopt niet tot aan de basis door, doch eindigt in het middelste basaalgroefje. De basaalstreepjes van het eerste onbedekt tergiet zijn zeer kort, doch duidelijk. — De soorten van dit genus leven bij mieren.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Licht roodbruin, vrij lang, neerliggend geelachtig behaard. Kop nagenoeg zoo breed als het halsschild. Halsschild hartvormig, even lang als breed; behalve de basaalgroeven en de middengroef, aan weerszijden tegen de basis aan nog met twee kleine groefjes. Dekschilden de helft langer dan het halsschild, zeer lijn doch weinig bestippeld. De korte basaalstreepjes van het eerste onbedekt tergiet op ongeveer iets meer dan ¼ van de breedte van elkaar

verwijderd. Bij het ♂ zijn de trochanters der middelvoeten van een stomp doontje voorzien; het laatste sterniet ingedrukt. Lengte 2 mm. Bij *Tetramorium caespitum* en *Ponera contracta*. Niet inlandsch. In België en in de Rijnprov. bij Elberfeld.

(Maerkelii Aubé)

III. Tribus BATRISINI.

4. Batrisus Aubé.

*Lichaam langwerpig, sterk gewelfd. Sprieten onder de voorhoeken van het voorhoofd of onder twee naar voren gerichte sprietbulten ingeplant, gewoonlijk dik en meestal met grootere, bij het ♂ verschillend gevormde eindleedjes. Kaaktasters vrij lang, met groot, meestal spoetvormig of in vorm zeer veranderlijk eindlid. Halsschild met drie door eene dwarsgroef vereenigde basaalgroeffjes, uit welke drie verdiepte lijnen naar voren verlopen; bovendien nog aan weerszijden met twee kleinere groeffjes, dicht nabij den zijrand. Dekschilden buikig gewelfd, met geheel doorlopende naadstreep, welke in een basaalgroeffje begint; met een korten indruk binnen de schouderbult, welke van binnen door een, eveneens uit een basaalgroeffje ontspringende, naar binnen sterk verkorte, rugstreep begrensd wordt; tusschen de basaalgroeffjes van naad en rugstreep is nog een derde basaalgroeffje voorhanden, dat zich naar achteren soms in eene zeer korte groef verlengt. De zijden van het achterlijf niet opgericht; het eerste sterniet zeer kort, korter dan de achtercoxae; het laatste sterniet groot, bij het ♂ ingedrukt of gegroefd. Tarsen met twee zeer ongelijke klauwen. — De soorten van dit genus leven bij mieren, vooral bij *Lasius*-soorten, in oude boomen en onder stenen; zij voeden zich volgens Wasmann met Acarinen.*

Van de 14 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Eindlid der kaaktasters vóór het midden het breedst. Halsschild voor de basis zonder doornachtige bultjes. Tweede en derde onbedekt tergiet aan de zijden niet gerand of slechts aan de basis met eene zijkiel. Derde tarslid veel korter dan het tweede. Achterschenen zonder eindspoor (Sub-gen. *Batrisus* isp.). Licht roodbruin, glanzig, zeer kort en weinig behaard. Sprieten dik, de middelste leedjes breed rondachtig, de 3 eindleedjes grooter en breeder, het eindlid ovaal en toegespitst, bij het ♂ aan de onderzijde uitgehold en aan de basis der uitholling van een haakvormigen tand voorzien. Schedel bultig opgericht, van voren en aan weerszijden eenigszins hoefijzer-vormig ingedrukt, van achteren met een groeffje; het voorhoofd van voren recht afgeknot. Halsschild in 't midden der zijden bultig verbreed, tusschen de basaalgroeffjes rimpelig. Dekschilden lijn bestippeld, tusschen de naad- en rugstreep met eene zeer korte basaalgroef. Het eerste onbedekt tergiet met drie even breede, zeer diepe en scherp begrensde basaalgroeven, aan den buitenrand der zijdelingsche basaalgroeven met eene schuine, het midden van het sterniet iets overschrijdende kiel. Middeldijen bij het ♂, aan de binnenzijde in het midden, van een zeer kleinen doorn voorzien; de middelschenen in het eerste gedeelte scherp tandvormig, voor het uiteinde stomp verbreed en aan den top met een rechten, naar binnen gerichten doorn. Het grootste tweede sterniet is bij het ♂ van achteren gegroefd. Lengte 3—3½ mm. De grootste Europeesche Pselaphide. Bij *Lasius brunneus* aan den voet van oude boomen. Uitsluitend bij Aalbeek nabij Valkenburg (Limburg) in Juli gevangen. Ook bij Benheim en Düsseldorf . . . 1. **formicarius** Aubé.

Eindlid der kaaktasters dichter bij de basis het breedst. Halsschild voor de basis met doornachtige bultjes. Tweede en derde onbedekt tergiet aan de zijden volkomen gerand (Sub-gen. *Batrisodes* Reitt.). 2

2 Achterschenen zonder eindspoor 3

Achterschenen met eene duidelijke eindspoor. Het derde tarslid korter dan het tweede. Lichaam bruinrood, de dekschilden meestal lichter rood, fijn en vrij lang behaard. Kop met uitpuilende oogen, het voorhoofd aan weerszijden in een vrij langen sprietbult uitgetrokken. Sprieten tamelijk slank, de middelste leedjes langer dan breed, bij het ♀ het negende en tiende lid weinig verbreed, nagenoeg kogelvormig, niet breeder dan lang, het eindlid lang-ovaal, toegespitst en naar het uiteinde uitgebogen; bij het ♂ het tiende lid grooter dan bij het ♀, zijdelings hoekig verbreed en aldaar met eenige lange haren bezet, het eindlid onder aan de basis met een kleinen afstaanden doorn bewapend. De hoog opgerichte, naar voren in de sprietbulten voortgezette zijden van den kop zijn rimpelig bestippeld en

van achteren gekield. Halsschild zoo lang als breed, in 't midden der zijden iets bultig verbreed. Dekschilden met stomp uitstekende schouderbult, nauwelijks zichtbaar bestippeld. De 3 basaalgroeven van het eerste onbedekt tergiet niet diep, de middelste iets breeder dan de beide zijdelingsche. Het derde tarslid veel korter dan het tweede. Het ♂ met scherp tandvormig uitgetrokken trochanters der middelpooten en een vrij langen, lijnen doorn in het midden van den binnenrand der middeldijen. Lengte 2 mm. Bij *Lasius brunneus*. Niet inl. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en Elberfeld . . (oculatus Aubé).

- 3 Sprietten dik, de middelste leedjes duidelijk breeder dan lang. Kop van achteren meestal zonder zijkiel. Het derde tarslid veel korter dan het tweede. De middelste basaalgroef van het eerste onbedekt tergiet slechts iets smaller dan de zijdelingsche. Lichaam roodbruin, het achterlijf donkerder bruin; de bovenzijde tamelijk fijn neerliggend behaard. Bij het ♀ is het negende sprietlid weinig-, het tiende meer vergroot, het eindlid kort ovaal, toegespitst en naar het uiteinde uitgerand; bij het ♂ is het negende sprietlid kort en dubbel zoo breed als lang, het tiende zeer groot, kogelvormig, weinig breeder dan lang, het eindlid onder aan de basis van een recht afstaand doortje voorzien. Kop dicht rimpelig bestippeld, de schedel bultig opgericht, door een enigszins hoelijzer-vormigen indruk omgeven, van achteren gegroefd. Halsschild voor het midden der zijden bultig verbreed. Dekschilden met uitpuilende schouderbult, zeer fijn bestippeld. Bij het ♂ de trochanters der middelpooten in een zeer klein tandje uitgetrokken, de middeldijen aan de binnenzijde in het midden van een borstelachtig doortje voorzien, de middelschenen aan de binnenzijde nabij het uiteinde stomp verbreed en dan tot aan het uiteinde uitgerand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Bij *Lasius brunneus*, achter boomschors en in holle boomen, zeldzamer onder afgevallen bladeren. Niet inl. In de Rijnprov. bij Cleef, Crefeld en Düsseldorf.

(Delaportei Aubé).

Sprietten slanker, de middelste leedjes niet breeder dan lang. Kop van achteren aan weerszijden met eene duidelijke zijkiel. Het derde tarslid nauwelijks korter dan het tweede. De middelste basaalgroef van het eerste onbedekt tergiet half zoo breed als de beide zijdelingsche 4

- 4 Dekschilden met gewoon uitpuilende schouderbult, zeer fijn bestippeld. Bij het ♀ is het negende sprietlid weinig vergroot, kogelvormig, het tiende sterker vergroot, iets breeder dan lang, het eindlid lang-ovaal, toegespitst en naar het uiteinde uitgerand; bij het ♂ is het negende lid kort en breed, het tiende groot en tamelijk kogelvormig, het eindlid onder aan de basis van een afstaand doortje voorzien. Schedel weinig opgericht en tamelijk glad, soms gekield, de zij-indrukken van den kop van voren meestal vereenigd, van achteren diep gegroefd. Halsschild voor het midden aan de zijden bultig verbreed. Bij het ♂ de trochanters der middelpooten in een zeer klein tandje uitgetrokken; de middeldijen aan de binnenzijde in het midden van een zeer klein borstelachtig doortje voorzien, de middelschenen nabij het uiteinde zeer weinig naar binnen verbreed en dan tot aan het uiteinde uitgerand. Licht roodbruin, het achterlijf donkerbruin of zwart, van boven langer en krachtiger behaard dan Delaportei. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Bij *Lasius brunneus*, in oude boomstronken en achter boomschors. Eenmaal bij Tiel. In de Rijnprov. bij Düsseldorf.

2. *venustus* Reichb.

Dekschilden met spits uitstekende schouderbult. Bij het ♂ heeft de clypeus in het midden een lijnen, opwaarts gekromden, van terzijde gezien duidelijk zichtbaren hoorn. Het tiende sprietlid bij het ♂ veel minder vergroot dan bij *venustus* en slechts weinig langer en breeder dan het negende. Overigens aan *venustus* zeer verwant. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Bij *Lasius brunneus*. Eenmaal bij Oldenzaal. In België bij Jemeppe-sur-Meuse 3. *adnexus* Hampe.

IV. Tribus BRYAXINI.

5. *Bryaxis* Leach.

(*Rybasis* Sauley).

Dit genus onderscheidt zich van *Reichenbachia*, doordat de drie basaalgroefjes van het halsschild door eene gebogen dwarsgroef samenhangen, alsmede door de aanwezigheid van eene diepe, naar voren en naar achteren verkorte langsgroef op de omgeslagen zijden der dekschilden. — De soorten van dit genus leven op rechtige plaatsen.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Pekzwart of pekbruin, de dekschilden rood, zeer zelden eveneens nagenoeg zwart; de sprietten bruinrood, de tasters roodgeel, de poelen bruin; soms het geheele lichaam geelrood, of geelrood met pekbruin achterlijf (*ab. nigropygialis* Fairm.). Kop tusschen de oogen met twee groote,

diepe, ronde groeven; van voren met een zeer breedten oppervlakkigen indruk. Sprieten lang en slank, bij het ♂ veel langer dan het halve lichaam. Halsschild breeder dan lang, bij groote mannetjes duidelijk breeder dan de kop, voor de basis met twee groote zijgroefjes en een bijna even groot middengroefje, welke door eene gebogen dwarsgroef met elkaar verbonden zijn. Dekschilden even lang als te zamen breed, bij het ♂ met iets uitgetrokken achterrand. De basaalstreep van het eerste onbedekt tergiet zeer kort, slechts $\frac{1}{2}$ van de lengte van het tergiet bereikend. Bij het ♂ de voorschenen, aan de binnenzijde in 't midden, van een tandje voorzien; de achterschenen iets naar binnen gekromd en naar het uiteinde verbreed. Bij kleine mannetjes is het metasternum en het midden van het achterlijf gewoon ingedrukt; bij groote mannetjes (var. **laminata* Morsch.) vertoont het metasternum eene naar voren gerichte, eenigszins horizontale, tussehen de middelcoxae doorreikende, vrije, van voren ankervormig verbrede plaat; bovendien is hier de buik dieper en breeder ingedrukt. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Op moerassige plaatsen, o. a. onder mos, zeldzaam; Middelburg, den Haag, Veenendaal, Utrecht, Lochem, Haarlem, Breda, Vogelenzang en Zeeburg bij Amsterdam; ook in België en in de Rijnprov. (♂ *longicornis* Leach) 1. *sanguinea* L.

6. Reichenbachia Leach.

(*Bryaxis* Aubé).

Lichaam tamelijk gedrongen en gewelfd. Kop met groote, sterk uitpuilende oogen. Sprieten meestal zoo lang als het halve lichaam, met groot, kegelvormig toegespitst eindlid. Kaaktasters 4-ledig, met langwerpig-eivond of spoelvormig eindlid. Halsschild voor de basis met drie groefjes, welke niet door eene dwarsgroef verbonden zijn; het middengroefje is soms klein, als eene stip, bij eene enkele soort zelfs geheel ontbrekend. Dekschilden veel breeder dan het halsschild, naar het uiteinde iets verbreed, met geheel doorlopende naastreep en eene lange, naar het uiteinde nitgewijschte rugstreep, zonder langsgroef op de omgeslagen zijden. Het eerste onbedekt tergiet zeer lang, aan de basis met twee langere of kortere, aan elkaar parallelle of naar achteren divergeerende langsstreepjes; tussehen deze basaalstreepjes is de basis van het eerste onbedekt tergiet iets ingedrukt en behaard. Bij het ♂ de eerste sterniten in het midden breed ingedrukt. Tarsen slechts met één klauw. — De soorten van dit genus leven vooral op vochtige plaatsen, onder steenen, in vochtig mos en op grasvelden; enkelen treft men uitsluitend op ziltten bodem aan.

Van de $\pm$ 60 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Het middelste basaalgroefje van het halsschild groot, even groot en diep als de beide zijdelingsche (Sub-gen. *Brachygluta* Thoms.) 2
- 2 Het middelste basaalgroefje van het halsschild zeer klein (Sub-gen. *Reichenbachia* isp.) 8
- 3 De eerste onbedekte tergieten in beide seksen gewoon; de langsstreepjes van het eerste onbedekt tergiet reiken meestal tot aan- of tot iets over het midden, bij uitzondering niet geheel tot aan het midden. De kleur van het lichaam is in den regel lichter of donkerder kastanjebruin, bruinzwart of zwart, de dekschilden veelal bruinrood of bloedrood 3
- 4 De eerste twee onbedekte tergieten, of ten minste het eerste alleen bij het ♂ door bijzondere sculptuur in 't oog vallend. Kop en halsschild nagenoeg onbestippeld, glad. (Behalve de geheel geelroode *R. haematica* behoort nog tot deze groep *R. Helferi*, welke in habitus en kleur sterk aan *Lefebvrei* en *haemoptera* herinnert, doch onderscheiden is, doordat de langsstreepjes van het eerste onbedekt tergiet zeer kort zijn en slechts tot op $\frac{1}{2}$ van de lengte van het tergiet reiken). 7
- 5 Dekschilden veel korter dan te zamen breed 4
- 6 Dekschilden iets langer dan-, even lang als- of slechts zeer weinig korter dan te zamen breed 5
- 7 Lichaam donker kastanjebruin, de dekschilden lichter of donkerder roodbruin. Sprieten donkerbruin, de tasters en pooten iets lichter bruin. De streepjes van het eerste onbedekt tergiet iets divergeerend en iets over het midden reikend, aan de basis op $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Bij het ♂ de dijen verdikt, de trochanters der voorpooten stomphoekig verbreed; de voorschenen van binnen aan het uiteinde van een zeer dunnen, de middelschenen van een dikkeren, korten doorn voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Niet iul. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. (*haemoptera* Aubé)
- 8 Lichaam geheel donker kastanjebruin of bruin, zelden diep zwart (*ab. aterrima* Reitt.), de

sprieten, tasters en pooten rood 1). De streepjes van het eerste onbedekt tergiet weinig divergeerend, doch ver over het midden reikend en aan de basis op $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Halsschild met zeer groote basaalgroeven. Bij het ♂ de trochanters der voorpooten in een scherpen, iets naar buiten gekromden tand uitgetrokken; de voor- en middelschenen van binnen aan het uiteinde van een klein doornje voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren, tusschen mos, dood riet en onder stukken hout. De abt. *aterrima* bij Hillegersberg 1. **fossulata** Reichb.

- 5 Sprieten en tasters zwartachtig. Lichaam zwart of bruinzwart, zeldzamer bruin; de dekschilden roodbruin. Dekschilden iets langer dan te zamen breed. De streepjes van het eerste onbedekt tergiet naar achteren divergeerend en nagenoeg het midden van het tergiet bereikend, aan de basis op meer dan $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Bij het ♂ de trochanters der voorpooten in een langen, lijnen, scherpen doorn uitgetrokken; de voorschene aan het uiteinde van een zeer duidelijk-, de middelschenen van een minder duidelijk doornje voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Op moerassige plaatsen. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf (Lefebvrei Aubé)

Sprieten, tasters en pooten rood 6

- 6 Halsschild zeer verspreid bestippeld. Lichaam donkerder of lichter kastanjebruin, de dekschilden rood. Dekschilden zeer weinig korter dan te zamen breed. De streepjes van het eerste onbedekt tergiet iets divergeerend en het midden van het tergiet bereikend, aan de basis op meer dan $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Bij het ♂ de trochanters der voorpooten gewoon, het uiteinde der middelschenen aan de binnenzijde van een zeer lijn, kort doornje voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Langs de zeekust. Niet inl. In Noord-Frankrijk en Engeland (simplex Waterh.) (Waterhousei Rye)

Halsschild fijn en dicht bestippeld. Lichaam donker kastanjebruin, de dekschilden rood. Dekschilden nagenoeg even lang als te zamen breed, zeer fijn en dicht bestippeld. De streepjes op het eerste onbedekt tergiet iets divergeerend en het midden van het tergiet gewoonlijk niet geheel bereikend, aan de basis op meer dan $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Bij het ♂ de dijnen verdikt, de trochanters der voorpooten in een langen, spitsen, iets naar buiten gekromden doorn uitgetrokken, de voorschene van binnen aan het uiteinde met een onduidelijk-, de middelschenen met een duidelijk doornje. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en bij Gulik in aanspoelsel van de Roer (xanthoptera Reichb.)

- 7 Pekbruin, de dekschilden bloedrood; de sprieten en tasters donkerder-, de pooten lichter roodbruin. Dekschilden even lang als te zamen breed. De streepjes van het eerste onbedekt tergiet kort, slechts $\frac{1}{2}$ van de lengte van het tergiet bereikend, divergeerend en aan de basis bij het ♂ op meer dan $\frac{1}{2}$, bij het ♀ op $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Bij het ♂ het eerste onbedekt tergiet voor het midden van den achterrand met een klein bultje, hetwelk van achteren door een half-cirkelvormigen indruk omgeven is; de trochanters der voorpooten in een zeer langen, spitsen, naar voren gericht en naar achteren gekromden doorn uitgetrokken; de middelschenen van binnen nabij het uiteinde met een langen, schuinen doorn. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam op zeeklei, o. a. bij Zeeburg (Amsterdam), in Zeeland en op Texel; zeldzamer langs de stranden 2. **helferi** Schmidt.

Geheel geelrood. De streepjes van het eerste onbedekt tergiet parallel of een weinig divergeerend, op $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. De trochanters der voorpooten bij het ♂ gewoon. Bij den in Noord- en Middel-Europa voorkomenden vorm (*sinuata*, *bidenticulata* Aubé) is bij het ♂ het eerste tergiet in 't midden van den achterrand bochtig uitgesneden en vertoont het tweede tergiet aan de basis achter de uitsnijding van het eerste, twee kleine groeffjes; het derde tergiet is gewoon 2). Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Op vochtige plaatsen in gras; verbreid, doch zeldzaam 3. **haematica** Reichb.

- 8 Kop en halsschild matig fijn, dicht en zeer duidelijk bestippeld, weinig glanzig. Lichaam roestrood, zeer kort behaard. Dekschilden veel korter dan te zamen breed. De streepjes van het eerste onbedekt tergiet zeer kort, aan de basis op $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Bij het ♂ vertoonen de trochanters der voorpooten een klein en recht-, die der middelpooten een langer-, naar voren en naar buiten gebogen doornje; de voorschene zijn van binnen in het topgedeelte van een klein tandje, de middelschenen van binnen nabij het uiteinde van een klein doornje voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, onder afgevalen bladeren en vochtig hooi; in vochtige bosschen tegen den avond op grassen en biezen; ook in aanspoelsel 4. **juncorum** Leach.

1) In Zuid-Europa komt eene licht-bruinroode aberr. voor (*infuscens* Reutt.)

2) In Zuid-Europa komen nametjes voor, bij welke de eerste twee of drie onbedekte tergieten nog reingsams anders gevormd zijn

Kop en halsschild glad, onbestippeld. Lichaam zwart, de dekschilden bloedrood; de sprieten en pooten bruin, de middelste sprietleedjes, de schenen en de tarsen niet zelden bruinachtig-rood, de tasters geelrood. Dekschilden nagenoeg even lang als te zamen breed, uiterst fijn bestippeld, aan de basis tusschen de beide kleine groeften van de naad- en rugstreep nog met een klein basaalgroeftje. De streepjes van het eerste onbedekt tergiet divergeerend, aan de basis op $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Bij het ♂ vertoonen de middelcoxae een kleinen, naar buiten gekromden doorn; de middel-schenen van binnen naar het uiteinde met een zeer duidelijk, schuin staand doortje. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. In moerassige streken onder afgevallen bladeren en plantenalval. Uitsluitend bij Roermond gevangen; ook in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf.

5. *impressa* Panz.

V. Tribus BYTHININI.

7. Bythinus Leach.

Lichaam gewoonlijk kort en gewelfd, gelijkmatig behaard. Sprieten met 3-ledige, zwak afgescheiden knots, het eindlid ovaal toegespitst; bij het ♂ der meeste soorten zijn de eerste twee sprietleedjes, of slechts een van beide door den eigenaardigen vorm bijzonder in het opvallend. Kaaktasters lang; het derde lid zeer kort, het eindlid zeer groot, mestvormig. Halsschild met twee groote zijdelingse basaalgroeven, welke meestal door eene gebogen dwarsgroef met elkaar verbonden zijn; vlak voor de basis zonder groeften. Dekschilden met breede epipteren, welke door eene fijne, doch scherp aangeduide, onder de schouderbuil in een diep groeften eindigende randstreep begrensd worden. Het eerste onbedekt tergiet niet of slechts weinig langer dan het tweede. Het eerste sterniet langer dan de achtercoxae, doch in 't midden ongeveer $\frac{1}{2}$ korter dan het tweede. Pooten bij het ♂ van vele soorten sterk verdikt; de voorschenen bij het ♂ meestal aan de binnenzijde naar den top, uitgerand en aan de basis der uitranding in een tandje uitgetrokken. Tarsen met één enkele klauw, bij het ♀ van enkele soorten nog een tweede, zeer fijne, haarvormige klauw. In vele gevallen schijnt bij de mannetjes dimorfisme voor te komen, daar men vormen van de mannetjes, evenals de wijfjes, met nauwelijks verdikte pooten aantreft en vormen van mannetjes met sterk verdikte dijen, met van binnen sterker getande voorschenen en met verbrede achterschenen, welke naar den top meestal uitgebogen zijn. — De soorten van dit genus leven, evenals die van *Reichenbachia*, onder steenen, vochtig mos enz.

Van de 132 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 8 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild meer of minder dicht bestippeld 2
- Halsschild niet of slechts zeer weinig of onduidelijk bestippeld 4
- 2 Eerste sprietlid bij het ♂, aan de binnenzijde, tandvormig verbreed. Lichaam gedrongen, gewelfd, lichter of donkerder bruinrood, soms de dekschilden of ook het achterlijf pekbruin of wel zwartachtig; de sprieten, tasters en pooten geelrood. Kop rimpelig bestippeld. Halsschild veel breeder dan lang, krachtig en dicht bestippeld. Dekschilden langer dan te zamen breed, grof en meer of minder verspreid bestippeld. Bij het ♂ het tweede sprietlid smaller dan het eerste, eenigszins kogelvormig; de dijen niet verdikt; de voorschenen naar het uiteinde aan de binnenzijde van een klein, scherp tandje voorzien; de achterschenen achter het midden met een zeer klein tandje, dan naar het uiteinde iets gebogen, van binnen zwak uitgerand en dichter en langer behaard. Bij het ♀ de eerste twee sprietleedjes minder verdikt, het eerste slechts weinig langer dan breed, het tweede bijna even breed als het eerste, kogelvormig. Lengte 1— $1\frac{1}{2}$ mm. In het Haagsche bosch langs slooten onder dorre bladeren; ook bij Vorden. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 1. *puncticollis* Denny.
- Eerste sprietlid bij het ♂ zonder tandvormige verbreding. Halsschild iets minder sterk en dicht bestippeld 3
- 3 Dijen bij het ♂ zeer sterk verdikt; de voorschenen bij het ♂ naar het uiteinde aan den binnenrand getand en daarvoor uitgebogen; de achterschenen verbreed, aan het uiteinde iets gekromd en aldaar aan den binnenrand iets uitgebogen. Lichaam zwartbruin, kop en halsschild veelal roodbruin, de sprieten, tasters en pooten rood; soms het geheele lichaam bruinrood. Kop fijn rimpelig bestippeld. Halsschild breeder dan lang, sterk gewelfd, vrij krachtig- en min of meer dicht bestippeld. Dekschilden korter dan bij *nigripennis*, nauwelijks langer dan

te zamen breed, matig grof en tamelijk verspreid bestippeld. Bij het ♂ het eerste sprietlid verdikt, doch minder sterk dan bij *nigripennis*, weinig langer dan breed, naar het uiteinde aan de binnenzijde afgerond-verbreed; het tweede lid iets smaller dan het eerste, kogelvormig. Bij het ♀ is het eerste sprietlid ongeveer $\frac{1}{2}$ langer dan breed, naar het uiteinde zwak verdikt; het tweede lid iets smaller dan het eerste, nagenoeg kogelvormig. Lengte 1—1½ mm. Niet inlandsch. In België bij Groenendael (validus Aubé)

Dijen bij het ♂ niet verdikt; voorschienen bij het ♂ gewoon. Lichaam gedrongen, sterk geweld, bruinrood, de dekschilden bruinzwart; zelden het geheele lichaam eenkleurig roestrood. Kop zeer dicht rimpelig bestippeld. Halsschild breder dan lang, vrij sterk en tamelijk dicht bestippeld. Dekschilden langer dan te zamen breed, grof en matig dicht bestippeld. Bij het ♂ het eerste sprietlid zeer dik, weinig langer dan breed, naar het uiteinde aan de binnenzijde afgerond-verbreed, voor de basis aan de binnenzijde iets gegroefd, het tweede lid veel smaller dan het eerste, kogelvormig, iets breder dan lang. Bij het ♀ het eerste sprietlid cilindervormig, naar het uiteinde nauwelijks verdikt, langer dan bij het ♀ van *puncticollis*, de helft langer dan breed; het tweede lid smaller dan het eerste, eenigszins kogelvormig. Lengte 1½—1¾ mm. Niet inlandsch. In Westfalen.

(*nigripennis* Aubé)

- 4 Tweede sprietlid bij het ♂ sterk verdikt en nagenoeg zoo breed als of iets breder dan het eerste lid, of wel naar binnen verbreed en door den scherpkantigen binnenrand, of door tandvormig uitgetrokken of uitstekende hoeken of door eenige andere bijzondere gedaante onderscheiden. Dekschilden krachtiger bestippeld. 5

Tweede sprietlid bij het ♂ gewoon, slechts half zoo breed als het eerste, iets langer dan breed. Lichaam donker kastanjebruin of zwartbruin, soms de dekschilden donkerder dan de rest gekleurd; de sprieten, tasters en pooten geelrood. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel geelrood. Kop met de oogen weinig smaller dan het halsschild, de voorrand aan weerszijden sterk en bultig opgericht en met eene, tuschen de vrij dikke sprieten eenigszins versmalde, voorhoofdsgrae. Halsschild nauwelijks breder dan lang, glad, onbestippeld. Dekschilden even lang als te zamen breed, tamelijk fijn en verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het eerste sprietlid naar het uiteinde, aan de binnenzijde, in een zeer krachtigen, tandvormigen hock verbreed, aan het uiteinde zelf van een zeer klein of onduidelijk kegelvormig tandje voorzien; voorschienen van binnen naar het uiteinde met een tandje en daarvoor uitgerand. Bij het ♀ is het eerste sprietlid cilindervormig, het tweede slechts iets smaller. Lengte 1½ mm. Niet inlandsch. In geheel Middel-Europa . (*crassicornis* Motsch.)

- 5 Het eerste sprietlid bij het ♂ gewoon, cilindervormig of naar het uiteinde weinig of niet verdikt, niet getand 1) 6

Het eerste sprietlid bij het ♂ sterk verdikt, of naar binnen tandvormig verbreed, of aan de binnenzijde met een haakvormig gebogen dun aanhangsel, of met een groefje 1) 9

- 6 Het tweede sprietlid bij het ♂ zeer groot, naar binnen sterk driehoekig verbreed, dubbel zoo breed als het eerste lid. Lichaam kastanjebruin, de dekschilden en het achterlijf donkerder, de sprieten, tasters en pooten geelrood; soms is het geheele lichaam roestrood. Kop iets smaller dan het halsschild, beiden nagenoeg onbestippeld. Halsschild breder dan lang, onbestippeld. Dekschilden langer dan te zamen breed, met krachtige schouderbuit, vrij sterk en zeer verspreid bestippeld. Bij het ♂ het eerste sprietlid bijna de helft langer dan breed, cilindervormig; de voorschienen aan de binnenzijde naar het uiteinde van een klein tandje voorzien, de achterschenen iets gekromd, aan de binnenzijde naar het uiteinde zeer zwak uitgebogen en langer behaard. Bij het ♀ is het eerste sprietlid cilindervormig, 1½ maal zoo lang als breed; het tweede iets smaller dan het eerste, ovaal, iets langer dan breed, met afgeronde hoeken. Lengte 1½—1¾ mm. Niet inlandsch. Bij Hamburg. . (*nodicornis* Aubé)

Het tweede sprietlid bij het ♂ halvemaa-vormig, langer dan breed, met hollen binnenrand en spits uitgetrokken binnensten basaal- en binnen-tophoek of wel nagenoeg vierhoekig met meer of minder rechten of afgeronden binnensten basaalhoek en spits uitgetrokken binnen-tophoek. Lichaam 1 of ruim 1 mm. lang 7

- 7 Tweede sprietlid bij het ♂ halvemaa-vormig, langer dan breed, met hollen binnenrand en spits uitgetrokken binnensten basaal- en tophoek. Bruinzwart of kastanjebruin, de sprieten, tasters en pooten roodgeel. Kop smaller dan het halsschild, fijn bestippeld. Halsschild breder dan lang, bijna glad. Dekschilden iets korter dan te zamen breed, vrij sterk en verspreid bestippeld. Bij het ♂ het eerste sprietlid verdikt en kort cilindervormig, nauwelijks langer dan breed; dijen en schenen gewoon. Bij het ♀ het eerste sprietlid tamelijk cylin-

1) De wijfjes der soorten van deze heele serie, alsook van enkele andere soorten, zijn niet met zekerheid van elkaar te onderscheiden, zodat het wenschelijk is bij het verzamelen van Bythinussorten, de telkens uit eene hoeveelheid dorre bladeren gezonde exemplaren zoveel mogelijk afzonderlijk te bewaren en door middel van de kenmerken der mannetjes te onderscheiden. Op eene bepaalde plaats komen steeds weinig soorten te zamen voor.

dervormig, weinig langer dan breed, het tweede nagenoeg even breed als het eerste, rond. Lengte 1 mm. Onder afgevallen bladeren van wilgen en elzen, nabij oevers; 's avonds aan grashalmen in weilanden. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. (*Burellii* Denny)

Tweede sprietlid bij het ♂ nagenoeg vierhoekig, met meer of minder rechten of afgeronden binnensten basaalhoek en spits uitgetrokken binnen-tophoek. Lichaam iets grooter dan bij *Burellii* 8

- 8 Het tweede sprietlid bij het ♂ duidelijk breder dan het eerste, naar binnen mesvormig afgeplat, de binnen-tophoek naar voren lang, spits uitgetrokken, de binnenste basaalhoek recht. Het eerste lid in beide seksen veel langer dan breed. De schouders afgerond. Achterschenen bij het ♂ met eene lijne eindspoor. Lichaam roestrood, kastanjebruin of zwartachtig, het achterlijf meestal donkerder gekleurd; de sprietten, tasters en pooten geelrood. Kop iets smaller dan het halsschild, zeer fijn en spaarzaam bestippeld. Eindlid der kaaktasters zeer krachtig ontwikkeld. Halsschild slechts iets breder dan lang, uiterst lijn en zeer verspreid-, soms bijna onzichtbaar bestippeld. Dekschilden even lang als te zamen breed, tamelijk grof en verspreid bestippeld. Bij het ♂ het eerste sprietlid cilindervormig, de helft langer dan breed. Bij het ♀ de twee eerste sprietleedjes minder sterk verdikt, het tweede zoo breed als het eerste, ovaal. Lengte ruim 1 mm. Niet zeldzaam op vochtige weilanden onder steenen en langs slooten onder plantenaafval; ook in *Sphagnum* . . . 2. *securiger* Reichenb.

Het tweede sprietlid bij het ♂ nauwelijks breder dan het eerste, naar binnen mesvormig afgeplat, de binnen-tophoek spits, doch niet naar voren uitgetrokken, de binnenste basaalhoek afgerond. Het eerste lid bij het ♂ nauwelijks-, bij het ♀ iets langer dan breed. De schouders niet afgerond, doch als duidelijke builen zijwaarts uitstekende. Achterschenen bij het ♂ zonder eindspoor. Overigens is deze soort naverwant aan *securiger*, doch onderscheidt zich nog door de kortere wortelleedjes der sprietten en de kortere, breedere dekschilden. Bij het ♀ de eerste twee sprietleedjes weinig verdikt, het eerste cilindervormig, het tweede rondachtig. Lengte ruim 1 mm. Onder plantenaafval. Niet inlandsch. In België bij Groenendael (*distinctus* Chaud.)

- 9 Het voorhoofd aan den voorrand bij het ♂ lang en enigszins spits-, bij het ♀ meer kort en stomp driehoekig verlengd. Clypeus bij het ♂ in 't midden met een fijn, opgericht, van terzijde gezien, duidelijk in 't oog vallend hoorntje. Het eerste sprietlid bij het ♂ groot, doch zonder tandje. Lichaam lichter of donkerder roodbruin; de sprietten, tasters en pooten licht bruinrood. Kop smaller dan het halsschild, bestippeld. Halsschild iets breder dan lang, niet of slechts zeer verspreid en zeer onduidelijk bestippeld. Dekschilden even lang als te zamen breed, sterk en tamelijk verspreid bestippeld. Bij het ♂ is ook het tweede sprietlid groot, kogelvormig, even breed als- of iets breder dan het eerste, aan den binnen-tophoek met een kort tandje; en de voorschenen aan de binnenzijde naar het uiteinde met een klein scherp tandje. Bij het ♀ de eerste twee sprietleedjes veel minder verdikt, het eerste cilindervormig, ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, het tweede iets smaller dan het eerste, ovaal, iets langer dan breed, met afgeronde hoeken. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Vooral in bergstreken, in plantenaafval en achter schors van doode boomen. Een ♀ bij Houthem in Limburg. In de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf. 3. *Curtisii* Leach.

Voorhoofd in beide seksen gewoon. Clypeus bij het ♂ zonder hoorntje 10

- 10 Eerste sprietlid bij het ♂ aan den binnen-tophoek met een aan het uiteinde haakvormig gebogen dun aanhangsel. Lichaam kastanjebruin of licht bruinrood, soms roestrood of met donkerder dekschilden, de sprietten, tasters en pooten geelrood. Kop smaller dan het halsschild, lijn bestippeld, met diepe voorhoofds-groeffjes. Halsschild lijn en verspreid bestippeld. Dekschilden iets langer dan te zamen breed, met krachtige schouderbuil en zeer grof verspreid bestippeld. Bij het ♂ is het tweede sprietlid smaller dan het eerste, breed vierhoekig, naar binnen enigszins bijlvormig afgeplat, met enigszins afwaarts gerichten binnensten basaalhoek en kort uitgetrokken binnen-tophoek; de dijen sterk verdikt; de voorschenen aan de binnenzijde naar het uiteinde met een scherp tandje; de achterschenen verbreed, aan de binnenzijde nabij het midden met een krachtigen tand en tusschen dezen en het uiteinde iets uitgerand, met eene korte eindspoor. Bij het ♀ de eerste twee sprietleedjes matig verdikt, het eerste cilindervormig, $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, het tweede smaller, ovaal, met afgeronde hoeken. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Niet inl. In Westfalen.

(*temoratus* Aubé)

Eerste sprietlid bij het ♂ met tandvormig uitgetrokken binnen-tophoek of aan het uiteinde met een gewoon tandje. Dekschilden minder grof en verspreid bestippeld 11

- 11 Het eerste sprietlid bij het ♂ nagenoeg cilindervormig, meer dan $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, naar het uiteinde iets verbreed, met kort en scherp tandvormig uitgetrokken binnen-tophoek. Lichaam lichter of donkerder kastanjebruin, of wel roestrood met kastanjebruine dekschilden; de sprietten, tasters en pooten geelrood. Kop smaller dan het halsschild, uiterst lijn bestippeld. Halsschild iets breder dan lang, onbestippeld. Dekschilden langer dan te zamen breed, met krachtige schouderbuil, tamelijk grof en vrij dicht bestippeld.

Bij het ♂ het tweede sprietlid niet of slechts weinig smaller dan het eerste, met iets afgeplattten, zwak afgeronden binnenrand, min of meer afgeronden binnensten basaalhoek en meer of minder rechten binnen-tophoek. De voorschenen zijn aan de binnenzijde, naar het uiteinde, van een klein scherp tandje voorzien. In den regel zijn de dijen en schenen gewoon, bij eene in Wurtemberg voorkomende variëteit (*inflatipes* Reitt.) zijn alle dijen sterk verdikt en alle schenen verbreed, de achterschenen naar het uiteinde van binnen uitgebogen. Bij het ♀ is het eerste sprietlid cilindervormig, ongeveer dubbel zoo lang als breed, het tweede iets smaller dan het eerste, nagenoeg even lang als breed. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In Duitschland bij Hamburg, Oldenburg en Elberfeld.

(*clavicornis* Panz.)

Het eerste sprietlid bij het ♂ dik en vrij kort, nauwelijks de helft langer dan breed, voor het midden verbreed en van een groefje voorzien, aan den binnen-tophoek met een gewoon klein tandje. Lichaam zwart of bruinzwart, zelden donker roodbruin; de sprieten en pooten bruinrood, de dijen veelal donkerbruin; de tasters geelrood. Kop smaller dan het halsschild, met vrij groote voorhoofds-groeven. Halsschild nagenoeg onbestippeld. Dekschilden iets langer dan te zamen breed, met krachtige schouderbuil, grof en vrij dicht bestippeld. Bij het ♂ het tweede sprietlid veel smaller dan het eerste, nagenoeg even lang als breed, iets rondachtig, aan de binnenzijde afgeplat, met meer of minder rechten binnensten basaalhoek en scherpen binnen-tophoek. Voorschenen, aan de binnenzijde naar het uiteinde, met een zeer klein, scherp tandje; de achterschenen naar het uiteinde iets gekromd en aldaar met eene korte eindspoor. Bij het ♀ zijn de eerste twee sprietledjes iets verdikt, het eerste cilindervormig, dubbel zoo lang als breed, het tweede smaller, nagenoeg even lang als breed, ovaal. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Op moerassige plaatsen, onder vochtige bladeren, dood riet, aan wortels en in aanspoelsel; 's avonds aan grashalmen. Niet zeldzaam, vooral langs slooten en rivieren. 4. **bulbifer** Reichenb.

8. Tychus Leach.

Sprieten met 3-ledige, duidelijk afgescheiden knots, bij het ♂ meestal anders gevormd dan bij het ♀. Kaaktasters lang, het derde lid minstens half zoo lang als het tweede, veel grooter dan bij Bythinus, spoelvormig of driehoekig; het eindlid groot, evenals bij Bythinus mesvormig, doch veel korter. Halsschild ter weerszijden voor de basis, met een groefje en onmiddellijk voor de basis met eene dwarsrij van 5 kleinere groefjes. Dekschilden zonder gerande epipleuren, met geheel doorlopende naadstreep en een langsindruk binnen de schouderbuil. Eerste onbedekt tergiet duidelijk langer dan het tweede. Tarsen met één klauw. — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen, onder bladeren, plantenafval, tusschen graswortels en in aanspoelsel.

Van de 31 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Zwart, de sprieten en pooten bruinrood, de tasters meer geelachtig, bij ab.c. *dichrous* Schmidt zijn de dekschilden over het midden of wel geheel rood; onuitgekleurde exemplaren geheel roestrood. Kop met zeer dicht bijeenstaande sprietbultjes en twee zeer kleine groefjes op den schedel. Halsschild breeder dan lang. Dekschilden even lang als te zamen breed. Bij het ♂ het vijfde sprietlid sterk vergroot, veel grooter dan het vierde en zesde, in den vorm iets veranderlijk, even lang als of iets langer of wel iets korter dan breed, aan den binnen-tophoek veelal met een klein tandje; metasternum op de achterhelft uitgehold; de trochanters der middelpooten met een naar achteren gericht doortje. Bij het ♀ is het vijfde sprietlid slechts iets grooter dan het vierde, even lang als breed; het mesosternum en de trochanters gewoon. Bij een bij den Haag gevangen ♀ is het linker dekschild eenigszins rood, terwijl het rechter diep zwart is. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Op vochtige plaatsen niet zeldzaam, tusschen dorre bladeren, plantenafval, onder steenen in gras, en in aanspoelsel der rivieren. De ab.c. *dichrous* bij Arnhem, Breda, Oisterwijk en Zeeburg (Amsterdam).

1. **niger** Payk.

VI. Tribus PSELAPHINI.

9. Pselaphus Herbst.

Kop en halsschild smal, de dekschilden van af de basis sterk naar achteren verbreed; het achterlijf zeer breed, met het eerste onbedekt tergiet zeer groot en de volgende tergieten naar beneden omgebogen. Voorhoofd naar voren in eenen, door eene middengroef gedeeld,

bult verengd, onder vier voorhoeken de sprieten ingeplant staan. Sprieten met 3 ledere, bij het ♂ duidelijker afgescheiden, eindledjes. Kaaktasters zeer lang en dun. Het eindlid naar het uiteinde knotsvormig verdikt (Fig. 28 I). Dekschilden met scherp afgescheiden epipleuren, eene geheel doorlopende naadstreep en meestal eene geheel doorlopende rugstreep. Eerste sterniet veel langer dan de achtercoxae, doch korter dan het tweede sterniet. Tarsen slechts met één klauw. — De soorten van dit genus leven in vochtig gras, onder steenen en tusschen vochtige bladeren.

Van de 23 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halschild voor de basis met eene diepe, gebogen dwarsgroef. Lichter of donkerder kastanjebruin, de sprieten en pooten licht bruinrood, de tasters geelrood. Kop weinig langer dan met de sterk uitpuilende oogen breed, met diep gegroefde voorhoofd-uitsteeksel en tusschen de oogen met twee, veelal ineenvloeiende groefjes. Het knotsvormige uiteinde van het laatste kaaktasterlid glad. Halschild weinig langer dan voor het midden breed, naar voren meer versmald dan naar de basis, aan de zijden van achteren gerand. Dekschilden met eene geheel doorlopende, van voren zeer diepe, van achteren tegen de naadstreep gekromde rugstreep. Bij het ♂ het metasternum sterker gewelfd en over het midden gegroefd, welke groef van achteren sterker verdiept is. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Op vochtige weilanden en op zeeklei, tusschen gras en onder steenen. Bij Zeeburg (Amsterdam) en Roermond. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 1. *dresdensis* Herbst.

Halschild voor de basis niet gegroefd. Licht kastanjebruin of roodbruin, met lichtere tasters en pooten; onuitgekleurde exemplaren zijn geheel geelrood. Kop langer dan met de sterk uitpuilende oogen breed, met eene diepe middengroef en tusschen de oogen met twee lichtgele builen. Het knotsvormige uiteinde van het laatste kaaktasterlid raspachtig gekorfeld (Fig. 28 I). Halschild langwerpig, bij het ♀ langer dan bij het ♂, aan de zijden ongerand. Dekschilden met geheel doorlopende, lijne, van achteren tegen de naadstreep gekromde rugstreep. De achterrand van het zeer groote eerste onbedekt tergiet is bij het ♂ meer, bij het ♀ minder naar achteren bochtig uitgetrokken. Het metasternum is bij het ♂ in 't midden breed gegroefd en aan weerszijden van deze groef gekield. Het groote tweede sterniet is bij het ♂ over 't midden in de lengte breed en vlak ingedrukt. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam onder in gras liggende steenen en vochtige planken; soms tusschen afgevallen bladeren en in aanspoelsel 2. *Heisei* Herbst.

VII. Tribus CTENISTINI.

10. Chennium Latr.

Lichaam op de bovenzijde schubachtig behaard. Clypeus groot, in 't midden gewelfd, met veelal kegelvormig uitgetrokken zijhoeken. Sprieten kort en dik, bij het ♀ de laatste 3, bij het ♂ de laatste 4 ledjes iets grooter. Kaaktasters 3-ledig. Halschild aan weerszijden van de basis met eenen indruk. Dekschilden met geheel doorlopende naadstreep en eveneens geheel doorlopende, naar binnen gebogen rugstreep. Bij het ♂ de buik vlak, bij het ♀ gewelfd. Tarsen met twee klauwen. — De vermoedelijke larve van *Chennium bituberculatum* is door Xambou en Ganglbauer beschreven. — De soorten van dit genus leven bij mieren.

Van de 7 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Roodachtig-geelbruin, kort, neerliggend grijsgeel behaard; de beharing dichter en langer aan de zijden en aan de basis van den kop, in het midden en aan de zijden voor de basis van het halschild, aan het uiteinde der dekschilden en van het eerste onbedekt tergiet. Kop met ingesnoerde, door eene groef gedeelde voorhoofds-builen; en met een bultje op den schedel. De zijhoeken van den clypeus lang-kegelvormig uitgetrokken. Sprieten zeer dik, de ledjes van af het tweede tot aan het zevende (♂) of achtste (♀) zeer sterk verbreed. Bij het ♀ de laatste 3 ledjes weinig breder dan het zevende en nauwelijks zoo breed als het tweede lid; bij het ♂ de laatste 4 ledjes veel breder dan het zevende en even breed als het tweede; het eindlid is kort en stomp-ovaal. Halschild afgeknort, kegelvormig, in 't midden van de zijden een weinig verbreed, tamelijk lijn bestippeld, voor het midden van de basis met twee onmiddelijke, scheeve indrukken, welke zich naar voren tot eene korte middengroef verenigen. Dekschilden vrij dicht bestippeld, binnen de schouderbuil met een basaalindruk. Achenlijf zeer dicht bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$ mm. Op onbebouwde plaatsen, bij *Tetramorium caespitum* onder steenen; gewoonlijk in het midden van het nest. Het ♂ verschijnt soms tegen den avond op planten. Door den heer *Wasmann* werd de zeer kenbare larve in een nest van *Tetramorium caespitum* aangetroffen; de kever zelf nog niet. Ook komt deze soort in de Rijnprov. bij Cleef voor. 1. *bituberculatum* Latr.

Centrotoma v. Heyden.

Dit genus is naverwant aan *Chennium*, doch onderscheiden door den meer gedrongen vorm, de 4-ledige kaaktasters, van welke de laatste drie leedjes aan de buitenzijde van een lang doornachtig-, aan het uiteinde betwimperd, aanhangsel voorzien zijn. — De soorten van dit genus leven bij mieren.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Zwartbruin of pekbruin, de sprieten en pooten roodbruin, de tasters geelrood; onuitgekleurde exemplaren geheel roodachtig-geelbruin; kort, neerliggend en iets schubachtig behaard, aan de zijden van den kop, in de basaalgroefjes van het halsschild, aan het uiteinde der dekschilden en aan voor- en achterrand van het eerste onbedekt tergiet dichter behaard. Kop met korte, door een langsgroefje gedeelde, vrij sterk ingesnoerde sprietbultjes, met twee groote, diepe, vrij dicht bijeenstaande groefjes tusschen de oogen. Sprieten kort en dik, bij het ♂ met 4 grootere, nagenoeg even breede eindleedjes; bij het ♀ naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Halsschild breeder dan lang, met afgeronde zijden, naar voren sterker dan naar achteren versmald, met een rond basaalgroefje in 't midden en twee langwerpige zijgroefjes. Dekschilden binnen de schouderbuit met een basaalindruk, eene geheel doorlopende naadstreep en goed ontwikkelde, naar het uiteinde iets naar binnen gebogen rugstreep. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Bij *Tetramorium caespitum*. In Middel-Duitschland. . . (*Lucifuga* Heyd.)

VIII. Tribus TYRINI.

Tyrus Aubé.

Bovenzijde gewoon behaard. Clypeus gewoon, aan de zijden niet verbreed. Kaaktasters 4-ledig. Sprieten met geleidelijk verdikte, zwak afgescheiden, 3-ledige knots. Halsschild sterk gewelfd, achter het midden iets ingesnoerd, met twee zijgroeven, welke door eene fijne gebogen lijn met elkaar samenhangen. Dekschilden tweemaal zoo breed als het halsschild, met geheel doorlopende naadstreep en van achteren afgekorte rugstreep. Pooten lang; de trochanters der middelpooten zeer lang, aan het uiteinde met een grooten, krachtigen, gekromden doorn; de tarsen met twee klauwen.

De enige Europeesche soort, welke in molm en achter schors van oude boomen leeft, komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Zwart of pekbruin, de dekschilden en sprieten roodbruin, de pooten rood en de tasters geel; onuitgekleurde exemplaren licht geelbruin. Kop met twee groote, rondachtige schedelgroefjes. De middelste sprietleedjes bij het ♀ slechts weinig, bij het ♂ duidelijk langer dan breed. Halsschild weinig of niet breeder dan de kop. Dekschilden langer en te zamen, aan het uiteinde, nagenoeg dubbel zoo breed als het halsschild, fijn en niet dicht bestippeld, met eenen indruk binnen de schouderbuit. Bij het ♂ het metasternum van achteren diep uitgehold; bij het ♀ is de indruk van het metasternum veel kleiner en oppervlakkiger, van achteren in een klein bultje opgericht. De doorn der trochanters bij het ♂ iets langer dan bij het ♀. Lengte 2—2½ mm. In bergstreken achter schors van oude boomstronken, bij mieren; ook onder steenen, waar zij waarschijnlijk kleine larven en Acarinen verslindt. Niet inl. In de Rijnprov. (*mucronatus* Panz.)

II. Sub-Familie CLAVIGERINAE.

IX. Tribus CLAVIGERINI.

11. *Claviger* Preyßler (Fig. 29, blz. 372.)

Lichaam van achteren breed, naar voren zeer sterk versmald. Kop zonder oogen, zeer smal en lang, vóór de basis diep ingesnoerd, met korte middengroef. Voorhoofd tusschen de diepe sprietgroeven neergebogen en tot eene plaat versmald. Sprieten aan de zijden van het voorhoofd, in een groefje ingeplant, 6-ledig, kort, dik, de eerste twee leedjes zeer klein, het eerste moeielijk zichtbaar, het eindlid groot, met parallelle zijden of naar het uiteinde iets verbreed. De monddeelen zijn geatrophiceerd, de ongelede kaaktasters knievormig gebogen en aan het uiteinde van twee vliezige

aanhangsels voorzien. Halsschild aan de zijden zeer sterk samengedrukt, met een basaalgroefje in 't midden of met eene korte middengroef; aan de ver neergebogen, ongerande zijden vóór de basis sterk ingedrukt. Dekschilden aan de basis weinig breeder dan het halsschild, naar het uiteinde zeer sterk verbreed, van achteren breed neergebogen, nabij de achterhoeken plooiachtig opgericht en met lange, gele haren bezet. Het huiltengewoon groote, onbedekt eerste tergiet aan weerszijden in de voorhoeken van een bundel gele haren voorzien en aan den voorrand met korte gele haartjes omzoomd; ook de basis is ingedrukt en vertoont in 't midden twee diepe, meer of minder evenwijdige langsstrepen of eene zeer diepe langsgroef. De twee laatste tergieten zijn neergebogen. Zes sterniten: het vijfde bij het ♀ zeer kort, doch duidelijk zichtbaar, bij het ♂ geheel onder het vierde teruggetrokken; het zesde bij het ♀ horizontaal en gewoon, bij het ♂ neergebogen en met een kiekvormig bultje. Bij het ♂ zijn het metasternum en de basis van het achterlijf, over het midden, lang geel behaard. Alle trochanters zijn lang; de dijen krachtig ontwikkeld; de tarsen 3-ledig, het eindlid groot, iets gekromd en van één klauw voorzien. Bij het ♂ de middelschenen naar het uiteinde met een scherp tandje. — Over de eerste toestanden en de levenswijze van *Cl. testaceus* schreef Muller, von Heyden en Wasmann. — De soorten van dit genus zijn echte mierengasten, welke vooral bij *Lasius*-soorten leven. Zij scheiden uit de met gele borstelharen bezette deelen van het lichaam een rocht af, dat door de mieren gretig afgelikt wordt. Zelf worden zij door de mieren gevoed en noodigen haar daartoe uit, door aanraking met de knotsvormige sprieten.

Van de 26 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Achterlijf, op de neergebogene basis van het zeer groote tergiet, met twee diepe, nagenoeg evenwijdige langsstrepen, welke ongeveer op $\frac{1}{2}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd zijn, daartusschen niet gegroefd (Sub-gen. *Claviger* Lap.). Roodgeel, op de bovenzijde, behalve op de glanzige basis en het midden van het groote tergiet, zeer fijn en dicht bestippeld en neerliggend geel behaard. Kop smal, nagenoeg even lang als het halsschild. Sprieten ongeveer tweemaal zoo lang als de kop, tamelijk slank; het derde lid lang gestrekt, ruim 4 maal zoo lang als breed, het vierde minstens dubbel zoo lang als breed, het vijfde minstens even lang als breed, het eindlid de helft langer dan breed, naar het afgeknotte uiteinde eenigszins geleidelijk verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Gewoonlijk bij *Lasius umbratus*, zeldzamer bij *Lasius brunneus* en *niger*; bij uitzondering bij *Myrmica laevinodis*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Cleef, Elberfeld en Barmen.

(*Longicornis* Müll.)

Achterlijf aan de basis van het zeer groote tergiet met een grooten, scherp begrensden, diepen, langwerpige-ovalen indruk (Sub-gen. *Claviger* isp.). Roodgeel; kop en halsschild dicht, de dekschilden en het achterlijf, behalve de gladde basis en het gladde midden van het groote tergiet, minder dicht doch langer geel behaard. Kop langer dan het halsschild. Sprieten slechts weinig langer dan de kop, het derde tot vijfde lid breed, het vierde en vijfde meer dan dubbel zoo breed als lang, het derde iets smaller, het zeer groote eindlid slechts iets dikker dan het vijfde, $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Het meest bij *Lasius flavus*; ook wel bij *L. alienus*, zelden bij *L. niger*; bij uitzondering bij *Myrmica laevinodis*. Onder steenen op dorre plaatsen, welke aan de zon zijn blootgesteld; vooral op kalkboden. Uitsluitend bij Valkenburg (Limburg) gevangen, Juni. In de Rijnprov. bij Aken; ook bij Oldenburg (*foveolatus* Müll.) 1. *testaceus* Preysl.

X. Familie SCYDMAENIDAE.

Kleine of zeer kleine, sierlijke, meestal vrij slanke en in den regel ongevlugelde kevertjes, welke in habitus en grootte veelal aan de Pselaphidae doen denken, doch het meest verwant zijn aan de Silphidae (Sub-fam. Cholevinae). Sommigen vertoonen in habitus iets van kleine Anthicus-soorten, anderen (*Cephennium*) herinneren door den meer verbreedten vorm aan Atomaria; gewoonlijk zijn zij op de bovenzijde meer of minder fijn behaard.

Kop langer of korter, meestal aan de basis meer of minder ingesnoerd en alsdan door eene steelvormige verbinding aan het halsschild gehecht; bij de *Cephennium* daarentegen weinig of in 't geheel niet ingesnoerd en min of meer tot aan de oogen door het halsschild omsloten. De oogen staan overigen, behalve bij *Eucnossus* en *Scydmaenus*, bij welke de slapen zeer lang zijn, ver achter aan den kop, dicht naar het halsschild geplaatst, zoodat de slapen alsdan zeer kort zijn.

Fig. 30. Inplanting der sprieten. Orig.

I. Bij *Cytoscydmus*. II. Bij *Seydmanus*.

rond; bij het genus *Eutheia*, waarbij het pygidium onbedekt blijft, afgeknot; gewoonlijk met basaalgroefjes. — Volgens *J. Redtenbacher* is bij *Seydmanus tarsatus* het topgedeelte van den vleugel buitengewoon ontwikkeld en zijn, behalve de vena marginalis en scapularis, slechts twee zwak aangeduide strepen zichtbaar, die wellicht als de vena externo-media en interno-media moeten geduid worden. — Mesosternum al of niet gekield. — Achterlijf uit 6 sterniten bestaande, bij het ♂ van *Enconus* is nog een zevende sterniet voorhanden.

Voor- en achtercoxae kegelvormig uitstekend, de achtercoxae meestal ver van elkaar afstaande, bij *Neuraphes* dicht bijeen. Trochanters bij *Seydmanus* zeer lang. Pooten vrij slank; de dijnen naar het uiteinde meer of minder knotsvormig verdikt; tarsen 5-ledig, het eerste lid gestrekt, de volgende leedjes in lengte afnemende, het eindlid wederom langer, met twee gewone, lijne klauwen.

Van de larven is weinig bekend; die van *Seydmanus tarsatus* is door *Meinert* beschreven.

De *Scydmaenidae* leven grootendeels tusschen plantenaafval, onder mos, steenen, achter boomschors, in *Sphagnum*, aan boomwortels, in mofm, rottend hout, aanspoelsel en enkelen bij mieren. Zij schijnen vooral van plantaardig voedsel te leven.

Overzicht der Tribus.

Halsschild met tot naar voren reikenden, duidelijken, scherpen rand, niet of slechts weinig smaller dan de dekschilden. Kop aan de basis weinig of in 't geheel niet ingesnoerd, min of meer door het halsschild omsloten. Kaaktasters schijnbaar 3-ledig, aangezien het vierde lid zeer kort, nauwelijks zichtbaar en dicht tegen het voorlaatste lid aangevoegd is.

1. *Cepheenniini*.

Halsschild van af de basis hoogstens tot aan het midden met scherpen zijrand, altijd duidelijk smaller dan de dekschilden. Kop aan de basis meer of minder ingesnoerd, breder dan de voorste opening van het halsschild. II. *Seydmaniini*.

I. Tribus CEPHENIINI.

Kop, met de oogen, breder dan de voorste opening van het halsschild, naar achteren iets versmald. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, aan de basis met 5-, de dekschilden aan de basis met 2 groefjes. Dekskildes aan het uiteinde afgeknot; het pygidium onbedekt. Mesosternum niet gekield. Sprieten met 3-ledige knots, of geleidelijk verdikt. Lichaam tamelijk smal. De beide eindleedjes der tasters te zamen dun, spelvormig. 1. *Eutheia*.

1. Bij het Zuid-Europese genus *Mastigus* is het eindlid der kaaktaster met priemvormig

Kop smaller dan de voorste opening van het halsschild, naar achteren niet versmald. Halschild gewoonlijk breeder dan de dekschilden. Dekschilden aan het uiteinde niet afgeknot. Mesosternum gekield. Sprietten met 2-3-ledige knots. De beide eindledjes der tasters te zamen omgekeerd-cirond. Lichaam tamelijk breed en eenigszins aan *Atomaria* herinnerend 2. **Cephennium**.

II. Tribus SCYDMAENINI.

- 1 Sprietten aan de zijden van den kop, vóór de oogen, ingeplant, van elkaar verwijderd en door eene breede voorhoofds-plaat van elkaar gescheiden. Sprietten niet knievormig gebogen (Fig. 30 I). 2
- Sprietten, dicht bijeen, op het voorhoofd ingeplant, meer of minder duidelijk knievormig gebogen (Fig. 30 II) 1), met 3-ledige knots. Kaaktasters schijnbaar 3-ledig, aangezien het vierde lid uiterst klein en als een kegeltje dicht op het voorlaatste lid aangevoegd is. Halschild eivormig of nagenoeg kogelrond; de zijden niet gerand. Trochanters zeer lang. Mesosternum sterk gekield 6. **Scydmaenus**.
- 2 Kop kort; de oogen ver achter aan den kop, dicht naar het halsschild geplaatst, de slapen zeer kort; het halsgedeelte weinig ingesnoerd en uiterst kort. Sprietten naar het uiteinde verdikt of slechts met zwak afgescheiden knots 3
- Kop lang, met een groot, sterk ingesnoerd halsgedeelte en met lange slapen; de oogen ver van het halsschild verwijderd. De zijden van het halsschild niet gerand. Sprietten meestal met duidelijk afgescheiden 3-4-ledige knots. Achterlijf bij het ♂ met 7, bij het ♀ met 6 sternieten. Achtercoxae van elkaar verwijderd. 5. **Euconnus**.
- 3 De zijden van het, naar de basis nauwelijks versmalde, halsschild van af de basis tot ongeveer aan het midden scherp gerand. Achtercoxae dicht bijeenstaande 3. **Neuraphes**.
- De zijden van het altijd hartvormige halsschild afgerond, naast de achterboeken voor de basis met een klein langwerpige groefje. Achtercoxae tamelijk ver van elkaar verwijderd. 4. **Cyrtoscydmus**.

I. Tribus CEPHENNIINI.

1. *Eutheia* Steph.

Lichaam tamelijk smal. Kop met de oogen breeder dan de voorste opening van het halsschild, naar achteren iets versmald. Sprietten met 3-ledige eindknots of geleidelijk verdikt. Voorkaken sikkelvormig gebogen. Kaaktasters 4-ledig, het vierde lid zeer klein, weinig uit het sterk verdikte uiteinde van het derde lid te voorschijn komende: de beide eindledjes te zamen dun, spoelvormig. Tong aan het uiteinde tweelobbig. Liptasters 3-ledig, het eerste lid langer dan de twee volgende ledjes te zamen. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, aan de basis met 5-, de dekschilden aan de basis met 2 groefjes. Dekschilden aan het uiteinde afgeknot, het pygidium onbedekt. Mesosternum niet gekield. — De soorten van dit genus leven tusschen rottende plantenstoffen, vooral in moestuinen. Van de 8 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprietten naar het uiteinde weinig en geleidelijk verdikt, de knots weinig en niet duidelijk afgescheiden. Bruinrood, grauw behaard; de kop zwartachtig, het halsschild dikwerf kastanjebruin; de sprietten en pooten rood. De bovenzijde weinig en zeer fijn bestippeld. Dekschilden nagenoeg dubbel zoo lang als te zamen in het midden breed. Lengte $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ mm. In vermolde boomstammen bij mieren en ook in de nesten van *Formica rufa* en *exsecta*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Orefeld en Elberfeld (*plicata* Gyll.)
- Sprietten met duidelijk afgescheiden 3-ledige knots 2
- 2 Halsschild veel fijner- dan de dekschilden, doch zeer onduidelijk en verspreid bestippeld. Lichaam geelbruin of bruinrood, fijn grauw behaard; de kop, het midden van het halsschild en het achterlijf zwartbruin; de sprietten en pooten geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In West-Duitschland (*abbreviata* Thoms.) (*Schaumii* Kiesw.)

1) De knievormige buiging der sprietten 1) met altijd duidelijk waartoe doer; doch steeds daaraan te herkennen, dat op het een of ander lid boven aan het uiteinde een kort groefje aanwezig is, waardoor de gebroken stand der sprietten kan worden bewaargelooft; de plaatsing dezer groef maakt dan ook de eenige wijze van knikking van den spriet mogelijk en daarom kunnen de sprietten altoos naar boven knievormig gebogen worden.

Halsschild duidelijk en even sterk als de dekschilden bestippeld. Lichaam glanzig zwart, lijn behaard, iets gewelfd, vooral op het halsschild. Sprieten en pooten geelrood, de sprietknots zeer zelden donkerder. Dekschilden voor het midden duidelijk afgerond, langs den naad met een nauwelijks aangeduiden langsindruk, welke aan de basis tot den naad convergeert, doch naar het uiteinde gewoonlijk reeds in het midden verdwijnt. Lengte 1 mm. Indertijd zeer gemeen, tusschen rottende plantenresten en afval, op het terrein van eene suikerfabriek bij Delft; ook bij Nootdorp onder beschimmelde hooi. Volgens Märkel bij *Formica rufa*, wat ik betwijfel. 1. *scydmaenoides* Steph.

2. Cephennium Müll. & Kunze.

Lichaam tamelijk breed en eenigszins aan *Atomaria* herinnerend. Kop smaller dan de voorste opening van het halsschild, naar achteren niet versmald. Sprieten met 2- of 3-ledige eindknots. Voorkaken met korten, uitgeranden top. Kaaktasters zeer lang; het derde lid groot, naar het uiteinde sterk verdikt; het vierde, hetsij duidelijk als een naaldvormig uiteinde uitstekend, of zeer kort, stomp kegelvormig en moeielijk zichtbaar, de beide eindleedjes daardoor te zamen omgekeerd-cirond. Tong aan het uiteinde bijna niet uitgerand. Liptasters 3-ledig, het eerste lid zeer kort, het tweede het langst. Halsschild gewoonlijk breeder dan de dekschilden. Dekschilden aan het uiteinde afgerond. Mesosternum gekield. Bij het ♂ is het halsschild in het midden nabij de basis meer gewelfd, zoodat, van terzijde gezien, dit gedeelte builig is; ook zijn de voortarsen merkbaar breeder dan bij het ♀. — De soorten van dit genus leven onder dorre bladeren, plantenafval, veenmos, steenen, achter boomsehors en bij mieren.

Van de 50 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor, welke tot het Sub-gen. *Megaloderus* Steph. behoort.

Lichaam ongeveer dubbel zoo lang als breed, eenigszins gedrongen, iets gewelfd, lijn geelgrijs behaard, donkerbruin, de kop licht, het halsschild iets donkerder roestrood; sprieten en pooten geelrood. Halsschild aan de basis even breed als de basis der dekschilden, naar voren tot voor het midden verbreed; onduidelijk, de dekschilden iets duidelijker bestippeld. Bij het ♂ zijn de dijen iets meer verdikt, de voorschenen aan het uiteinde meer verbreed, bij het ♀ voor het uiteinde sterk naar binnen gebogen. Lengte ongeveer 1 mm. Bij Maarsbergen, gemeen tusschen *Sphagnum* in greppels; ook onder afgevallen beukenbladeren bij Utrecht, Breda, Arnhem, Bergen-Dal en Houthem (Limburg). Ook in België bij Brussel en in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld 1. *thoracicum* Müller.

H. Tribus SCYDMAENINI.

3. Neuraphes Thomson.

Kop kort, de oogen ver achter aan den kop, dicht nabij het halsschild geplaatst, met zeer korte slapen, het halsgedeelte weinig ingesnoerd en uiterst kort. Sprieten aan de zijden van den kop, vóór de oogen, ingeplant, van elkaar verwijderd en door eene breede voorhoofdsplaat van elkaar gescheiden, naar het uiteinde verdikt of met eene slechts zwak afgescheiden knots. Voorkaken scherp toegespitst. Kaaktasters zeer lang; het derde lid groot, aan het uiteinde sterk verdikt; het vierde naaldvormig, klein doch duidelijk. Tong aan het uiteinde diep uitgerand. Liptasters 3-ledig, het eerste lid zeer kort, het tweede het langst. Halsschild naar de basis bijna niet versmald, de zijden van af de basis tot ongeveer aan het midden scherp gerand. Achtercoxae dicht bijeenstaande. — De soorten van dit genus leven tusschen plantenafval, onder dorre bladeren, steenen en in mierennesten.

Van de 82 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 Voorhoofd, naast de oogen, met een diep groefje. Halsschild voor de basis met eene lijne langskiel in het midden. 2

Voorhoofd, naast de oogen, zonder groefje. Halsschild zonder lijne middenkiel voor de basis. 4

- 2 Halsschild niet bestippeld. 3
- Halsschild meer of minder fijn en dicht bestippeld, langer dan breed, naar achteren iets versmald; aan de basis met eene fijne middenkiel, welke veelal tot aan den voorrand doorloopt. Zwart, zelden kastanjebruin, glanzig, fijn behaard. Sprieten, tasters en pooten geelrood. Kop smaller dan het halsschild. Dekschilden langwerpig-eirond, tamelijk gewelfd, zeer fijn en verspreid bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. In beukenmool en onder dorre bladeren. Meermalen bij den Haag; ook bij Gilze-Rijen, Oisterwijk en Valkenburg. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 3. *elongatulus* Müller & Kunze.
- 3 Lichaam glanzig zwart; de sprieten, tasters en pooten geelrood; veelal het uiteinde der dekschilden ook iets roodachtig. Kop veel smaller dan het halsschild. Halsschild even lang als breed, met nagenoeg parallele zijden, van voren en aan de zijden met lange afstaande haren bezet. Dekschilden breed-eivormig, zwak gewelfd, zeer fijn en verspreid bestippeld, met korte, grauwe beharing, vrij diepe basaalindrucken, duidelijke schouderbulten en gewoonlijk met een aan het schildje iets verheven naad. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Bij den Haag en Loosduinen, tusschen beschimmeld stroo en dorre bladeren langs slooten; ook bij Berg-en-Dal en Valkenburg (Lamburg). In de Rijnprov. bij Aken 1. *angulatus* Müller & Kunze.
- Lichaam geheel roodgeel, glanzig, fijn behaard. Kop slechts iets smaller dan het halsschild, de schedel uitgehold, aan weerszijden naast de groefjes bultig opgericht. Halsschild iets langer dan breed. Dekschilden langwerpig-ovaal, vlak gedrukt, uiterst fijn en verspreid bestippeld, met diepe basaalindrucken en eene lange, sterk uitstekende schouderplooi. Lengte $1-1\frac{1}{2}$ mm. Onder rottende plantenstoffen. Bij den Haag en Arnhem 2. *rubicundus* Schaum.
- 4 Halsschild eenigszins vierkant, met nagenoeg parallele zijden en lijn opgerichten zijrand; vlak, met eene dwarsgroef voor de basis en aan weerszijden naast den zijrand met een langsgroefje. Lichaam op de bovenzijde tamelijk vlakgedrukt, glanzig bruinzwart of kastanjebruin, geel behaard. Sprieten, tasters en pooten roodgeel. De sprieten met 4 grootere eindledjes, van welke het achtste lid iets smaller dan het negende is. Kop iets smaller dan het halsschild, het voorhoofd iets gewelfd. Dekschilden langwerpig-eirond, weinig en zeer fijn bestippeld. Bij het ♂ de naad der dekschilden aan het uiteinde lijn gegroefd. Lengte bijna $1\frac{1}{2}$ mm. Onder plantenafval. Tiel en Arnhem 4. *longicollis* Motsch.
- Halsschild iets breeder dan lang of nagenoeg even breed als lang, eenigszins hartvormig, aan de voorzijde iets gewelfd, door een dicht tegen den zijrand staand langsgroefje gerand. Bovenzijde nimmer geheel vlakgedrukt 5
- 5 Lengte 1 mm. Halsschild iets breeder dan lang, in den dwarsindruk aan de basis met twee groefjes. Lichaam kastanjebruin of donkerbruin, zelden meer roodachtig; vooral op het halsschild geelachtig behaard; de dekschilden in den regel zwartbruin. Sprieten en pooten geel. Dekschilden fijn en duidelijk bestippeld, de binnenste basaalindruk gewoonlijk tegen den naad in eene onduidelijke langsgroef uitgetrokken. In beukenmool en onder beukenbladeren, eenmaal in Maart in het Haagsche bosch. Zij zou ook bij *Lasius fuliginosus* voorkomen. (helvolicus Schaum) 5. *Sparshallii* Denny.
- Lengte $\frac{3}{4}$ mm. Eenkleurig roestrood, menigmaal de kop iets donkerder. Kop met groote oogen en met dezen iets smaller dan het halsschild. Halsschild even lang als breed, in den basaalindruk met twee groefjes. Dekschilden weinig en lijn-, doch duidelijk bestippeld. Sprieten en pooten roodgeel. Deze soort zou bij *Formica rufa* voorkomen. Niet inlandsch. In Westfalen. (pumilio Schaum) (minutus Chaud.)

4. *Cyrtoscydmus* Motsch.

(*Scydmaenus* auct.)

Dit geslacht onderscheidt zich van *Neuraphes*, doordat de zijden van het naar achteren versmalde, hartvormige halsschild afgerond zijn; naast de achterhoeken voor de basis bevindt zich een klein, langwerpig groefje. De achtercoxae staan tamelijk ver van elkaar verwijderd. Bij het ♂ zijn de voordijen veel krachtiger ontwikkeld, veelal hoekig verdikt. Levenswijze als bij *Neuraphes*.

Van de 33 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Basis der dekschilden met twee groefjes, de schouderplooi meer of minder duidelijk. Achterrand van het halsschild met 4 meer of minder duidelijke, menigmaal slechts stipvormige groefjes. (Subgen. *Scydmaenus* auct.). 2

Basis der dekschilden slechts met één duidelijk groefje, de basis van het halsschild met zeer onduidelijke groefjes (Sub-gen. *Stenichnus* Thoms.). Zwart, de dekschilden roodbruin of kastanjebruin; de sprieten en pooten roodgeel. Halsschild hartvormig, nagenoeg even lang als breed, aan de basis met eenige aanduiding van eene dwarsgroef. Dekschilden tamelijk breed-ovaal, duidelijk, doch tamelijk lijn bestippeld, van voren naast den naad met een zeer lijnen, onduidelijken, naar het midden divergeerenden langsindruk. Bij het ♂ de voordijen gewoon verdikt. Lengte 1 mm. Zij zou bij *Formica rufa* en *exsecta* gevonden zijn. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld (exilis Erichs.)

2 Halsschild nauwelijks zoo lang als naar voren breed. Dekschilden kort-ovaal, sterk buikig verbreed 3

Halsschild langer dan breed. Dekschilden langwerpig-ovaal of eirond, aan de zijden minder verbreed. 4

3 Lichaam roodbruin, lijn behaard; de sprieten en pooten rood. Sprieten lang en dun, naar het uiteinde geleidelijk iets verdikt. Halsschild met vrij duidelijke basaalgroefjes. Dekschilden matig lijn bestippeld, met onduidelijke schouderplooi; het binnenste basaalgroefje klein en zwak aangeduid. Voordijen bij het ♂ aan het uiteinde sterk verdikt en afgerond. Lengte ruim 1½ mm. In moln van oude boomen en achter boomsehors bij *Lasius fuliginosus*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. . . . (Godartii Latr.)

Lichaam zwart, lijn behaard; de sprieten geelrood, de pooten bruin- of roestrood. Halsschild nagenoeg onbestippeld, met zeer duidelijke basaalgroefjes. Dekschilden duidelijk bestippeld, de binnenste basaal-indruk naast den naad tot een kort langsgroefje verlengd. Schouderplooi sterk en duidelijk aangeduid. Voordijen bij het ♂ van boven, voor het uiteinde, stomphoekig verbreed. Lengte 1½ mm. Gemeen onder dorre bladeren en beschimmeld stroo, op vochtige plaatsen; ook onder mos en bij *Lasius fuliginosus* . . . 1. *scutellaris* Müll. & Kunze.

4 De groefjes aan de basis van het halsschild onduidelijk, het middelste bijna niet aangeduid. Dekschilden matig lijn bestippeld, de schouderplooi duidelijk, het binnenste basaalgroefje langs den naad, ongeveer tot aan het midden, in een zwak langsgroefje verlengd, waarvan het uiteinde iets naar buiten divergeert. Glanzig zwart, zelden kastanjebruin, lijn grijs behaard; de sprieten en pooten rood, de dijen gewoonlijk donkerbruin. Deze soort, welke met *scutellaris* voorkomt, onderscheidt zich van deze, doordat het halsschild duidelijk langer dan breed en de dekschilden smaller-ovaal zijn. Bij het ♂ de voordijen knotsvormig verdikt. Lengte 1½ mm. Gemeen onder dorre bladeren, beschimmeld stroo en in *Sphagnum* 2. *collaris* Müll. & Kunze.

De groefjes aan de basis van het halsschild zeer duidelijk. Dekschilden sterk bestippeld, het binnenste basaalgroefje langs den naad niet groefachtig verlengd. Deze soort is kleiner dan *collaris*, zwart of donkerbruin, lijn behaard. Sprieten en pooten licht roodbruin, de dijen soms iets donkerder. Bij het ♂ de dijen vlak gedrukt, op de bovenzijde tot aan het uiteinde sterk driehoekig verbreed. Lengte 1—1,5 mm. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld, ook bij Hamburg (*pusillus* Müll. & Kunze)

5. *Euconnus* Thomson.

*Kop lang, met een groot, sterk ingesnoerd halsgedeelte en met zeer lange slapen; de oogen staan ver van het halsschild verwijderd. De zijden van het halsschild niet gerand. Sprieten meestal met duidelijk afgescheiden 3 of 4-ledige knots, aan de zijden van den kop vóór de oogen ingeplant. Achterlijf bij het ♂ met 7-, bij het ♀ met 6 sterniten. Overigens aan *Neuraphes* verwant en met dezelfde levenswijze.*

Van de 57 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 6 in het aangrenzend gebied voor.

1 Dekschilden aan de basis duidelijk breeder dan de basis van het halsschild, met breede, naar voren divergeerende basaalgroefjes, de schouderplooi duidelijk. 2

Dekschilden kort-ovaal, aan de basis zoo breed als de basis van het halsschild, elk met een of twee dicht bijeenstaande, naar achteren convergeerende basaalgroefjes; geen schouderplooi (Sub-gen. *Tetramelus* Motsch.). Lichaam zwart, de sprieten en pooten rood. Oogen tamelijk klein, niet uitpuilend. Sprieten met 4, vrij duidelijk afgescheiden, dikkere eindledjes, het zevende is slechts een onvolkomen overgangslid. Halsschild iets langer dan breed, dichter dan de rest van het lichaam behaard, met een zeer fijne basaalplooi. Dekschilden kort-ovaal, slechts met één basaalgroefje. Bij het ♂ de voordijen sterk verdikt. Lengte 1½ mm. In bergstreken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken.

(*pubicollis* Müll. & Kunze)

2 Halsschild van af de basis naar voren sterk versmald, kegelvormig; vóór de basis zonder

- duidelijke groefjes, met of zonder dwarsgroef en met eene kleine, korte basaalkiel aan de zijden (Sub-gen. *Napochus* Thoms.). Oogen groot, grof gefacetteerd 3
- Halsschild aan de zijden min of meer afgerond, niet kegelvormig, menigmaal naar voren iets meer dan naar de basis versmald, met duidelijke binnenste basaalgroefjes (Sub-gen. *Eucn-nus* Esp.) 4
- 3 Sprietknots 4-ledig, $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als de funiculus; de 3 voorlaatste leedjes matig ver-breed. Lichaam zwart of kastanjebruin, veelal donker met lichtere dekschilden; vrij lang-, vooral aan de zijden van het halsschild dichter, geelachtig behaard; nagenoeg onbestippeld. Spriet en pooten roestrood. Halsschild met eene duidelijke dwarsgroef aan de basis en aan de binnenzijde van de zijploo met eene meer of minder duidelijke stip. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Westfalen bij Dortmund. In het voorjaar bij *Formica rufa*, ook bij *Lasius niger* en *fuliginosus* (*claviger* Müll. & Kunze)
- Sprietknots 4-ledig, zeer groot, meer dan dubbel zoo breed als de funiculus; de 3 voorlaatste leedjes bijzonder sterk verbreed. Lichaam roestrood of bruinrood, nagenoeg onbestippeld; gelijkmatig en aan de zijden van het halsschild langer behaard. Halsschild met eene duidelijke dwarsgroef aan de basis en aan de binnenzijde van de zijploo met eene meer of minder duidelijke stip. Lengte bijna 1 mm. Bij *Formica rufa*. Niet inlandsch. In Middel-Europa. (Mäklinii Mannerh.)
- 4 Halsschild aan de zijden met twee langskielen, in het midden met ééne lijne, korte basaalkiel. Sprietknots groot, 4-ledig; bij het ♂ het achtste sprietlid langer dan het negende; het achtste $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, naar binnen mesvormig afgeplat, met stomp uitstekenden bui-tensten achterhoek en spits gebogen buiten-tophoek; het negende lid even lang als breed, eenigszins driehoekig uitgetrokken en eveneens naar binnen mesvormig afgeplat. Oogen groot, grof gefacetteerd. Halsschild nagenoeg vierkant, naar voren iets versmald, dicht met afstaande geelgrauwe haren bezet. Lichaam geheel zwart, glanzig, lang behaard; de spriet en pooten geelrood, de dijen donker. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. In beukemohr en bij mieren. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Cleef en Crefeld . . . (denticornis Müll. & Kunze)
- Halsschild in het midden aan de basis zonder langskiel. Spriet en in beide seksen gelijk en gewoon 5
- 5 Sprietknots 4-ledig 6
- Sprietknots 3-ledig 7
- 6 Zwart, glanzig; de dekschilden bloedrood; de sprietwortel, schenen en tarsen roestkleurig-rood. Kop klein, veel smaller dan het halsschild. Halsschild iets langer dan breed, naar voren versmald; dicht met lange afstaande grauwe haren bezet, met twee zeer kleine, puntvor-mige basaalgroefjes. Dekschilden kort-eivormig, naast den naad achter het schildje met een zwak aangeduiden, korten, divergeerenden langsindruk; onbestippeld, met enkele verspreide haartjes bezet. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Breda, in aanspoelsel van de Mark; bij Oisterwijk en Winterswijk onder vochtige bladeren; bij Hillegersberg onder dood riet.
1. *rutilipennis* Müll. & Kunze.
- Zwart; sprietwortel, schenen en tarsen roestrood; zeldzamer de spriet en de pooten geheel vuilrood (abc. **fimetarius* Chaud.). Halsschild even lang als breed, naar voren versmald; dicht met afstaande geelgrauwe haren, aan de basis met twee diepe stippen. Dekschilden volkomen onbestippeld, met enkele verspreide haren bezet. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Op vele plaatsen in groot aantal aangetroffen; vooral in aanspoelsel der rivieren . . . 2. *hirticollis* Illig.
- 7 Lichaam $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. lang. Spriet en slank en dun, het negende en tiende lid zwak verbreed of vierkant. Oogen weinig uitpuilend, niet zichtbaar gefacetteerd. Lichaam zwart of zwart-bruin, glanzig, gewelfd, tamelijk gedrongen, fijn grauw behaard. Spriet en pooten roest-rood, de sprietknots en dijen veelal donkerder. Kop smaller dan het halsschild. Halsschild groot en breed, eenigszins kogelvormig, met afstaande geelgrauwe haren en met 4 groefjes aan den achterrand. Dekschilden kort-eivormig, fijn en verspreid bestippeld. Bij het ♂ de voor-schenen naar het uiteinde verdikt en naar binnen gebogen; de achterschenen vrij dun, aan het uiteinde sterk gekromd en met eene duidelijke eindspoor. Onder afgevallen bladeren en bij mieren. Niet inf. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. . . (Wetterhali Gylh.)
- Lichaam $\frac{1}{2}$ mm. lang. Spriet kort en dik, de knots sterk afgescheiden, de beide voor-laatste leedjes sterk verbreed. Oogen uitpuilend, groot, grof gefacetteerd. Lichaam geelbruin of kastanjebruin, zelden zwartachtig; gewelfd. Spriet en pooten geel. Kop iets smaller dan het halsschild. Halsschild kogelvormig, de binnenste basaalgroefjes groot en diep. Dekschilden langwerpig-ovaal, uiterst fijn doch duidelijk bestippeld, met een grooten basaalindruk, welke naar buiten iets divergeert. Niet inlandsch. In Westfalen en in Noord-Frankrijk bij Rijssel. (nanus Schaum)

6. *Scydmaenus* Latr.

(Eumierus Lap.)

*Sprieten dicht bijeen op het voorhoofd ingeplant, meer of minder duidelijk knievormig gebogen, met 3-ledige knots. Kaaktasters schijnbaar 3-ledig, aangezien het vierde lid uiterst klein en als een kegeltje dicht op het voorlaatste zeer groote lid aangevoegd is. Halsschild eenigszins kegelvormig, eivormig of nagenoeg kogelrond, met niet gerande zijden. Mesosternum sterk gekield. Trochanters zeer lang. Bij het ♂ de voortarsen veelal iets verbreed en op de onderzijde dichter behaard. Overigens aan Eucannus verwant en met dezelfde levenswijze. — De larve van *S. tarsatus* is door Meinert beschreven.*

Van de 9 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden met eene groote basaalgroef en duidelijke schouderplooi. Oogen groot. Voortarsen bij het ♀ iets-, bij het ♂ sterk verbreed (Sub-gen. *Microstemma* Motsch.). Lichaam glanzig kastanjebruin, kop en halsschild iets donkerder, lijn behaard; de sprieten en pooten geelrood. Halsschild eenigszins cylindervormig, met 4 diepe basaalgroefjes. Dekschilden eivormig, onduidelijk bestippeld. Lengte bijna 2 mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren en oud stroo 1. *tarsatus* Müll. & Kunze.

Dekschilden zonder basaalgroef en schouderplooi. Oogen zeer klein. Halsschild aan den achterrand zeer zwak ingesnoerd; nagenoeg zonder basaalgroefjes, welke hoogstens als kleine, ondiepe stippen waarneembaar zijn. Kop soms bij het ♂ in 't oog vallend onderscheiden van die van het ♀ (Sub-gen. *Scydmaenus* isp.) 2

- 2 Lichaam ongeveer 1½ mm. lang. Kop in beide seksen gewoon. Lichaam geelrood, gewelfd. Halsschild nagenoeg kogelrond, overal fijn en duidelijk bestippeld. Dekschilden zeer kort en breed, lijn en duidelijk bestippeld. Voortarsen in beide seksen gewoon. Achter boomschors, in vermolnde boomstammen bij *Lasius fuliginosus* en onder plantenaafval; ook bij *Formica rufa*. Eenmaal bij Arnhem. 2. *rufus* Müll. & Kunze.

Lichaam 1½ mm. lang. Kop bij het ♀ zoo breed als het halsschild, bij het ♂ eenigszins driehoekig en aan den achterrand breeder dan het halsschild, met diep uitgeholden schedel, welke aan weerszijden tandvormig uitgetrokken is. Halsschild duidelijk langer dan breed, gewelfd, met twee onduidelijke stippen aan den achterrand. Dekschilden langwerpig-eivormig, zeer fijn bestippeld. Lichaam geelrood, glanzig, lijn behaard. Bij *Formica rufa* en achter boomschors bij *Lasius fuliginosus*; ook bij *Lasius brunneus*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf. (Hellwigii F.)

XI. Familie PLATYPSYLLIDAE.

Fig. 31. *Platypsyllus castoreus* Rüsg. Orig.

Deze kleine familie is hoogst merkwaardig, doordat de eenige bekende vertegenwoordiger (Fig. 31) parasitisch leeft op de huid van den bever, welke levenswijze geheel eenig is onder de Coleoptera. Het lichaam is eivormig, okergeel, heeft het voorkomen van eene dorso-ventraal plattedrukte vloer en gelijkt ook eenigszins op eene zeer kleine *Blatta*. — De kop is als eene breede, eenigszins half-cirkelvormige plaat gevormd, wier zijrand vóór de met lange haren bezette achterhoeken iets uitgebogen is; aan weerszijden op het midden met eene meer of minder duidelijke, driehoekige, bruine vlek. Op de plaats der oogen bevinden zich twee ovale plekkjes, welke aan den omtrek lijne stralige strepen vertoonen; niettegenstaande hier geen facetten aanwezig zijn en deze plekkjes als de rudimenten van oogen moeten beschouwd worden, zoo schijnen volgens *Friedrich* deze diertjes toch gevoelig te zijn voor lichtindrukken, daar de bij het leven onderzochte voorwerpen in 't oog vallend lichtschuw zijn en onmiddellijk van de lichtzijde trachten te ontvluchten. — De sprieten zijn 3-ledig, zitten met een vrij lang cylindervormig basaallid nabij de achterhoeken op de onderzijde van den kop; hunne bewegelijkheid wordt zeer beperkt, tengevolge van uitstekende lijsten op de onderzijde van den kop. Gewoonlijk legt het dier het eerste sprietlid met den binnenrand tegen de achterste lijst aan, waardoor de eindledjes der sprieten in eene

spruit groot gelegd worden, welke aan den rand van het halsschild aanwezig is; het tweede sprietlid ongeveer half zoo lang als het eerste; aan het uiteinde van den scheel naar binnen afgeknotten rand, aan de onderzijde, met korte-, van boven en vooral van buiten met lange haren bezet; in eene diepe uitholling van het tweede lid staan de, tot een eenigszins eivormigen sprietsknop vereenigde, eerste leedjes; de door sommige schrijvers vermelde beharing van dezen sprietsknop is niet aanwezig, evenmin dat het tweede lid uit twee stukken zoo zijn samengesteld. — Bovenlip zeer klein, van boven onzichtbaar. Voorkaken rudimentair, als korreltjes zichtbaar. Achterkaken vrij groot en zeer vlak, uit twee nagenoeg gelijke, dicht behaarde lobben samengesteld. Kaaktasters 4-ledig, het eindlid kegelvormig, smaller dan het derde lid. Kin zeer groot en vlak, het grootste gedeelte van de onderzijde van den kop bedekkend, van voren uitgerand, langs de zijden afgerond, aan de basis drielobbig. Tong uitgerand, zonder paraglossen. Liptasters 3-ledig, de leedjes geleidelijk in dikte afnemend.

De V-vormig gebogen achterrand van den kop vertoont een kam, uit een 24-tal korte, dikke, naar achteren gerichte, eenigszins zeisvormige stekels bestaande. Deze kam, welke ongetwijfeld als hechtorgaan dienst doet, herinnert aan een dergelijk werktuig bij de soorten van het genus *Ceratopsyllus* onder de vlooiën 1), bij welke echter iedere stekel van dezen kam recht is.

Het halsschild heeft de gedaante van een gelijkbeenig trapezium, is aan den voorrand diep V-vormig uitgebogen en heeft afgeronde achterhoeken, welke met lange haren bezet zijn; de basis is driemaal uitgebogen, aan weerszijden van een licht gekleurd middenveld, bruin gevlekt. Het groote prosternum is met doornetjes bezet, de zijranden zijn van lange haren voorzien; naar achteren eindigt het in eene afgeronde, aan den rand eveneens sterk behaarde plaat, welke iets over het mesosternum heengrijpt. Het mesosternum is kort, van voren afgerond, naar achteren versmald, evenals het prosternum eindigende in eene voortzetting, welke hier aan het uiteinde dieper uitgerand is en zich iets over het vooreinde van het metasternum voortzet en evenals het prosternum behaard is. De episternen en epimeren duidelijk ontwikkeld; de epimeren naar verbouding kort, ongeveer half zoo lang als de episternen, den zijrand niet bereikend. Het metasternum is even lang als het mesosternum, doch aan de basis iets breeder en eveneens met haren bezet. De epimeren van het metasternum zijn even groot als de episternen.

Het vlakke achterlijf bestaat uit 6 tergieten, waarvan het eerste door de uiteinden der dekschilden bedekt wordt; elk tergiet vertoont eene rij haren. Ook zijn 6 sterniten aanwezig; van het eerste sterniet zijn echter alleen de hoeken zichtbaar, daar het overige gedeelte door de epimeren van het metasternum bedekt wordt. De beharing is op de eerste twee sterniten verspreid; op het derde en vierde sterniet elk met twee haarrijen, op het vijfde met eene enkele haarrij, terwijl het laatste wederom verspreid behaard en aan den rand met langere haren bezet is.

De stigmata bevinden zich in de voorhoeken der ringen. Op den metathorax ligt een stigma zoowel op het episternum als op het epimerum; het stigma van den prothorax wordt door het daarover liggend epimerum bedekt.

Het schildje is vrij groot, driehoekig. — De verkorte dekschilden zijn ongeveer even lang als het halsschild en grijpen aan de zijden ver over de randen van meso- en metathorax; de binnen- en buiten-tophoeken zijn afgerond; de oppervlakte is grof en lijn dooreen bestippeld, behalve om het schildje, waar de bestippling ontbreekt; naar het uiteinde en aan de zijden is deze dichter; langs den naad bevindt zich eene flauw aangeduide streep; de omgebogen zijrand is van onderen dicht met korte haren bezet. — Ongeveelugeld.

De platte dijen nemen naar volgorde, zoowel in lengte als in breedte toe; de voorschenen zijn aan het uiteinde van eenige stijve haren voorzien, de middelschenen zijn dichter met stijve haren bezet, de beharing bij de achterschenen is nog dichter. Tarsen 5-ledig, de klauwen met een stompen tand aan de basis. De onderzijde der voor- en middel-tarsen dicht met lijne witte haren bezet. Bij de grootere wijfjes zouden de voortarsen van lijne, knotsvormige haartjes voorzien en de zijden van het achterlijf meer bestippeld en dichter behaard zijn.

Deze kevers loopen zeer geschikt, doch kunnen in 't geheel niet springen. In water geworpen keeren zij zich op den rug en blijven hetzij geheel zonder beweging op de oppervlakte liggen of trachten den rand van het vat te bereiken om er dan uit te kruipen. Bij het koud worden van een dooden bever loopen zij over de lange haren angstig rond.

De witachtige larven werden door *Friedrich* in de mondhoeven van den bever, in gezelschap van vele Acarinen, aangetroffen. Kop, als bij het volkomen insect, groot. Bovenlip groot; voorkaken krachtig ontwikkeld, driehoekig en naar elkaar toegebogen; achterkaken groot, kaaktasters 3-ledig; onderlip met twee tasters en eene korte tong. Spruiten kort, 3-ledig, in diepe groeven aan den zijrand van den kop ingeplant, de leedjes aan het uiteinde met korte haren bezet. De 3 borstringen dragen de 3-ledige pooten, wier eindlid klauwvormig en tot het vasthouden aan de haren van den bever geschikt is. Aan den achterrand van elken borstring bevinden zich op de onderzijde 4 haren op gelijken afstand van elkaar. Van de 9 achterlijfsringen nemen de eerste 8 geleidelijk, de laatste plotseling in breedte af; de laatste draagt aan het uiteinde twee aanhangsels, welke, naar het schijnt, tot vasthechten van het lange achterlijf moeten dienen. Elk sterniet draagt, op gelijken afstand van elkaar, 8 lange haren, tusschen welke korte doornetjes regelmatig geraangschikt zijn. Op de tergieten staan 4 lange haren. De stigmata der borst- en achterlijfsringen zitten aan de achterhoeken der zijranden.

1) Deze leven parasitisch op honden, katten, marters enz.

De familie der Platypsyllidae, welke groote verwantschap heeft met de Silphidae en vooral met den tribus der Leptinini, vertoont ook enkele punten van overeenkomst met de Gyrinidae en Parnidae door den vorm der sprieten; door het zeer ontwikkelde pro- en mesosernum met sommige Trichopterygidae 1); door de dekschilden en het achterlijf met de Staphylinidae (Omaliini) en door de pooten met de Anisotomidae.

Deze familie is slechts door één enkel genus vertegenwoordigd.

1. Platypsyllus Ritsema.

De eenige bekende soort werd door wijlen den heer *A. J. van Bemmelen* in een aantal exemplaren op een Canada-bever in de Rotterdamsche diergaarde aangetroffen. Zij werd overigens waargenomen op den bever in de Elbe en Mulde tusschen Wartenburg en Magdeburg, in de Camargue aan de Petit-Rhône en ook op den bever in Canada 2). Lengte 2½—3 mm.

1. *castoris* Rits.

XII. Familie SILPHIDAE.

De Silphidae of aaskevers zijn zeer verschillend van vorm en grootte; voor het meerendeel zijn zij vlak of slechts weinig-, bij uitzondering sterk gewelfd (*Bathyscia*); ovaal, eirond of lang gestrekt, zelden rondachtig, meestal lijn behaard, zelden onbehaard.

Kop in de voorste uitranding van het halsschild of onder den voorrand vrij bewegelijk of wel vast tegen het halsschild aangesloten, hetzij door den voorrand van het halsschild stevig omsloten, hetzij achter de oogen (die bij de Leptinini en Bathyscini ontbreken), door eene sleuf ingesneden en met den scherpen schedelrand over den voorrand van het halsschild grijpend (*Cholevinae*). — Sprieten in eene uitranding, aan de zijden van den kop, vóór de oogen ingeplant, 11- (fig. 32, I en II) of schijnbaar 10-ledig (fig. 32, III), waar het tweede lid zeer klein en min of meer in het eerste verscholen zit (*Necrophorus*); hetzij geleidelijk naar het uiteinde verdikt, of met 4 of 5 iets grootere eindledjes, welke eene min of meer losgelede knots vormen, of met 3-ledige, groote, langwerpige, dichte knots (*Sphaerites*), of met een dikken, 4-ledigen, doorbladerden, rondachtigen eindknop (*Necrophorus*), zeldzamer nagenoeg draadvormig. — Bovenlip afgeknut of meer of minder diep uiterand, bij *Leptinus* als eene smalle strook met den clypeus samengegroeid. Voorkaken met één of meer tandjes, bij *Silpha*

Fig. 32. I. Spriet van *Silpha thoracica* L. Orig.
II. Spriet van *Phosphuga luevigate* L. Orig.
III. Kop en spriet van *Necrophorus germanicus* L. Orig.

Fig. 33. Gedeelte van de onderzijde van *Silpha thoracica* L. Orig.

met gewonen top. Achterkaken tweelobbig, de binnenste lob veelal met een hoornhaak aan den top. Kaaktasters kort, 4-ledig. Kin soms iets uiterand, de tong gewoonlijk tweelobbig of uiterand. Lipstasters 3-ledig. — Halsschild over de basis der dekschilden verschuifbaar (*Silphini*), of daar tegenaan volkomen aansluitend. — Dekschilden zelden het achterlijf niet geheel bedekkend, aan het uiteinde afgerond, soms afgeknut; bij *Silpha* met meer of minder breed afgezetten zijrand. — Gevleugeld, behalve bij *Leptinus* en *Bathyscia*. De nervatuur der vleugels komt nagenoeg geheel overeen met die der Staphylinidae. Volgens *Roger* bevindt zich bij *Silpha obscura* het gewricht vóór het midden

1) Het Amerikaanse genus *Limnolodes*.

2) In vroegere eeuwen was de bever in ons waterrijk land niet zeldzaam, in de vorige eeuw werden nog enkele bevers gedood in de Maas, Merwede en IJssel, het laatste voorwerp werd in 1801 aan den IJssel geschoten.

van den vleugel en treft men daarachter, evenals bij *Staphylinus*, eene zwartbruine, langwerpig-vierhoekige pigmentvlek aan. Verder, evenals bij *Staphylinus*, eene dichotomische splitsing der vena externo-media op de hoogte van het gewricht, of, wanneer men de in het apicale gedeelte van de area externo-media nog verlopende straalader niet als de voortzetting der vena scapularis beschouwt, eene drievoudige splitsing van deze ader; deze splitsingstakken verlopen tot aan den achterrand. De achterrand is gewoon en zwak bewimperd; een basaal-lobje daarvan niet afgescheiden. In de area interno-media bevinden zich enkele gewijzigde overblijfselen van de bij *Hydrophilus* in dit veld aanwezige bijaders. Volgens *J. Redtenbacher* ontbreekt bij *Catops* de vena cubitalis geheel, terwijl zij bij *Silpha* en *Necrophorus* duidelijk vorksgewijs vertakt is.

Prosternum al of niet achter de voorcoxae ontwikkeld; mesosternum al of niet gekield. Episternen van den metathorax breed en duidelijk zichtbaar (Fig. 33).

Achterlijf in den regel met 7 tergiten, van welke de eerste twee of drie min of meer vliezig zijn, en met 5 of 6, zelden 4 (de meeste *Colon*- σ) vrij bewegelijke sterniten.

Voorcoxae kegelvormig uit de gewrichtsholten uitstekend, gewoonlijk de geheele lengte van het verkorte prosternum innemend. Achtercoxae smal, niet kegelvormig uitstekend, dicht aaneenstaande, zelden van elkaar verwijderd (*Bathysciini*), hoogstens met eene zeer kleine voortzetting, welke den dijwortel bedekt. Schenen altijd met eindsporen. Trochanter der achterpooten groot. Alle tarsen 5-, zelden de voortarsen 4-ledig (*Bathysciini*); de voortarsen veelal bij het σ verbreed; ook soms het eerste lid der middeltarsen bij het σ verbreed. Klauwen gewoon.

De *Silphidae* zijn voor het meerendeel middelmatig groote tot zeer kleine kevers, enkelen daarentegen (*Necrophorus*, *Silpha*) bereiken eene tamelijke grootte. Zij zijn door de *Agyrtini* verwant aan de *Anisotomidae* en door het genus *Sphaerites* aan de *Ilisteridae*. De meesten zijn zeer bewegelijk; velen hebben een zeer fijnen reuk, welke hen geschikt maakt tot het opsporen van rottende dierlijke stoffen, waarin de meeste soorten, evenals hare larven, leven. Enkele groote soorten (*Necrophorus*) schijnen ook levende prooi aan te grijpen. Bij uitzondering zijn zij phytophaag en alsdan in enkele gevallen schadelijk, o. a. de larven van *Silpha atrata*, *obscura* en *opaca* aan beetwortels. Bij aanraking scheiden de meesten uit den anus een stinkend vocht af.

Vooral van de meeste grootere *Silphidae* zijn de larven bekend geworden. De larven van *Necrophorus* zijn witachtig, week, cylinder- of spoelvormig, met een harden, hoornachtigen kop en dunne hoornachtige rugschilden, wier getande uiteinden dienen tot het tegen iets aandrukken of vastklemmen; zij hebben zes korte pooten, elk met één enkelen klauw; 4-ledige sprieten en aan weerszijden van den kop 6, in twee groepjes gerangschikte ocellen.

De larven der *Silpha*'s zijn zwart, geheel chitineus en gelijken eenigszins op pissebedden. Zij hebben vrij lange, 3-ledige sprieten, aan weerszijden van den kop 6 ocellen, twee vleezige ahangsels aan den laatste achterlijfsring en een uitstulpbaren, tot naschuiven dienenden anus. Pooten met één enkelen klauw. Zij verpoppen in den grond.

Overzicht der Sub-Familiën en Tribus.

- 1 Kop vast tegen het halsschild aansluitend, hetzij door den voorrand van het halsschild stevig omsloten, hetzij achter de oogen 1) door eene sleuf ingesneden en met den scherpen schedelrand over den voorrand van het halsschild grijpend. Het prosternum loopt nog achter de voorcoxae door I. Sub-Fam. **CHOLEVINAE**. 2
- Kop in de voorste uitranding van het halsschild of onder haren voorrand vrij bewegelijk. Eindlid der tasters cilindervormig of eirond. Prosternum achter de voorcoxae niet aanwezig. II. Sub-Fam. **SILPHINAE**. 5
- 2 Sprietknots (veelal onduidelijk afgescheiden en zich als het iets verbreedte uiteinde der draadvormige sprieten voordoende) 5-ledig, haar tweede lid kleiner dan de aangrenzende leedjes. 3
- Sprieten kort, met eene dikke, meer of minder duidelijk afgescheiden, 4-ledige knots, gerekend van af het achtste lid, dat langer en breeder is dan het zevende. Kop ovaal, achter de oogen niet sleufvormig ingesneden en zonder scherpkantigen rand. Oogen rond, uitpuilend. Achterlijf bij het σ met 5-, bij het σ gewoonlijk met 4 sterniten. Mesosternum gekield. Tarsen allen 5-ledig. IV. **Colonini**.
- 3 Kop achter den scherp geranden schedel met eene diepe sleuf, waarin de voorrand van het halsschild grijpt. Achtercoxae tegen elkaar aanstootende. Alle tarsen 5-ledig, de voortarsen bij het σ verbreed 4
- Kop achter den schedel niet scherp gerand en zonder sleuf; geen oogen. Achtercoxae duidelijk, doch op verschillende afstand van elkaar verwijderd. Voortarsen 4-, de middel- en achtertarsen 5-ledig; tarsen met enkele lange tastharen bezet. Dekschilden met afgerond uiteinde. Ongevleugeld III. **Bathysciini**.
- 4 Lichaam zeer vlak en breed. Geen oogen. De zijrand van den elyptus bedekt den sprietwortel.

1) De soorten der tribus *Leptenini* en *Bathysciini* hebben geen oogen.

Sprieten draadvormig, naar het uiteinde bijna niet verdikt. Mesosternum gekield. Kinplaat aan den achterrand met doornachtig naar achteren uitstekende hoeken. Bovenlip slechts als eene smalle strook voor aan den clypeus zichtbaar en daarmee samengegroeid, doch door eene rechte dwarsgroef afgescheiden. Dekschilden aan het uiteinde gemeenschappelijk afgerond, het geheele achterlijf bedekkend, zonder naadstreep. Ongeveleugeld I. **Leptinini**.

Lichaam meer of minder gewelfd. Oogen voorhanden. De zijrand van den clypeus niet over den sprietwortel verbreed II. **Cholevini**.

5 Achterlijf met 6 sterniten V. **Silphini**.

Achterlijf met 5 sterniten, soms bij het ♂ nog met een klein, veelal onduidelijk zesde, gewoonlijk aan het uiteinde uitgerand, klein sterniet VI. **Agrytini**.

I Sub-Familie CHOLEVINAE.

I. Tribus LEPTININI.

Bevat slechts het genus (Leptinus.)

II. Tribus CHOLEVINI.

1 Achterdijen slank, ongeveer dubbel zoo lang als de achtercoxae, ver buiten den zijrand van het lichaam uitstekende. Sprieten slank, ongeveer even lang als de helft van het lichaam. Oogen van de voorkaken verwijderd, op een afstand gelijk aan de doorsnede van het oog. Lichaam langwerpig. Mesosternum niet gekield. Middeltarsen bij het ♂ niet verbreed. Voorkaken met 3 tandjes I. **Choleva**.

Achterdijen weinig langer dan de achtercoxae, slechts matig over den zijrand van het lichaam uitstekende. Sprieten de basis van het halsschild zelden overschrijdend, met losledige knots, welke gewoonlijk duidelijk bij het zevende lid begint; het achtste sprietlid altijd kleiner dan de aangrenzende leedjes. Oogen van de voorkaken verwijderd, hoogstens op een afstand gelijk aan de halve doorsnede van het oog. Lichaam eivormig 2

2 Mesosternum niet gekield. Dekschilden zonder ingekraste dwarsstreepjes, hoogstens onregelmatig dwarsrimpelig 3

Mesosternum gekield. Dekschilden met duidelijk ingekraste dwarsstreepjes. Middeltarsen bij het ♂ niet of nauwelijks verbreed 5. **Ptomaphagus**.

3 Middeltarsen bij het ♂ niet verbreed. Sprieten naar het uiteinde slechts zwak en geleidelijk verdikt. Voorkaken met eenige tandjes 2. **Nargus**.

Het eerste lid der middeltarsen bij het ♂ verbreed. Voorkaken met één tand 4

4 De oogen reiken geheel of nagenoeg tot de insnijding, waarin de voorkaken ingeplant staan 3. **Sciodrepa**.

De oogen staan van de insnijding, waarin de voorkaken ingeplant zijn, verwijderd, op een afstand gelijk aan de halve doorsnede van het oog. Halsschild naar de basis versmald (behalve bij *C. umbrinus*); daardoor vertoont de omtrek van het lichaam eene duidelijke insnoering tusschen het halsschild en de dekschilden. 4. **Catops**.

III. Tribus BATHYSCIINI.

Bevat slechts het genus (Bathyscia.)

IV. Tribus COLONINI.

Bevat slechts het genus 6. **Colon**.

II. Sub-Familie SILPHINAE.

V. Tribus SILPHINI.

Sprieten duidelijk 11-ledig, geleidelijk verdikt of met langwerpige knots; het eerste sprietlid matig verlengd (Fig. 32, I en II). Dekschilden zelden het achterlijf niet geheel bedekkend, met meer of minder breed afgezetten zijrand. Middelencoxae hetzij van elkaar verwijderd of tegen elkaar aanstaande. Schenen naar het uiteinde niet verbreed 7. **Silpha**.

Sprieten schijnbaar 10-ledig, daar het tweede lid zeer klein is en min of meer in het eerste verscholen zit, met eene dikke, 4-ledige, doorbladerde, rondachtige knots; het eerste sprietlid sterk verlengd (Fig. 32, III). Dekschilden afgeknut, zonder breed afgezetten zijrand. Mid-

Elcoxae altijd van elkaar verwijderd. Schenen naar het uiteinde verbreed. Trochanters der achterlijken met een meer of minder krachtigen tand. 8. **Neerophorus**.

VI. Tribus AGYRTINI.

- 1 Sprietten met 3-ledigen, ovalen, doffen eindknop. Halsschild volkomen tegen de dekschilden aangesloten, tegen het schildje eenigszins uitgetrokken, van voren uitgerand. Dekschilden aan het uiteinde afgeknot, daardoor het pygidium onbedekt. Middelcoxae door een uitsteeksel van het mesosternum van elkaar verwijderd (Sphaerites.)

Sprietten geleidelijk naar het uiteinde verdikt, of met 5 iets grootere eindledjes. Halsschild iets over de basis der dekschilden grijpend. Dekschilden aan het uiteinde afgerond, het pygidium bedekkend. Middelcoxae elkaar aanrakende 2

- 2 Eindlid der kaaktasters dun, cylindervormig, $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het voorlaatste lid. Sprietten naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Alle strepen der dekschilden het uiteinde bereikend. Halsschild zoo breed als de dekschilden, aan de basis tamelijk recht, zeer lijn gerand. Clypeus, tusschen de sprietten, door eene diepe dwarsgroef afgescheiden. Lichaam langwerpig-ovaal, iets gewelfd (Hadrambe.)

Eindlid der kaaktasters verdikt, eivormig, meer dan tweemaal zoo lang als het voorlaatste lid. De 4 of 5 laatste sprietleedjes vormen eene geleidelijk in dikte toenemende of overal even breede knots. Voorrand van het halsschild nagenoeg recht. Niet alle strepen bereiken het uiteinde der dekschilden. 9. **Agyrtus**.

I. Sub-Familie CHOLEVINAE.

1. Tribus LEPTININI.

Leptinus Müller.

Lichaam zeer vlak en breed. Kop schijfvormig uitgebreid, zonder oogen; de sprieten wortel door den zijrand van den clypeus bedekt. Sprietten draadvormig, naar het uiteinde bijna niet verdikt. Borenlip hoornachtig, slechts als eene smalle strook voor aan den koprand zichtbaar en daarmee samengegroeid, door eene rechte dwarsgroef afgescheiden. Voorkaken als dunne, driehoekige platen, met twee ongelijke lange tandjes voor aan de binnenzijde. Achterkaken met twee korte, aan het uiteinde behaarde lobben, de buitenste dubbel zoo breed als de binnenste en van 4-ledige draadvormige tasters voorzien, van welke het derde lid iets korter dan het vierde is. Kin groot, breeder dan lang, den mond grootendeels bedekkend, van voren afgerond, aan de achterhoeken in een lang doortje uitgetrokken. Hetwelk even lang is als de kinplaat. Tong vliezig, uitgesneden. Liptasters draadvormig. Halsschild bij het ♀ even breed als-, bij het ♂ merkbaar breeder dan het halsschild, halve-maan-vormig, met naar achteren gerichte spitse achterhoeken. Schildje vrij groot, kort driehoekig. Dekschilden aan het uiteinde gemeenschappelijk afgerond, zonder naadstreep, het geheele achterlijf bedekkend. Ongeleugeld. Alle schenen met doortjes bewapend, tarsen 5-ledig.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Geheel roestgeel, dicht en lijn raspachtig bestippeld, lijn geel behaard. Halsschild iets breeder dan de dekschilden, met naar voren afgerond-versmalden zijrand. Lengte ruim 2 mm. Een zeer vlug kevertje, dat onder afgevallen bladeren, rottende plantenstoffen, in vermolmd hout en in de nesten van *Bombus terrestris* en *Vespa* leeft. Het zou ook in Engeland bij *Lasius fuliginosus* aangetroffen zijn. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Cleef, Crefeld, Aken, Gulik en Düsseldorf (testaceus Müller)

II. Tribus CHOLEVINI.

1. Choleva Latr.

Lichaam lang gestrekt. Sprietten slank en dun, ongereet zoo lang als de helft van het lichaam. Oogen van de voorkaken verwijderd op een afstand gelijk aan de doorsnede van het oog. Borenlip breed en zeer kort, aan den voorrand min of meer uitgerand.

Voorkaken met 3 tandjes. Mesosternum niet gekield. Achterdijen slank, ongeveer dubbel zoo lang als de achtercoxae, ver buiten den zijrand van het lichaam uitstekende. Tarsen 5-ledig: bij het ♂ de voortarsen, doch niet de middeltarsen, verbreed. — De soorten van dit genus zijn zeer beweegelijk: zij bewegen zich eenigszins spartelend en leven in aas en allerlei rottende stoffen, onder vochtig hout, rottend stroo en soms in groot aantal in grotten op vleermuizenmest.

Van de 16 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Middelschenen bij het ♂ sterk-, bij het ♀ zwak gebogen. Sprieten niet geheel zoo lang als het halve lichaam, de eindleedjes weinig langer dan breed. Halsschild zoo breed als de dekschilden, aan de basis aanmerkelijk breeder dan van voren, tot aan den zijrand gewelfd, met stompe, min of meer afgeronde achterhoeken, lijn en niet zeer dicht bestippeld. Dekschilden, vooral naar het uiteinde, duidelijk gestreept. Trochanters der achterdijen bij het ♂ niet verlengd, doch in 't midden verbreed en getand. Lichaam korter en breeder dan bij de aanverwante soorten, gewoonlijk donkerbruin met donkerroode sprieten, of meer roodbruin met lichtere sprieten; de dekschilden meestal iets lichter gekleurd; stoffijn behaard. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ mm. Zeer verbreed, doch niet gemeen 1. *agilis* Illig.

Middelschenen hoogstens bij het ♂ zwak gebogen. Sprieten even lang als het halve lichaam, de eindleedjes veel langer dan breed. Halsschild smaller dan de dekschilden, naar voren en naar achteren nagenoeg gelijkelijk versmald, nabij het midden het breedst. Trochanters der achterdijen bij het ♂ verlengd, bij uitzondering gewoon 2

- 2 Halsschild krachtig en dicht bestippeld, vóór het midden het breedst, de zijden op de achterhelft breed afgezet en iets opwaarts gebogen, met eene korte, meer of minder duidelijke middengroef. Kop iets langer dan, met de oogen, breed. Bovenzijde geelgrauw, iets afstaande behaard; zwartbruin, de randen van het halsschild, de sprieten, pooten en het voorste gedeelte van de dekschilden roodbruin of nagenoeg geheel roodbruin. Dekschilden sterk gestreept, in beide seksen met afgeronde topkanten. Trochanters bij het ♂ naar buiten verbreed en gewoonlijk sterk getand, in den vorm van een hollen beitel; of wel gewoon verlengd. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Uiterst zeldzaam. Eenmaal bij Doorn bij *Lasius fuliginosus*, Aug. In België bij Brussel en ook bij Hamburg 2. *spadicea* St.

Halsschild lijn bestippeld. Kop niet langer dan, met de oogen, breed 3

- 3 Halsschild kort voor het midden het breedst, de zijden achter het midden slechts zwak en onduidelijk afgezet, naar achteren geleidelijk versmald, met meer of minder afgeronde achterhoeken, tamelijk fijn en niet zeer dicht bestippeld. Dekschilden bij het ♀ aan het uiteinde eenigszins afgeknot, met uitstekenden naadhoek. Sterniten bij het ♂ met eene zwakke langsgroef. Het achste sprietlid is ongeveer tweemaal zoo lang als breed en veel korter dan de aangrenzende leedjes. Bij het ♂ vertoonen de achterdijen op de onderzijde een klein tandje. Lichaam donkerbruin, tamelijk lijn en dicht geelachtig behaard; meestal de dekschilden geelachtig-roodbruin, de sprieten en pooten roestkleurig-rood. Dekschilden met flauw aangeduide langsstrepen. Deze is de smalste en meest gerekte soort, de sprieten zijn langer dan bij *intermedia*. Lengte 5 mm. Zeer zeldzaam. Arnhem, Baarle-Nassau, Hoek van Holland. (J. Sturmii Bris.) 3. *angustata* F.

Halsschild in het midden het breedst, naar achteren afgerond-versmald. Dekschilden bij het ♀ aan het uiteinde gewoon 4

- 4 Halsschild tot aan den zijrand gewelfd, slechts in de achterhoeken iets ingedrukt. Dekschilden zeer lijn neerliggend, stoffijn behaard. Bij het ♂ de trochanters der achterdijen zelden gewoon scherp verlengd, meestal in 't midden verbreed en meer of minder krachtig getand; bovendien het tweede tot vijfde sterniet diep gegroefd. Lichaam in den regel donkerder gekleurd dan *angustata*, gewoonlijk eenkleurig pekwart, de dekschilden meestal, geheel of gedeeltelijk, iets lichter gekleurd, veelal roodbruin; sprieten en pooten roestkleurig-rood, het uiteinde der sprieten iets donkerder. Halsschild met of zonder middengroef, tamelijk fijn en zeer dicht bestippeld. Dekschilden met flauw aangeduide langsstrepen. Lengte 5 — $5\frac{1}{2}$ mm. Verbreed en niet zeldzaam; ook in de kalkgrotten van Zuid-Limburg. 4. *cisteloides* Fröhl.

Halsschild vóór het midden duidelijk gewelfd, achter het midden naast den zijrand ingedrukt en aldaar met duidelijk opwaarts gebogen zijden. Dekschilden gedeeltelijk met eenigszins opgerichte beharing, gedeeltelijk fijner neerliggend behaard. Bij het ♂ zijn de trochanters naar buiten verbreed, meestal sterk getand en in den vorm van een hollen beitel; de sterniten zijn vlak ingedrukt. Lichaam geheel roestkleurig-bruin, de kop en het midden van het halsschild gewoonlijk iets donkerder. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Verbreed en niet zeldzaam. Zeer gemeen aan den ingang van grotten in den mergelsteen van Zuid-Limburg.

5. *intermedia* Kraatz.

2. *Nargus* Thomson.

Sprieten de basis van het halsschild zelden overschrijdend, naar het uiteinde zeer weinig en geleidelijk verdikt, het achtste lid kleiner dan de aangrenzende leedjes. Oogen van de voorkaken verwijderd op een afstand gelijk aan de halve doorsnede van het oog. Voorkaken met verscheidene tandjes. Dekschilden niet met in de breedte ingekraste streepjes, doch hoogstens met onregelmatige dwarsrimpels. Mesosternum niet gekield. Achterdijen slechts iets langer dan de achtercoxae, weinig over den zijrand uitstekende. Lichaam eirond. Bij het ♂ de voortarsen, doch niet de middeltarsen, verbreed. — De soorten van dit genus hebben dezelfde levenswijze als *Choleva*.

Van de 16 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Achterhoeken van het halsschild meer of minder scherp aangeduid en recht, daar de basis aan weerszijden duidelijk uitgebogen is. 2

Achterhoeken van het halsschild stomp of afgerond 3

- 2 Halsschild en dekschilden nagenoeg even fijn bestippeld en dwarsrimpelig. Lichaam eenigszins breed-eivormig, donker roodbruin; het halsschild veelal iets lichter, in 't midden gewoonlijk iets donkerder; soms de geheele bovenzijde lichter gekleurd; sprieten en pooten roestkleurig-geel, enkele der voorlaatste leedjes van de sprieten veelal iets donkerder gekleurd. Trochanters der achterdijen bij het ♂ met tandvormig uiteinde. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Vrij gemeen in bosschen onder dorre bladeren; ook in beschimmeld stroo . . . 1. *velox* Spence.

Dekschilden veel duidelijker bestippeld en dwarsrimpelig dan het halsschild. Lichaam meer langwerpig-ovaal, eenkleurig bruin of roodbruin, soms over het midden van het halsschild en over de dekschilden iets donkerder. Het zesde sprietlid iets langer dan bij *velox*. Trochanters der achterdijen bij het ♂ gewoon. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch. Bij Hamburg (bradius St.)

- 3 Het derde sprietlid iets korter dan het tweede. Lichaam langwerpig-eirond, bruinachtig-roestkleurig, de kop iets donkerder; op de bovenzijde weinig glanzig, zeer fijn geelachtig behaard; tusschen de bestippeling, bij sterke vergrooing gezien, duidelijk netsgewijze gecha-grineerd. Het halsschild aan de basis iets breeder dan de dekschilden, even dicht, doch de dekschilden iets sterker bestippeld. Bij het ♂ de verbrede voortarsen zoo breed als de schenen. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Uiterst zeldzaam. Eenmaal bij Breda. In de Rijnprov. bij Aken, Cleef en Crefeld; ook in België (coll. *Hesmael*). (praecox Er.) 2. *Wilkinsonii* Spence.

Het derde sprietlid veel korter dan het tweede. Lichaam kort- en breed-eirond, lichter of donkerder bruin, het halsschild in 't midden meestal donkerder; sprieten en pooten roodgeel. Het halsschild aan de basis niet breeder dan de dekschilden; de bovenzijde glanzig, matig fijn, neerliggend behaard, de tusschenruimten der stipfels volkomen glad. Halsschild veel fijner en meer verspreid bestippeld dan de dekschilden. Bij het ♂ de zwak verbrede voortarsen smaller dan de schenen. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Verbreed en op sommige plaatsen niet zeldzaam onder dorre bladeren en in paddestoelen . . . 3. *anisotomoides* Spence.

3. *Sciodrepa* Thomson.

De oogen reiken geheel of nagenoeg tot aan de insnijding, waarin de voorkaken geplant zijn. Voorkaken met één tand. Dekschilden niet met in de breedte ingekraste streepjes, hoogstens onregelmatig dwarsrimpelig. Mesosternum niet gekield. Bij het ♂ zijn de voortarsen en het eerste lid der middeltarsen verbreed. Overigens als bij *Nargus*. Levenswijze als *Choleva*.

Van de 5 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Halsschild aan de basis duidelijk smaller dan de dekschilden aan de schouders, met stompe achterhoeken. Sprietknops groot en scherp afgescheiden, het zevende sprietlid nagenoeg tweemaal zoo groot als het zesde, het achtste zeer klein, het vierde, vijfde en zesde verbreed. Bovenzijde zwart of zwartbruin, de dekschilden licht roodbruin of geelbruin; fijn geel-, het halsschild dichter behaard. De eerste 3 sprietleedjes en het eindlid aan den top roodgeel. Bij het ♂ zijn de voortarsen en het eerste lid der middeltarsen zwak verbreed. Voorschenen naar binnen, achter de basis, uitgebogen. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht verzameld (subfusca Kellner). 1. *alpina* Gyll.

- Halsschild aan de basis niet smaller dan de dekschilden aan de schouders, met meer of minder rechte achterhoeken; het lichaam daardoor zonder insnoering tusschen halsschild en dekschilden. 2
- 2 Sprietknots smal, het vierde en vijfde sprietlid bijna niet verbreed. Achterhoeken van het halsschild iets naar achteren uitgetrokken. Halsschild en dekschilden zeer dicht bestippeld, het halsschild dicht geelachtig, de dekschilden lijner en meer grijs behaard. Lichaam bruin-zwart, de voorhelft der dekschilden iets lichter bruin; de sprieten en pooten roodbruin, de sprietwortel geel- of roestrood, de basis en het uiteinde van het eindlid geelrood. Deze soort is gemakkelijk van *Watsoni* te onderscheiden door de langere en minder dikke sprieten, alsook door de bredere dekschilden, welke donkerder gekleurd zijn. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Niet zeldzaam onder dorre bladeren en op aas; ook 's avonds aan grashalmen. (*scitula* Er.) 2. *fumata* Spencee.
- Sprietknots krachtig ontwikkeld, vooral het zevende sprietlid zeer groot, het vierde, vijfde en zesde verbreed. Achterhoeken van het halsschild naar achteren niet uitgetrokken. Lichaam donkerbruin, de randen van het halsschild min of meer roodachtig; de dekschilden roodbruin, aan het uiteinde veelal bruinachtig; de sprietwortel en het eindlid, alsook de pooten roestkleurig. De bestippeling en beharing is ongeveer als bij *fumata*. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren en dood riet (*fumata* Er.) 3. *Watsoni* Spencee.

4. *Catops* Payk.

(*Ptomaphagus* Reitter).

Dit genus onderscheidt zich van Sciodrepa, doordat de oogen van de insnijding, waarin de voorkaken staan, verwijderd zijn, op een afstand gelijk aan de halve doorsnede van het oog. Het halsschild is, behalve bij eene enkele soort (umbrinus), naar de basis versmald, waardoor de omtrek van het lichaam eene duidelijke insnoering tusschen halsschild en dekschilden vertoont. — De larve van C. fuscus is door Erichson en Schödtle beschreven 1). Dezelfde levenswijze als bij de vorige genera.

Van de 28 Europeesche soorten komen 11 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild naar achteren niet versmald, aan de basis zoo breed als de dekschilden aan de schouders. Achterhoeken van het halsschild spits en sterk naar achteren uitgetrokken. Sprietknots onduidelijk afgescheiden, weinig verdikt, het zesde lid niet verbreed. Bovenzijde lichter of donkerder bruin, de dekschilden gewoonlijk iets donkerder dan het halsschild; onuitgekleurde exemplaren geheel roodgeel; sprieten en pooten roestrood. Halsschild uiterst fijn, geelachtig, de dekschilden als met een waas grijsachtig behaard. Dekskildes met duidelijke sporen van langsstrepen. Sprieten bij het ♂ iets langer, met slankere leedjes. Lengte $3\frac{1}{4}$ —4 mm. Zij zou aan de wortels van eiken in het zand verborgen leven. Niet inlandsch. In Westfalen en bij Hamburg. (*umbrinus* Er.)
- Halsschild naar achteren versmald, aan de basis smaller dan de dekschilden aan de schouders, zoodat eene duidelijke insnoering tusschen halsschild en dekschilden aanwezig is 2
- 2 De zijden van het halsschild tot aan de achterhoeken in eene vlucht afgerond. Sprietknots niet zeer duidelijk afgescheiden, het vierde en vijfde sprietlid altijd langer dan breed . . . 3
- De zijden van het halsschild vóór de achterhoeken iets uitgebogen, waardoor deze scherp aangeduid zijn, hetzij stomp of recht. 10
- 3 Het zesde sprietlid duidelijk langer dan breed, of ten minste bij het ♂ iets langer dan breed, bij het ♀ veelal vierkant. Sprieten lang en dun 4
- Het zesde sprietlid breder dan lang, of hoogstens bij het ♂ vierkant 7
- 4 Dekskildes aan de zijden sterk buikig verbreed, met tot aan de basis reikende, vrij diepe langsstrepen. Het vierde lid der achtertarsen ongeveer half zoo lang als het derde. Lichaam zwartbruin; de sprieten en pooten roodbruin; de eerste sprietleedjes lichter gekleurd, de sprietknots, op het gele eindlid na, bruin, of wel roestkleurig-rood en slechts het zevende lid donker. Halsschild met stompe, niet uitstekende achterhoeken, bij het ♀ tweemaal, bij het ♂ slechts de helft breder dan lang, uiterst fijn en dicht rimpelig bestippeld. Dekskildes krachtiger en ook eenigszins rimpelig bestippeld. Voorschenen bij het ♂ gewoon. Onuitgekleurde exemplaren zijn lichtbruin of geelbruinachtig. Lengte 5—5½ mm. Vrij gemeen in rottende paddestoelen en ook aan uitvloeiende boomsappen. Aan den ingang van den St. Pietersberg bij Maastricht zeer gemeen met *Choleva intermedia* 1. *picipes* F.

1) Volgens *Meunier* zou *Schödtle* niet de larve van *fuscus*, doch wellicht van *Sciodrepa fumata* beschreven hebben.

- Dekschilden langwerpig-eirond of ovaal, aan de zijden niet buikig verbreed, met zeer fijne, aan de basis nauwelijks aangeduide langstrepen. Het vierde lid der achtertarsen slechts weinig korter dan het derde. De basis van het halsschild naast de achterhoeken meestal meer of minder duidelijk uitgerand, waardoor de achterhoeken eenigszins spits naar achteren uitsteken. 5
- 5 Sprieten lang en slank, eenkleurig geelrood, hoogstens het zevende lid aan het uiteinde iets donkerder; het achtste lid bij het ♂ duidelijk-, bij het ♀ nagenoeg vierkant. Lichaam langwerpig-eirond; zwartbruin of pekbruin, de pooten geelrood. Halsschild uiterst lijn geelachtig-, de dekschilden leikleurig behaard; de zijden van het halsschild gewoonlijk iets lichter gekleurd. Halsschild met sterk afgeronde zijden, iets achter het midden het breedst, de basis aan weerszijden, naast de achterhoeken, vrij diep uitgerand, waardoor de achterhoeken sterk uitsteken. Overigens is deze soort naverwant aan *nigricans*. Lengte 4½—5 mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam; o. a. meermalen in het Haagsche bosch en bij Loosduinen onder rottende paddestoelen en tusschen schommelende bladeren. In België bij Leuven. (*meridionalis* Aubé, *saburratus* Gozis) 2. **marginicollis** Lucas.
- Achtste sprietlid in beide seksen duidelijk verbreed 6
- 6 Sprieten met bruinachtige knots. De basis van het halsschild aan weerszijden, naast de achterhoeken, met eene weinig duidelijke uitranding, waardoor de achterhoeken niet sterk uitsteken. Lichaam eirond, zwart, bruinzwart of pekbruin; de sprieten, behalve de knots, alsook de pooten roestkleurig-rood. De beharing als bij *marginicollis*. Halsschild sterk verbreed, aan de zijden afgerond, naar voren iets meer dan naar achteren versmald, in of iets achter het midden het breedst, zeer dicht en fijn rimpelig bestippeld. Dekschilden naar het uiteinde lijn gestreept, iets minder dicht rimpelig bestippeld. Voorschenen bij het ♂ aan de binnenzijde, achter de basis, eenigszins hoekig uitgebogen. Overigens gelijkij deze soort zeer op *picipes*, doch is smaller en met onduidelijke strepen op de dekschilden. Kleine exemplaren zijn als *fuliginosus* Er. beschreven. Lengte 4—5 mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam in rottende paddestoelen en onder dorre bladeren. 3. **nigricans** Spence.
- Sprieten gewoonlijk eenkleurig roestrood of bruinachtig-geel, het zevende lid veelal aan het uiteinde iets berookt; bij uitzondering de knots iets donkerder getint, het zesde en zevende lid slechts iets langer dan breed. Halsschild aan weerszijden van de basis zeer flauw tweemaal uitgerand, met duidelijke rechte achterhoeken, aan de zijden sterk afgerond, naar voren meer versmald en ver achter het midden het breedst. Lichaam breed-eirond, zwartbruin, de randen van het halsschild veelal lichter gekleurd en geelachtig behaard; de dekschilden roodbruinachtig en lijn leikleurig behaard, dikwijls aan den schouder iets lichter. Bij het ♂ de voorschenen aan de binnenzijde, nabij de basis, nagenoeg niet uitgebogen. Lengte 3½—4½ mm. Zeer verbroed, doch gewoonlijk zeldzaam. Onder rottende aardappelen, schimmelende bladeren, paddestoelen en in stallen onder mest. Zeer gemeen aan den ingang van den St. Pietersberg bij Maastricht 4. **fuscus** Panz.
- 7 Het zesde en achtste sprietlid iets verbreed, van gelijke lengte en breedte. Sprieten krachtig ontwikkeld, zwart, de wortel en het uiteinde van het laatste lid roodgeel. Lichaam zeer lang gestrekt, langwerpig-ovaal; zwart, de pooten rood-bruinachtig, de dijen donkerder. Halsschild bij het ♂ iets smaller dan de dekschilden, aan de zijden gelijkmatig afgerond, iets langer dan bij de aanverwante soorten, dicht geelachtig behaard. Dekschilden veel meer dan tweemaal zoo lang als te zamen breed, lijn leikleurig behaard. De langere einddoorn der achterschenen langer dan de helft van het eerste tarslid. Lengte 4½ mm. Niet inlandsch. In België in de grot van Rochefort; ook in Westfalen (*longulus* Kellner)
- Het achtste sprietlid sterk verbreed en veel korter dan het vierkante zesde lid 8
- 8 Eindlid der sprieten niet smaller dan het voorlaatste lid. 9
- Eindlid der sprieten duidelijk smaller dan het voorlaatste lid. Halsschild groot, ruim zoo breed als de dekschilden, aan de zijden sterk afgerond, dicht achter het midden het breedst, nabij de stompe achterhoeken niet uitgerand. Dekschilden kort-eirond, duidelijk en dicht bestippeld, nagenoeg zonder eenige aanduiding van langstrepen. Bij het ♂ vertoonen de voordijen aan de onderzijde een tandvormig bultje. Lichaam eivormig, zwart of bruinzwart; de sprieten en pooten roodbruin, de sprietwortel iets lichter, het uiteinde der sprieten donkerder. Lengte 3½—4 mm. Uitsluitend gevangen aan den ingang van den St. Pietersberg bij Maastricht; ook in België bij Heure. 6. **grandicollis** Erichs.
- 9 Dekschilden langwerpig-ovaal, meer dan tweemaal zoo lang als te zamen breed, zwart. Halsschild ruim 1½ maal zoo breed als lang, lijn geel behaard, de dekschilden iets lijner geelgrijs behaard en leikleurig berijpt. Sprieten roodbruin of bruinzwart, de eerste twee leedjes, benevens het eindlid, geelrood. Pooten roodbruin, de dijen soms iets donkerder. Achterschenen lijn gedoorn, de langere einddoorn korter dan de helft van het eerste tarslid. Bij het ♂ zonder bultje op de onderzijde der voordijen. Lengte 3½—4 mm. Verbreid en niet zeldzaam onder dorre bladeren en in aangespoeld riet 5. **morio** F.

Dekschilden eivormig, $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, bijna dubbel zoo breed als lang, fijn geel, de dekschilden leikleurig behaard. Dekschilden zonder eenige aanduiding van langstrepen. Lichaam zwart; de sprieten en pooten lichtrood, de sprietknots en de dijen bruin. De langere eindspoor der achterschenen langer dan de helft van het eerste tarslid. Bij het ♂ de voordijen met een klein bultje op de onderzijde; ook vertoonen de middeldijen op de onderzijde eene kleine verhevenheid. Lengte $3-3\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Westfalen en in de Rijnprov. bij Elberfeld.

(*Coracinus* Kelln.)

- 10 Het zesde sprietlid ten minste bij het ♂ iets langer dan breed, bij het ♀ veelal vierkant. Sprieten slank, met niet duidelijk afgescheiden knots, roestrood, de knots donker, doch haar eindlid roodgeel. Halsschild sterk verbreed, iets smaller dan de dekschilden, aan de zijden afgerond en iets achter het midden het breedst, dicht rimpelig bestippeld, fijn en dicht geel, de dekschilden leikleurig, veel fijner en eenigszins rijpachtig behaard. Voorschenen bij het ♂ gewoon, aan de basis iets versmald. Dekschilden langwerpig-ovaal, gewoonlijk slechts aan het uiteinde met eenige aanduiding van langstrepen. Overigens gelijk deze soort zeer op *morio*. Lengte $3\frac{1}{2}-4$ mm. Onder plantenafval en doode vogels en zoogdieren. Verspreid, doch overal vrij zeldzaam; den Haag, Katwijk, Dieren en St. Pieter bij Maastricht (*nigrita* Er.) 7. **affinis** Steph.

Het zesde sprietlid breeder dan lang, hoogstens bij het ♂ vierkant. 11

- 11 Sprieten dun en slank, eenkleurig pekkruin of roodbruin, de wortel iets lichter; de knots onduidelijk afgescheiden, van gelijke breedte, het eindlid weinig of niet smaller dan het voorafgaande lid. Halsschild aan de zijden meer of minder sterk afgerond, niet of slechts weinig smaller dan de dekschilden op de grootste breedte 12

Sprieten krachtig ontwikkeld, meestal met eene donkere, duidelijk afgescheiden knots; het zevende lid in 't oog vallend breeder dan het negende of tiende, het eindlid smaller dan het voorlaatste lid; het achtste lid klein en sterk verbreed 13

- 12 Halsschild aan de zijden vrij sterk afgerond, ongeveer van de breedte der dekschilden, de grootste breedte iets achter het midden; dicht rimpelig bestippeld, doch iets minder grof dan bij *neglectus*. Lichaam zwartbruin, de sprieten pekkruin, de eerste leedjes geelrood; de pooten roodbruin, veelal meer pekkruin. Halsschild geel behaard, de dekschilden grauw behaard en leikleurig berijpt. Overigens aan *morio* herinnerend. Lengte $3-3\frac{1}{2}$ mm. Aan doode konijnen gevangen; den Haag en Loosduinen 8. **Kirbyi** Spence 1)

Halsschild aan de zijden zeer sterk afgerond, iets smaller dan de dekschilden, de grootste breedte iets voor het midden; tamelijk grof, dicht en diep rimpelig bestippeld. Deze soort gelijkt op kleine exemplaren van *tristis*; langwerpig eirond, bruinzwart; de sprieten en pooten geheel roodbruin, de sprietwortel gewoonlijk meer geelrood. Halsschild geelachtig behaard, de dekschilden grijsachtig behaard en leikleurig berijpt. Dekschilden met eenige aanduiding van langstrepen. Lengte $3-3\frac{1}{2}$ mm. Uiterst zeldzaam. Onder dorre bladeren; den Haag, Amsterdam, Dieren en St. Pieter bij Maastricht. In Westfalen bij Dortmund.

(*nigrita* Ths., nec Er.) 9. **neglectus** Kr.

- 13 Eindlid der sprieten slechts iets smaller dan en niet dubbel zoo lang als het voorlaatste lid. Einddoorn der achterschenen ongeveer zoo lang als de helft van het eerste tarslid. Lichaam zwart of bruinzwart; de sprieten en pooten bruinrood, de sprietknots en gewoonlijk ook de dijen donkerder. Halsschild iets-, bij den vorm *ventricosus* Weise veel smaller dan de dekschilden, ongeveer in het midden het breedst, met scherp aangeduide rechte achterhoeken. Dekschilden eivormig, vóór het midden het breedst, leikleurig berijpt. Onmitgekleurde exemplaren zijn geelachtig-bruin, met donkere sprietknots. Lengte $3\frac{1}{2}-4$ mm. Zeldzaam; den Haag, Loosduinen, Scheveningen, Arnhem en Dieren. De vorm *ventricosus* bij den Haag.

10. **tristis** Panz.

Eindlid der sprieten in 't oog vallend smaller dan en dubbel zoo lang als het voorlaatste lid. Einddoorn der achterschenen langer dan de helft van het eerste tarslid. Eene groote, zwarte soort; de sprieten en pooten roodbruin, de sprietknots zwart. Halsschild aan de zijden sterk afgerond, weinig of niet smaller dan de dekschilden. Bovenzijde zeer fijn zwartachtig behaard, waardoor deze soort gemakkelijk in 't oog valt. Dekschilden zwak leikleurig berijpt, naar het uiteinde met duidelijke sporen van langstrepen. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Verspreid op aas, onder steenen en in rottende paddestoelen; ook in wespennesten . . . 11. **chrysomeloides** Panz.

1) Ik betwijfel of *C. rotundicollis* Kellner wel synoniem is aan *C. Kirbyi* Spence.

5. *Ptomaphagus* Hellwig.

(Catops Reitter).

Dit genus onderscheidt zich van de aanverwante genera door het gekielde mesosternum en door de dekschilden, welke duidelijk ingekraste dwarsrimpels vertoonen. Bij het ♂ zijn de voortarsen sterk-, de middeltarsen daarentegen niet of nauwelijks verbreed. Dezelfde levenswijze.

Van de 12 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild even duidelijk in de breedte gerimpeld als de dekschilden; de dwarsrimpels der dekschilden verlopen meer in schuine richting tot aan den naad. Voorschenen naar het uiteinde verbreed; de middel- en achterschenen tamelijk breed, aan het uiteinde, behalve de twee lange doornen, met zeer korte, nagenoeg even lange doortjes dicht bezet. De middelcoxae duidelijk van elkaar verwijderd 2

Halsschild onduidelijk dwarsrimpelig, de dwarsrimpels der dekschilden daarentegen zeer duidelijk, doch niet zeer dichtstaande, aan de basis min of meer evenwijdig verloopende. Voorschenen naar het uiteinde weinig verbreed; middel- en achterschenen aan het uiteinde met ongelijke doortjes bezet; het eerste lid der middeltarsen bij het ♂ slechts iets verdikt. Middelcoxae dicht aaneenstaande, zoodat de trochanters der middeldijen elkaar aanraken (Sub-gen. *Nemadus* Thoms.). Lichaam langwerpig-eirond, donkerbruin, fijn geelachtig behaard; de sprieten en pooten roodgeel, het zevende sprietlid veel donkerder dan de overige leedjes. Achterhoeken van het halsschild scherp aangeduid, eenigszins spits naar achteren uitstekende. Dekschilden naar het uiteinde iets lichter gekleurd, aan het uiteinde gemeenschappelijk smal afgerond; behalve de naadstreep, niet gestreept. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 mm. Aan wortels van oude eiken in den grond en onder mos, in boomhol en in de nesten van *Lasius brunneus*. Niet inlandsch. In België bij Humbeek, in de Rijnprov. bij Crefeld. (*Colonoides* Kraatz)

- 2 Het eerste lid der achtertarsen ongeveer zoo lang als de volgende 3 leedjes te zamen. Het derde sprietlid iets korter dan het tweede en veel langer dan het vierde; de sprieten reeds van af het vierde lid duidelijk verbreed, bruin, de eerste leedjes en het eindlid geelrood. Bovenzijde donkerbruin, zeer dicht en fijn zijdeachtig geelbruin behaard, zeer dicht dwarsrimpelig. Middel- en achterschenen bij het ♂ weinig gebogen. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Deze in bijna geheel Europa voorkomende soort is nog niet uit ons gebied bekend. . . . (varicornis Rosh.)

Het eerste lid der achtertarsen weinig of niet langer dan de volgende 2 leedjes te zamen. Sprietknots geheel zwart 3

- 3 Het derde sprietlid even lang of nagenoeg even lang en dik als het tweede lid, de sprietknots slank, het tiende lid nagenoeg even breed als lang. Bij het ♂ de achterschenen duidelijk gekromd en de voortarsen sterk verbreed; de middelschenen bij het ♂ sterk-, bij het ♀ zwak gebogen; de voortarsen bij het ♀ tamelijk breed, de eerste 4 leedjes dubbel zoo breed als het eindlid. Sprieten en pooten zwartbruin, de eerste sprietleedjes en soms de schenen of ook de voordijen roodbruin. Overigens met *sericatus* overeenkomende. Lengte $3\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer zeldzaam; bij Zoelen, Breda, Arnhem en in de omstreken van Maastricht. In België bij Arlon en Groenendaal. 1. *sericeus* Panz.

Het derde sprietlid aanmerkelijk korter dan het tweede, zelden nagenoeg even lang, doch iets smaller; de sprietknots dik, het tiende lid breeder dan lang. De achterschenen in beide seksen recht; de voortarsen bij het ♀ slank, de eerste 4 leedjes weinig of niet breeder dan het eindlid, bij het ♂ sterk verbreed. Bovenzijde bruin of donker roodbruin, bij onuitgekleurde exemplaren meer geelbruin; lijn en dicht zijdeglanzig behaard; de eerste sprietleedjes geelrood, de pooten roodbruin of grootendeels bruin. Lengte 2—3 mm. Niet zeldzaam onder dorre bladeren en oud riet. . . (sericeus Reitt., nec Panz.) 2. *sericatus* Chaud.

III. Tribus BATHYSCINI.

Bathyscia Schiödte.

(Adelops auct.)

Sprieten langer dan het halve lichaam, draadvormig, aan de zijden van het voorhoofd ingeplant; het zevende lid en de laatste 3 leedjes iets grooter. Kop achter den schedel niet scherp gerand en zonder sleuf; geen voegen. Voorkaken aan het uiteinde

met twee tandjes, waartusschen nog kleinere tandjes: het voorlaatste kaaktaster-lid groot, aan het uiteinde verdikt, het eindlid veel korter en dunner, naaldvormig toegespitst. Lichaam eivormig, sterk gewelfd. Halsschild breeder dan lang, aan de basis het breedst en volkomen tegen de dekschilden aansluitend. Dekschilden aan het uiteinde afgerond, gewoonlijk fijn dwarsrimpelig. Voortarsen 4-, de middel- en achtertarsen 5-ledig; de tarsen met enkele lange lastharen bezet. Ongevelegeld. — De soorten (ruim 100 Europeesche) van dit genus leven grootendeels in Zuid-Europa, in grotten, tusschen rotsblokken, onder steenen en tusschen dorre bladeren.

Eéne soort is echter in Noord Frankrijk en bij Londen waargenomen.

Lichaam eivormig, gewelfd, roodbruin; fijn en dicht-, de dekschilden eenigszins rimpelig bestippeld; lijn geelgrijs behaard. Dekschilden met eene naadstreep aan het uiteinde. Sprieten kort en krachtig ontwikkeld. Middelschenen krachtig ontwikkeld; de achterschenen weinig gedoord. Voortarsen bij het ♂ sterk verbreed. Lengte 1½ mm. Deze soort was bij Rijssel in Noord-Frankrijk gemeen in een tuin, tusschen rottende bladeren en wortelen.

(Wollastonii Janson)

IV. Tribus COLONINI.

6. Colon Herbst.

Dit genus is zeer verwant aan *Catops* en *Choleva*, doch onderscheiden door de korte sprieten, welke in den regel in eene meer of minder duidelijk afgescheiden 4-ledige knots eindigen, gerekend van af het achtste lid, dat langer en breeder is dan het zevende. Kop ovaal, achter de oogen niet sleufvormig ingesneden en zonder scherpkantigen rand. Oogen rond, uitpuilend. Voorkaken, achter het uiteinde, met een stompen tand. Lichaam langwerpig-eivond, hoewel de vorm bij een en dezelfde soort korter of langer kan zijn; ook hebben de kleinere exemplaren kortere en krachtiger ontwikkelde sprieten. Mesosternum gekield. Achterlijf bij het ♂ met 5-, bij het ♀ gewoonlijk met 4 sterniten. Alle tarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven grootendeels tusschen gras, bij zonsondergang verschijnen zij aan grashalmen. Volgens Czwalina zouden zij in onderaardsche fungi leven, wat volgens Kraatz zeer onwaarschijnlijk is.

Van de 28 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 9 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Voorschenen en voortarsen in beide seksen smal (Sub-gen. *Colon* isp.). 2
Voorschenen in beide seksen naar het uiteinde vrij sterk verbreed. Voor- en middel-tarsen in beide seksen (de voortarsen bij het ♂ sterker) verbreed (Sub-gen. *Myloechus* Latr.). . . . 4
- 2 Halsschild smaller dan de dekschilden, met vrij scherp aangeduide, stompe achterhoeken; daarvoor is de zijrand nagenoeg rechtlijnig en vormt dan een stompen hoek. Het eerste lid der sprietknots (achtste sprietlid) nagenoeg zoo breed als het volgende lid. Lichaam donkerbruin, de sprieten en pooten roestrood, de sprietknots iets donkerder. Bij het ♂ de achterdijen naar het uiteinde niet verbreed, met een klein tandje aan den binnenrand, daarachter lijn gekorven; achterschenen recht, met een klein stomp tandje aan de basis. Lengte 2—2½ mm. Niet inlandsch. In Noord- en Middel-Europa.
(*bidentatum* Sahlb.)
- 3 Halsschild met volkomen afgeronde achterhoeken; daarvoor met afgeronden zijrand 3
Halsschild smaller dan de dekschilden, dicht en fijn bestippeld. Het eerste lid der sprietknots nagenoeg zoo breed als het volgende. Lichaam donkerbruin, de sprieten geheel geelrood. Dekschilden met duidelijke langstrepen. Bij het ♂ de achterdijen naar het uiteinde sterk verbreed en in een breeden, rechthoekigen tand eindigend; de achterschenen gekromd; bij het ♀ de achterdijen minder verbreed en aan het uiteinde met een meer stomp-afgeronden tophoek. Lengte 2—2½ mm. 's Avonds aan grashalmen tusschen bakhout, Juni tot Aug. Niet inlandsch. Bij Bremen, in België bij Leuven en in Westfalen. . . . (viennense Herbst)
- Halsschild aan de basis breeder dan de dekschilden, naar voren zeer sterk versmald, aan de randen iets krachtiger bestippeld dan op het midden. Het eerste lid der sprietknots (het achtste sprietlid) duidelijk kleiner dan het volgende. Kleur als bij viennense. Achterdijen bij het ♂ met een zeer klein, veelal onduidelijk tandje; de achterschenen nagenoeg recht. Lengte 1½—2 mm. Niet inlandsch. In Oldenburg en bij Elberfeld. (*serripes* Sahlb.) (*fusculum* Erichs.)

- 4 Halschild kort en breed, eenigszins kogelvormig-afgerond, naar voren sterk versmald . . . 5
Halschild meer verlengd, nagenoeg zoo lang als breed of slechts iets breeder dan lang, naar voren minder versmald . . . 9
- 5 Halschild veel sterker bestippeld dan de dekschilden . . . 6
Halschild even sterk bestippeld als of zwakker bestippeld dan de dekschilden . . . 7
- 6 Lichaam verlengd, weinig gewelfd; bruin, veelal geheel roestrood, weinig glanzig, geelachtig-grijs behaard. Sprieten en pooten roestrood, de sprietknots gewoonlijk iets donkerder. Halschild met scherp aangeduide, rechte achterhoeken, ongeveer dubbel zoo sterk bestippeld als de dekschilden, bij abs. **Zehel* Kr. wel driemaal zoo sterk bestippeld; bij abs. **Barnevillei* Kr. vloeien de stippels rimpelig ineen. Bij het ♂ de achterdijen met een langen, gebogen doorn nabij het uiteinde; de achterschenen recht. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2½ mm. Eenmaal een typisch exemplaar bij Limmel nabij Maastricht. In de Rijnprov. bij Elberfeld. . . 1. *dentipes* Sahlb.
Lichaam korter-ovaal, tamelijk gewelfd, donkerbruin tot roestkleurig-geel, goud-geelachtig behaard, glanziger dan dentipes. Sprieten en pooten roodgeel, de sprietknots, behalve het laatste lid, veelal iets donkerder. Groote, donker gekleurde exemplaren vormen volgens *Reitter* de var. **episternale* Czwal. en kleine exemplaren met donkerder sprietknots, de var. **sinuatum* Chaud. Halschild met duidelijke, stompe achterhoeken. Dekschilden, van terzijde gezien, eenigszins dwarsrimpelig. Clypeus bij het ♂ met eene kleine uitranding; achterdijen bij het ♂ met een klein tandje in het midden van den binnenrand, hetwelk bij de var. *episternale* iets grooter en scherper zou zijn. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeldzaam. Doorn, Oirschot, Winterswijk en meermalen in de omstreken van Maastricht (Valkenburg en Limmel). In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld . . . 2. *brunneum* Latr.
- 7 Lichaam kort en breed, naar achteren versmald, tamelijk gewelfd, donker roodbruin, eenigszins dof. Halschild en dekschilden nagenoeg even fijn en zeer dicht bestippeld. Halschild iets breeder dan de dekschilden, de zijden tot aan de rechte achterhoeken afgerond. Bij het ♂ de achterdijen gewoon, de voorschenen aan de basis iets gebogen. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2½ mm. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa . . . (latum Kr.)
Lichaam elliptisch, weinig gewelfd. Halschild fijner dan de dekschilden bestippeld . . . 8
- 8 Dekschilden met eenige aanduiding van lijne langsstrepen, vooral naar de basis. Halschild bij het ♂ aan den achterrand, naast de achterhoeken, met eene kleine uitranding, waardoor de achterhoeken scherper zijn dan bij het ♀. Lichaam donkerbruin, dicht en tamelijk fijn-, de dekschilden eenigszins rimpelig bestippeld, geelgrijs behaard; de sprieten en pooten rood, de sprietknots donker. Achterdijen bij het ♂ met een langen tand, waarop een haarbundeltje; de achterschenen bij het ♂ min of meer gekromd. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2½ mm. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa . . . (appendiculatum Sahlb.)
Dekschilden zonder eenige aanduiding van langsstrepen. De achterrand van het halschild aan weerszijden niet uitgerand, waardoor de achterhoeken zeer stomp zijn. Lichaam bruin-rood, de sprieten en pooten lichter gekleurd. Achterdijen bij het ♂ met een langen, rechten tand vlak achter het midden. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1½ mm. Zeer zeldzaam. Doorn, Valkenburg bij Maastricht. In de Rijnprov. bij Crefeld . . . (nanum Kr.) 3. *calcaratum* Er.
- 9 Halschild en dekschilden even sterk bestippeld . . . 10
Halschild sterker bestippeld dan de dekschilden . . . 11
- 10 De bestippeling vrij sterk en uiterst dicht, bijna als kleine streepjes op het halschild. Eindlid der dikke sprietknots slechts aan het uiteinde geel. Halschild ongeveer even lang als breed, de zijden vóór de rechte achterhoeken eenigszins uitgebogen. Bovenzijde dof, donkerbruin, geelachtig behaard. Sprieten en pooten lichtrood, de sprietknots grootendeels zwart. Achterschenen bij het ♂ vrij sterk gekromd. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld en in Westfalen . . . (clavigerum Herbst)
- De bestippeling minder dicht. Eindlid der sprietknots bijna geheel geel. Halschild iets breeder dan lang, de zijden tot aan de stompe achterhoeken afgerond. Bovenzijde eenigszins glanzig, roodbruin. Achterschenen bij het ♂ zeer weinig gekromd. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld . . . (confusum Bris.) (affine St.)
- 11 Bovenzijde eenigszins dof, grof en zeer dicht bestippeld, zeer dicht ruw behaard, donker roodbruin; de sprietknots gewoonlijk donker gekleurd. Achterschenen bij het grootere ♂ ge kromd. Lengte 2—2½ mm. Niet inlandsch. In Middel-Europa. Ik zag exemplaren van *Reitter* (Mus. v. J. Poll) . . . (fuscicornis Kr.)
Bovenzijde meer afgeplat, duidelijk glanzig, fijn behaard, donkerbruin tot licht-roodbruin; de sprieten en pooten roestrood. Eindlid der sprieten meer afgerond. Achterdijen bij het ♂ in 't midden met een zeer klein scherp tandje, de tophoek toegespitst en iets uitgetrokken; achterschenen recht. Kleine exemplaren vormen *C. rectangulum* Chaud. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Elberfeld. . . (angulare Er.)

II. Sub-Familie SILPHINAE.

V. Tribus SILPHINI.

7. Silpha L.

Sprieten duidelijk 11-ledig, geleidelijk verdikt of met eene langwerpige knots; het eerste lid eenigszins verlengd. Bovenlip diep uitgerand. Voorkaken met gewoon top. De binnenste achterkaaklob met een haak aan het uiteinde. Halsschild half cirkelvormig of schijfvormig. Dekschilden zelden het achterlijf niet geheel bedekkend, met meer of minder breed afgezetten zijrand. Middelcoxae hetzij van elkaar verwijderd of tegen elkaar aanstaande. Schenen naar het uiteinde niet verbreed. Bij het ♂ de voortarsen iets verbreed en aan de onderzijde viltig. De wijfjes kunnen het achterlijf als een eierlegger ver uitsteken en leggen hare eieren in de bovenste aardlaag onder rottende dierlijke of plantaardige stoffen — De soorten van dit genus vliegen, evenals de „doodgravers“, rond en leven grootendeels van aas; sommigen verslinden levende insecten en slakjes; enkelen (*opaca* en *obscura*) zijn phytophaag en soms schadelijk, o. a. aan beetwortels, daar de larven de jonge planten afvreten. — De larve van *S. atrata* is door de Geer, Nördlinger, Taschenberg en Perris, de pop door de Geer beschreven; de larve van *laevigata* door Rey, van *obscura* door Frisch, Schiötte en Blisson en de pop door Frisch, de larve van *nigrita* door Heer, de pop door Rosenhauer, de larve en pop van *carinata* door Xamheu, de larve van *quadripunctata* door Rosenhauer en Rey, de larve en pop van *undata* door Rosenhauer, de larve van *opaca* door Fairmaire en Curtis, de larve en pop van *sinuata* door Rosenhauer en Xamheu, de larve van *rugosa* door Schiötte, de larve van *thoracica* door Schäffer en de larve van *littoralis* door Chapuis en Candèze, benevens de pop door Buist.

Van de 26 Europeesche soorten komen 14 in Nederland voor.

- 1 Kop lang en smal, met vrij lange voorkaken. Het halsschild is van voren afgerond en overdekt den kop. Sprieten slank, geleidelijk en zwak verdikt. Middelcoxae dicht tegen elkaar aanstaande. Dekschilden zonder de geringste aanduiding van eene buil (Sub-gen. *Phosphuga* Leach). 2
- Kop kort en breed, met korte voorkaken. Middelcoxae van elkaar verwijderd. 3
- 2 Dekschilden elk met drie duidelijke langsribben en grof-rimpelige tussenruimten. Voorrand van het halsschild smal opgericht. Voorscheenen smal, aan het uiteinde niet verbreed. Tarsen op de onderzijde viltig, de voortarsen bij het ♂ bijna niet verbreed (*Peltis* Reitter). Zwart of roodbruin (ab. *brunnea* Herbst), glanzig. Sprieten lang, tot aan de basis van het halsschild reikend; de laatste 3 leedjes duidelijk grooter. Dekschilden met tamelijk breed afgezetten zijrand. Lengte 9—12 mm. Zeer gemeen onder mos en boomschors, vooral des winters. Zij schijnt als larve zich hoofdzakelijk te voeden met slakjes, doch verschijnt ook soms in groot aantal in velden, waar zij aan nangelwortels schadelijk wordt. Overgangsvormen in kleur tusschen het type en de ab. *brunnea* zijn zeldzaam. Terwijl type en ab. gewoonlijk in aantal bijeen gevonden worden, vindt men, hetzij de zwarte, hetzij de rood-bruine soms uitsluitend alleen. 1. *atrata* L.
- Dekschilden zonder langsribben of hoogstens met eenige aanduiding ervan, vrij dicht en lijn bestippeld. Voorrand van het halsschild nagenoeg niet opgericht. Voorscheenen aan het uiteinde tandvormig verbreed. Tarsen op de onderzijde kaal, de voortarsen bij het ♂ vrij sterk verbreed en aan de onderzijde viltig (*Abtattaria* Reitter). Lichaam zwart, mat-glanzig. Sprieten kort, de basis van het halsschild niet bereikend; de laatste 3 leedjes niet breeder dan de voorafgaande (Fig. 32, II). Halsschild met meer afgeronde basis, lijner en meer gelijkmatig dicht bestippeld. Dekschilden meer gewelfd, met smal afgezetten, meer gelijk breedten zijrand. Lengte 12—15 mm. Meermalen in de omstreken van Maastricht en Roermond aangetroffen. Zij leeft van plantenkost en is in het buitenland soms schadelijk aan beetwortels (*polita* Sulz.) 2. *laevigata* F.
- 3 Middelcoxae weinig van elkaar verwijderd. Dekschilden tot aan het uiteinde gewelfd en aan het uiteinde in beide seksen gemeenschappelijk afgerond, bij uitzondering met eene gewoonlijk zwakke buil achter het midden 4

- Middeloocae tamelijk ver van elkaar afstaande. Dekschilden naar achteren meer of minder vlak uitgebreid en van eene duidelijke buil voorzien 10
- 4 Kop vlak achter de oogen ingesnoerd. Bovenlip kort, gewoon uitgerand. Clypeus niet zeer kort. 5
- Kop zeer dik, achter de oogen met dikke slapen. Bovenlip lang en tot aan den clypeus in tweeën gedeeld. Clypeus zeer kort en weinig voorbij de inplanting der sprieten naar voren reikend. Halsschild van voren recht afgeknot (Sub-gen. *Aclypea* Reitt.). 9
- 5 Sprieten geleidelijk verdikt, zonder duidelijk afgescheiden knots. Lichaam zwart, bij uitzondering roestkleurig of roodbruin. Achterschenen recht (Sub-gen. *Silpha* Lsp., *Parasilpha* Reitt.) 6
- Sprieten met scherp afgescheiden, 4-ledige knots. Bovenzijde geel. Achterschenen gebogen (Sub-gen. *Nylodrepa* Thoms., *Dendroxena* Reitt.). Het midden van het halsschild, het schildje, eene schouderplek en eene vlek achter het midden op de zwak aangeduide buil van elk der dekschilden zwart. Dekschilden tusschen de flauw aangeduide langsribben rimpelig bestippeld. Lengte 11—13½ mm. Verbreid en op vele plaatsen in het voorjaar niet zeldzaam, op eiken, berken en andere boomen, heesters en struiken, waar zij jacht maakt op rupsen.
7. **quadripunctata** L.
- 6 Halsschild van voren nagenoeg of volkomen recht afgeknot. De zijrand der dekschilden tamelijk smal afgezet. Het achtste sprietlid nagenoeg even lang als het negende. 7
- Halsschild van voren duidelijk uitgerand en vrij sterk opgericht, lijn en dicht bestippeld. Dekschilden tusschen de krachtige langsribben vrij grof bestippeld, met zeer breed afgezetten zijrand. Het achtste sprietlid duidelijk langer dan het negende. Onuitgekleurde exemplaren zijn roestkleurig. Bij het ♂ de voor- en middeltarsen verbreed. Van deze soort komen smalle en breede exemplaren voor. Lengte 13—19 mm. Niet zeldzaam in heidestrekken; ook eenmaal bij den Haag en op IJsselmonde (Lunata F.) 6. **carinata** Ill.
- 7 Dekschilden tusschen de zwak aangeduide langsribben grof en gewoon bestippeld, de stippels niet vijlchtig ruw; de buitenste tusschenruimten veel fijner bestippeld dan de binnenste; de twee binnenste langsribben bereiken nagenoeg het uiteinde, elke rib is aan weerszijden door eene rij dichter staande fijnere stippels begrensd. Halsschild aan den voorrand bijna niet opgericht, doch dik gerand. Onuitgekleurde exemplaren zijn roestkleurig. Bij het ♂ de voor- en middeltarsen verbreed. Lengte 11½—15 mm. Gemeen in heidestrekken, vooral op wegen rondlopende. Zij knaagt soms aan graangewassen en wordt dan schadelijk. Ook eenmaal bij den Haag gevangen 3. **obscura** L.
- Dekschilden tusschen de langsribben ruw vijlchtig bestippeld. Halsschild van voren min of meer fijn gerand 8
- 8 Dekschilden langs de langsribben met enkele grovere stippels bezet, onregelmatig en naar het uiteinde rimpelig bestippeld; de langsribben zijn zwak, de twee binnenste soms nauwelijks aangeduid. De voorrand van het halsschild niet opgericht. Bovenzijde zwart, de dekschilden veelal roodbruin (ab. *tyrolensis* Laich., *alpina* Germ.). Bij het ♂ de voor- en middeltarsen verbreed. Lengte 12—14 mm. Van deze soort, welke in de Alpenstrekken inheemsch is, werd een exemplaar bij Leiden gevangen; dit voorwerp nadert, wegens de donker roodbruine kleur, zeer de ab. *tyrolensis*. In België bij Etterbeek.
4. **nigrita** Creutz.
- Dekschilden langs de scherp aangeduide, glanzige langsribben niet met grovere stippels bezet. Voorrand van het halsschild duidelijk opgericht. Deze soort herinnert overigens aan *obscura*, doch is minder dof. Voortarsen bij het ♂ sterk verbreed. Lengte 13—14 mm. Vrij zeldzaam in de heidestrekken en grensprovinciën, op wegen en tusschen steenen; ook enkele malen langs de stranden aangetroffen. 5. **tristis** Illig.
- 9 Clypeus als een dikke gladde verheven rand, sterk afgezet. Achterschenen bij het ♂ gewoon. Dekschilden, tusschen de vlakke langsribben, met bultige dwarsrimpels. Lichaam zwart, de bovenzijde niet behaard. Halsschild gelijkmatig en uiterst dicht bestippeld, aan weerszijden van de basis duidelijk uitgerand. Dekschilden met vierhoekige vijlstippels. Voor- en middeltarsen bij het ♂ verbreed. Lengte 11—13 mm. Niet zeldzaam in de diluviale streken, vooral op wegen; zij zou aan aas van zoogdieren en vogels leven. Volgens *Nowicki* is deze soort phytophaag (reticulata F.) 8. **undata** Müll.
- Clypeus bijna niet afgezet. Achterschenen bij het ♂ aan het uiteinde naar binnen uitgetrokken en met eene derde, haakvormig omgebogen, eindspoor. Dekschilden zonder dwarsrimpels, vrij dicht bestippeld; uit elke stip ontspringt een neerliggend, geelachtig of geelgraauw haartje, waardoor de dekschilden evenals kop en halsschild door de bruinachtige kleur in 't oog vallen. Op het halsschild bevinden zich tusschen de bestippeling en beharing eenige gladde verhevenheden. Schedel achter de oogen verdiept. De buitenste langsrib der dekschilden eindigt in eene vrij duidelijke buil. Bij het ♂ de voor- en middeltarsen verbreed. Lengte 9—10 mm.

Niet zeldzaam, vooral op kleigrond; zij leeft vooral van plantenkost. In 1877 was deze soort zeer schadelijk in den drooggemaakten Y-polder III oost; zij vernielde daar zelfs het jonge koolzaad 9. *opaca* L.

- 10 Halsschild breder dan lang, van voren diep uitgerand, viltig behaard. Spriet en sterk afgescheiden knots 11

Halsschild nagenoeg cirkelrond, van voren lauw uitgerand, niet viltig. Oogen sterk uitpuilend. Kop vooruitstekend. Dekschilden verkort en recht afgeknut (Sub-gen. *Neerodes* Leach, *Asbolus* Reitt.). Lichaam lang gestrekt, glanzig zwart; onuitgekleurde exemplaren roodbruin. Halsschild in 't midden lijn-, aan de zijden sterker bestippeld. Dekschilden naar het uiteinde iets verbreed; de twee binnenste langsribben zwak, de buitenste krachtig ontwikkeld. De laatste 3 sprietledjes roestrood, dof. Middelschenen voor het uiteinde gekromd. Bij het ♂ is een klein zevende sterniet voorhanden en zijn de twee voorlaatste sternieten dicht, donker behaard; de voortarsen verbreed. Bij groote mannelijke exemplaren zijn ook de achterdijen sterk knorsvormig verdikt en op de onderzijde, nabij het uiteinde, met twee getande kanten bezet; ook zijn de achterschenen naar binnen sterk gekromd. Deze soort vormt een duidelijken overgang tot het genus *Neerophorus*. Lengte 16—23 mm. Verbreed in de diluviale streken, aan aas van groote zoogdieren, als honden, geiten, schapen enz., vooral langs beken en slooten; zij zou ook aan doode visch gevangen zijn. Over het algemeen zeldzaam. Ook eenmaal bij den Haag en bij Leiden gevangen 14. *littoralis* L.

- 11 Voorrand van het halsschild gewoon uitgebogen. Dekschilden bij het ♂ aan het uiteinde breed en nagenoeg recht afgeknut, bij het ♀ met uitgetrokken naadhoek (Sub-gen. *Thanatophilus* Leach, *Pseudopelta* Reitt.) 12

Voorrand van het halsschild in 't midden vooruitstekend en sterk opgericht, aan weerszijden uitgebogen en afgeplat. Dekschilden met tandvormig uitstekende schouders, bij het ♂ aan het uiteinde afgerond (Sub-gen. *Oiceoptoma* Leach). Halsschild oneffen, aan weerszijden van de basis naast de achterhoeken uitgebogen, dicht viltig geelrood behaard, aan de zijden geelrood doorschijnend. Dekschilden met breed opgerichten zijrand en met 3 langsribben, van welke de binnenste zwak aangeduid is; ook is de middelste langsrib tot aan de tandvormige buil zwak aangeduid, doch loopt verder scherpkantig naar binnen gebogen door; de buitenste is zeer scherpkantig en loopt tot aan de buil door; zwart, eenigszins flauweelglanzig, bij het ♀ de naadhoek in eene kleine, naar onderen gerichte slip uitgetrokken. Bij het ♂ de voortarsen slechts zwak verbreed. Lengte 12—15 mm. Zeer gemeen op aas, vooral op doode vogels; ook aan doode kikvorschen en slakken 13. *thoracica* L.

- 12 Dekschilden tusschen de langsribben fijn bestippeld. Halsschild vlekkelig behaard. 13

Dekschilden tusschen de scherpe langsribben met groote, bultige dwarsrimpels. Halsschild in 't midden van de basis uitgebogen. Schouders der dekschilden afgerond. Lichaam zwart. Halsschild tusschen de niet zeer dichte, grauwe beharing, met vele bultige, zwart viltig behaarde vlekken. Dekschilden bij het ♀ aan den naadhoek iets uitgetrokken. Bij het ♀ is het voorlaatste sterniet uitgesneden en in het midden van een tand voorzien; het propygidium eveneens uitgesneden, met eene uitgerande middenlob. Lengte 9—11 mm. Zeer gemeen, gewoonlijk in gezelschap van *thoracica*. 12. *rugosa* L.

- 13 Dekschilden met afgeronde schouders. Het voorlaatste sterniet bij het ♀ recht afgeknut. Halsschild aan het naar achteren uitstekende middengedeelte van de basis uitgebogen. De kop, het halsschild gedeeltelijk, benevens het schildje geel behaard; daartusschen met zwart behaarde vlekken. Dekschilden met verspreide, gele haartjes; bij het ♀ de naadhoek niet sterk uitgetrokken. Ook is bij het ♀ het voorlaatste tergiet (propygidium) aan den achterrand driemaal uitgebogen. Lengte 9—10 mm. Verbreed, doch overal vrij zeldzaam. 10. *dispar* Herbst.

Dekschilden met scherp aangeduide schouderhoeken. Halsschild in 't midden van de basis nagenoeg recht afgeknut. De naadhoeken der dekschilden bij het ♀ tot lange slippen uitgetrokken. Het voorlaatste sterniet diep en breed uitgerand, bij het ♀ in 't midden eenigszins hoekig uitgetrokken. Het propygidium bij het ♀ in 't midden met eene groote, half-cirkelvormige uitranding. Lichaam dof zwart; kop en halsschild, evenals bij *rugosa*, doch dichter en grover, neerliggend behaard; op het halsschild met een groot aantal zwarte viltvlekken. Lengte 9—11½ mm. Zeer gemeen op aas van zoogdieren. Wanneer men een dood dier omkeert en de *Silpha*'s daardoor gestoord worden, dan trekken deze de pooten in en houden zich als dood, waardoor zij, tengevoel van hare grijze kleur, moeielijk in 't oog vallen 11. *sinuata* F.

S. *Necrophorus* Fabr.

(Silpha L. ex parte, Reitter).

Lichaam langwerpig, plomp gebouwd. Sprieten schijnbaar 10-ledig, daar het tweede lid zeer klein is en min of meer in het zeer verlengde eerste verscholen zit; met een dikken, 4-ledigen, doorbladerden, rondachtigen eindknop (Fig. 32, III). Clypeus, in beide seksen, van voren met eene meer of minder diepe uitranding, welke door een meestal geelachtig, zelden zwartachtig, dun chitineus vlies aangevuld is; bij *humator* en *vespilloides* alleen bij het ♂. Bovenlip sterk uitgerand. De binnenste achterkaakslob zonder haak aan het uiteinde. Dekschilden afgeknoot, zonder breed afgezetten zijrand. Middelscoxae altijd van elkaar vertwijfderd. Schenen naar het uiteinde verbreed. Trochanters der achterdijen met een meer of minder krachtigen tand. Bij het ♂ de voortarsen sterker verbreed dan bij het ♀. — De soorten van dit genus leven, vooral in den zomer, aan aas, hoofdzakelijk van kleinere zoogdieren en vogels; eene enkele in rottende paddenstoelen. Zij graven, dikwerf verscheidene bijeen, kleine doode dieren, als muizen en mollen, in den grond (wanneer deze niet te hard is), door er onder te kruipen en met de pooten de aarde er onder weg te krabben. Reeds op grooten afstand bemerken zij het aas en vliegen, vooral na het begin der schemering, rond, waarbij de vleugels met de binnenzijde naar buiten gekeerd worden. Zij geven eene hoogst onaangename lucht van zich af. Door het verwijten van het eerste der drie onbedekte tergieten (dat over het midden twee verhevene, overdwars geriggelde langslijsten vertoont) tegen den verheven achterrand der dekschilden, brengen zij een eigenaardig geluid voort; ook maken zij een snorrend geluid bij het vliegen. Na de paring kruipen de wijfjes in den grond om in de begraven dieren eieren te leggen; na eenige dagen komen zij weder te voorschijn, geheel met mijten (*Gamasus coleopterorum* L.) bedekt en sterven kort daarop. De larven ontwikkelen zich zeer snel. — De larve van *N. vespillio* is door Rosel en Schödte, die van *investigator* door Schödte, van *humator* en *interruptus* door Xamben en de larve en pop van *vespilloides* door Schödte beschreven.

Van de 13 Europeesche soorten komen 8 in Nederland voor.

- 1 Achterschenen aan den achterrand met een sterk gedoord, bultig uitsteeksel en aan de binnenzijde met eene sterk gebogen langslijst. Sprietknots zwart. Bovenzijde geheel zwart, de epipleuren der dekschilden roodbruin. Het midden van den clypeus bij beide seksen vliezig en geel. Bij ab.c. **frontalis* Fisch. (*apicalis* Kr.) bevindt zich eene bloedroode vlek voor het uiteinde van elk dekschild; bij ab.c. **bipunctatus* Kr. eene bloedroode vlek voor het midden van elk dekschild; bij ab.c. **speciosus* Schulze (in Westfalen) vertoonen de dekschilden elk twee bloedroode vlekken, de eene voor het uiteinde, de andere, welke gewoonlijk dubbel is, voor het midden. Voortarsen bij het ♂ sterk verbreed. Lengte 23—33 mm. Op aas van groote dieren; soms ook in mest, waar zij *Geotrupes* zou vervolgen, wat volgens Klingelhöffer en Schmidt zou geschieden bij gebrek aan aas. Over het algemeen zeldzaam; uitsluitend in de diluviale streken en in Zuid-Limburg gevangen. Eenmaal in groot aantal bij Oosterbeek in Sept. 1. **germanicus** L.
- Achterschenen aan den achterrand ruw stekelig, doch niet bultig verdikt; op de binnenzijde met eene zwakke, met den voorrand evenwijdig loopende langslijst. Voortarsen bij het ♂ sterk verbreed. 2
- 2 Bovenzijde geheel zwart, bij onuitgekleurde exemplaren donker kastanjebruin. Dekschilden grof en dicht bestippeld, met blauw aangeduide langsrriben en eene duidelijke buil voor het uiteinde. Achterschenen recht. Sprietknots, behalve het eerste lid, rood. Alleen bij het ♂ met een geel-vliezig gedeelte van den clypeus. De ab.c. **bimaculatus* Steph. (op het eiland Borkum) vertoont twee roode vlekken op de dekschilden. Lengte 14—25 mm. Overal zeer gemeen, vooral in bosschen op doode vogels 2. **humator** F.
- Bovenzijde zwart, met twee dwarsbanden op de dekschilden, benevens de epipleuren geel-rood, oranjerood of rood 3
- 3 Achterschenen gebogen, bij het ♂ zeer sterk gekromd. De voorrand van het halsschild, het sternum, de randen van het achterlijf, de tarsen, de buitenzijde der achterdijen en gedeeltelijk de kop dicht geel behaard. Halsschild van voren duidelijk breeder dan aan de basis. Epipleuren geheel geelrood. Trochanters der achterpooten in een langen priemvormigen doorn

uitgetrokken. Sprietknots, behalve het eerste lid, rood. Dekschilden, vooral langs de zijden, verspreid lang geel behaard. Bij ab.c. **Jarenderffi* Westh. zijn de dekschilden geheel roodachtig; bij ab.c. **Bolsmanni* Westh. is de voorste roode band zeer smal, de achterste nagenoeg uitgewischt en de epipleuren van voren rood (beiden in Westfalen). In Frankrijk werd eene geheel zwarte aberratie (ab.c. **Fauvelii* Fauconnet) aangetroffen, welke van humeralis door de geelachtige beharing onderscheiden is; de sprietknop roodachtig. Lengte 12—23 mm. Zeer gemeen op aas van zoogdieren 3. **vespillo** L.

Achterschenen recht. Trochanters der achterpooten met een korten, soms haakvormig teruggebogen tand 4

4 Sprietknots, behalve het eerste lid, roodgeel 5

Sprietknots geheel zwart. Halsschild van voren nagenoeg even breed als aan de basis, geheel onbehaard. Het vliezige gedeelte van den clypeus bij het ♂ zwart, bij het ♀ onthrekend. Pygidium aan het uiteinde geel bewimperd. De voorste en achterste zwarte dwarsband der dekschilden grijpt over de epipleuren heen; de achterste roode band op elk der dekschilden is tot eene, geheel door het zwart omgeven dwarsvlek beperkt. Bij eene in Westfalen gevangen ab.c. **Altumii* Westh. zijn de dekschilden bijna geheel rood. Lengte 11—16 mm. In bosschen, gemeen op doode vogels, doode slakken en in rottende paddestoelen.

(mortuorum F.) 8. **vespilloides** Herbst.

5 Halsschild van voren veel breeder dan van achteren, aan den geheelen omtrek, zoo ook het sternum, de zijranden der sterniten, benevens de buitenzijde der achterdijen lang en dicht geel behaard; ook zijn de dekschilden hier en daar met lange gele, verspreide haren bezet. De epipleuren geheel geel. Dekschilden met twee uitgezakte, oranjerode dwarsbanden, van welke soms de achterste tot enkele vlekjes gereduceerd is (ab.c. *interruptus* Brullé); zelden is ook de voorste dwarsband meer of minder onderbroken. Soms is de voorste dwarsband zoozeer uitgezakt, dat zij tot aan den tweeden dwarsband nadert. Het eerste lid der sprietknots zwart 1). Lengte 14—23 mm. Verbreid in de grensprovinciën; ook op Texel en bij Leiden.

4. **vestigator** Herschel.

Halsschild van voren slechts weinig breeder dan van achteren, in 't geheel niet behaard. Het sternum kort behaard. De zijrand van het achterlijf en de achterdijen niet dicht geel behaard. 6

6 Pygidium en propygidium geel behaard, gewoonlijk ook het daaraan voorafgaand tergiet aan de randen geel bewimperd. De voorste zwarte dwarsband der dekschilden grijpt over de epipleuren heen, de voorste roode band is meestal aan den naad duidelijk onderbroken. Kop achter de oogen bij het ♀ en bij kleine mannetjes zwak-, bij groote mannetjes sterk opgeblazen. De tand van de trochanters der achterpooten is kort en spits, soms min of meer haakvormig teruggebogen (de vorm *gallicus* Duv.), doch zijn daarvan overgangsvormen. Bij Göttingen komt eene ab.c. **centrimaculatus* Reitt. voor, bij welke de geelroode kleur der dekschilden zoozeer de overhand heeft, dat alleen de smalle naad, een niet op de epipleuren overgrijpende basaalband en eene kleine, gemeenschappelijke middenvlek, benevens de toprand aan den naadhoek zwart blijven. Bij ab.c. **rimiculatus* Gratl is de zwarte middenband in tamelijk kleine vlekjes opgelost; bij ab.c. **brunipes* Gratl zijn de pooten, benevens de coxae licht bruinrood. Lengte 14—18 mm. Verbreid in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. (fossor Er.) 5. **interruptus** Steph.

Hoogstens het pygidium geel bewimperd, het propygidium en de daaraan voorafgaande tergieten zwart bewimperd. 7

7 Het pygidium geel bewimperd. De epipleuren geheel rood; de voorste roode band aan den naad niet onderbroken; zelden hangt de voorste band met den achtersten door eene smalle strook samen, zoodat eene zwarte vlek op het midden van den naad voorhanden is (bij Maastricht). Kop achter de oogen bij het ♀ en bij kleine mannetjes (*microcephalus* Thoms.) bijna niet-, bij groote mannetjes sterk opgeblazen. De tand der trochanters van de achterpooten klein en spits, bij groote mannetjes gewoonlijk haakvormig teruggebogen. Het sternum dicht geel behaard. Lengte 14—21 mm. Niet zeldzaam in het voorjaar in bosschen op doode kraaien (vestigator Gyll., rufator Er.) 6. **investigator** Zett.

Ook het pygidium zwart bewimperd. De voorste zwarte dwarsband der dekschilden grijpt over de geheele breedte der epipleuren en laat eene roode schoudervlek vrij. Bij groote mannetjes is de tand der trochanters van de achterpooten meer ontwikkeld dan bij de wijfjes en bij kleine mannetjes, en is meer haakvormig gekrond. Lengte 14—22 mm. Zeer zeldzaam; bij Vlissingen en Roermond; ook bij Brussel en Düsseldorf. (obrutator Er.) 7. **sepultor** Charp.

1) Volgens Reitter komt in geheel Middel- en Zuid-Europa eene naverwante soort *antennatus* Reitt. voor, bij welke alle lediges der sprietknots geelrand zijn, ook reiken de randen van den clypeus niet voorbij den toprand van het vierge clypeaalgedeelte, zoals bij *vestigator*. Volgens Ganglbauer is deze slechts eene variëteit van *vestigator*.

VI. Tribus AGYRTINI.

Sphaerites Duftschm.

Sprieten 11-ledig, met 3-ledige, groote, langwerpige, dichte knots; het eerste lid groot. Bovenlip afgeknut. Voorkaken ver uitstekende, met haakvormig omgebogen top; de linker aan den binnenrand met twee tanden, de rechter met een grooten stompen tand. Eindlid der kaaktasters even lang als de beide voorafgaande leedjes te zamen. Lichaam rondachtig, eenigszins vierhoekig en iets gewelfd. Halsschild volkomen tegen de dekschilden aangesloten, tegen het groote schildje eenigszins uitgetrokken, van voren uitgerand, aan de zijden kantig gerand. Dekschilden aan het uiteinde afgeknut, het pygidium onbedekt. Mesosternum tusschen de middelcoxae uitstekend. Achterlijf met 5 sterniten. Bij het ♂ is nog een klein, onduidelijk zesde sterniet voorhanden. — Dit genus verbindt de Silphidae met de Anisotomidae en Histeridae.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam kort en breed, in voorkomen aan *Hister* herinnerend; op de bovenzijde groenachtig-bronskleurig, glanzig en glad. Sprieten, behalve de donkere knots, roodbruin. Onderzijde en pooten zwartachtig. Halsschild zeer fijn verspreid bestippeld, aan de basis tweemaal uitgerand, met dik gerande zijden. Dekschilden zeer fijn verspreid bestippeld en met duidelijke stippelrijen. Lengte 5—6½ mm. In bergstreken, in bosschen aan uitvloeiende boomsappen en in vermolmden boomen, in den grond en in het najaar in fungi; volgens sommigen ook in rottende dierlijke en plantaardige stoffen en op mest. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnprov. bij Aken en ook in Oldenburg gevangen zijn (*glabratus* F.)

Hadrambe Thomson.

Sprieten naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Clypeus tusschen de sprieten door eene diepe dwarsgroef afgescheiden. Bovenlip breed uitgerand. Eindlid der kaaktasters dun, cilindervormig, 1½ maal zoo lang als het voorlaatste lid. Halsschild dubbel zoo breed als lang, even breed als de dekschilden; van voren diep uitgesneden, aan de basis tamelijk recht, zeer fijn gerand, iets over de basis der dekschilden grijpend. Dekschilden aan het uiteinde afgerond, het pygidium bedekkend; met tot aan het uiteinde reikende langsstrepen. Lichaam langwerpig-ovaal, iets gewelfd. Achterlijf in beide seksen met 5 sterniten. Middelcoxae elkaar aanrakende.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Glanzig zwart of bruinzwart, onbehaard; de sprieten en pooten bruinrood, de tarsen roestrood. Kop en de zijden van het halsschild verspreid bestippeld. Sprieten van af het zevende lid geleidelijk sterk verdikt, het eindlid tweemaal zoo lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Halsschild met afgeronde hoeken. Dekschilden met krachtige stippellijnen, welke tot aan het uiteinde reiken. Bij het ♂ de tarsen der voor- en middelpooten verbreed. Lengte 5—5½ mm. Niet inlandsch. Zij zou bij Düsseldorf en Elberfeld gevangen zijn. Ik zag een exemplaar in het museum Neerhyoort v. d. Poll. (*glabra* Payk.)

9. **Agyrtes** Fröhl.

*Dit genus onderscheidt zich van Hadrambe, doordat het eindlid der kaaktasters eivormig en meer verdikt is. De laatste 4 of 5 sprietleedjes vormen eene geleidelijk in dikte toenemende of gelijk breede knots. Halsschild 1½ maal zoo breed als lang, de voorrand nagenoeg recht, slechts flauw uitgerand. Niet alle strepen bereiken het uiteinde der dekschilden, doch de middelsten zijn van achteren met elkaar verbonden en tamelijk fijn. Het lichaam is meer verlengd. Achterlijf met 5 sterniten; bij het ♂ van *A. castaneus* nog een klein zesde sterniet.*

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Sprieten met 5 grootere, even breede eindleedjes. Clypeus, tusschen de sprieten, door eene diepe dwarsgroef afgescheiden. Halsschild met iets afgeronde achterhoeken. Lichaam langwerpig-ovaal, peckbruin; de dekschilden geheel of gedeeltelijk roodbruin; de sprieten en pooten rood. Halsschild grof en fijn doorreen bestippeld. Dekschilden met scherpe stippellijnen. Lengte $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$ mm. Onder steenen en boomschors. Uitsluitend in Limburg bij Roosteren en in de omstreken van Maastricht aangetroffen 1. *castaneus* Fröhl.

Sprieten met 4 grootere, geleidelijk in breedte toenemende eindleedjes. Clypeus door eene zeer fijne, dicht tegen de bovenlip gelegen dwarslijn afgescheiden. Halsschild met scherper aangeduide achterhoeken. Lichaam iets meer gedrongen en meer gewelfd, eenkleurig bruin-zwart of kastanjebruin; de sprieten en pooten roestrood. Lengte 4–5 mm. Niet inlandsch. In België bij Brussel en Schooten; in de Rijnprov. bij Gulik onder aanspoelsel van de Roer. Ik zag een exemplaar uit Schooten. (bicolor Casteln.)

XIII. Familie ANISOTOMIDAE.

Kleine, aan de Silphidae naverwaante kevertjes van min of meer rondachtige, kort-ovale, eivormige of langwerpig-eironde gedaante, meer of minder sterk gewelfd, soms nagenoeg half-kogelvormig en doordat soms de achterhoeken van het halsschild en de schouders der dekschilden over elkaar verschuifbaar zijn, alsdan met het vermogen zich meer of minder volkomen tot een kogeltje ineen te rollen. De vormen, bij welke de achterhoeken van het halsschild en de schouders der dekschilden vast aaneensluiten, hebben dit kogelvermogen niet. Van de Silphidae onderscheiden zij zich hoofdzakelijk, doordat de zeer smalle, veelal lijnvormige episternen van den metathorax geheel of bijna geheel door de epipleuren der dekschilden bedekt zijn.

Kop op de onderzijde met of zonder sprietgroeven. — Bovenlip tweelobbig, in 't midden iets ingesneden of slechts zwak uitgerand. Voorkaken krachtig ontwikkeld, doch in den regel weinig vooruitstekend, bij *Triarthron* en *Hydnobius* sterk vooruitstekend, veelal met een tand in 't midden aan de binnenzijde of aan de basis; bij de mannetjes van enkele *Agathidium*-soorten is de linker voorzaak groter dan de rechter of met een hoorn bewapend. Achterkaken 2-lobbig. Kaaktasters 4-, lipstasters 3-ledig. — Sprieten 11-ledig, met 3- tot 5-ledige knots. — Dekschilden met stippellijnen of stippelrijen, zeldzamer met eenige zeer flauwe aanduiding daarvan; in enkele gevallen duidelijk dwarsrimpelig. — De vleugels komen met die der Silphidae overeen, doch ontbreekt, volgens *J. Redtenbacher*, bij *Amphicyllis*, evenals bij *Carops*, de vena cubitalis, terwijl deze bij *Agathidium* door een kort streepje is aangeduid. — Mesosternum al of niet gekield. Achterlijf met 6 sterniten. — Voorcoxae kegelvormig uit de van achteren gesloten gewrichtsholten uitstekende. Middel- en achtercoxae tegen elkaar aanstaande. Achtercoxae smal, niet kegelvormig uitstekende; hoogstens met eene zeer kleine voortzetting, welke de dijwortel bedekt. Pooten krachtig ontwikkeld, met duidelijk gedoornde (*Anisotomini*, Fig. 34) of met fijn en dun gedoornde, of in rijen behaarde schenen (*Agathidiini*). Trochanters der achterpooten klein. Tarsen hetzij allen 5-ledig (*Triarthron* en *Hydnobius*), of de voor- en middeltarsen 5- en de achtertarsen 4-ledig (*Anisotoma*, *Cyrtusa*, de mannetjes van *Agathidium* en *Liodes*), of de voortarsen 5- en de middel- en achtertarsen 4-ledig (*Colenis*, de mannetjes van *Amphicyllis* en sommige wijfjes van *Agathidium* en *Liodes*), of alle tarsen 4-ledig (de wijfjes van *Amphicyllis* en sommige *Agathidium* en *Liodes*), of wel de voortarsen 4- en de middel- en achtertarsen 3-ledig (*Agaricophagus*). — De Anisotomidae zijn door de genera *Triarthron* en *Hydnobius* verwant aan de Silphidae (*Agyrtes*), en door de *Agathidiini* aan de familie der Clambidae.

Fig. 34 Voorschene en tars van *Anisotoma dubia* Kugel Öreg.

De soorten leven deels in fungi, deels in rottende plantenstoffen. Velen verschijnen eerst tegen den avond, aan grashalmen, vooral op open grasplekken in bosschen.

Overzicht der Tribus.

Kop zonder sprietgroeven. Achterhoeken van halsschild en schouders der dekschilden vast aaneensluitend, niet verschuifbaar en daardoor zonder kogelvermogen. Pooten krachtig ontwikkeld, schenen gedoornd. Dekschilden met stippellijnen, zelden met stippelrijen. Tarsen in beide seksen met evenveel leedjes 1. *Anisotomini*.

Kop op de onderzijde met duidelijke sprietgroeven. Achterhoeken van halsschild en schouders der dekschilden over elkaar verschuifbaar en daardoor met kogelvermogen. De basis van het

halsschild nimmer gerand. Schenen fijn en dun gedoord of met haarrijen. Tarsen bij het ♂ 5, 5, 4-, bij het ♀ 5, 4, 4- of 4, 4, 4-ledig 1) II. **Agathidiini.**

I. Tribus ANISOTOMINI.

- 1 Halschild aan de basis gerand. Meso- en metasternum gewoon. Alle tarsen 5-ledig 2
- Halschild aan de basis niet gerand. Mesosternum gekield of wel het metasternum van voren bultig. Achtertarsen 3- of 4-ledig, voortarsen 4- of 5-ledig 3
- 2 Sprietknots 3-ledig. Tusschenruimten op de dekschilden niet rimpelig. Clypeus door eene lijne gebogen lijn afgescheiden (Triarthron.)
- Sprietknots 5-ledig, het tweede lid klein. Tusschenruimten der dekschilden meer of minder duidelijk dwarsrimpelig ingekrast of eenigszins onduidelijk onellen. 1. **Hydnobius.**
- 3 Tarsen 4, 3, 3-ledig. Sprietknots 5-ledig, het tweede lid klein. Mesosternum gekield. Dekschilden met scherp aangeduide dwarsrimpels en lijne stippellijnen. Bij het ♂ de tarsen eenigszins verdikt en aan de onderzijde langer behaard; de achterdijen op de onderzijde met een naar achteren gericht tand. Clypeus door eene gebogen dwarslijn afgescheiden. (Agaricophagus.)
- Voortarsen 5-, achtertarsen 4-ledig 4
- 4 Middeltarsen 5-ledig. Bovenzijde bestippeld, zeer zelden op de dekschilden met zwakke dwarsrimpels 5
- Middeltarsen 4-ledig. Sprietknots 3-ledig. Dekschilden met dicht opeenstaande lijne dwarsrimpels en lijn gestreept. Mesosternum fijn gekield. Achterdijen bij het ♂ met twee tanden. 4. **Colenis.**
- 5 Sprietknots duidelijk 5-ledig, het tweede lid klein. Halsschild tegen de basis met eene rij grootere stippels. Dekschilden met krachtige stippellijnen. Mesosternum fijn gekield; metasternum gewoon. Lichaam eenigszins langwerpig-ovaal, minder hoog gewelfd. Bij het ♂ zijn veelal de achterpooten verlengd, met verdikte en getande dijen en gekromde schenen.

2. **Anisotoma.**

Sprietknots schijnbaar 4-ledig, aangezien het tweede lid zeer klein en moeielijk zichtbaar is. Halsschild tegen de basis zonder eene rij grootere stippels. Dekschilden slechts met lijne stippelrijen en daartusschen dicht en sterk bestippeld. Mesosternum ongekield, metasternum tusschen de middelcoxae bultig. Lichaam hoog gewelfd en rondachtig 3. **Cyrtusa.**

II. Tribus AGATHIDIINI.

- 1 Kop klein, de slapen zeer kort; dicht achter de groote ronde, uitpuilende oogen sterk ingesnoerd. Bovenlip van normale grootte, hoornachtig. Achterhoeken van het halsschild min of meer aangeduid. Mesosternum niet gekield, tusschen de middelcoxae een klein uitsteeksel vormend. Dekschilden met meer of minder duidelijke stippelrijen. Kogelvermogen onvolkomen. 2
- Kop groot, de slapen lang. Oogen klein, langwerpig, schuin staande en weinig uitpuilend. Bovenlip zeer kort, lijnvormig. Achterhoeken van het halsschild met den achterrand afgerond. Mesosternum fijn gekield. Dekschilden zonder stippelrijen of slechts met zeer flauwe aanduiding ervan, doch met eene naadstreep. Sprietknots 3-ledig. Kogelvermogen meer of minder volkomen. 8. **Agathidium.**
- 2 Sprietknots 4-ledig. Schenen slechts behaard 5. **Amphicyllis.**
- Sprietknots 3-ledig 6. **Cyrtoplastus.**
- Sprietknots 5-ledig, het tweede lid klein. Achterschenen met lijne doortjes bezet. Bij het ♂ de eerste leedjes der voortarsen verbreed 7. **Liodes.**

I. Tribus ANISOTOMINI.

Triarthron Schmidt.

Spriet en met groote, 3-ledige, rondachtige knots. Clypeus door eene fijne, gebogen lijn afgescheiden. Bovenlip tweelobbig. Voorkaken vooruitstekend, aan de binnenzijde getand. Eindlid der kaaktasters toegespitst, dat der liptasters stomp. Halsschild

1) De drie cijfers doelen op de voors-, middel- en achtertarsen

aan de basis gerand. Dekschilden met stippellijnen. Meso- en metasternum ongekiëld. Lichaam langwerpig-eirond. Alle tarsen 5-ledig; bij het ♂ de eerste 3 voortarsen-leedjes verbreed.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Langwerpig-ovaal, gewelfd, glanzig roestrood. Kop en halsschild lijn bestippeld. Dekschilden met krachtige stippellijnen; de afwisselende tussenruimten met enkele grootere-, de eerste tussenruimte met dicht opeenstaande stippels bezet. Bij het ♂ de kop bijzonder groot, de voorrand van het voorhoofd half-cirkelvormig uitgerand en de clypeus uitgehold; ook zijn de achterdijen knotsvormig verdikt en aan de onderzijde in 't midden met een drietandigen bult. Lengte 3 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld. (Märkelii Schmidt)

1. Hydnobius Schmidt.

Sprietknots 5-ledig, het tweede lid kleiner dan de overige leedjes. Bovenlip klein, tweelobbig. Voorkaken sterk uitstekende, van binnen in 't midden met een tand; de rechter stomp en gespleten, de linker gewoon. Kaaktasters draadvormig, het eindlid zoo lang als de beide voorafgaande leedjes. Halsschild aan de basis gerand. Dekschilden in de tussenruimten meer of minder duidelijk dwarsrimpelig ingekrast of eenigszins oneffen. Lichaam langwerpig-eirond. Mesosternum niet gekield. Tarsen in beide seksen 5-ledig. Het ♂ met een grooten tand nabij het uiteinde der achterdijen. — De soorten van dit genus leven in fungi en tussen gras van open plaatsen in bosschen.

Van de 13 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Zijrand der dekschilden met fijne haren dicht bewimperd. Lichaam geheel roodbruin. Sprieten kort, de knots donker. De zijden van het halsschild overal gelijkmatig gerand. Kop, behalve op het midden, en het halsschild krachtig en vrij dicht bestippeld. Dekschilden met eenigszins onregelmatige, dicht opeenstaande stippelrijen, doordat de tussenrijen bijna even sterk ontwikkeld zijn als de hoofdrijen; de tussenruimten niet dwarsrimpelig, doch iets of wat oneffen. Bij het ♂ de achterdijen met breeden, driehoekigen tand, waarachter nog een klein tandje. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Deze zeldzame soort werd enkele malen bij den Haag aangetroffen. (Ciliaris Thoms.) 1. **Perrisii** Fairm.
- Zijrand der dekschilden niet bewimperd, hoogstens aan de schouders met enkele korte, moeielijk zichtbare haartjes bezet. 2
- 2 Sprietknots zwart of bruin, het eindlid duidelijk smaller dan het voorlaatste lid 3
- Sprietknots geel. Tussenruimten der fijne stippellijnen op de dekschilden met eene iets fijnere stippelrij en overal sterk dwars ingekrast. Lichaam roestrood, de sprieten en pooten geel. Het eindlid der sprietknots nauwelijks smaller dan het voorlaatste lid. Bij het ♂ de achterdijen met een breeden, driehoekigen tand. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Eenmaal bij Wylré (Limburg) in Juli, uit gras gesleept; ook in de Rijnprov. 5. **strigosus** Schmidt.
- 3 De stippelrijen der tussenruimten op de dekschilden even sterk ontwikkeld als de hoofd-stippelrijen zelf, waardoor de dekschilden dicht opeenstaande stippelrijen vertoonen; in de tussenruimten hoogstens met zwakke aanduiding van dwarsrimpels. 4
- De stippelrijen der tussenruimten veel fijner dan de hoofd-stippelrijen en vooral de tussenruimten langs de zijden der dekschilden in schuine richting dwarsrimpelig ingekrast. Bovenzijde licht roodbruin of roodgeel, de kop en het midden van het halsschild gewoonlijk donkerder. Achterdijen bij het ♂ met een grooten haakvormigen tand. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Valkenburg (Limburg), Juli 4. **spinipes** Gyll. 1)
- 4 De stippelrijen der tussenruimten eenigszins onregelmatig. Bovenzijde glanzig zwart of bruin-zwart, zelden bruin of geelachtig; de sprieten, behalve de knots, alsook de tarsen geelbruin. Achterdijen bij het ♂ op de onderzijde aan het uiteinde met een haakvormigen tand. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. In paddenstoelen en in gras. Ik sleepte deze soort eenmaal van gras in het Haagsche bosch, Sept.; ook bij St. Pieter in November. In Westfalen. 2. **punctatissimus** Steph.
- De stippelrijen der tussenruimten volkomen regelmatig. Bovenzijde bruin-, roest- of geel-rood. Halsschild fijn-, de dekschilden krachtig bestippeld. Achterdijen bij het ♂ met een grooten, doornachtigen smallen tand. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Op gras; Scheveningen, Mei; ook in Belgisch Limburg 3. **punctatus** St.

1) Volgens Ganglbauer niet te onderscheiden van punctatus St.

Agaricophagus Schmidt.

Sprietknots 5-ledig, het tweede lid klein. Clypeus door eene gebogen dwarslijn afgescheiden. Bovenlip in 't midden iets ingesneden. Halsschild aan de basis niet gerand. Dekschilden met scherp aangeduide dwarsrimpels en fijne stippellijnen. Mesosternum gekield. Tarsen 4, 3 en 3-ledig. Bij het ♂ de tarsen eenigszins verdikt en aan de onderzijde langer behaard, de achterdijen op de onderzijde met een naar achteren gericht tand. Levenswijze als Anisotoma.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam geelrood of roestkleurig, eenigszins langwerpig-ovaal, weinig gewelfd, de tussenruimten der stippellijnen vrij dicht dwarsrimpelig ingekrast. Kop groot. Halsschild naar voren weinig versmald. De naadstreep der dekschilden van af het uiteinde tot over het midden sterk verdiept. Lengte ruim 2 mm. In Agarici en op open grasplekken in bosschen. Niet inlandsch. In België bij Orval en in Westfalen (cephalotes Schmidt)

2. Anisotoma Illiger.

(Liodes Latr. ex parte, Reitt.)

*Sprietknots duidelijk 5-ledig, het tweede lid klein. Bovenlip twee-lobbig. Voorkaken aan de binnenzijde met een tand. Voorhoofd meestal met 4 grootere stippels tusschen de oogen. Halsschild tegen de niet gerande basis met eene rij grootere stippels. Dekschilden met krachtige stippellijnen. Mesosternum fijn gekield, metasternum gewoon. Lichaam eenigszins langwerpig-ovaal. Voor- en middel-tarsen 5-, achter-tarsen 4-ledig. Bij het ♂ van vele soorten zijn de achterpooten verlengd, met verdikte en getande dijen en gekromde schenen. De kleur is rood-bruinachtig, roestkleurig of bleekgeel, bij uitzondering pektzwart. — De soorten van dit genus leven in de onderaardsche deelen van fungi, in truffels, vermolmd hout en tusschen schimmelende, afgevallen bladeren. 's Zomers verschijnen zij, vooral tegen den avond, aan grashalmen. — De larve van *A. cinnamomea* is door Laboulbène afgebeeld, de levenswijze door Beling en die van *furva* door Decaux beschreven.*

Van de 53 Europeesche soorten komen 13 in Nederland en 12 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Tusschenruimten der stippellijnen, vooral aan de zijden, duidelijk lijn dwarsrimpelig ingekrast. Sprietknots donker gekleurd 2
- Tusschenruimten der stippellijnen op de dekschilden zonder dwarsrimpels. 4
- 2 Achterhoeken van het halsschild recht, scherp aangeduid. Eindlid der dunne sprietknots niet smaller dan het voorafgaande lid. Mesosternum hoog gekield. Lichaam eirond, roodbruin of roodgeel, nagenoeg kaal en glanzig. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde met een soms onduidelijken, stomp-driehoekigen tand. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 mm. In het najaar in bosschen aan gras. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Aken 1). . . . (parvula Sahlb.)
- Achterhoeken van het halsschild zeer stomp. Eindlid der sprietknots iets smaller dan het voorlaatste lid. Mesosternum lijn gekield 3
- 3 Bovenzijde en vooral de dekschilden naar de zijden en aan het uiteinde lijn afstaande behaard. Voorschenen naar het uiteinde verbreed. Lichaam kort-eivormig, licht roestkleurig-rood. De basis van het halsschild recht afgeknot. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde van buiten afgerond, van binnen met een klein tandje; op de onderzijde onduidelijk gekorven; de achterschenen sterk en gelijkmatig gekromd. Voortarsen verbreed; de middel-tarsen gewoon. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Den Haag en Wassenaar, October en December. (armata Sturm) 1. *rugosa* Steph.
- Bovenzijde glad, onbehaard, hoogstens aan den toprand der dekschilden met eenige weinige, onduidelijke, uiterst korte haartjes. Voorschenen smal. Lichaam langwerpig-ovaal, lichter of donkerder rood- of pektbruin, de dekschilden veelal iets lichter. Achterdijen bij het ♂ zonder tandje. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld. . . . (hybrida Er.)
- 4 Zijrand der dekschilden met duidelijke wimperharen. Achterhoeken van het halsschild nagenoeg afgerond 5

1) Een exemplaar uit België (coll. Wesmali), als *A. parvula* bestemd, is *Colenis dentipes* Gyll.

- Zijrand der dekschilden zonder wimperharen 6
- 5 Zijrand der sterk gewelfde dekschilden vrij lang bewimperd. Halsschild vlak achter het midden het breedst, naar achteren nagenoeg even sterk als naar voren verbreed. Lichaam eirond, roodgeel of roestkleurig-rood, weinig glanzig. Sprietknots donker gekleurd. Halsschild duidelijk en dicht bestippeld. Dekschilden in de tusschenruimten vrij dicht bestippeld. Voorscheneu sterk gedoorn. Bij het ♂ de achterdijen gewoon. Lengte 3—3½ mm. Meermalen bij den Haag gevangen; ook op Terschelling en aan den Hoek van Holland . . . 2. *ciliaris* Schmidt.
- Zijrand der dekschilden kort bewimperd. Halsschild kort voor de basis het breedst, naar voren sterk versmald. Achterdijen bij het ♂ op de onderzijde stomphoekig verbreed. Lichaam iets langer en minder gewelfd. Overigens als *ciliaris*. Lengte 3—3½ mm. Den Haag, Wassenaar, Brummen, Hoek v. Holland; ook op Borkum (Caullei Bris.) 3. *furva* Er.
- 6 Het laatste lid der meestal smalle sprietknots niet smaller dan het voorlaatste lid. 7
- Het laatste lid der meer of minder breede sprietknots duidelijk smaller dan het voorlaatste lid. 17
- 7 Voorscheneu naar het uiteinde vrij sterk verbreed, aan den buitenrand met scherpe doortjes bezet 8
- Voorscheneu smal, naar het uiteinde weinig of niet verbreed 12
- 8 Lichaam langwerpig-ovaal. Groote soorten van 4—6½ mm. 9
- Lichaam kort-ovaal. Soorten van 2½—4 mm. Bij het ♂ de achterdijen met gewone trochanters, met stompe tandjes aan het uiteinde, op de onderzijde zonder tandvormig uitsteeksel, doch meestal onduidelijk gekorven; de middelste 3 leedjes der voortarsen iets verbreed. . 10
- 9 Het tweede sprietlid duidelijk langer dan breed. Sprietknots zwartachtig of donkerbruin. Halsschild achter het midden het breedst, met stompe, eenigszins afgeronde achterhoeken, evenals de kop, fijn en vrij dicht bestippeld. Lichaam vrij sterk gewelfd, glanzig, lichter of donkerder bruinrood. Dekschilden met vrij sterke stippelrijen, in de afwisselende tusschenruimten, behalve de uiterst fijne bestippeling, nog met eene rij grootere stippels; de stippelrij aan de schouders verloopt dicht nabij den zijrand daaraan evenwijdig. Bij het ♂ de achterdijen met haakvormig uitgetrokken trochanters, haakvormig gebogen tanden aan het uiteinde en een tandvormig uitsteeksel aan de onderzijde nabij het uiteinde; middeldijen gewoon, middelschenen sterk gebogen, iets gedraaid en naar de buiging verdikt; achterschenen gewoon gebogen; voortarsen meer dan de achtertarsen verbreed. Lengte 4½—6½ mm. In onderaardsche fungi, o. a. in truffels; ook treft men ze soms op open grasplaatsen in bosschen en op beukenhout aan. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld. (*cinnamomea* Panz.) 1)
- Het tweede sprietlid nauwelijks langer dan breed. Sprietknots gewoonlijk licht gekleurd. Lichaam iets meer elliptisch dan *cinnamomea*, roodachtig-geelbruin. Halsschild naar voren duidelijk-, naar de basis slechts iets versmald; fijn en dicht bestippeld. Dekschilden met krachtige stippelrijen. Overigens aan *cinnamomea* naverwant. Lengte 4—6 mm. Aan rottend eikenhout. In Oldenburg (*oblonga* Er.)
- 10 Lichaam donkerbruin of zwartachtig. Sprietknots langwerpig-ovaal, de twee voorlaatste leedjes meer dan dubbel zoo breed als lang. Dekschilden met iets neergetrokken top en spitsen naadhoek. Achterschenen bij het ♂ naar het uiteinde sterker gebogen. Lengte 3½—4 mm. Achter schors van rottende boomstronken en in boomzwammen. Volgens *Fittadini* zou de larve in truffels leven. Niet inlandsch; een ♂ bij Neerhaeten (Belgisch Limburg). (*pieca* Ill.)
- Lichaam roodbruin of geelrood. Sprietknots iets smaller dan bij *pieca*, de laatste 3 leedjes nagenoeg even breed, de twee voorlaatste leedjes niet meer dan dubbel zoo breed als lang. Achterschenen bij krachtig ontwikkelde mannetjes gebogen en aan de basis bochtig, waardoor zij als het ware dubbel gebogen toeschijnen 11
- 11 Halsschild volkomen zoo breed als de dekschilden, van af het midden tot aan de basis nagenoeg van dezelfde breedte, naar voren duidelijk versmald, met nagenoeg rechte achterhoeken. Bovenzijde glanzig-roodbruin. Achterschenen bij het ♂ zwak tweemaal gebogen. Lengte 3—3½ mm. Putten in Gelderland, Monster en op Texel. In de Rijnprov. bij Elberfeld; ook op het eiland Borkum. 4. *obesa* Schmidt.
- Halsschild niet geheel zoo breed als de dekschilden, langs de zijden sterk afgerond, naar de basis duidelijk-, naar voren meer versmald en iets achter het midden het breedst, met stompe achterhoeken. Lichaam bij den meer zeldzamen, typischen vorm *subglobosa* Reitt. zeer kort ovaal, hooggewelfd, met eenigszins kogelvormige dekschilden; bij den meer algemeenen vorm *longipes* Schmidt (*consobrina* Sahlb.) minder kort ovaal, met kort-eivormige dek-

1) De vroeger als inlandsch opgegeven exemplaren behooren tot *A. lucens* Lamm.

schilden, welke van af de basis tot aan het uiteinde geleidelijk versmald zijn. Dekschilden bij het ♂ met iets neergetrokken top en met rechte naadhoeken. De kleur is zeer veranderlijk, roodbruin (*ferruginea* St.), soms met donkeren kop, halsschild, schildje en naad, of wel op de bovenzijde geheel donker en slechts de schouders en het uiteinde der dekschilden roodbruin. Achterschenen bij groote mannetjes tweemaal gebogen, bij kleinere echter weinig van die der wijfjes onderscheiden. Lengte 2—3 mm. De gemeenste soort van het genus; aan grashalmen, tusschen duinhelm en in bosschen onder plantenafval en aan de wortels van lage planten. De typische vorm o. a. in aantal op Texel 5. **dubia** Kugel.

- 12 Halsschild over het midden glad, onbestippeld, met vrij scherp aangeduide rechte achterhoeken, van af de basis naar voren versmald. De stippels der langsrijen op de dekschilden tamelijk ver van elkaar verwijderd. Mesosternum scherp en hoog gekield. Lichaam zeer kort-ovaal, nagenoeg kogelvormig gewelfd, sterk glanzig, bruinrood of donker roodbruin, zelden geelrood, het uiteinde der dekschilden iets lichter; sprietknots geelachtig. Achterdijen bij het ♂ zonder tandje. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Tusschen gras in boschrijke streken, vooral des avonds aan grashalmen. Eenmaal bij Valkenburg (Limb.) in Juli. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf; in België bij Fleurus 6. **badia** St.

Halsschild meer of minder duidelijk bestippeld. Dekschilden met fijne stippellijnen, daarin meestal zeer dicht bestippeld. Mesosternum fijn gekield 13

- 13 Voorhoofd aan weerszijden slechts met eene grootere stip. De langsstrepen der dekschilden veel minder dicht bestippeld dan bij de volgende soorten, de tweede, derde en vierde stippellijn in het midden iets hoekig gebogen. Sprietknots iets gebruint. Bovenzijde glanzig roestrood. Kop en halsschild iets donkerder dan de dekschilden. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Eene zeer zeldzame soort. Niet inl. In Noord-Duitschland. (*scita* Er.) 1)

Voorhoofd aan weerszijden met 2 grootere stippen. Dekschilden met dicht bestippelde, recht doorlopende langsstrepen 14

- 14 Achterrand van het halsschild recht afgesneden, dicht bij de achterhoeken schuin naar voren gericht, waardoor de achterhoeken stomp zijn of eenigszins afgerond toeschijnen; aldaar glad en glanzig. Lichaam kort-ovaal, glanzig, lichter of donkerder roodbruin; de sprietknots meestal iets gebruint. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde met een weinig uitstekend tandje; de achterschenen min of meer gebogen, de voor- en middeltarsen verbreed. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Op verscheidene plaatsen aangetroffen, doch overal vrij zeldzaam.

7. **ovalis** Schmidt.

Achterrand van het halsschild recht afgesneden, naast de achterhoeken niet schuin naar voren gericht. Bij het ♂ de binnen-tophoek der achterdijen lobvormig uitgetrokken, doch de buiten-tophoek afgerond; de achterschenen min of meer gebogen 15

- 15 Sprietknots gewoonlijk licht gekleurd. Lichaam kort-ovaal of eirond, roestrood of bruingeel, glanzig. Halsschild met scherp aangeduide, stompe achterhoeken 16

Sprietknots donker gekleurd, breeder. Lichaam ovaal, veranderlijk in kleur, gewoonlijk roestrood; de kop, het halsschild geheel of gedeeltelijk, de naad en de zijrand der dekschilden donker gekleurd. Halsschild van af de basis naar voren sterk versmald, aan de zijden weinig afgerond, met nagenoeg rechte achterhoeken. Lengte 2 mm. Eenmaal bij St. Pieter (Limburg) in December (*punctulata* Reitt. nec Gylh.) 3. **litura** Steph. 2)

- 16 Sprieten eenkleurig geel, slank en lang, de langer uitgetrokken knots meer roodachtig gekleurd, het eindlid niet breeder dan het voorafgaande lid. Dekschilden met matig sterke stippellijnen. Lengte 2 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld, Düsseldorf en Elberfeld. (*brunnea* St.)

Sprieten zelden iets gebruint, breeder; het eindlid iets breeder dan het voorafgaande. Dekschilden met krachtige stippellijnen. Lengte 2 mm. Op het eiland Borkum. Mij onbekend. (*clavicornis* Rye)

- 17 Voorschelen smal 18

Voorschelen naar het uiteinde verbreed. 20

- 18 Basis van het halsschild aan weerszijden uitgebogen, de achterhoeken stomp. Bovenzijde roestrood, bruinrood of geelrood; soms kop en halsschild gedeeltelijk donkerder; de sprietknots zwartachtig. Achterdijen bij het ♂ aan het uiteinde van binnen met een lobvormigen, van buiten met een krachtigen spitsen tand; de achterschenen gebogen, de middel- en achtertarsen

1) Het bij den Haag gevangen, door Reitter als *A. scita* Er. gedetermineerde exemplaar is, volgens Ganglbauer, de meest gewone vorm *longipes* Schmidt van *A. dubia* Kugel.

2) Ganglbauer schrijft mij dat, volgens zijne opvatting, *A. punctulata* Gylh. eene van *litura* Steph. onderscheiden Noordsche soort is.

niet verbreed. Lengte $2\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. In de onderaardsche deelen van paddestoelen, in bosschen aan grashalmen en andere lage planten. Zeldzaam. Woudrichem, Breda, Winterswijk, Valkenburg, Bemelen en Nuth bij Maastricht. 9. *calcarata* Er.

Basis van het halsschild recht afgeknot, de achterschenen bij het ♂ nagenoeg recht 19

- 19 Achterhoeken van het halsschild zeer stomp. Voorhoofd met twee grootere stippen. Lichaam hoog gewelfd, roest- of geelrood, lijn en eenigszins verspreid bestippeld. Halsschild langs de zijden zeer sterk afgerond. Dekschilden kort, met krachtige, veelal duidelijk gegroefde stippellijnen; de tussenruimten iets gewelfd. Sprietknots zelden gebruind. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde van buiten afgerond, van binnen in een kort tandje eindigend; de voortarsen niet verbreed. Lengte $2\frac{3}{4}$ —3 mm. Zeer zeldzaam. Den Haag en Oirschot. In de Belgische provincie Luxemburg bij Izel 10. *rubiginosa* Schmidt.

Achterhoeken van het halsschild nagenoeg recht. Langwerpig-eirond, bruinzwart, roest- of geelrood, glanzig; de sprietknots donker gekleurd. Halsschild van af de basis naar voren versmald. Dekschilden met krachtige stippellijnen, wier groote stippels minder dicht staan dan bij de verwante soorten. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde van buiten met een grooten spitsen tand; de middelste leedjes der voor- en middeltarsen zwak verbreed. Roestroode exemplaren met donkerbruine of zwarte dekschilden vormen de abt. *bicolor* Branczik. De soort onderscheidt zich van *calcarata* door de lijne, minder dichte bestippling en de nagenoeg rechte achterhoeken van het halsschild. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld. Ik zag twee exemplaren van *Reitter* (Mus. v. d. Poll).

(*nigrita* Schmidt)

- 20 Dekschilden ovaal, aan de basis iets smaller en reeds van vóór het midden naar het uiteinde geleidelijk versmald 21

Dekschilden langwerpig-eirond, de grootste breedte in of iets achter het midden 24

- 21 Basis van het halsschild aan weerszijden naast de zeer stompe achterhoeken een weinig uitgebogen. Sprieten kort, de knots breed en lang, zelden iets donkerder gekleurd. Kop zeer groot; voorhoofd in den regel slechts met twee grootere stippen. Lichaam kort-ovaal, zeer breed en hoog gewelfd, bruin- of geelrood. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde van binnen met een klein tandje, op de onderzijde met eene hoekige verbreding; de achterschenen in den regel vrij sterk gebogen en aan de basis van binnen bochtig; de voor- en middeltarsen niet verbreed. De mannetjes zijn grooter dan de wijfjes. Lengte 3— $3\frac{1}{4}$ mm. Op vochtige grasvelden in bosschen. Zeer zeldzaam. Wolfhezen in Juli 11. *Triepei* Schmidt.

Basis van het halsschild recht afgeknot, nabij de achterhoeken eenigszins schuin naar voren opgericht 22

- 22 Sprietknots breed, haar eindlid duidelijk smaller dan het voorlaatste lid 23

Sprietknots niet zeer breed, evenals de rest der sprieten licht gekleurd, het eindlid niet veel smaller dan het voorlaatste lid. Voorhoofd met 4 grootere stippels. Dekschilden met fijne stippellijnen. Lichaam eirond, licht roestkleurig. Deze soort onderscheidt zich van de zeer op haar gelijkende *dubia*, door de meer gewelfde, eironde gedaante, de kortere en meer gedrongen sprietknots, het veel fijner bestippelde halsschild, de fijnere en dichter geplaatste stippels der langslijnen op de dekschilden en de duidelijker bestippelde, minder glanzige tussenruimten. Lengte 2— $2\frac{1}{4}$ mm. Niet inlandsch. In Oldenburg, in de Rijnprov. bij Düsseldorf, in Westfalen bij Hamm (*pallens* St.)

- 23 Sprieten zeer kort, den kop weinig overschrijdend, meestal eenkleurig. Lichaam kort gedrongen ovaal, sterk gewelfd, lichter of donkerder geelbruin, soms licht bruinrood. Dekschilden met fijne stippellijnen, wier stippels naar het uiteinde iets wijder uiteen staan. Bij het ♂ de achterpooten verlengd, de achterdijen gewoon, de achterschenen gekromd; de middelste leedjes der voortarsen zeer weinig verbreed. Lengte $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$ mm. Niet inlandsch. Zij zou op Borkum en Norderney, bij Hamburg en in Westfalen gevangen zijn. Ik zag drie exemplaren uit de collectie *Reitter* (Mus. v. d. Poll) (*rotundata* Er.)

Sprieten langer, het midden van het halsschild iets overschrijdend, de knots meestal donker gekleurd. Lichaam kort-ovaal, roodbruin, met licht roestkleurig-gele dekschilden; of geelachtig met donkerder dekschilden, of wel eenkleurig roestrood of roestbruin. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde van binnen en van buiten met een stompen tand, de achterschenen zwak gebogen, de voor- en middeltarsen iets verbreed. Overigens gelijkt deze soort zeer op *dubia*, doch onderscheidt zich vooral door de breedere sprietknots, van welke de twee voorlaatste leedjes veel grooter en dikker zijn dan het eerste en laatste lid; het laatste lid eindigt in eene kegelvormige punt. Lengte $2\frac{1}{4}$ —2 mm. Niet inlandsch. In West-Europa. Ik zag exemplaren uit de coll. *Reitter* (Mus. v. d. Poll). (*flavescens* Schmidt)

- 24 Halsschild aan de basis vóór het schildje zonder grovere stippels. Sprietknots zeer breed, donker gekleurd. Voorhoofd met onduidelijke grootere stippels. Halsschild iets vóór de basis

een weinig breeder dan de basis der dekschilden, overal duidelijk en dicht bestippeld. Schenen sterk gedoorn. Lichaam roodbruin, de pooten meer geelbruin. Lengte 3—3½ mm. Zeer zeldzaam. Den Haag en Scheveningen, Mei 12. **curta** Fairm.

Halschild aan de basis vóór het schildje met eenige grovere stippels; de stompe achterhoeken meer aangeduid dan bij *curta*. Sprietknots weinig of niet gebruind. Voorhoofd met 4-, soms met meerdere grove stippels. Lichaam grooter en meer gestrekt dan bij *curta*. Lengte 3¼—4½ mm. Deze zeldzame soort werd bij den Haag, Driebergen en Oirschot, Aug. — Nov. gevonden 13. **lucens** Fairm.

3. *Cyrtusa* Erichs

Sprietknots schijnbaar 4-ledig, aangezien het tweede lid zeer klein en moeilijk zichtbaar is. Bovenlip diep twee-lobbig. Halschild zonder eene rij grootere stippels tegen de basis aan. Dekschilden slechts met fijne stippelrijen en daartusschen dicht en sterk bestippeld. Mesosternum niet gekield, metasternum tusschen de middelcoxae buchtig. Lichaam hoog gewelfd en rondachtig. Voor- en middeltarsen 5-, achtertarsen 4-ledig. Levenswijze als bij *Anisotoma*.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

1 Naadstreep van af het midden tot aan het uiteinde der dekschilden sterk verdiept. Halschild over het midden fijn, maar duidelijk bestippeld 2

Naadstreep der dekschilden slechts aan het uiteinde verdiept, de fijne, maar duidelijke stippelrijen worden naar het uiteinde krachtiger. Halschild over het midden nauwelijks zichtbaar bestippeld, de basis aan weerszijden, naast de eenigszins spitse achterhoeken, iets uitgebogen. Achterschenen kort en breed, onmiddellijk van af de basis naar het uiteinde sterk verbreed. Lichaam half-kogelvormig, licht bruingeel. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde met een krachtigen, breedten, gebogen tand. Lengte 1½—2 mm. Niet inlandsch. In West-Europa. Ik zag een exemplaar van *Reitter* (Mus. v. d. Poll) (*latipes* Er.)

2 Achterschenen smal. Stippelrijen der dekschilden zeer onduidelijk, aan de basis en aan het uiteinde afgekort; de tussenruimten niet fijner dan de rijen bestippeld. Lichaam roestrood, kop en halschild kastanjebruin; zelden eenkleurig. Sprieten, behalve de donkere knots, benevens de pooten, geel. Halschild iets fijner dan de dekschilden bestippeld. Bij het ♂ de achterdijen met een krachtigen tand aan het uiteinde. Lengte 1½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld, Aken en Elberfeld; in Westfalen bij Dortmund. (*subtestacea* Gylh.)

Achterschenen naar het uiteinde sterk verbreed en aan de buitenzijde gedoorn. Stippelrijen der dekschilden tot dicht bij de basis of tot aan het midden duidelijk, de tussenruimten iets fijner bestippeld 3

3 Basis van het halschild naast de bijna rechte achterhoeken iets uitgebogen. De stippelrijen der dekschilden nagenoeg tot aan de basis duidelijk; de tussenruimten, evenals het halschild, zeer dicht en duidelijk bestippeld. Het achtste sprietlid volkomen onzichtbaar. Lichaam half-kogelrond, glanzig roodgeel of roestrood; de sprietknots bruin. Bij het ♂ de achterdijen aan het uiteinde met een haakvormigen tand. Lengte 1½—2 mm. 's Zomers in bosschen op grasplaatsen. Zeer zeldzaam; De Bilt, Wageningen en St. Pieter. In de Rijnprov. bij Crefeld 1. **minuta** Abr.

Basis van het halschild volkomen recht, met stompe achterhoeken. De stippelrijen der dekschilden tot aan het midden duidelijk; de tussenruimten, evenals het halschild, uiterst fijn en zeer verspreid bestippeld. Het achtste sprietlid als een klein dwarsplaatje zichtbaar. Lichaam eirond, minder gewelfd, roodgeel of bruinrood; de kop gewoonlijk iets donkerder. Bij het ♂ de achterdijen ongetand, de achterschenen aan het uiteinde plotseling verbreed. Lengte 1½—1¾ mm. In Limburg bij Bunde en Valkenburg, Juli 2. **pauxilla** Schmidt.

4. *Colenis* Erichs.

Sprietknots 3-ledig. Bovenlip zwak uitgerand. Dekschilden met dicht opeenstaande fijne dwarsrimpels en fijn gestreept. Mesosternum fijn gekield. Lichaam kort ovaal, sterk gewelfd. Voortarsen 5-, middel- en achtertarsen 4-ledig. Bij het ♂ de achterdijen met twee tandjes. Levenswijze als bij *Anisotoma*.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam zeer kort ovaal, hoog gewelfd, geelrood; het zevende sprietlid aanmerkelijk grooter dan het zesde en achtste. De achterhoeken van het halsschild recht. Dekschilden zeer onduidelijk gestreept. Bij het ♂ de achterdijen met twee tanden, waarvan de onderste scherp is; de voortarsen bijna niet verbreed. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Verbreed, doch overal vrij zeldzaam. (immunda Reitter, nec Sturm) 1. *dentipes* Gyll.

II. Tribus AGATHIDIINI.

5. Amphicyllis Erichs.

Sprietknots 4-ledig. *Kop* klein, dicht achter de groote, ronde, uitpuilende oogen sterk ingesnoerd; de slapen zeer kort. *Bovenlip* van voren afgerond, in 't midden flauwe uitgerand. *Clypeus* door eene fijne, verdiepte lijn van het voorhoofd gescheiden. *Halsschild* tot opname van den kop uitgerand. *Mesosternum* niet gekield, tusschen de middelcoxae een klein uitsteeksel vormend. *Lichaam* kogelrond, met onvolkomen kogelvermogen. *Schenen* behaard. Bij het ♂ de voortarsen 5-, de middel- en achtertarsen 4-ledig; de voortarsen met 3-, de middeltarsen met 2 verbrede ledjes; bij het ♀ alle tarsen 4-ledig. — De soorten van dit genus leven onder schimmellende dorre bladeren.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild met bijna rechte achterhoeken, geheel rood. Kop en dekschilden zwart; de sprieten geelrood, de middelste knotsleedjes donkerder; de pooten roodbruin, met donkerder achterdijen; veelal is het lichaam geheel roestrood, het halsschild meestal nog iets lichter (ab. c. *ferruginea* St.). Halsschild uiterst fijn-, de dekschilden sterker en dicht bestippeld. Lengte 2½—3 mm. Onder schimmellende, dorre bladeren en soms bij mieren; vooral verbreed in de diluviale streken 1. *globus* F.

Halsschild met stompe achterhoeken, evenals de rest van het lichaam, zwart, slechts de randen van het halsschild eenigszins bruinrood doorschijnend; de sprieten, behalve de twee voorlaatste donkere leedjes, en de pooten roodbruin. Deze soort is kleiner dan *globus* en minder dicht bestippeld; ook gelijkt zij veel op *Liodes orbicularis*, doch is dadelijk te onderscheiden door de 4-ledige sprietknots en de ongedoornde schenen. Lengte 2—2½ mm. Tusschen schimmellende bladeren. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Grefeld; ook in Westfalen en Oldenburg (*globiformis* Sahlb.)

6. Cyrtoplastus Reitter.

Dit genus heeft den habitus van *Agathidium*, doch is ook zeer verwant aan *Amphicyllis*, van welke het zich vooral onderscheidt door de 3-ledige sprietknots. Dekschilden met duidelijke, naar het uiteinde verdwijnende stippelrijen.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Glanzig zwart, onbehaard; de mond, de sprieten, behalve de gewoonlijk iets beroekte knots, de tarsen en een smalle zoom langs den zijrand van het halsschild roestrood; de pooten roodbruin. De kop vrij sterk-, het halsschild onduidelijk-, de dekschilden uiterst fijn en verspreid bestippeld, over het midden met 5—6 duidelijke, naar het uiteinde verdwijnende stippelrijen, langs de zijden veel sterker en verward bestippeld. Deze soort gelijkt veel op *Amphicyllis globiformis*, doch is gemakkelijk te onderscheiden door de 3-ledige sprietknots en de verwarde bestippeling aan de zijden der dekschilden. Lengte 2½ mm. Eenmaal bij Lochem in Juli 1. *seriatopunctatus* Bris.

7. Liodes Latr.

(*Anisotoma* Ill. ex parte, Reitter.)

Sprietknots 5-ledig, het tweede lid klein. *Bovenlip* twee-lobbig. *Voorkaken* krachtig ontwikkeld, aan de binnenzijde niet getand. *Clypeus* door een dwarsgroeffe duidelijk

van den kop gescheiden. Mesosternum niet gekield, tusschen de voorcoxae een klein uitsteeksel vormend. Achterschenen met fijne doortjes bezet. Bij het ♂ aan voor- en middeltarsen 5-, aan de achtertarsen 4 leedjes; de eerste leedjes der voortarsen verbreed; bij het ♀ alle tarsen 4-ledig, of de voortarsen 5-ledig. — De larve van *L. humeralis* is door Erichson, die van *glaber* door Schödtte en de larve en pop van *castanea* door Perris beschreven. — De soorten van dit genus leven in boomzwammen en tusschen schimmelende bladeren.

Van de 6 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Spriet en gewoon. Dekschilden met meer of minder duidelijke stippelrijen en met eene naar het uiteinde duidelijk verdiepte naadstreep. 2

Het derde tot achtste sprietlid naar binnen gezaagd. Dekschilden verspreid bestippeld, zonder langrijen en zonder naadstreep. Lichaam geelbruin; de kop, behalve het midden, eene middenvlek op het halsschild, de basis der dekschilden en de voorlaatste sprietleedjes donkerbruin. Bij het ♀ de tarsen 5, 4, 4-ledig. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In West-Europa.

(*serricornis* Gyllh.)

- 2 Dekschilden zeer fijn neerliggend-, bij het ♀ sterker behaard. Stippelrijen dubbel, hare stippels niet veel sterker dan die der tusschenruimten. Lichaam zwart; de spriet en, behalve de donkere knots, de pooten, de randen van het halsschild en eene schouderplek rood; de onderzijde roodbruin. Bij ab.c. *globosa* Payk. zijn de dekschilden grootendeels rood, slechts het uiteinde en de naad donker gekleurd. Tarsen bij het ♀ met 5, 4, 4 leedjes; bij het ♂ de eerste 3 leedjes der voor- en middeltarsen sterk verbreed. Bij ab.c. **clavipes* Herbst het geheele lichaam roodachtig en de plaats der schouderplek iets lichter. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. In boomzwammen, aan rottend hout en tusschen schimmelende bladeren. Verbreid in de diluviale streken. De ab.c. *globosa* bij Apeldoorn. 1. *humeralis* Kugel.

Dekschilden onbehaard. 3

- 3 De stippelrijen der dekschilden zijn dubbel, eenigszins onregelmatig. 4

De stippelrijen der dekschilden zijn allen of nagenoeg allen enkel. Bovenzijde zwart, pekszwart of pekbruin, met lichtere randen van het halsschild. Naadstreep tot aan het midden verdiept. Bij het ♀ de tarsen 4, 4, 4-ledig. 5

- 4 De naadstreep tot aan het midden sterk verdiept; de buitenste dubbele stippelrij der dekschilden naar voren van den zijrand verwijderd, de tusschenruimten zeer fijn bestippeld. Bovenzijde zwart, de randen van het halsschild en eene breede schouderplek op elk der dekschilden rood; de sprieten knots bruin, het eindlid min of meer roodgeel; onderzijde en pooten roodbruin. Tarsen bij het ♀ met 5, 4, 4 leedjes, bij het ♂ als bij *humeralis*. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Verbreid, in zwammen op boomstronken en tusschen schimmelende bladeren. 2. *axillaris* Gyllh.

De naadstreep tot over het midden sterk verdiept; de buitenste dubbele stippelrij der dekschilden loopt naar voren evenwijdig aan den zijrand door; de bestippeling der tusschenruimten is weinig lijner dan die der stippelrijen. Bovenzijde zwartbruin, de randen van het halsschild en der dekschilden roodbruin; de spriet en grootendeels, de onderzijde en de pooten bruinrood. Bij het ♀ zijn de tarsen 4, 4, 4-ledig. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. In boomzwammen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Essen en Elberfeld. (*castanea* Herbst)

- 5 Dekschilden met stompe, eenigszins afgeronde schouders en duidelijke, regelmatige stippelrijen; de buitenste dubbele stippelrij is naar voren sterk van den zijrand verwijderd. Lichaam niet zeer hoog gewelfd, glanzig zwart of pekzwart; onderzijde en pooten roodbruin; de spriet en laatste knotsleedjes bruin. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Achter schors van rottende boomstronken, vooral van den en; ook in boomzwammen. Elspeet en Winterswijk, Juni, Juli. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 3. *glaber* Kugel.

Dekschilden met nagenoeg rechte, weinig afgeronde schouders en eenigszins onregelmatige, fijne, naar buiten onduidelijke stippelrijen; de buitenste stippelrij blijft nabij den zijrand tot aan den schouder doorloopen. Lichaam hoog gewelfd, glanzig pekzwart of pekbruin; halsschild met roodachtige randen; de sprieten knots donker, met geelachtig uiteinde; onderzijde en pooten licht roodbruin. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Achter schors van boomstronken. Winterswijk en Gronsvelt (Limburg), Juni. In de Rijnprov. bij Düsseldorf. 4. *orbicularis* Herbst.

8. *Agathidium* Illiger.

*Sprietknots 3-ledig. Kop groot; de slapen lang; de oogen klein, langwerpig, schuin staande en weinig uitpuilend. Clypeus niet van het voorhoofd gescheiden. Beenvlip zeer kort en smal, lijnvormig. Voorkaken gewoon, bij het ♂ van enkele soorten de linker voorkaak grooter of met een hoorn bewapend. Achterhoeken van het halsschild met den achterrand afgerond. Dekschilden met eene naadstreep, zonder stippellijnen of slechts met zeer flauwe aanduiding ervan. Mesosternum fijn gekield. Kogelvermogen meer of minder volkomen. Het ♂ met 5 leedjes aan de voor- en middeltarsen en 4 aan de achtertarsen; het ♀ met 4 leedjes aan alle tarsen of 5 aan de voortarsen. De voortarsen bij het ♂ iets verbreed. — De larve en pop van *A. seminulum* is door Perris, de larve van mandibulare door Schödte beschreven. — De soorten van dit genus leven in fungi, schimmelende afgevalen bladeren, achter half vergane boom-schors en in rottende plantenstoffen.*

Van de 42 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 6 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden zonder schouderhoeken, doch naar voren geleidelijk afgerond. Kogelvermogen volkomen. Voorkaken bij het ♂ gewoon. Achterdijen bij het ♂ aan het uiteinde min of meer getand. Tarsen bij het ♀ met 5, 4, 4 leedjes (Sub-gen. *Cyphocleble* Thoms.) 2
 Dekschilden met duidelijke, min of meer stomp-afgeronde schouderhoeken. Kogelvermogen onvolkomen. Linker voorkaak bij het ♂ veelal verlengd of met een hoorntje, zelden gewoon 6
- 2 Dekschilden met eene tot aan het midden reikende naadstreep. 3
 Dekschilden zonder naadstreep, of deze is slechts aan het uiteinde aangeduid 5
- 3 Lichaam rood, de dekschilden zwart, de sprietknots iets gebruint. Dekschilden lang-eivormig, veel langer dan te zamen breed, lijn en dicht bestippeld, met uiterst geringe sporen van stippelrijen. Lengte 2—2½ mm. Op boomzwammen en achter de schors van geveld boomen. Loosduinen, Arnhem, Valkenburg (Limb.), April, Mei; ook bij Aken en in België bij Ridderborn 1. **nigripenne** Kugel.
 Lichaam geheel zwart of bruin. Dekschilden kort, nauwelijks of slechts zeer weinig langer dan te zamen breed 4
- 4 Het derde sprietlid zoo lang als de 3 volgende leedjes te zamen. Het breedste gedeelte van het halsschild achter het midden gelegen. Het voorste gedeelte van het metasternum helt weinig af en gaat ongemerkt in het achterste horizontale gedeelte over. Het ♂ met een breeden, nagenoeg rechthoekigen tand aan het uiteinde der achterdijen, benevens een groefje, waarin een haarbundeltje, op het metasternum. Lichaam zwart, de zijden van het halsschild en veelal ook de dekschilden roodbruin doorschijnend; de sprieten en pooten roodbruin, de achterdijen veelal zwartachtig. Halsschild zeer lijn-, de dekschilden grover bestippeld. Lengte 2½—2¾ mm. Verbreed en niet zeldzaam tusschen schimmelende bladeren en Sphagnum 2. **atrum** Payk.
 Het derde sprietlid zoo lang als de 2 volgende leedjes te zamen. Het breedste gedeelte van het halsschild vóór het midden gelegen. Het voorste afhellend gedeelte van het metasternum door een scherpen kant van het achterste horizontale gedeelte gescheiden. Bij het ♂ steekt het uiteinde der achterdijen, als een afgeronden hoek, eenigszins uit. Bovenzijde lichter of donkerder pekbruin, soms meer roodbruin, met lichter doorschijnende randen, zeer lijn bestippeld; de onderzijde donker roodbruin. Lengte 2 2½ mm. In rottende dennenstronken. Uitsluitend bij Vorden gevangen. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld 3. **seminulum** L.
- 5 Naadstreep aan het uiteinde duidelijk. Dekschilden lijn, doch nog duidelijk zichtbaar bestippeld; aan het uiteinde iets snavelachtig toegespitst. Bovenzijde glanzig, lichter of donkerder roodbruin. Achterdijen bij het ♂ aan het uiteinde scherp getand. Lengte 2—2½ mm. Onder afgevalen eikentakken en in eikenmold. Eenmaal bij Winterswijk, Juni. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Elberfeld; ook in Oldenburg. 4. **badium** Er.
- Naadstreep geheel ontbrekend. Dekschilden niet bestippeld. Bovenzijde glanzig zwart met lichtere randen, zeldzamer geheel roodbruin; bij onuitgekleurde exemplaren roodgeel; de sprieten en pooten rood. Lengte 1½—2 mm. Gemeen tusschen schimmelende bladeren, achter vermoldte, schimmelende boom-schors en in paddestoelen. 5. **laevigatum** Er.
- 6 De slapen achter de oogen geleidelijk versmald; de kop tot aan de oogen in het halsschild terugtrekbaar. Schouders der dekschilden in den regel duidelijk afgerond (Sub-gen. *Neocleble* Gozis) 7

- De slapen achter de oogen min of meer bultig verdikt; de kop zeer groot, niet tot aan de oogen in het halsschild terugtrekbaar. Schouders der dekschilden vrij scherp aangeduid. Tarsen bij het ♀ 5, 4, 4-ledig (Sub-gen. *Saecoecble* Gozis) 12
- 7 Dekschilden zonder naadstreep, duidelijk en vrij dicht bestippeld. Tarsen bij het ♀ met 4, 4, 4 leedjes. Clypeus door eene fijne lijn van het voorhoofd gescheiden. Lichaam glanzig zwart, de zijranden van het halsschild en veelal ook het uiteinde der dekschilden roodachtig doorschijnend; de eerste twee leedjes der sprietknots donker; onuitgekleurde exemplaren zijn roestkleurig. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Verbreid, doch overal vrij zeldzaam. 6. *marginatum* St. Dekschilden met eene, van het uiteinde tot min of meer naar het midden reikende, meestal dicht tegen den naad aanstaande, naadstreep 8
- 8 Dekschilden geheel onbestippeld, of zeer onduidelijk, bijna onzichtbaar lijn bestippeld, spiegelglad. Clypeus van voren recht 9
- Dekschilden lijn, doch duidelijk bestippeld. 10
- 9 Het derde sprietlid dubbel zoo lang als het tweede. De naadstreep niet tot aan het midden der dekschilden reikend. Tarsen bij het ♀ met 5, 4, 4 leedjes. Bovenzijde pekzwart of pekbruin, de randen van het halsschild, de sprieten en pooten roodbruin. Dekschilden bijna onzichtbaar lijn bestippeld. Linker voorkaak bij het ♂ met een hoorn. Clypeus min of meer door eene fijne gebogen dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Achter boomschors en in fungi. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld; ook in Oldenburg. (mandibulare St.)
- Het derde sprietlid $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het tweede. De naadstreep ongeveer tot aan het midden der dekschilden reikend. Tarsen bij het ♀ met 4, 4, 4 leedjes. Bovenzijde roodachtig-geelbruin, bij donkere exemplaren het midden van het halsschild en de dekschilden van de basis tot aan het midden of bijna geheel bruinachtig; of wel geheel geelachtig en de dekschilden, behalve de zijranden en het uiteinde, donker; bij abt. *pallidum* Gylh. is het geheele lichaam geel. Bij het ♂ de linker voorkaak verlengd of van een hoortje voorzien. Lengte 2— $2\frac{1}{4}$ mm. In rottende plantenstoffen en in beukenzwammen. In de Rijnprov. bij Elberfeld en in Westfalen (varians Beck)
- 10 Het derde sprietlid dubbel zoo lang als het tweede. Tarsen bij het ♀ met 5, 4, 4 leedjes. . . 11
- Het derde sprietlid $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het tweede. Tarsen bij het ♀ met 4, 4, 4 leedjes. De naadstreep der dekschilden reikt nauwelijks tot aan het midden. Clypeus onduidelijk afgescheiden. Bovenzijde zwart, de zijden van het halsschild en de achterhelft der dekschilden donkerrood. Deze soort gelijkt overigens op kleine exemplaren van *marginatum*. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Onder vochtige, schimmelende bladeren. Niet inlandsch. In Westfalen. (haemorrhoum Er.)
- 11 Sprieten met min of meer donkere knots. Lichaam aan de zijden iets samengedrukt, zwart of pekbruin, sterk glanzig; het halsschild aan de zijden roodbruin doorschijnend. Clypeus door eene meer of minder duidelijke, fijne, gebogen lijn van het voorhoofd gescheiden. Dekschilden vrij sterk bestippeld, de naadstreep tot aan het midden reikend. Bij het ♂ de linker voorkaak verlengd of wel van een scherp hoortje voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Bij Arnhem, Roermond, Doorn, Loosduinen en Berg-en-Dal; ook in Oldenburg, bij Hamburg, Elberfeld en op het eiland Borkum 7. *rotundatum* Gylh.
- Sprieten geheel licht-bruinrood. Clypeus niet duidelijk afgescheiden. Lichaam pekzwart of donker roodbruin. Dekschilden zeer lijn bestippeld, met eene tot aan het midden reikende naadstreep. Lengte 1; mm. Onder vochtige, schimmelende bladeren. Niet inlandsch. In Westfalen. (piceum Er.)
- 12 Clypeus niet afgescheiden. Voorkaken bij het ♂ gewoon. Dekschilden gewoon bestippeld, tusschen de bestippeling glad. Halsschild met sterk afgeronde zijden. Dekschilden duidelijk en vrij dicht bestippeld, niet zeer stompe schouders en diep gegroefde naadstreep. Bovenzijde glanzig zwart, de randen van het halsschild lichter; ook wel het halsschild bruin; bij abt. *rubundum* Reitt. het geheele lichaam, behalve de twee donkere voorlaatste sprietleedjes, roestrood. Deze soort heeft iets van *trium*, doch is doorgaans grooter. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. In bolten en onder beschimmeld hout. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Disseldorf en Crefeld; ook in Westfalen en bij Oldenburg (nigrinum St.)
- Clypeus door eene, bij het ♂ in 't midden eenigszins bultig opgerichte dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. De linker voorkaak bij het ♂ met een hoorn. Dekschilden tusschen de gewone lijne bestippeling met eene nog fijnere, dichte bestippeling; met bijna rechte schouders. Halsschild met zwak afgeronde zijden. Bovenzijde pekzwart of pekbruin, de zijden van het halsschild licht gekleurd en elk der dekschilden met eene groote, roodgele langsvlek, welke den naad en den zijrand zwart laat; soms zijn de dekschilden bijna geheel geelbruin. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. In bergstreken; zij kan wellicht in Zuid-Limburg en in het daaraan grenzend gebied worden aangetroffen (discoidum Er.)

XIV. Familie EUCINETIDAE.

Lichaam langwerpig-eirond, naar het uiteinde versmald. — Kop geheel op de onderzijde teruggeslagen, op de voorcoxae liggend, met scherpen achterrand. — Bovenlip groot, weinig korter dan breed, van voren iets uitgerand. Voorkaken met sterk gebogen, gespleten top. Achterkaken met twee, nagenoeg even lange, aan het uiteinde afgeronde, behaarde lobben; de binnenste is aan het uiteinde van een stevigen haak voorzien. Kaaktasters lang, draadvormig; het tweede en vierde lid even lang, langer dan het derde, het vierde met stomp uiteinde. Tong naar voren iets verbreed en in 't midden een weinig uitgerand. Paraglossen door twee rijen vrij lange, tegen het midden der tong gerichte haren, aangeduid. Laatste lip-taster-lid eirond. — Sprietten 11-ledig, draadvormig; het tweede lid langer dan het derde. — Oogen weinig uitpuilend, tegen de inplanting der sprietten iets uitgerand. De slapen vlak. Halsschild naar voren versmald, veel breeder dan lang, aan de basis volkomen tegen de dekschilden aansluitend. — Schildje driehoekig, volkomen op het niveau der dekschilden gelegen en daardoor niet altijd duidelijk. — Dekschilden naar het uiteinde versmald, met flauw aangeduide langsstrepen; de epipleuren van voren tamelijk breed, tot op het eerste derde gedeelte van de lengte versmald en verder zeer smal tot aan het uiteinde doorlopend. — Volgens *J. Redtenbacher* herinnert de achtervleugel door de rechthoekige voortzetting van de vena scapularis en van de vena externo-media aan die van het Zuid-Europeesche genus *Melyris*, als vertegenwoordiger van de fam. der *Melyridae*; de vena cubitalis is gevorkt, de vena interno-media sluit een kleine ellips-vormige cel in en staat met de vena analis door eenee scheeve dwarsader in verbinding. — Prosternum achter de voorcoxae niet ontwikkeld, waardoor deze familie vooral onderscheiden is van de *Cholevinae* (fam. *Silphidae*). — Achterlijf bij het ♂ met 7, bij het ♀ met 6 sterniten. — Achtercoxae zeer sterk verbreed, als driehoekige, smalle platen de achterdijen bedekkend; de voorrand verloopt schuin naar buiten en naar voren, waardoor de episternen van den metathorax zijdelings zeer verkort zijn. Schenen aan het topvlak met een krans van lijne doornjes 1). Achterschenen aan het uiteinde met twee duidelijke, vrij lange doornen. Tarsen 5-ledig, gewoon, langer dan de schenen; de leedjes geleidelijk dunner wordend. — Van de Zuid-Europeesche *E. meridionalis* Lap. is door *Perris* de ontwikkeling bekend geworden. — De larven leven in zwamvlokken, vooral achter dennenschors en vertoonen de meeste overeenkomst met die der *Agathidiini* en *Clambidae*. — Door *Thomson* en *Reitter* werd het genus *Eucinetus*, dat steeds tot de *Cyphonidae* gerekend werd, tot de *Silphidae* gebracht. — Deze kleine familie is het naast verwant aan de *Cholevinae* (*Catops*).

Van de twee Europeesche genera 2) is een in Nederland vertegenwoordigd.

1. *Eucinetus* Germ.

Lichaam gewelfd, glanzig bruinzwart, zeer fijn en kort behaard. Sprietten en pooten roodbruin. Dekschilden uiterst fijn en in de breedte dwarsrimpelig ingekrast, met rood uiteinde. Lengte 3 mm. In zwamvlokken achter de schors van zieke boomen, vooral van dennen en oude berkenstammen; ook 's winters tusschen dorre bladeren, in mos en onder stukken hout; ook wel op bloemen. Zij maakt spartelende bewegingen. Uitsluitend bij Middelburg aangetroffen. Langs het Oostzee-strand zou zij onder verzande *Elymus arenarius* voorkomen. 1. *haemorrhoidalis* Germ.

XV. Familie CLAMBIDAE 3).

Sprietten 9- of 10-ledig, met 2 grootere eindleedjes (Fig. 35, blz. 428) 4). — Lichaam nagenoeg half-kogelvormig, van voren sterk gewelfd en van achteren schuin afhellend; met volkomen kogelvermogen, het halsschild op de dekschilden verschuifbaar. — Bovenlip klein, vierhoekig, onder den clypeus verborgen. — Halsschild met afgeronde achterhoeken en zeer verkorte zijden. — Schildje groot. — De dekschilden bedekken het geheele achterlijf. — Achtercoxae tegen elkaar aanstaande,

1) Deze krans van lijne doornjes vindt men ook bij andere Coleoptera, welke evenals *Eucinetus*, spartelende bewegingen maken, b. v. bij *Conurus*, *Eustrophus*, *Orchesta* en *Mordella*.

2) Een tweede genus *Bisaya* Reitter, uit het Caspische gebied, wijkt in vele opzichten van *Eucinetus* af. De sprietten eindigen in een 4-ledige knots, de kop is slechts weinig gelogen, zonder slapen, de oogen zijn gewelfd, het eindlid der kaaktasters is lang en dun toegespijst, de verbrede achtercoxae zijn zeer groot en bedekken grootendeels de achterdijen, de trochanters der achterdijen zijn eveneens zeer groot.

3) Het genus *Cylocephalus*, dat in den Catalogus Coleopter. Europae tot deze familie gerekend wordt, behoort tot de *Nitidulidae* en kan als een daarvan enigszins afwijkenden vorm, verwant aan *Cylindrus*, beschouwd worden.

4) Het Zuid-Europee genus *Loricaster* Muls. wijkt in vele opzichten van de overige *Clambidae* af. Sprietten 8-ledig, met 3 grootere eindleedjes. Lichaam gelijkmatig gewelfd, met onvolkomen kogelvermogen, alleen kan de kop op de onderzijde teruggeslagen worden. Halsschild met duidelijke, tamelijk rechte achterhoeken en rechte zijden. Schildje zeer klein. Middeldijen bladachtig verbreed.

Fig. 35. Spriet van

I. *Calyptomerus* Orig.II. *Clambus* Orig.

met recht verloopenden voorrand, tot zeer groote dijplaten verbreed, welke de achterpooten bijna geheel bedekken. Middeldijen gewoon. — Gevleugeld; de vleugels schijnen met die der Anisotomidae overeen te komen. — Alle tarsen 4-ledig, bij *Calyptomerus* de achtertarsen slechts 3-ledig. — Achterlijf uit 5 of 6 sterniten bestaande. — De soorten van deze kleine familie leven in rottende plantenstoffen, oud beschimmeld stroo, in dakstroo en aan vochtig hout. De larve gelijkt eenigszins op die der Anisotomidae. *Perris* beschreef de larve en pop van *Calyptomerus dubius*.

Sprieten 9-ledig, dicht voor de oogen ingeplant; het tweede lid sterk verlengd (Fig. 35, II). Oogen door den zijrand van den clypeus geheel doorsneden. Mesosternum gekield. Achterlijf met 5 sterniten. Halsschild met korte, afgeronde zijden.

1. *Clambus*.

Sprieten 10-ledig, ver van de ongedeelde oogen afstaande, in een tot den rand van den clypeus doorlopende dwarsspleet inlegbaar; de eerste twee leedjes groot, het derde tot zesde lid even lang (Fig. 35, I). Halsschild zonder zijrand, aangezien de voor- en achterrand in een spitsen, slechts iets afgeronden hoek samenstooten. Mesosternum ongekield. Achterlijf met 6 sterniten.

2. *Calyptomerus*.1. *Clambus* Fischer.

Kop zeer groot. Sprieten 9 ledig, aan de zijden van het voorhoofd tegen den voorrand der oogen ingeplant; met twee zeer groote eindleedjes, het eerste lid breed, het tweede lid zeer lang en dun. Bovenlip zeer klein, onder den breeden clypeus verborgen. Voorkaken aan den top in twee lange haken verdeeld, van welke de eene aan het uiteinde gespleten is. Kaaktasters 4-ledig. Tong hoornachtig, naar voren aanmerkelijk verbreed, aan den voorrand afgerond, de zijhoeken meer vliezig. Liptasters 3-ledig. Oogen door den zijrand van den clypeus geheel doorsneden. Halsschild met korte, afgeronde zijden, de voor- en achterrand aan weerszijden in een afgeronden hoek samenkomend. Mesosternum gekield. Achtercoxae zeer groot, plaatvormig, de pooten geheel bedekkend. Achterlijf met 5 sterniten. Tarsen 4 ledig. Gevleugeld. Kogelvormigen tamelijk volledig. — De soorten van dit genus leven tusschen rottende bladeren en in oud stroo.

Van de 5 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Bovenzijde naakt, alleen bij sterke vergrooting gezien, met zeer enkele, verspreid staande stofhaartjes 2
- Bovenzijde duidelijk fijn behaard 3
- 2 Lichaam eirond, zwart, de zijden van het halsschild geelachtig. Het midden der eenigszins stomp uitgetrokken dekschilden roestrood, veelal de dekschilden eukleurig roestrood of roodbruin. Eindlid der sprieten veel langer dan breed. Laatste sterniet met een langen haarbundel, bij het ♂ met een groefje. Lengte 1 mm. Vrij zeldzaam; Den Haag, Rijswijk, Nijkerk, Arnhem, Heerenveen en Houthiem. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 1. *minutus* St.
- Lichaam in 't oog vallend kleiner, kogelrond, zwart, de zijden van het halsschild geelachtig. Dekschilden naar het uiteinde lichter gekleurd of geheel roodbruin, roestrood of geelachtig. Eindlid der sprieten zoo lang als breed. Laatste sterniet zonder haarbundel. Lengte 3 mm. Onder rottend hout. Niet inlandsch. Op het eiland Borkum, in Oldenburg en bij Elberfeld (nitidus Steph.) (punctulum Gylh.)
- 3 De grijsachtig-witte beharing duidelijk en vrij lang, eenigszins vlokkelig en min of meer opgericht, niet volkomen neerliggend. Lichaam zwart, de zijden van het halsschild zeer smal geelachtig gezoomd. Lengte 2 mm. Niet zeldzaam onder dorre bladeren en in aanspoelsel. (punctulum Beck) 2. *armadillo* de Geer.
- De beharing is uiterst fijn en dicht, eenigszins zijdeglanzig, neerliggend. Lichaam zwart of bruin, de zijden van het halsschild, het midden en in den regel ook het uiteinde der dekschilden roodgeel. Laatste sterniet met eene langsplooi. Lengte 1/2—1 mm. Niet zeldzaam onder beschimmeld hooi, dorre bladeren en stroo 3. *pubescens* Redt.

2. Calyptomerus Redtenb.

(Comazus Fairm. & Lab.)

Sprieten 10-ledig, ver van de ongedeelde oogen afstaande, in eene tot den rand van den clypeus doorloopende dwarspleet inlegbaar; de eerste twee leedjes groot, het derde tot zesde lid nagenoeg even lang, het zevende en achtste korter, de twee laatste leedjes eene groote, breede knots vormend. Halsschild zonder zijrand, aangezien de voor- en achterrand in een spitsen, slechts iets afgevoerd hoek samenstooten. Mesosternum ongekiel. Achterlijf met 6 sterniten. Voor- en middeltarsen 4-, de achtertarsen 3-ledig. Lichaam van voren sterk gewelfd, naar achteren geleidelijk schuin aflopend, met volledig kogelvermogen. Geveugeld.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam eirond, aan het uiteinde breed afgerond en als 't ware iets afgeknot, met nagenoeg rechte naadhoeken; roodbruin of bruingeel, kop, halsschild en het uiteinde der dekschilden gewoonlijk lichter; dicht en vrij lang neerliggend behaard. Lengte $\frac{3}{4}$ = 1 mm. Niet zeldzaam onder oud riet, beschimmeld stroo en in dakstroo. De larve en pop door *Perris* beschreven. (enshamensis Steph.) 1. **dubius** Mrsh.

Familie SPHAERIIDAE.

Deze kleine familie, welke stamverwant is met de Clambidae, Corylophidae en Trichopterygidae, alsmede ook door het genus *Ephistemus* aan de Cryptophagidae verwant is, wordt slechts vertegenwoordigd door één enkel genus met ééne enkele uiterst kleine, half-kogelvormige soort. — Kop klein. — Sprieten vrij kort, 11-ledig, nagenoeg aan den binnen-oogrand ingeplant; het eerste lid klein en kort, het tweede groot, eirond, het derde zoo lang als de 5 volgende leedjes tezamen, doch niet dikker; de laatste 3 eene scherp afgescheiden, dichte, 3-ledige knots vormend, welke met enkele lange borstelharen bezet is. — Bovenlip ver uitstekend, in 't midden iets uitgebogen. Voorkaken met diep gespleten uiteinde. Achterkaken slechts met ééne hoornachtige, sikkelvormig gebogen, aan den binnenrand bewimperde lob. Kaaktasters 4-ledig, het eerste lid zeer klein, het tweede lang, naar het uiteinde verdikt, het derde groot, eivormig, het laatste als een zeer klein, aan het uiteinde verdikt lid uit het derde te voorschijn komend. Kin vierhoekig, naar voren iets versmald. Tong vierhoekig, door eene lijne insnijding aan het uiteinde en eene middengroef in twee, aan het vliezige uiteinde bewimperde, lobben verdeeld. Liptasters draadvormig, 3-ledig, de eerste twee leedjes even lang, het laatste lid zeer klein. — Meso- en metasternum tot een groot schildvormig sternum vereenigd. — Pooten zeer kort; het uiteinde der schenen met twee krachtige einddoornen. Coxae zeer verbreed, plaatvormig; de middelcoxae ver van elkaar verwijderd. Tarsen onduidelijk 2-ledig of wellicht 3-ledig; het klauwld om de basis der ongelijke klauwen met eenige lijne borstels bezet en daartusschen met een hechtborstel. — Achterlijf met 3 sterniten.

Sphaerius Waltl.

(Microsporus Kolenati).

Zwart of pekbrown, glanzig, onbehaard, zonder zichtbare bestippeling. Pooten lichter gekleurd. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, naar voren versmald, met rechte, gerande zijden en eenigszins spitse achterhoeken. Dekschilden het geheele achterlijf omvattend. Lengte $\frac{1}{4}$ mm. Dit kevertje heeft veel overeenkomst met zekere kleine aardmijt (*Oribata*), welke niet zeldzaam tusschen plantenalval voorkomt; ook herinnert zij in habitus aan *Ephistemus*, doch is veel kleiner. Zij leeft vooral op turfgrond, langs oevers, onder mos en tusschen gras, op plaatsen die aan de zon zijn blootgesteld. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld. (*acaroides* Waltl)

XVI. Familie CORYLOPHIDAE.

Deze familie bestaat uit zeer kleine, ovale, eivormige, zelden elliptische, op de bovenzijde al of niet behaarde kevertjes, welke in habitus eenigszins aan de Clambidae herinneren. — Kop bijna altijd geheel onder den vooruitstekenden, zelden iets uitgebogen voorrand van het halsschild verborgen. — Sprieten 9-, 10- of 11-ledig, met 3 of 5 tot eene knots vereenigde grootere eindleedjes. Voorkaken aan het uiteinde in eenige krachtige tanden gespleten, aan den top rand gezaagd of aan den binnenrand zeer fijn gekamd, doch met lang scherp uiteinde (*Corylophus*). Achterkaken

1-lobbig. Kaaktasters 4-, lip-tasters 2- of 3-ledig, meer of minder duidelijk. De tong gewoonlijk hoornachtig, de paraglossen ontbreken of zijn onduidelijk. — Halsschild van voren half-cirkelvormig afgerond, zonder voorhoeken, den kop geheel bedekkend (Corylophini); of wel van voren duidelijk uitgerand, met duidelijke voorhoeken; de kop tot aan den schedel volkomen onbedekt (Orthoperini). Dekschilden niet of slechts weinig verkort en soms iets afgeknor, hoogstens het pygidium onbedekt latend. Zelden ongevlengeld; gewoonlijk zijn de vleugels breed, en langs den geheelen omtrek bewimperd. De vleugel bij *Parmulus* (*Sacium*) gelijkt, volgens *J. Redtenbacher* op die van *Seydmanus tarsatus* en vertoont, behalve de venae marginalis en scapularis, nog de vena externo-media; de matig groote area apicalis heeft, behalve twee oppervlakkig aangeduide concave plooiën, eene zeer flauw aangeduide lijn als rudiment van eene straalader; achter de vena externo-media bevindt zich eene concave plooi en dicht daarnaast de uiterst zwak aangeduide vena cubitalis, die voor het uiteinde een kleinen tak rechthoekig naar achteren uitzendt. Ook is nog eenige aanduiding van de vena interno-media aanwezig. De vena analis ontbreekt geheel. — Prosternum zeer smal; metasternum groot. Episternen van den metathorax zichtbaar. — Achterlijf vrij lang, met 6 duidelijke sternieten, van welke het eerste het grootst is. — Achtercoxae niet kegelvormig uitstekend, van elkaar afstaande. Tarsen 4-ledig, het derde lid klein en soms gedeeltelijk in eene uitholling van het voorafgaande verborgen. — Van enkele soorten is de ontwikkeling bekend. Zij leven in schimmelen en rottende plantenstoffen, sommigen aan vochtig dood hout of op boomzwammen.

Overzicht der Tribus.

Halsschild van voren half-cirkelvormig afgerond, zonder voorhoeken, den kop geheel bedekkend. Het pygidium meer of minder onbedekt. 1. **Corylophini.**

Halsschild van voren duidelijk uitgerand, met duidelijke voorhoeken; de kop tot aan den schedel volkomen onbedekt. 2. **Orthoperini.**

I. Tribus CORYLOPHINI.

1. Achterhoeken van het halsschild recht, scherp aangeduid. Bovenzijde fijn behaard. 2

Achterhoeken van het halsschild spits uitgetrokken. Sprietknots 3-ledig. 3

2. Sprietknots 5-ledig, het tweede lid der knots klein. (*Parmulus*.)

Sprietknots 3-ledig (*Arthroliptis*.)

3. Achterhoeken van het halsschild naar achteren sterk uitgetrokken. Bovenzijde behaard.

1. **Sericoderus.**

Achterhoeken van het halsschild naar achteren weinig uitgetrokken. Bovenzijde onbehaard.

2. **Corylophus.**

II. Tribus ORTHOPERINI.

Bevat slechts het genus 3. **Orthoperus.**

1. Tribus CORYLOPHINI.

***Parmulus* Gundlach.**

(*Sacium* Leconte, *Clypeaster* Latr.)

Sprieten 11-ledig, met 5-ledige knots, van welke het tweede lid veel kleiner is dan het eerste en derde; de eerste twee sprietledjes groot. Voorkaken aan het uiteinde in 3 of 4 krachtige tanden gespleten. Achterkaken met eene smalle, hoornachtige lob, welke top aan de binnenzijde met 3 tot 4 sterke doornen bewapend is. Kaaktasters 4-ledig. Tong hoornachtig, aan het uiteinde vliezig, iets verbreed en afgerond. Lip-tasters kort en dik, 2-ledig, met een priemvormig eindlid. Lichaam elliptisch, zwak gewelfd, op de bovenzijde fijn behaard. Kop onder den voorrand van het halsschild teruggetrokken. Achterhoeken van het halsschild recht, scherp aangeduid. Dekschilden aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond, het pygidium onbedekt latend. Tarsen 4-ledig, het klauwlied iets langer dan de 3 voorafgaande ledjes te zamen.

Van de 10 Europeesche soorten komen 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De achterrand van het halsschild steekt in 't midden als eene breede, afgeronde lob tegen het schildje uit. Lichaam langwerpig-eirond, dicht en duidelijk bestippeld 2
- De achterrand van het halsschild is recht afgesneden. Lichaam breed-eirond, de dekschilden zeer fijn bestippeld, de stippels door de daaruit ontspringende baren geheel bedekt. Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, aan den achterrand niet smaller dan de dekschilden, in de lengte over het midden duidelijk gewelfd. Bovenzijde zwartbruin, de voorrand van het halsschild geel. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnprov. bij Elberfeld aangetroffen zijn (discedens Duv., corticinus Thoms.) (obscurus Sahlb.)
- 2 Halsschild aan de basis duidelijk smaller dan de dekschilden, langer dan bij obscurus; van voren naast den zijrand ingedrukt, over het midden zeer zwak gewelfd. Bovenzijde zwart, de voorrand van het halsschild geel. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Achter boomschors. Niet inlandsch. In de Rijnprov. (pusillus Gylh.)
- Halsschild nagenoeg zoo breed als de dekschilden, $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang; de dekschilden achter de schouders een weinig verbreed. Bovenzijde zeer kort behaard, zwart, de voorrand van het halsschild geel. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Duitschland langs de oevers van den Rijn; ook in Frankrijk. (rhenanus Reitt.) (nanus Rey)

Arthrolips Wollaston.

Dit genus onderscheidt zich van Parmulus door de 10-ledige sprieten, wier knots slechts 3-ledig is. Ook is het lichaam iets meer gewelfd en naar voren zwak versmald.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam naar voren meer dan naar achteren versmald. Halsschild halvemaan-vormig, fijn bestippeld en daartusschen zeer fijn lederachtig gerimpeld. Dekschilden achter de schouders afgerond-verbreed, duidelijk bestippeld, de stippels iets navelachtig. Bovenzijde glanzig pekzwart of pekbruin, de voor- en zijrand van het halsschild en het uiteinde der dekschilden roodbruin. Lengte $\frac{3}{4}$ —1 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. (obscurus Duv.) (piceus Comolli)

1. Sericoderus Stephens.

Sprieten 10-ledig, met 3 grootere tot eene knots vereenigde eindleedjes; de eerste twee sprietleedjes zijn lang. Voorkaken kort, aan de binnenzijde iets uitgehold en aan den toprand gezaagd. Achterkaken met eene smalle lob, welker iets verdikte top met stekelborstels bezet is. Lichaam omgekeerd-eirond, op de bovenzijde behaard. Achterhoeken van het halsschild naar achteren zeer spits uitgetrokken. Tarsen 4-ledig.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Bovenzijde vrij dicht en fijn neerliggend behaard, rood- of geelbruin; aan den voorrand van het halsschild schijnt de kop donker door. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, tamelijk hoog gewelfd en van voren vrij steil afvallend, de achterhoeken zeer spits uitgetrokken en over de schouders der dekschilden heengrijpend. Dekschilden naar het uiteinde iets versmald, zoo lang als breed, aan het uiteinde te zamen recht afgeknot, met afgeronde buiten-tophoeken. Lengte 1 mm. Gemeen onder dorre bladeren, rottende plantenstoffen, aan paddestoelen en in dakstroo 1. *lateralis* Gylh.

2. Corylophus Stephens.

Sprieten 9-ledig, het eerste lid lang en dik, met 3-ledige knots. Voorkaken met lang scherp uiteinde, aan den binnenrand zeer fijn gekamd. Achterkaken uit eene lob bestaande. Kaaktasters 4-ledig. Liptasters zeer dik, 2-ledig. Lichaam hoog gewelfd, naar achteren iets versmald, op de bovenzijde onbehaard. Achterhoeken van het halsschild spits, doch weinig uitgetrokken. De voorschenen zouden bij het δ iets gebogen zijn. Tarsen 4-ledig.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Bovenzijde glanzig, onbehaard, zwart, het halsschild en de achterhelft der dekschilden geelrood, de kop door het halsschild donker doorschijnend, de pooten geelrood. Halsschild half-

cirkelrond, aan den achterrand dubbel zoo breed als in 't midden lang, met spits uitstekende achterhoeken. Dekschilden duidelijk en eenigszins verspreid bestippeld. Lengte 1 mm. Gemeen onder dorre bladeren, rottend stroo, vergane plantenstoffen, in dakstroo, onder vermolmd planken en in aangespoeld riet 1. *cassidoides* Mrsh.

II. Tribus ORTHOPERINI.

3. *Orthoperus* Stephens.

Sprieten 9-ledig, met 5-ledige knots, waarvan het tweede lid zeer klein is. Bovenlip groot, half-cirkelvormig. Voorkaken sterk gebogen. Achterkaken slechts met ééne smalle, vliezige, aan het uiteinde lang behaarde lob. Kaaktasters 3-ledig, het eerste lid zeer groot, eivond, aan het uiteinde afgeknut, het tweede zeer klein, het derde lang, fijn toegespitst. Tong recht afgeknut. Liptasters zeer dik, de tong nauwelijks overschrijdend, 2 ledig: het eerste lid zeer klein, bijna niet zichtbaar, het tweede zeer groot, eivond, van voren afgeknut en met eenige borstels bezet. Kop tot aan den schedel volkomen onbedekt. Halsschild van voren duidelijk uitgerand, met duidelijke voorhoeken. Voorcoxae kegelvormig, achtercoxae breed. Tarsen 4-ledig, de eerste twee leedjes onduidelijk gescheiden, het derde lid hartvormig, het klauwblad bijna zoo lang als de 3 voorafgaande leedjes te zamen. Lichaam eivond, behaard. — De soorten van dit genus leven in schimmel, op hout en boomzwammen.

Van de 10 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Bovenzijde tusschen de lijne bestippeling uiterst lijn lederachtig gerimpeld 2
Bovenzijde tusschen de duidelijke bestippeling volkomen glad. Achterhoeken van het halsschild recht, scherp aangeduid. Lichaam geheel geel. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Gemeen in kelders aan schimmel op wijnvaten (punctum Reitt.) 3. *atomarius* Heer.
 - 2 Lichaam ovaal, tamelijk breed, zwart; het uiteinde der dekschilden in den regel lichter gekleurd. Sprieten en pooten geelrood. Bij *ab.c. corticalis* Redt. is het lichaam eenkleurig kastanjebruin. Lengte $\frac{2}{3}$ mm. Gemeen op boomzwammen, tusschen schimmellende plantenstoffen en op rottend hout. De *ab.c. corticalis* niet algemeen. 1. *brunnipes* Gyll.
- Lichaam smaller ovaal, kleiner, minder glanzig, bruingeel; het midden van het halsschild en van elk der dekschilden kastanjebruin. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. 1). Bij Loosduinen, achter de met zwammen bezette schors van een dooden abeel, in eenige exemplaren gevangen.
(*atomus* Gyll.) 2. *picatus* Mrsh. 2)

XVII. Familie TRICHOPTERYGIDAE.

Fig. 36. Naar Huch.

- I. *Noctuidium pilosellum* Mrsh. spriet.
- II. *Pseudium nitidum* Br. voortars (magnif.)
- III. *Idem* voortars (wipje)

Deze familie bevat de kleinste van alle bekende Coleoptera; zij zijn alleen door middel van den microscoop te bestudeeren. — Sprieten 11-ledig, met 2 of 3 grootere eindleedjes, de laatste drie leedjes met een haarkrans (Fig. 36, I). — De bovenlip steekt ver uit, is naar voren versmald, aan het uiteinde afgerond, langs de randen bewimpert en om de breedte-as bewegelijk, wat tengevolge heeft dat door hare toevallige ligging de omtrek van den kop veelal een zeer verschillenden vorm hebben kan. — Voorkaken aan den top sikkelvormig gebogen, aan den binnenrand uitgehold, met kleine tandjes aan de basis de buitenrand is verdikt en vertoont in het midden twee vorksgewijs van elkaar afstaande tandjes. Volgens *Matthews* kunnen zich de voorkaken bij *Trichopteryx* omkeeren. Achterkaken twee-lobbig; kaaktasters 4-ledig, het eerste lid klein, het tweede lang en naar het uiteinde verdikt, het derde groot, eenigszins kogelrond, het eindlid dun en naaldvormig en slechts even uit

1) *Butter* zegt dat deze grooter dan *brunnipes* zou zijn, m. a. is dit niet geheel juist.

2) De als *O. corticalis* Muls. in *nipus* Naamlijst vermelde soort blijkt mij nader, slechts een onuitgekleurd exemplaar van *picatus* te zijn.

het derde te voorschijn komende. Liptasters evenals bij de Scaphidiidae buitengewoon klein, 3-ledig, de leedjes geleidelijk in lengte en dikte afnemend. — Het grootste gedeelte der oogen is naar onderen gericht. Tusschen de oogen en de onderlip is bijna altijd eene groef ter opname van den sprietwortel. — De dekschilden zijn, hetzij niet verkort en hoogstens het pygidium onbedekt, hetzij verkort en min of meer afgeknut, waardoor 3 tot 5 tergiten onbedekt blijven. Episternen van den metathorax niet zichtbaar. — Achterlijf met 6 of 7 sterniten, op welke eigenaardige haarlijsten voorkomen. — Voorcoxae kegelvormig uitpuilend, de middel- en achtercoxae ver van elkaar afstaande; de achtercoxae zijn (behalve bij *Microptilium*, volgens *Matthews*) meer of minder sterk plaatvormig verbreed. Achterdijen aan den achterrand veelal met een vliezig zoom. Tarsen 3-ledig (Fig. 36 II, III), het eerste lid rudimentair, zeer dun vliezig en meestal in eene uitholling der scheen, ingeplant, het tweede lid meestal duidelijk (bij het ♂ aan de voortarsen gewoonlijk sterk behaard) het derde lang, naar het uiteinde dunner en met twee paar zijborstelharen voorzien; dit derde lid is klaarblijkelijk door versmelting van drie eindleedjes gevormd. Tusschen de klauwen bevindt zich een hechtbaar, hetwelk bij *Ptenidium* in een uiterst klein ovaal knopje eindigt. Dit laatste kenmerk heeft dit genus gemeen met een aantal Acarinen. — Merkwaardig zijn, volgens *Flach*, de geslachtsorganen gevormd; de penis met zijne

Fig. 37. Vleugel van *Trichopteryx* Ong.

bijkomende deelen biedt veel verscheidenheid in vorm aan. — Hoogst eigenaardig is de bouw der vleugels; zij zijn bij alle genera, behalve bij *Nossidium*, eenigszins vedervormig en bestaan uit een ingesnoerd lancetvormig vlies op een kort steeltje, aan voor- en achterzijde voorzien van lange haren (Fig. 37). Volgens *Flach* geven de vleugels van *Nossidium* ons het middel aan de hand om een goed denkbeeld van hunnen bouw te verkrijgen; van het gedeelte der vleugelbasis, dat bij de andere Trichopterygidae de steel wordt, is nog eene ruit overgebleven, wier voorste begrenzing gevormd wordt door de venae marginalis, media-

stina, scapularis en externo-media, terwijl de achterste begrenzing, naar het schijnt, door de vena interno-media plaats vindt; daartusschen verloopt eene lijne straalader. In de groote, tamelijk breede tophelt is het tweede gewricht slechts aangeduid; de venae marginalis en scapularis zijn duidelijk maar kort. Van de korte, krachtig ontwikkelde externo-media vertakt zich in de area externo-media eene lange, nagenoeg den top bereikende straalader, die bij alle Trichopterygidae constant schijnt te zijn. — De soorten van deze familie zijn uiterst kleine, hoogstens ruim 1 mm. lange diertjes, welke onder vergane plantenstoffen, achter boomschors, in paddestoelen, onder drogen mest en in mierennesten leven. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit de sporen van fungi. Hare bewegingen zijn in den regel uiterst snel, uitgezonderd enkele vormen zonder oogen benevens eene enkele *Ptenidium*-soort.

Eene bijzonderheid is nog, dat bij het genus *Neuglenes* dimorfisme voorkomt; van eene zelfde soort heeft men ongevleugelde vormen met rudimentaire oogen, en gevleugelde vormen met goed ontwikkelde oogen. — De ontwikkeling van *Trichopteryx fascicularis* is door *Perris* bekend geworden; ook beschreef *Perris* de larve en pop van *Neuglenes apterus* en *Gillmeister* die van *N. testaceus*.

De familie der Trichopterygidae is naverwant aan de Corylophidae en Scaphidiidae.

Overzicht der Tribus.

- 1 Dekschilden niet verkort, bij het leven hoogstens het pygidium onbedekt latend 2
Dekschilden verkort, 3 tot 5 tergiten onbedekt latend. De voorcoxae niet van elkaar gescheiden 3
- 2 Voorcoxae door eene voortzetting van het prosternum gescheiden. De dekschilden bedekken het achterlijf geheel. De middelste sprietleedjes niet ingesnoerd, verspreid behaard, zonder duidelijke haarkransen. Lichaam min of meer breed-eivormig. Het ♂ en het ♀ met 7 sterniten. 1. **Ptenidiini**.
- Voorcoxae niet van elkaar gescheiden. De middelste sprietleedjes met haarkransen. Pygidium veelal bij het leven zichtbaar of 3 tot 5 tergiten onbedekt. Lichaam smal-eivormig of lang gestrekt. 11. **Ptiliini**.

- 3 Middelste sprietleedjes met twee haarkransen. (zie bij no. 2, II. Ptiliini).
 Middelste sprietleedjes verspreid behaard, zonder duidelijke haarkransen; hoogstens nabij het uiteinde ingesnoerd of van gelijke breedte. Pygidium van tandjes voorzien. Achterlijf met 6 sterniten. III. **Trichopterygini**.

1. Tribus PTENIDIINI.

Prosternum niet gekield. Achtercoxae dicht tegen elkaar aanstaande, de rand van het metasternum daartusschen in 2 tandjes uitgetrokken. Het mesosternum vormt tusschen de middelcoxae een uitstekend bulje. Pleurae van den metathorax van onderen zichtbaar, van achteren zeer smal, van voren naar binnen tot aan de coxae verbreed. Pygidium aan het uiteinde met 7 lange tandjes. Lichaam eivormig, lang behaard. (Nossidium.)

Prosternum gekield. Achtercoxae ongeveer op $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Het mesosternum, tusschen de middelcoxae, met eene groefvormig uitgeholde, breede voortzetting, die tot opname van den top van het prosternum van voren is uitgerand. Pleurae van den metathorax van onderen niet zichtbaar. Pygidium met 7 zeer kleine tandjes aan den rand. Lichaam glanzig, als gepolijst. Schildje met eene dwars-groef aan de basis. 1. **Ptenidium**.

II. Tribus PTILIINI.

- 1 Dekschilden niet verkort, bij het leven hoogstens het pygidium onbedekt latend. 2
 Dekschilden verkort, 3 tot 5 tergiten onbedekt latend. 7

- 2 Pleurae van den metathorax van onderen hoogstens als een smalle zoom zichtbaar. Lichaam meestal donker gekleurd, zeer zelden met eene middellijn op het halsschild. 3

Pleurae van den metathorax van onderen duidelijk zichtbaar. Tarsen zeer lijn en slank. Het ♂ en het ♀ met 7 sterniten. Lichaam meestal lichter of donkerder bruin; het midden van het halsschild gewoonlijk met lanklijnen. Achtercoxae slechts iets verbreed. De haartjes der oppervlakte ontspringen uit kleine groefjes. 6

- 3 Tarsen kort en plomp. Middelcoxae door eene tongvormige, vlak gewelfde mesosternale voortzetting gescheiden. Het ♂ met 7-, het ♀ met 6 sterniten; het eerste sterniet veelal verlengd. Sprietleedjes slechts aan de basis ingesnoerd, meestal over de geheele lengte behaard, minstens aan de basis met een haarkrans; het negende en tiende lid niet steelvormig verlengd. Lichaam zwart, met lijn rimpelig gekorrelde bovenzijde. Halsschild aan weerszijden van de basis iets uitgebogen en daardoor in het midden een weinig lobvormig uitgezakt. Het laatste sterniet breed afgerond en afgeknot, door de dekschilden bedekt. 2 **Actidium**.

Tarsen zeer lijn en slank. Middelcoxae door eene smalle, spitse, kort gesteelde voortzetting gescheiden. Het negende en tiende sprietlid aan het uiteinde duidelijk steelvormig verlengd. 4

- 4 Middelste sprietleedjes aan de basis en aan het uiteinde sterk ingesnoerd, met een dubbel haarkrans. Halsschild zonder indrukken over het midden. Bovenzijde met haardragende korreltjes bezet. De achtercoxae vrij sterk plaatvormig verbreed. Het ♂ met 7-, het ♀ met 6 sterniten. 5

Middelste sprietleedjes eivormig, met een gewonen haarkrans. Achtercoxae iets verbreed. Het laatste tergiet breed afgerond, met zeer lijne, stompe middentandjes. Lichaam zeer smal, lichtbruin. Halsschild met eene middellijn. (Oligella.)

- 5 Pygidium afgerond, met een paar tandjes aan den rand. De basis der dekschilden recht afgesneden, met een krachten schouder tand. Halsschild aan de basis het breedst, naar voren versmald. (Euryptilium.)

Pygidium met een scherp midden tand. De schouders der dekschilden meestal afgerond. Halsschild vóór de basis het breedst. 3. **Ptiliolium**.

- 6 Middelste sprietleedjes aan de basis ingesnoerd, met 2 haarkransen. Pygidium met twee, dicht bijeenstaande tandjes. Halsschild bijna altijd met eene langsgroef in het midden en met 2 zijlijnen. Bovenzijde gechagrineerd en bovendien lijn en meer of minder korrelig bestippeld. 4. **Ptilium**.

Middelste sprietleedjes eivormig, met een gewonen haarkrans. Pygidium met een stompen midden tand. Halsschild zonder middengroef. Bovenzijde glad en gewoon bestippeld. (Micridium.)

- 7 Middelcoxae niet van elkaar gescheiden. Voorschenen aan de binnenzijde vóór het uiteinde met twee bewegelijke doornen. Pygidium ongerand, met lange tastborstels. De achtercoxae op een afstand van meer dan $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Lichaam lichter of donkerder geel tot roodbruin. De oogen veelal rudimentair 8
- Middelcoxae door eene voortzetting van het mesosternum gescheiden 9
- 8 Middellste sprietleedjes voor de basis en nabij het uiteinde ingesnoerd. Achterlijf met 6 sterniten. Achtercoxae zeer weinig verbreed. Halsschild naar achteren versmald. 5. **Neuglones**. Middellste sprietleedjes aan de basis slechts onduidelijk ingesnoerd. Achterlijf met 7 sterniten. Achtercoxae vrij sterk verbreed. Halsschild naar voren versmald (Aderces.)
- 9 Mesosternale voortzetting vlak, tamelijk breed. De middelste sprietleedjes voor de basis en nabij het uiteinde ingesnoerd. Achterlijf met 6 sterniten. De niet verbreedte achtercoxae op een afstand van slechts $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Halsschild hartvormig, met twee langs-indrukken. Lichaam smal, bruinzwart. Sprieten lang. (Microptilium Matth.)
- Mesosternum scherp gekield. De middelste sprietleedjes zeer lang en dun, voor de basis en naar het uiteinde sterk ingesnoerd. Achterlijf met 7 sterniten. Pygidium met een scherp middenrand. De vrij sterk verbreedte achtercoxae op een afstand van $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Halsschild veel breeder dan de dekschilden, aan weerszijden van de basis sterk uitgerand. Dekschilden naar het uiteinde aanmerkelijk versmald. Lichaam donker gekleurd 6. **Actinopteryx**.

III. Tribus TRICHOPTERYGINI.

- 1 Bovenzijde netsgewijze gechagrineerd en korrelig bestippeld 2
- Bovenzijde glad, groefachtig bestippeld. Voorschenen aan de binnenzijde met eene rij stekelborstels. Pygidium met breed opgericht rand, met een krachtigen middenrand en onduidelijke zijtandjes (Baeocrara.)
- 2 Mesosternum niet gekield, tusschen de middelcoxae breed opgericht. De matig verbreedte achtercoxae staan op nagenoeg $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Achterdijen krachtig ontwikkeld, van binnen zonder vliezige verbreding. Halsschild met stompe achterhoeken. Lichaam buitengewoon klein 7. **Nephanes**.
- Mesosternum scherp gekield. De sterk verbreedte achtercoxae staan op ongeveer $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. De achterdijen zijn van binnen vliezig verbreed 3
- 3 Pygidium recht afgeknoot, met twee ver van elkaar staande, zeer kleine tandjes. Halsschild aan de basis iets ingesnoerd, naar achteren iets versmald. Lichaam langwerpig 3. **Micrus**.
- Pygidium aan het uiteinde met 3 scherpe tandjes. Halsschild aan den achterrand het breedst, naar voren versmald, met scherpe achterhoeken 9. **Trichopteryx**.

I. Tribus PTENIDIINI.

Nossidium Er.

Lichaam eivormig, lang behaard, met den habitus van eene uiterst kleine Choleva. Halsschild naar voren versmald, dicht tegen de dekschilden aansluitend. De dekschilden bedekken het geheele achterlijf en vertoonen hier en daar gedeelten van eene naadstreep. De middelste sprietleedjes zijn niet ingesnoerd, verspreid behaard, doch zonder duidelijke haarkransen. Prosternum niet gekield. Het mesosternum vormt tusschen de middelcoxae een uitstekend bultje. Pleurae van den metathorax van onderen zichtbaar, van achteren zeer smal, van voren naar binnen tot aan de coxae verbreed. Pygidium aan het uiteinde met 7 lange tandjes. Voorcoxae door eene voortzetting van het prosternum gescheiden. Achtercoxae als driehoekige platen zeer dicht tegen elkaar aanstaande, de rand van het metasternum daartusschen in twee tandjes uitgetrokken. Het ♂ en het ♀ met 7 sterniten.

Van de 2 Europeesche soorten zou één in ons gebied kunnen voorkomen.

Dez. soort heeft de gedaante van een uiterst kleinen *Nargus anisotomoides*. Lichaam eivormig, sterk gewelfd, lichter of donkerder roestkleurig-bruin, lang geelachtig behaard. Halschild aan de basis het breedst, met rechte achterhoeken, gerande zijden, niet zeer dicht-, doch duidelijk bestippeld, met eene lijne dwarstlijn vóór de basis. Dekschilden met grovere, dichter staande, eenigszins raspachtige bestippeling, welke van voren iets in onregelmatige dwarsrijen geplaatst is, naar het uiteinde met de aanduiding van eene naadstreep. Lengte ongeveer 1 mm. In boomhol, vooral van wilgen, en in rottende plantenstoffen. In Engeland en bij Hamburg (*pilosellum* Mrsh.)

1. *Ptenidium* Erichs.

Sprieten 11-ledig, haarfijn, lang behaard; het negende lid een weinig-, het tiende en elfde aanmerkelijk grooter. Lichaam glanzig, als gepolijst. Halschild aan den achterrand met 4 even ver van elkaar afstaande groefjes en twee groefjes aan den voorrand, waarin tastharen; deze groefjes kunnen echter bij enkele soorten, op de tastharen na, ontbreken. Schildje groot, met een dwarsgroefje aan de basis. Prosternum gekield. Mesosternum tusschen de middelcoxae met eene gegroefde, breede voortzetting tot opname van het uiteinde van het prosternum. Voorcoxae door eene voortzetting van het prosternum gescheiden. Achtercoxae op een afstand van ongeveer $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Pleuræ van den metathorax van onderen niet zichtbaar. Pygidium met 7 kleine tandjes aan den rand. De soorten van dit genus leven in rottende plantenstoffen, onder dorre bladeren, oud riet en ook bij mieren.

Van de 21 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halschild aan de basis het breedst, slechts naar voren versmald, met de dekschilden in eene vlucht gewelfd. Lichaam volkomen ovaal, met den habitus van een kleinen *Ephistemus*; kastanjebruin, uiterst fijn en verspreid bestippeld, met enkele stoffijne haartjes bestrooid, nagenoeg kaal, glanzig. Sprieten en pooten roodgeel. Halschild zonder duidelijke basaal-groefjes, met nagenoeg rechte, slechts aan den top afgeronde achterhoeken. Lengte ongeveer $\frac{1}{2}$ mm. In boomhol, waarin mieren (*Lasius fuliginosus*) verblijf houden. Zij beweegt zich uiterst langzaam. Niet inl. In Noord-Duitschland . . . (*Gressneri* Gillm.)

Halschild naar voren en naar achteren versmald, aan de basis iets ingedrukt, met stompe of min of meer afgeronde achterhoeken. Habitus van kleine *Atomaria's* 2

- 2 Halschild en dekschilden zeer grof bestippeld, op het halschild eene gladde middellijn vrij latend, op de dekschilden in onregelmatige rijen. Lichaam langwerpig, weinig gewelfd, zwart, vrij lang behaard. Sprieten en pooten bruingeel. Lengte ongeveer $\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam nabij de zeekust onder plantenaafval, riet en op stuifzand der duinen.

(*calutaceum* Gillm., *littorale* Motsch.) 1. *punctatum* Gylh.

Halschild en dekschilden meer of minder fijn bestippeld of nagenoeg glad 3

- 3 Halschild aan de basis slechts met een duidelijk groefje nabij de achterhoeken 4

Halschild aan de basis met 4 duidelijke groefjes, waarvan twee in het midden 6

- 4 Metasternum geheel glad, niet gehagrineerd. Soorten van $\frac{3}{4}$ mm. 5

Metasternum, ten minste aan de zijden, lijn gehagrineerd. Bovenzijde zwart of pekwart, met lichter uiteinde der dekschilden, vrij lang behaard; de sprieten geel, hoogstens de laatste twee leedjes iets donkerder. Zeer groote exemplaren met meer buikig verbreedde dekschilden vormen de var. **corpulentum* Lucas (? *atomaroides* Motsch.). Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Gemeen onder dood riet, stroo, dorre bladeren, drogen mest, tusschen rottende plantenstoffen en in mierenhoopen. De var. *corpulentum* komt meer in Zuid-Europa voor.

(*pasillum* Gylh., *apicale* Er.) 4. *evanescens* Msh.

5. Lichaam kort-cirond, diep zwart met donkerbruin uiteinde der dekschilden, vrij lang en dicht grauw behaard. Sprieten zwartbruin. Halschild dubbel zoo breed als lang. Dekschilden weinig of niet langer dan aan de schouders breed, lijn doch duidelijk bestippeld. Lengte $\frac{3}{4}$ mm. Vrij zeldzaam, vooral langs de zeekust, doch ook langs rivieren onder dood riet en plantenaafval. Den Haag, Katwijk, Zierikzee, Amsterdam, Muiden, Hillegersberg en Driebergen. 2. *fuscicorne* Er.

Lichaam langwerpig-cirond, pekwart met kastanjebruine dekschilden, zeer kort en verspreid

behaard. Sprietten geel. Halsschild niet volkomen dubbel zoo breed als lang. Dekschilden veel langer dan breed, nog lijner en minder duidelijk bestippeld. Lengte $\frac{3}{4}$ mm. In mierennesten. In de Waalsdorpsche duinpannen in de nesten van *Formica rufa*, Maart. Ook bij *Lasius fuliginosus*. In Oldenburg 3. **formicetorum** Kr.

- 6 De groefjes aan den achterrand van het aan de zijden sterk afgeronde halsschild zeer klein, doch nog duidelijk zichtbaar. 7

De groefjes aan den achterrand van het aan de zijden niet sterk afgeronde halsschild groot, de middelste slechts iets kleiner dan de buitenste. Lichaam langwerpig-eirond, zwart, zeer onduidelijk bestippeld en verstrooid behaard. Lengte $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ mm. Gemeen onder dood riet, stroo en tusschen *Sphagnum* (nitidum Heer) 5. **pusillum** Er.

- 7 Lichaam tamelijk breed eirond, op de bovenzijde meestal kastanjebruin, nagenoeg onbehaard, glad, uiterst fijn bestippeld. Dekschilden met lichter uiteinde. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Den Haag en Nootdorp. In de Rijnprov. bij Aken en in Westfalen. (atomaroides Matth.) 6. **laevigatum** Gillm.

Lichaam langwerpig-eirond, sterk gewelfd; kop en halsschild pekschwart, dekschilden kastanjebruin; de bovenzijde fijn en verspreid behaard. Sprietten bruinachtig of alleen de knots en de basis iets gebruint. Grootte exemplaren met kleiner halsschild, wier dekschilden aan de zijden eenigszins hoekig verbreed en naar het uiteinde versmald zijn, werden door *Fuss* als *longicorne* beschreven. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. Zij zou wellicht in ons gebied kunnen worden aangetroffen (nitidum Bris.) (Brisoutii Matth.) 1)

II. Tribus PTILIINI.

2. Actidium Matthews.

Lichaam smal eivormig of lang gestrekt, met fijn rimpelig gekorrelde en meer of minder dicht en kort behaarde bovenzijde. Sprietleedjes slechts aan de basis ingesnoerd, meestal over de geheele lengte behaard en minstens aan de basis met een haarkrans, het negende en tiende lid niet steekvormig verlengd. Halsschild aan weerszijden van de basis iets uitgebogen en daardoor in het midden iets lobvormig uitgesakt. Pleurac van den metathorax van onderen bijna niet-, hoogstens als een smalle zoom zichtbaar. Dekschilden niet verkort, bij het leven hoogstens het pygidium onbedekt latend. Middecoxac door eene smalle, vlak gewelfde mesosternale voortzetting gescheiden. Voorcoxac niet van elkaar gescheiden. Tarsen kort en plomp; de schenen meer of minder schepelvormig, waardoor de soorten van dit genus beter kunnen graven dan de overige Trichopterygidae. Het ♂ met 7, het ♀ met 6 sterniten; het eerste sterniet veelal verlengd. De soorten leven langs oevers.

Van de 5 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Dekschilden met parallele zijden, zeer fijn gecchagrineerd en fijn korrelig bestippeld, grijs behaard. Halsschild met duidelijke navelstippels en met een dwarsindruk voor de basis. Lichaam zeer smal, dof zwart; de sprietten en pooten lichtgeel. Lengte $\frac{2}{3}$ mm. Nabij de zeekust onder plantenaafval en in zandkuilen op de duinen nabij het strand. Scheveningen, Maart. (filiforme Aubé) 1. **coarctatum** Haliday.

Dekschilden eivormig, zeer onduidelijk korrelig bestippeld. Halsschild met een duidelijken dwarsindruk voor de basis. Bovenzijde zwart, eenigszins vetglanzig; de sprietten en pooten donkerbruin. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. In aanspoelsel. Niet inlandsch. In Duitschland en Frankrijk. (Boudieri Allib.)

Oligella Flach.

Lichaam zeer smal. Halsschild met eene middellijn. Middelste sprietleedjes eivormig, met een gewonen haarkrans, het negende en tiende lid aan het uiteinde duidelijk steekvormig verlengd. Het laatste tergiet breed afgerond, met zeer fijne, stompe

1) Het in mijne Naamlijst (2e supplement) vermeldde exemplaar uit Nootdorp is *laevigatum*.

1. *Antenn. Middelcoxae door eene smalle, spitse en kort gesteelde voortzetting verbreed. Achtercoxae iets verbreed. Tarsen zeer fijn en slank. Overigens als bij A. Ptilium.*

De enige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam zeer smal, lichtbruin, zeer fijn gehagrinced, bestippeld en behaard. Halschild naar de basis versmald, met stompe achterhoeken, met breed basaal-indruk, eene meer of minder duidelijke korte middengroef en met eenige aanduiding van twee divergerende zijlijnen. Schildje diep uitgehold. Sommige exemplaren hebben een brederen kop en zijn wellicht mannetjes. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Onder rottende plantenstoffen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld. Ik zag een Belgisch exemplaar door Matthews gedetermineerd.

(excavata Er.) (foveolata Allib.)

Eurypytium Matthews.

Bovenzijde met haardragende korreltjes bezet. Halsschild aan de basis het breedst, naar voren versmald, zonder indrukken voor het midden. Middelste sprietleedjes aan de basis en aan het uiteinde sterk ingesnoerd, met een dubbelen haarkrans. Het negende en tiende sprietlid aan het uiteinde duidelijk steekvormig verlengd. Basis der dekschilden recht afgesneden, met een krachtigen schouderland. Pygidium afgerond, met een paar tandjes aan den rand. Middelcoxae door eene smalle, spitse, kort gesteelde voortzetting gescheiden. Achtercoxae vrij sterk plaatvormig verbreed. Tarsen zeer fijn en slank. Het ♂ met 7-, het ♀ met 6 sterniten.

De twee Europeesche soorten komen in Noord-Duitschland voor.

Halschild dicht netsgewijze gerimpeld, veel meer verspreid korrelig bestippeld dan de dekschilden. Sprietten slank, geelachtig. Lichaam zwartbruin, vrij dicht grijs behaard. De trochanters der achterpooten bij het ♂ een weinig uitgerand. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Vermoedelijk bij Hamburg gevangen (saxonicum Gillm.)

Halschild grof en even sterk en dicht korrelig bestippeld als de dekschilden. Sprietten krachtiger ontwikkeld, donkerder geelachtig. Kleiner dan saxonicum, meer pekswart. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland. Bij Formica rufa. (marginatum Aubé)

3. Ptilolum Flach.

Dit genus onderscheidt zich van Eurypytium, doordat het pygidium een herpen middelland vertoont, de schouders der dekschilden gewoonlijk afgerond zijn en het halsschild vóór de basis het breedst is. Het ♂ zou 7-, het ♀ 6 sterniten hebben.

Van de 14 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1. Dekschilden aan het uiteinde zeer breed afgerond, met scherp afgescheiden, smallen, lichtgekleurden toprand. Het uiteinde van het pygidium meestal zichtbaar (Sub-gen. Nanopytium Flach). Halschild ongeveer dubbel zoo breed als lang, naar de basis iets versmald, met stompe achterhoeken en iets afgeronde basis. Bovenzijde zwart of zwartbruin, dicht, fijn, zijdeglanzig behaard; de sprietten donker. Het ♂ met verbrede voortarsen. De var. **regulosum* Allib. is kleiner, meer bruinachtig, met lichtere sprietten en pooten. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Onder vochtige bladeren, drogen mest en in Fungi. Den Haag, Utrecht, Zutphen, Amsterdam, Rotterdam en Zierikzee. 1 **Kunzei** Heer.

Dekschilden van het uiteinde niet zeer breed afgerond, eenkleurig, zonder scherp afgescheiden licht gekleurden toprand. Bij het doode dier is het uiteinde van het pygidium bedekt . . . 2

2. Kop nagenoeg zoo breed als het halsschild, dit $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, ongeveer in het midden het breedst. Lichaam smal, bruin tot zwartbruin, soms met lichtere dekschilden, vrij lang behaard. De var. **Fosteri* Matth. is smaller en lichter, met bruingle sprietten. Bij het ♂ de trochanters der achterpooten in een langen, uit drie borstelharen gevormden, doorn uitgetrokken en de achterdijen eenigszins hoekig verbreed. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Als Kunzei. Den Haag en Vorden. In de Rijnprov. bij Crefeld . . . (Spencei Allib.) 2. **oblongum** Gillm.

3. Kop duidelijk smaller dan het halsschild, dit achter het midden het breedst. Lichaam breder dan bij oblongum, donkerbruin, fijn grauw behaard. Bij het ♂ de trochanters der achterpooten gewoon en de achterdijen met een langen, lijnen, naar achteren gerichten, uit eenige borstelharen bestaanden, doorn. Lengte ruim $\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld (angustatum Er.) (**fuscum** Er.)

4. *Ptilium* Erichs.

Sprieten 11-ledig, de eerste twee leedjes groot, de laatste drie verdikt, de middelste aan de basis ingesnoerd, met 2 haarkransen. Bovenzijde, bij microscopisch onderzoek, gewoonlijk in rondachtig veelhoekige mazen gechagrineerd en bovendien fijn en min of meer korrelig bestippeld. Halsschild bijna altijd met eene langsgroef in het midden en met twee zij-lijnen. Dekschilden niet verkort, bij het leven hoogstens het pygidium onbedekt latend. Pygidium met twee dicht bijeenstaande tandjes. Pleurac van den metathorax van onderen duidelijk zichtbaar. Achtercoxae slechts iets verbreed. Voorcoxae niet van elkaar gescheiden. Tarsen zeer fijn en slank. Het ♂ en ♀ met 7 sterniten. Het ♂ onderscheidt zich door een korten, knotsvormigen, gewoonlijk donkeren einddoorn aan de middelschenen en door den verschillende vorm der sterniten, van welke het zesde in 't midden altijd sterk uitgesneden is. — De soorten van dit genus leven in rottende plantenstoffen, achter boomschors en in mierennesten.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Bovenzijde nagenoeg kaal, glanzig. Schildje en halsschild met 3 breede, diepe langsgroeven (Sub-gen. *Millidium* Motsch.). Zwartbruin, bij zeer sterke vergrooting gezien, stoffijn behaard; het uiteinde der dekschilden geel. Halsschild naar achteren meer dan naar voren versmald, breeder dan lang. Dekschilden aan het uiteinde breed afgerond. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Uiterst zeldzaam onder rottende plantenstoffen. Den Haag, October. (trisulcatum Aubé) 1. *minutissimum* Ljungh.

Bovenzijde vrij dicht behaard. Schildje slechts onduidelijk gegroefd. Het halsschild met smalle, diepe langslijnen of wel de zij-lijnen zijn onduidelijk (Sub-gen. *Ptilium* isp.) 2

- 2 Lichaam vrij kort en hoog gewelfd. Halsschild met eenigszins S-vormig gebogen, van voren en van achteren afgekorte zij-lijnen en met een groefje in de achterhoeken. Dekschilden naar het uiteinde verbreed, de naad iets plooivormig opgericht. Bovenzijde zwartbruin, weinig glanzig, de dekschilden met gelen toprand. Bij het ♂ het 5e sterniet met een klein bultje in 't midden. Lengte $\frac{2}{3}$ mm. Niet inlandsch. In West-Europa (affine Er.)

Lichaam smaller en tanelijk vlak 3

- 3 Halsschild met diepe, naar voren convergeerende zij-lijnen. Bovenzijde donkerbruin, met lichter uiteinde der dekschilden. Bij het ♂ het 5e sterniet als bij affine. Lengte ruim $\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In West-Europa. (caesum Er.)

Halsschild met ondiepe of onduidelijke, naar voren divergeerende zij-lijnen 4

- 4 Zij-lijnen van het halsschild ondiep, doch duidelijk. Bovenzijde donkerbruin, met lichter toprand der dekschilden, duidelijk korrelig bestippeld. Dekschilden te zamen afgerond. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. In drogen mest en onder dorre bladeren. Den Haag, Februari. In de Rijnprov. bij Aken. (canaliculatum Gillm., angustatum Aubé) 2 *exaratum* Allib.

Zij-lijnen van het halsschild zeer onduidelijk. Bovenzijde lichtbruin, met lichter toprand der dekschilden, zeer fijn en onduidelijk korrelig bestippeld. Dekschilden aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. In de nesten van *Formica rufa*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld (inquinum Gillm.) (*myrmecophilum* Allib.)

Micridium Matthews.

*Middelste sprittleedjes eivormig, met een gewonen haarkrans. Bovenzijde glad en gewoon bestippeld. Halsschild zonder middengroef. Pygidium met een stompen midden-tand. Dit genus is naverwant aan *Oligella* en *Ptilium*; de soorten zijn lichter of donkerder geel, met zwarte oogen en lijnvormige doorschemerende achtervleugels.*

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam lichter of donkerder geelachtig, met eenigszins donker doorschemerende vleugels. Kop en halsschild grof bestippeld. Dekschilden vrij dicht en fijn bestippeld en behaard. Halsschild met twee korte, naar voren convergeerende, scherpe lijnen. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. In wit vermolmd eikenhout. Niet inlandsch. In Engeland en Oost-Duitschland. Ik zag een exemplaar uit het Weener Hofmuseum (Halidayi Matth.)

5. Neuglenes Thomson.

(Ptinella Matth.)

Middelste spruitledjes voor de basis en nabij het uiteinde ingesnoerd, met twee haarkransen. Lichaam lichter of donkerder geel tot roodbruin. Oogen veelal rudimentair. Halsschild naar achteren versmald. Dekschilden verkort, 3 tot 5 tergiten onbedekt latend. Achterlijf met 6 sterniten. Pygidium ongetand, met lange tastborstels. Voor- en middelcoxae niet van elkaar gescheiden. Achtercoxae op een afstand van meer dan $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Voorschenen aan de binnenzijde, voor het uiteinde, met twee bewegelijke doornen. Bij vele soorten van dit genus bestaat dimorphisme. De dekschilden zijn bij gevlugelde exemplaren betrekkelijk langer dan bij ongevlugelden. Zij vertoonen aan het uiteinde der dekschilden veelal een fijn rilsje als rudiment van het ontbrekende gedeelte. — De larve en pop van *N. testaceus* zijn door Gillmeister, die van *apterus* door Perris beschreven.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild met scherp aangeduide achterhoeken 2
- Halsschild met volkomen afgeronde achterhoeken, naar de basis sterk versmald en aldaar smaller dan de kop. Dekschilden naar het uiteinde verbreed en elk afzonderlijk afgerond. Achterlijf kegelvormig toegespitst. De ongevlugelde vorm zonder oogen, bleekgeel; de gevlugelde (*gracilis* Gillm.) met oogen, donkerbruin. Een opvallend grootere vorm van ruim $\frac{1}{2}$ mm. is *biimpressus* Reitter. Lengte $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ mm. Niet inlandsch. Bij Hamburg, achter vermoelde boomschors (*tenellus* Er.) (*microscopicus* Gillm.)
- 2 Lichaam $\frac{1}{2}$ mm. lang. De ongevlugelde evenals de gevlugelde vorm met duidelijke, doch vlakke, pigmentlooze oogen 3
- Lichaam $\frac{1}{2}$ mm. lang. De ongevlugelde vorm zonder oogen, lichtgeel, met kegelvormig toegespitst achterlijf. De gevlugelde vorm (*Ratisbonensis* Gillm.) gewoonlijk donkerbruin of zwartbruin, met groote zwarte oogen en met lobvormig uitgetrokken dekschilden. Kleinere, smallere exemplaren (meestal mannetjes) vormen *angustulus* Matthews. Achter boomschors en bij mieren. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld.
(*pallidus* Er.) (*apterus* Guér.)
- 3 Dekschilden tweemaal zoo lang als het halsschild, met eenigszins parallelle zijden, duidelijk langer dan breed, aan het uiteinde te zamen sterk uitgesneden, met afgeronde naadhoeken. Halsschild tweemaal zoo breed als lang, met sterk afgeronde zijden, en twee duidelijke langs-indrukken. Lichaam lichtgeel, met bruinachtig uiteinde der dekschilden. Ongevlugeld. De gevlugelde vorm (*limbatus* Heer) met zwarte oogen en doorschemerende zwarte vlengels. Het type bij Winterswijk en Roermond, de vorm *limbatus* bij den Haag. 1. *testaceus* Heer.
- Dekschilden slechts $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, nagenoeg zoo lang als breed, naar het uiteinde iets verbreed, met vrij sterk afgeronde naadhoeken en gebogen toprand. Halsschild minder dan tweemaal zoo breed als lang, met meer hoekige zijden en onduidelijke langs-indrukken. Lichaam roodgeel of roestkleurig-bruin, met lichter achterlijf. Eenmaal achter boomschors in het Haagsche bosch, Januari. Overigens in Zuid-Europa en vermoedelijk in Engeland (? *Mariae* Matth.) 2. *denticollis* Fairm.

Aderces Thomson.

Middelste spruitledjes aan de basis slechts onduidelijk ingesnoerd. Halsschild naar achteren versmald. Achterlijf met 7 sterniten. Achtercoxae vrij sterk verbreed. De Europeesche soort van dit genus komt zooveel met groote oogen en ontwikkelde, het uiteinde der dekschilden overschrijdende vleugels, als met vlakke, pigmentlooze oogen en onontwikkelde vleugels voor. De eerste vorm is meestal donkerbruin, de tweede roestrood, met of zonder eenigszins bruinachtigen dwarsband aan het uiteinde der dekschilden.

Zij komt in het aangrenzend gebied voor.

Halschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang, naar de basis weinig of niet versmald; van achteren breder dan de basis der dekschilden, met nagenoeg rechte achterhoeken; de achterrand aan weerszijden iets uitgebogen; lijn geelagrineerd en iets lijner- en meer verspreid korrelig- bestippeld dan de dekschilden, welke in gebogen dwarsrijen korrelig zijn. Dekschilden aan de zijden iets afgerond, aan het uiteinde afgeknut, met eenigszins afgeronde maadhoeken. Bovenzijde lichter of donkerder bruin, het midden van het halsschild en de dekschilden vóór het uiteinde donkerder; spriet en pooten bleekgeel. Lengte $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ mm. Achter boomschors bij mieren. Niet inl. In de Rijnprov. bij Cleef en Crefeld.

(naturalis Heer.)

Microptilum Matthews.

Spriet lang, de middelste leedjes vóór de basis en aan het uiteinde ingesnoerd, met twee haarkransen. Lichaam smal. Halsschild hartvormig, met twee langsindrukken. Dekschilden verkort, 3 tot 5 tergiten onbedekt latend. Achterlijf met 6 sterniten. Mesosternale voortzetting vlak, tamelijk breed. Voorcoxae van elkaar gescheiden. Middelcoxae door eene voortzetting van het mesosternum gescheiden. De niet verbrede achtercoxae op een afstand van slechts $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd.

De enige Europeesche soort zou ook in ons gebied kunnen voorkomen.

Lichaam smal, bruinzwart, dof, grauw behaard. Halsschild hartvormig, met zeer stompe achterhoeken en eenigszins afgeronde basis, met twee onduidelijke langsindrukken op het midden, zeer dicht geelagrineerd en korrelig. Dekschilden in dichte dwarsrijen korrelig, $2\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, aan het uiteinde scheef afgeknut, met een lijnen, lichten top rand. Spriet en pooten geelbruin. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Engeland en Frankrijk. Ik zag een exemplaar uit het Weener Holnuseum.

(pulchellum Allib.)

6. Actinopteryx Matthews.

De middelste sprielleedjes zeer lang en dun, vóór de basis en naar het uiteinde sterk ingesnoerd. Halsschild veel breder dan de dekschilden, aan weerszijden van de basis duidelijk uitgerand. Dekschilden naar het uiteinde aanmerkelijk versmald. Achterlijf met 7 sterniten. Pygidium met een scherpen middentand. Mesosternum scherp gekield. De vrij sterk verbrede achtercoxae op een afstand van $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Bovenzijde met zeer fijne, in regelmatige, kruislings geplaatste rijen staande, korrelige bestippling en beharing; de onderzijde vrij lang behaard. Voortarsen als bij Actidium. Habitus van Trichopteryx. De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Kop groot en breed, met uitpuilende oogen. Halsschild groot, veel breder dan de dekschilden, met naar achteren spits uitgetrokken achterhoeken. Dekschilden tweemaal zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde versmald. Bovenzijde zwartachtig, zeer fijn regelmatig in dwarsrijen korrelig, dicht en lijn zijdeachtig grijs behaard. Spriet en pooten en de top rand der dekschilden bruin geel. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Tusschen plantenaafval in aardappelenkuilen in de duinen bij Scheveningen, Mei; zij leeft ook onder zeewier. — *fucicola* Allib.

III. Tribus TRICHOPTERYGINÆ.

Baeocrara Thomson.

Middelste sprielleedjes verspreid behaard, zonder duidelijke haarkransen, hoogstens nabij het uiteinde ingesnoerd of van gelijke breedte. Bovenzijde glad, groefachtig bestippeld. Dekschilden verkort, 3 tot 5 tergiten onbedekt latend. Pygidium met breed

blen rand, met een krachtigen middentand en onduidelijke zijtandjes. Achterlijf met 6 sterniten. Voorschenen aan de binnenzijde met eene rij stekelborstels. Overigens verwant aan *Trichopteryx*.

De eenige Europeesche soort zou ook in ons gebied kunnen worden aangetroffen.

Deze soort heeft de grootte van *Trichopteryx grandicollis*. Lichaam kort en breed. Halsschild ongeveer dubbel zoo breed als lang, met scherp aangeduide, rechte achterhoeken. Dekschilden met meer parallele zijden, naar het uiteinde iets verbreed. Bovenzijde tamelijk gewelfd, glanzig, sterk-, doch niet zeer dicht in gebogen dwarsrijen bestippeld, verspreid en lijn behaard. Zwartbruin, de topvand der dekschilden geelachtig; de sprietten pekkruin. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Op vochtige grasvelden onder hooi. Niet inlandsch. In den Elzas en in het Noorden van Europa. Ik zag een exemplaar uit het Weener Hofmuseum.

(variolosa Muls.) (littoralis Thoms.)

7. Nephanes Thomson.

Lichaam buitengewoon klein, met den habitus van een kleinen *Ptiliolum*, doch veel meer verwant aan *Trichopteryx*; de bovenzijde netsgewijze gechagrineerd en korrelig bestippeld. Halsschild met stompe achterhoeken. Mesosternum niet gekield, tusschen de middelcoxae breed opgericht. De matig verbrede achtercoxae staan op nagenoeg $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. Achterdijen krachtig ontwikkeld en aan de binnenzijde zonder vliezige verbreding.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze soort gelijkt op *Ptiliolum Kunzei*. Halsschild dubbel zoo breed als lang en nagenoeg zoo breed als de dekschilden, naar voren en naar achteren slechts weinig versmald, met stompe achterhoeken en aan weerszijden van de basis gerand. Bovenzijde grof gechagrineerd en korrelig bestippeld; grijs behaard. Zwartbruin, de topvand der dekschilden geelachtig; sprietten pekkruin. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Achter boomschors en in vochtig zaagsel als strooisel in paardenstallen. Den Haag, Arnhem, Doorn en Zierikzee.

(abbreviatellus Er.) 1. Titan Newm.

8. Micrus Matthews.

Habitus van een lang gestrekten *Trichopteryx*. Halsschild aan de zijden, vóór de rechte achterhoeken, iets uitgerand; naar achteren iets versmald. Pygidium recht afgeknut, met twee eer van elkaar staande, zeer kleine tandjes. Mesosternum scherp gekield. De sterk verbrede achtercoxae staan op ongeveer $\frac{1}{2}$ der randbreedte van het metasternum van elkaar verwijderd. De achterdijen aan de binnenzijde vliezig verbreed. Bij het δ vertoont het zesde sterniet eene dwars-geplaatste, van voren eigenaardig getande groef.

De eenige Europeesche soort, welke ook in Nederland voorkomt, zou, volgens Flach, wellicht uit Amerika, waar zij zeer gemeen is, ingevoerd zijn.

Lichaam lang gestrekt, met parallele zijden. Halsschild vóór het midden het breedst, met rechte achterhoeken, aan de zijden lijn gerand. Bovenzijde dicht rimpelig en gelijkmatig-, lijn korrelig bestippeld en behaard. Zwartbruin, de dekschilden gedeeltelijk iets meer kastanjebruin. Sprietten slank, evenals de pooten, donker geelachtig. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Onder drogen mest en op oeverzand; veelal ook rondvliegende. Kratingen, Juni . . . 1. *filicornis* Fairm.

9. Trichopteryx Kirby.

Sprietten 11-ledig, haarfijn, bij het δ meestal korter dan bij het φ , de leedjes min of meer kantig, de 3 groote eindleedjes afgeplat. Bovenzijde netsgewijze gechagrineerd en met haardragende korreltjes in onregelmatige, op verschillende wijze verlopende rijen bedekt. Bovenlip beweeglijk; de voorkaken kunnen zich, volgens

Matthæus, omkeeren. Halsschild aan den achterrand het breedst, naar voren versmald, met scherpe achterhoeken, welke de schouders omtatten, en met een, twee- of driemaal uitgebogen achterrand. Pygidium aan het uiteinde met 3 scherpe tandjes. Achterdijen aan de binnenzijde vliezig verbreed. Bij het ♂ der grootere soorten vertoont het laatste sterniet eene half-cirkelvormige lijn, welke bij de kleinere soorten onduidelijk is. Alle soorten zijn donker gekleurd, doch er komen ook exemplaren met minder donkere dekschilden en veelal ook *rufinos* voor; onuitgekleurde exemplaren zijn geheel geelachtig. — De larve van *T. fascicularis* is door Perris beschreven. — De soorten van dit genus leven onder dorre bladeren, vochtig hout, drogen koemest, in allerlei rottende plantenstoffen en ook bij mieren.

Van de ongeveer 20 Europeesche soorten komen 11 in Nederland voor.

- 1 Halsschild duidelijk breeder dan de dekschilden. Dekschilden bij het ♂ naar het uiteinde meer of minder duidelijk versmald. Lichaam kort en breed. 2
- Halsschild niet of nauwelijks breeder dan de dekschilden. Dekschilden naar het uiteinde niet versmald, bij het ♂ veelal naar het uiteinde verbreed. 6
- 2 Halsschild met één borstelhaar, de dekschilden met twee afstaande borstelharen aan den zijrand. Zwartachtig, met meer of minder duidelijken, bronzen weerschijn, tamelijk glanzig, grijs behaard; de sprieten bruinzwart, de pooten pekbruin. Dekschilden grover en dichter korrelig bestippeld dan het halsschild. Lengte 1 mm. Gemeen in allerlei plantenafval en vooral onder drogen koemest en aas. 1. *grandicollis* Mannerh.
- Halsschild en dekschilden zonder afstaande borstelharen aan den zijrand. 3
- 3 Halsschild tusschen de korreltjes overal gelijkmatig netsgewijze gerimpeld, niet glanziger dan de dekschilden. 4
- Halsschild tusschen de verspreid staande korrelige bestippeling in het midden en naar den voorrand glad, veel glanziger dan de dekschilden. Bij het ♂ de dekschilden naar het uiteinde sterk versmald. 5
- 4 Halsschild met niet zeer dichtstaande dwarsrijen van korreltjes. Dekschilden naar het uiteinde bijna niet versmald. Bovenzijde weinig gewelfd, donkerbruin of bruinzwart; de sprieten geelbruin, naar het uiteinde iets donkerder. Lengte 1—1½ mm. Gemeen onder dorre bladeren, plantenafval en dood riet. (*lata* Matth.) 2. *intermedia* Gillm.
- Halsschild met zeer dicht opeenstaande dwarsrijen van korreltjes. Dekschilden naar het uiteinde matig versmald. Bovenzijde grauwwart tot diepzwart, soms pekzwart. Sprieten korter, geheel donkerbruin. Overigens op *intermedia* gelijkende, doch iets kleiner. Eene kleine, koolzwarte variëteit werd als *Lucitia* Matth. beschreven, doch zou volgens *Flach* het ♂ zijn. Lengte ½ mm. Gemeen tusschen dorre bladeren, in rottende plantenstoffen en onder uitgedroogden koemest; ook bij mieren. (? *lata* Motsch.) 3. *fascicularis* Herbst.
- 5 Lichaam sterk gewelfd. Schildje niet dichter korrelig bestippeld dan de basis van het halsschild en de dekschilden. Bovenzijde bruinzwart; de sprieten aan den wortel licht gekleurd, soms geheel geelachtig; de pooten geel. Zeer kleine exemplaren (♂) maken volgens *Flach* den vorm *thoracica* Matth. uit. Lengte ¾—1 mm. Gemeen onder dorre bladeren en plantenafval. De vorm *thoracica* Matth. bij Maarsbergen in *Sphagnum*; ook bij Zierikzee.
4. *atomaria* de Geer.
- Lichaam minder gewelfd, iets neergedrukt. Schildje veel dichter korrelig bestippeld dan de dekschilden. Bovenzijde koolzwart, de sprieten geheel donker gekleurd. Oogen met veel meer facetten dan bij *atomaria*. Kleine mannetjes, bij welke de dwarsindruk voor de achterhoeken van het halsschild duidelijk is, maken volgens *Flach* den vorm *attenuata* Gillm. uit, groote exemplaren (♀) den vorm *semitens* Matth. Lengte ¾—1 mm. Langs rivieroevers, Gorkum en Sleswijk, langs de Merwede onder aangespoeld riet, April.
- (*anthracina* Matth.) 5. *thoracica* Gillm.
- 6 Halsschild met spitse, naar achteren gerichte achterhoeken. 7
- Halsschild met nagenoeg rechte achterhoeken. Bovenzijde dof. Bij het ♂ de voortarsen zeer weinig verbreed. 10
- 7 Lichaam met enigszins parallele zijden. Bij het ♂ de voortarsen zeer weinig verbreed. 8
- Halsschild en dekschilden elk afzonderlijk aan de zijden afgerond. Bovenzijde zeer fijn korrelig bestippeld en kort behaard, donkerbruin, zelden zwart; weinig glanzig, kort, zijdeachtig behaard. Sprieten lichter of donkerder bruingeel, slank. Het ♂ met sterk verbreed

voorsers en voorschenen. Volgens *Flach* zou *longicornis* Mannerh. beschreven zijn op zulke wijfjes, welke iets langere sprieten hebben en wier dekschilden meer parallelc zijden vertoonen of naar het uiteinde iets verbreed en doffer zijn. Zeer smalle wijfjes zouden als *Edithia* Matth. beschreven zijn. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam onder dorre bladeren, plantenafval en in aanspoelsel der rivieren. De vorm *longicornis* bij den Haag.

(♂ *clavipes* (Gillm.), ♀ *sericans* Gillm.) 9. *brevipennis* Er.

8 Bovenzijde vrij sterk glanzig 9

Bovenzijde matglanzig. Halsschild tusschen de korrelige bestippeling met rondachtige mazen, netsgewijze gerimpeld. Deze soort gelijkt zeer op *fascicularis*, doch is smaller, eveneens koolzwart gekleurd, met nagenoeg zwarte sprieten, waarvan alleen de eerste twee leedjes soms roodbruinachtig zijn. Pooten roodbruin. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Den Haag en Amsterdam. (*caniana* Matth.) 8. *suffocata* Haliday.

9 Halsschild, met breede mazen, netsgewijze gerimpeld; met lijn gerande zijden. Lichaam eenigszins langwerpig. Bovenzijde bruinzwart, zelden koolzwart, vrij lang en dun grijs behaard. Sprieten en pooten lichtgeel, de sprieten naar het uiteinde soms donkerder. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Onder plantenafval en in mierennesten. In de Waalsdorpsche duinen bij *Formica rufa*, Mart, niet zeldzaam.

(*longicornis* Motsch., ♂ *rivularis* Matth., similis Gillm.) 6. *Montandonii* Allib.

Halsschild uiterst lijn netsgewijze gerimpeld en korrelig bestippeld, met breed opgerichte zijranden. Sprieten zeer lang, pekwart. Lichaam tamelijk parallel. Bovenzijde koolzwart, glanzig; de pooten pekbruin. Lengte $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam. Den Haag. In de Rijnprov. bij Aken. (*pygmaea* Er., *parallelogramma* Gillm.) 7. *Chevolatii* Allib.

10 Sprieten krachtig ontwikkeld, zwart, de leedjes van af het vierde lid eivormig of kogelvormig-eirond en aan het uiteinde duidelijk versmald; bij het ♂ het achtste lid kogelvormig en aan den top ingesnoerd. Bovenzijde diep-zwart, dicht bruinachtig behaard; de pooten gewoonlijk donker. Deze soort schijnt zeer veranderlijk te zijn; kleine, smalle, dicht korrelig bestippelde exemplaren vormen *bovina* Matth.; bredere, minder dicht korrelig bestippelde en daardoor meer glanzige exemplaren vormen *sericans* Matth. Bij sommige exemplaren zijn de eerste twee spriedeetjes meer bruin; onuitgekleurde exemplaren zijn geheel donkerbruin. Kleine mannetjes vormen, volgens *Flach*, *picicornis* Mannerh.; meer gewelde exemplaren *longula* Matth. De vorm *carbonaria* Matth. vertoont een niet-kogelvormig achtste spriedlid en is waarschijnlijk een ♀. Een kleine, iets meer verspreid korrelig bestippelde vorm is *brevis* Matth. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Gemeen onder plantenafval en dorre bladeren. De vormen *bovina* en *brevis* met het type. (*depressa* Gillm.) 10. *sericans* Heer.

Sprieten lijner, donker-geelachtig, het derde en vierde lid cilindervormig, de overige leedjes eivormig met versmalden top. Halsschild, vooral bij het ♀, duidelijk smaller dan de naar het uiteinde verbrede dekschilden. Bovenzijde zwartbruin, de pooten geelachtig. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam, Amsterdam. (*pumila* Thoms.) 11. *dispar* Matth.

XVIII. Familie SCAPHIDIIDAE.

Deze kleine familie bestaat uit middelmatig groote of kleine kevertjes, welke door hun glad en glanzig, tamelijk breed en dik spueelvormig lichaam in 't oog vallen. Kop klein, gedeeltelijk in het halsschild verzonken. Sprieten haarlijn, recht, hetzij duidelijk 11-ledig, met 5-ledige, losgelede, doch duidelijk afgescheiden knots; of onduidelijk 11-ledig, met 5 grootere eindleedjes (*Scaphisoma*). — Oogen al of niet uitgerand. — Bovenlip vrij groot, neergebogen, de voorkaken bedekkend. Voorkaken klein, aan de binnenzijde met een bewimperden, vliezigen zoom; hetzij gewoon (*Scaphisoma*) of wel tweetandig (*Scaphium* en *Scaphidium*). Achterkaken 2-lobbig; de kaaktasters 4-ledig, niet zeer lang, draadvormig, met scherp toegespitst eindlid. Liptasters uiterst klein, slechts even lang als of iets korter dan de tong. Kin hoornachtig; de tong breed, vliezig. Halsschild volkomen tegen de dekschilden aansluitend, aan de basis tweemaal uitgerand, met eene gebogen stippellijn vóór de basis, welke bij *Scaphisoma* ontbreekt. — Schildje duidelijk, bij *Scaphisoma* onzichtbaar. — Dekschilden iets verkort en aan het uiteinde afgeknot, één of meer tergieten onbedekt latend. — Vleugels groot, in het aderverloop met die der *Cholevinae* en *Agartini* onder de *Silphidae*, alsook met die der *Histeridae* overeenkomend, doch eenvoudiger; het gewricht is iets dieper nabij het midden gelegen en er is nog een tweede gewricht ruggeduid, waardoor de vleugel driemaal over elkaar geslagen, onder de dekschilden geborgen kan worden; de achterrand is sterk gebogen, zoodat de vleugel in 't midden het breedst is; de inkeeringen zijn slechts zeer oppervlakkig aangeduid. Achterlijf kegelvormig, met 8 tergieten en 5 tot 7 sterniten. — Pooten lang en dun; de voorcoxae kegelvormig uitstekend, dicht aaneen-

staande de middelcoxae kogelvormig en evenals de half-cylindervormige achtercoxae ver van elkaar verwijderd. — Tarsen duidelijk 5-ledig. — De Scaphidiidae zijn door de iets verkorte dekschilden en door de plaatsing der pooten naverwant aan de Histeridae, doch wijken daarvan af door de rechte sprieten en door het ontbreken van graatpooten. Aan de Silphidae zijn zij ook verwant, doch onderscheiden zich daarvan vooral door de plaatsing der pooten. — Het zijn zeer vlugge diertjes, welke in rottende boomstronken, schimmelende plantenresten en fungi leven. Zij maken veelal spartelende bewegingen, wanneer men ze grijpen wil. — Van een paar soorten zijn de larven bekend geworden.

- 1 Sprieten zeer duidelijk 11-ledig, met 5-ledige, losgelede, doch duidelijk afgescheiden knots, wier leedjes niet langer dan breed zijn. Schildje duidelijk. Halsschild met eene gebogen stippellijn voor de basis. Tarsen veel korter dan de schenen 2
- Sprieten onduidelijk 11-ledig, het derde en vierde lid zeer klein, doch bij sterke vergrooting gezien, toch van elkaar gescheiden; met 5 grootere eindleedjes, waarvan echter het tweede minder verdikt is. Schildje niet zichtbaar. Halsschild zonder gebogen basallijn. Tarsen zoo lang als de rechte schenen. Dekschilden verspreid bestippeld. . . . 3. **Scaphisoma**.
- 2 Metasternum tusschen de achtercoxae met eene, in twee tanden uitlopende, voortzetting. Het eerste lid der achtertarsen korter dan het tweede. Middel- en achterschenen sterk gekromd. Dekschilden met stippelrijen of stippellijnen. Oogen niet uitgerand. . . . 1. **Scaphium**.
- Metasternum gewoon en recht tegen het eerste sterniet aanstootend. Het eerste lid der achtertarsen langer dan het tweede. Middel- en achterschenen slechts weinig gekromd. Dekschilden verspreid bestippeld, de stippels hier en daar in onduidelijke rijen geplaatst. Oogen tegen den sprietwortel uitgerand 2. **Scaphidium**.

1. Scaphium Kirby.

Sprieten zeer duidelijk 11-ledig, met 5-ledige, losgelede, doch duidelijk afgescheiden knots, wier leedjes niet langer dan breed zijn. Oogen niet uitgerand. Halsschild met eene gebogen stippellijn vóór de basis. Schildje duidelijk. Dekschilden met stippelrijen of stippellijnen. Metasternum tusschen de achtercoxae met eene, in twee tanden uitlopende voorzetting. Tarsen veel korter dan de schenen. Middel- en achtercoxae sterk gekromd. Het eerste lid der achtertarsen korter dan het tweede. Bij het ♂ zijn de pooten langer en de achterschenen sterker gekromd dan bij het ♀. — De soorten van dit genus leven in de onderaardsche deelen van paddestoelen.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Eenkleurig zwart of pekzwart, onuitgekleurde exemplaren pekbruin. Halsschild voor de basis eenigszins ingesnoerd, tamelijk grof bestippeld. Dekschilden duidelijk bestippeld, met verdiepten naad, aan weerszijden daarvan met eene krachtige naadstreep en met eenige stippelrijen of stippellijnen, benevens eene dwarsrij van stippels langs de basis. Lengte $5\frac{1}{2}$ – $6\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam in de duinstreken; vooral in den nazomer in paddestoelen.

1. **immaculatum** Oliv.

2. Scaphidium Oliv.

Dit genus onderscheidt zich van Scaphium, doordat de oogen tegen den sprietwortel uitgerand zijn, het metasternum gewoon is en recht tegen het eerste sterniet aanstoot, het eerste lid der achtertarsen langer is dan het tweede, de middel- en achterschenen slechts weinig gekromd en de dekschilden verspreid bestippeld zijn: de stippels staan slechts hier en daar in onduidelijke rijen. Bij het ♂ is het metasternum in de lengte ingedrukt. — De larve is door Blanchard bekend geworden.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart, de dekschilden elk met twee roode vlekken. Halsschild voor de basis slechts flauw uitgebogen, zoodat de zijden meer recht schijnen; tamelijk grof bestippeld. Dekschilden vrij dicht bestippeld, met eene verdiepte naadstreep en eene grove stippelrij langs de basis. Achterschenen bij het ♂ aan de binnenzijde dicht behaard. Lengte 5 – $5\frac{1}{2}$ mm. In paddestoelen, heuken- en wilgenzwallen en achter losse, schimmelende boomschors. Zeldzaam.

Winterswijk, Apeldoorn en Valkenburg, Juni en Juli. 1. **quadrimaculatum** Oliv.

3. Scaphisoma Leach

*Sprieten onduidelijk 11-ledig, het derde en vierde lid zeer klein, met 5 grootere ontleedjes, waarvan echter het tweede minder verdikt is. Oogen niet uitgerand. Halsschild zonder gebogen basaallijn. Schildje niet zichtbaar. Dekschilden verspreid bestippeld. Tarsen zoo lang als de rechte schenen. — De soorten van dit genus zijn uiterst vlugge diertjes, met spartelende bewegingen. Zij leven in boomzwammen en in vermolmd hout. — De larve en pop van *S. agaricinum* is door Perris beschreven.*

Van de 6 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 of 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild uiterst fijn en meestal zeer onduidelijk bestippeld 2

Halsschild zeer duidelijk, de dekschilden zeer krachtig bestippeld. Lichaam zwart of bruinzwart, de dekschilden met lichter en toprand; de naad weinig of niet dakvormig opgericht; de naadstreep diep, haar omgebogen gedeelte nabij de basis van het halsschild zeer duidelijk en tot over de helft der halve breedte van het halsschild zichtbaar. Het achtste sprietlid iets dunner dan-, doch bijna zoo lang als het zevende en negende lid, het vierde en vijfde lid tweemaal-, het zesde $3\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het derde. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Ik betwijfel of deze soort wel in West-Europa voorkomt en vermoed dat *S. subalpinum* veelal met deze verward is (*limbatum* Er.)

- 2 De naadstreep der dekschilden wordt aan den voorrand onduidelijk, buigt zich iets naar buiten tegen de basis van het halsschild en eindigt hier zonder zelfs het derde gedeelte der halve basis van het halsschild te bereiken; de naad nagenoeg vlak. Het achtste sprietlid, d. i. het tweede van de knots, veel kleiner dan het zevende en negende, het vierde tweemaal-, het vijfde en zesde drie maal zoo lang als het derde. Lichaam zwart, de uiterste toprand der dekschilden smal geelachtig gezoomd. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Gemeen op boomzwammen en achter schors van rottende boomstronken 1. *agaricinum* L.

De naadstreep der dekschilden is tot aan den voorrand duidelijk, buigt zich nabij de basis naar buiten om en bereikt minstens de helft van de halve basis van het halsschild 3

- 3 Lichaam zwart, het uiteinde der dekschilden zeer smal, geelachtig gezoomd. Het achtste sprietlid veel kleiner dan het zevende en negende; het vierde ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal, het vijfde en zesde driemaal zoo lang als het derde. Halsschild zeer fijn-, doch iets duidelijker bestippeld dan bij *agaricinum*. De naad der dekschilden dakvormig opgericht. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf. (*subalpinum* Reitt.) 1)

Lichaam min of meer roestrood of donker roodbruin, zelden diep zwart, het uiteinde der dekschilden lichter. Het achtste sprietlid slechts iets dunner dan-, doch nagenoeg even lang als het zevende of negende 4

- 4 Lichaam bruinzwart; het voorste gedeelte van den kop, de sprietwortel, min of meer de zijden van het halsschild, het pygidium (behalve gewoonlijk aan de basis), de laatste twee sterniten en de pooten bruingeel of geelrood; de dekschilden veelal van af het midden naar het uiteinde lichter gekleurd, en aan het uiteinde, alsook de epipleuren lichter geelrood. Sprieten lang en zeer dun, de voorlaatste twee leedjes ongeveer driemaal zoo lang als breed. Dekschilden dicht en vrij krachtig bestippeld. Soms komen geheel zwarte exemplaren voor, welke zeer op *agaricinum* gelijken, doch door de reeds aangegeven verschilpunten van elkaar te onderscheiden zijn. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Verspreid en niet zeldzaam op boomzwammen 2. *assimile* Er.

Lichaam roodbruin; de mond, de sprietwortel, de pooten en het uiteinde van het achterlijf lichter geelrood. Dekschilden vrij sterk-, doch enigszins verspreid bestippeld, naar het uiteinde lichter gekleurd. Sprieten korter dan bij *assimile*, de twee voorlaatste leedjes ongeveer dubbel zoo lang als breed, het achtste lid iets dunner dan bij *assimile*. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. In rottende boomzwammen. Zeer zeldzaam; enkele malen bij den Haag, Maart en Mei; ook bij St. Pieter (Maastricht), Aug. In de Rijnprov. bij Düsseldorf.

3. *boleti* Panz.

1) De soort ontving ik indertijd uit Düsseldorf van den Heer von Hojens onder den naam van *limbatum* Er.

XIX. Familie HISTERIDAE.

Deze familie (Fig. 38) bestaat uit meestal plomp gebouwde, tamelijk breede, soms eenigszins vierhoekige, bij uitzondering meer langwerpige of ook wel rondachtige, in den regel weinig-, soms meer gewelfde of wel zeer vlakke, gewoonlijk eenkleurige, glanzig

Fig. 38. Boven- en onderzijde van *Hister unicolor* L.
Naar Seidlitz. — Gewijzigd.

Fig. 39. Sprieten van
I. *Hister meridarius* Holm. Orig.
II. *Hister ferrugineus* Ol. Orig.

meestal met eenige langsstrepen. — Gevleugeld. De vleugels van *Hister* (Fig. 40) herinneren het meest aan die der Silphidae en zijn volgens *Roger* langwerpig en smal, in het topgedeelte zwartachtig gepigmenteerd; het gewricht is ver vóór het midden gelegen; daartegenover bevindt zich eene kleine zwarte pigmentvlek. Het topgedeelte is veel grooter dan het zeer kleine basaalgedeelte. De buitenste drie randaders loopen in het topgedeelte geheel onafgebroken door. De vena externo-media is rechthoekig en splitst zich op de hoogte van het gewricht vorksgewijs in twee takken, waarvan de binnenste rechthoekig tot aan den achterrand verloopt, de buitenste zwak aangeduid is; een naar buiten van deze gelegen, bijkomende tak (straalader) is sterk knievormig naar binnen gebogen. De vena interno-media is zwak aangeduid, met eene gewone zijader. Dwarsverbindingen ontbreken geheel. De achterrand is lauw gelobd. Bij sommige genera is het adernet meer of minder rudimentair. — Achterlijf met 5 sterniten, het eerste sterniet gewoonlijk zeer lang (bij *Hololepta* etc.); de laatste twee

Fig. 40. Vleugel van *Hister unicolor* L.
Naar Burmeister.

zijn zij eenkleurig bruin of rood, groenachtig, bronzig of met roode vlekken op de dekschilden. — Kop in de rust in het halsschild teruggetrokken, afhellend of verticaal, de monddeelen tegen den voorrand of eene kinplaat van het prosternum min of meer aangedrukt; bij het genus *Hololepta* daarentegen is de kop niet in het halsschild teruggetrokken, doch horizontaal vooruitstekend en zijn de monddeelen niet door het prosternum bedekt. — Sprieten onder den zijrand van het voorhoofd, tusschen de oogen en de basis der voorakken, bij de *Abracini* op het voorhoofd naast

den binnenrand der oogen, ingeplant; geknikt, 11-ledig, het eerste lid lang en dik, met sterk ingedrongen 3-ledigen eindknop (Fig. 39, I), welke veelal in een daartoe bestemd groefje aan de onderzijde van het halsschild inlegbaar is; bij *Heraerius* zijn de sprieten 9-ledig, en is de eindknop cilindervormig, zonder duidelijke leedjes (Fig. 39, II). — Voorakken gewoonlijk duidelijk vooruitstekend. Achterkaken tweelobbig, meestal de beide lobben vliezig of hoornachtig (*Carcinops* en *Paromalus*), of wel de buitenste lob hoornachtig en de binnenste vliezig (*Platysoma*); bij *Teretrius* is de buitenste lob vliezig; bij *Hololepta* is de binnenste achterkaaks-lob zeer kort. Kin hoornachtig, de tong vliezig, de paraglossen duidelijk. Kaaktasters 4-, liptasters 3-ledig. — Halsschild aan de voorzijde nitgerand, met den achterrand volkomen tegen de dekschilden aansluitend. Schildje klein of zeer klein, bij *Paromalus* ontbrekend. — Dekschilden verkort en afgeknot, het pygidium en propygidium onbedekt latend, met verschillende sculptuur,

pygidium en propygidium) niet door de dekschilden bedekt; van deze is het laatste zeer klein. Pooten gewoonlijk kort, breed en sterk ineengedrongen; zij worden als met rukken bewoogd, meestal in daarvoor bestemde groeven ingelegd; de voorpooten zijn tot graven ingericht; de voorschienen op de binnenzijde gewoonlijk met eene groef tot het inleggen der tarsen, de achterbenen veelal met in rijen geplaatste doorntjes. — Voorcoxae groot, in de breedte cylindervormig of eenigszins vierhoekig, niet ver vaneenstaande. Achtercoxae meer eivormig, ver van elkaar verwijderd en door eene breede voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. — Tarsen zeer dun, cylindervormig, kort, 5-ledig; soms de achtertarsen 4-ledig (*Acritus*).

De larve van *Hister meridarius* is langwerpig, cylindervormig, uit 12 ringen samengesteld; met uitzondering van den hoornachtigen, pekbrainen kop en den daaropvolgenden ring vliezig en vuilwit. Sprieten 4-ledig. Kaken krachtig. Geen ocellen. Uiteinde van het achterlijf met twee gelede aanhangsels. Zes korte, uit 5 ledjes bestaande pooten, met één enkelen klauw.

De Histeridae leven met hare larven in aas, rottende dierlijke en plantaardige overblijfselen, mest, zeldzamer in paddestoelen, achter boomschors of als gasten bij mieren. Zij bewegen zich langzaam en trekken bij gevaar kop en pooten in. De grootere soorten (*Hister*) maken jacht op de zich in mest bevindende *Aphodii*. Overigens voeden zij zich met allerlei rottende stoffen.

Overzicht der Tribus.

- 1 Kop niet in het halsschild terugtrekbaar, horizontaal vooruitstekend, van onderen over de geheele lengte zichtbaar; de monddeelen niet door het prosternum bedekt. Eerste sterniet kort. Lichaam zeer vlak I. **Hololeptini**.
- Kop in de rust in het halsschild teruggetrokken, afhellend of verticaal; de monddeelen min of meer tegen den voorrand van het prosternum aangedrukt. Eerste sterniet zeer lang, veelal zoo lang als de overige sternieten te zamen 2
- 2 Sprieten onder den zijrand van het voorhoofd, tusschen de oogen en de basis der voor-kaken, ingeplant 3
- Sprieten op het voorhoofd, naast den binnenrand der oogen, ingeplant V. **Abracini**.
- 3 Prosternum met eene kinplaat, welke door eene lijne dwarslijn van de prosternale voortzetting gescheiden is en de monddeelen aan de onderzijde bedekt. Dekschilden met aan den zijrand evenwijdige strepen of wel zonder duidelijke strepen, ook wel met eenige andere sculptuur. 4
- Prosternum zonder kinplaat, de monddeelen tegen den voorrand van het prosternum aanstootend. Kop verticaal geplaatst. Dekschilden met meer of minder schuin tegen den zijrand verloopende strepen IV. **Saprinini**.
- 4 Sprietknoos rond of ovaal, bij uitzondering afgeknot, duidelijk geleed, kort en dicht behaard en bovendien veelal met enkele langere haartjes bezet II. **Histerini**.
- Sprietknoos cylindervormig, naar het uiteinde iets verdikt en afgeknot, zonder duidelijke ledjes, onbehaard en glad, hoogstens met enkele langere haartjes bezet . . III **Heterini**.

I. Tribus HOLOLEPTINI.

Bevat slechts het genus (Hololepta.)

II. Tribus HISTERINI.

- 1 Sprietgroeven op de onderzijde aan den voorrand van het halsschild gelegen, gedeeltelijk door de brede kinplaat overdekt, zonder sleuf vooraan naast het prosternum 2
- Sprietgroeven meestal van den voorrand van het halsschild verwijderd, aan weerszijden aan den voorrand van het prosternum, naast de smalle kinplaat, met eene sleuf, waardoor de sprieten in de onbedekte sprietgroeven gestoken worden 4
- Voorschienen op de binnenzijde met eene S-vormig gebogen, aan weerszijden scherp begrensde groef tot het inleggen der tarsen. Lichaam meer of minder vlak en meestal langwerpig. 1. **Platysoma**.
- Voorschienen op de binnenzijde met eene rechte, slechts aan den binnenkant scherp begrensde groef tot het inleggen der tarsen. Lichaam min of meer gewelfd en kort, bij uitzondering langwerpig 3
- 3 Sprietgroeven in de nitgesneden voorhoeken van het halsschild gelegen. Prosternum met verscheidene langsgroeven. Dekschilden weinig verkort, met langscribben . . . (Glymma.)
- Sprietgroeven op de onderzijde van de niet nitgesneden voorhoeken van het halsschild gelegen.

Dekschilden elk met 6 langsstrepen tusschen den naad en den schouder, van welke de eerste 3 meestal afgekort zijn of ontbreken; met eene lijne, schuine schouderlijn en twee randstrepen naast den zijrand, van welke hetzij de eene hetzij de andere afgekort is of ontbreekt. Halsschild met 1 of 2 zijstrepen. 2. **Hister**.

4 Alle schenen aan den buitenrand sterk verbreed. Sprietknots afgeknoot. Kinplaat van het prosternum kort. Dekschilden gestreept. Schildje zichtbaar 3. **Dendrophilus**.

Slechts de voorschenen sterk verbreed en gekromd, de achterschenen smal. Sprietknots ovaal. Kinplaat van het prosternum lang 5

5 Dekschilden met meer of minder diepe, doorlopende langsstrepen. Schildje zichtbaar. Voorschenen slechts aan den buitenrand verbreed 4. **Carcinops**.

Dekschilden bestippeld, hoogstens met eene afgekorte naadstreep; overigens slechts met zeer geringe sporen van strepen. Schildje ontbreekt. Voorschenen naar binnen en naar buiten verbreed, kamvormig getand en iets gedraaid. Lichaam tamelijk vlak en met parallelle zijden 5. **Paromalus**.

III. Tribus HETAEINI.

Bevat slechts het genus 6. **Hetaerius**.

IV. Tribus SAPRINI.

1 Schenen breed; de voorschenen met eene tarsaalgroef en aan den buitenrand duidelijk getand. Bovenzijde geheel of gedeeltelijk bestippeld. Dekschilden met zeer duidelijke strepen. 2

Schenen smal; de voorschenen zonder tarsaalgroef, aan den buitenrand met enkele doortjes; de achterschenen zonder doortjes. Bovenzijde niet bestippeld, eenigszins mat. Dekschilden met uiterst lijne rugstrepen 9. **Myrmetes**.

2 Kop met eene dwarsstreep vóóran tusschen de oogen. Achterschenen krachtig gedoord. Dekschilden met duidelijke strepen en gewoonlijk alleen van achteren bestippeld, van voren met eene spiegelgladde ruimte. Voorschenen op gelijke- of naar de basis steeds kleiner wordende afstanden getand. Epipleuren der dekschilden met twee strepen. 7. **Saprinus**.

Kop zonder dwarsstreep tusschen de oogen. Achterschenen zeer weinig gedoord. Dekschilden met strepen, doch zonder spiegelgladde ruimte. Voorschenen tusschen den tweeden en derden tand met eene grootere tusschenruimte. Naadstreep hoogstens op de voorhelft der dekschilden duidelijk. Epipleuren der dekschilden met 3 strepen 8. **Gnathoneus**.

V. Tribus ABRAEINI.

1 Lichaam langgestrekt, cylindervormig. Dekschilden zonder strepen. Achterschenen duidelijk gedoord. Voorschenen zeer breed, met getanden buitenrand (Teretrius.)

Lichaam langer- of korter-ovaal, of rondachtig 2

2 Halsschild en dekschilden zonder langscribben 3

Halsschild en dekschilden met langscribben. Pooten lang en smal. Sprietgroeven evenwijdig aan den voorrand van het halsschild. Eene zeer kleine kinplaat voorhanden 13. **Onthophilus**.

3 Halsschild langs de zijden stompkantig opgericht. Sprietgroeven iets dichter nabij het prosternum dan nabij den zijrand van het halsschild. Lichaam langer- of korter-ovaal. Dekschilden met zeer flauwe aanduiding van strepen 10. **Plegaderus**.

Halsschild langs de zijden niet stompkantig opgericht. Lichaam rondachtig, bij uitzondering ovaal, eenigzins lang-vierhoekig. Sprietgroeven dichter nabij de zijden van het halsschild, dan nabij die van het prosternum 4

4 Alle tarsen 5-ledig. Lichaam meer of minder kogelvormig geweld 5

Achtertarsen 4-ledig. Lichaam vlakker geweld. Schildje uiterst klein 12. **Acritus**.

5 Schildje uiterst klein, nauwelijks zichtbaar. Dekschilden zonder randstreep. Prosternum zonder kinplaat 11. **Abraeus**.

Schildje ontbreekt. Prosternum met eene kinplaat. Dekschilden met eene randstreep. (Bacanius).

I. Tribus HOLOLEPTINI.

Hololepta Payk.

Lichaam zeer vlak. Kop niet in het halsschild terugtrekbaar, horizontaal vooruitstekend, van onderen over de geheele lengte zichtbaar; de monddeelen niet door het prosternum bedekt. Voorkaken vooruitstekend. Achterkaken met twee vliezige lobben, van welke de binnenste zeer kort is. Kaaktasters de lobben nauwelijks overschrijdend. Tong gespleten. Liptasters de tong overschrijdend. Schildje zeer klein. Het eerste sterniet kort. Voorscheneen aan de buitenzijde met 4 tanden.

De enige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam eenigszins langwerpig-vierhoekig, geheel glanzig zwart. Dekschilden met afgekorte schouderstreep. Voorscheneen met 4 duidelijke tanden. Lengte 7-8 mm. Achter schors van oude populieren. Niet inh. in de Rijnprov. bij Aken. (Plana Fuessly)

II. Tribus HISTERINI.

1. Platysoma Leach.

*Kop in de rust in het halsschild teruggetrokken, de monddeelen min of meer tegen den voorrand van het prosternum aangedrukt. Sprietgroeven aan de onderzijde van den voorrand van het halsschild gelegen, gedeeltelijk door de breede kinplaat overdekt, zonder sleuf vooraan naast het prosternum. Voorkaken vooruitstekend. Achterkaken met twee gebaarde lobben, de buitenste hoornachtig, de binnenste vliezig. Eindlid der kaaktasters veel langer dan het voorlaatste lid, dat der liptasters slechts weinig langer. Voorscheneen op de binnenzijde met eene S-vormig gebogen, aan weerszijden scherp begrensde groef tot het inleggen der tarsen. Scheneen aan den buitenrand getand. Eerste sterniet zeer lang. Lichaam meer of minder vlak en meestal langwerpig; glanzig zwart, soms kastanjebruin. — De soorten van dit genus leven achter boomschors. — De larve en pop van *P. oblongum* is door Perris en de larve van *P. compressum* door Schiodte beschreven.*

Van de 9 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Lichaam over het midden duidelijk gewelfd, met den habitus van *Hister bimaculatus*, aan de zijden iets afgerond. Halsschild aan de basis duidelijk afgerond. Metasternum naast de episternen, aan weerszijden met eene langstreep. Dekschilden met 6 rugstrepen, van welke de eerste 3 afgekort zijn; veelal ontbreekt de eerste geheel. De zijden van het halsschild zijn naast de randstreep iets verdiept en dicht-, eenigszins rimpelig bestippeld. Middelscheneen met 5-, de achterscheneen met 4 tandjes. Lengte 3-4 mm. Van Maart tot October achter de schors van doode boomen, vooral van beuken en elzen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Westfalen. (frontale Payk.)

Lichaam van boven tanelijk vlak, met meer of minder parallele zijden. Basis van het halsschild nagenoeg recht. Metasternum aan weerszijden met twee langstrepen 2

- 2 Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang, met afgeronde zijden. Lichaam $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed. De vierde tot zesde rugstreep der dekschilden geheel ontwikkeld en aan de basis sterk naar binnen gekromd, de derde zeer kort; de eerste en gewoonlijk ook de tweede geheel ontbrekend. Sommige exemplaren zijn donker kastanjebruin. Lengte 3-3½ mm. Van Maart tot October achter de schors van eiken, beuken en berken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. Ook in Westfalen.

(depressum F.) (compressum Herbst)

Halsschild hoogstens $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, met parallele zijden. Lichaam minstens dubbel zoo lang als breed. 3

- 3 Mesosternum van voren niet gerand. Pygidium en propygidium grof bestippeld 4

Mesosternum van voren gerand. Pygidium en propygidium fijn en verspreid bestippeld. De buitenste vier langstrepen der dekschilden zijn geheel ontwikkeld, de eerste twee afgekort,

de tweede gewoonlijk minder ver naar voren reikend dan de eerste. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Achter dennenschors. In Noord-Duitschland bij Harburg.

(oblongum Ill., angustatum Payk.) (lineare Er.)

- 4 Lichaam dubbel zoo lang als breed. De eerste 3 langstrepen der dekschilden afgekort, de buitenste 3 geheel ontwikkeld. Pygidium en propygidium met navelstippels bezet. Lengte $4\frac{1}{2}$ —4 mm. In dennenstronken en in vochtigen molen, achter beuken- en eikenschors. Het ♀ legt in Mei hare eieren in de gangen van *Tomicus stenographus* tusschen de eieren van dezen schorskever; de larven verslinden de *Tomicus*-eieren. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken; ook in België en Westfalen (oblongum F.)

Lichaam meer dan dubbel zoo lang als breed. De eerste 2 langstrepen op de dekschilden afgekort, de buitenste 4 geheel ontwikkeld. Pygidium en propygidium met gewone stippels bezet. Sommige exemplaren zijn donker kastanjebruin. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Van Mei tot Sept., vooral achter eikenschors. Arnhem en Aalten. In de Rijnprov. bij Aken; ook in België 1. **angustatum** Hoffm.

Glymma Marseul.

Sprietgroeven in de uitgesneden voorhoeken van het halsschild gelegen. Prosternum sterk naar voren gericht, met verscheidene langsgroeven. Halsschild breed, met 6 kielvormig verheven, door diepe, gladde groeven gescheiden langscribben. Dekschilden weinig verkort, behalve de kielvormig opgerichte naad- en zijrand, elk met 3 langscribben, tusschen welke zich eene dubbele stippelrij bevindt. Voorschonen op de binnenzijde met eene rechte, slechts aan den binnenkant scherp begrensde groef tot het inleggen der tarsen. Lichaam eenigszins langwerpig, met tamelijk parallele zijden, min of meer gewelfd.

De eenige soort van dit genus werd in België bij Luik in een brocibak voor meloenen aangetroffen en is wellicht uit de tropen ingevoerd.

Lichaam roestrood. Lengte 1 mm. Ik zag een exemplaar uit het Leidsch Museum.

(Candèze et Mars.)

2. Hister Linné.

*Kop terugtrekbaar, aan de onderzijde door eene afgeronde voortzetting van het prosternum bedekt. Sprietgroeven op de onderzijde van de niet uitgesneden voorhoeken van het halsschild gelegen. Voorkaken vooruitstekend; de achterkaken met twee vliesige lobben, welke overal of slechts aan den binnenrand gebaard zijn. Halsschild met een of twee zijstrepen. Dekschilden elk met 6 langstrepen tusschen den naad en den schouder, van welke de eerste 3 meestal afgekort zijn of ontbreken; met eene fijne, schuine schouderlijn en twee randstrepen naast den zijrand, van welke hetzij de eene, hetzij de andere afgekort is of ontbreekt. Prosternum aan den achterrand recht afgeknut of in eene afgeronde voortzetting verbreed. Achterschonen met in rijen geplaatste doornjes. Lichaam tamelijk dik, meestal eenkleurig, glanzig zwart, zeldzamer roodbruin, of wel zwart met roode vlekken op de dekschilden. — De soorten van dit genus leven, evenals hare larven, in mest en aas, zeldzamer in rottende paddestoelen en andere rottende plantenstoffen. Zij schijnen ook op andere insecten jacht te maken, o. a. op *Aphodii* 1) en zouden zelfs elkaar verslinden.*

De larven van H. quadrimaculatus en duodecimstriatus, alsook de pop van deze laatste soort, zijn door Perris, de larve van unicolor door de Marseul en Schiödte, de pop van unicolor door Schiödte, de larve van cadaverinus door Latreille en die van merdarius door Paykull beschreven.

Van de ± 50 Europeesche soorten komen 18 in Nederland en 7 in het aangrenzende gebied voor.

1) Volgens Bodel verslindt H. Hoffm. Truppi de larven van *Agelastica alni* L.

- 1 Prosternale voortzetting van achteren afgerond, in eene uitranding van het mesosternum opgaend (Sub-gen. *Hister* isp.) 2
- Prosternale voortzetting van achteren recht afgeknut, tegen het recht afgeknutte of iets afgeronde mesosternum aanstootend. Bovenzijde der voorkaken vlak of uitgehold en door een scherpen of stompen kant begrensd (Sub-gen. *Atholus* Thoms.) 22
- 2 Sprietgroeven op de onderzijde van het halsschild ondiep, naar binnen slechts door de kinplaat scherpkantig begrensd 3
- Sprietgroeven diep ingesneden en nagenoeg tot aan het uiteinde der voorhoeken van het halsschild scherpkantig begrensd 5
- 3 Episternen van den prothorax dicht bestippeld en behaard. De binnenste randstreep der dekschilden aangeduid, de buitenste ontbreekt. Glanzig zwart, de dekschilden met eene groote, van af de basis tot achter het midden gekromde, soms in tweeën gedeelde (abc. *scapularis* Fisch.) ronde vlek; de abc. *gagates* Ill. (*aethiops* Heer) is geheel zwart. De buitenste randstreep van het halsschild is sterk afgekort. Voorschenen aan den top met een onverdeelde tand. Lengte 8—11 mm. In mest. Niet inlandsch. In België bij Maesyeck; in de Rijnprov. bij Düsseldorf en Elberfeld; in Westfalen bij Dortmund. De abc. *gagates* zou in België en bij Dortmund voorkomen. (*quadrimaculatus* L.)
- Episternen van den prothorax verspreid en fijn bestippeld, onbehaard. Lichaam met sterk afgeronde zijden. Halsschild met twee randstrepen 4
- 4 Kinplaat van het prosternum toegespitst. De buitenste randstreep van het halsschild afgekort. Dekschilden met eene binnenste en eene afgekorte buitenste randstreep; de eerste 3 langstrepen slechts aan het uiteinde aangeduid. Lichaam eenkleurig zwart. Voorschenen met 3 tanden. Lengte $6\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen in mest, aas en rottende plantenstoffen.
1. **uicolor** L.
- Kinplaat van het prosternum uitgerand. De beide randstrepen van het halsschild geheel ontwikkeld. Dekschilden gewoonlijk zonder randstreep, de eerste 3 strepen ontbreken geheel. Op elk der dekschilden eene roode schouder- en eene roode middenvlek, welke veelal incenvloeden. Lengte $5\frac{1}{2}$ —8 mm. Vrij zeldzaam; in schapenmest en aan aas. Arnheim, Nijmegen, Roosteren, Venlo, Roermond en Limmel bij Maastricht; Mei, Juni.
2. **quadrinotatus** Scriba.
- 5 De buitenste randstreep der dekschilden duidelijk, hetzij geheel ontwikkeld, hetzij van voren of van achteren afgekort; de binnenste randstreep komt slechts bij uitzondering voor. Bovenzijde der voorkaken afgerond, zonder scherpen kant. 6
- De buitenste randstreep der dekschilden ontbreekt, de binnenste is hoogstens rudimentair 20
- 6 Halsschild met twee randstrepen 7
- Halsschild slechts met eene randstreep 11
- 7 De eerste 3 langstrepen der dekschilden slechts van achteren aangeduid of geheel ontbrekend. De buitenste randstreep reikt tot aan het midden. De uitholling der epipleuren van de dekschilden onbestippeld. Voorschenen met 3 krachtige tanden, soms nog met een vierden, kleineren tand. Lengte 6— $6\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld; in Oldenburg en bij Dortmund in Westfalen (*terricola* Germ.)
- De eerste 2 langstrepen der dekschilden zijn afgekort, de derde reikt naar voren tot over het midden. De buitenste randstreep van het halsschild reikt meestal tot aan de basis. De uitholling der epipleuren van de dekschilden duidelijk bestippeld. Voorschenen met 4 tot 6 kleine tandjes 8
- 8 Lichaam rondachtig, sterk gewelfd. De randstrepen van het halsschild zijn recht en verlopen parallel aan elkaar. Epipleuren onbestippeld. Pygidium en propygidium gelijkmatig grof en verspreid bestippeld. Mesosternum zeer vlak uitgerand. Voorschenen met 4 of 5, naar het uiteinde grootere tanden. Lengte 4— $5\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnprov. bij Abweiler in groot aantal onder een hoop koehaar als mest op een veld aangetroffen zijn. Mij onbekend (*distinctus* Er.)
- Lichaam langer- of korter-ovaal, matig gewelfd. De binnenste randstreep van het halsschild buigt zich van achteren naar de buitenste toe. Epipleuren bestippeld. Pygidium fijner en steeds dichter bestippeld dan het propygidium. Mesosternum vrij diep uitgerand 9
- 9 Lichaam langwerpig-ovaal, eenigszins vierhoekig, naar voren en naar achteren slechts zeer weinig versmald; zwart, soms lichter of donkerder roodbruin. De voorste groote tand der voorschenen in den regel dubbel, daarvoor staat nog een meer of minder duidelijk klein tandje. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Verbreid doch niet gemeen in hoedermest, menschen-uitwerpselen, rottende plantenstoffen, zeldzamer in koemest. 3. **merdarius** Hoffm.
- Lichaam aan de zijden sterk afgerond, naar voren en naar achteren sterk versmald 10

- 10 Kinplaat van het prosternum van voren nagenoeg recht afgeknot. Voorhoofds-dwarslijn gewoon gebogen, in het midden soms onduidelijk. Pygidium en propygidium nagenoeg alleen grof bestippeld, daartusschen slechts met eene uiterst fijne bestippeling. Dekschilden met niet zeer dicht bestippelde epipleuren. Soms bevindt zich op de binnenhelft van de basis der dekschilden een kort, diep streepje (abs. *striola* Sahlb., met het type). Lichaam geheel zwart of lichter- of donkerder roodbruin (abs. *brunneus* Ill.). Kleine exemplaren met twee kleine indrukken op het halsschild vormen ab. **impressus* F. Lengte 5½–9 mm. Zeer gemeen in mest, aas, rottende paddestoelen en bij uitzondering aan uitvloeiende boomsappen 4. *cadaverinus* Hollm.

Kinplaat van het prosternum afgerond. Voorhoofds-dwarslijn in het midden met een inspringenden hoek. Pygidium en propygidium duidelijk, grof en lijn dooreen, bestippeld. Dekschilden met dicht- en eenigszins rimpelig bestippelde epipleuren. Overigens gelijkij deze soort zeer op *cadaverinus*. Lengte 5½–7 mm. Eenmaal in groot aantal bij Patten (Gelderland) in Juni, in een in den grond gegraven pot met zuur bier gevangen; ook bij Vorden, Sept. In de Rijnprov. bij Cleef en Elberfeld; in België bij Fleurus en Schooten.

5. *succicola* Thoms.

- 11 Epipleuren der dekschilden zonder duidelijke langstreep, diep uitgehold en in de uitholling duidelijk en diep bestippeld. De randstreep der dekschilden tot aan het uiteinde reikende . 12

Epipleuren door eene diepe langstreep in twee deelen gedeeld, meestal vlak of weinig uitgehold en niet of slechts weinig en niet diep, doch duidelijk bestippeld 17

- 12 Kinplaat van het prosternum slechts aan het uiteinde met eene fijne randlijn, geheel glad, slechts aan de zijden lijn bestippeld. De uitholling van de epipleuren der dekschilden verspreid bestippeld. De derde langstreep der dekschilden reikt in den regel slechts tot aan het midden, zelden iets daarover. De randstreep van het halsschild recht en tamelijk ver van den zijrand verwijderd. Lichaam nagenoeg cirkelvormig. Overigens zeer verwant aan *carbonarius*. Lengte 4–5½ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam in koemest 6. *ventralis* Mars.

Kinplaat tot aan de basis met eene diepe randlijn. De derde langstreep der dekschilden reikt gewoonlijk tot over het midden naar voren of loopt tot bijna aan de basis door. De randstreep van het halsschild dichter bij den zijrand gelegen 13

- 13 Lichaam kort en breed. Halsschild naar voren sterk afgerond-versmald. 14

Lichaam langwerpig-ovaal, eenigszins vierhoekig, zwart of donker kastanjebruin. Halsschild naar voren weinig afgerond-versmald, met eene nagenoeg rechte, of hoogstens in 't midden iets naar binnen gebogen randstreep. De derde langstreep der dekschilden loopt tot iets over het midden of tot bijna aan de basis door. De uitholling van de epipleuren der dekschilden zeer dicht bestippeld. Voorschenen aan den buitenrand met 6 tandjes. Lengte 6–7 mm. Gemeen in menschen-uitwerpselen en onder rottende plantenstoffen.

9. *neglectus* Germ.

- 14 De randstreep van het halsschild loopt nagenoeg tot aan den achterrand door. Aan de basis der dekschilden bevindt zich een rudiment der tweede rugstreep, gerekend van af den naad. Tandjes der voorschenen zeer klein. Sprietknots rood. Uitholling van de epipleuren der dekschilden lijn en verspreid bestippeld. De derde langstreep der dekschilden reikt tot aan de basis. Lichaam zwart, soms eenigszins bruinachtig. Voorschenen met 5 tandjes, soms schijnbaar met 6, naarmate de top afgerond of spits is. Lengte 3½–4½ mm. In de nesten van *Lasius fuliginosus*, waarin zij volgens *Wasmann* als een indifferent gedulden gast wordt aangetroffen. Niet inl. Zij zou in België bij Schaarbeck en Fleurus gevangen zijn. (myrmecophilus Muls.) (ruficornis Grimm.) 1)

De randstreep van het halsschild op eenigen afstand van den achterrand afgekort. Aan de basis der dekschilden zonder eenige aanduiding van de tweede rugstreep. Tandjes der voorschenen vrij krachtig 15

- 15 Pygidium en propygidium, alsmede de epipleuren der dekschilden, matig dicht en sterk bestippeld. Sprietknots zwartachtig. De ruimte tusschen de randlijn en den zijrand van het halsschild iets gewelfd. Voorschenen aan den buitenrand met 5 tandjes. Lengte 3–5 mm. Vrij gemeen in mest, aas en andere rottende stoffen. 7. *carbonarius* Hollm.

Pygidium en propygidium, alsmede de epipleuren der dekschilden, zeer dicht en grof bestippeld 16

- 16 Dekschilden met vier geheel doorlopende rugstrepen. Prosternum met twee korte, zelden ontbrekende langstrepen. Sprietknots roodachtig. Dekschilden tamelijk gewelfd. Overigens

1) De uit Breda en Loschode opgegeven exemplaren behooren tot *stigmatus* Mars.

- Verwant aan *ruticornis*. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. In rottende paddestoelen. Breda en Bieschedé; Juni, Aug. (*nigellatus* Mars.) 8. **stigmus** Mars.
- Dekschilden slechts met drie geheel doorlopende rugstrepen. Prosternum zonder strepen. Sprietknots zwartachtig. Overigens aan *ventralis* verwant. Lengte 5 — $6\frac{1}{2}$ mm. In aas. Niet inl. In de geheele „Faune Gallo-Rhénane” (*ignobilis* Mars.)
- 17 De randstreep der dekschilden slechts van voren aangeduid; de derde langstreep zeer kort; de epipleuren onbestippeld. Lichaam langwerpig-ovaal, eenigszins vierhoekig, met weinig afgeronde zijden. Voorschenen met 4 of 5 tandjes. Lengte 4 — $5\frac{1}{2}$ mm. In koemest en op mestvaalten, niet zeldzaam in de diluviale streken en Limburg; ook eenmaal bij Bloemendaal. 10. **stercorarius** Hoffm.
- De randstreep der dekschilden loopt geheel door 18
- 18 Lichaam eenigszins vierhoekig. Dekschilden met eene helderroode, eenigszins uitgezakte vlek op het midden; de tweede langstreep ontbreekt geheel. Voorschenen met 4 tanden. Lengte $5\frac{1}{2}$ — 8 mm. Niet zeldzaam in koemest, vooral in heideachtige streken; ook in aantal bij Haarlem en bij Koudekerke op Walcheren. (*sinuatus* F., Illigeri Dfts.) 11. **finetarius** Herbst.
- Lichaam rondachtig, eenkleurig zwart of met eene niet scherp begrensde, donkerroode vlek op elk der dekschilden. De tweede langstreep der dekschilden kort. 19
- 19 Epipleuren der dekschilden nagenoeg, of geheel onbestippeld. Dekschilden met eene onduidelijk begrensde, donkerroode vlek, welke soms de geheele dekschilden inneemt. Soms is de geheele kever roodbruin (*abc. brunneus* Herbst), zeldzamer geheel zwart (*abc. niger* Er.). De eerste twee langstrepen der dekschilden afgekort. Voorschenen met 5 tandjes. De zwarte aberratie gelijkt zeer op *carbonarius*, doch onderscheidt zich door de onbestippelde uitholling van de epipleuren der dekschilden. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam onder rottende bladeren en op mestvaalten. De *abc. brunneus* met het type; de *abc. niger* bij den Haag, Nootdorp, Rotterdam, Breda en Eethen. 12. **purpurascens** Herbst.
- Epipleuren der dekschilden duidelijk bestippeld. Dekschilden geheel zwart. Halsschild aan de binnenzijde der randstreep ingedrukt en bestippeld, zoodat de ruimte langs den zijrand boltig opgericht is. De eerste en derde langstreep der dekschilden reiken nagenoeg tot aan de basis. Lengte $4\frac{1}{2}$ — 5 mm. Onder rottende bladeren. Eenmaal bij Breda. In Oost-Friesland en in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. 13. **marginatus** Er.
- 20 Bovenzijde der voorkaken gewelfd en afgerond, zonder scherpen zijrand. De buitenste randstreep van het halsschild kort 21
- Bovenzijde der voorkaken vlak of eenigszins uitgehold, met scherpen zijrand. De eerste twee langstrepen der dekschilden afgekort 1). Sprietknots lichtrood. Voorschenen met 5 tandjes. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam op mestvaalten, op wegen en tusschen rottende plantestoffen 15. **bissexstriatus** F.
- 21 De binnenste randstreep der dekschilden ontbreekt geheel. Dekschilden met eene groote helderroode, hoekige vlek, welke van af den schouder tot achter het midden verloopt. De eerste drie langstrepen afgekort of ontbrekend. De binnenste randstreep van het halsschild loopt evenwijdig aan den zijrand. Lengte 6 — $3\frac{1}{2}$ mm. In koemest en op mestvaalten. Niet inlandsch. Volgens *Faurel* in de geheele „Faune Gallo-rhénane”. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (*sinuatus* Ill.) (*uncinatus* Ill.)
- De binnenste randstreep der dekschilden slechts aan het uiteinde door een rudiment aangeduid. Dekschilden eenkleurig zwart, de eerste twee langstrepen afgekort. Het voorste gedeelte der binnenste randstreep van het halsschild verloopt schuin binnenwaarts. Voorschenen met 3 tanden, van welke de eerste dubbel is. De voorhoeken van het halsschild, binnen de binnenste randstreep, lijn bestippeld. Lengte 5 — $6\frac{1}{2}$ mm. Onder rottend aardappelloop en in schapenmest. In aantal bij St. Oedenrode; ook bij Nijmegen, Winterswijk en Houthem (Limb.). In België bij Antwerpen en in Westfalen. 14. **helluo** Truqui.
- 22 Pygidium vlak, evenals het propygidium tamelijk grof bestippeld. De eerste twee langstrepen der dekschilden afgekort; de randstrepen ontbreken beiden, of van de buitenste is slechts een rudiment in het midden aanwezig. Voorschenen aan den buitenrand met 4 tot 6 kleine tandjes. Lengte 3 — 5 mm. Zeer zeldzaam. Bergen-op-Zoom, Zierikzee, Dieren, Roosteren en Maastricht. 16. **corvinus** Germ.
- Pygidium sterk gewelfd, evenals het propygidium lijn en verspreid bestippeld. Hoogstens de eerste langstreep der dekschilden afgekort. De uitholling der epipleuren zeer klein 23
- 23 Alle langstrepen der dekschilden loopen geheel door, de eerste twee zijn van voren ver-

1) Bij *abc. niger* door den heer K. Kemper met het type op Foxel verzameld, zijn de eerste drie langstrepen der dekschilden afgekort, welk kenmerk eigen is aan de niet in ons gebied voorkomende *H. lunatus* Er. (*arenicola* Hs.), en welke een der voorkeuren van een toupen zijrand voorzien zijn.

bonden; soms is de eerste van voren, nabij de ombuiging van de tweede, een weinig uitgewischt. Lichaam eenkleurig zwart 24

De eerste langsstreep afgekort. Dekschilden zonder randstrepen, met eene van binnen scheef afgesneden, lichtroode vlek, welke het geheele uiteinde inneemt. Sprieten en pooten bruinrood. Voorschenen aan den buitenrand met 4 tandjes. Lengte 4—5½ mm. Niet zeldzaam op mestvaalten, in rottende paddestoelen en in plantenaafval. Eenmaal in groot aantal met *H. 12-striatus* in Juni, in eene broeikas van het Kon. Zoöl. Bot. Gen. te 's-Gravenhage 13. *bimaculatus* L. 1)

24 Dekschilden met eene in het midden aangeduide randstreep. Lichaam iets meer verkort en meer gewelfd; overigens als *12-striatus* en wellicht eene lokaal-variëteit. Men vindt deze soort nimmer met *12-striatus* samen. Lengte 4½—5 mm. Vooral in bergstreken. Niet inlandsch. (14-*striatus* Gylh.)

Dekschilden zonder randstreep, aan de zijden iets minder afgerond dan bij *14-striatus*. Zeer zelden is op de dekschilden een onduidelijk rood vlekje zichtbaar. Lengte 3½—5 mm. Niet zeldzaam in rottende plantenstoffen, koemest en op mestvaalten. 17. *12-striatus* Schrank.

3. *Dendrophilus* Leach.

Achterkaken met twee vliezige lobben, welke aan het uiteinde en aan den binnenrand, achter het uiteinde, gebaard zijn. Sprietknots afgeknut. Sprietgroeven meestal van den voorrand van het halsschild vertwijfeld; aan weerszijden aan den voorrand van het prosternum, naast de smalle, korte kinplaat, met eene sleuf, door welke de sprieten in de onbedekte sprietgroeven gestoken worden. Schildje zichtbaar. Dekschilden gestreept. Alle schenen aan den buitenrand sterk verbreed. — De soorten van dit genus leven in mierennesten.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Bovenzijde duidelijk en dicht bestippeld, zwart, een weinig glanzig. Sprieten en pooten roodbruin. Dekschilden met 4 duidelijke langsstrepen, van welke de binnensten iets afgekort zijn. Lengte 2½—3½ mm. Bij *Lasius fuliginosus*, in den molen van vruchthoopen en volgens *Wasmann* veelal in de nesten van *Vespa crabro*. Niet int. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf; ook in België (*punctatus* Herbst)

Bovenzijde dof, donkerbruin. Kop en halsschild niet bestippeld; de dekschilden uiterst fijn bestippeld en met 6 zeer fijne, iets verheven langsstrepen. Lengte 2½—3 mm. Gemeen in de nesten van *Formica rufa* en *pratensis*, Feb.—Nov. 1. *pygmaeus* L.

4. *Carcinops* Marseul.

*Voorkaken met een krachtigen tand achter het uiteinde. Achterkaken met twee hoornachtige, aan den binnenrand sterk gebaarde lobben; de binnenste lob veel dunner en korter en aan den top haakvormig omgebogen. Kaaktasters vrij lang, 3-ledig, het eindlid nagenoeg driemaal zoo lang als de voorafgaande ledjes. Sprietknots afgeknut. Kinplaat van het prosternum lang. Sprietgroeven als bij *Dendrophilus*. Schildje zichtbaar. Dekschilden met meer of minder diepe, doorlopende langsstrepen. Voorschenen slechts aan den buitenrand verbreed; de achterschenen smal. Lichaam ovaal. — De soorten van dit genus leven tusschen plantenaafval*

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Lichaam rondachtig, de bovenzijde overal duidelijk en dicht bestippeld. Kop zonder voorhoofdslijn (Sub-gen. *Cissister* Schmidt). De derde langsstreep der dekschilden buigt zich tegen het schildje aan; de eerste twee langsstrepen, benevens de randstreep, ontbreken. Pekzwart, met lichtere pooten. Lengte 1½—1¾ mm. Niet zeldzaam op de duinen tusschen plantenaafval en onder steenen; ook bij Leiden, Rijswijk, Noordorp, Zierikzee, Breda en op Texel. 1. *minima* Aubé.

1) In Zuid Europa zou van deze soort een geheel zwarte aberratie (*forma* Schmidt) voorkomen, welke echter niet in ons gebied is aangetroffen. Een uit Oldenzaal opgegeven exemplaar is *12-striatus*.

Lichaam ovaal; het halsschild uiterst fijn-, aan de zijden duidelijker-, de dekschilden aan het uiteinde duidelijk bestippeld. De voorhoofdlijn nabij den voorrand van den clypeus onafgebaar (Sub-gen. *Carcinops* isp.). De derde langsstreep niet tegen het schildje gebogen; de eerste twee en de randstreep geheel aangeduid, hoogstens de eerste afgekort. Pekzwart of pekbruin, met lichtere pooten. Lengte 2—2½ mm. Zeer zeldzaam, op de duinen bij Scheveningen in aardappelkuilen, Mei—Juli; ook bij Rotterdam. In België bij Antwerpen. Zij schijnt ook voor te komen in vermolmd boomstronken.

(pumilio Er.) 2. **14-striata** Steph.

5. *Paromalus* Erichs.

Sprietknots ovaal, platgedrukt. Voorkaken vooruitstekend, met een krachtigen tana achter het uiteinde. Achterkaken met twee hoornachtige, aan den binnenrand sterk gebaarde lobben; de binnenste lob veel dunner en korter, aan het uiteinde haakvormig omgebogen. Kin naar voren versmald, van voren uitgesneden. Tong hoornachtig, kort, afgeknut, in 't midden met een haarbundel. De paraglossen overschrijden nagenoeg het uiteinde van het tweede liptaster-lid en zijn aan den binnenrand lang bezwaimpd. Sprietgroeven als bij *Dendrophilus*. Schildje ontbreekt. Dekschilden bestippeld, hoogstens met eene afgekorte naadstreep, overigens slechts met zeer geringe sporen van strepen. Voorschienen naar binnen en naar buiten verbreed, kamvormig getand en iets gedraaid. Lichaam tamelijk vlak en met parallelle zijden. — De soorten van dit genus leven achter boomschors. — De larve van *P. flavicornis* is door Perris beschreven.

Van de 6 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

1 Lichaam breed ovaal, zeer vlak; glanzig zwart. Prosternum met twee langsstrepen. Mesosternum zonder dwarslijn, slechts met eene onderbroken randstreep. Halsschild naast den zijrand met eene verdiepte langsstreep, uiterst fijn bestippeld. Dekschilden vooral langs de zijden duidelijker bestippeld, zonder langsstreepjes. Lengte 3—3½ mm. Achter schors van doode eiken, beuken, berken en populieren; vooral in dikke populiertakken. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld (*complanatus* Panz.)

Lichaam smal, eenigszins gewelfd. Prosternum zonder langsstrepen. Mesosternum, behalve de randstreep, nog met eene lijne dwarslijn, welke uit drie naar voren concave, hockig samenkomende, gebogen streepjes bestaat. Halsschild met fijn gerande zijden, zonder randstreep 2

2 De zijden van het lichaam nagenoeg recht en parallel. De streepjes van de mesosternale dwarslijn zijn vrij sterk gebogen en komen scherphoekig samen. Lichaam zwart of bruin, de sprieten en pooten roodbruin. Dekschilden met eenige onduidelijke strepen langs de zijden. Lengte 2—2½ mm. In het voorjaar achter rottende boomschors en in molm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld (*parallelipipedus* Herbst)

De zijden van het iets meer gewelfde lichaam duidelijk afgerond, daardoor elliptisch. De streepjes van de mesosternale dwarslijn zijn zeer weinig gebogen (de middelste bijna recht) en komen stomphoekig samen. Zwart, sprieten en pooten roodbruin. Lengte 2—2½ mm. Vooral in den zomer achter schors van doode boomen. Arnhem, Winterswijk en Gronsveld (Limb.). In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf; in België bij Antwerpen en Huy.

1. **flavicornis** Herbst.

III. Tribus HETAEERIINI.

6. *Hetaerius* Erichs.

Sprieten Fig. 39, II) 9-ledig, van af het derde lid geleidelijk en sterk naar het uiteinde verdikt; het eerste lid zeer groot, aan de basis tot een gekromden steel versmald, naar het uiteinde sterk verbreed; het tweede lid aan den buitenrand ingeplant; de knots cilindervormig, naar het uiteinde iets verdikt en afgeknut, zonder duidelijke ledies, glad, hoogstens met enkele lange haartjes bezet. Voorkaken met sterk sikkelvormig gebogen top, aan den binnenrand in het midden met een afgeronden tand. Achterkaken met twee lobben; de buitenste aan den top- en daarachter dicht behaard, de binnenste zeer kort. Kaaktasters vrij dik, niet over de achterkaaks-lobben uitstekend. Sprietgroeven zeer diep, aan de voorhoeken van het prosternum gelegen. Schienen breed, aan den buitenrand met fijne doortjes bezet. Lichaam eenigszins vierhoekig. — De soorten van dit genus leven in mierennesten.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Roestkleurigrood, glanzig, hier en daar met fijne gele haartjes bestrooid, op de dekschilden eenigszins in rijen. Halsschild aan weerszijden met eene langsgroef, waarin twee fijne, verheven langslijnen. Dekschilden met eenige fijne langstrepen. Schenen sterk verbreed. Lengte $1\frac{1}{2}$ 1; mm. Bij *Formica sanguinea*, *fusca* en *Polyergus rufescens*, doch ook in de nesten van *Formica rufa*, *pratensis*, *exsecta* en *rufibarbis*, *Lasius fuliginosus*, *niger* en *flavus*, *Tapinoma erraticum* en *Myrmica scabrinodis*. Arnhem, Doorn, Roermond en Valkenburg. In België bij Marboie en in de Rijnprov. bij Cleef en Crefeld (*sesquicornis* Preysl.) 1. **ferrugineus** Oliv.

IV. Tribus SAPRINI.

7. *Saprinus* Erichs.

Kop met eene dwarsstreep vóóran tusschen de oogen. De mond onmiddellijk tegen den voorrand van het prosternum aanstootend. Eindlid der kaaktasters cilindervormig. Sprietgroeven langs de zijden van het prosternum gelegen. Dekschilden met duidelijke strepen en gewoonlijk alleen van achteren bestippeld, van voren met eene spiegelgladde ruimte. Epipleuren met twee strepen. Schenen breed. Voorschenen op gelijke of naar de basis steeds kleiner wordende afstanden getand. Achterschenen krachtig gedoord. — De soorten van dit genus zijn geheel zwart, groen of bronskleurig; zeldzamer roodachtig. Zij leven met hare larven in mest, aas en rottende paddestoelen. Enkele soorten treft men uitsluitend langs het zeestrand en in de zeeduinen aan. Eene korte mededeeling werd door Meinert over de larve van *S. nitidulus* gegeven.

Van de $\pm$ 70 Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 6 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Voorhoofd van voren zonder verheven dwarslijn, hoogstens door eene verdiepte dwarslijn van den clypeus gescheiden. Het prosternum uanelijk vlak en breed. Dekschilden aan het uiteinde in den regel met eene randstreep (*Sub-gen. Saprinus* L. sp.) 2
- Voorhoofd door eene verheven dwarslijn van den clypeus gescheiden. Het prosternum smalen kielvormig. Dekschilden aan het uiteinde in den regel zonder randstreep (*Sub-gen. Hypocaccus* Thoms.) 9
- 2 De zijden van het halsschild bewimperd. Dekschilden slechts op de achterhelft bestippeld, met duidelijke naadstreep en 4 schuin staande rugstrepen. Halsschild naast den zijrand met een dicht bestippelden langsindrak. Bovenzijde zwak, vooral de dekschilden meer donkergroen-achtig of blauwgroen. Lengte 6—8 mm. Niet inlandsch. Zij zou bij Düsseldorf voorkomen. (*semipunctatus* F.)
- De zijden van het halsschild niet bewimperd 3
- 3 De bestippeling der dekschilden reikt naar achteren tot aan de top-randstreep 4
- De bestippeling der dekschilden eindigt ver van de top-randstreep, zoodat een glanzige randzoom overblijft. Halsschild in 't midden nagenoeg onbestippeld. Dekschilden met eene naadstreep, eene schuin staande schouderstreep en 3 meer of minder duidelijke rugstrepen 7
- 4 Dekschilden behalve eene kleine spiegelvlek naast het schildje, benevens de schouderhuil, dicht rimpelig bestippeld en mat. Lichaam zwart. Halsschild op het midden lijn en duidelijk, aan de zijden zeer grof bestippeld. Lengte 4—5 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en Elberfeld, in de nesten van *Hirundo riparia*. (*rugifer* Payk.)
- Dekschilden op de achterhelft niet dicht bestippeld en ook op dit gedeelte glanzig 5
- 5 Halsschild op het midden nagenoeg onbestippeld. Op de dekschilden het gedeelte van af den naad tot aan de derde rugstreep op de voorhelft spiegelglad. Bovenzijde bronzig-zwart. De naadstreep der dekschilden in den regel slechts in 't midden aangeduid. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 $\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen aan aas, zeldzamer in mest. 1. **nitidulus** Payk.
- Halsschild ook op het midden duidelijk bestippeld 6
- 6 Dekschilden, behalve de schoudervlek en eene spiegelvlek, van af den naad tot op de eerste rugstreep, overal vrij dicht bestippeld. Bovenzijde groen of blauwachtig-groen, metaalglanzig. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Meermalen in de omstreken van Maastricht, Juni, Juli; ook bij Zutphen. In de Rijnprov. bij Crefeld. 2. **virescens** Payk.

- Dekschilden slechts op de achterhelft meer verspreid bestippeld, de voorhelft geheel onbestippeld. Bovenzijde zwart. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Niet inlandsch. In Noord- en Middel-Europa (Fautus Er.)
- 7 Dekschilden elk met eene groote, van af den naad tot aan de eerste rugstreep reikende spiegelvlek, benevens eene kleine, slechts half zoo lange spiegelvlek tusschen de eerste en tweede rugstreep; het overige gedeelte der dekschilden, behalve de schouderbuil, zeer dicht rimpelig bestippeld en mat 8
- Dekschilden elk slechts met eene groote, door eene rugstreep in tweeën gedeelde, spiegelvlek, van welke het buitenste gedeelte zelden korter dan het binnenste is; het overige gedeelte der dekschilden vrij dicht bestippeld, glanzig; zelden vertoont zich aan de buitenzijde van de rugstreep eene weinig en zwak bestippelde strook. De naadstreep gewoonlijk geheel ontwikkeld. Bovenzijde bronzig, soms zwart (ab.c. *niger* Suffr.). Bij ab.s. **fulminans* Koltze (Elbstrand bij Hamburg) is de naadstreep slechts zeer zwak- en de eerste rugstreep slechts door enkele stippels van voren aangeduid, waardoor de spiegelvlek niet in tweeën gedeeld is (mij onbekend). Lengte $2\frac{1}{2}$ —4 mm. Zeer gemeen in mest en aas; de ab.c. *niger* bij Winterswijk, Baexem, Zeist en Maastricht 4 **aeueus** F.
- 8 De groote spiegelvlek der dekschilden weinig of niet over het midden naar achteren reikend, nagenoeg zoo lang als de eerste rugstreep; de kleinere spiegelvlek van deze slechts door de eerste rugstreep, zeldzamer door eene smalle strook van verwarde stippels 1) gescheiden. De naadstreep naar voren meestal afgekort. Lichaam zwart, glanzig, veelal met bronzigen weerschijs. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Niet zeldzaam langs de stranden onder rotte visch en in menschen-uitwerpselen; ook bij Bergen-op-Zoom, Hilversum, Winterswijk, Haarlem, Zeist, Amsterdam en Maastricht 3, **immundus** Gyll.
- De groote spiegelvlek der dekschilden ver over het midden naar achteren reikend, duidelijk langer dan de eerste rugstreep en van de kleinere spiegelvlek door eene breede, bestippelde strook gescheiden. Ook de onbestippelde top-zoom breeder en de naadstreep altijd geheel ontwikkeld. Bovenzijde licht-bronzig. Lengte 3—4 mm. Niet inlandsch. Zij zou bij Aken en Düsseldorf voorkomen (speculifer Latr.) (**pulcherrimus** Weber) 2)
- 9 Dekschilden, behalve de schouderbuil en eene spiegelvlek naast den naad, dicht rimpelig bestippeld, mat, met zeer onduidelijke of nagenoeg ontbrekende rugstrepen, doch met eene afgekorte naadstreep. Voorhoofd rimpelig 10
- Dekschilden met 4 duidelijke rugstrepen, eene schuin staande schouderstreep, eene randstreep en eene geheel ontwikkelde naadstreep 11
- 10 Halschild, behalve twee kleine vlekken, geheel dicht bestippeld. Dekschilden elk met eene kleine, van den naad afsnede spiegelvlek. Bovenzijde licht bronskleurig. Lengte 4 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en in het eerste voorjaar langs de Ahr in het zand (specularis Mars.)
- Halschild aan voor- en zijrand breed, aan den achterrand slechts zeer smal, doch dicht bestippeld, overigens glad. Dekschilden met eene groote, tot aan den naad reikende spiegelvlek. Bovenzijde zwart, veelal met iets blauwachtigen weerschijs. Lengte 3—4 mm. Gemeen langs de stranden, vooral nabij de zeedorpen, onder rotte visch en menschen-uitwerpselen 5, **4-striatus** Hoffm.
- 11 Voorhoofd lijn bestippeld of rimpelig, zonder accolade-vormige dwarslijnen 12
- Voorhoofd eëgig bestippeld, met een of twee, soms onduidelijke, hoekig gebogen, eenigszins accolade-vormige, golvende dwarslijnen 13
- 12 De strepen der dekschilden breed en krachtig bestippeld; van de buitenste 4, die geheel ontwikkeld zijn, verbindt zich de binnenste van voren in een boog met de naadstreep; tegen de naadstreep vertoont zich, aan de binnenzijde nabij het uiteinde, nog eenige aanduiding van eene bijkomende stippellijn. Dekschilden aan het uiteinde grof bestippeld. Voorhoofds-rand iets uitgebogen. Bovenzijde zwart. Halschild met eene bestippelde strook op eenigen afstand van den zijrand, aan den achterrand met eene smalle bestippelde strook. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Eenmaal bij Arnhem in Juni. In België bij Fleurus. In de Rijnprov. bij Elberfeld 6, **conjugens** Payk.
- De strepen der dekschilden fijn en tot op $\frac{2}{3}$ der lengte reikend. Dekschilden op de achterhelft lijn en vrij dicht bestippeld. Voorhoofds-rand recht. Bovenzijde bronskleurig of blauwachtig, zelden donkerbruin (ab.c. *arcarius* Mars.), sterk glanzig; sorieten en pooten bruinrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk bij Cahis. (rufipes Payk.) 3)

1) De schijle exemplaren werden ten onrechte als *S. pulcherrimus* Web. (speculifer Latr.) gedetermineerd.

2) De vroegere opzake uit Nederland vervalt ik betwijfel of deze Zuid-Europesche soort wel in ons gebied voorkomt. Volgens "Fauna in de gederde. L'anne Gallo-Romane".

3) De af *S. metallicus* Er. van het eiland Wangeroog (Wierken) opgegeven soort is wellicht *rufipes metallicus* et rubrifrons.

- 13 Halsschild, behalve de gewone bestippeling aan den achterrand, volkomen onbestippeld. Voorhoofd met een duidelijken, accolade-vormigen dwarsrimpel, daarachter gewoonlijk nog met eenige aanduiding van een tweeden dwarsrimpel. Dekschilden, tusschen de naadstreep en de vierde rugstreep, tot over het midden en veelal tot nabij de basis vrij dicht bestippeld; de rugstrepen breed bestippeld, de naadstreep geheel doorlopend en van voren met de vierde rugstreep door een boog verbonden. Lichaam langwerpig-ovaal, zwartbruin of zwart; sterk glanzig. Voorschenen met 3 grootere en 3 kleinere tandjes. Lengte 3—5 mm. Gemeen langs de stranden aan doode visch en uitwerpselen.
(sabulosus Fairm.) 7. **maritimus** S eph.
- Halsschild aan voor- en zijranden meer of minder uitgebreid bestippeld. Voorhoofd met twee duidelijke, of wel door de grove, dichte bestippeling onduidelijke, accolade-vormige dwarsrimpels 14
- 14 De buitenste der 4 rugstrepen van de dekschilden aan het uiteinde eenigszins bochtig en bijna tot aan den achterrand reikend. Dekschilden nauwelijks tot aan het midden en naar buiten tot aan de tweede rugstreep lijn en verspreid bestippeld. Voorhoofd meestal grof en dicht bestippeld, waardoor de dwarsrimpels weinig in 't oog vallen. Bovenzijde donker metaalgroen, zeldzamer donker bruinachtig of de dekschilden roodbruinachtig. Voorschenen gewoonlijk met 4 tandjes, zelden nog met een klein vijfde tandje. Lengte 2½—3½ mm. Gemeen in mest, vooral in de duinstreken en langs de stranden 8. **metallicus** Herbst.
- De buitenste der 4 rugstrepen even lang als of iets korter dan de overigen, welke ongeveer tot iets over het midden reiken. Dekschilden krachtiger en naar binnen iets verder naar voren bestippeld 15
- 15 Voorhoofd onbestippeld, met zeer duidelijke, accolade-vormige dwarsrimpels. Voorschenen met drie zeer groote, stompe- en twee veel kleinere, veelal onduidelijke tandjes. Dekschilden op de achterhelft vrij sterk en verspreid bestippeld. Achterschenen sterk verbreed en verdikt. Bovenzijde glanzig bruin, veelal roodachtig-bruin, vooral op de dekschilden; de pooten rood. Lengte 2¼—3½ mm. Gemeen met *maritimus* langs de stranden 9. **crassipes** Er.
- Voorhoofd tusschen de dwarsrimpels lijn gestreept en bestippeld. Voorschenen met 6-, naar de basis geleidelijk kleiner wordende tandjes. Dekschilden op de achterhelft meestal krachtig en dicht bestippeld. Achterschenen weinig verbreed en verdikt. Bovenzijde metallisch-groen, de pooten zwart. Lengte 2½—3½ mm. Gemeen in mest, vooral in de duinstreken en langs de stranden 10. **rufifrons** Payk.

8. Gnathoneus Jacq. Duval.

Dit genus is zeer verwant aan Saprinus. Kop zonder dwarsstreep tusschen de oogen. De binnenste lob der achterkaken draagt aan het uiteinde een langen, krachtigen haak. Dekschilden met langsstrepen, doch zonder spiegelgladde ruimte; de naadstreep hoogstens op de voorhelft duidelijk. Epiplenuren der dekschilden met 3 strepen. Voorschenen tusschen den tweeden en derden tand met een grootere tusschenruimte. — De larve van G. rotundatus is door Perris beschreven.

De 2 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Bovenzijde en mesosternum vrij grof en dicht-, het pygidium en propygidium, alsmede het uiteinde der dekschilden min of meer rimpelig bestippeld. De strepen der dekschilden naar het uiteinde tot over het midden reikend, de naadstreep al of niet ontwikkeld. Lichaam aan de zijden sterker afgerond en meer geweldd, pekschwart, glanzig. De sprieten, de aiterste topvand der dekschilden en de pooten roodbruin. Bij den vorm *conjugatus* Ill. bevindt zich op het halsschild een groefje voor het schildje. Lengte 2½—3 mm. Zeer verbreed door het geheele land en o. a. niet zeldzaam in de duinstreken. Onder drogen mest, mos, op heederen, bij mieren en aan uytloeiende boomsappen.

(nannetensis Mars.) 1. **rotundatus** Illig.

Bovenzijde en mesosternum lijftr en minder dicht bestippeld. De strepen der dekschilden slechts tot aan het midden reikend. Lichaam doorgaans kleiner, minder geweldd en aan de zijden minder afgerond. Overigens zeer verwant aan de vorige soort en wellicht (volgens R.itter) slechts eene variëteit. Lengte 2—2½ mm. Even verbreed als *rotundatus*.

2. **punctulatus** Thoms.

1) Volgens Reitter is *nannetensis* Mars. eene goede soort uit zuidlijker streken

9. Myrmetes Marscul.

Op verticaal geplaatst. Bovenzijde niet bestippeld, eenigszins mat. Dekschilden uiterst fijn rugstrepen. Prosternum zonder kinplaat, de monddeelen tegen den voorrand van het prosternum zelf aanstootend. Schenen smal; de voorschenen zonder tarsaal-groef, aan den buitenrand met enkele doortjes. Achterschenen smal, weinig verbreed, zonder doortjes.

De eenige, ook in Nederland voorkomende soort leeft in mierennesten.

Zij gelijkt eenigszins op *Dendrophilus pygmaeus*. Lichaam ovaal, eenigszins vierkant, met afgeronde hoeken en zijden, aan het uiteinde breed afgeknut, vrij sterk gewelfd, lichter of donkerder bruin, onbestippeld, matglanzig en met 4 zeer fijne, schuine rugstrepen. Het uiteinde der dekschilden, het pygidium en het propygidium, bij sterke vergrooting gezien, uiterst fijn bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ 2 mm. Overal gemeen in de nesten van *Formica rufa* en *pratensis*. 1. **piceus** Payk.

V. Tribus ABRAEINI.

Teretrius Erichs.

Voorkaken kort en breed, in een scherp tand eindigend. De buitenste achterkaakslab vliezig en aan den buitenrand gebaard. Kin van voren uitgerand. Lichaam lang-gestrekt, cilindervormig. Schildje zeer klein, doch duidelijk zichtbaar. Dekschilden zonder strepen. Voorschenen zeer breed, met getanden buitenrand, de achterschenen duidelijk gedoorn. Sprieten op het voorhoofd, naast den binnenrand der oogen, ingeplant.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam dubbel zoo lang als breed, met parallele zijden, glanzig zwart, gelijkmatig en niet dicht bestippeld. Halsschild langer dan de helft der dekschilden. De uiterste rand der dekschilden, de sprieten en de pooten meer roodachtig. Lengte 2–2½ mm. In de gangen van *Ptilinus costatus* in oud wilgenhout, in rottend eiken- en berkenhout en soms in bosschen onder vochtige bladeren. Niet inl. In België bij Hasselt, in Oldenburg en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. — De larve is door *Perris* beschreven. (picipes F.) 1

10. Plegaderus Erichs.

Lichaam langer of korter ovaal. Voorkaken met tweetandig uiteinde. Eindlid der kaaktasters zoo lang als de voorafgaande leedjes te zamen. Sprietknots kegelvormig. Halsschild langs de zijden stomp-kantig opgericht, bij de inheemsche soorten met eene middengroef. Dekschilden met zeer flauwe aangeduide strepen. Sprietgroeven iets achter nabij het prosternum dan nabij den zijrand van het halsschild. Voorschenen aan het uiteinde verbreed en met eenige doortjes bezet. — De soorten van dit genus leven achter boomschors. — De larve en pop van *P. discisus* zijn door *Perris* beschreven.

Van de 8 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De buitig opgerichte randzoom van het halsschild door de, vóór het midden geplaatste, dwarsgroef doorsneden 2
- 2 De buitig opgerichte randzoom van het halsschild niet door de dwarsgroef doorsneden . . . 3
- 3 De buitig opgerichte randzoom van het halsschild van al de basis naar voren slechts tot aan de dwarsgroef reikend, daarvoor ontbrekend en vervangen door den naar voren sterk verbreedten zijrand. Dekschilden krachtig en vrij dicht, het halsschild minder dicht bestippeld. Lengte 1½ 2 mm. Achter dennenschors. In België en Westfalen. (*saucius* Er.)

1 Het eerste dier van de soort door *Muthon* bij Rotterdam gevonden. Ik zag dit exemplaar met zeker wel een Belgisch karakteristiek. (B-Boum.) In de coll-Muthon ontbreken meestal de nauwkeurige opgaven der vindplaatsen.

De buktig opgerichte randzoom van het halsschild ook vóór de dwarsgroef, naast den smallen zijrand, voorhanden. Dekschilden fijn en verspreid-, het halsschild bijna niet bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Achter boomschors, vooral van dennen, ook van kersenboomen. In groot aantal bij Arnhem, April; voorts bij Breda, Venlo, Katwijk en Wassenaar. Ook in de Rijnprov. 1. *vulneratus* Panz.

- 3 De dwarsgroef van het halsschild iets vóór het midden gelegen en vrij diep. Halsschild tamelijk fijn en niet zeer dicht-, de dekschilden dichter en sterker bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Achter eikenschors. Niet inl. Bij Hamburg. (*dissectus* Er.)

De dwarsgroef van het halsschild in het midden gelegen en zeer diep. Dekschilden aan het uiteinde sterk versmald. 4

- 4 Dekschilden grof en dicht bestippeld, mat, slechts met geringe sporen van strepen aan de basis. Halsschild minder grof en meer verspreid bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Achter wilgen-schors. Niet inl. In België bij Huy en bij Hever nabij Mechelen, in Mei, bij *Formica rufa*; ook bij Düsseldorf en Dortmund. (*caesus* Herbst.)

Dekschilden fijn en verspreid bestippeld, glanzig, met eene schouderstreep en eene, nagenoeg tot aan het midden reikende rugstreep. Lichaam zwart, donkerbruin of roodbruin. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. In boomholten en in rottend beukenhout. Niet inl. In de Rijnprov. bij Düsseldorf; ook in België en bij Hamburg. (*dissectus* Er.)

11. *Abraeus* Leach.

Lichaam kogelvormig-gezweld. Achterkaaks-lobben zonder haak aan het uiteinde. Schildje uiterst klein of onzichtbaar. Dekschilden zonder randstreep. Prosternum zonder kinplaat. Alle tarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven in vette tuinaarde onder rottende plantengestoffen. De larve van *A. globosus* is door Perris beschreven.

Van de 6 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Bovenzijde zwart, mat, overal zeer dicht bestippeld en met korte, dikke, witte, verspreide borstelhaartjes bezet, welke meestal afgewreven zijn. De achter helft der dekschilden dicht langsrimpelig. Voorschenen slechts weinig verbreed en afgerond. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Bij *Lasius brunneus* en *Formica rufa*; de larve bij *Lasius fuliginosus* waargenomen. Niet inl. In Westfalen (*globulus* Creutz.)

Bovenzijde glanzig, de dekschilden dichter dan het halsschild en soms iets ineenvloeiend bestippeld, doch nimmer langsrimpelig; zonder verspreide borstelhaartjes 2

- 2 Voorschenen aan den buitenrand scherp-hoekig verbreed, aan het uiteinde uitgesneden, waardoor een duidelijk tandje aanwezig is. Halsschild fijn en vrij dicht-, de dekschilden iets krachtiger en meer verspreid bestippeld. Lichaam lichter of donkerder roodbruin, de naad der dekschilden veelal iets donkerder. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Achter rottende boomschors, in vette tuinaarde en onder vergane plantengestoffen. Arnhem, Aug.; Bunde bij Maastricht, Juli. In de Rijnprov. bij Düsseldorf en in Westfalen. 1. *globosus* Hollm.

Voorschenen aan den buitenrand afgerond-verbreed, zonder scherpen hoek, aan het uiteinde afgerond, zonder tandje. 3

- 3 Halsschild sterk en vrij dicht-, de dekschilden iets dichter en grover-, doch niet ineenvloeiend bestippeld. Prosternum zonder schuine strepen aan de basis, evenals het mesosternum krachtig en dicht bestippeld. Lichaam lichter of donkerder roodbruin. Lengte $\frac{3}{4}$ — 1 mm. In oude run. Niet inl. In België, Westfalen en bij Hamburg. (*granulum* Er.)

Halsschild fijn en meer verspreid-, de dekschilden daarentegen krachtiger-, dichter en hier en daar eenigszins ineenvloeiend bestippeld. Prosternum aan de basis met twee korte, schuin naar binnen gerichte strepen, evenals het mesosternum fijn en verspreid bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Niet inl. In België bij Groenendael (*parvulus* Aubé)

Bacanius Leconte.

Lichaam kort-eivormig, vrij sterk gezweld. Schildje ontbreekt. Dekschilden met eene randstreep. Prosternum met eene kinplaat. Alle tarsen 5-ledig. — De soorten van dit genus gelijken overigens eenigszins op *Aceritus* en leven in rottende plantengestoffen.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

H. lid met eene dwarslijn voor het schildje, welke een naar voren gerichten hoek vormt ruitvormig gedeelte voor het schildje begrenst. Dekschilden met eene lijne schouderstreep. Bovenzijde pekzwart of roodbruin, bij sterke vergrooting gezien, hier en daar fijn bestippeld. Lengte 1—1½ mm. Niet incl. In België en in Noord-Frankrijk. Ik zag een exemplaar uit Luik (ex Mus. Brun.) en bezit een exemplaar uit Picardië van Reitter. Zij schijnt te leven in broeikassen op een fungus (*Fuligo vaporaria*), welke zich op oude, vochtige ran ontwikkelt (*rhomphorus* Aubé)

12. *Acritus* Leconte.

Lichaam kort-eivormig, slechts weinig gewelfd. Schildje uiterst klein. Sprietgroeven achter nabij de zijden van het halsschild dan nabij die van het prosternum gelegen. Voor- en middeltarsen 5-, de achtertarsen 4-ledig. De binnenste achterkaaks-lob aan het uiteinde van een haak voorzien. Dekschilden met eene randstreep. — De soorten van dit genus leven onder steenen, dorre bladeren, in rottende plantenstoffen en in run. Van de 8 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild zonder dwarslijn voor het schildje. 2
- Halsschild met eene duidelijke stippellijn voor het schildje. 3
- 2 Lichaam langwerpig-eivormig, eenigszins vierhoekig, aan de zijden slechts weinig afgerond, op de bovenzijde lijn en verspreid bestippeld, kastanjebruin met iets lichtere dekschilden. Prosternum aan de basis uitgerand, van voren nagenoeg dubbel zoo breed als van achteren, met naar voren divergeerende strepen. Mesosternum van voren afgerond. Lengte ½—1½ mm. Een paar maal op de duinen bij Vlissingen in April gevangen. 1. **punctum** Aubé.
- Lichaam ovaal, aan de zijden sterk afgerond, op de bovenzijde krachtiger en dichter bestippeld, roodbruin. Sprieten en pooten roestrood, de sprietknots lichtgeel. Prosternum aan de basis recht afgesneden, van achteren en van voren nagenoeg even breed, met naar voren en naar achteren divergeerende strepen. Mesosternum van voren flauw uitgerand, bijna recht. Lengte ½—1 mm. Achter eiken- en dennenschors. Niet incl. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. (*minutus* Herbst)
- 3 Bovenzijde eenigszins dof, de tussenruimten der stippels dicht en lijn langsrimpelig. Overigens aan *nigricornis* gelijk. Lengte 1 mm. Zeer zeldzaam. Een paar maal bij Kralingen in Mei. In de Rijnprov. bij Ahrweiler 2. **rhenanus** Fuss.
- Bovenzijde glanzig, zonder langsrimpelige sculptuur 4
- 4 Dekschilden duidelijk bestippeld. Bovenzijde lichter of donkerder kastanjebruin. Sprieten en pooten gewoonlijk lichter. 5
- Bovenzijde zonder duidelijke bestippeling, welke slechts bij microscopisch onderzoek zeer lijn en verspreid blijkt te zijn; glanzig geelrood. Halsschild met donker gezoomden achterrand. Sprieten en pooten geel. Lengte ½—¾ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Cleef. Mij onbekend (*Hopffgartenii* Reitter)
- 5 Dekschilden met twee krachtige, schuin verlopende, van af de basis tot minstens aan het midden reikende langsgroeven, de eene ongeveer in het midden, de andere, iets kortere, aan den s. hoender. Lengte 1 mm. Niet incl. In de Rijnprov. Mij onbekend. (*sulcipennis* Fuss)
- Dekschilden zonder langsgroeven, slechts met korte en zeer onduidelijke sporen van strepen. 6
- 6 Roodbruin of donkerbruin, de sprietknots geelrood. Voorschenen naar het uiteinde bijna niet verbreed. Prosternum iets langer dan breed, de randlijn van het mesosternum aan den voorrand niet onderbroken. De stippels der dekschilden overal gewoon. Lengte ¾—1 mm. Zeer zeldzaam. Een paar malen bij den Haag in October; ook bij Limmel nabij Maastricht in Mei. (*microscopicus* Reitt.) 3. **semiculum** Küst.
- Lichter of donkerder kastanjebruin, de sprietknots donkerbruin. Voorschenen naar het uiteinde gekieldijk verbreed. Prosternum veel langer dan breed, de randlijn van het mesosternum aan den voorrand onderbroken. De stippels op de achterhelft der dekschilden zeiden naar voren een kort, lijn streepje af. Lengte ¾—1 mm. Verbreed onder dorre bladeren, in vette tuinaarde, onder steenen en planken 4. **nigricornis** Hoffm.

13. *Onthophilus* Leach.

Lichaam rondachtig, zwart. Halsschild en dekschilden met langssribben. Sprichtgroeven diep, evenwijdig aan den voorrand van het halsschild verloopend. Voortzetting van het prosternum met eene zeer kleine kinplaat. Pygidium sterk naar onderen gericht. Pooten lang en smal. Voorschenen met eene tarsadlgrœf. — De soorten van dit genus leven in mest en onder rottende plantenstoffen.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Van de 6 langssribben op het halsschild zijn de middelste twee tot eene enkele rib versmolten; de tussenruimten groot bestippeld. Dekschilden elk met 3 langssribben, in wier tussenruimten 5 even fijne, kielvormige langsstrepen en twee stippelrijen voorhanden zijn. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Onder rottende plantenstoffen, in mest en in aanspoelsel der rivieren. Goor, Zutphen, Arnhem, Breda, Roosteren en Bergen-op-Zoom.

(? globulosus Oliv.) 1. **sulcatus** F.

Van de 6 langssribben van het halsschild zijn de middelste twee even ver van elkaar verwijderd als van de daarop volgende; de buitensten van voren afgekor; de tussenruimten dicht langsrimpelig. Dekschilden met 6 afwisselend zwakkere langssribben, in wier tussenruimten fijne langsstrepen en eene stippelrij aanwezig zijn. Lengte 2 mm. Op vele plaatsen gemeen in drogen mest en vooral in het voorjaar, in den zonneschijn rondzwermend over lage planten. 2. **striatus** Forst.

Sub-Orde III. CLAVICORNIA.

XX. Familie PHALACRIDAE.

Deze familie is zeer verwant aan de Nitidulidae door den bouw der sprieten en tarsen, doch onderscheidt zich vooral door de kogelvormige voor- en de dicht aaneenstaande, verbrede achtercoxae. — Het metasternum vertoont aan den achterrand eene korte langsspleet tusschen de achtercoxae. — Ook heeft deze familie eenige verwantschap met de Erotylidae door den bouw der sprieten en tarsen, doch staan bij deze alle coxae wijd uiteen en zijn de eerste twee sterniten met elkaar vergroeid. Het zijn kleine, ei-vormige, meestal van boven hoog gewelfde, gladde, glanzige kevertjes met vrij grooten kop, die door de uitstekende voorhoeken van het halsschild omvat wordt. Bij uiterst sterke vergrooting ziet men hier en daar een zeer klein, sterk aangedrukt haartje. — Sprieten vóór de oogen en onder den voorhoofds-rand ingeplant, 11-ledig, recht; de eerste twee leedjes grooter en met langwerpige, 3-, zeldzamer 4- of 5-1) ledige knoos. — Oogen vrij groot en gewelfd. Bovenlip klein, van voren afgerond. Voorkaken niet vooruitstekend, sterk gebogen, met tweetandigen top, aan de basis met een gladden of geribden maaltand en daarboven met een vliezigen zoom. Achterkaken met twee lobben, waarvan de binnenste met een dubbelen haak. Kaaktasters draadvormig, het vierde lid cilindervormig of eirond. Liptasters 3-ledig. Kin hoornachtig. Tong half hoornachtig, eenigszins hartvormig. — Halsschild en dekschilden aan de zijden altijd lijn en duidelijk gerand. Halsschild groot, van voren uitgerand, van achteren volkomen tegen de dekschilden aansluitend, aan voor- en achterrand bijna altijd met eene uiterst fijne randlijn. — Schildje duidelijk zichtbaar. — Dekschilden het geheele achterlijf bedekkend, met eene fijne randlijn aan de basis, welke zich langs de zijden van het schildje (de scutellair-streep) en ook wel langs den naad (de naad-streep) voortzet, welke laatste veelal zeer fijn is en al of niet naar de scutellair-streep toe onderbroken kan zijn. Verder vertoonen de dekschilden ongeveer 9, meer of minder duidelijke rijen van fijne stippels, die zoowel naar binnen als naar buiten door eene gewone streep kunnen begeleid zijn; van deze zijn 1 of 2 als hoofd-strepen (volgens sommige schrijvers als naad-strepen) duidelijk en scherp aangeduid 2). Verder vertoont de oppervlakte der dekschilden bij microscopisch onderzoek nog eigen aardige, uiterst fijne, ε- of ε-vormige stipjes, van welke het middengedeelte een uiterst fijn, aangedrukt, naar achteren gericht haartje is. — Gevleugeld. De vleugels (*Olibrus bicolor*) zijn volgens *Roger* lang-elliptisch, de voorrand, vóór het ribbij het midden gelegen gewricht, een weinig bewimpeld. Het topgedeelte slechts weinig grooter dan het basaalgedeelte, nagenoeg zonder aderen. De vena scapularis verloopt nagenoeg rechtlijnig tot vóór het gewricht; de vena externo-media verloopt rechtlijnig tot aan het midden van den achterrand en geeft op de hoogte van het gewricht eene zijader af, welke, naar de basis teruglopend, eerst rechthoekig uit de hoofdader

1) Bij eenige Noord-Afrikaansche genera

2) Bij het Zuid-Europeesche genus *Tolyplus* Er. zijn alle strepen scherp aangeduid

— Doch dan weder aan deze evenwijdig loopt. De vena interno-media iets gekromd. In de arca interno-media loopt eene zijader, welke zich nabij de basis door twee korte aderen met de venae interno- en externo-media verbindt en zich ook naar den achterrand splits. De achterrand lijn bewimpert en aan de basis flauw uitgebogen. Het achterlijf vrij groot. Volgens *J. Redtenbacher* zouden de Phalacridae, wier kleine vliegels meer gereduceerd adernet vertoonen, meer verwantschap hebben met de Trogositidae dan met de Nitidulidae. Voorcoxae door eene smalle, naar achteren verbrede voortzetting van het prosternum gescheiden. Tusschen de middelcoxae bevindt zich eene lijn-gerande, breede metasternale voortzetting. — Achterlijf uit 5 sterniten bestaande. — Pooten kort en krachtig ontwikkeld. Schenen aan het uiteinde met een krans van dicht aaneenstaande doortjes. Tarsen 5-ledig 1), de eerste drie leedjes iets verbreed en op de onderzijde viltig behaard, het vierde lid altijd zeer klein en evenals de wortel van het klauwlid in het derde lid verborgen. Klauwen aan de basis met een duidelijke rand.

De soorten leven grootendeels op bloeiende Compositen, sommigen op Gramineëen en Cyperaceëen. Velen overwinteren achter boomschors, in dood riet en onder mos.

De larven leven in den vruchtbodem van Compositen.

- 1 Het naar voren gerichte gedeelte van het metasternum, tusschen de middelcoxae door, tot aan het prosternum reikend; het mesosternum daartusschen niet ontwikkeld 2

Het naar voren gerichte gedeelte van het metasternum niet voorbij de middelcoxae reikend en door een duidelijk, kort mesosternum van het prosternum gescheiden. Voordijen met afgeronden onderkant. Schenen met duidelijke eindsporen. Het tweede lid der achtertarsen slechts weinig versmald, smaller dan het derde lid. Dekschilden met eene verdiepte naadstreep 3. **Stilbus**.

- 2 Dekschilden met eene verdiepte naadstreep. Voordijen met afgeronden onderkant. Eindsporen der schenen lijn, niet langer dan de haarborstels. Achtertarsen kort en breed; het tweede lid weinig langer dan het eerste en nagenoeg zoo breed als het derde, diep uitgesneden. Bovenzijde diep zwart. 1. **Phalacrus**.

Dekschilden met twee verdiepte naadstrepen. Voordijen aan de onderzijde iets uitgebogen. Eindsporen der schenen duidelijk langer dan de haarborstels. Achtertarsen min of meer verlengd, het tweede lid veel langer dan het eerste en smaller dan het iets verbrede en zwak uitgesneden derde lid. Dekschilden meestal met lichter uiteinde 2. **Ohlbus**.

1. Phalacrus Paykull.

*Sprieten met 3-ledige, langwerpige knots. Eindlid der kaaktasters lang, nagenoeg cilindervormig. Dekschilden met slechts ééne verdiepte hoofdstreep. Schildje zeer groot. Het naar voren gerichte gedeelte van het metasternum, tusschen de middelcoxae door, tot aan het prosternum reikend, het mesosternum daartusschen niet ontwikkeld. Voordijen met afgeronden onderkant. Eindsporen der schenen fijn, niet langer dan de haarborstels. Achtertarsen kort en breed; het tweede lid weinig langer dan het eerste en nagenoeg zoo breed als het derde lid, diep uitgesneden. Bovenzijde diep zwart. — De soorten van dit genus leven op bloemen en overwinteren achter boomschors. — De larve van *P. corruscus* (†) is door *Kaltenbach* beschreven.*

Van de 16 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

- 1 Dekschilden, behalve de van voren afgekorte naadstreep, niet gestreept, of wel de strepen zijn hier en daar zeer onduidelijk. 2

Dekschilden met lijne, meer of minder duidelijke, gladde langsstrepen, naast iedere streep eene lijn, duidelijke stippeelrij. Het eindlid der sprieknoks zoo lang als de twee andere leedjes te zamen, dik, $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed 3

- 2 Het eindlid der sprieknoks zoo lang als de twee andere leedjes te zamen, met stomp uiteinde. Middeldijen, evenals de achterdijen, aan het uiteinde van binnen vlak afgerond. Dekschilden met lijne, doch duidelijke stippeelrijen en bovendien nog met verspreide, fijne stippeeljes. Overigens veel op *corruscus* gelijkend. Lengte 3 mm. Deze soort schijnt

1) Bij een paar Noord-Afrikaan. he genera zijn de achtertarsen 4-ledig, doordat de eerste twee leedjes meengesmolten zijn.

vooral nabij de zeekust op *Carex*-soorten voor te komen. Een paar maal bij Bergen-op-Zoom in Mei en Juni. Zij zou ook in de Rijnprov., Westfalen en bij Hamburg gevangen zijn 1. **grossus** Er.

Het eindlid der sprietknots langer dan de twee andere leedjes te zamen, met toegespitst uiteinde, driemaal zoo lang als breed. Middeldijen aan het uiteinde van binnen stomphoekig. De geheele bovenzijde uiterst fijn en vrij dicht bestippeld, op de dekschilden veelal met zeer onduidelijke langlijnen. Kleine exemplaren met lichtere pooten vormen de var. **Humberti* Rye. Bij het ♂ de voorrand van den kop diep uitgerand, bij het ♀ bijna recht afgeknut. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen op allerlei lage planten, vooral op bloeiende Gramineëën, o.a. *Bromus mollis*; zij overwintert in dood riet, achter boomschors en onder dorre bladeren (Ginetarius F.) 2. **coruscus** Panz.

3 Lichaam kort-eivormig, hoog gewelfd, nagenoeg half-kogelvormig, doch naar het uiteinde iets versmald, niet gehagrineerd, sterk glanzig. De naad der dekschilden eenigszins dakvormig opgericht; in de tusschenruimten der rugstrepen eene rij van uiterst fijne stippeltjes en daartusschen nog eenige grootere stippels. Lengte 1½—2½ mm. Op Gramineëën en aan boommos. Den Haag, Scheveningen, Loosduinen, Utrecht en op Texel; April—Aug. 3. **substriatus** Gyll.

Lichaam langwerpig-eirond, minder hoog gewelfd en van boven iets neergedrukt, zeer dicht gehagrineerd en daardoor eenigszins vetglanzig. Tusschen de duidelijke rugstrepen met volkomen gelijke, regelmatige rijen van even groote stippels. De naad der dekschilden iets dakvormig opgericht. Lengte 1½—2 mm. Op *Carex*-soorten, van Mei tot Juni; ook onder mos. Den Haag, Leiden, Katwijk, Hoek van Holland en Vianen 4. **caricis** St.

2. Olibrus Erichs.

*Sprieten met 3-ledige, langwerpige knots. Laatste kaaktaster-lid eivormig. Schildje veel kleiner dan bij Phalacrus. Dekschilden met twee verdiepte hoofdstrepen, meestal met lichter uiteinde. Het naar voren gerichte gedeelte van het metasternum, tusschen de middelcoxae door, tot aan het prosternum reikend, het mesosternum daartusschen niet ontwikkeld. Voordijen aan de onderzijde iets uitgebogen. Eindsporen der schenen duidelijk langer dan de haarborstels. Achtertarsen meer of minder verlengd, het tweede lid veel langer dan het eerste en smaller dan het iets verbrede en zwak uitgesneden derde lid. Bij het ♂ het tweede lid der voortarsen meer of minder verbreed. — De larven van *O. aeneus* en *millefolii* zijn door Kaltenbach, de larve en pop van *affinis* door Laboulbène en de metamorfose van *bicolor* door Heeger beschreven. — De soorten van dit genus leven op bloemen; zij overwinteren in aantal onder steenen, tusschen dorre bladeren, in bloempotten en achter boomschors.*

Van de 28 Europeesche soorten komen 7 in Nederland voor.

1 De tweede hoofdstreep nabij het uiteinde, kort voor het vereenigingspunt met de eerste hoofdstreep, uitgewischt. Bovenzijde donker bronskleurig of metallisch-zwart 2

De tweede hoofdstreep legt zich vóór het uiteinde meer of minder dicht tegen de eerste aan, of is daarmede vóór het uiteinde zeer duidelijk vereenigd 3

2 Langwerpig-eirond, naar het uiteinde versmald. De tweede hoofdstreep gewoon, veel sterker aangeduid dan de overige strepen. Bovenzijde glanzig bronskleurig. Pooten lichter of donkerder rood. Het vierde tot achtste sprietlid duidelijk langer dan breed. Halsschild niet gehagrineerd, slechts zeer fijn bestippeld. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen op allerlei bloemen en achter boomschors 1. **aeneus** F.

Eirond, hoog gewelfd, of eenigszins half-kogelvormig. De tweede hoofdstreep is gewoonlijk eene dubbelstreep, welke slechts weinig krachtiger dan de overige strepen ontwikkeld is. Bovenzijde glanzig, veelal iets metallisch-zwart. Pooten zwartachtig of donkerbruin. Halsschild, vooral aan de zijden, duidelijk gehagrineerd. Lengte 1—1½ mm. Zeer gemeen op *Achillea millefolium*. 2. **millefolii** Payk.

3 Bovenzijde geelachtig, glanzig; de kop, het halsschild, de naad en de zijden der dekschilden bruin. De beide hoofdstrepen veel krachtiger ontwikkeld dan de hier en daar aangeduide stippellijnen. Lengte 2—2½ mm. Gemeen op bloeiende *Compositen* en *Ranuncula*-ceëën; 's winters in groot aantal achter boomschors 3. **corticalis** Panz.

Bovenzijde glanzig zwart, metallisch-zwart of zwartbruin, gewoonlijk aan het uiteinde lichter gekleurd of met eene roode vlek, zelden eenkleurig 4

- 4 De tweede hoofdstreep is eene meer of minder duidelijke dubbelstreep, welke zich dicht tegen de eerste aanlegt; beide strepen veel krachtiger ontwikkeld dan de hier en daar aangeduide stippellijnen. Bovenzijde zwart, gewoonlijk met eene meer of minder groote, soms onduidelijke roode vlek. Bij het ♀ de dekschilden naar het uiteinde, soms tot aan de helft, gehagrineerd. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Gemeen o.a. op bloeienden *Taraxacum*, *Crepis*, *Hieracium* en *Tragopogon* 4. **bicolor** F.
- De tweede hoofdstreep vereenigt zich tamelijk ver van het uiteinde met de eerste 5
- 5 Lichaam eenigszins lang-eivormig. De tweede hoofdstreep op de dekschilden is eene dubbelstreep. Bovenzijde zwart, metallisch-zwart of zwartbruin, de dekschilden naar het uiteinde geleidelijk lighter wordend 6
- Lichaam eivormig. De tweede hoofdstreep gewoon en aan het uiteinde veel dieper ingedrukt dan de overige, meer of minder duidelijke strepen. Bovenzijde zwart, de dekschilden geheel aan den top iets of wat doorschijnend. Lengte 1— $1\frac{1}{2}$ mm. Op bloeiende *Gramineen* en *Compositen*; verbreid, doch niet gemeen 7. **pygmaeus** St.
- 6 Achterhoeken van het halsschild eenigszins stomp. De tweede hoofdstreep der dekschilden nauwelijks dieper ingedrukt dan de overige, meer of minder duidelijke strepen. Dek-schilden bij het ♂ aan het uiteinde, bij het ♀ verder naar voren, ongeveer op $\frac{1}{3}$ der lengte, door fijne streepjes gehagrineerd. Bovenzijde donker metaalbruin, met lichtbruin uiteinde der dekschilden. Bij ab.c. *discoideus* Küst. de dekschilden over het midden grootendeels roodbruin. Overigens in vorm, grootte en kleur eene zeer veranderlijke soort. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Verbreid en niet zeldzaam in gras en op *Ranunculus*-soorten; de ab.c. *discoideus* bij Valkenburg, ook in België bij Boisfort en Andergheem 5. **affinis** St.
- Achterhoeken van het halsschild recht, vrij scherp aangeduid. De tweede hoofdstreep dieper ingedrukt dan de overige, vrij duidelijke strepen. Bij het ♀ de dekschilden overal of ten minste voor $\frac{1}{2}$ van de oppervlakte gehagrineerd. Bovenzijde zwart of donkerbruin, veelal met geringen metaalglans, de dekschilden meest naar het uiteinde lighter gekleurd. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Vrij zeldzaam. Den Haag, Scheveningen, Leiden, Wassenaar en Maastricht 6. **liquidus** Er.

3. Stilbus Seidlitz.

(*Eustilbus* Sharp).

Dekschilden met ééne verdiepte hoofd- (naad-)streep. Het naar voren gerichte gedeelte van het metasternum niet voorbij de middelcoxae reikend en door een duidelijk, kort mesosternum van het prosternum gescheiden. Voordijen met afgeronden onderkant. Eindsporen der schenen duidelijk. Het tweede lid der achtertarsen slechts weinig versmald, smaller dan het derde lid. — Levenswijze als bij Olibrus.

Van de 4 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Prosternale voortzetting van achteren met eenige borstelharen bezet. Lichaam breed-eirond 2
- Prosternale voortzetting zonder borstelharen. Lichaam meer langwerpig-eirond, naar voren en naar achteren meer versmald, zwartachtig of donkerbruin, met scherp begrensde, roode topvlek of geheel roode dekschilden, zeldzamer eenkleurig rood (ab.c. *uniformis* Flach), niet sterk glanzig. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. Op riet; in het voorjaar in groot aantal onder aangespoeld riet en 's winters in de holten van rietstengels 3. **oblongus** Er.
- Achterhoeken van het halsschild duidelijk spits en scherp aangeduid. Bovenzijde lighter of donkerder roodbruin, met eene groote, gele, gewoonlijk vrij scherp begrensde vlek aan het uiteinde der dekschilden en met lichtere zijden van het halsschild; de ab.c. *unicolor* Flach geheel rood. Lichaam sterk glanzig. Lengte 2 mm. Zeer gemeen op allerlei lage planten, achter boomschors en tusschen afgevallen bladeren.
(*consimilis* Marsh., *geminus* Ill.) 1. **testaceus** Panz.
- Achterhoeken van het halsschild recht, vrij scherp aangeduid. Bovenzijde zwart, aan het uiteinde der dekschilden eenigszins uitvloeiend roodbruin, minder glanzig dan *testaceus*. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Vrij zeldzaam op riet. Den Haag, Rotterdam, Capelle a/d. IJssel, Katwijk en Vianen (*piceus* Steph.) 2. **atomarius** L.

XXI. Familie NITIDULIDAE.

Deze onder den naam van „Bloem- of Glanskevers” bekende insecten zijn kleine, meestal cenkleurige, donkere, metaalglanzige, blauw- of groenachtige, rood- of geelachtige, zeldzamer lichter of donkerder gevlekte kevertjes. Zij zijn meer of minder eivormig, breed-ovaal of eenigszins

vierhoekig, soms lang-gestrekt, elliptisch, zeldzamer cilindervormig of zelfs bij uitzondering eenigszins half-kogelvormig en dan met volledig kogelvermogen (*Cybocephalinae*); gewoonlijk eenigszins gewelfd, soms daarentegen sterk afgeplat, in den regel lijn behaard, zelden onbehaard (*Cyllodes*, *Ips*, *Cybocephalus*). Kop nagenoeg tot aan de oogen in het halsschild verzonken, bij de *Cybocephalinae* zeer groot en het geheele pro- en mesosternum kunnende bedekken. — Sprietten 11-ledig, recht, met drie grootere eindledjes, welke meestal tot eene duidelijke, scherp afgescheiden, soms los gelede knots vereenigd zijn; veelal is de sprieknots rondachtig en dicht geleed (*Meligethes*); bij *Pria* (♂) is de knots 4-ledig en gezaagd (Fig. 41, II). Het eerste sprietlid kan gewoonlijk in een meer of minder diep groefje aan de onderzijde van den kop worden opgenomen. Bij de *Rhizophaginae* zijn de sprietten 10-ledig en is het eindlid zelf een scherp afgescheiden, dichte, gewoonlijk aan het uiteinde geringde eindknop. Bovenlip onbedekt, hoornachtig, gewoonlijk iets uitgerand, meer of minder scherp ingesneden of twee-lobbig, soms zeer klein of wel vliezig en dan onder den clypeus verborgen (*Ipini* en *Rhizophaginae*). Voor-kaken met haakvormig gebogen, soms twee-tandigen of gespleten top, veelal met een of twee tandjes achter het uiteinde, aan den binnenrand bewimperd. Achterkaken in den regel slechts één-lobbig, daar de buitenste

Fig. 41. Sprieknots bij de Nitidulidae. Orig.

I. <i>Carpophilus</i> .	II. <i>Pria</i> , mannetje en wyfje.
III. <i>Amphotus</i> .	IV. <i>Cercus</i> , wyfje.

lob rudimentair is; bij de *Brachypterini* met twee lobben. Kaaktasters 4-ledig. De tong gewoonlijk uitgerand of twee-lobbig, ten minste in het midden hoornachtig. De paraglossen gewoonlijk als aan de binnenzijde bewimperde, vliezige lobben aan de zijden van de tong bevestigd. Lip-tasters 3-ledig, veelal meer of minder verdikt. — Het halsschild sluit gewoonlijk volkomen tegen de dekschilden aan of staat daarvan iets verwijderd, doch bij de *Cyllodini* en vooral bij de *Cybocephalinae*, is de achterrand over de basis der dekschilden verschuifbaar. — Dekschilden meestal iets afgeknut, waardoor alleen het pygidium of wel de laatste 2 of 3 tergiten onbedekt blijven (*Carpophilini*); zeldzamer het geheele achterlijf bedekkend. — Bij alle soorten zijn de achtervleugels goed ontwikkeld. Volgens *Roger* zijn deze (*Eupuraea aestiva* en *Amphotus marginata*, Fig. 42) lang-gestrekt, elliptisch, met het gewricht in het eerste derde gedeelte; de voorrand tot aan het gewricht bewimperd. De vena scapularis vertoont een lichtbruinen pigment-zoom tot aan het gewricht en zet zich daarachter, doch veel zwakker wordend, tot op het tweede derde gedeelte voort en doet hier, door eene flauw aangeduide pigment-vlek, denken aan het tweede gewricht bij de *Staphylinidae*. De vena externo-media verloopt met de concave zijde naar buiten tot op de hoogte van het gewricht, dan echter in minder sterke bocht met de convexe zijde naar buiten, zonder zijaders af te geven, tot dicht nabij den achterrand. De vena interno-media is rudimentair. Bij *Amphotus marginata* bevindt zich in de area interno-media eene bijader, welke zich door dwarsverbindingen met de venae externo- en interno-media verbindt. De achterrand is lijn bewimperd, op de plaats waar de vena externo-media eindigt iets ingesneden; het basaallobe is klein. Bij den vleugel van *Cercus* en *Meligethes* is het basaallobe door een zeer diepen

Fig. 42. Vleugel van *Amphotus marginata* F.
Naar *Burmester*.

afgescheiden. Volgens *J. Redtenbacher* schijnen de Nitidulidae, met betrekking tot de vleugels, na de meeste verwantschap te vertoonen met de Silphidae, Histeridae enz. Volgens *Burmester* heeft *Rhizophagus* door den vleugelbouw meer verwantschap met de Trogositidae dan met de overige Nitidulidae. — Prosternum naar achteren met of zonder (Nitidulini) voortzetting, welke zich veelal tot ver achter de voorcoxae voortzet; bij de Meligethini loopt deze voortzetting over het mesosternum door tot aan het metasternum. — Achterlijf met 5 of 6 bewegelijke sterniten. Bij de mannetjes van enkele genera komt nog een kleine anaalring achter het pygidium voor. — Voorcoxae sterk verbreed, cilindervormig, meer of minder in de gewrichtsholten ingesloten. Achtercoxae meestal wijd uiteenstaande, door eene breede voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Voorschenen in vele gevallen op verschillende wijze getand of gezaagd. Alle tarsen 5-ledig, bij de Cybocephalinae 4-ledig; de eerste 3 tarsledjes bijna altijd (bij de Rhizophaginae niet) verbreed; soms is het vierde lid veel kleiner dan het derde; bij uitzondering zijn bij het ♂ de achtertarsen 4-ledig (Rhizophaginae). Klauwen al of niet getand.

De Nitidulidae leven grootendeels op bloeiende planten en op bloemen, velen achter boomschors, sommigen in fungi, aan dierlijken afval, tusschen afgevallen bladeren, in gedroogde vruchten en bij uitzondering als gasten bij mieren. Het voedsel bestaat uit stofmeel, schimmeldraden, uitvloeiende boomsappen en andere stoffen; enkelen maken jacht op de larven van andere insecten achter boomschors. Sommigen zijn schadelijk aan cultuur-gewassen, o.a. *Meligethes brassicae* door het uitvreten der bloemknoppen van het koolzaad.

De lang-gestreekte, rolronde, gelachtig-witte larven hebben een eenigszins uitstekenden, hoornachtigen kop, gewoonlijk met 2, zeldzamer met 3 ocellen aan weerszijden; 2-ledige sprietten, één enkelen klauw aan de tarsen, twee hoornachtige aanhangsels aan den laatsten achterlijfsring en een tot naschuiven dienenden, buisvormigen anus. Het lichaam bestaat uit 12 ringen. Zij leven achter boomschors, aan uitvloeiende boomsappen, onder mest, aan afgeknagde beenderen enz.

Overzicht der Sub-Familiën en Tribus.

- 1 Sprietten 11-ledig met drie grootere eindledjes, welke meestal tot eene duidelijke, scherp afgescheiden knots vereenigd zijn. Alle tarsen in beide seksen gelijk, 5- of 4-ledig. 2
 Sprietten 10-ledig, van welke het eindlid een scherp afgescheiden, dichte, gewoonlijk aan het uiteinde geringde eindknop is. Tarsen 5-ledig, het 4e lid klein, de eerste drie ledjes niet verbreed; de achtertarsen bij het ♂ slechts met 4 ledjes. III. Sub-Fam. RHIZOPHAGINAE.
 IX. *Rhizophagini*.
- 2 Alle tarsen 5-ledig, het vierde lid soms klein. I. Sub-Fam. NITIDULINAE 3
 Alle tarsen 4-ledig. Lichaam met kogelvermogen, de achterrand van het halsschild over de basis der dekschilden verschuifbaar. Kop zeer groot, het geheele prosternum bedekkend.
 II. Sub-Fam. CYBOCEPHALINAE. VIII. *Cybocephalini*.
- 3 Bovenlip onbedekt, soms zeer klein. Clypeus naar voren versmald, het meer of minder groote wortellid der sprietten geheel onbedekt latend. 4
 Bovenlip onder den clypeus verborgen. Het smalle wortellid der sprietten meestal door den iets verbreedden zijrand van den clypeus geheel of ten deele bedekt. Tarsledjes meer of minder verbreed, het vierde lid klein VII. *Ipini*.
- 4 Achterkaken met twee lobben. De 3 ledige knots niet scherp afgescheiden van het overige gedeelte der sprietten (Fig. 41, IV). Kop zonder sprietgroeven. I. *Brachypyterini*.
 Achterkaken slechts met ééne lob. Sprietknots scherp afgescheiden (Fig. 41, I). 5
 De laatste 2 of 3 tergiten onbedekt. Pygidium bij het ♂ met een kleinen anaalring.
 II. *Carpophilini*.
- Hoogstens het pygidium onbedekt. 6
- 6 Meta- en prosternum geleidelijk in het iets lager gelegen, duidelijk zichtbaar mesosternum overgaande. Prosternum naar achteren zonder voortzetting III. *Nitidulini*.
 Meta- en prosternum veel hooger gelegen dan het geheele mesosternum of dan het sterk verzonken voorste gedeelte van het mesosternum. Prosternum met eene voortzetting tot ver achter de voorcoxae 7
 De voortzetting van het prosternum is lang en zet zich over het mesosternum heen tot aan het metasternum voort. Voorschenen aan den buitenrand fijn gekorven of getand. Bovenlip zeer klein. Halsschild aan de basis niet gerand IV. *Meligethini*.
 De voortzetting van het prosternum kort, niet tot aan het metasternum verlengd; door buiging echter van het halsschild kan deze soms tot aan het metasternum reiken. Voorschenen aan den buitenrand gaaf. Bovenlip duidelijk zichtbaar. Halsschild aan de basis al of niet gerand. 8

- 8 De lijn maar duidelijk gerande basis van het halsschild grijpt niet over de basis der dekschilden, doch sluit daar volkomen tegen aan V. **Pocadiini**.
De hoogstens in het midden zeer lijn gerande basis van het halsschild reikt, vooral aan de schouders, over de basis der dekschilden heen en is daarover eenigszins verschuifbaar.
VI. **Cyllodini**.

I. Sub-Familie NITIDULINAE.

I. Tribus BRACHYPTERINI.

- Laatste liptaster-lid eivormig. Tarsklauwen gewoon. Pygidium in beide seksen meestal gewoon.
1. **Cereus**.
Laatste liptaster-lid nagenoeg kogelrond. Tarsklauwen aan de basis met een tandje en daarvoor sterk gekromd. Pygidium bij het ♂ met een kleinen anaalring. 2. **Brachypterus**.

II. Tribus CARPOPHILINI.

- Bevat slechts het genus 3. **Carpophilus**.

III. Tribus Nitidulini.

- 1 De eerste drie tarsleedjes verbreed 2
Tarsen gewoon, niet verbreed 5
2 Bovenlip diep uitgesneden, min of meer twee-lobbig. Liptasters verdikt. De anaalring bij het ♂ uitstekende. Sprietknots los geleed 3
Bovenlip gewoon uitgerand. Liptasters niet verdikt. De anaalring bij het ♂ verborgen. Sprietknots met dicht opeenstaande leedjes, rondachtig, zeer breed 6. **Nitidula**.
3 Halsschild aan de zijden vlak uitgebreid. Klauwen ongetand. Pygidium bij het ♂ afgeknut, de anaalring vrij groot. 4
Halsschild aan de zijden niet vlak uitgebreid, nagenoeg tot aan den lijn geranden zijrand gewelfd. Klauwen met eene bultige verhevenheid aan de basis. Pygidium bij het ♂ afgerond, de kleine anaalring veelal moeilijk zichtbaar (Micrurula.)
4 Achtercoxae zeer ver van elkaar afstaande. Eindlid der kaaktasters, evenals dat der liptasters, kort-eirond en aan het uiteinde duidelijk afgeknut. Lichaam zeer kort en breed. Halsschild en dekschilden met zeer breed en vlak uitgebreide zijden 4. **Omosiphora**.
Achtercoxae niet ver van elkaar afstaande. Eindlid der kaaktasters lang-eirond, aan het uiteinde afgerond; het eindlid der liptasters kort- en dik-eirond, aan het uiteinde duidelijk afgeknut. Lichaam meer gestrekt, elliptisch, lang-eirond of min of meer vierhoekig. Halsschild en dekschilden met veel minder breede, vlak uitgebreide zijden 5. **Epuraea**.
5 Lichaam breed-ovaal. De sprietgroeven eenigszins divergeerend of naar binnen gericht 6
Lichaam lang-gestrekt, met parallelle zijden. De sprietgroeven parallel aan elkaar loopend. (Ipidia.)
6 Bovenlip diep uitgerand, eenigszins twee-lobbig. Het eerste sprietlid zeer sterk oorvormig verbreed en uitgehoud (Fig. 41, III). 7. **Amphotis**.
Bovenlip slechts een weinig uitgerand. Het eerste sprietlid gewoon verbreed. 7
7 Voorkaken met een kleinen tand achter het uiteinde. De sprietgroeven naar binnen gericht. Dekschilden het geheele achterlijf bedekkend 8. **Soronia**.
Voorkaken met gewoon uiteinde, daarachter met eene korte insnijding. De sprietgroeven iets naar buiten gericht. Dekschilden het uiteinde van het pygidium onbedekt latend.
9. **Omosita**.

IV. Tribus Meligethini.

- Voorschenen smal, niet getand, doch bij sterke vergrooting gezien, uiterst lijn gekorven. Sprietgroeven onduidelijk, slechts aan den binnenrand der oogen aangeduid. Het laatste sterniet zonder indrukken. Sprietknots bij het ♂ 4-ledig en gezaagd, bij het ♀, evenals bij Meligethes, 3-ledig (Fig. 41, II). 10 **Pria**.

Verschenen naar het uiteinde verbreed en in den regel duidelijk getand. Sprietgroeven diep, voorbij den binnenrand der oogen naar achteren reichend. Het laatste sterniet aan weerszijden met een ondiepen, boogvormigen indruk 11. **Meligethes**.

V. Tribus POCADIINI.

Voor- en middeltarsen, vooral bij het ♂, duidelijk verbreed; het vierde lid zeer klein. Sprietgroeven onduidelijk, slechts aan den binnenrand der oogen aangeduid. . . . 12. **Thalycra**.

Tarsen niet verbreed, het vierde lid slechts weinig kleiner dan de voorafgaande leedjes. Sprietgroeven duidelijk, langs de oogen eenigszins naar buiten verbreed . . . 13. **Pocadius**.

VI. Tribus CYLLODINI.

De prosternale voortzetting smal, in eene uitholling van het mesosternum inlegbaar en slechts het voorste gedeelte van het mesosternum bedekkend. Metasternum tusschen de middelcoxae toegespitst. Bovenzijde behaard. Basis van het halsschild in het midden zeer fijn gerand. Dekschilden dicht- en eenigszins rimpelig bestippeld 14. **Cychramus**.

De prosternale voortzetting is breed afgeknot en kan tegen het recht afgeknote metasternum, tusschen de middelcoxae door, worden aangelegd, en bedekt alsdan het geheele mesosternum. Bovenzijde onbehaard. Basis van het halsschild niet gerand. Dekschilden met fijne stippelrijen en in de tusschenruimten verspreid bestippeld (Cyllodes.)

VII. Tribus IPIINI.

1 Voorste coxaal-bolten van achteren open. Halsschild veel breeder dan lang, met meer of minder vooruitstekende voorhoeken. Lichaam meer of minder breed, soms vrij smal, doch alsdan tamelijk vlak 2

Voorste coxaal-bolten van achteren nagenoeg gesloten. Halsschild ongeveer zoo breed als lang, van voren recht afgeknot, aan de basis zeer fijn gerand. Lichaam zeer smal en nagenoeg cilindervormig, tamelijk gewelfd; onbehaard. 17. **Pityophagus**.

2 Halsschild aan de basis niet gerand. Dekschilden bij het ♂ afgerond, bij het ♀ aan den naadhoek iets uitgetrokken. Mesosternum door eene voortzetting van het prosternum bedekt. De voorkaken niet ver uitstekend. Bovenzijde van het tamelijk breede en eenigszins gewelfde lichaam behaard 15. **Cryptarcha**.

Halsschild aan de basis duidelijk gerand. Dekschilden bij het ♂ afgeknot, bij het ♀ de naadhoek meer of minder duidelijk uitgetrokken. Mesosternum geheel of bijna geheel onbedekt. De voorkaken tamelijk ver vooruitstekend. Bovenzijde onbehaard. 16. **Ips**.

II. Sub-Familie CYBOCEPHALINAE.

VIII. Tribus CYBOCEPHALINI.

Bevat slechts het genus (Cybocephalus.)

III. Sub-Familie RHIZOPHAGINAE.

IX. Tribus RHIZOPHAGINI.

Bevat slechts het genus 18. **Rhizophagus**.

I. Sub-Familie NITIDULINAE.

I. Tribus BRACHYPTERINI.

1. *Cercus* Latr.

Dit genus onderscheidt zich van Brachypterus door het bezit van gewone tarsklauwen, het ontbreken van een kleinen anaalring bij het ♂ en door het grootte, eivormige eindlid der liftasters. Kop zonder sprietgroeven. Boventip iets uitgerand, be-

zeimperd Voorkaken met scherp, eenigszins gebogen top. Achterkaken twee-lobbig. Eindlid der kaaktasters langwerpige-eivond. De 3-ledige knots van het overige gedeelte der sprieten niet scherp* afgescheiden. Dekschilden verkort. Tarsen 5-ledig. Het ♀ meestal iets grooter dan het ♂. — De soorten van dit genus zijn kleine, weinig bewegelijke kevertjes, welke op bloemen, bloeiende struiken, grassen en Cyperaceën op rochtige plaatsen leven. — De larve van *C. rufilabris* is door Perris, de ontwikkeling van *C. solani* door Rupertsberger beschreven.

Van de 7 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Achterhoeken van het halsschild afgerond. Sprietknots in beide seksen 3-ledig. 2

Achterhoeken van het halsschild recht of stomp, de zijrand kantig opgericht, daardoor het halsschild langs de zijden gegroefd (Sub-gen. *Heterhelus* Jacq. Duv., *Amartus* Reitt.) 4

- 2 Clypeus met een lijn dwarsgroefje tusschen de sprieten. Het eerste sprietlid bij het ♂ meer of minder verbreed. Zijden en achterhoeken van het halsschild zeer sterk afgerond (Sub-gen. *Anomoeocera* Shuck.) 3

Clypeus zonder dwarsgroef. Het eerste sprietlid bij het ♂ niet verbreed. Halsschild met weinig afgeronde zijden en meer aangeduide, doch afgeronde achterhoeken (Sub-gen. *Cercus* i.sp.). Veel kleiner dan de andere soorten, meer langwerpig en minder geweldd; lijn witachtig behaard, zeer veranderlijk in kleur, donkerbruin of zwartachtig; de mond en het pygidium rood, de sprieten en pooten geelrood; zeldzamer het geheele lichaam rood of geelrood (ab.c. *pallidus* Heer). De ab.c. *junci* Steph. roodbruin, met donkerbruine of zwarte dekschilden. Bovenzijde krachtig en dicht bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Gemeen op bloeiende *Juncus*- en *Carex*-soorten, op moerassige plaatsen 2. *rufilabris* Latr.

- 3 Sprieten ongeveer zoo lang als het halve lichaam. Bovenzijde krachtig-, vrij dicht bestippeld en zeer fijn grijs behaard; roestkleurig, de dekschilden meestal met eene zwartbruine vlek aan het schildje en min of meer over den naad, zelden bijna geheel donkerbruin; gewoonlijk ook het achterlijf, doch zelden het halsschild donkerbruin. Bij deze soort komen meer plompere voorwerpen voor, bij welke bij het ♂ het eerste en tweede sprietlid zeer sterk verbreed en het tweede bovendien eenigszins driehoekig van vorm en nagenoeg zoo lang als breed is; de knots eenigszins bruinachtig. Bij de minder krachtig ontwikkelde exemplaren zijn bij het ♂ de eerste twee sprietledjes minder sterk-, doch nog duidelijk verbreed; het tweede lid langer dan breed en de knots evenals het overig gedeelte der sprieten meer geelachtig. De ook in twee vormen voorkomende wijfjes zijn aan de gewone sprieten te herkennen. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen op allerlei bloeiende planten, vooral op Umbelliferen, *Spiraea*, *Sambucus*, grassen en waterplanten. 1. *pedicularius* L.

Sprieten bij het ♂ iets langer dan-, bij het ♀ nagenoeg even lang als kop en halsschild. Bovenzijde zwartbruin, met eene groote roodgele vlek op het midden van elk dekschild; zelden geheel roodbruin en slechts de omtrek van elk dekschild zwartbruin (ab.c. *ochraceus* Murray) 1); sprieten en pooten roodgeel. In habitus met *pedicularius* overeenkomende, doch iets minder sterk en dicht bestippeld. Bij het ♂ het eerste sprietlid iets verbreed. Lengte 2½—2 mm. Op droge grasplaatsen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld; ook bij Hamburg en op het eiland Borkum (bipustulatus Payk.)

- 4 Zijden van het halsschild in het midden min of meer hoekig verbreed, vóór de achterhoeken iets uitgebogen, dezen daardoor recht. Sprietknots bij het ♂ onduidelijk 3-ledig, bij het ♀ 2-ledig. Habitus van *pedicularius*, op de bovenzijde veel lijner bestippeld en dichter behaard; roestkleurig geel, of bruinachtig met geelachtige dekschilden, veelal om het schildje en langs den naad donkerder, soms bijna geheel bruinachtig; de sprieten en pooten geelrood. Over het algemeen het ♂ donkerder gekleurd dan het ♀. Lengte 1½—2½ mm. Op bloeiende *Sambucus racemosa*. Niet inlandsch. In België bij Tellin, Hockai en Brussel; in de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf. . . (sambuci St., ♀ scutellaris Heer) (*solani* Heer)

Zijden van het halsschild gelijkmatig afgerond, met stompe achterhoeken. De sprietknots in beide seksen duidelijk 3-ledig. Bovenzijde gewoonlijk donker-, soms lichter roodbruin, de kop en ook het halsschild meer zwartbruin; vrij dicht en grover dan bij *solani* bestippeld, zeer fijn grijs behaard. Sprieten geelrood. Lengte 1½—2½ mm. Op *Spiraea ulmaria*. Arnhem, Juli. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf.

(*Spiraea* Märk., *rhenanus* Bach) 3. *rubiginosus* Er.

1) In Finland komt eene geheel zwarte variëteit (*niger* J. Saldu) voor.

2. *Brachypterus* Kugelann.

*Bovenlip klein, iets uitgerand. Voorkaken scherp toegespitst. Achterkaken tweelobbig. Eindlid der kaaktasters langwerpig, dun, cylindervormig. Laatste liptaster-lid nagenoeg kogelvormig. Pygidium bij het ♂ met een kleinen anaalring. Tarsen 5-ledig; de klauwen aan den wortel met een tandje, daarvoor sterk gekromd. — Levenswijze als bij *Cercus*. De larven van *B. urticae*, *linariae* en *cinereus* alsook de pop van *urticae* zijn door Perris, de larve en pop van *linariae* door Cornelius en de ontwikkeling van *gravidus* door v. Frauentfeld en Kaltenbach beschreven.*

Van de 15 Europeesche soorten komen 6 in Nederland voor.

- 1 De basis van het halsschild aan weerszijden meer of minder uitgebogen, daardoor de achterhoeken duidelijk (Sub-gen. *Heterostomus* J. Duv.) 2
- De basis van het halsschild recht of geleidelijk afgerond, de achterhoeken afgerond of nauwelijks iets aangeduid (Sub-gen. *Brachypterus* isp.) 4
- 2 De achterhoeken van het halsschild nagenoeg recht of spits, door de sterke uitranding der basis iets naar achteren gericht; de voorhoeken iets uitgetrokken, tamelijk recht. Bovenzijde dof-zwart, fijn bruinachtig behaard. 3
- De achterhoeken van het halsschild stomp, niet naar achteren gericht, de voorhoeken niet uitgetrokken, eenigszins afgerond. Bovenzijde dicht neerliggend grijs behaard. Sprietten rood, het eerste lid meestal zwart; de twee paar voorpooten roodbruin, de middelschenen min of meer, de achterpooten, behalve de tarsen, nagenoeg geheel zwartachtig. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Op *Sarothamnus vulgaris*; Arnhem en Venlo, Juni. In België bij Neerhaeren, in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 3. ***cinereus*** Heer.
- 3 De sprietten en de twee paar voorpooten, soms alle pooten geheel rood. Achterhoeken van het halsschild eenigszins spits uitgetrokken. Bovenzijde uiterst dicht en vrij grof bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Gemeen op bloeiende *Linaria vulgaris*, *Galium erectum* en *Spiraea ulmaria*. 1. ***gravidus*** Ill.
- Het eerste spriettlid zwart; slechts het eerste paar pooten rood. Achterhoeken van het halsschild nagenoeg recht, minder uitgetrokken. Overigens op *gravidus* gelijkend. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Zeldzamer. In de bloemen van *Linaria vulgaris*, Juni en Juli; den Haag, Vianen, Assen en in de omstreken van Maastricht. In de Rijnprov. bij Elberfeld. 2. ***linariae*** Cornelius.
- 4 De zijden en achterhoeken van het halsschild volkomen afgerond. Bovenzijde glanzig zwart, iets loodkleurig, wit-grijs behaard; de pooten donkerbruin of zwart; de sprietten geheel zwart of donkerbruin, de eerste 2 leedjes zwart. Lichaam minder gedrongen dan bij *Urticae*. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer gemeen op bloeiende brandnetels. (*pubescens* Er.) 4. ***glaber*** Newm.
- De zijden van het halsschild vóór de achterhoeken eenigszins rechtlijnig, waardoor deze meer stomp zijn. Sprietten geheel of grootendeels, benevens de pooten rood 5
- 5 Spriethoeken donker. Bovenzijde glanzig zwart, dicht grijs behaard en vrij dicht bestippeld. Habitus van *glaber*. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer zeldzaam, op *Urtica*. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht, Juni en Juli, gevangen 5. ***fulvipes*** Er.
- Sprietten geheel rood. Lichaam korter en meer gedrongen, zwartachtig of bruin, soms roodbruin, met uiterst geringen, bronzen weerschijn; vrij sterk en niet dicht bestippeld; de schenen aan de basis iets bruinachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer gemeen op bloeiende brandnetels en enkele andere planten, als *Stachys sylvatica* en *Sisymbrium alliariae*. 6. ***urticae*** F.

II. Tribus CARPOPHILINI.

3. *Carpophilus* Leach.

Bovenlip tweelobbig. Voorkaken breed en scherp toegespitst, met een klein tandje achter den top. Achterkaken slechts met éne lob. Eindlid der kaaktasters zoo lang als de overige leedjes te zamen. Eindlid der liptasters iets bijlvormig verbreed. Sprietten met scherp afgescheiden knots. De laatste 2 of 3 tergieten onbedekt. Pygidium bij het ♂ met een kleinen anaalring, welke in het diep uitgerande vijfde sterniet opgenomen is. Bij het ♀ is het vijfde sterniet gewoon afgerond. Tarsen

5-ledig. — De larve en pop van *C. hemipterus* en *sempustulatus*, benevens de larve van *bipustulatus* zijn door Perris beschreven. — De soorten van dit genus leven in gedroogde vruchten, als: vijgen, dadels en ook in rijst; zeldzamer achter boomschors.

Van de 7 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild naar de basis niet versmald, zoo breed als de dekschilden, welke nagenoeg even lang als breed zijn (Sub-gen. *Carpophilus* Lsp.) 2

Halsschild naar de basis versmald. Dekschilden veel langer dan breed, met parallelle zijden (Sub-gen. *Ecnomorphus* Murray). Bovenzijde pekzwart of pekbruin, soms roodbruin, tamelijk glanzig, zeer weinig behaard; eene schouderplek, eene grootere vlek nagenoeg in het midden naast den naad, benevens een smal, veelal ontbrekend vlekje naast den zijrand achter het midden, geel. Spriet en roodbruin met zwartachtige knots, pooten lichter of donkerder roodbruin. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Achter schors van beuken- en dennenstronken, ook aan uitloeiend eikensap. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Düsseldorf en Crefeld; ook in Oldenburg en Westfalen (*abbreviatus* Panz.) (*sempustulatus* F.)

- 2 Dekschilden, evenals de rest van het lichaam, bruinzwart, bij onuitgekleurde exemplaren roodbruinachtig; met eene lichtere schouderplek, welke zich meestal tot aan den naad voortzet, doch niet altijd even duidelijk is; deze vlek is, evenals het halsschild behalve op het midden, langer en dichter geelachtig behaard. Spriet en pooten rood. Lengte 2—3 mm. Enkele malen in groot aantal in *Arachiden*-noten, dadelkisten, cacao en zelfs in rijst; zij schijnt uit West-Indië afkomstig en over de geheele aarde verspreid te zijn. 1. *dimidiatus* F. 1)

Dekschilden duidelijk geel gevlekt. 3

- 3 Dekschilden met eene vlek aan den schouder en eene groote, naar buiten uitgebogen, het geheele uiteinde innemende vlek, geel; soms breiden zich de beide groote vlekken meer uit en vloeien ook wel ineen, of wel zij bepalen zich slechts tot eene stip aan den schouder en eene kleine ronde vlek aan het uiteinde, welke den toprand niet bereikt (ab. c. **quadrisignatus* Er.); de grondkleur is overigens donkerbruin tot roodbruin. Spriet en pooten geelrood, de sprietknots meestal iets donkerder. Lengte $2\frac{1}{4}$ —3 mm. Zeer verbreid in waren, op vijgenmanden enz.; ook in pakhuizen tegen muren en vensters. Bij Berlijn zou zij ook op bloeiende boekweit, alsook achter boomschors aangetroffen zijn 2. *hemipterus* L.

Dekschilden slechts met eene geelroode middenvlek, overigens de geheele bovenzijde pekzwart of pekbruin; de spriet grootendeels en de pooten roodbruin. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld, ook bij Hamburg . . . (*bipustulatus* Heer)

III. Tribus NITIDULINI.

4. Omosiphora Reitter.

Bovenlip diep uitgesneden, min of meer twee-lobbig. Voorkaken minder scherp toegespitst dan bij *Epuraea*, achter den top met een stomp tandje. Achterkaken met slechts ééne lob. Eindlid der beide taster-paren kort, rond en aan den top duidelijk afgeknot. Sprietknots losgeleed. Sprietgroeven als bij *Epuraea*. Lichaam zeer kort en breed. Halsschild en dekschilden met zeer breed en vlak uitgebreide zijden. Dekschilden het pygidium bijna geheel bedekkend. Pygidium bij het ♂ afgeknot, de anaal-ring vrij groot. Achtercoxae zeer ver van elkaar afstaande. Tarsklauwen ongetand.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam breed-eivormig, dicht bestippeld, lijn neerliggend behaard. Spriet en roestrood, gewoonlijk met iets donkerder knots. Kop donkerbruin. Halsschild van voren breed uitgegerand, donkerbruin of bruin, met roestrooden zijrand. Dekschilden donkerbruin of bruin, de basis en de zijrand roestrood. Pooten roodachtig. Soms het geheele lichaam nagenoeg eenkleurig rood. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Zeer verbreid op boomzwammen, achter schimmellende boomschors en aan uitloeiende sappen 1. *limbata* F.

1) De opgave van *C. rubripennis* Heer in Nederland berust op onjuiste determinatie.

5. *Epuraea* Erichson.

Lichaam meer gestrekt, elliptisch, lang-cirond of min of meer vierhoekig. Halschild en dekschilden met veel minder breedte, vlak-uitgebreide zijden. Eindlid der kaaktasters lang-cirond, aan het uiteinde afgerond; dat der liptasters kort en dik-cirond, aan het uiteinde duidelijk afgeknut. Sprietgroeven, op de onderzijde van den kop, recht, naar elkaar toegericht. Achtercoxae niet ver van elkaar verwijderd. Het overige als bij *Omosiphora*. — De soorten van dit genus leven op bloemen, achter boomschors en aan uitvloeiende boomsappen. — De larve van *E. obsoleta* is door Bouché en Perris, de pop door Perris beschreven.

Van de 38 Europeesche soorten komen 13 in Nederland en 7 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halschild lichter of donkerder bruin, met eene gele basaalvlek voor het schildje en met lichtere zijden. Dekschilden met verscheidene gele vlekken. Schenen, vooral bij het ♂, naar het uiteinde verbreed; de achterschenen aan de binnenzijde, achter de basis, plotseling verbreed en van daar tot aan het uiteinde met nagenoeg parallele zijden; bij het ♂ soms met een tandje achter de basis (Sub-gen. *Dadopora* Thoms.) 2
- Halschild aan de basis niet geel gevlekt. Dekschilden in den regel ongevekt. Schenen bij het ♂, ook de achterschenen, smal (Sub-gen. *Epuraea* l.s.p.) 3
- 2 Zijden van het halschild en der dekschilden tamelijk breed afgezet en opgericht. Halschild naar voren sterk versmald. Bovenzijde donkerbruin, de 5 gele vlekken op elk der dekschilden scherp begrensd. Achterschenen bij het ♂, achter de basis, met een tand. Lengte 3—4 mm. Verbreid, doch over het algemeen zeldzaam, aan uitvloeiende sappen van eiken, beuken en wilgen; ook aan boomzwammen, Juni tot Nov.; bij Roermond in groot aantal. Bij eene aberratie uit St. Pieter bij Maastricht zijn de twee gele vlekken op elk dekschild aan weerszijden van den naad met elkaar versmolten 1. **decemguttata** F.
- Zijden van het halschild en der dekschilden smal afgezet en weinig opgericht. Halschild naar voren slechts iets meer dan naar achteren versmald. Bovenzijde lichtbruin, de gele vlekken op de dekschilden flauw aangeduid en gewoonlijk ineenvloeiend. Achterschenen in beide seksen gelijk, bij het ♂ zonder duidelijke tand. Kleiner en smaller dan *decemguttata*. Lengte 2½ mm. Niet inlandsch. In Frankrijk en Engeland (*diffusa* Bris.) (*fascicollis* Steph.)
- 3 Voorrand van het halschild duidelijk uitgerand 4
- Voorrand van het halschild bijna niet uitgerand, nagenoeg recht afgeknut. Dekschilden met smal afgezetten zijrand. Lichaam eenigszins langwerpig, geel of roodgeel, dicht bestippeld en lijn neerliggend geel behaard. Achterhoeken van het halschild als kleine, rechthoekige tandjes. Dekschilden met recht afgeknut uiteinde. Middelschenen bij het ♂ aan de binnenzijde aan het uiteinde iets verbreed. Lengte 2½—2¾ mm. Op bloemen, vooral in het eerste voorjaar en in het begin van den zomer; zeldzamer aan boomsappen en aan versch afgeschilde boomschors 13. **florea** Er.
- 4 Halschild nagenoeg of volkomen dubbel zoo breed als lang 5
- Halschild hoogstens 1½ maal zoo breed als lang, van voren veelal slechts weinig of niet smaller dan van achteren; de grootste breedte ligt meestal nagenoeg in of kort achter het midden 15
- 5 Het eindlid der sprietknuts aan het uiteinde breed afgerond. Halschild van voren veel smaller dan van achteren; de grootste breedte ligt ver naar achteren 6
- Het eindlid der sprietknuts op den top met eene tepelvormige verhevenheid 9
- 6 Het eindlid der sprietknuts bij het ♂ even breed als-, bij het ♀ breder dan de overige leedjes. Schenen in beide seksen gewoon. Dekschilden aan het uiteinde min of meer afgerond. Sprietknuts geheel 7
- Het eindlid der sprietknuts smaller dan het tweede lid. Dekschilden aan het uiteinde recht afgeknut, met afgeronde buitenhoeken 8
- 7 Halschild met matig breeden-, de dekschilden met tamelijk smallen, omgebogen zijrand. Achterhoeken van het halschild nagenoeg recht. Eindlid der sprietknuts bij het ♀ zoo groot als de twee overige leedjes te zamen. Lichaam eenkleurig, lichter of donkerder okergeel of roodgeel, dicht bestippeld; de dekschilden veelal achter het midden met een klein, onduidelijk zwart vlekje, hetwelk bij ab.c. *signata* St. tot eene groote, langwerpig, zwarte middenvlek ontwikkeld is. Lengte 2½—3½ mm. Gemeen op allerlei bloeiende planten. De ab.c. *signata* vrij zeldzaam (depressa Gylh., ochracea Er.) 2. **aestiva** L.

Halsschild en dekschilden met zeer breeden, eenigszins omgebogen zijrand; de achterhoeken van het halsschild eenigszins spits. Eindlid der sprietknots bij het ♀ kleiner dan de overige leedjes te zamen. Lichaam eenkleurig geelachtig, of vuilbruin met lichtere randen; meestal de naad en het uiteinde der dekschilden, zeldzamer eene langsvlek donkerder gekleurd; de donkere grond der dekschilden sluit gewoonlijk achter het midden eene lichtere, ovale vlek in. Fijner en minder dicht bestippeld dan *aestiva*. Spriet en pooten lichtgeel. Deze soort herinnert iets aan *obsoleta*, doch is grooter, breeder en aan de zijden breeder gerand. Lengte 3—3½ mm. Aan uitvloeiende boomsappen en aan versch geschilde boomschors. Eenmaal bij den Haag in Mei. In de Rijnprov. bij Crefeld; ook bij Bremen.

3. *deleta* Er.

- 8 Dekschilden met breed afgezetten zijrand, in het midden iets buikig verbreed. Middelschenen bij het ♂ aan het uiteinde iets naar binnen verbreed. Lichaam groot en breed, eenkleurig geel, soms het uiteinde en de zijden der dekschilden iets berookt, zelden met een vrij onduidelijk, licht rond vlekje achter het midden. Lengte 4 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf. Bij Oldenburg uit *Polyporus betulae* gekweekt.

(*Silacea* Herbst)

Dekschilden met smal omgebogen zijrand. Middelschenen in beide seksen gewoon. Lichaam eenkleurig roestrood. Zeer op *aestiva* gelijkend, doch glanziger, krachtiger en minder dicht bestippeld; het halsschild aan de basis iets smaller dan de dekschilden, met tamelijk smallen randzoom en stompe achterhoeken. Eindlid der sprietknots altijd donker gekleurd. Dekschilden iets langer. Lengte 3—3½ mm. Verbreed, vooral op bloeienden *Crataegus*.

4. *melina* Er.

- 9 Dekschilden aan het uiteinde nagenoeg recht afgeknot, de zijrand tot aan het uiteinde smal omgebogen 10
Dekschilden elk aan het uiteinde afgerond 12
10 Halsschild aan de zijden matig- en tot aan de basis gelijkmatig afgerond, met nagenoeg rechte achterhoeken 11
Halsschild aan de zijden sterk afgerond, in- of vlak achter het midden het breedst, de voorrand vrij diep uitgesneden, voor de eenigszins spitse achterhoeken iets uitgebogen. Lichaam licht roestrood, op de bovenzijde dicht en krachtig bestippeld. Middelschenen bij het ♂ aan het uiteinde naar binnen uiterst weinig verbreed. Lengte 2½—3½ mm. Niet ind. Zij zou in Westfalen voorkomen (*castanea* Dfts.)

- 11 Halsschild vóór de basis het breedst, met vrij diep uitgeranden voorrand. Bovenzijde, behalve de roodbruine randen van het halsschild en der dekschilden, bruinzwart of donkerbruin, zelden eenkleurig bruinrood (*ab.c. *convergens* Reitter); zeer dicht en vrij sterk bestippeld. Dekschilden vrij kort en breed, naar het uiteinde iets versmald, met nagenoeg rechte zijden. Middelschenen in beide seksen gewoon. Lengte 2½—2¾ mm. Aan uitvloeiende boomsappen, aan versch geschilde boomschors en soms onder dorre beukenbladeren. Apeldoorn, Aug. In de Rijnprov. bij Düsseldorf 5. *neglecta* Heer.

Halsschild nagenoeg aan de basis het breedst, met oppervlakkig uitgeranden voorrand. Bovenzijde eenkleurig roodgeel, dicht doch zeer fijn bestippeld. Middelschenen bij het ♂ aan het uiteinde sterk verbreed. Deze soort herinnert aan *longula*, doch is korter en breeder, aan de zijden van het halsschild, vóór de achterhoeken, niet naar binnen gebogen. Dekschilden naar het uiteinde duidelijker versmald. Lengte 2½—2¾ mm. Achter dennenschors. Den Haag, Loosduinen, Oisterwijk, Winterswijk en Enschedé 6. *abietina* J. Sahlb.

- 12 Het eindlid der sprietknots nagenoeg zoo breed als het tweede lid. Zijrand der dekschilden breed afgezet 13
Het eindlid der sprietknots smaller dan het tweede lid 14

- 13 Halsschild tamelijk fijn- en over de geheele oppervlakte gelijkmatig bestippeld. Middelschenen bij het ♂ aan het uiteinde iets verbreed. Sprietknots donker gekleurd. Halsschild in het midden en de dekschilden langs de zijden en aan het uiteinde, min of meer uitgebreid, donker gekleurd. Sommige exemplaren alleen aan het uiteinde der dekschilden donker, in welk geval ook de sprietknots licht gekleurd is. Zelden het geheele lichaam eenkleurig geel (*ab.c. Seidlitzii* Schilsky), of geheel donker (*ab.c. nigricans* Schilsky). Lengte 3—3½ mm. Aan uitvloeiende boomsappen en achter versch geschilde boomschors; ook op versch geveld hout, zeldzamer op bloemen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf.
(*immunda* Er.) (*terminalis* Mannerh.)

Halsschild over het midden grof-, op de breed afgezette zijden fijner bestippeld. Bovenzijde roestrood; de dekschilden met eene ronde, meer of minder duidelijke zwarte vlek op het midden; veelal ook aan het uiteinde en soms ook het midden van het halsschild zwart. Bij *ab.c. variabilis* Reitt. heeft de zwarte kleur de overhand, alleen de randen van

halsschild en dekschilden, eene groote basaalvlek en eene kleinere vlek aan het uiteinde blijven roodachtig. Bij ab.c. *monochroa* Reitt. is het geheele lichaam eenkleurig licht-roestrood. Middelschenen in beide seksen gewoon. Sprietknoks geheel licht gekleurd. Lengte 2½—3 mm. Achter boomschors, aan uitvloeiende sappen van eiken en op boleren. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf (variegata Herbst)

- 14 Lichaam donkerbruin met breede, lichte zijranden, of wel roodbruin met het midden van het halsschild en een langsveeg op elk dekschild donkerbruin. Uiteinde der dekschilden afgerond, naar buiten iets scheef afgeknut. Middelschenen in beide seksen gewoon. Halsschild met iets gegolfde zijranden en nagenoeg rechte achterhoeken. Sprietknoks en soms ook de dijen bruinachtig. Lengte 3—3½ mm. Achter boomschors. Zij zou in de gangen van *Dryocoetes autographus* voorkomen. In aantal bij Arnheim en den Haag, Mei. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. (parvula St.) 7. **rufomarginata** Steph.

Lichaam lichter of donkerder roodgeel of vuil-okerkleurig, meestal in het midden van het halsschild en de dekschilden berookt; de dekschilden altijd met eene, gewoonlijk ook bij licht-gekleurde exemplaren aangeduide, lichter doorschijnende vlek tusschen het midden en het uiteinde. Een exemplaar uit Putten (Gelderland) is op het midden van het halsschild en langs den zijrand en aan het uiteinde der dekschilden berookt. Lichte exemplaren met eene donkere vlek achter het midden der dekschilden vormen de ab.c. *bipunctata* Heer. Uiteinde der dekschilden naar buiten niet scheef afgeknut. Middelschenen bij het ♂ aan het uiteinde naar binnen verbreed. Halsschild met minder breed afgezetten, nagenoeg niet gegolfden zijrand en met eenigszins spits uitstekende achterhoeken. Sprietknoks min of meer bruinachtig. Lengte 2½—3 mm. Gemeen achter schors van dennen en populieren, aan uitvloeiende boomsappen, op versch geveld hout, bloemen en paddestoelen. De ab.c. *bipunctata* bij Kolhorn (N.-H.) 8. **obsoleta** F.

- 15 Halsschild aan de zijden, vóór de achterhoeken, duidelijk uitgebogen. Bovenzijde van het tamelijk smalle, langwerpig lichaam eenkleurig zwart, bruin of bruingeel; de dekschilden bijna niet met lichtere randen. Halsschild ongeveer ½ breeder dan lang, naar voren en naar achteren nagenoeg gelijk versmald; de zijden breed afgezet en iets omgebogen. Middelschenen bij het ♂ aan het uiteinde naar binnen verbreed. Lengte 2½—2¾ mm. Niet inl. Zij zou in de Rijnprov. bij Crefeld gevangen zijn. (boreella Zett.)

Halsschild aan de zijden, vóór de achterhoeken, niet uitgebogen, tot aan de basis in eene ronding doorgaande 16

- 16 Bovenzijde donker met lichtere randen. Middelschenen bij het ♂ recht, aan het uiteinde niet of nauwelijks verbreed. 17

Bovenzijde eenkleurig roodgeel of okergeel 18

- 17 Halsschild de helft breeder dan lang, van voren duidelijk smaller dan aan de basis, met breed afgezetten zijrand. Dekschilden met tamelijk breed afgezetten zijrand, naar het uiteinde eenigszins smal afgerond. Bovenzijde roestrood; de dekschilden en veelal ook het halsschild, behalve de zijranden, donkerbruin; zelden donker roodbruin met lichtere randen. Lichaam langwerpig-vierhoekig, met tamelijk parallele zijden. Onuitgekleurde exemplaren kunnen bijna eenkleurig okergeel zijn. Lengte 2½—2¾ mm. Eenmaal bij Breda. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. 9. **pygmaea** Gylh.

Halsschild slechts weinig breeder dan lang, van voren nauwelijks smaller dan aan de basis, met smal afgezetten, weinig afgeronden en eenigszins gegolfden zijrand. Dekschilden met zeer smalle zijrand, aan het uiteinde recht afgeknut. Bovenzijde van het lange, smalle lichaam donkerbruin, met smalle lichtere randen. Lengte 2—2½ mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld (angustula Er.)

- 18 Dekschilden elk afzonderlijk aan het uiteinde smal afgerond en naar buiten eenigszins scheef afgesneden. Halsschild met breed afgezetten zijrand. Middelschenen bij het ♂ gebogen, aan het uiteinde krachtig, eenigszins haakvormig naar binnen verbreed. Lichaam roodachtig-geelbruin, de bovenzijde dicht bestippeld; de sprietknoks licht gekleurd. Lengte 2½—3 mm. Achter boomschors, vooral van wilgen; verbreed, doch niet gemeen. 10. **pusilla** Illig.

Dekschilden aan het uiteinde breed afgerond, nagenoeg afgeknut. Middelschenen bij het ♂ aan het uiteinde naar binnen verbreed 19

- 19 Halsschild van voren duidelijk smaller dan aan de basis. Het eindlid der sprietknoks nagenoeg zoo breed als het tweede lid. Bovenzijde van het tamelijk gestrekte, smalle lichaam helder okergeel, iets minder dicht bestippeld dan bij *pusilla*, tamelijk glauzig; eenkleurig, zelden de dekschilden elk met twee kleine, berookte, ronde vlekjes; nog zeldzamer het uiteinde, kort voor den toprand, met een smalle, zwartachtigen dwarsband (ab.c. **Erichsonis* Reitt.) of wel met een berookten langsveeg of eene ovale, zwarte middenvlek (ab.c. **ornata* Reitt.). Sprietknoks donker. Deze soort onderscheidt zich van *florea*, doordat de voorrand van

het halsschild niet recht afgeknot-, van de licht-gekleurde *obsoleta*, doordat de voorrand van het halsschild minder diep uitgerand is. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Op bloemen en achter boomschors; verbreid in de grensprovinciën 11. *longula* Er.

Halsschild van voren nauwelijks smaller dan aan de basis. Het eindlid der sprietknots duidelijk smaller dan het tweede lid. Lichaam korter en breeder, de dekschilden met parallelle zijden. Eenkleurig roodgeel; de sprietknots gewoonlijk donker gekleurd. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Eenmaal bij Arnhem, Aug. In de Rijnprov. bij Crefeld 12. *oblonga* Herbst.

Micrurula Reitter.

Dit genus is naverwant aan Epuraea en onderscheidt zich doordat het halsschild aan de zijden niet vlak uitgebreid en nagenoeg tot aan de fijn gerande zijden gevoelfd is. Klauwen met eene bultige verhevenheid aan de basis. Pygidium bij het ♂ afgerond, de kleine anaal-ring veelal moeilijk zichtbaar.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam tamelijk kort en breed, dicht bestippeld, vrij dicht grauw behaard; gewoonlijk grijs-achtig-bruinzwart, met roodgele spriet en pooten en roodachtig-geelbruine dekschilden (*brunnea* Heer); soms zijn ook de dekschilden grijsachtig-bruinzwart; bij *ab.c. affinis* Steph. het geheele lichaam roodgeel. Halsschild van voren oppervlakkig uitgerand. Middelschenen in beide seksen gewoon. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. In bosschen in het voorjaar, tusschen droge bladeren; ook op bloemen. Niet inl. in de Rijnprov. . (*melanoccephala* Marsh.)

6. Nitidula Fabr.

*Bovenlip gewoon uitgerand. Voorkaken met twee-tandigen top. Achterkaken éénlobbig. Eindlid der kaaktasters geleidelijk toegespijst. Liptasters niet verdikt, het eindlid eivormig-toegespijst. Sprietknots zeer breed, rondachtig, met dicht openstaande leedjes. Sprietgroeven, aan de onderzijde van den kop, naar binnen gebogen. Halsschild, dekschilden en pygidium aan de randen zeer dicht bewimperd. De anaal-ring bij het ♂ verborgen. De eerste 3 tarsleedjes verbreed. — De soorten van dit genus leven meestal op aas en beenderen, zelden achter boomschors en in paddestoelen. — De larve van *N. carnaria* is door Perris beschreven.*

Van de 5 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

1 Halsschild naast den omgebogen zijrand, ten minste van voren, vlak uitgebreid. Lichaam tamelijk breed. 2

Halsschild, vooral naar voren, tot aan den smal omgebogen zijrand, gewelfd, aan weerszijden met eene meer of minder doorlopende, aan den zijrand evenwijdig loopende, langsplooi. Lichaam smal, bruinzwart; elk der bruine dekschilden met twee achter elkaar liggende okergele vlekken en soms nog met twee vlekjes aan den zijrand, welke bij *ab.c. variata* Steph. (*flavipennis* Heer) nagenoeg ineenvloeden en de geheele dekschilden innemen. Bij *ab.c. castanea* Sahlb. is de geheele bovenzijde roodgeel. Lengte 2—3½ mm. Gemeen in zandige streken, o.a. op de duinen aan aas en vooral op bijna afgeknagde beenderen, in gezelschap van *Dermestes*, *Saprinus* en *Omosita*.

(*quadripustulata* F.) 3. *carnaria* Schaller.

2 Halsschild dubbel zoo breed als lang, van voren veel smaller dan aan de basis, langs den omgebogen zijrand tot aan de basis breed en vlak uitgebreid. Bovenzijde zwartachtig tot donker roodbruin; onuitgekeurde exemplaren roodbruin; de dekschilden elk met eene ronde, roode vlek achter het midden. Bij het ♂ het halsschild naar voren iets meer versmald en iets dichter en fijner bestippeld dan bij het ♀. Lengte 3½—4½ mm. Veelal in huizen; zij knaagt aan allerlei eetwaren, beenderen en wollen stoffen, zeldzamer aan aas. Eenmaal in een legermagazijn te Maastricht zeer schadelijk aan spek. 1. *bipustulata* L.

Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, van voren weinig smaller dan aan de basis, langs den omgebogen zijrand, vooral naar voren, vlak uitgebreid. Bovenzijde minder breed dan bij *bipustulata*, eenkleurig zwartachtig of donker roodbruin, bij onuitgekeurde exemplaren lichtbruin. Spriet en, behalve de bruine knots, benevens de pooten roodachtig. Lengte 3—4 mm. Aan aas. Uitsluitend bij Roermond gevangen. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf; ook in Westfalen en bij Hamburg. (? *rufipes* L.) 2. *obscura* F.

7 *Amphotis* Erichson.

Bovenlip diep uitgerand, eenigszins twee lobbig. *Voorkaken* met twee-tandigen *op* en verbreed, scherpen buitenrand. *Eindlid* der beide *taster-paren* cilindervormig. *Eerste sprietlid* zeer sterk oortvormig verbreed en uitgehold; de *sprietknots* nagenoeg cirkelrond, samengedrukt. *Sprietgroeven* aan de onderzijde van den kop naar buiten gericht. *Lichaam* breed-ovaal. *Tarsen* gewoon, niet verbreed.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam ovaal, gewelfd. *Halschild* en *dekschilden* met zeer breed afgezetten en omgebogen, lichter zijrand; de achterhoeken van het *halschild* recht. *Dekschilden* met 5 langribben. Roodbruin; de (behalve de randen) gewoonlijk donkerder *dekschilden* aan de basis en achter het midden licht gevlekt; onderzijde en pooten geelrood. *Lengte* 4—4½ mm. *Verbreid*, in de nesten van *Lasius fuliginosus*, in oude boomstammen, vooral achter losse stukken schors; toevallig aan uitvloeiende eikensappen of op bloemen. Zij is een echte mierengast, daar zij door de mieren gevoed wordt. De levenswijze is door *Wasmann* beschreven. 1. *marginata* F.

8. *Soronia* Erichson.

Bovenlip iets uitgerand. *Voorkaken* met gewonen top en een kleinen tand achter het uiteinde. *Eindlid* der *tasters* aan het uiteinde iets versmald. *Eerste sprietlid* gewoon verbreed, de *sprietknots* afgescheiden, groot, eivond, samengedrukt. *Sprietgroeven*, op de onderzijde van den kop, naar binnen gericht. *Lichaam* breed-ovaal. *Dekschilden* het geheele achterlijf bedekkend. *Tarsen* gewoon, niet verbreed. — *Larven* en *kevers* leven achter boomschors en vooral aan uitvloeiende boomsappen. — De larve van *S. grisea* is door *Curtis*, *Westwood* en *Erichson*, de pop door *Perris* beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Lichaam breed-ovaal, iets gewelfd, duidelijk en dicht bestippeld, donkerbruin tot roodbruin, met lichte, verspreide, hier en daar ineenvloeiende vlekjes. *Dekschilden* met een 5-tal weinig duidelijke, kielvormige langlijnen. Voorschenen bij het ♂ gebogen en aan het uiteinde sterk verdikt. *Lengte* 4½—6½ mm. Vrij zeldzaam, aan uitvloeiende boomsappen en achter boomschors 1. *punctatissima* Ill.

Lichaam smaller, meer afgeplat en niet dicht bestippeld, doorgaans lichter gekleurd, met zwartachtige vlekjes en streepjes geteekend, welke iets achter het midden der *dekschilden* eene lichte vlek insluiten. *Dekschilden* met zeer onduidelijke kielvormige langlijnen. Voorschenen in beide seksen gewoon. *Lengte* 3½—5½ mm. Zeer gemeen achter boomschors, aan uitvloeiende boomsappen en soms in groot aantal op rijpe frambozen.

2. *grisea* L.

9. *Omosita* Erichson.

Bovenlip iets uitgerand. *Voorkaken* met gewonen top, daarachter met eene korte insnijding. *Eindlid* der *kaaktasters* naar het uiteinde iets versmald. *Eindlid* der *liptasters* nagenoeg eivond. Het eerste *sprietlid* gewoon verbreed, de *knots* rondachtig, samengedrukt. *Sprietgroeven*, op de onderzijde van den kop, iets naar buiten gericht. *Larven* op afgeknagde beenderen en aan aas.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 *Halschild* naar voren zoo sterk versmald, dat de voorrand ongeveer de helft smaller dan de basis is; aan weerszijden breed en diep ingedrukt. *Dekschilden* met breed omgebogen zijrand en in rijen behaard. Bovenzijde geelachtig tot roodbruin, hier en daar met flauw aangeduide donkere vlekken. *Lengte* 3½—4½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld (*depressa* L.)

Halschild van voren slechts weinig smaller dan aan de basis, met twee middenstreepjes voor de basis. Dekschilden tot aan de zijden gewelfd 2

- 2 Halschild met smal afgezetten zijrand. Bovenzijde zwartachtig of donkerbruin, soms roodbruin of bij onuitgekleurde exemplaren geelbruin; de randen der dekschilden licht gekleurd en de dekschilden met verspreide lichtere vlekken, welke aan het uiteinde tot eene groote geelachtige vlek ineenvloeien. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Overal zeer gemeen op aas en afgeknaagde beenderen, vooral op zandgrond 1. **colon** L.

Halschild met breed afgezetten zijrand. Deze soort komt in kleur met **colon** overeen, doch vertoont eene groote, gemeenschappelijke gele vlek van af de basis tot over het midden der dekschilden. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Met **colon**, doch iets minder gemeen . 2. **discoidea** F.

Ipidia Erichson.

Lichaam lang-gestrekt, met parallele zijden. Bovenlip iets uitgerand. Voorkaken aan het uiteinde gespleten. Tweede en derde liptaster-lid sterk verdikt. Eerste sprietlid naar buiten iets verbreed, de sprieknoots rondachtig. De sprietgroeven op de onderzijde van den kop aan elkaar evenwijdig loopend. Tarsen gewoon, niet verbreed. Het ♂ met een kleinen anaal-ring.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Glanzig-zwart, onbehaard; de dekschilden met eene groote vlek aan den schouder en eene tweede vlek achter het midden nabij den naad, rood; de pooten pekbruin, de tarsen en de sprieten roodachtig. Halschild langs den zijrand gegroefd, aan weerszijden met eenige grove stippels, overigens uiterst fijn bestippeld. Dekschilden met grove stippelrijen, de zevende tussenruimte kielvormig verheven, ook de vijfde en min of meer de derde tussenruimte zeer flauw kielvormig. Lengte 4½—5 mm. Achter rottende eiken- en denenschors. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf (*quadrinotata* F.)

IV. Tribus MELIGETHINI.

10. Pria Stephens.

Dit genus is zeer verwant aan Meligethes. Bovenlip kort, twee-lobbig. Voorkaken aan den buitenrand verbreed, scherp toegespitst, met een paar tandjes achter het uiteinde. Eindlid der kaaktasters cilindervormig, afgeknot; het eindlid der liptasters grooter, eivormig en eveneens afgeknot. Sprieknoots bij het ♂ 4-ledig en gezaagd, bij het ♀ 3-ledig (Fig. 41, II). Sprietgroeven onduidelijk, slechts aan den binnenrand der oogen aangeduid. Het laatste sterniet zonder indrukken. Voorschenen smal, niet getand, doch, bij sterke vergrooting gezien, uiterst fijn gekorven.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Bruinachtig-geel, eenigszins olijkleurig, zeer fijn bestippeld, fijn zijdeglanzig grijs behaard, het schildje en de onderzijde donkerder gekleurd. Pooten geelachtig; de sprieten geel, de knoots bruin. Overigens op een kleinen Meligethes gelijkende. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer verbreid op Solanum dulcamara en nigrum. De larve en pop door Perris beschreven.

1. **dulcamarae** Scop.

11. Meligethes Stephens.

Bovenlip twee lobbig. Voorkaken breed, achter den top aan den binnenrand stomp getand. Eindlid der kaaktasters langer en dunner dan dat der liptasters. Sprieten kort, met rondachtige, dicht geledede knoots. Sprietgroeven diep, voorbij den binnenrand der oogen naar achteren reikend. Op het eerste sterniet bevinden zich z.g. dijlijnen,

welke om de trochantinen verloop en volgens Schilsky door hare verscheidenheid tot de onderscheiding van soorten zouden aanleiding kunnen geven. Veelal worden de dijlijnen door de achtercoxae bedekt en blijven dan onzichtbaar (b.v. bij *M. coracinus*, *viduatus* en *hebes*). Het laatste sterniet aan weerszijden met een ondiepen, boogvormigen indruk. Voorschenen naar het uiteinde verbreed, in den regel duidelijk en op verschillende wijze getand (Fig. 43). Tarsen 5-ledig, de eerste 3 leedjes verbreed. Klauwen gewoon, zelden getand. Bij het ♀ is het laatste sterniet geheel afgerond, bij het ♂ aan het uiteinde iets uitgerand; veelal met een kleinen indruk aan het uiteinde en soms ook met een klein bultje. Bij het ♂ van sommige soorten is ook het metasternum iets ingedrukt; ook zijn bij het ♂ de voor- en middeltarsen sterker verbreed en bezitten zij nog een kleinen anaalring. De soorten van dit

Fig. 43. Voorschen van *Meligethes obscurus* Fr. Orig.

genus zijn gewoonlijk zwart of bruin, soms bronskleurig, groen- of blauwachtig; zij vertoonen, bij microscopisch onderzoek, op de bovenzijde eene zeer verschillende sculptuur (Fig. 44). — De soorten leven bijna uitsluitend op bloeiende planten, zeer zelden achter schors en aan uitvloeiende boomsappen. Zij voeden zich vooral met stuifmeel. Enkelen zijn schadelijk aan cultuurgewassen (o. a. *M. brassicae* aan koolzaad). — De ontwikkeling van *M. brassicae* is door Heeger, de larve en pop van *brassicae* en *viridescens* door Perris, de larve en pop van *Symphyti* door Cornelius, de larve van *difficilis* door Rey en de larven van *nanus*, *obscurus*, *flavipes*, *egenus* en *erythropus*, benevens de pop van *nanus*, door Perris beschreven.

Van de ruim 100 Europeesche soorten komen 43 in Nederland en 20 in het aangrenzend gebied voor.

Fig. 44. Sculptuur by *Meligethes*. Orig.

I *M. rufipes* Gyll. II *M. coracinus* St. III *M. subrugosus* Gyll.

- 1 Klauwen ongetand (Sub.gen. *Meligethes* isp.) 2
- Klauwen met een grooten tand aan de basis 54
- 2 Clypeus aan den voorrand recht of nagenoeg recht afgeknot 1) 3
- Clypeus aan den voorrand met eene uitranding in 't midden 38
- De geheele voorrand van den clypeus in een vlakken boog-, of nagenoeg half-cirkelvormig uitgerand. 46
- 3 Bovenzijde van halsschild en dekschilden, bij sterke vergrooing gezien, tusschen de stippels niet segrijnachtig of netsgewijze geaderd; wel kunnen de stippels in golvende lijnen geplaatst staan of door min of meer golvende, fijne dwarsrimpels verbonden zijn 4
- De geheele bovenzijde of ten minste de dekschilden of alleen het halsschild, bij uiterst sterke vergrooing gezien, tusschen de stippels duidelijk segrijnachtig of netsgewijze geaderd (Fig. 44, II) 17
- 4 De zeer dichte bestippeling der dekschilden in golvende dwarsrijen geplaatst (Fig. 44, I). Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. 5
- De stippels der dekschilden door fijne dwarsrimpels verbonden (Fig. 44, III). Lichaam diep zwart, weinig glanzig, zeer fijn en dun bruin behaard. Spriet en pooten geheel zwart; de pooten pekkwart of pekbruin, de voorschenen iets lichter. Bij de ab.c. **substrigosus* Er. de voorschenen, alsook het tweede sprietlid roodbruin. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Op allerlei bloemen. Zeer verbreid doch overal tamelijk zeldzaam; in aantal bij Maastricht. De ab.c. *substrigosus* in België en in de Rijnprov. bij Aken 4. *subrugosus* Gyll.

1) Om goed te zien of de clypeus al of niet uitgerand is, moet men het voorwerp met de loupe bezien in eenigszins schuine richting voor den mond.

- Dekschilden gewoon bestippeld, niet rimpelig 7
- 5 Halsschild en dekschilden even fijn en dicht bestippeld. Lichaam breed, zwart, in den regel met geringen groen- of violetachtigen weerschijn; de randen van het halsschild veelal iets roodachtig doorschijnend, de omgeslagen rand der dekschilden donker roodbruin. Kop, halsschild en schildje zeer fijn, dicht, grijs-, de dekschilden zwartachtig behaard. Sprietten, behalve de donkere knots en het donkere eerste lid, alsook de pooten rood. Halsschild aan de basis nagenoeg zoo breed als de dekschilden. Voorschenen zeer fijn-, naar het uiteinde scherper en duidelijker gezaagd. Lengte 3—3½ mm. In de bloemen van *Scabiosa*, *Succisa* en *Knautia*; ook op *Rubus caesius*. Uitsluitend bij Roosteren in Limburg (Mei, Juni) gevangen. In België op vele plaatsen en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. 1. *rufipes* Gyll.
- Halsschild minder dicht bestippeld dan de dekschilden 6
- 6 Halsschild minstens zoo breed als de basis der dekschilden. Lichaam eirond, meer gewelfd en in den regel iets kleiner dan *rufipes*; zwart, het halsschild soms met groenachtigen weerschijn, aan de zijden zelden roodachtig doorschijnend; de omgeslagen rand meer of minder roodbruin. Het eerste sprietlid en de knots zwartachtig; de pooten donker roodbruin, dikwerf de achterpooten zwartbruin. Overigens veel op *rufipes* gelijkend. Lengte 2½—3 mm. Op allerlei struiken en heesters, vooral op *Rubus*, *Genista* en *Rhamnus*. Mei—Juli. Arnhem, Cuyk, Nijmegen, Haaksbergen en in de omstreken van Maastricht. Ook in België en in de Rijnprov. 2. *lumbaris* St.
- Halsschild aan den achterrand nauwelijks zoo breed als de basis der dekschilden. Lichaam ovaal. Deze soort heeft veel overeenkomst met de vorige. De eerste 3 spriedeetjes geel-rood, de volgende donkerbruin, de knots nog donkerder gekleurd. Pooten rood, de achterdijen gewoonlijk meer bruinachtig. Vermoedelijk een afwijkende vorm van *lumbaris*. Lengte 2½—2¾ mm. Eenmaal bij Warnsveld nabij Zutphen, Juli. Ook in de Belgische prov. Luxemburg en in de Rijnprov. bij Aken. Ik zag typische exemplaren van *Forster* uit Aken. 3. *Forsteri* Reitt.
- 7 Voorschenen aan den buitenrand tamelijk fijn en gelijkmatig getand. Lichaam eenigszins gewelfd, diep zwart, glanzig, tamelijk fijn-, doch zeer dicht bestippeld en fijn, neerliggend, zwart behaard; de sprietten zwart. Dekschilden nagenoeg dubbel zoo lang als het halsschild, naar achteren geleidelijk versnald. Pooten tamelijk breed, bruinzwart. Lengte 2½—2¾ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken (*corvinus* Er.)
- Voorschenen met twee of drie grootere tandjes, van welke veelal 1 of 2 aan de basis en één kort voor het uiteinde geplaatst staan, of wel zij zijn zeer krachtig en regelmatig getand of gezaagd 8
- Voorschenen aan de basis gekorven en slechts nabij het uiteinde krachtig getand, of wel geheel onregelmatig gezaagd 10
- 8 Voorschenen met groote, scherpe tanden, welke deels langer, deels korter zijn 9
- Voorschenen met nagenoeg even lange, matig groote, aan het uiteinde eenigszins schuin staande, scherpe zaagtandjes. Lichaam eenigszins langwerpig, zwart, fijn grijs behaard, tamelijk fijn en dicht bestippeld; de sprietten en pooten roodbruin. Dekschilden iets meer dan tweemaal zoo lang als het halsschild. Lengte 1½—1¾ mm. Verbreid en niet zeldzaam, o.a. op *Saponaria officinalis*, *Salvia pratensis* en andere lage planten. 7. *serripes* Gyll.
- 9 Dekschilden ongeveer 1½ maal zoo lang als het halsschild, aan het uiteinde nagenoeg recht afgesneden, niet zeer dicht- en iets sterker dan het halsschild bestippeld; zeer fijn behaard. Eene der kleinste soorten van het genus, glanzig zwart; de sprietten en pooten lichter of donkerder rood, de achterdijen soms zwart. Lengte 1½ mm. In het eerste voorjaar op de katjes van *Salix aurita* en des zomers op *Sisymbrium alliaria* en *Marrubium vulgare*. Oud-Vroenhoven en Honthem bij Maastricht, Juni en Juli. 5. *nanus* Er.
- Dekschilden dubbel zoo lang als en ook iets breder dan het halsschild, vrij lang en tamelijk dicht behaard, naar het uiteinde weinig versnald, fijn en dicht-, naar de basis iets sterker bestippeld. Glanzig zwart; de sprietten roodgeel, de knots gewoonlijk donkerder; de voor- en middelpooten roodbruin. Halsschild fijn en dicht-, naar de basis sterker en minder dicht bestippeld. Bij het ♂ is het mesosternum iets ingedrukt, het laatste sterniet aan het uiteinde geel bewimperd. Lengte 2 mm. Op *Marrubium vulgare*. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht gevangen 6. *villosus* Bris.
- 10 Halsschild aan de basis gewoonlijk iets breder dan-, doch minstens zoo breed als de basis der dekschilden en ongeveer 1 breder dan lang. 11
- Halsschild aan de basis gewoonlijk iets smaller dan-, doch hoogstens zoo breed als de basis der dekschilden en veel breder dan lang 12

- 11 Voorschenen aan de basis met lijne, steeds krachtiger wordende tandjes; van af het midden tot aan het uiteinde met ongeveer 4 breede, niet bijzonder lange, grootere tandjes, van welke het voorlaatste wel het krachtigste is. Deze soort gelijkt eenigszins op *flavipes*, doch is grooter en langwerpiger. Zwart, tamelijk glanzig, dicht en fijn bestippeld en lijn, neerliggend zwart behaard; de voorpooten en sprieten rood; de eerste twee sprietleedjes lichter gekleurd. Halsschild met nagenoeg stompe achterhoeken. Dekschilden iets sterker bestippeld dan het halsschild. Lengte 2—2½ mm. In de omstreken van Maastricht op *Mentha rotundifolia*, in Juli. 8. **moestus** Er.
- Voorschenen aan de basis fijn-, vervolgens duidelijker gezaagd, aan het uiteinde met 4—5 dicht opeengeplaatste, eenigszins schuin staande groote tandjes. Lichaam glanzend zwart, fijn grijs en vrij dicht behaard, tamelijk lijn en dicht bestippeld; de sprieten en voorpooten roodgeel, de overige pooten meer bruinachtig. Halsschild met stompe achterhoeken. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen op allerlei planten, als *Melilotus*, *Cirsium*, *Ballota* enz. (*flavicornis* Miller) 9. **flavipes** St.
- 12 Pooten, behalve de meer roodbruine voorpooten, zwart of donkerbruin 13
- Pooten, alsook de sprieten, geelrood of rood, de sprietknots soms donkerder 14
- 13 Sprieten zwartachtig, het tweede lid bruinrood. Voorschenen lijn gezaagd, aan het uiteinde met 3 langere, scherper tandjes. Bovenzijde glanzig zwart, zeer weinig behaard. Halsschild aan weerszijden van het schildje niterand en tegen de stompe achterhoeken scheef afgesneden; de zijrand eenigszins donker roodbruin doorschijnend; vrij dicht en lijn bestippeld. Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als-, iets minder dicht en iets sterker bestippeld dan het halsschild. Pooten donkerbruin; de voorschenen bruinrood. Lengte 1½—2 mm. Niet inl. In zuidelijk Middel-Europa. Ik zag een exemplaar uit het Weener Hofmuseum. (*memnonius* Er.)
- Sprieten roodbruin, de eerste twee leedjes lichter gekleurd. Voorschenen van af het midden tot aan het uiteinde eenigszins onregelmatig met korte, breede tandjes bezet. Lichaam breed-eivormig, matig gewelfd, zwart, tamelijk glanzig, dicht en lijn bestippeld; kort, lijn en neerliggend, zwart behaard. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, met eenigszins stompe achterhoeken. Dekschilden nagenoeg dubbel zoo lang als het halsschild. Voorpooten rood, de middel- en achterpooten donkerbruin. Bij het ♀ het laatste sterniet van achteren breed ingedrukt, bij het ♂ ellén en van achteren van eene dwarslijst voorzien. Lengte 2—2½ mm. Op *Knautia arvensis*. Zeer zeldzaam; Schiedam en Overveen, Juni en Juli. In de Rijnprov. bij Aken 10. **brachialis** Er.
- 14 Voorschenen onregelmatig, scherp getand. Bovenzijde zeer lijn en dicht bestippeld, dicht en duidelijk grijs behaard. Deze soort is naverwant aan *flavipes*, doch iets kleiner en naar verhouding iets breeder; het halsschild korter, met scherper achterhoeken; de voorschenen met veel fijnere zaagtandjes. Sprieten roodachtig, de eerste leedjes geelrood; de pooten lichter of donkerder rood, soms geelrood, vooral de voorpooten. Bij het ♂ het laatste sterniet met een rond groefje. Lengte 1½—2 mm. Eene der gemeenste soorten, vooral op bloeiende Cruciferen 11. **picipes** St.
- Voorschenen regelmatig, lijn getand, aan het uiteinde met veel langere tandjes. Bovenzijde meer of minder wijd uiteen krachtig bestippeld en bovendien uiterst kort en lijn, donker behaard 15
- 15 Pekzwart of pekbruin; het pygidium, benevens de laatste sterniten, van dezelfde kleur als het geheele lichaam 16
- Pekzwart met bruinachtigen vetglans; het pygidium en gewoonlijk ook de laatste sterniten geelrood. Lichaam langwerpig-eivormig. Sprieten en pooten rood; het uiteinde der dekschilden meer of minder roodachtig. Lengte 2 mm. In de bloemen van *Lamium album* zeldzaam. Den Haag, Loosduinen, Vianen, Hilversum, Deventer, Delden, Capelle a/d. IJssel en Arnhem 14. **haemorrhoidalis** Fürst.
- 16 Lichaam breed- en kort-ovaal, zeer sterk gewelfd. Bovenzijde pekzwart of pekbruin, soms met blauwen purperachtigen- en langs de randen van het halsschild eenigszins groenachtigen weerschijn. Dekschilden hoogstens tweemaal zoo lang als het halsschild. Sprieten meer of minder roodachtig, de knots donkerder; de pooten rood. Voorschenen van af het midden met enige breede, krachtiger zaagtandjes. Lengte 1½—2½ mm. Op *Labiata*-ten, vooral op *Lamium album*; vrij zeldzaam 12. **ochropus** St.
- Lichaam langwerpig-ovaal; de dekschilden meer dan dubbel zoo lang als het halsschild. Glanzig pekzwart; zeer verwant aan *ochropus*. Sprieten en pooten, alsook de sprietknots roodgeel. Halsschild aan den zijrand soms roodachtig doorschijnend; ook de omgeslagen zijrand der dekschilden veelal roodbruin. Voorschenen lijn gezaagd, aan het uiteinde met 3 of 4 langere, scherpe zaagtanden. Onuitgekleurde exemplaren zijn licht bruinachtig. Lengte

- 2½—2½ mm. Op *Laminum album* en *Symphytum*, Mei tot Sept. Meermalen bij den Haag; ook bij Nijmegen, Delden en Maastricht 13. **brunicornis** St.
- 17 Voorscheneen aan de basis zeer fijn gezaagd, van af het midden met krachtige, meestal ongelijke zaagtandjes. Deze soort is grooter dan brassicae, veel breeder en sterker gewelfd, zwartblauw, soms met groenachtigen weerschijs, tamelijk glanzig, sterk en dicht bestippeld. De eerste twee leedjes der bruinachtige sprieten geelrood; de pooten lichter of donkerder roodgeel. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen in de bloemen van *Symphytum officinale* 15. **symphyti** Heer.
- Voorscheneen fijn gekorven of getand, met twee meer uitstekende tandjes, welke door eenige kleinere van elkaar gescheiden zijn 18
- Voorscheneen uiterst fijn en gelijkmatig getand of gekorven. 19
- Voorscheneen fijn gekorven of getand, aan het uiteinde altijd met eenige langere tandjes . . . 32
- 18 Lichaam ovaal, gewelfd, grauwzwart, kort neerliggend-, vrij dicht bruinachtig behaard, fijn en vrij dicht bestippeld en tusschen de bestippeling duidelijk gehagrineerd. Sprieten en pooten zwartbruin of zwart, de wortelleedjes der sprieten en de voorscheneen lichter. Voorscheneen tot over het midden uiterst fijn gekorven, verder tot aan het uiteinde met ongeveer 6 krachtiger zaagtandjes, van welke het eerste en het voorlaatste iets langer is en meer uitsteekt (Fig. 43). De var. *confusus* Er. is volkomen ovaal, diep zwart. Lengte 1½—2 mm. Vrij gemeen in de bloemen van *Linaria vulgaris* . . (♂ *palmaris* Er.) 16. **obscurus** Er.
- Lichaam met parallelle zijden, weinig gewelfd. Sprieten en pooten als bij *obscurus*. Halsschild tusschen de bestippeling nagenoeg overal glad, de dekschilden van stip tot stip dwarsrimpelig geaderd. Overigens naverwant aan *obscurus* en vermoedelijk slechts eene afwijking daarvan. Lengte 1½—1½ mm. Niet inl. Zij zou in West-Europa voorkomen. Ik zag twee typische exemplaren van *Reitter* (Mus. v. d. Poll). (parallelus *Reitt.*)
- 19 Sprieten en pooten licht geelachtig of rood 20
- Sprieten donkerder of lichter gekleurd, de sprietknots echter zwart of bruin, bij uitzondering roodbruin, in welk geval de bovenzijde eenkleurig metaalgroen is 23
- 20 Het fijne netwerk tusschen de bestippeling van het halsschild wordt door hoekige cellietjes gevormd. Kop en halsschild zwartbruin, met meer of minder sterken blauwachtigen weerschijs of licht metaalkleurig; de dekschilden bruinrood, veel sterker en iets meer verspreid dan het halsschild bestippeld, nauwelijks zichtbaar behaard. Sprieten en pooten geelrood. Lengte 2—2½ mm. Eenmaal in het mastbosch bij Breda, Mei. In de Rijnprov. bij Elberfeld. Ik bezit een typisch exemplaar van *Reitter* 17. **discolor** *Reitt.*
- Het fijne netwerk tusschen de bestippeling, vooral op het halsschild, door zeer dicht staande, ronde, schubachtige cellietjes gevormd 21
- 21 Lichaam op de bovenzijde zeer onduidelijk behaard 22
- Lichaam neerliggend bruingrijs behaard, eenigszins bronzig-zwart of met geringen olijkleurigen weerschijs, minder glanzig op kop en halsschild dan op de dekschilden. Sprieten geelrood, de middelste leedjes iets donkerder. Halsschild aan weerszijden van de basis nabij het schildje iets uitgerand; evenals de dekschilden fijn en vrij dicht bestippeld. Pooten geelrood. Mesosternum bij het ♂ met eene gladde middengroef, welke bij het ♀ slechts aangeduid is. Lengte 2—2½ mm. Op vele plaatsen in de provinciën Noord- en Zuid-Holland gevangen en soms niet zeldzaam (rubripes Muls.) 18. **fulvipes** Bris.
- 22 Donkerbruin met eenigen violetachtigen weerschijs. Dekschilden meer roodbruin, zeer wijd uiteen bestippeld. Deze soort is zeer verwant aan *discolor*, doch kleiner en iets meer gewelfd. De fijn rimpelige sculptuur van het halsschild bestaat uit ronde, dicht staande, schubachtige cellen. Lengte 1½—1½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Elberfeld. Ik zag een typisch exemplaar van *Reitt.* uit Aken (ex coll. Förster, Mus. v. d. Poll). (subrubicundus *Reitt.*)
- Zwart, met bruinachtigen vetglans en uiterst geringen blauwachtigen weerschijs aan de zijden van het halsschild en der dekschilden. Halsschild en schildje fijn- en dicht-, de dekschilden sterk en wijd uiteen bestippeld. Deze soort onderscheidt zich van *coeruleovirens*, met welke zij het naast verwant is, door de donker bruinzwarte kleur der bovenzijde, de nauwelijks zichtbare beharing, den iets breederen, plomperen vorm en het dicht bestippelde schildje. Lengte 2½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken. Ik zag een typisch exemplaar van *Reitter* uit Aken (ex coll. Förster, Mus. v. d. Poll). . . (rhenanus *Reitt.*)
- 23 Zwart of bruinzwart, soms met geringen bronsglans of olijkleurigen of paarsachtigen

- weerschijn. Schildje en de naad der dekschilden van dezelfde kleur als het omliggend gedeelte; bij uitzondering de dekschilden bruinachtig-rood 24
- Bovenzijde of ten minste de dekschilden blauw- of groenachtig, min of meer metaalglanzend, soms violetachtig; de naad en gewoonlijk ook het schildje zwartachtig. 28
- 24 Bestippeling zeer fijn en uiterst dicht, zoodat de tusschenruimten der stippels buitengewoon klein zijn 25
- Bestippeling meer wijd uiteen, zoodat de tusschenruimten der stippels vrij groot zijn 26
- 25 Bruinzwart, gewelfd; de dekschilden soms bruinachtig-rood (*abc. decoloratus* Först.). Deze soort is zeer verwant aan *coracinus*, doch veel kleiner en iets meer gewelfd. Matglanzig en uiterst fijn-, kort, neeliggend, zijdeachtig behaard. Sprieten zwartachtig, de eerste twee leedjes geelachtig; de pooten donker, de voorpooten lichter gekleurd. Halsschild zoo breed als de dekschilden, naar voren weinig versmald, de achterrand nagenoeg recht afgesneden. Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als het halsschild. Voorschenen tamelijk breed, uiterst fijn gekorven. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeldzaam. Arnhem, Winterswijk, Overveen, Bodegraven, Wolfhezen, Maastricht en Valkenburg, Juni tot Aug. De *abc. decoloratus* bij Arnhem. Ook in België bij Heure en Hoesselt en in de Rijnprov. bij Aken.

19. *pumilus* Er.

Zwart, met geringen, olijkleurigen of eenigszins paars- of blauwachtigen weerschijn, zelden diep zwart. Habitus en grootte van *brassicæ*, doch iets smaller en lijner bestippeld; vooral op het halsschild, fijn neeliggend, bruin grijs behaard. Sprieten zwart, de eerste twee leedjes roodbruin; de achterpooten bruin, de voor- en middelpooten roodgeel. Voorschenen aan den buitenrand uiterst fijn gekorven. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Gemeen op allerlei bloeiende planten als *Galium*, *Epilobium*, *Umbelliferen*, *Prunus spinosa* enz.

20. *coracinus* St.

- 26 Bovenzijde van het lichaam tussen de bestippeling met een netwerk van hoekige cellen. 27

Bovenzijde van het lichaam, bij zeer sterke vergrooting gezien, met zeer fijne dwarsstreepjes, welke de eene stip met de andere verbinden. Lichaam zwart, vrij sterk glanzig, fijn bruinachtig behaard; de sprieten roodbruin of donkerbruin, de eerste leedjes veelal lichter. Dekschilden ongeveer driemaal zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde geleidelijk versmald. Pooten donkerbruin, de voorschenen iets lichter. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Op *Ficaria ranunculoides*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken. Ik zag twee typische exemplaren van *Reitter* uit Aken (ex coll. *Förster*, Mus. v. d. *Poll*). (*ranunculi* Reitt.)

Langwerpig-ovaal, bruinzwart, met geringen bronzen weerschijn. Habitus van *coracinus*; tamelijk fijn bestippeld, lijn neeliggend zwart behaard. Sprieten zwart, de eerste twee leedjes roodbruin. Halsschild naar voren aanmerkelijk versmald, aan den achterrand recht afgesneden en slechts aan weerszijden van het schildje iets uitgerand. Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde geleidelijk versmald. Pooten donker roodbruin, de achterpooten soms zwartachtig. Voorschenen fijn gezaagd. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Zij zou o.a. in de bloemen van *Anemone nemorosa* voorkomen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld (*subaeneus* St.)

Langwerpig, met tamelijk parallele zijden en met den habitus van *viridescens*. Zwart, eenigszins bruin-vetglanzig, aan de basis van het halsschild met geringen groenachtigen weerschijn, meer verspreid bestippeld dan bij *subaeneus*; op het halsschild lijn-, op de dekschilden iets sterker en meer verspreid behaard. Sprietwortel en pooten geelrood. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Ik ving deze soort bij Kleef. (*anthracinus* Bris.)

Het fijne netwerk tussen de bestippeling, vooral op het halsschild, door ronde celletjes gevormd. Deze soort herinnert iets aan *brassicæ*, doch is korter; de bovenzijde donker blauwachtig, eenigszins vetglanzig, zwart behaard en dieper, doch minder dicht bestippeld; soms het halsschild meer zwart. Sprietwortel en voorschenen roodbruin. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Op sommige plaatsen niet zeldzaam; op *Caltha palustris* en vooral in het voorjaar in aanspoel der rivieren 21. *coeruleovirens* Först.

Het fijne netwerk min of meer hoekige celletjes vormend. 29

- 27 Pooten pekkwart of pekbruin, de voorschenen en soms alle schenen lichtbruin. Bovenzijde lichter- of donkerder metaalgroen, soms naar het blauw of violet trekkend, glanzig; lijn en dicht bestippeld en vrij dicht en lijn grijs behaard. De eerste twee leedjes der zwarte sprieten gewoonlijk roodbruinachtig. Halsschild aan de basis nagenoeg zoo breed als de dekschilden; schildje lijner en dichter bestippeld dan het halsschild en de dekschilden. Onderzijde zwart. Voorschenen smal, zeer lijn en gelijkmatig gezaagd. Bij *abc. australis* Küst. is de bovenzijde metaalachtig-geelgroen en dicht geel behaard; bij *abc. coeruleus* Mrsh. iets groenachtig-blauw, fraai blauw of iets violet, en zeer weinig behaard. De *abc. coeruleus* Rein. is zwartachtig groen, met bruinroode dekschilden. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm.

Zeer gemeen op allerlei bloeiende planten, in het voorjaar vooral op Cruciferen, Ranunculus, paardenbloemen en later op Epilobium en andere planten; soms is zij schadelijk aan koolzaad, raapzaad en andere gekweekte Cruciferen. Op warme voorjaarsdagen ziet men ze van de eene bloem op de andere vliegen. Zij vreten de bloemknoppen van het koolzaad uit en de larven voeden zich met de zich ontwikkelende zaadjes in de hawven. De larven verpoppen op den grond. De abe. *australis* en *coeruleus* zeldzaam, de abe. *rubripennis* bij Elberfeld. (aeneus F.) 22. **brassicae** Scop.

Pooten en sprietwortel rood- of geelachtig. 30

- 30 Kop en halsschild zwart, weinig glanzig; de dekschilden lichter of donkerder groen-metaalglanzig. Deze soort is naverwant aan kleine exemplaren van *brassicae*, doch onderscheiden door de kleur, de meer gewelddige bovenzijde, de minder dicht bestippelde dekschilden, de lichter gekleurde pooten en het (bij het ♂ sterker dan bij het ♀) gegroefde mesosternum. Lengte 1½—1¾ mm. Niet inh. In West-Europa. Ik zag twee typische exempl. van *Brissoni* uit Parijs (ex coll. Reitter, Mus. v. d. Poll). (*gracilis* Bris.)

Bovenzijde eenkleurig, metaalglanzig groen of blauw. Middeldijen met een kort, stomp tandje voor het uiteinde. 31

- 31 Halsschild zoo breed als- of iets breder dan de dekschilden. Sprietknots bruin. Bovenzijde metallisch blauwachtig-groen of groenachtig-blauw, zelden lichtgroen of geelgroen, niet zeer dicht bestippeld, lijn zwartachtig behaard. Deze soort heeft de grootte en habitus van *brassicae*, doch roode sprieten (behalve het uiteinde) en pooten, alsook meer verspreide bestippeling. Schenen aan den buitenrand gelijkmatig en zeer lijn gezaagd. De abe. *germanicus* Reitt. is fraai blauw of purperkleurig, bij niet geheel uitgekleurde exemplaren bruinrood en gedeeltelijk blauwachtig; bij sommige exemplaren het halsschild groen- en de dekschilden blauwachtig. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen op allerlei bloemen. De abe. *germanicus* verbroed, doch niet gemeen. 23. **viridescens** F.

Halsschild duidelijk smaller dan de basis der dekschilden, tusschen de bestippeling lijner gechagrineerd. Sprietknots meestal roodbruin. Bovenzijde metallisch-groen, dicht en diep-, de dekschilden meer verspreid bestippeld dan het halsschild. Deze soort gelijkt overigens zeer op *viridescens* en is wellicht slechts een afwijkende vorm. Lengte 2½ mm. Enkele malen in de omstreken van Maastricht gevangen. Ook in de Rijnprov. en in België bij Neerhaeren. 24. **Czwalinai** Reitt.

- 32 De geheele oppervlakte, bij sterke vergroting gezien, tusschen de stippels uiterst lijn dwarsrimpelig gedend, soms nabij de basis der dekschilden nagenoeg glad. 33

Kop en halsschild tusschen de bestippeling glad; de dekschilden, bij sterke vergroting gezien, duidelijk netsgewijze gaderd. 37

- 33 Halsschild aan de basis iets breder dan de basis der dekschilden, met iets naar achteren gerichte achterhoeken. Deze soort herinnert zeer aan *lumbaris*, doch is korter en breder, tamelijk gewelddig, diep zwart, weinig glanzig, dicht en lijn bestippeld en zeer lijn bruinzwart behaard. Sprieten zwart, de eerste twee leedjes bruinrood. Dekskildes weinig meer dan 1½ maal zoo lang als het halsschild. Voorpooten roodbruin, de schenen lichter; middel- en achterpooten bruinzwart. Voorschenen breed, zeer lijn gekerfd en aan het uiteinde met eenige grootere, scherper tandjes. Tarsen breed. Bij het ♂ is het metasternum in 't midden breed ingedrukt en vertoont aan den achterrand, tusschen de achtercoxae, een bultje; het laatste sterniet aan het uiteinde met een rond groefje. Lengte 2½—2¾ mm. Zeldzaam; Nijmegen, Rotterdam, Wolfhezen, Wageningen, Harkste (Groningen) en in de omstreken van Maastricht. 25. **umbrosus** S.

Halsschild hoogstens zoo breed als- of iets smaller dan de dekschilden. 34

- 34 Voorschenen lijn gekorven of gezaagd, nabij het uiteinde met eenige groote, ongelijke tandjes. 35

Voorschenen aan de basis lijn gezaagd, ongeveer van af het midden tot aan het uiteinde met 4 of 5 grootere, breede, scherpe tandjes. 36

- 35 Bovenzijde tamelijk glanzig, lijn en niet dicht zwartachtig behaard. Deze soort is nagenoeg even groot als *umbrosus*, doch iets smaller; zwart, lijn en zeer dicht bestippeld. Sprieten zwart, het tweede lid roodbruin. Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, met nagenoeg rechte achterhoeken. Dekskildes ongeveer dubbel zoo lang als het halsschild, langs de zijden met een meer of minder zichtbare aanduiding van een verdiepte langsplooi. Voorpooten of minstens de schenen pekkbruin, de middel- en achterpooten zwart. Voorschenen aan het uiteinde met 4 vrij krachtige tandjes. Bij het ♂ is het metasternum oppervlakkig en breed ingedrukt en vertoont op het voorste gedeelte van dezen indruk een zeer klein bultje; bij het ♀ op het laatste sterniet een klein, vlak middengroefje. Bij de var. *lurida* Reitt. is het lichaam loodglanzig-zwart, grauwwart behaard en de voorschenen zijn reeds

van af het midden sterker getand. De var. **calvus* Reitt. is diep zwart, sterk en dicht bestippeld, onbehaard. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Verbreid op *Mentha* en *Salvia*; op sommige plaatsen niet zeldzaam. De var. *durus* in België. 26. **maurus** St.

Bovenzijde vrij lang en dicht bruingrauw behaard. Deze soort is naverwant aan *maurus*, doch meer langwerpig-eirond, meer gewelfd en veel dichter bestippeld; bij het ♂ vertoont het metasternum geen bultje. Sprietten zwart, de eerste twee leedjes pekbruin. Halsschild aan de basis nagenoeg zoo breed als de dekschilden, met eenigszins stompe achterhoeken. Dekschilden dubbel zoo lang als het halsschild. Pooten pekbruin; de voorschenen roodbruin, nabij het uiteinde met eenige groote, ongelijke, scherpe tandjes. Metasternum bij het ♂ breed en vlak ingedrukt. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Op *Solanum dulcamara* en *Nepeta cataria*. Zeer zeldzaam; Den Haag, Amsterdam, Breda en in de omstreken van Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld 27. **incanus** St.

36 Lichaam korter- (♂) of langer-eirond (♀), sterk gewelfd, diep zwart, tamelijk glanzig; lijn neerliggend zwart behaard en tamelijk fijn en dicht bestippeld. Sprietten zwart of bruin, de eerste 2 of 3 leedjes rood. Dekschilden nagenoeg dubbel zoo lang als het halsschild, langs den zijrand met flauwe aanduiding van eene langsplooi, welke bij het ♀ meer in 't oog valt. Pooten breed, de voorpooten donkerrood. Voorschenen van af het midden met een 4-tal grootere tandjes. Metasternum bij het ♂ gewoon. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam op *Labiata* en *Campanula* (♀ *fuliginosus* Er.) 28. **ovatus** St.

Lichaam langwerpig-eirond, gewelfd, veel minder dicht bestippeld. Kop en halsschild met donker groen- of blauwachtigen-, de dekschilden met violetachtigen weerschijn. Dekschilden iets sterker en minder dicht dan het halsschild bestippeld; de bestippling naar het uiteinde fijner. Halsschild en dekschilden, behalve op een gedeelte van de basis, tusschen de bestippling duidelijk dwarsrimpelig gechagrineerd. Voorschenen van af het midden met een 5-tal grootere tandjes. Lengte 2 mm. Uiterst zeldzaam; Gorkum en Ruurlo, Juli. In de Rijnprov. bij Aken 29. **atramentarius** Först. 1)

37 Voorschenen lijn gezaagd, aan het uiteinde met twee grootere, tegen elkaar staande tandjes. Lichaam zwart, eenigszins glanzig, lijn en zeer dicht bestippeld, weinig behaard. Sprietten en pooten donkerbruin, de eerste twee sprietleedjes, benevens de voorschenen roodachtig. Bij het ♂ de voortarsen sterk verbreed, het mesosternum met een tamelijk breed en, vrij diepen indruk; bij het ♀ is het mesosternum bijna niet ingedrukt. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam; Den Haag, Breda, Maarsbergen, Baarn, Ossendrecht, Brummen en in de omstreken van Maastricht. 30. **bidens** Bris.

Voorschenen lijn en duidelijk gezaagd, aan het uiteinde met verscheidene grootere, verdikte tandjes. Bovenzijde lichter of donkerder blauwgroen, in voorkomen aan *atramentarius* herinnerend, doch grooter en op het halsschild niet gechagrineerd; ook aan *difficilis* verwant, doch met recht afgesneden clypeus. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken. Ik bezit een exemplaar uit Saksen, door *Reitter* gedetermineerd.

(Dieckii Reitt.)

38 Bovenzijde tusschen de bestippling volkomen glad. 39

Dekschilden tusschen de bestippling uiterst fijn van stip tot stip dwarsrimpelig geaderd; kop en halsschild glad. Deze soort gelijkt op kleinere exemplaren van *difficilis* en op *blandulus*, doch de lijn getande voorschenen zijn aan het uiteinde slechts van 2 of 3 grootere tandjes voorzien. Lichaam pekbruin of pekschwart, eenigszins verglanzig, zeer fijn bestippeld en uiterst fijn grijs behaard; de sprietten en pooten rood. Halsschild op het midden iets fijner bestippeld dan de dekschilden. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Cleef en Elberfeld. Ik bezit een typisch exemplaar van *Reitter*. (*aestimabilis* Reitt.)

39 Voorschenen aan het uiteinde met één of meer grootere tandjes 40

Voorschenen vrij smal en tamelijk gelijkmatig, scherp gezaagd. Deze soort gelijkt zeer op *viduatus*. Lichaam kort en breed, sterk gewelfd; zwart, tamelijk glanzig, vrij dicht bestippeld en grauw behaard. Het eerste lid en de knots der geelachtige sprietten bruin; pooten zwart, de voorschenen geelachtig-rood. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken. (*assimilis* St.)

Voorschenen lijn getand of slechts gekorven, met 2 meer uitstekende, spitse, door eenige kleinere van elkaar gescheiden tandjes. Lichaam eenigszins langwerpig-ovaal, tamelijk smal,

1) De enige twee exemplaren in mijn collectie zijn door *Reitter* gedetermineerd en beantwoorden dan ook geheel aan de beschrijving van *Dieckii*. Bij sterke vergrooting met het enkelvoudig microscoop blijkt het halsschild niet glad (zoals *Reitter* zegt) doch duidelijk gechagrineerd te zijn. Een onderzoek van het type van *Forster* kan beslissen of dit wel deze is.

loodkleurig-zwart, weinig glanzig, duidelijk neerliggend grijs behaard. Sprieten roodachtig, het tweede lid lichter. Dekschilden krachtiger bestippeld dan het halsschild. Pooten zwartbruin, de voorschienen en soms de voordijen roodachtig. Bij het ♂ is het mesosternum dieper gegroefd dan bij het ♀. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. Zij zou bij Aken gevangen zijn. Ik zag twee typische exemplaren van *Brisout* (ex coll. Reitter, Mus. v. d. Poll).

(*minutus* Bris.) (*distinctus* St.)

- 40 Halsschild tamelijk fijn en dicht, de dekschilden veel wijder uiteen en krachtiger bestippeld. Lichaam sterk glanzig, zeer fijn en verspreid zwart-, zelden witachtig behaard. Halsschild aan de basis iets smaller dan de basis der dekschilden, naar voren weinig versmald, met stompe of nagenoeg afgeronde achterhoeken. Sprieten en pooten meestal lichtrood. 41

Halsschild, ofschoon lijner-, toch niet dichter dan de dekschilden bestippeld; lijn-, doch gewoonlijk duidelijk behaard. Uiteinde der sprieten en de achterpooten veelal donker gekleurd. 42

- 41 Langwerpig-ovaal, pekzwart of donker pekbruin, zeer fijn zwart-, bij abc. **Kunzei* Er. lijn witachtig behaard. Kop en halsschild met groenachtigen weerschijn. Deze soort gelijkt op *ochropus*, doch is grooter. Sprieten gewoonlijk roodbruin, de eerste twee leedjes lichter; halsschild aan de zijden veelal roodbruin doorschijnend. Dekschilden tamelijk wijd uiteen en sterk bestippeld, de omgeslagen zijrand roodbruinachtig. Voorschienen lijn gekorven, naar het uiteinde met 4 of 5 langere, scherpe, schuin staande tandjes. Lengte $2\frac{1}{2}$ – $2\frac{3}{4}$ mm. Op *Lamium album*, April–Juli. Vrij zeldzaam: Den Haag, Noordorp, Haarlem, Kratingen, Rotterdam, Schiedam, Zutphen en in de omstreken van Maastricht.

31. *difficilis* Heer.

Korter- en breder-ovaal, kleiner dan *difficilis*; bruinrood of roodbruin, sterk glanzig, matig dicht en zeer fijn-, de dekschilden zeer verspreid en krachtig bestippeld, zeer weinig en onduidelijk behaard. Sprieten rood. Halsschild met lichtrood doorschijnende randen. Pooten rood; de voorschienen lijn gekorven, aan het uiteinde met 3 tot 4 grootere, scherpere tandjes. Lengte $1\frac{1}{2}$ –2 mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken; in Westfalen bij Dortmund. Ik zag een typisch exemplaar van *Förster* uit Aken (Mus. v. d. Poll).

(*blandulus* Reitt.)

- 42 Sprieten en pooten pekzwart of donkerbruin, de eerste twee sprietleedjes en de voorpooten roodbruin. Lichaam langwerpig-ovaal, pekzwart of pekbruin. Lengte 1½ mm. Eenmaal bij Wolfhezen, Juli. Ook op het eiland Borkum. Ik zag twee typische exemplaren van *Reitter* (Mus. v. d. Poll). 32. *austriacus* Reitt.

Sprieten lichter of donkerder roodbruin, of geelrood; de eerste leedjes altijd lichter rood. Achterpooten lichter of donkerder roodbruin, soms donkerbruin; de voorsten of allen rood. 43

- 43 Dekschilden met eene duidelijk uitpuilende schouderbuil. Lichaam ovaal, gewelfd, glanzig zwart, soms hier en daar met geringen paars- of groenachtigen weerschijn; lijn neerliggend zwart behaard, lijn en niet zeer dicht bestippeld; onuitgekleurde exemplaren roodbruin. Halsschild aan weerszijden van de basis diep uitgerand, met stompe achterhoeken. Voorschienen uiterst lijn gezaagd en eerst aan het uiteinde met een paar vrij lange, afwaarts gerichte zaagtandjes. Lengte $1\frac{1}{2}$ –2 mm. Niet zeldzaam; op *Lamium album*.

33. *morosus* Er.

Dekschilden zonder uitpuilende schouders 44

- 44 De beharing zoo kort en donker, dat zij schijnt te ontbreken. Lichaam, vooral op de dekschilden, diep en uiterst dicht bestippeld, glanzig pekzwart of zwartbruin. Sprieten en pooten rood. Wellicht eene variëteit van *viduatus*. Lengte 2 mm. Op *Lamium album*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken. Ik bezit een typisch exemplaar van *Reitter*.

(*luctuosus* Först.)

De beharing ofschoon kort, toch duidelijk. 45

- 45 Lichaam sterk gewelfd, lijn en vrij dicht bestippeld, glanzig zwart; lijn, doch vrij dicht donker behaard. Sprieten roodbruin, de eerste twee leedjes lichter; de pooten roodbruin. Halsschild aan de zijden smal afgezet en omgebogen. Achterschienen zeer breed; de scheef afgeknotte top met den buitenrand eenen hoek vormend. Voorschienen aan den buitenrand, ten iets over het midden, uiterst lijn gezaagd en naar het uiteinde met groote, scherpe, deels schuin staande tandjes. De bij Aken voorkomende *littoreculatus* Först., bij welke boven den sprietwortel 2 kleine buities voorhanden zijn, schijnt slechts eene monstruositeit te zijn. Lengte 2– $2\frac{1}{2}$ mm. Op *Salvia pratensis*, *Lamium album*, *Mentha aquatica* en *Galeopsis tetrahit*, zeldzaam; Den Haag, Amsterdam, Noordwijk, Vlissingen, Maarsbergen, Arnhem, Nijmegen en Maastricht.

(*melanarius* Först.) 34. *viduatus* St.

- Lichaam weinig gewelfd, lijn en zeer dicht bestippeld, minder glanzig, lijn en zeer dicht behaard. Sprieten donker roodbruin, de eerste 2 leedjes en de pooten roodachtig; de achterpooten soms donkerbruin. Halsschild aan de zijden smal afgezet, doch nagenoeg niet omgebogen. Achterschenen minder breed dan bij *viduatus*, aan het uiteinde afgerond. Voorschenen uiterst lijn en naar het uiteinde geleidelijk iets duidelijker gezaagd, nabij den top met 3 meer uitstekende tandjes, van welke het middelste het grootste is. Lengte 2—2½ mm. Op *Salvia pratensis* en *Lamium album*, zeldzaam; Rotterdam, Katwijk, Winterswijk, Bussum, Valkenburg en Oud-Vroenhoven bij Maastricht.
(*tenebrosus* Först.) 35. **pedicularius** Gylh.
- 46 Voorschenen regelmatig getand, nagenoeg altijd rood of ten minste bruinrood. De geheele bovenzijde tusschen de bestippeling netsgewijze geaderd 47
- Voorschenen met groote kamvormige tanden, aan de basis bijna altijd eenigszins onregelmatig getand, zwart of donkerbruin 48
- Voorschenen aan de basis lijn, van daar geleidelijk sterker gezaagd, met 2 of 3 langere tandjes, welke door kleinere gescheiden zijn 49
- 47 Voorschenen met eenigszins wijd uiteenstaande, krachtige, doornachtige zaagtandjes. Lichaam loodglanzig-zwart, lijn en dicht, eenigszins neerliggend grauw behaard; overal tusschen de bestippeling lijn netsgewijze geaderd. Sprieten roodgeel. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, met stompe achterhoeken; zeer dicht en vrij sterk bestippeld. Dekschilden nagenoeg dubbel zoo lang als het halsschild en even dicht als dit, doch naar het uiteinde iets fijner bestippeld; over het midden, vooral naar het uiteinde, meer of minder uitgebreid lichter of donkerder roodachtig. Pygidium aan het uiteinde lichter of donkerder roodbruin, de pooten geelrood. Bij zeer donkere exemplaren schijnt slechts het midden der dekschilden bruinachtig door. Lengte 2—2½ mm. Op *Erysimum canescens*, eene uit Oostenrijk afkomstige Crucifeer, welke ook in Nederland aangetroffen is. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld (*discoideus* Er.)
- Voorschenen met kleine, soms onregelmatig geplaatste zaagtandjes. Bovenzijde cenkleurig zwart, veelal eenigszins loodglanzig, zeer dicht en vrij grof bestippeld. Halsschild aan de zijden sterk afgerond, met zeer stompe, nagenoeg afgeronde achterhoeken. Sprieten en pooten rood, de achterpooten veelal iets donkerder. Bij het ♂ het mesosternum met een zwak langsgroefje. Lengte 2 mm. Op *Genista*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Bonn. (*rotundicollis* Bris.)
- 48 Halsschild en schildje tusschen de bestippeling lijn, netsgewijze geaderd. Lichaam kort en en breed, loodglanzig-zwart, tamelijk lijn en zeer dicht bestippeld, lijn en dicht grauw behaard. Sprieten, behalve het roodachtige tweede lid, en de pooten zwart. De lange scherpe tandjes der voorschenen staan eenigszins schuin. Dekschilden iets sterker bestippeld dan het halsschild. Lengte 2—2½ mm. Op *Echium vulgare* en andere Boragineën. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. (*tristis* St.) 1)
- Slechts het schildje lijn netsgewijze geaderd, het overige gedeelte van de bovenzijde glad. Lichaam smaller, meer verlengd en vlakker dan bij *tristis*, loodglanzig-zwart, dicht grauw behaard. Sprietwortel rood; de pooten zwartachtig, de voorpooten meer bruinachtig. De scherpe zaagtandjes der voorschenen naar het uiteinde iets langer. Halsschild iets smaller dan de dekschilden. Dekschilden nagenoeg dubbel zoo lang als het halsschild, iets minder dicht, doch even lijn bestippeld. Lengte 1½—2 mm. Overal gemeen op *Echium vulgare*. (♂ *murinus* Er., ♀ *seniculus* Er.) 36. **planiusculus** Heer.
- 49 Dekschilden uiterst lijn dwarsrimpelig. Lichaam ovaal, gewelfd, glanzig zwart, zeer kort behaard. Sprieten en pooten donker gekleurd. 50
- Dekschilden niet dwarsrimpelig. Lichaam meer langwerpig-ovaal, weinig gewelfd, meestal grauwwaard, weinig glanzig. Sprieten en pooten meestal roodachtig, de pooten soms bruin. 53
- 50 Halsschild hoogstens aan de zijden en vóór het schildje met eenige aanduiding van een lijn rimpelig adernet tusschen de stippels; de dekschilden volkomen glad, glanzig 51
- Bovenzijde of alleen de dekschilden, behalve de lijne dwarsrimpels, nog met een lijn rimpelig netwerk tusschen de bestippeling 52
- 51 Van de twee langere tandjes der voorschenen bevindt zich het eene in of nabij het uiteinde, het andere in of voorbij het midden. Lichaam ovaal, diep zwart, glanzig, tamelijk fijn

1) Ofschoon deze niet in geheel Europa voorkomt, zag ik nog geen enkel inlandsch exemplaar. De vroegere opgave was fout.

en niet zeer dicht bestippeld, lijn neerliggend zwart behaard. Halsschild vóór de scherp aangeduide achterhoeken iets uitgebogen. Pooten zwart, de voorschenen bruin, alsmede de sprieten, behalve het roode tweede lid en de zwarte knots. Metasternum bij het ♂ met een langwerpige bultje en daarachter dwars ingedrukt. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Op *Thymus setpyllum*. Zeer zeldzaam; De Bildt, Juli. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld.

(ebeninus Först.) 37. **lugubris** St.

Van de twee langere tandjes bevindt zich het eene in of nabij het uiteinde, het andere achter het midden. Lichaam iets grooter en langwerpiger dan bij *lugubris*, diep zwart, fijn en dicht bestippeld, dichter behaard en iets minder glanzig. Halsschild met eenigszins afgeronde achterhoeken. Laatste sterniet bij het ♂ aan het uiteinde met eene kielvormig verheven dwarslijn. Lengte 2—2½ mm. Op *Mentha*, zeldzaam; Den Haag, Stadskanaal, Steenwijk en in de omstreken van Maastricht (cristatus Först.) 38. **gagatinus** Er.

- 52 Alleen de dekschilden lijn dwarsrimpelig geaderd en zeer dicht bestippeld. Een der kleinste soorten van het genus, naverwant aan *gagatinus* en *lugubris*. Lichaam diep zwart, glanzig, de dekschilden dichter bestippeld dan het halsschild, naar het uiteinde minder versmald dan bij *lugubris*, iets doffer en met stomper uiteinde. Voorschenen fijn gekorven, met twee meer uitstekende tandjes, waartusschen 3 of 4 kleinere. Laatste sterniet bij het ♂ als bij *gagatinus*. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken. Ik zag een typisch exemplaar van *Förster* (Mus. v. d. Poll) (mellitulus Reitt.)

Bovenzijde overal lijn netsgewijze geaderd en tamelijk lijn en vrij dicht bestippeld. Laatste sterniet bij het ♂ nabij den achterrand in 't midden met een bruin behaard bultje. Deze soort is zeer verwant aan *lugubris* en *gagatinus*, doch minder geweldd, loodglanzig-zwart, eenigszins mat; lijn, neerliggend, tamelijk dicht grijs behaard. Sprieten zwart, het tweede lid roodbruin. Halsschild met rechte achterhoeken. Pooten zwart, de voorschenen tot ongeveer het midden zeer lijn gekorven, vervolgens tot aan het uiteinde met lijne zaagtandjes, van welke een in 't midden en een ander vóór het uiteinde iets langer zijn, daartusschen met ongeveer 5 kleine tandjes. Lengte 2—2½ mm. Op *Mentha*-soorten. Over het algemeen vrij zeldzaam. Katwijk en Arnhem. In aantal in de omstreken van Maastricht, Juli (menthae Bris.) 39. **egenus** Er.

- 53 Voorschenen met 3 meer uitstekende tandjes. Clypeus in het midden van de uitranding met eene kleine bultige verhevenheid. Lichaam zwart, tamelijk glanzig, dicht en tamelijk lijn bestippeld, lijn—doch niet zeer dicht, bruinachtig-grijs behaard. Pooten donker roodbruin of bruin, de voorschenen lichter. Sprietwortel pekkbruin, de knots zwart. Achterhoeken van het halsschild eenigszins stomp. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1¾ mm. Zeldzaam; Den Haag, Katwijk, Arnhem, Vogelsang, Breda en Valkenburg bij Maastricht 40. **exilis** St.

Voorschenen met 2 meer uitstekende tandjes. Clypeus in het midden van de uitranding zonder bultige verhevenheid. Lichaam zwart, eenigszins loodglanzig, vrij dicht grijs behaard. Sprieten en pooten rood, de achterpooten menigmaal iets donkerder. Achterhoeken van het halsschild vrij scherp aangeduid. Bij het ♂ het laatste sterniet in het midden met eene kleine kielvormig verheven dwarslijn. Bij eene ab. **carbonarius* Först. (bij Aken) ontbreekt de beharing en is de uiterste tand aan het uiteinde der dekschilden lichter doorschijnend. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1¾ mm. Verspreid op *Papilionaceë*n. Ik vermoed dat *carbonarius* op een defect exemplaar beschreven is. (carinulatus Först.) 41. **erythropus** Gyll.

- 54 Clypeus aan den voorrand recht afgesneden. Voorschenen lijn gekorven, de achterschenen slechts met haartjes bezet. Lichaam weinig geweldd (Sub-gen. *Odontogethes* Reitter), lichter of donkerder bruin; de randen van het halsschild lichter doorschijnend; matglanzig, dicht en lijn bestippeld, lijn en kort neerliggend, bruinachtig grijs, zijdeachtig behaard; sprieten en pooten geelrood, de sprietknots donkerder. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2¾ mm. Op *Prunus spinosa*, *Sambucus nigra* en op grazige plaatsen in bosschen. Zeer zeldzaam; Den Haag, Sept., Zeeburg bij Amsterdam, Aug., en bij Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld; in België bij Brussel en Orval (olivaceus St.) 42. **hebes** Er.

Clypeus aan den voorrand half-cirkelvormig uitgerand. Voorschenen sterk getand, de achterschenen met stijve doornjes bezet. Lichaam sterk geweldd (Sub-gen. *Acanthogethes* Reitt.). 55

- 55 Voorschenen aan het uiteinde met 4 grootere-, aan de basis met eenige kleinere tandjes. Dekschilden tusschen de bestippling lijn netsgewijze geaderd. De mond zwartachtig. Bovenzijde zwart, lijn en dicht bestippeld, donker behaard. Deze soort herinnert aan *maurus*, doch is meer gedrongen en sterker geweldd. Sprieten zwartachtig, de eerste twee leedjes geelrood. Halsschild aan de basis iets breeder dan de dekschilden, met zeer stompe achterhoeken. Pooten krachtig ontwikkeld, rood of bruinrood, de achterdijen soms zwartachtig. Lengte 2½—2¾ mm. Op *Lotus*, *Genista* en *Primula*. Zeer zeldzaam; uitsluitend in de omstreken van Maastricht gevangen, Juli. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld 43. **solidus** Kugel.

Voorschienen met naar het uiteinde geleidelijk grooter wordende tandjes, het laatste tandje of de laatste 2 tandjes wederom iets kleiner. De bovenzijde tusschen de grove, dichte bestippeling glad, fijn grauw behaard. De mond roodachtig. Deze soort is kleiner dan *solidus*, zwart, loodglanzig, dicht en tamelijk grof bestippeld en vrij dicht grauw behaard. Spriet en licht bruinrood, Halsschild duidelijk breeder dan het halsschild, met afgeronde achterhoeken. Pooten licht bruinrood, de achterpooten soms zwartachtig. Lengte 1½–2 mm. Niet inlandsch. Zij zou in Westfalen voorkomen (*brevis* St.)

V. Tribus POCADIINI.

12. *Thalycra* Erichson.

Bovenlip in 't midden scherp ingesneden. Voorkaken breed, met gewonen top en daarachter met kleinere tandjes. Eindlid der tasters eivond. Eerste spriettlid verdikt en naar buiten iets verbreed; de knots nagenoeg kogelrond. Sprietgroeven onduidelijk, slechts aan den binnenrand der oogen aangeduid. De fijn maar duidelijk gevande basis van het halsschild sluit volkomen tegen de basis der dekschilden aan. Dekschilden iets verkort, zoodat het laatste tergiet grootendeels onbedekt blijft. Pooten krachtig ontwikkeld; de voorschienen ongetand, aan het uiteinde naar buiten in een naar achteren gekromden tand uitgetrokken; de achterschienen met verscheidene haarrijen en aan den buitenkant met doortjes. Tarsen 5-ledig; de voor- en middeltarsen, vooral bij het ♂, duidelijk verbreed, het vierde lid zeer klein. Het ♂ met een kleinen anaalring achter het pygidium.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam roodgeel of roodbruin, het uiteinde der dekschilden gewoonlijk donkerder, kort neerliggend zijdeachtig behaard, vrij dicht en krachtig bestippeld. Sprietknots meestal bruin. Lengte 3–4½ mm. Aan uytvloeiende boomsappen, in paddestoelen en op bloemen; ook in mierennesten en tusschen schimmelen de bladeren. Zij vliegt op warme zomeravonden over grasvelden. Zeldzaam; Den Haag, Overveen, Oosterbeek, Ginneken, Warnsveld, Putten, Roermond en Ossendrecht. (*sericea* St.) 1. **fervida** Oliv.

13. *Pocadius* Erichson.

*Bovenlip in 't midden ingesneden. Voorkaken met haakvormigen, gewonen top. Achterkaken één-lobbig. Eerste spriettlid naar buiten weinig verbreed; de knots groot, eivond. Sprietgroeven duidelijk, langs de oogen eenigszins naar buiten verbreed. Lichaam tamelijk gewelfd, lang behaard, de randen van het halsschild en der dekschilden dicht bewimperd. Het ♂ met een kleinen anaalring achter het pygidium. Overigens aan *Thalycra* verwant.*

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam kort-eivormig, rood- of geelachtig-bruin, vrij grof geel behaard; in de tusschenruimten der naar het uiteinde verdiepte stippellijnen der dekschilden staan de haren in rijen geplaatst. Halsschild met opgebogen zijrand. Bij sommige exemplaren is de kop, het midden van het halsschild, het schildje en ook wel het uiteinde der dekschilden donkerder gekleurd. Lengte 3–4 mm. Verbreed in bovisten, vooral in weilanden. De larve, welke met de pop door *Letzner* beschreven is, leeft in aantal gedurende den winter in genoemde fungi; het volkomen insect komt reeds in April te voorschijn en vliegt dan rond 1. **ferrugineus** F.

VI. Tribus CYLLODINI.

14. *Cychramus* Kugelann.

Bovenlip slechts vaak uitgerand. Voorkaken breed, de plotseling versmalde top haakvormig naar binnen gebogen. Eindlid der tasters eivond. Eerste spriettlid naar voren iets verbreed, de knots los-geleed. Sprietgroeven aan het begin duidelijk, daarop

zeer onduidelijk en recht naar achteren gericht. Bovenzijde van het rondachtige, gewelfde lichaam neerliggend behaard; het halsschild en de dekschilden aan de zijden fijn en dicht bewimperd. De basis van het halsschild is in 't midden zeer fijn gerand, reikt vooral aan de schouders over de basis der dekschilden en is daarover eenigszins verschuifbaar. Dekschilden dicht- en eenigszins rimpelig bestippeld. De voortzetting van het prosternum is smal, in eene uitholling van het mesosternum inlegbaar en bedekt slechts het voorste gedeelte van het mesosternum. Metasternum tusschen de middelcoxae toegespitst. Schenen aan de randen ongedoord, met zeer korte einddoornen. Tarsen 5-ledig, de eerste 3 leedjes verbreed. Bij het ♂ is het vijfde sterniet aan het uiteinde aan weerszijden iets uitgebogen, bij het ♀ gelijkmatig afgerond.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild dicht geelgrijs behaard, met 4, soms min of meer ineenvloeiende, kale, bruine, rondachtige vlekjes op het midden. Bovenzijde lichter of donkerder roestkleurig, gewoonlijk langs de zijden der dekschilden-, of slechts eene schouderplek donkerder gekleurd. Dekschilden bij het ♀ eenigszins glanzig, minder dicht en sterker bestippeld, aan de basis gewoonlijk met eene uitgezakte haarvlek, overigens meer verspreid behaard; bij het ♂ dof, iets fijner en dichter bestippeld, behalve een kaal schouderplekje gelijkmatig geelgrijs behaard. Sprietten, behalve de bruine knots, en de pooten roodgeel of geel. Het ♀ vertoont op het voorhoofd, naast de oogen, eene ronde groef. Lengte 5—5½ mm. Op beschaduwde plaatsen, op bloemen, paddestoelen als *Boletus edulis*, en op eikenbladeren. Niet inl. In Oost-Friesland en in de Rijnprov. bij Elberfeld . . . (*quadripunctatus* Herbst)

Halsschild gelijkmatig-, hetzij dicht-, hetzij meer verspreid behaard. Deze soort is zeer veranderlijk in kleur, bestippling en beharing. Het type is lichtgeel of meer roodachtig-geel, veelal met een iets donkeren, doorschemerenden vegg op het midden der dekschilden; geel behaard; de sprietknots donker. Bij het ♀ is de bovenzijde glanzig, sterker- en minder dicht bestippeld en behaard; bij het ♂ (*alutaceus* Reitt., *pubescens* Pic) lijner en dichter bestippeld en behaard, vooral op het halsschild. De var. *jungicola* Heer roodbruin of bruin, met meer grijsachtige beharing; soms het halsschild of ook de zijden of het midden der dekschilden iets donkerder; de beide seksen als bij het type onderscheiden. Lengte 3½—4½ mm. Op bloeiende *Spiraea filipendula*, *Crataegus*, *Sorbus*, *Ligustrum*, *Rubus* enz. Het type in groot aantal in het Twickelsche bosch (Overijssel), Juli; ook bij Warnsveld en in de omstreken van Maastricht. De var. *jungicola* bij Bunde, Mei. Deze soort komt ook in België en in de Rijnprov. voor.

1. *luteus* L.

Cyllodes Erichson.

(*Strongylus* Herbst, Reitter)

Bovenlip tweelobbig. Voorkaken breed, met gewoon dun uiteinde. Eindlid der tasters rond. Sprietten met groote, langwerpige, dicht-gelede knots. Sprietgroeven zeer kort, een weinig convergeerend. Bovenzijde onbehaard. De basis van het halsschild is niet gerand en reikt, vooral aan de schouders, over de basis der dekschilden heen en is daarover eenigszins verschuifbaar. Dekschilden met fijne stippeellijnen en in de tusschenruimten verspreid bestippeld. De voortzetting van het prosternum is breed afgeknot en kan, tusschen de middelcoxae door, tegen het recht afgeknotte metasternum worden aangelegd, zij bedekt alsdan het geheele mesosternum. Pooten krachtig ontwikkeld, de schenen eenigszins samengedrukt.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam gewelfd, glanzig zwart, veelal met geringen bronzen weerschijn; soms de onderzijde donkerbruin; of wel met donkerrood halsschild, of de geheele bovenzijde donkerbruin en de onderzijde lichter gekleurd; zeldzamer het lichaam geheel geelrood. De tusschenruimten der fijne stippeellijnen lijn bestippeld. Sprietten en pooten lichter of donkerder roodbruin. Lengte 3—3½ mm. In paddestoelen. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa (ater Herbst)

VII. Tribus IPINI.

15 *Cryptarcha* Shuckard.

Bovenlip onder den clypeus verborgen. Voorkaken tamelijk breed, niet ver uitstekend, met dunnen, haakvormig naar binnen gebogen, twee-tandigen top; bij het ♂ is de rechter voorkaak iets verlengd en sikkelvormig gekromd. Achterkaken één-lobbig. Eindlid der liptasters eirond. Sprieten onder den sterk verbreeden zijrand van het voorhoofd ingeplant, zoodat minstens het eerste lid geheel bedekt wordt; met 3-ledige, los-gelede knots. Sprietgroeven op de onderzijde van den kop diep en kort. Bovenzijde van het tamelijk breede en eenigszins gewelfde lichaam behaard. Halsschild veel breeder dan lang, met meer of minder vooruitstekende voorhoeken; aan de basis niet gerand en over den voorrand der dekschilden grijpend. Dekschilden bij het ♂ afgerond, bij het ♀ aan den naadhoek iets uitgetrokken. Mesosternum door eene voortzetting van het prosternum bedekt. Voorste coxaal-holten van achteren open. — De soorten van dit genus leven achter boomschors en aan uitloeiende boomsappen.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Prosternale voortzetting breed en aan het uiteinde afgeknot. Lichaam breed-eirond. Dekschilden te zamen zoo lang als breed, vrij grof en dicht bestippeld. Bovenzijde zwartachtig of donkerbruin, de dekschilden met een uitgezakt dwarsband achter het midden en eene onregelmatige, langwerpige vlek aan de basis, benevens gewoonlijk daartusschen een klein vlekje nabij den zijrand, geel; fijn behaard en hier en daar met afstaande, verspreide, gele haartjes; de randen van het halsschild en de zijden der dekschilden meer of minder breed roodbruin. Sprieten, behalve de donkere knots, benevens de pooten roodbruin, de dijen aan de onderzijde donkerder. Lengte 3½—4 mm. Niet zeldzaam achter boomschors en aan uitvloeiende sappen van eiken en iepen 1. *strigata* F.

Prosternale voortzetting vrij smal, met afgeronden top. Lichaam langwerpig-eirond. Dekschilden langer dan breed, zeer fijn bestippeld, geel; eene gemeenschappelijke, halveaan-vormige vlek vóór het uiteinde, alsook eene langwerpige zijvlek en twee kleine uitgezakte vlekjes op de wortelhelft van elk, zwartachtig of donkerbruin; met duidelijk afstaande, verspreide, gele haartjes. Halsschild geel, over het midden zwart. Sprieten en pooten geelachtig, de dijen veelal iets gebruind. Lengte 2½—3 mm. Levenswijze als bij *strigata*. Zeldzaam; Breda, Apeldoorn, Arnhem en Roermond. Ook in België en in de Rijnprov.

2. *imperialis* F.

16. *Ips* Fabr.

Bovenlip onder den clypeus verborgen. Voorkaken tamelijk ver uitstekend, met twee-tandigen top. Achterkaken met ééne groote, perkamentachtige, aan den binnenrand dicht en kort bewimperde lob. Kaaktasters niet langer dan de lobben. Eindlid der liptasters cilindervormig, met afgeknotten top. Sprieten met tamelijk los-gelede knots. Sprietgroeven smal en kort, convergeerend. Lichaam meer of minder breed, soms iets smaller, doch alsdan tamelijk vlak, op de bovenzijde onbehaard. Halsschild aan de basis en aan de zijden duidelijk gerand. Dekschilden bij het ♂ afgeknot, bij het ♀ de naadhoek meer of minder duidelijk uitgetrokken. Mesosternum geheel of nagenoeg geheel onbedekt. Voorste coxaal holten van achteren open. — De soorten van dit genus leven achter de schors van zieke of afgestorven boomen, soms ook op boomzweammen en in andere fungi. — De larve van *I. quadripustulatus* is door Frisch, die van *quadripunctatus* door Perris beschreven.

Van de 5 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

1 De voorhoeken van het halsschild steken weinig uit. Voortarsen, vooral bij het ♂, sterk verbreed. Lichaam elliptisch, vlak gewelfd. Dekschilden met twee roodgele of witgele vlekken, van welke de tweede op de achterhelft staat (Sub-gen. *Ips* isp.). 2

De voorhoeken van het halsschild steken duidelijk uit. Halsschild van voren zoo breed als (♀), of breder (♂) dan aan de basis. Tarsen in beide seksen weinig verbreed. Lichaam lang en vrij smal, doch zeer vlak (Sub-gen. *Glichrochilus* Reitt.). Dekschilden met twee

roodgele vlekken, van welke de tweede reeds in het midden begint. De voorste vlek zet zich met een smaller gedeelte tot aan de basis der dekschilden voort. Sprieten en pooten zwartbruin. Bij het ♂ de kop grooter; de dekschilden aan het uiteinde afgeknut, bij het ♀ aan den naadhoek uitgetrokken. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Achter schors van loofboomen en aan uitvloeiende sappen van berken; zij zou ook op aas (?) aangetroffen zijn. Zeer zeldzaam; Wageningen en Steenwijk. Ook in Westfalen. 3. **quadripustulatus** L.

- 2 Lichaam tamelijk gewelfd. Halsschild bij het ♀ nauwelijks-, bij het ♂ in 't geheel niet naar voren versmald. Dekschilden elk met twee gewone, min of meer rondachtige, roodgele vlekken. Sprieten en pooten pekbruin. Bij het ♂ de kop zeer groot. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Achter boomschors en op eiken- en berkenzwammen. Verbreid in de grensprovinciën, doch overal vrij zeldzaam. 1. **quadripunctatus** Oliv.

Lichaam minder gewelfd. Halsschild naar voren iets versmald. Dekschilden elk met twee witgele vlekken, van welke die aan den schouder gewoonlijk drie-lobbig, die achter het midden ingesnoerd en als het ware uit twee samenhangende vlekken gevormd is. Sprieten en pooten pekbruin. Bij het ♀ is de naadhoek der dekschilden zeer weinig uitgetrokken. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Aan eikensap en achter boomschors. Zeer zeldzaam; Arnhem, Deventer en in de omstreken van Maastricht. Ook in Westfalen en in België, o.a. bij Antwerpen. 2. **quadriguttatus** F.

17. Pityophagus Shuckard.

Dit genus is zeer verwant aan *Ips*. Lichaam zeer smal, eenigszins cylinder-vormig, tamelijk gewelfd, onbehaard. Halsschild nagenoeg zoo breed als lang, van voren recht afgeknut, aan de basis zeer fijn gerand. Dekschilden in beide seksen afgeknut. Voorste coxaal-holten van achteren bijna gesloten. Het ♂ met een kleinen anaal-ring achter het pygidium.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam nagenoeg cylindervormig, zeer smal, tamelijk gewelfd; geelrood of licht roodbruin, glanzig, de kop gewoonlijk iets donkerder; de bovenzijde overal dicht en vrij sterk-, de dekschilden gedeeltelijk in rijen bestippeld. Laatste sterniet met opgerichten toprand. Dekschilden in beide seksen recht afgesneden, met afgeronde buitenhoeken. Lengte $4\frac{1}{2}$ —6 mm. Achter dennenschors, waar zij jacht maakt op insecten-larven. De larve en pop zijn door Perris beschreven. Niet zeldzaam, vooral in de diluviale streken. 1. **ferrugineus** L.

II. Sub-Familie CYBOCEPHALINAE.

VIII. Tribus CYBOCEPHALINI.

Cybocephalus Erichson.

Lichaam met volledig kogelvermogen, doordat de zeer groote kop het pro- en mesosternum, benevens de vier voorpooten, bedekken kan; de achterrand van het halsschild is over de basis der dekschilden verschuifbaar; de bovenzijde glad en glanzig. Kop op de onderzijde met convergeerende sprietgroeven. Sprieten 11-ledig, nauwelijks langer dan de kop, met 3 groote eindledjes, welke eene niet zeer dichte knots vormen. Bovenlip onbedekt, hoornachtig, uitgerand. Achterkaken slechts éénlobbig. Kaaktasters dik, weinig langer dan de kaaks-lob, met verdikt eindlid. Laatste lip-taster-lid cylinder-vormig, aan het uiteinde recht afgeknut. Alle tarsen 4-ledig; de tarsen der voor- en middelpooten iets verbreed en aan de onderzijde zolig behaard; de klauwen met een zwak aangeduiden, stompen tand in het midden. Bij het ♂ is nog een vrij groote anaal-ring voorhanden; ook zijn de beide seksen verschillend in kleur. — Dit genus vormt de aansluiting van de Nitidulidae tot de Anisotomidae (*Agathidium*).

Van de 13 Europeesche soorten komen 2 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam glanzig zwart, zeer lijn gechagrineerd en onduidelijk bestippeld. Halsschild hoogstens met smallen, gelen zijrand; de pooten donkerbruin, de voorpooten bruinrood. Bij het ♂ (*ruficeps* Sahlb.) zijn de kop, de voorrand van het halsschild, de voorpooten,

alsook de middeldijen roodgeel. Lengte $\frac{2}{3}$ tot ruim 1 mm. In rottende plantenstoffen en aan boomschors. Niet inl. 1). In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld; ook in België.

(exiguus Sahlb.) (politus Germ.)

Lichaam glanzig zwart, zeer fijn gechagrineerd en duidelijk verspreid bestippeld; de stippels zenden elk naar achteren drie divergeerende streepjes uit. Sprieten en pooten pekbruin. Bij het ♂ (*aeniceps* Duv.) zijn de kop en de voorrand van het halsschild donker bronzig. Lengte ruim 1 mm. Aan de schors van vruchtboomen. Niet inl. In West-Europa.

(pulchellus Er.)

III. Sub-Familie RHIZOPHAGINAE.

IX. Tribus RHIZOPHAGINI.

18. Rhizophagus Herbst.

Bovenlip twee-lobbig, doch door den verbreedten voorrand van den kop bedekt. Voorkaken met twee kleine tandjes achter den gekromden top. Achterkaken één-lobbig. Sprieten 10-ledig, het eindlid een scherp afgescheiden en gewoonlijk aan het uiteinde geringden eindknop vormend. Lichaam lang gestrekt, smal, in den regel tamelijk vlak; op de bovenzijde, bij sterke vergrooting gezien, duidelijk netsgewijze geaderd. Halsschild aan de zijden en aan den achterrand fijn gerand. Dekschilden het laatste tergiet grootendeels onbedekt latend. Schenen met korte doorntjes. Tarsen 5-ledig, het vierde lid klein; de eerste 3 ledjes niet verbreed. Achtertarsen bij het ♂ slechts met 4 ledjes. Ook heeft het ♂ een bijkomenden anaal-ring achter het pygidium. Dit genus vormt de aansluiting van de Nitidulidae tot de Colydiidae en Cucujidae. De soorten leven met hare larven achter de schors van afgestorven of zieke boomen, waar zij jacht maken op Tomiciden-larven — De larve en pop van *R. depressus* en *nitidulus* en de larve van *dispar* zijn door Perris, de larve van *depressus* door Erichson en de eenigszins twijfelachtige larve van *bipustulatus* door Westwood beschreven.

Van de 17 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 6 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De tweede tusschenruimte der dekschilden naar voren verbreed en bestippeld. Bovenzijde roodbruin of roodgeel, glanzig 2
- De tweede tusschenruimte der dekschilden naar voren niet verbreed en niet bestippeld. . . 3
- 2 Halsschild iets breeder dan lang, vrij grof en verspreid bestippeld. De stippels van den kop langwerpig of zelfs hier en daar in lijne langsrimpeltjes overgaande. Dekschilden met niet volkomen regelmatige stippelrijen, de tweede tusschenruimte van voren tamelijk fijn en eenigszins verward bestippeld. De bestippeling der dekschilden fijner dan die van het halsschild. Lengte 5 mm. Achter dennenschors. Niet inl. In Westfalen. . (grandis Gyll.)
- Halsschild zoo lang als of iets langer dan breed, fijn en vrij dicht bestippeld; de kop eveneens fijn en gewoon bestippeld. Dekschilden met regelmatige stippelrijen, de tweede tusschenruimte met eene afgekorte, vrij regelmatige stippelrij. De bestippeling op halsschild en dekschilden nagenoeg even fijn. Lichaam licht roodbruin of roodgeel, glanzig. Bij het ♂ is de kop groot, nagenoeg zoo breed als het halsschild, bij het ♀ duidelijk smaller. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Gemeen achter dennenschors 1. **depressus** F.
- 3 Eindknop der sprieten aan den top recht afgeknot en schijnbaar niet geringd, doordat de andere ringen in den grooten, bekervormigen eersten ring opgenomen zijn. Kop van achteren sterk ingedrukt, dicht bestippeld. Halsschild zeer grof en verspreid bestippeld. Dekschilden met krachtige, tot aan het uiteinde doorlopende stippelrijen, aan het uiteinde iets verward bestippeld. Lichaam roodbruin of roestrood. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam; achter eikenschors, ook achter schors van vruchtboomen. Den Haag, Loosduinen, Noordorp en Utrecht. In de Rijnprov. bij Crefeld. 2. **cribratus** Gyll.
- Eindknop der sprieten eirond, duidelijk geringd, daar de groote eerste ring de overige ringen niet geheel opneemt. 4

1) De uit Nederland opgezonden exemplaren waren onjuist gedetermineerd, zoo ook de uit België opgegeven *C. pulchellus*.

- 4 Het derde sprietlid $2\frac{1}{2}$ tot 3 maal zoo lang als het tweede. Sprietgroeven op de onderzijde van den kop niet convergeerend 5
- Het derde sprietlid hoogstens $1\frac{1}{2}$ tot 2 maal zoo lang als het tweede 9
- 5 Halsschild nagenoeg zoo breed als lang, met afgeronde voorhoeken en tamelijk fijne, ronde stippels. Bovenzijde glanzig zwart, bij onuitgekleurde exemplaren roodbruin. Sprieten en pooten roodbruin. Kop, behalve aan de basis, en het halsschild matig fijn en niet dicht bestippeld. Dekschilden met eenigszins verdiepte stippelrijen, welke vóór het uiteinde verdwijnen; die langs de zijden fijner. Lengte $3-3\frac{1}{2}$ mm. Achter populier- en dennenschors, ook aan uitvloeiend eikensap en gistend berkensap. Zeldzaam; bij Leiden en in de omstreken van Maastricht 3. **politus** Hellw.
- Halsschild met meer rechte voorhoeken en met eenigszins langwerpige, diepe stippels. Bovenzijde geheel of grootendeels roodbruin of roestrood 6
- 6 Bovenzijde vlak gedrukt 7
- Bovenzijde iets gewelfd. Halsschild in 't oog vallend langer dan breed, met duidelijke voorhoeken; zeer grof bestippeld. Dekschilden met zeer krachtige stippellijnen. Lengte $3\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}$ mm. Achter de schors van sparren. Niet algemeen; Arnhem, Utrecht, Terborgh, Breda, Ginneken, Diemen en Valkenburg (Limb.). Ook in België. . . 4. **ferrugineus** Payk.
- 7 Halsschild duidelijk langer dan breed, vrij dicht bestippeld; over het midden en menigmaal ook de dekschilden donker gekleurd; het lichaam veelal eenkleurig roodbruin. Dekschilden met vrij diepe stippelrijen, eenigszins als stippellijnen. Lengte $3-4$ mm. Verbreid, doch niet algemeen; achter eiken- en dennenschors, onder dood hout en soms op kerkhoven aan schedels en doodsbeenderen 5. **parallelocollis** Gyll.
- Halsschild niet of slechts weinig langer dan breed. Dekschilden met fijnere en weinig of niet verdiepte stippelrijen 8
- 8 Halsschild iets langer dan breed, meer verspreid en iets sterker bestippeld dan bij *parallelocollis*, met iets spitsere voorhoeken. Dekschilden met stippelrijen, wier stippels fijner zijn dan die van het halsschild; zij bereiken geheel het uiteinde, ofschoon zij daar veel fijner worden. Lichaam glanzig roestrood, gewoonlijk iets korter en breeder dan bij *parallelocollis*. Lengte $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam achter beukenschors. 6. **perforatus** Er.
- Halsschild niet langer dan breed, dichter en minder sterk bestippeld dan bij *perforatus*. De stippelrijen naar het uiteinde fijner en ten laatste nagenoeg geheel verdwijnend; de stippels der rijen niet fijner dan die van het halsschild. Deze soort onderscheidt zich van de roestroode aberratie van *bipustulatus*, door het langere derde sprietlid. Lengte $3-4$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld. Mij onbekend . . (Bruckii Reitt.)
- 9 De sprietgroeven op de onderzijde van den kop duidelijk convergeerend. Halsschild met rechte voorhoeken. Dekschilden met eene zwarte vlek, welke slechts de basis en het uiteinde vrij laat; of wel zij zijn, behalve eene vlek voor het uiteinde of ook eene schoudervlek, geheel donker gekleurd. Lichaam zelden geheel roodbruin 10
- De sprietgroeven op de onderzijde van den kop nauwelijks convergeerend. Kop korter, met veel kortere slapen. Lichaam vlak. Halsschild korter, zoo lang als breed, met afgeronde voorhoeken 12
- 10 Lichaam tamelijk gewelfd. Kop zonder indruk. Laatste sterniet met een, door twee bultjes begrensden indruk. Deze soort onderscheidt zich van *dispar* door de meer cilindervormige gedaante en door de geheel of nagenoeg geheel tot aan het uiteinde reikende, en slechts de basis rood latende, zwarte kleur der dekschilden. Kop rood; het halsschild over het midden zwart, langer dan breed, fijn bestippeld. Dekschilden met lijne stippellijnen en eene naar het uiteinde gegroefde naadstreep. Bij het ♂ de kop groot, nagenoeg zoo breed als het halsschild; het halsschild langer dan bij het ♀. Lengte $3\frac{1}{2}-4$ mm. Achter beukenschors en in rottend wilgenhout. Niet inlandsch. In Oldenburg en Westfalen (*nitidulus* F.)
- Lichaam eenigszins vlak gedrukt. Kop achter den sprietwortel meer of minder ingedrukt. Laatste sterniet gewoon. 11
- 11 Halsschild, vooral bij het ♂, duidelijk langer dan breed. Kop bij het ♂ zoo breed als het halsschild, bij het ♀ smaller. Lichaam lang gestrekt, licht roodbruin; het halsschild op het midden gewoonlijk iets donkerder. Dekschilden met een breeden, meer of minder donkeren middenband, welke zich naar voren meer dan naar achteren uitbreidt; zelden ontbreekt deze dwarsband of blijft slechts een iets donkerder vegg op het midden over. Halsschild lijn- en verspreid bestippeld. De naadstreep der dekschilden verdiept. Lengte $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ mm. Achter de schors van vermoede eiken- en beukenstammen. Niet inland.

België bij Hertogenwald; ook in Oldenburg, Westfalen en bij Elberfeld. . (dispar Payk.)

Halsschild iets langer dan breed. Kop in beide seksen smaller dan het halsschild. Lichaam bruinzwart of donker roodbruin, glanzig; de sprieten, de pooten, eene vlek voor het uiteinde der dekschilden en meestal ook eene schoudervlek roestrood; de grondkleur der dekschilden veelal lichtbruin, de schouders en het uiteinde lichter. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel licht roestkleurig. De naadstreep der dekschilden naar het uiteinde sterker verdiept. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Gemeen achter beuken- en eikenschors en in vermolmd hout. 7. *bipustulatus* F.

12 Lichaam smal, tamelijk vlak, zoo groot als de kleine exemplaren van *bipustulatus*, donker-roodbruin; de dekschilden, behalve het uiteinde, roestkleurig, veelal ook de naad en de randen iets donkerder. Halsschild korter dan bij *bipustulatus*, tamelijk lijn en niet zeer dicht bestippeld. Dekschilden met regelmatige, fijne stippelrijen. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Achter de schors van *Populus tremula* en wellicht ook van berken. Niet inf. in Westfalen; ook bij Elberfeld en Hamburg. (parvulus Payk.)

Lichaam tamelijk breed, glanzig zwart; de dekschilden blauw- of groenachtig. Sprieten en pooten roodbruin, de sprietknots en gewoonlijk ook de dijen donkerder. Halsschild zoo lang als breed, tamelijk grof en eenigszins verspreid bestippeld. Dekschilden met lijne stippelrijen. Lengte 3 mm. Niet inf. Zij zou in de Rijnprov. bij Elberfeld gevangen zijn. (*coeruleus* Waltl, *cyanipennis* Hardy & Bold) (*coeruleipennis* Sahlb.)

XXII. Familie CRYPTOPHAGIDAE.

Meestal kleine, gewoonlijk eenkleurige, rood- of geelbruine, bruine, zeldzamer zwartachtige, bij uitzondering gevlekte kevertjes. Lichaam eivormig, veelal langwerpig, bij uitzondering meer verbreed (*Diphyllini*), soms meer of minder half-kogelvormig-ovaal; meestal meer of minder

Fig. 45. *Cryptophagus fumatus* Gylb. Orig.

I Zijrand van het halsschild
II Spriet

gewelfd, zelden tamelijk vlak (*Diphyllini*); in den regel fijner of grover behaard, zelden onbehaard (*Emphyllus*). — Sprieten in den regel vóór de oogen, meer of minder onder den zijrand van het voorhoofd-, bij de *Atomarini* daarentegen dicht bijeen en vrij op het voorste gedeelte van het voorhoofd, tusschen de oogen, ingeplant, 11-ledig, in den regel met 3-. (Fig. 45, II), bij uitzondering met 2-ledige knots (*Diphyllus*); bij het ♂ van *Antherophagus* zijn de sprieten in 't midden zoo dik, dat de knots niet duidelijk afgescheiden is; de funiculus bestaat veelal uit ongelijke leedjes. — Onderzijde van den kop gewoonlijk zonder sprietgroeven, bij *Ephistemus* bevinden zich deze langs de oogen en zetten zich dikwijls op de onderzijde van het halsschild voort. — Bovenlip meestal afgeknot, soms iets uitgerand (*Diplocoelus*, *Antherophagus*) of afgerond (*Diphyllus*). Voorkaken in den regel klein, doch krachtig ontwikkeld; niet altijd duidelijk zichtbaar; gewoonlijk sterk gebogen, zelden aan den top gekorven of gespleten, aan den binnenrand met een vliezigen zoom en aan de basis met een geribbelde kauwvlak; bij *Antherophagus* zijn de voorkaken groot en naast de bovenlip zichtbaar. Achterkaken met twee hoornachtige of vliezige, aan het uiteinde behaarde lobben. Kaaktasters 4-, lip-tasters 3-ledig. Tong hoornachtig. — Halsschild bij vele soorten (*Cryptophagus*) met eenigszins bultige, of napvormig verdikte, of haakvormig uitstekende voorhoeken en fijn gekorven zijden (Fig. 45, I). — De dekschilden bedekken het geheele achterlijf. — De vleugels zijn ongeveer geaderd als bij de *Nitidulidae*; zij zijn volgens Roger (*Cryptoph. acutangulus* Gylb.) lang gestrekt, met het gewricht iets vóór het midden. De vena scapularis, welke aan den oorsprong met de concave zijde iets naar buiten gebogen is, zet zich in het topgedeelte niet voort; kleine, divergeerend teruglopende takken van de vena scapularis en externo-media zijn door eene dwars-anastomose verbonden. De vena externo-media verloopt nagenoeg rechtlijnig en reikt met haar uiteinde tot aan den achterrand. In de area interno-media bevindt zich eene bijader, die met de vena interno-media door eene dwars-anastomose verbonden is, zich echter tegen den achterrand in twee, eerst rechthoekig uiteenvallende, vervolgens evenwijdig loopende takken splitst. In de area-analis verloopt dicht langs de vena interno-media eene bijader, welke met haar door eene korte dwarsader verbonden is. De achterrand is tot aan het breede basaal-lobje bewimperd. Bij *Telmatophilus* is het topgedeelte van den vleugel buitengewoon groot en vertoont geene eigenlijke aderen, doch nabij den voorrand slechts zwak aangeduide schaduwstrepen. — Prosternum naar achteren, tusschen de voorcoxae, meer of minder verlengd, in eene diepe of slechts oppervlakkige groef van het mesosternum opgenomen en bij uitzondering tot aan het metasternum doorlopend. — Tarsen 5-ledig, gewoon, niet gelobd; bij *Diphyllus* en *Telmatophilus* het vierde lid

zeer klein en geheel of gedeeltelijk in het derde opgenomen, bij het ♂ veelal de achtertarsen 4-ledig; de voortarsen bij het ♂ soms min of meer verbreed, bij *Telmatophilus* het derde of ook nog het tweede lid gelobd. Klauwen gewoon. De coxae op verschillenden afstand van elkaar verwijderd; de voorcoxae iets verbreed en gewoonlijk vrij dicht aaneenstaande, de achtercoxae op tamelijk grooten afstand van elkaar verwijderd en bijna den zijrand der dekschilden bereikend. — Achterlijf met 5 sterniten, het eerste sterniet langer dan de overigen, allen meestal bewegelijk. — De larven zijn verschillend gevormd, lang gestrekt, meestal week, met vooruitstekenden kop; soms lang behaard, met 3—4-ledige sprieten; de pooten met een enkelen klauw. Die der *Cryptophagini* gelijken meer op die der *Colydiidae*, die der *Atomarini*, welke slechts eene enkele ocel aan weerszijden van den kop hebben, meer op die der *Endomychidae*. — De *Telmatophilini* naderen door den bouw der tarsen tot de *Nitidulidae* en hebben ook verwantschap met de *Erotylidae*. De *Diphyllini* vormen de aansluiting der *Cryptophagidae* aan de *Engini* (*Erotylidae*) en vooral aan de *Byturidae* 1), doch ook aan de *Cucujidae*, door den vleugelbouw aan de *Tritomidae* en volgens *Burmeister* het meest aan de *Nitidulidae*, ofschoon zij in vele opzichten daarvan afwijken. Het genus *Diphyllus* nadert tot het genus *Phloeostichus* (*Cucujidae*).

De soorten dezer familie leven voor het meerendeel onder rottende en schimmelende plantentoffen, oud stroo en hooi, sommigen op bloemen, bloeiende dennen, in vochtige weilanden, langs slooten op bloeiende oeverplanten, als *Typhaceeën* en riet, op fungi, in vochtige kelders, op schimmel van wijnvaten, enkelen in mieren-, hommels- en wespennesten. — Zij voeden zich, evenals hare larven, hoofdzakelijk met schimmels en andere fungi; sommigen leven van bloemdeelen en enkelen wellicht ook van dierlijke stoffen (sommige *Cryptophagus*-soorten).

Overzicht der Tribus.

- 1 Halsschild aan weerszijden evenwijdig aan den zijrand, met kielvormig verheven langslijsten. Dekschilden met stippellijnen. Lichaam breed en tamelijk vlak. Sprietknots 2- of 3-ledig. Het derde tarslid met lobvormige zool. **I. Diphyllini.**
- Halsschild zonder verheven langslijsten, hoogstens met eene fijne langslijn evenwijdig aan den zijrand, doch dan zijn de dekschilden niet gestreept. 2
- 2 Sprieten vóór de oogen, onder den zijrand van het voorhoofd ingeplant, het voorhoofd daartusschen vlak. 3
- Sprieten dicht bijeen en vrij op het voorste gedeelte van het voorhoofd, tusschen de oogen ingeplant, het voorhoofd daartusschen als een naar voren toegespitste kant uitstekend. **IV. Atomarini.**
- 3 Het derde tarslid en meestal ook het tweede gelobd. Halsschild aan de zijden slechts uiterst lijn gekorven of gaaf, de voorhoeken niet bultig of tandvormig verdikt. Dekschilden gewoonlijk zonder stippellijnen 2). Sprieten met 3-ledige knots. **II. Telmatophilini.**
- Alle tarsleedjes gewoon, niet gelobd. **III. Cryptophagini.**

I. Tribus DIPHYLLINI.

Sprietknots 2-ledig. Het tweede en derde tarslid zwak 2-lobbig, aan de onderzijde lang behaard. (*Diphyllus*.)
 Sprietknots 3-ledig. Het derde tarslid met smal-lobvormige zool. (*Diplocoelus*.)

II. Tribus TELMATOPHILINI.

Het eerste lid der sprietknots smaller dan de volgende leedjes. In habitus aan *Cryptophagus* herinnerend, weinig glanzig of tamelijk dof, op de bovenzijde meer of minder dicht behaard. **I. Telmatophilus.**
 Het eerste lid der sprietknots niet smaller dan de volgende leedjes. In habitus aan *Atomaria* herinnerend, glanzig, nagenoeg kaal, met enkele lange, verspreide, opstaande haren. (*Tomarus*.)

III. Tribus CRYPTOPHAGINI.

- 1 Mesosternum met eene diepe, scherpkantig gerande groef, ter opname van de voortzetting van het prosternum. Zijrand van het halsschild gaaf, hoogstens de voorhoeken iets verdikt.

1) De nervatuur der vleugels van *Diplocoelus fagi* komt volgens *J. Reichenbacher* met die van *Byturus* zoozeer overeen, dat de volgens *Ganglbauer* aangetoonde verwantschap dezer twee genera volkomen gerechtigd is. Wij zonden dus hierin de aansluiting vinden van de *Byturidae* aan de *Cryptophagidae*.
 2) Bij het genus *Glisonotha* Motsch. uit Ceylon met stippellijnen.

- Voorkaken groot, naast de bovenlip zichtbaar. Kop met duidelijke, vrij groote slapen. Keelrand aan weerszijden spits uitgetrokken. Dekschilden verspreid bestippeld. Bovenzijde behaard. Sprietknots 3-ledig. Sprietten bij het ♂ in 't midden zoo dik, dat de knots niet duidelijk afgescheiden is. 2. **Antherophagus.**
- Mesosternum slechts met een oppervlakkigen indruk, op welken de voortzetting van het prosternum rust. Voorkaken klein, niet duidelijk zichtbaar. Kop zonder slapen. 2
- 2 Bovenzijde onbehaard, dof. Halsschild aan de zijden gaaf, de voorrand uitgesneden en de voorhoeken vooruitstekend. 3. **Emphyllus.**
- Bovenzijde duidelijk behaard. 3
- 3 Zijden van het halsschild niet gekorven of getand, maar door een drietal stompe hoeken bochtig, de voorhoeken gewoon en de voorrand recht afgeknut. De stippels der dekschilden hier en daar in rijen gerangschikt. 4. **Paramecosoma.**
- Zijden van het halsschild min of meer gekorven of getand. 4
- 4 De voorhoeken van het halsschild eenigszins bultig of napvormig verdikt of wel haakvormig uitstekend, de zijden fijn gekorven, nabij het midden gewoonlijk met een sterker kerftandje (Fig. 45, 1). Naadstreep der dekschilden naar voren afgekort. 5. **Cryptophagus.**
- De voorhoeken van het halsschild niet verdikt of haakvormig uitstekend, de zijden slechts zeer fijn en gelijkmatig getand. 5
- 5 Derde sprietlid niet langer dan breed. De zijden van den keelrand onder de oogen spits uitstekende. Halsschild verbreed, de zijrand fijn en duidelijk getand. Naadstreep der dekschilden het schildje bereikend en aldaar sterker verdiept. Lichaam vlak, met parallelle zijden, fijn neerliggend behaard. (Pterygium.)
- Derde sprietlid langer dan breed. De zijden van den keelrand niet spits uitstekende. Halsschild naar voren sterker versmald, de zijrand met scherpe tandjes. Naadstreep der dekschilden nabij het schildje afgekort. Lichaam ovaal, duidelijk gewelfd, ruw en iets afstaande behaard. 6. **Henoticus.**

IV. Tribus ATOMARINI.

- 1 De zijden van het halsschild verdikt en door eene tweede lijne randlijn begrensd. Achtertarsen bij het ♂ 4-ledig. 7. **Caenoscelis.**
- De zijden van het halsschild gewoon gerand, niet door eene minder lijne randlijn begrensd. Achtertarsen in beide seksen 5-ledig. 2
- 2 Halsschild en dekschilden duidelijk van elkaar afgesnoerd, elk afzonderlijk meer of minder gewelfd. Lichaam duidelijk behaard. Schildje verbreed. Prosternum tusschen de voorcoxae meer of minder smal en met parallelle zijden; geen sprietgroeven. 3. **Atomaria.**
- Halsschild en dekschilden niet scherp van elkaar gescheiden, doch in eene zelfde half-kogelvormige werving een ovaal vormend. Lichaam niet duidelijk zichtbaar behaard, hoogstens met verspreide stoflijne haartjes bezet. Schildje rondachtig. Prosternum tusschen de voorcoxae breed, naar achteren verbreed en afgeknut, tegen het korte, breede mesosternum aanstootend. Langs de oogen met sprietgroeven, welke zich meestal ook op de onderzijde van het halsschild voortzetten. 9. **Ephistemus.**

I. Tribus DIPHYLLINI.

Diphyllus Stephens.

Sprietten 11-ledig, met 2-ledige knots. Bovenlip afgerond. Achterkaken met twee hoornachtige, aan het uiteinde lang gebaarde lobben, van welke de binnenste smaller en korter is. Kaaktasters 4-ledig. Kin naar voren aanmerkelijk versmald, van voren diep uitgerand met een tand in het midden. Tong hoornachtig, recht afgeknut, lang bewimpeld. Halsschild aan weerszijden, evenwijdig aan den zijrand, met kielvormig verheven langsljsten. Dekschilden met stippellijnen. Lichaam breed en tamelijk vlak. Tarsen 5-ledig, het tweede en derde lid zwak 2-lobbig, aan de onderzijde lang behaard; het vierde lid zeer klein, gedeeltelijk in het derde verborgen.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild dubbel zoo breed als lang, met zeer fijn gekorven zijrand. Dekschilden met tamelijk grove stippellijnen. Lichaam pekwart, fijn behaard, langs de zijden van halsschild en dekschilden bewimperd. Over het midden van den naad der dekschilden met eene wit behaarde dwarsvlek, ook aan het uiteinde met een soms onduidelijk wit haarvlekje. Spriet en pooten roestrood. Lengte 3 mm. Achter schors van doode boomen. Niet inl. Komt overigens in geheel Europa voor. De ontwikkeling is door *Perris* beschreven. (*Unatus* F.)

Diplocoelus Guérin.

Bovenlip iets uitgerand. Voorkaken sterk gebogen, aan den top gespleten. Spriet met 3 ledige knots. Schenen aan het uiteinde met verscheidene groote einddoornen, aan den binnenrand kamvormig getand. Tarsen 5-ledig, het derde lid met smalle, lobvormige zoom.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild bijna dubbel zoo breed als lang, met duidelijk afgeronde, gekorven en iets opgerichte zijden, niet dicht bestippeld, aan weerszijden met twee evenwijdige, kielvormig verheven langslinjen, waartusschen eene vrij regelmatige rij van grovere stippels. Dekschilden nagenoeg driemaal zoo lang als het halsschild, met regelmatige stippelrijen. Lichaam roodbruin of pekbruin, bij onuitgekleurde exemplaren geelbruin, vrij dicht neerliggend, de dekschilden op het midden nabij den naad iets dichter behaard; op de dekschilden in de tusschenruimten met meer of minder duidelijke haarrijen. Spriet en pooten roestkleurig. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Achter beukenschors, in beukenzwanen en droog vermolmd eikenhout. Niet inl. In de Rijnprov. bij Gulik; ook bij Hamburg. (*fagi* Chevrol.)

II. Tribus TELMATOPHILINI.

1. Telmatophilus Heer.

*Bovenlip afgeknut. Voorkaken breed, driehoekig, met gewonen top en daarachter stomp gekerfd, aan de binnenzijde met eene aan den top behaarde membraan. Achterkaken met twee hoornachtige, aan het uiteinde gebaarde lobben; de buitenste lob vierhoekig, de binnenste zeer smal en aan het uiteinde in eenen hoornhaak eindigend. Eindlid der 4-ledige kaaktasters spoelvormig, zoo lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Kin van voren driepuntig, de middeltand afgeknut of vlak uitgerand. Tong kort, hoornachtig, afgeknut, met eenigszins uitstekende hoeken, bewimperd. Eindlid der 3-ledige lipstasters cirond. Spriet 11-ledig, met 3 grootere eindleedjes, van welke het eerste smaller is dan de volgende. In habitus aan *Cryptophagus* herinnerend, weinig glanzig of tamelijk dof, meer of minder dicht behaard. Halsschild aan de zijden slechts niterst fijn gekorven, de voorhoeken niet bultig of tandvormig verdikt. Dekschilden zonder stippellijnen. Gevechtsgroeven der voorcoxae van achteren open. Tarsen 5-ledig, het derde en meestal ook het tweede lid gelobd, het vierde zeer klein en in het derde opgenomen; het klauw-lid groot. Door den bouw der tarsen grenzen de *Telmatophilus*-soorten aan de *Nitidulidae*; ook hebben zij verwantschap met de *Erotylidae*. — De soorten van dit genus leven op waterplanten, als *Typha*-, *Sparganium*- en *Carex*-soorten; ook op vochtige weiden. — De larve en pop van *T. brevicollis* zijn door *Perris* beschreven.*

De 5 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

- 1 Halsschild duidelijk breder dan lang. 2
- Halsschild zoo lang of nagenoeg zoo lang als breed 4
- 2 Halsschild met eene zeer fijne langslin evenwijdig aan den zijrand, veel breder dan lang, de zijden fijn gekorven en tot aan de basis geleidelijk afgerond, de achterhoeken eenigszins stomp. Bovenzijde tamelijk vlak gewelfd, zwart, zeer fijn grauw behaard. Spriet en pooten geelrood, de dijen soms iets donkerder. Lengte $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{4}$ mm. Verbreid; op *Typha latifolia* en onder aangespoeld riet. 1. *typhae* Fall.
- Halsschild zonder eenige aanduiding van eene langslin evenwijdig aan den zijrand, de zijden onduidelijk gekorven, vóór de scherp aangeduide rechte achterhoeken iets uitgebogen . . . 3

- 3 Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, iets minder verbreed dan bij typhae, niet in-, doch iets vóór het midden het breedst. Bovenzijde zwart, vrij dicht grauw behaard. Pooten zwart, met geelroode schenen. Lengte $2-2\frac{1}{2}$ mm. Op Typha en riet; ook onder aangespoeld riet. Den Haag, Hillegersberg, Rotterdam en Abcoude . . . 2. **Schönherri** Gylh.

Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang. Lichaam zwartachtig, bruin, roodbruin of geelbruin (*rufus* Reitt.), het achterlijf naar het uiteinde gewoonlijk lichter, dicht grauw of geelgrauw behaard. Spriet en pooten roodachtig, de dijen veelal iets donkerder. Deze soort is korter en breder dan *caricis* en met breder halsschild. Lengte $2\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$ mm. Op Carex en Sparganium. Vele exemplaren bij Gouda en Gorkum, Juli; ook bij den Haag, Arnhem, Breda, Zwaluwe en Bunde bij Maastricht . . . 3. **brevicollis** Aubé.

- 4 Zijden van het halsschild, vóór de scherp aangeduide, rechte achterhoeken, iets uitgebogen. Bovenzijde tamelijk gewelfd, zwart- of bruinachtig en veelal met een schijn van bronsglans, meer of minder dicht geelachtig of grauw behaard. Spriet en pooten geelrood. Bij het ♂ zijn de achterdijen verdikt en de schenen nabij de basis iets naar buiten verbreed. Licht roodbruine, fijn geelachtig-wit behaarde, iets krachtiger bestippelde exemplaren werden als *longicollis* Reitter beschreven. Lengte $2\frac{1}{2}-3$ mm. Gemeen op Carex-soorten, April—Sept. De ab. *longicollis* werd bij Breda aangetroffen . . . (obscurus F.) 4. **caricis** Oliv.

Zijden van het halsschild tot aan de vrij stompe achterhoeken gelijkmatig afgerond en zeer fijn gekorven. Bovenzijde okerkleurig, de onderzijde en veelal ook het halsschild meer roodbruin, het uiteinde van het achterlijf meer roestkleurig; vrij dicht geelgrauw of grauw behaard en tamelijk fijn en vrij dicht bestippeld. De naad en de zijden der dekschilden en veelal ook een dwarsband donkerder of eenigszins zwartbruin. Spriet en pooten roodgeel. Lengte $2\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$ mm. Op bloeiende Sparganium-soorten, Juli en Aug. In aantal bij Gouda; ook bij Arnhem, Wageningen, de Bilt en Rotterdam . . . 5. **sparganii** Ahrens.

Tomarus Leconte.

In habitus aan Atomaria herinnerend, glanzig, nagenoeg kaal en slechts met enkele lange, verspreide, opstaande haren bezet. Het eerste lid der sprieknoots niet smaller dan de volgende leedjes.

Van de 2 Europeesche soorten zou wellicht 1 in Nederland kunnen worden aangetroffen.

Langwerpig-ovaal, gewelfd, pekkwart of pekbruin, glanzig. Kop en halsschild fijn bestippeld en uiterst fijn, verspreid behaard, met enkele opstaande haren aan de zijden van het lichaam. Halsschild aan weerszijden met een basaalgroefje. Dekschilden zeer fijn bestippeld; met eene groote schouderplek en een onduidelijken, breedten band achter het midden, alsook de spriet en pooten, roodgeel. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Met Varinas-tabak uit Noord-Amerika naar Duitschland ingevoerd. Mij onbekend. (pulchellus Lec.)

III. Tribus CRYPTOPHAGINI.

2. Antherophagus Latreille.

Bovenlip iets uitgerand. Voorkaken groot, sterk gekromd, naast de bovenlip zichtbaar, met gewonen top. Achterkaken met twee lobben, de binnenste aan den top met eenen hoornhaak. Eindlid der kaaktasters kegelvormig. Tong hoornachtig, afgerond, aan de zijden beweimperd. Eindlid der lipstasters lang, smal, toegespitst. Keelrand aan weerszijden spits uitgetrokken. Kop met duidelijke, vrij groote slapen. Spriet 11-ledig, met 3-ledige knots; bij het ♂ in 't midden zoo dik, dat de knots niet duidelijk afgescheiden is. Zijrand van het halsschild gaaf, hoogstens de voorhoeken iets verdikt. Dekschilden verspreid bestippeld. Bovenzijde behaard. Mesosternum met eene diepe, scherpkantig gerande groef, ter opname van de voortzetting van het prosternum. Tarsen 5-ledig, gewoon, niet gelobd, de achtertarsen bij het ♂ 4-ledig. Ook is bij het ♂ het voorhoofd van voren min of meer uitgesneden en zijn de eerste drie leedjes der voortarsen iets verbreed en aan de onderzijde dicht behaard. — De soorten van dit genus leven in hommel- en weespennesten, doch worden ook veel op bloemen aangetroffen, vooral op Umbelliferen, van waar zij zich, naar het

schijnt, aan het lichaam der hommels vastgeklemd, naar 'de nesten van deze laten medevoeren. — De larve van A. silaceus is door Perris, die van A. pallens door v. Gernet beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 De scherpe zijrand van het halsschild achter de niet bultige voorhoeken eindigend, nagenoeg recht, met scherp aangeduide rechte achterhoeken. Halsschild bij het ♀ naar voren meer versmald dan bij het ♂. Lichaam okergeel of iets roodgeel, uiterst fijn behaard. Dekschilden veelal iets donkerder dan kop en halsschild, naar het uiteinde versmald, meestal met duidelijke rijen van doorschijnende, donkere stippels der onderzijde. De middelste spriet-ledjes in den regel iets donkerder gekleurd. Bij het ♂ is de kop iets breeder. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Verbreid op bloemen en in gras; ook in hommelnesten aangetroffen.

1. *nigricornis* F.

De scherpe zijrand van het halsschild duidelijk tot aan den voorrand doorlopend en aan de voorhoeken tot eene vlakke bult verdikt, een weinig afgerond, met stompe achterhoeken. Halsschild naar voren zeer weinig versmald. Lichaam meer roodgeel of licht roodbruin. . . 2

- 2 Voorschenen aan het uiteinde met tandvormig uitstekende buitenhoeken. Kop en halsschild dichter en meer witachtig-geelgrijs-, eenigszins glanzig behaard. Sprieten donker roodbruin, het uiteinde lichter. Lengte 4—5 mm. Verbreid op Umbelliferen, doch vrij zeldzaam; ook in hommelnesten 2. *silaceus* Herbst.

Voorschenen aan het uiteinde zonder tandvormig uitstekende buitenhoeken. Kop en halsschild even fijn en dun behaard als de rest van het lichaam. Bij het ♂ zijn de schenen breeder dan bij het ♀ en eenigszins gebogen. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Niet zeldzaam op bloemen, vooral op Umbelliferen; ook in hommelen- en wespennesten 3. *pallens* Oliv.

3. *Emphylus* Erichson.

(Spavius Motsch.)

Sprieten 11-ledig, met 3 grootere eindledjes. Voorkaken klein, niet duidelijk zichtbaar, achter den top gekorven. Achterkaken met twee behaarde lobben, de binnenste smaller en aan den top met een kleinen hoornhaak. Eindlid der kaaktasters kegelvormig, dat der lipstasters ei-vormig. Tong hoornachtig, aan weerszijden met een klein vliezig aanhangsel. Kop zonder slapen. Bovenzijde onbehaard, dof. Halsschild aan de zijden gaaf, de voorrand uitgesneden en de voorhoeken vooruitstekend. Dekschilden naar het uiteinde met eene naadstreep. Mesosternum slechts met een oppervlakkigen indruk, op welken de voortzetting van het prosternum rust. Tarsen 5-ledig, de achtertarsen bij het ♂ 4-ledig.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam weinig verlengd en tamelijk breed, bruinrood, uiterst fijn bestippeld, eenigszins dof, onbehaard. Halsschild veel breeder dan lang, met parallele zijden en scheef afgeknotte, eenigszins bultige voorhoeken. Dekschilden met eene zeer fijne, naar voren afgekorte naadstreep. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. In de nesten van *Formica rufa* en soms ook bij *Bombus muscorum*. Verbreid in de diluviale streken. Niet in de duinstreken gevonden.

1. *glaber* Gylh.

4. *Paramecosoma* Curtis.

Habitus van eene groote Atomaria. Sprieten fijn en slank, het eerste lid sterk verdikt, met 3-ledige knots. Halsschild smal, de zijden niet gekorven of getand, maar door een drietal stompe hoeken bochtig, de voorhoeken gevonn en de voorrand recht afgeknut. Bovenzijde duidelijk behaard. De stippels der dekschilden hier en daar in rijen gerangschikt, de naadstreep tot over het midden reikende. Tarsen in beide seksen 5-ledig, het vierde lid aanmerkelijk kleiner.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam zwart, zeer fijn behaard, tamelijk glanzig. Sprieten, pooten en dekschilden licht roodbruin. Onmitgekleurde exemplaren geheel roodbruin of roestkleurig. Halsschild weinig

breeder dan lang, duidelijk smaller dan de dekschilden, met eene van voren afgekorte, kielvormige middellijn. Dekschilden iets lijner en minder dicht dan het halsschild-, gedeeltelijk in rijen bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Onder afgevallen bladeren en op dennen. Uitsluitend in Limburg bij Houthem en Valkenburg, in Juli, aangetroffen. Ook in de Rijnprov. 1. *melanocephalum* Herbst.

5. Cryptophagus Herbst.

*Sprieten vóór de oogen onder den zijrand van het voorhoofd ingeplant, 11-ledig, met 3 grootere eindledjes; het voorhoofd daartusschen vlak. Bovenlip van voren recht afgesneden, bewimperd. Voorkaken klein, achter den top gekorven. Achterkaken met twee behaarde lobben, van welke de binnenste smaller en aan den top met een klein hoornhaakje bewapend is. Tong onduidelijk gespleten. De voorhoeken van het halsschild eenigszins bultig of napvormig verdikt, of wel haaktvormig uitstekend, de zijden fijn gekorven, nabij het midden gewoonlijk met een sterker kerstandje. Bovenzijde duidelijk behaard. De naadstreep der dekschilden naar voren afgekort. Tarsen 5-ledig; bij het ♂ de achtertarsen slechts 4-ledig, de eerste drie voortarsen-ledjes min of meer verbreed. — De soorten van dit genus zijn meest allen roodbruin of rood-geel en leven op vochtige, dampige plaatsen, aan schimmel, in boomzwammen, paddestoelen, onder rottende plantenstoffen, in oud stroo en beschimmeld hooi, in dakstroo, op rottend hout, in kelders tegen muren, op wijnvaten en in hemel- en weespennesten. — De larve van *C. lycoperdi* is door Bouché, die van *pilosus* door Erichson, van *cellaris* door Newport en Westwood, de pop van *cellaris* door Newport, de vermoedelijke larve van *subdepressus* en de larve van *lapponicus* (wellicht *pubescens* St.) door Rey en de larve en pop van *dentatus* door Perris beschreven.*

Van de 63 Europeesche soorten komen 21 in Nederland en 10 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild met een klein uitstekend, meer of minder duidelijk tandje in of nabij het midden van den zijrand. Sprieten gewoonlijk krachtig ontwikkeld 2
- Halsschild zonder zijtandje, achter de duidelijk verdikte voorhoeken gelijkmatig gekorven of lijn getand. Sprieten dun en slank, het derde en vijfde lid langer dan het vierde en zesde (Sub-gen. *Micrambe* Thoms.) 25
- 2 Voorrand van het halsschild nabij de oogen een weinig uitgebogen, waardoor de voorhoeken naar voren iets uitstekend, doch zeer weinig verdikt zijn. Eindlid der liptasters meestal halfkogelvormig verdikt en aan het uiteinde afgeknot. Halsschild zonder duidelijke bultige verhevenheden, vóór het schildje met eene zeer korte basaalplooï (Sub-gen. *Mnionomus* Woll.), sterk verbreed, weinig of niet smaller dan de dekschilden, aan weerszijden aan de basis met een klein, rondachtig groefje; het kleine zijtandje in het midden van den zijrand staande. Lichaam elliptisch, eenigszins buikig gewelfd, niet grof bestippeld en tamelijk fijn, neerliggend behaard, lichter of donkerder roodbruin. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Niet inl. Zij zou in de Rijnprov. bij Gulik in de nesten van *Bombus terrestris* voorkomen; ook bij Elberfeld (?). (*baldensis* Er.)
- Voorrand van het halsschild recht afgesneden, de voorhoeken naar voren niet- of slechts als stompe builen uitstekend. Liptasters ovaal, niet sterk verdikt (Sub-gen. *Cryptophagus* i.sp.) 3
- 3 Lichaam ruw behaard of ten minste gedeeltelijk met afstaande beharing, of wel tusschen de neerliggende beharing der dekschilden bevinden zich langere, opgerichte, gewoonlijk in rijen geplaatste haren 4
- Lichaam gelijkmatig lijn neerliggend behaard 10
- 4 De zijwaartsche verbreding der voorhoeken van het halsschild naar achteren in een spits tandje uitgetrokken 5
- De zijwaartsche verbreding der voorhoeken van het halsschild naar achteren stomp of recht, doch nimmer in een spits tandje uitgetrokken, of wel zonder eenig tandje 7
- 5 Het zijtandje van het halsschild in het midden tusschen vóór- en achterrands staande 6
- Het zijtandje van het halsschild vóór het midden staande, de zijden sterk gekarteld en achter

het zijtandje lang bewimperd. Halsschild $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, aan de zijden weinig afgerond. Lichaam langwerpig, roestrood of bruinrood, vrij sterk, doch niet dicht bestippeld. Lengte 2 mm. Niet inlandsch. Bij Hamburg. Mij onbekend. (Skalitzkyi Reitt.)

- 6 Voorschenen aan den buiten-tophoek tandvormig uitgetrokken. Lichaam krachtig ontwikkeld, geweldig, roodbruin, soms meer geelrood, vooral de dekschilden; zeer lang en ruw behaard, diep en krachtig bestippeld. Halsschild breeder dan lang, aan weerszijden met twee meer of minder duidelijke gladde bultjes, achter het zijtandje onduidelijk gekorven, met stompe achterhoeken. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer gemeen in bovisten. 1. *lycoperdi* Herbst.

Voorschenen met gewoon uiteinde. Lichaam gemiddeld iets kleiner dan bij *lycoperdi*, minder lang behaard en gewoonlijk ook minder sterk bestippeld, lichter of donkerder roodbruin of roestrood. De zijden van het halsschild in 't midden hoekig verbreed, de voorhoeken 1) duidelijk en vrij sterk kantig uitstekend, de achterhoeken bijna recht, de 4 gladde bultjes onduidelijk. Dekschilden langwerpig-ovale. Eene in habitus, lengte der beharing en bestippling veranderlijke soort. Licht roestroode exemplaren met meer ovale dekschilden, iets sterkere en meer verspreide bestippling en iets langere beharing vormen de var. *punctipennis* Bris. 2). Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Verbreed doch niet gemeen. De var. *punctipennis* bij den Haag, onder oud stroo. Ook op het eiland Borkum. 2. *pilosus* Gyll.

- 7 Het zijtandje van het halsschild iets vóór het midden staande. Halsschild weinig of niet sterker, doch wel dichter bestippeld dan de dekschilden, met 4 zeer onduidelijke, gladde bultjes. 8

Het zijtandje van het halsschild in het midden staande. Halsschild met weinig of niet afgeronde zijden 9

- 8 Halsschild weinig verbreed, ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, aan de zijden sterk afgerond en naar de basis versmald, iets minder grof bestippeld dan bij *setulosus*, zoo breed als de lang-ovale dekschilden in hunne grootste breedte. Eene der grootste soorten, donker roodbruin of bruinrood. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. Ook in Westfalen en Oldenburg (Schmidtii St.)

Halsschild meer verbreed, ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang, aan de zijden iets minder afgerond en naar de basis weinig versmald, zeer dicht en krachtig bestippeld, in 't midden nauwelijks zoo breed als de dekschilden in hunne grootste breedte, met een zeer klein zijtandje. Dekschilden minder dicht bestippeld dan het halsschild. Lichaam korter en meer gedrongen, geweldig, ovaal, roodbruin, roestrood of geelrood; zeer lang geelachtig, zelden wit behaard; overigens op *lycoperdi* gelijkend. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam; in hommelen en wespennesten; ook in dakriet. Oisterwijk, de Steeg, Kolhorn (N. Holl.) en Valkenburg (Limburg), Juni—Sept. Ik bezit een wit behaard exemplaar uit Putten (Gelderland), in een nest van *Vespa rufa* aangetroffen. In de Rijnprov. bij Cleef en Crefeld.

3. *setulosus* St.

- 9 Oogen klein, fijn gefacetteerd, eenigszins kegelvormig uitpuilend. Halsschild sterk verbreed, met slechts iets afgeronde zijden, weinig uitstekende voorhoeken, uiterst dicht en krachtig bestippeld; de dekschilden iets lijner en veel minder dicht bestippeld. Lichaam roestrood of bruinrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam; onder oud riet, stroo en plantenafval. 4. *affinis* St.

Oogen groot, meer half-kogelvormig, grof gefacetteerd. Halsschild iets minder verbreed dan bij *affinis*, met bijna rechte zijden, de voorhoeken naar buiten als een korte, uitstekende, schuin staande kant, welke naar achteren rechthoekig is. Halsschild en dekschilden dicht, op de dekschilden fijner bestippeld. Lichaam lichter of donkerder geelbruin of roodbruinachtig. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam; in vochtige huizen, stallen en kelders, tegen muren; ook onder mos, bladeren en beschimmeld stroo 5. *cellaris* Scop.

- 10 De verdikte voorhoeken van het halsschild naar achteren haakvormig of in een meer of minder fijnen tand uitgetrokken. 11

De verdikte voorhoeken van het halsschild naar achteren niet in een tand uitgetrokken, doch als een stompe, rechte of afgeronde hoek 18

- 11 Het zijtandje van het halsschild in het midden staande 12

Het zijtandje van het halsschild iets achter het midden staande; de zijrand vormt daar ter plaatse een zeer stompen hoek 16

1) Bij het determineren zou men hier ook kunnen komen op den vorm *hirtulus* Kr. van *C. samius* L. (zie bij No. 24), met sterk verbrede en naar achteren haakvormig uitstekende voorhoeken van het halsschild. Deze verdikking der voorhoeken van het halsschild neemt ongeveer een vierde of meer, bij *pilosus* daarentegen hoogstens een vijfde van den zijrand in. De bestippling van het lichaam is dicht, op het halsschild grover dan op de dekschilden.

2) Volgens sommige schryvers eene goede soort.

- Het zijtandje van het halsschild iets vóór het midden staande. 17
- 12 De voorhoeken van het halsschild 1) tamelijk verdikt, haakvormig naar achteren gebogen en tevens naar achteren verbreed; zij vertoonen op de buitenzijde eene zeer duidelijke, ovale, napvormig verdiepte, gladde oppervlakte, wier randen kantig opgericht zijn. 13
- De voorhoeken van het halsschild zeer weinig verbreed en slechts als een smalle, naar achteren niet breeder wordende, lijne kant verdikt. Halsschild breed-vierhoekig, met bijna niet afgeronde zijden en rechte achterhoeken, slechts iets smaller dan de dekschilden. Lichaam zwartbruin, de kop voor de oogen roodbruin. Dekschilden ovaal, geelachtig-roodbruin, in 't midden en langs de zijden donkerder. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Een paar exemplaren bij St. Pieter nabij Maastricht, Maart. In Noord-Duitsland bij Hamburg.
(? ruficornis Steph.) 6. **umbratus** Er.
- 13 Oogen zeer groot, grof gefacetteerd. Sprietten, vooral de middelste leedjes, dun. Halsschild duidelijk breeder dan lang, naar de basis versmald, de voorhoeken zeer sterk haakvormig uitstekend. Lichaam langwerpig, lichter of donkerder roodachtig-geelbruin, zeer dicht en lijn bestippeld en lang, zeer dicht en zacht grauw behaard. Dekschilden veel fijner bestippeld dan het halsschild. Bij sommige exemplaren zijn kop en halsschild iets donkerder gekleurd. Bij eene monstruositeit *Waterhousei* Rye (*Heydenii* Reitt.) de voorhoeken van het halsschild scheef afgeknut en reikende tot aan het zijtandje, hetwelk met den voorhoek versmolten en daardoor niet zichtbaar is. (Mij onbekend). Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Vrij gemeen in vochtige huizen, kelders, stallen en schuren tegen witgekalkte muren; ook tusschen rottende en schimmelige plantenstoffen in tuinen 7. **acutangulus** Gyll.
- Oogen van gewone grootte, fijner gefacetteerd. Sprietten vrij dik, ook in het midden. Bovenzijde krachtiger-, de dekschilden bijna zoo dicht als het halsschild bestippeld. Beharing minder dicht 14
- 14 Halsschild 2) zeer dicht en veel sterker dan de dekschilden bestippeld, sterk verbreed. De grootste soort van het genus, zeer gestrekt, met parallele zijden, roodbruin, de dekschilden in den regel donkerder gekleurd, de basis en de zijrand, van voren breed, roestrood. Bij het ♂ zijn de voorschenen naar het uiteinde verbreed, de achterschenen gekromd. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. Op wilgen. Niet inlandsch. Bij Hamburg, Oldenburg en in Denemarken.
(grandis Kr.) (populi Payk.)
- Halsschild dicht- en duidelijk sterker dan de dekschilden bestippeld. Lichaam langwerpig-ovaal, eenkleurig licht roestrood of geelbruin 15
- Halsschild dicht- en, evenals de dekschilden, vrij sterk-, doch niet dichter bestippeld, duidelijk verbreed, naar de basis iets versmald, de voorhoeken naar achteren als een spits tandje weinig uitstekend. Lichaam ovaal, korter dan bij *fumatus* en *quercinus*, iets gewelfd, licht roestrood, glanzig, lijn en niet dicht-, kort neerliggend geel behaard. Deze soort is kleiner dan *fumatus*, met veel breeder halsschild en minder behaarde en minder dicht en sterker bestippelde dekschilden. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. In de nesten van *Formica rufa*. Zeldzaam; Amsterdam, Nootdorp, Oisterwijk, Grebbe en Maastricht 10. **badius** St.
- 15 Halsschild weinig breeder dan lang, duidelijk smaller dan de dekschilden aan de basis, naar de basis niet of slechts zeer weinig versmald, met eene onduidelijke, kielvormige verhevenheid vóór het schildje, de voorhoeken als spits naar achteren gerichte tandjes. Lichaam langwerpig, iets gewelfd, roodgeel-achtig, zeer dicht bestippeld en zeer dik en lijn, kort geel behaard. Dekschilden achter het midden meer of minder duidelijk verbreed, fijner dan het halsschild bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam; aan oud hout en in gras. Den Haag, Nootdorp, Arnhem, Laag-Soeren, Zutphen, Breda en Haeren (Limburg).
8. **fumatus** Gyll.
- Halsschild duidelijk breeder dan lang, korter dan bij *fumatus*, naar de basis duidelijk versmald, meestal met eene duidelijke, kielvormige verhevenheid vóór het schildje; de voorhoeken meer verbreed en iets verder uitstekend. Lichaam minder verlengd dan bij *fumatus*, met meer parallele zijden, licht roestrood, glanzig, kort en lijn geel behaard. Dekschilden grover en iets minder dicht bestippeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Aan schimmelige eikenschors. Bij Arnhem, Maarsbergen en aan de Grebbe 9. **quercinus** Kr.
- 16 Bovenzijde tamelijk gewelfd, eenigszins glanzig, zeer lijn-, het halsschild iets dichter bestippeld, eenkleurig geelbruin of roodbruin, soms het halsschild iets donkerder dan de dekschilden, kort, neerliggend dicht-, de dekschilden meer verspreid behaard. Het eerste lid

1) Hierby komt ook te staan een vorm van *C. distinguendus* Sturm (zie bij No. 16), by welken het zijtandje van het halsschild in 't midden staat. Deze onderscheidt zich van *umbratus* doordat de zyden van het halsschild minder parallel, in 't midden zeer weinig boogig verbreed- en de achterhoeken stomp zijn.

2) Hierby komt ook te staan *C. scutellus* L., var. *hirtulus* Kraatz (zie bij No. 24), by welke de voorhoeken van het halsschild sterk verbreed en naar achteren haakvormig verlengd zijn. Eenkleurig bruinrood of roodbruin.

der sprietknots weinig of niet smaller dan het volgende. De voorhoeken van het halsschild als zeer kleine, meer of minder spitse uitstekend; de spitse zijtandjes iets achter of in het midden (zie bij no. 12). Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Verbreed door het geheele land, doch niet gemeen; in schimmelende plantenafval. 11. **distinguendus** St.

Bovenzijde tamelijk vlak gedrukt, vrij dof, overal krachtig-, het halsschild iets dichter bestippeld; neerliggend kort en dicht behaard. Het eerste lid der sprietknots duidelijk smaller dan het volgende. De voorhoeken van het halsschild als kleine, minder spitse tandjes uitstekend, de zijden vóór het middentandje iets uitgerand en daarachter sterk versmald, waardoor de zijden in het midden meer hoekig verbreed zijn. Dekschilden met nagenoeg parallele zijden, aan de basis veel breeder dan de basis van het halsschild. Lichaam roodbruin, de dekschilden meer roestrood, de naad en de zijden donkerder; soms eenkleurig lichter roodbruin, doch gewoonlijk over het midden der dekschilden iets lichter gekleurd. Spriet en pooten roodachtig-geelbruin. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Crefeld; ook in Westfalen (dorsalis Sahlb.)

- 17 Halsschild 1) aan weerszijden van de basis met een duidelijk, klein rond groefje; de voorhoeken sterk verdikt en naar achteren tandvormig uitstekend, de zijden achter het inddentandje duidelijk versmald en met kerftandjes. Bovenzijde sterk glanzig, licht roodbruin, uiterst kort en zeer fijn behaard. Halsschild sterk verbreed, evenals de weinig of niet bredere dekschilden niet dicht bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inl. In Westfalen. (fuscicornis St.)

Halsschild aan weerszijden van de basis zonder eenig in 't oogvallend rond groefje; de voorhoeken weinig verdikt, doch met een naar achteren gericht tandje; met meer parallele, meer kantige en iets breeder dan gewoonlijk afgezette zijden. Lichaam meer langwerpig, iets gewelfd, licht bruinrood of roestrood, glanzig, niet dicht-, doch sterk bestippeld, uiterst kort en fijn behaard. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. In huizen en kelders. Niet inl. In België en bij Hamburg. (labilis Er.)

- 18 Het zijtandje van het halsschild vóór het midden staande 19
Het zijtandje van het halsschild in het midden staande 22

Het zijtandje van het halsschild iets achter het midden staande, klein en onduidelijk. Lichaam langwerpig-ovaal, weinig gewelfd, geelrood of licht bruinrood, soms de dekschilden donkerder; vooral het halsschild dicht en sterk bestippeld, kort geclachtig neerliggend behaard. Halsschild sterk verbreed, naar voren meer dan naar de basis versmald; de voorhoeken slechts bultig verdikt, doch weinig of niet uitstekend. Het eerste lid der sprietknots ongeveer de helft smaller dan het volgende, de knots daardoor meer 2-ledig schijnend. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. In de nesten van *Bombus terrestris*, *Vespa vulgaris* en veelal in dakstroo. Zeldzaam; Oldenzaal, Winterswijk, Arnhem, de Steeg, Warnsveld, Putten, Maarsbergen, Wageningen, Gronsveld en Oirschot, Juni—Sept. In de Rijnprov. bij Cleef, Crefeld en Gulik (lapponicus Reitt. nec Gylh.) 16. **pubescens** St.

- 19 Halsschild niet sterker- en niet of slechts weinig dichter bestippeld dan de dekschilden aan de basis, iets breeder dan lang, met nagenoeg parallele zijden, in 't oog vallend smaller dan de ovale dekschilden, de voorhoeken zeer weinig merkbaar verdikt, het zijtandje uiterst klein en ver voor het midden staande. Eene der kleinste soorten van het genus, dicht en fijn bestippeld, vrij dicht en kort neerliggend behaard, roodbruin, de dekschilden lichter bruineel; soms het geheele lichaam geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam; den Haag, Nootdorp, Valkenburg en Limmel bij Maastricht, Juli—Oct. In de Rijnprov. bij Elberfeld; ook in Oldenburg (bicolor St.) 12. **scutellatus** Newm.

Halsschild duidelijk sterker dan de dekschilden bestippeld 20

- 20 Halsschild uiterst dicht-, veel dichter en grover dan de dekschilden bestippeld. Lichaam lang-gestrekt, licht roodbruin of geelbruin, kort en niet dicht neerliggend behaard. Halsschild naar achteren versmald, met smalle, fijn gekorven en lang bewimperde, vóór het zijtandje iets uitgerande zijden; de voorhoeken napvormig verdikt, zelden naar achteren in een tandje uitgetrokken (zie bij no. 17 de noot). Dekschilden met nagenoeg parallele zijden, eenigszins in rijen bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen onder rottende bladeren, in kelders en stallen tusschen schimmelend stroo en vuil, op vochtige planken en tegen witgekalkte muren. 13. **dentatus** Herbst.

1) Hierbij komt ook te staan een vorm van *C. dentatus* (zie bij no. 20), bij welken de voorhoeken van het halsschild naar achteren in een tandje uitgetrokken zijn. Deze is grooter dan *fuscicornis*, vrij lang-, neerliggend en tamelijk dicht behaard. Halsschild zeer dicht-, de dekschilden iets fijner en minder dicht bestippeld. Bij *C. labilis*, waarop deze vorm gebijkt, is de bestippling minder dicht en het halsschild naar achteren minder versmald.

Halsschild slechts iets dichtër dan de dekschilden bestippeld 21

- 21 Halsschild veel grover dan de dekschilden bestippeld, naar de basis eenigszins versmald, langs de zijden min of meer afgerond, met een zeer klein zijtandje en daarachter met duidelijke kerftandjes; de voorhoeken weinig verdikt. Lichaam tamelijk breed, ovaal, een weinig gewelfd, roodgeel of licht roestrood, vrij dicht-, kort, grauwegeel, neerliggend behaard. Lengte 2—2½ mm. Niet zeldzaam; tusschen schimmelende bladeren, aan oude boomen, in huizen en ook wel in de nesten van *Lasius fuliginosus*.

14. *saginat*us St.

Halsschild slechts iets grover dan de dekschilden bestippeld, langs de zijden sterk afgerond, de zeer duidelijk verdikte voorhoeken ongeveer een vierde van den zijrand innemend. Lichaam geelbruin of roestkleurig-bruin, dicht behaard. Groote exemplaren met iets langer halsschild vormen *C. kraatzii* Reitt. (zie ook bij no. 23 de noot). Lengte 2½—3 mm. Eenmaal bij Katwijk. In de Rijnprov. bij Elberfeld; ook bij Hamburg . 15. *subfumatus* Kr.

- 22 Lichaam gewelfd. Halsschild aan de zijden gelijkmatig afgerond of wel naar de basis sterker dan naar voren versmald, duidelijk grover bestippeld dan de dekschilden. 23

Lichaam vooral naar voren, afgeplat, ovaal, eenigszins dof, bruinachtig geelrood, zeer dicht en fijn bestippeld en zeer fijn geelachtig of grauw behaard. Halsschild slechts iets sterker bestippeld dan de dekschilden, sterk verbreed, naar voren gewoonlijk meer in 't oog vallend versmald dan naar de basis, aan de zijden afgerond. Lengte 1½—2 mm. Niet inlandsch. In Westfalen. (subdepressus Gylh.)

- 23 Lichaam lang en smal, met volkomen parallelle zijden, roestrood of roodgeel, grauwegeel of grauw behaard. Halsschild weinig breeder dan lang, naar de basis sterk versmald, met eenigszins stompe achterhoeken. Lengte 1½—2½ mm. Eenmaal bij Assen, Juli; vermoedelijk op een *Pinus*- of *Abies*-soort. Deze soort komt in Griekenland op *Abies Apollinus* voor (parallelus Bris.) 17. *cylindrus* Kiesw.

Lichaam met meer afgeronde zijden, ovaal. Halsschild sterk verbreed, met zeer duidelijke zijtandjes, aan weerszijden van de basis met een klein rond groefje en met nagenoeg rechte achterhoeken 1). 24

- 24 Halsschild slechts weinig dichtër en iets grover bestippeld dan de dekschilden, aan de zijden vrij sterk afgerond, naar voren en naar achteren evenzeer versmald. Lichaam eenkleurig roestrood of bruinrood, niet zeer dicht grauwegeel behaard. Deze soort gelijkt overigens op de licht gekleurde exemplaren van *scanicus*, doch is korter en fijner bestippeld. Lengte 1½—2½ mm. Zeer zeldzaam. Venlo, Limmel bij Maastricht, Juni, Aug. Ook op het eiland Borkum 18 *Thomsonii* Reitt.

Halsschild veel dichtër en grover bestippeld dan de dekschilden, naar de basis iets meer dan naar voren versmald. Lichaam dicht, neerliggend, kort, grauwegeel behaard, roodbruin of roestrood; de dekschilden, behalve de lichtgekleurde basis op de schouders, zwartachtig, bij abc. *cellaris* Sturm (*patruelis* Sturm) eenkleurig geelbruin of bruingeel. De voorhoeken van het halsschild vormen een naar achteren gericht, stomp uitsteksel; bij den sterker behaarden vorm *hirtulus* Kr. (zie bij No. 6 en 14 de noot) sterk verbreed en naar achteren haakvormig uitstekend. De vorm *validus* Kr. is grooter en krachtiger ontwikkeld, de voorhoeken van het halsschild niet sterk uitstekend en naar achteren niet tandvormig uitgetrokken; het zijtandje klein; ook het halsschild naar de basis weinig meer dan naar voren versmald. Lengte 2—2½ mm. Overal zeer gemeen; in huizen tegen witte muren, in keldervuil, stallen, rottende plantenstoffen, beschimmeld hooi, achter boomschors, in zwammen en zelfs in mierennesten. De vorm *hirtulus* bij Venlo, Maastricht en Valkenburg; vooral gemeen in Zuid-Europa. De vorm *validus* eenmaal in honig aangerolven.

19. *scanicus* L.

- 25 Voorhoeken van het halsschild zeer weinig verdikt, eenigszins stomp, ongeveer het zesde gedeelte van den sterk gekorven zijrand innemend; de voorrand recht afgeknot, de zijden gelijkmatig en zwak afgerond, bijna recht. Lichaam langwerpig, gewelfd, geelrood of roodbruin, dicht bestippeld, gewoon en vrij lang behaard, de borst en het voorste gedeelte van den buik, alsook gewoonlijk eene groote, meer of minder uitgebreide middenvlek op elk dekschild zwartachtig; onuitgekleurde exemplaren zijn meer roestkleurig-geel en de vlek op de dekschilden is meer bruinachtig, soms zelfs bijna niet aangeduid. Achtertarsen bij het ♂ 4-ledig. Lengte 1½—1¾ mm. Niet inlandsch. In Noord- en Middel-Europa.

(bimaculatus Panz.)

1) Hoedje komt ook te staan een vorm van *C. subfumatus* Kr. (zie bij No. 21), bij welken het zijtandje van het halsschild meer in het midden staat. Deze onderscheidt zich van de onder No. 24 staande soorten door het meer gestrekte lichaam, het aan de zijden sterk afgeronde halsschild, met zeer klein, onduidelijk zijtandje, het ontbreken der kleine groefjes aan weerszijden van de basis en de nagenoeg afgeronde achterhoeken.

Voorhoeken van het halsschild sterk verdikt, doch gewoonlijk niet zijwaarts uitstekend, minstens het vierde gedeelte van den zijrand innemend; de voorrand met de voorhoeken iets afgerond, de zijrand lijn getand. Bovenzijde, vooral het halsschild, dicht bestippeld. Achtertarsen in beide seksen 5-ledig 26

- 26 De verbrede voorhoeken van het halsschild napvormig ingedrukt en naar achteren tand- of haakvormig uitstekend. De zijden van af de voorhoeken naar de basis versmald 27

De bultige voorhoeken van het halsschild tot een ovaal, glanzig, weinig of niet verdiept vlakje, scheef afgeknot, doch niet naar achteren tandvormig uitstekend. De zijrand van af het midden naar de basis versmald en duidelijk getand. Sprietten slank, den achterrand van het halsschild overschrijdend. Dekschilden fijn en zeer kort neerliggend behaard, zonder lange haren daartusschen. Lichaam roestrood of geelrood, weinig glanzig. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Verspreid; op dennentakken, pijnappels en onder afgevallen dennennaalden. 21. *abietis* Payk.

- 27 Dekschilden gewoon, tamelijk fijn en kort-, doch niet dicht neerliggend behaard, daartusschen zonder langere, opstaande haren. Lichaam lichter of donkerder roodbruin, de dekschilden iets lichter; eenigszins glanzig. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Westfalen en in de Rijnprov. bij Crefeld (vini Panz.)

Dekschilden fijn, neerliggend, kort en vrij dicht behaard en daartusschen met lange, opstaande, gedeeltelijk in rijen geplaatste, witte haren. Lichaam roestrood. Halsschild aan de zijden lijn en scherp getand. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet zeldzaam. Op *Sarothamnus vulgaris*, dennen, in gras en onder mos. (pilosulus Er.) 20. *villosus* Heer.

Pterygium Reitter.

Dit genus is naverwant aan Cryptophagus. Lichaam vlak, met parallelle zijden, fijn neerliggend behaard. Derde spriethlid niet langer dan breed. De zijden van den keelrand steken onder de oogen spits uit. Halsschild verbreed, de zijrand fijn en duidelijk getand, de voorhoeken niet verdikt of haakvormig uitstekend, de zijden slechts zeer fijn en gelijkmatig getand. De naadstreep der dekschilden bereikt het schildje en is aldaar sterker verdiept.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam langwerpig, met nagenoeg parallelle zijden, tamelijk vlak, licht roestrood of geelbruin, fijn behaard. Halsschild verbreed, eenigszins rechthoekig, dicht bestippeld, iets glanziger dan de dekschilden, aan weerszijden van de basis met een rondachtig groefje. Dekschilden weinig of niet breder dan het halsschild, lijner en dichter bestippeld, met zeer flauwe aanduiding van langsstrepen. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ mm. Op beukenzwammen en bloemen. In de Rijnprov. bij Düsseldorf; ook in Westfalen en Oldenburg.

(*crenulatum* Er.) (*crenatum* Gyll.)

6. Henoticus Thomson.

Dit genus is eveneens zeer verwant aan Cryptophagus. Lichaam ovaal, duidelijk gewelfd, ruw en iets afstaande behaard. Derde spriethlid langer dan breed. De zijden van den keelrand niet spits uitstekend. Halsschild naar voren sterker versmald, de zijrand met scherpe tandjes, de voorhoeken niet verdikt of haakvormig uitstekend. Naadstreep der dekschilden onmiddellijk nabij het schildje afgekort.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Langwerpig-ovaal, vlak gewelfd, donker roodbruin, vrij kort-, ruw, geelgrijs behaard en krachtig bestippeld. Sprietten en pooten geelrood. Halsschild iets smaller dan de dekschilden, aan de zijden lijn getand. Dekschilden iets lijner dan het halsschild bestippeld. De eerste twee spriethlides sterk verbreed. Lengte 2—2 $\frac{1}{2}$ mm. Op wilgenkatjes en bloeiende dennen; Leiden en Amersfoort; ook in België 1. *serratus* Gyll.

IV. Tribus ATOMARINI.

7. *Caenoscelis* Thomson.

Habitus van een *Cryptophagus*, doch in grootte met eene *Atomaria* overeenkomende. Sprietten dicht bijeen en vrij op het voorste gedeelte van het voorhoofd, tusschen de oogen, ingeplant, het voorhoofd daartusschen eenigszins als een naar voren toegespitste kant uitstekend; het eerste en tweede sprietlid zeer sterk verdikt; de knots 3-ledig. Geen sprietgroeven. De zijden van het halsschild verdikt en door eene tweede fijne randlijn begrensd. Het prosternum is achter de voorcoxae sterk verlengd, tamelijk smal, met gerande zijden en kan in eene diepe, breede uitholling van het nagenoeg geheel bedekte mesosternum ingelegd worden. Achtertarsen bij het ♂ 4-ledig.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Deze soort herinnert in habitus en kleur eenigszins aan een kleinen *Cryptophagus*. Lichaam elliptisch, geelrood, lijn geelgrijs behaard, weinig gewelfd, dicht-, het halsschild iets sterker bestippeld. Het tweede sprietlid zoo lang als breed; de sprietknots 3-ledig, het eerste lid kleiner dan de twee volgende leedjes, doch duidelijk breeder dan het achtste sprietlid. Basis van het halsschild weinig, doch gelijkmatig verdiept; de fijne randlijn vereenigt zich naar voren met den verdikten zijrand. Lengte $1\frac{3}{4}$ — $1\frac{5}{8}$ mm. Meermalen in de omstreken van Maastricht bij St. Pieter, Houthem en Valkenburg van lage planten gesleept, April—Juli. Zij zou ook bij *Lasius fuliginosus* voorkomen. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (Brisoutii Seidl., ferruginea Reitt.) 1. **pallida** Wollast.

8. *Atomaria* Stephens.

Lichaam eivormig of langwerpig-cirond, soms met eenigszins parallele zijden, sterk glanzig, duidelijk fijn behaard. Sprietten als bij *Caenoscelis* ingeplant, 11-ledig, met 3-ledige knots. Geen sprietgroeven. Voorkaken aan den top gespleten. Achterkaken met twee vliezige, aan den top behaarde lobben, de binnenste smaller en aan den top met een klein haakje. Halsschild en dekschilden duidelijk van elkaar afgesnoerd, elk afzonderlijk meer of minder gewelfd. Zijden van het halsschild gewoon gerand, niet door eene fijne randlijn begrensd. Schildje verbreed. Prosternum tusschen de voorcoxae meer of minder smal en met parallele zijden. Achtertarsen in beide seksen 5-ledig. — De soorten van dit genus leven op vochtige plaatsen, in schimmel, paddestoelen, rottend hout, tusschen plantenafval, rottend stroo, dorre bladeren, op wijngaarden en tegen witgekalkte muren. — De larve van *A. nigripennis* is door Erichson en Lucas beschreven.

Van de ± 70 Europeesche soorten komen 25 in Nederland en 8 in het aangrenzende gebied voor.

- 1 Lichaam smal, lang-gestrekt, met meer of minder parallele zijden. Sprietten dichter bijeen-, dan bij de oogen geplaatst (Sub-gen. *Atomaria* isp., *Agathengis* Gozis) 2
- Lichaam langer- of korter-ovaal, aan de zijden meer verbreed en afgerond. Sprietten verder van elkaar- dan van de oogen verwijderd (Sub-gen. *Anchicera* Thoms.) 13
- 2 Halsschild aan de basis gewoon neergedrukt, zonder langsplooien. 3
- Halsschild in 't midden van de basis met een door twee korte langsplooien scherp begrensden dwarsdruk en nagenoeg rechte achterhoeken, verspreid en zeer sterk bestippeld. Lichaam zwartachtig of donkerbruin, met verspreide grijze haartjes; de schouders en het uiteinde der iets of wat in rijen bestippelde dekschilden bruinrood; soms geheel bruinrood. Sprietten en pooten roestkleurig. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam; onder dood riet, rottende plantenstoffen, dorre bladeren en tusschen *Sphagnum*. (*plicicollis* Mäkl., *umbrina* Er.) 8. **fusciollis** Mannh.
- 3 Het eindlid der sprietten smaller dan het voorlaatste lid. Lichaam eenigszins cilindervormig, sterk gewelfd, pekswart met naar het uiteinde roodbruine dekschilden, roodbruin of bruinachtig-geel, op de bovenzijde vrij dicht en lijn bestippeld, glanzig, zeer lijn grijs behaard. Halsschild zoo breed als de dekschilden, bijna zoo lang als breed, met zeer stompe achterhoeken.

Sprieten en pooten roestkleurig. Lengte 2—2½ mm. Zeer zeldzaam; in gras, plantenafval en op zwammen. Rotterdam en Rijswijk, Mei, Juli. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 1. *finetarii* Herbst.

Het eindlid der sprieten niet smaller dan het voorlaatste lid. 4

4 De eerste twee leedjes der sprietknots duidelijk breder dan lang 5

De eerste twee leedjes der sprietknots vierkant, niet breder dan lang, de sprieten zeer slank. Halsschild gewoonlijk sterk gewelfd, duidelijk smaller dan de dekschilden, naar voren iets meer dan naar de basis versmald. Dekschilden al of niet gewelfd. 12

5 Lichaam duidelijk en vooral het halsschild sterk gewelfd. 6

Lichaam tamelijk vlak. Halsschild naar voren en naar achteren geleidelijk afgeplat 9

6 Halsschild weinig of niet smaller dan de dekschilden, naar voren niet meer dan naar de basis versmald, aan de zijden gelijkmatig afgerond, in het midden het breedst. 7

Halsschild in den regel in 't oog vallend smaller dan de dekschilden en gewoonlijk naar voren iets meer dan naar de basis versmald. 8

7 Halsschild dicht-, iets dichter doch even sterk als de dekschilden bestippeld. Lichaam bruin-zwart, op de bovenzijde lijn behaard. Dekschilden elk met eene voor het uiteinde gewoonlijk samenhangende roestgele langsstreep. Onuitgekleurde exemplaren roodbruinachtig, langs de zijden en aan het uiteinde der dekschilden lichter. De var. *pilosella* Reitt. is grooter, eenkleurig zwart en op de bovenzijde langer behaard. Sprieten en pooten roodachtig. Lengte 1½—1¾ mm. Zeer zeldzaam. De var. *pilosella* bij Arnhem en Wageningen, April, Juli. Het type niet in Nederland waargenomen; in Noord-Frankrijk bij Rijsel. Ik zag een typisch ex. van Reitter (Mus. v. d. Poll) 2. *Baranii* Bris.

Halsschild evenals de dekschilden lijn, matig dicht of iets meer verspreid bestippeld, doch niet dichter dan de dekschilden. Lichaam zwartbruin of bruin, de dekschilden roodbruinachtig, aan de basis en aan het uiteinde veelal lichter of wel over het midden donkerder gekleurd. Veelal de dekschilden roodbruinachtig, met een lichter gekleurden langsvceg over het midden. Sprieten en pooten geelachtig roodbruin. Lengte 1½ mm. Zeldzaam; in gras, tusschen plantenafval en onder hooi. Den Haag, Nootdorp, Arnhem en Rotterdam . . . 3. *subfasciata* Reitt.

8 Bovenzijde vrij dicht en tamelijk lijn-, op het halsschild iets dichter dan op de dekschilden bestippeld, pekszwart of pekbrown, lijn grauww behaard, de dekschilden meer bruinrood of ook donkerder met lichter schouderbuilen. Sprieten kort en gedrongen, evenals de pooten roodachtig. Het eerste sprietlid veel langer dan breed. Halsschild zelden naar voren niet meer dan naar de basis versmald. Lengte 1½—2 mm. Niet inlandsch. In België bij Heure op een paddestoel; ook in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 1). Ik zag een exemplaar van Reitter (fumata Er.) (umbrina Gyll.)

Bovenzijde zeer verspreid en vrij sterk bestippeld, tamelijk grof behaard, eenkleurig bruingeel of zwartbruin met licht gekleurde schouders en uiteinde der dekschilden, of wel de dekschilden bruinrood, hetzij eenkleurig of op den naad, langs de zijden en aan het uiteinde donkerder. Sprieten en pooten geelrood. Het eerste sprietlid nauwelijks langer dan breed. Groote exemplaren vormen *puncticollis* Thoms. Lengte 1½—1¾ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam in gras en tusschen plantenafval. De vorm *puncticollis* niet inlandsch; bij Münster en Pymont (nana Er.) 4. *nigriventris* Steph.

9 Halsschild aan de basis niet of bijna niet smaller dan de dekschilden 10

Halsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, weinig breder dan lang, met zwak afgeronde, bijna parallele zijden, naar voren niet meer versmald dan naar de basis, nagenoeg zoo sterk als de dekschilden bestippeld. Bestippeling der geheele bovenzijde lijn doch niet dicht. Roodbruin, de dekschilden naar het uiteinde en veelal ook aan de schouders lichter, soms nagenoeg geheel geelrood. Onuitgekleurde exemplaren geheel geelrood. De abc. *Hollastonii* Sharp zwartbruin, de dekschilden bruinrood, langs de zijden meestal iets donkerder. Deze soort gelijkt overigens zeer op *linearis*, doch is minder sterk afgeplat, heeft een korter en smaller halsschild en is minder lijn behaard. Lengte 1½—1¾ mm. Zeer zeldzaam; tusschen afgevallen bladeren. Het type niet inlandsch; de abc. *Hollastonii* eenmaal bij Nootdorp. (? alpina Heer, badia Er.) 7. *elongatula* Er.

10 Lichaam lang en smal, met volkomen parallele zijden, op de bovenzijde dicht bestippeld. Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als te samen breed 11

Lichaam minder lang-gestrekt, met niet volkomen parallele zijden, glanzig geelrood, lijn en dun behaard. Halsschild iets breder dan lang, nabij de basis het breedst, naar voren

1) De vroeger opgegeven exemplaren uit Nederland bleken later allen tot *subfasciata* te behooren.

duidelijk versmald. Dekschilden niet volkomen dubbel zoo lang als te zamen breed, evenals het halsschild fijn en tamelijk verspreid bestippeld. Eerste sprietlid lang, knotsvormig, dubbel zoo lang als breed. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inl. In België en in Westfalen.

(*diluta* Er.)

- 11 Halsschild nagenoeg vierkant, zoo breed als de dekschilden, naar voren en naar de basis slechts zeer weinig versmald, met stompe achterhoeken. Dekschilden uiterst dicht-, doch in 't oog vallend fijner dan het halsschild bestippeld. Lichaam pekwart, pekbruin of geelbruin, glanzig, kort neerliggend grauw behaard, het uiteinde der dekschilden gewoonlijk lichter gekleurd. Spriet en pooten geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen op allerlei lage planten, in gras, onder dorre bladeren en schimmelend stroo. In 1877 zeer schadelijk bij Wageningen en Lemele (Overijssel) aan suikerbieten of mangelwortelen. 5. *linearis* Steph.

Halsschild duidelijk breder dan lang, slechts iets-, doch zeer weinig smaller dan de dekschilden, naar voren en naar de basis nagenoeg even veel en duidelijk versmald. Dekschilden zoo dicht en sterk als het halsschild bestippeld. Bestippeling der geheele bovenzijde iets dichter dan bij *elongatula*. Lichaam donkerbruin, op de dekschilden met een iets lichter, van af de schouders tot aan het midden verloopenden langsveeg. Bij *abietina* J. Sahlb. zijn de dekschilden licht roodbruin of geelbruin. Lengte $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam. Het type bij Arnhem; enige exemplaren van de *ab. abietina* bij den Haag en Rotterdam, in gras. Ik vermoed dat deze soort slechts een iets afwijkende vorm van *elongatula* is. 6. *Herminae* Reitt.

- 12 Lichaam, vooral ook de dekschilden gewelfd. Halsschild naar voren duidelijk versmald, de achterhoeken met den achterrand geleidelijk afgerond. Dekschilden in- of dicht vóór het midden het breedst, naar het uiteinde aanmerkelijk versmald, iets grover dan het halsschild bestippeld. Pekzwart, de dekschilden aan de schouders en naar het uiteinde lichter, of wel roodbruin met donkerder naad, zijrand en uiteinde; vrij dicht grauw behaard. Spriet en pooten roodachtig, de dijen zwartachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (*procerula* Er.)

Lichaam tamelijk vlak. Halsschild kleiner en smaller dan bij *procerula*, aan den achterrand tamelijk recht, met zeer duidelijk stompe achterhoeken, aan de zijden weinig afgerond, naar voren en naar achteren slechts weinig- en bijna even veel versmald. Dekschilden achter het midden het breedst, aan het uiteinde meer breed afgerond, niet grover dan het halsschild bestippeld. Lichaam in den regel pekbruin, de dekschilden bruinrood, de naad en de zijden donker gekleurd; kort en dun grijs behaard. Bij de variëteiten *pulchra* Er. en *atrata* Reitt. is het halsschild naar voren meer versmald; de eerste is meer of minder roodbruin met lichtere dekschilden, wier naad en zijden donkerder zijn, of wel het geheele lichaam is roodgeel; de tweede is zwart met geelroode pooten, de sprieknoks en de dijen zijn iets donkerder. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Elberfeld. De var. *atrata* in Westfalen. (*prolixa* Er.)

- 13 Halsschild in het midden aan de basis met een diepen dwarsindruk, welke aan weerszijden door eene kleine langsplooi begrensd wordt 14

Halsschild aan de basis meer of minder diep ingedrukt, doch zonder langsplooien. 15

- 14 Spriet en slank en dun, het eerste sprietlid lang gestrekt, meer dan dubbel zoo lang als breed, de eerste twee leedjes der sprieknoks weinig of niet breder dan lang. Halsschild naar de basis niet-, van af het midden naar voren sterk versmald. Lichaam langwerpig-ovaal, gewelfd, zeer fijn behaard en zeer fijn-, doch niet dicht bestippeld, lichter of donkerder roodbruin; kop en halsschild meestal iets donkerder. Dekschilden eenigszins buikig verbreed en hier en daar iets in rijen bestippeld. Achterlijf, spriet en pooten roodgeel. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In Westfalen. (*impressa* Er.)

Spriet korter, het eerste lid kort, gewoon, de eerste twee leedjes der sprieknoks iets breder dan lang. Halsschild aan de zijden afgerond, in het midden eenigszins hoekig, naar voren iets meer dan naar de basis versmald. Lichaam langwerpig-ovaal, uiterst fijn bestippeld en behaard, lichter of donkerder rood, zelden het halsschild donker gekleurd; de dekschilden zwart of bruin, aan de schouders meestal roestrood, en gewoonlijk ook met lichter uiteinde, soms geheel geelbruin en slechts aan de basis iets donkerder; onuitgekleurde exemplaren rood-geel. Spriet en pooten roodgeel. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Verbreed. Aan schimmel op wijnvaten en niet zeldzaam tusschen schimmelend hooi en plantenresten nabij stallen en schuren op het land. (*pulchella* Reitt. nec Heer, *nigripennis* Heer) 9. *munda* Er.

- 15 Halsschild aan den achterrand gewoon afgerond, niet aan weerszijden in 't oog vallend uitgehogen, in 't midden veelal meer opgericht, aan de zijden gewoonlijk sterk afgerond, naar voren iets meer dan naar de basis versmald, in of vóór het midden het breedst. Bij uitzondering de zijden van af het midden naar achteren zeer weinig of niet-, doch naar voren sterk versmald, waardoor zij in of vóór het midden eenigszins hoekig uitsteken . . . 16

- Halschild aan weerszijden van den achterrand duidelijk uitgebogen, nagenoeg altijd van af de basis naar voren geleidelijk versmald, aan de zijden minder afgerond, nabij het midden nimmer hoekig verbreed. Lichaam duidelijk gewelfd. 23
- 16 Sprietten meestal lang en dun, de eerste twee leedjes der langwerpige, vrij smalle knots niet breeder dan lang, het eerste knotslid meestal kegelvormig 17
- Sprietten korter, de eerste twee leedjes der sterk afgescheiden, iets dikkere knots, een weinig verbreed 23
- 17 Halschild, behalve aan de basis, niet in 't oogvallend sterker dan de dekschilden bestippeld. 18
- Halschild duidelijk sterker dan de dekschilden bestippeld 20
- 18 Achterrand van het halsschild in 't midden niet sterker opgericht, de lijn gerande zijden neergebogen en daardoor van boven gezien niet zichtbaar 19
- Achterrand van het minder gewelfde halsschild in 't midden sterker opgericht; de lijn gerande zijden, van boven gezien, nagenoeg over de geheele lengte zichtbaar; de zijden van af het midden tot aan den achterrand bijna recht, vóór het midden niet duidelijk hoekig, de achterhoeken recht. Dekschilden in 't midden buikig verbreed en daar veel breeder dan het halsschild. Lichaam geheel roodachtig-bruingeel of licht roodbruin, soms de zijden van het achterlijf donkerder, zeer fijn en niet dicht bestippeld, niterst fijn witachtig behaard, iets glanzig. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. In gras. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld; in Westfalen en in Oldenburg (gravidula Er.)
- 19 Lichaam langwerpig-ovaal, weinig gewelfd. Halschild aan de basis minder neergedrukt dan bij gutta, duidelijk smaller dan de dekschilden. Lichaam zwart of zwartbruin, de tophelft der dekschilden vrij scherp roodgeel of geel, vrij dicht en duidelijk bestippeld, fijn behaard; veelal kop en halsschild roodbruin. Sprietten en pooten roodgeel. De ab.c. **imitata* Reitt. is zwart, de dekschilden voor het uiteinde met eene aan den naad samenstootende geelroode vlek. De ab.c. **psudatra* Reitt. is, behalve de sprietten en pooten geheel zwart. Variëteiten, welke eenigszins op die van gutta gelijken, onderscheiden zich van laatstgenoemde soort door de krachtiger en dichtere bestippeling, de langere dekschilden en de mindere werving. Ook is deze soort minder sterk gewelfd dan de daarmede in kleur overeenkomende exemplaren van nitidula. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Gemeen in gras, onder aangespoeld riet en dorre bladeren 10. *mesomelas* Herbst.
- Lichaam kort-ovaal of eirond, sterk gewelfd, glanzig zwart, zeer fijn behaard, meer of minder dicht en veelal iets fijner dan *mesomelas* bestippeld; met eene gemeenschappelijke, bloed-roode, meer of minder duidelijke vlek achter het midden der dekschilden en gewoonlijk ook het uiteinde iets roestrood. Halschild aan de basis sterk ingedrukt. Sprietten gewoonlijk met bruinachtige knots. Soms het halsschild in 't midden geelrood en de dekschilden naar het uiteinde geheel geelrood; bij onuitgekleurde exemplaren het geheele lichaam roodgeel gekleurd. De ab.c. *rhenana* Kr. is roodbruin, de dekschilden geelrood, aan de basis zwart. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam onder dood riet, beschimmeld hooi en in aanspoelsel der rivieren. De ab.c. *rhenana* ook zeer verbreed. 11. *gutta* Steph.
- 20 Dekschilden sterker gewelfd dan het zeer verbrede halsschild. Lichaam ovaal, roodbruin of zwart, met roodachtig uiteinde der dekschilden 21
- Dekschilden even sterk gewelfd als het veel minder verbrede halsschild. Lichaam meer verlengd, met meer of minder parallele zijden, grootendeels roestrood of roodbruin 22
- 21 Lichaam zwart of zwartbruin, de tophelft der dekschilden tamelijk ver naar voren uitgebreid geelrood of roodbruin, zelden op eene groote, driehoekige scutellairvlek na, geheel roodbruin, vrij dicht bestippeld, fijn behaard, glanzig. Sprietten en pooten geelrood. Halschild smaller dan de dekschilden, naar voren iets meer dan naar de basis versmald. Deze soort gelijkt op *mesomelas*, doch is doorgaans iets grooter en plomper en vooral onderscheiden door het meer gewelfde lichaam en de dichtere en sterkere bestippeling, vooral op het halsschild. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen onder dood riet en afgevallen bladeren. (basalis Er.) 12. *nitidula* Heer.
- Lichaam zwart (*atra* Panz.), zwartbruin, kastanjebruin, roodbruin of meer roestrood (*castanea* Steph.), glanzig, fijn grauw behaard. Dekschilden bij donkere exemplaren naar het uiteinde meer of minder lichter wordend. Sprietten en pooten roodbruin, de dijen veelal donkerder. Halschild de helft breeder dan lang, aan de zijden sterk afgerond en in 't midden meer of minder stomphoekig uitstekend, dicht en tamelijk fijn bestippeld. Dekschilden in 't midden het breedst, dicht en lijn bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen tusschen plantenaafval, dood riet en op gras 13. *fuscata* Schönh.
- 22 Halschild iets smaller dan de dekschilden, tamelijk gewelfd, vrij sterk bestippeld. Lichaam geelrood, zeer fijn grauw behaard; de kop en de onderzijde zwartachtig, de naad der dekschilden nabij het schildje en de achterrand van het halsschild gewoonlijk iets berookt.

Dekschilden met meer of minder parallele zijden; soms hier en daar met onduidelijke, door donkere stippels aangeduide langlijnen. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren en ond stroom, ook op lage planten en aan grashalmen.

(nigriceps Er.) 14. **atricapilla** Steph.

Halsschild nagenoeg zoo breed als de dekschilden, sterk gewelfd, vrij dicht en krachtig bestippeld. Lichaam licht roodbruin of geelbruin, de kop, het halsschild en de naad der dekschilden nabij het schildje iets donkerder roodbruin of zwartbruin; zelden het lichaam geheel licht roodbruin of geelbruin, of donkerbruin met iets lichter uiteinde der dekschilden. Spriet en pooten geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Zeer verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam; onder plantenaafval, dorre bladeren en op lage planten.

(tumulorum Reitt., ? Villa) 15. **berolinensis** Kr.

- 23 De lijn gerande zijden van het halsschild neergebogen en daardoor, van boven gezien, niet zichtbaar. 24

De lijn gerande zijden van het halsschild, van boven gezien, van af het midden tot aan de basis duidelijk zichtbaar; de achterhoeken nagenoeg recht, de achterrand over de gehele breedte sterk ingedrukt, grof bestippeld. Lichaam breed-eirond, gewelfd, uiterst lijn en niet duidelijk bestippeld, zeer lijn behaard, rood, glanzig. Dekschilden zwart of donkerbruin, aan het uiteinde en veelal aan de schouders roodachtig. Spriet en pooten geelrood. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel licht roodbruin, de basis van het halsschild en de dekschilden iets donkerder. Deze soort gelijkt veel op sommige exemplaren van *munda*, doch is korter en breder en het halsschild aan de basis over de gehele breedte ingedrukt. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Verbreid; op schimmel van wijnvaten en in tuinen onder dood hout.

(pulchella Heer) 20. **nigripennis** Payk.

- 24 Lichaam kort-ovaal, slechts iets minder sterk gewelfd dan *gibbula*, met welke de soort in habitus overeenkomt; het halsschild daarentegen zeer bultig gewelfd; glanzig zwart of bruinzwart. Spriet en pooten roodachtig-geelbruin, de sprietknots en de dijen meer bruinachtig. Halsschild en dekschilden zoo dicht en duidelijk, doch wijder uiteen bestippeld dan bij de volgende soorten (behalve bij *peltata* Kr.); halsschild weinig of niet smaller dan de dekschilden. Deze soort, welke veelal met de donkere exemplaren van *fuscata* verward werd, is echter gemakkelijk te onderscheiden door de minder dichte bestippeling en de meer afgeronde en neergebogen zijden van het iets langere halsschild; ook zijn de dekschilden korter ovaal en veel meer gewelfd. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Niet inl. (atra Herbst, Er.) 1)

Lichaam ovaal of lang-gestrekt, veel minder of slechts weinig gewelfd of min of meer vlak, meestal zeer lijn en dicht-, bij *peltata* iets minder dicht bestippeld 25

- 25 Lichaam ovaal, tamelijk gewelfd, geelrood, weinig glanzig, zeer lijn en dicht bestippeld en uiterst lijn grijs behaard. Achterhoeken van het halsschild bijna recht, de zijden sterk afgerond, naar voren iets meer dan naar achteren versmald. Deze soort onderscheidt zich van de lichtgekleurde exemplaren van *fuscata* door de veel fijnere en dichtere bestippeling. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Vrij zeldzaam. In aantal bij Loosduinen, Mei; ook bij Arnhem en Grons-veld (Limburg). In België bij Anderghem. (salicicola Kr.) 16. **Zetterstedtii** Zett.

Lichaam lang-gestrekt, weinig-, min of meer vlak gewelfd 26

- 26 Achterrand van het halsschild in 't midden nauwelijks in 't oog vallend sterker opgericht. Lichaam grootendeels zwart of bruin, zelden bij onuitgekleurde exemplaren geheel geelbruin. 27

Achterrand van het halsschild in 't midden in 't oog vallend sterker opgericht. De kleinste soort van het genus. Lichaam langwerpig-ovaal, glanzig, lijn bestippeld en lijn grauw behaard, roodgeel of geelbruin, de dekschilden aan de basis meer of minder uitgebreid-, zelden bijna geheel zwartachtig. Lengte 1 — $1\frac{1}{2}$ mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam; in gras; ook soms bij *Formica rufa* 19. **pusilla** Schönh.

- 27 Lichaam zwart of bruin, lijn grauw behaard; de dekschilden aan het uiteinde en de schouders roestrood of bruingeel; spriet en pooten geelrood, de dijen gewoonlijk iets donkerder. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel bruingeel. Halsschild breed afgerond, naar voren en naar achteren zeer duidelijk versmald, aan de basis dwars ingedrukt, iets minder dicht bestippeld dan *fuscipes*. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Eenmaal bij St. Pieter nabij Maastricht, April 17. **peltata** Kr.

1) Ik ken van deze soort slechts een exemplaar uit het Wiener Hofmuseum, mij door de welwillendheid van den Heer Ganglbauer ter beschikking toegestaan. Een origineel exemplaar uit de collectie Reitter (Mus. v. d. Poff), wat niet de *atra* van Herbst is, is in door Ganglbauer als *A. clavigera* aangeduid en wordt in het derde deel zijner «Käfer von Mittel-Europa» beschreven. Reitter heeft de ware *A. atra* Herbst niet gekend, daar hij zegt dat het halsschild sterker en aanmerkelijk sterker en dichter bestippeld is dan de dekschilden. Seidlitz daarentegen geeft een goede beschrijving van *A. atra* Herbst. Er zijn dus twee soorten te onderscheiden, nl. *A. atra* Herbst en *A. clavigera* Ganglb. (*atra* Reitt. na Herbst, Er.). Deze laatste soort is mij uit ons gebied niet bekend.

Lichaam eenkleurig zwart, fijn grauw behaard, zelden de dekschilden aan het uiteinde of geheel bruinachtig. Spriet en pooten bruinzwart. Halsschild smaller dan de dekschilden, breder dan lang, langs de zijden afgerond, naar voren meer dan naar de basis versmald, met stompe achterhoeken. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, in gras; zij zou ook bij *Lasius fuliginosus* voorkomen. . . 18. **fuscipes** Gyll.

28 De fijn gerande zijden van het halsschild van af het midden tot aan de basis, van boven gezien, zichtbaar; het halsschild van af de basis naar voren geleidelijk versmald en daardoor nagenoeg kegelvormig, met scherp aangeduide rechte achterhoeken, evenals de dekschilden zeer fijn en verspreid bestippeld. Lichaam vrij sterk gewelfd, glanzig geelrood, uiterst fijn grauw behaard, de dekschilden zwartachtig, naar het uiteinde en aan de schouders roodgeel, tamelijk kort eivormig, breder dan het halsschild. Eerste sprietlid duidelijk langer dan breed. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam; op schimmel van wijnvaten. Rotterdam en Maastricht. In de Rijnprov. bij Elberfeld . . . (versicolor Er.) 21. **ornata** Heer.

De fijn gerande zijden van het halsschild neergebogen en daardoor, van boven gezien, niet zichtbaar. 29

29 Halsschild duidelijk dichter en krachtiger bestippeld dan de zeer fijn bestippelde dekschilden 30

Halsschild weinig of niet dichter en niet sterker bestippeld dan de dekschilden. Bovenzijde gewoonlijk niet dicht en tamelijk fijn bestippeld. 32

30 Eerste sprietlid slank, ongeveer dubbel zoo lang als breed. Halsschild van af de basis naar voren versmald, duidelijk breder dan lang. Dekskild in 't midden zeer buikig verbreed 31

Eerste sprietlid weinig of niet langer dan breed. Halsschild weinig breder dan lang, van af de basis tot voor het midden met nagenoeg parallele zijden, van daar naar voren iets versmald, tamelijk dicht en niet zeer krachtig bestippeld. Dekskild langwerpige-eivormig, slechts weinig gewelfd, veel fijner bestippeld dan het halsschild. Lichaam zwartachtig of donkerbruin, glanzig, fijn en dun behaard. De spriet en het uiteinde der dekschilden roodachtig, de pooten roodgeel. Onuitgekleurde exemplaren geheel geelachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen in gras en onder plantenafval.
(ruficornis Reitt., nec. Mrsh.) 23. **terminata** Comol. Er.

31 Lichaam eivormig, hoog gewelfd, vrij lang en dun behaard, zwart; de dekschilden aan het uiteinde en de schouders iets roodbruinachtig, of lichter of donkerder roodbruin met lichter gekleurde dekschilden. Spriet roodbruin, de pooten roodgeel. Dekskild breder dan het halsschild, met sterk uitpuilende schouderbuilen, zeer fijn bestippeld. Halsschild veel grover en dichter bestippeld dan de dekschilden, met nagenoeg rechte achterhoeken. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en in Westfalen . . (turgida Er.)

Lichaam kort-eivormig, gewelfd, fijn en dun behaard, glanzig zwartbruin of bruin, de spriet en het uiteinde der dekschilden en de schouders lichter; de pooten geelachtig; veelal ook het lichaam eenkleurig roodbruin. Dekskild breder dan het halsschild, met weinig duidelijke schouderbuil, voor het midden het breedst, verspreid en fijn-, naar het uiteinde nog fijner bestippeld. Deze soort onderscheidt zich van *terminata* door het kortere halsschild en den meer gedrongen vorm; ook is zij kleiner dan *analis*, bij welke de dekschilden meer langwerpig zijn. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren en in gras.

22. **apicalis** Er.

32 Spriet lang, de eerste twee knotsleedjes nagenoeg vierkant of, bij het ♀, iets langer dan breed. Lichaam vrij lang gestrekt, eenigszins gewelfd. Halsschild breder dan lang, van af de basis tot aan het midden met nagenoeg evenwijdige zijden, van daar naar voren sterk versmald, met nagenoeg rechte achterhoeken. Dekskild langwerpige-eivormig, aan de basis zoo breed als de basis van het halsschild, vóór het midden het breedst. Halsschild veelal iets dichter-, doch niet sterker bestippeld dan de dekschilden. De kleur is zeer veranderlijk, glanzig zwart of bruin, de schouders en het uiteinde der dekschilden geelrood, of wel eenkleurig zwart, roodbruin of bruineel; onuitgekleurde exemplaren geheel geel (*testacea* Steph.), fijn grauw behaard; de pooten bruinachtig, de tarsen en de basis der schenen, zelden de pooten geheel geel. Deze soort is vooral te herkennen aan de vrij lang gestrekte gedaante 1). Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zelden onder plantenafval.

(*testacea* Reitter) 24. **analis** Er.

Spriet iets korter en dunner, de eerste twee knotsleedjes meer of minder duidelijk verbreed. Lichaam ovaal, vooral op de dekschilden hoog gewelfd. Halsschild veel breder dan lang, aan de zijden sterk afgerond en naar voren versmald. Lichaam zwart, naar het uiteinde iets lichter of donkerder roodbruin, met lichtere dekschilden; of wel geheel kastanje-

1) De variëteit *rupestris* Reitter uit Oostenrijk, welke ook bij Elberfeld in de Rijnprov. zou gevangen zijn, is veel korter en meer gedrongen, de eerste twee knotsleedjes zijn verbreed, het halsschild is ook meer verbreed, de dekschilden eveneens breder, ovaal, in 't midden het breedst, aan het uiteinde veelal lichter.

bruin of roestrood (abc. **hiemalis* Baudi), nu eens wat sterker-, dan eens wat fijner en eenigszins verspreid bestippeld. Halsschild met tamelijk rechte achterhoeken. Dekschilden aan de zijden vrij sterk buikig verbreed, iets voor het midden het breedst. Spriet en pooten roodgeel. Lengte $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ mm. In beukenmool en in plantenaafval. Eenmaal bij Valkenburg, Juni. In België en bij Hainburg. De abc. *hiemalis* op het eiland Borkum.

25. *gibbula* Er. 1)

9. Ephistemus Stephens.

Lichaam sterk glanzig, niet duidelijk zichtbaar behaard, hoogstens met verspreide stoffijne haartjes bezet, sterk gewelfd; halsschild en dekschilden niet scherp van elkaar gescheiden, doch in eene zelfde half-kogelvormige welfing een ovaal vormend. De spriet en pooten komen in eene groef, welke zich ook meestal op de onderzijde van het halsschild voortzet, ingelegd worden. Voorkaken aan den top gewoon. Schildje rondachtig. Prosternum tusschen de voorcoxae breed, naar achteren verbreed en afgeknut, tegen het korte, breede mesosternum aanstootend en daarmee in één vlak gelegen. Overigens als bij Atomaria. — De soorten van dit genus leven tusschen half vergane plantentoffen, dorre bladeren en beschimmeld stroo.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae aan de zijden ongerand, slechts door eenige stippels begrensd; de naden van het prosternum gewoon. De rechte achterhoeken van het halsschild scherp aangeduid. Kop, halsschild en de basis helft der dekschilden lijn-, doch duidelijk en verspreid bestippeld. Lichaam zwart, het uiteinde der dekschilden iets lichter gekleurd. Spriet en pooten geel, de sprietknots veelal iets donkerder. Onuitgekleurde exemplaren zijn bruin of roodbruinachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ mm. Verbreed, doch tamelijk zeldzaam; onder oud stroo en plantenaafval.

(*nigriclavis* Reitt., nec Steph.) 1. *globosus* Walzl, Er.

Prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae aan de zijden duidelijk gerand; de naden van het prosternum vormen duidelijke, rechte, ondiepe sprietgroeven, gaande van den voorrand tot aan de voorcoxae. Bovenzijde niet- of nagenoeg niet bestippeld 2

Achterhoeken van het halsschild duidelijk recht, de voorhoeken meer of minder scherp aangeduid. Lichaam zwart, het uiteinde der dekschilden eenigszins uitvloeiend roodachtig of wel de dekschilden op de tophelft meer scherp afgescheiden rood (abc. *dimidiatus* St.). Spriet en pooten roodgeel of braingeel. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel geelachtig. Lengte ongeveer 1 mm. Zeer gemeen, onder dorre bladeren en plantenaafval. De abc. *dimidiatus* zeldzamer (*gyrinoides* Mish., *ovulum* Er.) 2. *globulus* Payk.

Achterhoeken van het halsschild stomp. Lichaam zwart, de dekschilden al of niet aan het uiteinde lichter, het halsschild soms meer pekbruin. Spriet, behalve de gewoonlijk iets donkerder knots, en de pooten roodgeel. Lengte $\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In België bij Brussel; ook in Oldenburg, bij Löhne in Westfalen en op het eiland Borkum . . . (*exiguus* Er.)

XXIII. Familie SPHINDIDAE.

Fig. 46. Kop van *Sphindus* *Sphindus* Payk. Orig.

Eene kleine familie, welke de naaste verwantschap heeft met de Cryptophagidae en de Cioidae; ook nadert zij eenigszins tot de Tritomidae. Vooral is zeer in 't oog vallend de groote, lange, meer of minder gewelfde clypeus, welke door eene ingedrukte, half-cirkelvormige, met de holle zijde naar voren gerichte lijn tusschen de oogen, van het voorhoofd afgescheiden is (Fig. 46). — Spriet en pooten ver van elkaar afstaande, vrij ingeplant, 10-ledig en van eene 3-ledige, hetzij scherp of iets minder scherp afgescheiden knots voorzien (Fig. 46). — Bovenlip gedeeltelijk onder den clypeus verscholen, een kort

1) By Elberfeld ont nog gevonden zijn A. rubricollis Reitter (?)

en breed gedeelte daarvoor uitstekend. Achterkaken met twee hoornachtige, aan het uiteinde en aan den binnenrand gebaarde lobben. Kaaktasters 4-, de liptasters 3-ledig. Tong min of meer lederachtig. — Lichaam kort-cylindervormig of nagenoeg half-kogelvormig. — Schildje groot. — Dekschilden met stippelrijen. Prothorax met eene duidelijke zijlijn, welke de pleurae van het pronotum afsondert. Epimeren van den metathorax onduidelijk. Prosternale voortzetting in één vlak tegen het mesosternum aansluitend (*Aspidiphorus*), of van achteren opgericht en niet in één vlak tegen het mesosternum aansluitend (*Sphindus*). — Achterlijf met 5 sterniten, de eerste twee bewegelijk met elkaar verbonden, het eerste tweemaal zoo groot als het tweede. — Alle tarsen 5-ledig. Klauwen vrij groot. — De *Sphindidae* zijn van de *Cryptophagidae* vooral onderscheiden door de 10-ledige sprietten, van de *Cioidae* door de 5-ledige tarsen. Volgens *γ. Kieschewetter* zou *Aspidiphorus*, wegens de verschillende monddeelen en de volgens een ander plan gevormde achtervleugels, niet met *Sphindus* in dezelfde groep kunnen gebracht worden. — Zij leven vooral in kleine fungi, op boomstronken.

Middel- en achtercoxae zeer ver van elkaar afstaande. Prosternale voortzetting in één vlak tegen het mesosternum aansluitend. Aan den voorrand der oogen een klein groefje vóór de sprietten. De 3-ledige sprietknots lang en van de overige leedjes scherp afgescheiden. Lichaam nagenoeg half-kogelvormig, op de bovenzijde niet rimpelig. Halsschild met den tegen het schildje uitgezaktten achterrand dicht tegen de basis der dekschilden aangesloten. 1. *Aspidiphorus*.

Alle coxae nagenoeg op gelijken afstand-, niet zeer ver van elkaar verwijderd. Prosternale voortzetting van achteren opgericht en niet in één vlak tegen het mesosternum aansluitend, zonder groefjes vóór de sprietten. De drie leedjes der sprietknots meer geleidelijk verdikt en niet zoo scherp van de overige leedjes afgescheiden als bij *Aspidiphorus*. Lichaam kort-cylindervormig, op de bovenzijde fijn lederachtig geïmpeld. Halsschild aan den achterrand nagenoeg recht, niet dicht tegen de basis der dekschilden aangesloten.

2. *Sphindus*.

1. *Aspidiphorus* Latreille.

Sprietten 10-ledig, het eerste lid groot, eirond, het tweede kleiner en meer kogelvormig, het derde lang en dun, nagenoeg zoo lang als de drie volgende leedjes, met eene lange, 3 ledige, scherp afgescheiden knots. Voorkaken met gewonen top, daarachter gekortven, aan den binnenrand met een smal, bewimpert ribb. Achterkaken met twee hoornachtige, nagenoeg even breede, aan het uiteinde en aan den binnenrand gebaarde lobben, de binnenste korter en aan het uiteinde van een hoornhaak voorzien. Kaaktasters 4-ledig, kort, de lobben iets overschrijdend, het eerste lid klein, het tweede veel grooter, eirond, het derde korter en iets dunner, het eindlid slechts iets langer dan het tweede, dunner en speelvormig. Kin half-cirkelvormig, afgerond en aan weerszijden iets uitgesneden, zoodat twee scherpe hoeken gevormd zijn. Tong hoornachtig, van voren breed en oppervlakkig uitgerand, bewimpert. Liptasters de tong de helft overschrijdend, het tweede lid het grootst en dik, het eindlid korter en veel dunner. Aan den voorrand der oogen een klein groefje vóór de sprietten. Lichaam nagenoeg half-kogelvormig, op de bovenzijde niet rimpelig. Halsschild met den tegen het schildje uitgezaktten achterrand dicht tegen de basis der dekschilden aangesloten. Prosternale voortzetting in één vlak tegen het mesosternum aansluitend. Middel- en achtercoxae zeer ver van elkaar afstaande. Tarsen 5-ledig, de eerste vier leedjes nagenoeg even lang, het klauw-lid zeer lang en de klauwen vrij groot. — De larve en pop van de niet inlandsche *A. Lareyniei* Duv. zijn door *Perris* beschreven. Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Zwart of kastanjebruin (*piceus* Er.), soms alleen de dekschilden bruinachtig, fijn behaard. Sprietten en pooten roodachtig-geelbruin, de sprietknots donker. Kop aan weerszijden nabij den zijrand met eene verdiepte langlijn. Halsschild kort, zeer fijn bestippeld. Dekschilden veel breeder dan het halsschild, met duidelijke schouderbulten en iets verdiepte, regelmatige stippelrijen. Onderzijde grof bestippeld. Schenen iets gebogen, de tarsen half zoo lang als de schenen, dun. Lengte 1—1½ mm. Zeer verbreid; op vochtige gronden, vooral op zandgrond, in gras, onder dorre bladeren en in kleine zwammen op boomstronken. De larve ontwikkelt zich in fungi 1. *orbiculatus* Gyll.

2. *Sphindus* Chevrol.

(Coniophagus Mink)

Sprietten 10-ledig (Fig. 46), het eerste lid zeer groot, aan eene zijde sterk afgerond, het tweede slechts half zoo groot, het derde dun en het langst; de laatste drie leedjes eene geleidelijk verdikte knots vormend, welke niet scherp van de overige leedjes afgescheiden is. Voorkaken krachtig ontwikkeld, met een tand nabij het scherpe uiteinde. Kaaktasters 4-ledig, het tweede en vierde lid nagenoeg even lang en ongeveer driemaal zoo lang als het derde, het vierde kegelvormig, met afgestompten top. Liptasters 3-ledig, het tweede en derde lid even lang, het derde kegelvormig. Kin groot, breeder dan lang, naar voren versmald. Lichaam kort-cylindervormig, op de bovenzijde fijn lederachtig gerimpeld. Kop driehoekig, tot aan de groote, half-kegelvormige oogen in het halsschild verborgen, zonder groeffjes vóór de sprietten. Halsschild aan den achterrand nagenoeg recht, niet dicht tegen de basis der dekschilden aangesloten, aan den zijrand fijn gekarteld. Prosternale voortzetting van achteren opgericht en niet in één vlak tegen het mesosternum aansluitend. Alle coxae nagenoeg op gelijken afstand, niet zeer ver van elkaar verwijderd. Schenen met zeer kleine, moeilijk zichtbare einddoornen. Alle tarsen 5-ledig. Klauw-lid langer dan de overige leedjes te zamen. Klauwen gewoon.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Zwartbruin; de sprietten, de pooten en de schouderhuiden of de geheele basis der dekschilden roodachtig, soms de dekschilden meer bruinachtig. Onuitgekleurde exemplaren zijn geelbruin. Halsschild tamelijk fijn bestippeld. Dekschilden met stippelrijen, de tusschenruimten in rijen kort behaard. Bij het ♀ is het metasternum in de lengte verdiept en aan weerszijden voor den achterrand van een klein, rond bultje voorzien. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2½ mm. Op vele plaatsen in de diluviale streken, in kleine zwammen, vooral op beuken- en elzenstronken; ook met hare larven in *Lycoperdons* (*Reticularia hortensis* en *miniata*). Larve en pop zijn door *Perris* beschreven.

(*dubius* Gyll., *Gyllenhalii* Chevrol., *humeralis* Mink) 1. *hispidus* Payk.

XXIV. Familie CIOIDAE.

Deze familie wordt gevormd door kleine kevers, welke uitsluitend worden aangetroffen in boomzwammen (*Polyporus*) en verwante fungi, welke op dood hout of op boomstronken leven. Gewoonlijk treft men ze met hare larven in aantal bijeen aan, soms in massa; zij doorboren alsdan de zwammen in alle richtingen, zoodat deze daardoor ten laatste geheel verteerd worden. De voorwerpen van vele soorten varieren zeer in grootte in een en dezelfde zwam, wat moet worden toegeschreven aan de meerdere of mindere gunstige voedingsvoorwaarde, iets wat bij gezellig bijeen levende dieren meer voorkomt. — Het lichaam is min of meer cylindervormig. — Kop diep in het halsschild verborgen. — Sprietten vrij kort, vóór de oogen, onder den meer of minder verbreeden zijrand van den clypeus ingeplant, 8—11 ledig 1), het eerste lid groot, in een groeffje vóór de oogen inlegbaar; de twee 2) of drie grootere eindleedjes tot eene knots vereenigd. — Voorkaken plomp, driehoekig, aan het uiteinde gewoonlijk met twee stompe tandjes. Achterkaken met gebaarde buitenste- en meer of minder rudimentaire binnenste lob. Kaaktasters 4-ledig, met groot lang-cirond, naar het uiteinde toegespitst eindlid. Tong smal en lang, perkamentachtig. Liptasters 3-ledig, meestal dik, het eerste lid klein, het tweede gewoonlijk veel grooter, eenigszins opgeblazen, het eindlid klein, uit den top van het tweede uitstekend, zelden draadvormig en zoo lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen 3). Tong weinig zichtbaar, geen paraglossen. — Halsschild groot, nagenoeg zoo breed als de dekschilden, gewelfd, de voorrand in het midden veelal iets kapvormig over den kop gewelfd. — Dekschilden met tamelijk parallelle zijden. — Bij de achtervleugels (bij *Cis boleti* F.) is volgens *Roger* het gewricht vóór het midden gelegen, het topgedeelte is daardoor zeer groot en is daarin de voortzetting der vena scapularis als eene breede pigmentstreep tot aan de vleugelpunt, waarin zich eene donkere pigmentvlek bevindt, aangeduid. De voortzetting van de vena externo-media is als ader duidelijker en verloopt van af het gewricht tot aan den achterrand. De vena externo-media verloopt in het basaalgedeelte duidelijk met de concave zijde naar buiten, de basale helft der vena externo-media is grooter

1) 8-ledig bij *Oxycetanus*, 9-ledig bij *Eucarthron*, 11-ledig bij het niet indische genus *Hendecatomus*, 10-ledig bij *Ci.* en de overige genera.

2) Bij *Ci.* (*Cedryma* Reut.) *clavicornis* Bandt uit Klein-Azië.

3) Bij het met u. on. geheel voorkomende genus *Xylographus*.

dan de rest van de basaalhelft van den vleugel. De vena interno-media is gewoon en verloopt nagenoeg rechthoekig. De achterrand is tegenover het gewricht iets uitgebogen en aldaar van eene gele pigmentvlek voorzien. Het basaallobje ontbreekt. Volgens *J. Kollmann* komt de nervatuur bij de vleugels van Cis zoo zeer met die van *Corticaria* overeen, dat de Cioidae in dit opzicht het naast sluiten aan de Lathridiidae. — Prosternum tamelijk kort. Achterlijf met 5 sterniten. — Voorcoxae hetzij min of meer ovaal, in de breedte geplaatst en in de gewrichtsholten ingesloten en tamelijk ver van elkaar afstaande (Cisini), of wel kegelvormig uit de gewrichtsholten uitpuilend en vrij dicht aaneenstaande (Rhopalodontini). Pooten vrij kort, de dijen scheef tegen de kleine trochanters aangelegd. Tarsen 4-ledig, de eerste twee leedjes saamengegroeid, het klaw-lid veel langer dan de overige leedjes te zamen. Bij het niet in ons gebied voorkomende genus *Xylographus* vertoonen de schenen eene langsgroef, waarin de tarsen kunnen worden opgenomen. — Eigenaardig is de beharing bij de meeste Cioidae; zij bestaat uit zeer korte, stijve, als afgeschoren, zijdeglanzige borstelhaartjes; vooral zijn deze het duidelijkst op de dekschilden. — Bij de mannetjes is het voorhoofd niet zelden uitgehold of ingedrukt, de clypeus aan den voorrand opwaarts gebogen en uitgerand en aan weerszijden van de uitranding in een spits tandje uitgetrokken. Ook is het halsschild bij het ♂ niet zelden aan den voorrand uitgerand en aan weerszijden bultig of tandvormig. — De larven gelijken op die der Anobiidae en vertoonen ook het eigenaardige gekromde, weeke, witachtige lichaam, met drie paar kleine pooten. Volgens *Perris* zouden de larven van *Rhopalodontus* (?) geen ocellen hebben, de overige Cioidae 4. De Cioidae vertoonen, zooals reeds boven gezegd is, door de groote overeenkomst in nervatuur der vleugels nauwe verwantschap met de Lathridiidae, doch sluiten door den tribus der Cisini aan de Cryptophagidae, van welke zij hoofdzakelijk door de 4-ledige tarsen onderscheiden zijn; door de Rhopalodontini naderen zij ook tot de Apatidae en de Anobiidae.

Overzicht der Tribus.

Voorcoxae min of meer ovaal, in de breedte geplaatst en in de gewrichtsholten ingesloten, door eene tamelijk breede voortzetting van het prosternum van elkaar gescheiden. . . I. **Cisini**.

Voorcoxae kegelvormig uit de gewrichtsholten uitpuilend, vrij dicht aaneenstaande, doch nog door eene smalle voortzetting van het prosternum gescheiden. . . II. **Rhopalodontini**.

I. Tribus CISINI.

Sprieten 10-ledig 1. **Cis**.

Sprieten 9-ledig 2. **Ennearthron**.

II. Tribus RHOPALODONTINI.

Sprieten 10-ledig. Clypeus van voren eenigszins toegespitst, bij het ♂ met twee kleine bultjes. (Rhopalodontus.)

Sprieten 8-ledig 3. **Oetotemnus**.

I. Tribus CISINI.

1. Cis Latreille.

Sprieten vóór de oogen, onder den meer of minder verbreedten zijrand van den lypeus ingeplant, 10-ledig, met 3 groote, tot eene knots vereenigde, niet dicht aaneenstaande eindleedjes. Voorkaken met getanden top. Achterkaken met twee korte, hoornachtige, aan het uiteinde dicht met stekelborstels bezette lobben, van welke de buitenste kort en stomp, de binnenste zeer kort en smal is. Kaaktasters 4-ledig, met een groot, dik, langwerpig-eivormig, stomp toegespitst eindlid. Kin van voren uitgerand; de tong half hoornachtig, klein, de basis der liftasters niet overschrijdend. Liftasters 3-ledig, het eerste lid klein, het tweede veel grooter en iets opgeblazen, het eindlid klein, cilindervormig, uit den top van het tweede uitstekend. Lichaam cilindervormig, met tamelijk parallele zijden. Halsschild aan de basis meestal gerand. Dekschilden gewoonlijk verward bestippeld, zeldzamer met regelmatige stippelrijen, meestal met geringe aanduiding van onregelmatige stippelrijen. Tarsen 4-ledig,

1) *Antenne* oftd krachtig ontwikkeld, langer dan de overige ledjes te zamen. Bij het ♂ meestal het voorhoofd meer dan bij het ♀ uitgehoud en de opgerichte voorrand, behalve de voorrand van het halsschild uitgerand en getand. — Larven en kevers zeer gewoonlijk in aantal bijeen in *Polyporus*-soorten. — De larve en pop van *C. boleti* zijn door Bouché, Westwood en Mellié, de larven van *laminatus* en *Jacquemartii* door Mellié, de larven van *coluber* en *fronticornis* door Perris en de larve en pop van *alni* door Lucas 1) beschreven.

Van de 40 Europeesche soorten komen 15 in Nederland en 8 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden met regelmatige stippellijnen. De sprietknots naar het uiteinde verbreed. Voorrand en voorhoeken van het halsschild niet vooruitstekend (Sub-gen. *Hadraule* Thoms.). Lichaam zeer lang-gestrekt, slechts weinig gewelfd, met parallele zijden, tamelijk glanzig, zwartbruin. Halsschild zeer fijn bestippeld; de stippellijnen der dekschilden, behalve die nabij den naad, krachtig ontwikkeld; op de dekschilden bevinden zich uiterst korte, glinsterende, eenigszins in rijen geplaatste haartjes. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet incl. In Hannover. (*elongatulus* Gyll.)

Dekschilden verward bestippeld, hoogstens met onregelmatige stippellijnen. De ledjes der sprietknots van gelijke breedte. Voorrand van het halsschild in 't midden meer of minder vooruitstekend 2

- 2 Prosternum vóór de voorcoxae stomp kielvormig opgericht. Halsschild met geleidelijk afgeronde achterhoeken. Bovenzijde glanzig, onbehaard (Sub-gen. *Eridaule* Thoms.). . . . 3

Prosternum vóór de voorcoxae vlak of hoogstens een weinig dakvormig gewelfd. Bovenzijde behaard of met lijne borstelhaartjes bezet (Sub-gen. *Cis* isp.). 5

- 3 Voorhoeken van het halsschild recht of naar voren spits uitstekend. Halsschild fijn en dicht-, de dekschilden fijn en grof dooreen, doch minder dicht en verward bestippeld 4

Voorhoeken van het halsschild zeer stomp. Halsschild fijn en dicht-, de dekschilden fijn en grof dooreen en verward bestippeld. Bovenzijde glanzig roodbruin of pekbruin, onuitgekleurde exemplaren geelachtig. Sprieten en pooten geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{4}$ mm. Aan *Polyporus* van esschen. Niet incl. In Westfalen (*glabratus* Mellié)

- 4 Voorhoeken van het halsschild naar voren spits uitstekend. Lichaam eenigszins langwerpig, glanzig kastanjebruin. Sprieten en pooten geelbruin. Dekschilden ongeveer dubbel zoo lang als het halsschild, grof en fijn dooreen verward bestippeld. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. In ciken- en dennenzwammen. In aantal bij Vogelenzang aan dennen-zwammen, Aug.

1. *nitidus* Herbst.

Voorhoeken van het halsschild duidelijk recht, weinig of niet uitstekend. Lichaam iets langer dan bij *nitidus*, glanzig pekbruin. Halsschild langer dan bij *nitidus*. Dekschilden dubbel zoo lang als het halsschild, grof en fijn dooreen verward bestippeld, de grovere bestippeling krachtiger dan bij *nitidus*. Sprieten en pooten roestrood. Bij het ♂ vertoont het eerste sterniet een zeer klein, behaard middengroefje en is de clypeus aan den voorrand zeer onduidelijk twee-tandig. Lengte 2—2 $\frac{1}{4}$ mm. Niet inlandsch. In Duitschland en Frankrijk (*Jacquemartii* Mellié)

- 5 Halsschild met breed afgezetten zijrand. Voorschelen aan het uiteinde naar buiten tandvormig uitgetrokken, doch aldaar veelal door de tarsen bedekt 6

Halsschild slechts met smal afgezetten zijrand of alleen met gerande zijden 9

- 6 Halsschild min of meer oneffen, met meerdere onregelmatige, oppervlakkige indrukken. . . 7

Halsschild zonder oneffenheden, gelijkmatig gewelfd, de basis fijn gerand, de voorhoeken zoo breed afgeplat als de zijrand en duidelijk vooruitstekend. Dekschilden tussehen de zeer weinig dichte en lijne bestippeling nog met dicht staande, grove, doch ondiepe stippels, welke hier en daar rimpelig samenhangen en nergens langsrijen vormen. Lichaam smaller en in den regel kleiner dan *boleti*, op de bovenzijde geelbruinachtig, met kleine, half-opstaande, niet in rijen staande borstelhaartjes, welke ongeveer zoo lang zijn als bij *villosulus*. Bij het ♀ is het voorhoofd vlak, bij het ♂ eenigszins uitgehoud, met opgerichten voorrand, welke aan weerszijden als een stomp tandje uitsteekt. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$ mm. In *Polyporus*-soorten, minder algemeen dan *boleti* 5. *micans* Herbst.

- 7 Halsschild aan de basis, ten minste in 't midden, niet gerand, over het midden met eene meer of minder duidelijke langskiel. Bovenzijde met zeer korte, weinig of niet opstaande, tamelijk breede borstelhaartjes bezet 8

1) *Lucas* noemde deze soort *punctatus*, volgens *Perris* zou het *Lucasi* Abille zijn.

Halsschild aan de basis lijn gerand, over het midden zonder eenige aanduiding van eene langskiel, de voorhoeken afgeplat, iets afgerond en een weinig vooruitstekend. Bovenzijde dicht bezet met half-opstaande borstelhaartjes, welke iets langer zijn dan bij *boleti*; rood- of geel-bruinachtig, soms aan de basis van het halsschild en over het midden der dekschilden donkerder gevlekt (abc. *plagiatus* Thoms.). Dekschilden tusschen de lijne bestippling met duidelijke grovere stippels, welke hier en daar rimpelig samenhangen. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Minder algemeen dan *boleti*; o.a. op *Polyporus* van vruchtboomen. Amsterdam, Baarn, Arnhem en den Haag. De abc. *plagiatus* bij den Haag.

(? *villosulus* Msh.) 4. *setiger* Mellié.

- 8 Voorhoeken van het halsschild zoo breed afgeplat als de rest van den zijrand en naar voren sterk afgerond en vooruitstekend. Halsschild vooral bij het ♂ iets breeder dan de dekschilden. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, tusschen de lijne bestippling met zeer duidelijke, matig groote en diepe, hier en daar tot langsrijen gerangschikte stippels. Bovenzijde van het eenigszins plumpe lichaam geelbruin tot zwart. Voorhoofd bij het ♀ vlak, bij het ♂ in de breedte diep ingedrukt. Clypeus aan den voorrand bij het ♀ vlak afgerond, bij het ♂ iets opgericht, in 't midden een weinig uiterand en aan weerszijden van de uiterand met een stompen tand. Lengte 2—3 mm. Zeer gemeen in *Polyporus* aan beuken, wilgen, haagbeuken en paalwerk 2. *boleti* L.

Voorhoeken van het halsschild veel minder afgeplat dan de rest van den zijrand en naar voren slechts zeer weinig vooruitstekend. Halsschild iets smaller dan de dekschilden; deze ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed en tusschen de lijne bestippling met zeer groote, ondiepe en veel minder duidelijke stippels bezet, welke hier en daar tot dwarsrimpels samenvloeien. Bovenzijde bruin tot zwart. Overigens navertant aan *boleti* en wellicht daarvan eene variëteit. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeldzaam; Venlo, Juni. 3. *rugulosus* Mellié.

- 9 Dekschilden tusschen de lijne bestippling met grootere, min of meer in rijen geplaatste stippels 10

Dekschilden slechts gelijkmatig lijn bestippeld, zonder rijen van grootere stippels. 13

- 10 Zijden van het halsschild, van terzijde gezien, tamelijk gelijkmatig afgerond en in 't midden slechts weinig naar onderen gebogen; de voor- en achterhoeken stomp en slechts iets afgerond. Bovenzijde met korte, dikke, glanzige, nagenoeg neerliggende borstelhaartjes bezet, welke op de dekschilden nergens in rijen geplaatst staan 11

Zijden van het halsschild, van terzijde gezien, sterk afgerond en in 't midden eenigszins neergetrokken. Bovenzijde met eenigszins opgerichte, hier en daar in rijen staande borstelhaartjes 12

- 11 Halsschild dof, zeer dicht-, ineenvloeiend bestippeld. Lichaam donkerbruin, de beharing der bovenzijde goudkleurig roodgeel. Sprieten en pooten geelrood. Kop en halsschild in beide seksen gewoon, bij het ♂ de kop iets dieper ingedrukt. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer gemeen in *Polyporus*, gewoonlijk met *boleti*. (*micans* Gylh.) 6. *hispidus* Gylh.

Halsschild glanzig, tamelijk verspreid bestippeld. Lichaam meer zwartachtig, de beharing der bovenzijde meer zilverachtig wit. Overigens als *hispidus*. Deze gemakkelijk van *hispidus* te onderscheiden soort werd bij Winterswijk in Juni gevangen.

7. *nitidicollis* Abeille.

- 12 Halsschild met volkomen vlak afgeronde voorhoeken, over het midden matig sterk gewelfd, tamelijk grof bestippeld. Dekschilden met krachtige stippelrijen, waartusschen slechts weinige lijne stippeltjes. Borstelharen op de bovenzijde veel langer dan dik. Lichaam eenigszins langwerpig, pekkruin, soms over het midden donkerder; de sprieten en pooten geelbruin. Kop en halsschild bij het ♂ gewoon. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf (*comptus* Gylh.)

Halsschild met duidelijk stomphockige voorhoeken; over het midden en vooral ook naar de zijden toe zeer sterk gewelfd, tamelijk lijn bestippeld. Dekschilden met tamelijk lijne stippelrijen, waartusschen vele lijne stippeltjes. Borstelharen op de bovenzijde slechts weinig langer dan dik. Lichaam geelachtig-rood of licht roodbruin. Kop en halsschild bij het ♂ elk aan den voorrand met eene kantige, in twee tandjes uitlopende verhevenheid. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 mm. In droge zwammige beukenschors. Niet inlandsch. Bij Hamburg.

(*quadridens* Mellié)

- 13 Voorhoeken van het halsschild naar voren spits uitgetrokken. Halsschild breeder dan lang, bij het ♂ aan den voorrand in 't midden met twee tandvormige buitjes. Dekschilden zoo breed-, doch dubbel zoo lang als het halsschild, eenigszins verward bestippeld, glanzig, met zeer kleine, stoflijke borstelhaartjes bezet. Voorhoofd in beide seksen ingedrukt, bij het ♂ aan den voorrand met 4 tandjes. Lichaam langwerpig, zwart of donkerbruin; de sprieten en pooten roestrood. Onuitgekleurde exemplaren zijn geelachtig. Lengte 2—2 mm.

- Aan beukenzwammen. Eenmaal bij Heerlen (Limb.), Juli; ook in de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf en in Westfalen. 8. **bidentatus** Oliv.
- Voorhoeken van het halsschild recht, stomp of vlak afgerond, naar voren niet spits uitgetrokken 14
- 14 Lichaam kort en dik, op de bovenzijde met duidelijk opgerichte, grauwe borstelhaartjes, welke veel langer dan dik zijn, pekbruin, de sprieten en pooten geelrood. Bij het ♂ is de clypeus als eene groote, breede plaat opgericht, welke van voren de aanduiding van vier tandjes vertoont; ook is de voorrand van het groote halsschild van twee zwakke bultjes voorzien. Dekschilden iets sterker dan het halsschild bestippeld, ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inl. In Hannover. (laminatus Mellie)
- Lichaam langwerpig, meer gestrekt 15
- 15 Bovenzijde en vooral het halsschild dof, zwart. Bij het ♂ is de clypeus als eene smalle, twee-tandige plaat opgericht en het halsschild van twee krachtige bultjes voorzien. Lengte 1½ mm. Niet inl. Zij zou in België voorkomen. Ik zag een exemplaar uit het Weener Hofmuseum (bicornis Mellie)
- Bovenzijde, of althans de dekschilden, meer of minder glanzig. Clypeus bij het ♂ aan den voorrand hoogstens met twee-, het halsschild zonder bultjes 16
- 16 Clypeus bij het ♂ aan den voorrand zonder bultjes. De zijden van het halsschild, van terzijde gezien, zeer weinig afgerond; de voorhoeken recht of stomp, de achterhoeken stomp. Bovenzijde sterk glanzig, met zeer korte borstelhaartjes bezet. 17
- Clypeus bij het ♂ aan den voorrand met twee bultjes. Bovenzijde in den regel niet sterk glanzig, duidelijk behaard 18
- 17 Halsschild met rechte, aan den top afgeronde en duidelijk vooruitstekende voorhoeken; met minder smalle zijrand dan bij coluber, slechts iets breder dan lang. Dekschilden met stoffijne borstelhaartjes bezet. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan het lange halsschild en de gladde, glanzige oppervlakte. Lichter of donkerder bruin, veelal zwartbruin, lijn en eenigszins verspreid bestippeld. Sprieten en pooten licht geelbruin. Dekschilden $2\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2½ mm. Op zwammen aan Prunus spinosa, Corylus en Alnus. Eenige exemplaren in het Haagsche bosch; bij Arnhem en Voorstonden bij Brummen, ook in de Rijnprov. 9. **alni** Gylh.
- Halsschild met stompe-, in 't geheel niet vooruitstekende voorhoeken; van boven gezien, met nagenoeg rechte, zeer smal afgezette zijranden. Borstelhaartjes der dekschilden langer dan dik en duidelijk opstaande. Lichaam cylindervormig, lichter of donkerder bruin, de voorrand van het halsschild veelal roodachtig. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2½ mm. Eenmaal bij Valkenburg (Limburg), Juli. 10. **coluber** Abeille.
- 18 Halsschild van terzijde gezien, zeer flauw afgerond, bijna rechtlijnig, de voor- en achterhoeken duidelijk stomp. Dekschilden met duidelijk opstaande borstelhaartjes bezet, welke even lang zijn als de tussenruimten; iets grover en minder dicht bestippeld dan het halsschild. Donker geelachtig-roodbruin of donker roodbruin. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2½ mm. Eenmaal een ♀ bij Bunde nabij Maastricht, Juli. 11. **punctulatus** Gylh.
- Halsschild, van terzijde gezien en ook de achterhoeken duidelijk afgerond 19
- 19 Dekschilden met korte, eenigszins gebogen borstelhaartjes bezet, welke iets korter zijn dan de tussenruimten. Halsschild tusschen de bestippeling volkomen glad of, bij sterke vergrooting gezien, uiterst zwak gechagrineerd. Lichaam naar voren niet versmald, geelbruin of geelachtig-roodbruin. 20
- Dekschilden met lange, meer opstaande borstelhaartjes bezet, welke minstens zoo lang zijn als de tussenruimten. Halsschild tusschen de bestippeling gechagrineerd 21
- 20 Voorhoeken van het halsschild zeer stomp en iets afgerond. Deze soort is naverwant aan festivus, doch gewoonlijk iets kleiner, lichter gekleurd, minder glanzig en vlakker, met meer parallele zijden en smalleren zijrand van het halsschild. Roestrood of geelachtig-bruin, zelden met donkerder dekschilden. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. In boomzwammen o.a. van Juglans. Den Haag, Loosduinen, Putten (Veluwe) en Maarsbergen . 12. **castaneus** Mellie.
- Voorhoeken van het halsschild bijna recht, aangezien de voorrand vlak daarnaast, achter de ooggen, flauw uitgerand is; de zijrand breder afgezet. Lichaam duidelijk glanzig, donker geelbruin of bruin, met zeer korte, stijve, geelachtige borstelhaartjes vrij dicht bezet. Sprieten en pooten roodgeel. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. In boomzwammen, vooral van oude

Larix-stammen. Nijkerk en Gronsvelt nabij Maastricht, Juni. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf; ook in België. 13. **festivus** Panz. 1)

21 Derde sprietlid tweemaal zoo lang als het vierde 22

Derde sprietlid weinig of niet langer dan het vierde. Bovenzijde lijn en dicht-, op de dekschilden iets grover bestippeld, zwart of donkerbruin, soms het halsschild van voren en de dekschilden aan het uiteinde lichter of wel min of meer geelachtig; met zeer korte, witachtige, vrij dicht staande borstelhaartjes op de dekschilden. Halsschild tusschen de bestippeling zeer fijn gechagrineerd, met afgeronde voorhoeken. Spriet en pooten rood-geel, de spriet en naar het uiteinde veelal bruinachtig. Lengte 1½—1¾ mm. Zeer gemeen in boomzwammen, vooral van eikenstronken; ook op berken, populieren en dennen.

15. **fronticornis** Panz. 2)

22 Voorhoeken van het halsschild volkomen afgerond. Lichaam naar voren versmald, bruinachtig-geel, tamelijk lijn bestippeld, zeer weinig glanzig. Halsschild tusschen de bestippeling duidelijk gechagrineerd. Het eerste sterniet bij het ♂ met een behaard groefje in het midden. Lengte 1½—2 mm. Eenmaal op Texel in November gevangen. In Noord-Frankrijk (dep. du Nord) 14 **vestitus** Mellié.

Voorhoeken van het halsschild duidelijk, ofschoon stomp. Lichaam langer en smaller, doch naar voren niet versmald, bruinzwart, zeldzamer meer roodbruin, tamelijk glanzig, met duidelijke borstelhaartjes bezet. Lengte 2—2½ mm. Niet int. In Noord-Frankrijk (Dep. du Nord) en op het eiland Borkum. Ik zag exemplaren uit het Weener Hofmuseum. (oblongus Mellié)

2. Ennearthron Mellié.

Spriet en als bij Cis ingeplant, 9-ledig, het derde lid langwerpig, het vierde meer ovaal, het vijfde en zesde zeer kort, de laatste drie ledjes tot eene groote, los-gelede knots vereenigd. Monddeelen als bij Cis. Clypeus bij het ♂ met twee bultjes. Halsschild met afgeronde achterhoeken. Dekschilden verward bestippeld, evenals het halsschild (behalve bij E. Wagae) dicht met borstelhaartjes bezet. Tarsen 4-ledig, als bij Cis. — Larven en kevers leven in boomzwammen. — De larve en pop van E. cornutum is door Perris, de larve bovendien door Mellié beschreven; ook zou de larve van affinis door Mellié beschreven zijn.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

1 Bovenzijde onbehaard, glanzig. De prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae smal en scherpkantig opgericht. Clypeus van voren bij het ♀ iets-, bij het ♂ sterk opwaarts gebogen en uitgerand. Halsschild en dekschilden vrij krachtig-, het halsschild iets dichter bestippeld; de voorhoeken stomp, eenigszins afgerond, de voorrand bij het ♂ in 't midden iets kielvormig opgericht. Lichaam kort en dik, homogeen, geelachtig-roodbruin. Lengte 1½—1¾ mm. Niet inlandsch. Deze soort zou in Noord-Frankrijk (Dep. du Nord) in eene beukenzwam gevonden zijn (Wagae Wankow.)

Bovenzijde meer of minder dicht met borstelhaartjes bezet. De prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae iets breder en niet scherpkantig opgericht. 2

2 Voorrand van den clypeus bij het ♀ een weinig-, bij het ♂ sterk opgericht en van twee kleine hoortjes voorzien. Halsschild bij het ♂ in 't midden van den voorrand met twee tandjes en met stompe voorhoeken. Dekschilden krachtig-, iets grover bestippeld dan het halsschild, met duidelijk opstaande, geelachtige, stijve borstelhaartjes niet zeer dicht bezet, welke duidelijk langer dan dik, doch korter zijn dan de tussenruimten; ook vormen zij hier en daar onduidelijke langrijen. Rood- of geelbruin. Lengte 1½—1¾ mm. In oude eikenstronken en elzen- en dennenzwammen; ook in oud beukenhout. 1. **cornutum** Gyll.

Voorrand van den clypeus niet opgericht, bij het ♂ slechts met 2 bultjes. Voorrand van het halsschild gewoon. 3

3 Halsschild en dekschilden niet zeer dicht bestippeld. De voorhoeken van het halsschild geleidelijk afgerond. Dekschilden met gewoonlijk in rijen geplaatste, opstaande, fijne, witte borstelhaartjes, welke langer zijn dan de tussenruimten. Meestal donker gekleurd,

1) De meeste mij bekende inlandsche exemplaren waren verkeerd gedetermineerd en behoorden tot *Ennearthron cornutum*.
2) Deze soort behoort wegens hare niet regelvormig uitstekende voorcoxae, zoals *Scutitis* terecht aangeeft, tot het genus *Cis*, en niet tot *Rhopalodontus*, waartoe zij door de meeste schryvers werd gebracht.

neerbruin of bruin, soms meer roodbruinachtig; onuitgekleurde exemplaren meer geelachtig. Deze soort gelijkt zeer op *Cis fronticornis*, doch onderscheidt zich door de 9-ledige sprieten. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. In berken- en dennenzwammen. Bij den Haag en Venlo, Juni, Juli. In de Rijnprov. bij Aken, ook in Oldenburg.

(*fronticornis* Ths., Kiesw. nec Panz.) 2. *affinis* Mellié.

Halsschild en dekschilden uiterst dicht en fijn bestippeld. De voorhoeken van het halsschild stomp. Dekschilden met uiterst korte, weinig of niet opstaande, zijdeglanzige, niet in rijen staande borstelhaartjes. Lichaam langwerpig, meer gestrekt dan bij de andere soorten, naar voren iets versmald, roestrood of bruin, dof of slechts weinig glanzig. Deze soort herinnert zeer aan *Cis festivus* en *castaneus*, doch is meer gestrekt en veel fijner en dichter bestippeld. Lengte $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Niet inlandsch. Zij zou bij Overpelt in Belgisch Limburg aangetroffen zijn (*laricinum* Mellié)

II. Tribus RHOPALODONTINI.

Rhopalodontus Mellié.

Dit genus is zeer verwant aan *Cis*, doch onderscheiden doordat de voorvoet kegelvormig uit de gewrichtsholten uitpuilen en vrij dicht aaneenstaan, terwijl zij bij *Cis* min of meer oral en in de gewrichtsholten ingesloten zijn. De clypeus is bij het ♂ van twee kleine bultjes voorzien.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam kort-cylindervormig. Halsschild slechts iets breder dan lang, naar voren versmald, tamelijk fijn bestippeld. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, met parallele zijden, vrij sterk-, tamelijk verward of hier en daar in onduidelijke rijen bestippeld. Bovenzijde iets glanzig, kastanjebruin, vrij dicht en lang afstaande behaard. Lengte ongeveer 2 mm. Op elzen. Niet inl. In de Rijnprov. De larve is door Mellié beschreven.

(*perforatus* Gyll.)

3. Octotemnus Mellié.

Sprieten 8-ledig, meer of minder onder den weinig of niet verbreedten zijrand van den clypeus ingeplant, de eerste twee ledjes groot, de laatste drie tot eene groote knots vereenigd. Voorkaken met twee-tandig uiteinde, hetzij in beide seksen gelijk of bij het ♂ van het Sub-gen. *Orophius* zoo lang als de kop, met drie-tandig uiteinde, van welke de bovenste tand der linker voorkaak zich in een schuin opgerichten tak verlengt; bij het ♀ zijn hier de voorkaken langer dan de halve kop. Achterkaken met twee hoornachtige lobben, van welke de binnenste zeer klein en smal is en slechts door eene rij van dikke stekelborstels aangeduid wordt; de buitenste daarentegen bereikt nagenoeg de lengte der kauktasters, welke draadvormig en 4-ledig zijn, met nagenoeg cilindervormig eindlid. Tarsen gewoon, 4-ledig, met lang, dun klauw-lid. Bij het Sub-gen. *Orophius* puilen bij het ♂ de oogen meer uit dan bij het ♀, is het voorhoofd diep uitgehold en de voorrand van den clypeus iets uitgerand; bij het ♀ is het voorhoofd iets ingedrukt. — Larven en kevers leven in boomzwammen.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Voorkaken, vooral bij het ♂, ver vooruitstekend. Lichaam langwerpig, cilindervormig (Sub-gen. *Orophius* Redtb.), kastanjebruin, tamelijk glanzig, onbehaard. Halsschild naar voren een weinig versmald, zeer fijn bestippeld. Dekschilden meer dan $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed, met parallele zijden, fijn-, doch iets krachtiger dan het halsschild bestippeld. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. In berkenzwammen. In België, in de Rijnprov. en in Hannover (*mandibularis* Gyll.)

Voorkaken niet vooruitstekend. Lichaam eenigszins langwerpig-ei rond (Sub-gen. *Octotemnus* i.sp.), lichter of donkerder kastanjebruin, glanzig, onbehaard. Halsschild naar voren duidelijk versmald, zeer fijn bestippeld. Dekschilden nauwelijks $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed, eivormig, tamelijk fijn-, doch iets krachtiger dan het halsschild bestippeld. Lengte 1— $1\frac{1}{2}$ mm. Gemeen in zwammen van eiken, berken, elzen en haagbeuken.

1. *glabriculus* Gyll.

XXV. Familie EROTYLIDAE.

De Erotylidae vormen eene kleine familie, welke door de Engini het naast verwant is aan de Cryptophagidae, doch door de Triplacini ook eenige verwantschap vertoont met de Endomychidae. Het lichaam is langwerpig of meer ovaal, meer of minder gewelfd, glanzig en onbehaard. — Sprieten 11-ledig, vóór de oogen onder den zijrand van den kop ingeplant, met drie grootere eindleedjes. — Voorkaken gewoonlijk aan den top gespleten. Achterkaken met twee gebaarde lobben. Kaaktasters 4-ledig, het eindlid zeer verbreed, min of meer bijlvormig of eenigszins halve-maanvormig, bij de Engini gewoon, ovaal. Liptasters 3-ledig. Kin hoornachtig, drie-lobbig of trapeziumvormig. Tong ovaal, van voren afgeknoot of uitgerand; de paraglossen onduidelijk. — De vleugels (bij *Engis bipustulata* Thunb.) zijn, volgens *Roger*, minder gestrekt dan bij de Cryptophagidae. Het gewricht is achter het midden gelegen, het aderlooze topgedeelte daardoor niet zoo groot als het basaalgedeelte. De vena externo-media verloopt aan haar uiteinde duidelijk concaaf naar buiten, nagenoeg diagonaal door het basaalgedeelte van den vleugel; de area externo-media is groot, hare teruglopende takken zijn vereenigd door eene dwarsverbinding, welke tegen de vena scapularis nog eene kleine voortzetting uitzendt, zoodat daardoor bijna eene voorste ruit gevormd wordt. In de area interno-media bevindt zich dicht naast het korte topgedeelte van de vena externo-media eene ovale pigmentvlek. De vena interno-media is gebogen en vertoont een stelsel van bijaders en dwarsverbindingen, hetwelk in samenhang met de pigmentvlek veel overeenkomst vertoont met de vleugelvorming van *Orthocerus* onder de Colydiidae. De vena externo-media verloopt, na het eerste derde gedeelte, over een zeer korten afstand, tamelijk hoekig, om eene dwars-anastomose tegemoet te gaan, welke uit eene in de area analis dicht langs haar heen verlopende, tamelijk rechtlijnige bijader ontspringt; aan dezen hoek ontspringt uit haar eene bijader, welke zoowel aan hare voortzetting, als ook aan eene tweede, tegenover haren oorsprong uit de vena externo-media ontspringende bijader, zeer flauw tweemaal gebogen, tot aan den achterrand evenwijdig loopt. De van de vena externo-media uitgaande bijader zendt uit haar midden eene dwarsverbinding uit tot de uit de vena interno-media ontspringende bijader, en deze wederom, iets hooger op, eene dergelijke tot de hoofdadar, zoodat eerstens de beide dwarsverbindingen met het daartusschen gelegen stuk van de bijader eene zigzag-lijn vormen, en ten tweede langs het middengedeelte van de vena interno-media eene lang-gestreckte cel ontstaat, welke analoog is aan het wigvormige vakje der Caraboidea. De achterrand is iets bewimperd; de inkerving, welke het onbewimperde basaallobje afzondert, is slechts oppervlakkig aangeduid. Volgens *J. Redtenbacher* is de nervatuur der vleugels bij de Erotylidae geheel als bij de Melandryidae, Cistelidae en Tenebrionidae, met nauwelijks in 't oog vallende verschillen. — Pro- en mesosternum breed. Achterlijf met 5 sterniten, van welke de eerste twee onbewegelijk met elkaar verbonden zijn. — Voorcoxae kogelvormig, in de gewrichtsholten ingesloten. Tarsen 5-ledig, de eerste drie tarsleedjes breed en aan de onderzijde dicht viltig, het vierde lid zeer klein en min of meer in het derde verborgen; bij de Engini zijn de tarsen gewoon en is het vierde lid duidelijk zichtbaar of gedeeltelijk in het derde ingesloten. — De Erotylidae leven met hare larven in allerlei fungi, achter boomschors, onder plantenafval en in vermolmd hout; sommigen onder steenen. De volkomen insecten vliegen ook rond. — De larven zijn lang-gestrekt, met hoornachtige tergiten. Sprieten 3-ledig. Zes ocellen aan weerszijden van den kop. Voorkaken door de bovenlip bedekt. Achterkaken één-lobbig. Pooten duidelijk 5-ledig.

Overzicht der Tribus.

- Eindlid der kaaktasters gewoon, ovaal; het eerste lid kort, korter dan de twee volgende leedjes te zamen. Tarsen gewoon, smal; het vierde lid duidelijk zichtbaar of gedeeltelijk in het derde ingesloten. I. **Engini**.
- Eindlid der kaaktasters zeer verbreed, eenigszins halve-maan- of bijlvormig; het eerste lid verlengd, minstens zoo lang als de twee volgende leedjes te zamen. De eerste drie tarsleedjes breed, aan de onderzijde dicht viltig; het vierde lid zeer klein en min of meer in het derde verborgen II. **Triplacini**.

I. Tribus ENGINI.

Sprietkots rondachtig, drie- tot viermaal zoo breed als de vrij slanke funiculus, de leedjes dicht aaneengesloten; het eerste sprietlid grooter, het derde langer dan het tweede. De eerste drie tarsleedjes smal, niet veel breder dan het vierde. Halschild en dekschilden aan de basis zeer fijn gerand. Dekschilden met eenigszins onregelmatige, lijne stippelrijen.

1. **Engis**.

Spruitknots langwerpig, nauwelijks dubbel zoo breed als de dikke funiculus, de leedjes los samenhangend; de leedjes van den funiculus kogelvormig en onderling gelijk. Het vierde tarslid zeer klein en gedeeltelijk in het derde ingesloten. Halsschild en dekschilden aan de basis dik gerand. Dekschilden met zeer fijne, regelmatige stippelrijen (Combocerus.)

II. Tribus TRIPLACINI.

Mesosternum tusschen de middelcoxae hoogstens dubbel zoo breed als lang, eene enigszins vierhoekige plaat vormend. Prosternum tusschen de voorcoxae veel langer dan de voortzetting van achteren breed, met enigszins parallele zijden. Halsschild, en meestal ook de dekschilden, aan de basis gerand 2. **Triplax**.

Mesosternum tusschen de middelcoxae viermaal zoo breed als lang. Prosternum tusschen de voorcoxae zeer breed, ongeveer zoo lang als de voortzetting van achteren breed, trapeziumvormig. Halsschild en dekschilden aan de basis ongeand 3. **Cyrtotriplax**.

I. Tribus ENGISI.

1. Engis Paykull.

(*Dacne* Latreille ex parte).

Voorkaken met gespleten of drie-tandigen top. *Achterkaken* twee-lobbig; de buitenste lob is driehoekig, de binnenste smal en met een langen hoornhaak aan het uiteinde. *Eindlid* der kaaktasters gewoon, ovaal, het eerste lid kort, korter dan de twee volgende leedjes te zamen. *Tong* hoornachtig, afgerond, bewimperd. *Chypeus* meer of minder duidelijk ingedrukt. *Sprieten* 11 ledig, met drie grootere eindleedjes, welke drie- tot viermaal zoo breed zijn als de slanke funiculus; het eerste sprietlid is grooter-, het derde langer dan het tweede. Halsschild en dekschilden aan de basis zeer fijn gerand. Dekschilden met enigszins onregelmatige, fijne stippelrijen. *Tarsen* 5-ledig, gewoon, smal, het vierde lid duidelijk zichtbaar, de eerste drie leedjes smal, niet veel breeder dan het vierde, het klauw-lid zoo lang als de overige leedjes te zamen. — *Larven* en *kevers* leven gewoonlijk in groot aantal bijeen in *boleten* en *achter schimmelende boomschors*. De *metamorphose* heeft plaats in *September*; de *kevers* overwintert en verschijnt in *Mei*. — De *larve* van *E. rufifrons* is door *Westwood*, die van *bipustulata* door *Bedel* beschreven.

Van de 4 *Europeesche* soorten komen 2 in *Nederland* en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 Eindlid der sprietknots slechts weinig langer en iets smaller dan het tweede lid. De lichte schouderplek klein en niet scherp begrensd. Kleinere soorten 2

Eindlid der sprietknots veel langer en breeder dan het tweede, bijna zoo groot als de eerste twee leedjes te zamen. De lijn gerande zijden van het halsschild zwak afgerond. Bovenzijde glanzig zwart, de pooten en eene scherp begrensde, groote schouderplek roodgeel; de sprieten roestrood. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Achter boomschors en op boomzwammen. Niet int. Bij Hamburg (*bipustulata* F.) (*notata* Gmel.)

2 De zijden van het halsschild gelijkmatig, doch zeer weinig afgerond, langs den geheelen, duidelijk geranden zijrand enigszins vlak gedrukt. Halsschild vrij dicht bestippeld. Bovenzijde zwart, glanzig; de kop, het halsschild, eene kleine schouderplek op de dekschilden, de sprieten en pooten licht rood. Bij abe. *Jekeli* Reitt. is het geheele lichaam roodgeel. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer gemeen op boomzwammen, vooral van beuken; ook achter schimmelende iepenschors (*humeralis* F.) 1. **bipustulata** Thunb.

De zijden van het halsschild tamelijk recht, in 't midden flauw uitgebogen, langs den geranden zijrand niet vlakgedrukt. Halsschild verspreid bestippeld. Bovenzijde zwart, de kop, eene schouderplek en het uiteinde der dekschilden, benevens de sprieten en pooten rood. Zelden is het lichaam lichtbruin en de vlekken geel. Onuitgekleurde exemplaren gelijken op de abe. *J. lii* van *bipustulata*, doch onderscheiden zich door de iets uitgebogen zijden van het halsschild. Lengte 2—3 mm. Even gemeen als *bipustulata*, vooral in iepen-, abelen- en eikenzwammen. 2. **rufifrons** F.

Combocerus Bedel.

Dit genus onderscheidt zich van *Eugis* vooral, doordat de sprietknots, vier leedjes meer los aaneenhangen, langwerpig en nauwelijks dubbel zoo breed is als de dikke funiculus, vier leedjes kogelvormig en onderling gelijk zijn. Eindlid der kaaktasters minder verlengd. Clypeus zonder indruk. Halsschild en dekschilden aan de basis dik kantig gerand. Dekschilden met zeer fijne, regelmatige stippelvrijen. Mesosternum in het midden gekield, aan de zijden gegroefd. Het vierde tarslid zeer klein en gedeeltelijk in het derde ingestoten.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild naar voren versmald, met tamelijk rechte zijden. Dekschilden naar achteren vrij sterk versmald. Bovenzijde zwart, glauzig, het halsschild, eene groote schouderplek en eene groote topvlek op de dekschilden, benevens de sprietknots en de pooten licht rood. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Onder steenen, in boomhol, in drogen paardenmest en tegen witte muren. Niet inl. In België bij Visé en Ridderborn nabij de grens; ook in de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. (sanguinicollis F.) (glaber Schall.)

II. Tribus TRIPLACINI.

2. Triplax Paykull.

Voorkaken met gespleten top. Achterkaken met twee korte, aan het uiteinde gebaarde, hoornachtige lobben. Eindlid der kaaktasters zeer verbreed, eenigszins halve-maan- of bijlvormig, het eerste lid verlengd, minstens zoo lang als de twee volgende leedjes te zamen. Eindlid der liptasters eivormig. Tong hoornachtig, aan de zijden lang behaard. Sprietten 11-ledig, met drie grootere eindleedjes, welke eene langwerpige, tamelijk los-gelede knots vormen. Halsschild, en meestal ook de dekschilden, aan de basis gerand. Prosternum tusschen de voorcoxae veel langer dan de voortzetting van achteren breed, met eenigszins parallele zijden. Mesosternum tusschen de middelcoxae hoogstens dubbel zoo breed als lang, eene eenigszins vierhoekige plaat vormend. Tarsen 5-ledig, de eerste drie leedjes breed, aan de onderzijde dicht villig, het vierde lid zeer klein en evenals de basis van het klauw-lid min of meer in het derde verborgen. — De soorten van dit genus leven met hare larven, meestal in aantal bijeen, in paddestoelen, boomzwammen, boleten en achter boomstemschors. Zij verspreiden een eigenaardigen reuk en ontsnappen zeer snel of houden zich een oogenblik als dood. — De larve van *T. russica* is door Westwood en Dufour, de pop door Dufour en de larve en pop van de niet inlandsche *melanocephala* door Xamben beschreven.

Van de 14 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 6 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Voorrand van het prosternum gelijkmatig gewelfd, de voortzetting tusschen de voorcoxae naar achteren slechts weinig verbreed. Basis van het halsschild dik-, die der dekschilden tamelijk fijn gerand. Eindlid der kaaktasters bijlvormig, hoogstens $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang 1). Lichaam langwerpig, met eenigszins parallele zijden (Sub-gen. *Triplax* isp.). 2
- Voorrand van het prosternum in 't midden scherper en eenigszins dakvormig opgericht, de voortzetting tusschen de voorcoxae naar achteren sterk verbreed. Basis van het halsschild fijn gerand. Eindlid der kaaktasters sterk verbreed, 3 tot 4 maal zoo breed als lang. Lichaam meestal korter en meer eirond, zelden iets meer verlengd, naar achteren versmald (Sub-gen. *Platichna* Thoms.) 4
- 2 De eerste twee leedjes der sprietknots $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. De zijden van het halsschild rechtlijnig. Kop, halsschild, schildje, de geheele onderzijde en de pooten rood; de dekschilden blauw, zelden groenachtig, bij abe. *bicolor* Mrsh. zwart. Sprietten geheel zwart. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken; ook in België (coll. *Hesmael*). (*aenea* Schall.)

1) Betreft bij de in Oostelyk Europa voorkomende 1 *elongata*

De eerste twee leedjes der sprietknots dubbel zoo breed als lang. De zijden van het halsschild zwak afgerond 3

- 3 Achterlijf rood. Meso- en metasternum, sprieten, schildje en dekschilden zwart. Kop, halsschild, prosternum en pooten rood; de sprieten soms meer roodbruinachtig. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel licht roodachtig (*castanea* Mrsh.). Lengte $4\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Op boomzwammen, zeldzamer achter boomschors. De larve werd o.a. in *Boletus hispidus* aangetroffen. Over het algemeen zeldzaam. Leiden, Hilversum, Oldenzaal, Bunde, Roosteren en Bocholtz, Juli; in groot aantal bij Nuth nabij Maastricht, Juli (*nigripennis* F.) 1. *rusica* L.

Achterlijf zwart. Meso- en metasternum, schildje en dekschilden zwart. Kop, halsschild, prosternum en pooten rood. Sprieten roodbruinachtig, de knots iets donkerder. Overigens aan *rusica* naverwant, doch kleiner. Lengte 3 — $3\frac{1}{2}$ mm. In beukenzwammen. Zij zou in Westfalen voorkomen (*ruficollis* Lac.) (*Lacordairei* Crotch)

- 4 Dekschilden aan de basis lijn gerand, zwart. Halsschild, de sprieten, behalve de donkerder knots, en de pooten rood. Schildje zwart 5

Dekschilden aan de basis niet gerand, zwart. Kop en halsschild rood 6

- 5 Het derde sprietlid zoo lang als het tweede. Kop zwart. Lichaam niet zeer breed, naar achteren geleidelijk versmald. Lengte 3 — 4 mm. Niet inl. In Noord-Duitschland bij Hamburg (*collaris* Schall.)

Het derde sprietlid $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het tweede en vierde. Kop rood. Lichaam in de schouders zeer breed, naar het uiteinde sterk versmald; de vorm der dekschilden eenigszins veranderlijk. Lengte 4 — $4\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In Oldenburg, Westfalen en bij Hamburg (*rufipes* F.)

- 6 Het derde sprietlid iets korter dan het tweede. Schildje en onderzijde, behalve het prosternum, zwart. Sprieten geheel roodachtig. Lichaam kort-eirond, in de schouders zeer breed, naar het uiteinde sterk versmald. Overigens zeer op *rufipes* gelijkend. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In Middel- en Noord-Europa (*lepidia* Fald.)

Het derde sprietlid nagenoeg dubbel zoo lang als het tweede. Schildje en de geheele onderzijde geelrood. Sprieten roodachtig, naar het uiteinde donkerder. Lichaam iets meer verlengd, naar achteren minder versmald. Lengte $4\frac{1}{2}$ mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken (*scutellaris* Charp.) (*bicolor* Gylh.)

3. Cyrtotriplax Crotch.

(*Tritoma* F.)

Voorkaken met gespleten top. Achterkaken met twee korte, nagenoeg even lange, aan het uiteinde gebaarde, hoornachtige lobben. Eindlid der kauktasters bijvormig, dat der lipstasters eirond. Tong hoornachtig, naar voren iets versmald, aan den rand zeer kort gebaard. Sprieten 11 ledig, met drie groote, dicht ingengedrongen eindleedjes, van welke het eerste driehoekig, het tweede halve-maantvormig, het laatste iets kleiner en rond is. Halsschild en dekschilden aan de basis ongerand. Prosternum tusschen de voorcoxae zeer breed en ongeveer zoo lang als de voortzetting van achteren breed, trapeziumvormig. Mesosternum tusschen de middelcoxae viermaal zoo breed als lang. Tarsen 5-ledig, het vierde lid zeer klein en met de basis van het klauw-lid in het derde ingesloten.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam breed-eirond, hoog gewelfd, glanzig zwart. Dekschilden met eene groote, breede, roode schoudervlek (*abc. binotata* Reitt.), welke bij het type eene zwarte stip tegen de schouderbuil omsluit. Zeldzamer vloeien de beide roode vlekken ineen, waardoor eene breede, in 't midden hoekig uitgerande roode dwarsband aan de basis ontstaat, terwijl ook het schildje roodachtig is. Kop en halsschild grootendeels, de sprieten en pooten geheel rood (*abc. dimidiata* Redt.). Bij onuitgekleurde exemplaren zijn ook de dekschilden geheel roodachtig. Sprieten, behalve de donkerder knots, de tarsen en de epipleuren der dekschilden rood. Lengte 3 — 4 mm. In paddestoelen, beuken- en berkenzwammen, achter eikenschors en in vermolnd hout, Mei—Aug. Apeldoorn, Wageningen, Arnhem, Oldenzaal, Maarsbergen, Roermond en Venlo. In groot aantal bij Gronsveld nabij Maastricht. De ontwikkeling is door *Perris* en de larve door *Gorham* beschreven . . . 1. *bipustulata* F.

XXVI. Familie TROGOSITIDAE (Fig. 47).

Eene kleine familie, welke het naast verwant is aan de Nitidulidae (Rhizophaginae) en zich ook aansluit aan de Colydiidae en Cucujidae. Het lichaam is tamelijk vlak, breed of meer gestrekt, zelden hoog gewelfd en eenigszins half-kogelvormig, of zeer smal, cilindervormig (Nemosomini). — Sprieten 10- of 11-ledig, met 3-ledige knots of met geleidelijk grooter wordende eindledjes (Trogosita). — Voorkaken meestal met twee-tandig top. Achterkaken twee-lobbig, de binnenste lob soms rudimentair en nauwelijks zichtbaar. Kaaktasters 4-, de lipstasters 3-ledig. Tong min of meer hoornachtig. Paraglossen door de tong bedekt en gewoonlijk daarmede vergroeid. — Achterlijf met 5 sterniten, de mannetjes der Nemosomini nog met een zesde sterniet. — Voorcoxae groot, in de breedte sterk cilindervormig, niet uitstekend, hare gewrichtsholten van achteren gesloten, bij de Peltini open. Achtercoxae dicht tegen elkaar aanstaande, slechts door eene smalle, toegespitste voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. — Bij de vleugels van Peltis ferruginea L. is volgens

Roger het gewricht achter het midden gelegen; het topgedeelte is nog niet half zoo groot als het basaalgedeelte. De vena externo-media verloopt rechthoekig en diagonaal tot aan het midden van den achterrand. De teruglopende takken in de area externo-media zijn zeer kort, die van de vena scapularis uitgaande zijn met deze door eene dwarsverbinding verbonden, waardoor eene voorste ruit gevormd wordt. Het topgedeelte der vena externo-media is zeer kort, zoodat de area externo-media ongeveer

$\frac{1}{2}$ van de geheele vleugeloppervlakte inneemt. In de area interno-media bevinden zich twee, met de gebogen vena interno-media evenwijdig loopende bijaders, die met haar en ook onderling door eene dwarsverbinding samenhangen, en te zamen eene zigzag-lijn vormen. In de area analis bevindt zich eene bijader, welke tegenover de het breede basaallobje begrenzende inkerving van den achterrand, met de vena interno-media samenstoot. De vena analis is duidelijk, doch gewoon. Volgens J. Redtenbacher hebben de Trogositidae door den vleugelbouw de grootste verwantschap met de Colydiidae en Tritomidae en deels ook met de Lathridiidae. — Tarsen gewoon, cilinderrond, 5-ledig, het eerste in plaats van het vierde lid zeer klein of rudimentair, moeijelijk zichtbaar, het klaw-lid groot; tusschen de klauwen met een klein onychium, waarop twee borstelharen. — De soorten leven, evenals hare larven, grootendeels achter boomschors; die van Trogosita en Peltis pusilla in meel, drogerijen, rijst, enz. Zij maken jacht op Tomiciden-larven en andere kleine Arthropoden. — De larven hebben 5 ocellen.

Fig. 47. I *Nemosoma elongatum* F. Ong.
II *Peltis pusilla* Klug. Orig.

Overzicht der Tribus.

- 1 Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten 2
Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren open. De zijden van het halsschild meer of minder vlak uitgebreid en iets opwaarts gebogen. De epipleuren der dekschilden zijn breed en bereiken het uiteinde III. **Peltini**.
- 2 Kop zeer lang, iets breeder dan het halsschild. Sprieten nauwelijks langer dan de kop. Oogen rond, van den voorrand van het halsschild ver verwijderd. Lichaam cilindervormig, zeer smal. Het ♂ met een zesde sterniet I. **Nemosomini**.
- Kop kort, smaller dan het halsschild. Sprieten langer dan de kop. Oogen verbreed. Lichaam tamelijk vlak. De beide seksen met 5 sterniten II. **Trogositini**.

I. Tribus NEMOSOMINI.

Bevat slechts het genus (*Nemosoma*.)

II. Tribus TROGOSITINI.

Bevat slechts het genus 1. *Trogosita*.

III. Tribus PELTINI.

Voorschenen met duidelijke einddoornen. Het eerste sprietlid oövormig verbreed. Halsschild van voren meer of minder diep uitgerand, met vooruitstekende voorhoeken. Dekschilden met meer of minder duidelijke langsribben. Lichaam vlak, breed of meer gestrekt, op de bovenzijde hoogstens onduidelijk behaard 2. *Peltis*.

Voorschenen zonder einddoornen. Het eerste sprietlid gewoon verdikt. Halsschild van voren afgerond, zonder aangeduide voorhoeken. Dekschilden zonder langsribben. Lichaam hoog gewelfd, eenigszins half-kogelvormig, op de bovenzijde dicht behaard (Thymalus.)

I. Tribus NEMOSOMINI.

Nemosoma Latreille (Fig. 47, I).

Kop zeer lang, iets breeder dan het halsschild, het voorhoofd door eene langspleet in tweeën verdeeld. Oogen rond, van den voorrand van het halsschild ver verwijderd. Bovenlip met een langsindruk in het midden. Voorkaken tamelijk ver uitstekend, naar onderen gekromd, met een tand aan den binnenrand achter het scherpe uiteinde. Achterkaken met twee lobben, de binnenste echter zeer weinig ontwikkeld en nauwelijks zichtbaar. Sprieten nauwelijks langer dan de kop, met eene losse, 3-ledige knets. Lichaam cilindervormig, zeer smal. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Pooten kort, de schenen niet gedoorn. Bij het ♂ is een zesde sterniet voorhanden.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam smal, cilindervormig, glanzig zwart, soms pekbruin; de basis der dekschilden en eene niet scherp aangeduide vlek voor het uiteinde, alsook de sprieten en pooten roodgeel. Sprieten 10-ledig. Voorhoofd van voren gegroefd en in twee stompe builen uitgetrokken. Kop en halsschild fijn bestippeld. Dekschilden met zeer fijne stippelrijen, de naadstreep aan het uiteinde verdiept, de zijden zeer fijn kantig gerand. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{2}$ mm. De larve is door *Erichson* en *Perris* bekend geworden. Deze soort leeft met hare larve in de gangen van verschillende Tomiciden, waarop zij jacht maakt. Vooral in iepen en beuken. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa. De larve is door *Westwood* en *Erichson* beschreven (*elongatum* L.)

II. Tribus TROGOSITINI.

1. *Trogosita* Oliv.

(*Tenebrioides* Piller & Mitterpacher)

Kop kort, smaller dan het halsschild. Voorhoofd van voren met drie uitrandingen. Oogen niervormig, in de breedte geplaatst. Bovenlip uitgerand. Voorkaken met twee-tandigen top, aan den binnenrand met een stompen tand. Achterkaken tweelobbig. Tong afgeknot. Eindlid der tasters eenigszins eivond, toegespitst. Sprieten langer dan de kop, 11-ledig, met geleidelijk grooter wordende eindleedjes. Sprietgroeven op de onderzijde van den kop eerst diep en schuin naar binnen-, dan vlakker en naar buiten gericht. Lichaam gestrekt, tamelijk vlak. Halsschild naar de basis versmald. Achterlijf in beide seksen met 5 sterniten. Gewrichtsgroeven der voorcoxae van achteren gesloten. De larve van *T. mauritanica* is door *Westwood*, *Erichson*, *Curtis*, *Küttel* en *Nambei*, de pop door *Nambei* beschreven; de larve is cilindervormig, vlakgedrukt, zwitwit, behalve de zwartachtige, hoornachtige deelen; aan de

zijden met lange, afstaande haartjes bezet. Kop hoornachtig, nagenoeg vierhoekig, zonder duidelijke ocellen. Spriet en slechts 2-ledig. De eerste 8 sterniten dun en vliezig, het negende tergiert hoornachtig, in twee sterke haken uitlopend; met 9 paar stigmata. Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam langwerpig, vlak, zwart of donkerbruin, bij onuitgekleurde exemplaren roodbruin. Spriet en pooten roodbruin. Kop en halsschild krachtig bestippeld. Halsschild eenigszins hartvormig, met uitgetrokken voorhoeken en kleine, tandvormig uitstekende achterhoeken; de zijden en de basis, behalve voor het schildje, scherp gerand. Dekschilden met stippelrijen en fijn dwarsrimpelige tusschenruimten, waarin twee zeer fijne stippelrijen. Lengte 7—9½ mm. Niet zeldzaam in meel, drogerijen, kruiden, scheepsbeschuut en op graanzolders, waar de kever volgens *Olivier* de motten vervolgt, doch de waren zelf niet aantast; ook zou zij achter boomschors, in rottend hout en buiten vliegende aangetroffen zijn. Door de scheepvaart is zij overal verbreid. De larve daarentegen, in Zuid-Frankrijk „Cadelle” genaamd, zou veel schade aanrichten (caraboides F.) 1. *mauritanica* L.

III. Tribus PELTINI.

2. *Peltis* Geoffr.

(*Ostoma* Laich. ex parte, Reitter).

*Bovenlip recht afgesneden of iets afgerond. Voorkaken met twee-tandigen top. Achterkaken met twee even sterk ontwikkelde lobben, de binnenste met een krachtigen, hoornachtigen haak aan het uiteinde. Eindlid der kaaktasters lang-eivormig, dat der liptasters stomp-eivormig. Tong twee-lobbig. Oogen rond of iets verbreed. Spriet en 11-ledig, het eerste lid oortvormig verbreed, met los-gelede, 3-ledige knots. Lichaam vlak, breed of meer gestrekt, op de bovenzijde hoogstens onduidelijk behaard, met eenigszins vlak uitgebreide zijden en iets opwaarts gebogen randzoom van halsschild en dekschilden. Halsschild van voren meer of minder diep uitgerand, met vooruitstekende voorhoeken. Dekschilden met meer of minder duidelijke langsribben: de epipleuren meestal breed, het uiteinde bereikend. — De soorten van dit genus leven achter boomschors en in boomzwammen. Eene enkele soort leeft in allerlei waren en is cosmopoliet. — De larve en pop van de niet inlandsche *P. grossa* L. is door *Assmann*, de larve van *pusilla* door *Rey* beschreven.*

Van de 5 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

1 De binnenste einddoorn der voorschenen weinig of niet grooter dan de buitenste. Oogen tamelijk rond. Halsschild naar voren weinig versmald, aan de basis niet veel breder dan van voren. Lichaam gestrekt. Epipleuren der dekschilden smal 2

De binnenste einddoorn der voorschenen groot en haakvormig, de buitenste zeer klein. Oogen verbreed. Halsschild ongeveer driemaal zoo breed als lang, met tweemaal uitgebogen achterrand, naar voren zeer sterk versmald, aan de basis meer dan dubbel zoo breed als van voren. Lichaam breed-ovaal. Epipleuren der dekschilden breed. Dekschilden elk met 6 langsribben en eene dubbele rij diepe stippels in de tusschenruimten (Sub-gen. *Gaurambe* Thoms.); de vijfde langsrib afgekort en veelal onduidelijk. Donkerbruin of roodbruin, met lichter doorschijnende zijden, soms geheel roestkleurig, op de bovenzijde onbehaard; de spriet en pooten roestrood. Kop en halsschild grof bestippeld. Lengte 7—9½ mm. Achter schors van doode boomen en aan boomzwammen, vooral van dennen; ook schijnt zij soms in huizen voor te komen. Niet inl. In de Rijnprov. en in Oldenburg.

(*ferruginea* L.)

2 Dekschilden elk met 6 fijne, scherpe langsribben, waartusschen twee onduidelijke stippelrijen. Bovenzijde van het zeer vlakke lichaam, vooral op het halsschild, niterst fijn geelachtig behaard (Sub-gen. *Lophocateres* Olliff) (Fig. 47, II). Halsschild naar voren slechts iets versmald, met nagenoeg rechte achterhoeken en spits vooruitstekende voorhoeken; vrij dicht bestippeld. Lichaam roodbruin, de spriet en pooten licht roestrood. Lengte 2½—3 mm. Over de geheele aarde verbreid in allerlei waren, als: rijst, zaden, kruiden, gedroogde wortelen, enz. Ook in het Rijks Herbarium te Leiden gevonden.

(*Yvanii* Allib.) 1. *pusilla* Klug.

Dekschilden elk met 8 krachtige langsribben, waartusschen twee rijen van diepe stippels. Bovenzijde van het minder vlakke lichaam nagenoeg onbehaard, behalve min of meer aan de zijden van het halsschild (Sub-gen. *Grynocharis* Thoms.). Halsschild naar voren meer versmald, met stompe, eenigszins afgeronde achterhoeken en afgeronde, vooruitstekende voorhoeken; zeer grof en dicht bestippeld. Lichaam bruinzwart, de pooten en gewoonlijk ook de sterniten grootendeels roestkleurig. Bij het ♂ zijn de sterniten dof en niterst fijn en dicht bestippeld, bij het ♀ daarentegen glanziger en veel krachtiger en minder dicht bestippeld. Lengte 6—7½ mm. Achter schors en in boomzwammen van eiken en wilgen. Niet inl. In Westfalen en bij Hamburg. (*oblonga* L.)

Thymalus Latreille.

Kop klein, sterk afhellend, grootendeels onder het halsschild verborgen. Oogen vrij groot, rond, grootendeels door den voorrand van het halsschild bedekt. Bovenlip van voren afgerond. Voorkaken met dubbelen top. Achterkaken met twee even sterk ontwikkelde lobben, de binnenste met een krachtigen hoornhaak aan het uiteinde. Eindlid der kaaktasters stomp-eivormig. Tong aan het uiteinde iets uitgerand. Sprieten 11-ledig, met gewoon verdikt eerste lid en ineengedrongen, 3-ledige knots. Lichaam hoog gewelfd, kort-oraal, eenigszins half-kogelvormig, op de bovenzijde dicht behaard, de zijranden afgeplat. Halsschild van voren afgerond, zonder aangeduide voorhoeken. Dekschilden zonder langsribben. Schenen met groeven aan de buitenzijde tot het inleggen der tarsen. Voorschenen zonder einddoornen.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam sterk gewelfd, de bovenzijde glanzig bronskleurig, rood gezoomd, lang opgericht geelachtig behaard; de onderzijde, de sprieten en de pooten roodbruin. Halsschild fijn en dicht bestippeld. Dekschilden met eene sterke schouderbuil en grove stippelrijen. Sommige exemplaren zijn roodbruin, met minder bronsglaas. Lengte 5½—7 mm. Achter schimmellende schors van doode beuken en eiken, vooral in bergstreken, zelden in het vlakke land. Het levende dier is met een wit, wasachtig uitzweetsel bedekt, dat na verwijdering zich weder ontwikkelt. De larve werd door *Chapuis & Candèze*, de pop door *Aubé* beschreven. Niet inl. In de Rijnprov., Westfalen, Oldenburg en bij Bremen (*limbatus* F.)

XXVII. Familie COLYDIIDAE.

Deze familie wordt gevormd door vrij kleine of middelmatig groote kevers, wier lichaam lang en smal cilindervormig of korter en vlakker, bij uitzondering min of meer ovaal (*Murmidius*) is. — Bij *Aglenus* ontbreken de oogen. — Sprieten aan de zijden van den kop ingeplant, de wortel meestal meer of minder, bij *Aglenus* slechts zeer weinig door den zijrand van den clypeus overdekt; bij de *Bothriderini*, *Teredini*, *Cerylonini* en *Murmidiini* meer op den voorrand van den kop ingeplant en de wortel niet door den zijrand van den clypeus overdekt;

Fig. 48.
Orthocerus muticus L. Orig.
Kop met spriet

10- of 11-ledig 1) met 1-, 2- of 3-ledige knots of schijnbaar 1-ledigen eindknop (*Oxytaemus*), of wel geleidelijk verdikt, zonder afgescheiden knots (*Orthocerus*) (Fig. 48). Kop meestal zonder-, bij *Colobicus* en *Murmidius* met duidelijke-, bij *Colydium*, *Aglenus*, *Synchita* en *Ciccones* met oppervlakkige, korte sprietgroeven. — Bovenlip hoornachtig, soms onder den clypeus verborgen. Voorkaken kort, krachtig ontwikkeld, gebogen, veelal met gedeelden top, aan de binnenzijde naar de basis met een geribd kauwvlak en daarover met een vliezigen zoom. Achterkaken 2-lobbig. Kaaktasters 4-, de lipstasters 3-ledig 2). Tong gewoonlijk min of meer hoornachtig, de paraglossen zelden zichtbaar. — Voorhoeken van het halsschild zonder sprietgroef, alleen bij de *Murmidiini* op de onderzijde met eene diepe groef tot opname van de sprietknots. — Schildje duidelijk, bij *Aglenus* onzichtbaar. —

De vleugels van *Orthocerus muticus* L. zijn volgens *Roger* eenigszins lancetvormig; ter hoogte van het gewricht, hetwelk meer nabij de vleugelpunt gelegen is het breedst, het topgedeelte daardoor

1) Bij het met in ons gebied voorkomende genus *Derhomus* 8-ledig en zeer kort en dik; ook wel 4-ledig (*Pleganophorus*).

2) Bij het met in ons gebied voorkomende genus *Pleganophorus* 3- en 2-ledig.

klein. De beide teruglopende takken in de area externo-media zijn door eene dwars-anastomose verbonden. Het basale gedeelte der vena externo-media is naar buiten iets concaaf en ongeveer vijf maal zoo lang als het, den achterrand bijna bereikend, topgedeelte. De vena interno-media is tamelijk recht en door dwars-anastomosen met evenwijdig loopende bijaders verbonden. In het midden-gedeelte der area interno-media is eene bijader, welke zich naar den achterrand onder een stompen hoek in twee takken splitst, van welke de buitenste tot aan den buitenrand evenwijdig loopt aan de vena externo-media en tusschen haar uiteinde en dat der vena interno-media, eene ovale, gele pigmentvlek insluit; de binnenste tak verbindt zich rechthoekig met de van de vena interno-media komende dwarsverbinding en loopt dan eveneens tot aan den achterrand. In de area analis, nabij de vena interno-media, bevindt zich eene aan deze nagenoeg gelijke bijader, met welke zij door twee dwarsverbindingen samenhangt, waardoor eene langwerpige cel ontstaat, die aan het wig-vormige vakje van den vleugel der Caraboiden analoog schijnt te zijn. De vena analis is gewoon. De achterrand is niet bewimperd en er is geen basaal-lobje afgescheiden. Bij *Aglenus* ontbreken de vleugels. — Prosternum alleen bij de *Murmidiini* met eene kin-voorzetting, welke den mond van onderen bedekt. — Achterlijf door de dekschilden geheel bedekt, met 5-, zeer zelden met 6-1) sterniten, van welke geen van allen of alleen de eerste twee niet over elkaar verschuifbaar zijn; bij de *Teredini* en *Murmidiini* zijn zij allen onderling beweegelijk. — Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren meestal gesloten, bij *Colobicus* en *Orthocerus* open. Voorcoxae kogelvormig, meestal door het prosternum gescheiden, bij de *Teredini* tegen elkaar aanstaande. Achtercoxae verbreed. Alle tarsen met 4 gewone leedjes. — Kevers en larven leven achter boomschors, in de gangen der *Tomiciden*, of in boomzwammen en rottend hout; eene enkele (*Murmidius*) in waren, als rijst en gedroogde appelen, eene andere (*Aglenus*) in schimmellend hooi, oude zemelen, rim van broeibakken enz. — De larven zijn lang gestrekt, geheel vleezig of met hoorn-achtige thoracaal-platen bezet, met 4-ledige sprieten, met 5-ocellen aan weerszijden van den kop en korte pooten met één enkelen klauw. Zij leven voor het merendeel van roof. — Deze familie heeft eenige verwantschap met de *Trogositidae*, doch onderscheidt zich vooral door de 4-ledige tarsen; ook heeft zij door de *Murmidiini* eenige aansluiting aan de *Histeridae*.

Overzicht der Tribus.

- 1) De sterniten liggen in één vlak en zijn geen van allen, of alleen de eerste twee niet, over elkaar verschuifbaar. Voorhoeken van het halsschild, op de onderzijde, zonder sprietgroef. Prosternum zonder kin-voorzetting 2
- De sterniten liggen duidelijk dakpansgewijs over elkaar, de voorrand van elk volgend sterniet ligt dieper dan de achterrand van het voorafgaande en kan min of meer daaronder verschoven worden. Sprietwortel niet door den zijrand van den clypeus overdekt. Het eerste sterniet veel langer dan het tweede 7
- 2) Sprieten aan de zijden van den kop ingeplant, de wortel meer of minder (behalve bij *Aglenus*) door den zijrand van den clypeus overdekt. De voorcoxae altijd door het prosternum gescheiden 3
- Sprieten meer op den voorrand van den kop ingeplant, de wortel niet door den zijrand van den clypeus overdekt. De achtercoxae zeer ver van elkaar verwijderd. De voorcoxae van elkaar gescheiden. Kop zonder sprietgroeven 6
- 3) Sprieten vlak voor de oogen, of bij *Aglenus*, welke geene oogen heeft, vlak voor de daarvoor bestemde plaats ingeplant. 4
- Sprieten op eenigen afstand voor de oogen ingeplant. Onderzijde van den kop zonder sprietgroeven. Het eerste sterniet weinig of niet langer dan het tweede. 5
- 4) Eerste tarslid langer dan het tweede. Halsschild langer dan breed, soms zeer lang, naar voren niet versmald. Kop op de onderzijde langs de oogen met eene smalle sprietgroef. Lichaam in den regel met parallelle zijden, gewoonlijk zeer lang en smal; op de bovenzijde meer of minder glanzig, onbehaard. Sprietknots 3-ledig. Voorcoxae van elkaar gescheiden. Achtercoxae duidelijk van elkaar verwijderd. Schenen naar het uiteinde verbreed, de buiten-tophoek tandvormig uitgetrokken. 1. *Colydiini*.
- Eerste tarslid niet langer dan het tweede. Halsschild gewoonlijk verbreed, naar voren al of niet versmald, met enigszins vlak uitgebreiden en meer of minder duidelijk gekartelden zijrand; zelden nagenoeg zoo lang als breed, met kielvormige langslijnen en duidelijk gekartelden zijrand. Lichaam hetzij een weinig verbreed, of meer gestrekt, op de bovenzijde ruw en behaard. Sprietknots 1- of 2-ledig, de sprietwortel meer of minder duidelijk

1) Bij *Pleganophorus*.

- door de zijden van den clypeus bedekt. Achtercoxae dicht aaneenstaande. Schenen tamelijk smal, de buiten-tophoek niet tandvormig uitgetrokken. II. **Synchitini.**
- 5 Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren open. Schenen smal, gewoon, zonder einddoornen. De sprieten kunnen niet onder den kop teruggeslagen worden, en zijn naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Bovenzijde ruw behaard. Achtercoxae duidelijk, doch niet wijd uiteenstaande. III. **Orthocerini.**
- Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Schenen naar het uiteinde verbreed, met einddoornen, de buiten-tophoek tandvormig uitstekend. De sprieten kunnen naar omlaag bewogen worden, en hebben eene schijnbaar 1-ledige knots. Bovenzijde onbehaard. Achtercoxae wijd uiteenstaande. IV. **Pycnomerini.**
- 6 Trochanters geheel met de dijen versmolten. Halsschild over het midden gegroefd, aan de zijden niet gerand. Sprieten 11-ledig, met 2-ledige knots. Eindlid der tasters lang, geleidelijk toegespitst. V. **Bothriderini.**
- Trochanters duidelijk afgescheiden. Halsschild over het midden niet gegroefd, aan de zijden gerand. Sprieten 10-ledig, met 1-ledige knots. Eindlid der tasters klein, priemvormig. VI. **Cerylonini.**
- 7 Achtercoxae vrij dicht aaneenstaande, de voortzetting van het eerste sterniet daartusschen toegespitst. Voorcoxae tegen elkaar aanstaande. Sprieten dik, met 2-ledige knots. Lichaam lang-cylindervormig. VII. **Teredini.**
- Achtercoxae buitengewoon ver van elkaar verwijderd, de voortzetting van het eerste sterniet daartusschen recht afgeknot. Voorhoeken van het halsschild, op de onderzijde, met eene diepe groef tot opname der sprietknots. Prosternum met eene breede kin-voortzetting, welke den mond van onderen bedekt. Eerste sterniet met dijlijnen. Lichaam ovaal. VIII. **Muridiini.**

I. Tribus COLYDIINI.

- 1 Oogen aan den voorrand door eene voortzetting van den zijrand van den clypeus een weinig doorsneden. Achtercoxae slechts weinig van elkaar verwijderd. Halsschild met langsgroeven. Schildje duidelijk zichtbaar. 2
- Oogen ontbrekend. Achtercoxae iets meer uiteenstaande. Schildje niet zichtbaar. Halsschild niet gegroefd. Dekschilden verward bestippeld. 2. **Aglenus.**
- 2 Halsschild met ééne middengroef. Lichaam cylindervormig, zeer smal, ongeveer 6-maal zoo lang als breed. Dekschilden met diepe langsgroeven, waarin twee lijne stippellijnen, en vier scherp-kantige tusschenruimten. Het eerste sterniet zoo lang als het tweede. (Colydium.)
- Halsschild met twee middengroeven. Lichaam ongeveer viermaal zoo lang als breed. Dekschilden met lijne stippellijnen, zonder langscribben. Het eerste sterniet langer dan het tweede. 1. **Aulonium.**

II. Tribus SYNCHITINI.

- 1 Dekschilden met duidelijke langscribben en twee diepe stippellijnen in de tusschenruimten. Bovenzijde uiterst fijn neerliggend behaard. Kop op de onderzijde zonder sprietgroeven, slechts nabij de oogen met eene flauwe aanduiding ervan. Voorcoxae van elkaar gescheiden. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Sprietknots 2-ledig. Halsschild met kielvormig verheven langscribben. 3. **Ditoma.**
- Dekschilden zonder langscribben. 2
- 2 Sprieten 10-ledig met 1-ledige knots. Onderzijde van den kop met sprietgroeven. 3
- Sprieten 11-ledig, met 2-ledige knots. De sprietgroeven op de onderzijde van den kop zijn lang en verloopend schuin naar binnen. Halsschild met lijn gekartelden zijrand. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren open. (Colobicus.)
- 3 De sprietgroeven, op de onderzijde van den kop, zetten zich niet verder voort dan aan de binnenzijde der oogen. De zijden van het halsschild zwak afgezet en onduidelijk gekarteld. Kin gewoon. 4. **Synchita.**
- De sprietgroeven, op de onderzijde van den kop, zetten zich naar achteren rechtlijnig voort, veel verder dan aan de binnenzijde der oogen. De zijden van het halsschild breed afgezet en lijn gekarteld. Kin aan de zijden lobvormig uitgetrokken. (Cicones.)

III. Tribus ORTHOCERINI.

- Bevat slechts het genus 5. **Orthocerus.**

IV. Tribus PYCNOMERINI.

Bevat slecht het genus' (Pycnomerus.)

V. Tribus BOTHRIDERINI.

Bevat slechts het genus (Bothrideres.)

VI. Tribus CERYLONINI.

Bevat slechts het genus 6. Cerylon.

VII. Tribus TEREDINI.

De leedjes der sprietknots duidelijk van elkaar gescheiden en zeer weinig in grootte verschillend. Halsschild zonder langsindrakken. Voorrand van het prosternum gewoon. Schenen aan de buitenzijde zonder doortjes. Lichaam onbehaard (Teredus.)

Het tweede lid der sprietknots veel kleiner en grootendeels in het eerste opgenomen. Halsschild aan weerszijden van de basis met een langsindrak. Voorrand van het prosternum in eene kegelvormige punt uitgetrokken. Schenen aan de buitenzijde met doortjes. Lichaam met enkele borstelhaartjes bezet (Oxylaemus.)

VIII. Tribus MURMIDIINI.

Bevat slechts het genus 7. Murmidius.

I. Tribus COLYDIINI.

Colydium Fabr.

*Sprieten 11 ledig, met 3-ledige knots. Sprietgroeven aan de onderzijde van den kop oppervlakkig en kort. Bovenlip door den iets uitgebogen rand van den clypeus bedekt. Voorkaken verborgen, met gedeelden top. Achterkaken met twee lobben, de binnenste smal en kort, de buitenste veel langer, breed en aan het uiteinde gebaard. Eindlid der kaaktasters een weinig bijtormig, zoo lang als de twee voorafgaande leedjes. Eindlid der lipstasters lang-eirond, aan het uiteinde afgeknot. Tong breed, aan het uiteinde uitgerand en lang gebaard. Oogen aan den voorrand, door eene voortzetting van den zijrand van den clypeus een weinig doorsneden. Lichaam cylinder-vormig, zeer smal, ongeveer zesmaal zoo lang als breed, onbehaard. Halsschild met ééne middengroef en twee zijgroeven. Schildje duidelijk zichtbaar. Dekschilden met diepe langsgroeven, waarin twee fijne stippelrijen; bovendien vier scherpkantige tusschenruimten. Eerste sterniet zoo lang als het tweede. Achtercoxae slechts weinig van elkaar verwijderd. Schenen naar het uiteinde verbreed, met tandvormig uitgetrokken buiten-tophoek. Het eerste tarslid langer dan het tweede. — De soorten van dit genus leven achter boomschors. — De larve van *C. filiforme* is door Erichson en Ratzburg en de pop door Erichson beschreven.*

De twee Europeesche soorten komen ook in het aangrenzend gebied voor.

De leedjes der sprietknots ongeveer tweemaal zoo breed als de overige sprietleedjes. Halsschild nagenoeg dubbel zoo lang als breed. Kop over het midden meer of minder duidelijk in de lengte verheven. Dekschilden elk afzonderlijk aan het uiteinde afgerond. Lichaam zwart, tamelijk glanzig; sprieten, pooten en gewoonlijk ook de basis der dekschilden rood, zelden de dekschilden geheel roodbruin. Lengte 5–6½ mm. Kever en larve leven in de gangen van Tomiiden en Anobiiden, vooral in oude eiken en beuken. Niet int., doch overigens in geheel Europa. (*filiforme* F.)

De leedjes der sprietknots ongeveer driemaal zoo breed als de overige sprietleedjes. Halsschild ongeveer 1½ maal zoo lang als breed. Kop vlakker. Dekschilden aan het uiteinde gemeenschappelijk afgerond. Lichaam geheel zwart; sprieten en pooten roestrood, zelden de basis der dekschilden iets lichter of de dekschilden geheel roodbruin. Lengte 5–6½ mm. Vooral in sparren; ook in eiken en tamme kastanjes, zeldzamer in beuken. Niet int. In de omstreken van Hamburg (*elongatum* F.)

1. *Aulonium* Erichson.

Sprieten 11-ledig, met drie veel grootere eindleedjes, van welke de eerste twee stomp-driehoekig, het laatste kleiner en rond is. Bovenlip duidelijk uitstekend. Voorkaken met gewonen top, waarachter een stompe tand. Achterkaken als bij Colydium. Eindlid der kaaktasters cilindervormig, zoo lang als de beide voorafgaande leedjes te zamen. Tong breed, aan den top uitgerand en lang gebaard. Eindlid der liptasters nagenoeg cilindervormig. Oogen door eene voortzetting van den zijrand van den clypeus iets doorsneden. Lichaam ongeveer viermaal zoo lang als breed. Halsschild met twee middengroeven en bovendien eene groef aan weerszijden. Dekschilden met fijne stippellijnen, zonder langscribben. Het eerste sterniet langer dan het tweede. Voorste coxaal-holten van achteren gesloten.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam geheel roestgeel of licht roodbruin. Halsschild zoo lang als breed, met twee tamelijk fijne, sterk gebogen middengroeven, welke van af het midden naar voren dicht naast elkaar verlopen. Dekschilden met fijne stippelrijen, in de tussenruimten uiterst fijn en onduidelijk bestippeld. Lengte $4\frac{1}{2}$ —7 mm. Achter boomschors. Zeer zeldzaam. Een paar exemplaren, benevens eenige larven en poppen, bij Valkenburg, achter de schors van een esch, Juni. In Noord-Frankrijk op iepen, welke door *Scolytus* aangetast waren. De larve is door Westwood en W. Kolbe, de pop door W. Kolbe beschreven.

(sulcatum Oliv.) 1. *trisulcum* Fourcr.

2. *Aglenus* Erichson.

Sprieten 11-ledig, met 3-ledige knots. Sprietgroeven oppervlakkig aangeduid. Bovenlip aan den voorrand recht afgeknut. Voorkaken met gespleten top en daarachter met 3 tandjes aan den binnenrand. Achterkaken met twee, nagenoeg even lange, aan het uiteinde gebaarde lobben, van welke de buitenste iets breeder is dan de binnenste. Kaaktasters 4-ledig, het eindlid lang-eivormig. Eindlid der liptasters groot, eirond, aan het uiteinde afgeknut. Tong hoornachtig, aan het uiteinde recht afgeknut en met borstelhaaren bezet. Oogen ontbreken. Halsschild niet gegroefd. Schildje niet zichtbaar. Dekschilden verward bestippeld. Ongeveelengeld. Het eerste tarslid langer dan het tweede.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam langwerpig, gewelfd, licht roodbruin, glanzig, tamelijk fijn verward-, op het halsschild iets krachtiger bestippeld. Halsschild iets langer dan breed, naar voren iets verbreed, met rechte zijden. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het halsschild, naar het uiteinde iets versmald en gemeenschappelijk afgerond. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. In de run van broeibakken en looikuilen, in oude zemelen, beschimmeld hooi en soms in huizen en bakkerijen. Bij Nootdorp op eene boerderij, het geheele jaar door, gemeen onder schimmeld hooi, steenen, planken en in een trog voor paardenvoer; ook bij Berkel en Rotterdam. De larve en pop zijn door Rey beschreven 1. *brunneus* Gyllh.

II. Tribus SYNCHITINI.

3. *Ditoma* Herbst.

(*Synchitodes* Crotch, Reitter)

Sprieten 11-ledig, met 2-ledige knots. Kop op de onderzijde zonder sprietgroeven, slechts nabij de oogen met eene flauwe aanduiding ervan. Bovenlip uitgerand en bewimpeld. Voorkaken met twee-tandigen top. Achterkaken met twee hoornachtige lobben, de binnenste smal, aan het uiteinde met naar binnen gekromde, stekelige borstels bezet, de buitenste breeder, aan het afgeronde uiteinde dicht gebaard. Tong vlak uitgerand. Eindlid der kaaktasters kegelvormig, naar den scheef afgeknotten top iets versmald.

Halsschild zoo breed als de dekschilden, met kielvormig verheven langslijnen en duidelijk gekartelden zijrand. Dekschilden met duidelijke langscribben en met twee diepe stippelrijen in de tusschenruimten. Bovenzijde uiterst fijn neerliggend behaard. Voorcoxae van elkaar gescheiden. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Schenen met kleine, fijne einddoornen.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Halsschild aan weerszijden met twee langscribben. Bovenzijde dof zwart, uiterst fijn, neerliggend grijs behaard. Sprieten, pooten en twee groote vlekken op elk der dekschilden rood. Dikwerf zijn de dekschilden geheel (ab.c. *rufipennis* F.) of bij onuitgekleurde exemplaren het geheele lichaam roestrood. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Verbreid achter vermolmde boomschors, vooral van beuken. De larve en pop zijn door *Perris* beschreven. 1. *crenata* F.

4 Synchronita Hellwig.

(*Ditoma* Crotch, Reitter)

Sprieten 10-ledig, met 1-ledige knots. Bovenlip recht afgeknut. Voorkaken met gewonen top. Eindlid der kaaktasters groot, langwerpige-eirond, met langen, uitgetrokken, afgeknotten top. Kin gewoon. Tong iets uitgerand. De sprietgroeven op de onderzijde van den kop zetten zich niet verder voort dan aan de binnenzijde der oogen. De zijden van het halsschild zwak afgezet en onduidelijk gekarteld. Dekschilden zonder langscribben. Overigens als bij *Ditoma*. — De soorten van dit genus leven achter boomschors.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Halsschild veel breeder dan lang, de basis aan weerszijden scheef afgesneden, zoodat het midden duidelijk uitgezakt is, met onduidelijk gekartelde zijden en afgeronde achterhoeken. Dekschilden met borstelrijen, welke op de derde tusschenruimte naar de basis toe dubbel zijn; de stippellijnen zelf met onduidelijke, stoffine, neerliggende haartjes bezet. Lichaam lichter of donkerder roestkleurig of donkerbruin, dof; kop en halsschild bij lichte exemplaren gewoonlijk donkerder, de schouders der dekschilden lichter gekleurd; sprieten en pooten rood. Kleine zwarte exemplaren vormen de ab.c. **obscura* Redt. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel roestkleurig. Lengte $2\frac{1}{2}$ —4 mm. Zeer zeldzaam. Achter schors van oude wilgen, ook van *Carpinus* en in elzenzwammen. De gedaanteverwisseling heeft plaats in Mei en Juni. Axel en Doetinchem. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. De ab.c. *obscura* in Oldenburg uit beukenhout gekweekt. Over de larve bericht Nördlinger.

1. *juglandis* F.

Cicones Curtis.

Sprieten 10-ledig, met een kogelvormigen, iets samengedrukten, 1-ledigen eindknop. Bovenlip een weinig afgerond. Eindlid der kaaktasters groot, langwerpige-eirond, met iets langer uitgetrokken en afgeknotten top. Kin aan de zijden lobvormig uitgetrokken. Tong van voren afgerond. De sprietgroeven op de onderzijde van den kop zetten zich naar achteren rechtlijnig veel verder voort dan de binnenzijde der oogen. Halsschild aan de zijden breed afgezet. Schenen met kleine, fijne einddoornen.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild breeder dan lang, nagenoeg zoo breed als de dekschilden, met eenige ondiepe groefjes. Dekschilden met onduidelijk bestippelde langsstrepen, de afwisselende tusschenruimten iets meer verheven. Bovenzijde donkerbruin, door dikke, neerliggende borstelhaartjes, welke op de dekschilden eenige dwarsbanden vormen, vlekkelig geschakeerd; de meeste haarvlekjes en handen op de dekschilden staan op een roestkleurigen grond. Sprieten, schenen en tarsen roestrood. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Achter afgestorven boomschors, vooral van dennen; ook in beukenmolm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf; in België bij Brussel. (*variegatus* Hellw.)

Colobicus Latreille.

Kop op de onderszijde met schuin naar binnen gerichte, lange, diepe sprietvoeten. Sprietten 11-ledig, met 2-ledige knots. Voorkaken met twee-tandig uiteinde. Kinplaat met schief naar buiten gerichte zijlobben. Halsschild met fijn gekartelden zijrand, zonder langskiel. Dekschilden zonder langscribben. Voorste coxaal-holten van achteren open. Schenen met kleine, fijne einddoornen.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam elliptisch. Halschild met tamelijk breede, vlak afgezette zijden en afgeronden, zeer fijn gekartelden zijrand. Dekschilden met stippellijnen. Bovenzijde bruinzwart, dof, eenigszins ruw korrelig en hier en daar met neerliggende, schubachtige haartjes, welke gedeeltelijk vlekjes vormen. Sprietten, pooten en de afgezette zijrand van halsschild en dekschilden roestkleurig. Lengte 4 $4\frac{1}{2}$ mm. Achter de schors van oude iepen en lindes. Niet inlandsch. In Westfalen. De larve is door *Perris* beschreven.

(*cemarginatus* Er.) (*marginatus* Latr.)

III. Tribus ORTHOCERINI.

5. **Orthocerus Latreille.**

(*Sarrotrium* Ill.)

Bovenlip iets uitgerand en bezwimperd. Voorkaken zeer verborgen, met stompen, twee-tandigen top. Achterkaken met twee hoornachtige lobben, de binnenste met een hoornhaak en kromme stekels; de buitenste iets breeder, doch even lang, aan het uiteinde afgeknot en naar binnen gebaard. Tong iets uitgerand. Eindlid der kaaktasters groot, eivond, aan het uiteinde afgeknot. Eindlid der liptasters eveneens groot, eivond, doch toegespitst. De sprietten kunnen niet onder den kop teruggeslagen worden; zij zijn naar het uiteinde geleidelijk en sterk verdikt, 10 ledig, borstelig; de basis door den zijrand van den clypeus bedekt. Geen sprietgroeven. Oogen grof gefacetteerd. Bovenzijde ruw behaard. Halsschild met eene middengroef. Geveleghel Gewrichtsholten der voortcoxae van achteren open. Schenen smal, zonder einddoornen. — De soorten van dit genus leven op droge, zandige plaatsen onder steenen, mos en tusschen gras.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam grauwwaart, dof; de eerste twee sprietleedjes, evenals de kop en de zijden van het halsschild grijs behaard; de overige leedjes fluweelachtig-zwart met lange opstaande haren; het eindlid aan het uiteinde wit, de sprietknots naar het uiteinde versmald. Halsschild naar voren duidelijk versmald, over het midden met twee stompe, kielvormige langsverhevenheden, welke achter het midden dichter bij elkaar verloop; daartusschen eene diepe langsgroef. Dekschilden met dubbelrijen van krachtige stippels, wier tusschenruimten, alsook de naad, kielvormig verheven zijn; de twee buitenste langscribben vereenigen zich voor het uiteinde. Lengte 2 $\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{2}$ mm. In sommige jaren gemeen in de duinstreken op het barre zand en onder steenen, vooral in den morgenstond na regen, April tot Sept.; ook bij Soest, Doorn en Renkum in de nesten van *Formica rufa*. De larve en pop is door *Rupertsberger* beschreven (*clavicornis* L.) **muticus** L.

IV. Tribus PYCNOMERINI.

Pycnomerus Erichson.

De sprietten kunnen naar omlaag bezwogen worden; zij zijn 11-ledig, het eindlid is zeer klein en grootendeels in het voorafgaande ronde lid opgenomen, waardoor de eindknop 1-ledig schijnt. Voorkaken kort, sterk gebogen. Achterkaken met twee smalle, nagenoeg even lange lobben, de buitenste breeder en aan het uiteinde behaard, de

binnenste aan den binnenrand met stekelborstels bezet. Kaaktasters draadvormig; het eindlid eivormig, langer dan de voorafgaande ledjes. Tong hoornachtig, zwak uitgerand. Bovenzijde onbehaard. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Schenen naar het uiteinde verbreed, met eindhooften; de buiten-tophoek tandvormig uitstekend.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam langwerpig, lichter of donkerder roodbruin of roestrood, eenigszins glanzig. Halschild iets breeder dan lang, naar voren eenigszins verbreed, met dik gerande zijden, grof bestippeld en met twee onduidelijke langsindrukken op het midden. Dekschilden eenigszins gewelfd, aan het uiteinde iets uitgetrokken en uitgehold; met dicht naast elkander staande, diepe langstrepen, waarin vierkante stippels; de tusschenruimten als smalle langsribben, met eene zeer fijne stippelij. Lengte $3\frac{1}{2}$ –4½ mm. Achter eikenschors. Niet incl. In de Rijnprov. bij Boppard (terebrans Oliv.)

V. Tribus BOTHRIDERINI.

Bothrideres Erichson.

Sprieten meer op den voorrand van den kop ingeplant, de basis niet door den zijrand van den clypeus bedekt; 11-ledig, met 2-ledige knots. Bovenlip grootendeels onder den clypeus verborgen, van voren zwak uitgerand en sterk bewimpert. Voorkaken aan het uiteinde met 3 stompe tandjes. Achterkaken met twee aan het uiteinde behaarde lobben, de buitenste langer en breeder, de binnenste aan het uiteinde van eenen hoornhaak voorzien. Eindlid der tasters lang, geleidelijk toegespitst. Tong hoornachtig, van voren afgerond en dicht bewimpert. Geen sprietgroeven. Halschild over het midden gegroefd, met indrukken; aan de zijden niet gerand. Trochanters geheel met de dijnen versmolten. De coxae der voor- en achterpoten ver van elkaar verwijderd. Tarsen 4-ledig.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Kop veel smaller dan het halsschild. Halsschild naar achteren sterk versmald, grof en dicht, eenigszins langsrimpelig bestippeld; met twee voor elkaar staande, door eene min of meer verdiepte, gladde tusschenruimte samenhangende, groote, diepe indrukken en ongerande zijden. Dekschilden breeder dan het halsschild, met regelmatige, fijne stippellijnen, breede, gladde tusschenruimten en in rijen behaard; de naad aan weerszijden ingedrukt en daardoor iets dakvormig opgericht; de derde, vijfde en zevende tusschenruimte met enkele fijne, in rijen geplaatste stippeltjes. Lichaam roestrood of roodbruin, gewoonlijk de naad en meestal ook de randen der dekschilden zwartachtig. Lengte 4–4½ mm. Vooral aan wilgen en populieren, in de boorgaten van Ptilinen en Anobiiden. Niet incl., doch overigens in geheel Europa. (contractus F.)

VI. Tribus CERYLONINI.

6. Cerylon Latreille.

Sprieten 10 ledig, met 1-ledigen, aan het uiteinde geringden eindknop. Bovenlip duidelijk zichtbaar, in het midden iets uitgerand. Voorkaken klein, sikkelvormig, aan den top gespleten en daarachter gekorven. Achterkaken met twee lange, smalle lobben. Eindlid der tasters klein, priemvormig. Halsschild over het midden niet gegroefd, aan de zijden gerand. Trochanters duidelijk afgescheiden. — De soorten van dit genus leven achter boomschors. — De larve van *C. histeroides* is door Erichson en Perris, de pop door Perris beschreven.

Van de 12 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

1. Sprieten zeer dik en plomp, het vierde tot zevende lid sterk verbreed. Halsschild aan weerszijden van de basis met een breeden indruk, welke zich soms naar voren iets voort-

et; ongeveer zoo lang als breed, bij het ♂ naar voren weinig of niet-, bij het ♀ iets versmald. Naadstreep der dekschilden naar het uiteinde sterk verdiept, de overige langsstrepen naar het uiteinde fijner. Lichaam pekzwart of pekbruin, een weinig gewelfd, eenigszins vetglanzig. Spriet en pooten rood. Overigens aan *histeroides* gelijk, bij welke de spriet en pooten dunner en de basaal-indrukken van het halsschild veel kleiner zijn. Lengte 2—2½ mm. Niet inl. In Oldenburg (fagi Bris.)

Spriet en pooten vrij dun, het vierde tot zevende lid weinig of niet verbreed; de knots smaller . . . 2

- 2 Halsschild bij het ♀ van af de basis-, bij het ♂ van af iets vóór het midden een weinig naar voren versmald, met kleine basaal-indrukken. Dekschilden iets gewelfd, in 't midden duidelijk buikig verbreed, de langsstrepen nabij het uiteinde nagenoeg geheel verdwenen; de naadstreep naar het uiteinde sterk verdiept. Lichaam glanzig, pekzwart, pekbruin of roodbruin, de spriet en pooten rood; zelden het lichaam geheel roestrood. Het ♂ is iets korter, iets meer gewelfd en krachtiger bestippeld dan het ♀. Lengte 2—2½ mm. Gemeen achter boomschors, vooral van beuken en dennen; ook in houtmolen; soms in groot aantal bij *Formica rufa*. 1. *histeroides* F.

Halsschild met parallele zijden en slechts van voren iets afgerond-versmald. Dekschilden vlak, in het midden slechts weinig of niet afgerond; de langsstrepen nagenoeg tot aan het uiteinde duidelijk doorlopend. Lichaam roestrood 3

- 3 De naadstreep tot aan het uiteinde sterk verdiept. Halsschild met parallele zijden. 4

De naadstreep aan het uiteinde weinig of niet verdiept. Halsschild naar de basis iets-, doch naar voren niet versmald, met zeer onduidelijke basaal-groefjes. Lengte 1½—2 mm. Achter de schors van populieren en soms in beukenstronken. Roermond en Arnhem, Juli. In België bij Tervueren 2. *deplanatum* Gyll.

- 4 Dekschilden met tamelijk fijne stippellijnen. Halsschild aan weerszijden van de basis met een zwakken indruk, bij het ♂ niet-, bij het ♀ duidelijk langer dan breed. Lengte 1½—2 mm. Achter boomschors, vooral van beuken en berken. Arnhem en Winterswijk, Juli. In België bij Groenendaal en Hambeek. In de Rijnprov. bij Crefeld.

(? ferrugineum Steph.) 3. *angustatum* Er.

Dekschilden met diepe langsstrepen, waarin zeer dicht staande, fijne stippeltjes; over den rug meer neergedrukt. Halsschild aan weerszijden van de basis met een diepen indruk. Lengte 2 mm. Niet inl. In België en Westfalen (*impressum* Er.)

VII. Tribus TEREDINI.

Teredus Shuckard.

Spriet 11-ledig, dik; de beide leedjes der knots duidelijk van elkaar gescheiden en zeer weinig in grootte verschillend; de wortel niet door den zijrand vanden clypeus overdekt. Borenlijp recht afgesneden. Voorkaken aan het uiteinde met drie stompe tandjes. Achterkaken met twee lobben, de binnenste smal, de buitenste breeder en langer, beiden aan het uiteinde behaard. Tong aan weerszijden tot eene bewimperde, vliezige lob verbreed. Lichaam onbehaard, lang-cylindervormig. Halsschild zonder langsinndrukken. Voorrand van het prosternum gewoon. Voorcoxae tegen elkaar aanstaande. Achtercoxae vrij dicht aaneenstaande, de voortzetting van het eerste sterniet daartusschen toegespitst. Eerste sterniet veel langer dan het tweede. Schenen aan de buitenzijde zonder dooruitjes.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Deze soort heeft den habitus van *Colydium*, doch is op de bovenzijde geheel effen; cylindervormig, glanzig zwart, de dekschilden soms meer pekbruin, de spriet en pooten rood. Kop en halsschild fijn en dicht bestippeld. Halsschild ongeveer 1½ maal zoo lang als breed. Dekschilden driemaal zoo lang als te zamen breed, met uiterst fijne stippellijnen. Lengte 4 4½ mm. Achter beukenschors. Niet inl. In de Rijnprov. bij Düsseldorf; ook in Westfalen (*nitidus* F.) (*cylindricus* Oliv.)

Oxylaemus Erichson.

Dit genus onderscheidt zich van *Teredus* vooral door den vorm der spriet, het naar voren kegelvormig uitgetrokken prosternum en de gedoornde schenen. Spriet

met schijnbaar 1-ledigen eindknop, daar het zeer kleine laatste lid grootendeels in het tiende is opgenomen. Halsschild aan weerszijden van de basis met een langsindruk. Lichaam met enkele borstelhaartjes bezet. Schenen aan de buitenzijde van doortjes voorzien. Achtercoxae weinig van elkaar verwijderd. — Van de larve van de niet in ons gebied voorkomende *O. variolosus* Dufour wordt iets bericht door Scriba.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam smal, cylindervormig, roestrood of roodbruin, glanzig. Halsschild langer dan breed, zeer grof en niet zeer dicht bestippeld, met twee kleine, diepe groefjes vóór het schildje en aan weerszijden van de basis met een tot op ruim een derde van de lengte van het halsschild doorlopend langsgroefje. Dekschilden ongeveer $2\frac{1}{2}$ maal langer dan-, doch zoo breed als het halsschild, met krachtige stippelrijen, welker stippels iets minder grof zijn dan die van het halsschild. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Op eiken, in de gangen van *Xyleborus monographus*. Niet inl. In de Rijnprov. bij Düsseldorf (cylindricus Panz.)

VIII. Tribus MURMIDIINI.

7. Murmidius Leach.

(Ceuthocerus Germ.)

Sprieten kort, 10-ledig, in open groeven vóór de oogen ingeplant, in welke het dikke wortel-lid ingelegd wordt; met eenigszins kogelvormige, twee-ledige knots. Voorhoeken van het halsschild op de onderzijde met eene diepe groef tot opname van de sprietknots. Lichaam ovaal, min of meer lang-vierhoekig, eenigszins gewelfd. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, naar voren versmald, de achterrand tweemaal gebogen. Prosternum met eene breede kin-voortzetting, welke den mond van onderen bedekt. Metasternum zeer groot, dicht tegen het zeer breede mesosternum aansluitend. Achtercoxae buitengewoon ver van elkaar afstaande, de voortzetting van het eerste sterniet daartusschen recht afgeknut. Op de onderzijde van het halsschild en op de epipleuren der dekschilden bevinden zich ondiepe groeven tot opnemng der dijen. Achterlijf geheel door de dekschilden bedekt, met 5 sterniten; het eerste sterniet zoo lang als de drie volgende te zamen, met dijlijnen. Pooten terugtrekbaar, met in 't midden naar buiten verbreedde schenen en 4-ledige, dunne tarsen.

De eenige bekende soort, welke in habitus iets aan een kleinen *Scymnus herinerti* en in enkele opzichten verwantschap vertoont met de *Histeriden*, komt ook in Nederland voor.

Halsschild aan weerszijden tegen den voorrand met een diepen langsindruk en meer naar het midden nabij den voorrand met eene korte, lijne langlijn. Dekschilden zeer fijn behaard, met tamelijk fijne stippelrijen. Lichaam roodbruin, kop en halsschild soms iets donkerder. Lengte $1-1\frac{1}{4}$ mm. Deze naar het schijnt geïmporteerde soort werd bij ons waargenomen in rijst, gedroogde appelen en verschillende Oost-Indische plantenstoffen; ook zou zij aangetroffen zijn in galnoten, pakhooi en, volgens Rye, zelfs in dorre bladeren (ferrugineus Leach) 1. *ovalis* Beek.

XXVIII. Familie LATHRIDIIDAE.

Deze familie bevat zeer kleine, langwerpige of min of meer eironde, in den regel weinig gewelfde kevertjes, welke onder rottende plantenstoffen, aan schimmel, in oud stroo en achter boomstochs leven. Enkelens zijn door waren over de geheele aarde verbreid en eenige weinige soorten leven bij mieren 1). — Clypeus niet door eene dwarslijn van het voorhoofd gescheiden, bij de *Merophysini* wel. — Sprieten 11-ledig, met meer of minder duidelijk afgescheiden, 3-ledige knots; bij uitzondering is de knots slechts 2-ledig (*Coninomus constrictus*), of wel 10-ledig met een grooten, 1-ledigen, geringden eindknop (*Anommatus*); bij *Holoparamesus* zijn de sprieten hetzij in beide seksen 11-ledig, of bij het ♂ 9- en bij het ♀ 10-ledig, met 2-ledige knots; zij staan of vóór de oogen onder den zijrand van den kop (*Holoparamesus*), of meestal aan weerszijden vooraan boven op het

1) O.a. het Zuid-Europeesche genus *Merophysia*.

voorhoofd; bij *Dasycerus* zijn zij haarlijn en naar het uiteinde lang bewimperd. Geen sprietgroeven. — Bij *Anommatus* ontbreken de oogen. — Bovenlip meestal afgeknot, of ook wel afgerond, of uiterst zwak uitgerand. Voorkaken aan het uiteinde gewoon, doch veelal met 2-tandigen top; bij de *Lathridiini* eenigszins vliezig. Achterkaken meestal 1-lobbig, zeldzamer 2-lobbig (*Merophysiini* en *Dasycerini*). Kaaktasters 4-ledig, de lipstasters 3-, soms 2-ledig (*Lathridiini*). Tong en paraglossen zeer verschillend gevormd. — Dekschilden aan het uiteinde afgerond, soms een weinig snavelachtig uitgetrokken (*Lathridius lardarius*), minstens van stippellijnen voorzien. — Achterlijf met 5-, bij het ♂ van *Corticaria* met 6 vrij bewegelijke sterniten; bij *Melanophthalma* in beide seksen, met 6 sterniten. — De bovenzijde van het lichaam is meestal meer of minder ruw of oneffen, bij de *Merophysiini* daarentegen glad. — Gevleugeld, behalve bij *Anommatus*. De vleugels van *Enicmus minutus* zijn volgens *Roger* langgestrekt en smal; het gewricht iets vóór het midden gelegen; het groote topgedeelte vertoont, behalve eene door eene pigmentstreep aangeduide straalader, geene aderen. De achterraand is tot aan het gewricht bewimperd. De vena externo-media is recht. Het basaal-gedeelte der area externo-media is grooter dan de rest van het basaal-gedeelte van den vleugel, slechts met zeer flauwe aanduiding van teruglopende takken. Het topgedeelte van de vena externo-media is zeer kort, daarnaast in de area interno-media eene ovale pigmentvlek. De vena interno-media is gewoon, zonder bijaders of dwarsverbindingen. De achterraand vertoont op de plaats van de uitmonding der vena externo-media eene inkerving en is over de geheele lengte bewimperd, zonder basaal-lobje. — Voorcoxae kogelvormig, dicht bijeenstaande of slechts door eene fijne kiel gescheiden; min of meer in de gewrichtsholten ingesloten. Alle tarsen slechts 3-ledig. — De *Lathridiidae* zijn het naast verwant aan de *Colydiidae* en *Monotomidae*, alsook aan de *Mycetacidae*. Volgens *Burmeister* staan de *Lathridiidae* in de nabijheid der *Trogositidae*, *Tritomidae* enz. Volgens *J. Redtenbacher* maakt de gereduceerde nervatuur der kleine vleugels het echter onmogelijk, de verwantschap in de nervatuur te onderzoeken.

Overzicht der Tribus.

- 1 Voorhoofd zonder eigenaardige sculptuur, slechts tussehen de sprieten met eene fijne, half-cirkelvormige dwarslijn. Sprieten 8- 1), of 10-ledig, zeer zelden 11-ledig; met 1- of 2-ledige knots 1. **Merophysiini.**
 Voorhoofd met zeer verschillende sculptuur, van den clypeus niet door eene gebogen dwarslijn afgescheiden. Sprieten 11-, zelden 10-ledig 2); met 2- of 3-ledige knots 3). 2
- 2 Voorcoxae meer of minder door eene voortzetting van het prosternum van elkaar gescheiden. Kop nagenoeg altijd met een meer of minder duidelijk langsgroefje 4). Halsschild aan de zijden gaafrandig. Lichaam glad of slechts met rijen van korte borstelhaartjes. Dekschilden veelal met langsribben II. **Lathridiini.**
 Voorcoxae tegen elkaar aanstaande. Kop zonder middengroef. Halsschild aan de zijden getand of zeer lijn gekarteld. Lichaam nagenoeg altijd behaard 3
- 3 Sprieten haardun, aan het uiteinde lang bewimperd. Bovenzijde met langsribben III. **Dasycerini.**
 Sprieten gewoon, niet haardun. Bovenzijde zonder ribben IV. **Corticariini.**

I. Tribus MEROPHYSIINI.

- Sprieten vóór de oogen, onder den zijrand van den kop ingeplant. Halsschild hartvormig. Dekschilden eivormig of elliptisch, zonder stippellijnen, gewoonlijk met eene naadstreep. 1. **Holoparamecus.**
 Sprieten aan weerszijden boven op het voorhoofd ingeplant. Geen oogen. Halsschild min of meer vierkant. Dekschilden met parallele zijden en met stippellijnen. . . 2. **Anommatus.**

II. Tribus LATHRIDIINI.

- 1 Halsschild over het midden met twee fijne, kielvormige langslijnen 2
 Halsschild zonder kielvormige langslijnen over het midden 3

1) Bij het Zuid-Europesche genus *Merophysia*.

2) Bij de Zuid-Europesche genera *Migneauxia* en *Metophthalmus*.

3) Slechts *Metophthalmus* en eenige *Continuus*-soorten hebben eene twee-ledige knots.

4) Behalve het genus *Revelieria*.

- 2 De sprietknots niet scherp van het overige gedeelte der sprietten afgescheiden, hare leedjes geleidelijk verbreed. De slapen zeer klein of bijna onzichtbaar 3. **Lathridius**.
 De sprietknots duidelijk afgescheiden. De slapen groot en tamelijk lang 4. **Coninomos**.
 3 Halsschild in het midden met eene meer of minder duidelijke langsgroef. Sprietknots in den regel niet scherp van het overige gedeelte der sprietten afgescheiden, hare leedjes meer of minder geleidelijk verbreed 5. **Enicmus**.
 Halsschild zonder langsgroef, soms met een dwarsgroefje vóór de basis. Sprietknots duidelijk afgescheiden, hare eerste twee leedjes van gelijke breedte 6. **Cartodere**.

III. Tribus DASYCERINI.

Bevat slechts het genus (Dasycerus.)

IV. Tribus CORTICARINI.

- Achterlijf bij het ♀ met 5-, bij het ♂ met 6 sterniten. Metasternum over het midden met eene langsgroef. Halsschild aan de zijden fijn getand of gekarteld. Lichaam meer of minder gestrekt, de dekschilden elliptisch, van tamelijk gelijke breedte 7. **Corticaria**.
 Achterlijf in beide seksen met 6 sterniten. Metasternum zonder langsgroef. Halsschild aan den zijrand slechts uiterst fijn- en veelal onduidelijk gekarteld. Lichaam kort en gedrongen, de dekschilden meer eivormig 8. **Melanophthalma**.

I. Tribus MEROPHYSINI.

1. *Holoparamacus* Curtis.

*Sprietten vóór de oogen, onder den zijrand van den kop ingeplant, 9—11-ledig, met 2-ledige knots. Bovenlip afgerond. Voorkaken met twee-tandigen top en daarachter onduidelijk gekerwen. Achterkaken met twee lobben, de binnenste korter en zeer dun, aan het uiteinde en daarachter behaard; de buitenste breeder en langer, aan het uiteinde gebaard. Kaaktasters dik. Tong rliezig, van voren afgerond. Liptasters zeer kort en dik, 3-ledig, nauwelijks langer dan de tong. Voorhoofd, tusschen de sprietten, met eene fijne, half-cirkeelvormige dwarslijn. Halsschild hartvormig. Dekschilden eivormig of elliptisch, zonder stippelrijen, gewoonlijk met eene naadstreep. Dijen naar het uiteinde knotsvormig verdikt. Tarsen 3-ledig. — De soorten van dit genus zijn kleine, meestal roodgele kevertjes, welke in voorkomen eenigszins aan *Scydmaenus* herinneren: zij leven onder rottende plantenstoffen, in rijst en, naar het schijnt, ook onder steenen, die door het zeewater bespeld worden. — De larve van *H. Kunzei* is door Coquerel beschreven.*

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprietten in beide seksen 11-ledig, de twee leedjes der knots in vorm en grootte nagenoeg gelijk. Halsschild vóór de basis met twee breede bultjes, in de achterhoeken met eene kleine verheven plooi. Dekschilden met eene fijne naadstreep (Sub-gen. *Calyptobium* Aubé). De beide bultjes vóór de basis van het naar achteren zeer sterk versmalde halsschild hangen eenigszins samen, en zijn van voren door twee samenhangende groefjes begrensd. Geheel geel. Lengte 1 mm. In plantenafval (*caularum* Aubé)
 Sprietten bij het ♂ 9-, bij het ♀ 10-ledig. Halsschild aan de basis met twee verdiepte, aan weerszijden door eene diepe langsgroef begrensde dwarslijnen (Sub-gen. *Holoparamacus* isp.) 2
 2 Oogen klein, slechts een klein gedeelte van de zijden van den kop innemend. Dekschilden elliptisch, met eene uiterst fijne naadstreep. Lichaam roodgeel, fijn en onduidelijk bestippeld. Halsschild naar achteren minder sterk versmald dan bij *caularum*. Lengte 1 mm. Onder afval van broeibakken; ook in rijst. Rotterdam en Breda 1. **singularis** Beck 1)

1) Volgens den «Catalogus Coleopterorum Europae etc.» auct. v. Heyden, Reitter en Weise, 1891, zou *H. depressus* Curt. synoniem zijn aan *singularis* Beck; ik vermoed dat zulks eerder aan Kunze's Aubé het geval is, daar *depressus* Curt., evenals Kunze's, zeer groote oogen heeft, terwijl deze bij *singularis* zeer klein zijn.

Oogen groot, de zijden van den kop grootendeels innemend 3

- 3 Lichaam gestrekt, vlak, licht roodgeel, uiterst fijn en zeer onduidelijk bestippeld. Halsschild hartvormig, tamelijk breed, aan den voorrand nagenoeg zoo breed als de basis der langwerpige dekschilden; de langstrepen, aan weerszijden van de basis, het midden niet bereikend; met een duidelijk middengroefje en diepe dwarsgroeven aan de basis. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. In rijst en allerlei andere waren, ook in chocolade-tabletten, waarin ook de larve leeft. Bij Nootdorp op een boeren!, in Juni onder planken gemeen. Zierikzee, in een morille; ook bij Rotterdam en Breda. 2. **Kunzei** Aubé.

Lichaam ovaal, gewelfd, iets op een *Scydmacnus* gelijkend. Halsschild veel smaller dan de breed-civormige, gewelfde dekschilden; de langstrepen aan de basis diep, ongeveer de halve lengte van het halsschild bereikend; de dwarsgroeven aan de basis duidelijk en dicht bijeenstaande. Lengte ruim 1 mm. Niet inlandsch. In België en in de Rijnprovincie. 1)
(Ragusa e Reitter)

2. Anommatus Wesmael.

*Sprieten aan weerszijden boven op het voorhoofd ingeplant, 10-ledig, met eene groote, dikke, kogelronde, vóór het uiteinde geringde, 1-ledige knots. Geen oogen. Borenlip recht afgesneden. Voorkaken met vorksgewijs gedeelden top. Achterkaken met twee smalle, vrij lange lobben, de buitenste aan het uiteinde lang behaard, de binnenste smaller, met 3 lange doornen en fijne haartjes aan het uiteinde. Tong klein, hoornachtig, aan het uiteinde vliezig, bewimperd. Halsschild min of meer vierkant. Dekschilden met parallele zijden en grove stippelrijen. Ongevelegeld. Tarsen 3-ledig. — De soorten van dit genus, welke iets aan *Aglenus* herinneren, leven in de aarde, hetzij onder rottend hout of onder groote, in vochtigen, vetten leem- of kleibodem diep verzonken steenen.*

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halsschild vlak tegen de basis met eene diepe, smalle dwarsgroef, waarin meer of minder duidelijke stippels staan; daardoor de achterrand zelf eenigszins kantig opgericht. De basis der dekschilden gaafrandig. Kop zeer fijn en verspreid bestippeld en daartusschen zeer fijn dwars-rimpelig. Lichaam roestrood of geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Eenmaal te Leiden in een stadstuin onder beschimmeld hout. (pusillus Schauf. ex parte) 1. **duodecimstriatus** Müll.

Halsschild met gewonen achterrand. De basis der dekschilden nabij de schouders met twee tandjes, welke door stipvormige uitrandingen gevormd zijn. Kop zeer krachtig bestippeld, aan de zijden zeer fijn langsrimpelig. Overigens aan *duodecimstriatus* gelijk. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Eenmaal bij Zierikzee, in September, onder een rotten appel. In de Rijnprov. bij Elberfeld (pusillus Schauf. ex parte) 2. **basalis** Reitt.

II. Tribus LATHRIDIINI.

3. Lathridius Herbst.

Sprieten 11-ledig, aan de voorhoeken van den kop ingeplant, met niet scherp afgescheiden, 3-ledige knots, welker leedjes geleidelijk verbreed zijn. Kop met een meer of minder duidelijk langsgroefje en zeer kleine of bijna onzichtbare slapen. Borenlip zeer breed, van voren recht afgeknot. Voorkaken eenigszins vliezig, met fijnen top. Achterkaken 1-lobbig, de binnenste lob niet ontwikkeld of slechts als een langen haarbundel zichtbaar; de buitenste kort, breed, van buiten hoornachtig, van binnen vliezig, aan het uiteinde zeer lang-, aan den binnenrand korter behaard. Kaaktasters 4-ledig, het eindlid nagenoeg zoo lang als de beide voorafgaande leedjes te zamen. Tong hoornachtig, ter nauwernood van de kin onderscheiden en daarmede eene hoornachtige plaat vormende, welke zich van den achterrand af naar het midden geleidelijk verbreedt en daarna zich sterk naar voren versmalt; de voorrand is door een vliezigen

1) Deze soort schijnt meer in Zuid-Europa voor te komen, ik zeeffe haar uit plantenaafval in den botanischen tuin te Napels.

zoom begrensd; de hoeken zijn vliezig en bewimpeld. De liptasters schijnen slechts 2-ledig te zijn; het eerste lid is namelijk zeer klein, het tweede zeer groot, kort-cirond, aan het uiteinde afgeknot en vrij lang bewimpeld. Halsschild smaller dan de dekschilden, over het midden met twee fijne, kielvormige langslijnen, aan de zijden gaafrandig. Voorcoxae meer of minder door eene voortzetting van het prosternum gescheiden. Tarsen 3-ledig. — De soorten van dit genus leven onder vuilnis, tusschen beschimmelde plantenstoffen, achter boomschors, in dood riet en soms bij mieren. — De larve van *L. lardarius* is door de Geer en Westwood beschreven.

Van de 14 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden aan het uiteinde te zamen snavelachtig uitgetrokken. De grootste soort van het genus, roodachtig-geelbruin. Kop en halsschild zeer grof rimpelig bestippeld. Halsschild eenigszins vierhoekig, weinig of niet langer dan breed; de zijden nu eens meer, dan eens minder bochtig. Dekschilden aan de basis ongeveer dubbel zoo breed als het halsschild, met eenigszins lobvormig uitstekende schouderbuilen, krachtige stippellijnen en breede, veelal iets verheven tusschenruimten. Bij het ♂ zijn de voor- en middelschenen vrij sterk gebogen en kort vóór het uiteinde aan de binnenzijde van een klein, doch duidelijk tandje voorzien; daarvoor bij de voorschenen nog eene rij kleinere tandjes. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Gemeen onder plantenaafval, dorre bladeren en dood riet. 1. *lardarius* de G.
- Dekschilden gewoon, aan het uiteinde niet gemeenschappelijk toegespiest 2
- 2 Dekschilden met rijen van lijne, wirachtige borstelhaartjes. Halsschild langer dan breed, naar de basis iets versmald en aan de zijden tweemaal gebogen, met lobvormige naar buiten uitstekende voorhoeken. De afwisselende tusschenruimten der strepen op de dekschilden nu eens meer, dan eens minder verheven, doch nimmer zoo scherp kielvormig als bij *alternans* of *rugicollis*. Geheel roodbruin of roestrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet zeldzaam, onder plantenaafval en mos (*angulatus* Mannrh.) 2. *angusticollis* Gylh.
- Dekschilden geheel kaal, zonder borstellijnen 3
- 3 De afwisselende tusschenruimten der dekschilden niet- of slechts weinig meer verheven dan de anderen. Dekschilden gestrekt, met zeer grove stippellijnen. Deze soort houdt het midden tusschen *lardarius* en *angusticollis*; van eerstgenoemde onderscheidt zij zich door de geringere grootte, het minder vlakke, naar achteren meer versmalde halsschild, welks voorhoeken nog meer lobvormig uitsteken, en welks zijden in 't midden dieper uitgebogen zijn; verder door de aan het uiteinde niet spits uitgetrokken dekschilden, welke tusschenruimten der stippellijnen aan de basis sterker verheven zijn. Van *angusticollis* onderscheidt zij zich door het ontbreken der borstellijnen op de dekschilden, het kortere, naar achteren duidelijk versmalde halsschild en de plompere gedaante. Roodbruin of roestrood. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In België, in de Rijnprov., bij Hamburg en Dortmund. (*angusticollis* Mannrh.) (*Pandellei* Bris.)
- De afwisselende tusschenruimten der dekschilden scherp kielvormig verheven 4
- 4 Halsschild nagenoeg zoo lang als van voren breed, met bochtige zijden en onmiddelijk achter het midden ingesnoerd. Deze soort is nagenoeg zoo groot als *lardarius* en evenzoo gekleurd. Dekschilden elk met drie sterk kielvormig verheven langribben en een verheven naad; de buitenste langsrib eindigt achter het midden. Doordat het negende sprietlid slechts weinig grooter dan het achtste en veel smaller dan het tiende is, schijnt de sprietknots slechts twee-ledig te zijn. Bij het ♂ zijn de voorschenen zwak, de middelschenen daarentegen veel sterker gebogen. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Achter eikenschors. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld (*alternans* Mannh.)
- Halsschild aan de zijden nagenoeg niet gebogen en niet ingesnoerd, hetzij vierkant met lobvormig uitstekende voorhoeken, hetzij iets breeder dan lang, naar de basis iets versmald en zonder lobvormig uitstekende voorhoeken 5
- 5 Halsschild vierkant, met nagenoeg evenwijdige zijden en lobvormig naar buiten uitstekende voorhoeken. Deze soort is naverwant aan *alternans* en evenzoo gekleurd, doch veel kleiner; de dekschilden korter en meer gedrongen. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. O.a. in schimmelend knaagsel van afgevallen pijnappels, die door eene *Ernobius*-soort bewoond waren. Niet inl. In de Rijnprov. bij Elberfeld en in Westfalen (*rugicollis* Oliv.)
- Halsschild iets breeder dan lang, naar de basis iets versmald, de voorhoeken niet lobvormig uitstekend, de langribben niet scherp aangeduid en van voren nagenoeg geheel uitgewischt. Dekschilden met langribben als bij *alternans* en *rugicollis*, de stippellijnen echter tot aan het uiteinde duidelijk. Lichaam roodbruin of roestkleurig, bij onuitgekleurde exemplaren geelachtig. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Te Leiden, in groot aantal, in eene oude dadelkist en onder dood hout in een stadstuin. 3. *Bergrothii* Reitt.

4. *Coninomus* Thomson.

Dit genus onderscheidt zich van *Lathridius* door de duidelijk afgescheiden, 2- of 3-ledige sprietknots en de zeer groote, tamelijk lange slapen. De zijden van het halsschild slechts achter het midden, doch hier zeer diep ingesnoerd; het midden van het halsschild met twee fijne, kielvormige langslijnen. — Levenswijze als bij *Lathridius*. — De ontwikkeling van *C. nodifer* is door Perris beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Sprietknots twee-ledig. Dekschilden zonder bultige verhevenheden; de afwisselende tussenruimten der diep bestippelde rijen iets meer verheven dan de anderen; slechts bij zeer kleine exemplaren zijn alle tussenruimten nagenoeg gelijk. Lichaam rood- of geelbruin, onbehaard, eenigszins glanzig. Halsschild iets achter het midden zeer sterk ingesnoerd, van voren met eene afgekorte langsgroef en aan weerszijden daarvan met eene fijne langskiel. Exemplaren met afwisselend sterk verheven tussenruimten der dekschilden werden als *carinatus* Gylh. beschreven. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam; in dakstroo, tegen muren, op vochtige planken en tusschen plantenafval. Doorn, Venlo en omstreken van Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken. (*incisus* Mannerh.) 1. **constrictus** Gylh.

Sprietknots duidelijk 3-ledig. Dekschilden driemaal in de breedte ingedrukt, de afwisselende tussenruimten der grof bestippelde rijen kielvormig verheven en hier en daar lange, bultige verhevenheden vormend. Lichaam zwartachtig of pekkbruin, bij onuitgekleurde exemplaren licht roodbruin of geel; sprieten en pooten in den regel roodbruin. Halsschild met een vliezig randzoom, welke bij enkele exemplaren zeer smal is en soms ontbreekt, achter het midden sterk ingesnoerd en met twee duidelijke, kielvormig verheven langslijnen over het midden. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet zeldzaam; door het geheele land tusschen afgevallen bladeren, achter boomschors en in mos; in Juli bij Bergen-op-Zoom, groote massa's onuitgekleurde exemplaren onder plantenafval. 2. **nodifer** Westw.

5. *Enicmus* Thomson.

Dit genus onderscheidt zich van de beide voorgaande genera door het ontbreken der kielvormig verheven langslijnen op het midden van het halsschild; in het midden berindt zich eene meer of minder duidelijke langsgroef, welke menigmaal in twee langsgroeffjes opgelost schijnt. Sprietknots in den regel niet scherp van het overige gedeelte afgescheiden, hare ledjes meer of minder geleidelijk verbreed. — Levenswijze als bij *Lathridius*. — De larve van *E. hirtus* is door Blisson, de larve en pop van *rugosus* door Letzner en de ontwikkeling van *minutus* door Kyber en Perris beschreven. Perris deelt ook iets mede over de ontwikkeling van *rugosus*.

Van de 11 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

1 Prosternum tusschen de voorcoxae niet kielvormig verheven. Derde sprietlid in den regel korter dan het vierde. Dekschilden met stippellijnen of diepe stippelrijen; de tweede tussenruimte aan de basis iets meer verheven dan de overigen (Sub-gen. *Conithassa* Thoms.) 2

Prosternum tusschen de voorcoxae kielvormig verheven. Derde sprietlid in den regel nagenoeg zoo lang als de nabijgelegen ledjes. Dekschilden gewoonlijk met tamelijk fijne, zelden verdiepte stippelrijen; alle tussenruimten meestal vlak, vóór het midden tegen de basis met een duidelijken, scheven indruk (Sub-gen. *Enicmus* isp.) 5

2 Dekschilden met langstrijen van opstaande haartjes. Lichaam zwart, kop en halsschild dof, de dekschilden eenigszins glanzig. Halsschild nagenoeg vierkant, zeer dicht rimpelig bestippeld, met eene diepe middengroef, nagenoeg rechte, sterk opgerichte zijden en aan weerszijden van de basis diep ingedrukt. Dekschilden met diepe stippelrijen. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ mm. In boleten en zwammen. Niet inl. In België en in de Rijnprov. (*hirtus* Gylh.)

Dekschilden onbehaard. Halsschild met eene ondiepe middengroef 3

- 3 De voorhoeken van het naar de basis versmalde halsschild naar buiten uitstekend, breed afgerond of scheef afgestompt, zeldzamer nagenoeg niet uitstekend; de zijden tamelijk recht. Dekschilden met diepe langsstrepen, waarin eenigszins vierkante stippels staan; de tussenruimten smal, de afwisselenden meer verheven. Eene in kleur, grootte en vorm zeer veranderlijke soort. Zwart, zwartbruin, bruin, roodbruin of bij onuitgekleurde exemplaren geelachtig; de sprieten en pooten roodachtig of geelbruin. Halsschild langer of korter, met eene oppervlakkig aangeduide langsgroef. Lengte $1\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Gemeen aan schimmel in kelders, tegen witte muren, tussen plantenafval, in stallen, enz. Ook schadelijk in droge plantenstoffen, o.a. te Oude-Pekela in Cichorei-wortels.

1. *minutus* L.

De voorhoeken van het halsschild niet uitstekend, de zijden parallel of min of meer afgerond. Dekschilden met gewone stippellijnen en minder verheven tussenruimten, van welke veelal slechts de tweede of ook nog de vierde iets meer verheven is 4

- 4 Halsschild nagenoeg vierhoekig, weinig of niet breder dan, zelden zoo breed als lang, met parallelle, rechte of iets afgeronde zijden en eene flauw aangeduide middengroef. Deze soort gelijkt overigens zeer op *minutus*. Dekschilden in de langsstrepen minder sterk bestippeld, de tussenruimten tamelijk breed en nagenoeg gelijkmatig en weinig verheven. Lichaam zwart, zwartbruin of roodbruin, de dekschilden veelal lichter gekleurd. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Aan beukenzwammen. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (*consimilis* Mannh.)

Halsschild sterk verbreed, veelal dubbel zoo breed als lang, naar de basis slechts iets versmald en daardoor van voren het breedst. Dekschilden kort en zeer breed, eivormig, naar het uiteinde eenigszins gewelfd, iets glanziger en in de langsrijen iets sterker bestippeld dan bij *consimilis*. Lichaam zwart, kop en halsschild soms roodbruin, de sprieten en pooten roestrood; veelal ook de dekschilden licht gekleurd. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. In de bergstreken van Noord- en Middel-Europa, aan beukenzwammen. Niet inl. In Oldenburg en in de Rijnprov. (*brevicollis* Thoms.) (*anthracinus* Mannh.)

- 5 Sprieten slank, de sprietknots niet scherp afgescheiden, hare leedjes geleidelijk verbreed en gewoon aangevoegd. 6

Sprieten kort, slechts tot aan het midden van het halsschild reikend; de sprietknots duidelijker afgescheiden, hare leedjes bijna even breed en aan ééne zijde aangevoegd, waardoor de sprietknots aan de andere zijde als gezaagd toeschijnt. Lichaam lang-gestrekt, met eenigszins parallelle zijden, dof zwart of pekbruin, bij onuitgekleurde exemplaren meer roodbruin. Sprieten en pooten roodachtig. Halsschild eenigszins hartvormig, dicht rimpelig bestippeld, met eene vrij diepe, afgekorte middengroef. Dekschilden elliptisch, met fijne stippelrijen en breede, vlakke tussenruimten. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Niet inl. In de Rijnprov., bij Hamburg en Hannover (*carbonarius* Mannh.) (*brevicornis* Mannh.)

- 6 Halsschild meer of minder vierkant of iets breder dan lang, doch nimmer duidelijk hartvormig; de zijden veelal iets afgerond, dicht rimpelig bestippeld, over het midden met eene zwak aangeduide langsgroef, aan de basis dwars ingedrukt. Dekschilden langwerpig-ovaal, in- of kort vóór het midden het breedst, met zeer duidelijke, veelal dichter opeenstaande, hier en daar verdiepte en tot aan het uiteinde zichtbare stippelrijen; de tussenruimten gewoonlijk zeer smal en iets verheven. Eene zeer veranderlijke soort. Roestrood of bruingeel, tamelijk glanzig. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren, op lage planten, gras en tussen schimmelende plantenresten. 2. *transversus* Oliv.

Halsschild in den regel sterk verbreed, naar de basis min of meer hartvormig versmald. Dekschilden met tamelijk lijne, naar het uiteinde bijna uitgewishte stippelrijen; de tussenruimten breed en vlak 7

- 7 Halsschild slechts iets hartvormig, met bijna gave zijranden 8

Halsschild breed, zeer duidelijk hartvormig, met zeer fijn gekartelde zijranden. Lichaam dof, bij sterke vergroting gezien, lijn netsgewijze geaderd, roestrood of licht roodbruin. Dekschilden kort en breed-ovaal, iets gewelfd, met fijne stippelrijen en breede, nagenoeg vlakke tussenruimten. Overigens veranderlijk in grootte, kleur en ontwikkeling der stippelrijen op de dekschilden. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam. Een paar malen bij St. Pieter (Maastricht), Juni. In België bij Groenendaal 3. *testaceus* Steph.

- 8 Lichaam eenkleurig zwart, de sprieten en pooten rood. Van de aanverwante soorten onderscheiden door het minder duidelijk hartvormige, minder verbreed halsschild, waarvan de zijden, vooral van voren, minder afgerond en smaller afgezet zijn; van *fungicola*, behalve door de geheel zwarte kleur, ook door de diepere middengroef op het halsschild. Van *brevicornis* is zij nog onderscheiden door de meer kort-eivormige gedaante, de glanzige dekschilden, het bredere halsschild en de langere sprieten. Het halsschild veranderlijk, nu eens iets breder dan lang (*planatus* Mannh.), dan eens ongeveer dubbel zoo breed als lang, het breedst vóór of in het midden. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Achter boom-

schors, op boomzwammen, in stofzwammen en in rieten daken. Arnhem, de Steeg, Doorn en Maarsbergen; Mei tot Aug. 4. **rugosus** Herbst.

Lichaam zwart of zwartbruin, de dekschilden evenals de sprieten en pooten roodbruin, zeer zelden geheel roestrood. Deze soort is het naast verwant aan *rugosus*, doch doorgaans iets grooter. Het halsschild vóór het midden eenigszins afgerond-verbreed en daar het breedst. Dekschilden als bij *rugosus* gestreept. Lengte $1\frac{5}{8}$ —2 mm. Eenmaal bij Zutphen gevangen. 5. **fungicola** Thoms.

6. *Cartodere* Thomson.

Sprieten 11-ledig, met duidelijk afgescheiden, 3-ledige knots, van welke de eerste twee ledjes even breed zijn. Halsschild zonder langsgroef, soms met een dwars-groefje vóór de basis. Dekschilden zeer lang, met uiterst grove stippelrijen, welke uit dicht bijeengeplaatste, groote, groefvormige stippels bestaan. Schenen iets, bij het ♂ sterker gebogen. — In schimmel, tusschen dorre bladeren en achter boomschors; ook in sigaren aangetroffen.

Van de 16 Europeesche soorten komen 6 in Nederland voor.

- 1 Halsschild van voren duidelijk smaller dan de dekschilden 2

Halsschild tamelijk breed, eenigszins hartvormig, van voren niet- of bijna niet smaller dan de dekschilden. 3

- 2 Dekschilden met duidelijk kielvormig verheven, afwisselende (waaronder ook de tweede) tussenruimten. Lichaam geheel roodbruin, uiterst fijn-, doch vrij lang en niet dicht behaard. Halsschild breder dan lang, met een dwarsindruk vóór de basis, eene breede langsgroef over het midden en eenigszins opgerichte zijden. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Eenmaal in sigaren. Ook in België. (*elegans* Reitt. olim, nec Aubé) 1. **Beloni** Reitt.

Op de dekschilden slechts de vierde tussenruimte, vooral naar de basis, de vijfde vooral naar het uiteinde duidelijk, de tweede daarentegen niet kielvormig verheven; met 6 grove stippelrijen, voor het uiteinde bultig gewelfd en de naad aan het uiteinde met eene langwerpige uitholling. Lichaam geheel roodbruin, roestrood of roodgeel. Kop en halsschild grof rimpelig bestippeld. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, langer dan breed, voor de basis meer of minder ingesnoerd en met een vliezigen zoom, welke veelal verloren gaat. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ mm. In aantal in een stadstuin te Leiden, in eene oude dadelkist en onder dood hout; ook bij Loosduinen in dakstroo. Zij zou ook bij verschillende mieren-soorten aangetroffen zijn 2. **elongata** Curtis.

Dekschilden elk met 7 grove, dicht aaneenstaande stippelrijen, de naad tot aan het uiteinde gewoon doorlopend; alle tussenruimten gelijkmatig en nagenoeg effen. Lichaam rood, de dekschilden donker of zwartachtig, bij ab. c. *concinna* Mannerh. het lichaam eenkleurig roestrood. Halsschild eenigszins veranderlijk in vorm, gewoonlijk zoo lang als breed, min of meer hartvormig, voor de basis ingesnoerd en met een vliezigen zoom, welke veelal verloren gaat. Lengte 1—1 $\frac{1}{2}$ mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam; achter boomschors, in beschimmeld hooi, soms ook in insecten-verzamelingen 3. **ruficollis** Mrsh.

- 3 Halsschild zonder middengroef. Sprietknots 3-ledig. 4

Halsschild met eene duidelijke middengroef op het voorste gedeelte en met eene diepe dwars-groef vóór de basis. Sprietknots 2-ledig. Lichaam roestrood of geelachtig-bruinrood. Dekschilden zeer lang en smal. Lengte $1\frac{2}{3}$ —1 $\frac{3}{4}$ mm. Eenmaal bij Amsterdam, Aug. 4. **filum** Aubé.

- 4 Oogen groot, daarachter zonder slapen. Deze soort gelijk zeer op *filiformis* en is nagenoeg even groot; het halsschild iets korter, van voren iets breder en aan de basis met drie samenhangende groefjes. Sprieten slanker. De dekschilden iets korter en de stippels der langrijen iets breder. Eenmaal bij Rhoon nabij Rotterdam, Juli. 5. **Argus** Reitt.

Oogen zeer klein, daarachter met duidelijke slapen. Halsschild eenigszins hartvormig, van voren zoo breed als de dekschilden, voor de basis dwars ingedrukt. Lichaam lang en smal, geelachtig-bruin of geelrood. Dekschilden met nagenoeg parallelle zijden, alle tussenruimten gelijkmatig verheven. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Vrij zeldzaam; tegen witgekalkte muren en onder stukken hout in tuinen. Ook in de nesten van *Vespa crabro*. 6. **filiformis** Gyllh.

III. Tribus DASYCERINI.

Dasycerus Brogniart.

Sprieten op het voorhoofd ingeplant, 11-ledig, met 4 grootere eindleedjes; de eerste twee leedjes zeer groot, kogelvormig, de volgende vijf zeer lang, haardun, aan het uiteinde iets verdikt, de laatste 4 korter, aan het uiteinde kogelvormig verdikt en lang bewimpert. Bovenlip van voren uiterst zwak uitgerand. Voorkaken met gewonen top, hoornachtig. Achterkaken met twee lobben; de buitenste half hoornachtig, vóór het uiteinde gebogen, iets langer dan de binnenste, aan het uiteinde en aan den binnenrand lang behaard; de binnenste hoornachtig, breed, aan den verdikten top van een scheef opzittend, eivormig, rimpelig vlak voorzien. Kaaktasters zeer lang, 4-ledig. Tong van voren vliezig, afgerond en met eenige lange borstelharen bezet. Liptasters 3-ledig. Halsschild met twee sterk kielvormige verhevenheden. Dekschilden eivormig, bultig opgericht, met verscheidene kielvormige verhevenheden. Voorcoxae tegen elkaar aanstootend. Achterlijf met 5 sterniten. Zijden van het lichaam bewimpert. Tarsen 3-ledig, de eerste twee leedjes kort, het klauwlied zeer lang.

Van de 5 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam bruin, geelbruin of geel. Kop driehoekig, aan weerszijden met eene groote, oornormige verhevenheid. Halsschild sterk verbreed, aan de zijden lobvormig uitgetrokken, over het midden met twee rijen sterk verheven bultjes. Dekschilden kort, gedrongen, met tandvormig uitstekende schouderhoeken en bewimperde zijranden; de eerste, nabij den naad verloopende langsrib aan de basis meer verheven en in den uitersten naadhoek eindigend, de tweede den achterrand geheel bereikend en evenwijdig aan de eerste loopend, de derde iets minder scherp aangeduid. Lengte 2 mm. In vochtige, beschaduwde bosschen onder mos en in molm van oude boomstronken; ook aan de wortels van beuken en tusschen droge bladeren. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken; ook in Westfalen.

(echinatus Arag.) (sulcatus Brogn.)

IV. Tribus CORTICARINI.

7. Corticaria Marsh.

*Sprieten 11-ledig, aan de voorhoeken van den kop ingeplant, met 3 grootere, tot eene knots vereenigde eindleedjes. Bovenlip van voren uitgerand, aan de zijden afgerond. Voorkaken hoornachtig, met twee-tandigen top en daarachter fijn gekorven. Achterkaken met eene enkele lob, de binnenste niet ontwikkeld en slechts als een haarbundel naar binnen uitstekend, de buitenste ternauwernood langer dan breed, van buiten hoornachtig, naar binnen vliezig, aan het uiteinde zeer lang-, aan den binnenrand korter behaard. Kaaktasters 4-ledig. Tong hoornachtig, nauwelijks van de kin onderscheiden en daarmede eene hoornachtige plaat vormend, welke zich vóór den achterrand in twee afgeronde hoeken sterk verbreedt en vandaar naar het uiteinde zich versmalt; de voorrand recht, de hoeken vliezig. Liptasters 2-ledig. Halsschild aan de zijden fijn getand of gekarteld. Lichaam meer of minder gestrekt. Dekschilden elliptisch, met tamelijk parallele zijden. Metasternum over het midden met eene langsgroef. Achterlijf bij het ♀ met 5, bij het ♂ met 6 sterniten. Tarsen 3 ledig. — De soorten van dit genus leven onder ruïnis, tusschen schimmelende bladeren, rottende plantenstoffen, in fungi, dakstroo en achter boomschors; ook worden velen van lage planten en gras geslept. — De ontwikkeling van *C. pubescens* is door Perris, de larve van *fulva* door Thévenet beschreven.*

Van de 37 Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 5 in het aangrenzend gebied voor.

1 Dekschilden met zeer dicht aaneenstaande, weinig duidelijke stippelrijen, waardoor de tusschenruimten slechts zwak aangeduid zijn 2

Dekschilden met duidelijke stippellijnen of stippelrijen en duidelijke tusschenruimten. 3

2 Halsschild in het breedste gedeelte toch altijd veel smaller dan de dekschilden, zoo lang als- of korter dan breed, evenals de kop zeer grof bestippeld, naar de basis sterk versmald,

met een tamelijk breed basaalgroefje en aan de zijden onregelmatig gekorven. De drie leedjes der sprietknots langer dan breed. Lichaam lichter of donkerder bruin, soms meer roodbruinachtig of bij onuitgekleurde exemplaren geelachtig, vrij lang geelachtig behaard; de dekschilden soms over het midden iets donkerder; de sprieten en pooten meer roodachtig. Kleine exemplaren met zeer kort halsschild werden als piligera Mannerh. beschreven. Lengte 2—2½ mm. Gemeen onder dorre bladeren, oud stroo, mos en in dood riet.

1. *pubescens* Gyll.

Halsschild in het breedste gedeelte zoo breed als of slechts zeer weinig smaller dan de dekschilden. De eerste twee leedjes der sprietknots ongeveer zoo lang als breed. Deze soort heeft den habitus van *pubescens*, doch is kleiner. Lichaam roodbruin of zwartbruin, met lichtere schouders. Dekschilden meer gelijkmatig lijn behaard, de haartjes meer naar achteren gericht. Sprieten en pooten rood. Halsschild aan de zijden onduidelijk gekorven, grof en dicht bestippeld, met eene rondachtige basaalgroef. Lengte 2—2½ mm. Eenmaal op Terschelling gevangen. Ook in de Rijnprov. bij Crefeld 2. *crenulata* Gyll.

- 3 Dekschilden met lange, ruwe, eenigszins opstaande beharing, of wel tamelijk fijn behaard en daartusschen met in rijen geplaatste langere haren. Lichaam geheel roodgeel of bruingeel, veel fijner, korter en minder afstaande behaard dan bij *pubescens* en *crenulata*; het lichaam minder gewelfd. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, meestal hartvormig, met onduidelijk gekorven zijden, dicht bestippeld en met een vrij diep basaalgroefje. Deze soort is van de licht gekleurde exemplaren van *impressa* gemakkelijk te onderscheiden door de fijnere stippenrijen der dekschilden en de niet duidelijk waarneembare stippenrij in de tussenruimten. Lengte 1½—2½ mm. Op enkele plaatsen niet zeldzaam. In keldervuil, onder plantenafval in tuinen en tegen wit gekalkte muren 3. *fulva* Comolli.

Dekschilden gelijkmatig lijn, neerliggend behaard, soms met rijen van zeer korte, fijne, opstaande borstelhaartjes; de afwisselende tussenruimten zonder rijen van langere opstaande haartjes 4

- 4 Dekschilden eenigszins cilindervormig, lang-gestrekt en gewelfd, met regelmatige rijen van fijne witte opstaande borstelhaartjes. Halsschild nagenoeg zoo breed als de dekschilden; met een zwak basaalgroefje. De eerste twee leedjes der sprietknots iets langer dan breed. Lichaam roodgeel of roodbruin, veelal de naad en de zijden der dekschilden, zeldzamer ook het midden van het halsschild donkerder. Dekschilden met sterke, vrij dicht opstaande stippenrijen en iets rimpelige smalle tussenruimten. Lengte 2—2½ mm. Uitsluitend bij Houthem en Valkenburg nabij Maastricht gevangen, Juli. Ook in Westfalen en bij Düsseldorf. 4. *umbilicata* Beck.

Dekschilden niet geheel cilindervormig, langs de zijden meer afgerond, soms elliptisch, eirond of ovaal, lijn neerliggend behaard, zonder rijen van witte, opstaande borstelhaaren. 5

- 5 Prosternum vóór de voorcoxae zonder sterker behaarde dwarslijn. Halsschild aan de zijden soms weinig afgerond en eenigszins breed-vierhoekig of aan de zijden sterk afgerond en eenigszins hartvormig. Dekschilden meestal tot aan het uiteinde in langsrijen bestippeld. . 6

Prosternum vóór de voorcoxae met eene verdiepte, sterker en dichter behaarde dwarslijn. Halsschild breed, eenigszins vierhoekig, naar de basis weinig versmald, van voren nagenoeg zoo breed als de dekschilden, of wel breed-rondachtig en veel smaller dan de dekschilden, in welk geval de stippenrijen der dekschilden reeds achter het midden verdwijnen. 14

- 6 Kop achter de oogen met slapen, welke door een klein, doch duidelijk uitstekend, meer of minder scherp en aan het uiteinde langer behaard bultje aangeduid zijn 7

Kop achter de oogen zonder eenig spoor van dit bultje; de slapen in 't geheel niet aangeduid. 13

- 7 Dekschilden met duidelijk verdiepte, krachtige stippenrijen en tamelijk breede, meer of minder verheven tussenruimten, waarin eene veel fijnere stippenrij staat, niet door lijne dwars-rimpels onduidelijk 8

Dekschilden met meer of minder krachtige, zelden verdiepte stippenrijen; de tussenruimten in den regel smal en slechts zeer zwak gewelfd of vlak, veelal eenigszins dwarsrimpelig, waardoor de tussenruimten onduidelijk worden. 9

- 8 Halsschild veel breeder dan lang, naar de basis minder versmald dan bij *longicornis*, met zeer duidelijk getande zijden en een klein, duidelijk basaalgroefje. De stippenrijen der dekschilden vóór het uiteinde onduidelijk. Lichaam bruinzwart, bruinrood of roestrood, kort en weinig behaard, slechts iets glanzig. Dekschilden iets gewelfd. Lengte 2—2½ mm. Niet inl. Bij Oldenburg, Dortmund, Hamburg en op het eiland Borkum.

(*denticulata* Gyll.)

Halsschild slechts iets breeder dan lang, aan de zijden sterk afgerond en eenigszins hart-

vormig, de zijden onduidelijk gekorven en daardoor van de andere soorten onderscheiden. De stippelrijen der dekschilden tot aan het uiteinde duidelijk, de tusschenruimten meer verheven dan bij *denticulata*. Deze soort is zeer veranderlijk in kleur, van geelrood tot zwart, glanzig en vrij kort behaard; sprietten en pooten rood. Bij vele exemplaren zijn de naad en de zijrand der roodachtige dekschilden zwartachtig. Kleine, lichtgekleurde exemplaren vormen de var. *badia* Mannerh. Lengte 2—2½ mm. Gemeen onder aangespoeld riet en dorre bladeren. De var. *badia* bij Nijmegen. (Impressa Oliv.) 5. **longicornis** Hrbst.

- 9 Halsschild in het breedste gedeelte toch altijd aanmerkelijk smaller dan de dekschilden . . . 10

Halsschild in het breedste gedeelte zoo breed als de dekschilden aan de basis of in het midden. 12

- 10 Dekschilden in dicht aaneenstaande rijen krachtig bestippeld, de tusschenruimten min of meer dwarsrimpelig en met eene veel fijnere stippelrij. 11

Dekschilden fijn en gelijkmatig in rijen bestippeld, daar de tusschenruimten tamelijk breed en vlak en met eene nagenoeg even sterke stippelrij bezet zijn. Kop zeer weinig smaller dan het halsschild. Halsschild smal, zeer gewelfd, eenigszins rondachtig of onduidelijk hartvormig, met eene diepe basaalgroef. Dekschilden achter het midden het breedst, veel breeder dan het halsschild. Lichaam bruin, roodbruin of roestrood, op de bovenzijde iets neergedrukt. Lengte 2—2½ mm. Op dennen, vooral in bergstreken. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld. (Foveola Beck)

- 11 Het zesde en zevende sprietlid duidelijk langer dan breed, het achtste rondachtig. Kop weinig smaller dan het halsschild. Dekschilden achter het midden het breedst, met nagenoeg rechthoekige schouders en duidelijke schouderbuilen; de tusschenruimten niet gewelfd. Lichaam roestrood, glanzig. Halsschild vóór het midden het breedst, lijn en verspreid bestippeld, met een basaalgroefje. Lengte 1½—2 mm. Niet inl. Zij komt in Noord-Duitschland voor. Ik zag een typisch exemplaar van *Reitter* (Mus. v. d. Poll).
(longicollis Mannerh.) (Mannerheimii Reitt.)

Het zesde sprietlid weinig of niet langer dan breed, het zevende en achtste rondachtig. Kop duidelijk smaller dan het halsschild. Dekschilden in 't midden het breedst, de tusschenruimten zeer zwak-, doch gelijkmatig gewelfd. Lichaam zwartbruin, iets gewelfd en lijn behaard. Sprietten en pooten roodbruin. Onuitgekleurde exemplaren geelbruin. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, aan de zijden lijn gekorven, vrij dicht en diep bestippeld, met een diep basaalgroefje. Lengte 2 mm. Zeer zeldzaam. Mantgum (Friesland) en Leiden. In de Rijnprov. bij Elberfeld. 6. **linearis** Payk.

- 12 Halsschild weinig of niet breeder dan lang, hartvormig, in het breedste gedeelte zoo breed als de dekschilden aan de basis. Dekschilden ovaal, vrij sterk gewelfd, aan de zijden duidelijk afgerond, met dicht aaneenstaande, grove stippelrijen, welker stippels dicht aaneen geplaatst staan. Lichaam roodbruinachtig. Lengte 1¼—1½ mm. Gewoonlijk in micrennesten. Niet inl. In Westfalen. (longicollis Zett.)

Halsschild 1½ maal zoo breed als lang, hartvormig, in het breedste gedeelte zoo breed als de dekschilden in het midden. Dekschilden meer langwerpig-ovaal, iets gewelfd, met weinig afgeronde zijden, fijnere stippelrijen en meer rimpelige tusschenruimten, waarin eene veel fijnere stippelrij. Lichaam geelrood. Lengte 1½—1¾ mm. In dakstroo en op boomzwammen. Loosduinen, Oisterwijk, Wolfhezen en Ossendrecht 7. **crenicollis** Mannh.

- 13 Lichaam eenigszins gewelfd. Dekschilden langwerpig-ovaal, de tusschenruimten der dicht aaneenstaande stippelrijen met eene fijnere stippelrij. Roodbruin; de dekschilden, behalve gewoonlijk de lichtere schouders, zwartbruin, veelal eenkleurig lichter of donkerder roestrood of roodgeel; lijn, neerliggend behaard. Halsschild meer of minder breed, eenigszins hartvormig, met sterk getande zijden; dicht en sterk, veelal eenigszins rimpelig bestippeld, met een vrij diep basaalgroefje. Lengte 1½—2 mm. Verbreid op boomzwammen, in dakstroo en tusschen schimmellende bladeren 8. **serrata** Payk.

Lichaam van boven meer of minder neergedrukt, met zeer weinig afgeronde, eenigszins parallele zijden. Dekschilden langer dan bij *serrata*, met fijnere stippelrijen; in de breede, vlakke tusschenruimten met eene rij even groote stippels, zoodat eigenlijke tusschenruimten niet van de gewone stippelrijen te onderscheiden zijn. Lichaam donkerder gekleurd en fijner, donkerder behaard dan bij *serrata*; gewoonlijk zwartachtig of pekbrown, de sprietten en pooten roodbruin. Halsschild aan de zijden minder afgerond en minder dicht bestippeld. Lengte 1½—1¾ mm. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa (obscura Bris.)

- 14 Halsschild sterk verbreed, eenigszins vierhoekig, naar de basis weinig versmald, van voren nagenoeg zoo breed als de basis der dekschilden, met bijna rechte, zeer fijn gekorven zijden en slechts nabij de achterhoeken met eenige grootere tandjes; zeer fijn bestippeld, met een duidelijk basaalgroefje. De stippelrijen der dekschilden tot aan het uiteinde zichtbaar, de tusschenruimten met eene veel fijnere stippelrij. Lichaam met bijna parallele zijden, tamelijk

vlak, licht roodgeel, soms nabij het schildje iets donkerder, vrij lang, geelachtig behaard. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen onder schimmelend stroo, plantenafval en dorre bladeren.

9. *elongata* Humm.

Halschild iets breeder dan lang, aan de zijden sterk afgerond, naar de basis iets meer versmald, van voren veel smaller dan de basis der dekschilden, met een dieper basaalgroefje. De stippelrijen der ovale dekschilden achter het midden verdwijnend, de tussenruimten onduidelijker in rijen bestipeld. Lichaam met minder parallel zijden en meer gewelfd dan bij *elongata*, gewoonlijk roodbruin met donkeren kop, soms ook het halschild zwartachtig, of wel het geheele lichaam bruinrood of zwartbruin. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Bij Haren (Groningen) en Putten (Gelderl.), Juli. Ook in Oldenburg. (? *fenestralis* L., Reitt.) 10. *ferruginea* Gylh.

8 *Melanophthalma* Motsch.

Dit genus onderscheidt zich van Corticaria door het korter en meer gedrongen lichaam, de meer eivormige dekschilden, het niet gegroefde metasternum, de nimmer met lange haren bezette bovenzijde, de dünnere en iets langere sprieten en het in beide seksen uit 6 sterniten bestaande achterlijf. Halschild aan den zijrand slechts uiterst fijn, soms onduidelijk gekarteld. — In gras, op lage planten en tusschen dorre bladeren en plantenafval. — De larve en pop van M. gibbosa is door Perris beschreven.

Van de 9 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Het eerste sterniet met twee schuin staande dijlijnen. Voorschenen in beide seksen gewoon. Kop achter de oogen met duidelijke, kleine, tandvormige slapen (Sub-gen. *Melanophthalma* isp., *Oropsime* Gozis). Sprieten met 3-ledige knots 1). 2

- Het eerste sterniet zonder dijlijnen. Voorschenen bij het ♂ aan de binnenzijde met een klein tandje. Kop zonder eenige aanduiding van slapen, de oogen den voorrand van het halschild volkomen aanrakend (Sub-gen. *Corticarina* Reitt.). 3

- 2 Sprieten eenkleurig roestrood. Halschild aan de zijden, nabij het midden, min of meer hoekig verbreed. Eindlid der voortarsen bij het ♂ met een lijn, naaldvormig doortje op de onderzijde. Lichaam meer gestrekt dan bij *transversalis*, vrij lang en grof wit- of geelgrijsachtig behaard, eenkleurig roestrood, meestal de dekschilden donkerbruin; de ab. c. *angulosa* Motsch. eenkleurig roodgeel. Halschild met vrij diepen dwarsindruk aan de basis. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Eenmaal bij Maastricht, Juli. Ook in de Rijnprov. en in Westfalen.

1. *distinguenda* Comolli.

Sprieten roestrood, gewoonlijk met donkerder knots. Halschild kort, veel smaller dan de dekschilden, aan de zijden in het midden niet hoekig verbreed, doch nagenoeg recht of min of meer afgerond, met een dwarsindruk aan de basis en meer of minder duidelijke, rechte achterhoeken. Het eindlid der voortarsen in beide seksen gewoon. Dekschilden met nagenoeg tot aan het uiteinde doorlopende stippelrijen. Lichaam kort grijs- of wit-, iets schubachtig behaard, zeer veranderlijk in grootte en kleur. Het type is niet groot, donkerbruin, de vorm *brevicollis* Mannerh. donkerbruin met iets dichter bestipeld halschild en duidelijk rimpelige dekschilden; de vorm *hortensis* Mannerh. is grooter, bruin, met geelbruine dekschilden en iets donkerder naad; de ab. c. *Hollastonii* Waterh. bovendien met iets donkerder zijrand. De vorm *suturalis* Mannerh. bestaat uit licht gekleurde, groote exemplaren, met iets donkerder naad der dekschilden en bovendien de basaal-indruk van het halschild met de aanduiding van een middengroefje. De ab. c. *erecta* Mannerh. en *curticollis* Mannerh. bevatten eenkleurig lichte, bruinachtig-roestroode of geheel roodgele exemplaren; de vorm *pallens* Mannerh. bevat licht geelbruine exemplaren, nagenoeg zonder basaal-indruk op het halschild. Ook komen roodbruine exemplaren voor met, behalve aan het uiteinde, donkere dekschilden. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Vrij gemeen onder dorre bladeren, dood riet en in gras.

2. *transversalis* Gylh.

- 3 Kop dicht en sterk bestipeld. Halschild veel smaller dan de dekschilden, weinig of niet verbreed, met een ondiepen dwarsindruk achter het midden, welke de gehele breedte inneemt. Dekschilden kort en breed-ovaal, ongeveer in 't midden het breedst, gewelfd, met stippelrijen, welker stippels aan de basis diep en dicht opeenstaan, in 't midden fijner worden en nabij het uiteinde onduidelijker zijn. Lichaam bruin, roodbruin of geelbruin; de sprieten, behalve de knots, en de schenen roodgeel. De tand der voorschenen staat bij het ♂ dicht nabij het uiteinde. Bij een vorm *cylindricollis* Motsch. zijn de dekschilden meer parallel. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Gemeen onder dorre bladeren en rottende plantenstoffen. 3. *gibbosa* Herbst.

1) Bij de Zuid-Europesche *M. fuscescens* Mannerh. is de sprietknots 2-ledig.

- Kop lijn en verspreid bestippeld. Halsschild bijna altijd met een basaalgroefje 4
- 4 Halsschild aan de zijden tamelijk gelijkmatig- en niet zeer sterk afgerond, slechts iets breder dan lang, tamelijk gewelfd, veel smaller dan de kort-ovale dekschilden, met meer of minder spitse achterhoeken, een diep basaalgroefje en gewoonlijk nog met een klein, langwerpig zijgroefje (de vorm *subtilis* Mannh.). Dekschilden aan de basis met zeer duidelijk kielvormig verheven, smalle tussenruimten. Lichaam roodbruin of geelbruinachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Verbreid onder dorre bladeren, doch minder algemeen dan *fuscula*. 4. *similata* Gyll.
- Halsschild sterk verbreed, aan de zijden sterk afgerond. Dekschilden met vlakke, soms onduidelijk verheven tussenruimten, welke zeer zelden nagenoeg tot over de geheele lengte verheven zijn. 5
- 5 Spriet en met donkerder knots. Halsschild in 't midden niet geheel dubbel zoo breed als lang, aan de zijden sterk afgerond, met een diep basaalgroefje en spitse achterhoeken; bij den vorm *trifoveolata* Redt. vertoont het halsschild nog een diep zijgroefje. Dekschilden vóór het midden veel breder dan het halsschild, langwerpig-ovaal of eirond, met matig fijne stippelrijen en tamelijk vlakke tussenruimten, welke bij den grooteren vorm *latipennis* Sahlb. duidelijker verheven zijn, doordat de stippelrijen nagenoeg tot aan het uiteinde gegroefd zijn. Lichaam gewoonlijk bruin of donkerbruin. Van *similata* onderscheiden door het breedere halsschild en de langere dekschilden. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen onder dorre bladeren en allerlei plantenafval. De vorm *trifoveolata* niet zeldzaam, de vorm *latipennis* zeldzaam 5. *fuscula* Humm.
- Spriet en cenkleurig roestrood. Halsschild duidelijk dubbel zoo breed als lang. Dekschilden kort-ovaal 6
- 6 Lichaam op de boven- en onderzijde cenkleurig geelrood, minder sterk behaard dan bij *fulvipes*. Halsschild in 't midden bijna zoo breed als de dekschilden in de grootste breedte, met sterk afgeronde zijden en een duidelijk basaalgroefje. De tussenruimten der stippelrijen op de dekschilden iets gewelfd. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen, vooral in de duinstreken tusschen afgevallen bladeren, in helmzoden en zandkuiltjes. 6. *truncatella* Mannh.
- Bovenzijde geelbruin of licht roestrood, de dekschilden in den regel bruin of donkerbruin, zoo ook gewoonlijk de onderzijde. Halsschild in 't midden veel smaller dan de dekschilden in de grootste breedte, met sterk afgeronde zijden, spitse achterhoeken, een diep basaalgroefje en meestal nog een tweede groefje nabij den zijrand. Dekschilden met vrij diepe stippelrijen en daardoor iets meer gewelfde tussenruimten. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Niet inlandsch. In België en, naar het schijnt, gemeen op het eiland Borkum. (*fulvipes* Com.)

XXIX. Familie CUCUJIDAE. (Fig. 49.)

Fig. 49. Onderzijde van *Prostomis mandibularis* L. Orig.

Lichaam meestal lang gestrekt en gewoonlijk zeer vlak. — Kop veelal vrij groot en gewoonlijk horizontaal vooruitstekend, zonder sprietgroeven op de onderzijde. — Spriet en 11-ledig, hetzij draadvormig of naar het uiteinde geleidelijk, doch weinig verdikt, of met 2—3, zelden 4 tot eene meer of minder scherp afgescheiden knots verenigde eindledjes. — Bovenlip klein, soms door den clypeus overdekt. Voorkaken nu eens vooruitstekende, dan eens verborgen, veelal met 2- of 3-tandigen top; bij eenigen met een vliezigen zoom aan den binnrand. Achterkaken 2-lobbig. Kaaktasters 4-, lipstasters 3-ledig. Tong hoorn- of lederachtig. Paraglossen onduidelijk. — Halsschild iets van den voorrand der dekschilden afstaande, bij vele soorten met gekartelden of getanden zijrand. — Dekschilden gewoonlijk het geheele achterlijf bedekkend. — Achterlijf met 5 vrij bewegelijke sterniten, de eerste twee nagenoeg even lang. — De gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten, bij de *Cucujini* en *Hyliotini* echter open. De coxae gewoonlijk tamelijk ver van elkaar verwijderd, die der voor- en middelpooten kogel-, die der achterpooten cilindervormig. Tarsen met gewone ledjes, in den regel allen 5-ledig, het 1ste of 4de lid meestal klein, bij de meeste *Cucujini* de achter-tarsen bij het ♂ 4-ledig; ook kunnen zij allen 4-ledig (*Prostomis*) of onduidelijk 5-ledig zijn, daar het 1ste lid zeer klein en moeilijk zichtbaar is (*Laemotmetus*). Bij *Psammoechus* is het 3de lid der 5-ledige tarsen breed, met tweelobbig zool; larven en kevers leven achter boomstamelen, tusschen plantenafval, in graanvruchten en andere plantenwaren; enkelen treft men in vochtig gras en op waterplanten aan; sommigen zijn met waren over de geheele aarde verspreid. De larven zijn, met uitzondering

van den kop en den voorlaatsen achterlijfsring, die van twee hoornachtige, gekromde haakjes voorzien is, vliezig; sprieten 4-ledig; 5 ocellen aan weerszijden van den kop; de pooten met één enkelen klauw. — Deze familie heeft eenige verwantschap met de Colydiidae en Trogositidae, alsook met de Nitidulidae. — Volgens *J. Redtenbacher* herinnert de nervatuur der vleugels bij de Cucujidae het meest aan die der Thelephoridae en Elateridae. Psammoechus vertoont eene tamelijk gereduceerde nervatuur.

Overzicht der Tribus.

- 1 Achterkaken aan de onderzijde door de zeer lang uitgetrokken zijhoeken van den keelrand bedekt (Fig. 49). De gewrichtsgroeven der voorcoxae van achteren gesloten. Tarsen 4- of onduidelijk 5-ledig, daar het eerste lid zeer klein en moeielijk zichtbaar is. Sprieten met 3 iets grootere eindledjes. Schenen met twee krachtige einddoornen. Voorkaken zeer dik en sterk in de breedte ontwikkeld **I. Prostomini.**
- Achterkaken aan de onderzijde geheel onbedekt. De zijhoeken van den keelrand niet of slechts iets tandvormig uitstekend. Einddoornen der schenen zeer klein 2
- 2 Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren open. Eerste tarslid zeer klein, meestal moeielijk zichtbaar 3
- Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Tarsen in beide seksen 5-ledig. De zijhoeken van den keelrand steken bijna altijd iets tandvormig uit. Uiteinde van het pygidium veelal zichtbaar 4
- 3 Eerste sprietlid gewoon. Tarsen 5-ledig, de achtertarsen bij het ♂ meestal 4-ledig. **II. Cucujini.**
- Eerste sprietlid zeer sterk verlengd en naar het uiteinde enigszins knotsvormig verdikt. Tarsen in beide seksen 5-ledig **III. Hylotini.**
- 4 Eindlid der kaaktasters zeer groot, enigszins bijlvormig. Het derde tarslid breed, met twee-lobbige zool, het vierde lid daarin opgenomen. Halschild veel smaller dan de dekschilden, breeder dan lang; de zijden van voren met kerftandjes. Prosternale voortzetting tusschen de kleine, kogelvormige voorcoxae zeer smal, zoodat deze zeer dicht aaneenslaan. Sprieten naar het uiteinde geleidelijk-, doch weinig verdikt; het eerste lid tamelijk breed en lang. Voorhoofd aan weerszijden nabij de oogen met een langsindruk. Dekschilden met struppelrijen **IV. Psammoechini.**
- Eindlid der kaaktasters gewoon, dun, kegelvormig toegespitst of langwerpig-eirond. Tarsen gewoon, het derde lid soms lobvormig ingesneden, doch weinig verbreed. Halschild weinig of niet smaller dan de dekschilden, minstens zoo lang als breed 5
- 5 De buitenhoeken van den keelrand steken duidelijk uit. Sprieten met 3 grootere, los samenhangende eindledjes, welke, soms geleidelijk in dikte toenemend, van de overige ledjes niet scherp afgescheiden zijn. Lichaam meer of minder lang-gestrekt. Dekschilden nagenoeg altijd met stippellijnen. De prosternale voortzetting, tusschen de voorcoxae, aan het uiteinde tamelijk breed. Het eerste tarslid minstens zoo lang als het tweede, het derde min of meer uitgerand, het vierde klein **V. Silvanini.**
- De keelrand van voren recht afgesneden. Sprieten met scherp afgescheiden, 3-ledige knots. Lichaam langwerpig, in habitus aan *Monotoma* herinnerend. Dekschilden verward bestippeld. De prosternale voortzetting, tusschen de voorcoxae, zeer smal eindigend. Het eerste tarslid zeer klein **VI. Hypocoprini.**

I. Tribus PROSTOMINI.

- De uitgetrokken zijhoeken van den keelrand breed en aan het uiteinde afgeknot. Voorkaken korter dan de kop, neergebogen. Kop van achteren zonder indruk. Sprieten weinig behaard. Halschild aan de zijden gerand, naar achteren iets versmald, zonder middellijn. Achterrand van het laatste sterniet opgericht. Tarsen onduidelijk 5-ledig, daar het eerste lid zeer klein en moeielijk zichtbaar is (*Lacmotmetus*.)
- De uitgetrokken zijhoeken van den keelrand lang, smal en spits (Fig. 49). Voorkaken zoo lang als de kop, recht vooruitstekend. Kop van achteren met eene dwarsgroef. Sprieten lang behaard. Halschild aan de zijden volkomen ongerand, naar voren iets versmald, met eene verdiepte middellijn. Laatste sterniet gewoon. Tarsen 4-ledig 1) (*Prostomis*.)

1) Bij microscopisch onderzoek is mij geloken, dat *Ludwig Redtenbacher* juist gezien heeft, dat geen rudimentair eerste lid aanwezig is.

II. Tribus CUCUJINI.

- 1 Prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae smal. De middelcoxae verder van elkaar staande dan de voorcoxae. Zijden van het halsschild onregelmatig getand of gegolfd, zonder langslijnen. Achtertarsen bij het ♂ 4-ledig. 2
- Prosternale voortzetting zeer breed. Alle coxae even ver-, doch op grooten afstand van elkaar verwijderd. Halsschild aan weerszijden met eene langslijn 4
- 2 De wangen achter de oogen sterk lobvormig uitstekend. Sprieten met verlengd derde lid, zonder afgescheiden knots. Bij het ♂ ontbreekt het vierde lid der achtertarsen; het zeer kleine eerste lid is aanwezig. (Cucujus.)
- De wangen bijna geheel ontbrekend. Sprieten met 3-ledige knots 3
- 3 Derde sprietlid nauwelijks langer dan breed. Dekschilden niet gestreept. De buitenhoeken van den keelrand tandvormig uitstekend. Lichaam zeer vlak 1. *Pediacus*.
- Derde sprietlid duidelijk langer dan breed. Dekschilden met dicht opeenstaande stippellijnen. Keelrand recht afgeknot, zonder zijtandjes. Lichaam iets gewelfd. (Phloeostichus.)
- 4 De langslijnen op het halsschild zetten zich op den kop, langs de oogen, voort. Sprieten minstens den achterrand van het halsschild bereikend. Achtertarsen bij het ♂ 4-ledig. 2. *Laemophloeus*.
- De langslijnen op het halsschild zetten zich niet op den kop voort. Sprieten zeer kort, den achterrand van het halsschild niet bereikend. Alle tarsen 5-ledig (Lathropus.)

III. Tribus HYLIOTINI.

- Bevat slechts het genus 3. *Hyliota*.

IV. Tribus PSAMMOECHINI.

- Bevat slechts het genus 4. *Psammoechus*.

V. Tribus SILVANINI.

- 1 Achterdijen sterk verbreed, bij het ♂ gekromd en in het midden van een tandje voorzien. Sprieten met eene breede, 4-ledige knots. Halsschild aan de zijden met afgeronde kerftandjes. Basis der dekschilden te zamen diep uitgerand. De sterniten nagenoeg even lang. 5. *Nausibius*.
- Achterdijen gewoon. 2
- 2 De sterniten nagenoeg even lang. Sprieten met 3 grootere eindleedjes. De voorhoeken van het halsschild naar buiten spits uitstekend 3
- Het eerste sterniet zoo lang als de twee volgende te zamen. Voorhoeken van het halsschild niet uitstekend, de zijden zeer fijn gekarteld. Sprieten naar het uiteinde geleidelijk verdikt, de 3 eindleedjes van de overigen niet scherp afgescheiden (Airaphilus.)
- 3 De 3 eindleedjes der sprieten even breed. Het derde tarslid gewoon. Halsschild aan de zijden veelal krachtig getand 6. *Silvanus*.
- Het eerste of het derde van de 3 eindleedjes der sprieten duidelijk kleiner dan de overigen. Het derde tarslid lobvormig ingesneden, doch weinig verbreed 7. *Cathartus*.

VI. Tribus HYPOCOPRINI.

- Bevat slechts het genus 8. *Hypocopus*.

I. Tribus PROSTOMINI.

Laemotmetus Gerstäcker.

(*Orycoecus* Reitter)

Kop van achteren zonder indruk. Sprieten weinig behaard, met 3 grootere eindleedjes. Voorkaken korter dan de kop, neergebogen. De uitgetrokken zijhoeken van den keelrand, welke de achterkaken aan den onderkant bedekken, zijn breed en aan

het uiteinde afgeknot. Halsschild aan de zijden gerand, naar achteren iets versmald, onder middellijn. Achterrand van het anale sterniet opgericht. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Tarsen onduidelijk 5-ledig, daar het eerste lid zeer klein en moeielijk zichtbaar is.

De eenige Europeesche soort zou ook in ons gebied kunnen worden aangetroffen.

Lichaam eenigszins gewelfd, met parallele zijden, roestkleurig-rood. Dekschilden diep gestreept. Lengte 3½ mm. Niet inl. Uit Zuid-Afrika en Middel-Amerika met drogerijen naar Duitschland ingevoerd. Mij onbekend (cathartoides Reitt.) (ferrugineus Gerst.)

Prostomis Latreille.

Kop van achteren met eene dwarsgroef. Sprieten kort, snoervormig, 11-ledig, naar het uiteinde eenigszins geleidelijk verdikt, lang behaard. Voorkaken zoo lang als de kop, recht vooruittakend, aan de onderzijde door de lange, smalle, spits uitgetrokken zijhoeken van den kestrand bedekt, aan den binnenrand gezaagd. Achterkaken met 2 smalle lobben, welke naar het uiteinde knotsvormig verdikt en met stekelborstels bezet zijn. Tong lang, hoornachtig, toegespitst. Lichaam smal, vlak. Halsschild aan de zijden volkomen ongerand, naar voren iets versmald, met eene verdiepte middellijn. Het anale sterniet gewoon. Tarsen 4-ledig 1). Bij het ♂ zijn de voorkaken langer en aan de zijden sterker verbreed.

De eenige Europeesche soort zou ook in ons gebied kunnen voorkomen.

Lichaam zeer lang-gestrekt, met parallele zijden, vlak, roestkleurig of roodgeelachtig, glanzig. Halsschild verspreid bestippeld, met eene verdiepte middellijn. Dekschilden aan de basis weinig of niet breeder dan het halsschild, naar voren een weinig versmald, met duidelijke stippelrijen. Lengte 5 5½ mm. Zeer zeldzaam; achter boomschors en op zonnige plaatsen in vermoede, oude eikenstronken, in gezelschap van Formica brunnea. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa. De larve is door Erichson beschreven en door Curtis afgebeeld. (mandibularis F.)

II. Tribus CUCUJINI.

Cucujus Fabr.

Sprieten met verlengd derde lid, zonder afgescheiden knots. Bovenlip klein, vertikaal geplaatst. Voorkaken met 3 tandigen top. Achterkaken aan de onderzijde geheel onbedekt, met twee lederachtige, aan het uiteinde sterk gebaarde lobben. Tong in twee divergerende, smalle, aan den binnenrand bewimperde lobben gedeeld. De wangen achter de oogen sterk lobvormig uitstekend. Halsschild met onregelmatig getande of gegolfde zijden, zonder langslijnen. Prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae smal. Gewrichtsgroeven der voorcoxae van achteren open. De middecoxae staan verder van elkaar dan de voorcoxae. Tarsen bij het ♀ 5-ledig, het eerste lid zeer klein; bij het ♂ 4-ledig, het vierde lid ontbrekend, het zeer kleine eerste aanwezig.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Bovenzijde scharlakenrood; de onderzijde, de voorkaken, de zijranden van het halsschild en de pooten zwart, de tarsen naar het uiteinde roodbruinachtig. Halsschild naar achteren versmald, met soms uitstekende voor- en achterhoeken, aan de zijden onregelmatig gekarteld. Dekschilden mat-zijdeachtig, verspreid en onduidelijk bestippeld, elk met twee, zeer zwak aangeduide langslijnen en een kielvormig verheven zijkant. Lengte 11½—13 mm. Achter boomschors. Niet inl. In de Rijnprov. De larve is door Rosenhauer beschreven. (sanguinolentus L., depressus F.) (cinnabarinus Scop.)

1. *Pediacus* Shuckard.

Bovenlip van voren afgerond. Voorkaken met twee-tandigen top. Achterkaken met twee vliezige, aan het uiteinde gebaarde lobben, van welke de binnenste smaller dan de buitenste is. Tong in twee vliezige, afgeronde lobben verdeeld. De buitenhoeken van den keelrand tandvormig uitstekend. De wangen bijna geheel ontbrekend. Sprieten kort, het derde lid nauwelijks langer dan breed, met 3-ledige knots. Kop achter de oogen van eene diepe dwarsgroef voorzien. Lichaam zeer vlak. Halsschild aan de zijden getand. Dekschilden niet gestreept. Tarsen bij het ♀ met 5-, de achtertarsen bij het ♂ slechts met 4 leedjes. — De soorten van dit genus leven vooral achter boomschors. — De larve van *P. dermestoides* is door Perris beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Halsschild met twee naast elkaar staande, ondiepe, doch duidelijke langsindrukken; de bochtige zijden van stompe tandjes voorzien. Bovenzijde eenigszins glanzig. Dekschilden aan de zijden met eene duidelijke langskiel 2

Halsschild nagenoeg zonder langsindrukken, met bochtige zijden en nagenoeg recht afgesneden achterrand. Bovenzijde donkerbruin, dof. Deze soort is wat korter dan de beide anderen en heeft iets minder parallele zijden. Kop en halsschild dicht bestippeld. Dekschilden aan de zijden met zeer weinig aangeduide langskiel. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Vooral achter schors van geveld den. Niet inl. In Middel-Europa. (*fuscus* Er.)

- 2 Halsschild aan weerszijden van den achterrand, naast de eenigszins spits naar buiten uitstekende, tandvormige achterhoeken, duidelijk uitgerand. Bovenzijde bruin geel of roodbruin, de dekschilden veelal iets lichter gekleurd, eenigszins glanzig en uiterst fijn, neerliggend geelachtig behaard. Dekschilden, behalve de naadstreep, met flauwe aanduiding van een paar langsstrepen. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Achter eiken- en berkenschors en ook in stofzwammen op beukenstronken. Den Haag, Rotterdam, Bennekom en Hoek van Holland; ook een exemplaar op een oorlogschip op de Zuiderzee 1. *depressus* Herbst.

Halsschild iets korter dan bij *depressus*, aan den achterrand nagenoeg recht, de tandvormige achterhoeken niet naar buiten gericht. Bovenzijde roodbruin, kop en halsschild eenigszins glanzig, de dekschilden dof, uiterst kort-, neerliggend grijs behaard; het voorhoofd, het midden van het halsschild en de borst veelal donkerder gekleurd. Dekschilden fijn bestippeld, behalve de naadstreep nauwelijks gestreept. Lengte $3\frac{2}{3}$ —4 mm. Achter eikenschors. Niet inl. 1). In Middel-Europa (*dermestoides* F.)

Phloeostichus Wilh. Redtenbacher.

Sprieten 11-ledig, het derde lid duidelijk langer dan breed, met 3 grootere eindleedjes. Bovenlip afgerond. Voorkaken met twee-tandigen top. Achterkaken tweelobbig, de buitenste lob hoornachtig, aan het uiteinde dicht gebaard, de binnenste perkamentachtig, korter en smaller, aan het uiteinde en aan den binnenrand lang behaard. Tong hoornachtig, aan de zijden in twee afgeronde, half-vliezige lobben verbreed, aan het uiteinde iets uitgerand en bewimperd. Keelrand recht afgeknut, zonder zijtandjes. De wangen bijna geheel ontbrekend. Lichaam iets gewelfd. Dekschilden met dicht opeenvolgende stippellijnen. Tarsen bij het ♀ met 5-, de achtertarsen bij het ♂ met 4 leedjes.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lang-gestrekt, weinig gewelfd, zwart of bruinzwart, met lijne, lichte beharing; de dekschilden met twee smalle, golvende, roestroode of geelachtige dwarsbanden. Halsschild met twee groefjes achter het midden en scherp getanden zijrand. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Achter ahornschors. *Wise* vond de larven in 4 meters hooge stammetjes van *Populus balsamifera*, welke door *Lucanus cervus* vernield waren; zij vreten de mergcylinder en de daaraan grenzende houtdeelen volkomen uit. Niet inl. In de Rijnprov. (*denticollis* Redt.)

1) De vroeger opgegeven inlandsche exemplaren waren verkeerd gedetermineerd en behooren tot *P. depressus*.

2 *Laemophloeus* Laporte de Casteln.

*Sprieten minstens den achterrand van het halsschild bereikend, nagenoeg draadvormig, bij het ♂ soms langer dan het geheele lichaam, 11-ledig, de 3 iets grootere eindledjes niet scherp afgescheiden. Voorkaken met twee- of drie-tandigen top. Achterkaken met twee lobben; de binnenste klein, met haakvormig, hoornachtig uiteinde; de buitenste breed, vliezig, aan het uiteinde dicht gebaard. Tong hoornachtig, van voren afgerond. Halsschild aan weerszijden met eene langslijn, welke zich op den kop langs de oogen voortzet. Prosternale voortzetting zeer breed. Alle coxae even ver-, doch op grooten afstand van elkaar verwijderd. Voorschenen met een haakvormigen einddoorn. Tarsen 5 ledig, de achtertarsen bij het ♂ 4-ledig. Kop bij het ♂ dikwerf zeer breed — Kleine, vlakke kevertjes, welke achter boomschors, in oud hout, plantenstoffen en in koloniale waaren leven. — De larve van *L. monilis* is door Kaltenbach en Bellevoye, de larve van *ferrugineus* door Carpentier, die van *ater* door Westwood, en de larve en pop van *testaceus*, benevens de larven van *bimaculatus* en *clematidis* zijn door Perris beschreven.*

Van de 25 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 7 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Clypeus van voren uitgerand. De zijden van het halsschild vlak en meer of minder scherpkantig. Lichaam meer of minder breed. Schildje breed-driehoekig. Halsschild aan weerszijden slechts met eene langslijn. Voorhoofd met een lijn langsstreepje (Sub-gen. *Laemophloeus* i.sp.) 2

Clypeus van voren recht afgeknort. De zijden van het halsschild stomp of meer afgerond en gaafrandig. Lichaam smal (Sub-gen. *Leptus* Duft.) 3

- 2 Clypeus door eene dwarslijn van het voorhoofd afgescheiden. De zijrand van het halsschild stomp getand. Dekschilden met 4 langsstrepen. Kop en halsschild, behalve eene donkere middenvlek, licht roodbruin; de dekschilden, behalve eene geelachtige langsvlek, zwart of donkerbruin. Schildje, sprieten en pooten lichtrood. Lichaam tamelijk breed, de sprieten krachtig ontwikkeld. Kop bij het ♂ nagenoeg zoo breed als-, bij het ♀ smaller dan het halsschild. Halsschild bij het ♂ zoo breed als-, bij het ♀ smaller dan de dekschilden. Ook zijn bij het ♂ de sprieten veel langer dan bij het ♀. Lengte 3–4 mm. Vooral achter plataanschors. Niet inlandsch. In Westfalen (*denticulatus* Preysl.) (*monilis* F.)

Clypeus niet van het voorhoofd afgescheiden. Sprieten slank. De zijrand van het halsschild gaaf. Lichaam smaller dan bij *monilis*, licht roodgeel, met eene donkere vlek op ieder dekschild. Bij het ♂ de kop grooter dan bij het ♀, het halsschild naar achteren meer versmald, de dekschilden aan het uiteinde iets verkort en afgeknort, met afgeronde buitenhoeken; bij het ♀ de dekschilden aan het uiteinde geneenschappelijk afgerond. Lengte 2–2½ mm. Zeer zeldzaam; achter beuken- en berkenschors. Eenmaal bij Delden, Juli, achter de schors van een afgevalen boomtak. In Noord-Duitschland bij Hamburg.

1. *bimaculatus* Payk.

- 3 Clypeus door eene gegroefde dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Schildje half-cirkelvormig. Halsschild met eenigszins tandvormig naar buiten uitstekende voorhoeken, aan weerszijden slechts met ééne langslijn. Dekschilden onduidelijk gestreept. Lichaam zeer plat, licht roodbruin of roodgeel, glanzig, lijn neerliggend geel behaard. Bij het ♂ de kop iets grooter dan bij het ♀, de sprieten langer, het halsschild naar achteren iets versmald. Lengte 2–2½ mm. Achter boomschors. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf.

(testaceus F.)

Clypeus niet van het voorhoofd gescheiden. Schildje verbreed 4

- 4 Halsschild naast den zijrand met twee verdiepte, evenwijdig loopende langslijnen, even lang als breed, naar achteren iets-, bij het ♂ meer dan bij het ♀, versmald. Sprieten bij het ♂ zoo lang als-, bij het ♀ korter dan het halve lichaam. Lichaam licht roodbruin of roodgeel, lijn behaard. Dekschilden bij het ♂ aan het uiteinde afgeknort, bij het ♀ afgerond. Bij het ♂ de kop zoo breed als-, bij het ♀ smaller dan het halsschild. Lengte 1½–2 mm. Achter boomschors, vooral aan eiken. Winterswijk, Juli. In de Rijnprov. bij Düsseldorf, ook in Westfalen 2. *duplicitus* Waltl.

Halsschild naast den zijrand slechts met ééne langslijn. 5

- 5 Achterhoeken van het halsschild scherp aangeduid, recht of spits. Bovenzijde licht roodbruin of roodgeelachtig 6

- Achterhoeken van het halsschild stomp en eenigszins afgerond. Bovenzijde licht roodbruin of roestrood, soms donkerbruin of zwartbruin 9
- 6 Dekschilden hoogstens dubbel zoo lang als breed 7
- Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als breed. Lichaam zeer smal. Halsschild met een duidelijken dwarsindruk aan de basis, en rechte achterhoeken. Sprieten bij het ♂ zoo lang als, bij het ♀ korter dan kop en halsschild te zamen. Kop en halsschild iets glanzig, de dekschilden dof. Bij het ♂ de voorkaken iets uitstekend en aan de zijden hoekig verbreed. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Deze soort zou o. a. in meel voorkomen. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa (alternaus Er.)
- 7 Sprieten bij het ♂ nagenoeg zoo lang als het geheele lichaam, de eindleedjes zeer verlengd. Halsschild breder dan lang, bij het ♀ soms even lang als breed 8
- Sprieten bij het ♂ zoo lang als het halve lichaam, de eindleedjes vrij kort en dik, bij het ♀ zoo lang als kop en halsschild te zamen. Halsschild nagenoeg even lang als breed, bij het ♂ naar achteren meer versmald dan bij het ♀, met spitse achterhoeken. Voorkaken bij het ♂ van buiten aan de basis hoekig verbreed. Lichaam licht roodbruin of roodgeel, dicht geel behaard. Bij het ♂ de kop zoo breed als het halsschild. Lengte 2—2½ mm. Vooral op graanzolders; in meel, rijst, vergane zemelen, in huizen; op houtwerk, onder beschimmel hooi en achter beukensel-ors; ook in sigaren aangetroffen. 4. *ferrugineus* Steph.
- 8 Dekschilden aan het uiteinde zeer stomp afgerond, nagenoeg afgeknot. Sprieten bij het ♀ zoo lang als het halve lichaam. Deze soort is iets grooter dan *pusillus*, roestrood. Halsschild bij het ♀ vierkant, bij het ♂ iets breder dan lang. Lengte 2 mm. In Duitschland uit Oostersche vruchten verkregen (turdicus Grouv.)
- Dekschilden aan het uiteinde gemeenschappelijk afgerond. Sprieten bij het ♀ zoo lang als het halve lichaam. Lichaam licht roodbruin of geelbruin, fijn behaard, tamelijk glanzig. Halsschild in beide seksen breder dan lang, met bijna rechte zijden en scherp aangeduide, rechte achterhoeken. Bij het ♂ is de kop grooter dan bij het ♀ en het halsschild naar achteren meer versmald. Ik bezit een exemplaar dat, behalve de dekschilden, donkerbruin is. Deze soort gelijkt overigens veel op *ferrugineus*, doch is korter en meer gedrongen. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1½ mm. In rijst en andere grutterswaren; ook in herbaria en pakhuizen. 3. *pusillus* Schönh.
- 9 Dekschilden bijna dubbel zoo lang als breed. Sprieten bij het ♂ zoo lang als het halve lichaam, bij het ♀ zoo lang als kop en halsschild te zamen. Bovenzijde gewoonlijk roestrood, veelal om het schildje iets donkerder, zelden geheel donkerbruin of zwartbruin. Halsschild zoo lang als breed; bij het ♂ naar achteren sterk versmald, met stompe achterhoeken, en daardoor vooral van de naverwante *ferrugineus* onderscheiden. Voorkaken bij het ♂ aan de basis naar buiten hoekig verbreed. De kop bij het ♂ zeer groot, bij het ♀ iets smaller dan het halsschild. Roestroode exemplaren werden als *ferrugineus* Er. beschreven. Lengte 2—2½ mm. In plantenafval. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. (ater Oliv.)
- Dekschilden meer dan dubbel zoo lang als breed. Sprieten zoo lang als kop en halsschild te zamen 10
- 10 Dekschilden iets meer dan dubbel zoo lang als breed, aan het uiteinde nagenoeg afgeknot, de langstrepen afwisselend meer of minder sterk aangeduid. Lichaam breder dan bij *clematidis*, roodbruin, dof, zeer fijn behaard. Halsschild even lang als breed. Bij het ♂ de kop grooter dan bij het ♀, het halsschild naar de basis iets versmald en de voorkaken naar buiten, aan de basis, tandvormig verbreed. Lengte 2 mm. Achter dennenschors en in boommolm. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa (corticinus Er.)
- Dekschilden 2½ maal zoo lang als breed, aan het uiteinde gemeenschappelijk afgerond, de langstrepen allen even sterk aangeduid. Lichaam smal, roodbruin, nagenoeg dof, nimmer fijn behaard. Halsschild iets langer dan breed. Bij het ♂ is de kop grooter dan bij het ♀. Lengte 2½—2¾ mm. Achter de schors van dorre takken van *Clematis vitalba* en ook des winters in de verlaten gangen van *Xylocleptes bispinus*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld; ook in Westfalen (clematidis Er.)

Lathropus Erichson.

Sprieten zeer kort, den achterrand van het halsschild niet bereikend; met drie grootere eindleedjes, welke eene langwerpige, smalle knots vormen. Roventip afgerond, de voorkaken bijna geheel bedekkend. Achterkaken en onderlip als bij Laemophloeus, slechts de binnenste achterkaaks-lob iets langer. Tong ongedeeltd. Halsschild aan

weerszijden met eene langslin, welke zich niet op den kop voortzet. Prosternale voortzetting breed. Schenen met gewone einddoornen. Alle tarsen 5-ledig.

De eenige Europeesche soort, die in voorkomen iets aan *Enicmus* herinnert, komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam langwerpig, bruinzwart, dof, zeer fijn behaard. Sprieten en pooten bruin. Halsschild met lijn gekartelde zijden, op het midden met 4 ondiepe groetjes. Dekschilden met stippellijnen en afwisselende, iets kielvormig verheven tusschenruimten. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Op eiken in de boorgaten van houtwespen; ook in palen, door *Lyctus canaliculatus* bewoond. Niet iul. In de Rijnprov. bij Crefeld, Düsseldorf en Gulik. De larve en pop zijn door Perris beschreven. (sepicola Müll.)

III. Tribus HYLIOTINI.

3. *Hyliota* Latreille.

(Brontes Fab.)

Sprieten 11-ledig, bijzonder lang, draadvormig, het eerste lid zeer sterk verlengd en naar het uiteinde eenigszins knotsvormig verdikt. Bovenlip afgerond. Voorkaken met gedeelden top. Achterkaken met vliezige lobben, van welke de binnenste smal en aan het uiteinde van eenen hoornhaak voorzien is. Tong hoornachtig, hartvormig. Lichaam gestrekt, vlak. Halsschild aan de zijden getand. Gewrichtsholten der voortcoxae van achteren open. Pooten kort, de schenen met uiterst fijne einddoornen. Tarsen in beide seksen 5-ledig, het eerste lid zeer klein. Het ♂ heeft langere sprieten en een gebogen, langen, dunnen hoorn aan de buitenzijde der voorkaken.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam dof, zwart of bruin, kort en fijn grijs behaard en zeer sterk bestippeld. De voorhoeken van het halsschild als een dubbele tand uitstekend, de zijden scherp getand. Dekschilden met ondiepe stippellijnen, in de tusschenruimten met stippeellijnen. Sprieten en pooten geelrood. Onuitgekleurde exemplaren zijn geelachtig. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Om jonge iepen zwermend; ook achter de schors van dennen en vermolde eiken. Bij Rotterdam in groot aantal achter de schors van gevelde boomen, Mei, Juni. In de Rijnprov. bij Crefeld. De larve en pop zijn door Erichson en Perris beschreven. 1. *planata* L.

IV. Tribus PSAMMOECHINI.

4. *Psammoechus* Latreille.

Sprieten 11-ledig, naar het uiteinde geleidelijk, doch weinig verdikt, het eerste lid tamelijk breed en lang. Bovenlip iets uitgerand. Voorkaken met gewonen top en daarachter stomp getand. Achterkaken met twee vliezige, aan het uiteinde gebaarde lobben. Eindlid der kaaktasters zeer groot, eenigszins bijtormig. Tong hoornachtig, van voren iets uitgerand. Voorhoofd aan weerszijden met een langsendruk nabij de oogen. Halsschild veel smaller dan de dekschilden, breeder dan lang, de zijden van voren met kerfstandjes. Dekschilden met stippeellijnen. Prosternale voortzetting tusschen de kleine, kegelvormige voortcoxae zeer smal, zoodat deze zeer dicht aaneenstaan. Gewrichtsholten der voortcoxae van achteren gesloten. Tarsen in beide seksen 5-ledig, het derde lid breed, met twee lobbige zoel, het vierde lid daarin opgenomen.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam roodgeel, de dekschilden meer bleekgeel, lijn geelgrijs behaard; de kop, eene ronde vlek achter het midden op elk der dekschilden, en de voorlaatste 2 of 3 sprietleedjes zwartachtig. Kop en halsschild grof bestippeld. Dekschilden met verdiepte stippeellijnen en eene lijne stippeellijnen in de tusschenruimten. Bij onuitgekleurde exemplaren ontbreekt de zwarte vlek op de dekschilden en zijn de kop en de sprieten geheel roodgeel. Bij eene aberratie vormen de beide zwarte vlekken op de dekschilden een samenhangenden dwarsband. Bij sommige exemplaren zijn de zijden van het halsschild donker gekleurd. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Verbreid, in rietstengels en onder aangespoeld riet en *Carex* langs oevers.

1. *bipunctatus* F.

V. Tribus SILVANINI.

5. Nausibius L. Redtenbacher.

Sprieten 11 ledig, met eene breede, niet scherp afgescheiden, 4-ledige knots. Monddeelen ongeveer als bij Silvanus. De buitenhoeken van den keelrand duidelijk uitstekend. Oogen sterk uitpuilend. Lichaam behaard. Halsschild aan de zijden met afgeronde kerftandjes. Basis der dekschilden te zamen diep uitgerand. De sterniten nagenoeg even lang. Achterdijen sterk verbreed, bij het ♂ gekromd en in het midden van een tandje voorzien.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Donkerbruin, roodbruin of roestkleurig, zeer fijn en kort grauw-geel behaard; de pooten roestrood; bij sommige donkere exemplaren zijn de randen der dekschilden iets lichter. Kop driehoekig, met opgerichten zijrand. Halsschild zoo lang als-, of iets langer dan breed, uiterst dicht bestippeld, met twee samenhangende basaal-groeven, stomp getande zijden en drie zwak aangeduide, verheven langslijnen, waarvan de middelste soms ontbreekt. Dekschilden meer dan tweemaal zoo lang als te zamen breed, weinig of niet breeder dan het halsschild, met uitpuilende, afgeronde schouders en parallele zijden; de afwisselende tusschenruimten der fijne stippelrijen, vooral naar buiten, iets meer kantig verheven. Lengte $3\frac{1}{2}$ –4 mm. In rijst en soms in andere waren, als gedroogde appelen, gemberwortel, campêche-hout, in de peulen van Cassia, enz. In Rotterdam in groot aantal met de larven in eene azijnfabriek op den rand der azijnkuipen rondlopende.

1. *dentatus* Mrsh.

6. Silvanus Latreille.

*Sprieten 11-ledig, de 3 grootere eindledjes even breed. Bovenlip van voren afgerond en dicht bezwimpd. Voorkaken breed, met gespleten top. Achterkaken met twee lobben; de buitenste breed, perkamentachtig, aan het uiteinde afgerond en dicht met borstelharen bezet; de binnenste zeer smal en veel korter. Kaaktasters 4-ledig, de kaaklobben nauwelijks overschrijdend. Tong hoornachtig, iets breeder dan lang, naar voren verbreed, recht afgeknot, aan de hoeken afgerond en aan de randen bezwimpd. Liptasters 3-ledig. Lichaam behaard. Halsschild aan de zijden veelal krachtig getand, de voorhoeken naar buiten spits uitstekend. Basis der dekschilden te zamen zwak uitgerand. De sterniten nagenoeg even lang. Achterdijen gewoon. Het derde tarstlid gewoon, het vierde klein. — De soorten van dit genus leven deels achter boomschors, deels in allerlei waren, als graan, rijst enz. — De larve van *S. surinamensis* is door Erichson, Blisson en Westwood, de pop door Blisson en de larve en pop van *unidentatus* door Perris beschreven.*

Van de 7 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De slapen achter de oogen groot en bultig uitstekend, de oogen daardoor ver van den voorrand van het halsschild afstaande. De zijrand van den clypeus, boven den sprietwortel, kantig opgericht. Halsschild aan de zijden met 6 krachtige, spitse tandjes; over het midden met twee-, door 3 fijne, kielvormige langslijnen begrensde langsgroeven. Dekschilden met regelmatige stippelrijen, de afwisselende tusschenruimten iets meer verheven. Lichaam zeer smal, donkerder of lichter bruin, geelbruin of roodgeel, fijn en vrij dicht geelgrauw behaard. Het ♂, onder den naam van *bicornis* Er. beschreven, onderscheidt zich, doordat de voorrand van den clypeus in twee tandjes uitloopt; de achterdijen zijn getand, de trochanters grooter en in een tandje uitlopend 1). Lengte $2\frac{1}{2}$ –3 mm. Gemeen, met de larven, in allerlei waren, als rijst en andere granen, meel, peper, gedroogde vruchten, zemelen, boekweitdoppen en tabak; soms schadelijk; ook wel eens in insectenverzamelingen nadeelig. Volgens *Karsch* is het nog aan twijfel onderhevig of zij en niet een ander dier de oorzaak is van de verwoestingen aan de moutkorrels, en zij wellicht entomophaag is. (frumentarius F., sexdentatus F.) 1. *surinamensis* L. 2)

1) Volgens *Gallebeau* is *S. bicornis* Er. eene andere, in Zuid-Europa levende soort.

2) Wellicht zou nog in onze havenplaatsen, in ladingen Arachiden-noten, kunnen worden aangetroffen *S. mercator* Fauvel, bij welke de slapen veel kleiner zijn en als bultjes uitsteken, de kop van voren fijner bestippeld is en de sprietledjes breeder zijn dan bij *surinamensis*.

- De slapen achter de oogen niet aanwezig of slechts als een klein tandje uitstekend. De zijrand van den clypeus weinig of niet opgericht. Voorhoeken van het halsschild meer of minder tandvormig uitgetrokken 2
- 2 Geen slapen. Halsschild ongeveer zoo lang als breed, met regelmatig fijn getande zijden, de voorhoeken als een kleine tand uitstekend. Lichaam roodbruin, de dekschilden gewoonlijk iets lichter met een donkeren dwarsband of donker vlekje nabij het midden. Kop en halsschild vrij grof bestippeld, dekschilden met krachtige stippelrijen. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. In groote handelsplaatsen, uit Indië en Amerika ingevoerd. Nog niet in Nederland aangetroffen.
(*fasciipennis* Reitt.) (*signatus* Frauenfeld)
- De slapen als een meer of minder duidelijk klein tandje achter de oogen zichtbaar, bij uitzondering geheel ontbrekende. De zijden van het halsschild niet getand, doch al of niet duidelijk fijn gekarteld. Dekschilden eenkleurig 3
- 3 De slapen als spitse tandjes duidelijk zichtbaar. Voorrand van den clypeus niet opgericht. Dekschilden lang, met parallelle zijden, weinig of niet breeder dan de voorzijde van het halsschild. Bovenzijde tamelijk vlak 4
- De slapen nagenoeg geheel ontbrekend. De zijrand van den clypeus, boven den sprietwortel, iets opgericht. Dekschilden korter, breeder en minder vlak dan bij de aanverwante soorten, veel breeder dan het halsschild. De voorhoeken van het iets gewelfde halsschild lang doornachtig en iets opgericht, de zijden uiterst fijn en onduidelijk gekarteld. Lichaam roodbruin of geelbruin, de basis en het uiteinde der dekschilden, het achterlijf en de pooten roodgeel, veelal ook de geheele onderzijde of wel het geheele lichaam rood- of bruingeel, dof. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Roermond bij *Lasius fuliginosus*, Nov.; Venlo, Warnsveld en Vorden achter boomschors; Lochem, Juni, op Lichenen van dennen. In België en in de Rijn-prov. bij Crefeld.
4. *similis* Er.
- 4 Halsschild over het midden met twee langsgroeven. De tandvormige slapen en de voorhoeken van het halsschild vrij lang en spits naar buiten uitstekend, deze laatsten ook iets opgericht. Lichaam lichter of donkerder bruinrood, dof, uiterst lijn grijs behaard. Kop en halsschild zeer dicht en eenigszins rimpelig bestippeld. Halsschild veel langer dan breed, met zeer lijn gekartelden zijrand; van voren iets smaller dan de dekschilden. Dekschilden met stippelrijen, de smalle tusschenruimten afwisselend iets verheven. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Achter dennenschors. Den Haag; te Rotterdam op wijnvaten 2. *bidentatus* F.
- Halsschild over het midden, door twee zeer onduidelijke langsgroeven slechts iets ingedrukt. De slapen en de voorhoeken van het halsschild veel minder spits, deze laatsten weinig vooruitstekend en niet opgericht. Lichaam roestrood of geelrood, eenigszins glanzig, zeer lijn behaard. Halsschild iets langer dan breed, van voren weinig of niet smaller dan de dekschilden. Dekschilden met stippelrijen, de afwisselende tusschenruimten iets meer verheven. Lengte 2—3 mm. Achter boomschors. Oldenzaal, Boxtel en niet zeldzaam in de omstreken van Maastricht, Juni, Juli. In België bij Visé, in de Rijnprov. bij Aken 3. *uidentatus* F.

7. Cathartus Reiche.

De soorten van dit genus herinneren in habitus deels aan Silvanus, deels aan Cryptophagus. Het eerste of het derde van de 3 eindledjes der sprieten duidelijk kleiner dan de twee overige ledjes. Het derde tarslid lobvormig ingesneden, doch weinig verbreed. Voorhoeken van het halsschild als een stomp tandje zijwaarts uitstekend — De soorten van dit genus zijn door allerlei waren, vooral door rijst en tabak, over de geheele aarde verbreid. — De larve en pop van C. advena zijn door Perris beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Lichaam smal, met parallelle zijden. Dekschilden met stippelrijen. Sprieten vrij kort, het eerste lid der knots van het even groote tweede lid duidelijk afgescheiden, het derde lid klein, smaller, in het voorlaaste verzonken of daar dicht tegen aangevoegd. 2
- Lichaam korter en tamelijk breed, met den habitus van *Cryptophagus*. Dekschilden met eenigszins afgeronde zijden. Halsschild breeder dan lang. 3

- 2 Halsschild veel langer dan breed, met twee onduidelijke basaalgroeffjes, zeer fijn rimpelig bestippeld en fijn behaard, met smalle, gladde middellijn. Dekschilden met dicht oopenstaande, fijne stippelrijen. Lichaam roodbruin, fijn geelgrauw behaard. Deze soort heeft eenigszins den habitus van *Silvanus unidentatus*. Lengte 3—3½ mm. Uit Cuba in tabak ingevoerd; ook in *Cassia-peulen*. Nog niet in Nederland waargenomen.

(cassiae Reiche)

Halsschild zoo lang als breed, iets dichter rimpelig bestippeld, met bijna ontbrekende basaalgroeffjes en smalle, gladde middellijn. Dekschilden met dicht oopenstaande, fijne stippelrijen. Lichaam licht roodbruin, de dekschilden meer geelrood, fijn geel behaard. Lengte 2¼—2½ mm. Evenals de vorige soort uit Cuba ingevoerd. Nog niet in Nederland waargenomen.

(gemellatus Duv.)

- 3 Sprietknots uit drie duidelijk van elkaar gescheiden leedjes bestaande, het tweede lid grooter dan het eerste en derde. Dekschilden met fijne, naar het uiteinde verwarde stippelrijen. Halsschild zeer fijn bestippeld, met zijwaarts uitstekende voorhoeken. Lichaam lichter of donkerder roestrood, iets glanzig, fijn en kort geelachtig behaard; soms zijn kop en halsschild iets donkerder. Lengte 2—2½ mm. In rijst, gedroogde appelen, aardnoten en andere waren; door den handel over de geheele aarde verbreid. 1. *advena* Waltl.

Spriet en iets korter, het eindlid van de 3-ledige knots dichter tegen het tweede lid aangevoegd. Dekschilden zonder stippelrijen, doch vrij grof dwarsrimpelig. Overigens aan *advena* naverwant. Lengte 1½—2 mm. Ik bezit een enkel exemplaar, met *advena* in gedroogde appelen gevonden 2. *excisus* Reitt.

Airaphilus Ludw. Redtenbacher.

Spriet en 11-ledig, naar het uiteinde geleidelijk verdikt, de drie eindleedjes van de overigen niet scherp afgescheiden. Bovenlip door den van voren afgeronden clypeus bedekt. Voorkaken sikkelvormig gebogen. Achterkaken met twee korte, half-hoornachtige, aan het uiteinde gebaarde lobben, de binnenste smaller en iets korter, aan het uiteinde met haakvormige borstelharen bezet. Tong hoornachtig, eirond; de doorschijnende, afgeronde voorrand fijn bewimperd. De buitenhoeken van den keelrand duidelijk uitstekend. Oogen grof gefacetteerd. Voorhoeken van het halsschild niet uitstekend, de zijden zeer fijn gekarteld. Het eerste sterniet zoo lang als de twee volgende te zamen. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Tarsen in beide seksen 5-ledig. Al of niet gevleugeld. — De soorten van dit genus leven tusschen grassen.

Van de 14 Europeesche soorten zou 1 in Nederland kunnen worden aangetroffen.

Lichaam lang-gestrekt, smal, zwartbruin, op de bovenzijde vrij dicht grauw behaard; de dekschilden, de spriet en de pooten donker roodbruin. Kop driehoekig. Halsschild veel langer dan breed, naar de basis versmald, slechts iets smaller dan de dekschilden, met afgeronde, zeer fijn gekartelde zijden en rechte achterhoeken. Dekschilden met parallelle zijden, ongeveer viermaal zoo lang als te zamen breed, met dicht oopenstaande stippelrijen. Ongeveugeld. Lengte ruim 3 mm. Op het duinzand langs de Noord- en Oostzee en op vochtige weilanden. Niet inl. Ik zag een exemplaar uit het Weener Hofmuseum.

(elongatus Gyll.)

VI. Tribus HYPOCOPRINI.

8. Hypocopus Motschulsky.

Spriet en 11-ledig, met scherp afgescheiden, 3-ledige knots. Bovenlip dubbel zoo breed als lang, de bewimperde voorrand iets uitgebogen. Voorkaken met haakvormig gebogen top, daarachter met twee groote, stompe tanden. Achterkaken met twee lobben, welke aan het uiteinde en aan den binnenrand met lange, gekromde borstelharen bezet zijn; de binnenste lob zeer smal en moeielijk te onderscheiden. Eindlid der kaaktasters gewoon. Kin aan het uiteinde diep uitgesneden. Tong hoornachtig, van voren afgerond en bewimperd. Keelrand van voren recht afgesneden. Lichaam langwerpig, in habitus aan *Monotoma* herinnerend. Dekschilden verward bestippeld,

Het uiteinde van het pygidium onbedekt latend. Prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae zeer smal eindigend. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Tarsen in beide seksen 5-ledig.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam zwart of bruinzwart, de sprieten en pooten roodbruin. Halsschild iets langer dan breed, zeer fijn en verspreid bestippeld. Dekschilden iets breeder dan het halsschild, bijna dubbel zoo lang als breed, zeer fijn bestippeld en behaard. Lengte 1 mm. In de Scheveningsche duinen, in April en Mei, tusschen plantenaafval; zij zou ook in drogen mest voorkomen. 1. *quadrifollis* Reitt.

XXX. Familie MONOTOMIDAE.

Fig. 50. Monotoma.
Uiteinde van een achterpoot. Orig.

Deze kleine familie, welke slechts uit een enkel genus bestaat, is zeer verwant aan de Lathridiidae en aan de Cucujidae. Zij onderscheidt zich vooral doordat de vrij dikke sprieten 10-ledig, en van een grooten, onduidelijk geringden eindknop voorzien zijn. Ook zijn alle tarsen 4-ledig (Fig. 50). — Het lichaam is gestrekt, herinnert enigszins aan *Silvanus*, en is op de bovenzijde ruw. — Sprietwortel onbedekt, op het voorhoofd vóór de oogen ingeplant. — Bovenlip afgerond, bijna geheel door den clypeus bedekt. Voorkaken met 2-tandigen top. Achterkaken 2-lobbig 1); de binnenste lob is hoornachtig, tamelijk breed, nagenoeg zoo lang als de buitenste, aan het uiteinde en daarachter met dikke, gebogen borstelharen bezet; de buitenste lob eveneens hoornachtig, dun, draadvormig en aan het uiteinde met een kleinen, wellicht bewegelijken haak bezet. Kaaktasters dik, 4-ledig; het eerste lid klein, het 2de groot, kogelvormig-eirond, het 3de korter en smaller, het eindlid veel dunner en min of meer eivormig toegespitst. Tong langwerpig-vierhoekig, hoornachtig, aan het uiteinde iets verbreed, de voorrand recht, vliezig. Liprasters dik, 3-ledig, het eerste lid klein, het 2de zeer groot, kogelvormig-eirond, het eindlid veel dunner, kogelvormig en afgeknut. — Dekschilden aan het uiteinde enigszins afgeknut, het pygidium gedeeltelijk onbedekt latend. Achterlijf met 5 vrij bewegelijke sterniten, het 1ste en 5de verlengd, de 3 middelsten korter en even lang. Bij het ♂ is een klein bijkomend sterniet voorhanden, evenals bij *Rhizophagus*. — Voorcoxae klein, rond, door het prosternum gescheiden, zonder trochanters, hare gewrichtsholten van achteren geheel gesloten. Middelcoxae klein, rond, door de epimeren van het mesosternum gesloten. Achtercoxae breed-ovaal, tamelijk van elkaar verwijderd. Alle tarsen 4-ledig 2), het klauwlid langer dan de overige leedjes te zamen; klauwen gewoon (Fig. 50).

1. *Monotoma* Herbst.

De soorten van dit genus leven tusschen allerlei plantenaafval en gedeeltelijk in mierennesten.

Van de 18 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Kop langwerpig, enigszins vierhoekig, zonder groefjes; de slapen minstens $\frac{2}{3}$ van de lengte der oogen bedragend en stomp afgerond (Sub-gen. *Gyrocecis* Thoms.) 2
- 2 Kop kort-driehoekig, met of zonder duidelijke langsiindrucken; de slapen veel korter dan de oogen, stomp of in een meer of minder scherp tandje uitgetrokken (Sub-gen. *Monotoma* isp.) 6
- 3 Halsschild zoo lang als breed, naar voren niet versmald; met 4 groeven, welke twee aan twee samenhangen en twee langsgroeven op het midden vormen. Lichaam vrij kort, bruin of roodbruin. 3
- 4 Halsschild naar voren duidelijk versmald, slechts met twee basaalgroeven. 4
- 5 Kop van af de oogen naar voren geleidelijk versmald. Halsschild met breed afgezetten zijrand. Dekschilden van boven tamelijk vlak. Lichaam geheel roodgeel, de bovenzijde met zeer fijne,

1. Volgens *Aube* slechts 4-ledig, ik zag bij microscopisch onderzoek 2 lobben.

2. 4-ledig volgens *Frickson*, *Horn* en *Neulitz*. 4-ledig volgens *Leconte*, *Aube* en *Muschulsky*. 5-ledig volgens *Leconte* en *F.* 3-ledig volgens *L. Reitter*. Bij microscopisch onderzoek zag ik 4 ledjes aan alle tarsen.

neerliggende grauwe haartjes bezet, welke op de dekschilden iets langer en in rijen geplaatst staan. Lengte 2 mm. In keldervuul, ook in gras, in tuinen en vooral in schepen geladen met arachiden-noten. Niet inlandsch. Zij zou in Hannover voorkomen. Ik zag een exemplaar uit het Weener Hofmuseum.

(subquadrifoveolata Waterh., quadriimpressa Reitt. nec Mots., ferruginea Bris., quadrifoveolata Fowl. nec Aubé) (rufa Redt.)

Kop van af de inplanting der sprieten naar voren versmald, de slapen zoo lang als de oogen. Halsschild met lijnen en weinig afgezetten zijrand, de vier groeven groot en onderling gelijk. Dekschilden gelijkmatig gewelfd. Lichaam bruin of roodbruin, op de bovenzijde dicht met korte neerliggende, geelgrauwe haartjes bezet, welke op de dekschilden minder dicht en in rijen geplaatst staan; de sprieten en pooten roestrood. Bij het ♂ is het metasternum zwak ingedrukt en het eerste sterniet duidelijk uitgehold. Lengte 2—2½ mm. Tezelfder plaatse met rufa; ook in vochtigen plantenaafval. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberfeld. (subquadrifoveolata Fowl., nec Waterh.) (quadrifoveolata Aubé, Mots.)

4 Dekschilden ongeveer tweemaal zoo lang als breed. De slapen langer dan de oogen. Lichaam lang-gestrekt 5

Dekschilden nauwelijks 1½ maal zoo lang als breed. De slapen ongeveer ¾ van de lengte der oogen bedragend. Halsschild iets langer dan breed, naar voren weinig, doch duidelijk versmald, met zeer spits uitstekende voorhoeken, grof getande, in 't midden iets afgeronde zijden en afgeronde achterhoeken. Deze soort heeft den habitus van picipes, doch is meer gedrongen en vooral onderscheiden door de veel langere slapen. Lichaam donkerbruin, roodbruin of roestkleurig. Het halsschild grof, de dekschilden in rijen korrelig bestippeld. Lengte 2 mm. Niet inl. In België; in de Rijnprov. bij Crefeld. In Oldenburg aan beschimmeld brood gevangen. (spicicollis Aubé)

5 Halsschild naar voren sterk versmald, met smal-lobvormig uitstekende voorhoeken, scherp aangeduide, stompe achterhoeken en scherp gekorven zijden. Dekschilden aan de schouders het breedst, naar het uiteinde geleidelijk versmald, zonder verheven schouderplooi. Lichaam donkerbruin, dof, de dekschilden meer roodbruinachtig; soms het geheele lichaam meer roodbruin of roodachtig. Kop en halsschild dicht grof korrelig, met korte, geelachtige borstelhaaren bezet. Dekschilden in langrijen rimpelig bestippeld en met langrijen van korte, geelachtige borstelhaartjes bezet. Schenen bij het ♂ gekromd. Lengte 2½—3 mm. In de nesten van Formica rufa en pratensis. Verbreid in de diluviale streken; ook een paar malen bij den Haag. 1. conicicollis Aubé.

Halsschild naar voren weinig versmald, met tandvormig, doch veel minder uitstekende voorhoeken, eenigszins afgeronde, scheef afgestompte achterhoeken en minder duidelijk gekorven zijden. Dekschilden iets korter en meer in het midden het breedst, met eene kleine, verheven schouderplooi. Schenen in beide seksen gewoon. Overigens als conicicollis. Lengte 2½—2 mm. Gemeen in de nesten van Formica rufa en pratensis, vooral in de duinstreken; ook bij Doorn en Roermond. 2. angusticollis Gyll.

6 Kop met twee duidelijke langsdrukken. Halsschild aan de basis, naast de achterhoeken, scheef afgeknor. Bovenzijde grof korrelig bestippeld. De slapen als scherpe tandjes uitstekend. Dekschilden 1½ maal zoo lang als het halsschild, naar het recht afgeknotte uiteinde versmald. Lichaam zwartachtig of donkerbruin, met zeer korte, op de dekschilden in rijen staande, grauwe borstelhaartjes bezet; sprieten en pooten roestrood; de dekschilden soms meer roodbruinachtig. Onuitgekleurde exemplaren zijn geheel roestkleurig. Halsschild slechts iets langer dan breed, met nagenoeg parallele, fijn gekorven zijden en spits uitstekende voorhoeken. Dekschilden, van terzijde gezien, vooral op de voorhelft dwarsrimpelig. Bij het ♂ het eerste sterniet een weinig uitgehold. Bij de var. * brevipennis Kunze zijn de dekschilden korter en naar het uiteinde minder versmald, niet dwarsrimpelig, lichter gekleurd en met geelachtige schouders; de zijden van het halsschild onduidelijk gekorven en de voorhoeken meer stomp. Lengte 2—2½ mm. Verbreid. In groot aantal bij Delft, op het terrein van eene voormalige suikerfabriek, onder allerlei plantenstoffen en afval der beetworfels; ook tegen de ramen van eene broeikas, onder verdroogden koemest en soms bij mieren. De var. brevipennis is mij onbekend; zij zou in de Rijnprov. voorkomen.

(scabra Kunze) 3. picipes Herbst.

Kop zonder langsdrukken 7

7 Halsschild met meer of minder parallele zijden, aan de basis zoo breed als van voren; de basis, aan weerszijden naast de duidelijke achterhoeken, scheef afgeknor. Bovenzijde grof, min of meer rimpelig bestippeld. De slapen als een meer of minder uitstekend, stomp tandje 8

Halsschild naar achteren versmald, aan de basis smaller dan van voren, met spitse voorhoeken; de basis en de achterhoeken afgerond, de zijden onduidelijk gekorven. De slapen als scherpe tandjes uitstekend. Bovenzijde zeer fijn behaard, iets glanzig en tamelijk lijn bestippeld, bruin of lichter of donkerder roodbruin. Spriet en pooten roodachtig. Dekschilden met stippelrijen. Lengte $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{3}{4}$ mm. Niet zeldzaam; in gras, op vochtige planken, onder plantenalval, dorre bladeren, tegen muren en rondvliegend.

(*flavipes* Kunze) 6. *longicollis* Gyll.

3 Halsschild zoo lang als breed, met tamelijk rechte, vrij duidelijk gekorven zijden en rechte voorhoeken. Lichaam vrij lang-gestrekt, zwartachtig, bruin of roodbruin, met korte borstelhaartjes bezet. Spriet en pooten rood; soms de dekschilden geheel of alleen naar het uiteinde roodbruin; onuitgekleurde exemplaren zijn geheel roestkleurig. De slapen als een uitstekend stomp tandje. Lengte 2 – $2\frac{1}{4}$ mm. Zeldzaam; met *picipes* tegen de ramen van eene broeikas; ook bij Rotterdam. 4. *brevicollis* Aubé.

Halsschild langer dan breed, de tusschenruimten der stippels ruw en dof. Deze soort heeft den habitus van *picipes*, doch is smaller en vooral onderscheiden door den niet gegroefden kop. Lichaam zwartachtig of donkerbruin, de dekschilden roestrood, om het schildje iets donkerder, zeldzamer evenals het overige lichaam donker gekleurd, met iets lichtere schouders; spriet en pooten roodgeel. Halsschild met duidelijk naar buiten uitstekende voorhoeken, onduidelijke basaalgroefjes en parallelle, bijna gave zijden. Dekschilden rimpelig bestippeld en evenals kop en halsschild met zeer korte, doch in rijen geplaatste, gele borstelhaartjes bezet. Bij de var. *quisquiliarum* Redt. steken de voorhoeken van het halsschild niet tandvormig uit en zijn de dekschilden altijd roestrood. Lengte 2 – $2\frac{1}{4}$ mm. Met *picipes* gemeen op het terrein van eene voormalige suikerfabriek bij Delft, onder oud stroo en dorre bladeren, welke met den afval der beetwortels vermengd waren; ook bij den Haag, St. Pieter bij Maastricht en bij Nootdorp op een boerenerv onder beschimmeld hooi met de var. *quisquiliarum*. 5. *quadracollis* Aubé.

XXXI. Familie LYCTIDAE (Fig. 51).

Eene kleine familie, welke de meeste verwantschap heeft met de *Silvanini* (Fam. *Cucujidae*), doch ook enkele punten van overeenkomst vertoont met de *Colydiidae*, *Cloidae*, *Anobiidae* en in nervatuur der vleugels met de *Apatidae*.

Fig. 51.

1. *Oxytelus boveicollis* Redt. Orig.

De kop is tot aan de sterk uitpuilende oogen in het halsschild terugtrekbaar, de clypeus door een diepen dwarsindruk van het voorhoofd afgescheiden en vóór de oogen bochtig versmald; de zijden van het voorhoofd boven den sprietwortel min of meer bultig opgericht. — Spriet 11-ledig, met twee grootere eindledjes. — Bovenlip uitgerand en lang bewimperd. Voorkaken klein, met twee-tandigen top. Achterkaken met twee vliezige, nagenoeg even lange, aan het uiteinde lang gebarde lobben, van welke de binnenste iets breeder is. Kaaktasters vrij lang, draadvormig, het eindlid langer dan het voorlaatste, eivormig toegespitst. Kin zeer kort en breed, naar voren stomp toegespitst, de tong bedekkend. Liptasters draadvormig, het eindlid langer dan de twee voorafgaande ledjes, geleidelijk toegespitst. — Lichaam lang-gestrekt, min of meer cilindervormig. — De zijden van het halsschild duidelijk gerand en soms meer of minder duidelijk getand of gekarteld. — De dekschilden het geheele achterlijf bedekkend. — Prothorax aan weerszijden met eene duidelijke zijlijn, welke de pleurae van het prosternum afzondert. Pleurae van den metathorax smal, hare epimeren onduidelijk. — De vleugel van *Lyctus unipunctatus* heeft, naar teekeningen van den Heer K. Kemper, in de nervatuur de meeste overeenkomst met die van *Apat. capucina* (Fam. *Apatidae*), doch het gewricht ontbreekt de driehoekige cel; eveneens ontbreekt de vena cubitalis en is van de vena interno-media slechts de bovenste cel, van de vena analis slechts een kort takje aanwezig. Ook is nog eene niet bewimperde lob voorhanden. — Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren gesloten. Voorschienen aan het uiteinde naar buiten tandvormig verbreed. Tarsen 5-ledig, het eerste lid zeer klein en grootendeels in de scheen verborgen. Achterlijf met vijf sterniten, van welke het eerste het langst is. — De soorten leven met hare larven in hout, achter boomschors en in drogerijen, als wortels, kruiden, schors, enz.

Eindlid der sprieknoks eivormig, nimmer cylindervormig verlengd. Zijrand van den kop met eene bultige langs-verhevenheid boven den sprietwortel en daarvoor met een tandvormig bultje. Zijden van het halsschild uiterst fijn-, soms onduidelijk gekarteld en veelal met fijne, gebogen borstelhaartjes bewimperd. Dekschilden met stippel- en haarrijen. Voorschenen met kleine, tamelijk rechte einddoornen. Tarsen tamelijk slank, het klauwlid gewoon; klauwen vrij lang 1. *Lyctus*.

Eindlid der sprieknoks cylindervormig-verlengd. Zijrand van den kop aan weerszijden met drie zwak aangedoide, tandvormige bultjes. Zijden van het halsschild fijn getand en evenals de zijden der dekschilden met schubachtige borstelhaartjes bewimperd. Dekschilden met fijne stippelrijen en met rijen opstaande, schubachtige borstelhaartjes. Voorschenen met een vrij grooten, gebogen einddoorn. Tarsen vrij kort, het klauwlid meer knotsvormig verdikt; de klauwen korter 2. *Lyctophilis*.

1. *Lyctus* Fabr.

Eindlid der sprieknoks eivormig, het voorlaatste lid enigszins driehoekig. Zijrand van den kop met eene bultige langs-verhevenheid boven den sprietwortel en daarvoor met een tandvormig bultje. Oogen sterk uittuilend. Halsschild aan de zijden uiterst fijn-, soms onduidelijk gekarteld en veelal met fijne, gebogen borstelhaartjes bewimperd. Dekschilden met parallelle zijden, met stippel- en haarrijen. Voorschenen aan het uiteinde tandvormig verbreed en met kleine, tamelijk rechte einddoornen. Tarsen tamelijk slank, het klauwlid gewoon; de klauwen vrij lang. — De soorten van dit genus leven in hout en achter boomschors. — De larve en pop van *L. unipunctatus* zijn door Perris en Nordlinger, de larve ook door Kaltenbach en de larve van *pubescens* Panz. door Heeger beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

1 Halsschild naar achteren duidelijk versmald, met een zeer ondiepen of onduidelijken indruk over het midden; de basis naast de achterhoeken gewoon scheef afgesneden 2

Halsschild bij het ♂ met parallelle zijden, bij het ♀ naar achteren iets versmald, smaller dan de dekschilden, rimpelig bestippeld, dicht behaard; met eene diepe, van voren en van achteren afgekorte middengroef; de basis naast de achterhoeken duidelijk uitgerand. Dekschilden met langsstrepen, waarin groote, ondiepe stippels; de tussehenruimten in rijen behaard. Slechts het voorhoofd aan de zijden bultig opgericht. Lichaam geelbruin of licht roodbruin, veelal met iets donkerder kop en halsschild; of geheel donkerbruin met lichter gekleurde schouders; sprieten en pooten roestkleurig. Kleine exemplaren met minder diep gegroefd halsschild vormen *pubescens* Dfts. Lengte 2½—5½ mm. Hier en daar vrij gemeen aan zieke esschen, eiken, iepen en populieren; ook aan paalwerk, waarin zij gaten vreet en in huizen aan oude balken en tegen vensters aangevlogen.

(canaliculatus F.) 2. *unipunctatus* Herbst.

2 Dekschilden fijn bestippeld, over het midden elk met 4 of 5 fijne langsstrepen. Halsschild grof bestippeld, tamelijk glanzig, aan de afgeronde, verbreede voorhoeken zoo breed als de dekschilden, met een breeden, ondiepen midden-indruk. Clypeus en voorhoofd aan de zijden boven den sprietwortel als twee bultjes opgericht. Lichaam eenkleurig roodbruin, zeer fijn behaard. Voordijen veel sterker verdikt dan bij de overige soorten. Lengte 2½—4½ mm. Door den handel verbreid; enkele malen uit wormstekige wandelstokken (zg. eubarebe) ontwikkeld; ook in zoethout gevonden.

(glycyrrhizae Chevrol.) 1. *brunneus* Steph.

Dekschilden met diepe stippellijnen en enigszins geweldde, in rijen behaarde tussehenruimten. Halsschild rimpelig bestippeld en behaard, smaller dan de dekschilden, meestal met de aanduiding van eene smalle middengroef. Slechts het voorhoofd boven den sprietwortel met een bultje. Lichaam zwartachtig, de dekschilden en de onderzijde gewoonlijk geelbruin of licht roodbruin; de sprieten, de pooten en gewoonlijk de voorrand van het halsschild geelbruin of roodbruin. Lengte 3½—4½ mm. De larve overwintert in het spint van geveld eikenhout, vooral wanneer het op vochtige, beschaduwde plaatsen ligt; zij verpoot in April en verschijnt in Mei als kever. De kevers komen na zonsoudergang te voorschijn en zwermen gedurende een gedeelte van den nacht rond. Niet inf. In België bij Luik en in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld (bicolor Comolli) (*pubescens* Panz.)

2. *Lyctopholis* Reitter (Fig. 51).

Eindlid der sprietknots cilindervormig-verlengd, ongeveer de helft langer dan het voorafgaande lid. Zijrand van den kop, aan weerszijden, met 3 zwak aangeduide, tandvormige bultjes. Halsschild vrij dicht bestippeld en met korte schubhaartjes bezet; over het midden met een ellips-vormigen langsindruk; aan de zijden fijn getand en met vrij lange, knotsvormige, schubachtige borstelhaartjes bewimperd. Dekschilden iets breeder dan het halsschild, met tamelijk parallelle zijden; met fijne stippelrijen, welke uit oppervlakkige navelstippjes bestaan en iets of wat rimpelige tusschenruimten; langs de zijden eveneens met vrij lange, knotsvormige, schubachtige borstelhaartjes bewimperd, en over de oppervlakte met langsrijen van dicht opeenstaande, witte, knotsvormige schubhaartjes, welke gemakkelijk afgeworpen worden. Voorscheneen aan het uiteinde tandvormig verbreed en met een vrij grooten, gebogen einddoorn. Tarsen vrij kort, het klauwlid knotsvormig verdikt.

Lichaam min of meer cilindervormig, lichter of donkerder roodbruin, eenigszins glanzig.

De eenige bekende soort, welke 2—3 mm. lang is, is over de geheele aarde verbreid en leeft in drogerijen; ook in groot aantal levend aangetroffen in de schors van *Butea frondosa* uit Oost-Indië 1. *foveicollis* Reitt.

XXXII. Familie BYTURIDAE.

(Trixagidae Cat. Col. Eur., v. Heyd., Reitt., Weise)

Deze kleine familie, van welke slechts een enkel genus bekend is, schijnt het naast verwant te zijn aan de Nitidulidae (*Cychramus*), en ook met *Telmatophilus* en vooral met *Diplocnelus* onder de Cryptophagidae punten van verwantschap te vertoonen. *Burmeister* plaatst *Byturus* wegens den vleugelbouw in de onmiddellijke nabijheid van de Trogositidae en Tritomidae; volgens *Kraatz* kan het genus als een van de Nitidulidae afwijkende vorm beschouwd worden. Ook zou het als een overgang tot de Melyridae kunnen gelden en aldaar zijne naaste verwanten vinden bij het genus *Danacea*. Met de Nitidulidae heeft het de meeste kenmerken gemeen, o.a. denzelfden sprietvorm, de nagenoeg gelijke voorkaken, denzelfden vorm van kin en tong alsook van het prosternum, met de van achteren geheel gesloten gewrichtsholten der gelijk gevormde voorcoxae; ook dezelfde gedaante en ligging der epimeren en episternen van den metathorax, hetzelve aantal sterniten en eindelijk denzelfden bouw der tarsen.

Fig. 52. *Byturus* Orig.
I. Voorkaak. II. Tars.

— Spriet 11-ledig, met drie tot eene knots vereenigde, grootere eindledjes; aan de zijden van den kop, vóór de oogen, ingeplant. Bovenlip slechts weinig uitstekend, zeer verbreed. Voorkaken achter het uiteinde met eenige stompe kerfandjes (Fig. 52, I), wat onder de kevers over het algemeen weinig voorkomt, doch ook bij de Cryptophagidae en bij *Danacea* onder de Melyridae gevonden wordt; aan de basis met een bewimperden zoom. Achterkaken met twee hoornachtige, sterk gebaarde lobben; de buitenste naar het uiteinde verbreed en iets langer dan de binnenste, de binnenste slechts weinig korter en smaller. Tasters draadvormig; de kaaktasters 4-ledig, het eerste lid het kleinste, het tweede sterk verdikt, het derde dunner doch niet korter, gebogen, het vierde het langst, nagenoeg cilindervormig en in 't midden slechts iets verbreed, het uiteinde scheef afgeknot; lipstasters 3-ledig, de eerste twee ledjes nagenoeg gelijk, het eindlid langwerpig-cirond. Kin vrij groot, geheel hoornachtig, naar voren versmald, aan het uiteinde diep en breed uitgerand, aan weerszijden met scherpe voorhoeken. Tong aan de basis hoornachtig, naar voren sterk verbreed, aan de zijden afgerond en aan de voren vlak uitgerand.

Kop groot, diep in het halsschild verzonken, met groote oogen. — Halsschild gewelfd, breeder dan lang, ongeveer zoo breed als de dekschilden; de zijden, vooral van achteren, breed afgezet en opgericht, de achterhoeken spits. — De dekschilden bedekken en omvatten het geheele achterlijf. Bij de vleugels van *Byturus tomentosus* is volgens *Roger* het gewricht iets achter het midden gelegen, het topgedeelte vrij groot, zonder aderen en iets bruinachtig gepigmenteerd. De teruglopende takken der venae scapularis en externo-media zijn in het bij-aan-gedeelte der area externo-media zeer kort en hangen door eene dwarsverbinding te zamen; de teruglopende tak van de vena scapularis is ook met de hoofdadere door eene dwarsverbinding ver-

bonden, zoodat hier eene cel ontstaat, wier buitenhelft gepigmenteerd is. De vena externo-media is naar buiten een weinig concaaf. In de area interno-media loopt eene bijader, welke uit de basis ontspringt, iets onder het midden tot aan de vena interno-media, nadat zij zich reeds op de helft van haar verloop door eene dwarsanastomose met deze verbonden heeft, zoodat tegen de basaalhelft der vena interno-media twee lang-gestreckte cellen aanliggen, van welke de onderste met het wigvormige vakje der Caraboidae overeenkomt. Dan bevinden zich in deze area nog twee bijaders, welke tegen den achterrand divergeeren, van welke de buitenste eene ovale pigmentvlek doorsnijdt; de beide bijaders zijn aan het begin, wat ongeveer tegenover het laatste vijfde gedeelte der vena interno-media gelegen is, onderling door eene zeer korte- en met de vena interno-media door eene langere dwarsanastomose verbonden; een derde dwarstak richt zich, op deze laatste rechthoekig staande, tegen het midden der vena externo-media, bereikt deze echter niet, doch eindigt vorksgewijs in twee zeer korte, vrije takjes, van welke het binnenste tegen het wigvormige vakje gericht is, op welks midden zich een kort uitsteeksel vertoont, dat op het rudiment van eene grootere cel duidt, welker buitenste begrenzing uitgewischt is. In de area analis gaat uit het onderste derde gedeelte der vena interno-media eene gewone bijader tot den achterrand; de vena analis is gewoon. De achterrand is bewimperd en het basaal-lobje door eene vrij diepe inkerving afgescheiden, doch niet bewimperd. De vleugel wordt slechts in het topgedeelte in verscheidene, scheef tegen elkaar liggende plooiën dicht gevouwen. In het aderverloop vertoont zich ook overeenkomst met de vleugels der Tritomidae en met die van Corynetes onder de Cleridae. Prosternum tusschen de groote, sterk verbreedte, cylindervormige voorcoxae toegespijst. — Achtercoxae nagenoeg tegen elkaar aanstootend, slechts door eene smalle, toegespijste voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Tarsen 5-ledig, het eerste lid klein, het tweede en derde hartvormig uitgerand, van anderen zolig en gelobd, het vierde zeer klein en met den wortel van het lange klauwlied in het derde verborgen (Fig. 52, H). Klauwen aan den wortel met een breeden tand. Het ♂ onderscheidt zich door de iets gebogen voorschienen, welke in de voorhelft van een spits bulgie voorzien zijn. — De soorten hebben den habitus van Dermestes. — De larven zijn cylindervormig, donker geelachtig, borstelig, met zes ocellen aan weerszijden van den kop, 4-ledige sprieten en vrij lang behaarde pooten; zij leven gedurende de maanden Juni en Juli in bramen en frambozen, welke zij uitvreten. Volgens *Bouché* zouden zij, wanneer deze schijnvruchten rijp geworden zijn, zich in reuten van hout a. a. verbergen en binnen een aangekleefd omhulsel verpoppen. De kevers zijn vooral gemeen in tuinen op bloemen.

1. Byturus Latreille.

(*Trixagus* Kugelann, pars)

De zijrand van het halsschild tot aan de voorhoeken duidelijk vlak uitgebreid en opgebogen. Oogen groot. Bovenlip vooruitstekend, duidelijk zichtbaar. Bovenzijde zeer dicht bestippeld, hetzij geheel roodgeel of met donker halsschild, in welk geval de geheele bovenzijde dooiergeel, soms vaalgeel behaard is; of wel de geheele bovenzijde zwartachtig of donkerbruin met grauwe of geelgrauwe beharing. Onderzijde geelgrauw behaard. Pooten roodgeel. Lengte 4—5 mm. Gemeen op bloeiende *Ranunculus*- en *Rubus*-soorten.

(*Rosae* auct.) 1. *fumatus* F.

De zijrand van het halsschild niet tot aan de voorhoeken vlak uitgebreid en opgebogen. Oogen kleiner. Bovenlip weinig zichtbaar. Bovenzijde zeer dicht bestippeld, zwart of donkerbruin en dicht grau of geel-grauw behaard; bij ab.c. *flavescens* Mrsh. (*ochraceus* Scriba) roodbruin en licht geel of grauwegeel behaard. Sprieten en pooten roodgeel. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Gemeen op bloeiende *Rubus*-soorten, vooral op frambozen. De larve is door *Bouché* beschreven. (*sambuci* auct.) 2. *tomentosus* de Geer.

XXXIII. Familie TRITOMIDAE.

(*Mycetophagidae* auct.)

Eene kleine familie, welke de naaste verwantschap vertoont met de *Erotylidae*, *Colydiidae* en *Cryptophagidae* (*Diphyllus*), doch ook eenigszins aansluit aan de *Dermestidae*. — Lichaam langwerpig, vlak gewelfd, op de bovenzijde meer of minder lijn behaard. — Sprieten 11-ledig, geleidelijk verdikt of met 4 of 5 duidelijk grootere eindleedjes (*Tritoma*), of wel met meer of minder duidelijk afgescheiden 3-ledige knots 1). — Clypeus bijna altijd door eene diepe dwarsgroef of duidelijke (bij *Litargus* echter onduidelijke) dwarslijn van het voorhoofd afgescheiden. Bovenlip

1) Bij het *Z.-Europeesche* genus *Berginus* slechts met 2 grootere eindleedjes.

onbedekt, hoornachtig, de voorkaken bedekkend. Voorkaken gebogen, met twee-tandig uiteinde, aan den binnenrand met eene huidplooi en aan de basis met een kauwvlak. Achterkaken twee-lobbig. Kaaktasters 4-ledig, vrij lang en tamelijk dik, de lipstasters draadvormig, 3-ledig. Tong hoornachtig (bij *Litargus* vliezig), de paraglossen verborgen. — Metasternum tusschen de middelcoxae diep liggend en smal. — Achterlijf met 5 vrij bewegelijke sterniten. — Voorecoxae rondachtig; achtercoxae dwars-cylindervormig, nagenoeg tegen elkaar aanstoetend en slechts door eene smalle voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Tarsen 4-ledig, bij het ♂ de voortarsen in den regel slechts 3-ledig. — De nervatuur der vleugels van *Tritoma* 4-pustulata vertoont, zooals uit de afbeelding bij *Burmeister* blijkt, groote overeenkomst met die van *Orthocerus* (*Colydiidae*) en *Engis* (*Erotylidae*). Het gewricht is achter het midden gelegen en daardoor het topgedeelte klein; bijaders en dwars-anastomosen zijn zeer ontwikkeld; ook is de pigmentvlek naast het uiteinde der vena externo-media voorhanden. De vena analis is geheel ontwikkeld; het basaallobe echter niet aanwezig, daar de inkerving, welke het anders begrenst, even zwak aangeduid is als daar waar de vena externo-media in den achterrand uitmondt. — De soorten leven met hare larven in boomzwammen, paddestoelen, achter boomschors en in schimmelende molm van boomstronken. — De larven hebben 5 ocellen.

- 1 Sprietten geleidelijk verdikt of met 4 tot 5 duidelijk grootere eindleedjes. Dekschilden met stippellijnen of stippelrijen. Clypeus door eene verdiepte dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Oogen verbreed, met eene uitranding tegen de implanting der sprietten. Halschild aan weerszijden met een basaalgroefje. Schenen zeer fijn gedoornd; het 1ste lid der voortarsen bij het ♂ aan de onderzijde lang behaard 1. **Tritoma.**
- Sprietten met 3-ledige knots. Dekschilden zonder stippellijnen of stippelrijen, slechts bij *Typhaea* met eene zeer flauwe aanduiding ervan 2
- 2 Oogen iets verbreed, met eene uitranding tegen de implanting der sprietten. Clypeus door eene diepe dwarsgroef van het voorhoofd gescheiden. Halschild aan de zijden lijn gekarteld. Voorschenen lijn gedoornd. Bovenzijde grof bestippeld. 3
- Oogen rond. De zijden van het halschild gaaf. Voorschenen lijn behaard, aan het uiteinde met kleine doornjes. Bovenzijde zeer fijn en dicht behaard 4
- 3 Halschild aan weerszijden met een basaalgroefje. Eindlid der kaaktasters met stomp afgeronden top. Sprietknots scherp afgescheiden, met smaller eindlid. Mesosternum gewoon, klein. Voorrand van het prosternum bij het ♀ met een rond groefje. (*Pseudotriphyllus*.)
- Halschild zonder basaalgroefjes. Eindlid der kaaktasters sterk afgeknut. Sprietknots slechts weinig scherp afgescheiden, met even breede leedjes. Mesosternum tamelijk breed, met twee naar voren divergeerende, kielvo misge verhevenheden. Prosternum bij het ♀ zonder groefje. 2. **Triphyllus.**
- 4 Clypeus slechts door eene zeer onduidelijke dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Achterhoeken van het halschild eenigszins spits uitgetrokken, de dekschilden omvattend. Tong vliezig. Bovenzijde zeer fijn behaard 3. **Litargus.**
- Clypeus door eene duidelijke dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Achterhoeken van het halschild stomp, min of meer afgerond. Tong hoornachtig. De dekschilden in zeer onduidelijke rijen bestippeld en met rijen langere haren 4. **Typhaea.**

1. *Tritoma* Geoffroy.

(*Myecetophagus* Hellw.)

Sprietten geleidelijk verdikt of met 4 of 5 duidelijk grootere eindleedjes. Bovenlip onbedekt, de voorkaken bedekkend. Voorkaken met twee-tandigen top. Achterkaken met twee aan het uiteinde gebaarde lobben, van welke de binnenste klein en dun is. Tong hoornachtig, van voren breed en vlak uitgerand. Clypeus door eene verdiepte dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Oogen sterk verbreed, met eene uitranding tegen de implanting der sprietten. Halschild aan weerszijden met een basaalgroefje. Dekschilden met stippellijnen of stippelrijen. Schenen zeer fijn gedoornd. Tarsen 4-ledig; het eerste lid der 3-ledige voortarsen bij het ♂ aan de onderzijde lang behaard. — De soorten van dit genus leven in boomzwammen en achter boomschors.

De larve en pop van T. 4-pustulata zijn door v. Frauenfeld, de larve en pop van picea door Perris en de larve van multipunctata door Erichson beschreven.

Van de 10 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprietten naar het uiteinde nagenoeg gelijkmatig verdikt 2
 Sprietten van af het zevende of achtste lid in 't oogvallend verdikt 5
- 2 Laatste spriethid zoo lang als- of langer dan de twee voorafgaande leedjes te zamen. Dek-schilden met een ongevlekt, breed middengedeelte 1) 3
- Laatste spriethid slechts weinig langer dan het voorlaatste lid. Dekschilden ook op het midden geelachtig gevlekt, overigens in kleur eenigszins met *picea* ab.c. *undulata* overeenkomende; de gele banden echter zijn smaller en meer uitgezakt en daartusschen met kleine ronde vlekjes. De schouderplek soms in tweeën verdeeld, de achterste band soms zeer smal en in eenige vlekjes opgelost. Fijn geelachtig behaard, de grondkleur bruinzwart of pekbrown; zelden heeft de gele kleur de overhand. Sprietten rood, de eindleedjes, behalve het laatste lid, donkerder; de pooten roodachtig-geelbruin. Halsschild fijn en grof dooreen bestippeld. Dekschilden met ondiepe stippelrijen, de tusschenruimten fijn rimpelig. Lengte 4—4½ mm. In boomzwammen. Apeldoorn, Aug. In de Rijnprov. bij Aken, Cleef, Crefeld en Düsseldorf.
3. *atomaria* F.
- 3 Eindlid der sprietten kegelvormig, zoo lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen . . . 4
- Eindlid der sprietten langwerpig, met kegelvormig uiteinde, iets langer dan de twee voorafgaande leedjes te zamen. Lichaam iets korter en meer gewelfd dan bij *picea*, nagenoeg evenzoo gekleurd, doch de achterste band meer naar het uiteinde geplaatst. Bovenzijde zwart, bruin of roodbruin, fijn grijs behaard; eene groote, naar binnen uitgezakte schouderplek, eene kleinere, veelal in drieën verdeelde dwarsplek achter het midden, een klein rond vlekje in 't midden nabij den zijrand en een dergelijk vlekje aan het uiteinde geel. Bij sommige exemplaren ontbreekt de dwarsplek achter het midden of is daarvan slechts een rond zijvlekje overgebleven; ook is soms de schouderplek tot een klein rond vlekje gereduceerd. Sprietten roodgeel, nabij het uiteinde donkerder; de pooten roodgeelachtig. Achterhoeken van het halsschild iets meer afgerond dan bij *picea*. Lengte 3½—4½ mm. In eikenmoten en op boomzwammen. Niet inlandsch. In België bij Brussel; in Westfalen, Oldenburg en bij Hamburg (*decempunctata* F.)
- 4 Lichaam breed. Dekschilden 1½ maal zoo lang als breed, met duidelijk vlak afgezetten zijrand. Kop rood; halsschild en dekschilden zwart, eene breede schouderplek en eene kleinere dwarsplek voor het uiteinde der dekschilden, welke laatste soms ontbreekt, geel; zelden bevindt zich nog eene gele stip aan den zijrand en een aan den top. Bij ab.c. **bipustulata* Schilsky is alleen de schouderplek, welke soms zeer klein is, voorhanden; bij ab.c. **impustulata* Schilsky ontbreken alle vlekken. Zelden is het halsschild rood (ab.c. **ruficollis* Schilsky). Onderzijde roodbruin, de sprietten roodbruin, in het midden donker. Halsschild grof en fijn dooreen bestippeld. Dekschilden met vrij grove stippelrijen, in de tusschenruimten verspreid bestippeld. Lengte 5—6 mm. In boomzwammen; soms vliegt zij rond. Enkele exemplaren bij Gronsveld (Limburg), Juni, Juli. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf 1. *quadripustulata* L.
- Lichaam meer langwerpig en smaller. Dekschilden 1½ maal zoo lang als breed, nagenoeg zonder afgezetten zijrand. Bovenzijde zwart of donkerbruin; eene schouderplek, eene naar binnen daarmede al of niet samenhangende rondachtige vlek, een dwarsband achter het midden, welke veelal in tweeën, zelden in drie ronde vlekjes opgelost is, een rondachtige topvlek en een vlekje in 't midden van den zijrand helder roodgeel; de ronde vlekjes kunnen soms ontbreken, of komen in grooter aantal voor, zoodat zelfs een klein geel stipje in het midden der dekschilden kan voorhanden zijn; soms reikt de schouderplek als een breede dwarsband tot aan den naad (ab.c. *undulata* Marsh.); bij ab.c. **humeralis* Schilsky zijn alleen de schouderplek, bij ab.c. **punctulata* Schilsky bovendien vier kleine stippen (welke zich niet vereenigen) op de dekschilden voorhanden; bij ab.c. *histrionis* Sahlb. is het halsschild rood. Bij een exemplaar uit Rotterdam is de basaalband nabij den naad smal uitgezakt tot bijna tegen den achtersten, breedten, uitgezakt dwarsband; aan weerszijden van dit uitgezakte gedeelte staan een paar gele vlekjes. Lengte 4½—4¾ mm. Niet zeldzaam; op boomzwammen (*variabilis* Hellw.) 2. *picea* F.
- 5 Sprietknots 5-ledig. Halsschild naar de basis eenigszins versmald, met fijn gekerfden zijrand. Lichaam langwerpig en tamelijk smal 6
- Sprietknots 4-ledig 7
- 6 Eindlid der sprietten iets langer dan het voorlaatste lid. Lichaam zwartbruin, de sprietten en pooten roodachtig-geelbruin; de sprietten nabij het uiteinde gewoonlijk donkerder. Dekschilden met vele zeer veranderlijke, dan eens meer, dan eens minder samenhangende, licht geelbruine vlekjes en stippen. Onuitgekleurde exemplaren licht bruinrood of geelrood, de dekschilden met lichtere vlekjes. Bovenzijde uiterst kort en fijn, neerliggend behaard, dicht

1) Bij groote uitzondering komt bij 1. *picea* een klein geel middenstipje voor

rimpelig bestippeld. Halsschild naar voren en naar achteren even sterk versmald, met een langwerpige basaalgroefje voor het schildje. Lengte 3–4½ mm. Gemeen op boomzwammen, vooral van abeelen en platanen, en achter schimmelende boomschors. 4. **multipunctata** Hellw.

Eindlid der sprieten zoo lang als het voorlaatste lid, meer rondachtig. Lichaam glanzig zwart, vrij lang ruw behaard. Sprieten en halsschild rood, de sprieten nabij het uiteinde iets donkerder; de pooten roodgeel. Dekschilden met eene vlek nabij de basis en eene dwarsvlek achter het midden geel; veelal is ook nog eene vlek in 't midden aan den zijrand voorhanden. Halsschild ongeveer in het midden het breedst, grof en verspreid bestippeld. Dekschilden met krachtige, verdiepte stippelrijen op de dekschilden breed. Halsschild, behalve de uiterst fijne bestippeling, nog met duidelijke, verspreide stippels. Lengte 3½–4 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. . . (Fulvicollis F.)

7 Eindlid der sprieten de helft langer dan het voorlaatste lid. Lichaam langwerpig en vlak. Zijrand van het halsschild gaaf. Bovenzijde dof, uiterst fijn behaard en uiterst fijn en dicht bestippeld, geelrood; de dekschilden bruin, de basis, eene topvlek en eene vlek achter het midden roodgeel; bij onuitgekleurde exemplaren zijn de vlekken onduidelijk. Tusschenruimten der stippelrijen op de dekschilden breed. Halsschild, behalve de uiterst fijne bestippeling, nog met duidelijke, verspreide stippels. Lengte 4–4½ mm. Rijswijk, Arnhem en Oldenzaal. In België bij Ridderborn 5. **populi** F.

Eindlid der sprieten nauwelijks langer dan het voorlaatste lid, meer rondachtig. Lichaam korter, breder en gewelfd. Zijrand van het halsschild uiterst fijn en onduidelijk gekorven. Bovenzijde donkerbruin, iets glanzig, duidelijk geelachtig behaard. Halsschild dicht rimpelig bestippeld, met ingestrooide grovere stippels. Dekschilden met duidelijke haarrijen en elk met twee groote roodgele vlekken, de eene aan den schouder en de andere achter het midden. Sprieten en pooten roodgeel. Lengte 3½ mm. Op boomzwammen. Eenmaal bij Nootdorp in beschimmeld hooi. Ook in België. 6. **quadriguttata** Müll.

Pseudotriphyllus Reitter.

Dit genus onderscheidt zich van Triphyllus door het gewone, kleine mesosternum, de met een smaller eindlid voorziene, scherp afgescheiden sprietknots, den stomp afgeronden top van het kaaktaster-eindlid en het basaalgroefje aan weerszijden van het halsschild. Voorrand van het prosternum bij het ♀ met een rond groefje.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam tamelijk smal, gewelfd, fijn neerliggend geelgrijs behaard, krachtig en dicht, op het halsschild iets fijner bestippeld; lichter of donkerder bruin. Sprieten en pooten, de randen van het halsschild en de dekschilden over het midden lichter. Deze soort, welke den habitus van *Triphyllus punctatus* heeft, is veel kleiner en herinnert zeer aan een *Cryptophagus*. Lengte 2½–2½ mm. Achter boomschors en in boomzwammen.

(suturalis F.)

2. Triphyllus Latreille.

Bovenlip onbedekt, de voorkaken bedekkend. Voorkaken met twee-tandigen top. Tong van voren uitgerand. Eindlid der kaaktasters sterk afgeknot. Sprietknots slechts weinig scherp afgescheiden, met drie even breede leedjes. Clypeus door eene diepe dwarsgroef van het voorhoofd afgescheiden. Oogen iets verbreed, met eene uitranding tegen de implanting der sprieten. Halsschild met fijn gekartelden zijrand, zonder basaalgroefjes. Bovenzijde grof bestippeld, de dekschilden zonder stippellijnen of stippeellijnen. Mesosternum tamelijk breed, met twee naar voren divergeerende, kielvormige verhevenheden. Voorschenen fijn gedoorn. Tarsen 4-ledig, de voortarsen bij het ♂ 3 ledig. Prosternum bij het ♀ zonder groefje.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam tamelijk smal, gewelfd, glanzig, vrij lang geelachtig behaard, zeer grof bestippeld, bruinrood; de dekschilden donkerder, de basis en eene vlek aan het uiteinde geelachtig; soms is ook het halsschild donkerder. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de vlekjes op de dekschilden niet altijd scherp afgeteekend. Lengte 3½–4 mm. Gemeen in boomzwammen en achter schimmelende boomschors. De larve en pop zijn door *Perris* beschreven.

1. **punctatus** F.

3. Litargus Erichson.

Bovenlip breed, nagenoeg driemaal zoo breed als lang. Voorkaken achter den gedeelden top met een stomp tandje. Achterkaken als bij Tritoma, het eindlid der kaaktasters echter meer afgeknot. Tong rliezig, aan het uiteinde zwak en breed uitgerand, kort bewimperd. Liptasters 3-ledig, het tweede lid het langst, het derde veel dunner, iets gebogen en afgeknot. Clypeus slechts door eene zeer onduidelijke dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Oogen rond. Sprieten met 3-ledige knots. Achterhoeken van het halsschild eenigszins spits uitgetrokken, de dekschilden omvattend; de zijden gaaf. Bovenzijde zeer fijn behaard en fijn en dicht bestippeld; de dekschilden zonder stippellijnen of stippelrijen. Voorschenen fijn behaard, aan het uiteinde met kleine doorntjes. — De larve en pop van L. bifasciatus zijn door Perris beschreven.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Eindlid der sprietsknots aan den top toegespitst. Halsschild aan weerszijden van de basis met een lijn, maar duidelijk langsstreepje. Lichaam elliptisch, tamelijk vlak, zwart, lijn geelbruin behaard, lijn en zeer dicht rimpelig bestippeld. Dekschilden met een gebogen, gewoonlijk uit meer of minder samenhangende vlekken bestaanden basaalband, een dwarsband achter het midden en eene topvlek roodgeel. Bij ab.c. **lunatus* F. zijn de schouders, de zijrand, een vlekje nabij den naad, een dwarsband achter het midden en eene topvlek rood-geelachtig. Bij ab.c. **signatus* Panz. de dekschilden met 3 vlekjes aan de basis, een dwarsband achter het midden en eene topvlek roodgeel. Halsschild in de achterhoeken roodgeel en met enkele haarvlekjes. Sprietwortel en pooten roodbruin. Lengte 2½—3 mm. Achter beuken- en eikenschors en ook wel achter de schors van den paardenkastanje. Zeer zeldzaam; de Steeg, Winterswijk, Venlo en Gronsveld, Juni—Aug. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf. In België bij Laeken. . (? connexus Fourc.) 1. **bifasciatus** F.

Eindlid der sprietsknots aan den top afgeknot. Halsschild aan weerszijden met een zeer onduidelijk of nagenoeg ontbrekend langsstreepje. Lichaam korter, meer ovaal, iets meer gewelfd, zwartbruin, zeer dicht en neerliggend goudgeel behaard, uiterst lijn en dicht rimpelig bestippeld. Dekschilden veranderlijk geel gevlekt, hetzij met een basaalband en een dwarsband achter het midden, of wel deze basaalband is in vlekken opgelost, welke tot aan den dwarsband achter het midden reiken, bovendien met een geel topvlekje. Lengte 2—2½ mm. Niet inl. Van deze Zuid-Europeesche soort bezit ik een exemplaar, door den Heer D. van der Hoop bij Antwerpen gevangen . . . (coloratus Rosenh.)

4. Typhaea Curtis.

Bovenlip tweemaal zoo breed als lang, recht afgeknot. Voorkaken met gespleten top, zonder tand daarachter. Achterkaken als bij Litargus. Tong hoornachtig, van voren recht afgeknot en bewimperd. Kaaktasters 4-ledig. Liptasters 3-ledig. Sprieten met 3-ledige knots. Oogen rond. Clypeus door eene duidelijke dwarslijn van het voorhoofd afgescheiden. Lichaam langwerpig. Achterhoeken van het halsschild stomp, min of meer afgerond; de zijden gaaf. Dekschilden zeer onduidelijk in rijen bestippeld en met rijen van lange haren. Voorschenen fijn behaard, aan het uiteinde met kleine doorntjes. Tarsen 4-, bij het 3 de voortarsen 3-ledig.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Geheel roestkleurig, licht roodbruin, zeer zelden donkerbruin of zwartachtig, zeer dicht en lijn-, op de dekschilden onduidelijk in rijen bestippeld; tamelijk ruw, geel-, op de dekschilden bovendien in rijen behaard. Lichaam langwerpig, eenigszins vlak. Halsschild zoo breed als de dekschilden, naar voren versmald. Lengte 2½—3 mm. Zeer gemeen tusschen beschimmeld hooi, rottende bladeren, in keldervuil en tegen wit gekalkte muren van stallen en schuren. Zwartbruine exemplaren ontving ik uit Doetinchem. De larve en pop zijn door Perris beschreven . . . 1. **fumata** L.

XXXIV. Familie ENDOMYCHIDAE.

Deze kleine familie wordt gevormd door meestal fraai geteekende kevers, wier lichaam ovaal of langwerpig-ovaal, meer of minder gewelfd en bij uitzondering behaard is. — Kop min of meer in het halsschild teruggetrokken, naar voren versmald. — Spriet 11-ledig, op het voorhoofd tusschen de oogen ingeplant, aan de onderzijde van den kop niet terugtrekbaar, geleidelijk naar het uiteinde verdikt of met twee- (*Lycoperdina*), of 3 iets vergrootte (*Dapsa*), of duidelijk grootere eindledjes (*Endomychus*, *Mycetina*). — Voorkaken gebogen, soms aan den top gespleten of met een tandje nabij het uiteinde. Achterkaken tweelobbig, de binnenste lob altijd kleiner, meer of minder bewimperd. Kaaktasters 4-ledig, het eindlid meestal kegel- of eivormig en toegespitst, hoogstens scheef afgeknot en daardoor een weinig bijlvormig (*Endomychus*, *Mycetina*). Liptasters 3-ledig. Tong gewoonlijk sterk uitgerand en bewimperd. — Halsschild met een langsindruk of langsplooi aan weerszijden van de basis en met eene duidelijke inzinking tusschen deze en de dekschilden. — Voorcoxae rondachtig, door de opgerichte voortzetting van het prosternum gescheiden (*Endomychus*, *Mycetina*), of tegen elkaar aanstaande en meer of minder uitpuilend (*Dapsa*, *Lycoperdina*). Achtercoxae meer of minder ver van elkaar verwijderd en door eene breede voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Pooten vrij lang; zij kunnen niet zooals bij de aanverwante *Coccinellidae* tegen het borststuk aangedrukt worden; de dijen overschrijden meestal de zijden van het lichaam. Tarsen schijnbaar 3-ledig, de eerste twee leedjes aan de onderzijde zolig; het tweede lid, dat meestal iets verbreed, doch soms duidelijk tweelobbig is, neemt steeds in eene uitholling het kleine, moeilijk te vinden derde lid, benevens de helft van het klauwlid op (*pseudotrimer*). Klauwen gewoon. — Achterlijf met 5 of 6 sternieten; bij het ♀ van *Endomychus* met een klein-, bij het ♂ met een groot zesde sterniet; het ♂ van *Mycetina* slechts met een rudimentair zesde sterniet. — Gevlengeld. Volgens *J. Redtenbacher* vertoonen de vleugels der *Endomychidae* een eigenaardigen bouw, die tengevolge van de reductie van het adernet, zich bezwaarlijk met de vleugels der andere familiën laat vergelijken. De teruglopende aders zijn kort, licht gekleurd en convergeeren onder een scherpen hoek; de dwarsader tusschen beiden ontbreekt, evenals de eindeel van de vena scapularis. Straaladers zijn niet of slechts zeer onduidelijk aangeduid. De vena interno-media is 8-vormig gebogen; de vena cubitalis als eene streep, die bij *Endomychus coccineus* niet-, bij anderen naar het schijnt wel met de vena interno-media in verbinding staat; de voorste tak der vena analis is aan het uiteinde met de vena interno-media vereenigd, de achterste tak ontbreekt bij *Endomychus coccineus* geheel. — De soorten leven met hare larven in *Lycoperdon's*, *Agarici*, *Boleten*, achter boomstochers en in schimmelen den boomholn, vooral in vochtige bosschen. Tegen den avond komen zij te voorschijn en vliegen dan rond. — De larven zijn plat, hebben 3-ledige spriet en korte pooten, doch missen de oogen. De familie der *Endomychidae*, welke het naast verwant is aan de *Coccinellidae*, sluit met de kleine familie der *Mycetaeidae* aan de *Erotylidae* (*Triplacini*), *Cryptophagidae* en *Tritomidae*.

- 1 Voorcoxae door de opgerichte prosternale voortzetting gescheiden. Mesosternum tusschen de middelcoxae breed. Halsschild slechts naar voren versmald. Bovenzijde onbehaard 2
- Voorcoxae tegen elkaar aanstaande, min of meer uitpuilend. Mesosternum tusschen de middelcoxae smal. Halsschild naar achteren meer of minder duidelijk versmald. Het 2de tarslid smal 3
- 2 Mesosternum met parallele zijden, duidelijk breeder dan lang. Halsschild naar voren sterk versmald, met nagenoeg rechte zijden; de langsplooi, aan weerszijden van de basis, naar binnen gericht, in het midden tusschen den zijrand en de middellijn geplaatst. Kop vóór de oogen naar voren versmald. Achterlijf bij het ♀ met een klein-, bij het ♂ met een groot 6de sterniet. Het 2de tarslid breed 1. **Endomychus.**
- Mesosternum met naar voren convergeerende zijden. Halsschild naar voren weinig afgerond-versmald, de voorrand in 't midden met een kleinen, snallen, vhezigen zoom; de langsplooi, aan weerszijden, dicht bij den zijrand dan bij de middellijn geplaatst. Kop vóór de oogen met nagenoeg parallele zijden. Achterlijf slechts bij het ♂ met een rudimentair 6de sterniet. Het 2de tarslid smal (*Mycetina*.)
- Mesosternum van achteren niet uitgerand. Spriet tamelijk slank, met langwerpige leedjes en lossen, vrij duidelijk afgescheiden knots. Bovenzijde behaard (*Dapsa*.)
- Mesosternum van achteren met eene uitranding, waarin het vooreinde van het metasternum wordt opgenomen. Spriet dik, met verbrede leedjes en minder duidelijk afgescheiden knots. Bovenzijde nauwelijks behaard (*Lycoperdina*.)

1. *Endomychus* Panz.

Voorkaken met gespleten top. Achterkaken met twee nagenoeg even lange, aan het uiteinde gebaarde, hoornachtige lobben; de buitenste lob is dubbel zoo breed als de binnenste. Kaaktasters lang, 4-ledig, met eenigszins bijtormig eindlid. Liptasters kort en dik, het eindlid eirond, afgeknut. Tong recht afgeknut, met een vliezigen zoom omgeven. Sprieten met drie grootere eindledjes. Kop vóór de oogen naar voren versmald. Halsschild naar voren sterk versmald, met nagenoeg rechte zijden; de langsplooi, aan weerszijden aan de basis, in 't midden tusschen den zijrand en de middellijn geplaatst en naar binnen gericht. Mesosternum duidelijk breeder dan lang, met parallelle zijden. Bovenzijde onbehaard. Achterlijf bij het ♀ met een klein-, bij het ♂ met een groot zesde sterniet. Voorcoxae door de opgerichte voortzetting van het prosternum gescheiden. Het tweede tarslid breed; klauwen krachtig ontwikkeld.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Bovenzijde fraai rood, uiterst fijn bestippeld. Halsschild in 't midden met een meer of minder breeden, zwarten langband. Dekschilden elk met twee vrij groote, eenigszins ovale, zwarte of violetzwarte vlekken. Onderzijde rood. De zijden van het sternum, de sprieten en de pooten, behalve de tarsen, zwart. Lengte 4½—5½ mm. Meestal achter schimmelende schors van beuken, dennen, berken, elzen en wilgen; ook in boleten en Agarici. De larve is door Gerstäcker, Curtis, Rey en Westwood, de pop door Rey beschreven. Zeer zeldzaam; Beek en Winterswijk, Juli. In België bij Luik en Visé; in de Rijnprov. bij Aken; ook bij Hamburg en in Oldenburg. 1. *coccineus* L.

Mycetina Mulsant.

*Achterkaken met twee half-vliezige lobben, waarvan de binnenste kort en smal, de buitenste veel langer, breeder en lancetvormig is. Eindlid der kaaktasters kegelvormig toegespitst. Tong vliezig, naar voren zeer sterk verbreed, met spits naar buiten uitstekende hoeken. Eindlid der liptasters zeer kort-cylindervormig, afgeknut. Kop vóór de oogen met nagenoeg parallelle zijden. Halsschild naar voren weinig afgerond-versmald, de voorrand in 't midden met een kleinen, smallen, vliezigen zoom; de langsplooi, aan weerszijden van de basis, dichter bij den zijrand dan bij de middellijn geplaatst. Achterlijf alleen bij het ♂ met een rudimentair zesde sterniet. Het tweede tarslid smal. Overigens als bij *Endomychus*.*

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Deze soort herinnert in grootte en kleur eenigszins aan *Lycoperdina succincta*. Lichaam ovaal, op de bovenzijde sterk glanzig, rood. Metasternum, sprieten en pooten donker; de naad en een dwarsband op de dekschilden breed zwart gekleurd, te zamen een kruis vormend 1). Achterlijf rood. Bij het ♂ zijn de voorschienen nabij het uiteinde verdikt en de achterschenen nabij het uiteinde uitgerand. Lengte 4—4½ mm. In bergstreken; achter schimmelende boomschors, vooral van berken. Niet inl. Zij zou in Hannover voorkomen. (cruciata Schall.)

Dapsa Latreille.

(*Phylira* Muls.)

*Bovenzijde fijn behaard. Voorkaken met gewonen, langen, sterk gebogen top, waarachter een klein tandje. Achterkaken en onderlip als bij *Lycoperdina*, de buitenste kaak-lob echter breeder, scheef afgeknut; de kaaktasters veel langer; de hoeken der onderlip afgerond, de vliezige tong zeer diep, driehoekig uitgesneden en het eindlid der liptasters afgeknut. Sprieten tamelijk slank, met langwerpig leedjes en losse, vrij duidelijk afgescheiden knots. Halsschild naar achteren meer of minder*

1) In Italië komt een *alce*, *calabra* Costa voor, bij welke de dwarsband aan den naad onderbroken is.

duideijk versmald. Voorcoxae tegen elkaar aanstaande, min of meer uitpuilend. Mesosternum tusschen de middelcoxae smal. Het tweede tarslid smal.

Van de 8 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Voorhoeken van het halsschild haakvormig naar buiten en naar achteren gericht, de zijden daarachter diep uitgerand en van eenige onregelmatige kerftandjes voorzien. Bovenzijde geelbruin of roestrood, lijn behaard en tamelijk lijn bestippeld, de dekschilden met eene zwarte naadvlek nabij het uiteinde en eene zwarte vlek naast den zijrand 1). Lengte 4 4½ mm. Achter vermolnde berkenschors en tusschen afgevallen bladeren van eiken, wilgen, beuken en hazelaars. Niet inl. Zij zou in Hannover voorkomen.

(denticollis Germ.)

Lycoperdina Latreille.

Voorkaken met gewoon uiteinde en daarachter aan den binnenrand met een tandje. Achterkaken met twee lobben, de binnenste kort en smal, de buitenste breed en even lang als de tasters, toegespitst; het vierde kaaktaster-lid langwerpig-cirond, stomp toegespitst. Tong rliezig, zeer kort, aan weerszijden lang behaard. Liptasters kort, het derde lid cirond. Sprieten dik, met verbreedde leedjes en twee iets vergrootte eind-leedjes. Bovenzijde, bij sterke vergrooting gezien, uiterst fijn behaard. Mesosternum van achteren met eene uitranding, waarin het vooreinde van het metasternum wordt opgenomen. Overigens als bij Dapsa. — De soorten van dit genus leven in boom-zwammen. — De larve van L. succincta is door Chapuis & Candèze, de ontwikkeling van bovistae door Dufour beschreven.

Van de 7 Europeesche soorten komen 2 in het aangrenzend gebied voor.

Voorschenen aan de binnenzijde in 't midden bij het ♀ met eene geringe, dicht behaarde verhevenheid, bij het ♂ met een scherp tand. Dekschilden slechts naar achteren met de aanduiding van eene naadstreep (Sub-gen. *Gorgia* Muls.). Bovenzijde rood, de dekschilden over het midden met een breeden, zwarten dwarsband, welke slechts de basis en het uiteinde onbedekt laat. Sprieten en pooten rood. Halsschild soms in 't midden zwart, de langsgroeven aan weerszijden dicht bij den zijrand dan bij het midden geplaatst. Het tweede sprietlid zoo lang als breed, het derde langwerpig. Bij ab.c. *fasciola* F. is de band op de dekschilden smaller en raakt den naad niet; bij ab.c. *humeralis* Schilsky zijn de dekschilden, behalve aan weerszijden eene basaalvlek, zwart. Lengte 3½—4½ mm. In boom-zwammen en achter beschimmelde boomschors; ook wel in zandkuilen. Niet inl. In Westfalen en in de Rijnprov. (succincta L.)

Voorschenen in beide seksen gewoon, de achterschenen bij het ♂ duidelijk naar binnen gekromd. Dekschilden met geheel doorlopende, duidelijke naadstreep (Sub-gen. *Lycoperdina* isp.). Lichaam zwart of pekbruin, de sprieten en gewoonlijk ook de pooten roodbruin. Dekschilden elk op zich zelf sterk gewelfd, waardoor de naad meer weggezonden is. De langsgroeven, aan weerszijden van het halsschild, slechts iets dicht bij den zijrand dan bij het midden geplaatst en verder naar voren reikend. Het tweede en derde sprietlid ongeveer tweemaal zoo lang als breed. Lengte 3½—4½ mm. In *Lycoperdon bovista* en *pyriformis*, in gezelschap van *Pocadius ferrugineus*; ook onder schimmelende bladeren. Niet inl. In België bij Visé, Lixhe en Luik; in de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf en in de Ahrstreek op zonnige bergen, vooral in den herfst tot tegen den winter; ook in Westfalen. (inmaculata Latr.) (bovistae F.)

XXXV. Familie MYCETAEIDAE.

Sprieten 11-, bij uitzondering 10-ledig (*Alexia*), naar het uiteinde geleidelijk verdikt of met 2- (leistes), meestal 3- of 4 (*Myrmecoxenus*) grootere eindleedjes; hetzij op het voorhoofd vrij voor de oogen, of vóór de oogen onder den zijrand van den kop ingeplant. — Clypeus meer of minder duidelijk van het voorhoofd gescheiden, behalve bij het niet in ons gebied voorkomend genus *Lithophilus*. Kop zonder sprietgroeven. — Voorkaken aan den top gespleten of 2- of 3-tandig.

1) In Hongarije komt eene ab.c. *myricollis* Gerst. met zwartachtig halsschild voor.

Achterkaken tweelobbig, bij *Alexia* 1-lobbig, Kaaktasters 4-, de liptasters 3-ledig. Tong gedeeltelijk hoornachtig, de paraglossen verborgen. — Lichaam eivormig, langwerpig, zelden half-kogelvormig (*Alexia*), al of niet behaard. — Gevleugeld; bij *Alexia* ontbreken de vleugels of zijn zij rudimentair. — Vooreoxae in den regel door eene prosternale voortzetting gescheiden, zelden tegen elkaar aanstaande (*Leiestes*). Tarsen gewoon, 4-ledig, bij het niet in ons gebied voorkomende genus *Clemmus* slechts 3-ledig. — Achterlijf met 5 sterniten, bij het ♂ van *Symbiotes* nog met een zesde sterniet 1). — Deze kleine familie is het naast verwant aan de *Endomychidae* en *Erotylidae*, doch nadert ook tot de *Cryptophagidae*. — De soorten leven met hare larven in vermolmd hout, achter boomschors, op schimmelende wijnvaten en sommigen in mierennesten.

- 1 Spriet en vóór de oogen, onder den zijrand van den kop, ingeplant, met 4 of 2 grootere eindledjes. Dekschilden zonder strepen of stippelrijen. 2
- Spriet en op het voorhoofd, vrij vóór de oogen, ingeplant; met 3-ledige knots. 3
- 2 Vooreoxae door eene prosternale voortzetting gescheiden. Halsschild aan de zijden niet gerand en zonder basaal-indrukken. Dekschilden zonder naadstreep. Lichaam op de bovenzijde lijn behaard. Spriet met 4 iets grootere eindledjes. 1. **Myrmecoxenus.**
- Vooreoxae tegen elkaar aanstaande. Halsschild aan weerszijden nabij de achterhoeken met een diepen basaal-indruk, door eene scherpe langskiel begrensd; de zijden gerand. Dekschilden met eene geheel doorlopende, fijne naadstreep. Spriet met 2 veel grootere eindledjes. Lichaam onbehaard. (*Leiestes*.)
- 3 Halsschild aan weerszijden met een langsendruk. Spriet 11-ledig. 4
- Halsschild zonder indrukken. Spriet 10-ledig. Lichaam nagenoeg half-kogelvormig. 4. **Alexia.**
- 4 Halsschild aan weerszijden van de basis met een, tot aan het midden reikenden, diepen indruk, welke door eene langskiel begrensd wordt; naar achteren slechts zeer weinig versmald, met eene naadstreep, welke aan de basis tegen den schouder gebogen is. 2. **Symbiotes.**
- Halsschild aan weerszijden met een, tot aan den voorrand doorlopenden, langsendruk welke door eene fijne, naar voren convergerende kiellijn begrensd wordt; naar voren en naar achteren nagenoeg evenzeer versmald. Dekschilden zonder duidelijke naadstreep, met stippelrijen. 3. **Mycetaea.**

1. *Myrmecoxenus* Chevrolat.

Spriet vóór de oogen, onder den zijrand van den kop, ingeplant, 11-ledig, met 4 iets grootere eindledjes. Bovenlip recht afgeknut. Voorkaken met vorksgewijs verdeelden top en daarachter met een stompen tand. Achterkaken met twee korte, aan het uiteinde gebaarde lobben; de binnenste lob zeer klein. Kaaktasters 4-ledig, veel langer dan de lobben; het eindlid groot, zoo lang als de twee voorafgaande ledjes te zamen, langwerpig-eivormig. Tong half-eliezig, van voren recht afgeknut. Liptasters 3-ledig; het eindlid grooter dan de eerste twee ledjes te zamen, eivormig. Clypeus slechts weinig duidelijk van het voorhoofd gescheiden. Lichaam fijn behaard. Halsschild aan de zijden niet gerand, zonder basaal-indrukken. Dekschilden zonder naadstrepen en zonder strepen of stippelrijen. Vooreoxae door eene prosternale voortzetting gescheiden. Tarsen 4-ledig. Klauwlied der achtertarsen zoo lang als de overige ledjes te zamen. — De soorten van dit genus herinneren in voorkomen aan *Atomaria* en leven voor het meereendeel in mierennesten.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Halsschild naar achteren en naar voren nagenoeg gelijk versmald, veel breeder dan lang en duidelijk smaller dan de dekschilden. Het zevende sprietlid breeder dan het zesde. Lichaam roestgeel of roestrood, op de bovenzijde dicht en lijn bestippeld. Uiteinde van het achterlijf zwartachtig. Lengte 1½—2 mm. Zij zou in brocikassen voorkomen. Niet inl. In Middel-Europa. (*vaporariorum* Guér.)

Halsschild naar achteren sterk versmald, eenigszins hartvormig, slechts weinig breeder dan lang en in het voorste gedeelte slechts weinig smaller dan de dekschilden. Het zevende sprietlid niet breeder dan het zesde. Lichaam zwartbruin; de bovenzijde, vooral op het halsschild, vrij sterk bestippeld. Spriet en pooten roodgeel; de dekschilden hetzij geheel

1) Bij het genus *Lithophilus* zijn op het 1ste sterniet dylphen ontwikkeld

geelachtig-roodbruin, of slechts aan de basis of aan het schildje donker en naar het uiteinde licht gekleurd; soms alleen met lichter naad. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ mm. In de nesten van *Formica rufa*, *pratensis* en *exsecta*; bij uitzondering bij andere mieren. In groot aantal bij Roermond, gedurende het geheele jaar; bij Vorden, Aug. en bij Breda, April. Ook in België 1. *subterraneus* Chev.

Leiestes L. Redtenbacher.

Sprieten 11-ledig, de ledjes van af het tweede geleidelijk korter en dikker wordend, met twee veel grootere eindledjes. Bovenlip afgerond, van voren met een smallen, vliezig-zoom. Voorkaken aan den top gespleten, daarachter zeer zwak gekorven. Achterkaken twee-lobbig, de lobben hoornachtig, aan het uiteinde gebaard, nagenoeg even lang, de binnenste zeer smal. Kaaktasters dik, het eindlid scheef afgeknot. Tong zeer kort, afgeknot, hoornachtig, aan den voorrand door een fijn bewimperden, vliezig-zoom begrensd. Liptasters dik, het eindlid afgeknot, nagenoeg vierhoekig. Lichaam onbehaard. Halsschild, aan weerszijden nabij de achterhoeken, met een diepen basaal-indruk, welke door eene scherpe langskiel begrensd wordt: de zijden gerand. Dekschilden met eene geheel doorlopende, fijne naadstreep. Voorcoxae tegen elkaar aanstootende.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam zwart, glanzig. Kop, halsschild en sprieten rood; de pooten geelrood. Halsschild veel breeder dan lang, in 't midden gewelfd, met nagenoeg rechte zijden en vooruitstekende voorhoeken, langs de geheele basis, en zeer sterk naast de rechte achterhoeken, die scherp kielvormig opgericht zijn, neergedrukt. Eindlid der sprietknots groot, aan den top scheef afgeknot. Bovenzijde zeer fijn, verspreid bestippeld. Deze soort herinnert in grootte en kleur eenigszins aan *Engis bipustulata*. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Achter vermolmd boonschors. Niet inl. Bij Hamburg in zieke beuken, in de met moolm gevulde gangen van *Sinodendron*-larven (*seminigra* Gyll.)

2 Symbiotes L. Redtenbacher.

(*Microchondrus* Wollast.)

Sprieten 11-ledig, vrij op het voorhoofd vóór de oogen ingeplant, met 3-ledige knots, van welke het eerste lid even groot is als het tweede. Bovenlip iets uitgerand. Voorkaken met twee-tandigen top. Achterkaken met twee lobben, de binnenste zeer kort en smal, vliezig, aan het uiteinde behaard, de buitenste hoornachtig, vierhoekig, gebaard. Eindlid der kaaktasters eivond, scheef afgeknot. Tong hoornachtig, naar het uiteinde verbreed, aan de hoeken lang bewimperd. Eindlid der liptasters veel dikker dan het voorlaatste lid, kogelvormig. Halsschild naar achteren slechts zeer weinig versmald, aan weerszijden van de basis met een tot aan het midden reikenden, diepen indruk, welke door eene langskiel begrensd wordt. Dekschilden met eene naadstreep, welke aan de basis tegen den schouder gebogen is. Tarsen 4-ledig. Bij het ♂ is het vijfde sterniet kort en breed, recht afgeknot; bij het ♀ is dit smaller, iets langer en afgerond; het ♂ heeft bovendien een stomp, driehoekig zesde sterniet. — De soorten van dit genus leven in vermolmd hout, bij mieren.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Langwerpig-eivond; de dekschilden fijn en dicht in rijen-, in de tussenruimten niet bestippeld. Roodachtig-geelbruin, glanzig; vrij lang, neerliggend grijs behaard. Halsschild tweemaal zoo breed als lang, vóór het midden het breedst en daarvoor versmald, met afgeronde voor- en spitse achterhoeken, breed gerand, aan weerszijden van de basis met een langs-indruk, die aan de buitenzijde door een kantig verheven rand begrensd is. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Wellicht bij *Lasius brunneus*. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf (? *rubiginosus* Heer) (*latus* Redt.)

Kort-ovaal; de dekschilden fijn en verward-, slechts hier en daar in onduidelijke rijen bestippeld. Roodgeel, glanzig, lang behaard. Halsschild sterk gewelfd, meer dan dubbel zoo

breed als lang, met afgeronde voor- en nagenoeg rechte achterhoeken, naar voren sterk versmald. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ mm. Wellicht bij mieren. Amsterdam, Aug., achter boomschors.
(latus Hampe) 1. *gibberosus* Lucas.

3. Mycetaea Stephens.

Sprieten op het voorhoofd, vrij voor de oogen, ingeplant; 11-ledig, met 3-ledige knots. Bovenlip afgeknol. Voorkaken met 3-tandigen top. Achterkaken met twee, in lengte weinig verschillende lobben, welke aan het uiteinde gebaard zijn; de buitenste is vrij dik en in 't midden hoornachtig, de binnenste smal en vliezig. Eindlid der kaaktasters lang, eivormig, toegespitst. Tong kort, hoornachtig, met vliezig beweimperden zoom. Tweede en derde liptaster-lid ongeveer even dik, het eindlid kort en afgeknol. Halsschild naar voren en naar achteren evenzeer versmald, aan weerszijden met een tot aan den voorrand doorlopenden langsindruk, welke door eene fijne, naar voren convergerende kiellijn begrensd wordt. Dekschilden zonder duidelijke naadstreep, met stippelrijen.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Langwerpig-cirond, roestrood of geelachtig, glanzig; vrij lang opgericht behaard. Halsschild tamelijk fijn-, de dekschilden in meer of minder regelmatige rijen grof bestippeld. Het ♂ is smaller dan het ♀ en heeft naar het uiteinde meer versmalde dekschilden. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ mm. Zeer gemeen in allerlei schimmelende plantenstollen, hoendermest, in kelders op schimmel van wijnvaten en kurken, tegen keldermuren en ook in bijenkorven. De larve en pop zijn door *Blisson*, de pop ook door *Westwood* beschreven . . . 1. *hirta* Mrsh.

4. Alexia Stephens.

(*Hygrotophila* Champion)

Sprieten op het voorhoofd, vrij voor de oogen, ingeplant; 10-ledig, met 3 groote eindledjes. Bovenlip iets uitgerand. Voorkaken aan het uiteinde gespleten, achter den top fijn gekorven. Achterkaken slechts met ééne hoornachtige, aan het uiteinde gebaarde lob. Kaaktasters 4-ledig, de eerste drie ledjes klein, weinig in grootte verschillend, het eindlid kogelvormig-cirond, aan het uiteinde breed afgeknol. Tong hoornachtig, naar het uiteinde verbreed. Liptasters 3-ledig; het tweede lid kogelvormig, gebogen; het derde groot, cirond, afgestompt. Lichaam nagenoeg half-kogelvormig, ongeteugeld of met rudimentaire vleugels. Halsschild zonder indrukken. Uiteinde van het prosternum in 't midden fijn gekield. Tarsen 4-ledig, de eerste drie ledjes nagenoeg gelijk. — De soorten van dit genus leven in rottend hout en in zwammen.

Van de 23 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Bovenzijde onbehaard, sterk glanzig; pekswart, bruin, rood- of geelbruin. Sprieten en pooten geelbruin, de spriectknots veelal donkerder. Schildje niet zichtbaar. Dekschilden slechts hier en daar een weinig bestippeld; de epipleuren niet zeer breed, glad. Lengte 1 — $1\frac{1}{2}$ mm. In boomzwammen. Niet inl. In Hannover. (*globosa* St.)
- Bovenzijde duidelijk behaard. Schildje als een stip, duidelijk zichtbaar 2
- 2 Bovenzijde met lange, dichte, opgerichte beharing; de haartjes aan den top achterwaarts gebogen. Dekschilden grof en dicht bestippeld. Zwartachtig, bruin of roodachtig-geelbruin; de sprieten en pooten geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken 1) (*pilifera* Müll.)
- Bovenzijde korter en minder dicht-, half opgericht behaard. Dekschilden vrij sterk-, doch minder dicht bestippeld; met zeer breede epipleuren. Roestrood of geelbruin, het midden van halsschild en dekschilden gewoonlijk donkerder; de sprieten en pooten geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ mm. Bij Apeldoorn in Juni, van *Erica* gesleept. Bij St. Pieter en Nuth nabij Maastricht, April—Juli 2). Ook bij Antwerpen en Aken 1. *pilosa* Panz. 3)

1) Belgische exemplaren uit de coll. *Wesmæl* waren verkeerd gedetermineerd en zijn *pilosa* Panz.

2) Deze exemplaren waren verkeerdelyk als *pilifera* Müll. gedetermineerd.

3) *Better* noemt deze soort *ignorans* en beschouwt *pilosa* Panz. als eene andere soort, in 1. heeft *Panzer* wel degelyk onze soort bedoeld.

XXXVI. Familie COCCINELLIDAE. 1)

Deze meestal door levendige kleuren in het oog vallende kevers vormen eene der meest natuurlijke familiën der Coleoptera. Het lichaam is rond, eirond, langwerpig-ovaal of eenigszins half-kogelvormig; meer of minder sterk en soms bultig gewelfd (*Chilocorus*). — Kop, halsschild en dekschilden in eene vlucht gewelfd. De kop gewoonlijk in het halsschild teruggetrokken. — Spriet en 11-ledig, soms 10-2), zelden 9- (*Chilocorini*), of 8-ledig (*Novius*) 3), naar het uiteinde geleidelijk verdikt of in eene 3-ledige knots eindigend; meestal onder den zijrand van den clypeus, vóór de oogen, ingeplant; zij kunnen onder den kop teruggetrokken worden. — De clypeus bij de *Chilocorini* aan weerszijden verbreed en over de oogen heengrijpend, de sprietwortel daardoor duidelijk bedekt. — Bovenlip meestal hoornachtig, naar voren versmald. Voorkaken kort, krachtig ontwikkeld, sterk gebogen, gewoon of aan den top gespleten, bij de *Epilachnini* met 3 of 4 scherpe tandjes aan de binnenzijde van den top; met een vliezig binnenzoom. Achterkaken 2-lobbig; de lobben gewoonlijk sterk gebaard. Kaaktasters 4-ledig, het 1ste lid kort, het 2de lang kegelvormig, het 3de slechts weinig ontwikkeld, het 4de groot, nagenoeg vierhoekig, scheef afgeknut of meer of minder bijlvormig 4). Lipstasters 3-ledig, zeer kort. — Halsschild bijna altijd aan den voorrand uitgerand. — Schildje klein. — Bovenzijde onbehaard 5), zeldzamer fijn en dicht behaard 6) (*Epilachna*, *Rhizobius*, *Platynaspis*, *Novius* en *Scymnus*). — De vleugels der *Coccinellidae* 7) zijn volgens *Roger*, althans bij de grootere soorten, gewoonlijk zwart gepigmenteerd, met gele hoofdadern; het gewricht ligt meestal in of iets vóór het midden; het topgedeelte is groot. De vena externo-media is naar buiten eenigszins concaaf; op de hoogte van het gewricht is zij tegen den achterrand niet als eene gebroken lijn, eenigszins knievormig gebogen, doch geleidelijk afwaarts gebogen en geeft haar teruglopenden tak eerst achter het gewricht in eene geleidelijk bocht weder tegen de basis terug. De vena interno-media is meestal sterk gekromd, gewoon, hare bijaders zijn

Fig. 53. Onderzijde van *Coccinella septempunctata* L. Oog.

twee leedjes meer of minder-, soms sterk verbreed, op de onderzijde viltig gezoold, het derde lid klein en in het tweede verborgen, het vierde lang. Klauwen zelden gewoon (*Anisosticta*),

rudimentair. Steeds is door eene diepe inker-ving in de area analis een basaal-lobje afge-scheiden. De vleugels der *Coccinelliden* vertoonen volgens *Roger* en *J. Redtenbacher* groote overeenkomst met die der *Chrysomelidae* (*Melasma* en *Phytodecta*), doch onderscheiden zich van deze door het ontbreken van de dwarsader tusschen de vena scapularis en de vena externo-media, door de geheele reductie van de vena cubitalis en door het duidelijk afgescheiden lobje. — Achterlijf met vijf vrij bewegelijke sternieten. Het eerste sterniet vertoont, evenals het metasternum, aan weerszijden eene duidelijke, half-cirkel- of V-vormige lijn, de z.g. „dijlijn” (Fig. 53), welke voor de systematiek van groot gewicht is, daar zij op verschillende wijze kan ontwikkeld zijn; bij *Hippodamia* ontbreken deze dijlijnen. Gewrichtsholten der forecoxae van achteren geheel of slechts in de buitenhelft gesloten, of wel geheel open. Forecoxae min of meer kogelvormig. Achter-coxae meer of minder ver van elkaar verwijderd en door eene breede voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Pooten kort. Tarsen breed, schijnbaar 3-ledig (*pseudotrimer*); de eerste

1) In de meeste Europeesche talen worden deze diertjes met namen van eenigszins gelijke beteekenis hestempeld, als: Leven-leensbeestjes, Levenleersbeestjes, Vaches à Dieu, Bêtes du bon Dieu, Marienkäferchen, Herrgottsküchen, Jungfernkäferchen, Fely Jards, enz. De oude Germanen en Noormannen noemden de *Coccinelliden* (nl. *C. 7-punctata*) aan de godin „Frigga” en noemden ze daarom „Friggahanna” (*Friggahaantje*). Bij de invoering van het Christendom werd *Frigga* door de Heilige Maagd vervangen en van daar de tegenwoordige benamingen. In het Zweedsch wordt *C. septempunctata* „Nyckelpaga”, d. i. sleutelhaantje genoemd. Eertijds waren enkele soorten bij de geneeskunde in gebruik.

2) Bij sommige *Scymnus*-soorten.

3) Bij 10-, 9-, of 8-ledige sprietten zijn de eerste twee leedjes onduidelijk gescheiden en vormen schijnbaar een enkel lid.

4) Daarom door *Mulsant* *Securipalpes* genaamd.

5) *Gymnosomoides* volgens *Mulsant*.

6) *Tychosomoides* volgens *Mulsant*.

7) *Cynogaster* 1. ongevleugeld.

meestal getand, of ook wel gespleten (*Epilachna*). — In 't oogvallend is vooral de meeste roode of gele kleur met donkere of lichtere stipvlekken, of wel zwart met roode vlekjes; slechts weinige soorten zijn eenkleurig. Van vele soorten komen een groot aantal kleur-afwijkingen voor, tengevolge van het meer of minder ineenvloeien der lichte of donkere vlekken. De larven (*C. 7-punctata*) zijn langwerpig-eirond, naar achteren toegespitst, lederachtig, veelal fraai gekleurd en met haartjes, doornetjes of wratten bezet. Spriet en 3-ledig; aan weerszijden van den kop met 3-, bij andere *Coccinelliden* met 4 ocellen. Prothorax gewoonlijk iets langer dan de overige ringen. Pooten met lange dij en schenen. Volgens *Roger* heeft de larve der *Coccinelliden* de grootste overeenkomst met die der *Chrysomeliden* en zouden de *Coccinelliden* als een van *Melasma* en *Phytodecta* uitgaande zijtak der *Chrysomeliden* moeten beschouwd worden, van welke *Coccinella* en *Halyzia* stamvormen, de overige genera echter meer of minder gewijzigde vormen zijn. Toch valt niet te ontkennen, dat zij groote verwantschap vertoonen met andere „Knotsprietkevers”, en ongetwijfeld het meest met de *Phalacridae*, doch ook door de aanverwante *Endomychidae* aan de *Erotylidae* sluiten. — De soorten leven met hare larven op allerlei planten, welke door bladluizen, schildluizen, planten-Acarinen en wantsen-larven 1) bewoond zijn, waarop zij jacht maken; dit zijn dan de aphidiphage *Coccinelliden*, terwijl enkele soorten (*Epilachnini*) phytophaag zijn en alsdan, vooral als larve, zeer schadelijk kunnen worden. — In het najaar vooral verschijnen de *Coccinelliden* dikwerf in groote massa's; zij worden dan soms door kustwinden naar zee gedreven en vinden daar hun ondergang. Men treft ze dan ook veelal in groot aantal, deels dood, langs onze stranden. Enkele malen werden geheele wolken bladluizen, met *Coccinelliden* vermengd, over de Noordzee gedreven, en vielen, zoowel langs de Engelsche als Nederlandsche kusten, in dichte massa's neder, zoodat zij in verbaasend aantal straten en wegen bedekten. Tegen den winter verborgen zich velen achter boomschors en in retsen van palen, houtwerk en muren. Bij gevaar trekken zij de pooten onder het lichaam terug en blijven als vastgekleefd aan eenig plantendeel zitten; bij de geringste beweging laten zij zich op den grond vallen en aangeraakt zweeten zij aan de dij- en kniegewrichten een onaangenaam riekend, geel vocht uit. Zij vliegen gemakkelijk.

Overzicht der Tribus.

- 1 Clypeus aan weerszijden verbreed en over de oogen heengrijpend, den sprietwortel bedekkend. Voorkaken gewoon. Spriet korter dan de kop. Klauwen getand. I. **Chilocorini**.
Clypeus aan de zijden niet verbreed, den sprietwortel niet of bijna niet bedekkend. 2
- 2 Voorkaken met eenige tandjes aan de binnenzijde. Spriet langer dan de kop. Bovenzijde fijn en dicht behaard. De gewrichtsholten der voorcoxae van achteren in de buitenhelft gesloten. Klauwen getand of gespleten. De dijlijn op het eerste sterniet geheel ontwikkeld. II. **Epilachnini**.
Voorkaken gewoon of aan den top gespleten. Bovenzijde onbehaard; bij enkele genera behaard, in welk geval hetzij de spriet korter zijn dan de kop of wel de gewrichtsholten der voorcoxae van achteren geheel open blijven. 3
- 3 Spriet langer dan de kop, minstens tot aan het midden van het halsschild reikend. 4
Spriet korter dan de kop. V. **Scymnini**.
- 4 Bovenzijde onbehaard, gewoon bestippeld. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren geheel gesloten. De spriet niet tot aan den achterrand van het halsschild reikend. III. **Coccinellini**.
Bovenzijde behaard, grof en fijn dooreen bestippeld. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren geheel open. Spriet tot aan den achterrand van het halsschild reikend. Klauwen met een tand aan de basis. IV. **Rhizobiini**.

I. Tribus CHILICORINI.

- 1 Dekschilden veel breder dan het halsschild; de epipleuren worden geleidelijk smaller, doch blijven tot aan den naadhoek breed. Bovenzijde van het min of meer rondachtige lichaam onbehaard 2). Klauwen getand. De eerste twee tarsleedjes verbreed. 2
- Dekschilden slechts weinig breder dan het halsschild; de epipleuren tot aan het achterlijf zeer breed, doch voorbij het eerste sterniet verdwijnend. Bovenzijde van het langwerpige,

1) In Frankrijk en Hongarije is door *Perrand* en *Sajo* waargenomen, dat *Coccinella 7-punctata* de larven van *Tortrix ambigua* II., een bladroller van den wuustok, verdelgt, en derhalve ook in dit opzicht als zeer nuttig kan beschouwd worden.

2) Bij eenige Zuid-Europesche *Exochomus*-soorten zeer fijn behaard.

vlak gewellde lichaam dicht behaard. De dijlijn op het eerste sterniet tot aan den toprand reikend en daarin overgaande. De eerste twee tarsleedjes slechts weinig verbreed.

3. **Platynaspis.**

- 2 De dijlijn op het eerste sterniet tot aan den toprand reikend en daarin overgaande. Voorschenen aan den buitenrand met een klein tandje voorbij het midden. Voorrand van den clypeus iets opgericht en in 't midden diep uitgerand. Basis van het halsschild aan weerszijden, nabij de afgeronde achterhoeken, met eene dubbele randlijn; in het midden niet gerand. Lichaam eenigszins bultig gewelfd 1. **Chilocorus.**

De dijlijn op het eerste sterniet niet tot aan den toprand reikend, doch half-cirkelvormig naar de basis teruggebogen. Voorschenen ongetand. Clypeus niet of slechts weinig uitgerand, de voorrand niet opgericht. Basis van het halsschild fijn gerand. Lichaam meer gelijkmatig gewelfd 2. **Exochomus.**

II. Tribus **EPILACHNINI.**

- 1 Klauwen gespleten. Achterhoeken van het halsschild stomp of afgerond. Gevleugeld. . . . 2
Klauwen gewoon, slechts met een tand aan de basis. Achterhoeken van het halsschild tamelijk recht, tegen de schouders der dekschilden aansluitend. Ongevleugeld. (Cynegetic.)
- 2 Klauwen in twee bijna even lange deelen gespleten en aan de basis met een breeden tand. Achterhoeken van het halsschild afgerond 4. **Epilachna.**
Klauwen in twee zeer ongelijke deelen gespleten, zonder tand aan de basis. Achterhoeken van het halsschild stomp 5. **Subcoccinella.**

III. Tribus **COCCINELLINI.**

- 1 Metasternum en eerste sterniet zonder dijlijnen. De randlijn der metasternale voortzetting tusschen de middelcoxae in eene flauwe bocht op vrij grooten afstand van den eigenlijken toprand verloopend. Klauwen met een scherp middenrand 6. **Hippodamia.**
Metasternum en eerste sterniet met duidelijke dijlijnen, welke in een breeden boog geheel of gedeeltelijk om de basis der midden- en achterdijen heenloopen. De randlijn der metasternale voortzetting tusschen de middelcoxae dicht nabij den toprand verloopend, of wel de voortzetting is niet gerand. 2
- 2 Klauwen gewoon. Lichaam eenigszins langwerpig en tamelijk vlak. Halsschild naar voren en naar achteren versmald 7. **Anisosticta.**
Klauwen gespleten, of met een scherp tand nabij of aan de basis. 3
- 3 Schildje duidelijk. Tong recht afgeknot of zeer zwak uitgerand 8. **Coccinella.**
Schildje bijna niet zichtbaar. Tong diep driehoekig uitgerand. 9. **Micraspis.**

IV. Tribus **RHIZOBINI.**

- Dekschilden verward bestippeld. Halsschild slechts naar voren versmald . . . 10. **Rhizobius.**
Dekschilden, behalve de verwarde bestippeling, met krachtige, eenigszins onregelmatige stippelrijen. Halsschild naar voren en naar achteren versmald 11. **Coccidula.**

V. Tribus **SCYMNINI.**

- 1 Schildje vrij groot. Bovenzijde onbehaard 12. **Hyperaspis.**
Schildje tamelijk klein. Bovenzijde behaard 2
- 2 Dekschilden veel breeder dan het halsschild; de epipleuren naar het uiteinde schijnbaar verdwijnend, daar zij door het achterlijf bedekt worden. Halsschild naar voren en naar achteren versmald, aan de basis niet gerand. Klauwen dik, met een breeden tand aan de basis (Novius.)
- Dekschilden slechts weinig breeder dan het halsschild; de epipleuren naar het uiteinde geheel verdwijnend. Halsschild slechts naar voren versmald, aan de basis fijn gerand. Klauwen met een spitsen tand nabij het uiteinde. 13. **Scymnus.**

1. Tribus CHILOCORINI.

1. Chilocorus Leach.

Lichaam min of meer rond, eenigszins bultig gewelfd, onbehaard. Clypeus aan weerszijden verbreed en over de oogen heengrijpend, den sprietwortel bedekkend; de voorrand iets opgericht en in 't midden diep uitgerand. Sprieten korter dan de kop, 9-ledig; de eerste twee leedjes groot, schijnbaar slechts één lid vormend, de laatste leedjes tot eene spoelvormige knots verdikt. Voorkaken met gewonen top, haar binnenrand met eene fijn bewimperde huid, en vóór de basis, achter eene diepe uitranding, met een grooten, haakvormigen tand. Achterkaken met twee korte, aan den top lang gebaarde lobben. Kaaktasters 4-ledig, zeer groot, het eindlid nagenoeg vierhoekig, scheef afgeknot. Tong van voren rliezig, stomp afgerond. Liptasters 3-ledig, draadvormig; het eindlid lang, iets toegespitst. Halsschild aan weerszijden van de basis nabij de afgeronde achterhoeken met eene dubbele randlijn, in 't midden niet gerand. Dekschilden veel breeder dan het halsschild; de epipleuren geleidelijk smaller, doch tot aan den naadhoek breed blijvend. Dijlijn op het eerste sterniet tot aan den toprand reikend en daarin overgaande. Voorschenen aan den buitenrand met een klein tandje voorbij het midden. De eerste twee tarsleedjes verbreed. De klauwen met een breeden tand aan de basis. — De soorten van dit genus leven van Coccus- en Aphis-soorten. — De larve van *C. renipustulatus* is door de Geer en Letzner, de pop ook door de Geer, de larve en pop van *bipustulatus* door Rösel en Letzner beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Basis van het halsschild nabij de achterhoeken met eene breede ruimte tusschen den dubbelrand. Bovenzijde zwart, eene rondachtige, eenigszins verbrede vlek iets voor het midden van elk der dekschilden, alook het achterlijf rood. Lengte 4—5 mm. Gemeen op elzen, essen en wilgen. Zij schijnt, evenals hare larve, ook de eieren en jonge larven van Diptera te verslinden (similis Harold, nec Rossi) 1. **renipustulatus** Scriba.

Basis van het halsschild nabij de achterhoeken met eene smalle ruimte tusschen den dubbelrand. Bovenzijde zwart, zwartbruin of roodbruin (onuitgekleurd); de kop en een smalle, uit drie kleine, meer of minder samenhangende vlekken bestaande dwarsband, iets voor het midden op elk der dekschilden, rood. Achterlijf gedeeltelijk roodachtig; veelal ook de pooten min of meer roodachtig. Lengte 3—4 mm. Gemeen op wilgen, populieren en *Vaccinium* 2. **bipustulatus** L.

2. Exochomus L. Redtenbacher

Dit genus is zeer verwant aan *Chilocorus*. De clypeus is niet of slechts weinig uitgerand, de voorrand niet opgericht. Bovenlip duidelijk uitstekend. Lichaam meer gelijkmatig gewelfd, onbehaard. Basis van het halsschild fijn gerand. Dekschilden door een duidelijken langsiendruk, bij scheef opvallend licht gezien, breed afgezet. Dijlijn op het eerste sterniet niet tot aan den toprand reikend, doch half-cirkelvormig naar de basis teruggebogen. Voorschenen ongetand. — Levenswijze als bij *Chilocorus*. — De ontwikkeling van *E. quadripustulatus* is door Buddeberg beschreven.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halsschild met opwaarts gebogen zijrand; de basis aan weerszijden nabij de achterhoeken iets ingedrukt en uitgebogen. Lichaam zwart, zelden de voorhoeken van het halsschild roodachtig. Dekschilden elk met eene halve-maانvormige, roode schoudervlek en eene roode dwarsvlek achter het midden nabij den naad; de epipleuren der dekschilden op de voorhelft naar binnen roodachtig gevlekt, alook het achterlijf grootendeels roodachtig gerand. Bij de abe. **bilunulatus* Weise ontbreekt de achterste vlek op de dekschilden; zelden ontbreken de vlekken geheel of breiden zij zich meer uit en hangen te zamen. Bij onuitgekleurde exemplaren (*haematideus* Costa) is de geheele bovenzijde geelrood, hetzij eenkleurig of met aanduiding der meer of minder lichter gekleurde vlekken. Lengte $3\frac{1}{2}$ —5 mm. Niet zeldzaam in de heidstreken op dennen 1. **quadripustulatus** L.

1) De in Zuid-Europa voorkomende *E. pubescens* Kust. is zeer fijn behaard

Halsschild met gewoon gerande, doch niet opwaarts gebogen zijden; de basis aan weerszijden, naast de achterhoeken, slechts weinig of niet ingedrukt of uitgebogen. Lichaam zwart. Kop bij het ♂ van voren roodgeel, bij het ♀ geheel zwart; de zijden van het halsschild, het achterlijf en de pooten geelrood. Lengte $2\frac{1}{2}$ —4 mm. Gemeen, vooral in de heidestreken op verschillende boomsoorten.

(nigromaculatus Goeze, auritus Scriba) 2. **flavipes** Thunb.

3 Platynaspis L. Redtenbacher.

Bovenzijde van het langwerpig-ovale, vlak gewelfde lichaam dicht behaard. Clypeus aan weerszijden verbreed en over de oogen heengrijpend, den sprietwortel bedekkend. Sprieten 11-ledig, met 3-ledige knots. Voorkaken aan het uiteinde gespleten, aan de basis met een grooten, haakvormigen tand. Dekschilden slechts weinig breeder dan het halsschild; de epipleuren tot aan het achterlijf zeer breed, doch voorbij het eerste sterniet verdwijnend. Dijlijn op het eerste sterniet tot aan den toprand reikend en daarin overgaande. De eerste twee tarsleedjes slechts weinig verbreed. Klauwen met een grooten tand aan de basis.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam zwart, op de bovenzijde dicht grijs behaard; gewoonlijk de zijden van het halsschild en twee groote ronde vlekken op elk der dekschilden geelrood. Zelden het halsschild nagenoeg geheel zwart. Bij ab.c. **confluens* Muls. (in België) is de voorste vlek zeer groot en min of meer met de achterste verbonden. Bij het ♂ zijn ook de kop en de voordijen rood. Lengte 2½—3 mm. Onder mos aan wortels van oude boomen; ook op lage planten in dennenbosschen. Utrecht, Arnhem, Winterswijk, Breda, Oirschot, Houthem, Bunde en Bergen op Zoom (villosa Fourc.) 1. **luteorubra** Goeze.

II. Tribus EPILACHNINI.

4. Epilachna L. Redtenbacher.

Lichaam enigszins half-kogelvormig, hultig gewelfd, op de bovenzijde fijn en dicht behaard. Gerleugeld. Clypeus aan de zijden niet verbreed, de sprietwortel niet bedekt. Sprieten 11-ledig, langer dan de kop. Voorkaken in 3 of 4 spitse tandjes gespleten, welker randen aan de basis wederom scherp gezaagd zijn. Achterkaken nagenoeg als bij Coccinella. Tong hoornachtig, naar het uiteinde versmald en afgerond. Achterhoeken van het halsschild afgerond. De gevoelsholten der voorcoxae van achteren in de buitenhelft gesloten. Dijlijn op het eerste sterniet geheel ontwikkeld. Klauwen in twee bijna even lange deelen gespleten, met een breeden tand aan de basis.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam geelrood, de dekschilden te zamen met 11 zwarte stippen, waarvan een op het schildje, een op elken schouder en nog twee paar achter elkaar op elk dekschild; soms zijn de stippels van een iets lichter zoom omgeven. Lengte $5\frac{1}{2}$ —7½ mm. De larve is bekend geworden door Westwood en Dübner. Op Bryonia dioica, in Juli. De gedoode larven vreten het parenchym der bladeren en maken daarin gaten, zoo ook in de bloemen. De kever vreet alles tuschen de nerven weg. Gemeen in Zuid-Limburg; ook eenmaal bij Nijmegen. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf.

(11-maculata F.) 1. **Argus** Fourc.

5. Subcoccinella Huber.

(Lasia Mulsant)

Dit genus is zeer verwant aan Epilachna. Achterhoeken van het halsschild stomp. De klauwen in twee zeer ongelijke deelen gespleten, zonder tand aan de basis. Eveneens gerleugeld.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam aan de zijden gelijkmatig afgerond, naar achteren nauwelijks meer dan naar voren versmald, geel- of bruinrood; eene gewoonlijk onduidelijke vlek in 't midden van het halsschild en 12 (3, 4, 3, 2) stippen 1) op elk der dekschilden zwart. Achterlijf dicht en lijn bestippeld. Dekschilden met eene schouderbuil. Bij ab.c. *saponariae* Huber (*livida* Herbst) is het lichaam eenkleurig roodgeel, het schildje veelal donkerder (gelijkt zeer op *Cynegetis impunctata* L.). Bij ab.c. **zonata* Heyd. bevindt zich op de dekschilden eene lijne zwarte lijn van af het midden tot aan het schildje. De ab.c. *4-nictata* F. is roodgeel; het halsschild met 1 of 3 stippen, of het geheele midden donkerder; de dekschilden slechts aan de basis, langs den naad, of langs de zijden met eenige meer of minder duidelijke stippen. Bij ab.c. *25-punctata* Rossi vloeien de stippen der dekschilden meer of minder, en op verschillende wijze, soms in dwarsbanden ineen. Bij ab.c. *haemorrhoidalis* F. zijn de dekschilden zwart, met enkele lichtere vlekken, welke vooral aan het uiteinde gelegen zijn. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4½ mm. Gemeen op allerlei lage planten, van welke zij het bladparenchym vreet; o.a. op *Saponaria*, *Trifolium*, *Medicago*, *Silene inflata* en tuinaanjers; soms schadelijk aan klaver. De larve is door Mulsant en Huber beschreven. De metamorphose heeft plaats in Juli. . . (*globosa* Schneid.) 1. **vigintiquatuorpunctata** L.

Cynegetis Redtenbacher.

*Dit genus is zeer verwant aan Epilachna en Subcoccinella, doch onge-
vleugeld. Voorkaken spits driehoekig, de top in 4 aan den rand niet gezaagde tanden
gespleten. Tong naar het uiteinde niet versmald en recht afgeknot. Achterhoeken van
het halsschild tamelijk recht, tegen de schouders der dekschilden aansluitend. Klauwen
niet gespleten, slechts met een driehoekigen tand aan de basis.*

De enige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam naar achteren minder afgerond en meer plotseling versmald dan bij *Subcoccinella*; enigszins dof, bij het leven helder rood, na den dood licht- of geelbruin. Kop en de onderzijde zwart, de pooten gedeeltelijk licht gekleurd. Dekschilden zonder schouderbuil 2). Achterlijf meer verspreid en fijner dan de bovenzijde bestippeld. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4½ mm. 's Zomers in moerassige weilanden, onder mos en aan graswortels. Niet inl. In Westfalen, in weilanden langs de Ruhr; ook in België en in de Rijnprovincie bij Elberfeld, Crefeld en Düsseldorf. De ontwikkeling is door Heeger beschreven.

(aptera Payk.) (*impunctata* L.)

III. Tribus COCCINELLINI.

6. Hippodamia Mulsant.

Lichaam langwerpig-ovaal, op de bovenzijde onbehaard, gewoon bestippeld. Sprieten 11-ledig, langer dan de kop, doch niet tot aan den achterrand van het halsschild reikend; de laatste drie ledjes vormen eene platgedrukte knots, welke aan het uiteinde afgeknot is. Voorkaken breed, met gespleten top. Achterkaken met twee nagenoeg even groote, aan den top gebaarde lobben. De randlijn der metasternale voortzetting, tussehen de middecoxae, verloopt in eene flauwe bocht op vrij grooten afstand van den eigentlichen toprand. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren geheel gesloten. Metasternum en eerste sterniet zonder dijlijnen. Klauwen met een scherpen middentand. — De soorten van dit genus houden zich niet als dood, zooals

1) In navolging van F. Weise druk ik het aantal stippen of vlekken op de dekschilden uit door cijfers. Zoo beteekent (3, 4, 3, 2) dat de stippen geplaatst staan in vier elkaar opvolgende dwarsrijen, de eerste uit 3-, de tweede uit 4- naast elkaar staande stippen bestaande, enz. — Wanneer bepaalde stippen bedoeld worden, dan zijn zij in eene bepaalde rangorde genummerd, zoo is bij *Hippodamia 13-punctata* 1. stip 1 aan den schouder gelegen, de stippen 2 en 3 vormen de tweede, de stippen 4 en 5 de derde rij, en dan volgt stip 6. De stip of vlek aan het schildje (scutellar-vlek) wordt steeds afzonderlijk genoemd. Ik heb gemeend zooveel mogelijk de vele beschreven kleur-afwijkingen der Coccinelliden met de daaraan gegeven namen te moeten vermelden, ofschoon dit meer practische, dan wel wetenschappelijke waarde heeft.

2) In Oostenryk komt eene var. *palustris* Redt. met zwart gevlekte dekschilden voor.

De meeste Coccinellen, doch vluchten. — De larve en pop van *H. 13-punctata* zijn door Letzner, de pop nog door Cornelius en de larve nog door Rosenhauer beschreven.

De 2 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Halsschild van voren nagenoeg recht afgesneden, bijna dubbel zoo breed als lang; zwart, de voorrand geel, aan de zijden met een breeden, gelen zoom, waarin eene zwarte stip, welke soms met het zwarte midden samenhangt. Dekschilden roodgeel, geelrood of fraai rood, eene min of meer ovale, gemeenschappelijke vlek aan het schildje en op elk 6 (1. 2. 2. 1.) grootere of kleinere stippen zwart. Dijen zwart, de schenen geheel of slechts aan het uiteinde, benevens de tarsen geel. Deze soort is zeer veranderlijk in kleur door het ontbreken van één of meer-, of door het samenmelten van meerdere stippen op de dekschilden; ook is soms de middenvlek op het halsschild klein, driehoekig en niet dubbel zoo breed als de gele randzoom, en zijn bovendien de stippen op de dekschilden klein (*padana* Muls.). Van de navolgende kleur-aberraties zijn enkelen met het type in ons land waargenomen. Dekschilden eenkleurig rood of roodgeel (**signata* Fald., *xanthoptera* Muls.) 1). Dekschilden elk met 2 stippen, hetzij 2 en 3 (*incomta* Weise), hetzij 1 en 2 (*4-punctata* de Rossi); met 3 (1, 2 en 3) stippen, met of zonder de scutellair-vlek (*Corneli* de Rossi); met 4 (1, 4, 5 en 6) stippen (*8-punctata* Schmeid.); met 4 (1, 2, 3 en 4) stippen en de scutellair-vlek; met 5 (1, 3, 4, 5 en 6) stippen (*laeta* Weise); met dezelfde stippen, benevens de scutellair-vlek (*11-maculata* Harrer); met 6 stippen, doch zonder scutellair-vlek (*scutellaris* Weise). Bij **albingica* Meier bevindt zich op elk der dekschilden tusschen stip 2 en 3 eene bijkomende stip. Bij de typische kleur kan de scutellair-vlek met stip 3 samenhangen (*triloba* Weise), of stip 4 met stip 5 een breeden, hoekigen dwarshand vormen (*spissa* Weise), of bovendien stip 1 met stip 2 (**marchica* Weise), of daarbij de scutellair-vlek met stip 3 samenvloeien (**contorta* Weise); ook kan stip 4 met 5 en 6 tot eene dikke C verbonden zijn (*C-nigrum* Weise), of eene groote, hoekige vlek vormen, die soms eene roode stip insluit (*Gyllenhalii* Weise); ook kan nog stip 3 met de scutellair-vlek en met de stippen 2 en 4 verbonden zijn, waardoor eene zadelvormige vlek ontstaat; hierbij is soms nog stip 1 nabij stip 2 geplaatst of daar even mede verbonden (**sellata* Weise). Eindelijk bestaat eene variëteit met zwarte dekschilden, elk met 1 of 2, meer of minder duidelijke, roode vlekken (**borealis* Weise) 2). In West-Duitsland komt nog eene aberr. *Eichhoffii* Seidl. voor, bij welke het halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, de voorrand in het midden zwart en de zijrand smal geel omzoomd is; pooten zwart, de schenen aan het uiteinde geel; ik ving bij den Haag een dergelijk gekleurd exemplaar, met nagenoeg geheel roodgele schenen. Lengte $4\frac{1}{2}$ —6 mm. Niet zeldzaam, vooral op moerasplanten; ook veelal in den nazomer langs de stranden.

1. *tredecimpunctata* L.

Halsschild van voren vrij sterk uitgerand, meer dan dubbel zoo breed als lang, aan voor- en zijrand smal geel gezoomd. Dekschilden bij het leven fraai rood, evenals bij het type van *13-punctata* zwart gevlekt; de eerste stip nabij den naad (d. i. stip 3) staat intusschen dicht bij het schildje en vloeit in den regel met de meestal langwerpige scutellair-vlek tot eene groote, min of meer hartvormige vlek ineen; ook hangt stip 4 met stip 5 samen en is stip 2 zeer klein. Pooten geheel zwart, of wel het uiteinde der schenen en de tarsen lichter gekleurd. Deze soort is, evenals de vorige, zeer veranderlijk; de bekende kleur-aberraties zijn de navolgende. Dekschilden zonder stippen of slechts het schildje donker (**rubra* Weise); of alleen met stip 1 (**monostigma* Heyd.), of stip 5 (**diminuta* Wimmel). Met stip 1 en de scutellair-vlek (**axillaris* Weise); of stip 3 en de scutellair-vlek (**Meieri* Heyd.), of deze beiden hangen te zamen (**alligata* Heyd.); met stip 5 en de scutellair-vlek (**inchoata* Heyd.); of stip 6 en de scutellair-vlek (**apicalis* Wimmel). Met de stippen 1 en 5 (**inornata* Weise), of 1 en 3 (**sanguisorbae* Meier). Met de stippen 1 en 3 en de scutellair-vlek (**rubi* Meier), of is hier stip 3 met de scutellair-vlek verbonden (**Schulzii* Wimmel); met de stippen 1 en 5 en de scutellair-vlek (**holSATICA* Weise), of 3 en 5 en de scutellair-vlek (**manca* Heyd.); bij **reducta* Wimmel hangt stip 3 met de scutellair-vlek samen. Met de stippen 1, 4 en 5 (**suecica* Weise), of 1, 2 en 5 (**calthae* Meier); of 1, 5 en 6 (**Zetterstedtii* Weise). Met de stippen 1, 4 en 3 en deze laatste met de scutellair-vlek verbonden (**excelsa* Wimmel); of 1, 3 (met de scutellairvlek verbonden) en 5 (*tarda* Weise); of 5, 6 en 3 (met de scutellair-vlek verbonden) (**Heydenii* Meier); of 1, 3, 4 en de scutellair-vlek (**pini* Meier); of 1, 3, 5 en de scutellair-vlek (**vittosa* Heyd.); of 1, 4, 5 en de scutellair-vlek (**imperfecta* Heyd.); of 1, 2, 3 en de scutellair-vlek (**beccanburgae* Meier); of 3, 5, 6 en de scutellair-vlek

1) Schijnt allereerst in den Caucasus te zijn waargenomen.

2) Schijnt meer in het Noorden van Europa voor te komen.

(**vena* Meier); of 1, 4 met 5 verbonden, en de scutellair-vlek (**conjuncta* Wimmel); of 1, 5 en 6 en de scutellair-vlek (**republicana* Heyd.); of 3, 4, 5 en de scutellair-vlek (**graminis* Wimmel). Met de stippen 1, 2, 3 en 5 (**autumnalis* Wimmel); of 1, 2, 4 en 5 (**festucae* Wimmel); of 1, 4, 5 en 6 (**mendosa* Heyd.) 1); of 1, 4 met 5 verbonden, en 6 (**submutabilis* Weise). Met de stippen 1, 2, 5 en 3 (met de scutellair-vlek verbonden) (**sarothamni* Wimmel); of 1, 2, 4, 5 en de scutellair-vlek (**germanica* Weise); of 1, 2, 3, 5 en de scutellair-vlek (**Domlingii* Meier); of 1, 3, 4, 5 en de scutellair-vlek (**frustrata* Heyd.); of 1, 4, 5 en 3 (met de scutellair-vlek verbonden) (**hamburgensis* Weise); of 1, 3, 4 met 5 verbonden, en de scutellair-vlek (**similaris* Wimmel); of 1, 3, 5, 6 en de scutellair-vlek (**prava* Heyd.); of 1, 5, 6 en 3 (met de scutellair-vlek verbonden) (**Wimmelii* Meier); of 1, 4, 5, 6 en de scutellair-vlek (**lapponica* Weise); of 1, 4 met 5 verbonden, 6 en de scutellair-vlek (**comari* Weise); of 1, 4, 5, de scutellair-vlek en eene bijkomende zevende stip (**supernumeraria* Heyd.). De stippen 1, 2, 4 met 5 verbonden, en 6 (**berolinensis* Weise). De stippen 1, 2, 3, 4, 5 en de scutellair-vlek (**vorax* Weise); of 1, 2, 3 (met de scutellair-vlek verbonden), 4 en 5 (**fontinalis* Weise); of 1, 2, 4, 5, 6 en de scutellair-vlek (**salicis* Wimmel); of 1, 2, 4 met 5 verbonden, 6 en de scutellair-vlek (**sii* Weise); of 1, 3, 4, 5, 6 en de scutellair-vlek (**berulae* Weise); of 1, 3 met de scutellair-vlek verbonden, 4, 5, en 6 (**oblonga* Herbst); of 1, 3, 4 met 5 verbonden, 6 en de scutellair-vlek (**palustris* Weise); of 1, 4 met 5, en 3 met de scutellair-vlek verbonden, en 6 (**viadri* Weise). De stippen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en de scutellair-vlek (**baltica* Weise); of 1, 2, 3, 4 met 5 verbonden, 6 en de scutellair-vlek (**aestiva* Weise); of 1, 2, 3 met de scutellair-vlek verbonden, 4, 5 en 6 (**Paykullii* Weise); en eindelijk kunnen een of meer stippen verbonden zijn met de samenhangende scutellair-vlek en stip 3, alsook met de samenhangende stippen 4 en 5 (**continua* Weise). Lengte 5½—6 mm. Op allerlei planten, vooral op *Sarothamnus vulgaris*, *Menyanthis trifoliata*, *Hypericum*, *Rubus*, berken en zelfs op sparren. Enkele typische exemplaren, benevens de ab.c. *Paykullii*, werden bij Bunde (nabij Maastricht) en bij Roermond, in Aug. en Sept., gevangen. In België bij Boisfort en la Hulpe. In Noord-Duitschland, o. a. bij Hamburg, komt zij in nagenoeg alle kleur-aberraties voor. 2. *septemmaculata* de G.

7. Anisosticta Duponchel.

Lichaam eenigszins langwerpig en tamelijk vlak, op de bovenzijde onbehaard. Sprietten 11-ledig, knotsvormig; de eerste twee ledjes groot. Voorkaken als bij *Hippodamia*, de tand aan de basis echter klein. Eindlid der kaaktasters zeer groot, bijtormig. Tong recht afgeknut, naar het uiteinde verbreed. Eindlid der lipstasters lang-eivormig. Halsschild naar voren en naar achteren versmald. Metasternum en eerste sterniet met duidelijke dijlijnen, welke in een breeden boog geheel of gedeeltelijk om de basis der middel- en achterdijen loopen. De randlijn van de voortzetting van het metasternum, tusschen de middelcoxae, tot dicht nabij den toprand voortgezet. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren geheel gesloten. Klauwen gewoon.

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Langwerpig-ovaal; het halsschild met breed afgezetten zijrand. Bovenzijde licht okergeel of witgeel, bij het leven gewoonlijk vleeschkleurig; met 3 stippen aan weerszijden van het halsschild en 19 stippen (1. 2. 1. 2. 2. 1. en de scutellair-vlek) op de beide dekschilden zwart. De navolgende kleur-aberraties komen ook voor een deel in Nederland voor. De stippen der dekschilden worden kleiner, onduidelijker en verdwijnen gedeeltelijk of geheel (**athesis* Weise), of de stippen 3 en 6 aan den naad, of een van beiden, benevens de scutellair-vlek, blijven over (**Tiesenhauseni* Weise). De 3 stippen aan weerszijden van het halsschild tot eene groote of C-vormige vlek versmolten (*thoracica* Weise). Op de dekschilden kunnen samenvloeien de stippen 1 en 2 (*palustris* Walter), of 7 en 8 (*conjuncta* Weise), of 4 met 5, of 2 met 4 en 5, of 4 met 5, 7 en 9, alsook 6 met 8 (*Hesthoffii* de Rossi). Ook kan stip 1 zeer groot zijn en al of niet met de scutellair-vlek samenhangen, stip 2 gewoon-, stip 3 met den naad en met de scutellair-vlek verbonden- en de overigen meer of minder tot langsbanden versmolten zijn (*irregularis* Weise). Bij een exemplaar uit Baarn zijn alle stippen der dekschilden versmolten, zoodat de nagenoeg geheel zwarte dekschilden langs den zijrand en langs een gedeelte van den naad smal

1. *W.* Meer noemt exemplaren van deze aberratie, bij welke het halsschild in het midden van den voorrand zwart is, 'abbreviata'.

gelechtig omzooind zijn. Lengte 3½—4 mm. Zeer gemeen op riet en andere waterplanten; ook op vochtige weilanden. De larve is door Mulsant bekend geworden.

1. novemdecimpunctata L.

8. Coccinella Linné.

Lichaam gewoonlijk min of meer half-kogelvormig, zelden meer langwerpig-ovaal; op de bovenzijde onbehaard. Sprieten 11-ledig, tot aan het midden van het halsschild reikend. Voorkaken breed, met gespleten top, aan den binnenrand nabij de basis in een haakvormigen tand verbreed en daarvoor met eene vrij diepe uitranding. Achterkaken met nagenoeg even lange, aan het uiteinde sterk gebaarde lobben, van welke de buitenste dikker is. Kaaktasters 4-ledig, lang. Tong recht afgeknut of zeer zwak uitgerand. Schildje duidelijk. Metosternum en eerste sterniet met duidelijke dijlijnen, welke in een breedten hoeg geheel of gedeeltelijk om de basis der middel- en achterdijen loopen. Klauwen gespleten of met een scherp tand nabij of aan de basis. — De soorten van dit genus leven van Aphis- en Coccus-soorten. — De larve en pop van *C. variegata* zijn door Letzner; de larve van *obliterata* door Mulsant; de larve en pop van *bipunctata* door Frisch, Westwood en Letzner; de larve van *quadripunctata* door Letzner; de larve en pop van *14-pustulata* door Rosenhauer; de larve en pop van *18-punctata* door Letzner, Rey en Planet; de larve en pop van *variabilis* door Letzner; de levensgeschiedenis van *hieroglyphica* door Reich; de larve en pop van *quinquepunctata* door Heeger en de pop door v. Heyden; de metamorfose van *7-punctata* door Goedart en Kittel, de larve en pop door Frisch, Rosel, de Geer, Ratzeburg en Letzner, de pop door v. Heyden, Kessler en Hagens; de larve en pop van *distincta* door Rosenhauer; de larve en pop van *oblongoguttata* door Mulsant; de larve en pop van *ocellata* door de Geer, de larve door Letzner; de vermoedelijke larve van *18-guttata* door Mulsant; de larve van *14-guttata* door Perris; de levensgeschiedenis van *16-guttata* door Heeger, de larve en pop door Sommerville; de larve van *10-guttata* door Rosenhauer en Rey; de larve en pop van *12-guttata* door v. Frauenfeld; de metamorfose van *22-punctata* door Heeger en Letzner; de larve van *conglobata* door Frisch en Letzner en de pop ook door Letzner beschreven.

Van de 44 Europeesche soorten komen 22 in Nederland en 3 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprietknots ineengedrongen, uit korte, dicht aaneengesloten leedjes gevormd 2
- Sprietknots los geled, de leedjes duidelijk van elkaar gescheiden. Achterschienen met onduidelijke einddoornen 15
- 2 De dijlijn hoogstens tot op $\frac{2}{3}$ der lengte van het eerste sterniet reikend en naar buiten in den vorm van een gewoonlijk scherp aangeduiden halven cirkel geheel of bijna tot aan de basis teruggebogen. Achterschienen met duidelijke einddoortjes. Prosternum zonder langslippen in het midden 3
- De dijlijn reikt min of meer tot nabij den achterrand van het eerste sterniet, zet zich daarlangs verder naar buiten voort en zendt naar voren in buitenwaartsche richting onder een scherp hoek een rechten tak uit, welke den voorrand echter niet geheel bereikt 7
- 3 Klauwen in 't midden met een scherp tand. Bij het ♂ is het eerste tarslid sterk verbreed (Sub-gen. *Adonia* Muls.). Halsschild zwart, de voor- en zijrand, benevens eene korte middellijn en twee stippen op het midden, welke soms met den voorrand samenhangen, geelachtig-wit. Dekschilden rood, naast het schildje witachtig; eene rondachtige scutellair-vlek en 6 (1. 2. 2. 1.) stippen op elk der dekschilden, welke evenals bij *Hippodamia* 13-punctata geplaatst zijn, zwart. Van deze soort zijn verscheidene kleur-aberraties bekend, waarvan enkelen ook in Nederland zijn waargenomen. Dekschilden ongevekt of slechts met de scutellair-vlek (*immaculata* Gmel.); met de scutellair-vlek en stip 1 (*betulae* Walter), of 5 (*inhonesta* Weise), of 4 (*Hummelii* Weise), of 6, of 2. De scutellair-vlek en de stippen 3 en 5 (*artemisiae* Weise), of 4 en 5, (welke ook verbonden kunnen zijn), of 2 en 3, of 1 en 5, of 5 en 6 (*5-punctata* Walter), of 4 en 6 (*lugubris* Walter), (al deze aberraties zijn als *5-maculata* F. geduid). De stippen 4, 5 en 6 (*6-punctata* F.).

De scutellair-vlek met de stippen 4, 5 en 6 (*constellata* Laich.); of 1, 4 en 5 (*obverse-punctata* Schrank); of 3, 4 en 5 (**postica* Weise); of 2, 4 en 5 (*alacris* Weise); of 2, 3 en 4 (**mediopunctata* Sajó); of 2, 3 en 5 (**gradata* Walter); of 1, 5 en 6 (**Steineri* Walter); of eindelijk 4 met 5 verbonden en 6 (*conjuncta* Walter). Dekschilden, behalve met de scutellair-vlek, met de stippen 1, 4, 5 en 6 (*carpini* Fourcr., *9-punctata* Schrank); of 1, 4 met 5 verbonden, en 6 (**angulosa* Weise, in België bij Arlon); of 1, 2, 3 en 5 (**simplex* Weise); of 1, 3, 4 en 5 (**campestris* Weise); of 2, 4, 5 en 6 (*basilaris* Weise); of 2, 4 met 5 verbonden, en 6; of 2, 3, 4 en 5 (*arcuaria* Sajó); of 3, 4, 5 en 6 (*biconstellata* Sajó). Dekschilden, behalve met de scutellair-vlek, met de stippen 1, 2, 3, 4 en 5 (**moraviaca* Walter); of 1, 3, 4, 5 en 6 (*neglecta* Weise); of 1, 3, 4 met 5 verbonden, en 6 (**abbreviata* Weise); of 1, 2, 4, 5 en 6 (**ulox* Weise); of 1, 2, 4 met 5 verbonden, en 6; of 2, 3, 4, 5 en 6 (*litigiosa* Weise); of 2, 3, 4 met 5 verbonden, en 6. Ook kunnen bij de type-teekening de stippen 4 en 5 samenvloeden (**confluens* Sajó, in België), of hierbij de scutellair-vlek ontbreken (**Bellieri* Fleischer). Nog kunnen alle stippen groot, doch stip 2 meestal klein zijn, en stip 3 met de scutellair-vlek-, of bovendien de stippen 4 en 5 met elkaar verbonden zijn (*ustulata* Weise). Eindelijk kunnen de stippen 4, 5 en 6 tot eene dikke, C-vormige teekening, of tot eene groote, hoekige vlek vereenigd zijn; bovendien kan nog stip 3 met de scutellair-vlek verbonden zijn, of wel de stippen 1, 2 en 3 geheel ontbreken (**maculiger* Weise) 1). Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Niet zeldzaam op allerlei lage planten, als *Cirsium*, *Chenopodium*, *Atriplex*, enz., in droge streken; ook wel op dennen. (*mirabilis* Scriba) 1. *variegata* Goeze.

Klauwen aan de basis met een korten, stompen tand (Sub-gen. *Adalia* Muls.) 4

- 4 Halsschild langs de geheele basis fijn gerand, van voren nagenoeg recht afgesneden. Lichaam eenigszins langwerpig-ovaal, vlak gewelfd; op de bovenzijde lichter of donkerder okergeel, de randen der dekschilden gewoonlijk iets lichter gekleurd; met eenige, tot eene groote M samenvloeiende vlekken op het halsschild en soms met eene scheeve vlek nabij het uiteinde van elk dekschild zwart of bruinachtig (*livida* de Geer). Soms is het geheele midden van het halsschild donker gekleurd. Van deze soort zijn eenige kleur-aberraties bekend, van welke een paar ook in Nederland aangetroffen zijn. Dekschilden met 1 of 2 duidelijke, donkere langslijnen over het midden (*sublineata* Weise); of min of meer onregelmatig zwart bespikkeld, of met 6 tot 8 regelmatige, scherp geteekende vlekken, van welke 2 of 3 in eene gebogen dwarsrij vóór het midden en eene langwerpige vóór het uiteinde (*6-notata* Thumb.); of bruin of zwart, de basis, eene langsvlek dicht achter het midden en veelal ook nog eene stip daarvóór naar buiten, geel (**fenestrata* Weise, in België); ook wel zwartachtig, hetzij aan de basis lichter (**Illigeri* Weise), of geheel zwartbruin of diepzwart (**fumata* Weise). Lengte $3\frac{1}{2}$ —4½ mm. In de heide-streken vrij gemeen op dennen; zij overwintert achter boomschors.

(*M-nigrum* F.) 2. *obliterata* L.

Halsschild aan de basis, hoogstens nabij de achterhoeken, kantig gerand; van voren duidelijk uitgerand. Lichaam korter ovaal en meer gewelfd 5

- 5 De kantige zijrand van het halsschild slechts even om de volkomen afgeronde achterhoeken reikend. Voortarsen en sprietten bij het ♂ gewoon 6

De kantige zijrand van het halsschild langs een gedeelte van de basis om de meer stompe achterhoeken reikend. Bij het ♂ is het eerste voortarsen-lid verbreed en het derde sprietlid van een tandvormig aanhangsel voorzien (*Semiatadia* Crotch). Kop bij het ♂ grootendeels geel, bij het ♀ zwart met twee roodgele vlekken. Halsschild zwart, met eene breede, driehoekige (♂) of vierhoekige (♀) witgele vlek in de voorhoeken; bij het ♂ bovendien de voorrand met een wigvormig zoom, welke in het midden iets uitgezakt is. Dekschilden rood, eene min of meer hartvormige scutellair-vlek en op elk 5 stippen zwart; daarvan staat stip 1 aan den schouder, stip 2 op den zijrand en de 3 anderen, in een driehoek, achter het midden. Bij ab.c. *9-punctata* Fourcr., behalve de scutellair-vlek, op elk dekschild 4 stippen (1, 2, 3 en 4) of (1, 3, 4 en 5); bij ab.c. *Schäfferi* Weise 3 stippen (1, 2 en 3); bij ab.c. *carpini* Brahm eveneens 3 stippen (1, 3 en 4); bij ab.c. *graminis* Weise 2 stippen (1 en 3), of (2 en 3), of (3 en 4); bij ab.c. *bipunctata* Sajó met ééne stip (1 of 3). Lengte $5\frac{1}{2}$ —6½ mm. Op verschillende planten, als distels en Malvaceën. Niet inl. Deze soort zou in België bij Brussel en Arlon gevangen zijn; ik zag geen Belgische exemplaren.

(*undecimnotata* Schneid.)

- 6 Klauwen aan de basis met een kleinen, moeilijk zichtbaren tand. Bovenzijde geel. Halsschild met 3, den voorrand nagenoeg geheel of geheel rakende, zwarte langslijnen, van welke de middelste in 't midden-, de beide anderen aan de basis het breedst zijn en veelal zoodanig incenvloeden, dat het midden zwart is; met twee langwerpige, gele vlekken

1) In Zuid-Europa komen nog kleur-aberraties voor, bij welke op de dekschilden langsbanden gevormd- of eene scherp begrensde, breede, zwarte zoom en stip 5 (*umbata* F.) voorhanden zijn.

voor het schildje. Dekschilden met zwarten naadzoom, welke aan het schildje, in 't midden en vóór het uiteinde breeder is, en elk met 6 (1, 3, 2.) zwarte stippen. Van deze soort zijn ook verscheidene kleur-aberraties bekend. Dekschilden eenkleurig geel of slechts met flauwe aanduiding van donkere stippen (*destituta* Weise); met zwarten naadzoom en de stippen 2, 3 en 6, of 1, 2, 3 en 6 (*encausta* Weise), of 1, 2, 3, 4 en 6 (*immunda* Weise), of 1, 2, 3, 5 en 6 (*decas* Beck). Soms zijn enkele stippen met den naad of ook onderling verbonden, b.v. stip 1 met den naad (*connexa* Schneider); of 3 met 4 en met den naad (*crucifera* Weise); of stip 1, benevens de stippen 3 en 4 vereenigd en met den naad verbonden, zoodat een dubbel kruis ontstaat (*bicruciata* Schneid.); of stip 1 met den naad-, 2 met 3 en 4 onderling- en 6 eveneens met den naad verbonden, waardoor een kruis met 3 dwarsbalken gevormd wordt en slechts stip 5 vrij blijft (*tricruciata* Schneid.); of eindelijk stip 1 met den naad-, 2 met 3 en 4 slechts onderling-, en 5 met 6 door eene breede lijn verbonden (*intermedia* Schneid.). Ook kunnen nog de stippen onderling en met den naad verbonden zijn, waardoor de dekschilden zwart zijn met 5 groote, gele vlekken: eene langwerpige aan den buitenrand onder de schouderbuil, welke daarachter verbreed en in twee takken gesplijt is, eene tweede ronde aan den naad vóór het midden, eene hoekige derde en vierde naast elkaar achter het midden, en eene vijfde aan het uiteinde (*reticulum* Weise). Lengte 3½—4½ mm. Op Coniferen, vooral in bergstreken. Niet inl. Zij komt wellicht in het aangrenzend gebied voor.

(bochnica Payk.)

Klauwen aan de basis met een grooten, breedten tand. Halschild zwart, de zijden breed-, de voorrand smal geel-witachtig gezoomd; veelal ook eene korte middellijn van voren en twee vlekken vóór het schildje geelwit. Dekschilden rood, elk met eene zwarte stipplek op het midden, welke soms door een geelachtigen kring omgeven is (*bioculata* Say), of zich onregelmatig vergroot. Van deze soort zijn verscheidene kleur-aberraties bekend, van welke ook eenige in Nederland zijn aan getroffen. Dekschilden elk met twee stippen, van welke de bijkomende stip tusschen de gewone stip en den naad (*Herbstii* Weise), of tegen den zijrand staat (*Stephensii* Weise, in België); soms zijn beiden verbonden (*pruni* Weise); ook ontstaat deze teekening, wanneer de gewone stip zich, hetzij naar binnen, hetzij naar buiten, uitbreidt. Dekschilden elk met eene dwarsrij van 3 stippen, welke hetzij vrij blijven (*borcella* Weise), of waarvan de beide binnensten (*rubiginosa* Weise), of de beide buitensten (*anglicana* Weise), of alle drie tot een dwarsband vereenigd zijn (*unifasciata* F.); nog kan nit het midden van dezen dwarsband eene zwarte streep tot op de helft achterwaarts loopen en eene zwarte stip op de voorhelft voorhanden zijn (*Reitteri* Walter). Dekschilden met 4, 6 of 8 stippen, van welke ééne nimmer in de dwarsrij, doch meestal tusschen de gewone stip en de basis, zelden op den schouder staat (*perforata* Marsh.). Dekschilden met een zwarten, aan den naad slechts iets onderbroken dwarsband, van welken het buitenste deel aan weerszijden ook als eene vlek kan gescheiden zijn, daarachter met 1 of 2 donkere of zwartachtige vlekken, welke te zamen zich tot een gemeenschappelijken, boogvormigen band achter het midden uitbreiden; de takken van dezen boog reiken naar voren niet tot aan den dwarsband (*Olivieri* Weise, in België), of verbinden zich daarmede, zoodat zij eene breed-ovale, roode vlek (die veelal aan den naad onderbroken is) insluiten; aan het schildje bevindt zich eene gemeenschappelijke, donkere vlek, of eene zwarte streep aan weerszijden (*annulata* L.); ook kunnen de beide banden zich zoodanig verbreeden, dat de achterhelft der dekschilden zwart is, elk met drie roode vlekken (eene ronde vlek aan den naad, eene min of meer driehoekige aan den zijrand en eene derde aan den top); veelal zijn de beide laatste vlekken nog door een rooden randzoom verbonden, schildje al of niet donker gekleurd (*pantherina* L., *tripustulata* Zschach); nog kan hier de roode vlek aan den zijrand tot eene stip gereduceerd zijn en eindelijk geheel verdwijnen, terwijl het schildje eene meer of minder groote vlek vertoont, welke een of meer donkere strepen naar den dwarsband uitzendt (*inaequalis* Weise), of wel verdwijnt bovendien de roode topvlek. Dekschilden op de voorhelft rood, aan het schildje met enkele donkere streepjes; op de achterhelft zwart, met eene roode vlek aan den naad achter het midden (*semirubra* Weise). Dekschilden zwart, elk met 3 roode vlekken; de eerste, op den schouder tot aan den zijrand, groot, eenigszins vierhoekig; de tweede, achter het midden nabij den zijrand, min of meer driehoekig en met de eerste samenhangend; de derde, aan den naad achter het midden, ovaal (*conjuncta* Schneider). Dekschilden zwart, met 3 roode vlekken; de eerste, aan den schouder, gewoonlijk vierhoekig; de tweede, aan den naad achter het midden; de derde, vóór het uiteinde, rond; de laatste twee veelal zeer klein; soms sluit de roode schouderplek eene zwarte stip in (*6-pustulata* L., *dispar* Schneid.). Soms verdwijnt hier de derde- (*maculata* Scop.); of de tweede vlek, in welk geval de schouderplek smal is en tot op 1 van den zijrand reikt en bovendien de topvlek vrij groot is (*Simonii* Weise). Dekschilden zwart, met roode schouderplek en een rooden randzoom tot aan het uiteinde (*marginata* Rossi). De schouderplek halve-maantvormig, de vlek aan den naad klein (*unigera* Weise); of de schouder-

vlek nu eens meer vierhoekig, dan eens halve-maantvormig, de rest der dekschilden eenkleurig zwart (*sublunata* Weise). De schouderplek is aan den zijrand slechts zwak aangeduid en verdwijnt eindelijk geheel; het lichaam is nu bijna geheel zwart, de zijden van het halsschild van voren breder witachtig gezoomd dan van achteren, de omgeslagen rand der dekschilden roodachtig (*lugubris* Weise). Eindelijk is nog eene kleur-aberratie bekend, welke het meest bij *pantherina* komt; de dekschilden zwart, met eene roode vlek aan de basis nabij den naad, benevens een breeden, rooden randzoom, die in het eerste of tweede derde gedeelte van de lengte sterk versmald is en van af den top naar voren op den naad tot aan het midden terugloopt en aldaar gemeenschappelijk spiesvormig verbreed is. Lengte 3½–5½ mm. Zeer gemeen op boomen en allerlei lage planten, welke met blad- en schildluizen bezet zijn; ook veelal tegen muren en in den zonneschijn vliegend.

3. *bipunctata* L.

- 7 Mesosternum tot opname van de prosternale voortzetting nitgerand. Achterscheuen met onduidelijke einddoortjes (Sub-gen. *Harmonia* Muls.) 8
Mesosternum van voren recht afgesneden. Achterscheuen met duidelijke einddoortjes (Sub-gen. *Coccinella* sp.) 9

- 8 Prosternum zonder langslippen. Lichaam breed en tamelijk vlak. Halsschild witachtig-geel, met 11 zwarte stippen, waarvan 7 in eene dwarsrij aan de basis (twee zijn kleiner en ontbreken veelal, of kunnen met de naar binnen gelegen grotere stip verbonden zijn) en 4, van welke soms de buitensten ontbreken, in eene rij daarvoor. Dekschilden geel-roodachtig of okergeel, met 16 (1. 3. 3. 1.) zwarte stippen, waarvan de stippen 2 en 5 aan den zijrand staan. De navolgende kleur-aberraties zijn bekend. Dekschilden zonder stippen (*sordida* Weise); of met stip 2 of 5; of met dezen beiden (*rustica* Weise). Dekschilden, behalve met de twee scherp begrensde randstippen, met samenhangende, bruinachtige, niet scherp begrensde stippen, van welke de middelsten veelal tot wolkige dwarsbanden vereenigd zijn (*nebulosa* Weise, in België); of te zamen met 10-, met 12- (*multimaculata* v. Heyd., in België), met 14- (*pinastri* Weise, in België), of wel met 16 scherp begrensde, zwarte stippen; veelal zijn hierbij de middelste 5 stippen op het halsschild tot eene M-vormige-, of wel alle stippen tot eene eenigszins onregelmatige, groote, zwarte vlek versmolten (*16-punctata* F.). De stippen der dekschilden kunnen min of meer tot scherp begrensde banden vereenigd zijn, hetzij 1 met 3, of 3 met 4; meestal 3 met 4 en 6 met 7. Soms kromt zich de voorste band van binnen naar voren tot aan den naad en loopt de daarachter gelegen band recht tegen den naad aan (*abieticola* Weise, in België). Lengte 5–6½ mm. In den nazomer, vooral op dennen; ook op eiken. Alleen bij Arnheim en Venlo aangetroffen. In België bij Luik en Huy. (*marginipunctata* Schall.) 4. *quadripunctata* Pontopp.

Prosternum met twee dicht naast elkaar staande langslippen in het midden. Halsschild witachtig-geel, met 7, veelal ineenvloeiende, zwarte stippen, van welke eene vóór het schildje, vier in een boog daaromheen en eene aan weerszijden nabij den zijrand. Dekschilden witgeel, okergeel of vleeschkleurig; elk met 8, grotere en kleinere, zwarte stippen (2. 2. 1. 3.); van welke de stippen 1 en 2 (in den regel verbonden) aan de basis-, stip 3 (soms met 4 verbonden) aan den zijrand vóór het midden-, stip 5 (groot en breed) aan den naad achter het midden-, en de stippen 6, 7 en 8 (hetzij met elkaar verbonden of 8 vrij) in eene scheeve dwarsrij voor het uiteinde staan. Van deze soort zijn de navolgende kleur-aberraties bekend. Halsschild en dekschilden zonder stippen of slechts met eenige aanduiding ervan (*xyandaltinae* Weise) 1). Halsschild met de gewone vlekjes; dekschilden elk met 2 tot 8 meer of minder groote stippen, van welke geen enkele duidelijk met eene andere verbonden is (*rosea* de Geer, *contaminata* Mén., *bupthalmus* Muls., *australis* Weise). Op de dekschilden stip 5 met den naad- (en op of langs dezen lijnvormig naar voren verlengd), en stip 6 met 7 verbonden (*gemella* Herbst). Bij eene ab.c. *juliana* Gratl vormen de stippen 1 met 2, alsmede 3 met 4, groote, breede vlekken, terwijl op de achterhelft de stippen 6, 7 en 8 klein blijven; stip 5 is met de overeenkomstige tot eene breede middenvlek versmolten, welke op elk der dekschilden eene lange, driehoekige voortzetting tot aan het schildje uitzendt. Ook kunnen de stippen 1 en 2 op de beide dekschilden met elkaar een doorlopenden dwarsband vormen, de stippen 3 met 4 en 6 met 7 zijn met stip 5 verbonden, welke den naad bereikt; stip 8 is alleen vrij of met stip 8 van het andere dekschild vereenigd; de stippen van het halsschild zijn vrij of met elkaar versmolten (*pineti* Weise). Dekschilden zwart, met een of meer lichte vlekken, hetzij aan de basis, aan den zijrand, aan den naad of vóór den top (*rubra* Weise). Dekschilden geheel zwart, zoo ook de epipleuren 2); halsschild met de gewone vlekjes, of wel zwart en aan voor- en zijrand witachtig gezoomd, soms nog met eene witachtige, gevorkte

1) In Zuid-Europa; zou ook in België voorkomen.

2) Daardoor is de zwarte aberratie van alle andere zwarte Coccinellen-aberraties onderscheiden.

middellijn vóór het schildje; in den breedten randzoom bevindt zich eene zwarte vlek, welke soms met het zwarte midden samenhangt (*impustulata* L.); soms blijft van deze witachtige teekening slechts een smalle randzoom of een vlekje in de voorhoeken over (*specularis* Bon.). Lengte 3½–5 mm. Gemeen, vooral in het najaar; ook dikwerf des winters in groot aantal achter losse boomschors, vooral van oude eiken; ook in retsen van palen en houtwerk 5. **octodecimpunctata** Scop.

- 9 Prosternum in het midden met twee evenwijdig loopende, ver naar voren reikende langslijsten. Episternen van den metathorax geel. Bovenzijde zwart. Kop bij het ♂ bijna geheel geel, bij het ♀ met twee gele vlekken. Halsschild met eene eenigszins vierhoekige, gele vlek in de voorhoeken, welke naar achteren twee takken uitzendt, van welke de buitenste, aan den zijrand, min of meer tot aan de achterhoeken reikt; bovendien een smalle zoom aan den voorrand en eene korte middellijn; veelal is de geheele voorrand breed geel gezoomd en van achteren vijfmaal uitgezakt. Dekschilden elk met 7 (2. 2. 2. 1.) gele vlekken. Van deze soort zijn de navolgende kleur-aberraties bekend. Twee- (*colligata* Weise), drie- (*cingulata* Weise), vier- (*taeniolata* Weise), of vijf- (*abundans* Weise) verschillende vlekken op de dekschilden met elkaar vereenigd; of wel zes vlekken (1, 3, 5 en 6, deze laatste met 4 en 7) met elkaar samenhangend (*effusa* Weise). Ook kunnen (bij normaal geteekend halsschild) de dekschilden witgeel zijn, met eenige kleine, zwarte stippen, van welke stip 1 aan den schouder, stip 2 iets achter het midden (dichter bij den zijrand dan bij den naad geplaatst), stip 3 op ½ van de lengte, vlak achter stip 2, alsmede de stippen 4 en 5 (samenhangend) op den naad, stip 4 achter het schildje en stip 5 in het midden; de stippen 2 en 3 der beide dekschilden zijn door eene rechte, donkere lijn onderling verbonden; deze aberratie gelijkt eenigszins op licht gekleurde exemplaren van *bothnica*, doch is grooter (*nigropicta* Weise). Lengte 3–4 mm. Op boomen en lage planten, vooral in bosschen. Uitsluitend in Limburg bij Venlo, Gronsveld en Maastricht aangetroffen. In België o.a. bij Brugge 6. **quatuordecimpustulata** L.

Prosternum in het midden slechts met korte- of zonder langslijsten. Episternen van den metathorax, evenals deze, zwart 10

- 10 Prosternum in het midden met twee korte langslijsten, welke van achteren elk in den kantigen zijrand van de voortzetting overgaan, doch naar voren slechts even voorbij het begin der voortzetting reiken. Pooten zwart. 11

Prosternum geheel zonder langslijsten, slechts de voortzetting tusschen de voorcoxae aan weerszijden gerand, welke randing zich intusschen naar voren, om de voorcoxae heen, naar buiten oombuigt. Pooten geel. Halsschild geelachtig-wit, eene stip vóór het schildje, 4 veelal verbonden stippen in een hoog daarvóór, en eene niet zelden ontbrekende stip aan weerszijden aan den zijrand, bruin tot zwart. Dekschilden donkerder geel- of meer rood-geelachtig, elk met 6 (1. 3. 2.) zwarte stippen, van welke stip 1 aan den schouder, de stippen 2, 3 en 4 in eene dwarsrij in het midden, en 5 en 6 naast elkaar nabij het uiteinde staan. Bij het door *Linné* beschreven type (*C. 10-punctata*) ontbreekt stip 5. In den regel vertoonen de dekschilden vóór het uiteinde eene meer of minder duidelijke dwarsplooi. Deze soort is de meest veranderlijke van alle *Coccinelliden*; in allerlei overgangen gaan de individuen van eenkleurig witgeel in eenkleurig zwart over. Het zijn de navolgende kleur-aberraties, welke grootendeels ook in Nederland zijn aangetroffen. Bovenzijde eenkleurig witgeel, de onderzijde en de pooten meestal iets meer roodachtig (*pellucida* Weise); of wel het halsschild met 4 of 5 rood- tot zwartachtige stippen en enkele gedeelten van de onderzijde donker gekleurd (*lutea* Rossi). Dekschilden elk met 1 of 2 stippen, zelden ook met een duidelijk streepje aan het schildje, benevens het halsschild met 4, 5 of 7 stippen; hetzij op elk der dekschilden slechts ééne stip, nl. stip 2, in 't midden aan den zijrand (*subpunctata* Schrk.), of stip 4, in 't midden aan den naad (*dorsomaculata* Weise), of stip 1, aan den schouder (*loricata* Weise), of stip 5, op ¼ aan den zijrand (*rubellula* Weise), of stip 6, op ½ aan den naad; hetzij op elk der dekschilden twee stippen, nl. 2 en 4 (*4-punctata* L.), of 1 en 2 (*lateralis* Weise), of 1 en 4 (*sedula* Weise). Dekschilden elk met 3 stippen, met of zonder scutellair-streepje, nl. de stippen 2, 3 en 4 (*6-punctata* L.), of 1, 2 en 4 (*trigemina* Weise), of 2, 4 en 6 (*cautumnalis* Weise), of 2, 4 en 5 (*6-maculata* Thunb.), of 1, 2 en 5 (*Saalmülleri* v. Heyd.). Dekschilden elk met 4 stippen, met of zonder scutellair-streepje, nl. de stippen 1, 2, 3 en 4 (*8-punctata* Müller), of 1, 2, 4 en 5 (*salicis* Weise), of 1, 2, 4 en 6 (*silestaca* Schneider). Dekschilden elk met 5 stippen, b.v. 1, 2, 3, 4 en 5, benevens een scutellair-streepje of eene scutellair-vlek (*consita* Weise), of 1, 2, 3, 4 en 6 (*relicta* v. Heyd.), of 1, 2, 4, 5 en 6 (*11-maculata* Walter). Verder komen nog aberraties voor met meer dan 5 stippen op elk der dekschilden, nl. met 6 stippen (*12-punctata* Müll.), of bovendien met een duidelijk scutellair-streepje, dat soms met het overeenkomstige streepje tot ééne stip kan vereenigd zijn (*13-maculata* Forster), terwijl ook de 5 of 7 stippen op het halsschild ineenvloeien kunnen; deze laatste twee aberraties zijn ook als *14-punctata*

Müller geduid. Doordat de stippen der dekschilden grooter worden en voor een deel of allen tot vlekken of banden ineenvloeien, ontstaan de overgangsvormen tot de donkere variëteiten. Eerst verbindt zich stip 4 met de overeenkomstige tot eene groote, gemeenschappelijke naadvlek (*centromaculata* Weise); soms ontbreken hier de stippen 5 en 6 (**affinis* Walter); dan vereenigen zich de stippen 3 en 4, met de beide overeenkomstigen tot een gemeenschappelijken dwarsband, en bovendien is dan veelal de naad tot aan de basis zwart gezoomd (*semifasciata* Weise); ook kunnen zich de stippen 3 en 4 met de beide overeenkomstigen tot een gemeenschappelijken band vereenigen, terwijl stip 3 met 6 en 4 met 6 verbonden- en 1, 2 en 5 vrij zijn (**Troegneri* Walter); vervolgens vereenigt zich bovendien stip 3 met 6 en 5 (*recurva* Weise), en eindelijk voegt zich nog daarbij stip 2, terwijl ook de naad op de achterhelft meer en meer zwart omzoomd wordt. Eindelijk zijn de dekschilden zwart, elk met 4 groote, lichtgele vlekken, van welke de eerste de vergrootte, doch vrij staande, zwarte schouderstip nagenoeg cirkelvormig omsluit; de ronde vlekken 2 en 3 bevinden zich achter het midden en 4 aan het uiteinde (*humeralis* Schaller). Dezelfde teekening ontstaat nog op de navolgende wijze: eerst vereenigen zich de beide stippen 4, dan 3 en 4 met de overeenkomstigen tot een dwarsband, vervolgens 2, 3 en 4 met de overeenkomstigen eveneens tot een dwarsband (*triangularis* Weise), dan nog bovendien 5 met 2 aan den zijrand en 6 met 4 aan den naad (*ephippiata* Weise), en eindelijk nog de stippen 5 en 6 met elkaar en naar voren met stip 3. Dan heeft men eene serie, die weer begint met de vereeniging van stip 4 met de overeenkomstige, dan 3 met 4 en de overeenkomstigen; vervolgens verbindt zich van voren stip 1 en van achteren stip 6 min of meer met stip 3, terwijl stip 6 met de overeenkomstige een gemeenschappelijken dwarsband vormt (*consolidata* Weise); ook is de naad gedeeltelijk of geheel donker geworden en de beide nog vrije stippen 2 en 5 voegen zich meer en meer tegen het bruine of zwarte netwerk aan. Eindelijk zijn de dekschilden zwart en elk van 5 (2, 2, 1.) groote, lichte vlekken voorzien, van welke 1 en 2 nagenoeg halve-maanvormig zijn, de eerste aan den buitenrand en achter den schouder, de andere nabij het schildje; 3 en 4 zijn rondachtig en dicht achter het midden geplaatst, vlek 5 staat aan den top (*obliquata* Reiche). Deze geheele serie werd als *10-pustulata* L. geduid; een zeer lichte vorm (*guttatopunctata* L., *clathrata* Schaaf.) heeft witgele vlekken, die door een bruin of roodbruinachtig net gescheiden worden. Bij eene ab.c. **Hildeae* Grall, welke iets kleiner zou zijn dan gewoonlijk *10-pustulata* is, zijn de vlekken lichtgeel (niet roodgeel), op een diepzwarten grond; de vierde vlek op de dekschilden ontbreekt, zoodat op elk 4 vlekken langs den zijrand voorkomen, doch het midden overigens ongevekt is. Ook komen nog zeer licht bruingele, onuitgekleurde (?) exemplaren voor, bij welke de vlekken onduidelijk en eenigszins witachtig geteekend zijn. Nog kunnen bij de teekening der dekschilden als bij *recurva* de achterste drie lichte vlekken kleiner worden (*pantherina* de Geer), of gedeeltelijk verdwijnen, nl. de topvlek alleen (*bella* Weise), of de vlek aan den naad (*obscura* Weise), of die aan den zijrand (*arvensis* Weise), of twee van die drie vlekken tegelijk (*austriaca* Schnrk.), of eindelijk alle drie; alsdan zijn de dekschilden zwart, met eene groote, roodgele of roode, halve-maanvormige schoudervlek, die naar binnen tot nabij het schildje of ten minste over het midden van de dekschilden reikt; bovendien is het halsschild zwart, met smallen, witachtigen zijrand en meestal ook met witachtigen voorrand (*unifasciata* Scriba, *Scribae* Weise). Dan kan hiervan afgeleid worden de ab.c. *bimaculosa* Herbst, bij welke de dekschilden lichter of donkerder bruin zijn; zelden geheel eenkleurig (*thoracica* Schneid.), doch gewoonlijk met eene wit- of geelachtige, halve-maanvormige schoudervlek (*inconstans* Schaaf.). Dan heeft men de ab.c. *bimaculata* Pontopp., afgeleid van den vorm *10-pustulata* L., wanneer de achterste drie vlekken, alsook de scutellair-vlek kleiner worden en de eene na de andere en eindelijk alle drie verdwijnen, ten laatste ook die aan het schildje; zoodoende worden de dekschilden zwart, met eene kleine, halve-maanvormige, roode vlek op den buitenrand achter den schouder, welke gewoonlijk den zijrand niet nadert en niet over het midden der dekschilden naar achteren reikt; of wel (*bipustulata* Herbst, *limbella* Weise) zij vertoonen eene smalle, bandvormige langsvlek tussehen de schouderbuit en den buitenrand. Eindelijk zijn de dekschilden, behalve de epipleuren, geheel zwart, of is ook nog de uiterste randzoom licht gekleurd; de witachtige randzoom van het halsschild reikt tot aan de achterhoeken (**nigrina* Weise); deze is vooral daardoor van *hieroglyphica*, ab.c. *areolata* Panz. onderscheiden, bij welke alleen de voorhoeken van het halsschild geelwit gekleurd zijn. Lengte $\frac{3}{4}$ —4; mm. Zeer gemeen op allerlei boomen, heesters en lage planten.

(*10-punctata* L.) 12. *variabilis* Herbst. 1)

- 11 Klauwen aan de basis met een zeer weinig uitstekenden tand. Epimeren van den mesothorax witgeel. Halsschild zwart, met eene langwerpige, min of meer driehoekige, witgele vlek in de voorhoeken, welke evenzeer op de boven- als op de onderzijde ontwikkeld is.

1) De heer D. ter Haar ving deze soort in copulatie met *C. bipunctata*.

Dekschilden geelrood, met eene gemeenschappelijke scutellair-vlek en elk met 5 (1. 2. 2.) zwarte stippen, van welke 2 en 4 (aan den zijrand) iets meer naar voren dan 3 en 5 (nabij den naad) staan. Van deze soort zijn de navolgende kleur-afwijkingen bekend, welke gedeeltelijk ook in Nederland zijn aangetroffen. Dekschilden ongevekt (**pura* Weise). Dekschilden, behalve met de scutellair-vlek (die veelal slechts door een streepje aan weerszijden van het schildje is aangeduid) met 1 of 2 stippen, nl. stip 5 (*tripunctata* L.), of 3; of wel 3 en 5 (**4-maculata* F.), of 1 en 5 (*peregrina* Weise). Dekschilden, behalve met de scutellair-vlek, met 3 stippen, nl. 3, 4 en 5, van welke 4 en 5 veelal eenigszins samenhangen (**vicina* Weise); of wel 2, 3 en 5 (*variegata* Weise); of eindelijk 2, 4 en 5 (**litoralis* Weise). Dekschilden, behalve met de scutellair-vlek nog met 4 stippen, van welke soms 2 met 4, of 4 met 5 door eene streep verbonden zijn; het kunnen zijn de stippen 2, 3, 4 en 5 (*9-punctata* L.), of 1, 2, 3 en 4 (**oculata* Westmann), of 1, 3, 4 en 5 (*Salsolae* Weise), of 1, 2, 3 en 5 (*cahiles* Weise). Nog kunnen bij de normale teekening de stippen 2 met 3 (*longula* Weise), of 4 met 5 (**amaricis* Weise), of de beide paren stippen tot breede, eenigszins scheef staande dwarsbanden verbonden zijn (*brevifasciata* Weise). Ook kunnen stip 3 met de scutellair-vlek meer of minder breed, of bovendien stip 3 met 2, of met 5, of eindelijk stip 2 met 3 en met de scutellair-vlek en voorts stip 4 met 5 verbonden zijn (**nigrofasciata* de Rossi). Lengte $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Gemeen, vooral op distels en meestal langs de zeekust 7. **undecimpunctata** L.

Klauwen aan de basis met een grooten, driehoekigen, spitsen tand 12

- 12 Lichaam kort-ovaal, meer half-kogelrond. Epimeren van den mesothorax geel. Halsschild zwart, met eene min of meer vierhoekige, zelden weinig ontwikkelde gele vlek op de voorhoeken. Dekschilden met eene gemeenschappelijke scutellair-vlek en in den regel elk met 2 of 3 stippen, benevens bij uitzondering nog eene kleine schoudervlek 13

Lichaam iets meer langwerpig-ovaal. Epimeren van den mesothorax zwart. Halsschild zwart, met eene driehoekige, witgele vlek in de voorhoeken. Dekschilden geelbruin of geelroodachtig, met een breedten, gemeenschappelijken, golvenden zwarten dwarsband op $\frac{1}{3}$ van de lengte, welke naar de basis een breedten tak langs den schouder en een over den naad uitzendt, en zich van achteren met eene groote, breede vlek, aan weerszijden op $\frac{2}{3}$ van de lengte, verbindt (*hastata* Oliv.). Goed uitgekleurde exemplaren bezitten een gemeenschappelijken, donker roodbruinen, na den dood verkleurden band op de achterhelft van den naad, welke zich nabij het uiteinde, ter weerszijden, in een met den achterrand evenwijdig loopenden tak voortzet. De navolgende kleur-afwijkingen zijn bekend en komen ten deele ook in ons land voor. Dekschilden ongevekt, slechts aan het schildje iets donkerder (**brunnea* Weise). Dekschilden geelbruin, een van achteren veelal twee-lobbige, gebogen langsband over den schouder voor het midden en eene langwerpige vlek aan het schildje zwart (*curva* Weise); of met eene vertakte, zwarte langslign over het midden, benevens een overblijfsel der achterste dwarsvlek en eene scutellair-vlek (*cervicornu* Gratl.); of in de plaats van den schouderband met twee of drie enkele vlekken (*lineolata* Mrsh.). Dekschilden met eene scutellair-vlek, een schouderband en een of twee vlekken op $\frac{2}{3}$ van de lengte (*4-fasciata* Weise en *brachiata* Gratl.); deze laatste twee vlekken kunnen zich van lieverlede tot eene onregelmatige dwarsvlek vereenigen, wier binnenhelft aanmerkelijk grooter is dan de buitenhelft en zich ten slotte met den schouderband vereenigt (*sinuata* Naëzen). De schouderband vereenigt zich halve-maantvormig met de scutellair-vlek, doch niet met de achterste dwarsvlek; de kleine tak van den schouderband tegen den zijrand ontbreekt (*flexuosa* F.), of is aanwezig (*Schneideri* Gratl.). Ook kan de donkere kleur der dekschilden zoodanig toenemen, dat de dekschilden zwart zijn, elk met 5 (2. 2. 1.) geelbruine vlekken, van welke de vlekken 1 en 3 aan den zijrand, 2 en 4 (deze laatste veelal stipvormig) aan den naad, en 5 aan het uiteinde (*marginemaculata* Brahm); van deze vlekken verdwijnt gewoonlijk eerst de vierde, dan ook vlek 2 (**bistriverrucata* Haworth), vervolgens 1 aan den schouderband (*luctuosa* Weise) en eindelijk 5 (*fuliginosa* Weise), waardoor de dekschilden alsdan zwart zijn, met eene gele vlek in 't midden van den zijrand (vlek 3); ten slotte verdwijnt ook vlek 3 en zijn de dekschilden zwart en slechts de opgerichte zijrand geelachtig, of wel, met uitzondering van de epipleuren, geheel zwart (*areata* Panz.)¹⁾. Deze laatste donkere vormen zijn meestal iets grooter en vlakker dan de lichtere. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Op dennen, Rubus-soorten en op *Calluna vulgaris*, vooral op vochtige heidegronden; ook soms in de duinen en eene enkele maal in groot aantal langs de stranden opgewaaid 11. **hieroglyphica** L.

- 13 Voorhoeken van het halsschild iets spitsier uitgetrokken, slechts aan den top afgerond en

1) Deze zwarte aberratie is gemakkelijk van de zwarte aberr. van *C. 18-punctata* Scop. te onderscheiden door de gele epipleuren der dekschilden, van die van *C. variabilis* F. door de zwarte epimeren van den mesothorax, de geheel zwarte punten en de geel gekleurde voorhoeken van het halsschild.

daardoor meer vooruitstekend. Dekschilden nabij den zijrand met een ondiepen, daaraan evenwijdig loopenden langsindruk. Epimeren van den metathorax zwart 1) 14

Voorhoeken van het halsschild meer breed afgerond en minder vooruitstekend. Dekschilden zonder langsindruk. Epimeren van den metathorax geel. Deze soort gelijkt zoozeer op 7-punctata, dat zij daarmede gemakkelijk te verwarren is. Zij is iets minder rond; de witte vlek in de voorhoeken van het halsschild reikt op de onderzijde naar achteren tot over het midden, bij 7-punctata daarentegen hoogstens tot op een derde van den zijrand; ook zijn de stippen 2 en 3 der dekschilden in den regel groter en altijd meer in de breedte ontwikkeld. Dekschilden, behalve met de gemeenschappelijke scutellair-vlek, elk nog met de stippen 2 en 3; de normale stip 1 op het eerste derde gedeelte aan den zijrand ontbreekt. Bij het ♂ is veelal de voorrand van het halsschild gedeeltelijk of geheel witachtig gezoomd 2). Een drietal kleur-aberraties zijn bekend. Dekschilden, behalve de scutellair-vlek, elk met 3 stippen, die als bij 7-punctata geplaatst staan; bij uitzondering verdwijnt de lichte vlek op de bovenzijde in de voorhoeken van het halsschild geheel, is echter nog op de onderzijde door een uiterst smallen, witachtigen randzoom, die tot over het midden naar achteren reikt, aangeduid (*magnifica* Redt., *labilis* Muls.). Dekschilden, behalve de scutellair-vlek, elk met 4 stippen, daar eene meestal kleine schouderstip nog daarbij komt (*domiduca* Weise). Eindelijk kennen enkele stippen der dekschilden door strepen met elkaar verbonden zijn, nl. eene groote schouderstip door eene streep met de normale stip 1, door eene tweede streep met stip 2, die weer met 3 samenhangt (*intertexta* Weise). Lengte $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ mm. Op droge gronden, vooral in den nazomer op zieke dennen. Ook op bloeienden *Asparagus*. In aantal bij St. Oederode; ook bij Oisterwijk, Apeldoorn, Bergen-op-Zoom en eenmaal bij den Haag. Ik ken uit Nederland uitsluitend typische exemplaren van den vorm *magnifica* en ook de *ab. domiduca*. Ook in België op vele plaatsen 10. *distincta* Falderm.

- 14 Dekschilden in den langsindruk grover bestippeld, de zijrand scherpkantig afgezet. Voorhoeken van het halsschild op de onderzijde breed, min of meer driehoekig geel gevlekt. Deze soort gelijkt eenigszins op 7-punctata, doch is veel kleiner. Dekschilden, behalve de zwarte scutellair-vlek, nog met twee stippen, van welke stip 1 (die veelal door een gelen ring omgeven is) nabij den naad in het midden, en stip 2 op $\frac{2}{3}$ van de lengte aan den zijrand, iets verder naar voren dan bij 7-punctata gelegen is. De navolgende kleur-aberraties zijn bekend geworden. Dekschilden behalve de scutellair-vlek slechts met ééne stip, hetzij stip 1 (*3-punctata* de Rossi), of stip 2 (*simplex* Weise); beide afwijkingen vormen te zamen de *ab. Rossii* Weise. Dekschilden, behalve de scutellair-vlek, met drie stippen; de bijkomende stip staat evenals bij 7-punctata in het eerste derde gedeelte aan den zijrand (*simulatrix* Weise, in België), of op den schouder, of aan den naad, iets verder naar achteren dan stip 2 (*jucunda* Weise). Bij *ab. Schreitteri* Fleischer is de scutellair-vlek klein, ontbreken de stippen 1 en 2, doch is alleen de bijkomende stip van achteren (als bij *jucunda*) voorhanden. Dekschilden, behalve de scutellair-vlek, nog met 4 stippen; van de twee bijkomenden staat gewoonlijk de eene aan den schouder, de andere in het eerste derde gedeelte aan den zijrand (*multipunctata* Weise). Bij *ab. arcuata* Weise is de scutellair-vlek met stip 1 (aan den naad) verbonden. Bij *ab. Elbertii* Flach breidt zich het zwart zoodanig uit, dat van uit de scutellair-vlek zich een 8-vormige band over de middenstip langs den naad gevormd heeft, die met het teruggebogen uiteinde eindigt in de randstip; ook is nog eene bijkomende randstip aanwezig. Bij een exemplaar uit Nijmegen zijn de epimeren van den metathorax geel. Lengte 4—5½ mm. Op allerlei planten en op dennen; ook op vruchtboomen. In de provinciën Holland minder algemeen . . . 3. *quinquepunctata* L.

Dekschilden in den langsindruk niet grover bestippeld, de zijrand breder en minder scherpkantig afgezet. Halsschild zwart; eene witachtige, meer of minder vierkante vlek in de voorhoeken, welke zich gewoonlijk reeds kort achter de voorhoeken van den zijrand verbreedt en op de onderzijde slechts als een smalle zoom in de voorhoeken zichtbaar blijft. Dekschilden helder rood; eene vlek ter weerszijden van het schildje in den regel witachtig; eene groote gemeenschappelijke zwarte scutellair-vlek en op elk drie zwarte stippen, van welke stip 1 ongeveer in het eerste derde nabij den zijrand, 2 iets vóór het midden nabij den naad, en 3 in het laatste derde gedeelte nabij den zijrand; soms zijn de stippen zeer klein en worden deels onduidelijk. De navolgende kleur-aberraties zijn bekend. Dekschilden zonder duidelijke stippen (*lucida* Weise, in België). Dekschilden met de scutellair-vlek en ééne stip, hetzij stip 2 (*interpunctata* Weise) of stip 3 (*florivola* Weise); behalve de scutellair-vlek nog met twee stippen, hetzij 2 en 3 (*atomaria* Weise), of 1 en 3 (*externpunctata* Weise), of 1 en 2 (*conspicua* Weise, in België). Dekschilden, behalve de scutellair-vlek met 4 stippen, daar bij het normale getal nog eene stip op de schou-

1) Als groote uitzondering bij een exemplaar van *C. 5-punctata* geel.

2) Deze typische vorm schijnt alleen in den Caucasus voor te komen.

14. *coarctata* Muls. Weise, in België; met 5 of meer stippen, welke veelal zeer groot, tot een rimp begrensde zijn. *coarctata* Weise. 15. Nog komen, volgens *Weise*, twee soorten aberraties voor, bij welke de dekschilden zwart zijn en elk een geelwit vlekje (soms met seildie vertoonen) (*lipsisus* Zschern), of bij welke halsschild en dekschilden geheel zwart zijn (*arctica* Weise). Lengte gewoonlijk 6—8 mm., bij uitzondering slechts 5 mm. Overal zeer gemeen op allerlei lage planten. Het ♀ legt in het begin van het voorjaar hare eieren in hoopjes van 10—12 aan de onderzijde der bladeren van planten, welke met bladluizen bezet zijn. De larven, welke op den rug met haarbundeltjes op kleine wraties bezet zijn, voeden zich met bladluizen. Na eenige vervellingen veranderen zij van kleur, worden van zwart blauwachtig grijs en vertoonen dan aan weerszijden van het prosternum en aan den ten en vier achterlijfsring eene gele vlek, benevens eene langsrij van geel gekleurde rugstippels. In Juni volwassen zijnde, hechten zij zich met het uiteinde van het lichaam aan een blad, krommen zich naar voren en verpoppen, waarbij zij dan op de teruggeschoven larvenhuid zitten. Na 8 dagen kruipen de kevers uit. In één jaar telt men twee generaties aan, bij zeer gunstig weder zelfs drie. Het is vooral deze soort, welke soms te midden van zwermen bladluizen over zee gedreven wordt en alsdan als bezaaid langs de stranden wordt aangetroffen. Zij schijnt zich niet alleen met bladluizen te voeden, doch verslindt ook de larven van andere kevers en zelfs de poppen van andere Coccinelliden.

9. *septempunctata* L.

15. Naad der dekschilden gewoon, zonder geelachtige beharing. 16

De bovenste randlijn van den naad der dekschilden buigt zich voor het uiteinde een weinig naar binnen, zoodat daardoor een kleine inham gevormd wordt, welke geelachtig behaard is. Mesosternum van voren nigerand (Sub-gen. *Anatis* Muls.). Halsschild zwart, een smalle zoom aan den voorrand, een breede zoom langs den zijrand (welke op de achterhelft zich van de zijden verwijfert en een zwart vlekje insluit, dat soms met het zwarte midden of met den zijrand verbonden is), alsmede eene dubbele vlek voor het schildje, witgeel. Dekschilden geelrood, aan den omtrek smal zwart omzoomd, en elk met 10 (2, 4, 3, 1) kleinere of grootere zwarte vlekken, die meestal door een lichten kring omgeven zijn; enkele vlekken zijn soms elliptisch. De vlekken 3 en 4 zijn veelal te zamen en met den zijrand verbonden; vlek 2 is een streepje aan het schildje. De dekschilden zijn soms voor het uiteinde, in de breedte, blijk opgericht. De navolgende kleur-aberraties zijn bekend. Dekschilden geheel geelrood, met of zonder duidelijke lichtere vlekken, welke geene zwarte stipvlek in het midden hebben (*vicular* Weise). Dekschilden met 2 tot 9 zwarte, meestal door een geelachtigen kring omgeven, vlekken, b.v. twee vlekken: eene op den schouder en eene andere aan den buitenrand, of in het midden, of aan den naad, of voor het uiteinde (*flavata* Gebler); of elk met 3 (1, 2 en 6) vlekken (*Böhneri* Cederjhelm); of met 4 (1, 2, 4 en 6) vlekken; of met 6 (1, 2, 3, 4, 6 en 7, of 1, 2, 4, 6, 7 en 8, of 1, 2, 6, 7, 8 en 10) vlekken (*vicular* Weise, *badensis* Heyd.); of elk met 8 vlekken, dan ontbreken de stippen 3 en 10, of 2 en 10, of 3 en 9 (*vulgaris* Weise, *dominula* Heyd.); of met 9 vlekken, bij welke stip 10 of eene andere ontbreekt; al deze afwijkingen vormen te zamen de abt. 15-*punctata* de Gier. Dan kunnen twee of meer vlekken op de dekschilden in de breedte samenhangen, b.v. 3 met 9, of 4 met 3 en 5 (*subfasciata* Weise). Ook kunnen twee of meer vlekken in de lengte met elkaar samenhangen (*hyattata* Weise), en eindelijk ontstaan drie langsbanden, welke vrij blijven, of twee aan twee of alle drie van voren en van achteren samenhangen; de buitenste band ontstaat door de vereeniging der vlekken 1, 3, 4 en 7 en veelal nog 10, de middelste vormt zich uit de vlekken 5 en 8, en de binnenste uit 6 en 9 (*tricolor* L.). Lengte 7—9½ mm. Gemeen op eiken, berken, dennen en distels. Ook soms in groot aantal langs de stranden. 22. *ocellata* L.

16. Kluwen met een grooten driehoekigen tand aan de basis (Sub-gen. *Halyzia* Muls.) . . . 17

Kluwen met een klein spits tandje nabij het midden, aan de basis tamelijk slank. Mesosternum van voren recht afgeknot. Eindlid der sprietten recht afgeknot (Sub-gen. *Mysia* Muls.). Bovenzijde roodachtig-geel of bruin-geel. Halsschild aan de zijden breed geelachtig-wit omzoomd, voor het schildje met 2, meestal zeer onduidelijke, lichtere vlekken; het midden veelal donker gekleurd, soms nagenoeg zwartachtig, of met 2 zwarte langsbanden. Dekschilden met licht geelachtige of geelachtig-witte vlekken: eene aan het schildje, twee meer langzaam op het eerste derde gedeelte nabij den naad, eene langere daarachter, alsmede een smalle langsband over de geheele buitenhelft (*3-punctata* F.). Op de dekschilden kan de een of der voorste twee vlekken nabij den naad met de achterste vlek een langsband vormen; bovendien zijn dan de naad en de buitenrand wit gezoomd (*Fleischeri* Walter). De vlekken deze voorste twee vlekken zich tot eene groote, gemeenschappelijke dwarsvlek

1. In *Z. f. Naturg.* komt een *aberrata* Ohs. voor, bij welke verschillende stippen tot een gewoonlijk niet scherp begrensd, meer of minder groot vlekje zamenhangen.

vereenigen, welke met den schouderrand door eene streep verbonden is; de zeer zwak aangeduide langsband is op de voorste helft onderbroken (*maculata* Fleischer i.l.). Nog kunnen aan het schildje twee vlekken in plaats van eene vlek voorkomen, van welke de buitenste met den buitenrand verbonden is; de voorste twee vlekken hangen samen, evenzoo de langsband met den buitenrand door twee breede vlekken verbonden (*mixta* Walter). Eindelijk kan de binnenste van de voorste twee vlekken geheel ontbreken, de langsband bevindt zich slechts op de achterhelft der dekschilden en begint met eene vlek (*abbreviata* Walter). Bij een exemplaar uit Huissen zijn de lichte vlekken op de dekschilden zeer onduidelijk, zoodat de dekschilden bijna alleen de grondkleur vertoonen 1). Lengte 6—8 mm. Vrij gemeen op jonge deenen; ook soms op lage planten. Zij heeft meerdere generaties in het jaar 21. *oblongoguttata* L.

- 17 Mesosternum van voren, tot opnemng van de prosternale voortzetting, diep uitgerand. Prosternum op het midden met twee kielvormige langlijnen. 18

Mesosternum van voren recht afgeknut of slechts vlak uitgebogen 21

- 18 De uitranding van het mesosternum half-cirkelvormig en lijn gerand. Sprieten nagenoeg tot aan de basis van het halsschild reikend. Onderzijde zwart, met gele epimeren (Propylea Muls.). Halsschild zwart; een breede, driemaal uitgezakte zoom aan den voorrand en een smalle zoom aan de zijden wit. Dekschilden geelwit, elk met 7 (1. 2. 3. 1.) zwarte vlekken. Hierbij is vlek 3 met die van het andere dekschild tot eene gemeenschappelijke, vierhoekige vlek op den naad voor het midden-, vlek 5 met 6 en deze met de overeenkomstigen tot een gemeenschappelijken, ankervormigen band- en vlek 7 met de overeenkomstige tot een gemeenschappelijken dwarsband nabij het uiteinde vereenigd; veelal is nog vlek 4 aan den ankervormigen band aangesloten. Bij abc. *Frivaldskyi* Sajó zijn twee hoekige dwarsbanden voorhanden, de een voor, de ander achter het midden. De naad is meestal zwart gezoomd. Van deze soort zijn een aantal kleur-aberraties bekend. Bovenzijde bleekgeel, met 6 zwarte stippen op het halsschild, waarvan 4 in een boog voor het schildje en aan weerszijden ééne aan den zijrand voor de achterhoeken; deze stippen vloeien zelden ineen of ontbreken gedeeltelijk. Dekschilden elk met 7 zwarte vlekken, van welke vlek 1 aan de basis binnen den schouder, vlek 2 daarachter naar buiten aan den zijrand, vlek 3 nabij den naad voor het midden, de vlekken 4, 5 en 6 in eene dwarsrij achter het midden (daarvan zijn de vlekken 4 en 5 langwerpig, 6 klein) en vlek 7 smal, aan het uiteinde dwars geplaatst en soms onduidelijk (de grondvorm *cellulata* Scopoli). Soms ontbreken van de vlekken der dekschilden enkelen, als: vlek 6 (*12-punctata* Walter), of 7; of 6 en 7 beiden, en is het halsschild slechts van 4 stippen aan de basis voorzien (*parumpunctata* Sajó). Van de 7 stippen op elk der dekschilden kunnen 5 en 6 verbonden zijn (*angularis* Sajó); of 1 met 3 en 5 met 6 (*5-lineata* Fleischer i.l.); of 5 met 6 en de beide overeenkomstigen (*palustris* Sajó); of 1 met 3 en 6 met 7 (*figurata* Walter); of 1 met 3, 5 met 6 en de overeenkomstigen, 6 met 7 (*lineata* Walter); of 3 met 5, 6 en 7 (*lyra* Walter); of 2 met 1 en 3, en 5 met 6 en 7 (*paraviata* Walter); of 4 met 2, 1 en 3, en 5 met 6 en 7 (*phila* Walter); of 3 met 6 en de overeenkomstige, en 5 met 6 en 7 (de typische *conglobata* L.); of 1 met 3 en met de beide overeenkomstigen, benevens 5 met 6 en 7 (*Walteri* Fleischer i.l.); of 2 met 1, 3 met 6 en de overeenkomstige, benevens 4 met 5, 6 en 7 (*brunnensis* Walter); of 2 met 1, 3 met 6 en de overeenkomstige, 3 met 5, benevens 4 met 5, 6 en 7 (*Trappii* Walter); of 2 met 1, 3 en de overeenkomstigen, benevens 4 met 5, 6 en 7 (*bifusciata* Fleischer i.l.); of 1 met 3 en de overeenkomstigen, 5 met 6, 7 en 4 (niet 4 met 5, wel 7 met 4 verbonden) (*maeandra* Walter); of 5 met 2, 1 en 3, en 4 met 5, 6 en 7 (*fasciata* Fleischer i.l.). Nog kunnen de vlekken 3, 6 en 7 met hare overeenkomstigen samenhangen en daardoor drie zwarte dwarsbanden over den naad vormen; of wel de vlekken 1, 3, 5 en 6 met elkaar en 6 met 7 door den breed zwart gekleurden naad verbonden zijn (*vil-vuosa* Weise, *nitritilis* Weise). Bij abc. *conglomerata* F. vloeien alle vlekken ineen; daardoor zijn de dekschilden alsdan zwart, met eene langwerpige basaalvlek nabij het schildje, eene dergelijke aan den schouderrand, eene ronde aan den naad achter het midden, alsmede twee dwarsvlekken, van welke de eene bandvormig, in 't midden aan den zijrand, de andere halve-maanvormig (van achteren uitgerand) voor het uiteinde, geel- of witachtig; beide dwarsvlekken hangen door een geelwitte randzoom te zamen (*leopardina* Weise); wanneer de zwarte normaal-stippen 2 en 4 niet geheel aan de teekening zijn aangesloten, dan worden de gele

In Zuid-Europa komt eene aberratie voor, bij welke de lichte vlekken op de dekschilden zich zoodanig uitbreiden, dat de grondkleur verdrongen is; de dekschilden zijn alsdan eenkleurig licht geelwit, terwijl het halsschild eveneens geheel geelwit of geelbruin is. *Mulsanta* Schaud. bij abc. *longa* Schaud. daarentegen is alsdan het halsschild op het midden bruin of zwart.

dwarsvlekken nog, door eene gele langstreep, evenwijdig aan den zijrand, onderling en met de schoudervlek verbonden. Ook kan de voorste dwarsvlek zich in twee vlekken verdeelen, de eene aan den zijrand, de andere in het midden van de schijf (*fimbriata* Sulz.); of ook de achterste dwarsvlek, waardoor de dekschilden nu zwart zijn, elk met 7 kleine, witgele vlekken, waarvan 3 aan den zijrand, door den gelen randzoom verbonden, 3 aan den naad en eene in het midden van de schijf (*perlata* Weise); eindelijk kan de middelste, uit de verbinding der stippen 3 met 5 en 6 ontstane vlek ontbreken (**Steineri* Walter). Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen op allerlei lage planten.

13. **conglobata** L.

De nitranding van het mesosternum eenigszins driehoekig en dik gerand. Sprieten slechts iets over het midden van het halsschild reikend. Onderzijde roodachtig. Bovenzijde roodbruinachtig, roodgeel of licht geelachtig, met geelachtig witte vlekken, welke bij uitzondering nauwelijks van de grondkleur te onderscheiden zijn (*Calvia* Muls.) 19

- 19 Dekschilden langs den tamelijk smal afgezetten zijrand zonder duidelijken langsindruk. Lichaam ovaal, roodbruinachtig, zeldzamer geelachtig; het halsschild met smallen, geel-witachtigen zoom aan voor- en zijrand, welke laatste zich aan de achterhoeken tot eene groote vlek verbreedt; ook met eene onduidelijke, lichtere middellijn. Dekschilden met een zeer smallen, lichter gekleurden zoom aan den zijrand en elk met 7 (1. 3. 2. 1.) scherp begrensde, geelachtig-witte, rondachtige vlekken, van welke de laatste aan het uiteinde geplaatst is en veelal met den lichter zijrand samenhangt. Soms zijn de vlekken met een donkeren of zwarten kring omgeven (ab.c. *ocelligera* Weise); ook kunnen twee of meer vlekken verbonden zijn, als: 2 met 3, 2 met 5, of 3 met 2 en 5 (**exoleta* Weise). Bij ab.c. **scutellata* Weise (in België) is de bovenzijde zwartbruin of zelfs zwart, de teekening op het halsschild gewoonlijk scherp witachtig, de middellijn roodachtig en de vlekken der dekschilden wit. Lengte $4\frac{1}{2}$ —6 mm. Vrij gemeen op dennen, eiken, beuken en elzen. De ab.c. *ocelligera* bij Valkenburg (Limburg) 14. **quatuordecimguttata** L.

Dekschilden langs den breed afgezetten zijrand duidelijk vlak ingedrukt. Lichaam meer cirkelrond. Dekschilden met groote, witachtige vlekken, welke bij uitzondering nauwelijks van de grondkleur te onderscheiden zijn 20

- 20 Dekschilden elk met 7 (2. 2. 2. 1.) witachtige vlekken en meestal met een breeden, lichten zoom langs den zijrand. Lichaam roodgeel. Halsschild als bij 14-guttata gekleurd, doch zonder middellijn. Bij ab.c. 12-gemmata Herbst ontbreekt de schoudervlek. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Op eiken. Niet inl. in Middel-Europa. Zij zou in België bij Brussel voorkomen. Ik ken deze soort naar een exemplaar uit het Weener Hofmuseum.
(bisseptemguttata Schaller) (quindecimguttata F.)

Dekschilden elk met 5 (2. 2. 1.) groote, geel- of witachtige vlekken, welke soms nauwelijks van de roodgele grondkleur te onderscheiden zijn (*imperfecta* Muls.). Bij ab.c. *julya* Weise bevinden zich op elk der dekschilden slechts 4 vlekken, de schoudervlek is hier klein en vlek 4 ontbreekt. Halsschild met smallen, geelachtigen zoom aan voor- en zijrand, welke laatste zich aan de basis in eene langwerpige, naar binnen en een eindwegs naar voren doorlopende vlek voortzet, en bovendien met eene smalle, voor het schildje vlekachtig verbreedde middellijn. Lengte 5 — $5\frac{1}{2}$ mm. Op linden en elzen. Eenmaal bij Maastricht. Ook in België bij la Hulpe 15. **decemguttata** L.

- 21 Prosternum in het midden met twee kielvormige langlijnen. Voorrand van het halsschild slechts weinig uitgerand, de oogen nagenoeg geheel bedekkend (*Vibidia* Muls.). Lichaam geelachtig-roodbruin, het halsschild met een smallen, witachtigen randzoom, welke aan de basis tot eene vlek verbreedt is. Dekschilden elk met 6 (1. 2. 2. 1.) witachtige of witgele vlekken, van welke eene naast het schildje, twee langs den zijrand, eene nabij het midden, eene nabij den naad en eene aan den top; bovendien veelal met eene bultig verheven dwarsplooi nabij het uiteinde. Bij ab.c. *patricia* Weise ontbreekt de vlek nabij den schouder en is vlek 3 zeer klein. Lengte 3 — 4 mm. In aantal bij Valkenburg en Oud-Vroenhoven, Juli, op *Crataegus*; ook op eiken en elzen. In België bij Ridderborn en Brussel. (bissexguttata F.) 16 **duodecimguttata** Poda.

Prosternum zonder kielvormige langlijnen. 22

- 22 Voorrand van het halsschild in een gelijkmatigen, flauwen boog uitgerand, den kop van boven geheel bedekkend; de voorhoeken zeer breed afgerond. Zijrand der dekschilden zeer breed afgeplat (*Halysia* Muls.). Lichaam licht roodachtig-geel, het halsschild langs de zijden breed-, doch onduidelijk begrensde, witachtig gezoomd; veelal met een geel basaalvlekje in de achterhoeken en eene, gewoonlijk aan de basis verbreedde, gele middellijn. Dekschilden elk met 8 (1. 2. 2. 2. 1.) geelachtig-witte vlekken, van welke de eerste

aan het schildje staat; de binnenste vlekken staan altijd verder naar achteren dan de buitenste; veelal worden de vlekken 6 en 8 onduidelijk. Lengte 5–6 mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam op elzen en dennen; ook in het eerste voorjaar onder losse eikenschors. 17. *sedecimguttata* L.

Voorrand van het halsschild in het midden nagenoeg recht afgesneden, aan weerszijden sterk uitgerand, waardoor de oogen niet geheel bedekt zijn. De voorhoeken minder breed afgerond. Zijrand der dekschilden smaller afgeplat 23

- 23 De dijlijn nauwelijks tot aan het midden van het eerste sterniet reikend. Lichaam geel- of roodbruin. Halsschild aan de zijden smal bleekgeel gezoomd, eene veelal ontbrekende dubbelelek in het midden van den voorrand en twee langwerpige vlekken voor het schildje bleekgeel. Dekschilden elk met 9 tot 10 (2, 1, 3, 2, 1) bleekgele vlekken; daarvan vlek 1 halve-maantvormig, aan den schouderrand; vlek 2 hoekig, aan het schildje; vlek 3 in het midden; tusschen de vlekken 1 en 3 veelal een klein langwerpig vlekje; de vlekken 4, 5 en 6 iets achter het midden; 7 en 8 nabij- en 9 aan het uiteinde. Bij eene variëteit *ornata* Hbst is de grondkleur der bovenzijde donkerbruin, zwartbruin of zwart, met gewoonlijk kleine, scherp begrensde, witachtige vlekken. Ook kunnen enkele vlekken der dekschilden verbonden zijn, nl. 4 met 5, of 7 met 8, of wel 4 met 5 en 7 met 8 (*silyicola* Weise). Lengte 3½–5 mm. Gemeen op bloeiende dennen 18. *octodecimguttata* L.

De dijlijn nagenoeg tot aan den achterrand van het eerste sterniet reikend 24

- 24 Eindlid der sprietten aan het uiteinde recht afgeknot (*Suspita* Muls.). Roodgeel of licht roodbruin; het halsschild met eene, soms dubbelelek, in het midden van den voorrand; twee langwerpige vlekken voor het schildje, alsmede een breede, in 't midden breed en diep uitgesneden randzoom geelachtig-wit. Dekschilden elk met tien (1, 2, 1, 3, 2, 1) geelachtig-witte vlekken, van welke de vlekken 5 en 6 meestal vereenigd zijn (*Kochii* Heyd.). Soms vloeien meer dan twee vlekken ineen (*trigaria* Weise). Bij de variëteit *tigrina* L. zijn de dekschilden zwartbruin of zwart, met witachtige vlekken, van welke eveneens de vlekken 5 en 6 meestal vereenigd zijn (*Linnei* Weise). Lengte 4½–5½ mm. Op elzen en verschillende andere loofboomen. Zeer zeldzaam. Doetinchem en Renkum. De var. *tigrina* bij Zwolle 19. *vigintiguttata* L.

Eindlid der sprietten aan het uiteinde scheef afgesneden (*Thea* Muls.). Bovenzijde helder citroengeel, soms iets bruinachtig-geel; het halsschild met eene zwarte stip voor het schildje en vier stippen in een boog daarvoor. Dekschilden elk met 11 (3, 4, 1, 2, 1) grootere of kleinere zwarte stippen, van welke stip 4 op den zijrand staat en ook op de onderzijde zichtbaar is. Onderzijde grootendeels en de dijnen aan het uiteinde zwart. Soms ontbreken enkele stippen op de dekschilden, nl. stip 4 of 11, 5, 10, 1 of 3, of 1 en 5 beiden (*23-punctata* F.). Bij eene ab.c. *ellipsoidea* Gratl zijn de stippen 7, 8 en 10 op elk dekschild in 't oogvallend grooter dan de overigen en staan ook veel verder uiteen, gerekend naar voren, naar achteren en naar den rand, waardoor eene groote, min of meer ellips-vormige vlek van de grondkleur in en iets achter het midden duidelijk in 't oog valt. Ook kunnen enkele stippen op de dekschilden tot vlekken vereenigd zijn (ab.c. *signifera* Weise), nl. 4 met 5 (*lateripunctata* Weise), of 1 met 2, of wel de stippen 3, 6 en 7 door eene zwarte lijn tot een eenigszins onregelmatigen kring verbonden (*circularis* Schneid.). Lengte 3–4 mm. Zeer gemeen, met de larve, op allerlei planten, welke met bladluizen bezet zijn, o.a. veelvuldig op *Verbascum* 20. *vigintiduopunctata* L.

9. *Micraspis* Ludw. Redtenbacher.

Lichaam rond, hoog gewelfd, op de bovenzijde onbehaard. Tong diep driehoekig uitgerand. Schildje bijna niet zichtbaar. Overigens als bij Coccinella.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Bovenzijde licht oker- of witachtig-geel. Halsschild met 6 zwarte stippen, van welke 4 in een boog voor het schildje, veelal ineenvloeiend, en eene aan weerszijden nabij den zijrand. Dekschilden met smallen, zwarten naad en elk met 3 (1, 2, 2, 2, 1) zwarte stippen, van welke de stippen 4 en 6 aan den zijrand langwerpig en de overigen meestal rondachtig zijn. Onderzijde grootendeels zwart. Meestal zijn de stippen 4 en 6 (*communis* Weise), of 2, 4 en 6 (*12-punctata* L.) verbonden; ook kunnen een of meer verschillende stippen der dekschilden ontbreken (*flavidula* Weise) 2). Bij ab.c. *Poweri* Weise (in België) zijn de dekschilden eenkleurig zwart. Lengte 2½–3 mm. Niet zeldzaam op allerlei lage planten, o.a. op *Echium vulgare*; ook op vruchtboomen en waterplanten. 1. *sedecimpunctata* L.

1) In Zuid-Europa komen iets grootere exemplaren voor, met geelachtig-bruin achterlid of alleen de eerste sternieten in het midden donkerder. De dijnen soms iets donkerder (*27-punctata* Mulsch., *flaviventris* Schauf.).

2) In Zuid-Europa komen exemplaren voor, bij welke alle vlekken grooter zijn en onderling aenhangen (*italica* Weise).

IV. Tribus RHIZOBIINI.

10. *Rhizobius* Stephens.

(*Nundina* Redt.)

Lichaam langwerpig-cirond, op de bovenzijde behaard, grof en fijn door een bestippeld. Spruiten tot aan den achterrand van het halsschild reikend. Halsschild slechts naar voren versmald. Dekschilden verward bestippeld. Gewrichtsholten der coxae van achteren geheel open. De dijlijn op het eerste sterniet half-cirkelvormig. Tarskluuven met een tand aan de basis, welke bij het ♂ grooter is dan bij het ♀.

De twee Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Lichaam gewelfd, naar achteren duidelijk versmald. Halsschild met nagenoeg rechte zijden, naar voren versmald. Prosternum met twee convergeerende, kielvormige langslijnen, welke zich nabij den voorrand scherphoekig vereenigen. Bovenzijde lichter of donkerder geelbruin, het halsschild voor het schildje soms iets donkerder of zwart; de dekschilden ongevlekt (*testaceus* F.), of met een of meer donkere of zwarte langsvlekken over het midden (*crysmeloides* Herbst), of bovendien met een donkeren, gemeenschappelijken dwarsband achter het midden over den naad; deze vlekken en dwarsband hangen veelal tot een gemeenschappelijke vlek over den naad aan, en kunnen zich bij Zuid-Europeesche exemplaren zoodanig uitbreiden, dat slechts een breede randzoom en het uiteinde der dekschilden geelbruin blijft (*disimaculata* Costa). Onderzijde lichtbruin tot zwart. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Zeer gemeen op dennen en allerlei lage planten. 1. *litura* F.

Lichaam minder gewelfd, naar achteren meer breed afgerond. Halsschild aan de zijden, van af het midden naar voren, duidelijk afgerond-versmald. Prosternum met twee evenwijdige, kielvormige langslijnen, welke zich nabij den voorrand in een bocht vereenigen. Bovenzijde lichtbruin; het halsschild veelal voor het schildje donker, of met het midden en de basis zwart. Dekschilden gewoonlijk slechts met twee, meestal tot een langsband vereenigde, donkere lijnen; overigens ook wel als *litura* geteekend. Onderzijde bruin, de eerste sternieten in 't midden zwart. Lengte $3\frac{1}{2}$ mm. Vooral gedurende den winter en in het eerste voorjaar achter dennenschors. Veel zeldzamer dan *litura*; Loosduinen, Maarsbergen, Nijmegen, Berg-en-Dal en Houthem; ook in België. . . 2. *subdepressus* Seidl.

11. *Coccidula* Kugelann.

Lichaam langwerpig, op de bovenzijde behaard. Halsschild naar voren en naar achteren versmald. Dekschilden, behalve met de verwarde bestippeling, met krachtige, eenigszins onregelmatige stippelrijen. Overigens als bij Rhizobius. — De larve en pop van C. scutellata zijn door Heeger beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

De dijlijn op het eerste sterniet cirkelvormig gebogen. Bovenzijde roodgeel, de dekschilden met eene breede, gemeenschappelijke zwarte vlek aan het schildje en twee zwarte vlekken op elk, van welke de eene aan den zijrand nabij het midden, de andere nabij den naad achter het midden staat. Soms verdwijnt de vlek aan den zijrand en zijn de overige vlekken klein en veelal uitgewischt (*subrufa* Weise); ook kunnen de vlekken der dekschilden tot een breeden band samenvloeien, hetzij alleen vlek 1 met 2, of 1 met 2 en met de scutellair-vlek (*arguata* Weise). Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Gemeen op riet en andere waterplanten. 1. *scutellata* Herbst.

De dijlijn op haar binnenste gedeelte cirkelvormig, op haar buitenste gedeelte daarentegen meer recht en daardoor in haar geheel meer hoekig dan bij *scutellata*. Bovenzijde eukleurig rood, soms met eenige blauwe aanduiding van eene vlek aan weerszijden achter het schildje, of met iets donkerder naad. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Gemeen op allerlei grassen en vooral op waterplanten. 2. *rufa* Herbst.

V. Tribus SCYMNINI.

12. *Hyperaspis* Ludw. Redtenbacher.

Lichaam meer of minder duidelijk ovaal of rondachtig, op de bovenzijde onbehaard. Spruiten korter dan de kop. Voorkaken aan den top gespleten. Schildje vrij groot. Epimeren der dekschilden met diepe groeven tot het opnemen van het uiteinde

der middel en achterdijen. Trochanters der voorpoeten breed en tot begins van het uiteinde der schenen lepelvormig uitgeholt. Klauwen aan de basis met een breeden tand. — De soorten van dit genus leven van Coccus-soorten. — De metamorfose van *H. campestris* Herbst, var. *concolor* Suffr., is door Giard beschreven. Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Lichaam nagenoeg cirkelrond, zwart. Halsschild met een breeden, roodachtigen zoom langs de zijden, welke van af het midden naar achteren smaller wordt en de basis niet alijd volkomen bereikt. Dekschilden elk met eene kleine, rondachtige, roode vlek achter het midden, welke dichterbij den zijrand dan nabij den naad en veel verder naar voren dan bij *repensis* staat. Bij het ♂ is de kop, benevens een smalle zoom aan den voorrand van het halsschild geel. Bij de meestal iets grootere en gewoonlijk sterker bestippelde var. *concolor* Suffr. is de roodachtige randzoom van het halsschild naar achteren in den regel niet versmald en reikt meestal tot aan de basis. Dekschilden ongevekt, behalve dat het 3 veelal een geel vlekje aan de basis van den zijrand onder den schouder vertoont. Lengte 2½—3½ mm. Zij zou op *Lamium album* en in droge streken op dennen voorkomen. Een paar exemplaren bij Nijmegen, Juni; de var. *concolor* bij Vorden, Sept. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld. Bij Dormind op jonge beuken. 1. *campestris* Herbst.

Lichaam duidelijk ovaal, zelden zoo lang als breed; zwart. Halsschild met een roodgelzen, breeden, in het midden gewoonlijk iets breedere, in den regel scherp begrensden zoom langs de zijden, alsmede met eene roodgelze ronde of iets verbrede vlek voor het uiteinde der dekschilden, nabij den zijrand. Soms blijft van deze vlek nog slechts eene stip over of verdwijnt zij geheel (**subtruncatus* Weise); ook breidt zich deze vlek soms naar den buitenrand uit, zoodat slechts de opgerichte zijrand aldaar zwart blijft; deze vlek is alsdan breed-ovaal of eenigszins halve-maantvormig (**marginella* F., in België 1). Bij het ♂ is de kop, behalve eene dwarsstreep op den schedel, een zoom aan den voorrand van het halsschild en veelal eene driehoekige schoudervlek op de dekschilden, geelachtig. Pooten bij het ♀, behalve de lichte voorschenen en de tarsen, zwart; bij het ♂ roodgeel, de achterdijen en veelal ook gedeeltelijk de middel- en voordijen zwartachtig. Lengte 2½—3½ mm. In droge streken op dennen en op *Rubus*. Twee typische exemplaren bij den Haag en Scheveningen, Mei, Juni. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld. 2. *repensis* Herbst.

Novius Mulsant.

Lichaam van voren en van achteren afgerond, aan de zijden weinig afgerond-verbreed, op de bovenzijde zwak gewelfd en fijn behaard. Sprieten kort, schijnbaar 8-ledig, met 3 ledige knots. Voorkaken met gespleten top. Halsschild naar voren en naar achteren versmald, aan de basis niet gerand. Schildje tamelijk klein. Dekschilden veel breeder dan het halsschild; de epipleuren naar het uiteinde schijnbaar verdwij-nend, daar zij door het achterlijf bedekt worden. Klauwen dik, met een breeden tand aan de basis. Dijlijn volledig ontwikkeld, als een cirkelboog nauwelijks het midden van het eerste sterniet bereikend.

De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam zwart, dicht grauw behaard. Voor- en zijrand van het halsschild, alsmede vijf (2, 2, 1) vlekken op elk der dekschilden, helder bloedrood; hiervan hangen de vlekken 1 en 3 aan den zijrand, gewoonlijk tot een band te zamen, en zijn veelal ook de vlekken 4 en 5 verbonden 2). Lengte 2½—4 mm. Gedurende den winter, meestal in aantal bijeen, achter de schors van dennen; zij verlaat op de eerste zonnige Februari-dagen hare winterkwartieren en verschijnt in het begin van Juni op bloeiende dennen. Zij vlieg buiten-ewoon snel. Niet inlandsch. Zij zou bij Aken voorkomen. De larve en leven-geschiedenis zijn door Weise, de larve en pop van de Zuid-Europeesche variëteit (*conpunctata* Kr.), door Perris beschreven. (*cruentatus* Muls.)

13. Scymnus Kugelann.

Lichaam kort-eivormig, eivormig of elliptisch; op de bovenzijde behaard. Sprieten 11- of slechts 10-ledig, daar de eerste twee ledjes onduidelijk gescheiden zijn. Hals-

1) In Zuid-Europa komen ook meer variëteiten voor.

2) In Zuid-Europa komen exemplaren voor, bij welke de roode vlekken zich meer en meer uitbreiden, zoodat eindelijk de dekschilden rood zijn met tien zwarte vlekken (10 *punctata* Kr.)

alleen naar voren versmald, aan de basis fijn gerand. Schildje tamelijk klein. Halsschild slechts weinig breeder dan het halsschild, de epipleuren naar het uiteinde afgerond. Klauwen met een spitsen tand nabij het uiteinde. — De soorten van dit genus leven op verschillende lage planten en boomen, vooral op dennen. — De larve en pop van *S. interruptus* zijn door Perris, de levensgeschiedenis van *arcuatus* en *ater* door Heeger, de larve van *frontalis* door Ruhl, de larve van *subvillosus* door Réaumur en de larve en pop van *minus* door Bouché beschreven.

Van de 46 Europeesche soorten komen 13 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De dijlijn op het eerste sterniet is een gesloten cirkelboog, meestal een volkomen halve cirkel; het buitenste gedeelte loopt tot aan den voorrand van dit sterniet terug 2
- De dijlijn op het eerste sterniet is een onvolkomen halve cirkel, d. i. keert niet in een boog tot aan de basis terug, of is slechts een kwart-cirkel; het buitenste gedeelte loopt tot aan den zij- of achterrand, of verliest zich, zonder een der randen te bereiken 1) 10
- 2 Het prosternum loopt tot aan den voorrand in één vlak door. 3
- Het prosternum valt dicht voor de voorcoxae steil af, zoodat het zeer korte voorste gedeelte van het sternum en de mond tegen de voorcoxae aanstooten (Sub-gen. *Clitostethus* Weise). De dijlijn reikt bijna tot aan den achterrand van het eerste sterniet. Bovenzijde zwart of bruin, het halsschild aan de zijden of bijna geheel geelachtig. De dekschilden met twee, voor elkaar staande, gemeenschappelijke, gele, hoelijzervormige figuren; soms is de geheele oppervlakte meer of minder geelachtig en bevindt zich alleen binnen de voorste figuur eene zwarte vlek. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Eenmaal in Maastricht, Juni, tegen het raam van een tuinhuisje. In de Rijnprov. en in Noord-Duitschland bij Hamburg. 7. *arcuatus* Rossi.
- 3 Prosternum aan den voorrand niet dakvormig opgericht, vlak en recht afgesneden, met twee kielvormige langslijnen in het midden (Sub-gen. *Pullus* Muls.) 4
- Prosternum aan den voorrand dakvormig opgericht en tot opnemng van den mond vooruitstekend, zonder kielvormige langslijnen. De dijlijn is klein en reikt niet geheel tot aan het midden van het eerste sterniet (Sub-gen. *Stethorus* Weise). Lichaam breed-ovaal, eenigszins half-kogelrond, zwart; de monddeelen, sprieten, schenen en tarsen geelbruin, de dijen gedeeltelijk zwart. Dekschilden lijn bestippeld en gewoon behaard. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Verbreid op allerlei planten, vooral op frambozenstruiken, wilgen en dennen. De larve voedt zich meest met Acarinen, Juni, Juli. 6. *minus* Payk.
- 4 De dijlijn klein, haar binnenste gedeelte veel minder gekromd dan haar buitenste, dat ver van den zijrand afstaat en daarmede slechts weinig convergeert 5
- De dijlijn vrij groot, haar binnenste en buitenste gedeelte zijn of even sterk gekromd, of het buitenste is minder sterk gekromd dan het binnenste en convergeert vrij sterk of sterk met den zijrand 6
- 5 Lichaam ovaal, minder gewelfd dan bij *minus*, op welke zij eenigszins gelijk; zwart, de pooten pekszwart, de schenen en tarsen meestal lichter gekleurd. Halsschild dof, onduidelijk bestippeld, niterst fijn gechagrineerd; dekschilden dicht en iets grover bestippeld dan bij *minus*, en minder dicht, hier en daar in verschillende richtingen, behaard. De kielvormige langslijnen op het prosternum reiken naar voren slechts tot ongeveer het midden. De dijlijn reikt tot het midden van het eerste sterniet. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. Op eiken, Mei—Juli. Niet algemeen. Loosduinen, den Haag, Venlo, Maastricht 1. *ater* Kugel.
- Lichaam iets breeder ovaal, zwart; dekschilden gewoonlijk vuilrood of roodbruinachtig, over den naad met een zwarten, niet scherp begrensden, breedten langsband, welke naar het uiteinde smaller wordt en naar de basis zich tot binnen langs de schouderbuilen verbreedt; veel sterker bestippeld dan het halsschild en lijn, witachtig, in verschillende richtingen eenigszins wolkechtig, behaard; soms zijn de dekschilden bijna geheel zwart, met een onduidelijken donkerranden veege achter den schouder, of wel geheel zwart (*concolor* Weise). Deze soort herinnert in kleur eenigszins aan *suturalis*. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm. In veenstreken langs slooten, op waterplanten, Mei—Sept.; volgens Weise op *Salix cinerea*. Meermalen in de omstreken van den Haag; ook bij Breda en Zierikzee 2. *scutellaris* Muls. 2)

1) Bij sommige exemplaren van *S. nigritarsis* zou de dijlijn als bij 2 verlopen.

2) Volgens Weise zou deze ene variëteit zijn van de Caucasische *S. testaceus* Motsch. Deze is geelbruin of roodged; het halsschild van het schildje soms donkerder, ook veelal de basis en de naad der dekschilden iets donkerder. De *quercus* Muls. met zwartachtigen kop, donkerbruine pooten en donkerder basis en naad der dekschilden zou den overgang vormen.

- 6 De dijlijn bijna tot aan den achterrand of minstens tot op $\frac{1}{2}$ van de lengte van het eerste sterniet reikend 7
- De dijlijn tot iets over het midden, bijna tot op $\frac{1}{2}$ van de lengte van het eerste sterniet reikend. Lichaam ovaal, weinig gewelfd, zwart. Dekschilden geelachtig-rood; de basis, beuevens de naad en een smalle randzoom tot over het midden zwart; dicht en duidelijk bestippeld, weinig glanzig. Soms zijn ook de voorhoeken van het halsschild roodachtig. Pas uitgekomen exemplaren zijn geheel roodgeel, alleen de kop en het midden van het halsschild donker. Bij ab.c. *limbatus* Steph. is de zwarte naad- en randzoom breed en reikt tot aan het uiteinde; de dekschilden zijn zwart, met eene roodachtige langsvlek over het midden. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer gemeen op dennen en duinwilg.
(discoides Ill.) 5. *suturalis* Thunb.
- 7 De dijlijn tot op $\frac{2}{3}$ van de lengte van het eerste sterniet reikend 8
- De dijlijn nagenoeg tot aan den achterrand van het eerste sterniet reikend 9
- 8 Lichaam breed-ovaal, veel grooter dan haemorrhoidalis. Onderzijde, behalve gewoonlijk het eerste sterniet, geelrood. Kop en halsschild, behalve eene zwarte, half-cirkelvormige vlek voor het schildje, geelrood; de pooten roodgeel. Dekschilden zwart, aan het uiteinde breed geelrood gezoomd. Bij het ♂ is de achterrand van het vijfde sterniet recht. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$ mm. Op wilgen. Niet inl. In België op verscheidene plaatsen; in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld; ook bij Dortmund (analis F.) (ferrugatus Moll.)
- Lichaam ovaal. Onderzijde zwart, de anus of hoogstens de laatste twee sterniten roodgeel. Kop en halsschild geelrood, met eene zwarte vlek voor het schildje, welke zich veelal zoodanig uitbreidt, dat slechts een smalle voor- en zijrand roodachtig blijft; de pooten roodgeel. Dekschilden zwart, met eene gemeenschappelijke, geelroode topvlek. Bij het ♂ is de achterrand van het vijfde sterniet in 't midden iets uitgesneden. Deze soort gelijkt overigens zeer op ferrugatus. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Verbreid, doch niet gemeen; op gras en bloemen. Hillegersberg, Gouda, Breda, Arnhem, de Steeg, Kralingen, Utrecht, Dinsperlo en in de omstreken van Maastricht (analis Rossi) 3. *haemorrhoidalis* Herbst.
- 9 Dekschilden hoogstens aan het uiteinde smal geel gezoomd, vrij grof en dicht bestippeld. Lichaam breed-ovaal, zwart. Kop geelrood; het halsschild bij het ♀ in de voorhoeken roodachtig, of wel geheel zwart, bij het ♂ aan de zijden breed-, aan den voorrand smaller geelrood gezoomd, zelden geheel geelrood. Pooten geelrood of de dijen meer of minder donker gekleurd. Onderzijde geheel zwart. Bij ab.c. *tibialis* Bris. zijn de kop en alle dijen bruin of zwart. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ mm. Verbreid en op vele plaatsen niet zeldzaam, vooral op dennen 1). De ab.c. *tibialis* bij den Haag (? minimus Rossi) 4. *capitatus* F.
- Dekschilden met twee roodachtige of roodgele niet zeer scherp begrensde scheeve banden, de een grooter en van den schouder tot bijna aan het midden van den naad, de ander achter het midden; veelal ook de toprand roodachtig gekleurd. Ook zijn de kop en de zijranden van het halsschild (bij het ♂ breeder dan bij het ♀) roodachtig gekleurd. Pooten licht roodgeel. Bij ab.c. *pubescens* Panz. verdwijnt de donkere teekening der dekschilden, behalve een gemeenschappelijke, van voren iets verbrede naadzoom (*aurantiacus* Panz.), of behalve eene onduidelijke middenvlek, die eindelijk ook verdwijnt, zoodat de dekschilden alsdan eenkleurig bruinrood zijn; bij deze afwijkingen is soms ook het halsschild geheel roodgeel. Lengte 2—2 $\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. Zeldzaam; in Middel-Europa. In de Rijnprov. bij Düsseldorf; ook in Westfalen (fasciatus Fourc.) (subvillosus Goeze)
- 10 Prosternum in het midden met twee kielvormige langslijnen, welke tot aan den voorrand reiken en naar voren convergeren. Het buitenste gedeelte van de dijlijn verliest zich in de richting van de epimeren van het metasternum en eindigt even ver van den zijrand van het eerste sterniet als het zijdelingsche uiteinde der achtercoxae van den zijrand verwijderd is (Sub-gen. *Scymnus* i. sp.) 11
- Prosternum zonder kielvormige langslijnen in het midden, slechts de voortzetting tusschen de voorcoxae langs de zijden gerand. Het buitenste gedeelte van de dijlijn eindigt op den halven afstand tusschen den zijrand van het eerste sterniet en het zijdelingsche uiteinde der achtercoxae (Sub-gen. *Nephus* Muls.) 15
- 11 De dijlijn reikt ongeveer tot op $\frac{1}{2}$ van de lengte van het eerste sterniet. Lichaam ovaal, met nagenoeg parallel zijden, sterk gewelfd; eenkleurig geel- of roodbruin. Dekschilden dicht bestippeld, gelijkmatig behaard en iets glanzig. Klauwen slank, met een korten tand. Deze soort herinnert in grootte en habitus aan *Rhizobius litura*. Lengte $2\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$ mm. Op dennen in bergstreken. Niet inlandsch. In België bij Mons; in de Rijnprov. bij Aken; ook in Westfalen (abietis Payk.)

1) Deze soort werd meestal verward met *rubromaculatus*.

- De dijlijn reikt bijna tot aan den achterrand, zeldzamer (exemplaren van *C. nigrinus*) slechts tot aan het midden van het eerste sterniet. Lichaam zwart 12
- 12 Dekschilden ongevekt. 13
- Dekschilden geelrood gevlekt. De schenen en bij het ♂ de kop en de voorhoeken van het halsschild geel 14
- 13 Pooten, evenals het geheele lichaam, diep zwart, de bovenzijde veelal met uiterst geringen blauwachtigen weerschijn; de sorielen en arsen pekbrown of roodbrown. Lichaam tamelijk breed-ovaal, doch langs de zijden zeer weinig afgerond. Dekschilden dicht bestippeld, tamelijk glanzig. Klauwen krachtig ontwikkeld, met een nagenoeg tot aan het uiteinde reikenden tand. Bij het ♂ is het vijfde sterniet in 't midden duidelijk afgerand. De dijlijn reikt bij sommige exemplaren slechts tot aan het midden en bij de var. **decepiens* Weise loopt zij geheel tot aan de epimeren van den metathorax door. Lengte 2—2½ mm. Gemeen op denmen; ook wel op eiken en andere boomen (? ater Thunb.) *C. nigrinus* Kugel.
- Pooten geheel roodgeel, of de dijen meer of minder donker tot zwart (**femorialis* Gyllh.). Lichaam breed-ovaal, langs de zijden afgerond, zwart, glanzig. Bij het ♂ zijn kop en halsschild roodgeel, behalve eene zwarte, half-cirkelvormige vlek voor het schildje. Deze soort gelijkt overigens op *capitatus*, doch de dekschilden zijn geheel zwart, zonder lijnen, roodachtigen toprand; ook verschilt de dijlijn. Lengte 1½—2½ mm. Zeldzaam. Den Haag, Arnhem, Bergen-op-Zoom, Nijmegen en in de omstreken van Maastricht.
- (pygmaeus Fourc.) *C. rubromaculatus* Goeze.
- 14 Epipleuren der dekschilden geheel zwart. Lichaam bij het ♂ langwerpig-ovaal, bij het ♀ veelal iets breeder-ovaal; zwart, elk der dekschilden op de voorheft met eene geelroode vlek, welke zelden den buitenrand bereikt. Kop bij het ♂, gewoonlijk ook de voorhoeken van het halsschild en de pooten, behalve de zwart gevlekte achterdijen, geel of roodgeel. Bij het ♀ zijn soms alle dijen zwartachtig (*bimaculatus* Motsch.). Soms vertoonen de dekschilden twee geelroode vlekken, van welke de normale zelden tot aan den buitenrand reikt en de andere vlek voor het uiteinde staat (abc. **4-pustulatus* Herbst, in België bij Huy); ook kunnen deze twee vlekken op elk dekschild tot een langsband ineenvloeien, welke in 't midden min of meer versmald is (abc. *Suffriani* Weise) 1). Lengte 2½—3 mm. Zeer gemeen op bloemen, gras en denmen. De abc. *Suffriani* Weise op Texel en bij Limmel (Maastricht) 10. *frontalis* F.
- Epipleuren der dekschilden grootendeels en de pooten, behalve de gewoonlijk zwart gevlekte achterdijen, rood. Lichaam breed-ovaal, matig gewelfd, zwart. Dekschilden met eene eenigszins driehoekige, roodgele vlek, welke zich van den schouderhoek over de schouderbuil scheef naar achteren tot aan den naad uitstrekt en tot over den omgeslagen rand, meestal tot aan het midden der dekschilden reikt. Bij het ♂ is de kop, eene groote driehoekige vlek aan den zijrand van het halsschild en de pooten roodgeel, de achterdijen zelden donker. Bij het ♀ is de mond en een smalle zoom in de voorhoeken van het halsschild roodachtig, de dijen gedeeltelijk of geheel donker. Bij abc. *flavicollis* Redt. zijn kop en halsschild roodgeel, het halsschild met eene zwarte vlek voor het schildje; de vlek op de dekschilden is rond en bereikt den zijrand niet (♂) (in Westfalen) 2). Lengte 1½—2½ mm. Op eiken. Niet inlandsch. In België, bij Brussel; in Westfalen en in Hannover.
- (marginalis Rossi) (interruptus Goeze)
- 15 Lichaam breed-ovaal, gewelfd. Dekschilden zonder gelen langsband 16
- Lichaam langwerpig-ovaal, weinig gewelfd, zwart. Dekschilden elk met een roodgele, in 't midden aan weerszijden eenigszins ingesnoerden langsband, welke van af den schouder tot ongeveer op ⅓ van de lengte verloopt, doch zich meer of minder kan uitbreiden; veelal ook de toprand, benevens de pooten, of alleen de schenen roodgeelachtig. Halsschild fijn en dicht-, de dekschilden veelal meer of minder rimpelig bestippeld. De dijlijn op het eerste sterniet reikt tot op ⅓ of ½ der lengte en loopt naar buiten gewoonlijk recht. Bij de abc. **unicolor* Weise, welke op abc. *algericus* Weise van *bipunctatus* Kugel. gelijkt, zijn de dekschilden eenkleurig zwart, en is slechts de toprand roodachtig gezoomd; zij is langer ovaal, minder gewelfd en sterker, meer rimpelig bestippeld. Lengte 1½—2 mm. Op riet in moerasige streken en 's winters onder afgevallen elzen- en wilgenbladeren. Eenmaal bij Zierikzee, Mei 13. *Redtenbacheri* Muls.
- 16 De dijlijn bijna tot aan den achterrand van het eerste sterniet reikend. Lichaam zwart, elk der dekschilden met 2 roodgele dwarsvlekken, van welke de eerste schuin van af den schouder tot aan den naad, de tweede in de breedte op ⅓ der lengte verloopt; deze laatste raakt noch den buitenrand, noch den naad; ook zijn de toprand, de pooten geheel of gedeeltelijk en het uiteinde van het achterlijf roodgeel. Dekschilden dicht en tamelijk fijn bestippeld. Pas nieuw komen exemplaren zijn geheel roodgeel, met zeer bleeke, niet scherp begrensde

1. In Zuid-Frankrijk ook eene aberratie voor met geheel zwarte dekschilden.

2. In Zuid-Frankrijk komen nog andere aberraties voor.

vlekken. Bij ab.c. **obliquus* Weise is de achterste vlek zeer klein, als een stip, of verdwijnt geheel, de voorste is zeer smal. Bij het ♂ is het zesde sterniet zwak uitgerand. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Op den paardenkastanje. Eenmaal bij Roermond. In België bij Jemeppe; in de Rijnprov. bij Cleef, Crefeld en Aken. . (quadrilunulatus Illig.) 11. *pulchellus* Mbst.

De dijljn ongeveer tot op $\frac{1}{2}$ of $\frac{2}{3}$ der lengte van het eerste sterniet reikend. Lichaam zwart, elk der dekschilden achter het midden met eene geelroode, gewoonlijk rondachtige, in grootte zeer veranderlijke vlek, welke bij ab.c. *nigricans* Weise ontbreekt; de mond, de toprand der dekschilden, benevens de schenen en tarsen roodgeel. Soms zijn de dijen gedeeltelijk-, de voorste 4 veelal geheel roodgeel. Bij het ♂ is het zesde sterniet zwak uitgerand. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Het type zeer zeldzaam; Scheveningen, den Haag, Noordwijk, Doorn, Apeldoorn, Delden en Nijkerk, Juli, Aug.; de aberratie niet zelden in de duinen op verschillende planten, o.a. op dennen; ook bij de Bilt en Giesendam. In de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf; in België en ook op het eiland Borkum.

(biverrucatus Panz.) 12. *bipunctatus* Kugel.

Sab-orde IV. BRACHYMERA.

XXXVII. Familie DERMESTIDAE.

Deze familie is het naast verwant aan de Byrrhidae, met welke zij het vermogen gemeen heeft, do h in veel geringere mate 1), om de schenen in daarvoor bestemde groeven aan den onderrand der dijen en meestal ook dezen in bijzondere uithollingen op de onderzijde van het

lichaam in te leggen. Een zeer in 't oogvallend kenmerk is de aanwezigheid van een ocel op het midden van het voorhoofd, welke alleen bij het genus *Dermestes* ontbreekt. — Spriet en aan de zijden van het voorhoofd, vóór de oogen, ingeplant; in den regel 11-ledig (Fig. 54), zelden 10-ledig (*Hadrotoma*), kort en recht; gewoonlijk met eene 3-, zelden met 4- of 5-ledige knots (sommige *Trogoderma*); bij het ♂ van sommige *Trogoderma*-soorten is de sprieknoots 6—7-ledig; bij een paar *Anthrenus*-soorten zijn de spriet en hetzij 8-ledig met 2-ledige knots, of 5-ledig met buitengewoon lang, knotsvormig eindlid. — Bovenlip onbedekt, gewoonlijk hoornachtig. Voorkaken klein, weinig in 't oog vallend, zonder kauwvlak, met een scherp-beitelvormigen, meestal gewonen top, en daarachter aan den binnenrand met een haarszoom. Achterkaken met twee lederachtige of vliezige lobben, welke soms geheel (*Anthrenus*), soms alleen aan de basis (*Tirestus*, *Trogoderma*) met elkaar vergroeid zijn; bij *Trinodes* is de binnenste lob iets meer hoornachtig. Tasters in den regel kort en vrij dik. Liptasters 3-, veelal schijnbaar 2-ledig. Tong vliezig. Paraglossen onduidelijk. — Lichaam ovaal, eivormig, elliptisch of min of meer cylindervormig; gewelfd, doch meestal iets vlak gedrukt; hetzij glaz, behaard of beschubd. — Halsschild met of zonder spriegroeven. Prosternum niet tegen den mond verbreed en de kop alsdan op de onderzijde geheel vrij (*Dermestes*, *Attagenus*), doch meestal met eene verbrede kinplaat, welke den mond grootendeels bedekt. — De vleugels van *Dermestes*

Fig. 53. Spriet en van *Dermestidae*.
Naar Leclercq.

- I *Attagenus peltus* L. wijfe.
- II idem idem mannetje.
- III *Tirestus sericeus* F. mannetje.
- IV *Anthrenus praeputius* Hae I.

ardarius (Fig. 55) zijn volgens *Rog.* z langwerpig en overal donker gepigmenteerd; het gewricht is ver achter het midden gelegen, waardoor het topgedeelte klein is. De vena externo-media is naar buiten een weinig concaaf. De area externo-media is vrij groot, met twee teruglopende bijaders; die, welke van de vena scapularis komt is zeer kort en hangt met de hoofdlader nog eens door eene dwarsverbinding samen, zoodat eene voorste ruit gevormd wordt; die, welke van de vena externo-media uitgaat, is zeer lang en loopt parallel met haar, tot dicht nabij de basis; eene dwarsverbinding der beide teruglopende aders is slechts door eene pigment-

Fig. 55. Vleugel van *Dermestes* *ardarius* L.
Naar Burmeister.

1) Bij *Anthrenus* is zulks veel sterker, doch niet wat de tarsen betref.

angeduid. De vena interno-media is bochtig en heeft vele bijaders en enkele dwarsverbindingen. In de area interno-media bevinden zich twee bijaders, welke in de naar den achterrand toegekeerde helft aan deze evenwijdig loopen en zich in het midden vereenigen tot een gemeenschappelijken, tegen de basis verloopenden stam, welke, nadat deze eene kleine dwarsverbinding tot de vena interno-media heeft afgegeven, vlak voor de basis ook nog een kleinen zijtak tot de vena externo-media uitzendt. In de area analis loopt eene zijader evenwijdig aan de hoofdader, die met haar verbonden is door twee dwars-anastomosen, gelegen tegenover die van de bijaders der area interno-media. Bovendien ontspringt uit deze bijader een zijtak, welke tegenover de bovenste dwars-anastomose aanvangt en tot aan den achterrand loopt. De vena analis is gewoon, aan de basis zeer breed. Het basaallobje is door eene inkerving aangeduid. Bij *Attagenus pelli* zijn de vleugels niet gepigmenteerd. De vleugels van *Anthrenus* hebben onduidelijke bijaders en dwarsverbindingen. De nervatuur der vleugels van *Dermestes* vertoont volgens *J. Redtenbacher*, met uitzondering van de kleine eindeel van de vena scapularis, nagenoeg volkomen overeenkomst met die van de *Elateridae* (*Campylus*). — Achterlijf met 5 vrij bewegelijke sterniten. — Voorcoxae kegelvormig uitstekend en met de toppen aaneenstootend, of slechts door eene smalle spits van het prosternum van elkaar gescheiden (*Dermestes*); meestal grijpt deze meer stekelvormige voortzetting in eene groef van het mesosternum, welke echter bij *Orphilus* ontbreekt. Achtercoxae cilindervormig, nagenoeg altijd van achteren en naar binnen plaatvormig verbreed, waardoor eene groef tot opnemng der dijen gevormd wordt. Dijen met eene groef tot het inleggen der schenen, welke laatste al dan niet met lijne doortjes bezet zijn. Tarsen 5-ledig, gewoon; de klauwen gewoon, even lang. — Larven en kevers leven in allerlei min of meer verdroogde dierlijke stoffen, als: bijna geheel afgeknapte beenderen, kleine doode zoogdieren en vogels, huiden, pelzen, vederen, insecten-verzamelingen, opgezette dieren en soms aan geconserveerde vleeschwaren, als hammen, spek, enz. (*Dermestes lardarius*, de „spektor“). — De larven zijn lang-gestrekt, cilindervormig of platgedrukt, met een kleinen, ronden, hoornachtigen kop, welke gewoonlijk 6 kleine ocellen aan weerszijden en korte, 4-ledige sprieten vertoont. Lichaam hetzij met eene dunne, hetzij met eene lederachtige of dun hoornachtige huid bekleed, welke lange, opgerichte, naar achteren gewoonlijk tot dichte bundels vereenigde haren draagt, en bovendien aan weerszijden van het uiteinde van het in 9 ringen verdeelde achterlijf een pauwstaartachtigen, langen haarbundel bevat. Pooten kort; de tarsen met één klauw. Bij de verandering tot pop scheurt de huid slechts op den rug open en wordt niet afgestroopt, doch dient tot beschuttend omhulsel voor de pop. De larven worden schadelijk door het uiteren van opgezette dieren, of aan spelden gestoken insecten; ook knagen zij aan pelswerk en huiden. — Elke generatie duurt niet langer dan een jaar. Bij gevaar leggen de kevers hunne sprieten in daarvoor bestemde groeven, trekken de pooten in en houden zich als dood.

- 1 Voorhoofd zonder ocel. Voorcoxae tegen elkaar aanstootend. Bovenzijde van het gewelfde lichaam meer of minder dicht behaard 1. **Dermestes.**
 Voorhoofd met een ocel op het midden. 2
- 2 Mesosternum langer dan breed. Middelpooten dicht bijeenstaande 3
 Mesosternum breder dan lang. Middelpooten verder van elkaar verwijderd 5
- 3 Prosternum niet tegen den mond verbreed, de kop op de onderzijde geheel vrij. Schenen fijn gedoord. Eerste lid der achtertarsen veel korter dan het tweede, veelal moeielijk zichtbaar. Sprieten 11-ledig. 2. **Attagenus.**
 Prosternum met eene verbrede kinplaat, den mond voor een groot deel bedekkend. Schenen zonder doortjes. Eerste lid der achtertarsen even lang als- of langer dan het tweede . . . 4
- 4 Sprieten 11-ledig. Epipleuren der dekschilden tot aan het uiteinde van het derde sterniet duidelijk, haar buitenrand verder naar achteren verdwijnend 3. **Megatoma.**
 Sprieten 10-ledig. Epipleuren der dekschilden slechts tot aan het uiteinde van het eerste sterniet duidelijk, haar binnenrand verder naar achteren verdwijnend (*Hadrotoma*.)
- 5 Mesosternum met eene groef tot opnemng van de prosternale voortzetting. Prosternum tegen den mond met eene verbrede kinplaat 6
 Mesosternum zonder groef tot opnemng der prosternale voortzetting. Voorpooten tegen elkaar aanstaande, het geheele prosternum tot aan den mond bedekkend. Halsschild zonder sprietgroeven. Bovenzijde onbehaard, tamelijk glanzig (*Orphilus*.)
- 6 Halsschild op de onderzijde met diepe, scherp begrensde sprietgroeven. Dekschilden dicht bestippeld 7
 Halsschild op de onderzijde zonder sprietgroeven. Dekschilden slechts weinig bestippeld, lang, afstaande behaard (*Trimodes*.)
- 7 Lichaam behaard. De sprietgroeven onder den zijrand van het halsschild liggend 8

Lichaam beschud, zeer kort en breed, min of meer rondachtig. De sprietgroeven liggen in den zijrand van het halsschild zelf. Alle dijen en schenen kunnen in groeven ingelegd worden. 6. **Antrenus**.

3 Sprietknots dicht-geleed, ovaal of spoelvormig, gewoonlijk 4- of 5 ledig. Halsschild vrij dicht bestippeld. Bovenzijde meestal vlekkelig behaard 1). 4. **Trogoderma**.

Sprietknots breed, in beide seksen 3-ledig, naar eene zijde zwak gezaagd, vooral bij het ♂. Halsschild verspreid bestippeld. Bovenzijde glanzig, lijn behaard. 5. **Tirosias**.

1. Dermestes Linné.

*Sprietten 11-ledig, kort, aan de zijden van het voorhoofd, vóór de oogen ingeplant, met 3 grootere eindledjes. Kop op de onderzijde geheel vrij, de mond niet door het prosternum bedekt. Voorhoofd zonder ocel. Bovenlip iets uitgerand. Voorkaken met gewonen top. Achterkaken met twee lederachtige lobben; de buitenste breeder, scheef afgestompt, sterk gebaad; de binnenste iets korter, met een haak aan het gebaarde uiteinde. Kaaktasters 4-ledig. Tong vliezig, van voren niet of slechts zeer zwak uitgerand. Liptasters 3-ledig. Bovenzijde van het gewelfde lichaam meer of minder dicht behaard. Voorcoxae tegen elkaar aanstoelend. Pooten krachtig ontwikkeld, aan de buitenzijde met fijne doortjes bezet. Bij het ♂ vertoont het vierde of het derde en vierde sterniet op het midden een rond, glanzig plekje, waarop een bundeltje borstelharen. — De soorten van dit genus leven deels in huizen, deels in de vrije natuur van allerlei dierlijke stoffen, als: afval, huiden, vederen, hoorn, hoeven van gedooide dieren, aas en afgeknaagde beenderen. — Bij de larve is het laatste sterniet van een paar haken voorzien; de anus steekt buisvormig uit en schuift na. Het lichaam is met lange, afstaande haren bezet, welke, bij sterke vergrooting bezien, wederom fijn behaard zijn. — De larve en pop van *D. Frischii* zijn door Frisch, de larve van *murinus* door Frisch en Bouché, de larve van *undulatus* door Chapuis & Candèze, de larve en pop van *vulpinus* door Letzner, Rosenhauer en Riley, de larve en pop van *lardarius* door de Geer, Lyonet, Mulsant, Saunders en Rey en hare ontwikkelings-geschiedenis reeds door Goedart en Blankaart, de larven van *lanarius*, *atomarius*, *bicolor* en *tessellatus*, en de pop van deze laatste soort door Rosenhauer, de levensgeschiedenis van *peruvianus* door Rey en Heller en de larve van *domesticus* (? *cadaverinus*) door Katwall en Rey beschreven.*

Van de 23 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 5 in het aangrenzend gebied voor.

1 Het vierde sterniet bij het ♂ met een kaal, glanzig plekje, waarop een bundeltje borstelharen. Halsschild met sterk gewelfden voorrand, aan de zijden witgrauw of wit, op de onderzijde van het lichaam krijtwit behaard. Halsschild over het midden, en de dekschilden met verspreide, licht gekleurde haartjes. 2

Het derde en vierde sterniet bij het ♂ met een kaal, glanzig plekje, waarop een bundeltje borstelharen 2). Halsschild aan de zijden niet wit behaard. 3

2 Naadhoek der dekschilden in een scherp tandje uitgetrokken. Laatste sterniet zwart, met twee krijtwitte haarvlekken. Halsschild aan de zijden zonder zwarte vlek. Lichaam zwart, soms donker roodbruin, lijn grauw of geelgrauw (de vorm **senex* Germ.) behaard. Sprietten roodbruin, gewoonlijk met donkerder knots. De schedel, de achterrand van het halsschild en het schildje met gele haartjes bezet. Sterniten elk met een zwart vlekje langs de zijden. Dijen met een krijtwitten band, evenals de schenen soms roodbruin. Lengte 7-9½ mm. Niet gemeen. Over de geheele aarde verbreid, met huiden; ook op doode visch langs de stranden en aan allerlei dierlijken afval. 1. **vulpinus** F.

1) Niet bij *E. villosulum* Duft.

2) Hierbij komt te staan *D. carnivorus* F. (versierd bij Castelnau) uit West-Indië, welke soms met waren naar Europa overgebracht wordt en wellicht in onze havensteden kan worden aangetroffen. Zg is zwart, aschgrauw behaard. Halsschild aan de zijden en aan den voorrand breed witgrauw behaard. Dekschilden aan de basis roodbruin. Onderzijde grootendeels krijtwit, de sterniten aan weerszijden met eene zwarte stip. Pooten zwartachtig, de vier achterlijgen wit met donkere knieën. Lengte 8 mm. Ik zag een exemplaar uit het Brusselsch Museum.

- van deels der dekschilden zonder tandje. Laatste sterniet krijt wit, aan weerszijden en aan den top zwart gevlekt. De witgraauwe zijden van het halsschild omsluiten van achteren een meer of minder scherp begrensd, fluweelachtig zwart vlekje. Deze soort gelijkt overigens zeer op vulpinus. Lengte 6½—8½ mm. Zeer gemeen, vooral in de duinstreken op doode konijnen en ander aas, beenderen en rotte visch. 2. **Frischii** Kugelann.
- 3 Voorhoeken van het halsschild tamelijk ver naar onderen gebogen en min of meer uitgetrokken; op de onderzijde met eene diepe, tot aan den van voren scherpkantig neergebogen zijrand reikende uitholling tot het inleggen van de sprietknots. De voorrand van het halsschild is, van voren gezien, half-cirkelvormig gebogen. Onderzijde dicht krijt wit, zelden geelgraauw behaard, met scherp aangeduide, zwarte zijvlekken 4
- Voorhoeken van het halsschild weinig of niet afwaarts gebogen. Halsschild met ondiepe sprietgroeven, welke in het midden tusschen de voorhoeken en de middellijn liggen en niet tot aan den meer horizontaal liggenden zijrand reiken; de voorrand meer flauw gebogen. Onderzijde zeer fijn en onduidelijk, hoogstens iets zijdeachtig behaard, de grondkleur echter doorschemerend 9
- 4 Onderzijde krijt wit behaard. Laatste sterniet zwart, gewoonlijk met witte vlekken 5
- Onderzijde, benevens het laatste sterniet, geelgraauw behaard; alle sterniten aan de zijden zwart gevlekt. Lichaam dofzwart. Kop en halsschild meer of minder roestgeel en zwart dooreen-, golvend en vlekkelig behaard. Dekschilden met zwarte en daartusschen met geelgraauwe, eenigszins vlekkelige beharing. Pooten zwart of roodbruin, de dijen met een wit behaarden band. Bij het ♂ zijn de kale, glanzige, ronde plekken, waarop de haarbundeltjes staan, eenigszins ingedrukt. Lengte 6 mm. Niet inl. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld; ook in Westfalen (tessellatus F.)
- 5 Voorhoeken van het halsschild recht, met afgeronden top; de zijrand niet veel korter dan de slechts weinig gewelfde middellijn. De eerste 4 sterniten met eene zwarte zijvlek; het laatste sterniet zwart, met 3 witte basaalvlekjes. Bovenzijde dofzwart, door leikleurig-grauwe haarvlekjes dicht gemarmerd. Sprieten donkerbruin, met zwarte knots. Schildje geel behaard. Haarbundeltjes op het derde en vierde sterniet bij het ♂ zwart. Lengte 6½—9 mm. Niet zeldzaam op zoogdier- en vogelkrengen, beenderen, en langs de stranden onder rotte visch 3. **murinus** L.
- Voorhoeken van het halsschild stomp; de zijrand veel korter dan de sterk gewelfde middellijn. Laatste sterniet hoogstens met twee vlekken 6
- 6 Het tweede tot vierde sterniet, behalve met de zwarte zijvlek, met een zwart vlekje aan weerszijden van den achterrand. Haarbundeltje op het derde en vierde sterniet bij het ♂ geelbruin of pekzwart op eene groote, ronde, glanzige plek. Lichaam zwart, op de bovenzijde zwart behaard en met meer of minder dicht staande, grauwe haartjes doormengd. Laatste sterniet geheel zwart, hoogstens met enkele witte haartjes aan de basis. Sprieten roodbruinachtig. Halsschild iets breeder dan de dekschilden, sterk gewelfd. Deze soort is iets korter en meer gewelfd dan de naverwante soorten. Lengte 7—8 mm. Op doode vogels. Zeer zeldzaam. Bij Noordwijk en Heemstede. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 4. **laniarius** Illig.
- Hoogstens het vierde sterniet aan den achterrand met zwarte vlekken. Haarbundeltje op het derde en vierde sterniet bij het ♂ geelbruin of geel. Halsschild door geelbruine haarvlekjes gemarmerd. Dekschilden gewoonlijk grauw gemarmerd 7
- 7 Het vierde sterniet aan den achterrand met 3 zwarte vlekken. Laatste sterniet met twee, veelal onduidelijke, witachtige langlijnen. Lichaam langwerpig, eenigszins cilindervormig, zwart, iets of wat glanzig. Halsschild en dekschilden door geelachtige haarvlekjes gemarmerd. Haarbundeltjes op het derde en vierde sterniet bij het ♂ op eene groote, glanzige vlek. Sprieten bruinrood. Bij het ♂ is de bovenzijde meer grauw behaard en op de dekschilden slechts met enkele lichter gele haren doormengd. Lengte 7 mm. Niet inl. In Middel-Europa (mustelinus Er.)
- 8 Het vierde sterniet zonder zwarte vlekken aan den achterrand. Halsschild door geelbruine of roodachtig-geelbruine-, de dekschilden door leikleurige of geelgraauwe haarvlekjes gemarmerd 8
- 9 Laatste sterniet met een wit vlekje aan weerszijden van de basis. Haarbundeltje op het derde en vierde sterniet bij het ♂ op een zeer klein, kaal, glanzig plekje staande. Deze soort heeft den habitus van murinus, doch is doorgaans iets kleiner. Kop, halsschild en basaalrand der dekschilden roodachtig-geelbruin en zwart gemarmerd. Schildje geheel geel behaard. Sprieten bruinrood. Pooten zwart, de dijen met witbehaarde ringen. Lengte 5½—8½ mm. Gemeen met Frischii en murinus. 5. **undulatus** Brahm.

Laatste sterniet met twee witachtige, gedeeltelijk geelachtige langsbanden. Haarbundeltje op het derde en vierde sterniet bij het ♂ op een duidelijk, kaal, glanzig plekje staande. Deze soort gelijkt veel op *undulatus*, doch onderscheidt zich door het gewoonlijk kleinere, meer gewelpe, cylindervormige lichaam en de iets sterkere bestippeling, vooral op de dekschilden. Lichaam dof zwart. Halsschild roodgeel of geelbruinachtig en zwartachtig gemarmerd. Schildje dicht witachtig behaard. Dekschilden door grauwe haarvlekjes gemarmerd, welke gedeeltelijk met roodgele haartjes gemengd zijn. Onderzijde dicht krijwit behaard, aan de zijden zwart gevlekt. Pooten gewoonlijk roodbruin, zelden zwartachtig; de dijen met een smalle, wit behaarden band. Lengte 5 $\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch, doch overigens in geheel Europa (*catomarius* Er.)

- 9 Bovenzijde dof zwart, met een breeden, dicht geelgrauw behaarden dwarsband, welke eenige zwarte stippen insluit, aan de basis der dekschilden. Onderzijde weinig behaard, zonder meer kale plekken. Halsschild met verspreide, geelgrauwe haarvlekjes; naar voren vrij sterk versmald, met duidelijke, stompe voorhoeken. Spriet en brainroot. Onuitgekleurde exemplaren zijn meer roodbruin. Lengte 6-8 mm. Deze onder den naam „spektor” bekende soort is gemeen in huizen, magazijnen, musea enz. Vooral zeer schadelijk aan vleeschwaren, naturalien en stapels huiden, waarin de larven soms in groot aantal voorkomen.

6. *lardarius* L.

Bovenzijde gelijkmatig fijn behaard, zonder breeden haarband aan de basis der dekschilden, of slechts het halsschild en een smalle zoom aan de basis der dekschilden geelachtig behaard 10

- 10 Dekschilden zonder langsgroeven of slechts met zeer flauwe aanduiding ervan. Bovenzijde eenkleurig, fijn-, lichter of donkerder behaard 11

Dekschilden met duidelijk gegroefde langsstrepen. Lichaam lang-gestrekt en vrij smal, tamelijk glanzig zwart, pekkruin of roodbruin; het halsschild en een smalle zoom aan de basis der dekschilden geelachtig behaard. Onderzijde, de voor- en zijrand van het halsschild, de schouderbuis, de spriet en de pooten roodbruin. Halsschild met breed afgeronde voorhoeken. Lengte 7-8 mm. In huizen, aan vogelaas en in duivenhokken. Niet inlandsch. In België bij Vliermael (prov. Limburg) en Fleurus. Ook bij Bremen en in de Rijnprov. bij Elberfeld (*bicolor* F.)

- 11 Lichaam tamelijk gestrekt, bruin of donker roodbruin; op de boven- en onderzijde gelijkmatig fijn, roodbruinachtig, zijdeglanzig-, het schildje meer geelachtig behaard. Het 2de tot 5de sterniet aan de zijden met eene gebogen kale plek, het 2de tot 4de sterniet nog met twee kale middenvlekjes. Halsschild naar voren weinig versmald, met zeer stompe, iets afgeronde voorhoeken. Dekschilden met zeer flauwe aanduiding van langsgroeven. Lengte 7 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$ mm. Over de geheele aarde door handelswaren verbreid. Volgens *Schultz* in gezelschap van *Blatta germanica*. Amsterdam en Breda, in Oost-Indische waren.

(? *cadaverinus* F.) 7. *domesticus* (Germ.)

Lichaam kort en breed; zwart, op de boven- en onderzijde fijn zwart behaard. Laatste sterniet en soms ook, min of meer, het 3de en 4de aan den achterrand roodachtig behaard. Voorhoeken van het halsschild eenigszins stomp en bijna met den voorrand in een breeden boog gelijkmatig afgerond. Lengte 6-7 mm. Niet inlandsch. In middel-Europa (*ater* Oliv.)

2. *Attagenus* Latreille.

Spriet en 11-ledig, aan de zijden van het voorhoofd, vóór de oogen ingeplant, met 3 grootere eindledjes, van welke het laatste bij het ♂ sterk verlengd is (Fig. 54, I, 11). Voorhoofd met een oecel op het midden. Bovenlip iets afgerond, stijf behaard. Voorkaken aan het uiteinde gekorven. Achterkaken met twee rliezige lobben, de binnenste korter en van een haak voorzien. Kaaktasters lang, langer dan de lobben. Lip-tasters 3-ledig. Tong, in 't midden iets ingesneden. Prosternum niet tegen den mond verbreed, de kop van onderen geheel vrij. Mesosternum langer dan breed; de middel-pooten dicht aanstaande. Schenen aan de buitenzijde fijn gedoord. Eerste lid der achtertarsen veel korter dan het tweede, veelal moeilijk zichtbaar. — Bij de larve is het uiteinde van het achterlijf niet bewapend en de anus niet tot naschuiven verlengd.

(1) Het bij komt nog te staan *D. peruvianus* Laporte (*chaemorrhoidalis* Koll. gult. Muls.), eene langgestrekte, pekkruine, fijn zwart en zwart verpeld behaarde soort, zonder enige aanduiding van langsstrepen op de dekschilden en met zeer dicht goudgeel behaarde onderzijde. Lengte 7 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$ mm. Deze zou over de geheele aarde in handelsplant en voorkomen.

L. gem. Jindervormig, hoornachtig, met kleine, ronde, neerliggende schubjes bedekt; van den achterrand van elken ring met naar achteren gerichte borstelharen en aan de zijden met eenige lange, afstaande haren; aan het uiteinde van het achterlijf met een staart van zeer lange haren. — De larve van *A. pellio* is door Frisch, de Geer en Erichson, de pop door Frisch en Sturm, de larve en pop van *Schaefferi* door Rosenhauer, de larve en pop van *piceus* door Sturm en Lintner, de larve van *vigintiguttatus* door Rosenhauer en Rey en de larve van *pantherinus* door Fuss en Hampe beschreven. — De soorten van dit genus, onder den naam van „pelskevers” bekend, leven van dierlijke stoffen, doch men vindt ze ook op bloemen.

Van de 23 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Eindlid der sprieten bij het ♂ even lang tot meer dan tweemaal zoo lang als de overige leedjes te zamen. Bovenzijde zwart, hoogstens met een paar witbehaarde stippen (Sub-gen. *Attagenus* isp.) 2

Eindlid der sprieten bij het ♂ hoogstens $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen. Bovenzijde bont gevlekt (Sub-gen. *Lanorus* Muls.) 5

- 2 Onder- en bovenzijde fijn zwart behaard. Halsschild sterk gewelfd. Eindlid der sprieten bij het ♂ buitengewoon lang, meer dan tweemaal zoo lang als de rest der sprieten. Deze soort is even groot als *pellio*; het ♂ is eivormig, het ♀ breeder en grooter; zwart, eenigszins glanzig. Sprieten roodbruin, de knots zwart. Pooten rood, de dijen veelal bruin; de tarsen geelrood. Lengte $3\frac{1}{2}$ –5 mm. Op wilgen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken; ook in Westfalen (Schaefferi Herbst)

Onderzijde geel-grauw of geelachtig behaard. Eindlid der sprieten bij het ♂ hoogstens iets langer dan de rest der sprieten 3

- 3 Bovenzijde zonder witte haarvlekjes. Pooten geelrood. 4

Bovenzijde met 3 kleine, witte haarvlekjes aan de basis van het halsschild en eene ronde, witte stipplek op elk der dekschilden. Sprieten en pooten donker roodbruin. Eindlid der sprieten bij het kleinere ♂ ruim zoo lang als de overige leedjes te zamen. Lichaam zwart, op de bovenzijde zwart, op de onderzijde eenigszins zijdeglanzig geelgrauw behaard. Gewoonlijk bevinden zich nog twee zeer kleine, witbehaarde stipjes onder de schouderbuil. Onuitgekleurde exemplaren zijn roodbruin. Lengte $3\frac{1}{2}$ –5 $\frac{1}{2}$ mm. Het „bonttorretje”. Zeer gemeen in huizen, ook op bloeiende heesters, vooral in stadstuinen. De larve schadelijk aan pelswerk, wollen stoffen, huiden en opgezette dieren. 2. **pellio** L.

- 4 Eindlid der sprieten bij het ♂ ruim zoo lang als de overige leedjes te zamen. Bovenzijde geheel zwart behaard; soms zijn de dekschilden roodbruin (abc. *sordidus* Heer, *fulvipes* Muls.). Deze soort is naverwant aan *Schaefferi*, doch vooral onderscheiden door de geelachtig behaarde onderzijde. Het grootere ♀ gelijkt zeer op dat van *Schaefferi*, de bestippeling echter is minder dicht. Bij het type is de bovenlip bruin, bij de donker gekleurde abc. **styialis* Muls. en de abc. *sordidus* Heer rood. Lengte 3–5 mm. In huizen en op wilgen. Haarlem, in Amerikaansche kruiden; ook bij Valkenburg (Limburg). De abc. *sordidus* bij Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken; ook in Westfalen.

(Megatoma F.) 1. **piceus** Oliv.

Eindlid der sprieten bij het ♂ zoo lang als de overige leedjes te zamen, meer afgestompt. De omtrek van het halsschild en de basis der dekschilden geelachtig behaard. Overigens gelijkt deze soort zeer op *piceus*. Het ♀ is grooter dan het ♂. Dekschilden veelal roodbruin. Lengte 3–5 mm. Niet inlandsch. In België bij Waterloo, Luik, Dinant, Hologne en Vliermael-Roodt (prov. Limburg). (marginicollis Küst.)

- 5 Bovenzijde met vele krijtwitte haarvlekjes, een aan weerszijden van de basis van het halsschild en veelal nog een kleiner in 't midden, 5 in eene langstrij aan weerszijden langs den naad en 4 langs den zijrand der dekschilden, benevens nog hier en daar een zeer klein vlekje; soms ontbreken enkele vlekjes; overigens dof zwart, zwart behaard. Bij het ♂ is de sprietknots grooter en meer langwerpig dan bij het ♀. Lengte 4 mm. De larven leven in pelswerk, in oude sofa's, wollen dekens enz. De kevers overwinteren in huizen en achter boomschors, komen in het voorjaar te voorschijn en zoeken dan de vrije natuur op, om zich op bloemen met stuifmeel te voeden. Niet inlandsch. In Westfalen.

(*vigintiguttatus* F.)

Bovenzijde met minder dicht wit behaarde vlekjes, welke op de dekschilden eenige meer of minder duidelijke, smalle, golvende dwarsbanden vormen. Halsschild in de achterhoeken

wit-, over het midden geelbruin vlekkelig behaard, overigens dof zwart. Het ♂ is kleiner dan het ♀. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{4}$ mm. In hommelnesten. Niet inlandsch. Wellicht bij Dortmund 1) aangetroffen (pantherinus Ahr.)

3. Megatoma Samouelle.

Sprieten 11-ledig, met 3-ledige knots, waarvan het tweede lid het kleinste is. Voorhoofd met een ocel. Bovenlip iets uitgerand, met een dicht bezwimperden huidzoom omgeven. Voorkaken spits uitgesneden. Achterkaken met twee lederachtige lobben, de binnenste aan het uiteinde met een haak. Kaaktasters draadvormig, het vierde lid langer dan de overige ledjes te zamen. Tong nagenoeg vierhoekig, vlak uitgebreid en van voren glauw uitgerand. Liptasters langer dan de tong, 3-ledig. Prosternum met eene verbrede kinplaat, den mond voor een groot deel bedekkend. Epipleuren der dekschilden tot aan het uiteinde van het derde sterniet duidelijk, haar buitenrand verder naar achteren verdwijnend. Schenen zonder doortjes. Eerste lid der achtertarsen zoo lang als of langer dan het tweede. Mesosternum langer dan breed, de middelvoeten dicht bijeenstaande. Bij het ♂ is het eindlid der sprieten meer verlengd. Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam lang-gestrekt, zwart, grootendeels fijn zwart behaard, met enkele ingestrooide witte haartjes. Achterhoeken van het halsschild en veelal nog een klein vlekje in 't midden van den achterrand, benevens twee uitgezakte, soms onderbroken dwarsbanden op de dekschilden, dicht wit behaard. Sprieten en poeten zwart of zwartbruin, de tarsen roodbruin. Lengte $3\frac{1}{4}$ —6 mm. Verbreed, doch tamelijk zeldzaam; in huizen aan oud houtwerk, in vermolmden berken en wilgen en soms op bloemen. De larve is door Westwood, Carpentier en Rey beschreven 1. undata L.

Hadrotoma Erichson.

Dit genus is zeer verwant aan *Megatoma*, doch vooral onderscheiden door de slechts 10-ledige sprieten, met 3-ledige knots, wier eerste en tweede lid even lang doch korter zijn dan het derde, terwijl bij *Megatoma* het middelste lid het kortst is. Voorhoofd met een ocel. Bovenlip iets uitgesneden, door een huidzoom omgeven. Voorkaken kort, met twee oppervlakkige insnijdingen aan het uiteinde. Achterkaken met twee nagenoeg even lange, lederachtige, aan het uiteinde gebaarde lobben, de binnenste zonder haak. Kaaktasters kort, met 4 korte, vrij dikke ledjes, welke eene langwerpige knots vormen. Tong vliezig, loodrecht in den mond gelegen en van buiten slechts als een smal vlak zichtbaar. Liptasters dik, zeer kort, 3-ledig. Prosternum met eene verbrede kinplaat, den mond voor een groot deel bedekkend. Epipleuren der dekschilden slechts tot aan het uiteinde van het eerste sterniet duidelijk, haar binnenrand verder naar achteren verdwijnend. Schenen ongedoord. — De soorten van dit genus leven op bloeiende heesters en boomen, achter schors en op oud hout. — De larve en pop van *H. marginata* en *nigripes* zijn door Rosenhauer, de ontwikkeling van *corticalis* door Eichhoff beschreven.

Van de 13 Europeesche soorten komen 4 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Sprietknots bij het ♀ even lang-, bij het ♂ dubbel zoo lang als de rest der sprieten. Halsschild met eenigszins kantig opgerichte basis (Sub-gen. *Melasia* Muls.) 2
- Sprietknots in beide seksen slechts half zoo lang als de rest der sprieten (Sub-gen. *Hadrotoma* isp., *Globicornis* Muls.). 3
- 2 Halsschild bij het ♂ sterk-, bij het ♀ nog sterker gewelfd. Lichaam langwerpig, geheel zwart of zwartbruin, fijn zwart behaard; de dekschilden soms lichter gekleurd; dicht bestippeld. Sprieten lichter-, poeten donkerder roestrood. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Aan wilgen, aan oud hout en op bloemen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld; in België bij Maeseyck en Neerhaeren. Ook in Westfalen (*marginata* Payk.)

1) Onder den naam van *A. trifasciatus* F. opgegeven, welke echter eene Zuid-Europeesche soort is.

Halsschild bij het ♂ tamelijk vlak, bij het ♀ een weinig gewelfd. Lichaam langwerpig, geheel donkerbruin, geel- of roodachtig behaard; de dekschilden gewoonlijk lichter gekleurd. Het eerste lid en de knots der sprieten zwartachtig; overigens aan *marginata* zeer verwant. Lengte 3—4½ mm. Achter doode schors van Acer. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik.

(*corticalis* Eichh.)

- 3 Bovenzijde van het lichaam eenkleurig zwart, lijn zwart behaard, zelden de dekschilden donkerbruin. Halsschild zeer dicht bestippeld en daardoor nagenoeg dof, met eenigszins kantig opgerichte basis. Sprieten, behalve de middelste leedjes, alsook de pooten zwart of donkerbruin. Sprietknots bij het ♀ kort-ovaal, bij het ♂ nagenoeg rond; de beide eerste knotsleedjes kort en breed, het eindlid groot. Lengte 2—3 mm. Op bloeienden Meidoorn. Niet inlandsch. In Westfalen (*nigripes* F.)

Halsschild, met uitzondering van het donkerder behaarde midden, benevens een gebogen dwarsband op de dekschilden, welke onder de schouders begint en op elk in een halven hoog tegen het schildje reikt, geelgrijs behaard. Lichaam overigens zwart, vrij lang. Sprietknots bij het ♀ kort-ovaal, bij het ♂ nagenoeg rond. Lengte 2½—3½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf. Mij onbekend (*fasciata* Fairm.) 1)

4. Trogoderma Latreille.

Sprieten 11-ledig, de knots dicht geleed, ovaal of spoelvormig, gewoonlijk 4- of 5-ledig. Voorhoofd met een oed. Bovenlip klein, van voren afgerond, met een bewimperden huidzoom. Vooraken kort, aan het uiteinde iets uitgesneden. Achteraken met twee aan het uiteinde gebaarde, vliezige lobben, welke aan de basis vergroeid zijn. Kaaktasters vrij kort, het eindlid tweemaal zoo lang als de 3 overige leedjes te samen. Liptasters 3-ledig. Tong vliezig, vlak uitgebreid, van voren iets uitgesneden. Bovenzijde gewoonlijk vlekkelig behaard, behalve bij *T. villosulum*. Sprietgroeven onder den zijrand van het halsschild gelegen. Halsschild vrij dicht-, de dekschilden dicht bestippeld. Mesosternum met eene groef tot opnemng der prosternale voortzetting. Prosternum met eene verbrede kinplaat tegen den mond. Bij het ♂ is het halsschild van af het midden, bij het ♀ reeds van af de basis naar voren versmald. — De larve komt met die van *Anthrenus* overeen. — De soorten van dit genus leven van dierlijke stoffen. — De larve en pop van *T. versicolor* zijn door Rosenhauer en Perris (var. *testaceicornis* Perris) beschreven.

Van de 7 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

- 1 Sprietknots bij het ♂ 6- tot 7-, bij het ♀ 4- tot 5-ledig (Sub-gen. *Trogoderma* isp., *Asidorus* Muls.) 2
- Sprietknots in beide seksen 3-ledig (Sub-gen. *Phradonoma* Duv., *Orbecola* Muls.). Lichaam kort-ovaal, gewelfd, glanzig zwart, ongevlekt, dicht en lang afstaande zwart of vaal behaard. Kop vrij dicht-, halsschild en dekschilden iets meer verspreid en tamelijk lijn bestippeld. Sprieten en pooten zwart, tarsen bruinachtig. Lengte 2½—2¾ mm. Vooral op Umbelliferen. Eenmaal bij Leiden, Sept.; Breda, in rijstbalen . . 4. *villosulum* Duft. 2)
- 2 Dekschilden zwart of zwartbruin, met roestroode banden en vlekken, welke geel- of witachtig behaard zijn. Lichaam weinig gewelfd, op de bovenzijde iets vlak gedrukt; zeer veranderlijk in grootte, teekening en kleur der beharing; zwart, lijn bestippeld. Onderzijde zwartachtig of grauw behaard. Dijen bruin, schenen en tarsen lichter. Sprieten bij het ♀ kort, met 5-ledige knots, roodbruin, de eerste twee leedjes donkerder; bij het ♂ met lange, spoelvormige, 7-ledige knots. Licht gekleurde exemplaren zijn als *costae* Muls. beschreven. Lengte 2½—4 mm. In reten en spleten van wilgen. Bij Kralingen; ook een paar malen schadelijk in eene insecten-verzameling, waarin zij hare metamorphose doorloopen had. (elongatum Dfts.) 1. *versicolor* Creutz.

1) Een Belgisch exemplaar uit Kernipt, als zodanig geïdentificeerd, is *Trogoderma glabrum* Herbst.

2) Van den Heer D van der Hoop te Rotterdam ontving ik een aantal doode, meestal verbruikde exemplaren van eene *Trogoderma*-soort, welke in Amerikaanse en Poolsch-Odessa larve aangetroffen werd. Deze volgens *Rottler* onbeschreven soort welke ik *T. granarium* noem, is licht roodbruin, gewoonlijk met pekkruinen of pekwarten kop en halsschild. In sommige exemplaren met zeer blauwe aandoening van donkerder dwarsbanden; tamelijk glanzig, uiterst lijn geelachtig behaard en lijn bestippeld. Sprieten en pooten geelachtig. Sprietknots in beide seksen 3-ledig. Lengte 1½—2½ mm.

Dekschilden eenkleurig zwart of slechts aan het uiteinde lichter gekleurd, al of niet duidelijk met haarbanden of haarvlekken 3

- 3 Halsschild aan de zijden breed wit behaard, aan weerszijden een donker behaard middenvlekje door het wit ingesloten. Lichaam zwart, dicht en lijn bestippeld. Onderzijde donker of grijs; de bovenzijde zwart-, wit- en bruinvlekkig behaard, met drie meer of minder duidelijke bochtige banden op de dekschilden en het uiteinde lijn wit behaard. Veelal is de ruimte tusschen de twee voorste banden, met uitzondering van eene bruin behaarde middenvlek nabij de zijden en eene gemeenschappelijke vlek aan den naad, geheel wit behaard. Halsschild voor het schildje met een klein wit behaard vlekje op een bruin behaarden grond. Het ♂ gelijkt in habitus veel op *Megatomus*; lichaam met parallelle zijden; de sprieten met van de overige leedjes niet scherp afgescheiden 7 dikkere, zwak gezaagde, zwarte eindleedjes; het tweede en derde sprietlid roestrood. Het ♀ is grooter en breeder; de sprieten met eene 4-ledige, langwerpige, duidelijk afgescheiden knots; het derde tot zevende sprietlid bij het ♀ roestrood. Lengte 3—4½ mm. Van deze, wellicht uit Mexiko afkomstige soort, welke met hare larve eene enkele maal als schadelijk in insectenverzamelingen werd aangetroffen, werd eenmaal een ♀ te Amsterdam in huis gevangen 2. *megatomoides* Reitt.

Halsschild grijs of geelgrijs en zwart, vlekkelig behaard, zonder donker behaard middenvlekje aan weerszijden, welke door eene witte beharing ingesloten is. Lichaam zwart, aan het uiteinde gewoonlijk roodbruinachtig; op de dekschilden met drie onduidelijke grijs- en bruin behaarde, of hier en daar met enkele witachtige haartjes doormengde golvende dwarsbanden, welke veelal slechts door enkele lichte haartjes zijn aangeduid of in onduidelijke grijs vlekjes opgelost zijn. Sprieten bij het ♂ met 6 of 7 dikkere eindleedjes, bij het ♀ met eene 4- of 5-ledige knots. Lengte 2½—3½ mm. In huizen. Venlo; Roermond in de nesten van *Odynerus parietum*; ook eenmaal bij den Haag. In België bij Otrange, Kermt en Ridderborn (prov. Limburg). Ook in Westfalen.

(nigrum Herbst) 3. *glabrum* Herbst.

5. *Tiresias* Stephens.

(*Ctesias* Steph.)

Sprieten 11-ledig, de knots breed, in beide seksen 3-ledig, naar eene zijde zwak gezaagd, vooral bij het ♂ (Fig. 54, III). Voorhoofd met een ocel. Bovenlip hoornachtig, afgeknot. Voorkaken met gewonen top. Achterkaken met twee rliezige lobben, welke aan het toegespitste uiteinde bewimperd en aan de basis vergroeid zijn. Kaaktasters vrij kort en dik, het eindlid tweemaal zoo lang als de overige leedjes te zamen. Tong loodrecht in den mond geplaatst, met een smal buitenvlak. Liplasters 3-ledig. Bovenzijde glanzig, fijn behaard. Halsschild verspreid bestippeld. Prosternum met eene verbrede kinplaat tegen den mond. Mesosternum met eene groef tot opneming van de prosternale voortzetting.

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze soort gelijkt zeer op *Attagenus Schaefferi*, doch is gemakkelijk te herkennen aan het verspreid en zeer zwak bestippelde halsschild. Lichaam tamelijk breed-eirond, achter het midden het breedst; zwart of pekbrown, glanzig, zeer lijn donker behaard; lijn en verspreid-, de dekschilden dichter en sterker bestippeld; met een kort oppervlakkig groefje nabij het schildje; bij het ♀ langs den naad aan het uiteinde verdiept. Sprieten en pooten roestrood, de dijen donkerder. Lengte 3½—5 mm. Niet zeldzaam tegen eiken-, wilgen-, iepen- en populierstammen. De larve leeft achter schors; zij is beschreven door *Waterhouse, Perris* en *Dعاux* 1). 1. *serra* F.

6. *Anthrenus* Geoffroy.

Sprieten 11-ledig, met 3-ledige knots (Fig. 54, IV); of slechts 8-ledig, met 2-ledige knots; of wel 5-ledig, waarbij het eindlid knotsvormig verdikt is. Voorhoofd met een ocel. Bovenlip flauw uitgerand. Voorkaken aan den binnenrand stomp gekorven. Achterkaken met vergroeide, smalle, rliezige lobben, van welke de binnenste

1) Merkwaardig gevormd en geleed zijn de haren der opgerichte borstels op de laatste achterlijfsringen van de larve. Deze haren bestaan, volgens *Oudemans*, uit ongeveer 100 leedjes.

kort en aan den binnenrand met iets sterkere borstelharen bezet is dan bij de buitenste. Kaaktasters draadvormig, vrij dik; het vierde lid langer dan de overige leedjes te zamen. Tong vliezig, afgerond. Liptasters kort, 3-ledig. Lichaam beschubd, zeer kort en breed, min of meer rondachtig. De sprietgroeven liggen in den zijrand van het halsschild zelf. Prosternum met eene verbrede kinplaat tegen den mond. Alle dijen en schenen kunnen in groeven ingelegd worden. — De soorten van dit genus leven vooral op *Spiraea*'s, *Umbelliferen* en vlier. — De larven leven van dierlijke stoffen en worden daardoor soms schadelijk, vooral aan naturalien. Zij komen in hout met die van *Tragoderma* en *Tiresias* overeen. Het lichaam is min of meer behaard, aan het uiteinde van het achterlijf met een dikkeren of dunneren staart van lange haren, in drie bundels verdeeld, welke zij als een pauwestaart oprichten 1). Deze haren eindigen als eene pijlspits en zijn wederom fijn behaard. Bovendien bevinden zich nog aan weerszijden op het laatste tergiet bundels van gele haartjes, welke eveneens kunnen worden opgericht. — De larve van *A. pimpinellae* is door Rey en Cornelius, de pop door Cornelius, de larve van *scrophulariae* door de Geer en Erichson, en met de pop nog door Hagen en Riley, de larve van *verbasci* door Erichson en Mulsant, de larve en pop van *muscorum* en de larve nog door Kittel, Sturm, Kollar en Westwood, de geheele ontwikkeling door Letzner en de larve van *fuscus* door Letzner beschreven.

Van de 22 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Eerste sterniet aan weerszijden nabij het midden met een smal ondiep langsgroefje, waarin de achtertarsen kunnen worden ingelegd. Sprieten 11-ledig, met scherp afgescheiden 3-ledige knots, wier eindlid afgerond is (Sub-gen. *Anthrenus* isp.) 2
- Eerste sterniet zonder tarsgroeven. Dekschilden aan den naadhoek niet uitgesneden 4
- 2 Dekschilden aan den naadhoek scheef afgeknot en daardoor te samen driehoekig uitgesneden . 3
- Dekschilden aan den naadhoek niet uitgesneden. Onderzijde van het lichaam gewoonlijk wit en meestal hier en daar wat bruingeel beschubd; de laatste 4 sternieten aan weerszijden met eene zwartachtige, bij zeer kleine exemplaren met eene geelbruine vlek; de bovenzijde bruingeel en bruin beschubd; de zijden van het halsschild, eene basaalvlek voor het schildje en drie bochtige dwarsbanden op de dekschilden wit of geelachtig beschubd, in welk laatste geval de grondschubben meer zwartachtig of donkerbruin zijn. Zwart beschubde exemplaren met wit beschubde dwarsbanden vormen de ab.c. *nitidulus* Küst.; kleine, dicht geelachtig beschubde exemplaren met wit beschubde, vlekkelijke dwarsbanden de ab.c. *nebulosus* Reitt.; en nagenoeg eenkleurig dicht witgraauw of bruingeel beschubde exemplaren, met zeer onduidelijke banden en vlekken de ab.c. **confusus* Reitt. Lengte 2½—3½ mm. Verbreid op bloemen, vooral op *Umbelliferen* en vlier. Soms is de larve schadelijk aan pelswerk, in herbaria en insectenverzamelingen. De aberraties *nitidulus* en *nebulosus* met het type. De ab.c. *confusus* in België bij Mechelen (varius F.) 3. *verbasci* L.
- 3 Dekschilden met een niet onderbroken, licht beschubden, gewoonlijk meermalen zijwaarts uitgezaktten langsband over den geheelen naad, en met 3 tamelijk smalle, meer of minder onderbroken witte dwarsbanden. De zijden van het halsschild dicht wit beschubd. Lichaam overigens zwart beschubd; bovendien nog met een wit beschubd vlekje aan de basis der dekschilden naast het schildje, hetwelk met den eersten band min of meer samenhangt. De naad en de smalle zijrand der dekschilden, ook de randen der witte zijvlekken en eene meer of minder duidelijke fijne langslin op het halsschild, welke echter ook veelal ontbreekt, rood of geel beschubd. Oude exemplaren zijn veelal afgewreven en verbleekt. Lengte 3—3½ mm. Over het algemeen vrij zeldzaam; komt echter veelvuldig voor in Limburg en op enkele plaatsen in de grensprovincies. Vooral op *Umbelliferen*, *Spiraea*'s en vlier. De larve ook soms in pelswerk en herbaria. 1. *scrophulariae* L. 2)
- Dekschilden slechts over de achterhelft van den naad met een rood- of geelachtig gekleurden langsband; op de voorhelft der dekschilden met een breeden, wit beschubden dwarsband, aan het uiteinde met meer of minder duidelijke, samenhangende, wit- en roodachtige schubvlekjes. Halsschild, vooral aan de zijden, licht gevlekt en evenals de meeste kleinere witte schubvlekjes met enkele rood- of geelachtige schubjes doormengd. Overigens zwart beschubd. Alle sternieten aan de zijden met eene donker beschubde of zwarte vlek op een witten grond. Lengte 2½—3½ mm. Niet zeldzaam op *Umbelliferen*, *Spiraea*'s en vlier. In de provincie Zuid-Holland weinig waargenomen 2. *pimpinellae* F.

1) Over de haren der *Anthrenus*-larven gaf Vogler eene uitvoerige verhandeling.

2) Van *A. scrophulariae* en *pimpinellae* komen meerdere variëteiten in Zuid-Europa voor.

- 4 Sprietten 8-ledig, met 2-ledige knots (Sub-gen. *Florilinus* Muls.). Lichaam zwart beschubd; de schubjes zeer klein, driehoekig, met den top naar boven gericht. Halsschild aan weerszijden van de basis langs den zijrand met eene groote, voor het schildje met eene kleine, witte schubvlek; bovendien meerdere vlekjes over het midden alsook drie onduidelijke, smalle, meestal onvolkomen ontwikkelde, beschubde dwarsbanden op de dekschilden en bovendien vele afzonderlijk ingestrooide schubjes daartusschen geelgrauw of bruingeel; hier en daar nog met enkele witte schubjes doormengd. Sterniten witgrauw beschubd, de 4 laatsen aan de zijden met een donker vlekje. Laatste sprietlid bij het ♀, evenals de rest der sprietten licht gekleurd, tweemaal-, bij het ♂ donkerder en 5 maal zoo lang als het voorlaatste knotslid. Lengte $2\frac{1}{2}$ – $3\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen op Umbelliferen, Spiraea's, vlier enz.; ook in huizen en soms zeer schadelijk aan allerlei naturalien, vooral in huiden, insectenverzamelingen en opgezette dieren. Bekend onder den naam van „muscumtor“.

4. *muscorum* L.

Sprietten 5-ledig, met zeer lang knotsvormig eindlid, dat veel langer is dan de rest der sprietten (Sub-gen. *Helocerus* Muls.). Schubjes als bij *muscorum*, doch iets grooter. Onderzijde grijswit-, bovenzijde zwart of zwartbruin beschubd; eene breede grijswitte schubvlek aan weerszijden aan de basis van het halsschild en hier en daar nog meerdere verspreide schubvlekjes; de achterrand voor het schildje zonder grijswit vlekje, de rand zelf slechts met eene rij witachtige schubjes omzoomd; daardoor is deze soort reeds oppervlakkig van *muscorum* te onderscheiden; drie bochtige, meestal door tusschengevoegde donkere schubjes onderbroken, gewoonlijk onduidelijk begrensde of nauwelijks aangeduide dwarsbanden, benevens een vlekje aan het uiteinde der dekschilden grauwegeel beschubd. De zijvlekken op de laatste 4 sterniten zijn zeer klein, gewoonlijk slechts iets donkerder geelbruin beschubd. De sprietgroeven bij het ♀ reiken tot aan het midden der zijden van het halsschild, bij het ♂ iets verder. Lengte 2– $2\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch minder algemeen dan *muscorum*. (claviger Er.) 5. *fuscus* Latr.

Trinodes Latreille.

Sprietten 11-ledig, met eene uit 3 ledjes bestaande losgelede knots. Voorhoofd met een ocel. Bovenlip kort, weinig uitstekend, vlak uitgerand. Voorkaken met twee-tandigen top. Achterkaken met twee aan den top gebaarde lobben, van welke de binnenste iets meer hoornachtig en korter is. Kaaktasters vrij dik, het vierde lid het langst. Tong vliezig, vlak, aan het uiteinde afgerond. Liptasters 3-ledig, het eindlid het langst, meer dan dubbel zoo lang als het tweede. Halsschild op de onderzijde zonder sprietgroeven. Dekschilden slechts weinig bestippeld, lang afstaande behaard. Prosternum tegen den mond met eene verbrede kinplaat. Mesosternum breeder dan lang, met een groeffje tot opname der prosternale voortzetting. — Bij het ♂ is het eindlid der sprietten meer verlengd, bij het ♀ meer rondachtig. — De larve heeft groote overeenkomst met die van *Anthrenus*.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam ovaal, zwart, pekbruin of kastanjebruin, glanzig, zeer fijn en verspreid bestippeld, met vrij lange opgerichte haren bezet. Sprietten en pooten geel. Halsschild aan de basis, naast de achterhoeken, met een indruk en eene langsplooi, welke tegen de kantig verheven schouderbuil aansluit. Soms zijn de randen van het halsschild, de dekschilden en het achterlijf, of zelfs het geheele lichaam meer bruingeel. Lengte $1\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$ mm. In oude gebouwen, aan oude lindeboomen en veelal dood in spinnewebben. De larve is door *Erichson*, *Douglas* en *Mulsant* beschreven. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf (*hirtus* F.)

Orphilus Erichson.

Bovenzijde van het lichaam onbehaard, tamelijk glanzig. Sprietten kort, 11-ledig, met 3-ledige knots. Voorkaken aan den binnenrand met een huidzoom. Achterkaken met twee perkamentachtige, smalle lobben, van welke de binnenste toegespitst, de buitenste iets langer en aan het uiteinde gebaard is. Kaaktasters lang, het eindlid nagenoeg cilindervormig. Tong vliezig, vlak uitgebreid, naar voren iets verbreed, de voorrand flauw uitgesneden en bezwimperd. Liptasters dun, het derde lid spoelvormig; voorhoofd met een ocel op het midden. Halsschild zonder sprietgroeven. Mesosternum

aan lang, zonder prosternaal-groef. Voorpooten tegen elkaar aanstaande, het prosternum tot aan den mond bedekkend. Middelpooten tamelijk ver van elkaar verwijderd. Dijen met groeven tot opnemng der schenen.

De eenige Europeesche soort zou in het omliggend gebied voorkomen.

Deze soort herinnert in habitus aan een eenigszins langwerpigen *Anthrenus*. Zwart, tamelijk glanzig, nagenoeg onbehaard. Halsschild tamelijk fijn-, de dekschilden grof bestippeld, langs den opgerichtcn naad ingedrukt. Spriet en tarsen roestrood. Lengte 3 mm. Op bloemen. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnprov. bij Crefeld gevangen zijn. (glabratus F.) (niger Rossi)

XXXVIII. Familie BYRRHIDAE (Fig. 56).

(Cistelidae Car. Col. Eur., v. Heyd., Reitt., Weise).

Deze familie is van de aanverwante Dermestidae vooral onderscheiden door het ontbreken der ocel op het voorhoofd; door de in de breedte geplatste, cylindervormige, niet uitstekende, maar ingesloten voorcoxae, welke steeds gescheiden zijn door eene voortzetting van het prosternum, die tegen het mesosternum aanstoet; door de samengegroeide eerste drie sterniten en de in den regel veel meer ontwikkelde inlegbaarheid der pooten, welke zich echter veelal tot de schenen en tarsen bepaalt; vooral bij *Syncalyptra* zijn de pooten in diepe groeven inlegbaar; bij *Simplocaria* daarentegen kunnen de achterpooten niet in daarvoor bestemde groeven van het eerste sterniet, en de achtertarsen niet in de schenen ingelegd worden. De cylindervormige voorcoxae komen ook voor bij de *Histeridae* en *Nitidulidae*, doch de *Byrrhidae* zijn van de eerstgenoemde familie onderscheiden door den sprietvorm, en van de tweede door de vergroeiing der eerste drie sterniten. — Lichaam eivormig of kogelrond, hoog gewelfd, op de bovenzijde veelal viltig of gewoon behaard, soms kaal, zeldzamer met opstaande borsteltjes of haarbundeltjes (*Nosodendron*). — Kop loodrecht staande, in het halsschild teruggetrokken, zoodat de voorrand van den clypeus of wel de bovenkaken tegen den voorrand van het al of niet schildvormig verbrede prosternum aanstoeten; bij *Nosodendron* steekt de kop vooruit en kan niet in het halsschild worden teruggetrokken. Clypeus al (*Limnichini*) of niet (*Nosodendrini* en *Byrrhini*) door een dwarsnaad van het voorhoofd gescheiden. — Spriet en tarsen, meer of minder onder den voorhoofdsrand, ingeplant, 10- of 11-ledig, geleidelijk verdikt of met 2, 3 of zelfs meerdere groote eindledjes; evenals de pooten in den regel in daarvoor bestemde groeven inlegbaar. — Bovenlip hoornachtig, gewoonlijk onbedekt. Voorkaken kort, krachtig ontwikkeld, scherp bijtelformig; hetzij stomp getand, soms met 2- of 3-tandigen of gespleten top; aan de binnenzijde meestal met een vliezigen zoom en aan de basis gewoonlijk met een krachtigen maaltand. Achterkaken met twee lobben, welke, hetzij beiden lederachtig, of de binnenste alleen vliezig, of beiden hoornachtig zijn. Kaaktasters 4-, lipstasters 3-ledig. Tong vliezig of hoornachtig.

Fig. 56. Onderzijde van *Byrrhus pilula* L. Orig.

Paraglossen ontbreken of zijn verborgen. — Halsschild volkomen tegen de dekschilden aangesloten. De naaden van het prosternum vormen aan weerszijden van den voorrand bij de *Byrrhini* diepe sprietgroeven; bij het genus *Bothriophorus* met diepe sprietgroeven op de bovenzijde der voorhoeken van het halsschild. — Dekschilden met omgeslagen zijranden, welke de borst omvatten. — Gevleugeld of ongevleugeld. De vleugel van *Byrrhus pilula* is, volgens *Roger*, langgestrekt, in het midden het breedst, naar het uiteinde tamelijk versmald. Het gewricht iets achter het midden gelegen, het topgedeelte daardoor vrij groot. De vena externo-media is nagenoeg recht; in het basaalgedeelte van de area externo-media bevinden zich twee teruglopende bijaders; die, welke van de vena scapularis nitgaat, is kort en vormt door eene dwarsverbinding eene voorste ruit; die, welke van de vena externo-media nitgaat, is langer; de dwarsverbinding tusschen deze bijaders is nauwelijks aangeduid. De bijaders der vena interno-media herinneren in haar verloop en in de wijze van verbinding zeer aan *Dermestes*, de in de area interno-media aanwezige bijaders staan echter veel dicht bij de hoofdad, zoodat de tegen de vena externo-media gelegen helft van de area geheel zonder aderen blijft; de beide eerste bijaders loopen niet parallel aan elkaar, doch divergeeren, vereenigen zich veel eerder dan bij *Dermestes* en zenden aan haar vereenigingspunt eene dwarsverbinding uit tot de hoofdad; haar gemeenschappelijke stam zendt dan hooger op eene dwarsverbinding uit tot de vena externo-media;

eene dwarsverbinding tot de vena interno-media is bijna uitgewischt. De vena interno-media loopt van af de basis een eind naast de vena externo-media en buigt zich dan tegen den achterrand af, nadat zij in de area analis, kort voor de intreding der van de twee eerste bijaders komende dwarsverbinding, eene van af de basis komende bijader heeft opgenomen, welke op hare beurt weder hooger op een zijtak afgeeft, die aan de hoofdader evenwijdig loopt en den achterrand bereikt. De vena analis is gewoon; geen basaallobje. Bij andere Byrrhidae is het adernet minder ontwikkeld. Bij *Simpliocaria semistriata* zijn de vleugels van slechts weinig aders voorzien, zij liggen als zeer kleine schijfjes onder de dekschilden verborgen. — Achterlijf met 5 sterniten. Achtercoxae plaatvormig in de breedte ontwikkeld. Dijen en schenen veelal verbreed, de dijën gewoonlijk met eene groef tot het inleggen der schenen; ook veelal de tarsen in groeven aan de binnenzijde der schenen inlegbaar. Tarsen gewoon, 5-ledig; het vierde lid veelal kleiner dan het voorafgaande. — De larven (*Byrrhus pilula*) zijn cylindervormig, vleezig, met eene hooraplaat op den prothorax en lederachtige platen op de overige ringen. Kop rondachtig, loodrecht geplaatst, met zeer kleine, 2-ledige sprieten en met 2 groote ocellen aan weerszijden. Achterlijf uit 9 ringen bestaande, de laatste ring met een paar anaal-aanhangels; de twee laatste grootere ringen worden naar onderen gekromd. Pooten kort, de zeer kleine tarsen met een enkelen klauw. Vele andere larven vertoonen 5 ocellen. — De soorten leven vooral op droge, zandige grasplaatsen en onder steenen; zij kruipen over dag rond en voeden zich vooral met mossen; eene enkele soort leeft aan uitvloeiende boomsappen en achter boomschors. Soms komen zij in aanspoelsel voor. De gevleugelde soorten vliegen 's nachts. Bij gevaar trekken de kevers den kop terug en bergen sprieten en pooten onder het lichaam.

Overzicht der Tribus.

- 1 Kop vooruitstekend, niet onder het halsschild terugtrekbaar, aan de onderzijde over eene grootere oppervlakte zichtbaar dan het prosternum, hetwelk zeer kort en smal is. De naden van het prosternum zonder sprietgroeven I. **Nosodendrini**.
- Kop loodrecht staande, in het halsschild teruggetrokken, zoodat de voorrand van den clypeus of wel de voorkaken tegen den voorrand van het prosternum aanstooten; bij *Bothriophorus* zijn de monddeelen volkomen onbedekt, daar het prosternum van voren uitgerand is. 2
- 2 Clypeus niet door eene dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Voorrand van het prosternum tegen den kop niet schildvormig verbreed. De naden van het prosternum aan weerszijden van den voorrand diepe sprietgroeven vormend II. **Byrrhini**.
- Clypeus door eene zeer duidelijke dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Voorrand van het prosternum tegen den kop schildvormig verbreed; bij *Bothriophorus* is het prosternum van voren uitgerand; de naden aan weerszijden geen sprietgroeven vormend. Tarsen niet in de schenen inlegbaar; dijën en schenen smal III. **Limnichini**.

I. Tribus NOSODENDRINI.

Bevat slechts het genus I. **Nosodendron**.

II. Tribus BYRRHINI.

- 1 Achterpooten in daarvoor bestemde groeven van het eerste sterniet en alle tarsen in groeven aan de binnenzijde der schenen inlegbaar. Bovenkaken door het prosternum bedekt . . . 2
- Achterpooten niet in daarvoor bestemde groeven van het eerste sterniet en de achtertarsen niet in de schenen inlegbaar. Bovenzijde van het lichaam meer of minder metaalglanzig, nimmer beschud 4
- 2 Bovenlip vrij, niet door het prosternum bedekt. De sterniten vlak. Sprieten naar het uiteinde geleidelijk verdikt 3
- Bovenlip door het prosternum bedekt. De sterniten elk afzonderlijk gewelfd. Sprieten met 2-ledige knoos, waarvan het eindlid zeer groot en afgerond is. Bovenzijde van het lichaam met opstaande borsteltjes en gewoonlijk ook beschud 4. **Syncalyptra**.
- 3 Epipleuren der dekschilden aan den buitenrand, tot aan de achtercoxae duidelijk scherpkantig begrensd. Bovenzijde van het lichaam viltig behaard of nagenoeg kaal, in den regel zonder opstaande borsteltjes 1) 2. **Byrrhus**.

1) De in Zwitserland voorkomende *B. pilosellus* Heer maakt eene uitzondering.

7. Dekschilden der dekschilden aan den buitenrand, slechts aan de basis scherpkantig begrensd. Bovenzijde van het lichaam met kleine, half opstaande borsteltjes bezet. Derde tarslid zonder huidlobje 3. **Porcinolus**.
4. Voortarsen niet volkomen in de schenen inlegbaar. Voorkaken vrij. Dekschilden minstens aan de basis met langsstrepen 5. **Simplocaria**.
- Voortarsen volkomen in de schenen inlegbaar. 5
5. Dekschilden niet gestreept. Voorkaken vrij. Sprietten naar het uiteinde geleidelijk verdikt. 6. **Pedilophorus**.
- Dekschilden met duidelijke, doorlopende langsstrepen. Voorkaken door het prosternum bedekt. 7. **Cytillus**.

III. Tribus LIMNICHINI.

1. Halsschild met diepe sprietgroeven op de bovenzijde der voorhoeken. Lichaam nagenoeg half-kogelrond 10. **Bothriophorus**.
- Halsschild zonder sprietgroeven. Lichaam ovaal 2
2. Schildje groot, weinig langer dan breed, bijna als een gelijkzijdige driehoek. Voortzetting van het prosternum tusschen de voorcoxae afgerond, slechts een weinig in het vrij lange mesosternum ingrijpend. Dwarshlader der achtercoxae in de breedte gegroefd . 3. **Pelochares**.
- Schildje klein en smal, driehoekig, veel langer dan breed. Voortzetting van het prosternum tusschen de voorcoxae driehoekig toegespijst. Mesosternum zeer kort, door de prosternale voortzetting bijna geheel middendoor gedeeld. Dwarshlader der achtercoxae zonder groef, met een of meer, veelal onregelmatige stippelrijen 9. **Limnichus**.

I. Tribus NOSODENDRINI.

1. *Nosodendron* Latreille.

Sprietten 11-ledig, met zeer sterk afgescheiden, grootte, 3-ledige knots. Kop vooruitstekend, niet onder het halsschild terugtrekbaar, aan de onderzijde over een grootere oppervlakte zichtbaar dan het prosternum, hetwelk zeer kort en smal is. Bovenlip slechts als een smalle rand uitstekende. Voorkaken met scherpen top. Achterkaken met twee even lange lobben; de binnenste vliezig, aan den buitenrand hoornachtig, aan den binnenrand gebaard en aan het uiteinde met een haak; de buitenste lob is hoornachtig en aan het uiteinde sterk gebaard. Kaaktasters niet langer dan de lobben. Tong vliezig, zwak uitgerand en gebaard, en evenals de zeer korte liptasters bedekt door de groote hoornachtige kin, welke aan de onderzijde van den kop een naar voren versmalde plaat vormt. Lichaam eivond, sterk gewelfd. De naden van het prosternum zonder sprietgroeven. Dekschilden zonder strepen. Pooten kort; de schenen naar het uiteinde verbreed, platgedrukt, aan den buitenrand gedoornd; voorschenen aan den buitenrand stomp getand.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart of pekzwart; sprietten en pooten meer roodbruin. Kop en halsschild, vooral in het midden, fijn verspreid-, de dekschilden dichter en sterker bespikkeld en elk met 5 rijen geelbruine haarbundeltjes. Lengte 4–5 mm. Aan uitvloeiende sappen van kankerachtige plekken aan oude boomen, vooral van beuken, iepen en elzen; ook achter schors. De larve, welke door *Gory*, *Chapuis*, *Candèze*, *Dufour* en *Laboulbène* beschreven is, zou ook aan platanen gevonden zijn. Gemeen bij Houthem, St. Pieter en Gronsveld (Limburg), Juni, Juli; aan zieke beuken. In de Rijnprov. bij Aken, Duisburg en Düsseldorf. 1. **fasciculare** Oliv.

II. Tribus BYRRHINI.

2. *Byrrhus* Linné.

(*Cistela* Geoffr. ex parte)

Sprietten 11-ledig, naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Bovenlip vrij groot, half-cirkelvormig, vrij, niet door het prosternum bedekt. Voorkaken met meertandigen,

breeden, uitgeholden top en met een krachtigen maaltand aan de basis, door het prosternum bedekt. Achterkaken met twee lederachtige lobben, de binnenste scheef afgeknol en evenals de buitenste sterk gebaad. Kin breed en zeer kort; tong vliezig, door eene insnijding in twee, van voren afgeronde lobben gedeeld. Liptasters kort, weinig langer dan de tong. Lichaam eirond of langwerpig-eirond, hoog gewelfd; op de bovenzijde viltig behaard of nagenoeg kaal, in den regel zonder opstaande borsteltjes ¹⁾. Epipleuren der dekschilden, tot aan de achtercoxae, aan den buitenrand duidelijk scherpkantig begrensd. Sterniten vlak. Achterpooten in daarvoor bestemde groeven van het eerste sterniet, en alle tarsen in groeven aan de binnenzijde der schenen inlegbaar. Gevleugeld of ongevleugeld. Bij het ♂ zijn de klauwen iets verdikt, haakvormig en vooral de voorklauwen plotseling hoekig gekromd; ook is gewoonlijk het laatste sterniet zeer zwak uitgerand; de forceps bestaat uit drie bewegelijke onderdelen, een lepelvormig middengedeelte en twee zijdelingsche kleppen. — De soorten van dit genus leven op den grond, op zand tusschen lage planten, mos en onder droge bladeren; ook op weilanden en op zonnige droge plaatsen, op wegen en langs uitgedroogde slooten. Zij voeden zich met mossen. — De larve van *B. pilula* is door Latreille, Kittel, Westwood en Erichson beschreven.

Van de 22 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Het derde tarslid met een huidlobje. Ongevleugeld. Dekschilden aan den naad vergroeid, de epipleuren even breed als de basis der episternen. Prosternum nauwelijks langer dan de voortzetting tusschen de voorcoxae breed (Sub-gen. *Seminolus* Muls.). Lichaam kort, breed-ovaal, hoog gewelfd. Halsschild grootendeels uiterst fijn en zeer dicht bestippeld. Dekschilden met duidelijke langsstrepen; de vijfde en zevende tusschenruimten gedeeltelijk breeder dan de overigen; bij gave exemplaren zijn de vierde, zesde en achtste tusschenruimten donkerder of zwart fluweelachtig, vlekkelig behaard, in het midden met een zilverwit gezoomden dwarsband. Overigens is de bovenzijde fijn grijsbruin viltig behaard en gewoonlijk ook het halsschild met eene meer of minder duidelijke lichtere teekening. Veelal zijn de voorwerpen afgewreven. De korte, krachtig ontwikkelde kleppen van den forceps zijn van buiten, dicht voor het uiteinde, van eene kleine uitranding voorzien. Lengte $8\frac{1}{2}$ —11 mm. Onder mos langs boschbeken. Eenmaal bij Maastricht. Ook in Westfalen en in de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld 1. **ornatus** Panz.

Het derde tarslid zonder huidlobje (Sub-gen. *Byrrhus* isp.). 2

- 2 Ongevleugeld. Dekschilden aan den naad vergroeid, de epipleuren even breed als de basis der episternen. Prosternum weinig of niet langer dan tusschen de voorcoxae breed. Lichaam zeer kort, nagenoeg half-kogelvormig, gewoonlijk iets kleiner dan bij *ornatus* en evenals dezen gekleurd. Dekschilden met regelmatige langsstrepen; de derde, vijfde en zevende tusschenruimten iets breeder dan de overigen. De forceps als bij *ornatus*. Lengte 8—9 mm. Niet inlandsch. Deze soort zou op den Jacobsberg bij de Porta-Westfalica voorkomen (*lineatus* Panz.) (*luniger* Germ.) 2)

Gevleugeld. Dekschilden niet aan den naad vergroeid. Prosternum duidelijk langer dan tusschen de voorcoxae breed. 3

- 3 Lichaam langwerpig, gestrekt, naar voren en naar achteren gelijkmatig versmald. Onderzijde fijn, griuw, ondiep behaard; de sterniten tusschen de bestippling eenigszins glanzig. Anaal-segment bij beide seksen met 3 ondiepe dwarsgroefjes, welke bij het ♂ door een zwakken dwarsindruk samenhangen. De kleppen van den forceps zijn aan den stompen top scheef afgeknol; het lepelvormige middengedeelte is aan het uiteinde sterk verbreed en vertoont eene langsstreep. Kleur der beharing op de bovenzijde zeer veranderlijk. De navolgende kleur-aberraties zijn bekend. De ab.c. *auratopunctatus* Reitter bij welke de grondkleur der beharing in hoofdzak zwartachtig of bruinzwart is; halsschild met hier en daar meer of minder samenhangende goudgele teekening; de afwisselende tusschenruimten der strepen op de dekschilden gewoonlijk meer fluweelachtig zwart, hier en daar iets onderbroken; dekschilden met twee goudgele, gemeenschappelijke, bochtige vlekbanden (bij den Haag en Steenwijk; in België bij Turnhout). De ab.c. *albopunctatus* F. als de vorige, doch met zilverwitte vlekbanden (den Haag en Apeldoorn). Bij ab.c. *aurofuscus* Reitter is de grondkleur in hoofdzak bruin of goudachtig geelbruin; halsschild met eenige helder

1) Behalve de in Zwitserland voorkomende *B. pilosellus* Heer

2) De uit Elberfeld opgegeven *B. signatus* Panz. zal wel *ornatus* of *luniger* zijn.

goudachtig-geelbruine vlekken en de afwisselende tusschenruimten der strepen op de dekschilden dicht fluweelachtig goudgeel of goudbruin, hier en daar echter iets onderbroken. Bij de aberraties *Dennyi* Curt., *oblongus* St. en het type is de grondkleur bruin en zijn de afwisselende tusschenruimten der strepen op de dekschilden zwart fluweelachtig en hier en daar door lichtere vlekken onderbroken. De ab.c. *Dennyi* bevat groote, breede exemplaren, bij welke de zwart fluweelachtige tusschenruimten gewoonlijk meermalen en langer onderbroken zijn (bij Vianen). Bij ab.c. **oblongus* St. (in België) bevinden zich nog dwarsgeplaatste, witte, bij het type goudachtig geelbruine vlekbanden op de dekschilden, welke hier echter weinig bij de grondkleur afsteken. Lengte 7—9½ mm. Overal zeer gemeen onder mos, steenen, aan boomwortels, soms op wegen. De larve leeft onder mos in den grond 2. *pilula* L.

- Lichaam tamelijk kort-eirond, naar voren of naar achteren sterker versmald. Onderzijde, ten minste op het sternum, grauwigglanzig behaard. 4
- 4 Lichaam naar voren meer dan naar achteren versmald. Dekschilden achter het midden het breedst en aan het uiteinde zeer breed afgerond. De geheele onderzijde dicht witgrauw, zelden goudgeel, borstelachtig behaard en zeer dicht korrelig bestipeld; zeer weinig glanzig, nagenoeg dof. Het anaal-segment in beide seksen nagenoeg effen, in het midden nimmer met een groefje; bij het ♂ zeer onduidelijk in de breedte verdiept. De kleppen van den forceps zijn aan den top gewoon en tamelijk stomp, het lepelvormig middengedeelte als bij *pilula*. Kleur der beharing op de bovenzijde zeer veranderlijk, op de onderzijde evenals de pooten soms roodbruinachtig. De meest in het oog vallende kleur-aberraties zijn: 1º, die bij welke de beharing in hoofdzaak zwart of zwartbruin is; het halsschild gewoonlijk met verscheidene vlekken en twee meer of minder duidelijke, dicht bijeenstaande langsbanden over het midden, goudkleurig geelbruin; de afwisselende tusschenruimten der strepen op de dekschilden nog meer in het oog vallend fluweelachtig zwart. Hiertoe behoort de ab.c. *inornatus* Reitt., zonder duidelijken dwarsband of dwarsgeplaatste vlekbanden op de dekschilden; de ab.c. *subornatus* Reitt. met twee witte, dwarsgeplaatste, bochtige vlekbanden op het midden der dekschilden; bij ab.c. **auratofasciatus* Dfts. zijn deze goudgeel (in België bij Groenendael); de ab.c. *arietinus* Steff. op het midden der dekschilden met twee witte, naar buiten samenhangende, niet onderbroken dwarsbanden; bij ab.c. **bellus* Reitt. zijn deze goudgeel (in België). Bij het type is het midden der dekschilden van een breeden, bochtigen, goudkleurig-gelen of roodbruinen dwarsband voorzien; bij ab.c. *cinetus* Illig. is deze dwarsband zilverwit; bij ab.c. *complicans* Reitt. is de middenband goudkleurig-roodbruin, van buiten geheel wit of door witte vlekjes omzoomd. 2º, die bij welke de beharing in hoofdzaak lichtbruin of roodbruin is; het halsschild met verscheidene donkerder of lichter goudkleurig-geelbruine vlekken en twee meer of minder dicht bijeenstaande langsbanden in het midden; de afwisselende tusschenruimten der strepen op de dekschilden fluweelachtig zwartbruin of roodbruin. Hiertoe behoort ab.c. *Dianae* F., welke op het midden der dekschilden twee lijne, witte, geheel doorlopende, bochtige, naar buiten samenhangende of uit vlekken bestaande banden vertoont; bij ab.c. *Fabricii* Reitt. zijn deze banden goudgeel en bij ab.c. *fusculus* Reitt. ontbreken zij geheel. 3º, is de beharing op de bovenzijde dicht grauwwit; de afwisselende tusschenruimten der strepen op de dekschilden met enkele donkerbruine, weinig in het oog vallende vlekken; het midden der dekschilden met twee zilverwitte, gemeenschappelijke, naar buiten samenhangende, bochtige dwarsbanden (ab.c. **bilunulatus* Muls.). Lengte 7—9 mm. Nagenoeg even gemeen als *pilula* 3. *fasciatus* F.
- Lichaam naar achteren meer dan naar voren versmald. Dekschilden aan de schouders het breedst, aan het uiteinde smal afgerond. De beharing op de onderzijde is iets glanziger op het sternum dan op het achterlijf. Bovenzijde van het lichaam zwart, zwartgrauw of donkerbruin, viltig behaard. De eenigszins veranderlijke teekening op het halsschild, alsook de gemeenschappelijke middenvlek op de dekschilden goudglanzig-geelbruin, welke laatste gewoonlijk door twee grauwe of goudgeelachtige, smalle vlekbanden omgeven is. Soms wordt de lichte middenvlek op de dekschilden onduidelijk en ontbreekt eindelijk bij ab.c. *albopunctatus* Thunb., bij welke slechts de twee lichtgekleurde, smalle vlekbanden overblijven. Bij ab.c. *ater* F. ontbreekt de teekening der dekschilden geheel en is de bovenzijde geheel zwart behaard. Bij ab.c. *rufipennis* Illig. eindelijk is de geheele bovenzijde roodbruinachtig behaard en ontbreekt de teekening op de dekschilden geheel of bijna geheel. Lengte 5½—6½ mm. Verbreed en niet zeldzaam . . (dorsalis F.) 4. *pustulatus* Forst.

3. Porcinolus Mulsant.

Dit genus onderscheidt zich van Byrrhus doordat de epipleuren der dekschilden aan den buitenrand slechts aan de basis scherpkantig begrensd zijn. De bovenzijde van het lichaam is met kleine half-opstaande borsteltjes bezet. Derde tarslid zonder huidlobje. De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam zeer kort eirond, sterk gewelfd; de bovenzijde met iets knotsvormige, eenigszins gebogen, korte borstelhaartjes, op de dekschilden in rijen geplaatst; de afwisselende tusschenruimten der dekschilden fluweelachtig zwart of donkerbruin behaard, over het midden veelal met een dubbelen dwarsband van witachtige vlekjes. Ook is het halsschild dikwijls aan weerszijden witachtig gevlekt. Eene enkele maal komen exemplaren voor met een rood-bruinen dwarsband tusschen den dubbelen vlekband op de dekschilden (niet incl.). Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. Op zandgronden, onder mos en steenen; vrij zeldzaam in de provinciën Utrecht, Gelderland, N.-Brabant en Limburg. Veelal vindt men deze soort met eene aardkorst overdekt. In België bij Rochefort 1. *murinus* F. 1)

4. Syncalypta Stephens.

Sprieten 11-ledig, met 2-ledige knots, waarvan het eindlid zeer groot en afgerond is. Bovenlip kort, van voren iets uitgerand en evenals de aan het uiteinde scherp getande voorkaken, bij teruggetrokken kop, door het prosternum bedekt. Achterkaken met twee lobben: de binnenste vliezig, de buitenste lederachtig, beiden aan het uiteinde gebaard. Tong breed, vliezig, van voren gerand, zwak uitgerand. Lichaam kogelvormig-eirond, op de bovenzijde met opstaande borsteltjes en gewoonlijk ook beschubd. De sterniten elk afzonderlijk geveelfd. Pooten in diepe groeven inlegbaar; tarsen aan de binnenzijde der schenen ingeplant; klauwelid lang. — De soorten van dit genus leven onder steenen, op zandgronden, gewoonlijk nabij oevers.

Van de 9 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Bovenzijde van het lichaam met een hier en daar vlekkelig schubkleed bedekt en met opstaande, knotsvormige borstelhaartjes bezet. 2
- Bovenzijde van het lichaam slechts met opstaande, korte, knotsvormige, witte borstelhaartjes bezet. Voorhoofd met twee divergeerende groeven. Veel kleiner dan de overige soorten, rondachtig, zwart. Dekschilden met rijen van grove strippels, de voorlaatste rij groefachtig verdiept. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Langs oevers van rivieren en meren, op slib en vochtig zand rondkruipend; gewoonlijk met eene korst van de slib of de aarde waarop zij leeft, welke zich tusschen de borstelhaartjes vasthecht. Valkenburg (Limburg), langs de Geul, Juli. In België bij Groenendaal, Waterloo en Rouge-Cloître. In de Rijnprov. bij Crefeld. (arenaria St.) 3. *spinosa* Rossi.
- 2 De borstelhaartjes zijn tamelijk lang, zwartachtig, zelden bruin. De zijrand van het lichaam met bruine, iets achterwaarts gerichte borstelhaartjes bezet. Lichaam kort-eirond, zwart, door de schubjes zwart en witachtig gemarmerd. Dekschilden met lijn bestippelde strepen, de zijstrepen gewoonlijk sterker ingedrukt dan de overigen. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Valkenburg, Juni, langs de Geul. In België, Oldenburg en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf; 's winters in aanspoelsel 2. *setigera* Ill.
- De borstelhaartjes zijn kort, bruin of wit 3
- 3 De borstelhaartjes zijn bruin. Alle strepen der dekschilden zeer grof bestippeld, de beide zijstrepen weinig of niet dieper. Deze soort is iets breeder dan *setigera* en daardoor ook iets meer kogelrond. Dof zwart, door de schubjes bruin en witachtig gemarmerd, langs den rand met eene rij afwaarts gerichte witte borstelhaartjes. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam. Breda, in aanspoelsel van de Mark; de Steeg langs den IJssel. Ook in België. 1. *setosa* Waltl.
- De borstelhaartjes zijn wit- of geelachtig. De strepen der dekschilden lijn en verspreid, soms zelfs onduidelijk bestippeld; de beide zijstrepen sterker verdiept. Lichaam kogelvormig-eirond, op de bovenzijde door witte en bruine schubjes gemarmerd of met bandvlekken. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm. Niet inlandsch. In België en in Noord-Frankrijk aangetroffen. Ik bezit een Belgisch exemplaar uit de collectie Maurissen, zonder nadere vindplaats. . . (paleata Er.)

5. Simplocaria Marsham.

Sprieten 11-ledig, de 5 laatste ledjes duidelijk grooter. Bovenlip duidelijk uitstekend, iets uitgerand. Voorkaken met 4 tandjes, door het prosternum bedekt. Achterkaken

1) De uit Hamburg opgegeven *Curinus hispidus* Lr. zal wel *Porcinolus murinus* L. zijn.

met twee lobben, welke aan het uiteinde en daarachter aan den binnenrand gebaard zijn, de buitenste lob is iets langer. Tong 2-lobbig. Lichaam eivormig, de bovenzijde meer of minder metaalglanzig, nimmer beschud, doch gewoonlijk behaard. Clypeus door eene verdiepte dwarslijn van het voorhoofd gescheiden. Dekschilden minstens aan de basis met langsstrepen. Voortarsen niet volkomen in de schenen inlegbaar. Achterpooten niet in daarvoor bestemde groeven van het eerste sterniet en de achtertarsen niet in de schenen inlegbaar. — De soorten van dit genus leven tusschen gras. — De larve van *S. semistriata* is door Chapuis & Candèze, de pop door Letzner beschreven.

Van de 8 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Bovenzijde van het lichaam ruw, opstaand, witgrauw behaard, veelal hier en daar, vooral naar het uiteinde, als witte vlekken; glanzig, min of meer bronzig zwart- of bruinachtig, soms naar het uiteinde meer roodbruin; zeer fijn bestippeld. De zijden van het halsschild uitgerand. Lichaam kort-eirond. Spriet en pooten geelrood. Dekschilden aan de basis gestreept. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Niet zeldzaam onder mos, tusschen gras en aan boomwortels; in het najaar tegen muren 1. *semistriata* F.

Bovenzijde van het lichaam kort, geelbruin behaard en door bijna neerliggende, witte haartjes gevlekt; weinig glanzig. De zijden van het halsschild bijna recht. Lichaam meer langwerpig, metallisch zwartgroen. Spriet en pooten bruinrood. Dekschilden aan de basis gestreept. Lengte 3 mm. Niet inlandsch. Zij zou in Westfalen en bij Hamburg voorkomen. 1) (maculosa Er.)

6 Pedilophorus Steffahny.

Spriet van af het zevende lid naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Voorkaken zonder maaltand aan de basis; de rechter met een 3-tandigen-, de linker met een 2-tandigen top; evenals de bovenlip vrij en niet door den voorrand van het prosternum bedekt. Lichaam glanzig, groen of bronskleurig. Dekschilden niet gestreept, verward bestippeld. Voortarsen volkomen in de schenen inlegbaar. Bij het ♂ is het eindlid der spriet bij vele soorten langer, hoogsgewijs geslingerd, op de binnenzijde afgeplat en min of meer uitgehold. — Bij het in Nederland vertegenwoordigde Sub-gen. *Morychus* Er. zijn de schenen aan den buiten en top rand met krachtige, doornachtige borstels bezet; het derde tarslid zonder huidlobbe. Geveelgeld. — De soorten van dit genus leven op zandgronden, vooral tusschen gras.

Van de 10 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Lichaam langwerpig-eirond, de dekschilden in het midden met parallelle zijden; bronzig bruin- of groenachtig, matig glanzig, vrij dicht bestippeld en witgrauw-, aan de zijden dichter behaard. Schildje dicht wit viltig behaard. Spriet en pooten zwart. Pooten roodbruin. Onderzijde zeer dicht, lang, grauwwlekkig behaard. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{2}$ mm. Verbreed en vooral in het voorjaar op zandgrond. Gemeen in de duinen, vooral onder afgevallen bladeren en op het zand.

1. *aeneus* F.

Lichaam zeer kort-eirond, eenigszins kogelvormig, de dekschilden aan de zijden afgerond; glanzig, metallisch-groen, zeldzamer bronzig-bruin, niet dicht, tamelijk fijn, doch diep bestippeld; lijn grauww- of geelachtig, niet dicht behaard. Schildje niet wit viltig behaard. Spriet bruin. Pooten donker roodbruin. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Op zandgrond, nabij rivier-oeveren, onder steenen. Eenmaal in Holland, vermoedelijk bij Heemstede, gevangen. In België bij Uccle, Deurne en Leuven; in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf; ook in Westfalen. 2. *nitens* Panz. 2)

7. Cytilus Erichson.

(Cistela Geoffr. ex parte, Seidl.)

Dit genus is naverwant aan *Byrrhus*. Spriet met eene duidelijk afgescheiden, 5-ledige, langwerpige eindknots. Bovenlip vrij; voorkaken zonder maaltand, door

1) Een aantal als *maculosa* gedetermineerde Belgische exemplaren, die ik zag, behooren tot *semistriata*, zoo ook een ex. van *S. metallica* St. (ex coll. Wesmalt), alsook van *S. acuminata* Er. Ook betwijfel ik het voorkomen van *S. metallica* St. bij Ucclefeld.

2) *P. auratus* Dits uit Aken is ongetwijfeld onjuist.

den voorrand van het prosternum bedekt. Dekschilden met duidelijke, doorlopende langsstrepen. Bovenzijde van het lichaam viltig behaard. Voortarsen volkomen in de schenen inlegbaar; de achtertarsen daarentegen kunnen niet aan de binnenzijde der schenen inlegd worden.

De 2 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Lichaam kort-ovaal, min of meer eirond; de dekschilden dicht achter de schouders het breedst. Halsschild dicht bestippeld, gewoonlijk donker bronskleurig; de dekschilden metallisch groen; de afwisselende tusschenruimten der strepen door fluweelachtig zwarte haarvlekken zwart en groen gevlekt. Bij *ab.c. fuscus* Steph. zijn de dekschilden zwartgroen, de afwisselende tusschenruimten goudgeel en zwart gevlekt; bij *ab.c. tessellatus* Reitt. zwartachtig grijs behaard, de afwisselende tusschenruimten geelbruin en zwart gevlekt. Sterniten tamelijk glanzig, zeer fijn en verspreid-, de dolfte topanden van het 2de, 3de en 4de sterniet zeer dicht witgrijs, borstelachtig behaard. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Niet zeldzaam tusschen gras, onder mos, tusschen dorre bladeren en helm op de duinen. De *ab.c. tessellatus* komt meer voor dan het type en de *ab.c. fuscus*. (*varius* F.) 1. *sericeus* Forster.

Lichaam ovaal, eenigszins omgekeerd-eirond, de dekschilden achter het midden het breedst; op de bovenzijde dicht bronzig-bruin of goudachtig-geelbruin, gelijkmatig behaard; de afwisselende tusschenruimten der strepen op de dekschilden gewoonlijk iets lichter behaard, soms nog met enkele ingestrooide witachtige haartjes. Sterniten, behalve het eerste glanzige en meer verspreid behaarde, dof, uiterst kort en dicht grijs, schubachtig behaard. Lengte 5—5½ mm. Zeer zeldzaam; een paar malen bij den Haag en Loosduinen, Mei; ook bij Maarsbergen 2. *auricomus* Dfts.

III. Tribus LIMNICHINI.

8 Pelochares Mulsant.

Dit genus onderscheidt zich van *Limnichus* door het grootte schildje, dat weinig langer dan breed, bijna een gelijkzijdige driehoek is. Voortzetting van het prosternum tusschen de voorcoxae afgerond, slechts een weinig in het vrij lange mesosternum ingrijpend. Clypeus door een zeer duidelijken dwarsnaad van het voorhoofd gescheiden. Voorrand van het prosternum tegen den kop schildvormig verbreed, de naden aan weerszijden sprietgroeven vormend. Dwarsbladen der achtercoxae in de breedte gegroefd. Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam eirond, zwart of donkerbruin, glanzig; met glanzige, door de verschillende richting der haren, vlekke, grijsachtige of geelgrijsachtige beharing. Lengte 2 mm. Langs rivieroeveren en in moerassen op zand en slib. Breda, Maart, in aanspoelsel van de Mark. Ook in België en Westfalen 1. *versicolor* Waltl.

9. Limnichus Latreille.

Sprieten 10-ledig, het achtste en negende lid even groot, slechts weinig grooter dan het zevende, het tiende veel grooter, eivormig. Clypeus door een dwarsnaad, tusschen de oogen, van het voorhoofd gescheiden. Bovenlip ver uitstekend, afgerond, aan de zijden hoekig verbreed. Voorkaken kort en breed, diep gespleten, elk deel aan het uiteinde wederom in twee tanden verdeeld. Achterkaken met twee hoornachtige, nagenoeg even lange, aan het uiteinde gebaarde lobben, van welke de binnenste dikker is. Kaaktusters kort en dik, weinig langer dan de lobben. Kin breed, naar voren sterk versmald. Tong hoornachtig, aan het uiteinde gerand, aan de zijden in een vliezig, bewimperd top uitlopend. Liptasters vrij dik, de helft langer dan de tong. Lichaam klein, ovaal. Voorrand van het prosternum tegen den kop schildvormig verbreed; de naden aan weerszijden sprietgroeven vormend. Schildje klein, smal driehoekig, veel langer dan breed. Voortzetting van het prosternum, tusschen de voorcoxae, driehoekig toegespitst. Mesosternum zeer kort, door het prosternum bijna geheel middendoor gedeeld. Dwarsbladen der achtercoxae zonder groef, met een of meer, veelal onregel-

matige stippelrijen. — De soorten van dit genus leven op vochtige, zandige, met gras begroeide plaatsen, langs rivieroeveren, op weilanden en in aanspoelsel der rivieren.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Lichaam ovaal, naar voren en naar achteren gelijkmatig versmald; glanzig zwart, uiterst kort donkergrauw of bruinachtig behaard. Dekschilden uiterst fijn en niet dicht bestippeld, zonder stippeelrij langs den naad, hier en daar met eene enkele kale plek. Sprietwortel en pooten roodbruin. Dikwijls is de onderzijde en soms zijn de dekschilden of het geheele lichaam roodbruin. Lengte 1½ mm. Op zandige oevers tusschen gras, op weilanden en in het voorjaar in aanspoelsel. Zeer zeldzaam; Utrecht, Tiel, Zierikzee en op Goeree . . . 1. **pygmaeus** St.

Lichaam naar achteren meer toegespitst dan naar voren, op het midden meer bultig gewelfd; dof zwart, vetglanzig, zeer kort en uiterst dicht grauw behaard, en daartusschen met korte, opgerichte, witte haartjes. Dekschilden uiterst fijn lederachtig gerimpeld en fijn verspreid, naar de zijden en het uiteinde sterker bestippeld; met eene naar het uiteinde meer of minder verdiepte stippeelrij langs den naad. Lengte 1½—1¾ mm. Zeer zeldzaam langs oevers. Haarlem, Zierikzee, Ruurlo en Houthem, Mei—Juli. In de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf . . . 2. **sericeus** Dfts.

10. Bothriophoras Mulsant.

Lichaam nagenoeg half-kogelvormig. Sprieten 11-ledig, de eerste twee leedjes aanmerkelijk verdikt, de laatste drie duidelijk afgescheiden, eene knots vormend, welke in eene diepe groef aan weerszijden op de bovenzijde der voorhoeken van het halsschild kan ingelegd worden. Prosternum van voren uitgerand, waardoor de monddeelen volkomen onbedekt blijven. Dijen in diepe groeven inlegbaar.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart, weinig glanzig, uiterst fijn en dicht bestippeld en, bij sterke vergrooting gezien, uiterst fijn gechagrineerd en stoffijn, grauw, zijdeachtig behaard. Sprieten en pooten roodbruinachtig; sprietknots aan het uiteinde witachtig behaard. Lengte ¾—1 mm. Langs oevers. Deze tot nu toe uit Zuid-Europa bekende soort werd, in één exemplaar, door den heer K. Kempers op Texel in Juni, ontdekt. (venetus Ferrari) 1. **atomus** Muls.

Sub-orde V. HYGROPHILI.

XXXIX. Familie GEORYSSIDAE.

Deze kleine familie, welke eenige verwantschap vertoont met de Byrrhidae, wordt gevormd

Fig. 57

Georyssus crenulatus Rossi

I Van terzijde gezien. (Orig.)

II Spriet. (Naar Imhoff)

kenmerk is bij geene der andere Coleoptera-familien waargenomen. Mesosternum breed. — De vleugels

van Georyssus liggen onopgevoeven onder de dekschilden; zij wijken, volgens *J. Redtenbacher*, door het sterk gereduceerd zijn van de nervatuur, zeer van die der *Hydrophilidae* af. De cel aan het uiteinde van de vena scapularis ontbreekt. De vorkgewijs vertakte vena cubitalis ontspringt uit de vena interno-media, welke eene wigvormige ruimte insluit. De vena analis schijnt geheel te ontbreken. — Van deze familie is slechts een enkel genus bekend.

1. Georyssus Latreille.

De soorten van dit genus leven langs oevers, vooral op zandige plaatsen, tusschen vergane plantenstoffen: zij vallen moeielijk in het oog, daar zij geheel met aangekleeftde zandkorreltjes of slib bedekt zijn; men ziet ze als bewegelijke aardkluittjes rondloopen. Van de 6 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Zwart, eenigszins glanzig. Halschild sneller dan de dekschilden, naar voren versmald en op het voorste gedeelte in de lengte rimpelig gestreept. Schildje onduidelijk. Dekschilden met rijen groote, diepe stippels. Spriet bruin met roodbruinen wortel. Pooten zwart. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer gemeen, o. a. langs duinplassen . . . (*pygmaeus* F.) 1. *crenulatus* Rossi.

XL. Familie PARNIDAE. (Fig. 58.)

De Parnidae zijn vooral gekenmerkt, doordat het groote prosternum als een schild den mond bedekt; slechts bij *Potamophilus* blijft de onderzijde van den kop geheel vrij. Zij zijn het meest verwant aan de *Hydrophilidae*, doch hebben

Fig. 58. I. Spruit van Parnus. (Naar Imhoff)

II. *Macronychus quadrituberculatus* Müll. (Orig.)

meer of minder gewelfd. — Het halsschild sluit de dekschilden bedekken het geheele achterlijf en omvatten met hunnen zijrand de borst. — De Parnidae naderen door de nervatuur der vleugels tot de *Hydrophilidae*. De nervatuur der vleugels van *Potamophilus acuminatus* komt, volgens *Roger*, overeen met die van *Byrrhus*. Het gewricht is achter het midden gelegen, het topgedeelte is daardoor kleiner. De teruglopende aders der area externo-media zijn door dwars-anastomosen verbonden; de voorste ruit ontbreekt; de teruglopende ader der vena externo-media is lang. Het verloop van de bijaders der vena interno-media is als bij *Byrrhus*, doch met dit verschil, dat de zijtak, welke bij *Byrrhus* de bijader in de area analis met de hoofdadert verbindt, hier niet zoo hoog opwaarts in deze laatste intreedt, doch zich dicht bij den achterrand met haar verbindt; deze zijtak geeft twee dwars-anastomosen tot haar af, van welke de eerste tegenover de dwars-anastomose staat, welke den gemeenschappelijken stam der twee bijaders van de area interno-media met de vena externo-media verbindt, en de tweede tegenover de dwars-anastomose, welke verder naar onderen van uit het vereenigingspunt van genoemde twee bijaders tot de hoofdadert ontspringt. Daardoor ontstaat eene teekening als bij *Orthocerus*; alleen ontbreekt daar, van af de laatste dwars-verbinding, het laatste gedeelte van de hoofdadert, het welk zich hier nog met het uiteinde van de bijader vereenigt. De vena analis is gewoon, doch lang. Het basaallobe ontbreekt. — Prosternum vóór de voorcoxae groot en veel langer dan de voorcoxae (alleen bij *Potamophilus* kort), naar achteren in eene kortere of langere, spitse voortzetting verlengd, welke in het mesosternum grijpt en zodoende ongeveer als bij de *Elaterridae*, in eene

diepe groef wordt opgenomen. — Voorcoxae verschillend gevormd, hetzij cilindervormig (Parnini), of zij kogelvormig (Elmini). Achtercoxae groot, tot dijplaten ontwikkeld, welke minstens de dijbasis bedekken en veelal hoekig ingesneden zijn (Parnidae); of wel klein en niet tot dijplaten ontwikkeld (Elmini). — Achterlijf met 5 sterniten, van welke de voorsten samengegroeid zijn. — Tarsen met 5 gewone leedjes. Klauwld zeer groot, met opvallend groote, krachtige klauwen. — De Parnidae leven grootendeels in stroomend, doch ook wel in stilstaand water; zij zwemmen niet, doch kruipen onder water, in eene groote luchtbel gehuld, langzaam voort aan waterplanten, steenen, palen enz. en houden zich met hare krachtige klauwen zoodanig vast, dat de sterkste strooming ze niet medevoert; zij leggen zich met hare lange klauwen als 't ware voor anker. Tegen den namiddag kruipen zij veelal naar de oppervlakte van het water en zwermen dan rond; sommigen, o.a. *Limnius Dargelasi*, tref men dan tegen zonsondergang op waterplanten aan. Anderen blijven zeer verborgen, veelal onder, in het water liggende, steenen. Het voedsel bestaat uit vergane plantenstoffen, waarin vele Infusoriën en andere Protozoën leven. Gedurende den winter leven de Elmini in het water, dicht opengehoopt, in de holten van steenen. Zij komen dan niet aan de oppervlakte; de lage temperatuur verhoogt de oplosbaarheid der lucht in het water, doch doet de behoefte aan ademen verminderen. In den zomer verspreiden zij zich en zoeken dan volgens *Flach* die plaatsen op, waar een hevige stroom of het voortdurend opbruisen het luchtgehalte in het water verhoogt. Merkwaardig is volgens *Erichson* de ademing bij Parnus. Wanneer een Parnus onder water gaat, omhult hij zich met eene luchtbel. Tusschen deze luchtbel en het water is een laagje van eene afgescheiden, olieachtige stof; het is dus niet het haarkleed dat de luchtbel vasthoudt, maar het olieachtige, evenals bij de waterspin. Bij de Elmini bepaalt zich de luchtbel slechts tot de zijden van het lichaam. — De larve van *Elmis* herinnert eenigszins aan die der *Silpha*'s; zij is schildvormig, ovaal, vlak uitgebreid, naar achteren toegespitst, de zijden dicht met franjes bezet; met 10 dorsaal gelegen paren stigmata en in den laatsten achterlijfsring met bundelvormige kieuwen, welke onder het zwemmen, naar willekeur, uit de anaalspleet kunnen worden uitgestulpt. De kop is klein, aan weerszijden met 5 ocellen. Sprieten zeer kort, 3-ledig, aan de zijden van den kop ingeplant. Tarsen zeer kort, met een enkelen klauw. De jonge larve heeft geen stigmata, het tracheëen-stelsel is derhalve gesloten. Ditzelfde geldt ook voor de larven van *Potamophilus* en *Macronychus*. Bij de larve van *Potamophilus* bevinden zich aan den mesothorax en aan elk der 8 eerste achterlijfsringen een paar stigmata. In den regel ademen de larven door de staartkieuwen; wanneer echter bij lagen waterstand palen, balken en ander houtwerk, waaraan zij leven, boven water komen, worden de larven gedwongen om in de lucht te ademen en alsdan functioneeren de stigmata.

Overzicht der Tribus.

Achtercoxae klein, niet tot dijplaten ontwikkeld. Voorcoxae gewoonlijk kogelvormig. Sprieten draadvormig, dicht tegen de oogen ingeplant, meestal langer dan de kop. Lichaam meestal kort, ovaal, zelden langgestrekt (*Stenelmis*), slechts gedeeltelijk met een dicht haarkleed bedekt. Het prosternum bedekt 1) den geheelen mond. 1. **Elmini.**

Achtercoxae groot, tot dijplaten ontwikkeld, welke minstens de dijbasis bedekken en veelal hoekig ingesneden zijn. Voorcoxae cilindervormig. Sprieten kort en onregelmatig, gewoonlijk op het voorhoofd ingeplant. Lichaam gewoonlijk zeer lang gestrekt, overal dicht viltig behaard en onder water in eene groote luchtbel gehuld. 11. **Parnini.**

1. Tribus E L M I N I.

- 1 Sprieten 11-ledig, het eindlid niet in het oogvallend groot. Tarsen gewoonlijk korter dan de schenen. 2
- Sprieten 6-ledig, zeer kort, het eindlid vrij groot. Tarsen langer dan de schenen, het klauwld buitengewoon lang. Halsschild bultig. Schildje vrij groot. Pooten zeer lang. (Macronychus.)
- 2 Halsschild zonder middengroef en zijbulten, meestal met verdiepte langslijnen 3
- Halsschild met eene diepe middengroef en twee langsbultjes aan weerszijden; even lang als breed, aan voor- en achterraand nagenoeg even breed. Lichaam lang gestrekt. Schildje groot. Schenen onbewimperd (*Stenelmis*.)
- 3 Halsschild aan weerszijden met eene diep gegroefde langslijn 4
- Halsschild zonder verdiepte langslijnen. De 7de tusschenruimte der dekschilden kielvormig opgericht. 5. **Riolus.**

1) Bij de Europeesche soorten.

- 4 Schildje vrij groot, rondachtig. De langslijnen op het halsschild gaan in de, eveneens sterk verdiepte en naar buiten kielvormig begrensde, 4de streep der dekschilden over; de ruimte tusschen deze verdiepte lijnen en den zijrand is fijn en dicht, viltig behaard en onder water met luchtbelletjes bezet 1. **Limnius**.
 Schildje klein, langwerpig of smal. Hoogstens de 6de tusschenruimte naar binnen scherp gekield 5
 5 Halsschild aan de basis zonder dwarsindruk, welke de zijgroeven verbindt 6
 Halsschild aan de basis met een dwarsindruk, welke de beide zijgroeven verbindt. 4. **Lareynia**.
 6 Alle tusschenruimten der dekschilden vlak of gewelfd, doch nimmer de 4de of 6de scherp gekield of kantig 2. **Elmis**.
 De 6de tusschenruimte der dekschilden naar binnen scherpkantig gekield. De zijrand der dekschilden min of meer viltig behaard. De verdiepte langslijnen op het halsschild staan niet in het verlengde, maar meer naar binnen van de verdiepte schouderlijn der dekschilden. 3. **Esolus**.

II. Tribus PARNINI.

- 1 De sprieten zijn dicht tegen de oogen ingeplant en kunnen niet in schedelgroeven ingelegd worden; het 2de lid is niet oorvormig verbreed. Halsschild zonder verdiepte langslijnen. Prosternum voor de voorcoxae zeer kort, niet tegen den mond schildvormig ontwikkeld. Het metasternum loopt niet tusschen de middelcoxae door. 6. **Potamophilus**.
 Sprieten op het voorhoofd ingeplant; het 2de lid oorvormig verbreed, de volgende, in eene voorhoofdsgroef inlegbare, leedjes bedekkend. Prosternum tegen den mond schildvormig ontwikkeld. Het metasternum loopt tusschen de middelcoxae door en stoot tegen de breede voortzetting van het prosternum, hetwelk het kleine mesosternum geheel bedekt 2
 2 Halsschild zonder verdiepte langslijnen. 7. **Dryops**.
 Halsschild aan weerszijden met eene verdiepte langslijn. 8. **Parnus**.

I. Tribus ELMINI.

1. **Limnius** Müller.

Sprieten 11-ledig. Bovenlip zeer breed, met dicht behaarde randen. Voorkaken gebogen. Kaaklasters draadvormig, het eindlid toegespitst en aan het uiteinde afgeknut. Halsschild zonder middengroef en zijbulten, aan weerszijden met eene diep gegroefde langslijn, welke in de eveneens sterk verdiepte en naar buiten kielvormig begrensde vierde streep der dekschilden overgaat; de ruimte tusschen deze verdiepte lijn en den zijrand is fijn en dicht viltig behaard en onder water met eene luchtblas bezet. Achterrand van het halsschild voor het schildje diep ingedrukt. Schildje vrij groot, rondachtig. Tarsen gewoonlijk korter dan de schenen.

Van de 7 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Eivormig; bovenzijde donkerder of lichter bronskleurig-bruin; dekschilden in rijen behaard. Halsschild over het midden iets rimpelig, overigens zeer fijn bestippeld; met iets gebogen zijlijnen. Metasternum voor de achtercoxae met eene uitholling, welke naar voren in een langsgroefje uitloopt; bij het ♀ met eene fijne, dubbele lijn op den bodem der uitholling. Pooten roodachtig; de tarsen alsook de sprieten roodgeel. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Onder water aan de wortels van waterplanten, alsook onder steenen in het water. Deze soort is minder traag dan de overige Elmiden; tegen den avond komt zij uit het water te voorschijn en gaat zwermen. Haarlem, Utrecht, Driebergen, Noordwijk en Houthem. Ook in België (Groenendael in aantal) en in Westfalen. . . (tuberculatus Müll.) 1. **Dargelasii** Latr.

2. **Elmis** Latreille.

(*Latelmis* Reitter)

Lichaam eirond; de bovenzijde dun, fijn en zeer kort behaard; de randen van de onderzijde dicht zijdeachtig viltig. Sprieten 11-ledig. Kop afwaarts gebogen, aan de onderzijde door het naar voren uitgetrokken prosternum bedekt. Halsschild aan weers-

ijden met eene diep gegroefde langslijn; zonder dwarsindruk voor de basis. Schildje klein, langwerpig of smal. Alle tusschenruimten der dekschilden vlak of gewelfd, doch nimmer de vierde of zesde scherp gekield of kantig. Schenen aan de binnenzijde bezeimperf. Tarsen gewoonlijk korter dan de schenen; het vijfde lid even lang als de 4 overigen te zamen. — De larve van E. Volkmari is door Laboulbène en Rolph, de pop door Beling beschreven. — De soorten van dit genus zijn kleine kevertjes, welke even als hunne larven in sterk stroomende wateren, aan de onderzijde van steenen hun verblijf houden.

Van de 9 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 De verdiepte langslijnen op het halsschild convergeeren naar voren. De tusschenruimten der dekschilden zijn bestippeld. Onderzijde van het achterlijf zwart. 2

De verdiepte langslijnen op het halsschild loopen naar voren nagenoeg evenwijdig. De tusschenruimten der dekschilden zijn vlak en rimpelig bestippeld. Bovenzijde bruin-bronskleurig, iets glanzig; de dekschilden iets lichter dan kop en halsschild. Prosternum veelal rood; ook het midden van het achterlijf roodachtig. Dekschilden met krachtige stippellijnen. Halsschild zeer fijn en dicht bestippeld. Pooten bruin, de knieën en tarsen, alsook de sprietwortel geelrood. Lengte 2—2½ mm. Langs de Maas bij Bunde (Limburg), Juni. Ook in de Belgische provincie Luik. 2. **Mülleri** Er.

- 2 De grove stippels der dekschilden staan, vooral over het midden, in rijen geplaatst en vormen geene duidelijke stippellijnen; de tusschenruimten zijn vlak. De basis der dekschilden helt naar voren zeer weinig af. Dekschilden achter het midden slechts weinig verbreed, waardoor het lichaam iets smaller is dan bij Germari. De langslijnen op het halsschild convergeeren naar voren minder dan bij Germari. Bovenzijde van het lichaam zwart, eenigszins bronsglanzig, uiterst fijn en onduidelijk behaard. Voordijen met eene minder duidelijke viltvlek dan bij Germari. Halsschild fijn bestippeld. Lengte 3 mm. Langs de Geul bij Valkenburg en Houthem, onder steenen in het water en op waterplanten. In de Rijnprovincie bij Aken en Crefeld; in België bij Groenendaal.

1. **Volkmari** Panz.

De stippels der dekschilden staan in duidelijke langslijnen 3

- 3 Stippellijnen der dekschilden verdiept, doch tamelijk fijn bestippeld; de tusschenruimten iets gewelfd. De langslijnen van het halsschild convergeeren sterk. Dekschilden achter het midden vrij sterk verbreed; de basis naar voren sterk afhellend. Bovenzijde glanzig zwart of eenigszins bronzig, duidelijk behaard. Voordijen met eene dichte viltvlek aan de voorzijde. Halsschild iets grover bestippeld dan bij Volkmari. Lengte 3 mm. In de Rijnprovincie langs de Ruhr en bij Elberfeld (Germari Er.)

Stippellijnen der dekschilden niet verdiept, doch grof bestippeld; de tusschenruimten vlak. De langslijnen van het halsschild convergeeren weinig. De vorm der dekschilden als bij Volkmari. Bovenzijde zwart, zonder of met geringen bronsglans; eenigszins dof, fijn behaard. Pooten zwart, tarsen rood. Halsschild dicht, fijn en duidelijk bestippeld. Bij het ♀ zijn de twee laatste sterniten zeer zwak en onduidelijk, breed uitgesneden. Lengte 2½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprovincie, langs de Ruhr; ook in Westfalen in boschbeken. (opacus Müll.)

3. Esolus Mulsant.

De verdiepte langslijnen van het halsschild staan niet in het verlengde, maar meer naar binnen, van de verdiepte schouderlijn der dekschilden. De zijrand der dekschilden is meer of minder viltig behaard; de zesde tusschenruimte is naar binnen scherpkantig gekield. Het overige als bij Elmis.

Van de 12 Europeesche soorten komen 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden vlak, met stippellijnen; de stippels naar het uiteinde fijner wordend en nagenoeg verdwijnend. Dekschilden naar verhouding langer dan bij pygmaeus 2

Dekschilden iets gewelfd, met duidelijke stippellijnen; op de voorhelt met grove stippels, ongeveer 1½ maal zoo lang als te zamen breed. Halsschild met niet naar voren convergeerende langslijnen. Bovenzijde bruin, de dekschilden iets lichter dan kop en halsschild. Pooten en sprieten roodgeel. Lengte ruim 1 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprovincie bij Elberfeld (pygmaeus Müll.)

- 2 Halsschild duidelijk breder dan lang; de langslijnen naar voren convergeerend. Bovenzijde zwartbruin of nagenoeg zwart, tamelijk glanzig, lijn verspreid behaard. Pooten rood, de dijen veelal iets donkerder. Lengte 1½ mm. In aantal onder steenen in de Geul bij Houthem en Wijlre (Limb.). Ook in België bij Spa, in de Rijnprovincie en in Westfalen

1. *angustatus* Müll.

Halsschild nauwelijks breder dan lang; de langslijnen loopen nagenoeg evenwijdig. Bovenzijde zwartbruin, weinig glanzig en uiterst lijn behaard. De eerste stippels der langslijnen aan den voorrand der dekschilden vormen eene grovere dwars-stippelrij. Pooten rood, de dijen en schenen gedeeltelijk donkerder. Lengte 1½ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprovincie bij Elberfeld en in het Ahldal. (parallelepipedus Müll.)

4. *Lareynia* Duval.

Sprieten 11-ledig. Halsschild aan de basis met een dwarsindruk, welke de beide zijgroeven verbindt. Schildje klein, langwerpig of smal. Hoogstens de zesde tusschenruimte op de dekschilden naar binnen scherp gekield. Tarsen gewoonlijk korter dan de schenen. — De larve van L. Maugetii is door Kolenati, die van aenea door Westwood, Muller, Erichson, Laboulbène en Rolph, en de pop van deze laatste soort door Belling beschreven.

Van de 10 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden aan de basis gewelfd, met duidelijke schouderbuiten, op welke de 7de tusschenruimte zich merklijk naar binnen buigt. 2

Dekschilden aan de basis vlak, zonder schouderbuiten; de 7de tusschenruimte tot aan de basis rechthoekig en sterk gekield, de 3de en 5de minder sterk kielvormig verheven; de stippels der strepen zeer groot. Halsschild als bij *aenea*. Dekschilden 1½ maal zoo lang als breed, naar het uiteinde duidelijk verbreed. Bovenzijde dof zwart of zwartbruin; dekschilden minder dof dan het halsschild, doch nagenoeg zonder bronsglans. Sprieten en tarsen rood. Lengte 1½—1; mm. Niet inlandsch. In Westfalen. (*obscura* Müll.)

- 2 De langsgroeven op het halsschild naar buiten door eene stompe langskiel begrensd, welke naar de zijden zeer steil afvalt en naar achteren vlakker wordt; beiden naar achteren iets convergeerend. Halsschild met een diepen indruk aan de basis. De langsgroeven van het voorhoofd liggen met die van het halsschild bijna in eene richting. De 3de, 5de en 7de tusschenruimte en soms ook de naad der dekschilden meer of minder duidelijk verheven. Zwart of donkerbruin, meestal zonder bronsglans op de dekschilden. Sprietwortel roodbruin. Pooten donker roodbruin of bruin. Lengte 2½ mm. Niet inlandsch. In Westfalen, ook op de Lüneburger heide (*Latreillei* Bedel) (*Maugetii* Latr.)

De langsgroeven op het halsschild naar buiten door eene scherpe langskiel begrensd, welke naar de zijden meer vlak afhelt en van voren niet hooger opgericht is; beiden naar achteren niet convergeerend. Halsschild met eene ondiepe dwarsgroef aan de basis. De langsgroeven van het voorhoofd staan veel meer naar binnen dan die van het halsschild. Op de dekschilden zijn slechts de 5de en 7de tusschenruimten duidelijk verheven. 3

- 3 Dekschilden 1½ maal zoo lang als breed. De langskielen van het halsschild gaan naar buiten in een langindruk over. Halsschild naar voren duidelijk versmald, met tamelijk rechte zijden. Zwart, met bronskleurige, bij het ♂ tamelijk parallelle, bij het ♀ achter het midden bredere dekschilden. Sprietwortel en tarsen rood. Halsschild lijn en verspreid bestippeld, over het midden min of meer glanzig. Lengte 2—2½ mm. Bij Velp, op Beckhuizen, in beekjes onder steenen; bij Houthem in de Geul. Ook op waterplanten en aan de wortels van *Scrophularia aquatica* (*Maugei* Bedel ex parte) 1. *aenea* Müll.

Dekschilden korter, slechts 1½ maal zoo lang als breed, naar het uiteinde meer verbreed. De langindruk buiten de langskielen van het halsschild is zwakker aangeduid; het middenveld duidelijk breder dan bij *aenea*. Ook is het halsschild naar voren sterker versmald, met meer gebogen zijden en dof, ten gevolge van de dichtere bestippling. Zwart; de dekschilden veelal bruin, gewoonlijk met uiterst geringen bronsglans, veel minder duidelijk dan bij *aenea*. Pooten bruin, uiteinde der tarsen roodachtig. Vermoedelijk eene variëteit van *aenea*. Lengte 1½—2 mm. Met *aenea*, bij Houthem in de Geul.

(*Kirschii* Gerh., *Maugei* Bedel ex parte) 2. *Megerlei* Dfts.

5. *Riolus* Mulsant.

Sprieten 11-ledig. Halsschild zonder verdiepte langslijnen. De zevende tussenruimte der dekschilden kielvormig opgericht. Tarsen gewoonlijk korter dan de schenen. Volgens Flach leven de soorten van dit genus uitsluitend op kalkbodern of in kalkhoudend water.

Van de 10 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Alleen de 7de tussenruimte der dekschilden kielvormig opgericht. De zijden van het halsschild aan de basis naar buiten gebogen, zoodat de achterhoeken zeer spits en iets naar buiten gericht zijn. Bovenzijde bronskleurig; sprieten geheel roodachtig, met lichter uiteinde. Dekschilden langwerpig-eivond, rijkelijk $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed; glanzig, met krachtige stippellijnen; de beharing, bij van voren opvallend licht bezien, gelijkmatig en goudglanzig; met vlakke, weinig uitstekende schouderbuilen. Dijen geheel witachtig viltig. Slanker en iets grooter dan *cupreus*. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Deze soort zou, door den heer *von Hagens*, bij Valkenburg in Limburg gevangen zijn; ik zag echter het exemplaar niet 1. **nitens** Müll.

Behalve de 7de tussenruimte is ook de 3de en 5de, over de geheele lengte, of alleen aan het begin of aan het uiteinde, kielvormig opgericht en langer en meer opstaande behaard . . . 2

- 2 Dijen, behalve de knieën, met een (het best bij van voren opvallend licht te zien) gelijkmatig, viltachtig bekleedsel voorzien. Halsschild aan weerszijden met twee scheeve zij-indrukken; de een van voor het midden van den zijrand naar het midden van de basis gericht, de ander voor de achterhoeken. Sprieten rood, meestal met donkere eindcedjes. Bovenzijde donker bronskleurig en, behalve op de verheven tussenruimten, niet zeer dicht behaard. Dekschilden aan het uiteinde kort afgerond, niet volkomen $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed; met sterk uitstekende schouderbuil. Halsschild fijn en dicht bestippeld, doffer dan de dekschilden, welke van krachtige stippellijnen voorzien zijn. Kleiner dan *Mulsantii*. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Eenmaal bij Houthem, Juni, in de Geul. In Westfalen soms in groot aantal; ook bij Düsseldorf. 2. **cupreus** Müll.

Dijen zeer zwak, doch nog duidelijk behaard, zoodat, ook bij van voren opvallend licht bezien, de grondkleur niet bedekt wordt. Het lichaam is iets meer gewelfd. Dekschilden achter het midden iets verbreed. Bovenzijde zwart of donker bronskleurig, meer of minder dof door de dichte bestippling en structuur; zeer dicht grijsachtig behaard. Halsschild slechts met een scheeven indruk. Dekschilden aan het uiteinde langer uitgetrokken, $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, met tamelijk uitpuilende schouderbuil. Pooten rood, soms de knieën iets donkerder, in welk geval de voordijen aan de basis duidelijk licht geelachtig-behaard, alsook het uiteinde der sprieten iets donkerder is. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Deze soort zou, volgens *Kuwert*, in Holland gevangen zijn, ik weet echter niet waar.

(subviolaceus Muls.) 3. **Mulsantii** Kuw. 1)

Stenelmis Dufour.

*Sprieten 11-ledig, draadvormig. Lichaam lang-gestrekt, met parallele zijden, vlakgedrukt, met kielvormige langs-verhevenheden; kort, fijn-, op de verheven strepen der dekschilden iets langer en dichter behaard. Onderzijde en pooten dichter berijpt. Bovenlip zeer breed. Voorkaken aan het uiteinde twee-tandig. Derde liptaster-lid eivormig. Kop grootendeels in het halsschild verzonken, bijna loodrecht staande. Schildje vrij groot, eivormig. Halsschild met eene diepe middengroef en met twee langsbultjes aan weerszijden; zoo lang als breed, aan voor- en achterrand nagenoeg even breed. Schenen onbewimperd. Tarsen gewoonlijk korter dan de schenen. — De ontwikkeling van de niet in ons gebied voorkomende *S. consobrinus* Dufour werd door *Kirsch* beschreven 2).*

Van de 4 Europeesche soorten zou wellicht ééne in Nederland kunnen worden aange troffen.

Lichaam lang gestrekt, zwart of donkerbruin, eenigszins glanzig. Sprieten roodbruin, pooten bruin. Halsschild met breede middengroef en zijgroeven, welke naar achteren verbreed en

1) Volgens *Kuwert* is *R. subviolaceus* Müll niet synoniem met *subviolaceus* Muls.

2) Ik verzamelde deze soort in groot aantal, met hare larve en pop, langs de Elbe bij Dresden.

naar buiten door eene kielvormige verhevenheid, welke in het midden onderbroken is, begrensd zijn. De zesde tusschenruimte op de dekschilden tot aan het uiteinde, de derde alleen aan de basis scherp kielvormig verheven; in de tweede tusschenruimte met eene afgekorte scutellair-stippelrij. Lengte 4—4½ mm. Niet inlandsch. Bij Dortmund. (*canaliculatus* Gyllh.)

Macronychus Müller. (Fig. 58 II.)

Sprieten 6-ledig, zeer kort, korter dan de kop; de eerste twee leedjes eenigszins dik, rondachtig, de volgende drie klein en smal; het eindlid langwerpig-cirond. Bovenlip breed. Voorkaken met twee-tandigen top. Kaaktasters kort; het eindlid even lang als de twee voorafgaande leedjes te zamen, eenigszins eivormig verdikt. Lichaam langwerpig, op de bovenzijde iets vlak gedrukt. Halsschild langwerpig, iets smaller dan de dekschilden, bultig, van voren over den kop kapvormig geveld. Schildje tamelijk groot, driehoekig. Dekschilden met parallele zijden, aan de basis elk afzonderlijk afgerond; de zijden, alsook de onderzijde van het halsschild met een dicht en fijn overtrekfel, dat bij het gedroogde dier, ten gevolge eener afscheiding, met eene fijne korst bedekt is. Pooten zeer lang; tarsen langer dan de schenen; het klauwlid zeer lang, met buitengewoon groote klauwen. Schenen, aan de binnenzijde, van af het midden tot aan het uiteinde dicht bezwimpeld.

De eenige Europeesche soort, welke ook in de Rijnprovincie zou voorkomen, is wellicht ook in ons gebied aan te treffen.

Lichaam zwart, uiterst weinig metallisch glanzig; soms meer roodbruin. Sprieten roodgeel; de voorrand van het halsschild roodgeel doorschijnend. Onderzijde bruin; de pooten roodbruin, of de dijen rood. Halsschild naar de basis, alsook de van stippelrijen voorziene dekschilden aan de basis, met twee met geelachtige stijve borsteltjes bezette bultjes; ook zijn de verheven tusschenruimten langs den zijrand, en die aan den naad, met stijve, naar achteren gerichte borsteltjes bezet. Lengte 3—3½ mm. In moerassen aan met conferven bezette steenen en aan in het water liggend hout. De wijfjes leggen de eieren in aantal op hoopjes. De larven voeden zich met half verrot hout, dat in het water drijft. De kevers stijgen van tijd tot tijd naar de oppervlakte, met eene luchtbel aan het uiteinde van het lichaam. Volgens *Léon Dufour* heeft het ♂ korte, rudimentaire vleugels. De larve is door *Dufour* en ook met de pup, alsook de levenswijze door *Perez* beschreven.

(*quadrituberculatus* Müll.)

H. Tribus Parnini.

6. Potamophilus Germar.

Sprieten 11-ledig, dicht tegen de oogen ingeplant; het eerste lid gebogen, het tweede eenigszins kogelvormig, niet oortvormig verbreed; de 9 volgende leedjes kort en breed, geleidelijk breder wordend, eene dicht gelede knots vormend; zij kunnen niet in schedelgroeven ingelegd worden. Bovenlip zwak uitgerand, borstelachtig behaard. Voorkaken gebogen, met drie-tandigen top. Tasters kort; kaaktasters viltig behaard, het scheef afgestompt eindlid met een groot, rond tastelak. Lichaam langwerpig, kort behaard. Halsschild zonder verdiepte langslijnen. Prosternum voor de voorcoxae zeer kort, niet tegen den mond schildvormig ontwikkeld. Het metasternum loopt niet tusschen de middelcoxae door.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam gestrekt, zwartachtig; op de bovenzijde zeer lijn, neerliggend geelgrauw-, op de onderzijde meer witachtig behaard. De eerste sprietleedjes geel, dicht behaard. Achterlijf in het midden en aan de zijden rondachtig gevlekt. Pooten rondachtig, de schenen en dijen gewoonlijk gedeeltelijk iets donkerder. Halsschild aan de achterhoeken met eene diepe uitranding, waardoor een tandvormig uitsteeksel ontstaat; de basis aan weerszijden van het schildje, alsmede voor het schildje zelf, duidelijk uitgebogen. Dekschilden van voren, naast de schouders, ingedrukt en aan het uiteinde tandvormig uitgetrokken, met stippellijnen; naast het schildje met eene afgekorte stippelrij; de afwisselende tusschenruimten op de achterhelft iets meer geveld. Lengte 7—8 mm. In rivieren en vaarten aan drijf hout en takken. Eenmaal bij Rotterdam in April. De larve is door *Dufour* beschreven. . . . *acuminatus* F.

7. *Dryops* Olivier.

(Pomatinus St.)

Sprieten op het voorhoofd ingeplant, 9-ledig; het eerste lid dik; het tweede oortvormig verbreed; de 7 volgende, tot eene vrij breede, korte, gezaagde knots vereenigde, in eene voorhoofds-groef inlegbare leedjes, enigszins bedekkend. Bovenlip breed, van voren afgerond en bezwimpd. Voorkaken gebogen, scherp drie-tandig. Kaaktasters met twee tastvlakken aan het uiteinde. Eindlid der kaaktasters scheef afgeknot, dat der lip-tasters eivormig, met afgeknot uiteinde. De buitenste achter-kaaks-lob breed, driehoekig, hoornachtig. Halsschild zonder verdiepte langslijnen. Prosternum tegen den mond schildvormig verbreed. Het metasternum loopt tusschen de middelcoxae door en stoot tegen de breede voortzetting van het prosternum, hetwelk het kleine mesosternum geheel bedekt. Overigens verwant aan *Parnus*.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Lichaam gestrekt, dof zwart, dicht neerliggend geelgrijs behaard; de geheele bovenzijde lijn en dicht bestippeld. Onderzijde alsook de pooten roodachtig. Halsschild aan de basis, aan weerszijden van het schildje, diep uitgebogen. Dekschilden met zeer flauwe langstrepen en iets gewelfde tusschenruimten. De kop is grootendeels in het halsschild teruggetrokken. Deze soort herinnert in voorkomen aan *Parnus prolifericornis*, doch is meer gewelfd. De larve en pop is door *Beling* beschreven. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5½ mm. Langs oevers van rivieren en in beken onder steenen. Bij Houthem en Valkenburg in de Geul; ook bij Leiden en Cuijk. In de Rijnprovincie bij Elberfeld. In België bij Fleurus. 1. *substriatus* Müll.

8. *Parnus* Fabr.

(Dryops Oliv. ex parte).

Sprieten op het voorhoofd ingeplant, 9-ledig; het tweede lid oortvormig verlengd; de volgende leedjes eene spoelvormige knots vormend, welke in eene groef aan de zijden van den kop onder de oogen inlegbaar is. Lichaam langwerpig of elliptisch, dicht behaard. Kop in het halsschild teruggetrokken, op de onderzijde door het prosternum bedekt. Oogen van boven lang en dicht behaard. Halsschild aan weerszijden met eene verdiepte langslijn. Prosternum tusschen de verbrede voorcoxae breed lancetvormig, met een spitsen top in eene uitholling van het mesosternum ingrijpend. Het metasternum reikt tusschen de middelcoxae door en stoot tegen de voortzetting van het prosternum aan, hetwelk het kleine mesosternum geheel bedekt. Achterlijf met 5 sterniten; het eerste met eene spitse voortzetting, tusschen de achtercoxae, in eene sleuf van het metasternum ingrijpend. Coxae matig ver van elkaar afstaande. Klauwelid zeer lang, met groote, krachtige klauwen. — De larve van *P. auriculatus* is door *Beling* en *Nambei* beschreven. De soorten leven in staand en stroomend water, waar zij, in eene luchtbel gehuld, onder steenen en aan stengels van waterplanten uiterst traag rondkruipen.

Van de 20 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden met duidelijke langstrepen of regelmatige stippelrijen 2
- Dekschilden hoogstens met zeer zwak aangeduide strepen, welke niet door grootere stippels zijn gevormd 3
- 2 Dekschilden met grof bestippelde langstrepen, wier stippels diep, groot en tot aan het uiteinde duidelijk zijn. De neerliggende, korte, fijne beharing, alsook de lange opstaande grovere beharing, donkergrijs. Halsschild dicht en sterk bestippeld, de dekschilden in de tusschenruimten eveneens dicht, doch iets fijner bestippeld. Lichaam en pooten zwart, tarsen meer roodachtig bruin. Lengte 5—5½ mm. Niet inlandsch. Deze soort zou in de Rijnprovincie voorkomen (*striatopunctatus* Heer)
- Dekschilden met fijnere langstrepen, wier stippels veel kleiner, zeer ondiep, en veelal alleen van voren en langs de zijden duidelijker zijn. De neerliggende zoowel als de opstaande beharing is meer geelachtig-grijs. Halsschild en dekschilden lijn bestippeld.

Lichaam zwartachtig; pooten bruin, tarsen roodachtig. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm. In stroomend water, aan stengels van *Potamogeton*. Breda en Gilze-Rijen. In de Rijnprov. bij Crefeld.

1. *lutulentus* Er.

- 3 Dekschilden fijn en dicht bestippeld 4
Dekschilden grof en niet dicht-, hier en daar soms in rijen bestippeld, ook wel met fijnere stippels gemengd 6
4 Sprieten aan de basis half zoo ver van elkaar als van de oogen verwijderd. Voorhoofd min of meer kielvormig gewelfd 5

Sprieten aan de basis niet dichter bijeenstaande dan van de oogen verwijderd. Voorhoofd vlak gewelfd. Lichaam zwartbruin, tamelijk gewelfd; de dichte, neerliggende en de afstaande beharing geelbruin. Pooten bruin-, soms roodachtig. Dekschilden veelal met eene flauwe aanduiding van langsstrepen; iets minder lang gestrekt dan bij *prolificornis*, en aan het uiteinde minder spits. Het voorlaatste tarslid ongeveer zoo lang als breed. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Verbreid en niet zeldzaam . . (pilosus St.) 2. *luridus* Er.

- 5 De neerliggende, zijdeachtige, dichte beharing is geelachtig, de afstaande meer witachtig-geel. Lichaam zeer lang gestrekt. Voorhoofd enigszins spits gewelfd. Dekschilden uiterst fijn bestippeld, bij uitzondering met zeer geringe aanduiding van langsstrepen. Kop en halsschild met nauwelijks eenige aanduiding van eene kielvormige middellijn. Lichaam bruinachtig, bij sommige exemplaren de dekschilden roodachtig (*bicolor* Curtis). Dijen meestal, de schenen en tarsen altijd roodachtig. Het voorlaatste tarslid iets langer dan breed. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Verbreid, doch zeldzamer dan *luridus*. In slooten en beken, tusschen drijvende waterplanten en aan rietstengels 3. *prolificornis* F.

De neerliggende beharing veel minder dicht, niet zijdeachtig en evenals de meer ruige, afstaande beharing witachtig-grijs. Lichaam iets korter en minder gewelfd dan bij *prolificornis*. Voorhoofd minder sterk gekield. Dekschilden iets duidelijker bestippeld, soms met uiterst geringe aanduiding van langsstrepen. Lichaam zwartachtig; pooten donker, tarsen roodachtig; soms ook de dijnen min of meer roodbruin. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Bij den Haag; in groot aantal bij Nijkerk, Mei. Ook op Norderney, en in de Rijnprov. langs de Ahr en bij Elberfeld (griseus Er.) 4. *niveus* Heer. 1)

- 6 Lichaam smal en vlak gewelfd, zwart. Halsschild iets smaller dan de dekschilden. De neerliggende, grauwe beharing zeer dicht. Dekschilden meer dan tweemaal zoo lang als breed, sterk bestippeld, hier en daar enigszins in rijen. Sprieten roodachtig of bruin, tamelijk ver van elkaar afstaande. Laatste sterniet in het midden meestal roodachtig. Pooten donker, met roode tarsen; ook de dijnen veelal roodachtig. Lengte 4— $5\frac{1}{2}$ mm. Bij Bunde en Meerssen, Juli; ook eenmaal bij Loosduinen. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf. (viennensis Heer) 5. *obscurus* Dfts.

Lichaam breed, sterk gewelfd; met meer verspreide, neerliggende beharing. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ tot hoogstens tweemaal zoo lang als te zamen breed 7

- 7 Halsschild zoo breed als de dekschilden aan de schouders. De breedste soort van het genus; met lange, zwarte, opgerichte beharing en geelachtige, neerliggende beharing, welke op het schildje lichter en dicht viltig is; vrij krachtig bestippeld. Dekschilden aan de basis met sporen van strepen. Pooten zwartachtig of donkerbruin, de tarsen gewoonlijk roodbruin. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, o. a. onder vochtige bladeren langs slooten (Ernesti Gozis) 6. *auriculatus* Panz.

Naverwant aan *auriculatus* is eene soort, bij welke het schildje nauwelijks lichter, viltig behaard is. Dekschilden achter de basis iets ingesnoerd; aan de basis veel fijner, goudachtig-geel-, veelal onduidelijk neerliggend behaard; de langere haren slechts half zoo lang als bij *auriculatus* en *nitidulus*. Pooten donkerbruin, de tarsen lichter. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Niet inlandsch. Door Dr. O. Schneider op het eiland Borkum ontdekt. Mij onbekend.

(Schneideri Reitt.)

Halsschild een weinig smaller dan de dekschilden aan de schouders. Lichaam iets smaller dan bij *auriculatus*; glanzig zwart, tamelijk grof bestippeld; met fijne, neerliggende, geelachtige beharing; op het halsschild met zwartachtige-, op de dekschilden met geelbruinachtige, langere, opgerichte beharing, waarvan de baartjes enigszins naar achteren gericht zijn. Dekschilden zonder sporen van strepen. Laatste sternieten rood met zwarte zijvlekken. Schenen en tarsen roodachtig, de dijnen gewoonlijk iets donkerder. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Verbreid, doch overal vrij zeldzaam 7. *nitidulus* Heer.

1) Ik vermoed dat de uit Lyland opgegeven *P. hirsutus* Seidl., als soort, niet van *niveus* te onderscheiden is. Een door mij bij den Haag gevangen exemplaar beantwoordt in vele opzichten aan de door Seidlitz gegeven beschrijving van *hirsutus*, doch ik vind geen reden om deze van *niveus* af te scheiden.

XLI. Familie HETERO CERIDAE.

Deze familie, welke slechts uit een enkel genus bestaat, is het naast verwant aan de Parnidae, door den vorm der sprieten en de water-afstootende beharing van het lichaam; doch onderscheiden door de 4-ledige tarsen, de graafpooten en het niet volkomen tegen de dekschilden aansluitend halsschild, welk laatste kenmerk eigen is aan vele gravende kevers, als: *Clivina*, *Dyschirius* en *Bledius*. — Bovenlip hoornachtig, dicht bewimperd, ver vooruitstekend. Voorkaken krachtig ontwikkeld, vooruitstekend, breed, aan weerszijden van de bovenlip, met omgebogen buitenrand;

Fig. 59. Heterocerus (Orig.)

I. Spriet. II. Voorpoot.

naar het uiteinde getand, aan de basis met een geribbeld maalvlak en daarvoor een vrijen, gewoonlijk smallen, van binnen bewimperden huidzoom. Achterkaken tweelobbig. Kaaktasters 4-ledig, kort, draadvormig. Liptasters 3-ledig, draadvormig. Tong smal, lederachtig. Paraglossen onduidelijk. — Sprieten kort, aan de zijden van den kop, onder den zijrand van het voorhoofd, vóór de oogen ingeplant, 10- of 11-ledig; de eerste twee leedjes groot, driehoekig, het derde en vierde klein, de overigen gekamd, en met het afgerond eindlid eene spoelvormige knots vormend (Fig. 59 I.); bij ééne soort begint het knotsvormige gedeelte bij het vierde lid. — Halsschild altijd veel breeder dan lang, met geweldig oppervlak en meer of minder afgeronde achterhoeken. — Schildje klein, meestal langwerpig-driehoekig. Dekschilden met smallen, omgeslagen zijrand, de naadhoeken in eene gemeenschappelijke punt uitgetrokken; hoogstens met eene flauwe aanduiding van verdiepte langlijnen. — De vleugels van *Heterocerus* wijken, volgens *J. Redtenbacher*, door de gereduceerde nervatuur van die der *Hydrophilidae* af. De vena cubitalis is slechts door eene korte streep aangeduid; de vena interno-media is gewoon en door eene dwarsader met de vena externo-media verbonden. De vena analis is van af den wortel gesplitst en door eene schuine dwarsader met de vena interno-media verbonden. — Prosternum eenigszins naar voren ontwikkeld, zoodat de onderzijde van den kop voor een deel bedekt is; naar achteren vertoont het een klein uitsteeksel, dat in eene uitholling van het mesosternum grijpt. Achterlijf met 5 sterniten, van welke de 4 eersten onbewegelijk zijn; het eerste sterniet aan weerszijden met eene gebogen dijlijn, waarachter het veelal uitgehold is om de dijen meer vrij te kunnen bewegen. Ook bevindt zich aan de binnenzijde der achterdijen eene fijne langsrib, welke over de soms bij het ♂ 1) fijn gekerfde dijlijn gestreken wordt en, naar het schijnt, daardoor een zacht geluid zou veroorzaken. — Pooten vrij kort, tot graven ingericht; alle schenen, doch vooral die der voorpooten, bijzonder sterk verbreed en gedoord (Fig. 59 II). Voorcoxae cilindervormig, middelcoxae kogelvormig, achtercoxae half-cylindervormig. Tarsen dun, 4-ledig. — De beharing van het lichaam is zijdenachtig of meer wollig, hetzij gelijkmatig, of wel uit korte neerliggende en langere afstaande haartjes samengesteld. — Bij het ♂ is gewoonlijk de kop grooter en steekt de mond meer uit.

1. *Heterocerus* Fabr.

Bij nagenoeg alle soorten van dit genus zijn de dekschilden geel gevlekt, welke teekening, ofschoon zeer veranderlijk, toch, ten gevolge van hare standvastige grondtype, voor de onderscheiding der soorten dienstig is. — De larven zijn cilindervormig, met breeden, vlak gedrukten prothoracaal-ring en met uitstekenden kop. De huid is lederachtig, fijn en dicht behaard en bovendien met enkele afstaande haren bezet. Kop rond, aan weerszijden met 5 ocellen. Sprieten slechts door eene wratachtige verhevenheid, dicht achter de implanting der voorkaken, aangeduid. Achterlijf met 9 sterniten, de vleezige anus is uitstulpbaar en schuift na; met 9 paar stigmata. Pooten met één vrij langen, krachtigen, iets gebogen klauw. — De soorten van dit genus leven, meestal in aantal bijeen, op vochtige oevers, waar zij gangen graven, die door ritten of kleine aard of zandhoopjes gemakkelijk te herkennen zijn. Eenige soorten leven op zandgrond, anderen meer op klei of op ziltigen bodem. Bij fellen zonnenschijn vliegen zij rond; ook zwermen zij vooral op warme avonden. Men verzamelt ze gemakkelijk door heen- en weertrappen op den bodem, of wel den grond flink met

1) Dat vooral bij het ♂ van II fossor de gebogen dijlijn zou gekorven zijn, is mij niet gebleken.

water te besproeien, zoodat dit aftloeit en de dieren uit hunne gangen te voorschijn komen; ook kan men klei of zand in een emmer water uitspoelen. — De larve van *H. marginatus* is door Westwood, die van *laevigatus*, benevens de pop, door Letzner beschreven.

Van de $\pm$ 50 Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 4 in het aangrenzende gebied voor.

- 1 Het derde sprietlid klein, het vierde met de volgende leedjes eene langwerpige knots vormend (Sub-gen. *Phyrites* Schiödte). Geheel zwart, kort en vrij dicht goudgeel glanzig behaard, vooral op den kop. Dekschilden zonder lichtere vlekken. Schenen en monddeelen roodbruin. Bij het ♂ is het sterk gewelfde halsschild breeder dan de dekschilden en van achteren tamelijk afgerond; bij het ♀ de achterhoeken recht en gerand. De voorkaken bij het ♂ zijn, op de helft van den buitenrand, van een naar voren gericht, krachtigen tand voorzien. De dijlijnen op het eerste sterniet loopen halfcirkelvormig tot aan de dijbasis door. Lengte, volgens *Schiödte*, $3\frac{1}{2}$ —4 mm.; volgens *Kuwert*, $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Mij onbekend. Deze in Denemarken en Holstein voorkomende soort zou, volgens *Kuwert*, ook in Holland gevangen zijn 1. *aureolus* Schiödte.
- Het derde en vierde sprietlid klein, de volgende leedjes eene langwerpige knots vormend. 2
- 2 Halsschild aan de achterhoeken niet gerand (Sub-gen. *Heterocerus* isp.). De dijlijn op het eerste sterniet loopt niet tot aan de dijbasis door, doch eindigt als een kwartcirkel aan het uiteinde van het sterniet 3
- Halsschild aan de achterhoeken gerand (Sub-gen. *Taen heterocerus* Kuw.) 5
- 3 Dekschilden slechts met uiterst korte, afstaande, gelijkmatige, als geschoren beharing. 4
- Dekschilden, behalve de korte, witachtige, afstaande, dichte beharing, bovendien met langere opstaande haren bezet. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, niet zeer dicht, grof en fijn dooreen bestippeld; zwart of zwartbruin, meestal met eene vlek aan de basis en eenige bandvormige vlekken over de oppervlakte rood- of bruingeel; zeldzamer is de geheele basaal- en zijrand geel, of breidt zich het geel over het grootste gedeelte der dekschilden uit; ook zijn de zwarte dekschilden soms geheel of nagenoeg geheel ongevekt. Pooten meestal grootendeels zwartachtig, gewoonlijk alleen de voordijen roodbruin gevlekt; tarsen rood. Voorhoeken van het halsschild meestal roodachtig. Achterlijf aan de zijden gewoonlijk rood gevlekt of gerand. Voorschenen met lange krachtige doornen. Bij het ♂ zijn de voorkaken aan den buitenrand, vóór het midden, van een naar voren gericht tand voorzien. Lengte 4— $4\frac{1}{2}$ mm. Vooral langs brak water, op enkele plaatsen langs de kust, niet zeldzaam; zij zou ook bij Zutphen gevangen zijn. (femoralis Kiesw. pars) 2. *flexuosus* Steph.
- 4 Halsschild tweemaal zoo breed als lang. Dekschilden dubbel zoo lang als breed, gelijkmatig fijn en dicht bestippeld. Donkerbruin; het halsschild aan de zijden min of meer geel gerand; de dekschilden met geelachtigen zijrand en met eenige geelachtige langsvlekken, die zich soms zoodanig uitbreiden, dat de dekschilden ten laatste nagenoeg geheel geelachtig zijn. Pooten geheel geel. Sterniten meer of minder duidelijk geel gevlekt. Bij het ♂ vertoonen de voorkaken slechts een kleinen zijrand, welke echter bij de var. *maxillosus* Motsch. 1) zeer krachtig ontwikkeld en aan het uiteinde lepelvormig uitgehold, zijwaarts voor de oogen over het voorhoofd gericht is. Lengte 6—7 mm. Niet inlandsch. In Duitschland en Frankrijk op ziltige gronden (parallelus Kiesw. pars, Kry.) (salinus Kiesw.)
- Halsschild $2\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, grof en fijn dooreen bestippeld. Donkerbruin; het halsschild gewoonlijk alleen aan de voorhoeken een weinig roodgeel. Dekschilden dicht en kort behaard; de zijrand, eene basaalvlek en eenige gele vlekken, welke zich soms meer uitbreiden, geel. Dijen donker, de schenen rood-geelachtig, soms de voorschenen donkerder, of wel de voordijen gedeeltelijk roodgeel. Bij het ♂ zijn de voorkaken lang en krachtig ontwikkeld, in het midden aan den buitenrand met een vrij grooten, opgericht, lepelvormig uitgeholden tand. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam op zeelei. Bij Bergen-op-Zoom langs de Schelde in Juni en Juli; ook in Zeeland 3. *fossor* Kiesw.
- 5 Lichaam eenkleurig zwartbruin, de dekschilden aan den zijrand soms met de aanduiding van roode randvlekken. De dicht staande lange beharing, vooral op het halsschild, nog met eenige zeer lange haren doormengd. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, zeer grof bestippeld en geelgrijs vlekkelig behaard, welke vlekjes in hunne plaatsing herinneren aan de roode vlekjes bij andere soorten. Pooten donker, tarsen rood. De dijlijn op het eerste sterniet loopt als een halve cirkel van af de basis

1) De var. *murillosus* Motsch. komt in Zuid-Rusland voor.

- terug naar de dijbasis. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Deze zeer kenbare, in Stiermarken en bij Frankfort a.d.M. voorkomende soort werd eenmaal door den heer *Persluys* bij Houthem langs de Geul gevangen. 5. **crinitus** Kiesw.
- Lichaam tweekleurig, donker met gele of roode vlekjes of banden op de fijn bestippelde dekschilden. 6
- 6 Dekschilden donker gekleurd, met lichte teekening. 7
- Dekschilden geelachtig, langs den naad elk met drie achter elkaar liggende, zwartachtige vlekken, welke zich soms meer uitbreiden, doch den zijrand niet bereiken. Halsschild met eene roodachtige middellijn, welke bij donkerder exemplaren min of meer verdwijnt. De bovenzijde van het lichaam is fijner bestippeld dan bij de aanverwante *sericans* en *burchanensis*, en dicht geel, als geschoren, kort behaard. Pooten geelachtig. Dijlijn geheel ontwikkeld. Lengte $2\frac{1}{2}$ — 3 mm. Niet inlandsch. Zij zou bij Norden en op Norderney voorkomen. (*minutus* Kiesw.)
- 7 Dekschilden zonder licht gekleurde, voor elkaar liggende, kleinere dubbelvlekken over het midden. 8
- Dekschilden met voor elkaar liggende dubbelvlekken over het midden, welke meestal langwerpig zijn, veelal samenvloeiende en binnen de zijvlekken of zijbanden gelegen zijn; de eerste dubbelvlekken vloeien soms met de schoudervlek samen, waardoor alsdan elk dekschild drie gele of roode vlekken, of afgekorte vlekbanden vertoont, welke den naad niet bereiken. 12
- 8 De onder den schouderhoek gelegen geelroode of roode vlek buigt zich van achteren halve-
maanvormig of haakvormig om den schouderhoek heen. Achterhoeken van het halsschild
duidelijk en scherp gerand. Lichaam zwart, grijs behaard; dekschilden tamelijk fijn, dicht
en iets onregelmatig bestippeld; behalve de gele schoudervlek nog met een gelen Z-vormigen
dwarsband achter het midden, eene kleine vlek voor het midden, eene topvlek en eene daar-
mede samenhangende randvlek aan het uiteinde. Dekschilden slechts langs het schildje met
eenige aanduiding van langsstrepen. Pooten donker. De dijlijn op het eerste sterniet slechts
een kwart-cirkel. Lengte $3\frac{1}{2}$ — 4 mm. Verbreid en niet zeldzaam, langs oevers in klei,
aarde of zand. 4. **marginatus** F.
- De onder den schouderhoek gelegen geelroode vlek buigt zich niet haakvormig om. De
dijlijn op het eerste sterniet loopt als een halve cirkel, van af de basis terug naar
de dijbasis. 9
- 9 Halsschild geheel zwart, hoogstens aan de voorhoeken een weinig rood, of aan de basis
met een geel vlekje. 10
- Halsschild met roodachtige, meer of minder uitvloeiende middellijn. 11
- 10 Dekschilden met korte, bijna neerliggende, grauwege, of eenigszins goudglanzige haartjes, en
vrij lange, iets naar achteren gekromde, opgerichte, stijve, witachtige borstelhaartjes, dicht
bezet. Halsschild eveneens met enkele lange haartjes tusschen de dichte, neerliggende beharing;
niet scherp aangeduide, rechte achterhoeken. Lichaam pekbruin; dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo
lang als breed, met aanduiding van langsstrepen, en met breede, roode dwarsbanden, van
welke de eerste soms onderbroken is; vrij sterk en zeer dicht bestippeld. Pooten donker. De
laatste sterniten aan de zijden rood gevlekt. Bij ab.c. **unicolor* Dufour zijn de dekschilden
geheel zwart. Lengte $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. Vrij gemeen langs duin- en heideplassen. 6. **hispidulus** Kiesw.
- Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als breed, met kortere, meer opstaande, iets wollige, meer
bruinachtige beharing, en niet veel langere, niet dicht staande, naar achteren gebogen borstel-
haartjes. Halsschild eveneens met enkele langere haartjes bezet. Lichaam iets meer gewelfd en
smaller dan bij *hispidulus*, met smallere, geelroode teekening der dekschilden. Halsschild
aan de basis gewoonlijk met een geel vlekje en met eenige aanduiding van eene langskiel;
aan weerszijden van de basis iets ingedrukt. Pooten geheel of gedeeltelijk geel. Dekschilden
tamelijk fijn bestippeld. Deze soort gelijkt veel op *marginatus*, doch de schoudervlek is
niet haakvormige omgebogen. Lengte 3 — $3\frac{1}{4}$ mm. Niet inlandsch. In Westfalen en bij Harburg.
(*intermedius* Kiesw.) 1)
- Lichaam roodachtig-donkerbruin, met niet scherp begrensden, gelen zijrand en gele vlekken, van
welke de beide laatste op elk dekschild, vóór het uiteinde, eene groote C vormen; geel-
achtig behaard en niet zeer fijn bestippeld. Kop zwart. Halsschild donkerder dan de dek-
schilden, langs de zijden en over de middellijn iets roodachtig. Pooten roodgeel. Deze soort,
welke veel gelijkt op *minutus*, is naar verhouding langer en smaller. Lengte $2\frac{1}{2}$ mm.
Niet inlandsch. Zij zou in Denemarken en in de Rijnprov. bij Bonn gevangen zijn. Mij onbekend.
(*sericans* Kiesw.)

1) Exemplaren uit Ruurlo waren verkeerd gedetermineerd.

Lichaam zwart of zwartbruin, het halsschild veelal iets lichter dan de dekschilden; zelden de geheele bovenzijde roodbruin; dicht, kort en half opstaande, geelachtig behaard. Halsschild meer of minder, doch altijd duidelijk breeder dan de dekschilden; met duidelijke, roode middellijn en niet scherp begrensde, roode zijden. Dekschilden 1½ maal zoo lang als breed, vrij dicht en lijn bestippeld; meestal duidelijk rood geteekend; n.l. een iets gebogen band, welke van den schouderrand scheef tot den naad verloopt; eene scheef staande, naar het uiteinde der dekschilden geopende half-cirkelvormige vlek, benevens eene langwerpige-ronde vlek naast het achtergedeelte van den naad; ook is de achterrand rood gezoomd; zelden is de voorste band met den middelsten aan den naad enigszins verbonden. Het achterlijf aan het uiteinde en de sterniten langs de zijranden veelal duidelijk roodachtig. Pooten roodachtig. Dijlijn geheel ontwikkeld. Clypeus bij het ♂ aan de voorzijde met zwak aangeduide bultjes. Lengte 2½–3½ mm. Door *Dr. O. Schneider* op het Noordzeeland Borkum ontdekt, waar zij niet zeldzaam is in het slijk langs brakwatersloten. Ook door den heer *K. Kemper*, in een enkel ♂ exemplaar, op Texel aangetroffen.

7. *burchauensis* O. Schneid.

- 12 Bovenzijde met vrij lange, enigszins ongelijke, opstaande, zwartgrauwe beharing, en vrij ondichte, grove bestippling. Dekschilden aan de basis, naast het schildje, met een klein rood vlekje, dat veelal ontbreekt; de overige van elkaar gescheiden vlekjes zijn soms onduidelijk, en kunnen bij uitzondering ontbreken. Lichaam en pooten zwart, tarsen meer roodbruin. Sterniten aan de zijden meer of minder rood gevlekt; het eerste sterniet altijd tot aan de dijlijn roodgeel. Voorkaken bij het ♂ met een tand aan den bovenrand. Lengte 4–5½ mm. Vrij zeldzaam op zeeklei; Amsterdam, Kolhorn, Zierikzee en Nijkerk; in aantal op Texel; ook bij Scheveningen aangespoeld 8. *obsoletus* Curtis.

Bovenzijde zeer kort, opstaande behaard, als geschoren. Dekschilden naast het schildje met eene langwerpige, veelal tot aan het midden reikende gele vlek; de overige vlekjes hangen meer of minder samen. Pooten geheel of gedeeltelijk geel 13

- 13 Pooten zwartachtig of met grootendeels gele dijen; tarsen meer of minder roodachtig; bij onafgekleurde exemplaren zijn de pooten geheel geel. Dekschilden nagenoeg zonder enige aanduiding van langsstrepen, met gele of roodgele vlekjes, welke zich meer of minder uitbreiden en onderling samenhangen; voorhoeken van het halsschild geel. Achterlijf breed roodgeel gezoomd. Clypeus en voorkaken in beide seksen gewoon. Lengte 3–3½ mm. Verspreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam 9. *fusculus* Kiesw.

Pooten geel, alleen de knieën iets donkerder. Dekschilden met eenige aanduiding van verdiepte langsstrepen, achter den schouderhoek veelal enigszins scheef ingedrukt; met langwerpige geelachtige vlekjes, welke hier en daar samenhangen. Achterlijf eveneens breed geel gezoomd, bij zeer lichte exemplaren geheel geel; ook zijn de zijranden van het halsschild geel. Bij het ♂ is de clypeus aan den voorrand van twee spitse doornjes voorzien, en vertoonen de voorkaken aan den bovenrand een tand. Lengte 3½–4½ mm. Verspreid langs rivieroeveren op klei en slib (*fenestratus* Thunb.) 10. *laevigatus* Panz.

XLII. Familie HYDROPHILIDAE. (Fig. 60.)

(Palpicornia).

De Hydrophilidae 1) onderscheiden zich door hunne meestal buitengewoon ontwikkelde 4-ledige kaaktasters, welke verschillend gevormd kunnen zijn en even lang, of langer zijn dan de betreffende korte sprieten. Oogen al of niet uitpuilend. Sprieten onder den zijrand van den clypeus ingeplant, 7-, 8- of 9-ledig, bij uitzondering (*Spercheini*) 6-ledig (Fig. 61); het eerste lid is lang, terwijl de 3, 4 of 5 laatste leedjes eene behaarde knots vormen; zij reiken zelden tot aan de basis van het halsschild en kunnen meestal in eene groef onder den zijrand van den kop, zeldzamer in eene groef van den omgeslagen zijrand van het halsschild (*Ochthebius*) ingelegd worden. — Achterkaken met twee behaarde of bewimperde lobben, welke, hetzij beiden lederachtig of vliezig zijn, of wel de buitenste lob is hoornachtig en de binnenste lederachtig (*Spercheini*). Kin groot. Tong zeer breed, weinig uitstekend; lipstasters 3-ledig. — Lichaam rondachtig, ovaal, cirroïd, elliptisch, meer of minder gewelfd, zeldzamer langgestrekt; bij uitzondering met kogelvermogen (*Chaetarthria*). — Het sternum is in vele gevallen, hetzij geheel of gedeeltelijk gekield en biedt in dit opzicht belangrijke kenmerken aan voor de systematiek; prosternum vóór de voorcoxae duidelijk ontwikkeld, doch kort; bij de Hydrophilini eindigt de kiel van het metasternum in een scherp en doorn of stekel tusschen de achtercoxae en is de kiel van het meso- en metasternum samengegroeid. — Het achterlijf bestaat uit 5 tot 7 sterniten. — De dekschilden omsluiten in den regel het geheele achterlijf, bij uitzondering zijn zij meer of minder afgeknot (*Limnobiini*). — Voorcoxae dikwerf kegelvormig uitstekend; achtercoxae

1) *Snellen van Vollenhoven* noemt ze „Vochlortorren.“

verbreed, bij uitzondering elkaar niet aanrakende. Achterpooten al of niet tot zwemmen ingericht; in het eerste geval de middel- en achtertarsen van zwembaren voorzien; zeldzamer zijn de schenen tot graven geschikt en met krachtige, veel minder met fijne doornen bezet (*Sphaeridiinae*). Tarsen altijd 5-ledig, doch verschillend gevormd; bij de *Hydrophilinae* is het eerste tarslid weinig zichtbaar. — Onderzijde van het lichaam bij de waterbewoners geheel of gedeeltelijk met een waterafstootend viltkleed bedekt. — De soorten zijn voor het meerendeel trage dieren, welke in slooten, poelen, in of langs het water, in slib of onder steenen, in vochtige aarde of in mest leven; slechts weinigen kunnen goed zwemmen; de meeste in het water levende soorten kruipen tusschen ondergedoken waterplanten, en leven alsdan van roof; de meeste kleinere soorten daarentegen voeden zich met plantenstoffen of mest. — De larven (zie bij *Hydrophilus piceus*) bezitten alleen borspooten, geen afzonderlijk klawlid en slechts een enkelen klaww. De voorkaken zijn aan de binnenzijde getand. Bij de larven van *Philhydrus* bevinden zich bovendien korte buikpooten aan den derden tot zevenden achterlijfsring. De larven van *Hydrocharis*, *Enoplurus* en *Berosus* vertoonen goed ontwikkelde, buisvormige tracheënkieuwen aan de zijden van het lichaam. Bovendien bevinden zich, evenals bij de overige in het water levende *Hydrophilidae*, twee stigmata aan het uiteinde van het achterlijf, welke alleen dan functioneeren, wanneer zij, evenals de larven der *Dytiscidae*, het uiteinde van het achterlijf boven water houden en zodoende de lucht rechtstreeks opnemen. Alle *Hydrophiliden*-larven vertoonen 6 ocellen. De larven der *Sphaeridiinae* hebben geen pooten. —

Fig. 60. *Hydrophilus piceus* L. ♂
Onderzijde (Orig.)

Fig. 61. Spiet van *Sphaerichneumon marginatus* Schall. (Orig.)

Deze familie vertoont de grootste natuurlijke verwantschap met de *Heteroceridae*, *Parnidae* en *Georyssidae*, en vormt met deze de onder-orde der *Hygrophili*, die den samenhang vormt tusschen de Sub-orde der *Caraboidea* (*Gyrinidae*) en die der *Lamellicornia* (*Lucanidae* en *Scarabaeidae*). De Sub-fam. der *Sphaeridiinae* vertoont groote verwantschap met *Aphodius*, doch ook eenigszins met de *Histeridae*. Ook hebben de *Hydrophilidae* kenmerken gemeen met de *Clavicornia*. De schijnbaar groote verwantschap van de *Hydrophilinae* met de *Dytiscidae* is meer gelegen in den voor het water aangepasten vorm, dan in den anatomischen bouw. — De vleugel van *Hydrophilus piceus* (Fig. 62) gelijkt volgens *Roger* in vorm op dien van *Dytiscus*; de aders zijn echter niet zoo scherp aangeduid als bij dezen; slechts de vereenigde drie buitenste aders en de vena externo-media zijn donkerder. Het gewricht bevindt zich op het laatste derde gedeelte van den vlengel. De vena externo-media is zeer flauw gebogen. In de area externo-media is de binnenste ruit groot, de achterste onduidelijk, de voorste tamelijk groot. Intusschen is de binnenste ruit, wat vorm aangaat, zeer van die der *Caraboidea* onderscheiden, aangezien zij niet zooals daar met een hoek naar de vleugelpunt gericht is, uit welke eene teruglopende ader tot deze gaat; bij *Hydrophilus* daarentegen is zij door

Fig. 62. Vleugel van *Hydrophilus piceus* L. (Orig. K. Kemper del.)

eene rechte zijde, welke nagenoeg loodrecht op de hoofdadere gericht is, begrensd; hare achterste begrenzing is echter onduidelijk en uitgewischt. Van uit de voorste ruit ontspringt een korte, naar achteren gerichte tak, welke als rudiment van de vena scapularis bij den *Dytiscus*-vleugel kan beschouwd worden. Een tweede teruglopende tak, welke overeenstemt met dien tak bij de *Caraboidea*-vleugels, welke de basaalhelft der area externo-media middendoor deelt, ontspringt uit den binnenhoek der binnenste ruit en is door eene gebogen dwarsverbinding (welker verdubbeling het „oblongum” bij de *Caraboidea*-vleugels vormt) met het uiteinde van het basaalgedeelte der vena externo-media verbonden, welks zeer kort topgedeelte van hier uit nagenoeg rechthoekig op den achterrand van den vleugel zich afbuigt. In het topgedeelte der area externo-media bevinden zich geen duidelijke aders, doch slechts eenige zeer flauw gepigmenteerde vegen. De vena interno-media is veel minder duidelijk dan bij de *Caraboidea*, en onderscheidt zich doordat de aldaar met twee wortels uit de vena interno-media ontspringende bijader, hier daarentegen met een dikken stam aan de basis ontspringt en aldus tot hoofdader wordt; hierdoor is ook de vorming der lis in de area interno-media, alsook het wigvormige vakje in 't oog vallend gewijzigd. De vena interno-media en hare anale bijader ontspringen naast elkaar aan de basis en loopen dan, een weinig gebogen, evenwijdig tot den achterrand; in het eerste vierde gedeelte van haar beloop geven zij elk een zijtak af, welke zich met die der andere ader, onder een scherp hoek, tot eenen enkelen tak vereenigt, welke nabij den achterrand van den vleugel weder in de bijader uitloopt en daarmede aldus het wigvormige vakje vormt, hetwelk hier zeer groot en meer of minder elliptisch is; van af het midden ongeveer van dit vakje loopt tot aan de vena externo-media eene dwarsverbinding, en uit dit zelfde punt gaat eene sterk gebogen bijader tot den achterrand, waaraan eene tweede dergelijke, dichter nabij het uiteinde van het wigvormige vakje evenwijdig loopt. De vena analis ontspringt met twee takken en is aan het uiteinde slechts even omgebogen, zonder de eigenaardige lis te vormen. Aan dezen vleugelbouw sluiten die der overige *Hydrophilidae* zich aan, echter veelal met meerdere afwijkingen. Volgens *J. Redtenbacher* zijn de *Hydrophilidae* door de nervatuur der vleugels, zoowel van de *Caraboidea* als van de *Staphylinodea* te onderscheiden. De vleugels der *Helophorinae* wijken in 't oogvallend af van die der overige *Hydrophilidae*.

Overzicht der Sub-Familiën en Tribus.

- 1 Klauwlied der achtertarsen veel korter dan de 3 voorafgaande leedjes te zamen. Halsschild aan de basis breder dan aan den voorrand, nimmer met groeven, indrukken of oneffenheden. Lichaam ovaal, eirond, of elliptisch, gewelfd. 2
- Klauwlied der achtertarsen iets langer, nagenoeg even lang, of hoogstens iets korter dan de 3 voorafgaande leedjes te zamen. Halsschild aan de basis in den regel smaller dan, zelden zoo breed als aan den voorrand; nagenoeg altijd met dwars- of langsgroeven, indrukken of verhevenheden. De kevers leven steeds in het water, doch worden ook veelal in de nabijheid van water, langs oevers, in aanspoelsel, op slib, in mos enz., aangetroffen. Larven met pooten. III. Sub-Fam. *HELOPHORINAE*. 3
- 2 Eerste tarslid kort, of zeer kort, nooit langer dan het tweede; van boven gezien gewoonlijk onzichtbaar. De kevers leven uitsluitend in water. Larven met pooten. I. Sub-Fam. *HYDROPHILINAE*. 3
- Eerste lid der achter- en middeltarsen altijd verlengd, veel langer dan het tweede. Middel- en achterschenen steeds zonder zwembaren. Tweede tasterlid verdikt of ovaal. Sprieten 8-9 ledig. Lichaam gewelfd, kort-ovaal of rondachtig. Halsschild aan den achterrand zoo breed als de dekschilden. De kevers in mest, modder, boomhol, tuinaarde of in paddestoelen. Larven pootloos. II. Sub-Fam. *SPHAERIDIINAE*. 7
- 3 De kiel van het meso- en metasternum zijn samengegroeid. De kiel van het metasternum steekt meestal als een scherpe doorn of stekel voorbij de achtercoxae uit, die van het mesosternum steekt meestal tussehen of voorbij de voorcoxae uit (Fig. 60). Middel- en achtertarsen samengedrukt. Sprieten 9-ledig. I. *Hydrophilini*.
- De kiel van het meso- en metasternum blijven gescheiden. De kiel van het mesosternum ontbreekt geheel, of reikt hoogstens tot aan het midden tussehen de voorcoxae. Metasternum bij uitzondering gekield. 4
- 4 Oogen weinig gewelfd, niet uitpuilend, zoodat zij door den rand van het halsschild meer of minder kunnen bedekt worden. 5
- Oogen sterk uitpuilend, half kogelvormig; zij kunnen niet door het halsschild gedekt worden. Sprieten 7-ledig. V. *Berosini*.
- 5 De eerste twee sterniten niet door eene schubachtige plaat bedekt. Kever zonder kogelvermogen. Tarsen zeer lang, nagenoeg even lang als, of niet veel korter dan de schenen. 6

- De eerste twee sterniten door twee breede, schubachtige platen bedekt, welke goudglanzig zijdeachtig behaard zijn. Sprietten 9-ledig, met 3-ledige knots. Kever met kogelvermogen. Tarsen ongeveer half zoo lang als de schenen IV. **Chaetarthriini**.
- 6 Achterlijf met 5 sterniten II. **Hydrobiini**.
 Achterlijf met 6—7 sterniten. Dekschilden naar het uiteinde versmald, meer of minder afgeknot; bijna altijd zonder naadstreep III. **Limnebiini**.
- 7 Metasternum niet vingervormig tusschen de middelcoxae uitgetrokken, hoogstens hoekig, of van voren breed afgesneden. Schenen samengedrukt, naar het uiteinde meer of minder driehoekig verbreed, vrij sterk gedoord. Sprietten 8—9 ledig VI. **Sphaeridiini**.
 Metasternum vingervormig tusschen de middelcoxae uitgetrokken. Schenen samengedrukt, naar het uiteinde weinig verbreed, kort gedoord. Sprietten 9-ledig. Kin aan de voorzijde diep uitgehold. VII. **Coelostomini**.
- 8 De bovenlip door den ver uitstekenden, van voren diep uitgeranden clypeus bedekt. Lichaam kort-eirond. Sprietten 6-ledig (Fig. 61) VIII. **Spercheini**.
 De bovenlip niet door den clypeus bedekt. Lichaam meer of minder langwerpig-ovaal of langgestrekt, niet sterk geweldig. 9
- 9 Achterlijf met 5 sterniten. Sprietten 7- of 9-ledig, sprietknots 3-ledig . . . IX. **Helophorini**.
 Achterlijf met 6 of 7 sterniten. Sprietten 9-ledig, sprietknots 5-ledig . . . X. **Hydraenini**.

I. Sub-Familie HYDROPHILINAE.

I. Tribus HYDROPHILINI.

- De stekel van het metasternum reikt ver voorbij de achtercoxae. Het verheven midden-gedeelte van het prosternum is diep sleufvormig uitgehold (Fig. 60). Voorkaken aan den binnenrand getand 1. **Hydrophilus**.
- De stekel van het metasternum is kort en reikt niet voorbij de achtercoxae. Prosternum in het midden scherp kielvormig verheven, doch niet uitgehold. Voorkaken aan den binnenrand bewimperd. 2. **Hydrocharis**.

II. Tribus HYDROBIINI.

- 1 Metasternum slechts van voren gekield. Prosternum over het midden gekield. Mesosternum in het midden als eene verticale plaat opgericht 3. **Limnoxenus**.
 Metasternum gewoon, niet gekield. Prosternum meestal gewoon, zelden gekield. Mesosternaal-kiel van voren of in het midden tandvormig opgericht; zelden is het mesosternum slechts bultig opgericht. 2
- 2 Trochanters onmiddellijk tegen de dijen aangedrukt. Achterschenen niet gebogen. Sprietten 9-ledig. 3
 Trochanters der achterpooten iets van de dijen afstaande, met vrij uitstekenden top. Achterschenen gebogen. Sprietten 8-ledig. Dekschilden zonder naadstreep 11. **Laccobius**.
- 3 Clypeus aan den voorrand breed afgesneden, hoogstens iets over de bovenlip flauw uitgebogen. Laatste kaaktaster-lid langer dan het derde. Dekschilden met regelmatige, verdiepte langstrepen. Halsschild aan de zijden lijn gerand 4. **Hydrobius**.
 Clypeus aan den voorrand meer of minder uitgerand of uitgebogen. 4
- 4 Kaaktasters aanmerkelijk langer dan de sprietten; het tweede lid het langst. Laatste kaaktaster-lid korter dan het voorlaatste 5
 Kaaktasters ongeveer even lang als, of korter dan de sprietten 7
- 5 Mesosternum niet als eene loodrechte, scherp-kielvormige plaat opgericht, doch als eene trapezoidale bultige verhevenheid. Vijfde sterniet aan het uiteinde, in het midden, met eene zeer kleine, ronde uitranding. Kinplaat in het midden gewoonlijk ingedrukt, krachtig en dicht bestippeld. Het tweede tasterlid iets langer dan het derde. Zonder verdiepte naadstreep op de dekschilden. 5. **Helochares**.
 Mesosternum tusschen de middelcoxae tot eene scherp kielvormige plaat opgericht. Dekschilden met eene verdiepte naadstreep. Vijfde sterniet zonder de zeer kleine, ronde uitranding aan het uiteinde 6

- 6 De mesosternale verhevenheid over de geheele lengte kielvormig opgericht. Basis van het halsschild lijn gerand. 6. **Philhydrus**.
 De mesosternale verhevenheid als eene scherp-kegelvormige punt, die naar achteren, breed neergedrukt, afvalt. Basis van het halsschild niet gerand. 7. **Cymbiodyta**.
 7 Laatste kaaktaster-lid even lang als het voorlaatste 8. **Enochrus**.
 Laatste lid der korte, meestal vrij dikke kaaktasters langer dan het voorlaatste lid 8
 8 Achterdijen niet viltig behaard, glad. Prosternum gekield. Bovenzijde bronskleurig. Halsschild aan de basis niet gerand 9. **Paraeymus**.
 Achterdijen, evenals de voor- en middeldijen, grootendeels viltig behaard. Prosternum ongekield. Halsschild aan de basis zwak gerand. Bovenzijde sterk glanzig, doch niet of slechts onduidelijk bronskleurig 10. **Anacaena**.

III. Tribus LIMNEBIINI.

Bevat slechts het genus 12. **Limnebius**.

IV. Tribus CHAETARTHRIINI.

Bevat slechts het genus 13. **Chaetarthria**.

V. Tribus Berosini.

De dijen tot ver over het midden viltig. De 6 sterniten zijn in den regel duidelijk zichtbaar. Lichaam langer gestrekt en minder hoog gewelfd dan bij *Berosus*. Het groote mesosternum met eene lijne, scherpe, doch niet hooge kiel in het midden voor de middelcoxae. Dekschilden aan het uiteinde met twee doornjes, van welke dat aan den naad soms bijna geheel ontbreken kan 14. **Enoplurus**.

De dijen ongeveer tot aan het midden, of slechts aan de basis viltig. Het zesde sterniet is meestal verborgen. Dekschilden aan het uiteinde niet gedoord. Lichaam hoog gewelfd. Het mesosternum voor de middelcoxae hoog kielvormig opgericht, bij uitzondering stomphoekig en niet hoog opgericht 15. **Berosus**.

II. Sub-Familie SPHAERIDIINAE.

VI. Tribus SPHAERIDIINI.

- 1 Sprieten 9-ledig. Oogen niet, of nagenoeg niet door eene zijlijst van den clypeus doorsneden. 2
 Sprieten 8-ledig. Oogen door eene zijlijst van den clypeus duidelijk doorsneden. Mesosternum in het midden tot eene loodrechte, naar voren afvallende, lijst of plaat opgericht. Lichaam meer of minder half-kogelvormig. Schildje zeer langwerpig, tweemaal zoo lang als breed. 19. **Sphaeridium**.

- 2 Mesosternale plaat bijna lijnvormig, elliptisch of ovaal. Prosternum driehoekig, tussehen de voorcoxae uitgetrokken. Middelcoxae niet ver van elkaar staande. De zijden van achterlijf en metasternum dof, het midden glanziger. Prosternum en eerste sterniet altijd gekield. 16. **Cereyon**.

Mesosternale plaat ongeveer zoo breed als, of breeder dan lang. Prosternale plaat meer of minder vijfhoekig. Middelcoxae ver van elkaar afstaande. De zijden van achterlijf en metasternum, evenals het midden, glanzig. 3

- 3 Voorschenen naar het uiteinde sterk verbreed, aan de buitenzijde van voren diep uitgerand. Prosternale plaat niet zeer breed en aan weerszijden, in het midden, niet hoekig verbreed. Metasternum zonder kielvormige zijlijnen. De zijden van het halsschild niet omgeslagen. Bovenzijde van het lichaam glad. Dekschilden met zwakke stippeellijnen. 17. **Megasternum**.

Voorschenen gewoon. Prosternale plaat sterk verbreed, aan weerszijden in het midden hoekig. Metasternum aan weerszijden met eene kielvormige lijn, welke van af de achtercoxae tot aan de schouderhoeken loopt. De zijden van het halsschild naar onderen omgeslagen en aldaar driehoekig uitlopend. Bovenzijde dicht bestippeld, weinig glanzig, uiterst lijn behaard. Dekschilden met langlijnen 18. **Cryptopleurum**.

VII. Tribus COELOSTOMINI.

Bevat slechts het genus 20. **Coelostoma**.

III. Sub-Familie HELOPHORINAE.

VIII. Tribus SPERCHEINI.

Bevat slechts het genus 21. **Spercheus**.

IX. Tribus HELOPHORINI.

Spieten 9-ledig. Halsschild met vijf diepe langsgroeven; in den regel breeder dan lang. Sterniten vlak 22. **Helophorus**.

Spieten 7-ledig. Halsschild met vijf verspreide groeven. Sterniten gewoonlijk in de breedte kantig verheven 23. **Hydrochus**.

X. Tribus HYDRAENINI.

De omgeslagen zijrand van het halsschild met eene sprietgroef. Laatste tasterlid korter dan het voorlaatste. De voorcoxae niet door eene kielvormige voortzetting van het prosternum gescheiden. Voorhoofd met twee groefjes. Halsschild meestal met vier kleine, ronde groefjes, en met eene verdiepte langsgroef over het midden. 24. **Ocnthebius**.

De omgeslagen zijrand van het halsschild zonder sprietgroef. Tasters zeer lang, het laatste lid veel langer dan het voorlaatste. De voorcoxae, door eene kielvormige voortzetting van het prosternum, duidelijk gescheiden. Voorhoofd en halsschild niet of slechts onduidelijk gegroefd. 25. **Hydraena**.

I. Sub-Familie HYDROPHILINAE.

1. Tribus HYDROPHILINI.

1. **Hydrophilus** Geoffroy.

(Hydrous Leach)

*Spieten 9-ledig; het eerste lid vrij groot, breed en enigszins gekromd; het tweede kegelvormig, de 4 laatste ledjes eene knots vormend. Bovenlip nagenoeg niet uitgerand. Voorkaken met diep gespleten top, aan den binnerrand met drie breede tanden. Onderlip bijna vierhoekig, iets uitgerand. Lichaam langwerpig-eirond, naar het uiteinde enigszins toegespitst; tamelijk gewelfd. Dekschilden gestreept. Het kielvormig verheven middengedeelte van het prosternum is breed en diep sleufvormig uitgehold. Mesosternum gekield, tot vóór de voorcoxae reikend. De stekel van het metasternum reikt ver voorbij de achtercoxae. Achterlijf met 5 sterniten, slechts aan den zijrand behaard. Dijen onbehaard. Achtertarsen sterk samengedrukt en van zwemharen voorzien. Klauwen met langen spitsen tand. Bij het ♂ is het laatste voertarsen-lid naar binnen plaatvormig verbreed en van onderen van een borsteligen randzoom voorzien; de voorklauwen krachtig ontwikkeld en ongelijk. — De soorten van dit genus zijn zeer groot, geheel zwart of groenachtig-zwart; zij bewegen zich langzaam voort tusschen planten in staande wateren. Niettegenstaande de tot zwemmen ingerichte middel- en achterpooten, bewegen zij dezen niet gelijkmatig, zooals bij *Dytiscus*, doch zwemmen er afwisselend mede. Eigenaardig is de ademhaling; de kever brengt niet, zooals bij *Dytiscus*, het uiteinde van het achterlijf boven water, doch steekt de spieten boven water en draait ze zoodanig, dat de basis van de knots in de lucht is, de top daarentegen de borst aanraakt; daardoor gaat de lucht over de zijdeachtige beharing van de sprietknots en komt in verbinding met de aan de buikzijde, tusschen de zijne beharing, zich aanhechtende luchtlag, waardoor versehe lucht tegen de verbruikte lucht wordt ingewisseld. Van de buikzijde gaat deze ververschte*

lucht onder de dekschilden naar de aan de rugzijde gelegen stigmata. De sprieten zijn derhalve de overbrengers der lucht; men ziet dan ook nimmer deze dieren met het achterlijf boven water komen. In het lichaam, tusschen borststuk en achterlijf, bevindt zich eene trachee blaas, waardoor het specifiek gewicht verminderd kan worden. — De eieren worden gelegd tegen het einde van April, waartoe het wijfje een eivormig spinsel vervaardigt, dat voorzien is van een boven het water uitstekenden, doorboorden steel, welke dient tot het invoeren van lucht. Dergelijke spinsels, met eieren opgevuld, drijven op het water tusschen allerlei plantendeelen en kroos, en verliezen spoedig hunnen oorspronkelijken vorm, daar zij door den wind heen en weder bewoogen en met allerlei vuil verontreinigd worden. Het vervaardigen van deze cocons geschiedt op de volgende wijze. Het wijfje komt aan de oppervlakte van het water, daar, waar ergens een drijvend blad is; zij legt zich op den rug en drukt het blad met de voorpooten tegen de buikzijde aan, om zich zoodoende in die ligging te houden. Daarop komen uit het achterlijf 4 buizen te voorschijn, 2 lange en 2 korte, waaruit eene witachtige spinstof vloeit, welke in aanraking met de lucht verhardt en tot draden wordt uitgetrokken. Door het heen en weder bewegen dezer buisjes wordt binnen $\frac{3}{4}$ uur de buikzijde van het dier met een fijn spinsel bedekt. Daarop keert het dier zich om, neemt het spinsel op den rug en maakt eene tweede laag, die met de eerste aan den rand samentvloeit, zoodat een van voren open zak gevormd is, waarin de kever zelf met het achterlijf besloten zit. Nu vult zij dit zakje met ongeveer 50 eieren en trekt, naarmate dit gevuld wordt, het achterlijf meer en meer terug. Om het nu dicht te maken, neemt zij de randen tusschen de achterpooten, trekt ze door nieuwe draden verder uit en enger te samen, en spint er eindelijk dwars over heen; daarop zet zij nog een steel, doordat zij steeds langer wordende draden van onderen naar boven en weder terug trekt. Na 4 à 5 uren is het geheele werk voltooid en drijft de cocon met de eieren tusschen de waterplanten; kantelt het eiernestje om, dan komt het weder in de goede richting, daar het zwaartepunt in de eiermassa gelegen is. Na 16 tot 18 dagen kruipen de larven uit, blijven echter nog eenigen tijd, wellicht tot aan de eerste vervelling, in hun verblijf en voeden zich met de ledige eierdoppen. De ontwikkeling van *H. picus* is door meerdere onderzoekers beschreven, o. a. reeds in 1634 door Mouffet, doch kortelings uitvoerig door v. Fricken en Planet; de larve en pop van *H. aterrimus* is door Letzner en Schödlte beschreven. — De larve is zwartachtig en bestaat, behalve uit den kop, uit 12 ringen. De voorkaken zijn in het midden sterk getand, de achterkaken steken ver uit. De eerste 3 ringen elk met een paar één-klauwige pooten; bovendien de laatste achterlijfsring met een paar draadvormige aanhangsels en met twee functioneerende stigmata aan het uiteinde. Behalve dat de larven slechts een enkelen klauw bezitten, onderscheiden zij zich nog van die der *Dytiscidae* en *Gyrinidae*, doordat zij geen doorboorde voorkaken hebben, doch met de vrije mondopening hare prooi uitzuigen. Zij voeden zich met kleinere waterdieren, benevens met vischkuit en kikvorscheieren. Bij gevaar scheiden zij uit den anus eene zwarte, onaangenaam riekende vloeistof af, waardoor het water troebel wordt en zij daardoor ontsnappen kunnen. Tegen den nazomer zijn zij volwasssen, verlaten dan het water en maken in de nabijheid in de aarde eene holte, waarin zij verpuppen. — De volkomen kevers vliegen slechts zelden; zij kruipen, op den grond zijnde, gewoon voort. Water-spitsmuizen en stekelbaarsjes zijn voor hen en hun broedsel gevaarlijke vijanden.

Van de 4 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

Alle sternieten scherp gekield. Dekschilden aan den naadhoek met een klein, scherp tandje. Het uiteinde van den borststekel niet benedenwaarts gebogen. Het bijlvormig verbreedde laatste voortarsen-lid bij het ♂, is aan den top meer spits. Het ♀ vertoont veelal langs de zijden der dekschilden, eene kielvormige langs-verhevenheid op de voorhelft, tegen of op den zijrand. Lengte 38—48 mm. Zeer gemeen in slooten en poelen . . . 1. *picus* L.

Slechts het uiteinde van het laatste sterniet scherp gekield of samengedrukt, de overigen wel dakvormig opgericht, maar afgerond. Dekschilden aan den naadhoek zonder tandje,

hoogstens met een klein stomp bultje. Tasters en sprieten gewoonlijk lichter gekleurd dan bij *piceus*. Het uiteinde van den borststekel is iets benedenwaarts gebogen. Het bijlvormig verbrede laatste voortarsen-lid bij het ♂ aan den top afgerond. Deze soort is doorgaans iets kleiner dan *piceus*. Lengte 35—40 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprovincie bij Crefeld, Düsseldorf en Dortmund. (morio St.) (aterrimus Eschsch.)

2. Hydrocharis Le Conte.

(Hydrous Brullé, Hydrophilus Leach).

*Boventip duidelijk uitgerand. Voorkaken aan den binnenrand bewimperd. Laatste kaaktaster-lid korter dan het voorlaatste. Lichaam langwerpig-eirond. Dekschilden met eenige onregelmatige stippellijnen. Prosternum in 't midden scherp kielvormig verheven, doch niet uitgehold. De stekel van het metasternum is kort en reikt niet voorbij de achtercoxae. Achtertarsen sterk samengedrukt en van zwemharen voorzien. Bij het ♂ is het klauw-lid der voortarsen verbreed en zijn de voorklauwen sterk haakvormig gekromd. Bij het ♀ is de klauwtand spits, bij het ♂ stomp. Overigens als bij *Hydrophilus*. De soorten zijn zwart of groenachtig-zwart; zij leven in staande wateren. Het ♀ maakt uit een samengesponnen smal blad een eiercocon, welke meestal van een steeltje voorzien is. De larven bezitten aan den laatsten achterlijfsring twee hoornhaken. — De levenswijze en ontwikkeling is het eerst beschreven door Rüssel von Rosenhof; ook werd nog de larve, pop en eiercocon door Schiödte beschreven.*

Van de 2 Europeesche soorten komt 1 in Nederland en zou 1 in het aangrenzend gebied voorkomen.

Prosternaal-kiel naar achteren in een schuin afstaanden, scherpen tand eindigende. Lichaam glanzig zwart, al of niet met purperachtigen weerschijn, zelden donker groenachtig. Kaaktasters en sprieten, behalve de knots, roodachtig. Pooten zwartachtig, de voorsten soms lichter gekleurd. Stippelrijen der dekschilden hetzij zwak aangeduid, of zeer krachtig en duidelijk (*substriatus* St.). De var. **smaragdinus* Bach is iets smaller, naar het uiteinde minder breed afgerond, glanzig donkergroen; schenen en voorpooten roodachtig, tarsen geel of roodachtig. 1) Lengte 15—19 mm. Gemeen in staande wateren. De var. *smaragdinus* is mij niet bekend 1. *caraboides* L.

Prosternaal-kiel ongetand. Lichaam glanzig zwart met groen- of purperachtigen weerschijn. Dekschilden met grove stippelrijen. Pooten geel, met zwarte dijbasis. Lengte 13—14½ mm. Niet inlandsch. Zij zou bij Crefeld en Düsseldorf voorkomen (*flavipes* Stev.)

II. Tribus HYDROBIINI.

3. Limnoxenus Rey.

*Laatste kaaktaster-lid langer dan het voorlaatste. Dekschilden met eene naadstreep en met regelmatige stippelrijen. Prosternum over het midden gekield; mesosternum kort, in het midden als eene verticale plaat opgericht; metasternum slechts van voren gekield. Klauwen gewoon. Overigens aan *Hydrobius* zeer verwant.*

De enige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam langwerpig-ovaal, zwart, vrij sterk glanzig, zeldzamer met geringen groen- of purperachtigen weerschijn; fijn en dicht bestippeld. Dekschilden met fijne stippelrijen en in de afwisselende tusschenruimten met eenige grootere stippels; op de achterhelft met eene naadstreep. Pooten pekbruin, tarsen roodachtig. Lengte 8—9½ mm. Over de larve werd door Miger iets medegedeeld. Verbreid, doch vrij zeldzaam, in slooten. 1. *oblongus* Hrbst.

1) Eene monstrositeit met onregelmatige bulten op de dekschilden is *scrabulatus* Panz.

4. Hydrobins Leach.

Sprieten 9-ledig; het tweede lid kegelvormig, de 3 eindledjes tot eene knots vereenigd. Lichaam langer of korter eirond. Clypeus aan den voorrand breed afgesneden en hoogstens over de bovenlip flauw uitgebogen. Eindlid der kaaktasters duidelijk langer dan het derde lid. Halsschild aan de zijden fijn gerand. Dekschilden met, vooral naar het uiteinde, regelmatige, verdiepte langsstrepen. Prosternum gewoon, of aan den voorrand met een landje Mesosternaal-kiel tandvormig opgericht, bij de Zuid-Europeesche *H. convexus* Brullé plaatvormig, met gebogen bovenkant. Metasternum gewoon, niet gekield. Achterlijf met 5 sterniten; geheel behaard. Trochanters onmiddellijk tegen de dijen aangedrukt. Achtercoxae dicht behaard. Achterschenen niet gebogen, met sterke doornen bezet. Tarsen in beide seksen gelijk, bij het ♂ de klauwen aan de basis gekromd.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Prosternum gewoon. Glanzig zwart, met geringen metaalglaans, zeldzamer groen- of purperachtig metaalglaans (*ab.c. aeneus* Sol.); langs de zijranden gewoonlijk iets lichter gekleurd. Dekschilden met duidelijk bestippelde langsstrepen en fijn bestippelde tusschenruimten, van welke de afwisselenden met grovere stippels bezet zijn. Bij de var. *Rottenbergii* Gerh. zijn de langsstrepen zwakker of bijna niet bestippeld, de tusschenruimten fijner bestippeld, en staan de grootere stippels der afwisselende tusschenruimten onmiddellijk tegen, als het ware op de strepen. Bij den vorm *subrotundatus* Steph. is het lichaam korter ovaal, meer rondachtig. Schenen, het uiteinde en veelal ook de voorkant der dijen, geelrood of bruinrood; bij *ab.c. picicus* Thoms. de pooten geheel zwartachtig. Lengte 6—7½ mm. Zeer gemeen in poelen en slooten. De *ab.c. aeneus* bij Amsterdam; de var. *Rottenbergii* bij den Haag, Ede, Wageningen en in Limburg; de vorm *subrotundatus* bij Breda en op Texel. De *ab.c. picicus* met het type. De larve is door Schiödt, het eierleggen door Cussac beschreven. 1. *fuscipes* L.

5 Helochares Mulsant.

Sprieten 9-ledig, met 3-ledige knots. Lichaam langwerpig-eirond, naar het uiteinde verbreed. Clypeus aan den voorrand meer of minder uitgerand. Kinplaat in 't midden gewoonlijk ingedrukt, krachtig en dicht bestippeld. Kaaktasters aanmerkelijk langer dan de sprieten, het tweede lid iets langer dan het derde. Mesosternum niet als eene loodrechte, scherp kielvormige plaat opgericht, doch als eene trapezoidale, bultige verhevenheid. Pro- en metasternum gewoon, niet gekield. Vijfde sterniet aan het uiteinde, in het midden, met eene zeer kleine, ronde uitranding. Dekschilden zonder verdiepte naadstreep. Trochanters onmiddellijk tegen de dijen aangedrukt. Achterschenen niet gebogen. Achtertarsen nagenoeg niet samengedrukt, bewimperd. Bij het ♂ zijn de klauwen aan de basis sterk gebogen. — De wijfjes dragen de eieren een tijd lang in een zak aan het achterlijf met zich rond. — De larve en pop, alsmede de levenswijze van *H. lividus* is door Cussac beschreven; de levenswijze ook reeds door Lyonet.

Van de 8 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

- 1 Lichaam eenigszins langwerpig, van voren tot over het midden nagenoeg parallel. Achterhoeken van het halsschild recht of stomp, met niet sterk afgeronden top. 2
- Lichaam meer kort-ovaal, de dekschilden aan den zijrand meer of minder gebogen. Achterhoeken van het halsschild altijd stomp en afgerond. 3
- 2 Bovenzijde van het lichaam gelijkmatig dicht en vrij sterk bestippeld, krachtiger dan bij de overige soorten; bruinachtig-roodgeel, meestal op het midden van het halsschild en van de dekschilden wat donkerder; zelden de dekschilden grootendeels donker gekleurd. De stippelrijen van de onderzijde der dekschilden niet zelden aan de zijranden doorschermerend; soms ook hier en daar over het midden met flauw aangeduide donkere langsstrepen. Achterhoeken van het halsschild recht of stomp, met bijna afgeronden top. Schenen, tarsen en knieën rood; tasters en sprieten roodgeel, sprieknots weinig donkerder 1). Lengte 4½—6 mm. Zeer gemeen in poelen en slooten

(punctatus Sharp, punctatulus Rey) 1. *erythrocephalus* F.

1) Kuwert geeft deze beschrijving ten onrechte voor *lividus* Forst.

Halsschild en dekschilden niet gelijkmatig bestippeld, op de dekschilden iets fijner dan op kop en halsschild. Bovenzijde meer licht okergeel, halsschild en schedel in het midden iets donkerder. De stippellijnen van de onderzijde der dekschilden aan de zijranden eenigszins doorschemerend; de grootere, doorschemerende, donkere begin-stippels dezer stippellijnen achter den voorrand der dekschilden, welke bij *erythrocophalus* gewoonlijk duidelijk voorhanden zijn, meestal weinig zichtbaar; daarentegen is de schouderbuit altijd iets donkerder. Achterhoeken van het halsschild iets stomper. Schenen en tarsen, benevens de tasters, vaalgeel. Dekschilden aan de zijden iets samengedrukt. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Bij Oisterwijk en bij Amby nabij Maastricht. Ook in België bij Calmpthout, Lanaken en Lessines.

2. *subcompressus* Rey.

- 3 Bovenzijde van het lichaam gelijkmatig fijn bestippeld, rood- of geelachtig bruin, sterk glanzig. Dekschilden veelal met donkere, doorschemerende langsstrepen, of wel met een donkeren veeq over het midden; zeldzamer vertoonen de geheel lichter gekleurde dekschilden, naar het uiteinde een aantal verspreide, ronde, donkere stippen 1). Halsschild met 4 zwarte stippen, twee nabij den voorrand en twee aan den achterrand; zeldzamer is het midden van het halsschild iets donkerder. De stippellijnen van de onderzijde der dekschilden langs de randen, en vooral ook de begin-stippels aan den voorrand, benevens de twee eerste stippellijnen langs den naad, doorschemerend. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen in poelen en slooten. (griseus F.) 3. *lividus* Forst.

Bovenzijde van het lichaam niet gelijkmatig-, de dekschilden uiterst fijn, fijner en iets dichter dan kop en halsschild bestippeld; sterk glanzig geelbruin. Dekschilden op de achterhelft met vier rijen grovere stippels, aan de zijden en het uiteinde gewoonlijk met de doorschemerende donkere stippellijnen der onderzijde. De bestippling der bovenzijde is in 't oogvallend fijner en minder dicht dan bij de vorige soort. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam; omstreken van Amsterdam. In België bij Grammont en Vlier-nael-Roodt.

(pallidus Rossi) 4. *dilutus* Er. 2)

6. Philhydrus Solier.

Laatste liptaster-lid even lang als het voorlaatste. Kaaktasters duidelijk langer dan de spriden, het laatste lid korter dan het voorlaatste. De mesosternale verhevenheid is over de geheele lengte kievormig opgericht en steekt tusschen de middelcoxae scherp-kantig uit. Halsschild aan de basis fijn gerand. Dekschilden met eene verdiepte naad-streep. Vijfde sterniet zonder de zeer kleine ronde uitranding aan het uiteinde. Overigens als bij Helochares. Bij het ♂ zijn de klauwen der voortarsen in den regel sterker haakvormig gebogen. — De larve en pop van P. testaceus zijn door Schödté, de larve van de in Skandinavië voorkomende maritimus Ths. door Thomson, en de larve van melanoccephalus door Cussat beschreven.

Van de 32 Europeesche soorten komen 9 in Nederland voor.

- 1 Lichaam $4\frac{1}{2}$ —6 $\frac{1}{2}$ mm. lang. Halsschild aan de zijden met twee dwarsrijen grootere, veelal verwarde en dikwerf onduidelijke stippels: de voorste rij nabij den voorrand is gebogen; soms zijn het meer verwarde, grootere stippels (Sub-gen. Philhydrus isp.) 2

Lichaam hoogstens $3\frac{1}{2}$ mm. lang. Halsschild aan de zijden zonder rijen grootere stippels (Sub-gen. Agraphilhydrus Kuvert) 8

- 2 Dekschilden, behalve de gewone bestippling, zonder eenige aanduiding van grootere, onregelmatige stippellijnen. Lichaam ovaal, donkerbruin, geelbruin of roodbruin. Halsschild grootendeels zwartbruin, naar de zijden in het lichtbruin overgaande. Kop bij het ♂ geheel zwart, bij het ♀ geel met donker voorhoofd. Tasters geheel roodachtig. Schenen en tarsen roodbruin. Onderzijde en dijen zwart. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Gemeen in poelen.
(nigricans Zetterst., Thoms.) 1. *frontalis* Er.

Dekschilden met meer of minder duidelijke, onregelmatige, grovere stippellijnen 3), welke echter niet te verwarren zijn met de doorschemerende stippellijnen der onderzijde. 3

1) Bij een exemplaar uit Amby nabij Maastricht vertoonen de dekschilden, vooral langs de zijden en langs den naad, vrij duidelijke stippellijnen, welke niet te verwarren zijn met de doorschemerende stippellijnen van de onderzijde der dekschilden; dit exemplaar nadert daardoor tot de Noord-Afrikaansche *H. melanophthalmus* Muls.

2) Ik vermoed dat de vier vermelde soorten slechts verscheidenheden van eene en dezelfde soort zijn.

3) Deze stippellijnen zijn het best te zien, wanneer men den kever overdwars beschouwt.

- 3 Tweede kaaktaster-lid grootendeels zwart of gedeeltelijk donker gekleurd. De donkere kop bij het ♂ met eene groote bruingle vlek voor de oogen, bij het ♀ van voren geheel geel. Halsschild en dekschilden roodachtig-geelbruin, met iets lichtere zijranden. Halsschild gewoonlijk met vier donkere stippen. De stippelrijen van de onderzijde der dekschilden zijn van boven hetzij onzichtbaar, hetzij als donkere lijnen zichtbaar (ab.c. *lineatus* Kuw.), in welk laatste geval de schouderhuiten, als ook het midden van het halsschild, iets donkerder gekleurd zijn. Dijen, behalve de roode knieën, pekwart of donkerbruin. Lengte $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen in staande wateren en langs oevers onder dood riet; de ab.c. *lineatus* zeldzamer. (melanocephalus Zett.) 2. **testaceus** F.
- Tweede kaaktaster-lid eenkleurig geel 4
- 4 Kop geelachtig, dikwerf met een klein donker middenvlekje 5
- Kop zwart, ten minste tot op de hoogte van den voorrand der oogen 7
- 5 Achterlijf over het midden veel sterker gewelfd, doordat het langs de zijden vrij diep ingedrukt is, als het ware iets uitgehold schijnt 6
- Achterlijf over het midden meer gelijkmatig gewelfd, langs de zijden vlak afhellend, niet ingedrukt. De voordijen naar het uiteinde, aan den voorrand, van eene scherp begrensde, wigvormige, roodgele vlek voorzien. Bovenzijde meer geelachtig-bruin, of grijs-geelachtig. Achtergedeelte van den kop een weinig gebruint. Halsschild geelachtig, over het midden iets donkerder; met vier zwarte stippen. Dekschilden met gelen zijrand, en meestal ook met gelen voorrand. De stippelrijen van de onderzijde der dekschilden schemeren langs den zijrand en aan het uiteinde door. Lengte 5— $6\frac{1}{2}$ mm. Gemeen op zeelei; bij Amsterdam, Kolhorn in N.-Holland en bij Zierikzee. In België bij Heyst. (bicolor Bedel nec. F.) 5. **griseus** Gylh. 1)
- 6 De voordijen zijn nabij het uiteinde, aan den voorrand, iets rood, zonder duidelijke wigvormige vlek. Lichaam naar verhouding iets smaller en vlakker dan bij *testaceus*. Bovenzijde geelroodachtig of roodachtig-geelbruin, met lichter gekleurde zijranden. De stippelrijen van de onderzijde der dekschilden hier en daar als donkere, doorschemerende lijnen zichtbaar. Lengte $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Zeldzaam; bij Amsterdam en den Haag. Ook op het Duitse eiland Borkum (griseus Gylh. pars) 3. **ferrugineus** Klst.
- De voordijen vertoonen aan den voorrand eene scherp begrensde roodgele, wigvormige vlek. Lichaam meer gewelfd dan bij *ferrugineus*. Achterlijf over het midden tamelijk kielvormig, in het midden sterker afgerond en zwakker behaard dan bij *griseus*. Bovenzijde grijsachtig-bruingeel, met smallen, roodbruinen naad, en geelachtige randen der dekschilden. Halsschild met vier zwarte stippen. Lengte $5\frac{1}{2}$ mm. Bij Amsterdam. Ook bij Heyst in België en op Borkum. Vermoedelijk een vorm van *griseus* 4. **sternospina** Kuw.
- 7 Mesosternaal-plaat aan den top in eene afzonderlijke scherpe punt eindigende. Laatste kaaktaster-lid geheel geel. Bovenzijde pekbruin. Dekschilden fijn en dicht bestippeld. Halsschild iets fijner en dichter, de kop nog fijner en dichter bestippeld dan de dekschilden. Halsschild en dekschilden met breed uitvloeiende, gele zijden; bij lichter gekleurde exemplaren ook de voor- en achterrand van het halsschild geelachtig. Dijen zwart; de schenen, tarsen, alsook de sprietwortel bruingle. Lengte $4\frac{1}{2}$ —5 mm. Langs de zee kust. Bij Scheveningen langs het strand 2), ook op Terschelling. In de duinstreek van Noord-Frankrijk. 6. **halophilus** Bedel 3)
- Mesosternaal-plaat met gewonen, spitsen top, zonder afzonderlijke scherpe punt. Laatste kaaktaster-lid aan den top zwart. Bovenzijde geelbruin, of donker grauwbruin (ab.c. *ochropterus* Mrsh.). Halsschild met vier zwarte stippen en in den regel over het midden zwart, waardoor de zwarte stippen aldan geheel bedekt zijn. Dekschilden om het schildje, langs de zijden en soms ook langs den naad geelachtig; de schouderbui in den regel zwart; hier en daar met donkere, doorschemerende stippellijnen. Tarsen, schenen en eene kleine dijvlek roodachtig. Sprietwortel geel, de knots bruin. Lengte 5 mm. Bij Amsterdam op zeelei, vele exemplaren; vooral de ab.c. *ochropterus* Mrsh. (quadripunctatus Bedel, nec Herbst) 7. **melanocephalus** Ol.
- 8 Laatste kaaktaster-lid aan het uiteinde zwartachtig of geheel zwart. Dekschilden roodachtig-bruin, met evenzoo gekleurden naad, of deze laatste slechts iets donkerder. Kop gewoonlijk geheel

1) De uit Knucke (België, prov. W.-Vlaand., Coll. de Volrem) opgegeven *P. maritimus* Thoms. behoort tot deze soort. Ook vermoed ik dat de op het eiland Borkum door Dr. O. Schneider in twee exemplaren gevangen *P. maritimus* Thoms. slechts eene donkere aberratie van *griseus* Gylh. is; ik zag deze exemplaren niet. Bedel beschouwt *griseus* Gylh. en *maritimus* Thoms. als eene enkele soort. — Nog is de uit de duinen van W.-Vlaanderen (Coll. Wesmaël) medegedeelde *P. vultur* Kuw. slechts een onuitgekleurd exemplaar van *griseus*.

2) Volgens Ganglbauer zouden de twee bij Scheveningen gevangen exemplaren tot *P. melanocephalus* Ol. behooren. *P. halophilus* Bedel zou, volgens het type, veel meer verspreid bestippeld zijn dan *melanocephalus* Ol. Toch beantwoordt de vorm der mesosternaal-plaat geheel aan die van *halophilus*.

3) Eene uit Windnyne (W.-Vlaanderen in België, Coll. de Borre) als *P. hispanicus* Kuw. opgegeven soort behoort tot *halophilus*.

zwart, zeldzamer met eene kleine gele vlek voor de oogen. Halsschild donkerder gekleurd, met licht bruingele randen. Dekschilden iets krachtiger dan het halsschild bestippeld. Lengte 3—3½ mm. Niet zeldzaam. (*marginellus* Muls.; *minutus* Fabr., Bedel) 8. *affinis* Thunb.

Laatste kaaktaster-lid geheel geelrood, soms zijn alle leedjes in het midden iets donkerder, (*suturalis* Sharp). Dekschilden geelbruin, met zwarten naad Halsschild in het midden veelal donkerder, ook wel het midden der dekschilden. Kop geheel zwart, of met eene groote gele vlek voor de oogen. Overigens als *affinis*. Lengte 3½ mm. Verbreid, doch veel zeldzamer 9. *coarctatus* Gredl.

7. Cymbiodyta Bedel.

De mesosternale verhevenheid als eene scherp-kegelvormige punt, die naar achteren breed nergedrukt, afvalt. Basis van het halsschild niet gerand. Overigens als bij Philhydrus.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Elliptisch, dicht bestippeld; de bovenzijde glanzig zwart; zeldzamer de dekschilden donkerbruin. Tasters, tarsen, de voor- en zijrand van het halsschild, benevens de zijden der dekschilden roodachtig. Halsschild met de beide dwars-stippelrijen van *Philhydrus*. Dekschilden met duidelijke naadstreep. Lengte 3½—4 mm. Verbreid in poelen, doch niet gemeen.
 (*marginata* Dfts., *ovalis* Thoms.) 1. *marginella* F.

8. Enochrus Thomson.

Sprieten 9-ledig, met 3-ledige knots. Kaaktasters zoo lang als de sprieten; het laatste lid even lang als het voorlaatste. Clypeus aan den voorrand meer of minder uitgerand. Mesosternaal-kiel van voren tandvormig opgericht. Prosternum gewoon. Metasternum eveneens gewoon, niet gekield. Trochanters onmiddelijk tegen de dijen aangedrukt. Achterschenen recht.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam hoog gewelfd, kort-eivormig, roodgeel. Kop zwart, met eene gele vlek voor de oogen. Uiteinde der tasters, de onderzijde en de pooten zwart; de knieën lichter gekleurd. Aan de randen der dekschilden schemeren de stippelrijen van de onderzijde der dekschilden eenigszins door. Lengte 4½ mm. Verbreid en niet zeldzaam in poelen.
 (*melanocephalus* Bedel nec Oliv.) 1. *bicolor* Payk.

9. Paracymus Thomson.

Laatste lid der korte, meestal vrij dikke kaaktasters langer dan het voorlaatste. Halsschild aan de basis niet gerand. Dekschilden met eene naadstreep. Bovenzijde van het lichaam bronskleurig. Prosternum fijn gekield. Mesosternum in 't midden kielvormig opgericht. Achterdijen niet villig behaard. Overigens als bij Enochrus.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Lichaam ovaal, hoog gewelfd, bronzig-zwart. Tasters naar het uiteinde donker gekleurd. Pooten bruin, hoogstens naar het uiteinde iets lichter. Lengte 2½—2¾ mm. Zeer zeldzaam; Breda en Oldenzaal . . . (*nigroaeneus* J. Sahlb., *aeneus* Muls. pars) 1. *scutellaris* Rosenh.
 Lichaam meer langwerpig-ovaal, sterker bronskleurig-bruin. Tasters en pooten rood. Lengte 2½—3 mm. Op zeelei; in aantal bij Zierikzee; ook bij IJmuiden, op Texel en bij Sluiskill (Staats-Vlaanderen) (*punctulatus* St., *salinus* Bielz) 2. *aeneus* Germ.

10. Anacaena Thomson.

Halsschild aan de basis slechts zwak gerand. Dekschilden met eene naadstreep. Bovenzijde van het lichaam sterk glanzig, doch niet of slechts onduidelijk bronzig.

Prosternum niet gekield. Mesosternum in 't midden kegelvormig. Achterdijen evenals de voor- en middeldijen grootendeels dicht viltig behaard. Overigens als bij Paracymus. De 4 Europeesche soorten komen in Nederland voor.

- 1 Kop zwart, aan weerszijden voor de oogen met eene groote, driehoekige, gele vlek. Lichaam kort-ovaal, roestkleurig-geel of geelbruin; halsschild in het midden donkerder. Dekschilden niet dicht bestippeld. Pooten roodbruin. Tasters geel, het eindlid tot aan het midden zwart. De kleur van deze soort trekt gewoonlijk meer naar het geel dan bij de naverwante ovata. Lengte 2—2½ mm. Zeldzaam, in poelen 1. **bipustulata** Marsh.
- Kop zwart, zonder gele vlekken 2
- 2 Dekschilden geheel roestkleurig of geelbruin. Halsschild zwart met gelen zijrand. Lichaam ovaal, hoog gewelfd. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen in poelen.
(minuta Oliv., globulus Lap., limbata Rey) 2. **ovata** Reiche
- Dekschilden donker gekleurd, nagenoeg zwart of zwartbruin, met lichtere randen
- 3 Mesosternum voor de middelcoxae met eene zeer kleine, kegelvormige verhevenheid. Lichaam kort-ovaal. Lengte 2½—2¾ mm. Gemeen in poelen. . (ambigua Rey) 3. **limbata** F.
- Mesosternum voor de middelcoxae zonder kegelvormige verhevenheid. Lichaam meer breed-ovaal, eenigszins half-kogelvormig. Lengte 2½—3 mm. Zeer gemeen in poelen en onder vochtige bladeren in uirgedroogde slooten (limbata Fairm.) 4. **globulus** Payk. 1)

11. Laccobius Erichson.

Sprieten 8-ledig, de drie laatste leedjes vormen eene langwerpige knots. Lichaam klein, nagenoeg half-kogelvormig. Dekschilden zonder naadstreep, met dicht openstaande stippelrijen. Prosternum in 't midden kielvormig. Mesosternaal-kiel in 't midden tandvormig opgericht; metasternum gewoon, niet gekield. Trochanters der achterpooten iets van de dijnen afstaande en met vrij uitstekenden top. Achterschenen gebogen. Tarsen der achterpooten van boven met eene rij zwemharen bezet. Vijf sterniten. Bij het ♂ is het tweede en derde tarslid der voorpooten altijd iets verbreed. De soorten leven in stilstaande wateren, zeldzamer langs stroomend water.

Van de 20 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

- 1 Halsschild tusschen de gewone bestippeling volkomen glad 2
- Halsschild, bij zeer sterke vergrooting bezien, tusschen de gewone bestippeling zeer fijn segrijnachtig bestippeld, en daardoor wat minder glanzig 3
- 2 Tweede lid der achtertarsen bijna tweemaal zoo lang als het derde. Dekschilden met afwisselend regelmatige en meer verwarde, fijne stippelrijen; naar het uiteinde spits-ovaal. Kop geheel zwart, of wel bij de abc. *maculiceps* Rottbrg. de clypeus aan de zijden geel gezoomd. Halsschild zwart, aan de zijden breed geel. Schildje zwart. Dekschilden gewoonlijk licht bruingeel, over het midden iets donkerder, meer of minder vlekkelig. Pooten geel, voordijen aan de basis donker gekleurd. Sprieten en tasters geel, het taster-eindlid aan het uiteinde donkerder. Lengte 3½—4 mm. Zeldzaam, langs rivieren en beken. De grootste soort van het genus. (sinuatus Bedel, nec Motsch.) 2) 1. **nigriceps** Thoms.
- Tweede lid der achtertarsen 1½ maal zoo lang als het derde. Dekschilden met regelmatige, grovere stippelrijen; aan het uiteinde meer afgerond. De kleur komt met die van nigriceps overeen; de dekschilden zijn gewoonlijk aan het uiteinde van twee groote lichte vlekken voorzien. Clypeus aan de zijden geel gezoomd. Sprieten, tasters en pooten geel, de trochanters iets donkerder. Exemplaren met zeer licht gekleurde dekschilden zijn als *pallidus* Lap. beschreven. Lengte 2½—3 mm. Over het algemeen zeldzaam, langs helder water. Niet zeldzaam op Texel (minutus Gyllh.) 2. **bipunctatus** F.
- 3 Dekschilden fijn en in verwarde langrijen bestippeld 4
- Dekschilden in duidelijke rijen, grover dan bij de naast verwante soorten bestippeld; deze stippelrijen zijn zwart. Kop en halsschild vrij sterk en tamelijk dicht bestippeld. De zijden en de achterhoeken van het halsschild zeer breed geel. De gele vlekjes aan weerszijden van

1) De 3 laatste soorten zijn wellicht variëteiten van eene en dezelfde soort

2) L. sinuatus Motsch. is eene Zuid-Europeesche soort, de Belgische exemplaren van deze soort, behooren tot L. nigriceps Thomson.

den clypeus klein. Dekschilden bruinachtig vlekkelig, met breede gele zijranden. Pooten en tasters geel, trochanters donkerder. Exemplaren met nagenoeg zwarte dekschilden vormen de abt. *globosus* Heer. *L. nanulus* Rottbrg. is beschreven op zeer kleine exemplaren. Lengte 2—2½ mm. Zeer gemeen 5. *minutus* L. 1)

- 4 De twee laatste sterniten zeer dicht en fijn bestippeld. Voordijen bijna tot aan de helft viltig. Kop en halsschild zwart. Halschild met breede gele zijden en achterhoeken. Dekschilden geelbruin, meer of minder donker vlekkelig, met lichtere zijranden. Lengte 2½—3 mm. Zeer gemeen. 3. *alutaceus* Thoms.

Het voorlaatste (vierde) sterniet slechts aan den achterrand bestippeld. Voordijen ongeveer over een derde gedeelte viltig. Kop en halsschild donkergroen. Halschild met breede, gele zijden en achterhoeken. Dekschilden meer bruin, minder gevlekt, met lichtere zijranden. Lengte 3 mm. Eenmaal bij Leiden. Ook in België bij Antwerpen . . . 4. *biguttatus* Gerhdt.

III. Tribus LIMNEBIINI.

12. Limnebius Leach.

(*Limnobi*us Bedel).

*Sprieten 8-ledig, met 3-ledige knots. Oogen van achteren door den voorrand van het halsschild bedekt. Lichaam eivormig. Dekschilden naar het uiteinde versmald en meer of minder afgeknut, fijn verspreid bestippeld of glad, bijna altijd zonder naadstreep. Achterlijf met 6 tot 7 sterniten. Schenen en tarsen der achterpooten niet of slechts zeer zwak bewimpert. Bij het meestal grootere ♂ is het eerste, of zijn de twee eerste voortarsen-ledjes iets verbreed; ook onderscheidt het zich door bijzondere kenmerken aan de tasters, de dij en de schenen der middel- en achterpooten, alsook door het zesde sterniet. — Over de larve van *L. truncatellus* gaf Miger een kort bericht. — De soorten leven meest in staande wateren.*

Van de 28 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Naad der dekschilden, op de achterhelft, niet door eene daaraan evenwijdig loopende naadstreep duidelijk gerand 2

Naad der dekschilden op de achterhelft, door eene daaraan evenwijdig loopende naadstreep, fijn, doch duidelijk gerand (Sub-gen. *Bolimbius* Rey, *Crepilimnebius* Kuw.). Halschild glad, niet bestippeld. Bovenzijde geelbruin of bruin; de kop en het midden van het halsschild zwartachtig. Dekschilden hier en daar duidelijk gechagrineerd en fijn behaard, en niterst fijn verspreid bestippeld. Pygidium met twee vrij lange, veelal samenhangende borstelhaartjes. Lengte 1 mm. In staande wateren Niet inlandsch 2). In België bij Leuven, in de Rijnprovincie bij Crefeld . . . (*atomus* Muls., *sericans* Gerh.) (*pictus* Mrsh.) 3)

- 2 Kin in het midden, over de geheele lengte, sterk verdiept of uitgehold, langs de zijden opgericht. Lichaam vuilbruin of geelbruin; de kop en het midden van het halsschild zwartachtig, soms ook de naad der dekschilden iets zwartachtig. Halschild sterk glanzig. Dekschilden zeer fijn, verspreid bestippeld en eenigszins gechagrineerd. Pooten geel of roestkleurig. Het eindlid der tasters iets donkerder. Bij het ♂ het voorlaatste tasterlid sterk verdikt; het zesde sterniet met een waaierachtigen haarkwast (sub-gen. *Tricholimnebius* Kuw.); het zevende sterniet iets gekield, en de achterdijen op den bovenrand meer bochtig verbreed. Het ♀ is kleiner en meer gewelfd. Lengte 1¼—2¼ mm. Zeer verbreed en niet zeldzaam in staande wateren 1. *papposus* Muls.

- Kin effen of slechts zeer zwak ingedrukt, de zijden niet opgericht. Het voorlaatste tasterlid bij het ♂ niet verdikt 3

1) De in Tirol en Zuid-Frankrijk voorkomende *L. regularis* Rey, welke ook in België zou gevangen zijn, onderscheidt zich door den geheel zwarten of pekkruinen clypeus en door de sterke bestippeling van den kop. Ik zag exemplaren uit Leimes, Carlsbourg en Rummant (Mus. de Br.) door Kneert gedetermineerd, doch betwijfel zeer de juistheid der determinatie.

2) De uit Nederland opgegeven exemplaren behooren tot *L. aluta* Bedel.

3) Volgens Kneert is *L. atomus* DUS. (*minutissimus* Germ., *pictus* Bedel) erne andere, iets kleinere soort dan *pictus* Mrsh. (*atomus* Muls., *sericans* Gerh.). My is het niet gelukt een onderscheid te vinden.

- 3 Dekschilden gechagrineerd en duidelijk bestippeld. Zesde sterniet bij het ♂ aan het uiteinde met eene gegroefde, kegelvormige verhevenheid (Sub-gen. *Embololimnebius* Kuw.). Bovenzijde donker pekkruin tot zwart, tamelijk glanzig; met breede, eenigszins doorschijnende, bruine zijranden van het halsschild, en smallere, bruine randen der dekschilden. Bovenlip vrij duidelijk uitgerand. Halsschild duidelijk bestippeld. Onderzijde van het lichaam dicht neerliggend, geelachtig behaard. Bij het ♂ de middelschenen sterk gekromd, de achterschenen naar binnen gebogen en verbreed; de beide paren schenen, bij onbeschadigde mannetjes, met lange zwembaren bezet. Bij het ♂ het pygidium met twee, eenigszins uiteenstaande, bij het ♀ dicht bijeenstaande borstelhaartjes. Het ♂ is veel grooter dan het ♀. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam in diluviale boschrijke streken, in slooten, beekjes en vijvers. 2. *truncatellus* Thunb. 1)
- Dekschilden fijn gechagrineerd, doch zonder in het oogvallende bestippling 4
- 4 Halsschild over het midden glad en meer of minder duidelijk bestippeld 5
- Halsschild over het midden eenigszins gechagrineerd, zonder eenige aanduiding van bestippling. Bovenzijde glanzig zwart, soms met bruinachtige zijden van het halsschild en bruinachtigen topvand der dekschilden, geheel onbestippeld. Zesde sterniet bij het ♂ zonder bijzonder kenmerk (Sub-gen. *Limnebius* l.sp. Kuw.). Pygidium bij het ♂ met twee van elkaar afstaande, bij het ♀ dichter bijeenstaande korte borstelhaartjes. Lengte 1 mm. Zeer zeldzaam; Breda, Vorden en op Texel. In België bij Brussel. . . . (atomus Gerhdt.) 7. *aluta* Bedel.
- 5 Lichaam licht bruinachtig, met iets lichter gekleurde randen van halsschild en dekschilden; kop en onderzijde van het lichaam altijd zwart. Dekschilden duidelijk, fijn gechagrineerd. Metasternum in het midden dicht behaard. Het zesde sterniet bij het ♂ met een neerliggenden haarbundel, bij welken de haren naar voren convergeeren (Sub-gen. *Tricholimnebius* Kuw.); het zevende sterniet is langs de zijden slechts zwak uitgerand, waardoor het niet kegelvormig uitsteekt. Bij het ♀ is het zesde sterniet eenigszins glanzig en ternauwernood behaard; ook staan bij het ♀ de twee borstelhaartjes op het pygidium dichter bijeen dan bij het ♂. Overigens herinnert deze soort zeer aan *papposus*. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeldzaam; Wassenaar, Arnhem, Brummen en Oldenzaal. 3. *nitidus* Kuwert 2)
- Lichaam pekkwart of zwart, hoogstens de randen van halsschild en dekschilden bruinachtig . . . 6
- 6 Pooten donkerbruin, hoogstens de schenen geelachtig. 7
- Pooten geheel geelachtig of roodachtig-geelbruin. Lichaam pekkwart, met lichtere zijden van halsschild en dekschilden; bijna glad, slechts hier en daar zeer dun grauw behaard. Sprieten en tasters roodgeel. Halsschild zeer fijn, verspreid bestippeld. Dekschilden, bij sterke vergroting gezien, zeer fijn gechagrineerd en uiterst fijn, verspreid bestippeld. Pro- en mesosternum fijn gekield. Bij het ♂ is het zesde sterniet bijna glad, nauwelijks behaard, glanzig en aan het uiteinde tamelijk afgerond (Sub-gen. *Limnebius* l.sp. Kuwert); bij het ♀ minder glanzig, meer behaard en aan het uiteinde uitgerand. Het pygidium bij het ♂ met twee van elkaar afstaande, bij het ♀ dicht bijeenstaande borstelhaartjes. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Verbreed, doch niet algemeen; Loosduinen, Wassenaar, Haarlem, Vianen, Vorden en Winterswijk. (*nitidus* Mrsh., Bedel; *Fussii* Gerh.) 6. *sericans* Muls.
- 7 Halsschild onduidelijk gechagrineerd, doch duidelijk bestippeld; dekschilden duidelijk gechagrineerd, doch minder duidelijk bestippeld. Bovenlip afgerond. Bovenzijde glanzig pekkwart, de randen van halsschild en dekschilden roodbruinachtig, fijn verspreid en neerliggend behaard. Onderzijde zwart; verspreid, witachtig behaard. Dijen bruin; de coxae, schenen, alsook de tasters geel. Bij het ♂ het zesde sterniet met eene groote, verwarde, gele haarvlek, en diep uitgerand uiteinde; aan de zijden met eene rij borstelhaartjes (Sub-gen. *Tricholimnebius* Kuw.). Het ♀ is kleiner, op het pygidium met twee dichter bijeenstaande borstelhaartjes. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Verbreed; de meest gewone soort met *papposus*. (? *furcatus* Bedel, ? *nitidus* Seidl.) 4. *crinifer* Rey. 3)
- Naverwant aan *crinifer* is eene soort, bij welke de kin zwak, doch nog duidelijk uitgehold is. Bovenlip uitgerand. Het zesde sterniet bij het ♂ aan weerszijden met eene langere, naar voren convergeerende rij, uit afstaande haren bestaande; het kegelvormig uiteinde van het achterlijf bij het ♂ zonder (?) de bij *crinifer* voorkomende twee uiteenstaande, lange

1) Kuwert beschrijft in zijne *Bestimmungs-Tabellen* een *L. crassipes* uit Holland, doch deelde mij per brief mede dat het eenige in zijn bezit zijnde mannetje geëtiketteerd is *Gracia* (Lange). Er schijnt hier verwarring plaats gehad te hebben, daar ook in het Museum voor Nat. Hist. te Brussel, waaruit Kuwert het meeste materiaal ter bewerking toegezonden kreeg, geen enkel Belgisch of Nederlandsch exemplaar van deze soort voorhanden bleek te zijn. Deze soort is naverwant aan *truncatellus*; de schenen zijn zeer breed, die der middel-pooten bij het mannetje niet gekromd. Het wijfje is aan Kuwert niet bekend.

2) Dat *L. nitidus* door Kuwert beschreven, niet de door Gerhardt, Redtenbacher en Seidlitz bedoelde soort kan zijn, volgt reeds daaruit, dat deze soort, volgens Kuwert, zich door de licht bruine kleur onderscheidt, terwijl de drie andere auteurs hem *L. nitidus* als zwart aangeven.

3) Deze soort, van welke vooral het mannetje gemakkelijk te herkennen is, werd gewoonlijk met de Zuid-Europesche *L. furcatus* Bandi verward.

borstelhaartjes. Coxae evenals de dijen donker. Lengte 2 mm. Deze soort werd beschreven op een ♂ en ♀ uit Ridderborn in de Belgische prov. Limburg en niet uit Holland zooals Kuwert in zijne „Bestimmungs-Tabelle” vermeldt. Mij onbekend; niet in het Brusselsch Museum voorhanden. (barbifer Kuw.)

Halsschild zeer onduidelijk of niet bestippeld, dekschilden zeer fijn bestippeld; beiden zeer fijn gechagrineerd. Bovenzijde zwart of donker pekbruin, sterk glanzig. Onderzijde zwart of donker pekbruin. Pooten lichter of donkerder pekbruin. Eindlid der tasters aan het uiteinde donker. Bij het ♂ het zesde sterniet aan het uiteinde recht- of stomphoekig uitgerand en ter weerszijde tandvormig uitgetrokken; in den indruk of de uitranding behaard (Sub-gen. *Odontolimnebius* Kuw.). Achtercoxae iets tandvormig uitstekend. Achterdijen in het midden met een breeden, stompen tand. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Zeldzaam in stroomend water. Laag-Soeren, Sleeuwijk en Breda 5. *truncatulus* Ths.

IV. Tribus CHAETARTHRIINI.

13. *Chaetarthria* Stephens.

(Cyllidium Erichs.)

Sprieten 7-ledig, de laatste 3 leedjes vormen eene ovale knots. Lichaam half-kogelvormig. Schenen fijn gedoornd. Tarsen ongeveer half zoo lang als de dikke schenen. De eerste twee sternieten door twee breede schubachtige platen bedekt, welke goudglanzig, zijdeachtig behaard zijn. — De soorten van dit genus, welke op een kleinen Agathidium gelijken, zijn merkwaardig door het kogelvermogen.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Glanzig zwart, veelal met bruinachtig doorschijnend uiteinde der dekschilden. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ mm.

Zeer gemeen; zij wordt gewoonlijk minder in water dan wel langs oevers en in aanspoelsel aangetroffen 1. *seminulum* Payk

V. Tribus Berosini.

14. *Enoplurus* Hope.

(Anchialus Thoms., Acanthoberosus Kuwert)

Sprieten 7-ledig. Oogen sterk gewelfd. Dijen tot ver over het midden viltig. Het groote mesosternum met eene fijne, scherpe, doch niet hooge kiel in 't midden voor de middelcoxae. Metasternum gewoon. Dekschilden aan het uiteinde met twee tandjes, van welke die aan den naad soms bijna onthreken kan. Achterlijf met 6 sternieten, welke in den regel duidelijk zichtbaar zijn; het vijfde sterniet zonder uitranding. Lichaam langer gestrekt en minder hoog gewelfd dan bij Berosus.

Van de 6 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Bovenzijde van het lichaam lichter of donkerder bruingeel. Bovenlip zwart of geel. Het achterhoofd, eene dubbele vlek op het midden van het halsschild, benevens hier en daar eenige vlekjes op de dekschilden, zwartachtig. Pooten geel; de dijen tot over het twee derde gedeelte viltig. Tusschenruimten der dekschilden meer of minder duidelijk in rijen bestippeld. Bij het ♂ is het tweede en derde voortarsen-lid verbreed en aan de onderzijde behaard. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. In aantal bij Amsterdam, op zeelei gevangen; ook op Texel. De larve en pop zijn door Schiödt beschreven (guttalis Rey) 1. *spinosus* Stev. 1)

1) Volgens Fauvel zouden, in ons gebied, twee soorten goed van elkaar te onderscheiden zijn, nl *spinosus* Steven en *guttalis* Rey. Bij eerstgenoemde soort is het achterlijf dof, viltig en gechagrineerd, de bovenlip zwartachtig; de tweede tusschenruimte op de dekschilden met eene enkele stippeley, het mannetje met gewoon vijfde sterniet; het wijfje dof, soms een weinig glanzig, doch altijd gechagrineerd, met de naadhoeken der dekschilden divergeerend en naar buiten gelogen. Bij de tweede soort is het achterlijf bestippeld, niet viltig, doch een weinig glanzig, de bovenlip geelachtig, de tweede tusschenruimte der dekschilden forward bestippeld, bij het mannetje het vijfde sterniet aan den top uitgerand en van twee tandjes voorzien, het wijfje glanzig, soms een weinig dof en gechagrineerd, de naadhoeken der dekschilden convergeerend. — Beide vormen komen bij ons voor, doch behalve de exemplaren, die aan de hierboven gegeven beschrijving beantwoorden, bezit ik zulken, die de kenmerken van beiden meer of minder in zich vereenigen. Op dien grond reken ik de beide vormen tot eene en dezelfde soort, van welke de vorm *guttalis* Rey het meest bij ons wordt aangetroffen.

15. Berosus Leach.

*Sprieten 7-ledig met 3-ledige knots. Oogen sterk uitpuilend, half-kogelvormig. Lichaam hoog gewelfd. Dekschilden met diepe stippellijnen, aan het uiteinde niet getand. Het mesosternum is vóór de middelcoxae hoog, kielvormig opgericht; bij uitzondering stomphoekig en niet hoog opgericht. Metasternum van achteren 3-tandig. Achterlijf met 5 duidelijke sterniten, het vijfde met eene uitranding, het zesde meestal verborgen. De dijen zijn ongeveer tot aan het midden viltig. Schenen en tarsen der achterpooten bewimperd. Voortarsen bij het ♂ aan de onderzijde viltig behaard, het tweede lid sterk verbreed; de achterschenen aan de binnenzijde met lange haren bewimperd. — De larve van *B. signaticollis* is door Schiötte beschreven; een bericht over de larve van *luridus* werd door Miger gegeven. — De soorten leven in stilstaande wateren; zij zwemmen veel beter dan de meeste andere *Hydrophilidae*. De bewegingen der abdominale ringen brengen eene stridulatie teweeg.*

Van de 8 Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

- 1 Halsschild niet dicht bestippeld. Bestippeling van de derde, vijfde en zevende tusschenruimten der dekschilden door grovere stippels verdubbeld. Metasternum met eene diagonale lijn, welke van den top der episternen tot aan de basis der achterdijen loopt. Middellijn van het eerste sterniet alleen aan de basis aangeduid. Bovenzijde grijsachtig- of geelachtig-bruin, op de dekschilden hier en daar met eenige zwarte vlekjes. Halsschild met een smallen metaalkleurigen langsband, welke door eene gele lijn middendoor gedeeld is. Bij het ♂ is het tweede voortarsen-lid kort; de dekschilden tusschen de bestippeling glad, bij het ♀ uiterst fijn gechagrineerd. Lengte 4—5½ mm. Verbreed, doch over het algemeen vrij zeldzaam (*aericeps* Curtis) 1. **signaticollis** Charp.

Halsschild zeer dicht bestippeld. Bestippeling van de tusschenruimten der dekschilden gelijkmatig. Metasternum zonder diagonale lijn. Eerste sterniet met eene doorloopende, scherpkielevormige middellijn. Tweede voortarsen-lid bij het ♂ verlengd. 2

- 2 Strepen der dekschilden breed en diep, door grove stippels gekarteld; de tusschenruimten gewelfd, gewoonlijk met twee, meer of minder verwarde stippeellijnen, hier en daar ook wel met eene enkele stippeellijn. Mesosternaal-kiel van voren nagenoeg rechthoekig; voor de middelcoxae hoog, eenigszins hoekig opgericht. Dekschilden meer of minder donkerbruin, met eenige zwarte vlekjes. Kop en halsschild donker metallisch-groen, krachtig en dicht bestippeld. Halsschild met geelachtige zijden en veelal met eene geelachtig gekleurde middellijn. Lengte 3½—4½ mm. Verbreed en op sommige plaatsen gemeen 2. **luridus** L.

Strepen der dekschilden smal en ondiep; de tusschenruimten vlak, dicht bestippeld. Mesosternaal-kiel voor de middelcoxae stomphoekig, van een spitsen tand voorzien. Dekschilden bruin of bruingeel, de kop en eene middenvlek op het halsschild metallisch-groen. Lengte 3½—4½ mm. In brak water. In aantal bij Zierikzee en Middelburg 3. **affinis** Brullé.

II. Sub-Familie SPHAERIDIINAE.

VI. Tribus SPHAERIDIINI.

16. Ceryon Leach.

Sprieten 9-ledig, met 3-ledige knots. Lichaam eivormig, ovaal of kogelvormig-eirond, meestal hoog gewelfd. Oogen niet of nagenoeg niet door de zijlijst van den clypeus uitgesneden. Prosternum en het eerste sterniet altijd gekield; het prosternum is driehoekig en tusschen de voorcoxae uitgetrokken. Mesosternale plaat bijna lijn-vormig, elliptisch of ovaal. Dekschilden aan het uiteinde te zamen afgerond, bij uitzondering aan den naadhoek iets snavelachtig uitgetrokken. Middelcoxae niet ver van elkaar afstaande. De zijden van achterlijf en metasternum dof, het midden glanziger. Schenen samengedrukt, naar het uiteinde meer of minder hoekig verbreed; met korte doorntjes bezet. — De soorten leven in allerlei mest, vochtige aarde, verrotte paddestoelen, vermolmd hout en op vochtige plaatsen onder steenen. Gedurende den winter vliegen zij

op zonnige dagen veelal rond. — De larve en pop van *C. litoralis* en *analis* zijn door Schobbe beschreven; ook nog de larve van *litoralis* door Thomson.

Van de 26 Europeesche soorten komen 19 in Nederland voor.

- 1 Het metasternum is van voren stomp en niet ingesneden; de mesosternaal-kiel is naar achteren versmald (Sub-gen. *Cercyon* i.sp.) 2
- Het metasternum is van voren iets buitig opgericht en van eene insnijding voorzien, waarin de naar achteren zeer weinig versmalde mesosternaal-kiel grijpt (Sub-gen. *Paracercyon* Seidl.). Glanzig zwart, met roodachtig uiteinde der dekschilden; soms breidt zich het rood meer of minder langs den zijrand uit en zijn de zijden van het halsschild en dekschilden geheel rood (ab.c. *marginellus* Payk.). Dekschilden naar het uiteinde sterk versmald, met vrij krachtige stippellijnen; de tussenruimten in twee of drie rijen bestippeld; de negende tussenruimte slechts met eene enkele stippelrij. Tasters en pooten roodachtig. Onuitgekleurde exemplaren zijn soms geheel roodachtig. Zeer kleine exemplaren met spitse dekschilden maken den vorm *acutus* Steph. uit. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Zeer gemeen in vochtige bladaarde 19. *analis* Payk.
- 2 De zijden van het halsschild, nabij de achterhoeken, iets uitgebogen, of ten minste niet gelijkmatig afgerond. Dekschilden over den naad eenigszins platgedrukt. Laatste sterniet met eene kleine verhevenheid aan het uiteinde (*Ercyon* Rey) 3
- De zijden van het halsschild ook naar de basis volkomen afgerond. Dekschilden altijd sterk gewelfd 4
- 3 Voorschenen naar het uiteinde, aan den buitenrand, met eene uitranding en een grooten, krommen, einddoorn. Clypeus iets uitgebogen. Stippellijnen der dekschilden naar het uiteinde verdiept; de tussenruimten van voren vlak, naar het uiteinde gewelfd, fijn en dicht bestippeld. Kop en halsschild zwart, fijn en dicht bestippeld. Halsschild zonder groote stippen aan den achterrand, soms met roodachtige zijden, of geheel rood (ab.c. *ruficollis* Schilsky). Dekschilden zwart, aan het uiteinde veelal geel. Dikwerf is de geheele kever geel, roodachtig, of wel hier en daar rood gevlekt, vooral aan den voorrand der dekschilden (ab.c. *binotatus* Steph.); soms zijn de dekschilden lichtgeel met een zwart vlekje naar het uiteinde. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Zeer gemeen langs de zeekust onder doode visch en aanspoelsel; ook op zeekei. 1. *litoralis* Gylh.
- Voorschenen naar het uiteinde gewoon. Clypeus niet uitgebogen. De zeer fijne stippellijnen der dekschilden op het steeds roode of geelachtige uiteinde verdwijnend; de tussenruimten zeer fijn of onduidelijk bestippeld. Halsschild zeer fijn en dicht bestippeld, aan weerszijden van den achterrand met eene groote stip. Bovenzijde zwart, zeldzamer iets naar het roodachtige trekkend, of met lichtere zijden van het halsschild. Lengte 2— $2\frac{1}{2}$ mm. Met *litoralis*, doch vrij zeldzaam (*dorsostriatus* Ths.) 2. *depressus* Stph.
- 4 Halsschild alzonderlijk gewelfd; aan de basis door eene sleuf van de dekschilden gescheiden. De tiende stippelrij der dekschilden loopt tot aan den schouder door en nadert de zevende lijn. Lichaam glanzig zwart, zeldzamer roodbruin; het uiteinde der dekschilden rood gevlekt. Dekschilden langs de zijden fijner bestippeld dan het halsschild; op het midden van het halsschild fijner en dichter dan over het midden der dekschilden. Pooten donker, met roodachtige tarsen. Lengte $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Niet zeldzaam. (*haemorrhous* Gylh.) 3. *ustulatus* Preysler.
- Halsschild en dekschilden in ééne vlucht gewelfd 5
- 5 Dekschilden minstens aan de basis om het schildje even duidelijk bestippeld als het halsschild; tussenruimten der stippels niet gehagrineerd 6
- Dekschilden niet of zeer onduidelijk bestippeld, steeds veel fijner dan op het halsschild; dekschilden meer of minder gehagrineerd, veelal dof (*Epicercyon* Kuw.) 17
- 6 Bestippeling der tussenruimten, over de geheele oppervlakte der dekschilden, vrij dicht en zeer duidelijk 7
- Bestippeling der tussenruimten op de achterhelft der dekschilden verspreid en zeer onduidelijk. 15
- 7 De zijrand-zoom van het halsschild zet zich niet nabij de achterhoeken op de basis voort. 8
- De zijrand-zoom van het halsschild zet zich op de basis duidelijk voort. Halsschild meer of minder rood gerand. Dekschilden geheel geelachtig, of met een in het midden verbreedend naadband (*Chilocercyon* Seidl.) 14
- 8 Het middengedeelte van het metasternum breidt zich zijwaarts uit, door middel van eene schuine lijn, naar den top der episternen van den metathorax. Halsschild en tasters zwart. 9
- Het middengedeelte van het metasternum zonder deze zijwaarts loopende, schuine lijn 11
- 9 Halsschild met een klein groefje voor het schildje. Lichaam zwart; dekschilden met roodachtig uiteinde, gewoonlijk van af de meer of minder sterk uitpuilende schouders, naar het

uiteinde vrij sterk versmald, met rechten naadhoek. Dijen zwart, schenen en tarsen bruin. Tusschenruimten der dekschilden van voren vlak, naar het uiteinde iets gewelfd. Bij ab.c. *melanocephaloides* Kuw. zijn de dekschilden rood, om het schildje zwartachtig. Lengte 3—3½ mm. Gemeen. (impressus St.) 5. **haemorrhoidalis** F.

Halsschild zonder groefje voor het schildje 10

- 10 Epipleuren en zijranden der dekschilden roodachtig. Dekskildes langs den naad en het schildje, alsook gewoonlijk aan het schoudergedeelte, roodachtig; de naad zelf, en de basis der dekschilden, in den regel zwart. Dekskildes achter de schouders naar het uiteinde slechts weinig versmald, de naadhoek meestal eenigszins spits uitgetrokken. Overigens varieert deze soort, wat betreft de ontwikkeling der stippellijnen en de kleur, aanmerkelijk; soms is het halsschild roodachtig, of bij onuitgekleurde exemplaren het geheele lichaam roodachtig. Bij ab.c. *erythropterus* Muls. zijn de dekschilden rood en slechts de basis en de naad in den vorm van een T zwart; het uiteinde der dekschilden is bleekgeel; ook zijn de schenen lichter gekleurd. Lengte 2½—3 mm. Gemeen. De ab.c. *erythropterus* bij Sleeuwijk. (haemorrhoidalis Bedel) 6. **flavipes** F.

Epipleuren zwart. Dekskildes rood, met zwarte schouders en eene driehoekige, zwarte, scherp begrensde vlek om het schildje; het uiteinde meer geelachtig-rood; de naadhoek soms iets spits uitgetrokken. Pooten bruin. Bij ab.c. **rubripennis* Kuw. ontbreekt de driehoekige scutellairvlek. Zeer gemeen. 7. **melanocephalus** L.

- 11 Dekskildes zwart of roodbruin, soms naar het uiteinde lichter gekleurd, doch zonder scherp begrensde topvlek. 12

Dekskildes zwart, met eene scherp begrensde, geelachtige topvlek. Halsschild zwart, aan de zijden roodachtig gevlekt of met roodachtige zijranden 13

- 12 Halsschild en tasters zwart. Tusschenruimten der dekschilden vlak, fijn en zeer dicht bestippeld. De stippellijn langs den naad is op de voorhelft onduidelijk. Deze soort gelijkt overigens op haemorrhoidalis, doch is naar het uiteinde meer breed afgerond en daardoor meer ovaal. Pooten roodbruin, de dijnen iets donkerder. Soms zijn de dekschilden ook meer naar de basis roodachtig. Lengte 3½—4 mm. Zeer zeldzaam, met haemorrhoidalis. Cuyk (N.-Br.) en in de omstreken van Maastricht. Ook in België bij Vliermael-Roodt, en in de Rijnprov. bij Aken. 4. **obsoletus** Gyll.

Halsschild aan de zijden breed roodachtig. Tasters roestkleurig. Tusschenruimten der dekschilden naar het uiteinde gewelfd. De stippellijn langs den naad zeer duidelijk. Lengte 2½—3 mm. Vrij gemeen 8. **lateralis** Mrsh. 1)

- 13 Mesosternum smal. Lichaam langwerpig-ovaal. Topvlek der dekschilden minder naar binnen ontwikkeld, doch langs den zijrand tot nabij den schouder doorlopende. Dijen zwart, schenen donkerbruin. Tusschenruimten der tamelijk lijne stippellijnen, evenals het halsschild, duidelijk en dicht bestippeld. Lengte 2½—3 mm. Vrij zeldzaam, langs oevers onder steenen en op slib (aquaticus Steph. forte) 9. **marinus** Thoms.

Mesosternum ovaal (*Epicercyon* Kuw.). Lichaam korter ovaal dan marinus. Topvlek der dekschilden naar binnen breder ontwikkeld, doch langs den zijrand slechts tot op de hoogte van het metasternum doorlopende. Overigens als marinus. Lengte 2—3 mm. Vrij gemeen. (aquaticus Lap., Muls., palustris Thoms.) 10. **bifenestratus** Küst.

- 14 Dekskildes geelrood, met eene gemeenschappelijke, zwarte, grootere of kleinere naadvlek achter het midden. Halsschild zwart; met breede, geelroode zijden. Ook is de naad der dekschilden, achter de gemeenschappelijke vlek, zwart. Pooten en tasters roodbruin, eindlid der tasters donkerder. Bij ab.c. **impunctatus* Kuw. ontbreekt de gemeenschappelijke zwarte vlek, doch blijft het achtergedeelte van den naad zwart (mij onbekend). Lengte 2½—3½ mm. Zeer gemeen 11. **unipunctatus** L.

Dekskildes geheel geelachtig. De zijden van het zwarte of donkerbruine halsschild smal roodachtig. Schildje donker. Overigens aan unipunctatus verwant, doch steeds veel kleiner. Pooten en tasters geelachtig. Exemplaren, welke nabij het schildje donkerder gekleurd zijn, zijn als *scutellare* Muls., die, bij welke de zijden van het halsschild breder rood zijn, als *flavus* Mrsh. geduid. Lengte 1½—2½ mm. Vrij gemeen 12. **quisquilius** L.

- 15 Metasternale plaat aan weerszijden van voren door eene schuine zijlijn begrensd, en daardoor in het oogvallend bultig opgericht. 16

1) Bij sommige exemplaren van deze soort, alsook van haemorrhoidalis, zijn de dekschilden naar het midden van de basis soms sterk bultig opgericht

Metasternum zonder deze schuine zijlijn, meer verbreed en meer geleidelijk naar de zijden afhellend. Zwart, de dekschilden met breeden, roodachtigen randzoom en roodachtig uiteinde. Sprietten, tasters en pooten roodachtig. Dekschilden met over de geheele lengte even duidelijke stippellijnen. Bij ab.c. **separandus* Rey zijn de dekschilden bijna geheel roestrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Vrij zeldzaam. (plagiatus Er.) 14. **terminatus** Mrsh.

- 16 De randzoom van het halsschild zet zich zeer lijn op de basis voort. De binnenste stippellijnen der dekschilden zijn van voren zeer duidelijk. Tasters en de zijden van het halsschild roodachtig. Dekschilden roodachtig, veelal over het midden donker gevlekt (ab.c. *centromaculatus* St.). Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer verbreed, in bladaarde, run der leerlooierijen en van broeikassen, waar zij soms rondzwermen en in aantal tegen de ruiten zitten.

13. **nigriceps** Mrsh.

De randzoom van het halsschild zet zich niet op de basis voort. De binnenste stippellijnen der dekschilden worden naar het schildje steeds fijner en verliezen zich soms nagenoeg in de fijne bestippeling der dekschilden. Tasters bruinachtig; sprietten en pooten roodachtig. Kop en halsschild glanzig zwart. Dekschilden in kleur veranderlijk, bij ab.c. *merdarius* St. bijna geheel zwart, slechts met rood uiteinde en lichter gekleurden naad; bij ab.c. *conspurcatus* St. rood, met eene scherp begrensde scutellair-vlek, gedeeltelijk zwarten naad en zwarte schouders. Bij ab.c. *erythropus* Steph. is het lichaam geheel roodachtig, met zwarten kop en iets donkerder midden van het halsschild. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Gemeen in koemest en op mesthoopen. 15. **pygmaeus** Ill.

- 17 De stippellijnen der dekschilden loopen tot aan het uiteinde duidelijk door. 18

De stippellijnen der dekschilden worden naar het uiteinde zwakker. Dekschilden fijn gecha-grineerd, dof. Lichaam ovaal, zwart; de sprietten, tasters en pooten roodbruin. Exemplaren met kastanjebruine dekschilden met roodachtig uiteinde, vormen ab.c. *minutus* Muls. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam. (tristis Ill.) 16. **minutus** F.

- 18 Dekschilden, evenals kop en halsschild, glanzig zwart, nagenoeg eenkleurig; met krachtige stippellijnen; tussenruimten tot aan het uiteinde vlak. Lengte 2 — $2\frac{1}{2}$ mm. Niet zeldzaam langs oevers, onder steenen, dood riet en in aanspoelsel. 17. **granarius** Er.

Dekschilden zeer fijn gehagrineerd, meer of minder dof; evenals kop en halsschild zwart, doch het uiteinde duidelijk roodachtig; met zwakkere stippellijnen, welke naar het uiteinde meer of minder verdiept zijn. Lengte $1\frac{1}{2}$ —bijna 2 mm. Niet zeldzaam. 18. **lugubris** Payk.

17. Megasternum Mulsant.

Sprietten 9-ledig. Oogen niet of nagenoeg niet door de zijlijst van den clypeus uitgesneden. Bovenzijde glad. De zijden van het halsschild niet omgeslagen. Dekschilden met zwakke stippelrijen, nagenoeg onbehaard. Prosternale plaat niet zeer breed, meer of minder vijfhoekig, aan weerszijden in het midden niet hoekig verbreed. Metasternum zonder kielvormige zijlijnen. Mesosternale plaat ongeveer zoo breed als of breeder dan lang. Middelcoxae ver van elkaar afstaande. De zijden van achterlijf en metasternum, evenals het midden, glanzig. Voorschenen naar het uiteinde sterk verbreed, aan de buitenzijde van voren diep uitgerand.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Kort-ovaal, sterk gewelfd, naar het uiteinde versmald; glanzig zwartbruin of roodbruin. Sprietten, tasters en pooten rood. Het tweede knaaktaster-lid sterk verdikt. Dekschilden met fijne stippelrijen. Metasternum sterk en dicht bestippeld. Voorschenen aan het uiteinde, naar buiten, diep uitgerand. Lengte $1\frac{1}{2}$ — 2 mm. Zeer gemeen in rottende paddestoelen, tussen schimmelende bladeren, in vette aarde, in zandkuilen en soms aan grashalmen.

(obscurum Mrsh.) 1. **boletophagum** Mrsh.

18. Cryptopleurum Mulsant.

Bovenzijde dicht bestippeld, weinig glanzig, uiterst fijn behaard. De zijden van het halsschild naar onderen omgeslagen en aldaar driehoekig uitlopende. Dekschilden met sterke langsstrepen, fijn behaard. Prosternale plaat sterk verbreed, aan

weerszijden in het midden hoekig. Metasternum aan weerszijden met eene kielvormige lijn, welke van de achtercoxae tot aan de schouderhoeken loopt. Voorschenen gewoon. Overigens als bij *Megasternum*.

De twee Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

De strepen der dekschilden van af den voorrand tot aan het uiteinde sterk verdiept, daardoor de tusschenruimten over de geheele lengte sterk gewelfd. Halsschild aan den achterrand duidelijk gerand. Lichaam zwart, met roodachtig uiteinde der dekschilden. Sprieten en tasters donkerbruin, pooten roodachtig. Lengte 2—2½ mm. Verbreed, doch zeldzaam. Ook in België (Fleurus) (Vaucheri Tourn.) 1. *crenatum* Panz.

De strepen der dekschilden aan de basis niet verdiept, de tusschenruimten daardoor bijna vlak, nagenoeg niet gewelfd. Halsschild aan den achterrand onduidelijk of niet gerand. Lichaam zwart, met roodachtig uiteinde der dekschilden, en meestal met roodachtige schouderhoeken. Sprieten en tasters bruin, pooten roodachtig. Roodachtige exemplaren vormen ab.c *sordidum* Mrsh. Lengte 1½—2 mm. Zeer gemeen.

(minutum Herbst) 2. *atomarium* Ol.

19. Sphaeridium Fabr

Sprieten 8-ledig, met 3-ledige knots. Oogen door de zijlijst van den clypeus duidelijk uitgesneden. Lichaam meer of minder half-kogelvormig. Dekschilden aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond, slechts met eene naadstreep. Schildje zeer smal, tweemaal zoo lang als breed. Prosternum in eene lange spits uitgetrokken. Mesosternum in het midden tot eene loodrechte, of naar voren afvallende lijst of plaat opgericht. Schenen samengedrukt, naar het uiteinde meer of minder hoekig verbreed; vrij sterk gedoornd. Bij het ♂ zijn de eerste 4 voortarsen-ledjes zeer kort, het klauwled sterk verbreed, de buitenste klauw sterk ankervormig gebogen — De larven van beide soorten zijn door Schiödte beschreven, ook de pop van *S. scarabaeoides*.

De twee Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Achterhoeken van het halsschild stomp. De zwarte naad deelt de gemeenschappelijke, roodgele topvlek der dekschilden middendoor. Halsschild gewoonlijk geheel zwart, zeldzamer met smallen gelen zijrand. Dekschilden met roode schoudervlek. Dijen bruingeel, met breede, zwarte vlekken, of wel geheel zwart (*scarabaeoides* St. Ill.); schenen bruingeel met zwarte uiteinden, of bijna geheel zwart. Bij ab.c *lunatum* F. ontbreekt de roode schoudervlek. Bij ab.s. *striolatum* Heer vertoonen de dekschilden uiterst fijne stippelrijen (St. Pieter bij Maastricht). Lengte 4½—6½ mm. Zeer gemeen in mest van plantetende zoogdieren, vooral in verschen koemest 1. *scarabaeoides* L.

Achterhoeken van het halsschild recht, meer scherp aangeduid. De topvlek der dekschilden neemt aldaar ook het gedeelte van den naad in. Halsschild bijna altijd zeer fijn geel gerand, ook de zijden der dekschilden meestal fijn geelachtig gerand. Pooten bruingeel, het midden der dijnen donkerder. Bij het type heeft men slechts de twee samenkomende, gele topvlekken der dekschilden; bij ab.c. 4-*maculatum* Mrsh. bovendien met eene roodachtige schoudervlek; bij ab.c. *humeralis* Westh. (*bimaculatum* Kuw.) slechts met de twee schoudervlekken. De ab.c. *marginatum* F. heeft ongekleurde dekschilden; onuitgekleurde exemplaren vormen *testaceus* Heer. Bij ab.s. *semistriatum* Lap. vertoonen de dekschilden zeer fijne, maar duidelijke stippelrijen. Lengte 4—5 mm. Zeer gemeen; als de vorige. De ab.s. *semistriatum* zeer zeldzaam 2. *bipustulatum* F.

VII. Tribus COELOSTOMINI.

20. Coelostoma Brullé.

(Cyclonotum Er.)

Sprieten 9-ledig, de laatste 3 ledjes eene langwerpige knots vormend. Voorkaken met tweetandigen top. Kin aan de voorzijde diep uitgehold. Lichaam nagenoeg half-kogelvormig, hoog gewelfd. Dekschilden slechts met eene naadstreep. Mesosternum klein

en smal, met het puntig naar voren uitstekende metasternum tot een spitsen tand vereenigd, welke tot de tegen elkaar staande voorcoxae reikt. Schenen samengedrukt, naar het uiteinde weinig verbreed, kort gedoord.

Van de 5 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Kort-ovaal of rondachtig, sterk gewelfd; glanzig zwart, overal dicht bestippeld. De sprietwortel en de tarsen geelachtig. De randen van halsschild en dekschilden soms iets lichter gekleurd. Dekschilden met duidelijke naadstreep. Lengte $3\frac{1}{2}$ —4 mm. Gemeen in staande wateren en gedurende den winter onder vochtig mos en vochtige bladeren langs slooten.

1. *orbiculare* F.

III. Sub-Familie HELOPHORINAE.

VIII. Tribus SPERCHEINI.

21. *Sperchens* Kugelann.

Sprieten 6-ledig; het tweede lid groot, kogelvormig, sterk bewimperd; de laatste 4 leedjes eene knots vormend (Fig. 61). Bovenlip door den ver uitstekenden, van voren diep uitgeranden clypeus bedekt; de randen van den clypeus eenigszins opwaarts gebogen. Buitenste achterkaaks lob hoornachtig, met een haarbundel aan het uiteinde. Lichaam kort-eirond, hoog gewelfd. Schildje smal driehoekig. Dekschilden in rijen bestippeld. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren open. De eerste 4 tarsleedjes even lang. Achterlijf met 5 sterniten

De eenige Europeesche soort, welke een zeer traag dier is en niet zwemmen kan, komt ook in Nederland voor.

Lichaam hoog gewelfd, tamelijk breed. op de bovenzijde meer of minder dof, soms iets meer glanzig; geel- of roodbruin, veelal met donkere vlekjes op de dekschilden. Kop, het midden van het halsschild en het schildje donkerbruin, grof en rimpelig bestippeld. Dekschilden langs de randen sterk gebogen en met de aanduiding van langsribben, vooral langs de zijden. Schenen in de lengte scherp gekield. Zij bezit een stridulatieorgaan. Lengte $5\frac{1}{2}$ —7 mm. Gemeen aan oevers van modderpoelen, aan graswortels. De wijfjes dragen een eierzak, aan de achtercoxae bevestigd; de larven leven van prooi. De larve is door *Cussac*, van *Kiesenwetter* en *Schödt*, de pop door *Cussac*, en de eierzak door *γ. Kiesenwetter* beschreven. 1. *emarginatus* Schaller.

IX. Tribus HELOPHORINI.

22. *Helophorus* Fabr.

Sprieten 9-ledig, met 3 ledige knots. Bovenlip onbedekt. De beide achterkaakslobben lederachtig. Kaak- en liptasters lang. Kin van voren afgerond. Lichaam meer of minder langwerpig-ovaal of langgestrekt, niet sterk gewelfd. Halsschild in den regel breeder dan lang, met vijf diepe langsgroeven. Dekschilden met stippellijnen, veelal ook geribd. Achterlijf met 5 duidelijke, vlakke sterniten. Voorcoxae tegen elkaar aanstootend. Eerste tarslid zeer kort; tweede achtertarsen lid langer dan het derde. De sexuele verschillen vallen weinig in 't oog; volgens Thomson zou bij het ♂ het midden van het halsschild glanziger, bij het ♀ de klauwen aan de basis sterker gebogen zijn. — De soorten leven vooral in staande wateren, tusschen wieren en andere planten; ook langs oevers op slib en zand; zeldzamer langs stroomend water. Zij zwemmen niet. — De larven voeden zich met dierlijke stoffen. Volgens Perris zouden de larven van *H. rugosus* Oliv. in de stengels van een Crucifeer leven, waarin zij Halticiden-larven verstoppen. — De larve van *H. rugosus* is door Perris, de larve en eierzak van *aquaticus*, alsook de larve en pop van *granularis* zijn door *Schödt* beschreven.

Van de ± 60 Europeesche soorten komen 21 in Nederland voor

- 1 De afwisselende tusschenruimten der dekschilden zijn ketenvormig, bultig opgericht (Sub-gen. *Cyphelophorus* Kuw.). Zwart; de pooten donker roodbruin. Dekschilden met stippellijnen; de derde en zevende tusschenruimte aan de basis sterk kielvormig opgericht en aldaar, evenals de bultige verhevenheden der derde, vijfde en zevende tusschenruimten en de naad, metallisch glanzig; achter het schildje ingedrukt. Kop en halsschild sterk gekorrelt, met vijf langsgroeven. Lengte 3 mm. Deze soort, welke meestal langs de stranden van Noord-Europa, onder zeewier voorkomt, vond ik eenmaal bij den Haag langs eene duinsloot; ook bij Zeeburg (Amsterdam). Op het eiland Borkum 1. **tuberculatus** Gyll.
- De afwisselende tusschenruimten der dekschilden zijn niet bultig opgericht, doch hoogstens over de geheele lengte kielvormig verheven, of wel in het geheel niet opgericht 2
- 2 Het laatste kaaktaster-lid spoelvormig, volkomen bilateraal-symmetrisch 3
- Het laatste kaaktaster-lid niet spoelvormig, doch asymmetrisch; langs eene zijde bultig verdikt, of naar het uiteinde aan eene zijde knotsvormig 7
- 3 Dekschilden met eene afgekorte stippellijn en gewoonlijk ook met eene afgekorte kiellijn naast het schildje. De afwisselende tusschenruimten zijn over de geheele lengte gekield en met in rijen geplaatste, naa. achteren gebogen, opstaande borsteltjes bezet (Sub-gen. *Empleurus* Hope, *Trichelophorus* Kuw.). De soorten van dit sub-genus leven meestal buiten het water, langs oevers. 4
- Dekschilden zonder afgekorte stippellijn naast het schildje. De afwisselende tusschenruimten veelal verheven (Sub-gen. *Attractohelophorus* Kuw.) 6
- 4 De middelste bultige langs-verhevenheden van het halsschild zijn achter den voorrand diep ingedrukt en daarachter bultig opgericht; de zijdelingsche verhevenheden zijn door een indruk in twee bulten verdeeld. Lichaam bruineel, halsschild gewoonlijk iets meer roestkleurig; dekschilden met zeer veranderlijke, zwarte dwarsbanden en vlekjes. Achterhoeken van het halsschild scherp, de schouderhoeken der dekschilden tandvormig. Pooten roestkleurig-geel. Lengte $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch zeldzaam.
(*fennicus* Payk., *rufipes* Bosc.) 2. **rugosus** Oliv.
- De middelste bultige langs-verhevenheden van het halsschild zijn achter den voorrand niet diep ingedrukt. 5
- 5 Halsschild naar voren iets versmald, met stompe achterhoeken en sterk uitgetrokken, afgeronde voorhoeken. Lichaam als bij *rugosus* gekleurd. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed, met zeer sterk verheven, afwisselende tusschenruimten; bruin- of geelachtig, met zeer veranderlijke, zwarte, bandvormige dwarsvlekjes. Lichaam meer of minder viltig, na afslijting glanzig. Lengte 4—5 mm. Verbreid en meer algemeen dan *rugosus*.
(*rugosus* Duft. nec Oliv.) 3. **porculus** Bedel.
- Halsschild naar voren iets verbreed, met minder stompe achterhoeken en minder uitgetrokken, gewoonlijk scherpe voorhoeken. Lichaam geelbruin, bruin of zwartachtig; veelal de kop zwart, het halsschild roodbruin en de dekschilden geelbruin, gewoonlijk met zwarte dwarsbanden of dwarsvlekjes, welke veelal onder eene viltige bekleeding minder in 't oog vallen. Dekschilden ongeveer tweemaal zoo lang als breed, achter het midden eenigszins buikig verbreed, aan het uiteinde duidelijk versmald, achter de schouders ingedrukt. Bij de var. *costatus* Goeze zijn de dekschilden weinig of niet verbreed en aan het uiteinde meer stomp afgerond; gewoonlijk minder gevlekt en veelal geheel donker; ook is het laatste kaaktaster-lid spits. Ik zag een lichtgeel typisch exemplaar, uit België (Antwerpen), met donkeren kop en roestkleurig halsschild. Lengte 3— $3\frac{1}{2}$ mm. Gemeen 4. **nubilus** F. 1)
- 6 De afwisselende tusschenruimten der dekschilden, over de geheele lengte, meer kielvormig verheven. Dekschilden met diep gegroefde, grove stippellijnen. Halsschild gewelfd, vóór het midden verbreed. Kop en halsschild meer of minder metaalglanzig, grof gekorrelt. Lichaam tamelijk kort, dik gewelfd. Dekschilden geelbruin, met eene gemeenschappelijke, zwarte, pijlvormige vlek en eenige verspreide, donkere vlekjes. Pooten bruinrood. Sommige exemplaren zijn meer donkerbruin. Lengte 3—3' mm. Niet zeldzaam langs de Maas bij Maastricht en Roermond; ook bij Zierikzee en Ommen. 5. **arvernicus** Muls.
- De afwisselende tusschenruimten der dekschilden niet kielvormig verheven, hoogstens een weinig gewelfd, gewoonlijk iets breeder dan de stippellijnen. Halsschild naar voren verbreed, niet gewelfd; zwartbruin, veelal groen- of blauwachtig, metallisch glanzig of bronskleurig, veelal geel gerand; evenals de kop duidelijk gekorrelt. Dekschilden geelbruin, hier en daar donker gevlekt. Tasters en pooten roodachtig-geelbruin, de dijbasen en het uiteinde der tasters meestal donkerder. Het laatste kaaktaster-lid is in het midden sterk verdikt en plomp,

1) De door Dr. O. Schneider uit Borkum opgegeven *H. Schmidti* Villa is vermoedelijk een vorm van *nubilus* F.; ik zag daarvan geen exemplaren. *H. Schmidti* is eene soort uit het hooggebergte.

- niet lijn toegespitst. Exemplaren, welke veelal iets grooter en smaller zijn dan het type, met in het midden minder verdikt, meer toegespitst kaaktaster-eindlid, vormen de var. *brevipalpis* Bedel. Lengte 2½—3 mm. Gemeen, met de variëteit . (granarius Thoms.) 6. **griseus** Herbst.
- 7 Dekschilden met eene afgekorte stippellijn naast het schildje (Sub-gen. *Megahelophorus* Kuw.) 8
- Dekschilden zonder afgekorte stippellijn naast het schildje (Sub-gen. *Rhopalhelophorus* Kuw.) 9
- 8 Uiteinde van den laatsten achterlijfsring op den bovenkant lijn kamvormig gezaagd. De middelste verhevene gedeelten, tusschen de langsgroeven, van het halsschild zeer duidelijk en scherp gekorrelt. Kop en halsschild meestal sterk metallisch-groenachtig, veelal met roodachtig-goudglanzige zijranden. Het kleinere ♂ is geheel donker bronskleurig; het grootere ♀ heeft geel- of grauwbrown, meer of minder groenachtig-glanzige dekschilden, welke meestal een donker vlekje vertoonen. Lengte 6—7½ mm. Overal zeer gemeen.
- (grandis Ill.) 7. **aquaticus** L.
- Uiteinde van den laatsten achterlijfsring niet kamvormig gezaagd. De middelste verhevene gedeelten, tusschen de langsgroeven, van het halsschild, zijn veel zwakker gekorrelt, de korreltjes zelf als platgeslagen knopjes. Lichaam metallisch-groenachtig, met gewoonlijk bruine of in het grijsbruin overgaande dekschilden. Tusschenruimten der dekschilden vlakker dan bij *aquaticus*. Lengte 4—6 mm. Even verbreid als *aquaticus*, doch minder algemeen.
- (frigidus Bedel, Kuw.) 8. **aequalis** Thoms.
- 9 Halsschild sterk gewelfd; de beide, duidelijk gewelfde, middelste gedeelten door eene diepe, in haar midden nog meer verbreede of verdiepte, middengroef gescheiden. Dekschilden met krachtige of diep gegroefde stippellijnen en met smallere gekielde of gewelfde tusschenruimten 10
- Halsschild, hetzij niet zoo sterk gewelfd, hetzij zeer vlak; of de middengroef is in het midden niet dieper uitgehold, of de dekschilden vertoonen breedere of niet gewelfde tusschenruimten 12
- 10 Dekschilden bruinachtig of geelbruin, donker wolkachtig gevlekt; elk met een langwerpige licht stipvlekje op de tweede tusschenruimte, onmiddellijk voor de gemeenschappelijke donkere rugvlek; bovendien met een meer of minder duidelijk licht vlekje op het ingedrukte gedeelte der dekschilden achter het schildje op de derde en vierde tusschenruimte. Kop en halsschild meer of minder fraai groen of roodkoperkleurig metallisch, duidelijk en vrij sterk gekorrelt. Dekschilden met sterk gewelfde, veelal afwisselend iets meer gekielde tusschenruimten. Tasters en pooten geel of geelrood, de klauwleedjes en het laatste tasterlid met zwart uiteinde. Lengte 3½—4 mm. Zeer zeldzaam; Zeeburg, Naarden, Utrecht, Breda en in de omstreken van Maastricht. Ook in België en in de Rijnprov. bij Elberfeld.
- (Mulsanti Rye) 9. **dorsalis** Mrsh.
- Dekschilden zonder dergelijke lichtere vlekjes. 11
- 11 De voorheft van het laatste kaaktasterlid is scherp donker gekleurd. De binnenste groeven van het halsschild zeer zwak gebogen, bijna recht; de geheele middengroef diep. Dekschilden slechts 1½—1¾ maal zoo lang als te zamen breed. Het sterk gewelfde halsschild vertoont een sterken, purperachtigen glans en is, behalve over het midden der middelste verhevenheden, duidelijk gekorrelt. Dekschilden sterk gewelfd, met kielvormig verheven tusschenruimten, welke smaller zijn dan de stippellijnen; zwartbruin, met geringen metallischen weerschijn. Coxae en dijën donker, schenen en tarsen bruingeel. Lengte 2½—2¾ mm. Zeer zeldzaam, in slooten op turfgrond; Breda, Leiden en Wassenaar. Ook in België.
10. **fallax** Kuw.
- Het laatste kaaktasterlid slechts aan het uiteinde donker gekleurd. De binnenste groeven van het halsschild duidelijk in het midden naar buiten gekromd; de middengroef in het midden duidelijk verdiept en meestal eenigszins verbreed. Dekschilden 2½ maal zoo lang als te zamen breed. Kop en halsschild metallisch glanzig, duidelijk gekorrelt. Dekschilden iets minder sterk gewelfd dan bij *fallax*; met sterk kielvormig verheven tusschenruimten, van welke de afwisselenden soms nog iets meer verheven en breeder zijn dan de stippellijnen; donkerbruin tot zwartbruin, soms met geringen metaalglans; enkele malen met zichtbare naadvlak. Tasters en pooten geheel bruingeel. Lengte 3—3½ mm. Zeer zeldzaam; Breda en Cuyk in N.-Brab. Ook in België bij Calmpthout en in de prov. Limburg. 11. **strigifrons** Thoms.
- 12 Voorhoofd in den regel, aan weerszijden, met een scheef tegen de vorklijn gericht, schuin streepje. Dekschilden met diepe stippellijnen en smalle, kantige tusschenruimten. Middengroef van het halsschild in het midden niet verdiept of verbreed. Kleine soorten van 2—2½ mm. lengte. 13
- Voorhoofd zonder dit streepje. Meestal grootere soorten. 14
- 13 Het tamelijk gewelfde halsschild nagenoeg altijd van achteren het breedst; gewoonlijk zeer blinkend, soms op de middelste, verheven gedeelten iets rimpelig, doch niet korrelig, wel

daarentegen iets aan de zijden. De binnenste groeven nagenoeg recht, met eene zeer flauwe buiging naar buiten. Kop en halsschild donker koperkleurig, of blauwachtig metallisch glanzig. Dekschilden lichter of donkerder geelbruin, met eene donkere, meestal metallisch glanzige rugvlek, die soms de geheele bovenzijde der dekschilden inneemt. Het schuin geplaatste streepje op het voorhoofd duidelijk, slechts hoogst zelden ontbrekend. De absc. **pallidulus* Thoms. is lichter gekleurd, veelal met gelen voor- en zijrand van het halsschild, met eenkleurig gele of geelbruine dekschilden, zonder rugvlek 1). Lengte 2 — 2½ mm. Zeer zeldzaam; Gorkum en Utrecht. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld 12. *nanus* St.

Het weinig gewelfde halsschild meer van gelijke breedte, slechts zeer zwak in, of kort voor het midden verbreed; de binnenste groeven nagenoeg recht, of in het midden slechts iets naar buiten gebogen; alle verheven gedeelten meer of minder dicht en gelijkmatig, lijn korrelig. Dekschilden geelbruin tot zwartbruin, met of zonder donkere rugvlek, alsook met of zonder den bronsglans van het halsschild; dit laatste hetzij zwartachtig en zeer sterk en dicht korrelig en meer of minder dof, of wat minder korrelig en dan sterk brons- of goudglanzig. Lichaam smaller en vlakker dan bij *nanus*. Het schuin geplaatste streepje op het voorhoofd ontbreekt veelal. Lengte 2 — 2½ mm. Zeer verbreed, doch overal zeldzaam.

13. *pumilio* Er.

- 14 Het breed afgeronde, tamelijk vlakke halsschild in het breedste gedeelte (hetwelk vóór of nagenoeg in het midden gelegen is) bijna zoo breed als het breedste gedeelte der dekschilden. De middengroef niet in het midden verdiept, de binnenste groeven in het midden vrij sterk naar buiten gebogen en nabij den achterrand in 't oog vallend divergeerend. Halsschild sterk goudglanzig, gelijkmatig en sterk korrelig. Dekschilden met sterk bestippelde kerfstrepen en gewelfde tussenruimten; geelbruin, meer of minder met donkere wolkvlekjes en veelal een weinig bronzig. Lengte 3½ — 4½ mm. Langs de zeekust: Zeeburg bij Amsterdam; ook op Texel. In België langs de Schelde bij Lillo 14. *crenatus* Rey. 2)

Het niet opvallend sterk verbreedde halsschild smaller dan de grootste breedte der dekschilden 15

- 15 Lichaam zeer vlak. Halsschild zeer smal, naar achteren sterk versmald, op het breedste gedeelte smaller dan de voorrand der dekschilden; met niet gekorrelde, doch gladde, vlakke, sterk glanzige, verheven gedeelten. Kop en halsschild goud-, groen- of purperglanzig. De groeven op het halsschild breed, de binnensten iets in het midden uitgebogen. De dekschilden zijn achter het midden sterk verbreed, het achterlijf zeer overschrijdend; geel met lichtere en donkere vlekjes, hier en daar in wolkjes aangeduid; soms zijn zij eenkleurig. Halsschild meestal met breeden, gelen voor- en zijrand. Dekschilden met lijne stippellijnen en effen tussenruimten. Lengte 2½ — 4 mm. Zeer zeldzaam; ik zag een exemplaar uit Blijenbeek bij Roermond. Ook in België bij St. Gilles (dorsalis Er.) 15. *Erichsonii* Bach.

Lichaam minder vlak. Halsschild op het breedste gedeelte niet smaller dan de voorrand der dekschilden, veelal breeder. Dekschilden zelden over het pygidium verlengd. 16

- 16 Dekschilden geel of geelbruin. Lichaam vrij smal 17

Dekschilden donker gekleurd, of wel bruinachtig, in welk geval het lichaam breeder en gedrongen is 19

- 17 Lichaam bijna 4½ mm. lang. Achterlijf naar verhouding lang. De verheven gedeelten van het halsschild zijn gelijkmatig en sterk gekorrelde. Halsschild kort, aan de basis smaller dan de dekschilden aan de schouders, zwak gewelfd; groen-metallisch, met gelijk breede, niet zeer diepe, goudglanzige groeven; de binnenste groeven in het midden niet sterk naar buiten gebogen, eenigszins tegen den voorrand convergeerend, aan den achterrand iets naar buiten gericht; de zijgroeven bijna recht. Dekschilden tot over het midden met parallelle zijden, met krachtige kerfstrepen en sterk gewelfde tussenruimten, welke van boven gezien, eenigszins ruw schijnen; geelbruin, met donkere naadvlek en aan weerszijden daarvan met nog een paar donkere vlekjes. Tasters en pooten licht geelbruin. Onderzijde zwart, iets viltig; de sterniten geelachtig gerand. Ik zag een exemplaar in het Brusselsch Museum, bij Sluiskill nabij Ter Neuzen gevangen (Coll. v. d. Bruck). Zij zou ook bij Ridderborn (Belg. Limburg) gevangen zijn. Wellicht een afwijkende vorm van *crenatus*.

17. *asperatus* Rey.

Lichaam 2½ — 3½ mm. lang. Achterlijf naar verhouding korter 18

- 18 De binnenste groeven van het halsschild bijna recht. Lichaam iets meer gewelfd dan bij *granularis*. Laatste laptaster-lid kort behaard. Het vilt op de randen der sterniten gaat niet in eene beharing over. Keel diep ingedrukt. De gevorkte lijn op het voorhoofd

1) De vroegere opgave uit Nederland berust op onjuiste determinatie.

2) Ik vermoed dat de door Dr. O. Schneider uit Borkum opgegeven *H. umbilicellus* Kuw. tot *crenatus* Rey behoort, ik zag geen exemplaren *H. umbilicellus* komt in Zwitserland en Tirol voor, volgens opgave van O. Schneider ook in Thüringen.

dieper dan bij *granularis*. Halsschild overal zwak-, aan de zijden iets sterker gekorrelt; op het midden groen-, aan de zijden goudglanzig, zelden meer geheel roodkoperkleurig. Dekschilden ongeveer 2½ maal zoo lang als te zamen breed, de stippels der niet krachtige lijnen zeer dicht opeenstaande; met smalle, vlakke tusschenruimten; eenkleurig geelbruin of bruingeel, met eene onduidelijke, donkere pijlvlek, langs de zijden in 't geel overgaande. Tasters en pooten geel; klauwlied der tarsen aan het uiteinde, benevens de klauwen, donkerder. Wellicht een afwijkende vorm van *granularis*. Lengte 2½—3½ mm. Zeer zeldzaam; Breda, Zutphen, Laag-Soeren en St. Pieter. In België bij Hastière, St. Gilles en Duffel. 16. *discrepans* Rey.

De binnenste groeven van het halsschild in het midden iets naar buiten gebogen. Laatste liptaster-lid vrij lang behaard. Uiteinde van het achterlijf duidelijk behaard. Keel zwak ingedrukt. Halsschild op de middelste verhevenheden duidelijk gekorrelt; goudgroen, koperkleurig, purperrood, violet of donker metallisch, soms zwartachtig; langs de randen gewoonlijk goudkleurig-groen of geelkoperkleurig, met of zonder gelen voor- en zijrand. Dekschilden iets korter; bleekgeel of bruingeel, met eene gemeenschappelijke, donkere pijlvlek; overigens met donkere wolkjes en soms met eene rondachtige, lichtere vlek voor het uiteinde. Pooten geel; het klauwlied aan het uiteinde zwart; zoo ook het lange taster-eindlid aan het uiteinde zwart. Bij *abs. affinis* Mrsh. zijn de middelste verhevenheden van het halsschild nagenoeg niet gekorrelt en blinkend. De var. *brevicollis* Thoms. heeft een duidelijk gekorrelt halsschild, iets kortere dekschilden, welke gewoonlijk donkerder bruinachtig zijn, met diepe stippellijnen en meer of minder kielvormige tusschenruimten; onderzijde minder viltig; pooten of minstens de dijen donkerder gekleurd. Lengte 2½—3½ mm. Gemeen; de *abs. affinis* bij St. Pieter, Breda en aan den Hoek van Holland; de var. *brevicollis* bij Sleeuwijk, Breda en Laag Soeren. 18. *granularis* L. 1)

- 19 De achter het schildje gewoonlijk niet ingedrukte dekschilden donkerbruin, met 4 of 6 grootte, ronde, gele vlekken. Lichaam breed, gedrongen, gewelfd; met op de bovenzijde tamelijk vlak halsschild. Dekschilden met zeer grootte stippels in de rijen en iets gewelfde tusschenruimten; achter het midden iets verbreed. Halsschild zeer sterk glanzig metallisch, met bijna gladde verheven middengedeelten. Tasters en pooten geel. Bij het ♂ zijn de vlekken op de dekschilden dikwerf nauwelijks aangeduid. Wellicht een afwijkende vorm van *aeneipennis*. Lengte 3—3½ mm. Eenmaal bij Bunde nabij Maastricht. Ook in België bij Ridderborn, Soignies en Lessines. (? *Demonini* Mathieu) . . . 19 *quadrisignatus* Bach.

De achter het schildje bijna altijd ingedrukte dekschilden zijn hetzij eenkleurig bronzig-zwart, donker metallisch, of wel metallisch bruin, met eenige donkere vlekken. 20

- 20 Dekschilden eenkleurig bronzig-zwart of donker metallisch, zelden met eenige aanduiding van eene rugvlek. Middengroef van het halsschild in het midden niet breder uitgehold. De middelste verheven gedeelten van het halsschild zijn weinig uitgebogen. Dekschilden gewoonlijk iets smaller dan bij *obscurus*, achter het midden eenigszins verbreed; met iets gewelfde tusschenruimten der stippellijnen. Tasters en pooten roestkleurig; eindlid der tasters aan het uiteinde iets donkerder. Lengte 2½—3½ mm. Verbreed en op sommige plaatsen niet zeldzaam. (*granularis* Gyll., *aquaticus* Er.) 20. *aeneipennis* Thoms.

Dekschilden bruin, met metallischen weerschijn; eene donkere naadvlek en aan weerszijden een of meer donkere vlekjes; veelal nog met een licht rond vlekje voor het uiteinde. Middengroef van het halsschild in het midden iets uitgehold of verbreed; de middelste verheven gedeelten vrij sterk uitgebogen. Dekschilden naar achteren iets verbreed en aan de zijden sterk gewelfd, op de bovenzijde vlak, veelal met gewelfde tusschenruimten. Tasters en pooten roestgeel, eindlid der tasters aan het uiteinde donkerder, zoo ook het laatste tarslid. Lengte 3—4 mm. Overal gemeen. Vermoedelijk een afwijkende vorm van *aeneipennis*. 21. *obscurus* Muls.

23. *Hydrochus* Leach.

Sprieten 7-ledig, met 3-ledige knots. Bovenlip iets vooruitstekend, afgerond. Eindlid der kaaktasters nauwelijks half zoo lang als de kop. Liptasters kort, het eindlid eivormig. Oogen uitpuilend. Halsschild zoo lang als, of langer dan breed, naar achteren versmald; met 5 verspreid staande groeven. Dekschilden met rijen van krachtige stippen en meestal met kielvormig verheven langsstrepen. Prosternum niet gekield. Achterlijf met 5 sterniten, van welke het tweede tot vijfde in de breedte kantig opgericht

1) Wat O. Schneider met *H. elongatus* Schaller? (uit Borkum) bedoelt is mij niet duidelijk; er schijnt wel een *H. elongatus* Motsch. bij Berlijn voor te komen; deze is mij echter onbekend.

is; het vijfde met eene rliezige lob aan het uiteinde. Het tweede lid der achtertarsen even lang als het derde. Onderzijde van het lichaam viltig behaard; de bovenzijde veelal metaalglanzig. — De soorten van dit genus leven, evenals die van *Helophorus*, in en langs staande wateren, onder aangespoelde plantendeelen en aan de wortels van waterplanten. Hare bewegingen zijn uiterst langzaam.

Van de 14 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

- 1 De derde en vijfde tussenruimten der dekschilden, minstens op het voorste gedeelte, kielvormig verheven 2
- De derde en vijfde tussenruimten der dekschilden niet kielvormig verheven; de zesde tussenruimte iets meer gewelfd dan de overigen, de achtste in het midden met eene kleine langsverhevenheid; de stippels der langsribben diep en zeer grof. Dekschilden zeer lang, duidelijk breeder dan het halsschild, aan het uiteinde met twee rondachtige, grootere stippels. Halsschild grof bestippeld, met 5 ondiepe groeven. De geheele bovenzijde gewoonlijk groenachtig-bronskleurig of iets koperkleurig, zeldzamer zwartbruin zonder metaalglans. Pooten roodachtig met donkerder knieën en zwartachtig uiteinde van het klauwlied. Lengte $3-3\frac{1}{2}$ mm. Vooral in de diluviale streken niet zeldzaam; ook bij Amsterdam en op Texel. 1. **angustatus** Germ. 1)
- 2 De derde en vijfde tussenruimten der dekschilden op de voorhelft, de vierde op de achterhelft, de vijfde bovendien op twee plaatsen van de achterhelft, alsook de zevende en negende meer of minder kielvormig verheven. Lichaam zwart, gewoonlijk zonder eenigen metaalglans; of wel het halsschild en de langsribben der dekschilden of alleen het halsschild groenachtig-bronskleurig; soms is de geheele kever groen- of blauwachtig metaalglanzig. Exemplaren met fraai goudglanzig halsschild werden als *ignicolis* Motsch. geduid (bij Maastricht). Halsschild sterk bestippeld, met 5 indrukken. Dekschilden vrij lang. Pooten donker roodbruin. Het ♀ veelal breeder dan het ♂. Lengte $3\frac{1}{2}-4$ mm. Op sommige plaatsen niet zeldzaam 2. **elongatus** Schall.
- De derde en vijfde tussenruimten loopen onafgebroken kielvormig-verheven door, de vierde is niet kielvormig verheven 3
- 3 Lichaam smal, de dekschilden elliptisch. De voorrand van het halsschild zoo breed als de kop met de oogen. Pooten geheel, of alleen de schenen roodachtig. Halsschild met eenige zwakke indrukken, evenals de kop grof bestippeld. Lichaam zwart of pekbruin, de langsribben der dekschilden soms blauwgroen. Lengte $2\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$ mm. Verbreid en op sommige plaatsen in aantal gevangen 3. **carinatus** Germ.
- Lichaam korter en meer gedrongen; de dekschilden eivormig, naar het uiteinde verbreed. De voorrand van het halsschild is iets breeder dan de kop met de oogen. Pooten in den regel geheel zwart, zelden donker roodbruin. Halsschild met duidelijke indrukken, evenals de kop grof bestippeld. Lichaam zwart. Lengte $2\frac{3}{4}-3\frac{1}{2}$ mm. Verbreid, doch over het algemeen zeldzaam. In aantal op Texel. 4. **brevis** Herbst.

X. Tribus HYDRAENINI.

24. Ochthebius Leach.

Sprieten 9-ledig; het eerste lid bijna half zoo lang als het overige gedeelte; de laatste 5 leedjes tot eene knots verdikt. Bovenlip meer of minder uitgerand. Kaaktasters slechts matig lang; het eindlid spits, korter en dunner dan het voorlaatste, soms uiterst kort en als in het voorgaande lid verborgen. Liptasters zeer kort. Halsschild naar achteren versmald, aan de zijden gewoonlijk met een wit- of geelachtig membraan omzoomd; in den regel met vier kleine, ronde groeffjes en met eene verdiepte langsgroef over het midden; de omgeslagen zijrand met eene sprietgroef. Voorcoxae niet door eene kielvormige voortzetting van het prosternum gescheiden. Achtercoxae tegen elkaar aanstaande. Achterlijf met 6 sterniten. — De soorten zijn kleine kevertjes, welke gemakkelijk te herkennen zijn aan de twee diepe groeffjes op het voorhoofd tusschen de oogen. Zij leven zoowel in stroomend als in stilstaand, velen in ziltig water; meestal aan plantenstengels, ook in aanspoelsel. De larven voeden zich met het mos, dat op

1) De door Kneert uit Middel- en Zuid-Europa opgegeven *H. brevicornis* Dahl (Rey) is m. i. niet van *angustatus* Germ. te onderscheiden.

steen in het water groeit. — De larve en pop van *O. exculptus* zijn door Wailes beschreven.

Van de ± 70 Europeesche soorten komen 8 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden van af de schouders tot aan den naadhoek met een duidelijken, breedten randzoom (Sub-gen. *Henicoecerus* Steph.) 2

Dekschilden hoogstens met eene geringe aanduiding van randzoom in het midden. 3

- 2 Halsschild in het midden zeer sterk verbreed, bij het ♂ hoog gewelfd, naar de basis haakvormig versmald; zonder scherphoekige uitranding en met nauwelijks waarneembaar membraan aan de achterhoeken. Lichaam ovaal (*Cyrtochthebius* Kuwert). Halsschild bij het ♂ lijn-, bij het ♀ nagenoeg niet bestippeld. Dekschilden met dicht bestippelde langstrepen en gewelfde tussenruimten, waarvan die, welke van den schouder uitgaat, aan de basis duidelijk gekield is; overigens zijn bij het ♀ de afwisselende tussenruimten iets meer verheven dan de anderen. Op het halsschild zijn de achterste zijgroefjes bij het ♀ breed, bij het ♂ lijnvormig, de midden-langsgroef zeer duidelijk. Bovenlip bij het ♂ diep ingesneden, bij het ♀ in het midden uitgerand. Onderzijde zwart, de tasters donker, de pooten gedeeltelijk geelachtig. Bovenzijde groenachtig- of geelkoperkleurig metaalglanzig, soms bruin-bronskleurig (ab.c. *sulcicollis* St.), of donker metallisch-zwart (ab.c. **tristis* Curtis, ♂ *Gibsonii* Curtis). Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Uiterst zeldzaam; ik zag slechts een exemplaar van de ab.c. *sulcicollis* bij Utrecht gevangen. In Westfalen onder steenen, langs zandige oevers. De ab.c. *tristis* komt in Engeland voor. (viridiaeneus Curt.) 1. *excultus* Germ. 1)

Halsschild in het midden verbreed, naar de achterhoeken met een duidelijk membraan in het scherphoekig uitgesneden gedeelte; bij het ♂ slechts iets meer gewelfd dan bij het ♀. Lichaam zeer kort ovaal, eenigszins kogelvormig gewelfd (*Sphaerochthebius* Kuwert). Halsschild nagenoeg onbestippeld; met diepe zijgroefjes, die in twee zwakke dwarsindrukken over het midden van het halsschild gelegen zijn, doch overigens van elkaar gescheiden blijven; bij de var. *lacunosus* St. daarentegen zijn zij twee aan twee met elkaar verbonden, en doorsnijden alsdan, als twee diepe dwarsgroeven, de middengroef. Dekschilden met dicht bestippelde langstrepen en afwisselend iets sterker verheven tussenruimten, van welke die aan den schouder het meest in 't oog valt. Bovenlip bij het ♂ in het midden duidelijk uitgerand. Tasters donker; pooten donker roodbruin. Bovenzijde van het lichaam geheel zwart, bij de var. *lacunosus* donker metallisch. Lengte 1 mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld; ook in België. (*gibbosus* Germ.)

- 3 Halsschild ongeveer van af het eerste derde gedeelte zijner lengte naar achteren plotseling en sterk versmald; de daardoor gevormde uitranding door een membraan aangevuld. De oortvormige voorhoeken van het halsschild, vóór de membraan, niet haak- of tandvormig naar achteren gericht (Sub-gen. *Bothochius* Rey, *Camptochthebius* Kuwert). Dekschilden met zwak aangeduide stippelrijen en eenigszins rimpelige en bovendien lijn verspreid bestippelde tussenruimten; het achterlijf niet volkomen bedekt. Kop met twee scherp begrensde voorhoofds-groeven, evenals het halsschild lijn en verspreid bestippeld. Middengroef van het halsschild dieper dan de zijgroefjes. Bovenzijde van het lichaam uiterst lijn behaard; bij het ♂ bruinskleurig, bij het ♀ dof zwartachtig. Tasters en pooten geelrood, dijen iets donkerder. Lengte $1\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ mm. Eenmaal bij Rotterdam gevangen.

(*aeratus* Steph.) 2. *nanus* Steph.

Het naar achteren meer geleidelijk versmalde halsschild vertoont hoogstens op het laatste derde of vierde gedeelte zijner lengte eene meer of minder diepe uitranding, welke door een membraan aangevuld is. 4

- 4 De uitranding van het halsschild is ongeveer zoo lang als breed, of wel iets langer; het oortvormige gedeelte gewoonlijk naar achteren iets haakvormig getand; soms is het membraan meer chitineus, doch blijft de uitranding zichtbaar. Lichaam sterk gewelfd en eenigszins gedrongen (Sub-gen. *Asiohates* Thoms., *Trymochthebius* Kuwert). 5

De uitranding van het halsschild bevindt zich slechts op het laatste vierde gedeelte, of is slechts zeer zwak aangeduid en zelfs moeielijk herkenbaar; zonder haakvormig getand oortvormig gedeelte 7

- 5 Dekschilden om het schildje iets bultig opgericht en aan den naad eenigszins ingedrukt, de naad zelf in den regel lijn kielvormig verheven. De zijden van het halsschild vertoonen eene duidelijke, diepe uitranding, welke ongeveer het laatste derde gedeelte der lengte inneemt en door een wit membraan is aangevuld 6

1) De uit België (Ostende, coll. *Chapuis*) opgegeven *O. granulatus* Muls. zal vermoedelijk *excultus* Germ. zijn.

Dekschilden meer regelmatig gewelfd, niet bultig opgericht, of aan den naad ingedrukt; de naad zelf weinig of niet verheven. De zeer breed-roestkleurige zijden van het halsschild vertoonen eene zeer kleine uitranding aan de achterhoeken, welke ongeveer $\frac{1}{2}$ van de lengte bedraagt en door een geelachtig, chitineus membraan is aangevuld. De stippelrijen staan niet in verdiepte langsstrepen; die onmiddellijk nabij het schildje zijn eenigszins verward; in elke stip staat een duidelijk, naar achteren gekromd borstelhaartje. Bovenzijde van het lichaam bruin, nagenoeg zonder bronsglans; langs de randen meer roodachtig. Kop zwart, met twee ronde voorhoofds-groeven. Halsschild kort en breed, met diepe middengroef en zijgroefjes; glanzig en duidelijk bestippeld. Dekschilden iets langer dan bij *impressicollis* en *bicolor*. Tasters en pooten roestrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam; Scheveningen en Zeeburg bij Amsterdam. Door Dr. O. Schneider in aantal op Borkum, tusschen zee gras, verzameld.

5. *auriculatus* Rey.

- 6 De krachtige stippelrijen der dekschilden staan niet in verdiepte langsstrepen; met tamelijk breede, nagenoeg vlakke tusschenruimten; eene afgekorte stippelrij langs het schildje, met zeer fijne, naar achteren gerichte haartjes in de stippels. Bovenzijde donker gekleurd, sterk bronsglanzig, langs de randen soms iets meer bruinachtig. Halsschild met een duidelijk, gebogen dwarsindruk, die de beide achterste zijgroefjes, over de middengroef, vereenigt; zeer sterk bestippeld en ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo breed als lang. Kop met zeer diepe, groote, ronde voorhoofds-groeven. Dekschilden $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed. Pooten roestrood, de tasters en de klauwleedjes donkerder. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Over het algemeen zeldzaam, op ziltigen bodem; Zeeburg (Amsterdam), Watergraafsmeer, Scheveningen, Zierikzee, Hoek van Holland, in groot aantal bij Nijkerk. (*bicolor* Steph.) 3. *impressicollis* Lap. 1)

De stippelrijen der dekschilden staan in duidelijk verdiepte langsstrepen, daardoor met verheven, smalle tusschenruimten; eene afgekorte stippelrij langs het schildje; zonder duidelijke haartjes in de stippels. Bovenzijde donkerbruin, met geringen bronsglans. Lichaam iets korter gedrongen dan *impressicollis*. Halsschild sterk en dicht bestippeld, met diepe middengroef en zijgroefjes. Kop met zeer diepe, groote voorhoofds-groeven. De stippelrijen der dekschilden zijn breeder dan de tusschenruimten. Dekschilden bij het ♂ glanzig, bij het ♀ dof. Tasters bruin, pooten rood; sprieten geelachtig, met donkere knots. Bij *absc. rufomarginatus* Er. zijn de randen van halsschild en dekschilden roodachtig. Lengte $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ mm. Zeer zeldzaam; Loosduinen, Naarden en Muiderberg. De *absc. rufomarginatus* bij Leiden en Breda 4. *bicolor* Germ.

- 7 Halsschild slechts met eene middengroef, zonder dwarsgroefjes op het midden; met eene zeer onduidelijke uitranding voor de achterhoeken; dicht en zeer sterk bestippeld, naar achteren slechts weinig versmald. Lichaam een weinig gewelfd (Sub-gen. *Homalochthebius* Kuw.). Lichaam lichter of donkerder bruin, gewoonlijk duidelijk bronsglanzig; met lichter gekleurd uiteinde der dekschilden. Kop met voorhoofds-groeven en ocellen. Dekschilden met stippellijnen, waarin vierhoekige stippels, welke ongeveer zoo breed zijn als de tusschenruimten, die bij het ♀ duidelijk lijn gechagrineerd of eenigszins dwarsrimpelig en weinig glanzig zijn. Dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed, ovaal, gewelfd. Tasters en pooten roestrood. Het ♂ heeft meer glanzige en onduidelijk gerimpelde dekschilden. Bij Wageningen werd een exemplaar gevangen dat op de bovenzijde geelbruin is, met donkeren kop, donker midden van het halsschild, en met eene van voren uitgezakte donkere rugvlek; niet bronzig. Lengte $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Op vele plaatsen gemeen.

(*pygmaeus* Gylh., *impressus* Bedel.) 6. *riparius* Ill.

Halsschild met eene veelal zwak aangeduide middengroef en meestal met twee meer of minder duidelijke dwarsindrukken; met eene zeer geringe uitranding of zonder uitranding aan de achterhoeken; naar achteren altijd meer of minder sterk versmald. Lichaam vlak (Sub-gen. *Ochthebius* isp.) 8

- 8 Tusschenruimten op de dekschilden gewelfd en bijna even breed als de stippelrijen. Bovenzijde donkerbruin, de zijranden van het halsschild iets bruinachtig doorschijnend. Halsschild met twee diepe dwarsindrukken, waarin de 4 dwarsgroefjes zich nog duidelijk vertoonen; nabij den voorrand het breedst, naar achteren hartvormig versmald; glad en zeer onduidelijk bestippeld, met een smal membraan en zonder uitranding voor de achterhoeken. De dekschilden ongeveer $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als te zamen breed; op de tusschenruimten bij het ♀ zwakker, bij het ♂ vrij sterk glanzig; het uiteinde geelbruinachtig. Metasternum op het midden glanzig. Pooten bruinachtig, tasters donker. Lengte 1 — $1\frac{1}{2}$ mm. Op zeelei; ook in zoet en brak water. Bij Middelburg, Zierikzee, Nijkerk, Utrecht, den Haag en op Texel (*pusillus* Steph.) 7. *margipallens* Latr.

1) Deze soort, welke door Bedel duidelijk van *bicolor* Germ. onderscheiden is, en zich ook goed van *auriculatus* Rey laat onderscheiden, werd door Kuwert niet duidelijk gekarakteriseerd. Exemplaren, die ik van den heer Favet uit Portbail (la Manche) ontving, stemmen volkomen met onze inlandsche exemplaren overeen.

Tusschenruimten op de dekschilden vlak, veel breeder dan de stippelrijen. Bovenzijde donkerbruin, kop en halsschild groenachtig- of koperglanzig. Halschild verspreid en zeer fijn bestippeld, met duidelijke dwarsindrukken, waarin de dwarsgroefjes zijn aangeduid; vóór de achterhoeken met eene smalle uitranding, welke grootendeels aan den zijrand evenwijdig loopt, en waarin meestal een membraan aanwezig is. Dekschilden bruin-, of geelachtig, met of zonder eenige donkere vlekjes, gewoonlijk zonder bronsglans; de tussenruimten zijn bij het ♀ lederachtig gerimpeld. Metasternum geheel dof. Pooten roodachtig, het uiteinde van het klawwld donker. Tasters en sprieten geelachtig. Sommige exemplaren missen geheel den metaalglans op kop en halsschild, het halsschild is alsdan geelrood gerand. De grootendeels gele exemplaren vormen ab.c. *pallidus* Muls. (*deletus* Rey). Lengte $1\frac{1}{2}$ –2 mm. Niet zeldzaam op zeeklei tusschen conferven; Amsterdam, Hock van Holland, Bergen-op-Zoom, Zierikzee, Nijkerk en op Texel. 8. *marinus* Payk. 1)

25. Hydraena Kugelann.

Sprieten 9-ledig; de eerste twee leedjes lang, te zamen langer dan de helft van de sprietlengte; de laatste 5 eene losse knots vormend. Bovenlip diep uitgerand, in twee afgeronde lobben verdeeld. Kaaktasters zeer lang, het eindlid veel langer dan het voorlaatste lid. Kin van voren in het midden in een scherp top uitgetrokken. Voorhoofd en halsschild niet of slechts onduidelijk gegroefd. Halsschild naar achteren meer dan naar voren versmald, de omgeslagen zijrand zonder sprietgroef. De voorcoxae door eene kielvormige voortzetting van het prosternum duidelijk gescheiden. Achtercoxae van elkaar verwijderd. Achterlijf met zes sterniten. Bij de mannetjes is het zesde sterniet in den regel aanmerkelijk grooter dan het vijfde, op welk laatste zich eene kale, glanzige, weinig of niet gehagrincede, of villige, halve-maantvormige plek bevindt. De wijfjes daarentegen bezitten een zesde sterniet, dat weinig of niet grooter is dan het vijfde, en gewoonlijk nog de aanduiding van een zevende sterniet; de halve-maantvormige plek op het vijfde sterniet is niet veel glanziger dan de rest van het sterniet, doch bijna altijd zwakker gehagrinced of behaard. — De levenswijze als bij *Helophorus*, doch vindt men de soorten meestal in helder water. Zij kunnen niet zwemmen, doch kruipen tegen steenen en wortels van waterplanten. Hare bewegingen zijn zeer langzaam. Eene enkele soort (*H. palustris*) treft men ook soms boven water op planten aan.

Van de ± 50 Europeesche soorten komen 7 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor.

- 1 Dekschilden met 9 of 10 stippelrijen tusschen den naad en den schouderhoek 2
- Dekschilden met 5 of 6 stippelrijen tusschen den naad en den schouderhoek 6
- 2 Zijrand der dekschilden naar het uiteinde met eene rij groote, ronde, doorschijnende stippen (Sub-gen. *Phothydraena* Kuw.). Bruin- of geelachtig, met donkerder kop en midden van het halsschild. De stippelrijen der dekschilden staan zoo dicht opeen, dat de diepe stippels over de geheele oppervlakte een soort traliewerk vormen. Dekschilden naar het uiteinde geleidelijk verbreed. Kop en halsschild grof bestippeld. Bovenzijde weinig glanzig, zeer fijn behaard. Metasternum met drie duidelijke, kielvormige lijnen. Tasters en pooten geel. Lengte $1\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam; Vorden, Winterswijk, Breda, Rhoon (bij Rotterdam) en Velp. Ook in de Belgische Prov. Luik en in de Rijnprov. bij Elberfeld. 1. *testacea* Curtis.
- Zijrand der dekschilden naar het uiteinde zonder eene rij grotere stippels 3
- 3 Halsschild bijna niet naar voren-, naar de basis daarentegen sterk versmald; zwart, aan voor- en achterrand breed bruinroodachtig gezoomd; aan den voorrand duidelijk uitgerand, evenals de zwarte kop dicht en grof bestippeld. Dekschilden dicht in rijen bestippeld, met langwerpige-vierhoekige stippels; naar het uiteinde zwak verbreed, met smalle tussenruimten; roodbruin, uiterst fijn behaard. Mesosternum met 3 zwak aangeduide kiellijnen. Tasters, sprieten en pooten geelrood. Lengte $1\frac{1}{2}$ mm. Zeer zeldzaam; bij Oisterwijk. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf 2. *palustris* Er.
- Halsschild naar voren en naar achteren duidelijk versmald 4
- 4 Halsschild met meer of minder duidelijke middengroef en lijn gekartelden zijrand. Lichaam zwartbruin, de dekschilden soms bruin. Dekschilden smal, elliptisch, de zijrand-zoom

1) De door Rey beschreven *O. subabruptus* is slechts eene onbeduidende afwijking van *marinus*.

eindigt achter den schouder; met dicht opeenstaande, zeer fijn behaarde stippelrijen. Halsschild grof bestippeld. Tasters en pooten rood, eindlid der tasters aan den top zwart. Onuitgekleurde exemplaren zijn lichtbruin. Lengte 2 mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam (longipalpis Mrsh.) 3. **riparia** Kugel. 1)

Halsschild zonder eenige aanduiding van de middengroef; met gaven zijrand. De zijrand-zoom der dekschilden eindigt op den schouder 5

- 5 De buikige verbreeding van het halsschild is hoekig. Dekschilden vrij lang, ongeveer 1½ maal zoo lang als breed, met parallele zijden; dicht in rijen bestippeld, welke langs de zijden eenigszins verward zijn; met eene duidelijke, afgekorte stippelrij langs het schildje en eene naar het uiteinde verdiepte naadstreep. Halsschild van voren en van achteren dicht en grof, op het tamelijk glanzige middenlijner en niet dicht bestippeld; met twee iets convergerende, meer of minder duidelijke, langsindrukken achter het midden, en met eene gebogen, van voren en van achteren in een groefje eindigende, vrij diepe randgroef. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden soms roodbruin. Tasters en pooten rood; bij var. *subdepressa* Rey zijn de dekschilden iets grover bestippeld, en is de naad aan het schildje iets sterker ingedrukt. Lengte 1½–2 mm. Niet inlandsch. Bij Aken en in Westfalen.
(rufipes Curt.) (angustata St.) 2)

De buikige verbreeding van het halsschild is meer afgerond. Dekschilden ovaal, ongeveer 1½ maal zoo lang als breed, naar het uiteinde iets verbreed; dicht in rijen bestippeld, de stippels meer vierkant, naar het uiteinde eenigszins verward; met iets breedere tussenruimten en eene zeer korte, doch duidelijke stippelrij langs het schildje. Halsschild vrij sterk en dicht, op het middenlijner en meer verspreid bestippeld; met twee scheeve langsindrukken achter het midden, en met eene, van voren en van achteren in een groefje eindigende randgroef. Bovenzijde zwartbruin, de dekschilden soms meer roodachtig-bruin. Tasters, behalve de donkere top van het eindlid, benevens de pooten rood. Lengte 1½ mm. Zeer zeldzaam; eenmaal bij Breda. Ook in de Belgische prov. Luik, en in de Rijnprov. bij Aken. 4. **nigrita** Germ.

- 6 Dekschilden met regelmatige stippelrijen, de stippels dicht opeenstaande; tussenruimten tweemaal zoo breed als de stippels der rijen. Dekschilden lang-elliptisch. Halsschild tamelijk verbreed, in 't midden eenigszins hoekig afgerond; op het midden met twee bijna niet bestippelde plekken, overigens vrij dicht bestippeld; langs den zijrand ingedrukt. Zwartbruin; de dekschilden met roodachtig uiteinde, of geheel kastanjebruin. Tasters en pooten rood. Metasternum met eene diepe uitholling, met glanzigen, verheven rand. Achterschelen bij het ♂ aan den binnenrand, achter het midden, met lange franjeharen. Lengte 2 mm. Een ♂ bij Houthem in de Geul. In België bij Laroche; ook in Westfalen.
(concolor Waterh.) 5. **gracilis** Germ.

Dekschilden gedeeltelijk onregelmatig, gedeeltelijk in rijen bestippeld; de stippels en de tussenruimten bijna even breed. Lengte 1½ mm. 7

- 7 De bestippeling, van af de basis der dekschilden duidelijk in regelmatige rijen, slechts langs de zijden iets verward. Halsschild nagenoeg zeshoekig, evenals de dekschilden roodbruin, in 't midden zwartachtig; vrij sterk en niet dicht bestippeld; langs de randen ingedrukt. Kop zwart. Dekschilden langwerpig-ovaal, met zeer krachtige stippelrijen en nagenoeg even breede tussenruimten. Tasters en pooten roodgeel. Bij het ♂ is het laatste kaaktaster-lid naar binnen hoekig verbreed. Lengte 1½ mm. Zeer zeldzaam; eenmaal bij Houthem, langs de Geul. In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld.
(flavipes St.) 6. **atricapilla** Waterh.

De bestippeling minstens aan de basis duidelijk verward 8

- 8 Halsschild hartvormig, de zijden naar de basis duidelijk uitgerand. Metasternum met twee onduidelijke, lijnvormige verhevenheden. Kop zwart, halsschild en dekschilden roodbruin. Halsschild op het glanzige midden zwakker dan aan den omtrek bestippeld; met een zijndruk, welke van voren en van achteren in eene groote groef eindigt. Dekschilden eivormig, met eenigszins dakvormig verheven naad; verward en slechts hier en daar in rijen bestippeld. Bij het ♂ de achterschelen op de tweede helft naar binnen verbreed. Lengte 1½ mm. Niet inlandsch. Bij Elberfeld in de Rijnprov.; ook in de Belgische provincie Luik.
(Sieboldii Rosenh., lata Kiesenw.) (pygmaea Waterh.)

1) De door Knaut als *H. Rey* beschreven soort is niet met van *riparia* te onderscheiden.

2) De uit België (Duffel) opgegeven *H. subsequens* Rey is onjuist gedetermineerd, deze soort komt in Corsica en Italië voor.

Halsschild zeshoekig. Metasternum met twee duidelijke, glanzige langsplekjes 1). Kop bruin-zwart, halsschild en dekschilden licht geelachtig-bruin. Halsschild in het midden zwartachtig; vrij onduidelijk bestippeld, met tamelijk rechte zijranden. Dekschilden eivormig, bij het ♂ glanziger dan bij het ♀; vrij regelmatig in rijen-, doch aan de basis en vooral langs het schildje meer verward bestippeld. Tasters en pooten geel of geelrood, het eindlid der tasters aan het uiteinde zwart. Lengte 1½ mm. In snel stroomende beken, met rotsachtigen bodem. Bij Honthem en Valkenburg, in de Gent onder steenen. Ook in Westfalen.

7. *pulchella* Germ.

1) De rangschikking, volgens *Kuwert*, van *H. pulchella* Germ. en *gracilis* Germ. tot een Sub-genus *Sphaenhydraena* Kaw. komt mij minder geschikt voor, daar de sculptuur van het metasternum bij beide soorten volstrekt niet overeenstemt, en bovendien de verwantschap van *pulchella* met *atricapilla* en *pygmaea* veel groter is dan met *gracilis*.

A A N H A N G S E L.

- Op bladz. 1, Noot 18; achter Nemonychidae bijvoegen: en de Platyrhinidae.
- „ „ 18, regel 10 v. o. na (Fig. 78 I) bij te voegen: Bij het Zuid-Europeesche genus *Luciola* is de kop grootendeels onbedekt en het halsschild aan de zijden slechts smal bladachtig verbreed.
- „ „ 19, regel 1 v. b. moet na achtervleugels volgen: , behalve bij het Zuid-Europeesche genus *Luciola*.
- „ „ 38, Van *Calosoma sycophanta* L. is eene var. **Habelmanni* Schilsky bekend; bij deze is de bovenzijde zwart, de dijen rood (bij Berlijn).
- „ „ 42, Van *Carabus glabratus* Payk. is eene abs. **punctatosulcatus* Haury bekend; bij deze vertoonen zich op de dekschilden drie zeer smalle, lijne langsribben, welke slechts uit dicht aaneenstaande, lijne korreltjes bestaan en noch geheel tot aan de basis, noch tot aan het uiteinde reiken; deze korreltjes zijn even fijn als alle overigen op de dekschilden, doch iets meer verheven (in Oostenrijk).
- „ „ 45, bijvoegen: *Leistus *picus* Fröhl; deze in de bergen van Middel-Duitschland en in de Alpen voorkomende soort, werd door Mr. D. L. Uyttenboogaart bij Laroche in België gevangen. De schouders zijn met den zijrand der dekschilden in eene gelijkmatige bocht afgerond, niet of slechts zwak aangeduid; bij de overige in ons gebied voorkomende soorten zijn de schouders gewelfd. Pekzwart of pekbruin, het uiteinde van het achterlijf meer roodbruin; de sprieten en pooten roestrood. Kop zeer groot en breed, tusschen de oogen sterk gewelfd, van achteren sterk ingesnoerd. Halsschild voor het midden ongeveer $\frac{1}{2}$ breeder dan lang, aan de zijden zeer sterk afgerond, de zijrand tamelijk smal afgezet. Dek-schilden langwerpig-eivond, ongeveer driemaal zoo lang als het halsschild, achter het midden het breedst, met diepe stippellijnen en tamelijk gewelfde tusschenruimten. Lengte 8—10 mm.
- „ „ 53, *Bembidium striatum* F. ab.c. **nigrescens* Schilsky; bovenzijde zwartachtig, de dijen nog lichter dan bij het type.
- „ „ 56, *Bembidium elongatum* Dej. ab.c. **impustulatum* Schilsky; het roode vlekje aan den zijrand, nabij het uiteinde der dekschilden, ontbreekt geheel.
- „ „ 56, *Bembidium minimum* F. ab.c. *bicolor* Schilsky; het uiteinde der dekschilden is bruin of roodbruin, terwijl zij bij het type geheel metallisch-zwart of brons-groen zijn.
- „ „ 63, *Tachys quadrisignatus* Dits. Faun. nov. sp., bij Kerkrade (Limburg), langs de Worm, op oeverzand en kiezel, Juli.
- „ „ 73, *Pterostichus punctulatus* Schaller. Faun. nov. sp., bij Roermond in Mei.
- „ „ 74, *Pterostichus dimidiatus* Oliv., komt talrijk in Westfalen voor op dorre, zompige, met kort gras begroeide plaatsen, waar schapen weiden; zij vervolgt de in schapenmest levende Aphodiën en andere coprophagen. Exemplaren bij welke het halsschild en de basaal-helft der dekschilden fraai koperkleurig zijn, vormen de ab.c. **semicupreus* Fügner (Westfalen).
- „ „ 77, *Pterostichus metallicus* F. ab.c. **virens* Schilsky; de geheele bovenzijde fraai donkergroen.

- O. bladz. 80, *Amara praetermissa* Sahlb. ab.c. **nigricans* Schilsky; bovenzijde glanzig metallisch-zwart.
- „ „ 81, *Amara bifrons* Gylh. ab.c. **nigrescens* Schilsky; bovenzijde geheel zwart, onderzijde lichtbruin.
- „ „ 81, *Amara silvicola* Zimm. Faun. nov. sp., bij den Haag, Rotterdam en Nijmegen.
- „ „ 82, *Amara famelica* Zimm. ab.c. **nigricans* Schilsky; bovenzijde zwart.
- „ „ 88, *Harpalus distinguendus* Dfts. ab.c. *nigricans* Schilsky; bovenzijde zwart-achtig.
- „ „ 90, *Harpalus servus* Dfts. Exemplaren met roodbruine dekschilden werden door O. Schneider als ab.c. *maritimus* beschreven.
- „ „ 94, *Stenolophus teutonius* Schrk. ab.c. *abdominalis* Géné, bij den Haag.
- „ „ 95, Ik vermoed met *Schilsky* dat *Acupalpus luteatus* Dfts. (*luridus* Dej.) en *exiguus* Dej. (*pumilus* Schaum) kleur-aberraties van eene en dezelfde soort zijn. *Schilsky* beschreef de lichte aberr. van *exiguus* als *dubius*. De synonymie zou dus zijn: *A. exiguus* Dej. (*pumilus* Schaum) en de ab.c. *luteatus* Dfts. (*luridus* Dej., *dubius* Schilsky).
- „ „ 101, *Lebia crux-minor* L. Bij sommige exemplaren hangt de zwarte band langs den naad der dekschilden met de scutellair-vlek samen.
- „ „ 101, *Lionychus quadrillum* Dfts. Faun. nov. sp., met ab.c. *bipunctatus* Heer, bij Kerkrade (Limburg), Juli; langs de Worm, in gezelschap van *Tachys quadrisignatus* Dfts. en *Cryptohypnus meridionalis* Lap.
- „ „ 104, *Dromius quadrinotatus* Panz. ab.c. **basalis* Schilsky; van de vier vlekken op de dekschilden ontbreken de beide achtersten. De ab.c. **biplagiatus* Heyd. komt in Westfalen voor.
- „ „ 104, *Demetrias imperialis* Germ.; bij het type hangt de zwarte zijvlek met de ruitvormige naadvlek samen; exemplaren bij welke deze vlekken niet verbonden zijn, vormen ab.c. *interruptus* Schilsky.
- „ „ 106, *Cymindis macularis* Dej.; exemplaren bij welke eene lichte vlek aan het uiteinde der dekschilden voorkomt, vormen ab.c. *fenestrata* Schilsky. In Dalmatië komt eene ab.c. *fasciola* Schilsky voor, bij welke de schoudervlek met de achterste vlek tot een langsband samenhangen.
- „ „ 114, Bij *Dytiscus* bevindt zich naast de vleugelbasis nog een klein epauletvormig bijvleugeltje.
- „ „ 119, *Hygrotus decoratus* Gylh. ab.c. **unicolor* Schilsky; dekschilden eenkleurig zwartachtig.
- „ „ 121, *Bidessus unistriatus* Ill. ab.c. *subrufulus* O. Schneider; halsschild en dekschilden van het op de onderzijde goed uitgekleurd (zwart) lichaam, licht roodachtig-geelbruin; de naad en de achterrand van het halsschild zeer smal donker gezoomd; bovendien eene driehoekige, berookte scutellair-vlek.
- „ „ 125, *Hydroporus palustris* L. ab.c. *apicalis* Schilsky; de gele teekening op de achterhelft der dekschilden is geheel verdwenen; er blijft nu nog eene vlek aan de basis en eene, tot ongeveer aan het midden reikende, randstreep over; de vlek nabij het uiteinde der dekschilden is veelal zeer klein en onduidelijk, de langsband aan den zijrand echter blijft altijd voorhanden.
- „ „ 133, *Agabus nitidus* F. ab.c. **pauper* Schilsky; exemplaren bij welke de topvlek der dekschilden geheel verdwijnt.
- „ „ 135, *Agabus undulatus* Schrank, ab.c. **interruptus* Schilsky; de dwarsband aan de basis der dekschilden in enkele stippen opgelost of bijna geheel ontbrekend, of wel eene schoudervlek kromt zich langs de basis, eindigt echter spoedig, terwijl het einde van den band nog slechts door eene in de nabijheid van den naad zich bevindende gele stip wordt aangeduid; deze kan intusschen ook ontbreken.
- „ „ 136, *Platambus maculatus* L. ab.c. **inornatus* Schilsky; op de dekschilden blijft alleen de buitenrand geel, terwijl alle teekeningen overigens ontbreken; de dwarsband van het halsschild is onderbroken, de kop donkerder. Bij ab.c. **inaequalis* Panz. daarentegen is nog de vlek aan het schildje voorhanden.
- „ „ 137, *Rhantus suturalis* Lacord., bij welke de zwarte randvlek in het midden van de basis van het halsschild met de beide zwarte zijvlekjes tot een half-cirkelvormigen hoog samenhangt, beschrijft O. Schneider als ab.c. *semicirculatus*.

- Op bladz. 142, van *Dytiscus punctulatus* F. ontving ik van *Dr. A. C. Oudemans* een bij Arnhem gevangen exemplaar van ab.c. *maurus* Schaaf., zijnde een prachtig voorbeeld van melanisme; de kleur is geheel als die van *Hydrophilus piceus*.
- „ „ 172, *Homoëusa acuminata* Märk. Faun. nov. sp., bij Valkenburg (Limb.) in Mei, bij *Lasius niger*. Volgens *Wasmann* is vooral *Lasius niger* de normale mierensoort, bij welke zij voorkomt.
- „ „ 192, *Myrmedonia Haworthi* Steph. is volgens *Wasmann* niet bepaald myrmecophil; het voorkomen bij *Formica rufa* en *Lasius fuliginosus* is wellicht toevallig, of onjuist opgegeven.
- „ „ 207, bij *Atheta marcidata* Er. vertoont het ♂ op het midden van den kop, tusschen de oogen, een klein doch duidelijk, soms kielvormig, glanzig bultje.
- „ „ 259, *Lamprinus haematopterus* Kr. Faun. nov. sp., bij Valkenburg (Limb.) Mei en Juni, met de larven, bij *Tapinoma erraticum*.
- „ „ 335, *Bledius arenarius* Payk. ab.c. *subniger* O. Schneider; dekschilden grootendeels zwart.
- „ „ 356, *Micralymna marinum* Stroem, Faun. nov. sp., een exemplaar langs het Scheveningsche strand, April.
- „ „ 386, *Chennium bituberculatum* Latr., de kever sedert bij Exacten nabij Roermond, in Juni, gevangen.
- „ „ 387, *Tyrus mucronatus* Panz. Door *Fügnier* in groot aantal in Westfalen (Witten a.d. Ruhr), bij *Lasius brunneus* in oude eikenstronken gevangen; ook ab.c. *niger* *Fügnier*, bij welke de geheele bovenzijde zwart is.
- „ „ 433, De soorten van het genus *Trichopteryx* vliegen veelal op zonnige zomerdagen, des namiddags en regen den avond rond; men kan ze alsdan op een wit tafelkleed in massa verzamelen.
- „ „ 440, *Neuglenes apterus* Guér. Faun. nov. sp., Gronsveld, Juni, in aantal achter boomschors.
- „ „ 474, *Epuraea fuscicollis* Steph. Faun. nov. sp., Gronsveld, Juli.
- „ „ 475, bijvoegen: *Epuraea *nana* Reitt. Het type op het Noordzee-eiland Borkum door *Dr. O. Schneider* gevangen. Deze soort is klein, kort-ovaal, tamelijk breed; geheel vuil bruingeel, bij ab.c. *binotata* Reitt. de dekschilden in het midden met eene donkere vlek. Sprietknots geheel donker gekleurd, de pooten geel. Halsschild smaller dan de dekschilden, van voren weinig smaller dan aan de basis, de zijden vóór de eenigszins spitse achterhoeken iets uitgebogen. Dekschilden met afgeronde, zeer smal afgezette en opgehogen zijden; naar achteren versmald en elk afzonderlijk aan het uiteinde afgerond. Bij de naast verwante soorten (*terminata*, *variegata*, *rufomarginata* en *obsoleta*) is het halsschild van voren veel smaller dan van achteren, en vertoont de naar achteren niet sterk versmalde dekschilden tamelijk rechte zijden. Lengte 2½ mm.
- „ „ 512, *Atomaria bicolor* Er.; volgens *O. Schneider* op Borkum. Ofschoon ik van deze vindplaats geene exemplaren zag, vermoed ik toch dat zij, als soort, niet van *berolinensis* Kr. te onderscheiden zijn.
- „ „ 534, *Aulonium trisulcatus* Fourcr., gemeen op de buiten-boulevards van Brussel, als parasiet van *Scolytus Geoffroyi* en *multistriatus*, die de iepen vernielen. Dat deze soort bij Valkenburg op een esch zou gevangen zijn, berust vermoedelijk op eene vergissing, het zal een iep geweest zijn.
- „ „ 541, bij *H. Tribus Lathridiini*, vóór 1 moet bijgevoegd worden:
 Lichaam lang gestrekt, met nagenoeg parallele zijden. Halsschild en dekschilden met langsribben. Geen oogen. Sprieten onder den zijrand van den kop ingeplant. (Langelandia) 1)
 Lichaam langer of korter ovaal. Met oogen. Sprieten aan de zijden van het voorhoofd ingeplant. 1
- „ „ 542, vóór *Lathridius* komt te staan: het genus *Langelandia* Aubé, met de soort (*anophthalma* Aubé) welke in West-Duitschland (o.a. bij Bonn) met *Anomamatus duodecimstriatus* Wesm. aan oude wortels van den wijnstok werd

1) Het genus *Agelandia* Reitter (Fam. Lathridiidae) uit Zuid-Europa, heeft 4-ledige tarsen.

aangetroffen. Beide soorten hebben eene onderaardsche levenswijze. — *L. anophthalmus* is ongevleugeld, dof, bruin; de pooten roodbruin. Geen oogen. Halschild veel langer dan breed, in het voorste derde gedeelte verbreed, de zijden fijn gekorven, evenals de dekschilden (te zamen) met drie langsribben. Lengte $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm.

- Op bladz. 596, *Coccinella (Propylea) conglobata* L. ab.c. **nigra* Croissandeau; dekschilden geheel zwart; bij de donkerste exemplaren zijn bijna de geheele kop en het halschild, behalve de gele zijden, eveneens zwart; zoo ook de dijen en grootendeels de schenen.
- „ „ 601, *Seymnus suturalis* Thunb. ab.c. **nigricans* Gerh.; van de roodachtige langsvlek blijft nog maar een flauwe schijn over, zoodat de dekschilden nagenoeg eenkleurig zwart zijn.
- „ „ 602, *Seymnus frontalis* F.; exemplaren met geheel zwarte dekschilden (zie Noot 1) vormen de ab.c. **immaculatus* Suffr.
-

ALPHABETISCH REGISTER

DER

FAMILIËN, GENERA EN SUB-GENERA

(MET DE SYNONIEMEN).

	Blz.		Blz.		Blz.
<i>Abax</i>	77	<i>Agraphilhydrus</i>	644	<i>Anthophagus</i>	350
<i>Abemus</i>	279	<i>Agyrtes</i>	414	<i>Anthraxus</i>	94
<i>Ablattaria</i>	409	<i>Airaphilus</i>	561	<i>Anthrenus</i>	611
<i>Abraeus</i>	461	<i>Alaobia</i>	213	<i>Anthrenus</i>	611
(<i>Acanthoberosus</i>)	650	<i>Alcochara</i>	165	<i>Apimela</i>	202
<i>Acanthogethes</i>	489	<i>Alcochara</i>	167	<i>Arena</i>	237
<i>Acatodes</i>	131	<i>Alcuonota</i>	202	<i>Argutor</i>	75, 76
<i>Achenium</i>	302	<i>Alexia</i>	577	<i>Arpedium</i>	353
<i>Acidota</i>	352	<i>Allanta</i>	199	<i>Arthrolips</i>	431
<i>Acilius</i>	140	<i>Aluconota</i>	224	<i>Asbolus</i>	411
<i>Aclypea</i>	410	<i>Amara</i>	78	<i>Asidorus</i>	610
<i>Acrinus</i>	462	<i>Amara</i>	80	<i>Asiobates</i>	662
<i>Acrodon</i>	81	<i>Amarochara</i>	186	<i>Aspidiphorus</i>	515
<i>Acrognathus</i>	345	<i>Amarochara</i>	187	<i>Asterus</i>	314
<i>Acrolocha</i>	362	<i>Amartus</i>	471	<i>Astilbus</i>	194
<i>Acrotoma</i>	203, 204	<i>Amauronyx</i>	377	<i>Astrapaeus</i>	268
<i>Acrulia</i>	363	<i>Amidobia</i>	202	<i>Astycops</i>	335
<i>Actedum</i>	55	<i>Amischa</i>	201	<i>Atemeles</i>	189
<i>Actephilus</i>	89	<i>Amphicyllis</i>	423	<i>Atheta</i>	197
<i>Actidium</i>	437	<i>Amphigynus</i>	67	<i>Atheta</i>	213, 220
<i>Actinopteryx</i>	441	<i>Amphotis</i>	478	<i>Atholus</i>	452
<i>Actobius</i>	295	<i>Anacaena</i>	646	<i>Atomaria</i>	508
(<i>Acrobis</i>)	294, 295	<i>Anatis</i>	594	<i>Atomaria</i>	508
<i>Actosus</i>	236	<i>Anaulacaspis</i>	231	<i>Attractohelophorus</i>	657
<i>Acupalpus</i>	94	(<i>Anchialus</i>)	650	<i>Attagenus</i>	607
<i>Acupalpus</i>	95	<i>Anchicera</i>	508	<i>Attagenus</i>	608
<i>Acylophorus</i>	267	<i>Anchomenus</i>	70	<i>Aulonium</i>	534
<i>Adalia</i>	587	<i>Achus</i>	70	<i>Aulonogyrus</i>	146
(<i>Adelops</i>)	406	<i>Ancyrophorus</i>	344	<i>Autalia</i>	231
<i>Adelosia</i>	75	<i>Anisodaetylus</i>	91	<i>Autocarabus</i>	41
<i>Aderces</i>	440	<i>Anisodactylus</i>	91		
<i>Adonia</i>	586	<i>Anisosticta</i>	585	<i>Bacanius</i>	461
<i>Aëpus</i>	63	<i>Anisotoma</i>	418	<i>Badister</i>	95
<i>Ætophorus</i>	104	(<i>Anisotoma</i>)	423	<i>Badister</i>	96
<i>Agabus</i>	131	Anisotomidae	415	<i>Badura</i>	206
<i>Agaricochara</i>	240	<i>Anommatus</i>	542	<i>Baeocrara</i>	441
<i>Agaricophagus</i>	413	<i>Anomococera</i>	471	<i>Baeoglana</i>	177
<i>Agathengis</i>	508	<i>Anopleta</i>	199	<i>Baptolinus</i>	296
<i>Agathidium</i>	425	<i>Anotylus</i>	337	<i>Bargus</i>	334
<i>Aglenus</i>	534	<i>Anthrophagus</i>	500	<i>Baryodma</i>	167
<i>Aglypha</i>	210	<i>Anthobium</i>	363	<i>Batenus</i>	60
<i>Agonum</i>	70	<i>Anthobium</i>	363	<i>Bathyscia</i>	406
<i>Agostenus</i>	98	<i>Anthophagus</i>	350	<i>Batrisedes</i>	378

	Blz.		Blz.		Blz.
<i>Batriscus</i>	378	<i>Calyptomercus</i>	429	Coccinellidae	578
<i>Batriscus</i>	378	<i>Campa</i>	55	<i>Coelambus</i>	119
<i>Baudia</i>	96	<i>Campalita</i>	38	<i>Coclostoma</i>	655
<i>Bembidium</i>	53	<i>Gamplochthebius</i>	662	<i>Colenis</i>	422
<i>Berosus</i>	651	Carabidae	28	<i>Colobicus</i>	536
<i>Bessobia</i>	198	<i>Carabus</i>	38	<i>Colon</i>	407
<i>Bessopora</i>	177	<i>Carabus</i>	41	<i>Colon</i>	407
<i>Biblopectus</i>	374	<i>Carcinops</i>	455	<i>Colpodota</i>	204
<i>Bibloporus</i>	376	<i>Carcinops</i>	456	Golydiidae	530
<i>Bidessus</i>	120	<i>Cardiola</i>	231	<i>Colydium</i>	533
(<i>Bisnius</i>)	294	<i>Carphaxis</i>	262	<i>Colymbetes</i>	138
<i>Blechnus</i>	102	<i>Carpophilus</i>	472	(<i>Comasus</i>)	429
<i>Blediodes</i>	332	<i>Carpophilus</i>	473	<i>Combocerus</i>	525
<i>Bledius</i>	330	<i>Cartodere</i>	546	(<i>Compsocilus</i>)	345
<i>Bledius</i>	330	<i>Cartartus</i>	560	<i>Coninomos</i>	544
<i>Blemus</i>	63	<i>Cathusya</i>	229	(<i>Coniophagus</i>)	516
<i>Blethisa</i>	48	<i>Catops</i>	403	<i>Conithassa</i>	544
<i>Boliminius</i>	648	(<i>Catops</i>)	406	(<i>Conosoma</i>)	259
<i>Bolitobius</i>	262	<i>Celia</i>	80, 81	<i>Conurus</i>	259
<i>Bolitobius</i>	262	<i>Centrotoma</i>	387	<i>Copelatus</i>	136
<i>Bolitochara</i>	232	<i>Cephennium</i>	391	<i>Coprochara</i>	167
<i>Borboropora</i>	230	<i>Ceranota</i>	166	<i>Coprophilus</i>	346
<i>Bothochius</i>	662	<i>Cercus</i>	470	<i>Coprothassa</i>	203
<i>Bothrideres</i>	537	<i>Cercus</i>	471	<i>Corticaria</i>	547
<i>Bothriophorus</i>	622	<i>Cercyon</i>	651	<i>Corticarina</i>	550
<i>Bothriopterus</i>	75	<i>Cercyon</i>	652	Corylophidae	429
<i>Brachida</i>	244	<i>Ceritaxa</i>	211	<i>Corylophus</i>	431
<i>Brachygluta</i>	380	<i>Cerylon</i>	537	<i>Coryphium</i>	349
<i>Brachynus</i>	106	(<i>Ceuthocerus</i>)	539	<i>Cratarea</i>	173
<i>Brachypterus</i>	472	<i>Chaetarthria</i>	650	<i>Creophilus</i>	277
<i>Brachypterus</i>	472	<i>Chaetida</i>	206	<i>Crepilimnebius</i>	648
<i>Brachyusa</i>	227	<i>Chaetocarabus</i>	40	<i>Cryptarcha</i>	492
<i>Bracteon</i>	53	<i>Chennium</i>	386	<i>Cryptobium</i>	301
<i>Bradycellus</i>	93	<i>Ghilocercyon</i>	652	Cryptopbagidae	496
<i>Bradycellus</i>	93	<i>Chilocorus</i>	581	<i>Cryptophagus</i>	502
<i>Bradytus</i>	80	<i>Chilopora</i>	184	<i>Cryptophagus</i>	502
(<i>Brontes</i>)	558	<i>Chlaenius</i>	97	<i>Cryptopleurum</i>	654
<i>Brosicus</i>	52	<i>Chlaenius</i>	98	(<i>Ctesias</i>)	611
<i>Bryaxis</i>	379	<i>Choleva</i>	400	Cucujidae	551
(<i>Bryaxis</i>)	380	<i>Chrysocarabus</i>	40	<i>Cucujus</i>	554
<i>Brychius</i>	109	<i>Cicindela</i>	26	<i>Cybister</i>	143
<i>Bryocharis</i>	261	Cicindelidae	25	<i>Cybocephalus</i>	493
<i>Bryoporus</i>	264	<i>Cicindela</i>	26	<i>Cychramus</i>	490
Byrrhidae	614	<i>Cicones</i>	535	<i>Cychrus</i>	44
<i>Byrrhus</i>	616	(<i>Cilea</i>)	252	(<i>Cyclonotum</i>)	655
<i>Byrrhus</i>	617	<i>Cillenus</i>	61	<i>Cylindera</i>	26
<i>Bythinus</i>	332	Gioidae	516	(<i>Cyllidium</i>)	650
Byturidae	566	<i>Cis</i>	517	<i>Cyllodes</i>	491
<i>Byturnus</i>	567	<i>Cis</i>	518	<i>Cymbiodyta</i>	646
		<i>Cissister</i>	455	<i>Cymindis</i>	105
<i>Caceporus</i>	337	(<i>Cistela</i>)	616, 620	<i>Cymindis</i>	105
<i>Caenoscelis</i>	503	(<i>Cistela</i>)	614	<i>Cynegetis</i>	583
<i>Cafius</i>	293	Clambidae	427	<i>Cyphca</i>	239
<i>Calathus</i>	67	<i>Clambus</i>	428	<i>Cyphelophorus</i>	657
<i>Calathus</i>	67	<i>Clavifer</i>	383	<i>Cyphocelle</i>	425
<i>Calina</i>	230	<i>Claviger</i>	387	<i>Cyrtochthebius</i>	662
<i>Callicerus</i>	195	<i>Claviger</i>	388	<i>Cyrtotonus</i>	79
<i>Callicerus</i>	195	<i>Clibanarius</i>	72	<i>Cyrtoplastus</i>	423
<i>Callisphaena</i>	38	<i>Clitostethus</i>	600	<i>Cyrtoseydmus</i>	392
<i>Callistus</i>	99	<i>Clivina</i>	52	<i>Cyrtotriplax</i>	526
<i>Calodera</i>	185	(<i>Clypeaster</i>)	430	<i>Cytusa</i>	422
<i>Calosoma</i>	37	(<i>Cnemidotus</i>)	111	<i>Cytulus</i>	620
<i>Calpusa</i>	239	<i>Coccidula</i>	598		
<i>Calvia</i>	596	<i>Coccinella</i>	586	(<i>Dacne</i>)	524
<i>Calyptribium</i>	541	<i>Coccinella</i>	589	<i>Dacrila</i>	224

	Blz.		Blz.		Blz.
Dadobia	196	Endomychus	573	Graptodytes	123
Dadopora	474	Engis	524	Gymnusa	248
Dapsa	573	Enicmus	544	Gyrinidae	144
Dasycerus	547	<i>Enicmus</i>	544	Gyrinus	146
Dasyglossa	174	Ennearthron	521	Gyrocecis	562
Datomiera	205	Enochrus	646	Gyrochypus	298
Deleaster	346	Enoplurus	650	Gyrophæna	240
Deliphram	355	Epaphius	65		
Demetrius	104	Epistemus	514	Habrocerus	250
<i>Demetrius</i>	104	<i>Epiceryon</i>	652, 653	Hadrante	414
Demosoma	177	Epilachna	582	Hadrant	518
Dendrophilus	455	(Epipeda)	238	Hadrotoma	609
<i>Dendroxena</i>	410	Epomatylus	338	<i>Hadrotoma</i>	609
Dermestes	605	Epuraca	474	Halipidae	107
Dermestidae	603	<i>Epuraca</i>	474	Halipus	109
Deronectes	121	<i>Ereylon</i>	652	<i>Halobrecta</i>	209
Dexiogyia	182	(Erichsonius)	294, 295	<i>Halysia</i>	594, 596
Diachromus	92	Eridaulus	518	<i>Hapalaraca</i>	361
Dianous	315	<i>Erigenus</i>	132	Haploderus	340
Diehirotrichus	92	Erotylidae	523	Harmonia	589
<i>Diehirotrichus</i>	92	Esolus	626	Harpalus	87
<i>Diehirus</i>	91	Euaesthetus	315	(Harpognathus)	349
Diglossa	246	<i>Eucarabus</i>	43	<i>Helocerus</i>	613
<i>Dilacra</i>	223	Eucinetidae	427	Helochares	643
<i>Dimetrota</i>	206	Eucinetus	427	Helophorus	656
<i>Dinaraca</i>	210	Eucennus	393	<i>Hemicarabus</i>	41
Dinard	171	<i>Eucenus</i>	394	Hemistenus	324
Dinopsis	249	Eulissus	297	Henoticus	507
Diphyllus	498	(Eumierus)	395	<i>Hesperophilus</i>	335
Diploceus	499	Euplectus	373	Hesperus	293
<i>Disochara</i>	175	<i>Euplectus</i>	374	Hetaerius	456
<i>Disopora</i>	218	<i>Europhilus</i>	72	Heterhelus	471
Ditoma	534	<i>Euryalea</i>	183	Heteroceridae	632
(Ditoma)	535	Euryporus	268	Heterocerus	632
<i>Dochmonota</i>	211	Euryptilium	438	<i>Heterocerus</i>	633
Doliceon	301	Euryssa	234	<i>Heterostomus</i>	472
Dolichus	68	<i>Eusphalerum</i>	363	Heterota	233
Domene	307	(Eustilbus)	466	Heterothops	269
<i>Dralica</i>	211	<i>Eutelocarus</i>	43	<i>Hilara</i>	212
Dromius	102	Eutheia	390	Hippodamia	583
<i>Dromius</i>	103	Exochomus	581	Hister	451
<i>Dropephylla</i>	361			<i>Hister</i>	452
(Drusilla)	194	Falagria	231	Histeridae	447
<i>Drymoporus</i>	253	<i>Falagria</i>	231	<i>Holobus</i>	244
Dryops	630	(Feronia)	73	Hololepta	450
(Dryops)	630	<i>Florinus</i>	613	Holoparamecus	541
<i>Dyschura</i>	168			<i>Holoparamecus</i>	541
Dyschirius	50	<i>Gabrus</i>	292	<i>Homalochthebis</i>	663
Dytiscidae	113	<i>Gaurambe</i>	529	Homalota	238
Dytiscus	141	<i>Gaurodytes</i>	131	(Homalota)	197
<i>Dytiscus</i>	142	<i>Gefyrobis</i>	292	<i>Homocentura</i>	168
		Geodromicus	351	Homocusa	172
<i>Ecnomorphus</i>	473	Georyssidae	622	Hydatiens	139
<i>Edignus</i>	271	Georyssus	623	Hydnobius	417
Elaphrus	48	<i>Geotiba</i>	200	(Hydrachna)	113
<i>Elbidus</i>	331	<i>Glischrochilus</i>	492	Hydraena	664
Ellipsotomus	253	<i>Globicornis</i>	609	Hydrobius	643
Elmis	625	<i>Glossola</i>	224	Hydrocharis	642
<i>Embololimnechus</i>	649	Glymma	451	Hydrochus	660
<i>Emphanes</i>	56	(Glyptoma)	348	Hydrophilidae	635
Emphyllus	501	Gnathoneus	459	Hydrophilus	640
<i>Empleurus</i>	657	Gnypeta	227	(Hydrophilus)	642
Emus	277	<i>Goërius</i>	280	Hydroporus	122
Encephalus	243	<i>Golgia</i>	574	<i>Hydrosmeeta</i>	224
Endomychidae	572	Graphoderes	136	<i>Hydrosmeeta</i>	201

	Blz.		Blz.		Blz.
Hydrous	640, 642	Leucoparyphus	252	Microglossa	173
Hydrovatus	118	Licinus	96	Micropeplidae	368
Hygrobia	113	Licinus	96	Micropeplus	369
Hygrobiidae	112	Limnaceum	61	Microptilium	441
<i>Hygrobia flava</i>	41	Limnebius	648	<i>Microsaurus</i>	271
<i>Hygrobia</i>	210	Limnebius	649	(Microsporus)	429
Hygromoma	245	Limnichus	621	<i>Microstemma</i>	395
Hygropora	179	Limnius	625	Micrura	477
(Hygrotophila)	577	(Limnobiis)	648	Micrus	442
Hygrotus	119	Limnoxenus	642	Millidium	439
Hyllota	558	<i>Limodromus</i>	70	<i>Mniobates</i>	186
Hyperaspis	598	Liodes	423	<i>Mnionomus</i>	502
Hyphidrus	118	(Liodes)	418	Mniusa	180
<i>Hypocaccus</i>	457	<i>Lioglut</i>	219	Molops	78
Hypocoprus	561	Lionychus	101	Monotoma	562
Hypocyrtus	251	(Liopterus)	136	<i>Monotoma</i>	562
<i>Hypomedon</i>	309	Litargus	571	Monotomidae	562
<i>Hypopycna</i>	360	Lithocharis	309	<i>Morphocarabus</i>	43
<i>Hypostemus</i>	323	(Lithocharis)	307	<i>Morychus</i>	620
		<i>Lobrathium</i>	306	Murmidiis	539
<i>Idiolybius</i>	130	Lomechusa	191	Mycetaea	577
Ilybius	130	Lopha	59	Mycetaeidae	574
Ilybius	130	Lophocateres	529	Mycetina	573
Ilyobates	187	Lordithon	262	<i>Mycetodrepa</i>	177
Ipidia	479	Loxocera	49	(Mycetophagidae)	567
Ips	492	Lycoperdina	574	(Mycetophagus)	568
<i>Ips</i>	492	<i>Lycoperdina</i>	574	Mycetoporus	264
Ischnoglossa	182	Lycidae	564	<i>Mycetoporus</i>	265
<i>Ischnopoda</i>	229	Lycopholis	566	Myllaena	247
<i>Ischnosoma</i>	264	Lycus	565	<i>Myloechus</i>	407
Ityocara	185	<i>Lyperosomus</i>	75	Myrmecoxenus	575
		<i>Lyprocarthe</i>	197	Myrmedonia	191
Laccobius	647			Myrmetes	460
Laccophilus	129	<i>Macrodytes</i>	142	<i>Myrmoceta</i>	192
Lacmophloeus	556	Macronychus	629	<i>Mysia</i>	594
<i>Lacmophloeus</i>	556	(Macropalpus)	349		
Lacmostenus	66	<i>Manicellus</i>	95	<i>Nanoptilium</i>	438
Lacmotenus	553	Masoreus	100	<i>Napochus</i>	394
<i>Lagarus</i>	75	Medon	307	Nargus	402
<i>Lamprias</i>	100	<i>Medon</i>	308	Nausibius	559
Lamprinus	259	<i>Megachelophorus</i>	658	Nebria	46
Langelandia	669	<i>Megaloscapa</i>	209	<i>Necrodes</i>	411
Lanorus	608	Megarhirus	367	Necrophorus	412
Larexnia	627	Megasternum	654	<i>Neja</i>	54
(Lasia)	582	Megatoma	609	<i>Nemadus</i>	406
<i>Lesiochara</i>	187	<i>Megista</i>	219	Nemosoma	528
<i>Lesiotrechus</i>	64	<i>Megodontus</i>	39	Neobisnius	294
(Lelmis)	625	Melanophthalma	550	<i>Neoclebe</i>	425
Lathridiidae	539	<i>Melanophthalma</i>	550	<i>Nepha</i>	56
Lathridius	542	<i>Melasia</i>	609	Nephane	442
Lathrimacrum	354	Meligethes	479	<i>Nephus</i>	601
Lathrobium	302	<i>Meligethes</i>	480	<i>Nestus</i>	317
<i>Lathrobium</i>	303	<i>Menas</i>	105	Neuglenes	440
Lathropus	557	<i>Meotica</i>	201	Neuraphes	391
Lebia	100	<i>Mesocarabus</i>	40	Nitidula	477
<i>Lebia</i>	100	<i>Mesostenus</i>	324	Nitidulidae	467
Leistes	576	Metabletus	101	Nosodendron	616
(Leistotrophus)	278	<i>Metallina</i>	54	Nossidium	435
Leistrus	45	<i>Metaxya</i>	221	<i>Notaphus</i>	55
Leptacinus	300	Micralymma	356	Noterus	128
Leptinus	400	<i>Micrambe</i>	502	Notiophilus	47
<i>Leptus</i>	556	Micraspis	597	Notothecta	196
Leptusa	235	Micridium	439	Novius	599
<i>Leptus</i>	235	(Microchondrus)	576	Nudobius	297
Lesteva	351	<i>Microdota</i>	211	(Nundina)	598

	Blz.		Blz.		Blz.
<i>Ocalea</i>	183	<i>Paralela</i>	86	Platypyllidae	395
<i>Ocalea</i>	183	<i>Paranulus</i>	430	<i>Platypyllus</i>	397
<i>Ochthebius</i>	661	Parnidae	623	<i>Platysma</i>	75
<i>Ochthebius</i>	663	<i>Parnus</i>	630	<i>Platysoma</i>	450
<i>Octotemnus</i>	522	<i>Paromalus</i>	456	<i>Platystethus</i>	335
<i>Octotemnus</i>	522	<i>Parophonus</i>	84	<i>Platystethus</i>	335
<i>Ocybus</i>	282	<i>Patrobus</i>	66	<i>Plectophloeus</i>	374
<i>Ocys</i>	61	<i>Pediacus</i>	555	<i>Plegaderus</i>	460
<i>Ocyusa</i>	180	<i>Pedilophorus</i>	620	<i>Plocionus</i>	105
<i>Odacantha</i>	106	<i>Pedius</i>	75	<i>Pocadius</i>	490
<i>Odontogethes</i>	489	<i>Pella</i>	192	<i>Podoxya</i>	177
<i>Odontolimnchius</i>	650	(<i>Pelobius</i>)	113	<i>Pocillus</i>	73
<i>Oicoptoma</i>	411	<i>Pelochares</i>	621	<i>Pogonus</i>	65
<i>Olibrus</i>	465	<i>Peltis</i>	529	<i>Polychara</i>	168
<i>Oligella</i>	437	<i>Peltis</i>	409, 529	<i>Polyodontus</i>	310
<i>Oligota</i>	244	<i>Peltodytes</i>	111	<i>Polyota</i>	210
<i>Oligota</i>	244	<i>Pelurga</i>	223	<i>Polystoma</i>	166
<i>Olisthopus</i>	69	<i>Percosia</i>	80	(<i>Pomatinus</i>)	630
<i>Olophrum</i>	353	(<i>Perileptus</i>)	63	<i>Porcinolus</i>	611
<i>Omalius</i>	358	<i>Peryphus</i>	56	<i>Poromnius</i>	130
<i>Omascus</i>	76	<i>Phaenogyra</i>	241	<i>Potamophilus</i>	629
<i>Omophron</i>	48	<i>Phaganthus</i>	350	<i>Pria</i>	479
<i>Omosiphora</i>	473	Phalacridae	463	<i>Princidium</i>	54
<i>Omosita</i>	478	<i>Phalacrus</i>	464	<i>Procrustes</i>	39
<i>Ontholestes</i>	278	<i>Phila</i>	54	(<i>Prognatha</i>)	347
<i>Onthophilus</i>	463	<i>Philhydrus</i>	644	<i>Pronomaea</i>	246
<i>Oodes</i>	97	<i>Philhydrus</i>	644	<i>Propylea</i>	595
<i>Ophonus</i>	84	<i>Philhygra</i>	212	<i>Prostomis</i>	554
<i>Ophonus</i>	85	<i>Philochthus</i>	54	<i>Proteinus</i>	366
<i>Orbeola</i>	610	<i>Philonthus</i>	283	<i>Psammoechus</i>	558
<i>Orectochilus</i>	148	<i>Philonthus</i>	284	Pselaphidae	370
<i>Oreodytes</i>	123	<i>Philorinum</i>	356	<i>Pselaphus</i>	385
<i>Orescius</i>	97	<i>Phloeobium</i>	368	<i>Pseudobium</i>	302
<i>Orinocarabus</i>	43	<i>Phloeocharis</i>	349	<i>Pseudocypus</i>	280
<i>Orochares</i>	355	<i>Phloeodroma</i>	188	<i>Pseudomascus</i>	76
<i>Orophius</i>	522	<i>Phloeonomus</i>	357	<i>Pseudonedon</i>	309
<i>Orpsime</i>	550	<i>Phloeonomus</i>	357	<i>Pseudopelta</i>	411
<i>Orphilus</i>	613	<i>Phloeopora</i>	188	<i>Pseudophonus</i>	86
<i>Orthocerus</i>	536	<i>Phloeostiba</i>	358	<i>Pseudopsis</i>	348
<i>Orthopernus</i>	432	<i>Phloeostichus</i>	555	<i>Pseudotriphyllus</i>	570
(<i>Orycoecus</i>)	553	<i>Phosphuga</i>	409	<i>Ptenidium</i>	436
(<i>Ostoma</i>)	529	<i>Phothydraena</i>	664	<i>Pterostichus</i>	73
<i>Othius</i>	295	<i>Piradonoma</i>	610	<i>Pterostichus</i>	76
<i>Ousipalia</i>	200	<i>Phryogora</i>	223	<i>Pterygium</i>	507
<i>Oxylaemus</i>	538	<i>Phyllocrepa</i>	360	<i>Ptilium</i>	439
(<i>Oxynoptilus</i>)	118	<i>Phyllocrepa</i>	361	<i>Ptilium</i>	439
<i>Oxypoda</i>	174	<i>Phyllocrepidae</i>	355	<i>Ptilium</i>	438
<i>Oxypoda</i>	175	(<i>Phyllira</i>)	573	(<i>Ptinella</i>)	440
<i>Oxyporus</i>	329	<i>Phymatura</i>	233	<i>Ptomaphagus</i>	406
<i>Oxytelus</i>	336	<i>Phyrites</i>	633	(<i>Ptomaphagus</i>)	403
<i>Oxytelus</i>	337	<i>Phytosus</i>	236	<i>Ptychandra</i>	199
		<i>Phytosus</i>	236	<i>Pellus</i>	600
<i>Pachnida</i>	198	<i>Pityophagus</i>	493	<i>Pycnomerus</i>	536
<i>Pachygluta</i>	235	<i>Placusa</i>	239	<i>Pycnoeris</i>	335
<i>Paederidus</i>	312	<i>Placusa</i>	239		
<i>Paederus</i>	312	<i>Planeostomus</i>	345	<i>Quedius</i>	270
<i>Paederus</i>	312	<i>Platambus</i>	135	<i>Quedius</i>	274
(Palpicornia)	635	<i>Plataphus</i>	55		
<i>Panagaeus</i>	99	<i>Plataraca</i>	199	<i>Rabigus</i>	284
<i>Paracercyon</i>	652	<i>Platichna</i>	525	<i>Raphirus</i>	271
<i>Paracymus</i>	646	<i>Platyacarus</i>	40	<i>Reichenbachia</i>	380
<i>Paradromius</i>	103	<i>Platydomene</i>	307	<i>Reichenbachia</i>	380
<i>Paramecosoma</i>	501	<i>Platydracus</i>	279	(<i>Remus</i>)	295
<i>Parameotica</i>	203	<i>Platynaspis</i>	582	<i>Rhantus</i>	136
<i>Parasilpha</i>	410	<i>Platynus</i>	69	<i>Rheochara</i>	166

	Blz.		Blz.		Blz.
Rhizobius	393	Stenolophus	94	Thinochromus	341
Rhizophagus	494	Stenus	316	Thinoecia	224
Rhopalophorus	658	Stenusa	237	Thinonoma	229
Rhopalodontus	522	Steropus	76	Thoracophorus	348
Riolus	628	Stethorus	600	Thymalus	530
(Rybaxis)	379	Stichoglossa	182	Tiresias	611
Saccoceble	426	Stilbus	466	Tomarus	500
(Sacium)	430	Stillicus	311	Tomoglossa	196
Saprinus	457	Stomis	78	Tranoecia	213
Saprinus	457	(Strongylus)	491	Trechoblemus	64
(Sarrotrium)	536	Suboccinella	582	Trechus	64
Sauridus	274	(Sumus)	314	Trechus	64
Scaphidiidae	444	Symbiotes	576	Trepantes	59
Scaphidium	445	Synelypta	619	Triana	79
Scaphisoma	446	Synchita	535	Triarthron	416
Scaphium	445	(Synchitodes)	534	Trichelophorus	657
Schistoglossa	195	Synechostictus	56	Trichocellus	92
Sciocrepa	402	Syntomium	347	Trichoderma	279
Scopaeus	310	Synuchus	69	Tricholimnebius	648, 649
Scopaeus	310	Tachycellus	92, 93	Trichonyx	377
Scydmaenidae	388	Tachinus	256	Trichophya	250
Scydmaenus	395	Tachyporus	252	Trichopterygidae	432
Scydmaenus	392, 395	Tachypus	53	Trichopteryx	442
(Scydmaenus)	392	Tachys	62	Tridium	376
Seymnus	509	Tachys	62	Trinodes	613
Seymnus	601	Tachyta	63	Triphyllus	570
Semadalia	587	Tachyura	62	Triplax	525
Seminolus	617	Tachyusa	228	Triplax	525
Semiris	195	Tachyusa	229	Tritoma	568
Sericoderus	431	Tachyusida	234	(Tritoma)	526
Siagonium	347	Tadmus	331	Tritomidae	567
Silpha	409	Taenhieterocerus	633	(Trixagidae)	566
Silphidae	397	Taenosoma	341	(Trixagus)	567
Silpha	410	Talanus	56	Troginus	341
(Silpha)	412	Tanyraerus	338	Trogoderma	610
Silusa	237	Tanygnathus	267	Trogoderma	610
Silusa	238	(Taphria)	69	Trogophloeus	340
Silvanus	559	Tasgius	282	Trogophloeus	341
Simplocaria	619	Taxicera	210	Trogosita	528
Soginus	73	Telmatophilus	499	Trogositidae	527
Solenia	204	(Tenebrioides)	528	(Trogus)	143
Soronia	478	Teredus	538	Trymochthebius	662
S. spita	597	Teretrius	460	Tychus	385
(Spavus)	501	Tesnus	328	Typhaca	571
Spercheus	656	Testellum	55	Tyrus	387
Sphaeridium	655	Tetartopeus	393	Velleius	270
Sphaeriidae	429	Tetramelus	393	Ubidia	596
Sphaerites	414	Thalassophilus	64	Xantholinus	298
Sphaerius	429	Thalycra	490	Xantholinus	298
Sphaeroclitellus	662	Thamiaraca	194	Xenochara	167
Sphenoma	175	Thanatophilus	411	Xylodrepa	410
Sphindidae	514	Thea	597	Xylodromus	356
Sphindus	516	Thectura	238	Xylostiba	357
Sphodrus	66	Thiasophila	181	Zabrus	84
Staphylinidae	148	Thinobacna	219	Zoosetha	211
Staphylinus	273	Thinobius	344	Zyrus	192
Staphylinus	280				
Stenelmis	628				

VERBETERINGEN.

- Op blad/ 5, regel 7 v. o. staat: Engidae; lees Engini (Erotylidae).
- „ „ 16, „ 1 v. o. is de b van Chrysobothris uitgevallen.
- „ „ 19, „ 31 v. b. staat: Telephoridae; lees Thelephoridae.
- „ „ 22, „ 1 v. o. ontbreekt de s aan het einde van Phoenicocerus
- „ „ 32, „ 8 v. b. is het verwijzingscijfer 6 uitgevallen
- „ „ 33, „ 17 en 21 v. o. staat: Bovenkaken; lees Voorkaken.
- „ „ 34, „ 2 v. o. is achter schildje het woord „gerand” uitgevallen.
- „ „ 43, „ 27 v. b. en 3 v. o. staat *Kroni*; moet zijn *Kronii*.
- „ „ 43, „ 28 v. o. staat: *versicolor* Goerin; lees *varicolor* Joerin Gerber.
- „ „ 51, vóór de tweede noot is het cijfer 2) uitgevallen.
- „ „ 53, regel 19 v. o. staat: *Schiöde*; lees *Schiödt*.
- „ „ 55, „ 7 v. o. achter *ustulatum* L. bijvoegen „ex parte”.
- „ „ 57, „ 19 v. b. staat: *coeruleum* Dej; lees *coeruleum* Serv.
- „ „ 68, „ 30 v. b. achter *melanocephalus* den auteursnaam L. te voegen.
- „ „ 68, „ 26 v. o. de abc *maritimus* Schilsky behoort niet bij *Calathus micro-*
pterus Dfts, maar bij *C. mollis* Mrsh. *Schilsky* had zich daarin vergist
- „ „ 82, De vindplaats Rotterdam voor *Amara fusca* Dej. vervalt.
- „ „ 90, bij *Harpalus fuscipalpis* St. de twee zinnen na „Niet inlandsch”. laten ver-
vallen; daarvoor lezen: Twijfelachtig of deze soort in ons gebied voorkomt.
- „ „ 127, regel 15 v. b. staat: *nigrifrons*; lees *nigriceps*.
- „ „ 144, „ 17 v. o. staat: weinig ontwikkeld en 2-ledig is; lees: weinig ontwikkeld en
ongeleed is.
- „ „ 191, regel 20 v. o. staat: *rufulabris*, lees *rufibarbis*.
- „ „ 267, „ 24 v. o. staat: STAPHYLINAE; lees STAPHYLININAE.
- „ „ 269, „ 25 v. b. staat: 3 in Nederland en 1 in het aangrenzend gebied; moet zijn:
4 in Nederland.
- „ „ 284, regel 5 v. b. staat: 17 in het aangrenzend gebied; moet zijn: 10.
- „ „ 292, „ 2 v. b. staat: *gracilis* Latr.; lees *gracilis* Latzn.
- „ „ 323, „ 1 v. o. achter *vafellus* den auteursnaam Er te voegen.
- „ „ 335, „ 12 v. o. staat: *Platysthetus*; lees *Platystethus*.
- „ „ 397, „ 5 v. b. staat: *Omalini*; lees *Omalini*.
- „ „ 508, „ 23 v. b. staat: *Coenoscelis*; lees *Caenoscelis*.
- „ „ 535, „ 1 v. o. de t uit *variegatus* weggevallen.
- „ „ 592, „ 2 v. o. staat: *mesosthorax*; lees *mesothorax*.
- „ „ 616, „ 8 v. o. staat: *Chapuis*, *Candèze*; lees: *Chapuis & Candèze*.

Bij den Uitgever dezes is verschenen :

DE NEDERLANDSCHE INSECTEN

DOOR

Dr. J. Th. OUDEMANS

AFLEVERING 1—10

MET 30 STEENDRUKPLATEN EN ONGEVEER 300 FIGUREN IN DEN TEKST

PRIJS PER AFLEVERING 90 CENTS

Het werk zal compleet zijn in omstreeks 15 afleveringen met 38 steendrukplaten en ruim 400 figuren in den tekst.

P 536

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00354937 5

nhent QL591.N4E93

v 1 Coleoptera Neerlandica :