2000 17242

J. C. Bondwell

Feb 28 1905 Durlissa VT

9 ~~th~~ ~~th~~ ~~th~~

一十

MONOGRAPHIE ICONOGRAPHIQUE

DU GENRE

ANTHOPHORA LAT.

GL
567
A53.D68
1869
ENT

MONOGRAPHIE ICONOGRAPHIQUE

DU GENRE

ANTHOPHORA Lat.

Jean Marie Antoinette

PAR M. LE D^r DOURS, *Antoinette*

MEMBRE TITULAIRE DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU NORD DE LA FRANCE.

AMIENS,

Imprimerie LENOEL-HEROUART, rue des Rabouissous 30.

—
1869.

1869
Bibl. Nat. 1869

*(Extrait des Mémoires de la Société linnéenne du Nord
de la France.)*

595,78553

.D 739

Insects

MONOGRAPHIE ICONOGRAPHIQUE

DU GENRE

ANTHOPHORA, LAT.

Par M. le Dr DOURS,

Membre titulaire de la Société Linnéenne du Nord de la France.

PRÉAMBULE.

Ce travail devait être publié avec la collaboration de M. le Dr J. Sichel; — et, certes, sans la mort imprévue qui vient d'enlever l'illustre médecin aux sciences naturelles, j'aurais été heureux et fier d'être associé à cette nouvelle production du maître. Aujourd'hui, un scrupule qui sera compris de tous les Entomologistes vient m'assaillir. La *Monographie des Anthophores* que je livre à l'impression, sera-t-elle l'expression exacte de la pensée de mon savant ami, ou bien seulement le pâle reflet de ses nombreuses communications? On connaît les tendances de M. Sichel à ramener à des types

uniques une foule d'espèces décrites par différents auteurs sous des noms divers, et qui pour lui ne représentent que des variétés peu significatives dues au climat, à l'altitude... Il suffit de lire ses recherches sur les *Sphécodes* et sur le *Bombus montanus* pour se rendre compte de ce besoin de synthèse qui portait l'illustre Entomologiste de Paris à trouver non pas une analogie, mais bien une similitude complète dans un grand nombre de prétendues espèces qu'il croyait pouvoir réduire à un seul type en les étudiant au moyen de séries nombreuses. Cette idée, je l'avoue, est séduisante, mais on arrive vite à la confusion en la pratiquant d'une manière absolue.

Les espèces, dans certains genres d'Hyménoptères, ne sont pas très-tranchées. Il est par conséquent possible, en réunissant de nombreuses séries, de faire rentrer successivement leurs caractères les uns dans les autres, et d'arriver ainsi à ne constituer qu'une seule espèce représentée par des milliers d'individus différant à peine par quelques signes extérieurs. Mais outre que de semblables séries ne se rencontrent pas souvent dans les collections les plus riches, il faut bien reconnaître qu'un vêtement à peu près pareil recouvre des individus tout-à-fait différents. Je n'en donnerai qu'un exemple.

L'*Anthophora 4-fasciata*, de Vill., examinée sur des centaines de sujets, vient, par gradations successives, s'identifier avec

l'Albigena, Lep. M. Sichel n'avait pas manqué d'englober cette dernière dans *A. 4-fasciata*, comme une variété à petite taille. *L'Albigena*, cependant, est bien distincte; on la trouve constamment avec son mâle. Quoique vivant côte à côte avec *4-fasciata*, on ne la capture jamais accouplée avec elle; et j'ai obtenu séparément les deux espèces d'éclosion, à Pontéba, sur les bords du Shélif, dans la province d'Alger.

Je pourrais citer bien d'autres tentatives de réunion qui doivent, je crois, être repoussées et que j'aurai soin de signaler dans le cours de cette Monographie.

Ce sont ces divergences, sur lesquelles nous n'avons pas eu le temps de nous mettre d'accord, qui me décident à faire paraître cette étude sous mon nom seul, me réservant d'indiquer avec le soin le plus religieux les articles dont M. Sichel a fourni la rédaction. J'ajoute de suite que c'est grâce aux matériaux immenses qu'il avait accumulés, matériaux toujours généreusement mis à ma disposition, que cet opuscule a pu voir le jour.

NOTE.

L'étude des Hyménoptères n'est pas en grand honneur parmi les Entomologistes français. Cela tient peut-être, entre autres causes, à l'absence totale de livres élémentaires, indispensables aux commençants, et aux difficultés qu'on éprouve à se procurer ces insectes au moyen de chasses faites sans apprentissage. M. le Dr Sichel a publié, il y a quelques années, une notice destinée à faciliter la recherche des Hyménoptères. Je crois être agréable à mes collègues en la reproduisant en tête de ce travail.

•

GUIDE

DE LA

CHASSE DES HYMÉNOPTÈRES,

Par J. SICHEL.

[Extrait du *Guide de l'Amateur d'Insectes*, 1857, chez Deyrolle, naturaliste, rue de la Monnaie, 19, Paris.]

Les Hyménoptères constituent un des ordres les plus intéressants de la classe des insectes. La grande variété de leurs formes, leurs mœurs extrêmement curieuses, leurs instincts plus développés que dans aucun autre ordre, et les importantes considérations de zoologie générale et pratique dont ils peuvent devenir le sujet, donnent à leur étude un intérêt et un charme tout particuliers, qui vont en croissant à mesure qu'on s'en occupe.

Si, jusqu'ici, cet ordre a été presque délaissé par les amateurs, s'il n'a même été cultivé que par un petit nombre d'Entomologistes, cela tient à plusieurs raisons. C'est d'abord la crainte d'accidents. Les femelles d'une des grandes divisions des Hyménoptères, celles des *Porte-Aiguillon*, sont armées d'un aiguillon dont la piqure est douloureuse. Elle est cependant facile à éviter, et nous aurons soin d'indiquer les précautions à l'aide desquelles elle devient très-rare. La douleur se dissipe d'ailleurs promptement, selon ses degrés, par la pression et la succion de l'endroit piqué, une friction

un peu rude, des fomentations d'eau froide, l'application de quelques gouttes d'ammoniaque étendues d'eau ou, bien mieux, d'acide phénique pur, sans mélange d'alcool ou d'eau, moyens qui préviennent toute suite fâcheuse.

On devra toujours emporter à la chasse un petit flacon d'acide phénique, muni d'un bouchon en verre allongé en pointe, à l'aide duquel on porte facilement ce liquide sur les points les plus circonscrits. Ce flacon, pour l'empêcher de se casser, doit être renfermé dans une capsule en bois.

Une seconde raison est l'extérieur des Hyménoptères, en général moins attrayant que celui des Lépidoptères et des Coléoptères; mais cette raison n'est qu'apparente. Dès qu'on est un peu familiarisé avec cet ordre, on y découvre des espèces, des genres et même des familles entières, par exemple celle des *Chrysidides* (Guêpes dorées), qui, par la beauté et l'éclat de leurs couleurs, peuvent rivaliser avec les familles les plus brillantes des Coléoptères.

Une troisième raison, enfin, peut expliquer l'oubli immérité dans lequel cet ordre est resté jusqu'ici : c'est le manque d'un bon ouvrage, ni trop volumineux, ni trop superficiel, rendant possible et facilitant l'étude des familles et des genres, et donnant les diagnoses des espèces, tout au moins celle des espèces indigènes. Cet ouvrage est encore à faire; car celui de Lepeletier de Saint-Fargeau, œuvre d'un Hyménoptérologiste distingué, mais courbé sous le poids des années, des infirmités et des chagrins, est incomplet et défectueux sous tous les rapports, à l'exception de la quatrième partie, rédigée par M. Brullé, et formant un excellent *genera* des familles non décrites par Lepeletier. Ceux qui voudront se familiariser avec l'étude de cet ordre, feront bien de s'en tenir, pour le commencement, au *Règne animal* de Latreille, tome V, au *Manuel* de Boitard, tome III (extrait élémentaire

du précédent ouvrage et de celui du même auteur sur les Crustacés et les Insectes), ou, s'ils peuvent se la procurer, à la partie des Hyménoptères de l'excellente *Introduction à la classification moderne des Insectes* (en anglais) de M. Westwood, dont il existe une traduction française.

La nature de ce petit travail ne nous permet pas d'entrer dans des détails sur les Hyménoptères, leur classification, leurs familles, etc. Disons seulement, pour ceux qui sont encore complètement étrangers à cet ordre, qu'on appelle ainsi les insectes semblables aux Abeilles, aux Bourdons, aux Guêpes et aux Fourmis, et dont les principaux caractères sont les suivants :

Quatre *ailes* membraneuses, ayant des veines peu nombreuses, mais très-régulièrement disposées, de manière à constituer des cellules très-aptées à concourir à la formation d'importants caractères génériques.

Organes de la bouche composés généralement de mandibules cornées, d'une lèvre supérieure ou labre, de mâchoires avec leurs palpes maxillaires, et d'une lèvre inférieure ou labre, avec ses palpes labiaux, organes formant par leur ensemble une espèce de fausse trompe, rétractée dans l'état du repos, mais capable de s'allonger.

Extrémité postérieure de l'abdomen munie, dans l'une des grandes divisions (*Terebrantia*, *Porte-Tarière*), d'une *tarière* ou oviscapte, servant uniquement à déposer les œufs sur ou dans les matières organiques au milieu desquelles ils doivent éclore; et, dans l'autre grande division (*Aculeata*, *Porte-Aiguillon*), même extrémité postérieure de l'abdomen munie d'un *aiguillon* servant en même temps d'oviscapte et d'arme offensive et défensive.

Deux *sexes*, des mâles (♂) et des femelles (♀); et, dans certaines familles sociales et nidifiantes, comme les genres

Abeille (*Apis*) et *Bourdon* (*Bombus*), les familles des *Guêpes* (*Vespidæ*) et des *Fourmis* (*Formicidæ*), un troisième sexe, des neutres ou ouvrières (♀), ou, en réalité, une simple modification des femelles, consistant dans l'atrophie des ovaires, ce qui les prive de la faculté d'être fécondées, sans leur ôter l'instinct de la nidification et des soins à donner à la progéniture des femelles fécondes.

Six *pattes*, dont la dernière paire reçoit d'importantes modifications dans les femelles et les ouvrières de certains genres sociaux nidifiants (*Abeille* et *Bourdon*) et dans d'autres genres.

Métamorphose complète; larves vermiformes et apodes (sans pieds), à l'exception d'une grande famille, celle des *Tenthredonides* (mouche à scie), dont les larves sont munies de pieds et ressemblent beaucoup aux Chenilles des Lépidoptères; aussi ont-elles reçu le nom de *Fausses-Chenilles*.

CHASSE DES HYMÉNOPTÈRES.

Elle se fait autrement que celle des Coléoptères; elle a plus de rapports avec celle des Lépidoptères, dont cependant elle diffère encore considérablement. Beaucoup d'Hyménoptères nichent dans la terre ou le sable (ce que les Lépidoptères, à l'état parfait, ne font jamais), ou vivent sur le sable, où l'on ne trouve pas de Lépidoptères et seulement un certain nombre d'autres insectes. En outre, on les rencontre sur les fleurs, et presque toujours au soleil. C'est donc principalement au soleil qu'il faut les chasser, soit sur les terrains couverts de fleurs, soit, du côté du midi, sur des talus en pente formés de terre un peu aride ou sur de vieux murs. Lorsque, dans ces sortes de terrain et dans ces murs, on voit de nombreux trous assez profonds et ayant de 4 à 10 millimètres de diamètre, on est sûr d'avoir rencontré le

gite d'une multitude d'Hyménoptères et souvent leurs colonies avec leurs métropoles. On n'en trouve pas quand les murs sont peu anciens, unis, sans fentes ni trous; exceptionnellement, il y a quelques *Chrysis* et quelques autres Hyménoptères, au soleil, sur les murs blancs et unis. Les terrains trop fermes, trop calcaires, trop pierreux ou trop meubles sont également stériles pour la chasse aux Hyménoptères, si ce n'est qu'on rencontre des *Mutiles* et certains Fouisseurs sur le sable même meuble, lorsque les autres conditions existent, c'est-à-dire au soleil et dans le voisinage de fleurs ou de colonies de ces insectes.

L'instrument le meilleur pour la chasse des Hyménoptères, celui qui doit être employé le plus ordinairement, est le filet. Il est semblable à celui pour les Lépidoptères; mais le sac, en gaze ou en crêpe, doit être un peu plus court. Outre ce filet en gaze, il en faut un autre en toile et une pince à raquette.

C'est sur les fleurs, au soleil, qu'on trouve le plus grand nombre d'Hyménoptères. On fait les chasses les plus abondantes, au printemps, sur les chatons des saules, en été et en automne, sur les Labiées, les Carduacées, les Ombellifères, pour ne citer que les familles les plus habituellement fréquentées par ces insectes. D'autres fleurs sont spéciales à des groupes ou des genres divers. Les espèces indigènes du genre *Reseda*, le Réséda sauvage (*Reseda lutea*) et la Gaude (*Reseda luteola*), sont le séjour habituel d'une infinité d'Hyménoptères. Un genre de la famille des *Siricidae*, les *Cephus* (mouches à scie du blé), attaque les graminées et même les céréales. Sur les fleurs, l'herbe et les feuilles des plantes non épineuses, on chasse avec le filet en gaze, absolument comme pour les Lépidoptères, mais avec quelques précautions qu'il convient d'indiquer.

Il ne serait pas sans inconvénient, en capturant les Hyménoptères, de ne pas tenir compte de leur nombre et de leur position dans le filet. Sur les Ombellifères, par exemple, ils sont souvent tellement nombreux que, malgré soi, on en remplit le filet, et qu'en voulant le vider sans précaution, on se fait piquer d'autant plus fort qu'on est moins sur ses gardes. Il faut donc soigneusement examiner le filet après chaque coup, l'assujettir et le fermer de manière qu'aucun insecte ne puisse s'échapper; enfin, expulser les insectes inutiles, surtout les Hyménoptères communs, tels que les Abeilles des ruches, les Guêpes des espèces communes, etc., qui ne servent qu'à gêner et à exposer à des piqûres. Quant aux insectes qu'on veut garder, il faut les réunir dans un coin du filet. La meilleure manière de faire, c'est d'appuyer le bout du manche à terre, le cercle de fer contre un mur, contre la boîte de chasse ou contre la poitrine, et d'élever d'une main, aussi haut qu'on le peut, le fond du filet, en serrant et fermant de l'autre la base de celui-ci tout autour; les insectes remontent alors dans le fond. En les suivant avec l'autre main depuis la base jusqu'au fond et en resserrant toujours le filet au-dessous d'eux, on finit par les emprisonner dans le coin supérieur qu'on tend alors, avec les deux mains en sens inverse, contre un mur, contre la terre ou la boîte de chasse. Selon qu'on veut piquer les insectes sur place ou les tuer dans de la vapeur d'éther ou dans celle de chloroforme, pour les piquer à l'aise à la maison, il faut procéder d'une manière différente; voici comment.

Tous les insectes poilus, et tous ceux d'un volume trop considérable pour être introduits dans un flacon à goulot étroit, doivent être piqués sur place. Après avoir tendu le filet avec les deux mains en sens opposé, comme nous venons de le dire, on augmente cette tension de manière à

rendre immobile l'insecte qu'on veut piquer, et on lui transperce le milieu du corselet de part en part avec l'épingle, de façon que celle-ci, du côté de sa tête, ne le dépasse plus que d'un tiers ou d'un quart de sa longueur. Si l'on a placé le filet à terre, ce qui en général est plus commode et plus sûr, il est bon de faire entrer la pointe de l'épingle dans le sol, pour rendre l'insecte immobile et l'empêcher de se dégager. Toutes ces précautions minutieuses ne doivent pas être négligées, si l'on ne veut pas souvent voir un gros Hyménoptère, tel qu'un Bourdon ou un Frelon, s'envoler déjà piqué, en emportant l'épingle et en ne laissant pour souvenir qu'une piqûre douloureuse. Après que tous les insectes volumineux ou poilus sont piqués, on les retire avec précaution, en faisant traverser à la tête de l'épingle le tissu du filet. Quand il n'y a plus dans celui-ci que les insectes piqués, on les dégage facilement en le retournant. Lorsqu'il y en a d'autres, il faut d'abord, de la manière que nous avons indiquée, les faire remonter dans l'extrémité supérieure du filet, la replier et la fermer soigneusement avec des épingles, afin d'empêcher les insectes de redescendre, puis retourner la partie inférieure pour la vider. Pour éviter ces embarras et les piqûres auxquelles on est toujours exposé quand le filet contient à la fois beaucoup d'Hyménoptères, insectes vifs, agiles et qui changent continuellement de place sans qu'on y puisse toujours faire attention, il vaut beaucoup mieux le vider après chaque coup, et ne prendre à la fois qu'un seul insecte ou un petit nombre.

Les Hyménoptères glabres, c'est-à-dire entièrement sans poils, tels que les *Vespidés* (la famille qui contient les Guêpes), les *Fouisseurs* (Hyménoptères creusant la terre pour faire leur nid, comme les Pompiles, les Crabrons, etc.), les *Formicides* (toutes les Fourmis), peuvent être recueillis

dans un flacon bouché à l'émeri, comme les Coléoptères; mais ce flacon doit avoir un goulot assez étroit, sans quoi la plupart des Hyménoptères en ressortiraient et s'envoleraient. On remplit ce flacon d'étroites bandes de papier fin, et l'on y verse, pour la capacité d'à peine un demi-verre d'eau, dix à douze gouttes d'éther ou de chloroforme, dont la vapeur rend les insectes insensibles et les tue si le flacon n'a pas été ouvert au bout d'une heure. Comme chaque fois qu'on ôte le bouchon il s'échappe une certaine quantité de vapeur d'éther ou de chloroforme, il faut emporter à la chasse plusieurs flacons semblables et une petite quantité d'éther ou de chloroforme de réserve, pour en verser de nouveau dans le flacon de chasse lorsqu'il n'en contient plus assez, chose qu'on reconnaît facilement à ce que les insectes restent trop longtemps sans devenir immobiles, tandis qu'ils le deviennent promptement et presque instantanément tant qu'il y a la quantité voulue de vapeur d'éther ou de chloroforme.

Pour faire entrer les insectes dans le flacon, on le débouche et on l'introduit dans le filet jusqu'à l'extrémité supérieure de celui-ci, qu'on soulève un peu. On dirige les insectes sur l'embouchure, au-dessus de laquelle on tend et on ferme le filet à l'aide de la main libre, le manche étant appuyé à terre. On donne par-dessus le filet quelques légers coups de doigts sur l'embouchure, afin de faire descendre l'insecte dans le flacon, où il devient promptement insensibles, si on a la précaution de boucher immédiatement l'ouverture.

Quand un des insectes ne descend pas assez vite au fond du flacon, on n'a qu'à retourner celui-ci après l'avoir bouché: l'insecte remonte alors vers le fond.

En remettant de temps à autre quelques gouttes d'éther

dans le flacon, et en le fermant exactement chaque fois, les insectes qu'il contient meurent promptement; si non, on ajoute de nouveau quelques gouttes d'éther à la fin de la chasse, et on tient le flacon bien bouché pendant une demi-heure ou une heure; au bout de ce temps, tous les insectes sont morts. Quant à ceux piqués par les épingles, on peut les tuer, s'ils ne meurent pas promptement, soit en chauffant fortement la tête de l'épingle, après avoir fait passer celle-ci à travers le trou d'un carton ou d'une planchette, afin que la chaleur n'agisse pas sur l'insecte lui-même, soit en portant avec la pointe d'une épingle une quantité minime de nicotine sur la bouche de l'insecte.

La chasse la plus habituelle et la plus fructueuse des Hyménoptères se fait donc au soleil et sur les fleurs, où la manière de les prendre est la même que pour les Lépidoptères. Mais leur chasse sur les fleurs n'est pas la plus instructive, parce qu'on y trouve plus rarement les différents sexes d'une même espèce réunis, et parce que dans certaines famille, l'un des sexes étant aptère, c'est-à-dire privé d'ailes (les neutres ou ouvrières chez les Formicides, les femelles chez les Mutillides et chez les *Pezomachus*, groupe des *Ichneumonides*), ce sexe ne se rencontre qu'exceptionnellement sur les fleurs. Pour trouver ensemble les différents sexes des mêmes espèces, il faut chercher les *nids* des Hyménoptères. On les trouve, comme nous l'avons déjà dit, sur le sable, la terre ferme et un peu aride, les vieux murs, sous la mousse et les pierres, etc., au grand soleil et du côté du midi. Cette chasse ne se fait plus en fauchant, mais en posant le filet à terre ou contre le mur, rapidement et à plat, au moment où les insectes sont sur le point d'entrer dans leur nid, ou en les prenant au vol près de celui-ci. Elle n'est pas facile, à cause de la difficulté qu'on a d'appliquer

le filet assez rapidement et assez à plat sans casser l'anneau, et à cause de l'extrême agilité avec laquelle les insectes de certaines familles, comme par exemple les *Pompilides*, les *Larrides*, s'échappent latéralement sous les bords du filet, ou pénètrent dans la terre ou dans le mur dès qu'ils se trouvent à l'entrée de leur nid. Cette chasse toute spéciale s'apprend mieux par l'expérience et par l'exercice; comme elle use beaucoup les filets, il est toujours utile, surtout lorsqu'on fait une excursion un peu lointaine, d'emporter un filet de rechange, ou du moins du fil de fer pour raccommoder l'anneau s'il se casse, et une aiguille avec de la soie pour fermer les trous du filet. Disons une fois pour toutes qu'avant le premier coup de filet il faut soigneusement examiner s'il n'y a pas dans le voisinage, cachées sous des herbes et des branches inoffensives, quelques ronces, ennemies acharnées et véritable fléau des filets et de la chasse. Pour chasser sur les ronces mêmes, il faut se servir soit de la pince à raquette, soit du filet à sac de toile.

La chasse près des nids n'offre aucun danger quand il s'agit des Hyménoptères solitaires, dont chaque individu a son nid isolé et ne s'occupe pas de son voisin. Lors même qu'on en trouve de grandes colonies, on n'a à se préoccuper que des individus auxquels on donne directement la chasse; car entre ces insectes il n'existe pas la communauté d'intérêts et d'instincts guerriers qui rendent si redoutables les habitants d'un nid d'Hyménoptères sociaux. On rencontre quelquefois des colonies très-nombreuses d'Hyménoptères nidifiants solitaires, tels que d'Andrènes, de Sphécodes, d'Anthophores, de Cerceris, de Philantes, et on peut les prendre en masse sans la moindre crainte. Il en est autrement des Hyménoptères sociaux, tels que les Bourdons (*Bombus*) et les Guêpes (les différentes espèces du genre

Vespa, et surtout le géant des espèces indigènes, le Frelon, *Vespa crabro*), dont la taille, l'aiguillon et les habitudes guerrières et vindicatives rendent la chasse dangereuse près des nids, si l'on ne prend certaines précautions que je vais indiquer.

Il faut se placer à quelque distance du nid, et ne chasser que les individus isolés ou les petits groupes de deux à quatre individus, sans donner aucun coup de filet vers les troupes plus considérables qui quelquefois s'accumulent près du nid ou à son orifice, et qui souvent se jettent sur le chasseur avec l'intention non douteuse de punir son attentat contre la colonie. Si l'on veut simplement observer leurs mœurs, il faut se tenir entièrement immobile; les insectes alors, pourvu qu'on ne soit pas directement devant l'orifice du nid, de manière à en barrer le chemin, ne font pas attention à l'observateur. Veut-on prendre le nid tout entier, ce qui se fait le mieux, lorsque la plupart de ses habitants sont rentrés, pendant la nuit et à l'aide d'une lanterne : on observe d'abord, pendant le jour, la direction que les insectes prennent après être entrés dans l'orifice; car entre celui-ci et l'entrée véritable du nid (quand il s'agit des nids souterrains, les plus fréquents), il y a toujours une espèce de conduit ou de chemin, quelquefois multiple. C'est la direction de ce conduit qu'il faut avant tout bien étudier. Pour s'emparer du nid, on saisit d'abord, à l'aide d'une longue pince, une large pelote de ouate ou d'étoupe fortement imbibée d'éther ou de chloroforme, et on l'introduit tout le long du conduit jusqu'à ce qu'on soit arrêté par une résistance. On retire rapidement la pince, et on pousse de la même manière une seconde pelote imbibée d'éther ou de chloroforme, puis on bourre tout le conduit de ouate, d'étoupe ou de chiffons. Au bout d'une demi-heure environ,

après avoir pris successivement avec le filet tous les insectes isolés qui sont venus pour rentrer pendant et après l'opération, et dont le nombre est très-grand dans la journée, on commence à travailler à l'aide de la pioche et de la pelle (ou simplement à l'aide d'un fort couteau, lorsqu'il s'agit d'un nid petit et situé peu profondément), toujours avec beaucoup de précaution, de manière à ne pas endommager le nid, ni ouvrir une issue à ceux de ses habitants qui ne seraient pas complètement engourdis. Lorsque le nid est dégagé, on trouve d'ordinaire, dans la cavité qu'il occupait, un très-grand nombre de ses habitants engourdis. On les enlève à l'aide de la pince, et on a toujours tout prêt un filet, pour le cas où un certain nombre des insectes n'aurait pas été atteint par la vapeur d'éther. On emporte le nid dans une grande boîte, dont deux des parois au moins sont formées de toile métallique. Un garde-manger peut très-bien servir à cet usage.

A la campagne, il est plus facile de les élever et d'obtenir leurs parasites (les *Mutiles* pour les *Bourdons*, le *Metococcus paradoxus* pour la *Vespa germanica*, etc.). On n'a qu'à laisser le nid fermé d'abord et à pourvoir aux besoins de ses habitants; au bout de quelques jours, on le laisse ouvert. Les insectes, alors, prennent eux-mêmes soin de leur subsistance et rentrent régulièrement dans le nid. Vers l'époque de l'éclosion des parasites, il faut fermer le nid jusqu'à ce qu'on les ait recueillis. En ville, on laisse le nid constamment fermé, en renouvelant journellement la nourriture de ses habitants et en n'oubliant pas de leur donner de l'eau, sans laquelle ils meurent promptement.

La chasse au filet en gaze est difficile sur les ronces, sur les chardons, sur tous les végétaux épineux, et même sur ceux qui ont simplement des branches trop fortes et trop

nombreuses. Là on se sert de la pince à raquette et du filet en toile.

La pince à raquette est la même que pour les Lépidoptères; son usage exige une certaine habitude, surtout quand il s'agit de chasser sur les chardons, dont il faut éviter de saisir les fleurs ou capitules, parce qu'elles empêchent les branches de l'instrument de se rapprocher, et qu'elles permettent à l'insecte pris de s'échapper. Il faut aussi que les raquettes soient couvertes, non de gaze ou de tulle comme pour les Lépidoptères, mais d'une toile métallique assez forte pour immobiliser les gros Hyménoptères si vifs et si vigoureux, et percées de mailles ou de trous assez larges pour que la tête des plus grosses épingle puisse pénétrer facilement au travers, sans quoi on aurait la plus grande difficulté à fixer les insectes, et l'on s'exposerait à en perdre la plupart et à être fréquemment piqué.

Les Tenthredonides, les Siricides, les Ichneumonides, les Cynipides se trouvent en grand nombre sur les fougères, les feuilles des arbres et des arbustes, et même sur leurs branches et sur leurs troncs. Les Tenthredonides s'y trouvent même, au printemps, avant que les feuilles aient poussé. Il faut les y faucher avec le filet en toile : le filet en gaze s'userait et se déchirerait trop vite. Toutes les fois que le filet en toile est rempli, on en tourne le fond en bas et on l'ouvre, après avoir couvert son anneau avec l'ouverture d'un filet en gaze dont on tient le sac tendu de bas en haut. De cette manière, les Hyménoptères remontent et se réunissent dans l'extrémité supérieure du sac en gaze, où on les isole pour les prendre de la manière indiquée ci-dessus. Pendant qu'on vide le filet en gaze, on referme soigneusement le filet en toile pour l'examiner de nouveau plus tard et y prendre les insectes qui y seraient restés. Outre les

Hyménoptères, on capture ainsi beaucoup de Coléoptères, d'Hémiptères, de Névroptères, etc.

Un très-grand nombre d'Hyménoptères peuvent aussi être pris sur des nappes et des serviettes tendues sous les arbres et les buissons qu'on bat à l'aide d'un parapluie ou du Thérentome de M. de Graslin. Il faut seulement qu'une ou deux personnes s'occupent exclusivement de ramasser les Hyménoptères, ou de les saisir à l'aide du filet en gaze et de la pince à requête, tandis que les autres recueillent les autres ordres. Lorsqu'on a terminé la chasse au soleil, on trouve encore à l'ombre, par les journées chaudes, de nombreux Hyménoptères, en fauchant sur toute espèce d'arbres, d'arbustes, de fleurs et d'herbes, ou en battant les premiers.

On se procure quantité d'autres Hyménoptères en fouillant les mousses, les herbes courtes, les feuilles sèches, en retournant les pierres, en cherchant sur les terrains sablonneux et arides, surtout au soleil. On réunit ainsi beaucoup de Mutillaires, de Formicides, de Proctotrupides, etc.

Tout le monde sait que, pour observer et chasser les Fourmis et toute la famille des Formicides, il faut aller à la recherche des fourmilières, comme pour les Coléoptères qui y vivent. Ajoutons encore que les Fourmis aptères, qui forment la masse des fourmilières, sont des neutres ou ouvrières, et que les mâles et les femelles, ailés, ne volent que vers l'époque de l'accouplement ; qu'il faut donc tâcher de connaître cette époque (qui tombe le plus ordinairement au milieu de l'été) et de trouver ces deux sexes, en examinant souvent les fourmilières qu'on a découvertes.

Une chasse qu'il faut encore signaler, c'est celle sur les arbres coupés, surtout sur les bûches de chêne régulièrement entassées, dans les bois et les campagnes, ou même dans les chantiers. Sur ces monceaux de bois, le mode de

chasse est le même que sur les murs : on y trouve de grands nombres d'Osmites, de Chrysidides, d'Odynères, de Pemphrédonides, de Braconides, d'Ichneumonides, surtout du groupe des *Xorides* (genres *Xorides* et *Xylonomus*), ainsi que de nombreux Coléoptères, dont ces Braconides et ces Ichneumonides sont les parasites. Il est à remarquer que, sur les bûches de bouleau, on ne rencontre jamais aucun Hyménoptère, pas même un Ichneumon, probablement parce que le nombre des Coléoptères qui nichent dans les troncs de bouleau est minime, tandis que dans ceux de chêne il est très-grand.

Il y a encore beaucoup d'autres manières de se procurer des Hyménoptères. On élève et on fait éclore les chenilles et les cocons des Tenthredonides, absolument comme on le fait pour les Lépidoptères; les galles de certaines plantes, telles que le chêne et les rosiers pour les *Cynipides*, l'ajonc pour les *Chalcidites*; les parasites des Lépidoptères (*Ichneumonides*), qu'on obtient d'éclosion en élevant des chenilles. En conservant des morceaux et des détritux de vieux bois, on peut se procurer un nombre considérable d'Hyménoptères qui y nichent (*Osmites*, *Siricides*, *Sapyga*, etc.). En collectionnant au printemps et en automne des tiges de ronces, on aura au commencement de l'été ou au printemps suivant des éclosions de plusieurs espèces de *Ceratina*, d'*Osmia* et d'autres genres. En fouillant au printemps et en automne dans les feuilles mortes et les mousses, on trouve des Ichneumonides qui s'y sont cachés. Après les inondations, le sable des rivages fournit aussi quelques Hyménoptères; mais, endommagés par l'humidité, ils sont rarement en assez bon état pour pouvoir être incorporés dans une collection.

Il y aurait encore d'autres détails à donner sur la chasse et l'étude des Hyménoptères; mais l'espace nous manque

pour le faire, et ce que nous en avons dit peut suffire comme introduction pratique. Ajoutons seulement que les Hyménoptères trop peu volumineux pour pouvoir être piqués, doivent être collés à la pointe de petits morceaux de papier ferme ou de carte, ou mieux sur des paillettes de mica. Il faut mettre le moins de colle possible, afin de ne cacher sous cet enduit aucun détail important pour la description de l'espèce. En général, il ne faut coller que les insectes qu'il est impossible de piquer. Des Hyménoptères d'un volume en apparence minime se laissent encore piquer avec du fil d'argent mince sur de petits carrés de moelle de sureau, qu'on fixe eux-mêmes dans les boîtes à l'aide d'épingles.

Pour recueillir ces espèces minimales (*Micryménoptères* ou *Microhyménoptères*), il est bon d'emporter des tubes en verre un peu épais, longs de 4 centimètres, remplis de très-étroites bandes de papier, et dans chacun desquels on met une à deux gouttes d'éther ou de chloroforme.

DESCRIPTION DU GENRE ANTHOPHORA.

Le genre *Anthophora* est un des plus naturels de l'ordre des Hyménoptères. Ses caractères buccaux et alaires lui assignent des limites parfaitement tranchées. Abondamment répandus dans les cinq parties du monde, ses représentants sont pourtant plus nombreux dans les régions chaudes du nouveau et de l'ancien continent. On pourrait presque dire que c'est un genre essentiellement européen, puisque, parmi les espèces décrites dans cette Monographie, un tiers environ habite exclusivement le littoral de la Méditerranée, un autre tiers l'Europe centrale et septentrionale.

Les *Anthophores* se rencontrent dès les premiers beaux jours du printemps butinant indistinctement sur toutes les fleurs des labiées, sur les *Lamium* et les *Ajuga* principalement. Quelques-unes, toutefois, fréquentent avec plus de prédilection les mêmes espèces de plantes. Ainsi, l'*Anthophora femorata* reste fidèle à l'*Echium vulgare*; l'*Anthophora furcata* compose sa pâtée sur la *Melissa officinalis*; l'*Anthophora mixta* visite exclusivement les différentes espèces de *Stachys*, le *Stachys hirta* surtout.

En Algérie, où les labiées printanières sont rares, les *Anthophores* se fixent sur l'*Asphodelus ramosus*, qui couvre de ses nombreux panicules les plaines incultes de notre colonie.

Toutes les *Anthophores*, à l'exception de l'*Anthophora furcata*, qui niche dans l'intérieur du bois (1), confient leur

(1) Kirby, Mon. Ap. Angl., t. II, p. 290.

postérité à la terre. Elles construisent leurs nids soit sur les vieux murs dont elles minent le mortier, soit sur les rideaux escarpés formés par un terrain sablonneux. Ces nids sont constitués dans l'intérieur du sol par un tuyau cylindrique divisé en cellules plus ou moins longues par des cloisons minces formées au moyen de débris terreux et calcaires amalgamés entre eux à l'aide d'un suc particulier sécrété par la femelle. Les parois de ce tuyau sont unies et assez lisses pour qu'aucune aspérité ne puisse blesser la larve, qui, éclosé d'un œuf, doit y séjourner dix à onze mois en partie sous cette forme, en partie sous celle de nymphe.

Chaque nid contient, d'après Lepeletier de Saint-Fargeau, au plus une vingtaine de cellules. Dans celui de l'*Anthophora personata*, que j'ai souvent observé en automne, par conséquent après les derniers travaux de la femelle, je n'ai jamais trouvé plus de cinq cellules, souvent trois seulement. L'*Anthophora dispar* dépose dans chaque tuyau onze œufs au plus, séparés par autant de cloisons.

Le passage de l'état de larve à celui de nymphe se fait sans que la première ait besoin de se filer une coque. L'*Anthophore*, sortie de sa dépouille de nymphe, attaque et détache la cloison avec ses mandibules unidentées, sort de son berceau isolé, faible, molle, ne pouvant prendre son vol qu'après avoir, pendant quelque temps, ressenti l'action tonique des rayons du soleil.

L'*Anthophora parietina* offre cette particularité curieuse de faire précéder la portion souterraine de son nid d'un tuyau externe longuement recourbé et formé de petits grains de sable agglutinés. Cette disposition, semblable à celle qu'on remarque chez l'*Odynerus parietum*, est certainement un indice qui trahit les soucis de la mère pour sa future postérité. Malgré cette précaution, l'*Anthophora parietina* est

la proie d'une foule d'ennemis. J'ai sous les yeux un fragment de muraille occupé par deux nids de cette espèce, visités, furetés par le *Chrysis ignita*, les *Cœlioxis conica*, *C. rufescens*, les *Melecta punctata*, *M. aterrima*, par des *Anthrax*, qui, se reposant sur la cheminée externe du nid, peuvent à bon droit être considérés comme les parasites de cette *Anthophora*.

Mais ce ne sont pas là les seuls ennemis du genre. Il faut lire dans le 21^e volume des Transactions Linnéennes, de Londres, le mémoire de M. Newport, concernant un parasite de l'*Anthophora retusa*, l'*Anthophorabia retusa*, qui n'est autre que la *Melittobia Audouini* Westwood. Cette *Eulophide* se rencontre fréquemment dans les nids des *Anthophora* avec la *Melittobia acasta*, le *Monodontomerus nitidus*, dont les femelles pondent jusqu'à cent œufs sur une même larve (1). D'après Latreille (observations sur l'Abeille pariétine, in Annales du Muséum d'Histoire naturelle, t. III, p. 259, anno 1804), diverses espèces de *Malachius*, de *Dermestes*, la *Necydalis humeralis*, la *Scolia 5-punctata*, devraient être rangés parmi les parasites ou les ennemis des *Anthophora*. Mais leurs plus grands destructeurs sont sans contredit les forficules qui, lorsqu'elles parviennent à s'introduire dans leurs nids, ravagent tout, dévorant larves, nymphes, insectes parfaits.

Les mâles d'un grand nombre d'*Anthophora* se différencient de leurs femelles par la structure des pattes. Tantôt les tarses intermédiaires sont ciliés, garnis de poils longs sur le premier ou le dernier article; d'autrefois les cuisses sont renflées, armées de plaques, d'apophyses, d'épines qui

1) Consulter in Annales de la Société Ent., 1869, 2^e trimestre, une note de M. le Dr Giraud.

sont autant de précieux caractères pour la diagnose des espèces. Malheureusement, ces caractères ne peuvent servir à établir des coupes naturelles; ils sont l'apanage exclusif des mâles, et rien dans la femelle ne dénote *à priori* la légitimité des deux sexes. Il faut obtenir les espèces, ou bien en les faisant éclore chez soi, ou bien en les surprenant *in copulâ*.

Bien que les *Anthophora* décrites dans cette Monographie ne soient pas très-nombreuses, il m'a paru utile de les grouper de la manière suivante, dans le but d'arriver à leur prompt et facile détermination.

♀ Face tachetée de blanc, ou de jaune, ou de ferrugineux.	Divis. 1.
♀ Face noire, immaculée.	Divis. 2.
♂ Pattes simples, sans cils	Subdivis. 1.
♂ Pattes intermédiaires garnies de cils.	Subdivis. 2.
♂ Pattes renflées, armées d'épines, de plaques, d'apophyses	Subdivis. 3.

Dans ces derniers temps, M. F. Smith a introduit un genre nouveau parmi les *Anthophora*, le genre *Habropoda*, très-bien caractérisé, comme je l'indiquerai plus bas et qui mérite d'être conservé. Les espèces qui lui appartiennent frappent tout d'abord par leur aspect extérieur. La vénu-lation des ailes est différente; les antennes, chez le mâle surtout, sont plus longues, les articles dissemblables. Mais, contrairement au sentiment de M. le Dr Sichel, le genre *Habropoda* doit rester isolé. Il ne saurait comprendre toutes les espèces dont les mâles ont les cuisses renflées, tels que *A. femorata*, *A. crassipes*, etc., etc., qui conservent constants les caractères alaires des vraies *Anthophora* si différents de ceux fournis par les *Habropoda*.

GENUS I.

HABROPODA, olim HABROPHORA.

F. Smith's, Mss. Catal., pars I.

Palpi. { Palpis labialibus, 4-articulatis; 1° longissimo;
2° ad apicem acuto, reliquis minutis in latere
secundi appositis, reflexis.

Palpis maxillaribus, 6-articulatis; 2° longiori,
clavato, reliquis vix æqualibus.

Alæ. { Cellulâ radiali unicâ, appendiculatâ.
Cellulis cubitalibus 3. 2^a, 3^a versùs radialem
coarctatis; primo nervo recurrente ad intersec-
tionem 2^e, 3^eque cellulæ cubitalis desinenti.

Pl. 1; fig. 5, 6, 7.

Les caractères buccaux sont semblables à ceux des vraies *Anthophores*, bien que présentant quelque différence. Ainsi la langue chez les *Habropoda* est courte, pubescente dans toute sa longueur, qui ne dépasse pas celle des palpes. Les articles des palpes maxillaires sont plus longs, plus épais, le 2° est trois fois plus long que le 1^{er} et que les suivants. Les antennes, surtout chez les mâles, dépassent un peu ou atteignent toujours la naissance des ailes; le 3° article est un peu plus long que dans les *Anthophora*. Enfin, les 2° et 3° cellules cubitales sont sensiblement rétrécies vers la radiale, et la 2° cubitale reçoit la 1^{re} nervure récurrente au point d'intersection de la ligne formée par les 2° et 3° cubitales.

Les mâles des *Habropoda* ont les pattes irrégulières, renflées, ornées de plaques, d'apophyses et garnies de cils.

Le caractère tiré de l'aile des *Habropoda* n'est pas exclusivement dévolu à ce genre. Quelques A. du Mexique : *A. Pluto*, *A. Aurulento-caudata*, *A. Melanopyrrha*, ont la 1^{re} nervure récurrente comme dans les vraies *Habropoda*; mais les mâles de ceux-ci sont toujours bien différents des femelles.

N^o 1. HABROPODA ZONATULA.

Smith, Cat., pars 2; p. 319. G. 50.

♀ Long. : — Corps 11 mm.; Ailes 12 mm.

♀ *Nigra; fulvo-albido vel cinereo villosa. Segmentis 2, 3, 4, albido vel cinereo fasciatis. Ano fulvo. Alis hyalinis.*

♀ Noire. Poils de la face fauves, plus pâles sur les côtés. Bout des mandibules testacé clair. Corselet et 1^{er} segment de l'abdomen en dessus hérissés de poils fauves, plus pâles en dessous. Les autres segments noirs. Bords inférieurs des segments abdominaux ornés d'une bande de poils blancs tirant sur le fauve, plus large au 4^e et au 5^e. Côtés de l'abdomen hérissés de poils blancs, fauves à l'anus. Pattes, en dessus, recouvertes de longs poils fauves blanchâtres, en dessous ferrugineux noirs, ainsi que les tarses. Ailes presque limpides. Point calleux roux testacé. Côte et nervures ferrugineuses.

♂ Long. : — Corps 16 mm.; Ailes 12 mm.

♂ *Nigra; facie nigro-flavo maculatâ; fulvo-albido vel cinereo-pilosâ; femoribus crassis, trochanteribus anterioribus pinna acutâ, femoribus dente recurvato munitis; 1^o articulo tarsorum*

quadrato, 4°, 5° dentibus, 2° articulo spinâ brevi, acutâ armatis; 1° tarsorum posticorum articulo in rotundatam auriculam desinente.

♂ Noire. Dessous des antennes jaune, ainsi que la base des mandibules et toute la face, à l'exception de deux larges taches noires placées sur le chaperon, et de deux points noirs de chaque côté du labre. Pubescence en tout semblable à celle de la femelle. Cuisses épaisses, hanches antérieures armées d'une longue épine recourbée, très-aiguë à son sommet. 1^{er} article des tarses antérieurs portant une large apophyse carrée, crénelée à son bord libre de quatre ou cinq petites dents mousses; 2^e article des tarses antérieurs dentiforme, terminé par une épine saillante très-aiguë. 1^{er} article des tarses postérieurs se prolongeant en forme d'oreillette arrondie à son extrémité.

Iles de l'Archipel grec.

Collection Sichel, Doubs.

N° 2. HABROPODA EZONATA.

ANTHOPHORA PASSERINI. Sichel, Ann. Soc. Ent. 1856. Bull., p. 19.

Smith. Catal., pars 2, p. 320; 2.

Long. : — Corps 16 mm.; Ailes 12 mm.

♀ *Nigra; thorace, 1° abdominis segmento, sarothroque fulvo-pilosis. 2°, 3° nigro, 4°, 5° albido-pilosis. Ano fulvo; alis sub-hyalinis.*

♀ Noire. Poils de la face cendrés, épais sur les joues, ceux du vertex noirs. Corselet en dessus hérissé de poils jaunes

ferrugineux, cendrés en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen recouvert de poils jaunes ferrugineux, 2^e et 3^e segments noirs, 4^e, 5^e blancs. Poils de l'anus ferrugineux. Pattes hérissées de poils cendrés noirâtres, brosse plus pâle. Tarses ferrugineux. Point calleux testacé. Ailes un peu enfumées. Côte et nervures brunes.

♂ *Nigra; antennis, facie, mandibulis flavo-maculatis; femoribus crassis, trochanteribus anterioribus pinnâ obtusâ, apice fulvo-pilosâ ornatis. Tibiis intermediis dilatatis, subtus excavato concavis, duobus dentibus inæqualibus, acutis, externo longiori, armatis. 1^o tarsorum intermediorum articulo dilatato, obtuso dente externè armato. Tibiis posticis excavatis, 1^o articulo dilatatissimo, suprâ convexo, obtuso dente acuto dimidiato.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes jaune, ainsi que le chaperon, une ligne en avant de lui, les joues et la base des mandibules; l'extrémité de celles-ci est ferrugineuse. Poils de la face blancs, cendrés-noirs sur le vertex. Corcelet en dessus hérissé de poils jaunes ferrugineux, cendrés en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen recouvert de poils jaunes ferrugineux, 2^e, 3^e noirs, 4^e, 5^e, 6^e blancs. Quelques poils ferrugineux à l'anus. Pattes hérissées de poils cendrés-noirâtres, un peu ferrugineux aux postérieures. Hanches antérieures armées d'un appendice obtus coiffé à son sommet d'une touffe de poils plus ou moins roux. Cuisses épaisses, un peu boursoufflées. Jambes intermédiaires creusées en gouttière à leur partie inférieure et munies de deux épines inégales, l'interne courte, l'externe plus longue, aiguë. 1^{er} article des tarses de cette paire intermédiaire dilaté et muni d'une dent obtuse à son bord

externe. Jambes postérieures creusées sur leurs faces inférieures et à peine échancrées sur le tranchant extérieur. 1^{er} article des tarses postérieurs très-dilaté, difforme, convexe en dessus, armé d'une forte dent sur son tranchant externe et muni d'une facette concave en dessous.

Iles de l'Archipel grec.

Collection Siehel, Dours.

N^o 3. HABROPODA FESTIVA. Dours.

♀ Long. : — Corps 17 mm.; Ailes 15 mm.

♀ *Nigra, fulvo-tomentosa*; 5^o segmento maculâ albâ mediâ; pedibus extûs fulvo, subtûs aurco-pilosis; alis fumato-hyalinis.

♀ Noire; chaperon, labre, mandibules noires; une tache jaune sur le bord inférieur du chaperon. Poils de la face blancs, mêlés de jaunes. Ceux du vertex, du corselet fauves, mêlés de noirs sur le milieu, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils fauves, les autres recouverts de petits poils de cette couleur, semblables à des écailles; 5^e segment ayant en outre sur le milieu une touffe de poils plus longs, fauves-blanchâtres. Bord de tous les segments portant une bande de poils couchés, roux-blanchâtres. Anus ayant quelques poils dorés; en dessous l'abdomen un peu ferrugineux, les segments ciliés de poils d'un roux doré. Poils des pattes en dessus roux doré, en dessous dorés, très-brillants. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes; point calleux plus pâle.

Cap de Bonne-Espérance.

♂ Long. : — Corps 17 mm.; Ailes 42 mm.

♂ *Nigra; nigro-rufescenti-villosa. Pedibus suprà albido, subtils aureo-pilosis, tarsis posticis dente minuto armatis.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes strié d'une ligne jaune qui manque souvent. Face jaune, sauf deux petits points en haut qui sont noirs. Labre jaune, leurs bords et deux petits points sur les côtés noirs. Mandibules jaunes, noires au bout et sur les bords. Face recouverte de poils blancs-roussâtres, plus foncés sur le vertex. Thorax en dessus, hérissé de poils roux mêlés de noirs au milieu, blanchâtres en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux; les autres segments noirs, bordés d'une large bande de poils roux plus ou moins blanchâtres, soyeux, couchés. Anus roux. Poils des pattes épais, blancs et roux en dessus; les supérieures ont la tranche externe des jambes et du 1^{er} article des tarsi ornées d'une longue frange de poils roux. Les pattes intermédiaires ont les tibias garnis de poils roux au côté interne, blancs au côté externe, ainsi que sur le 1^{er} article des tarsi. Cuisses postérieures un peu renflées, leurs jambes contournées, creusées en gouttière et munies à leur extrémité interne de deux petites épines. Le 1^{er} article de leurs tarsi est dilaté et porte sur le milieu du bord interne une petite dent mousse. En dessous, les pattes et surtout les tarsi sont recouverts de poils d'un ferrugineux doré, très-brillants.

Caferrie.

Collection Sichel, Dours.

GENUS 2.

ANTHOPHORA.

APIS, p^{im} Linn., Syst. nat., I, 955 (1766).

MEGILLA, p^{im} Fabr., Syst. Piez., p. 528 (1804).

LASIUS, p^{im} Jurine, Hym., p. 255 (1807).

ANTHOPHORA, Lat., Nouv. Dict. d'Hist. nat., IX, 167 (1803); Gene. Crust. et Ins., IV, 174 (1809).

Palpi. { Palpis labialibus 4-articulatis; 1^o articulo ter longiori; 2^o ad apicem acuto, reliquis minutis in latere secundi appositis, reflexis.

Palpis maxillaribus 6-articulatis; 1^o articulo brevi; 2^o longiori, reliquis vix æqualibus.

Cellulâ radiali unicâ, appendiculatâ.

Alæ. { Cellulis cubitalibus 3. 1^a longiori, 2^a versùs radialem coarctatâ, in medio primum nervum recurrentem recipiente; 3^a pentagonali versùs extremitatem, secundum nervum recurrentem recipiente.

Pl. I, fig. 3, 4.

Tête transverse, large; yeux grands, proéminents, ocelles placés en triangle sur le vertex. Antennes ne dépassant pas la naissance des ailes; 1^{er} article large, plus long que le 2^e, qui est globuleux et très-petit; 3^e article plus long que les deux premiers, terminé en godet à son extrémité. Les autres articles petits, égaux entre eux. Labre arrondi à sa partie antérieure. Palpes labiaux formés de quatre articles; le 1^{er} trois fois plus long que le 2^e, celui-ci très-aigu à son extrémité recevant sur les côtés et près du bout les deux derniers articles, qui sont égaux, courts, réfléchis. Langue très-longue, linéaire, un peu pubescente vers son tiers supérieur. Paraglosses courts, n'atteignant pas le tiers de la longueur du 1^{er} article des palpes labiaux. Mandibules termi-

nées en pointe. Palpes maxillaires formés de six articles, le 1^{er} court, épais; le 2^e deux fois plus long que le 1^{er}; les autres plus courts, allant en diminuant de longueur et s'épaississant à partir du 3^e. Une radiale terminée par un appendice court, son bout s'éloignant un peu de la côte. Trois cubitales: la 1^{re} un peu plus longue que les deux autres; la 2^e rétrécie vers la radiale recevant vers son milieu la 1^{re} nervure récurrente; la 3^e pentagonale recevant à son extrémité la 2^e nervure récurrente (1).

ANTHOPHORARUM

CLAVIS ANALYTICA.

Feminæ.

STATURA :

Major = *hispanica*, *rypara*.

Magna = *personata*, *nigro-cincta*.

Media = *pilipes*, *4-fasciata*.

Minor vel parva = *albigena*, *rufo-lanata*.

Minima = *pygmaea*.

Facie albo, flavo vel ferrugineo maculatâ, punctatâ, vel lineolatâ. Div. I.

Facie nigrâ, immaculatâ. Div. II.

DIVISIO I.

1. Abdomine nigro, albido-hirto vel nudo.	3
2. . . . cupro-aneio.	46
3. . . . nigro, albo-hirto vel nudo.	3
4. . . . nigro, fulvo-hirto	34

(1) Dans quelques espèces exotiques, la deuxième nervure récurrente vient s'insérer un peu en dedans de la cellule cubitale.

Femelles pollinigères. Mâles ayant tantôt les pattes simples, tantôt armées d'appendices écailleux, ou garnies de cils longs.

α *Abdomine nigro, albo-hirto vel nudo.*

5. . . . thoracis dimidium anticum nigro-hirtum; posticum
rufo-hirtum. *A. bi-partita.*
6. . . . thorace fulvo, abdomine vix apice albo-piloso.
A. Aeraensis.
7. Abdomine nigro, apice nigro-villoso; thorace viridescenti,
pedibus ferrugineis, tarsis nigris. *A. æruginosa.*
8. Abdomine nigro, 4^o, 5^o albo hirsutis; thorace fulvo-ferrugineo
piloso *A. albo-caudata.*
9. Abdomine nigro, segmento 4^o toto, 5^o albo-fasciato; thorace
albo-villoso. *A. Nubica.*
10. Abdomine nigro, segmentis, 4^o immaculato, 2^o puncto laterali,
3^o, 4^o albo-marginatis; thorace albo-villoso.
A. bi-cincta.

α * *Abdomine nigro, caeruleo vel cupro-cæruleo marginato.*

11. . . . thorace fuseo vel cinereo. *A. zonata.*
12. . . . thorace fulvo. *A. cincta.*
13. . . . thorace pallide-fuseo. *A. cingulata.*
14. . . . thorace cinereo. *A. subcærulea.*
15. . . . thorace rufo-fulvo. *A. pulchra.*
16. . . . thorace pedibusque nigerrimis.
A. atro-cærulea.
17. . . . thorace cinerescenti-subcæruleo.
A. analis.
18. . . . thorace rufo; fasciis 5^{ae}que segmento toto,
flammeo-quammosis, leviter enpreo-
micantibus. *A. flammeo-zonata.*
19. . . . thorace fulvo-rufo, segmentis apice
fulvo-rufis, scopâ aureo-ferrugineâ.
A. vigilans.

Varietates
A. zonatæ.

α ** *Abdomine nigro; segmentis albo vel rufo vel rufescenti-marginatis.*

20.	. . .	thorace fulvo vel cinerescenti, ano utrinque albo-piloso.	<i>A. 4-fasciata.</i>	
21.	. . .	Primo segmento pallide-hirto vix fasciato.	<i>A. socia.</i>	
22.	. . .	fasciis cinerescenti-fulvescentibus, tomentosis; thorace cinerescenti.	<i>A. alternans.</i>	
23.	. . .	1 ^o segmento albo-piloso.	<i>A. farinosa.</i>	
24.	. . .	thorace fusco; segmentis ventralibus piceo-rufescentibus, margine apicali utrinque albo-ciliatis.	<i>A. confusa.</i>	
25.	. . .	thorace albo-piloso; segmentis niveo-marginatis.	<i>A. albescens.</i>	Varietates
26.	. . .	thorace fulvo; 4 ^o segmento fulvo-hirto, fasciis sordide albidis, latis.	<i>A. mucorea.</i>	<i>Anthophora 4-fasciata.</i>
27.	. . .	abdominis fasciis cinerescenti vel rufescenti (in varietate) squamosis.	<i>A. nivea.</i>	
28.	. . .	1 ^o segmento fasciisque rufescente-pilosis, femoribus ferrugineis.	<i>A. Domingensis.</i>	
29.	. . .	thorace rufo-fulvo, segmentis 4, 5 cinereo-pubescentibus squamosis.	<i>A. semi-pulverosa.</i>	
30.	. . .	thorace nigerrimo; fasciis sarothroque ferrugineis.	<i>A. Maderæ.</i>	

31. . . . fasciis albis vel rufescentibus; thorace rufo vel cinerescenti. *A. albigena.*
 32. . . . fasciis niveis; antennis rufo-ferrugineis. *A. calens.*

Clypeo vix in medio flavo vel eburneo-lineolato.

- 32'. Magna; abdomine nigro; segmentorum fasciis albidis, 3^a et 4^a in medio fuscis, alis hyalinis. *A. canifrons.*
 33. Magna; abdomine nigro, segmentis in latere flavo-maculatis, alis violaceis. *A. violacea.*

α *** *Abdomine nigro, fulvo-hirto.*

34. Media; segmentis 1, 2, 3 fulvis, 4, 5 aurulento-hirtis; thorace fulvo. *A. melanopyrrha.*
 35. Media; segmentis 4, 5 aurulento-villosis, reliquis thoraceque nigerrimis. *A. aurulento-caudata.*
 36. Parva; segmentis 1^o fulvo, 5^o nigro-hirtis; fasciis fulvis; thorace nigro-fulvo. *A. rufo-lanata.*
 37. Parva; segmentis 4^o fulvo, 5^o albido-hirtis; fasciis fulvo-aureis; thorace fulvo in medio nigro-hirto. *A. rufipes.*

α **** *Abdomine nigro, ferrugineo-hirto.*

38. Magna; omnino ferrugineo-pilosa; pygidio nigro. *A. holopyrrha.*
 39. Media; 1^o segmento ferrugineo, reliquis nigro-hirtis, fasciis 2, 3, 4 flavo-albo ciliatis. *A. albifrons.*
 39'. Media; abdomine nigro, segmentis 2 basi, 3, 4, 5 thoraceque fulvis. *A. atro-cincta.*

α ***** *Abdomine nigro, cinereo-hirto vel tomentoso.*

40. Magna; segmentis 1, 2 cinereo-hirtis, 3 albo-squammoso, 4, 5 nigro-hirtis; thorace cinereo. *A. hypopolia.*

41. Magna; segmentis 4, 2 cinereo-hirtis, fasciis 2, 3, 4 albido-ciliatis; thorace cinereo vel rufo. *A. personata.*
42. Magna; segmentis 4 rufo, 2 cinereo hirtis; fasciis 2, 3 albo-ciliatis; thorace cinereo vel rufo. *A. nasuta.*
43. Magna; segmentis 1, 2 rufo vel cinereo-hirtis; fasciis quatuor albo-ciliatis distinctis, clypeo labroque vix nudis flavo-maculatis. *I. euris.*
44. Parva; segmento 1^o cinereo-hirto, reliquis flavo vel albido cinerescenti tomentosis, squammosis; 5^o maculâ nigrâ, mediâ. *I. squammulosa.*
45. Parva; segmento 1^o, cinereo-rufescenti villosa; reliquis albido-tomentosis, squammosis, fasciis albidioribus, ano nigro, thorace rufescenti-viloso. *I. pubescens.*

β. Abdomine cupro-æneo.

46. Magna; 1^o segmento fulvo, 4^o, 5^o albido-hirtis, 2, 3, 4 cupreis, thorace fulvo in medio nigro-hirto. *A. Dufourii.*
47. Magna; 1^o segmento fulvo, 2, 3 nigro, 4, 5 cinereo-hirtis, fusco-æneis; thorace fulvo in medio fusco. *A. tecta.*

DIVISIO II.

1. Abdomine nigro vel ferrugineo-hirto. . . 3
 2. . . . cupro vel æneo vel badio. . . 69

α Abdomine nigro vel ferrugineo-hirto.

3. Media; abdomine nigro, nigro-hirto, segmentis nigro-ciliatis. *A. retusa.*
4. Magna; abdomine nigro, nigro-hirto, segmentis nigro, late ferrugineo ciliatis. *A. atro-ferruginea.*

α * *Abdomine nigro, cano vel cinereo-hirsuto; segmentorum fasciis nullis.*

5. Magna; segmentis 1, 2, thoraceque cano-tomentosis, scopà nigerrimà. *A. atricilla.*

6. Magna; segmentis 1, 2, thoraceque albo-villosis; pedibus nigris, anticis nigro-albo-hirsutis. *A. Romandii.*

7. Media; segmentis 1, 2, thoraceque cinereo vix fulvo hirsutis; scopà fulvâ; metatarsis posticis albido-ferrugineis. *A. semis-cinerea.*

8. Media; segmentis 1, 2, thoraceque cinereo vix fulvo hirsutis; scopà cinereo-fulvâ, metatarsis posticis nigris. *A. Bellicri.*

9. Magna; segmentis 1^o toto, 2^o in margine, thoraceque cano vel cinereo-hirsutis, scopà fulvo-ferrugineâ. *A. pedata.*

10. Media; segmentis 1, 2, thoraceque nigro-cinereo hirsutis, scopà rubrâ. *A. rubricrus.*

11. Media; abdomine nigro; thorace 1^oque segmento (interdùm) cinereo-villoso; pedibus nigro-ferrugineis. *A. abrupta.*

12. Minor; abdomine aterrimo; segmentis omnibus tomento-candido-maculatis; thorace cinereo-hirsuto, dorso nigro; pedibus atro-hirsutis. *A. lepida.*

13. Minor; abdomine nigro, nitido; 4^o segmento albo-maculato, tarsis ferrugineis. *A. fuscipennis.*

14. Minor; abdomine ochraceo-tomentoso, apice rufo; pedibus flavido hirtis, tarsis ferrugineis. *A. pulchrosa.*

15. Media; abdomine thoraceque fulvo-pilosis, hoc maculâ mediâ nigrâ, 1^o et 2^o segmentis in medio nigro-pilosis; pedibus nigris. *A. atrifons.*

α ** *Abdomine nigro, cano vel cinereo-hirsuto; segmentorum fasciis distinctis.*

16. Magna; 1^o segmento cinereo (interdùm fulvo), 2, 3, 4, 5 nigro-pilosis. Fasciis 1-4 albidis (sæpe rufescentibus), primâ augustiori; scopà pedibusque aureo-fulvis. *A. dispar.*

17. Media; 1^o, 2^o segmentis cinereis (interdùm fulvis), 3-5 nigro-pilosis. Fasciis albidis (interdùm rufescentibus) æqualibus; scopà aureo-fulvâ, tarsis nigris.

A. nigro-cinctula.

18. Media; 1^o segmento cinereo. Fasciis 2, 3, 4, pedibusque suprâ argenteo, his infrâ ferrugineo-hirsutis. *A. calcarata.*

19. Minor; griseo vel ferrugineo-hirsutâ. Fasciis albido vel fulvo subciliatis; pedibus cinereo-hirsutis. *A. 4-maculata.*

20. Minor; 1^o segmento nigro-cinereo-hirto. Fasciis, 2, 3, 4, albo vel flavido-pilosis; pedibus ferrugineis, nigro longe hirsutis; thorace cinereo, nigro-fasciato. *A. laurea.*

21. Minor; 1^o segmento cinereo-hirto. Fasciis 3, 4, 5, cæruleo-pilosis; thorace cinereo, abdomine fortiter punctato.

A. cincto-femorata.

22. Media; thorace abdomineque nigerrimis, primi segmenti fasciâ albidâ, pedibus ferrugineis. *A. Gedofredi.*

23. Magna; thorace cinereo in medio nigro-villoso; abdominis segmentis 1, 2 cinereis, fasciis albescentibus. Sarothro ferrugineo. *A. nigro-cincta.*

24. Magna; thorace nigro-lutescenti, 1^o segmento lutescenti-villoso, reliquis nigris, 4^o in lateribus albo-piloso. Sarothro lætè ferrugineo. *A. latè-cincta.*

25. Media; atro-albo-villosa; thorace fasciâ mediâ, nigrâ; fasciis albidis. Sarothro 4^oque tarsorum posteriorum articulo albido-fulvescenti hirsutis. *A. atro-alba.*

26. Media; cinereo-tomentoso; fasciis abdominis albido-ciliatis. Sarothro ferrugineo, labro bituberculato.

A. tuberculilabris.

27. Media; cinereo-hirsuta; fasciis abdominis vix cinereo-ciliatis. Sarothro fulvescenti; labro bituberculato. *A. spodia.*

28. Media; cinereo-tomentosa; fasciis abdominis sordidè albescentibus, labro non tuberculato. Sarothro cinereo.

A. lanata.

29. Media; cinereo-tomentosa; fasciis abdominis sordide albescentibus; ano ferrugineo, labro non tuberculato.

A. pyropyga.

30. Minor; cinereo (sepe rufescenti) hirsuta, segmentorum fasciis sordidè albo vel rufescenti ciliatis; ano nigro.

A. pubescens.

31. Minor; cinereo-tomentosa; segmentis suprà cinereo-lanatis, infrà pedibusque ferrugineis, fasciis pallidioribus.

A. lepidodea.

32. Media; rufescenti-villosa, 1° abdominis segmento rufescenti-birto, reliquis segmentis nigris citreo-strigatis; ano nigro. Sarothro rufescenti.

A. citreo-strigata.

33. Media; cinereo-villosa; 1° segmento sarothroque albido-villosis, segmentis aureo-strigatis; ano nigro.

A. marginata.

34. Parva; nigro-cinereo-pilosa; fasciis abdominis albidis, pedibus nigro-ferrugineo-villosis.

A. Chiliensis.

35. Parva; albo-cinerescenti pilosa; abdomine nigro, segmentis 1-4 niveo-lineatis; pedibus ferrugineis, albo villosis.

A. nigrita.

α *** Abdomine nigro, rufo fulvo vel ferrugineo-hirsuto; segmentorum fasciis nullis.

36. Magna; abdomine nigro, subtùs apiceque piloso; thorace et 1° segmento abdominis ferrugineo-villosis; pedibus aterrimis.

A. basalis.

37. Media; abdomine nigro, 4°, 5° abdominis segmentis et ano ferrugineo-villosis, tarsis ferrugineis; thorace nigro.

A. Pluto.

38. Media; abdomine nigro, rufo-piloso, 3°, 4°que segmentis rufo-villosis; metatarsis rufis; thorace nigerrimo.

A. parietina.

39. Media; abdomine nigro, rufo-piloso, segmentis dorso rufis, lateribus albis, pedibus extùs rufo, subtùs nigro-ferrugineo pilosis; thorace rufo.

A. balnearum.

40. Media; abdomine nigro albo-piloso, segmentis 1° fulvo, reliquis nigro-albo-pilosis; thorace anoque rufis; illo fascià medià nigrà.

A. obesa.

41. Minor; thorace abdomineque rufo-pilosis, illo fascià nigrà inter alas; segmentis 1, 2, 3, 4, rufo-hirtis, 5^o anoque (epipygio nigro excepto) aureo-rufis. *A. furcata.*
42. Media; fulvescenti-hirsuta; thorace fascià medià nigrà. Abdomine flavido tomentoso. *A. fulcipes.*
43. Media; fusco-nigro-hirsuta (in detritis). Abdomine nudo, fasciis solùm fusco-hirtis. *A. caliginosa.*
44. Media; ferrugineo-villosa, pedibus subtùs nigro-pilosis. *A. ferruginea.*
45. Media; nigro-ferruginea; segmentis 2^o toto, 3^o partim nigro-piloso, reliquis ferrugineis. *A. nigro-vittata.*
46. Media; nigro-fulva; thorace segmentisque 1-2 fulvo-hirsutis, reliquis nigris, ano fulvo. *A. dimidiata.*
47. Media; cinereo fulva; thorace cinereo in medio nigro, segmentis fulvo-hirsutis, ano nigro, pedibus extùs albido, subtùs aureo villosis. *A. concinna.*
- z **** *Abdomine rufo, fulvo vel ferrugineo-hirsuto;
fasciis distinctis.*
48. Major; segmentis 1, 2 rufo vel cinereo-vestitis, fasciis 2, 3 albo ciliatis, thorace rufo vel cinereo, lineà nigrà anticà, scopà atrà. *A. Hispanica.*
49. Major; segmento 1^o rufo, 2, 3, 4, 5 cinereo-hirsutis, albido marginatis; thorace rufo, vix nigro-antice mixto; scopà nigro-ferrugineà. *A. rypara.*
50. Major; segmentis 1, 2 thoraceque latè fulvo-villosis, fasciis pallidioribus. *A. rutilans.*
51. Media; segmentis totis thoraceque fulvo hoc nigris dorso intermixtis hirtis, fasciis distinctis pallidioribus. *A. pennata.*
52. Magna; segmentis 1, 2 sordide fulvis, thorace cinereo, scopà aureà. *A. pyralitaris.*
53. Media; segmentis 1, 2 rufo-pilosis; fasciis 2, 3 rufo-albido sordidè ciliatis, scopà rufà. *A. pilipes.*
54. Magna; segmento 1^o rufo, reliquis cinerescente-hirtis, fasciis

albo vel cinerescenti ciliatis, pedibus albo villosis; thorace rufo in medio nigro-hirsuto. *A. femorata*.

55. Magna; segmento 1° rufo, 2°, 3°, 4° nigris nudis, 5° anoque ferrugineo-villosis, 2°, 3°, 4° albo, 5° ferrugineo ciliatis; pedibus thoraceque fulvo-hirtis, hoc maculâ mediâ nigrâ. *A. segnis*.

56. Magna; 1°, 2° segmento rufo-hirto, reliquis nigro-pilosis; fasciis 2, 3, albis vel albescentibus. *A. bi-ciliata*.

57. Magna; 1°, 2°, 3°que segmento rufo-hirto, reliquis nigro-pilosis, fasciis concoloribus vix pallidioribus.

A. repleta.

58. Magna; thorace 1°que segmento rufo-hirtis; segmentorum fasciis albido flavo-rufis. *A. nigro-maculata*.

59. Magna; thorace, 4° segmento anoque rufo-pilosis, segmentorum fasciis fulvo-albescentibus, tibiis extûs fulvescentibus, intûs aureo-ferrugineis. *A. dubia*.

60. Media; thorace (fasciâ mediâ nigrâ), rufo vel cinereo piloso; 4°, 2° segmentis rufo-hirtis, fasciis 2, 3, 4 cinerescentidis vel rufescentibus continuis. *A. intermedia*.

61. Media; thorace (fasciâ mediâ nigrâ), rufo vel cinereo piloso; primo, secundo segmentis rufo-hirtis, fasciis 2, 3, 4 cinerescentibus vel rufescentibus in medio interruptis. *A. interrupta*.

Varietates

62. Media; thoracis fasciâ mediâ nigrâ; 4° segmento thoraceque vix cinereo rufo-piloso; fasciis 2, 3, 4 albis, scopâ ferrugineâ. *A. usticalis*.

A. intermediæ.

63. Media; rufo-cinerescenti pilosa; fasciis albescentibus, scopâ aureâ. *A. 4-strigata*.

64. Media; thorace 1°que segmento fulvo-piloso, 2°, 3°, 4° alboniveo marginatis; pedibus nigris, tibiis posticis suprâ albo-villosis. *A. Oranicensis*.

65. Media; thorace fulvescenti, abdomine nigro, fasciis pedumque pilis cinereo albis. *A. Mexicana*.

66. Media; rufo-villosa, segmentis 1, 4 flavo-albido marginatis.

A. tarsata.

67. Media; thorace abdominisque 1° segmento testaceo (sæpe flavo) villosis, 2°, 3°que apice densè albido-ciliatis. Pedibus nigro-piceis, testaceo flavo-pilosis.

A. robusta.

68. Magna; fulvo-cinereo-pilosa; 2° segmento albo, 3° et apice 5ⁱ nigro-ciliatis.

A. pruinosa.

β. Abdomine cupro-æneo vel badio.

69. Media; thorace ferrugineo, dorso nigro; abdominis segmentis 4°, 2° lateribus, 3° toto ferrugineis, illorum medio nigris, 4°-5° albo-pilosis, hoc ferrugineo-mixto. *A. 4-color.*

70. Media; thorace fulvescenti hirsuto in medio fasciâ nigrâ; abdominis segmentis 1°, 3° fulvis, 4°, 5° albido-tomentosis, 5° fasciâ fulvo-ferrugineâ. *A. Smithii.*

71. Media; abdomine badio, pedibus nigris, nigro ferrugineo hirsutis. *A. badia.*

72. Minor; thorace cinereo-villoso; abdomine nitido, æneo-violaceo; fasciis 1, 2 albis, pedibus nigris, nigro-ferrugineo-villosis. *A. nitidula.*

Mares.

SUBDIVISIO I.

PEDIBUS SIMPLICIBUS NEC CILIATIS.

α Abdomine nigro, albo-hirto vel nudo.

1. . . . thorace fulvo, 6° segmento anoque albo-ferrugineo-hirto. *A. Acraensis.*

2. . . . thorace viridescenti-fulvo; abdomine infrà ferrugineo, suprâ versùs apicem nigro-piloso.

A. wruginosa.

3. . . . thorace dorso cinereo, postice albo-piloso; segmento 4° toto albo, 5° et 6° fasciâ albâ interruptâ.

A. Nubica.

1. . . . thorace dorso cinereo, postice albo-piloso, segmento
3° albo in lateribus maculato, 4° toto albo, 5° et 6°
fasciâ albâ interruptâ. *A. bi-cincta.*

α * *Abdomine nigro, cæruleo vel cupro-cæruleo
marginato.*

5. . . . thorace rufo-cinerescenti-hirto; segmentorum abdo-
minalium apicibus 1 ad 5 metallice-cæruleo-
fasciatis. *A. zonata.*
6. . . . thorace pedibusque ardente rufis; segmentorum
fasciis metallicè-cæruleo-argentatis. *A. cincta.*
7. . . . thorace cinerescenti-hirto; segmentorum fasciis
cæruleo-viridescenti non metallicè pilosis.
A. cingulata.
8. . . . segmentorum fasciis griseo-pallidis vix subcæru-
leis. *A. subcærulea.*
9. . . . segmentorum fasciis albescenti, subcærulescentibus,
hinc, inde leviter viridescentibus. *A. pulchra.*
10. . . . thorace cinereo, hinc, inde subcæruleo, segmentorum
fasciis 1 ad 5 subcæruleis, 6 anoque nigris sub
nudis. *A. analis.*

α ** *Abdomine nigro; segmentis albo vel rufo vel
rufescenti marginatis.*

11. . . . thorace cinereo-rufo, fasciis apicalibus albis, rufis,
vel rufescentibus, 5^a fasciâ in medio sæpiùs inter-
ruptâ; 6° segmento anoque nigro-pilosis.
A. 4-fasciata.

A. Metatarsi postici duo albo-pilosi.

12. . . . 1° segmento pallidè hirto vix fasciato. *A. socia.*
13. . . . fasciis cinerescenti-fulvescentibus tomentosis.
A. alternans.

14. . . . 1° segmento albo-piloso. *A. farinosa.*
 15. . . . segmentis ventralibus piceo-rufescentibus, margine apicali utrinque albo-ciliatis. *A. confusa.*
 16. . . . fasciis abdominis rufescenti-pilosis, pedibus ferrugineis; 6° segmento anoque nigro-ferrugineo-pilosis. *A. Domingensis.*

B. *Metatarsi postici duo nigro-pilosi.*

17. Abdominis fasciis tibiarumque pilis pallidè rufo ferrugineis; fascià 5^a interruptà. *A. Madera.*
 18. . . . segmentis 1-5 niveo-marginatis, fascià 5^a in medio interruptà, 6° anoque nigris. *A. albescens.*
 19. . . . segmentorum fasciis sordidè albidis, 6° segmento anoque nigris, facie eburnea. *A. mucorea.*
 20. Parva; facie eburnea; fasciis albis vel rufescentibus, 6° segmento nigro. *A. albigena.*
 21. Parva; facie eburnea; fasciis niveis, 6° segmento nigro, antennis rufo-ferrugineis. *A. calens.*
 22. Media; facie eburnea nigro-maculatà, segmentis in latere albo-flavo maculatis, 6° albo fasciato; alis violaceis. *A. violacea.*

z *** *Abdomine nigro fulvo-hirto.*

23. Media; facie flavà, nigro lineatà, thorace fasciisque abdominalibus fulvo-hirtis; tarsis rufis. *A. melanopyrrha.*
 24. Minor; facie flavà, nigro-lineatà, thorace segmentis abdominis 1, 2, 3 nigro, 4 basi, 5-6 aureo-pilosis, pedibus cinereo rufo hirtis. *A. aurulento-caudata.*
 25. Parva; facie flavo-ferruginea, thorace segmentorumque fasciis fulvis, flavidis. Pedibus albo, tarsis aureo-fulvis. *A. rufipes.*

α **** *Abdomine nigro; ferrugineo-hirto.*

26. Major; facie flavidâ immaculatâ, scapo, 1^oque antennarum articulo ferrugineis. Thorace, abdomine, pedibus lætè ferrugineo piloso-tomentosis. *A. holopyrrha.*
27. Media; facie eburneâ, nigro signatâ, thoracis parte posticâ, segmentis 1^o toto, 2ⁱ parte anticâ, pedibus, nigerrimo hirtis. Capite, thoracis parte anticâ segmentorum 3, 4, 5, 6, et parte posticâ 2ⁱ, ferrugineo-hirto-tomentosis, in lateribus albo-pictis. *A. atro-cincta.*
28. Magna; facie flavo-maculatâ, cinereo-villosâ; thorace suprâ nigro-cinereo vix rufo, infrâ albo-piloso; 4^o, 2^o segmentis cinereis, 1, 3, 4, 5 nigris, 6^o anoque nigro-ferrugineis. Fasciis niveo-pilosis, pedibus albo-nigro villosis. *A. nigro-cincta.*
29. Magna; facie flavo-maculatâ; capite, thoraceque nigro, rufo-cinereis, infrâ albidis, 4^o, 2^o segmento rufo-villoso, reliquis nigris; fasciis 2, 3 sordidè albis. Pedibus cinereo-hirtis, tarsis ferrugineis. *A. bi-ciliate.*
30. Media; facie eburneâ, immaculatâ, omninò ferrugineo vel cinereo vestitâ. Pedibus nigris fulvo-cinereo-pilosis, tarsis ferrugineis. *A. 4-color.*
31. Media; facie flavo-punctatâ; thorace nigro, postice ferrugineo-villoso, 4^o segmento ferrugineo, reliquis nigris, fasciis albis. Pedibus ferrugineis albo extûs pilosis. *A. 3-color.*
32. Media; facie flavo-punctatâ, thorace et 1^o segmento fulvo-pilosis, 2, 3, 4 nigris badio in lateribus maculatis; 5^o, 6^o badiis, fulvo-hirtis, fasciis fulvis nitidis. Pedibus nigris, fulvo suprâ, anreo infrâ, pilosis. *A. badia.*
33. Parva; thorace nigro-fulvo-dimidiato, abdomine basi fulvo, apice albo-villoso. Pedibus nigris. *A. rufo-zonata.*
34. Media; facie albido-luteo-maculatâ, omninò ferrugineo-hirtâ. Pedibus suprâ albido-hirsutis. *A. ferruginea.*
35. Media; facie eburneâ. Capite, thoraceque (hoc in medio nigro)

rufo-villosis; 1°, 2°que segmentis cinereo-rufo-hirtis, reliquis nigris. Pedibus cinereo-villosis, tarsis ferrugineis. *A. parietina.*

36. Media; facie albido-luteo-maculatâ, thorace suprâ rufo, infrâ albo vel cinereo-villosâ; segmentis 1, 2, rufo-hirtis, 3, 4, 5, 6 anoque cinereis vel nigris. Pedibus cinereis, suprâ rufo-villosis. *A. balnearum.*

37. Media; facie albido-luteo-maculatâ. Caput, thorax, segmentum primum abdominis et pedes fulvescenti-hirsutis, pedum epidermis fulva. Abdominis segmenta, excepto primo, atra, tomento lutescenti-albido marginata. *A. fulvipes.*

38. Media; facie eburneo maculatâ, segmentis 5, 6 anoque albido-fasciatis. Pedibus extûs albescentibus, subtûs fulvo-nigricantibus. *A. obsca.*

39. Media; facie luteâ nigro punctatâ, thorace, segmentis pedibusque rufo-pilosis (in recentioribus) cinereis in detritis, tarsis ferrugineis. Ano mucronato. *A. furcata.*

40. Media; facie luteo-maculatâ; thorace, segmentis 1, 2, 3, 4, 5 nigro-cinereo tomentosis, 6° anoque fulvescenti-pilosis, fasciis albidioribus. Pedibus albido-hirtis; tarsis ferrugineis. *A. pyropyga.*

41. Media; facie albo luteo-maculatâ; thorace 1°que segmento abdominis rufo-ferrugineo-hirtis, reliquis nigris fasciis niveo-pilosis. Pedibus 1°que tarso articulorum albo-villosis. *A. Oraniensis.*

42. Magna; facie flavo nigro-maculatâ; thorace 1°, 2°que segmentis hirsutis, segmentorum fasciis 2, 3, 4 albido flavo-rufis. Pedibus nigris, rufo-pilosis. *A. nigro-maculata.*

43. Magna; facie flavo nigro-maculatâ; thorace rufo-hirto in medio fasciâ nigrâ; 1° segmento abdominis rufo-hirto, reliquis nigro-pilosis, fasciis 1, 2, 3, 4 flavo rufo-lineatis. Pedibus nigris rufo-pilosis. *A. atro-ferruginea.*

α ***** *Abdomine nigro, cinereo-hirto vel tomentoso.*

44. Minor; facie flavâ nigro-punctatâ; thorace cinereo-rufo; 1° segmento cinereo-hirsuto, reliquis nigris in parte inferâ

fulvescenti, albescenti, vel cinereo tomentosis. Pedibus albo-hirsutis.

A. squammulosa.

45. Minor; facie flavidà; abdomine cinereo-ochraceo tomentoso apice rufo. Pedibus flavido vestitis tarsis ferrugineis.

A. pulverosa.

46. Magna; facie nigro-flavo maculatà thoracis capitisque pilis rufo-cinereis suprà infrà albescentibus; 4°, 2°que segmentis cinereo-hirtis, reliquis nigris; fasciis 1, 2 angustis, albidis. Pedibus nigris, albo-rufo villosis.

A. Romandii.

47. Magna; labro et hypostomate parte inferiore flavis, segmentis 1, 2, 3, 4 cano-tomentosis, reliquis pedibusque omnibus atro-hirsutis.

A. atricillæ.

48. Media; facie nigro-flavo lineatà; thoracis pilis cinereis; 4° segmento cinereo vix rufo-hirto, reliquis nigris. Pedibus ferrugineis atro-hirsutis.

A. abrupta.

49. Media; rufo-cinereo-tomentosa segmentorum fasciis sordidè albicantibus. Pedibus ferrugineis, extùs candido, subtùs aureo-pilosis.

A. lepidodea.

50. Parva; facie immaculatà (varietas?). Capitis thoracisque pilis albo-cinerescentibus; abdomine nigro; segmentis 1, 2, 3, 4 niveo-lineatis in medio interruptis (usurà), reliquis nigris. Pedibus ferrugineis extùs albo, subtùs ferrugineo-pilosis.

A. nigrita.

51. Parva; facie flavo-maculatà, pilis faciei fulvis, thoracis et 4ⁱ segmenti abdominis cinereis; fasciis 2, 3, 4, 5, 6 ano-que niveo-lineatis. Pedibus ferrugineis albo-tomentosis.

A. fulvifrons.

52. Media; facie flavo-maculatà; capitis thoracisque suprà nigro, infrà cinereo-albidis; 1° segmento rufo-cinereo-villoso, fascià albà; reliquis nigris, 2°, 3°, 4°que et forsàn 5° (in recentioribus), maculà laterali ferrugineà. Pedibus aureo-ferrugineis.

A. Godofredi.

53. Parva; facie flavo-maculatà, capitis thoracisque cinereo-hirtis.

Segmentis 1, 2 cinereo-villosis, reliquis nigris his solùm niveo-fasciatis. Pedibus ferrugineis cinereo-hirtis.

A. Chiliensis.

34. Parva; facie nigrà, clypeo labroque albo-pilosis; antennis in medio ferrugineis, thorace cinereo vix rufo-hirto. Segmentis nitidis violaceis seu cæruleis; 2º albo-maculato. Pedibus nigerrimis extùs albo-nigro maculatis.

A. nitidula.

SUBDIVISIO II.

A. TARSIS INTERMEDIIS CILIATIS, VEL PENICILLATIS.

Articulis 1, 2, 3, 4, 5 tarsorum intermediorum ciliatis vel penicillatis.

1. Magna, tarsi intermedii posticè pilis longis, nigris fasciculati, primus quintusque depresso-dilatati, pilis nigris flabellato-penicillati. Segmentis abdominalibus rufo-ciliatis

A. pilipes.

2. Magna; tarsorum intermediorum articulis omnibus ciliatis, 1º 5ºque flabellatis. Abdominis segmentis 2, 4 nigro-pilosis non fasciatis.

A. dispar.

3. Media; tarsorum intermediorum articulis omnibus ciliatis, 1º, 5º nigro-flabellatis. Abdomine rufo-piloso; tibiis posticis externè albo-ciliatis.

A. pennata.

4. Media; tarsorum intermediorum articulis omnibus ciliatis, 1º, 5º nigro-flabellatis. Abdomine fulvescenti-piloso.

D. nigro-fulva. (Var. præcedentis.)

5. Magna; tarsorum intermediorum articulo 1º 5ºque nigro ciliatis, hoc nigro-penicillato; reliquis ferrugineo-ciliatis. Abdomine thoraceque-cinereo.

A. pyralitarsis.

6. Magna; tarsorum intermediorum articulis omnibus ciliatis rufis, 1º longiori nigro-penicillato; thorace, segmentisque 1, 2 ferrugineo rutilantibus, reliquis nigris.

A. rutilans.

B. *Articulis 1, 2, 3, 4 tarsorum intermediorum ciliatis, cochleariformibus.*

7. Major; tarsorum intermediorum extùs fasciculo pilorum nigrorum subsemilunari, cochleariformi, suprâ convexiusculo. Thoracis baseosque abdominis dorso rufo-hirto, reliquis nigris. *A. Hispanica.*
8. Major; tarsorum intermediorum extùs fasciculo pilorum nigrorum subsemilunari, cochleariformi suprâ convexiusculo. Thoracis baseosque abdominis dorso rufo-cinereo-hirto, reliquis cinereis. *A. rypara.*

C. *Articulis 1°, 5°que tarsorum intermediorum ciliatis.*

9. Major; tarsis intermediis nigro-penicillatis, penicillis distichis nigris. Thorace et segmentis abdominis 1, 2 cinereo-hirtis. *A. personata.*
10. Major; tarsis intermediis rufo-nigro penicillatis, penicillis nigris. Thorace et segmentis 1, 2 abdominis rufo-hirtis *A. nasuta.*
11. Major; tarsis intermediis rufo-nigro penicillatis, penicillis nigris. Thorace abdominisque segmentis totis rufo-cinereo hirtis. *A. squalens.*
12. Major; tarsis intermediis fulvo-nigro penicillatis, penicillis nigris. Thorace segmentisque abdominis 1, 2 fulvo-hirtis, reliquis nigris; fasciis 3, 4, 5 albidis. *A. arietina.*
13. Major; tarsis intermediis nigro-penicillatis distichis subtùs albidis. Thorace et segmentis 1, 2 abdominis cinereo-hirtis. *A. affinis.*
14. Major; tarsis intermediis griseo-penicillatis distichis, 1° articulo aureo-hirto, 5° nigro-penicillato. Thorace segmentisque abdominis 1, 2 cinereo-hirtis. *A. scopipes.*

Varietates

A. personatæ.

15. Magna; tarsi intermediis nigro fasciculatis; 4° articulo nigro-albo penicillato, 5° nigro-hirto. Thorace segmentisque abdominis 1, 2 fulvo cinereo-hirtis. *A. intermedia*.
16. Magna; tarsi intermediis nigro-fasciculatis; 4° articulo nigro-rufo penicillato, 5° nigro-hirto. Thorace segmento 1° abdominis rufo-nigro-hirtis, fasciis albidis.
A. k-strigata.
17. Media; tarsi intermediis 1°, 5°que nigro-fasciculatis. Thorace segmentisque abdominis 1, 2 nigro-rufo-cinereo hirsutis.
A. rubricrus.
18. Media; tarsi intermediis 1°, 5°que nigro-fasciculatis. Thorace segmentisque abdominis 1, 2 (in recentioribus) fulvo (in senescentibus) cinereo-hirsutis. *A. retusa*.
19. Media; tarsi intermediis nigro-fasciculatis, 1° rufo vel fulvo vel nigro-fasciculato, ultimo semper nigro-penicillato. Thorace 1°que segmento abdominis cinereo vel rufo-hirtis, fasciis griseis vel rufescentibus *A. senescens*.
20. Minor; tarsi intermediis albo-nigro fasciculatis; 4° albo externe, nigro interne piloso, 5° nigro penicillato. 4° articulo tarsorum posteriorum dilatato, dente acuto externe armato. *A. pubescens*.
- 20 bis. Media; tibiis intermediis elongatis, 1° et 5° tarsorum intermediorum nigro-rufo penicillatis. Thorace abdomineque cinereo-rufo-hirtis. *A. villosula*.

D. *Articulo 1° tarsorum intermediorum ciliato.*

21. Magna; 1° tarsorum intermediorum articulo nigro-albo fasciculato. Thorace et abdominis segmentis 1, 2 cinereo-hirsutis. *A. atro-alba*.
22. Magna; 1° tarsorum intermediorum articulo nigro-albo fasciculato. Thorace et abdominis segmentis 1, 2 fulvo-hirsutis, fasciis albido-griseis. *A. liturata*.
23. Media; 1° tarsorum intermediorum articulo nigro-fulvo fasci-

culato. Thorace abdominisque segmentis 1, 2 ferrugineo hirtis, reliquis nigris nec fasciatis.

A. dimidio-zonata.

24. Magna; 4° tarsorum intermediorum articulo nigro-ciliato, posticorum dilatato, utrinque uni-spinoso. Pedibus posticis crassis, tibiis aculeo armatis. *A. Dufourii.*

24 bis. Magna; femoribus intermediis elongatis, tibiis pilis longissimis albis 1° articulo antice breviter, postice longissime nigro-hirsuto. *A. pruinosa.*

E. *Articulo 5° tarsorum intermediorum ciliato vel penicillato.*

25. Magna; 5° tarsorum intermediorum articulo nigro, breviter penicillato. Thorace abdominisque segmentis 1, 2 rufo-pilosis. *A. ventilabris.*

26. Media; 5° tarsorum intermediorum nigro-penicillato. Thorace abdominisque segmentis fulvo-ferrugineo hirsutis. *A. concinna.*

SUBDIVISIO III.

Pedibus crassis, dentibus, spinis, etc.... armatis.

1. Magna; femoribus posticis crassissimis, tibiis excavatis, 4° tarsorum posticorum articulo longiori, duobus dentibus acutis armato. *A. femorata.*

2. Magna; femoribus posticis crassis; 1° tarsorum posticorum articulo longiori levi dente in medio armato. Facie eburnea. *A. segnis.*

3. Magna; femoribus posticis crassissimis, tibiis extus et 4° articulo tarsorum posticorum dente acuto armatis. *A. oxygona.*

4. Media; femoribus crassis; 4° tarsorum intermediorum articulo interne sinuato; 1° posticorum pyramidalis, tribus apophysis armato, ultimâ longissimâ. *A. irregularis.*

5. Media; femoribus posticis crassis dente basi armatis, tibiis posticis crassis, valgis, dente acutissimo externe armatis. *A. calcarata.*
 6. Minor; femoribus intermediis posticisque crassiusculis, tibiis simplicibus. *A. quadri-maculata.*
 7. Media; femoribus posticis crassis, 1^o articulo tarsorum posteriorum valgo, duobus spinis, unâ maximâ armatis. *A. tarsatu.*
 8. Media; femoribus posticis crassis, excavatis; tarsorum posteriorum 4^o articulo incrassato, trigono. *A. valga.*
 9. Media; femoribus posticis crassis, excavatis, tuberculatis. Thorace nigro, griseo fasciato. *A. taurea.*
 10. Media; femoribus posticis crassiusculis, tarsorum posteriorum 1^o articulo longiori, convoluto. Segmentorum fasciis citreis, nudiisculis. *A. marginata.*
 11. Minor; femoribus posticis crassis, abdomine forte punctato; segmentis 3 ad 6 caeruleo-marginatis. *A. cincto-femoratu.*
 12. Minima; femoribus posticis crassissimis, tuberculatis, tibiis posticis excavatis levi dente armatis. 1^o tarsorum articulo externe uncinato, 5^o longissimô. *A. pygmaea.*
 13. Magna; femoribus posticis crassis; 1^o, 2^oque articulo tarsorum intermediorum nigro-penicillato; tibiis posticis excavato-concavis dente armatis, penicillatis. 1^o articulo tarsorum posteriorum difformi dente obtuso armato. *A. dives.*
-

N° 1.

ANTHOPHORA ZONATA.

Lep. Hym., 11, 23 1.

APIS ZONATA, L. Syst. nat., 4, 953, 49.

ANDRENA ZONATA, Fab., Ent. Syst. 11, 341, 49.

MEGILLA ZONATA, Fab., Syst. Piez., 351, 45.

Long. : — Corps 45 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Media; nigra; capite, thorace et pedibus rufo-cinerescenti-hirtis. Clypeo ♂, ♀ plus-minus nigro-lineato. Segmentorum abdominalium apicibus 1-4 ♀, ♂ 1-3, metallice-cæruleo-fasciatis. Alæ hyalinæ.*

♀ Noire. Antennes en dessous rousses ou testacées, presque ferrugineuses; 1^{er} article en dessous jaune. Chaperon blanchâtre, portant deux taches noires, grandes, carrées. Labre blanc avec deux petits points noirs, un de chaque côté à sa base. Poils de la tête roux, mêlés de quelques-uns de noirs sur le vertex. Poils du milieu du corselet et de ses côtés roux, ceux du dessous blancs. Segments de l'abdomen hérissés de poils noirs; bord postérieur de chacun d'eux portant une bande de poils couchés, d'un bleu argentin; poils du 5^e segment noirs, les côtés en ayant de blancs (1). Anus noir; les segments en dessous sont bordés de poils d'un brun roussâtre. Poils des pattes antérieures blanc-sale, leurs tarses roussâtres. Poils de pattes intermédiaires noirs, dessus de leurs jambes et origine de leurs tarses blancs. Poils des pattes postérieures noirs, à l'exception de la moitié de la partie postérieure de la jambe prise en long, qui les a blancs. Ailes assez transparentes,

(1) Chez les individus nouvellement éclos, il existe sur le milieu du cinquième segment une petite touffe de poils blancs.

nervures brunes ; 1^{er} article des tarses postérieurs quelquefois un peu dilatés.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, joues, labre, mandibules jaunes, sauf deux lignes suturales noires sur le chaperon, deux points noirs en haut sur le labre ; ces lignes noires sont peu apparentes chez certains mâles. Abdomen et pattes comme dans les femelles. Les bandes des segments sont parfois plus larges que dans les femelles.

Nouvelle-Hollande. Manille. Indes Anglaises, Françaises

Collection Sichel, Dours.

De nombreux spécimens reçus de toutes les régions de l'Asie, permettent de grouper d'une manière certaine les variétés suivantes qui ne sont que des modifications du type dues à des influences diverses.

Dr Sichel.

VAR. 1.

ANTHOPHORA CINCTA.

MEGILLA CINCTA. Fab., Syst. Piez., 550, 9 ♀.

Long. : — Corps 18 mm. ; Ailes 10 mm.

♀ *Paulo major* ; capite, thorace, pedibus ardentè-rufis. Alar fusco hyaline.

♀ Noire. Face comme dans le type. Poils de la tête et du corselet en dessus roux ferrugineux, blanchâtres en dessous. Segments de l'abdomen noirs, chacun d'eux portant une bande de poils couchés d'un bleu plus ou moins argenté, un peu roux sur le 1^{er}, 5^e segment noir. En dessous les segments ont des poils noirs roussâtres au milieu, blancs sur les côtés. Poils des pattes en dessus rouge ferrugineux, noirs en dessous. Ailes un peu enfumées, nervures brunes.

Nouvelle-Hollande.

Collection Sichel, Dours.

SUBVAR. MINOR. *Pedibus nigro, vix fulvo-pilosis.*

SUBVAR. AFRICANA.

♂ Conforme à la femelle, sauf les différences sexuelles.

VAR. 2. **ANTHOPHORA CINGULATA.**

Lep., 41, 46, 20.

MEGILLA CINGULATA, Fab., Syst. Piez., 552, 18.

ANDRENA CINGULATA, Fab., Ent. Syst., 2, 544, 50.

Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 10 mm.

Capite cinerescenti-hirto. Abdominis fasciis pallidè cæruleis, è pilis brevibus stratis; metallicè vix nitentibus. Pedum pilis extùs cærulescentibus. Alæ sordidæ, hyalinæ.

♀ Face comme dans le type. Antennes presque entièrement ferrugineuses. Poils de la face et du corselet en dessus hérissés cendrés, roux sur les côtés, plus pâles en dessous. Abdomen noir revêtu de poils noirs, courts, un peu cendrés sur le 1^{er} segment; chacun de ceux-ci bordé d'une bande de poils courts couchés, verts-bleuâtres, sans reflet métallique marqué. Anus noir; côtés du ventre et segments en dessous garnis de poils blanchâtres. Poils des pattes noirs en dessous, en dessus bleuâtres, pareils à ceux de la frange des segments. Ailes un peu enfumées. La coloration bleue des poils des pattes devient cendrée chez les sujets vieux.

♂ Antennes presque ferrugineuses. 1^{er} article en dessous jaune. Chaperon ferrugineux avec deux lignes suturales noires. Labre jaune avec deux points noirs en haut. Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la face, du vertex et du corselet en dessus roux-cendrés, avec quelques-uns noirs, courts. Abdomen noir, 1^{er} segment hérissé de poils cendrés, courts; tous les segments bordés d'une bande de poils bleu-verdâtre, sans reflet métallique. Anus noir. Pattes comme dans la femelle.

Nouvelle-Hollande.

Collection Sichel, Dours.

SUBVAR. **ANTHOPHORA SUBCÆRULEA.**

Lep., 11, 50, 4.

Differt à var. 2. Fasciis segmentorum abdominis griseo-pallidis vix subcæruleis. Var. indica.

Pondichéry.

Collection Dours.

VAR. 3. **ANTHOPHORA PULCHRA.**

Smith., 553, 87

♀ Thorace rufo-fulvo; pedibus pallidè rufo-fulvo (non cærulescenti), capite, thoraceque subtus albido-cinerescenti (nullo modo cærulescenti vel viridescenti) pilosis. Abdominis 1-5 fasciis albescenti-subcærulescentibus, hinc indè leviter viridescentibus. (SICHEL).

Evidenter zonatæ varietas in cingulatam et subcærulescentem, transeuns. (SICHEL).

Australia.

(Je n'ai pas vu cette variété).

VAR. 4. **ANTHOPHORA ATRO-CÆRULEA. Sichel.**

Long.: — Corps 15 mm ; Ailes 12 mm.

♀ Nigra. Thoracis, capitisque pilis rufis, vel ferrugineo-nigris partim viridescentibus. Abdominis 1-4 latè metallico-cæruleo marginatis. Femoribus nigro-ferrugineo pilosis, duobus anterioribus viridescentibus. Alis fumatis.

(SICHEL).

Célebes.

Collection Sichel, Dours.

Remarquable variété dont on retrouve les analogues dans les espèces *A. 4-fasciata* de Vill. et *A. nigro-maculata*. Luc.

VAR. 5. **ANTHOPHORA FLAMMEO-ZONATA** Dours.

Long. : — Corps 12 mm ; Ailes 8 mm.

♀ *Nigra; facie A. zonatæ; thorace pedibusque rufo-pilosis; fasciis 5^oque segmento omnino, flammeo-squamosis leviter cupreo-micantibus. Alis hyalinis.*

♀ Antennes roussâtres, sauf le dessous du 1^{er} article qui est jaune, le 2^e, le 3^e qui sont noirs. Chaperon jaune, à l'exception de deux grandes taches noires sur le milieu. Labre jaune, deux petits points noirs sur les côtés, en haut. Mandibules jaunes, leur bout noir. Poils de la face et du corselet en dessus fauves, mêlés de noirs, blancs en dessous. Abdomen noir; 1^{er} segment ayant quelques poils fauves, 2^e, 3^e, 4^e entièrement noirs, avec quelques poils de cette couleur très-courts; 5^e segment en entier et base des quatre premiers portant une bande de poils orangés, couchés, simulant des écailles et présentant une teinte cuivrée métallique indécise. Base du 5^e et anus portant quelques poils ferrugineux. Pattes fauves en dessus, noires en dessous. Ailes transparentes, côte et nervures noires. — Voisine de la *Megilla fasciata* et *4-cincta* Fab., mais se rapprochant du groupe des *Zonata* par la teinte cuivreuse métallique des segments abdominaux.

Sumatra

Collection Dours.

VAR. 6. **ANTHOPHORA ANALIS** Sichel.

Long. : — Corps 16 mm.; Ailes 11 mm.

♂ *Nigra, nigro-pilosa; pilis capitis et thoracis partim, segmentorum abdominalium 4, 5 omnino, cinerescenti-subcæruleis; alis fusco-hyalinis.*

Os fere A. 4-zonatæ ♀, sed maculis duabus maximis

quadratis nigris baseos clipei; suprà basim clipei maculâ triangulari flavâ parvâ, et utrinque inter clipeum orbitas que internas nigras, lineolâ flavâ nigro-pilosâ; genis pectorisque albido-pilosis; capite (clipeo excepto), pronoto et mesothorace pilis cinerescentibus, intermixtis, hine, indè subcæruleis. Segmentorum abdominalium 4, 5, pedumque anticorum, tibiarum præsertim, pilis cinerescentibus, in recentibus forsân albis, subcæruleis; 6° et ano nigris sub nudis; 6° utrinque albido-ciliato, pedes nigro-picei, posteriores nigro-pilosi. Alæ fusco hyalinae leviter cupreo-micantes, venis nigris. (SICHEL).

Guinea.

Collection Drevsen.

(Je n'ai pas vu cette variété).

VAR. 7. **ANTHOPHORA VIGILANS. Smith.**

Long. : — Corps 25 à 26 mm , Ailes 11 à 12 mm.

♀ *Nigra, parçè rufo-pubescent; thorace fulvo-rufo-hirto. Abdominis segmentorum fasciis apicalibus fulvo-rufis; pedibus rufo-piceis, tibiarum posticurarum scopâ sub aureo-ferrugineâ. Alis sordidè flavo-hyalinis.*

Clypeus fere A. 4-zonata, maculis nigris maximis. Abdomen pallide nigrum, segmentis pallide nigris, parcissimè fulvo-rufo-pubescentibus, margine apicali (præsertim ventrali), decolorato, testaceo, fulvo-rufo fasciato; (fasciarum pilis decumbentibus); segmento 5° paulo, sed vix rufo-pilosiori. Alis sordidè flavo-hyalinis, leviter cupreo-micantibus. (SICHEL).

Célebes.

Collection Drevsen.

(Je n'ai pas vu cette variété).

N^o 2. ANTHOPHORA 4-FASCIATA.

ANTHOPHORA NIDULANS, Lep. hym., 2, 27. ♂ ♀.

Brullé, Hist. Nat., il. Can., 5, p. 84, 8.

Lucas, Expé. Sc. Alg., 5, 112, 4.

APIS NIDULANS, F. Ent. Syst., 2, 550, 72. (Var. Thorace cinerescenti piloso; abdomine albo-fasciato.)

CENTRIS NIDULANS, Fab., Syst. Piez., p. 557, 11.

APIS QUADRIFASCIATA, de Vill., Ent., 5, 519, 90. (Var. Thorace rufo, cæterum albo-pilosâ.)

MEGILLA CIRCULATA, Fab., Syst. Piez., p. 552, 17. (Thorace tomentoso fulvo, abdomine atro; segmentorum marginibus albis.)

ANTHOPHORA NANA. Evers, Bull. des Natur. de Mese., 1832, p. 115, 8. Var. ♂

ANTHOPHORA GARRULA. Germ.

APIS GARRULA. Rossi, 2. p. 101, 908. ♀

Long. : — Corps 10 mm.; Ailes 10 à 15 mm.

♀ ♂ *Media, nigra, varia. Ore ♀ flavo, nigro-vario; ♂ fluvido, vel albido, vir nigro-vario; thorace fulvo vel cinerescenti, pleuris pectoreque hirtis (sterno interdum nigro-piloso), segmentorum abdominalium fuscis apicalibus (♀ 4, ♂ 5), utrinque in ventrem decurrentibus albis, rufis, vel rufescentibus; ano utraque albo-piloso in medio nigro, tibiis extus albido-pilosis. Alis hyalinis.*

♂ *Fœminâ fere dimidiò minor.*

♀ Noire. Chaperon blanc, à l'exception de deux taches carrées plus ou moins grandes, qui sont noires. Labre jaune avec un petit point noir de chaque côté de sa base. Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la face cendrés, plus ou moins roux. Corselet en dessous hérissé de poils roux, fauves, cendrés suivant l'état plus ou moins frais du sujet; en dessous ces poils sont blancs. Abdomen noir, revêtu de poils couchés, rares, courts, fauves ou cendrés. Chacun des

segments bordés d'une bande de poils de cette couleur, qui varie du blanc éclatant au ferrugineux; dernier segment noir au milieu, blanc sur les côtés. Poils des pattes en dessus hérissés blancs ou roux, tarses postérieurs noirs. Ailes un peu enfumées; nervures brunes.

♂ Moitié plus petit que la femelle. Chaperon, labre, mandibules, dessus du 1^{er} article des antennes jaune, souvent de couleur éburnée. Deux petits points noirs de chaque côté du labre. Poils de la tête et du corselet en dessus hérissés cendrés, plus ou moins roux. Abdomen noir, recouvert chez les sujets frais de poils courts, rares, couchés tantôt roux, tantôt cendrés. Chacun des segments bordés d'une bande de poils de cette couleur, qui varie du blanc éclatant au ferrugineux, et qui est interrompue au milieu de la 5^e; le 6^e segment n'a que des poils noirs. Poils des pattes en dessus hérissés blancs ou roux, en dessous noirs, ainsi que ceux des tarses postérieurs. Ailes un peu enfumées; nervures brunes.

Depuis l'Europe Méridionale jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.

Saint-Sever, Perpignan, Montpellier, Cannes.

Corse, Florence, Naples, Sicile.

Algérie, Tanger, Egypte, Syrie.

Indes Orientales, Amérique Centrale et Méridionale.

Cette espèce cosmopolite présente une foule de nuances pouvant se résumer dans les variétés et sous-espèces suivantes, dues à l'altitude, à la chaleur, etc., etc., et offrant les divers états connus sous les noms d'Albinisme, de Mélanisme, d'Erythrisme, de Flavisme.

TRIBUS 1.

♀ *Metatarsi postici duo, nigro-pilosi.*

SUBVARIETAS α.

Caput albido-hirtum; vertex rufo-hirtus (plerumque lineà

pilorum nigrorum inter verticem et occiput). Antennis rarissimè subtus piceo-rufis, vel rufescentibus. Fasciæ abdominales albæ. Metatarsi duo posteriores nigri. (Variant interdum basi postice nigræ.) Abdominis segmentum 1 nigrum, basi albido-pilosum, apice albo-fasciatum.

SUBVAR. 6. Rufescens, omnium pilorum color rufus, pleuris interdumque tibiis extus albido-pilosis. 5^e segmento sæpè albo-fasciato.

♂ Typico paulò minor.

(D^r SICHEL).

Florentia, Montepessulo, Neapoli, Algiria.

VAR. 1. **ANTHOPHORA MADERÆ.** Sichel.

Reise, p. 14.

♀ *Nigra; nigro-pilosa. Abdominis fasciis tiliarumque pilis pallide rufis. Alis sordidè hyalinis; ore ♀ flavo-maculato, ♂ flavo.*

♀ Chaperon jaune, deux grandes taches carrées de chaque côté. Labre jaune; deux points noirs en haut sur les côtés. Mandibules jaunes, leur extrémité noire. Poils de la face, du corselet en dessus et en dessous noirs. Abdomen noir, presque dépourvu de poils; 2^e, 3^e, 4^e segments bordés d'une frange de poils couchés, ferrugineux, pâles; cette frange à peine marquée sur le bord du 1^{er} segment. Anus noir, quelques poils ferrugineux sur les côtés. Poils des pattes noirs en dessus, sauf ceux des jambes, qui sont ferrugineux-fauves. Tarses postérieurs en dessous lavés de ferrugineux. Ailes enfumées.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes, face, à l'exception de deux points noirs sur les côtés du labre, mandibules jaunes. Poils de la face et du corselet en dessus ferrugineux-fauves, plus pâles en dessous. 1^{er} segment hérissé de poils noirs mêlés de fauves; les autres segments peu garnis de poils noirs, ponctués, chacun d'eux orné d'une frange de poils couchés ferrugineux-fauves; frange très-interrompue au 5^e. Anus noir. Poils des pattes noirs en dessus, sauf ceux des jambes, qui sont ferrugineux-fauves. Tarses en dessous lavés de ferrugineux. Ailes moins enfumées que dans la femelle.

Madère.

Collection Sichel, Dours.

Cette variété remarquable a son analogue dans *A. nigro-maculata* Luc., comme je l'établirai plus bas.

VAR. 2. **ANTHOPHORA ALBESCENS. Dours.**

Long : — Corps 12 à 15 mm ; Ailes 7 à 9 mm.

♀ *Cinereo-villosa*. Abdomine nigro; fasciis 2, 3, 4 niveis, 1 cinerescenti; pedibus extus albo-pilosis, metatarsis nigris.

♀ Noire. Antennes ferrugineuses, sauf le 2^e et le 3^e articles, qui sont noirs. Chaperon, labre et mandibules jaunes, sauf deux taches noires se rejoignant parfois sur le haut du chaperon, deux points noirs sur les côtés du labre. Face recouverte de poils argentés, cendrés sur le vertex et le dessus du corselet, blancs en dessous, un peu fauves sur les côtés. Abdomen noir; 1^{er} segment hérissé de poils cendrés, 2^e, 3^e, 4^e portant une large bande de poils courts, très-blancs; 5^e segment et anus noirs, avec quelques poils blancs

sur les côtés et quelques poils ferrugineux au bout. Pattes en dessous hérissées de poils blancs éclatants, noirs ferrugineux en dessous. Tarses noirs. Ailes transparentes; nervures et côte noires.

Algérie.

Collection Dours.

♂ Les poils du corselet plus blancs que dans la femelle; 5^e segment recouvert de poils argentés interrompus au milieu.

Budna.

Collection Dours.

VAR. 3. **ANTHOPHORA MUCOREA.**

Klug, 49, fig. 14 ♀, fig. 15 ♂, 11.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Nigro, cinereo-villosa. Abdominis segmentis apice, tibiis extus albis, clypeo labroque pallidis. Antennis testaceo-ferrugineis. Alæ hyalinæ.*

♀ Antennes ferrugineuses; le 1^{er} et le 2^e articles noirs. Chaperon jaune, son bord inférieur ferrugineux, deux taches triangulaires noires sur le milieu. Labre jaune, deux points noirs sur les côtés, en haut. Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la face et du corselet en dessous et sur les côtés d'un blanc sale, roux sur le vertex et sur le corselet en dessus. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux; 2^e, 3^e, 4^e ayant quelques poils noirs, rares. 5^e segment tout entier hérissé de poils roux et cendrés, sauf sur le milieu, qui porte un pinceau de poils noirs; chaque

segment est garni en outre d'une bande de poils couchés, roux-cendré, très-large sur le 2^e, 3^e, 4^e. Anus noir. Abdomen en dessous ferrugineux, ses segments ciliés de poils blancs. Pattes ferrugineuses, recouvertes en dessus de poils d'un blanc sale, noirs ferrugineux en dessous. Ailes transparentes; côte, nervures brunes.

♂ Plus petit d'un tiers que la femelle; antennes d'un brun ferrugineux, sans tache sur le 1^{er} article. Face jaune, immaculée, sauf deux petits points noirs sur les côtés du labre. 6^e segment de l'abdomen et anus noirs, avec quelques poils ferrugineux. Le reste comme dans la femelle.

Abyssinie.

Collection Dours.

C'est avec doute que je rapporte ce mâle à l'*A. Mucorea* Klug. La figure de cet auteur diffère par le 3^e segment abdominal entièrement recouvert de poils blancs; par le 1^{er} article des antennes jaune en dessous. Ce n'est peut-être qu'une variété.

VAR. 4 **ANTHOPHORA SEMI-PULVEROSA.** Sichel.

♀ *Rufo-fulva*. *Abdomine nigro*; 4^o, 5^o *cinereo-pubescentibus*, *fasciis 1-3 rufo-fulvis*; *femoribus ferrugineis*, *fulvo pilosis*.

(SICHEL.)

♀ Face semblable à celle de l'*A. 4-fasciata*. Poils du vertex et du corselet en dessus fauve-roussâtres, blancs en dessous. Chaperon de couleur testacée ou ferrugineuse. Antennes ferrugineuses. Abdomen noir; bords des 1^{er} et 3^e segments recouverts de poils roussâtres ou cendrés, le 4^e et le 5^e tout-à-fait cendrés, simulant des écailles de papillon; le 5^e en

outre est noir à son extrémité. Anus noir. Pattes en dessous rousses, presque ferrugineuses. Ailes transparentes.

Indes Orientales.

Collection Sichel, Dours.

♂ Moins long et moins large que la femelle 4^e, 5^e segments de l'abdomen recouverts de poils cendrés au milieu, imbriqués en forme d'écailles, noirs sur les côtés; 6^e segment et anus noirs. Ailes transparentes.

Natal.

Cette variété, par la taille, est intermédiaire entre *A. 4-fasciata* et *A. albigena*.

TRIBUS 2.

♀ *Metatarsi postici duo, albo vel albido-pilosi. (Typice conformis.)*

SUBVAR. γ. ♂. 5ⁱ segmenti fascià interruptà, subrufescenti.

Neapoli

♀ *Metatarsi antici externè, maculà angustà, flavà, triangulari ornati.*

SUBVAR. γγ. ♀ ♂ Thorace, pedibusque extùs rufo, vel rufescenti-pilosis. Fasciis rufis, vel rufescentibus. 1^o nigro, basi albido-piloso.

Pedemon.

♂ Rufescens, sterni pedumque anteriorum pilis albidis. 1ⁱ segmenti medio pili nigri, fulvis mixti. 5ⁱ segmenti, fascià continuà. (D^r SICHEL.)

Italia, Corsica.

VAR. 3. **ANTHOPHORA DOMINGENSIS.**

Lep., 11, 52, 6, ♂.

A. MACULICORNIS, Lep., 11, 52, 5.

A. MELALEUCA, Lep., 11 52, 7 (Senex).

Long. : — Corps 12 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Nigra; facie A. 4-fasciata. Capitis, thoracis 1^{er} segmenti pilis rufis. Fasciis abdominis rufo-pilosis, femoribus ferrugineis.*

♀ Noire. Face de l'*A. 4-fasciata*. Poils de la face, du corselet en dessus et du 1^{er} segment de l'abdomen roux, mêlés de noirs. 2^e, 3^e, 4^e, 5^e segments noirs, avec quelques poils de cette couleur, courts. Base de tous les segments portant une bande de poils couchés, roux chez les sujets frais. Anus noir, avec quelques poils ferrugineux. Abdomen en dessous ferrugineux. Pattes ferrugineuses, leurs poils en dessus roux, avec une petite touffe de poils blancs à l'extrémité des cuisses postérieures. Dessous du 1^{er} article des tarses noir. Ailes transparentes. Côte, nervures noirâtres; point calleux testacé clair.

♂ Semblable à la femelle, sauf les différences sexuelles de la face. 6^e segment et anus hérissés de poils noirs, mêlés de ferrugineux.

Sénégal.

Collection Dours.

A. maculicornis est une variété à antennes tachées de ferrugineux sur le 3^e article; à pubescence moins rousse, plus cendrée.

A. melaleuca est un sujet vieux, usé.

(SICHEL.)

VAR. 6.

ANTHOPHORA SOCIA.

MEGILLA SOCIA, Klug., Symb. ph. Déc., 5, 2, 49, I. 6, ♀.

*Abdominis primum segmentum totum pallide hirtum nec
vel vix fasciatum.*

Syria, Cypro.

Collection Sichel, Dours.

♀ Noire. Poils de la face cendrés, roux sur le vertex et sur le thorax en dessus; quelques poils noirs sur le milieu de ce dernier. 1^{er} segment hérissé de poils roux, les autres segments noirs très-finement ponctués; 2^e, 3^e, 4^e segments bordés d'une frange de poils roux couchés; 5^e segment noir. Anus ayant quelques poils ferrugineux. Pattes en dessus hérissées de poils cendrés plus ou moins roux; ils sont noirs ferrugineux en dessous, surtout au 1^{er} article des tarses postérieurs. Ailes un peu enfumées.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune. Chaperon (deux lignes suturales noires sur les côtés), labre (deux points noirs sur les côtés), mandibules jaunes. Poils de la face cendrés, ceux du vertex et du corselet en dessus roux, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux, mêlés de blancs sur les côtés, les autres segments noirs; 2^e, 3^e, 4^e, 5^e bordés d'une frange de poils couchés, roux ou blancs, interrompue au milieu du 5^e. Anus noir. Pattes en dessus hérissées de poils cendrés plus ou moins blancs, de noirs ferrugineux en dessous, surtout aux tarses postérieurs. Ailes un peu enfumées.

Corse.

Collection Sichel, Dours.

VAR. 7. **ANTHOPHORA FARINOSA.**

MEGILLA FARINOSA, Klug, Symb. phys., déc., V. T. 50, f. 2. ♀ ♂.

Nigra, pilis omnibus cinerescens, sæpius albidis. 1^o segmento albo-piloso, fasciis omnibus latè albis. ♂ ♀.

♀ Noire; face semblable à celle du type. Poils de la face et des côtés de la tête blancs, ceux du vertex et du corselet en dessus sont cendrés, un peu roux en arrière, tout-à-fait blancs en dessous de ce dernier. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés, un peu roux; les autres segments, à l'exception du dernier qui a quelques poils noirs, sont nus, brillants, très-finement ponctués. Pattes ferrugineuses, leurs poils blancs avec une légère teinte rousse, surtout sur les postérieures. Ailes transparentes; côtes, nervures ferrugineuses. Point calleux testacé, très-pâle.

Arabie Heureuse, Cafrerie.

Collection Sichel, Dours.

♂ Semblable à la femelle, sauf les différences sexuelles. Cette variété se distingue à peine de la suivante.

VAR. 8. **ANTHOPHORA ALTERNANS.** ♀

MEGILLA ALTERNANS, Klug, Symb. phys., déc., V. 2, 50, f. 3.

♀ *Nigra, pilis thoracis cinerescens; fasciis abdominis cinerescenti-fulvescentibus vel albidis, tomentosus.*

♀ Noire, ponctuée; face semblable à celle du type. Poils de la tête hérissés, cendrés; ceux du corselet en dessus sont grisâtres, un peu plus pâles en dessous, roux sur les côtés.

1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils blanchâtres, les autres en ont de noirs, rares, très-courts. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils couchés, blancs, tomenteux plus large sur le milieu. Poils de l'anus noirs; en dessous, les segments portent une bande très-étroite de poils blanchâtres, s'élargissant sur les côtés. Poils des pattes blanchâtres en dessus, noirs, lavés de ferrugineux en dessous. Ailes un peu enfumées; côte, nervures ferrugineuses. Point calleux testacé, clair.

SUBVAR. 2. *Rufescens*. Poils du corselet, du 1^{er} segment de l'abdomen, des bandes, des pattes, roux plus ou moins foncé.

Egypte, Piémont, Etrurie, Naples, Corse.

Collection Sichel, Doubs.

VAR. 9. **ANTHOPHORA CONFUSA.**

Smith, Catal. 94.

♀ Thorace pedibusque albido-cinerescenti pilosis. Metatarsis posticis nigris, baseos margine postico tantum albido-cinerescenti-piloso (ut interdum in Africanis). Tibiarum posticarum dimidii basalis margine postico nigro-piloso. Segmento 5^o nigro, utrinque albo-ciliato, segmentis ventralibus piceo-subrufescentibus, margine apicali utrinque albo ciliato; alis sordide hyalinis. Tibiæ intermediæ quoque suprâ pallide-albido-pilosi, at pilis minus densis, margine posteriori dense albido-fimbriato.

(SICHEL.)

India.

Collection Drewsen.

(Je n'ai pas vu cette variété.)

VAR 10.

ANTHOPHORA NIVEA.

Lep., 11, 52, 26.

MEGILLA INCANA, Klug, Tab. 49, f. 42, n° 19.

Long. : — Corps 13 à 14 mm. ; Ailes 40 mm.

♀ *Nigra, cinerescenti villosa; antennis femoribusque ferrugineis, cinereo villosis. Abdominis fasciis cinerescenti-squammosis. Alæ hyaline.*

♀ Noire. Antennes ferrugineuses, sauf le 2^e article et la base du 3^e qui sont parfois noirs. Chaperon ferrugineux portant deux petites lignes suturales, quelquefois deux taches triangulaires noires sur le milieu. Labre ferrugineux-jaunâtre, avec deux points noirs sur le côté, en haut. Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la face et du corselet en dessous blancs sale, ceux du vertex et du corselet en dessus cendrés, roussâtres. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils de cette couleur; les autres segments ayant des poils courts, couchés, ressemblant à des écailles, d'un blanc plus ou moins roussâtre. Chacun des segments porte une large bande de poils roussâtres; 5^e segment tout entier garni de poils de cette couleur, sa partie moyenne et l'anus noirs, avec quelques poils ferrugineux. Abdomen en dessous ferrugineux, avec les segments garnis de cils blanchâtres. Pattes ferrugineuses, recouvertes en dessus de poils cendrés, noir-ferrugineux en dessous. Ailes transparentes; côte et nervures brun-pâle. Point calleux testacé, clair.

Sénégal.

SUBVARIETAS ♂. *Omnino rufescens. Thoracis femoribusque pilis rufescentibus, ferrugineis.*

Abyssinie.

Collection Dours.

♂ Semblable à la femelle, sauf les différences sexuelles de la face et des antennes; 6^e segment recouvert entièrement de poils roussâtres. Les bandes des segments sont aussi plus larges.

N^o 3. ANTHOPHORA ALBIGENA.

Lep., 11, 28, 5.

A. BINOTATA, ♂ Lep., 11, 58, 12.

Long. : — Corps 11 mm.; Ailes 8 mm.

Minor, nigra. Clipei lineâ intermediâ flavâ, rarò nullâ. Thorace cinerescenti, interdum rufo. Abdominis fasciis albis. 5^e segmento albo-piloso, apice nigro.

♀ Noire, une tache triangulaire au-dessus du chaperon. Celui-ci noir, portant ordinairement dans son milieu une ligne perpendiculaire et une autre transverse, avant le bord inférieur, lignes jaunes, invisibles chez deux femelles de ma collection, très-larges au contraire chez deux autres. Joues blanches chez les sujets frais, le plus souvent jaunes, recouvertes de poils blancs. Labre blanc portant de chaque côté un point noir sur sa base. Mandibules blanches, noires au bout. Sommet de la tête hérissé de poils noirs. Antennes en dessous plus ou moins roussâtres. Corcelet en dessus hérissé de poils cendrés, rarement roux, plus blancs en dessous. Abdomen noir, finement ponctué, hérissé de poils noirs très-courts. Chacun des segments est bordé d'une frange de poils couchés cendrés, un peu roussâtres; 5^e segment entièrement recouvert de poils blancs, si ce n'est à son extrémité, qui est noire. Poils des pattes et du 1^{er} article des tarses postérieurs blancs en dessus, noirs avec une teinte ferrugineuse en dessous. Ailes transparentes.

♂ Noire; antennes roussâtres, le dessous du 1^{er} article, face toute entière de couleur éburnée, à l'exception de deux lignes très-étroites sur les côtés du chaperon et de deux points noirs sur les côtés du labre. Poils du vertex, du corselet en dessus cendrés, rarement roux, plus blancs en dessous. Abdomen noir, finement ponctué; 1^{er} segment hérissé de poils cendrés, les autres en ont quelques-uns de noirs. Chaque segment est bordé d'une frange de poils couchés, blancs, parfois un peu roux. Anus noir. Poils des pattes en dessus blancs, noir-ferrugineux en dessous. Tarses postérieurs noirs.

France, Corse, Italie, Grèce, Algérie, Syrie, Indes (Variétés).

Collection Sichel, Dours.

VAR. 1. SUBVAR. α. *Metatarsis posticis nigris*. Thorace rufo-piloso.

SUBVAR. β. *Metatarsis posticis nigris*. Thorace rufo-piloso. Segmentis 1-3 rufo-fasciatis.

Grèce, Algérie.

VAR. 2. SUBVAR. γ. *Metatarsis posticis albis*. Thorace cinerescens-piloso; fasciis abdominis vix rufescentibus.

France, Corse.

SUBVAR. δ. *Metatarsis posticis albis*. Fasciis abdominis rufis.

Algérie.

VAR. 3. **ANTHOPHORA NIVEO-CINCTA** ♀.

Smith, Cat. 92, p. 557.

ANTHOPHORA CALENS, Lep., 11, 49, 25 ♀

Long. : — Corps 10 mm.; Ailes 6 mm.

♀ *Cinerescens, antennis, femoribus et ventre rufo-ferrugi-*

neis. Abdominis fasciis niveis, pedibus sordide albo-pilosis. Alis hyalinis ♀.

♀ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes jaune, 2^e, 3^e articles noirs, les autres ferrugineux. Chaperon ferrugineux-jaunâtre, avec deux taches triangulaires sur les côtés. Labre jaune, deux points noirs en haut. Mandibules jaunes, noires ou ferrugineuses au bout. Poils de la face et du corselet en dessus fauves, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils fauves, 2^e, 3^e, 4^e ayant des poils rares, noirs. Base de tous les segments portant une bande de poils blancs couchés, cette bande recouvrant le 5^e segment tout entier. Anus noir, avec quelques poils ferrugineux au bout. Abdomen en dessous et pattes ferrugineuses. Celles-ci en dessus sont hérissées de poils d'un blanc sale, et de noirs en dessous.

Pondichéry.

Collection Dours.

Souvent, dans l'*A. nigro-cincta* ♀, les trois premiers articles des antennes sont noirs.

SUBVAR ε. *Anthophora ruficornis*, Sichel : Antennes entièrement ferrugineuses, corselet hérissé de poils fauves-roussâtres. Abdomen en dessous et pattes *ferrugineuses-noires*.

Tranquebar.

Les espèces désignées dans Fab., Syst. Piez., *Megilla 4-cincta*, p. 333, 24, *Megilla fasciata*, p. 331, appartiennent bien certainement au groupe de l'*A. calens*.

♂ *Nigra; fulva; antennis ferrugineis, scapo subtils flavo, femoribus et ventre nigro-ferrugineis. Abdominis fasciis niveis, pedibus sordide albo-pilosis; alis hyalinis.*

Noire; dessous du 1^{er} article des antennes jaune, 2^e et base du 3^e noirs, les autres ferrugineux. Chaperon jaune,

avec deux lignes suturales noires à peine marquées sur les côtés. Labre et mandibules jaunes, celles-ci noires au bout. Poils de la face jaunes, roux sur le vertex et sur le corselet en dessus, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen ayant quelques poils roux mêlés de noirs; les autres segments hérissés de poils noirs rares au milieu, plus abondants à la base. Chacun des segments porte une bande de poils blancs couchés; cette bande recouvre le 5^e segment presque en entier. 6^e segment et anus noirs; en dessous les segments sont garnis de cils blancs, noirs au milieu. Pattes très-obscurement ferrugineuses, hérissées en dessus de poils d'un blanc sale et de noirs-ferrugineux en dessous. 1^{er} article des tarses postérieurs noir. Ailes transparentes; côte et nervures noires.

Pondichéry.

Collection Dours.

VAR 4. **ANTHOPHORA ALBIDA. Sichel.**

Var. Africae Occidentalis.

Minor, albescens. Capitis tibiæque pili; metathoracisque utrinque fasciculus pilorum latissimus, abdominisque fasciæ pallide niveo-albæ. Thorace cinerescenti hirta. Affinissima et per staturam in *A. albigenam* transeuns, à 5^o-nigro, juxtâque eam collocanda.

A. niveo-cinctâ quoque similis est.

(SICHEL.)

Tanger

N^o 4. **ANTHOPHORA SQUAMMULOSA. Sichel.**

♀ *Nigra; clypeo, labro mandibulisque flavo-nigro maculatis. Thorace nigro-flavido-piloso. Abdominis 2-5 segmentis, flavo vel albido vel cinerescenti-tomentosis, squammosis, fasciis distinctis; 5^o maculâ triangulari nigra. Pedibus nigris flavido-cinerescenti-hirsutis. Tarsis ferrugineis. Alæ hyalinæ.*

♂ *Cinerecenti-piloso*; 5^e segmento in lateribus duabus dentibus acutis armato. *Pygidio triangulari, in medio carinato.*

♀ Noire; partie inférieure du chaperon, labre, milieu des mandibules jaunes. Face recouverte de poils blancs, mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus hérissé de poils plus ou moins jaune-cendrés, mêlés de noirs sur le disque, blancs en dessous. 1^{er} segment hérissé de poils cendrés; moitié inférieure du 2^e et suivants en entier recouverts de poils courts très-serrés, semblables à des écailles de papillon, de couleur cendrée ou jaune. 5^e segment ayant sur son milieu une touffe triangulaire de poils noirs. Bord de tous les segments portant une bande de poils plus foncés, squammeux; en dessous et sur les côtés les segments sont ciliés de poils blancs. Pattes noires recouvertes de poils plus ou moins cendrés ou jaunâtres. Ailes transparentes; côte, nervures brunes.

♂ Face jaune sans tache, recouverte, chez les sujets frais, de poils blancs mêlés de jaunes, surtout sur le vertex. 5^e segment portant de chaque côté une dent aiguë. Anus triangulaire, avec une ligne saillante sur le milieu.

NOTA. En général, la pubescence du mâle est plus franchement cendrée que dans l'autre sexe.

Mexique.

Collection Sichel, Dours.

N^o 5. ANTHOPHORA RUFIPES.

Lep., 11, 50, 24.

ANTHOPHORA SAVIGNYI, Lep., 11, p. 47, n^o 21 ?

ANTHOPHORA RUFA, Lep., 11, p. 48, n^o 22 ?

♂ Long.: — Corps 8 mm.; Ailes 5 mm.

♀ *Parva, nigra, rufescenti-villosa. Pedibus extus albido rufescentibus, subtus rufis. Alæ hyalinæ.*

♀ Noire; labre (sa base et un point de chaque côté noirs). Chaperon (une grande tache carrée de chaque côté de sa base, et son bord inférieur noirs), les joues, une tache triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc jaunâtre. Poils du dessus de la tête et du corselet roux mêlés de noirs, ceux du milieu hérissés noirs; base des 2^e, 3^e, 4^e portant quelques poils hérissés noirs, mêlés sur les 3^e, 4^e d'un petit nombre de poils couchés blanchâtres; bord postérieur de ces quatre segments portant une bande de poils couchés d'un roux pâle chez les sujets frais. 5^e segment hérissé de poils couchés blancs, son bord inférieur et les côtés de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des segments blancs sur les côtés, ferrugineux sur le milieu. Les pattes antérieures sont revêtues de poils tout-à-fait blancs; chez les intermédiaires et les postérieures surtout, les poils blancs sont mêlés de poils dorés, la tranche externe des cuisses postérieures est ornée de cils blancs. En dessous les poils de toutes les pattes sont ferrugineux-doré. Ailes transparentes, côte, nervures brunes; point calleux de couleur testacé clair.

Cafrerie.

Collection Dours.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune; face immaculée; extrémité des mandibules ferrugineuse. Poils de la face et du corselet en dessus et en dessous roux. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux abondants; 2^e, 3^e, 4^e, 5^e segments ayant des poils roux courts mêlés de noirs; 6^e segment entièrement roux. Base de tous les segments portant une bande de poils roux plus large sur les derniers. Anus roux, muni de deux épines. Poils des pattes en dessus roux blanchâtres, ferrugineux-doré en dessous.

Abyssinie.

Collection Dours.

Les *Anth. rufa*, *Savigny* Lep., sont, je crois, des variétés de cette espèce.

N° 6. ANTHOPHORA RUFO-LANATA. Dours.

Long. : — Corps 14 mm. ; Ailes 18 mm.

Parva; nigra; capite, cinereo, thorace abdomineque nigro-fulvo-villosis. Pedibus extus albido, subtus aureo-pilosis. Alis hyalinis.

♀ Noire. Antennes noires, à l'exception du dessous du 1^{er} article qui porte une tache ferrugineuse. Face entièrement noire, sauf deux taches jaunes sur les côtés inférieurs du chaperon. Mandibules noires, un point jaune à la base. Poils de la face roux-cendré, ceux du labre blancs, ceux du vertex noirs. Corselet en dessus hérissé de poils fauves mêlés de noirs sur le milieu; en dessous ils sont blancs, roux sur les côtés. 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments de l'abdomen hérissés de poils roux mêlés de noirs; 5^e segment noir. Bord inférieur de tous les segments portant une bande de poils roux couchés; en dessous et sur les côtés les poils sont blancs. Anus un peu ferrugineux. Poils des pattes en dessus blancs, ferrugineux-dorés en dessous, principalement sur le 1^{er} article des tarses. Ailes transparentes, côte, nervures brunes; point calleux testacé clair.

Cafrerie.

Collection Dours

Très-voisine de *P. A. rufipes*.Forsan femina *Megillæ concinna*.

Klug, Symb. phys. Dec. V, fig. 44.

N° 7 ANTHOPHORA BI-PARTITA

Smith, Catal., p. 555, n° 81.

ANTHOPHORA HEMITHORACICA. Sichel.

Long. : — 16 mm.

♀ *Media, nigra; capite punctato, opaco, albido-maculato;*

thoracis dimidium anticum cum pedibus nigro-hirtum, posticum rufo-fulvo-hirtum. Abdomen nudum, labrum, alæ fusco-hyalinæ.

♀ Statura A. 4-fasciatæ, caput nigrum opacum dense satque profunde punctatum, albido-pilosum, verticis frontisque fasciculis pilorum nigrorum; clypei nudi linea media subcarinata, albido flavescens, apice (versus labrum) latior, labri partem basalem continuat. Abdomen nigrum, nudum, glabrum, nitidiusculum. Pedes nigri, nigro-hirti, femoribus rufis. Alæ fusco-hyalinæ, extremâ basi subhyalinæ, venis nigris. Tegulæ testaceæ, vix nigrescenti-maculatæ.

(SICHEL.)

Sina. Mus. Drevsen.

(Je n'ai pas vu cette variété.)

♀ Noire. Poils de la face gris mêlés de noirs sur le vertex et sur les côtés; chaperon portant sur le milieu une ligne jaune qui s'élargit vers le bas sur les côtés. Labre ayant deux petits points blancs reconverts de poils gris. Poils du corselet noirs dans sa partie inférieure jusqu'à la naissance des ailes; ceux de la partie postérieure sont fauves. Abdomen en dessus brillant, finement ponctué et revêtu sur les côtés et au sommet de quelques poils noirs; en dessous il prend à son extrémité une teinte ferrugineuse. Pattes un peu ferrugineuses, leurs poils noirs. Ailes enfumées, un peu irisées.

Port Natal.

Ex Smith.

N^o 8 ANTHOPHORA ÆRUGINOSA.

Smith, Cat, p. 536, n^o 89.

Long. : — 12 mm.

♀ Nigra; capite thoraceque viridescenti pilosis. Pedibus ferrugineis, tarsis nigris. Abdomine nigro apice nigro-villoso.

♀ Noire ; tête, corselet hérissés de poils courts verdâtres, variant de teinte suivant les individus. Chaperon, labre, mandibules jaunes; le 1^{er} portant de chaque côté de sa base une tache carrée, le 2^e deux petits points noirs sur les côtés; les mandibules sont de couleur ferrugineuse au bout, ainsi que le dessous des derniers articles des antennes. Pattes ferrugineuses, leurs tarses noirs. Abdomen en dessous ferrugineux, son extrémité porte en dessus quelques poils noirs. Ailes transparentes, côte, nervures brunes, point calleux testacé.

♂ Dessus du 1^{er} article des antennes jaune, joues et cuisses antérieures hérissées de poils blancs, longs, épais ; jambes intermédiaires et tarses frangés en avant de longs poils noirs, blancs en arrière.

Australie.

Ex Smith.

(Je n'ai pas vu cette variété.)

N^o 9. ANTHOPHORA ACRAENSIS.

Smith., 543, 121.

CENTRIS ACRAENSIS, Fab., Syst. Piez., 556, 9, ♂.

APIS ACRAENSIS, Fab., Ent. Syst., 11, 529, 68.

Long. : — Corps 17 mm.; Ailes 15 mm.

Nigra, capite, abdomine pedibusque nigro-pilosis; thorace suprâ fulvo-hirto; 5^o segmento ♂, anoque ♀ albo-pilosis.

♀ Noire; un point jaune à la partie inférieure médiane du chaperon qui est très-punctué. Poils du labre roux. Ceux du vertex, du corselet en dessous, ceux de l'abdomen hérissés, noirs; anus ayant quelques poils blancs. Corselet en dessous hérissé de poils fauves. Pattes ferrugineuses, recouvertes de poils noirs épais, surtout sur chaque tranche

interne et externe. En dessous, les poils plus courts sur une teinte ferrugineuse, obscure. Ailes enfumées. Point calleux de couleur testacé-clair. Côte et nervures brunes.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes, face, labre et mandibules jaunes, celles-ci noires au bout; deux taches noires triangulaires sur les côtés du chaperon. Poils de la face et de la tête en dessous blancs. Corselet en dessus hérissé de poils fauves. Abdomen noir avec quelques poils courts. 6^e segment et anus recouverts de poils blancs mêlés de ferrugineux. Pattes ferrugineuses; les antérieures ayant quelques poils blancs, les intermédiaires et les postérieures hérissées de poils noirs sur leur tranche extérieure et intérieure.

Guinée.

Collection Sichel, Dours.

N^o 10. ANTHOPHORA ALBO-CAUDATA. Dours.

Long. : — Corps 18 mm ; Ailes 14 mm.

♀ *Clipeo flavo lineato; labro mandibulisque flavo punctatis; thorace ferrugineo piloso. Abdominis segmentis 1, 2, 3 nigro, 4, 5 albo hirsutis. Tibiis posticis compresso dilatatis, hirsutis, nigris. Alis fumato-violaceis.*

♀ Noire; chaperon portant sur le milieu une ligne en forme de $\perp$. Labre noir, avec un point jaune au milieu; mandibules noires, avec un point jaune à la base. Poils de la tête fauves, noirs sur le vertex. Corselet en dessus hérissé de poils ferrugineux, noirs-cendrés en dessous. Abdomen très-finement ponctué, les trois premiers segments garnis de poils noirs-cendrés, 4^e et 5^e segments recouverts de poils blancs-jaunâtres. Anus noir. En dessous, les segments sont ferrugineux et garnis sur les côtés surtout de poils blancs

jaunâtres. Pattes noires avec une teinte ferrugineuse. Les poils de la 1^{re} paire sont blanc-sales, ceux des deux autres noirs, rudes. 1^{er} article des tarses postérieurs dilaté, aplati, cilié sur ses deux tranches de poils noirs assez longs. Ailes brunes avec un reflet violet. Côte, nervures brunes; point calleux ferrugineux.

Guinée.

Collection Dours.

Ce n'est peut-être qu'une variété de la précédente.

N^o 11. ANTHOPHORA NUBICA.

Lep., ♂, 11, 33, 8.

MEGILLA NUBICA, Klug, Tab. 49, fig. 8, 9, n^o 7. ♀ ♂.

Long.: — Corps 18 à 20 mm.; Ailes 16 mm.

Nigra. Thorace albido-piloso; segmentis 1, 3 nigris, 4^o toto ♀ albo-piloso, femoribus posticis nigris, anterioribus extus albo-pilosis, ♂ 5^o et 6^o fasciâ albâ interruptâ. Alis fumatis.

♀ Noire; antennes en dessous un peu ferrugineuses, sauf le 2^e et le 3^e articles qui sont noirs. Chaperon jaune, deux taches triangulaires noires sur le milieu. Labre jaune, avec deux taches noires s'étendant jusqu'au sommet. Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la face et du milieu du corselet cendrés noirâtres, blancs sur les côtés, en dessous et à la partie postérieure. Abdomen noir finement ponctué, 1^{er}, 2^e, 3^e segments ayant quelques poils noirs rares; 4^e segment entièrement recouvert de poils blancs, courts, couchés; 5^e segment noir, hérissé de poils blancs sur les côtés. En dessous, les segments 3, 4, 5 ont des poils blancs sur les côtés. Poils des pattes antérieures hérissés, blancs sur leur tranche externe, ferrugineux en dessous. Poils des pattes intermédiaires noirs, sauf une touffe de poils blancs sur la tranche externe du tibia. Poils des pattes

postérieures noirs en dessus, un peu ferrugineux en dessous, surtout au 1^{er} article des tarses. Ce dernier porte en outre sur la tranche externe des poils épais, longs, rudes, noirs. Ailes très-enfumées; côte, nervures noires.

Var. Antennes entièrement noires.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune, les autres noirs, quelquefois ferrugineux à partir du 4^e. Chaperon jaune, deux taches noires sur les côtés. Labre jaune, deux points noirs sur les côtés, en haut. Mandibules noires au bout. Poils de la face blancs, ceux du vertex et du milieu du corselet cendrés, mêlés de noirs; ceux du dessous, des côtés et de la partie postérieure blancs. Abdomen noir, finement ponctué. 1^{er}, 2^e, 3^e segments ayant des poils noirs rares, 4^e entièrement recouvert de poils blancs, 5^e, 6^e portant une bande de poils blancs interrompue au milieu. En dessous, les segments sont roussâtres; les côtés des 4^e, 5^e, 6^e ont quelques poils blancs. Pattes antérieures hérissées de poils blancs, les intermédiaires et les postérieures de noirs; chacune d'elles ornée à la partie externe du tibia d'une touffe de poils blancs. 1^{er} article des tarses postérieurs longuement cilié sur ses deux tranches, sur l'externe de poils rudes, noirs. Les autres articles des tarses de cette paire ont aussi quelques poils noirs, courts. Ailes plus transparentes que celles de la femelle. Côte, nervures noires.

Sénégal.

Collection Sichel, Dours.

N^o 12. ANTHOPHORA BICINCTA.

Lep., 11, 34, 9, ♀ ♂.

MEGILLA SESQUICINCTA, Klug, Mus. Ber.

MEGILLA VIDUA, Klug, Tab. 49, fig. 40, 8, Var.

Long. : — Corps 16 mm.; Ailes 11 mm.

♀ *Nigra*; *thorace albo-villoso*; *abdomine nigro*; *seg-*

mentis 3, 4 *albo-marginatis*, *fasciis sæpè interruptis*. *Alis fumatis*.

♀ Noire. Dessous des antennes ferrugineux, sauf les trois premiers articles qui sont noirs. Face jaune, deux grandes taches très-noires sur le milieu. Labre jaune, deux points noirs sur les côtés. Mandibules noires au bout. Abdomen noir portant quelques poils courts; 1^{er} segment noir sans taches; base du 2^e ornée sur ses côtés d'un point blanc; base du 3^e et du 4^e ayant une bande de poils couchés, un peu interrompue sur le 4^e. Côtés de l'anus et du 5^e segment revêtus de poils blancs lavés de ferrugineux. Cils de dessous les segments blancs sur les côtés, bruns sur le milieu. Poils des pattes antérieures hérissés, blancs en dessus, noirs ferrugineux en dessous. Poils des pattes intermédiaires noirs, sauf une touffe de blancs sur la tranche externe du tibia. Poils des pattes postérieures noirs en dessus, ferrugineux-sombre en dessous. Ailes enfumées; côte, nervures noires.

♂ Conforme à la femelle, sauf les différences sexuelles de la face et le 5^e segment de l'abdomen qui est semblable au 4^e.

Var. Corselet recouvert de poils fauves.

Pondichéry.

Collection Sichel, Dours.

Megilla vidua, Klug, est une variété de cette espèce à face immaculée, avec *Abdomine, fasciis duabus baseos albis* (Klug).

N^o 13. ANTHOPHORA HYPOPOLIA. Dours.

Grisman.

Long. : — Corps 48 mm.; Ailes 50 mm.

♀ *Magna, nigra, cano-cinerecenti tomentosa, segmentis 4-5 nigris. Facie flavâ, nigro-maculatâ; pedibus fulvis.*

♀ Noire. Poils de la tête grisâtres. Chaperon noir, à l'exception de la partie inférieure portant une large tache triangulaire jaune tirant sur le ferrugineux. Labre jaune; deux points ferrugineux de chaque côté à la partie supérieure. Mandibules, antennes noires, lavées de ferrugineux. Poils du corselet gris mêlés de fauves sur les côtés. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen revêtus de poils gris cendrés, hérissés sur le 1^{er}, couchés sur le 2^e. Poils du 3^e segment blanchâtres, couchés, très-courts, plus apparents sur les bords supérieur et inférieur. 4^e, 5^e segments et anus hérissés de poils noirs peu serrés. Abdomen en dessous ferrugineux; chacun des segments en dessous bordés de poils blancs s'étendant aussi sur les côtés. Pattes ferrugineuses, recouvertes de poils gris un peu fauves en dessus, noirs en dessous. Tarses ferrugineux noirs. Ailes transparentes, nervures noires; point calleux de couleur ferrugineuse.

Province d'Orenbourg.

Collection Dours.

Cette espèce qui, au premier aspect, ressemble à l'*A. atricilla* Evers., nom qu'elle porte dans un envoi que j'ai reçu de M. le général Radoszkovsky, est très-distincte. La coloration de la face, des pattes, du sarothrum, est différente de celle de l'espèce décrite par Eversmann.

N^o 14. ANTHOPHORA VIOLACEA.

Lep., 11, 80, 47.

Long. : — Corps 19 mm.; Ailes 14 mm.

Nigra, nigro-pilosa; segmentorum lateribus maculâ albâ. Alis fumatissimis violaceis ♀. ♂ *Antennis nigris; facie eburneâ, nigro-maculatâ.*

♀ Noire. Chaperon très-grossièrement ponctué, partagé en deux moitiés égales par une ligne saillante tachée de

jaune près de l'extrémité inférieure. Poils de la face, du corselet et de l'abdomen noirs; côtés de chacun des segments en dessus et en dessous ornés d'une petite touffe de poils blancs. L'anüs porte quelques poils ferrugineux. Poils des pattes noirs, lavés de ferrugineux. Ailes opaques, noires, avec un reflet violet.

♂ Antennes noires. Chaperon de couleur d'ivoire, avec deux grandes taches noires sur les côtés. Labre de couleur d'ivoire avec deux petits points noirs en haut. Mandibules noires, avec une tache couleur d'ivoire à la base. Poils de la tête, du corselet, de l'abdomen et des pattes noirs. L'anüs porte quelques poils ferrugineux. Côtés des segments en dessus et en dessous ornés d'une touffe de poils blancs; le 6^e segment porte une bande de poils blancs.

NOTA. Il est probable que chez les sujets frais, la base de tous les segments porte une bande entière de poils blancs.

Indes Orientales.

Collection Dours.

N^o 15. ANTHOPHORA HOLOPYRRHA. Sichel.

XENOGLOSSA FULVA, Smith, Cat. 315, 1.

Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 12 mm.

Nigro-ferruginea; flagello nigro-piceo; 1, 2, 3 articulis ferrugineis. Pilis omnibus fulvo-ferrugineis ♀. ♂ *Facie luteo-ferruginea, ano quadrato, tricarinato.*

♀ Antennes noires, sauf les trois premiers articles qui sont ferrugineux. Chaperon ferrugineux, portant une bande jaune à la partie inférieure. Corselet en dessus et en dessous, 1^{er} segment de l'abdomen hérissés de poils fauves ferrugineux, les autres segments en ont de semblables, mais courts, couchés. Bord anal orné d'une plaque lisse, triangulaire.

Pattes hérissées de poils ferrugineux. Crochets du dernier article des tarses noirs. Ailes enfumées; côte, nervures noires.

♂ Face plus jaune en général que dans la femelle, à laquelle il ressemble du reste. Une plaque quadrangulaire sur le bord anal, tricarénée sur les côtés, qui sont creusés en fossette.

Mexique.

Collection Sichel, Dours.

N° 16. ANTHOPHORA MELANOPYRRHA. Dours.

Long. : — Corps 15 mm ; Ailes 10 mm.

Nigra, facie flavo-maculatâ; pilis thoracis abdominisque fulvo-hirtis; 4°, 5° aurulento-villosis. Pedibus nigris, extus cinereo-villosis ♀ ♂.

♀ Noire; 2^e, 3^e article des antennes ferrugineux. Chaperon finement ponctué, noir, une grande tache jaune sur le milieu. Labre noir, avec un petit point jaune sur le milieu, en haut; ses poils cendrés, ceux du vertex noirs. Corselet en dessus hérissé de poils fauves éclatants, blancs ou cendrés en dessous. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils fauves, le 2^e et le 3^e ayant chacun une large bande de couleur baie, presque nue; 4^e, 5^e segments revêtus de poils fauves, couchés, longs, mêlés de quelques-uns plus petits simulant des écailles. Bord des segments portant une bande de poils plus pâle, plus distincte en dessous. Pattes ferrugineuses, hérissées en dessus de poils cendrés; de noirs ferrugineux en dessous. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires.

♂ Semblable à la femelle, sauf les caractères de la face. 6^e segment revêtu de poils fauves en forme d'écailles. Nervure des ailes comme dans *Habropoda*.

Mexique.

Collection Sichel, Dours.

Nº 17. ANTHOPHORA ATRO-CINCTA.

Lep., 11, 35, 10.

CENTRIS PLUMIPES. Fab., Syst. Piez., p. 356, 7.

Long. : — Corps 16 mm ; Ailes 12 mm.

♀ *Nigra ; capite, thorace segmentisque 3, 4, 5 fulvo-ferrugineo-pilosis. Thorace subtilis, pedibusque anterioribus albis, posticis compresso-dilatatis, hirsutis, nigris. Alis fumato-riolaceis.*

♀ Antennes noires, avec une teinte ferrugineuse obscure. Chaperon jaune, avec deux grandes taches noires carrées sur le milieu. Labre jaune, avec la suture et deux points noirs sur les côtés. Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la tête, du corselet en dessus et sur les côtés d'une belle couleur fauve ferrugineuse chez les sujets frais. Méta-thorax noir. 1^{er} segment de l'abdomen et les deux tiers supérieurs du 2^e finement ponctués, hérissés de poils noirs, courts; base des 2^e, 3^e, 4^e et 5^e, en entier, recouverte de poils fauve-ferrugineux, couchés; une touffe de poils noirs sur le milieu du 5^e. Anus noir; en dessous, les segments fauves sont ferrugineux au centre, ciliés de blanc sur les côtés, à partir du 2^e. Poils des pattes antérieures blancs en dessus, noirs en dessous. Pattes intermédiaires et postérieures hérissées en dessus et en dessous de longs poils noirs, rudes. 1^{er} article des tarses postérieurs aplati, large, cilié sur ses deux tranches de poils noirs assez longs. Ailes brunes, avec un léger reflet violet. Côte, nervures brunes.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune. 6^e segment semblable au 4^e et au 5^e, sans interruption. Le reste comme dans la femelle.

Cafrerie.

Collection Sichel, Dours.

N° 18. ANTHOPHORA AURULENTO-CAUDATA.

Dours.

Long. : — Corps 15 mm ; Ailes 10 mm.

Nigra, clypeo labroque flavo-maculatis. Capite, thorace abdominisque 1-3 segmentis nigris, 4-5 aurulento-villosis. Pedibus ferrugineis extus nigro pilosis; sarothro cinereo, tarsis ferrugineis. Alis fumatis ♀ ♂.

♀ Noire; une large tache jaune sur le milieu du chaperon; une petite ligne jaune sur le milieu du labre. Poils de la tête, du corselet et des trois premiers segments de l'abdomen hérissés, noirs; base des 3^e, 4^e, 5^e et anus recouverts de poils fauves, dorés, très-brillants; en dessous, les segments sont ciliés de poils fauves. Pattes ferrugineuses, leurs poils hérissés, noirs; tarses plus pâles. Brosse cendrée. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Nervure des ailes comme dans *Habropoda*.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune. Face de cette couleur, sauf deux taches noires sur les côtés du chaperon, deux points noirs sur les côtés du labre, en haut. Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la face cendrés, ceux du vertex, du corselet en dessus, des 1^{er}, 2^e, 3^e segments et de la base du 4^e noirs. Ces poils sont rares sur les derniers segments. En dessous du corselet, les poils sont cendrés. Base des 4^e, 5^e et 6^e segments, en entier, anus, revêtus de poils ferrugineux, dorés. En dessous, les segments sont ciliés de poils cendrés. Poils des pattes en dessus cendrés, noirs en dessous. Ailes enfumées.

Mexique.

Collection Sichel, Dours.

N^o 19.**ANTHOPHORA TECTA.**

Smith, Cat., p. 342, 117.

Long : — 15 mm.

♀ *Nigra*, 1^o *segmento fulvo*, 2^o, 3^o, *nigro*, 4^o, 5^o *cinereo-hirtis*, *fusco-aneis*; *thorace fulvo*, *in medio fusco*.

♀ Tête et corselet noirs. Chaperon portant une large tache blanche en forme de T, son bord inférieur est ferrugineux. Labre blanc-jaunâtre, ses bords ferrugineux ainsi que les mandibules. Côtés de la face hérissés de petits poils courts, blancs; ceux du vertex fauves. Corselet en dessus hérissé de poils fauves, plus foncés au milieu, un peu cendrés sur les côtés. Cuisses ornées de poils blanc-jaunâtres, ceux des jambes sont cendrés, les postérieures les ont blancs ainsi que le 1^{er} article de leurs tarses. Eperons noirs. Abdomen d'un fauve métallique, 1^{er} segment hérissé de poils fauves, 2^e, 3^e ayant quelques poils noirs, rares, 4^e, 5^e segments hérissés de poils cendrés, courts. Bord de tous les segments ciliés de poils roux.

Brésil.

Ex Smith

(Je n'ai pas vu cette variété.)

N^o 20.**ANTHOPHORA CANIFRONS.**Smith, Cat., part. 2, p. 328, n^o 42.

Long.: — Corps 15 à 16 mm ; Ailes.....?

♀ *Atra*; *clypei lineâ mediâ angustâ*. *Abdomine infra rufopiceo*; *segmentorum fasciis albidis*, 3^a, 4^a *in medio fuscis*.

♀ Noire; chaperon portant sur son milieu une ligne courte, étroite, jaune, s'étendant jusqu'au bord antérieur. Face recouverte de poils cendrés, noirs au bout. Corselet en dessus hérissé de poils jaunâtres, plus blancs sur les

côtés et en arrière. Pattes ferrugineuses, recouvertes en dessus de poils jaunes cendrés, en dessous de noirs. Abdomen ferrugineux-clair; bord des segments en dessus et en dessous ornés d'une bande étroite de poils blancs qui sont remplacés sur le milieu du 3^e et du 4^e par des poils fauves.

Canaries.

Ex Smith

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N^o 21. ANTHOPHORA ALBI-FRONS.

Long : — 12 mm.

♀ *Nigra*; 1^o *segmento ferrugineo, reliquis nigro-hirtis; fasciis 2, 3, 4 flavo-albo-ciliatis.*

♀ Noire; poils de la tête longs, cendrés. Mandibules ferrugineuses, sauf sur le milieu où elles sont jaunes. Poils du corselet en dessus courts, de couleur ferrugineuse. Ailes presque transparentes, nervures noires. Poils du corselet en dessous et des cuisses hérissés, blancs; jambes ferrugineuses, recouvertes en dessus de poils cendrés, brillants. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils ferrugineux; bord des trois segments suivants cilié de blanc-jaunâtre, en dessous les segments ont des poils noirs.

Amerique du Sud.

Ex Smith.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N^o 22. ANTHOPHORA BASALIS.

Smith, Cat. 335, 86.

Long. : — Corps 17 mm.; Ailes 12 mm.

♀ *Nigra, thorace et primo abdominis segmento ferrugineo-villoso. Abdomine nigro, subtus apiceque albo-piloso. Pedibus aterrimis. Alis nigro-fumatis, iridescentibus, tegula testaceâ.*

♀ Noire; moitié inférieure du chaperon nue, ponctuée; une ligne saillante au milieu. Poils de la tête en dessus

noirs, lavés de ferrugineux en dessous ainsi que sur le labre. Corselet en dessus et 1^{er} segment de l'abdomen hérissés de poils fauve-ferrugineux très-épais, noirs en dessous. Abdomen finement ponctué, hérissé de poils noirs, courts sur le 2^e et le 3^e, un peu plus longs et légèrement ferrugineux sur le 4^e et le 5^e. Côtés des segments ciliés de poils fauve-cendrés. Pattes très-noires, les postérieures revêtues de poils très-noirs en dessus, lavés de ferrugineux en dessous. Ailes noires avec un reflet violet obscur.

Cafrerie.

Collection Dours.

N^o 23. ANTHOPHORA CITREO-STRIGATA. Dours.

Long. : — Corps 16 mm.; Ailes 12 mm.

♀ *Facie nigrâ, punctatâ; thorace, 1^o segmento pedibusque extus fulvo-pilosis; fasciis 1 parve, 2, 3, 4 latè citreo-marginatis. Alis fusco-hyalinatis.*

♀ Noire. Antennes noires. Face immaculée, noire, grossièrement ponctuée, recouverte de poils fauves mêlés de noirs. Corselet en dessus, 1^{er} segment de l'abdomen, pattes hérissés de poils fauve-vifs, cendrés en dessous. Bord des segments portant une bande de poils couchés, couleur de citron, étroite au 1^{er}, plus large sur le milieu des 2^e, 3^e, 4^e. Anus noir, avec quelques poils ferrugineux; en dessous, les segments sont bordés de poils blancs s'étendant sur les côtés. Poils des pattes en dessous noirs; tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Nervures, côte brunes.

Amérique Septentrionale.

Collection Dours.

N^o 24. ANTHOPHORA PLUTO. Dours.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, nigro-cinereo-villosa. Abdomine nigro. 4ⁱ, 5ⁱ anique*

pilis ferrugineis hirsutis. Pedibus nigris. Tarsis ferrugineis. Alis fumatis.

♀ Noire ; chaperon et labre fortement ponctués. Poils de la face cendrés, blancs en dessous de la tête. Corselet en dessus hérissé de poils noirs mêlés de cendrés sur le disque, plus pâles en dessous. Abdomen finement ponctué, 1^{er} segment hérissé de poils cendrés ; 2^e, 3^e segments ayant quelques poils noirs couchés ; 4^e, 5^e et côtés de l'anus recouverts de poils ferrugineux s'étendant en dessous et sur les côtés. Pattes noires, tarses ferrugineux. Ailes enfumées ; côte et nervures brunes.

Mexique.

Collection Douars

N^o 25. ANTHOPHORA ABRUPTA.

Say, Bost., Journ. Nat. Hist., 1, 409, ♂.

A. FLORIDANA, Smith, Cat. 339, 105, ♀ ♂.

A. SPONSA, Smith, Cat. 339, 101, ♀.

Long. : — Corps 7 mm. ; Ailes 11 mm.

♀ *In recentioribus nigra ; thorace ochraceo (Floridana), in senilibus, cinereo-villosa (abrupta). Capite, abdomine pedibusque atro-pilosis. Alæ hyalinae.*

♀ Noire ; poils de la tête noirs. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de poils roux cendrés. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils noirs légèrement lavés de ferrugineux ; les autres segments noirs ont des poils rares mêlés de ferrugineux sur le 5^e et sur les côtés. Pattes ferrugineuses, recouvertes de poils noirs légèrement lavés de ferrugineux, surtout en dessous des tarses. Ailes transparentes.

NOTA. Dans la variété *Floridana*, la pubescence du corselet, qui est un peu plus rousse, s'étend au 1^{er} segment de l'abdomen.

♂ Semblable à la femelle, sauf le chaperon et le labre, qui sont jaunes.

Nord de l'Amérique.

Collection Sichel, Dours.

N° 26. ANTHOPHORA FERRUGINEA

Lep., T. 2, p. 78, n° 45.

ANTHOPHORA NIGRO-FULVA, Lep., T. 2, p. 88, n° 55, ♀.

Lucas, Expl. Scient., Alg., 111, 153, 23. Atl., fig. 6.

A. FULVA, EVERS., 144, 11.

Long. : — Corps 16 mm.; Enverg. 52 à 58 mm.

♀ *Nigra, ferrugineo-villosa, pedibus subtus nigro-villosis. Alæ subfuscae* ♀. ♂ *Facie albido-lutea, pedibus suprâ albido-hirsutis.*

NOTA. In detritis maribus, hirsuties omnino cinerea, non ferruginea adest.

♀ Noire, entièrement recouverte de poils ferrugineux, hérissés sur le 1^{er} segment, couchés sur les autres. Les pattes en dessous sont noires, excepté sous le 1^{er} article des tarses postérieurs, où les poils ferrugineux apparaissent de nouveau. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires.

Algérie, Espagne, Corse.

♂ Noir. Dessous du 1^{er} article des antennes, face, labre, sauf deux points noirs sur les côtés, en haut. Base des mandibules d'un blanc plus ou moins jaunâtre. Poils de la tête, du corselet, des segments abdominaux ferrugineux en dessus, blancs en dessous chez les individus nouvellement éclos. Pattes revêtues de poils blanchâtres. Tarses bruns. Ailes à peine enfumées. Côte, nervures brunes.

Collection Sichel, Dours.

NOTA. La pubescence devient d'un cendré plus ou moins terne

chez les individus âgés. La collection de M. le Dr Sichel en possède un curieux exemplaire entièrement recouvert de poils d'un cendré très-pâle.

NOTE. *A. nigro-fulva* Lep. 53, est une variété de *A. ferruginea*, dont la pubescence ferrugineuse, surtout à la tête et au thorax en dessus, est entremêlée de poils noirs, courts.

N° 27. ANTHOPHORA CALIGINOSA.

MEGILLA CALIGINOSA, Klug, Tab. 49, fig. 7, n° 6.

Sav., Descr. d'Egyp., Hym., pl. 1, fig. 13.

Long. : — Corps 49 mm.; Ailes 14 mm.

♀ *Nigra, supra nigro, lateribus fusco-tomentosa, abdominis segmentis 1° excepto, nudis, apice fusco-villosis.*

♀ Statura M. robustæ. Nigra, caput obsolete punctatum, vertice fusco-nigro, fronte occipiteque fusco-villosis. Clypeus confertim punctatus, lineâ longitudinali mediâ subelevatâ, lævi. Labrum magnum rugosum. Thorax dorso dense fusco-nigro-lateribus et sub alis fusco-tomentosus. Alæ subinfuscatæ, nervis, stigmatibus fuscis. Tegulæ fuscae. Pedes fusco-nigro-hirsuti. Abdominis segmentum primum et ultimum fusco-nigro, reliqua margine fusco-villosa. (KLUG.)

Syria.

Cette espèce, que je n'ai pas vue, me semble être une variété d'un sujet usé se rapportant à l'*A. nigro-fulva* de Lep., qui elle-même appartient à *A. ferruginea*.

N° 28. ANTHOPHORA NIGRO-VITTATA.

Dours.

Long. : — Corps 14 mm.; Enverg. 24 mm.

♀ *Nigra, ferrugineo-hirsuta, 2° segmento abdominis toto, 3° partim nigro-piloso. Alis subfuscescentibus.*

♀ Noire. Entièrement recouverte de poils ferrugineux, si ce n'est aux 2^e, 3^e segments de l'abdomen où ils sont noirs, mêlés de ferrugineux, surtout au 3^e. Pattes en dessous noires. Ailes un peu enfumées au bout. Côte et nervures noires.

Voisine de *ferruginea*.

Corse.

Collection Sichel, Dours.

♂ Long. . — Corps 44 mm.; Enverg. 25 mm.

♂ Noir. Dessous du 1^{er} article des antennes blanc-jaunâtre ou éburné. Face de cette couleur, sauf deux taches sur la partie supérieure du chaperon et deux points sur les côtés du labre, noirs. Mandibules noires. Pubescence de tout le corps d'un roux plus ou moins foncé, sauf sur les 2^e, 3^e segments abdominaux, où elle est mêlée de poils noirs, plus rares sur le 3^e. Poils des pattes cendrés. Tarses ferrugineux.

Collection Sichel, Dours.

N^o 29. ANTHOPHORA PARIETINA.

Lep., T. 2, p. 79, n^o 46.

Latr., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., Encyc., T. 10, p. 798, n^o 1.

Spin., Ins. Lig., T. 1, p. 126, n^o 2.

APIS PARIETINA, Fab., Ent. Syst., T. 11, p. 323, n^o 28.

MEGILLA PARIETINA, Fab., Syst. Piez., p. 329, n^o 3.

Nyl. Apum, Bor., p. 244. — Revis Ap., Bor., p. 257, 4.

MEGILLA PLAGIATA, Illiger, ♀.

Long. : — Corps 15 mm ; Enverg. 27 mm.

♀ *Nigra; nigro-rufo pilosa, segmentis 3-4 rufo pilosis. Pedibus nigris, metatarsis rufis. Alæ hyalineæ.*

♂ *Nigra, fulvo-nigro hirsuta. Abdominis segmentis 1, 3 fulvo, reliquis nigro-pilosis. Pedibus cinereo extùs, ferrugineo subtùs hirsutis.*

♀ Noire. Quelques poils ferrugineux sur le labre et les mandibules. Poils de la face, de la tête, du corselet noirs, très-denses. 1^{er} segment de l'abdomen tout entier, base du 2^e hérissés de poils noirs; tiers inférieur du 2^e segment, 3^e et 4^e tout entiers hérissés de poils ferrugineux; 5^e segment noir. Anus et côtés de l'abdomen revêtus de poils plus ou moins ferrugineux. Pattes noires Tarses ferrugineux. Ailes transparentes. Côte, nervures noires.

Algérie, France, Italie, Suède.

Collection Sichel, Dours.

VAR. 4. ANTHOPHORA FULVO-CINEREA, Dours.

Poils de la tête cendrés, noirs sur le vertex. Poils du corselet fauves, noirs à la partie antérieure, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés roux, ceux des autres segments sont fauves, longs avec des poils noirs très-courts formant le fonds du segment. Anus noir; en dessous et sur les côtés, les poils sont blanc-cendrés. Poils des pattes antérieures en dessus blanc-cendrés, ceux des intermédiaires et des postérieures fauves en dessus, noirs en dessous. 1^{er} article des tarses en dessous garni de poils fauve-doré.

Le mâle de cette variété est semblable à la femelle. Il en diffère pourtant par la couleur moins intense des poils du thorax et des segments abdominaux. Le 5^e et le 6^e sont entièrement noirs.

Dalmatie, Algérie.

Collection Sichel, Dours.

VAR. 2.

MEGILLA PLAGIATA, Hlig.

Dans cette variété, la pubescence fauve du thorax est mélangée de poils noirs, courts. Le 1^{er} segment est recouvert de poils cendrés ; ceux-ci se continuent jusque vers le milieu du 2^e segment. Les poils de l'anüs sont fauves au milieu, noirs sur les côtés ♀ ♂.

Dalmatie, Algérie.

Collection Bours.

♂ MEGILLA VILLOSA, Herr. Schaff.

Long. : — Corps 13 mm ; Enverg. 27 mm.

♂ Noire. Face et base des mandibules d'un blanc plus ou moins éburné. Poils de la tête et du corselet roux, plus ou moins foncés ; ceux du 1^{er} et du 2^e segment de l'abdomen en dessus roux-cendrés. Base et côtés du 3^e garnis de poils de cette couleur. Poils des autres segments hérissés, noirs. Poils des pattes cendrés. Tarses ferrugineux. Ailes transparentes. Côte et nervures brunes.

Collection Sichel, Dours.

N^o 30. ANTHOPHORA QUADRICOLOR.

Erichson in Wagner, Reize in der Regent. Algier, 111, 193; 54, T.9.

Lucas, Expl. Alg., 111, 154, 24.

ANTHOPHORA DORSI-MACULA, L. Duf., in litteris.

Long. : — Corps 13 mm.; Enverg. 27 mm.

♀ *Nigra, nigro-ferrugineo-alboque pilosa. Capite nigro, thorace ferrugineo, dorso nigro, segmentis abdominis 1^o, 2^o lateribus, 3^o toto ferrugineis, illorum nudis nigris, 4^o, 5^o albo-pilosis hoc ferrugineo-mixto, ano pedibusque nigris. Alis fumatis.*

♂ *In recentioribus ferrugineo, in senioribus cinereo-villosis, facie eburneâ, immaculatâ, pedibus nigris fulvo-cinereo-pilosis, metatarsis ferrugineis.*

♀ Noire. Poils de la face noirs; une touffe de poils jaune-ferrugineux sur le vertex. Un large disque de poils noirs sur le corselet, circonscrit par une bande de poils jaune-ferrugineux dépassant le point calleux. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils noirs, jaune-ferrugineux sur les côtés; 2^e, 3^e segments revêtus de poils jaune-ferrugineux, ceux-ci interrompus sur le milieu du 2^e segment par un triangle de poils noirs. 4^e, 5^e segments présentant un reflet cuivreux un peu bleuâtre, recouverts par des poils blancs, épais, courts, mêlés de jaunes sur le 4^e. Bord inférieur du 5^e et anus ornés de poils jaune-ferrugineux. Abdomen en dessous hérissé de poils noirs, excepté à la partie inférieure du 4^e et du 5^e, où ils sont blancs, ainsi que sur les côtés. Pattes noires. Tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures, point calleux noirs.

Algérie.

Collection Sichel, Dours.

NOTA. L'épithète *quadricolor* ne peut s'adresser qu'aux individus âgés. Chez eux, en effet, les poils circonscrivant le disque noir du corselet sont jaunes, tandis que chez les sujets nouvellement éclos la couleur en est ferrugineuse, semblable à celle des 1^{er}, 2^e, 3^e segments.

♂ Face immaculée, de couleur d'ivoire; dessous du 1^{er} article des antennes, base des mandibules de cette couleur. Poils de la face blanchâtres, ceux du vertex, du corselet en dessus et sur les côtés, ceux des segments de l'abdomen ferrugineux-fauves, en dessous les segments sont noirs. Poils des pattes cendrés, fauves en dessus, noirs en dessous. Jambes et 1^{er} article des tarses intermédiaires ciliés de longs

poils cendré-fauves sur la tranche externe, noirs sur la tranche interne; dernier article des tarses ferrugineux. Anus noir, terminé à chaque angle par une petite dent aiguë.

Le mâle est très-difficile à distinguer de celui de l'*A. ferruginea*.

Chez les individus usés par l'âge, la robe est entièrement d'un gris sale.

Collection Sichel, Dours.

N^o 31. **ANTHOPHORA SMITHII.** Sichel.

ANTHOPHORA DUBIA, Smith, Cat., n^o 17, non Eversm., Faune,

p. 114, n^o 10 ♂ ♀.

Long. : — Corps 13 mm.; Euverg., 16 mm.

♀ *Nigra, fulvescenti-hirsuta. Capitis thoracisque (hoc nigro-dorso-fasciato) pilis fulvescenti-hirsutis; abdominis segmentis 1, 3 fulvo, 4, 5 albido-tomentosis, 5ⁱ fasciâ fulvo-ferrugineâ; pedibus posterioribus extus fulvescente, intus nigro-pilosis. Alis fumatis, apice hyalinatis.*

♀ Noire. Poils de la face cendrés; ceux du corselet plus ou moins roux, excepté sur le milieu, où ils forment un large disque noir. Tous les segments de l'abdomen sont recouverts de poils fauves, hérissés sur le 1^{er} segment, couchés sur les autres, entremêlés de blanchâtres sur le 4^e et le 5^e. Bord inférieur de ce dernier et anus ornés de poils ferrugineux. Poils des pattes en dessus fauves, noirs en dessous. Tarses bruns. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Midi de la France.

Collection Sichel, Dours.

NOTA. L'*Anthophora Dubia* Eversmann, Faune, 114, n^o 10, ne peut se rapporter à notre espèce si bien caractérisée par la pubes-

cence du corselet. Celle d'Evers. a le corselet hérissé de poils entièrement fauves, les pattes fauves en dessus, ferrugineuses en dessous.

N° 32. ANTHOPHORA TRICOLOR.

Lep., 11, 86, 53 ♂.

MEGILLA TRICOLOR, Fab., Syst. Piez. 329, 7.

ANDRENA TRICOLOR, Fab., Ent., Syst., 2, 310, 13.

Long. : — Corps 12 à 14 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra; thorace nigro, postice ferrugineo-villoso; 1^o segmento ferrugineo, reliquis nigris, fasciis albis; pedibus ferrugineis, extus albido-villosis. Alæ hyalinæ.*

♀ Noire; face immaculée, noire, recouverte de poils cendrés un peu plus blancs en dessous. Corselet en dessus, jusqu'au tiers postérieur, hérissé de poils noirs, de poils ferrugineux dans son dernier tiers. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux-ferrugineux, les autres en ont de noirs, courts, rares. Base de tous les segments portant une bande de couleur d'ivoire, dépourvue de poils et d'écailles, très-étroite au 1^{er}. Cils du dessous des segments noirs au milieu, blancs sur les côtés. Pattes ferrugineuses, hérissées en dehors de poils blancs. 1^{er} article des tarses noirs. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout. Côte, nervures brunes.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune; chaperon de cette couleur, sauf deux lignes suturales sur les côtés et le bord inférieur, qui sont noirs. Labre jaune, deux points noirs en haut. Mandibules noires, un peu jaunes à la base. 6^e segment de l'abdomen comme les précédents. Le reste semblable à la femelle.

Amérique Méridionale.

Collection Siebel, Doubs.

N° 33.

ANTHOPHORA SICULA.

SMITH, 327, 39.

Long. : — Corps 15 à 14 mm.; Ailes 8 mm. ?

♀ *Nigra, fulvo-hirsuta, pedibus ferrugineis. Alar fusco-hyalinæ.*

♀ Noire, recouverte de poils fauves pâles. Pattes ferrugineuses, brosse en dessus formée de poils fauves brillants, plus pâles, plus courts en dessous; derniers articles des tarsi ferrugineux, éperons noirs. Abdomen très-velu, bord des segments longuement ciliés de poils fauves. En dessous, les segments ferrugineux ont des poils plus pâles. Ailes un peu enfumées. (SMITH.)

♂ Poils de la tête, du thorax et de l'abdomen épais, fauves; ceux des joues et de l'abdomen en dessous noirs. Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, labre et un point à la base des mandibules, jaunes. Ailes un peu enfumées.

(SMITH.)

Sicile.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N° 34.

ANTHOPHORA BALNEORUM.

Lep., T. 2. p. 81, n° 48, ♀.

Long. : — Corps 13 mm.; Enverg. 29 mm.

♀ *Media, nigro, rufo-villosa. Segmentis dorso rufis, lateribus albis; pedibus extus rufo, subtus nigro ferrugineo-pilosis. Alis subfusciscentibus.*

♂ *Facie eburnea, pilis fulvis ornata; thorace, segmentis 1-2 fulvo, reliquis nigris-hirsutis. Pedibus extus fulvo-cinereo, subtus aureo-pilosis.*

In senioribus, albescit hirsuties.

♀ Noire. Poils de la face cendrés, ferrugineux sur le labre, noirs sur le vertex, entre les ocelles. Corselet en dessus hérissé de poils roux, longs, de blancs ou de cendrés en dessous. Dessus de tous les segments abdominaux hérissés de poils longs, roux, plus épais sur le 3^e et le 4^e; 5^e segment et anus ayant quelques poils noirs ferrugineux. Côtes et dessous de l'abdomen garnis de poils blancs, plus ou moins ternes. Poils des pattes en dessus roux, plus ou moins blanchâtres, ferrugineux en dessous, surtout au 1^{er} article des tarses. Ailes un peu enfumées. Nervures, côte brunes.

Batèges (France).

Lep. Saint-Fargeau.

♂ Lep., T. 2, p. 82, n° 48.

Long. : — Corps 15 mm.; Enverg. 50 mm.

♂ Noir. Chaperon (une ligne transversale au dessus), labre, jaunes; deux points noirs sur les côtés de ce dernier. Antennes entièrement noires. Base des mandibules jaune. Poils de la face blanc-cendrés, mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus hérissé de poils roux, longs, blancs ou cendrés en dessous. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils roux, longs; 3^e, 4^e, 5^e, 6^e revêtus de poils cendrés, plus ou moins mêlés de noirs, surtout sur le dernier et l'anus. Poils des pattes cendrés, mêlés de roux en dessus. Tarses en dessous ferrugineux, garnis de longs poils cendrés sur leurs deux tranches.

Espèce très-litigieuse. La collection de M. le Dr Siehel renferme deux femelles et deux mâles très-détériorés, provenant de la collection de M. de Romand.

N° 35. ANTHOPHORA BADIA. Dours.

Long. : — Corps 13 mm.; Ailes 11 mm.

♀ *Nigra, rufo-villosa; abdomine badio, pedibus nigris, nigro-ferrugineo-hirsutis. Alæ hyalinæ.*

♀ Face noire, grossièrement ponctuée, recouverte de poils cendrés, noirs sur le vertex, blancs en dessous. Corselet en dessus hérissé de poils fauves, mêlés de noirs sur les côtés. Abdomen de couleur baie, lavé de noir sur les 4^e et 5^e segments. 1^{er} segment hérissé de poils fauves, les autres en ont de courts, mêlés de noirs, surtout à l'anus. En dessous, les segments sont ponctués, noirs avec quelques lignes de couleur baie. Bord de tous les segments, anus et côtés de l'abdomen hérissés de poils fauves. Pattes noires, recouvertes de poils noir-ferrugineux. Tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes.

Var. Labre ferrugineux.

♂ Dessous du 1^{er}, quelquefois aussi du 2^e article des antennes jaune; chaperon (deux points noirs sur les côtés), joues, labre (deux points noirs en haut), mandibules (leur bout ferrugineux), jaunes. Poils de la face cendrés, mêlés de noirs. Corselet en dessus hérissé de poils fauves, plus pâles en dessous. 1^{er} segment hérissé de poils fauves, 2^e, 3^e, 4^e, presque entiers, noirs, avec quelques poils fauves et une tache ronde sur les côtés de couleur baie. 5^e, 6^e segments de couleur baie, revêtus de poils fauves, courts, couchés. Bord de tous les segments portant une bande de poils fauves peu marquée sur le 1^{er} et le 2^e. Pattes noires, hérissées de poils fauves en dessus, dorés en dessous. Chez les sujets vieux, la pubescence est tout-à-fait cendrée.

Mexique.

Collection Eichel, Dours.

Var. Tous les segments de l'abdomen noirs à l'exception du bord inférieur du 3^e et du 4^e, qui ont une ligne de couleur baie.

N^o 36. ANTHOPHORA FULVIPES.

Evers., Faune, 115, 12.

Long. : — Corps 16 mm.; Ailes 12 mm.

♀ *Nigra, flavido-squamosa; thorace in medio fasciâ nigrâ; 2^o segmento in medio fasciâ latissimâ nigrâ; ano aureo; pedibus extûs flavidis, subtûs nigro-ferrugineis.*

♀ Noire, poils de la face cendrés, jaunes sur le vertex, blanchâtres sur le labre. Partie antérieure et postérieure du corselet hérissée de poils jaunâtres, plus pâles en dessous. Une large bande noire occupe le milieu du corselet. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils jaunâtres. Côtés et partie inférieure des 2^e, 3^e, 4^e en entier recouverts de poils jaunâtres, courts, couchés, simulant des écailles de papillon; une large bande noire occupe le milieu du 2^e segment, une autre très-petite la base du 3^e. Partie inférieure du 5^e segment et anus garnis de poils dorés. Pattes antérieures hérissées de poils blanchâtres, les intermédiaires et les postérieures de poils jaunes-dorés en dessus, de noirs-ferrugineux en dessous. 1^{er} article des tarses postérieurs ornés à leur partie inférieure d'une petite touffe de poils dorés. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout; côte, nervures brunes. Point calleux noir.

Russie.

Collection Puls, de Gand.

♂ Mandibules, labre, chaperon jaunes, deux taches trapézoïformes noires sur ce dernier. Dessous du 1^{er} article des antennes jaune, dessous des articles suivants roussâtre. Poils de la tête, du corselet, du 1^{er} segment de l'abdomen

et des pattes roux. Les autres segments sont recouverts de petits poils blanc-jaunâtres semblables à des écailles de papillon.

(Je n'ai pas vu ce mâle.)

Ex Eversmann.

N^o 37. ANTHOPHORA OBESA.

Giraud, z. b. Ges. 1863, p. 43.

A. BICOLOR, Sichel.

Long. : — Corps 15 mm.; Enverg. 25 mm.

♀ *Media, nigra, fulvo-nigro alboque villosa; capite nigro, thorace fulvo piloso. Segmentis 1 fulvo, reliquis albo-nigro-pilosis. Ano rufo; lateribus ventrique albo hirsutis. Pedibus nigris, tarsis ferrugineis. Alis fusciscentibus.*

♂ *Facie eburneo-maculatâ; segmentis 5-6 anoque albido fasciatis. Pedibus extus albescentibus, subtilis fulvo-nigricantibus.*

In senioribus cinerescit hirsutis.

♀ Noire. Poils de la face cendrés, mêlés de ferrugineux sur le labre, ceux du vertex noirs. Poils du corselet en dessus hérissés, ferrugineux, très-épais, avec quelques poils noirs sur le milieu du disque peu apparents; ils sont noirs à la partie antérieure, sur les côtés et en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux mêlés de noirs; 2^e, 3^e segments entièrement noirs; 4^e, 5^e portant quelques poils blancs. Anus garni de poils fauves. Côtés et dessous de l'abdomen, surtout dans les derniers segments, ciliés de poils blanchâtres. Pattes noires. Tarses ferrugineux. Ailes enfumées; nervures et côte noires.

Suisse, Italie, Algérie, d'après M. Giraud.

Collection Sichel, Bours.

♂ Long. : — Corps 15 mm.; Enverg. 22 mm.

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes blanc-

jaunâtre, éburné. Face de cette couleur, sauf deux taches sur les côtés du chaperon, en haut, et deux points sur les côtés supérieurs du labre, noirs. Mandibules de cette couleur. Poils de la face cendrés, ceux du vertex noirs. Corcelet en dessus et sur les côtés hérissés de poils ferrugineux, épais, blanc-cendrés en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils ferrugineux, épais; 2^e, 3^e, 4^e segments mêlés de noirs, clair-semés, 5^e 6^e et anus ciliés de poils blancs. Poils de l'abdomen en dessous, ceux des côtés et des pattes blancs. Tarses un peu ferrugineux. Ailes moins enfumées que dans la femelle. Nervures et côte noires.

NOTA. La pubescence devient entièrement gris-cendré chez les individus âgés.

Suisse.

Collection Sichel.

NOTE. Très-voisine de l'*A. furcata*, dont elle diffère surtout par la taille, la couleur et la distribution des poils, la forme de l'anus et probablement des appendices génitaux.

N^o 38. ANTHOPHORA FURCATA.

Lep., T. 2, p. 82, n^o 49. Evers., Faune, p. 111, n^o 6.

APIS FURCATA, Kirby, Mon. Ap., Ang., T. 2, p. 288, n^o 64.

Tab. 17, fig. 5, ♀.

MEGILLA FURCATA, Nyl. Ap. Bor., p. 245, 1.

Long. : — Corps 15 mm. ; Enverg. 21 mm.

♀ ♂ *Thoracis abdominisque pili rufi, thoracis fasciâ inter alis transversâ nigrâ.* ♀ *Segmenti quinti apice medio (vel et 5^o toto, basi obscuris) anique fimbriâ utrinque (vel et ano toto, epipygio nigro excepto) aureo-rufis.*

A. furcata Pz. est ♂ *senilis, albido-cinereus.* Kirby quoque *specimina subsenilia* describit.

♀ Noire. Poils de la face ferrugineux-noirâtre; ceux du labre, des mandibules franchement ferrugineux; ceux du vertex noirs. Corselet en dessus garni de poils roux, noirs sur le milieu, où ils forment une bande entre les ailes. Poils des quatre premiers segments de l'abdomen en dessus hérissés, roux, peu serrés. 5^e segment et anus entièrement recouverts de poils ferrugineux, dorés, éclatants, un peu plus pâles en dessous. Poils des pattes plus ou moins roux. Tarses ferrugineux; une touffe de poils de cette couleur à l'extrémité du 1^{er} article des tarses des pattes postérieures. Ailes un peu enfumées; nervures, côte noires.

La pubescence de tout le corps devient grise chez les sujets usés.

Algérie, France, Angleterre, probablement toute l'Europe, sur les *Melissa*, les *Nepeta*.
Collection Sichel, Dours.

♂ Lep., T. 2, p, 83, n° 49.

APIS FURCATA, PANZ., FAUH. GERM., 56, 8.

Long. : — Corps 14 mm.; Enverg. 17 mm.

Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes marqué d'un point jaune qui manque quelquefois. Face entièrement jaune, sauf deux points noirs sur les côtés du labre, en haut. Poils du corselet, de tous les segments abdominaux et des pattes hérissés roux chez les individus nouvellement éclos, gris-cendrés chez les sujets vieux ou usés. Tarses ferrugineux. Anus très-mucroné.

Collection Sichel, Dours.

NOTE. Var. *α* vel *typica* (non Pz. *typica*) specimina recentissima, thoracis abdominisque pilis rufis vel rufescentibus ♀ ♂.

Angleterre, Danemark, Suisse, Autriche, France.

♂ Ore interdum albido.

Var. *b.* Thorace rufo, abdomine cinereo vel cinereo-rufescenti.

Bavière, Suisse, Piémont.

Var. *c.* Pz. typ. ♂ Varietas senilis, cinereo-albido-pilosa.

♀ Pauzero incognita.

Bavière, Savoie, Piémont.

Var. *d.* ♂ Scapo nigro.

Var. *e.* ♀ (non extat in ♂). Thorace vix fasciato. (SICHEL.)

N^o 39. ANTHOPHORA RUFO-ZONANA. Dours.

Long. : — Corps 12 mm.; Enverg. 20 mm.

Parva, nigro-fulvo dimidiata. Abdomine basi-fulvo, apice albo-villoso. Alis fuscescentibus.

♂ Noire. 1^{er} article des antennes en dessous jaune. Jones, chaperon, une ligne transverse au dessus de ce dernier, labre, jaunes. Deux taches obliques, noires sur le chaperon devant les joues, deux points noirs sur les côtés du labre. Mandibules noires. Poils de la face cendrés, mêlés de noirs sur le vertex. Corcelet en dessus recouvert de poils noirs sur ses deux tiers antérieurs, de poils roux sur le tiers postérieur. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux, 2^e, 3^e, 4^e noirs. Bord inférieur des 4^e, 5^e, 6^e tout entier, hérissé de poils blancs s'étendant sur les côtés. En dessous, tous les poils sont noirs, ainsi que ceux des pattes. Tarses d'un ferrugineux noir. Ailes un peu enfumées. Nervures, côte noires. Femelle inconnue.

Mexique.

Collection Dours, 2 ♂.

N^o 40. ANTHOPHORA TUBERCULILABRIS.

Dours.

Long. : — Corps 15 mm.; Ailes 11 mm.

♀ *Nigra, labro in lateribus tuberculato. Capite, thorace*

abdomineque cinereo-rufo-tomentosis, fasciis albo-ciliatis, ano, pedibusque ferrugineo-nigris, scopâ aureâ. Alis hyalinis.

♀ Noire. Poils de la face blancs cendrés. Ceux de la partie postérieure de la tête, du corselet en dessus et en dessous cendrés roux, mêlés de noirs. Labre portant de chaque côté de sa base deux petits tubercules arrondis, couleur marron et garnis de poils ferrugineux. 1^{er} segment de l'abdomen en dessus hérissé de poils roux, les autres segments hérissés de poils d'un blanc sale. Bord postérieur de tous les segments orné d'une frange de longs poils d'un blanc plus pur. En dessous, le ventre est nu, sauf le bord inférieur des segments qui porte quelques cils rares, de couleur cendrée. Poils de l'anus ferrugineux, ainsi que ceux du dessus des pattes, ceux du dessous sont noirs. Ailes diaphanes. Point calleux couleur de poix très-foncée au centre. Côte et nervures ferrugineuses.

Abyssinie.

Collection Dours, 2 ♀.

Mâle inconnu.

Très-voisine de *P. A. lanata*, Klug; en diffère surtout par les deux tubercules du labre.

N° 41. ANTHOPHORA SPODIA (1). Dours.

Long. : — Corps 14 mm ; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra; labro in lateribus tuberculato, capite nigro-piloso; thorace abdomineque cinereo-villoso, fasciis albidioribus longe ciliatis, ano rufo, pedibus extûs cinereo, subtûs nigro-ferrugine-pilosis.*

♀ Labre muni, comme dans l'espèce précédente, de deux tubercules couleur marron situés sur les côtés. Face ponctuée

(1) Σποδίας, brun-cendré.

finement, recouverte de poils noirs mêlés de fauves. Tête et corselet hérissés de poils cendrés, mêlés de noirs à la partie antérieure, de roux en dessous, sur les côtés et à la partie postérieure. L'abdomen est hérissé de longs poils cendrés, les trois premiers segments portent une bande de cils blancs plus courts sur le 1^{er}. Anus garni de poils fauve-ferrugineux. Pattes ferrugineuses, garnies en dessus de poils roux-cendrés, en dessous de poils ferrugineux dorés. Ailes presque transparentes. Côte, nervures brunes.

Très-voisine de l'*A. tuberculilabris*, à pubescence plus sombre.
Sine patriâ?

N^o 42. ANTHOPHORA LANATA.

Klug, Tab. 49, fig. 4, n^o 3.

Long. : — Corps 13 à 14 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, albo vel cinereo-villosa, pedibus fulvo-pilosis.*

♀ Noire. Face immaculée. Poils du chaperon cendrés, ceux du labre jaunâtres. Corselet en dessus hérissé de poils cendrés, mêlés de noirs sur le milieu, un peu fauves sur les côtés, blanchâtres en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de longs poils cendrés, plus courts sur les autres segments. 4^e, 5^e noirs, ce dernier ayant quelques poils fauves. Base de tous les segments portant une bande de poils couchés, blanc-jaunâtres, large sur le 3^e et le 4^e. Anus noir. En dessous, les segments sont presque nus, sauf le 5^e qui porte une bande de poils fauves. Pattes hérissées de poils cendré-roux en dessus, d'une belle couleur fauve-doré en dessous. Tarses entièrement de cette couleur. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes. Point calleux ferrugineux-clair.

Cafrerie.

Collection Dours.

N^o 43.

ANTHOPHORA LEPIDA.

Pall., mnspt.

Evers., Faune, p. 116, n^o 14.

♀ *Nigra; thorace cinereo-hirsuto, dorso nigro; abdomine aterrimo, fasciis omnibus utrinque tomento-candido-maculatis; pedibus posticis externe atro-hirsutis, tibiis anterioribus externe candido-tomentosis.*

Province d'Orenbourg.

Ex Eversman.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N^o 44. ANTHOPHORA LEPIDODEA. Dours.

Long. : — Corps 13 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Nigra, cano-tomentosa; fasciis abdominis candido breviter ciliatis, 5^o anoque ferrugineis. Pedibus anterioribus albo, reliquis cinereo-ferrugineis. Alæ hyalinae.*

♂ *Fulvo-cinereo-villoso; facie flavo-maculatâ, segmentorum fasciis sordide albicantibus, ano bi-spinoso; pedibus simplicibus ferrugineis, extus candido, subtilis aureo-pilosis.*

♀ Noire. Chaperon finement ponctué, ses poils cendrés, ceux du labre blancs. Corselet en dessus hérissé de poils cendrés, mêlés de noirs sur le milieu, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés, 2^e, 3^e, 4^e recouverts de petits poils serrés, semblables à des écailles de papillon, 5^e de noirs lavés de ferrugineux. Chacun des segments porte à sa base une bande de poils couchés, entièrement blanche sur les quatre premiers, un peu ferrugineuse sur le 5^e. Cils du dessous de l'abdomen ferrugineux au milieu, blancs sur les côtés. Pattes ferrugineuses, les antérieures hérissées de poils blanchâtres, les intermédiaires

et les postérieures de poils cendrés ferrugineux. Tarses de cette couleur. Ailes transparentes; nervures, côte brunes.

Voisine de l'*A. lepida* Evers.; mais en diffère par la brosse, qui est noire dans celle-ci.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune. Chaperon, labre, bout des mandibules de cette couleur; deux taches noires circonscrivant les joues; deux points noirs sur le labre, en haut. Poils de la face cendrés, mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus et sur les côtés, 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés, un peu fauves, blanchâtres en dessous. Les autres segments sont recouverts de petits poils gris, serrés, simulant des écailles de papillon du milieu desquelles émergent quelques poils noirs ou cendrés, plus longs. Base de tous les segments portant une bande de cils d'un blanc sale s'étendant sur les côtés et en dessous. Anus ferrugineux, terminé de chaque côté par une petite épine. Pattes ferrugineuses, hérissées sur leur tranche externe de poils cendrés. Tarses en dessus et en dessous d'un brun ferrugineux doré.

Dalmatie ?

Collection Dours.

N^o 45. ANTHOPHORA PULVEROSA.

Smith, Cat., p. 329, n^o 44.

♀ *Nigra; cinereo vel ochraceo-pilosa. Abdomine ochraceo-tomentoso apice rufo; pedibus flavido vestitis, tarsis ferrugineis.*

Long. : — Corps 12 mm.

♀ Noire; poils du corselet blanchâtres, avec une teinte rousse au centre. Abdomen en dessus recouvert de poils courts ressemblant à des écailles, d'une teinte ochracée, sauf vers l'extrémité où ils deviennent fauves. Poils des

pattes jaunâtres; tarses ferrugineux. En dessous l'abdomen présente une teinte ferrugineuse. Ailes transparentes. Point calleux testacé.

♂ Semblable à la femelle, sauf les différences sexuelles de la face et des antennes.

Iles Canaries.

Ex Smith.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N^o 46. ANTHOPHORA PYROPYGA. Dours.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, cinerescenti-villosa. Ano ferrugineo.*

♀ Noire; entièrement recouverte de poils cendrés noirs, hérissés. Bord de tous les segments abdominaux cilié d'une bande plus pâle tranchant sur la pubescence cendrée du fond. 5^e segment et anus ornés de poils d'un beau ferrugineux. Pattes cendrées, ferrugineuses, ayant quelques poils de cette couleur aux articulations des hanches, des cuisses et des jambes. Tarses ferrugineux, leur dernier article noir. Ailes enfumées; point calleux, côte et nervures noires.

Cafrerie.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes noir, sans doute par exception. Chaperon noir, avec une tache ronde à la partie inférieure. Labre jaune, deux points noirs très-grands sur les côtés. Mandibules noires au bout. Pubescence comme dans la femelle; les poils sont plus hérissés, plus blancs, surtout en dessous sur les pattes. En revanche, les cils des segments sont un peu roux.

Très-voisine de l'*A. lanata*.

Collection Dours.

N^o 47. ANTHOPHORA ORANIENSIS.Lep., 11, p. 39, n^o 13.

Luc., Expl. Scient. de l'Alg., 3, 143, 6. Tab. 1, fig. 1.

Long. : — Corps 26 mm.; Enverg. 27 mm.

♀ *Media, nigra, thorace 1^{er}que segmento abdominis fulvo-pilosis; 2^o, 3^o, 4^o albo-niveo-marginatis. Pedibus nigris, tibiis posticis suprâ albo-villosis.*

♀ Noire. Face immaculée. Poils de la tête noirs, ceux du vertex jaune vif, ceux du corselet en dessus et sur les côtés d'un roux éclatant, presque ferrugineux, ceux du dessous noirs. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils d'un roux très-vif semblables à ceux du corselet; 2^e, 3^e, 4^e segments revêtus de quelques poils noirs courts, bord inférieur de ces segments muni d'une frange de poils d'un blanc de neige; 5^e segment et anus noirs, quelques poils blancs sur les côtés. Poils des pattes noirs, excepté ceux du dessus des jambes postérieures, qui sont blancs de neige. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout; nervures noires.

Long : — Corps 17 mm.; Elverg. 26 mm.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, joues, mandibules en dehors d'un blanc-jaunâtre. Corselet en dessous revêtu de poils blanchâtres. Poils de toutes les jambes et du 1^{er} article des tarses blancs. Le reste semblable à la femelle.

Algérie, Corse.

Collection Lucas.

M. Sichel regarde cette espèce comme une variété de l'*A. 4-fasciata* (*); mais elle appartient bien certainement à une autre division; la face étant toujours immaculée...

(*) *Pectore nigro-piloso, sterno nigro-hirto...*

(SICHEL.)

N° 48. ANTHOPHORA GODOFREDI. Sichel.

Long. : — Corps 13 mm ; Ailes 12 mm.

♀ *Nigra; obesa. Capite, thorace abdomineque nigro-pilosis. 1° segmento albo-fasciato; 2ⁱ et 3ⁱ lateribus ferrugineo-maculatis. Pedibus anterioribus nigro-ferrugineis, posterioribus ferrugineo-pilosis. Alis fumatis.*

♀ Noire; poils du labre un peu ferrugineux; ceux de la face, de la tête, du corselet, de l'abdomen noirs. 1^{er} segment portant une bande étroite de poils couchés, blancs; le 2^e et le 3^e ayant sur les côtés une petite touffe de poils ferrugineux qui, chez les sujets frais, doit se continuer sous forme de bande. Poils des pattes antérieures et intermédiaires noirs, mêlés de ferrugineux; ceux des postérieures sont entièrement ferrugineux éclatant. Ailes enfumées; côte, nervures noires.

♂ Antennes noires. Chaperon jaune. Mandibules et labre noirs, ce dernier ayant une ligne perpendiculaire jaune sur le milieu. Poils de la face et du dessous du corselet blancs cendrés, ceux du dessus noirs, mêlés de jaunes. 1^{er} segment hérissé de poils jaunes; les autres segments les ont noirs. Base du 1^{er} segment portant une bande de poils blancs, couchés, 2^e, 3^e segments ayant une bande de poils ferrugineux qui disparaît souvent sur le 3^e, pour n'y laisser qu'une tache latérale. Poils des pattes d'un beau ferrugineux. Ailes moins enfumées que chez la femelle.

Saint-Vincent.

Collection Sichel, Dours.

N° 49. ANTHOPHORA DUBIA.

Evers., Faune, p. 114, n° 10.

Long. : — Corps 17 mm.; Enverg 50 mm.

♀ *Nigra. Facie immaculatâ nigri, clypeo valdè convexo.*

Capitis, thoracisque pilis fulvo-hirsutis. 1^o segmento fulvo-cinerescenti-piloso, reliquis nigris puberulis; fasciis 1-4 albidis, 5^a anoque ferrugineis; pedibus extùs albido-rufo, intùs ferrugineo-pilosis. Alæ subfucescentes.

♀ Noire; face immaculée. Chaperon très-convexe, son bord inférieur un peu ferrugineux. Poils de la face roux cendrés, blancs derrière les yeux et sur le labre. Corselet en dessus hérissé de poils roux, blanchâtres sur les côtés. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux; une ligne de cils très-courts, plus foncée, sur le bord inférieur de ce segment. 2^e, 3^e, 4^e, 5^e segments revêtus de poils noirs, couchés, très-courts, entremêlés de roux sur le 2^e. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e cilié de poils blancs, couchés, ne formant pas imbrication sur les suivants. Bord inférieur du 5^e et anus frangés de poils ferrugineux. Côtés et dessous de l'abdomen ayant des poils blanchâtres, roux sur le 5^e segment. Poils des pattes roux en dessus, ferrugineux en dessous. Tarses de cette couleur. Ailes presque transparentes. Point calleux noir, côte et nervures d'un noir ferrugineux.

♂ Semblable à la femelle, sauf les taches jaunes caractéristiques de la face. Les pattes sont simples, sans épines, sans cils.

Iles de l'Archipel grec, montagnes de l'Oural, province d'Orenbourg, d'après Eversman. Collection Dours.

Cette espèce est très-voisine de l'*A. segnis* Evers.; la femelle s'en distingue par la pubescence un peu plus fauve du thorax, et surtout par la couleur du dessous des pattes, qui est noir dans l'*A. segnis*, ferrugineux-doré dans l'*A. dubia*. Celle-ci enfin appartient par son mâle à une subdivision toute différente; *A. dubia* ♂ a les pattes simples.

N° 50. ANTHOPHORA NIGRO-MACULATA.

Lucas, Expl. Alg. 3, 146, 10. Tab. 1, fig. 3, 8.

Long. : — Corps 22 mm.; Ailes 15 mm.

♀ *Magna, nigra, rufo-cinereo-hirsuta. Thorace 1^{re}que segmento rufo-hirsutis, illo fasciâ mediâ nigrâ. Segmentorum fasciis 2, 3, 4 albido-flavo-rufis. Pedibus ferrugineo-pilosis.*

♂ *Rufo-villosus, facie flavo-nigro-maculatâ. Pedibus simplicibus.*

♀ Noire. Tête ponctué, portant sur la face des poils roussâtres, plus blancs en arrière et sur les côtés. Corselet en dessus hérissé de poils roussâtres, excepté sur le milieu, où ils forment un petit carré noir entre les deux ailes; en dessous ces poils sont blanchâtres, couleur qu'ils prennent partout en vieillissant. 1^{er} segment de l'abdomen entièrement revêtu de poils longs d'un cendré-roussâtre; les autres segments sont noirs. Bord inférieur de tous les segments, ainsi que des côtés de l'abdomen, ciliés de poils tantôt roux, tantôt cendrés, très-serrés aux 2^e et 3^e, rares au 4^e. Anus ferrugineux, ainsi que les tarses. Les poils des pattes, de la brosse sont plus ou moins ferrugineux-cendrés. Ailes un peu enfumées. Côte et nervures brunes.

♂ 1^{er} article des antennes en dessous, chaperon, joues, labre, milieu des mandibules, jaunes. Une grande tache en forme de croissant de chaque côté du chaperon; deux petits points sur les côtés du labre noirs. Le reste semblable à la femelle.

Algérie, Espagne, Portugal, îles de l'Archipel.

Collection Sichel, Dours.

N^o 51. ANTHOPHORA ATRO-FERRUGINEA.

Dours.

Long. : — Corps 22 mm.; Ailes 15 mm.

♀ *Magna, aterrima pilis ferrugineis intermixta. Fasciis abdominis 1-3; pedibus anoque ferrugineo-pilosis. Alæ fumatæ.*

♂ *Facie flavâ, nigro-maculatâ, thoracis primique segmenti abdominis pilis ferrugineis, reliquis nigris; in thorace fasciâ mediâ-nigrâ; fasciis 2-3 lineato-ferrugineis, pedibus nigris, cinereo-ferrugineo-pilosis. Alæ subfuscescentes.*

♀ Très-noire. Tête ponctuée, portant sur la face quelques poils ferrugineux, courts, rares, noirs à la partie postérieure. Corselet en dessus recouvert de poils noirs, épais; en dessous plus pâles. Une petite touffe de poils ferrugineux près du point calleux et sur les côtés du corselet. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils noirs mêlés de ferrugineux sur les côtés; les autres segments sont noirs. Bord postérieur des 1^{er}, 2^e, 3^e segments et anus ciliés de longs poils ferrugineux. Pattes noires en dessous, recouvertes en dessus de poils ferrugineux, épais. Tarses bruns. Ailes très-enfumées; point calleux, côte, nervures très-brunes.

Collection Sichel, Dours.

Le mâle de cette espèce ressemble tout-à-fait à celui de l'*A. nigro-maculata* Luc. M. le Dr Sichel pense que l'*A. atro-ferruginea* n'est qu'une variété de l'*A. nigro-maculata*, due au mélanisme.

♂ 1^{er} article des antennes en dessous, joues, chaperon, labre, milieu des mandibules, jaunes. Une grande tache en forme de croissant de chaque côté du chaperon; deux petites taches sur les côtés du labre, noires. Poils de la tête, du corselet, du 1^{er} segment de l'abdomen, hérissés, tantôt très-ferru-

gineux, tantôt roux-cendrés. Une bande de poils noirs entre les ailes et sur le corselet. Tous les segments de l'abdomen, à partir du 2^e, garnis de poils noirs. Bord postérieur des 2^e et 3^e ciliés de poils roussâtres. Poils des pattes cendré-roux. Tarses bruns. Ailes moins enfumées que dans la femelle.

Cette espèce, prise très-fréquemment *in copula*, dans les îles de l'Archipel grec, se distingue facilement de l'*A. nigro-maculata* Luc. Les mâles présentent entre eux plus de ressemblance. M. Sichel pense que ces deux espèces doivent être réunies. Dans ce cas, la femelle offrirait une remarquable variété dont les analogies se retrouvent cependant dans l'*A. nidulans* ♀, dont l'*A. Madera* Sichel ne serait qu'une variété, dans l'*A. Hawartana* ♀ Kirby, qui ne serait qu'une variété noire de l'*A. retusa* ♀.

Italie, îles de l'Archipel grec.

Collection Dours, Sichel.

N^o 52. ANTHOPHORA NIGRO-CINCTA.

Lep., T. 2, p. 76, n^o 44.

Long : — Corps 20 mm.; Enverg. 55 mm.

Nigra, albo-cinereo-villosa. Sarothro ferrugineo. Alis sub-fuscescentibus ♀ ♂.

♀ Noire. Poils de la face d'un blanc cendré plus ou moins terne. Labre et mandibules recouverts de poils ferrugineux, s'étendant quelquefois sur les côtés du chaperon. Corselet en dessus garni de poils cendrés, mêlés de noirs sur le milieu, plus blancs en arrière et sur les côtés. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen bérissés de poils blancs, ternes, plus longs sur le 1^{er}; 3^e, 4^e, 5^e segments noirs. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments cilié de poils blancs, courts sur le 2^e, s'étendant sur la moitié inférieure du 4^e. Bord inférieur du 5^e segment et anus garnis de poils ferrugineux; ceux des côtés et du dessous de l'abdomen blancs. Pattes antérieures

ayant sur leur tranche externe des cils blancs. Pattes intermédiaires et postérieures recouvertes de poils ferrugineux. En dessous, les pattes sont noires avec un reflet ferrugineux. Tarses de cette couleur. Ailes presque transparentes. Côte, nervures brunes.

Var. *a*. Tous les poils blancs sont remplacés par des poils roux.

Var. *b*. Tous les segments sont hérissés de poils blancs épais, à peine entremêlés de quelques poils noirs sur le 3^e.

Algérie, Grèce.

Collection Sichel, Dours.

♂ Lep., T. 2, p. 77, n° 44.

Long. : — Corps 19 mm.; Enverg. 50 mm.

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, labre, jaunes. Deux points noirs sur les côtés de ce dernier. Joux, mandibules noires. Poils de la face blanchâtres, mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus recouvert de poils cendrés plus ou moins ternes, mêlés de noirs sur le milieu. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils blancs ternes, plus longs sur le premier. 3^e, 4^e, 5^e segments noirs. Leur bord inférieur et leurs côtés hérissés de poils blancs, éclatants. 6^e segment et anus garnis de poils ferrugineux mêlés de noirs. Pattes recouvertes de poils blancs entremêlés de noirs en dessus, tout-à-fait noirs en dessous. Tarses bruns. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes.

Var. *a*. Var. *b*. Comme dans la femelle.

Algérie, Grèce.

Collection Sichel, Dours.

N° 53. ANTHOPHORA LATI-CINCTA Dours.

Long. : — Corps 22 mm.; Enverg. 54 mm.

♀ *Nigra, nigro-lutescenti-villosa; abdomine apice albo. Pedibus nigris, sarothro late ferrugineo.*

♀ Noire. Poils de la face et du vertex noirs, mêlés de jaunes; ceux du labre ferrugineux-doré. Corselet hérissé de toutes parts de poils noirs, sauf à la partie postérieure, derrière l'insertion des ailes, où ils sont remplacés par une bande de poils presque jaunes. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils jaunes; 2^e, 3^e, 4^e segments noirs. Bord inférieur du 4^e cilié de longs poils blancs. Bord inférieur du 5^e et anus portant des poils ferrugineux. Dessous du corps entier hérissé de poils noirs ferrugineux. Poils des pattes noirs. Brosse formée de poils ferrugineux-doré, semblables à ceux du labre. Tarses d'un ferrugineux-obscur. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires.

Var. *a*. 4^e, 5^e segments hérissés de poils roux.

Mâle inconnu.

Ce n'est peut-être qu'une variété de l'*A. nigro-cincta*.

Corse.

Collection Sichel, Dours.

N^o 54. ANTHOPHORA BICILIATA.

Lep., T. 2, p. 83, n^o 50.

Long. : — Corps 22 mm.; Enverg. 54 mm.

♀ *Magna, nigra, rufo-nigro-villosa. Segmentis 2-3 albociliatis. Alæ fuscæ.*

♀ Noire. Poils de la face roux, mêlés de noirs sur le vertex, de ferrugineux sur le labre et les mandibules. Corselet en dessus et en dessous hérissé de poils roux-ferrugineux, mêlés de noirs sur le milieu. 1^{er}, 2^e segments abdominaux hérissés de poils roux, longs sur le 1^{er}, rares, courts sur le 2^e, surtout au milieu. 3^e, 4^e, 5^e segments hérissés, noirs. Bord inférieur des 2^e, 3^e segments portant une bande de poils un peu plus pâle, à peine distincte sur le 3^e. Poils

de l'anus noirs, mêlés de roux. En dessous, cils des segments cendrés au milieu, un peu roux sur les côtés. Pattes en dessus d'un roux blanchâtre, noires en dessous. Tarses ferrugineux. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Algérie, Espagne, Midi de la France.

Collection Sichel, Dours.

♂ Lep., T. 2, p. 84, n° 50.

Long. : — Corps 22 mm.; Enverg. 54 mm.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune. Chaperon et labre de cette couleur, tournant parfois au ferrugineux. Deux taches noires sur les côtés du chaperon, deux points noirs sur les côtés du labre, en haut. Mandibules noires. Poils de la face cendré-roux, ceux de la partie antérieure du corselet cendré-noirs, ceux de la partie postérieure roux, ceux du dessous blancs. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils roux, plus foncés, plus longs sur le premier. 3^e, 4^e, 5^e, 6^e segments ayant quelques poils noirs, courts, mêlés de roux sur le 6^e et l'anus. Base des 2^e, 3^e portant une bande de poils blanchâtres, courts, s'étendant aussi en dessous. Poils des pattes cendrés, tarses ferrugineux.

N° 55. ANTHOPHORA SEMIS-CINEREA. Dours.

Long. : — Corps 15 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Nigra, fulvo-cinereo-hirsuta, thorace abdominisque segmentis 1-2 fulvo-cinereo-hirsutis, sarothro ferrugineo, 1^o tarsorum posticorum articulo nigro-ferrugineo-piloso. Alæ hyalinæ.*

♀ Noire ; chaperon ponctué, sans ligne saillante au milieu. Poils du labre ferrugineux, ceux de la face noirs, mêlés de roux. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de poils cendrés-roux, mêlés de noirs sur le disque, de noirs

lavés de ferrugineux en dessous. Abdomen finement ponctué; 1^{er}, 2^e segments hérissés de poils roux-cendrés, 3^e, 4^e, 5^e segments ayant des poils noirs, courts, rares. Bords du 1^{er} et du 2^e segment portant une bande de poils blancs couchés, à peine marquée sur le 1^{er}. Bord des autres segments et anus ornés d'une bande de poils noirs lavés de ferrugineux. En dessous, les segments sont noirs. Pattes reconvertes de poils noirs lavés de ferrugineux. Brosse d'un ferrugineux-doré. 1^{er} article des tarses postérieurs en dessus noir-ferrugineux; les autres articles sont ferrugineux. Ailes transparentes. Côte, nervures brunes.

Dalmatie.

Voisine de l'*A. biciliata*, mais en diffère par le bord cilié des segments qui, dans celle-ci, commence au 2^e, non au 1^{er}.

N^o 56. ANTHOPHORA VETULA.

♀ Evers., Faune, p. 117, n^o 17.

A. SENILIS, EVERS. ?

Long. : — Corps 16 mm.; Enverg. 20 mm.

♀ *Magna, cano-hirta. Abdominis segmentis 1, 2, albido, reliquis rufo-aureo-tomentosis. Mandibulis tarsisque rufis; tarsorum 1^o articulo rufo-aureo-hirto.*

♀ Noire. Poils de la face, de la tête, du corselet et de l'abdomen en dessus, blanc-cendrés, longs, épais. Base des 2^e, 3^e, 4^e, 5^e segments frangée de poils fauves ou roux, serrés. Anus ferrugineux. Poils des pattes en dessus ferrugineux, plus dorés en dessous. Ailes transparentes. Nervures brunes.

Mâle inconnu.

Collection Sichel, provenant des types Eversman.

Kalmugie.

Collection Forster.

NOTE. La *Megilla vetula*, Klug, Symb. phys., Déc. 5, Tab. 49,

fig. 3, ne doit pas se rapporter à notre espèce. Celle décrite par Klug est sans doute le mâle d'*A. atricilla*, Eversm.

NOTE. La tête et le thorax ne sont pas, comme dit Eversman, « *tomento, cano ubique tecta*, » mais, comme il l'écrivit plus exactement (Bull. de la Soc. de Moscou, à l'endroit cité par lui-même) *cano hirta* aussi sur les joues; c'est-à-dire que ce ne sont pas des poils courts du *tomentum*, mais de véritables poils longs qui couvrent ces parties.

Les écailles des ailes et la frange du milieu du 5^e segment abdominal sont rousses, les pinceaux des métatarses postérieurs « *appendicula penicillata, articuli primi tarsorum posticorum* (Evers., Bull. Mosc.), » sont formés de poils roux, un peu dorés, comme dans d'autres espèces.

La taille est celle des plus grands individus de l'*A. pilipes* ou de l'*A. personata*.

N^o 57. ANTHOPHORA REPLETA ♀. Dours.

Long. : — Corps 20 mm.; Enverg. 52 mm.

♀ *Magna, nigra, fulvo-hirsuta. Segmentis 4-5 nigris. Facie immaculatâ.*

♀ Noire. Tête entièrement noire, avec les poils de la face gris-fauve, mêlés de noirs sur le vertex. Poils du corselet noirs sur le milieu et en avant, fauves en arrière et sur les côtés, blancs en dessous. 1^{er}, 2^e, 3^e segments abdominaux hérissés de poils fauves, plus courts sur le 2^e et le 3^e; 4^e, 5^e segments hérissés de poils noirs, mêlés de roux sur les côtés et à l'anus. Dessous de l'abdomen garni de poils plus blancs. Pattes noires, hérissées de poils roux en dessus, noirs ferrugineux en dessous. Tarses bruns. Ailes transparentes, nervures noires. Point calleux de couleur ferrugineuse.

Mâle inconnu.

Province d'Orenbourg.

Collection Dours.

N^o 58. **ANTHOPHORA ROMANDII.**

Lep., 3, 87, 54.

ANTHOPHORA INSIDIOSA, ♂ L. Duf., in litteris.

Long. : — Corps 15 mm.; Ailes 41 mm.

♀ *Nigra, cinereo-villosa. Abdomine nigro, 1, 2 segmentis cinereo-hirsutis; ano leviter ferrugineo; pedibus nigris albido-intermixtis. Alis hyalinis.*

♀ Noire. Poils de la tête et du corselet blancs, mêlés de quelques noirs sur les parties supérieures. Poils des 1^{er} et 2^e segments de l'abdomen en dessous hérissés blancs, ceux des 3^e, 4^e, 5^e noirs; le bord inférieur du 3^e portant un petit nombre de poils blancs, celui du 5^e et les côtés de l'anus garnis de poils noirâtres un peu ferrugineux; cils du dessous des segments blancs sur les côtés, noirs sur le milieu. Poils des pattes noirs, quelques-uns blancs entremêlés, surtout sur les cuisses antérieures. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout. Côte et nervures noires.

Ex Saint-Fargeau.

L'*A. atricilla*, Evers. diffère par les poils de la tête et des deux segments de l'abdomen qui, chez elle, sont un peu plus tomenteux; par les pattes, dont les poils sont plus noirs. Taille plus grande.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon (deux lignes obliques sur les côtés, noires), labre (deux points noirs en haut), mandibules (leur extrémité noire), jaunes. Poils de la face et du corselet jaune-cendrés, un peu plus blancs en dessous. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils cendrés, les autres de noirs; 2^e, 3^e segments portant une bande étroite de poils blancs, 4^e, 5^e, 6^e ayant quelques poils ferrugineux au bout. En dessous et sur les côtés, les

segments ont des poils blancs. Pattes noires hérissées de poils blancs, mêlés de roux, surtout aux tarses.

Algérie, Midi de la France.

Var. ♂ Thorace rufo-cinereuscenti.

Algérie.

Collection Sichel, Dours

N° 59. ANTHOPHORA ATRICILLA.

Evers., Faune, p. 116, n° 16,

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, cano-tomentosa, hirsuta, segmentis 1-2 cano-tomentosis, reliquis, pedibusque omnibus atro-hirsutis.*

♂ *Labro et hypostomatis parte inferiore flavis, segmentis duobus ultimis atris.*

Ex Eversman.

♀ Noire. Poils de la tête, du corselet et des deux premiers segments abdominaux hérissés de poils blancs, tomenteux, courts; 4^e, 5^e segments et pattes recouverts de poils noirs. Point calleux, côte, nervures brunes.

♂ 3^e segment recouvert comme les deux premiers de poils courts, tomenteux, blancs. Poils des pattes hérissés, blanchâtres.

Cette espèce me paraît identique avec l'*A. Romandii* Lep.; celle-ci toutefois est un peu plus petite.

Algérie, Russie.

Ex Eversman.

N° 60. ANTHOPHORA PEDATA.

♀ Evers., Faune, p. 116, n° 15.

Long. : — Corps 16 mm ; Enverg. 24 mm.

♀ *Atra, atro-hirsuta, thorace abdominisque segmento primo albido-hirsutis; sarothro fulvo.*

♀ Noire. Poils de la face très-noirs, ceux du corselet en dessus et sur les côtés cendrés noirâtres. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils cendrés, très-rare sur le 2^e, où ils ne forment qu'une bande de cils, blanchâtres sur le bord inférieur. Les autres segments sont hérissés de poils noirs. En dessous, le vertex est de couleur ferrugineuse sombre; tous les segments bordés de cils ferrugineux-noir, assez longs. Pattes noires; brosse d'un ferrugineux éclatant. Dernier article des tarses ferrugineux. Ailes hyalines, nervures, côte noires.

NOTA. Il faut ajouter les remarques suivantes à la description d'Eversman.

« *Clipei linea media*, Evers. » Cette ligne, peu élevée, incomplète, va de la pointe jusqu'au centre et manque en haut. De chaque angle supérieur externe du chaperon, une autre ligne petite, élevée, longue de 2 mm. descend obliquement vers le centre..

Les segments abdominaux 2 à 6 sont presque glabres par l'usure; le 3^e porte sur sa base une ligne tomenteuse grisâtre, assez large, disparaissant sur les côtés; sur le 2^e et le 4^e se voient des traces d'une bande semblable.

Ailes hyalines. Taille des plus grands individus de l'*A. pilipes*. Un peu moins large que l'*A. personata*.

(Décrite d'après deux individus très-vieux, très-usés.)

N^o 61. ANTHOPHORA BELIERI. Sichel.

Long.: — Corps 12 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Nigra, griseo-hirsuta, thorace abdominisque segmentis 1-2 griseo-hirsutis, sarothro albicanti, 1^o tarsorum posticorum articulo nigerrimo. Alæ hyalinæ, apice fusæ.*

♀ Noire. Chaperon ponctué, une ligne saillante sur son milieu, une deuxième parallèle à son bord inférieur. Poils

du labre ferrugineux, ceux de la face cendrés, ceux du vertex noirs. Corselet en dessus et sur les côtés recouvert de poils gris un peu roussâtres, de noirs en dessous. Abdomen lisse, 1^{er} segment hérissé de poils gris assez longs; 2^e segment ayant quelques poils noirs, courts, mêlés de gris. Les autres segments sont noirs avec des poils noirs, courts, rares. Anus ferrugineux. Bord du 2^e segment portant une bande de cils gris; 3^e, 4^e, 5^e portant une bande de cils noirs lavés de ferrugineux. En dessous, les segments et leurs cils sont noirs. Poils des pattes noirs, lavés de ferrugineux; brosse blanche, avec une teinte légère rousse. 1^{er} article des tarses postérieurs noirs en dessus, un peu ferrugineux en dessous; dernier article ferrugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout. Côte, nervures brunes.

Sicile.

Très-voisine de l'*A. pedata*, Evers., mais d'un tiers plus petite.

N^o 62. ANTHOPHORA ATRIFRONS.

Smith, Cat., p. 333, n^o 80.

Long. : — Corps 14 mm.

♀ *Nigra, fulvo-villosa; thorace abdomineque fulvo-pilosis; illo fasciâ mediâ nigrâ. 1^o, 2^oque segmentis in medio nigro-pilosis. Pedibus nigris.*

♀ Noire. Poils de la tête noirs, ceux du vertex fauves. Corselet en dessus hérissé de poils fauves brillants, avec une tache ronde de poils noirs sur le milieu. Abdomen en dessus hérissé de poils fauves brillants, avec un pinceau de poils noirs sur le milieu du 1^{er} et du 2^e segment; en dessous l'abdomen et les pattes en entier sont recouverts de poils noirs. Ailes un peu enfumées.

Cap de Bonne-Espérance.

Ex Smith.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N° 63. ANTHOPHORA MEXICANA. Sichel.

Long. : — Corps 17 mm.; Ailes 11 mm.

♀ *Nigra; thorace fulvescenti, interdum in disco nigrescenti-villoso. Abdomine nigro, fasciis, pedumque pilis cinereo-albis.*

♀ Noire. Poils de la tête, du corselet en dessus et sur les côtés, fauves, cendrés en dessous. Milieu du corselet ayant quelquefois des poils noirs. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils fauves, plus rares sur les autres segments. Base de chacun d'eux portant une bande étroite de poils cendrés, couchés. En dessous, les segments ont la même pubescence. Pattes noires, recouvertes de poils cendrés. Ailes transparentes. Côte, nervures noires.

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune, ainsi que le chaperon et le labre. Deux grandes taches sur les côtés du 1^{er}, deux points sur le 2^e, en haut noirs. Extrémité des mandibules noire. Poils de la face et du corselet en dessous cendrés. Ceux du corselet en dessus d'un fauve brillant. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils fauves, les autres en ont de noirs, courts. Base de tous les segments et le 6^e en entier recverts d'une bande de poils cendrés, plus ou moins roux, s'étendant en dessous et sur les côtés. Poils des pattes cendrés.

Mexique.

Collection Saussure, Dours.

N° 64. ANTHOPHORA ROBUSTA.

MEGILLA ROBUSTA, Klug. Tab. 49, fig. 5, 14.

Long. : — Corps 20 mm.; Ailes 12 mm.

♀ *Nigra, thorace abdominisque primo segmento testaceo-villosis, 2°, 3°que apice dense albido-ciliatis.*

Magnitudine fere et staturâ *M. Hispanicæ* (intermediæ). Nigra. Caput confertim punctatum, immaculatum, sparsim fulvo-villosum. Thorax dense fulvo-villosus, pilis in medio dorsi fuscis intermixtis. Abdomen subtiliter punctatum, segmento 1°, suprâ fulvo-villoso, segmentis reliquis nigro-tomentosis, 2°, 3°que apice dense albido-ciliatis. Subtùs abdomen fuscum, segmentis margine ciliatis. Alæ vix infuscatae, hyalinae, nervis stigmatique fuscis. Alarum tegulae testaceo-ferrugineae. Pedes nigro-picei, tibiis tarsisque latere interno fusco, externo testaceo-hirtis. (KLUG.)

Syria.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N° 65. ANTHOPHORA FUSCIPENNIS. Smith.

Cat., p. 338, n° 100.

Long. : — Corps 10 mm.

♀ *Nigra. Abdomine nitido; 4° segmento albo maculato, tarsis ferrugineis.*

♀ Noire. Chaperon grossièrement ponctué. Corselet un peu plus finement ponctué, hérissé de poils noirs. Abdomen brillant, finement ponctué, recouvert de poils noirs; base du 4° segment portant de chaque côté un petit pinceau de poils blancs. Tarses ferrugineux. Ailes enfumées.

Amérique du Nord.

Ex Smith.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N° 66. ANTHOPHORA FULVIFRONS. Smith.

Cat. 331, 115.

Long. : — Corps 10 mm.; Ailes 8 mm.

♀ *Parva, nigra, capite thoraceque fulvo-piloso. Abdomine*

nigro, 2, 3, 4 *segmentis flavo-marginatis*; *femoribus ferrugineis*, *extùs nigro-pilosis*. *Antennis ferrugineis*. *Alis fumatis*.

♀ Noire. Antennes et mandibules ferrugineuses. Face noire, recouverte de poils fauves s'étendant sur le vertex et à la partie antérieure du corselet. Celui-ci jaune-cendré sur les côtés, noir au milieu et à la partie postérieure. Abdomen brillant, finement ponctué, noir. Base des 2^e, 3^e, 4^e segments portant une bande étroite de poils jaunes. 5^e segment et anus hérissés de poils noirs, mêlés chez le dernier de quelques poils ferrugineux. Pattes ferrugineuses, recouvertes, surtout sur les postérieures, de longs poils noirs, lavés de ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires. Point calleux ferrugineux-noirâtre.

♂ Semblable à la femelle. 6^e segment ayant comme les autres une bande jaune.

Brésil

Collection Dours.

N^o 67. ANTHOPHORA NITIDULA. Sichel.

Long . — Corps 11 mm.; Ailes 7 mm.

♀ *Nigra*, *violacea*; *facie thoraceque cinereo-villosâ*. *Abdomine nitido-violaceo*. *Fasciis 1-2 albis*; *pedibus nigris, nigro-ferrugineo-villosis*.

♂ *Antennis medio testaceis, pedibus extùs cinereo-villosis*.

♀ Noire, avec un reflet violacé. Chaperon et labre recouverts de poils blancs un peu roussâtres. Poils du vertex et du corselet en dessus cendrés, noirs en dessous. Abdomen brillant, très-finement ponctué, à reflets violets. 1^{er} segment hérissé de poils cendrés mêlés de noirs. Les autres segments

ont des poils noirs très-courts, plus abondants sur les côtés et à l'anus, où ils sont mêlés de ferrugineux. Bord des 1^{er} et 2^e segments portant une bande de poils blancs plus ou moins cendrés, interrompue par l'usure chez les vieux sujets. En dessous, l'abdomen est noir. Pattes noires, recouvertes de poils noirs lavés de ferrugineux, longs sur la tranche externe du 1^{er} article des tarses. Ailes presque transparentes; côte, nervures noires.

♂ Milieu des antennes de couleur ferrugineuse. Pubescence semblable à celle de la femelle, sauf sur la partie externe des pattes, où elle est cendrée.

Chili.

Collection Dours.

N^o 68. ANTHOPHORA CHILIENSIS.

Spin., Faune, Chili, VI, 172, 1, ♂.

A. TRI-STRIGATA, Spin., Faune Chili, VI, 171, 1, ♀.

Long. : — Corps 11 mm.; Ailes 7 mm.

♀ *Nigra, cinereo-pilosa. Fasciis abdominis albis. Pedibus nigro, ferrugineo-pilosis. Tarsis ferrugineis.*

♂ *Labro luteo.*

♀ Noire. Poils du labre cendrés-ferrugineux, ceux du chaperon cendrés, mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de poils cendrés, un peu ferrugineux, noirs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés-ferrugineux; les autres en ont de noirs, courts, couchés. Bord inférieur de tous les segments portant une bande de poils blancs, couchés, souvent peu visible sur le premier pour cause d'usure. Anus noir avec quelques

poils ferrugineux très-courts. En dessous, les segments sont ciliés de poils cendrés-ferrugineux. Pattes rouges, hérissées de poils noirs mêlés de ferrugineux en dessus, tout-à-fait noirs en dessous. Tarses ferrugineux. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

♂ Semblable à la femelle, sauf le labre qui est jaune. Les poils sont plus cendrés que chez la femelle.

Chili.

Collection Sichel, Dours.

NOTA. L'*A. tri-strigata*, Sp., est un sujet vieux appartenant à cette espèce.

N° 69. ANTHOPHORA NIGRITA.

MEGILLA NIGRITA, Fab., Syst. Piez, 331, 11.

Long. : — Corps 10 mm.; Ailes 8 mm.

♂ *Nigra; capite thoraceque albo-cinerescenti-piloso. Abdomine nigro; segmentis 1-4 niveo-lineatis, in medio interruptis. Pedibus ferrugineis, extus albo, subtus ferrugineo-pilosis.*

♂ Antennes noires; face immaculée, recouverte de poils blancs, cendrés-noirs sur le vertex, sur le milieu et les côtés du corselet. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés sur le milieu, de blancs sur les côtés. Les autres segments ont des poils noirs, courts, mêlés de ferrugineux au 6^e et à l'anús. Base des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments portant une petite ligne de poils couchés, blancs, interrompue aux 2^e, 3^e, 4^e. Pattes ferrugineuses, recouvertes en dessus de poils blancs, de ferrugineux en dessous. Tarses ferrugineux. Ailes transparentes. Côte, nervures noirâtres.

Amérique.

Collection Dours.

N° 70. ANTHOPHORA FEMORATA.

Lat., Gen. Crust. et Insect. T. 4, p. 176, ♂.

Panz., Faune, 105, 19, ♀; 18, ♂.

Lep. Saint-Farg., ♀ ♂, 19, T. 2, p. 45, 19.

A. CINEREA Klug, Evers., Faune, p. 112, 7?

Long. : — Corps 15 mm.; Ailes 11 mm.

♀ *Nigra; albo vel fulvo-cinereo-hirsutâ Capite thoraceque albo vel fulvo-cinereo-pilosis, hoc nigro fuscato. Abdomine atro, segmentis 2-4 albo-ciliato marginalis. Pedibus albo-hirsutis. 1° tarsorum articulo subtilis ferrugineo.*

♀ Noire. Poils de la tête cendrés-roux sur le vertex ainsi que sur le corselet en dessus. Ce dernier présente une touffe noire entre l'insertion des ailes. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux. Les autres segments sont revêtus de poils rares, cendrés. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments garnis d'une bande de poils blanchâtres, très-étroite au 2^e. Ces mêmes poils blanchâtres revêtent les côtés et le dessous de l'abdomen, ainsi que le dessous du corselet et des deux premières paires de pattes. Palette et tarses en dessous un peu ferrugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout. Nervures, côte brunes.

♂ *Hypostomate, mandibulisque flavo-eburneis. Corpore cano vel fulvo-hirsuto. Metatarsis posticis dilatatis, 1° articulo 2 dentibus acutis armato. Femoribus posticis crassissimis.*

Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 14 mm.

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes jaune, ainsi que le chaperon, une ligne transversale au-dessus de lui,

le labre, les joues et la base des mandibules. Deux taches noires sur la partie antérieure du chaperon; deux petits points noirs sur les côtés supérieurs du labre. Poils de la face, du vertex, du corselet en dessus, du 1^{er} segment abdominal hérissés, cendrés-roux, plus pâles en dessous. Les autres segments abdominaux ont des poils plus rares, cendrés, mêlés de noirs. Poils des pattes cendrés. Cuisses intermédiaires et postérieures renflées. Jambes postérieures dilatées, concaves en dessous, le 1^{er} article de leur tarse dilaté, armé de deux épines, une longue très-aiguë sur le côté interne, l'autre plus courte, surtout vue de face sur le côté externe, portant en outre intérieurement des poils ROUX.

France, Algérie.

Collection Siehel, D. urs.

Très-rare à Paris et dans toute l'Europe, quand on ne connaît pas son gîte. Elle est fréquente au commencement de juin à Paris dans le bois du Vésinet, actuellement presque détruit, sur la Vipérine (*Echium vulgare*). Le mâle semble cesser de paraître dans la deuxième moitié de juin. Cette espèce, la femelle surtout, vole très-vite et fait entendre un bourdonnement très-aigu qui la fait reconnaître de loin.

N^o 71. ANTHOPHORA SEGNIS.

Evers., Faune, 9, p. 113.

A. MICRODONTA ♂. L. Duf., in litteris.

Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 14 mm.

♀ *Atra, fulvescenti-hirsuta. Abdomine atro, segmentorum fasciis albido-tomentosis, ano fulvescenti-piloso. Pedibus externe albido-hirsutis, interne atro-hirtis. Alis sordide hyalinis.*

♀ Noire. Poils de la tête en dessus et en dessous blanchâtres. Ceux du vertex, du labre, du corselet en dessus et

sur les côtés très-roux. Une touffe de poils noirs entre les ailes. Abdomen très-bombé, 1^{er} segment hérissé de poils roux, 2^e, 3^e, 4^e segments lisses, très-finement ponctués; 5^e segment, anus et dessous de l'abdomen hérissés de poils ferrugineux. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments en dessus ornés d'une large bande de poils couchés, blancs. Poils des pattes ferrugineux-pâles en dessus, noirs en dessous. Ailes un peu enfumées. Côte et nervures noires.

♂ *Facie immaculatâ, eburnâ vel flavâ; metatarso postico valido, levi dente armato.*

♂ 1^{er} article des antennes en dessous, chaperon, sauf le bord inférieur qui est noir, joues, labre, base des mandibules éburnés. Poils de la face blanchâtres, ceux du vertex, du corselet en dessus et sur les côtés hérissés, roux. Ces poils sont blancs en dessous. Abdomen très-convexe, bombé. 1^{er} segment garni de poils roux, les autres sont nus. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e orné d'une large bande de poils cendrés. Anus et bord inférieur de tous les segments en dessous hérissés de poils roux. Pattes portant en dessus des poils d'un ferrugineux blanchâtre, roux-noirs en dessous. Cuisses postérieures renflées, leurs jambes dilatées, creusées et concaves en dessous. 1^{er} article des tarses postérieurs dilaté et armé d'une petite dent à sa partie antérieure; les quatre suivants bruns-ferrugineux.

(EVERSMAN.)

Hes de l'Archipel, provinces d'Orenbourg et d'Astrakan, Algérie.

Collection Dours, Sichel, ♂.

Très-voisine de l'*A. femorata*, mais très-distincte par la configuration des pattes chez le mâle.

N° 72. ANTHOPHORA OXYGONA. Dours.

Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 14 mm.

♂ *Nigra, cinereo-villosa. Facie luteâ, nigro-maculatâ. Abdomine nigro-cinereſcenti, fasciis albido-cinereſcentibus; femoribus poſterioribus craſſis; tibiis extuſ, 1^oque articulo tarſorum dente acuto armatis.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes jaune. Chaperon jaune, une large bande noire sous les antennes; deux taches noires sur le milieu. Labre jaune, deux petits points noirs sur les côtés, en haut. Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la face blanchâtres, noirs sur le vertex. Corselet en dessus et sur les côtés jaune-cendré, noir sur le milieu, blanchâtre en dessous. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils cendrés, très-épais sur le premier. Poils des 3^e, 4^e, 5^e noirs, rares. 5^e segment entièrement recouvert de poils blancs. Chaque segment porte une bande de poils blancs, couchés, à peine marquée sur le premier. Anus noir, ayant quelques poils blancs sur les côtés. En dessous, les segments sont ciliés de poils blancs. Pattes hérissées de poils blanchâtres. Tarses ayant des poils blancs mêlés de ferrugineux en dessus et de noirs-ferrugineux en dessous. Cuisses postérieures très-épaisses. Jambes de cette paire de pattes un peu arquées, légèrement creusées en gouttière, armées d'une dent aiguë sur le bord externe, près de l'articulation tibio-tarsienne. 1^{er} article des tarses postérieurs très-long, aplati, portant sur le bord interne une petite épine, sur le bord externe une touffe de poils blancs.

Cette espèce est très-voisine de l'*A. femorata*, dont elle diffère surtout par la taille, ainsi que par la conformation des tibias.

Sierra de Guadarrama (Espagne).

Collection Dours.

N° 73. ANTHOPHORA IRREGULARIS. Dours.

Long.: — Corps 12 mm.; Ailes 9 mm.

♂ *Nigra, flavo-villosa; femoribus crassis; 1° tarsorum intermediorum articulo irregulari, interne sinuato; 1° articulo posticorum pyramidali, tribus apophysis armato; ultimo longissimo, reliquis externè albo-ciliatis.*

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune, 2^e, 3^e noirs, les autres ferrugineux. Moitié supérieure du chaperon noire, moitié inférieure, labre (deux points noirs sur les côtés), mandibules (leur bout ferrugineux-noir) jaunes. Poils de la face blanc-jaunâtres, ceux du corsèlet en dessus et sur les côtés jaunes, mêlés de noirs sur le disque, plus blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils jaunes, les autres en ont de semblables, plus courts, plus rares, sauf sur le 5^e et le 6^e, où ils recouvrent les segments en entier. Bord de tous les segments portant une bande de poils jaune-blanchâtres, couchés. Même pubescence en dessous de l'abdomen. Poils des pattes jaunes en dessus, dorés en dessous. Cuisses renflées. 1^{er} article des tarsi intermédiaires long, sinué à sa partie interne et terminé de ce côté par une apophyse ronde. Jambes postérieures creusées en gouttière en dessous. 1^{er} article des tarsi de cette paire large, en forme de pyramide quadrangulaire; le côté interne terminé par une apophyse un peu aiguë, le côté externe par deux apophyses monsses. Bord externe des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e articles des tarsi cilié de poils blanc-jaunâtres, 5^e article très-long, filiforme, entièrement nu. Crochets noirs. Ailes transparentes; côte, nervures brunes. Point calleux ferrugineux-pâle.

Arménie.

Collection Dours.

Cette espèce remarquable présente les caractères buccaux et alaires des Anthophora, ceux des tarsi appartenant aux Habropoda. Elle relie en outre les deux genres par les signes tirés du gonflement

des cuisses, des cils offerts par les espèces de la section des Femorata et des Pilipes.

N° 74. ANTHOPHORA DIVES. Dours.

Long : — Corps 46 mm. ; Ailes 12 mm.

♂ *Nigra, fulvo-nigro-hirsuta, facie eburnea, mandibulis nigerrimis; articulis 1^o-5^oque tarsorum intermediorum nigro-penicillatis; femoribus posterioribus crassis, extus albido-pilosis; tibiis posticis excavato-concavis, dente obtuso externe armatis, extus albido-pilosis, intus nigro-penicillatis. 1^o tarsorum articulo, difformi dente obtuso externe armato. Alæ hyalinae.*

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes, face toute entière, sauf les deux lignes noires suturales des joues, deux petits points noirs sur les côtés du labre en haut, de couleur d'ivoire. Mandibules très-noires. Poils de la face blanchâtres mêlés de jaunes, de noirs sur le vertex. Corselet en dessus hérissé de poils fauves, mêlés de noirs sur le disque, de blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen revêtu de poils fauves, dressés, longs; 2^e, 3^e et base du 4^e en ayant de noirs, courts; partie inférieure du 4^e, 5^e et 6^e revêtue de poils blancs, mêlés de ferrugineux, surtout sur le bord, les côtés et en dessous. Poils des pattes hérissés, blancs, ferrugineux sur la tranche externe. Tarses ferrugineux, 1^{er} et 5^e articles des tarses intermédiaires garni d'un pinceau de poils noirs. Cuisses postérieures épaisses; jambes dilatées, creusées en gouttière à la surface inférieure, présentant près de son éperon noir une dent mousse, et garnies du côté interne d'un faisceau de poils longs, noirs. 1^{er} article des tarses de cette paire très-élargi en haut et armé sur le bord externe d'une apophyse pyramidale tronquée au sommet. Ailes transparentes; côte, nervures brunes.

Dalmatie.

Collection Dours.

N^o 75. **ANTHOPHORA CALCARATA.**

Lep. Saint-Fargeau, T. 2, 42, 16, ♀ ♂.

ANTHOPHORA CRASSIPES ♂. Lep. Saint-Fargeau, T. 2, 11, 15.

Long. . — Corps 14 mm.; Ailes 19 mm.

♀ *Nigra, albo-cinereo-villosa. 1^o segmento fulvo, reliquis nigro-hirtis, fasciis albis, femoribus supra albo, infra nigro-ferrugineo-hirsutis. Alis hyalinis.*

♀ Noire. Face, tête recouvertes de poils blancs mêlés de noirs. Poils du corselet en dessus roux, mêlés de noirs au milieu, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux, blancs sur les côtés; les autres segments sont noirs, très-finement ponctués. Anus un peu ferrugineux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils blancs, brillants, presque nulle sur le 1^{er}, étroite sur le milieu des 2^e et 3^e et s'élargissant sur les côtés. En dessous, l'abdomen est ferrugineux, ses segments ciliés de poils blancs. Pattes ferrugineuses, hérissées de poils blancs en dessus, ferrugineux-noirs en dessous. Tarses ferrugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout. Point calleux, côte, nervures noirs.

♂ *Nigra, albo-cinereo-villosa; femoribus posticis, crassis dente basi armatis, tibiis posticis crassis, valgis excavatis, dente acutissimo externè armatis.*

Long. : — Corps 10 mm.; Ailes 8 mm.

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, joues, une ligne transversale au-dessous du chaperon, chaperon, à l'exception des côtés et du petit bord inférieur, labre, sauf deux petits points noirs de chaque côté en haut, base des mandibules jaunes. Poils de la face blanchâtres. Corselet en dessus hérissé de poils cendrés, blancs en dessous et sur les

côtés. 1^{er} segment de l'abdomen recouvert de poils cendrés, les suivants de poils noirs, ceux de l'anus ferrugineux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils blancs assez large, sauf au 1^{er}, où elle est à peine marquée. Poils des pattes blancs, tarsi ferrugineux. Cuisses postérieures épaisses, munies à leur base d'une, quelquefois de deux petites dents obtuses. Jambes postérieures épaisses, contournées, portant un appendice qui commence à la base, reste adhérent jusqu'à l'extrémité de la jambe et se termine par un long ongllet très-aigu. 1^{er} article des tarsi postérieurs long, mais sans dent ni épine.

Afrique (Pontéba), Brest, Montpellier.

Collection Siehel, Dours.

La pubescence de *crassipes* est plus blanche, les tarsi plus ferrugineux que dans *calcarata*.

N° 76. ANTHOPHORA QUADRIMACULATA.

Lep. Saint-Fargeau, T. 11, p. 85, 51, ♀.

APIS QUADRIMACULATA, Panz., Faune Germ., 56, 7, ♂.

APIS VULPINA, Kirby, Mon. Ap. Ang., T. 11, p. 290, 65, ♂ (nec Panz.).

APIS SUBGLOBOSA, Kirb., id., p. 295, 68, ♂.

SAROPODA VULPINA, Smith, Zool., 111, 892, 2, ♂ ♀.

MEGILLA QUADRIMACULATA, Fab., Syst. Piez., p. 331, 14.

Nylander, Ap. Bor., p. 244. Eversm., Faune, p. 110, 5, ♀ ♂.

ANTHOPHORA MIXTA, Lep., 11, p. 85, 52, ♂.

ANTHOPHORA VARA? ♂. Lep., 11, 43, 17.

ANTHOPHORA BOREALIS, Mor., Bull. de Moscou, 1864, p. 446.

Long : — Corps 15 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Nigra*, ferrugineo-griseo-hirsuta. Segmentis albido vel fulvos-ubcingulatis. Pedibus cinereo hirsutis.

♀ Noire. Poils de la face, du vertex, du corselet roussâtres, plus pâles en dessous. Tous les segments abdominaux, surtout le premier, hérissés de poils de cette couleur. Bord de tous les segments orné d'une bande de poils plus blancs, étroite au 1^{er} segment. Anus et dessous de l'abdomen garnis de poils un peu ferrugineux. Poils des pattes en dessus cendrés, en dessous noirs-ferrugineux. Tarses de cette dernière couleur. Ailes enfumées vers le bout. Point calleux noir; côte et nervures roussâtres.

Var. 1. Pubescence presque entièrement cendrée. Bord des segments orné de cils blancs, longs, surtout au 3^e et au 4^e.

♂ Long.: — Corps 12 mm ; Ailes 8 mm.

♂ *Facie flavo-nigro-maculatâ. Segmentis albido-ciliato-marginatis. Femoribus intermediis posticisque crassiusculis.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes jaune, ainsi que la base des mandibules, le chaperon, sauf une tache noire de chaque côté de la base et les bords latéraux et inférieurs, qui sont noirs; le labre, sauf un point noir de chaque côté de la base et les bords latéraux et inférieurs, qui sont noirs. Pubescence semblable à celle de la femelle. Cuisses intermédiaires et postérieures un peu renflées.

Var. 1. Pubescence presque entièrement cendrée. Bord des segments comme dans la variété 1 ♀.

France, Algérie.

Collection Sichel, Doubs.

M. Morawitz, in Bull. de Moscou, 1861, p. 446, désigne sous le nom de *A. borealis* une variété de *A. 4-maculata*, qui ne diffère du type que par la couleur noire des tarses, caractère qui se trouve par gradations successives dans les nombreux individus indigènes que nous possédons.

N° 77. ANTHOPHORA TARSATA Sichel.

Long. : — Corps 15 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Nigra, rufo-villosa. Segmentis 1-4 flavo-albido-marginatis. Alæ subhyalinæ.*

♀ Face noire. Chaperon, labre ponctués, une ligne saillante sur le milieu du chaperon. Poils de la face fauves. Corselet en dessus hérissé de poils fauves, mêlés de noirs sur le disque, plus pâles, presque blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils fauves, les autres segments en ont de noirs, courts, plus nombreux sur le 5^e. Bord de tous les segments portant une bande blanche un peu jaunâtre, brillante, unie. En dessous et sur les côtés, les poils sont fauve-pâle. Pattes ferrugineuses, les deux paires antérieures revêtues en dessus de poils cendrés, de ferrugineux en dessous. Les postérieures sont recouvertes de poils d'un fauve noir. 1^{er} article des tarses postérieurs hérissé sur sa surface externe de poils fauves-noirs avec un pinceau de poils noirs à son extrémité. En dessous, les tarses sont ferrugineux-doré. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout. Côte, nervures brunes. Point calleux testacé.

♂ *Femoribus posticis crassis, tibiis subtùs excavatis, externe dentatis; articulo 1^o tarsorum dilatato, duabus spinis, unâ maximâ externâ, armatis.*

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune. Chaperon, labre et mandibules jaunes, sauf deux petits points en haut sur le premier, deux autres sur les côtés du second, qui sont noirs. 6^e segment bordé de blanc comme les précédents.

Cuisses postérieures renflées, hérissées de poils blancs. Jambes creusées en gouttière et prolongées sur le côté externe par une longue épine aiguë. 1^{er} article des tarses de cette paire large, portant sur le bord externe deux épines dont la première est plus longue et très-aiguë. Le dessous de tous les tarses est recouvert de poils dorés, un peu blancs en dessus.

Mexique.

Collection Sichel, Dours.

N^o 78.

ANTHOPHORA VALGA.

MEGILLA VALGA, Klug, 49, 15, 12.

Long. : — Corps 16 mm.; Ailes 12 mm.?

♂ *Nigra, fulvo-tomentosa, capite, thorace abdomineque albido-villosis, capite antice antennarumque articulo 1^o, subtus flavis. Pedibus nigro-piceis, pesticis elongatis, subcompressis, tibiis incurvis tarsorum articulo 1^o, incrassato, trigono.*

♂ *Nigra.* Caput antice flavum, albido-villosum, mandibulis antennisque nigris, illis basi, horum articulo 1^o subtus flavis. Thorax subtus albido-dorso-fulvo-villosus. Alæ hyalinae, apice parum infuscatæ, nervis stigmatæque fuscis. Tegulae testaceae. Pedes nigro-picei, femoribus subtus albido-villosis, tibiis tarsisque extus fulvo-hirtis. Pedes postici longiores, subcompressi, tibiis subincurvis, basis intus nigro-ciliatis. Tarsorum articulus primus incrassatus, trigonus, quintus antecedendibus tribus longior. Abdomen punctatum, albido-pilosum, segmentis apice densius albido-tomentosis, segmento 1^o, insuper basi fulvo-villoso. (KLUG.)

Arabia Deserta.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N^o 79.

ANTHOPHORA TAUREA.

Say, Bost., Journ. Nat. Hist., 1, 409, 1, ♂.

Long. : — Corps 12 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, capite cinerescenti vel flavido-piloso; thorace cinerescenti nigro-fasciato. Abdomine nigro, 1^o segmento nigro cinerescenti-piloso. Segmentorum 2, 3, 4 fasciis albo vel flavido-pilosis. Pedibus ferrugineis nigro-hirsutis. Alæ hyalinæ.*

♀ Noire. Poils de la tête cendrés, mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de poils cendrés, au milieu desquels tranchent trois bandes noires, une transversale en arrière et deux sur les côtés en forme de croissant se regardant par leur convexité, dépassant le point calleux et se rejoignant par leur partie inférieure. 1^{er} segment de l'abdomen revêtu de poils courts, dressés, cendrés; les autres segments en ont de noirs, très-courts, plus longs sur le 5^e et à l'anus, où ils sont légèrement lavés de ferrugineux. Bord des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments portant une petite bande de poils blancs, couchés, à peine apparente sur le premier. Pattes ferrugineuses, hérissées de poils noirs lavés de ferrugineux. Tarses de cette couleur.

♂ *Femoribus posticis crassis, tuberculatis.*

♂ Entièrement semblable à la femelle. 6^e segment ayant comme les précédents une bande de poils blancs. Pattes moins velues. Cuisses postérieures renflées, surmontées sur le bord externe par une apophyse mousse, peu saillante.

Mexique.

Collection Sichel, Dours.

Var. ♀ ♂ *Facie albido-pilosâ; fasciis flavidis.*

N^o 80. ANTHOPHORA MARGINATA.

Smith, Cat., 339, 104.

Long. : — Corps 13 mm.; Ailes 9 mm.

♀ *Nigra; griseo-villosa; segmentis 1-4 flavo-marginatis. Alæ hyalinæ.*

♀ Noire. Chaperon et labre ponctués, le premier ayant sur son milieu une ligne saillante. Poils de la face gris, ceux du corselet en dessus cendrés, ceux du dessous plus pâles. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils gris-cendrés ; les autres segments, le 5^e surtout, en ont de noirs. Bord inférieur des quatre premiers segments portant une bande jaune brillante, presque nue. En dessous et sur les côtés, les segments sont ciliés de poils gris. Poils du dessus des pattes gris, ferrugineux-noirs en dessous. Tarses ferrugineux. Ailes presque transparentes ; côte, nervures, point calleux noirs.

♂ *Femoribus posticis crassis; tarsorum 1^o articulo longiori, convoluto.*

♂ Semblable à la femelle, sauf le dessous du 1^{er} article des antennes qui est de couleur éburnée, ainsi que le chaperon (deux lignes noires sur les côtés), le labre (deux points noirs en haut) et les mandibules (leur bout noir). 6^e segment également bordé de jaune. Anus bi-spineux. Cuisses postérieures un peu renflées ; 1^{er} article des tarses allongé, un peu contourné.

Var. Abdomine cano-tomentoso.

Mexique.

Collection Sichel, Dours.

N° 81. ANTHOPHORA CINCTO-FEMORATA.**Sichel.**

Long. : — Corps 9 mm. (sans la tête), Ailes 7 mm.

♂ *Niger; minor; thorace pedibusque argenteo pubescentibus. Abdomine nigro, forte punctato. Segmentis 3-6 cincto ruleo marginatis. Femoribus posticis crassis.*

♂ Noire, recouverte d'une pubescence argentée sur le thorax et les pattes. Abdomen noir, très-grossièrement ponctué. Segments fortement limités par une ligne saillante, revêtus de poils noirs, courts, épais sur les côtés et à l'anus, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e portant une bande bleue tirant sur le vert. Cuisses, surtout les postérieures, renflées. (La tête manque sur l'individu de ma collection.) Ailes enfumées; côte, point calleux, nervures noires.

Nouvelle-Hollande.

Collection Dours.

N° 82. ANTHOPHORA PYGMEA. Dours.

Long. : — Corps 7 mm.; Enverg. 17 mm.

♂ *Ferrugineus, albedo-tomentosus; femoribus posticis crassissimis, tuberculatis, tibiis posticis excavatis dente levi armatis. 1^o tarsorum posticorum articulo externè uncinato.*

♂ Noire, avec une teinte générale ferrugineuse. Antennes de cette couleur. Chaperon noir, son bord inférieur jaune. Labre et mandibules jaunes, l'extrémité de ces dernières ferrugineuse. Poils de la face blancs, ceux du corselet en dessus cendrés-fauves. Tous les segments abdominaux et l'anus sont hérissés de petits poils cendrés, courts; leur bord inférieur garni d'une bande de poils fauves, couchés, très-courts. Pattes ferrugineuses, couvertes de poils cendrés

très-courts. Cuisses postérieures très-renflées, tuberculées à leur partie interne. Jambes postérieures creusées en gouttière, armées au bord interne d'une petite dent mousse. 1^{er} article des tarses postérieurs long, dilaté à la base, où il forme un crochet saillant sur le bord interne. 2^e, 3^e, 4^e articles de ces tarses très-courts, 5^e article très-long, grêle, terminé par deux petites épines noires. Ailes transparentes. Nervures, côte ferrugineuses. Point calleux testacé.

Mexique.

Collection Bours.

N^o 83.

ANTHOPHORA PILIPES.

Lep. Saint-Fargeau, T. 2. n^o 31.

APIS PILIPES, Fab., Ent. Syst., 11, 326, ♂.

MEGILLA PILIPES, F., Syst. Piez, p. 329, 6.

Nylander, Rev., p. 266, 3, ♀.

ANTHOPHORA HIRSA, Lat., Gen. Crust. et Ins., T. 4, p. 175.

Evers., Faune, p. 109, 4.

Long. . — Corps 15 mm.; Ailes 12 mm.

♀ *Media, nigra, thorace segmentisque abdominalibus 1, 2 suprâ rufo-pilosis, 2, 3 suprâ pallide rufo-ciliatis, ventralibus cinereo parum nigro-ciliatis, scopâ rufâ.*

♂ *Ore flavo, nigro picto, scapo subtus flavo, tarsi intermedi postice pilis longis nigris fasciculati, primus quintusque depresso dilatati, pilis nigris flabellato-penicillati.*

Maris typici subvarietas. Clipei baseos præterea maculis nigris duabus (Anglia).

♀ Noire. Poils du labre et des mandibules roux. Ceux de la tête, de la partie antérieure du corselet noirs. Thorax en dessus hérissé de poils roux, en dessous de cendrés,

quelquefois mais rarement noirâtres. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils roux, les suivants de noirs; ceux de l'anus roussâtres. Bord postérieur des 3^e et 4^e segments garni de cils cendrés, moins apparents au 1^{er} segment. Côtés de l'abdomen ayant des cils cendrés. En dessous, les bords des segments sont garnis de poils roux, rarement noirâtres. Poils des pattes roux en dessus, surtout aux postérieures, où ils sont ferrugineux et épais. Ces poils sont noirs en dessous, excepté au 1^{er} article des tarses, où ils redeviennent ferrugineux-brun. Ailes limpides. Côte, nervures noirâtres ou noires.

Commune partout.

Var. 1. Rufa. Tous les segments abdominaux hérissés de poils roux.

Amiens.

Var. 2. Segments abdominaux 1, 2, 3 hérissés de poils roux ♀ ♂.

Amiens.

Var. 3. Segments abdominaux hérissés de poils cendrés, tirant à peine sur le roux (Var. squalens) ♀ ♂.

Amiens.

Var. 4. *Anthophora capillipes*, Sichel ♀ ♂. Duplo minor. An subvarietas varietatis n° 1? Duplo minor, nigra, rufo hirta. (Bar.)

Le mâle n'a pas de point blanc à la base des mandibules.

Collection du Dr Cartereau.

♂ Lep.

APIS RETUSA, Kirby, Mon. Ap. Angl., T. 2, p. 296, n° 69.

♂ 1^{er} article des antennes en dessous blanc-jaunâtre. Chaperon de cette couleur, son bord inférieur, une tache, parfois une longue bande de chaque côté noirs. Labre blanc-

jaunâtre, avec une tache noire au côté externe de sa base. Joues blanc-jaunâtre, un point de cette couleur à la base des mandibules, qui sont noires. Poils de la face blancs, ceux du sommet de la tête roux mêlés de noirs; ceux du corselet roux, en dessous blancs. 1^{er}, 2^e segments abdominaux hérissés, roux; les autres segments garnis de poils noirs. Quelques poils plus pâles indiquent comme dans la femelle le bord des 2^e et 3^e segments. Poils des pattes antérieures d'un roux pâle, des intermédiaires roux, ainsi que ceux du dessus des cuisses et des jambes; ces poils sont bruns en dessous. 1^{er} article des tarsi intermédiaires dilaté, aplati, avec quelques poils blancs à la base et des cils noirs sur les tranches, ces cils serrés et courts sur la partie antérieure, clairs et très-longs sur la partie postérieure. 2^e, 3^e, 4^e articles très-longuement ciliés de poils noirs. 5^e article garni d'un pinceau de poils noirs. Poils des pattes postérieures noirs, excepté sur la tranche postérieure, où ils sont blancs. Dessous du 1^{er} article des tarsi postérieurs ferrugineux.

Au premier printemps sur toutes les labiées.

Le mâle, avant l'accouplement, vole autour de la femelle. « *Femina assiduus comes, quam dum nectar florum sugit, lætus circum volat.* » Kirby, T. 2, p. 298.

Evers., Fn., p. 440, Fas. 3, n^o 4, dit., ♂. « *Mandibulæ nigrae, rarius puncto minuto flavo-signatae.* » C'est le contraire dans les nombreux mâles provenant de France, Corse, Alger, Corfou. Un seul mâle sans point blanc à la base des mandibules.

(Amiens.)

TABLEAU
DES
VARIÉTÉS DE L'ANTHOPHORA PILIPES, F.

d'après M. le Dr Sichel.

♀ ♂ Varietas typica vel α . Rufo-hirta, abdominis segmentis 3^o et sequentibus nigris.

Très-commune à Paris. Cette variété et la suivante offrent déjà souvent une teinte grisâtre des poils roux.

♀ ♂ Var. β . Segmento 3^o-4^oque rufo vel rufescenti hirta.

Très-commune à Paris.

♀ ♂ Var. γ . Varietati typicae conformis, at cinerescenti-hirta.

Très-commune à Paris. Le mâle de Sardaigne dans la collection de M. Saussure, à Genève.

♀ Var. δ . Conformis varietati γ , at segmentis 1-3 cinerescenti-hirtis.

Souvent on voit déjà des poils grisâtres sur le 4^e segment, ce qui forme le passage à la variété suivante. Assez commune à Paris, mais beaucoup moins que les trois variétés précédentes. Le 3^e segment est quelquefois noirâtre, ce qui constitue un passage qui ramène cette variété au type. De pareilles fluctuations sont fréquentes et nombreuses entre toutes les variétés de cette espèce, et entre les variétés des espèces de tous les genres en général, surtout quand il s'agit d'espèces riches en individus.

♀ Var. ϵ . Segmento 4^o-5^oque cinereo vel cinerescenti-hirta, interspersis interdum pilis nigris (ut et interdum in segmentis 1-3).

Souvent tous les poils tournent au roux, et le 5^e segment seul

reste noir, quelquefois même seulement au bout. Cette variété se trouve en Danemark, Piémont et France. Les individus de France sont ordinairement moins roux, un peu plus grisâtres. Cette variété semble avoir quelque analogie avec l'*A. vetula*, Evers., 1, 7. Le mâle de cette espèce n'existe pas à Paris, nous ne l'avons vu que de Naples et de Chypre.

♀ Var. ζ. Thorax vel caput cum thorace plus vel minus nigro-hirtum. Interdum corpus quoque nigrescit.

Cette variété, remarquable par la teinte brun-noirâtre ou noirâtre, surtout des poils du thorax, se trouve à Paris tantôt en individus isolés, tantôt en colonies entières formées seulement par des femelles. Je n'en ai vu qu'un seul mâle de Chypre, dont les poils noirâtres, d'une teinte moins foncée, occupaient en même temps tous les segments d'une manière égale, ce qui la ramenait à la variété précédente.

♀ Var. η. Conformis varietati ζ, at thorace et scopà rufis, segmento tertio subrufescenti.

Un seul individu mâle de la collection de M. Drewsen, à Copenhague, sous le nom d'*A. cornuta*. *Germania*.

♀ ♂ Var. θ. Tota cinerescens.

Femelle de Lisbonne, mâle de Bordeaux. Collection Drewsen. Quelques mâles de différentes régions méridionales de France et d'Europe. Est-ce une subvariété de la variété ε?

L'*A. pilipes* se trouve en grandes colonies dans toute l'Europe. Elle niche surtout dans les vieux murs, et aussi dans les terrains un peu secs. On la trouve depuis mars jusqu'au commencement de juillet.

N° 84.

ANTHOPHORA DISPAR.

Saint-Fargeau, Hym., T. 2, p. 56, n° 30, ♀ ♂.

Lucas, Expl. Scient. Alg., 111, 146, 12, Tab. 1, fig. 8.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, cinerescenti-pilosa; abdominis segmentis 1° cinereo, 2° ad quintum nigro-pilosis. Segmentorum 1-4 fasciâ apicali pilorum alborum erectorum, primâ angustiori. Pedibus rufo-pilosis, scopâ aureo-rufâ. Alis sordidè hyalinis, tegulis rufo-piceis.*

♂ *Scapo subtilis, clipeo labroque fere totis, flavis. Abdominis segmentis 2-4 nigro-pilosis, non fasciatis. Tarsorum intermediorum articulis omnibus ciliatis, 1°-5°que flabellatis.*

(SICHEL.)

♀ Noire. Poils de la tête plus ou moins cendrés; ceux du labre roux, ceux du vertex noirs. Poils du corselet en dessus cendrés ou roux, mêlés de noirs au milieu, en dessous blancs-roussâtres. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux ou cendrés, formant au bord postérieur une bande plus étroite, moins apparente, plus intense au milieu qu'aux autres segments, et en général comme avortée. 2^e, 3^e, 4^e segments portant des poils noirs, leur bord inférieur ayant une bande de poils hérissés, blancs. 5^e segment orné de poils noirs, ses côtés fortement ciliés de blancs; poils du dessus de l'anus roux, rarement noirâtres. Dessous de l'abdomen cilié de poils ferrugineux. La brosse des pattes postérieures roux-dorée en dessus, noire en dessous. Les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Ailes limpides, avec une très-légère teinte brunâtre ou un peu sale. Ecaille couleur de poix ou rousse.

Algérie, Sicile, Naples, Toscane, Corse.

Collections Dours, Sichel, Saussure, Olivier, à Bône.

Var. 2. ♀ Poils du métathorax, des côtés du corselet, cils des segments abdominaux fauves. Très-rare.

Collection Dours.

Var. 3. Poils du métathorax et du 1^{er} segment abdominal fauves. Rare.

Collection Sichel.

♂ Noire. 1^{er} article des antennes en dessous, chaperon jaunes. Bord inférieur et côtés de ce dernier noirs. Labre jaune, sauf le bord inférieur et deux points sur les côtés de la base, qui sont noirs. Poils de la face blanc-sale, ceux du dessus du corselet plus cendrés, mêlés de roux sur les côtés, noirs au milieu; ils sont blancs en dessous. Poils du 1^{er} et de la moitié du 2^e segment de l'abdomen hérissés, cendrés, plus ou moins roux; ceux de la partie inférieure du 2^e et ceux des autres segments noirs. Côtés des 5^e et 6^e blancs, ainsi que ceux du dessous de l'abdomen. Poils de l'anus noirs, mêlés de roux. Poils des pattes hérissés, blanchâtres, surtout sur la tranche postérieure. Les cinq articles des tarses intermédiaires ciliés, le 1^{er} et le 5^e aplatis, garnis de poils blancs et noirs. 1^{er} article des tarses postérieurs épais, portant des poils noirs aux deux tiers supérieurs, le tiers inférieur est orné de poils blancs, ainsi que les trois articles suivants.

Var. 2. ♂ Semblable à la variété 2 ♀. Très-rare.

Collection Dours.

Var. 3. ♂ 6^e segment abdominal hérissé de poils blancs. Poils du corselet et du 1^{er} segment très-roux. Rare.

Bône (Algérie), Corse.

Collection Sichel

Var. 4. ♂ Poils du mésothorax en majorité noirâtres.

Bône.

Collection Sichel.

N° 85. ANTHOPHORA NIGRO-CINCTULA. Sichel.

Long. : — Corps 44 mm. ; Ailes 14 mm.

♀ *Nigra, cinerescenti-pilosa; abdominis segmentis 1-2 cinereo, 3° ad quintum nigro-pilosis. Segmentorum 1-4 fasciâ apicali pilorum alborum erectorum, primâ angustiori. Pedibus anterioribus albo, intermediis nigro-ferrugineo-pilosis, scopâ aureorufâ. 1° tarsorum articulo nigro-hirto. Alis hyalinis.*

♀ D'un tiers plus petite que la précédente. Noire; poils de la face, du corselet en dessous blancs; ils sont en dessus cendrés-roussâtres, mêlés de noirs, rares. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils cendrés, plus longs au 1^{er} segment. 3^e, 4^e segments munis de poils noirs. Bord inférieur de tous les segments ciliés de poils plus ou moins cendrés, moins marqués dans le premier, poils des côtés blancs; ceux de l'anus cendrés-roussâtres, ainsi que ceux du dessous de l'abdomen. Pattes antérieures ayant des poils cendrés en dessus. Jambes postérieures ornées d'une magnifique *brosse ferrugineuse*. En dessous, les pattes sont noires, ainsi que tous les articles des tarses postérieurs en dessus et en dessous. Ailes diaphanes. Côte et nervures brunes.

Mâle inconnu.

Algérie, France.

Collection Sichel, Dours

Var. 1. Poils du métathorax, des côtés du corselet, du 1^{er} segment abdominal roux-cendrés.

N° 86. ANTHOPHORA RUTILANS. Dours.

Long. : — Corps 47 mm ; Ailes 12 mm.

♂ *Magna, nigra, rufo-villosa. Tarsis intermediis, pilis rufis ciliatis, 1° longioribus, hocque articulo nigro-penicillato. Alis sordidè hyalinis.*

♂ 1^{er} article des antennes en dessous jaune, ainsi que le chaperon et le labre, à l'exception de deux points à la partie supérieure, qui sont noirs. Poils de la tête, du corselet, des deux premiers segments abdominaux et des pattes d'un ferrugineux brillant. 3^e, 4^e, 5^e, 6^e segments abdominaux hérissés de poils noirs. Articles des tarses intermédiaires garnis de poils longs, ferrugineux, surtout au premier, qui porte en outre sur son bord externe un pinceau aplati de poils noirs. Ailes un peu enfumées.

Chypre.

Collection Sichel, Dours.

N^o 87. ANTHOPHORA PYRALITARSIS. Dours.

Long. : — Corps 13 mm ; Ailes 12 mm.

♂ *Nigra, fulvo-cinereo-villosa. Metatarsis intermediis ferrugineo, 1^o, 5^o nigro-penicillato-ciliatis. Alis sordide hyalinis.*

♂ Noire. 1^{er} article des tarses en dessous jaune. Chaperon de cette couleur, son bord inférieur, ses côtés, deux larges taches au sommet noirs. Labre jaune, sauf deux petits points noirs à sa base. Mandibules noires. Poils de la face et du dessous du corselet cendrés-blancs. Corselet en dessus, 1^{er} segment de l'abdomen hérissés de poils d'un roux sale; les autres segments recouverts de poils noirs. Poils des pattes cendrés-noirâtres. Tarses des pattes intermédiaires ferrugineux, ciliés de poils de cette couleur au 2^e, 3^e, 4^e articles, de noirs au 1^{er} et au 5^e, formant sur ce dernier un petit pinceau. Ailes un peu enfumées. Point calleux, côte et nervures noirs.

Femelle inconnue.

New-York.

Collection Dours.

N° 88. ANTHOPHORA PENNATA.

Lep. Saint-Fargeau, T. 2, n° 32.

A. NIGRO-FULVA, Lep., T. 2, n° 55.

Long. : — Corps 15 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, ferrugineo-villosa, capitis thoracisque pilis nigris intermixtis. Alis sordidè hyalinis.*

♀ Noire. Poils de la face, du dessus de la tête ferrugineux, mêlés de noirs, ceux du labre et des mandibules roux; ceux du dessus du corselet et des côtés ferrugineux. En dessous, les poils sont plus ou moins blancs ou noirâtres. Tous les segments de l'abdomen en dessus hérissés, roux, bruns en dessous. Les bords postérieurs des segments à peine visibles, ciliés de poils plus pâles. Poils des pattes antérieures roux pâles, ferrugineux sur le dessus des pattes postérieures. Le dessous de toutes les pattes est garni de poils noirs. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires.

♂ *Tarsorum intermediorum 1^o-5^oque articulis nigro-penicillatis.*

♂ 1^{er} article des antennes en dessous blanc-jaunâtre. Chaperon de cette couleur; son bord inférieur, ses côtés, deux points au sommet, noirs. Labre blanc-jaunâtre, avec deux petits points noirs à sa base. Jones blanches jaunâtres. Mandibules noires dans le type, ornées d'un point blanc à leur base dans la variété. Poils de la face et du dessous du corselet, des côtés de l'abdomen en dessous, blancs. Corselet en dessus et sur les côtés hérissés de poils ferrugineux mêlés

de noirs. Tous les segments abdominaux hérissés de poils ferrugineux. Poils des pattes antérieures blancs. 1^{er} article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, avec quelques poils blancs à sa base, et des cils noirs sur les tranches, serrés et courts sur l'antérieure, plus clairs et très-longs sur la postérieure. 2^e, 3^e, 4^e articles ciliés postérieurement de longs poils noirs. 5^e article orné d'un pinceau de poils noirs. Poils des pattes postérieures en dessus et en dessous noirs, excepté ceux de la tranche postérieure des jambes, qui sont cendrés.

Algérie, Corfon, Syra, etc.

Collection Sichel, Dours

Variété 1. Les mandibules chez le mâle ont à leur base un point blanc-jaunâtre.

Var. 2. *A. nigro-fulva*, Lep., T. 2, 55, ne diffère du type que par les poils noirs plus nombreux de la tête et de la partie antérieure du corselet.

NOTE. L'*A. pennata*, Lep., femelle, est très-difficile à distinguer de l'*A. ferruginea*, Lep., 45, quand on ne prend pas les deux sexes ensemble. L'*A. pennata* a, comme le dit Lep., les poils de l'abdomen hérissés; mais parmi nos *ferruginea* femelles prises avec les mâles à Malaga et à Oran, il y en a dont les poils de l'abdomen sont plus ou moins couchés. Parmi les nombreux *pennata* femelles et mâles envoyés de Bône par M. Olivier, il s'est trouvé un seul mâle de *ferruginea* qui n'avait pas les poils plus sensiblement couchés que *pennata* mâle. La couleur des poils de la tête et de l'abdomen varie à peu près de même (?) chez les deux espèces. L'*A. ferruginea* présente à Malaga une variété nombreuse en individus, dont les poils sont plus pâles et plus couchés.

N^o 89. ANTHOPHORA HISPANICA. Fab.* ♀ ♂.

APIS HISPANICA ♂, Fab., Ent. Syst., 318, 17.

Nec Panz., Fn., 55, 6, ad *A. retusam* ♂. L., nobis pertinens.

MEGILLA HISPANICA, Fab., Syst. Piez, 328, 1.

Illig., Mag. V, 139, 13, excluso *Apidis palmipedis* ♂ Rossisynonymo, ad *A. retusam* ♂. L., spectante.

ANTHOPHORA HISPANICA, Lep., T. 2, 55, 29.

Lucas, Alg., 111, 146, 11.

Nec Evers., Fn., 108, 3, ad æstivalem pertinens

Smith, Cat. 11, 328, 41.

♀ 1, ♂ 2. Oran.

Collection Siehel.

♂ Bône, Ponteba (Algérie), Espagne, Portugal. Collection Siehel, Doubs.

♀ Var.? *Minor, brevior, latior. Thoracis abdominisque baseos cinerescenti-hirto. Forsan alia species.*

Dalmatie.

Collection Siehel.

♂ Var. *Pilis non ferrugineis sed rubro-ferrugineis.*

Algérie.

Collection Lucas.

♀ Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 15 mm.

Magna, nigra, nigro-hirta; thoracis baseosque abdominis dorso rufo vel ferrugineo-hirto. ♀ scopâ tibiali nigrâ, pilis ferrugineis mixtâ. ♂ tarsorum intermediarum extûs fasciculo pilorum nigrorum subsemilunari, cochleariformi, suprâ convexiusculo.

♀ Noire. Poils de la tête noirs, surtout à la partie postérieure; quelques poils roux sur la face. Corselet en dessus et sur les côtés couvert de poils tantôt roux, tantôt ferrugineux-noirs en dessous. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils de cette couleur; 3^e, 4^e, 5^e segments por-

tant des poils noirs, un peu ferrugineux sur les côtés. Poils des pattes noirs, brosse noire avec des reflets ferrugineux. Quatre derniers articles des tarses bruns ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures et point calleux bruns.

♂ Long : — Corps 24 mm ; Ailes 13 mm.

♂ 1^{er} article des antennes en dessous, chaperon, labre jaunes. Deux points noirs à la partie supérieure du chaperon et du labre. Poils de la face blanchâtres, ceux du vertex et de la partie postérieure de la tête, noirs. Corselet et les deux premiers segments abdominaux, en dessus, couverts de poils tantôt roux-cendrés, tantôt très-ferrugineux, surtout sur les côtés, noirs en dessous. 3^e, 4^e, 5^e, 6^e segments noirs, garnis de quelques poils blanchâtres sur les côtés. Pattes noires, à l'exception des tarses, qui sont ferrugineux. Cuisses intermédiaires garnies de longs poils noirs. Les quatre premiers articles des tarses intermédiaires portent sur la tranche extérieure une magnifique touffe de poils noirs en éventail, bombée en dessus en forme de coquille et allant en décroissant du premier au quatrième.

N^o 90. ANTHOPHORA RYPARA (1). Dours.

♀ *Magna, nigra, cinereo vel fulvo-hirsuta. Thoracis baseosque abdominis dorso cinereo vel fulvo-hirtis. Segmentorum 2, 3, 4 fasciâ albido-griseâ. Ano, scopâque tibiali ferrugineâ. Alis sordidè hyalinis.*

Long. : — Corps 20 mm.; Ailes 14 mm

♀ Noire. Chaperon ponctué. Poils de la face fauves cendrés, mêlés de noirs sur le vertex, de ferrugineux à la base du chaperon et des mandibules, qui sont de cette

(1) Ρυπαρος, sale.

couleur à la base et au sommet. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de poils fauves, un peu plus pâles en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils fauves; les autres segments en ayant de plus pâles, de plus courts, surtout sur les côtés et en dessous, où ils sont tout-à-fait d'un blanc sale. Anus garni de poils ferrugineux. Pattes hérissées de poils d'un ferrugineux noirâtre. Brosse toute ferrugineuse. 1^{er} article des tarses postérieurs noir, les autres ferrugineux. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Mâle inconnu.

Très-voisine de la précédente.

Afrique.

Collection Dours.

N^o 91. ANTHOPHORA PERSONATA.

Illig. Mag., V, 22.

Ill. Wappl., Reise, p. 209.

Evers., Faune, p. 107, n^o 1, ♀ ♂.

ANTHOPHORA FULVITARSIS, Lep., T. 2, p. 62, n^o 34, ♀ ♂.

A. FULVITARSIS, Brullé, Voy. en Morée, p. 329, n^o 335, ♀ ♂.

A. NASUTA, Lep., T. 2, p. 66, n^o 36.

A. EPHIPPIMUM, Lep., T. 2, 67, 37, ♀ ♂?

A. AFFINIS, Lep., T. 2, 61, 33. — Brullé, Voy. en Morée, 736.

A. SCOPIPIES, Klug, Symb. Phys., Déc. V, Tab. 49, fig. 1 ♂, 2 ♀?

Long.: — Corps 20 mm.; Enverg 34 mm.

♀ *Cano-hirsutâ, abdominis segmentis cano-ciliatis, cingulatis; clypeo flavo, sarothro fulvo.*

♀ Noire. Mandibules noires. Chaperon et labre jaunes,

sauf deux taches plus ou moins grandes à la partie supérieure du premier et deux points sur les côtés du second, qui sont noirs. Corselet en dessus et en dessous, 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen recouverts de poils d'un blanc sale, mêlés de roux. 3^e, 4^e, 5^e segments hérissés de poils noirs beaucoup moins denses. Bord inférieur des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments portant une bande de poils blancs, peu distincte sur le premier, plus ou moins large sur les autres. Bord inférieur du 5^e segment et anus hérissés de poils ferrugineux. En dessous, les segments ont des cils blancs sur les côtés, ferrugineux au milieu. Poils des pattes roux, mêlés de blancs sur les antérieures, Ailes un peu enfumées. Nerves, côte ferrugineuses tirant sur le noir.

Algérie, Grèce, Espagne, Corse, France, Amiens, d'où je l'ai souvent obtenue par éclosion. Collection Sichel, Dours.

NOTA. L'*Anthophora nautica*, Lep., est une espèce méridionale qui ne se distingue du type que par sa robe ferrugineuse. Les nombreux individus de ma collection, provenant de l'Algérie, de la Grèce, de Montpellier, des environs de Paris, d'Amiens, présentent les diverses nuances de la pubescence qui, chez les premiers, est foncièrement ferrugineuse, gris-fauve chez les derniers.

VAR. *a*.

ANTHOPHORA EURIS. DOURS.

Face entièrement noire, sauf deux petits points jaunes situés, le premier sur la partie inférieure et médiane du chaperon, le deuxième sur la partie supérieure et médiane du labre.

Dans cette variété, les cils blancs qui bordent les segments abdominaux sont plus larges que dans le type.

Algérie, Grèce.

Collection Sichel, Dours

Subvar. *a.* Pas de tache jaune sur le chaperon. Un très-petit point sur le milieu du labre, en haut.

Subvar. *b.* Face noire immaculée.

A. AFFINIS, Lep. T. 2, , 61, 53. Brullé, Voy en Mo:ée, 756.

♂ *Tarsis intermediis nigro-penicillatis, penicillis distichis.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, face, base des mandibules jaunes. Deux petits points noirs sur les côtés du labre, celui-ci séparé du chaperon par une ligne noire. Entièrement recouverte de poils cendrés, mêlés de roux sur les côtés. Bande du 1^{er} segment peu apparente, celle des autres segments cendrée, brillante chez les individus nouvellement éclos. Poils des pattes d'un roux pâle. 1^{er} article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, cilié sur ses deux tranches de poils noirs et ferrugineux, ceux-ci plus longs s'étendant aussi sur les 2^e, 3^e, 4^e articles. 5^e article orné d'un pinceau de poils noirs.

Collection Siehel, Bour.

Nora. La robe du mâle provenant de l'Algérie ne varie pas autant que celle de la femelle.

Var. *b.* *A. squalens*. Uniformément recouverte de poils d'un roux sale. Bande des segments abdominaux formée de cils de cette couleur, mais plus pâles.

Obtenue d'éclosion en mai 1866.

Amiens.

Collection Bour.

NOTE. ♀ ♂ Variant clipeo plus minus vel flavo, vel nigro-picto, segmentis abdominalibus nigris vel plus minus rufescentibus, tarsorum epidermide plus vel minus rufa. Feminae tibiæ posticarum scopâ fulvo vel interdum albido-subargenteo-pilosâ.

A. affinis, Lep., 33, est varietas *Algiriensis*, capite thoraceque magis rufescentibus, abdomine magis nigrescenti.

A. ephippium, Lep., n° 67, 37?

A. scopipes, Klug, forsan est varietas, fusco-rufescens, abdomine magis nigro, minus albido-ciliato.

A. personata, ♀ ♂, in Asiâ occidentali (Persiâ, Asiâ minori?) frequens. (SICHEL.)

N° 92. ANTHOPHORA ARIETINA. Dours.

Long.: — Corps 20 mm ; Enverg. 54 mm.

♂ *Niger, fulvo-tomentosus; facie flavâ, immaculatâ, abdominis segmentis 1-2 fulvo-hirtis, reliquis nigris; fasciis 2-6, sordidè albo-ciliatis. Tarsorum intermediarum articulo primo fulvo-fasciculato, ultimo nigro-penicillato. Alæ hyalinæ.*

♂ Noire. Chaperon très-bombé; devant du 1^{er} article des antennes, face, mandibules (le bout noir) jaunes, cette couleur tourne souvent au rouge. Bord inférieur du chaperon, deux lignes suturales, deux points noirs sur les côtés du labre, en haut, noirs. Poils de la face, surtout ceux du labre, blancs. Poils du vertex, du corselet fauves, mêlés de noirs sur le disque, un peu plus foncés sur les côtés. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils fauves dressés, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e en ont de noirs, courts, rares. Bord des segments 1-6 ciliés de poils d'un blanc sale, s'étendant sur les côtés et en dessous. Poils des pattes fauves; 1^{er} article des tarses intermédiaires un peu aplati, orné d'un faisceau de poils fauves, mêlés de noirs; dernier article des tarses de cette paire garni d'un pinceau de poils noirs. Ailes transparentes. Nervures, côte noires, quelquefois ferrugineuses.

Algérie.

Collection Dours.

Ce n'est bien certainement qu'une remarquable variété de l'*A. personata*.

N° 93. ANTHOPHORA INTERMEDIA.

Lep., T. 2, p. 64, n° 35, ♀.

A. ZONATA, Brullé, Voy. en Morée, p. 331, n° 737, fig. 3, Tab. 48.

A. HISPANICA, Evers., Faune, p. 108, n° 3.

A. INTERRUPTA, L. Duf., in litteris, 3231.

MEGILLA HISPANICA, Fab., Piez, 3281.

— Illig., 13, ♂.

APIS ÆSTIVALIS, Panz., Fn., 81, 21.

— Illig., 24, ♀.

Long. : — Corps 17 mm ; Enverg. 22 mm.

♀ *Nigra, griseo aut fulvescenti hirsutâ. Thorace nigro fasciato; abdominis segmentis 2-4 albo vel cinereo, vel fulvescenti ciliatis. Pedibus externe albido, vel ferrugineo-pilosis.*

♀ Noire. Poils de la face, du corselet en dessus, des deux premiers segments de l'abdomen roux. Une bande de poils noirs derrière les ocelles et sur le milieu du corselet, entre les deux ailes. 3^e, 4^e, 5^e segments noirs. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e portant une bande de poils plus ou moins blanchâtres, parfois interrompue par usure chez les vieux sujets. Bord inférieur du 5^e segment et anus garnis de poils roux-ferrugineux. Poils des pattes roux en dessus, noirs en dessous. 1^{er} article des tarses postérieurs en dessous ferrugineux-clair.

Algérie, France, Amiens.

Collection Siehel, Dours.

L'espèce décrite par Eversmann sous le nom d'*A. Hispanica, æstivalis* Pz., ne diffère du type de Lepelletier que par la pubescence du corps un peu plus pâle, souvent cendrée, et par la brosse formée de poils entièrement ferrugineux.

La variété nommée, par M. L. Dufour, *interrupta*, est tout-à-fait semblable au type. Les bandes des segments sont seulement interrompues au milieu.

Long. : — Corps 14 m m.; Enverg. 22 mm.

♂ *Labro et hypostomate flavis; maculis duabus nigris clypei. Thorace fulvo aut griseo hirsuto; abdominis 1-2 segmentis fulvo aut griseo-hirsutis, reliquis nigris, apice nigro. Tarsis intermediis nigro fasciculatis.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, labre jaunes. Deux grandes taches sur le milieu du chaperon, deux points sur les côtés du labre, noirs. Mandibules noires. Poils de la face blanchâtres, ceux du corselet roux; une bande noire entre les ailes, moins distincte que chez la femelle. 1^{er}, 2^e segments abdominaux hérissés de poils roux plus ou moins ferrugineux, suivant l'âge. 3^e, 4^e, 5^e, 6^e segments hérissés de poils noirs. Les bandes marginales de poils blancs ou roux des segments abdominaux très-retrécies, parfois peu apparentes, si ce n'est sur les côtés. Poils des pattes ferrugineux chez les individus nouvellement éclos, blanc-sales chez ceux qui sont plus âgés. 1^{er} article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, portant un pinceau de poils noirs, festonné sur la tranche externe par des poils grisâtres plus longs. 5^e article un peu renflé, garni de quelques poils noirs, courts.

Grece, Algérie, France.

Collection Sichel, Dours.

N^o 94. ANTHOPHORA QUADRI STRIGATA. Sichel.

Long : — Corps 13 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, rufo-cinereo-villosa. Abdomine albo-tomentoso, fasciis pilis albis longe ciliatis; ano nigro. Pedibus nigris fulvo-hirsutis; scopâ aureâ. Alis hyalinis.*

♀ Noire. Chaperon finement ponctué. Poils de la face cendrés, ceux du labre roux. Mandibules un peu ferrugineuses. Corselet en dessus hérissé de poils cendrés, mêlés de noirs sur le milieu, de roux sur les côtés, de blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen recouvert de poils cendrés mêlés de roux, longs, dressés; les 2^e, 3^e, 4^e en ont de semblables, mais très-courts, pareils à des écailles. 5^e segment et anus noirs, avec une teinte ferrugineuse. Bord de tous les segments orné d'une bande de cils blanchâtres, couchés, très-étroite sur le premier. En dessous et sur les côtés, les poils sont plus longs, blanchâtres. Poils des pattes cendrés, un peu roux. Brosse d'un beau ferrugineux-doré. Tarses de cette couleur, le 1^{er} article portant dans sa moitié inférieure une touffe de poils noirs. Ailes transparentes. Côte, nervures brunes.

Malaga, Algérie (Oran).

♂ *Similis*. 1^o-5^o *tarsorum intermediorum longe penicillatis*. *Pedibus extus albo-hirsutis*.

♂ Semblable à la femelle, à l'exception : dessous du 1^{er} article des antennes jaune; face de cette couleur, sauf deux points noirs sur les côtés du chaperon et deux autres sur les côtés du labre. Pubescence plus cendrée que dans la femelle. 1^{er}, 3^e articles des tarses intermédiaires garnis d'un pinceau de poils noirs.

Envoyé par M. le Dr Sorel.

Algérie (Orléansville).

Collection Dours.

N^o 95. ANTHOPHORA RUBRICRUS Dours.

Long. : — Corps 15 mm.; Enverg. 20 mm.

♀ *Atra, atro-hirsuta, thorace abdominisque 1-2 segmentis albido vel cinereo-hirsutis. Sarothro fulvo.*

♀ Noire. Poils de la face, du corselet en dessus et en dessous d'un gris-cendré sale, plus blancs sur les côtés. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils gris-cendrés; les autres segments noirs. Poils des pattes noirs mêlés de ferrugineux. Brosse formée de poils fauves, presque ferrugineux. Ailes transparentes. Nervures, côte, point calleux noirs.

Grèce.

Collection Siehel, Dours.

♂ *Facie flavâ; tarsorum intermediorum 1^o articulo nigro-fasciculato, ultimo nigro-penicillato.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, une tache près des yeux, une large plaque sur la partie antérieure du chaperon, jaunes. Labre de cette couleur. Mandibules noires. Poils de la face, du corselet en dessus et en dessous, ceux des deux premiers segments abdominaux gris-sale. Poils des autres segments hérissés, noirs. Poils des pattes noirs mêlés de gris. 1^{er} et 5^e articles des tarsi intermédiaires garnis d'un pinceau de poils noirs, courts, serrés sur le 5^e; longs, rares sur le 1^{er} article, où ils affectent la forme de longs cils cendrés. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures noirs.

Grèce (Syracuse).

Collection Dours.

N^o 96.

ANTHOPHORA RETUSA.

♂ Lep., T. 2, p. 69, n^o 38.

Encycl. Méth., T. 10, p. 798, n^o 2.

ANTHOPHORA ACERVORUM, ♀ ♂. Latr., Gen. Crus. et Ins., T. 4, p. 196.

APIS RETUSA, L., Fau. Suec., p. 420. Syst. Nat., 1, 954, 8.

MEGILLA RETUSA, Nyl., Rev. Ap. Bor., p. 265, 2.

Long. : — Corps 15 à 18 mm.; Enverg. 50 à 52 mm.

♀ *Atrâ, hirsutâ; tibiârum posticarum scopâ fulvo-aureâ.*

♀ Noire. Chaperon ponctué. Poils du labre ferrugineux, ceux de la tête, du corselet en dessus noirs. En dessous et sur les côtés du corselet, ils sont lavés de ferrugineux. Abdomen très-finement ponctué, 1^{er} segment hérissé de poils noirs, longs; 2^e, 3^e, 4^e, 5^e ayant quelques poils noirs très-courts. Bord de tous les segments portant une bande de poils couchés, noirs-ferrugineux, très-étroite au 1^{er}, plus brillante au 3^e. Anus ferrugineux. En dessous et sur les côtés, les poils sont ferrugineux-noirs. Pattes ferrugineuses, avec des poils noirs sur les deux premières. Poils des pattes postérieures en dessus et en dessous d'un beau ferrugineux doré. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Les individus provenant des îles de l'Archipel ont la brosse presque entièrement noire, à peine lavée de ferrugineux.

♂ Lep., T. 2, p. 70, n° 38.

APIS HAWORTHANA, Kirby, Mon. Ap. Angl., 11, 307, 70.

Long. : -- Corps 14 à 16 mm ; Enverg. 25 à 28 mm.

♂ *Ater, atro-fulvo-hirsutus. Pedibus intermediis elongatis crinito-pectinatis.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, joues, labre jaunes. Deux larges taches, quelquefois réunies, à la base du chaperon; deux petits points de chaque côté du labre, noirs. Poils de la face cendrés, ceux du labre blancs; ceux du vertex, du corselet en dessus roux, blancs en dessous. Quelques poils noirs sur le milieu du corselet. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils roux, longs sur le 1^{er}, plus courts, moins denses chez le 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e segments revêtus de poils noirs, rares, mêlés de cendrés ou de roux. Base de chaque segment frangée de cils plus pâles.

Anus ferrugineux Cils de l'abdomen en dessous et sur les côtés cendrés. Poils des pattes antérieures d'un blanc sale. 1^{er} article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, garni de longs cils noirs en dedans et en dehors, blancs aux extrémités; 2^e, 3^e, 4^e articles testacés, ayant quelques poils blancs très-courts. 5^e article orné d'un pinceau de poils noirs. Poils des pattes postérieures roux au centre, blanchâtres sur la tranche extérieure. 1^{er} article des tarses postérieurs noir, ferrugineux en dessous, blanc au bout Ailes plus transparentes que dans la femelle.

France, Algérie, Grèce

Collection Sichel, Doubs.

NOTA. Chez les individus âgés, la pubescence, au lieu de présenter une couleur plus ou moins fauve, devient d'un blanc sale. Les éperons, comme dans la femelle, sont tantôt noirs, tantôt testacés.

N^o 97. ANTHOPHORA SENESCENS.

♀ Lep., T. 2, p. 71, n^o 39.

A. 4-CINCTA, Evers., Faune. p. 108, n^o 2.

A. CRINIPES, Smith, Cat., pars 1, p. 324, n^o 20.

Long : — Corps 46 mm ; Enverg. 29 mm.

(La taille varie beaucoup, s'abaissant à plus d'un tiers.)

♀ *Nigra, subrufescence villosa; segmentorum fasciis sordide albido, vel subrufescence ciliatis. Alis hyalinis*

♀ Noire. Poils de la face, du sorselet en dessus gris-roux, plus ou moins mêlés de noirs, roux sur les côtés, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux mêlés de noirs; 2^e, 3^e, 4^e, 5^e segments revêtus de poils blanchâtres, courts, mêlés à des poils noirs plus longs. Base des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments ciliée d'une bande de poils d'un

blanc sale, cette bande peu apparente au 1^{er} segment. Base du 5^e et anus portant des poils roux. Côtés et dessous de l'abdomen garnis de poils gris plus ou moins blancs. Poils des pattes en dessus roussâtres, noirs en dessous. Ailes transparentes. Côte, nervures noires.

Algérie, Grèce, France, Italie.

NOTA. La couleur de la robe varie beaucoup. Tantôt très-fauve (*crinipes*, Smith), presque ferrugineuse, cette teinte s'affaiblit pour ne présenter qu'une nuance d'un blanc sale.

Var. 1. *Canescens*, *sarothro ferrugineo*.

Algérie.

Var. 2. *Ioïdea* (*ἰοειδής*, couleur de rouille).

Corfou

♂ Lep., T. 2, p. 72, n° 39.

♂ 1^o-5^o *que articulo tarsorum intermediarum nigro-pennicillatis*.

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, joues, labre d'un blanc jaunâtre devenant rouge par la vieillesse. Le labre porte de chaque côté de la base deux gros points noirs. Mandibules noires, avec un point jaune à la base. Poils de la face et du corselet en dessous blancs, ceux du vertex et du corselet roux, mêlés de noirs. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux, longs, les autres en ont de cendrés, courts, avec quelques noirs plus longs. Bord de tous les segments cilié de poils blancs, plus ou moins roux. Anus noir, bi-spineux. Poils des pattes blanchâtres. 1^{er} article des tarses intermédiaires aplati, garni d'un pinceau de poils noirs. 2^e, 3^e, 4^e articles ornés de quelques poils blancs, courts; le 5^e article porte un pinceau de poils noirs.

Collection Siehel, Doubs.

NOTA. L'*Anthophora 4-cincta*, Evers., appartient bien certaine-

ment à notre *senescens*. C'est une variété à pubescence un peu plus blanche ou grisâtre. Dans la nombreuse série que je possède, on trouve des individus dont le *sarothrum* presque fauve devient par gradations successives blanc-sale. Les poils du corselet passent du roux au cendré en conservant sur le milieu une petite zone noire (*fascia media nigra* d'Evers.)

Le mâle est absolument identique à celui des vrais *senescens*.

Ces diverses transitions se rencontrent dans les environs d'Amiens.

Dans l'*A. crinipes* ♂, les tarses des pattes intermédiaires sont garnis de cils plus longs.

N° 98. ANTHOPHORA PUBESCENS.

Fab., Syst. Piez, p. 377, 21.

Lep., T. 2, 54, 28, ♀.

ANTHOPHORA ELABELLIFERA, Lep., T. 2, 40, 28, ♂.

ANTHOPHORA SQUALIDA, Lep., T. 2, 53, 27.

MEGILLA SELADONIA, Fab., Syst. Piez, p. 334, n° 28.

Long. : — Corps 12 mm. ; Ailes 7 mm.

♀ ♂ *Parva, nigra, rufescenti, cinerescenti-hirta; clipeo labroque* ♀ *eburneo-lineatis, ♂ eburneis, nigro-maculatis, mandibulis nigris. Abdominis segmentorum 1-4 fasciâ tomentoso-cinereo-albidâ; segmentis 2° ad 4 ♀ densissime, ♂ sparse cinereo-albido squammulosis. Ano ♀ rufo vel nigro-piloso.*

♀ Noire. Chaperon et labre très-ponctués, le premier portant vers son milieu une ligne perpendiculaire aboutissant par ses deux extrémités à deux petites lignes transversales, de couleur nacrée ou sulfureuse. Un point de cette

couleur sur le milieu du labre. Milieu des mandibules ferrugineux. Poils de la face, de la tête, du corselet en dessus, cendrés, plus ou moins roussâtres, mêlés de noir sur le vertex et entre les ailes 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés-roux; les autres segments noirs, recouverts de petits poils très-serrés, de couleur cendrée semblable à des écailles de papillon. Bord inférieur de tous les segments ciliés de poils roux ou blanc-sale. Anus ayant quelques poils noirs; ceux des côtés et du dessous de l'abdomen cendrés. Poils des pattes roux-blanchâtre. Tarses ferrugineux. Ailes à peine enfumées. Point calleux, côte et nervures bruns.

♂ *Tarsorum intermediarum articulis 1 ad 5 piloso-penicillatis. 1^o posticorum tarsorum dilatato dente acuto externe armato.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes de couleur nacrée, ainsi que le chaperon et les joues. Bord inférieur et côtés du chaperon noirs. Labre de couleur nacrée, à l'exception de deux taches noires arrondies, situées de chaque côté de la base. Mandibules noires. Poils de la face, de la tête, du corselet en dessus et sur les côtés recouvert de poils cendrés, roussâtres. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils roux; les segments suivants, noirs, recouverts de poils cendrés très-serrés, semblables à des écailles de papillon, rares au deuxième. Bord inférieur de tous les segments cilié de poils cendrés, peu visibles au premier. Anus échancré, ses deux angles postérieurs formant chacun une petite dent. Poils des pattes blancs. Tarses intermédiaires ayant leur premier et dernier articles ciliés de chaque côté de poils noirs mêlés de cendrés. 1^{er} article des tarses postérieurs un

peu dilaté, portant sur le tranchant externe une petite dent, et garni de poils ferrugineux

France, Algérie, Corse,

Collection Siehel, Dours.

N° 99. ANTHOPHORA VILLOSULA.

Smith, Cat., p. 338, n° 97.

Long. : — Corps 14 mm.

♂ *Niger; rufo-cinereo-rillosus. Tibiis intermediis elongatis. 1° et 5° tarsorum intermediarum nigro-rufo-penicillato-ciliatis.*

♂ Noire. Poils de la tête et du corselet blanchâtres, avec une teinte fauve. Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, labre et mandibules jaunes. Une large tache ronde, noire de chaque côté de la base du chaperon; deux points ferrugineux sur le labre et sur le sommet des mandibules. Abdomen hérissé de poils blanchâtres; bord de chaque segment portant une bande de poils un peu roux. Jambes intermédiaires allongées; 1^{er} article des tarses épais, orné ainsi que le 5^e d'un petit pinceau de poils roux, mêlés à des cils plus pâles et plus longs. Ailes transparentes. Côte, nervures, point calleux bruns

Nord de la Chine.

Ex Smith

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

N° 100. ANTHOPHORA VENTILABRIS.

Lep., T. 2, 72, 40, ♂

Long. : — Corps 19 à 20 mm.; Ailes 12 mm.

♀ *Magna, nigra; capite, thorace, segmentisque 1, 2 rufo-*

cinerescentibus. Pedibus nigris, extus fulvo-pitosis. Alis fumatis.

♀ Noire. Face noire, rugueuse, ponctué, recouverte de poils cendrés. Quelques poils ferrugineux sur les côtés du labre. Corselet en dessus hérissé de poils cendrés, noirs au milieu, roux sur les côtés et sur le métathorax. 1^{er}, 2^e segments abdominaux hérissés de poils roux-cendrés; les autres segments ont des poils noirs, rares, courts. 5^e segment noir avec des poils ferrugineux au bout. Chacun des segments porte une bande étroite de poils cendrés, quelquefois blancs, qui se continuent sur les côtés. En dessous, les segments sont hérissés de poils roux. Poils des pattes blanchâtres sur les antérieures, roux-ferrugineux sur les autres. Tarses bruns-ferrugineux. Ailes enfumées. Côte, nervures brunes.

♂ *Ultimo tarsorum intermediarum articulo nigro, breviter penicillato.*

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes jaune. Chaperon, labre, pourtour interne des orbites jaunes. Deux taches noires carrées sur le milieu du chaperon; deux points noirs sur les côtés du labre, en haut. Mandibules noires. Poils de la face blanc-cendrés, ceux du vertex, du corselet en dessous cendré-noirs, roux sur les côtés et sur le métathorax. 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen hérissés de poils roux, très-épais sur le premier. Les autres segments ont des poils noirs, rares, mêlés de cendrés. Le 6^e segment et l'anus ayant quelques poils ferrugineux. Poils des pattes blancs, mêlés de roux en dessus, noir-ferrugineux en dessous. Tarses ferrugineux, le dernier article des tarses intermédiaires orné d'un pinceau de poils noirs.

N^o 101. ANTHOPHORA CONCINNA.

MEGILLA CONCINNA, Klug, 49, 11, 9, ♂.

ANTHOPHORA VESTITA, Smith ♀, 334, 82.

ANTHOPHORA DREWSENI, Sichel.

MEGILLA CROCEA, Klug, 50, 1, 13, ♀.

Long. : — Corps 44 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra* ; *capite thoraceque cinerescentibus. Abdomine fulvo-piloso. Pedibus extus albo, subtus aureo-pilosis.*

♀ Antennes noires, 1^{er} article en dessous un peu lavé de ferrugineux. Chaperon noir; une petite ligne jaune à la partie inférieure, près du bord sutural. Labre noir. Mandibules noires, jaunes à la base et au bout. Face toute entière recouverte de poils blanchâtres. Vertex, corselet en dessus et sur les côtés hérissés de poils cendrés, blancs en dessous, plus pâles sur le métathorax. 1^{er} segment hérissé de poils cendré-roux; chacun des autres recouvert de poils fauves, couchés, tomenteux, plus foncés sur la base, où ils forment des bandes distinctes. Anus noir. En dessous, les segments ont des cils plus pâles. Pattes en dessus recouvertes de poils blancs sur les premières, de poils roux sur les autres. En dessous, ces poils sont ferrugineux-dorés. Eperons de cette couleur. Ailes un peu transparentes. Côte, nervures brunes.

♂ *Ultimo tarso nigro-penicillato.*

♂ Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, labre, mandibules jaunes; celles-ci noires au bout. Face toute entière recouverte de longs poils roux, mêlés de noirs entre les antennes. Corselet en dessus hérissé de poils roux, mêlés de noirs au milieu, de blancs en dessous. 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e seg-

ments de l'abdomen hérissés de poils roux, 5^e, 6^e noirs. Chacun des segments porte une bande de poils plus foncés, couchés. Anus noir, à deux pointes. Pattes en dessus recouvertes de poils blanchâtres, de poils ferrugineux-dorés en dessous, surtout sur les tarses. Dernier article des tarses intermédiaires orné d'un pinceau de poils noirs.

Caferrie.

Collection Siehel, Dours.

Je possède une variété de cette espèce, sous le nom d'*A. Drewsenii*, Siehel, à pubescence roux-cendrée due à la vieillesse.

N^o 102. ANTHOPHORA FULVO-DIMIDIATA.

Dours.

Long. : — Corps 10 mm.; Enverg. 48 mm.

♂ *Parvus, fulvo-nigro-dimidiatus, thorace 1^oque segmento abdominis fulvo, reliquis nigro-pilosis. Pedibus nigris, tarsorum intermediorum ultimo articulo nigro-penicillato. Femoribus posticis subcrassis, tibiis paululùm excavato-concavis. Alis hyalinis.*

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, face, labre jaunes. Deux petits points ferrugineux sur les côtés du labre, en haut. Mandibules jaunes, leur bout ferrugineux. Poils de la face d'un jaune pâle; ceux du corselet en dessus et sur les côtés fauves, blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils fauves; les segments suivants sont noirs. Anus ayant quelques poils ferrugineux et terminé par deux dents aiguës. Pattes antérieures hérissées sur leur tranche externe de poils blancs, de poils fauves sur leur tranche interne. Pattes intermédiaires noires; 1^{er} article de leurs tarses noirs, 2^e, 3^e, 4^e ferrugineux-fauves; dernier article orné d'un pinceau de poils noirs. Pattes postérieures noires, leurs cuisses un peu renflées, jambes creusées en

gouttière. Tarses ferrugineux-obscur. Ailes transparentes. Nervures, côte brunes.

Femelle inconnue.

Béziers (Hérault).

Collection Fairmaire, Dours.

N° 103. ANTHOPHORA ATRO-ALBA.

Lep., T. 2, p. 73, n° 41.

Brullé, Hist. Nat. Iles Can., 111, 84, 9.

Long. : — Corps 15 à 18 mm.; Enverg. 25 à 28 mm.

♀ *Nigra, albo-nigro-villosa. Capitis thoracisque pilis albido-cinerescentibus, hoc nigro-fasciato. Segmentorum fasciis 2-4 albis. Sarothro albo. Alæ subhyalinae.*

♀ Noire. Quelques poils d'un ferrugineux obscur sur le labre et les mandibules. Poils de la face blancs. Une touffe de poils noirs sur le vertex. Poils du corselet en avant, en arrière et sur les côtés blancs. Une large bande de poils noirs entre les ailes. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils blancs; 2^e, 3^e, 4^e, 5^e segments revêtus de poils noirs, rares. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e cilié d'une bande de poils blancs interrompue sur le milieu chez les sujets âgés. Bord inférieur du 5^e segment et anus portant des poils ferrugineux. Cils du dessous des segments blancs sur les côtés, noirâtres sur le milieu. Poils des pattes en dessus blancs, noirs en dessous; ceux du 1^{er} article des tarses en dessous ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires. Point calleux noir.

Var. *a*. Les poils du corselet et du 1^{er} segment de l'abdomen roux, jaunes quelquefois. *A liturata* ♀ ?

Algérie, Italie, Midi de la France, Saint-Sever. La variété *a* de Cannes.

Collection Sichel, Dours.

A. LITURATA ♂, Lep., T. 2, p. 74, n° 42.

Long.: — Corps 16 mm.; Enverg. 28 mm.

♂ 1° articulo tarsorum intermediorum albo-nigro penicillato.

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, face toute entière jaunes, à l'exception de deux larges taches sur les côtés du chaperon et de deux points sur la partie supérieure du labre, noirs. Mandibules noires. Poils de la face, du vertex, du corselet blanc-sale. Quelques poils noirs rares sur le milieu du corselet remplacent la bande qui, chez la femelle, se trouve entre les deux ailes. 1^{er}, 2^e segments abdominaux hérissés de poils cendrés, épais sur le premier. 3^e, 4^e, 5^e segments revêtus de poils noirs, rares; leur bord inférieur portant quelques cils gris-pâle. Poils des pattes de cette couleur. 1^{er} article des tarses intermédiaires dilaté, orné d'un pinceau de longs poils, noirs au centre, blancs sur la tranche externe; les autres articles des tarses intermédiaires sont ferrugineux-pâle, le 2^e, 3^e, 4^e annelés de noirs, avec quelques poils blancs; le 5^e, chez les individus nouvellement éclos, présente quelques poils noirs, courts.

Var. *a*. Les poils de la face, du corselet, des deux premiers segments abdominaux roux, quelquefois même jaune-pâle.

A. liturata, Lep.

Collection Dours, Siehel.

NOTA. In recentioribus, pilis capitis, thoracis et segmentorum 1-2 abdominalium rufo-fulvo-hirsutis, in senescentibus cinereis, vel albo-rufis.

N° 104. ANTHOPHORA PRUINOSA.

Smith, 327, 40.

Long.: — Corps 15 à 14 mm.; Ailes 8 mm.?

♀ *Nigra, fulvo-cinereo-pilosa, 2° segmento albo, 3° apice et 5° nigro-ciliatis.*

♀ Noire. Face, corselet en dessus, 1^{er}, 2^e segments de l'abdomen, dessus des jambes postérieures hérissés de poils cendrés, mêlés plus ou moins de ferrugineux. Vertex, côtés de la tête et dessous tout entier du corps noirs. Pattes d'un noir ferrugineux. Ailes un peu enfumées, surtout au bout. Le 2^e segment de l'abdomen porte une bande étroite de poils blancs, le 3^e et le bout du 5^e en ont une de poils noirs. En dessous, l'abdomen est d'une teinte ferrugineuse noire.

(SMITH.)

Sicile.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)

♂ *Femoribus intermediis elongatis, tibiæ pilis longissimis albis, 1^o articulo antice breviter, postice nigro longissime hirsuto.*

♂ Pubescence semblable, mais plus dense que celle de la femelle. Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, labre jaunes; le chaperon a deux taches rondes à sa base, le labre deux points sur les côtés noirs. Poils des joues et du corselet cendrés. Pattes antérieures et intermédiaires ciliées de poils de cette couleur; cuisses intermédiaires allongées, leurs jambes ciliées de poils blancs en arrière; 1^{er} article de leurs tarses garni de poils noirs, courts en avant, longs en arrière; 2^e, 3^e, 4^e articles testacés.

N^o 105. ANTHOPHORA DIMIDIO-ZONATA. Dours.

Long.:— Corps 15 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, thorace, 1^o, 2^o segmento, pedibus extus fulvo-ferrugineis, 3, 4, 5 nigro-villosis. Alis fumatis.*

♀ Noire. Poils de la face noirs, mêlés de jaunes entre les yeux; ceux du labre ferrugineux. En dessous, les poils sont cendrés, lavés de ferrugineux. Corselet en dessus, 1^{er}, 2^e

segments hérissés de poils ferrugineux brillants; 3^e, 4^e, base du 5^e recouverts de poils noirs. Bord inférieur du 5^e et anus ornés de poils ferrugineux. En dessous, les segments ont des cils de cette couleur. Pattes d'un noir ferrugineux, les antérieures sont garnies de poils cendrés sur leur tranche externe, les moyennes et les postérieures de poils ferrugineux pâles en dessus, de ferrugineux noirs en dessous. Tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes.

♂ 1^o *articulo tarsorum intermediorum nigro-penicillato.*

♂ Poils de la moitié inférieure du chaperon et du labre jaune-cendrés; ceux de la moitié supérieure du chaperon noirs. Vertex, corselet en dessus, 1^{er} segment de l'abdomen hérissés de poils ferrugineux brillants; les autres segments sont hérissés de poils noirs un peu mêlés de cendrés au 6^e et à l'anus. Poils des pattes antérieures cendrés; ceux des intermédiaires et des postérieures hérissés, ferrugineux sur leur tranche externe, noirs-cendrés sur leur tranche interne. 1^{er} article des tarses intermédiaires portant un pinceau de poils noirs un peu fauves au bout; 2^e, 3^e, 4^e articles ferrugineux, ciliés de poils blancs; 5^e article ayant quelques poils ferrugineux, longs. 1^{er} article des tarses postérieurs hérissé de poils noirs, avec quelques-uns de ferrugineux plus longs; base de cet article et des suivants, en entier, ciliée de poils blancs.

NOTA. Il est à remarquer que chez tous les mâles que j'ai eu occasion d'observer, les antennes et la face en entier sont tout-à-fait noires.

Var. *Pilis omnibus grisescentibus.*

Corse, Algérie.

Collection Sichel, Dours.

N° 106. ANTHOPHORA DUFOURII

Lep., T. 2, p. 75, n° 43.

Long. : — Corps 15 mm ; Enverg. 50 mm.

♀ *Nigra, nigro-aneâ ; facie flavo-lineatâ. Capitis thoracis, hoc dorso nigro-fasciato, abdominisque 1ⁱ segmenti pilis rufo-hirsutis ; segmentis 2-5 subviridi-cærulescentibus, 2-3 nigro, 4-5 albo-puberulis, fasciis 2-3 anoque rufo-hirtis. Pedibus extus albido, intus nigro rufoque pilosis. Alæ subfucescentes.*

♀ Noire, avec des reflets blenâtres métalliques sur l'abdomen. Chaperon noir, à l'exception d'une ligne jaune perpendiculaire qui le traverse dans son milieu et rejoint sa base. Labre jaune, deux points noirs sur ses côtés, en haut. Mandibules noires. Poils de la face et du dessous du corselet blancs ; ils sont roux-ferrugineux en dessus et sur les côtés, avec une touffe de noirs sur le milieu, entre les ailes. Abdomen présentant un reflet métallique cuivreux. 1^{er} segment hérissé de poils roux, longs ; 2^e, 3^e portant des poils de cette couleur, courts, couchés, formant sur le bord inférieur une bande très-distincte, mais n'empiétant pas sur le segment suivant. 4^e, 5^e segments et côtés de l'abdomen garnis de poils blanchâtres. Bord inférieur du 5^e et anus ayant des poils ferrugineux-noirs. Poils des pattes en dessus blanchâtres, avec une teinte rousse ; en dessous, ils sont noirs, un peu ferrugineux, surtout à l'extrémité du 1^{er} article des tarses postérieurs. Les quatre derniers articles des tarses sont ferrugineux-pâles. Ailes presque transparentes. Point calleux, côte, nervures ferrugineux.

Grèce, Algérie, Italie, France.

Collection Sichel, Doubs

NOTA. Chez les sujets âgés, la couleur rousse des poils est remplacée par une teinte cendrée.

♂ Lep., T. 2, p. 75, n° 43,

♂ *Labro totoque clypeo et genis cum frontis margine inferè luteis. Abdominis segmentis 2-4 nigro-puberulis, 5-6 rufonigroque mixtis. Pedes postici incrassati; tibiis intus aculeo magno subrecurvo armatis. Tarsorum articulo primo utrinque unispinoso-dilatato. Tarsorum intermediarum articulo primo toto nigro-ciliato.*

♂ Face entière jaune. 2^e, 3^e, 4^e segments abdominaux n'ayant que des poils courts et fins, de couleur noire; ceux du 5^e et du 6^e noirs et roux mélangés. Pattes postérieures renflées; leurs jambes armées à la partie interne d'une grande épine un peu courbe. 1^{er} article de leurs tarses dilaté et comme épineux de chaque côté. 1^{er} article des tarses intermédiaires entièrement cilié de cils noirs.

(Ex Lep. DE SAINT-FARGEAU.)

J'ai reçu, depuis la terminaison de ce travail, une riche série d'Anthophores appartenant à la collection de M. Puls, pharmacien à Gand. J'y ai trouvé les espèces suivantes inédites.

N° 107. ANTHOPHORA COMBUSTA. Dours.

Long. : — Corps 14 mm ; Ailes 11 mm.

♀ *Nigra, facie nigrâ, luteo maculatâ, lineâ in medio nigrâ. Thorace pedibusque nigro-hirtis. Abdominis segmentis ferrugineo-pilosis, pilis stratis.*

♀ Noire. Antennes lavées de ferrugineux en dessous, sauf les trois premiers articles qui sont noirs. Chaperon finement ponctué, noir, à l'exception d'un point entre les antennes, de la partie inférieure et d'une portion des joues, qui sont jaunes. Il existe en outre une ligne saillante sur son milieu. Labre finement ponctué, jaune-ferrugineux vers ses deux tiers inférieurs, noir vers son extrémité supérieure, où se trouvent deux petits tubercules. Mandibules jaune-ferrugineux, noires au bout. Poils de la face, du vertex et du corselet noirs mêlés de roux. Segments de l'abdomen en dessus revêtus de poils ferrugineux, couchés, excepté sur le tiers supérieur du premier, où ils sont noirs. En dessous, les segments sont ferrugineux noirâtres et ciliés de poils ferrugineux. Poils des pattes noirs, longs, rudes. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Egypte.

Collection Puls, de Gand.

N° 108. ANTHOPHORA PYRO-ZONATA. Dours.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm.

♂ *Nigra; facie, thorace pedibusque extus cinereo-villosis. Abdominis 1° et 2° segmentis cinereo-tomentosis, reliquis nigris; fasciis ferrugineis, primâ angustâ, pallidâ.*

♂ Face noire, ses poils ainsi que ceux du corselet en dessus et sur les côtés cendrés; sommet du vertex garni de

poils noirs. 1^{er}, 2^e segments recouverts de poils cendrés, foncés, courts, tomenteux; les autres segments, de noirs courts. Chacun d'eux porte sur son bord inférieur une bande de poils ferrugineux à peine marquée sur le premier. Anus noir. En dessous, les segments sont noirs avec leur bord inférieur ferrugineux. Poils des pattes en dessus cendrés, noirs en dessous. Cuisses intermédiaires et postérieures un peu renflées; tarses ferrugineux, leur 1^{er} article très-long. Ailes presque transparentes. Côte, nervures, point calleux noirs.

Collection Puls, de Gand.

N^o 109 ANTHOPHORA VOLUCELLÆ-FORMIS.

Dours

Long. : - Corps 16 mm.; Ailes 12 mm

♀ *Nigra; thorace nigro-cinereo-dimidiato. Abdomine nigro-hirto, 1^o segmento cinereo, 5^o anoque aureo-vestitis. Scopæ ferrugineo-aureæ. Tarsorum articulis (1^o excepto nigro), ferrugineis.*

♀ Noire. Face ponctuée, garnie de poils noirs, rudes. Labre portant de chaque côté, en haut, deux petits tubercules ronds, brillants, de couleur testacé-clair. Corselet revêtu dans sa moitié antérieure de poils noirs, de poils cendré-jaunâtre dans sa moitié postérieure, ainsi que partout en dessous. Abdomen noir, luisant, ses poils longs, couchés, noirs, avec une légère teinte ferrugineuse, sauf sur le 1^{er} segment, où ils sont cendré-jaunâtre, pareils à ceux du corselet, et sur le bord inférieur du cinquième et à l'anus, où ils sont dorés, brillants. Pattes ferrugineuses recouvertes de poils noirs et de cendrés, surtout aux cuisses. Brosse d'un ferrugineux éclatant. 1^{er} article des tarses noir,

les autres sont ferrugineux-obscur. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Mexique.

Collection Puls, de Gand.

N° 110. ANTHOPHORA PULSELLA. Dours.

Long : — Corps 15 mm. ; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra, cinereo-ferrugineo-hirta; thorace 1^oque segmento cinereo-hirsutis, reliquis nigris, ferrugineo-pilosis. Pedibus nigro-ferrugineis. Scopâ 1^oque tarsorum posticorum articulo villosissimis, ferrugineis.*

♀ Noire. Antennes ferrugineuses, sauf les trois premiers articles qui sont noirs. Poils de la face en dessus et en dessous cendrés, ceux du labre roux. Corselet ponctué, hérissé à sa partie antérieure, latérale et postérieure de poils cendrés un peu jaunes; au centre ces poils sont noirs et se prolongent jusqu'au devant de l'insertion des ailes. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés un peu jaunes; les autres segments ont des poils roux couchés. 5^e segment et anus noirs; en dessous et sur les côtés tous les segments sont ciliés de poils roux. Pattes noires lavées de ferrugineux; poils des deux paires antérieures noir-ferrugineux. Brosse et 1^{er} article des tarses postérieures garnis de poils longs, serrés, d'une couleur ferrugineuse éclatante. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires.

Mexique.

Collection Puls, de Gand.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. Puls, pharmacien à Gand, savant Hyménoptérologiste, qui m'a généreusement permis d'étudier sa riche collection d'Anthophores.

N° 111. ANTHOPHORA HISTRIO. Dours.

Long. : — Corps 12 mm ; Ailes 8 mm.

♂ *Facie nigra, immaculatâ, punctatâ. Thorace primoque*

segmento rufo-luteo-lanatis; segmentis 2, 3, 4, 5, 6 in medio luteo-tomentosis. Ventre cinereo-hirsuto. Pedibus nigris, femoribus intermediis et posterioribus crassis; primo tarsorum articulo longissimo.

♂ Antennes ferrugineuses, sauf les trois premiers articles qui sont noirs. Face noire finement ponctuée, recouverte de poils roux. Poils du corselet en dessus et sur les côtés cendré-roux tirant sur le ferrugineux, surtout en arrière. Poils du 1^{er} segment en dessus et de tous les segments en dessous hérissés, cendrés; tous les autres en dessus noirs. Chacun d'eux porte sur son bord inférieur une ligne de poils jaunes très-courts, couchés, semblables à des écailles de papillon; cette ligne, très-étroite sur le bord du 1^{er} segment, devient plus large mais en même temps plus courte sur chacun des autres. Pattes noires, cuisses intermédiaires et postérieures renflées. Tarses roux, le 1^{er} article très-long. Ailes presque transparentes. Côte, nervures, point calleux de couleur ferrugineuse.

Mexique.

Collection Puls, de Gand.

N^o 112. ANTHOPHORA NIGRO-ÆRUGINOSA.

Dours.

Long. : — Corps 45 mm.; Ailes 40 mm.

♀ *Nigra, nigro-hirsuta. Abdomine nigro-æruiginoso, 5ⁱ fasciâ anoque ferrugineis.*

♀ Antennes lavées de ferrugineux. Poils de la face, de la tête, du corselet hérissés, noirs, assez longs. Abdomen noir, brillant, avec une teinte bleuâtre ferrugineuse. 1^{er} segment revêtu de poils assez longs, noirs, un peu lavés de ferrugineux. Base du 5^e segment et anus portant une touffe de poils

ferrugineux-blanchâtres sur le genou des pattes intermédiaires. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Patrie inconnue.

Collection Puls, de Gand.

N° 113. ANTHOPHORA UNI-STRIGATA. Dours.

Long. : — Corps 13 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra; scapo nigro, flagello ferrugineo. Thorace 1^oque segmento fulvo-hirsutis. 3ⁱ segmenti strigâ albido-subcaeruleâ. Abdomine pedibusque nigris.*

♀ Noire. Antennes ferrugineuses, sauf les trois premiers articles qui sont noirs. Poils de la face cendrés, mêlés de noirs; ceux du labre roux, ils sont blancs en dessous. Corselet en dessus et 1^{er} segment de l'abdomen hérissés de poils roux. Abdomen noir, avec quelques poils de cette couleur sur le 1^{er} segment; base du 5^e ornée d'une petite bande de poils très-courts d'un blanc azuré. En dessous et sur les côtés les segments sont ciliés de poils cendrés. Poils des pattes et du 1^{er} article des tarses noirs; les autres articles des tarses sont ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires. Point calleux testacé clair.

Mexique.

Collection Puls, de Gand.

N° 114. ANTHOPHORA LUTEO-DIMIDIATA.

Dours.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 11 mm.

♀ *Nigra, thorace primoque segmento luteo-hirtis, reliquis nigris; quinti segmenti fasciâ anoque ferrugineis.*

♀ Dessous des antennes ferrugineux, sauf les trois premiers articles des tarses qui sont noirs. Face entièrement jaune, à l'exception d'une plaque triangulaire noire sur le

milieu du chaperon. Mandibules jaunes, leur bout noir. Poils de la face, du corselet et du 1^{er} segment de l'abdomen hérissés jaune-serin. Ces poils forment au-devant des antennes une ligne transverse épaisse, très-saillante. 2^e, 3^e, 4^e segments recouverts de poils noirs très-courts, lavés de ferrugineux. Base du 5^e et anus garnis de poils ferrugineux-obscur. Poils des pattes antérieures et intermédiaires hérissés, jaune-ferrugineux; ceux des postérieures noirs, longs, rudes. 1^{er} article des tarses postérieurs orné d'un pinceau de poils noirs très-épais, un peu lavés de ferrugineux. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Mexique.

Collection Puls, de Gand.

NOTA. Dans cette espèce, les deux premières cellules cubitales sont presque carrées; la première nervure récurrente aboutit au tiers antérieur de la deuxième cubitale.

N^o 115. ANTHOPHORA SIMIA. Dours.

Long.: — Corps 15 mm.; Ailes 10 mm.

♀ *Nigra; capite pedibusque aterrimis. Thorace et 1^o segmento abdominis albo, griseo-villosis. Abdomine nigro, 2^o, 3^oque segmentis in latere niveo-maculatis.*

♀ Noire. Chaperon finement ponctué. Poils de la face et du vertex très-noirs. Corselet en dessus et 1^{er} segment de l'abdomen hérissés de poils blancs ou cendrés, longs. Les autres segments sont noirs, presque nus, si ce n'est sur les côtés et à l'anus. Le 2^e et le 3^e segment sont ornés d'une tache blanche sur les côtés, plus longue sur le 2^e, où elle forme une ligne interrompue au milieu. Poils des pattes longs, épais, noirs, lavés de ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires.

Collection Puls, de Gand.

INCERTÆ SEDIS, MIHI INCOGNITÆ.

ANTHOPHORA APICALIS.

Guérin, Icon. Règne Anim. Ins., p. 455, Tab. 74, fig. 4.

ANTHOPHORA BOMBOÏDES.

Kirby, Faune Bor. Amér., 271, 1

ANTHOPHORA CINERESCENS.

Lep., Hym., T. 2, 51, 25, ♀.

ANTHOPHORA FRONTATA.

Say, Bost., Journ. Nat. Hist., 1, 409, 2, ♂.

ANTHOPHORA INCERTA.

Spin., Faune Chili, VI, 172, 3, ♀.

Antennes, abdomen, pattes noires. Poils de la tête et du corselet en avant fauves pâles.

(Ex SMITH.)

GENUS III.

SAROPODA.

Lat., Gen. Crust. et Ins., Tab. 4, fig. 17 (1800).

APIS, P^{im} Panz, Faune Germ., Fasc. 55, fig. 17 (1800).

ANTHOPHORA, P^{im} Spin., Ins. Lig., Fasc., 1, 127 (1806).

HELIOPHILA, Klug, Illig., Mag. VI (nec Burmann) (1807).

Palpi. { Palpis labialibus 4-articulatis, continuis;
1^o articulo sex longiori secundi, ultimo brevissimo, acuto.
Palpis maxillaribus 4-articulatis; 1^o articulo brevi, crasso; 2^o longiori fusiformi, ultimo brevissimo, cylindrico.

Pl. 1; fig. 1, 2.

Alæ. { Cellulà radiali unicà, rotundatà.
Cellulis cubitalibus 3; 1^a longiori, 2^a versùs radialem coarctatà, in medio primum nervum recurrentem recipiente, 3^a secundum recurrentem nervum recipiente versùs extremitatem.

Tête transverse; ocelles placés en triangle sur le vertex.

Antennes filiformes; 1^{er} article large, plus long que le deuxième, qui est globuleux et très-petit; 3^e article égal au premier, terminé en godet à son extrémité supérieure. Les autres articles sont petits et égaux entre eux.

Labre presque carré, arrondi à ses angles.

Palpes labiaux formés de *quatre* articles se continuant en ligne droite; le premier plus de six fois plus long que le deuxième; le dernier très-petit, terminé en pointe aiguë.

Palpes maxillaires formés de *quatre* articles, le premier court, épais; le deuxième moitié plus long, fusiforme; le quatrième très-petit, cylindrique.

Langue très-longue, fusiforme, un peu pubescente sur toutes ses faces.

Paraglosses courts, atteignant à peine la moitié du 1^{er} article des palpes labiaux.

Mandibules terminées en pointe un peu émoussée.

Une cellule radiale un peu arrondie à son extrémité.

Trois cubitales; la première un peu plus longue que les deux autres; la deuxième rétrécie vers la radiale recevant vers son milieu la première nervure récurrente; la troisième recevant à son extrémité la deuxième nervure récurrente.

N° 1. SAROPODA BI-MACULATA.

Lat., Gen. Crus. Ins., IV, 17.

ANTHOPHORA BIMACULATA, Lep., T. 2, p. 36, n° 11.

APIS BIMACULATA, Panz., Faun. Germ., 55, 17, ♀.

Kirby, Mon. Apum. Angl., T. 11, p. 286, n° 63, ♀.

APIS ROTUNDATA, Panz., Faun. Germ., 56, 9, ♂.

Kirby, Mon. Ap. Angl., T. 2, p. 291, n° 66, ♂.

ANTHOPHORA ALBIFRONS, ♂. Evers., Faune, p. 115, n° 13.

ANTHOPHORA ROTUNDATA, Blanchard, Hist. Nat. Ins., 111, 406.

ANTHOPHORA COGNATA ♀. Smith, Cat., 326, 35.

ANTHOPHORA BIMACULATA, Klug, Illig. Mag. VI, 227.

Long. : — Corps 10 à 11 mm.; Enverg. 15 mm.

Parva, nigra, rufescenti-cinereſcenti-hirta; clipeo ♀, medio apiceque ♂ toto, scapoque ſubtilis, flavis; labro flavo, nigro maculato, mandibulis medio flavis; occipite meſonotique diſco ♀ nigricanti; ♂ rufescenti-piloſis, ♀ abdominis ſegmenti

1ⁱ fasciâ apicali lineari albidâ; 2ⁱ cinereo-squammulosis; 2-4 fasciâ apicali cinerescenti, rufescenti tomentosâ; ano nigro, ♂ abdominis nigri segmentorum 1-5 fasciâ apicali cinereo-rufescenti, tomentosâ; ano cinerescenti albido-piloso, tarsis intermediis simplicibus.

♀ Noire. Corselet, une ligne transversale au dessus, labre jaunes. Deux points noirs, larges, carrés sur les côtés du chaperon; deux petits points parfois peu distincts sur les côtés du labre, en haut, noir-ferrugineux. Mandibules jaunes, leur bout ferrugineux. Poils de la face d'un blanc sale, roux sur le vertex et le corselet en dessus; ce dernier portant sur son milieu un disque de poils noirs. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés-roux; une petite ligne de poils jaunes très-courts limite son bord inférieur. 2^e, 3^e, 4^e segments recouverts de poils jaunes, très-courts, semblables à de petites écailles, formant sur le bord supérieur et inférieur de chacun d'eux une bande que sépare un espace entièrement nu, large sur le deuxième, à peine perceptible sur le quatrième. 5^e segment, côtés et dessous de l'abdomen hérissés de poils cendrés. Anus noir. Pattes en dessus recouvertes de poils cendrés, noir-ferrugineux en dessous. Eperons testacés. Tarses ferrugineux-noir. Ailes transparentes. Point calleux testacé. Nervures, côte brunes.

♂ Long. : — Corps 10 mm.; Enverg. 15 mm.

♂ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes et face toute entière jaunes, sans tache. Mandibules jaunes, leur bout ferrugineux. Poils de la face et du corselet en dessus fauves. 1^{er} segment de l'abdomen hérissé de poils fauves. 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e ayant des poils noirs, courts, rares. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils fauves tirant au

cendré sale. 5^e, 6^e, anus et côtés de l'abdomen recouverts de poils cendrés. Pattes ayant des poils cendrés. Dernier article des tarses noir. Ailes transparentes. Côte et nervures brunes.

Cette description est faite d'après des individus nouvellement éclos. Chez les sujets vieux, la pubescence perd sa teinte fauve pour devenir cendrée.

NOTA. ♀ Recentium clipei basis utrinque maculam nigram quadratam offert, ut pote parte orbitali, nigra quoque, à pilis flavescenti-cinereis obsita. Antennæ subtus plerumque nigrae, rarissime piceae vel rufae.

Oculi in vivis latè viridescunt.

Recentium pili thoracis rufi, multo pallidiores in feminâ at semper mesonoti disci pilis pro maximâ parte nigris.

♂ Thorax segmentumque primum densè latèque rufo-hirtum, admixtis pilis nigris nullis, in feminis senioribus pili thoracis peripherici semper canescunt: in mare omnes thoracis pili, ad multo rariùs.

♀ Segmentorum abdominalium 2-4, rarè 3 detritione tantum, basis nigra nudaque.

♂ 2-6 basis in recentissimis quoque nigra et nigro-trepidosa, fasciis albidis, ultimo latiore. 5ⁱ segmenti excissura analis semicircularis, anusque nigro-pilosa.

♂ Anus suprâ albido-cinereis pilosus.

Nous avons dû être un peu long dans la description de cette espèce, que nous avons refaite entièrement sur de nombreux individus et surtout sur des séries complètes, comme par exemple six femelles, huit mâles pris au bois du Vésinet le 21 juin 1864; trois femelles, trois mâles pris dans la même localité le 8 juillet 1866; huit femelles, douze mâles provenant de Ponteba (Algérie).

La description de M. Lepelletier, faite sur un petit nombre d'individus usés, est conforme à ce que nous avons vu sur des exemplaires semblables. Mais elle est très-imparfaite, fautive et ne peut donner aucune idée de cette espèce. (SICHEL.)

VAR. 1.

SAROPODA SQUALIDA.

ANTHOPHORA SQUALIDA, Lep. Saint-Fargeau, T. 2, 53, 27, ♀.

Long. : — Corps 12 mm.; Ailes 7 mm.

♀ Noire. Face de couleur jaune-éburnée, sauf deux taches noires sur les côtés du chaperon, et une ligne ferrugineuse sur son bord inférieur. Le labre porte aussi sur ses côtés deux points noirs, quelquefois ferrugineux. Mandibules jaunes, sauf à leur bout qui est ferrugineux. Poils de la face, du corselet en dessus hérissés, plus ou moins roussâtres, mêlés de noir surtout entre les ailes; en dessous, ces poils sont blanc-cendrés. 1^{er} segment de l'abdomen revêtu de poils roussâtres à sa base, noirs au milieu. 2^e, 3^e, 4^e, 5^e chargés de petites écailles jaune-cendré allant en s'épaississant du 1^{er} au 5^e, où elles sont tout-à-fait cendrées; ces écailles s'interrompent sur le milieu du 2^e et y sont remplacées par une bande de poils noirs. Bord inférieur de tous les segments orné d'une frange de poils roussâtres qui tournent au ferrugineux sur le 5^e. Côtés de l'anus et pattes revêtus de poils ferrugineux-blanchâtres. Jambes postérieures couronnées à leur extrémité par une touffe de poils noirs atteignant le bout du 1^{er} article des tarses. Ceux-ci sont ferrugineux, revêtus en dessous de poils ferrugineux-doré. Ailes un peu enfumées. Côte et nervures noires.

♂ Noire. Un peu plus petit que la femelle. Dessous du 1^{er} article des antennes jaune-éburné. Face toute entière de cette couleur, sauf deux très-petits points noirs placés sur

les côtés supérieurs du labre. Mandibules comme dans la femelle. Poils de la face et du corselet en dessus hérissés, roussâtres, plus blancs en dessous. 1^{er} segment de l'abdomen revêtu de poils cendrés, plus ou moins mêlés de roux; les autres segments noirs, leur bord inférieur orné d'une bande de poils couchés, plus ou moins cendrés. Anus caréné, bidenté et portant quelques poils ferrugineux. Poils des pattes blanchâtres. Tarses ferrugineux, revêtus, le dessous, surtout au 1^{er} article, de poils ferrugineux-doré.

Var. Poils du corselet et du 1^{er} segment abdominal entièrement roux. Tarses très-ferrugineux.

Algérie, Corse.

Collection Sichel, Dours.

NOTA. Cette variété me semble appartenir à l'*A. bi-maculata*, Lep. Elle n'en diffère que par la couleur de ses tarses postérieurs, qui sont en dessous hérissés de poils ferrugineux-doré.

N° 2.

SAROPODA FULVA.

Evers. Faune.

Long. : — Corps 10 mm.

♀ *Nigra, fulvo-pubescent, abdomine, antennarum flagello, tibiis tarsisque fulvis.*

(EX EVERSMANN.)

Province de Casan.

Je n'ai pas vu cette espèce, qui pourrait bien ne pas appartenir au genre *Saropoda*. La première nervure récurrente se continue avec la ligne d'intersection de la deuxième cubitale, ce qui la rapprocherait de la venulation des *Habropoda*.

N° 3.

SAROPODA TENELLA.

Klug, Symb. Phy. Dec. V, Tab. 50, fig. 6, ♀.

Long. : — Corps 9 à 10 mm.

♀ *Nigra, ore albo, abdominis segmento quinto maculâ fuscâ.*

Capitis clypeus albidus, basi utrinque niger. Labrum albidum. Mandibulæ albidæ apice nigræ. Antennæ fuscæ, subtùs, basi exceptâ, rufæ. Thorax subtùs, marginibusque densiùs villosus. Alæ albo-hyalinæ, nervis tegulisque testaceis. Pedes nigro-picei, albido-pilosi, tarsis latere interno fulvo-aureo-hirtis. Abdomen subtùs piceum, suprâ densè albido-tomentosum, segmento quinto maculâ triangulari fuscâ.

Affinis *S. Byssinæ*.

Egypte.

Ex Klug.

N^o 4.

SAROPODA BYSSINA.

Klug, Symb. Phys., Dec. V, Tab. 50, fig. 4.

Long.: — Corps 10 à 11 mm.

♀ *Nigra, capite antice pallido, abdominis segmento quinto maculâ mediâ, atrâ, tarsis nigro-hirtis.*

Caput albido-villosum, clypeo, labro mandibulisque pallidis, his apice nigris. Antennæ fuscæ, subtùs ferrugineæ. Thorax ubique densè albo-villosus. Alæ albo-hyalinæ, nervis tegulisque testaceis. Pedes picei, femoribus subtùs, tibiis extùs niveo, margine interno tarsisque nigro-hirsutis. Abdomen subtùs piceum, suprâ tomento cretaceo tectum, segmento quinto maculâ magnâ, mediâ, triangulari, velutinâ, fuscâ ornato, sexto fusco.

Egypte.

Ex Klug.

N^o 5.

SAROPODA LUTULENTA.

Klug, Symb. Phy Déc. V, Tab. 50, fig. 5.

Long.: — Corps 10 à 11 mm.

♀ *Nigra, capite antice pallido, abdominis segmentis intermediis dorso transversim nudis.*

Caput albido-postice griseo-villosum. Clypeo, labro mandibulisque pallidis, his apice nigris. Antennæ fusæ, subtus ferrugineæ. Thorax subtus cinereo, suprâ griseo-villosus. Alæ albo-hyalinæ, nervis stigmatique testaceis, tegulæ testaceæ. Pedes albido-villosi, tarsis latere interno fulvo-aureo-pilosis. Abdomen subtus nigro-piceum, suprâ flavescenti-griseo, apice niveo-tomentosum. Segmentum quintum maculâ mediâ fulvo-aureâ ornatum. Segmentum secundum et tertium basi apiceque non nisi tomentosâ lineâ transversâ, flexuosâ, mediâ, nudâ, relutâ.

Egypte.

Ex Klug.

N^o 6. SAROPODA BOMBIFORMIS.

Smith, Cat., p. 318, 6.

Long. : — Corps 13 à 14 mm.

♀ ♂ *Nigra, fulvo-villosa; facie flavo-albida vel ferrugineâ vix nigro-punctatâ. Capitis pilis cinereis, thoracis, abdominis pedumque extus fulvis, 2^o segmento basi nigro-fasciato.*

♀ Noire. Dessous du 1^{er} article des antennes, chaperon, labre de couleur jaune-orangée. Mandibules jaunes, leur bout ferrugineux. Poils de la face cendrés. Poils du corselet en dessus fauves, éclatants, blancs en dessous. Tous les segments de l'abdomen sont couverts de poils fauve-doré, éclatants, couchés, sauf sur la base du deuxième, où ils sont remplacés par une bande de poils noirs très-courts. Poils des pattes en dessus longs, surtout sur les tranches, fauve-doré; en dessous, les poils sont noirs, surtout sur le 1^{er} article des tarses postérieurs. 1^{er} article des tarses postérieurs noir. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes. Point calleux testacé-clair.

♂ Entièrement semblable à la femelle. Anus mucroné.

Australie.

Collection Sichel, Dours.

Var. Paulo major. 1^o segmento nigro (usurâ?), 2ⁱ, 3ⁱ que
litrâ nigrâ.

Collection Puls.

N^o 7. SAROPODA LATIZONA.

Spin., Ann. Soc. Ent. Franç., VII, 543, 82 (anno 1838).

N^o 8. SAROPODA HUMILIS.

Spin., Ann. Soc. Ent. Franç., VII, 544 (anno 1838).

N^o 9. SAROPODA NIGRILABRIS.

Spin., Ann. Soc. Ent. Franç., VII, 543 (anno 1838).

Il m'a été impossible de confronter ces trois espèces avec la
description de M. Spinola.

Erratum. — Page 94, à la suite d'*Anthophora albi-frons*,
écrivez : SMITH.

NOTA. La planche I (noire) est empruntée aux dessins de M. Frédéric Smith, Apidæ Angliæ, Cat. Hym.

Les autres planches n'ayant pu être terminées à temps, elles
paraîtront successivement dans les prochains volumes de la Société.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS CITÉS.

Académie des Sciences (Mémoires de l'), T. vu, 1841.

Annales de la Société Entomologique de France.
Années 1838, 1853, 1854, 1856.

Blanchard, dans d'Orbigny, Dictionnaire d'Histoire naturelle.

— dans Cuvier, Règne animal.

— Histoire naturelle des Insectes.

Brullé, Expédition scientifique de Morée. T. m, 1832, in-folio.

— Histoire naturelle des îles Canaries. T. m, 1839, in-folio.

Christ, Naturgeschichte klassifikation und nomenclatur der Insecten;
vom Bienen, wesen und Ameisengeschlecht, Frankfurt an Main,
1791, petit in-4°.

Conte (le), The complete writings of the Say... Edited by J.-L. Le
Conte, 2 vol. New-York, 1859.

Coquebert, Illustratio iconographica Insectorum, etc. Parisiis,
1801, in-folio.

Costa (A.), Fauna del regno di Napoli, in-4°.

Curtis, Brit. Entom

Erichson, in Wagner reise in der Regents. Algier.

Eversmann, Fauna hymenopterologica Volgo-Uralensis, Mosque,
1852, n° 3. (Extrait des Bulletins des Naturalistes
de Moscou. T. xxii, 1849.)

— Bulletin des Naturalistes de Moscou. T. xxv.

Fabricius, *Entomologica Systematica*, 1793; — *Mantissa Insectorum*, 1787; — *Species Insectorum*, 1781; — *Systema Entomologicæ*, 1775; — *Systema Piezatorum*, 1804.

Germar, *Fauna Insectorum Germaniæ*.

— *Reise nach Dalmatien und Ragusæ*, Leipzig, 1817; annoté par Klug pour les Hyménoptères.

Guérin, *Iconographie du règne animal*; *Revue zoologique*.

Illiger, *Magazin für Insecten kunde*, 1802.

Jurine, *Nouvelle Méthode de classer les Hyménoptères*, 1807, in-4°.

Kirby, *Monographia Apum Angliæ*, 2 vol. Londres, 1802.

Klug, in Hemprich et Ehrenberg, *Symbolæ physiciæ*, Decas, V, 1832, in-folio.

Latreille, *Observ. sur l'Abeille pariétaire*, de Fab. *Annales du Muséum d'Hist. nat.* T. III, 1804, et T. XIV, 1809.

— *Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle*, 1819.

— *Genera Crustaceorum et Insectorum*, 1809.

Lepelletier de Saint-Fargeau, *Histoire naturelle des Insectes. Hyménoptères*. T. II, 1841.

Lepelletier et Serville, in *Encyclopédie Méthodique*. T. X.

Linné, *Systema naturæ*, *Insecta*, 1767.

Lucas, *Expédition Scientifique de l'Algérie*. T. III, 1849; in-folio.

Morawitz, *die Bienen des Gouvernements...* in *horæ Societatis Entomologicæ Rossicæ*. T. VI.

Nylander, *Adnotationes in Expositionem monographicam apum Borealiæ*, 1847.

— *Revisio synoptica apum Borealiæ*, 1851.

Panzer, *Fauna Insectorum Germaniæ*; — *Kritische revision der Insecten-fauna*, 1806.

Pallas, *Voyages*. Paris, 1748. (Trad. de Gauthier de la Peyronie.)

Radoszkovsky, in hore Societatis Entomologicæ Rossicæ. T. vi.

Rossi, Fauna Etruscæ, 1790.

Savigny, Description de l'Égypte; pl. sans texte, gr. in-folio.

Say, American Entomology, 1825.

— in Boston, Journal of natural History, passim 1836, 1837.

Schrank, Enumeratio Insectorum Austriæ indigenorum, 1781.

— Fauna Boica, 1802

Schenck, die Bienen der Herzogthums Nassau, 1861.

Scopoli, Deliciæ Floræ et Faunæ Insubricæ, 1786.

Sichel (J.), in Annales de la Société Entomologique de France.
Années 1853, 1854, 1856.

— In litteris passim.

Smith (F.), Catalogue of Hymenopterous Insects, in the collection
of British-Museum, part 4. London, 1853.

— Apidæ-Bees, part 4, 1855.

Spinola, Insecta Liguriæ, 1806.

— dans Say, Fauna Chilena, 1851.

Villers (de), Linnei Entomologia, 1789.

Westwood, An introduction to the modern Classification of
Insects. London, 1840. 2 vol.

TABLE

ET

CATALOGUE SYNONYMIQUE DES ESPÈCES

APPARTENANT AUX GENRES

ANTHOPHORA, HABROPODA, SAROPODA.

Noms.	Pages.	N ^{os} .	Noms.	Pages.	N ^{os} .
ANTHOPHORA.	29		Albo-caudata, Dours.	84	40
{ Abrupta ♂, Say.	96	25	<i>Alternans</i> , Klug.	72	
{ <i>Floridana</i> ♀, Smith.			<i>Analís</i> , Sichel.	64	
{ <i>Sponsa</i> ♀, Smith.			Apicalis, Guér.	194	
<i>Acervorum</i> , Lat.	172		Arietina, Dours.	168	
Aeraensis, Fab.	83	9	Atricilla, Evers.	130	
Æruginosa; Smith.	82	8	Atrifrons, Smith.	132	62
<i>Estivalis</i> , Panz.	169		{ Atro-alba ♀, Lep.	182	103
<i>Affinis</i> , Lep.	165		{ <i>Liturata</i> ♂, Lep.	183	
<i>Albescens</i> , Dours.	66		<i>Atro-carulea</i> , Sichel.	60	
<i>Albida</i> , Sichel.	78		{ Atro-cincta, Lep.	91	17
Albi-frons, Smith.	94	21	{ <i>Plumipes</i> , Fab.	91	
{ Albigena, Lep.	75	3	Atro-ferruginea, Dours.	122	54
{ <i>Albida</i> , Sichel.	78		Aurulentocaudata,		
<i>Binotata</i> , Lep.	75		Dours.	92	18
<i>Calens</i> , Lep.	76		Badia, Dours.	107	35
{ <i>Fasciata</i> , Fab.	77		Balnearum, Lep.	105	34
{ <i>Niveo-cincta</i> , Smith.	76		Basalis, Smith.	94	22
{ <i>Quadri-cincta</i> , Fab.	77		Belieri, Sichel.	131	61
{ <i>Ruficornis</i> , Sichel.	77		Biciliata, Lep.	125	54

Noms.	Pages.	N°.	Noms.	Pages.	N°.
{ Bicincta, Lep.	86	42	<i>Domingensis</i> , Lep	70	
{ <i>Sesquicincta</i> , Klug.	86		<i>Dorsi-macula</i> , L. Duf.	101	
{ <i>Vidua</i> , Klug.	86		<i>Dreusenii</i> , Sichel.	180	
<i>Bicolor</i> , Sichel.	409		Dubia, Evers.	119	49
{ Bipartita, Smith.	81	7	Dufourii, Lep.	186	106
{ <i>Hemithoracia</i> , Sichel.	81		<i>Ephippium</i> , Lep.	163	
Bomboïdes, Kirby.	494		<i>Euris</i> , Dours.	166	
<i>Borealis</i> , Moraw.	445		<i>Farinosa</i> , Klug.	72	
Calcarata, Lep.	144	75	<i>Fasciata</i> , Fab.	76	
<i>Calens</i> , Lep.	76		{ Femorata, Lep.	438	70
Caliginosa, Klug.	98	27	{ <i>Cinerea</i> , Evers.	438	
<i>Canescens</i> , Dours.	174		{ Ferruginea, Lep.	97	26
Canifrons, Smith.	93	20	{ <i>Fulca</i> , Evers.	97	
{ <i>Chiliensis</i> , Spin.	136	68	{ <i>Nigro-fulva</i> , Lep	97	
{ <i>Tristrigata</i> , Spin.	436		<i>Flabellifera</i> ♂, Lep.	176	
<i>Cincta</i> , Fab.	58		<i>Flammeo-zonata</i> ,		
Cincto-femorata, Sichel.	451	81	Dours.	64	
<i>Cinerea</i> , Evers.	438		<i>Floridana</i> ♀, Smith.	96	
Cinerescens, Lep.	194		<i>Frontata</i> , Say.	194	
<i>Cingulata</i> , Fab.	59		Fulvifrons, Smith.	134	66
<i>Circulata</i> , Fab.	63		Fulvipes, Evers.	108	36
Cilreo-strigata, Dours.	95	23	<i>Fulcitaris</i> , Brullé.	165	
Combusta, Dours.	188	407	<i>Fulco-cinerea</i> , Dours.	100	
{ Concinna, Klug.	180	401	Fulvo-dimidiata, Dours.	181	102
{ <i>Crocea</i> , Klug.	180		Furcata, Lep.	110	38
{ <i>Dreusenii</i> .	180		Fuscipennis, Smith.	434	65
{ <i>Vestita</i> , Smith.	480		<i>Garrula</i> , Rossi.	63	
<i>Confusa</i> , Klug.	73		Godofredi, Sichel.	119	48
<i>Crassipes</i> ♂, Lep.	444		<i>Hawortana</i> , Kirby.	172	
<i>Crinipes</i> , Smith.	474		<i>Hirsuta</i> , Lat.	452	
<i>Crocea</i> , Klug.	180		<i>Hispanica</i> , Evers.	469	
Dimidio-zonata, Dours.	484	405	Hispanica, Fab.	463	89
Dispar, Lep.	157	84	Histrio, Dours.	190	111
Dives, Dours.	443	74	Holopyrrha, Sichel.	89	45

Noms.	Pages.	N ^{os} .	Noms.	Pages.	N ^{os} .
Hypopolia, Dours.	87	43	Nubica, Lep.	85	44
Incerta, Spin.	494		{ Obesa, Giraud.	409	37
{ Intermedia, Lep.	469	98	{ Bicolor, Sichel.	109	
{ Interrupta, L. Duf.	469		Oraniensis, Lep.	448	47
{ Aestivalis, Panz.	469		Oxygona, Dours.	441	72
{ Hispanica, Panz.	469		{ Parietina, Fab.	99	29
{ Zonata, Brullé.	469		{ Plagiata, Illig.	99	
Interrupta, L. Duf.	469		Passerini, Sichel.	31	
Ioïdea, Dours.	474		Pedata, Evers.	430	60
Irregularis, Dours.	442	73	Pennata, Lep.	461	88
Lanata, Klug.	444	42	{ Personata, Illig.	165	91
Lati-cincta, Dours.	424	53	{ Affinis, Lep.		
Lepida, Evers.	445	43	{ Ephippium, Lep.		
Lepidodea, Dours.	445	44	{ Euris, Dours.		
Luteo-dimidiata.	492	114	{ Fulvitaris, Brullé.		
Madera, Sichel.	65		{ Nasuta, Lep.		
Marginata, Smith.	450	80	{ Scopipes? Klug.		
Melanopyrrha, Sichel.	90	46	{ Pilipes, Fab.	452	83
Mexicana, Sichel.	433	64	{ Hirsuta, Evers.	452	
Microdonta, L. Duf.	439		Plagiata, Illig.	99	
Mixta ♂, Lep.	445		Pluto, Dours.	95	24
Mucorea, Lep.	67		Pruinosa, Smith.	483	104
Nana, Evers.	63		{ Pubescens ♀, Lep.	476	98
Nasuta, Lep.	465		{ Flabellifera ♂, Lep.	476	
Nidulans, Lep.	63		Pulchra, Smith.	60	
Nigrita, Sichel.	437	69	Pulsella, Dours.	490	110
Nigro-æruginea, Dours.	491	112	Pulverosa, Smith.	446	45
Nigro-cincta, Lep.	423	52	Pygmæa, Dours.	451	82
Nigro-cinctula, Sichel.	459	85	Pyralitaris, Dours.	460	87
Nigro-maculata, Luc.	421	50	Pyropyga, Dours.	447	46
Nigro-vittata, Dours.	98	28	Pyro-zonata, Dours.	488	108
Nitidula, Sichel.	435	67	Quadri-cincta, Evers.	474	
Nivea, Lep.	74		{ Quadricolor, Erichson.	401	30
Nireo-cincta, Smith.	76		{ Dorsi-macula, L. Duf.	401	

Noms.	Pages.	N ^{os} .	Noms.	Pages.	N ^{os} .
Quadri-fasciata, de Vill.	63	2	Robusta, Klug.	133	64
<i>Albescens</i> , Dours.			{ Romandii, Lep.	129	58
<i>Albida</i> , Sichel.			{ Insidiosa, L. Duf.		
<i>Alternans</i> , Klug.			Rubricrus, Dours.	171	95
<i>Circulata</i> , Fab.			<i>Ruficornis</i> , Sichel.		
<i>Citreo-strigata</i> ,			{ Rufipes, Lep.	79	5
Dours.			{ Savignyi, Lep.		
<i>Confusa</i> , Klug.			Rufo-lanata, Dours.	81	6
<i>Domingensis</i> , Lep.			Rufo-zonata, Dours.	112	39
<i>Farinosa</i> , Klug.			Rutilans, Dours.	159	86
<i>Flammco-zonata</i> .			Rypara, Dours.	164	90
Dours.			<i>Savignyi</i> , Lep.	79	
<i>Incana</i> , Klug.			<i>Scopipes</i> , Klug.	165	
<i>Maculicornis</i> , Lep.			{ Segnis, Evers.	139	71
<i>Madera</i> , Sichel.			{ Microdonta, L. Duf.		
<i>Melaleuca</i> , Lep.			Semi pulverosa, Sichel.	68	
<i>Mucorea</i> , Lep.			Semis-cinerea, Dours.	126	55
<i>Nana</i> , Evers			{ Senescens, Lep.	174	97
<i>Nidulans</i> , Rossi.			{ 4-cincta, Evers.		
<i>Nicea</i> , Lep.			{ Canescens, Dours.		
<i>Semi-pulchrosa</i> ,			{ Ioïdea, Dours.		
Sichel.			Sicula, Smith.	105	33
Quadri-maculata,			Simia, Dours.	193	115
Panz.	145	76	Smithii, Sichel.	103	31
<i>Borealis</i> , Moraw.	155		<i>Socia</i> , Klug.	71	
{ <i>Mixta</i> ♂, Lep.			Spodia, Dours.	113	41
<i>Subglobosa</i> , Kirby.			<i>Sponsa</i> , Smith.	96	
<i>Tara</i> ? ♂, Lep.			<i>Squalens</i> , Dours.	167	
<i>Vulpina</i> ♂, Kirby.			Squammulosa, Sichel.	78	4
Quadri strigata, Sichel.	170	94	<i>Subcavrulea</i> , Lep.	60	
{ Refusa, Lat.	172	96	<i>Subglobosa</i> , Kirby.	145	
{ <i>Acervorum</i> , Lat.			Tarsata, Sichel.	147	77
<i>Hawortana</i> , Kirby.			Taurea, Say.	149	79
Repleta, Dours.	128	57	Tecta, Smith.	93	19

Noms.	Pages.	N ^{os} .	Noms.	Pages.	N ^{os} .
Tricolor, Fab.	104	32	Villosa, Herr. Schæf.	101	
<i>Tri-strigata</i> , Spin.	436				
Tuberculilabris, Dours.	412	40	HABROPODA.	20	
Unistrigata, Dours.	492	413	Ezonata, Smith.	31	2
Valga, Klug.	448	78	Festiva, Dours.	33	3
<i>Para</i> , Lep.	445		Zonatula, Smith.	30	4
Ventilabris, Lep.	478	400			
<i>Vestita</i> , Smith.	480		SAROPODA.	195	
Vetula, Evers.	427	56			
<i>Vigilans</i> , Smith.	62		<i>Albifrons</i> .	495	
Villosula, Smith.	478	99	<i>Bimaculata</i> , Lat.	496	1
Violacea, Lep.	88	44	<i>Rotundata</i> , Panz.		
Volucellæformis, Dours.	489	109	Bombiformis, Smith.	202	6
<i>Vulpina</i> , Kirby.	445		Byssina, Klug.	201	4
<i>Zonata</i> , Lep.	57	1	Cognata.	196	
<i>Analís</i> , Siehel.			Fulva, Evers.	200	2
<i>Atro-cerulea</i> , Siehel.			Humilis, Spin.	203	9
<i>Cingulata</i> , Lep.			Latizona, Spin.	203	7
<i>Cincta</i> , Fab.			Lutulenta, Klug.	204	5
<i>Flammeo-zonata</i> ,			Nigrilabris, Spin.	203	9
Dours.			<i>Rotundata</i> , Panz.	496	
<i>Pulchra</i> , Smith.			<i>Squalida</i> .	499	
<i>Vigilans</i> , Smith			Tenella.	200	3

FIN.

1

2

3

4

4

5

6

Ris. pinx.

1 Habropoda zonatula	♀	2 Habropoda zonatula	♂
3 Habropoda ezonata	♀	4 Habropoda ezonata	♂
5 Habropoda festiva	♀	6 Habropoda festiva	♂

HYMÉNOPTÈRES NOUVEAUX

DU BASSIN MÉDITERRANÉEN,

PAR M. LE D^r DOURS, d'Amiens.

Le travail suivant a pour but de faire connaître quelques Hyménoptères nouveaux du bassin méditerranéen. Un grand nombre d'entre eux se trouvent, depuis plus de vingt ans, dans la collection de feu M. Léon Dufour, mais leur diagnose n'a pas été publiée. Ils proviennent des chasses de M. Mieg, faites en Espagne, et de celles que j'ai exécutées moi-même en Algérie de 1847 à 1852. Les autres ont été capturés dans les diverses contrées que baigne la mer Méditerranée, en France, en Italie, dans le nord de l'Afrique et surtout dans les îles de l'Archipel grec : Syra, Tinos, Micanos, Corfou, etc. Il est à remarquer que la plupart des types se rencontrent indistinctement sur tous les points de ce bassin intérieur, et, sous ce rapport, bien des jouissances attendent les naturalistes qui exploreront nos départements méridionaux, si riches en nombreuses espèces réputées propres à l'Italie, la Sicile, la Dalmatie, l'Algérie....

Ce résultat, du reste, était à prévoir, puisque l'on sait que la Flore est identique dans toutes les zones où l'olivier croît spontanément.

La place qu'occupent les Hyménoptères décrits dans cet opuscule n'est pas définitive, je me réserve de les

grouper d'une manière plus naturelle dans ma faune des *Hyménoptères de France et d'Algérie*, à laquelle je travaille depuis plusieurs années.

PROSOPIS LUTEO-BALTEATA, Dours.

Nigra, facie lutea. Thorace luteo-ferrugineo-variegato. Abdomine nigro, 1^o segmento basi apiceque luteo-balteato, 6^o emarginato utroque latere spinula armato. Pedibus nigris luteo-annulatis. Alis hyalinis. ♂

Long. corps 10-12^{mm}; aile, 6^{mm}.

♂. Noir, antennes d'un ferrugineux pâle en dessous. Face finement ponctuée; joues et une ligne perpendiculaire sur le milieu du chaperon jaunes. Mandibules ferrugineuses. Corselet en dessus fortement ponctué, à points saillants. Bord céphalique limité par une ligne saillante couleur d'ivoire, deux tubercules de cette couleur en avant du point calleux, deux autres sur le mésothorax; deux larges taches d'un beau ferrugineux sur les côtés. En dessous, le corselet est également tatoué de ferrugineux. Abdomen assez allongé, plus large au niveau du premier segment, noir mat, lisse. Bords supérieur et inférieur du premier segment ornés d'une bande jaune se continuant en dessous sur le bord inférieur seulement. Sixième segment profondément sinué, portant, de chaque côté, une petite épine. Pattes noires; tibias et taches de la première paire presque entièrement jaunes. Base des tibias des deuxième et troisième paires jaune. Ailes blanches très-limpides; point calleux jaune; côte noire, nervures très-pâles.

Algérie. — Coll. Dours.

PROSOPIS NIVEO-FASCIATA, Dours.

Nigra, niveo-puberula, facie leviter punctata, genis luteo maculatis. Abdomine nitido lævissime punctulato; segmentis niveo fasciatis, 1, 2 interruptis. Pedibus nigris, tibiis basi flavis, tarsis ferrugineis. Alis fumatis. ♀

♂ Facie infra antennis eburnea; pedibus flavo annulatis.

Long. corps, 8-9^{mm} ; aile, 5^{mm}.

♀ Noire à pubescence d'un blanc de neige, très-courte. Antennes noires un peu ferrugineuses en dessous. Face entièrement noire, sauf deux petits points jaunes sur les joues près du bord oculaire, très-finement ponctuée sur sa moitié supérieure, plus grossièrement sur le chaperon. Corselet assez fortement ponctué; son bord céphalique et deux taches en avant du point calleux, de couleur d'ivoire. Métathorax ridé; entre lui et le mésothorax se trouve un petit espace entièrement lisse. Abdomen allongé, convexe, très-finement ponctué (à la loupe), recouvert, à partir du deuxième segment, d'une pubescence très-fine d'un blanc de neige, un peu rousse vers l'anus. Base de tous les segments ornée d'une bande de poils couchés d'un blanc de neige, interrompue sur le premier et le deuxième, où elle se réduit à deux larges taches. Pattes noires, leurs poils blanchâtres. Base des tibias jaune, tarses ferrugineux obscur, le dernier plus pâle. Ailes un peu enfumées avec quelques reflets irisés sur les postérieures. Point calleux noir avec un peu de jaune au bout. Côte, nervures noires.

♂. Semblable à la femelle, sauf la face qui est de couleur d'ivoire sur le chaperon et les joues, et les pattes qui sont moins noires.

Algérie.

Cette espèce voisine de *P. signata* est surtout facile à distinguer par sa tête arrondie, sa ponctuation plus fine, par les bandes des segments abdominaux.

Collection Dours.

COLLETES NIVEO-FASCIATUS, Dours.

Niger; albo vel cinereo, vel rufo villosus. Abdomine leviter punctato marginibus niveis, latis; sexto segmento anoque nigris. ♀

Long. corps, 12^{mm} ; aile, 9^{mm}.

♀. Noire. Chaperon, corselet, premier segment de

l'abdomen assez fortement ponctués; la ponctuation va en s'effaçant sur les autres segments. Face recouverte de poils cendrés. Corselet en dessus hérissé de poils d'un roux cendré, plus pâles sur les côtés. Abdomen brillant, avec quelques poils roux mêlés de noirs sur les côtés. Premier, deuxième, troisième, quatrième segments ornés d'une bande de blanc de neige, couchés, courts; bande interrompue sur le milieu du troisième, et réduite, pour le premier et le deuxième, à deux taches (effet de l'usure). Cinquième segment et anus noirs. Poils des pattes cendrés, tarsi roux. Ailes à peine enfumées; point calleux, côte, nervures de couleur brune.

♂. Plus petit que la femelle, pubescence plus blanche; segments abdominaux plus profondément ponctués, recouverts de poils cendrés, hérissés. Bande des cinq premiers segments non interrompue; sixième segment et anus noirs.

Cannes, Algérie; reçu abondamment des îles de l'Archipel grec.

V. Bande des segments formée de poils roux au centre. Magnifique espèce, ayant quelques rapports avec le *C. canescens*, Smith, mais bien distincte de ce dernier, dont le bord antérieur du chaperon est réfléchi et profondément sillonné.

COLLETES COLLARIS, Dours.

Niger, rufo-cinereo villosus; abdomine leviter punctato; marginibus albis vel rufis, pedibus fulvis.

Long. corps, 15^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire. Chaperon, corselet, premier segment de l'abdomen profondément ponctués, la ponctuation devenant plus superficielle sur les derniers segments. Face recouverte de poils cendrés un peu roux. Corselet, en dessus et sur les côtés, hérissé de poils roux mêlés de noirs sur le disque qu'ils entourent d'un collier épais. En des-

sous les poils sont cendrés; tous les segments de l'abdomen sont ornés d'une bande de poils blancs courts, couchés, interrompue par l'usure sur le premier segment. Anus noir avec quelques poils roux. Poils des pattes fauves, presque ferrugineux; ailes à peine enfumées. Point calleux testacé. Côte, nervures de couleur brune.

♂. Plus petit que la femelle; pubescence plus cendrée. Bande des segments non interrompue. Anus noir.

Cannes, Algérie, îles de l'Archipel grec.

Voisine de *C. niveo-fasciatus*. La transition s'établit par l'apparition d'une ligne de poils cendrés-roux sur le cinquième segment de *C. niveo-fasciatus*, et par la couleur plus foncée des tarses.

COLLETES LACUNATUS, Dours.

Niger, fulvo-hirsutus, clypeo in medio lacunato, punctatissimo; abdomine convexo, nitido, nudiusculo, subtiliter punctulato, segmentorum marginibus nec non secundo basi, fulvescenti fasciatis. Pedibus fusco-ferrugineis, pilis cinereis. Alis hyalinis, venis fuscis. ♀

Long. corps, 16-18^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire. Antennes noires, mandibules ferrugineuses au bout. Tête en triangle allongé, chaperon bombé très-ponctué présentant sur son milieu une fossette assez profonde. Une ligne saillante partant du milieu de l'insertion des antennes pour rejoindre l'ocelle médian partage la moitié supérieure de la face en deux. Les poils qui recouvrent la face sont cendrés, ceux du labre roux. Corselet fortement ponctué, hérissé de longs poils roux. Abdomen convexe, brillant, presque glabre, finement ponctué surtout sur le premier segment qui est hérissé de poils roux. Le bord inférieur des segments est légèrement testacé, orné d'une bande de poils courts, fauves; la base du deuxième porte, de plus, une bande semblable. Pattes d'un ferrugineux plus ou moins foncé avec les tarses plus pâles,

leurs poils cendrés-roux; ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures de couleur testacée pâle.

♂. Semblable à la femelle, sauf la pubescence, qui est plus cendrée.

Algérie. — Midi de la France. — Coll. Dours.

Remarquable espèce très-facile à reconnaître par la forme triangulaire de la tête, la fossette médiane du chaperon....

COLLETES DENTIVENTRIS, Dours.

Niger, cinereo villosus. Abdomine leviter punctato, marginibus cinerescentibus; 5°, 6°que segmentis dente armatis.

Long. corps, 10^{mm}; aile, 6^{mm}.

♂. Noir, avec des poils cendrés plus ou moins clairs, abondants sur la face, le corselet et le premier segment abdominal. Chaperon, corselet et abdomen finement ponctués. Chacun des segments est orné d'une bande non interrompue de poils blanchâtres, couchés, plus large sur les derniers. Le deuxième segment porte deux bandes, une à chaque bord. Les cinquième et sixième sont munis, sur les côtés, d'une dent plus courte chez le cinquième, et terminés par un long cil. Pygidium formé, sur les côtés, de deux plaques longues, transparentes, coniques. Anus roux. Poils des pattes cendrés, tarses roux. Ailes un peu enfumées. Point calleux, côte, nervures noirs.

Algérie. — Trois mâles.

V. Poils du corselet roux.

COLLETES ACANTHOPYGUS, Dours.

Niger, rufo-cinereo villosus. Abdomine valde punctatato, marginibus albis. Sexto segmento dente acuto, pilis longis ciliato, armato.

Long. corps, 12^{mm}; aile, 6^{mm}.

♂. Noir. Chaperon, corselet, abdomen plus fortement ponctués que dans l'espèce précédente. Poils de la face

cendrés-roux, ceux du corselet en dessus, roux, cendrés en dessous et sur les côtés. Premier segment de l'abdomen fortement ponctué, hérissé de poils roux courts; les autres segments ont une ponctuation plus fine et quelques poils cendrés très-courts sur les côtés. Chaque segment porte une bande de poils blancs couchés, très-large, double sur le deuxième; sixième segment armé d'une longue épine, enveloppé dans tous les sens par de longs cils noirs mêlés de roux. Anus roux. Pygidium terminé sur les côtés par deux plaques transparentes, longues, coniques. Poils des pattes cendrés, tarses roux. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures de couleur brune.

Algérie. — 4 mâles. — Montpellier, 7 mâles.

DASYPODA RUFIPES, Sichel.

Nigra, rufo-villosa, thorace rufo in medio nigro hirto. Abdomine nigro, nitido, lævi, fasciis 2, 3, 6 rufescentibus in medio interruptis; 5° segmento sordide ferrugineo, ano fulvo aureo. Femoribus nigris, tibiis tarsisque læte ferrugineis, pilis densissimis cinereo-rufis. Alis subflavo hyalinis nervis fuscis. ♀. ♂ similis, flagello antennarum ferrugineo, fasciis abdominalibus continuis.

Long. corps, 16-18^{mm}; aile, 12^{mm}.

♀. Noire. Antennes, en dessous, lavées de ferrugineux, à partir du troisième article. Face noire, avec des poils de cette couleur courts, roux sur le bord libre du labre. Thorax hérissé de poils roux, noirs au centre. Abdomen un peu déprimé, brillant, lisse, noir, avec le bord inférieur des segments plus pâle, surtout au centre. Le premier segment est hérissé de poils roux; le bord inférieur des deuxième, troisième, quatrième est orné d'une bande de poils roux quelquefois cendrés, interrompue largement sur le milieu; le cinquième est revêtu de poils noirs, lavés de ferrugineux; l'anus a des poils roux doré. Cuisses noires avec une teinte un peu ferrugineuse, jambes et tarses fauve doré, leurs poils abondants, cendrés-roux.

Ailes presque transparentes avec une teinte jaune. Point calleux très-brun; côte, nervures plus pâles.

♂. Plus allongé, plus grêle que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement, sauf que les antennes en dessous sont entièrement ferrugineuses, à l'exception du deuxième article qui est noir. Bandes de l'abdomen continues.

Arch. grec, Algérie, Espagne. — Coll. Sichel, L. Duf., Dours.

Cette espèce, voisine de *Dasypoda villipes* Lep, s'en distingue par la couleur des antennes, la villosité du thorax, celle du cinquième segment abdominal et la couleur foncière ferrugineuse des jambes et des tarses.

HALICTUS FORMOSUS, Dours. Pl. xxviii, fig. 1.

Niger, ferrugineo-hirsutus. Abdomine ovali, convexo, subtiliter punctulatissimo, nudiusculo. Segmentis apice ferrugineo-lineatis, fasciis albescentibus. Pedibus late ferrugineis, trochanteribus solum nigris. Alis luteo fumatis, apice nigris, venis pallidis. ♂, ♀. Antennis subtus ferrugineis, scapo nigro, clypeo producto apice luteo. Segmentis 5, 6 ventralibus excavatis, ferrugineis, fulvo-aureo-pilosis.

Long. corps, 17-18^{mm}; aile, 12^{mm}.

♀. Noire; antennes de longueur ordinaire noires, mandibules noires avec leurs arêtes et le tubercule basilaire ferrugineux. Tête un peu allongée, face très-ponctuée sur tout le vertex et le chaperon; ses poils roux, dorés sur le bord inférieur du labre. Corselet en dessus très-fortement ponctué, métathorax à peine tronqué; ses angles latéraux obtus, poils de ses régions roux. Abdomen ovale, allongé, convexe, très-finement ponctué (à la loupe), nu, si ce n'est sur le premier segment dont la base est hérissée de poils roux courts. Bord inférieur des segments orné d'une large bande de poils courts blanchâtres, qui, en disparaissant par l'usure, laisse voir la couleur ferrugineuse de l'épiderme, très-prononcée sur les côtés. En dessous, les segments sont fortement ponctuéés et leurs cils plus longs.

Pattes entièrement ferrugineuses, sauf les trochanters, qui sont noirs ; leurs poils roux doré, plus pâles sur les cuisses. Ailes enfumées, jaunes avec le bout brun ; côte noire ; point calleux, nervures pâles.

♂. Plus grêle que la ♀. Antennes ferrugineuses en dessous à partir du 3^e article, chaperon très-allongé, son bout jaune ; poils de la face argentés. En dessous, le cinquième et le sixième segment de l'abdomen sont très-excavés ; le dernier, formant une fossette profonde, de couleur ferrugineuse pâle avec des cils roux doré. Le bout des ailes est un peu plus noir que dans la ♀, le reste semblable.

Belle espèce de la taille de l'*H. strigatus*. Elle en diffère par les bandes de l'abdomen, la couleur des pattes, des ailes, etc.

Algérie. — Coll. Dours.

HALICTUS FERRUGINEO-ZONATUS, Dours.

Niger, ochraceo-hispidus, metathorace rotundato. Abdomine nigro, impunctato, segmentorum fasciis apicalibus latissimis, ochraceis. Pedibus læte ferrugineis. Alis fumatissimis, venis pallidis. ♀

Long. corps, 16^{mm} ; aile, 11^{mm}.

♀. Noire. Antennes courtes, lavées de ferrugineux. Chaperon fortement ponctué, la face plus finement ; ses poils roux doré. Corselet grossièrement ponctué, arrondi en arrière, où la ponctuation plus fine est mêlée de rides ; ses poils d'un ferrugineux éclatant. Abdomen ovale d'un noir mat, sans ponctuation appréciable, sauf sur le premier segment, qui est, en outre, hérissé de poils ferrugineux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande très-large, continue, formée de poils courts couchés, d'une belle couleur ferrugineuse. L'anus porte des poils semblables. En dessous, la ponctuation est plus marquée ; le bord inférieur des segments est ferrugineux et cilié de poils de cette couleur. Pattes entièrement ferrugineuses,

poils de cette couleur. Ailes très-enfumées; point calleux, côte, nervures testacés. Mâle inconnu.

Magnifique espèce bien caractérisée par la brièveté de ses antennes, la couleur des pattes et des ailes, la forme arrondie du métathorax.

Algérie. — Coll. Dours.

HALICTUS ALBO-ZONATUS, Dours.

Niger, ferrugineo-hirsutus, metathoracis linea postica elevata, sinuata. Abdomine nigro, subtiliter punctulato, segmentorum fasciis apicalibus late albis vel rufescentibus. Pedibus ferrugineis, trochanteribus coxisque nigris. Alis fumatis, venis pallidis. ♂. ♀ similis, clypeo apice luteo, antennis nigris, scapo luteo.

Long. corps, 12^{mm}; aile, 9^{mm}.

♀. Noire. Face finement ponctuée, plus grossièrement sur le chaperon; les poils roux. Corselet fortement ponctué, ridé sur le métathorax qui se termine par une ligne saillante légèrement sinueuse; les poils ferrugineux. Abdomen ovale, noir terne, très-finement ponctué, presque nu, si ce n'est sur le premier segment qui est hérissé de poils ferrugineux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande large continue, formée de poils blancs ou roux. En dessous la ponctuation est très-forte, et le bord des segments est cilié de poils roux. Pattes ferrugineuses, sauf les trochanters et les cuisses, qui sont noirs, leurs poils cendré roux. Ailes un peu enfumées; point calleux, côte, nervures testacés.

V. Bandes de l'abdomen d'une belle couleur d'ocre.

♂. Semblable à la ♀, sauf la taille qui est plus grêle, le bout du chaperon et le dessous des deux premiers articles des antennes jaunes.

Algérie. — Voisin de l'*H. 4* — *cinctus*, mais taille beaucoup plus grande et villosité différente, etc.

HALICTUS SORELI, Dours. Pl. xxviii, fig. 2.

Niger, rubro-ferrugineo hirsutus. Clypeo producto. Abdomine nitido, segmentis 2, 3, 4 basi late rubro-ferrugineo-pilosis, 5^o anoque pallidioribus. Pedibus late ferrugineis, femoribus nigris; alis fumatis. ♀

Long. corps, 13-14^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire. Labre très-sensiblement prolongé. Antennes et mandibules noires. Face finement ponctuée et ridée, ponctuation plus grossière sur le chaperon. Poils de toute la tête courts, d'un ferrugineux éclatant. Corselet très-finement ridé partout; ses poils assez touffus, d'un ferrugineux éclatant. Abdomen, en dessus, ovale, allongé, très-brillant, noir, à ponctuation très-fine, même à une forte loupe; premier segment hérissé, surtout à la base et sur les côtés, de poils courts ferrugineux. Les autres segments sont entièrement noirs et nus. Base du deuxième, troisième, quatrième, ornée d'une bande de poils courts, couchés, semblables à des écailles de papillon, bande rétrécie au milieu chez les vieux sujets. Le cinquième segment ne présente pas de bande. Poils de l'anus roux-dorés. En dessous, les segments sont distinctement ponctués, surtout sur le bord inférieur, qui est cilié de longs poils roux. Pattes d'un rouge ferrugineux éclatant avec les poils de cette couleur. Les cuisses sont noires. Ailes enfumées; point calleux marron; côte, nervures ferrugineuses-pâles.

Mâle inconnu. Espèce voisine du *H. xanthopus*.

Algérie. — Envoyé par M. le Dr Sorel, médecin aide-major au 1^{er} spahis, auquel je me fais un plaisir de le dédier.

HALICTUS OCHRACEO-VITTATUS, Dours.

Niger, ochraceo hispidus. Abdomine depresso, nitido, subtiliter punctulato; segmentis 1, 2, 3, 4 postice ochraceo-vittatis; 2^o linea basali, liturata, concolori. Pedibus aureo-fulvis, pilis griseis. Alis limpidis, venis ferrugineo-pallidis. ♂. ♀ Antennis nigris, subtus obscure ferrugineis, scapo labroque luteis; trochanteribus solum nigris.

Long. corps, 10-12^{mm} ; aile, 8^{mm}.

♀. Noire. Chaperon assez fortement ponctué. Tête, corselet à ponctuation plus fine, plus serrée. Métathorax tronqué, très-finement strié. Antennes noires un peu lavées de ferrugineux au bout. Poils de la face roux, ceux du labre cendré doré; ceux du sommet de la tête, du corselet en dessus et en dessous, sur les côtés un peu plus pâles. Abdomen déprimé, brillant, très-finement ponctué (à la loupe). Premier segment hérissé, surtout à la base, de poils roux, courts; deuxième, troisième, quatrième nus; cinquième ayant quelques poils noirs mêlés de roux, ceux de l'anus fauve doré. Bord inférieur des quatre premiers segments, orné d'une bande continue, large, de poils couchés, courts, de couleur jaune d'ocre, à peine plus étroite sur le premier. Le deuxième segment porte en outre, à sa base, une petite bande moins fournie, très-étroite, de poils plus pâles. En dessous, les segments sont très-fortement ponctués, hérissés de poils roux, longs; le bord de chacun d'eux est mis en relief par une petite ligne de cils blancs. Hanches, cuisses noires. Tibias et premier article des tarses de toutes les paires de pattes dorés. Poils des pattes cendré roux, un peu plus pâles sur les hanches. Ailes transparentes; point calleux noir sur les bords, jaune au centre; côte brune, nervures d'un ferrugineux pâle.

V. I. *Hirsuties corporis fasciisque abdominis albidopargenteis.*

♂ Niger, ochraceo-hispidus, antennis nigris subtus obscure ferrugineis, scapo labroque luteis. Abdomine lineari, depresso, punctulato, segmentis, 1, 2, 3, 4, 5 antice ochraceo-fasciatis, 2^o linea postica liturata concolori. Pedibus aureis, trochanteribus solum nigris.

Long. corps, 12^{mm}; aile, 8^{mm}.

♂. Antennes noires en dessus et en dessous chez les trois articles terminaux, dont le dernier est recourbé,

obscurément rougeâtre en dessous des autres. 1^{er} et 2^e articles noirs avec un point jaune en dessous sur le 1^{er}. Chaperon jaune au bout. Mandibules noires avec le bout ferrugineux. Poils de la face, du corselet et du 1^{er} segment abdominal roux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils courts, couleur d'ocre; base du 2^e portant, en outre, une ligne peu distincte de poils semblables. En dessous, le 5^e segment est un peu concave. Pattes jaune d'or, bout des hanches et des trochanters noir. Ailes transparentes; point calleux jaune; nervures pâles.

Algérie. — Reçu en très-grand nombre avec les deux sexes accouplés. La femelle, sauf la taille et la pubescence grise des pattes, est à peine différente de l'*H. scabiosæ*. Le mâle est plus distinct par ses antennes. Il faut pourtant remarquer que *H. scabiosæ* ♂ a parfois une teinte légèrement ferrugineuse sur le dessous des antennes, à leurs derniers articles, transition entre ces deux formes.

Coll. Dours.

HALICTUS SEX-CINCTELLUS, Dours.

Niger, rufo-cinereo vel albido hispidus. Abdomine depresso, subtiliter punctato, segmentis albo-fasciatis, 2^o 3^oque linea liturata, basali concolori. Pedibus nigris fulvo-hirtis. Alis limpidis, venis ferrugineo-pallidis.

Long. corps, 11^{mm}; aile, 8^{mm}.

♀. Noire. Chaperon assez fortement ponctué; tête et corselet à ponctuation plus fine, plus serrée. Métathorax tronqué, finement strié. Antennes noires; poils de la face roux, ceux du labre dorés, ceux du sommet de la tête et du corselet en dessus roux, cendrés en dessous. Abdomen déprimé, terne, très-finement ponctué. 1^{er} segment hérissé de poils cendrés, roux doré près de l'articulation sternale; 2^e, 3^e, 4^e presque nus, 5^e ayant quelques poils noirs mêlés de roux, ceux de l'anus fauve doré. Bord inférieur des quatre premiers segments orné d'une bande continue assez large de poils blancs, courts, couchés, à peine plus

étroite sur le 1^{er}. Base du 2^e, 3^e portant, en outre, une petite bande très-étroite les poils blancs très-courts, bande cachée en partie par le 2^e segment. En dessous les segments sont fortement ponctués, hérissés de poils roux longs. Le bord de chacun d'eux est mis en relief par une petite ligne de cils cendré roux très-courts. Pattes noires, les tibiais bruns; tarses fauve doré, le 1^{er} article un peu enfumé. Poils des pattes roux doré, cendrés sur les hanches. Ailes transparentes; point calleux, côte, nervures de couleur ferrugineuse claire.

♂. Niger. Antennis nigris, subtus obscur ferrugineis, 1^o articulo subtus luteo naso producto. Pedibus fulvis, trochanteribus femoribusque posticis, his partim, nigris.

Long. corps, 10-14^{mm}; aile, 11^{mm}.

Noir. Antennes noires en dessus, d'un ferrugineux très-obscur en dessous, avec le 1^{er} et quelquefois le 2^e article tachés de jaune, le dernier recourbé en dedans. Bord libre du chaperon jaune. Le ventre est concave et tous les segments sont revêtus d'un duvet très-court formé de poils cendré roux, simulant des stries très-fines et très-régulières. Pattes jaune rougeâtre. Trochanters et cuisses noirs, celles-ci en partie seulement. Le reste comme dans la famille.

Algérie. — Reçu en grand nombre, les deux sexes accouplés.

Coll. Dours.

HALICTUS PLATYCESTUS, Dours. Pl. xxviii, fig. 3.

Niger, cinereo-hispidus, punctulatissimus. Abdomine convexo, punctulato, fasciis basalibus 2, 3, 4 niveis, latis, 1_a in medio interrupta; pedibus nigris cinerco hirsutis. Alis fumatis, venis nigro-ferrugineis, ♀. ♂ naso apice maculato, pedibus nigris flavo irratis.

Long. corps, 13^{mm}; aile, 8^{mm}.

♀. Noire. Chaperon à peine allongé, cilié de poils

fauve doré. Mandibules noires, ferrugineuses au bout ; face grossièrement ponctuée sous les antennes, plus finement au-dessus et sur le vertex ; ses poils cendrés, roux sur le sommet. Corselet grossièrement ponctué, ses points épars, métathorax à peine tronqué, à angles latéraux un peu aigus, ses stries longitudinales très-saillantes. Poils du corselet en dessous et en dessus cendré clair. Abdomen ovale, assez convexe, d'un noir mat. 1^{er}, 2^e segments assez fortement ponctués surtout dans les deux tiers antérieurs, ponctuation des suivants à peine visible ; 1^{er} segment hérissé de poils blanchâtres plus abondants à la base et sur les côtés ; 2^e, 3^e, 4^e ayant des poils très-courts noirs, mêlés de ferrugineux, ceux du 5^e et de l'anus dorés. Les 3 1^{ers} segments sont inégalement partagés par une ligne saillante plus ou moins courbe. Base du 2^e, 3^e, 4^e ornée d'une bande de poils d'un blanc de neige, un peu interrompue sur le milieu du 1^{er}, large et continue sur le 2^e et 3^e. En dessous, les segments sont fortement ponctués et hérissés de poils roux cendré. Pattes noires ; poils des hanches longs, blancs, ceux des cuisses et des tibias cendrés, ceux du 1^{er} article des tarsi en dessous, roux doré. Ailes un peu enfumées ; point calleux, côte, nervures de couleur ferrugineuse obscure.

♂. Moitié plus petit que la ♀. Bord inférieur du chaperon taché de jaune. Antennes noires, pattes noires, base des tibias et 1^{er} article des tarsi jaunes. Le reste comme dans la ♀.

Magnifique espèce très-constante qui doit se placer à côté de l'*H. Leucozonius* et *major*, Nyl.

Algérie. — Coll. Dours.

V. I. Minor.

V. II. Pedibus rufo-hirtis, puncto calloso testaceo.

HALICTUS AUREIPES, Dours.

Niger, cinereo-rufo vestitus. Abdomine convexo vix subtiliter punctulato, rufo-puberulo, segmentis apice cinereo vel rufescenti

lineatis ; ano fulvo-aureo. Femoribus nigris, tibiis tarsisque aureo-ferrugineis, illis interdum fusco irroratis. Alis luteo-fumatis, venis pallidioribus. ♀. ♂ minor, pilis cinerescens, facie nigra, tibiis nigris vix ferrugineo irroratis.

Long. corps, 10^{mm}; aile, 7^{mm}.

♀. Noire; chaperon un peu proéminent, fortement ponctué. Antennes noires. Face finement ponctué sur la moitié supérieure, plus fortement sur l'inférieure; ses poils cendrés, roux doré sur le labre; corselet en dessus finement ponctué, ses poils cendré roux. Métathorax arrondi, très-délicatement strié. Abdomen très-convexe, d'un noir mat, à ponctuation à peine visible (à la loupe), revêtu de poils très-courts, roux, plus nombreux sur les côtés. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande très-étroite de poils cendrés, quelquefois roux; anus revêtu de poils d'un roux doré; cuisses noires, tibias et tarses dorés, les premiers parfois un peu bruns, leurs poils roux doré. Ailes jaunâtres, enfumées; point calleux, côte d'un brun ferrugineux; nervures plus pâles.

♂. D'un tiers plus petit, semblable à la femelle, sauf les tibias qui sont plus bruns. Face noire.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

HALICTUS GRISEO-ZONATUS, L. Duf.

Niger, cinereo-rufus vestitus. Abdomine nigro, depressiusculo, subtiliter punctulato, nudo; segmentis apice griseo-zonatis, ano fulvo. Pedibus nigris supra cinereo, infra ferrugineo hirsutis, tarsis ultimis ferrugineo-pallidis. Alis hyalinis, venis flavo-testaceis. ♀

Long. corps, 13^{mm}; aile, 9^{mm}.

♀ Noire. Tête presque orbiculaire; antennes un peu lavées de ferrugineux en dessous vers les derniers articles; face très-finement ponctué, ses poils cendrés. Corselet en dessus très-densément ponctué, revêtu de poils cendré roux; métathorax arrondi, très-finement strié. Abdo-

men allongé, un peu déprimé; sa ponctuation très-fine, très-serrée; premier segment hérissé de poils roux, les autres nus. Bord inférieur de chacun d'eux orné d'une bande assez large, continue de poils couchés, cendrés, courts; cinquième et anus roux. En dessous les poils des segments sont roux et plus longs. Pattes noires, leurs poils cendrés en dessus, ferrugineux pâle en dessous surtout sur les tibias et le premier article des tarses. Les 4 derniers articles sont ferrugineux pâle. Ailes transparentes; nervures blanc jaunâtre avec le point calleux et les côtés plus foncés.

Mâle inconnu.

Voisin de l'*H. aureipes*, mais taille plus grande, abdomen de forme différente, etc...

Algérie. — Coll. Dours, L. Duf.

HALICTUS SEMI-PUBESCENS, L. Duf.

Niger, rufo-albo hirsutus, clypeo producto; abdomine nitido subtiliter punctato, segmentis 2 basi, 3 antice et postice, 4 toto cinereo squammulosis, 5 anoque rufis. Alis fumatis, venis pallidis. ♀

Long. corps, 9^{mm}; aile, 6^{mm}.

♀ Noire, antennes noires, tête allongée; face très-finement ponctuée et ridée; ses poils cendrés mêlés de roux, surtout sur le bord libre du chaperon. Mandibules de couleur ferrugineuse pâle. Corselet assez fortement ponctué en avant, très-finement ridé en arrière; ses poils en dessus roux, cendrés en dessous et sur les côtés. Abdomen en dessus ovale, brillant, très-finement ponctué; la ponctuation, très-saillante sur le premier segment, devient moins marquée à partir du deuxième. Les poils sont blanc cendré, hérissés sur le premier segment, très-courts, couchés et mêlés de roux sur les 2^e, 3^e, 4^e, où ils ressemblent à des écailles de papillon, 5^e et anus garnis de poils entièrement roux. Base des 2^e et 4^e segments, bords supérieur et inférieur du 3^e ornés d'une bande de

poils courts, couchés, blanc cendré. En dessous tous les segments sont ciliés de poils roux assez longs. Pattes noires hérissées de poils cendré roux. Tarses ferrugineux. Ailes assez enfumées ; point calleux, côte, nervures ferrugineux.

Mâle inconnu.

Algérie et Saint-Sever (Landes).—Coll. L. Duf. Dours.

HALICTUS GEMMEUS, Dours.

Cupro-æneo-nitidus, cinereo-puberulus. Antennis ferrugineis, scapo nigro. Abdomine ovato, nitido, impunctato, cinereo-puberulo, marginibus pallidis. Pedibus fulvis, cinereo hirtis, femoribus tibisque nigro irroratis. ♀ ♂. minor clypeo producto, apice luteo.

Long. corps, 7^{mm}; aile, 5^{mm}.

♀ Noire, d'un vert de cuivre très-prononcé surtout à la tête et au corselet. Antennes ferrugineuses avec le scape noir. Mandibules noires à la base et au bout, ferrugineuses au milieu. Tête assez arrondie, très-finement et très-uniformément ponctuée, d'un vert de cuivre brillant ; ses poils roux cendré, plus dorés sur le bord inférieur du labre. Corselet de la couleur de la tête, très-finement ponctué. Sa partie antérieure est partagée en deux moitiés égales par une ligne assez profonde, s'étendant jusqu'au bord céphalique qui est légèrement sinueux. Métathorax arrondi, finement strié de lignes longitudinales parallèles. Abdomen ovale, d'un noir cuivreux brillant, à ponctuation peu distincte (à la loupe), hérissé de poils cendrés très-courts, un peu plus abondants sur les segments inférieurs et sur les côtés. Poils de l'anus fauves. Bord inférieur de tous les segments presque nu et de couleur testacée pâle. En dessous, le ventre est de couleur ferrugineuse pâle avec ses poils cendrés. Pattes fauves, cuisses et extrémité supérieure des tibias plus ou moins brunes, leurs poils longs, cendrés. Ailes transparentes à reflets irisés. Point calleux, côte, nervures très-pâles.

♂ d'un tiers plus petit que la ♀ à laquelle il ressemble entièrement, sauf le chaperon, qui est proéminent, avec le bord inférieur jaune.

V. I. Minor, pedibus fuscis.

Alg. France mérid. — Coll. Dours et L. Duf., où il est désigné sous le nom de *H. viridulus* qui doit disparaître, car il appartient à une espèce de Fabr. d'origine américaine et spécifiquement distincte. *Megilla viridula* F., syst. Piez, p. 333, n° 25.

HALICTUS CARNEI-VENTRIS, DOURS.

Nigro-carneo, capite thoraceque nigro-æneis, abdomine carneo, pedibus luteis, coxis femoribusque nigris, tibiis 2, 3, 1^{re}que tarsorum posticorum articulo nigro irroratis. Alis fumatis. ♀

Long. corps, 6-7^{mm}; aile, 4-5^{mm}.

♀. Antennes courtes, ferrugineuses, lavées de noir en dessus. Mandibules jaunes au milieu, noires à leur naissance, ferrugineuses au bout. Tête noire à reflets cuivreux, sans ponctuation, si ce n'est à la partie antérieure du chaperon, où se voient quelques rares points enfoncés; les poils courts, serrés, cendré roux en haut et en arrière, roux doré sur le labre. Corselet noir avec un reflet cuivreux bien manifeste, lisse, brillant, hérissé de quelques poils cendré roux plus abondants sur le milieu et les côtés. Bord antérieur ou céphalique orné d'une ligne jaune pâle, interrompue au milieu et se terminant de chaque côté, en avant du point calleux, par une tache saillante, assez grande, d'un jaune très-pâle. Métathorax très-finement strié à la base. Abdomen ovale, d'une belle couleur de chair, lisse, sans ponctuation ni poils, si ce n'est sur le 5^e segment et l'anus, où ces derniers sont courts et cendrés. Quelques poils blancs, couchés, très-courts se font remarquer au bord inférieur des segments. Pattes jaunes, sauf les cuisses qui sont noires. Les tibiais intermédiaires et postérieurs sont tachés de noir, ainsi que le 1^{er} article des tarses postérieurs. Leurs poils sont blancs, assez abon-

dants sur le flocculus. Ailes un peu enfumées. Point calleux jaune pâle ; côte, nervures brunes.

Mâle inconnu.

Corfou. Algérie. — Coll. Dours.

HALICTUS BI-MACULATUS, Dours.

Niger, cinereo-hirsutus. Abdomine nigro, nitido, subtiliter punctulato, segmentis 2, 3 basi macula nivea ornatis. Pedibus nigris, cinereo-hirsutis. Alis hyalinis splendide iridescentibus, ♀. ♂ antennis subtus ferrugineis, naso luteo, tibiis flavo irroratis, tarsis luteis.

Long. corps, 8^{mm}; aile, 5^{mm}.

♀. Noire. Tête presque ronde, un peu aplatie sur le chaperon, très-finement ponctuée ; ses poils cendrés, courts, roux sur le labre. Corselet en dessus très-finement ponctué, recouvert de poils cendré roux. Métathorax légèrement tronqué, délicatement strié. Abdomen noir, brillant, nu, excepté sur les deux derniers segments qui sont revêtus d'un duvet très-court, cendré-roux. Base des 2^e et 3^e segments ornée, sur les côtés, d'une tache assez large d'un blanc de neige. En dessous, la ponctuation est plus grossière et le bord des segments est cilié de poils cendrés. Pattes noires, leurs poils cendrés, roux doré sur le 1^{er} article des tarses en dessous. Les autres articles sont bruns. Ailes transparentes avec des reflets irisés. Point calleux, côte, nervure, bruns.

♂. De moitié plus petit que la ♀. Antennes ferrugineuses en dessous à partir du 3^e article ; chaperon un peu proéminent, son bout libre jaune ferrugineux. Poils de la face argentés ; cuisses noires ; jambes jaunes aux deux extrémités, tarses entièrement jaunes. Le reste comme dans la ♀.

Algérie. — Coll. Dours.

LUCASIUS N. S. G., Dours.

(Dédié à M. Lucas, le savant secrétaire de la Société entomologique de France.)

Palpes maxillaires de six articles, le 1^{er} le plus long, les suivants allant en diminuant de longueur. Palpes labiaux de 4 articles, le 1^{er} aussi long que les deux suivants, 2^e 3^e, 4^e égaux entre eux. Labre, vu dessous, proéminent, carré, terminé à chaque bout par une petite dent aiguë. Antennes à articles peu serrés, légèrement moniliformes, égaux entre eux à partir du 3^e; le 2^e plus court que les suivants, cupuliforme. 5^e segment de l'abdomen chez les ♀ pourvu d'une fissure triangulaire, large, d'où s'échappe un aiguillon sans force, semblable à celui des *Andrènes*.

Une radiale allant en s'amincissant à partir du milieu, s'écartant légèrement de la côte, non appendiculée.

Trois cubitales fermées : la 1^{re} plus longue que les deux suivantes réunies, la 2^e presque quadrilatère, recevant près de la ligne d'intersection des 2^e et 3^e, la 1^{re} nervure récurrente un peu flexueuse au bout. 3^e cubitale plus large que la 2^e, un peu rétrécie vers la radiale, recevant, passé son milieu, la 2^e nervure récurrente, appendiculée.

Pattes des ♂ difformes, tantôt renflées (les postérieures), tantôt munies de poils barbelés ou frisés en forme d'éventail.

Le sous-genre que je propose établit une transition naturelle entre les *Halictus* et les *Systropha*. Voir les caractères de ces derniers.

LUCASIUS (*HALICTUS*) *CLAVIPES*, L. Dufour. Pl. xxviii, fig. 5.

Niger, cinereo-rufo-vestitus. Abdomine convexo, subtiliter punctulato, cinereo-puberulo, segmentis basi niveo-fasciatis, ano fulvo. Pedibus nigris rufo-ferrugineo pilosis; alis fumatis; venis testaceis. ♀ ♂, tibiis posterioribus crassissimis, fulvo-penicillatis, tarsis ultimis

ferrugineis, 1° tarsorum intermediorum articulo pilis nigris rigidis barbato; 1° posticorum basi longo, lineari, apice dilatato.

♀. Noire. Antennes noires; face et corselet assez densément ponctués, leurs poils cendré roux. Abdomen en dessus convexe, allongé, très-finement ponctué, recouvert, sur les 3^e et 4^e segments, d'un léger duvet formé de petits poils blanc de neige. 5^e segment et anus garnis de poils roux doré. Base des 2^e, 3^e, 4^e segments ornée d'une bande de poils couchés, d'un blanc de neige. En dessous le bord des segments est testacé (chez les vieux sujets?) et garni de longs cils roux. Pattes noires, leurs poils roux un peu ferrugineux. Derniers articles des tarses ferrugineux. Ailes enfumées; point calleux, côte, nervures testacés.

♂. Chaperon noir un peu proéminent, côtés du labre terminés par une petite dent visible, lorsqu'on regarde l'insecte en dessous. 6^e segment et côtés de l'abdomen revêtus de longs poils roux. Pattes postérieures difformes: jambes en forme de pyramide, très-épaisses au bout, présentant en dessus, près de l'articulation tibio-tarsienne, une large fossette; elles sont hérissées de longs poils roux doré en dessous et sur les côtés. Tarses ferrugineux pâle. 1^{er} article des pattes intermédiaires barbelé de poils noirs, roides. 1^{er} article des tarses postérieurs filiforme dans ses deux tiers supérieurs, évasé au sommet et garni, ainsi que les suivants, de petits cils ferrugineux. Le reste comme dans la ♀.

Algérie. — France mérid. Iles de l'Archipel grec.

LUCASII COCHLEARITARSIS, Dours. Pl. XXVIII, fig. 4.

Niger, cinereo-vestitus, naso producto luteo. Antennis nigris subtus ferrugineis. Abdomine nigro, elongato; segmentis 2, 2 basi apiceque, reliquis apice solum niveo-fasciatis. Pedibus ferrugineo luteis, femoribus basi nigris; 1° tarsorum intermediorum longissimo, pallide aureo-ciliato; 2, 3, 4 longis pilis cochleariformibus penicillatis, infra albidis, supra ferrugineis. ♂

Long. corps, 14-16^{mm}; aile, 11-13^{mm}.

♂ noir. Antennes noires en dessus, jaunes ou ferrugineuses en dessous. Mandibules noires; face allongée, bord inférieur du chaperon jaune; ses poils cendrés, roux sur le vertex et le corselet. Abdomen en dessus linéaire, très-finement ponctué, convexe, presque nu, sauf sur le 1^{er} segment, qui est garni de poils cendré roux. Bords supérieur et inférieur des 2^e et 3^e segments ornés d'une bande de poils couchés courts, d'un blanc de neige, peu visible sur le 3^e, où elle est cachée par le 2^e. Chacun des autres segments porte sur son bord inférieur une bande semblable. En dessous, le ventre est concave, nu, avec le bord des segments testacé. Pattes d'un jaune mêlé de ferrugineux; trochanters et base des cuisses noirs. Jambes intermédiaires courtes, renflées. 1^{er} article des tarsi de cette paire très-long, garni, sur la tranche externe, de poils frisés blancs; 2^e, 3^e, 4^e articles de cette paire ornés d'une touffe de poils formant éventail, blancs en dessous, ferrugineux en dessus, crochets noirs. Ailes transparentes; point calleux, côte, nervures jaunes.

♀ inconnue.

Montpellier. — 10 mâles.

ANDRENA MESO-PYRRHIA, Sichel.

Nigra; thorace nigro; abdomine ferrugineo, 1^o basi, 4^o toto nigro, scopa fulva, alis fumatissimis, violaceis. ♀

Femelle : long. corps, 16-17^{mm}; aile, 13^{mm}.

♀. Noire; face assez finement ponctué, présentant une ligne bien distincte entre les antennes. Poils de la face noirs, lavés de ferrugineux, surtout vers le labre; mandibules testacées au bout. Corselet plus grossièrement ponctué que la face, hérissé de poils noirs, courts, rares sur le milieu, un peu plus abondants sur les côtés et en arrière, où ils deviennent roux foncé. Abdomen ellipti-

que, très-finement ponctué surtout sur le 1^{er} segment qui est ferrugineux avec sa base noire. 2^e, 3^e et base du 4^e segment ferrugineux plus ou moins obscur. Les 2/3 du 4^e et du 5^e sont souvent noirs. Le 5^e est recouvert de poils fauves couchés. En dessous, tous les segments sont ferrugineux, sauf le 5^e qui est noir. Leur base est ornée d'une bande de poils ferrugineux clairs sur les premiers, de noir ferrugineux sur le 5^e. Cuisses noires, leurs poils cendrés, courts sur les deux antérieures, très-longes sur les postérieures. Brosse formée de poils fauve doré; tarses ferrugineux. Ailes très-enfumées à reflet violet, leur bout noir. Point calleux, ferrugineux, obscur. Côte, nervures noires.

V. A. 1^{er} segment abdominal presque entièrement ferrugineux, 3^e plus ou moins maculé de noir.

Sub. V. A. 2^e, 3^e segments maculés de noir.

Mâle : long. corps, 15-16^{mm}; aile, 12^{mm}.

Plus grêle que la femelle. Chaperon jaune avec deux petits points noirs sur les côtés. Mandibules ferrugineuses au bout. Antennes noires avec un léger reflet testacé. Poils de la face, du corselet et des pattes, cendrés, un peu roux sur ces dernières. Poils des tarses en dessous, ferrugineux doré. Abdomen assez fortement ponctué, noir, sauf sur le tiers inférieur du 1^{er} segment qui est ferrugineux, ainsi que le 2^e tout entier, et les 2/3 supérieurs des 3^e, 5^e, 6^e segments et anus recouverts de poils fauves. Ailes noires, moins enfumées que dans la femelle. Point calleux, côte, nervures ferrugineux.

Sub. V. A. 2^e, 3^e segments plus ou moins maculés de noir.

Iles de l'Archipel grec. — Reçus en abondance.

Collec. Sichel, Dours.

ANDRENA BASALIS, Sichel.

Nigra, fulvo-villosa; facie, thorace pedibusque fulvo-hirsutis.

abdomine nigro; 1^o, 2^oque segmentis plus minus ferrugineis, fasciis albis; ano fusco-nigro. ♀

Long. corps, 15^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀ Face noire; chaperon assez fortement ponctué; ses poils roux mêlés de fauves sur son bord inférieur et près de l'insertion des antennes; celles-ci sont noires. Corselet finement ponctué, recouvert de poils fauves épais, plus pâles sur les côtés, cendrés en dessous. Abdomen nu, sans ponctuation appréciable, noir, sauf les 1^{er} et 2^e segments, qui sont plus ou moins ferrugineux clair. 1^{er}, 2^o, 3^e, 4^e segments ornés d'une bande de poils couchés blanchâtres, souvent roux, peu apparente sur le 1^{er}. 5^e segment recouvert de poils noirs, lavés de ferrugineux. En dessous, le 1^{er} et le 2^e segment en entier, la base des suivants sont ferrugineux et ciliés de longs poils roux. Pattes noires. Les poils des antérieures sont cendré roux; ceux des postérieures tout à fait roux. Brosse formée de poils fauves mêlés de cendrés. Tarses fauve doré. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures testacés.

V. A. Tous les segments noirs, sauf le 1^{er}, dont la base est bordée de ferrugineux.

Mâle : 1^o, 2^o, 3^o segmentis ferrugineis, plus minusve nigro maculatis.

Long. corps, 12^{mm}; aile, 10^{mm}.

Face noire assez fortement ponctué; ses poils noirs, mêlés de roux, surtout près de l'insertion des antennes, qui sont noires. Poils du corselet, roux, fauves chez les sujets frais, plus pâles en dessous et sur les côtés. Abdomen un peu ovale. 1^{er} segment noir, sauf le bord inférieur qui est ferrugineux. 2^e segment entièrement ferrugineux, sauf un point noir sur les côtés. 3^e segment plus ou moins maculé de noir. 4^e, 5^e, 6^e noirs; ce dernier, ainsi que l'anus, est recouvert de poils noir fauve. Base des 4 premiers segments ciliée de poils blancs, quelque-

fois de roux, peu abondants sur le premier. En dessous, les segments sont presque entièrement ferrugineux et ciliés de longs poils blancs un peu cendrés. Pattes noires, sauf les postérieures qui ont une tache ferrugineuse à la partie inférieure du tibia; leurs poils sont cendré roux. Tarses fauve doré. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures testacés.

Iles de l'Archipel grec. — Reçue en grand nombre.

Coll. Sichel, Dours.

Très-voisine de l'*A. albicrus*, dont elle semble être une variété méridionale.

ANDRENA PICCIOLII, Sichel.

Nigro-ferruginea, cinereo-villosa; fasciis scopaque albescentibus, ano fulvo, metatarsis ferrugineis. ♀

Long. corps, 12-13^{mm}; aile, 9-10^{mm}.

♀ Antennes ferrugineuses, sauf le 2^e et le 3^e article qui sont en partie noirs, une ligne saillante ferrugineuse entre l'insertion des antennes, coupant perpendiculairement la moitié supérieure de la face. Celle-ci noire, très-finement ponctuée sur le chaperon et le vertex, plus grossièrement sur le labre, ses poils cendrés un peu roux. Corcelet assez fortement ponctué, entièrement ferrugineux, si ce n'est sur le milieu du disque qui est noir. Les poils en dessus et en dessous cendré roux. Abdomen très-finement ponctué; 1^{er}, 2^e, 3^e segments plus ou moins ferrugineux, 4^e, 5^e noirs. 1^{er} segment hérissé de poils cendré roux, courts, très-rares sur les suivants. Anus recouvert de poils fauves. Base de tous les segments ornée d'une bande de poils couchés blancs, quelquefois un peu roux, à peine visible sur le premier. En dessous, tous les segments sont ferrugineux clair avec les cils cendré roux. Pattes noires avec une teinte ferrugineuse, les poils des antérieures

sont cendré roux, ceux des cuisses postérieures et de la brosse un peu blancs. 1^{er} article des tarses noir en dessus, fauve en dessous, les 4 derniers ferrugineux. Ailes enfumées avec une teinte fauve. Point calleux testacé clair; côte, nervures noires.

Mâle : long. corps, 9-10^{mm}; aile, 7^{mm}.

Antennes de couleur de poix avec une teinte plus foncée sur les deux premiers articles. Face finement ponctuée, noire, sauf le chaperon et les joues qui sont de couleur d'ivoire, 2 petits points noirs sur le chaperon, ses poils cendrés. Corselet assez fortement ponctué, ses poils roux, cendrés en dessous. Abdomen assez fortement ponctué, les 3 premiers segments plus ou moins ferrugineux, hérissés de poils cendrés assez longs sur le premier, très-courts sur le 2^e et surtout sur le 3^e; 4^e, 5^e et 6^e segments noirs avec une légère pubescence cendrée très-manifeste chez les sujets frais, quand on les regarde de côté. Anus revêtu de poils fauves. Chacun des segments est orné d'une bande de poils couchés blancs, quelquefois un peu roux. Pattes ferrugineux noirâtre, leurs poils cendrés. Tarses ferrugineux clair. Ailes enfumées, moins que dans la femelle.

V. A. Abdomen entièrement noir avec la bande des segments très-étroite.

Voisine de l'*A. basalis*.

Iles de l'Archipel grec. — Reçue en grand nombre.

Coll. Sichel, Dours.

ANDRENA FONSCOLOMBI, Sichel.

Nigra, cinereo vel rufo-villosa. Abdomine nigro, creberrime punctato, apice fusco, fasciis cinerescens vel rufescentibus, tarsis subtus fulvo-aureis. ♀

♀ Long. corps, 15^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀ Tête noire, aussi large que le corselet, fortement ponctuée; son bord postérieur profondément sinué. An-

tennes ferrugineuses, avec les 4 premiers articles noirs. Poils de la face blanchâtres, mêlés de roux près de l'insertion des antennes. Corselet fortement ponctué, ses poils cendrés, blancs en dessous et sur les côtés, roux sur le milieu. Abdomen noir à ponctuation serrée, profonde, hérissé de poils cendrés, courts, rares. Base de tous les segments ornée d'une bande de poils couchés, blanchâtres; bord inférieur du 5^e segment et anus recouverts de poils fauves. En dessous, les segments sont un peu ferrugineux et ciliés de poils cendrés, sauf sur le 5^e et l'anus, où ils sont fauves. Pattes noires, quelquefois lavées de ferrugineux; leurs poils en dessus cendrés, ceux des cuisses postérieures et de la brosse longs, épais, roux cendré. Tarses en dessous fauve doré. Ailes enfumées. Point calleux testacé. Côte, nervures brunes.

V. A. Bord inférieur des segments orné d'une bande de poils fauves.

Mâle : long. corps, 12^{mm}; aile, 9^{mm}.

Tête noire aussi large que le corselet, fortement ponctué; son bord postérieur profondément sinué. Antennes ferrugineuses, sauf les 4 premiers articles qui sont noirs. Poils de la face cendré roux; chaperon et joues jaunes, le 1^{er} ayant deux petits points noirs sur les côtés. Mandibules noires, un peu ferrugineuses au bout. Corselet fortement ponctué, ses poils cendrés, blancs en dessous et sur les côtés, roux sur le milieu. Abdomen noir, ovale, finement ponctué; chacun des segments portant une bande de poils blanchâtres, couchés; anus légèrement roussâtre. Pattes noires, leurs poils cendrés. Tarses en dessous fauve doré. Ailes enfumées. Point calleux, côte, nervures ferrugineux.

Iles de l'Archipel grec. — Reçue en grand nombre.

Très-voisine de l'*A. labialis*, le mâle surtout.

V. A. Bord inférieur des segments abdominaux orné d'une bande de poils fauves.

Coll. Sichel, Dours.

ANDRENA ATRO-RUBRICATA, Dours.

Atra, atro-ferrugineo-hispida. Abdomine fortiter punctato, scopa subtus atro-ferruginea. Alis fumatis. ♀

Long. corps, 14-15^{mm}; aile, 10-11^{mm}.

♀. Noire. Tête grossièrement ponctuée; ses poils noirs mêlés de ferrugineux, surtout près de l'insertion des antennes et sur le bord libre du chaperon. Corset très-grossièrement ponctué, recouvert, en dessus et en dessous, de poils d'un ferrugineux sombre, un peu plus pâles sur les côtés et en arrière, où ils forment une frange droite. Abdomen, en dessus, très-régulièrement ponctué, sans rides. 1^{er} segment hérissé de poils ferrugineux sombres, courts, dressés. Base des 2^e, 3^e, 4^e de couleur testacée obscure avec des poils ferrugineux plus épais sur les côtés. Quelques poils noirs sur le 5^e segment. Anus garni de poils ferrugineux couchés. En dessous, le bord des segments est plus largement teinté de ferrugineux, les poils ferrugineux-pâle. Pattes noires. Hanches hérissées de poils roux frisés. Brosse en dessus formée de poils roux ferrugineux. Tarses noirs lavés et ferrugineux. Ailes assez enfumées, surtout au bout. Côte noire. Point calleux et nervures de couleur ferrugineuse claire.

Algérie. — Coll. Dours.

Voisine de l'*A. rubricata* Smith.

ANDRENA ARIETINA, L. Dufour. (Pl. xxviii, fig. 6 et 7.)

Nigra, cinereo-fusco hirsuta; antennis pedibusque ferrugineis, his fusco lanatis, alis fumatis, nervis testaceis ♀.

Long. corps, 14^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire; antennes ferrugineuses, surtout vers les derniers articles. Face noire, très-finement ponctuée, recouverte de poils noirs, de poils roux centré sur les côtés

et en dessous. Corselet en dessus, hérissé de poils cendrés sur les côtés et à la partie postérieure, de brun roux à la partie antérieure, où ils forment un collier épais. Abdomen finement ponctué, déprimé. 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments hérissés de poils cendrés longs, surtout sur les trois premiers; plus courts et mêlés de roux sur le 4^e. 5^e segment et anus recouverts de poils longs ferrugineux, couchés. En dessous, les segments sont plus velus, mais leur bord est cilié de longs poils cendré roux sur les 4 premiers, de roux pur sur le 5^e. Pattes ferrugineuses; poils des cuisses longs, cendrés, ceux des jambes et des tarses ferrugineux avec quelques poils blancs, surtout sur les jambes postérieures en dessus. Ailes un peu enfumées. Point calleux, côte, nervures de couleur testacée claire.

Algérie. — 4 exemplaires.

Appartient au groupe de l'*A. clarkella*.

Collect. L. Duf., Dours.

♂. De moitié plus petit, plus grêle, mais absolument semblable à la femelle pour la couleur des poils qui, quelquefois cependant, sont un peu plus cendrés.

Algérie.

Coll. Dours.

ANDRENA MELANARIA, Sichel.

Nigra, cinereo-hirsuta. Thorace cinereo, in medio nigro. Pedibus nigris, ferrugineo-fumatis ♀.

Long. corps, 14-15^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire; face fortement ponctuée, ses poils cendrés; mandibules ferrugineuses au bout. Poils du vertex noirs; ceux du corselet, en dessus, en avant, en arrière, sur les côtés et en dessous, cendrés, noirs, hérissés au milieu, où ils forment une grande tache carrée. Abdomen brillant, très-finement ponctué; 1^{er} segment hérissé de poils cendrés, couchés, peu épais. Base des 2^e, 3^e, 4^e garnie de

poils de cette couleur, couchés, à peine apparents chez les sujets usés, plus nombreux sur les côtés; 5^e segment ayant des poils ferrugineux mêlés aux poils cendrés. Poils des deux paires de pattes antérieures, noirs, lavés de ferrugineux; ceux des cuisses postérieures cendré roux, ceux des jambes et du 1^{er} article des tarses postérieurs noirs, lavés de ferrugineux. Derniers articles des tarses de toutes les paires ferrugineux clair. Ailes enfumées, surtout vers le bout. Point calleux, côte, nervures de couleur noire un peu testacée.

Mâle; de moitié plus petit que les femelles, plus grêle. Pubescence en général cendrée, lavée de ferrugineux sur toutes les pattes. Ailes noires, enfumées; côte, nervures brunes.

C'est certainement une forme méridionale de l'*A. pilipes*.

Une anomalie fréquente se rencontre dans l'*A. melanaria*. La 2^e cellule cubitale est plus large que dans l'*A. pilipes*.

Le mâle est très-difficile à distinguer de l'*A. pilipes*.

Reçue en abondance de l'Algérie.

Collection Sichel, Dours.

ANDRENA NIGRO-SERICEA, DOURS.

Atra, nigro-cinereo hirta; thorace in medio nigro-hirto; segmentis 1, 2, 3 cinereo-villosis, reliquis nigris; scopa fulvo-aurea; tarsi nigris ♀.

Long. corps, 13-14^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire. Poils de la face noirs, lavés de roux sur le bord inférieur du chaperon. Corselet hérissé de poils roux cendré à la partie antérieure, postérieure et sur les côtés, de noirs sur le milieu. Abdomen ovale, un peu déprimé, très-finement ponctué. 1^{er}, 2^e, 3^e segments recouverts de poils roux-cendrés assez longs, un peu pâles

sur les côtés; 4^e et 5^e ayant des poils noirs avec une légère teinte ferrugineuse. En dessous, tous les segments sont garnis de poils ferrugineux courts, leur bord est cilié de poils blanchâtres. Pattes noires, leurs poils ainsi que la brosse ferrugineux doré. Articles des tarses noirs avec des poils courts, ferrugineux, dorés. Ailes transparentes, à peine enfumées au bout. Point calleux noir lavé de ferrugineux. Côte, nervures de couleur ferrugineuse pâle.

V. 1. *Scopa atra* vix pilis ferrugineis raris intermixtis.

Mâle : long. corps, 9^{mm}; aile, 7^{mm}.

Antennes noires dépassant à peine l'insertion de l'aile, leurs articles très-distincts. Tête noire, de la largeur du corselet, très-finement ponctuée; ses poils noirs mêlés de roux sur le milieu. Poils du corselet en arrière et sur les côtés, roux, noirs sur le milieu. Abdomen très-finement ponctué. 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments hérissés de poils roux, un peu plus pâles sur les côtés. Pattes noires, leurs poils ferrugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout. Point calleux noir, lavé de ferrugineux. Côte, nervures de couleur ferrugineuse pâle.

Algérie, reçue en grand nombre (Ponteba).

Cette espèce est très-voisine de l'*A. nigro-ænea* K., dont ce n'est peut-être qu'une variété méridionale. Je possède, en effet, des individus *nigro-ænea* provenant de l'Algérie, chez lesquels les poils du corselet sont mêlés de noirs sur le milieu. Les tarses sont aussi, chez eux, noirs, avec des poils à peine ferrugineux.

Coll. Dours.

ANDRENA SOROR, L. Duf.

Nigra, niveo-villosa; thorace albido-hirto in medio nigro. Abdomine nigro, marginibus niveis, in detritis solum lateribusque niveo-maculatis; scopa fulvo-aurea. Alis fumatis ♀.

Long. corps, 14^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire; poils de la face, du corselet, en dessus, en

dessous et sur les côtés, d'un blanc de neige mêlé de noir sur le disque. Abdomen très-finement ponctué. 1^{er} segment hérissé de poils blancs, 2^e, 3^e et 4^e nus; 5^e revêtu de poils noirs lavés de ferrugineux. Base des 2^e, 3^e, 4^e ornée d'une bande assez large de poils couchés, interrompus au milieu par l'usure. Poils des pattes antérieures cendré roux, ceux des cuisses postérieures longs, entièrement blancs, si ce n'est près de l'articulation de la jambe, où ils sont fauves. Brosse formée de poils fauve doré. En dessous, les poils sont noirs, ainsi que sur les 4 premiers articles des tarses. Ailes enfumées. Point calleux, côte, nervures noirs lavés de ferrugineux.

Mâle : long. corps, 10^{mm}; aile, 8^{mm}.

Noir; face ponctuée; ses poils, ceux du corselet, en dessus et sur les côtés, d'un blanc de neige avec quelques poils noirs sur le disque. Abdomen finement ponctué revêtu de poils courts, cendrés, excepté sur le 6^e segment et l'anus, où ils sont noir ferrugineux, couchés. Base des 4 premiers segments ornée d'une bande de poils blanc de neige, se réduisant par l'usure en une simple tache sur chacun des bords latéraux. Poils des pattes cendrés, lavés de ferrugineux. Ailes enfumées. Point calleux, côte, nervures lavés de ferrugineux.

Algérie. Espagne. — Collection L. Dufour, Dours.

Cette espèce, très-distincte, forme la transition entre l'*A. lugubris* Luc. et l'*A. funebris* Panz.

ANDRENA HETEROXANTHA, Sichel.

Nigra, uigro-fulvo-cinereo hispida. Abdomine rufo hirsutissimo, fasciis 2, 3, 4 cinerescens, 5^a fimbriataque nigris. Pedibus nigris, scopa fulva. Alis hyalinis. ♀

Long. corps, 14^{mm}; aile, 11^{mm}.

♀. Noire. Antennes noires. Poils de la face cendrés sur le chaperon, roux sur le bord inférieur du labre, mêlés de noirs entre l'insertion des antennes et sur le vertex.

Poils du corselet en dessus très-abondants, mêlés de noirs sur le milieu, roux en arrière et sur les côtés. Abdomen en dessus ovale, 1^{er}, 2^e et base du 3^e segment hérissés de poils roux, longs, touffus surtout sur les deux premiers. 5^e segment et anus garnis de poils noirs. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e orné d'une bande de poils couchés, courts, blanchâtres. En dessous, les segments sont ciliés de poils cendrés. Pattes noires. Poils des cuisses cendrés; ceux de la brosse roux doré, touffus, ceux des tarses plus obscurs. Ailes transparentes; point calleux, côte, nervures testacés.

♂. A peine un peu plus grêle que la femelle, à laquelle il ressemble entièrement, sauf le chaperon, qui est jaune, avec deux points noirs sur les côtés.

Algérie. — Coll. Sichel, Dours.

Voisine de l'*E. bipartita* Luc. Le mâle surtout est très-différent. *A. bipartita*, ♂, a la face noire, les poils peu abondants, l'abdomen sans bandes, etc., etc.

ANDRENA PICEICORNIS, L. Duf. (Pl. xxviii, fig. 9.)

Nigra, nigro-albida, villosa, punctatissima; fasciis albidis; antennis pedibusque piceis, his albido-villosis; alis fumatis, nervis ferrugineis. ♀

Long. corps, 14-15^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire; tête très-grosse, profondément ponctuée. Antennes couleur de poix, avec une nuance plus claire en dessous. Mandibules noires; un point ferrugineux, clair à la base. Poils de la face cendrés, abondants, avec une nuance rousse près de l'insertion des antennes et sur le bord libre du chaperon. Corselet très-fortement ponctué, recouvert, en dessus et en dessous, de poils cendrés légèrement roux. Abdomen ovale, un peu déprimé, finement ponctué. 1^{er} segment recouvert de poils cendré roux. Les autres segments noirs. Base des 4 premiers segments ornée d'une bande de poils courts, couchés, d'un blanc assez éclatant; base du 5^e segment et anus recouverts de

poils roux. En dessous, l'abdomen est garni de poils cendré roux. Pattes d'un ferrugineux noirâtre, hérissées de poils cendré roux. Tarses de couleur plus claire. Ailes enfumées; point calleux testacé clair; côte, nervure ferrugineuses.

Mâle. Long. corps, 10^{mm}; aile, 7-8^{mm}.

Absolument semblable à la femelle, sauf le labre, qui est jaune, avec un point noir de chaque côté. Antennes moniliformes, noueuses, à reflets ferrugineux.

Appartient au groupe de l'*A. labialis*.

France méridionale. Saint-Sever (L. Dufour). Bordeaux (Péres). Coll. Dours.

ANDRENA INSOLITA, L. Duf.

Nigra, rufo-villosa. Abdomine ovato, 1^o segmento sparse, 4^o, 5^o anoque rufo-fulvo-villosis. Tarsis ferrugineis. ♀

Long. corps, 15^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Antennes noires lavées de ferrugineux; face fortement ponctuée, ses poils roux épais. Mandibules noires, un gros tubercule ferrugineux à leur base. Corselet assez fortement ponctué, ses poils en dessus, en dessous et sur les côtés roux. Abdomen ovale, finement ponctué. 1^{er} segment hérissé de poils roux peu épais, 2^e, 3^e nus, 4^e, 5^e et anus revêtus de poils roux très-épais un peu fauves sur le milieu. Chacun des segments est orné d'une bande de poils roux foncé, peu apparente sur le 1^{er}. En dessous le bord des segments est ferrugineux clair avec les cils fauves. Pattes noires, leurs poils roux; ceux des cuisses postérieures et ceux de la brosse un peu cendrés. Tarses ferrugineux clair. Ailes enfumées; point calleux couleur de poix. Côte, nervures brunes.

Mâle. Long. corps, 12^{mm}; aile, 9^{mm}.

Antennes de couleur ferrugineux-sombre, sauf le devant du 1^{er} article, le 3^e et le 4^e en entier qui sont noirs. Face

assez fortement ponctuée, hérissée de poils roux. Chape-ron, joues de couleur d'ivoire avec deux points noirs sur les côtés du 1^{er}. Mandibules noires avec une forte teinte ferrugineuse au bout et à la base. Corselet fortement ponctué, hérissé de poils roux, plus pâles en dessous. Abdomen finement ponctué, ovale. 1^{er} segment hérissé de poils cendrés, courts, rares; 4^e, 5^e, 6^e et anus recouverts de poils couchés, fauves; base de tous les segments de couleur plus ou moins ferrugineuse ornée d'une bande de poils roux couchés. En dessous, les segments sont ferrugineux avec quelques teintes noires, leurs cils roux. Pattes noires, les antérieures lavées de ferrugineux, leurs poils roux cendré. Tarses ferrugineux. Ailes enfumées; point calleux, couleur de poix. Côte, nervures ferrugineuses.

Appartient au groupe de l'*A. labialis*.

Espagne. Algérie. — Coll. L. Dufour, Dours.

ANDRENA CHRYSOPYGA, L. Duf. (Pl. xxviii, fig. 10.)

Nigro-ferruginea, fulvo-aureo vestita. Thorace ochraceo-hirto. Abdominis segmentis 1, 3 basi nigris, reliquis ferrugineo-fulvo pruinosis, fasciis ochraceis, ano læte fulvo-aureo. Femoribus nigris, tibiis tarsisque læte ferrugineo-aureis. Alis luteo-fumatis, iridescentibus. ♀

Long. corps, 14^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire. Antennes lavées de ferrugineux à partir de l'extrémité supérieure du 2^e article. Mandibules ferrugineuses, surtout à la base. Poils de la face et du vertex roux doré. Corselet en dessus fortement ponctué, recouvert sur les deux tiers antérieurs d'un plastron formé de petits poils épais couleur d'ocre, plus longs, moins foncés sur les côtés et surtout sur le tiers postérieur. Abdomen ovale un peu convexe, assez fortement ponctué, recouvert de petits poils roux semblables à un léger duvet. Base des 1^{er} et 3^e segments noire. Les autres segments sont de couleur ferrugineuse plus ou moins foncée. Bord inférieur de

tous les segments orné d'une bande de poils courts, couchés, couleur d'ocre. 5^e segment et anus garnis de poils ferrugineux doré. Cuisses noires ; tibias, tarsi ferrugineux doré avec leurs poils de cette couleur, ceux des cuisses sont cendrés. Ailes jaunes avec le bout très-enfumé, les postérieures présentent quelques reflets irisés ; point calleux testacé ; côte, nervures brunes.

Mâle inconnu.

Algérie. — Coll. L. Dufour, Dours. Voisine d'*A. pruinosa* Erich.

ANDRENA SUCCINEA, L. Duf. (Pl. xxviii, fig. 11.)

Nigro-carnea. Thorace ochraceo vestito. Abdomine carneo, subtiliter punctulato, niveo puberulo, fasciis 1, 2, 3, 4 albidis ; 5^e segmento anoque fulvo-aureis. Pedibus pallide ferrugineis. Alis fumatis. ♀

Long. corps, 14^{mm} ; aile, 11^{mm}.

♀. Noire sur la tête et le corselet, de couleur de succin partout ailleurs. Antennes noires lavées de ferrugineux. Poils de la face roux pâle. Mandibules ferrugineuses ; corselet en dessus portant un plastron formé de poils très-courts, couleur d'ocre, et occupant ses deux tiers supérieurs ; ces poils sont plus pâles, plus longs sur les côtés, en dessous et en arrière. Abdomen en dessus couleur de chair ou de succin (un point noir se remarque de chaque côté du 1^{er} segment), très-finement ponctué et hérissé de poils très-courts semblables à un léger duvet ; ces poils constituent sur le bord inférieur des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments une bande continue très-marquée ; 5^e segment et anus revêtus de poils dorés. En dessous, les segments sont ciliés de longs poils cendré roux. Pattes entièrement de couleur ferrugineuse pâle. Poils des cuisses cendrés, ceux de la brosse roux. Ailes enfumées au bout ; point calleux, côte, nervures testacés.

Mâle inconnu.

Algérie. — Coll. L. Dufour, Dours.

Ce n'est peut-être qu'une variété de l'*A. chrysopyga* mais la ponctuation est plus fine, les ailes moins enfumées sans coloration jaune, etc., etc.

ANDRENA TRACHYDERMA, Dours.

Nigra, rufo-hirsuta, thorace rufo in medio nigro. Abdomine depresso, aspero, creberrime punctulato, fasciis 2, 3, 4 albescentibus angustissimis, 5^o segmento anoque fulvis. Pedibus nigris, scopa atroferruginea. Alis vix fumatis, venis uigris. ♀

Long. corps, 13,14^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire, d'un aspect rugueux. Antennes assez courtes, 1^{er} article atteignant à peine le bord interne des yeux; face finement ponctuée, entièrement recouverte de poils roux. Corselet en dessus assez fortement ponctué, ses poils roux en avant et en arrière, pâles en dessous et sur les côtés, noirs au centre qui est souvent dénudé par l'usure. Métathorax très-finement ridé. Abdomen un peu déprimé, mat, finement ponctué, recouvert de poils roux courts assez abondants sur le 1^{er} segment et sur les côtés, rares sur les autres. 5^e segment et anus recouverts de longs poils fauves. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande très-étroite de poils courts blanchâtres. En dessous les poils sont roux. Pattes noires, leurs poils noirs lavés de ferrugineux; genoux postérieurs, brosse et 1^{er} article des tarses en dessous d'un beau ferrugineux avec quelques poils noirs sur l'extrémité inférieure de ce dernier. 2^e, 3^e, 4^e articles noirs, 5^e ferrugineux pâle. Ailes à peine enfumées; point calleux, côte, nervures noirs.

♂. Semblable à la femelle, sauf les joues et le chaperon qui sont jaunes; ce dernier porte, en outre, deux petits points noirs sur les côtés.

France méridionale. Coll. Dours.

Appartient au groupe de l'*A. labialis*.

ANDRENA NIGRO-STINCTA, Dours.

Nigra, sordide ferrugineo-pilosa. Abdomine nigro, depresso, punctato. Fasciis sordide ferrugineis, ano nigro. Pedibus nigris, scopa cinereo-ferruginea. Alis fumatis, venis pallidis. ♀

Long. corps, 12,13^{mm}; aile, 17^{mm}.

♀. Noire ; 1^{er} article des antennes atteignant à peine le bord interne des yeux. Poils de la face d'un ferrugineux sale. Corselet en dessus grossièrement ponctué, très-finement ridé sur le métathorax, ses poils noir ferrugineux, plus pâles en arrière, où ils forment une frange un peu frisée en dedans. Abdomen en dessus noir, déprimé, un peu luisant, finement ponctué, presque nu, sauf sur le 1^{er} segment, où se voient quelques poils courts, hérissés, roux ; 5^e segment et anus noirs. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande très-étroite de poils ferrugineux noir, couchés, un peu interrompue sur le milieu des 2^e et 3^e. En dessous, les segments ont de longs cils ferrugineux. Pattes noires, poils des cuisses et de la brosse cendré ferrugineux. Ailes un peu enfumées ; point calleux, côte, nervures pâles.

♂. Semblable à la ♀, sauf les joues et le chaperon qui sont jaunes ; ce dernier porte, en outre, deux points noirs sur les côtés.

Algérie. France méridionale.

Appartient au groupe de l'*A. labialis*.

ANDRENA PLANIVENTRIS, Dours. (Pl. xxviii, fig. 12-13.)

Nigra, cinereo-fusco hirta. Abdomine nigro, plano, nitido, subtiliter punctulato, 1^o segmento cinereo hirta, reliquis nigris, fasciis 1, 2, 3, 4 niveis, 5^e anoque ferrugineis. Pedibus nigris, tarsi ferrugineis, flocculo albido, scopa cinereo-fusca. Alis fumatis, venis fuscis. ♀

Long. corps, 13,14^{mm}; ailes, 9^{mm}.

♀. Noire ; antennes ferrugineuses en dessous à partir

du 3^e au 4^e article. Chaperon un peu bombé, fortement ponctué. Face très-finement ridée, avec la fossette intra-orbitaire profonde, atteignant le dernier ocelle. Poils de la face cendré brun, roux sur le bord inférieur du labre. Corselet finement ponctué, ses poils en dessus roux, cendrés en arrière et en dessous. Abdomen très-déprimé, elliptique, brillant, très-finement ponctué (à la loupe). 1^{er} segment hérissé de poils cendrés, les suivants nus; le bord inférieur des 4 premiers est de couleur testacée et orné d'une bande de poils couchés, courts, d'un blanc de neige; le 5^e et l'anus ont des poils roux. Pattes noires, sauf les tibias postérieurs et les tarses de toutes les paires, qui sont plus ou moins ferrugineux; leurs poils cendré roux; flocculus assez épais, blanchâtre; poils de la brosse cendré roux. Ailes un peu enfumées; point calleux, côte, nervures bruns.

♂. De moitié plus petit que la ♀, entièrement recouvert de poils cendrés, sauf sur le corselet, où ils sont roux. Face et antennes noires.

Algérie. — Coll. Dours. 11 ♀, 4 ♂.

ANDRENA GRISEO-BALTEATA, Dours.

Nigra, cinereo-rufo-hirsuta. Abdomine depresso, levissime punctulato, cinereo-puberulo, marginibus 1, 2, 3 testaceo lineatis, fasciis griseo-albidis, ano rufo. Pedibus fusco-ferrugineis, albo-hirsutis. Alis fumatis. ♀

Long. corps, 12^{mm}; aile, 9^{mm}.

♀. Noire; antennes ferrugineuses au bout. Corselet fortement ponctué, ses poils en dessus cendré roux, blanchâtres en dessous. Abdomen déprimé, brillant, très-finement ponctué (à la loupe). Base du 1^{er} segment ayant quelques poils hérissés roux, les suivants sont recouverts de petits poils pulvérulents, cendré roux; anus roux. Bord inférieur des 1^{er}, 2^e, 3^e segments plus ou moins testacé, orné, ainsi que le 4^e, de poils courts cendré roux.

Pattes d'un ferrugineux obscur, avec les tarses plus clairs; les poils du flocculus et de la brosse sont blanchâtres. Ailes enfumées; point calleux assez pâle; côte, nervures plus foncées.

Midi de la France, Saint-Sever (Landes). Algérie.

Coll. L. Dufour, Dours.

ANDRENA STRIGOSA, Dours.

Nigra, rufo-cinereo-pilosa. Abdomine creberrime punctulato, fasciis latis, albido rufis, integerrimis, ano fusco-piloso. Pedibus nigris, scopa cinerea, tarsis ultimis ferrugineo-pallidis. Alis vix fumatis, venis pallidis. ♀

Long. corps, 13^{mm}; aile, 19^{mm}.

♀. Noire, tête orbiculaire; antennes longues; 1^{er} article atteignant le bord interne des yeux. Face ridée à sa partie supérieure, finement ponctuée sur le chaperon; ses poils roux. Corselet en dessus grossièrement ponctué, finement ridé à sa partie postérieure; ses poils roux, hérissés, abondants, un peu plus pâles en dessous et sur les côtés. Abdomen ovale, légèrement déprimé, à ponctuation très-fine, diffuse, hérissé de quelques poils roux plus abondants sur le 1^{er} segment. Poils de l'anus ferrugineux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils cendré roux, assez large, continue. En dessous, les segments sont ciliés de longs poils roux. Pattes noires; leurs poils ferrugineux, ceux de la brosse en dessous cendré roux. Derniers articles des tarses d'un ferrugineux pâle. Ailes un peu enfumées au bout; point calleux, côte, nervures de couleur testacée pâle.

♂. Plus grêle que la femelle; à laquelle il ressemble, sauf les différences suivantes: chaperon jaune ou de couleur d'ivoire avec deux petits points noirs sur les côtés. Poils du dessous des tarses roux.

Midi de la France.— Coll. Dours.

Cette espèce appartient au groupe de l'*A. labialis* par

les antennes dont le 1^{er} article atteint le bord interne des yeux; au groupe d'*extricata* par la forme de son abdomen à fascies continues, larges, etc., etc.

ANDRENA BOYERELLA, L. Duf.

Nigra, nitida, rufo-cinereo hirsuta. Abdomine nigro, nitido, depressiusculo, punctato, segmentorum fasciis 2, 3, 4 cinereis, vel niveis, 5^o anoque fuscis. Pedibus nigris, scopa tarsorumque posticorum 1^o articulo, rufo-cinereo vestitis. Alis hyalinis, venis fuscis. ♀

Long. corps, 10^{mm}; aile, 7^{mm}.

♀. Noire, brillante. Antennes noires, moitié supérieure de la face ridée, ponctuée sur le chaperon et les joues. Poils de la face et du vertex cendrés, abondants. Corselet en dessus assez fortement ponctué, reconvert de poils cendré roux, presque blancs en dessous. Abdomen en dessus allongé, un peu déprimé, brillant, fortement ponctué, hérissé de poils courts, cendrés, formant, sur le bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments, une bande étroite, d'un blanc de neige chez les sujets frais, devenant grise au bout de très-peu de temps. 5^e segment et anus, recouverts de poils bruns. En dessous, les segments sont ciliés de longs poils cendré roux. Pattes noires, leurs poils cendré roux. Dernier article des tarses noir. Ailes transparentes; point calleux noir; côté, nervures un peu plus pâles.

♂. Un peu plus petit que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement; sauf les antennes qui sont lavées de ferrugineux, le chaperon jaune avec les poils de la face plus longs, plus touffus.

France méridionale, Algérie. Coll. Dours, L. Dufour, qui l'a dédiée à feu M. Boyer de Fonscolombe.

ANDRENA GRAVIDA, Dours. (Pl. XXVIII, fig. 14.)

Nigra, fusco, cinereo hirsuta, punctatissima. Abdomine nudo, elliptico, in medio latiori. Segmentis 2, 3, 4 niveo marginatis, 2^o fim-

bria interrupta. Pedibus nigro-ferrugineis. Flocculo albido, scopa cinerea. Tarsis aureo-ferrugineis. Alis limpidis, venis fuscis. ♀.

Long. corps, 11^{mm}; aile, 9^{mm}.

♀. Noire; antennes noires; mandibules ferrugineuses au bout. Tête arrondie, ponctuée; les poils cendré roax. Corselet assez fortement ponctué, les poils en dessus roux, plus pâles sur les côtés et en dessous. Abdomen elliptique très-élargi au niveau des 2^e et 3^e segments, nu, assez fortement ponctué. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments cilié de poils couchés, courts, d'un blanc de neige. Les poils du 5^e segment et de l'anüs sont roux doré. En dessous, le bord des segments est cilié de longs poils cendrés. Pattes noires. Tibias intermédiaires et postérieurs ferrugineux obscur. Tarses ferrugineux doré. Cuisses postérieures hérissées de poils blancs frisés, brosse cendré roux. Ailes assez limpides; point calleux testacé, noir au centre; côte, nervures brunes.

♂. Plus grêle que la femelle. Chaperon jaune avec deux petits points noirs sur les côtés; ses poils blancs, ceux de la tête et des autres parties du corps cendrés. Le reste comme dans la femelle.

Iles de l'archipel grec. Algérie. — Reçue en grand nombre. Coll. Dours.

Appartient au groupe de l'*A. proxima*.

ANDRENA POUPILLIERI, Dours. (Pl. xxviii, fig. 15.)

Nigra, cinereo-albido-villosa; abdomine cordiformi, fasciis albidis 1, 2 interruptis, ani fimbria sordide fulva. Pedibus fusco-migris, argenteo-lanatis, pilis ferrugineis intermixtis. ♀

Long. corps, 12^{mm}; aile, 9^{mm}.

♀. Tête un peu plus large que le corselet, très-finement ponctuée et ridée sur le chaperon, recouverte partout de poils blancs, excepté sur le vertex et sur le bord libre du chaperon, où ils sont lavés de ferrugineux. Corselet assez

fortement ponctué en avant et sur le disque, ridé à sa partie postérieure et recouvert de poils blancs, surtout sur les côtés et en arrière, où ils forment une frange recourbée. Abdomen, en dessus, nu, convexe, cordiforme, très-finement ponctué (à la loupe). Bord inférieur des 4 premiers segments orné d'une bande étroite de poils couchés, blancs, interrompue sur le 2^e et surtout sur le 1^{er}. 5^e segment et anus garnis de poils cendré roux. En dessous le bord des segments est cilié de poils blancs assez longs. Pattes noires : poils des hanches blancs, longs sur les postérieures ; brosse formée de poils blancs avec une teinte ferrugineuse à l'insertion de la cuisse avec le tibia, et de celui-ci avec le 1^{er} article des tarses, qui est ferrugineux noir en dessus, plus clair en dessous et sur les côtés. Les derniers articles des tarses sont ferrugineux noir. Ailes enfumées ; point calleux testacé clair ; côte, nervures brunes.

♀. Plus grêle que le mâle ; pubescence plus rousse sur le corselet. Coll. Dours.

Algérie. *Voisine d'Afzeliella*.

Je dédie cette espèce à M. Poupillier, dont la science déplore la mort prématurée.

ANDRENA FERRUGINEI-CRUS, Dours.

Nigra, aureo-ferrugineo hirsuta ; abdomine nigro lævissime ruguloso ; femoribus nigris, tibiis tarsisque ferrugineis, aureo-ferrugineo hirsutis. Alis vix fumatis, venis nigro-testaceis. ♀

Long. corps, 11-12^{mm} ; aile, 10^{mm}.

♀. Noire ; tête très-finement ponctuée ; les poils roux mêlés de noirs surtout sur le vertex et entre l'insertion des antennes qui n'atteignent pas l'insertion de l'aile et qui sont noires. Poils du corselet longs, épais, d'un ferrugineux doré en dessus, en arrière et sur les côtés, mêlés de noirs sur le disque, un peu cendrés en dessous. Abdomen

en dessus noir, un peu bombé, très-finement ponctué et ridé surtout sur les 3 derniers segments. Le 1^{er} est hérissé de poils ferrugineux doré assez longs, les 2^e, 3^e, 4^e de poils plus courts, plus ternes, le 5^e de poils couchés, noirs, lavés de ferrugineux. En dessous, les segments ont le bord inférieur cilié de poils roux cendré. Pattes antérieures noires avec quelques poils courts ferrugineux. Cuisses intermédiaires et postérieures noires. Tibias et tarses des deux dernières pattes ferrugineux doré avec des poils de cette couleur. Ailes à peine enfumées; point calleux; nervures noires lavées de ferrugineux.

V. Poils des pattes un peu plus sombres que dans le type.

♂. Entièrement semblable à la femelle, sauf la taille qui est grêle. 6^e segment cilié, comme les précédents, de poils ferrugineux doré, mais plus longs.

Algérie. — Coll. Dours.

Voisine de *Russula*, Lep.

ANDRENA USTULATA, DOURS.

Nigro-ferrugineo hirsuta, abdomine nigro, nudo (in senioribus), lævissime ruguloso; femoribus nigris, tibiis tarsisque ferrugineis, nigro-ferrugineo hirsutis. Alis fumatis, venis ferrugineis. ♀

Long. corps, 11-12^{mm}; aile, 10^{mm}.

♀. Noire; face ponctuée, ridée; ses poils courts, noirs, mêlés de roux à la base du chaperon. Antennes atteignant à peine l'insertion des ailes, lavées de ferrugineux dans les 9 derniers articles. Poils du corselet ferrugineux, mêlés de noirs sur le disque, de roux sur les côtés et en dessous. Abdomen noir, aplati, presque nu, sans ponctuation appréciable sur les 3 premiers segments, plus marquée et légèrement rugueuse sur le 4^e et le 5^e. 1^{er} segment hérissé de poils couchés, noirs, un peu lavés de ferrugineux. En dessous, les segments sont ciliés de poils blanchâtres. 1^{re} et 2^e paires de pattes et cuisses postérieures noires, hé-

rissées de poils ferrugineux plus ou moins foncés. Tibias postérieurs et tarses, de toutes les paires, ferrugineux, hérissés de poils de cette couleur, plus pâles en dessous. Ailes enfumées; point calleux noirâtre; nervures ferrugineuses.

V. Tarses postérieurs noirs.

♂. Noir, plus grêle que la ♀, entièrement hérissé de poils roux. Abdomen un peu plus finement ponctué.

Algérie. — 5 ♀ 2 ♂. — Coll. Dours.

Voisine de *fusca*, Lep.

ANDRENA RUFO-HISPIDA, Dours.

Nigra, rufo-hispida. Abdomine nigro, depresso, creberrime punctulato, segmentorum marginibus testaceis, rufo-ciliatis, ano fulvo. Femoribus nigris, tibiis 2, 3 tarsisque totis læte ferrugineis. Alis fumatis. ♀

Long. corps, 11-12^{mm}; aile, 7^{mm}.

♀. Noire; derniers articles des antennes ferrugineux en dessous; face finement ridée, ponctuée sur le chaperon; ses poils roux. Poils du corselet en dessus roux, plus pâles en dessous et sur les côtés. Abdomen en dessus noir, déprimé, très-finement ponctué surtout à partir du 2^e segment, hérissé de poils roux plus abondants sur le 1^{er} segment. Bord inférieur de tous les segments de couleur testacée et orné d'une bande de longs cils roux cendré. Poils de l'anus roux doré. En dessous, la ponctuation est plus prononcée et les cils sont roux. Cuisses et jambes des deux 1^{res} paires, noires. Jambes postérieures et tarses de toutes les paires d'un ferrugineux doré. Poils de la brosse de cette couleur, ceux des cuisses roux cendré. Ailes un peu enfumées; point calleux, côté, nervures bruns.

Var. Jambes postérieures et tarses de couleur brune.

♂. Un peu plus petit que la femelle. Poils de la face noirs, sauf une touffe de roux entre les antennes. Jambes postérieures ornées d'une tache noire sur le milieu.

Midi de la France et Algérie. — Coll. Dours.

Voisine de l'*A. Russula*, Lep., dont elle diffère par la ponctuation, la coloration de l'abdomen et les pattes postérieures qui, chez cette dernière, sont entièrement ferrugineuses.

HYMÉNOPTÈRES DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

ANDRENA (suite)

BIAREOLINA, EUCERA

Par M. le Dr DOURS.

ANDRENA VULCANA, Dours.

Aterrima, nigro-pilosa ; abdomine punctato, scopâ ferruginea, parvâ : alis fumatissimis, iridescentibus, venis nigris.

Long., corps, 13 mm. ; aile, 10 mm.

♀. Entièrement noire, antennes en dessous lavées de ferrugineux ; chaperon bombé, très-finement ponctué et ridé ; poils de la face, du corselet, de l'abdomen et des pattes noirs, mêlés de cendré sur les côtés du corselet, de ferrugineux sur le labre, les cuisses et les tarses. Abdomen en dessus très-finement ponctué, presque nu, sauf sur le premier segment qui est hérissé de poils noirs, rares sur le 4^e et le 5^e, où ils sont lavés de ferrugineux. En dessous, les segments sont ciliés de poils noirs un peu cendrés à leur extrémité. Pattes très-noires, avec les poils des cuisses cendrés, ceux de la brosse, en dessous, sont d'un ferrugineux éclatant, agglomérés : ceux des tarses d'un ferrugineux obscur. Épines des jambes de couleur ferrugineuse pâle. Ailes très-enfumées avec des reflets violets. Point calleux, côte, nervure noirs.

♂. Semblable à la femelle, sauf la taille qui est un peu plus grêle et les articles de tous les tarses qui sont d'un ferrugineux très-pâle.

La forme de la tête suffit à caractériser le mâle de cette espèce des *A. Lepelletieri*, Luc. et *dorsalis*, Lep. dont la tête est épaisse, large, quadrilatère.

Algérie. Coll. Dours.

ANDRENA CIRCINATA, Dours.

Nigra, fulvo-aureo vestita; abdomine nigro, cæco, creberrimè punctulato, segmentis circinatis; fasciis 2, 3, 4 fulvo-cinereis plus minùs in medio interruptis, 5^o anoque lætè aureis. Femoribus nigris, tibiis 1^oque tarsorum articulo fusco aureis, reliquis ferrugineis; flocculo cinereo, scopâ fulvo-cinereâ. Alis hyalinis, venis fuscis. ♀.

Long., corps, 11, 12 mm.; aile, 7 mm.

♀. Noire. Antennes noires légèrement lavées de ferrugineux; face très-finement chagrinée, ses poils roux. Corselet, en dessus, très-finement ponctué recouvert de poils roux à l'état frais, presque nu, par usure chez les vieux sujets, sauf sur les côtés du métathorax où ils forment une frange droite, courte. Abdomen allongé, elliptique d'un noir mat, nu, très-finement ponctué, ses segments étranglés à leur sommet. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande de poils couchés, courts, cendrés-roux, interrompue sur le 2^e et le 3^e. Cinquième segment et anus revêtus de poils roux-doré. En dessous, tous les segments sont ciliés de poils roux. Pattes noires, leurs poils roux épais sur le flocculus. Jambes postérieures d'un ferrugineux sombre. Brosse rousse un peu plus pâle sur la tranche interne 1^{er} article des tarses doré en dessous, brun en dessus, les suivants ferrugineux. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées au bout. Point calleux testacé-clair, côte, nervures plus brunes.

Cette espèce se place à côté de l'*A. Distincta* L., dont elle diffère surtout par la forme et la ponctuation de son abdomen.

♂. D'un noir mat un peu olivâtre. Pubescence d'un cendré-roux, blanche sur le chaperon et le dessous du corselet. Chaperon jaune avec deux petits points noirs sur les côtés et une ligne de cette couleur ne dépassant pas la moitié du bord interne des yeux. Abdomen un peu

plus fortement ponctué. Poils des pattes cendrés, ceux du dessous des articles des tarses de toutes les paires, roux.

Algérie, France méridionale. Très-abondamment répandue. Coll. Dours.

ANDRENA MIEGIELLA. L. Duf.

Fusco-ferruginea, cinereo-albido-hirsuta, punctatissima, segmentis 1, 2, 3 nigro marginatis, 4, 5 nigris, fasciis 2, 3, 4 albis, ano fulvo piloso: pedibus lætè ferrugineis, albo pilosis. Alis hyalinis. venis nigris. ♀.

Long., corps, 7 mm.; aile 5 mm.

♀. Noire, avec une teinte ferrugineuse sombre. Antennes et mandibules ferrugineuses. Tête arrondie, ses poils blancs très-courts. Corselet noir-ferrugineux, très-fortement ponctué, ses poils en dessus courts, roux, en dessous et sur les côtés, blancs. Abdomen ovale, bombé, très-fortement ponctué d'un ferrugineux plus ou moins foncé, presque glabre au moins chez les vieux sujets. Base des 1^{er}, 2^e, 3^e segments de couleur ferrugineuse pâle, 4^e, 5^e segments noirs avec des poils un peu roux, surtout à l'anus. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande de poils blancs, couchés courts. En dessous les segments sont uniformément ferrugineux pâle, moins fortement ponctué et ciliés de poils cendrés. Pattes entièrement ferrugineuses, sauf les genoux qui sont noirs, leurs poils blancs. Ailes diaphanes, point calleux, côte, nervures d'un noir ferrugineux.

Esp. Coll. de M. L. Duf. Voisine de l'A. *Rubiginosa*.

♂. Inconnu.

ANDRENA RUBIGINOSA. Dours.

Parva, nigra, subglobosa: thorace ferrugineo-hirto, meta-thoracis fimbria pallidiori: abdomine fasciis 2, 3, 4 albidis

vel rufescentibus, 2, 3 interruptis, 5^o anoque rufescentibus; pedibus nigris, pallide lanatis. ♀.

Long., corps, 9, 11 mm.; aile, 6, 7 mm.

♀. Petite, noire, trapue. Tête aussi large que le corselet, profondément ponctuée, recouverte de poils épais blanchâtres partout, sauf sur le vertex, derrière l'insertion des antennes et sur le bord inférieur du chaperon où ils sont roux. Antennes noires avec un reflet ferrugineux en dessous. Corselet arrondi, profondément ponctué, légèrement ridé en arrière, hérissé de poils courts, épais, de couleur ferrugineuse sur le disque et près de l'insertion des ailes, plus pâles en arrière, où ils forment une frange légèrement recourbée. Abdomen convexe, très-finement ponctué, presque glabre. Premier segment garni à la base de quelques poils courts, ferrugineux. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande étroite de poils blancs ou roux, couchés, bande interrompue toujours sur le 2^e et souvent sur les 3^e, 5^e segments et anus revêtus de poils cendrés-roux. En dessous les segments sont plus fortement ponctués et leur bord est cilié de poils blanchâtres. Pattes noires, hérissées de poils cendrés presque blancs sur les cuisses. Tarses ferrugineux, le premier article fortement garni en dessous de poils ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Point calleux, nervures, côte, ferrugineux foncé.

V. 1. Pedibus ferrugineis, ferrugineo-hirtis.

♂. Long., corps, 6 mm.; aile, 4 mm.

Entièrement semblable à la femelle, sauf la taille qui est moitié moins grande.

V. Omnino ferrugineo-hirto.

Les individus appartenant à cette variété sont en général d'une taille plus grande que le type.

Algérie. Reçue en grand nombre de Ponteba, de Tiaret. Coll. Dours.

ANDRENA VENTRICOSA. Dours.

Nigra, punctulatissima, cinereo-fusco-hispida; abdomine cordiformi. marginibus, 2, 3, 4 argenteo ciliatis, 2, 3 interruptis; pedibus nigris, tarsis lætè ferrugineis. Alis fumatis. venis ferrugineis. ♀.

Long., corps, 8, 9 mm.; aile, 6 mm.

♀. Tête plus large que le corselet, assez distinctement ponctuée et ridée, partagée en deux par une ligne saillante qui du milieu de l'insertion des antennes rejoint l'ocelle médian. Chaperon un peu bombé. Tous les poils de la tête sont roux, sauf sur le bord libre du chaperon où ils sont fauves. Antennes noires, ferrugineuses en dessous vers les derniers articles. Corselet très-distinctement ponctué, recouvert de poils cendrés-roux, surtout sur les côtés du métathorax, où ils forment une petite frange non recourbée. Abdomen court, cordiforme, très-distinctement ponctué, presque absolument glabre. Bord postérieur des 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande de poils couchés courts, interrompue sur le 2^e et le 3^e. Cinquième segment, côtés et anus recouverts de poils fauves. Pattes noires. Poils des hanches et de la brosse cendrées avec une teinte rousse chez cette dernière. Premier article des tarses noir en dessus, ferrugineux en dessous. Derniers articles des tarses ferrugineux. Ailes enfumées. Point cal-leux, côte, nervures ferrugineux.

V. Une tache jaune sur le bord libre du chaperon. Pubescence un peu plus rousse.

♂ semblable à la femelle. Tête un peu moins large. Abdomen à reflets testacés très-peu distinctement ponctué. Tarses ferrugineux clair.

Iles de l'Archipel grec. Reçue en grand nombre. Coll. Sichel, Dours.

ANDRENA NIGRO-OLIVACEA. Dours.

♀. Nigro-olivacea. rufo-fulvo hirsuta. Abdomine punctula-

tissimo, rufo-hirsuto, fasciis distinctissimis concoloribus. Femoribus nigris, pedibus aureis, aureo-hirsutis. ♀.

Long., corps, 12 mm.; aile, 9 mm.

♀. Noire avec un fond vert d'olive surtout à l'abdomen. Antennes de couleur testacée, surtout à partir du quatrième article. Poils de la face et du corselet roux-cendrés en dessus, en dessous et sur les côtés, un peu plus foncés entre l'insertion des antennes. Abdomen ovale de couleur olivâtre sombre, finement ponctué, à points saillants, hérissé partout de poils roux, plus longs sur le premier segment et sur les côtés. Bord de tous les segments orné d'une bande de poils couchés plus pâles. Cinquième segment et anus revêtu de poils fauves-dorés. En dessous les trois derniers segments sont ciliés de poils fauves. Cuisses noires, les postérieures garnies de poils roux. Jambes et tarses de la première paire de pattes de couleur ferrugineuse-noire avec quelques poils dorés. Jambes et tarses des dernières paires de couleur testacée très-clair, avec des poils dorés, très-épais sur la brosse et sur le premier article du tarse. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures testacés.

Cette espèce doit se placer près de l'*A. Taraxaci*, Gir., dont elle diffère par la couleur olivâtre de l'abdomen, par sa taille, etc., etc.

Bordeaux. — Sur le *Leontodon Taraxacum*, sur les renoneules.

♂. Long., corps, 8 mm.; aile, 6 mm.

Noir, avec une légère teinte olivâtre. Antennes noires ne dépassant pas l'insertion de l'aile. Chaperon jaune avec deux petits points noirs sur les côtés, hérissé de poils blancs. Poils de la tête et du corselet roux-cendré en dessus, blancs en dessous. Abdomen finement ponctué hérissé de poils roux-cendrés, un peu plus longs et plus blancs sur les bords. Sixième segment et anus roux. Pattes

noires, leurs poils cendrés, roux sur les postérieures et surtout sur le dessous des tarses. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures de couleur testacée.

Très-difficile à distinguer de *Fulvescens* ♂. La taille est moins grande, l'abdomen olivâtre, plus finement ponctué, la pubescence plus cendrée, etc., etc. Coll. Dours.

ANDRENA GIRAUDII. Dours.

Nigro-olivacea, rufo-ferrugineo-hirsuta. Abdomine olivaceo, depresso, ruguloso, fasciis 2, 3, 4 linearibus, fuscis. Pedibus nigris, tibiis posticis tarsisque totis ferrugineis, scopâ concolori. Alis hyalinis, iridescentibus, venis fuscis. ♀. ♂. Clypeo luteo nigro punctulato, pedibus nigris, tarsis solum ferrugineis.

♀. D'un noir olivâtre. Poils de la face et du corselet roux très-denses. Abdomen, en dessus, olivâtre, déprimé, rugueux, hérissé surtout sur le premier segment, sur les côtés et à l'anus de poils roux. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e orné d'une bande, très-étroite, de cils plus pâles, mais très-distincte. En dessous, les segments sont fortement ponctués et leur bord inférieur cilié de longs poils roux. Pattes noires, les jambes postérieures et tous les articles des tarses ferrugineux-pâle un peu bruns sur les tarses des deux premières paires. Brosse formée de poils ferrugineux. Ailes transparentes avec quelques reflets irisés, surtout sur les postérieures. Point calleux, côte, nervures bruns.

♂ plus grêle que la ♀. Chaperon jaune avec deux petits points noirs sur les côtes. Pattes noires, les tarses seuls ferrugineux.

V. ♂, tarses bruns.

Algérie. Coll. Dours.

Dédiée à M. le docteur Giraud, le savant président de la Société entomologique de France.

ANDRENA DOURSANA. L. Duf.

Nigro-cærulea, albido-niveo pilosa. Tarsis aureo-ferrugineo hirsutis. ♀.

Long., corps, 12 mm ; aile, 9 mm.

♀. Noire, avec une teinte bleue. Face finement ponctuée, ridée ; ses poils blancs mêlés de roux près de l'insertion des antennes qui sont noires, sauf les 8 ou 9 derniers articles dont la couleur est testacée. Corselet très-finement ponctué, hérissé, en dessus, de poils cendrés, blancs, en dessous et en arrière. Abdomen légèrement déprimé, bleu-olivâtre, très-finement ponctué. Premier segment hérissé de poils courts d'un blanc de neige. 2^e, 3^e, 4^e segments nus ; 5^e et anus garnis de poils couchés, noirs un peu roux. Bord inférieur de tous les segments cilié de poils couchés, d'un blanc de neige mêlés de noirs sur le 5^e. En dessous, l'abdomen est plus fortement ponctué et les cils des segments plus longs, un peu plus cendrés. Pattes noires, leurs poils blancs, surtout ceux des hanches et de la brosse. Premier article des tarses, noir en dessus, ferrugineux-doré en dessous, les autres ferrugineux sombre. Ailes à peine enfumées. Point calleux, côte, nervures de couleur testacée.

Algérie. Collection Dours.

M. L. Duf. n'a pas connu cette femelle que j'ai reçue accouplée avec son mâle décrit par mon savant maître.

ANDRENA DOURSANA. L. Duf.

Ann. Soc. ent. de France, année 1853, p. 382. ♂.

Nigro-cærulea, niveo-villosa ; labro eburneo, flagello antennarum, tarsisque diaphano-testaceis. ♂.

♂. Long., corps, 10. 12 mm. ; aile, 8 mm.

Antennes de couleur testacée, sauf le 1^{er}, le 2^e et la base du 3^e qui sont noirs. Face finement chagrinée, la

moitié supérieure noir-bleuâtre. Chaperon, (deux petits points noirs sur les côtés) joues éburnées, ses poils très-touffus, d'un blanc de neige. Corselet très-finement ponctué, ses poils, en dessus, en dessous et sur les côtés, d'un blanc de neige. Abdomen d'un bleu foncé à reflets un peu métalliques, très-finement ponctué, surtout à partir du 2^e segment, hérissé, en dessus et en dessous, de poils blancs assez rares. Base de tous les segments, en dessus et en dessous, ciliée de poils blancs couchés. Sixième segment et anus revêtus de poils fauves. Pattes noires, leurs poils blancs. Tarses testacés avec des poils de cette couleur. Ailes transparentes, un peu enfumées au bout. Point calleux noir, côte, nervures de couleur brune.

Algérie. Coll. Dours. L. Duf.

ANDRENA ALBO-VIRESCENS. Dours.

Virescens, fulvo-albido-hirsuta. Abdominis fasciis albescentibus, integris. Alis hyalinis. ♀.

Long., corps, 9, 10 mm. : aile, 7 mm.

♀. Noire avec des reflets vert-olivâtre. Tête très-finement ponctué, ridée, ses poils roux. Antennes ferrugineuses à partir du 3^e, quelquefois du 4^e article. Corselet très-finement ponctué, hérissé, en dessus et sur les côtés, de poils roux, plus pâles en dessous et en arrière, où ils forment une frange recourbée. Abdomen, en dessus, très-finement ponctué. Premier segment recouvert de poils cendrés, hérissés, plus abondants sur les côtés. Les segments suivants sont presque nus. Bord inférieur des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande de poils roux cendrés, couchés. Les poils du 5^e et de l'anus sont fauves. En dessous, le ventre est lavé de ferrugineux avec les cils des segments cendrés. Cuisses noires, leurs poils blanchâtres très-touffus sur les postérieures. Jambes et tarses un peu ferrugineux, leurs poils blanchâtres. Ailes

transparentes. Point calleux, côte, nervures de couleur testacée.

♂ plus petit, plus grêle que la ♀ à laquelle il ressemble entièrement, sauf le chaperon qui est jaune avec deux petits points noirs sur les côtés.

Algérie. Coll. Dours. Léon Dufour, où elle est désignée sous le nom de *Virescens*. L'A. *Virescens*. F. Ent. Syst. 2. 314. 29, est une espèce bien différente n'appartenant pas au genre *Andrena*.

ANDRENA OERINIFRONS. Dours.

Nigra, cinereo-hispida. Capite œneo. Abdomine depresso. nitido, impunctato, fasciis 1, 2, 3, 4 niveis, 5^o anoque fulvis. Pedibus nigro-testaceis, pilis albis. Alis hyalinis, venis fuscis. ♀. ♂. Clypeo flavo nigro-maculato.

Long., corps, 10, 12 mm.; aile, 7 mm.

♀. Noire, derniers articles des antennes lavés de ferrugineux, tête d'un vert obscur, chaperon non bombé, finement ponctué, fossette intrà-orbitaire petite, profonde; poils de la face courts, cendrés. Corsetlet, en dessus, très-finement ponctué (à la loupe), recouverts de poils cendrés bruns, plus pâles en dessous et sur les côtés. Abdomen déprimé, très-brillant avec une teinte vague olivâtre, sans ponctuation appréciable, hérissé, surtout sur le premier segment, de poils cendrés très-courts ou nuls sur les suivants, sans doute par usure. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande de poils blancs, courts, continue. Les poils du 5^e et de l'anüs sont mêlés de roux. En dessous, les segments sont ciliés de poils blancs. Pattes brunes, poils du flocculus longs, blanchâtres, ceux de la brosse, épais, courts, blancs mêlés de roux, ceux des tarses, en dessous, de cette couleur. Ailes transparentes, à reflets irisés. Point calleux. côte, nervures bruns.

♂ plus grêle que la ♀ à laquelle il ressemble entière-

ment, sauf le chaperon qui est jaune avec deux petits points noirs sur les côtés.

Algérie. Collect. Dours. Voisine de l'A. *Albo-virescens*

ANDRENA NIGRO-VIRIDULA. Dours.

Nigro-ænea, cinereo-fusco - hirsuta. Abdomine ovali, nitido, creberrime punctato, puberulo. Fasciis 2, 3, 4 albidis, 5^o anoque fulvis. Pedibus nigris, tarsis fuscis, fulvo-cinereo hirsutis. Alis vix fumatis, venis fuscis. ♀. ♂. Clypeo flavo-nigro maculato.

Long., corps, 9 mm.; aile, 6 mm

♀. D'un noir bronzé obscur. Antennes lavées de ferrugineux, en dessous, fossette intra-orbitaire à peine marquée. Poils de la face et du corselet cendrés-roux, très-abondants sur les côtés du métathorax où ils forment une frange droite. Abdomen en dessus, cordiforme, brillant, très-finement ponctué, recouvert de poils blancs très-courts, peu serrés. Le bord inférieur de tous les segments est de couleur testacée, celui des 2^e, 3^e, 4^e orné, en outre, d'une bande de poils blancs couchés, courts. Cinquième segment et anus garnis de poils roux-doré. En dessous, les segments sont ciliés de poils cendrés-roux. Pattes noires, tarsi ferrugineux, leurs poils cendrés-roux, blancs sur le flocculus. Ailes à peine légèrement enfumées à reflets irisés. Point calleux, côte, nervures de couleur testacée.

♂ semblable à la ♀, à peine un peu plus petit qu'elle. Chaperon jaune avec deux points noirs sur les côtés.

Algérie. Coll. Dours. Voisine de l'A. *Ærinifrons*, dont elle diffère par la taille, la forme et la ponctuation de l'abdomen, etc., etc.

ANDRENA FLAVO-PICTA. Dours.

Long., corps, 5 mm.; aile, 3 mm.

Viridi-ænea, nitida, cinereo-puberula. Antennis subtus

ferrugineis, scapo flavo. Thorace viridi-æneo, nitidissimo, glabro, metathorace flavo-picto. Abdomine elliptico, depresso, viridi-æneo, marginibus flavo fasciatis vel maculatis. Pedibus flavis, cinereo hirtis, femoribus tibiisque posticis, his partim, nigris. Alis albis hyalinis, iridescentibus. ♀.

♀. Tête arrondie d'un vert clair. Chaperon orné au milieu d'une tache arrondie avec deux points noirs près du centre. Mandibules jaunes pâles, ferrugineuses au bout. Antennes noires en dessus, ferrugineuses en dessous, avec le scape jaune pâle. Corselet en dessus, d'un vert très-clair, brillant, presque glabre, sans ponctuation appréciable. Son bord céphalique est orné d'une ligne jaune pâle, un peu élargie sur les côtés, et présente en outre une tache ronde en avant du point calleux. Une ligne jaune pâle limite le bord supérieur et inférieur du mésothorax et du métathorax. Entre ces deux lignes on remarque deux petites taches jaunes saillantes. Métathorax très-finement strié et cilié sur les côtés, de petits poils blancs. Abdomen elliptique, déprimé, d'un vert tirant sur le noir, glabre, si ce n'est vers le 5^e segment et l'anus où se trouvent quelques poils blancs, courts. Le premier segment porte, sur les côtés, une petite tache arrondie, jaune. Les segments suivants ont une bande de cette couleur continue sur le 2^e et le 3^e, interrompue sur le 4^e et le 5^e où elle est réduite à deux taches plus ou moins grandes. En dessous, le ventre est très-déprimé, les segments plus ou moins ferrugineux, lavés de jaune. Pattes jaunes pâles, hérissées de poils blancs. Cuisses noires. Tibias postérieurs plus ou moins tachés de noir, extrémité des tarses un peu ferrugineuse. Ailes blanches, transparentes à reflets irisés. Point calleux jaune pâle, côte, nervures très-claires.

♂ plus grêle que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement, sauf les différences suivantes : le chaperon est un peu allongé jaune sans points noirs ; le corselet présente sur son bord céphalique une seule tache en avant du

point callenx; il est partout ailleurs immaculé; l'abdomen est linéaire, tous les segments sont bordés de jaune chez le type, et seulement de lignes plus ou moins larges sur le 2^e et le 3^e chez quelques variétés.

Algérie, Montpellier, Coll. Dours. Voisine de l'A. *Minutissima Rossi*, dont elle n'est peut-être qu'une variété.

CAMPYLOGASTER N. SUBGENUS.

(καμπύλος, recourbé, γαστήρ, ventre.)

Antennes courtes, un peu en massue. Abdomen très-convexe, recourbé en dedans, allant en grossissant à partir du 3^e segment. Caractères buccaux et alaires semblables à ceux du genre *Andrena*. Ce s.-genre établit le passage entre le genre *Systropha* et le genre *Andrena*. Il est surtout caractérisé par la forme de son abdomen, recourbé en dedans, hérissé de poils, sur les côtés, à la manière des *Systropha* ♂.

CAMPYLOGASTER (*Andrena*) FULVO-CRUSTATUS, Dours.

Niger, fulvo-cinereo vestitus; thorace fulvo-crustato. Abdomine ovali, incurvato, punctato, fulvo-cinereo vestito. Segmentis 1, 2, 3, 4, apice fulvo-cinereo squamosis, 5^o anoque fulvo-aureis; femoribus nigris, tibiis apice, tarsisque totis lætè ferrugineis, pilis cinereis. Alis luteo-fumatis in medio pallidis. ♀.

Long., corps, 13 mm.; aile, 11 mm.

♀. Noire, antennes noires, premier article atteignant à peine le bord interne des yeux. Tête un peu plus large que le corselet, très-fortement ponctuée, ses poils rouxcendrés, fauves sur le bord inférieur du chaperon et la base des mandibules. Corselet, en dessus, très-fortement ponctué, ridé sur le métathorax, ses poils très-courts d'un fauve doré, formant plastron, cendrés sur les côtés et en dessous. Abdomen noir, en ovale allongé, convexe,

recourbé vers le bout. Premier segment très-grossièrement ponctué, le 2^e moins, les suivants très-finement, leurs poils roux-cendrés, hérissés, abondants sur le premier, rares sur les autres. Bord inférieur des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande de poils très-courts, couchés, roux sur le 1^{er} et le 2^e, blancs sur le 3^e et le 4^e, semblables à des écailles de papillon, 5^e segment et anus garni de poils roux dorés. En dessous, les segments sont ciliés de longs poils cendrés. Cuisses et jambes noires, celles-ci teintées de ferrugineux au bout. Tarses d'un beau ferrugineux. Poils des pattes roux-cendrés. Ailes jaunes à reflets irisés, très-enfumées au bout, transparentes au milieu. Point calleux, côte, nervures de couleur testacée plus ou moins obscure.

♂ plus grêle que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement, sauf que les poils qui recouvrent le corselet sont plus longs.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

Cette espèce est très-remarquable; par la forme de son abdomen ovale-allongé, très-convexe, recourbé au bout, par la couleur de ses ailes...

CAMPYLOGASTER (Andrena) SUBGLOBOSUS, Dours.

Niger, nigro-rufo-hirsutus. Abdomine ovali, incurvato, subtiliter punctato, marginibus testaceo lineatis, fasciis albidis, ano fulvo. Pedibus nigris, tarsis lætè ferrugineis, pilis fulvo-cinereis. Alis fumatis, venis fuscis. ♀.

Long., corps, 11 mm.; aile, 7 mm.

♀. Noire. Antennes noires, premier article atteignant le bord interne des yeux. Tête arrondie de la largeur du corselet, finement ponctuée, ses poils roux-cendrés. Corselet, en dessus, hérissé de poils roux-cendrés, sans ponctuation appréciable. Abdomen en dessus, noir, ovale, convexe, un peu recourbé vers le bout, très-finement ponctué, presque glabre. Bord inférieur des seg-

ments de couleur testacée, orné d'une bande de poils blancs, couchés, interrompue par l'usure, sur les deux premiers. Cinquième segment et anus recouvert de poils roux-dorés. En dessous, les segments sont ciliés de poils roux assez longs. Pattes noires, tarsi ferrugineux-pâle, leurs poils roux-cendrés. Ailes enfumées. Point calleux ferrugineux sombre, côtes, nervures, plus pâles.

♂ plus grêle que la ♀. Chaperon jaune avec deux petits points noirs sur les côtés, ses poils blancs, ceux du reste de la face, roux. Tarsi bruns, en dessous, le reste comme dans la ♀.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

CAMPYLOGASTER (Andrena) ABBREVIATUS, Dours.

Niger, rufo-cinereo hispidus. Abdomine nigro, nudo, impunctato, segmentorum marginibus testaceis, 5^o anoque fulvis. Pedibus-nigris, scopa fulvo-cinerea, densissima. Alis fumatis, venis fusco nigris. ♀.

Long., corps, 9, 10 mm.; aile, 6, 7 mm.

♀. Noire. Antennes lavées de ferrugineux à partir du troisième article. Tête arrondie, poils de la face et du vertex, roux. Corselet, en dessous, très-finement ponctué, ses poils roux. Abdomen très-convexe, presque nu, si ce n'est sur les côtés où se remarquent quelques poils roux très-courts. Bord inférieur des segments de couleur testacée, 5^e et anus recouvert de poils roux-doré. Pattes noires, tarsi bruns, leurs poils roux, ceux de la brosse et du flocculus très-épais. Ailes un peu enfumées, point calleux, côte, nervures bruns.

♂. Inconnu.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

BIAREOLINA, L. Duf., N.G.

Lingua brevis, spathuliformis, leviter bifida. plumosa.

Para glossæ ovales ellipticæ, apice acutæ. Palpi labiales longitudinæ linguæ, 4 articulati, primo longitudine sequentiorum simul sumptorum. Palpi maxillares 6 articulati, 2º longiori, 6º versus quintum reflexo. Cellula radialis unica non appendiculata, versus costam coarctata. Cellulæ cubitales 2; prima longiori, secunda versus radialem dimidio coarctata, duos nervos recurrentes recipienti primum propè quintam partem anteriorem, secundum propè quintam partem posteriorem, longe appendiculata. Antennæ 12 articulatæ, scapo longiori, 2º minuto, 3º longiori cupuliformi, reliquis geniculatis ad apicem incrassatis.

Habitus Halictorum, differt præcipuè 5º segmento rimâ denudato.

BIAREOLINA NEGLECTA, L. Duf.

Nigra, ferrugineo-villosa, abdomine punctulatissimo, marginibus albo vel cinereo ciliatis, pedibus anoque fulvis. ♀ : ♂. Labro porrecto, hirsutie cinerea.

Long., corps, 9, 10 mm.; aile, 7, 8 mm.

♀. Noire. Face finement ponctuée, ridée sur le labre, ses poils fauves courts, peu épais. Mandibules ferrugineuses au bout. Poils du corselet, en dessus, d'un ferrugineux éclatant, fauves, en dessous et sur les côtés. Le corselet est finement ponctué et présente à sa partie postérieure une surface triangulaire ridée, chagrinée, non ponctuée. Abdomen allongé, légèrement déprimé, très-ponctué, surtout sur le premier segment qui, chez les sujets frais, est hérissé de poils fauves assez longs. Les 2º, 3º, 4º segments ont des poils de cette couleur, courts, rares. Cinquième segment et anus recouverts de poils fauves couchés. Base du 1º, 2º, 3º, 4º segments ornée d'une bande de poils couchés, blancs ou cendrés; cette bande, chez les sujets vieux, est plus distincte sur le premier segment et interrompue sur le milieu des deux autres. En dessous, les segments sont ciliés de poils fauves. Poils des pattes antérieures ferrugineux-noirs, ceux des cuisses postérieures plus pâles, brosse fauve-

cendrée, tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées; point calleux, côte, nervures bruns.

♂. Labre carré, un peu dressé, poils de la face cendrés, ceux du corselet, en dessous et sur les côtés, roux, un peu plus pâles en dessous. Abdomen profondément ponctué, hérissé de poils cendrés, courts, peu nombreux; 6^e segment et anus recouverts de poils roux, couchés. Chacun des segments, en dessus et en dessous, est orné d'une bande de poils plus pâles. Le 6^e, en outre, porte sur chacun de ses côtés inférieurs une petite dent, due peut-être au soulèvement de la paroi ventrale. Poils des pattes, cendrés, ceux des tarses, roux en dessus, dorés en dessous. Point calleux, côte, nervures d'un testacé clair.

Alg., Esp., France, (Saint-Sever, Hautes-Pyrénées, ex. L. Duf., Pérez.) Reçue en très-grand nombre de ces diverses localités. Coll. L. Duf., Pérez, Dours.

BIAREOLINA PEREZELLA, Dours.

Nigra, fulvo-villosa, labro gibboso, punctatissimo. Abdomine gibboso, marginibus fulvo ciliatis; pedibus anoque fulvis. ♀.

Long., corps, 11, 12 mm.: aile, 9 mm.

♀. Noire. Face fortement ponctué, profondément ridée sur le labre qui est assez bombé, une ligne saillante s'élevant entre les antennes. Poils de la face, courts, fauves. Corselet très-profondément ponctué, sa partie postérieure ridée, chagrinée, dépourvue de toute surface triangulaire; ses poils fauves, un peu plus pâles à la partie postérieure. Abdomen ovale, gibbeux, très-fortement ponctué, surtout sur le premier segment qui est hérissé de poils fauves, courts. Cinquième segment et anus revêtus de poils fauves couchés. Base des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments ornée d'une bande de poils roux plus pâles que le reste. Cette bande est surtout interrompue sur le

premier segment, par usure. En dessous, les cils sont roux. Poils des pattes fauves, dernier article des tarses ferrugineux. Ailes enfumées; point calleux, côte, nervures bruns.

Bordeaux. Envoyée par M. Pérez, professeur à la Faculté des sciences de cette ville.

Cette espèce se distingue de la précédente par sa taille, la forme du labre, de l'abdomen, par sa ponctuation, etc., etc. Coll. Pérez, Dours.

DUFOUREA PUTONIANA, Dours.

Nigra, cinerescenti pilosa, tarsis subtus fulvis, alis fumatissimis, nervis nigris. ♀.

Long., corps, 10 mm.; aile, 7 mm.

♀. Noire. Tête noire très-distinctement ponctuée, ses poils noirs, courts, mêlés de roux, surtout en dessous et près de l'extrémité du chaperon, qui est très-brillant. Antennes noires : scape très-long, hérissé de poils roux, surtout sur les côtés interne et externe. Corselet finement ponctué en avant et sur son milieu, ridé en arrière et recouvert partout de poils cendrés. Abdomen, en dessus, déprimé, brillant, à peine ponctué, hérissé de poils courts, cendrés, roux sur les côtés et à l'anus. La ponctuation est plus visible en dessous. Le bord inférieur de chaque segment est de couleur testacée, avec une bande de cils roux. Cuisses renflées, surtout les intermédiaires, leurs poils cendrés. Tarses, en dessous, hérissés de poils fauves, dorés. Ailes très-enfumées. Point calleux, côte, nervures noirs.

Hospenthal. Coll. de M. le docteur Puton. 1 femelle.

♂ Long., corps, 7, 9 mm.; aile, 8 mm.

♂. Noir. Tête presque ronde, très-finement ponctuée. hérissée de poils blanchâtres, surtout en dessous et à

l'extrémité du chaperon. Antennes longues, largement moniliformes comme dans les *Halictes*, noires. Scape large, hérissé de poils courts, roux. Corselet très-finement ponctué en avant et sur le milieu, ridé en arrière et recouvert partout de poils cendrés un peu roux. Abdomen convexe, brillant, à ponctuation peu distincte, recouvert de poils cendrés-roux, plus abondants sur les côtés et à l'anus. En dessous, le 5^e segment porte, sur son bord inférieur, une petite dent très-aiguë au sommet. Sixième segment un peu tuberculeux au bout. Plaques anales cordiformes, à bord sinueux, épais. Cuisses renflées, surtout les intermédiaires, leurs poils ainsi que ceux des pattes cendrés-roux. Tarses, en-dessous, hérissés de poils roux-doré. Ailes enfumées, point calleux, côte, nervures noirs. 3 exemplaires.

Lautaret. Coll. de M. le docteur Puton, Dours.

Cette espèce remarquable m'a été communiquée par M. le docteur Puton, à qui je me fais un plaisir de la dédier.

ANCYLA BREVIS, Dours.

Nigra, fulvo cinereo-hirsuta. Capite thoraceque punctatissimis, pilis rufis. Abdomine brevi, nudo, nitido, fasciis cinereo-rufescentibus, 1^o, 2^oque interruptis. Ano rufo. Pedibus nigris, 1, 2 rufo pilosis, scopâ 1^oque tarsorum articulo nigerrimis, pilis rufis extûs vix intermixtis. Alis fumatissimis. ♀.

Long., corps, 6 mm.; aile, 4 mm.

♀. Noire. Face et corselet grossièrement ponctués, leurs poils, roux foncé, plus pâles en dessous. Abdomen, en dessus, très-convexe, globuleux, nu, brillant, très-finement ponctué. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils cendrés, un peu roux, interrompue sur le 1^{er} et le 2^e. Pattes noires, tarses ferrugineux, première et deuxième paires ayant leurs poils roux. Jambes et premier article des tarses postérieurs hérissés de

poils rudes, longs, très-noirs, si ce n'est sur le tibia où ils sont un peu mêlés de roux. Ailes très-enfumées. Point calleux, côtes, nervures noirs.

♂. Inconnu.

Alg. Coll. Dours. Diffère de l'*A. oraniensis* par sa taille plus petite, sa ponctuation et la couleur de ses poils.

Reçu 10 ♀.

OSMIA TRICUSPITATA, Sichel.

Nigra, rufo-hispida; segmentorum fasciis abdominalium 2, 3, 4, 5 rufis, 6^o segmento latere margineque infero sinuato nec dentato; ano tricuspitato, dentibus lateribus brevioribus, crassis, medio longè quadrato. ♂.

Long., corps, 14 mm.; aile 10 mm.

♂. Noir. Poils du chaperon épais, blanchâtres, ceux du reste de la face, du vertex, du corselet, du premier segment de l'abdomen, roux. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande étroite de poils couchés, roux, très-courts. Sixième segment presque nu, son bord inférieur, un peu sinué, se terminant légèrement en pointe au milieu. Anus noir, orné de trois appendices, les latéraux plus courts, en forme de dents, celui du milieu, en carré long. Pattes noires, leurs poils roux-pâle, ceux du dessous des tarses, plus vifs. Ailes un peu enfumées au bout, radiale tout à fait transparente. Point calleux, côte, nervures ferrugineux clair.

Iles de l'Archipel grec. Plusieurs ♂ sans ♀. Coll. Dours.

OSMIA MUCIDA, Dours.

Nigra, albo-lanata, clypeo-gibbo, tarsis subtùs ventrequè albo-rufescenti pilosis. Alis hyalinis ♀. ♂, 1^o segmento latè marginato, duobus dentibus armato, ano elongato, integro. Ultimo antennarum articulo spinula brevi aucto.

Long., corps, 13 mm.; aile, 10 mm.

♀. Noire, recouverte partout d'un léger duvet blanc seni-

blable à de la moisissure. Face finement ponctuée, chapeçon bombé au centre, recouverts de poils plus longs, blancs, un peu roussâtres sur son bord libre. Corselet et abdomen plus fortement ponctués, à points enfoncés. Ce dernier, bombé, cordiforme, avec le bord inférieur des segments à peine marqué par une ligne de poils cendrés très-courts et très-épais. Palette ventrale blanche avec des reflets roux. Articles des tarses, en dessous, garnis de poils roux, leurs crochets ferrugineux-clair. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures très-noirs.

♂ plus grêle que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement, sauf les différences sexuelles suivantes : dernier article des antennes, un peu épais, surmonté d'une petite épine ; sixième segment de l'abdomen, fortement échancré sur les côtés, muni de deux dents, dont la supérieure est plus forte que l'inférieure, celle-ci un peu aiguë ; bord inférieur de ce segment très-légèrement sinué ; anus allongé en carré long, entier.

V. ♀. Une tache jaune entre l'insertion des antennes.

Espèce bien distincte se plaçant à côté de l'O. *Adunca*.

Algérie. Coll. Dours.

OSMIA PSEUDO-AURULENTA, Dours.

Nigra, punctatissima, ferrugineo-hirsuta. Alis fumatis, cellulis 2, discoïdalibusque partim pellucidis. ♀. ♂. 6^o segmento in latere sinuato, læviter denticulato, ano bispinoso.

Long., corps, 11, 12 mm. ; aile, 8 mm.

♀. Noire, très-fortement ponctuée et revêtue, partout, de poils ferrugineux, plus épais sur le premier et sur le bord inférieur de tous les segments où ils forment une bande étroite très-saillante. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes noires, leurs poils ferrugineux, tarses plus pâles. Ailes enfumées avec des places limpides sur la deuxième cubitale et la deuxième discoïdale. Point calleux testacé, côte, nervures noires.

♂ de même taille que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement sous le rapport de la ponctuation et de la pubescence. Sixième segment de l'abdomen légèrement sinué sur les côtés et armé d'une dent peu marquée. Bord inférieur de ce segment, entier, coupé en ligne droite. Anus orné, en dessous, de deux petites dents très-saillantes.

Algérie. — Obtenue d'éclosion dans les coquilles de l'*Helix maritima*. Le ♂ diffère de celui de l'*O. Aurulenta* par la dent latérale du 6^e segment abdominal qui est peu saillante, et par le bord inférieur de ce même segment non sinué. Coll. Dours. In coll. L. Duf., *O. Insignis*?

OSMIA CINCTA, Dours.

Nigro-rufo-cinereo-hispida. Thorace rufo-cinereo. Segmentis abdominis, 2, 3, 4, 5. cinerescens, integris. Ventre nigro-ferrugineo. ♀, ♂. 6^o segmento latere denticulo armato, ano recondito, bispinuloso.

Long., corps, 10, 11 mm.; aile, 8 mm.

♀. Noire. Poils de la face roux-cendré, roux-vif sur le bord libre du chaperon et les mandibules. Corselet, en dessus, hérissé de poils roux, plus pâles sur les côtés, cendrés en dessous. Métathorax, finement pointillé et strié, avec quelques parties plus lisses, luisantes au milieu. Abdomen assez fortement ponctué, nu, sauf sur le premier segment où se trouvent quelques poils roux-cendrés, et sur le 6^e, qui est recouvert d'un duvet cendré. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils cendrés-roux, entière. Palette ventrale noire, avec une teinte ferrugineuse très-prononcée sur les côtés. Pattes noires, leurs poils cendrés, sauf sous les tarses où ils sont bruns-ferrugineux. Ailes noires, à reflets violets, quelques taches blanches sur la portion discoïdale. Point calleux, côte, nervures noirs.

V. 1. *Tota rufa*.

♂ plus grêle que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement, sauf : 6^e segment échancré sur les côtés où se remarque une petite dent triangulaire, 7^e un peu allongé. Anus peu apparent, armé, de chaque côté, d'une très-courte épine.

Iles de l'Archipel grec, Algérie. Reçue en grand nombre. Coll. Dours.

OSMIA CINCTELLA, Dours.

Nigro-cæruleo-rufo-albo-hispida; thorace 1^{er}que segmento abdominis rufo villosis, fasciis 2, 3 rufescentibus, 4, 5 albescentibus, 5^e segmento toto albo piloso. Ventre nigro. Pedibus nigris, albo pilosis. Alis apice fumatis. ♀ : ♂, 6^e segmento latere denticulato, 7^e apice acuminato excavato, ano bispinuloso.

Long., corps, 8, 9 mm.; aile, 6 mm.

♀. Trapue. Tête et corselet bleu-noirâtre; poils de la face cendrés sur les joues, roux sur le vertex et le bord libre du chaperon. Corselet finement ponctué, ses poils, roux en dessus et sur les côtés, cendrés en dessous. Métathorax très-finement strié sur les côtés, présentant au milieu un espace lisse, luisant. Abdomen finement ponctué, bleu foncé, assez brillant, nu, si ce n'est sur le premier segment qui porte des poils roux abondants sur les côtés et sur le 6^e qui est revêtu d'un duvet blanc de neige. Bord inférieur des 2^e, 3^e segments orné d'une bande étroite de poils roux couchés, celle du 4^e et du 5^e est formée par des poils blancs. Palette ventrale noire. Pattes noires, leurs poils blancs avec quelques-uns de roux sous les tarses. Ailes enfumées, limpides au bout. Point calleux ferrugineux pâle, côte, nervures noires.

♂ semblable à la ♀, sauf : 6^e segment sinné sur les côtés formant ainsi une dent obtuse très-courte, 7^e allongé en pointe. Anus armé de deux petites épines.

Iles de l'Archipel grec, Algérie. Reçue en grand nombre. Coll. Dours.

OSMIA RUFICOLLIS, Sichel.

Nigro-rufo-cinereo-hispida. Thorace, ventre tarsisque subtus rufo-villosis. Abdomine nigro, fasciis cinerescentibus. Alis fumatis. ♀. ♂ Ultimo segmento apice attenuato, læviter supra excavato, ano bispinoso.

Long., corps, 9, 10 mm.; aile, 6 mm.

♀. Noire. Poils de la face cendrés. roux sur le vertex et le bord libre du chaperon. Antennes et mandibules noires. Corselet, en dessus, recouvert de poils roux, presque fauves, plus abondants en arrière et sur les côtés. En dessous, ses poils sont cendrés. Abdomen noir, finement ponctué, nu, si ce n'est sur les côtés du premier segment où se trouvent quelques poils roux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande très-étroite de poils cendrés ou tout à fait blancs. Sixième segment un peu pointu avec le bord postérieur roux. Palette ventrale d'un roux assez vif. Pattes noires. leurs poils cendrés, dessous des articles des tarses, roux. Ailes très-enfumées avec quelques points transparents sur la partie discoïdale. Point calleux ferrugineux, presque noir, côte, nervures noires.

♂ un peu plus petit que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement, sauf : 7^e segment abdominal légèrement sinué à son bord libre, un peu excavé en dessus; anus armé, de chaque côté, d'une épine droite de couleur noire. Tarses ferrugineux.

Iles de l'Archipel grec. Recue en grand nombre. Coll. Sichel, Dours.

OSMIA MICRO-GRAMMA, Dours.

Parva, nigra, subtiliter punctulata, cinereo-hirsutula. Segmentis albo lineatis. ventre cinereo. tarsis subtus rufis.

Alis fumatis. venis nigris ♀. ♂ *Similis*, 6^e segmento obtuse denticulato. Ano mucronato.

Long., corps, 9 mm.; aile, 5 mm.

♀. Petite, trapue, noire, finement ponctuée. Antennes noires, leur scape épais, chaperon un peu bombé, face recouverte de poils blanchâtres, roux sur le vertex et sur le bord libre du chaperon. Corselet, en dessus, hérissé de poils cendrés-roux, courts, blanchâtres en dessous et sur les côtés. Abdomen nu, si ce n'est sur les côtés où se remarquent, surtout sur le premier segment, quelques poils blancs très-courts. Bord inférieur de tous les segments orné d'une petite ligne de poils blancs, continue chez les sujets frais, interrompue par l'usure sur le milieu. Palette ventrale cendrée, peu fournie. Pattes noires, leurs poils blancs, dessous des tarses, roux, épines des tibias et crochets des tarses ferrugineux-clair. Ailes enfumées. Point calleux testacé. côte et nervures noires.

♂ semblable à la ♀. Antennes un peu plus longues, leurs articles égaux. Sixième segment sinué sur les côtés avec une dent obtuse, son bord inférieur légèrement crénelé. Anus peu allongé, mucroné.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours, Sichel.

La ♀ est voisine de l'Œ. *Leucomelana* Smith, mais le ♂ est très-distinct, ses segments ventraux ne présentent ni tubercule ni appendice lamelleux.

CHALICODOMA NOBILIS, Dours.

Nigra, fulvo nigro hirsuta. Thorace suprâ fulvo-hirto in medio nigro. Segmentis 1, 2, 3, fulvo hirsutis, reliquis nigris. Pedibus nigris, tarsi subtilius fulvis, unguibus nigro testaceis. Alis luteo-fumatis, iridescentibus. ♀. ♂ *similis*, ultimo segmento latere integro, apice emarginato, denticulis 5, 6. armato.

Long., corps, 16, 17 mm.; aile, 13 mm.

♀. Noire, très-fortement ponctuée. Poils de la face

noirs, fauves sur les joues et le bord des mandibules. Corselet, en dessus, hérissé de poils fauves, mêlés de noirs sur le milieu. Ils sont roux, en dessous, et tout à fait noirs sur les côtés. Premier, 2^e, 3^e segments hérissés de poils fauves, plus longs et plus serrés sur leur bord inférieur; 4^e, 5^e, 6^e tout à fait noirs. Palette ventrale fauve au centre, noire sur les côtés. Pattes noires, dessous des tarses garni de poils courts, ferrugineux. Épine des tibias, crochets des tarses, ferrugineux, le bout de ces derniers, noir. Ailes d'une teinte jaunâtre à reflets irisés, enfumées, surtout au bout. Point calleux très-noir et très-brillant, côte, nervures brunes.

♂ semblable à la ♀. Pubescence un peu plus pâle. Taille un peu moins grande. Septième segment abdominal, entier sur les côtés, échancré au bout; de chaque côté de l'échancrure, se voient 6 dents, très-aiguës, réunies en deux groupes, le 1^{er} de quatre, le 2^e de deux, et séparés par une petite sinuosité.

France méridionale, Montpellier. Découvert par M. Lichtenstein. — Hyères. — Alg. Coll. Dours, L. Duf., ex Lichtenstein.

CHALICODOMA LUCTUOSA, Dours.

Aterrima, metathorace 1^o que segmento abdominali cinereo-hispidis, 2, 3, 4 macula nivea notatis; tarsis subtus ferrugineis. ♀.

Long., corps, 16 mm.; aile, 11 mm.

♀. Très-noire, fortement ponctuée à points enfoncés. Poils de la face, courts, roux, dorés sur les mandibules. Métathorax garni de poils cendrés. Premier segment abdominal hérissé de poils cendrés très-épais sur les côtés, où ils sont réunis en faisceau. Côtés des 2^e, 3^e, 4^e portant une large tache de poils d'un blanc de neige. Palette ventrale noire lavée de ferrugineux, dessous des tarses ferrugineux. le dernier article plus clair avec les

crochets noirs. Ailes très-enfumées avec quelques reflets violets. Point calleux, côte, nervures très-noirs.

♂. Inconnu.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

CHALICODOMA LEUCO-POGONATA, Dours.

Nigra, niveo-rufo-hirsuta. Capite subtilis, femoribusque anticis longe niveo pogonatis. Thorace suprâ cinereo-hirsuto, segmentis abdominis 1, 2, 3, 4 rufo-cinereo villosis, reliquis nigris, 6^o latere integro, apice medio emarginato, utrinque 8, 9 denticulis armato. Ventre longè nigro-rufo hirsuto. Alis fumatis, venis fuscis. ♂. Fœmina latet.

Long., corps, 17 mm.; aile, 12 mm.

♂. Noir, ponctuation moins grossière que dans les espèces de ce genre. Poils de la face, du dessous de la tête, des cuisses antérieures longs, d'un blanc de neige éclatant, ceux du vertex et du corselet, en dessus, cendrés, un peu roux. 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments abdominaux hérissés de poils roux mêlés de cendrés, surtout sur le premier, les suivants sont noirs. Bord inférieur du 6^o segment légèrement échancré au milieu et armé, de chaque côté, de 8 ou 9 dents. En dessous, les segments sont hérissés de longs poils noirs lavés de roux. Pattes foncièrement noires, le dessous des tarses seul est ferrugineux. Épine des tibias noire en dessus, ferrugineuse en dessous, crochets des tarses testacés, leur bout, noirs. Ailes un peu enfumées. Point calleux noir, côte, nervures testacées.

Iles de l'Archipel grec. 10 ♂ sans ♀. Coll. Dours.

MEGACHILE DIMIDIATI-VENTRIS, Dours.

Nigra, niveo-villosa. Segmentis abdominis 1, 2, 3, 4, 5, niveo-strigatis, ventralibus, 2, 3, 4 longè niveo-ciliatis, 1, 5, 6 nigris. ♀ ventre versicolori.

Long., corps, 8, 10 mm.; aile, 6 mm.

♀. Noire, grossièrement ponctuée, tête de la largeur du

corselet. Poils de la face, argentés, roux sur le vertex. Poils du corselet, en dessus et sur les côtés, argentés, courts, rares sur le disque par usure? Abdomen déprimé, nu, à ponctuation assez fine. Bord inférieur des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e segments orné d'une bande de poils couchés d'un blanc de neige, quelquefois un peu roux, non interrompue, plus large sur les côtés du 1^{er} et du 2^e, se continuant en dessous. Sixième segment portant quelques poils très-courts, noirs, avec un léger reflet ferrugineux. En dessous, la palette ventrale est formée par de longs cils blancs placés sur les 2^e, 3^e, 4^e segments. Le 1^{er} et le 5^e ont des poils noirs, le 6^e des poils roux. Pattes noires, leurs poils, argentés. Tarses ferrugineux avec le premier article, en dessous, orné de poils roux-dorés. Épine des tibias très-pâle. Ailes enfumées. Point calleux testacé, côte, nervures noires.

♂. Inconnu.

Diffère de *M. Argentata* par le 6^e segment noir, par la palette ventrale qui, chez cette dernière, est entièrement blanche.

Algérie. Montp. Coll. Dours.

MEGACHILE MONTENEGRENSIS, Sichel.

Elongata, cinereo, rufo-hirta, faciis abdominalibus cinereo-rufescentibus. ano nigro, ventre albido-rufo ♀. ♂ similis, 6^o segmento in medio lacunato, margine mucronato, laterè pluri dentato, ano quadrato læviter sinuato.

Long., corps 16, 17 mm. : aile, 10 mm.

♀. Allongée. Poils de la face cendrés, mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus revêtu de poils cendrés, rares au centre, blancs sur les côtés et en dessous. Premier, 2^e, 3^e segments de l'abdomen en dessus hérissés de poils roux abondants sur le 1^{er} et le 2^e, 4^e, 5^e, 6^e ayant quelques poils noirs très-courts. Bord inférieur des segments 2^e, 3^e, 4^e, 5^e orné d'une bande de poils couchés

très-courts d'un blanc roussâtre. Palette ventrale cendrée. Pattes noires, leurs poils cendrés en dessus. Tarses ferrugineux noirâtre, leurs poils en dessus, roux. Ailes à peine enfumées. Point calleux ferrugineux-pâle, côte, nervures plus brunes.

♂ semblable à la ♀, sauf le 6^e segment de l'abdomen profondément creusé au milieu, son bord inférieur mucroné, armé de chaque côté de 5 ou 6 petites épines. Anus en carré long un peu sinué au milieu.

Cette espèce parfaitement caractérisée doit se placer à côté de la *M. Sericans Fonsc.*

Iles de l'Archipel grec, Algérie. Coll. Sichel, Dours.

MEGACHILE CLAVICRUS, Dours.

Nigra, cinereo-rufa hirsuta. Segmentis abdominis 1, 2, 3 rufo-hispidis, reliquis nigris; 6^o latere denticulato, 7^o margine sinuato utrinquè spinis 4 armato; subtùs pygidio spina acuta instructo. Pedibus nigris, tarsis subtùs rufis. Trochanteribus anterioribus dentatis longè albo ciliatis, tibiis anterioribus claviformibus, intùs excavatis, 1^o tarsorum articulo basi dilatato, longè penicillato ♂.

Long., corps 14 mm.; aile, 10 mm.

♂. Noir; chaperon recouvert de longs poils blancs; pubescence cendrée sur la moitié antérieure du corps, rousse sur le 1^{er}, 2^e, 3^e segment de l'abdomen, noire sur les autres; 6^e segment légèrement échancré avec une petite dent noire sur les côtés; 7^e segment largement échancré sur le milieu de son bord inférieur, muni de chaque côté de l'échancrure de 4 ou 5 petites épines. En dessous l'anus porte une épine plus longue, droite, noire, très-visible en regardant l'insecte de côté. Pattes noires, leurs poils cendrés, ceux des tarses roux en dessous. Trochanters antérieurs munis d'une apophyse noire longuement cilié de poils roux à leur implantation, blancs au sommet. Cuisses antérieures épaisses, inermes, tibias très-dilatés

excavés à leur partie intérieure, convexes extérieurement. Premier article des tarses de cette paire dilatés à leur base portant un pinceau de poils noirs, roux près de l'articulation. Ailes transparentes; point calleux, côte. nervures noirs.

♀. Inconnue.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

ANTHIDIUM LÆVIVENTRE L. Duf.

Nigrum, cinereo hispidum, flavo maculatum. Segmento anali tribus denticulis armato, medio quadrato, lateralibus rotundatis; 6^o segmento ventrali porrecto lamelliformi in medio acuto, pygidio ferrugineo quadridentato. Alis fumatis. ♂.

Long. corps 15, 16 mm.; aile 10 mm.

♂. Noir; antennes noires avec le dessous du scape jaune. Chaperon, mandibules jaunes, celles-ci avec le bord dentaire et l'extrémité noirs; une tache jaune plus ou moins échancrée sur le vertex derrière les yeux. Poils de la face roux sur le sommet, blancs cendrés partout ailleurs principalement sur les joues où ils sont très-longs. Corselet noir, sans tache, ses poils cendrés-roux en dessus, blancs en dessous et sous les côtés. Abdomen noir, hérissés de poils cendrés un peu plus abondants à la base; 1^{er}, 2^e segment portant sur les côtés une tache jaune plus ou moins arrondie n'atteignant pas le milieu. Tache du 3^e segment se prolongeant en pointe jusque vers le centre. Les segments suivants ont une bande jaune continue amincie au milieu, sauf sur les deux derniers. Bord inférieur de l'anus noir tridenté, les deux dents latérales larges en forme d'oreillettes, celles du milieu en carré long. En dessous le bord inférieur du 6^e segment est sinueux, soulevé en forme de lamelle pointue à son centre et cilié de poils roux. La plaque anale est ferrugineuse, 4 dentée. les deux dents supérieures obtuses, courtes.

les inférieures aiguës. (L'insecte examiné de côté à la loupe.) Hanches et cuisses noires, celles-ci jaunes-rougeâtres près de l'articulation du tibia. Jambes antérieures et intermédiaires jaunes en dessus, ferrugineuses en dessous avec une teinte plus sombre sur les intermédiaires. Dessous des jambes postérieures, noir, tarses jaunes un peu lavés de ferrugineux, leurs poils cendrés ou blancs. Ailes enfumées, point calleux, côte, nervures, ferrugineux.

Esp. Montp. Coll. L. Duf. (Esp.) Dours. (Montp.).

Cette espèce curieuse a le segment anal semblable à celui de l'A. *Dentatum*, Walt. Schmid; die Scheirerischen Arten der Bienen gattung, in Bull. de la Soc. Suisse d'entom. V. 3, n° 9, p. 467, fig. 5. Mais la configuration si remarquable du 6^e segment ventral n'est pas indiquée par l'auteur de la Monographie.

ANTHIDIUM UNDULATUM, Dours.

Nigrum; clypeo immaculato luteo, antennis nigro-ferrugineis, scutello posticè sinuato, latere subspinuloso. Abdomine nigro-flavo cingulato, 6^o segmento latere denticulo luteo armato, ano bilobato. Pedibus nigro-luteo-ferrugineis. Alis fumatis. ♂.

Long. Corps 10 mm.; aile, 7 mm.

♂. Chaperon sans tache, joues, dessus des mandibules (leur bout noir) jaunes; un petit point de cette couleur derrière les yeux. Antennes ferrugineuses en dessous, sauf la base du scape et le troisième article qui sont noirs. Poils de la face blancs, cendrés sur le vertex. Corselet noir, ses poils cendrés, une petite tache sur le bord céphalique, une 2^e un peu plus grande en avant de l'insertion des ailes, jaune. Bord postérieur du métathorax prolongé en lame sinueuse avec deux petites dents latérales, orné d'une ligne jaune interrompue après l'insertion des ailes et sur son milieu qui est sinué. Abdomen noir: 1^{er} seg-

ment portant une tache plus ou moins allongée, large sur les côtés, très-aiguë vers le milieu, où elle se termine par deux petits points ronds. 2^e et 3^e segments ayant une bande presque continue, étroite, concave sur le bord postérieur; la bande du 4^e, 5^e, 6^e segments est plus large, sans échancrure. 6^e segment légèrement échancré sur les côtés qui sont munis d'une petite épine jaune. Son bord inférieur est très-entier. Anus noir bilobé, chaque lobe orné d'une tache jaune. En dessous le 5^e segment est concave sur son bord postérieur, la plaque anale est cordiforme, mamelonée sur les côtés. Hanches et cuisses noires, celles-ci plus ou moins tachées de jaune ou de ferrugineux. Tarses jaunes ou ferrugineux-pâle, ciliés de poils blancs. Ailes enfumées, point callenx jaune, ferrugineux au centre. Côte. nervures noires.

♀. Latet.

Montp. Coll. Dours.

Espèce bien caractérisée par la conformation du 5^e segment ventral et de la plaque anale.

ANTHIDIUM STIGMATICORNE, Dours.

Nigro-ferrugineum; antennarum articulis 4, 5 ferrugineis, reliquis subtus rufis. Abdomine luteo-ferrugineo, segmentis 1, 2 macula media nigra, triangulari, 3, 4 latere, marginibus, medioque plus minus nigris, 5^o toto nigro. Pedibus ferrugineis basi nigro notatis. Alis fumatis, apice cellulaque discoidali partim albidis. ♀

Long. corps 7 mm.; aile, 4 mm.

♀. Noire ferrugineuse; premier, deuxième, troisième articles des antennes noirs, quatrième, cinquième, ferrugineux, les suivants roux en dessous. Chaperon et joues de couleur ferrugineuse avec quelques nuances jaunes. Bord antérieur du vertex sinué, orné d'une tache ferrugineuse très-large sur les côtés, se rejoignant sur le milieu en formant deux triangles contigus par leur sommet.

Mandibules ferrugineuses avec le bout noir. Poils de la face courts, argentés sous les antennes, roux sur le labre. Thorax très-fortement ponctué, noir, portant une tache ferrugineuse en avant de l'insertion des ailes, son bord antérieur présente une ligne ferrugineuse saillante interrompue sur le milieu; son bord postérieur légèrement prolongé en lame mince, orné de quatre taches ferrugineuses, les deux médianes plus larges, les deux latérales très-petites. Poils de cette région argentés très-rare sur le disque, (par usure.) abondants en dessous et sur les côtés. Abdomen plus finement ponctué que le corselet, entièrement nu, si ce n'est à la base des 1^{er} et 5^e segments, où se trouvent quelques poils courts cendrés. Sa couleur foncière est ferrugineuse-noirâtre. Le 1^{er} et le 2^e segments portent une tache ferrugineuse sur les bords, jaune au centre, large sur les côtés, allant en s'amincissant vers le haut et laissant ainsi un espace triangulaire noir. Les 3^e, 4^e, 5^e segments ont, sur le milieu, une tache ronde ferrugineuse jaunâtre plus ou moins grande sans échancrure. Le 6^e segment est noir. Palette ventrale rousse. Pattes ferrugineuses avec la base des cuisses, noire. Ailes enfumées avec quelques points blancs sur la 2^e discoïdale et vers le bout. Point calleux ferrugineux, nervures noires.

V. 1. Abdomine ferè toto ferrugineo. maculis flavo pallidis.

V. 2. Clypeo macula infera nigra.

V. 3. Scutello bipunctato.

♂. Latet.

Algérie. Coll. Dours.

Espèce intermédiaire entre *A. Scapulare* et *A. rubiginosum*.

EPEOLUS AUREO-VESTITUS, Dours.

Ferrugineus, pilis aureo-albido vestitus. Segmentis abdominalis latè aureo-albido tomentosis, fasciis vix in medio interruptis. ♀ et ♂.

Long., corps, 9 mm.; aile, 5 mm.

Dr Dours.

♀. Entièrement ferrugineuse, sauf les deux tiers supérieurs de la face et le bout des mandibules qui sont noirs. La face est recouverte de poils argentés très-brillants; un duvet très-court, jaune-doré, forme une ligne qui tapisse l'extrémité du vertex entre les yeux. Corselet ferrugineux presque entièrement recouvert d'un duvet jaune-doré, plus épais sur les côtés et formant sur le bord du prothorax une ligne bien saillante. Mésothorax ferrugineux portant quatre lignes longitudinales formés du même duvet, deux sur le dos, à la partie antérieure, n'atteignant pas la moitié de l'organe, et une de chaque côté, le long de l'insertion des ailes. Écusson ferrugineux trilobé, les lobes latéraux terminés en pointe, l'intermédiaire échancré au milieu. Méta-thorax ayant à sa partie médiane un espace en triangle renversé, noir à son extrémité, c'est-à-dire, au sommet du triangle. Dessus de l'abdomen ferrugineux; bord inférieur de tous les segments portant une large bande de poils dorés, à peine interrompue au milieu. La base du premier segment est, en outre, ornée de deux larges taches de cette couleur, se rejoignant presque pour former une bande. Pattes ferrugineuses, revêtues d'une pubescence très-fine, jaune-dorée ou blanche. Ailes enfumées, avec quelques petites taches blanches sur le limbe. Point callosus ferrugineux, côte, nervures brunes.

♂ entièrement semblable à la ♀, sauf les différences sexuelles du corselet qui, dans ce genre, est noir. Les bandes des segments abdominaux sont un peu plus ondulées que dans la ♀.

Nota. — Les poils, chez les sujets frais, sont tout à fait dorés. ils deviennent un peu cendrés en vieillissant.

Algérie. Coll. Dours.

MELECTA RUGOSA, Dours.

Aterrina, nigro-niveo-villosa. Abdomine longitudinaliter

rugoso, segmentis utrinquè macula nivea ornatis. Pedibus nigerrimis, tarsis obscure ferrugineis. ♀.

Long., corps, 13 mm.; aile, 9 mm.

♀. D'un noir très-foncé. Poils de la face, argentés, longs au-dessus de l'insertion des antennes, duveteux sur le chaperon; ceux du vertex sont noirs, lavés de roux au centre. Corselet en dessus, hérissé de poils très-noirs, très-serrés, sauf sur le bord céphalique où ils sont blancs, formant une bande assez large qui s'étend sur les côtés, bien au delà de l'insertion des ailes; en arrière des ailes, sur les côtés du métathorax, ces poils blancs sont réunis en un petit pinceau. Abdomen nu, sauf sur le premier segment où se remarquent quelques poils noirs formant une tache triangulaire. Tous les segments sont sillonnés de rides longitudinales, sinueuses, très-serrées. Les côtés des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, sont ornés d'une tache plus ou moins triangulaire, d'un blanc de neige. Le cinquième segment est tout à fait noir, l'anus est revêtu d'un léger duvet ferrugineux. Pattes noires, poils des cuisses noirs, lavés de ferrugineux. Tarses d'un ferrugineux obscur. Ailes enfumées, avec quelques parties transparentes sur la troisième cubitale et la deuxième discoïdale. Point calleux. côte, nervures très-noirs.

Iles de l'Archipel grec. Algérie. Coll. Dours.

NOMADA PYROSOMA, Dours.

Nigro-ferruginea. Antennis nigro-ferrugineis. Capite ferrugineo, puncto nigro circa ocellos et suprâ antennas. Thorace nigro; prothoracis linea, puncto antè alas, macula pleurali, mesonotho, post scutello, metathorace 2 maculis, ferrugineis. Coxis basi nigris. Alis fumatissimis, venis nigris. ♀.

Long., corps, 12, 13 mm.: aile, 10 mm.

♀. D'un noir ferrugineux. Antennes en dessus ferrugineuses, sauf les six derniers articles qui sont noirs. l'ex-

trémité du dernier est ferrugineux. En dessous, les trois premiers articles sont seuls ferrugineux, les autres lavés de noir. Tête entièrement ferrugineuse, à l'exception d'une tache entourant les ocelles, et d'un point noir derrière les antennes, de couleur noire. Le bout des mandibules est brun. Corselet noir, sauf le bord céphalique, un point en avant de l'insertion des ailes, une grande tache sur les côtés, avec un point noir vers le haut, ferrugineux. Le dos est recouvert par une plaque ferrugineuse, interrompue au milieu par une ligne noire. Parfois, la plaque ferrugineuse est divisée en deux, de chaque côté, par un trait noir. Tubercules de l'écusson très-saillants, agglutinés. Ligne du postécusson ferrugineuse. Métathorax noir, avec un espace cordiforme central finement chagriné, ses côtés ornés d'une ou deux taches ferrugineuses plus ou moins étendues. Abdomen entièrement ferrugineux, le bord des segments brun, le bout du cinquième ayant quelques poils jaunes. Pattes ferrugineuses, base des hanches postérieures, noire. Ailes très-enfumées, avec quelques trainées blanches sur le limbe. Point calleux, ferrugineux; côte, nervures noires.

Espèce bien caractérisée par sa taille uniforme, la couleur des antennes, la bigarrure du corselet...

Algérie. Reçue en grand nombre. Coll. Dours.

NOMADA TRIDENTI ROSTRIS, Dours.

Parva, nigro-ferruginea. Labro mutico-ferrugineo. Abdominis segmentis 1 basi, 2, 3, 4 margine postico. nigris. Pedibus nigris ferrugineo irroratis. Alis fumatis, limbo albo-notato ♀ ♂ similis, labro in medio spinuloso, mandibulis externè minuto denticulo armatis.

Long., corps, 6, 7 mm.; aile, 5 mm.

♀. Petite, d'un ferrugineux noirâtre. Antennes obscurément, ferrugineux, le deuxième article seul tout à fait noir à ses deux tiers supérieurs. Face entièrement noire,

à l'exception d'une ligne rouge étroite contournant la partie interne des yeux en se prolongeant jusque sur le vertex. Bord inférieur du chaperon et mandibules de couleur ferrugineuse. Corselet noir, excepté le bord céphalique qui porte une ligne rouge un peu interrompue sur le milieu, quelques vestiges linéaires rouges entre la naissance des ailes, un point en avant de celles-ci, deux taches, quelquefois réunies sur les côtés, deux tubercules sur l'écusson, rouges. Pattes noires avec quelques parties ferrugineuses sur le bout des hanches, des cuisses, des tibias et des tarses. Ailes très-enfumées, deux petits espaces blancs sur le limbe. Point calleux ferrugineux obscur, côte, nervures noires.

♂ un peu plus grand que la ♀. Face noire recouverte de poils cendrés. Bord libre du chaperon jaune-ferrugineux, avec une petite épine très-aiguë au milieu. Mandibules ferrugineuses avec le bout brun; leur base vers le dernier tiers est munie, sur le côté externe, d'une très-petite dent obtuse. Antennes ferrugineuses en dessous, lavées de noir en dessus, avec le scape entièrement noir. Corselet en dessus noir, avec des poils cendrés-roux, blancs sur les côtés, deux petits points rouges sur l'écusson. Abdomen ferrugineux noirâtre, avec quelques poils cendrés. Base du premier segment, un point sur les côtés des 2^e et 3^e, bord inférieur des suivants noirs. Pattes ferrugineuses, leurs poils cendrés, hanches noires, cuisses ayant des lignes de cette couleur plus ou moins étendues, sommet des tibias et premier article des tarses noirâtres. Ailes transparentes, avec des reflets violets, deux taches blanches sur le limbe. Point calleux, côte, nervures ferrugineux.

V. Corselet entièrement noir, sans taches à l'écusson.

Algérie. Reçue en très-grand nombre. Coll. Dours.

♀ très difficile à différentier de la *N. Germanica*, *ferruginata*. Le ♂ est bien distinct par la configuration du labre et des mandibules.

EUCERA CANESCENS, Dours.

Nigra, cinereo-rufo-aureo hirsuta. Thorace, segmentis que 1, 2, 3 cinereo vestitis, his tomentosis, 4^o nigro, 5^o anoque rufo-aureis. Pedibus nigris, rufo-aureo pilosis. ♀.

Long., corps, 16 mm.; aile, 12 mm.

♀. Noire. Poils de la face noirs en dessus, cendrés en dessous, ceux du labre roux doré. Poils du corselet cendrés et mêlés de quelques-uns de roux sur les côtés et en dessous. Abdomen de la largeur du corselet, elliptique légèrement convexe. 1^{er}, 2^e, 3^e segments recouverts de poils courts, gris, tomenteux, 4^e noir, nu, 5^e noir, son bord inférieur, ainsi que l'anus ayant quelques poils roux-doré. En dessous, le plastron du premier segment est noir, et tous les segments, surtout le dernier, bordés de cils d'un roux vif. Pattes noires, leurs poils roux doré, ceux des cuisses et du premier article des tarses de la paire postérieure, plus longs. Derniers articles des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, point calleux, côte, nervures bruns.

Algérie. Coll. Dours.

Cette jolie espèce, dont le ♂ m'est inconnu, appartient au groupe de l'*E. Nigrilabris*, Lep.

EUCERA CONSIMILIS, L. Duf.

Nigra, fulvo-cinereo tomentosa. Thorace suprâ fulvo, infrâ cinereo hirsuto. 1^o Segmento abdominali cinereo hirsuto, reliquis fulvo tomentosis, fasciis cinereis, distinctis. Pedibus suprâ cinereo, infrâ fulvo hirsutis, metatarsis ferrugineis. Alis subhyalinis, nervis bruneis.

Long., corps, 10 mm.; aile, 7 mm.

Alger. Hisp. Coll. L. Duf. 2 ♂.

EUCERA TOMENTOSA, Sichel.

Nigra, in recentioribus ferrugineo, in senioribus cinereo-

tomentosa. Segmentis 1, 2, margine infero nigro. Pedibus anterioribus ferrugineo, posterioribus nigro hispidis; tarsis ferrugineis. Alis apice fumatis. ♀.

Long., corps, 14 mm.; aile, 11 mm.

♀. Noire. Mandibules ferrugineuses au centre. Poils de la face, roux, ceux du corselet, en dessus et en dessous, d'un ferrugineux éclatant à l'état frais, cendrés chez les sujets déjà avancés en âge. Base du premier segment abdominal hérissé de poils ferrugineux assez longs; base et côtés des 2^e, 3^e, 4^e, 5^e et anus recouverte d'un duvet ferrugineux très-vif, avec quelques poils plus clairs, sur le dos et le bord inférieur du 5^e. Bord inférieur du 4^{er} et du 2^e finement ponctué, nu, noir. Pattes noires, les poils des deux premières paires, ferrugineux, ceux de la troisième paire, noirs, rudes, lavés de ferrugineux sur le dessus du premier article des tarses, derniers articles des tarses ferrugineux avec les crochets noirs. Ailes transparentes, leur bout un peu enfumé. Point calleux, côte, nervures, bruns.

♂. Latet.

Diffère de l'E. *Hispana*, Lep. par la coloration noire des pattes et la pubescence de l'abdomen.

Algérie. Coll. Sichel, Dours.

EUCERA PULVERACEA, L. Duf.

Nigra, fulvo-albido tomentosa; pedibus rufo-cinereis. Bus. ano fulvo-nigro. ♀.

Long., corps, 13, 14 mm.; aile, 9, 10 mm.

♀. Noire. Poils de la face et du dessous du corselet blancs cendrés, ceux du dessus jaunes roussâtres mêlés de noirs. Premier segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés, peu abondants, 2^e, 3^e, 4^e segments en ayant de courts, roux. Base de ces segments ornée d'une bande large de poils blancs, un peu cendrés, courts, couchés,

semblables à des écailles de papillon ; base du 5^e et anus ayant des poils fauves. Pattes, en dessus, hérissées de poils cendrés, très-longs aux postérieures, ceux du métatarse fauves brillants. Ailes un peu enfumées. Point calleux, côte, nervures, bruns.

Esp. Coll. L. Duf. Envoyé par M. Mieg, sans ♂.

EUCERA NIGRO-THORACICA, Dours.

Nigro-ferruginea. Thorace femoribusque nigro-hirsutis. Abdomine tibiisque ferrugineo pilosis. Alis fumatis. ♀ ♂. Antennis longitudine corporis, facie lutea.

Long., corps, 13 mm. : aile, 10 mm.

♀. Noire. Poils de la face, noirs, ceux du labre, roux. corselet, en dessus, hérissés de poils noirs lavés de ferrugineux, surtout à la partie postérieure, ceux des côtés et en dessous, tout à fait noirs. Tous les segments de l'abdomen sont recouverts de poils ferrugineux, ceux du premier, longs, hérissés, ceux des suivants, très-courts, squameux. Le bord inférieur de tous les segments porte une bande de poils plus clairs, s'étendant en forme de V jusque sur le milieu, le bord inférieur du 5^e est cendré au centre. En dessous, les deux derniers segments sont ciliés de longs poils ferrugineux. Pattes noires. Poils des cuisses et des jambes des deux premières paires, noirs, lavés de ferrugineux, ceux des cuisses postérieures et de tous les tarses, longs, ferrugineux. Crochets noirs. Ailes un peu enfumées. Point calleux noir, côte, nervures brunes.

♂ semblable à la ♀, sauf : antennes de la longueur du corps ; chaperon et labre jaunes. Bord inférieur de tous les segments décoloré de couleur ferrugineuse pâle.

Algérie. Coll. Dours.

EUCERA ALBO PUNCTULATA, Dours.

Nigra, cinereo-ferrugineo hirta, thorace cinereo hirta.

Abdomine fusco tomentosus, segmentis latere, 2, 3, 4, 5 albo punctulatis, 5° anoque rufo-ferrugineis. Pedibus ferrugineis, ferrugineo lavatis. Alis hyalimis. ♀.

Long., corps, 15 mm ; aile, 9 mm.

♀. Noire. Poils de la face, du corselet, en dessous et sur les côtés, bruns ferrugineux, ceux du corselet, en dessus, et du premier segments de l'abdomen, hérissés, cendrés. Abdomen de la largeur du corselet, un peu déprimé, revêtu sur les quatre derniers segments de petits poils couchés, bruns ferrugineux. Côtés des 2°, 3°, 4°, 5° ornés d'une tache d'un blanc de neige, bien marqué sur les 2°, 3°, 4°, s'éteignant insensiblement dans les poils bruns ferrugineux qui recouvrent le 5°. En dessous, le corps tout entier est recouvert de poils bruns ferrugineux. Pattes brunes, les poils des postérieures, touffus d'un ferrugineux éclatant. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures testacés très-clair.

♂. Latet.

Constantinople. Coll. Dours.

EUCERA BI-BALTEATA. Dours.

Nigra, rufo-nigro-cinereo hirsuta. Thorace rufo. Segmentis nigro-cinereis, 3, 4, margine infero albidis. Pedibus nigris, tarsis obscuris, ultimo solum articulo ferrugineo. Alis fumatis ♀. ♂. Antennis longitudine corporis, facie lutea, 5° segmento læviter latere spinuloso.

Long., corps, 14, 15 mm.; aile, 9, 10 mm.

♀. Noire. Mandibules ferrugineuses au bout. Poils de la face noirs, lavés de roux, plus pâles sur le labre et en dessous. Poils du corselet, en dessus, roux, mêlés de noirs sur le disque, blancs sur les côtés et en dessous. Abdomen de la largeur du corselet, elliptique, un peu déprimé. Premier, 2°, 3° segments ayant des poils hérissés, roux pâles, les suivants de très-courts, noirs. Bord inférieur des 3° et 4° segments, orné d'une bande de poils

couchés, blancs, 5^e portant une bande de poils ferrugineux s'étendant aussi à l'anus. En dessous, le plastron ventral s'avance jusque vers le milieu du 2^e segment, son bord inférieur est doublé d'une ligne d'un roux-vif; tous les autres segments ont des cils cendrés-roux. Ailes très-peu enfumées. Point calleux, côte, nervures bruns.

♂ plus grêle que la ♀, à laquelle il ressemble entièrement, sauf : antennes aussi longues que le corps; chaperon et labre jaunes.

Algérie. Iles de l'Archipel grec. Coll. Sichel, Dours. Recue en grand nombre.

EUCERA PEDATA, Dours.

Nigra, rufo-nigro-hirta. Thorace rufo-hirto. Abdomine nigro, segmento 2 margine infero albo balteato, ano nigro-ferrugineo. Pedibus nigris, tibiis tarsisque posticis villosissimis ferrugineis. Alis fumatis. ♀ ♂ similis, facie lutea. Antennis corpore tertia parte brevioribus.

Long., corps, 13, 14 mm. : aile, 9 mm.

♀. Noire. Poils de la face, noirs, lavés de ferrugineux, surtout sur le chaperon et le labre.. Corselet, en dessus et sur les côtés, hérissé de poils roux-foncés, de noirs en dessous. Abdomen, de la largeur du corselet, presque nu, sauf sur le premier segment qui est hérissé de poils roux-cendrés. Bord inférieur du 2^e segment orné d'une bande continue de poils blancs, courts, couchés. Base et bord inférieur des segments suivants ainsi que l'anus recouverts de poils noirs, courts, tomenteux, lavés de ferrugineux en dessous, le bord des segments est ferrugineux, cilié de poils de cette couleur, le plastron du premier segment est rouge vermillon. Pattes noires; poils des jambes postérieures et ceux du premier article des tarses de toutes les paires, touffus, d'un roux très-vif. Ailes enfumées. Point calleux, côte, nervures, bruns.

♂ plus grêle que la ♀. Chaperon et labre jaunes; antennes d'un tiers plus courts que le corps.

Algérie. Iles de l'Archipel grec. Coll. Sichel, Dours.

EUCERA TRIZONA (*E. Bicincta*, Lep.?), L. Duf.

Rufo-cinereo-hirsutus. Antennis corpore tertia parte brevioribus, clypeo labroque luteis vel ferrugineis; thorace rufo-hispido. Abdomine, segmentis margine infero 3, 4, 5 albo zonatis. Pedibus nigris, ultimo tarso ferrugineo. Alis vix infumatis. ♂.

Long., corps, 15 mm.; aile, 11 mm.

♂. Noir. Antennes d'un tiers plus courts que le corps. Chaperon et labre jaunes ou ferrugineux. Poils de la face, en dessus, cendrés-roux, tout à fait blancs sur le labre et en dessous. Corselet, en dessus, hérissé de poils roux, blanchâtres sur les côtés et en dessous. Abdomen, de la largeur du corselet, ovale, aplati. Premier, 2^e segments hérissés de poils longs, cendrés-roux; ceux des suivants très-courts. Bord inférieur des 3^e, 4^e, 5^e orné d'une bande assez large de poils courts, couchés, blancs. Sixième segment tout entier et anus revêtus de poils roux mêlés de blancs. Plaque anale en dessous, concave au bout. Pattes noires, leurs poils blanchâtres, ceux du dessous du premier article des tarses postérieures, roux, dernier article des tarses, ferrugineux pâle. Ailes un peu enfumées. Point calleux, côte, nervures testacés.

♀. Latet.

Le ♂ *E. Bicincta*, décrit par Lep. appartient sans doute à un sujet vieux, la bande du 3^e segment ayant disparu par usure.

Algérie. Coll. L. Duf., Dours.

EUCERA DIZONA, L. Duf.

Fulvo-nigro-hirsutus. Clypeo productio ferrugineo vel luteo maculato. Antennis dimidio corporis. Segmentis abdominis 1, 2 fulvo hispidis, reliquis nigris; 2, 3 margine

infero albo cilatis, tarsis 2, 3, 4, 5, ferrugineis. Alis hyalinis ♂.

Long., corps, 13 mm.; aile, 10 mm.

♂. Noir. Antennes de la longueur de la moitié du corps; chaperon, bombé, presque entièrement ferrugineux, labre noir. Poils de la face, cendrés-roux mêlés de noirs sur le vertex et les joues, ceux du labre plus pâles. Poils du corselet, en dessus et sur les côtés, roux, cendrés en dessous. Abdomen un peu plus large que le corselet. 1^{er}, 2^e segments hérissés de longs poils roux-vif, les 3^e, 4^e, 5^e en ayant de très-courts, noirs, couchés. Bord inférieur des 2^e, 3^e orné d'une bande étroite de poils couchés, blancs. En dessous, les segments sont bordés, ainsi que les côtés, de cils roux. Plaque anale plane. Pattes noires, dernier article des tarses, ferrugineux clair, leurs poils cendrés-roux, ceux du premier article des tarses d'un roux-vif. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures bruns.

♀. Latet.

Algérie. Coll. L. Duf., Dours.

EUCERA EPHIPPIA, Sichel.

Nigra, cinereo-ferruginea. Thorace cinereo-hirto. Abdomine nigerrimo immaculato. Pedibus obscure ferrugineis ♀. ♂. Gracilior, clypeo luteo punctulato. Antennis dimidio corporis.

Long., corps, 14 mm.; aile, 9 mm.

♀. Noire. Poils de la face, noirs lavés de ferrugineux. Poils du corselet hérissés, cendrés en dessus, noirs sur les côtés et en dessous. Abdomen, un peu plus large que le corselet, légèrement déprimé, entièrement noir, sauf sur le premier segment qui est hérissé de poils cendrés sur les côtés du 3^e et de l'anus qui portent quelques poils courts d'un noir ferrugineux. Pattes noires, tarses ferrugineux. Ailes transparentes. Point calleux, côte, nervures testacés.

♂ plus grêle que la ♀. Chaperon portant une tache irrégulière jaune qui atteint le bord inférieur. Mandibules noires. Antennes de la moitié de la longueur du corps.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Sichel, Dours. Reçue en très-grand nombre.

EUCERA SEMI-STRIGOSA, Dours.

Nigro-cinereo-rufo hirta. Abdomine nigro creberrime punctulato, segmentis 1, 2, 3, 4 margine postico albo strigosis, 4^o striga continua, 1, 2, 3 interrupta, 5^o anoque rufis. Pedibus nigris cinereo-hispidis, tarsis ferrugineis subtilis ferrugineo pilosis. Alis hyalinis apice fumatis. ♀ ♂. Antennis longitudine corporis, clypeo labroque luteis, fasciis 3, 4, 5 albidis, continuis, 6^o anoque fulvis. 5^o segmento latere integro.

Long., corps, 13 mm.; aile, 9 mm.

♀. Noire, milieu des mandibules ferrugineux, poils du labre roux; ceux du labre, du corselet cendrés, à peine plus pâles, sur les côtés et en dessous. Abdomen, un peu plus large que le corselet, brillant, très-finement ponctué, nu, si ce n'est à la base du premier segment où se trouvent quelques poils cendrés, hérissés. Bord inférieur des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande de poils blancs, très-courts, continue sur le 4^e, interrompue sur le 2^e et le 3^e, et se réduisant à une simple tache sur les côtés du 1^{er}. Cinquième segment et anus roux. En dessous, les segments sont longuement ciliés de poils de cette couleur. Pattes noires, leurs poils cendrés, roux sur le premier article des tarses de toutes les paires. Derniers articles des tarses ferrugineux, crochets noirs. Ailes à peine enfumées au bout. Point calleux, côte, nervures de couleur brune.

♂ plus grêle que la ♀. Antennes de la longueur du corps, tête non comprise. Chaperon, labre jaunes. Abdomen revêtu de poils roux-cendrés, hérissés. Bord inférieur des 3^e, 4^e, 5^e segments orné d'une bande de poils

blancs couchés, continue. Côtés du 5^e segment entier sans épine, 6^e et anus fauves. Le reste comme dans la ♀.

Alg.. Iles de l'Archipel grec, Hongrie. Coll. Dours.

EUCERA TENUI-MARGINATA. L. Duf.

Cinereo-hispidus. Clypeo luteo, labro nigro. Antennis longitudine corporis. Abdomine, segmentis 2, 3, 4, 5 linea grisea distincta ciliatis, 6^e anoque rufis. Pedibus nigris, rufo-cinereo longè ciliatis. Tarsis lætè ferrugineis. ♂.

Long., corps 13 mm.; aile 10 mm.

♂. Noir, recouvert de longs poils cendrés un peu plus pâles sur les côtés et le dessous du corselet. Chaperon portant sur son milieu une tache irrégulière jaune, n'atteignant pas les joues. Abdomen un peu plus large que le corselet ovale, un peu arrondi. Parmi les poils cendrés qui recouvrent l'abdomen se remarquent quelques poils noirs hérissés, rudes. Le bord inférieur du 2^e, 3^e, 4^e, 5^e surtout porte une bande étroite de poils couchés blanchâtres, très-distincte. Le 6^e et l'anüs ont des poils roux-noir; les côtés du 5^e sont en outre munis d'une très-petite épine. En dessous la plaque anale est légèrement concave, très-légèrement mamelonnée sur les côtés. Pattes noires, poils des hanches et des cuisses cendrés, ceux des jambes et des tarses longs en dessus, roux-cendré, ceux du dessous des tarses, ferrugineux vif. Le dernier article des tarses est ferrugineux pâle. Ailes transparentes. Points calleux, côte et nervures, bruns.

♀. Latet.

Diffère de l'E. *Distincta*, Lep. par son labre noir.

Algérie. Coll. L. Duf. Dours.

EUCERA COLARIS. Dours.

Nigra, thorace cinereo-luteo, in medio nigro. Abdomine punctulato, marginibus 2, 3, 4 albis, 5^e anoque rufis, pedibus ferrugineis. ♀.

♀. Noire: chaperon fortement ponctué. poils de la face

cendrés, ceux du labre et des mandibules fauves. Corselet en dessus hérissé de poils jaunes-cendrés, plus pâles en dessous, noirs au centre. Premier segment de l'abdomen assez fortement ponctué, hérissé de poils jaune-cendrés ; 2^e, 3^e, 4^e, 5^e segments plus finement ponctués ayant des poils noirs très-courts chez les sujets frais ; bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments ornés d'une bande de poils blancs à peine ondulée sur le 2^e, presque droite sur le 4^e, bandes plus ou moins incomplètes par suite d'usure. Bande du 5^e segment fauve ; anus et segments en dessous garnis de poils fauves mêlés de cendré, de blanc sur les côtés. Poils des pattes ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Point calleux noir, côte, nervures, bruns.

♂. Antennes de la longueur du corps ; face entièrement noire, ses poils cendrés, roux ; corselet, 1^{er} segment tout entier et base du 2^e hérissés de poils roux, devenant cendrés par l'âge. Les poils des autres segments sont noirs. Cinquième segment portant sur les côtés une petite épine noire. Le reste comme dans la ♀.

Algérie. Coll. Dours. Reçue en grand nombre.

Cette espèce doit se placer immédiatement après l'*E. Oraniensis*.

EUCERA OBESA, Dours.

Nigra, rufo-cinereo villosa. Abdomine crasso, obeso lævisimè punctulato ; fasciis 2, 3, 4, albidis vel rufescentibus. integris. Pedibus fulvo-aureo hirsutis, alis subhyalinis. ♀ ♂. Antennis dimidio corporis, clypeo labroque luteis, hoc sæpissimè solum luteo punctato. Segmentis 3, 4, 5, 6 albo vel rufescenti pilosis ; 5^o segmento latere subdentato.

Long. corps 14 mm. ; aile, 10 mm.

♀. Noire ; poils de la face cendrés-roux mêlés de noir, ceux du labre entièrement roux. Corselet en dessus finement ridé, ses poils roux mêlés de noir sur le disque, plus pâles en dessous et sur les côtés. Abdomen très-finement ponctué ou plutôt ridé en ovale arrondi, presque nu,

sauf sur le 1^{er} et le 2^e segments qui portent quelques poils hérissés cendrés. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e segments orné d'une bande de poils courts, couchés, blanchâtres ou roux, entière. La bande du 5^e segment est plus formée, l'anus roux. En dessous le bord inférieur des segments est longuement cilié de poils roux. Pattes noires, leurs poils roux-dorés, très-épais sur les postérieures; tarses ferrugineuses avec les crochets noirs. Ailes à peine enfumées. Point calleux, côte, nervures, bruns.

♂ un peu plus grêle que la ♀. Antennes atteignant la moitié du corps. Chaperon et labre jaunes, la couleur de ce dernier se réduisant souvent à un seul point. Poils de la face, du corselet et des deux 1^{ers} segments abdominaux du 6^e et de l'anus roux. Le 5^e segment porte sur les côtés une petite dent obtuse. Le reste comme dans la ♀.

Algérie. Reçue en grand nombre. Coll. Dours.

EUCERA EUCNEMIDEA. Dours.

Nigra, cinereo-rufo hirsuta; faciis abdominalibus 2. 3. 4, 5, anoque rufis, integris. Pedibus rufo-plumosis, tarsis ferrugineis. ♀. ♂. Antennis ferè longitudine corporis; fasciis segmentorum abdominis rufis, vel cinereo-rufis. 5^o segmento latere spinuloso, pygidio triangulari leviter fossulato.

Long., corps, 10 mm.; aile, 8 mm.

♀. Noire; mandibules ferrugineuses au milieu. Poils de la face cendrés-roux, ceux du labre, de la tête et du corselet en dessous plus pâles. Poils du corselet en dessus épais, d'un roux ferrugineux plus pâles sur les côtés. Abdomen assez fortement ponctué, ovale, nu, si ce n'est sur le 1^{er} segment et la base du 2^e, où se trouvent des poils roux courts. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e, 5^e tout entier orné d'une bande non-interrompue de poils roux, couchés, très-courts. En dessous, les segments ont de longs cils roux, et le 5^e un petit faisceau de poils ferrugineux sur

son milieu. Pattes noires ; les poils des deux premières paires sont courts, roux, ceux des postérieures du premier article des tarses très-longs plumeux. Tarses ferrugineux, extrémité libre des crochets noirs. Ailes à peine enfumées au bout. Point calleux, côte, nervure, bruns.

♂. un peu plus grêle que la ♀. Antennes presque aussi longues que le corps (la tête non comprise). Face noire, pubescence semblable à celle de la ♀. Bord inférieur des 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e segments orné d'une bande de poils couchés, courts, roux. Le 5^e segment porte sur les côtés une très-petite épine recourbée en dedans qui s'émousse avec l'âge. En dessous, il est orné de deux taches ferrugineuses. La plaque anale est triangulaire, avec quelques impressions concaves sur les côtés.

Algérie, midi de la France. Reçue en très-grand nombre. Coll. Dours.

Cette espèce appartient au groupe de l'E. *Oraniensis* dont il se distingue par les bandes de l'abdomen continues, et les longs cils des pattes postérieures ; le ♂ est en outre armé d'une petite dent sur les côtés du 5^e segment abdominal, qui fait défaut chez *oraniensis*.

EUCERA BREVICORNIS, Dours.

Nigro-rufo-cinereo villosa; antennis thorace brevioribus, clypeo labroque nigris, illo macula media lutea. 1^o segmento toto, 2^oque basi rufo-hirsutis, reliquis nigris. Tarsis subtus ferrugineis, 1^o postico externe rufo ciliato. Alis limpidis ♂.

Long., corps, 12 mm.; aile, 10 mm.

♂. Noir, pubescence cendrée-rousse. Antennes n'atteignant pas le bord postérieur du corselet. Face noire, à l'exception d'une tache jaune triangulaire sur le milieu du chaperon; ses poils roux à la naissance des antennes, cendrés sur le labre. Corselet en dessus hérissé de poils denses, roux chez les sujets frais, mêlés de cendrés avec l'âge. Premier segment de l'abdomen recouvert de poils

roux s'étendant un peu sur la base du 2^e. Poils des autres segments noirs, lavés de roux. Pattes noires, leurs poils roux, ceux du dessous du premier article des tarses postérieurs ferrugineux, avec la tranche externe plus pâle. Ailes transparentes, point calleux, côte, nervures, bruns.

♀. Inconnue.

Algérie. Coll. Dours.

Espèce bien facile à distinguer par la brièveté des antennes chez les ♂ de ce genre.

TETRALONIA (MACROCERA) NIGRIFACIES, L. DUF.

Nigra, rufo cinereo-hirsuta. Segmentis 2, 3, 4 basi albostrigatis, 5^o toto anoque rufis. Pedibus nigris rufo pilosis, tarsis fuscis. Alis hyalinis, venis nigris ♀.

♂. Similis facie nigra. Antennis dimidio longitudine corporis, 5^o segmento latere subspinuloso.

Long., corps, 14 mm.; aile, 10 mm.

♀. Noire. Poils de la face et du vertex cendrés, ceux du labre roux. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de poils cendrés-roux, plus pâle en dessous. Abdomen de la largeur du corselet, ovale, un peu bombé, brillant, finement ponctué. Premier segment hérissé de poils cendrés-roux, un peu plus pâles sur les côtés; les autres segments ont quelques poils courts noirs, lavés de ferrugineux. Cinquième segment et anus revêtus de poils d'un roux très-vif, les 2^e, 3^e 4^e, portent sur leur milieu une ligne presque droite donnant insertion à quelques poils courts, leur base et le bord inférieur du 4^e sont ornés d'une bande de poils blancs, couchés, très-courts, tomenteux. En dessous, le plastron, le bord inférieur et le milieu des segments sont d'un ferrugineux vif, leurs cils longs, roux, ceux du 5^e dorés sur le milieu, cendrés sur les côtés. Pattes noires, leurs poils roux, ceux des tibias postérieurs et du premier article des tarses de cette paire, longs, d'un roux vif, noirâtre en dessous. Dernier article des tarses ferrugineux,

crochets noirs. Ailes transparentes, côte, nervures brunes, point calleux testacé.

♂ presque aussi grand que la ♀. Antennes atteignant la moitié de la longueur du corps; face entièrement noire. Base de tous les segments, troisième tout entier, revêtue de poils blanchâtres, tomenteux. Le reste comme dans la ♀.

Alg. Fr. mérid. Coll. L. D. Dours.

Reçue en grand nombre. Doit se placer après *M. Strigata*, Lep.

TETRALONIA (MACROCERA), CÆLEBS, L. DUF.

Nigra : Antennis nigris dimidio longitudine corporis; clypeo flavo vel ferrugineo, labro nigro. Thorace 1^o que segmento abdominis rufo hirsutis, segmento 2 rufo-cinereo tomentoso hirsutis reliquis albido tomentosis pilis nigris inter mixtis; ano fulvo, ventre rufo hirsuto; pedibus rufo-hirsutis, tarsis ferrugineis ♂.

Algérie. Coll. L. Duf.

TETRALONIA (MACROCERA), SUBAURATA, L. DUF.

Nigra, nigro flavo hirsuta. Clypeo labroque luteis, thorace fulvo-hirsuto; segmentis, 1 cinereo hispido, 2, 3, 4, 5, 6 luteo tomentosis, 5^o levi dente armato, ano fulvo, tarsis subtus ferrugineis. Alis hyalinis, nervis brunneis ♂.

Long., corps, 14 mm.; aile, 10 mm.

Esp. Fr. mérid.

TETRALONIA (MACROCERA), INOEQUIDISTANS, L. DUF.

Nigra. Antennis nigris, dimidio corporis longioribus; clypeo labroque luteis; thorace 1^o que segmento abdominis rufo-hirsutis, 2^o pilis brevioribus tecto, reliquis nigris, fasciis albis tomentosis, 3^o, 4^o que latioribus; ano fulvo, pedibus fulvo-hirsutis. Alis hyalinatis, nervis, puncto calloso brunneo ferrugineis.

Long., corps, 14 mm.; aile, 12 mm.

Esp. Alg. France mérid. Perpign. Coll. L. Duf. Dours.

TETRALONIA (MACROCERA), COANGUSTATA, DOURS.

Nigra. Antennis nigris, dimidio longitudine corporis : facie nigra ; thorace 1^oque segmento abdominali rufo-luteo hirsutis, reliquis cinereo-tomentosis-fasciis albidioribus. 6^o Segmento fulvo marginato. Ventre rufo-cinereo ciliato. Pedibus fulvo-cinereo hirsutis. Tarsis posticis ferrugineis. Alis subfumatis, nervis, costâ, puncto calloso, brunneis ♂.

Long., corps, 15 mm. ; aile, 9 mm.

Alg. Esp. ex Mieg. Coll. L. Duf.

TETRALONIA (MACROCERA), CANESCENS, L. DUF.

Nigra. Antennis nigris, dimidio longitudine corporis, clypeo labroque flavis, hirsutie corporis cinerescenti, abdomine flavo-cinereo tomentoso, fasciis distinctis, 6^o segmento anoque fulvis, 5^o levi dente armato. Pedibus extûs cinereo-hirsutis, tarsis posticis intûs fulvis. Alis hyalinis, nervis nigris ♂.

Long., corps, 14 mm. ; aile, 10 mm.

Alg. Esp. Fr. mérid.

Vh. Degrolle des

Corbie etc

1 2	<i>Andrena büraudü</i>	7 8	<i>Andrena rubiginosa</i>
3 4	<i>hemipyrrha</i>	9 10	<i>Doursella</i>
5	<i>circiliata</i> f	11	<i>Campylogaster subglobosus</i>
6	<i>circinata</i>	12 13	<i>fulvoeristatus</i>

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00964 6902