ATLAS
DE LA
FLORE ALPINE.

Tome. IV.

QK315

.C58

t.4

ATLAS

DE LA

FLORE ALPINE

*Publié par le Club alpin allemand
et autrichien.*

Tome IV (Planches 301 à 400).

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

GENÈVE & BALE
LIBRAIRIE GEORG & Co

Lyon, même maison.

1899

Tous droits réservés.

.C56
t. 4

Index des planches du tome IV.

(Planches 301 à 400.)

Les plantes dont les noms sont accompagnés d'un * sont photographiées d'après nature.

301. <i>Calluna vulgaris</i> Salisb.	351. <i>Gentiana obtusifolia</i> Wild.*
302. <i>Erica carnea</i> L.	352. » <i>ciliata</i> L.*
303. <i>Loiseleuria procumbens</i> Desv.*	353. » <i>verna</i> L.*
304. <i>Rhododendron Chamaecistus</i> L.	354. » <i>Favrati</i> Rittener.*
305. » <i>hirsutum</i> L.*	355. » <i>imbricata</i> Frœl.*
306. » <i>ferrugineum</i> L.*	356. » <i>bavarica</i> L.*
307. <i>Pyrola uniflora</i> L.	357. » <i>pumila</i> Jacq.*
308. <i>Armeria alpina</i> Wild.	358. <i>Pleurogyne carinthiaca</i> Gris.
309. <i>Primula Auricula</i> L.*	359. <i>Swertia perennis</i> L.*
310. » <i>carniolica</i> Jacq.	360. <i>Polemonium coeruleum</i> L.
311. » <i>latifolia</i> Lap.*	361. <i>Eritrichium nanum</i> Schrad.*
312. » <i>cenensis</i> Thom.*	362. <i>Pulmonaria styriaca</i> A. Kern.*
313. » <i>viscosa</i> Vill.	363. <i>Myosotis alpestris</i> Schmidt.*
314. » <i>villosa</i> Jacq.*	364. <i>Cerinthe alpina</i> Kit.
315. » <i>Wulfeniana</i> Schott.*	365. <i>Scopolia carniolica</i> Jacq.*
316. » <i>Clusiana</i> Tausch.*	366. <i>Linaria alpina</i> Mill.*
317. » <i>glutinosa</i> Wulf.*	367. <i>Scrophularia Hoppei</i> Koch.*
318. » <i>minima</i> L.*	368. <i>Digitalis ambigua</i> Murr.*
319. » <i>farinosa</i> L.*	369. <i>Erinus alpinus</i> L.*
320. » <i>longiflora</i> All.*	370. <i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.
321. » <i>elatior</i> Jacq.*	371. <i>Pæderota Bona Rota</i> L.
322. <i>Androsace Chamaejasme</i> Host.	372. » <i>Ageria</i> L.*
323. » <i>villosa</i> L.*	373. <i>Veronica saxatilis</i> Jacq.*
324. » <i>obtusifolia</i> All.*	374. » <i>fruticulosa</i> L.*
325. » <i>lactea</i> L.*	375. » <i>alpina</i> L.
326. » <i>carnea</i> L.	376. » <i>bellidioides</i> L.*
327. » <i>vitaliana</i> Lap.	377. » <i>aphylla</i> L.*
328. » <i>Hausmanni</i> Leyb.	378. » <i>latifolia</i> L.
329. » <i>Helvetica</i> Gaud.*	379. <i>Euphrasia salisburgensis</i> Funk.*
330. » <i>imbricata</i> Lam.	380. » <i>minima</i> Jacq.*
331. » <i>glacialis</i> Hoppe.*	381. <i>Bartschia alpina</i> L.*
332. <i>Cortusa Matthioli</i> L.	382. <i>Rhinanthus lanceolatus</i> Neilr.*
333. <i>Soldanella alpina</i> L.*	383. <i>Pedicularis rosea</i> Wulf.*
334. » <i>pusilla</i> Baumg.*	384. » <i>acaulis</i> Wulf.
335. » <i>minima</i> Hoppe.*	385. » <i>geminata</i> Port.
336. <i>Cyclamen europæum</i> L.*	386. » <i>asplenifolia</i> Floerke.*
337. <i>Gentiana Clusii</i> Perr. et Song.*	387. » <i>rostrata</i> L.
338. » <i>Kochiana</i> Perr. et » *	388. » <i>cæspitosa</i> Sieb.
339. » <i>Frœlichii</i> Jan.*	389. » <i>incarnata</i> Jacq.*
340. » <i>frigida</i> Hænke.*	390. » <i>verticillata</i> L.*
341. » <i>lutea</i> L.	391. » <i>recutita</i> L.
342. » <i>purpurea</i> L.	392. » <i>Oederi</i> Vahl.
343. » <i>punctata</i> L.*	393. » <i>elongata</i> A. Kern.*
344. » <i>pannonica</i> Scop.*	394. » <i>foliosa</i> L.
345. » <i>asclepiadæa</i> L.*	395. <i>Melanpyrum silvaticum</i> L.
346. » <i>prostrata</i> Hænke.	396. <i>Tozzia alpina</i> L.*
347. » <i>utriculosa</i> L.*	397. <i>Orobanche flava</i> Mart.*
348. » <i>nivalis</i> L.	398. <i>Pinguicula vulgaris</i> L.*
349. » <i>nana</i> Wulf.*	399. » <i>alpina</i> L.*
350. » <i>tenella</i> Rottb.*	400. <i>Globularia cordifolia</i> L.

301. *Calluna vulgaris*, Salisb. — Besenheide.

Bruyère commune. — Common Heath.

Tourbes, landes et pentes arides des Alpes. Juillet—Octobre.

302. *Erica carnea*, L. — Rosenheide.

Bruyère rose. — Alpine Heath.

Pentes boisées et bords des torrents. Mars — Juin.

303. *Loiseleuria procumbens*, Desv. — Alpenheide.

Azalée des Alpes. — Alpine Azalea

Pentes arides et sèches des régions supérieures. Juillet — Août.

304. *Rhododendron Chamaecistus*, L. — Zwerg-Alpenrose.

Rosage faux Ciste. — Rockrose flowered *Rhododendron*.

Pentes ombragées de la région alpine et sous alpine dans les Alpes orientales. Juin — Juillet.

305. *Rhododendron hirsutum*, L. — Wimperhaarige Alpenrose.
Rosage cilié. — Ciliate *Rhododendron*.

Alpes calcaires. Juin — Août.

306. *Rhododendron ferrugineum*, L. — Rostfärbige Alpenrose.

‘ Rosage des Alpes. — Alpine Rhododendron

Alpes, surtout granitiques. Juin — Août.

307. *Pirola uniflora*, L. — Einblüthiges Wintergrün.
Pyrole uniflore. — Oneflowered Wintergreen.

Bois de la région montagneuse. Juin — Juillet.

308. *Armeria alpina*, Willd. — Alpengrassnelke.

Armérie des Alpes. — Alpine Sea Pink.

Pentes gazonnées et ensoleillées des Alpes. Juin — Août.

309. *Primula Auricula*, L. — Aurikel.

Auricule des Alpes. — Alpine Auricule.

Rochers des Alpes calcaires dans la région alpine et sous alpine. Mai — Juillet.

310. *Primula carniolica*, Jacq. — Krainer Aurikel.

Primevère de Carniole. — Carniolian Primrose.

Fentes des rochers dans les Alpes de Carinthie et Carniole. Mai — Juin.

311. *Primula latifolia*, Lap. — Breitblättrige Primel
 Primevère à feuilles larges. — Broadleaved Primrose.

Fentes des rochers ardoisières dans les Alpes occidentales et orientales. Juin — Août.

312. *Primula oenensis*, Thom. — Inn-Primel.

Primevère de l'Inn. — Inn's Primula.

Pentes rocheuses et fraîches des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Juillet.

313. *Primula viscosa*, Vill. — Klebrige Primel.
Primevère visqueuse. — Viscous Primula.

Fentes des rochers granitiques des Alpes. Avril—Juillet.

314. *Primula villosa*, Jacq. — Zottige Primel.

Primevère velue. — Hairy Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Mai—Juin.

315. *Primula Wulfeniana*, Schott. — Wulfen's Primel.

· Primevère de Wulfen. — Wulfen's Primula.

Fentes des rochers calcaires des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Août.

316. *Primula Clusiana*, Tausch. — Clusius' Primel.

Primevère de Clusius. — Clusius' Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales, sur le versant septentrional. Mai — Juillet.

317. *Primula glutinosa*, Wulf. — Blauer Speik.

Primevère glutineuse. — Glutinous Primula.

Alpes granitiques des Alpes orientales dans les rochers de la région alpine. Juin — Août.

318. *Primula minima*, L. — Zwergprimel.

Primevère minime. — Minime Primula.

Pâturages et rochers des Alpes orientales dans la région alpine. Juni — Août.

319. *Primula farinosa*, L. — Mehlprimel.
Primevère farineuse. — Bird's-eye Primrose.

Prairies et pâturages frais des Alpes. Avril — Juin.

320. *Primula longiflora*, All. — Langblumige Primel.
Primevère à longues fleurs. — Longflowered Primrose.

Prairies des Alpes granitiques (disséminé). Juin — Juillet.

321. *Primula elatior*, Jacq. — Hochstengliger Himmelschlüssel.
Primevère inodore. — Oxlip.

Bois et prairies des régions inférieures. Mai—Juillet.

322. *Androsace chamaejasme*, Host. — Zwerg-Mannsschild.

Androsace trompeuse. — Ciliated *Androsace*.

Pâturages des Alpes calcaires dans la région alpine. Mai — Août.

323. *Androsace villosa*, L. -- Zottiger Mannsschild.

Androsace velue. — Hairy *Androsace*.

Pâturages rocheux des Alpes occidentales et orientales calcaires, dans la région alpine et sous alpine.
Juillet — Août.

324. *Androsace obtusifolia*, All. — Stumpfblättriger Mannsschild.

Androsace à feuilles obtuses. — Blunt leaved *Androsace*.

Pâturages et pentes sèches de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.

325. *Androsace lactea*, L. — Milchweisser Mannsschild.
Androsace lactée. — Milkwhite Androsace.

Pâturages rocheux des Alpes calcaires (disséminé). Juin — Août.

326. *Androsace carnea*, L. — Fleischrother Mannsschild.

Androsace carnée — Flesh coloured *Androsace*.

Pâturages des Alpes granitiques centrales et méridionales. Juillet—Août.

327. *Androsace Vitaliana*, Lap. — Goldprimel.

Androsace jaune. — Yellow *Androsace*.

es occidentales, centrales et tyroliennes sur les pentes arides de la région alpine. Juin — Juillet.

328. *Androsace Hausmanni*, Leyb. — Hausmann's Mannsschild.
Androsace de Haussmann. Hausmann's *Androsace*.

Fentes des rochers calcaires et dolomitiques des Alpes orientales (disséminée). Juillet — Aout.

329. *Androsace helvetica*, Gaud. — Schweizer Mannsschild.

Androsace Helvétique. — Swiss *Androsace*.

Fentes des rochers calcaires de la région alpine. Disséminé. Juillet — Août.

330. *Androsace imbricata*, Lam. --- Dachziegelblättriger Mannsschild.

Androsace argentée. — Silverleaved *Androsace*.

Fentes des rochers granitiques et secs de la région alpine (disséminé). Juin — Juillet.

331. *Androsace glacialis*, Hoppe. — Alpen-Mannsschild.

Androsace glaciale. — Glacial *Androsace*.

Morâines et pierriers granitiques des Alpes. Juillet — Août.

332. *Cortusa Matthioli*, L. — Heilglöckchen.

Cortuse de Matthiöle. — Alpine Sanicle.

Lieux frais des Alpes occidentales, méridionales et orientales, dans la région sous alpine.
Mai — Juillet.

333. *Soldanella alpina*, L. — Gemeines Alpenglöckchen.
Soldanelle. — Soldanella.

Pentes gazonnées et humides des Alpes. Mai — Août.

334. *Soldanella pusilla*, Baumg. — Kleines Alpenglöckchen.
Petite Soldanelle. — Little Soldanella.

Pâturages frais des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Août.

35. *Soldanella minima*, Hoppe. — Zwerg-Alpenglöckchen.

Soldanelle minime. — *Minime Soldanella*.

Alpes calcaires orientales dans les zones supérieures. Juin — Juillet.

336. *Cyclamen europaeum*, L. — Erdscheibe.

Cyclame d'Europe. — Alpine Sowbread.

Pentes pierreuses des Alpes calcaires dans la région montagneuse. Juillet—Septembre.

337. *Gentiana Clusii* Perr. Song. — Clusius' Enzian.
Gentiane de Clusius. — Clusius's *Gentianella*.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes. Mai — Août.

338. *Gentiana Kochiana*, Perr. et Song. — Stengelloser Enzian.
Gentiane de Koch. — Gentianelle.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes granitiques. Juin — Juillet.

339. *Gentiana Froelichii*, Jan. — Fröhlich's Enzian.

Gentiane de Froelich. — Froelich's Gentian.

Rochers des zones élevées des Alpes orientales. Août — Septembre.

340. *Gentiana frigida*, Hänke. — Kälteliebender Enzian.
Gentiane des frimas. — Gentian of the cold region.

Alpes granitiques de la Styrie. Juillet — Août.

341. *Gentiana lutea*, L. — Gelber Enzian.

Gentiane jaune. — Yellow Gentian.

Montagnes calcaires. Juillet — Août

342. *Gentiana purpurea*, L. — Purpurrother Enzian.

Gentiane pourpre. — Brown Gentian.

Habitat : montagnes de la région alpine et sous alpine dans les Alpes centrales et tyroliennes. Juillet — Août.

343. *Gentiana punctata*, L. — Punktirter Enzian.
Gentiane ponctuée. — Dotted Gentian.

Pâturages des Alpes dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Août.

344. *Gentiana pannonica*, Scop. - Pannonischer Enzian.
Gentiane de Hongrie. - Hungarian Gentian.

Pâturages des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Juillet - Septembre.

345. *Gentiana asclepiadea*, L. — Schwalbenwurz-Enzian.

Gentiane asclépiade — Willow Gentian.

Pentes boisées et humides de la région montagneuse. Août — Septembre.

346. *Gentiana prostrata*, Hänke. — Niedergestreckter Enzian.
Gentiane couchée. — Prostrate Gentian.

Gazons des Alpes orientales dans la région alpine. Juillet—Août.

347. *Gentiana utriculosa*, L. — Blasiger Enzian.

Gentiane à calice renflé. — Inflated Gentian.

Prairies humides des Alpes. Juin — Août.

348. *Gentiana nivalis*, L. — Schnee-Enzian.

Gentiane des neiges. — Snow Gentian.

Pentes gazonnées de la région alpine. Juillet — Août.

349. *Gentiana nana*, Wulf. — Zwergenzian.

Gentiane naine. — Dwarf-Gentian.

Moraines glaciaires supérieures des Alpes tyroliennes. Juillet—Août.

350. *Gentiana tenella* Rottb. — Zarter Enzian.

Gentiane grêle. — Tender Gentian.

Moraines et pentes des régions supérieures. Juillet—Août.

351. *Gentiana obtusifolia*, Willd. — Stumpfblättriger Enzian.
Gentiane aux feuilles obtuses. — Blunt-leaved Gentian.

Prairies et pâturages des Alpes orientales. Juin — Septembre.

352. *Gentiana ciliata*, L. — Gefranster Enzian.
Gentiane ciliée. — Ciliate Gentian.

Pentes arides de la région sous alpine et montagneuse. Septembre — Novembre.

353. *Gentiana verna*, L. — Frühlings-Enzian.
Gentiane printanière ou Oeil de Chat. — Vernal Gentian.
Prairies des Alpes. Mars — Juillet.

354. *Gentiana Favratii*, Bittener. — Kurzblättriger Enzian.

Gentiane de Favrat. — Favrat's Gentian.

Pentes rocheuses des Alpes calcaires, ici et là, dans la région alpine. Juin — Juillet.

355. *Gentiana imbricata*, Fröl. — Dachziegelblättriger Enzian.

Gentiane à feuilles imbriquées. — Imbricateleaved Gentian.

Pentes fraîches des Alpes orientales dans la zone supérieure. Juillet—Août.

146. *Gentiana bavarica*, L. — Baierischer Enzian.
Gentiane de Bavière. — Bavarian Gentian.

357. *Gentiana pumila*, Jacq. — Kleiner Enzian.

Gentiane pumile. — Pumile Gentian.

Pâturages et prairies de la région alpine dans les Alpes orientales. Juin — Août.

355. *Pleurogyne carinthiaca*, Griseb. — Transscantée.

Pleurogyne. — *Pleurogyne*.

Alpes de Sans de Glaris et de la Carinthie dans les gazons frais de la région alpine et sous alpine.
Juillet — Août

359. *Swertia perennis*, L. — Tarant.

Swertie vivace. — Marsh *Swertia*.

Terrains tourbeux de la région sous alpine et montagneuse. Juillet — Août

360. *Polemonium coeruleum*, L. — Sperrkraut.

Polémoine. — Jacob's Ladder.

Prairies humides des Alpes orientales dans la région montagnarde et sous alpine. Juin—Juillet.

361. *Eritrichium nanum*, Schrad. — Himmelsherold.

Roi des Alpes. — King of the Alps.

Pierriers des hautes altitudes. Juillet—Août.

362. *Pulmonaria styriaca*, A. Kern. — Steierisches Lungenkraut.
Pulmonaire de Styrie. — Styrian Lungwort.

Région boisée des Alpes styriennes. Avril—Juin.

363. *Myosotis alpestris*, Schmidt. — Alpen-Vergissmeinnicht.

Myosotis des Alpes. Alpine Forget-me-not.

Prairies des Alpes. Juin — Septembre.

364. *Cerinthe alpina*, Kit. — Alpen-Wachsblume.
Mélinet des Alpes. Alpine Honeywort.

Pâturages rocheux de la région alpine. Juin—Août.

365. *Scopolia carniolica* Jacq. — Scopolie.
Scopoline. — Scopoline.

Pentes boisées des Alpes orientales. Avril — Mai.

366. *Linaria alpina*, Mill. — Alpenleinkraut.

Linaire des Alpes. — Alpine Toad-Flax.

Sables, moraines et pierriers des Alpes. Juin—Octobre.

367. *Scrophularia Hoppei*, Koch. — Hoppe's Braunwurz.

Scrofulaire de Hoppe. Hoppe's Figwort.

Eboulis rocheux de la région subalpine et montagneuse. Juin — Août.

368. *Digitalis ambigua*, Murr. — Gemeiner Fingerhut.

Digitale à grandes fleurs. — Largeflowered Foxglove.

Pentes rocheuses et boisées de la région sous alpine et montagneuse. Juin — Août

369. *Erinus alpinus*, L. — Leberbalsam.

Erine des Alpes. — Wall Erinus.

Rochers des Alpes calcaires. Juin — Août.

370. *Wulfenia carinthiaca*, Jacq. — Wulfenie.
Wulfénie. — Wulfenia.

Alpes de la Carinthie dans la région alpine. Juin — Août.

371. *Paederota Bonarota*, L. f. Manderle.

Bonerote blue. — Blue *Paederota*.

Lieux rocheux des Alpes du Tyrol méridional et de la Styrie. Juin — Juillet.

372. *Paedarota Ageria*, L. — Gelber Ehrenpreis.

Bonerote jaune. — Yellow *Paederota*.

Lieux rocheux des Alpes méridio-orientales. Juin — Août.

372. *Veronica saxatilis*, Jacq. — Blauer Felschrenpfeil.

Véronique saxatile. — Saxatile speedwell.

Lieux rocheux des Alpes. Juin—Août.

374. *Veronica fruticulosa*, L. — Rother Felsehrenpreis.

Véronique petit arbuste. — Shrublike Speedwell.

Lieux rocheux des Alpes. Juillet—Septembre.

375. *Veronica alpina*, L. — Alpenehrenpreis.

Véronique des Alpes. — Alpine Speedwell.

Région alpine et sous alpine dans les gazons. Juillet — Août.

376. *Veronica bellidioides*, L. — Maassliebchenblättriger Ehrenpreis.
 Véronique à feuilles de Pâquerettes. — Daisylike speedwell.
 Pâturages secs de la région alpine. Juillet—Août.

377. *Veronica aphylla*, L. — Stengelblattloser Ehrenpreis.
 Véronique aphyllé. — Aphyllé Speedwell.

Pentes rocheuses et herbeuses des hautes altitudes. Juillet — Août.

378. *Veronica latifolia*, L. — Breitblättriger Ehrenpreis.
 Véronique à feuilles larges. — Broadleaved Speedwell.

Région montagnaise et boisée. Juin — Juillet.

379. *Euphrasia salisburgensis*, Funk. — Salzburgischer Angentrost
 Euphrase de Salzburg. — Eyebright of Salzburg.
 Prairies et pâturages des Alpes. Août — Septembre.

380. *Euphrasia minima*, Jacq. — Zwerg - Augentrost.
 Euphrase naine. — Dwarf Eyebright.

Pâturages des Alpes. Juillet—Septembre.

381. *Bartsia alpina*, L. — Alpenhelm.

Bartsie des Alpes. — Alpine Bartsia.

Prairies rocheuses et pentes arides de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.

382. *Rhinanthus lanceolatus*, Neilr. — *Alectorolophus-Rhinanthus*.
Cocriste lancéolé. — Lanceolate Rattle.

Prairies des régions inférieures. Juillet — Août.

383. *Pedicularis rosea*, Wulf. — Rosenrothes Läusekraut.

Pédiculaire rose. — Pink Lousewort.

Alpes occidentales et orientales (rare) dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Aout.

384. *Pedicularis acaulis*, Wulf. — Stengelloses Läusekraut.

Pédiculaire acaule. — Sessile flowered Lousewort.

Alpes méridio-orientales, dans les lieux ombragés de la région alpine et sous alpine. Août — Juin.

385. *Pedicularis geminata*, Port. — Blüthenarmes Läusekraut.

Pédiculaire géminée. — Fewflowered Lousewort.

Alpes orientales calcaires dans les pâturages et les escarpements rocheux de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.

386. *Pedicularis asplenifolia*, Floerke. — Streifenfarnblättriges
Läusekraut.
Pédiculaire à feuilles d'Asplenium. — Asplenium leaved Lousewort.
Alpes granitiques orientales dans la région alpine. Juillet — Août.

387. *Pedicularis rostrata*, L. — Geschnäbeltes Läusekraut.

Pédiculaire à bec crochu. — Crooked Lousewort.

Pentes herbeuses des régions supérieures dans les Alpes. Juillet — Août.

388. *Pedicularis caespitosa*, Sieb. — Rasenbildendes Läusekraut.
Pédiculaire cespiteuse. — Caespitous Lousewort.

Pâturages rocheux de la région alpine dans les Alpes orientales. Juillet — Août.

389. *Pedicularis incarnata*, Jacq. — Fleischrothes Läusekraut.

Pédiculaire incarnat. — Fleisch coloured Lousewort.

Pâturages de la région alpine dans les Alpes orientales et centrales. Juin — Août.

390. *Pedicularis verticillata*, L. — Quirblättriges Läusekraut.
Pédiculaire en verticille. — Verticillated Lousewort.

Prairies fraîches des Alpes. Juin — Août.

391. *Pedicularis recutita*, L. — Ungeschnäbeltes Läusekraut.
Pédiculaire édentée. — Dissected Lousewort.

Prairies humides des Alpes. — Juillet—Août.

392. *Pedicularis Oederi*, Vahl. — Öder's Läusekraut.

Pédiculaire d'Oeder. — Oeder's Lousewort.

aux humides et rocheux des Alpes septentrionales, piémontaises et autrichiennes. Juillet — Août.

393. *Pedicularis elongata*, A. Kern. — Langtraubiges Läusekraut.
 Pédiculaire à grappe allongée. — Longeared Lousewort.
 Dolomites et pentes méridionales des Alpes orientales. Juillet — Août.

394. *Pedicularis foliosa*, L. — Blattrisches Läusekraut.

Pédiculaire feuillée. — Strongleaved Lousewort.

Escarpelements herbeux et frais de la région sous-alpine et montagneuse. Juin — Août.

395. *Melampyrum silvaticum*, L. — Wald-Wachtelweizen.
Mélampyre des forêts. — Wood's Cow Wheat.

Liens boisés et frais des Alpes. Juin — Août

396. *Tozzia alpina*, L. — Alpenrachen.

Tozzie des Alpes. — Alpine Tozzia.

Lièux frais et couverts de la région montagneuse et boisée. Juni — Août.

397. *Orobanche flava*, Mart. — Gelbe Sommerwurz.
Orobanche fauve. — Yellow Broom Rape.

Dans la région montagneuse sur les *Tussilages* et *Adenostyles*. Juin — Juillet.

398. *Pinguicula vulgaris*, L. — Gemeines Fettkraut.
Grassète vulgaire. — Common Butterwort.
Rochers moussus et lieux humides des Alpes. Avril — Juin.

399. *Pinguicula alpina*, L. — Alpen-Fettkraut

Grassète des Alpes. — Alpine Butterwort.

Lieux humides de la région alpine et sous-alpine. Juin — Août.

400. *Globularia cordifolia*, L. — Herzblättrige Kugelblume.
 Globulaire à feuilles en coeur. — Heartleaved Globularia.

Pentes sèches et rocheuses des Alpes. Mai—Août.

New York Botanical Garden Library
QK 315 .C58 v.1 4
Correvon, Henry/Atlas de la flora alpine

3 5185 00108 2484