QK
295
.F52

VERZEICHNISS
DER
GEFÄSSPFLANZEN
NEU-VORPOMMERNS UND RÜGENS.

VERFASST

VON

JOHANN KARL FISCHER.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL

STRALSUND 1861.

DRUCK DER KÖNIGLICHEN REGIERUNGS-BUCHDRUCKEREI.

1911-1912

ANNUAL REPORT

OF THE

COMMISSIONER OF THE

LAND OFFICE

OF THE

STATE OF

ALABAMA

FOR THE

YEAR

1911-1912

Dem
Director des Gymnasiums
PROFESSOR D. ERNST NIZZE

Ritter des RAO. 3. m. d. Schl.

ZUR
Feier seines fünfzigjährigen Jubiläums

am 1. Juli 1861

in Liebe und Verehrung

seine hiesigen Collegen

A. BRÖSE. K. FISCHER. L. FREESE. J. v. GRUBER. K. KROMAYER. FR. v. LÜHMANN.
B. NIZZE. A. RIETZ. W. ROLLMANN. H. SCHULZE. W. TETSCHKE. H. WÄRDEL.
CHR. ZIEMSEN. E. ZÖBER.

Vorwort.

Von den hiesigen Collegen des Herrn Jubilars ist mir der ehrende Auftrag geworden, dieses Verzeichniss dem Druck zu übergeben. Da der verehrte und hochverdiente Mann, welchem dies Schriftchen als Festgabe dargebracht wird, in früherer Zeit selbst mit thätigem Eifer der Pflanzenkunde obgelegen und auch später, im Drange anderweitiger Beschäftigungen, ihr seine Theilnahme nicht entzogen hat, so glaube ich hoffen zu dürfen, er werde auch diese Blätter einmal in einer Stunde der Musse eines wohlwollenden Blickes würdigen.

Über die Arbeit selbst ist Folgendes zu bemerken.

Das betreffende Florengebiet hat gegen Alt-Vorpommern und Meklenburg keine eigentliche Vegetationsgrenze: möge es daher Entschuldigung finden, wenn hin und wieder ein Fundort aufgenommen ist, der, streng genommen, etwas über die politische Abgrenzung hinaus liegt.

Der Hauptzweck ist die möglichst vollständige Aufzählung der im Gebiet heimischen gefässführenden Pflanzen. Die oft und leicht verwildernden Culturpflanzen sind nebenbei genannt; dies hätte ausserdem wenigstens noch mit den folgenden geschehen sollen: *Anethum graveolens*, *Borrago officinalis*, *Coriandrum sativum*, *Melissa officinalis*. — Die im Ganzen alphabetische Ordnung schien für den Gebrauch die bequemste zu sein.

Seit Weigel (*Fl. pomeranico-rugica*. 1769.) ist kein Werk erschienen, welches die Flora unserer Gegend speciell behandelt. Baumgardt (Programm des Pädag. zu Putbus. 1845.) berücksichtigt nur Rügen; Schmidt (Fl. von Pommern u. Rügen. 2. Aufl. 1848.) und Garcke (Fl. von Nord- u. Mittel-Deutschland. 4. Aufl. 1858.) konnten nur für Seltneres die Fundorte angeben. Mehrere, längst bekannte Pflanzen sind hier wohl zum ersten Mal als heimische nachgewiesen worden.

Die Fundorte um Stralsund, bis auf etwa zwei Meilen Entfernung, beruhen fast ohne Ausnahme auf des Vf.s Bestimmungen; ebenso die der Demminer Gegend. — Wo kein Ortsname vorangeht, bezieht die Angabe sich auf die Stralsunder Feldmark. — Für die Tribseer Gegend sind schätzbare Bereicherungen gewonnen aus einer von Herrn Pastor Billich hieselbst zur Durchsicht verstatteten sehr fleissigen Pflanzensammlung seines früh verstorbenen Sohnes Gotthard. Mit gleich dankenswerther Bereitwilligkeit hat Herr Apotheker Heinrich, früher in Lassan, nicht Weniges aus seinen Sammlungen aus der Lassaner Gegend mitgetheilt und ausserdem in Betreff der letzteren vielfache mündliche und schriftliche Anskunft gegeben. Anderweitige Mittheilungen, welche von dem Vf. benutzt worden, betreffen zu sehr Einzelnes, als dass sie hier aufgezählt werden könnten. — Alle Fundorte, von welchen dem Vf. sichere Exemplare vorgelegen, sind in gewöhnlicher Schrift gedruckt, und, wenn das Vorkommen auf einem einzigen Orte beruht, ist diesem der Name des Finders beigesetzt worden, wenn dieser ein Anderer ist, als der Vf. selbst; diejenigen hingegen, welche entweder aus gedruckten Werken oder ohne Bestätigung durch Exemplare aus mündlichen oder schriftlichen Mittheilungen entnommen wurden, sind in *Cursiv* gedruckt, und zwar mit Absicht ohne Angabe der Autorität.

Die Nomenclatur schliesst sich im Ganzen an Koch (Synopsis der deutschen etc. Flora. 2. Aufl. 1846.) an; wo davon abgewichen ist, geben die Verweisungen und die Beifügung der dort vorangestellten Benennungen die erforderliche Auskunft. Die Linneischen Namen sind möglichst vollständig gegeben, mehrere derselben wieder vorangestellt worden.

Bei den Gattungsnamen ist vor dem Namen des wahren Autors einer der Begründer der bot. Wissenschaft, meist aus dem 16. Jahrhundert, genannt worden; ist der Name des Letzteren in Klammern einge-

schlossen, so hat derselbe eine *verwandte* Gattung od. Art so benannt; ist aber dieser ältere Autor hinter dem neueren in Klammern angeführt, so gilt die von ihm eingeführte Benennung einer jetzt ganz anders benannten Gattung.

In ähnlicher Weise ist den specifischen Namen durch Beigabe der alten Synonymen ein gewissermassen historischer Charakter gegeben worden: in der Regel ist dies nur mit solchen geschehen, aus welchen sich die Herleitung und das Alter des jetzt gebräuchlichen Namens ergibt; selten mit solchen, die in anderer Weise ein gewisses Interesse beanspruchen können. Ist der Name des älteren Autors eingeklammert, so hat dieser unter der voranstehenden Benennung eine andere, verwandte Pflanzenart verstanden.

Bei Anwendung folgerichtiger Grundsätze in Bezug auf die Benennung, deren Ausführung hier nicht gegeben werden kann, hat der Vf. sich mehrmals genöthigt gesehen, seinen Namen beizusetzen, wo er vergebens eine bewährte Autorität gesucht hatte. Die Gründe der Namensänderung werden dem Kundigen theils von selbst in die Augen springen, theils liegen sie in den Synonymen angedeutet, oder sie sind durch die hinzugefügten Bemerkungen erörtert. — In Benennung der Varietäten ist nach Gleichmässigkeit und nach bezeichnenden Namen gestrebt worden; beseitigt sind hier solche Namen, die im Widerspruch zu den Artnamen stehen.

Da dem Plane gemäss Diagnosen im Allgemeinen auszuschliessen waren, sind hie und da Bemerkungen beigelegt, die zur Ergänzung und mitunter zur Berichtigung des von Andern Gegebenen dienen mögen. Unter den aufgestellten Varietäten wird sich die eine oder die andere durch Erweiterung der üblichen Diagnose beseitigen lassen. Ausserdem aber bezwecken die Bemerkungen in Fällen, wo nur einzelne oder getrocknete Exemplare zur Untersuchung benutzbar waren, Andern ein Urtheil über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der hier gegebenen Bestimmung möglich zu machen.

Die Orthographie und das grammatische Genus der *vorangestellten* Namen sind ohne Weiteres berichtigt, die Synonymen dagegen nach Möglichkeit buchstäblich genau angeführt worden. Sollten bei letzteren sich dennoch Abweichungen vom Original finden, so liegt die Ursache davon darin, dass dieselben sehr oft nach fremden Citaten wiederzugeben waren.

Die wenigen Abkürzungen werden ohne Erklärung verständlich sein; ausserdem ist **R.**: od. **R.** s. v. a. Rügen, Str. ist Stralsund, F. der Name des Vfs.

Mit aufrichtigem Dank würde ich es anerkennen, wenn in Folge dieser Veröffentlichung mir von Freunden der Botanik Beiträge zur Berichtigung, Vervollständigung od. Bestätigung des hier Gegebenen zuzingen.

Stralsund, im Jun. 1861.

Fischer,

vorn. Lehrer am Gymn.

Berichtigungen.

- Spec. 14. *Richtig*: Wilcke (u. so immer).
 Spec. 49. u. 50. *Richtig*: **silvestris**.
 Spec. 65. Der 2te u. 3te Gedankenstrich zu tilgen.
 Spec. 356. *Richtig*: Sium Fale.
 Spec. 361, β. *Richtig*: Vorstadt (Heinrich).
 Spec. 362, δ. *Richtig*: einfach-zusammenge-faltet.
 Gen. 201. *Richtig*: **Honckenya**.

Ebenso Honkeney, Honkenya u. Seite 23. unten.

Gen. 321. *Richtig*: **Pinguicula**.

Spec. 724, β. *Richtig*: incanum, Koch.

Spec. 757. *Richtig*: **P. recta**, Linn. (Var. β. obscura, Koch).

Ebenda die Bem. über die Blätter zu streichen.
 Spec. 881. *Richtig*: Zansbur.

1. *Acer*, Dalechamp. Tournef.

1. *A. campestre*, Linn. Casp. Bauhin. — **R:** Bergen. Kl. Vilm.

2. *A. platanoides*, Linn. Munting. — **R:** Granitz, Stubnitz.

3. *A. Pseudo-Platanus*, Linn. — *A. majus*, multis falso Platanus, Joh. Bauhin. — Wahrscheinlich eingeführt, aber eingebürgert: junge, aus Samen aufgewachsene Pflanzen fand ich mehrmals um Stralsund. — **R:** Vilm.

2. *Achillea*, Dodonaeus. Vaill.

4. *A. Millefolium*, Linn. — Millef., Fuchs.]

5. *A. Ptarmica*, Linn. — *Draco silvestris* s. *Ptarmica*, Dodon. — Voigdhäger Moor, Negast, Cumerow u. a. O.

3. *Acorus*, Tragus. Linn.

6. *A. Calamus*, Linn. — *Cal. aromaticus*, Amatus. — Am Knieper-Mühlengraben u. a. O.

4. *Actaea*, J. Bauh. Linn.

7. *A. nigra*, Fl. Wett. — *A. spicata a. nigra*, Linn. — Wolfast. Anclam. **R:** Stubnitz.

5. *Adoxa*, Linn.

8. *A. Moschatellina*, Linn. — Mosch., J. Bauh. — H. Graben, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

6. *Aegopodium*, Tabernaem. Linn.

9. *A. Podagraria*, Linn. — *Pod. germanica* aut *belgica*, Lobel. Herba Gerhardi, Dodon.

7. *Aethusa*, Arctedi. Linn.

10. *A. Cynapium*, Linn. — *Cyn. Rivini* et *Tabernaemontani*, Rupp.

β. pygmaea, Koch. — Äcker unsern Knöchelsöhren u. a. O.

8. *Agrimonia*, Brunfels. Tournef.

11. *A. Eupatoria*, Linn. — *Eupatorium*, Fuchs. — Barther Landstr. u. a. v. a. O.

9. *Agrostemma*, Linn.

12. *A. Githago*, Linn. — *Githago*, Rosae marianae sextum genus, Tragus.

10. *Agrostis*, (Dodon.) Linn.

13. *A. canina*, Linn. — *Gramen caninum supinum paniculatum folio varians*, C. Bauh. — *Devier* Anlagen (am Sumpf); Sandhagen, Negast u. a. O.

14. *A. capillaris*, Linn. („*Exasperati flores*“, L.) mit Ausschl. der *Praelect.* ed. Giseke, wo es heisst: „*A. capillaris exotica*!“ — *A. vulgaris*, Withering nach Richter: ohne Zweifel richtig; auch L.s Zeitgenossen (Haller, hist.; Wilke, flora gryph.; Weigel) haben den vorangestellten Namen von der heimischen Art verstanden, und Linn. sagt in der Fl. succ. (I): „*in pratis elevatis*“. — Kugelfang u. a. v. a. O. — Die niedere Form mit brandigen Blüten (*A. pumila*, Linn.) bei Sandhagen am Krummenbg. See.

β. stolonifera, Meyer (Chlor. han. unter *A. vulgaris*). — *A. stolonifera a.* Linn. — Diese fand ich noch nicht.

γ. vivipara, F. — *A. silvatica*, Pollich. — Abtshagen: im diesseitigen Walde am Wege zu den Steinhäger Bauernhöfen.

15. *A. coarctata*, Ehrh. — *A. alba*, Schrad. Villa coarct., Beauv. — L.s Namen bezeichnen nur *Farr.* — Ändert ab in der Färbung der Rispe, die bald grün, bald gefärbt, seltner gelblich-bleich erscheint, und im Wuchs:

α. erecta, F. — Halme aufrecht oder am Grunde niederliegend, gekniet, nicht wurzelnd, von dem Knie an aufsteigend oder aufrecht. — Hängig. Steif-aufrecht, mit breiteren Blättern und satt-braun gefärbter Rispe, ziemlich gross, findet sie sich auf rohem Lehmboden des vormal. Kl. Paschenberges. — Oft werden die äusseren Halme ausläuferartig, wodurch eine Übergangsform zur *β.* entsteht.

β. stolonifera, F. — Halme ausläuferartig, niedergestreckt, verlängert, oft sehr lang, unterwärts meist ästig, wurzelnd, die fruchtbaren an der Spitze aufstrebend. — Die gemeinste Form; an Gräben und feuchten Orten, oft grosse Flächen dicht überziehend. — Eine grössere Waldform mit gefärbter oder grüner Rispe ist *A. alba*, Linn.

γ. gigantea, Meyer (Chlor. han. unter *A. alba*). — Franken-Vorstadt u. Chaussee; Negast. — Rispe $\frac{1}{2}$ — 1' lang. Sonst wie *α.*, selten wie *β.*

δ. arenaria, F. — *A. stolonifera γ.* Linn. Spec. *A. stol. β.* arenaria, Linn. Fl. suec. II. *A. stolonifera δ. maritima*, Koch. — Blätter steif, bläulich-grün. Rispe gedrunken. Sonst wie *β.* — Frankenstrand.

ε. congesta, F. — *A. stolonifera γ. prorepens*, Koch. — Rispe sehr dicht-gedrunken, kurz-ästig, gelappt, nach dem Verblühen unverändert. — Deviner Ort (am Strande) u. a. O.

11. *Aira*, Linn.

16. *Ai. cespitosa*, Linn.

β. pallida, Koch. — Negast, im Walde, selten an der Chaussee; Abshagen, Niederhof, Martensdorf. Lissan: Jamitzow, Waschow. — Ist vielleicht eigene Art, da sie auch an sonnigen Orten merklich später blüht, als die Hauptform (an waldigen Orten gewöhnlich im Septbr.). Wuchs und Rispe kleiner u. grösser; letztere bis 18" lang, bisw. flatterig.

γ. heterophylla, F. — Wurzelblätter zusammenge-
rollt, die äusseren zuletzt flach. — Auf kiesigem Boden: Wiese am Knieperstrande, jenseit des Lootsensteins.

17. *Ai. flexuosa*, Linn. — Devin, Zarrendorf, Sandhagen, Negast, Martensdorf.

β. montana, F. — *Ai. montana*, Linn. — Rispe kleiner, mehr zusammengezogen; Ähren dunkelgefärbt. — Kaum als Var. anzusehn.

52. 12. *Ajuga*, Ear. Cordus, Linn.

18. *A. genevensis*, Linn. — Deviner Anlagen und Ort (am Ufer des Sees), Chaussee nach Pütze u. a. O. Lissan: Lentschow.

19. *A. pyramidalis*, Linn. — **R:** Berger Holz.

20. *A. reptans*, Linn. — Herrenwiese; bei den Vogelsang; Abshagen u. a. O.

25. 13. *Alchemilla*, Column. Linn.

Sonst *Alchemilla* von *Tragus* bis *Vaill.*

21. *A. arvensis*, Scop. — *A. minor montana*, Column. *Aphanes arvensis*, Linn. — Gr. Kädingshagen, Grünhufe, Negast, Devin u. a. O., aber — wie es scheint — nicht auf dem Stadtfelde.

22. *A. vulgaris*, Linn. — *Alchim. vulg.*, C. Bauh. — An allen Chausseen am Str., am H. Graben u. a. O. **R:** Stubnitz.

49. 14. *Alectorolophus*, Anguillara (-os). Haller.

23. *A. major*, Reichenh. — *Rhinanthus major*, Ehrh. Rh. Crista galli, Linn. Spec. I. (mit Anschluss der Varr.) und Var. *α.* Spec. II. nach dem Cit. aus C. Bauh. Crista galli, Dodon.

24. *A. minor*, Wimm. u. Grab. — Rhin. minor, Ehrh.

Rh. Crista galli *β.* Linn. Spec. I. II. nach dem Cit. aus C. Bauh. — Voigtländer Moor, Teschenhagen, Chaussee von Grünhufe bis Martensdorf; Negast, Abshagen: überall nicht häufig. Lissan: Vorwerk. **R:** Putbus.

β. pallidus, W. u. Grab. — Mit der Hauptform, z. B. an der Chaussee jenseits Grünhufe.

61. 15. *Alisma*, Lobel. Dillen.

25. *A. natans*, Linn. — Greifswald: Hanshäger Holz.

26. *A. Plantago*, Linn. Syst. X. — XIII. — *A. Pl. aquatica*, Linn. Spec. Pl. aqu., Brunfels. — Bildet mit Übergangsformen die flgg. Varr.

β. lanceolatum, Wither. (als Art). — Sehr häufig.

γ. maritimum, Wallenbg. — Knieper-Mühlengraben, häufig; Lehmgrube zur Linken des Wegs von Andershof nach Devin, klein. Lissan: in der Peene.

27. *A. Ranunculoides*, Linn. — Am Krummenhäger See. Greifswald: Helmshäger Holz. **R:** Putbus, beim Badehause.

9. 16. *Alliaria*, Fuchs. Adans.

28. *A. officinalis*, Andrzej. — *Erysimum* All., Linn. *Sisymbrium* All., Scop. — An der Stadtmauer um das Tribs. Thor; Tribs. Vorstadt. Greifswald. Lissan: beim Waschower Fischerhause.

67. 17. *Allium*, Brunfels. Haller.

29. *A. montanum*, Schmidt. — *A. montanum foliis uaricis minus*, C. Bauh. *A. fallax α. β.* Schult. — Der Wurzelstock in den ersten Jahren wagerecht, einfach, mit end- u. seitenständigen Zwiebeln, darauf aus den Knospen in langsam sich verlängende, aufsteigende, dichotome Äste auswachsend, nur an den Spitzen derselben (etwa $\frac{1}{4}$ " lang) fortlebend und daselbst mit Wurzelfasern besetzt; die Zwiebeln alsdann nur endständig, zu 2, zuerst von einer gemeinschaftlichen äusseren Haut eingeschlossen, später sich trennend und wiederum theilend; daher nur zufällig, wenn die eine der Zwiebeln zum Blüthentragen noch zu schwach ist, ein „unfruchtbares Blüthbüschel zur Seite des Schaftes.“ Letzterer am Grunde umblättert: Blätter 4—6, fast 2zeilig gestellt. Dolde in feuchteren Jahren reieblüthiger, kugelig, in trockneren oft gleichhoch. — Demmin: bei den Kiefern.

30. *A. oleraceum*, Linn. — II. Graben; Ufer am Knieperstrande und nach Devin zu; Chaussee nach Andershof; Seener bei Lüssow. Demmin. Lissan: am Bauerberg und bei Waschow. **R:** Altenfähr, am südl. Ufer.

31. *A. scorodoprasum (α.)*, Linn. (*Scorodopr.*, *Tragus*). — II. Graben; Andershöfer u. Deviner Strand, Niederhof, Seener bei Lüssow. Barth. Wolgast. — Kommt auch (bei Lüssow) mit sprossender Dolde vor.

32. *A. ursinum*, Linn. Fuchs. — Greifswalder Oie. **R:** Vilm.

33. *A. vineale*, Linn. — *Porrum vin.*, Eur. Cordus. —

Sehr reichzweiblige Dolden spalten sich öfters in 2 oder 3 Theile, deren jeder sich kugelig rundet, so dass der Schaft an der Spitze scheinbar 2 oder 3 geknäuelte Köpfchen trägt: Porrum silvestre gemino capite, C. Bauh. — Bisw. sind die Blüthenstielechen über der Mitte mit einem Deckblättchen besetzt, in dessen Achsel ein Zweichelchen sitzt. — Knicperstrand, Deviner Ort, Seeufer bei Lüßow. Demmin.

18. *Alnus*, Dodon. Tournef.

34. *A. glutinosa*, Gärtn. — *A. rotundifolia* glut. viridis, C. Bauh. Betula Alnus, Linn. *B. glutinosa*, Linn. Syst. X.

19. *Alopecurus*, (Dodon.) Linn.

35. *A. agrestis*, Linn. — Auf unbebautem Boden 2 $\frac{1}{2}$. Mitte Mai bis Sept. — Halme aufrecht, oder aufsteigend, oft am Grunde niederliegend u. wurzelnd, selten gestreckt. — Am Wege nach Gr. Kädingshagen; Äcker westlich vom H. Graben. Greifswald. R: Altenfähr. — Auf hartem, nacktem Lehm Boden roth überlaufend.

β . stolonifer, F. — Mit sehr zahlreichen Ausläufern eine Fläche von 3–4' im Durchmesser bedeckend. — Eine grosse Pflanze mit sehr vielen fruchtbaren Halmen; früher in der Ballastkiste, jetzt mit der Ballasterde weggeführt.

36. *A. fulvus*, Smith. — Wiesen um den Vogel-sang; an Weihern bei Gr. Kädingshagen n. Langendorf und (auf R.) bei Ginstow. — Unhereift, grasgrün an schattigen Orten im Ahtshäger Walde.

37. *A. geniculatus*, Linn. — Gramen aquaticum geniculatum spicatum, C. Bauh. — Kommt an trockeneren Orten auch mit aufsteigenden und aufrechten, so wie mit völlig niedergestreckten (nicht wurzelnden) Halmen vor; ausserdem mit ästig-gelappter Rispe.

β . nigricans, F. — Rispe kürzer, im Umriss lineal-lanzettförmig, an beiden Enden ziemlich spitz, violett-schwarzlich. Gramen etwas kürzer, steifer, nach dem Trocknen meist mehr abstehend. — Wenigstens diese Form ist sicher 2 $\frac{1}{2}$: sie treibt nicht allein Ausläufer, welche neue Stöcke ansetzen, sondern auch aus den alten Wurzel neue Halme, mag indessen von nicht langer Dauer sein. — Auf feuchtem Lehm Boden des vormalig. Kl. Paschenberges.

38. *A. pratensis*, Linn. — Gramen alopecuro simile, — J. Bauh. — Auf dem Stadtfelde sehr selten: am H. Graben; häufig bei Niederhof.

20. *Alsine*, (Fuchs). Wahlenbg.

39. *A. viscosa*, Schreb. — *A. tenuifolia*, Wahlenbg. β . viscosa, Koch. — Kugelfang (in trockenen Jahren ausbleibend); Grünhufe, Langendorf, Zitterpenningshagen. Greifswald.

21. *Alyssum*, Dalech. Linn.

40. *A. calycinum*, Linn. — Der Kelch fällt kurz vor der Fruchtreife ab. — Lüßow: an der Chaussee;

Langendorf; Martensdorf: am Wege nach Gr. Zausen-bur. Lassar: häufig.

22. *Amarantus*, Lobel. Linn.

41. *A. Blitum*, Linn. — Blitum, Fuchs. — Demmin: an der westl. Stadtmauer, Anclam.

42. *A. retroflexus*, Linn. — Einmal in der Ballastkiste von mir gefunden.

23. *Annemphila*, Host. — Vid. Psamma.

24. *Anagallis*, Brunfels. Tournef.

43. *A. arvensis*, Linn. — Kugelfang, Strand, Äcker. — An feuchteren Orten nicht selten mit monströsen Blüten.

25. *Anchusa*, Dodon. Linn.

44. *A. officinalis*, Linn. — Kugelfang, Tribs. Feld u. a. v. a. O.

26. *Andromeda*, Linn.

45. *A. calyculata*, Linn. — Greifswald: bei Behrenhof einmal gefunden.

46. *A. Polifolia*, Linn. — Polif. und Polifolia, Buxb. Vitis idaeae affinis polifolia montana, J. Bauh. — Pflüte, Negast, Voigdelagen, Teschenhagen, Brandshagen n. a. O. Lassar: Silberkuhl.

27. *Anemone*, Dalech. Tournef.

Vgl. Hepatica und Pulsatilla.

47. *A. nemorosa*, Linn. — *A. nem. flore majore*, C. Bauh. — H. Graben, Barther Landstrasse, Parower Park, Negast u. a. v. a. O.

48. *A. ranunculoides*, Linn. — Ranunculus nemorosus luteus, C. Bauh. — Parower Park; Abtshagen, im diesscitigen Walde. Greifswald: Hohenmühl. Anclam. Lassar: Bauerberg.

49. *A. sylvestris*, Linn. — *A. silv. prima*, Chusius. — Anclam.

28. *Angelica*, Dodon. Rivin.

50. *A. sylvestris*, Linn. Dodon. — Vogelsang, Andershäuser Strand n. a. v. a. O.

51. *A. montana*, Schleich. — Lüßow: am See; Brandshagen n. a. O.

β . pubescens, F. — Stengel unterwärts nebst den Blättchen unterseits kurzhaarig-flaumig. — Negast: zwischen den jungen Kiefern auf der vormal. Heide, auf trockenem Boden.

29. *Anthemis*, Val. Cordus. Micheli.

52. Vgl. Maruta und Ormenis.

53. *A. arvensis*, Linn.

54. *A. tinctoria*, Linn. — Am vormal. Kl. Paschenherge (östl. Rand). Barth: an der Chaussee u. der alten Burg. Greifswald. Lassar. R: Altenfähr, in Menge; Jasmund.

30. *Anthericum*, Linn.

55. *A. Liliago*, Linn. — Liliago Cordi, Thal. — Tribsees: Fleminner Laubholz (Bülich).

55. **A. ramosum**, Linn. — Phalangium ram., Dodou. — Demmin: Devenische Holz; Kiefern- und Buchen- bei der Gypsmühle.

30. **Anthoxanthum**, Linn.

56. **A. odoratum**, Linn. — Gramen anthoxanthon, Hist. Lugd. Gramen — odoratum —, Loesel.

31. **Anthriscus**, Dalech. Hoffm.

57. **A. silvestris**, Hoffm. — Chaerophyllum silvestre, Linn. Myrrhis silvestris, C. Bauh.

58. **A. vulgaris**, Pers. — Scandix Anthr., Linn. — Vorstädte, Devlin u. a. O.

A. Cerefolium, Hoffm. — Fast wie eingebürgert.

32. **Anthyllis**, Dalech. Rivin.

59. **A. vulneraria**, Linn. — Vulu. rustica, Cour. Gesner. — Grimmen, Barth. Demmin: um Vorwerk. Anclam. R: am Rande der Granitz; Jasmund.

33. **Antirrhinum**, Eur. Cordus. Rivin.

60. **A. Orontium**, Linn. — A. parvum s. Orontium, Dalech. — R: Garz (?).

34. **Apera**, Adams.

61. **A. Spica venti**, Beauv. — Agrostis Sp. v., Linn. — Eine Form mit ungleich-langen Grannen, deren meiste nur etwas länger als ihre Spelze, fand ich bei Negast im Waldrande gegen Seemühl. — Ob dies Agrostis sepium, Linn. (Syst. X.)?

20. 35. **Apium**, Brunfels. Tournef.

62. **A. graveolens**, Linn. — A. vulgare ingratius, J. Bauh. — Am Deviner See.

Aquilegia vulgaris, Linn. — Kommt hier wohl nur verwildert vor.

36. **Arabis**, (Lacina.) Linn.

63. **A. arenosa**, Scop. — Sisymbrium arenosum, Linn. Eruca — in arenosis proveniens, C. Bauh. — R: am Straude der Granitz u. Stubnitz; Mönchgut.

64. **A. hirsuta**, Scop. — Turritis hirs., Linn. Erysimo similis hirsuta —, C. Bauh. — R: Putbus; Jasmund, am Ufer zwischen Sassnitz u. Cricitz.

30. 37. **Archangelica**, Dodou. Hoffm.

65. **A. littoralis**, Wahlenb. — A. officinalis, Hoffm. zum Theil. — Angelica Arch., Linn. Spec. u. Fl. suec. mit Ausschl. der Var. β . — Ang. sativa, Miller (Fuchs?). — Niederhof, häufig; Pröhn, Lüchow, Negast. Barth. Lassau. Demmin, häufig.

β . foliolosa, F. — Wuchs niedriger. Blättchen der obersten (3zähligen) Blätter vollkommen ausgebildet, noch zur Fruchtzeit frisch und grün. Gewöhnlich sind dieselben verkümmert u. ihre Blattscheiden schon während des Blühens fast vertrocknet. — Demmin.

γ . leptocarpa, F. — Frucht kaum $\frac{2}{3}$ so lang u. breit als gewöhnlich; das Fruchthaus am Rücken gleich- dick: die Nerven der Rückenriefen oberflächlich, nicht

— wie gewöhnlich — in die korkige Masse des Fruchthaus eingesenkt; die Riefen daher fadenförmig, nicht wulstig. — Lüchow: mit der Hauptform in der Nähe des Sees am Abzugsgraben.

38. **Arctostaphylos**, Chusius. Adams.

66. **A. Uva ursi**, Spreng. — A. officinalis, W. u. Grab. Arbutus U. ursi, Linn. Uva ursi, Lobel. — Greifswald: Gruben- hauer Holz. R: Schmale Heide; Jasmund; Tribratz; Ahbeck.

39. **Arenaria**, Rupp.

67. **A. serpyllifolia**, Linn. — A. multicaulis serp., Rupp. β . glutinosa, Koch. — An trockenen Orten.

γ . tenuior, Koch. — R: auf dem Wapen am Wege nach Drigge.

40. **Aristolochia**, Brunfels. Tournef.

68. **A. Clematitis**, Linn. Ruellius. — Demmin: Ver- chen, in zieml. Menge, freilich ausserhalb des Gebiets; in letzterem hin u. wieder in Gärten wie wild.

41. **Armeria**, Willd. — Vid. Statice.

42. **Arnica**, Rupp.

69. **A. montana**, Linn. — Parmica mont., Hist. Lugd. — Negast, jetzt selten; Demmin: sonst in Menge auf der vormal. Martensdorfer Heide. Barth: Arbhagen, Saatel. Greifswald: Harschagen, Grimmen, Anclam.

43. **Arnosceris**, Gärtner.

70. **A. minima**, Link. — A. pusilla, Gärtner. Hyoseris min., Linn. Hieracium minimum, Chusius. — Devlin, Sandha- gen, Langendorf u. a. O. Greifswald: Kl. Zastrow, Las- sau: Papenberg.

44. **Arrhenatherum**, Pal. Beauv.

71. **A. elatius**, Mert. u. Koch. — Arena elatior, Linn. Gramen avenaceum elatius —, Rajus. — Am Strande nach Parow u. nach Devlin: Niederhof u. a. O.

45. **Artemisia**, Fuchs. Linn.

72. **A. Absinthium**, Linn. — Absinthium, Brunfels. — Nicht häufig: Vorstädte, Gr. Kädingshagen, Devlin, Chaussee nach Teschenhagen u. a. O.

73. **A. campestris**, Linn. — Abrotanum campestre, Tabern. — Kugelfang, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

74. **A. maritima**, Linn. — Am Strande des Deviner Oris (wenigstens in früherer Zeit). Greifswald. R: Fresenwerder, Schabe, Wiltow.

75. **A. vulgaris**, Linn. Caesalpin.

46. **Arum**, Fuchs. Tournef.

76. **A. maculatum**, Linn. Tabern. — Baumgarten. Anclam. Lassau: Buggenhagen, im Park! R: Putbus, im Park!

47. **Asparagus**, Brunfels. Tournef.

77. **A. altissimus**, F. Fuchs. — A. officinalis γ . altiss., Linn. Spec. — Barth. Hiddensee. R: Mönchgut. Um Sir. hier u. da einzeln, aus verschleppten Samen.

47. *Asperugo*, Dodon. Tournef.

78. *A. procumbens*, Linn. — Buglossum — caulis procumbentibus, C. Bauh. — Vorstädte, Parow u. a. O.

48. *Asperula*, Dalech. Linn.

79. *A. arvensis*, Linn. — *A. caerulea* arv., C. Bauh. — R: Jasmund.

80. *A. odorata*, Linn. Dodon. — Abtshagen u. a. O. R: Jasmund.

A. galinoides, M. Bieb. müchte auf Jasmund sich finden.

49. *Asplenium*, Lobel. Linn.

81. *A. Filix femina*, Bernh. — Polypodium Fil. fem., Linn. Filix petraea femina —, Tabern. — Negast, Abtshagen u. a. v. a. O. — Von den zahlreichen Abänderungen hier nur 2 Gg. zwei:

β. dilatatum, F. — Laub fast elliptisch, zugespitzt, wenigstens $\frac{1}{2}$ so breit als lang, von dünnerer Substanz u. kürzer gestielt als gewöhnlich, nur spärlich fruchttragend. Spindel der Fiedern schmal-gefältelt, unterwärts ungleich. Fiederchen mit beiderseits verschmälertem Grunde sitzend, fiederspaltig; Zipfel eiförmig, die meisten an der Spitze 2—3zählig, der unterste der Vorderseite an den unteren Fiederchen meist merklich grösser, an der Spitze 2—3zählig und beiderseits 1zählig. — In Wäldern: Abtshagen im diesseitigen Walde, östl. neben der Chaussee; Elmenhorst.

γ. reflexum, F. — Athyrium rlaeticum, Roth. — Laub zuletzt fast lineal; Fiedern aus bogig-abstehendem Grunde fast aufrecht, an der Spitze auswärts-gebogen. Fiederchen mit zurückgekrümmten, am Rande zurückgerollten Zipfeln die Fruchthaufen zuletzt fast gänzlich bedeckend; die obere Reihe derselben zurückgeschlagen, von denen der unteren Reihe in einem spitzen Winkel abstehend. — In lichten Gebüsch und an offenen Orten: Niederhof, im Bruch; Parow, Aussenkoppel; Gr. Kädingshagen, Heidestelle in den Wiesen neben der Heide, kleiner. — Eine ähnliche Bildung zeigt sich auch bei Polypodium Dryopteris (Linn.), wenn es an sonnigeren Orten wächst.

82. *A. Ruta muraria*, Linn. — Ruta mur., Dodon. — Aussenseite der Stadtmauer beim Johannis-kloster, Greifswald: Stadtmauer.

83. *A. septentrionale*, Swartz. — Acrostichum sept., Linn. — Greifswald („rarissimum“, Wg.).

84. *A. Trichomanes*, Linn. — Trich. Fuchs. — Vormalis (nach Weigel, und noch vor etwa 25 Jahren) in der Kirchhofsmauer zu Elmenhorst; von mir dort nicht mehr gefunden. R: Jasmund, bei Lancken in Steinmauern und im Holz.

50. *Aster*, Fuchs. Tournef.

85. *A. Tripolium*, Linn. — Trip., Dodon. — Am Strande, stellenweise in Menge.

51. *Astragalus*, Clusius. Linn.

86. *A. Ciccr*, Linn. — Cic. silvestre, Dodon. — Demmin, bei Haus Demmin.

87. *A. glycyphyllos*, Linn. — *A. γλυκύφυλλος*, silvestris, luteus, Morison. Glycyrrhiza silvestris, Gesner. — Knieperstrand, Barther Landstrasse; Seuefer bei Lüßow, Greifswald: Kl. Zastrow. Lassan; Bauerberg. Demmin. R: Ufer am Nesehanzer Strande; Granitz; Stubnitz.

52. *Atriplex*, Fuchs. Tournef.

88. *A. hastatum*, Linn. — *A.* — folio deltoide, hastae cuspidi simili, Moris. hist. *A.* folio hastato s. deltoide, Moris. blaes.

Hier ziehe ich auch *A. latifolia*, Wahlenbg u. A. calotheca, Fries. — Den specifischen Namen hat Linn. nach der Blattform („folio — hastae cuspidi simili“, Linn.) gegeben, hat aber die von Wahlenbg und Fries aufgestellten Arten nicht getrennt, obwohl er beide bekannt für die erstere zieht er im It. oeland. nach Wahlenbg selbst einen Standort an; die zweite bezeichnet er unzuweideutig in den Spec. (Nr. 7620. ed. Richter) mit den Worten: „valvulis femineis magnis, deltoideis, sinuatis“, und wenn er Fl. succ. II. n. 920. unter *A. laeiniata* sagt: „calyce fructus magni, laeves [?], palmato-lacini, acuti, magnitudine et figura fere Asperuginis“, so ist diese Beschreibung offenbar unter eine unrichtige Art hingerathen u. mit Recht von Wahlenbg (Fl. succ.) auf unsere Art bezogen worden, passt aber ebenfalls nur auf die *A. calotheca*, Fries. — Jene Trennung hat Linn. aber nach meiner Ansicht mit vollem Recht unterlassen: denn die Blattform wird eine solche schwerlich begründen; die Gestalt der Fruchtkelche aber zeigt nicht nur Mittelformen zwischen den beiden von Wahlenbg und Fries unterschiedenen Arten (was man auf Bastarde deuten könnte), sondern die beiden Formen derselben finden sich mit einander auf einer und derselben Pflanze. — Demnach stelle ich folgende, oft durch Zwischenformen in einander übergehende Varietäten auf, und bemerke noch, dass Blätter und Fruchtkelche an Gestalt und Beschaffenheit einander in der Regel entsprechen.

α. vulgare, F. — *A. latifolia*, Wahlenbg. — Fruchtklappen 3eckig, ganzrandig od. klein-gezähnt. — Die Blätter an kleinen Pflanzen auch bisw. ganzrandig, wobei die meisten od. nur die untersten spießförmig sind.

β. microtheca, Koch. — *A. ruderalis*, Wallr. *A. latifolia* β. microcarpa, Koch. — Fruchtklappen kaum grösser als die Frucht, gewölbt. Samen klein, im Durchmesser kaum $\frac{1}{2}$ so gross als gewöhnlich, fast glatt. — Ist dennoch keine eigene Art; die kleineren, glatteren Samen finden sich untermischt mit denen der gewöhnlichen Form auf derselben Pflanze.

γ. macrotheca, F. — (Ob dies *A. prostrata*, De C. ?) — Fruchtklappen gross (die grössten bis 1" lang), länglich, ganzrandig, spießförmig od. halb-spießförmig,

mit ungetheilten oder seltner getheilten Öhrchen. auch ungeführt, am Grunde gerade od. etwas herzförmig, auf den Rücken nackt, nebst den Blättern dicklich, fast fleischig, oberwärts aderlos od. undeutlich-aderig, getrocknet meist durchscheinend-gross-punktirt, oft proliferend und dann leicht für Blätter anzusehen. — Kraut kahl od. (Übergang zur Var. ϵ) schwach-schülferig. — Die Blätter, wenigstens die oberen, meist ungeführt und ganzrandig; die Ähren oft so schwer, dass sie darniederliegen. — Knieper- und Frankenstrauch, Andershöfer Strand. **R:** Altenfähr. — Ich besitze ein Exemplar, woran die Fruchtklappen einer Blüthe genau die Form der flg. Var. zeigen.

δ . calothecum (-ca), Schumehr. — A. calotheca, Fries. A. hastata der meisten Autoren. — Fruchtklappen eiförmig-3eckig, oder länglich-3eckig u. verschmälert spitz oder schwach-zugespitzt, am Grunde herzförmig (die kleinere oft fast rautenförmig-3eckig). buchtig-spitz-gezähnt mit oft sehr engen Buchten (niemals „eingeschnitten-gezähnt“) oder oberwärts ganzrandig, die grösseren (bis $\frac{3}{8}$ lang) beiderseits an den Ecken mit 2–3 längeren, zugespitzten od. pfriemenförmigen Zähnen (fast herz-spießförmig mit getheilten Öhrchen), auf dem Rücken sämtlich (grössere u. kleinere) oft blattig-weich-stachelig mit bisw. zusammengerollt-rinnigen Weichstacheln, alle von dünnerer Substanz, getrocknet durchscheinend, meist bis zur Spitze deutlich netzig-aderig, die gestielten mit einem in das Stielchen hinablaufenden Flügel. — Mit der v. Var. auf **R.** auch bei der Grablerfähre.

ϵ . salinum, F. — A. patula, Smith, Var. salina, Wallr. — Meist kleinere Form; schülferig-grau, zuletzt meist geröthet. Fruchtklappen wie bei α od. β , seltner wie bei δ . — Dies ist (nach Koch) A. oppositifolia (De C.), wenn die Blätter ganzrandig, und A. Sackii (Rostk. u. S.), wenn die unteren Blätter gezähnt sind. — Frankenwäde u. a. O.
89. **A. laciniatum**, Linn. — A. maritima laciniata, C. Bauh. — *Stralsund, Greifswald.* **R:** *Jasmund.* — Vielleicht einmal von mir am Frankenstrande gefunden, aber zu jung.

90. **A. littorale**, Linn. — Am Strande, auf moorigem Boden und halb-verwesenen Auswürfen der See ist der aufstrebende Stengel oft vom Grunde an ästig, mit verlängerten, niederliegenden, an der Spitze aufstrebenden Ästen; auf unfruchtbaren, trockeneren Torfboden und auf trockenem Kies wird derselbe ganz einfach, steif, aufrecht, etwa 1 Spanne hoch.

β . rhynchothecum, F. — Fruchtklappen hervorgezogen-geschnäbelt: Schnabel linear-länglich, stumpf, ganzrandig, naeki, kahl, fleischig, an der Spitze klaffend.

γ . maritimum, Dethard. (als Art). — Blätter breiter, die mittleren buchtig-gezähnt.

δ . salinum, F. — Ziemlich klein, Stengel und Äste

niederliegend, an der Spitze aufstehend. Blätter lineal-od. ein wenig lanzettförmig, ganzrandig, ziemlich dick, unterseits gewölbt. — Erscheint nur bei anhaltend gleichem Wasserstande auf dem dauernd vom Salzwasser feucht erhaltenen Kiese, und ist daher nicht alljährlich zu finden. — Vormalig am Strande bei der Reiferbahn, wo jetzt die neue Schiffswerte. **R:** Altenfähr.

91. **A. nitens**. Reichenst. — Franken- u. Knieper-Vorstadt, jetzt spärlicher.

92. **A. patulum**, Linn. — A. angustifolia, Smith. A. angusto — folio, C. Bauh. — Kommt auch vor mit spieß-lanzettförmigen (bis gegen $\frac{3}{4}$ langen), am Grunde fast geraden Fruchtklappen; jedoch fand ich dieselben noch immer untermischt mit denen der gewöhnlichen Form.

β . microthecum, F. — A. patula β . microcarpa, Koch. — Wie A. hastatum β . microthecum oben.

γ . isophyllum, F. — Sämmtliche Blätter ungeführt u. ganzrandig.

δ . strictum, F. — Kleinere Form, Stengel aufrecht. Äste aufrecht-abstehend od. fast aufrecht. Blätter länglich, ganzrandig, ungeführt od. die unteren halb-spießförmig od. spießförmig. — Frankenstrauch, ufern des Pulverhauses.

A. hortense, Linn. — Oft wie wild aus verschlepptem Samen, aber doch wohl nicht beständig.

93. **A. caryophylla**, Webb. — Aira car., Linn. Caryophyllus arvensis —, C. Bauh. — Kugelfang, Deviner Anlagen, Sandhagen, Negast u. a. O. Lössau; Haggenhagen.

94. **A. fatua**, Linn. Tillands.

95. **A. praecox**, Beauv. — Aira pr., Linn. Gramen — praecox —, Rajus. — Deviner Anlagen; Sandhagen, neben dem Wege nach Lüssow; Martensdorf, Lössau; Silberkuhl.

96. **A. pratensis**, Linn. — **R:** Wampen, am süd. Abhang und am Graben daselbst. — Nach Wilke, der aber — wie auch Weigel — die flg. Art nicht hat, bei Greifswald.

97. **A. pubescens**, Linn. — Neben dem Knieper-Mühlengraben; beim Vogelsang; an den südöst. Abhängen und am Ufer des Mühlengrabens nach der Barther Landstrasse hin; bei Stadtkoppel. Deviner Anlagen u. a. O. Lössau; Wiesen.

A. strigosa, Schreber. — Die und da wie wild; doch kaum ursprünglich heimisch.

98. **A. Ballota**, Linn.

Ballote, Fuchs — Tourn. u. Haller.

98. **B. nigra**, Linn. — B. ruderalis, Swartz. B. vulgaris, Link. Marrubium nigrum foetidum, Pena. — Mit weisser Blumenkrone in Devin, selten. — Kraut etwas behaart, aber nicht von Haaren grau. Blätter gekerbt-gesägt,

am Grunde ganzrandig: Sägezähne breit-eiförmig-3eckig, ziemlich gleich, 2mal so breit als lang. Kelezähne eiförmig, zugespitzt-begrannt.

β. incana, F. — Kraut diefhaarig-grau: die jüngeren Blätter und meist auch die Kelche fast filzig-zottig; die Haare etwas schimmernd, länger, stärker und viel dichter stehend als bei der Hauptform, am Stengel entweder — wie bei der letzteren — abwärtsgekrümmt (Zäune an den Bleichen beim Knieper-Mühlengraben, auch mit weisser Blumenkrone; Devin), od. fast gerade und wagrecht-abstehend (am Wege zur ersten Knieperbleiche). Blätter bis gegen den Grund ungleich-gekerbt-gesägt: Sägezähne fast regelmässig-abwechselnd grösser und mehrmals kleiner, eiförmig, an den oberen Blättern eilanzettförmig.

55. *Barbarea*, Dodon. Rob. Brown.

99. *B. arcuata*, Reichenb. — Auf Kleeefeldern (unter Trifolium pratense) oft in grösster Menge, also ohne Zweifel mit fremdem Samen eingeführt, aber auch an Wegen, Rainen u. dgl. Orten häufig u. völlig eingebürgert, z. B. auf dem Schiessstande bei Franzenshöhe, an den Chausseen u. a. O.

100. *B. stricta*, Andrzej. — Einmal von mir am Frankenstrande gefunden.

101. *B. vulgaris*, R. Brown. — Erysimum Barb., Linn. Setae Barbareae herba, Fuchs. — Die u. da in den Vorstädten u. an den Wällen; Tribs., Feld.

56. *Bellis*, Fuchs. Tournef.

102. *B. perennis*, Linn. — *B. minor* vestristis, Fuchs.

57. *Berberis*, Brunfels. Tournef.

103. *B. vulgaris*, Linn. Bellon. (ed. Clus.) — *Amirbaris* Avicennae, Camerar. — *R. Jasmand.*

58. *Berula*, Koch. (Tabern.)

104. *B. angustifolia*, Koch. — *Sium angustifolium*, Linn. *S. Berula*, Gouan. — H. Graben, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

Beta vulgaris, Linn. *γ. rapacea*, Koch. — Jetzt nicht selten an Ufern und Wegen verwildert. Ob beständig?

59. *Betonica*, Fuchs. Tournef.

105. *B. officinalis*, Linn. — Richtenberg: am Wege nach Millienhagen. Grimen: Caschow, Wüst-Eldena. Tribses: Plenniner Laubholz. Barth: Mastweise. Dömnitz: Devensche Holz. — An den Orten, von welchen ich Pflanzen gesehen, überall die Var. *a. hirta*, Koch.

60. *Betula*, Dodon. Tournef.

106. *B. alba*, Linn. (nach Koch).

107. *B. humilis*, Schrank. — Tribses: Plenniner Moor, Loitz: Trantower u. Vierower Moor.

108. *B. odorata*, Bechstein. Häufig; auch oft angepflanzt.

61. *Bidens*, Caesalp. Tournef.

109. *B. cernua*, Linn. — *Cannabinae aquaticae* similis capitulis nutantibus, C. Bauh. — Winzige, oft iköpfige Pflanzen auf unfruchtbarem Torf bei Sandhagen und Negast; häufig.

β. radiata, F. — *Coreopsis Bidens*, Linn. — Bei Stadtkoppel, Grünhufe, Lüssow; häufig in Devin am Fluss.

110. *B. tripartita*, Linn. — *B. folio tripartito-diviso*, Caesalp. *Cannabina aqu. foliis trip-divisis*, C. Bauh. — Winzige, oft iköpfige Pflanzen mit oft nur 5-blühigen Köpfchen u. ungetheilten Blättern auf feuchtem Sande (bei Negast u. Martensdorf) bilden die *B. minima*, Linn. — „*Floribus erectis*“ sagt Linn. von ihr; weshalb sie unrichtig zur v. Art gezogen wird.

β. radiata, F. — Mit der Hauptform; aber selten: Strahl kurz. — Am Knieperstrande bei der Badeanstalt; am Frankenteich.

62. *Blechnum*, Linn.

111. *B. Spicant*, Roth. — *Osmunda* Sp., Linn. *Spicant* Tragi et Germanorum, Rupp. — *R. Stübnitz.*

63. *Blitum*, Eur. Cordus. Linn.

Die lgg. sind bei Linn. Arten von *Chenopodium* mit denselben Trivialnamen.

112. *Bl. Bonus Henricus*, C. A. Meyer. Rajus. — *Bou. Heur.*, Brunfels. — In den Vorstädten, selten; Devin, Parow, Gr. Kädingshagen u. a. O.

113. *Bl. glaucum*, Koch. — Auch aufrecht. — Am Strande u. a. v. a. O.

114. *Bl. rubrum*, Reichenb. — Vorstädte u. a. O.

64. *Blysmus*, Panzer.

Unterscheidet sich von *Scirpus* durch den unterwärts erhartenden (nicht bis auf den Grund abfallenden) Griffel, wodurch die Frucht pfriemenförmig-geschnäbelt erscheint.

115. *Bl. compressus*, Panz. — *Scirpus compr.*, Pers. *Schoenus compr.*, Linn. *Carex uliginosa*, Linn. (?) Gramen cyperoides — *spica compressa* —, Plukenet. — Tribs., Feld, Frankenweide, Strand u. a. O. Am Deviner See in Menge.

β. multiflorus, F. — Ähre doppelt-zusammengesetzt. — Mit der Hauptform; viel seltner.

116. *Bl. rufus*, Link. — *Scirpus rufus*, Schrad. *Schoenus rufus*, Huds. — Frankenweide (von mir nicht wiedergefunden). Barth: Barthewiese. Lassau: Weide; Wiese vor dem Bauerhagen. Rügen.

65. *Botrychium*, Swartz.

117. *B. Lunaria*, Swartz. — *Osmunda Lun.*, Linn. Lun. minor, Fuchs. Lun. botrytis —, Clusius. — Kugelfang; sonst auf der vormal. Laugendorfer Heide sehr häufig. *Barhöet. Grefswald.* Lassau: Papenberg. *R.*: auf den Höhen an der Wamper Wick neben dem Wege nach Drigge. *Stübnitz.*

118. **B. rutaceum**, Swartz. — *B. matricariaefolium*, Al. Braun, *Luaria minor rutaceo folio*, C. Bauh. (?) — Sonst auf der vormal. Langendorfer Heide, selten.

66. **Brassica**, *Branfels*, Linn.

119. **Br. campestris**, Linn. — Früher in Neu-Vorpommern (nach Weigel) häufig; jetzt, bei dem häufigen Anbau, von der wieder verwilderten Pflanze nicht zu unterscheiden.

Br. Napus, Linn. und **Br. nigra**, Koch. — Häufig verwildert.

67. **Brachypodium**, *Pol. Beauv.*

120. **Br. silvaticum**, Röm. u. Schult. — *Festuca silvatica*, Huds. *Bromus pinnatus* β. Linn. — H. Graben, Andershöfer Strand, Niederhof; Lüßow, am Seeufer; Negast, Abtshagen. Parower Kiefern. Demmin: Devenische Holz. **R**: Ufer am Nesehauzer Strande; *Stubnitz*.

121. **Br. pinnatum**, Beauv. — *Bromus pinnatus* (α), Linn. — *Rügen*.

68. **Briza**, (*Dodon.*) Linn.

122. **Br. media**, Linn.

69. **Bromus**, (*Fuchs.*) Linn.

123. **Br. arvensis**, Linn. — Demmin. *Anclam*. — Wilke u. Weigel haben wohl *Br. mollis* dafür angesehen, dessen sie gar nicht erwähnen.

124. **Br. asper**, Murr. — Abtshagen, im diesseitigen Walde neben der Chaussee.

125. **Br. mollis**, Linn. — Die zwergige Form mit einem od. wenigen Ährchen, oft nur fingerhoch (*Br. nanus*, Weigel. Obs.) sehr häufig: Frankenweide, Barther Landstrasse.

β. *calvus*, F. — Klappen und untere Spelzen unbehaart, von kleinen, borstenförmigen Spitzen rauh. — Knieperwall u. a. O.

126. **Br. secalinus**, Linn. — Von den Varr. bei Koch fand ich hier nur flgg. 2:

α. *vulgaris*, Koch (Var. γ.).

β. *grossus*, Koch (Var. α.).

γ. *divaricatus*, F. — Rispe zur Fruchtzeit aufrecht od. an der Spitze ein wenig nickend: die obersten Äste abstehend od. aufrecht-abstehend; die längeren unteren Äste wagerecht-abstehend od. rückwärts-spreizend oder herabgeschlagen. Ährchen 5—blüthig, getrocknet leicht zerfallend, zur Fruchtzeit sehr locker mit einander nicht od. kaum berührenden Blüthen; untere Spelze fein-rauh, zur Fruchtzeit kürzer als die obere. Granne verschieden: bald kaum hervorragend, bald länger und bisw. fast so lang als die Spelze. Halmknoten von rückwärts-abstehenden Haaren kurzhaarig, fast doppelt so lang als bei der Hauptform. — Abtshagen, im diesseitigen Walde auf einer Lichtung am Fusssteige nach Windebrak. — *Vielleicht eigene Art.*

127. **Br. sterilis**, Linn. — *Festuca avenacea* *spiculis elatior*, C. Bauh. — Wälle, Vorstädte u. a. O.

128. **Br. tectorum**, Linn. — Dänholm; sonst um Str. äusserst selten, Demmin, häufig. *Anclam*.

Andere Arten sind mir im Gebiet nicht vorgekommen, obwohl **Br. inermis** (Leyser) nach Schmidt gemein ist.

70. **Bryonia**, *Tragus. Tournef.*

129. **Br. alba**, Linn. — *Vitis alba baccis nigris*, Castor Durantes. — Vorstädte, Devin u. a. O. *Lassan*.

β. *monoclinia*, F. — Blüthen in verlängerter Traube ibettig, die obersten weiblich. — Frankenvorstadt.

71. **Bupleurum**, *Dodon. Tournef.*

130. **Br. tenuissimum**, Linn. — *B. angustissimo folio*, C. Bauh. — Frankenweide. **R**: Wampen.

72. **Butomus**, *Caesalp. (-os). Tournef.*

131. **Br. umbellatus**, Linn. — Frankenteich, Knieper-Mühlengraben u. a. O.

73. **Cakile**, *Anguillara. Tournef.*

132. **C. maritima**, Scop. — *Bunias C.*, Linn. *Eruca maritima*, Hist. Lugd. — Franken- u. Andershöfer Strand, Dänholm u. a. O. Hiddensee. **R**: Altenfähr, am nördl. Strande, u. a. O.

74. **Calamagrostis**, *Lobel. Adans.*

133. **C. arundinacea**, Roth. — *C. silvatica*, De C. *Agrostis arundin.*, Linn. *Gramen arundinaceum montanum*, Tabern. — *Rügen*.

134. **C. epigeios**, Roth. — *Arundo* ep., Linn. — H. Graben u. a. O. Demmin. Auch an feuchteren Orten: Ufer am Strande nach Devin. **R**: Altenfähr. — Die Granne aus der oberen Hälfte der Spelze, von der Mitte des Rückens bis nahe an der Ausrandung, hervorgehend.

β. *katatheros*, F. — Granne aus der unteren Hälfte des Rückens hervorgehend, und, wenn die meisten od. viele Blüthen dem Grunde nahe begrannt sind, bisweilen fehlend. Halme meist etwas überhangend und höher (3—6' hoch), schlanker, weniger rauh. Rispe schwächer gelappt od. fast ungelappt: Ährchen mehr oder minder gleichmässig zerstreut. Von C. Halleriana (De C.) durch die reichblüthigere Rispe und die an der Spitze zusammenge-drückt-rinnig-pleiemenförmigen Balgklappen sofort zu unterscheiden. — Auf feuchbarrem, etwas feuchtem Waldboden: in der Nähe des Vogelsangs an der Barther Landstrasse und am Wege von da nach Gr. Kädingshagen; Negast, am inneren Rande des die Schonung in der Nähe des Sees umgebenden Waldsaums.

135. **C. lanceolata**, Roth. — *Arundo Calamagrostis*, Linn. — Am Vogelsang u. a. v. a. O.

136. **C. neglecta**, Fl. Wett. — *Arundo* negl., Ehrh. *C. stricta*, Spreng. *Arundo stricta*, Timm. — *Lassan*: im rothen Moor (Heinrich). *Rügen*.

75. *Calamintha*. (Fuchs.) Rivin.

137. *C. Acanthos*, Clairv. — *Thymus* Ac., Linn. *Acanthos*, Lacuna. — Frankenweide, Ufer unweit Franzenshöhe, Deviner Ort u. a. O. Demmin. Lissan.

Calendula officinalis, Linn. — Oflverwildernd.

76. *Calla*, Linn.

138. *C. palustris*, Linn. — *Aron palustre*, Gesner. — Negast: am See, selten; aller Toststich vor Brandshagen. Lissan: am Mühlenteich.

77. *Callitriche*, Columna. Linn.

139. *C. autumnalis*, Linn. — In flacherem stehenden Wasser, bei niederem Wuchs, tauchen die Spitzen der Äste oft senkrecht hervor, bilden aber niemals eine schwimmende Rosette. — Franken- u. Knierpenteich, Kupfermühlenteich, Knier- Mühlengraben (in Menge) u. Mühlenteich, Mühlengraben oberhalb Garbodenhagen, Borgwallsee. Lissan.

140. *C. stagnalis*, Scop. — *C. verna* β. Linn. Fl. suec. II. Spec. II. *C. palustris* α. minima, Linn. Spec. I: „foliis omnibus subrotundis.“ — Graben an der Barther Landstrasse, an der Chaussee nach Negast u. a. O.

β. *coenosa*, F. — Stengel und Blätter kürzer, letztere an der Spitze der Äste nicht rosettenförmig-gedrängt. Deckblätter kaum $\frac{1}{2}$ so lang als die Frucht, mit fast gerader Spitze; die Griffel bald verschwindend. — An ausgetrockneten und nassen Orten, Gräben und Waldwegen: Negast; Abtshagen.

141. *C. verna* (α.), Linn. Fl. suec. II. Spec. II. — *C. palustris* γ. *nataus*, Linn. Spec. I. — Um Str. sehr häufig, z. B. an der Allee neben der Herrenwiese, Kramerhof u. s. w. — Die Merkmale der 3 von Kützing hieraus gebildeten Arten fand ich unbeständig: namentlich hängt das Bleiben od. baldige Verschwinden der Griffel, ja, sogar die Gestalt der Frucht von der durch die fortschreitende Jahreszeit verursachten grösseren od. geringeren Menge und Reinheit so wie von der höheren od. niederen Temperatur des Wassers ab. — Beim Austrocknen des Wassers wurzelt der Stengel im Boden, treibt kürzere Glieder und lauter verkehrt-ei-spätförmige Blätter; alsdann kann die Pflanze leicht für *C. stagnalis* angesehen werden.

β. *coenosa*, F. — Stengel aufstrebend, nebst seinen Gliedern in den Blättern kurz; letztere sämtlich gleich, elliptisch-linéal, am Grunde schmal, an der Spitze ausgerandet, od. gestutzt oder stumpf ($\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{8}$ lang), mit einfachem Mittelnerv; die Griffel aufrecht, noch an den fast reifen Früchten vorhanden. — Ins Wasser gepflanzt ging sie in die Hanpform zurück. — An ausgetrockneten und nassen Orten: Weiher neben der Chaussee nach Panditz, jenseit des Langendorfer Torfmoors; Negast.

78. *Calluna*, Salisb.

142. *C. vulgaris*, Salisb. — *Erica* vulg., Linn. *Tragus*. — Negast u. a. v. a. O.

79. *Calltha*, *Tragus*. Rupp.

143. *C. palustris*, Linn. Dodou. — Trägt bis 18 (20?) Balgkapseln.

80. *Camelina*, Dodon. Crantz.

144. *C. dentata*, Pers. — *Myagrum sativum* γ. Linn. Spec. II. — Auf Leineldern.

145. *C. sativa*, Crantz.

α. *pilosa*, De C. — *Myagrum sativum* (α), Linn. M. silvestre, C. Bauh. — Deviner Ort, Voigdhagen, Negast.

β. *glabrata*, De C. — *Myagrum sativum* β. Linn. M. sat., C. Bauh. — Gehaut; in den Vorstädten u. a. O. wie wildwachsend.

81. *Campanula*, Fuchs. Tournef.

146. *C. glomerata*, Linn. — *C. patensis* flore conglomerato, C. Bauh. — Ufer des Deviner Orts, Niederhof. Trilsees: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensehe Holz. Großwald. Lissan: Pulow.

147. *C. latifolia*, Linn. — *C. maxima* foliis latissimis, C. Bauh. — II. Graben, Andershöfer Strand, Zinkendorf, Abtshagen u. a. O.

148. *C. patula*, Linn. — An der Chaussee bei Grünhufe u. bei Steinhagen; Voigdhagen, Lüssow, Pütte, Pennin u. a. O.

149. *C. persicifolia*, Linn. — *C. persicaef.*, Clusius. — Ufer am Deviner Ort und bei Lüssow. Demmin: Devensehe Holz. Lissan: Bauerberg. R: Ufer am Strande bei Nesehanz. Stubnitz.

150. *C. rapunculoides*, Linn. — *C. hortensis* *Rapunculi radice*, C. Bauh. — Knierstrand u. a. v. a. O.

151. *C. rotundifolia*, Linn. Jo. Gerard.

152. *C. Trachelium*, Linn. — *Trach. majus*, Dodon. — H. Graben, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

82. *Cannabis*, Brunfels. Tournef.

153. *C. sativa*, Linn. Fuchs. — In der Frankenvorstadt vollkommen eingebürgert.

83. *Capsella*, Ventenat.

154. *C. Bursa pastoris*, Münch. — *Thlaspi* B. p., Linn. *Bursa p. prima*, *Tragus*.

84. *Cardamine*, Dalech. Tournef.

155. *C. amara*, Linn. — *Nasturtium* — *amarum*, C. Bauh. — Parower Park; Deviner Wiesen: am Fliess in der Nähe der Chaussee; Niederhof; bei Negast und Pennin am Abzugsgraben des Krummenhäger Sees.

156. *C. hirsuta*, Linn. — *Sisymbrium cardamine hirsutum* —, J. Bauh. — R: Stubnitz.

157. *C. pratensis*, Linn. — *Nasturtium pratense*, *Tragus*.

158. *C. silvatica*, Link. — ☉ u. ♂. Blüht vom April bis in den Herbst, und zwar wiederholt aus später treibenden Nebestengeln, zuerst und zuletzt oft heimlich.

— Abtshagen, im diesseitigen Walde am Fussteige nach Windebrak.

85. *Carduus, Dalech. Vail.*

159. *C. acanthoides*, Linn. (J. Bauh.) — Um die Franken- u. Tribs. Vorstadt.

160. *C. crispus*, Linn. — *C. caule crispo*, J. Bauh.

a. incanus, F. — Meist grösser (2—8' hoch) u. ästiger. Blätter unterseits von dünnerem wolligen Filze grau-lich, oberseits ziemlich kahl, die untersten filzlos: Blattzipfel breiter, schwächer gelappt. — Vorstädte, Wälle, Brunnenaue u. a. O.

β. albidus, F. — Kleiner (1—3' hoch), weniger ästig als die *v.* Var. oder mit ganz einfachem Stengel. Blätter unterseits von dichterem wolligen Filze weisslich, oberseits von gekrüselten Haaren ziemlich dicht flaumig: Blattzipfel schmaler, meist stärker gelappt. — Knieer-Vorstadt: an der Allee zum Strande; Tribs. Vorstadt; Andershof, Kl. Kordshagen u. a. O.

161. *C. nutans*, Linn. J. Bauh. — Devin, Lüssow, Langendorf, Kädingshagen u. a. O.; auf dem hiesigen Stadtfelde äusserst selten. — Kommt auch niedrig, 1-köpfig vor. **R:** Wampen.

Bastarde:

159 + 160. *C. acanthoidi-crispus*, F. — Durch die zahlreichen, längeren und stärkeren Dornen und die obersten, gleich-breiten Blätter wie *C. acanthoides*; die unteren und mittleren Blätter aber breiter, fast elliptisch, minder tief getheilt, unterseits dünn wollig-filzig, die untersten filzlos; die Blattadern unterseits deutlich hervortretend, nach der Spitze hin beträchtlich verdickt. Blütenstand und Köpfchen wie bei *C. crispus*, die Blütenstiele kurz, dornig. — Einmal von mir gefunden an der Tribs. Vorstadt.

159 + 161. *C. acanthoidi-nutans*, Koch. — Chaussee bei Langendorf u. bei Andershof.

161 + 159. *C. nutanti-acanthoides*, Koch. — Andershof: einmal von mir gefunden.

86. *Carex, Lonicer. Dillen. (emend.)*

C. acuta *a. nigra*, Linn. Spec. (Var. *β.* Fl. suec. — *Car. nigra verna vulgaris*, Fl. lapp.) ist jetzt allgemein als *C. vulgaris* (Fries) anerkannt. *C. acuta β. rufia*, Linn. Spec. (Var. *a.* Fl. suec. — *Car. maxima, spica plurimis* [!] *remotis longis*, Fl. lapp.) kann sich nach dem Cit. aus Royen („spicae mase. superioribus numerosae“ [!] ect.) füglich nur auf *C. riparia* (Curt.) beziehen, obwohl auch *C. paludosa* (Good.) darin begriffen sein möchte. — Wenn nun mit der Var. *a.* und *β.* die *Art* erschöpft sein muss, so lässt sich auch aus den Worten der Spec. in der Haupt-Diagnose: „cap-sulis obtusiusculis“ kein Grund hernehmen, noch eine dritte Art in der *C. acuta* unterzubringen, und es scheint daher unumgänglich, hier von den L.-schen Namen abzustehn und anerkannt sichere dafür zu gebrauchen, nämlich *C. gracilis*, *C. paludosa*, *C. riparia*, *C. vulgaris*.

162. *C. ampullacea*, Good. — *C. vesicaria γ.* Linn. Spec. — Andershöfer Strand, Voigdhäger Moor, Negast u. a. v. a. O. Lassin.

163. *C. arenaria*, Linn. — Gramen cyperoides — in arenosis nascens, Plukenet.

β. abnormis, F. — Gräser und kleiner. Ährchen zahlreich od. wenige: untere weiblich, mittlere und obere mannweilig, an der Spitze männlich (keine od. nur das oberste ganz u. gar männlich). Übrigens wie die Hauptform und (auf besserem Sandboden wahrscheinlich überall) mit ihr. — Kugelfang, Chaussee bei Langendorf, Devin. **R:** Wampen, besonders in den Kiefern.

γ. ligeriana, F. — *C. ligeriana*, Gay. *C. repens*, Bellardi (der älteste Name). — Kleiner, schwächer. Ährchen wenige. Früchte schmaler u. schmaler-berandet. *Sonst wie β.* — Auf tieflockerem, unfruchtbarem Sande. **R:** Wampen, am Wege nach Drigge.

164. *C. axillaris*, Good. — *Greifswald* (wenn die Angabe nicht etwa auf einer Verwechselung mit *C. remota β. apicula* beruht).

165. *C. biformis*, Schultz Fl. starg. — Deckschuppen weiss-berandet.

a. sterilis, Schultz. — Angeblich *C. fulva*, Good., wobei jedoch die Länge der Deckblätter nicht ganz zutrifft. *C. Hornschuchiana - flava*, Gareke (?). — Gelblich-grasgrün. Männl. Ähre 1, seltener deren 2; weibliche 1—4; obere Deckblätter die nächst-obere Ähre erreichend oder überragend (das 2te erreicht od. überragt bisw. die endständige Ähre, das 4te erreicht etwa den Grund des nächsten Blütenstiels). Früchte durch Verknümmung der Nuss leer oder fast leer, in der Mitte oft zusammengezogen, gelblich-grün, nebst den Deckblättern bis tief in den Sept. frisch u. unverändert. Halm mehr od. minder rauh. — Ist das Erzeugniss eines trockneren, wärmeren, minder fruchtbaren Bodens, eigentlich eine Ausartung, da sie nicht od. doch äusserst selten keimfähigen Samen trägt: einzelne Halme u. weibl. Ähren, auch einzelne Früchte dieser Form finden sich an Übergangsorten auf der Wurzel der flg. Var. (u. umgekehrt), und wenn es begründet ist, dass bei letzterer die Ausläufer sich mehr entwickeln, so ist das eine Erscheinung, welche die Gräser bei verschiedenem Standorte nicht selten zeigen. Mit *C. flava* (Linn.) hat sie keine Ähnlichkeit. — Voigdhäger Moor, selten; Negast, häufig am Rande der Wiesenflecke in den jungen Kiefern, auf der vormal. Heide, wo der Boden sich zur Heide erhebt; auf dem eigentlichen Wiesenboden daselbst wächst die flg. Var. sehr häufig.

β. fertilis, Schultz. — *C. Hornschuchiana*, Hoppe. — Dunkel-grasgrün, fast lauchgrün. Männl. Ähre 1, sehr selten deren 2; weibl. 1—3; obere Deckblätter die nächst-obere Ähre oft nicht erreichend. Früchte von der vollkommen ausgebildeten Nuss fast ausgefüllt, dunkelgrün,

bei der Reife graubraun; die Deckblätter zu dieser Zeit vertrocknet. Halm oft milder rauh als an der v. Var., jedoch fahl ich ihn an der Spitze niemals glatt und bisw. — wenn auch selten — sogar unter der untersten (3ten) weibl. Ähre noch merklich rauh. Sekuhr Car. tab. T. No. 67. *Fig. links.* — Voigdhäger Moor, Negast; Abtshagen, im Heller. Lissan: Wiese bei Waschow.

166. *C. brizoides*, Linn. — *Anclam.*

167. *C. canescens*, Linn. — Deviu, Zarrendorf, Negast; Lüssow u. a. O. Lissan.

168. *C. chondrorhiza*, Ehrh. — Negaster Moor.

169. *C. Davalliana*, Smith. — Die männl. Ähre findet sich auch bisw. mit einigen unterwärts od. in der Mitte eingemischten weibl. Blüten. — *Rügen.*

170. *C. digitata*, Linn. — Gramen — paniculis forma pedum avium, J. Bauh. — Abtshagen, im jenseitigen Walde westlich von der Chaussee. **R:** Granitz.

171. *C. dioica*, Linn. — Die Blätter sind nach der Spitze hin am Rande oft rauh. — Negaster Moor. *Anclam.* Lissan: Wiese bei Waschow. — Bei Negast a. a. O. auch die Form mit einigen in die männl. Ähre unterwärts eingemischten weibl. Blüten; selten.

β. brachycarpa, F. — Früchte kürzer ($\frac{2}{3}$ so lang) in einem merklich kürzeren Schnabel kurz-zugespitzt. — Negast: Wiese in der südwestl. Gegend der vormal. Heide, in der Nähe des Laubwaldes und der Scheide gegen Seemühl; häufig. Wo die Pflanze sich dort dem Heideboden nähert, gelangen die Früchte grossentheils nicht zur vollkommenen Ausbildung.

172. *C. distans*, Linn. Syst. X. — Cyperoides spicis parvis longe distantibus, Rajus. — Deckschnuppen am Rande ein wenig blasser, aber nicht weiss. — **R:** Wiesen an der Südseite des Wampens.

173. *C. disticha*, Linds. — Mittlere, männl. Ähren oft sehr zahlreich (bis 35 u. mehr).

β. abnormis, F. — Mittlere und obere Ähren mannweibig, an der Spitze männl. Bisw. sind die seitständigen Ähren sämtlich weibl. und nur das endständige mannweibig od. männlich. Ähren mit wenig zahlreichen Ähren kommen auch ganz ohne männliche Blüten vor. — Tribes. Feld, Andershöfer Strand u. a. O.

174. *C. divulsa*, Good. — Negaster Moor, sehr selten.

175. *C. elongata*, Linn. — Gr. Kädingshagen, Faningsberg, Negast, Abtshagen, Brandshagen. Lissan: rothes Moor. — Auf einzelnen Halmen findet sich (bei Negast) eine Abweichung: untere Ähren allmählig weiter entfernt, das unterste mit einem blattigen, die Spitze der Ähre erreichenden od. überragenden Deckblatt.

176. *C. ericetorum*, Pollich. — Deviu: Rauhe Berg; Sandhagen, am Wege nach Zarrendorf neben dem See; Martensdorf. Demmin. Lissan: Weide; Pulow. **R:** Wampen.

177. *C. extensa*, Good. — Hiddensee. **R:** Wittow.

178. *C. filiformis*, Linn. — Negaster Moor, Brandshagen, Martensdorf. *Greifswald: Hohenmühl. Anclam.* Lissan: Wangelkow.

179. *C. flava*, Linn. — Voigdhäger Moor, Negast, Martensdorf u. a. O. Lissan: Vorwerk, Waschow, Klotzow.

β. minor, F. — Halme niedriger (3–9" hoch), dünner. Ähren u. Früchte kleiner. Wurzel wenighalbig. — Torfige Wiesen und Triften: Negaster Moor; Parower Aussenkoppel u. a. O.

γ. refracta, F. — Halm an der obersten od. der 2ten weibl. Ähre, seltener an der männl. Ähre (oft rechtwinkelig, bisw. 2mal) zurückgebrochen.

Vielleicht sind hier 2 noch nicht hinreichend unterschiedene Arten vereinigt: *Die eine*, welche der Abbildung bei Sekuhr Car. tab. H. no. 36. entspricht, ist um Stralsund äusserst selten; in wiefern die Pflanzen der Lissaner Gegend zu ihr gehören, vermag ich jetzt nicht zu ermitteln. *Die andere*, hier sehr häufige, würde in der Abbildung bei Sekuhr Car. tab. F. no. 26. (mit Ausschluss der mittelsten Figur) dargestellt sein und die hier aufgezählten *Var.* mit umfassen: sie trägt meist 2–4 weibl. Ähren, deren unterste bisw. zusammengesetzt ist; die Früchte sind von verschiedener Grösse, meist kleiner als bei jener; ihr Schnabel ist glatt od. beiderseits am Rande von Höckerehen ein wenig rauh, aber nicht „fein-gerägt-rauh“, kürzer als bei ersterer und weniger stark zurückgebogen (bei jener steht er an den unteren Früchten abwärts-senkrecht od. an den untersten rückwärts-zusammenneigend). Der *C. lepidocarpa*, Tausch (bei Bluff u. Fing.) entspricht die 2te Form nicht; aber sie gilt vermuthlich bald für *C. flava*, bald für *C. Oederi*, obwohl letztere in ihrer ausgeprägtesten Form bisw. dicht neben jener steht und von ihr wie von allen heimischen Arten durch die Dauer ihrer Blühzeit verschieden ist. Welche von beiden endlich die wahre *C. flava* (Linn.) sei? Doch wahrscheinlich die 2te!

180. *C. glauca*, Scop. — (*C. limosa*, Linn. It. gotl.) — Fruchtknoten sehr oft aufrecht. Blüten oft proliferierend: der Fruchtknoten verwandelt sich in ein den Rücken der Fruchthülle durchbrechendes Ähren. — Ufer am Knieperstrande; bei Faningsberg, Abtshagen u. a. v. a. O. Lissan: Vorwerk, Waschow.

181. *C. gracilis*, Curtis. — *C. acuta*, Autor, aber entw. nicht Linn. (s. oben unter dem Gattungsnamen), oder sonst unter dessen *Var. a. nigra* mitbegriffen. — Am Strande nach Deviu, selten; Wiesen am Vogelsang neben dem Wege von Grünhufe nach Gr. Kädingshagen. Lissan.

182. *C. hirta*, Linn. — Häufig proliferierend (wie *C. glauca*). — Barther Landstrasse, Heide bei Gr. Kädingshagen u. a. v. a. O.

β. denudata, F. — Blätter und Scheiden kahl od. letztere oberwärts auf der vorderen Seite etwas behaart. — An nassen Orten: Wiesen an der Nordseite des Andershöfer Teichs.

183. *C. lusa*, Wahlenb. — *Loitz: Trantower Moor (?)*.

184. *C. leporina*, Linn. — Kugelfang, Negast u. a. v. a. O. Lassin.

β. argyroglochis, Koch. — *C. argyr.*, Hornem. — Niederhof: Park.

185. *C. limosa*, Linn. — Negaster Moor; Abtshagen, im Heller. Lassin: Sumpf am Wege nach Klotzow.

186. *C. loliacea*, Linn. — *Greifswald*.

187. *C. maxima*, Scop. — *It: Stubbenkammer*.

188. *C. montana*, Linn. — *Cyperoides montanum* — Scheuchz. — Tribsees: Plenniner Laubholz.

189. *C. microstachya*, Ehrh. — *Greifswald: Kieshöfer Moor*.

190. *C. muricata*, Linn. (nach Smith. Vgl. bei *C. stellulata*.) — H. Graben, Knieperstrand u. a. v. a. O., auch in den Vorstädten.

β. brachycarpa, F. — Früchte eiförmig, kurz-zugespitzt, am Grunde vielnervig, nur $\frac{2}{3}$ so lang als gewöhnlich. Wand des (falschen) Fruchtgehäuses gleich dick, nicht, wie bei der Hauptform, am Grunde innen korkig-verdickt. — *It: Wampen*, auf der Höhe und am südl. Abhänge.

191. *C. Oederi*, Ehrh. — Blüht vom Mai bis Oct. Weibll. Ähren 1—7, meist 3—5, die unteren oft (mit 1—5 Nebenähren) am Grunde zusammengesetzt; die unterste nicht selten weit-entfernt, fast grundständig, lang-gestielt. — Auf dem vormal. Kl. Paschenberg; Negast: in den Wiesen am See, wo der Rasen ausgestochen; Ufer des Borgwallsees; Parower Aussenkoppel; Prohner Trift; Voigdelhäger Moor; Zarrendorfer Heide; Lassin.

192. *C. pallescens*, Linn. — Hat bisw. 2 Nüsse in einer Frucht. — Negast, Abtshagen, Niederhof u. a. O. Lassin.

193. *C. paludosa*, Good. — *C. rufa*, Gaud. — Männl. Ähren 1—4, selten 5, 6. — An den Teichen; Andershöfer Strand, Barther Landstrasse, Lüssow, Negast u. a. v. a. O.

β. attenuata, F. — Halm sehr dünn, aufrecht. Deckblätter sehr schmal. Endständige Ähre männl. od. weibl. od. mannweibig; die seitenständigen sämtlich weiblich, lockerblühig od. am Grunde entfernt-blühig. Deckschuppen oft lang-begrannt od. blattig. — Barther Landstrasse, mit der gewöhnl. Form; Wiese bei Kl. Kordslaghen.

γ. polygama, F. — Die typisch weibl. Blüten zwittrig: die Mündung der Blütenhülle durch die sich hervordrängenden Staubbeutel merklich erweitert. Ob fruchttragend? — Lassin: Weide (Heinrich).

194. *C. panicea*, Linn. — Wiesen am Vogelsang, Parower Aussenkoppel u. a. v. a. O. Lassin.

195. *C. paniculata*, Linn. — Andershöfer Strand, Niederhof, Ge. Kädingshagen, Negast u. a. O. Lassin: Vorwerk, Waschow. — Kommt auch vor mit einer aus einfachen Ähren gebildeten Ähre, nicht rispig.

196. *C. paradoxa*, Willd. — Negaster Moor, Tribsees: Recknitzmoor zwischen Plennin und Marlow. Lassin: Weide; Waschow, beim Fischerhause.

197. *C. pilulifera*, Linn. — An der Sandgrube im Tribs. Felde, Voigdelhagen, Negast, Abtshagen, Mariensdorf u. a. O. Lassin: Weide, Buggenhagen. *It: Wampen*.

198. *C. praecox*, Jacq. — Blüht bis Mitte Jun. — Kugelfang, an den Chausseen u. a. v. a. O. Lassin: Bauerberg.

β. reflexa, Hoppe (als Art). — Halm an der untersten Ähre stumpfwinkelig - zurückgeknickt. — Kugelfang, Devin.

199. *C. Pseudo-Cyperus*, Linn. — *Pseudocyp.*, Dodon. — Um den Vogelsang; Negast, Voigdelhagen, Niederhof u. a. O. Lassin: Silberkuhl. *It: Wampen*.

200. *C. pulicaris*, Linn. — *Cyperoides pulicare*, Christoph. Merret. — Voigdelhäger Moor; am See bei Sandhagen; Negast: am Fussteige in den Wald u. häufig auf einer Wiese im südwestl. Theil der vormal. Heide. *Greifswald: Grubenhäger Torfmoor*. Lassin: Bruch beim Waschower Fischerhause.

201. *C. remota*, Linn. — Dunkelgrün, fast blaugrün. — Niederhof; Abtshagen, häufig. *Anclam*. Lassin: Waschow, beim Fischerhause.

β. aprica, F. — Gelblich-grasgrün. Halme gerade, aufrecht od. aufsteigend. Deckblätter abstehend. — An lichten, sonnigen Orten. Abtshagen, im diesseitigen Walde am Seitenwege zu den Steinhäger Bauernhöfen. Demmin: bei Vorwerk am südl. Rande der Peenewiesen. — Nicht mit *C. axillaris* zu verwechseln!

202. *C. riparia*, Cnrt. — *C. rufa*, Lamck. *C. acuta β. rufa*, Linn. Spec. (s. oben unter dem Gattungsnamen). *C. vesicaria*, Linn. Fl. suec. (mit Ausschl. der Var. *β.*) — wenigstens nach dem Cit. Michel. gen. pg. 57. (no. 10. 11.) tab. 32. fig. 6. 7. — An den Teichen, um den Vogelsang; Barther Landstrasse; Niederhof u. a. O. Lassin.

β. attenuata, F. — Halm sehr dünn. Deckblätter sehr schmal. Männl. Ähren 1—3, meist entfernt, die unterste mit einem blattigen Deckblatt, die oberste od. die 2 oberen an der Spitze meist weiblich. Weibl. Ähren entfernter und kürzer als bei der gewöhnl. Form. — Chausseegraben neben Grünthal.

203. *C. silvatica*, Hud. — *C. vesicaria β.* Linn. mit Ausschl. des Cit. aus der Fl. lapp. Gramen cyperoides silvarum —, Rajus. — Negast, Abtshagen. *It: Stubnitz*.

204. *C. stellulata*, Good. — *C. muricata*, Linn. nach

Wahlenbg.: sehr wahrscheinlich richtig nach dem Cit. aus Mich. bei Linn. (bei Letzterem unrichtig fig. 11. für fig. 12!). — Schlachterweide; Gr. Kädingshagen am südl. Rande der Heide; Negast, Zarrendorf u. a. O. Lissan: Wangelkow.

β. refracta, F. — Spindel zur Fruchtzeit an dem untersten od. 2ten Ähren und bisw. noch zum 2ten Mal an einem oberen Ähren (oft rechtwinkelig-) zurückgebrochen. — Negast.

205. **C. stricta**, Good. — C. caespitosa, Linn. nach Gay, und diese Ansicht scheint richtig nach Ls Worten: „Hab. in paludibus, ubi caespitum instar turfos et fasciculos grate viridos maximosque constituit“. Fl. succ. Auch Wilko u. Weigel haben Ls Namen von dieser Art verstanden. — Am Knieper-Mühlengraben u. a. v. a. O.

β. rostrata, F. — Früchte in einen hinterseits etwas gespaltenen Schnabel zugespitzt, der 2—3 mal so lang als breit ist. Halm glatt! — Negast, am Rande des Sees, selten.

206. **C. teretiuscula**, Good. — Negaster und Voigdeläger Moor, Martensdorf u. a. O. Lissan: bei der Sehlense; im rothen Moor; im Waschower Torfmoor.

207. **C. vesicaria**, Linn. mit Ausschl. der beiden Varr. — Cyperoides vesicarium —, Schleutz. — Kupferwiese, Parow u. a. v. a. O. Lissan.

208. **C. vulgaris**, Fries. — C. acuta α. nigra, Linn. Spec. (S. oben unter dem Gattungsnamen.) C. caespitosa, Good. u. der flgg. Autoren bis auf Fries. — Der methodisch richtige Name wäre C. nigra, ist aber von Allion. schon einer andern Art beigelegt worden. — Eine sehr veränderliche Art: Höhe von $\frac{1}{4}$ — $\frac{2}{4}$; bei hohem Wuchs oft das unterste und bisw. noch das 2te Deckblatt die endständige Ähre überragend; männl. Ähre 1, seltner deren 2; weibl. 1—5, walzenförmig od. länglich od. fast rundlich; Früchte meist 6zellig, verkehrt-eiförmig-rundlich od. verkehrt-eiförmig, auch elliptisch od. fast eiförmig, undeutlich- od. deutlich-nervig, stärker u. schwächer gewölbt; Deckschuppen stumpf, kürzer, bisw. fast nur $\frac{1}{2}$ so lang als die Frucht, oder spitzlich, spitz und oft stachelspitzig, fast so lang od. länger (bisw. fast bis 2mal so lang) als die Frucht. Manche dieser Formen nähern sich der C. gracilis, andere der C. stricta. — Eine mehr abweichende, seltne Form (die ich mir als **C. pleoandra** bezeichnet habe) trägt sehr gedrungene Ähren: männliche 2—4, lanzettförmig-lineal, die seiteständigen lanzettförmig, die unterste fast immer mit einem blattigen, die Ähre meist überragenden Deckblatt gestützt; weibliche 1, 2 (selten $2\frac{1}{2}$: die dritte nämlich oberwärts männlich), walzenförmig, sitzend od. die unterste kurz-gestielt; Deckblätter blattig, am Grunde beiderseits häutig-kurz-geöhrt, die endst. Ähre oft überragend, das unterste am Grunde oft umfassend od. fast scheidig; Deckschuppen sehr stumpf, kürzer als die

Frucht; Früchte abgerundet-stumpf, beiderseits gewölbt, am Rücken 5—nervig, 8zellig und mehr abstechend als bei den übrigen Formen, daher die Ähren dicker.

209. **C. vulpina**, Linn. — Kupferwiese, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

β. nemorosa, Koch. — Lissan: beim Waschower Fischerhause (Heinrich).

38. **S7. Carlina**, Dodon. Tournef.

210. **C. vulgaris**, Linn. — C. silvestris vulg., Clusius. — Kugelfang, Barther Landstr. u. a. O.

58. **S8. Carpins**, Dodon. Tournef.

211. **C. Betulus**, Linn. — Bet. und Carp. Lobel. — Rügen.

21. **S9. Carum**, Dodon. Ricin.

212. **C. Carvi**, Linn. — Carvi, Lonicer. — Am Knieper-Mühlengraben u. a. O.

38. **90. Centaurea**, Caesalpin. Linn.

213. **C. Cyanus**, Linn. — Cyanus, Fuchs. — Auch mit weisser Blumenkrone.

214. **C. Jacea**, Linn. — Jacea nigra, Gesner. — H. Graben, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

215. **C. maculosa**, Lamck. — Lissan: am Papenberg.

216. **C. Scabiosa**, Linn. — Scab. Bruniels. — Barther Landstrasse u. a. O., häufig; selten mit weisser Blumenkrone. **R**: Altenfähr.

53. **91. Centunculus**, Dillen. (Eur. Cordus.)

217. **C. minimus**, Linn. — Alsine palustris minima —, Christ. Mentzel. — Langendorf, Mariensdorf; von Borgwall über Pennin bis auf die Negaster Äcker; zwischen Sandhagen und Neu-Lüssow; Teschenhagen. — Oft mit Radiola, Juncus capitatus u. Hypericum humifusum.

5. **92. Cephalanthera**, Richard.

218. **C. grandiflora**, Babiing. — Serapias grand., Linn. Syst. XII. (? Nach dem Cit. aus Haller — hist. no. 1298. — hat er, wie Letzterer, wahrscheinlich C. Xiphophyllum hiermit verbunden.) Ceph. pallens, Rich. — **R**: Stuhnitz.

219. **C. rubra**, Rich. — Serapias rubra, Linn. — **R**: Stuhnitz, Granitz.

220. **C. Xiphophyllum**, Rehbch. fil. — Serapias Xiph., Linn. fil. Ceph. ensifolia, Rich. — **R**: Stuhnitz.

3. **93. Cerastium**, Dillen.

221. **C. arvense**, Linn. — Barther Landstrasse, Franken-Chaussee u. a. v. a. O.

222. **C. glomeratum**, Thuill. — **R**: Patbus; Jasmund.

223. **C. glutinosum**, Fries. — Hier die flg. Var.

β. pallens, Koch. — Deich am östl. Rande der Kupferwiese bei Knöchelsöhrn.

224. **C. semidecandrum**, Linn. — Kugelfang u. a. v. a. O.

225. **C. triviale**, Link.

22. **94. Ceratophyllum** (-on), Vaill.

bot. par.

226. **C. demersum**, Linn. — Teiche, Knieper-Müh-

lengraben, Frankenweide; Prähner Trift: Torfgrube. *Lassan.*

β. brevirostre, F. — Frucht am Grunde ohne Dornen u. ohne Hölcker: der endständige Dorn $\frac{1}{2}$ so lang als die Frucht. — Im Strandwasser.

1. 95. *Cherophyllum*, C. Barch. Tourn.

227. *Ch. bulbosum*, Linn. — *Cicutaria* — *bulbosa*, J. Bauh. — *Greifswald: Koitenhagen. Anclam. R: Garz.* — Ob ursprünglich wildwachsend?

228. *Ch. tenulum*, Linn. — Vorstädte u. a. v. a. O.

96. *Chetidonium*, Fuchs. Tournef.

229. *Ch. majus*, Linn. Fuchs. — Vorstädte u. a. O.

xx 55 97. *Chenopodium*, Moquin-Tandon.

230. *Ch. maritima*, Moq. Tand. — *Schoberia mar.*, C. A. Meyer. *Chenopodium maritimum*, Linn. *Salsola quaedam* in maritimis, Caesalpiu. — Blüten zu 3 (selten zu 2 oder einzeln), od. statt der beiden seitenständigen ein 2–7-blühthiges geknäueltes Ährchen. — Frankenweide; Zingst. *Greifswald. R: Altenfährl*, am nördl. Strande, sehr gross — auf Kies; Drigge, in den Wiesen am Mühlen.

57 98. *Chenopodium*, Tabern. Tournef.

231. *Ch. hybridum*, Linn. — *Pes auserinus*, Fuchs. — Vorstädte, Gärten.

232. *Ch. murale*, Linn. — Frankenvorstadt u. a. O.

233. *Ch. polyspermum*, Linn. — *Blitum pol.*, C. Bauh. *Polyspermon*, Lobel.

α. cymoso-racemosum, Koch. — Vorstädte, Gärten; Abtshagen, in Waldwegen; bei der Cummerower Ziegelei in Gräben unfern des Waldes.

β. spicato-racemosum, Koch. — Seltner: Vorstädte, Gärten.

234. *Ch. urbicum*, Linn. — Sehr selten: um die Frankenvorstadt, *Anclam.*

235. *Ch. vulgare*, F.

α. album, F. — *Ch. album*, Linn. *α. spicatum*, Koch.

β. viride, F. — *Ch. viride*, Linn. *Ch. album β. cymigerum*, Koch.

236. *Ch. Vulvaria*, Linn. — *Vulv.*, Dalech. — *Stralsund (?) Greifswald.*

x 40. 99. *Chondrilla*, Tabern. Tournef.

237. *Ch. juncea*, Linn. Tabern. — *Lassan: Jamitzower Mühle. R: Mönchgut.*

100. *Chrysanthemum*, Clus. Tourn.

Vgl. *Leucanthemum u. Tripleurospermum.*

238. *Chr. segetum*, Linn. — Die randständigen Achänen sind in grösserer od. geringerer Anzahl 2flügelig; sämtlich flügellos habe ich sie bei Hunderten von Köpfchen, die ich untersuchte, niemals gefunden.

101. *Chrysosplenium*, Tabern. Tourn.

239. *Chr. alternifolium*, Linn. — Parower Park; Voigedhäuser Trift n. a. O. Abtshagen im diesseitigen Walde, in Menge.

240. *Chr. oppositifolium*, Linn. — *R: Garz.*

33. 102. *Cichorium*, Gesner. Tournef.

241. *C. Intybus*, Linn. — *Intybum agreste*, Eur. Cordus. — Auch mit weisser und rosenrother Blumenkrone. Vorstädte, Wegränder.

29 103. *Cicula*, Gesner. Wepfer.

242. *C. virosa*, Linn. — *C. aquatica*, Gesn. Wepf. — An den Teichen, Knieper-Mühlengraben, Vogelsang; Lüssow, Sandhagen u. a. O. Demmin. *Lassan.*

36 104. *Cineraria*, Linn. — *Vid. Senecio.*

26 105. *Circaea*, Lobel. Tournef.

243. *C. lutetiana*, Linn. Lohel. — Alte Schiffswerfte: zwischen dem Bauholz; Niederhof; Pemmin; Abtshagen; in Menge; Bussiner Forst. *Lassan: Waschow. R: Stubnitz.* — Am erstgenannten Ort sehr üppig: die Stengelblätter meist sämtlich und oft auch die unteren astständigen Blätter am Grunde herzförmig; die untersten Blätter bisw. mit schmal-lanzettförmigen Deckblättchen; Stengel stammig.

37. 105. *Cirsium*, Lobel. Tournef.

244. *C. acule*, Allion. — *Carduus acaulis*, Linn. Lobel. — *R: Sassnitz.* — Kommt in 3, freilich nicht ganz streng begrenzten Formen vor:

α. vulgare, F. — Stengel sehr verkürzt, nebst den etwa vorhandenen Ästen daher wurzelständigen, behäuterten, kürzeren od. längeren Blütenstielen gleichend.

β. fastigiatum, F. — Stengel entwickelt (bis spannenhoch), vom Grunde an ästig mit ziemlich gleich-hohen Ästen, mehr- bis vielköpfig: bis 16köpfig, in welchem Falle jedoch in der Regel mehrere der unteren Köpfchen verkümmern. Bei geringerer Entwicklung des Stengels bleibt ein oder der andre Ast in Form eines wurzelständigen Blütenstiels vom Stengel getrennt. — Schlachterweide; vormalig. Kl. Paschenberg; Deviner Anlagen.

γ. elatius, F. — Stengel entwickelt ($\frac{1}{2}$ – $1\frac{3}{4}$ hoch), meist 1–köpfig; Äste sämtlich stengelständig, keiner als wurzelständiger Blütenstiel erscheinend. — Barther Landstrasse; am Seeufer bei Lüssow; Deviner Anlagen.

245. *C. arvense*, Scop. — *Serratula arvensis*, Linn.

β. vestitum, Koch (Var. *δ.*) — Sehr häufig.

246. *C. heterophyllum*, Allion. — *Carduus heterophyllus*, Linn. — Bis vor wenigen Jahren in einem seitdem ausgerodeten Laubgebüsch der südl. Martensdorfer Kiefern, und zwar die Form mit vorn fiederspaltigen mittleren Blättern: die Köpfchen einzeln, lang-gestielt. Ob vielleicht noch im Martensdorfer „Busch“ zu finden?

247. *C. lanceolatus*, Scop. — *Carduus lanceolatus*, Linn. Tabern.

248. *C. oleraceum*, Scop. — *Cnicus oleraceus*, Linn. — Kommt auch mit einzelnen Köpfchen vor. — II. Graben, Andershöfer Strand, Negast u. a. v. a. O.

X 61. 100. a. 44

xx 55.

249. **C. palustre**, Scop. — *Carduus palustris*, Linn. C. Bauh. — Kupperwiese u. a. v. a. O.

106. **Cladium**, *Patrik Brown*.

250. **Cl. Mariscus**, R. Brown. — *Schoenus Mar.*, Linn. — Triebes: Plenniner Moor. *Dars. Greifswald*.

51. 107. **Clinopodium**, *Dalech. Tournef.*

251. **Cl. vulgare**, Linn. Matthiol. — H. Graben, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

108. **Cochlearia**, *Dalech. Tournef.*

252. **C. Armoracia**, Linn. — Arm. auf Raphanus major, Brunfels. — Vorstädte u. a. O.

β. isophylla, F. — Stengelblätter sämmtlich fast gleich, schmal-lanzettförmig, die oberen fast lineal. — Am Wege nach dem Kugelfang, sehr selten.

γ. latifolia, F. — Untere Stengelblätter gestielt, ungetheilt, gross, den Wurzelblättern ähnlich. — Trieb. Vorstadt, selten.

253. **C. danica**, Linn. — C. dan. repens und C. minor erecta, C. Bauh. — R: Wampe, auf dem Anger an der Mündung des Mühlen; bei der Prosnitzer Schanze.

C. officinalis, Linn. — Nach Weigel am Deviner See; von mir dort nicht gefunden. Vielleicht die v. Art, die Wg. nicht hat?

2. 109. **Comarum**, *Linn.*

254. **C. palustre**, Linn. — *Pentaphylon pal.*, Val. Cordus. — Herrenwiese, Vogelsang u. a. v. a. O.

31. 110. **Conium**, *Fuchs. Linn.*

255. **C. maculatum**, Linn. — Vorstädte, Parow, Gr. Kädingshagen (hier, am Wege nach Grünhufe, auch niedrig (1—1½), schwach, mit einfachem, 1—6ldoldigen Stengel) u. a. O. *Greifswald*. R: Altenfäh, am nördl. Strande.

β. minus, F. — In allen Theilen kleiner (1½—2 hoch): Dolden und Blumenkrone von ½ so grossem Durchmesser. Früchte mehr länglich: die Rippen auch der grünen Frucht nicht od. kaum gekerbt, dünn, fast häutig. — Parow, in der Trift am nördlich. Dorfsende; selten.

111. **Convallaria**, *Dodart. Linn.*

256. **C. maiialis**, Linn. — *Maianthemum flore albo simplic.* Siegesbeck. *Lilium convallium*, Tragus. — Negast, selten; Niederhof, im Park! Triebes: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensche Holz, *Lassan*. R: Stubnitz, *Boldevitzer Holz*.

257. **C. multiflora**, Linn. — *Polygonatum latifolium*, Fuchs. — H. Graben, Barther Landstrasse, Parower Aussenkoppel, Elmenhorst u. a. v. a. O. *Lassan: Bauerberg*.

258. **C. Polygonatum**, Linn. — *Pol. latifolium minus*, C. Bauh. — Triebes: Plenniner Laubholz. *Anclam*. R: Granitz, Stubnitz.

259. **C. verticillata**, Linn. — *Polygonatum angustifolium*, Fuchs. — R: Granitz.

45 112. **Convolvulus**, *Eur. Cordus. Tourn.*

260. **C. arvensis**, Linn. — *Volubilis arv.*, Tabern. — Blumenkrone bisw. innen nach dem Grunde hin mit 5 purpurnen Doppelflecken.

261. **C. sepium**, Linn. — C. major, Gesner.

β. roseus, F. — Blumenkrone blass-rosenroth mit 5 weissen Streifen. — Niederhof.

65 113. **Corallorrhiza**, *Rupp.*

262. **C. innata**, R. Brown. — *Ophrys Corallorrhiza*, Linn. *Dentaria coralloide radice*, Clusius. — Negaster Moor, sehr selten. R: Granitz, Stubnitz.

31. 114. **Cornus**, *Eur. Cordus. Tournef.*

263. **C. sanguinea**, Linn. — *Virga sangu.*, Ruellius. — R: Ufer am Nesebanzer Strande. *Sassnitz. Stubnitz*.

14 115. **Coronaria**, *Linn.* (vor 1753.).

Vgl. unten bei *Lychnis*.

264. **C. Flos cuculi**, Al. Braun. — *Lychnis Fl. cuc.*, Linn. *Flos cuc. pratensis*, Tragus.

2 116. **Coronilla**, *Lobel. Linn.*

265. **C. varia**, Linn. — *Lassan*, häufig.

10 117. **Coronopus**, *Dodon. Rupp.*

Vgl. *Senebiera*.

266. **C. Ruellii**, Allion. Dodon. — *Cochlearia Cor.*, Linn. *Senebiera Cor.*, Poiret. — Hauptstengel verkürzt, blattlos, auf eine einzige, scheinbar wurzelständige Traube beschränkt; Nebenzweig niederliegend. — In der Ballastkiste, jetzt mit der Erde weggeführt. R: Grabler Fähre, selten.

2 118. **Corydalis**, *Custor Durantes. Dillen.*

267. **C. cava**, Schweigg. u. K. — *Fumaria bulbosa a. cava*, Linn. Spec. *Radix cava major*, Dodon. — H. Graben. *Anclam. Lassan: Bauerberg*.

β. semitomentosa, F. — Blättchen unterseits filzig, auf den Nerven kahl. — H. Graben, selten.

268. **C. intermedia**, Merat. — *Fum. bulb. β. intermedia*, Linn. Spec. *Coryd. fabacea*, Pers. *Fabacea radice Capnos altera*, Lobel. — Jenseits Stadtkoppel am H. Graben und an der Barther Landstrasse; Kl. Kordshagen, am Fusssteige nach Gr. Kädingshagen; am Pütter Teich. *Greifswald: Eldenaer Holz. Anclam. Lassan: Bauerberg*.

269. **C. pumila**, Host. — *Hiddense*.

270. **C. solida**, Smith. — *Fum. bulb. γ. solida*, Linn. Spec. *Aristolochia rotunda vulgaris radice solida*, Tragus. *Cor. digitata*, Pers. *Fumaria* —³ bracteis digitatis, Hall. — *Anclam*; es mag jedoch wohl die v. Art sein.

C. claviculata, Pers. — *Greifswald*.

58 119. **Corylus**, *Dalech. Tournef.*

271. **C. Avellana**, Linn. — Av. —, Fuchs. — H. Graben, Negast u. a. O.

78 120. **Corynephorus**, *Pal. Beauv.*

272. **C. canescens**, Beauv. — *Aira can.*, Linn. — Kugelfang u. a. v. a. O.

121. *Cracca*, (Ruellius.) Rivin.

273. *Cr. major*, Godron u. Grenier. Franken. — *Vicia Cracca*, Linn. *Cracca vulgaris*, Linn. Hort. ups. (gelegentlich).

274. *Cr. tenuifolia*, Godr. u. Gren. — *Vicia ten.*, Roth. — *Anclam*, Lissan.

275. *Cr. villosa*, Godr. u. Gren. — *Vicia vill.*, Roth. V. *Cracca* ♂, Linn. Fl. succ. nach Wahlenb. — Hier nur 2mal von mir gefunden.

122. *Crambe*, Tournef.

276. *Cr. maritima*, Linn. — *Brassica mar. monosperma*, C. Bauh. — *Rügen*. Nach Weigel häufig am Strande von Areona nach Varnkevitz; soll jetzt dort gänzlich verschwunden sein.

123. *Crataegus*, Anguillara. Linn.

277. *Cr. monogyna*, Jacq. — *Pennin. Anclam*. R: *Sassnitz. Viln.*

278. *Cr. Oxyacantha*, Linn. — *Ox. sive Spina acuta*, Dodon. — Ästchen. Blütenstiele und Kelchgrund kahl od. von kurzen Härchen flaumig. Griffel 1—4. — Auch mit hell-rosenrother Blumenkrone; am H. Graben.

124. *Crepis*, (Dalech.) Linn.

279. *Cr. hiemalis*, Linn. — Demmin: bei Stuterhof und vorn im Devenschen Holz: Vorwerk.

280. *Cr. paludosa*, Mönch. — *Hieracium paludosum*, Linn. — Am Knieper-Mühlengraben; Negast; Abtshagen, in Menge, u. a. O.

281. *Cr. tectorum*, Linn. — *Hieracium vulgare tect.*, minus, Linder.

β. *planifolia*, F. — Blätter sämtlich (noch bei der Fruchtzeit) flach, die mittleren und oberen oft breiter als gewöhnlich, lanzettförmig-lineal. — Bei Stadtkoppel u. a. O.

γ. *amblyphyllus*, F. — Mittlere Blätter mit stumpfem (nicht pfeilförmigem) bei kräftigeren Pflanzen oft halb-umfassendem Grunde sitzend, dabei übrigens oft wie die v. Var. — Nicht selten: bei Stadtkoppel, Langendorf, Negast.

282. *Cr. virens*, Villars. — *Cr. polymorpha*, Wallr.

α. *angustifolia*, F. — Stengelblätter lineal, ganzrandig od. lin u. wieder gezähnt. Grössere Form. — Kugelfang, Barther Landstrasse; Negast: Schonnung im Walde nach Pennin zu.

β. *media*, F. — Untere und mittlere Stengelblätter lanzettförmig, am Grunde verbreitert und buchtig-spitzgezähnt, um die Mitte ausgeschweift-gezähnt, oberwärts meist ganzrandig. Grössere Form. — Wegränder bei Voigdehagen, Teschenhagen, Devin u. a. O.

γ. *pinnatifida*, F. — Untere und mittlere Stengelblätter lanzettförmig, am Grunde sehr verbreitert (etwa 3-mal so breit) und tief-schmalbuchtig-fiederspaltig mit fast linealen, spitzen Zipfeln, oberwärts buchtig-gezähnt.

Grössere Form, in die v. Var. übergehend. — Negast, im Walde am Wege nach Pennin u. a. O.

δ. *amblyphyllus*, F. — Stengelblätter mit stumpfem (nicht pfeilförmigem) Grunde sitzend. Kleine Pflanzen, selten über 1 Spanne hoch. — Langendorf, Negast: auf sandigen Äckern.

125. *Cucubalus*, Hist. Lugd. Tournef.

283. *C. baccifer*, Linn. Spec. I. (später *C. hacciferus*). — *Alsine scandens baccifera*, C. Bauh. — R: *Jasund.*

126. *Cuscuta*, Fuchs. Tournef.

284. *C. Epithimum*, Weihe. — Auf Leinfeldern: Devin, Steinhagen.

285. *C. europaea*, Linn. — H. Graben (in Menge) u. a. O.

γ. *Epithimum*, Linn. Syst. XIII. — *C. europaea* β. *epithimum*, Linn. Spec. *Epithimum*, Matthiol. — Für das Gebiet sehr zweifelhaft.

127. *Cynoglossum*, Dodon. Tournef.

286. *C. officinale*, Linn. — *C. officinarum*, Louicr. — Knieperbleichen, Bartler Landstrasse, Franzenshöhe u. a. O.

128. *Cynosurus*, Linn.

287. *C. cristatus*, Linn. — *Gramen pratense cristatum*, C. Bauh.

129. *Cyperus*, Fuchs. Tournef.

288. *C. flavescens*, Linn. — *Gramen cyperoides* — panicula — subflavescente, C. Bauh. — Lissan: Buggenhagen.

R: *Schmale Heide.*

289. *C. fuscus*, Linn. — Lissan: Buggenhagen. R: *Gustower Torfmoor.*

130. *Cypripedium*, Linn.

290. *C. Calceolus*, Linn. — *Calc. marianus*, Dodon. — R: *Stubnitzufer.*

131. *Cystopteris*, Bernh.

291. *C. fragilis*, Bernh. — *Polypodium Filix fragilis*, Linn. Filix — cauliculis — fragili, Plukenet. — Elmenhorst: Kirchhofsmauer; Mauer am Wege von Brandshagen nach Niederhof. Demmin: in Vorwerk. R: *Stubnitz.*

132. *Dactylis*, Linn.

292. *D. glomerata*, Linn.

β. *viripara*, F.

133. *Datura*, Garzias. Linn.

293. *D. Stramonium*, Linn. — *Stram. spinosum*, Jo. Gerard. *Datura Turcarum*, Besler. *Persis et Turcis Datura*, Paludanus. *Tatula*, Camerar. *Tatoula* —, Bellon. — Vorstädte, nicht häufig. Demmin: Vorstadt, Vorwerk. Lissan: Vorwerk, Pulow. R: *Gustow.*

β. *chalybea*, Koch. — *D. Tatula*, Linn. Spec. II. — In Gärten bisw. verwildert.

X *Cracca* u. *Crataegus* 26.

X *Cracca* u. *Crataegus* 26.

134. *Daucus*, *Clusius*. *Tournef.*

294. *D. Carota*, Linn. — Car., Fuchs. — Knieperstrand, Barther Landstrasse u. a. O.

135. *Delphinium*, *Clusius*. *Tournef.*

295. *D. Consolida*, Linn. — Cons. regalis, Brunfels.

136. *Dentaria*, *Caesalp.* *Tournef.*

296. *D. bulbifera*, Linn. Lobel. — R: Stubnitz.

137. *Dianthus*, Linn.

Diosanthos, *Anguillara*.

297. *D. arenarius*, Linn. — Wolgast: Ziesenberg n. Ziesenmoor. *Lassan: Bugenhagen*.

298. *D. Armeria*, Linn. — Arn. —, Lobel. — Barth: alte Burg. *Greifswald. Anclam.*

299. *D. Carthusianorum*, Linn. — Barth: Schlossberg, Heide. Demmin. R: Putbus.

β. pallidus, F. — Kelch blass-grünlich; Blumenkrone röhlich-weiss. — Demmin, am Fusssteige nach der Gypsmühle, auf torfigem Boden.

300. *D. deltoides*, Linn. — Elmenhorst. *Tribsees. Greifswald. Lassan: Papenberg, Jamitzow. Anclam. R: Papenberg bei Gustow. Putbus.*

301. *D. prolifer*, Linn. — *Armeria prolifer*, Lobel. — *Greifswald: Hanshagen. Anclam. Demmin. R: Ufer am Nesebanzer Strande; Wampen. Schanzenberg an der Prora.*

302. *D. superbus*, Linn. — *Superba austriaca*, Lobel. — Niederhof. *Greifswald. Lassan: Bugenhagen. R: an der Gora.*

D. barbatus, Linn. — *Caryophyllus Carthusianorum*, Tabern. — An Hecken und Wegrändern bisw. verwildert.

138. *Diplotaxis*, *De Cand.*

303. *D. muralis*, *De C.* — *Sisymbrium murale*, Linn. Spec. II. — *Stralsund (?)*.

304. *D. tenuifolia*, *De C.* — *Sisymb. tenuifolium*, Linn. — Früher in der Ballastkiste nicht selten; jetzt mit der Erde weggeführt. *Greifswald.*

139. *Dipsacus*, *Dodon.* *Tournef.*

305. *D. silvester*, Mill. *Dodon.* — *D. fullonum*, Linn. mit Ausschl. der Var. β. *Carduus full. erraticus*, *Tragus.* — R: Binz, *Jasmund.*

Draba, *Dillen.* — *Vid. Erophila.*140. *Drosera*, Linn. (*Val. Cordus.*)

306. *Dr. intermedia*, Hayne. — Martensdorf: alte Torfgrube an der vormal. Heide neben dem Wege nach Gr. Zansbur. *Lassan: Moor bei Wangelkow. Anclam.*

307. *Dr. longifolia*, Linn. — *Dr. anglica*, Huds. *Ros solis folio oblongo*, C. Bauh. — Nach Linn. Fl. suec. nur durch die Blattform („vix sufficienter“) von der flg. verschieden: schwerlich kann er also die durch Wuchs und Samen deutlich unterschiedene *Dr. intermedia* hier mit verstanden haben. — Negaster Moor. *Greifswald.*

308. *Dr. rotundifolia*, Linn. — *Ros Solis folio rotundo*, C. Bauh. — Negast, Sandhagen, Voigdhäger Moor, Teschenhagen, Pütte, Martensdorf u. a. O.

141. *Echinoppermum*, *Sac.* — *Vid. Lappula.*141. *Echium*, *Dodon.* *Tournef.*

309. *E. vulgare*, Linn. *Clusius.* — Am Wege nach Devin u. a. v. a. O.

142. *Elsholtzia*, *Willd.*

310. *E. Patrini*, Gareke. — *Mentha Patrini*, *Lepechin.* *Elsh. cristata*, Willd. — In Gärten hie und da wie wild. Demmin: um die Gypsmühle. — Ist wohl in unseren Gegenden nirgends ursprünglich heimisch.

143. *Elymus*, (*Fuchs.*) Linn.

311. *E. arenarius*, Linn. — Parow, Devin u. a. O. R: Altenfähr, Drigge u. a. O.

312. *E. europaeus*, Linn. — Abtshagen, im diesseitigen Walde.

144. *Empetrum*, *Tournef.* (*Tragus.*)

313. *E. nigrum*, Linn. — *Erica baccifera procumbens nigra*, C. Bauh. — Negast. Barth. Dars. *Greifswald. R: Arcona, Spieker, Schmale Heide.*

145. *Epilobium*, *Gesner.* *Dillen.*

314. *E. alpinum*, Linn. β. nutans, Koch. — *E. nutans*, Tausch. *Chamaenerion alpinum*, Scheuchzer. — Einmal an der Kniepervorstadt von mir gefunden.

315. *E. angustifolium*, Linn. — *Lysimachia Chamaenerion dicta angustifolia*, C. Bauh. — II. Graben, im südlichsten Gebüsch der Westseite; Cummerow u. a. O. R: Stubnitz, Granitz.

316. *E. hirsutum*, Linn. mit Ausschl. der Var. β. — *Antoniana campestris hirsuta*, Gesner. — Barther Landstrasse u. a. v. a. O. Rügen.

317. *E. montanum*, Linn. — *Lysimachia montana* —, Rudbeck. — Voigdhäger Trift, Negast, Abtshagen, Bussiner Forst u. a. O.

β. verticillatum, Koch (Var. α.). — Zimkendorf, in der Waldecke Borgwall gegenüber (Dr. Tetschke).

γ. lanceolatum, Koch (Var. β.). — Abtshagen.

δ. minus, Wimm. u. Grab. (Var. β.). — Var. γ. collinum, Koch. *Epil. collinum*, Gmelin. — Wahrscheinlich heimisch: ich habe es ohne genauere Angabe des Fundorts erhalten. — Ausserdem ändert die Art noch ab mit grösseren und kleineren Blüten u. Kapseln, mit Blättern, deren mittlere am Grunde herzförmig, und mit solchen, welche unterseits bläulich-grün sind.

318. *E. palustre*, Linn. — Um die Teiche, am Knieper-Mühlengraben u. Vogelsang, Barther Landstrasse u. a. O.

319. *E. parviflorum*, Schreb. — *E. hirsutum* β. Linn. *Lysimachia* — *hirsuta parvo flore*, C. Bauh. — Am Kupfergraben, an der Herrenwiese u. a. v. a. O.

320. *E. roseum*, Schreb. — Schiffswerfte; Abtshagen.

321. *E. tetragonum*, Linn. — Graben am Wege von den Knieperbleichen zur Vogelstange. Demmin: Stülerhof, am Wege zur Kiebitzmühle.

146. *Epipactis*, *Camerar.* *Haller.*

322. *E. helleborine*, Crantz. — Helleb., Dodon. *Serapias latifolia*, Linn. Syst. XII.

α. *rubiginosa*, Crantz. — *E. latifolia* β. *rubiginosa*, Gaud. — *R:* Ufer der Granitz und Stubnitz. — Noch vor wenigen Jahren standen hier an der Chaussee von Andershof nach Brandshagen einige Pflanzen.

β. *varians*, Crantz. — *E. latifolia*, Allion. — Niederhof, Elmenhorst, Abtshagen, Pennin, Zimkendorf u. a. O. Demmin: Devensche Holz. Lassin: Waschower Park. *R:* Berger Holz, Stubnitz.

323. *E. palustris*, Crantz. — Helleborine angustifolia palustris s. pratensis, C. Bauh. *Serapias longifolia*, Linn. Syst. XII. — Negaster Moor; Lüßow. Lassin: Vorwerk. *R:* Binz.

147. *Epipogon*, *Gmelin.*

324. *E. Gmelini*, Rich. — *Satyrion Epipog.*, Linn. — *R:* Jasmund.

148. *Equisetum*, *Eur. Cordus. Tourn.*

325. *E. arvense*, Linn. C. Bauh. — *Hippuris arvensis* —, Tabern.

β. *memorosum*, Al. Braun. — Am Frankenteich; Gräben im Tribs. Felde; Negast, im Walde. — Eine etwas abweichende Form bei Parow, in den Kiefern jenseit der Aussenkoppel, und bei Abtshagen, im diesseitigen Walde neben der Chaussee.

326. *E. fluviatile*, Linn. — *E. Telmateia*, Ehrh. — Linn. führt seine Art nicht bloß als eine einheimische auf, sondern eignet sich auch (Mant. II.) Hallers Worte („*Caules floriferi a sterilibus distincti, ut E. arvensis.*“) an. Fast überflüssig scheint es, dem noch hinzuzufügen, dass Haller (hist. no. 1675.), nach Anführung der L.-schen Diagnose, eine Beschreibung giebt, welche keinen Zweifel übrig lässt. — *R:* in Schluchten der Stubnitz, stellenweise; am Fuss des hohen Lehmanns bei Sassnitz.

327. *E. hiemale*, Linn. — Ufer am Andershöfer u. Deviner Strande; Abtshagen. *R:* Stubnitz.

328. *E. limosum*, Linn.

329. *E. palustre*, Linn. Lobel.

330. *E. pratense*, Ehrh. — *E. umbrosum*, Meyer bei Willd. — Der Standort dieser am Str. sehr häufigen Art ist hier vorzugsweise Heideboden. Vom Anfang des Jun. an verzweigen sich die Äste sehr vieler sowohl fruchtbar als unfruchtbarer Stengel, und den erst im Sommer hervorkommenden (immer unfruchtbar.), vom Grunde aus ästigen, oft breit-pyramidenförmigen Stengeln fehlen die Ästchen vielleicht niemals. — Chaussee nach Brandshagen u. nach Cumberow; an den Wegen nach Devin, Gr. Kädingshagen u. Prolin; Heide bei Gr. Kä-

dingshagen; am Wege von Negast nach Pennin bei der Schonung. *R:* Stubnitz.

β. *memorale*, F. — Stengel sämtlich unfruchtbar, höher, unterwärts nackt. Äste länger, grasgrün, einfach od. später verästelt. — In Wäldern und etwas feuchten Gebüsch: Ufer am Strande nach Devin zu. Demmin: Devensche Holz.

331. *E. silvaticum*, Linn. Tabern. — Negast, Abtshagen u. a. O. *R:* Granitz, Stubnitz. — Auch an Wegen, Grabenrändern, kleiner.

β. *rigidulum*, F. — Äste gerade, wagrecht-abstehend. — Abtshagen im diesseitigen Walde am Ende des Seitenweges zu den Steinhäger Bauerhöfen.

149. *Eranthis*, *Salisb.*

332. *E. hiemalis*, Salisb. — Helleborus hiem., Linn. *Aconitum hiemale* —, Lobel. — Parow: auf dem Hofe am Abhang des alten Burggrabens.

150. *Erica*, *Dodon. Tournef.*

333. *E. Tetralix*, Linn. — *E. spuria* s. *Tetr.*, Rupp. — Negast, Zarendorf, Cumberow. *Greifswald. R:* zwischen Güngst u. Dreschwitz; *Schmale Heide, Schabe.*

151. *Erigeron*, *Eur. Cordus. Linn.*

334. *E. acer*, Linn. — *Conyza caerulea acris*, C. Bauh. — Dänholm, Barthler Landstrasse u. a. v. a. O.

335. *E. canadensis*, Linn. — *Conyza canadensis* —, Boccone. — Bei Wilke (1765.) noch gar nicht erwähnt u. vor etwa 90 Jahren bei uns kaum zu finden. — Dänholm, Frankenfeld, Chaussee nach Pantlitz. Demmin.

152. *Eriophorum*, *Dodon. (-on). Linn.*

336. *E. alpinum*, Linn. — *Juncus alpinus bombycinus*, C. Bauh. — Negaster Moor.

337. *E. polystachyon (-ion)*, Linn. Spec. und (mit Ausschl. der Varr.) Fl. succ. — *E. angustifolium*, Roth. *Gramen eriophoron*, Dodon. — Wiese neben dem Knieper-Mühlengraben u. am Strande nach Parow u. a. v. a. O.

β. *minus*, Koch. (als Var. γ. von *E. angustif.*, Roth.) — Östliche Wiesen am Voigdelhäger Moor.

γ. *strictum*, F. — Halm niedrig, steif-aufrecht. Ähren meist 4–6, doldig-gestellt, aufrecht: 1 od. 2 mittlere kurz-gestielt od. fast sitzend, die äusseren lang-gestielt mit steifen, geraden, aufrecht-abstehenden, fast gleichlangen Blütenstielen. — Gr. Kädingshagen: in den Wiesen neben der Heide.

δ. *ramosum*, F. — Halm von mittlerer Höhe, aufrecht, dick, unterwärts mit einem aufrechten, zerschneidigen, fast halb-stielrunden, etwas kürzeren Aste. Blätter länger u. breiter als bei der gemeinen Form. Ähren 10–20. — Negast, am süd. Rande des Laubwaldes, links vom Wege nach Pennin, selten.

338. *E. gracile*, Koch. — *E. polystachyon* γ. Linn. Fl. succ. — *Greifswald: Kiezhöfer Moor.* Lassin: Moor am Wege nach Pulaw; Wangelkow.

339. *E. latifolium*, Hoppe. — *E. polyst.* β. Linn. Fl.

succ. — Negast: Wiese am See; Sandhagen, in der Torfgrube am See; Niederhof.

340. *E. vaginatum*, Linn. — Negaster u. Voigdhäger Moor; alte Torfgrube vor Brandshagen. Lassau.

Erodium, L'Herit. — Vid. *Herodium*.

153. *Erophila*, De Caud.

341. *E. verna*, E. Meyer. — *Draba verna*, Linn. — In feuchten Jahren kommen u. blühen junge Pflanzen wieder im Spätsommer u. Herbst. — Kugelfang u. a. v. a. O.

154. *Errum*, Gesner. *Tournef.*

342. *E. cassubicum*, Peterm. — *Vicia cassubica*, Linn. *Vic. multiflora* Cass. — Plukenet. — Lüssow: Seeufer;

344. *E. silvaticum*, Peterm. — *Vicia silvatica*, Linn. Cracca silv. Rupp. — Trihsees: Plenniner Laubholz. Lassau: Buggenhausen. R: Ufer am Nesehanzer Strande; Papenberg bei Gustow. Gora. Schanzenberg an der Proxa.

343. *E. hirsutum*, Linn. — *Vicia* — cum siliquis — hirsutis, C. Bauh. — Blütenstiele 2—9blühig.

344. *E. silvaticum*, Peterm. — *Vicia silvatica*, Linn. Cracca silv. Rupp. — Trihsees: Plenniner Laubholz. Lassau: Buggenhausen. R: Stabnitz, an mehreren Stellen; Sassnitz.

345. *E. tetraspermum*, Linn. — *Deviner Anlagen*. Greifswald.

155. *Eryngium*, Dalech. *Tournef.*

346. *E. campestre*, Linn. — *E. camp. vulgare*, Clusius. — *Anclum*.

347. *E. maritimum*, Linn. C. Bauh. — Dänholm, Parower Haken; Hiddensee. Greifswald: Wampen, Ludwigsweg. R: Altenfähre, selten. Binz. Schabe.

E. planum, Linn. — R: Patbus, um den Park!

156. *Erysimum*, Dodon. *Tournef.*

348. *E. cheiranthoides*, Linn. — *Turritis Leucoid folio*, Tournef. — Bei sehr kräftigen Pflanzen sind die Samen in der Mitte od. in der ganzen Länge des Fachs zweizellig. — Vorstädte, Knieper- und Frankenfeld u. a. v. a. O. — Auf torfigem Boden und Sand klein (3—6" hoch) mit einfachem, 1 — wenigblühigem Stengel: Parower, Negast.

157. *Erythraea*, Renealm. (-i). Pers.

349. *E. Centaurium*, Pers. — *Gentiana Cent.*, Linn. (zum Theil) mit Ausschluss der Var. *E. Centaurium minus*, Fuchs. — Kugelfang, Negast, Chaussee nach Cummrow u. a. v. a. O.

350. *E. linariaefolia*, Pers. — *Gentiana linariaefolia*, Lamck. *Gent. Centaurium*, Linn. Fl. succ. mit Ausschl. der Var. *E. Cent.*, minus *maritimum angustifolium*, Celsins. — Greifswald. R: Wampen, in den Wiesen am Mühlen. Bergen: am Nonnensee, klein.

351. *E. pulchella*, Fries. — *Gentiana pulch.*, Swartz. *Gent. Centaurium* β . Linn. Spec. und Fl. succ. II. *Erythraea inaperta*, Willd. (aus unrichtiger Auffassung des *Centaurium*

palustre minimum flore inaperto, Vaill. bot. par. tab. 6. Fig. 2.) — Frankenweide, auf dem vormal. Kl. Paschenberg, um den Galgenberg, Negast, Gr. Kädingshagen, Kl. Darnitz: überall sehr vereinzelt. Greifswald: Wampen. R: Drigge, in den Wiesen am Mühlen, auch mit weisser Blumenkrone, sehr hündig; Bergen: am Nonnensee; am Wicker Rodden.

158. *Euonymus*, Dodon. *Tournef.*

352. *Eu. europaea*, Linn. — II. Graben, Barther Landstrasse u. a. O.

159. *Eupatorium*, Fuchs. *Tournef.*

353. *Eu. cannabinum*, Linn. Gesner. — *Hepatorium*, Simon Paulli. *Herba Setae Kunigundis*, Tragus. — II. Graben, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

Euphorbia, Linn. — Vid. *Tithymalus*.

160. *Euphrasia*, Fuchs. *Haller.*

Vgl. *Odontites*.

354. *Eu. officinalis*, Linn. — *Eu. officinarum*, C. Bauh. *Ophthalmica* s. *Ocularia*, Eur. Cordus.

1) Sämmtliche Blätter fast gleichförmig-gesägt: Sägezähne der oberen Blätter kurz-zugespidt, stachelspitzig. *a. pratensis*, Fries. — Stengel oberwärts nebst den oberen Blättern u. den Kelchen drüsig-behaart. Blumenkrone meist grösser, weiss, mit dem gelben Flecken der Unterlippe und den violetten Linien. — Diese fand ich hier nicht.

β . *alpestris*, Koch (Var. δ) — Stengel von gekrümmten, rückwärts-gerichteten, weisslichen, drüsenlosen Haaren flaumig. Blätter u. Kelche meist ganz kahl. — Hier von bei uns die kleinblühige Form (*Eu. micrantha*, Rehbch.) mit einfachem od. aufrecht-ästigem Stengel u. weisser Blumenkrone nebst der Zeichnung wie bei der var. *Var.* — Kugelfang, Zarrendorfer Heide u. a. O. Früher auf der vormal. Langendorfer Heide in Menge.

2) Obere Blätter tiefer-gesägt: die seitenständigen Sägezähne zugespitzt-pfriemenförmig-haarspitzig.

γ . *nemorosa*, Pers. (Var. β) nach Koch. — Behaarung wie bei β . Blumenkrone od. wenigstens die Oberlippe bläulich-rosch, selten weiss, mit dem gelben Flecken u. s. w. — Hier die gewöhnliche Form: auf trockneren Triften (z. B. an den Martensdorfer Tannen u. a. O.) und in den (auch feuchteren) Wiesen sehr häufig.

δ . *neglecta*, Wimm. u. Gr. (Var. β). — Blätter und Kelche von steifen, drüsenlosen Haaren kurzhaarig. Stengel wie bei β . behaart, aber die Haare dichter-stehend, fast gerade, dicker. Blumenkrone wie bei α , kleiner. — Selten: Steinhagen, auf der südlichen, zu den ausgebauten Höfen führenden Trift.

161. *Fagus*, Brunsfels. *Tournef.*

355. *F. silvatica*, Linn.

162. *Falcaria*, *Riv.*

356. **F. Rivini**, Host. — *Sium*. Falc., Lina. — Demmin: Stuterhof. *Anclam*. **R.**: Puthus.

163. *Farsetia*, *Turra* (1765.).

357. **F. incana**, R. Brown. — *Alyssum* incanum, Linn. Thlaspi inc. Meckliniense, Lobel. — *Greifswald*. Demmin, sehr häufig. *Anclam*. *Lassan*, häufig. **R.**: Rothenkirchen; *Lenzitz*; zwischen *Posewald* und *Zirkow*; auf *Jasmund* bei *Langen*.

164. *Festuca*, (*Dodon.*) *Dillen*.

358. **F. arundinacea**, Schreb. — *F. elatior* β . Linn. Spec. II. (?). Gramen arundinaceum —, Rajus. — Untere *Rispenäste* 5–50 Ähren tragend: Ähren (nach Koch) 4–5blüthig. — Am *Strande*, *H. Grahen* u. a. v. a. O. **R.**: *Strand* bei *Kl. Bandelwitz* u. a. O.

β . multiflora, F. — Ähren 6–10blüthig. Nicht selten: *Knieperstrand* u. a. O.

γ . stricta, F. — *Rispe* aufrecht: Äste abstechend, seltener wagerecht, meist kürzer und steifer als bei der gewöhnl. Form, sonst wie diese. — Am *Strande* hie u. da.

δ . triflora, F. — *Bromus* patentissimus, Weigel. Obs. bot. pag. 12. Ähren 2–4blüthig. Wuchs niedriger (1–3), schwächer. *Rispe* kleiner, aufrecht, meist abstechend; Ähren oft gefärbt. — Auf trockenerem und auf kiesigem Boden: *Kniepervorstäd*, an mehreren Stellen; *Knieperstrand*, *Kugelfang*; *Frankenstrand*, unfern des *Pulverhauses*.

359. **F. elatior**, Linn. — Gramen paniculatum elatius —, Vaill. — Die fgg. Varr. gehen durch Zwischenformen in die gewöhnl. Form über.

β . major, F. — Höher, kräftiger. Untere *Rispenäste* einzeln, mehr od. minder verzweigt, 5–20 Ähren tragend, oder zu 2, traubig, der kürzere mit 2–3, der längere mit 3–6 Ähren: die Ähren 5–15blüthig. — Auf fruchtbarem Boden: an der *Chaussee* nach *Pantlitz*; besonders neben *Pütze*, u. a. O.

γ . minor, F. — Niedriger, schwächer. *Rispe* aufrecht, traubig od. fast traubig: Äste meist einzeln, 1 Ähren tragend, oder eine und andre der untersten traubig mit 2–3 Ähren: die Ähren 2–10blüthig, oft gefärbt. — In *Sammlungen*, vielleicht auch in *Floren*, geht sie öfters unter dem Namen *F. loliacea*. — An trockeneren Orten, besonders auf *Kies* und *hartem*, unbebautem *Lehm*: *Erdgrube* an der *Chaussee* nach *Garbodenhagen*; *Wiese* am *Knieperstrande* jenseit des *Lootsensteins* u. a. O.

360. **F. gigantea**, Vill. — *Bromus* giganteus, Linn. — *H. Grahen*, *Andershöfer Strand* u. a. O. *Rügen*.

β . triflora, Koch. — *Bromus* triflorus, Linn. — Niedriger, schwächer. Blätter schmal. Ähren 2–5blüthig. — *Abtshagen*. *Niederhof*.

γ . stricta, F. — Niedriger. *Rispe* aufrecht: Äste aufrecht-abstechend, gerade, kürzer, meist mehr verzweigt

und reichlicher mit Ähren besetzt. — An sonnigen, feuchten Orten, *Grabenrändern*: um die nördl. *Stadtmauer* (jetzt vielleicht durch den *Siehlbau* ausgerottet) u. a. O.

F. loliacea, Huds. — Vid. *Lolium festuaceum*.

361. **F. ovina**, Linn. — Um *Str.* nicht eben häufig: *Frankenstrand*, *Devin* u. a. O.

β . duriuscula, Koch (Var. ϵ). — *Lassan*: *Vorstäd*. (Heinrich).

362. **F. rubra**, Linn. — Um *Str.* gemein, in zahlreichen, sämtlich — mit Ausnahme der letzten — auf hiesiger *Feldmark* vorkommenden Abänderungen, deren Eigenthümlichkeiten sich theilweise oft an einer u. derselben Pflanze vereinigt finden. — Die Ähren 2–10blüthig. — Mit weit-unherkriechender *Wurzel* und vereinzelten *Halmen* wächst sie nicht nur auf *Sandboden* (am *Kugelfang*), sondern auch auf nassem *Sumpfboden*, z. B. auf einer *Stelle* am *Ufer* des *Knieperstrandes* jenseit des *Lootsensteins*.

1) Nach der *Färbung* ist die Pflanze grasgrün od. blauschgrün oder gelblich-bleich, oder — sehr häufig — graublan, u. letztere besonders wird nach dem Verblühen an *Halm* und *Rispe* meist violett-roth; ausserdem: β . glaucescens, F. — Pflanze (blauschgrün) äusserst fein meergrün-herfellt. — *Frankenweide*.

2) Die *Wurzelblätter* sind kürzer (bisw. nur $\frac{1}{2}$ so lang als der *Halm*) oder länger, oft so lang od. länger als der *Halm*; ausserdem:

γ . setacea, F. — *Wurzelblätter* zusammengerollt-borstenförmig, stielrund. — Geht durch eine Zwischenform, deren *Wurzelblätter* am *Rücken* eine spitze Kante zeigen, in die fgg. Var. über.

δ . plicata, F. — *Wurzelblätter* einfach-zusammengefaltet, die älteren oft rinnig.

ϵ . planifolia, F. — *Wurzelblätter* flach (1), meist breiter, die jüngeren rinnig.

3) Die *Blattscheiden* sind entweder glatt und kahl, od. die unteren (die äusseren der unfruchtbaren *Blätterbüschel*, an denen diese Merkmale sich meist in noch stärkerem Grade zeigen) sind bekledet:

ζ . scabra, F. — Untere *Blattscheiden* von drüsenartigen Knötchen und sehr kurzen *Borstchen* rauh.

η . pubescens, F. — Untere *Blattscheiden* von kurzen, abstehenden *Haaren* flaumig.

θ . hirsuta, F. — Untere *Blattscheiden* von längeren, weit-abstehenden, weichen *Haaren* grau, fast zottig; auch die *Blätter* unterwärts meist zerstreut-behaart.

4) Die untere *Spelze* ist entweder glatt oder rauh, oft auch am *Rande* und an der *Spitze* etwas flaumig; ausserdem:

ι . villosa, Koch (Var. β). — *F. dumetorum*, Linn. (?) — Ähren, mit Ausnahme der *Balgklappen*, überall zottig-kurzhaarig.

«. arenaria, Fries (Var. β . Bei Koch Var. γ .) — Ährchen wollig-zottig, grösser und auch kleiner. — Wahrscheinlich auf dem Zingst und auch wohl auf Rügen. (Ich fand sie noch nicht. — Auf Usedom am Strelkeberg.)
363. **F. silvatica**, Vill. — Abtshagen, im diesseitigen Walde neben der Chaussee: die Ährchen dort 2—4 blüthig.

165. Ficaria, Brunsfels. Dillen.

364. **F. ramunculoides**, Münch. — Ramunculus Fic., Linn. — Vorstädte u. a. v. a. O.

35. 166. Filago, Dodon. Vail.

365. **F. arvensis**, Linn. Spec. I. add. u. append. und später. — Gnaphalium arvense, Linn. Spec. I. im Text. — Barther Landstrasse, Gr. Kädingshagen, Dänholm u. a. O.
366. **F. germanica**, Linn. Spec. II. nicht Syst. X. — F. pyramidata, Linn. Fl. suec. II. (nicht Spec. I. append. Spec. II. u. Syst. XII.). — Gnaphalium germanicum, Linn. Spec. I. J. Bauh. — Langendorf, Negast, Niederhof u. a. O.

367. **F. montana**, Linn. Spec. I. add. und später. — Gnaphalium montanum, Linn. Spec. I. im Text. Filago minima, Fries. — Mir scheint der L.'sche Name nicht zu bezweifeln: Haller (hist. no. 155.) beschreibt unsere Art sehr deutlich und führt „Gnaphalium minimum, Lobel“ an; dasselbe Cit. hat Linn. und bezeichnet als Standort sandige und bergige Orte Europas ohne irgend eine Beschränkung (sein Cit. aus Haller konnte ich nicht nachsehen, da mir nur dessen hist. zur Hand ist). Weigel (Fl. und Magazin III. 2. pg. 77.) hat ebenfalls F. montana als heimische Pflanze; und endlich konnte Linn. fast unmöglich diese nicht kennen oder sie verwechseln. — Devin, Zarenndorf, Sandhagen, Negast, Gr. und Kl. Kädingshagen u. a. O.

β . denudata, F. — Angedriekt-dünnsitzig, fast grün, oder der (immer schlankere, weniger ästige) Stengel schwach-spinnwebig, ein wenig zottig. Köpfchen meist einzeln, fast kahl. — An grasigen, etwas feuchten Orten, in wasserleeren Gräben: um Sandhagen.

24. 167. Fragaria, Brunsfels. Tournef.

368. **Fr. collina**, Ehrh. — Anclam. Lissan: Buggenhagen.

369. **Fr. elatior**, Ehrh. — Gehölz zur Rechten des Weges von Gr. Kädingshagen nach Neu-Preetz, unsern der Scheide.

370. **Fr. vesca**, Linn. — Barther Landstrasse, Ufer am Strande u. a. v. a. O.

44. 168. Fraxinus, Brunsfels. Tournef.

371. **Fr. excelsior**, Linn. C. Bauh. — In den Vorstädten, angepflanzt und aus Samen aufwachsend. **R:** Granitz, Stubnitz.

169. Fumaria, Fuchs. Rivin.

372. F. officinalis, Linn. — F. officinarum, C. Bauh. a. vulgaris, Koch.

β . minor, Koch.

γ . floribunda, Koch. — Diese fand ich nicht.

F. capreolata, Linn. — In Gärten bisw. wie Unkraut.

170. Gagea, Salisb.

373. **G. arvensis**, Schult. — Ufer am Knieperstrande nach Parow zu. Bis vor wenigen Jahren auch an der Voigdeläger Trift. Anclam.

374. **G. minima**, Schult. — Ornithogalum minimum, Linn. — Greifswald: Hanshagen u. a. O. Anclam. **R:** Putbus, im Park.

375. **G. pratensis**, Schult. — G. stenopetala, Rehbch. Ornithogalum pratense, Pers. — Um Str. sehr häufig: Kniepervorstadt, Ufer am Knieperstrande, an den Chausseen: Devin (am See, grossblüthig) u. a. O. Lissan: Vorwerk. β . secunda, F. — G. prat. γ . Schult. G. stenopetala β .

pratensis, Koch. — Mit der Hauptform: Ufer am Knieperstrande: Deich längs der Kupferwiese; Tribis. Feld u. a. O.

376. **G. silvatica**, London. — G. lutea, Schult. Ornithogalum silvaticum, Pers. — Orn. luteum, Linn. ist schwerlich eine Art, sondern ein Collectiv-Name ohne Unterscheidung von Varr. — H. Graben, Barther Landstrasse, Parower Park u. a. O. Lissan: Putbus.

377. **G. spathacea**, Schult. — Parower Park: Kädingshagen; um Voigdelhagen; Pennin, in der Waldecke nahe zur Rechten des Wegs nach Zinkendorf. **R:** Putbus.

Galanthus nivalis, Linn. — An Hecken und in Gehäusen in der Nähe von Wohnörtern: oft mit gefüllter Blüthe!

52. 171. Galeobdolon, Dillen. (Fuchs.)

378. **G. luteum**, Hud. Galeopsis Galeobd., Linn. Galeopsis flore luteo, Camerar. — Parower Park, Negast u. a. v. a. O. Lissan: Bauerberg.

52. 172. Galeopsis, Linn.

Von Eur. Cordus bis Rivin, diente dieser Name fast allgemein für Lamium, Linn.

379. **G. bifida**, Bönningh. — Voigdelhagen, Gr. Kädingshagen.

380. **G. pubescens**, Roth. — **R:** Putbus.

381. **G. ladanum**, Linn. — Lad. segetum, J. Bauh.

a. latifolia, Wimm. u. Gr. — Kugelfang, Langendorf, Negast, Zitterpenningshagen, Devin u. a. O. Wahrscheinlich auch bei Lissan: Clotzon.

382. **G. Tetrabit**, Linn. mit Ausschl. der Var. β . — Tetr. herbariorum, Lobel. ist Sideritis hirsuta, Linn.

β . albiflora, F. — Kleiner, schwächer. Blumenkrone weiss, gleichfarbig. — Denmin: Devensche Holz, auf den Höhen rechts vom Seimenwege nach Devin. — Ist weiter zu beobachten.

383. **G. versicolor**, Curt. — G. Tetrabit β . Linn. Spec. — Franken- und Tribis. Feld, Niederhof, Pantlitz u. a. O. — Mit bleicher Unterlippe ohne den violetten Flecken fand

ich eine Pflanze unter hundert den gewöhnl. Färbung bei Gr. Kädingshagen.

32. 173. *Galium. Lacuna. Linn. L.*

Die meisten älteren Botaniker haben Galium und Galion, Eur. Cordus zuerst Galion.

384. *G. Aparine*, Linn. — Aparine, Brunfels.

β. agreste Wallr. (als Art). — Franken- und Knieperfeld, ziemlich selten: nur die Form mit hakig-steifhaarigen Früchten.

385. *G. boreale*, Linn. — Negast, in den jungen Kiefern am westl. Rande der vormal. Heide. Barth: Saatelsche Moor. Tribsees: Plenniner Laubholz. Demmin.

386. *G. Cruciata*, Scop. — Valantia Crac., Linn. Cruciata, Dodon. — Greifswald: Kl. Zastrow. Anclam.

387. *G. Mollug*, Linn. — Moll. prima, Dodon.

388. *G. palustre*, Linn. — Gallion pal., Dodon.

β. glabrum, F. — Meist höher. Kraut kahl u. glatt. Blätter meist 5—6ständig. — Sehr häufig.

389. *G. saxatile*, Linn. — Gallium sax. —, Juss. — Sehr zersert: Negast, Sandhagen, Zarrendorf, Voigdhagen, Devin. Rügen.

390. *G. silvaticum*, Linn. — Rubia silvatica, Gesner. — R: an der Gora; Stubnitz.

391. *G. uliginosum*, Linn. — Wiese am Frankenteich neben dem Wege nach Knöchelsöhrn; Voigdhäger Moor, Sandhagen, Negast u. a. v. a. O. — Wird bis 3' lang.

392. *G. verum*, Linn. — Galion ver., J. Bauh.

18. 174. *Genista*, Dodon. Linn.

393. *G. pilosa*, Linn. — R: Schmale Heide.

394. *G. tinctoria*, Linn. — Tinctorius flos, Fuchs. — Negast, Abtshagen, Martensdorf. Demmin. Lassar. Rügen.

45. 175. *Gentiana*, Brunfels. Tournef.

395. *G. Amarella*, Linn. Früher hier auf der vormal. Knieperweide. An der Peene. R: Garwitz.

396. *G. campestris*, Linn. — Amarella, Franken. — Früher hier nicht selten; jetzt durch Urbarmachung der Standörter wohl ganz verdrängt. Greifswald. R: Garwitz, Granitz, Schanzenberg an der Prora, Sassnitz.

397. *G. Cruciata*, Linn. C. Bauh. — Cruciata, Fuchs. — R: Garz (wenigstens in früherer Zeit).

398. *G. Pneumonanthe*, Linn. — Pn., Lobel. — Negast, Martensdorf, Cummow. R: Gingst.

17. 176. *Geranium*, Fuchs. Tournef.

399. *G. columbinum*, Linn. Tabern. — Pes columbinus, Dodon. — Ufer am Knieperstrande nach Parow zu; Devin; am Abfluss des Pülter Teiches auf der Nordseite der Chaussee u. a. O. Greifswald. Demmin.

400. *G. dissectum*, Linn. — Am Kniepertheich; Chaussee von Steinhagen nach Abtshagen. Demmin. Greifswald. Anclam.

401. *G. molle*, Linn. — ♂ u. ♀. — Wälle, Vorstädte u. a. O.

402. *G. palustre*, Linn. — Seeufer bei Lüssow, häufig; Cummowische Ziegelei. Demmin: im Devenischen Holz u. bei Vorwerk häufig.

403. *G. pusillum*, Linn. — ♂ u. ♀. Stengel 3—30" lang, bisw. aufrecht, unterwärts einfach. 4—6" hoch über dem Boden quirlig-ästig, wie es oft (z. B. im diesseit. Walde bei Abtshagen) auch bei der flg. Art der Fall ist.

404. *G. Robertianum*, Linn. Ruellius. — Herba Ruperti —, Hist. Lugd. — Parower Aussenkoppel, Ufer am Strande nach Devin u. a. v. a. O.

β. albidiflorum, F. — Blumenkrone weiss. — Abtshagen im diesseitigen Walde.

405. *G. sanguineum*, Linn. C. Bauh. — Sanguinaria radix —, Tragus. — Greifswald. Anclam. R: Granitz: Thiessow.

406. *G. silvaticum*, Linn. — Greifswald: Kl. Zastrow. Tribsees: Stadtholz. R: Gr. Medars, Stubnitz.

23. 177. *Geum*, Conr. Gesner. Linn.

407. *G. intermedium*, Ehrh. — Caryophyllata silvestris, Fuchs. — H. Graben; Zimkendorf; Waldecke. Borgwall gegenüber. R: Güstetitzer Holz. — Vielleicht Bastard der flgg. Arten.

408. *G. rivale*, Linn. Gesner. Caryophyllata aquatica und palustris, Camerar. Benedicta silvestris, Tragus. — Herrenwiese bei Stadtkoppel, Chaussee nach Negast u. a. v. a. O. — Mit aufrechten, grösseren Blüten, eingeschnittenen Kelchzipfeln u. oft mehr als 5 Kronblättern (monströse Form) bei Zimkendorf; Waldecke, Borgwall gegenüber.

β. virescens, F. — Kelch grünlich; Blumenkrone weisslich-grünlich. — Abtshagen, an der Chaussee im diesseitigen Walde, selten.

409. *G. urbanum*, Linn. — G. urb. und Benedicta, Gesner. Caryophyllata hortensis, Fuchs. — Vorstädte, H. Graben u. a. O.

54. 178. *Glaux*, Dodon. Tournef.

Sonst auch von Pflanzen aus Class. XVII. 4. Linn.

410. *Gl. maritima*, Linn. C. Bauh. — Gl. exigua mar., Lobel. — Strand, Frankenweide, Tribs. Feld u. a. O. Lassar: Bauerberg. Rügen.

57. 179. *Glechoma*, Linn. (seit 1753.).

Glechoma, Linn. früher.

411. *Gl. hederaceum*, Linn. — Hedera terrestris, Brunfels. — Wälle, Vorstädte, Strand u. a. v. a. O.

β. hirtum, F. — Blätter von dicht-stehenden, kurzen, steiferen Haaren graugrün. — Frankenwall, Tribs. Vorstadt.

γ. parviflorum, F. — Kleiner; auch die Blüten kleiner, aber nicht die gewöhl. Form mit kürzerer Kronröhre: Blumenkrone viel kleiner; Staubgefässe kürzer als die Kronröhre, unfruchtbar od. verkümmert. — Ufer am Knieperstrande; Voigdhäger Trift; Pennin, am südlichen Eingange.

x 388. 179. 34

412. *G. hirsutum*, W. u. Kit. — Hederae terrestri species montana, Camerar. (?) Priore hirsutior est, foliis majoribus —, C. Bauh. — Im Garten der Herren Ziegler u. Krämer, nicht angepflanzt.

180. *Glyceria*, R. Brown.

413. *G. aquatica*, Wahlenbg. — *G. spectabilis*, M. u. Koch. Poa aqu., Linn. Gramen majus aquaticum, Lobel. — An den Teichen u. a. O.

G. aquatica, Presl. — *Vid. Molinia aqu.*, Wibel.

414. *G. distans*, Wahlenbg. — Poa dist. („flosculis distantibus“), Linn. — Frankenweide, Strand, Tribs. Feld u. a. O. **R:** am Wampen u. a. O.

415. *G. festucaeformis*, Heynhold (bei Rehbe.). — An der alten Schiffswerfte, mehrere üppig gedeihende Pflanzen; seit einigen Jahren mit Planken belegt.

416. *G. fluitans*, R. Brown. — Festuca fl., Linn. Gramen — aquaticum s. fluitans, Jo. Gerard. — Knieperstrand, Schlachterweide u. a. v. a. O.

417. *G. maritima*, M. u. Koch. — Ähren bis 10-blüthig. Die längeren Rispenäste nach dem Verblühen absehnend od. wagrecht ausgebreitet od. herabgeschlagen. — Strand bei der Reiferbahn, Frankenweide; Hildensee. **R:** Wampen, in der südl. Wiese nach dem Anger zu.

G. plicata, Fries — fand ich nicht.

181. *Gnaphalium*, Eur. Cordus. Vaill.

418. *Gn. dioicum*, Linn. — Parower Aussenkoppel; Heide bei Gr. Kädingshagen; Voigdhäger Moor u. a. O. Lassar: Weide. **R:** Wampen u. a. O.

419. *Gn. luteo-album*, Linn. — Bei Sandhagen am See; selten und klein.

420. *Gn. silvaticum*, Linn. — Arendsee, Neu-Zarrendorf; Abtshagen u. a. O. **R:** Putbus. — Ändert ab mit unterwärts ästigem Stengel (Negast; selten) und mit unterwärts od. oberwärts rispigem Blüthenstande (Deviner Anlagen).

182. *Goodyera*, R. Brown.

421. *G. repens*, R. Br. — *Satyrion r.*, Linn. Orchis minor radice repente, Camerar. — Demmin: erste Kiefern bei Vorwerk an der Chaussee nach Treptow. **R:** Ahlbecker Kiefern, Granitz.

Gratiola officinalis, Linn. — Nach Weigel hier an 2 Orten; jetzt verschwunden.

183. *Gymnadenia*, R. Brown.

422. *G. conopsea*, R. Br. — *Orchis c.*, Linn. Cynosorchis c., Lobel. — Greifswald: Hohenmühl, Hiarichshagen. Grimmen: an der Trehel bei Vorland. **R:** Stubnitz.

184. *Gypsophita*, Linn.

423. *G. muralis*, Linn. — *Caryophyllis minimus mur.*, C. Bauh. — Beim Lüdershäger Ellerholz (Billich).

Halianthus, Fries. — *Vid. Honkeneya*.

185. *Halimolus*, Clusius. Wallroth.

424. *H. pedunculatus*, Wallr. — *Atriplex pedunculata*, Linn. *Art. maritima* — folliculis — longo pediculo insidentibus, Plukenet. — Greifswald. **R:** Drigge, Wiesen am Mühlen, häufig.

186. *Hedera*, Dalech. Tournef.

425. *H. Helix*, Linn. Dalech. — *H. Graben* u. Andershöfer Strand: kriechend, klein; Negast, Abtshagen u. a. O. Lassar: Bauerberg. **R:** Granitz, Stubnitz.

187. *Heleocharis*, R. Brown.

426. *H. acicularis*, R. Br. — *Scirpus ac.*, Linn. — Andershöfer u. Voigdhäger Teich; Borgwallsee bei Negast u. Lüssow. Lassar: Weide.

427. *H. palustris*, R. Br. — *Scirpus pal.*, Linn.

428. *H. pauciflora*, Link. — *Scirpus pauciflorus*, Lightf. — Ist kein *Scirpus* der verbreiterte, 3kantige, auf der Innenseite rinnige, erhartende, bleibende Griffelgrund ist durch ein nicht eingeschnürtes, kaum siehtbares Gelenk mit der Frucht verbunden, durch einen Seitendruck leicht abzutrennen. — Am Krummhäger See bei Sandhagen und Negast: Kl. Kordshagen in der Wiese am Fuchssteige nach Gr. Kädingshagen; Neu-Pretz in der Wiese neben dem Gehölz unfern der Gr. Kädingshäger Scheide.

429. *H. unguiculis*, Link. — Kl. Paschenberg, Allee an der Herrenwiese; Strand am Parower Haken u. bei Niederhof, u. a. O. Lassar: Wiese bei Wasehow. Rügen. **R:** pallsen, F. — Ähre weisslich, mit bleichen Deckschuppen. — **R:** Wampen, in der Wiese am Mühlen, mit der gewöhnl. Form.

188. *Helianthemum*, Val. Cord. Tournef.

430. *H. vulgare*, Gärtl. J. Bauh. — *Cistus Hel.*, Linn. — Demmin: bei den Kiefern und der Gypsmühle.

189. *Helichrysum*, Lonicer. Vaill.

431. *H. arenarium*, De C. — *Gnaphalium ar.*, Linn. — Die Var. *β. aurantiacum* (Pers.) ist keine: eitrngelbe und rothgelbe Köpfchen finden sich oft auf einem Stengel. — Dänholm, Kugelfang, Heide bei Gr. Kädingshagen, Parower Strand, Devin u. a. O. **R:** Wampen.

190. *Hepatica*, Brunfels. Rupp.

432. *H. triloba*, Chaix. — *Anemone Hep.* (foliis trilobis“), Linn. *Hep. trifolia*, Clusius. — Negast, Abtshagen. Demmin: Devensche Holz, häufig. Lassar: Bauerberg. **R:** Prosnitz, Granitz, Stubnitz.

191. *Heracleum*, (Dodon.) Linn.

433. *H. Sphondylium*, Linn. — *Sphond. vulgare*, Dod. **R:** glabrum, F. — Ganz kahl und glatt. — Demmin: Devensche Holz, mit der gemeinen Form, nicht häufig.

192. *Herminium*, Linn. R. Brown.

434. *H. Monorchis*, R. Br. — *Hermin.*, Linn. Fl. lapp. u. Fl. suec. I. Ophrys Mon., Linn. Spec. Monorchis, Christ. Mentzel. *Satyrus species* — *monorchis* —, Gesner. — **R:**

Tribratz; am Sagardschen Bach; zwischen Bobbin und Camp.

21. **193. *Herniaria*, Dodon. Tournef.**

435. **H. glabra**, Linn. J. Bauh. — Kugelflang, Parow, Dänholm, Deviner Ort u. a. O. **R:** Gustow n. a. O.

194. ***Herodium*, L'Herit.**

Wer *Heleocharis* u. s. w. schreibt, wird auch hier das **H** annehmen müssen.

436. **H. cicutarium**, L'Herit. — *Geranium cicut.* Linn. Ger. *cicutae* folio —, C. Bauh. — ☉ u. ♂. Kommt auch aufrecht vor.

β. *maculatum*, Koch. — Häufig.

437. ***Hesperis matronalis***, Linn. — (*H. inodora*, Linn. Spec. II.) Vervildert.

195. ***Hieracium*, Fuchs. Tournef.**

437. **H. Auricul.** Linn. — *Aur. muris minor*, Frauenk. — Voigdeläger Moor; an der Chaussee nach Abtshagen u. bei Grünhufe. *Lassan: am Wege nach Waschow.* **R:** Ralswiek.

β. *polyccephalum*, F. — Stengel 6–12köpfig, meist höher. — Abtshagen, im diesseitigen Walde.

γ. *villosum*, F. — Hüllkelch ausser der gewöhnl. Behaarung von längeren, ziemlich steifen, drüsenlosen, weisslich-grauen, am Grunde schwärzlichen Haaren etwas zottig; der Stengel oberwärts oft mit ähnlichen, längeren Haaren zerstreut-besetzt, meist 2köpfig, bisw. mit verlängerten ($1\frac{1}{4}$ – $2\frac{1}{2}$ lang), aufrechten Blütenstielen. Das Kraut gelblich-meergrün. — Abtshagen, auf einer Stelle an der Ostseite der Chaussee im diesseitigen Walde.

438. **H. boreale**, Fries. — *H. sabaudum*, Linn. Fl. succ. nach Wahlenbg. — *H. Graben*, Chaussee nach Brandshagen, Ufer am Andershöfer Strande, Barther Landstrasse, Seenufer bei Lüßow u. a. v. a. O. — Der Stengel oft an der Spitze doldig-ästig. — Nicht selten (Ufer am Andershöf. Strande, Parower Aussenkoppel, Martensdorf bei den Kiefern) ist eine Mittelform zwischen dieser Art und dem *H. rigidum* mit hellerem Hüllkelch und am Rande (auch getrocknet) bleichen Blättchen desselben.

β. *patulum*, F. — Mittlere Blättchen des Hüllkelchs aufrecht- od. zurückgebogen-abstehend. — Keine eigentlicher Var. nach Koch.

439. **H. dubium**, Linn. Spec. u. Fl. succ. — *H. colubinum*, Gochnat. *H. pratense*, Tausch nach Koch. — *Greifswald: Hohennüßl. Ancken.*

440. **H. murorum**, Linn. Spec. mit Ausschl. der Var. γ. — Tribsees: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensche Holz. **R:** Berger Holz.

β. *salvaticum*, Linn. — Demmin: Devensche Holz.

441. **H. Pileosella**, Linn. — *Pil. major*, Fuchs. — Frankenweide, Strand, Wegränder u. a. v. a. O. — Der Purpurstreifen der randst. Blüthen ist oft verbleicht, kaum rötlich:

β. *concolor*, F. — Blumenkrone der Randblüthen beiderseits gelb, aussen kaum blasser, aber ohne einen verbleichten Streifen. — Selten: an der Chaussee nach Pütte; im diesseitigen Abtshäger Walde.

442. **H. rigidum**, Harlm. — Niederhof, Negast, Abtshagen, Bussin u. a. O. — Der Stengel nicht selten an der Spitze doldig-ästig.

443. **H. Rothianum**, Wallr. — *H. echinoides*, W. u. Kit. (?) Lamm. (?) — *Aetna.*

444. **H. umbellatum**, Linn. — Devin, Lüßow, Negast, Martensdorf u. a. v. a. O. Demmin. Rügen. — Der Stengel kommt nicht nur (niedrig) auch 1köpfig vor, sondern auch (höher) nicht selten an der Spitze in zerstreut-stehende Äste zertheilt, nicht doldig. Die Achänen sind merklich kleiner als an den beiden nächstverwandten Arten.

β. *coronopifolium*, Koch. — Ufer am Andershöfer Strande n. a. O.

445. **H. vulgatum**, Fries. — *H. murorum* γ. Linn. Spec. (?) vielleicht; aber nicht Fl. succ. II.). — Parower Aussenkoppel; Ufer am Andershöfer Strande; Abtshagen, Zimkenhof. Tribsees: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensche Holz.

196. ***Hieracium* (-cloë), Gmelin.**

446. **H. odorata**, Wahlenbg. — *Holcus odoratus*, Linn. *Gramen paniculatum odoratum*, C. Bauh. — Am Strande nach Devin zu, zieml. spärlich. *Greifswald.*

197. ***Hippochaë*, Columna. Linn.**

447. **H. Rhamnoides**, Linn. — *Rhamn. florifera* salicis folio, Tourn. — Hiddensee. **R:** Wittow, Stubnitz, Thiersow, Granitz.

198. ***Hippuris*, Linn.**

Bei Brunfels u. A. s. v. a. *Equisetum*.

448. **H. vulgaris**, Linn. — Knieper-Mühlengraben, Andershöfer Teich, Borgwalsee, Prolner Trift u. a. O.

β. *coenosa*, F. — Bis fusshoch, mit den Blättern des hervorgetauchten Theils der gewöhnl. Pflanze, fruchtbar u. unfruchtbar. — Auf feuchten, im Winter mit Wasser bedeckten Ufern: Borgwalsee bei Negast und bei Langendorf; zufällig, aus ausgeworfener Wurzel, am Knieper-Mühlengraben.

199. ***Holcus*, (Anguillaria.) Linn.**

449. **H. lanatus**, Linn. — *Gramen lanatum*, Dalech. — Kupferwiese u. a. v. a. O.

450. **H. mollis**, Linn. — *Gramen paniculatum molle* —, Morisou. — Ufer am Andershöfer Strande; Negast, Sandhagen. *Lassan: Weide.*

200. ***Holostium*, Tabern. Dillen.**

451. **H. umbellatum**, Linn. — *Caryophyllus* — *umbellatus* —, C. Bauh. — Deich längs der Kupferwiese, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

15. 201. *Honkeneya*, Ehrhart.

„Gerh. Aug. Honkeney“! Also nicht Honkenya.

452. *H. pepioides*, Ehrh. — *Arenaria* pepl., Linn. *Hianthus* pepl., Fries. — Am Strande nach Devin u. bei Kl. Damitz, Greifswald; *Wampen*. *Lassan: an der Peene beim Bauerberg*. **R:** Altenfähr, am nördl. Strande; Grahler Strand u. a. O.

202. *Hordeum*, Brunnfels. Tournef.

453. *H. murinum*, Linn. *Caesalpin.* — *H. s. triticum* mur., Dodon. — Vorstädte u. a. O.

454. *H. secalinum*, Schreb. — *H. murinum* β . Linn. Spec. *H. pratense*, Huds. (Linn. It. scan.!) mit einer genauen Beschreibung). *Gramen spicatum secalium minus*, Scheuchz. *Nicht H. nodosum*, Linn. Spec. II. — **R:** Wampen, am Rande des Angers längs der Wiese.

H. maritimum, Wither. — Für Greifswald und Rügen angegeben — ist ohne Zweifel die v. Art.

54. 203. *Hottonia*, Boerhave.

455. *H. palustris*, Linn. — *Viola* pal. Hist. Lugd. — Tribs. Feld, Gr. Kädingshagen, Abtshagen u. a. O. *Lassan.*

58. 204. *Humulus*, Fuchs. Linn.

456. *H. lupulus*, Linn. — *Lupulus officinis*, vulgo *Humulus*, Fuchs. — H. Graben, Barthler Landstrasse, Parow, Abtshagen u. a. O.

61. 205. *Hydrocharis*, Linn.

457. *H. Morsus ranae*, Linn. — *Mors. r.*, Dodon. — Knieper-Mühlengraben u. a. v. a. O.

2. 206. *Hydrocotyle*, Tournef.

458. *H. vulgaris*, Linn. — *Cotyledon aquatica*, Lobel. — Die Blüthen stehen entweder kopfig (zu 3–7), oder (zahlreicher) kopfig-quirlig, oder (bis 21) quirlig-traubig, jede mit einem Deckblättchen geschützt. — Wiesen am Vogelsang, Parower Aussenkoppel, Langendorfer und Deviner Torfmoor, Negast, Martensdorf u. a. v. a. O. — In Torfgruben findet sie sich mit verlängertem, wasserrecht-untergetauchtem Stengel und schwimmenden Blättern, trägt dann aber keine Blüthen.

47. 207. *Hyoscyamus*, Brunnfels. Tournef.

459. *H. niger*, Linn. Dodon. — Wälle u. Vorstädte, Strahlenhof, Gr. Kädingshagen, Parower Strand. **R:** Strand bei Altenfähr und an der Wamper Wick.

16. 208. *Hypericum*, Fuchs. Tournef.

460. *H. hirsutum*, Linn. — *Androsaceum alterum* hirs., Column. — *Anclam.*

461. *H. humifusum*, Linn. — *H. — supinum —*, Lobel. — Töschenhagen; Sandhagen, am Wege nach Lüssow u. nach Seemühl; Negast, Nen-Preetz, Prohn. Demmin: Devensche Holz. *Lassan: Jasedow*. **R:** Drigge, Putbus.

462. *H. montanum*, Linn. Fl. succ. II. Spec. II. — *H. hirsutum* u. Linn. Spec. I. — Niederhof; Park. Trib-

sees; Plenniner Laubholz. Demmin: Devensche Holz. *Lassan: Pinnow, Bauer*. **R:** Stubnitz.

463. *H. perforatum*, Linn. — *Herba perforata* et *Hyp. vulgare*, Tragus. — Wegränder u. s. w.

464. *H. quadrangulum*, Linn. — *Hyperici minor* species caule quadrangulo foliis non perforatis, C. Bauh. — Deviner Anlagen; Gr. Kädingshagen: am Wege nach Grünhufe; Negast u. a. O.

465. *H. tetrapterum*, Fries. — Am Kupfergraben; bei Stadtkoppel u. a. v. a. O.

36. 209. *Hypochaeris*, Tabern. Vaill.

Hypochaeris, seltner *Hypochoeris*, Linn.

466. *H. glabra*, Linn. — *Hieracium* — folio — glabro, C. Bauh. — Kl. Kädingshagen, Parow, Devin, Zitterpenningshagen, Wendorf, Sandhagen, Seemühl, Negast, Lüssow, Langendorf, Martensdorf. **R:** Altenfähr, Ne-sebanz.

467. *H. maculata*, Linn. — *Trihsees*: Plenniner Laubholz. (*Auf Usedom an mehreren Orten*.)

468. *H. radicata*, Linn. — *Hieracium longius radica-tum*, Lobel. Hier. *macrorrhizon*, Tabern. — Am Knieper-Mühlengraben; Heide bei Gr. Kädingshagen, Deviner Anlagen u. a. v. a. O.

44. 210. *Hypopitys*, C. Bauh. Dillen.

Monotropa (Linn.) umfasst diese Gattung und *Monotropa*, Nutt.

469. *H. multiflora*, Scop. — *Monotropa Hypopithys*, Linn. *Orobanchae quae Hypopitys dici potest*, C. Bauh. — Abtshagen, im dieessigten Walde, selten. *Greifswald: Haanshagen. Lassan: Buggow*. **R:** Stubnitz, Granitz, Biaz.

42. 211. *Jasione*, Linn.

470. *J. montana*, Linn. — *Rapuntium montanum* —, Columna. — Kugelfang; Heide bei Gr. Kädingshagen, Devin u. a. O.

44. 212. *Hex*, Lonicer. Linn.

471. *I. Aquifolium*, Linn. — *Aqu.*, Ruellius. II. *aquifolia*, Lonicer. — Abtshagen. Trihsees: Forkenbeck. *Kienbakenhagen. Dars. Hiddensee. Greifswalder Oie*. **R:** Schmale Heide, Stubnitz.

17. 213. *Impatiens*, Dodon. Rivin.

472. *I. Noli tangere*, Linn. — *Noli me tangere*, Gesner. — Niederhof, Abtshagen u. a. O. *Lassan: Waschow*. **R:** Medars, Stubnitz.

34. 214. *Inula*, Fuchs. Linn.

473. *I. Britannica*, Linn. — *Brit. vera —*, Hist. Lugd. — Kupferwiese, in Menge; Allee an der Herrenwiese; Negast, Lüssow, Parower Aussenkoppel u. a. O. *Dars. Greifswald. Lassan: Waschow. Demmin*. **R:** Wampen, besonders an der Wamper Wick.

474. *I. Conyza*, De C. — *Con. squarrosa*, Linn. *Con. major*, Tragus. — **R:** Sassnitz, am Ufer neben dem Fusssteige zum Herrenbade.

Xanthoxylum 44 7

475. **I. Helenium**, Linn. — Hel., Val. Cordus. — *Greifswald: Friedrichshagen, Grubenhagen, Hanshagen.* **R:** Garz, bei Schmiederhagen. — Ist wohl kaum ursprünglich heimisch: sie wurde vormals wegen ihres Gebrauchs häufig angepflanzt.

476. **I. hirta**, Linn. — Aster hirsutus, Lo. Gerard. — *Dars. R: Jasmond.*

477. **I. salicina**, Linn. — Aster montanus luteus Salicis glabro folio, C. Bauh. — **R: Stubnitz.** Alles, was ich unter den beiden letzten Namen in Sammlungen heimischer Pflanzen sah, war I. Britannica; dennoch mögen sie an den a. O. vorkommen.

215. *Iris*, Brunnfels. Linn.

478. **I. Pseud-Acorus**, Linn. — Pseudo-acorus, Matthiol. — Am Frankenteich u. a. O.

Isoties lacustre, Linn. — von Weigel für Voigdenhagen angegeben, ist schon von ihm selbst (Obs. bot. pg. 36. sq.) zurückgenommen. — Es ist, nach der Entdeckung des Hrn. Heinrich, die junge Pflanze des Juncus bufonius, deren erstes Blatt die Samenschale auf der Spitze trägt.

216. *Juncus*, Tragus. Tournef.

479. **I. alpinus**, Vill. — Am Kl. Paschenberge; am Krummenhäger See bei Negast.

480. **I. bulbosus**, Willd. — Die innerste wurzelständige Scheide trägt bisw. ein spannenlanges Blatt. — Zingst. Hiddensee. Rügen.

481. **I. bufonius**, Linn. — Gramen — bufonium, Tabern. β . fasciculatus, Koch. — Frankenweide; bei Stadtkoppel; Kugelfang, Proln, Neu-Pretz. **R:** Altenfähr, am nördl. Strande; Kl. Bandelvit, auf einem Ager am Strande.

γ . viviparus, F.

482. **I. capitatus**, Weigel. — Gestielte Köpfehen 1—4 oder 0. — Am Wege nach Proln; Laogendorf, nach Grünhufe zu, nördl. von der Chaussee; zwischen Borgwall u. Negast, und von hier nach Seemühl u. nach Sandhagen zu; zwischen Teschenhagen u. Voigdenhagen. *Greifswald. Rügen.*

483. **I. compressus**, Jacq. — I. bulbosus, Linn. Spec. II. append. bis Syst. XIII. nach dem Citat: „I. compr., Jacq.“ — Ändert ab mit graubraunen Kapseln (gewöhnlich sind sie schwarzbraun) und (Frankenweide) mit einzeln-stehenden Blüten.

484. **I. conglomeratus**, Linn. — I. glomerato flore, Lobel. — Knieperstrand u. a. v. a. O.

485. **I. effusus**, (Var. u. Fl. succ. Var. β . Spec.) Linn. — I. — panicula sparsa, Lobel. — Barther Landstr. u. a. v. a. O.

486. **I. Gerardi**, Loisel. — I. botanicus, Wahlenbg. — Samen merklich grösser als bei I. compressus. — Kl. Paschenberg, Franken- und Andershöfer Strand, Kl. Damitz. *Greifswald: Rosenthal. Rügen.*

487. **I. filiformis**, Linn. — **R: Casnevitz.**

488. **I. glauca**, Ehrh. — I. inflexus Linn. mit Ausschl. der Varr. (?). I. inflexus, Scop. I. acumine reflexo major, C. Bauh. (nach Roth; von Linn. zu dem angeführten Namen citirt). — Barther Landstrasse, Knieper- u. Andershöfer Strand u. a. O.

489. **I. lamprocarpus**, Ehrh. — I. articulatus (α), Linn. Spec. I. Fl. succ. II. Syst. X.

β . viviparus, Linn. Fl. succ. II. (Var. β . Spec. I.)

490. **I. maritimus**, Lamck. — I. acutus β . Linn. Spec. — *Deviner Ort; Sundische Wiese, Hiddensee. R: am Strande des Wampen.*

491. **I. obtusiflorus**, Ehrh. — I. articulatus (α), Linn. Spec. II. Syst. XII. XIII. — Tribsees: Plenniner Moor.

Loitz: Trantower Moor. Wahrscheinlich auch bei Lassan. **R: Garz.**

492. **I. silvaticus**, Reich. — I. articulatus γ . Linn. Spec. I. — Rügen.

493. **I. squarrosus**, Linn. — Negast, Zarrendorf. *Greifswald: Helmschagen. Lassan: Silberkuhl.*

494. **I. supinus**, Münch. — I. bulbosus β . Linn. Spec. I: „folio varians“, Scheuchz. — Ist sehr veränderlich; aber mit den Varr. repens u. fluitans (bei Koch) verhält es sich wie mit den Varr. natans u. terrestre bei Polygonum amphibium: sie wachsen an günstigen Standorte mit einander n. mit der gewöhl. Form auf einer und derselben Wurzel. — Überschen ist von den Neueren, obgleich schon von Schenehzer angedeutet, dass die Halmblätter kräftiger Pflanzen stielrund-zusammengedrückt, oberseits nur am Grunde rinnig, innen querwändig sind. — Andershof, Teschenhagen, Deviner Höfe, Wüstenfelde, Wendorf, Sandhagen, Negast, Martensdorf u. a. O. Zingst, Lassan: Silberkuhl.

60. 217. *Juniperus*, Brunnfels. Tournef.

495. **I. communis**, Linn. — I. vulgaris, Tragus. — Negast u. a. v. a. O.

33. 218. *Erantia*, Linn.

496. **Kn. arvensis**, Coulter. — Scabiosa arv., Linn. Tabern. — Ändert in der Behaarung und in der Blattform mehr ab, als gewöhnlich angegeben wird, und ausserdem in der Länge der Staubgefässe: diese sind bald länger od. so lang od. kürzer als die Blumenkrone, bald eingeschlossen und in letzterem Falle (ein *vielleichtes* Geschlecht andeutend, was ich noch bei keiner Pflanze aus der Fam. der Dipsaceen bemerkt gefunden habe) öfters unfruchtbar oder — bei 4theiliger Blumenkrone — gänzlich verkümmert, wobei jedoch Griffel und Narbe vollkommen ausgebildet sind.

β . campestris, Koch. — Häufig.

74. 219. *Hoelteria*, Persoon.

497. **H. cristata**, Pers. — Poa cr., Linn. Syst. XII. Aira cr., Linn. Spec. Gramen spica cristata hirsutum, C. Bauh. — Aira der Barther Landstrasse diessseits Kl. Kordshagen

(von mir nicht wiedergefunden). Demmin: an den Kiefern und jenseits derselben am steilen Abhange.

498. **L. glauca**, De C. — **R:** *Schmale Heide*.

499. **L. muralis**, Less. — *Prenanthes mur.*, Linn. Sou-

chus — mur. —, C. Bauh. — Niederhof, Negast, Abtshagen u. a. O.

500. **L. Scariola**, Linn. — *Scariola*, Eur. Cordus. — An der Stadtmauer, den Festungswerken; Chaussee nach Negast.

L. sativa, Linn. — Bisw. an Wegen und auf Schutzstellen.

501. **L. Lamium**, Fuchs. *Tournef.*

A. Ausdauernde Arten.

501. **L. album**, Linn. Tabern. — Festungswerke, Vorstädte u. a. v. a. O.

502. **L. maculatum**, Linn. C. Bauh. — *Urtica mortua maculis albis aspersa*, Column. — **R:** *Patbus*.

B. Einjährige Arten (☉ u. ♂).

1) *Kronröhre ohne Einschnürung, innen ohne Haarkranz.*

Die Kronröhre ist hier nicht immer innen ganz nackt: bei **L. incisum** und **L. intermedium** nebst deren Bastarden findet sich an der Mitte des Rückens nicht selten eine ziemliche Anzahl auf der Wand der Kronröhre senkrecht-stehender, kurz-borsteförmiger, stumpf, bald zerstreuter, bald fast gebäufter blumenblattiger Haare, die durch ihre höhere Einfügung, ihre Anordnung und Richtung von dem Haarkranz sich unterscheiden.

503. **L. amplexicaule**, Linn. — *L. folio caulem ambiente*, C. Bauh. — Kronröhre gerade, schlanker als bei den übrigen. Die blüthenständigen Blätter (wenigstens die oberen) sind gewöhnlich gekerbt-gelappt, mit ganzrandigen od. stumpf-gekerbten Lappen, das unterste Paar derselben oft gestielt; viel seltner finden sie sich — fast den unteren gleich — stumpf-gekerbt. — Kommt — wenigstens in trocknen Jahren — den ganzen Sommer hindurch auch heimlich-blühend vor.

504. **L. intermedium**, Fries. — Kronröhre über dem Grunde aufwärts-gekrümmt, seltner gerade, weiter als bei den verwandten Arten. Die blüthenständigen Blätter sind seltner od. doch schwächer gelappt, als bei der v. Art, aber der endständige Lappen tritt mehr hervor, wodurch namentlich die obersten Blätter spitziger werden, und derselbe ist meist breiter und länger als die übrigen und oft gekerbt-3zählig. — Kommt, wie wohl seltner, im Frühling auch heimlich-blühend vor. — Ziemlich häufig.

505. **L. incisum**, Willd. — *L. foliis profunde incis, Plukenet* (?). — Kronröhre gerade od. über dem Grunde aufwärts-gekrümmt. — Kommt im Frühling bisw. auch heimlich-blühend vor. — Häufig.

2) *Kronröhre über dem etwas dickwandigeren Grunde eingeschnürt und dasselbst innen mit einem Haarkranz, aufwärts-gekrümmt oder gerade.*

506. **L. purpureum**, Linn. — *Urtica non mordax* — foetens purpurea, Lobel. — Kommt ebenfalls, wiewohl nicht häufig, heimlich-blühend vor, sogar in der Mitte des Sommers.

Bastarde der 1jährigen Arten

sind auf der liesigen Feldmark sehr zahlreich und mannichfaltig, oft wahrsehnlich in der Rückbildung begriffen oder durch doppelte Kreuzung entstanden, und daher nicht immer mit Sicherheit zu bestimmen od. mit Worten deutlich zu machen. Die nachfolgenden denke ich richtig unterschieden zu haben. — Der Name derjenigen Pflanze, welche nach meiner Ansicht den Samen getragen hat, ist hier wie in anderen Gattungen als zweiter gesetzt worden.

1. *Kelch und Blumenkrone wie bei L. amplexicaule.* — Oft, auch in der Mitte des Sommers (in dem trocknen Jahr 1859.), heimlich-blühend.

a) 505 + 503. **L. incisum-amplexicaule**, F. — Unterscheidet sich von **L. amplexicaule** durch die spitzeren, tiefer u. häufiger gekerbten oberen blüthenständigen Blätter.

b) g + 503. **L. incisum-purpureum-amplexicaule**, F. — Unterscheidet sich von a) durch die herzförmigen, gekerbt-gesägten mittleren Stengelblätter, von **L. incisum-purpureum** durch den Kelch und durch die obersten breiteren, sitzenden, am Grunde nicht keiligen Blätter. — Ich fand es nur heimlich-blühend (Jül.).

II. *Kelch wie bei L. purpureum.*

c) 505 + 504. **L. incisum-intermedium**, F. — Unterscheidet sich von **L. intermedium** durch die fast 3eckig-herzförmigen, spitzeren, eingeschnitten-, fast gesägt-gekerbten obersten Blätter. Die ersten Blüthen der Blüthenquirle oft nur mit $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ so langer Blumenkrone. — Oft von üppigem Wuchs und sehr grossblättrig, wie auch die flg. Form.

d) g + 504. **L. incisum-purpureum-intermedium**, F. — Unterscheidet sich von c) hauptsächlich durch die an allen od. den meisten Blüthen mit undentlicher Einschnürung und schwachem Haarkranz versehene Kronröhre; seltner ist letztere an allen Blüthen innen nackt.

e) 504 + 505. **L. intermedio-incisum**, F. — Unterscheidet sich von c) hauptsächlich durch die obersten Blätter, die länger gestielt und an dem etwas keiligen Grunde nicht od. kaum herzförmig sind; scheint auch nicht die Grösse jener Form zu erreichen. — Selten.

f) 504 + g. **L. intermedio-incisum-purpureum**, F. — Unterscheidet sich von d) hauptsächlich durch die länger gestielten obersten Blätter. — Auch hier finden sich Pflanzen, u. zwar nicht selten, an deren

sämmtlichen Blüthen die Kronröhre ohne Einschnürung und Haarkranz ist, ohne dass sich sonst eine grössere Ähnlichkeit mit *L. intermedium* zeigte, was ich mir nicht zu erklären weiss. — Nicht selten.

g) 505 + 506. *L. incisio-purpureum*, F. — Hierher wahrscheinlich *L. purpureum* β . *decipiens*, Sonder. — Obere Blätter eiförmig, breiter und schmaler, mit gerundeten od. ziemlich geraden Seiten, an dem etwas keiligen Grunde meist herzförmig, ungleich-eingeschnitten und gekerbt-gesägt; oberste Blattstiele deutlich verbreitert. Kronröhre etwas gekrümmt od. gerade, mit Einschnürung und Haarkranz; die ersten Blüthen der Blüthenquirle oft kleiner und alsdann bisw. ohne merkliche Einschnürung, seltner auch ohne Haarkranz. Auch heimlich-blühend. — Sehr häufig; auch bei Voigdenhagen vorkommend.

h) 506 + 505. *L. purpureo-incisum*, F. — Hierher wahrscheinlich *L. incisum*, Benth., das Koch sich nicht zu erklären wusste. — Obere Blätter denen des *L. incisum* mehr od. minder ähnlich, oft von ihnen gar nicht zu unterscheiden. Kronröhre gerade od. etwas gekrümmt; Einschnürung schwach od. unmerklich; Haarkranz meist vorhanden. Die ersten Blüthen der Blüthenquirle oft mit nur $\frac{1}{2}$ so grossen Blumenkrone und innen nackter Kronröhre, bisw. unfruchtbar. Von *L. incisum* ist diese Form oft allein durch den Haarkranz unterschieden; bei der Rückbildung (?) zu letzterem fehlt derselbe auch bei manchen grösseren, vollkommen ausgebildeten Blumenkronen. — Sehr häufig; auch neben der Barther Landstrasse auf den Äckern von Grünhufe und Gr. Kädingshagen vorkommend.

3x 222. *Lampsana*, Dodon., Vaill.

Lapsana, Linn. nach 1737.

507. *L. communis*, Linn. — Wälle, Vorstädte u. a. O.

3y 223. *Lappa*, Brunfels., Tournef.

508. *L. major*, Gärt., Brunfels. — *Arcium Lappa* (α), Linn. mit Einschl. der flg. Art. — Köpfchen etwa 90–110 blüthig. — Frankenvorstadt: an der Überfahrt nach dem Dänholm; Barther Landstrasse; Parow: an den Gehölzen hinter der Aussenkoppel.

509. *L. minor*, De C. (nicht der alten Botaniker). — *Arcium Lappa* (α), Linn. mit Einschl. der v. Art. — Köpfchen etwa 30–50 blüthig. Blumenkrone meist hellpurpurn. — Vorstädte.

β . *thyrsiformis*, F. In allen Theilen kleiner, etwa spannenhoch: Äste verkürzt, die untersten 2–3köpfig, die übrigen meist 1köpfig. Köpfchen etwa 15–20 blüthig. Achänen merklich kleiner. — Bei Andershof auf Sandboden.

γ . *silvatica*, F. — Fast in allen Theilen doppelt so gross als die Hauptform. Äste sehr schlank, bogig-überhangend, die untersten niederliegend. Köpfchen doppelt so breit und nebst den Blättern des Hüllkelchs doppelt

so lang, die Achänen um $\frac{1}{3}$ länger als bei der gewöhnl. Form. Eine sehr auffallende Var. — Demmin: auf einer Lichtung im Devenschen Holz.

510. *L. tomentosa*, Lamck. — *Arcium Lappa* β . Linn. *Lappa major montana capitulis tomentosis*, C. Bauh. — Köpfchen etwa 50–70 blüthig. Blumenkrone meist dunkelpurpurn. — Vorstädte, Barther Landstrasse. — Geht mit Köpfchen, die nach dem Aufblühen nur am Grunde ein wenig spinnwebig sind, über in die Varietät:

β . *calva*, F. — Hüllkelch ganz kahl, glänzend-grün, später oft purpurbraun. — Nicht selten.

γ . *ochrophylla*, F. — Innere Blättchen des Hüllkelchs bleich, nicht gefärbt. — An der Tribs. Vorstadt.

δ . *albiflora*, F. — Blumenkrone und innere Blättchen des Hüllkelchs weiss; die Staubbeutel hell-graublau. — Um die Tribs. Vorstadt; zerstreut.

Bastarde:

509 + 510. *L. minori-tomentosa*, F. — Blütenstand durch die an der Spitze etwas stärker entwickelten Äste weniger deutlich ebensträussig, als bei *L. tomentosa*. Hüllkelch mehr od. minder spinnwebig; innere Blättchen gefärbt, theils pfriemenförmig-hakig, theils verschmälert-spitz und stachelspitzig, theils stumpf mit aufgesetzter Stachelspitze. — Parow: Trift am nördl. Ende des Dorfs.

510 + 509. *L. tomentoso-minor*, F. — Blütenstand zwischen dem der Eltern schwankend, weder ebensträussig wie bei *L. tomentosa*, noch vollkommen traubig wie bei *L. minor*, und vielleicht niemals mit an der Spitze der Äste und Ästchen fast geknäuelten Köpfchen, übrigens bisw. sogar auf einem Stengel bald der einen Form, bald der anderen sich mehr nähernd. Hüllkelch etwas spinnwebig; innere Blättchen gefärbt, theils pfriemenförmig-hakig, theils verschmälert-spitz und stachelspitzig, theils — aber selten — stumpf mit aufgesetzter Stachelspitze. — Parow: mit der v.

510 + 508. *L. tomentoso-major*, F. — Blütenstand wie bei den Eltern. Hüllkelch schwach-spinnwebig; innere Blättchen gefärbt, theils pfriemenförmig-hakig, theils verschmälert-spitz od. stumpflich mit gerader od. fast gerader, meist starrer Stachelspitze. — Im Ganzen vom Aussehen der *L. major*, milder (?) hoch. Das eigentlich blumenblattige, weiche Spitzen der inneren Hüllkelchblättchen von *L. tomentosa* habe ich nicht gefunden. — Kramershof: diesseit des Dorfes am Wege dahin; vielleicht auch an der Barther Landstrasse.

46 224. *Lappula*, Dalech. Rivin.

Dieser von Mönch (1802.) wieder aufgenommene Name ist der ältere: *Echinospermum* (Swartz, mscr.) ist erst von Lehmann eingeführt worden.

511. *L. rusticorum*, F. Dalech. (die älteste Bezeichnung). — *L. Rivini*, Rupp. *L. Myosotis*, Mönch (nach einer nicht gewöhnl. Methode). *Myosotis Lappula*, Linn. *Echinosper-*

mum Lapp., Lehm. — Demmin: an der westl. Stadtmauer.

R: Quollitz.

225. *Laserpithum*, Morison. Tournef.

512. ***L. latifolium***, Linn. — L. lat. vulgaris, Moris. — Greifswald. **R:** Granitz.

226. *Lathraea*, Linn.

513. ***L. Squamaria***, Linn. — Squ., Rivin. Squamatia, Lonicer. Clandestina, Tourn. — Parower Park. Greifswald; Eldena. Anclam. Lassar: Pulow.

227. *Lathyrus*, Dodon. Linn.

Mit Einschl. von Arten des *Orobis*, Linn.

514. ***L. montanus***, Bernh. — L. — radice tuberosa, Loesel. *Orobis tuberosus*, Linn. — Negast. Trihsees: Lindenbusch bei Semlow. Barth: Diebst; Arbhagen. Anclam. Lassar: Buggenhagen. Rügen.

515. ***L. niger***, Wimm. — *Orobis* u., Linn. — Demmin: Devensche Holz. **R:** Granitz, Prora, Stubnitz.

516. ***L. paluster***, Linn. Rupp. — Wiesen um den Knieperich und den Vogelsang. Lassar: Vorwerk; Buggenhagen.

517. ***L. pratensis***, Linn. Rivin.

518. ***L. silvester***, Linn. Dodon. — Lüssow: am Seeufer, häufig; Gr. Zansebur: an der Landstrasse dieses Dorfs. Greifswald. Wolgast. Lassar: Pulow. **R:** Stubnitz.

519. ***L. tuberosus***, Linn. — *L. arvensis* repens tub., C. Bauh. — **R:** Ralswiek, Medars, Neu-Pastitz.

520. ***L. vernus***, Bernh. — *Orobis* v., Linn. Or. silvestris vernus, Thal. — Tribsees: Camitzer Laubholz. **R:** Stubnitz, Granitz.

228. *Ledum*, Lobel. Rupp.

521. ***L. palustre***, Linn. — *Rosmarinus palustris*, Tillands. — Negast. Zarendorf u. a. O. Dars. Zingst. Greifswald: Helmshagen. Lassar: Silberkuhl. **R:** zwischen Tribatz und der Granitz.

229. *Lemna*, Linn. (Hist. Lugd.)

522. ***L. gibba***, Linn. — *Lenticula* — inferne magis convexa, Michel. Telmatophace gibba, Schleiden.

523. ***L. minor***, Linn. — *Lenticularia* min. monorrhiza, Michel.

524. ***L. polyrrhiza***, Linn. — *Lenticularia* major, pol., Michel. Spirodela pol., Schleiden.

525. ***L. trisuleca***, Linn. — *Lenticula* aquatica tris., C. Bauh. **Lens esculenta**, Münch. — Bisw. verwildert.

230. *Leontodon*, Linn.

526. ***L. autumnalis***, Linn. — Das unterste der aststützenden, meist schuppenförmigen Blätter ist nicht selten blattig, lineal od. lanzettförmig-lineal, ganzrandig od. gezähnt.

β. *pratensis*, Koch. — Nicht selten.

527. ***L. hispidus***, Linn. Spec. mit Ausschl. der Varr. — *L. hastilis*, Linn. bei Koch, vorangestellt und hernach

auf die Var. β. hier unten bezogen: mir scheint unter letzterem Namen nach Ls Diagnose, dem Standort („in Europa australi“) u. dem Zeichen ⊙ eine fremde Art verstanden werden zu müssen, während der hier vorangestellte Name ganz sicher ist und dazu die überall vorkommende Hauptform bezeichnet. — Nicht selten (an der Chaussee dieses Andershof u. bei Teschenhagen, in den Deviner Anlagen, an der Barlher Landstrasse u. a. O.) ist eine *Abänderung im Wuchs*: der Wurzelkopf verlängert sich ein wenig, so dass die Blätter sich deutlich über einander stellen, und treibt aus der Spitze einen meist 2–3köpfigen Stengel, dessen seitenständige Blütenstiele ein schuppenförmiges, od. den untersten ein blattiges Deckblatt stützt, wobei zuweilen noch ein Iköpfiger Blütenstiel abgesondert in der Achsel eines der unteren Blätter steht.

β. *glabratus*, Koch (nach ihm das wahre *L. hastile*, Linn.). — Ganz kahle Pflanzen fand ich noch nicht.

231. *Leonurus*, Rivin.

528. ***L. Cardiacus***, Linn. — Card. vel Lycopos, Fuchs. — Frankenvorstadt, Devin, Brandshagen, Windbrak, Parow, Prohm u. a. O. Lassar. **R:** Gustow.

232. *Lepidium*, Fuchs. Linn.

529. ***L. campestre***, R. Brown. — *Thlaspi* camp., Linn. — Rügen.

530. ***L. ruderale***, Linn. — Wallgang, Trihs. Vorstadt, Dänholm. **R:** Altenfähre.

L. sativum, Linn. — Bisw. auf Äckern; schwerlich beständig.

233. *Lepigonum*, Wahlbg. — Vid. *Spergularia*.

234. *Lepturus*, R. Brown.

531. ***L. filiformis***, Trin. — Rügen.

235. *Leucanthemum*, Clusius. Adans.

532. ***L. vulgare***, Lamck. Tourn. — *Chrysanthemum* Leuc., Linn. *Bellis* major silvestris, Fuchs.

Leucolum vernum, Linn. — In Gehölzen u. dgl. O. bisw. anscheinend wie wildwachsend.

Levesticum officinale, Koch. — In Dorf- u. Baugärten, in Folge früherer Anzecht.

236. *Libanotis*, Lobel. Crantz.

533. ***L. montana***, Allion. — *Apium* petraeum s. montanum, J. Bauh. Athamanta Lib., Linn. — **R:** Stubnitz.

237. *Ligustrum*, Brunfels. Tournef.

534. ***L. vulgare***, Linn. Tragus. — Anclam (?). **R:** Jasmund (verwildert?).

238. *Limnanthemum*, Gmelin.

535. ***L. Nymphoides***, Link. — *L. petatum*, Gmel. (1769.). *Nenyanthes* Nymph., Linn. Nymph., Tourn. *Nymphaea lutea* minor flore finifriato, C. Bauh. — Lassar: in der Peene, häufig (Heinrich).

238. *Limonium*, Matthiol. Tournef.

Vgl. bei Statice.

536. *L. vulgare*, Mönch. — *L. maritimum* —, C. Bauh. Statice Lim., Linn. — *Dars*, Zingst.

239. *Limosella*, Lindern (1728.).

537. *L. aquatica*, Linn. — *Plantago* aqu. minima, Clusius. Lim. annua, Lindern. — Martensdorf: an der Lache vor dem Dorfe, unfern der Chaussee (1857. Vorher dort von mir nie gesehen; ob noch vorhanden?).

240. *Linaria*, Brunsfels. Rivin.

538. *L. arvensis*, Desfont. — *L. arv. caerulea*, C. Bauh. Antirrhinum arvense, Linn. — Zwischen Zitterpenningshagen und Teschenhagen.

539. *L. minor*, Desfont. — Antirrhinum minus, Linn. Ant. arvense minus, C. Bauh. — **R:** am östl. Strande von Jasmund, bei Sassnitz u. an der Stübnitz auf mehreren Stellen. Bei Str. hin u. wieder als Gartenunkraut.

540. *L. striata*, De C. — *L.* — flore — striato, Dillen. Antirrhinum repens, Linn. und *A. monspessulanum*, Linn. — In der Ballastkiste, eine Reihe von Jahren hindurch; jetzt mit der Ballasterde weggeführt.

541. *L. vulgaris*, Mill. Tragus. — Antirrhinum Lin., Linn.

β. pallida, F. — Blumenkrone gelblich-weiss; Gauen leichtgelb. — Ufer am Andershöfer Strande; selten um Voigdelhagen.

241. *Linnaea*, Gronovius.

542. *L. borealis*, Linn. — Nummularia norwegica, Kylling. Petiver. — Greifswald: Haushäger Holz, nach Carbow zu.

242. *Linosyris*, Lobel. Cassin.

543. *L. vulgaris*, Cass. — *L. nuperorum*, Lobel. Chrysocoma Lin., Linn. — *Anclam*.

243. *Linum*, Brunsfels. Dillen.

544. *L. catharticum*, Linn. — *L. silvestre cathart.*, Jo. Gerard. — An der Kupferwiese u. a. v. a. O. **R:** zwischen Tribartz und Dollan.

L. usitatissimum, Linn. mit Ausschl. der Varr. *γ.* und (?) *δ.* — An Wegen u. a. O. wie heimisch, jedoch meist nur die Var. *α.* vulgare, Schübl. u. Mart.

244. *Liparis*, Richard. (Gesner.)

545. *L. Loeselii*, Rich. — *Sturmia* Loes., Rehenbch. Ophrys Loes., Linn. Ophrys diphyllus bulbosa, Loesel. — Negaster Moor. Greifswald: Behrenhöfer Moor.

245. *Listera*, R. Brown.

546. *L. ovata*, R. Br. — Ophrys ov., Linn. — Parow: Elsbüchle hinter der Ansenkoppel; Gr. Kädingshagen: Heidestelle in den Wiesen neben der Heide; Lüssow: am See, sehr häufig; Negast, Pennin, Zimkendorf u. a. O. Greifswald: Hohenkühl. **R:** Patbus, Serpin.

246. *Lithospermum*, Brunsfels. Tourn.

547. *L. arvense*, Linn. — *L. arv. radice rubra*, Matthiol.

548. *L. officinale*, Linn. — *L. legitimum*, Clusius. Milium Soler Mauritais, quod in montibus Soler frequenter nascatur: hinc vulgo milium Solis inepte dicitur, C. Bauh. — **H.** Graben, häufig; Ufer am Andershöfer Strande, Demmin: Haus Demmin, Greifswald. Loitz. Anclam. Wolgast. Hiddensee. **R:** Arcona.

247. *Littorella*, Bergius (Act. holm.).

549. *L. lacustris*, Linn. Mant. II. — *Plantago uniflora*, Linn. Spec. I, Pl. palustris —, Tourn. Gramen junceum — palustre —, Plukenet. — *Am Borgwallsee*.

248. *Lolium*, Tragus. Linn.

550. *L. arvense*, With. — *L. linicola*, Sonder. — Unter Lein nicht selten.

551. *L. festuaceum*, Link. — *Festuca loliacea*, Huds. — Halm glatt. Ähre aufrecht, unterwärts traubig: unterste Blütenstiele $\frac{1}{2}$ –6" lang, vor u. nach dem Blühen in den rinnigen Ausschnitten der Spindel dicht-anliegend. Obere Balgklappe ungefähr so lang als die nächste Blüte; untere Balgklappe an den gestielten Ährchen vorhanden, meist vollkommen, 3nervig, an den sitzenden fehlend od. verkümmert, od. 2spaltig, 2theilig, wie bei *L. perenne*. Ährchen 9–15 blüthig, während des Blühens frei-abstehend. Jüngere Blätter einfach-zusammengefaltet. — Kann leicht für *L. perenne* od. für die wehrlose Form von *L. italicum* angesehen werden; die Ähre ist öfters zusammengesetzt od. rispig-ästig. — Seltener in der Kupferwiese und am H. Graben.

552. *L. italicum*, Al. Braun. — Frankenstein, dem Stadt-Lazareth gegenüber (die begraunte Form; vielleicht angesäet); am H. Graben (die wehrlose Form), sehr selten.

553. *L. perenne*, Linn.

β. vaginatum, F. — Halm an der Spitze ($\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ " unter der Ähre) mit einer (2–3" langen) bis auf den Grund 2theiligen, blattlosen Scheide besetzt. **R:** Altenfähr, am nördl. Strande; sehr selten.

554. *L. temulentum*, Linn. — *L. et triticum* tem., Lobel.

31. *Lonicera*, Linn. — *Vid. Periclymenum u. Xylosteum*.

249. *Lotus*, Dodon. Rivin.

555. *L. corniculatus*, Linn. — *Trifolium corniculatum*, Dodon.

556. *L. tenuifolius*, Rehenbch. — *L. corniculatus γ.* tenuif., Linn. Lot. pentaphyllos — tenuissimis — foliis, C. Bauh. — Greifswald: bei Wick.

557. *L. uliginosus*, Schkuhr. — *L. corniculatus β.*, Linn. *L. pentaphyllos major et erectus*, Gesner. — Auf feuchtem, nacktem Boden liegen die Stengel nieder; auf trockenem, kurzgrasigem Boden (Heide bei Gr. Kädingshagen) sind sie ausgebreitet, aufstrebend, das Kraut meergrün. — Kupferwiese u. a. v. a. O.

Lupinus angustifolius, Linn. und **Lup. luteus**, Linn. — Jetzt, bei dem häufigen Anbau, auf Äckern und an Wegen oft verwildert.

250. Luzula, Anquillara. De Cand.

„Gramen rore lucidum“, Chabreas.

558. **L. campestris**, De C. — Juncus camp., Linn. mit Ausschl. aller Varr. Gramen luzulae minus, J. Bauh.

559. **L. multiflora**, Lej. — Juncus campestris ♂. Linn. (?) — Negast, Sandhagen, Abtshagen u. a. O. *Lassau: im rothen Moor.*

β. pallescens, Koch (Var. ε.). — Parow: Aussenkoppel; Zarrendorf.

560. **L. pilosa**, Willd. — Juncus pilosus, Linn. mit Ausschl. aller Varr. Gramen silvaticum quartum s. pilosum, Tabern. — Negast u. a. v. a. O.

561. **L. silvatica**, Gaud. — Juncus silvaticus, Huds. Juncus pilosus ♂. Linn. Luz. maxima, De C. Gramen hirsutum latifolium maximum, juncus panicula, Morison. — *Greifswald.*

251. Lychnis, Dodon. Tournef.

Vgl. Coronaria und Viscaria. — Den Rochlingschen, von Fries wieder aufgenommenen Namen Melandryum beschränke ich auf Class. X, 3. und unterscheide die verwandten Gattungen in folgender Weise:

1. Kapselzähne und Griffel gleichzählig.

1. Coronaria, Linn. X, 5. — Kapsel 1fächerig, 5zählig.

2. Agrostemma, Linn. X, 5. — Wie die v., unterschieden durch den 5spaltigen Kelch, die am Sehlunde nackte Blumenkrone, die am Grunde beiderseits geflügelten Nägel der Kronblätter, und durch die ringsum behaarten Narben.

3. Viscaria, Rupp. X, 5. — Kapsel halb-5fächerig, 5zählig.

II. Kapselzähne 2mal so viele als Griffel.

4. Silene, Linn. X, 3. — Kapsel halb-3fächerig, 6zählig.

5. Melandryum, Fries. X, 3. — Kapsel 1fächerig, 6zählig.

6. Lychnis, Tourn. X, 5. — Kapsel 1fächerig, 10zählig.

562. **L. alba**, Mill. — L. dioica β. Linn. alba, Wilke (Fl. gryph. 1765.). L. silvestris alba, Dodon. L. vespertina, Sibth. — Die Platte der Kronblätter ist beiderseits am Rande entw. ganzrandig, od. gezähnt, od. eingeschnitten-1zählig mit einem stumpfen, lineal-länglichen od. linealen Zahne (fast ungleich-4spaltig).

563. **L. rubra**, Patze, Mey. u. Elk. — L. dioica α. Linn. rubra, Wilke. L. silvestris rubra, Camerar. L. diurna, Sibth. — II. Graben, Parow, Zimkendorf, Pennin, Abtshagen, Niederhof u. a. O. häufig. Die Pflanzen dieser Standorte sind jedoch noch weiter zu prüfen, da ich die erste der nachfolgenden Bastardformen erst später unterscheiden habe, und diese — wie ich jetzt bestimmt weiss — nicht auf den unten angegebenen Standort beschränkt ist.

Bastarde:

562 + 563. **L. albo-rubra**, F. — Von L. rubra durch Folgendes unterschieden: Blätter schmäler, allmählicher und schwächer zugespitzt; Stengel oberwärts nebst den oberen Blättern, den Blütenstielen und Kelchen minder zottig, aber zugleich drüsenhaarig. Übrigens ist der Fruchtkelch vor dem Verrotten oft etwas aufgeblasen, die Kapsel ein wenig dicker; die Blumenkrone ist bald grösser, mit breiteren, einander berührenden, beiderseits am Rande bisw. eingeschnitten-1zähligen Platten und schief-verkehrt-eiförmigen Zipfeln der Kronblätter, bald kleiner, wie bei L. rubra, wobei auch oft eine breitere Blattform u. eine Verminderung der Drüsenhaare eintritt, wahrscheinlich eine Rückbildung zu letzterer. Die unteren blüthenständigen Blätter sind, wie auch bei L. alba, öfters spärlich grob-gezähnt. Blumenkrone Tags offen, schön-purpurn, selten weiss. Abends wohlriechend. — II. Graben, von der untersten Brücke (in der Kupferwiese) aufwärts, u. a. O.

563 + 562. **L. rubro-alba**, F. — Von L. alba durch Folgendes unterschieden: die Blätter etwas breiter, stärker zugespitzt, weniger grau, oft nebst dem Stengel violett-braun überlaufend. Blütenstiele und Kelche ausser der drüsigen Behaarung etwas zottig. Fruchtkelch aufgeblasen wie bei L. alba. Kapsel mit gerade-abstehenden Zähnen aufspringend, von derselben Grösse wie bei dem v. Bastard. Die Blumenkrone Tags geschlossen, heller und dunkler gefärbt, hell-roseroth bis schön-purpurn, an der weibl. Pflanze oft merklich kleiner. — Am H. Graben mit der v., aber selten.

45. **Lycium barbarum**, Linn. — Bisw. verwildert.

252. Lycopodium, Dodon. Linn.

564. **L. annotinum**, Linn. — „Sarculis annotino-contractis“. „Rami ad genicula annotina contracti“. Linn. — Parower Aussenkoppel, sehr selten. Zwischen Arendsee und Benkenhagen. **R:** Stubbütz.

565. **L. clavatum**, Linn. — Muscus clavatus, Lobel. — Negaster Heide, jetzt vielleicht verschwunden; an a. O. um Str. jetzt durch Aufbruch des Bodens verlitgt. *Greifswald:* Eldena, Hausshagen, Koitenhagen. **R:** zwischen Tribraz und Ahlbeck; Patziger Heide.

566. **L. inundatum**, Linn. — Martensdorf: Torfgrube neben dem Wege nach Gr. Zansehur, selten. Moor bei Arendsee.

567. **L. Selago**, Linn. — Selago tertia, Thal. **R:** Stubbütz, selten.

253. Lycopsis, Dodon. Linn.

568. **L. arvensis**, Linn.

254. Lycopus, (Lonicer.) Tournef.

569. **L. europaeus**, Linn. — Am Frankenteich n. a. v. a. O.

255. Lysimachia, Fuchs. Tournef.

570. **L. nemorum**, Linn. — Anagallis lutea nem., C.

Bauh. — *Anclam*. **R.**: Boldewitzer Holz; am Wege von Bergen nach der Lietzener Fähr; Stubnitz; Medars.

571. **L. Nummularia**, Linn. — Numm., Fuchs. — Chaussee nach Negast u. a. v. a. O.

572. **L. thyrsoiflora**, Linn. — Kelch u. Blumenkrone oft 6–7theilig. — Neben dem Frankenteich am Wege nach Knöchelsöhrn; um den Vogelsang; Parow, Negast u. a. O. *Greifswald. Lissan.*

573. **L. vulgaris**, Linn. — *L. lutea*, Tragus. — Am Frankenteich; Kieperwiese, Parow u. a. O. — Die Form mit langen Ausläufern (*L. paludosa*, Baumg.) in den Torfgruben des Voigdehäger Moors.

25. **256. Lythrum**, Linn.

Lythrum, Lonicer. = *Isatis*, Tourn.

574. **L. Salicaria**, Linn. — *Sal. vulgaris purpurea*, Tourn. (*Salicaria*, Gesn. — *Lysimachia vulgaris*). — Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

67. **257. Matanthemum**, (Siegesbeck.) Weber.

575. **M. bifolium**, De C. — *Convallaria bifolia*, Linn. *Bifolium* 1., Lonicer. — Stengel selten 3blättrig. — Parower Aussenkoppel, Negast u. a. v. a. O.

11. **258. Matachium**, Fries.

576. **M. aquaticum**, Fries. — *Cerastium aqu.*, Linn. — Um die Vorstädte, Grünhufe, Teschenhagen, u. a. v. a. O.

66. **259. Matucis**, Swartz.

577. **M. monophyllos**, Swartz. — *Ophrys mon.*, Linn. *Pseudo-orchis mon.*, Clusius. — **R.**: Granitz, bei Kieköwer.

578. **M. paludosa**, Swartz. — *Ophrys pal.*, Linn. — Negaster Moor, mit *Scheuchzeria palustris*. *Greifswald: Kiezhöfer Moor.*

16. **260. Matra**, Fuchs. Linn.

579. **M. Alcea**, Linn. — *Alcea et herba Simeonis*, Brunfels. — Ufer am Deviner See und bei Lüssow, häufig; ausserdem um Str. sehr zerstreut. Demmin. Rügen.

580. **M. borealis**, Wallmann. — *Anclam.*

581. **M. silvestris**, Linn. — *M. silv. elatior*, Fuchs. *M. equina*, Brunfels. — Kieper-Vorstadt, Gr. Kädingshagen u. a. O.

582. **M. vulgaris**, Fries. — Die *M. rotundifolia*, Linn. umfasst diese Art und die *M. borealis*, Wallm.

β. erecta, F. — Die Stengel sämmtlich od. nur der Hauptstengel aufrecht. — Vorstädte. **R.**: Altenfähr, am nördl. Strande (auf fast nacktem Boden).

57. **261. Marrubium**, Brunfels. Rivin.

583. **M. vulgare**, Linn. Clusius. — *Devin*, Demmin. *Lissan.* **R.**: bei Gnstow u. an der Wamper Wick.

3. **262. Maruta**, Cassin.

584. **M. Cotula**, De C. — *Anthemis Cot.*, Linn. *Cot. foetida*, J. Bauh. — Vorstädte, Barther Landstrasse u. a. O.

3. **263. Matricaria**, Brunfels. Tournef. 585. **M. Chamomilla**, Linn. — *Cham. vulgaris*, Tragus. — ☉ u. ♂. — Franken- und Knieperfeld, nicht häufig. Rügen.

17. **264. Medicago**, Tournef.

Medica, Dodon. u. A.

586. **M. falcata**, Linn. — *Falcata* →, Rivin. — Wall auf der Frankenweide, spärlich. Barth. Demmin. Hiddensee. **R.**: Pulow.

587. **M. lupulina**, Linn. — ☉ u. ♂. — Auch aufrecht, an trockeneren Orten. — Oberste Blütenstiele oft genähert, fast doldig, mit pfriemenförmigen Deckblättern od. die untersten derselben mit unvollkommenen Blättern gestützt: Tribs. Feld.

588. **M. minima**, Laeuk. — *M. polymorpha* μ. *minima*, Linn. *Medica echinata* min., J. Bauh. — Demmin. **R.**: Wampen, am südl. Abhänge.

M. sativa, Linn. — Verwildert.

49. **265. Melampyrum**, Dodon. Tournef.

589. **M. arvense**, Linn. — Barth: Kenz. *Anclam. Lissan. Hiddensee.* **R.**: zwischen Bergen und der Lietzener Fähr. Münchgut.

590. **M. nemorosum**, Linn. — Ufer am Andershöfer Strande; Zinkendorf. Demmin: Devensche Holz (hier auch mit bleichen Deckblättern). *Lissan: Pulow.* **R.**: Stubnitz.

591. **M. pratense**, Linn. — Negast, Abtshagen u. a. O. *Lissan: Pulow.* **R.**: Jasmund.

17. **266. Melandryum**, (Clusius.) Fries.

592. **M. noctiflorum**, Fries. — *Silene noctiflora*, Linn. *Ocymoides noctiflorum*, Camerar. — Franken- und Tribs. Feld; Andershof.

42. **267. Melica**, (Dodon.) Linn.

593. **M. nutans**, Linn. — Tribses: Plemminer Laubholz. Demmin: Devensche Holz. *Greifswald. Anclam. Lissan: Pulow.* **R.**: Stubnitz.

594. **M. uniflora**, Retz. — Niederhof: Abtshagen, nicht selten. Demmin: Devensche Holz, häufig.

19. **268. Melilotus**, Fuchs. Tournef.

(*Trifolium Melilotus*, Linn.)

595. **M. alba**, Desrouss. — Tr. *Mel. officinalis* β. Linn. *Lotus silvestris* flore albo, Tabern. — Dänholm: Neu-Lüssow; Chaussee bei Pantlitz. — Scheint unbeständig zu sein und aus verstreuten Samen od. früherem Auhau herzustammen.

596. **M. dentata**, Pers. — Frankenstrand. Hiddensee.

597. **M. macrorhiza**, Desfont. — Tr. *Mel. officinalis* γ. Linn. Spec. II. (?). — Frankenstrand u. a. O.; am Deviner See; Braundshagen, Niederhof u. a. O. Demmin. **R.**: Altenfähr, am südl. Strande. *Jasmund.*

598. **M. officinalis**, Desrouss. — Tr. *Mel. officinalis* (α), Linn. *Mel. officinarum* →, C. Bauh. Wälle, Vorstädte,

Frankenstrand; an Wegrändern und sehr häufig auf Kleeefeldern unter *Trifolium pratense* und *Tr. hybridum*; daher bei uns vielleicht überall als eingeführter Samen herstammend.

269. *Mentha, Brunfels. Tournef.*

599. *M. aquatica*, Linn. Louicer. — Calamintia aqu., Gesner. Kupfergraben, Vogelsang u. a. O.

β. *hirsuta*, Koch. — *M. hirsuta*, Linn. Mant. I. M. aqu. *hirsuta* —, J. Bauh. — Parower Aussenkoppel u. a. O.
600. *M. sativa*, Linn. — *M. sat. prima*, Fuchs. — Knieper-Mühlengraben, H. Graben, Ufer am Andershöfer Strande u. a. v. a. O. Demmin.

601. *M. silvestris*, Linn. Louicer. — *Anclam. R.*: Garz, Putbus, Medars.

β. *glabra*, Koch (Var. δ.). — *M. viridis*, Linn. Spec. II: „Affinis nimium *M. silvestri*, sed minor et glabra“. — Knieperstrand, diesselt des Lootsensteins; Steinhagen, am den Dorfeich! Demmin, an der westl. Stadtmauer! — Oft wohl nur verwildert: in Gärten häufig als „Pfeffermünze“ angepflanzt.

γ. *crispata*, Koch (Var. ε.). — Bisw. verwildert od. gegühtet.

270. *Mentha, Dalech. Tournef.*

602. *M. trifoliata*, Linn. — *M. trif.* —, Plukenet. *Trifolium* — fibrinum, Tabern. — Am Fusswege nach Knöchelsbörn u. a. v. a. O. Lassar. *R.*: Putbus.

271. *Mercurialis, Fuchs. Tournef.*

603. *M. annua*, Linn. — *M. annua glabra vulgaris*, Rajus. — Die blüthigen Blüthenstiele der weibl. Pflanze ganz wie bei der fig. Art. — Frankeuvorstadt, an der Reiferbahn, häufig; Kniepervorstadt, selten.

604. *M. perennis*, Linn. — *M. perennis repens* Cynocrambe dicta, Rajus. — Parower Park, Barther Landstrasse, Ufer am Andershöfer Strande, Abtshagen u. a. O. Am H. Graben in Menge, aber nur die männl. Pflanze. *Greifswald: Eldena. Lassar: Waschow. R.*: Medars. Stubnitz.

272. *Milium, (Brunfels.) Tournef.*

605. *M. effusum*, Linn. — Gramen miliaecum, Lobel. — H. Graben, Niederhof, Negast, Abtshagen u. a. O. Demmin. Lassar.

273. *Moehringia, Linn.*

606. *M. trinervia*, Clairv. — *Arenaria trin.*, Linn. *Alisne plantaginifolia*, J. Bauh. — Blüht bis in den Herbst. — H. Graben, Ufer am Andershöfer Strande, Negast u. a. v. a. O. — Blätter oft durchscheinend-punktirt.

274. *Motilia, Münch.*

607. *M. aquatica*, Wibel. — *Glyceria aqu.*, Presl. *Aira aqu.*, Linn. *Gramen aquaticum miliaecum*, Scheuchz. — Gehört hieher u. nicht zu *Glyceria*, wegen der bauchig-hervortretenden, auf beiden Nerven kahlen oberen Spelze.

— „Knieperstrand; Gräben unterhalb der Quelle im Frankenfelde. Lassar: Bleiche.

608. *M. caerulea*, Münch. — *Aira caer.*, Linn. Spec. *Melica caer.*, Linn. Mant. II. — Parow, Negast, Abtshagen, Voidehagen, Niederhof u. a. O.

275. *Montia, Micheli.*

609. *M. minor*, Gmel. — *M. aquatica minor*, Mich. M. fontana, Linn. zum Theil. *Portulaca exigua* s. *Adrachion arvense*, Camerar. — Lassar: Weiße (Heinrich).

276. *Myosotis, Lobel. Dillen.*

610. *M. caespitosum*, Schult. Starg. — Sandgrube im Tribs. Felde u. a. v. a. O.

611. *M. hispida*, Schlechtal. — Barther Landstrasse, Sandgrube im Tribs. Felde, Ufer am Frankenstrande diesselt Franzenshöhe u. a. O.

612. *M. intermedia*, Link. — *M. scorpioides* α. arvensis, Linn. (?).

613. *M. palustris*, Wither. — *M. scorpioides* β. palustris, Linn. *Scorpioides aquaticum vel palustre* —, Gesner.

614. *M. silvatica*, Hoffm. — *M. scorpioides latifolia hirsuta*, Rajus (Linn. Fl. suec. II.)? — *R.*: Stubnitz.

615. *M. stricta*, Link. — *M. scorpioides* α. arvensis, Linn. (?).

616. *M. versicolor*, Ehrh. Herb. nach Roth. — *M. scorpioides* γ. Linn. Spec. II. (?). — Bei der Gasanstalt; Gr. Kädingshagen, Langendorf, Negast u. a. O.

277. *Myosurus, Dodon. (-os). Knaut.*

617. *M. minimus*, Linn.

278. *Myrica, Frankenius. Linn.*

Myrica, Fuchs. — *Tamarix*.

618. *M. Gale*, Linn. — *Gale* (englisch), Turner. *Gagel* (niederl.), Dodon. *Rosmarinus septentrionalium* und *Myrtus nostras*, Jo. Backmeister. — Dars, Zingst. Lassar: beim Waschower Fischerhause; Buggenhagen. *R.*: Mönchgut, zwischen Middelthagen u. Baabe.

279. *Myriophyllum, Clus. Pontedera.*

619. *M. spicatum*, Linn. — *Millefolium aquaticum pennatum spicatum*, C. Bauh. — Teiche; tiefere Gräben; Strandwasser u. a. O. Lassar: Peene.
620. *M. verticillatum*, Linn. — *Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos*, C. Bauh. — Negast: Gräben und Torfgruben. Lassar: Wiesengraben bei Waschow.

280. *Naius, Linn.*

621. *N. marina*, Linn. mit Ausschl. der Varr. — *N. major*, Roth. — Fruchtknoten ohne Griffel u. ohne bemerkliche Narbe! — *R.*: im Mählen.

281. *Nardus, Linn.*

622. *N. stricta*, Linn. — Heide bei Gr. Kädingshagen; Negast, Zarrendorf u. a. O.

282. *Nasturtium*, Fuchs. R. Broien.

623. *N. amphibium*, R. Br. — *Sisymbrium* amph., Linn. — Am Frankenteich n. a. v. a. O.

624. *N. officinale*, R. Br. — *Sisymbrium* Nast. aquaticum, Linn. Spec. Sis. Nast., Linn. Syst. X. XII. Nast. aquaticum, Tragus. — Gräben unterhalb der Frankenquelle; Devin: am See bei den Quellen, klein; Kramerhof. *Greifswald: Hohenmühl. Lassar: Weide.* Demmin: Vorwerk, Quellgrund neben den Peenewiesen. **R:** *Jasmund.* 625. *N. palustre*, De C. — *Sisymbrium* pal., Leyser. Sis. silvestre, Linn. zum Theil (? Nach dem Citat: „*Eruca palustris* et *Nasturtii folio*, siliqua oblonga, Bauh. pin.“). Bei Stadtkoppel; Sandgrube im Tribbs. Felde; Langendorf, Lüßow, Sandhagen u. a. O.

β. ovatum, F. — Obere Blätter gestielt, eiförmig-rundlich, ungetheilt, stumpf-gezähnt. — Demmin: an der Tollense, mit der gewöhnl. Form. Alle dort stehende Pflanzen dieser Art waren klein und schwach; von dieser Var. fand ich nur 2 Exemplare.

626. *N. silvestre*, R. Br. — *Sisymbrium* silv., Linn. (zum Theil?). *Eruca* silvestris, Fuchs. — Um die Vorstädte n. a. v. a. O.

β. siliquosum, F. — Schoten etwa 3mal so lang als das Stielchen. — Nicht häufig: Graben zur Rechten des Verbindungsweges von der Barther Landstrasse zur Chaussee, mit der gewöhnl. Form, und im Tribbs. Felde nach Lüdershagen zu.

283. *Neottia*, Dodon. Richard.

Auch bei Linn. vor 1753.

627. *N. Nidus avis*, Rich. — *Ophrys* Nid. av., Linn. Nid. av., Dodon. — Abtshagen, im diesseitigen Walde. Demmin: Devensche Holz. *Anclam. R:* *Berger Holz*, Granitz, *Stubnitz.*

284. *Nepeta*, Tragus. Rivin.

628. *N. Cataria*, Linn. — *Cataria* herba, Dodon. — **R:** Ufer am Nesebanzer Strande; Gussow, an der Landstrasse diesseit des Dorfs.

285. *Neslea*, Desvoux.

629. *N. paniculata*, Desv. — *Myagrum* paniculatum, Linn. — Bei Stadtkoppel, Zinnendorf u. a. v. a. O. *Lassar. R:* Kl. Bandelwitz.

Nieandra physaloides, Gärt. — Bisw. verwildert; unbeständig.

286. *Nigella*, Eur. Cordus. Tournef.

630. *N. arvensis*, Linn. — *Melanthium* arvense, Clusius. — *Anclam.*

N. damascena, Linn. — Bisw. verwildert.

287. *Nuphar*, (Vestling.) Smith.

631. *N. luteum*, Smith. — *Nenuph.* lut., Brunnfels. *Nymphaea* lutea, Linn. Fuchs. — Knieper-Mühlengraben u. a. v. a. O. — Kommt bei gesunkenem Wasser an flachen Ufern auch vollkommen ausser dem Wasser mit kür-

zeren, aufrechten Blatt- u. Blütenstielen vor: am Andershöfer Teich, am Borgwallsee.

632. *N. pumilum*, Smith. — Grimmen: Poggendorf.

288. *Nymphaea*, Brunnfels. Tournef.

633. *N. alba*, Linn. Brunnfels. — Kniepersteich; Andershöfer u. Voigdehäger Teich u. a. O. Demmin. Rügen.

289. *Odontites*, Tabern. Rivin.

Arten von *Euphrasia* bei Tournef. u. Linn.

634. *O. littoralis*, F. — *Euphrasia* litt., Fries. *Euphr.* verna, Bellardi (nach Gareke; von Anderen als Syn. der flg. Art citirt!) nicht Rehbch. — Ist fast verblüht, wenn die folgende Art zu blühen anfängt; Blätter u. Kelehe etwas fleischig. — **R:** Waupen, in den südl. Wiesen; Laneken, am Strande.

635. *O. rubra*, Pers. — *Euphrasia* Odont., Linn.

30. 290. *Oenanthe*, Lobel. Tournef.

636. *Oe. fistulosa*, Linn. — *Oe. aquatica* — *caulibus fistulosis*, Morison. — Tribbs. Feld u. a. O.; Abtshagen, Niederhof u. a. O.

β. *Tabernaemontani*, Koch. — Knipferwiese am Jungfernstieg u. a. O.

637. *Oe. Phellandrium*, Lamek. — *Phell.* aquaticum, Linn. *Phell.*, Dodon. — In Gräben u. Sümpfen des Stadtfeldes; Lüßow, Andershof, Devin u. a. O.

26. *Oenothera biennis*, Linn. — Verwildert; hie u. da an Wegen.

18. 291. *Ononis*, Eur. Cordus. Linn.

638. *O. repens*, Linn. — Der Stengel ist oft nicht wurzelnd, und in Gebüschen nicht selten aufrecht.

β. *inermis*, Smith (als *O. arvensis* a.). — Nicht eben selten.

639. *O. spinosa*, Linn. Syst. X. — *O. arvensis* β. *spinosa*, Linn. Spec. II. *Anonis* spin., Besler. — Mit weisser Blumenkrone am Frankenstrande (selten) u. auf dem Dänholm.

O. arvensis, Linn. Syst. X. (*O. spinosa* a. *mitis*, Linn. Spec. II. *Anonis* *mitior* *prima*, Cnsius.) fand ich hier nicht.

37. 292. *Onopordon*, Gesner. Vuill.

640. *O. Acanthium*, Linn. — Aca., Dodon. — Scheint auch ☉ (klein, bisw. kaum über fingerslang und 1-köpfig) vorzukommen.

293. *Ophioglossum*, Fuchs. Tournef.

641. *O. vulgatum*, Linn. C. Bauh. — Zu Weigels Zeiten (jetzt mit dem Gehölz verschwunden) zwischen dem Vogelsang und Jungfernhof häufig. Wahrscheinlich noch im Gebiet vorhanden.

64. 294. *Ophrys*, Caesalpin. Linn. em.

642. *O. apifera*, Huds. — *O. insectifera* Var. *adachnites* (n. *Arachnites*, Linn. zum Theil. — **R:** *Stubnitz.*

63. 295. *Orchis*, Fuchs. Tournef.

643. *O. angustifolia*, Wimm. u. Gr. (nicht Rehbch.).

X *Androsace* 53 = *Lychnis* a *Obione* 56 = *Hyssopus*

— *O. incarnata*, Linn. (Fl. suec. II. — Syst. XII.) nach Fries bei Koch u. A. vorangestellt, obwohl Letzterer selbst sagt, dass *L.s* Worte in der Bem. (Fl. suec.) nur zu *O. Traunsteineri* (Sauter) passen. Linn. hat sie zuletzt (Mant. II.) wenigstens zum Theil als rothblühende Var. zur *O. sambucina* (Fl. suec. II. u. später) gezogen, indem er das Cit. aus Haller (hist. n. 1280.) von letzterer Art auch auf die *O. incarnata* überträgt, dagegen das Cit. aus Segnier („*O. palmata lutea* cet.“) zur *O. sambucina* hinhernimmt. — Auch *O. latifolia* (Linn.) kommt vor mit Deckblättern, deren oberste die Blüten überragen, und mit (schmalen) Blättern, die an der Spitze kahnförmig-vertieft od. etwas kappenförmig sind. — Um Str. vereinzelt und selten: an der Herrenwiese; Devin; Voigdelagen, in einer Wiese nach Lüdershagen zu.

644. *O. latifolia*, Linn. — Satyrium — latifolium, Thal. — Die Blütenhülle ist oft blass-purpurn, od. hell-fleischroth mit weisslichem Sporn, auch rötlich-weiss od. rein weiss. — Eine kleinere, schwächere Form mit kaum röhrrigem Stengel, mit einer Lippe, deren Seitenlappen abgerundet-verkürzt sind, auf einer Strandwiese nahe vor Parow.

β. *rhombica*, F. — Lippe rauten-eiförmig, ungelappt, an den vorderen, geraden Rändern etwas gezähnt. — Heide bei Gr. Kädingshagen am Wiesenraude; selten.

645. *O. laxiflora*, Lamck. — R: auf dem Bug.

646. *O. maculata*, Linn. — Palma Christi mac., Tabern. — Heide bei Gr. Kädingshagen, klein. Niederhof, Negast, Abtshagen u. a. O. häufig. R: Stubnitz.

647. *O. mascula*, Linn. — Satyrium mas., Brunfels. Testiculus morionis mas., Dodon. — Tribsees: Bisdorf; an der Barthe; Kienbakenhagen. Greifswald. R: Schrow; Putbus; Jasmund (Nipmerow).

648. *O. Morio*, Linn. — Cynosorchis mor. —, Lobel. Testiculus morionis femina, Dodon. — Heide bei Gr. Kädingshagen, Mariensdorf; Hofwiese bei Abtshagen. Greifswald: Hohenmühl. R: Bergen, Gora, Granitz, Quadtitz, Perd.

649. *O. purpurea*, Huds. (1762.). — *O. fusca*, Jacq. *O. militaris* β. u. (wahrscheinlich auch) δ. Linn. *O. stratiotica* — s. *militaris*, Gemma. — Testiculus — mil., Tabern. — R: Stubnitzufer und am Steinbach.

650. *O. Rivini*, Gouan. — *O. militaris* γ. Linn. „minor.“ — R: zwischen Bobbin und Campe. Garz.

651. *O. ustulata*, Linn. — R: Stubnitzufer (häufig, nach Weigel; ich konnte über das Vorkommen daselbst bis jetzt nichts erfahren).

296. *Origanum*, Fuchs. Tournef.

652. *O. vulgare*, Linn. Fuchs. — Seeufer bei Lüssow, häufig; Gr. Zansbur, an der Landstrasse. Loitz. Lassau: Clotzow. R: Jasmund.

297. *Ornithopus*, Cassin.

653. *O. mixta*, De C. — *Anthemis* m., Linn. Chamae-

melum — — flore mixto, Morison. — Auf einem Acker, wo vorher *Ornithopus sativus* (Brotero) gestanden, bei Langendorf. Da sie sich dort mehrere Jahre erhielt und sich also leicht irgendwo einbürgern könnte, habe ich sie hier vollständig eingereiht.

654. *Ornithogalum chloranthum* (Sauter), *O. nutans* (Linn.) und *O. umbellatum* (Linn.): bisw. in Baumgärten und Gebüsch verwildert.

298. *Ornithopus*, Linn.

Ornithopodium von Dalech. bis Tournef.
654. *O. perpusillus*, Linn. — *O. perpusillum*, Dalech. — Devin, Zarrendorf, Wendorf, Sandhagen, Negast u. a. O. Lassau: Silberkuhl. R: Gora.

O. compressus, Linn. — Bisw. unter dem jetzt öfters gebauten *O. sativus*, Brot.

50. 299. *Orobancha*, Gesner. Tournef.

655. *O. Galli*, Duby. — Ildensees. R: Mönchgut, auf dem Perd.

656. *O. rubens*, Wallr. — Barth: am sundischen Berge. Demmin: an den Kiefern.

O. minor (Sutton) angeblich auf R: in der Granitz.

22. *Orobis*, Linn. — *Vid. Lathyrus*.

23. 300. *Osmunda*, Lobel. Tournef.

657. *O. regalis*, Linn. Plumier. (Lonicer.) — Parower Aussenkoppel. Negast Heide. Greifswald: Hanshagen u. a. O. Lassau: Jamitzow. R: Aalbecker Kiefern.

17. 301. *Oxalis*, Linn.

Oxalis bei den Älteren = *Rumex*.

658. *O. Acetosella*, Linn. — *Ac. vulgaris*, Rupp. *Trifolium acetosum*, Brunfels. — Negast, Pennin u. a. v. a. O.

659. *O. corniculata*, Linn. — *Oxys lutea corniculata* repens, Lobel. — Als Unkraut in Gärten; hier selten.

660. *O. stricta*, Linn. — *Oxys americana erectior*, Tourn. — Franken- und Tribs. Vorstadt. Demmin. *Auculam*. Lassau.

25. 302. *Panicum*, Matthiol. Linn.

661. *P. Crus galli*, Linn. — Frankenvorstadt, Knieperfeld u. a. O. Demmin.

662. *P. glabrum*, Gaud. — *P. sanguinale* Linn. Faun. suec. II. append. und der Standort „Halland“ in Spec. II. — Franken- und Knieperfeld, Gr. Kädingshagen, Pennin u. a. O. häufig. Demmin.

663. *P. sanguinale*, Linn. Spec. u. Syst. — *Sanguinaria venenaria*, Tragus. *Gramen Mannae esculentum*, Lobel. Demmin: an der westl. Stadtmauer. Rügen. — Soll in älteren Zeiten gebaut worden sein (Germanis Schwaden, Val. Cordus).

P. capillare (Linn.) und *P. miliaceum* (Linn.) bisw. aus verschlepptem Samen, aber unbeständig.

303. *Papaver*, Brunfels. Tournef.

664. *P. Argemone*, Linn. — *A. capitulo longiore*, Lobel.

665. **P. dubium**, Linn. — Mit hell-fleischrother Blumenkrone am Ufer diesseits Franzenshöhe.

666. **P. Rhoeas**, Linn. Fuchs. — **P. Rh.** sive caduceo flore — Lobel. — Demmin. Greifswald. Anclam. Lassan. Rügen.

P. strigosum, Bönningh. — Demmin. Geht durch Zwischenformen in die gewöhnl. Pflanze über.

P. somniferum, Linn. — Aus verschlepptem Samen an Wegen und auf Äckern.

54. 304. **Parietaria, Brunfels. Tournef.**

667. **P. officinalis**, Linn. — **P. officinarum**, C. Bauh. **P.** — etiam Vittraria, Eur. Cordus. **P. erecta**, M. u. Koch. — Greifswald: an der nördl. Stadtmauer. Bei Str. seit einigen Jahren ausgerottet.

6. 305. **Paris, Lobel. Rupp.**

668. **P. quadrifolia**, Linn. — **Solanum tetraphyllum**, Gesner. — Parower Park, Ufer am Andershöfer Strande, Niederhof, Negast, Pennin, Bussin, Abtshagen u. a. O. Lassan. **R:** Medars.

12. 306. **Parnassia, Tournef.**

669. **P. palustris**, Linn. — **P. pal. et vulgaris**, Tourn. **Gramen Parnassi**, Dodon. — Herrenwiese, Parow, Chaussee nach Pölte, Lüßow (in den Wiesen am See) u. a. v. a. O.

30. 307. **Pastinaca, Tragus. Tournef.**

670. **P. sativa**, Linn. **Tragus**. — Barther Landstrasse, am Strande u. a. O.

44. 308. **Pedicularis, Lonicer. Rivin.**

671. **P. palustris**, Linn. — Herrenwiese; nm den Vogelsang; Negast u. a. O.

672. **P. Sceptrum Carolinum**, Linn. — **Sc. car.**, Rudbeck. — Tribsees: Plenniner Moor. Loitz: Transtower Moor. Gützkow.

673. **P. silvatica**, Linn. — Voigdhäger Moor, Negast; Martensdorf: an der Westseite der Kiefern. Tribsees: Plenniner Moor. Greifswald: zwischen Wampen und Ladebow. Lassan: Wiesen.

27. 309. **Peplis, Linn. (Anquillaria.)**

674. **P. Portula**, Linn. — Port, Dillen, Alsine rotundifolia **P. Portulaca aquatica**, Jo. Gerard. — Brandshagen, Negast; Martensdorf: an der Laehe vor dem Dorf.

31. 310. **Perichyemenum, Fuchs. Rivin.**

Periel. u. **Caprifolium**, Tourn. **Caprifolium**, Juss.

675. **P. vulgare**, Mill. — **P. vulg.** Septentrionalium, Clusius. **Lonicera Periel**, Linn. — Barther Landstrasse, Andershöfer und Parower Strand, Negast u. a. v. a. O. Lassan: Waschow. Rügen.

33. 311. **Petasites, Fuchs. Tournef.**

676. **P. officinalis**, Mönch. — Tussilago Petasites, Linn. u. **T. hybrida**, Linn. — Am Knieper-Mühlenteich, Tribs. Vorstadt, Abtshagen u. a. O. Rügen. — Überall fand ich nur die Zwitterpflanze (**Tuss. Pet.**, Linn.), und diese scheint niemals Samen zu tragen.

677. **P. tomentosus**, De C. — Tussilago tomentosa, Ehrh. **T. spuria**, Retz. u. **T. paradoxa**, Retz. — Lassan; an der Peene beim Bauerberg (Heinrich); ich sah von dort nur die Zwitterpflanze (**Tuss. spuria**, Retz.).

Petroselinum sativum, Hoffm. — Bisw. aus verschlepptem Samen an Dorfstrassen und Wegen.

50. 312. **Peucedanum, Fuchs. Tournef.**

678. **P. Cervaria**, Lapeyr. — **Athamanta Cerv.**, Linn. **Selinum Cerv.**, Linn. Spec. I. append. **Cervaria nigra**, Jungermann. — Lassan: Lentschow.

679. **P. Oreoselinum**, Mönch. — **Athamanta Or.**, Linn. **Or. s. Veeltutta**, Dodon. — Devin: am Ufer des Sees; Langendorf: an der Chaussee. Demmin: Devensehe Holz, Kiefern, Vorwerk. Lassan: Papenberg. **R:** Gustow, auf dem Papenberg.

P. nanum, F. — Stengel niedrig (3—6" hoch), 1ldolbig. Blätter 2fach-gefiedert. — Devin: Rauhe Berg. Demmin.

75. 313. **Phalaris, Tragus. Linn.**

680. **Ph. arundinacea**, Linn. — **Gramen arundinaceum** —, Tabern. — Am Frankenteich u. a. v. a. O. Auch auf trocknerem Boden: H. Graben.

Ph. canariensis, Linn. — Aus verschlepptem Samen auf Schnitt und Äckern.

Philadelphus coronarius, Linn. — Bisw. verwildert.

76. 314. **Phleum, Linn.**

681. **Phl. Boehmeri**, Wibel. — **Phalaris phleoides**, Linn. — Greifswald. Demmin: an den Kiefern. Lassan: Buggenhagen.

682. **Phl. pratense**, Linn.

P. nodosum, Linn. (als Art.). — Sehr häufig.

P. viviparum, F.

77. 315. **Phragmites, Francus de Frankenan. Trinius.**

683. **Phr. communis**, Trin. — **Arundo phragm.**, Linn. Spec. I. Fl. succ. II. A. **phragmitis**, Linn. Spec. II. Syst. XIII. Ruellius. A. **vallatoria**, Dodon. — Mit sehr verlängerten Ansläufern unherkriechend am Franken- und Andershöfer Strande. Klein und schwächig (1½—2' hoch), mit kleiner (2—3' langer) Rispe auf trockenem Lehm-boden auf **R:** am Wege von der Grabler Fähre nach Kl. Bandelwitz.

42. 316. **Phyteuma, Cuesalpin. Linn.**

684. **Ph. spicatum**, Linn. — **Rapunculus silvestris spicatus**, Thal. — Tribsees: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensehe Holz. **R:** Stubnitz.

61. 317. **Picea, Brunfels. Link.**

685. **P. vulgaris**, Link. — **Pinus Abies**, Linn. **Abies rubra**, **Tragus**. — Unter vielmal älteren Kiefern; daher doch wohl vollkommen eingebürgert.

39. 318. **Picris, Dalech. Linn.**

686. **P. hieracioides**, Linn. — **Hieracium pratense**

asperum, Gesner. — Treibt nach dem ersten Blühen oft Äste aus den mittleren Blattwinkeln, und diese blühen bis in den Herbst. — Seeufer bei Lüssow, häufig; Chaussee bei Teschenhagen, klein. *Greifswald.*

P. hispidissima, Bartl. nach Koch. (?) — Einmal von mir in der Ballastkiste gefunden. Die Pflanze stimmt, auch in Betreff der Achänen, mit der Diagnose bei Koch überein: nur sind die äusseren Hüllchen des Hüllkeles nicht am Rande borstig-gewimpert. Die Äste weit-abstehend.

319. *Ptilularia*, Vaill.

687. **P. globulifera**, Linn. — *Greifswald:* Galgenkamp.

320. *Pimpinella*, Brunfels. Rivin.

688. **P. magna**, Linn. Mant. II. Syst. XIII. — *P. saxifraga* *p.* *δ.* und (?) *ε.* Linn. Spec. Saxifraga m., Dodon. — H. Graben, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

p. laciniata, Wallr. — H. Graben. Die Blätter dieser Form sind durch weitere Entwicklung der unteren, länger als bei der Hauptform gestielten Blättchen bisw. theilweise doppelt-gefiedert.

689. **P. Saxifraga**, Linn. (Syst. XIII. Sonst *saxifr.*) mit Ausschl. der Varr. *p. δ.* und (?) *ε.* — Saxifraga parva, Dodon. — An den Chausseen, Weggründern u. a. O. häufig. **R:** Altenfähr, am nördl. Strände; *Jasmund.*

α. major, Wallr. — Geht durch Zwischenformen in die fig. Var. über.

β. dissectifolia, Wallr. — Vielleicht Var. *ε.* Linn. Spec. II. *γ. poteriifolia*, Wallr. — Selten.

δ. rosea, F. — Blumenkrone rosenroth. — Bei Fraueneshöhe; am Wege von Grünhufe nach Lüssow u. a. O.

P. nigra, Willd. (Tragoselinum majus umbella candida, radice succum caeruleum fndente, Johren. Daucus Cyanopus, Val. Cordus) möchte im Gebiet auch vorkommen.

321. *Pinguicula*, Gesner. Tournef.

690. **P. vulgaris**, Linn. — Parower Aussenkoppel, Voigdhäger Moor, Negast, Abtshagen (Hofwiese) u. a. O. Tribsees: Plenniner Moor. **R:** *Jasmund.*

322. *Pinus*, Brunfels. Tournef.

Vgl. Picea.

691. **P. silvestris**, Linn. Matthiol.

323. *Pirola*, Brunfels. Tournef.

692. **P. chlorantha**, Swartz. — *Greifswald:* Hanshagen. **R:** Kiefern zwischen Putbus und Casnevitz; *Jasmund.*

693. **P. media**, Swartz. — **R:** Stubnitz.

694. **P. minor**, Linn. Rajus. — Pennin, Abtshagen. Anclam. **R:** Gora, Granitz, Stubnitz.

695. **P. rotundifolia**, Linn. — *P. rot. major*, C. Bauh. — Negast, Pennin. *Greifswald:* Eldena, Hanshagen. *Lassan:* Moor bei Wangelkow. *Anclam:* *R:* Serpin, Granitz, Stubnitz.

696. **P. secunda**, Linn. — *P. 2. et tenerior*, Clusius. —

Abtshagen. Tribsees: Forkenbeck. Demmin: Devensehe Holz. *Greifswald:* Hanshäger Kirchenholz. **R:** Stubnitz.

697. **P. umbellata**, Linn. — *Lassan:* Wangelkow. *Wolgast:* *Gr. Ernsthof.* **R:** Kiefern zwischen Putbus und Casnevitz u. a. O.

698. **P. uniflora**, Linn. Rudbeck. — *Wolgast:* *Gr. Ernsthof.* *Lassan:* Buggenhagen.

324. *Pinus*, Brunfels. (-y-) Linn.

699. **P. communis**, Linn. — *P. silvestris*, C. Bauh. — H. Graben: jung u. vielleicht aus verschlepptem Samen. **R:** *Jasmund.*

700. **P. Malus**, Linn. — *Malus silvestris*, Tabern. — Abtshagen. **R:** *Jasmund.*

325. *Pisum*, Brunfels. Tournef.

P. arvense, Linn. (nach der Bem. im It. vestg.) ist die von ihm als wirklich wildwachsend betrachtete Pflanze, die sich von seinem *P. sativum* durch weit geringere Grösse [aller Theile] unterscheidet, und der er ausserdem 1blüthige Blütenstiele und die gefährte Blumenkrone beilegt, ohne die beiden letzteren Merkmale dem *P. sativum* abzusprechen. C. Bauhins *P. arvense* zieht er zur letzteren Art, und versteht also unter dieser die gebaute Pflanze in allen ihren Formen. In anderem Sinne wenden alle (?) Neueren die L. sehen Namen an: ich glaube, mit Unrecht. — Verwildert, auf minder fettem Boden, wird *P. sativum* (Linn.) sofort viel kleiner und magerer. — Es würde hiernach also in die durch Cultur entstandenen Varr. von *P. arvense* aufzulösen sein, welches noch hier u. da zu finden sein dürfte.

701. **P. maritimum**, Linn. — *P. marinum*, Rajus. — Rügen.

326. *Plantago*, Brunfels. Linn.

702. **Pl. Coronopus**, Linn. — *Cor. sativus*, Dodon. *Cor. silvestris*, Caesalpin. — Frankenweide, Deviner Ort u. a. O. Zingst. *Greifswald:* Hiddensee. **R:** Wiesen am Mühlen; *Wittow.*

703. **Pl. lanceolata**, Linn. Tragus. — Lancelolata, Fuchs. *p. capitellata*, Koch. — Nebst der von Sonder ebenso benannten Form häufig.

γ. lanuginosa, Koch. — Chaussee jenseit des Bocks.

704. **Pl. major**, Linn. Fuchs. — Kapseln 6—36samig. Die Blätter, bes. am Grunde, oft grob-gezähnt; der Blattstiel auf nacktem Boden oft mehrmals kürzer als das Blatt.

705. **Pl. maritima**, Linn. Gesner. — Frankensrand u. -Weide, Dänholm u. a. v. a. O. Rügen.

706. **Pl. media**, Linn. Fuchs. — Die Blattstiele sind nicht selten so lang als das Blatt und alsdann unterwärts nicht breiter als bei *Pl. major*. An feuchteren Orten werden die Blätter länger, schmaler (3—4 mal so lang als breit), stumpfer, spärlicher behaart, fast grasgrün. — An der Chaussee nach Brandshagen; Deviu u. a. O.

327. *Platanthera*, Richard.

707. **P. bifolia**, Rich. — Orchis bif., Linn. zum Theil. O. alba bif. minor —, C. Bauh. — Stielehen der Staubmassen etwa $\frac{1}{4}$ so lang, als diese. — Voigdhäger Moor, Parower Auskuppel, Martensdorf, Negast (vormal. Heide u. am Waldrande), Abtshagen: überall nicht häufig.

708. **P. montana**, Rehb. fil. — Orchis mont., Schmidt. O. bifolia, Linn. (zum Theil); namentlich in der Mant. II. wegen des Cit. aus Haller) Tabern. Plat. chlorantha, Cust. — Stielehen der Staubmassen ziemlich so lang als diese. Blüten ebenfalls wohlriechend. — Um Str. sehr häufig: an allen bei der v. Art angegebenen Orten (bei Abtshagen in grosser Menge); ausserdem bei Niederhof (im Park) und bei Zimkendorf. R.: Stabnitz, häufig.

β . minor, F. — Kleiner (kaum 1' hoch); auch die Blüten kleiner und die inneren seitenständigen Zipfel derselben mehr wie bei der ersten Art. — Gr. Kädingshagen: Heidestelle in den Wiesen am Vogelsang neben der Heide. Ob ein Erzeugniss des sonuigen, minder fruchtbaren Standorts?

328. *Poa*, Linn.

709. **P. annua**, Linn. — Auch ♂, und vielleicht sogar zum 2ten Mal blühend.

710. **P. bulbosa**, Linn. — Nicht heimisch (?).

β . vivipara, Koch. — Var. β . Linn. — Andershöfer Strand; sehr selten.

711. **P. compressa**, Linn. — Ähren meist 4—10blüthig.

β . triflora, F. — Ähren 1—4blüthig. — Stadtmaner; Knieperwall.

γ . denudata, F. — Untere Spelze ganz kahl. — Auf dem vormal. Kl. Paschenberge.

712. **P. nemoralis**, Linn. — Ähren 1—6blüthig. — H. Graben, Niederhof, Abtshagen u. a. v. a. O.

β . firmula, Koch. — Barthler Landstrasse n. a. O.

γ . rigidula, Koch. — Zimkendorf, Negast, Abtshagen.

713. **P. pratensis**, Linn. — Ähren 1—8blüthig. — Ändert fast eben so sehr ab, als *Pestuca rubra*.

1) Nach der Färbung ist die Pflanze entw. grasgrün, oder (bes. die Ähren) ins Graue ziehend; ausserdem:

β . caesia, F. — Überall bläulich-grau-bereift; die Ähren dazu meist satt-violett gefärbt. Blätter kurz, flach od. weit-rinnig, breit. — Kleinere Form; häufig auf sandigem und torfigem Boden: bei Stadtkoppel, bei der Vogelstange, am Strande u. a. O. — Hierher gehört auch Var. β . latifolia, Koch, der dabei übersehen hat, dass diese Blattform auch bei der unbereiften Pflanze vorkommt.

2) Die Wurzelblätter sind bald nur $\frac{1}{4}$ od. $\frac{1}{4}$ so lang als der Halm, bald länger, oft so lang od. länger als dieser; dazu sind sie bald schlaffer, bald steifer, und

ausserdem — in einander durch Zwischenformen übergehend:

γ . setacea, F. — Wurzelblätter zusammengerollt-borstenförmig, schmal.

δ . plicata, F. — Wurzelblätter einfach-zusammengefallt, schmal od. ein wenig breiter.

ϵ . plauifolia, F. — Wurzelblätter flach od. weit-rinnig, breiter.

3) Die Blattscheiden sind gewöhnlich kahl und glatt, ausserdem aber — besonders die äusseren Scheiden der unfruchtbaren Blätterbüschel:

ζ . scabra, F. — Untere Blattscheiden von kleinen Knötchen rauh.

η . setulosa, F. — Untere Blattscheiden von kurzen od. sehr kurzen rückwärtsgerichteten Borsten rauh.

4) Der Halm ist entweder stielrund, oder:

θ . compressa, F. — Halm mehr od. minder zusammengedrückt, oft fast 2sehnig (oder unterwärts zusammengedrückt und oberwärts oder an der Spitze stielrund: eine Zwischenform). Grösser und kleiner; auch die Var. β . gehört sehr oft hieher. Die Var. IV. anceps, Gaud. begreift nach Koch nur grössere Formen.

714. **P. serotina**, Ehrh. — P. fertilis, Host. — Kupferwiese; am Knieper-Mühlengraben u. a. O.

715. **P. trivialis**, Linn. — Kommt bisw. ganz und gar gelblich-bleich vor. Die Ähren bisw. 1blüthig mit untermischten 2blüthigen.

β . glabra, F. — Blattscheiden und Halm glatt. — An nassen Orten: Knieperstrand.

Polemonium caeruleum, Linn. — möchte an der Grenze des Gebiets zwischen Tribssee und Dömnitz vorkommen.

329. *Polygala*, Tragus. Linn.

716. **P. amara**, Linn. — P. — foliolis circa radicem rotundioribus — sapore admodum amaro —, Thal. — Greifswald. Anetan.

717. **P. vulgaris**, Linn. — P. vulg. (major und minor?), Clusius. — Kugelfang, Frankenweide n. a. v. a. O.

β . oxyptera, Reichenb. (als Art.) — Nicht gar selten. **P. comosa**, Schkuhr. — Wahrscheinlich heimisch.

330. *Polygonum*, Fuchs. Linn.

718. **P. amphibium**, Linn. — Persicaria major amphibia —, Plukenet. — Die Varr. natans (Mönch) u. terrestre (Leers) bilden sich an günstigen Standorten auf einer und derselben Wurzel aus. — Die schwimmende Form im Knieper-Mühlengraben, an der Barthler Landstrasse; Devin u. a. O.

β . maritimum, Dethard. — Dieses fand ich nicht

719. **P. aviculare**, Linn. — Das eigentliche **P.** der Älteren.

β . revolutum, F. — Blätter schmal-lanzettförmig, spitz, am Rande zurückgerollt. Stengel niedergestreckt. —

An sandigen Orten, auch mit der gewöhnlichen Form: Kugelfang; Ufer des Borgwallsees bei Lüssow.

720. **P. Bistorta**, Linn. — Bist., Brunsfels. — Der Stengel treibt nicht selten aus dem obersten Blattwinkel eine zweite, kleinere, gestielte Ähre od. einen kleinen, lährigen Ast; sehr selten sind 2 steinständige Ähren. — Tribsees: Plenniner Moor, Demmin. Anclam. *Lassau: Vorwerk, Wolgast. R: Garz.*

721. **P. Convolvulus**, Linn. — Conv. niger, Dodon.
722. **P. dumetorum**, Linn. — Fagopyrum scandens — dum. — Rupp. — Zimkendorf: Waldecke Borgwall gegenüber, Demmin: Devensee Holz. **R: Ufer am Nesebanzer Strande.**

723. **P. Hydro Piper**, Linn. — Hydr., Fuchs. — Kupfergraben u. a. O.

β. submersum, F. — Untergetaucht, aufrecht, heimlich-blühend. — Knieper-Mühlengraben.

724. **P. lapathifolium**, Wahlenb. Ob aber auch Linn. ? — Persicaria major, lapathi folis —, Tourn. nach Linn., welcher der Pflanze blattgegenständige Blütenstiele von der Länge des Blatts zuschreibt und sie in die Fl. succ. nicht aufgenommen hat. — In allen Formen vorkommend.

β. incanum, Koch. — P. Persicaria *γ.* Linn. Spec. II. Pers. folio subtus incano, Rajus. — An einer sehr häufigen Mittelform sind die oberen Blätter unterseits kahl, aber drüsig-punktiert.

725. **P. minus**, Huds. — P. Persicaria *δ.* Linn. Mant. II. Pers. pumila, Tabern. — Kupferwiese, Negast, Abtshagen u. a. O. Demmin.

β. submersum, F. — Untergetaucht, aufrecht, heimlich-blühend. — Knieper-Mühlengraben.

726. **P. mite**, Schrank. — *Wiesen um den Vogelsang.*

727. **P. Persicaria**, Linn. mit Ausschl. des Cit. aus Haller und sämtlicher Varr. Persicaria, Fuchs.

P. Fagopyrum, Linn. und **P. tataricum**, Linn. — Verwildert.

331. Polypodium, Brunsfels. Linn.

728. **P. Dryopteris**, Linn. — Filix querna s. Dr., Jo. Gerard. — **R: Stübnitz.**

729. **P. Phegopteris**, Linn. — Abtshagen, im diesseitigen Walde, selten. *Greifswald. R: Stübnitz.*

730. **P. vulgare**, Linn. C. Bauh. — Mauern in Elmenhorst; Martensdorfer Kiefern. Dars. Zingst. Demmin. *Greifswald: Hanshagen. R: Wampen; Stübnitz.*

332. Polystichum, Roth.

731. **P. cristatum**, Roth. — Polypodium cr., Linn. — Parower Aussenkoppel, Negaster Moor, Sandhagen, Middelhagen.

732. **P. Filix mas**, Roth. — Polypodium F. mas, Linn. Fil. mas, Fuchs. — Am Strande nach Devin; Elmenhorst, Bussiner Forst u. a. O. **R: Stübnitz.**

733. **P. Oreopteris**, De C. — Dars (?). **R: Stübnitz.**

734. **P. spinulosum**, De C. — Parower Aussenkoppel, Negast, Pennin, Abtshagen, Martensdorf u. a. O. — **R: Stübnitz.**

β. dilatatum, Koch. — Negast u. a. O.

γ. glandulosum, F. — Laub unterseits od. beiderseits mit kurz-gestielten Drüsen bestreut; der Stiel ebenfalls drüsig, oder drüsenlos. — Negast: Waldrand neben der Wiese am See.

735. **P. Thelypteris**, Roth. — Polypodium Thel., Linn. Mant. II. Thel. palustris —, Rupp. — In Menge am Vogelsang u. a. v. a. O. **R: Jasmund.**

β. dilatatum, F. — Laub lang gestielt, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ so breit als lang; die untersten od. die meisten Zipfel der Fiedern kerbig-gelappt, der eine od. der andre derselben sehr selten vergrößert, fiederspaltig. — Lüssow: am Weiher infern des Sees nach Negast zu, mit der gewöhnl. Form, selten.

333. Populus, Tragus. Tournef.

736. **P. alba**, Linn. Dodon. — Staubgefäße 2—20.

737. **P. canescens**, Smith. — Staubgefäße 2—20. — Eine P. albo-tremula od. viell. P. tremulo-alba giebt es wahrscheinlich auch, ist aber wohl von P. can. zu unterscheiden.

β. mixta, F. — Trägt auf einem Ast nur männliche, auf einem anderen nur weibl., auf einem dritten, in denselben Kätzchen untermischt, männl. u. weibl. Blüten, endlich auf einem kleinen unteren Ast männl. u. weibl. Blüten in demselben Kätzchen mit (etwa 5männigen) Zwitlern untermischt. — In einem Garten der Kniepervorstadt.

738. **P. nigra**, Linn. Dodon. — Staubgefäße 3—30. Männl. Kätzchen bisw. am Grunde ästig.

739. **P. tremula**, Linn. C. Bauh. — Tremula Latino-rum, Val. Cordus. — Staubgefäße 3—30.

β. villosa, Lang (als Art). — Negast.

334. Potamogeton, Fuchs. Tournef.

740. **P. compressus**, Linn. — P. caule compresso —, Rajus. — Knieper-Mühlengraben und -Teich, Paulitz (Weiher) u. a. O. Demmin. Lassau.

741. **P. crispus**, Linn. — P. — crispum —, Thal. — Die unteren Blätter am Rande flach. — Knieperteich (in Menge) u. a. v. a. O. Demmin. Lassau.

742. **P. gramineus**, Linn. mit Ausschl. des Cit. aus Rajus u. aus Loesel (obgleich aus Letzterem der Name entnommen ist). — Ich fand hier nur die flg. Var.

β. heterophyllus, Fries. — Lehmgrube neben dem Wege nach Devin; Torfgruben im Voigdhäger Moor u. am See bei Sandhagen; im Krummenhäger u. im Borgwall-See; bei Steinhagen. — Vgl. unten die Bem. bei P. natans.

743. **P. lucens**, Linn. — Fontinalis lucens major, I. Bauh. — Knieperteich (auch die gehörte Form mit verkleinert od. verschwindender Blattfläche), Andershöfer Teich u. a. O. Demmin. Lassau.

744. **P. marinus**, Linn. — Weiher jenseits Paulitz

an der Chaussee (Früchtchen grösser, röthlich-ledergelb). Wahrscheinlich auch im Straudwasser. **R:** im Mählen, mit kleineren, olivenbraunen Früchtchen.

745. **P. mucronatus**, Schrad. — Knieper-Mühlengraben u. -Teich; selten.

746. **P. natans**, Linn. — Frankenteich u. fast in allen Weiern u. alten Torfgruben. — Am Ufer flachrandiger Gewässer u. an austrocknenden Standorten wird diese Art nebst *P. gramineus* kurzstengelig, kommt aber nicht zum Blühen; bei beiden sind dann die unteren Blätter meist phylloidenartig, die oberen den sonstigen schwimmenden gleich, aber bei *P. natans* kürzer gestielt.

747. **P. obtusifolius**, M. u. Koch. — Knieper-Mühlengraben u. -Teich, häufig.

748. **P. pectinatus**, Linn. — Unterste Blätter oft (immer?) 3nervig. — Straudwasser; Gräben der Frankenteiche; Torfgrube der Pöhner Trift am Fusssteige nach Preetz: hier die Früchte mit einer ins Gelbliche ziehenden Färbung. Lissan: in der Peene. **R:** in u. an dem Mählen.

749. **P. perfoliatus**, Linn. Rajus. — Frankenteich, Borgwallsee; Mühlengraben an der Chaussee bei Grünhude u. bei Pütte. Demmin. Lissan.

750. **P. pusillus**, Linn. — *P. pusillum* —, Vaill.

α. major, Fries. — In dem alten Wallgraben an der Tribs. Vorstadt, nördlich von der Brücke zur Barther Landstrasse. Lissan: in der Peene.

β. vulgaris, Fries. — Mit der v. Var. in dem vorher bezeichneten Wallgraben. Rügen (ohne genauere Angabe des Fundortes).

751. **P. rufescens**, Schrad. — Knieper-Mühlengraben; II. Graben in Menge; Deviner Fliess u. a. O.

752. **P. vaginalis**, F. — Zur Rotte Coleophylli (Koch) gehörig. — Blätter lineal, vom Grunde an kaum merklich verschmälert, kurz-stachelspitzig, quer-aderig, etwas breiter als der Stengel, krautig; *untere und mittlere* stumpf, fast halb-stielrund, oberseits flach u. nach dem Grunde hin leicht-rinnig, 5 — mehrnervig; *obere* ziemlich flach, unterseits schwach-gewölbt, nach der Spitze hin merklicher verschmälert, 5nervig; *die obersten* flach, verschmälert spitz, 3nervig. — Blüten u. Früchtchen vermochte ich noch nicht zu erlangen; aber auch so unterscheidet sich diese Art hinreichend von den beiden heimischen verwandten, ausserdem von *P. zosteraceus* (Fries) durch die nicht flachen noch durchscheinenden, auch nur ziemlich entfernt quer-aderigen, nicht netzig-aderigen Blätter. Letztere, wenigstens die unteren, werden bis 9" lang u. über 1" breit; der Stengel ist von 2mal so grossem Durchmesser, als bei *P. pectinatus*. — Demmin: in der Tollense; häufig.

24. 335. **Potentilla**, Brunfels. Linn.

753. **P. Anserina**, Linn. — Die Pot. der Älteren.

β. sericea, Koch.

γ. viridis, Koch. — Selten.

754. **P. argentea**, Linn. — Quinquifolium folio argenteo, C. Bauh. — Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

755. **P. cinerea**, Chaix. — **R:** *Kl. Vilm.*

756. **P. opaca**, Linn. — Tribsees: Plenniner Laubholz. Lissan: Kirchhof.

757. **P. pilosa**, Willd. — Kniepervorstadt (am Wege zur Vogelstange) u. vielleicht a. O. — Die unteren Blätter bisw. 7zählig.

758. **P. procumbens**, Sibth. — Tormentilla reptans, Linn. Pentaphyllum rept. alatum, Rob. Plot. — Deviner u. Voigdeläger Moor; Sandhagen: am See bei der Torfgrube; an der Chaussee bei Negast u. bei Steinhagen.

759. **P. reptans**, Linn. — Pentaphyllum repens, Camerar. — Untere Blätter nicht selten 7zählig. Stengel bisw. etwas ästig mit einfachen Ästen. Blüthenheile, wie auch bei *P. Anserina*, öfters 6zählig.

760. **P. supina**, Linn. — Pentaphyllum supinum, Lobel. — Ganz sicher 7. — An der neuen Schiffsverfte, jetzt verschüttet. Kniepervorstadt? *Greifswald.*

761. **P. Tormentilla**, Sibth. — Torm., Brunfels. Torm. erecta, Linn. — Der Stengel wurzelt bisw. auf nacktem Boden. — Parower Aussenkoppel, Negast u. a. v. a. O.

762. **P. verna**, Linn. — Deviner Ort. Anclam. **R:** *Kl. Vilm. Thiesow.*

25. 336. **Potérion**, Dalech. Linn.

763. **P. Sanguisorba**, Linn. — Sangu. minor, Fuchs. — **R:** *Areona*, Jasmund.

33. 337. **Primula**, Lobel. Linn.

764. **Pr. elatior**, Jacq. — *Pr. veris β. elatior*, Linn. *Pr. v. — el.* Clusius. — Abtshagen, im diesseitigen Walde. Anclam. **R:** Stuhnitz u. a. O.

765. **Pr. farinosa**, Linn. — Barth. Tribsees. Gützkow. Anclam, sehr häufig. Lissan: Vorwerk.

766. **Pr. officinalis**, Jacq. — *Pr. veris α. off.*, Linn. Verbasculum odoratum, Fuchs. — Am Strande nach Devin; Niederhof; Chaussee bei Pütte u. a. O.

52. 338. **Prunella**, Fuchs. Tournef.

767. **Pr. vulgaris**, Linn. Tragus. — Brunella, Brunfels.

22. 339. **Prunus**, Fuchs. Linn.

768. **Pr. avium**, Linn. Fl. succ. II. — Cerasus — silvestris —, C. Bauh. — Knieperstrand; Neu-Preetz; Devin: Raube Berg. Häufig in Wäldern. **R:** Jasmund; Berger Holz.

769. **Pr. insiticia**, Linn. — *Pr. silvestris major*, Rajus. — II. Graben; Niederhof.

770. **Pr. Padus**, Linn. — Padus, Hist. Lugd. — Penin; Abtshagen. **R:** Berger Holz; Medars.

771. **Pr. spinosa**, Linn. — *Pr. silvestris vulgaris*, Tragus. *β. cometanea*, Wimm. u. Gr. — II. Graben u. a. O.

Pr. Cerasus, Linn. und **Pr. domestica**, Linn. — Bisw. verwildert.

340. *Psamma*, Roem. u. Schultes.

772. **Ps. arenaria**, R. u. Sch. — Arundo ar., Linn.
— Dänholm; Deviner Ort; Parower Strand. Demmin.
R: Altenführ, Drigge.

773. **Ps. baltica**, R. u. Sch. — Arundo balt., Flüge.
— Dars. Zingst. Rügen.

341. *Pteris*, (Fuchs.) Linn.

774. **Pt. aquilum**, Linn. — Deviner Strand, Negast
u. a. v. a. O. Rügen.

342. *Pulicaria*, Gaze. Gärtner.

775. **P. dysenterica**, Gärt. — Ioula dys., Linn. —
Andershöfer Strand; Ufer am Deviner See; Teschenha-
gen, neben der Chaussee; Pennin, neben dem Hof-
garten. Lassar: Vorwerk.

776. **P. vulgaris**, Gärt. — Ioula Pulicaria, Linn. Co-
nyza minima s. Pul. Lobel. — Greifswald. Rügen.

343. *Pulmonaria*, Ruellius. Tournef.

777. **P. angustifolia**, Linn. — P. quarta — ang., Ta-
bern. — Tribses: Lindenbusch bei Semlow (Billich).

778. **P. officinalis**, Linn. — P. vulgaris, Clusius. P.
latifolia, C. Bauh. — Andershöfer Strand; Niederhof: Park.
Mit gefleckten Blättern in der Bussiner Forst bei Cum-
merow; desgl. bei Barth: Saatel, Lübnitz. Greifswald:
Grubenhagen; Hohenmühl. Anclam. Lassar. **R:** Jasmond.

344. *Pulsatilla*, Bruffels. Tournef.

779. **P. patens**, Mill. — Anemone pat., Linn. Puls. —
fl. majore — patente, Amman. — Hiddensee. **R:** Schmale
Heide, Mönchgut.

780. **P. pratensis**, Mill. — Anemone prat., Linn. —
Tribses: Plenniner Laubholz. Demmin, häufig (blühte
dort im Aug. 1859. zum 2ten Mal ziemlich reichlich).
Greifswald. Anclam. Lassar: Papenberg. **R:** Schmale
Heide.

781. **P. vernalis**, Mill. — Anemone vern., Linn. —
Lassar: Baggow.

782. **P. vulgaris**, Mill. Lobel. — Anemone Puls., Linn.
— Martensdorf, in der Nähe der Kiefern, selten. Grim-
men. Anclam. **R:** zwischen Bergen und der Lietzower
Fähre. Jasmond: Polchover Mühlenberg.

Pyrethrum Parthenium, Smith. — Oft
verwildert.

Pyrola. Pyrus.* — Vid. *Pirola. Pirus.**345. *Quercus*, Fuchs. Linn.**

783. **Qu. Robur**, Linn. Spec. u. Fl. succ. — Qu. pec-
dunculata, Ehrh.

784. **Qu. sessilis**, Ehrh. nach Smith. — Qu. sessili-
flora, Smith. Qu. Robur p. Linn. Fl. succ. II. u. Mant. II.

346. *Radiola*, Rajus. Dillen.

785. **R. Linoides**, Gmel. — R. vulgaris serpyllifolia,
Rajus. Linoides s. Rad., Rupp. Linum Rad., Linn. — Teschen-
hagen, Sandhagen, Negast, Langendorf, Martensdorf,
Prolm u. a. O. **R:** bei Stubbenkammer.

347. *Ranunculus*, Fuchs. Dillen.

Vgl. Ficaria.

I. Batrachium.

R. hederaceus (Linn. Dalech.) angeblich bei An-
clam (u. Stettin).

a) Stengel stumpfkantig. Staubgefäße länger als das
Köpfchen der Fruchtknoten.

1) Staubgefäße meist 8—12.

786. **R. paucistamineus**, Tausch. — Kronblätter
verkehrt-eiförmig-länglich, fast keilig; Blumenkrone
klein. — Gräben im Tribs. Felde; alter Festungsgraben
um die Frankenvorstadt u. a. O.

β . coenosus, F. — Stengel kurz, aufstrebend, dicht-
beblättert. Blattzipfel fast in einer Ebene ausgebreitet,
kürzer, breiter. (Kronblätter meist kürzer.) — An über-
schwemmten gewesen od. ausgetrockneten Orten.

787. **R. minor**, F. — Von dem v. unterschieden durch
meist kräftigeren Wuchs, durch die breit-verkehrt-eiför-
migen Kronblätter und durch die oft od. meist vorhan-
denen schwimmenden (im Ganzen wie bei R. aquatilis
gestalteten) Blätter. — Mit dem v. (und mit R. aquatilis:
von letzterem durch die gleich-bleibende von Anfang an
geringere Zahl der Staubgefäße und Kleinheit der Blum-
enkrone, so wie durch kleineren Wuchs unterschieden);
Parow, in der Nähe der Aussenkoppel; Seemühl u. a. O.
 α . trichotomus, F.

β . natans, F. — Vgl. über beide Varr. unten bei
R. aquatilis.

γ . coenosus, F. — Wie die Var. β . der v. Art, aber
auch mit Blättern von der Gestalt der schwimmenden.

2) Staubgefäße 15—30, selten weniger.

788. **R. divaricatus**, Schrank. — R. aquatilis β . Linn.
R. aquatilis albus, circinatis tenuissime divisis foliis, Plukenet.
— Staubgefäße oft nur 12—18. Narben länglich, an
den äusseren Fruchtknoten 3—4mal so lang als breit. —
Sehr häufig: im Frankenteich in Menge; Knieper-Mühl-
engraben u. a. O. Demmin. — Kommt auch als Land-
form (coenosus) vor; allein so fand ich ihn noch nicht
blühend.

789. **R. aquatilis**, Linn. (mit Ausschl. der meisten
Varr.) Dodon. — Narbe verkehrt-eiförmig. Grösse der
Blumenkrone von kaum $\frac{1}{2}$ " bis gegen $\frac{1}{4}$ " im Durch-
messer wechselnd; bei sehr langem Blühen, besonders
bei verschwindendem Wasser, wird sie an den späteren
Blüthen oft viel kleiner als zuerst, und die Zahl der
Staubgefäße vermindert sich dermassen, dass man eine
der beiden ersten Arten vor sich zu haben glauben
könnte. — Nach der Gestalt der Blätter sind die beiden
Hauptformen:

α . trichotomus, Vill. (als Art). R. aquatilis γ . Linn. mit
Ausschl. des andern, zu R. fluitans gehörenden Cil. aus
C. Bauh. R. aquatilis capillaceus, C. Bauh. — Die min-
der entwickelte Form. Blätter sämtlich untergetaucht:

nur an Standorten, deren Wasser sich mit der steigenden Sommerwärme sehr erwärmt (in Lachen, Gräben u. dgl.), fallen sie beim Herausziehen in eine pinselförmige Spitze zusammen, aber nicht in kühlerem, reinem Wasser.

β. natans, F. — Var. *α. β. γ.* Koch, worin aber die zahlreichen Formen keineswegs erschöpft sind. — Obere Blätter schwimmend, zu einer mehr od. minder vollkommen ausgebildeten, vielgestaltigen (3spaltigen oder 3theiligen, verschiedentlich gekerbten, gelappten od. getheilten, seltener 5lappigen) Blattfläche entwickelt. Zwischen den untergetauchten und den schwimmenden Blättern bildet sich oft eine Mittelform von 3zähligen Blättern aus, deren Blättchen nicht in einer Ebene liegen, während öfters das eine od. das andre derselben in lineale, fast haarförmige, aber doch deutlich flache Zipfel zersplitzt ist. Auch wirklich schwimmende 3zählige Blätter sind nicht selten. Bisw. wächst der Stengel, nachdem er schwimmende Blätter getrieben, mit borstenförmig-vielspaltigen Blättern weiter.

γ. coenosus, F. — Var. *δ. succulentus* (Koch) ist ohne Blätter von der Gestalt der schwimmenden. — Vgl. oben *R. minor γ. coenosus*.

790. **R. triphyllus**, Wallr. — *R. Petiveri*, Koch zum Theil: die Var. *α. minor* möchte zu *R. aquatilis* gehören, welchem Koch unrichtig die 3zähligen Blätter abspricht. — Von der *v.* Art unterschieden durch kräftigeren Wuchs u. durch Folgendes: Narben *länglich*; Blütenstiele länger (ein etwas trügerisches Merkmal); schwimmende Blätter weniger häufig als bei der *v.* Art, tief-3theilig od. 3zählig (nicht bloss 3spaltig od. 3lappig, also eine minder ausgebildete Blattfläche darstellend). — Südlicher Graben der Frankenweide; Deriner Fliess, oberhalb des Dorfs, u. a. O.

α. trichotomus, F.

β. natans, F. — Beide Varr. wie bei *R. aquatilis*.

791. **R. rigidulus**, F. — Ob *Batrachium maritimum*, Fries? — Von der *v.* Art durch Folgendes unterschieden: Staubgefässe das Köpfchen der Fruchtknoten kaum überragend; Kronblätter in den fast gleich-breiten Nagel kurzverschmälert; *Fruchtboden* und Früchtchen *kahl*, letztere durch einen schlankeren Griffel hespitzt; Blätter untergetaucht, weniger oft getheilt, mit (minder zahlreichen) längeren, etwas dickeren, ziemlich steifen Zipfeln (dem *R. fluitans* sich nähernd). — Mit den borstenförmig-vieltheiligen Blättern *abwechselnd* (?) kommen obervärts, aber viel seltener, solche vor, an denen sich die Blattfläche ziemlich unvollkommen entwickelt: sie sind bald 3zählig, bald doppelt-3zählig; die Blättchen im ersten Falle meist Seckig-verkehrt-eiförmig, ausgerandet od. 2-3spaltig od. getheilt, klein, — im zweiten Falle meist lineal-spaltförmig und bisw. gespalten od. getheilt. — Da die Pflanze im weiten Wasserraum (im Strand-

wasser) wächst, so weiss ich mir diesen Blattwechsel nicht zu erklären.

b) Stengel stielrund. Staubgefässe kürzer als das Köpfchen der Fruchtknoten.

792. **R. fluitans**, Lamck. — *R. albus fl. pencedani foliis*, Hermann. *R. aquatilis δ.* Linn. — Ob im Gebiet sicher vorhanden?

793. **R. pentapetalus**, F. — Von der *v.* Art (wie sie beschrieben wird) durch Folgendes unterschieden: Blumenkrone stets 5blättrig (nicht 9-12blättrig), mässig gross (wenig od. kaum grösser, als bei *R. divaricatus*); Kronblätter verkehrt-eiförmig (nicht länglich-keilig). — Demmin: in der Tollense u. der Peene, und wahrscheinlich im Verlauf der letzteren bis Wolgast hinab.

II. Ranunculus.

794. **R. acer**, Linn. — *R. pratensis erectus acris*, C. Bauh.

β. parviflorus, F. — Blumenkrone kaum länger als der (ebenfalls kleinere) Kelch, etwa $\frac{3}{8}$ im Durchmesser, grünlich-gelb. Die ganze Pflanze bisw. sehr klein. — Mit der Hauptform: am Knieerteich, an der Chaussee nach Langendorf; selten.

795. **R. arvensis**, Linn. Gesner. — Äcker am II. Graben und an der Barther Landstrasse. Lassar. Rügen.

796. **R. auricomus**, Linn. Dodon. — Unweit Knöchelsöhrn; Chaussee nach Negast bis zur Windmühle; Negast, Parower Park u. a. O.

797. **R. bulbosus**, Linn. Lobel. — Knieperstrand, Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

798. **R. flammula**, Linn. — Fl. *ranunculus*, Dodon. — Trihs. Feld; am Vogelsang u. a. v. a. O.

799. **R. lanuginosus**, Linn. — *R. montanus lan.* —, C. Bauh. — Abtshagen. Richtenberg: zwischen Millienhagen und Bärcwalde. Trihses: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensche Holz. Anclam. Lassar: Bauerberg. **R. Berger Holz.**

800. **R. lingua**, Linn. — L. Plinii, Dalech. — Am Knieper-Mühlengraben, Vogelsang; Faningsberg u. a. v. a. O.

801. **R. polyanthemus**, Linn. — *R. pol. simplex*, Lobel. — Greifswald.

802. **R. repens**, Linn. — *R. pratensis rep.* —, C. Bauh. — Am Wallgang u. a. v. a. O.

803. **R. reptans**, Linn. — *R. palustris longifolius minimus rept.* —, (Burser.) P. Martin. — Stengel auf grasigem Boden vom Grunde an aufstrebend, nicht wurzelnd, auf steinigem Kiesboden aufsteht. Der Wuchs am üppigsten auf feinerem, mässig feuchtem Kiese. — Am Borgwallsee bei Negast, Lüssow, Langendorf.

804. **R. sardous**, Crantz. — Sard. Ran., Val. Cordus. R. Philonotis, Ehrh. — Jarmen: Müssentiner Holz (ausserhalb des Gebiets).

805. **R. sceleratus**, Linn. — *Scelerata*, Apulejus. —

○ u. ♂. — Am Knieper-Mühlengraben, Strand u. a. v. a. O.

11. **348. *Raphanistrum*, Morison. Tourn.**
806. **R. Lampsana**, Gärtln. — Lamps, Matthiol. L. vera, Hist. Lugd. Raphanus Raphanistrum, Linn.

Raphanus sativus, Linn. — Die Var. Radicula bisw. verwildert.

12. **349. *Reseda*, Gesner. Linn.**

807. **R. Luteola**, Linn. — Lut., Lobel. — Wälle, Vorstädte, Schiessstand bei Franzeshöhe, Chaussee nach Panitzsch. **R. Jasmund.**

R. alba, Linn. — Bisw. aus verschlepptem Samen.

13. **350. *Rhamnus*, Bellonius. Linn.**

808. **Rh. cathartica**, Linn. — Rh. catharticus, Linn. Hist. Lugd. — H. Graben. **R: Garz, Stubnitz.**

809. **Rh. Frangula**, Linn. — Fr., Dodon. — Negast, Niederhof u. a. O. **Lassan. R: Berger Holz.**

Rhinanthus, Linn. — *Vid. Alectorolophus.*

70. **351. *Rhynchospora*, Vahl.**

810. **Rh. alba**, Vahl. — Schoenus albus, Linn. — Negaster Moor.

811. **Rh. fusca**, R. u. Schult. — Schoenus fuscus, Linn. Spec. II. append. — **R: Schmale Heide, in dem Moor am Fusse der Prora.**

2. **352. *Ribes*, Fuchs. Linn.**

812. **R. alpinum**, Linn. — R. alpinus dulceis, J. Bauh. — Parower Park! **R: Bergen. Sagard. Stubnitz.**

813. **R. Grossularia**, Linn. — Gr., Rællius. — Am Ablass des Andershöfer Teiches, Knieperstrand, Martensdorf u. a. O., überall vereinzelt.

814. **R. nigrum**, Linn. Dodon. — Vogelsang, Barther Landstrasse, Pennin, Deviner Moor. **Lassan: Waschoe, beim Fischerhause. R: Berger Holz.**

815. **R. rubrum**, Linn. — R. rubra, Lobel. — H. Graben, Voigdeläger Trift, Niederhof, Pennin u. a. O. **Lassan: Bauerberg. R: Putbus, Jasmund.**

3. **353. *Rosa*, Brunsfels. Tournef.**

816. **R. canina**, Linn. Camerar.

α. vulgaris, Koch.

β. dumetorum, Koch.

γ. collina, Koch.

δ. sepium, Koch. — Diese fand ich nicht.

817. **R. rubiginosa**, Linn. Mant. II. append. mit Ausschl. des Cit. aus C. Bauh. — R. spinis aduncis, foliis subtus rubiginosis, Haller. — Dänholm. **Lassan: Waschoe, beim Fischerhause. R: Ufer am Gräher und Neschanzers Strande; Wampen. Stubnitz.**

818. **R. tomentosa**, Smith. — R. villosa, Linn. Fl. suec. II. append. nach Fries: allein Linn. sagt dort: „Caulis aculeis raris recurvis!“ — H. Graben, Knieperstrand u. a. v. a. O.

R. pomifera, Hermann. — Bisw. verwildert. —

Eine od. die andre Art ist nasser den verzeichneten wohl noch heimisch; ich fand sie indess nicht blühend.

21. **354. *Rubus*, Ewr. Cordus. Tournef.**

Da diese jetzt so schwierige Gattung in der Nähe von Stralsund nur durch verhältnissmässig wenige Arten vertreten ist, aus getrockneten Exemplaren aber sichere Bestimmungen sich nicht geben lassen, so muss ich darauf verzichten, hier eine auch nur annähernd vollständige Aufzählung der heimischen Arten zu liefern. Ähnlich, wenngleich nicht völlig so übel, verhält es sich mit der Gattung Salix.

819. **R. caesius**, Linn. — R. repens fructu caesio, C. Bauh.

820. **R. Chamaemorus**, Linn. — Chamaemorum Norwegica, Clusius. — Zingst. **Dars. Greifswald.**

821. **R. Idaeus**, Linn. Tragus. — Lüssow, Martensdorf u. a. v. a. O.

β. simplicifolius, F. — Blätter einfach, verkehrt-eiförmig, kurz-zugespitzt, am Grunde etwas herzförmig, an den heurigen Stengeln oft vorn schwach-3lappig. — Parow: Elsbruch hinter der Aussenköppl in der Nähe der Kiefern, mit der gewöhl. Pflanze, selten.

822. **R. plicatus**, W. u. Nees. — R. fruticosus, Linn. zum Theil; denn ohne Zweifel ist dies im Verhältniss zu den jetzigen Unterscheidungen eine Collectiv-Benennung. — Parower Aussenköppl.

823. **R. saxatilis**, Linn. Clusius. — Chamaerubus sax., C. Bauh. — Negast, Abtshagen, Bussiner Forst. Tribses: Lindenhüschel bei Semlow. **Lassan: Buggenhagen. R: Stubnitz.**

824. **R. Schleicheri**, W. u. Nees. — Negast.

825. **R. Sprengelii**, W. u. Nees. — Negast.

826. **R. suberectus**, Anderson. — R. fastigiatus, W. u. Nees. — Negast. Demmin: Kiefern des Devensen Holzes.

827. **R. vulgaris**, W. u. Nees. — Parower Aussenköppl u. a. O.

5. **355. *Rumex*, Ewr. Cordus. Linn.**

828. **R. Acetosella**, Linn. Spec. (mit Ausschl. der Varr. δ. ε.) u. Fl. suec. (mit Ausschl. der Var. β.). — Acetosa, Brunsels.

829. **R. Acetosella**, Linn. — Acetosella, Lonicer.

830. **R. conglomeratus**, Murr. — R. acutus, Linn. Spec. (?) Val. Cordus. Lappathum acutum, Tragus. — Tribs. Feld, Frankenweide, Devin, Negast, Abtshagen u. a. O.

831. **R. crispus**, Linn. Spec. u. (zum Theil) Fl. suec. II. — Lappathum acutum crispum, Tabern. — Sehr häufig trägt nur eine Fruchtklappe eine vollkommene Schwiele.

832. **R. Hydrolapathum**, Huds. — Hydr. majus, Lobel. — An den Teichen; Kuperwiese, Vogelsang, Negast u. a. O.

833. **R. maritimus**, Linn. — Anthoxanthion, J. Bauh. — Am Strande bei Andershof u. Devin; Weiher bei Langendorf u. bei Panitzsch, u. a. O. **R: Wittow, Schabe.**

831. **R. Nemolapathum**, Wallr. — *R. sanguineus*, Linn. bei Koch; s. unten Var. β .

α . *viridis*, F. — *R. sanguineus* β . *viridis*, Smith. *R. nemorosus*, Schrad. — Negast. **Denmin. R: Garz.**

β . *sanguineus*, Wallr. — *R. sang.*, Linn. *Lapathum sanguineum*, Lobel. Diese fand ich nicht.

835. **R. obtusifolius**, Linn. Spec. (nicht Mant. II. pag. 370.). — *Lapathum vulgare folio obtuso*, J. Baul. — Tribs. Vorstadt u. a. v. a. O.

β . *discolor*, Wallr. — Sout an den Gärten neben dem Voigdehäger Teich (Nordseite).

γ . *silvester*, Koch. — *R. silvestris*, Wallr. — Ahtshagen, im diesseitigen Walde, ziemlich selten.

836. **R. paluster**, Smith. — Linn. scheint diese Art in Mant. II. (unter *R. obtusifolius*) und Syst. XIII. (unter *R. acutus*) angedeutet zu haben mit den Worten: „Valvularum dentes utrinque plures, inaequales, longitudine diametri ipsius valvulae“. — Am Frankenteich; Tribs. Feld; bei Stadtkoppel; Kniepervorstadt u. a. O. Devin; am Strande; Langelorf.

β . *major*, F. — Höher; Blätter fusslang u. darüber, fast handbreit. — Am Frankenteich; selten.

6. 836. **Rupia**, Linn.

Blüthenstiele 2blüthig mit wechselständigen Blüten. Staubbeutelstiel getrennt, mit einer Längsspalte 2klappig-aufspringend. Fruchtknoten 4—8. Fruchtschließchen dem Blüthenstiel mit einem Gelenk eingefügt, zuletzt etwa 6mal so lang als das Steinfrüchtchen, mit diesem abfallend. — Bei Linn. in Class. IV, 4, indem er flache Staubbeutel annahm; wer die Staubbeutel (richtig) als 2fächerig ansieht, muss die Gattung in Class. II, 4. (Tetragynia — Polygynia) des Sexualsystems stellen.

837. **R. rostellata**, Koch. — *R. maritima*, Linn. zum Theil. *Buccaferrea maritima*, foliis acutissimis, Michel nov. gen. pg. 72. (?) tab. 35: der fruchttragende Blüthenstiel unten rechts. — Staubbeutelstiel kreisrundlich, fast halbkugelig, 4—6mal kleiner als bei der flg. Art: auch die Ähre viel kleiner. Fruchtknoten meist 4. Blüthenstiele zuletzt höchstens 2mal so lang als die Blattscheide, nicht selten kaum so lang als diese: daher die Ähre oft während des Blühens eingeschlossen od. halb eingeschlossen. Blätter spitz. Stengel vielästiger und viel reichblüthiger als bei flg. Art: daher die Blätter oft zusammengeschoben, fast gegenständig, und die Blüthenstiele nicht selten in den Astwinkeln. — Im Strandwasser. **R:** im Mählen. — Linn. hat beide Arten gekannt und im Hort. cliff. so wie in den Spec. diese erstere (nach dem Cit. aus Micheli) als *Hauptform* aufgestellt, die folgende im *H. cliff.* als Var. β . („*Buccaferrea maritima*, foliis minus acutis, Mich. pg. 72. tab. 35.“) hinzugefügt, in den Spec. nicht wieder erwähnt. Von der letzteren scheint er auch in dem *H. vestg.* zu handeln, wenn er nicht an dem dort angegebenen Orte vielleicht beide, ohne sie zu unter-

scheiden, gefunden hat; mit reifen Früchtchen hat er die lebende Pflanze wohl nirgends gesehen.

838. **R. spiralis**, F. — *R. maritima*, Linn. zum Theil. — Staubbeutelstiel länglich, zu 2 den Blüthenstiel fast ringförmig schräg umgebend. Fruchtknoten oft 6—8. Blüthenstiele schon vor dem Aufblühen verlängert, zuletzt meist 2—4mal so lang als das stützende Blatt, beim Sinken des Wassers sieht in schraubenförmige, ziemlich weite Windungen legend. Blätter stumpflich. — Im Strandwasser. **R:** im Mählen.

14 837. **Sagina**, Lobel. Linn.

I. Saginella. — Die Blüthen, besonders die ersten, bilden bei den meisten Arten einzelne od. einige Organkreise nicht selten 5zählig aus.

a) *Stengel verkürzt*, aufrecht, dicht-beblättert, niemals aus der Spitze sich verlängernd u. blüthentragend. *Äste niederliegend*, wurzelnd, neue Stöcke von der Form des Stengels treibend, an der Spitze nebst den Ästchen aufstrebend.

839. **S. Nizzeana**, F. — Kahl. Blätter kurz-stachel-spitzig (das Stachelspitzchen bisw. kaum merklich). Blüthenstiele gerade od. (gleich den Ästchen) gekrümmtaufstrebend, niemals an der Spitze hakig. Blüthen (im geschlossenen Zustande) seitwärts (in der Richtung der inneren Kelchblätter) zusammengedrückt, breit-eiförmig, am Grunde abgestutzt. Die Blüthenheile (sind ich) durchans nur 4zählig. Kelchblätter eiförmig und (besonders die äusseren) kahnförmig-vertieft, stumpf. Kronblätter (grünlich) verkehrt-eiförmig, an der Spitze oft 2spaltig od. gezähnt (meist) mit einem längeren Zähnechen, od. auf einen sehr kleinen zahnförmigen Ansatz beschränkt, oft unvollzählig od. fehlend. Kapsel etwas kürzer als der bei der Reife abstehende Kelch. 2. Mai — Septbr. Blüht meist mit geschlossenem Kelch: nur im hellen Sonnenschein der höheren Tagesstunden sind die äusseren Kelchblätter abstehend. — Auf dem Stadtfelde; selten. Die ähnliche *S. procumbens* unterscheidet sich durch Folgendes: Wuchs etwas schwächer: Stachelspitzchen der Blätter 2—3mal länger; Blüthenstiele nach dem Verblühen bis gegen die Fruchtreife an der Spitze hakig-herabgehogen; Blüthen kleiner, (geschlossenen) länglich-rundlich, an beiden Enden gleich, im Querschnitt kreisrund; Kelchblätter elliptisch, an der Spitze weniger vertieft, kürzer als die ausgebildete Kapsel, beim Blühen im Sonnenschein den grössten Theil des Tages hindurch (wie auch bei der Fruchtreife) wagenrecht-ausgebildet; Narben 2mal so lang als bei jener, die Kapsel kleiner, die Samen kleiner und minder höckerig, die Kronblätter fast weiss; ausserdem oft (im Mai u. Jun.) mit zum Theil 5zähligen Blüthenkreisen und mit mehr oder minder vollkommen doppelt-zähligen Staubgefässen.

840. **S. procumbens**, Linn. mit Ausschl. der Varr.

— Schon Linn. sagt: „ramis (?) procumbentibus“. — 2. Hat 4—10 Stängelfässe!

β. ciliolata, F. — Blätter mehr od. minder gewimpert: Wimpern sehr kurz, etwa $\frac{1}{6}$ od. $\frac{1}{8}$ so lang als die Breite des Blatts. — Am Andershöfer Teich, selten.

h) Stengel vollkommen entwickelt, mehr od. minder ästig, aufrecht oder nebst den untersten, am Grunde oft ausgebreiteten Ästen (Nebenstengeln) aufstrebend.

841. **S. apetala**, Arduin. — Mai — Septbr. — Kugelfang; Gr. Damitz; am Andershöfer Teich. — An sehr trocknen, unfruchtbaren Stellen beim Kugelfang wird der Stengel niedriger, ganz einfach, 1—3blüthig. — Blüthen zur Fruchtzeit oft ein wenig nickend. Blüthenstiele und Kelche gewöhnlich drüsig-laubhaarig; Blattwimpern an den älteren Blättern verschwindend. Indem die Behaarung spärlicher wird, entsteht endlich die glg. Var.

β. denudata, F. — Blätter von Anfang an wimperlos. Blüthenstiele u. Kelche gänzlich kahl, letztere merklich länger, oft 2mal so lang als die Kapsel u. nicht selten an der Spitze auswärts-bogeu. — An feuchten Stellen: in Vertiefungen des Bodens am Kugelfang. 842. **S. stricta**, Fries. — S. procumbens β. Linn. Spec. II. nach Fries. — Kahl. — Mai bis Septbr. — Frankenweide, bis 1860. auf einer Stelle in Menge; Parower Strand. Hiddensee. **R:** Wampen.

II. Spargella.

843. **S. nodosa**, Bartl. — Spargella nod., Linn. Alsine nod., C. Bauh. — Stengel wie bei S. procumbens: Äste aufstrebend od. ausgebreitet, nicht wurzelnd. — Kuferwiese, Andershof, Voigdhäger Moor, Sandhagen, Negast, Parow u. a. O. Greifswald. Lassar. Rügen.

61. 358. **Sagittaria**, Lobel. Rupp.

844. **S. sagittifolia**, Linn. — Blütenstand bisw. am Grunde etwas ästig. Die mittleren Blüthen nicht selten zwittrig; Stängelfässe, theils die Stempel im Kreise umgebend, theils einzeln zwischen denselben. — Andershöfer Teich; Borgwallsee. Demmin, häufig. Greifswald. Anclam. Lassar. Nicht auf Rügen?

55. 359. **Salicornia**, Dodon. Tournef.

845. **S. herbacea**, Linn. — Frankenweide. Greifswald. **R:** Drigge, in den Wiesen am Mählen.

58. 360. **Salix**, Fuchs. Tournef.

Vgl. die Bem. unter Rubus. — S. alba u. S. fragilis am Str. angepflanzt; junge, ans Samen aufgewachsene Pflanzen von S. fragilis γ. Russeliana (Koch) nicht selten. 846. **S. alba**, Linn. — S. alba ptericalis, Hist. Lugd.

β. glabrescens, Richb. — S. alba β. caerulea, Koch. S. caerulea, Smith.

γ. vitellina, Koch. — S. vitellina, Linn. Dodon. S. sativa lutea —, C. Bauh. — Nur der männl. Baum in Deutschland?

847. **S. ambigua**, Ehrh. — Tribes: Plenniner Moor.

848. **S. amygdalina**, Linn. — S. folio amygdalino utrinque [?] virente aurito, C. Bauh., von Linn. Spec. II.

(nach Rajus) zu dieser Art, aber ebendasselbst auch zu S. fragilis (nach Haller) citirt.

α. discolor, Koch. — Blätter unterseits äusserst fein bläulich-bereift, glanzlos, oder durch Abreiben des Reifes nach dem Rande u. der Spitze hin grün, blasser als oberseits u. glänzend.

β. concolor, Koch. — S. tetrandra, Linn. nach Smith (ob richtig?).

849. **S. aurita**, Linn. — Ufer am Andershöfer Strande, Negast, Abtshagen u. a. v. a. O.

850. **S. caprea**, Linn. mit Ausschl. der Varr. — S. e. rotundifolia, Tabern. S. Capraea, Vaill. — Hier u. da wildwachsend und häufig angepflanzt. **R:** Jasmund.

851. **S. cinerea**, Linn. — Barther Landstrasse u. a. v. a. O. — Kommt auch vor mit häusigen, 1betigen, so wie mit monöstr.-zwittrigen Blüthen: Allee an der Herrenwiese.

852. **S. cuspidata**, Schult. Starg. — S. pentandra β. Linn. Fl. suec. nach Richter. S. tetrandra, Linn. It. gotl. nach Fries. — Negast.

853. **S. daphnoides**, Vill. — Niederhof. **R:** Jasmund.

854. **S. depressa**, Linn. Fl. suec. II. nach Fries. — S. livida, Wahlengr.

α. velutina, Koch. — Am Frankenteich. Negast.

855. **S. fragilis**, Linn. C. Bauh.

β. Russeliana, Koch (Var. γ.). — S. Russ., Smith.

856. **S. pentandra**, Linn. — Andershöfer Strand; am Vogelsang, häufig; Negast u. a. O.

β. latifolia, Hartm. — S. polyandra, Wilke Fl. gryph. —

Zwischen dem Voigdhäger Moor u. Teschenhagen im Hasenwinkel; angepflanzt, baumartig, in der Brunnenaue.

857. **S. phyllifolia**, Linn. — S. phyllicae humilioris folio, Rudbeck. — **R:** auf Dünen.

858. **S. repens**, Linn. — S. alpina pumila — rep., C. Bauh. — Kugelfang, Parower Aussenkoppel, Lüssow, Negast, Voigdhäger Moor u. a. v. O. — die 2 ersten Varr.

α. vulgaris, Koch. — S. repens, Smith.

β. fusca, Koch. — S. fusca, Smith; aber (nach Fries) nicht Linn.

γ. argentea, Koch. — S. arg., Smith. S. arenaria, Linn.

(?). — **R:** Schabe.

δ. leiocarpa, Koch. — **R:** Schmale Heide u. a. O.

859. **S. rosmarinifolia**, Linn. — Parower Aussenkoppel; Voigdhäger Moor. Greifswald. Lassar: Vorwerk.

860. **S. viminalis**, Linn. Schwenckfeld. — An den Teichen u. a. O.

Bastard:

855+846. **S. fragili-alba**, F. — Hat das Aussehen und die unterseits bläulich-bereiften Blätter der S. alba, nebst der nur in der Jugend vorhandenen seidigen Be-

haarung der Blätter wie bei *S. alba* β . *glabrescens*, unterscheidet sich aber durch Folgendes: Blätter länger zugespitzt, grüher gesägt (grösser); Nebenblätter aus halb-herz förmigem Grunde schief-lanzettförmig, gesägt. Schuppen der Kätzchen überall behaart, an der Spitze gewimpert. Kapsel *spitz*: Stielehen und Griffel 2mal so lang; Honigdrüse grösser; Narben 2spaltig, grösser. — Die *S. alba* β . *glabrescens*, welche sich in der Gestalt der bald stumpfen, bald spitzern Kapseln und in der Behaarung der Kätzchenschuppen sehr schwankend zeigt, möchte eine in der Rückbildung zur *S. alba* begriffene Form sein. — Angepflanzt.

361. *Salsola*, *Caesalpin.* Linn.

361. *S. Kali*, Linn. — *Tragus* et *Kali* —, Dodon. — Frankenstrand; am Strande nach Devin; Parow. **R:** Allenfähr, am nördl. Strande; Binz u. a. O.

362. *Salvia*, *Brunfels.* Linn.

362. *S. pratensis*, Linn. — *Hornimund* pratense —, C. Bauh. — Demmin: bei den Kiefern. *Anclam.*

363. *Sambucus*, *Brunfels.* Tournef.

363. *S. Ebulus*, Linn. — Eb., *Brunfels.* Eb. *S. humilis* Samb., Dodon. — *Greifswald.*

364. *S. nigra*, Linn. — *S. fructu* — nigro, C. Bauh. — Kommt vor mit Blättern, an denen hin u. wieder einzelne Blättchen mehr oder minder tief fiederspaltig sind: eine Minneigung zu der nicht heimischen Var. *laciniosa*, Linn.

364. *Samolus*, *Valerandus* Dourez. Tourn.

365. *S. Valerandi*, Linn. J. Bauh. — *Stralsund* (?). **R:** Lancken, am Strande.

365. *Sanguisorba*, *Fuchs.* Rupp.

366. *S. officinalis*, Linn. — *S. major*, Fuchs. — *Greifswald.* *Anclam.*

366. *Sanicula*, *Brunfels.*, Tournef.

367. *S. europaea*, Linn. — *Niederhof*, *Negast*, *Penin*, *Abtshagen* u. a. O. **R:** *Stubnitz.*

367. *Saponaria*, *Tragus.* Linn.

368. *S. officinalis*, Linn. — Am Wege längs der Nordseite des Knieper-Kirehhofs; Voigdehagen, am Kirehhof u. nach der Trift zn; an der Chaussee diesseits Pantlitz — u. a. O. *Lassan:* *Wehrdahn*. — An den beiden erstgenannten Orten steht die Pflanze nachweislich gegen 100 Jahre; dennoch ist sie bei uns kaum ursprünglich heimisch.

368. *Sorothamnus*, *Wimmer.*

369. *S. scoparius*, Koch (früher). — *Spartium scoparium*, Linn. *Genista scoparia* —, Lobel. *Soroth. vulgaris*, Wimm. *Genista vulg.*, Bellon. — *Kugelfang*, *Devin*, *Niederhof* u. a. O. *Lassan.* *Rügen.*

369. *Saxifraga*, *Fuchs.* Linn.

370. *S. granulata*, Linn. — *S. alba* (Fuchs) *radice* *grauulosa*, J. Bauh. — Ufer am *Deviner* Strande. *Greifswald.*

wald. *Lassan.* **R:** auf den Hügeln an der *Wamper Wick.*

371. *S. Hirculus*, Linn. — *Hirc.* *friscus* *Dortmanni* —, Clusius. — *Niederhof.* *Tribses:* *Plenniner Moor.* *Lassan:* *Moor hinter dem Teufelsberge.* **R:** *Halbinsel Thiessow.*

372. *S. tridactylites*, Linn. — *Sedum* *trid.* *tectorum*, C. Bauh. — *Tribs.* *Feld:* an mehreren Stellen, z. B. an der Sandgrube, aber in trockneren Jahren ausbleibend. *Prohn:* *Kirehhofsmauer.* *Tribses:* auf der Scheide zwischen *Semlow* u. *Plennin.* *Greifswald:* *Ludwigsburg.* *Lassan:* *am Moor hinter dem Teufelsberge.* **R:** *Zirkow* (bei *Schrow*), *in Menge.*

373. *Scabiosa*, *Tragus.* Vuill.

373. *Sc. Columbaria*, Linn. — *Col.* *Lobel.* — *Demmin:* an den Kiefern; bei *Vorwerk* u. im *Devenschen Holz.* *Tribses:* *Plenniner Laubholz;* *Dreehop.* *Greifswald:* *Kl. Zastrow.* *Lassan.* **R:** *Putbus.* *Stubnitz.*

374. *Sc. ochroleuca*, Linn. — **R:** *Ralswicker Heide;* *Stubnitzaufer* (nach Weigel; genauer zu untersuchen, wobei auf die Gestalt der Fruchtköpfchen zu achten).

374. *Scheuchzeria*, Linn.

375. *Sc. palustris*, Linn. — *Juncoidi* *affinis* *palustris*, *Scheuchzer.* — *Negast* und *Arundseer Moor.* *Greifswald.* *Anclam.* *Lassan:* *Moor am Wege nach Palow.*

Schoberia, *Mey.* — *Vid.* *Chenopodia.*

375. *Schoenus*, *Val.* *Cordus.* Linn.

376. *Sc. ferrugineus*, Linn. — *Tribses:* *Plenniner Moor*, am *Fusssteige* nach *Malow.*

376. *Scirpus*, *Lacuna.* Tournef.

Vgl. *Blysmus* u. *Helocharis.*

377. *Sc. caespitosus*, Linn. — *Dänholm* (?), *Negast.* *Greifswald:* *Kieshof.* *Rügen.* *Soust* auf der vormal. *Martensdorfer Heide* in *Menge.*

378. *Sc. Duvalii*, Hoppe. — *Rügen.*

379. *Sc. lacustris*, Linn. — *Frankenteich* u. a. O.

380. *Sc. maritimus*, Linn. — *Unfruchtbare Halme* dicht-beblättert. Ähren $\frac{3}{8}$ — $\frac{1}{2}$ lang. — Mit den Varr. am Strande. *Rügen.*

β . *compactus*, Koch.

γ . *macrostachys*, Koch.

381. *Sc. setaceus*, Linn. — *Nuss* zwischen den *Rippen* (in den Vertiefungen) *fein-querfurchig.* — *Voigdehagen:* am *Hasenwinkel;* *Negast,* *Seemühl,* *Moysal,* *Penin,* *Borgwall,* *Zimkendorf;* *Martensdorf:* am Wege nach *Gr. Zausebur.*

382. *Sc. silvaticus*, Linn. — *Knieper-Mühlengraben,* *Barther Landstrasse,* *H. Graben,* *Negast* u. a. v. a. O. *Rügen.*

383. *Sc. Tabernaemontani*, Gmel. — *An der Allee* neben der *Herrenwiese;* *Knieperstrand;* *Deviner Ort.* *Lassan.* **R:** an der *Wamper Wick.*

x Scirpus palustris *Wimmer.* 31.

Se. triquetra, Linn. (nach Koch) möchte sich auch im Gebiet finden.

27. **374. Scleranthus**, Linn.

884. **Se. annuus**, Linn. — Mit niedrigem, sehr gedrungenem, halbkugeligem od. fast kugeligem Wuchs auf der Heide bei Gr. Kädingslagen.

885. **Se. pereunis**, Linn. — Kugelfang, Devin, Negast u. a. O. Demmin. **R:** Wanpen; **Putbus** u. a. O.

32. **375. Scorzonera**, Dodon. Tournef.

886. **Se. hispanica**, Linn. Matthiol. — Sonst auf der vormal. Martensdorfer Heide.

887. **Se. humilis**, Linn. — **Se. hum.** —, Clusius. — Martensdorf: bei den Kiefern, Barth: Heide. **Dars.** Richtenberg: zwischen Übelitz u. der Lepflower Mühle. Tribsees: nördn des Lindenbushes bei Semlow u. im Plenniner Laubholz.

48. **376. Scrofularia (-ph-)**, Brunf. Tourn.

888. **Ser. aquatica**, Linn. — **Ser. major** aqu. Thal. Ser. Ehrhart, Steven. — Linn. citirt Loesel. pruss. mit Abbildung; weshalb nun neuerdings der vorangestellte Name auf eine nur in den Rhein- u. Moselgegenden stellenweise wachsende Art (**Ser. Balbisii**, Hornem.) übertragen werden soll, ist mir nicht einleuchtend. — Am Deviner Fliess u. See. Demmin.

889. **Ser. nodosa**, Linn. — **Ser. nod. foetida**, C. Bauh. — Barther Landstrasse, um die Vogelstange, am Strande nach Devin u. a. v. a. O. **Lassan.** **R:** Jasmond.

52. **377. Scutellaria**, Cortus. Tournef.

890. **Se. galericulata**, Linn. — **Lysimachia** gal., Dalech. — Am Frankenteich; auf dem vormal. Kl. Paschenberge u. a. v. a. O. **Lassan.** **R:** **Putbus.**

Se. Columnae, Allion. — **R:** am Rugard; verwildert.

27. **378. Sedum**, Fuchs. Tournef.

891. **S. acre**, Linn. — **Aizoon acre**, Val. Cordus.

β. **sexangulare**, Linn. (als Art. Nach L. aber ♂!) — Kugelfang, Frankenstrand; Deviner Ort: am Strande; Martensdorf. **R:** Altenfahr, am nördl. Strande.

892. **S. boloniense**, Lois. — **Sempervivum minus** vermiculatum insipidum („A priore non solum gustu differt, sed etiam foliis magis teretibus et tenuibus“), C. Bauh. — Linn. scheint in Mant. II. und in der Bemerkung der Fl. succ. diese Art mit seinem **S. sexangulare** vermischt zu haben. — Dänholm: östl. Ufer. selten. **Greifswald:** **Hanshegen.** Demmin: an den Kiefern, häufig. Rügen?

893. **S. maximum**, Suter. — **S. Telephium** δ. u. ε. maximum, Linn. **Anacampteros maxima**, J. Bauh. — Auf dem Stadtfelde hier zerstreut, aber nicht selten. Demmin. häufig. **R:** Ufer bei der Grähler Fähre, sehr gross. **Jasmond.**

894. **S. rupestre**, Linn. Spec. n. später: der ältere Name u. die allgemeiner verbreitete Var. bezeichnend.

— **S. rup. repens** —, Dillen. **S. reflexum**, Linn. Fl. succ. II. append. Syst. X. u. später, bei Koch vorangestellt, ist die Var. β. hier unten u. spätere Benennung. — Blüthen: theile 5—Szählig.

α) **glacum**, Koch (als Var. von **S. reflexum**, Linn.): das eigentliche **S. rupestre**, Linn. — Sonst in Menge auf der vormal. Langendorfer Heide. Demmin: an u. ju den Kiefern. **Lassan:** **Weide.**

β. **viride**, Koch (als Var. von **S. refl.**, Linn.) — **S. reflexum**, Linn. — Angeblieh bei uns nur in Gärten angepflanzt; soll jedoch auf Usedom (auf dem Gnitz) wildwachsend vorkommen.

3. **S. tectiprum**, Scop. — **Sempervivum tect.**, Linn. **Semp. tect. majus**, Rupp. — Nur angepflanzt und stets mit entarteten Blüthen.

10. **379. Senebiera**, Persoon.

S. Coronopus (Poir.) — vid. **Coronopus**. Diese trägt ein nicht aufspringendes, fast steinfruchtartiges, die fig. Art ein wahres, Zklappig-aufspringendes Schöthen. Endlicher schreibt irrig beiden eine **silicula evalvis** zu.

895. **S. didyma**, Pers. — **Lepidium didymum**, Linn. Mant. I. — Jahre hindurch in der Ballastkiste häufig, allmählich mit der Erde weggeführt, jetzt ganz verschwunden. **Wolgast:** am Schlossberg.

36. **380. Senecio**, Eur. Cordus. Vail.

896. **S. aquaticus**, Hud. — Tribs. Feld: Wiese nach Lüdershagen zu, einige tausend Schritt östlich von der Chaussee nach Negast. Dungenarten: an der Recknitz. Demmin: an der Tollense, sehr häufig. **Lassan:** Buggenhagen.

897. **S. Jacobaea**, Linn. — Jac., Dodon. **Flos S. Jacobi**, Brufels. — Kugelfang, Barther Landstrasse, Ufer am Andershöfer Strande u. a. v. a. O. Demmin.

898. **S. paludosus**, Linn. **Greifswald:** **Eldena.**

899. **S. paluster**, De C. — **Cineraria palustris**, Linn. — ○ (?) u. ♂. — Andershof, Devin, Niederhof; Sandbagen: am Krummenhäger See; Lüßow: am Ufer des Borgwallsees; Langendorfer Moor. **Anclam.** **Lassan:** **Vorwerk.** **R:** **Bobbin;** **Semper.** Die Wurzelblätter der heurigen Herbstgewächse kahl, glänzend.

β. **latifolius**, F. — Stengelblätter aus herz-eiförmigem Grunde kurz-zusammenggezogen, nach der stumpfen Spitze hin allmählich verschmälert. — Lüßow, mit der gewöhnl. Form.

γ. **angustifolius**, F. — Blätter sämmtlich lanzettförmig-lineal, sparsamer und meist schwächer gezähnt; Stengel meist einfach, an der Spitze mit zusammengesetztem Ebenstrass. Wuchs niedriger u. schwächer. — Am Knieper-Mühlengraben, sehr selten; Lüßow, mit der v. Var., seltner. Tribsees: Reeknitzmoor zwischen Plennin und Marlow.

900. **S. silvaticus**, Linn. — Devin: Aulagen u. Kie-

X *Senecio paluster* 36

fern; Sandhagen; Mariensdorf. Demmin. **R:** Wampen, Drigge.

901. **S. vernalis**, W. u. Kit. — Im Jahre 1859. zum ersten Mal von mir 2 Pflanzen gefunden, auf dem Stadtfelde. — Scheint einzuwandern: in Schlesien seit 1822., häufiger seit 1835. — bei Posen seit 1847., jetzt schon häufig.

902. **S. viscosus**, Linn. — *S. pinguis*, C. Bauh. *S. foetidus*, Gesner. — *Anclam.*

903. **S. vulgaris**, Linn. *Tragus.*

38. 381. **Serratula**, Dodon. *Dillen.*

904. **S. tinctoria**, Linn. *Tabern.* — Tribsees: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensche Holz u. bei der Gypsmühle. *Greifswald: Wampen. Barth. R: Drigge,* selten; *Jasmund; Mönchgut.*

382. **Setaria**, Pal. *Beauv.*

905. **S. glauca**, Beauv. — *Panicum glaucum*, Linn. (?). — *Anclam. Lissan.*

906. **S. viridis**, Beauv. — *Panicum viride*, Linn. — Oft braunroth-lila laufen. Kommt auch mit einzelnen Rispen als vivipara vor. Die Rispe bisw. etwas gelappt.

β. nana, F. — Klein (1–2" hoch), meist lila mit 1–3 kleinen, eiförmigen Rispen. Meist gesellig, auf unfruchtbarem Sandboden: auf dem Raum eines Quadratzolles fand ich oft 20 Pflanzen. — Sandhagen, Lüssow u. a. O. **R:** Altenfähr, am nördl. Strande, besonders auf den Äckern.

383. **Sherardia**, Dillen.

907. **Sh. arvensis**, Linn. — *Asperula caerulea* arv., C. Bauh. — Bei Franzenshöhe, Gr. Kädingshagen, Grünhufe, Langendorf, Neu-Lüssow u. a. O. *Lissan: am Papenberg. R: Wittow.*

384. **Silauis**, J. Bauh. *Besser.*

908. **S. pratensis**, Bess. — *Pastinaca prat.*, Val. Cordus. *Peucedanum Silauis*, Linn. — *Anclam.*

10. 385. **Silene**, (*Aldrovandus*) Linn.

Vgl. *Melandryum.*

909. **S. gallica**, Linn. — *Viscago hirta* gall. —, *Dillen.* — *Barth: Kenu.* — Wahrscheinlich mit fremdem Samen eingeführt und unbeständig: so fand ich sie bei Langeudorf. — Die flgg. Varr. bisw. in Gärten u. vielleicht auch auf Äckern zufällig oder verwildert.

β. quinquevulnera, Koch. — *Sil. qu.*, Linn. *Quinque vulnera* Xi, Hortul.

γ. ramosissima, F. — Var. *γ. anglica*, Koch. *Sil. angl.*, Linn. *Lychnis arvensis* angl., Lobel. — Stengel vom Grunde an ästig, mit weit-abstehenden, bogig-aufstrebenden, später oft niederliegenden, verzweigten Ästen.

910. **S. inflata**, Smith. — *Lychnis* — — *calyce inflato*, Boechem. *Cucubalus Behen*, Linn. *Been album*, Dodon. — H. Graben u. a. v. a. O. Kügen.

911. **S. nutans**, Linn. — *Deviner Ort*, am hohen Ufer.

Tribsees: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensche Holz. **R:** Gustow, auf dem Papenberg. *Ralswiek; Stubnitz; Prora; Granitz.*

912. **S. Oites**, Smith. — *Cucubalus Ot.*, Linn. *Ot.*, Tabern. — Demmin: an u. in den Kiefern und bei Vorwerk. *Anclam. Lissan: Papenberg.*

913. **S. viscosa**, Pers. — *Cucubalus viscosus*, Linn. *Lychnis montana viscosa noctiflora* —, Tilli. — *Hiddensee.*

S. Armeria (Linn.) u. **S. pendula** (Linn.) bisw. aus verschlepptem Samen. **S. vespertina**, Retz. (?) fand ich unter *Ornithopus sativus* (Brot.): die Schuppen des Schlundes waren abgeschnitten-stumpf!

37. **Silybum marianum** (Gärtu.) bisw. aus verschlepptem Samen.

9. 386. **Sinapis**, Brunfels. Linn.

914. **S. alba**, Linn. — *Sinapi album officinarum*, Besler. *S. luteum sativum*, *Tragus.* — Nicht ursprünglich heimisch; an Wegrändern und auf Äckern ziemlich häufig.

915. **S. arvensis**, Linn. — *Sinapi arvense*, Morison.

387. **Sisymbrium**, Fuchs. *Tournef.*

Vgl. *Alliaria.*

916. **S. officinale**, Scop. — *Erysimum off.*, Linn. — Vorstädte u. a. v. a. O.

917. **S. pannonicum**, Jacq. — Früher an der Küster-Bastion; seit mehreren Jahren durch Erntearbeiten verliert.

918. **S. Sophia**, Linn. — *Soph. chirurgorum*, Lobel.

919. **S. Thalianum**, Gaud. — *Arabis Thaliana*, Linn. — Barther Landstrasse, Gr. Kädingshagen, Kugelfang, Parow u. a. O. *Rügen.*

29. 388. **Sium**, Tabern. Linn.

920. **S. latifolium**, Linn. C. Bauh. — *S. majus latif.*, Tabern. — Am Frankenteich, Herrenwiese u. a. v. a. O.

47. 389. **Solanum**, Brunfels. *Tournef.*

921. **S. Dulcamara**, Linn. — *Dulc.*, Dodon. *Dulcis amara*, *Tragus.* *Amara dulcis*, Gesner. — Am Frankenteich, Vogelsang; Negast, Abtshagen u. a. v. a. O.

922. **S. vulgatum**, Willd. — *S. nigrum* (*a. vulg.*, Spec. II. *S. nigr.* *a. vulgare*, Spec. I.), Linn. mit Ausschl. der meisten Varr. *S. vulgare*, *Tragus.*

a. nigrum, F. — *S. nigrum*, Val. Cordus. — Beeren schwarz, glanzlos; seltener glänzend u. etwas kleiner bei niederem Wuchs der Pflanze: so bei Lüssow.

β. chlorocarpum, Spenner. — Beeren grün: die Färbung vom Schwarzgrünen bis ins Gelblich-graugrüne ziehend. — Nicht selten: in und an den Vorstädten.

γ. melinocarpum, F. — Beeren gelb: entweder wachsgelb, undrehlsichtig (an der neuen Schiffsverle einmal von mir gefunden), oder weingelb, mit einem schwachen Zuge ins Rötliche, stark-durchscheinend, die Samen deutlich von aussen zu unterscheiden: so auf einem Acker an der Frankenvorstadt, neben dem Fusssteige

von der Chaussee zur Reiferbahn (1858.) ziemlich häufig, mit der Var. α . und von dieser ausser der Farbe der Beeren in gar nichts verschiedend.

δ . quinquepartitum, F. — *S. nigrum stenopetalum*, A. Braun (?). — Stengel und Äste schlanker, letztere meist kanten- und knotenlos. Blätter kleiner, die oberen merklich schmäler und die Blattfläche oft einwärts der Länge nach bis zur Mittelrippe theilweise weggeschnitten, die der Ästchen lineal-lanzettförmig, spitz, oft ganzrandig. Blumenkrone bis auf einen ganz kurzen Ring getheilt: Zipfel lineal od. etwas lanzettförmig, rinnig, über dem Grunde meist plötzlich verbreitert. Die Beeren sah ich nur in der bei Var. β . erwähnten gelblich-graugrünen Färbung. — An demselben Fusssteige, wie Var. γ ., aber auf einem anderen Ackerstück (1858.), ziemlich häufig.

390. *Solidago*, (Fuchs.) Linn.

923. *S. Virga aurea* (Virgaurea), Linn. — V. aur., Dodon. u. A. — Deriv; Chaussee nach Brandshagen; Niederhof, Negast, Abtshagen, Bussin u. a. O. Lassar. R: Gustow u. a. O. *Jasmund*.

β . angustifolia, Koch. — Blätter sämmtlich lanzettförmig, ganzrandig od. die unteren etwas gesägt. — Gehöls am Wege von Alt-Zarrendorf nach Elmenhorst; Bussiner Forst.

γ . latifolia, F. (Koch?). — Blätter sämmtlich elliptisch, zugespitzt, gesägt od. die oberen blüthenständigen ganzrandig; die unteren Blätter oft eiförmig. — Abtshagen, im dießseitigen Walde.

δ . microcephala, F. — Blüthenköpfchen fast um die Hälfte kleiner. Die Blätter bald wie bei der Hauptform (bei Alt-Zarrendorf mit Var. β .), bald wie bei Var. β . (so in der Bussiner Forst); an beiden Orten selten; merklich später blühend!

391. *Sonchus*, Fuchs. Tournef.

924. *S. arvensis*, Linn. — *Hieracium majus*, Fuchs. H. — *sonchites*, C. Bauh. — Ist das eigentliche *Hieracium* der Älteren. — Stengel nicht selten ästig!

β . laevipes, Koch. — Um Str. sehr vereinzelt; in Menge bei Demmin in den Tollensewiesen.

925. *S. asper*, Vill. Dodon. — *S. oleraceus* γ . *asper*, u. Var. δ . Linn. Spec. — $\odot$ u. σ .

α . integrifolius, F. — Blätter ungetheilt.

β . runcinatus, F. — Blätter schrotsägig-fiederspaltig.

γ . pubescens, F. — Kleiner. Stengel einfach. Blätter ungetheilt, von gekrümmelten Haaren flaumig, die oberen ziemlich kahl. Meist roth überlaufend. — Auch im Zimmer gezogen und überwintert nicht vor Ende Jun. blühend. — In und an den Vorstädten.

δ . setosus, F. — Stengel an der Spitze nebst den Blüthenstielen drüsig-borstig od. theilweise kahl. — In und an den Vorstädten; nicht häufig.

ϵ . muricatus, F. — Blätthen des Hüllkelchs zum Theil auf dem Rücken weichstachelig: die Weichstacheln bald

kürzer, drüsenlos, bald länger, in eine Drüse ausgehend. Stengel und Blüthenstiele bald kahl, bald (häufiger) wie bei der v. Var. — In und an den Vorstädten; nicht selten.

926. *S. laevis*, Vill. Camerar. — *S. oleraceus* α . *laevis*, u. Var. β . Linn. Spec. — $\odot$ u. σ . — Die Achänen beiderseits ungleich-mehrfach (nicht 3reigig).

α . integrifolius, Wallr. (unter *S. oleraceus*).

β . runcinatus, Koch (unter *S. oleraceus*).

γ . laevis (-us), Wallr. (unter *S. oleraceus*). — Der vollständige Zipfel der Blätter 3spaltig mit lanzettförmigen Zipfelchen, bei der v. Var. ungetheilt.

δ . setosus, F. — Wie Var. δ . der v. Art; auch der Hüllkelch bisw. mit einigen drüsentragenden Borsten besetzt. — In u. an den Vorstädten; ziemlich häufig.

ϵ . muricatus, F. — Wie Var. ϵ . der v. Art: die Weichstacheln fast immer in eine Drüse ausgehend. — Mit der v. Var.

927. *S. paluster*, Linn. — *Niederhof*. R: *Putbus*.

Bastard:

926 + 925. *S. laevis-asper*, F. — Vom Aussehen des *S. laevis* α . Achänen genau wie bei *S. asper*. — In der Kniepervorstadt einmal von mir gefunden.

392. *Sorbus*, Brunsfels. Tournef.

928. *S. Aucuparia*, Linn. — Auc. Rivini, Rupp. Sorb. auc., Val. Cordus. — Negast u. a. O. *Rügen*.

929. *S. scandica*, Fries. — *Crataegus Aria* β . *suecica*, Linn. Spec. Cr. scandica, Celsius. — *Hiddensee*.

930. *S. torminalis*, Crantz. — *Crataegus torm.*, Linn. Val. Cordus. — *Greifswald*. R: *Stubnitz*.

393. *Sparganium*, Tragus. Tournef.

931. *Sp. minimum*, Fries. C. Bauh. — *Sp. natans*, Linn. Fl. suec. I. u. Var. β . *minima*, Linn. Fl. suec. II. — Negast; Teschenhagen: zur Rechten des Weges nach Zitterpenningshagen. Lassar: am Wege nach Clotzow. R: *Wrechen*, *Güstelitz*.

932. *Sp. ramosum*, Huds. C. Bauh. — *Sp. erectum* (α), Linn. — Am Frankenteich u. a. O. Lassar. *Rügen*.

933. *Sp. simplex*, Huds. — *Sp. erectum* β . Linn. *Sp. non ramosum*, C. Bauh. — Kupfergraben u. a. v. a. O. Lassar. R: *Altenfähr* u. a. O.

β . natans, F. — Stengel aufrecht, mit emporstehenden Blättern. Wurzelblätter mehr od. minder verlängert, ziemlich flach, unterwärts etwas 3kantig, der hervorstehende Theil schwimmend. — Im Knieper-Mühlengraben, häufig.

394. *Spergula*, Dodon. Dillen.

934. *Sp. arvensis*, Linn. — *Sp.*, Dodon. *Sagina* Sp., Lobel.

α . sativa, Koch.

β . vulgaris, Koch.

γ . maxima, Koch. — An Wegrändern hic u. da und bisw. in der Ballastkiste.

935. **Sp. Morisonii**, Boreau. — **R:** Drigge, in den Kiefern nach der Gustower Wick hin, ziemlich häufig. — Früher am Str. in den vormal. Deviner Kiefern.

14. 395. **Spergularia**, Pers. Presl.
Bei Persoon als Abtheilung von Arenaria.

936. **Sp. campestris**, F. — Arenaria camp., Allion. Ar. camp. — Rupp. Ar. rubra a. campestris, Linn. Sp. rubra, Presl. Lepigonum rubrum, Wallenbg. — Staubgefäße meist 5, 6. — Tribs. Feld; Sandhagen; Devin u. a. O. — **R:** Wampen, Drigge u. a. O.

937. **Sp. marginata**, F. — Lepigonum marginatum, Koch. Arenaria marginata, De C. Ar. media, Linn. Spec. II. no. 9. (vgl. die Bem. bei der flg. Art.). Sp. media, Garcke (methodisch richtig, aber systematisch nicht passend). Alsine — seminibus marginatis, Vaill. — 2. — Staubgefäße (8—)10. Kronblätter weiss, an der Spitze hell-rosenroth. Blüten fast 2mal so gross als bei der flg., fast den ganzen Tag geöffnet. — Knieperstrand, ufern des Bades. Zingst. Rügen. — Gewöhnlich ist die Pflanze oberwärts drüsig-flaumig, klebrig; ändert ab:

β. denudata, F. — Kahl od. fast kahl. — Mit der Hauptform: am Knieperstrande u. sehr häufig auf der Frankenweide, besonders am Strande.

938. **Sp. marina**, Garcke. — Ar. rubra β. marina, Linn. Spec. Spergula mar., Dalech. Lepigonum medium, Wahlbg; systematisch richtig, aber historisch nicht begründet, obwohl Linn. Spec. II. append. in den Worten: „A. media floret hora 12.“ (ähnlich in Mant. II.) nur diese Art bezeichnet haben kann, während ebendasselbe die Var. β. marina („Stamina 10; evigilat hora 9. Calyx tegit dimidiam capsulam.“) nur auf die v. Art passt. — Fruchthare Staubgefäße 1—6, bisw. 0. Kronblätter lila, nach dem Grunde hin blasser. Blüten nur um Mittag geöffnet. — Frankenweide, Strand u. a. v. a. O. Rügen. — Gewöhnlich geht mit spärlicher Behaarung über in die flg. Var.

β. pubescens, F. — Stengel oberwärts nebst den Blättern, Blütenstielen u. Kelchen drüsig-flaumig, etwas klebrig. — Knieperstrand u. a. O.

γ. candida, F. — Blumenkrone rein weiss. — Frankenweide, mit der gewöhnl. Pflanze, selten.

23. 396. **Spiraea**,CLUSIUS. Linn.

939. **Sp. Filipendula**, Linn. — Fil., Tragus. — Devin: am Ufer des Sees. Tribses: Plenniner Laubholz. Barth. Demmin: Kiefern. Anclam. Lassan: Silberkuhl. **R:** Ufer am Nesebanzer Strande; Wampen, an den südlichen Wiesen. Arcona.

940. **Sp. Ulmaria**, Linn. — Ulm., Gesner. Medesusium (?), Val. Cordus. — An der Kupferwiese u. a. v. a. O. Rügen.

α. denudata, Koch.

β. discolor, Koch. — Blätter unterseits filzig: der Filz aschgrau od. weisslich, bleibend. — Hänflg.

γ. calvescens, F. — Blätter unterseits filzig: der Filz graugrünlich, feiner und lockerer als bei der v. Var., an den älteren Blättern von der Mittelrippe und den Hauptadern aus allmählig verschwindend. — Voigdhäger Moor; Abtshagen, in diesseitigen Walde; wahrscheinlich weiter verbreitet.

52. 397. **Stachys**, Fuchs. Rivin.

941. **St. arvensis**, Linn. — An der Westseite des H. Grabens links vom Wege nach Voigdhagen. Demmin. **R:** Altenfährl und Grahl, in der Nähe des Strandes u. auf diesem.

942. **St. germanica**, Linn. Gesner. — **R:** Wittow.

943. **St. palustris**, Linn. Gesner. — Am Frankenteich u. a. v. a. O. Rügen. Kommt auch an trockeneren Orten, auf Äckern, vor.

944. **St. recta**, Linn. Mant. I. Syst. XII. — Sideritis — erecta, C. Bauh. — Anclam.

945. **St. silvatica**, Linn. — Urtica silvana, Lonicer. — H. Graben u. a. v. a. O. Rügen.

54. 398. **Statice**, Dalech. Tournef.

Vgl. Limonium. — Willd. hat, indem er die Lsche Gattung Statice wieder trennte, letzteren Namen unrichtig angewandt und ohne genügenden Grund seine Armeria eingeführt.

946. **St. Armeria**, Linn. — Armeria montana tenuifolia major, Clusius. St. elongata, Hoffm. — Kugelfang, an den Chausseen u. a. v. a. O. Rügen, häufig.

947. **St. maritima**, Miller. — St. Armeria β. De C. (oh auch Linn.?). — Rügen.

15. 399. **Stellaria**, Linn. (Brunfels.)

948. **St. crassifolia**, Ehrh. — Tribses: Plenniner Moor (Billich).

949. **St. glauca**, Wither. — St. graminea β. Linn. — Herrenwiese; um Stadtkoppel u. a. v. a. O. Rügen.

950. **St. graminea** (α.), Linn. — Gramen leucanthemon, Dodon. (nicht Dalech.). — Ufer um Franzenshöhe u. a. v. a. O. Rügen.

951. **St. Holostea**, Linn. — Holosteum caryophyllaceum, Tabern. — H. Graben u. a. v. a. O. Rügen.

952. **St. media**, Vill. — Alsine med., Linn. Dodon.

β. denudata, F. — Stengel ganz kahl, ohne die leistige Haarleiste. — Abtshagen: Chausseegraben im diesseitigen Walde.

γ. decandra, F. — Var. β. major, Koch. — Ist kleiner, als die gemeine Pflanze auf fetterem Boden wird. — Niederhof: Park; Pennin; Abtshagen.

953. **St. nemorum**, Linn. mit Ausschl. der Var. β. Spec. II. (?). — Alsine altissima nem., C. Bauh. — Parower Park; Voigdhäger Trift; Bruch bei Niederhof; Abtshagen u. a. O. Greifswald: Hokenmühl.

954. **St. uliginosa**, Murr. — St. graminea γ. Linn. Fl. suec. II. (nicht Spec. nach dem Cit. aus C. Bauh.). Alsine fontana, Tabern. — Untere Blätter kürzer als die oberen,

gestielt! — Bei Stadtkoppel; Devin, Negast, Abtshagen u. a. O. Rügen.

Stenactis annua, Nees v. E. — Bisw. in Gärten wie Unkraut.

400. **Stratiotes**, Lobel. Linn.

955. **Str. Aloides**, Linn. — Al., Boerb. Aloë palustris, C. Bauh. — In beiden Teichen; Vogelsang; Negast, Demmin. Greifswald. Lassar: Weide.

401. **Succisa**, Fuchs. Mert. u. Koch.

956. **S. pratensis**, Münch. — Succ. s. Morsus diaboli, Camerar. Scabiosa Succ., Linn. — Bei Stadtkoppel; Parower Aussenkoppel; Negast, Devin, Niederhof. Demmin. Rügen.

β. *dentata*, F. — Blätter schmäler, spitzer, die stengelständigen gezähnt od. fast fiederspaltig; das Kraut etwas schwächer behaart. — Demmin: Devensche Holz.

γ. *humilis*, F. — Stengel niedrig (1/2–1 Spanne hoch), 1–3köpfig. Wurzelblätter kürzer, breiter, elliptisch-eiförmig. — Parower Aussenkoppel. Demmin: Tollensewiesen.

402. **Sivertia**, Linn.

957. **Sw. perennis**, Linn. — Gentiana — punctata, Clusius. — Trilsees: Plenniner Moor, Grimmen: Vorland. Greifswald. Jarmen.

403. **Symphitum**, Fuchs. Tournef.

958. **S. officinale**, Linn. — *Consolida major*, Brunfels. — In und an den Vorstädten; Frankenfeld u. a. O.

Syringa vulgaris, Linn. — Lilac, Busbeck. — Bisw. verwildert.

404. **Tanacetum**, Brunfels. Tournef.

959. **T. vulgare**, Linn. Tragrus.

405. **Taraxacum**, (Lonic.) Delius.

960. **T. officinale**, Web. — *T. officinalis*, Hall. Leontodon T., Linn. *Deus leonis*, Brunfels.

961. **T. palustre**, De C. — *Leontodon palustre*, Smith. *T. officinale* s. *lividum*, Koch. — Unterscheidet sich ausser den sonstigen Merkmalen durch die auf den Mai u. Jun. beschränkte Blütezeit. — R: Wampen. Vielleicht auch bei Str. in der Parower Aussenkoppel.

406. **Tarax**, Dalech. Tournef.

962. **T. haecata**, Linn. — R: Stubnitz. — Soll vormals auf dem Dars häufig gewesen sein.

407. **Teesdatea**, Rob. Brown.

963. **T. nudicaulis**, R. Br. — *Iberis nud.*, Linn. — Blüht aus späteren Trieben, so wie auch bisw. junge Pflanzen, oft nach im Sept. — Devin, Tesebenhagen, Sandhagen, Langendorf, Gr. Kädingshagen u. a. O. Lassar: Heideberg, Wangeltow. R: Wrechen u. a. O.

408. **Teuerium**, Fuchs. Linn.

964. **T. Scordium**, Linn. — Scord., Tragrus. — Kupferwiese; um den Knieperteich; bei Stadtkoppel; Deviner Moor u. a. O. Anclam.

965. **T. Scorodonta**, Linn. — Scord., Tragrus. — R: Hagen, am Wege nach Binz beim Walde.

409. **Thalictrum**, Val. Cordus. Tourn.

966. **Th. aquilegifolium**, Linn. — *Th.* — *aquilegiae foliis*, — Tourn. — R: Garz (?).

967. **Th. flavum**, Linn. — *Thalictrum pratense*, Clusius. — Wiesen am Vogelsang; Abtshagen, im Heller; Niederhof; Bruch und Strand. Greifswald: Kaval. Lassar: Bauerberg. R: Sagard.

968. **Th. Jaquinianum**, Koch. — Blüht erst Ende Jun. bis in den Aug. — Kugelsang. Demmin: an den Kiefern und im Devenschen Holz. R: zwischen Bergen und der Lietzower Fähre (?) — nach Weigel dort die fig. Art).

969. **Th. minus**, Linn. C. Bauh. — *Thaliotr. min.*, Dodon. — Rügen; wahrscheinlich auf Jasmond vorkommend.

410. **Thesium**, Linn.

970. **Th. pratense**, Ehrh. — R: Jasmond; Wittow.

411. **Thlaspi**, Fuchs. Tournef.

971. **Thl. arvense**, Linn. — *Thl. ar. siliquis latis*, C. Bauh. *Thl. platycarpon*, Camerar. — Auf fettem Boden oft mit monströsen Blüten.

412. **Thymus**, Brunfels. Tournef.

972. **Th. Serpyllum**, Linn. — *Serp.*, Brunfels. *Serp. vulgare*, Dodon.

α. *Chamaedrys*, Koch. — *Th. Cham.*, Fries. *Th. Serp. β. γ. δ. ε.* Linn. — Mit weisser Blumkronen u. hellgrünem Kraut an der Sandgrube im Tribs. Felde (die weibl. Form) und am Seeufer bei Lüßow (die Zwitterform).

β. *angustifolius*, Koch. — *Th. ang.*, Pers. *Th. Serp. α.* (u. vielleicht ζ. Mant. II) Linn.

413. **Thyssetimum**, (Lobel.) Tournef.

973. **Th. palustre**, Hoffm. Tourn. — *Seseli pal.*, Camerar. — Frankenteich, Vogelsang u. a. v. a. O.

414. **Tilia**, Brunfels. Tournef.

974. **T. platyphyllos**, Scop. J. Bauh. — *T. grandifolia*, Ehrh. *T. europaea β. δ. ε.* Linn. — Ebensträusse 3–5blüthig od. durch Fehlschlagen 1–2blüthig; Kapseln 4–6kantig. — Angepflanzt; oh sich von selbst durch Samen fortpflanzend?

975. **T. umbellata**, Scop. — *T. parvifolia*, Ehrh. *T. europaea γ.* Linn. — Die Ebensträusse fand ich bei beiden von Koch aufgestellten Varr. 3–15blüthig. — R: Berger Holz; Stubnitz.

415. **Tithymalus**, Fuchs. Tournef.

Lactaria, Gaza. Arten von *Euphorbia*, Linn., der hierin die beiden Gattungen *Tithymalus* (Tourn.) und *Tithymaloides* (Tourn.) — Jetzt *Pedilanthus*, Neck.) vereinigte, mit denselben Trivialnamen.

976. **T. Cyparissias**, Scop. — *T. cyp.*, Fuchs. *T. cupressinus*, — Lobel. — Lassar: bei Lentschow.

X 55 =

977. **T. Esula**, Scop. — *Es. minor*, Dodon. Tith. pinea, Lobel. — **R: Patbus.**
 978. **T. exiguus**, Mönch. — *Esula exigua*, Tragus. Tith. minimus, Tabern. — Sehr selten und wohl nur aus eingeschlepptem Samen.

β. excisus, F. — Hüllblättchen am Grunde verbreitert und zum Theil ein wenig zusammengewachsen, durch einen buchtigen Ausschnitt der inneren Seite ungleich-2lappig: die Lappen spitz, der seitenständige mehrmals kleiner od. zahnförmig, der endständige lanzettförmig und an den grösseren (unteren) Blättchen etwas sichelförmig. Die Blättchen der Hülle von der gewöhl. Form kaum abweichend, oder am Grunde schwach-verbreitert, gleichseitig, selten etwas stärker verbreitert und beiderseits lzählig. — Unter Sommerblumen in einem Garten gefunden.

979. **T. helioscopius**, Scop. Fuchs.

980. **T. Peplus**, Gärtin. — *Peplus*, Fuchs.

T. Lathyris, Scop. — *Lath.*, Bruefels. — In Gärten bisw. verwildert.

31. **416. Torilis**, Adans. Hoffm.

981. **T. Anthriscus**, Gärtin. — *Tordylium Anthr.*, Linn. — Vorstädte u. a. v. a. O.

39. **417. Tragopogon**, Fuchs. Tournef.

982. **Tr. minor**, Fries. — *Tr. pratensis β. micranthes*, Wimm. — Hin u. wieder auf den Wällen.

983. **Tr. pratensis**, Linn. — *Tr. pratense luteum*, C. Bauh. — Wälle, Vorstädte, H. Graben, an der Chaussee u. a. O.

Tr. porrifolius, Linn. — Bisw. verwildert od. gelfüchtet.

5. **418. Trientalis**, Val. Cordus. Rupp.

984. **Tr. europaea**, Linn. — *Pyrola Alsinea flore europaea*, C. Bauh. *Herba trientalis*, Val. Cordus. — Negast: am östl. Waldrande neben dem Fusssteige; Abtshagen: unfern des Baumgartens im Walde. Tribssees: Kamitzer Holz. Barth: Stadtholz. Greifswald. **R: Gora; Granitz.**

19. **419. Trifolium**, Fuchs. Tournef.

985. **Tr. agrarium**, Linn. Dodon. — Abtshagen, neben der Chaussee im diesseitigen Walde; Chaussee von Pantlitz nach Martensdorf.

986. **Tr. alpestre**, Linn. — Tribssees: Plenniner Laubholz. Demmin: Devensche Holz. **R: Jasmond.**

987. **Tr. arvense**, Linn. — *Tr. arv.* — C. Bauh. Lagopus, Fuchs. — Kugelfang u. a. v. a. O.

988. **Tr. filiforme**, Linn. — ☉ u. ♂. — Ein fast doldiger Stand der obersten Blütenstiele findet sich hier, wie bei *Medicago lupulina*: an u. in der Kupferwiese. — Frankenvelde; Knieperstrand; Barther Landstrasse u. a. v. a. O.

989. **Tr. flexuosum**, Jacq. — *Tr. medium*, Linn. Faun. succ. II. append. (der blosse Name; in Spec. II. u. später

zu *Tr. alpestre* gezogen). — Am Ablass des Andershöfer Teichs; Seuler bei Lüssow, Abtshagen u. a. v. a. O. Demmin: Devensche Holz. Rügen.

990. **Tr. fragiferum**, Linn. — *Tr. fr. friscum*, Clusius. — Frankenvelde, Strand, Tribs. Feld u. a. v. a. O. Rügen. — An feuchteren, mit hohem Grase bedeckten Orten und an Gebüsch ist der Stengel aufstrebend od. fast kletternd, nicht wurzelnd, nebst den Blattstielen viel länger.

991. **T. hybridum**, Linn. — *Greifswald*. Demmin. Auch oft gebaut.

992. **T. montanum**, Linn. (Spec. I. no. 29.). — *Tr. mont. album*, C. Bauh. — Ufer am Deviner See; hier u. da an den Chausseen. *Greifswald*. Demmin. Rügen.

993. **Tr. pratense**, Linn. Dodon. — *Tr. pr. purpureum*, Fuchs. — Bei der an allen Wegen u. a. O. gemeinen (verwilderten?) Pflanze kommen auch gedreite Köpfchen vor; jedoch sind auch einzelne Köpfchen nicht selten. — An einer gebaueten, sehr grossen u. üppigen Form ist die Spindel und die etwa vorhandenen Blütenstiele der immer gezwieten Köpfchen fast ohne Ausnahme zusammengewachsen. — Die, wie es mir scheint, wirklich wilde Pflanze fand ich in allen Theilen mehrmals kleiner, als die erstere, den Stengel (auf nacktem od. kurzgrasigem Boden) aufrecht, die Blätter deutlich gezähnt, die unteren verkehrt-eiförmig, bisw. etwas rautenförmig, oft ausgerandet, die oberen länglich-verkehrt-eiförmig, die Köpfchen meist einzeln.

994. **Tr. procumbens**, Linn. — Oft, auch auf nacktem Boden, aufrecht. — Kugelfang, Barther Landstrasse u. a. v. a. O. Rügen.

α. majus, Koch.

β. minus, Koch. — Hier seltner als *α.*

995. **Tr. repens**, Linn. Rivin. — *Tr. pratense album*, C. Bauh.

996. **Tr. spadicum**, Linn. Fl. succ. II. — *Tr. montanum* Linn. Spec. I. no. 37. — *Greifswald*.

Bastarde:

989 + 993. **Tr. flexuoso-pratense**, F. — Unterscheidet sich von *Tr. pratense* durch Folgendes: Nebenblätter zugespitzt-begrannt; Köpfchen oft gestielt, meist einzeln; Kelche oft schwächer behaart; Blumenkrone meist feuriger purpurn. — Hier und da an Chausseen und Wegrändern; ziemlich selten. — Im diesseitigen Abtshäger Walde neben der Chaussee (selten) mit viel kleineren Köpfchen, stark-behaarten Kelchen und verkehrt-eiförmigen, ausgerandeten unteren Stengelblättern: die Blätter sämtlich kleiner; der Stengel aufstrebend, viel länger als bei der oben erwähnten kleinen (wilden?) Form von *Tr. pratense* und wohl ohne Zweifel aus dieser entstanden.

993 + 989. **Tr. pratensi-flexuosum**, F. — Unterscheidet sich von *Tr. flexuosum* durch Folgendes: Wuchs

niedriger, Stengel starker; Nebenblätter meist etwas breiter; Köpfehen gestielt od. sitzend, oft gezwiegt; Kelch-
röhre meist ein wenig behaart und oberwärts (wie es
auch bei *Tr. flexuosum* an sonnigen Orten, u. zwar in
noch höherem Grade der Fall ist) während des Blühens
blutroth überlaufen. — Blüht bis Ende Sept. — Um Str.
sehr häufig: Chaussee nach Brandshagen und nach Ne-
gast; Ufer am Strande nach Devin; am H. Graben bei
Stadtkoppel; Kugelfang; am Wege nach Prohn u. a. O.

61. 420. *Triglochin*, Dalech. Rivin.

997. *Tr. maritimum*, Linn. — Strand, Franken-
weide u. a. v. a. O. Demmin.

998. *Tr. palustre*, Linn. — Gramen trigl., Dalech. Gr.
Trigl., J. Bauh. — Kypferwiese, Knieperstrand u. a. v. a. O.

70. 421. *Triodia*, Rob. Brown.

999. *Tr. decumbens*, Beauv. — Festuca dec., Linn.
Gramen avenaceum parvum decumbens, paniculis non aristatis.
Rajus. — Frankenweide; Voigdhäger Moor, Negast u.
a. O. R: Wampen; Drigger Kiefern.

x 36 422. *Tripleurospermum*, C. H. Schultz.

1000. *Tr. inodorum*, Schultz. bip. — Chrysanthemum
inod. (u.), Linn. Spec. II. Cotula inodora, Pena. — ☉ u. ♂.
— Die Fruchtköpfchen sind oft auf derselben Pflanze
am Grunde flach oder gewabelt, grösser u. kleiner, der
Fruchtboden bald kürzer, breit-eif. od. eiförmig, bald
länger, ei-kegelf. od. kegelförmig, die Aelhäuten bald
dicker, bald dünner, die Stengel bald aufrecht, bald auf-
strebend od. ausgebreitet od. gestreckt, die Wurzel der
überwinterten (oft auch der heurigen) Pflanze meist viel-
stengelig. Eine 2te Art: *Tr. maritimum*, Koch (*Matricaria*
maritima, Linn. Spec. I. *Chamaemelum maritimum*, Linn. It.
vestg. *Chrysanthemum inodorum* β. Linn. Spec. II.), vermag
ich in hiesiger Gegend nicht zu unterscheiden; nach der
Beschreibung im It. vestg. („Semina radii 3angularia, 3den-
tata; semina disci 4gonia, 4dentata“) scheint die L. sehe
Pflanze nicht hieher zu gehören.

x 38 423. *Triticum*, Brunsfels. Tournef.

1001. *Tr. caninum*, Schreb. — Elymus caninus, Linn.
Fl. suec. II. Spec. II. sqq. — Das *Tr. caninum*, Linn. Spec. I.
wird fälschlich hieher gezogen: es gehört zu den be-
grannten Formen von *Tr. repens*, da es nach den Citaten
aus Vaillant und Scheuchzer eine kriechende Wurzel
hat, und da auch die Ähre bei Vaill. par. tab. 17. f. 2.
damit übereinstimmt. — *Anclam*.

1002. *Tr. junceum*, Linn. — Dars, Zingsl, Hidden-
see. R: Mönchgut.

1003. *Tr. repens*, Linn. — Gramen, Ruellius. Gr. —
medicatum, Lobel.

β. hirsutum, F. — Untere Blattseiden rauhaarig. —
Um die Tribs. und Knieper-Vorstadt u. a. O.

424. *Trollius*, Gesner. Rapp.

1001. *Tr. europaeus*, Linn. — Reinberg. Tribsees:
Pleinmiller Moor. Barth: Saatel. R: Putbus; Sagard.

425. *Turritis*, (Lobel.) Tournef.

1005. *T. glabra*, Linn. — Ufer am Knieper- u. An-
dershöfer Strande; Deviner Ort; Voigdhäger Trift;
Lüssow, am Seeufer. Demmin. Lissan: beim Waschever
Fischerhause. Rügen.

33. 426. *Tussilago*, Eur. Cordus. Tournef.

1006. *T. Farfara*, Linn. Lobel. — T. sive Farf. —,
Caesalpin. *Lactuca ustularia*, Eur. Cordus. — Am Strande
u. a. v. a. O. Rügen.

6. 427. *Typha*, Eur. Cordus. Tournef.

1007. *T. angustifolia*, Linn. — Knieper- u. a.
O. Seemühl. Greifswald. Lissan: Waschow.

1008. *T. latifolia*, Linn. — Kommt auch mit 3 Ähren
vor, deren 2 untere weiblich sind. — Knieper- u. a.
O. Lissan: Waschow. Rügen.

428. *Ulmus*, Tragus. Tournef.

1009. *U. campestris*, Linn. — U. camp. —, C. Bauh.
— R: Medars; Jasmund.

1010. *U. effusa*, Willd. — Nebst der v. oft ange-
pflanzt; ob aber heimisch?

429. *Urtica*, Brunsfels. Linn.

1011. *U. dioica*, Linn. — U. major, Brunsfels. U. vulgaris
urens —, Tragus.

1012. *U. urens*, Linn. — U. u. minima, Dodon. U. minor,
Brunfels.

53. 430. *Utricularia*, Linn.

1013. *U. intermedia*, Hayue. — U. vulgaris Var. mi-
nor, Linn. Fl. suec. u. lapp. nach Wahlenbg. — Voigde-
häger Teich.

1014. *U. minor*, Linn. — *Lentibularia min.*, Vaill.
— Negast. Greifswald: Kieshöfer Moor. Lissan: Moor bei
Wangelkow.

1015. *U. vulgaris*, Linn. — *Lentibularia major*, Vaill.
Lent., Rivin. Lent. et Meon aquaticum, Gesner. — Knieper-
Mühlengraben; Negast; Voigdhäger Teich u. a. O.
Loitz, in Menge. Lissan. Rügen.

431. *Vaccinium*, Dodon. Rapp.

1016. *V. Myrtillus*, Linn. — Myrt. germanica, Dalech.
Vitis idaea nigra, Camerar. — Negast, Abtshagen u. a. v.
a. O. Rügen.

1017. *V. Oxycoccos*, Linn. — *Oxycocum*, Val. Cor-
dus. *Serpyllum acinacium*, Gesner. — Negaster u. Voigde-
häger Moor, Zarendorf, Teschenhagen, Brandshagen,
Devin, Parow n. a. O. Lissan: Moor. R: Serpin.

1018. *V. uliginosum*, Linn. — *Vitis idaea major*,
Camarar. — Parower Aussenkoppel. Tribsees: Recknitz-
moor bei Pleinin. Negast. Greifswald: Pothagen. Hid-
denssee. R: Wittow; an der Prora.

1019. *V. Vitis idaea*, Linn. — Vit. id. rubra —, Do-

don. Camerar. Myrtillus exiguus, Tragus. — Sonst auf der vormal. Langendorfer Heide, selten u. klein. *Tribsees*. Dars. Greifswald: Kieshof. Lassar: Buggenhagen. **R:** Güstelit; Schmale Heide.

32. **432. *Valeriana*, Brunsfels. Tournef.**
1020. **V. dioica**, Linn. — Herrenwiese, Vogelsang, Parow, Devin u. a. v. a. O.

1021. **V. officinalis**, Linn. — Phu germanicum, Fuchs. — Die ziemlich zahlreichen Formen, die man zum Theil als selbständige Arten aufgestellt hat, sind folgende:

1) *multiceps*, F. — Val. *multiceps*, Wallr. (?) — Wurzel vielköpfig, vielstengelig, ohne Ausläufer.
a. *exaltata*, F. — Val. *exaltata*, Mikan. — Blätter 7—10paarig. — Andershöfer Strand. Abtshagen, im diesseitigen Walde.

β. *littoralis*, F. — Niedriger, bis 2' hoch. Blätter 3—5paarig. — Deviner Strand, auf Kiesboden, selten.

2) *turonifera*, F. — Val. *officinalis*, Linn. bei Koch mit Ausschl. der letzten Var. hier unten. — Wurzel (meist) Istengelig, mit Ausläufern.

γ. *major*, Koch (Var. α.). — Höher. Blätter 7—10paarig: Blättchen sämmtlich gezähnt, an den unteren Blättern oft tiefer-gezähnt und breiter. — II. Graben, Andershöfer Strand u. a. O.

δ. *media*, F. — Blätter 7—10paarig: Blättchen lanzettförmig, gezähnt, an den oberen Blättern ganzrandig. — H. Graben u. a. O.

ε. *minor*, Koch (Var. β.). — Blätter 7—10paarig: Blättchen schmal-lanzettförmig, ganzrandig od. die untersten schwach-gezähnt. — Andershöfer Strand u. a. O.

ζ. *sambucifolia*, F. — Val. *samb.*, Mikan. — Blätter 3—5paarig. — Andershöfer Strand; Wiese bei Negast am Fusssteige nach Lüssow.

33. **433. *Valerianella*, Columna. Tournef.**

1022. **V. Auricula**, De C. — Rügen.

1023. **V. dentata**, Pollich. — V. Morisonii, De C. Valeriana Locusta δ. *dentata*, Linn. mit Ausschl. des Cit. aus Rivin. — Langendorf, nach Grünhufe zu; Neu-Pretz. Lassar.

1024. **V. olitoria**, Pollich. — Valeriana Locusta α. *olitoria*, Linn. Locusta quibusdam, Gesner. — Wälle, Vorstädte, Knieperstrand, Niederhof u. a. v. a. O.

47. **434. *Verbascum*, Brunsfels. Linn.**

1025. **V. nigrum**, Linn. Tragus. — Devin, Chaussee nach Negast, Barther Landstrasse u. a. v. a. O. Rügen.

1026. **V. thapsiforme**, Schrad. — Um Str. äusserst selten. Demmin, häufig. Lassar: Palow.

1027. **V. Thapsus**, Linn. Fl. suec. (nach Fries.) Schrad. — Thapsus barbatus, Jo. Gerard. (vielleicht die v. Art). — Dänholm; sonst um Str. äusserst selten. Greifswald. **R:** Halbinsel Thiessow, Stubnitz.

V. phlomoides, Linn. Spec. 1. append. — V. sive candela regia, Tabern. — Ilie u. da zufällig in Gär-

ten, sich regelmässig fortpflanzend, bisw. (wie auch das auf gleiche Weise vorkommende V. Thapsus) mit gelblich-weisser Blumenkrone.

43. **435. *Verbena*, Brunsfels. Tournef.**

1028. **V. officinalis**, Linn. — Columbaris, Hermol. Barbarus. — Voigdelhagen; Gr. n. Kl. Kädingshagen. Demmin. Lassar: Garthof. Barth. **R:** Altenfähr n. a. O.

44. **436. *Veronica*, Fuchs. Tournef.**

1029. **V. agrestis**, Linn. zum Theil: wenigstens mit Ausschl. des Cit. aus Gouan. („calycina foliola ovataaequalia“), welches nur auf V. polita recht passt. — V. didyma, Ten. nach Koch. — Ist nebst den nächst verwandten Arten (V. Buxbaumii, V. opaca u. V. polita) ☉ u. ♂. Alle vier blühen vom Frühling bis zum Herbst; zuerst die überwinterten Pflanzen, dann die im Frühling aufgegangenen; nachdem sie eine Zeit lang geblüht, entwickeln sich in den obersten Blattwinkeln keine Blüten mehr, Stengel u. Äste machen einen Stillstand im Wachsen, bis die Samen gereift sind, wachsen dann weiter und beginnen aufs neue zu blühen, während sie unterwärts wegen der vollkommen abgestorbenen Blätter nackt erscheinen; oft treiben auch neue Äste unter den älteren hervor. Später kommen noch wieder jüngere Pflanzen hinzu. Nur die heissen Monate in trockenen Sommern hemmen öfters diese Vegetation. Bei allen 4 Arten wurzelt der Stengel nebst den Ästen oft am Grunde, u. zwar nicht bloss an den Gelenken, Unsere Art trägt gar nicht selten am Stengel od. an einem der Äste 1—3 Blüten mit 5theiligem Kelch, dessen oberster Zipfel lineal und viel kürzer als die übrigen ist.

1030. **V. Anagallis**, Linn. Syst. X. sqq. — V. An. aquatica, Linn. Spec. u. Fl. suec. Anagallis aqu., Jo. Gerard. Berula major, Tabern. — Gräben im Tribs. Felde u. a. O.; sehr gross, mit breiteren Blättern, im Deviner Fluss.

1031. **V. arvensis**, Linn. — Wälle, Ufer am Frankenstrande u. a. v. a. O.

1032. **V. Becabunga**, Linn. — Anagallis aquatica s. Becabunga Germanorum, Lobel. Berula s. Anagallis aquatica, Tabern. — Am Knieper-Mühlengraben, Barther Landstrasse u. a. O.

1033. **V. Buxbaumii**, Ten. — Vgl. bei V. agrestis. — Stadtfeld. Demmin: Acker am Mühlengraben neben dem Wege nach Vorwerk, in Menge.

1034. **V. Chamaedrys**, Linn. — Cham., Brunsfels. — Am Jungfernstieg bei Kuöchelsöhrn, II. Graben u. a. v. a. O.

1035. **V. hederifolia**, Linn. (hederaefol. vor 1755.). — Morsus gallinae folio hederulae, Lobel. Alsine hederacea, Tabern.

1036. **V. longifolia**, Linn. — Loitz. **R:** Mönchgut.

1037. **V. montana**, Linn. — Alysson Dioscoridis montanum, Column. — Abtshagen, im diesseitigen Walde. Tribsees: Forkenbecker Holz.

1038. **V. officinalis**, Linn. — V. vulgaris supina, Clu-

sus. — Deviner Anlagen, Sandhagen, Negast, Abtshagen u. a. O.

1039. **V. opaca**, Fries. — Vgl. bei *V. agrestis*. — Auf dem Stadtfelde, häufig, besonders auf fetterem Boden; Voigdehagen. **R**: Altenfähr, Grahl, Nesebanz. — Die Kapsel ist netzig-aderig, aber das Adernetz ist schwächer als bei *V. Buxbaumii* u. durch die Behaarung versteckt.

1040. **V. peregrina**, Linn. — Greifswald.

1041. **V. polita**, Fries. — Vgl. bei *V. agrestis*. — Wälle, Vordäde, Stadtfeld u. a. O., vorzüglich auf magerem, etwas sandigem Boden. **R**: Altenfähr (in Menge auf der alten Schanze am nördl. Strande), Kl. Bandelwitz.

1042. **V. scutellata**, Linn. — *Anagallis aquatica angustifolia* scut., C. Bauh. — Auf dem vormal. Kl. Paschenberg; Schlachterweide; um den Vogelsang u. a. v. a. O.

1043. **V. serpyllifolia**, Linn. — *V. minor* serp., Lobel. — Kl. Paschenberg, Kugelfang u. a. v. a. O.

1044. **V. spicata**, Linn. — *V. spic. minor*, C. Bauh. — Obere Blätter oft wechselständig od. zerstreut. — Demmin, sehr häufig. *Lassan: Pinnow. R*: Mönchgut, auf dem Perd.

1045. **V. triphylla**, Linn. — *Elatine triph.*, Hist. Lugd. — Die Pflanze verbreitet, wo sie häufig steht, gegen Abend einen strengen, etwas aromatischen Geruch. — Knieper- u. Frankenfeld, bei Stadtkoppel n. a. v. a. O.

1046. **V. verna**, Linn. — Kugelfang; Gr. Kädingshagen, Devin u. a. v. a. O.

V. prostrata (Linn.) möchte in der Gegend von Wolgast od. Lassan ebenfalls vorkommen.

31. 437. **Viburnum**, Gesner. Linn.

1047. **V. Opulus**, Linn. — *Op.*, Ruellius. *Sambucus aquatica*, Tragus. — Il. Graben u. a. O. Rügen.

32. 438. **Viola**, Fuchs. Rivin.

Vgl. Cracca und Ervum.

1048. **V. angustifolia**, Roth. Rivin. — *V. sativa* β . *angustifolia*, Linn. Fl. suec. II. *V. sativa* β . *nigra*, Linn. Spec. II. — Devin, Gr. Kädingshagen, Negast, Abtshagen, Zimkendorf u. a. O. **R**: zwischen Bergen und Ralswiek; Semper.

β . *segetalis*, Koch (Var. α). — *V. segetalis*, Thuill. — Nur 2mal von mir gefunden: im Frankenfelde unter Sommerkorn; an der Chaussee bei Andershof; an beiden Orten mehrere Pflanzen.

1049. **V. dumetorum**, Linn. — *V. maxima* dum., C. Bauh. — *Anclam. R*: Sagard, auf dem Dubberwort (?); Stubnitz.

1050. **V. Lathyroides**, Linn. — *V. lath.*, Hermann. — Kugelfang, Ufer am Deviner See, Zimkendorf. **R**: Wampen, Putbus, Granitz.

1051. **V. sativa**, Linn. mit Ausschl. der Var. β . Spec. II. — *V. major* sat., Tragus. — Kaum ursprünglich heimisch.

1052. **V. septium**, Linn. Rivin. — *V. sep. perennis*, J. Bauh.

α . *vulgaris*, Koch. — An der Kupferweise nördn des Pulverhauses; Voigdehagen; Pütte; Chaussee bei Negast und bei Abtshagen. Tribsees: Plenniner Laubholz.

β . *angustifolia*, Koch. — Abtshagen, im diesseitigen Walde, ziemlich häufig.

439. **Viola**, Brunfels. Rupp.

1053. **V. minor**, Linn. — *Clematis daphnoides minor* —, Besler. *V. pervinca*, Brunfels. *Pervinca*, Tragus. — *Loitz. Demmin*: in den Kiefern, selten.

440. **Vincetoxicum**, Dodon. Münch.

1054. **V. officinale**, Münch. — *Asclepias Vinc.*, Linn. Lobel. *Cynanchum Vinc.*, R. Brown. — Tribsees: Plenniner Laubholz. Greifswald: auf dem Streng. Lassan: *Lentschoe. R*: Wittow, stellenweise am hohen Ufer in Menge; Stubnitz.

441. **Viola**, Brunfels. Tournef.

1055. **V. canina**, Linn. Lonicer. — Devin, Niederhof, Negast u. a. v. a. O. — Die kleinere Form (*V. ericetorum*, Schrad.) auf der Frankenweide, am Kugelfang, Heide bei Gr. Kädingshagen, um die Windmühle diesseits Garbdenhagen u. a. O.

1056. **V. epipsila**, Ledebour (bei Fries Novit. Mant. II.). — Unterscheidet sich von *V. palustris* (Linn.) ausser den anderen Merkmalen durch Folgendes: Blätter deutlicher gesägt-gekerbt, mit einem (getrocknet) durchscheinenden, ziemlich eng-maschigen Adernetz, die jenseits überall mit zum Theil etwas gekräuselten Haaren bestreut, das innerste (2te od. 3te) ei-herzförmig; Kelchblätter lanzettförmig-länglich (3mal so lang als breit); die Blumenkrone etwas grösser, der Sporn länger. — Bei *V. palustris* sind die Blätter sämmtlich stumpf, meist abgerundet, kahl od. unterseits nur auf den Adern mit kurzen, geraden Haaren bestreut, ein durchscheinendes Adernetz nicht vorhanden od. (seltnr) undeutlich und weit-maschig; die Kelchblätter elliptisch-eiförmig (kaum 2mal so lang als breit), sehr stumpf. — Tribsees: Plenniner Moor.

1057. **V. hirta**, Linn. — Tribsees: Lindbusch bei Semlow; Plenniner Laubholz. **R**: Stubnitz.

1058. **V. mirabilis**, Linn. — **R**: Stubnitz.

1059. **V. odorata**, Linn. — *V. Martia* od. —, Tragus. — Wälle, Il. Graben u. a. v. a. O.

1060. **V. palustris**, Linn. — *V. pal.*, Morison. — Parower Aussenkoppel; Deviner Anlagen, am Sumpf; Teschenhagen, Zarrendorf, Wendorf, Sandhagen, Negast u. a. O.

1061. **V. recta**, Gareke. — *Anclam*: die Var. nicht angegehen.

1062. **V. silvestris**, Lamek. (*V. canina*, Linn. zum Theil?) — Parower Park, Pennin, Negast, Andershof, Voigde-

häger Trift, Niederhöfer Park u. a. v. a. O., stellenweise in Menge. Rügen.

β. Riviniana, Koch. — Parower Aussenkoppel u. a. O.

1063. **V. tricolor**, Linn. — Herba Trinitatis, Brunfels.
α. arvensis, Koch (Var. β.). — V. arvensis, Murr. V. tricolor α. Linn. V. bicolor arvensis, C. Bauh. — Die überall gemeine Form, daher von Linn. vorangestellt.

β. amoena, F. — V. tricolor β. Linn. V. tric. α. vulgaris (?), Koch (sie kommt aber nach Koch selbst nicht überall wildwachsend vor). V. tricolor, Dodon. — Auf dem Stadtfelde vielleicht nur aus dem Samen der durch die Cultur verschönerten, ebenfalls hierher gehörigen Zierpflanze verwildert; in der Tribseer Gegend an mehreren Orten; Demmin: in den Kiefern des Derenschen Holzes.

13. 442. **Viscaria**, (Tabern.) Rupp.

Vgl. Lychnis.

1064. **V. vulgaris**, Roehling. — Lychnis Visce, Linn. — Ufer am Deviner u. am Borgwall-See. Tribseer: Plenniner Laubholz. Anclam. R: Gastow, auf dem Papenberg; Medars.

31. 443. **Viscum**, Fuchs. Tournef.

1065. **V. album**, Linn. — V. baccis albis, C. Bauh. — Greifswald: Eldena. Lassan: Vorwerk (Garten).

12. 444. **Xanthium**, Fuchs. Tournef.

1066. **X. strumarium**, Linn. — X. sine Strumaria, Lobel. Lappa strumaria — Plukenet. Lappa minor, Brunfels u. A. — An der neuen Schiffswerfte, Kniepervorstadt u. a. O. R: Altenfähre.

31. 445. **Xylosteum**, Dodon. Rivin.

Xyl. u. Chamaecerasus, Tournef. Xylosteum, Juss.

1067. **X. dumetorum**, Münch. — X. vulgare, Roehling. Chamaecerasus dumetorum, C. Bauh. Lonicera Xylosteum, Linn. — Bussiner Forst. Anclam. R: Granitz, Stubnitz. — Nach v. Buggenhagen (in Weigels Mag. II. 2.) in Neu-Vorpommern nicht heimisch (?).

6. 446. **Zamichellia**, Micheli.

Einhäusig. Blüthen zu 2 (eine männl. u. eine weibl.) od. einzeln achselständig. Männl. Blüthe nackt: Staubfäden kürzer od. länger ($\frac{3}{4}$ " bis gegen 1" lang); Staubbeutel 2—4fächerig: Fächer getrennt, walzenförmig-länglich, vom Mittelbunde abwärts-gerichtet, dem Staubfaden anhangend, zuletzt von diesem sich ablösend, am Grunde mit einem Loch aufspringend. Weibl. Blüthe von einer glockigen, verschiedentlich getheilten, gespaltenen od. geklappten oder fast ganzrandigen Blüthenhülle umgeben, sitzend od. (wenigstens zuletzt) gestielt. Fruchtknoten 4—8; Griffel pfriemenförmig, bleibend; Narbe schief-schildförmig, ganzrandig oder gezähnt. Steinfrüchtchen fast sitzend od. deutlich gestielt, oft am Rücken und bisw. auch an der Innenseite mit einem

schmalen od. breiteren, flügelartigen, höckerigen Rande umgeben, bei der Reife (vor dem Abfallen) sich schälend (die krautige Rinde löset sich ab, wobei der höckerige Rand sich in meist von einander getrennte Höckerchen und Dörnchen verwandelt). — Für mehr als 2 Arten vermag ich an den hiesigen Pflanzen keine hinreichend unterscheidenden Merkmale aufzufinden. — Meine hiesigen Pflanzen sind alle aus mehr od. minder salzigem Wasser. Beide Arten blühen vom Jun. an.

1068. **Z. palustris**, Linn. (zum Theil?). — Z. pal. major —, Michel. (?). — Die Z. major (Bönnigh.) ist mir nicht klar, da sie nach Reichenbach Blätter hat, von denen wenigstens die oberen immer zu 3 stehen sollen. — Von kräftigerem Wuchs, grösseren Scheiden, Blättern (die sich bis gegen 1" breit finden) und Früchtchen, als die fig. Art. Griffel ziemlich dick, $\frac{1}{2}$ so lang als die fast sitzenden od. kurz-gestielten Früchtchen. — Im Strandwasser: flusen u. an der neuen Schiffswerfte; Gräben und Lachen der Frankenweide; bei Rügen.

1069. **Z. variabilis**, F. — Stengel schlanker, Blätter schmaler, Früchtchen nebst dem Griffel dünner als bei der v. Art. — Die Z. palustris minor — (Michel.) gehört schwerlich hieber.

α. major, F. — Z. palustris β. pedicellata, Wahlenbg (?). Z. ped., Fries (?). — Fruchtdöldchen und Früchtchen gestielt: Stiel und Stielehen zusammen etwa so lang als das Früchtchen; Griffel mehr als $\frac{1}{2}$ so lang als letzteres. — Im Strandwasser; häufig. Pflanzen aus der Nähe von Breslau stimmen hiermit überein.

β. media, F. — Früchtchen etwas kleiner, als bei der v. Var. (fast sämmtlich unberandet und höckerlos). Fruchtsiel und Fruchtsielehen zusammen, so wie der Griffel kaum $\frac{1}{2}$ so lang als das Früchtchen. — Im südl. Graben der Frankenweide unfern des Strandes, neben der v. Var., von eben so hohem, aufreißtem Wuchs, aber reichlicher fruchttragend, in klarem, mehrere Fuss tiefem Wasser, nicht durch die eigene Menge od. durch andere Pflaizen gedrängt. Scheint seltner zu sein als Var. α.

γ. brevis, F. — Z. polycarpa, Nolte (?). — Im Ganzen wie die v. Var., aber der Stengel (an meinem Expl.) länger gegliedert und die Früchtchen daher minder zahlreich. Fruchtsiel u. Früchtchen sehr kurz, zusammen, so wie der Griffel kaum $\frac{1}{4}$ so lang als das Früchtchen. — Greifswald: im Ryek.

6. 447. **Zostera**, Linn.

Zoster, Zwörger, Phyci marini genus, Lonicer.

1070. **Z. marina**, Linn. — Fucus s. Alga marina graminea angustifolia seminifera ramosior, Rajus. — Blüht hier im Binnenwasser schon vor Mitte des Jun.

New York Botanical Garden Library

QK 295 .F52

Fischer, Johann Kar/Verzeichniss der Gei

gen

3 5185 00006 2412