QK299

.K65

pt.1

Gray Herbarium
Purchase
August 1970

PRODROME

DE LA

FLORE DU GRAND-DUCHÉ

DE LUXEMBOURG

PAR

J.-P.-J. KOLTZ,

Agent des eaux et forêts.

Première partie.

Plantes Phanérogames.

LUXEMBOURG.

IMPRIMERIE DE BECK, RUE DU CURE.

1873.

685
Eilzug.

Von Herr an *R. Fricoländer* *Lehrer*
erbitten durch Herrn K. F. KÖHLER in LEIPZIG. *Berlin.*

London, W., 37, SOHO SQUARE. *30/10* 1885. *DULAU & Co.*

Festverlangtes bei erhöhtem Rabatt gegen Baar

*Libanthen aus Kaly, Prodrome
de la Flore de Luxembourg
second partie, vol I, welche wir
mit Belch. falls Sie die andern
Theile liefern können, wollen wir
das Exemplar behalten.* *partie*

Nur saubere Exemplare bitten zu senden.

DE LA

FLORE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Frage
Wiederum
Question
LIBRAIRIE
DE
L. SCHAMBURGER

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

AUG 28 1970

Extrait des Publications de la section des sciences naturelles
de l'Institut R. G.-D.

PRODROME

DE LA

FLORE DU GRAND-DUCHÉ

DE LUXEMBOURG

PAR

sur la
J.-P.-J. KOLTZ,

Agent des eaux et forêts.

Première partie.

Plantes Phanérogames.

LUXEMBOURG.

L. Schamburger in Luxemburg.

1873.

QK299

.K65

pt. 1

MAR 26 1912
Gray Herbarium
Harvard University

PROLÉGOMÈNES.

La connaissance des plantes usuelles, utiles ou nuisibles, remonte à la plus haute antiquité. Elle répondait d'abord à l'indispensable nécessité de l'alimentation et devint ensuite importante comme base de l'exercice de l'art de guérir. Aussi, est-ce par l'étude des simples que commencèrent les recherches approfondies sur le règne végétal; c'est aussi pourquoi la botanique ne put s'affranchir de la médecine que dans le dernier siècle. Linné lui-même était médecin, et c'est à raison de cette qualité qu'il parvint à obtenir une chaire universitaire. Le grand botaniste était avant tout chirurgien de l'Amirauté. Ajoutons que tout ce que nous comprenons sous la dénomination de sciences naturelles était dans le même cas. Aujourd'hui encore les universités sont faciles à compter, où il existe des facultés spéciales pour ces branches si importantes des connaissances humaines.

Le rôle secondaire, l'espèce de sujétion, dans lequel les hautes études tenaient les sciences naturelles, l'absence de cours spéciaux dans nos établissements d'enseignement moyen, semblent donner le motif pour lequel les Luxembourgeois qui s'illustrèrent en si grand nombre dans les autres branches de l'activité humaine, comptent si peu de représentants parmi les naturalistes. H. Crantz (1721—1800) est le seul qui se soit fait un nom comme botaniste. Encore son activité a-t-elle été, avant tout, consacrée à la médecine.

L'esprit Linnéen, qui s'était fait jour par les progrès réalisés dans les sciences naturelles, parvint enfin à prendre droit de cité chez nous. L'abbé Munchen (1763—1818), nommé en 1803 direc-

teur du collège de Luxembourg, y donna le premier cours de botanique. L'abbé Mazuir, le maître de Tinant, le remplaça en cette qualité, et jusqu'ici l'aimable science eut sa place au programme, pour prendre une extension exceptionnelle sous le professeur Moris. Au collège de Diekirch, le cours de botanique fut créé par M. Krombach (1831). A l'école modèle des instituteurs, fondée en 1817 à Luxembourg, l'abbé Mazuir professait la botanique dès 1821 à la section française. Ce cours fut donné, à partir de 1823, à la section allemande par M. le directeur Muller. Notre regretté collègue Gœrens l'introduisit dès 1844 à l'école normale actuelle, mais l'étude de cette science n'y fut pas continuée.

L'étude des richesses végétales du pays remonte à des temps plus anciens; c'est ainsi que Dodæns cite la station du *Cyclamen Europæus* ¹⁾ dans la forêt des Ardennes. De Pœderlé ²⁾ indique le *Pirus intermedia* comme croissant dans le Duché. Plus tard, (1810) Pyrame de Candolle, chargé par le Gouvernement de l'investigation de la Flore du vaste Empire français, explora le département des forêts. Il était accompagné de son frère. S'il y avait eu des botanistes dans la région, l'administration n'aurait pas manqué, comme cela avait eu lieu dans les autres départements, de les lui signaler. ³⁾ Ses excursions doivent toutefois avoir été très-superficielles, attendu que dans son rapport il dit: « Le pays » est tellement monotone dans sa nature physique que le nombre » des plantes y est très-borné. » Un quart de siècle plus tard, Tinant se chargeait de démontrer que cette contrée si pauvre renfermait près de 1500 espèces, dont plus d'un tiers étaient rares, même pour les régions de la France actuelle.

L'exploration sérieuse du Grand-Duché, sous le rapport botanique, commença vers 1815. MM. Krombach, Marchand père et fils, étudièrent d'abord la Flore des environs de Diekirch. En 1822 et

1) Dodæns, R. Cruydbœck. Anvers 1454.

2) B^{on} de Pœderlé. Manuel de l'arboriste et du forestier Belgique. Bruxelles 1792.

3) M. de la Fontaine, père, qui faisait alors son droit à Paris, avait exploré les environs de la ville et de Stadtbredimus. L'herbier qu'il réunit avant 1810 comme élève de München, et qu'il compléta ensuite comme avocat stagiaire, fait partie des collections de la société des sciences naturelles.

1823, M. B. Du Mortier explora une partie du pays en compagnie de Michel. C'est alors qu'il fit la connaissance de Tinant et que celui-ci s'associa à M. Krombach et à Marchand pour la réunion des matériaux de la *Flore des Ardennes*. L'herbier ainsi formé en commun, fut communiqué à M. Du Mortier, à Lejeune, l'auteur de la Flore de Spa, et à Courtois, directeur du jardin botanique de Liège, pour en vérifier les déterminations. Ce dernier parcourut également le pays ¹⁾ avec Th. Würth, Marchand, Tinant et M. Krombach, et fut suivi de M^{lle} Libert, de Nyst, Deronnay, Schæfer, Ch. Morren, Mathieu, Wirtgen, Löhr, Bové, etc.

Le Grand-Duché n'étant alors autonome que de nom, une partie des plantes du pays fut d'abord publiée dans des recueils étrangers. ²⁾ D'autres plantes furent incorporées aux flores des régions voisines, ³⁾ et il faut remonter à l'année 1826 ⁴⁾ pour trouver les premières notions spéciales sur la végétation du pays. Elles parurent alors en langue hollandaise et furent le précurseur de :

Tinant F.-A. *Flore luxembourgeoise, ou description des plantes phanérogames recueillies et observées dans le Grand-Duché de Luxembourg*.

Ce dernier ouvrage qui parut en 1836, étendit ses investigations au Luxembourg, tel que le laissa les traités de 1815. Il remplaça la Flore des Ardennes citée plus haut, dont les événements politiques de 1830 avaient retardé la publication, en en dispersant les auteurs. Tinant le fit suivre d'un herbier des plantes du Grand-

1) Verslag van een Plantkundig Reisje, gedaan in July 1826 in de Ardennes en het Groothertogdom Luxemburg; Dorr, R. Courtois. Bydragen II^e 450 ss.

2) Lejeune A.-L.-S. — Revue de la Flore de Spa. Liège. 1824.

Du Mortier B. C. *Flora Belgica, operis majoris prodromus*. Tornaci Nerviorum, 1827. — Lejeune A.-L.-S. et Courtois R. *Compendium Floræ belgiæ*. Leodi 1828—1831, Vervie 1836.

3) Schæfer M. *Trierische Flora*. Trier 1827.

4) Tinant. *Opmerkingen over den Grond en de Gewassen der provincie Luxemburg*. Bydragen 1826, p. 60.

— Waarnemingen over den Grond en de Gewassen van het Domeinbûsch Grünenwald, by Luxemburg. Bydragen 1826, p. 300.

— Opmerkingen over den Grond en de Gewassen van de oëvers der Mœzel, in het Groothertogdom Luxemburg. Bydragen 1826, p. 423.

Marchand. *Verhandeling over de Standelkruiden, van het Groothertogdom Luxemburg*. Bydragen 1827, p. 423.

Tinant. *Opmerkingen over den Grond en de Gewassen van de oëvers der Sure en omstreken, in het Groothertogdom Luxemburg*. Bydragen 1827, p. 517.

Duché dont il entra 10 centuries dans le commerce. Cet exsicata avait toutefois été précédé de Lejeune et Courtois, choix des plantes de Belgique, Verviers 1825—1827, qui renferma beaucoup d'espèces rares du Grand-Duché.

Depuis lors, les plantes du pays se trouvent très-souvent comprises dans les Flores des contrées voisines. ¹⁾ C'est ainsi que Wirtgen, *Flora der Rheinprovinz* (Bonne 1857), et surtout Garke, *Flora von Norddeutschland* (10^e éd. 1871), donnent les stations des plantes rares de la vallée de la Syr, de la Moselle, etc. Les mémoires de la société des sciences naturelles contiennent également divers travaux relatifs à notre Flore. ²⁾ Ce sont tous les ouvrages cités qui forment le fond du présent Prodrôme. Toutefois celui-ci n'a pu se borner à les colliger; ils ont tous été soumis à une étude sérieuse, ce qui donne le motif pourquoi des plantes indiquées ailleurs ont été négligées. En effet, il importait surtout de ne pas devenir le complice d'erreurs de déterminations et autres.

La Flore luxembourgeoise de Tinant, d'une grande exactitude sous le rapport du nombre des espèces, laisse certes à désirer pour ce qui concerne la géographie botanique. La station des plantes rares y est d'ordinaire trop vaguement libellée. Des indications multiples, réunies pendant de nombreuses excursions ou communiquées par la petite phalange de nos botanistes indigènes, a permis de délimiter plus exactement l'aire de dispersion de chaque espèce, d'en reconnaître la distribution ainsi que le plus ou moins de vulgarité ou de rareté. La grande excursion faite en 1869 par la Société royale de botanique de Belgique dans la partie sud du Grand-Duché, par cela qu'elle servit de trait-d'union aux amateurs du pays, imprima un nouvel élan aux recherches des disciples de Flore. La section de botanique de la société des sciences naturelles, créée en 1863, recruta alors de nouveaux adhérents et se forma en comité particulier. Cette réunion de bota-

1) Löhr. *Taschenbuch der Flora von Trier und Luxemburg*. Trier. 1844.

2) Brimmeyr, J.-P. — *Esquisse des environs de la ville d'Echternach*, 1854. Layen. — *Révision des Orchidées du Grand-Duché*, 1855.

Eug. Fischer et A. Meyer. — *Rapport sur les travaux de la section de botanique de la société des sciences naturelles*, 1869.

Meyer, *Hypericincæ*, 1869, p. 135.

Fischer E. — *Les plantes subspontanées et naturalisées de la Flore du Grand-Duché de Luxembourg*, 1872.

nistes luxembourgeois, qui compte aujourd'hui plus de 60 membres, explora le pays dans tous les sens, et ce sont ces nombreuses excursions qui provoquèrent le présent travail et permirent d'en réunir les éléments comme point de départ d'études ultérieures. Aucune recherche n'a été épargnée pour le rendre aussi exact que possible. Témoins les sources où il nous a été donné de puiser et que nous indiquons plus haut.

Le Prodrôme de la Flore luxembourgeoise se meut dans les limites politiques du Grand-Duché actuel. Dans le but de le relier aux pays environnants et de présenter pour autant que possible les avantages d'une botanographie régionale, il se rattache par la classification adoptée aux Flores des pays voisins. Le Synopsis de Koch avec les modifications y apportées par Garke, dans sa *Flora Deutschlands*, celles adoptées par Cosson et Germain de St-Pierre dans leur *Flore des environs de Paris*, comme aussi le manuel de la Flore de Belgique de Crépin, servirent de guide pour sa partie systématique. C'est dire que le système de de Candolle a été généralement adopté.

Pour ce qu'il en est de la nomenclature, les droits acquis par suite de la priorité ont été respectés comme devant seuls être admis par la science. Ceci pour les espèces. Quant aux variétés, celles qui à cause de leur importance avaient été élevées au rang d'espèce, ont seules été portées à la suite du type. Les plantes cultivées d'ancienne date ou généralement ont été exclusivement mentionnées.

L'herbier de Tinant ayant été gracieusement mis à notre disposition par M. Renaud-Boch, il nous a été permis de vérifier jusqu'où les plantes qu'il renferme, concordent avec sa Flore et avec les déterminations des auteurs. L'herbier Ducommun et la Flore de Schlechtendahl nous ont été d'un grand secours sous ce rapport. Il nous a été en outre donné de compléter le travail de Tinant avec l'aide du Prodrôme de la province du Rhin, annoté par lui. C'est à ce dernier qu'il faut rapporter les modifications indiquées sous son nom à la Flore luxembourgeoise.

Les progrès de la culture du sol amènent forcément le défrichement des terrains incultes, le dessèchement des marais et le déboisement. Plus d'une espèce rare ou peu répandue a ainsi été dé-

truite et d'autres encore sont menacées d'une prochaine disparition. Plus d'une localité indiquée par Tinant n'a plus qu'une valeur historique, et il en sera de même pour celles indiquées dans ce Prodrôme. C'est pourquoi nous nous sommes astreint à donner la liste des localités aussi exacte que possible, et que nous recevrons avec reconnaissance toute nouvelle indication complétive sous ce rapport.

Il en sera de même pour les noms vulgaires des plantes. Si une synonymie complète sous ce rapport est d'après G. W. Bischoff d'une grande utilité dans les usages de la vie, elle a en outre pour nous un intérêt ethnographique d'autant plus grand qu'elle peut donner le plus souvent une idée de l'aire d'extension de la plante. Nous n'ignorons pas que ces dénominations populaires sont essentiellement vagues et diffèrent très-souvent d'une localité à l'autre ; mais nous sommes convaincus que l'essai laborieux tenté sous ce rapport ne sera pas la partie la moins intéressante de ce Prodrôme, que nous plaçons sous le patronage des disciples de Flore, dans le désir de leur être utile.

LISTE DES PERSONNES

**auxquelles sont dues le plus grand nombre
d'indications de localités.**

- A. Dr Aschmann, président du collège médical à Luxembourg.
- B. Bockholz, ancien ingénieur à Trèves.
- BB. Société de botanique de Belgique.
- BL. Société de botanique du Grand-Duché de Luxembourg.
- Dmtr. Du Mortier, président de la société royale de botanique de Belgique, à Tournay.
- EF. Fischer, Eug., président de la commission d'agriculture à Luxembourg.
- J. Dr Ilse, auteur de la Flore de Thuringen, à Lemberg.
- Kz. Koltz, agent forestier à Luxembourg.
- K. Krombach, père, président de la société de botanique à Luxembourg.
- Md. Marchand, fils. †
- M. Meyer, pharmacien à Eich.

R. Dr Rosbach, médecin à Trèves.

Dr W. Warnimont, employé des contributions à Luxembourg.

W. Werner, ancien instituteur à Mersch. †

Wtg. Wirtgen, professeur à Coblenz. †

Ouvrages botaniques

concernant la Flore du Grand-Duché.

Sch. Schæfer, M. Trier'sche Flora. Trier, 1826.

Lj. Lejeune, A. L. S. Revue de la Flore des environs de Spa. Liège, 1824.

Lj. et C. Lejeune, A. L. S. et Courtois, R. Compendium Floræ Belgicæ. Leodi 1828-1831. Vervie 1836.

FB. Du Mortier, C. B. Florula Belgica, operis majoris prodromus. Tornaci Nerviorum. 1827.

T. Tinant, L. A. Flore luxembourgeoise. Luxembourg, 1836.

L. Löhr, Dr M. J. Taschenbuch der Flora von Trier und Luxemburg. Trier, 1844.

EM. Mathieu E. Flore générale de Belgique. Bruxelles, 1853.

EB. Bommer et Bautier. Tableau analytique de la Flore belge. Bruxelles, 1854.

M. Meyer. Beschreibung der im Groszherzogthum Luxemburg vorkommenden Orchideen. Luxemburg, 1864.

BB. Compte-rendu de la 8^e herborisation (1869) de la société royale de botanique belge (Bulletin t. VIII, de 377 à 405).

Abréviations et signes.

C. Commun.

AC. Assez commun.

R. Rare.

AR. Assez rare.

? Plante douteuse ou litigieuse pour notre Flore.

! Signe de certitude. Plante retrouvée à la station indiquée.

† Espèce naturalisée, introduite, subspontanée ou cultivée.

① Annuelle.

② Bisannuelle.

‡ Vivace.

‡ Plante ligneuse.

Les chiffres romains placés entre (—) à la suite d'une famille ou d'une espèce, indiquent la classe de Linnée.

PLANTES PHANÉROGAMES ou COTYLÉDONÉES.

DIVISION I. — **DICOTYLÉES** ou Exogènes.

SUBDIVISION I. — **Dialypétales** ou Polypétales.

CLASSE I. — **Dialypétales hypogynes.**

FAMILLE I. RENONCULACEÆ.

(Juss. Gen. 231. DC. sys. I. p. 127.) [XIII].

Tribu I. — **Clematidæ.** (DC. Sys. I, p. 131.)

1. Clematis. (L. Gen. 696.) — Clématite. — Waldrebe.

1) C. Vitalba. (L. Sp. 766.) — Hexenstrang, Judescl. T. n° 809.

‡ Fl. Juin-Août. Fructification, Octobre.

AC. Haies, buissons, taillis, particulièrement des terrains calcaires; subspontané en Ardennes.

2) ? C. recta. (L. Sp. 767) T. n° 810.

‡ Fl. Juin-Juillet. Fr. Octobre.

R. Prés en dessous de la Fels-lez-Schengen. T. Cette plante paraît être subspontanée : elle a été trouvée entre Marienthal et Hunebour (Mersch) W.; mais elle ne dure que quelques années aux stations fortuites où on la rencontre.

Tribu II. — **Anemoneæ.** (DC. Sys. I, p. 168.)

2. Thalictrum. (L. Gen. 697.) — Pigamon. — Wiesenraute.

3) T. minus. (L. Sp. 769). T. n° 811.

‡ Juin-Juillet.

R. Prés et côteaux secs, calcaires, sur la Moselle, entre Remich et Schengen.

AC. En aval de Schengen. T. !

Var. β . saxatile. (Gaud Fl. Helv. 3, p. 505) . . . T. n° 812.

‡ Juillet-Août.

R. Prés aux environs de Remich.

4) T. majus. (Jacq. Fl. Aust. V. p. 9. t. 420) . . T. n° 813.

‡ Juillet-Août.

AC. Prairies des vallées de la Moselle et broussailles au-dessus de Schengen.

T. EF. A. !

Var. β . *elatum*. (*Murs. præter Jacq.*) . . . Dmtr. F. B. 1668.

24 Juillet-Août.

R. Prés secs de la Moselle.

5) *T. flavum*. (*L. Sp.* 770) T. n° 815.

24 Juillet-Août.

AC. Prairies humides et tourbeuses. Bords des rivières, surtout de l'Alzette et de la Sûre près d'Ingeldorf. (Post.) Diekirch et Echternach. M. — Manque en Ardennes.

3. Anemone. (*L. Gen.* 694.) — Anemone. — Windröschen.

Sect. I. — *Pulsatilla*. (*Tournf. Inst.* 284.)

6) *A. Pulsatilla*. (*L. Sp.* 759.) — Oschterblum . . T. n° 816.

24 Mars-Juin. Refleurit quelquefois à l'automne.

C. par place: Hauteurs arides du grès luxembourgeois et du calcaire conchylien: Pulvermühl, Pétrusse, T. Fort Olizy, Kz. Herrenberg (Diekirch), K. etc. ! R ailleurs Echternach. M.; manque en Ardennes.

Sect. II. — *Anemoneæ*. (*Koch, syn.* 10.)

7) *A. silvestris*. (*L. Sp.* 761). T. n° 817.

24 Mai et quelquefois en automne.

AR. Lisière des bois, côteaux herbeux sur le calcaire jurassique. Wasserfall (coupe n° 20 du bois de Schiffmange.) Kz. Langenberg. Bois de Dudelange. Kz. Grünenwald T. Bois de Vianden K. Côtes de la Sûre au-dessus d'Erpeldange T. K.

8) *A. nemorosa*. (*L. Sp.* 762) T. n° 818.

24 Avril-Mai.

C. Bois, broussailles de tous les terrains.

9) *A. ranunculoides*. (*L. Sp.* 762) T. n° 819.

24 Avril-Mai.

AC. Bois ombragés. C. par place: Birkenbüsch (Ansembourg). Kz. Kopstal, EF. Mandelbach. DW. Bois au-dessous de Bastendorff. K. etc. — R. Ardennes.

Sect. III. — *Hepaticæ*. — (*Koch, syn.* 7.)

10) † *A. Hepatica*. (*L. Sp.* 758) E. F. n° 2.

24 Mars-Avril.

AC. Cultivé. R. subspontané: Howald (Hesperange.) 1844 Clausen. Limpertsberg. EF.

4. Adonis. (*L. Gen.* 698.) — Adonide. — Teufelsauge.

11) † *A. autumnalis*. (*L. Sp.* 771) E. F. n° 5.

① Juin-Août.

AR. Cultivé, subspontané. Champs arides entre Mondorf et Burmerange, EF. près de Remich. (Dmtr. et Michel.) — Beggen. EF. M.

- 12) *A. æstivalis*. (*L. Sp.* 771). L. n° 13.

① Mai-Juillet.

AR. Champs calcaires et argilo-calcaires, moissons près de Remich. Dmtr. Ehnen, Wintrange, Bous. BB. Wormeldange. L. Mersch. W.! Au-dessus de Mondorf. (A. EF et Kz.)

- Var. *β. flava*. (*DC. sys. I*, 223) T. n° 820.

① Juillet.

AR. Moissons aux environs de Remich. L. Wormeldange, Roth, Schrassig, etc. Munsteracht (Fetschenhof). T.

- 13) *A. flammea*. (*Jacq. Aust. IV.* 355) L. n° 14.

② Juillet-Août.

AR. Moissons sur le calcaire de la Moselle, Ehnen. BB! Mondorf. A. EF. Kz.

Tribu III. — *Ranunculeæ*. (*DC. Sys. I*, 228.)

5. *Myosurus*. (*L. Gen.* 394.) — Ratoncule. — Mäuseschwanz.

- 14) *M. minimus*. (*L. Sp.* 407) T. n° 505.

① Avril-Mai.

AC. par place: Champs argileux, imperméables, cultivés avant et inondés pendant l'hiver. Bettembourg. T. Champs au-dessus du village entre le chemin de fer et le chemin de Dudelange. BL ! Au-dessus des étangs de Kockelscheuer près du Schnapshof. Kz. Entre Bettendorf et Diekirch. K. Entre Remich et Stadtbredimus. Kz.

6. *Ranunculus*. (*L. Gen.* 699.) — Renoncule. — Hahnenfuss.

Sect. I. — *Batrachium*. (*DC. Sys. I*, 233.)

- 15) *R. hederaceus*. (*L. Sp.* 781 *ex parte*). T. n° 826.

4 Mai-Août.

AC. Lieux marécageux, tourbeux. Bords des mares, eaux peu profondes.

- 16) *R. aquatilis*. (*L. Sp.* 781. *Var. α et γ*) T. n° 828.

4 Mai-Juillet.

AC. Eaux tranquilles ou rivières à courant très-rapide. C. dans la Blees. K.

- 17) *R. tripartitus*. (*DC. Sys. I*, 234) T. n° 827.

4 Mai-Juillet.

R. Mares et fossés tourbeux.

- 18) *R. trichophyllus*. (*Chaix in Vill. Fl. Dauph. p.* 335.)

4 Mai-Septembre.

R. Dans la Sûre en amont de Wasserbillig. Erpeldange. K.

- 19) *R. fluitans*. (*Lmk. fl. Fr. III*, 164.) *R. peucedanifolius*. T. 829.

4 Mai-Août.

C. Ruisseaux, rivières.

20) *R. divaricatus*. (*Schrank, Baierische Fl. II, 104.*)

24 Juin-Juillet.

AR. Eaux stagnantes, tranquilles, mares. Hzig. EF.

Sect. II. — *Hecatonia*. (*Lour. non DC. nec Koch.*)

21) *R. sceleratus*. (*L. Sp. 776*) T. n° 834.

① Mai-Septembre.

AR. Lieux fangeux, marais, fossés. C. par place. Alluvions artificielles de la Sûre entre Ettelbruck et Reisdorf. K. Fossés près de Schuttrange. DW. Queue de l'étang de la Neumühl (*Schrassig*.) BL.!

Sect. III. — *Vesicastrum*. (*Gren. et God. Fl. Fr. I, 26.*)

22) *R. platanifolius*. (*L. Mant. 79.*) *R. aconitifolius*. T. n° 830.

24 Mai-Juin.

R. Bois montueux de l'Ardenne et de sa lisière calcaire. Dmtr. F. B. 1689.

Sect. IV. — *Euranunculus*. (*Gren. et God. Fl. Franç. I, 29.*)

23) *R. Flammula*. (*L. Sp. 772.*) Botterblumen. . . T. n° 832.

24 Juin-Octobre.

C. Marais, fossés, lieux humides.

24) *R. Lingua*. (*L. Sp. 773*) T. n° 831.

24 Avril-Juin.

R. Bords herbeux des étangs, eaux stagnantes, mares. Birel. T. Pleitrangle. BL.!

25) *R. auricomus*. (*L. Sp. 775*) T. n° 833.

24 Avril-Mai.

C. Bois humides et haies, lieux herbeux.

26) *R. acris*. (*L. Sp. 779.*) — Delpes. Pelpes . . T. n° 835.

24 Mai-Juillet.

C. Prés et lieux humides, mardelles boisées.

27) *R. lanuginosus*. (*L. Sp. 779*) T. n° 837.

24 Mai-Juin.

R. Forêts accidentées. Bois de la Sûre au dessus du moulin d'Erpeldange. T.

28) *R. nemorosus*. (*DC. Sys. I, 280*) T. n° 836.

24 Avril-Juin. Refl. qqf. à l'automne.

AC. Bois montueux, couverts.

29) *R. repens*. (*L. Sp. 779.*) — Gromes (Moselle) . . T. n° 838.

24 Avril-Septembre.

C. Champs, prairies, vignes, lieux frais.

30) *R. bulbosus*. (*L. Sp. 778*) T. n° 839.

24 Mai-Août.

C. Prairies, gazons, bords des chemins, etc.

31) *R. sardous*. (*Crantz, Aust.* 111.) *R. philonotis*. T. n° 840.

① Mai-Août.

C. Champs, près sablonneux humides, bords des mares, endroits inondés, etc.

Var. β . *parvulus*. (*L. et C. Comp. II*, 995) . . . T. n° 840b.

R. Champs secs près de Remich. T.

32) ? *R. parviflorus*. (*L. Sp.* 780) . . . T. n° 842.

① Avril-Juin.

R. Gravières des bords de la Moselle près Wasserbillig. T.

33) *R. arvensis*. (*L. Sp.* 780). . . T. n° 841.

① Mai-Juillet.

C. Moissons, champs cultivés.

Var. β . *incermis*. (*Koch, Sys. p.* 20.)

R. Moissons près de Merzig. K.

7. *Ficaria*. (*Dill. Nov. gen.* 108.) — Ficaire. — Feigwurzel.

34) *F. ranunculoides*. (*Mönch, Meth.* 215) Schuörbock. T. n° 843.

‡ Mars-Mai.

C. Bois, prairies, champs humides.

Trihu IV. — *Helleboreæ*. (*DC. Sys. I*, 306.)

8. *Caltha*. (*L. Gen.* 703.) — Populage. — Dotterblume.

35) *C. palustris*. (*L. Sp.* 784.) Schmalz=Frescheblum. T. n° 821.

‡ Avril-Juin.

C. Prés humides, bords des eaux.

Var. β . *minor*. (*DC. fl. Fr. IV.* 918.)

AR. Avec le type.

9. *Eranthis*. (*Salisb. Trans. Linn. Soc. VIII*, 303.) — Éranthie.
— Winterling.

36) † *E. hiemalis*. (*Salisb. l. c.*) . . . T. n° 825.

‡ Février-Mars.

R. Cultivé et quelquefois subspontané.

10. *Helleborus*. (*L. Gen.* 702.) — Hellebore. — Niesswurz.

37) † *H. niger*. (*L. Sp.* 783.) Chreschtblum. . . T. n° 823.

‡ Janvier-Avril.

R. Bois sur la hauteur de Rosport. ? Md. K. Cultivé et quelquefois subspontané.

38) *H. viridis*. (*L. Sp.* 784) . . . T. n° 824.

‡ Mars-Avril.

R. Bois secs, pierreux et montueux entre Kopstal et Ansembourg. T. Vieux châteaux, Kz. Entre Steinheim et Echternach. M. Hautes-Ardenne. Dmtr.

39) *H. foetidus*. (*L. Sp.* 784) T. n° 822.

24 Février-Mars.

C. Lieux pierreux des côtes de la Sûre entre Echternach et Rosport. T. Bois de Beaufort. K. Bois d'Echternach (Brimmeyr père). Champs de la Moselle. Lj. et C.

11. *Nigella*. (*L. Gen.* 685.) — Nigelle. — Schwarzkümmel.

40) ? *N. arvensis*. (*L. Sp.* 753) T. n° 807.

① Juin-Août.

R. Moissons des terrains calcaires, entre Septfontaines et Kehlen, et sablonneuses le long du Kiém (Niederanven.) T.

41) † *N. damascena*. (*L. Sp.* 753.) Jungfer-im-Grünen. EF. 11.

① Juin-Juillet.

C. Cultivé et souvent subspontané.

42) † *N. sativa*. (*L. Sp.* 753.) Kimmel T. n° 808.

① Juillet.

R. Cultivé et quelquefois subspontané dans les champs après la moisson. Le long du Kiém. T.

12. *Aquilegia*. (*L. Gen.* 275.) — Ancolie. — Akelei.

43) *A. vulgaris*. (*L. Sp.* 752.) — Goldwurz T. n° 806.

24 Juin-Juillet.

C. Bois montueux, rochers.

13. *Delphinium*. (*L. Gen.* 681.) — Dauphinelle. — Rittersporn.

44) *D. Consolida*. (*L. Sp.* 748.) Spüörblum T. n° 802.

① Juin-Août.

AC. Moissons, champs cultivés. C. Champs calcaires de la Moselle.

45) † *D. Ajacis*. (*L. Sp.* 748) T. n° 803.

① Juin-Juillet.

R. Cultivé et quelquefois subspontané. Vieux château d'Ausembourg. Kz. !

14. *Aconitum*. (*L. Gen.* 682.) — Aconit. — Eisenhut.

46) *A. lycoctonum*. (*L. Sp.* 750) T. n° 804.

24 Juin-Juillet.

AR. Bois, taillis montueux. Kahlscheuer, Kopstal. BL. ! Kamphengen (Eisemburg.) T. Stolzemburg. T. K. Hoffelt-Hachiville (van Bastelaar).

47) † *A. Napellus*. (*L. Sp.* 751.) *A. intermedium*. T. n° 805.

24 Juin-Juillet.

C. Cultivé. Les racines employées par nos pharmacies proviennent du calcaire devonien de l'Eifel (Prüm).

Tribu V. — *Paeoniæ*. (*DC. Prod.* 1. 64.)

15. *Actæa*. (*L. Gen.* 644.) — Actée. — Christophskraut.

48) *A. spicata*. (*L. Sp.* 722.) — Mutterkraut. . . . T. n° 794.

4 Mai.

AC. Bois montueux, frais. Fels (Schengen), Johannisberg. Kz. Rodenhof. M. Echternach (Brimmeyr père), etc. R. Ardennes.

16. *Prænia*. (*L. Gen.* 678.) — Pivoine. — Mohnling.

49) † *P. officinalis*. (*L. Sp.* 767.) — Patscheblum. — Peischtrös.

4 Mai-Juin.

C. Cultivé et qqf. subspontané. Vieux château d'Ansembourg. Eicherberg. Kz.

II. BERBERIDEAE.

(Vent. Tabl. III. 83. [VI, 1.]

17. *Berberis*. (*L. Gen.* 442.) — Vinettier. — Sauerdorn.

50) *B. vulgaris*. (*L. Sp.* 472.) — Dreidaar T. n° 506.

‡ Mai-Juin. Fr. Août-Octobre.

AR. Haies, rochers. Wurthsberg (Clausen), Haute- et Basse-Pétrusse. BL. Nouveau château d'Ansembourg. T. Tunnel au-dessous de Schuttbourg. Kz.

18. *Epimedium*. (*L. Gen.* 148.) — Epimède. — Sockenblume.

51) ? *E. alpinum*. (*L. Sp.* 171) T. n° 265.

4 Avril-Mai.

Subspontané. Taillis ombragés du Grünwald près du Kiém. T. Taillis montueux des Ardennes. Md. Dmtr. Prod. 1657. Bettendorf (Courtois).

III. CARYOPHYLLEAE.

(Juss. Gen. 299.) [X.]

Tribu I. — Sileneæ. (*DC. Prod. I*, 351.)

19. *Gypsophila*. (*L. Gen.* 768.) — Gypsophile. — Gypskraut.

52) *G. muralis*. (*L. Sp.* 583) T. n° 625.

① Juillet-Septembre.

AR. Champs siliceux un peu humides, murs, chemins, environs de Luxembourg. T. Stolzembourg. K.

20. *Dianthus*. (*L. Gen.* 565.) — Oeillet. — Nelke.

Sect. I. — *Americastrum*. (*DC. Prod. I*, 355.)

53) *D. prolifer*. (*L. Sp.* 587) T. n° 630.

① Juin-Septembre.

AC. Champs sablonneux, côtes arides, bords des chemins R. Ardennes.

Var. *β. diminutus*. (*L. Sp.* 587.)

R. Avec le type. Johannisberg (Courtois).

54) *D. Armeria*. (*L. Sp.* 586.) Wel Armence. . . . T. n° 629.

① Juin-Septembre.

C. Lieux secs, lisières et chemins des bois, haies. Sûre et Ardennes.

55) *D. Carthusianorum*. (*L. Sp.* 586) T. n° 628.

‡ Juin-Septembre.

C. Rochers, lieux secs, montueux, sablonneux. R. en Ardennes.

Sect. II. — *Caryophyllum*. (*DC. l. c.*)

56) † *D. Caryophyllus*. (*L. Sp.* 587.) — Armence.

‡ Juillet-Août.

Cultivé. C'est l'œillet des fleuristes

57) *D. arrectus*. (*Dmtr. l. c.*) Dmtr. F. B. 1353.

‡ Mai-Juin.

R. Sur les murs des Ardennes. D.

58) *D. deltoides*. (*L. Sp.* 586) T. n° 631.

‡ Juin-Septembre.

AC. Prés et collines arides, incultes le long des bois sablonneux.

Var. β . *glauca*. (*L. Sp.* 588.)

R. Avec l'espèce.

59) ? *D. caësius*. (*Smith, in act. Soc. Lin.* 2. 302) . . . T. n° 632.

‡ Juin-Juillet.

R. Rochers schisteux des Ardennes. D. 1350. Stolzenbourg. Kz.

60) † *D. plumarius*. (*L. Sp.* 589.) — Gràsarmence. EF. 17.

‡ Juillet-Août.

C. Cultivé sur le chaperon des murs surtout en Ardennes. Souvent subspontané.

21. Saponaria. (*L. Gen.* 564.) — Saponaire. — Seifenkraut.

61) *S. Vaccaria*. (*L. Sp.* 585) T. n° 627.

① Juin-Juillet.

C. par place. Moissons de la Moselle et de l'Attert. EF. Hauteur de Dalheim.

EF. entre Tuntingen et Greisch. DW. entre Rodange et Lasauvage. A. — Mersch.

W. Kz. Simmern. Kz. Lintgen BL! Wasserbillig. R. BB ! etc. R. Ailleurs.

62) *S. officinalis*. (*L. Sp.* 584) T. n° 626.

‡ Juillet-Septembre.

C. Lisière des bois, berges des rivières, bords des chemins, champs pierreux, décombres; également en Ardennes.

22. Cucubalus. (*Garth. Fruct. I.* 376.) — Cucubale. — Tauben-kropf.

63) ? *C. baccifer*. (*L. Sp.* 591.)

‡ Juin-Août.

R. Bois humides aux environs de Dickirch. Friedbüsch. K.

23. Silene. (*L. Gen.* 772.) — Siléné. — Leimkraut.

64) *S. inflata*. (*Sm. Fl. Brit. II.* 467.) — Kleckkraut. T. n° 644.

4 Juin-Septembre.

C. Champs, lieux pierreux, prés secs, moissons, rochers, bords des chemins, etc. R. Ardennes.

65) *S. conica*. (*L. Sp.* 598) T. n° 649.

① Juin-Juillet.

C. par place. Champs secs et sablonneux, moissons maigres, bords des chemins. Pulvermühl, Dommeldange, Clausen, Beltborn. T. BL.!

66) ? *S. conoidea*. (*L. Sp.* 598) T. n° 650.

① Juin-Juillet.

R. Lieux secs. Bellevue, Clausen, Pulvermühl, Dommeldange. T.

67) *S. nutans*. (*L. Sp.* 596) T. n° 646.

4 Mai-Juin.

C. Rochers, le long des bois montueux, coteaux secs R. Ardennes.

68) *S. gallica*. (*L. Sp.* 595.)

① Juin-Juillet.

R. Moissons des terrains secs. Carlshof. EF.

69) *S. noctiflora*. (*L. Sp.* 599) T. n° 648.

① Juillet-Octobre.

R. Champs des terrains argileux ou calcaires. Bettendorf (entre la Sûre et la Bles. K. (Courtois). Dommeldange, Beggen. T.

70) *S. Armeria*. (*L. Sp.* 601). T. n° 645.

① Juillet-Septembre.

R. Rochers entre Gebelsmühl et Kautenbach. BL. entre Vianden et Gemünd vers Hosingen (Courtois). — R. ailleurs et alors échappé des cultures.

24. Melandryum. (*Ræhl. Deutschl. Fl. I, 254.*) — Melandre. — Lichtnelke.

71) *M. silvestre*. (*Ræhl. l. c.*) — *Lychnis silvestris*. T. n° 676.

4 Juin-Août.

C. Prés, lisières des bois.

72) *M. pratense*. (*Ræhl. l. c.*) — *Lychnis dioica*. T. n° 675.

4 Mai-Septembre.

AC. Bords des chemins, moissons, champs cultivés.

25. Lychnis. (*Tourn. Inst.* 175.) — *Lychnide*. — Kranzrade.

73) † *L. chalcidonica*. (*L. Sp.* 436.)

4 Mai-Août.

Se trouve dans la plupart des jardins du cultivateur sous le nom de : Brennende Liebe.

74) *L. Flos-Cuculi*. (*L. Sp.* 625.) — Flêschblum. T. n° 674.

4 Mai-Juillet.

C. Prés humides, marécageux, bords des fossés, etc.

75) † *L. tomentosa*. (*L. Hort. Ups. Abr.*)

4 Juin-Août.

C. Cultivé et subspontané. Bellevue. Clausen. Kz.

76) *L. Viscaria*. (*L. Sp.* 625). T. n° 673.

4 Mai-Juin.

AR. Gazons secs, montueux, bois siliceux. Durensberg (Pulvermühl), Neudorf. Plankenhof (Fischbach.) BL. Meysembourg. T. Le long de la Schetzelbach (Eisembourg.) T. ! Eisch (Simmern). DW. Krischelheid (Ardennes.) Kz.

77) *L. Githago*. (*Lmk. Ency. méth. III*, 643.) — Roid. T. n° 672.

① Juin-Août.

C. Moissons.

Tribu II. — *Alsineæ*. (*DC. Fl. Fr.* 4, 766.)

Sous-tribu I. — *Sabulinae*. (*Fenzl. in End. gen. p.* 963.)

26. *Spergularia*. (*Pers. sys. pl.* 504.) — Spergulaire. — Schuppenmiere.

78) *S. segetalis*. (*Fenzl. in. Led. Fl. Ross. II*, 166.) — *Arenaria segetalis*. T. n° 636.

① Juin-Juillet.

R. Champs incultes et siliceux aux environs de Dudelange. T. Luxembourg. (Koch syn. 120.)

79) *S. rubra*. (*Pers. sys. pl. I*, 504.) — *Arenaria rubra*. T. n° 637.

① ou ② Mars-Automne, quelquefois jusqu'en Décembre.

C. Lieux sablonneux, bruyères, rues et cours peu fréquentées, décombres.

27. *Spergula*. (*L. Gen.* 586 *ex parte*.) — Spargoute. — Spark.

80) *S. arvensis*. (*L. Sp.* 430). T. n° 659.

② Mai-Octobre.

C. Terrains siliceux, moissons, bords des chemins.

† Var. β . *maxima*. (*Weihe in Bönning's. Prod.* 570.) T. n° 661.

AR. Moissons des Ardennes, linières aux environs de Kockelscheuer. T. !

† Var. γ . *sativa*. (*Bönn. Fl. Monast.* 569.)

AR. Cultivé.

81) *S. pentandra*. (*L. Sp.* 630). T. n° 660.

② Avril-Mai.

R. Lieux secs et exposés au soleil.

28. *Sagina*. (*L. Gen.* 178 *ex parte*.) — Sagine. — Mastkraut. (IV. 3.)

82) *S. procumbens*. (*L. Sp.* 185). T. n° 272.

① Mai-Août.

AC. Lieux un peu humides et frais, entre le pavé des cours, bords des chemins.

83) *S. apetal.* (*L. Mant.* 559) T. n° 273.

① Mai-Août.

C. Lieux herbeux, sablonneux; champs frais, bords des chemins.

Var. *β. saxatilis.* (*Lj. Rev.* 268) T. n° 275.

② Mai-Août.

R. Champs humides aux environs de Dudelange et Beltembourg. T. Md.

84) *S. ciliata.* (*Fries, Nov. Ed.* 2. p. 59.) Koch synopsis, ed. 2. 117.

① Mai-Octobre.

R. Champs, jachères.

Var. *β. depressa.* (*Schulz, Koch. l. c. Suppl. Fl. Starg.* 10.)

R. Bruyères entre Fischbach et Plankenhof. K.

29. Alsine. (*Whlb. Fl. Lapp.* 87.) — Alsine. — Mire.

85) *A. tenuifolia.* (*Walh. Helv.* 87.) — *Arenaria tenuifolia.*

① Mai-Août. [T. n° 635.

C. Champs incultes, moissons, côteaux secs, bords des chemins, vieux murs.

86) *A. viscosa.* (*Schreb. Koch. Syn.* 125) . . . Wtg. n° 227.

① Mai-Juin.

R. Jachères, pâturages, champs arides et sablonneux. Stromberg. Wtg.

Sous-tribu II. — *Stellarineae.* (*Fenzl, in End. Gen. p.* 966.)

30. Mœhringia. (*L. Gen.* 494.) — Mœhringie.

87) *M. trinervia.* (*Clairv. Man. d'herborisation, p.* 150.) — *Arenaria trinervia* T. n° 633.

① Mai-Juin.

C. Bois et haies humides, chemins creux, etc.

31. Holosteum. (*L. Gen.* 104.) — Holostie. — Spurre. (III. 1.)

88) *H. umbellatum.* (*L. Sp.* 130) T. n° 224.

① Avril-Mai.

AC. Terrains sablonneux, champs incultes, bords des chemins, vieux murs.

32. Arenaria. (*L. Gen.* 569 *ex parte.*) — Sabline. — Sandkraut.

89) *A. serpyllifolia.* (*L. Sp.* 606) T. n° 634.

① ou ② Mai-Août.

C. Lieux secs et sablonneux, moissons, bords des chemins, murs, etc. R. Ardennes.

33. Stellaria. (*L. Gen.* 568.) — Stellaire. — Sternmiere.

90) *S. nemorum.* (*L. Sp.* 603) T. n° 639.

② Mai-Juin.

R. Bois humides, bords des ruisseaux boisés, lieux frais. Grünenwald. EF. Beaufort. Senningen. Niederanven. Kz. AC. Ardennes.

91) *S. media*. (*Vill. Fl. Delph. III*, 615.) — Vulekraut. — Vulegràs.

① ou ② Toute l'année.

[T. n° 496.

C. Lieux frais, champs humides, bords des fossés, etc.

92) *S. Holostea*. (*L. Sp.* 603.) — Geeskraut. . . . T. n° 640.

4 Mai-Août.

C. Haies, buissons, endroits herbeux, bords des chemins, etc.

93) *S. glauca*. (*Withering, arrang. I*, 420) . . . T. n° 641.

① Juin-Juillet.

R. Prairies humides, bords des fossés, tourbières.

94) *S. graminea*. (*L. Sp.* 604) T. n° 642.

4 Mai-Août.

C. Haies, buissons, champs humides, lisières des bois.

95) *S. uliginosa*. (*Murray. Prod. Gött. p.* 55.) *S. aquatica*.

② ou 4 Juin-Octobre.

[T. n° 643.

AR. Fossés, bords des mares, ruisseaux, près paludéens des Ardennes.

34. *Cerastium*. (*L. Gen.* 585.) — Ceraste. — Hornkraut.

96) *C. cæspitosum*. (*Link. Enum. Hort. Berol. I*, 433.) *C. viscosum* T. n° 665.

① ou 4 Avril-Septembre.

C. Lieux arides, bords des chemins, murs, terrains cultivés, etc.

97) *C. pumilum*. (*Curt. Fl. Lond. fasc. VI*, 30.) T. n° 667 bis.

① Avril-Mai.

AC. Pelouses, rochers, bords des chemins, vieux murs. R. Ardennes.

98) *C. semidecandrum*. (*L. Sp.* 627) T. n° 667.

① Avril-Mai.

AR. Champs sablonneux, moissons, bords des chemins.

99) *C. tomentosum*. (*DC. Prod. I*, 448) T. n° 669.

4 Mai-Juin.

R. Vieux murs, lieux secs aux environs d'Ansembourg. T.

100) *C. brachypetalum*. (*Desp. ap. DC. Fl. Fr. IV*, 777) T. n° 668.

① Mai-Juillet.

R. Lieux secs, arides, montueux, vignes, bords des chemins du calcaire jurassique.

101) *C. glomeratum*. (*Thuill. Fl. Pa.* 225.) *C. vulgatum*. T. n° 664.

① Avril-Juin.

C. Lieux humides, forêts feuillues, sources, fossés, champs montueux.

Var. β . *apetalum*. (*Dr.*) Obs. bot. p. 47.

Avec le type: Environs de Luxembourg. Dr.

- 402) *C. arvense*. (*L. Sp.* 628) T. n° 670.
 24 Mai-Juin.

C. Lieux secs, le long des chemins.

35. Moenchia. (*Ehrh. Beit.* 2. 277.) Moenchie.

- 403) *M. erecta*. (*Flor. der Wett.* 1. p. 249.) *Sagina recta*. T. n° 274.
 24 Avril-Mai.

C. Bruyères sablonneuses, bords des chemins. R. Ardennes.

36. Malachium. (*Fries Fl. Hall.* 77.) — Malaquie. — Weichkraut.

- 404) *M. aquaticum*. (*Fries l. c.*) *Cerastium aquaticum*. T. n° 674.
 24 Juin-Septembre.

C. Lieux humides, fossés aquatiques, bords des étangs calcaires.

Var. *β. arenaria*. (*God.*) Fl. I. 427.

R. Sables de la Moselle.

IV. ELATINEAE.

(Cambessèdes in *Mém. mus.* XVIII, 225.) [VIII, 4.]

37. Elatine. (*L. Gen.* 502.) — Elatine. — Tännel.

- 405) *E. Alsinastrum*. (*L. Sp.* 527) T. n° 640 b.
 24 Juin-Juillet.

R. Bord des étangs de Kockelscheuer. T. Eaux mortes de la Moselle. L. C.

V. LINEAE.

(DC. *Théor. éd.* I. 217.) [V, 5.]

38. Linum. (*L. Gen.* 389.) — Lin. — Lein.

- 406) *L. catharticum*. (*L. Sp.* 401) T. n° 502.
 24 Juin-Août.

C. Lieux herbeux, clairières des bois, chemins.

- 407) *L. tenuifolium*. (*L. Sp.* 398) T. n° 504.
 24 Juin-Août.

AR. Bois sablonneux, côteaux calcaires, pelouses arides. C. Par place sur la Moselle. T. Kempgen (Fouhren). Courtois. Bettendorf. BL. ! Rosport. Echternach. Brimmeyr père. Angelsberg. Dommeldange. T.

- 408) † *L. usitatissimum*. (*L. Sp.* 397.) — Flûds. T. n° 500.
 ① Juin-Août.

Cultivé, souvent subspontané. Bettembourg, gare. BL. ! Glacis de Luxembourg. Kz.

39. Radiola. (*Gml. Sys.* I, 289.) — Radiole. — Zwerglein.

- 409) *R. linoides*. (*Gml. l. c.*) — *R. millegrana* . . . T. n° 276.

① Juin-Août.

C. Essarts et bruyères tourbeuses des Ardennes. Rambruch. Kz. R. Ailleurs ; ordinairement en compagnie de *Centunculus*.

VI. OXALIDAE.

(DC. Prod. 1. 659.) [X, 5.]

40. Oxalis. (*L. Gen.* 582.) — Oxalide. — Sauerklee.

110) *O. acetosella.* (*L. Sp.* 620.) — Gueguetsbröd. Huösebröd.

‡ Avril-Mai. [T. n° 677.

C. Bois monteux, humides, lieux ombragés, pierreux.

111) *O. stricta.* (*L. Sp.* 624) T. n° 678.

‡ Juin-Octobre.

R Champs cultivés, jardins, vignes, décombres. (Lj. et C. p. 1. 112.) Schras-sig. EF.

VII. RUTACEAE.

(Juss. Gen. 295.) [VIII, 1.]

41. Ruta. (*L. Gen.* 523.) — Rue. — Raute.

112) † *R. graveolens.* (*L. Sp.* 548.) — Raut . . . EF. 34.

‡ Juillet-Septembre.

Subspontané. Altwies. EF.

42. Dictamnus. (*T. Gen.* 522.) — Fraxinelle. — Diptam.

113) † *D. albus.* (*L. Sp.* 548.)

‡ Mai-Juin.

Subspontané. Rochers dans les environs du château de Vianden. !

VIII. BALSAMINEAE.

(A. Rich. in dict. class. Hist. nat. II. 173.) [V, 1.]

43. Impatiens. (*L. Gen.* 1008.) — Impatiente. — Springkraut.

114) *I. noli-tangere.* (*L. Sp.* 1328). T. n° 373.

① Juin-Août.

AR. Bois ombragés, humides, bords des rivières, mardelles des bois et des mares. Bobüsch (Schrassig.) BL. ! Schieren. A. Mandelbach. Toutschenmühle (Wiltz.) Kz.

115) *I. Balsamina.* (*L. Sp.* 1325.) — Balsamine.

② Juillet-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois subspontané.

IX. GERANIACEAE.

(DC. Fl. Fr. IV. 838.) [XVI, 2.]

44. Geranium. (*L. Gen.* 832.) — Geranium. — Storchschnabel.

116) *G. phaeum*. (*L. Sp.* 953) T. n° 1021.

4 Mai-Juin.

R. Bois montueux près de Stolzembourg. K.

117) *G. silvaticum*. (*L. Sp.* 953) T. n° 1022.

4 Mai-Juin.

R. Bois montueux, prairies, bords des ruisseaux. Greiveldange. K. Schwarze-grund (Baumbüsch.) Kz. Plus abondant en Ardennes. K.

118) *G. pratense*. (*L. Sp.* 954). T. n° 1023.

4 Juin-Août.

R. Prairies, bords des eaux. Diekirch. K. Breueh. Kz. AC. Prairies humides des bords de la Moselle. Ehnen. BB. ! C. dans les prés de Nagem et Hachiville. !

119) *G. palustre*. (*L. Sp.* 954) L. et C. III, 6.

4 Juillet-Août.

R. Prés paludéens, forêts humides, sources. !

120) *G. sanguinum*. (*L. Sp.* 958) T. n° 1020.

4 Mai-Septembre.

AR. Côtes pierreuses exposées au soleil, Clausen. L. et C. Pulvermühl !, Marienthal, Mersch, Diekirch, etc. T.

121) *G. columbinum*. (*L. Sp.* 955) T. n° 1027.

① ou 4 Juin-Septembre.

AC. Bois, buissons, haies, bords des chemins, champs, vignes.

122) *G. dissectum*. (*L. Sp.* 956) T. n° 1028.

① Juin-Octobre.

C. Champs argileux, haies, lieux incultes, bords des chemins.

123) *G. molle*. (*L. Sp.* 955) T. n° 1024.

① ou ② Juin-Septembre.

AC. Lieux pierreux, secs, décombres, bords des chemins. C. Ruines.

124) *G. pusillum*. (*L. Sp.* 957). T. n° 1025.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Haies, bords des chemins, voisinage des habitations. R. Ardennes.

125) *G. rotundifolium*. (*L. Sp.* 957.) — Daüveföss. T. n° 1026.

① Mai-Octobre.

AR. Lieux stériles, pierreux, haies, buissons, bords des chemins des contrées vignobles. Moselle. L. et C. III, 8.

126) *G. Robertianum*. (*L. Sp.* 954.) — Stenkert. T. n° 1029.

① Mai-Septembre.

C. Rochers frais, rocailles, vieux murs, bois, vignes.

45. Erodium. (*L'Heritier, Geran. med. DC. Fl. Fr. IV. 838.*) —
Erodion. — Storchschnabel.

- 127) *E. cicutarium*. (*L'Héritier in Ait. Hort. Kew. II, 414.*) —
Sësselblum. T. n° 1018.

② ou ① Avril-Octobre.

C. Bords des chemins, murs, pelouses, lieux cultivés, etc. des terrains calcaires. R. En Ardennes.

- 128) *E. pimpinellæfolium*. (*Sibth. Fl. Oxon, p. 211.*) T. n° 1018b.

② ou ① Avril-Octobre.

AR. Moissons, lieux cultivés, bords des chemins des sables des terrains jurassiques.

X. MALVACEAE.

(R. Brown Cong. p. 8.) [XVI, 5.]

46. *Malva*. (*L. Gen. 841.*) — Mauve. — Malve.

- 129) *M. Alcea*. (*L. Sp. 971.*) T. n° 1033.

4 Juin-Septembre.

AR. Bords des bois, lieux secs entre Diekirch et Bastendorf (Courtois.) K. Dommeldange. Leespech (Simmern), entre Tuntingen et Greisch. Echternach (Brimmeyr père.) T. — C. Sur la Moselle L. et C. III, 15.

Var. *β. fastigiata*. (*Malva bismalva.*) (*Lej. Rev. Fl. Spa. p. 147.*)
Avec l'espèce. Lj. et C. III, p. 15.

- 130) *M. moschata*. (*L. Sp. 971.*) T. n° 1034.

4 Juin-Septembre.

C. Lisières des bois, près secs, endroits arides.

- 131) *M. silvestris*. (*L. Sp. 969.*) T. n° 1031.

② Mai-Octobre.

C. Bords des chemins, haies, buissons, endroits arides. AR. Ardennes.

- 132) *M. rotundifolia*. (*L. Sp. 969.*) — Kèskreïtgen, Brèderches-
kraut EF. 28. T. n° 1030.

① ou ② Mars-Octobre.

C. Lieux incultes, bords des chemins, voisinage des habitations. R. Ardennes.

- 133) † *M. crispa*. (*L. Sp. 969.*) T. n° 1032.

① Juillet-Août.

Subspontané dans le voisinage des habitations. C. Herrenberg (Diekirch.) K. (Courtois). Finsterthal. Kz.

47. *Altea*. (*L. Gen. 839.*) — Guimauve. — Eibich.

- 134) † *A. officinalis*. (*L. Sp. 955.*) — Guimov. . . T. n° 1036.

4 Juin-Août.

Naturalisé autour des villages, dans les haies et endroits humides. Vieux château d'Ansembourg. Kz.

135) *A. hirsta*. (*L. Sp.* 965) T. n° 1025.

② Juin-Septembre.

AR. Coteaux calcaires et arides de la Moselle : Machthum. Kz. Wecker à Mauternach. R., de la Sûre. L. et C. (III, 12.) Echternach (Brimmeyr père). Coteau à droite du chemin de Diekirch à la Bleesmühle. K. Helmdange. T.

136) † *A. rosea*. (*Cav. dis.* 2 t. 28.) — Rose papale. EF. 28.

② Juillet-Septembre.

C. Cultivé.

48. Hibiscus. (*L. Gen.* 846.) — Ketmie. — Eibisch.

137) † *H. Trionum*. (*L. Sp.* 981) EF. 36.

① Juin-Septembre.

R. Subspontané dans le voisinage des jardins. Parvis de l'église de Clausen. Kz.

138) † *H. syriacus*. (*L. Sp.* 979) EF. 29.

‡ Septembre-Octobre.

Cultivé et subspontané dans les bosquets abandonnés de la forteresse. Clausen, Limpertsberg, EF. etc. !

XI. TILIAGEAE.

(*Juss. Gen.* 290.) [XIII, 1.]

49. Tilia. (*L. Gen.* 660.) — Tilleul. — Linde. ⁴⁾

139) *T. platyphyllos*. (*Scop. Carn. I*, 373.) — Lann. T. n° 796.

‡ Juin-Juillet. Fr. (Krackelsnoss.) Juillet.

C. par place, manque sur de grands espaces. Bois de la Moselle, de Mersch, de Hosingen, etc. C. Cultivé en allées.

140) *T. silvestris*. (*Desf. Cat. hort. Par.* 152.) Lann. T. n° 795.

‡ Juillet. Fr. Août.

C. par place, manque sur de grands espaces. Bois, forêts des Ardennes et du bon pays. Moselle.

XII. POLYGALEAE.

(*Juss. in Ann. Mus.* XIV, 336.) [XVII, 3.]

50. Polygala. (*L. Gen.* 851.) — Laitier. — Kreuzblume.

141) *P. vulgaris*. (*L. Sp.* 986.) — Kranzblum . . . T. n° 1043.

‡ Mai-Juin.

C. Bois, prés, pâturages, bords des chemins

1) Il existe dans le pays plusieurs tilleuls remarquables par leur taille. Nous citerons entre autres celui de Schimpach, 9 mètres de tour ; Kehlen, 6 m. 40 de tour ; Ansembourg, 3 m. 50 de tour ; Clemency, 4 m. 90 de tour ; Hostert, 5 m. 10 de tour, etc., le tout à hauteur d'épaules.

Var. *β. oxyptera*. (*Reich. ic.* 46. 49.)

R. Avec l'espèce. Groeknap (Altrier). EF. Kz.

142) *P. comosa*. (*Sch. k. II*, 294) T. n° 1043b.

‡ Mai-Juillet.

AC. Lisières boisées et près calcaires près de Luxembourg (L. et C. III, 29), Machthum. BB. ! Wecker à Mertert. R. Echternach. K.

143) *P. calcarea*. (*Fr. Schultz, Bot. Zeit.* 1837, p. 752.) Wtg.

‡ Mai-Juin.

[Fl. R. n° 250.

R. Gazons calcaires près Mompach (Bockholz et Ilse.) Mertert, Lellig, Wasserbillig (Ilse.)

144) *P. Austriaca*. (*Crantz. Aust. V.* 439.) T. amara. T. n° 1044a.

‡ Mai-Juin.

AR. Prairies humides des terrains calcaires. C. sur la Moselle. T. Sûre près d'Echternach. (L. et C. III, 27.) Nommern. BL.

XIII. ACERINEAE.

(DC. Théor. élé. 2^e éd. 244.) [VIII, 1.]

51. *Acer*. (*L. Gen.* 1155 *ex parte*.) — Érable. — Ahorn.

145) *A. campestre*. (*L. Sp.* 1497.) — Hârtholz. — Masselter.

‡ Mai. Fr. Septembre-Octobre.

[T. n° 591.

C. Bois taillis, montueux. AC. Ardennes.

146) *A. platanoides*. (*L. Sp.* 1496.) T. n° 590.

‡ Avril-Mai. Fr. Septembre.

R. Bois et taillis montueux des Ardennes. T. Schûltbourg. Kz. Cultivé dans les avenues.

147) *A. pseudo-platanus*. (*L. Sp.* 1495.) — Aschtholz, Plaine.

Aschtert T. n° 589.

‡ Mai. Fr. Septembre.

C. Bois du calcaire oolitique, manque sur de grands espaces. AC. bois montueux calcaires et des Ardennes. Cultivé dans les avenues.

XIV. HIPPOCASTANEAE.

(DC. Théor. élé. 2^e éd. 244.) [VII, 2.]

52. *Æsculus*. (*L. Gen.* 488.) — Marronnier. — Rosskastanie.

148) † *Æ. hippocastanum*. (*L. Sp.* 488.) Keschtebâm. T. n° 570.

‡ Mai. Fr. Septembre-Octobre.

C. planté dans les parcs et les avenues; subspontané.

149) † *Æ. rubicunda*. (*DC. Lod. bot. cab.* 1242). EF. 31 bis.

‡ Mai. Fr. Septembre-Octobre.

AC. Cultivé comme arbre d'ornement.

XV. AMPELIDEAE.

(Kunth. in Humb. et Bonpl., nov. Gen. et Sp. V. 223.) [V, 1.]

53. Vitis. (*L. Gen.* 284.) — Vigne. — Weinstock.150) † *V. vinifera.* (*L. Sp.* 293.) — Rêf. . . . T. n° 384.

‡ Juin. Fr. Septembre-Octobre.

C. cultivé. Subspontané au bois de Foels (Schengen); Kz. dans les lieux incultes, montueux et couverts de broussailles au-dessus de Schengen ! et vis-à-vis de Wormeldange. T. Clausen. Neudorf. EF. Ourthe et Sûre. EF.

54. Ampelopsis. (*Michaux. Fl. bor. am.* I, 159.) — Ampéloside.

— Zaunrebe EF. 33.

151) † *A. hederacea.* (*Michaux. l. c.*) — Weirêf.

‡ Juillet. Fr. Octobre.

Souvent cultivé pour couvrir les vieux murs et garnir les tonnelles.

XVI. CELASTRINEAE.

(R. Brown. Gen. rem. 225.) [V, 1.]

55. Staphylea. (*L. Gen.* 374.) — Staphylier. — Pimpernuss.152) † *S. pinnata.* (*L. Sp.* 386.) — Kokelter . . . T. n° 495.

‡ Mai-Juin. Fr. Août.

AC. cultivé, subspontané dans les haies, les taillis. Clausen, Bellevue, Bissertpoirt ! etc. T.

56. Evonymus. (*L. Gen.* 271.) — Fusain. — Spindelbaum.153) *E. europæa.* (*L. Sp.* 286.) Røde Paffeschengchen. Rödmutz.

‡ Mai-Juin. Fr. Septembre-Octobre. [T. n° 372.]

C. Haies, bois taillis. R. Ardennes.

XVII. MONOTROPEAE.

(Nuttal. Gen. am. I, 272.) [X, 1.]

57. Monotropa. (*L. Gen.* 536.) — Monotrope. — Ohnblatt.154) *M. hypopitys.* (*L. Sp.* 555) T. n° 613.

‡ Juin-Août.

AC. par place. Parasite sur les racines du pin. Rodenhof, Ditzenberg, Sæul. Kz.

Var. β . *M. hypophegea.* (*Wallr. Sched.* 191.) L. et C. T. n° 737.

AC. sur les racines du hêtre, et du chêne de tous les terrains. Manque sur de grands espaces. T. L. et C.

XVIII. HYPERICINEAE.

(DC. Fl. Fr. IV, 860.) [XVIII, 1.]

58. Hypericum. (*L. Gen.* 982.)—Millepertuis.—Johanniskraut.

— Hardnôl.

155) *H. perforatum*. (*L. Sp.* 1104) T. n° 1116.

‡ Juin-Août.

C. Lisières, clairières des bois, bords des chemins.

156) *H. humifusum*. (*L. Sp.* 1105) T. n° 1117.

‡ Juin-Septembre.

C. Moissons, bruyères, bois des terrains sablonneux, humides, jeunes coupes.
AC. Ardennes.

157) *H. quadrangulum*. (*L. Sp.* 1104) T. n° 1114.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois, buissons, lieux herbeux. R. Ardennes.

158) *H. tetrapterum*. (*Fries, Novit. Succ. ed.* 1. 94) *H. dubium*.

‡ Juin-Août. [T. n° 1115.

C. Prés et bois humides, bords des fossés. R. Ardennes.

159) *H. pulchrum*. (*L. Sp.* 1106) T. n° 1119.

‡ Juin-Septembre.

C. Taillis, lisières des bois, lieux arides, bruyères. AC. Ardennes.

160) *H. montanum*. (*L. Sp.* 1105) T. n° 1118.

‡ Juin-Août.

R. Bois et taillis montueux, Steinsel, Bofferdange. BL! Sengels (Tuntingen.) Kz.

161) *H. hirsutum*. (*L. Sp.* 1105) T. n° 1120.

‡ Juin-Août.

AC. Bois, buissons, lieux marécageux. R. Ardennes.

XIX. DROSERACEAE.

(DC. Théor. élém. éd. I, 214.) [V, 6.]

59. *Drosera*. (*L. Gen.* 391.) — Rossolie. — Sonnenthan.

162) *D. rotundifolia*. (*L. Sp.* 402) T. n° 503.

‡ Juin-Août.

AC. par place, mais manque sur de grands espaces. Prairies spongieuses, marais tourbeux à *Sphagnum*. Finsterthal (Bœvange) Kz. Buchebüsch (Büschdorf.) Mandelbach (Brouch.) Kz. Clervaux. K. Grosbous. K.

163) *D. longifolia*. (*L. Sp.* 501) T. n° 504.

‡ Juillet-Août.

R. Prairies marécageuses, marais tourbeux aux environs de Rambrouch. T. Basbellain. K.

60. *Parnassia*. (*Tourn. Inst.* 127.) — Parnassie. — Herzblatt.

164) *P. palustris*. (*L. Sp.* 391.) — Herreblum . . . T. n° 498.

‡ Août-Septembre.

AC. par place. Prairies spongieuses, lieux tourbeux. Eisembourg, Helmdange, T. Brouch, Oberpallen, Fischbach. Kz. etc.

XX. PYROLACEAE.

(Lindley, nat. syst. 219.) [X, 1]

61. Pyrola. (*Tourn. Inst.* 132.) — Pyrole. — Wintergrün.165) *P. rotundifolia.* (*L. Sp.* 567) T. n° 616.

‡ Juin-Juillet.

AC. par place. Bois et taillis montueux vers la lisière. R. Ardennes.

166) *P. minor.* (*L. Sp.* 567) T. n° 617.

‡ Juin-Juillet.

R. Bois montueux et humides. Unter dem Weyer (Lintgen) Kz. Eicherbüsch.
BB. ! Echternach (Brimmeyr père). Altrier (Ilse).

XXI. RESEDACEAE.

(DC. Théor. élém. 214.) [XI, 3.]

62. Reseda. (*L. Gen.* 608.) — Reseda. — Wau.167) *R. luteola.* (*L. Sp.* 645) T. n° 686.

② Juin-Septembre.

C. Bords des chemins, lieux arides, lisières des bois. AR. dans les Ardennes.

168) *R. lutea.* (*L. Sp.* 645.) — Wele Réséda . . . T. n° 687.

② Juin-Septembre.

C. Lieux arides, bords des chemins. R. Ardennes.

169) † *R. odorata.* (*L. Sp.* 645.) — Réséda. . . . EF. 22.

① Juin-Novembre.

C. Cultivé et quelquefois subspontané dans le voisinage des habitations.

XXII. NYMPHEACEAE.

(DC. Prop. médic. éd. 2. 119.) [XIII, 1.]

63. Nuphar. (*Smith, Prod. Fl. Græc. I,* 361.) — Nuphar. — Mumel.170) *N. luteum.* (*Smith, l. c.*) T. n° 801.

‡ Juin-Septembre.

AC. Dans l'Alzette depuis la Gantenbeinsmühl jusqu'à Lorentzweiler; ! les eaux mortes de la Moselle (Wintrange.) Kz. C. Ardennes.

64. Nymphaea. (*Tourn. Inst.* 137, 138.) — Nénuphar. — Seelilie.171) † *N. alba.* (*L. Sp.* 729) T. n° 800.

‡ Juin-Septembre.

Introduit du Luxembourg belge dans les pièces d'eau des parcs de Walferdange, Eisembourg, Steinsel!, etc.

XXIII. PAPAVERACEAE.

(DC. sys. II, 105.) [XIII, 1.]

65. Papaver. (*L. Gen.* 408.) — Pavot. — Mohn.172) † *P. somniferum.* (*L. Sp.* 726.) — Pavô . . . T. n° 792.

① Juin-Septembre.

R. Cultivé comme plante oléagineuse et subspontané dans les terrains remués, les décombres près des habitations.

Var. β . *setigerum*. (DC. Fl. Fr. 5. 985.)

① Juin-Juillet.

C. Cultivé dans les jardins pour ses fleurs et plus souvent subspontané que le précédent.

173) P. *Rhœas*. (L. Sp. 726.) — Engelsblum. — Röd Kuörblum.

① Mai-Septembre. [T. n° 790.

C. Champs, moissons, terres remuées en compagnie de la Centaurée bleue.

174) P. *hybridum*. (L. Sp. 725). T. n° 788.

① Mai-Juin.

AR. Champs pierreux ou sablonneux, terrains en friche.

175) P. *Argemone*. (L. Sp. 725). T. n° 789.

① Mai-Août.

C. Champs, lieux incultes.

176) P. *dubium*. (L. Sp. 726). T. n° 791.

① Mai-Septembre.

AC. Champs, moissons.

177) C. *Lecoquii*. (Lamott. Cat. 1848). Dr. 41.

① Juin-Août.

AC. dans les sols calcaires et argilo-sablonneux : moissons, champs cultivés.

66. Chelidonium. (Tourn. Inst. 116.) — Chelidoine. — Schellwurz.

178) C. *majus*. (L. Sp. 726.) — Gîelzegskraut . . T. n° 793.

② Avril-Septembre.

C. Vieux murs, décombres, lieux pierreux, humides, etc.

Var. β . *laciniatum*. (Mill. Dict. 2. non L.)

R. Avec l'espèce.

67. Glaucium. (Tourn. Inst. 130.) — Glaucière. — Hornmohn.

179) † G. *flavum*. (Crantz. Aust. II, 141.)

① Juin-Août.

R. Anciennement cultivé, subspontané dans le voisinage du château de Vianden. K.

68. Eschscholtzia. (Champ swt. br. gard. 276.)

180) E. *Californica*. (DG. l. c.). EF. 41.

4 Juillet-Octobre.

Cultivé et très-souvent subspontané.

XXIV. FUMARIACEAE.

(DC. *sys.* 2. 105.) [XVII, 2.]**69. Corydalis.** (DC. *sys.* II. 113.) — Corydalide. — Hohlwurz.181) *C. solida.* (Sm. *Fl. Beit.* II. 948.) *C. bulbosa.* T. n° 1138.

④ Mars-Mai.

AC. Bois montueux, haies, broussailles de la région jurassique et calcaire. R. Ardennes et sur le grès bigarré.

182) *C. lutea.* (DC. *Fl. Fr.* IV. 638.) EF. 42.

④ Avril-Septembre.

AC. Vieux murs, décombres à Clausen. !

70. Fumaria. (L. *Gen.* 849.) — Fumeterre. — Erdrauch.183) *F. officinalis.* (L. *Sp.* 981.) — Katzekierwel. T. n° 1040.

① Mai-Octobre.

C. Champs, vignes, jardins, terrains nouvellement remués.

184) *F. tenuifolia.* (Fr. *Fl. der Wett.* 9. 14.) . F. Wirtgenii.

① Mai-Septembre.

R. Champs cultivés sur la Moselle. A. environs de Luxembourg. R.

185) *F. Vaillantii.* (Lois. *Not.* 102) T. n° 1042.

① Mai-Juin.

R. Champs argilo-sablonneux, vignes. Mœrsdorf. R.

186) *F. parviflora.* (Lmck. *Enc.* 2. 567) T. n° 1041.

① Mai-Août.

AR. Lieux cultivés. Johannisberg. Courtois. Kockelscheuer, Blaschette, sur la Moselle. T.

187) *F. capreolata.* (L. *Sp.* 985) T. n° 1039.

① Mai-Septembre.

R. Haies, jardins, buissons, décombres. Johannisberg. Courtois.

XXV. CRUCIFEREAE.

(Juss. *Gen.* 257.) [XV.]. DIVISION I. — **SILIKUOSÆ.** (Magnol.)SOUS-DIVISION I. — **Pleurorhycæ.** (DC. *syn.* 2. 157.)Tribu I. — Arabideæ. (Koch *syn.* 36.)**71. Matthiola.** (DC. *Prod.* I, 232.) — Mathiole. — Levkoje.188) † *M. annua.* (Brow. *Kew.* 2. 4. 119.) — Millionair.

① En été.

C. cultivé sous le nom de millionnaire.

189) † *M. incana*. (DC. Prod. 1. 134.) — Quarantaine.

② ou 4 Mai-Juin.

C. cultivé sous le nom de quarantaine.

72. Cheiranthus. (L. Gen. 815.) — Giroflée. — Lack.

190) *Ch. cheiri*. (L. Sp. 924.) Metzveyol. Märzveyol. T. n° 991.

4 Mai-Juin.

C. Rochers du Boeck à Clausen, murs au-dessus du Neuenweg. !

73. Barbarea. (Brown. l. c. 409.) — Barbarée. — Winterkresse.

191) *B. vulgaris*. (B. l. c.) Erysimum barbarea. . T. n° 995.

② Avril-Juin.

C. Lieux herbeux, humides.

192) *B. arcuata*. (Rehb. Bot. Zeit. 1820.) Erysimum arcuatum.

① Mai-Juin.

AC. par place. Lieux humides. Wasserbillig (Dr Ilse.)

193) *B. stricta*. (Andozejowski. apd. Bess. en. pl. Volh. 72.) *B. parviflora*. (Fries nov. ed. 2. 207.)

② Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux humides, manque sur de grands espaces.

194) *B. præcox*. (B. l. c.) Erysimum præcox . . T. n° 996.

② Avril-Juin.

AC. Champs un peu humides des Ardennes, notamment entre Dahl et Wiltz. K.

74. Arabis. (L. Gen. 818.) — Arabette. — Gänsekresse.

195) *hirsuta*. (Scop. Carn. 2. 30) T. n° 1008.

② ou 4 Mai-Juillet.

C. Prairies, lieux pierreux, décombres.

196) *A. sagittata*. (DC. Fl. Fr. V. 592) T. n° 1007.

② Mai-Juillet.

AR. Lieux pierreux, côteaux secs, jeunes taillis. Schleifmühl, BL. !

197) *A. arenosa*. (Scop. Carn. 2. 32) T. n° 1010.

② Avril-Juillet.

C. Murs, rochers, endroits sablonneux, vignes.

198) *A. Turrita*. (L. Sp. 930) T. n° 1011.

① Mai-Juin.

R. Taillis rocheux des Ardennes. Rambrouch, Wiltz. T. K. Echternach.

75. Cardamine. (L. Gen. 812.) — Cardamine. — Schaumkraut.

199) *C. amara*. (L. Sp. 915) T. n° 1012.

4 Avril-Mai.

AC. par place. Ruisseaux ombragés, endroits humides, les bois près du Schetzelbour, bords de la Sûre, C. En Ardennes.

- 200) *C. pratensis*. (*L. Sp.* 915.) — Keesblum . . T. n° 1013.
 4 Avril-Juin.

C. Prairies, bois humides, etc.

- 201) *C. hirsuta*. (*L. Sp.* 915) T. n° 1014.

① Mars-Juin.

AR. Clairières des bois, lieux humides et cultivés. C. vignobles.

- 202) *C. silvatica*. (*Link. in Hoffm. phys. Blätt.* 1. 50) T. n° 1015
 4 Avril-Juillet.

R. Bois montueux, lieux ombragés, bord des eaux. Howald (Lintgen.) BL. ! AC.
 Ardennes.

- 203) *C. impatiens*. (*L. Sp.* 914) T. n° 1016.

① Mai-Juin.

AC. en Ardennes, bords des ruisseaux, lieux ombragés. R. ailleurs.

76. *Nasturtium*. (*R. Brown. in Hort. Kew.* 2. IV. 110.)—Cresson.
 — Brunnenkresse.

- 204) *N. officinalis*. (*R. Br. l. c.*) — Burekascht. . . T. n° 997.
 4 Mai-Septembre.

AC. par place. Ruisseaux, fontaines, étangs, mares.

- 205) *N. silvestre*. (*R. Br. l. c.*) T. n° 998.
 4 Mai-Automne.

C. Bords des eaux, lieux humides, endroits inondés l'hiver ; manque dans les
 Ardennes.

- 206) *N. amphibium*. (*R. Br. l. c.*) T. n° 1000.
 4 Mai-Juillet.

C. Bords des eaux, lieux humides.

- 207) *N. palustre*. (*DC. sys.* II. 191) T. n° 999.

① Juin-Octobre.

R. Endroits humides. AR. Dans les Ardennes.

77. *Turritis*. (*L. Gen.* 819.) — Tourette. — Thurmkrout.

- 208) *T. glabra*. (*L. Sp.* 930) T. n° 1006.

① Mai-Juillet.

AC. mais isolé dans les lieux secs et pierreux, sur la bordure des bois, les
 jeunes coupes de tout le pays.

Tribu II. — *Sisymbrieae*. (*Koch, l. c.*)

78. *Sisymbrium*. (*L. Gen.* 813. *ex parte.*)—Sisymbre.—Ranke.

- 209) *S. Alliaria*. (*Scop. Carn.* II. 26.) — Blöderkrout. Hesperis
 alliaria T. n° 990.

① ou ② Avril-Juin.

C. Lieux couverts, buissons, fossés humides.

210) **S. Thalianum.** (*Gaudin. Fl. Helv. 4. 348.*) *Arabis* Th.

① ou ② Avril-Juin. [T. n° 1009.

C. Bois sablonneux, lieux pierreux, champs arides, vignes, bords des chemins.

211) **S. officinale.** (*Scop. Carn. II. 26*) T. n° 1001.

① Mai-Septembre.

C. Bords des chemins, lieux incultes.

212) **S. Sophia.** (*L. Sp. 922*) T. n° 1002.

① Mai-Octobre.

AC. par place. Manque sur de grands espaces et en Ardennes. Lieux incultes, décombres, carrières, bords des chemins. Pulvermühl. BL! Cimetières : Bettembourg (Courtois), Tuntingen, DW.

79. Braya. (*Sternb. et Hopp. Denksch. I, 65.*) — Braye. — Braya.

213) **B. supina.** (*Koch, Syn. fl. Germ. II, 54.*) — *Sisymbrium supinum.* (*L. Sp. 917*) T. n° 1003.

① Juin-Août.

R. Graviers des bords de la Moselle : Grevenmacher. T. Sables humides et champs des rives de la Moselle. Lj. et C. 1162.

80. Erysimum. (*L. Gen. 814.*) — Velar. — Hederich.

214) **E. cheiranthoides.** (*L. Sp. 923*) T. n° 992.

① Juin-Septembre.

C. Bords des chemins et des rivières, champs cultivés, moissons. Manque à l'Ardenne.

215) **E. hieracifolium.** (*L. Sp. 923.*) *E. strictum.* T. n° 993.

① Juin-Juillet.

R. Champs sablonneux entre Dommeldange et Walferdange. T. !

216) **E. virgatum.** (*Roth. Cat. bot. I, 75*) T. n° 994.

② Juin-Juillet.

R. Champs humides aux environs de Bettembourg. T.

217) **E. orientale.** (*R. Brown. h. Kew. 2. IV, 117.*) *Brassia* or.

① Mai-Juin. T. n° 981.

C. Champs pierreux de la Moselle à Stadtbredimus. BB. ! Dans les marnes irisées de Rodenhof, Schrondeweiler, Stegen, Steinsel, etc. BL. !

81. Hesperis. (*L. Gen. 817.*) — Julienne. — Nachtviole.

218) **H. matronalis.** (*L. Sp. 927.*)

4 Mai-Juin.

AC. Carrefour du bois : Wasserfall au-dessus du village et du plan incliné en aval du cimetière de Schiffange. ! R. Chemins de fer de Bettembourg au tunnel près de la barrière n° 7, A. EF. Kz. Ruisseau près de Bastendorf. DW.

Var. β . † incana fl. pl. (*Hort.*) Damascitablum.

C. Cultivé pour ses fleurs odorantes.

Tribu II. — Brassicæ. (*Koch, syn.* 58.)

82. Diplotaxis. (*DC. Syst. II*, 628.) — Diplotaxe. — Doppelsame.

219) *D. tenuifolia.* (*DC. Sys. II*, 632) T. n° 1004.

② ou 4 Avril-Octobre.

AC. Murs des fortifications, chemins de rondes : Luxembourg ; Rochers de la Pulvermühl. R. Ruines d'Ansembourg et de Larochette. !

220) *D. muralis.* (*DC. Syst. II*, 634) T. n° 1005.

② ou ① Mai-Juillet.

AR. Murs et rochers de la Sûre vis-à-vis de Langsur. (Löhr.) Diekirch (Courtois.) AC. environs de Luxembourg, avec le précédent.

83. Erucastrum. (*Schimper et Spenner fl. Frib.* 3. 946.) — Erucastrum. — Hundsrauke.

221) *E. obtusangulum.* (*Rehb. fl. excurs.* 693.) — Brassica obtusangula T. n° 987.

② ou 4 Mai-Juillet.

R. Bords de la Moselle entre Grevenmacher et Wasserbillig. T.

84. Brassica. (*L. Gen.* 820 *ex parte.*) — Chou. — Kohl.

222) † *B. oleracea.* (*L. Sp.* 932) T. n° 982.

② Mai-Juin.

Cultivé partout en grand nombre de variétés.

Var. α . acephala. (*DC. Sys.* 2. 590.)

† vulgaris. Schlappmös.

† † quercifolia. Wanterkool.

† † † crispa. — id. —

Var. β . capitata. (*DC. Syst. I*, 2. 590.) Kabes.

† alba. Weisse Kabes.

† † rubra. Rõde Kabes.

Var. γ . Sabauda. L. Savoyer, Wirschem.

† gemmifera. (*DC. l. c.* 2. 589.) Brokelë.

Var. δ . gonglioides. (*L. Sp.* 932.) Colerâv.

Var. ε . botrytis. (*DC. l. c.* 2. 589.) Choufleur.

† Brocoli.

223) † *B. Napus.* (*L. Sp.* 931) T. n° 984.

② Avril-Juin.

Var. α . oleifera. (*DC. l. c.* 2. 590.) Kool.

† biennis. (DC. l. c. 592.) ② Wanterkool.

† † annua. ① Summerkool.

Var. β. *Napo brassica*. (L. Sp. 932.) *esculenta*. (DC. l. c. 2. 589.)

† Chou-navet. Erdcolerâv.

† † Navet de Suède. Rutabaga.

† † † Turneps.

224) † *B. Rapa*. (L. Sp. 934) T. n° 986.

① ou ② Avril-Juin.

Var. α. *oleifera*. (DC. l. c. 591.) *Ribkraut* T. n° 985.

† annua. ①

† † biennis. ②

Var. β. *rapifera*. (Metzger *Kohllart* p. 52.) ② Rib.

† oblonga.

† † depressa.

225) *B. nigra*. (Koch. D. fl. 4, 713.) *Sinapis nigra*. T. n° 979.

① Juin-Août.

AR. Bords des rivières, lieux herbeux, buissons, terrains cultivés. R. Ardennes. C. sur les bords de la Moselle, Mondorf, A. EF. Kz.

85. Sinapis. (L. Gen. 821.) — Moutarde. — Senf.

226) *S. arvensis*. (L. Sp. 933.) *Sinèf* T. n° 978.

① Avril-Août.

C. Champs, moissons, lieux cultivés.

227) † *S. alba*. (L. Sp. 934) T. n° 980.

② Mai-Juillet.

AR. Moissons, lieux cultivés, linières près Bastendorf. BL. ! Oberanven, EF. Beltembourg. Kz.

228) *S. Cheiranthus*. (Koch. D. fl. IV, 717.) *Brassica Ch*. T. n° 988.

② ou 4 Mai-Août.

R. Lieux cultivés, secs, arides, pierreux, bords des champs. C. Ardennes.

86. Raphanus. (L. Gen. 822.) — Radis. — Rettig.

229) *R. Raphanistrum*. (L. Sp. 935) T. n° 977.

① Juin-Août.

C. AC. Moissons, lieux cultivés.

230) † *R. sativus*. (L. Sp. 935.)

① ou ② Mai.

Var. α. *Radicula*. (DC. Sys. 2. 663.) Mondrèdig.

Var. β. *niger*. (DC. l. c.) Ramelasse. Wanterrèdig.

DIVISION II. — **SILICULOSÆ.**Sous-DIVISION I. — **Latiseptæ.**Tribu I. — **Alyssinæ.** (*Koch, Syn.* 621.)**87. Lunaria.** (*L. Gen.* 809.) — Lunaire. — Mondviole.231) *L. rediviva.* (*L. Sp.* 911) T. n° 951.

4 Mai-Juillet.

R. Rochers ombragés et humides des côtes de l'Our entre Stolzembourg et Vianden. T. K.

232) † *L. biennis.* (*Mönch. meth.* 126) T. n° 952.

② Avril-Mai.

Cultivé et quelquefois subspontané. Limpertsberg au-dessous du parc de la Fontaine. Kz. Chemin de Godbrange au-dessous de Bourglinster. Kz.

88. Alyssum. (*L. Gen.* 805.) — Alysson. — Steinkraut.233) *A. calycinum.* (*L. Sp.* 908). T. n° 954.

① ou ② Mai-Juin, quelquefois à l'automne.

AC. Lieux secs et sablonneux, tuf calcaire, oolite ferrugineuse. R. Ardennes.

234) ? *A. campestre.* (*L. Sp.* 909) T. n° 955.

① Juin-Juillet.

R. Champs pierreux aux environs de Perlé (Ardennes). T.

235) † *A. saxatile.* (*L. Sp.* 908) EF. 59.

4 Mai-Juin.

Cultivé d'ancienne date et quelquefois échappé des jardins.

89. Berteroa. (*DC. Sys.* 2. 291.) — Berteroa. — Berteroe.236) *B. incana.* (*DC. l. c.*) *Alyssum incanum* . . . T. n° 953.

② Juin-Août.

R. Rochers derrière la maison Hippert de Hesperange, EF. ! Bifurcation du chemin de fer en aval de la gare de Bettembourg. A. EF. Kz.

90. Draba. (*L. Gen.* 809.) — Drave. — Hungerblume.237) *D. verna.* (*L. Sp.* 896.) Wieselchen T. n° 956.

① Mars-Mai.

C. Lieux secs, terrains incultes, jachères, vieux murs, etc.

238) *D. muralis.* (*L. Sp.* 643) T. n° 957.

② Avril-Juin.

R. Rochers près d'Echternach du côté de Bollendorff. K.

91. Cochlearia. (*L. Gen.* 803.) — Cranson. — Löffelkraut.239) † *C. Armoracia.* (*L. Sp.* 904.) Mièrrèdeg . . . T. n° 959.

4 Juin-Juillet.

C. Cultivé et souvent subspontané le long des cours d'eaux.

240) ? *C. officinalis*. (*L. Sp.* 903) T. n° 958.

4 ou ② Juin-Juillet.

R. Bords de la Moselle près de Wintrange. T. in Prod.

92. *Camelina*. (*Crantz, Aust. I*, 70.) — Cameline. — Dotter.

241) *C. silvestris*. (*Wallr. Sched.* 347). T. n° 972.

① Juin-Juillet.

AR. Champsau-dessus de Dommeldange. Echternach. T. Pulvermühl, Clausen.

BB. ! AC. dans les guérets montueux de la Moselle. T. !

242) *C. sativa*. (*Crantz. l. c.*) Dièderchen. Grêle Sämchen.

① Juin-Juillet. [T. n° 971.

Cultivé et souvent naturalisé dans les champs et le long des chemins.

243) *C. dentata*. (*Pers. syn. I. p.* 191). T. n° 973.

① Juin-Août.

R. Linières. Beaufort 1871 EF. ! Ellange. 1872. A. Kz.

Var. β . *pinnatifida*. (*Pers. l. c. Lej. Rev.*). T. n° 973b.

Avec l'espèce.

93. *Teesdalia*. (*R. Br. in Hort. Kew. ed. 2. IV*, 23.) — Teesdalie.

244) *T. nudicaulis*. (*R. Br. l. c.*) *T. iberis* T. n° 969.

① ou ② Avril-Juin.

C. par place. Lieux secs et siliceux, bords des chemins, surtout en Ardennes.

Var. β . *integrifolia*. (*Dmtr. prodr. fl. Belg.*) T. n° 1546.

Avec l'espèce.

94. *Tblaspi*. (*L. Gen.* 802 *ex parte.*) — Tabouret. — Täschelkraut.

245) *T. arvense*. (*L. Sp.* 901.) *Herzgespann*. T. n° 964.

① ou ② Mai-Septembre.

AC. Champs, lieux cultivés un peu humides, décombres, bords des chemins.

C. dans le grès rouge. R. en Ardennes.

246) *T. montanum*. (*L. Sp.* 902). T. n° 967.

4 Avril-Mai.

R. Lisière des bois montueux, côteaux calcaires aux environs d'Echternach. T. (Brimmeyr père.)

247) *T. perfoliatum*. (*L. Sp.* 902) T. n° 965.

① ou ② Mars-Mai.

AR. Terres remuées, vignes, clairières dans les taillis. Fœls (Mertert). Kz. Mont St-Jean. BL. ! Esch s/S. T. Rambrouch. T. aussi commun que *Capsella Bursa pastoris* entre Heiderscheid et Wiltz. DW. !

248) *T. alpestre*. (*L. Sp.* 903) T. n° 966.

① Avril-Mai.

R. Schistes arides près de Hosingen, Folschette, Rambrouch, T. Roehers : Echternach (Brimmeyr père).

95. *Iberis*. (*L. Gen.* 804.) — Iberide. — Banernsenf.

249) *I. amara*. (*L. Sp.* 906) T. n° 970.

① Mai-Septembre.

A. Champs de l'oolite ferrugineuse. ! R. ailleurs, Moselle et Sûre inférieure, Kockelscheuer, T. !

96. *Capsella*. (*Medikus, DC. Sys. II*, 383.) — Capselle. — Hirtentasche.

250) *C. Bursa pastoris*. (*Mönch. Met.* 271) Beiteltschnider.

① ou ② Toute l'année. [T. n° 973.

C. Plante polymorphe et ubiquiste, généralement répandue.

97. *Lepidium*. (*L. Gen.* 801.) — Passerage. — Kresse.

251) † *L. sativum*. (*L. Sp.* 899.) Cressong. Carmelina. S.

① Juin-Août. [T. n° 971.

C. cultivé et souvent subspontané près des jardins. Bofferdange. BL. !

252) *L. campestre*. (*R. Brown. in Hort. Kew.* 4. 88). T. n° 968.

② Mai-Juillet.

C. Lieux incultes, clairières des bois sablonneux, bords des chemins.

253) *L. graminifolium*. (*L. Sp.* 900.)

② ou 4 Juin-Septembre.

R. Bords des chemins, murs, quai près de Wormeldange. K. Vallée de la Moselle. Garke.

254) *L. rudérale*. (*L. Sp.* 900) T. n° 961.

① ou ② Mai-Septembre.

AR. Décombres, eudroits pierreux près du café Glodt (Gare de Luxembourg.)
EF. Wecker, Manternach, Mertert, R. — AG. Moselle ; Schengen, Wintrange, Stadtbredimus, Wasserbillig. BL. !

255) ? *L. Draba*. (*L. Sp.* 645.)

4 Mai-Juin.

R. Champs, décombres derrière le moulin de Steinsel. (1871.) EF.

Tribu II. — Isatideæ. (*Desv. Journ. bot.* III, 162.)

98. *Senebiera*. (*Pers. Sys.* 2. 185.) — Senebrière.

256) *S. Coronopus*. (*Poirier. Ency. méth.* 7. 76.) *Coronopus Senebiera* T. n° 960.

① Mai-Octobre.

C. Bords des chemins et des éviars, rues peu fréquentées sur la Moselle, et dans les terres calcaires. R. ailleurs et manque sur de grands espaces.

99. Isatis. (*L. Gen.* 824.) — Pastel. — Waid.

257) *I. tinctoria.* (*L. Sp.* 936) T. n° 976.

① Mai-Juin. Fr. Août.

R. Collines arides aux environs d'Echternach. T. Brimeyr père. Dreisermühl, rochers entre Grevenmacher et Fronay. A. ! entre Mertert et Wecker. R.

100. Neslia. (*Desvaux, Journ. bot.* III, 162.) — Neslie.

258) *N. paniculata.* (*Desv. l. c.*) T. n° 974.

4 Mars-Juin.

C. Champs arides lez Schengen. T. Grevenmacher. L. Pulvermühl. BL. !

101. Calepina. (*Desv. Journ. bot.* III, 158.) — Calepine.

259) ? *C. Corvini.* (*Desv. l. c.*) , . T. n° 975.

① ou ② Mai-Juin.

R. Jachères près d'Echternach. Wrtg.

XXVI. CISTINEAE.

(*Juss. Gen.* 294, ex parte.) [XIII, 1.]

102. Helianthemum. (*Tournf. Inst.* 128.) — Helianthème. — Sonnenröschen.

260) *H. Chamæcistus.* (*Mill. dict.* n° 1.) [1768.] *H. vulgare.* G. [1788]. T. n° 797.

4 Juin-Septembre.

C. Lieux secs, arides, clairières des bois.

Var. β . *obscurum.* (*Pers. syn.* II, 79.) *H. obscurum.*

[T. n° 798.

R. Lieux secs au-dessus de Dommeldange. T.

Var. γ . *sperpyllifolium.* (*Crantz, a. f. 2. t. 6. f. 2.*) T. n° 797b.

5 Juin-Août.

R. Champs secs des Ardennes. (Michel.) Dmtr. P. fl. B. 1500.

261) *H. polifolium.* (*Cistus. L. Sp.* 745) L. n° 146.

4 Juin-Août.

R. Coteaux secs de la Moselle près Schengen. (Löhr, 146.)

Var. β . *pulverulentum.* (*DC. Fl. Fr.* IV, 823) . . . T. n° 799.

AC. Les lieux secs des côtes de la Moselle, de Remich à Schengen. T. et aux environs de Luxembourg. C. et L. 957. Bellevue (Courtois.)

XXVII. VIOLARIEAE.

(DC. Fl. Fr. IV. 804.) [V, 1.]

103. Viola. (*Tournf. Inst. t. 236.*) — Violette. — Veilchen.Tribu I. — *Violeæ*. (*Gingins in DC. Prod. I, 351.*)262) *V. palustris*. (*L. Sp. 2. 1324*) T. n° 376.

4 Mai-Juin.

AR. Prés humides, marais tourbeux, Helmsange. T. Eltersmoor (Reisdorf).
EF. ! aussi en Ardennes.263) *V. hirta*. (*L. Sp. 1324*) T. n° 374.

4 Mars-Mai.

AC. Bois, coteaux herbeux, prairies sèches des terrains calcaires et jurassiques R. en Ardennes.

264) *V. odorata*. (*L. Sp. 1324.*) Viljöll. Vyolchen. T. n° 375.

4 Mars-Mai.

C. Bois, buissons, haies, lieux herbeux. AR. Ardennes.

265) *V. canina*. (*L. Sp. 1324 ex parte.*) Welviljöll. T. n° 377.

4 Avril-Juin.

AC. Lisière des bois, lieux secs, pâturages.

266) *V. montana*. (*L. Sp. 1328*) T. n° 379.

4 Mai-Juin.

R. Bois aux environs de Wiltz. T.

267) *V. silvestris*. (*Koch, Syn. Fl. Germ. 91*) . . . T. n° 377.

4 Avril-Juin.

AC. Bois, haies, buissons, lieux humides et ombragés.

268) *V. Riviniana*. (*Rchb. ic. 202.*)

4 Avril-Mai.

AC avec la précédente près d'Echternach (Brimeyr); bois de Sandweiler. EF.

269) *V. mirabilis*. (*L. Sp. 2. 1326*) T. n° 378.

4 Avril-Mai.

AR. Bois ombragés de la vallée de la Syr entre Mertert et Wecker. (Nusbaum.)

Tribu II. — *Melaniceæ*. (*DC. l. c.*)270) *V. tricolor* (*L. Sp. 1326.*) Pensée T. n° 380.

(2) ou (1) Mai-Octobre.

AC. Champs, moissons, bruyères. C. Ardennes.

Var. α . vulgaris. (*Koch, Syn. Fl. Ger. 94.*)

AC. Champs en friche. Coteaux arides.

Var. β . arvensis. (*Murray, in DC. Prod. I, 303.*)

AC. Champs des terres fortes.

271) † *V. Altaica*. (*Pall. in R. et S. syst. V*, 383.)

‡ Avril-Septembre.

272) † *V. elatior*. (*Fr. nov. ed. II*, 277.)

‡ Avril-Septembre.

Ces deux variétés et leurs hybrides (tricolor-altaica, elatior-tricolor) donnent les variétés de Pensées cultivées pour leur coloris, leur ampleur et leur richesse florifère.

273) *V. Rothomagensis*. (*Desf. cat.* 152) T. n° 382.

‡ Mai-Octobre.

AR. Moissons et bois taillis des Ardennes. T. entre Stolzembourg et Bivels, entre Feulen et Heiderscheid. K.

274) *V. intermedia*. (*Lej. Fl. Spa.* 343) T. n° 383.

① Juin-Août.

R. Prés secs aux environs de Rambrouch. T.

CLASSE II. — Dialypétales périgynes.

XXVIII. RHAMNEAE.

(R. Brown. Gen. rem. 22.) [V, 1.]

104. Rhamnus. (*L. Gen.* 265.) — Nerprun. — Wegdorn.

275) *R. cathartica*. (*L. Sp.* 279.) Weedaar. Scheisdaar.

‡ Mai-Juin. Fr. Août-Septembre. [T. n° 370.

AC. par place, mais manque sur de grands espaces. Haies, bois et taillis mon-
tueux, rochers : Clausen, Pétrusse, Pulvermühl, Tuntingen ; manque en Ardennes.

276) *R. frangula*. (*L. Sp.* 280.) Schwarze Faulbaam. Polferholz.

Stenkholtz. Krætzschîel T. n° 371.

‡ Mai-Juillet. Fr. Août-Septembre.

C. Bois taillis, haies, clairières des bois, sur les sols secs et arides.

XXIX. PAPILIONACEAE.

(*L. Gen. ord. nat.* 32.) [XVII, 4.]

Tribu I. — Lotææ. (*DC. Prod. I*, 115.)

Sub-tribu I. — Genisteæ. (*Koch, Syn.* 165.)

105. Sarothamnus. (*Wim. Fl. v. Schles* 278.) — Sarothamne.
— Binsenstrauch.

277) *S. scoparius*. (*L. Sp.* 996.) Ginz. (*Genista scoparia*.)

‡ Avril-Juin. [T. n° 1046.

C. Terrains incultes, siliceux, notamment en Ardennes.

106. Cytisus. (*L. Gen.* 785 *ex parte*.) — Cytise. — Bohnenbaum.

278) † *C. Laburnum*. (*L. Sp.* 1041) T. n° 1053.

‡ Mai-Juillet.

C. cultivé, subspontané au Prinzenberg (Petange). !

107. Genista. (*L. Sp.* 859 *ex parte.*) — Genêt. — Ginster.

279) *G. germanica*. (*L. Sp.* 999) T. n° 1052.

‡ Mai-Juin.

R. Forêts à sols sablonneux ou pierreux entre Kopstal et Ansembourg. *T.* Juckelsbüsch. (Mamer.) ! *T.*

280) *G. sagittalis*. (*L. Sp.* 998) T. n° 1050.

‡ Mai-Juillet.

AC Pelouses sèches, bruyère dans les poudingues de l'Attert, manque sur de grands espaces *R.* en Ardennes.

281) *G. tinctoria*. (*L. Sp.* 998.) Rhamheed T. n° 300.

‡ Mai-Juillet.

G. Lisière des bois, bruyères, coteaux incultes, surtout de la Moselle. *AC.* Ardennes.

282) *G. pilosa*. (*L. Sp.* 999) ¹⁾ T. n° 1048.

‡ Mai-Juillet.

Coteaux, pâturages, bruyères exposés au soleil. *C.* Ardennes et dans les marnes irisées. *AR.* ailleurs.

283) † *G. juncea*. (*L. Sp.* 995). EF. 75.

‡ Juin-Juillet.

Cultivé pour ses fleurs.

108. Lupinus. (*L. Gen.* 774.) — Lupin. — Lupine.

284) † *L. luteus*. (*L. Gen.* 1015.) Luping EF. 76.

① Juillet-Août.

C. Cultivé comme engrais vert dans les sols sablonneux et très-souvent subspontané.

285) † *L. angustifolius*. (*L. Sp.* 1015.) Wele Kafë. EF. 77.

① Juin-Août.

Cultivé depuis le blocus continental comme succédané au café.

109. Ulex. (*L. Gen.* 881.) — Ajonc. — Hecksame. EF. 79.

286) † *U. europæus*. (*L. Sp.* 1045, *var. α.*) . . . T. n° 1045.

‡ Avril-Juin.

AC. Hauteur entre Rambrouch et Arsdorf, EF. ! Scheid (Luxembourg). !

1) *G. prostrata*, T. n° 1049, est une variété décombante de *G. pilosa*, commune à la Fels de Schengen. Tinant l'avait d'abord rapportée à *G. humifusa*. (Bydragden, I, 426.)

Sub-tribu II. — Anthyllidæ. (Koch, Syn. 173.)

110. Ononis. (*L. Gen.* 863.) — Bugrane. — Hauhechel.287) *O. spinosa.* (*L. Sp.* 1003, var. β .) Tændeldaar. Domeldaar.

4 Juin-Septembre. [T. n° 1054.

AC. Lieux incultes, accotement des chemins. Manque à l'Ardenne.

288) *O. repens.* (*L. Sp.* 1006.) Tændeldaar. Stagnbön. *O. procurens* T. n° 1055.

4 Juin-Septembre.

C. Lieux arides, incultes R. Ardennes.

111. Anthyllis. (*L. Gen.* 773.) — Anthyllide. — Wundklee.289) *A. vulneraria.* (*L. Sp.* 1012.) Gfêle Männchen. T. n° 1036.

4 Mai-Juillet.

C. Bords des chemins, coteaux arides, pelouses calcaires. R. Ardennes.

Sub-tribu III. — Trifoliceæ. (Koch, Syn. 173.)

112. Lotus. (*L. Gen.* 897 *ex parte.*) — Lotier. — Schotenklee.290) *L. corniculatus.* (*L. Sp.* 1092.) Éerblum. . . T. n° 1080.

4 Mai-Octobre.

C. Pelouses sèches et humides, prairies, champs.

Var. β . *tenuis.* (*Kit. in Willd. Enum.* 797). . . T. n° 1080d.

AR. Lieux secs.

291) *L. uliginosus.* (*Schkuhr I*, 211.) *L. major.* T. n° 1080b.

4 Juin-Septembre.

C. Fossés, bords des eaux, lieux herbeux, humides.

113. Trigonella. (*L. Gen.* 898.) — Trigonelle. — Hornklee.292) ? *T. Fœnum græcum.* (*L. Sp.* 1410.) — Fullegretchen.

(2) Juin-Juillet. [T. n° 1070.

R. Champs de la vallée de la Moselle entre Remich et Stadtbredimus. T.

114. Robinia. (*L. Gen.* 819 *ex parte.*) — Robinier. — Robinie.293) † *R. pseudo-acacia.* (*L. Sp.* 1043.) Acacien. T. n° 1081.

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé, subspontané.

Var. β . *umbraculifera.* (*Des.*) A. boule.

‡ Mai-Juillet.

C. Cultivé.

294) † *R. viscosa.* (*Vent.*) A. rose.

‡ Mai-Juin.

Cultivé pour ses fleurs roses.

115. Galega. (*Tourn. Inst.* 222.) — Galega. — Geisraute.295) † *G. officinalis*. (*L. Sp.* 1063) EF. 84.

‡ Juillet-Août.

Cultivé comme plante d'ornement et tout récemment comme fourrage. Subspontané près du Birkenwäldchen (Gare de Luxembourg).! Clausen, Bellevue, Mersch,! etc.

116. Colutea. (*L. Gen.* 880.) — Baguenaudier. — Blasenstrauch.296) † *C. arborescens*. (*L. Sp.* 104) T. n° 1082.

‡ Mai-Juin. Fr. Août.

Quelquefois cultivé. Naturalisé dans les haies, taillis; près l'étang de Fischbach. BL.!

117. Astragalus. (*L. Gen.* 892 *ex parte*.) — Astragale. — Traganth.297) *A. glycyphyllos*. (*L. Sp.* 1067.) Sëssholz . . . T. n° 1083.

‡ Juin-Juillet.

AR. Lisières des bois calcaires. Bour (Tuntingen). DW. Mont St-Jean. Kz. Wecker, Manternach. R.

118. Melilotus. (*Tournf. Inst.* 406.) — Mélilot. — Honigklee.298) *M. arvensis*. (*Wallr. Sched.* 892) T. n° 1072.

(2) Juin-Septembre.

C. Lieux secs, bords des chemins. R. en Ardennes.

299) *M. macrorrhiza*. (*Pers. Syn.* 2. 348.) *M. officinalis*. T. n° 1070.

(2) Juin-Septembre.

C. Lieux frais, bords des eaux, prairies. R. Ardennes.

300) *M. leucantha*. (*DC. Fl. Fr.* V, 564). T. n° 1071.

‡ Juin-Septembre.

R. Lieux cultivés, bords des chemins, Septfontaines, Schengen, T.

301) † *M. alba*. (*Lmk. Ency. méth.* IV, 361.) Russesch Lizèr.

(2) Juin-Septembre. [EF. 83.

Introduit sous le nom de trèfle de Bockhara ou trèfle géant et quelquefois subspontané. Colmar. EF. Godbrange. Kz.

302) *M. parviflora*. (*Desf. Atl.* 2. p. 192.)

(1) Juin-Juillet.

R. Luzernière près du chemin de Wasserbillig à Mertert. (Bockholtz.)

303) † *M. cœurulea*. (*Lmk. dict.* 4. p. 62) EF. 82.

(1) Juin-Juillet.

Cà et là cultivé pour son emploi dans la médecine populaire. R. échappé des jardins. Steinsel.!

119. Medicago. (*L. Gen.* 899.) — Luzerne. — Schottenklee.304) *M. lupulina.* (*L. Sp.* 1097.) Geckige Klee. T. n° 1073.

① ou ② Mai-Octobre.

C. Lieux herbeux, secs, bords des chemins, prairies. Généralement cultivé.

Var. β . *Willdenowii.* (*Böning. Fl. Monst. p.* 216.)

AR. avec le type.

305) *M. falcata.* (*L. Sp.* 1096) T. n° 1074.

4 Juin-Septembre.

AC. Prés secs, coteaux arides, bords des chemins.

306) † *M. sativa.* (*L. Sp.* 1096) T. n° 1075.

4 Juin-Septembre.

Cultivé, souvent subspontané.

307) *M. falcato-sativa.* (*Rechb. Fl. exc. p.* 504.) Versicolor.

4 Juin-Septembre. [T. n° 1075b.

AR. Terrains secs et sablonneux. Machtum. BB. ! Bollacker (Mersch.) Kz.

308) *M. minima.* (*Lmk. Ency. méth. III,* 636.) T. n° 1076.

① Mai-Juillet.

AR. Lieux secs et sablonneux. C. Rochers entre le chemin de fer de Trèves et Pulvermühl. Cimetière des Israélites (Luxembourg). BB. ! Dickirch. (Courtois.)

309) ? *M. Echinus.* (*DC. Prod.* 2. 181.) Intertexta. T. n° 1078.

① Juin-Août.

R. Champs, moissons : Everlange. (L. et C. 1273.) Bissen. T. Dmtr. 1280 ; est cultivé dans quelques jardins et s'est probablement échappé de là.

310) ? *M. maculata.* (*Willd. Sp. III,* 1412) . . . T. n° 1077.

① Mai-Juillet.

R. Lieux incultes des bords de la Moselle : Schengen. T. Champ près d'Ansembourg. EF. Mersch, Rumelange. Kz., où il a été introduit avec de la graine falsifiée du N° 305.

311) ? *M. denticulata.* (*Willd. Sp. III,* 1414) . . . EF. 853.

① Mai-Juin.

R. Avec la précédente et introduite dans les mêmes conditions.

120. Trifolium. (*Tourn. Inst.* 228.) — Trèfle. — Klee.Sect. I. — *Chronosomium.* (*DC. Prod.* 2. p. 204.)312) *T. filiforme.* (*L. Sp.* 1088 *ex parte*). . . . T. n° 1069.

① Mai-Septembre.

C. Prés secs ou humides, lisières des bois, bords des chemins.

313) *T. procumbens.* (*L. Sp.* 1088) T. n° 1068.

① Mai-Août.

C. Prés secs, bords des chemins, endroits pierreux et cultivés.

314) *T. aureum*. (Poll. Palat. 2. 344.) Gfêle Klë. T. n° 1067.
 24 Juin-Juillet.

C. Lieux secs et sablonneux dans les clairières et sur les lisières des bois.

315) *T. agrarium*. (L. Sp. 1087) T. n° 1067.
 ① ou ② Juin-Juillet.

Var. α . majus. (Koch.) campestre. (Schreb. ap. Sturm. l. 16.)
 Dreschklë.

C. par place. Champs, moissons, jachères. C. en Ardennes.

Var. β . minus. (Koch.) procumbens. (Schreb. ap. Sturm. l. 16.)

AC. Prairies, pâturages.

Sect. II. — *Trifolium*. (DC. Prod. 2. 198.)

316) *T. pratense*. (L. Sp. 1082) T. n° 1063.
 24 ou ② Mai-Septembre.

C. Prairies, pelouses, bords des chemins, bois, etc.

Var. β . † sativum. Dreijährige Klë. (Rehb. fl. exc. 494.)

② ou 24 Mai-Septembre.

C. Cultivé comme fourrage.

317) *T. medium*. (L. Fl. Suec. ed. 2. 758.) Wele Klë. T. n° 1062.
 24 Juin-Août.

C. Bois montueux, bords des chemins. R. Ardennes.

318) *T. alpestre*. (L. Sp. 1082) T. n° 1061.
 24 Mai-Août.

R. Rochers entre le chemin de fer de Trèves et la Pulvermühl. T. ! entre Wecker et Mertel. R. Echternach, Brimmeyr père.

319) *T. ochroleucum*. (L. Sys. nat. 144.)

24 Juin-Juillet.

AR. Lieux herbeux des bois, pâturages élevés. Manque sur de grandes étendues. C. Canach, coteaux de la Moselle. BB. ! R. Ardennes.

320) *T. rubens*. (L. Sp. 1081.) Hapklë T. n° 1057.
 24 Juin-Juillet.

R. Bois montueux, pelouses élevées. Stromberg (Schengen.) BB. ! Aspelt vers Preisch. EF Kz. Angelsberg, entre Dudelage et Wolmerange. T. et Courtois.

321) † *T. incarnatum*. (L. Sp. 1083.) Russesche Klë. T. n° 1058.
 ① Mai-Juillet.

AR. Cultivé, quelquefois subspontané. Septfontaines. T. Schäferei près Schönfels. Kz.

322) *T. arvense*. (L. Sp. 1083.) Kätzercher. Miezchen.

① Juillet-Août.

[T. n° 1050.

AC. Champs après la moisson, lieux cultivés, R. Ardennes.

323) *T. striatum*. (*L. Sp.* 1068) BB. 393.

② Mai-Juillet.

R. par place dans les terrains calcaires. Fetschenhof. BB. !

324) *T. montanum*. (*L. Sp.* 1087) T. n° 1063.

4 Mai-Juillet.

AR. Prairies montueuses, C. Marnes irisées. Eisembourg, Graueknop, bois de Grevenmacher, Beaufort. R. Ardennes.

325) † *T. repens*. (*L. Sp.* 1080.) Weisse Klē . . . T. n° 1064.

4 Mai-Octobre.

C. Prés, accotement des chemins. Cultivé généralement en Ardennes comme fourrage.

326) † *T. hybridum*. (*L. Fl. Suec. ed.* 2, p. 258.) Hybridklē.

4 Juin-Septembre. [EF. 89.

C. Prairies humides fertiles. Cultivé en grand depuis 1850 ; mais il appartenait avant cette époque à notre Flore. W. K.

Sect. III. — *Fragiferae*. — (*Koch, Syn.* 189.)

327) *F. fragiferum*. (*L. Sp.* 1086). T. n° 1066.

4 Juin-Octobre.

AC. Lieux humides des terres fortes, bords des chemins.

121. *Phascolus*. (*L. Gen.* 860.) — Haricot. — Mîerbôn.

328) † *P. vulgaris*. (*L. Sp.* 1016) EF. 90.

① Juin-Septembre.

Cultivé en grand nombre de variétés.

Var. *α. volubilis*. Stachebôn.

Var. *β. nanus*. Stäckelchesbôn.

329) † *P. multiflorus*. (*Lam. Ency. III*, 701) . . . EF. 91.

① Juin-Septembre.

Cultivé comme plante d'ornement, en Ardennes comme légume.

122. *Cercis*. (*L. Gen.* 510.) — Gainier. — Judasbaum.

330) † *C. siliquastrum*. (*L. Sp.* 1. 534.) Arbre de Judée.

‡ Avril-Mai.

Un de nos plus anciens arbuste d'ornement.

Tribu II. — *Vicieæ*. (*DC. Prod. II*, 353.)

123. *Vicia*. (*L. Gen.* 873.) — Vesce. — Wicke.

331) *V. pisiformis*. (*L. Sp.* 1034) T. n° 1097.

4 Mai-Juin.

R. Broussailles le long du bois de Dudelange vers Wolmerange. T. L. et C. 1314.

- 332) *V. Cracca*. (*L. Sp.* 1035.) Wel Wick . . . T. n° 1098.
 24 Juin-Août.

C. Moissons, haies, bois, etc.

- 333) *V. tenuifolia*. (*Roth. Tent. fl. Germ.* 1. 309.) T. n° 1098b.
 24 Juin-Août.

AC. Sur la Moselle: Kleeberg (Remerschen), BB.! derrière la halte de Mertert vers Berbourg. EF. Kz.

- 334) *V. onobrychioides*. (*L. Sp.* 1036) . . . T. n° 1099.
 24 Juin-Juillet.

AR. Broussailles dans les rochers des bords de la Sûre en aval d'Echternach. Forges du Grundhof et rochers près de Grevenmacher. T.

- 335) *V. sepium*. (*L. Sp.* 1038.) Wel Wick . . . T. n° 1102.
 24 Mai-Juillet.

C. Haies, bois et buissons. R. Ardennes.

- 336) *V. lutea*. (*L. Sp.* 1037) BL.
 ① Mai-Juin.

R. Moissons près de la Seitert, bois de Lintgen. 1872. BL.!

- 337) † *V. sativa*. (*L. Sp.* 1037.) Wick.
 ① Mai-Août.

C. Cultivé et naturalisé dans les champs, les moissons.

- 338) *V. angustifolia*. (*Roth. Tent. fl. Germ.* I, 300.) T. n° 1100d.
 ① ou ② Mai-Juillet.

C. Champs, haies, buissons, lisières des bois, bruyères.

- 339) *V. lathyroides*. (*L. Sp.* 1037) T. n° 1001.
 ① Avril-Juin.

AC. Hauteurs entre Pulvermühl et le chemin de fer de Trèves. BL. Fort Olizy, Höhl (Luxembourg). EF. Kz.

124. *Ervum*. (*L. Gen.* 874.) — Ers. — Lein.

- 340) *E. hirsutum*. (*L. Sp.* 1039.) Fetz T. n° 1106.
 ① Mai-Septembre.

C. Moissons, bois, buissons. AR. Ardennes.

- 341) *E. tetraspermum*. (*L. Sp.* 1039). T. n° 1108.
 ① Juin-Septembre.

C. Moissons, lieux cultivés, buissons. R. Ardennes.

- 342) *E. gracile*. (*DC. Fl. fr.* 581) T. n° 1109.
 ① Juin-Août.

AR. Moissons du calcaire coquillier. Champs près de la Coup (Ellange) A. EF. Kz.

- 343) † *E. monanthos*. (*L. Sp.* 1040.)
 ① Juin-Juillet.

Autrefois cultivé; spontané dans les haies aux environs de Diekirch. L. et C. 1324.

344) *E. Ervilia*. (*L. Sp.* 1040) T. n° 1107.

① Juin-Juillet.

C. Champs de lentilles des bords de la Moselle. T. mept.

345) † *E. Lens*. (*L. Sp.* 1039.) Lenz. T. n° 1105.

① Juin-Juillet.

Cultivé çà et là, notamment dans les terres légères. Subspontané dans les moissons.

125. Faba. (*Tournf. Inst.* 202.) — Fève. — Bohne.

346) † *F. vulgaris*. (*Mönch. meth.* 130) EF. 98.

① Juin-Août.

Var. α . *F. equina*. (*Bauh.*) Perdsbön. Saubön . . . T. n° 1104.

Var. β . *F. sativa*. (*DC.*) Gardebön T. n° 1103.

C. Cultivé et quelquefois subspontané.

126. Pisum. (*Tourn. Inst.* 215.) — Pois. — Erbse.

347) † *P. sativum*. (*L. Sp.* 1026.) Ierbes T. n° 1092.

① Mai-Juillet.

C. cultivé dans les jardins et quelquefois subspontané.

Var. α . *saccharatum*. (*Ser.*) Zockerfêrbes.

Var. β . *macrocarpum*. (*Ser.*) Pelfêrbes.

Var. γ . *humile*. (*Poir.*) Bordurfêrbes.

Var. δ . *quadratum*. (*Lin.*) Ridesfêrbes.

348) † *P. arvense*. (*L. Sp.* 1027) T. n° 1093.

① Juin-Juillet.

C. Cultivé en plein champ.

127. Lathyrus. (*L. Gen.* 872.) — Gesse. — Platterbse.

349) *L. Aphaca*. (*L. Sp.* 1029) T. n° 1087.

① Mai-Août.

C. par place. Manque sur de grands espaces. Moissons du calcaire de la Moselle de Wasserbillig à Elnen. AC. dans les moissons des marnes irisées.

350) *L. Nissolia*. (*L. Sp.* 1029) T. n° 1085.

① Mai-Août.

R. Moissons entre Elnen et Wormeldange. T. Eisembourg. BL.

351) † *L. sativus*. (*L. Sp.* 1030.) Lenzooren . . . T. n° 1086.

① Juin-Août.

Cultivé sur la Moselle entre Grevenmacher et Wormeldange, Mondorff; quelquefois subspontané dans les moissons.

352) *L. hirsutus*. (*L. Sp.* 1032) T. n° 1088.

② Juin-Septembre.

AC Haies, buissons, moissons. Hollerich, Bettembourg. TMD. R. Ardennes.

353) *L. tuberosus*. (*L. Sp.* 1033.) Erdnoss. . . T. n° 1089.

‡ Juin-Août.

AC. Moissons des terres fortes et argileuses.

354) *L. pratensis*. (*L. Sp.* 1033) . . . T. n° 1090.

‡ Juin-Août.

C. Prairies, haies, bois, buissons.

Var. β . *velutinus*. (*DC. fl. Fr. suppl.* 575) . . . T. n° 1090c.

R Haies près de Tandel.

355) *L. silvestris*. (*L. Sp.* 1033) . . . T. n° 1091.

‡ Juin-Août.

AC. par place; manque sur de grands espaces. Bois de Dudelange, Langenberg, Mont St.-Jean, Schrassig, ceux de la Sûre et de la Moselle, etc.

356) † *L. odoratus*. (*L. Sp.* 1033) . . . EF. 101.

① Juillet-Septembre.

Cultivé en plusieurs variétés.

357) † *L. latifolius*. (*L. Sp.* 1033.)

‡ Juillet-Août.

Anciennement cultivé pour ses fleurs.

128. Orobus. (*L. Gen.* 871.) — Orobe. — Walderbse.

358) *O. tuberosus*. (*L. Sp.* 1028) . . . T. n° 1094.

‡ Avril-Juillet.

C. Bois, buissons secs.

Var. β . *tennifolius*. (*Roth. tent.* 3. 171.)

AR. Avec le type. Canach.!

359) *O. niger*. (*L. Sp.* 1028) . . . T. n° 1095.

‡ Mai-Juillet.

AR. Bois montueux au-dessus de Bettendorf, rochers près de Grevenmacher, au-dessus des forges de Colmar. T. entre Erpeldange et Michelau. EF. Kz.

360) † *O. vernus*. (*L. Sp.* 1028) . . . T. n° 1096.

‡ Avril-Mai.

Anciennement cultivé. La plante de l'herbier de T. appartient au n° 358

Tribu III. — Enhedysseae. (*DC. Prod.* II. 313.)

129. Coronilla. (*L. Gen.* 883 *ex parte.*) — Coronille. — Kronenwicke.

361) † *C. Emerus*. (*L. Sp.* 1146). . . EF. 106.

‡ Mai-Juillet.

C. Rochers du Wurthsberg, Clausen, subspontané.?

362) *C. varia*. (*L. Sp.* 4048) T. n° 1112.

4 Juin-Août.

AR. Coteaux herbeux, secs de la Moselle. T. ! C. Au pied du Stomberg, le long du chemin vers Schengen. A ! et entre Greiveldange et Stadtbredimus. !

130. Ornithopus. (*L. Gen.* 884 *ex parte.*) — Ornithope. — Vogelfuss.

363) *O. perpusillus*. (*L. Sp.* 4049) T. n° 1100.

① Mai-Août.

C. par place. Lieux secs et sablonneux. Plankenhof, Fischbach, Pulvermühl. BL. ! Franzosegrund. EF.

364) *O. sativus*. (*Brot. fl. lus. II*, 160.) Serradella. EF. 107.

① Juillet-Août.

Cultivé. Terres légères des bords de la Sûre dans les cantons de Dickirch et d'Echternach, notamment Beaufort. ! Subspontané à Obermarienthal. A. EF. Kz.

131. Hippocrepis. (*L. Gen.* 885.) — Hippocrepide. — Pferdehuf.

365) *H. comosa*. (*L. Sp.* 4050) T. n° 1111.

4 Mai-Juillet.

AC. Collines arides, lisières des bois, dans les marnes irisées.

132. Onobrychis. (*Tournf. Inst.* 211.) — Sainfoin. — Esparsette.

366) † *O. vieiæfolia*. (*Scop. Carn.* 2. p. 76.) Steeklë. (*O. saliva*.)

4 Mai-Juin.

[T. n° 1113.

C. Cultivé et naturalisé çà et là.

XXX. LYTHRARIEAE.

(Juss die. sci. nat. XXVII, 453.)

133. Lythrum. (*L. Gen.* 604.) — Salicaire. — Weiderich. [XI, 1.]

367) *L. salicaria*. (*L. Sp.* 642.) Tausendknüod. T. n° 681.

4 Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux et fossés, lieux humides. R. Ardennes.

368) *L. hyssopifolia*. (*L. Sp.* 642) T. n° 683.

① Juillet-Août.

R. Lieux humides et marécageux entre Mamer et Capellen. T.

134. Peplis. (*L. Gen.* 446.) — Peplide. — Afterquendel. [VI, 1.]

369) *P. Portula*. (*L. Sp.* 474) T. n° 552.

① Juin-Septembre.

AR. Champs humides, fossés, bords des étangs et des mares des terrains sablonneux. Lieux inondés l'hiver.

XXXI. PORTULACEAE.

(Juss. Gen. 312 ex parte.)

135. Portulaca. (*Tourn. Inst.* 118.) Pourpier. Portulak. [XI, 1.]370) † *P. oleracea*. (*L. Sp.* 638) T. n° 680.

① Juin-Octobre.

C. Cultivé et naturalisé dans le voisinage des jardins des villes.

371) † *P. sativa*. (*Haw. syn. plant. succ. p.* 121.)

① Juin-Août.

Cultivé.

136. Montia. (*L. Gen.* 101.) — Montie. [VI, 1.]372) *M. minor*. (*Gmel. Fl. Bad. Als. I,* 301) . . . T. n° 222.

① Avril-Juin.

AC. Lieux humides, sablonneux, fossés et étangs asséchés de la région Ardennaise et de ses lisières.

373) *M. rivularis*. (*Gmel. l. c.* 302). T. n° 227.

‡ Mai-Septembre.

AC. Dans les mêmes localités, par exemple entre Erpeldange et le chemin de fer du Nord. BL.!

XXXII. PARONYCHIEAE.

(A. de St-Hil. Mém. plac. lib. 56.)

137. Corrigiola. (*L. Gen.* 378.) Corrigiole. Hirschsprung. [V, 3.]374) *C. littoralis*. (*L. Sp.* 388) T. n° 497.

① Juin-Septembre.

C. Rives de la Moselle. Gravières des bords de la Sûre à Erpeldange. Champs humides, schisteux des Ardennes. Rambrouch. T. Mersch, EF.!

138. Herniaria. (*Tourn. Inst.* 288.) — Herniaire. — Bruchkraut. [V, 3.]375) *H. glabra*. (*L. Sp.* 317). T. n° 423.

② ou 4 Mai-Octobre.

C. Lieux secs et sablonneux.

376) *H. hirsuta*. (*L. Sp.* 317) T. n° 424.

① ou ② Mai-Septembre.

R. Lieux secs et sablonneux, manque sur de grands espaces. AC. entre Schengen et Wintrange.

139. Scleranthus. (*L. Gen.* 562.) Gnavelle. Knäulkraut. [X, 2.]377) *S. annuus*. (*L. Sp.* 580.) Leiskraut T. n° 619.

① Mai-Octobre.

C. Moissons des terres sablonneuses.

Var. β . *divaricatus*. (*Dmtr. Prod. Fl. B.* 191.)

AC. avec le type.

Var. γ . *comosus*. (*Dmtr. l. c.* 193.)

AR. avec le type. Plankenhof. BL. ! Finsterthal. Kz.

378) *S. perennis*. (*L. Sp.* 580) T. n° 618.

‡ Mai-Octobre.

C. Lieux sablonneux et schisteux, cultivés et en friches.

XXXIII. CRASSULACEAE.

(DC. Bull. Soc. Phil. 1801. N° 49. 1.)

140. *Crassula*. (*L. Gen.* 392.) — Crassule. — Dickblatt. [X, 5.]

379) *C. rubens*. (*L. Sy. nat.* 2, 226) T. n° 499.

① Mai-Juillet.

R. Collines arides au-dessus d'Ehnen. T.

141. *Sedum*. (*L. Gen.* 616.) — Orpin. — Fettkraut. [X, 5.]

380) *S. acre*. (*L. Sp.* 619.) Mauerkreitchen T. n° 655.

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux secs et pierreux, vieux murs, toits de chaumes, rochers. R. Ardennes.

381) *S. sexangulare*. (*L. Sp.* 310) T. n° 656.

‡ Juin-Juillet.

R. Rochers calcaires près de Schengen. T. Fels. Ehnen. BB. !

382) *S. boloniense*. (*DC. Prod.* 3. 407.) *B. schistosum*. T. n° 658.

‡ Juillet-Août.

R. Rochers arénacés. Clausen. Bofferdange. BL. T. ! Ardennes (Biwels.) K.

383) *S. reflexum*. (*L. Sp.* 588.) Tripmadam T. n° 657.

‡ Juillet-Août.

C. Vieux murs, rochers, coteaux arides, champs sablonneux, etc. R. Ardennes.

Var. β . *glaucescens*. (*S. rupestre*. *L. Sp.* 618.)

‡ Juillet-Août.

C. Rochers calcaires.

384) *S. aureum*. (*Wirtg. Fl. R. P.* 184) BB. 383.

‡ Juin-Juillet.

AC. par place. Coteaux arides, champs sablonneux, rochers couverts d'herbes, etc. Luxembourg R. Pulvermühl, Beggen BB. Durensberg. BL. ! etc.

385) *S. treviricum*. (*Rosbach in Wgt. T. Fl. RP.* 185.)

‡ Juin-Juillet.

AC. Coteaux calcaires en amont d'Echternach vers Weilerbach. R.

386) *S. album*. (*L. Sp.* 688.) — Judendrauw T. n° 54.

‡ Juin-Août.

C. Vieux murs, rochers, toits en chaume, etc. R. Ardennes.

387) *S. maximum*. (*Suter. Fl. Helv.* 1. 270.) Schmeerwurzel.
Brandkraut. (*S. Telephium*. Auct. non L.). . T. n° 631.

‡ Juillet-Septembre.

AC. Buissons, lieux pierreux, vignes, lisière des bois, etc.

388) *S. purpurascens*. (*Koch. suppl. fl. germ. ined.*)

‡ Juillet-Août.

AR. Rochers, bois montueux. Grundhof. EF. Kz.

142. *Sempervivum*. (*L. Gen.* 612.) — Joubarbe. — Hauswurz.

389) *S. tectorum*. (*L. Sp.* 666.) Donnerkraut . . T. n° 700.

‡ Juillet-Août.

C. Toits de chaume, vieux murs, souvent planté sur les chaumières.

XXXIV. AMYGDALAE.

(*Juss. Gen.* 340) [XII, 1.]

143. *Persica*. (*Tournf. Inst.* 400.) — Pêcher. — Pfirsichbaum.

390) † *P. vulgaris*. (*Mill. dic.* 1400.) Pigebâm . . EF. 115.

‡ Février-Mars. Fr. Août-Octobre.

AC. Cultivé en plusieurs variétés en espalier pour ses fruits. Il ne réussit bien chez nous que greffé sur prunier ou myrobolan.

Var. β. † *laevis*. (*DC. Fl. Fr.* IV, 487.)

R. Cultivé.

144. *Amygdalus*. (*L. Gen.* 619.) — Amandier. — Mandelbaum.

391) † *A. communis*. (*L. Sp.* 576.)

‡ Février-Avril.

AR. Cultivé dans les parcs pour ses fleurs doubles et simples.

145. † *Armeniaca*. (*Tournf. Inst.* 399.) Abricotier. Aprikosenbaum.

392) † *A. vulgaris*. (*Lmk. Ency. méth.* 1. 2.) Abrikosebâm.

‡ Février-Mars. Fr. Juillet-Août. [EF. 114.]

AC. Cultivé en diverses variétés, presque toujours en espalier.

146. *Prunus*. (*L. Gen.* 620.) — Prunier. — Pflaumenbaum.

393) *P. spinosa*. (*L. Sp.* 681.) Schlëvendaar. . . T. n° 712.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre-Décembre.

C. Haies, buissons, lisières des bois, bords des chemins, coteaux arides, notamment des terrains calcaires.

394) *P. fruticans*. (*Weih. Bot. Zeit.* 9. 2. 748.) Scheispraum.

‡ Avril-Mai. Fr. Août.

AR. Haies des vergers, lieux cultivés, près des habitations.

Var. β . $\dagger$ *damascena*. Damaschtepraum.

Cultivé en plusieurs variétés.

395) $\dagger$ *P. institia*. (*L. Sp.* 680.) Praumebâm . . T. n° 703.

‡ Mars-Avril. Fr. Juillet-Septembre.

C. Haies et voisinage des habitations. Cultivé dès la plus haute antiquité pour ses fruits variant de qualité, mais toujours alimentaires.

Var. β . *Catharinca*. (*Ser. in DC. Prod.*) Perdrigon.

Var. γ . *Claudiana*. (*Pers. syn.*) Reine-Claude.

Var. δ . *cerea*. (*L. Sp.* 680.) Mirabell.

396) $\dagger$ *P. domestica*. (*L. Sp.* 680.) Quetschebâm. T. n° 704.

‡ Mars-Avril. Fr. Juillet-Septembre.

C. Cultivé en plusieurs variétés pour ses fruits La variété ordinaire est spontanée dans les haies, vignes, etc.

397) $\dagger$ *P. cerasifera*. (*Ehrh. Rut.* 17.) Russesch Praum.

‡ Avril-Mai. Fr. Août.

C. Cultivé pour ses fruits et comme sujet pour la greffe du pêcher.

147. Cerasus. (*Juss. Gen.* 340.) — Cerisier. — Kirschbaum.

398) *C. avium*. (*Mönch, meth.* 672.) Wele Kischtebâm. T. n° 709.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Juillet.

C. Bois, forêts, notamment sur l'oolite ferrugineuse.

$\dagger$ Var. β . *Juliana*. (*DC. Fl. F.* 3785.) Schockekîscht. T. n° 708.

$\dagger$ Var. γ . *Duracina*. (*DC. Fl. F.* 3787.) Bigarreau.

399) *C. vulgaris*. (*Mill. Dict.* 4.) Sauerkîscht. (*P. Caproniana*.)

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Juillet. [T. n° 707.

AC. Bois, forêts, haies, etc.

$\dagger$ Var. β . *brevipes*. (*D.*) C. de Montmorency.

$\dagger$ Var. γ . *semperflorens*. (*Ehrh.*) C. de la Toussaint.

Cultivé comme arbre d'ornement pour sa floraison continue.

400) *C. Mahaleb*. (*Mill. Dict.* 4). T. n° 706.

‡ Mai-Juin. Fr. Juillet-Août.

AR. Rochers des côtes de la Moselle entre Ahn et Wormeldange. T. Cultivé comme sauvageon.

401) $\dagger$ *C. Padus*. (*DC. Fl. Fr. IV*, 580) T. n° 705.

‡ Mai. Fr. Juillet-Août.

AC. Cultivé et quelquefois spontané dans les taillis rocheux des Ardennes. Bords de la Pall entre Niederpallen et Reichlange. DW.

XXXV. ROSACEAE.

(Juss. Gen. 334 ex parte.) [XII.]

Tribu I. — Spireaccae. (DC. Prod. 2. 541.)

148. Spiræa. (L. Gen. 702.) — Spirée. — Spierstaude402) *S. Filipendula.* (L. Sp. 436.) Schëfernoss. . T. n° 726.

‡ Juin-Juillet.

AR. Lieux herbeux, clairières humides. Merl. EF. Useldange, Blaschette, Christnach. T. Beaufort. EF. Kz. etc.

403) *S. Ulmaria.* (L. Sp. 702.) Reine des prés . . T. n° 727.

‡ Juin-Juillet.

C. Prés humides, bords des eaux, lisières des bois humides.

Var. β . *denudata.* (Hayne. *Arz. Gew.* 8. tab. 31.)

AC. avec le type.

404) † *S. salicifolia.* (L. Sp. 701) T. n° 724.

‡ Juin-Août.

AC. Cultivé surtout en Ardennes, se retrouve sauvage dans les haies et au bord des eaux.

405) † *S. hypericifolia.* (L. Sp. 701) EF. 116.

‡ Juin-Août.

AC. Cultivé et souvent subspontané.

406) † *S. prunifolia.* (Van Houtte. *Fl. serres.* 1842.)

‡ Printemps.

AC. Cultivé et souvent subspontané.

149. Kerria. (DC.) — Corète. — Karnunkelstrauch.407) † *K. Japonica.* (DC.) EF. 117.

‡ Tout l'été.

C. Cultivé et sauvage dans les haies. Clausen, Bellevue, etc.

Tribu II. — Potentilleæ. (C. et Germain. *Fl. Par.* 206.)**150. Rubus.** (L. Gen. 632.) — Ronce. — Brombeere. ¹⁾

1) La division du genre *Rubus* que nous donnons est celle de la Flore de Tinant. Les plantes de son herbier et de celui de M. Krombach qui servirent de base à celle-ci ont été vérifiées sur celles de l'Herb. rub. de Wirtgen, et sur Arrhen. Monog. Rubor. Pour ceux qui ne sont pas partisans de cette dismembration, adoptée par plus d'un floriste éminent, nous ramenons, à l'exemple de Arnott dans Britsch Flora, les ronces des sections I et II aux types suivants :

1. *R. suberectus.* (Anders. *Eng. bot.* 1. 2714.)

Sect. I. — Batotypus. (*Dmtr. Prod.* 91.)A. *Homalacanthi*. (*Dmtr. Monog. des espèces du genre Rubus.* 4.)408) *R. fruticosus*. (*L. Fl. Suec. ed. 2.* 172.) *Perdsbør.* T. n° 761.

‡ Juin-Septembre.

C. Lieux incultes, bords des chemins, haies, buissons, bois, terrains calcaires et argileux.

409) *R. suberectus*. (*Anders. Eng. bot.* 1. 2714) . T. n° 755.

‡ Juin-Juillet.

R. Bois, Grönenwald.

Var. *β. plicatus*. (*Weihe et Nees. Rubi. Germ. p.* 20. 1.) T. n° 755.

AC. Taillis, haies et broussailles.

Var. *γ. fastigiatus*. (*W. et N. l. c. p.* 16. 2) . . . T. n° 756.

R. Bois, lieux ombragés. C. Ardennes. Wiltz. T.

Var. *δ. nitidus*. (*W. et N. l. c. p.* 19. 4) . . . T. n° 758.

AR. Bords des bois, haies. Krichelheid. K.

440) *R. affinis*. (*W. et N. l. c. p.* 22. 3.) *R. corylifolius*. H.

‡ Juin-Juillet. [T. n° 757.

AR. Lisière des bois.

441) *R. thyrsoideus*. (*Wim. fl. v. Sch.* 131.) *R. fruticosus*. (*W.**et N. l. c.* 7.) *R. candicans*. (*Rech. fl. excurs.* 601.) T. n° 761.

‡ Juin-Juillet.

C. Calcaire jurassique.

Var. *β. rhamnifolius*. (*W. et N. l. c. p.* 21. t. 6). . T. n° 760.

C. Bords des bois du calcaire jurassique.

II. *R. rhamnifolius*. (*W. et N. l. c. p.* 21. 6 *emend.*)*R. affinis*. (*W. et N.*) | *R. thyrsoideus*. (*Wim.*)III. *R. fruticosus*. (*L. Fl. suec. ed. 2.* 172 *ex parte.*)*R. discolor*. (*W. et N.*) | *R. vestitus*. (*W. et N.*)*R. tomentosus*. (*Willd.*) | *R. viscosus* (*W.*)IV. *R. carpiniifolius*. (*W. et N. l. c. p.* 35. t. 13. *emend.*)*R. vulgaris*. (*W. et N.*) | *R. Sprengelii*. (*W.*)*R. silvaticus*. (*W. et N.*) | *R. Schlechtendalii*. (*W. et N.*)V. *R. glandulosus*. (*Bell. Append. ad. Fl. Ped. p.* 24. *emend.*)

<i>R. Hystrix</i> . (<i>W. et N.</i>)		<i>R. Guntheri</i> . (<i>W. et N.</i>)		<i>R. infestus</i> (<i>W. et N.</i>)
<i>R. Radula</i> (<i>W. et N.</i>)		<i>R. glandulosus</i> . (<i>Bell.</i>)		<i>R. hybridus</i> . (<i>Vill.</i>)
<i>R. rudis</i> (<i>W. et N.</i>)		<i>R. hirtus</i> (<i>W. et N.</i>)		<i>R. pygmaeus</i> . (<i>W. et N.</i>)
<i>R. fusco-ater</i> . (<i>W. et N.</i>)		<i>R. Schleicheri</i> (<i>W. et N.</i>)		

VI. *R. corylifolius*. (*Smith. Eng. bot.* t. 827.)VII. *R. cassinus*. (*L. Sp.* 706.)*R. nemorosus*. (*Hayne.*)

Var. *γ. cordifolius*. (*W. et N. l. c. p. 22. t. 7*) . . . T. n° 759.

C. Bords des bois.

412) *R. tomentosus*. (*Willd. Sp. II, 1083*) . . . T. n° 762.

‡ Juin-Juillet.

AC. Lieux secs et incultes, lisières des bois exposés au soleil. Md. C. Moselle et sart des Ardennes. (Courtois.)

413) *R. Sprengelii*. (*W. in Bot. Zeit. 1819. 17*). . . T. n° 764.

‡ Juin-Juillet.

AC. Bois humides. Ardennes: Folschette, Rambrouch T. — R. ailleurs; broussailles au-dessus de Dommeldange. T.

414) *R. vulgaris*. (*W. et N. l. c. 38. t. 14*) . . . T. n° 767

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux secs et incultes.

Var. *β. carpinifolius*. (*W. et N. l. c. p. 33. t. 13.*) *R. leucostachys*.

(*Sm. Eng. bot. 1. 2631*) T. n° 766.

AR. Lisière des bois.

Var. *γ. umbrosus*. (*God. Fl. L. 1. 210.*)

AC. Avec l'espèce.

415) *Schlechtendalii*. (*W. et N. l. c. 11*) T. n° 763.

AC. Bois montueux des Ardennes. R. ailleurs.

416) *R. silvaticus*. (*W. et N. l. c. p. 412. 15*) . . . T. n° 768.

‡ Juin-Juillet.

C. Lisières des bois.

417) *R. discolor*. (*W. et N. l. c. p. 46. 20.*) *R. fruticosus*. (*DC.*

Prod. 2. 561 non L. nec W. et N.). T. n° 771.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois, buissons, haies.

Var. *β. villicaulis*. (*W. et N. l. c. p. 43. t. 17*) . . . T. n° 769.

C. Bois, buissons, haies des terrains montueux.

Var. *γ. argenteus*. (*W. et N. l. c. 19*) T. n° 770.

AC Bois.

B. *Heteracanthi*. (*Dmtr. Monog. l. c. 4.*)

418) *R. vestitus*. (*W. et N. l. c. p. 81. 33.*) *R. vinetorum*. (*Hol.*

fl. Moselle. 267.) *R. diversiflorus*. (*Lindley, syn. 99.*) T. n° 778.

C. Haies, vignes, bois des terrains secs et calcaires.

Var. *β. hirsutus*. (*Wirtg. Prod. p. 61.*)

R Avec l'espèce. Kriehelheid.

419) *R. viscosus*. (*Weyhe. mon. ms. n° 23*) . . . L. et C. 931.

‡ Juin-Juillet.

R. Bois, buissons, broussailles, haies.

- 420) **R. Schleicheri.** (*W. et N. l. c. p. 68. 23*). *R. glandulosus.*
(*Schleich. pl. helv. exsica. non Bell.*) T. n° 773.
‡ Juin-Juillet.

R. Bois aux environs de Rambrouch et Grünenwald. T.

- 421) **R. fusco-ater.** (*W. et N. l. c. 25*). T. n° 774.
‡ Juin-Juillet.

AR. Haies, mardelles des bois à l'exposition du midi. C. Ardennes.

- 422) **R. Radula.** (*W. et N. l. c. p. 89. t. 38*). . . . T. n° 780.
‡ Juin-Juillet.

AR. Bois, broussailles.

- 423) **R. rudis.** (*W. et N. l. c. p. 91. 40*) T. n° 781.
‡ Juin-Juillet.

C. Collines calcaires et arides.

- 424) **R. infestus.** (*W. et N. l. c. 30*) T. n° 776.
‡ Juin-Juillet.

AC. Lieux arides, secs, bords des champs.

- 425) **R. hirtus.** (*W. et N. l. c. p. 95. t. 43*) T. n° 772.
‡ Juin-Juillet.

AC. Bois, le long des chemins. Grünenwald. T.

- 426) **R. Guntheri.** (*W. et N. l. c. 63. t. 21*) T. n° 772.
‡ Juin-Juillet.

R. avec le précédent

- 427) **R. hybridus.** (*Vill. fl. Delph. III, 559.*) *R. Lejeuni.* (*W. et N. l. c. p. 79. t. 3. non Sond.*) T. n° 777.
‡ Juin-Juillet.

AR. Broussailles aux environs de Rambrouch et de Folschelte. T.

- 428) **R. glandulosus.** (*Bell. Append. ad. Fl. Ped. p. 24.*) *R. Bel-*
lardii. (*W. et N. l. c. p. 27. 44.*) *R. villosus.* (*DC. Prod.*
II, 963) T. n° 784.
‡ Juin-Juillet.

AC. Lieux montueux, sablonneux et broussailles.

- Var. β . **rosaceus.** (*W. et N. l. c. p. 85*) T. n° 779.

R. Bois au-dessus de Donnmeldange. T.

- 429) **R. pygmæus.** (*W. et N. l. c. 19. t. 4*) T. n° 783.
‡ Juin-Juillet.

R. Champs arides. Neunhausen. T.

- 430) **R. nemorosus.** (*Hayne, Arznei. 3. tab. 10.*) *R. pallidus.*
(*W. et N. l. c. p. 75. t. 29.*) *R. dumetorum* var. *silvestris.*
(*God. Fl. L. 1. 209*) T. n° 775.

‡ Mai-Juin.

C. Bois et buissons.

Var. *β. tomentosus*. (*Arrhen. Rub. succ. p. 46.*)

R. Bois de Differdange, Esch-sur-l'Alzette. C. Ardennes.

Sect. II. — *Glauco-batos*. (*Dmtr. l. c.*)

431) *R. cæsius*. (*L. Sp. 706.*) Brehm T. n° 786.

‡ Juin-Août.

C. Haies et champs.

Var. *β. agrestis*. (*W. et N. l. c. p. 106.*) Brehm.

C. Champs arides

Var. *γ. dumetorum*. (*W. et N. l. c. p. 98. t. 45. a et b.*) T. n° 786.

AC. Haies, broussailles.

Var. *δ. ferox*. (*Vent. in Tratt. Monog. Rosa. 3. p. 40.*) Vestitus.
(*Wim.*)

AR. avec l'espèce.

Var. *ε. serpens*. (*God. et. Gren. Fl. Fr. t. 1. 538.*)

AC. Avec l'espèce dans les bois sablonneux.

Sect. III. — *Chamæ-batos*. (*Dmtr. l. c.*)

432) *R. saxatilis*. (*L. Sp. 708.*) Erdkrëschel. T. n° 763.

‡ Mai-Juin. Fr. Juillet.

AR. Rochers, bois montueux. Bellevue (Courtois.) Kiém (Grünenwald.) Pulfermühl. BL. ! Rodenhof. BB. Fels (Schengen) Kz. etc.

Sect. IV. — *Batidæa*. (*Dmtr. Pr. l. c.*)

433) *R. Idæus*. (*L. Sp. 706.*) Hambîer. T. n° 787.

‡ Juin-Juillet. Fr. Juillet-Août.

C. Bois et tourbières des Ardennes. AC. et R. ailleurs. Manque sur de grands espaces. Cultivé en diverses variétés — blanches, jaunes, roses, rouges, bifères.

434) *R. odoratus*. (*L. Spl. ed. I. 494.*) Amerikanische
Perdsbîer EF. 117.

‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé et échappé des bosquets.

151. Geum. (*L. Gen. 636.*) — Benoite. — Nelkenwurz. [XII, 3.]

435) *G. urbanum*. (*L. Sp. 716.*) Igelskraut. Gaffel. T. n° 741.

‡ Mai-Juillet.

C. Haies, buissons, bois, lieux pierreux, humides.

436) *G. rivale*. (*L. Sp. 717*) T. n° 742.

24 Mai-Juillet. Refl. à l'automne.

R. Bois humides, bords des ruisseaux. Grünenwald. Eisembourg, Blaschette, Kopstal. T. Mandelbach. Kz.

437) *G. rivali-urbanum*. (*Bell. Satter. Fl. B. 121.*) *G. intermedium*. (*Ehr. Rut. p. 143*) T. n° 742b.

24 Mai-Juillet.

R. Se produit parmi les pieds de *G. urbanum* et *rivale*. Bois de Blaschette. (Seitert, Beutelbüsch.) T.

438) *G. urbano-rivale*. (*G. Mey. Chl. Han.*)

24 Mai-Juillet.

R. Se produit de la même manière. Parc de Schrassig. EF.

152. *Fragaria*. (*L. Gen. 633.*) — Fraisier. — Erdbeere.

439) *F. vesca*. (*L. Sp. 709 ex parte.*) Erdbiër . . . T. n° 728.

24 Avril-Juin.

G. Clairières dans les bois taillis, broussailles, pelouses, haies, etc. Cultivé en nombreuses variétés pour ses fruits rouges et blancs.

† Var. *β. semperflorens*. (*Koch, Syn. 234.*) De tous mois.

† Var. *γ. efflagellis*. (*Duch. Lam. dict. 2. 531.*) Sans coulants ou de Gallion.

† Var. *δ. monophylla*. (*Duch. l. c. 532.*) A une foliole.

440) *F. moschata*. (*Duchesne 1766.*) *F. elatior*. (*Ehrh. Bot. VII, 23.*) T. n° 729.

24 Mai-Juin.

AR. Bois, haies des environs d'Ansembourg. T. Kz. Grünenwald. T. Schleid de Contern. Bosquet au-dessus du château de Dommeldange. Ruines d'Esch s./S. (Courtois.) Taillis au-dessus d'Erpeldange. EF. Kz. — Cultivé en plusieurs variétés dites Hautbois, Capronnier.

† Var. *β. communis*. (*Hort.*) Capron commun.

† Var. *γ. heterophylla*. (*Hort.*) A 3, 4 et 5 folioles.

441) *F. viridis*. (*Duchesne 1766.*) Huneknepp. *F. collina*. (*Ehrh. l. c. 26.*) T. n° 730.

24 Mai-Juin.

AR. Bois, coteaux arides, calcaires. Echternach, (Brimmeyr père.) Stromberg, Fels, Schengen. EB ! Hohfels, Machthum. BB. Manternach, Mertert. R. — C. près des forges de Berbourg. K. et les collines des marnes irisées.

Les nombreuses variétés cultivées n'appartenant pas aux espèces indigènes, se rapportent aux suivantes :

442) † *F. virginiana*. (*Ehr. l. c. 24.*) *F. pourpre*.

24 Mai-Juin.

443) † *F. grandiflora*. (*Ehrh. l. c.* 25.) *F. ananas*.

‡ Mai-Juin.

444) † *F. chilensis*. (*Ehrh. l. c.* 26.) *F. du Chili*.

153. Comarum. (*L. Gen.* 638.)—Commaret.—Blutauge. [XII, 3.]

445) *C. palustre*. (*L. Sp.* 718) T. n° 738.

‡ Mai-Juin.

Marais tourbeux, prairies marécageuses, bords des eaux. AC. Ardennes. R. Ailleurs. Felnerholz (Hesperange.) BL.!

154. Potentilla. (*L. Gen.* 634.)—Potentille.—Fünffingerkraut.

446) *P. sterilis*. (*L. Sp.* 709.) *P. Fragaria*. Gke. . . T. n° 737.

‡ Mars-Mai.

AC. Bois montueux, haies, bords des chemins herbeux C. Grund (Hesperange.) BL. ! AR. Ardennes.

447) *P. verna*. (*L. Sp.* 702.) Dragouner T. n° 733.

‡ Mars-Mai. Reff. quelquefois à l'automne.

C. Vieux murs, lieux secs et arides, rochers arborés, mardelles des bois.

448) *P. reptans*. (*L. Sp.* 714) T. n° 734.

‡ Juillet-Août.

C. Bords des chemins herbeux, fossés, lieux un peu humides.

449) *P. alpestris*. (*Haller fils. a. Sering. méth.* 53.) *P. aurea*.

‡ Juin-Août. [T. n° 733bis.

D'après Wirtgen Prod (N° 433), la plante de Tinant serait la var. α *firma*, Koch, Syn. 240. (*P. sabauda* DC fl. Fr. 4. 438.)

R. Rochers le long de la Sûre près d'Echternach. T.

450) *P. Anserina*. (*L. Sp.* 810.) Selverblät . . . T. n° 731.

‡ Mai-Octobre.

C. Bords des chemins et des fossés.

451) *P. rupestris*. (*L. Sp.* 711) T. n° 736.

‡ Mai-Juillet.

R. Bois montueux, rochers schisteux sur la lisière des bois Château de Schuttbourg. T. Schnaufmühl en aval de Wiltz. Mardette du canal de la Toutschenmühle. (Wiltz.) DW.

452) ? *P. supina*. (*L. Sp.* 711.) *Comarum supinum*. Alfd.

‡ ou ① Juin-Octobre. [T. n° 732.

R. Bords vaseux des rivières, villages, par place. Gravier de la Moselle aux environs de Remich et de Schengen. T.

453) *P. argentea*. (*L. Sp.* 712) T. n° 735.

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux sablonneux, arides, vieux murs, etc.

454) † *P. recta*. (*L. Sp.* 711) EF. 118.

‡ Juin-Juillet.

Çà et là subspontané.

155. Tormentilla. (*L. Gen.* 637.) — Tormentille. — Tormentille.

455) *T. procumbens*. (*Sibth. oxon.* 162.) reptans. T. n° 740.

‡ Juin-Juillet.

AC. Bois frais, tourbières, pâturages humides, bords des fossés. AC. Ardennes.

R. ailleurs.

456) *T. silvestris*. (*Necker, délic. I.* 222.) erecta. T. n° 741.

‡ Mai-Août.

C. Bois, bruyères, prairies fraîches, pâturages.

Tribu III. — Roseæ. (*DC. Prod.* 2. 596.)

156. Rosa. (*L. Gen.* 631.) — Rose. — Rose. [XII, 2.]

Sect. I. — Chamærodon. (*Dmrt. Hulth.* p. 11.)

457) *R. pimpinellifolia*. (*Ser. in DC. Prod. II,* 608.) T. n° 747.

‡ Juin-Juillet. Fr. Août-Octobre.

R. Rochers, coteaux arides, taillis montueux. Côtes de la Sûre, Erpeldange, Bockholz, Esch s. S. T. Ruines de Bourscheid. K.

Var. *β. inermis*. (*DC. Fl. Fr. IV,* 439) T. n° 7476.

R. Côtes de la Sûre au-dessus d'Erpeldange et carrières d'Alscheid. T.

Sect. II. — Cassiorhodon. (*Dmrt. Hulth.* p. 11.)

458) † *R. cinnamomea*. (*L. Sp.* 703) T. n° 748.

‡ Mai-Juin. Fr. Août-Octobre.

Cultivé dans les jardins, subspontané dans les haies. Bellevue. T. Hesperange.

EF. Clausen. BB. † Pétrusse. EF. Sichenhof, etc. T. Weimershof. Kz.

Sect. III. — Erorhodon. (*Dmrt. Bul. BB. T. VI,* 1.)

459) † *R. gallica*. (*L. Sp.* 704) EF. 121.

‡ Juin. Fr. Septembre-Octobre.

Très-anciennement cultivé, Naturalisé dans les haies. Bellevue. Kz. Weimershof. BL. Eisembourg. EF.

460) † *R. centifolia*. (*L. Sp.* 704) T. n° 119.

‡ Juin.

Très-anciennement cultivé en grand nombre de variétés et souvent subspontané.

Var. *β. muscosa*.

Var. *γ. pomponica*.

Sect. IV. — *Cynorhodon*. (*Dmrt. Hulth. p. 11.*)A. *Spiniferæ*. (*Dmrt. l. c.*)§ 1. — *Tomentosæ*. (*Deség. Rev. p. 5.*)461) *R. pomifera*. (*Herrm. Diss. p. 17*) T. n° 753b.

‡ Mai-Juin. Fr. Septembre-Octobre.

R. Rochers aux environs de Luxembourg. Clausen. BB. Pétrusse. BL. ! Vallée de la Moselle. Gke.

462) *R. tomentosa*. (*Sm. fl. Brit. 539*). . . . T. n° 751.

‡ Juin. Fr. Août-Novembre.

C. Bords des chemins, haies, bois, etc.

Var. *β. cinerascens*. (*Dmtr. Prod. 98*) T. n° 753.

AC. Haies, bords des chemins. Tavion. Dm. ! Pétrusse. BL. ! etc. Rochers schisteux des côtes de la Sûre près d'Esch s. | S. T.

Var. *γ. subglobosa*. (*Sm. Engl. Fl. II, p. 384.*)

AR. avec l'espèce. Weimershof. Crépin. BB.

Var. *δ. cuspidatoides*. (*Crépin in litt.*)

Avec l'espèce. Pulvermühl. (Crépin.)

B. *Hamiferæ*. (*Dmtr. l. c.*)§ 2. — *Rubiginosæ*. (*Lindl. Ros. Monogr. 84.*)463) *R. lutea*. (*Mill. Dict. n° 11.*) *R. eglanteria*. . . T. n° 746.

‡ Mai-Juin.

R. Cultivé. Subspontané dans les haies. Doit être spontané dans la vallée de la Moselle. Wrtg.

464) *R. rubiginosa*. (*Lin. Mant. p. 564.*) Pettendferchen.

‡ Juin. Fr. Août-Octobre.

[T. n° 750.

C. Coteaux arides, lieux incultes, haies, bois. AR. Ardennes.

Var. *β. umbellata*. (*Leers. fl. Herb. p. 117*) . . . T. n° 750b.

Avec l'espèce.

Var. *γ. microphylla*. (*Wallr. Ros. Hist. 220*) . . T. n° 750c.

AR. Vallée latérale de la Krischelheid. Bourscheid. BL.

465) *R. micrantha*. (*Sm. Eng. Bot. 1. 2490.*)

‡ Juin. Fr. Septembre.

AR. Coteaux arides, lieux incultes, bois, vallée de la Moselle. Crépin *in litt.*§ 3. — *Caninæ*. (*Deség. l. c. p. 3.*)466) *R. tomentella*. (*Lem. Bull. philom. 1818. vol. 86. p. 364.*)

‡ Juin. Fr. Septembre.

C. Coteaux arides, taillis, haies des terrains calcaires.

- 467) *R. campestris*. (*Dmtr. Prod.* 1127) . . . *Dmtr. Prod.* 93.
 ‡ Juin. Fr. Septembre-Octobre.

AR. Buissons, haies, mardelles des bois.

- 468) *R. canina*. (*L. Sp.* 704.) Hondsrös. Spakeldaar. Spakelter.
 ‡ Juin. Fr. (Spackel) Août-Novembre. [T. n° 749.

C. Bois, haies, buissons, etc.

- Var. *β. luxemburgensis*. (*Crép. in litt.*) *R. rubrifolia*. T. n° 748.

R. avec l'espèce. Haies et bois au-dessus des forges de Dommeldange.

- Var. *γ. malmundariensis*. (*Lej. Fl. Sp. I, 231. II, 314.*)

AR. avec l'espèce. Haies sur la hauteur sous l'Eicherbusch vis-à-vis de Beggen.

BB. !

- Var. *δ. nitens*. (*Desv. in Mérat. fl. Par. éd. 1. 192.*) T. n° 749a.

AC. Avec l'espèce.

- Var. *ε. glaucescens*. (*Desv. l. c.*) T. n° 749b.

AC. Avec l'espèce.

- Var. *ς. dumetorum*. (*Thuil. Fl. par.* 250) T. n° 749c.

AC. Avec l'espèce.

- Var. *η. collina*. (*Lej. Fl. Spa. 1. p. 231*) T. n° 752.

Avec l'espèce en Ardennes.

Sect. V. — *Stylorhodon*. (*Dmtr. Hulth. p. 11.*)

- 469) *R. arvensis*. (*Huds. Fl. Angl. p. 192*) T. n° 743.

‡ Juin-Juillet. Fr. Octobre.

C. par place. Bois montueux, broussailles, lieux incultes, humides,

- Var. *β. repens*. (*Scop. Car. I, p. 355.*)

AR. Avec l'espèce.

- Var. *γ. bibracteata*. (*Bast. in DC. Fl. Fr. V, 537.*)

R. Avec l'espèce en Ardennes.

Tribu IV. — *Agrimoneæ*. (*C. et Germ. l. c. 207.*)

157. *Agrimonia*. (*L. Gen.* 607.) — Aigremoine. — Odermennig.

- 470) *A. Eupatoria*. (*L. Sp.* 643.) Lentès. T. n° 684.

‡ Juin-Septembre.

C. Lisière des bois, haies, bords des chemins, pâturages argileux. R. Ardennes.

- Var. *β. canescens*. (*Dmtr. Prod.* 1200) *Dmtr.* 1200.

‡ Juillet-Août.

R. Haies, taillis, coteaux boisés. Michel et T.

- Var. *γ. acutifolia*. (*Dmtr. Prod.* 1199) *Dmtr.* 1199.

‡ Juin-Juillet.

R. Ravins boisés, broussailles. T.

471) *A. odorata*. (*Mill. Dict. n° 7*) T. n° 685.

‡ Juin-Août.

R. Bois, buissons, endroits ombragés des Ardennes. Alscheid. K. entre Pleitrange et Syren. BL.

XXXVI. SANGUISORBEAE.

(Lindl. Syn. 102.) [IV, 1.]

158. Alchemilla. (*Tournf. Inst. 269*). — Alchemille. — Sinau.

472) *A. vulgaris*. (*L. Sp. 178.*) Dàmantel . . . T. n° 268.

‡ Mai-Juillet.

C. Bois, prairies, bords des champs, haies.

Var. β . *subsericea*. (*Koch, Syn. 256.*) *A. montana*. (*Wild. en. 170.*)
[Dmtr. 223.]

R. Prés montueux et pâturages des Ardennes. Dmtr.

473) *A. arvensis*. (*Scop. Carn. 1. 115.*) Brochkraut. Aphanes
arvensis T. n° 270.

① ou ② Mai-Octobre.

C. Moissons maigres, lieux cultivés.

159. Sanguisorba. (*L. Gen. 146.*) — Sanguisorbe. — Wiesenknop. [IV, 1.]

474) *S. officinalis*. (*L. Sp. 169.*) Rothkäpgen. Knepchen.

‡ Juin-Septembre. [T. n° 77.]

R. Prairies un peu humides en aval de Schengen, près d'Echternach. T (Brimmeyr père). Bech, Stolzembourg (Courtois). Quelquefois cultivé et alors échappé des jardins : au-dessus du château de Dommeldange. BL.

160. Poterium. (*L. Gen. 1064.*) — Pimpinelle. — Becherblume.

475) *P. dictyocarpum*. (*Sp. A. Sc. nat. 1846. p. 34.*) *P. sanguisorba*. (*L. Sp. 1411 ex parte*) T. n° 1374.

‡ Mai-Août.

C. Prés, lieux herbeux, bois, bords des chemins, etc. R. Ardennes.

Var. β . *glaucescens*. (*Richb. fl. exc. 610.*)

AC. Avec l'espèce.

476) † *P. muricatum*. (*Spach. l. c.*) Pimpernelle.

‡ Juin-Juillet.

AR. Cultivé, notamment dans les talus des chemins de fer et souvent subspontané entre Mamier et Cap. Kz. Kleeberg (Remerschen.) BB. !

XXXVII. POMACEAE.

(Juss. Gen. 334.) [XII, 2.]

161. Mespilus. (*L. Gen. 625.*) — Néflier. — Mispel.

477) *M. germanica*. (*L. Sp.* 684.) Aspern. Mespel. Hespel.

‡ Mai. Fr. (Hondsaa) Automne. [T. n° 716.

AC. Cultivé en plusieurs variétés, rarement subspontané. Spontané? dans les haies de Vianden. T. Föls — (Schengen.) Kz.

162. Crategus. (*L. Gen.* 622.) — Aubépine. — Weisdorn.

478) *C. Oxyacantha*. (*L. Sp.* 683.) Hoodaar. . . T. n° 713.

‡ Avril-Mai. Fr. (Millebierchen) Août-Septembre.

C. Haies, lisières et clairières des bois, coteaux secs. AR. Ardennes. Cultivé en plusieurs variétés, notamment à fleurs pourpres, pleines, à feuilles laciniées.

479) *C. monogyna*. (*Jacq. Fl. Aust. III*, 292) . . T. n° 713d.

‡ Mai-Juin. Fr. Août-Septembre.

AC. avec le précédent. Neudorf (Lechensberg). BL.!

480) † *C. Pyracantha*. (*Pers. syn. II*, 37.) Buisson-ardent.

‡ Mai. Fr. Automne-hiver.

C. Anciennement cultivé dans les jardins.

163. Cotoneaster. (*Medic. Lindl. trans. lin. soc.* 13. 101.)

481) *C. vulgaris*. (*Lindl. Eng. Bot.* 2713.) Millebitzen. Mespilus cotoneaster. (*L. Sp.* 136). . . T. n° 717.

‡ Avril-Mai. Fr. Septembre-Octobre.

AC. Rochers, coteaux calcaires : Würthlsberg (Clausen), Pétrusse, Pulvermühl. BL. ! Côtes de la Basse-Sûre. Echternach (Brimmeyr père), de la Moselle. BL.

164. Amelanchier. (*Mönch. meth.* 682.) — Amelanchier. — Felsenmispel.

482) *A. vulgaris*. (*Mönch. l. c.*) . . . T. n° 718.

‡ Avril-Mai.

R. Rochers de l'Eisch entre Reckingen et Marienthal. Rochers de la Sûre aux environs de Rosport. Echternach. T. Brimmeyr père. B. Krischelheid. Château de Vianden. (Courtois.)

165. Cydonia. (*Tournf. Inst.* 403.) — Coignassier. — Quittenbaum.

483) † *C. vulgaris*. (*Pers. syn. pl. II*, 403.) Quidebâm. EF. 124.

‡ Avril-Mai. Fr. (Quidebier) Septembre-Octobre.

C. Cultivé pour ses fruits. R. Subspontané dans les haies.

484) † *C. japonica*. (*Pers. l. c.*) Poirier du Japon.

‡ Mars-Juin.

Très-anciennement et généralement cultivé pour sa floraison précoce.

166. Pirus. (*Tournf. Inst.* 406.) — Poirier. — Birnbaum.

485) *P. communis*. (*L. Sp.* 686.) Birebâm . . . T. n° 722.

‡ Avril-Mai. Fr. (Wel Bier) Septembre-Octobre.

AC. par place. Bois montueux, manque sur de grands espaces, notamment en Ardennes.

Var. *β. tomentosa*. (*Koch, Sys. Fl. G.* 269.)

Avec l'espèce.

Var. *γ. sativa*. (*DC. Prod.* 2. 634) . . . T. n° 723.

Cultivé en nombreuses variétés pour ses fruits.

† Achras. (*Wallr. Sched.* 213.) Bezy.

† † rufescens. (*Pers.*) Rousselet.

† † † Bergamotia. (*Ruellius.*) Marmotebier. Bergamotte.

† † † † Falerna. (*Plinius.*) Beurré.

167. Malus. (*Tournf. Inst.* 406.) — Pommier. — Apfelbaum.

486) *M. acerba*. (*Mérat. fl. Par.* 187.) Eppelbâm. T. n° 720.

‡ Mai. Fr. (Holzâpel) Avril-Octobre.

AC. par place. Bois montueux, haies.

487) † *M. communis*. (*Poir. Dict.* 5. t. 560) . . . T. n° 719.

‡ Avril-Mai. Fr. Août-Septembre.

AC. par place. Bois champs. Cultivé en nombreuses variétés.

† pardisiaca. (*Lin.*) Paradis.

† † mitis. (*Wall.*) Doucin.

Cultivé comme sauvageon.

† † † Costata. (*Schübler et Mertens. Fl. W.* 191.) Calville.

† † † † Megamilla. (*S. et M. l. c.*) Rambour.

† † † † † Platymela. (*M. l. c.*) Court-pendu.

† † † † † Prasomilla. (*Pers.*) Reinette.

Var. *β. dasyphylla*. (*Borkh. in. Prod. Fl. Rl.* 460.)

R. Rochers de la Moselle.

Var. *γ. luciliburgiensis*. (*Lucas H. der Pom. I.* 49.) Weiden-âpel. Reinette des vergers.

‡ Mai.

Variété à rameaux pendants, cultivée et se reproduisant de graines.

488) † *M. baccata*. (*L.*) Russeschen Apfel.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre.

Cultivé dans les parcs pour la beauté de ses fruits.

168. Sorbus. (*L. Gen.* 633.) — Sorbier. — Eberesche.

489) *S. domestica*. (*L. Sp.* 684.) Speerebâm. . . T. n° 715.

‡ Mai-Juin. Fr. (Speer.) Septembre-Octobre.

AR. Bois des terrains calcaires. Stadtbredimus. Kz. Rosport. T. Stegen. K. Quelquefois cultivé: Bricherhof, (Stadtbredimus), sujet de 3^m10 de tour. Canach, Trintange, Glabach, Weyderterhof (Larochette.) Bentzert (Mersch.) etc.

490) *S. aucuparia*. (L. Sp. 683.) Bentzelter. Vullekîschbàm.

‡ Mai-Juin. Fr. (Vullekîschten.) Août-Septembre. [T. n° 714.
C. Bois montueux, rochers, terrains arides.

491) *S. torminalis*. (Crantz. Aust. 85.) Ellrecher. Wele Speere-
bàm T. n° 711.

‡ Mai. Fr. Septembre-Octobre.

AC. par place. Dans les bois de la Moselle et des terrains calcaires. R. ailleurs.

492) *S. Aria*. (Crantz. Aust. 2. 2.) Hartholz. Schwerholz
Arlesbàm T. n° 712.

‡ Mai. Fr. (Welspeeren.) Avril-Septembre.

AC. Bois montueux, rochers de la Moselle. R. ailleurs.

XXXVII. PHILADELPHAE.

(Don. in James Journ 1825. 133.)

169. Philadelphus. (L. Gen. 614.) — Séringat. — Pfeiffen-
strauch. [XII, 2.] EF. 125.

493) † *P. coronarius*. (L. Sp. 671.) Wele Jasmeng. Welen
Orangebàm T. n° 701.

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé. Quelquefois subspontané dans les haies, Bellevue, Bisserweg. K. !
Dudelage (Courtois).

XXXIX. CALYCANTHEAE.

170. Calycanthus. (Lindl. Bot. mag. 503.) Calycanthe. Ge-
wüurzstrauch.

494) † *C. floridus*. (Ldl. l. c.) Pompadour.

‡ Juin-Août.

C. Cultivé pour ses fleurs odorantes.

XL. ONAGRARIEAE.

(Juss. in Annal. mus. III. 315 ex parte.)

171. Epilobium. (L. Gen. 471.) Epilobe. Weidenröschen. [VIII, 1.]

Sect. I. — Chamænerion. (Tauch. in DC. Prod. 3. 40.)

495) *E. angustifolium*. (L. Sp. 493.) Feierkraut. *E. spicatum*.
‡ Juin-Août. [T. n° 571.

C. Bois montueux, buissons, haies, bords des eaux.

Sect. II. — *Lysimachion*. (*Tausch. Prod.* 3. 41.)A. *Turinifera*.496) *E. hirsutum*. (*L. Sp.* 494) T. n° 572.

24 Juin-Août.

AC. Bords des eaux, endroits humides, fossés. R. Ardennes.

B. *Stolonifera*.497) *E. parviflorum*. (*Schreb. spic. fl. lips.* 146.) *E. pubescens* et molle T. n° 574.

24 Juin-Septembre.

C. Lieux humides, fossés, haies. R. Ardennes.

Var. β . *intermedium*. (*Mérat. Fl. Par.* 147.)

R. Bois humides, à droite de Stegen. K.

498) *E. lanceolatum*. (*Sebast. et Maur. Fl. rom. Prod.* p. 1. 387.

1. f. 2) BB. 401.

24 Juin-Juillet.

R. Rochers, bords des chemins entre Machthum et Ahn. BB. !

499) *E. montanum*. (*L. Sp.* 494) T. n° 580.

24 Juin-Août.

C. Bois, buissons, rochers, murs.

Var. β . *nutans*. (*Lej. rev. Fl. de Spa.* 76) T. n° 581.

24 Juin-Juillet.

R. Marais. Avec l'espèce en Ardennes.

500) *E. roseum*. (*Schreb. spic. fl. lips.* 147) T. n° 578.

24 Juin-Septembre.

AC. Lieux humides, bords des fossés et des eaux.

C. *Flagellifera*.501) *E. tetragonum*. (*L. Sp.* 494) T. n° 577.

24 Juin-Août.

AR. Lieux humides, bords des fossés, des sources, etc. Au-dessus des forges de Dommeldange. T. Vallée entre Krichelheid et Friedbüsch. (Courtois.)

502) *E. obscurum*. (*Schreb. spic. fl. lips.* 147) T. n° 579.

24 Juillet-Septembre.

R. Bois ombragés, haies des terrains marécageux; au-dessus des forges de Dommeldange. T. Plus commun en Ardennes

503) *E. palustre*. (*L. Sp.* 405) T. n° 575.

24 Juin-Septembre.

AC. Marais, lieux humides, tourbeux. C. Ardennes.

Var. β . *decumbens*. (DC. *Pr.* 1075). T. n° 576.
 4 Juin-Juillet.

R. Marais spongieux aux environs de Rambrouch. T.

172. *Oenothera*. (*L. Gen.* 469.) — Onagre. — Nachtkerze.

504) *O. biennis*. (*L. Sp.* 492) T. n° 582.

② Juin-Septembre.

AC. par place. Lieux cultivés, bois ombragés, etc.

173. *Isnardia*. (*L. Gen.* 456.) [IV. 1.]

505) *I. palustris*. (*L. Sp.* 175) T. n° 269.

4 Juillet-Août.

R. Lieux inondés, fossés, mares : entre Rambrouch et Folschette. T.

XL. CIRCEACEAE.

(Lindl. *Syn. Brit. fl. ed.* 2. 109.)

174. *Circaea*. (*Tournef. Inst.* 155.) [II. 1.]

506) *C. lutetiana*. (*L. Sp.* 121) T. n° 34.

4 Juin-Août.

C. Bois ombragés et humides. R. Ardennes.

507) *C. intermedia*. (*Ehrh. Beit.* IV. 42) T. n° 35.

4 Juillet-Août.

R. Bois montueux, ombragés, humides : Rodenbüsch (Kopstal.) Grünenwald.
 T. Kirschelheid. Md.

508) ? *C. alpina*. (*L. Sp.* 121). T. n° 36.

4 Juin-Juillet.

R. Bois humides aux environs de Rambrouch et de Folschette. T. Kirschelheid. Md.

XLII. HALORAGAEAE.

(R. Br. *Gen. rem.* 17.)

175. *Myriophyllum*. (*Vaill. in Act. acad.* 1719. 3.) Myriophile.
 Tausendblatt. [XXI. 5.]

509) *M. verticillatum*. (*L. Sp.* 1410.) Wässergräs. T. n° 1372.

4 Juin-Septembre.

AR. Fossés, rivières, étangs, marais. Basse-Sûre, Kz. Moselle. T.

Var. β . *intermedium*. (*Koch. Syn. Fl. Ger.* 244.)

Var. γ . *pectinata*. (*Wall. Sched.* 419. DC. *Fl. Fr.* 5. 529.)

Avec l'espèce.

510) *M. spicatum*. (*L. Sp.* 1410) T. n° 1371.

4 Juin-Août.

AR. Rivières, étangs, fossés. C. dans la Sûre et la Moselle. T.

511) *M. alternifolium*. (DC. *Fl. Fr. sup.* 529.)

24 Juin-Août.

R. Dans les eaux stagnantes et claires des Ardennes.

XLIII. UMBELLIFEREAE.

(Juss. *Gen.* 218.) [V, 2.]

DIVISION I. — ORTHOSPERMEÆ.

Tribu I. — *Hydrocotyleæ*. (Spreng. in Schreb. *syst. veg.* 6. XXXII.)

176. Hydrocotyle. (Tournf. *Inst.* 173.) — Hydrocotyle. — Wassernabel.

512) *H. vulgaris*. (L. *Sp.* 338) T. n° 489.

R. Prés marécageux, bords des étangs, des bois humides et des chemins, fossés, tourbières. C. Ardennes.

Tribu II. — *Saniculeæ*. (Koch. *Umb.* 138.)

177. Sanicula. (Tournf. *Inst.* 173.) — Sanicle. — Sanikel.

513) *S. europæa*. (L. *Sp.* 339.) Sauneckel . . . T. n° 487.

24 Mai-Juin. Fr. Juillet-Août.

AC. par place. Bois humides, lieux herbeux, couverts.

178. Astrantia. (L. *Gen.* 327.) — Astrantie. — Strenze.

514) † *A. major*. (L. *Sp.* 330.)

24 Mai-Juin.

C. Cultivé et quelquefois subspontané.

179. Eryngium. (Tournf. *Inst.* 173.) — Panicault. — Männertreu.

515) *E. campestre*. (L. *Sp.* 337.) Brochdeschtel. Ellend.

24 Juillet-Septembre. [T. n° 488.

C. Bords des chemins, lieux incultes, coteaux arides de la Moselle. R. ailleurs.

Tribu III. — *Cicuteæ*. (Koch, *l. c.*)

Sous-tribu I. — *Amminææ*. (Koch, *l. c.* 114.)

180. Bupleurum. (Tournf. *Inst.* 163.) Buplèvre. Tauröschchen.

516) *B. rotundifolium*. (L. *Sp.* 340.) Durchkraut. T. n° 484.

① Juin-Août.

AR. Champs, moissons des terrains calcaires et sablonneux. Herrenberg (Diekirch.) K. Helmsange. BL. ! AC. Moselle.

517) *B. falcatum*. (L. *Sp.* 341) T. n° 485.

24 Juillet-Septembre.

AC. Rochers, coteaux pierreux, vignes, bords des chemins, clairières des bois.

181. Falcaria. (*Host. Fl. Aust.* 1. 381.) Falcaire. Sichelmöhre.

518) *F. vulgaris.* (*Bernh.* 1800.) *Falcaria Rivini.* (*Host.*) *Sium falcaria.* (*L.*). T. n° 453.

① Juillet-Septembre.

C. Champs, bords des chemins. Echternach (Brimmeyr père.) Rosport. T. Moselle : entre Grevenmacher et Elnen. T. BB. Wecker. Mertert. R. BB.

182. Aegopodium. (*L. Gen.* 368.) — Egopode. — Ziegenfuss.

519) *A. Podagraria.* (*L. Sp.* 379.) Giersch. Dreiföss. T. n° 428.

4 Juin-Août.

C. Haies, bois, prairies ombragées. R. Ardennes.

183. Carum. (*L. Gen.* 365.) — Carum. — Kümmel.

520) *C. Bulbocastanum.* (*Koch. Umb.* 121.) Erdknüdd. Bunium.

4 Juin-Juillet. [T. n° 466.

C. Clairières des bois sablonneux, champs et moissons maigres.

521) *C. Carvi.* (*L. Sp.* 378.) Wiesegemelchen. Seseli Carvi.

② Mai-Juin. [T. n° 434.

C. Prairies, pelouses, surtout en Ardennes.

184. Petroselinum. (*Hoff. Umb.* 1. 78. t. 1. f. 7.) — Persil.
— Petersilie.

522) † *P. sativum.* (*H. l. c.*) Pëtersëleg . . . T. n° 480.

② Juin-Août.

C. Cultivé et quelquefois subspontané dans le voisinage des jardins.

185. Apium. (*L. Gen.* 367 *excl. species.*) — Celeri. — Sellerie.

523) † *A. graveolens.* (*L. Sp.* 379.) Zellerë. . . T. n° 479.

② Juillet-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois échappé des jardins.

186. Helosciadium. (*Koch, Umb. p.* 125.) — Helosciade. —
Scheiberich.

524) *H. nodiflorum.* (*Koch, Umb.* 126.) *Sium nodiflorum.*

4 Juin-Juillet. [T. n° 451.

AC. Buissons, mares, fossés, étangs.

525) *H. inundatum.* (*Koch, Umb.* 125.) *Sium inundatum.*

4 Juin-Juillet. [T. n° 454.

Mares, étangs, fossés. AC. Bords de la Moselle entre Remich et Wintrange.

187. Sium. (*L. Gen.* 348 *ex parte.*) — Berle. — Merk.

526) *S. latifolium.* (*L. Sp.* 351). T. n° 449.

4 Juillet-Septembre.

R. Manque sur de larges espaces. Bords des eaux, fossés, près marécageux de la plaine, sur la Moselle et en Ardennes. Echternach (Brimmeyr père.)

527) *S. angustifolium*. (*L. Sp.* 1672) T. n° 450.

4 Juillet-Septembre.

AC. Bords des eaux, fossés, fontaines, etc. Paraît manquer en Ardennes.

188. Pimpinella. (*L. Gen.* 366.) — Boucage. — Biebernelle.

528) *P. magna*. (*L. Mant.* 219) T. n° 430.

4 Juin-Septembre.

C. Bois, prairies, lieux herbeux. R. Ardennes.

529) *P. Saxifraga*. (*L. Sp.* 378). T. n° 429.

4 Juillet-Septembre.

C. Coteaux arides, bords des chemins, prairies, bois.

Var. β . *dissectifolia*. (*Wallr. Sched.* 123) T. n° 431.

Près secs. Avec l'espèce.

Var. γ . *poterriifolia*. (*Wallr. Sched.* 123.)

Avec l'espèce. Schönert (Bourglinster) Kz.

530) † *P. Anisum*. (*L. Sp.* 379.) Aneis.

① Juillet-Août.

Quelquefois cultivé et spontané dans le voisinage des cultures.

Sous-tribu II. — *Sesellinae*. (*Koch, Umb.* 102.)

189. Acthusa. (*L. Gen.* 351 *ex parte*.) — Êthuse. — Gleise.

531) *A. Cynapium*. (*L. Sp.* 367). T. n° 442.

① Juillet-Octobre.

C. Lieux cultivés, frais, bords des chemins, bois.

190. Oenanthe. (*L. Gen.* 352.) — Oenanthe. — Rebendolde.

532) *O. fistulosa*. (*L. Sp.* 365) T. n° 445.

4 Juin-Juillet.

AC. Fossés, ruisseaux, mares : Filsdorf, Hunsdorff, Mersch, etc. T.

533) *O. peucedanifolia*. (*Pollich. Pal. I.* 289. *t.* 2.) T. n° 446.

4 Mai-Juillet.

AC. Prairies fraîches et marécageuses. Moselle, C. Erpeldange. Rambrouch. T.

534) *O. Phellandrium*. (*Lamk. fl. Fr. III.* 432) . . . T. n° 444.

① ou 4 Juillet-Septembre.

AR. Mares, fossés, étangs, lieux marécageux.

191. Libanotis. (*Crantz. Aust.* 222.) — Libanotide. — Heilwurz.

535) *L. montana*. (*Allion. ped.* 2. p. 30. t. 62.) *Athamanta libanotis* T. n° 460.

② ou 4 Juillet-Septembre.

AR. Coteaux arides, bois montueux, rive gauche du ruisseau entre Wiltz et Toutschenmühle. DW. Côtes de la Sûre entre Michelau et Erpeldange. T. Krischeheid. Ruines de l'ancien château de Stolzenbourg. T. Md.

192. Seseli. (*L. Gen.* 360.) — *Seseli*. — *Sesel*.

536) *S. annuum*. (*L. Sp.* 373) T. n° 432.

① ou 4 Juillet-Août.

R. Collines sèches, bois montueux. Pulvermühl. T. BL. BB. !

537) *S. montanum*. (*L. Sp.* 372) T. n° 433.

4 Juillet-Août.

R. Coteaux arides, bois secs des terrains calcaires. Pulvermühl. T. Dudelage. EF.

193. Fœniculum. (*Adans. Fam.* II. 101.) — Fenouil. — Fenchel.

538) † *F. officinale*. (*All. ped.* 2. 25.) Fenchel.

② ou 4 Juillet-Septembre.

Quelquefois cultivé comme condiment et çà et là naturalisé.

194. Meum. (*Tournf. Inst.* 165.) — Meon. — Bärwurz.

539) *M. athamanticum*. (*Jacques. Aust.* II. p. 2. 303.) *Ligusticum meum* T. n° 457.

4 Mai-Juillet.

AC. Prairies fraîches et pâturages humides aux environs de Rambrouch et de Neunhausen. T. — C. Hoffelt. ! Hachiville. !

195. Silaus. (*Besser ap. Rœm. et Schult. Sys.* VI. 36.) *Silaus*. *Silau*.

540) *S. pratensis*. (*Bess. l. c.*) T. n° 481.

4 Juillet-Septembre.

C. Prairies fraîches, lieux humides.

Tribu IV. — *Sileneæ*. (*DC. Prod.* 4. 180.)

Sous-tribu I. — *Angelliceæ*. (*Koch, Umb.* 98.)

196. Levisticum. (*Koch, Umb.* p. 101. f. 141.) — Livèche. — Liebstöckel.

541) † *L. officinale*. (*Koch. l. c.*) Lëfstack. Lëwfraawesch.

Ligusticum levisticum T. n° 456.

4 Juin-Juillet.

Cultivé surtout en Ardennes ; çà et là subspontané, aux environs d'Esch s/S. C. Cimetière de Dudelage. Kz.

197. *Selinum*. (*Hoff. Umb. 1. 150.*) — Selin. — Silge.

542) *S. carvifolia*. (*L. Sp. 350*) T. n° 464.

① ou ② Juillet-Septembre.

AC. Bois, prairies humides. Moselle. Wgt. Bois de Remerschen. BB.

198. *Angelica*. (*L. Gen. 347 ex parte.*) Angelique. Brustwurz.

543) *A. silvestris*. (*L. Sp. 361.*) *Imperatoria silvestris*. T. n° 435.

① ou ② Juillet-Septembre.

C. Prairies, lieux ombragés, bords des eaux.

199. *Archangelica*. (*Hoff. Umb. 1. p. 168.*) — Archangelique. — Engelwurz.

544) † *A. officinalis*. (*H. l. c.*) T. n° 455.

② Juillet-Août.

Cultivé çà et là et quelquefois subspontané autour des lieux habités. Vieux château d'Ansembourg, DW. !

Sous-tribu II. — *Peucedanaceae*. (*DC. Prod. 4. 170.*)

200. *Peucedanum*. (*Koch. Umb. 92.*) — Peucedan. — Haarstrang.

545) *P. Chabræi*. (*Rehb. ap. Mont. hand. ed. 2.*) *Carvifolium*.

‡ Juin-Septembre. [T. n° 464.

AC. Clairières des bois, pelouses, prairies du calcaire coquillier entre Wasserbillig et Wecker. R. Remich, Remerschen, Wellenstein. A. EF. Kz. Schengen. BB.

546) *P. Cervaria*. (*Lap. Abr. 149.*) *Sium Cervaria*. T. n° 461.

‡ Juillet-Septembre.

R. Coteaux calcaires le long des bois, clairières. Grevenmacher, T. Wecker, Mertert, Luxembourg. R. Herborn. Ilse. Wellenstein. A. Kz. EF. Wintrange, Remerschen, Schengen, Machthum. BB.

547) *P. palustre*. (*Mönch. meth. 82.*) *Selinum palustre*. T. n° 462.

‡ Juillet-Août.

B. Bois tourbeux. Berbourg. Beyerholz. T.

548) *P. Oreoselinum*. (*Mönch. meth. 82.*) E. Math. Fl. B. 595.

‡ Juillet-Août.

R. Coteaux boisés, prés secs et montueux. L. et C. 522.

201. *Anethum*. (*Tournf. Inst. 169.*) — Aneth. — Dill.

549) † *A. graveolens*. (*L. Sp. 377.*) Dell. Cornichonskraut.

① Juillet-Août. [T. n° 482.

C. Cultivé et très-souvent subspontané aux environs des lieux habités.

202. *Pastinaca*. (*Tournf. Inst. t. 170.*) — Panais. — Pastinack.

550) *P. silvestris*. (*Mill. Dic. 1.*) Petener . . . T. n° 483.

② Juillet-Août.

AC. Moissons, prairies, décombres des terres fortes et calcaires. Canach, entre Esch-sur-l'Alzette et Mondereange, Cap et Bettingen. Kz. etc.

551) † *P. sativa*. (*L. Sp.* 376.)

② Juillet-Septembre.

Cultivé pour ses racines pyriformes ou rondes et pour ses feuilles.

203. Heracleum. (*L. Gen.* 345.) — Berse. — Bärenklau.

552) *H. Spondylium*. (*L. Sp.* 358.) Tüten . . . T. n° 459.

② Juin-Septembre.

C. Prés, lieux herbeux, bois.

Var. *β. elegans*. (*Jacq. Aust. 1. t.* 174.)

B. Avec l'espèce. Kiém (Grünwald). EF.

Var. *γ. sibiricum*. (*L. Sp.* 358.)

AC. Cultivé comme fourrage et plante d'ornement.

204. Tordylium. (*Tournf. Inst.* 170.) — Tordyle. — Zirmet.

553) *T. maximum*. (*L. Sp.* 345) T. n° 478.

① Juin-Août.

R. Le long des haies, lieux incultes. Diekirch. K.

Tribu V. — Laserpiticæ. (*DC. Prod. l. c.*)

Sous-tribu I. — Thapsiaceæ. (*Koch, Umb.* 73.)

205. Laserpitium. (*L. Gen.* 344.) — Laser. — Lauskraut.

554) *L. latifolium*. (*L. Sp.* 356). T. n° 458.

4 Juin-Août.

R. Rochers, broussailles. Pulvermühl, Wurthsberg, Clausen. T. Md.!

Sous-tribu II. — Daucineæ. (*Koch, Umb.* 76.)

206. Daucus. (*Tournf. Inst.* 161.) — Carotte. — Möhre.

555) *D. Carota*. (*L. Sp.* 348.) Wurzel. Muhrt . . . T. n° 468.

② Juin-Octobre.

C. Lieux cultivés, incultes, prairies, bords des chemins, lisières et clairières des bois. AR. Ardennes.

Var. *β. sativa*. (*DC. Prod. t. 4. p.* 211.)

Cultivé en plusieurs variétés.

207. Orlaya. (*Hoff. Umb.* 1. 58.) — Orlaya. — Breitsame.

556) *O. grandiflora*. (*H. l. c.*) Ackerlaus. Caucalis. T. n° 469.

① Juin-Août.

AC. Moissons, lieux cultivés de la Sûre. Echternach. Sch. (Brimmeyr père), de la Moselle. T. Vallée de la Syr: Mertel. R. BB. Rodt, Niederauven. Entre Tuntingen et Sæul. Kz. Kahlsehuer (Kopstal.) T.

DIVISION II. — **CAMPYLOSPERMEÆ.**Tribu I. — **Caucalineæ.** (*Koch, Sys. p. 343.*) [*Juss. l. c.*]**208. *Turgenia.*** (*Hoff. Umb. 59.*) — Turgénie. — Zwiesel.557) *T. latifolia.* (*Hoff. Umb. l. c.*) *Caucalis latifolia.* T. n° 470.

① Juin-Juillet.

AC. Moissons, lieux cultivés des terrains argileux. Echternach (Brimmeyr père.) Vallée de la Syr. R. Bous, Remich, Remerschen. BB. !

209. *Caucalis.* (*L. Gen. 334 ex parte.*) — *Caucalide.* — *Haftdolde.*558) *C. daucoïdes.* (*L. Mant. 351*) T. n° 471.

① Mai-Juillet.

AC. Moissons, lieux cultivés, le long des chemins.

559) ? *C. Leptophylla.* (*L. Sp. 347.*) *C. parviflora.* T. n° 472.

① Juin-Juillet.

Moissons : Remich, Blaschette, Kahlscheuer. T. — Cette espèce de l'Istrie est également indiquée par Koch (syn. 344) comme existant dans le pays.

210. *Torilis.* (*Adans. Fam. II. 99.*) — *Torilide.* — *Klettenkerbel.*560) *F. Anthriscus.* (*Gml. Fl. Bad. 1. 613.*) *Caucalis Anthriscus.*

② Juin-Septembre.

[T. n° 474.

C. Lieux incultes, lisières des bois, haies, buissons, bords des fossés et des chemins.

561) *T. infesta.* (*Duby. Bot. Gall. I. 217.*) *Caucalis arvensis.*

② Juillet-Septembre.

[T. n° 473.

AC. manque par place. Lieux cultivés, moissons.

562) ? *T. nodosa.* (*Gärt. Fruct. 1. 62. t. 20. f. 6.*) *Caucalis nodiflora.* T. n° 473.

① Mai-Août.

Introduit avec de la graine étrangère et très-fugace.

Tribu VI. — **Scandiciuæ.** (*Koch, Umb. 130.*)**211. *Anthriscus.*** (*Hoff. Umb. I. 38.*) — *Anthrisque.* — *Kerbel.*563) † *A. Cerefolium.* (*Hoff. Umb. 41.*) *Kiërwel.* T. n° 437.

① Mai-Août.

Condiment généralement cultivé et naturalisé dans le voisinage des habitations.

564) *A. silvestris.* (*Hoff. Umb. 40.*) T. n° 436.

4 Mai-Juin.

C. Haies, bois, prairies.

212. *Cherophyllum.* (*L. Gen. 358.*) — *Cerfeuil.* — *Kälberkropf.*

565) *C. temulum*. (*L. Sp.* 370.) Scharlach . . . T. n° 439.

② Juin-Juillet.

C. Haies, buissons, lisières des bois, lieux incultes, secs, décombres, etc.

566) † *Ch. bulbosum*. (*L. Sp.* 370.)

② Juillet-Août.

AR. Bois, haies humides et bords des eaux ombragés.

567) *Ch. hirsutum*. (*L. Sp.* 371). T. n° 438.

‡ Juillet-Août.

AR. Bords des cours d'eaux sous bois des Ardennes. C. Stolzenbourg. K.

213. Myrrhis. (*Scop. Carn. p.* 207.) — Myrrhide. — Süssdolde.

568) † *M. odorata*. (*Scop. l. c.*) Aneis-Kîrvel.

‡ Juin-Août.

Cultivé et parfois échappé des jardins. (T. mept. Prod.)

214. Scandix. (*Gærtner. Fruct. II.* 33.) Scandix. Nadelkerbel.

569) *P. Pecten-Veneris*. (*L. Sp.* 368) T. n° 440.

① ou ② Mai-Juin.

C. Moissons, lieux cultivés, surtout dans les terres argileuses. R. Ardennes.

Tribu VII. — *Smyrneæ*. (*Koch, Umb.* 133.)

215. Conium. (*L. Gen.* 336.) — Ciguë. — Schierling.

570) *C. maculatum*. (*L. Sp.* 469.) Schierling. Bonzenkraut.

Cicuta major T. n° 465.

② Juin-Août.

C. mais manque dans diverses cantons, notamment les vallées de l'Attert, de l'Eisch, etc. Décombres, bords des chemins, voisinages des habitations. Ruines des vieux châteaux, surtout de l'Ardenne où la tige atteint 2 et 3 mètres de hauteur et sert à faire des cannes de lignes.

DIVISION III. — **CELOSPERMA.** (*Juss. l. c.*)

Tribu I. — *Coriandreæ*. (*Koch, Umb.* 22.)

216. Coriandrum. (*L. Gen.* 350 *ex parte.*) Coriandre. Koriander.

571) *C. sativum*. (*L. Sp.* 367). EF. 136c.

① Juin-Juillet.

Cultivé çà et là et quelquefois subspontané.

XLIV. HEDERACEÆ.

(Ach. Rich. Bot. Med. éd. 3. 552.)

217. Hedera. (*Tournef. Inst.* 384.) — Lierre. — Epheu. [V, 1.]

572) *H. Helix*. (*L. Sp.* 292.) Wantergréng . . . T. n° 389.

‡ Septembre-Octobre. Fr. (Jerschen) hiver.

C. Tronc des arbres, rochers, vieux murs, etc.

Var. β . humi-repens. (*Lej. fl. Spa.* 1, 122.)

C. Bois ombragés.

218. Cornus. (*Tourn. Inst.* 410.) Cornouiller. Hartriegel. [IV, 1.]

573) *C. sanguinea.* (*L. Sp.* 771.) Røde Faulbâm. Hartruth.

Lenneblut T. n° 267.

‡ Mai-Juin. Fr. Septembre-Octobre.

C. Haies, taillis, bois de l'oolite ferrugineuse.

574) *C. mas.* (*L. Sp.* 171.) Kêrel T. n° 266.

‡ Mars-Avril. Fr. Septembre-Octobre.

C. Bois calcaireux, montueux; frontière française, Moselle et Basse-Sûre, Syr.

XLV. LORANTHACEAE.

(Juss. et Rich. in *An. Mus.* XII. 292.) [XXII, 4.]

219. Viscum. (*Tournf. Inst.* 380.) — Gui. — Mistel.

575) *V. album.* (*L. Sp.* 1651.) Mestel T. n° 1408.

‡ Mars-Avril. Fr. Août-Novembre.

AC. Parasite sur les vieux arbres: peupliers, poiriers, pommiers, etc.

XLVI. GROSSULARIEAE.

(DC. fl. Fr. IV. 40.)

220. Ribes. (*L. Gen.* 281.) — Grosseiller. — Stachelbeere. —
Johannisbeere. [V, 1.]

576) *R. Grossularia.* (*L. Sp.* 291.) Krêschel. R. *Uva crispa.*

‡ Mars-Avril. Fr. Juin-Juillet. [T. n° 388.

C. Lieux incultes, rochers, murs, décombres, etc.

Var. β . *Uva crispa.* (*L. Sp.* 291) à fruits poilus.

Var. γ . *reclinatum.* (*L. Sp.* 291) à fruits glabres.

Avec l'espèce.

577) *R. rubrum.* (*L. Sp.* 290.) Gehanskrêschel. Rôdkrêschel.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Août. [T. n° 385.

AR. Bois, bords des eaux. Mandelbach. ! C. cultivé en plusieurs variétés.

578) *R. alpinum.* (*L. Sp.* 291) T. n° 386.

‡ Avril-Mai. Fr. Juillet-Août.

AC. Manque sur de grands espaces. Rochers, bois montueux. Altmünster, EF. ! Bock (Clausen.) Kz. Pulvermühl. BB. Echternach (Brimmeyr père.) Fels Schengen. A. EF. Kz. etc. Cette dernière station prouve qu'il appartient à notre Flore.

Var. α . sterile. (Wallr. Sched. crit. 109.)

Var. β . bacciferum. (Wallr. Sched. crit. 109.)

579) † R. nigrum. (L. Sp. 291.) Schwarzkreschel. T. n° 387.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Août.

C. Cultivé et quelquefois subspontané dans les haies : Miés. (Mersch.) Kz.

XLVII. SAXIFRAGEAE.

(Vent. tabl. 3. 277.)

221. Saxifraga. (L. Gen. 223.) Saxifrage. Steinbrech. [X, 2.]

580) S. tridactylites. (L. Sp. 578) T. n° 623.

① Mars-Mai.

C. Lieux secs, arides, bords des chemins, vieux murs, toits de chaume.

581) S. granulata. (L. Sp. 576) T. n° 622.

‡ Mai-Juin.

C. Prés, bois et haies. AR. Ardennes.

582) S. caespitosa. (L. Sp. 578.) ¹⁾ Dmtr. P. 995.

‡ Avril-Mai.

R. Fissures des rochers de l'Ardenne. (DC.)

Var. β . S. sponhemica. (Gmel. Fl. Bad. 2. 220. t. 9.) T. n° 624.

‡ Mai-Juin.

C. Rochers schisteux des côtes de la Sûre et de l'Our. Vieux murs, toits de chaume. Vianden. T. BL. !

Var. γ . condensata. (Gmel. Fl. Bad. 2. 226.) Confusa. — R. Sp. 89.

R. avec l'espèce. Rochers de l'Our et de la Sûre.

Var. δ . uniflora. (Sternberg rev. p. 13 t. 9.)

R. avec condensata.

583) ? S. hypnoides. (L. Sp. 579) Wrtg. F. R. 492.

‡ Juin.

B. Rochers schisteux des côtes de l'Our et près Vianden, de la Sûre près Diekirch. Wrtg. Koch fide Lejeune.

222. Chrysosplenium. (L. Gen. 558.) — Dorine. — Milzkraut. [XIII, 2.]

584) Ch. alternifolium. (L. Sp. 568.) Schmalzkraut. T. n° 620.

‡ Avril-Juin.

AC. par place. Lieux frais, humides, marécageux, haies, bois.

1) Ces variétés sont, paraît-il, dûes à la nature du sol, et à l'exposition S. caespitosa et sponhemica se trouvent sur les rochers ombragés à l'exposition Nord. En plein soleil, la plante reste plus trappue, les tiges stériles forment les rosettes bien fournies de S. condensata. (Grœnlandica. L. ?)

585) *Ch. oppositifolium*. (*L. Sp.* 569) T. n° 621.

‡ Avril-Juin.

AR. Ruisseaux, fontaines, rochers humides. Au-dessus de la Neumühl (Mandelbach). Kz. Bouren au-dessus de Dommeldange. BL.!

SUBDIVISION II. — Gamopétales ou Monopétales.

CLASSE I. — Gamopétales hypogynés.

XLVIII. ERICINEAE.

(Desv. Journ. bot. 1813, p. 28.)

223. Erica. (*L. Gen.* 192.) — Bruyère. — Glockenheide. [VIII, 1.]

586) *E. Tetralix*. (*L. Sp.* 502) T. n° 588.

‡ Juin-Septembre.

C. par place dans les bruyères humides et tourbeuses des Ardennes.

224. Calluna. (*Salisb. Lin. Trans.* IV. 317.) Callune. Haide. [VIII, 1.]

587) *C. vulgaris*. (*Salisb. l. c.*) Heed T. n° 587.

‡ Juillet-Septembre.

C. Terrains siliceux et schisteux, bois, lieux incultes.

La culture des *Andromeda*, *Azalea*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Ledum* et de leurs variétés forme une spécialité très-importante de nos établissements horticoles.

XLIX. PRIMULACEAE.

(Vent. tabl. II, 285.)

Tribu I. — Primulæ. (*Dubois. Bot. Gall.* 383.)

225. Primula. (*L. Gen.* 80.) Primevère. Himmelschlüssel. [V, 1.]

288) *P. officinalis*. (*Jacq. Misc.* I. 159.) Guckgucksblum.

‡ Mars-Mai.

[T. n° 318.

C. Lieux herbeux, bois.

589) *P. elatior*. (*Jacq. Misc.* I. 158.) Guckgucksblum. T. n° 319.

‡ Mars-Mai.

C. Bois frais et humides, prairies tourbeuses.

590) † *P. grandiflora*. (*Lam. Fl. Fr.* 248.) Schlesselblum.

‡ Mars-Mai.

C. Cultivé pour ses fleurs jaunes, pourpres, purpurines, roses, tilas, blanches, acanthes ou caulescentes. Souvent spontané. Wurthberg (Clausen.) Kz.

591) † *P. auricula*. (*L. Sp.* 205.) Orikelcher.

‡ Avril-Mai.

C. Cultivé et quelquefois échappé des jardins.

226. *Lysimachia*. (*L. Gen.* 83 *ex parte*.) — Lysimaque. — Friedlos. [V, 1.]

592) *L. Nummularia*. (*L. Sp.* 211.) Mondkraut. . . T. n° 326.
 4 Juin-Août.

C. Lieux humides, fossés, bords des mares, bois, etc.

593) *L. nemorum*. (*L. Sp.* 211) T. n° 325.
 4 Juin-Juillet.

C. Bois humides, bords des ruisseaux ombragés.

594) ? *L. punctata*. (*L. Sp.* 210) T. n° 324.
 4 Juillet-Août.

R. Bords des eaux, prés frais. Cultivé. — C. Cimetière d'Elmen. T. Md. ! et dans les baches de plantes de terres de bruyères, où elle doit avoir été introduite avec des plantes provenant de Gand.

595) *L. vulgaris*. (*L. Sp.* 209.) Weiderich . . . T. n° 323.
 4 Juin-Juillet.

C. Bords des eaux, lieux humides, arides, etc.

Tribu II. — *Anagallideæ*. (*Dubois. l. c.*)

227. *Centunculus*. (*L. Gen.* 58.) Centenille. Kleinling. [IV, 1.]

596) *C. minimus*. (*L. Sp.* 169). T. n° 87.
 ① Juin-Août.

AC. Champs humides, chemins ombragés, environs de Capellen. T. Diekirch. K.

228. *Anagallis*. (*Tournf. Inst.* 59.) Mouron. Gauchheil. [V, 1.]

597) *A. arvensis*. (*L. Sp.* 211.) Gänsekrätchen.

① Juin-Octobre.

Var. α . *phoenicea*. (*Lmk. Fl. Fr. II.* 215) T. n° 328.

Var. β . *cœrulea*. (*Schreb. spicil. fl. Lips.* 5. 1771) . . T. n° 327.

Var. γ . *carnea*. (*Schrank, baier. Fl.* 1. 441.)

C. Lieux cultivés, champs.

Androsace maxima (*L. Sp.* 203), indiquée comme faisant partie de notre Flore (*Ed. Math.* 1192) provient d'une interprétation tronquée de Gmelin. Cette plante n'existe pas dans les moissons de la Haute-Moselle.

I. **PLUMBAGINEAE.**

(*Juss. Gen.* 92.)

229. *Armeria*. (*Willd. Hort. Berol.* 333.) — Armérie. — Stein-
 nelke. [V.]

598) † *A. elongata*. (*Hoff. Deutsch. Fl. ed. 2. v. 1.* 150.)
 Spüonesch Gràs.

4 Mai-Septembre.

C. Cultivé et souvent subspontané dans le voisinage des habitations.

LI. PLANTAGINEAE.

(Juss. Gen. 81.)

230. Plantago. (*L. Gen.* 142.) — Plantain. — Wegerich. [IV, 1.]599) *P. major.* (*L. Sp.* 163.) Wèblât T. n° 236.

‡ Juin-Octobre.

C. Bords des chemins, lieux cultivés, prairies, etc.

Var. *β. intermedia.* (*Gilibert. Pl. Europ.* 1. p. 125.)

‡ Juin-Octobre.

AC. Champs sablonneux, humides, etc.

Var. *γ. minima.* (*DC. fl. Fr.* 3. 418). T. n° 237.

‡ Juin-Octobre.

AR. Lieux siliceux, arides. C. Felzertunnel. BL. !

600) *P. media.* (*L. Sp.* 163.) Kätzeschwanz T. n° 238.

‡ Mai-Août.

C. Prairies, lieux herbeux, bords des chemins,

601) *P. lanceolata.* (*L. Sp.* 164). T. n° 239.

‡ Avril-Octobre.

C. Prairies, lieux herbeux, bords des chemins.

602) ? *P. arenaria.* (*Wald. et Kit. pl. rar. hung.* p. 51. t. 51.)

① Juillet-Août.

[EF. 140.]

Cette plante des sables du Nord et du Sud a été trouvée en 1863 en grandes quantités près de la gare centrale de Luxembourg par MM. Bockholz, ingénieur à Trèves, et Fr. Fischer jun. de Luxembourg.

LII. ILICINEAE.

(Brogn. in Ann. sc. nat. sér. 1. X. 329.) [IV, 4]

231. Ilex. (*L. Gen.* 172.) — Houx. — Stechpalme.603) *I. aquifolium.* (*L. Sp.* 182.) Walddeschtel. T. n° 271.

‡ Mai-Juin.

C. Bois montueux du grès luxembourgeois.

Var. *β. senescens.* (*Gaud. Helv.* 1. 462.)

AR, avec l'espèce. Bois de Fischbach, de Beaufort, etc.

Var. *γ. heterophylla.* (*Rehb. fl. ex.* 433.)

AC. avec l'espèce. Bois de Fischbach, Beaufort, Tuntingen, etc.

LIII. OLEINEAE.

(Hoffm. in Linck. Fl. Port. 1. 385.) [II, 1.]

232. Ligustrum. (*Tournef. Inst.* 367.) — Troëne. — Hartriegel.604) *L. vulgare.* (*L. Sp.* 10.) Schwarze Paafeschengchen.

Schwarz Moutz. Kellerholz. T. n° 5.

‡ Juin-Juillet.

C. Haies, buissons, lisières des bois. R. Ardennes.

233. Fraxinus. (*Tournef. Inst.* 343.) — Frêne. — Esche.

605) † *F. excelsior.* (*L. Sp.* 1509.) Esch. . . . T. n° 37.

‡ Avril. Fr. Juillet.

C. Bois un peu humides; planté en avenues.

606) † *F. Ornus.* (*L. Sp.* 1510.)

‡ Avril-Mai.

AR. Cultivé, subsponsané dans les environs d'Ansembourg.

234. Syringa. (*L. Gen.* 22.) — Lilas. — Flieder.

607) † *S. vulgaris.* (*L. Sp.* 11.) Nélchesblum. . . . T. n° 6.

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé, subsponsané dans les haies près des habitations. Bellevue, Pétrusse, Pulvermühl, etc. T. ! Ruines du Grewchesberg entre Greisch et Simmern. Kz.

608) † *S. persica.* (*L. Sp.* 12). EF. 142.

‡ Mai-Juin.

AC. Cultivé, quelquefois subsponsané dans le voisinage des habitations.

LIV. JASMINEAE.

(Rob. Brown. Prod. fl. nov. holl. p. 520.) [II, 1.]

235. Jasminum. (*L. Gen.* 17.) — Jasmin. — Jasmin.

609) † *J. fruticans.* (*L. Sp.* 9) EF. 143.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Juillet.

AC. Cultivé, subsponsané dans les rochers au-dessus de Clausen (Wurthsberg).

LV. APOCYNÆAE.

(Rob. Brown. Prod. 463.) [V, 1.]

236. Vinca. (*L. Gen.* 293.) — Pervenche. — Sinngrün.

610) *V. minor.* (*L. Sp.* 304.) Bierefang. Biereselchen. Bonzel.

‡ Mars-Juin.

C. par place. Bois, haies, broussailles, lieux pierreux. R. Ardennes.

611) † *V. major.* (*L. Sp.* 304). EF. 143bis.

‡ Mars-Mai.

C. Cultivé et subsponsané çà et là dans les haies.

LVI. ASCLEPIADEAE.

(R. Brown. in Wern. soc. 1. p. 12.)

237. Vincetoxicum. (*Mönch. meth.* 317.) — Dompte-venin. —

Schwalbenwurz. [V, 2.]

- 612) *V. officinale*. (*M. l. c.*) Hondswiërger. *A. vincetoxicum*.
 5 Juin-Août. [T. n° 396.]

AC. Rochers, coteaux incultes, pierreux. Pulvermühl, Wurthsberg, Bellevue, Moselle, Schönfels, etc. C. Dans les taillis de la commune de Willz, Schuttbourg.!

- 238. Asclepias.** (*L. Gen.* 120.) — Asclepiade. — Seidenpflanze. [V, 2.]

- 613) ? *A. syriaca*. (*L. Sp.* 313) T. n° 397.
 4 Juillet-Août.

AR. Cultivé pour ses fleurs. Subspontané à Clausen, Bellevue. (Courtois.) T. Md.!

LVII. GENTIANEAÆ.

(*Juss. Gen.* 141.)

Tribu I. — Menyantheæ. (*Juss. l. c.*)

- 239. Menyanthes.** (*Tournf. Inst.* 15.) — Menyanthe. — Fieberklee. [V, 1.]

- 614) *M. trifoliata*. (*L. Sp.* 208.) Geesklè. T. n° 320.
 4 Avril-Mai.

C. Prairies marécageuses, marais tourbeux, lieux vaseux, bords des eaux, eaux stagnantes, limoneuses.

- 240. Limnanthemum.** (*Gmel. in Act. Petrop. an.* 1769. 527.)
 — Limnanthème. — Seekanne. [V, 1.]

- 615) *L. nymphoides*. (*Link. Fl. Port.* 1. 344.) Villarsia nymphoides T. n° 321.
 4 Juillet-Septembre.

R. Rivières à courant peu rapide. Moselle (Green), vis-à-vis de Wintrange. EF.
 A. Kz. Moselle près de Stadtbredimus. EF. A. Entre Ehnen et Ahn. BB.!

Tribu II. — Eugentianeæ. (*Juss. l. c.*)

- 241. Gentiana.** (*Tournf. Inst.* 40.) Gentiane. Enzian. [V, 2.]

- 616) *G. cruciata*. (*L. Sp.* 334) T. n° 398.
 4 Juillet-Août.

AR. Prés secs et montueux, clairières et lisières des bois herbeux, coteaux pierreux. Fels (Schengen).! Reif (Wellenstein). Friedbüsch, Diekirch (Courtois). Echternach (Brimmeyr père). Diekirch. Md. K. Dudelange. Bereldange. Kz. etc.

- 617) *G. Pneumonanthe*. (*L. Sp.* 330) T. n° 399.
 4 Juillet-Octobre.

R. Tourbières, marais, bruyères humides, pâturages, prairies spongieuses, par place. T. et Wgt.

618) *G. campestris*. (*L. Sp.* 334) T. n° 402.

① Août-Septembre.

R. Bois, pâturages, coteaux arides. Blaschette. T.

619) *G. germanica*. (*Wallr. Sp.* 1. 1346) T. n° 401

24 Août-Octobre.

AR. par place. Lieux arides, collines sèches, lisière des bois. Marienthal. A. EF Kz. Föls. Mertert. R. Reif (Wellenstein.) Kz. Helperich. Kz. Dietzeberg. Kz.

620) ? *G. Amarella*. (*L. Sp.* 334.)

24 Août-Octobre.

R. Pelouses, prairies, pâturages, lisières des bois. Fels. K.

621) *G. ciliata*. (*L. Sp.* 334) T. n° 403.

② ou 24 Juillet-Septembre.

AR. Pelouses sèches, bois montueux, calcaireux. Ernster (Tuntingen.) DW. Zuschlag (Rumelange.) Kz. Marienthal. A. EF. Kz. Reif (Wellenstein.) Kz.

622) ? *G. acaulis*. (*L. Sp.* 330) T. n° 400.

② ou 24 Juillet-Août.

A été trouvée en 1824 sur les côtes de la Sûre entre Echternach et Grundhof par Tinant. Cette belle plante n'existe plus à la station citée, ni à celles de la Basse-Moselle, où elle avait été trouvée par différents collecteurs.

242. Cicendia. (*Adans. Fam.* II. 503 *ex parte.*) — Cicendie. — Bitterblatt.

623) *C. filiformis*. (*Delarbre. Fl. Auvergne.* 1. 29.) *Exacum* filiforme. T. n° 243.

① Juin-Octobre.

R. Lieux humides, siliceux, chemins des bois inondés l'hiver. Marienthal, Simmern. T. Gilsdorf. K.

243. Erythraea. (*Reich. ap. Pers. Sys. pl.* 1. 283.) — Erythrée. — Tausendguldenkraut. [V, 1.]

624) *E. Centaurium*. (*Pers. l. c.*) Dausendguldekraut. Chironia.

① ou ② Juillet-Septembre. [T. n° 349.

G. Bois, pâturages, bruyères, pelouses des terres argileuses.

625) *E. pulchella*. (*Fries. nov. Succ.* II. 31.) *Ch. pulchella*.

① ou ② Juillet-Septembre. [T. n° 350.

AC. Champs humides, lieux inondés l'hiver, prairies, etc.

Var. β . *Gerardii*. (*Schmidt. bot.* 1. 131.) *Ramosissima*. T. n° 350b.

Avec l'espèce.

244. Polemonium. (*L. Gen.* 217.) — Polemoine. — Himmelsleiter. [V, 1.]

626) † *P. cœruleum*. (*L. Sp.* 162.) Jacobsstäf.

‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé et quelquefois naturalisé près des habitations.

LVIII. CONVULVACEAE.

(Juss. Gen. p. 132 ex parte.)

245. *Convolvulus*. (*L. Gen.* 215.) — Liseron. — Winde. [V, 1.]

627) *C. arvensis*. (*L. Sp.* 218.) Wann. Frong . . . T. n° 330.

‡ Mars-Septembre.

C. Champs et moissons. AR. Ardennes.

628) *C. Sepium*. (*L. Sp.* 218.) Heckewann . . . T. n° 331.

② Juin-Septembre.

C. Haies, buissons, oseraies. AR. Ardennes.

LVIV. CUSCUTEAE.

(J. S. Presl. Fl. Cech. I. 247.)

246. *Cuscuta*. (*Tournf. Inst. t.* 422.) Cuscute. Seide. [V, 1.]

629) *C. suaveolens*. (*Seringe.*). EF. 145.

① Août-Septembre.

R. Parasite sur la luzerne. Talus du chemin de fer entre Bivange et Bellembourg, 1859. Kz. Luzernière à Rodenhof, EF., à Sæul, Kz. 1864. Geigeberg (Walferdange), 1870. BL. !

630) *C. Epilinum*. (*Weihe in Arch. Apoth. VIII.* 51.) T. n° 406.

① Juillet-Août.

R. Parasite sur le lin, au-dessus d'Ellange (Mondorf), 1872. A. EF. Kz.

631) *C. major*. (*C. Bauh. Pin.* 219). T. n° 404.

① Juin-Août.

AC. Parasite sur féverole, vesce, ortie, chanvre. Mersch, 1869. Kz. Hundhaus (Luxembourg), 1871. Reckingerhof. A. EF. Kz. 1872.

632) *C. Epithymum*. (*Murray in L. sys. veg. ed.* 13. 167.) *C. minor*.

① Juillet-Août.

[T. n° 405.]

C. Sur le *Thymus serpyllum*, *Calluna vulgaris*, *Trifolium pratense*, etc. Pfeifferbûsch, 1871. BL.

Var. β . *Trifolii*. (*Babingt. et Gibs. in Phyt. I.* 467.)

AR. Champ de trèfle et de luzerne.

LX. BORAGINEAE.

(Juss. Gen. 128 ex parte.) [V, 1.]

Tribu I. — *Anchusæ*. (*Juss. l. c.*)

247. *Borago*. (*Tournf. Inst.* 53.) — Bourache. — Boretsch.

633) † *B. officinalis*. (*L. Sp.* 197.) Bourage . . . T. n° 314.

① Juin-Octobre.

C. Cultivé et très-souvent subspontané près des habitations.

248. *Anchusa*. (*L. Gen.* 182 *ex parte*.)

634) *A. officinalis*. (*L. Sp.* 191) . . . T. n° 308.

② ou 4 Juin.

R. Prés, bords des chemins, dans les vallées latérales de la Moselle. Wintrange. T.

249. *Lycopsis*. (*L. Gen.* 190.) — *Lycopside*. — Krumhals.

635) *L. arvensis*. (*L. Sp.* 100.) Kaatzenaa . . . T. n° 316.

① Juin-Octobre.

C. Moissons, lieux incultes, sablonneux.

250. *Symphytum*. (*Tournf. Inst.* 56.) — Consoude. — Wallwurz.

636) *S. officinale*. (*L. Sp.* 195.) Heelwurz . . . T. n° 313.

4 Mai-Juin.

C. Prairies humides, bords des eaux, fossés.

Var. β . *patens*. (*Sibth. oxon. p.* 70) . . . T. n° 313b.

R. Prairies humides. Blesmühle. K.

251. *Myosotis*. (*L. Gen.* 180.) — *Myosotis*. — Vergissmeinnicht.

§ 1. — *Paludosæ*.

637) *M. palustris*. (*Withering, arrang. of Brit. II.* 225.) T. n° 303.

4 Mai-Août.

C. Bords des eaux, fossés, prairies humides.

Var. β . *repens*. (*Rchb. apud Sturm, Fl. D. t.* 42). . . T. n° 301.

Var. γ . *multiflore*. (*Mérat. in DC. Prod.* 10. 107.)

Var. δ . *laxiflora*. (*Reich. l. c.*)

C. Avec l'espèce.

638) *M. strigulosa*. (*Rchb. Fl. Germ. excurs.* 342.) T. n° 302.

② Mai-Juillet.

C. Lieux desséchés, fossés.

639) *M. cæspitosa*. (*Schultz. Fl. Starg. supp.* 11) . . . T. n° 299.

② Mai-Août.

C. Lieux marécageux, marais tourbeux, bords des eaux.

§ 2. — *Silvaticæ*.

640) *M. silvatica*. (*Hoff. Deutsch. Fl. ed. 2. p.* 85.) T. n° 300.

② Mai-Juillet.

C. Bois humides, buissons, bords des eaux.

641) *M. intermedia*. (*Lnk. Enum. hort. Berol. I. 164.*) T. n° 295.

① ou ②. Mai-Septembre.

C. Champs, lieux incultes, bords des chemins, bois, haies, buissons.

642) *M. hispida*. (*Schlecht. in Mag. Naturf. Berl. VIII. 229.*)

S. collina T. n° 296.

① ou ② Mai-Juin.

AC. Lieux incultes, arides, bords des chemins.

643) *M. versicolor*. (*Pers. Syn. I. 156*) T. n° 297.

① ou ② Mai-Juin.

AC. Champs sablonneux, moissons, lieux secs, graviers des rivières, pelouses.

644) *M. stricta*. (*Lnk. Enum. hort. Berol. I. 164 ex parte.*)

Arvensis T. n° 293.

① ou ② Mai-Juin.

C. Lieux sablonneux, pierreux, coteaux arides, bords des chemins.

645) ? *M. sparsiflora*. (*Pohl. in Hope Taschenb. 1807. 123.*)

① Mai-Juin. [T. n° 298.

R. Bois humides, ombragés. Haidgen (Helmsange). T.

252. *Lithospermum*. (*Tournf. Inst. 55.*) — Grémil. — Schminke.

646) *L. officinale*. (*L. Sp. 889.*) Steekraut T. n° 305.

24 Mai-Juillet.

AC. Ça et là. Endroits pierreux, calcaireux, bois, broussailles: Bellevue, Grünenwald, Helmdange, Schrässig, Ansembourg. T. Moselle. Wgt. Pr. 85.

647) *S. purpureo-cœruleum*. (*L. Sp. 190*) T. n° 307.

24 Mai-Août.

AR. Clairières des bois montueux de la Sûre et de la Moselle. Bettendorf. BL! Beaufort (Courtois). Echternach (Brimmeyr père). Berbourg. T. Wecker-Manternach. R. Fœls (Schengen). BB. EF. A. Kz.

648) *L. arvense*. (*L. Sp. 190*) T. n° 306.

① ou ② Mai-Août.

C. Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. R. Ardennes.

253. *Pulmonaria*. (*Tournf. Inst. 55.*) Pulmonaire. Schlüssel.

649) *P. officinalis*. (*L. Sp. 194.*) Longekraut T. n° 310.

24 Avril-Mai.

AC. Bois ombragés, bords des ruisseaux, par place, manque sur de larges espaces.

Var. β . *obscura*. (*Dmtr. in Bull. bot. Belg. IV. 341.*) BB. 393.

Avec l'espèce. Bois de Wintrange. BB.!

650) *P. angustifolia*. (*L. Sp.* 194 *ex parte*.) . . . T. n° 311.
 4 Juin-Août.

AC. par place. Terrains boisés, humides. Calcaire de l'Attert.

651) *P. mollis*. (*Wolf. in Lehm. Asperifol.* 276) . . . T. n° 312.
 4 Avril-Mai.

R. Bois frais de l'Ardenne. Wiltz, Esch s/S. F.

254. *Echium*. (*L. Gen.* 170.) — Viperine. — Natterkopf.

652) *E. vulgare*. (*L. Sp.* 200.) Schwengsschness. T. n° 317.

② Juin-Septembre.

C. Décombres, vieux murs, bords des chemins, lieux incultes.

Tribu II. — *Cynoglossæ*. (*Juss. l. c.*)

255. *Echinospermum*. (*Swartz. in Lehm. Asperifol.* 113.) —
 Echinosperme. — Igelsame.

653) *E. Lappula*. (*Lehm. Asper.* 121) T. n° 304.

① ou ② Juin-Juillet.

R. Murs, toits, lieux pierreux, bords des chemins.

256. *Cynoglossum*. (*L. Gen.* 183.) — Cynoglosse. — Hundsauge.

654) *C. officinale*. (*L. Sp.* 192.) Schöfszong . . . T. n° 309.

② Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux incultes, coteaux arides, bords des chemins.

257. *Omphalodes*. (*Tournf. Inst.* 58.) — Omphalode. —
 Gedenkemein.

655) † *O. verna*. (*Mönch. meth.* 420) EF. 149.

4 Avril-Mai.

C. Cultivé dans les jardins, souvent subspontané dans leur voisinage, Limpertsberg, Bellevue, etc.

258. *Asperugo*. (*Tournf. Inst.* 54.) — Rapette. — Scharfkraut.

656) ? *A. procumbens*. (*L. Sp.* 193) T. n° 315.

① Mai-Juillet.

R. Lieux pierreux, décombres. Basse-Pétrusse. T. DW.

259. *Heliotropium*. (*L. Gen.* 179.) Héliotrope. Sonnenwende.

657) *H. europæum*. (*L. Sp.* 187) T. n° 293.

① Juin-Août.

AC. Champs pierreux, arides, vignes, décombres entre Schengen et Remich. Md. T. Föls. Kz.

LXI. SOLANEAE.

(Juss. Gen. 124.) [V, 1.]

Tribu I. — Eusolaneae.

260. Solanum. (*Tournf. Inst.* 62.) — Morelle. — Nachtschatten.

658) *S. Dulcamara.* (*L. Sp.* 264.) Noischett. Porgeerk. T. n° 344.
 ‡ Juin-Septembre.

C. Haies, bords des eaux, bois humides.

659) *S. nigrum.* (*L. Sp.* 266). T. n° 345.
 ① Juin-Octobre.

Var. *α. nigrum.* (*Sm. Engl. Bot.* I. 566.)

AR. Autre part qu'en Ardennes.

Var. *β. ochroleucum.* (*Bast. in Journ. bot.* 1814, III. 20.)

C. Lieux cultivés, haies, bords des chemins, décombres.

Var. *γ. humile.* (*C. Bernh. ap. Willd. Hort. Berol.* I. 256.)

C. Avec l'espèce.

Var. *δ. miniatum.* (*Bernh. l. c.* 256.)

AR. Avec l'espèce.

Var. *ε. villosum.* (*Lmk. Encycl. méth.* IV. 289) . . . T. n° 346.

C. Avec l'espèce. Moselle. T.

660) *S. tuberosum.* (*L. Sp.* 265.) Krombier. . . . T. n° 347.
 ‡ Juin-Septembre.

C. Cultivé, souvent spontané.

261. Capsicum. (*L. Sp.* 269.) — Piment. — Beisbeere.

661) † *C. annum.* Spüonesche Pfeffer.

① Juin. Fr. Septembre.

Cultivé comme condiment.

262. Lycopersicum. (*Tournf. Inst.* 69.) Tomate. Liebesapfel.

662) † *L. esculentum.* Pomme d'amour.

① Juin. Fr. Septembre.

Cultivé comme condiment.

263. Physalis. (*L. Gen.* 250.) — Coqueret. — Judenkirsche.

663) *P. Alkekengi.* (*L. Sp.* 262) T. n° 343.

‡ Juin-Septembre. Fr. Octobre-Novembre.

AC. Vignes, lieux cultivés, haies entre Remich et Stadtbredimus. F. Wtg. BB.!

264. Atropa. (*L. Gen.* 249 *ex parte.*) — Belladone. — Tollkirsche.

664) **A. Belladonna.** (*L. Sp.* 260.) Judekisch. . . T. n° 342.

‡ Juin-Août.

C. par place. Bois montueux nouvellement exploités, carrières, rochers ombragés. R. Ardennes, entre la Toutschen- et la Merkolzermühle, Esch s/S.

265. Lycium. (*L. Gen.* 262.) — Lyciet. — Bocksborn.

665) † **L. barbarum.** (*L. Sp.* 277) . . . T. n° 348.

‡ Juin-Septembre.

Cultivé, quelquefois naturalisé dans les haies. Eich. T. Limpertsberg. EF. Mersch. Kz. etc.

Tribu II. — Nicotianæ.

266. Nicotiana. (*Tournf. Inst.* 41.) — Tabac. — Tabak.

666) † **N. rustica.** (*L. Sp.* 258.) Toubak . . . T. n° 334.

① Juillet-Octobre.

Quelquefois cultivé. R. Subspontané dans le voisinage des habitations. Clausen (Jardin Mansfeld.) Kz.

267. Datura. (*L. Gen.* 246.) — Datura. — Stechapfel.

667) **D. Stramonium.** (*L. Sp.* 255.) Daarâpel . . . T. n° 332.

① Juillet-Septembre.

C. par place. Lieux incultes, pierreux, aux environs des habitations, des vieux châteaux. Wiltz, Ansembourg, Schuttbourg, Kautenbach, Lintgen, Schrässig, etc.

268. Hyoscyamus. (*Tournf. Inst.* 42.) Jusquiam. Bilsenkraut.

668) **H. niger.** (*L. Sp.* 257.) Zennsémchen . . . T. n° 333.

① ou ② Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux incultes et pierreux, décombres, voisinage des habitations et des vieux châteaux. Schuttbourg, Wiltz, Vianden, Mersch, Kz. Beaufort, EF. Kz. Ansembourg. DW. Fischbach, fossés devant la Porte-Neuve. BL.!

LXII. VERBASCEAE.

(Bartling. Ord. nat. p. 170.) [V, 1.]

269. Verbascum. (*Tournf. Inst.* 61.) — Molène. — Wollkraut.

Sect. I. — Thapsus. (*Dmir. Hulth. p.* 11.)

669) **V. Thapsus.** (*L. Sp.* 252.) Dausendblum. Wollkraut.

Täkelblum. Wullich . . . T. n° 335.

② Juin-Août.

G. Lieux incultes, bords des chemins, champs en friche. R. Ardennes.

Var. β . Schraderi. (*G. Meyer. Chlor. hanov.* 326.) Lühr. 880.

R. Avec l'espèce.

670) *V. thapsiforme*. (*Schrad. Monogr. I. 21*) . . . T. n° 336.

② Juin-Août.

C. Lieux incultes, pierreux, en friche, bords des chemins. R. Ardennes.

671) *V. phlomoides*. (*L. Sp. 253*) T. n° 338.

② Juin-Août.

R. Lieux sablonneux, bords des chemins, manque sur de grands espaces. Aude-
dessus de Dommeldange. T.

672) *V. montanum*. (*Schrad. Hort. Gætt. Fasc. II. 18. t. 2.*)

Crassifolium T. n° 337.

② Juin-Juillet.

R. Lieux sablonneux et secs aux environs de Greisch. T. Beaufort.

Sect. II. — *Lychnites*. (*Benth. DC. Prod. X. 230.*)

673) *V. pulverulentum*. (*Vill. Fl. Dauph. II. 490.*) T. n° 340.

② Juin-Août.

AC. Lieux secs, incultes, champs sablonneux ou pierreux sur la Moselle, entre
autres aux environs de Remich, Ehnén, BB. ! Grevenmacher. T.

674) *V. floccosum*. (*Wald. et Kit. pl. rar. hung. 1 p. 81. 71.*)

② Juillet-Août.

R. Collines arides, chemins. Schengen. BB.

675) *V. Lychnitis*. (*L. Sp. 253*). T. n° 339.

② Juin-Août.

C. Coteaux arides, lieux incultes, bords des routes et des chemins.

Var. β . *album*. (*Mönch. meth. p. 447.*)

R. Avec l'espèce.

676) *V. nigrum*. (*L. Sp. 253*). T. n° 341.

② Juin-Août.

C. Bois sablonneux, lieux incultes, pierreux, bords des chemins. AC. Ardennes.

677) *V. nigro-floccosum*. (*Schottianum. Schrad. l. c. 13.*)

② Juillet-Août.

R. Coteaux incultes en amont d'Echternach vers la Weilerbach. R.

LXIII. SCROPHULARINEAE.

(R. Brown. Prod. 433.)

270. Veronica. (*Tournf. Inst. 60.*) — Véronique. — Ehren-
preis. [II, 1.]

Sect. I. — *Chamaedrys*. (*Koch, syn. ed. 2. 603.*)

678) *V. scutellata*. (*L. Sp. 16*) T. n° 11.

4 Mai-Septembre.

R. Lieux marécageux, humides : Blaschette, Kockelscheuer. T. Gasperich. BL. !
Bords des étangs. Pieitrange. BL.

679) *V. Anagallis*. (*L. Sp.* 16) T. n° 10.
 4 Mai-Septembre.

C. Fossés, ruisseaux, bords des eaux, lieux marécageux R. Ardennes.

680) *V. Beccabunga*. (*L. Sp.* 16.) *Wele Burekascht*. T. n° 9.
 4 Mai-Septembre.

C. Ruisseaux, fossés, bords des eaux, lieux marécageux.

Var. β . *limosa*. (*Lej. R. Fl. Spa. p.* 2.) *V. limosa*.

AC. Avec l'espèce.

681) *V. Chamædrys*. (*L. Sp.* 17) T. n° 15
 4 Avril-Juin.

C. Bois, haies, bords des chemins, prairies.

682) *V. montana*. (*L. Sp.* 17) T. n° 14.
 4 Juin-Juillet.

AR. Bois frais, humides, Rodenbüsch (Kopstal). Grünenwald. Schönfels. Md.

T. Beaufort. (Courtois.) Ilse.

683) *V. officinalis*. (*L. Sp.* 14.) *Ehrenpreis*. T. n° 7.
 4 Mai-Juillet.

C. Bois secs, pâturages, bords des chemins.

Var. β . *Spadana*. (*Lej. Fl. de Spa. I.* 22) T. n° 8.
 R. Grünenwald. T.

684) *V. prostrata*. (*L. Sp.* 17). T. n° 13.
 4 Mai-Juillet.

R. Coteaux arides en plein soleil. Schengen. Stadtbredimus. T. Mertert. R.

685) *V. Teucrium*. (*L. Sp.* 16.) *V. latifolia* T. n° 12.
 4 Avril-Juillet.

AC. par place. Coteaux exposés au midi, pâturages, bords des bois, etc. Pulfermühl, Hollerich, Dommeldange T. Remich, Wintrange, BB. Machthum. EF. Kz.

Sect. II. — *Veronicastrum*. (*Koch, l. c.* 608.)

686) *V. serpyllifolia*. (*L. Sp.* 15). T. n° 16.
 4 Avril-Septembre.

C. Pelouses humides, bords des allées et des bois humides.

687) ? *V. peregrina*. (*L. Sp.* 20.)

① Mai-Juin.

R. Lieux cultivés. Haies. 1872. EF. Kz.

688) *V. acinifolia*. (*L. Sp.* 19). T. n° 17.

① Avril-Mai.

AR. Champs cultivés, un peu humides.

689) *V. arvensis*. (*L. Sp.* 18) T. n° 19.

① ou ② Mars-October.

C. Champs sablonneux, lieux cultivés, bords des chemins. R. Ardennes.

Var. β . *polyanthos*. (*Thuill. Fl. Par.* 9) T. n° 20.

AC. avec le précédent. Clausen, Dommeldange, Fischbach. T.

690) *V. verna*. (*L. Sp.* 19) T. n° 23.

① ou ② Avril-Mai.

AC. par place. Champs sablonneux, bords des chemins Brouh. Kz. Hauteur entre le moulin d'Eppeldorf et Beaufort. K. Plankenhof. Kz. Fischbach, Blaschette, Kopstal, Ansembourg. T.

691) *V. triphyllos*. (*L. Sp.* 19) T. n° 22.

① ou ② Avril-Juin.

AR. Champs secs, sablonneux, manque sur de très-grands espaces.

692) *V. præcox*. (*Allioni. Auct.* 51. t. 1. f. 1) . . . T. n° 24.

① Avril-Mai.

R. Coteaux pierreux, champs sablonneux. Neudorf, Bellevue. T.

Sect. III. — *Alsinoïdes*. (*Koch, l. c.* 610.)

693) *V. agrestis*. (*L. Sp.* 18) T. n° 18.

① ou ② Mars-October.

C. Lieux cultivés, champs, vignes, haies. R. Ardennes.

694) *V. polita*. (*Fries. nov. succ. ed.* 2. p. 1) . . . T. n° 26.

① ou ② Mars-Mai.

AC. Lieux cultivés, sablonneux.

695) *V. opaca*. (*Fries. nov. succ. ed.* 2. p. 3). . . . Löhr. 933.

① ou ② Mars-Mai. Automne.

R. Lieux cultivés Grevenmacher, Echternach. L.

696) ? *V. Buxbaumii*. (*Ten. fl. Neap.* 1. p. 7.)

① Avril-Mai.

R. par place Moissons, environs de Luxembourg T. in litt.

697) *V. hederæfolia*. (*L. Sp.* 19) T. n° 21.

① ou ② Mars-Juin et Automne.

C. Lieux cultivés, moissons, le long des haies. R. Ardennes.

Var. β . *Lappago*. (*Schrank. Baier. Fl.* 1. 218.)

AR. Avec l'espèce.

271. *Limosella*. (*L. Gen.* 776.) Limoselle. Schlämling. [XIV, 2.]

698) *L. aquatica*. (*L. Sp.* 881) T. n° 941.

4 Juin-Septembre.

R. Bords sablonneux des eaux, lieux humides. Grünenwald. T. Capellen, Remerschen T. Remich. BB.

272. Scrophularia. (*Tournf. Inst.* 74.) — Scrofulaire. — Braunwurz. [XIV, 2.]

699) *S. nodosa.* (*L. Sp.* 863.) Gurgel T. n° 942.

4 Juin-Août.

C. Lieux frais, bords des fossés, bois humides.

Var. β . *umbrosa.* (*Dmtr. Prod.* 37.) *alata.* (*Acherson Fl. Brand.*)
[T. n° 942b.]

AR. Haies humides près d'Eisembourg. T.

700) *S. Erharti.* (*C. A. Stefen. conf. Babington, Manual of Britsch bot.* 218.) *S. aquatica* (*Koch.*) T. n° 944.

4 Juin-Juillet.

AR. Bords des ruisseaux, fossés.

701) *S. Neesii.* (*Wrtg. Verhandlungen des naturhistorischen Vereins, p.* 29, 1844.)

4 Juin-Septembre.

R. Bords des rivières et des ruisseaux avec la précédente. Cette espèce a été créée sur des exemplaires récoltés près d'Echternach.

702) *S. aquatica.* (*L. Sp.* 864.) *Balbisii.* (*Horn.*) *Betonicefolia.* (*DC.*)

4 Juin-Août. [T. n° 943.]

C. par place. Fossés aquatiques, bords des rivières et des eaux. Blaschette, Schengen. T. Entre Grevenmacher et Mertert. R.

703) ? *S. vernalis.* (*L. Sp.* 864) T. n° 945.

① Mai-Juillet.

R. et très-fugace. Lieux incultes, ombragés, pierreux, buissons, vieilles murailles. Zolverknapp. T.

273. Gratiola. (*L. Gen.* 29.) — Gratiole. — Gnadenkraut. [II, 1.]

704) *G. officinalis.* (*L. Sp.* 24) T. n° 27.

4 Juin-Septembre.

AR. Prairies humides, bords des ruisseaux, lieux marécageux, entre Mertert et Grevenmacher. R.

274. Digitalis. (*Tournf. Inst.* 73.) Digitale. Fingerhut. [XIV, 2.]

705) *D. purpurea.* (*L. Sp.* 866.) Fangerhutt . . . T. n° 946.

② ou 4 Juin-Août.

C. Bois montueux, essarts, jachères, coteaux arides de l'Ardenne. R. ailleurs. Bois entre Kœrich et Septfontaines. (1867.) DW. Hollenfels (1839.) Kz.

1) *Paulownia imperialis.* (*Sieb. et Zucc.*) Introduit en 1842 dans nos cultures. Château de Berg, exempl. de 1,40 m de tour.

- 706) *D. lutea*. (*L. Sp.* 867.) *D. parviflora*. (*DC.*) . T. n° 949.
 24 Juin-Juillet.

AR. Bois montueux, humides des Ardennes, de Wiltz à Clervaux, d'Esch s/S. à Heiderscheid, Stolzembourg, Alscheid, Neunhausen, Krischelheid, Folschette. etc.

- 707) *D. purpureo-lutea*. (*Mey. Chlor. Hanov.* 324.) *D. purpurascens*. (*Roth.*) *Libertiana*. (*Dmtr.*) . . . T. n° 947.

② ou 24 Juin-Août.

AC. Toujours au milieu des parents.

- 708) *D. ambigua*. (*Murr. Prod. fl. Gatt. p.* 62.) *Grandiflora*. (*Lmk.*) T. n° 948.

24 Juin-Août.

R. Bois montueux, rochers, avec *D. lutea*.

- 709) *D. ambiguo-lutea*. (*Mey. Chlor. Hanov.* 325.)

24 Juin-Juillet.

R. Au milieu des parents.

275. Anthirrhinum. (*Juss. Gen.* 120.) — Muflier. — Löwenmaul. [XIV, 2.]

- 710) *A. Orontium*. (*L. Sp.* 860) T. n° 940.

① Juin-Septembre.

C. Champs, moissons, bords des chemins. R. Ardennes.

- 711) † *A. majus*. (*L. Sp.* 859.) Lëwemaul . . . T. n° 939.

24 Juin-Septembre.

C. Cultivé, quelquefois subspontané. Vieux murs, Clausen, Fort Olizy, Kz. Ansembourg. A. EF. Kz.

276. Linaria. (*Mill. Dic.* 17.) *Linaria*. Frauenflachs. [XIV, 2.]

- 712) *L. vulgaris*. (*Mönch. meth.* 524.) Taakekraut. T. n° 937.

24 Juillet-Septembre.

C. Lieux sablonneux, stériles, bords des chemins, haies.

- 713) *L. minor*. (*Desf. Atl.* 2. p. 46). T. n° 936.

① Juillet-Octobre.

C. Lieux cultivés, moissons. R. Ardennes.

- 714) *L. arvensis*. (*Desf. Atl.* 2. p. 46) T. n° 934.

① Juin-Septembre.

AR. Champs, moissons. Stolzembourg, Diekirch, Erpeldange, Dudelange. T.

- 715) ? *L. simplex*. (*DC. Fl. Fr.* 3. 588). EF. 163.

① Juillet-Août.

R. Champs, moissons.

- 716) *L. striata*. (*DC. Fl. Fr.* 3. 586.) *L. repens*. (*Desf.*) T. n° 938.

24 Juillet-Août.

R. Lieux stériles, collines calcaires aux environs de Diekirch, Useldange, T.

717) *L. Cymbalaria*. (*Mill. Dic.* 17). T. n° 931.

24 Juin-Septembre. Mauersélchen. Leiskrètchen.

C. Vieux murs aux environs de Luxembourg. R. ailleurs.

718) *L. Elatine*. (*Desf. Atl.* 2. 37) T. n° 932.

① Juillet-Octobre.

C. Champs cultivés, argileux, calcaires.

719) *L. spuria*. (*Mill. Dic.* 15) T. n° 933.

① Juillet-Août.

AC. Moissons, champs cultivés.

277. *Pedicularis*. (*Tournf. Inst.* 77.) — Pediculaire. —
Moorkönig. [XIV, 2.]

720) *P. palustris*. (*L. Sp.* 845.) Leiskraut T. n° 929.

② ou 24 Mai-Août.

AC. par place. Prés marécageux, bois humides, tourbières. C. Ardennes.

721) *P. silvatica*. (*L. Sp.* 845) T. n° 930.

① Juin-Août.

C. Bois, pelouses, prés montueux, humides de l'Ardenne. R. ailleurs.

278. *Rhinanthus*. (*L. Gen.* 740 *ex parte*.) — Rhinanthé. —
Klappertopf. [XIV, 2.]

722) *R. major*. (*Ehrh. Beit.* VI. 144.) Kaasel. (*R. Crista-Galli*.
L. var. γ.) T. n° 923.

① Mai-Juillet.

AC. Prairies humides, lisières des bois.

723) *R. minor*. (*Ehrh. Beit.* VI. 144.) (*Crista-Galli. L. v. β.*)

① Mai-Juin. [T. n° 924.]

AC. Prairies, bois.

724) *R. Alectorolophus*. (*Pollich. palat.* 2. 177). . . T. n° 925.

① Mai-Juillet.

AR. Moissons, champs cultivés.

725) *R. angustifolius*. (*Gmel. Fl. Bad.* 2. 669) . . . L. 926.

① Juillet-Septembre.

R. Coteaux secs et pierreux en aval d'Echternach L.

279. *Melampyrum*. (*Tournf. Inst.* 78.) — Melampyre. —
Wachtelweizen. [XIV, 2.]

726) *M. cristatum*. (*L. Sp.* 842). T. n° 927.

① Juin-Août.

C. par place. Clairières des bois, coteaux incultes. Fentange. EF. Bivange. Rœser. Kz. Grünenwald. T. Greiveldange, Machthum BB.! Wasserbillig. R. Grevenmacher. Kz.

727) *M. arvense*. (*L. Sp.* 842.) Koliwees T. n° 928.

① Juin-Août.

C. Moissons, champs en friche des terres fortes.

Var. β . *barbatum*. (*Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung.* 80.)

R. avec l'espèce.

728) *M. pratense*. (*L. Sp.* 843) T. n° 928

① Juin-Août.

C. Bois, taillis, près tourbeux.

280. Euphrasia. (*L. Gen.* 741 *ex parte.*) — Euphrasie. — Augentrost. [XIV, 2.]

729) *E. officinalis*. (*L. Sp.* 241) T. n° 920.

① Juillet-Octobre.

C. Prairies, pelouses, clairières herbeuses des bois.

730) *E. nemorosa*. (*Soy.-Will. Mém. de l'Acad. de Nancy.* 1833. 4. 27). . . . T. n° 921.

① Juillet-Octobre.

C. Prés, pâturages, bords des bois, bruyères.

281. Odontites. (*Haller. Helv.* 304.) Odondité. Augentrost.

731) *O. rubra*. (*L. Sp.* 841.) *E. odontites*. . . . T. n° 922.

① Juin-Juillet.

C. Moissons, lieux cultivés, pelouses humides. R Ardennes.

732) *O. serotina*. (*Lmk. fl. F. éd. 2. 3.* 350). . . . T. n° 923.

① Juillet-Octobre.

C. Moissons, lieux herbeux, bords des chemins R Ardennes.

733) *O. lutea*. (*L. Sp.* 842) Gke. Fl. D. n° 1326.

① Juillet.

R. Coteaux incultes, pelouses montueuses. Moselle. Gke.

LXIV. LENTIBULARIEAE.

(Rich. in Poiteau et Turp. Flor. Par. 26.) [11, 1.]

282. Utricularia. (*L. Gen.* 31.) Utriculaire. Wasserschlauch.

734) *U. vulgaris*. (*L. Sp.* 26) T. n° 28.

4 Juin-Août.

R. Mares, fossés, étangs, flaques d'eaux des tourbières. Taillis d'Erpeldange, au-dessus de Bleesmühl. K. Fischbach, Kockelscheuer, Burel. T.

LXV. OROBRANCHEAE.

(Juss. in Ann. Mus. XII. 443.) [XIV, 2.]

283. Phelipæa. (*Tournf. Inst. coroll. 479 emend.*) — Phelipée.
— Phelipæe.

735) *P. cœrulea.* (*Vill. Fl. Dauph. 2. 406*) . . . T. n° 916.
4 Juin-Juillet.

R. Parasite sur l'*Achillea Millefolium*. Coteaux secs et arides entre Diekirch et Bettendorf. BL.!

736) *P. ramosa.* (*L. Sp. 882*). T. n° 915.

① Juillet-Septembre.

R. Parasite sur *Cannabis sativa*. (1871.) Mertert. BL. Dudelange. Kz. près du Buchebüsch, (Büschdorf.) Kz. Tuntingen. DW.

284. Orobanche. (*L. Gen. 779 ex parte.*) — Orobanche. —
Sommerwurz.

737) *O. Rapum.* (*Thuill. Fl. Par. 317.*) *O. genista.*
4 Mai-Juin.

R. Parasite sur *Sarothamnus scoparius*. Bois, bruyères, lieux incultes de l'Ardenne.

738) *O. elatior.* (*Sutton. Eng. bot. t. 568*). . . . T. n° 917.
4 Juin.

R. Parasite sur *Centaurea scabiosa* particulièrement dans les calcaires arides de la Moselle. Clausen. Md. Ansembourg. DW. Johannisberg. (1871.) Kz

739) *O. Galii.* (*Duby. Bot. Gall. 349.*) Caryophyllacea. T. n° 918.
4 Juin-Juillet.

R. Parasite sur les *Gallium Mollugo. vernum, silvaticum* des lisières des bois herbeux, pâturages, etc. Wurthberg, Bissersweg. EF. Kz.

740) *O. Epithymum.* (*DC. Fl. Fr. III. 490.*)
4 Juin-Juillet.

C. par place. Parasite sur *Thymus Serpyllum*. Pelouses sèches, pâturages, coteaux arides. Durensberg, Pulvermühl, Fetschenhof, Weymershof, Höhl, Sichenhof, Kuhberg, etc. BL.!

741) *O. Teucrii.* (*F. Schultz. in Holl. Fl. Mos. éd. I. 322.*)
4 Juin-Juillet.

R. Parasite sur *Teucrium Chamædrys et montanum*. Coteaux calcaires, secs. Schengen. F (Schultz). Hohfelz (Machthum.) BB. Fels (Mertert.) BB.

742) *O. alsatica.* (*F. W. Schultz. Fl. Gall. Germ. ex.*)
4 Juin.

R. Parasite sur *Peucedanum Cervaria*. Collines calcaires de la Moselle, Schengen (F. W. Schultz).

743) *O. minor*. (*Sutt. in Trans. Soc. Linn. IV. 178.*)

① Juin-Juillet.

R. Parasite sur *Trifolium pratense* et *Poterium Sanguisorba*. Lieux pierreux, coteaux arides, champs incultes. Weilerbach (Mersch). Kz.

285. *Lathraea*. (*L. Gen. 743.*) *Lathree*. *Schuppenwurz*. [XIV, 2.]

744) *L. squamaria*. (*L. Sp. 848*) T. n° 919.

4 Mars-Mai.

Parasite sur les racines de plusieurs espèces d'arbres et d'arbrisseaux, notamment sur celles de *Corylus Avellana*, *Fagus silvatica*, *Quercus*, etc. R. Bois ombragés et humides entre Erpeldange et Michelau. Md. K. T.

LXVI. LABIATAE.

(*Juss. Gen. 110.*) ¹⁾

Tribu I. — *Ocimoideæ*. (*Benth. lab. p. 1.*)

286. *Lavendula*. (*Tournf. Inst. 93.*) — Lavande. — Lavendel.

745) *L. vera*. (*DC. Fl. Fr. 5. 398.*)

4 Juin-Septembre.

Anciennement cultivé dans les jardins et rarement naturalisé dans leur voisinage. Rochers près du vieux château d'Aussembourg. Kz.

287. *Ocimum*. (*L. Gen. 732.*) — Basilic. — Basilikenkraut.

746) *O. Basilicum*. (*L. Sp. 838.*) Basilic.

① Avril-Octobre.

C. Cultivé pour son odeur pénétrante.

Tribu II. — *Menthoideæ*. (*Benth. lab. p. 152.*)

288. *Mentha*. (*L. Gen. n° 713.*) — Menthe. — Minze.

747) *M. silvestris*. (*L. Sp. 804*) T. n° 857.

4 Juillet-Septembre.

C. par place. Mardelle des eaux et des fossés, lieux frais et humides.

Var. *β. candicans*. (*Crantz. stirp. Aust. p. 330.*)

Avec le type.

Var. *γ. nemorosa*. (*Willd. Sp. 3. 75*) T. n° 858.

AC. Bords des eaux.

Var. *δ. velutina*. (*Lej. Revue. Fl. Spa. 115*) . . . T. n° 859.

R. Bords des eaux, lieux humides. Bellevue (Courtois), Sûre entre Bigelbach et Echternach. T. Moselle, Wtg. près Wasserbillig. BL. !

1) A l'exception de *Lycopus* et *Salvia* qui sont de la II^e classe, 1^{er} ordre de Linné, toutes les plantes de cette famille appartiennent à la XIV^e classe, 1^{er} ordre.

Var. ϵ . *gratissima*. (Willd. Sp. 3. 75.)

AC. avec le type et *rotundifolia*. Moselle.

748) *M. rotundifolia*. (L. Sp. 825) T. n° 860.

4 Juillet-Septembre.

AC. Bords des eaux et des fossés, lieux frais dans les vallées des terrains calcaires. ! R. ailleurs, paraît manquer à l'Ardenne.

Var. β . *rugosa*. (Roth. Ten. fl. Germ. I. 309.)

AR. Avec l'espece. C. Moselle.

749) *M. viridis*. (L. Sp. 804) T. n° 861.

4 Juillet-Octobre.

AR. Bords des chemins humides et des eaux entre les deux ponts de la Bles et Longsdorff. T. Kämpgen. Fohren (Courtois). Leesbech (Greisch.) Kz.

Var. β . *crispata*. (Schrader. cat. hort. Gœtt.) T. n° 860.

AR. Bords des ruisseaux sous bois.

Var. γ . *cordifolia*. (Opiz. ex Fresen. in Syll. pl. soc. Ratisb. 2.

232) T. n° 863.

R. Lieux humides près Vianden Dmtr. Pr. 514.

750) *M. gentilis*. (L. Sp. 205) T. n° 870.

4 Juin-Juillet.

AC. Lieux humides des terrains sablonneux. Leesbech sous Greisch.

Var. β . *acutifolia*. (Smith. l. c. 611) T. n° 870bis.

R. Bords des ruisseaux entre Kopstal et le Maximeinerbüsch. T.

751) *M. pubescens*. (Willd. enum. p. 608.) Wgt. Fl. R. P. 926.

4 Juillet-Septembre.

C. Ruisseaux, fossés de la vallée de la Moselle.

752) *M. piperita*. (L. Sp. 805.) Peffermanz T. n° 864.

4 Juillet-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois subspontané au voisinage des habitations. Herrenberg (Diekirch.) Md. K. Kämpgen. Fohren (Courtois). Vieux château d'Ansembourg. Kz.

Var. β . *crispa*. (L. Sp. 815.)

AC. Avec le type.

753) *M. aquatica*. (L. Sp. 805) T. n° 865b.

4 Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux et des fossés aquatiques, lieux humides, marécageux. R. Ardennes.

Var. β . *hirsuta*. (Lin. Mant. p. 81) T. n° 863.

Avec le type dans les habitations moins humides.

Var. γ . *nepetoides*. (Lej. R. Spa. 862) T. n° 866.

AR. Bords des eaux, bois humides. Dommeldange, Eisembourg, Kahlscheuer. T. Echternach (Brimmeyr père).

754) *M. arvensis*. (*L. Sp.* 406) T. n° 871.

24 Juillet-Septembre.

C. par place. Champs humides, bords des eaux, fossés, etc.

Var. β . *sativa*. (*Smith. trans. soc. linn. Lond.* 5. 199.)

C. Avec l'espèce dans les terrains calcaires.

Var. γ . *Rothii*. (*Nees ab. Esenb. in Rehb. icon. bot.* 10. 974.)

[T. n° 869bis.

R. Lieux humides aux environs de Kahlischeuer. T.

Var. δ . *rubra*. (*Smith. l. c.* 5. 205) T. n° 867.

R. Bords des eaux. Kahlischeuer. T.

Var. ϵ . *austriaca*. (*Jacq. Fl. Aust. t.* 430) T. n° 869.

AR. Avec les précédentes.

Var. ζ . *parietariæfolia*. (*Becker. Fl. Francf.* 223.)

R. Lieux humides du Thalweg de la Moselle. Wtg.

755) *M. Pulegium*. (*L. Sp.* 807). T. n° 872.

24 Juillet-Octobre.

AC. Marécages, bords des eaux, fossés, lieux inondés l'hiver. Mertert. BL.

Var. β . *tomentella*. (*Opitz. non Hoff. et Linck. nec. Presl.*)

R. Avec le type.

289. *Lycopus*. (*L. Gen.* 15.) — Lycope. — Wolfsfuss.

756) *L. europæus* T. n° 30.

24 Juillet-Août.

C. Bords des eaux, fossés aquatiques, lieux frais, marécages.

Tribu III. — *Monardeæ*. (*Benth. lab. p.* 190.)

290. *Rosmarinus*. (*L. Gen.* 38.) — Romarin. — Rosmarin.

757) † *R. officinalis*. (*L. Sp.* 33.) Rõsemarein.

‡ Avril-Mai.

Anciennement cultivé pour son odeur aromatique.

291. *Salvia*. (*Tournf. Inst.* 83.) — Sauge. — Salvei.

758) *S. pratensis*. (*L. Sp.* 35). T. n° 32.

24 Mai-Novembre.

C. Prés, lieux herbeux, sees.

759) ? *S. Selarea*. (*L. Sp.* 38). T. n° 33.

24 Juillet-Août.

R. Voisinage des ruines du vieux château de Brandenbourg. K. Vianden. Md.

760) † *S. officinalis*. (*L. Sp.* 34.) Salfei EF. 168.

‡ Juin-Juillet.

Généralement cultivé dans les jardins et çà et là subspontané dans leur voisinage.

Tribu IV. — Thymoideæ. (*Coss. et Germ. Fl. P.*)

292. Origanum. (*Tournf. Inst. 94.*) — Origan. — Dost.

761) *O. vulgare*. (*L. Sp. 824.*) Lëwfràbettstrë . . . T. n° 903.

4 Juillet-Septembre.

C. Lisières des bois, haies, coteaux, bords des chemins.

Var. *β. megastachyum*. (*Boreau, Fl. du Centre. Fr. 1967.*)

[T. n° 903g.

R. Collines calcaires de la Moselle.

762) † *O. Majorana*. (*L. Sp. 825.*) Mairon.

① ou 4 Juillet-Août.

Généralement cultivé comme condiment dans les jardins et souvent subspontané.
Jardin Mansfeld, Clausen. Papierberg. Kz.

293. Thymus. (*L. Gen. 727 ex parte.*) — Thym. — Thymian.

763) *T. Serpyllum*. (*L. Sp. 825.*) Teymergenchen. Kundelkraut.

4 Juin-Octobre.

[T. n° 905.

C. Coteaux secs, pelouses, bords des champs, bruyères, bois, etc.

764) *T. Chamædrys*. (*Fries. nov. 197.*)

4 Juin-Octobre.

C. Lieux secs et incultes.

765) † *T. vulgaris*. (*L. Sp. 825.*) Treipekrëitgen.

‡ Juin-Juillet.

Généralement cultivé comme condiment.

294. Hyssopus. (*L. Gen. 709.*) — Hysope. — Ysop.

766) *H. officinalis*. (*L. Sp. 796.*) T. n° 834.

‡ Juillet-Septembre.

Cultivé dans les jardins, quelquefois subspontané. Bellevue, Clausen, Pulvermühl. T. Vieux château d'Ansembourg. Kz.

295. Calamintha. (*Tournf. Inst. 92 ex parte.*)

767) *C. Acinos*. (*Clairv. in Gaud. Fl. Helv. IV. 84.*) *Thymus*

Acinos. (*L.*) T. n° 906.

① ou ② Juin-Août.

C. Champs pierreux, lieux arides, bords des chemins. R. Ardennes.

768) *C. officinalis*. (*Mönch. meth. 409.*) T. n° 907.

4 Juillet-Août.

R. Broussailles, bois, montagnes de la Moselle. Schengen, Remich. T.

769) ? *C. grandiflora*. (*Mönch. meth. 408.*) T. n° 908.

4 Juin-Septembre.

R. Broussailles aux environs de Remich. T.

296. Clinopodium. (*Tournf. Inst.* 92.) Clinopode. Wirbeldost.770) *C. vulgare.* (*L. Sp.* 821.) Bettfös. T. n° 904.

4 Juillet-Octobre.

C. Lisières et elairières des bois, haies, buissons, bords des chemins, lieux incultes. R Ardennes.

297. Melissa. (*Tournf. Inst.* 91 *ex parte.*) — Mélisse.771) † *M. officinalis.* (*L. Sp.* 827) T. n° 909.

4 Juin-Septembre.

AR. Cultivé dans les jardins et çà et là spontané au voisinage des habitations. Bofferdange. EF.

298. Satureia. (*L. Gen.* 707.) — Sarriette. — Pfefferkraut.772) † *S. hortensis.* (*Schk. Handb.* 1. 156.) Bōnekrēitchen.

① Juillet-Septembre. [T. n° 856]

Généralement cultivé dans les jardins comme condiment et très-souvent spontané.

Tribu V. — Lamioidæ. (*Coss. et Ger. l. c.*)**299. Nepeta.** (*L. Gen.* 710.) — Népéta. — Katzenminze.773) *N. Cataria.* (*L. Sp.* 796) T. n° 851.

4 Juin-Septembre.

AR. Bords des chemins, décombres, haies, buissons, villages, ruines, etc. Vianden. (Courtois). Ansembourg.!

300. Glechoma. (*L. Gen.* 714.) — Glechome. — Gundelrebe.774) *G. hederacea.* (*L. Sp.* 807.) Ablatz. Gūnnelrēw. Helrēw.

4 Avril-Mai. [T. n° 873.]

C. Lieux herbeux et ombragés, haies, buissons, bois, etc.

Var. *β. villosa.* (*Koch. Syn.* 647.) *G. hirsutum.* (*Rehb.*) T. n° 874.

C. Bois montueux.

301. Lamium. (*L. Gen.* 716 *emend.*) — Lamier. — Taubnessel.775) *L. amplexicaule.* (*L. Sp.* 809) T. n° 881.

① Avril-Octobre.

C. Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. R Ardennes.

776) *L. incisum.* (*Willd. Sp. III.* 89) T. n° 880.

① ou ② Avril-Octobre.

R. Lieux cultivés, bords des chemins. Fischbach. T.!

777) *L. purpureum.* (*L. Sp.* 809.) Rōd Brenndeschtel. T. n° 879.

① ou ② Mars-Octobre.

C. Lieux cultivés, moissons, bords des chemins.

- 778) *L. album.* (*L. Sp.* 809.) Weiss (Zahn) Brenndeschtel.
 Hunnegsäck. T. n° 875.
 4 Avril-Octobre.

C. Lieux herbeux, bords des chemins, haies, buissons.

- 779) *L. maculatum.* (*L. Sp.* 809) T. n° 877.
 4 Avril-Octobre.

AC. Buissons, haies, bords des chemins. Manque à l'Ardenne.

Var. β . *mutabile.* (*Dmtr. Pr.* 465.)

C. Avec l'espèce.

302. Galeobdolon. (*Hud. Fl. Angl.* 258.) — Galeobdolon. —
 Waldnessel.

- 780) *G. luteum.* (*Hud. l. c.*) Gîel Brenndeschtel. T. n° 887.
 4 Avril-Juin.

AC. Haies, buissons, bois, coteaux incultes.

303. Galeopsis. (*L. Gen.* 717 *ex parte.*) Galeopside. Hohlzahn.

- 781) *G. Tetrahit.* (*L. Sp.* 810.) Dahndeschtel. Hemmelsplauken.
 ① Juillet-Août. [T. n° 886.

C. Lisières des bois, buissons, haies, lieux incultes.

Var. β . *bifida.* (*Bönnig. Fl. Monast.* 178) . . . Dmtr. 475.

AC. Champs des Ardennes.

Var. γ . *cannabina.* (*Roth. Germ.* 254). T. n° 886b.

AC. Avec l'espèce.

- 782) *G. speciosa.* (*Mill. Dict.*) Versicolor. (*Curt.*) T. n° 885.
 ① Juillet-Août.

R. Moissons aux environs de Kockelscheuer Schrassig T.

- 783) *G. ochroleuca.* (*Lam. Dic.* 2. p. 600.) Villosa. (*Hud.*)
 ① Juin-Septembre. [T. n° 882.

C. par place dans les terrains sablonneux. Champs cultivés, lieux incultes.

- 784) *G. intermedia.* (*Vill. fl. Daup.* 2. p. 387. t. 9.) T. n° 883.
 ① Juillet-Octobre.

AC. par place. Lieux incultes, champs sablonneux. Kopstal, Ansenbourg,
 Fischbach, Dommeldange. T.

- 785) *G. Ladatum.* (*L. Sp.* 810.) angustifolia. (*Ehrh.*) T. n° 884.
 ① Juillet-Octobre.

C. Lieux pierreux, bords des chemins champs cultivés, moissons maigres. R.
 Ardennes.

304. Stachys. (*L. Gen.* 719.) — Epiaire. — Ziert.

- 786) *S. germanica.* (*L. Sp.* 812). T. n° 892.

② ou 4 Juillet-Août.

AR. Lieux pierreux, bords des chemins. Coteaux arides. Côtes de la Sûre entre Diekirch et Wallendorf. EF. Kz.

787) *S. alpina*. (L. Sp. 812) T. n° 891.

4 Juillet-Septembre.

R. Bois montueux, buissons. Esch s/S., Willz, Neunhausen, Rambrouch. T.

788) *S. silvatica*. (L. Sp. 811) T. n° 890.

4 Juin-Août.

C. Bois, buissons, lieux couverts.

789) *S. ambigua*. (Smith. Eng. bot. t. 2089) . . . T. n° 894.

4 Juillet-Septembre.

R. Bords des eaux, lieux humides. Feulen (Courtois.) Hunebour (Mersch) W. T.

790) *S. palustris*. (L. Sp. 811.) Wel Brenndeschtel. T. n° 893.

4 Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux, lieux humides, champs frais, etc.

791) *S. arvensis*. (L. Sp. 814) T. n° 895.

① Juillet-Octobre.

C. Champs un peu humides inondés l'hiver. R. Ardennes.

792) *S. annua*. (L. Sp. 813) T. n° 896.

① ou ② Juillet-Octobre.

C. Champs secs, lieux pierreux, bords des chemins.

793) *S. recta*. (L. Mant. 82.) *S. sideritis*. (Vill. Dauph. 4. 375.)

4 Juin-Septembre. [T. n° 897.

AR. Coteaux arides, rochers, lisière des bois montueux. Moselle, Dmtr. 456. Palmborg, (Machthum) BB. ! Pulvermühl (Courtois) ! Clausen. BB. !

305. *Betonica*. (L. Gen. 718.) — Betoine. — Batunge.

794) *B. officinalis*. (L. Sp. 810.) Antonisthee. Bartuneckel.

4 Juin-Septembre. [T. n° 888.

C. Lisières et clairières des bois frais, secs.

Var. β . *stricta*. (Ait. Kew. 1. 299) T. n° 889.

AR. Avec l'espèce, dans les Ardennes surtout.

306. *Marrubium*. (L. Gen. 721 *ex parte*.) Marrube. Andorn.

795) *M. vulgare*. (L. Sp. 816.) Helfkraut. . . . T. n° 898.

4 Juin-Octobre.

AC. par place. Haies, décombres, bords des chemins, coteaux arides au-dessous des ruines de Hesperange. BL. ! Ansembourg, château et village. DW.

307. *Ballota*. (Tournf. Inst. 85.) — Ballote. — Schattenkraut.

796) *B. nigra*. (*L. Sp.* 810.) *B. foetida*. (*Lmk.*) Gottesvergess.
 4 Juin-Septembre. [T. n° 899.

C. Lieux incultes, haies, buissons, bois.

Var. *β. ruderalis*. (*Koch. Syn.* 637.) *B. vulgaris*. (*Lmk.*) T. n° 900.
 Avec l'espèce.

Var. *γ. saepium*. (*Lej. Fl. Spa. II.* 29). T. n° 899b.
 Avec l'espèce.

308. *Leonurus*. (*L. Gen.* 722.) — Agripaume. — Herzgespann.

797) *L. Cardiaca*. (*L. Sp.* 817) T. n° 901.
 4 Juin-Septembre.

AR. par place. Haies, décombres, voisinage des habitations. Ruines du château de Bourscheid. EF. Ansembourg. DW.

798) ? *L. Marrubiastrum*. (*L. Sp.* 814) T. n° 902.

② ou 4 Juin-Août.

R. Lieux secs, incultes, environs du Zolverknap. T.

Tribu VI. — Scutellarineæ. (*Benth. lab. p.* 416.)

309. *Brunella*. (*Tournf. Inst.* 84.) — Brunelle. — Brunelle.

799) *B. vulgaris*. (*L. Sp.* 837) T. n° 910.
 4 Juillet-Août.

C. Bords des chemins, prés secs, pelouses, bois.

Var. *β. pennatifida*. (*Pers. syn.* 2. 137.)

AR. Avec l'espèce.

Var. *γ. surrecta*. (*Dmtr. P.* 442.)

AG. Avec l'espèce.

800) *B. grandiflora*. (*Jacq. Aust. IV.* 1. 377) . . . T. n° 911.
 4 Juillet-Septembre.

R. Clairières des bois montueux, pelouses sèches du calcaire de la Moselle.

801) *B. alba*. (*Pallas. ap. M. Bub. Fl. Taur. cam.* 2. 67.) *laciniata*.
 4 Juillet-Août. [T. n° 912.

AG. Coteaux secs, pelouses, bords des chemins du terrain calcaire. Canach. T. Schengen, Ehnlen. T ! Mertert. R. BB. !

310. *Scutellaria*. (*L. Gen.* 734.) — Scutellaire. — Helmer.

802) *S. galericulata*. (*L. Sp.* 836.) Scheldkraut. . . T. n° 913.
 4 Juin-Septembre.

C. Bords des eaux, étangs, déversoirs ombragés, lieux frais R. Ardennes.

803) *S. minor*. (*L. Sp.* 835) T. n° 914.
 4 Juillet-Septembre.

R. Lieux marécageux, tourbeux, bois humides, surtout en Ardennes.

Tribu VII. — Ajugoideæ. (*Benth. l. c.* 657.)**311. Ajuga.** (*L. Sp.* 705 *ex parte.*) — Bugle. — Günsel.804) *A. reptans.* (*L. Sp.* 783) T. n° 845.

24 Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages, bords des chemins, bois, lieux ombragés.

Var. *β. alpina.* (*Vill. Dauph.* 2. p. 347 *non L.*) Sans stolon.

[T. n° 845d.

R. Avec l'espèce. Stromberg (Schengen), moins rares en Ardennes.

805) *A. pyramidalis.* (*L. Sp.* 783) T. n° 846.

24 Mai-Juin.

R. Bruyères, pâturages, clairières des bois montueux. Stolzembourg, Rambrouch, Folschette. T.

806) *A. genevensis.* (*L. Sp.* 783) T. n° 847.

24 Juillet-Août.

AR. Coteaux secs, lieux pierreux. Fayencerie, Neudorff, Dommeldange. K. T. de la Syre. R.

807) *A. Chamæpitys.* (*Schreb. unilab.* p. 24). T. n° 848.

① Mai-Août.

AC par place. Moissons des terrains maigres. Champs pierreux, argileux, calcaires. Environs de Luxembourg. Sch. Dudelaenge, Ehnen T. Kleeberg entre Remerschen et Schengen. BB. !

312. Teucrium. (*L. Gen.* 708 *ex parte.*) Germandier. Germander.808) *T. Scorodonia.* (*L. Sp.* 789) T. n° 850.

24 Juillet-Septembre.

C. Bois, buissons, haies, lieux pierreux, bords des chemins.

809) *T. Botrys.* (*L. Sp.* 786) T. n° 849.

① Juillet-Octobre.

AC. Coteaux calcaires, champs sablonneux, lieux pierreux. Echternach, Mertert. R. ! Schengen. M.

Var. *β. alba.* (*T. fl. L.* 292) T. n° 849b.

C. Fels (Schengen).

810) ? *T. Scordium.* (*L. Sp.* 790) T. n° 851.

24 Juin-Octobre.

R. Prairies humides, bords des eaux et des marais. Mandelbach. K. Blachette. T.

811) *T. Chamædrys.* (*L. Sp.* 791) T. n° 852.

24 Juillet-Septembre.

C. Lieux pierreux, coteaux arides. Beggen. BB. Rochers, bois montueux. Kæmpgen. Fohren (Courtois). Manternach, Mertert. R. de la Sûre, Echternach, (Brimmeyr père), et de la Moselle, Fels (Schengen).

812) *T. montanum*. (*L. Sp.* 791) T. n° 850.

4 Juin-Septembre.

R. Coteaux arides, calcaires et sablonneux. Environs d'Ospern. Md.

Var. *β. supinum*. (*Jacq. a. t.* 417.)

R. Hauteur de Bettendorf à gauche de la Sûre. (Courtois).

LXVII. VERBENACEAE.

(Juss. in *Ann. Mus.* VII, 637)

313. *Verbena*. (*Tournf. Inst.* 94.) Verveine. Eisenbart. [XIV, 2.]

813) *V. officinalis*. (*L. Sp.* 295) T. n° 844.

② ou 4 Juin-Octobre.

C. Bords des chemins, fossés, lieux incultes. R. Ardennes.

CLASSE II. — Gamopétales périgynes.

LXVIII. VACCINEAE.

(DC. *Théor. élém.* éd. 1. 216.) [VIII, 1]

314. *Vaccinium*. (*L. Gen.* 483 *ex parte.*) Airelle. Heidelbeere.

814) *V. Vitis-idæa*. (*L. Sp.* 500) T. n° 585.

‡ Mai-Juillet.

BL. Bruyères, pâturages, bois : environs de Troine. Kz Echternach. (Brim.)

815) *V. Myrtillus*. (*L. Sp.* 498.) Mûlièr T. n° 586.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Juillet.

C. Manque sur de grands espaces. Bois, bruyères des terrains sablonneux et schisteux.

315. *Oxycoccus*. (*Tournf. Inst.* 431.) Canneberge. Moosbeere.

816) *O. palustris*. (*Pers. syn. pl.* 1. 419) T. n° 586.

‡ Avril-Juillet.

AR. Marais, tourbières, bruyères, taillis et bois fangeux des Ardennes.

LXIX CAMPANULACEAE.

(Juss. *Gen.* 163 *ex parte.*) (V, 1.)

316. *Campanula*. (*Tournf. Inst.* 37.) — Campanule. —
Glockenblume.

817) *C. Rapunculus*. (*L. Sp.* 232.) Raponzel. Gartegrand.

4 Juin-Août. [T. n° 358.]

C. Pelouses, prairies, haies, bruyères, lisières des bois.

818) *C. persicæfolia*. (*L. Sp. ed.* 1. 164.) Klackebloom. T. n° 359.

4 Juin-Août.

AC. Clairières des bois, taillis, buissons herbeux ; aussi en Ardennes.

819) † *C. pyramidalis*. (*L. Sp.* 232.)

② Juillet-Août.

C'est la plante *C.* cultivé sur les fenêtres pour former berceau.

820) *C. rotundifolia*. (*L. Sp.* 232) T. n° 334.

‡ Juillet-Septembre.

C. Murs, bords des chemins et des champs, rochers, pâturages, pelouses, bruyères.

821) ? *C. rapunculoides*. (*L. Sp.* 234) T. n° 363.

‡ Juillet-Septembre.

AR. Jardins incultes, lieux cultivés, voisinage des habitations.

822) *C. Trachelium*. (*L. Sp.* 233) T. n° 362.

‡ Juillet-Septembre.

AC Bois montueux, buissons, lieux couverts, murs. AR. Ardennes, C. Moselle. Manque sur de grands espaces.

Var. β . *urticaefolia*. (*Schmidt. bot.* 173) T. n° 361.

Avec l'espèce.

823) *C. Medium*. (*L. Sp.* 236) EF. 173.

‡ Juillet-Septembre.

Cultivé et quelquefois échappé dans le voisinage des habitations.

824) *C. glomerata*. (*L. Sp.* 235.) Fangerhut. . . . T. n° 364.

‡ Juin-Septembre.

C. Prairies, pelouses, pâturages secs, lieux incultes, herbeux, lisières des bois, etc. AR. Ardennes.

Var. β . *pumila*. (*C. et Germ. Fl. P.* 427.)

Var. γ . *elliptica*. (*Kit. ap. Schult. öst. Fl.* 1. 410.)

Var. δ . *salviifolia*. (*Wall. Sched.* 90.)

Var. ϵ . *aggregata*. (*Willd. in Hort. Berol. supp.* 10.)

Var. ζ . *speciosa*. (*Horn. Hufn.* 2. 957.)

Avec l'espèce.

825) ? *C. Cervicaria*. (*L. Sp.* 235) T. n° 365.

② ou ‡ Juillet-Août.

R. Bois, collines arides. Reckingen, Blaschette. T.

826) *C. patula*. (*L. Sp.* 232) T. n° 357.

② Mai-Juillet.

AR. Coteaux boisés, buissons. Rambrouch, Neunhausen. T. Entre la Merkolzer- et la Toutschenmühle. (Wiltz.) DW.

317. *Specularia*. (*Heid. Syst. pl. Gen.* 8.) — Spéculaire. —
Venusspiegel.

- 827) *S. speculum*. (*Alph. DC. Camp.* 346.) *Prismatocarpus speculum*. (*DC.*) T. n° 366.

① Mai-Août.

AC. Moissons, lieux cultivés, champs en friche, bords des chemins, etc.

- 828) *S. hybrida*. (*Alph. DC. l. c.* 349) T. n° 367.

① Juin-Juillet.

AR. Jachères et moissons des champs arides.

318. *Phyteuma*. (*L. Gen.* 89.) — Raiponce. — Teufelskrallen.

- 829) ? *P. orbiculare*. (*L. Sp.* 242) ¹⁾ T. n° 352.

‡ Juin-Août.

R. Clairières des bois, pelouses arides, pâturages des coteaux calcaires. Moselle, Grönenwald. T. Neumühl (Mandelbach). Schwanenthal (Hunsdorf). BL.

- 830) *P. spicatum*. (*L. Sp.* 242.) Rapunzel T. n° 353.

‡ Mai-Juin.

C. Bois, pâturages, prairies.

Var. *β. nigrum*. (*Schmidt. bot.* 2. 189.) *Perdsblum*.

Cette variété est la plus commune dans le bon pays, tandis que le type à fleur blanche est surtout abondant en Ardennes.

319. *Jasione*. (*L. Gen.* 455.) — Jasione. — Monke.

- 831) *J. montana*. (*L. Sp.* 1317) T. n° 390.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Lieux secs et sablonneux, coteaux arides, bruyères, bords des chemins.

- 832) ? *J. perennis*. (*Lam. Dict.* 3. p. 216) T. n° 391.

‡ Juin-Août.

R. Lisières des bois, lieux arides. Echternach, Rosport. T. Ardennes T.

Var. *β. humilis*. (*Pers. syn.* 2. 215) T. n° 392.

R. Champs secs et arides aux environs de Rambrouch. T.

320. *Wahlenbergia*. (*Schrad. Cat. Hort. Gætt. an.* 1814.) —

Wahlenbergie. — Klingel.

- 833) *W. hederacea*. (*L. Sp.* 240.)

‡ Juin-Juillet.

R. par place. Pâturages, près marécageux et tourbeux de l'Ardenne, entre Erpeldange et Kautenbach. (Bockholz.)

1) La plante de l'herbier de Tinant, ainsi que ce qui nous a été communiqué par d'autres sous ce nom n'est pas *P. orbiculare*. C'est une variété de *P. spicatum*, [*P. ovatum* (*Willd.*)] qui a été prise pour le n° 829. Celui-ci reste donc à rechercher.

LXX. CUCURBITACEAE.

(Juss. Gen. 393.) [XXI, 9.]

321. Bryonia. (*L. Gen.* 508.) — Bryone. — Zaunrübe.834) *B. dioica.* (*Jacq. Aust. II.* 59. t. 199.) Schwengswurzel.

‡ Juin-Juillet.

[T. n° 1426.

C. Haies, buissons, voisinage des habitations.

322. Cucumis. (*L. Gen.* 508.) — Concombre. — Gurke.835) † *C. sativus.* (*L. Sp.* 1437.) Cornischong.

① Mai-Juillet. Fr. Août-Septembre.

C. Cultivé en plusieurs variétés dans les jardins R. Ardennes.

836) † *C. Melo.* (*L. Sp.* 1436.) Melön.

① Mai-Juillet. Fr. Juillet-Septembre.

AR. Cultivé.

323. Cucurbita. (*L. Gen.* 1091.) — Courge. — Kürbiss.837) † *C. maxima.* (*Duch. in Lmk. Ency. méth. II.* 151.) Calebàs.

① Juin-Août: Fr. Septembre-Novembre.

C. Cultivé.

838) *C. Pepo.* (*DC. Prod. III.* 316.) Calebàs.

① Juin-Août. Fr. Septembre-Octobre.

Cultivé dans les jardins.

LXXI. CAPRIFOLIACEAE.

(A. Richd. in dict. class. III. 172.)

Tribu I. — Sambuceæ. (*H. B. et K. nov. gen. am.* 3. 487.)**324. Adoxa.** (*L. Gen.* 198.) — Adoxe. — Bisamkraut. [VIII, 4.]839) *A. Moschatellina.* (*L. Sp.* 527) T. n° 689.

‡ Mars-Avril.

C. Lieux frais, haies, buissons, broussailles, taillis.

325. Sambucus. (*L. Gen.* 372.) — Sureau. — Hollunder. [V, 3.]840) *S. Ebulus.* (*L. Sp.* 385.) Rôden Hîelenter. . . T. n° 492.

‡ Juillet-Août.

C. Lieux cultivés ou pierreux, bords des chemins et des fossés des terrains gypseux et calcaires AR. Ardennes. Manqué sur de grands espaces.

841) *S. nigra.* (*L. Sp.* 385.) Hîelenter. T. n° 493.

‡ Juin-Juillet.

AR. Haies, bois taillis. AC. Ardennes.

Var. *β. lacianata.* (*Rehb. Ic.* 1438) T. n° 493b.

R. Dans les haies près d'Everlange. T. Eicherberg, Limpertsberg. M.

- 842) *S. racemosa*. (*L. Sp.* 386.) Welken Hefelenter. T. n° 494.
 ‡ Avril-Mai.

AC. Bois montueux.

326. Viburnum. (*L. Gen.* 143.) — Viorne. — Schwelch. [V, 3.]

- 843) *V. Lantana*. (*L. Sp.* 384.) Sametholz. Moderselchen.
 Monzelter. Motler. T. n° 490.
 ‡ Mai. Fr. Août-Octobre.

C. Haies, taillis, bois montueux des terrains calcaires. AC. Ardennes.

- 844) *V. Opulus*. (*L. Sp.* 384.) Ierben. Weisse Faulbâm. T. n° 491.
 ‡ Mai-Juin.

AC. Haies, taillis, endroits humides des bois.

Var. β . *sterilis*. (*Hort.*)

C. Cultivé sous le nom de Boule-de-neige.

Trihu II. — Lonicereæ. (*Brown, Char. et deser. p. 4.*)

327. Lonicera. (*L. Gen.* 93 *ex parte.*) — Chèvre-feuille. —
 Geisblatt. [V, 1.]

- 845) *L. Xylostemum*. (*L. Sp.* 248.) Schlaufhölzchen. T. n° 369.
 ‡ Mai-Juin. Fr. Juillet-Septembre.

C. Haies, taillis, clairières des bois, etc.

- 846) *L. Periclymenum*. (*L. Sp.* 247.) Rankelter. Judesël.
 ‡ Juin-Septembre. Fr. Août-Octobre. [T. n° 368.]

C. Haies, buissons, bois.

- 847) † *L. caprifolium*. (*L. Sp.* 246.) Geesblât . . EF. 179.
 ‡ Mai-Juillet. Fr. Juillet-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois naturalisé dans les haies et les bois. Fels-lez-Schengen. BB. !

328. Symphoria. (*Pursh.*) — Symphoricarpe. — Peterstrauch.

- 848) † *S. racemosa*. (*Michaux.*) Dödeblê . . . EF. 180.
 ‡ Juillet-Septembre. Fr. Octobre-Novembre.

C. Planté dans les jardins et les bosquets; souvent subspontané.

LXXII. RUBIACEAE.

(*Juss. Gen.* 196 *ex parte.*) [IV, 1.]

329. Sherardia. (*L. Gen.* 50.) — Scherardie. — Schwarde.

- 849) *S. arvensis*. (*L. Sp.* 149) T. n° 264.
 ① Mai-Octobre.

C. Moissons, lieux cultivés. R. Ardennes.

330. *Asperula*. (L. Gen. 50.) — Asperule. — Meister.850) † *A. arvensis*. (L. Sp. 150) T. n° 261.

① Juin-Octobre.

Cultivé dans les jardins pour ses fleurs bleues.

851) *A. odorata*. (L. Sp. 150.) Waldmeschter. Meekraut.

‡ Mai-Juin. [T. n° 262.

AC. Bois humides. AR. Ardennes.

852) *A. Cynanchica*. (L. Sp. 151) T. n° 263.

‡ Juin-Septembre.

C. Coteaux arides, pelouses, bords des chemins sablonneux et pierreux.

853) *A. galioides*. (M. Bieberst. fl. Taur. cauc. I. 101.) T. n° 247.

‡ Juillet.

R. Prairies aux environs de Simmern. T. Jachères argilo-calcaires au-dessous le Bochholzhof. (Flaxweiler.) EF. Kz.

331. *Galium*. (L. Gen. 52.) — Gaillet. — Labkraut. [IV, 1.]854) *G. Cruciata*. (Scop. Fl. Carn. 1. 100) T. n° 260.

‡ Avril-Juin.

C. Haies, buissons, bois, endroits découverts des bois.

855) *G. verum*. (L. Sp. 155) T. n° 245.

‡ Juin-Septembre.

C. Pelouses sèches, prairies, bords des chemins, lisières des bois.

856) *G. silvaticum*. (L. Sp. 155) T. n° 246.

‡ Juin-Août.

AR. Bois montueux de l'Ardenne. Esch s/S. (Courtois). Schimpach. EF. Kz.
R. ailleurs. Mandelbach. Kz. Grünenwald, Moselle. T.857) *G. Mollugo*. (L. Sp. 155.) *G. elatum*. (Thuil.) T. n° 249.

‡ Mai-Juin.

C. Bords des chemins, haies, buissons, lisières des bois, pâturages, prairies.

858) *G. erectum*. (Huds. fl. Angl. 68.) *G. lucidum*. (Al.)

‡ Mai-Juin. [T. n° 250.

R. Pâturages, prairies. Ardennes. Rambrouch. T. C. et L. 298.

859) *G. silvestre*. (Poll. Palat. I. 151.) *G. læve*. (Thuil.) T. n° 251.

‡ Juin-Juillet.

C. Lisières des bois, bords des chemins, coteaux arides, rochers, bruyères.

Var. β . *supinum*. (DC. Fl. Fr. 1. 789) T. n° 253.

AC. Avec l'espèce.

860) *G. saxatile*. (L. Fl. suec. ed. 2. 463.) *Hercynicum*. (DC.)

‡ Juillet-Août. [T. n° 254, 255.

R. Manque sur de grands espaces. Bois montueux, bruyères, rochers humides, tourbières des terrains arenacés, au-dessus d'Erpeldange. T. C. Ardennes.

861) *G. palustre*. (*L. Sp.* 153) T. n° 248.
 4 Mai-Juillet.

AC. Prés marécageux, pelouses humides, fossés, marais, bords des étangs.

862) *G. uliginosum*. (*L. Sp.* 153) T. n° 252.
 4 Juin-Septembre.

AC. Prairies marécageuses et tourbeuses, fossés, bords des eaux.

863) *G. Aparine*. (*L. Sp.* 157.) Klieb T. n° 258.
 ① ou ② Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, moissons, haies, buissons, bois.

Var. β . *Vaillantii*. (*DC. Fl. Fr. IV.* 263) T. n° 259.

AC. Moissons.

Var. γ . *spurium*. (*L. Sp.* 154) T. n° 256.

R. Avec l'espèce dans les champs de lin.

864) *G. tricorné*. (*With. Brit. ed.* 2. 153). T. n° 257.
 ① Juillet-Septembre.

AC. Jachères et moissons maigres, lieux cultivés.

LXXIII. VALERIANEAE.

(*DC. Fl. Fr. IV.* 232.) [IV, 1.]

332. † *Centranthus*. (*Neck. Elem. I.* 123.) — Centranthe. —
 Spornblume.

865) *C. ruber*. (*DC. fl. Fr. IV.* 239.) Barbe de Jupiter. EF. 183.
 4 Juin-Août.

C. Cultivé, quelquefois subspontané sur les vieux murs et les décombres.

333. *Valeriana*. (*L. Gen.* 22.) — Valériane. — Baldrian.

866) *V. officinalis*. (*L. Sp.* 45.) Baltes T. n° 38.
 4 Juillet-Septembre.

AC. Manque sur de grands espaces. Bords des eaux, lieux frais, prairies, bois.

Var. β . *exaltata*. (*Mikan, ap. Pohl. tentam fl. boëm. I.* p. 41.)

R. Avec le type L et C.

867) † *V. Phu*. (*L. Sp.* 45). T. n° 39.
 4 Mai-Juin.

Cultivé et quelquefois subspontané aux bords des eaux.

868) *V. dioica*. (*L. Sp.* 44). T. n° 40.
 4 Avril-Juin.

C. Bois humides, prairies marécageuses et tourbeuses.

334. *Valerianella*. (*Tournf. Inst.* 32.) Valérianelle. Nissel.

869) *V. olitoria*. (*Poll. Palat. I. 30.*) Cabiset. Meissëerchen.

① Avril-Juin. [T. n° 41.

C. Lieux cultivés, champs, vignes, vieux murs. Cultivé pour salade dite Doucette.

870) *V. carinata*. (*Lois. Not. 149*) T. n° 42.

① Avril-Juin.

AR. Moissons, lieux cultivés, décombres, etc.

871) *V. auricula*. (*DC. Fl. Fr. supp. 492*) T. n° 47.

① Juin-Août.

AC. Lieux cultivés, jachères et moissons.

872) *V. Morisonii*. (*DC. Prod. IV. 627.*) *V. dentata*. T. n° 43.

① Juin-Septembre.

AC. Lieux cultivés, moissons, etc.

873) ? *V. eriocarpa*. (*Desv. Journ. Bot. II. 314*) . . . T. n° 48.

① Mai-Juin.

R. Moissons. Kahlscheuer (Kopstal) T.

874) *V. coronata*. (*DC. Fl. Fr. IV. 241.*) *hamata*. (*Lj.*) T. n° 45, 46.

① Juillet-Août.

R. Jachères et moissons des terrains sablonneux. Blaschette. T. Kahlscheuer. T.

875) *V. vesicaria*. (*Mönch. meth. 493*) T. n° 44.

① Juin-Juillet.

R. Lieux cultivés. Blaschette. T.

LXXIV. DIPSACEAE.

(*DC. Fl. Fr. 221.*) [IV, 1.]

335. Scabiosa. (*L. Gen. 48 ex parte.*) — Scabieuse. — Scabiose.

876) *S. Columbaria*. (*L. Sp. 143.*) Grandkraut . . . T. n° 234.

‡ Juillet-Octobre.

C. Lieux herbeux, lisières des bois, bords des chemins, rochers, etc.

Var. β . *pratensis*. (*Jordan. Pug. 91*) T. n° 234d.

Avec l'espèce.

Var. γ . *patens*. (*Jordan. l. c. 94*) T. n° 234c.

Avec l'espèce.

877) *S. Succisa*. (*L. Sp. 142*). T. n° 230.

‡ Juillet-Octobre.

C. Pâturages, prés, clairières des bois.

878) † *S. atropurpurea*. (*L. Sp. 144.*)

① Juillet-Octobre.

C. Cultivé sous le nom de *Fleur des Veuves*.

336. Knautia. (*Coult. Dips.* 28.) — Knautie.879) *K. arvensis.* (*Coult. l. c.* 29.) *Scabiosa arvensis.* T. n° 232.

24 Juin-Août.

C. Prairies, champs herbeux, lisières des bois, bords des chemins.

880) ? *K. silvatica.* (*Dub. bot. gall.* 1. 257) . . . T. n° 233.

24 Juin-Juillet.

AR. Bois montueux.

337. Dipsacus. (*L. Gen.* 114.) — Cardon. — Karde.881) *D. silvestris.* (*Mill. Dict.* n° 2) . . . T. n° 226.

② Juillet-Septembre.

C. Lieux incultes, bords des chemins, manque par place.

882) ? *D. Fullonum.* (*Mill. Dict.* 1). . . T. n° 227.

② Juillet-Août.

R. Autrefois cultivé, souvent subspontané. Echternach. T. Geigeberg. BL. !

883) *D. pilosus.* (*L. Sp.* 141). . . T. n° 229.

② Juin-Août.

AC. Bords des ruisseaux, haies, buissons, bords des chemins.

LXXV. COMPOSITAE.

(Adans. Fam. II. 103.) *Synantheræ.* (Rich. in Marth. Cat. jard. med.

Par. 1801. 85.) [XIX.]

Sous-ordre I. — Tubulifloræ. (*Endl. gen.* 356.)Tribu I. — Cynarocephalæ. (*Juss. gen.* 171.)Sous-tribu I. — Carduineæ. (*Lessing. syn.* 8.)**338. Onopordon.** (*L. Gen.* 409 *ex parte.*) Onoporde. Eselsdistel.884) *O. Acanthium.* (*L. Sp.* 1158). . . T. n° 1175.

② Juin-Septembre.

AR. Bords des chemins, décombres, lieux incultes, manque sur de très-grands espaces. C. Aux environs de Luxembourg du côté de l'ancienne Porte-Neuve.

339. Carlina. (*Tournef. Inst.* 285.) — Carline. — Eberwurz.885) *C. vulgaris.* (*L. Sp.* 1161.) Drâmdeschtel. T. n° 1197.

② Juillet-Septembre.

C. Coteaux secs arénacés, pâturages, bois, bords des chemins. AR. Ardennes.

340. Cinara. (*Vaill. Act. acad. Par.* 1718. 155.) — Artichaut. — Artischoke.886) † *C. Scolymus.* (*L. Sp.* 1159.) Artichô.

24 Août-Septembre.

AR. Cultivé dans les jardins potagers.

341. Cirsium. (*Tournf. Inst.* 255.) — Cirse. — Kratzdistel.887) *C. lanceolatum.* (*Scop. Carn. fl. II.* 130.) Deschtel.

(2) Juin-Septembre. [T. n° 1190.

C. Bords des chemins, villages, décombres, lieux incultes, bois.

Var. β . *nemorale.* (*Richb. fl. ex. p.* 286) . . . T. n° 1191.

R. Grünenwald au-dessus des forges de Dommeldange. T.

888) *C. eriophorum.* (*Scop. fl. Carn. II.* 130) . . T. n° 1189.

(2) Juillet-Août.

R. Coteaux pierreux, bords des chemins, décombres, lieux incultes des terrains calcaires, Bellevue, Glacis du Limpertsberg. T.!

889) *C. palustre.* (*Scop. fl. Carn. II.* 130) . . . T. n° 1195.

(2) Juin-Août.

C. Prairies humides, endroits marécageux, tourbières, etc.

890) *C. acaule.* (*All. Ped. I.* 153.) Hondsdeschtel. Pläut.

4 Juillet-Septembre. [T. n° 1188.

C. Collines sèches, lieux herbeux, pâturages, bords des chemins, lisières des bois.

Var. β . *caulescens.* (*C. dubium. Willd.*). . . T. n° 1188b.

R. Avec l'espèce.

Var. γ . *decoloratum.* (*Koch, syn. ed.* 2. 398.)

R. Bords des chemins et prés humides.

891) *C. arvense.* (*Lmk. Fl. Fr. II.* 26.) Deschtel. T. n° 1193.

(1) ou 4 Juin-Septembre.

C. Bords des chemins, décombres, champs cultivés ou en friche.

Var. β . *setosum.* (*M. Bieb. fl. Tauric. cauc.* 3. 560.) T. n° 1194.

AR. Avec l'espèce dans les lieux ombragés.

892) *C. oleraceum.* (*All. Ped. I.* 149.) Wiesendeschtel.

4 Juillet-Août.

[T. n° 1196.

AC. Prairies humides, marécageuses, bords des eaux; manque sur de grands espaces.

342. Carduus. (*L. Gen.* 925 *ex parte.*) — Chardon. — Distel.893) *C. tenuiflorus.* (*Sm. Brit.* 849) . . . T. n° 1182.

(2) Juin-Août.

R. Très-fugace; bords des chemins, lieux incultes: Mersch. T.

894) ? *C. multiflorus.* (*Gaud. helv.* 5. 166.) *C. polyanthemus.*

(2) Juin-Juillet.

[T. n° 1183.

R. Lieux incultes, humides; au-dessus de Dommeldange. T.

895) *C. crispus.* (*L. Sp.* 1150) . . . T. n° 1186.

(2) Juillet-Septembre.

C. Prairies, bords des eaux, broussailles et bois humides.

896) *C. nutans*. (*L. Sp.* 1150) T. n° 1185.

② Juin-Août.

C. Bords des chemins, champs en friche, lieux incultes.

897) *C. acanthoides*. (*L. Sp.* 1150) T. n° 1187.

② Juin-Juillet.

AR. Bords des chemins, lieux incultes, bois. Bords de la Sûre aux environs d'Echternach. T. Bellevue. Kz.

343. *Silybum*. (*Vaill. Act. acad. Par.* 1718. 172.) — Silybe. — Mariendistel.

898) † *S. marianum*. (*Gærtn. Fruct. II.* 377.)

① Juin-Août.

R. Autrefois cultivé, souvent subsponsané dans le voisinage des habitations. Tuntingen DW. Stierchen. (Grund.) Clausen, Bofferdange. Kz.

Sous-tribu II. — *Centaureæ*. (*DC. Diss. p.* 23.)

344. *Lappa*. (*Tournf. Inst.* 256.) — Bardane. — Klette.

899) *L. officinalis*. (*All. ped. 1. p.* 145.) Klèd. Wolfskraut.

Lappa major T. n° 1180.

② Juillet-Août.

C. Lieux incultes un peu humides, bords des chemins. R. Ardennes.

900) *L. glabra*. (*Lmk. Dic. 1. p.* 377 *pro parte.*) *L. minor*.

② Juillet-Septembre. [T. n° 1179.

C. Bois, bords des chemins, lieux incultes.

901) *L. nemorosa*. (*Körninke.*) *L. macrosperma*. (*Wallr.*)

② Juillet-Août.

R. Bois des terrains gypseux. Herborn (Ilse).

902) *L. tomentosa*. (*Lmk. Dic. 1.* 377.) A. Bardana. T. n° 1178.

② Juillet-Août.

R. Bords des chemins, lieux incultes. AR. Sur la Moselle.

345. *Serratula*. (*L. Gen.* 924 *ex parte.*) — Sarète. — Scharte.

903) *S. tinctoria*. (*L. Sp.* 1144) T. n° 1181.

4 Juillet-Septembre.

AC. par place. Bois taillis, prairies, pâturages, Echternach. (Brimmeyr père). Diekirch. C. et L. 1426. Cessingen. Md. EF. ! Christnach, Blaschette, Everlange, etc. T. Herborn, (Ilse). Wintrange. BB ! R. Ardennes.

346. *Centaurea*. (*L. Gen.* 984 *ex parte.*) Centaurée. Flockenblume.

904) *C. Calcitrapa*. (*L. Sp.* 1297) T. n° 1262.

② Juillet-Septembre.

C. Lieux secs, pierreux, bords des chemins de la vallée de la Moselle. T. !
Glacis entre la route du Limpertsberg et du Rollingergrund. BL. ! Mondorf. EF.
Manque sur de grands espaces.

905) *C. solstitialis*. (L. Sp. 1297) EF. 192.

① ou ② Juillet-Septembre.

R. Prairies artificielles. Talus du chemin de fer au Wackeberg, entre Gaspe-
rich, Hollerich et Bonnevoie. (Goerens) EF. Bissen, (Mersch-Faber.) !

906) *C. Cyanus*. (L. Sp. 1289.) Blo Kuørblum. . . T. n° 1260.

① ou ② Juin-Août. Refl. quelquefois à l'automne.

C. Champs, moissons, prairies artificielles.

907) *C. montana*. (L. Sp. 1289) T. n° 1261.

¼ Juillet-Août.

AR. Bois montueux, lieux ombragés de l'Ardenne entre Wiltz et Kautenbach.
Feschtertunnel (Kautenbach) BL. ! Stolzembourg. EF.

908) *C. Scabiosa*. (L. Sp. 1291) T. n° 1259.

¼ Juin-Août.

C. Coteaux calcaires, arides, bords des chemins, pâturages.

909) *C. maculosa*. (Lam. Ency. 1. 669) Wtg. p. 692.

¼ Juillet-Septembre.

R. Lieux incultes, exposés au soleil, ravins, murs de la vallée de la Moselle
de Schengen à Wasserbillig. Wtg.

910) *C. Jacea*. (L. Sp. 1293.) Hartknep. T. n° 1255.

¼ Juillet-Octobre.

C. Prés secs, pelouses, coteaux herbeux, lisières des bois.

Var. β . pratensis. (Thuill. Fl. Par. 441.)

C. Prairies et bois de la Moselle.

Var. γ . serotina. (Boreau. Fl. Cent. Fr. 1330). . . T. n° 1255d.

¼ Juillet-Octobre.

AR. Lieux secs, pelouses montagneuses. Mondorf, Moselle. A. EF. Kz.

Var. δ . angustifolia. (Rechb.) Duboisii. (Boreau. l. c. 1328.)

[T. n° 1255c.

R. Lieux secs, bords des chemins.

Var. ϵ . decipiens. (Thuill. fl. par. ed. 2. 445.)

AR. Avec le type dans les prairies.

911) *C. nigrescens*. (Willd. Sp. 3. 2288) T. n° 1256.

¼ Juillet-Août.

AC. Prés secs, pelouses des coteaux de la Moselle où on le confond avec *C. Jacea*,

Var. β .

- 912) ? *C. phrygia*. (*L. Sp.* 1287) T. n° 1258.
 4 Juillet-Août.

R. Prés montagneux, bois, par place. Angelsberg. T.

- 913) *C. nigra*. (*L. Sp.* 1288) T. n° 1257.
 4 Juillet-Août.

AR. Lieux montueux de l'Ardenne. R. ailleurs.

347. Echinops. (*L. Gen.* 453.) — Echinops. — Kugeldistel.

- 914) † *E. spærocephalus*. (*L. Sp.* 1314) . . . EF. n° 194.
 4 Juillet-Août.

AC. Cultivé et subspontané dans le voisinage des habitations. Bellevue. (Courtois).

Trihu II. — *Corymbiferae*. (*Vaill. Juss. Gen.* 177.)

Sous-tribu I. — Heliantheae. (*Lessing, syn.* 205)

348. Bidens. (*L. Gen.* 412.) — Bident. — Wasserdost.

- 915) *B. tripartita*. (*L. Sp.* 1165.) Strëpatsch . . T. n° 1215.
 ① Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux, étangs, fossés, marais.

- 916) *B. cernua*. (*L. Sp.* 1165) T. n° 1216.
 ① Août-Septembre.

C. Lieux humides, marécageux, fossés, bords des étangs et des rivières.

Var. β . *radiata*. (*DC. Coreopsis bidens. L. Sp.* 1281.) T. n° 1216b.

AR. Avec l'espèce.

Var. γ *minimus*. (*L. Sp.* 1281) T. n° 1216c.

R. Avec l'espèce.

349. Helianthus. (*L. Gen.* 978 *ex parte*.) Hélianthe. Sonnenblume.

- 917) † *H. annuus*. (*L. Sp.* 1276.) Sonnenblum. . . EF. 195.
 ① Juillet-Septembre.

C. Cultivé dans les jardins, quelquefois subspontané.

- 918) † *H. tuberosus*. (*L. Sp.* 1277.) Russesch Kromper. T. n° 1263.
 4 Septembre-Octobre.

Quelquefois cultivé dans les terrains sablonneux et alors aussi subspontané.

- 919) † *H. rigidus*. (*Desf. Cat. éd.* 3. 184.)

4 Septembre-Octobre.

Cultivé pour l'ornementation. Subspontané en 1871 dans les anciens remparts depuis le Breitenweg jusqu'au Pfaffenthal. BL. !

350. Madia. (*Mol. chil. ed. germ.* 113.) — Madie.

- 920) † *M. sativa*. (*Mol. l. c.*) EF. 197.
 ① Juillet-Août.

Autrefois cultivé en grand comme oléagineux.

351. Achillea. (*L. Gen.* 435.) — Achillée. — Tausendgarbe.

921) *A. Millefolium.* (*L. Sp.* 1267.) Kâtzekraut. Tausendschœerchen. T. n° 1253.

4 Juin-Octobre.

C. Lieux incultes, bords des chemins, champs cultivés, moissons.

Var. *β. setacea.* (*Wald. et Kitt. pl. rar. hung.* 1. 80.)

R. Collines arides en plein soleil.

922) *A. Ptarmica.* (*L. Sp.* 1266) T. n° 1254.

4 Juillet-Septembre.

AC. Bords des eaux, prairies humides, fossés.

352. Ormenis. (*J. Gay. in Fl. Par. éd. 1.* 397.) — Ormenide. — Edelkamille.

923) † *O. nobilis.* (*J. Gay. l. c. p.* 398.) Kamèleblum.

4 Juillet-Août.

AC. Cultivé dans les jardins et quelquefois subspontané. Oseraie à Clausen. Kz.

353. Anthemis. (*L. Gen.* 434 *ex parte.*) Anthémide. Hundskamille.

924) *A. arvensis.* (*L. Sp.* 1261) T. n° 1250.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Jachères, moissons. R. Ardennes.

925) *A. Cotula.* (*L. Sp.* 1261.) Hondskamèleblum. T. n° 1251.

① Juin-Septembre.

C. Jachères, moissons, bords des chemins.

926) *A. tinctoria.* (*L. Sp.* 1263) T. n° 1252.

4 Juillet-Septembre.

AC. Coteaux secs, bords des chemins, vieux terrys sur l'oolite ferrugineuse depuis Dudelange jusqu'à Belvaux. Kz.

Sous-tribu II. — Anthemideæ. (*Koch, syn.* 401.)

354. Matricaria. (*L. Gen.* 432.) — Matricaire. — Kamille.

927) *M. Chamomilla.* (*L. Sp.* 1256.) Kamèleblum. T. n° 1218.

① Mai-Juillet.

C. Moissons, lieux cultivés, etc.

Var. *β. suaveolens.* (*DC. Pr. t.* 521) T. n° 1219.

AR. Champs entre Dommeldange et Walferdange.

928) *M. inodora.* (*L. fl. Suec.* 297.) Méderchesblum. *M. pyrethrum* T. n° 1220.

① ou ② Juin-Septembre.

AC. par place Lieux pierreux, bords des chemins, jachères, moissons. R. Ardennes, Esch s/S. T. Manque aux environs de Wiltz.

355. Pyrethrum. (*Gærtn. Fruct. II. 430. t. 169. f. 1.*) — Py-rèthre. — Winterblume.

929) *P. Leucanthemum.* (*C. et G. Fl. Par. 1. 401.*) Gehânesblum.

4 Mai-Août.

C. Lieux herbeux, prairies naturelles et artificielles, pâturages, bois.

Var. *β. canescens.* (*Lej. R. Fl. Spa.*)

AR. Avec l'espèce près du Friedbüsch, Diekirch (Courtois).

930) *P. Parthenium.* (*Smth. Brit. II. 900.*) Mutterkraut.

4 Juin-Août. [T. n° 1221.

C. par place. Ardennes. Décombres, bords des chemins et des eaux, bois, lieux cultivés. R. ailleurs.

931) ? *P. corymbosum.* (*Willd. Sp. III. 2155.*) Wtg. Prod. 683.

4 Juin-Août.

R. Coteaux et montagnes calcaires de la Sûre. Rosport. T.

932) † *P. sinense.* (*Sabin, trans. hort. soc. 4. 330. t. 14.*) Chry-santhèm.

4 Octobre-Novembre.

C. Cultivé dans les jardins et les cimetières, assez souvent subspontané.

356. Chrysanthemum. (*DC. Prod. VI. 63.*) — Chrysanthème. — Wucherblume.

933) *Ch. segetum.* (*L. Sp. 1254.*) Veitgesblum. Rengelblum.

① Juin-Septembre. [T. n° 1223.

AC. Lieux cultivés et moissons des Ardennes. C. Rambrouch, Bilsdorf. R. ailleurs. Gare de Rumelange (1871.) Kz.

357. Bellis. (*L. Gen. 429.*) — Paquerette. — Maasliebchen.

934) *B. perennis.* (*L. Sp. 1248.*) Mâgrêthen. . T. n° 1217.

4 Toute l'année, hors le temps des grands froids et des fortes chaleurs.

C. Bords des chemins, pelouses, pâturages, prairies, bois, etc.

Var. *β. caulescens.* (*Lej. R. Spa. 1251.*) Silvestris. (*Cyrill.*)

AR. Bois montueux de la Sûre. [T. n° 1217c.

358. Artemisia. (*L. Gen. 418.*) — Armoise. — Beifuss.

935) † *A. Dracunculus.* (*L. Sp. 1189.*) Estragon. EF. 206.

4 Mai-Juin.

C. Cultivé dans les jardins, quelquefois subspontané. Pulvermühl. Kz.

936) *A. vulgaris.* (*L. Sp. 1188.*) Wesch. Beiföss. Wele

Batter Alzem T. n° 1200.

4 Juillet-Octobre.

C. Lieux incultes, décombres, bords des chemins, haies, buissons, bois.

937) **A. Absinthium.** (*L. Sp.* 1188.) Batter Alzem. T. n° 1198.

4 Juillet-Septembre.

AC. par place. Rochers, coteaux arides, bords des chemins. Bellevue. (Courtois). Bock. BL. ! Ruines du château d'Esch s/S. (Courtois). Schuttbourg. A. EF. Kz.

938) **A. campestris.** (*L. Sp.* 1185). T. n° 1199.

4 Juillet-Octobre.

R. Bords des chemins, murs, coteaux arides, secs : Moselle, Remerschen. T.

939) ? **A. pontica.** (*L. Sp.* 1187) T. n° 1201.

4 Juillet-Août.

R. Coteaux arides, bords des chemins, subspontané. Beaufort. T.

359. Tanacetum. (*L. Gen.* 944 *ex parte.*) Tanaïsie. Rainfarn.

930) **T. vulgare.** (*L. Sp.* 1148.) Wurmkraut . . . T. n° 1202.

4 Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux et des chemins, lieux incultes, etc.

941) † **T. Balsamita.** (*L. Sp.* 1148) EF. 203.

4 Juillet-Septembre.

C. Cultivé dans les jardins comme remède populaire et souvent subspontané sur les murs.

360. Tajetes. (*Tournf. Inst.* 488.) — Tajetes. — Sammtblume.

942) **T. patula.** (*L. Sp.* 1249.) Stenkigen Höfert.

② Juillet-Septembre.

C. Cultivé de tout temps en plusieurs variétés.

361. Calendula. (*L. Gen.* 446 *ex parte.*) Souci. Ringelblume.

943) **C. arvensis.** (*L. Sp.* 1303) T. n° 1264.

① Juin-Septembre.

R. sporadique. Champs et vignes, lieux cultivés. Bissen, Ospern, Simmern. T. Vallée de la Haute-Moselle. T. Wtg.

944) † **C. officinalis.** (*L. Sp.* 1304.) Krêrfechsblum. T. n° 1265.

① Juillet-Octobre.

C. Cultivé sur les cimetières et souvent subspontané dans leur voisinage.

362. Micropus. (*L. Gen.* 451.) — Micrope.

945) ? **M. erectus.** (*L. Sp.* 1313). T. n° 1214.

① Juin-Août.

R. Coteaux arides, champs maigres et pierreux. Greisch. T.

Sous-tribu III. — Gnaphalieæ. (*Lessing. syn.* p. 269.)

363. Helichrysum. (*Gærtn. Fruc.* 2. 404.) — Immortelle. — Immerschön.

946) *H. arenarium*. (DC. *fl. Fr.* 4. 130.) Eweg Bliemchen.

4 Juillet-Octobre.

[T. n° 1204.

AR. Bords des chemins, coteaux stériles. Echternach. (Brimmeyr père). Grönenwald. T. Bellevue, Diekirch. (Courtois).

364. Gnaphalium. (*L. Gen.* 946 *ex parte.*) Gnaphale. Ruhrkraut.

947) *G. silvaticum*. (*L. Sp.* 1200) T. n° 1205.

4 Juillet-Septembre.

C. Bois secs, pâturages, bords des chemins.

948) *G. luteo-album*. (*L. Sp.* 1196.) Goldblum. T. n° 1207.

① Juillet-Septembre.

AC. par place. Champs sablonneux un peu humides, bords des fossés. Eisenbourg. BL. Stenigerberg. (Altwies.) Kz.

949) *G. uliginosum*. (*L. Sp.* 1200) T. n° 1206.

① Juillet-Octobre.

C. Champs et chemins humides, lieux inondés l'hiver, fossés, bords des eaux.

Var. *β. nudum*. (*Hoff.*) T. n° 1206b.

Avec l'espèce.

365. Antennaria. (*R. Br. in Lin. trans.* VII. 122.) Antennaire. Katzenpfötgen.

950) *A. dioica*. (*Gærtn. Fruct.* II. 410. t. 167. f. 3.) Engelsbliemchen T. n° 1208.

4 Mai-Juin.

C. Coteaux arides, bruyères, pâturages des terrains sablonneux.

366. Filago. (*Tournf. Inst.* 259 *ex parte.*) — Cotonnière. — Pfötgen.

951) *F. germanica*. (*L. Sp.* 1311) T. n° 1209.

① Juillet-Septembre.

C. Champs secs, lieux incultes, arides, vignes.

Var. *β. pyramidata*. (*Gaud. auct. Germ. non L.*) . T. n° 1210.

Avec l'espèce.

952) ? *F. gallica*. (*L. Sp.* 1312) T. n° 1212.

① Juillet-Août.

R. Vignes, champs secs et sablonneux après la moisson. Plante fugace indiquée par T. et introduite avec des graines étrangères (à rechercher).

953) *F. minima*. (*Fries. novit. ed.* 2. p. 268.) *F. montana*. (DC. *Pr.* 6. 248) T. n° 1213.

① Juillet-Septembre.

AC. Lieux sablonneux, champs en friche, bruyères, bords des chemins, etc. Manque sur de grands espaces.

954) *F. arvensis*. (*L. Sp.* 1312) T. n° 1211.

① Juillet-Septembre.

C. Champs secs, sablonneux, arénacés, lieux arides, aussi en Ardennes.

367. *Pulicaria*. (*Gærtn. Fruct. II.* 461.) Pulicaire. Flöhkraut.

955) *P. dysenterica*. (*Gærtn. Fruct. II.* 462.) Inula. Domerian.

24 Juillet-Septembre. [T. n° 1228.

C. Fossés, lieux frais et humides, bords des eaux.

956) *P. vulgaris*. (*Gærtn. Fruct. II.* 461) . . . T. n° 1229.

① Juillet-Septembre.

AR. Lieux inondés l'hiver, berges des rivières, bords des fossés et des chemins humides. Ardennes.

368. *Inula*. (*L. Gen.* 426 *emend.*) — Inule. — Alant.

957) *I. Conyza*. (*DC. Prod. V.* 464.) *Conyza squarrosa*. (*L.*)

② Juillet-Septembre. [T. n° 1203.

C. Bords des chemins, coteaux arides, lisière des bois.

958) *I. salicina*. (*L. Sp.* 1238) T. n° 1230.

24 Juin-Août.

AC. Clairières des bois secs, pâturages montueux de la Moselle, de la Sûre. (Sch.) T. ! R. ailleurs.

959) *I. britanica*. (*L. Sp.* 1237) T. n° 1226.

24 Juillet-Septembre.

AC. Bords des eaux, prairies humides, fossés de la Moselle, surtout vers Mertert. BL. !

369. *Solidago*. (*L. Gen.* 425 *ex parte.*) Solidage. Goldruth.

960) *S. Virga-aurea*. (*L. Sp.* 1235.) Pëterstâf . . T. n° 1233.

24 Juillet-Septembre.

C. Lisières et clairières des bois, taillis, buissons, pâturages.

Var. *β. alpestris*. (*Wald. et Kit. pl. rar. h.* 208). . T. n° 1234.

R. Bois montueux des Ardennes. Rambrouch. T.

961) † *S. canadensis*. (*L. Sp.* 1233). EF. 211.

24 Août-Septembre.

Cultivé et quelquefois subspontané près des habitations et des cours d'eau.

370. *Erigeron*. (*L. Gen.* 422 *ex parte.*) Vergerette. Dürrewurz.

962) *E. acre*. (*L. Sp.* 1211.) Greiskraut T. n° 1231.

24 Juillet-Septembre.

C. Vieux murs, coteaux arides, pelouses sèches, bois sablonneux.

Var. *β. serotinum*. (*Weihe. Rchb. fl. exc.* 239.)

C. Avec l'espèce.

963) *E. canadense*. (*L. Sp.* 1209). T. n° 1232.

① Juillet-Octobre.

C. Manque sur de grands espaces. Décombres, vieux murs, bords des chemins, champs en friche des environs de Luxembourg. R. En Ardennes.

371. *Stenactis*. (*Nees, ast.* 273) — *Stenactide*. — Feinchen.

964) ? *S. annua*. (*L. Sp.* 1249). T. n° 1247.

② ou 4 Juillet-Août.

R. Bords des chemins, haies, pelouses, lisières des bois. Remich. T. près Schengen. (Hollandre).

372. *Aster*. (*L. Gen.* 424.) — *Aster*. — *Aster*.

965) *A. Amellus*. (*L. Sp.* 1226) T. n° 1246.

4 Juillet-Septembre.

AC. Clairières des bois pierreux, bords des chemins. Manternach. R. Echternach, Rosport. T. Fels. (Schengen.) BB. !

966) *A. dumosus*. (*L. Sp.* 1227). . . T. in Wrtg. Prod. 636.

② Septembre-Octobre.

R. Bords de la Moselle près Grevenmacher. (Wlg. T. Fl. R. p. 240 n° 11).

967) ? *A. leucanthemus*. (*Desf. Cat. hort. par. ed.* 3. 401.)

4 Août-Septembre.

R. Bords des eaux : Sûre Diekirch. Md. Moselle. (Günther.) fide Lej.

968) † *A. floribundus*. (*Willd. Sp.* 3. p. 2048) . . EF. 213.

4 Septembre-Novembre.

C. Cultivé dans les cimetières, les jardins et souvent subspontané dans les haies et près des habitations.

969) † *A. sinensis*. (*L. Sp.*) Reine-Marguerite. *Aster*.

① Août-Septembre.

C. Cultivé en nombreuses variétés et souvent subspontané dans le voisinage des habitations.

373. *Linosyris*. (*DC. Prod.* V. 351.) — *Linosyris*. — Goldhaar.

970) *P. vulgaris*. (*DC. l. c.*) *Chrysocoma*. L. . . T. n° 1177.

4 Août-Septembre.

R. Rochers, coteaux arides, pâturages, bois taillis. Moselle. Sch. T.

374. *Arnica*. (*L. Gen.* 427 *ex parte*.) — *Arnica*. — Wohlverleih.

971) *A. montana*. (*L. Sp.* 1245.) *Feierblum*.

4 Juin-Juillet.

AC. par place. Prairies, pâturages, bruyères, clairières des bois. Ardennes. Rambrouch. T. Bochlholz. DW. Echternach (Brimmeyr père). Beaufort. Kz.

375. Cineraria. (*L. Gen.* 426 *ex parte.*) — Cinéraire. — Blutze.

972) *C. spatulæfolia.* (*Gmel. bad.* 3. 454.) Cinerair. T. n° 1235.

24 Avril-Mai.

AR. Rochers ombragés des côtes de la Haute-Sûre et de la Wiltz. T. Entre Erpeldange et Michelau. EF. Kz.

376. Senecio. (*L. Gen.* 424.) — Seneçon. — Baldgreis.

973) *S. vulgaris.* (*L. Sp.* 1216.) Huneknepp. Kreizkréitgen.

① Fleurit presque toute l'année. [T. n° 1236.

C. Lieux cultivés, jardins, décombres, villages, etc.

974) *S. viscosus.* (*L. Sp.* 1217) T. n° 1237.

① Juin-Août.

AR. Lieux incultes, bords des chemins et des rivières, berges des chemins de fer, bois. Wasserbillig. BL! Bettembourg. A. EF. Kz.

975) † *S. silvaticus.* (*L. Sp.* 1217) T. n° 1238.

① Juillet-Août.

AC. Bois sablonneux, pâturages secs, bords des chemins. Ardennes.

976) *S. erucæfolius.* (*L. Sp.* 1218) T. n° 1241.

24 Août-Septembre.

AC. Haies, lisières des bois, pâturages montueux des terres fortes.

977) *S. Jacobæa.* (*L. Sp.* 1219) T. n° 1239.

② ou 24 Juillet-Septembre.

C. Pâturages, prairies, bois, bords des champs et des eaux.

978) *S. aquaticus.* (*Huds. fl. Ang.* 366) T. n° 1240.

24 Juin-Août.

AR. Lieux marécageux, prairies, bois humides, bords des eaux.

979) *S. nemorensis.* (*L. Sp.* 1221) T. n° 1243.

24 Juillet-Août.

R. Bois et prés montueux de l'Ardenne.

980) *S. Sarracenicus.* (*L. Sp.* 1221) T. n° 1245.

24 Juillet-Août.

R. Oseraies de la Moselle. T.

981) *S. Fuchsii.* (*Gmel. Fl. Bad. Als.* III. 444.)

24 Juillet-Août.

AC. Bois humides, cours d'eaux sous bois.

982) *S. ovatus.* (*Willd. Sp.* 3. 2004) T. n° 1244.

24 Juillet-Août.

R. Bois ombrageux. Dommeldange. T.

377. Dahlia. (*Cav. icon. v. 1. p. 57. t. 80.*) Dahlia. Georgine.

983) † *D. variabilis*. (*Desf. cat. h. par. ed. 3. 182.*)

‡ Août-Octobre.

C. Cultivé en nombreuses variétés. Introduit dans les jardins. 1840.

378. Eupatorium. (*Tournf. Inst. 259.*) — Eupatoire. — Kungundenkraut.

984) *E. cannabinum*. (*L. Sp. 1173.*) Abkraut . . T. n° 1176.

‡ Juillet-Septembre.

C. Fossés, bords des eaux, lieux humides et marécageux.

379. Tussilago. (*L. Gen. 952 ex parte.*) Tussilage. Huflattig.

985) *T. Farfara*. (*L. Sp. 1214.*) Ieselsföss. Lehmblät. T. n° 1248.

‡ Février-Avril.

C. Fossés, champs humides, bords des chemins des terrains calcaires. R. Ardennes.

380. Petasites. (*Tournf. Inst. 258.*) — Petasite. — Pestwurz.

986) *P. officinalis*. (*Mönch. meth. 568.*) Tussilago. T. n° 1249.

‡ Mars-Avril.

AC. Bords des eaux, prairies humides. R. Ardennes.

Sous-ordre II. — Ligulifloræ. (*Endl. gen. 493.*)

Tribu I. — Lampsanæ. (*Lessing. syn. 128.*)

381. Lampsana. (*L. Gen. 919 ex parte.*) — Lampsane. — Milche.

987) *L. communis*. (*L. Sp. 1141.*) Huðsemös . . T. n° 1122.

① Juin-Août.

C. Bois, lieux cultivés.

382. Arnoseris. (*Gærtn. Fruct. II. 355.*) Arnoséris. Lammkraut.

988) *A. minima*. (*Koch, syn. fl. Germ. ed. 1. 416.*) Hyoseris m.

① Juin-Août. [T. n° 1123.

AC. Champs sablonneux, mais manque sur de grands espaces. C. en Ardennes.

383. Cichorium. (*L. Gen. 921.*) — Chicorée. — Wegwarte.

989) *C. Intybus*. (*L. Sp. 1142.*) Wele Chikorč. . T. n° 1173.

‡ Juillet-Août.

C. Bords des chemins, pâturages secs, coteaux arides.

990) *C. Endivia*. (*L. Sp. 1142.*) Andiv . . . T. n° 1174.

② Juillet-Octobre.

C. Cultivé.

Tribu II. — Leontodontæ. (*C. H. Schultz. in Koch. syn. 479.*)

384. Hypochaeris. (*L. Gen. 918.*) — Porcelle. — Ferkelkraut.

991) *H. glabra*. (*L. Sp.* 1140) T. n° 1172.

① Juillet-Août.

AR. Lieux sablonneux, champs après la moisson, coteaux arides. Waldhof. BL.!

992) *H. radicata*. (*L. Sp.* 1140) T. n° 1171.

② ou 4 Juillet-Septembre.

C. Bords des chemins, prairies, lisières des bois.

993) *H. maculata*. (*L. Sp.* 1140) T. n° 1170.

4 Juin-Juillet.

R. Prairies, pâturages des Ardennes.

385. *Thrincla*. (*Roth. Cat. bot. I.* 97.) — Trincie. — Zinnensaat.

994) *T. hirta*. (*Roth. Cat. bot. I.* 98) T. n° 1158.

② ou 4 Juillet-Septembre.

C. Champs en friche, jachères, bords des chemins, pelouses, etc.

386. *Leontodon*. (*L. Gen.* 912 *ex parte*.) Lion-dent. Löwenzahn

995) *L. hispidus*. (*L. Sp.* 1124) T. n° 1156.

4 Juin-Septembre.

C. Bois, pâturages, prairies, lieux incultes, etc.

996) *L. hastilis*. (*L. Sp.* 1123) T. n° 1155.

4 Juin-Juillet.

AC. Lisières et clairières des bois, prairies. Longsdorf, Diekirch. L. et C. 1397.

997) *L. autumnalis*. (*L. Sp.* 1123) T. n° 1157.

4 Juillet-Octobre.

C. Lieux cultivés, prairies.

387. *Picris*. (*Juss. Gen.* 170.) — Picride. — Bitterich.

998) *O. hieracioides*. (*L. Sp.* 1115) T. n° 1159.

② Juillet-Septembre.

AR. Bords des chemins, champs en friche, moissons des terres fortes, calcaires. Rodenhof (Kopstal.) BL.!

388. *Helminthia*. (*Juss. Gen.* 170.) Helminthe. Wurmkrout.

999) *H. echiioides*. (*Gärtn. Fr. II.* 159) T. n° 1160.

① Juillet-Octobre.

R. Champs en friche, bords des chemins et des fossés. Remich. T. Luxemb. EF.

389. *Tragopogon*. (*L. Gen.* 905.) — Salsifis. — Haferwurz.

1000) † *T. porrifolius*. (*L. Sp.* 1110.) Salsifis. Weisswurz.

② Juin-Juillet. [T. n° 1163.

AC. Cultivé pour ses racines blanches.

1001) *T. major*. (*Jacq. Aust. l. c.* 29). T. n° 1162.

(2) Juin-Juillet.

R. Coteaux pierreux, prés secs, bords des chemins, environs de Lintgen. T.
1002) *T. orientalis*. (*L. Sp.* 1169) L. 742.

(2) Mai-Juillet.

AC. Prairies fertiles de la vallée de la Moselle. BB. ! Pulvermühl, ! etc.

1003) *T. pratensis*. (*L. Sp.* 1109.) Bocksbârt. Bârtel. T. n° 1161.

(2) Mai-Septembre.

C. Bords des chemins et des fossés, lisières des bois, pâturages, prairies humides. R. Ardennes.

Var. β . *minor*. (*Fries. Novit. fl. suec. ed. 2. p.* 241.)

R. Prairies de la Moselle.

Var. γ . *angustissimus*. (*Dmtr. Prod.* 724) T. n° 1161c.

R. Environs de Luxembourg. Md. Dommeldange. T.

Var. δ . *undulatum*. (*Jacq. Aust. l. c.* 36) T. n° 1161d.

R. avec le type.

390. Scorzonera. (*L. Gen.* 906 *ex parte*.) $\rightarrow$ Scorsonère. —
Schwarzwurz.

1004) *S. humilis*. (*L. Sp.* 1112) T. n° 1165.

4 Mai-Juin.

AR. Prairies humides, clairières des bois marécageux. Ardennes, Rambrouch.
T. — R. ailleurs.

Var. β . *angustifolia*. (*L. Sp.* 1113). T. n° 1166.

AR. Prés humides entre les forges de Fischbach et Kœdange. T. Eisembrg. Kz.

Var. β . *Plantaginea*. (*Schleich. ex. Rechb. fl. exc.* 275) T. n° 1165b.

R. avec le type.

1005) *S. hispanica*. (*L. Sp.* 1112.) Scorzonér. Schwarzwurzel.

(2) Juin-Juillet. [T. n° 1164.

C. Cultivé pour ses racines noires alimentaires. Quelquefois subspontané.
Bellevue. Kz.

391. Podospermum. (*DC. Fl. Fr. IV.* 61.) — Podosperme. —
Stielsame.

1006) *P. laciniatum*. (*DC. l. c.* 62) T. n° 1167.

(2) Juin-Août.

AR. Décombres, vieux murs, coteaux arides, lieux incultes et pierreux. Echternach, (Brimmeyr père.) R. (Schäfer) Clausen. T. Wintringen. L. BB. !
Beggen, Moselle. T. Nachthum, Ebnen BB Mertert, Wecker. R. Kleeberg entre Remerschen et Schengen. Grevenmacher. BB !

1007) *P. calcitrapifolium*. (*DC. Fl. V. p.* 455.) *P. resedifolium*.

(2) Mai-Juillet. [T. n° 1168.

R. Coteaux calcaires de la Sûre et de la Moselle. Grevenmacher. T.

1008) *P. muricatum*. (DC. *Fl. Fr.* IV. 111). . . T. n° 1169.

② Juin-Août.

R. Coteaux calcaires de la Moselle. Fels, Wintrange. T.

Tribu III. — Crepoideæ. (Gren. et God. *fl. Fr.* 2. 314.)

392. *Taraxacum*. (Juss. *Gen.* 169.) — Pissenlit. — Kuhblume.

1009) *T. officinale*. (Wigg. *Prim. fl. Hols.* 56.) — Bettséchesch.

Éerblum. Ketteblum. Leontodon *Taraxacum*. T. n° 1153.

4 Avril-Octobre.

C. Prairies, pelouses, lieux cultivés, bois, bords des chemins, voisinage des habitations.

Var. *β. levigatum*. (DC. *prod.* 7. 146.)

R. Prés et collines sèches.

Var. *γ. udum*. (Jord. *Pug.* 114.)

AR. Prairies humides, avec le type.

Var. *δ. arcuatum*. (Tausch. *fl.* 1821. 2. 567) . . T. n° 1153b.

C. Pelouses montueuses.

1010) *T. paludosum*. (Scop. *Fl. Carn.* 2. 100) . . T. n° 1154.

4 Mai-Septembre.

AR. Manque sur de grands espaces. Prairies humides, bois marécageux.

393. *Chondrilla*. (L. *Gen.* 910.) — Chondrille. — Krümling.

1011) *C. juncea*. (L. *Sp.* 1120). T. n° 1151.

② Juin-Août.

R. Champs arides, lieux pierreux, bords des chemins. Environs du cimetière de Clausen. T. Côtes de la Moselle. T. Lej. et C. 1338.

394. *Prenanthes*. (L. *Gen.* 911.) — Prenanthe. — Hasenlattich.

1012) *P. purpurea*. (L. *Sp.* 1121) T. n° 1125.

4 Juillet-Août.

R. Bois montueux, ombragés, Müllerthal, (Beaufort). (Courtois.) T. Dmtr. P. 686.

395. *Lactuca*. (L. *Gen.* 909.) — Laitue. — Lattich.

1013) *L. muralis*. (L. *Sp.* 1121.) *Prenanthes muralis*. T. n° 1152.

① Juin-Septembre.

C. Bois montueux, chemins creux, rochers, vieux murs. R. Ardennes.

1014) *L. perennis*. (L. *Sp.* 1120) T. n° 1150.

4 Juin-Juillet.

AR. Champs calcaires, coteaux arides, taillis montueux, rochers, terry de minières. Côtes de la Sûre, Echternach (Brimmeyr, père), de la Moselle, Stromberg. BL.! Dudelange. T. Johannisberg. BL.! Wasserfall (Schiffelange.) Kz.

1015) *L. saligna*. (*L. Sp.* 1119) T. n° 1149.

‡ Juin-Juillet.

AC. par place. Moissons, jachères, lieux incultes le long des chemins. Wintrange, entre Stadtbredimus et Ehnén. BB. Moselle. T. Entre Eitelbruck et Mersch. T. Reckingen et Finsterthal. BL.!

1016) *L. Scariola*. (*L. Sp.* 1119.) *L. silvestre*. . . T. n° 1147.

② Juin-Août.

AC. Manque sur de grands espaces. Bords des chemins, lieux incultes, terres remuées de la partie sud du pays. C. A l'ouest et au midi de l'ancienne forteresse de Luxembourg. BL.!

1017) † *L. sativa*. (*L. Sp.* 1118.) Blêderzalôt. . . T. n° 1146.

② Juin-Septembre.

Var. β . *capitata*. (*Bauhin. pin.* 123.) Héderzalôt.

Var. γ . *Romana*. (*Bauhin. trist.* 2. 998.) Chicon.

Var. δ . *crispa*. (*Bauhin. trist.* 2. 998.) Wantercrep.

C. Cultivé et souvent subspontané au voisinage des habitations.

1018) *L. virosa*. (*L. Sp.* 1119) T. n° 1148.

② Juillet-Août.

R. Bords des chemins, bois montueux. Schuttbourg. DW. Esch s/S. (Courtois). Neudorf. T. Mont St-Jean. Kz.

396. Sonchus. (*L. Gen.* 908.) — Laiteron. — Saudistel.

1019) *S. oleraceus*. (*L. Sp.* 1116.) Saudeschtel . . T. n° 1126.

① Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, moissons, friches, bords des chemins, vieux murs.

Var. β . *lacerus*. (*Wall. Sched. crit.* 432.)

C. avec l'espèce.

1020) *S. asper*. (*Vill. Fl. Dauph. III.* 158) . . . T. n° 1127.

① Juillet-Septembre.

C. Bords des chemins, friches, lieux cultivés, moissons.

1021) *S. arvensis*. (*L. Sp.* 1116) T. n° 1128.

‡ Juillet-Septembre.

AC. Moissons, lieux cultivés, vignes, endroits pierreux, bords des chemins et des eaux.

397. Barkhausia. (*Mönch. meth.* 539.) — Barkhausie.

1022) *B. foetida*. (*DC. Fl. Fr. IV.* 42) T. n° 1143.

① Juin-Août.

C. Bords des chemins, vieux murs, lieux arides, décombres, champs en friche, vignes. R. Ardennes.

Var. β . *prostrata*. (*Dmtr. Pr. Fl. B.* 671). T. n° 1144.

AR. Avec l'espèce dans les champs secs.

Var. γ . *gracilis*. (*Lej. Rev. fl. Spa.* 249) T. n° 1145.

AR. Lieux arides aux environs de Dudelange. C'est sur des échantillons de cette localité que l'espèce fut créée.

1023) *B. taraxacifolia*. (*Thuil. fl. par.* 2. 1. p. 409.)

② Avril-Juillet.

R. Prés secs, lieux arides des terres calcaires.

398. *Crepis*. (*L. Gen.* 914 *ex parte*.) — Crépide. — Grundfeste.

1024) *C. præmorsa*. (*Tausch. bot. Zeit.* II. 1.) *Hieracium*.

4 Mai-Juin.

[T. n° 1129.

R. Bois, prairies. Fels (Schengen.) T. Greiveldange. Md. Schrassig, Bereldange. T.

1025) *C. pulchra*. (*L. Sp.* 1134.) *Prenanthes hieracifolia*.

① Mai-Juin.

[T. n° 1124.

R. Champs sablonneux, bords des chemins, vignes. Machthum. BB ! Ehuen, Wiltz, Esch s/S. T. Grevenmacher, Merttert. R. Mandelbach. DW.

1026) *C. paludosa*. (*Mönch. meth.* 535.) *Hieracium* p. T. n° 1137.

5 Juin-Août.

C. Prairies humides, marécageuses, ravins des bois, bords des eaux en Ardennes. R. Ailleurs, entre Marienthal et Ansembourg. DW. !

1027) *C. biennis*. (*L. Sp.* 1136) T. n° 1138.

② Juin-Juillet.

C. Bords des chemins, pâturages, prairies. AR. Ardennes.

1028) *C. tectorum*. (*L. Sp.* 1135) T. n° 1139.

① Mai-Juin.

C. Champs sablonneux, lieux cultivés, moissons, murs.

1029) *C. virens*. (*Vill. Fl. Dauph.* III. 142) T. n° 1140.

① Juin-Octobre.

C. Bords des chemins, champs, pelouses, prairies, pâturages, lisières des bois.

Var. β . *pinnatifida*. (*Willd. Sp.* 1604.) *stricta*. (DC.) T. n° 1141.

Avec l'espèce.

Var. γ . *diffusa*. (DC. *Cat. hort. Mons.* 98) T. n° 1142.

Avec l'espèce.

399. *Hieracium*. (*Tournf. Inst.* 267.) — Épervière. — Hachtkraut.

1030) *H. pilosella*. (*L. Sp.* 1125.) *Kätzelföss* T. n° 1130.

4 Mai-Octobre.

C. Bords des chemins, pelouses, pâturages, bois.

Var. β . *Pelleterianum*. (*Mérat. fl. Par.* 305.)

R. Bois secs, lieux sablonneux.

1031) *H. Auricula*. (*L. Sp.* 1126) T. n° 1131.

24 Juin-Septembre.

AC. Lieux incultes un peu humides, bords des mares et des fossés.

1032) *H. præaltum*. (*Vill. Voy.* 62. t. 2. f. 1) . . . T. n° 1227.

24 Juin-Juillet.

AC. par place. Vieux murs, bois montueux, coteaux, prairies, vignes.

1033) *H. cæspitosum*. (*D. Pr.* 689.) *H. collinum*. T. n° 1132.

24 Juin-Juillet.

R. Lieux herbeux, pelouses, lisières des bois de la Moselle. *Stadtbredimus*. T.

1034) *H. murorum*. (*L. Sp.* 1128) T. n° 1136.

24 Juin-Août.

C. Vieux murs, rochers, bois, lieux pierreux, incultes.

Var. β . *petiolare*. (*Jord. in Cat. Gren.* 1849. p. 20.)

Avec l'espèce, entre Hachiville et Clervaux. (*Van Bastelaar*).

Var. γ . *oblongum*. (*Jord. l. c.*)

Avec l'espèce, bois montueux entre Hachiville et Clervaux. (*Van Bastelaar*).

Var. δ . *petrogenes*. (*Jord. l. c.*)

Avec l'espèce, rochers des bois montueux entre Hachiville et Clervaux (*Van Bastelaar*).

1035) *H. vulgatum*. (*Fries. novit. fl. suec. ed.* 2. 258.) *H. silvaticum*. (*L.*) T. n° 1135.

24 Juin-Juillet.

C. Bois, taillis.

1036) *H. tridentatum*. (*Fries. Nov. ed.* 2. p. 161.)

24 Juin-Juillet.

R. Bois du calcaire oolitique. Differdange. !

1037) *H. sabaudum*. (*L. Sp.* 1131) T. n° 1133.

24 Août-Octobre.

AC. Bois, buissons, lieux incultes.

1038) *H. boreale*. (*Fries. Nov. ed.* 2. p. 161). . . . L. 783.

24 Juillet-Octobre.

C. Bois, buissons, prairies arborées.

1039) *H. umbellatum*. (*L. Sp.* 1131) T. n° 1130.

24 Juillet-Août. Refl. Automne.

C. Lisières et clairières des bois, prairies, pâturages, bords des chemins.

LXXXVI. AMBROSIACEAE.

(*Link. Handb.* I. 816.) [XXI, 5.]

400. *Xanthium*. (*Tournf. Inst.* 252.) Lampourde. Spitzklette.

1040) *X. strumarium*. (*L. Sp.* 1400) T. n° 1368.

① Juillet-Octobre.

AR. Décombres, lieux incultes, bords des chemins, berges des rivières. Wasserbillig, Moselle. BL.!

SUBDIVISION III. — Apétales.

CLASSE. I. — Apétales non amentacées.

LXXVII. AMARANTACEAE.

(R. Brown. Prod. Nov. Holl. I. 413.)

401. *Amarantus*. (*L. Gen.* 1060.) — Amarante. [XXI, 5.]

1041) *A. Blitum*. (*L. Sp.* 1405) T. n° 1367.

① Juillet-Septembre.

R. Villages, lieux cultivés, chemins, pieds des murs, décombres. Wintrange, Echternach. T. (Brimmeyr père).

1042) ? *A. retroflexus*. (*L. Sp.* 1407). . . . R. Fl. Spa. 1381.

① Juillet-Septembre.

R. Décombres, villages, berges des rivières, champs en friche. Plante très-fugace.

1043) † *A. caudatus*. (*L. Sp.* 1406.) Focksschwanz. EF. 222.

① Juillet-Septembre.

AC. Cultivé et se resème souvent d'elle-même.

1044) † *A. paniculatus*. (*L. Sp.* 1408) EF. 223.

① Juillet-Septembre.

C. Cultivé et se resème d'elle-même.

† Var. β . *sanguinosus*. (*L. Sp.* 1408.)

AC. Cultivé et naturalisé aux environs des habitations.

402. *Polycnemum*. (*L. Gen.* 53.) — Polycnème. — Knörpeltkraut. [III, 4.]

1045) *P. arvense*. (*L. Sp.* 50) T. n° 52.

① Juin-Août.

AR. Champs arides, pierreux, bords des chemins, lieux incultes. Stadtbredimus, environs d'Echternach. T. Vallée de l'Our. Wrgt.

LXXVIII. SALSOLACEAE.

(L. Class. pl. 507 ex parte)

403. *Atriplex*. (*Tournf. Inst.* 286.) — Arroche. — Melde. [V, 2.]

1046) † *A. hortense*. (*L. Sp.* 1493.) Peinetsch . . EF. 224.

① Juillet-Septembre.

C. Cultivé et souvent subspontané au voisinage des jardins potagers.

Var. β . *rubra*. (*Lej. Rev. Spä.* 1452.)

AC. Cultivé et souvent subspontané.

1047) ? *A. nitens*. (*Schk. t.* 348) . . . Dmtr. P. f. B. 149.

① Juillet-Août.

AR. Murs, chemins, décombres, vignes de la Moselle. Dmtr. L. et C. 4911.
Très-disséminé.

1048) *A. tataricum*. (*L. Sp.* 1493.) *A. oblongifolium*. (*W. et K.*)

① Juillet-Août.

R. Décombres, ruines du château de Vianden. (Courtois).

1049) *A. hastatum*. (*L. Sp.* 1494.) *A. latifolium*. (*Whlbg.*) T. n° 419.

① Juillet-Août.

C. Lieux incultes et cultivés, bords des chemins, décombres.

1050) *A. patulum*. (*L. Sp.* 1494) . . . T. n° 420, 421.

① Juillet-October.

C. Villages, voisinage des habitations, bords des chemins, fossés, lieux cultivés et incultes, jachères, décombres, etc.

Var. β . *erectum*. (*Sm. brit.* 1093.)

AC. avec le type.

Var. γ . *oppositifolia*. (*DC. Fl. F. V.* 371) . . . Lj. et C. 492.

R. Bords de la Moselle.

404. Spinacia. (*Tournf. Inst.* 308.) Épinard. Spinat. [XXII, 4.]

1051) † *S. glabra*. (*Mill. Dict. n° 2.*) Peinetsch. *S. inermis*. (*M.*)

① ou ② Juin-Septembre. [T. n° 1412.

C. Cultivé dans les jardins et quelquef. subspontané au voisinage des habitations.

1052) † *S. oleracea*. (*L. Sp.* 1456 *pro parte.*) Peinetsch. *S. spinosa*. (*M.*) . . . T. n° 1411.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Cultivé dans les jardins et souvent subspontané au voisinage des habitations.

405. Beta. (*Tournf. Inst.* 286.) Betterave. Runkelrübe. [V, 2.]

1053) † *B. vulgaris*. (*L. Sp.* 322 *pro parte.*) Rommel. T. n° 422.

② Juillet-Septembre.

Cultivé en diverses variétés.

406. Chenopodium. (*Tourn. Inst.* 258 *ex parte.*) — Anserine.
Gänsefuss. [V, 2.]

1054) *Ch. polyspermum*. (*L. Sp.* 321.) Scheiskraut. T. n° 417.

① Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, vignes, voisinage des habitations, bords des chemins et des eaux. R. Ardennes.

Var. *β. acutifolium*. (*Kit. apud. Schult. Oestr. Fl.* 1. 458. *St. h.* 75). T. n° 418.

R. Lieux incultes et rochers près des forges de Berbourg. T.

1055) *Ch. Vulvaria*. (*L. Sp.* 321) T. n° 415.

① Juillet-Octobre.

AR. Villages, pied des murs, bords des chemins, lieux cultivés. Manque sur de grands espaces.

1056) *Ch. album*. (*L. Sp.* 319.) Scheismfel T. n° 411.

① Juillet-Octobre.

C. Villages, décombres, places à fumier, lieux cultivés, bords des rivières.

Var. *β. viride*. (*L. Sp.* 319.)

C. Avec l'espèce.

Var. *γ. lanceolatum*. (*Mérat. Fl. Par. éd. 2.*)

C. avec l'espèce.

1057) *Ch. hybridum*. (*L. Sp.* 319) T. n° 413.

① Juillet-Septembre.

AR. Voisinage des habitations, décombres, mardelles des rivières, bords des chemins.

1058) *Ch. glaucum*. (*L. Sp.* 320) T. n° 414.

① Juillet-Septembre.

R. Voisinage des habitations, décombres, graviers de la Moselle. Environs de Remich. BB. !

1059) *Ch. urbicum*. (*L. Sp.* 318). T. n° 408.

① Juillet-Septembre.

AR. Villages, pied des murs, lieux cultivés, décombres, fossés, manque sur de grands espaces.

Var. *β. intermedium*. (*Mert. et Koch. Deutschl. Fl. II.* 297.) L. 1070.

R. Avec l'espèce.

1060) *Ch. murale*. (*L. Sp.* 318) T. n° 410.

① Juillet-Septembre.

AR. Villages, pied des murs, basses-cours, bords des chemins, décombres.

1061) *Ch. opulifolium*. (*Schrad ap. Koch et Ziz. cat. fl. pl. palat.* p. 6) T. n° 416.

① Juillet-Septembre.

R. Pied des murs, décombres, bords des rivières, des chemins. Environs de Remich. T. Château de Vianden. (Courtois) T. Abweiler. EF. Kz.

1062) ? *Ch. ficifolium*. (*Sm. Eng. bot.* 1. 1724). T. n° 412.

① Juillet-Septembre.

R. Décombres, bords des chemins, lieux cultivés.

1063) † *Ch. Scoparium*. (*L. Sp.* 321.) *Kochia Scoparia*. (*Schrad.*)

① Juillet-Septembre.

Autrefois cultivé dans les jardins, pour fabriquer des balais.

407. Blitum. (*Tournf. Inst.* 288 *emend.*) — Blite. — Erdbeer-spinat. [V, 2.]

1064) **B. Bonus-Henricus.** (*Rech. Fl. excurs.* 582.) *Chenopodium.*

① Juillet-Septembre. [T. n° 407.]

AC. par place. Villages, voisinage des habitations, pied des murs, basses-cours, bords des chemins.

1065) **B. rubrum.** (*Rech. fl. excurs.* 582) T. n° 409.

① Juillet-Septembre.

AR. Villages, pieds des murs, décombres, mardelles des rivières et des étangs.
R. Château de Vianden. (Courtois.) AC. Environs de Luxembourg.!

LXXIX. POLYGONEAE.

(Juss. Gen. 82.)

408. Rumex. (*L. Gen.* 451 *ex parte.*) Rumex. Ampfer. [VI, 3.]

Sect. I. — Acetosa. (*Tourn. Inst.* 502.)

1066) **R. scutatus.** (*L. Sp.* 480). T. n° 561.

‡ Mai-Août.

AC. Vieux murs, coteaux pierreux, rocailles, rochers, etc. R. Ardennes.

1067) † **R. Acetosa.** (*L. Sp.* 481.) Saueramper. . . T. n° 562.

‡ Mai-Juin. Refleurit quelquefois à l'Automne.

C. Lieux herbeux, prairies, lisières et clairières des bois humides. Cultivé dans les jardins.

1068) **R. Acetosella.** (*L. Sp.* 481.) Wele Saueramper. T. n° 563.

‡ Mai-Août.

C. Champs sablonneux, arides, moissons, pâturages, bois, etc.

Sect. II. — Lapathum. (*Tourn. Inst.* 504.)

1069) **R. obtusifolius.** (*L. Sp.* 478.) Mökesaueramper. T. n° 558.

‡ Juin-Août.

C. Prairies, bords des eaux, lieux frais et ombragés, pied des murs, etc.

Var. β . *purpureus.* (*Poiret. dict.* 5. 163) T. n° 558b.

R. avec le type.

Var. γ . *silvestris.* (*Wallr. Sched.* 161.) R. *microcarpa.*

AC. avec le type.

Var. δ . *Friesii.* (*Gren. et God. Fl. F. III.* 36.) R. *macrocarpa.*

R. avec le type.

1070) *R. maritimus*. (*L. Sp.* 478) T. n° 559.

① ou ② Juillet-Septembre.

AR. Bords des étangs, fossés, mares, lieux marécageux et humides. Hollerich, Kockelscheuer. T.

1074) *R. palustris*. (*Sm. Fl. Brit. I.* 394). T. n° 560.

① ou ② Juillet-Septembre.

R. Bords des rivières et des étangs. T. Wrgt.

1072) *R. conglomeratus*. (*Murr. Prod. Gætt.* 52.) *Nemolapathum*.

4 Juillet-Septembre. [T. n° 556, 557.

AC. Bois humides, bords des eaux, fossés.

1073) *R. sanguineus*. (*L. Sp.* 476) L. 1090.

4 Juin-Août.

AR. Bois humides, lieux ombragés, bords des eaux, de la Sûre. L.

Var. β . *nemorosus*. (*Schrad. ap. Willd. in h. berol.* 4. 397.) T. n° 554.

Avec l'espèce.

1074) *R. crispus*. (*L. Sp.* 476.) Botterblât T. n° 555.

4 Juin-Août.

C. Bords des chemins, lieux cultivés, moissons, prairies.

1075) † *R. Patientia*. (*L. Sp.* 476.) Éwege Peinetsch. EF. 230.

4 Juin-Août.

AC. Cultivé dans les jardins pour remplacer les épinards et subspontané au voisinage des habitations.

1076) *R. Hydrolapathum*. (*Huds. Fl. Angl.* 154.) *H. aquaticum*.

(*Auct.*) T. n° 553.

4 Juillet-Août.

C. Bords de la Moselle. AR. Ailleurs, bords des eaux.

1077) *R. maximus*. (*Schreb. in Schweigg. et Kört. Fl. Erlang. I.*

152). L. 1093.

4 Juillet-Août.

R. Bords des fossés aquatiques des prairies du calcaire coquillier.

409. Polygonum. (*L. Gen.* 495 *ex parte.*) — Renouée. — Knöterich. [VIII, 1.]

1078) † *P. cuspidatum*. (*Sieb. Cat. rais. pl. du Jap.* 1850.) *P.*

sieboldi. (*Host.*) EF. 232b.

4 Avril-Septembre.

AC. Cultivé dans les jardins et quelquefois subspontané en leur voisinage.

1079) *P. Bistorta*. (*L. Sp.* 516) T. n° 595.

4 Juin-Juillet.

AR. Prairies humides, bois montueux, tourbeux, en amont du pont de Roodt (Simmern.) DW. C. à partir des prairies de Feulen jusque et y compris les Ardennes.

- 1080) *P. amphibium*. (*L. Sp.* 517) T. n° 597.
 4 Juin-Septembre.

AC. Fossés, mares, étangs, lieux marécageux. R. Ardennes.

- 1081) *P. lapathifolium*. (*L. Sp.* 517) T. n° 601.
 ① Juin-Septembre.

C. Lieux humides, bords des eaux, lieux humides ou inondés l'hiver.

- Var. *β. nodosum*. (*Pers. syn. pl.* I. 440) T. n° 602.

R. Avec l'espèce. Moselle Forges dites des Rochers près Grevenmacher T.

- Var. *γ. incanum*. (*Schmidt. bot.* 391) T. n° 601c.

AC. Avec l'espèce.

- 1082) *P. Persicaria*. (*L. Sp.* 518) T. n° 600.
 ① Juillet-Octobre.

C. Lieux humides, bords des eaux, fossés.

- 1083) *P. mite*. (*Schrank. Baier. Fl.* I. 668). L. 1106.

- ① Juillet-Octobre.

AR. Fossés, lieux humides. Moselle. L.

- 1084) *P. minus*. (*Huds. fl. Angl.* I. 148.) *P. pusillum*. T. n° 599.

- ① Juillet-Octobre.

R. Lieux humides, fossés.

- 1085) *P. Hydropiper*. (*L. Sp.* 517) T. n° 598.

- ① Juillet-Septembre.

C. Fossés, lieux humides, marécageux, berges des rivières.

- 1086) *P. aviculare*. (*L. Sp.* 519.) Tennenräs. Weegräs. Tau-
 sendknüttel T. n° 603.

- ① Juin-Octobre.

C. Villages, jardins, bords des chemins, rues peu fréquentées, basses-cours,
 lieux incultes et cultivés.

- 1087) *P. Bellardi*. (*All. Fl. Ped.* I. 90. f. 2). T. n° 604.

- ① Juin-Juillet.

R. Champs arides des Ardennes. M^{re} Libert. Lj.

- 1088) *P. Convolvulus*. (*L. Sp.* 522). T. n° 607.

- ① Juillet-Septembre.

C. Champs, lieux cultivés ou en friche, buissons, etc.

- 1089) *P. dumetorum*. (*L. Sp.* 522.) Wel Heedekaar. T. n° 608.

- ① Juillet-Septembre.

C. Haies, buissons, bois. A rechercher en Ardennes.

410. Fagopyrum. (*Tournf. Inst.* 290 *ex parte*.) — Sarrasin. —
 Buchweizen. [VIII, 1.]

1090) † *F. esculentum*. (*Mönch. meth.* 290.) Welkûor. Heede-
kaar T. n° 605.

① Juin-Août.

AC. Cultivé dans les terres arénacées et souvent subspontané.

1091) † *F. tataricum*. (*Gærtn. Fruct. II.* 182.) Greng Heede-
kaar T. n° 606.

① Juin-Septembre.

AC. Cultivé et souvent subspontané.

LXXX. MOREAE.

(Endl. Prodr. fl. Norf. 40.) [XXI, 4.]

411. Morus. (*Tournf. Inst.* 362.) — Mûrier. — Maulbeere.

1092) † *M. alba*. (*L. Sp.* 1398). T. n° 1358bis.
‡ Fl. Mai. Fr. Juillet-Août.

R. Cultivé. Haies aux environs de Rudlich (Schengen.) T. Jardin Thys. (Clausen).

1093) † *M. nigra*. (*L. Sp.* 1398.)
‡ Mai. Fr. Juillet-Août.

AC. Cultivé pour ses fruits.

LXXXI. CANNABINEAE.

(Endl. Gen. pl. 286.) [XXII, 5.]

412. Cannabis. (*Tournf. Inst.* 309.) — Chanvre. — Hanff.

1094) † *C. sativa*. (*L. Sp.* 1457.) Wierek. Plante mâle. Fimmel.
Pl. femelle. Mesch T. n° 1413.

① Juillet-Août.

C. Cultivé et souvent subspontané aux bords des chemins.

413. Humulus. (*L. Gen.* 1116.) — Houblon. — Hopfen.

1095) *H. Lupulus*. (*L. Sp.* 1457.) Happ T. n° 1410.
‡ Juillet-Août.

AC. par place. Haies, buissons, lieux frais et ombragés. R. Cultivé.

LXXXII. ULMACEAE.

(Mirbel. Elém. 905.)

414. Ulmus. (*L. Gen.* 316.) — Orme. — Ulme. [V, 2.]

1096) *U. campestris*. (*L. Sp.* 327.) Rôdhholz . . . T. n° 425.
‡ Mars-Avril. Fr. Fin Mai.

AR. Bois montueux. Schockbüsch (Hautcharage.) AC. Planté en avenue.

Var. *β. suberosa*. (*Ehrh. Beitr.* 6. 87) T. n° 427.
Avec l'espèce.

1097) *U. effusa*. (*Willd. Prod. fl. Berol.* 206.) Wel Lann.

‡ Avril. Fr. Juin.

[T. n° 426.

AR. Bois. Sauerheck (Sandweiler), Helperich (Buschdorff), etc. Planté en avenue.

LXXXIII. URTICEAE.

(DC. Fl. Fr. III. 517 ex parte.)

415. *Urtica*. (*Tournf. Inst.* 308 *ex parte*.) Ortie. Nessel. [XXI, 4.]

1098) *U. dioica*. (*L. Sp.* 1396.) Brenndeschtel. . T. n° 1360.

‡ Juin-Octobre.

C. Voisinage des lieux habités, pied des murs, décombres, lieux incultes et cultivés, haies, buissons, bois, etc.

1099) *U. urens*. (*L. Sp.* 1396.) Brenndeschtel. . T. n° 1359.

① Mai-Octobre.

C. Voisinage des habitations, pied des murs, décombres, haies, bords des chemins.

416. *Parietaria*. (*Tournf. Inst.* 289.) — Pariétaire. — Glas-kraut. [IV, 1, ou XXIII, 1.]

1100) *P. officinalis*. (*L. Sp.* 1492 *pro parte*.) . . T. n° 1361.

‡ Juin-Octobre.

AC. par place. Vieux murs, décombres, ruines. Vieux château d'Ansembourg. T. Echternach. (Brinmeyr père).

1101) *P. ramiflora*. (*Mönch. meth.* 371.) *P. Judaica*. (*L.*)

‡ Juin-Septembre.

[T. n° 1362.

AC. par place. Vieux murs, descente du Breitenweg. T. Rochers du Sternchen. Kz.

LXXXIV. THYMELACEAE.

(Meisn. in DC. Prodr. XIV. 493.) [VIII, 1.]

417. *Daphne*. (*L. Gen.* 485.) — Daphné. — Seidelbast.

1102) *D. Mezereum*. (*L. Sp.* 509.) Mærzblum. Kellerholz.

Feechholz. Fichtenholz. Joli-bois. . . T. n° 592.

‡ Février-Mars. Fr. Juin-Juillet.

AC. par place. Bois montueux.

418. *Thymelæa*. (*Tournf. Inst.* 594 *emend.*) — Thyméléc. — Spatzenzunge.

1103) *T. Passerina*. (*L. Sp.* 512.) *Stellera Passerina*. (*L.*)

① Juillet-Septembre.

[T. n° 594.

AR. Champs maigres, terrains en friche, moissons. Bettendorf, Echternach, Berbourg, Reckange, Remich. T. Moselle. Wgt. Felz (Schengen.) Kz.

LXXXV. ELÆAGNEAE.

(R. Brow. Prodr. p. 350.)

419. Elæagnus. (*L. Gen.* 159.) — Chalef. — Oelweide. [IV, 1.]1104) † *E. angustifolius.* (*L. Sp.* 176) EF. 239.

‡ Mai-Juin. Fr. Août-Septembre.

AR. Cultivé. Côte d'Eich.!

420. Hippophaë. (*L. Gen.* 1452.) Argoussier. Seedorn. [XXII, 4.]1105) † *H. rhamnoides.* (*L. Sp.* 1452) EF. 238.

‡ Avril-Mai. Fr. Septembre.

AC. Cultivé.

LXXXVI. HIPPURIDEAE.

(Link. Enum. Hort. Berol. I. 5.) [I, 1.]

421. Hippuris. (*L. Gen.* 11.) — Pesse. — Tannwedel.1106) ? *H. vulgaris.* (*L. Sp.* 6) T. n° 1.

‡ Juin-Août.

AC. par place. Fossés aquatiques, rivières et ruisseaux à courant peu rapides, flaques d'eau, marais tourbeux. Alzette (Joachim). L. 455. Neumühl. T. (Comme il y a 14 localités de ce nom dans le pays, il n'a pas encore été possible de retrouver la station indiquée.)

LXXXVII. SANTALACEAE.

(R. Br. Prodr. Nov. Holl. 350.) [V, 1.]

422. Thesium. (*L. Gen.* 292.) — Thesion. — Verneinkraut.1107) *T. pratense.* (*Ehrh. herb. exc. n° 12.*) *T. Linophyllum.* (*L.*)

‡ Juin-Juillet.

[T. n° 394.]

AR. Prairies, pâturages, pelouses sèches, lieux pierreux, coteaux incultes, clairières des bois. Bettendorff. C. Ardennes. Our au-dessus de Vianden. (Courtois).

LXXXVIII. ARISTOLOCHIEAE.

(Juss. Gen. 74 ex parte.)

423. Asarum. (*Tournf. Inst.* 215.) Asaret. Haselwurz. [XI, 1.]1108) *A. europæum.* (*L. Sp.* 633) T. n° 679.

‡ Avril-Mai.

R. Bois montueux, humides, généralement sous coudrier. Ansembourg. T. Ospem. Md.

424. Aristolochia. (*Tournf. Inst.* 71.) — Aristoloche. —

Osterluzei. [XX, 5.]

1109) *A. Clematitis.* (*L. Sp.* 1364) T. n° 1299.

4 Mai-Août.

C. par place. Haies, lisières des bois, buissons, lieux incultes, etc. Pétange, Simmern. T. Vieux château d'Ansembourg. T. ! Echternach. (Brimmeyr père). Krautemesgrund. (Esch s/A.) EF. Kz.

1110) † A. *Sipho*. (*L'Hérit. Bot. Mag. t. 534.*) Peiffenholz.

5 Mai-Juin.

[EF. 240.

AC. Cultivé comme plante grimpante.

LXXXIX. EUPHORBIACEAE.

(Juss. Gen. 384.)

425. Euphorbia. (*L. Gen.* 609.) Euphorbe. Wolfsmilch. [XXI, 1.]

1111) † E. *Lathyris*. (*L. Sp.* 653.) Porgœrkfêren. Zennett-blêder T. n° 690.

② Juin-Juillet.

AC. Cultivé pour son emploi dans la médecine populaire. Quelquefois subspontané au voisinage des habitations. Clausen, Blaschette, Helmdange. T. Mies (Mersch.) Kz., etc.

1112) E. *amygdaloides*. (*L. Sp.* 663.) Fescherkraut. E. *silvatica*.

4 Mai-Juin.

[T. n° 693.

C. Bois, taillis, buissons de l'Ardenne. AR. ailleurs. Beaufort. T. Langenberg (Dudelange.) BL. Grandbois (Rodange.) Kz. Bissenerhecken. DW. ! Echternach. (Brimmeyr père).

1113) E. *Peplus*. (*L. Sp.* 653) T. n° 688.

① Juillet-Octobre.

C. Bords des chemins, jardins, lieux cultivés, moissons. AC. Ardennes.

1114) E. *helioscopia*. (*L. Sp.* 658) T. n° 691.

① Juin-Octobre.

C. Bords des chemins, jardins, lieux cultivés, moissons.

1115) E. *exigua*. (*L. Sp.* 654) T. n° 689.

① Mai-Septembre.

C. Bords des chemins, terrains cultivés et en friche, moissons. R. Ardennes.

1116) E. *dulcis*. (*L. Sp.* 656.) E. *purpurata*. (*Thuil.*) T. n° 696.

4 Avril-Juin.

AC. par place. Bois montueux, lieux ombragés des terrains argileux. Ram-brouch, Esch s/S., Wiltz, Schrassig. T. Moselle. Md. Greiveldange, Ehnen. BB. Wecker, Merttert. R.

1117) E. *verrucosa*. (*L. Sp.* 658) T. n° 697.

4 Mai-Juin.

R. Buissons, haies, fossés, pâturages humides. Krewinkel (Hesperange.) BL. !

1118) *E. platyphyllos*. (*L. Sp.* 660) T. n° 698.

② ou ① Juillet-Septembre.

AR. Lieux cultivés, champs frais entre Eich et Rodenhof. Remich. BB.! Plei-trange. BL.

1119) *E. stricta*. (*L. Syst. Nat.* 1049) *E. micrantha*. L. 1130.

‡ Mai-Juillet.

C. par place. Bords des chemins, haies, bords des eaux entre Wasserbillig et Echternach. L. (Brimmeyr père). Kleeberg, Remerschen. BB. Bords de la Moselle (Garke). Wecker, Mertert. R. Walferdingerberg. BL.

1120) *E. Gerardiana*. (*Jacq. Aust. V.* 1. 436) . . . T. n° 692.

‡ Juin-Août.

AR. Lieux secs, pelouses arides, clairières des bois secs, graviers de la Moselle. T. Grevenmacher, Schengen, Kz. Remich (Löhr).

1121) *E. Cyparissias*. (*L. Sp.* 661) *Hexemelech*. . . T. n° 694.

‡ Avril-Juin.

C. Bords des chemins, lieux stériles, sablonneux, coteaux arides, pâturages secs.

1122) *E. Esula*. (*L. Sp.* 660) T. n° 695.

‡ Mai-Août.

AC. Bords des chemins et des eaux, prés en amont de Remich, BB.! en aval de Grevenmacher. R.

426. Mercurialis. (*Tournf. Inst.* 308.) — Mercuriale. —
Bingelkraut. [XXII, 8.]

1123) *M. annua*. (*L. Sp.* 1465.) Köhkrut . . . T. n° 1423.

① Juin-Octobre.

C. Voisinage des habitations, jardins, lieux cultivés, moissons.

1124) *M. perennis*. (*L. Sp.* 1465) T. n° 1422.

‡ Avril-Mai.

AC. par place. Bois montueux, rochers, etc. C. Grandbois (Differdange).

427. Buxus. (*Tournf. Inst.* 345.) — Buis. — Buchs. [XXI, 4.]

1125) *B. sempervirens*. (*L. Sp.* 1394.) Pälme . . . T. n° 1363.

‡ Fl. Mars-Avril. Fr. Juillet-Août.

AC. Coteaux pierreux du Palmberg (Aln). T.! Ruines de Larochette.!

Var. β . † suffruticosa. (*Lam. Dict. I.* 511.)

C. Employé comme bordure dans les jardins.

XC. CALLITRICHINEAE.

(Lavielle in Ann. soc. Linn. Par. 1824. 229.) [XXI, 1, ou 1, 2.]

428. Callitriche. (*L. Gen.* 13.) — Callitriche. — Wasserstern.

1126) *C. stagnalis*. (*Scop. Carn. II. 251*). L. 456.
 4 Juin-Octobre.

C. Mares, fossés, ruisseaux.

1127) *C. vernalis*. (*Kütz. in Linnaea. VII. 174*). . . T. n° 2.
 4 Mars-Octobre.

C. Mares, fossés, ruisseaux.

Var. β . *minima*. (*Hoppe*.) *C. caespitosa*. (*Schultz.*)

AR. Chemins humides des bois. (*Gleich*), *Elvange*. Kz.

Var. γ . *stellata*. (*Hoppe*.)

C. Eaux stagnantes, lavoirs.

Var. δ . *intermedia*. (*Hoppe*.)

AC. Avec la précédente.

Var. ε . *angustifolia*. (*Hoppe*.)

AR. Ornières du chemin du Beyerholz entre Munsbach et Schuttrange. Kz.

1128) *C. hamulata*. (*Kütz. in Koch syn. ed. 1. 246.*) *C. autumnalis*. (*Auct. non L.*). T. n° 3.

4 Avril-Automne.

R. Fossés, mares.

XCI. CERATOPHYLLEAE.

(Gray, Arr. II. 534.) [XXI, 5.]

429. Ceratophyllum. (*L. Gen. 1065.*) — Cornifle. — Igellock.

1129) *C. demersum*. (*L. Sp. 1409*). T. n° 1373.

4 Juillet-Septembre.

C. par place. Rivières, fossés, bassins, étangs, mares.

Var. β . *apiculatum*. (*Cham. et Schldl.*)

R. Avec l'espèce.

CLASSE II. — Apétales amentacées.

XCII. JUGLANDEAE.

(DC. Théo. élém. 215.) [XXX, 5.]

430. Juglans. (*L. Gen. 1071 ex parte.*) — Noyer. — Wallnuss.

1130) † *J. regia*. (*L. Sp. 1415.*) Nössert . . . T. n° 1380.

‡ Avril-Mai. Fr. (Bâmnoss.) Septembre-Octobre. Hackernoss.

C. Anciennement cultivé pour ses fruits et son bois.

1131) † *J. nigra*. (*Michx. Arb. forest. 1. 157*). . . EF. 250.

‡ Avril-Mai.

R. Cultivé. Dudelage.

XCIII. CUPULIFERAE.

(A. Rich. Elém. bot. éd. 6. 621.) [XXI, 5.]

431. Fagus. (*Tournf. Inst.* 351.) — Hêtre. — Buche.1132) *F. silvatica.* (*L. Sp.* 1416.) Bieh T. n° 1376.

‡ Avril-Mai. Fr. (Buchacker.) Octobre.

C. Bois, haies, etc.¹⁾**432. Castanea.** (*Tournf. Inst.* 352.) — Châtaignier. — Kastanie.1133) † *C. sativa.* (*Mill. Dict.* 3.) Käschtebâm. *C. vulgaris.*

‡ Juin. Fr. (Marong. Käscht.) Septembre-Octobre. [T. n° 1377.

Cette essence qui était avant l'hiver de 1793 assez commune dans nos bois est aujourd'hui R. cultivée. Marienthal. T. Leesbech. Schmelzerbüsch (Simmern.) DW. Kz. Pleitrang. Lechensberg. Kz.

433. Quercus. (*Tournf. Inst.* 349.) — Chêne. — Eiche.1134) *Q. pedunculata.* (*Ehrh. arbor.* 77.) *Q. Robur.* (*L. fl. Suec.**ed.* 2. p. 340 *excl. Var. β.*) *Q. racemosa.* Sommerèch. Steen-

èch. Freche T. n° 1378.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre.

AC. Bois de la plaine à sol frais et humides.

1135) *Q. sessiliflora.* (*Salisb. Prod.* 392.) Eisèch. Wanterèch.

Männchen. Ch. rouvre T. n° 1379.

‡ Mai. Fr. Octobre.

C. Bois et taillis montueux.

1136) † *Q. rubra.* (*Michx. Chêne amé. t.* 35. 36.)

‡ Mai. Fr. Octobre.

Cultivé en forêt. Johannisberg, Schäferei (Schönfels.) Kz.

1137) † *Q. tinctoria.* (*Michx. l. c. t.* 24. 25.)

‡ Mai. Fr. Octobre.

Cultivé en forêt. Johannisberg, Schönfels. Kz.

1138) † *Q. alba.* (*Michx. arbres forestiers. II. p.* 13.)

‡ Mai. Fr. Octobre.

Cultivé en forêt. Johannisberg, Schönfels. Kz.

434. Corylus. (*Tournf. Inst.* 347.) — Coudrier. — Hasel.1139) *C. Avellana.* (*L. Sp.* 1417.) Hiëselter. . . T. n° 1385.

‡ Février-Mars. Fr. (Hiëselnoß.) Août-Septembre.

C. Haies, buissons, taillis, surtout de l'oolite. Cultivé en grand nombre de variétés.

1) Le hêtre du Höhenhof mesure à hauteur d'épaule 7^m12, celui de la Hambierknup, (Grünenwald) 4^m70, celui de la Seitert. (Lintgen), 4^m74, etc.

435. Carpinus. (*L. Gen.* 1037 *ex parte.*) — Charme. — Hainbuche.

1140) *C. Betulus.* (*L. Sp.* 1416.) Hombuch. Maibich. Hoobich.

‡ Avril-Mai. Fr. Juillet-Août.

C. Haies, taillis, bois. Un exemplaire extraordinaire à Scheuerhof (Remich), mesure 2^m80 à hauteur d'épaule, 8^m10 au pied.

XCIV. SALICINEAE.

(A. Rich. *Elém. Bot.* éd. 6. 626.) [XXII, 2.]

436. Salix. (*Tournf. Inst.* 364.) — Saule. — Weide.

Sect. I. — Fragiles. (*Koch, Com. de Sal.*)

1141) † *S. pentandra.* (*L. Sp.* 1442) EF. 252.

‡ Mai-Juin.

C. Talus des chemins de fer.

1142) *S. fragilis.* (*L. Sp.* 1443) T. n° 1397.

‡ Avril-Mai.

AC. Villages, bords des chemins et des eaux.

Var. β . *decipiens.* (*Hoff. sal.* 2. p. 2. t. 3.) Gfêl Weid.

C. Avec le type.

1143) *S. alba.* (*L. Sp.* 1449) T. n° 1390.

‡ Avril-Mai.

C. Bords des eaux et des chemins.

Var. β . *vitellina.* (*L. Sp.* 1442) T. n° 1391.

AC. Avec l'espèce, surtout en oseraie.

1144) † *S. babylonica.* (*L. Sp.* 1443.) Trauerweid. T. n° 1395.

‡ Avril-Mai.

C. Cultivé comme arbre funéraire et dans les parcs.

Sect. II. — Amygdalinae. (*Koch, syn.* 741.)

1145) *S. amygdalina.* (*L. Sp.* 1443 *emend.*) . . . T. n° 1394.

‡ Avril-Mai.

C. Fossés, bords des eaux et des rivières.

Var. β . *concolor.* (*Koch, syn.* 742.) *S. triandria.* (*L. Sp.* 1442.)

Avec l'espèce. [T. n° 1393.]

1146) *S. hippophaëfolia.* (*Thuill. Fl. Par.* 514.) Holl. Fl. Moselle.

‡ Avril-Mai.

R. Lieux humides, bords des eaux. C. Wasserbillig à Schengen. BB.

Sect. III. — Pruinosæ. (*Koch, Com. de sal.*)

- 1147) *S. daphnoides*. (*Villars, fl. Dauph. 3. 765*) . T. n° 1396.
 ‡ Mars-Avril.

R. Bords sablonneux des rivières. Sûre entre Grundhof et Echternach. T. Weilerbach. L.

Sect. IV. — Purpureæ. (*Koch, syn. 744.*)

- 1148) *S. purpurea*. (*L. Sp. 1442*) T. n° 1406.
 ‡ Mars-Avril.

AC. Bords des eaux, lieux humides. Moulin de Steinsel, village de Sæul. Kz.

- 1149) *S. rubra*. (*Huds. fl. Ang. p. 423*) BB. 392.
 ‡ Mars-Avril.

R. Prairies humides, bords des eaux, fossés. En amont de Remich. BB.

Sect. V. — Viminales. (*Koch, syn. 745.*)

- 1150) *S. viminalis*. (*L. Sp. 1448.*) Banweid. Këferweid.
 ‡ Mars-Avril. [T. n° 1405.

C. Bords des eaux et dans les oseraies.

Sect. VI. — Capreæ. (*Koch, syn. 747.*)

- 1151) *S. Seringeana*. (*Gaud. Fl. helv. 6. 251*) . . T. n° 1401.
 ‡ Avril.

AC. Bords des eaux. Moselle. T.

- 1152) *S. incana*. (*Schrank, baier. Fl. 1. 230*) . . T. n° 1392.
 ‡ Avril-Mai.

R. Bords des eaux. Echternach, vers la Weilerbach. (Garke). Biwels (Courtois).

- 1153) *S. Caprea*. (*L. Sp. 1448.*) Beschweid. . . T. n° 1398.
 ‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

C. Bois, ruines, etc.

- 1154) *S. cinerea*. (*L. Sp. 1449.*) Muôrweid. *S. acuminata*.
 ‡ Mars-Avril. [T. n° 1400.

C. Lieux humides, mares, berges des rivières, etc.

- 1155) *S. aurita*. (*L. Sp. 2446*) T. n° 1399.
 ‡ Avril-Mai.

AC. Prés paludéens, tourbières, marécages, etc.

- 1156) *S. depressa*. (*L. fl. Suec. ed. 2. p. 352*) . . T. n° 1404.
 ‡ Avril.

AR. Marais tourbeux de l'Ardenne.

1157) *S. repens*. (*L. Sp.* 1417.)

‡ Avril-Mai.

AC. Prairies marécageuses et tourbeuses, pâturages, bruyères humides, lieux sablonneux. Brouch. EF. 1

1158) † *S. rosmarinifolia*. (*L. Sp.* 1148) . . . EF. 253.

‡ Mai.

AC. Marais spongieux. Echternach. Dmtr.

437. Populus. (*Tournf. Inst.* 365.) — Peuplier. — Pappel.

1159) † *P. alba*. (*L. Sp.* 1463) . . . T. n° 1415.

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

AR. Planté et quelquefois subspontané. Pont de Bettembourg.

Var. β . *denudata*. (*Hartig. Forstkulturpfl.* 454.)

R. Cultivé. Prés en aval du vieux château d'Ansembourg.

1160) † *P. canescens*. (*Smit. Brit.* 1080) . . . T. n° 1416.

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

AR. Cultivé et quelquefois subspontané. Bords de l'Alzette à Clausen. Kz.

1161) *P. tremula*. (*L. Sp.* 1464.) Tremble. Aesp. T. n° 1417.

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

C. Bois, terrains humides.

Var. β . *villosa*. (*Richb. exsicc.* 173) . . . T. n° 1417b.

AC. avec le type.

1162) *P. nigra*. (*L. Sp.* 1464.) Pampulgen. Pouplier. T. n° 1419.

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

AR. Bords des eaux, terrains humides entre Reckingen et Marienthal. T. 1 Limpertsberg. Kz.

Var. β . *pyramidalis*. (*Rosier, Cours. agr. VII.* 619.) Wässerhousar.

P. d'Italie. P. dilatata. (Ait.) fastigiata. (L.) T. n° 1420.

‡ Mars-Avril.

AC. Cultivé le long des eaux et des haies dans les villages. Nous ne connaissons que le mâle. Les premiers peupliers plantés chez nous sont âgés de 175 ans, mesurent 3^m80 de tour et se trouvent dans le parc du château de Berg.

1163) *P. canadensis*. (*Desf. Cat. hort. Par.*) Canada. *P. monolifera. (Ait.)* . . . T. n° 1421.

‡ Mars-Avril. Fr. Juin.

C. Cultivé en avenues dans lesquelles on ne rencontre le plus souvent que des pieds mâles.

1164) † *P. balsamifera*. (*L. Sp.* 1464.) Lantago. T. n° 1418.

‡ Mars-Avril.

AR. Cultivé en avenue. Route près de Merl. Altrier. Kz.

XCV. BETULINEAE.

(A. Rich. Elém. bot. éd. 5. 626.)

438. Betula. (*Tournf. Inst.* 360.) — Bouleau. — Birke. [XXI, 5.]1165) *B. alba.* (*L. Sp.* 1393 *pro parte.*) Bîerk . . . T. n° 1382.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin.

C. Bois sablonneux

Var. *β. pubescens.* (*Ehrh. Beiträge.* 6. p. 98. *arb.* n° 67.)

‡ Avril-Mai. Fr. Juin. [T. n° 1384.]

AR. Tourbières, bois humides. C. Ardennes, Beaufort. L.

Var. *γ. carpatica.* (*Willd. Sp.* 4. 1. 464) . . . T. n° 1383.

R. Forêts de l'Ardenne. Dmtr.

Var. *δ. verrucosa.* (*Ehrh. l. c.* n° 96.)Avec var. *β.***439. Alnus.** (*Tournf. Inst.* 359 *emend.*) Aulne. Erle. [XXI, 4.]1166) *A. glutinosa.* (*Gaertn. Fruct. II. t.* 90.) Eller. Ahlenter.

‡ Février-Mars. Fr. Août-Septembre. [T. n° 1364.]

C. Bords des eaux, lieux marécageux des bois, etc.

1167) † *A. incana.* (*DC. Fl. Fr. III.* 304) . . . EF. 258.

‡ Février-Mars. Fr. Août-Septembre.

AR. Planté dans les bois. Fascht. (Mersch) (1842) Baumbüsch (1853).

XCVI. PLATANEAE.

(Lestib. in Martins. Hort. Monas. 46.) [XXI, 5.]

440. Platanus. (*L. Gen.* 105.) — Platane.1168) † *P. orientalis.* (*L. Sp.* 1417) . . . EF. 259.

‡ Fl. Avril-Mai. Fr. Août.

AC. Planté en avenues.

1169) † *P. acerifolius.* (*Willd. Sp. IV.* 474.)

‡ Avril-Mai. Fr. Août.

AC. Planté en avenues et dans les parcs. Au château de Berg il existe des pieds de 2m50 de tour.

1170) † *P. occidentalis.* (*L. Sp.* 1418) . . . EF. 260.

‡ Avril-Mai. Fr. Août.

R. Cultivé parce qu'il souffre de la gelée.

SUBDIVISION IV. — *Gymospermes.*CLASSE UNIQUE. — *Coniferæ.* (*Juss. Gen.* 411.)

XCVII. ABIETINEAE.

(Rich. Conif. 145.) [XXI, 1.]

441. Pinus. (*L. Gen.* 1077 *ex parte.*) — Pin. — Kiefer.

1171) † *P. silvestris*. (*L. Sp.* 1418.) Wel Denn. Silvester.
[T. n° 1388.

‡ Mai-Juin. Fr. (Weieràch.) Septembre de l'année suivante.

C. Cultivé. Bois. Howald et Grünenwald (1810), Beyerholz (1816), Reisdorf (1827), et surtout depuis 1841.

1172) † *P. austriaca*. (*Höss. Anleit.* 6.)

‡ Mai. Fr. Automne de la seconde année.

AC. Cultivé. Bois sur calcaire. Edingsberg, Neudorf (1859), Grünenwald (1856), Baumbüsch (1868), etc.

1173) † *P. Pinaster*. (*Solander in Ait. Hort. Kew. ed. 1. III.* 367.) *P. maritime* EF. 263.

‡ Avril-Mai. Fr. Automne de la 2^e année.

AR. Cultivé en forêt. Friedbüsch, Diekirch (1827), Nagem (1855), Lintgen, Kopstal, Simmern (1858). Souffre des gelées tardives aux expositions méridionales.

1174) † *P. Strobus*. (*L. Sp.* 1419.) Lord Weymouth. EF. 262.

‡ Fin Mai. Fr. Automne de la 2^e année.

AR. Cultivé en forêt. Schrassig (1825), Würthsberg (1836), Edingsberg (1851), Lintgen (1859).

442. Larix. (*Tournf. Inst.* 357.) — Mélèze. — Lärche.

1175) † *L. decidua*. (*Mill. Dic. n° 1.*) *L. europæa*. (*DC.*)

‡ Fl. Avril. Fr. Automne. [T. n° 1389.

C. Cultivé. Bois. Ansembourg, 2^m35 de tour (1772), Baumbüsch et Brammeschbüsch (1779), Würthsberg, Arsdorf (1829), Holz (1831), Kippenhof (1842).

443. Picea. (*Link. in Linnæa. XV.* 516.) — Pesse. — Fichte.

1176) † *P. excelsa*. (*Link. l. c.* 515.) Épicéa. Rothtau. Abies excelsa T. n° 1388.

‡ Mai-Juin. Fr. Octobre de la même année.

C. Cultivé en forêt. Schälheck, Bissen, 2^m40 de tour (1772). Clausen, Holzem (1825), Reisdorf (1827), Holz (1831).

1177) † *P. alba*. (*Mich. Fl. Bor. Amer. II.* 207.) Sapinette.

‡ Fl. Mai. Fr. Octobre.

AR. Cultivé en forêt. Bereldange (1851), Itzig (1852)

444. Abies. (*Tournf. Inst.* 353, 354.) — Sapin. — Tanne.

1178) † *A. pectinata*. (*DC. Fl. Fr. III.* 275.) Weistan.

‡ Fl. Mai. Fr. Octobre.

AR. Cultivé en forêt. Juckelsbüsch, 2^m40 de tour (1768). Ansembourg, 2^m30 de tour (1771).

1179) *A. balsamea*. (*Mill. Dict. n° 3.*) Baumier . . EF. 266.

‡ Fl. Mai. Fr. Automne.

AR. Cultivé en forêt. Edingsberg (1853).

XCVIII. CUPRESSINEAE.

(Rich. Conif. 137 Taxineæ.) [XXII, 11.]

445. Juniperus. (*L. Gen. 1134.*) — Genévrier. — Wachholder.

1180) *J. communis*. (*L. Sp. 1470.*) Wackelter. Geißler. T n° 1425.

‡ Avril-Mai. Fr. (Wackelterkîeren.) Août-Octobre de l'année suivante.

C. Bruyères, coteaux sablonneux, ineultes, clairières des bois.

1181) † *J. Sabina*. (*L. Sp. 1472.*) Sievebâm . . . EF. 268.

‡ Fl. Mai-Juin. Fr. Octobre.

AR. Cultivé dans les jardins, où l'on rencontre des sujets d'un grand âge.

1182) † *J. virginiana*. (*L. Sp. 1471.*) Cèdre de Virginie. EF. 269.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre.

AR. Cultivé comme arbre d'ornement.

446. Thuia. (*Tournf. Inst. 358.*) — Thuia. — Lebensbaum.

1183) † *T. occidentalis*. (*L. Sp. 1422.*) Thuja . . EF. 271.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre.

AC. Cultivé comme arbre d'ornement pour clôture, et quelquefois en massif forestier. Johannisberg. Kz.

447. Taxus. (*Tournf. Inst. 362.*) — If. — Eibe.

1184) † *T. baccata*. (*L. Sp. 1472.*) Französische Pâlm. EF. 270.

‡ Mars-Avril. Fr. Août-Septembre.

Anciennement cultivé dans les jardins où il était soumis à des tailles bizarres. Château de Bettingen. ! A Ehrlange se trouve un pied ayant 2^m52 de tour, ce qui fait à raison de 0,015^m d'accroissement annuel : 675 ans.

DIVISION II. — MONOCOTYLÉES ou Endogènes.

SUBDIVISION I. — Coronariées.

CLASSE I. — Superovariées.

XCIX. ALISMACEAE.

(R. Br. Prod. Nov. Hall. 342 ex parte.)

448. Alisma. (*L. Gen. 460.*) — Flûteau. — Froeschlöffel. [VI, 5.]

1185) *A. Plantago*. (*L. Sp. 486.*) T. n° 566.

‡ Juin-Septembre.

C. Fossés, bords des eaux, lieux marécageux AC. Ardennes.

Var. *β. lanceolatum*. (*Wither. Arrang.* 362.)

R. Avec l'espèce sur la Moselle. L.

1186) *A. natans*. (*L. Sp.* 487) T. n° 567.

‡ Juin-Septembre.

R. Mares et étangs des terres légères ou tourbeuses. Cap. T.

449. Sagittaria. (*L. Gen.* 1067.) Sagittaire. Pfeilkraut. [XXI, 5.]

1187) *S. sagittæfolia*. (*L. Sp.* 1410) T. n° 1370.

‡ Juin-Août.

AC. par place. Bords des eaux, lieux marécageux. R. Ardennes.

C. BUTOMEAE.

(Rich. in Mém. Mus. I. 364.) [IX, 3.]

450. Butomus. (*L. Gen.* 507.) — Butome. — Schwanenblume.

1188) *B. umbellatus*. (*L. Sp.* 532.) Wasserlesch. T. n° 612.

‡ Juin-Août.

C. par place. Bords des étangs et des rivières. Sûre, Moselle, Alzette près Mœs-dorf. R. Ardennes.

CI. COLCHICACEAE.

(DC. Fl. Fr. III, 192.) [VI, 3.]

451. Colchicum. (*Tournf. Inst.* 181.) — Colchique. — Zeitlose.

1189) *C. autumnale*. (*L. Sp.* 485.) Hierschtblum. Uchteblum.

Lichtblum T. n° 565.

‡ Septembre-Octobre. Fr. (Guguckséer. Köhtùt.) Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages humides. Manque dans plusieurs contrées.

CII. LILIACEAE.

(DC. Theor. élé. éd. 1. 249.) [VI, 1.]

452. Tulipa. (*L. Gen.* 415.) — Tulipe. — Tulpe.

1190) † *T. silvestris*. (*L. Sp.* 438.) Tulipant.

‡ Mai-Juin.

AC. Cultivé et qqes. subspontané. Alzette près du pont de la Pulvermühl. BL.

1191) † *T. Gesneriana*. (*L. Sp.* 439.)

‡ Mai-Juin.

AC. Cultivé en diverses et nombreuses variétés.

453. Fritillaria. (*L. Gen.* 411.) — Fritillaire. — Schachblume.

1192) † *F. imperialis*. (*L. Sp.* 436.) Keserkrön.

‡ Avril-Mai.

C. Cultivé dans les jardins.

454. Lilium. (*L. Gen.* 40.) — Lilie. — Lilie.1193) † *L. bulbiferum.* (*L. Sp.* 1. 437.) Rödlilie.

‡ Juillet-Août.

C. Cultivé.

1194) † *L. candidum.* (*L. Sp.* 433.) Weiss Lilie.

‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé.

455. Ornithogalum. (*L. Gen.* 418 *ex parte.*) — Ornithogale. — Vogelmilch.1195) ? *O. pyrenaicum.* (*L. Sp.* 440) . . . Dmtr. P. 1829.

‡ Mai-Juin.

R. Buissons, taillis, lieux herbeux. Ardennes. Dmtr.

1196) *O. umbellatum.* (*L. Sp.* 441). T. n° 528.

‡ Mai-Juin.

R. Champs cultivés, moissons, vignes, haies, lisières des bois, coteaux pierreux. Beggen, Greisch, Keispelt. T. Entre Marienthal et Ansembourg en aval de Bour près du pont de Dondelange. Kz. Bords de l'Eisch près Simmern. DW.

1197) † *O. nutans.* (*L. Sp.* 441) EF. 273.

‡ Avril-Mai.

AC. Cultivé et quelquefois subsponané au voisinage des jardins.

456. Gagea. (*Salisb. in Ann. bot.* II. 555.) Gagée. Goldstern.1198) *G. pratensis.* (*R. et S. syst.* 7. p. 536.) *G. stenopetala.*

‡ Avril-Mai. [L. 1303.]

C. Champs, pelouses sèches, rochers des terrains marneux.

1199) *G. arvensis.* (*Schult. syst. veg.* VII. 547) . . . L. 1305.

‡ Avril-Mai.

AC. Lieux cultivés, moissons, etc. des terres marneuses.

1200) *G. minima.* (*Schult. l. c.* 539.) T. n° 526.

‡ Avril-Mai.

AR. Champs sablonneux, pelouses, bois, par place. Pulvermühl.

1201) *G. lutea.* (*Schult. l. c.* 538) *G. silvatica.* . . . T. n° 525.

‡ Avril-Mai.

AR. par place. Bois, taillis, lieux ombragés des marnes irisées.

457. Scilla. (*L. Gen.* 419 *ex parte.*) — Scille. — Meerzwiebel.1202) *S. bifolia.* (*L. Sp.* 443) T. n° 529.

‡ Mars-Avril.

C. par place, mais manque sur de grands espaces. Bois, taillis, buissons herbeux des terres fortes. Grund, entre Hesperange et Kockelscheuer. BL. Echternach. (Brimmeyr père). Dudelange. T. Scheffendelchen (Larochette.) Meysembourg. Kz.

458. Allium. (*L. Gen.* 409.) — Ail. — Lauch.

Sect. I. — *Molium.* (*Don, Monogr. of the genus Allium.* 3.)

1203) *A. ursinum.* (*L. Sp.* 431) T. n° 516.

‡ Avril-Mai.

AR. par place, mais manque sur de grands espaces. R. Lieux ombragés, bois humides, bords des ruisseaux, entre Marienthal et Ansembourg. Kz. en aval de Kopstal. C. EF. Affluent de la Clerf dans la Wiltz, entre Michelau et Erpeldange. BL.!

1204) † *A. moly.* (*L. Sp.* 430) EF. 278.

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé.

Sect. II. — *Scorodon.* (*Don. l. c.* 5.)

1205) † *A. sativum.* (*L. Sp.* 425.) Knûweleck . . EF. 280.

‡ Juillet-Août.

C. Cultivé.

1206) † *A. Ophioscorodon.* (*Don. Monog. all.* 5.) Rocambole.

‡ Juillet-Août.

AR. Cultivé.

Sect. III. — *Porrum.* (*Tournf. Inst.* 210.)

1207) † *A. Porrum.* (*L. Sp.* 423.) Porett EF. 279.

② Juin-Juillet.

C. Cultivé.

1208) *A. rotundum.* (*L. Sp.* 423) T. n° 514.

‡ Juillet-Août.

AR. Lieux secs, vignes de la Moselle. Remich, Wintrange. BB. Kleeberg, entre Remerschen et Schengen. A. EE. Kz.

1209) *A. sphærocephalum.* (*L. Sp.* 426) T. n° 512.

‡ Juin-Août.

R. Coteaux arides, rochers. Greisch, sur la Moselle. T.

1210) *A. vineale.* (*L. Sp.* 428) T. n° 513.

‡ Juin-Juillet.

C. par place. Champs, ravins sablonneux, vignes, moissons, prés.

Sect. IV. — *Codonoprasum.* (*Don. l. c.*)

1211) *A. oleraceum.* (*L. Sp.* 429). L. 1317.

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux cultivés, moissons, haies, bois, coteaux pierreux, rochers jurassiques.

1212) *A. complanatum*. (Boreau, Not. XXXV.) . . BB. 384.

‡ Juin-Juillet.

R. Champs sablonneux. Clausen près le Tavion. BB.

1213) *A. carinatum*. (L. Sp. 426) T. n° 511.

‡ Juillet-Août.

R. Moissons, haies, buissons, coteaux secs de la Moselle. T. Erpeldange, Beyren. Md. K.

Sect. V. — *Schœnoprasum*. (Don. l. c.)

1214) † *A. Schœnoprasum*. (L. Sp. 432.) Bratzel. T. n° 515.

‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé et quelquefois subspontané. Rochers de la vallée de la Moselle. Dmtr. 1845.

1215) † *A. Ascalonicum*. (L. Sp. 429.) Schalott. . EF. 281.

‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé.

1216) † *A. Cēpa*. (L. Sp. 431.) Enn. EF. 276.

② Juin-Juillet.

C. Cultivé en plusieurs variétés.

1217) † *A. fistulosum*. (L. Sp. 432.) Schalotten-Enn. E. 277.

‡ Juin-Juillet.

AR. Cultivé.

459. Muscari. (Tournf. Inst. 180.) — Muscari. — Bisamhyacinthe.

1218) ? *M. comosum*. (Mill. Dic. n° 5.)

‡ Mai-Juin.

R. Vignes, champs sablonneux de la Moselle. Schengen, Elnen. T.

460. Phalangium. (Tournf. Inst. 193.) — Phalange. — Graslilie.

1219) *P. ramosum*. (Lmk. Ency. méth. V. 250) . . T. n° 522.

‡ Juin-Juillet.

R. Bois, coteaux pierreux. Schuttbourg. T. Entre Erpeldange et Michelau. (Bockholz.)

1220) *P. Liliago*. (Schreb. spicil. 36) T. n° 523.

‡ Mai-Juin.

AC. par place, manque sur de grands espaces. Rochers, coteaux sablonneux, incultes. Helpert. T. Pulvermühl. T. Wurthsberg. BL.! Revers du fort Olisy vers Kirchberg. BL.! Entre Erpeldange et Michelau. EF. Kz. Rosport et Echternach. T.

461. Narthecium. (Mœhring in Ephem. nat. Curios. 1742. 389.)

Alabama. (DC.) — Narthécie. — Beinheil.

1221) *N. ossifragum*. (*Huds. Angl.* 145) . . . T. n° 524.

‡ Juillet-Août.

R. Marais, lieux tourbeux, bruyères humides. Troine. Nœrtrange. Kz.

462. Hemerocallis. (*L. Gen.* 172.) — Hemerocalle. — Tagililie.

1222) † *H. flava*. (*L. Sp.* 462) . . . EF. 283.

‡ Juin.

C. Cultivé et souvent subsponlané. Clausen, cimetières de la Moselle.

1223) † *H. fulva*. (*L. Sp.* 462.) Gfêl Lilje . . . EF. 284.

‡ Juillet-Août.

AC. Cultivé.

CIII. ASPARAGINEAE.

(A. Rich. Dict. clas. II, 21.)

463. Asparagus. (*L. Gen.* 424.) — Asperge. — Spargel. [VI, 1.]

1224) † *A. officinalis*. (*L. Sp.* 448.) Spargel . . T. n° 530.

‡ Juin-Juillet. Fr. Août-Octobre.

C. Cultivé et souvent subsponlané, entre les rochers sablonneux de Clausen. Gillensberg, Wurthsberg. Kz.

464. Convallaria. (*L. Gen.* 425 *ex parte*.) — Muguet. — Maiblume.

1225) *C. maialis*. (*L. Sp.* 451.) Meerèsgeu . . . T. n° 520.

‡ Mai-Juin.

AC. Bois, taillis, surtout des terrains siliceux frais, etc.

465. Polygonatum. (*Desf. in Ann. Mus.* IX. 48.) — Polygonatum. — Weisswurz. [VI, 1.]

1226) *P. verticillatum*. (*L. Sp.* 451) . . . T. n° 517.

‡ Mai-Juin.

AC. Bois ombragés des Ardennes. Rambrouch, Esch s/S. C. Friedbüsch (Diekirch.) K. de Kautenbach à Wiltz. Kz.

1227) *P. multiflorum*. (*All. ped.* 1. p. 131) . . . T. n° 519.

‡ Mai-Juin.

AC. Forêts, bois taillis, pâturages montueux ombragés.

1228) *P. officinale*. (*All. l. c.*) Weisswurz. Convallaria. (*L.*)

‡ Mai-Juin.

[T. n° 518.]

AR. Bois montueux, rochers, rocailles, coteaux arides. C. par place. Pulvermühl, Neudorf. BL.

466. Maianthemum. (*Wiggers, Primit. fl. Holsat.* 15.) — Maianthème. — Schattenblume. [IV, 1.]

1229) *M. bifolium*. (DC. *Fl. F. III*. 177.) Zweeblatt. T. n° 241.

‡ Mai-Juin.

AC. par place. Manque sur de grands espaces. Bois montueux, lieux ombragés.

467. Paris. (*L. Gen.* 198.) — Parisette. — Einbeere. [VIII, 4.]

1230) *P. quadrifolia*. (*L. Sp.* 523) T. n° 611.

‡ Mai. Fr. Août.

AC. par place. Manque sur de grands espaces. Bois humides.

CLASSE II. — Inferovariées.

CIV. DIOSCOREAE.

(R. Br. Prod. Nov. Holl. 294.)

468. Tamus. (*L. Gen.* 524.) Tamier. Schmeerwurz. [XXII, 6.]

1231) *T. communis*. (*L. Sp.* 1458) T. n° 1444.

‡ Mars-Avril. Fr. Août.

AC. Bois, buissons, broussailles. Fels (Schengen.) A. EF. Kz. Dudelange. Md. (Courtois). Krautemesgrund. (Esch s[A.] BL.)

CV. IRIDEAE.

(Juss. Gen. 571.)

469. Iris. (*L. Gen.* 27.) — Iris. — Schwertel. [III, 1.]

1232) † *I. germanica*. (*L. Sp.* 55) T. n° 50.

‡ Avril-Mai.

C. Cultivé et quelquefois subspontané. Clausen, Basse-Pétrusse, Pulvermühl, BL.

1233) † *I. pumila*. (*L. Sp.* 56) T. n° 49.

‡ Avril-Mai.

AR. Cultivé et par-ei par-là subspontané.

1234) *I. Pseudo-Acorus*. (*L. Sp.* 56). T. n° 51.

‡ Juin-Juillet.

C. Bords des rivières, étangs, marécages, fossés aquatiques.

CVI. AMARYLLIDAE.

(R. Br. Prod. Nov. Holl. 296.) [VI, 1.]

470. Narcissus. (*L. Gen.* 161.) — Narcisse. — Narzisse.

1235) *N. Pseudo-Narcissus*. (*L. Sp.* 414). T. n° 510.

‡ Mars-Avril.

R. Prairies. Stemeschwies dans la vallée de la Leespech entre Greisch et Tuntingen. DW.! A rechercher en Ardennes.

1236) † *N. poeticus*. (*L. Sp.* 414) T. n° 509.

‡ Avril-Mai.

AC. Cultivé.

471. Leucolum. (*L. Gen.* 160.) — Nivéole. — Knotenblume.

1237) † *L. vernum.* (*L. Sp.* 414) T. n° 507.

4 Mai-Juin.

AC. Cultivé et quelquefois subspontané.

472. Galanthus. (*L. Gen.* 160.) Galanthine. Schneeglöckchen.

1238) † *G. nivalis.* (*L. Sp.* 413.) Perce-neige . . . T. n° 508.

4 Février-Mars.

G. Cultivé et quelquefois subspontané.

CVII. ORCHIDEAE.

(*Juss. Gen.* 64.) [XX, 1 et 2.]

Tribu I. — Ophrydeæ. (*Lindl. Orch.* 280.)

473. Aceras. (*R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. V.* 191 *ex parte.*)

— *Aceras.* — Ohnhorn.

1239) *A. anthropophora.* (*R. Br. l. c.*) Gehänkte Männchen.

Synonymes. *Ophrys anthropophora.* (*L. Sp.* 1343.) [T. n° 1285.

Himantoglossum anthropophorum. (*Spr. sys.* 3. 694.)

Loroglossum anthropophorum. (*L. C. Rich. Orch. Eur.* 32.)

4 Mai-Juin.

R. Pelouses, coteaux secs, clairières des bois sur le calcaire. Rodenhof, Kahlischeuer, Kempchen (Fouhren). (Courtois.) Md. K. Vallée de la Sûre. Diekirch, Echternach (Brimmeyr et M.) Niesbüsch (Greiveldange.) T. Md. Versant oriental du Scheuerberg (Remich). (Layen). Fels (Scheugen.) T. Fels (Mertert.) BB. BL! Manternach. R.

474. Loroglossum. (*L. C. Rich. Orch. Eur. in Mém. Mus.* IV.

47 *ex parte.*) — Loroglosse. — Riemenzunge.

1240) *L. hircinum.* (*Rich. l. c.* 54.) Bocksbart. T. n° 1277.

Syn. *Satyrium hircinum.* (*L. Sp.* 1337.)

Orehis hircina. (*Crantz, Stirp. Aust.* 484.)

Himantoglossum hircinum. (*Spr. sys.* 3. 694.)

Aceras hircina. (*Lindl. Orch.* 282)

4 Mai-Juillet.

AR. Pelouses, taillis montueux, lisières des bois. Kempchen (Fouhren). (Courtois). Mœrsdorf. T. Md. M. R. Minerley (Echternach.) Niesbüsch (Greiveldange.) Md. T. Ehnen. T. Canach, Lenningen, Remich, Wellenstein (Layen). Fels (Mertert.) R. M. Hohfels près de Machthum et Ahn. BB. EF. Kz.

475. Anacamptis. (*Rich. l. c.* 47.) *Anacamptis.* Hundswurz.

1241) *A. pyramidalis.* (*Rich. l. c.* 41) T. n° 1268.

Syn. *Orchis pyramidalis*. (*L. Sp.* 1332.)

— *condensata*. (*Desf. Atl.* 2. p. 316.)

Aceras pyramidalis. (*Rehb. Ic. vol.* 13. p. 6 t. 9)

24 Mai-Juin.

R. Coteaux secs, herbeux, bois. Beggen. M. Steinsel. T. Ernzerberg (Echternach.) M. Kempchen (Fouhren.) Md. K. Entre Manternach et Mertert. R. Littoral de la Moselle. Wintrange, Schengen. (Dmtr. Michel, Layen). Reif (Wellenstein.) Kz. Elnen. BB. Niesbüsch (Greiveldange) Md.

476. *Orchis*. (*L. Gen.* 1009 *ex parte*.) — *Orchis*. — Knabenkraut.
1242) *O. ustulata*. (*L. Sp.* 1333) T. n° 1272.

24 Mai-Juin.

R. Prairies, coteaux herbeux, lisières des bois. AC Prairies de l'Eisch de Hobscheid à Hollenfels. Md. DW. ! — R. Marienthal, Md. vis-à-vis d'Ingeldorf. Md. K. Diekirch, Bettendorf, Reisdorf. T. Mersdorf, Echternach (Brimmeyr père.) M. Scheuerhof (Canach). (Layen).

1243) ? *O. tridentata*. (*Scop. fl. Carn.* 2. p. 190.) T. n° 1274.

Syn. *Orchis variegata*. (*All. ped.* 2. 147.)

— *Simia*. (*Villars, fl. Dauph.* 2. 33.)

— *cercopithecica*. (*Lmk. Dict.* 4. 593.)

— *Scopoli*. (*Timbal-Lagrave, diag.* 1850.)

24 Mai-Juin.

R. Prés montueux, humides. Hollenfels. T. Kempchen (Fouhren.) Md. K. Leningen, entre Remich et Schengen (Layen).

1244) *O. purpurea*. (*Huds. Fl. Ang. ed.* 1. p. 334.) T. n° 1273b.

Syn. *Orchis militaris*. (*L. Sp.* 1334, *var.* β et γ .)

— *fusca*. (*Jacq. Aust. IV. t.* 307.)

24 Mai-Juin.

R. Bois montueux. Environs de Kopstal. Md. BB. Kahlscheuer, en dessous du Rodenhof. BB. Bereldange, Helmdange. Blaschette, Mersch, Goldknop (Diekirch.) Md. K. T. Ernsterberg (Echternach.) M. Mersdorf. R. Reif (Wellenstein.) Kz. Fels (Mertert.) BB. Remich (Layen).

Var. β . Jacquini. (*God. fl. Lorr. éd. I.* 3. 33.)

Syn. *Orchis hybrida*. (*Bönningh. in Rehb. fl. exc.* 125.)

— *fusca. β . stenoloba*. (*Coss. et Germ. fl. Par. éd. 1.* 550.)

— *militaris. γ . hybrida*. (*Lindl. Orch.* 271.)

— *fusco-Rivini*. (*Timb. Mém. hybrd.* p. 16.)

— *mimusops*. (*Thuill. Fl. Par.* 458.)

R. Bois d'Echternach. (Brimmeyr père).

Var. γ . moravica. (*Jacq. Icon. rar. I.* 182) L. 1239.

Avec le type dans la vallée de la Sûre inférieure. L.

1245) *O. militaris*. (*L. fl. Succ. ed. 2. p. 310*) . . . T. n° 1273.

Syn. *Orchis militaris*. (*L. Sp. 1333 excl. Var. β, δ, ε.*)

— Rivini. (*Gouan, ill. p. 74*)

— galeata. (*Poir. in Lmk. Dict. 4. p. 593.*)

— cinerea. (*Schrank, baier. Fl. 241.*)

4 Mai-Juin.

AR. Clairières des bois, pelouses ombragées, humides, près montueux. Grönwald. T. Beggen, Ronnenbüsch (Ansembourg), Mersch, Dëffling (Tuntingen.) DW. Diekirch. T. Kempchen (Courtois.) Md. Mersdorf. Md. Ernsterberg (Echternach.) M. Niesbüsch (Greiveldange.) Md. Canach (Layen). Depuis Schengen jusqu'à Wormeldange (Layen).

Var. *β. nervata*. (*Marchand, Verhandling over te Standelkruider van het G. Hgd. Luxemburg. p. 436. 9.*) ¹⁾

R. Bois montueux. Kahlscheuer. Md. Kempchen (Fouhren). Mersdorf, Niesbüsch (Greiveldange).

1246) *O. Simia*. (*Lmk. Fl. Fr. III. 507*) . . . T. n° 1273.

Syn. *Orchis tephrosanthos*. (*Vill. fl. Dauph. 2. p. 32.*)

— *militaris*. (*L. Sp. 1333. Var. ε.*)

— *zoophora*. (*Thuill. Fl. Par. 459.*)

4 Mai-Juin.

R. Clairières et lisières des bois, pelouses ombragées. Kempchen (Fouhren). (Courtois).

1247) *O. coriophora*. (*L. Sp. 1332*) . . . T. n° 1269.

4 Mai-Juin.

AC. Prairies, pâturages fertiles des bords de la Sûre et de la Moselle. Michelau (Ardennes.) BL. Diekirch, Gilsdorf, Longsdorf, Mœstroff. Md. Matteswies (Echternach.) M. — R. Ansembourg, Hollenfels, Beggen, etc. T.

1) Linné avait compris sous le même type spécifique les *Orchis purpurea*, *militaris* et *Simia*, qui ne sont aujourd'hui pas encore unanimement considérés comme bonne espèce. Marchand y a ajouté en 1827 l'*Orchis nervata*, sur lequel l'attention ne s'est pas fixée, le recueil où il a été publié n'étant abordable qu'à un public restreint. C'est ce qui nous engage à en donner la description suivante :

Orchis nervata. (*Md. de Orchideis Magni Ducatus Luxemburgensis l. c. 436. Pl. IV. fig. III.*)

Bulbes entiers, ovoïdes ou subglobuleux. Tige de 3—4 décimètres, robuste dressée, non fistuleuse. Feuilles oblongues-lancéolées. Bractées un peu plus courtes que l'ovaire, à nervures distinctes. Fleurs assez grandes, en épi ovoïde, court, gros, assez lâche, à casque d'un violet pâle ou grisâtre en dehors, purpurin en dedans, légèrement ponctué, avec 3 stries de couleur violette et pourpre en dedans, à labelle rosé, marqué de petites houppes purpurines, peu nombreuses. Périanthe à divisions conniventes en casque ovoïde-lancéolé. Labelle 3 — partit; les lobes latéraux lancéolés, mucronés, obliquement divergents; le lobe moyen s'élargissant insensiblement à partir de la base, 4 — sède. Eperon à peine courbé, regardant en bas, obtus, plus court que le quart de la longueur de l'ovaire.

1248) *O. Morio*. (*L. Sp.* 1333.) Schlüsselblum. . . T. n° 1270.

4 Mai-Juin.

AC. Prairies, pâturages, clairières des bois. C. Merl, Grevels, Bertrange. Md.
AR. Ardennes.

1249) *O. pallens*. (*L. Mant.* 292) T. n° 1275.

4 Mai-Juin.

R. Pelouses montueuses, bois clairiés, Fischbach. T. Mersch. T. Md. Schengen.
(Layen).

1250) *O. mascula*. (*L. Sp.* 1333.) Cruchteblum. T. n° 1271.

4 Avril-Juin.

AC. Bois montueux, prairies, lisières des bois.

Var. β . *speciosa*. (*Host. fl. aust.* 2. 527.)

AR. Bois de Remich (Layen).

Var. γ . *minima*. (*Md. l. c. p.* 430. 3). T. n° 1271c.

Avec l'espèce. Kockelscheuer, Merl. Md. T.

1251) *O. laxiflora*. (*Lmk. Fl. Fr. III.* 504) T. n° 1276.

4 Juin-Juillet.

R. Prairies humides, bois marécageux. Reckange. T. Matteswies (Echternach.) M.

1252) *O. maculata*. (*L. Sp.* 1335) T. n° 1281.

4 Juin.

C. Prairies humides, bois.

1253) *O. latifolia*. (*L. Sp.* 1334) T. n° 1280.

4 Mai-Juillet.

AC. par place. Bois humides. Dudelange. Md. Dommeldange. Grünenwald. T.
T. Kahlscheuer. T. Schwanenthal (Hunsdorf.) BL.' Blaschette. T. Mersch. T.
Wahlenbrouch (Diekirch.) Md. K. Erpeldange, Echternach. M. Stecmeschwies
(Greisch.) Kz. Littoral de la Moselle. (Layen).

Var. β . *Traunsteineri*. (*Sauter in Koch, syn. ed.* 1. 688.)

R. Prairies aux environs de Diekirch. Md. Dmtr. (Est l'*O. sambucina*. Md.)

1254) *O. sambucina*. (*L. Sp.* 1334) T. n° 1278.

4 Mai-Juin.

R. Prés montueux, coteaux secs. Matteswies (Echternach.) M.

1255) *O. incarnata*. (*L. fl. succ. p.* 312. *sp.* 1335.) T. n° 1279.

Syn. *Orchis divaricata*. (*Rich. in Méral. fl. Par. éd.* 2. 94.)

4 Juin.

AR. Prés et bois marécageux et tourbeux (Heedgen) derrière Heisdorf. Md.
Grünenwald. T. Matteswies (Echternach). Nommern. BL. !

Var. β . *angustifolia*. (*Wimm. et Grab. Fl. Schl.* 323.) T. n° 1280b.

AR. Prés humides près du Hackenhof. (Layen).

477. Ophrys. (*L. Gen.* 1014 *ex parte.*) Ophrys. Frauenthräne.

1256) *O. muscifera.* (*Huds. Fl. Angl. ed.* 1. 340.) T. n° 1286.

Syn. *Ophrys insectifera.* (*L. Sp.* 1343.)

— *myodes.* (*Jacq. Misc. II.* 373.)

4 Mai-Juin.

R. Coteaux herbeux, pelouses, clairières et lisières des bois montueux, calcaires. Dudelange, Grünewald, bois de Bereldange. BB. Steinsel, Helmsange. T. Krobebüsch (Lorentzweiler.) Kz. Mersch, Reckingen, Kahlenberg (Diekirch.) T. Kempchen (Fouhren.) K. Md. (Courtois). Beaufort (Michel et Dmtr.) Md. Côtes de la Sûre. Vianden. Md. Ernsterberg (Echternach.) M. Mersdorf. R. Wasserbillig (Löhr). Niesbüsch (Greiveldange.) Md. Reckingerhof (Layen). Remich. Md. Föls, (Mertert.) R.!

1257) *O. aranifera.* (*Huds. Fl. Angl. ed.* 2. 392.) Affekap.

Syn. *Ophrys insectifera.* (*L. Sp.* 1343. ♂.)

[T. n° 1287.

— *pseudo-speculum.* (*DC. fl. Fr.* V. 332.)

4 Mai-Juin.

R. Pâturages, coteaux herbeux, clairières et lisières des bois calcaires. Kahl-scheuer. Md. Diekirch. T. Echternach. M. (Löhr). Canach, Elvingen (Layen). Wintrange. T. Hohfels (Machtum.) EF. Kz.

1258) *O. fuciflora.* (*Sequier, Rech. ic.* 9. f. 1162. 1165.) T. n° 1288.

Syn. *Ophrys arachnites.* (*Reichard. fl. mæno-francof.* 2. 89.)

— *insectifera.* (*L. Sp.* 1343. ♀.)

4 Mai-Juin.

AR. Coteaux herbeux, clairières des bois de la Basse-Sûre et de la Moselle. Kempchen (Fouhren.) Md. (Courtois.) K. Diekirch. Md. T. Ernsterberg (Echternach.) M. Stadlbredimus, Remich, Wintrange. T. Remerschen. BB. Schengen. T. Höfels (Machtum.) BB. Grevenmacher. T. Föls, Mertert. EF. Kz.

1259) *O. apifera.* (*Huds. Fl. Angl. ed.* 1. 340.) T. n° 1289.

Syn. *Ophrys insectifera.* (*L. Sp.* 1343. ♂.)

4 Mai-Juin.

AR. Clairières des bois montueux avec la précédente. Diekirch, entre Bellen-dorf et Longsdorf. BL. Ernsterberg (Echternach.) M. Rosport, Mersdorf. Md. Remerschen. BB. Remich (Dmtr. et Michel.) Md. Hœchten (Ehnen.) BB. Föls (Mertert.) BL.

Var. β . *apiculata.* (*Dmtr. Prod.* 1763.) ¹⁾ . . R. Fl. Sp. 1292.

Avec le type entre Schengen et Remich (Dmtr. et Michel).

478. Herminium. (*Rich. Orch. Eur. in Mém. Mus.* IV. 49.) —

Herminie. — Ragwurz.

1) *O. bombiliflora.* (*Link. in Schrad. diar.* 2), indiqué par Lejeune (*Comp.* n° 1554) comme croissant dans le Grand-Duché est particulier à la Corse. Ce qui a été pris pour lui est *O. apifera*, Var. β . ci-dessus.

1260) *H. Monorchis*. (*R. Br. in Hort. Kew. ed. 2. V. 191.*)

Syn. *Ophrys Monorchis*. (*L. Sp. 1342.*)

Herminium clandestinum. (*Gren. et God. Fl. Fr. III. 299.*)

4 Juin-Juillet.

[T. n° 1284.

R. Prés, pâturages secs ou humides, coteaux herbeux. Kahlscheuer, Dommeldange. T. M. Grunewald. Md. Klingelscheuer. Md. Eisembourg. Md. Blaschette. T. Kempchen (Fouhren.) Md. K. (Courtois). Ingeldorf. Md. Dickirch. Md. T. Ellingen (Mondorf). Schwebsingen, Wellenstein (Layen).

479. *Gymnadenia*. (*R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. V. 191 emend.*) — *Gymnadénie*. — *Höswurz*.

1261) *G. conopsea*. (*R. Br. l. c.*) T. n° 1283.

Syn. *Orchis conopsea*. (*L. Sp. 1335.*)

4 Juin-Juillet.

R. Prairies, pâturages, coteaux herbeux, clairières et lisières des bois. Beggen. M. Rodenhof. BB. Kahlscheuer. T. Blaschette. Md. T. Fischbach. Md. Kempchen (Fouhren.) Md. K. Rosport. Md. Matteswies (Echternach.) M. Manternach, Mertert. R. Fels (Schengen), Bous, Canach, Beyerholz, Greiveldange, Gostingen (Layen).

Var. β . *ornithis*. (*Jacq. Aust. t. 138.*) *albiflora*. . . T. n° 1283b. Avec l'espèce à Rodenhof (Kopstal.) Md.

1262) *G. odoratissima*. (*Rich. loc. cit. 57*). Meyer. Orch. 16.

Syn. *Orchis odoratissima*. (*L. Sp. 1335*)

4 Mai-Juin.

R. Prairies tourbeuses, coteaux calcaires, herbeux, clairières des bois. Echternach. M. Schronndweiler. BL. Clausen. BL.

1263) ? *G. albida*. (*Rich. l. c. 35*) Meyer. Orch. 17.

Syn. *Orchis albida*. (*Scop. Carn. 2. p. 201.*)

Satyrion albidum. (*L. Sp. 1338.*)

Habenaria albida. (*Sw. summ. scand. 1814. 32.*)

Platanthera albida. (*Lindl. Orch. 299.*)

Leucorchis albida. (*E. Mey. Chl. Hanov. 539.*)

4 Juin-Juillet.

R. Pelouses escarpées. Rodeshof (Echternach.) M.

1264) *G. viridis*. (*Rich. l. c. 57*) T. n° 1282.

Syn. *Orchis viridis*. (*Crantz. Aust. 491.*)

Satyrion viride. (*L. Sp. 1337.*)

Platanthera viridis. (*Lindl. Orch. 299.*)

Habenaria viridis. (*R. Bw. Kew. 5. p. 192.*)

4 Juin-Juillet.

AC. Prés humides. Pétrusse, Kopstal, Eisembourg. Md. Entre Junglinster et Godbrange, à gauche de la route. A. Wahlenbrouch (Diekirch.) Md. Echternach. M.

480. Platanthera. (*Rich. Orch. Eur. in Mém. Mus. IV. 48.*) —

Platanthère. — Kuckucksblume.

1265) *P. bifolia*. (*Rich. l. c. 57*) T. n° 1267.

Syn. *Orchis bifolia*. (*β. L. Sp. 1331.*)

— — *β. brachyglossa*. (*Wall. Sched. 486.*)

Platanthera solstitialis. (*Bönningh. in Richb. Fl. exc. 120.*)

Conopsidium sthenantherum. (*Wallr.*)

Satyrion bifolium. (*Whlb. succ. 558.*)

4 Mai-Juin.

A. Bois, pâturages, prairies humides. Fels (Schengen), T. Echternach (Brimmeyr père). Neumühl (Mandelbach). Schwanenthal (Heisdorf.) BL. Grünewald. T. etc. R. Ardennes. Erpeldange (Wiltz.) Kz.

1266) *P. chlorantha*. (*Custor ap. Reich. in Müssl. Handb. 2. p.*

1565). C. et Lej. Comp. n° 1533.

Syn. *Orchis bifolia*. (*γ. h. Sp. 1331.*)

— *montana*. (*Schmidt, fl. Boem. p. 35.*)

— *Conopsidium platantherum*. (*Wallr.*)

4 Juin-Juillet.

R. Bois feuillus. Nommern. BL. Cruchten. M. Vallée de la Sûre. Echternach. Md. (Brimmeyr père). Mersdorf. M. R. Manternach à Mertert. R. Vallée de la Moselle : Machtum, Ehnen. BB.

Tribu II. — *Gastrodieæ*. (*Lindl. l. c.*)

481. Epipogon. (*Gmel. Sib. 1. p. 12. t. 2. f. 2.*) — Epipogon. — Widderbart.

1267) *E. aphyllus*. (*Swartz, summ. veg. scand 1814. 32.*)

[Lej. et C. Comp. n° 1558.

Syn. *Epipogon Gmelini*. (*Rich. l. c. 36.*)

Satyrion Epipogium. (*L. Sp. 1338.*)

Orchis aphylla. (*Schmidt. l. c.*)

4 Juillet-Août.

R. Forêts de hêtre humides et sombres des Ardennes. L. et C.

Tribu III. — *Neotieæ*. (*Lindl. l. c.*)

482. Limodorum. (*Tournf. Inst. 250.*) — Limodore. — Dingel.

1268) *L. abortivum*. (*Swartz, act. Holm. VI. 80.*) T. n° 1297.

Syn. *Orchis abortiva*. (*L. Sp. 1336.*)

4 Juin-Juillet.

R. Clairières et lisières herbeuses des bois montueux, buissons et genévriers. Vallée de la Basse-Sûre et de la Moselle, par place. Echternach. M. Rosport. T. Hohfels (Machtum.) BB. ! Dreibern, Wormeldange (Layen). Fels (Mertert-Manternach.) BB. !

483. Cephalanthera. (*Rich. l. c.* 51.) — Cephalanthère. — Waldvöglein.

1269) *C. grandiflora.* (*Babingt. Man. Brit. bot.* 296.) T. n° 1293.

Syn. *Cephalanthera pallens.* (*Rich. l. c.* 60.)

Epipactis pallens. (*Willd. Sp.* 4. 85.)

Serapias grandiflora. (*L. Mant.* 471.)

— *lancifolia.* (*Murr. syst. veg.* 815.)

— *longifolia.* (*L. Sp.* 1345. *δ. part.*)

Epipactis lancifolia. (*DC. fl. Fr.* III. 261.)

4 Mai-Juin

AC. Bois ombragés, humides. Dudelange. Schifflange. Kz. Md. Kahlscheuer. BB. Rodenhof. Md. Niederanven. T. Reckingen. T. Mandelbach. Kz. Nommern. BL. Altrier. Kz. Mersdorf. Md. Mondorf. T. Greiveldange (Layen). Reif (Wellenstein.) A. EF. Kz. Fels (Schengen.) A. EF. Kz.

1270) *C. Xiphophyllum.* (*Rechb. fil. Ic. XIII.* 135. t. 470.) T. n° 1292.

Syn. *Cephalanthera ensifolia.* (*Rich. l. c.* 38.)

Epipactis — (*Schwartz. Act. Holm.* 1800. 232.)

Serapias Xiphophyllum. (*L. fil. suppl.* 404.)

— *longifolia.* (*δ. ex parte. L. Sp.* 1345.)

— *ensifolia.* (*Murr. syst. veg.* 815.)

4 Mai-Juillet.

R. Pelouses humides, taillis, forêts. Kahlscheuer. Md. Niederanven. Md. T. Seitert (Diekirch.) Md. Mersdorf. Md. T. T. Bous, Reckingerhof et vallée de la Moselle (Layen.) Reif (Wellenstein). Fels (Schengen.) A. EF. Kz.

1271) *C. rubra.* (*Rich. l. c.* 38) T. n° 1294.

Syn. *Serapias rubra.* (*L. Mant.* 490.)

— *longifolia.* (*δ. ex parte. L. Sp.* 1345.)

Epipactis rubra. (*All. Ped. II.* 153.)

4 Juin-Juillet.

R. Forêts, coteaux boisés. Greiveldange, Canach (Layen). Grünenwald près du Kiém. BL. Au-dessus de Dommeldange BL. Niederanven. Md. Dudelange. Md. T. — C. Wasserfall (Schifflange.) Kz.

484. Epipactis. (*Rich. l. c.* 51.) — Epipactis. — Sumpfwurzel.

1272) *E. latifolia.* (*All. Ped. II.* 152) T. n° 1291.

Syn. *Epipactis Helleborine.* (*Crantz, Stirp. Aust. IV.* 467.)

Serapias Helleborine. α. latifolia. (*L. Sp.* 1344.)

— *latifolia.* (*L. Mant.* 490.)

4 Juillet-Août.

AC. Bois, taillis, coteaux boisés. Diekirch, Dudelange, Kayl, Tétange. T.

Var. β . *microphylla*. (*Ehrh. Beitr.* 4. p. 42) . . . T. n° 1291b.

R. Avec l'espèce. Clausen, Siechenhof. Md.

Var. γ . *varians*. (*Crantz, Aust.* VI. 462.)

Avec le type dans les forêts ombragés. Reif (Wellenstein.) Kz.

1273) *E. palustris*. (*Crantz, Aust.* VI. 462. 2. 1. f. 5.) T. n° 1290.

Syn. *Serapias longifolia*. (*L. Sp.* 1345. Var. β . et γ .)

— *palustris*. (*Scop. Carn. ed.* 2. 204.)

24 Juin-Juillet.

R. Bois humides, prés tourbeux. Kahlscheuer. T. Md. Neumaxmühle. T. Neumühl (Mandelbach.) Kz. Echternach. Md. (Brimmeyr père). Reckingerhof (Layen). Lenningen, Canach, Elnen (Layen).

485. Neottia. (*Rich. l. c.* 12.) — Néottie. — Vogelnest.

1274) *N. Nidus-avis*. (*Rich. l. c.* 59) T. n° 1295.

Syn. *Epipactis Nidus-avis*. (*Crantz, Stirp. Aust.* 475.)

Ophrys — (*L. Sp.* 1339.)

24 Mai-Juin.

AC. par place. Manque sur de grands espaces. Couvert des bois. R. Ardennes.

486. Listera. (*R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed.* 2. V. 201.)—Listerie.

— Zweiblatt.

1275) *L. ovata*. (*R. Br. l. c.*) T. n° 1296.

Syn. *Ophrys ovata*. (*L. Sp.* 1340.)

Neottia ovata. (*Bluff. et Fingerh. Comp.* 453.)

— *latifolia*. (*Rich. l. c.* 59.)

Epipactis ovata. (*Crantz, Stirp. Aust.* 473.)

24 Mai-Juin.

AC. par place. Bois, taillis herbeux, prairies humides Birkenwäldchen (Luxembourg). Felsmühl, Völkerbach (Echternach). Grossebüsch (Grevenmacher). Fels (Schengen.) Kz. R. Ardennes. Friedbüsch. BL.

487. Spiranthes. (*Rich. l. c.* 50.)—Spiranthe. — Wendelorchée.

1276) ? *S. æstivalis*. (*Rich. l. c.* 58). Layen, Orchidées. 189.

Syn. *Neottia æstivalis*. (*DC. fl. Fr.* III. 258.)

Ophrys — (*Lmk. Dict.* IV. 567.)

24 Juillet-Août.

R. Prairies marécageuses, marais tourbeux. Reckingerhof (Layen).

Tribu IV. — *Cypripediæ*. (*Lindl. l. c.*)

488. Cypripedium. (*L. Gen.* 1015.) Cypripède. Frauenschuh.

1277) *C. Calceolus*. (*L. Sp.* 1346). T. n° 1298.

24 Mai-Juin.

R. Couvert des bois dans les jeunes coupes. Forêt de Grevenmacher T. district Hart, lieu dit Stolzenberg. Kz.

SUBDIVISION II. — **Périspermées.**CLASSE I. — **Spiciflores.**

CVIII. JUNCAGINEAE.

(Rich. in Mém. Mus. II. 365.) [VI, 3.]

489. Triglochin. (*L. Gen.* 453.) — Troscart. — Dreizack.1278) *T. palustris.* (*L. Sp.* 482) T. n° 564.

24 Juin-Juillet.

AR. Prairies humides ou spongieuses. Kahlscheuer, Blaschette, Mersch. T. Bomühl (Schrassig.) BL. !

CIX. POTAMEAE.

(Juss. in Diet. Sc. nat. t. 43. 93.) [IV, 4.]

490. Potamogeton. (*Tournf. Inst.* 103.) Potamot. Laichkraut.Sect. I. — *Diversifolii.* (*Coss. et Germ. fl. Par.* 572).1279) *P. natans.* (*L. Sp.* 182) T. n° 277.

24 Juin-Août.

C. Mares, étangs, eaux tranquilles, bords des rivières.

1280) *P. polygonifolius.* (*Pourret, Chl. narb. act. toul.* 3. p. 325.)*P. oblongus.* (*Viv.*) T. n° 280.

24 Juin-Août.

AC. Étangs, mares, ruisseaux de l'Ardenne.

1281) *P. fluitans.* (*Roth. Tentam. fl. Germ.* 1. 72 et 2. 202.)

24 Juillet-Août. [T. n° 278.]

AR. Rivières, eaux stagnantes et courantes. Sûre lez Gilsdorf. K.

1282) *P. alpinus.* (*Balbis, Misc. p.* 13.) *P. rufescens.* (*Schrad.*)

24 Juin-Août. [T. n° 288.]

R. Fossés, mares, eaux stagnantes, étangs. Bassin du jardin d'Ansembourg. T. Md. Our entre Bivels et Stolzembourg. (Courtois).

1283) *P. gramineus.* (*L. Gen.* 184) T. n° 281.

24 Juin-Août.

AR. Eaux stagnantes, mares, étangs, rivières.

Var. β . *heterophyllus.* (*DC. Fl.* 1. 844) T. n° 279.

24 Juin-Août.

R. par place. Eaux courantes et stagnantes. Fischbach, Burel. T.

Sect. II. — *Conformifolii.* (*Coss. et Germ. l. c.*)1284) *P. lucens.* (*L. Sp.* 183) T. n° 282.

24 Juin-Août.

C. par place. Eaux stagnantes et courantes, ruisseaux, rivières, étangs.

1285) *P. perfoliatus*. (*L. Sp.* 182) T. n° 284.

‡ Juin-Août.

C. Eaux stagnantes et courantes, rivières, ruisseaux, étangs.

1286) *P. crispus*. (*L. Sp.* 183) T. n° 286.

‡ Mai-Septembre.

C. Eaux stagnantes, mares, étangs, fossés.

1287) *P. densus*. (*L. Sp.* 182) T. n° 285.

‡ Juin-Septembre.

C. Fossés, mares, sources, ruisseaux, étangs. R. Ardennes.

Sect. III. — Graminifolii. (*Coss. et Germ. l. c.*)

1288) *P. compressus*. (*L. Sp.* 183) T. n° 287.

‡ Juillet-Août.

AR. Fossés, mares, eaux stagnantes.

1289) *P. obtusifolius*. (*Mert. et Koch. Deutsch. Fl.* 1. 835.)

‡ Juin-Août.

R. Mares, étangs, fossés. Environs de Luxembourg. (*Wtg. Fl. R.* 433).

1290) *P. pusillus*. (*L. Sp.* 184) T. n° 292.

‡ Juin-Septembre.

AC. par place. Mares, fossés, ruisseaux, étangs. C. Alzette à Clausen. Kz. Echternach (Brimmeyr père).

1291) *P. pectinatus*. (*L. Sp.* 183) T. n° 291.

‡ Juin-Août.

AC. Ruisseaux, rivières, fossés, étangs. Alzette entre Hesperange et Luxemb.

491. Zannichellia. (*L. Gen.* 1034.) — Zannichellie. [XXI, 1.]

1292) *E. palustris*. (*L. Sp.* 1375) T. n° 1300.

‡ Mai-Septembre.

AC. par place. Eaux stagnantes et courantes. C. Albach (Mondorf.) EF. Kz.

CX. NAIADEAE.

(*Lmk. Handb.* 1. 820.) [XXI, 1.]

492. Najas. (*L. Gen.* 1096.) — Naiade. — Nixkraut.

1293) *N. major*. (*Roth. Germ.* II. 499.) Sèhm. . . T. n° 1366.

‡ Août-Septembre.

AC. Dans les courants peu rapides de la Moselle. T. Remich, Grevenmacher.

BL. — C. dans les années à température élevée.

CXI. LEMNACEAE.

(*Duby, Bot. Gall.* 532. *Link. Handb.* 1. 289.) [II, 1.]

493. Lemna. (*L. Gen.* 1038.) — Lenticule. — Wasserlinse.

1294) *L. trisulca*. (*L. Sp.* 1376) T. n° 1307.

① ou 2 Avril-Mai.

R. Mares, fossés, étangs.

1295) *L. minor*. (*L. Sp.* 1378) T. n° 1305.

① ou 2 Avril-Juin.

C. Mares, fossés.

1296) *L. gibba*. (*L. Sp.* 1377) T. n° 1306.

① ou 2 Avril-Juin.

AC. par place. Mares, fossés.

1297) *L. polyrhiza*. (*L. Sp.* 1377) T. n° 1308.

2 Mai-Juin.

R. Mares, fossés, rivières à courant peu rapides.

CLASSE II. — Spadiciflores.

CXII. AROIDEAE.

(*Juss. Gen.* 23.)

494. Arum. (*L. Gen.* 1028 *ex parte.*) Gouet. Aron. [XXI, 1.]

1298) *A. maculatum*. (*L. Sp.* 1370.) Ieselsöeren. Perderches-
wurzél T. n° 1369.

2 Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux ombragés, haies, bois frais. R. Ardennes.

495. Calla. (*L. Gen.* 1030.) — Calla. — Schweinekraut. [XXI, 1.]

1299) *C. palustris*. (*L. Sp.* 1373.)

2 Juin-Juillet.

R. Marais tourbeux. Nœrtrange, Troine. K.

496. Acorus. (*L. Gen.* 434.) — Acore. — Kalmus. [VI, 1.]

1300) *A. Calamus*. (*L. Sp.* 462 *excl. Var. β.*) Kalmes. T. n° 531.

2 Juin-Juillet.

AC. Manque sur de grandes étendues. Bords des eaux. Pétrusse, Korn, Our, Sûre. C. Moselle.

CXIII. TYPHACEAE.

(*Juss. Gen.* 23.) [XXI, 3.]

497. Typha. (*L. Gen.* 1040.) — Massette. — Rohrkolben.

1301) *T. latifolia*. (*L. Sp.* 1377) T. n° 1309.

2 Juin-Août.

AR. Étangs, fossés, rivières, lieux marécageux au-dessus du fourneau de Dom-meldange. T. Eisch, depuis le déversoir jusqu'aux forges d'Ansembourg. Kz.

Var. *β. media*. (DC. *syn. fl. Gall.* 148) T. n° 1310.

R. Bords des étangs, parc de Walferdange. Kz.

1302) *T. angustifolia*. (L. *Sp.* 1377) T. n° 1311.

24 Juin-Août.

R. Bords des eaux, bassins derrière la ferme de Kockelscheuer. BL.!

498. Sparganium. (L. *Gen.* 104.) Rubannier. Igelskolbe. [XXI, 1.]

1303) *S. ramosum*. (Huds. *Fl. Angl. ed.* 1. 401.) Knüddlesch.

24 Juin-Août. [T. n° 1312.

C. Bords des eaux, lieux marécageux.

1304) *S. simplex*. (Huds. *l. c. p.* 401) T. n° 1313.

24 Juin-Août.

R. Bords des eaux, des fossés, des étangs. Kockelscheuer, Burel, Fischbach. T.

CXIV. JUNCEAE.

(R. Brow. *Prod.* 237.) [VI, 1.]

499. Juncus. (L. *Gen.* 487 *ex parte.*) Jonc. Ried. Jenk.

1305) *J. conglomeratus*. (L. *Sp.* 464 *emend.*) *J. communis*. (E. M.)

24 Juin-Août. [T. n° 532.

C. Bords des eaux, lieux frais, fossés.

1306) *J. effusus*. (L. *Sp.* 464 *excl. Var. γ*) T. n° 532b.

24 Juin-Août.

C. Bords des eaux, lieux frais, fossés.

1307) *J. glaucus*. (Ehrh. *Beit.* 6. 83) T. n° 533.

24 Juin-Août.

C. Mares, fossés, bords des eaux, lieux frais. R. Ardennes.

1308) *J. filiformis*. (L. *Sp.* 465) T. n° 534.

24 Juin-Août.

R. Lieux frais, bords des eaux, marais tourbeux.

1309) *J. silvaticus*. (Reich. *fl. mæno-francof.* 2. 181.) *acutiflorus*.

24 Juin-Août. [T. n° 536.

C. Bords des eaux, bois humides de l'Ardenne. AR. Ailleurs,

1310) *J. lamprocarpus*. (Ehrh. *calam.* 126.) *J. articulatus*. (L. *a. b.*)

24 Juillet-Août. [T. n° 537b.

AC. Bords des eaux, lieux humides ou marécageux.

1311) *J. obtusiflorus*. (Ehrh. *l. c.*) T. n° 535.

24 Juin-Août.

R. Bords des eaux, mares, fossés, prés marécageux.

1312) *J. supinus*. (Mönch. *Enum. pl. hass. n°* 296. 1. 5.) T. n° 538.

24 Juillet-Août.

AR. Fossés marécageux, prés paludéens des terrains siliceux. C. Ardennes. 3

Var. β . repens. (Koch, syn. 843.) J. uliginosus. (Roth. tent. 2. 1. p. 405.)

AC. Avec l'espèce.

Var. γ . fluitans. (Lmk. Fl. Fr. 2. 589) T. n° 540.

R. Lieux tourbeux. Rambrouch. T.

1313) J. squarrosus. (L. Sp. 465) T. n° 545.

24 Juin-Août.

C. Tourbières, pâturages, bruyères et bois humides de l'Ardenne. R. ailleurs.

1314) J. compressus. (Jacq. Stirp. vind. p. 60 et 235.) J. bulbosus.

24 Juin-Août.

[T. n° 544.

AK. Lieux humides, bords des eaux. Steinsel. K.

1315) J. Tenageia. (Ehrh. Beitr. 4. 148) T. n° 543.

① Juin-Août.

R. Lieux humides, chemins inondés l'hiver. Mondorf. EF.

1316) J. bufonius. (L. Sp. 465) T. n° 542.

① Juin-Septembre.

C. Lieux humides, bords des eaux, etc.

Var. β . ranarius. (Perrier et Sonjeon.)

C. avec le type.

Var. γ . fasciculatus. (Bertol. fl. ital. 4. p. 190.)

R. avec le type.

500. Luzula. (DC. Fl. Fr. III. 158.) Luzule. Marbel. [VI, 1.]

1317) L. pilosa. (Willd. Enum. 1. 393.) L. vernalis. (DC.)

① Avril-Mai.

[T. n° 547.

C. Bois, broussailles.

1318) L. angustifolia. (Wulf. in Jacq. coll. 3. p. 56.) albida. (DC.)

24 Juin-Juillet.

[T. n° 548.

AC. par place. Bois. Bellevue. BB. C. Ardennes.

1319) L. silvatica. (Gaud. helv. 2. 568.) L. maxima. (DC.)

24 Mai-Juin.

[T. n° 546.

AR. Bois montueux. Predigstuhl (Diekirch.) K. Sengels (Tuntingen.) Kz. Neudorf. BB. Howald, Lintgen. BL. etc.

1320) L. campestris. (DC. Fl. Fr. III. 161) T. n° 549.

24 Mars-Mai.

C. Pâturages, prairies, bruyères, etc.

1321) L. multiflora. (Lej. Fl. Spa. 1. p. 169). T. n° 550.

24 Mars-Mai.

AC. Bois, taillis montueux.

Var. β . congesta. (Lej. Fl. Spa. 1. p. 163). T. n° 551.

Avec l'espèce.

CXV. CYPERACEÆ

(Juss. Gen. 26.)

Tribu I. — Cariceæ. (Koch, syn. 861.)

501. Carex. (*L. Gen.* 1146.) — *Carex.* — Segge. [XXI, 3.]Sect. I. — *Psyllophora.* (*Lois. fl. Gall. ed. 2. p.* 282.)1322) *C. pulicaris.* (*L. Sp.* 1380) T. n° 1315.

24 Mai-Juillet.

R. Pâturages, prairies marécageuses et tourbeuses, au-dessus de Kedange, Eisembourg vers le Grünenwald. T. AC. Ardennes.

Tribu II. — *Vigneæ.* (Koch, syn. 864.)1323) *C. disticha.* (*Huds. fl. Angl. ed. 1, 403.*) *C. intermedia.* (*Good.*)

24 Mai-Juin.

[T. n° 1318.

C. Prairies et pelouses humides, fossés, bords des eaux.

1324) *C. vulpina.* (*L. Sp.* 1382) T. n° 1319.

24 Mai-Juin.

C. Lieux frais, fossés humides, prairies tourbeuses.

1325) *C. muricata.* (*L. Sp.* 1382) T. n° 1321.

24 Mai-Juin.

C. Buissons, bois, lieux herbeux. R. En Ardennes.

Var. β . *virens.* (*Schreb. spicil.* 64.) *C. loliacea.* Löhr. 1387b.

Avec l'espèce.

1326) *C. divulsa.* (*Good. trans. of. linn. soc. II.* 160.) T. n° 1320.

24 Mai-Juin.

R. Prairies, lieux herbeux, bois d'Echternach. L.

1327) *C. teretiuscula.* (*Good. l. c.* 163) T. n° 1328.

24 Mai-Juin.

R. par place. Prés marécageux, tourbeux. (Michel). Ansembourg. T. Md.

1328) *C. paniculata.* (*L. Sp.* 1383) T. n° 1325.

24 Mai-Juin.

R. Prairies et mares tourbeuses.

1329) *C. paradoxa.* (*Willd. act. acad. berol.* 1794. p. 39. t. 1. f. 1.)

24 Mai-Juin.

[T. n° 1324.

R. Marais tourbeux des Ardennes. T.

1330) *C. præcox.* (*Schreb. spicil.* 63.) *C. Schreberi.* (*Schrnk.*)

24 Avril-Mai.

[T. n° 1327.

C. Chemins, lieux sablonneux, bois.

1331) *C. brizoides.* (*L. Sp.* 1381). Löhr. 1393.

‡ Mai-Juin.

R. par place. Prairies humides de la Haute-Sûre. L. Echternach (Brim. père).
1332) *C. remota*. (*L. Sp.* 1383). T. n° 1330.

‡ Mai-Juin.

AC. Bords des fossés, endroits humides, ombragés.

1333) *C. echinata*. (*Murr. Prodr.* p. 76.) *C. stellulata*. T. n° 1329.

‡ Mai-Juin.

C. Lieux marécageux, tourbeux, fossés.

1334) *C. leporina*. (*L. Sp.* 1381 *excl. syn. Fl. Lapp.*) *C. ovalis*.
(*Good.*) T. n° 1326.

‡ Mai-Juin.

C. Prairies, lieux herbeux, bois.

1335) *C. elongata*. (*L. Sp.* 1383) T. n° 1331.

‡ Mai-Juin.

AC. par place. Fossés, lieux marécageux. Ellersmoor (Reisdorf).

1336) *C. canescens*. (*L. Sp.* 1383.) *C. curta*. (*Good.*) T. n° 1328.

‡ Mai-Juin.

C. Prés marécageux, marais.

Tribu III. — Legitimæ. (*Koch, syn.* 871.)

1337) *C. stricta*. (*Good. trans. of. linn. soc.* V. 2. 196. t. 21.)

‡ Mai-Juin.

[T. n° 1333.

AR. Bords des eaux vaseuses, marais, fossés tourbeux.

1338) *C. cæspitosa*. (*L. fl. suec.* p. 333) T. n° 1332.

‡ Avril.

AR. Prés marécageux entre Marienthal et Ansembourg.

1339) *C. Goodenoughii*. (*Cay, ann. sc. nat. sér.* 2. 11. 191.)

‡ Avril-Juin.

[*C. vulgaris*.

C. Fossés, prairies humides, bruyères, pâturages, bois.

1340) *C. acuta*. (*L. Sp.* 1388. *Var. β.*) *C. gracilis*. (*Curt.*)

‡ Avril-Mai.

[T. n° 1334.

C. Pelouses et prairies humides, fossés, bords des eaux.

Var. β. nigra. (*L. Sp.* 1388. *Var. α.*) T. n° 1334.

AR. Avec l'espèce. Leesbeek.

1341) *C. pilulifera*. (*L. Sp.* 1385) T. n° 1341.

‡ Avril-Mai.

C. Manque dans certains cantons. Bois, bruyères, prairies fraîches des terres sablonneuses.

1342) *C. tomentosa*. (*L. Mant.* 123) T. n° 1337.

24 Mai-Juin.

AR. Prés frais, bois feuillus montueux, coteaux gypseux. Mompach, Lellig, Wasserbillig (Ilse).

1343) *C. montana*. (*L. fl. succ. ed. 2. 328.*) *C. collina*. (*Willd.*)

24 Avril-Mai. [T. n° 1338.

C. Bois montueux, herbeux.

1344) *C. verna*. (*Vill. fl. Dauph. 2. p. 204*) . . . T. n° 1336.

24 Mars-Mai.

C. Pâturages, pelouses, prairies, bois.

1345) *C. humilis*. (*Leyss. fl. Hall. 173.*) *C. clandestina*. (*Good.*)

24 Avril-Mai. [T. n° 1342.

R. Coteaux arides, broussailles, rochers. Wurthsberg au-dessus de la Hierze-krepp. (Clausen.) Kz. Pulfermühl. T. BB.

1346) *C. digitata*. (*L. Sp. 1384*) . . . T. n° 1340.

24 Avril-Mai.

C. par place. Rochers, coteaux arides, bois montueux. Kopstal, Dudelange. BL.

1347) *C. ornithopoda*. (*Willd. Sp. 4. 255.*)

24 Avril-Mai.

AR. Clairières des bois calcaireux. Galgenberg (Dudelange.) BL.!

1348) *C. panicea*. (*L. Sp. 1387*) . . . T. n° 1350.

24 Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages, bois humides.

1349) *C. flacca*. (*Schreb. spic. 968.*) *C. glauca*. (*Scop.*) T. n° 1353.

24 Avril-Mai.

C. Prés humides.

1350) *C. pendula*. (*Huds. fl. Angl. 411.*) *C. maxima*. (*Scop.*)

24 Mai-Juin. [T. n° 1344.

R. Bois montueux, humides. Helmdange. T. Dillingen (Ilse).

1351) *C. pallescens*. (*L. Sp. 1386*) . . . T. n° 1349.

24 Mai-Juin.

C. Bois et prairies humides.

1352) *C. flava*. (*L. Sp. 1384*) . . . T. n° 1339.

24 Mai-Juin.

C. Prairies humides, marécageuses et tourbeuses.

1353) *C. Oederi*. (*Ehrh. calam. n° 79*) . . . T. n° 1335.

24 Mai-Juin.

C. Fossés, prés humides, endroits marécageux.

1354) *C. distans*. (*L. Sp. 1387*) . . . T. n° 1346.

24 Mai-Juin.

AC. par place. Manque sur de grands espaces. Pelouses et prairies humides.

1355) *C. Hornschuchiana*. (*Hoppe, in Regensb. Bot. Ztg. p.* 599.)

‡ Mai-Juin.

R. Prairies humides de la vallée de la Syr (Nussbaum).

1356) *C. fulva*. (*Good. in trans. Lin. Soc. II.* 177. *t.* 20. *f.* 6.)

‡ Mai-Juin.

[T. n° 1345.

R. Prairies humides, pâturages marécageux, etc. Rambrouch. T.

1357) *C. binervis*. (*Smith. trans. of Linn. Soc. V.* 5. 268.)

‡ Mai-Juin.

[T. n° 1347.

R. Bruyères, pâturages, prés humides de l'Ardenne.

1358) *C. lævigata*. (*Smith. l. c.* 272.) *C. biligularis*. (DC.)

‡ Mai-Juin.

[T. n° 1348.

R. Bois montueux, frais ou humides de l'Ardenne.

1359) *C. silvatica*. (*Huds. Fl. Ang. ed. 1.* 353), . T. n° 1351.

‡ Mai-Juin.

C. Bois, taillis frais, lieux ombragés.

1360) *C. Pseudo-Cyperus*. (*L. Sp.* 1387) . . . T. n° 1353.

‡ Mai-Juin.

AR. Fossés, bords des eaux, lieux marécageux. Cap, au-dessous du Höhenhof. T.

1361) *C. rostrata*. (*With. Arr. brit. 2.* 1059.) *C. ampullacea*.

(*Good.*) T. n° 1357.

‡ Mai-Juin.

AC. Bords des eaux, fossés, lieux marécageux.

1362) *C. vesicaria*. (*L. Sp.* 1388 *pro parte*) . . . T. n° 1358.

‡ Mai-Juin.

AC. Fossés, bords des eaux, lieux paludéens.

1363) *C. acutiformis*. (*Ehrh. calam. 30.*) *C. paludosa*. (*Good.*)

‡ Mai.

[T. n° 1354.

C. Lieux humides, marécages, bords des rivières.

1364) *C. riparia*. (*Curt. Fl. Lond. fasc. 4.* 60) . . T. n° 1355.

‡ Mai-Juin.

C. Fossés, bords des eaux.

1365) *C. hirta*. (*L. Sp.* 1389) T. n° 1358.

‡ Avril-Juin.

C. Lieux frais, bords des eaux dans les terres légères.

Tribu IV. — Scirpæ. (*Koch, syn.* 851.)

502. Rhynchospora. (*Vahl. Enum. II.* 229.) — Rhynchospore.

— Schnabelsame. [III, 1.]

- 1366) *R. alba*. (*Vahl. l. c.* 236) T. n° 55.
 4 Juillet-Août.

R. Marais tourbeux. Eltersmoor (entre Beaufort et Reisdorf.) K.!

503. *Heleocharis*. (*R. Br. Prod. Nov. Holl.* 224.) — Héléocharis.
 — Teichbinse. [III, 1.]

- 1367) *H. palustris*. (*R. Br. l. c.* 224) T. n° 67.
 4 Mai-Juillet.

C. Lieux humides, bords des eaux et des étangs.

- 1368) *H. acicularis*. (*R. Br. l. c.* 224) T. n° 69.
 4 Juin-Septembre.

C. par place. Bords des eaux, lieux inondés l'hiver.

504. *Scirpus*. (*L. Gen.* 67 *ex parte*.) — Scirpe. — Simse. [III, 1.]

- 1369) *S. pauciflorus*. (*Lighlf. fl. Scot.* 1078.) *S. Bæothryon*.
 (*Ehrh.*) *S. campestris*. (*Roth.*) *Lesch.* . . . T. n° 60, 61.
 4 Juin-Juillet.

AC. par place. Prairies marécageuses et tourbeuses entre Weiler et Pulscheid. K.

- 1370) *S. cæspitosus*. (*L. Sp.* 71) T. n° 59.
 4 Juin-Juillet.

AR. Marais, tourbières, bruyères humides.

- 1371) *S. setaceus*. (*L. Sp.* 73.) *Isolepis setacea*. (*R. B.*) T. n° 58.
 ① Juin-Août.

C. Terrains humides, bords des eaux.

- 1372) *S. lacustris*. (*L. Sp.* 72) T. n° 63.
 4 Juin-Juillet.

C. Fossés, mares, étangs. Our près de Bivels.

- Var. β . *medius*. (*Schrad.*) T. n° 63b.

R. Avec l'espèce.

- Var. γ . *glaucus*. (*Sm. Eng. bot.* 1. 232.)

R. Prairies tourbeuses, marécages.

- 1373) *S. Polichii*. (*God. et Gren. Fl. Fr. III.* 374.) *S. triqueter*.
 (*Auct. non L.*) Wtg. Fl. R. 1296.

4 Juillet-Août.

AC. Terrains vaseux des fossés et des étangs. Haute-Moselle. Wgt.

- 1374) *S. maritimus*. (*L. Sp.* 74) T. n° 65.
 4 Juin-Septembre.

AC. par place. Bords des eaux, surtout de la Moselle. BB.

- 1375) *S. silvaticus*. (*L. Sp.* 75) T. n° 60.
 4 Juin-Juillet.

C. Fossés, bords des eaux, prairies ombragées, lisières des bois humides.

1376) *S. compressus*. (*Pers. syst. I.* 66.) *Schoenus compressus*. (*L.*)

‡ Juin-Juillet.

[T. n° 53.

C. Prairies et pâturages humides, lieux marécageux.

505. Eriophorum. (*L. Gen.* 68.) Linaigrette. Wollgras. [III, 1.]

1377) *E. vaginatum*. (*L. Sp.* 76) T. n° 70.

‡ Avril-Mai.

AC. Tourbières, bois marécageux de l'Ardenne. R. Ailleurs. Echternach (Brimmeyr père).

1378) *E. polystachyum*. (*L. Suec.* 17. *pro parte.*) *E. angustifolium*. (*Roth.*) T. n° 71.

‡ Avril-Mai.

AC. Bruyères humides, prairies marécageuses, tourbeuses de l'Ardenne. R. Ailleurs. Près Grevelsbour entre Simmern et les forges St-Michel. Kz.

1379) *E. latifolium*. (*Hopp. Taschb.* 108) L. 1375.

‡ Avril-Mai.

AC. Manque sur de grands espaces. Prairies marécageuses, bruyères humides, tourbières.

1380) ? *E. gracile*. (*Koch, ap. Roth. Cat. bot. II.* 259.) T. n° 72.

‡ Mai-Juin.

R. Prairies tourbeuses, marécageuses.

Tribu V. — *Cypereæ*. (*Koch, syn.* 248.)

506. Cyperus. (*L. Gen.* 66.) — Souchet. — Cypergrass. [III, 1.]

1381) *C. flavesceus*. (*L. Sp.* 68) T. n° 74.

① Juillet-Août.

R. Lieux humides, bords des eaux, environs d'Echternach. (Löhr).

1382) *C. fuscus*. (*L. Sp.* 69) T. n° 75.

① Juillet-Septembre.

AR. Lieux marécageux, sablonneux, humides, bords des eaux. Kopstal. T. de la Moselle, entre Schengen et Wintrange. T.

CXVI. GRAMINEAE.

(*Juss. Gen.* 28.) ¹⁾

Tribu I. — *Phalarideæ*. (*Kunth, en.* 1, 18.)

Sous-tribu I. — *Olyreæ*. (*Coss. et Germ. Fl. Par.* 772.)

507. Zea. (*L. Gen.* 1042.) — Maïs. — Mais. [XXX, 3.]

1) A l'exception de *Zea Mays* (XXX, 3), *Anthoxanthum odoratum* (II, 2), *Nardus stricta* (III, 1), toutes les graminées font partie de la III. cl. 2. de Linné.

1383) † Z. Mays. (*L. Sp.* 1378.) Tièrkesche Wees.

① Juin-Septembre.

Quelquefois cultivé dans les jardins.

Sous-tribu II. — Oryzæ. (*Kunth, Enum.* 1. p. 5.)

508. Oryza. (*A. Braun. Verh. Bot. Verein. Brandenb.* 1862. 195. 205.) — Riz. — Reis.

1384) O. clandestina. (*A. Braun. l. c.*) Leersia oryzoides. (*Schwarz.*)

‡ Août-Octobre.

R. Bords vaseux des fossés, des rivières et des étangs. Moselle. L. et C.

Sous-tribu III. — Eupharidæ. (*Coss. et Germ. l. c.* 772.)

509. Anthoxanthum. (*L. Gen.* 42.) — Flouve. — Ruchgras.

1385) A. odoratum. (*L. Sp.* 40) T. n° 195.

‡ Mai-Juin.

C. Bois, pâturages, pelouses, prairies.

Var. β. villosum. (*Dmtr. Ag. Belg.*) T. n° 196.

Avec l'espèce.

510. Hierochloa. (*Gmel. fl. sibir.* 1. p. 100.) — Hierochloa. — Mariengras.

1386) H. odorata. (*Wahlenberg, sys.* 32.) H. borealis. T. n° 180.

‡ Mai-Juin.

R. Prairies marécageuses, tourbières. Rambrouch. T.

511. Phalaris. (*L. Gen.* 74.) — Alpiste. — Glanzgras.

1387) † P. canariensis. (*L. Sp.* 79.) Fulesämchen. EF. 294.

① Juin-Septembre.

AC. Cultivé et quelquefois subspontané.

512. Baldingera. (*Gærtn. Fl. Wett.* 1. 95.) Baldingère. Phalaris.

1388) B. arundinacea. (*Dmtr. Agros. Belg.* 1. 12. f. 135.)

① Juin-Juillet.

[T. n° 197.

C. Bords des eaux, lieux marécageux.

Tribu II. — Paniceæ. (*Kunth, en.* 1. 40.)

Sous-tribu IV. — Eupanicæ. (*Coss. et Germ. l. c.* 773.)

513. Oplismenus. (*P. Beauv. Agros.* 53. 11. f. 3.) — Oplismène. — Hirse.

1389) *O. Crus-galli*. (Kunth, Enum. pl. 1. 143). . . T. n° 214.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Lieux sablonneux, frais, champs, décombres, bords des chemins.

514. Digitaria. (Scop. Carn. 1. 42.) — Digitale. — Fingerhirse.

1390) *D. sanguinalis*. (Scop. l. c. 1. 52) . . . T. n° 212bis.

① Juin-Août.

AC. Lieux cultivés ou incultes, vignes, bords des chemins. T.

1391) *D. filiformis*. (Koch, Gram. 26.) *D. glabra*. (Ræm.) T. n° 213.

① Juillet-October.

C. Champs sablonneux, arides.

515. Setaria. (P. Beauv. Agros. 51. t. 13. f. 3.) Sétaire. Fennich.

1392) *S. verticillata*. (P. Beauv. l. c.) . . . T. n° 217.

① Juillet-Septembre.

R. Lieux cultivés, jardins, décombres, Jardin Mansfeld (Clausen.) Kz.

Var. β . *verticilliformis*. (Dmtr.) . . . Dmtr. P. f. B. 2007.

Avec l'espèce.

1393) *S. viridis*. (P. Beauv. l. c. 51) . . . T. n° 218.

① Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, bords des chemins, jardins, champs arides, etc.

Var. β . *rubicunda*. (Dmtr. Agros. p. 139) . . . T. n° 219.

Avec l'espèce.

1394) *S. glauca*. (P. Beauv. l. c. 51) . . . T. n° 220.

① Juillet-Août.

AC. Champs sablonneux, moissons maigres, terres en friche.

1395) † *S. italica*. (P. Beauv. l. c. 51.) Hfeschem. T. n° 216.

① Juillet-Septembre.

AR. Cultivé dans les jardins.

† Var. β . *germanica*. (P. Beauv. l. c. 51) . . . T. n° 215.

AC. Cultivé dans les jardins.

516. Panicum. (L. Gen. 76.) — Panic. — Hirse.

1396) † *P. miliaceum*. (L. Sp. 86.) Fullesämchen. EF. 295.

① Juillet-Septembre.

AC. Cultivé dans les jardins et quelquefois subspontané au voisinage des habitations.

Tribu III. — Poæ. (Coss. et Germ. l. c. 773.)

Sous-tribu V. — Alopecureæ. (Coss. et Germ. l. c. 774.)

517. Alopecurus. (L. Gen. 78.) — Vulpin. — Fuchsschwanz.

1397) *A. agrestis*. (*L. Sp.* 89) T. n° 203.

① Avril-Août.

C. Lieux cultivés, champs, vignes. Manque à l'Ardenne.

1398) *A. pratensis*. (*L. Sp.* 88) T. n° 204.

24 Avril-Juin.

C. Endroits herbeux, pâturages, prairies, bords des eaux.

Var. *β. aquaticus*. (*Dmtr. Agros.* 133) T. n° 205.

AC. Prés humides.

Var. *γ. pallidus*. (*Dmtr. Agros.* 133) T. n° 206.

R. Prés humides. Kaarwies au-dessus des forges de Dommeldange. T.

1399) *A. utriculatus*. (*Pers. syn. pl.* 1. 80) T. n° 202.

① Mai-Juin.

R. Prairies fertiles entre Grevenmacher et Wasserbillig (*Dmtr. et Michel.*) R. entre Mompach et Wasserbillig (Ilse), de la haute-Moselle. Gke.

1400) *A. fulvus*. (*Sm. Engl. bot. t.* 1467) T. n° 209.

① Juin-Août.

AC. Mares, fossés, lieux humides. Kockelscheuer, Fehnerholz (Hesperange.) BL.!

1401) *A. geniculatus*. (*L. Sp.* 89) T. n° 208.

① Juin-Août.

AC. Mares, fossés, lieux humides.

518. *Phleum*. (*L. Gen.* 77.) — Phléole. — Lieschgras.

1402) *P. pratense*. (*L. Sp.* 87.) Thimoty T. n° 200.

24 Juin-Juillet.

C. Prés, pâturages, coteaux arides, bords des chemins, bois.

Var. *β. nodosum*. (*L. Sp.* 88). T. n° 201.

AC. Lieux herbeux, secs.

Var. *γ. stoloniferum*. (*Hort.*)

C. avec l'espèce.

1403) *P. Bœhmeri*. (*Wibel. primit. flor. werth. p.* 125.) T. n° 199.

24 Juin-Juillet.

AC. Coteaux arides, rochers, broussailles des terres calcaïres de la Moselle. Hohfels (Machtum). EF. Kz. Föls (Mertert). BL.!

Sous-tribu VI. — Agrostideæ. (*Kunth, en* 198.)

519. *Agrostis*. (*L. Gen.* 80.) — Agrostide. — Straussgras.

1404) *A. vulgaris*. (*Withering, Arrang.* 132) T. n° 189.

24 Juin-Juillet.

C. Prairies, pâturages, lieux herbeux, bois, etc.

Var. *β. stolonifera*. (*L. Sp.* 93. *α.*) T. n° 190.

Avec l'espèce.

Var. γ . *pumila*. (*L. Mant.* 31) T. n° 190c.
Avec l'espèce.

1405) *A. alba*. (*L. Sp.* 93.) Fioringräs. T. n° 191.
24 Juin-Juillet.

C. Prairies, lieux herbeux, fossés, champs en friche, vignes, bois, etc.

Var. β . *diffusa*. (*Host. Gram. Aust.* 4. *tabl.* 53) . . . T. n° 192.
C. avec l'espèce.

Var. γ . *gigantea*. (*Meyer. Chlor. Hanov.* 655.)
C. avec l'espèce.

Var. δ . *prorepens*. (*Koch, Taschenb.* p. 563.)
C. avec l'espèce.

1406) *A. canina*. (*L. Sp.* 92) T. n° 193.
24 Juin-Juillet.

C. Bois, prés, bruyères des terrains sablonneux, humides.

Var. β . *mutica*. [*A. varians*.] (*Thuill. Fl. Par.* 35.) T. n° 193c.
AR. avec l'espèce.

520. *Apera*. (*Adans. Fam. pl.* II. 49.) — Apère. — Windhalm.

1407) *A. spica-venti*. (*P. Beauv. Agrost.* 31.) Perdsgräs.

① Juin-Juillet. [T. n° 187.

C. Lieux cultivés, jachères, moissons. R. Ardennes.

1408) *A. interrupta*. (*P. Beauv. l. c.* 31) T. n° 188.

① Mai-Juillet.

R. Champs sablonneux. Simmern, Kopstal. T.

521. *Calamagrostis*. (*Adans. Fam. pl.* II. 31.) — Calamagrostide. — Schilf.

1409) *C. lanceolata*. (*Roth. Tent. fl. Germ.* I. 34.) T. n° 186.
24 Juillet-Août.

AR. Marais tourbeux, bois marécageux, prés paludéens, fossés.

1410) *C. epigeios*. (*Roth. Tent. fl. Germ.* I. 34.) T. n° 184.
24 Juillet-Août.

AC. Terrains sablonneux, fossés et lisières des bois humides.

1411) *C. arundinacea*. (*Roth. Tent. II.* 89.) *silvatica*. T. n° 183.
24 Juillet-Août.

AC par place. Bois montueux.

Var. β . *contracta*. (*Dmtr. P. F. B.* 126). . . . T. n° 183bis.
R. avec l'espèce.

1412) *C. varia*. (*Schrad. Germ.* I. 216.) *C. subulata*. (*Dmtr.*)
24 Juillet-Août. [T. n° 185.

R. Bois montueux des Ardennes.

Sous-tribu VII. — Stipacæ. (*Coss. et Germ. l. c. 775.*)**522. Milium.** (*L. Gen. 79 ex parte.*) — Millet. — Flattergras.1413) *M. effusum.* (*L. Sp. 90*) T. n° 210.

24 Mai-Juillet.

AC. par place. Bois montueux, lieux ombragés, R. Ardennes.

523. Stipa. (*L. Gen. 90.*) — Stipe. — Pfriemengras.1414) † *S. pennata.* (*L. Sp. 115.*)

24 Mai-Juin.

C. Cultivé et souvent spontané. Sternchen (Clausen). !

Sous-tribu VIII. — Pappophoreæ. (*Kunth, enum. 1. 175.*)**524. Sesleria.** (*Scop. Carn. 1. 189.*) — Soslérie.1415) *S. cœrulea.* (*Ard. Sp. II. 18*) T. n° 141.

24 Avril-Mai.

C. par place. Manque sur de très-grands espaces. Coteaux secs, rochers sablonneux ou calcaireux. Clausen, Palvermühl. T. Pétrusse. BL. ! Sichenhof. Kz. Echternach (Brimmeyr père).

Sous-tribu IX. — Aenacæ. (*Coss. et Germ. l. c. 775.*)**525. Weingartneria.** (*Bernh. erf. 51.*) [1800.] — Corynephere.
[1812.] — Silbergras.1416) *W. canescens.* (*L. Sp. 97.*) *Aira canescens.* (*L.*) T. n° 161.

24 Juillet-Août.

C. Champs sablonneux, pâturages secs, clairières des bois, etc.

526. Aira. (*L. Gen. 81 ex parte.*) — Canche. — Schmiele.1417) *A. caryophyllea.* (*L. Sp. 97.*) T. n° 165.

② ou ① Mai-Juin.

C. Bruyères, clairières des bois sablonneux, coteaux incultes, rochers, etc.

Var. β . *multiculmis.* (*Dmtr. Agros. 121. 3*) T. n° 164.

Avec l'espèce.

1418) *A. præcox.* (*L. Sp. 97.*) *Festuca præcox.* (*L.*) T. n° 166.

① Avril-Juin.

AR. Terrains sablonneux, bords des chemins, bruyères, pelouses, rochers, clairières des bois. Kopstal, Fischbach. T.

527. Deschampsia. (*P. Beauv. Agros. 91.*) — Deschampsie.1419) *D. cæspitosa.* (*P. Beauv. 91.*) *Aira cæspitosa.* (*L.*) T. n° 159.

24 Juin-Juillet.

C. Prairies, pelouses, lieux et bois humides.

Var. *β. parviflora.* (Thuill. *fl. Par.* 38) T. n° 160.

AR. Prairies humides avec le type

1420) *D. flexuosa.* (Nees. *Gen. fl. Germ. monog. I.*) T. n° 163.

4 Juin-Juillet.

C. Bois, taillis, rochers, etc.

1421) *D. discolor.* (Rœm. et Schult. *system. veg. II.* 686.) T. n° 162.

4 Juillet-Septembre.

R. Fossés, terrains humides, marécageux. Kopstal, Merssch, Beaufort. T.

528. Avena. (*L. Gen.* 91 *ex parte.*) — Avoine. — Hafer.

1422) ? *A. brevis.* (Roth. *tent. fl. germ.* 1. 40.) Dmtr. P. 2072.

① Juillet-Août.

R. Moissons des Ardennes. Md. Michel.

1423) † *A. sativa.* (*L. Sp.* 118.) Huôver T. n° 171.

① Juin-Août.

C. Cultivé et souvent subspontané.

1424) † *A. orientalis.* (Schreb. *spicil.* 52.) Strausshuôver.

① Juillet-Août. [T. n° 170.]

AC. Cultivé et subspontané au voisinage des habitations.

1425) *A. strigosa.* (Schreb. *spicil.* 52) T. n° 175.

① Juillet-Août.

C. Subspontané parmi les moissons des n°s 1423, 24. Autrefois C. en Ardennes.

1426) † *A. nuda.* (*L. Sp.* 118) T. n° 172.

① Juillet-Août.

R. Cultivé.

1427) *A. fatua.* (*L. Sp.* 118.) Welhuôver. . . . T. n° 173.

① Juin-Juillet.

C. Moissons, surtout de la Moselle.

1428) ? *A. barbata.* (Brot. *lus.* 408.) *A. hirsuta.* (Roth.) T. n° 174.

① Juin-Juillet.

R. Moissons.

1429) *A. pubescens.* (*L. Sp.* 1665) T. n° 168.

4 Mai-Juin.

C. Prés secs, pâturages, coteaux arides, clairières des bois sablonneux.

1430) *A. pratensis.* (*L. Sp.* 119) T. n° 169.

4 Juin-Juillet.

AR. Coteaux incultes, pâturages secs, rochers, clairières des bois siliceux entre Wecker et Mertert. R.

1431) *A. flavescens.* (*L. Sp.* 118.) Langhalm. Trisetum.

4 Juin-Juillet.

[T. n° 167.]

C. Pâturages, pelouses, prairies, etc.

529. Arrhenatherum. (*P. Beauv. Agrost. 55. t. 11. f. 5.*) — Arrhénanthère. — Wiesenhafer.

1432) *A. elatius.* (*Mert. et Koch. Deutsch. Fl. I. 546.*) *Avena elatior.* (*L.*) T. n° 176.

‡ Juin-Juillet.

C. Prairies, pâturages, lieux herbeux, lisières des bois. R. Ardennes.

Var. β . *bulbosum.* (*Schrad. Germ. 1. 248*) . . . T. n° 175.

AC. avec le type.

530. Holcus. (*L. Gen. 1146.*) — Houque. — Honiggras

1433) *H. lanatus.* (*L. Sp. 1485*) T. n° 179.

‡ Juin-Août.

C. Prairies, pelouses, pâturages, bois, etc.

1434) *H. mollis.* (*L. Sp. 1485*) T. n° 178.

‡ Juin-Août.

C. Pâturages, pelouses, lisières et clairières des bois.

1435) † *S. saccharatus.* (*L. Sp. 1485.*) Sorgho. Zuckerhirse.

① Août-Octobre.

Cultivé en 1837 et abandonné depuis.

531. Sieglingia. (*Bernh. erf. 44. 1800.*) — Sieglingie.

1436) *S. decumbens.* (*Bernh. l. c.*) *Danthonia decumbens.* (*DC.*)

‡ Juin-Juillet. [T. n° 125.

C. Pâturages, prairies, bois frais.

532. Koeleria. (*Pers. Syn. p. 1. 1. 97.*) — Koélerie.

1437) *K. cristata.* (*Pers. Syn. pl. 1. 97*) . . . T. n° 142.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois, rochers, coteaux, pelouses.

Var. β . *glauca.* (*DC. Hort. Monsp. 106*) . . . Dmtr. P. 2108.

R. Prés secs avec le type. Vallée de la Sûre (Löhr) !

Sous-tribu X. — Festuceæ. (*Coss. et Germ. l. c. 777.*)

533. Phragmites. (*Trin. Fund. Agrost. 154.*) Phragmite. Rohr.

1438) *P. communis.* (*Trin. l. c.*) Lesch . . . T. n° 181.

‡ Juillet-Septembre.

C. par place. Fossés, bords des eaux, prés marécageux. R. Ardennes.

Var. β . *nigricans.* (*Mérot. Fl. Par. ed. II. 33*) . . T. n° 182.

R. avec l'espèce. Étang de Pleitrangle. BL. !

534. Gyncrium. (*Humb. et Bompl.*) — Gynévri. — Pampasgras.

1439) † *G. argenteum*. (Nees. in Mart. Fl. brass. II. 462.)

‡ Juillet-Septembre.

AC. Cultivé depuis 1855.

535. *Cynosurus*. (*L. Gen.* 87.) — Cynosure. — Kammingras.

1440) *C. cristatus*. (*L. Sp.* 105). T. n° 140.

‡ Juin-Août.

C. Prairies, pâturages, pelouses.

536. *Melica*. (*L. Gen.* 82.) — Mélique. — Perlgras.

1441) *M. ciliata*. (*L. Sp.* 97). T. n° 127.

‡ Mai-Juillet.

C. Rochers, coleaux arides de la Sûre, Echternach, de la Moselle, Stromberg (Schengen.) BB.! Hohfels.! (Wormeldange.)

1442) *M. uniflora*. (*Retz. Obs.* 1. 10) T. n° 129.

‡ Mai-Juin.

C. Bois montueux. R. Ardennes.

1443) *M. nutans*. (*L. Sp.* 98). T. n° 128.

‡ Mai-Juin.

AC. Bois montueux de la Moselle, de la Sûre et des Ardennes. R. Ailleurs.

537. *Molinia*. (*Schrank. baier. fl.* 1. 334.) Molinie. Pfeiffengras.

1444) *M. cœrulea*. (*Mönch. meth.* 183.) *Enodium cœruleum*.

‡ Juillet-Septembre. [T. n° 126.

AC. Bois, bruyères, pâturages humides, prairies tourbeuses. C. Sur terre dite de bruyère.

538. *Catabrosa*. (*P. Beauv. Agrost.* 97.) Catabrose. Quellgras.

1445) *C. aquatica*. (*Beauv. Agrost.* 97). T. n° 124.

‡ Juin-Août.

AC. Mares, fossés aquatiques, bords des eaux.

539. *Glyceria*. (*R. Br. Prod. Nov. Holl.* 179.) Glycérie. Schwaden.

1446) *G. fluitans*. (*R. Br. l. c.*) T. n° 122.

‡ Juin-Août.

C. Fossés, mares, bords des ruisseaux et des rivières, étangs, etc.

1447) *G. plicata*. (*Fries. Nov. Mant.* 3. p. 176.) Wrtg. F. R. 1481.

‡ Mai-Juillet.

R. Fossés, mares, ruisseaux de la vallée de la Moselle. Wrtg.

1448) *G. aquatica*. (*Whlbg. Fl. Gothol.* 18.) *Poa aquatica*. (*L.*)

‡ Juin-Septembre. [T. n° 130.

AC. par place. Bords des eaux, lieux marécageux. Moselle. R. Ardennes.

1449) *G. distans*. (Whlb. *fl. Upsal.* p. 36.) *G. maritima*. T. n° 123.

24 Mai-Juin.

R. Eaux saumâtres. Born. Md. Source sous la Fels (Schengen). Steiningen.

540. Briza. (*L. Gen.* 84.) — Brize. — Zittergras.

1450) *B. media*. (*L. Sp.* 103.) Fulegrîschen. Wibbel-de-Wabbel.

Fli-fla-flîschen T. n° 139.

24 Mai-Juillet.

C. Pâturages, prairies, bois.

1451) † *B. maxima*. (*L. Sp.* 103.)

① Mai-Juin.

AC. Cultivé comme plante d'ornement.

541. Sclerochloa. (*P. Beauv. Agrost.* 98.) *Sclerochloë*. Hartgras.

1452) *S. dura*. (*P. B. l. c.*) Löhr. 1500.

② Mai-Juin.

AR. Terrains compactes en friche, bords des chemins, de tout le littoral de la Moselle.

542. Poa. (*L. Gen.* 83 *ex parte.*) — Paturin. — Rispengras.

1453) *P. annua*. (*L. Sp.* 99) T. n° 132.

① ou ② Fl. presque toute l'année.

C. Cours, rues peu fréquentées, bords des chemins, lieux cultivés, endroits herbeux, etc.

1454) *P. bulbosa*. (*L. Sp.* 102) T. n° 131.

24 Mai-Juin.

R. Bords des chemins, coteaux arides, pelouses. Mompach (Bochkolz). Crispinusfels. EF. !

Var. β . *vivipara*. (*L. Sp.* 102. β .)

R. avec le type. Mompach. B. C. Glacis au-dessus de la Crispinusfels. EF. !

1455) *P. nemoralis*. (*L. Sp.* 102) T. n° 136.

24 Juin-Août.

C. Taillis, bois, buissons. haies.

1456) *P. serotina*. (*Ehrh. Beitr.* VI. 83.) *P. fertilis*. (*Host.*)

24 Juin-Août. [T. n° 135.

R. Bords des eaux, alluvions, lieux herbeux, frais. Moselle. L.

1457) *P. Chaixii*. (*Vill. fl. Dauph.* 2. 128.) *P. sudetica*. T. n° 136.

24 Juin-Juillet.

AC. Bois montueux de l'Ardenne, ruines d'Esch s/S. Rambrouch. T. Wiltz. T. R. Ailleurs.

1458) *P. trivialis*. (*L. Sp.* 99) T. n° 133.

24 Juin-Juillet.

C. Lieux cultivés, pelouses, prairies, bords des eaux.

1459) *P. pratensis*. (*L. Sp.* 99) T. n° 134.

24 Mai-Juillet.

C. Prairies, pâturages, pelouses.

Var. β . *angustifolia*. (*L. Sp.* 99) T. n° 134a.

Avec le type.

Var. γ . *Lejeunii*. (*Dmtr. Agros.* 112) T. n° 134b.

Avec le type.

Var. δ . *strigosa*. (*Kæler. Gr. Dmtr. l. c.*) T. n° 134c.

Avec le type lieux sablonneux.

Var. ε . *anceps*. (*Dmtr. l. c.*) T. n° 134d.

Avec le type.

1460) *P. compressa*. (*L. Sp.* 101) T. n° 137.

24 Juin-Août.

C. Prairies, pâturages, lieux secs, vieux murs, etc.

Var. β . *Langeana*. (*Rehb. Ic.* 11. f. 1647.)

Avec le type.

543. Dactylis. (*L. Gen.* 86.) — Dactyle. — Knaulgras.

1461) *D. glomerata*. (*L. Sp.* 103) T. n° 143.

24 Juin-Juillet.

C. Prairies, lieux herbeux, bords des chemins, fossés, bois.

Var. β . *hispanica*. (*Roth. catal. bot.* 4. 8) T. n° 144.

Avec le type.

544. Bromus. (*L. Gen.* 89.) Brome. Trespe. Fulegreeschén.

Sect. I. — *Eubromus*. (*Gren. et God. Fl. fr. III.* 582.)

1462) *B. sterilis*. (*L. Sp.* 113) T. n° 141.

① ou ② Mai-Juillet.

C. Bords des chemins, vieux murs, lieux incultes, champs en friche.

1463) *B. tectorum*. (*L. Sp.* 114) T. n° 142.

① Mai-Août.

C. par place. Vieux murs, toits, bords des chemins, coleaux incultes, etc.

Sect. II. — *Festucoides*. (*Coss. et Germ. l. c.* 830.)

1464) *B. asper*. (*Murr. Prod. Gætt.* 42) T. n° 148.

24 Juin-Juillet.

AC. par place. Bois montueux. R. Ardennes.

1465) *B. erectus*. (*Huds. Fl. Angl. ed.* 2. 49) T. n° 149.

24 Mai-Juin.

AC. Prairies, pâturages, pelouses montueuses, bords des chemins, clairières des bois sur les marnes irisées.

1466) *B. inermis*. (*Leysser. fl. halens. ed. 1. p. 16.*) T. n° 150.

24 Juin-Juillet.

R. par place. Prairies, coteaux secs, bords des champs, bois des vallées de la Sûre et de la Moselle.

Sect. III. — *Serrafalcus*. (*Parlatore, pl. rar. sic. fasc. 2. 14.*)

1467) *B. arvensis*. (*L. Sp. 113*) T. n° 154.

① Juin-Juillet.

R. Bords des chemins, lieux incultes, prairies artificielles, moissons. Kleeberg, entre Remerschien et Schengen. BB.!

1468) ? *B. patulus*. (*Mert. et Koch. Deutsch. Fl. 1. 685.*)

① Juin-Juillet.

[T. n° 155.

R. Bords des chemins, lieux incultes, humides. Reckingen. T. Ardennes. L. et C.

1469) *B. mollis*. (*L. Sp. 112*). T. n° 151.

② ou ① Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages, lieux incultes, chemins.

1470) *B. racemosus*. (*L. Sp. 114*) T. n° 152.

② Mai-Juin.

AC. par place. Manqué sur de très-grands espaces. Prairies naturelles et artificielles, pâturages.

1471) *B. commutatus*. (*Schrad. fl. Germ. 1. p. 253.*)

② Mai-Juin.

C. Prairies, lieux incultes, bords des chemins. R. Ardennes.

1472) *B. secalinus*. (*L. Sp. 112*). T. n° 156.

① ou ② Juin-Juillet.

C. Champs cultivés et en friche.

Var. β . *elongatus*. (*Gaud. agr. 1. 305*) T. n° 153.

C. Prairies.

Var. γ . *hordeaceus*. (*Gmel. fl. Bad. IV. 68. t. 1.*)

AR. Champs d'orge.

1473) *B. grossus*. (*DC. Fl. F. 1. 680*) T. n° 158.

① ou ② Juin-Juillet.

AC. Moissons.

Var. β . *velutinus*. (*Schrad. 1. 349. t. 6. f. 3.*)

Avec l'espèce.

Var. γ . *nitidus*. (*Dmtr. Agros. p. 119.*)

R. Prés des Ardennes. Dmtr. Mersch. T.

1474) *B. arduennensis*. (*Lej. Comp. 1. 99. 253.*)

② Juin-Juillet.

R. par place. Moissons de l'Ardenne. Schimpach. EF. Kz. Moissons, champs d'épeautre.

1475) † **B. Schraderi.** (*Kunth, Enum.* 1. 416.)

① Juin-Juillet.

R. Cultivé depuis 1865 comme fourrage.

545. Festuca. (*L. Gen.* 88 *emend.*) — Fétuque. — Schwingel.

Sect. I. — *Nardurus.* (*Comp. fl. Germ. ed.* 2. p. 193.)

1476) **F. rigida.** (*Kunth, Enum. pl.* I. 392.)

① Mai-Juin.

R. Coteaux secs, lieux incultes, rochers, bords des chemins, des terrains calcaires.

Sect. II. — *Vulpia.* (*Gmel. l. c.*)

1477) **F. bromoides.** (*L. Sp.* 110). T. n° 106, 107.

① Mai-Juillet.

R. Bords des chemins, champs secs. Everlange, Rambrouch. T.

1478) **F. sciuroides.** (*Roth, Ten. fl. Germ. II.* 130.) T. n° 108.

① Mai-Juillet.

AR. par place. Terrains sablonneux, coteaux secs, lieux incultes, bords des chemins entre Berdorf et Beaufort à la descente du Müllerthal. T. R. Ardennes.

1479) **F. Pseudo-Myuros.** (*Soy. Willm. in God. fl. Lorr. éd.* 1.

3. 177) T. n° 109.

① Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux incultes, coteaux secs, bords des chemins, pelouses. Kempelen (Courtois). C. Everlange. R. Ardennes.

Sect. III. — *Eufestuca.* (*Coss. et Germ. l. c.* 776.)

1480) **F. rubra.** (*L. Sp.* 109) T. n° 116.

24 Juin-Juillet.

C. Lieux cultivés, bords des chemins, prairies, bois. R. Ardennes. Schimpach. EF. Kz.

1481) **F. heterophylla.** (*Lmk. Fl. Fr. III.* 600) . . . T. n° 115.

24 Juin-Juillet.

C. Bois montueux, lieux herbeux, ombragés de l'Ardenne. AR. Ailleurs.

1482) **F. duriuscula.** (*L. Sp.* 108) T. n° 114.

24 Mai-Juillet.

C. Pâturages, pelouses, sables arides, lisières et clairières des bois.

1483) **F. ovina.** (*L. Sp.* 108) T. n° 110.

24 Mai-Juillet.

C. Clairières et lisières des bois, prairies, pâturages, pelouses.

Var. β . *glauca.* (*Schrad. Fl. Germ.* 322) T. n° 113.

AC. avec le type. Prés secs.

Var. γ . *valesciaca*. (*Sleich. in D. fl.* 1. 631) . . . T. n° 112.

R. Avec le type. Lieux sablonneux. Kopstal, Schanz (Klingelscheuer.) T. !

Var. δ . *capillata*. (*Lmk. Fl. F. III.* 597) . . . T. n° 114.

C. Avec le type. Clairières et lisières des bois.

1484) *F. elatior*. (*L. Fl. succ. ed.* 2. 32. *non Sp. sec. Sm.*) *Schenodorus pratensis* . . . T. n° 119.

¶ Juin-Juillet.

C. Prairies, lieux herbeux, bords des eaux.

Var. β . *radicans*. (*Dmtr. P. Fl. B.* 2161) . . . T. n° 120.

AC. avec l'espèce. Prairies.

1485) *F. loliacea*. (*Huds. fl. Angl. ed.* 1. 38.) *Schenodorus loliaceus* . . . T. n° 121.

¶ Mai-Juillet.

AC. par place. Prairies.

1486) *F. arundinacea*. (*Schreb. spicil.* 57.) *Schenodorus arundinaceus* . . . T. n° 118.

¶ Juin-Juillet.

C. Lieux herbeux, bords des eaux, prairies humides, fossés aquatiques.

1487) *F. silvatica*. (*Vill. fl. Dauph.* 2. 105.) *Schenodorus silvaticus*.

¶ Juin-Juillet. [T. n° 117.

AC. par place. Bois montueux entre Beeh et Consdorf (Ilse).

1488) *F. gigantea*. (*Vill. fl. Dauph. II.* 110.) Brous. g. T. n° 147.

¶ Juin-Juillet.

C. Bois montueux, buissons ombragés.

546. *Brachypodium*. (*P. Beauv. Agros.* 100. t. 19. *ex parte*.)—
Brachypode. — Zwenke.

1489) *B. silvaticum*. (*Rœm. et Schult. syst. veg. II.* 741.) T. n° 92.

¶ Juillet-Août.

C. Bois, taillis, buissons. R. Ardennes.

1490) *B. pinnatum*. (*P. Beauv. Agros.* 101) . . . T. n° 94.

¶ Juin-Août.

AC. Lieux herbeux, pâturages, coteaux pierreux, lisières et clairières des bois.
R. Ardennes.

Var. β . *rupestre*. (*R. et S. syst.* 2. 737.) *gracile*. T. n° 93, 95.

AR. Bois avec le type.

Sous-tribu XI. — Triticeæ. (*God. et Gren. fl. fr. III.* 598.)

547. *Lolium*. (*L. Gen.* 95.) — Ivraie. — Lolch.

1491) *L. perenne*. (*L. Sp.* 122.) Rêgras . . . T. n° 84.

4 Juin-Septembre.

C. Prairies, lieux herbeux, bords des champs.

Var. β . tenue. (*L. Sp.* 122) T. n° 85.

C. Avec le type.

1492) † *L. italicum*. (*A. Braun, in Flora XVII.* 229.) EF. 307.

4 Juin-Octobre.

C. Cultivé, subspontané. Lieux herbeux, prairies, etc.

1493) *L. multiflorum*. (*Lmk. fl. Fr. II.* 621) . . . T. n° 90.

① Juin-Juillet.

AR. Pâturages, lieux herbeux, moissons.

1494) *L. temulentum*. (*L. Sp.* 122.) Dronkekaar. T. n° 88.

① Juin-Juillet.

AC. suivant l'année. Moissons.

Var. β . arvense. (*With. arrang.* 168.)

R. Avec le type : Sûre près Diekirch (Courtois).

1495) *L. remotum*. (*Hoff. D. fl. ed. 2. 1. f.* 63.) *L. linicolum*.

① Juin-Août. [EF. 308.

R. Linières, champs cultivés.

548. *Hordeum*. (*L. Gen.* 98 *ex parte*.) — Orge. — Gerste.

Sect. I. — *Campestris*.

1496) *H. murinum*. (*L. Sp.* 126.) Wel Grèscht . . . T. n° 76.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Villages, pieds des murs, décombres, lieux incultes, bords des chemins. R. Ardennes.

1497) *H. secalinum*. (*Schreb. spicil.* 148.) *H. pratense*. (*Rth.*)

4 Juin-Juillet. [T. n° 77, 78.

AR. Prairies, lieux herbeux.

Sect. II. — *Cerealia*.

1498) † *H. distichum*. (*L. Sp.* 125.) Grèscht . . . T. n° 80.

① Juin-Août.

C. Cultivé.

1499) † *H. zeocrithon*. (*L. Sp.* 125). T. n° 79.

① Juin-Août.

R. Cultivé.

1500) † *H. vulgare*. (*L. Sp.* 125.) Wantergrèscht. T. n° 82.

① ou ② Juin-Juillet.

AR. Cultivé.

1501) † *H. hexastichon*. (*L. Sp.* 125) T. n° 81.

① Juin-Août.

AC. Cultivé par place.

549. Elymus. (*L. Gen.* 96.) — Elyme. — Haargras.

1502) *E. europæus*. (*L. Mant.* 35) T. n° 83.

‡ Juin-Juillet.

R. Bois montueux, Grünewald derrière Dommeldange. K. AR. Ardennes.

550. Secale. (*L. Gen.* 97.) — Seigle. — Roggen.

1503) † *S. cereale*. (*L. Sp.* 124.) Kuør T. n° 91.

① ou ② Mai-Juin.

C. Cultivé et souvent subspontané, notamment sur les toits en chaume.

551. Triticum. (*L. Gen.* 99.) — Froment. — Weizen.

Sect. I. — Cereale. (*Griesb. Fl. Rum.* II. 427.)

1504) † *T. vulgare*. (*Vill. fl. Dauph.* II. 153.)

① Juillet-Août.

Var. α . *æstivum*. (*L. Sp.* 126.) Summerwees. . . . T. n° 103.

AR. Cultivé.

Var. β . *hybernum*. (*L. Sp.* 126.) Wees T. n° 102.

C. Cultivé en plusieurs variétés.

1505) *T. durum*. (*Desf.*) Spreuze Wees.

① Juillet-Août.

AC. Cultivé suivant la région.

1506) *T. turgidum*. (*L. Sp.* 126.) Englesche Wees.

① ou ② Juin-Juillet.

AR. Cultivé en plusieurs variétés.

1507) † *T. Spelta*. (*L. Sp.* 127.)

② Juillet-Août.

R. Cultivé en Ardennes.

1508) † *T. monococcum*. (*L. Sp.* 127.) Spelz . . . T. n° 101.

① ou ② Juin-Juillet.

AC. Cultivé dans les marnes irisées et le gris bigarré.

Sect. II. — *Agropyrum*. (*Endl. Gen. pl.* 913b.)

1509) *T. repens*. (*L. Sp.* 128.) Dunggràs. Ongràs. T. n° 98.

‡ Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, champs en friche, bords des chemins.

1510) *T. caninum*. (*Schreb. spicil.* 51) T. n° 97.

4 Juin-Juillet.

C. Haies, buissons, lieux ombragés, lisières des bois.

Sous-tribu XII. — Nardoideae. (*N. ab E. gen.* 10. 15.)

552. *Nardus*. (*L. Gen.* 69.) — Nard. — Borstengras.

1511) *N. stricta*. (*L. Sp.* 722) T. n° 221.

4 Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages, bruyères, tourbières de l'Ardenne. R. ailleurs. Eltersmoor (Beaufort). EF. Kz.

CALENDRIER DES FLORAISONS.

JANVIER.

Helleborus		Stellaria		Capsella	
niger . . . n° 37		media . . . 91		Bursa pastoris . . 250	

FÉVRIER.

Eranthis		Amygdalus		Tussilago	
hiemalis . . . 36		communis . . . 391		Farfara . . . 985	
Helleborus		Armenacea		Daphne	
niger . . . 37		vulgaris . . . 392		Mezereum . . . 1102	
foetidus . . . 39		Veronica		Corylus	
Stellaria		hederifolia . . . 697		Avellana . . . 1139	
media . . . 91		Bellis		Alnus	
Capsella		perennis . . . 934		glutinosa . . . 1166	
Bursa pastoris . . 250		Senecio		incana . . . 1167	
Persica		vulgaris . . . 973		Galanthus	
vulgaris . . . 390				nivalis . . . 1238	

MARS.

Anemone		Arabis		Prunus	
Pulsatilla . . . 6		arenosa . . . 197		institia . . . 395	
Hepatica . . . 10		Cardamine		domestica . . . 396	
Ficaria		hirsuta . . . 201		Potentilla	
ranunculoides . . 34		Draba		verna . . . 447	
Eranthis		verna . . . 237		sterilis . . . 446	
hiemalis . . . 36		Thlaspi		Cydonia	
Helleborus		perfoliatum . . 247		japonica . . . 484	
niger . . . 37		Capsella		Cornus	
viridis . . . 38		Bursa pastoris . . 250		mas . . . 574	
foetidus . . . 39		Neslia		Viscum	
Spergularia		paniculata . . . 258		album . . . 575	
rubra . . . 79		Viola		Ribes	
Holosteum		hirta . . . 263		Grossularia . . . 576	
umbellatum . . . 88		odorata . . . 264		Saxifraga	
Stellaria		Persica		tridactylites . . . 580	
media . . . 91		vulgaris . . . 390		Crysosplenium	
Malva		Amygdalus		alternifolium . . . 584	
rotundifolia . . . 132		communis . . . 391		Primula	
Corydalis		Armenacea		officinalis . . . 588	
solida . . . 181		vulgaris . . . 392		elatior . . . 589	

Primula		Petasites		Populus	
grandiflora . .	590	officinalis . .	986	pyramidalis β .	1162
Vinea		Ulmus		canadensis . .	1163
minor . .	610	campestris . .	1096	balsamifera . .	1164
major . .	611	Daphne		Alnus	
Convolvulus		Mezereum . .	1102	glutinosa . .	1166
arvensis . .	627	Buxus		incana . .	1167
Veronica		sempervirens .	1125	Taxus	
arvensis . .	689	Callitriche		baccata . .	1184
agrestis . .	693	vernalis . .	1127	Scilla	
polita . .	694	Corylus		bifolia . .	1202
opaca . .	695	Avellana . .	1139	Tamus	
hederæfolia .	697	Salix		communis . .	1231
Lathraea		daphnoides . .	1147	Narcissus	
squamaria . .	744	purpurea . .	1148	Pseudo-Narcissus	1235
Lamium		rubra . .	1149	Galanthus	
purpureum . .	777	viminalis . .	1150	nivalis . .	1238
Adoxa		Caprea . .	1153	Luzula	
Moschatellina .	839	cinerea . .	1154	campestris . .	1320
Bellis		Populus		multiflora . .	1321
perennis . .	934	alba . .	1159	Carex	
Senecio		canescens . .	1160	verna . .	1344
vulgaris . .	973	tremula . .	1161	Poa	
Tussilago		nigra . .	1162	annua . .	1453
Farfara . .	985				

AVRIL.

Anemone		Spergularia		Erodium	
Pulsatilla . .	6	rubra . .	79	pimpinellæfolium	128
nemorosa . .	8	Spergula		Malva	
ranunculoides .	9	pentandra . .	81	rotundifolia . .	132
Hepatica . .	10	Holostium		Acer	
Myosurus		umbellatum . .	88	platanoides . .	146
minimus . .	14	Stellaria		Chelidonium	
Ranunculus		media . .	91	majus . .	178
nemosus . .	28	Cerastium		Corydalis	
repens . .	29	caespitosum . .	96	solida . .	181
parviflorus . .	32	pumilum . .	97	lutea . .	182
Ficaria		semi decandrum	98	Barbarea	
ranunculoides .	34	glomeratum . .	101	vulgaris . .	191
Caltha		apetalum β . .	101	præcox . .	194
palustris . .	35	Mentha		Arabis	
Helleborus		erecta . .	103	arenosa . .	197
niger . .	37	Oxalis		Cardamine	
viridis . .	38	acetosella . .	110	amara . .	199
Eplimedium		Erodium		pratensis . .	200
alpinum . .	51	cicutarium . .	127	hirsuta . .	201

Cardamine		Amgdalus		Chrysosplenium	
<i>silvatica</i>	202	<i>communis</i>	391	<i>alternifolium</i>	584
Sisymbrium		Prunus		<i>oppositifolium</i>	585
<i>Alliaria</i>	209	<i>spinosa</i>	393	Primula	
<i>Thalianum</i>	210	<i>fruticans</i>	394	<i>officinalis</i>	588
Diplotaxis		<i>institia</i>	395	<i>elatior</i>	589
<i>tenuifolia</i>	219	<i>domestica</i>	396	<i>grandiflora</i>	590
Brassica		<i>ceerasifera</i>	397	<i>auricula</i>	591
<i>Napus</i>	223	Cerasus		Plantago	
<i>Rapa</i>	224	<i>avium</i>	398	<i>lanceolata</i>	601
Sinapis		<i>vulgaris</i>	399	Fraxinus	
<i>arvensis</i>	226	Kerria		<i>excelsior</i>	603
Lunaria		<i>japonica</i>	407	<i>Ornus</i>	606
<i>biennis</i>	232	Spiraea		Jasminum	
Draba		<i>prunifolia</i>	406	<i>fruticans</i>	609
<i>verna</i>	237	Fragaria		Vinea	
<i>muralis</i>	238	<i>vesca</i>	439	<i>minor</i>	610
Teesdalia		Potentilla		<i>major</i>	611
<i>nudicaulis</i>	244	<i>sterilis</i>	446	Menyanthes	
Thlaspi		<i>verna</i>	447	<i>trifoliata</i>	614
<i>montanum</i>	246	Cratægus		Convolvulus	
<i>perfoliatum</i>	247	<i>Oxyacantha</i>	478	<i>arvensis</i>	627
<i>alpestre</i>	248	Cotoneaster		Pulmonaria	
Capsella		<i>vulgaris</i>	481	<i>officinalis</i>	619
<i>Bursa pastoris</i>	250	Amelanchier		<i>mollis</i>	651
Viola		<i>vulgaris</i>	482	Omphalodes	
<i>hirta</i>	263	Cydonia		<i>verna</i>	655
<i>odorata</i>	264	<i>vulgaris</i>	483	Veronica	
<i>canina</i>	265	<i>japonica</i>	484	<i>Chamædryas</i>	681
<i>silvestris</i>	267	Peries		<i>Teuerium</i>	685
<i>Riviniiana</i>	268	<i>communis</i>	485	<i>serpyllifolia</i>	686
<i>mirabilis</i>	269	Malus		<i>acinifolia</i>	688
<i>Altaica</i>	271	<i>communis</i>	487	<i>arvensis</i>	689
<i>elatior</i>	272	<i>baccata</i>	488	<i>verna</i>	690
Sarothamnus		Cornus		<i>triphyllus</i>	691
<i>scoparius</i>	277	<i>mas</i>	574	<i>præcox</i>	692
Ulex		Viscum		<i>agrestis</i>	693
<i>europæus</i>	286	<i>album</i>	575	<i>polita</i>	694
Cercis		Ribes		<i>opaca</i>	695
<i>siliquastrum</i>	330	<i>Grossularia</i>	576	<i>Buxbaumii</i>	696
Vicia		<i>rubrum</i>	577	<i>hederæfolia</i>	697
<i>lathyroides</i>	339	<i>alpinum</i>	578	Lunaria	
Orobus		<i>nigrum</i>	579	<i>Cymbalaria</i>	717
<i>tuberosus</i>	358	Saxifraga		Lathræa	
<i>vernus</i>	360	<i>tridactylites</i>	580	<i>squamaria</i>	744
Montia		<i>cæspitosa</i>	582	Ocymum	
<i>minor</i>	372			<i>Basilicum</i>	746

Rosmarinus		Hippophaë		Betula	
officinalis . .	757	rhamnoides . .	1105	alba . .	1165
Glechoma		Asarum		Platanus	
hederacea . .	774	europæum. .	1108	orientalis . .	1168
Lamium		Euphorbia		acerifolius . .	1169
amplexicaule .	775	dulcis . .	1116	occidentalis. .	1170
incisum . .	776	Cyparissias. .	1121	Pinus	
purpureum . .	777	Mercurialis		Pinaster . .	1173
album . .	778	perennis . .	1124	Larix	
maculatum . .	779	Elæxus		decidea . .	1175
Galeobiflorum		sempervirens .	1125	Juniperus	
luteum . .	780	Callitriche		communis . .	1180
Vaccinium		vernalis . .	1127	virginiana . .	1182
Myrtillus . .	815	hamulata . .	1128	Thuia	
Oxycoccus		Juglans		occidentalis. .	1183
palustris . .	816	regia . .	1130	Taxus	
Adoxa		nigra . .	1131	baccata . .	1184
Moschatellina .	839	Fagus		Fritillaria	
Sambucus		silvatica . .	1132	imperialis . .	1192
racemosa . .	842	Quercus		Ornithogalum	
Galium		pedunculata .	1134	nutans . .	1197
Cruciata . .	854	Carpinus		Gagea	
Valeriana		Betulus . .	1140	pratensis . .	1198
dioica . .	868	Salix		arvensis . .	1199
Valerianella		fragilis . .	1142	minima . .	1200
olitoria . .	869	alba . .	1143	lutea . .	1201
carinata . .	870	babylonica. .	1144	Scilla	
Bellis		amygdalina .	1145	bifolia . .	1202
perennis . .	934	hippophæfolia.	1146	Allium	
Cineraria		daphnoides .	1147	ursinum . .	1203
spatulæfolia .	972	purpurea . .	1148	Tamus	
Senecio		rubra . .	1149	communis . .	1231
vulgaris . .	973	viminalis . .	1150	Iris	
Tussilago		Seringeana .	1151	germanica . .	1232
Farfara . .	985	incana . .	1152	pumila . .	1233
Petasites		Caprea . .	1153	Narcissus	
officinalis . .	986	cinerea . .	1154	Pseudo-Narcissus	1235
Taraxacum		aurita . .	1155	poeticus . .	1236
officinale . .	1009	depressa . .	1156	Orchis	
Barkhausia		repens . .	1157	masecula . .	1250
taraxacifolia .	1023	Populus		Lemna	
Polygonum		alba . .	1159	trisulea . .	1294
cuspidatum . .	1078	canescens . .	1160	minor . .	1295
Linus		tremula . .	1161	gibba . .	1296
campestris . .	1096	nigra . .	1162	polyrrhiza . .	1297
montana . .	1096 ²	canadensis. .	1163	Luzula	
effusa . .	1097	balsamifera .	1164	pilosa . .	1317

Luzula

campestris. . .	1320
multiflora . . .	1321

Carex

præcox . . .	1330
caespitosa . . .	1338
Goodenoughii .	1339
acuta . . .	1340
pilulifera . . .	1341
montana . . .	1343

Carex

humilis . . .	1345
digitata . . .	1346
ornithopoda . .	1347
flacca . . .	1349
hirta . . .	1365
Eriophorum	
vaginatum . . .	1377
polystachyum .	1378
latifolium . . .	1379

Alopecurus

agrestis . . .	1398
pratensis . . .	1399

Sesleria

cœrulea. . . .	1416
----------------	------

Aira

præcox . . .	1419
--------------	------

Poa

annua . . .	1553
-------------	------

MAL.

Thalictrum

aqueligifolium. 2bis.	
-----------------------	--

Anemone

Pulsatilla . . .	6
silvestris . . .	7
nemorosa . . .	9
ranunculoides. .	10

Adonis

æstivalis . . .	12
-----------------	----

Myosurus

minimus . . .	14
---------------	----

Ranunculus

hederaceus. . .	15
aquatilis . . .	16
tripartitus . . .	17
trichophyllus . .	18
fluitans . . .	19
sceleratus . . .	21
platanifolius . .	22
auricomus. . .	25
acris . . .	26
lanuginosus . . .	27
nemorosus. . .	28
repens . . .	29
bulbosus . . .	30
sardous . . .	31
parvulus β . . .	31
parviflorus. . .	32
arvensis . . .	33
inermis β . . .	33

Ficaria

ranunculoides. .	34
------------------	----

Caltha

palustris . . .	35
-----------------	----

Actæa

spicata. . . .	48
----------------	----

Paeonia

officinalis . . .	49
-------------------	----

Berberis

vulgaris . . .	50
----------------	----

Epimedium

alpinum . . .	51
---------------	----

Dianthus

arceus . . .	57
--------------	----

Silene

nulaus . . .	67
--------------	----

Melandryum

silvestre . . .	71
-----------------	----

Lychnis

chalcædonia . .	73
Flos-Cuculi . .	74
Viscaria . . .	76

Spergularia

rubra . . .	79
-------------	----

Spergula

arvensis . . .	80
maxima β . . .	80
saliva γ . . .	80
pentandra . . .	81

Sagina

procumbens . .	82
apetala . . .	83
saxatilis β . . .	83
ciliata . . .	84
depressa β . . .	84

Alsine

tenuifolia . . .	85
viscosa . . .	86

Melhringia

trinervia . . .	87
-----------------	----

Holosticum

umbellatum . .	88
----------------	----

Arenaria

serpyllifolia. .	89
------------------	----

Stellaria

nemorum . . .	90
media . . .	91
Holostea . . .	92
graminea . . .	94

Gerastium

caespitosum. . .	96
pumilum . . .	97
semi decandrum	98
tomentosum . .	99
brachypetalum .	100
glomeratum. . .	101
apetalum β . . .	101
arvense . . .	102

Manchian

erecta . . .	103
--------------	-----

Oxalis

acetosella . . .	110
------------------	-----

Dictamnus

albus . . .	113
-------------	-----

Geranium

phaeum . . .	116
silvaticum . . .	117
sanguineum. . .	120
rotundifolium .	125
Robertianum . .	126

Erodium

cicutarium . . .	127
------------------	-----

Erodium		Arabis		Draba	
pimpinellæfolia.	128	sagittata . .	196	verna . .	237
Malva		arenosa . .	197	muralis . .	238
rotundifolia . .	132	Turritia . .	198	Teesdallia	
silvestris . .	131	Cardamine		nudicaulis . .	244
Polygala		amara . .	199	Thlaspi	
vulgaris . .	141	pratensis . .	200	arvense . .	245
oxyptera β . .	141	hirsuta . .	201	montanum . .	246
comosa . .	142	silvatica . .	202	perfoliatum . .	247
calcareæ . .	143	impatiens . .	203	alpestre . .	248
austriacæ . .	144	Nasturtium		Iberis	
Acer		officinale . .	204	amara . .	249
campestre . .	145	silvestre . .	205	Capsella	
platanoides . .	146	amphibium . .	206	Bursa pastoris . .	250
pseudo-platanus	147	palustre . .	207	Lepidium	
Aesculus		Turritis		campestre . .	252
hippocastanum	148	glabra . .	208	ruderales . .	254
rubicunda . .	149	Sisymbrium		draba . .	255
Staphylea		Alliaria . .	209	Senecio	
pinnata . .	152	Thalianum . .	210	Coronopus . .	256
Evonymus		officinale . .	211	Isatis	
europæa . .	153	Sophia . .	211	tinctoria . .	257
Papaver		Erysimum		Neslia	
Rhœas . .	173	orientale . .	217	paniculata . .	258
hybridum . .	174	Hesperis		Caleptra	
Argemone . .	175	matronalis . .	218	Corvini . .	259
dubium . .	176	Diploaxis		Viola	
Cheilanthes		tenuifolia . .	219	palustris . .	262
majus . .	178	muralis . .	220	hirta . .	263
Corydalis		Erucastrum		odorata . .	264
solida . .	181	obtusangulum . .	221	canina . .	265
lutea . .	182	Brassica		montana . .	266
Fumaria		oleracea . .	222	silvestris . .	267
officinalis . .	183	Napus . .	223	Riviniæ . .	268
tenuifolia . .	184	Rapa . .	224	mirabilis . .	269
Vaillantii . .	185	Sinapis		tricolor . .	270
parviflora . .	186	arvensis . .	226	Altaica . .	271
capreolata . .	187	alba . .	227	elatior . .	272
Cheiranthus		Cheiranthus . .	228	rothomagensis . .	273
cheiri . .	190	Euphonia		Rhamnus	
Barbarea		sativus . .	230	cathartica . .	275
vulgaris . .	191	Lunaria		frangula . .	276
arcuata . .	191	rediviva . .	231	Sorothamnus	
stricta . .	193	biennis . .	232	scoparius . .	277
præcox . .	194	Alyssum		Cytisus	
Arabis		calycinum . .	233	Laburnum . .	278
hirsuta . .	195	saxatile . .	236		

Genista		Lathyrus		Fragaria	
germanica . . .	279	Aphaca . . .	349	vesca . . .	439
sagittalis . . .	280	Nissolia . . .	350	moschata . . .	440
tinctoria . . .	281	Orobis		viridis . . .	441
pilosa . . .	282	tuberosus . . .	358	virginiana . . .	442
Ulex		niger . . .	359	grandiflora . . .	443
europaeus . . .	286	vernus . . .	360	Comarum	
Anthyllis		Coronilla		palustre . . .	445
vulneraria . . .	289	Emerus . . .	361	Potentilla	
Lotus		varia . . .	362	sterilis . . .	446
corniculatus . . .	290	Ornithopus		verna . . .	447
Robinia		perpusillus . . .	363	Anserina . . .	450
pseudo-acacia . . .	293	Hippocrepis		rupestris . . .	451
umbraculifera β . . .	293	comosa . . .	365	Tormentilla	
viscosa . . .	294	Onobrychis		silvestris . . .	456
Colutea		viciaefolia . . .	366	Rosa	
arborescens . . .	296	Montia		cinnamomea . . .	458
Medicago		minor . . .	372	pomifera . . .	461
lupulina . . .	304	rivularis . . .	373	lutea . . .	463
Willdenowii β . . .	304	Herniaria		Achemilla	
minima . . .	308	glabra . . .	375	vulgaris . . .	472
maculata . . .	309	hirsuta . . .	376	arvensis . . .	473
denticulata . . .	311	Scleranthus		Poterium	
Trifolium		annuus . . .	377	dictyocarpum . . .	475
filiforme . . .	312	perennis . . .	378	Mespilus	
procumbens . . .	313	Crassula		germanica . . .	477
pratense . . .	316	rubens . . .	379	Crataegus	
sativum . . .	317	Prunus		Oxyacantha . . .	478
alpestre . . .	318	spinosa . . .	393	monogyna . . .	479
incarnatum . . .	321	fruticans . . .	394	Pyracantha . . .	480
striatum . . .	323	cerasifera . . .	397	Cotoneaster	
montanum . . .	324	Cerasus		vulgaris . . .	481
repens . . .	325	avium . . .	398	Amelanchier	
Cercis		vulgaris . . .	399	vulgaris . . .	482
siliquastrum . . .	330	Mahaleb . . .	400	Cydonia	
Vicia		Padus . . .	401	vulgaris . . .	483
pisiformis . . .	331	Spiraea		japonica . . .	484
sepium . . .	335	prunifolia . . .	406	Pirus	
lutea . . .	336	Kerria		communis . . .	485
sativa . . .	337	japonica . . .	407	Malus	
angustifolia . . .	338	Rubus		acerba . . .	486
lathyroides . . .	339	saxatilis . . .	432	communis . . .	487
Ervum		Genm		baccata . . .	488
hirsutum . . .	340	urbanum . . .	435	Sorbus	
Pisum		rivale . . .	436	domestica . . .	489
sativum . . .	347	rivali-urbanum . . .	437	aucuparia . . .	490
		urbano-rivale . . .	438	terminalis . . .	491

Sorbus		Hlex		Veronica	
Aria . .	492	aquifolium. .	603	Chamædrys . .	681
Philadelphus		Fraxinus		officinalis . .	683
coronarius .	493	Ornus . .	606	prostrata . .	684
Sanicula		Syringa		Teucrium . .	685
eupæa . .	513	vulgaris . .	607	serpyllifolia. .	686
Astrantia		persica . .	608	peregrina . .	687
major . .	514	Jasminum		acinifolia . .	688
Carum		fruticans . .	609	arvensis . .	689
Carvi . .	521	Vinca		verna . .	690
Oenanthe		minor . .	610	triphyllus . .	691
peucedanifolia.	533	major . .	611	præcox . .	692
Menum		Menyanthes		agresitis . .	693
althamanticum.	539	trifoliata . .	614	polita . .	694
Caucalis		Convolvulus		opaca . .	695
daucoides . .	558	arvensis . .	627	Buxbaumii . .	696
Torilis		Symphytum		hederæfolia. .	697
nodosa . .	562	officinalis . .	636	Scropularia	
Anthriscus		Myosotis		vernalis . .	703
Ceræfolium .	563	palustris . .	637	Linaria	
silvestris . .	564	strigulosa . .	638	Cymbellaria .	717
Scandix		cæspitosa . .	639	Pedicularis	
Pecten-Veneris	569	silvatica . .	640	palustris . .	720
Cornus		intermedia. .	641	Rhinanthus	
sanguinea . .	573	hispida . .	642	major . .	722
Ribes		versicolor . .	643	minor . .	723
rubrum . .	577	stricta . .	644	Alectorolophus .	724
alpinum . .	578	sparsiflora. .	645	Orobanche	
nigrum . .	579	Lithospermum		Rapum . .	737
Saxifraga		officinale . .	646	Lathraea	
tridactylites .	580	purpureo-cæruleum	647	squamaria . .	744
granulata . .	581	arvense . .	648	Ocymum	
cæspitosa . .	582	Pulmonaria		Basilicum . .	746
sponhemica .	583	officinalis . .	649	Rosmarinus	
Chrysesplenium		mollis . .	651	officinalis . .	757
alternifolium .	584	Cynoglossum		Salvia	
oppositifolium.	585	officinale . .	654	pratensis . .	758
Primula		Omphalodes		Glechoma	
officinalis . .	588	verna . .	655	hederacea . .	774
elatior. . .	589	Asperugo		Lamium	
grandiflora. .	590	procumbens .	656	amplexicaule .	775
auricula . .	591	Hyoseyamus		incisum . .	776
Arenaria		niger . .	668	purpureum . .	777
elongata . .	598	Veronica		album . .	778
Plantago		scutellata . .	678	maculatum . .	779
media . .	600	Anagallis . .	679	Calcebdolon	
lanceolata. .	601	Beccabunga .	680	luteum . .	780

Ajuga		Arthemisa		Euphorbia	
reptans . . .	804	Dracunculus . .	935	verrucosa . . .	1117
pyramidalis . .	805	Antennaria		stricta . . .	1119
Chamaepitys . .	807	dioica . . .	950	Cyparissias . .	1121
Vaccinium		Cnicus		Esula . . .	1122
Myrtillus . . .	815	spatulifolia . .	972	Mercurialis	
Vitis-idaea . .	814	Tragopogon		perennis . . .	1124
Oxycoccus		orientalis . . .	1002	Callitriche	
palustris . . .	816	pratensis . . .	1003	vernalis . . .	1127
Campanula		Scorzonera		hamulata . . .	1128
patula . . .	826	hiemalis . . .	1004	Juglans	
Specularia		Podospermum		regia . . .	1130
speculum . . .	827	callitrapifolium	1007	nigra . . .	1131
Phytolacca		Taraxacum		Fagus	
spicatum . . .	830	officinale . . .	1009	silvatica . . .	1132
Cucumis		paludosum . . .	1010	Quercus	
sativus . . .	835	Barkhausia		pedunculata . .	1131
Melo . . .	836	taraxacifolia . .	1023	sessiliflora . .	1135
Sambucus		Crepis		rubra . . .	1136
racemosa . . .	842	praemorsa . . .	1024	tinctoria . . .	1137
Viburnum		pulehra . . .	1025	alba . . .	1138
Lantana . . .	843	lectorum . . .	1028	Carpinus	
Opulus . . .	844	Hieracium		Betulus . . .	1140
Lonicera		Pilosella . . .	1830	Salix	
Xylosteum . . .	845	Rumex		pentandra . . .	1141
Periclymenum	846	scutatus . . .	1066	fragilis . . .	1142
caprifolium . .	847	Acetosa . . .	1067	alba . . .	1143
Scherardia		Acetosella . . .	1068	babylonica . . .	1144
arvensis . . .	849	Polygonum		amygdalina . .	1145
Galium		cuspidatum . . .	1078	hippophaeifolia	1146
Mollugo . . .	857	Morus		incana . . .	1152
erectum . . .	858	alba . . .	1092	aurita . . .	1155
palustre . . .	861	nigra . . .	1093	repens . . .	1157
Valeriana		Urtica		rosmarinifolia .	1158
Phu . . .	867	urens . . .	1099	Betula	
dioica . . .	868	Elaeagnus		alba . . .	1165
Valerianella		angustifolius . .	1104	Platanus	
olitoria . . .	869	Hippophaë		orientalis . . .	1168
carinata . . .	870	rharnnoides . . .	1105	acerifolius . . .	1169
eriocarpa . . .	873	Asarum		occidentalis . .	1170
Matricaria		europaeum . . .	1108	Pinus	
Chamomilla . .	927	Aristolochia		silvestris . . .	1171
Pyrethrum		Clematilis . . .	1109	austriaca . . .	1172
Leucanthemum	929	Sipho . . .	1110	Pinaster . . .	1173
Bellis		Euphorbia		strobilus . . .	1174
perennis . . .	934	amygdaloides . .	1112	Picea	
		exigua . . .	1115	excelsa . . .	1176

Picea		Aceras		Luzula	
alba . . .	1177	anthropophora . . .	1239	pilosa . . .	1317
Abies		Leroglossum		silvatica . . .	1319
pectinata . . .	1178	hircinum . . .	1240	campestris . . .	1320
balsamea . . .	1179	Anacamptis		multiflora . . .	1321
Juniperus		pyramidalis . . .	1241	Carex	
communis. . .	1180	Orehis		pulicaris . . .	1322
Sabina . . .	1181	ustulata . . .	1242	disticha . . .	1323
Tulipa		tridentata . . .	1243	vulpina . . .	1324
silvestris . . .	1190	purpurea . . .	1244	muricata . . .	1325
Gesneriana. . .	1191	militaris . . .	1245	divulsa . . .	1326
Fritellaria		Simia . . .	1246	teretiuscula. . .	1327
imperialis . . .	1192	coriophora. . .	1247	paniculata . . .	1328
Ornithogalum		Morio . . .	1248	paradoxa . . .	1329
pyrenaicum . . .	1195	pallens . . .	1249	præcox . . .	1330
umbellatum . . .	1196	mascula . . .	1250	brizoides . . .	1331
nutans . . .	1197	latifolia . . .	1253	remota . . .	1332
Gagea		sambucina. . .	1254	echinata . . .	1333
pratensis . . .	1198	Ophrys		leporina . . .	1334
arvensis . . .	1199	muscifera . . .	1256	elongata . . .	1335
minima . . .	1200	aranifera . . .	1257	canescens . . .	1336
lutea . . .	1201	fuciflora . . .	1258	stricta . . .	1337
Allium		apifera . . .	1259	Goodenoughii . . .	1339
ursinum . . .	1203	Gymnadenia		acuta . . .	1340
moly . . .	1204	conopsea . . .	1261	pilulifera . . .	1341
Muscari		Platanthera		tomentosa . . .	1342
comosum . . .	1218	bifolia . . .	1265	montana . . .	1343
Phalangium		Cephalanthera		verna . . .	1344
Liliago . . .	1220	grandiflora . . .	1269	humilis . . .	1345
Convallaria		Xyphophyllum	1270	digitata . . .	1346
maialis . . .	1225	Neottia		ornithopoda. . .	1347
Polygonatum		Nidus-avis. . .	1274	panicea . . .	1348
verticillatum . . .	1226	Listera		flacca . . .	1349
multiflorum . . .	1227	ovata . . .	1275	pendula . . .	1350
officinale . . .	1228	Cypripedium		pallescens . . .	1351
Maianthemum		Calceolus . . .	1277	flava . . .	1352
bifolium . . .	1229	Potamogeton		Oederi . . .	1353
Paris		crispus . . .	1286	distans . . .	1354
quadrifolia . . .	1230	Zannichellia		Hornschuchiana	1355
Iris		palustris . . .	1292	fulva . . .	1356
germanica. . .	1232	Lemna		binervis . . .	1357
pumila . . .	1233	trisulca . . .	1294	laevigata . . .	1358
Narcissus		minor . . .	1295	silvatica . . .	1359
poeticus . . .	1236	gibba . . .	1296	Pseudo-Cyperus	1360
Leucoicum		polyrrhiza. . .	1297	rostrata . . .	1361
vernum . . .	1237	Arum		vesicaria . . .	1362
		maculatum . . .	1298	acutiformis. . .	1363

Carex		Stipa		Poa	
riparia . . .	1364	pinnata . . .	1414	bulbosa . . .	1454
hirta . . .	1365	Sesleria		pratensis . . .	1459
Heleocharis		cœrulea . . .	1415	Bromus	
palustris . . .	1367	Aira		sterilis . . .	1462
Eriophorum		caryophyllea . . .	1417	erectus . . .	1465
vaginatum. . .	1377	præcox . . .	1418	racemosus . . .	1470
polystachium . .	1378	Arena		commutatus. . .	1471
latifolium . . .	1379	pubescens . . .	1430	Festuca	
gracile . . .	1380	Melica		rigida . . .	1476
Anthoxanthum		ciliata . . .	1441	bromoides . . .	1477
odoratum . . .	1385	uniflora . . .	1442	sciuroides . . .	1478
Hierochloa		nutans . . .	1443	Pseudo-Myuros. .	1479
odorata . . .	1386	Glyceria		duriuscula . . .	1482
Alopecurus		plicata . . .	1447	ovina . . .	1483
agrestis . . .	1397	Briza		loliacea . . .	1485
pratensis . . .	1398	media . . .	1450	Secale	
utriculatus. . .	1399	maxima . . .	1451	cereale . . .	1503
Apera		Sclerochloa		Nardus	
interrupta. . .	1408	dura . . .	1452	stricta . . .	1511
Millium		Poa			
effusum . . .	1413	annua . . .	1453		

JUN.

Clematis		Ranunculus		Berberis	
Vitalba . . .	1	lanuginosus . .	27	vulgaris . . .	50
recta . . .	2	nemorosus. . .	28	Plantago	
Talictum		repens . . .	29	prolifer . . .	53
aquilegifolium. .	2	bulbosus . . .	30	diminutus β . .	53
minus . . .	3	parvulus β . .	30	Armeria . . .	54
saxatile β . .	3	sardous . . .	31	Carthusianorum .	55
Adonis		parviflorus. .	32	arrectus . . .	57
autumnalis . .	11	arvensis . . .	33	deltoides . . .	58
æstivalis . . .	12	inermis β . .	33	glaucus β . . .	58
Ranunculus		Nigella		cæsius . . .	59
hederaceus . .	13	arvensis . . .	40	Saponaria	
aquatilis . . .	16	damascena. . .	41	Vaccaria . . .	61
tripartitus. . .	17	sativa . . .	42	Cucubalus	
trichophyllus .	18	Aquilegia		baccifer . . .	63
nutans . . .	19	vulgaris . . .	43	Silene	
divaricatus . .	20	Delphinium		inflata . . .	64
secleratus . . .	21	Consolida . . .	44	conica . . .	65
platanifolius .	22	Ajacis . . .	45	conoidea . . .	66
Flammula . . .	23	Aconitum		nutans . . .	67
Lingua . . .	24	lycoctonum . .	46	gallica . . .	68
acris . . .	26	Napellus . . .	47		

Melandryum		Linum		Staphylea	
silvestre . .	71	catharticum .	106	pinnata . .	152
Lychnis		tenuifolium .	107	Evonymus	
chalcedonica .	73	usitatissimum .	108	europaea . .	153
Flos-Cuculi .	74	Radiola		Monotropa	
tomentosa . .	75	linoides . .	109	hypopitys . .	154
Viscaria . .	76	Oxalis		Hypericum	
Githago . .	77	stricta . .	111	perforatum . .	155
Spergularia		Dietamnus		humifusum . .	156
segetalis . .	78	albus . .	113	quadrangulum .	157
rubra . .	79	Impatiens		tetrapterum . .	158
Spergula		noli-tangere .	114	pulehrum . .	159
arvensis . .	80	Geranium		montanum . .	160
maxima β . .	80	phæum . .	116	hirsutum . .	161
sativa γ . .	80	silvaticum . .	117	Drosera	
Sagina		pratense . .	118	rotundifolia . .	162
procumbens .	82	sanguineum .	120	Pyrola	
apetala . .	83	columbinum .	121	rotundifolia . .	165
saxatilis β . .	83	dissectum . .	122	minor . .	166
ciliata . .	84	molle . .	123	Reseda	
depressa β .	84	pusillum . .	124	luteola . .	167
Alsine		rotundifolium .	125	lutea . .	168
tenuifolia . .	85	Robertianum .	126	odorata . .	169
viscosa . .	86	Erodium		Nuphar	
Mœhringia		Cicutarium .	127	luteum . .	170
trinervia . .	87	pimpinellæfolium	128	Nymphaea	
Arenaria		Malva		alba . .	171
serpyllifolia .	89	Alcea . .	129	Papaver	
Stellaria		moschata . .	130	somniferum . .	172
nemorum . .	90	silvestris . .	131	setigerum β .	172
media . .	91	rotundifolia .	132	Rhœas . .	173
Holostea . .	92	Altea		hybridum . .	174
glauca . .	93	officinalis . .	134	Argemone . .	175
graminea . .	94	hirsuta . .	135	dubium . .	176
uliginosa . .	95	Hibiscus		Lecoquii . .	177
Cerastium		Trionum . .	137	Chelidonium	
cæspitosum .	96	Tilia		majus . .	178
tomentosum .	99	platyphyllos .	139	Glaucium	
brachypetalum	100	Polygala		flavum . .	179
glomeratum .	101	vulgaris . .	141	Corydalis	
apetalum β .	101	oxyptera β . .	141	lutea . .	182
arvense . .	102	comosa . .	142	Fumaria	
Malachium		calcarea . .	143	officinalis . .	183
aquaticum . .	104	austriaca . .	144	tenuifolia . .	184
arenaria β .	104	Vitis		Vaillantii . .	185
Elatine		vinifera . .	150	parviflora . .	186
Alsinastrium .	105			capreolata . .	187

Cheiranthus		Brassica		Hellanthemum	
cheiri . . .	190	nigra . . .	223	Chamaecistus . .	260
Barbarea		Sinapis		serpyllifolium γ	260
vulgaris . . .	191	arvensis . . .	226	polifolium . . .	261
arcuata . . .	192	alba . . .	227	Viola	
stricta . . .	193	Cheiranthus . .	228	palustris . . .	262
præcox . . .	194	Raphanus		canina . . .	263
Arabis		Raphanistrum .	229	montana . . .	266
hirsuta . . .	195	Lunaria		silvestris . . .	267
sagittata . . .	196	rediviva . . .	231	Altaica . . .	271
arenosa . . .	197	Alyssum		elatior . . .	272
Turrita . . .	198	calycinum . . .	233	rothomagensis .	273
Cardamine		campestre . . .	234	intermedia . . .	274
pratensis . . .	200	saxatile . . .	235	Rhamnus	
hirsuta . . .	201	Berteroa		cathartica . . .	275
silvatica . . .	202	incana . . .	236	frangula . . .	276
impatiens . . .	203	Draba		Sarothamnus	
Nasturtium		muralis . . .	238	scoparius . . .	277
officinale . . .	204	Cochlearia		Genista	
silvestre . . .	205	Armoracia . . .	239	germanica . . .	279
amphibium . .	206	officinalis . . .	240	anglica . . .	279b
palustre . . .	207	Camellia		sagittalis . . .	280
Turritis		silvestris . . .	241	tinctoria . . .	281
glabra . . .	208	sativa . . .	242	pilosa . . .	282
Sisymbrium		dentata . . .	243	junceae . . .	283
Alliaria . . .	209	Teesdalia		Lupinus	
Thalianum . .	210	nudicaulis . . .	244	angustifolius . .	285
officinale . . .	211	Tiliaspl		Ulex	
Sophia . . .	212	arvense . . .	245	europæus . . .	286
Braya		Iberis		Ononis	
supina . . .	213	amara . . .	249	spinosa . . .	287
Erysimum		Capsella		repens . . .	288
cheiranthoides.	214	Bursa pastoris.	250	Anthyllis	
hieracifolium .	215	Lepidium		vulneraria . . .	289
virgatum . . .	216	sativum . . .	251	Lotus	
orientale . . .	217	campestre . . .	252	corniculatus . .	290
Hesperis		graminifolium.	253	uliginosus . . .	291
matronalis . .	218	ruderaie . . .	254	Trigonella	
Diplotaxis		Draba . . .	255	Fœnum-græcum	292
tenuifolia . . .	219	Seneciera		Robinia	
muralis . . .	220	Coronopus . . .	256	pseudo-acacia . .	293
Erucastrum		Isatis		umbraculifera β	293
obtusangulum .	221	tinctoria . . .	257	viscosa . . .	294
Brassica		Neslia		Colutea	
oleracea . . .	222	paniculata . . .	258	arborescens . . .	296
Napus . . .	223	Colepina		Astragalus	
Rapa . . .	224	Corvini . . .	259	glycyphyllos . .	297

Mellilotus			Viola		Herniaria	
arvensis . . .	298		angustifolia . .	339	hirsuta . . .	376
macrorrhiza . .	299		lathyroides . .	340	Helcranthus	
leucantha . . .	300		Ervum		annuus . . .	377
alba . . .	301		hirsutum . . .	340	perennis . . .	378
parviflora . . .	302		tetraspermum .	341	Crassula	
cœrulea . . .	303		gracile . . .	342	rubens . . .	379
Medicago			monanthos. . .	343	Sedum	
lupulina . . .	304		Ervilia . . .	344	acre . . .	380
Willdenowii β	304		Lens . . .	345	sexangulare. .	381
falcata . . .	305		Faba		aureum . . .	384
sativa . . .	306		vulgaris . . .	346	tréviricum . .	385
falcato-sativa .	307		Pisum		album . . .	386
minima . . .	308		sativum . . .	347	Cerasus	
Echinus . . .	309		arvense . . .	348	Mahaleb . . .	400
maculata . . .	310		Lathyrus		Spirœa	
denticulata . .	311		Aphaca . . .	349	Filipendula . .	402
Trifolium			Nissolia . . .	350	Ulmaria . . .	403
tiliforme . . .	312		sativus . . .	351	salicifolia . . .	404
procumbens . .	313		hirsutus . . .	352	hypericifolia .	405
aureum . . .	314		tuberosus . . .	353	prunifolia . . .	406
agrarium . . .	315		pratensis . . .	354	Kerria	
majus α . . .	315		silvestris . . .	355	japonica . . .	407
minus β . . .	315		Orobus		Rubus	
pratense . . .	316		tuberosus . . .	358	fruticosus . . .	408
sativum β . . .	316		niger . . .	359	cœsius . . .	431
medium . . .	317		Coronilla		saxatilis . . .	432
alpestre . . .	318		Emerus . . .	361	Idæus . . .	433
ochroleucum . .	319		varia . . .	362	odoratus . . .	434
rubens . . .	320		Ornithopus		Geum	
incarnatum . . .	321		perpusillus . .	363	urbanum . . .	435
striatum . . .	323		Hippocrepis		rivale . . .	436
montanum . . .	324		comosa . . .	365	rivali-urbanum.	437
repens . . .	325		Onobrychis		urbano-rivale .	438
hybridum . . .	326		viciæfolia . . .	366	Fragaria	
fragiferum . . .	327		Peplis		vesca . . .	439
Phaseolus			Portula . . .	369	moschata . . .	440
vulgaris . . .	328		Portulaca		viridis . . .	441
multiflorum . .	329		oleracea . . .	370	virginiana . . .	442
Viola			sativa . . .	371	grandiflora . .	443
pisiformis . . .	331		Montia		chilensis . . .	444
Cræca . . .	332		minor . . .	372	Comarum	
tenuifolia . . .	333		rivularis . . .	373	palustre . . .	445
onobrychioides	334		Corrigiola		Potentilla	
sepium . . .	336		litoralis . . .	374	alpestris . . .	449
lutea . . .	337		Herniaria		Anserina . . .	450
sativa . . .	338		glabra . . .	375	rupestris . . .	451

Potentilla

- supina . . . 432
argentea . . . 433
recta . . . 434

Tormentilla

- procumbens . . 433
silvestris . . . 436

Rosa

- pimpinellifolia. 437
cinnamomea . . 438
gallica . . . 439
centifolia . . . 460
pomifera . . . 461
tomentosa . . . 462
lutea . . . 463
rubiginosa . . . 464
mierantha . . . 465
tomentella . . . 466
campestris . . . 467
canina . . . 468
arvensis . . . 469

Agrimonia

- Eupatoria . . . 470
canescens β . . 470
acutifolia γ . . 470
odorata . . . 471

Alchemilla

- vulgaris . . . 472
arvensis . . . 473

Sanguisorba

- officinalis . . . 474

Poterium

- dietyocarpum . 475
muricatum . . . 476

Crataegus

- monogyna . . . 479

Cydonia

- japonica . . . 484

Sorbus

- domestica . . . 489
aucuparia . . . 490

Philadelphus

- coronarius . . . 493

Calycanthus

- floridus . . . 494

Epilobium

- angustifolium . 495

Epilobium

- hirsutum . . . 496
parviflorum . . 497
lanceolatum . . 498
montanum . . . 499
nutans β . . . 499
roseum . . . 500
tetragonum . . 501
palustre . . . 503
decumbens β . . 503

Oenanthera

- biennis . . . 504

Clethra

- lutetiana . . . 506
alpina . . . 507

Myriophyllum

- verticillatum . 509
spicatum . . . 510
alternifolium . 511

Santula

- europaea . . . 513

Astrantha

- major . . . 514

Dupleurum

- rotundifolium . 516

Aegopodium

- Podagraria . . . 519

Carum

- Bulbocastanum 520
Carvi . . . 521

Petroselinum

- sativum . . . 522

Heloscladum

- nodiflorum . . 524
inundatum . . . 525

Pimpinella

- magna . . . 528

Oenanthe

- fistulosa . . . 532
peucedanifolia. 533

Meum

- athamanticum. 539

Levisticum

- officinale . . . 541

Peucedanum

- Chabraci . . . 545

Heracleum

- Spondylium . . 552

Tordylium

- maximum . . . 553

Laserpitium

- latifolium . . . 554

Daucus

- Carota . . . 555

Oriola

- grandiflora . . 556

Turgenia

- latifolia . . . 557

Caucalis

- daucoides . . . 558
Leptophylla . . 559

Torilis

- Anthriscus . . 561
nodosa . . . 562

Anthriscus

- Cerfolium . . . 563
silvestris . . . 564

Chærophyllum

- temulum . . . 565

Myrrhis

- odorata . . . 568

Scandix

- Pecten-Veneris. 569

Conium

- maculatum . . . 570

Corlandrum

- sativum . . . 571

Cornus

- sanguinea . . . 573

Saxifraga

- granulata . . . 581
sponhemica β . . 582
hypnoides . . . 583

Chrysosplenium

- alternifolium . 584
oppositifolium . 585

Erica

- Tetralix . . . 586

Lysimachia

- Nummularia . . 592
nemorosum . . . 593
vulgaris . . . 595

Centunculus		Myosotis		Veronica	
minimus . . .	596	versicolor . . .	643	Anagallis . . .	679
Anagallis		stricta . . .	644	Beccabunga . . .	680
arvensis . . .	597	sparsiflora . . .	645	Chamaedrys . . .	681
Armeria		Lithospermum		montana . . .	682
elongata . . .	598	officinale . . .	646	officinalis . . .	683
Plantago		purpureo-cœruleum	647	prostrata . . .	684
major . . .	599	arvense . . .	648	Teucrium . . .	685
intermedia β . . .	599	Pulmonaria		serpyllifolia . . .	686
minima γ . . .	599	angustifolia . . .	650	peregrina . . .	687
media . . .	600	Echium		arvensis . . .	689
lanceolata . . .	601	vulgare . . .	652	triphyllus . . .	691
Ilex		Echinospermum		agrestis . . .	693
aquifolium . . .	603	Lappula . . .	653	hederæfolia . . .	697
Ligustrum		Cynoglossum		Limosella	
vulgare . . .	604	officinale . . .	654	aquatica . . .	698
Syringa		Asperugo		Scrophularia	
vulgaris . . .	607	procumbens . . .	656	nodosa . . .	699
persica . . .	608	Heliotropium		Erharti . . .	700
Vinca		europæum . . .	657	Neesii . . .	701
minor . . .	610	Solanum		aquatica . . .	702
Vincetoxicum		Dulcamara . . .	658	vernalis . . .	703
officinale . . .	612	nigrum . . .	659	Gratiola	
Cleodtia		tuberosum . . .	660	officinalis . . .	704
filiformis . . .	623	Capsicum		Digitalis	
Polemonium		annuum . . .	661	purpurea . . .	705
cœruleum . . .	626	Lycopersicum		lutea . . .	706
Convolvulus		esculentum . . .	662	purpureo-lutea . . .	707
arvensis . . .	627	Physalis		ambigua . . .	708
sepium . . .	628	Alkekengi . . .	663	ambiguo-lutea . . .	709
pubescens . . .	628b	Atropa		Anthriscinum	
Cuscuta		Belladonna . . .	664	Orontium . . .	710
major . . .	631	Lycium		majus . . .	711
Rorago		barbarum . . .	665	Linaria	
officinalis . . .	633	Hyoscyamus		arvensis . . .	714
Achusa		niger . . .	668	Cymbalaria . . .	717
officinalis . . .	634	Verbascum		Pedicularis	
Lycopsis		Thapsus . . .	669	palustris . . .	720
arvensis . . .	635	thapsiforme . . .	670	silvatica . . .	721
Symphytum		phlomisoides . . .	671	Rhinanthus	
officinale . . .	636	montanum . . .	672	major . . .	722
Myosotis		pulverulentum . . .	673	minor . . .	723
palustris . . .	637	Lychnitis . . .	675	Alectorolophus . . .	724
strigulosa . . .	638	nigrum . . .	676	Melampyrum	
cæspitosa . . .	639	nigro-floccosum . . .	677	cristatum . . .	726
silvatica . . .	640	Veronica		arvense . . .	727
intermedia . . .	641	scutellata . . .	678	pratense . . .	728
hispida . . .	642				

Odontites		Betonica		Cucurbita	
rubra . . .	731	officinalis . . .	794	maxima . . .	837
Utricularia		Marrubium		Pepo . . .	838
vulgaris . . .	734	vulgare . . .	795	Sambucus	
Phellipæa		Ballota		nigra . . .	841
cœrulea . . .	735	nigra . . .	796	Viburnum	
Orobanchæ		Leonurus		Opulus . . .	844
Rapum . . .	737	Cardiaca . . .	797	Lonicera	
elatior . . .	738	Marrubiastrum . . .	798	Xylosteum . . .	845
Galii . . .	739	Scutellaria		Periclymenum . . .	846
Epithymum . . .	740	galericulata . . .	802	caprifolium . . .	847
Teucrii . . .	741	Ajuga		Sherardia	
alsatica . . .	742	reptans . . .	804	arvensis . . .	849
minor . . .	743	pyramidalis . . .	805	Asperula	
Lavandula		genevensis . . .	806	arvensis . . .	850
vera . . .	745	Chamæpitys . . .	807	odorata . . .	851
Ocimum		Teucrium		Cynanchica . . .	852
Basilicum . . .	746	Scordium . . .	810	Gallium	
Mentha		montanum . . .	812	Cruciata . . .	854
gentilis . . .	750	Verbena		verum . . .	855
Salvia		officinalis . . .	813	silvaticum . . .	856
pratensis . . .	758	Vaccinium		Mollugo . . .	857
officinalis . . .	760	Vitis-idaea . . .	814	erectum . . .	858
Thymus		Oxycoecos		silvestre . . .	859
Serpyllum . . .	763	palustris . . .	816	palustre . . .	861
Chamædryas . . .	764	Campanula		uliginosum . . .	862
vulgaris . . .	765	Rapunculus . . .	817	Aparine . . .	863
Calamintha		persicifolia . . .	818	Centranthus	
Acinos . . .	767	glomerata . . .	824	ruber . . .	865
grandiflora . . .	769	patula . . .	826	Valeriana	
Melissa		Specularia		Phu . . .	867
officinalis . . .	771	speculum . . .	827	dioica . . .	868
Nepeta		hybrida . . .	828	Valerianella	
Cataria . . .	773	Phytolacca		olitoria . . .	869
Lamium		orbiculare . . .	829	carinata . . .	870
amplexicaule . . .	775	spicatum . . .	830	auricula . . .	871
incisum . . .	776	Jasione		Morisonii . . .	872
purpureum . . .	777	montana . . .	831	eriocarpa . . .	873
album . . .	778	perennis . . .	832	vesicaria . . .	875
maculatum . . .	779	Wahlenbergia		Knautia	
Galchobdolon		hederacea . . .	833	arvensis . . .	879
luteum . . .	780	Bryonia		silvatica . . .	880
Galcopsis		dioica . . .	834	Dipsacus	
ochroleuca . . .	783	Cucumis		pilosus . . .	883
Stachys		sativa . . .	835	Onopordon	
silvatica . . .	788	Melo . . .	836	Acanthium . . .	884
recta . . .	793				

Cirsium		Arnosceris		Hieracium	
lanceolatum . . .	887	minima . . .	988	vulgatum . . .	1035
palustre . . .	889	Hypochaeris		tridentatum . .	1036
arvense . . .	891	maculata . . .	993	Polygonum	
Carduus		Leontodon		arvense . . .	1045
tenuiflorus . . .	893	hispidus . . .	995	Spinacla	
multiflorus . . .	894	hastilis . . .	996	glabra . . .	1051
nutans . . .	896	Tragopogon		oleracea . . .	1052
acanthoides . . .	897	porrifolius . .	1000	Chenopodium	
Silybum		major . . .	1001	polyspermum . .	1054
marianum . . .	898	orientalis . . .	1002	Rumex	
Centaurea		pratensis . . .	1003	scutatus . . .	1066
Cyanus . . .	906	Scorzonera		Acetosa . . .	1067
Scabiosa . . .	908	humilis . . .	1004	Acetosella . . .	1068
Achillea		hispanica . . .	1005	obtusifolius . .	1069
Millefolium . . .	921	Podospermum		sanguineus . . .	1073
Anthemis		laciniatum . . .	1006	crispus . . .	1074
arvensis . . .	924	calceitrapifolium	1007	Patientia . . .	1075
Cotula . . .	925	muricatum . . .	1008	Polygonum	
Matricaria		Taraxacum		cuspidatum . . .	1078
Chamomilla . . .	927	officinale . . .	1009	Bistorta . . .	1079
inodora . . .	928	paludosum . . .	1010	amphibium . . .	1080
Pyrethrum		Chondrilla		lapathifolium .	1081
Leucanthemum .	929	junceae . . .	1011	aviculare . . .	1086
Parthenium . . .	930	Lactuca		Bellardi . . .	1087
corymbosum . . .	931	muralis . . .	1013	Fagopyrum	
Chrysanthemum		perennis . . .	1014	esculentum . . .	1090
segetum . . .	933	saligna . . .	1015	tataricum . . .	1091
Bellis		Scariola . . .	1016	Urtica	
perennis . . .	934	sativa . . .	1017	dioica . . .	1098
Arthemisia		Sonchus		urens . . .	1099
Dracunculus . .	935	oleraceus . . .	1019	Parietaria	
Calendula		Barkhausia		officinalis . . .	1100
arvensis . . .	943	foetida . . .	1022	ramiflora . . .	1101
Micropus		taraxacifolia .	1023	Eleagnus	
erectus . . .	945	Crepis		angustifolius .	1104
Antennaria		præmorsa . . .	1024	Hippuris	
dioica . . .	950	pulehra . . .	1025	vulgaris . . .	1106
Inula		paludosa . . .	1026	Thesium	
salicina . . .	958	biennis . . .	1027	pratense . . .	1107
Arnica		tectorum . . .	1028	Aristolochia	
montana . . .	971	virens . . .	1029	Clematitis . . .	1109
Senecio		Hieracium		Sipho . . .	1110
vulgaris . . .	973	Pilosella . . .	1030	Euphorbia	
viscosus . . .	974	Auricula . . .	1031	Lathyris . . .	1111
aquaticus . . .	978	præaltum . . .	1032	amygdaloides . .	1112
Lampsana		caespitosum . .	1033	helioscopia . . .	1114
communis . . .	987	murorum . . .	1034	exigua . . .	1115

Euphorbia		Muscari		Gymnadenia	
dulcis . . .	1116	comosum . . .	1218	conopsea . . .	1261
verrucosa . . .	1117	Phalangium		odoratissima . . .	1262
stricta . . .	1119	ramosum . . .	1219	albida . . .	1263
Gerardiana . . .	1120	Liliago . . .	1220	viridis . . .	1264
Cyparissias . . .	1121	Hemerocallis		Platanthera	
Esula . . .	1122	flava . . .	1222	bifolia . . .	1265
Mercurialis		Asparagus		chlorantha . . .	1266
annua . . .	1123	officinalis . . .	1224	Limodorum	
Callitriche		Convallaria		abortivum . . .	1268
stagnalis . . .	1126	maialis . . .	1225	Cephalanthera	
vernalis . . .	1127	Polygonatum		grandiflora . . .	1269
hamulata . . .	1128	verticillatum . . .	1226	Xylophyllum . . .	1270
Castanea		multiflorum . . .	1227	rubra . . .	1271
sativa . . .	1133	officinale . . .	1228	Epipactis	
Salix		Maianthemum		palustris . . .	1273
pentandra . . .	1141	bifolium . . .	1229	Neottia	
Pinus		Leucolum		Nidus-avis . . .	1274
silvestris . . .	1171	vernum . . .	1237	Elstera	
Picea		Aceras		ovata . . .	1275
excelsa . . .	1176	anthropophora . . .	1239	Cypripedium	
Juniperus		Loroglossum		Calceolus . . .	1277
Sabina . . .	1181	hircinum . . .	1240	Triglochin	
Allium		Anacamptis		palustris . . .	1278
Plantago . . .	1185	pyramidalis . . .	1241	Potamogeton	
natans . . .	1186	Ochlis		natans . . .	1279
Sagittaria		ustulata . . .	1242	polygonifolius . . .	1280
sagittæfolia . . .	1187	tridentata . . .	1243	alpinus . . .	1282
Rutomus		purpurea . . .	1244	gramineus . . .	1283
umbellatus . . .	1188	militaris . . .	1245	heterophyllus β . . .	1283
Tulipa		Simia . . .	1246	lucens . . .	1284
silvestris . . .	1190	coriophora . . .	1247	perfoliatus . . .	1285
Gesneriana . . .	1191	Morio . . .	1248	erispus . . .	1286
Lilium		pallens . . .	1249	densus . . .	1287
candidum . . .	1194	mascula . . .	1250	obtusifolius . . .	1289
Ornithogalum		laxiflora . . .	1251	pusillus . . .	1290
pyrenaicum . . .	1195	maculata . . .	1252	pectinatus . . .	1291
umbellatum . . .	1196	latifolia . . .	1253	Zannichellia	
Allium		sambucina . . .	1254	palustris . . .	1292
Porrum . . .	1207	incarnata . . .	1255	Lemna	
vineale . . .	1210	Ophrys		minor . . .	1295
oleraceum . . .	1211	muscifera . . .	1256	gibba . . .	1296
complanatum . . .	1212	aranifera . . .	1257	polyrrhiza . . .	1297
Schœnoprassum . . .	1214	fusciflora . . .	1258	Arum	
Ascalonium . . .	1215	apifera . . .	1259	maculatum . . .	1298
Cepa . . .	1216	Hemelinium		Calla	
fistulosum . . .	1217	Monorchis . . .	1260	palustris . . .	1299

Acorus

Calamus . . 1300

Thypha

latifolia . . 1301

angustifolia . . 1302

Sparganium

ramosum . . 1303

simplex . . 1304

Juncus

conglomeratus 1305

effusus . . 1306

glaucus . . 1307

filiformis . . 1308

silvaticus . . 1309

obtusiflorus . . 1311

squarrosus. . . 1313

compressus . . 1314

Tenageia . . 1315

bufonius . . 1316

Luzula

angustifolia . . 1318

silvatica . . 1319

Carex

pulcaris . . 1322

disticha . . 1323

vulpina . . 1324

muricata . . 1325

divulsa . . 1326

teretiuscula . . 1327

paniculata. . . 1328

paradoxa . . 1329

brizoides . . 1331

remota . . 1332

echinata . . 1333

leporina . . 1334

elongata . . 1335

canescens . . 1336

stricta . . 1337

Goodenoughii . 1339

tomentosa . . 1342

panicea . . 1348

pendula . . 1350

pallescens . . 1351

flava . . 1352

Oederi . . 1353

distans . . 1354

Hornschuchiana 1355

Carex

fulva . . 1356

binervis . . 1357

lexigata . . 1358

silvatica . . 1359

Pseudo-Cyperus 1360

rostrata . . 1361

vesicaria . . 1362

riparia . . 1364

hirta . . 1365

Heloccharis

palustris . . 1367

acicularis . . 1368

Scirpus

pauciflorus. . . 1369

caespitosus. . . 1370

setaceus . . 1371

lacustris . . 1372

maritimus. . . 1374

silvaticus . . 1375

compressus . . 1376

Eriophorum

gracile . . 1380

Zea

Mays . . 1383

Anthoxanthum

odoratum . . 1385

Hierochloa

odorata . . 1386

Phalaris

canariensis . . 1387

Balclutha

arundinacea . . 1388

Oplismenus

Crus-galli. . . 1389

Digitaria

sanguinalis . . 1390

Setaria

viridis . . 1393

Alopecurus

agrestis . . 1397

pratensis . . 1398

utriculatus. . . 1399

fulvus . . 1400

geniculatus . . 1401

Phleum

pratense . . 1402

Phleum

Boehmeri . . 1403

Agrostis

vulgaris . . 1404

alba . . 1405

canina . . 1406

Apera

Spica-venti . . 1407

interrupta . . 1408

Millium

effusum . . 1413

Stipa

pinnata . . 1414

Alra

caryophyllea . . 1417

præcox . . 1418

Deschampsia

caespitosa . . 1419

flexuosa . . 1420

Avena

sativa . . 1423

fatua . . 1427

barbata . . 1428

pubescens . . 1429

pratensis . . 1430

flavescens . . 1431

Arrhenantherum

elatus . . 1432

Holcus

lanatus . . 1433

mollis . . 1434

Sieglingia

decumbens . . 1436

Koeleria

cristata . . 1437

Cynosurus

cristatus . . 1440

Melica

ciliata . . 1441

uniflora . . 1442

nutans . . 1443

Catabrosa

aquatica . . 1445

Glyceria

fluitans . . 1446

plicata . . 1447

aquatica . . 1448

Glyceria

maritima . . 1449

Briza

media . . 1450

maxima . . 1451

Sclerochloa

dura . . 1452

Poa

annua . . 1453

bulbosa . . 1454

nemoralis . . 1455

serotina . . 1456

Chaixii . . 1457

trivialis . . 1458

pratensis . . 1459

compressus . . 1460

Dactylis

glomerata . . 1461

Bromus

sterilis . . 1462

tectorum . . 1463

asper . . 1464

erectus . . 1465

inermis . . 1466

arvensis . . 1467

Bromus

patulus . . 1468

mollis . . 1469

racemosus . . 1470

commutatus . . 1471

secalinus . . 1472

grossus . . 1473

arduennensis . . 1474

Schraderi . . 1475

Festuca

rigida . . 1476

bromoides . . 1477

sciuroides . . 1478

Pseudo-Myuros . . 1479

rubra . . 1480

heterophylla . . 1481

duriuscula . . 1482

ovina . . 1483

elatior . . 1484

loliacea . . 1485

arundinacea . . 1486

silvatica . . 1487

gigantea . . 1488

Brachypodium

pinnatum . . 1490

Lolium

perenne . . 1491

italicum . . 1492

multiflorum . . 1493

temulentum . . 1494

remotum . . 1495

Hordeum

murinum . . 1496

secalinum . . 1497

distichum . . 1498

zeocrithon . . 1499

vulgare . . 1500

hexastichon . . 1501

Elymus

europæus . . 1502

Secale

cereale . . 1503

Triticum

turgidum . . 1506

monococcum . . 1508

repens . . 1509

caninum . . 1510

Nardus

stricta . . 1511

JUILLET.

Clematis

Vitalba . . 1

recta . . 2

Talictum

minus . . 3

saxatile β . . 3

majus . . 4

elatum β . . 4

flavum . . 5

Adonis

autumnalis . . 11

æstivalis . . 12

flava β . . 12

flammea . . 13

Ranunculus

hederaceus . . 15

aquatilis . . 16

tripartitus . . 17

trichophyllus . . 18

Ranunculus

fluitans . . 19

divaricatus . . 20

sceleratus . . 21

Flammula . . 23

Lingua . . 24

acris . . 26

repens . . 29

bulbosus . . 30

sardous . . 31

parvulus β . . 31

arvensis . . 33

inermis β . . 33**Nigella**

arvensis . . 40

damascena . . 41

sativa . . 42

Aquilegia

vulgaris . . 43

Delphinium

Consolida . . 44

Ajacis . . 45

Aconitum

lycoctonum . . 46

Napellus . . 47

Gypsophylla

muratis . . 52

Dianthus

prolifer . . 53

diminutus β . . 53

Armeria . . 51

Carthusianorum . . 52

Caryophyllus . . 56

deltoides . . 58

glaucus β . . 58

cæsius . . 59

plumarius . . 60

Saponaria		Malachium		Ampelopsis	
Vaccaria . . .	61	arenaria β . .	104	hederacea . . .	151
officinalis . . .	62	Elatine		Monotropa	
Cucubalus		Alsinastrium . .	105	hypopitys . . .	154
baccifer . . .	63	Linum		Hypericum	
Silene		catharticum . .	106	perforatum . . .	155
inflata . . .	64	tenuifolium . .	107	humifusum . . .	156
conica . . .	65	usitatissimum .	108	quadrangulum .	157
conoidea . . .	66	Radiola		tetraphyllum . .	158
gallica . . .	68	linoides . . .	109	pulehrum . . .	159
noctiflora . . .	69	Oxalis		montanum . . .	160
Armeria . . .	70	stricta . . .	111	hirsutum . . .	161
Melandryum		Ruta		Drosera	
silvestre . . .	71	graveolens . . .	112	rotundifolia . .	162
pratense . . .	72	Impatiens		longifolia . . .	163
Lychuis		noli-tangere . .	114	Pyrola	
chalconica . . .	73	Balsamina . . .	115	rotundifolia . .	165
Flos-Cuculi . .	74	Geranium		minor . . .	166
tomentosa . . .	75	pratense . . .	118	Roseda	
Githago . . .	77	palustre . . .	119	luteola . . .	167
Spergularia		sanguineum . .	120	lutea . . .	168
segetalis . . .	78	columbinum . .	121	odorata . . .	169
rubra . . .	79	dissectum . . .	122	Nuphar	
Spergula		molle . . .	123	luteum . . .	170
arvensis . . .	80	pusillum . . .	124	Nymphaea	
Sagina		rotundifolium .	125	alba . . .	171
procumbens . .	82	Robertianum . .	126	Papaver	
apetala . . .	83	Erodium		somniferum . .	172
saxatilis β . . .	83	Cicutarium . .	127	setigerum β . .	172
ciliata . . .	84	pimpinellæfolium	128	Rhœas . . .	173
depressa β . .	84	Malva		Argemone . . .	175
Alsine		Alcea . . .	129	dubium . . .	176
tenuifolia . . .	85	moschata . . .	130	Lecoquii . . .	177
viscosa . . .	86	silvestris . . .	131	Chelidonium	
Arenaria		rotundifolia . .	132	majus . . .	178
serpyllifolia . .	89	crispa . . .	133	Glaucium	
Stellaria		Altea		flavum . . .	179
media . . .	91	officinalis . . .	134	Eschscholtzia	
Holostea . . .	92	hirsuta . . .	135	californica . . .	180
glauca . . .	93	rosea . . .	136	Corydalis	
graminea . . .	94	Hibiscus		lutea . . .	182
uliginosa . . .	95	Trionum . . .	137	Fumaria	
Cerastium		Tilia		officinalis . . .	183
cæspitosum . .	96	platyphyllos . .	139	tenuifolia . . .	184
brachypetalum	100	silvestris . . .	140	parviflora . . .	186
Malachium		Polygala		capreolata . . .	187
aquaticum . . .	104	comosa . . .	142		

Barbarea		Canellina		Trigonella	
striata . . .	193	silvestris . . .	241	Fœnum-græcum . . .	292
Arabis		sativa . . .	242	Robinia	
hirsuta . . .	195	dentata . . .	243	pseudo-acacia . . .	293
sagittata . . .	196	Thlaspi		umbraculifera β . . .	293
arenosa . . .	197	arvense . . .	243	Galega	
Cordamine		Theris		officinalis . . .	295
silvatica . . .	202	amara . . .	249	Astragalus	
Nasturtium		Capsella		glycyphyllos . . .	297
officinale . . .	204	Bursa pastoris . . .	250	Mellilotus	
silvestre . . .	205	Lepidium		arvensis . . .	298
amphibium . . .	206	sativum . . .	251	macrorrhiza . . .	299
palustre . . .	207	campestre . . .	252	leucantha . . .	300
Turritis		graminifolium . . .	253	alba . . .	301
glabra . . .	208	rudérale . . .	254	parviflora . . .	302
Sisymbrium		Senebiera		cœrulea . . .	303
officinale . . .	211	Coronopus . . .	256	Medicago	
Sophia . . .	212	Hellanthemum		lupulina . . .	304
Braya		Chamæcistus . . .	260	Willdenowii β . . .	304
supina . . .	213	polifolium . . .	261	falcata . . .	305
Erysimum		Viola		sativa . . .	306
cheiranthoides . . .	214	tricolor . . .	270	minima . . .	308
hieracifolium . . .	215	Altaica . . .	271	Echinus . . .	309
virgatum . . .	216	elatior . . .	272	maculata . . .	310
Diplotaxis		rothomagensis . . .	273	Trifolium	
tenuifolia . . .	219	intermedia . . .	274	filiforme . . .	312
muralis . . .	220	Rhamnus		procumbens . . .	313
Erucastrum		frangula . . .	276	aureum . . .	314
obtusangulum . . .	221	Cytisus		agrarium . . .	315
Brassica		laburnum . . .	278	majus α . . .	315
nigra . . .	225	Genista		minus β . . .	315
Sinapis		anglica . . .	279b	pratense . . .	316
arvensis . . .	226	sagittalis . . .	280	sativum β . . .	316
alba . . .	227	tinctoria . . .	281	medium . . .	317
Cheiranthus . . .	228	pilosa . . .	282	alpestre . . .	318
Raphanus		juncea . . .	283	ochroleucum . . .	319
Raphanistrum . . .	229	Lupinus		rubens . . .	320
Lunaria		luteus . . .	284	incarnatum . . .	321
rediviva . . .	231	angustifolius . . .	285	arvense . . .	322
Alyssum		Ononis		striatum . . .	323
campestre . . .	234	spinosa . . .	287	montanum . . .	324
Berteroa		repens . . .	288	repens . . .	325
incana . . .	236	Anthyllis		hybridum . . .	326
Cochlearia		vulneraria . . .	289	fragiferum . . .	327
Armoracia . . .	239	Lotus		Phaseolus	
officinalis . . .	240	corniculatus . . .	290	vulgaris . . .	328
		uliginosus . . .	291	multiflorum . . .	329

Viola

Cracca . .	332
tenuifolia . .	333
onobrychioides	334
sepium . .	335
sativa . .	337
angustifolia .	338

Ervum

hirsutum . .	340
tetraspermum.	341
gracile . .	342
monanthos. .	343
Ervilia . .	344
Lens . .	345

Faba

vulgaris . .	346
--------------	-----

Pisum

sativum . .	347
arvense . .	348

Lathyrus

Aphaca . .	349
Nissolia . .	350
sativus . .	351
hirsutus . .	352
tuberosus . .	353
pratensis . .	354
silvestris . .	355
odoratus . .	356
latifolius . .	357

Orobis

tuberosus . .	358
niger . .	359

Coronilla

Emerus . .	361
varia . .	362

Ornithopus

perpusillus .	363
sativus . .	364

Hippocrepis

comosa . .	365
------------	-----

Lythrum

salicaria . .	367
hyssopifolia .	368

Pepils

Portula . .	369
-------------	-----

Portulaca

oleracea . .	370
--------------	-----

Perfulaca

sativa . .	371
------------	-----

Montia

rivularis . .	373
---------------	-----

Corrigiola

litoralis . .	374
---------------	-----

Herniaria

glabra . .	375
hirsuta . .	376

Scleranthus

annuus . .	377
perennis . .	378

Crassula

rubens . .	379
------------	-----

Sedum

aere . .	380
sexangulare. .	381
boloniense. .	382
reflexum . .	383
glaucescens β .	383
aureum . .	384
treviricum. .	385
album . .	386
maximum . .	387
purpurascens .	388

Sempervivum

tectorum . .	389
--------------	-----

Spiraea

Filipendula .	402
Ulmaria . .	403
salicifolia . .	404
hypericifolia .	405

Kerria

japonica . .	407
--------------	-----

Rubus

fruticosus . .	408
cæsius . .	431
Idæus . .	433
odoratus . .	434

Geum

urbanum . .	435
rivale . .	436
rivali-urbanum	437
urbano-rivale.	438

Potentilla

reptans . .	448
alpestris . .	449

Potentilla

Anserina . .	450
rupestris . .	451
supina . .	452
argentea . .	453
recta . .	454

Tormentilla

procumbens .	455
silvestris . .	456

Rosa

pimpinellifolia .	457
arvensis . .	469

Agriumonia

Eupatoria . .	470
canescens β .	470
aculifolia γ .	470
odorata . .	471

Achemilla

vulgaris . .	472
arvensis . .	473

Sanguisorba

officinalis . .	474
-----------------	-----

Poterium

dictyocarpum .	475
muricatum . .	476

Calycanthus

floridus . .	494
--------------	-----

Epilobium

angustifolium .	495
hirsutum . .	496
parviflorum. .	497
lanceolatum. .	498
montanum . .	499
nutans β . .	499
roseum . .	500
tetragonum. .	501
obseurum . .	502
palustre . .	503
decumbens β .	503

Oenanthera

biennis . .	504
-------------	-----

Isnardia

palustris . .	505
---------------	-----

Circea

lutetiana . .	506
intermedia . .	507
alpina . .	508

Myriophyllum		Silva		Conium	
verticillatum . . .	509	pratensis . . .	540	maculatum . . .	570
spicatum . . .	510	Levisticum		Coriandrum	
alternifolium . . .	511	officinale . . .	541	sativum . . .	571
Hydrocotyle		Sellum		Erice	
vulgaris . . .	512	carvifolium . . .	542	Tetralix . . .	586
Eryngium		Angelica		Calluna	
campestris. . .	515	silvestris . . .	543	vulgaris . . .	587
Hupleurum		Archangelica		Lysimachia	
rotundifolium. . .	516	officinalis . . .	544	Nummularia . . .	592
falcatum . . .	517	Peucedanum		nemorum . . .	593
Falcaria		Chabraci . . .	545	punctata . . .	594
vulgaris . . .	518	Cervaria . . .	546	vulgaris . . .	595
Aegopodium		palustre . . .	547	Centunculus	
Podagraria . . .	519	Oreoselinum . . .	548	minimus . . .	596
Carum		Anethum		Anagallis	
Bulbocastanum . . .	520	graveolens. . .	549	arvensis . . .	597
Petroselinum		Pastinaca		Armeria	
sativum . . .	522	silvestris . . .	550	elongata . . .	598
Aptum		sativa . . .	551	Plantago	
graveolens. . .	523	Heracleum		major . . .	599
Meloschladium		Spondylium . . .	552	intermedia β . . .	599
nodiflorum. . .	524	Tordylium		minima γ . . .	599
inundatum. . .	525	maximum . . .	553	media . . .	600
Slum		Laserpitium		lanceolata . . .	601
latifolium . . .	526	latifolium . . .	554	Arenaria . . .	602
angustifolium . . .	527	Daucus		Ligustrum	
Plimphella		Carota . . .	555	vulgare . . .	604
magna . . .	528	Orlaya		Vincetoxicum	
saxifraga . . .	529	grandiflora . . .	556	officinale . . .	612
Anisum . . .	530	Turgenia		Aselepias	
Aethusa		latifolia . . .	557	syriaca . . .	613
cynapium . . .	531	Caucalis		Limnanthemum	
Oenanthe		daucoides . . .	558	nymphæoides . . .	615
fistulosa . . .	532	Leptophylla . . .	559	Gentiana	
peucedanifolia. . .	533	Torilis		cruciata . . .	616
Phellandrium . . .	534	Anthriscus. . .	560	Pneumonanthe . . .	617
Libanotis		infesta . . .	561	ciliata . . .	621
montana . . .	535	nodosa . . .	562	acaulis . . .	622
Sesell		Anthriscus		Cleodra	
annuum . . .	536	Cerefolium . . .	563	filiformis . . .	623
montanum. . .	537	Cherophyllum		Erlthrea	
Feniculum		temulum . . .	565	Centaurium. . .	624
officinale . . .	538	bulbosum . . .	566	pulchella . . .	625
Meum		hirsutum . . .	567	Polemonium	
athamanticum. . .	539	Myrrhis		cœrulum . . .	626
		odorata . . .	568		

Convolvulus		Verbascum		Melampyrum	
arvensis . . .	627	Thapsus . . .	669	cristatum . . .	726
sepium . . .	628	thapsiforme . .	670	arvense . . .	727
Cuscuta		phlomoïdes . .	671	pratense . . .	728
Epilinum . . .	630	montanum. . .	672	Euphrasia	
major . . .	631	pulverulentum .	673	officinalis . . .	729
Epitymum. . .	632	floccosum . . .	674	nemorosa . . .	730
Borago		Lychnitis . . .	675	Odontites	
officinalis . . .	633	nigrum . . .	676	rubra . . .	731
Lycopsis		nigro-floccosum	677	serotina . . .	732
arvensis . . .	635	Veronica		lutea . . .	733
Myosotis		scutellata . . .	678	Utricularia	
palustris . . .	637	Anagallis . . .	679	vulgaris . . .	734
strigulosa . . .	638	Beccabunga . .	680	Phelippen	
cæspitosa . . .	639	montana . . .	682	cærulea . . .	735
silvatica . . .	640	officinalis . . .	683	ramosa . . .	736
intermedia. . .	641	prostrata . . .	684	Orbanche	
Lithospermum		Teucrium . . .	685	Galii . . .	739
officinale . . .	646	serpyllifolia . .	686	Epithymum. . .	740
purpureo-cæruleum	647	arvensis . . .	689	Teucrii . . .	741
arvense . . .	648	agrestis . . .	690	minor . . .	743
Echium		Limosella		Lavandula	
vulgare . . .	652	aquatica . . .	698	vera . . .	745
Echinospermum		Scrophularia		Ocimum	
Lappula . . .	653	nodosa . . .	699	Basilicum . . .	746
Cynoglossum		Erharti . . .	700	Mentha	
officinale . . .	654	Neesii . . .	701	silvestris . . .	747
Asperugo		aquatica . . .	702	rotundifolia. .	748
procumbens . .	656	vernalis . . .	703	viridis . . .	749
Hellotrophum		Gratiola		gentilis . . .	750
europæum. . .	657	officinalis . . .	704	pubescens . . .	751
Solanum		Digitalis		piperita . . .	752
Dulcamara. . .	658	purpurea . . .	705	aquatica . . .	753
nigrum . . .	659	lutea . . .	706	arvensis . . .	754
tuberosum. . .	660	purpureo-lutea	707	Pulegium . . .	755
Physalis		ambigua . . .	708	Lycopus	
Alkekengi . . .	663	ambiguo-lutea	709	europæus . . .	756
Atropa		Anthriscinum		Salvia	
Belladonna . . .	664	Orontium . . .	710	pratensis . . .	758
Lycium		majus . . .	711	Sclearea . . .	759
barbarum . . .	665	Linaria		officinalis . . .	760
Nicotiana		vulgaris . . .	712	Origanum	
rustica . . .	666	minor . . .	713	vulgare . . .	761
Datura		arvensis . . .	714	Majorana . . .	762
Stramonium . .	667	simplex . . .	715	Thymus	
Hyoscyamus		striata . . .	716	Serpyllum . . .	763
niger . . .	668			Chamædrys. . .	764

Thymus		Brucella		Simphoria	
vulgaris . . .	765	vulgaris . . .	799	racemosa . . .	848
Hyssopus		grandiflora . .	800	Sherardia	
officinalis . . .	766	alba . . .	801	arvensis . . .	849
Calamintha		Scutellaria		Asperula	
Acinos . . .	767	galericulata . .	802	arvensis . . .	850
officinalis . . .	768	minor . . .	803	Cynanchica . . .	852
grandiflora . .	769	Ajuga		galioides . . .	853
Clinopodium		genevensis. . .	806	Galium	
vulgare . . .	770	Chamaepitys . .	807	verum . . .	855
Melissa		Teucrium		silvaticum . . .	856
officinalis . . .	771	Scorodonia. . .	808	silvestre . . .	859
Satureia		Botrys . . .	809	saxatile . . .	860
hortensis . . .	772	Scordium . . .	810	uliginosum . . .	862
Nepeta		Chamaedrys . .	811	Aparine . . .	863
Cataria . . .	773	montanum. . .	812	tricornis . . .	864
Lamium		Verbena		Centranthus	
amplexicaule . .	775	officinalis . . .	813	ruber . . .	865
incisum . . .	776	Vaccinium		Valeriana	
purpureum . . .	777	Vitis-idaea. . .	814	officinalis . . .	866
album . . .	778	Oxycoccus		Valerianella	
maculatum . . .	779	palustris . . .	816	auricula . . .	871
Galeopsis		Campanula		Morisonii . . .	872
Tetrahit . . .	781	Rapunculus . . .	817	coronata . . .	874
speciosa . . .	782	persicaefolia . .	818	vesicaria . . .	875
ochroleuca. . .	783	pyramidalis . .	819	Scabiosa	
intermedia. . .	784	rotundifolia . .	820	Columbaria. . .	876
Ladanum . . .	785	rapunculoides. .	821	Succisa . . .	877
Stachys		Trachelium . . .	822	atropurpurea . .	878
germanica. . .	786	Medium . . .	823	Knautia	
alpina . . .	787	glomerata . . .	824	arvensis . . .	879
silvatica . . .	788	Cerriaria. . .	825	silvatica . . .	880
ambigua . . .	789	patula . . .	826	Dipsacus	
palustris . . .	790	Specularia		silvestris . . .	881
arvensis . . .	791	speculum . . .	827	Fullonum . . .	882
annua . . .	792	hybrida . . .	828	pilosus . . .	883
recta . . .	793	Phytolacca		Onopordon	
Betonica		orbiculare . . .	829	Acanthium . . .	884
officinalis . . .	794	Jasione		Carlina	
Marrubium		montana . . .	831	vulgare . . .	885
vulgare . . .	795	perennis . . .	832	Cirsium	
Ballota		Wahlenbergia		lanceolatum. . .	887
nigra . . .	796	hederacea . . .	833	eriphorum. . .	888
Leonurus		Lonicera		palustre . . .	889
Cardiaca . . .	797	Periclymenum. .	846	acaule . . .	890
Marrubiastrum .	798	caprifolium . .	847	arvense . . .	891
				oleracum . . .	892

Carduus		Pyrethrum		Stenactis	
tenuiflorus. . .	893	Leucanthemum . . .	929	arvensis . . .	964
multiflorus . . .	894	Parthenium . . .	930	Aster	
crispus . . .	895	corymbosum . . .	931	Amellus . . .	965
nutans . . .	896	Chrysanthemum		leucanthemum . . .	967
acanthoides . . .	897	segetum . . .	933	Arnica	
Silybum		Bellis		montana . . .	971
marianum. . .	898	perennis . . .	934	Senecio	
Lappa		Arthemisia		vulgaris . . .	973
officinalis . . .	899	vulgaris . . .	936	viscosus . . .	974
glabra . . .	900	Absinthium . . .	937	silvaticus . . .	975
racemosa . . .	901	campestris. . .	938	Jacobæa . . .	977
tomentosa . . .	902	pontica . . .	939	aquaticus . . .	978
Serratula		Tanantum		nemorensis . . .	979
tinctoria . . .	903	vulgare . . .	940	Sarracenicus . . .	980
Centaurea		Balsamita . . .	941	Fuchsii . . .	981
Calcitrapa . . .	904	Tajetes		ovatus . . .	982
solsitialis . . .	905	patula . . .	942	Eupatorium	
Cyanus . . .	906	Calendula		cannabinum. . .	984
montana . . .	907	arvensis . . .	943	Lampsana	
Scabiosa . . .	908	officinalis . . .	944	communis . . .	987
maculosa . . .	909	Micropus		Arnoscris	
Jacea . . .	910	erectus . . .	945	minima . . .	988
nigrescens. . .	911	Helichrysum		Cichorium	
phrygia . . .	912	arenarium. . .	946	Intybus . . .	989
nigra . . .	913	Gnaphalium		Endivia . . .	990
Echinops		silvaticum. . .	947	Hypochoeris	
speroccephalus. . .	914	luteo-album . . .	948	glabra . . .	991
Bidens		uliginosum . . .	949	radicata . . .	992
tripartitus. . .	915	Filago		maculata . . .	993
Helianthus		germanica. . .	951	Thrinicia	
annuus . . .	917	gallica . . .	952	hirta . . .	994
Madia		minima . . .	953	Leontodon	
sativa . . .	920	arvensis . . .	954	hispidus . . .	995
Achillea		Pulicaria		hastilis . . .	996
Millefolium . . .	921	dysenterica . . .	955	autumnalis . . .	997
Parnica . . .	922	vulgaris . . .	956	Picris	
Ormenis		Inula		hieracioides. . .	998
nobilis . . .	923	Conyza . . .	957	Helminthia	
Anthemis		salicina . . .	958	echioides . . .	999
arvensis . . .	924	britannica . . .	959	Tragopogon	
Cotula . . .	925	Solidago		porrifolius . . .	1000
tinctoria . . .	926	Virga-aurea . . .	960	major . . .	1001
Matricaria		Erigeron		orientalis . . .	1002
Chamomilla . . .	927	acre . . .	962	pratensis . . .	1003
inodora . . .	928	canadense. . .	963	Scorzonera	
				hispanica . . .	1005

Podospermum

- laciniatum . . 1006
 calcitrapifolium 1007
 muricatum . . 1008

Taraxacum

- officinale . . 1009
 paludosum . . 1010

Chondrilla

- junceae . . 1011

Prenanthes

- purpurea . . 1012

Lactuca

- muralis . . 1013
 perennis . . 1014
 saligna . . 1015
 Scariola . . 1016
 sativa . . 1017
 virosa . . 1018

Sonchus

- oleraceus . . 1019
 asper . . 1020
 arvensis . . 1021

Barkhausia

- foetida . . 1022
 taraxacifolia . 1023

Crepis

- paludosa . . 1026
 biennis . . 1027
 virens . . 1029

Hieracium

- Pilosella . . 1030
 Auricula . . 1031
 præaltum . . 1032
 cæspitosum . 1033
 murorum . . 1034
 vulgatum . . 1035
 tridentatum . 1036
 boreale . . 1038
 umbellatum . 1039

Xanthium

- strumarium . 1040

Amaranthus

- Blitum . . 1041
 retroflexus . 1042
 caudatus . . 1043
 paniculatus . 1044

Polycnemum

- arvense . . 1045

Atriplex

- hortense . . 1046
 nitens . . 1047
 tataricum . . 1048
 hastatum . . 1049
 patulum . . 1050

Spinacia

- glabra . . 1051
 oleracea . . 1052

Beta

- vulgaris . . 1053

Chenopodium

- polyspermum . 1054
 Vulvaria . . 1055
 album . . 1056
 hybridum . . 1057
 glaucum . . 1058
 urbicum . . 1059
 murale . . 1060
 opulifolium . 1061
 ficifolium . . 1062
 Scoparium . . 1063

Blitum

- Bonus-Henricus 1064
 rubrum . . 1065

Rumex

- scutatus . . 1066
 Acetosella . . 1068
 obtusifolius . 1069
 maritimus . . 1070
 palustris . . 1071
 conglomeratus 1072
 sanguineus . . 1073
 crispus . . 1074
 Patientia . . 1075
 hydrolapathum 1076
 maximus . . 1077

Polygonum

- cuspidatum . 1078
 Bistorta . . 1079
 amphibium . . 1080
 lapathifolium . 1081
 Persicaria . . 1082
 mite . . 1083
 minus . . 1084

Polygonum

- Hydropiper . . 1085
 aviculare . . 1086
 Bellardi . . 1087
 Convolvulus . 1088
 dumetorum . . 1089

Fagopyrum

- esculentum . . 1090
 tataricum . . 1091

Cannabis

- sativa . . 1094

Humulus

- Lupulus . . 1095

Urtica

- dioica . . 1098
 urens . . 1099

Parietaria

- officinalis . . 1100
 ramiflora . . 1101

Thymelæa

- Passerina . . 1103

Hippuris

- vulgaris . . 1106

Thesium

- pratense . . 1107

Aristolochia

- Clematitis . . 1109

Enphorbia

- Lathyris . . 1111
 Peplus . . 1113
 helioscopia . . 1114
 exigua . . 1115
 platyphyllos . 1118
 stricta . . 1119
 Gerardiana . . 1120
 Esula . . 1122

Mercurialis

- annua . . 1123

Callitriche

- slagnalis . . 1126
 vernalis . . 1127
 hamulata . . 1128

Ceratophyllum

- demersum . . 1129

Allsma

- Plantago . . 1185
 natans . . 1186

Sagittaria		Cephalanthera		Juncus	
sagittifolia . . .	1187	Xylophyllum . . .	1270	supinus . . .	1312
Butomus		rubra . . .	1271	squarrosus . . .	1313
umbellatus . . .	1188	Epipactis		compressus . . .	1314
Lilium		latifolia . . .	1272	Tenageia . . .	1315
bulbiforme . . .	1193	palustris . . .	1273	bufonius . . .	1316
candidum . . .	1194	Spiranthes		Luzula	
Allium		æstivalis . . .	1276	angustifolia . . .	1318
salivum . . .	1205	Triglochin		Carex	
Ophioscorodon . . .	1206	palustris . . .	1278	pulicaris . . .	1322
Porrum . . .	1207	Potamogeton		Rhynchospora	
rotundum . . .	1208	natans . . .	1279	alba . . .	1366
sphærocephalum . . .	1209	polygonifolius . . .	1280	Heleocharis	
vineale . . .	1210	fluitans . . .	1281	palustris . . .	1367
oleraceum . . .	1211	alpinus . . .	1282	acicularis . . .	1368
complanatum . . .	1212	gramineus . . .	1283	Scirpus	
carinatum . . .	1213	heterophyllus β . . .	1283	pauciflorus . . .	1369
Schœnoprasum . . .	1214	lucens . . .	1284	cæspitosus . . .	1370
Asealoniceum . . .	1215	perfoliatus . . .	1285	setaceus . . .	1371
Cepa . . .	1216	crispus . . .	1286	lacustris . . .	1372
fistulosum . . .	1217	densus . . .	1287	Polichii . . .	1373
Phalangium		compressus . . .	1288	maritimus . . .	1374
ramosum . . .	1219	obtusifolius . . .	1289	silvaticus . . .	1375
Narthecium		pusillus . . .	1290	compressus . . .	1376
ossifragum . . .	1221	pectinatus . . .	1291	Cyperus	
Hemerocallis		Zanulichella		flavescens . . .	1381
fulva . . .	1223	palustris . . .	1292	fuscus . . .	1382
Asparagus		Arum		Zea	
officinalis . . .	1224	maculatum . . .	1298	Mays . . .	1383
Loroglossum		Calla		Phalaris	
hircinum . . .	1240	palustris . . .	1299	canariensis . . .	1387
Orchis		Acorus		Baldingera	
laxiflora . . .	1251	Calamus . . .	1300	arundinacea . . .	1388
latifolia . . .	1253	Thypha		Opismenus	
Heminitum		latifolia . . .	1301	Crus-galli . . .	1389
Monorchis . . .	1260	angustifolia . . .	1302	Digitaria	
Gymnadenia		Sparganium		sanguinalis . . .	1390
conopsea . . .	1261	ramosum . . .	1303	filiformis . . .	1391
albida . . .	1263	simplex . . .	1304	Setaria	
viridis . . .	1264	Juncus		verticulata . . .	1392
Platanthera		conglomeratus . . .	1305	viridis . . .	1393
chlorantha . . .	1266	effusus . . .	1306	glauca . . .	1394
Epipogon		glauca . . .	1307	italica . . .	1395
aphyllus . . .	1267	filiformis . . .	1308	Panicum	
Limodorum		silvaticus . . .	1309	miliacum . . .	1396
abortivum . . .	1268	lamprocarpus . . .	1310	Alopecurus	
		obtusiflorus . . .	1311	agrestis . . .	1397

Alopecurus		Sieglingia		Bromus	
fulvus . . .	1400	decumbens . . .	1436	arduennensis . . .	1474
geniculatus . . .	1401	Koeleria		Schraderi . . .	1475
Phleum		cristata . . .	1437	Festuca	
pratense . . .	1402	Phragmites		brœmoides . . .	1477
Boehmeri . . .	1403	communis . . .	1438	sciuroides . . .	1478
Agrostis		Cyperium		Pseudo-Myuros . . .	1479
vulgaris . . .	1404	argentum . . .	1439	rubra . . .	1480
alba . . .	1405	Cynosurus		heterophylla . . .	1481
canina . . .	1406	cristatus . . .	1440	duriuscula . . .	1482
Apera		Melica		ovina . . .	1483
Spica-venti . . .	1407	ciliata . . .	1441	elatior . . .	1484
interrupta . . .	1408	Molinia		loliacea . . .	1485
Calamagrostis		cœrulea . . .	1444	arundinacea . . .	1486
lanceolata . . .	1409	Catabrosa		silvatica . . .	1487
epiguos . . .	1410	aquatica . . .	1445	gigantea . . .	1488
arundinacea . . .	1411	Glyceria		Brachypodium	
varia . . .	1412	fluitans . . .	1446	silvaticum . . .	1489
Milium		plicata . . .	1447	pinnatum . . .	1490
effusum . . .	1413	aquatica . . .	1448	Lolium	
Weingartneria		maritima . . .	1449	perenne . . .	1491
canescens . . .	1416	Briza		italicum . . .	1492
Deschampsia		media . . .	1450	multiflorum . . .	1493
caespitosa . . .	1419	Poa		temulentum . . .	1494
flexuosa . . .	1420	annua . . .	1453	remotum . . .	1495
discolor . . .	1421	nemoralis . . .	1455	Hordeum	
Avena		serotina . . .	1456	murinum . . .	1496
brevis . . .	1422	Chaixii . . .	1457	secalinum . . .	1497
sativa . . .	1423	trivialis . . .	1458	distichum . . .	1498
orientalis . . .	1424	pratensis . . .	1459	zeocrithon . . .	1499
strigosa . . .	1425	compressa . . .	1460	vulgare . . .	1500
nuda . . .	1426	Dactylis		hexastichon . . .	1501
fatua . . .	1427	glomerata . . .	1461	Elymus	
barbata . . .	1428	Bromus		europæus . . .	1502
pratensis . . .	1430	sterilis . . .	1462	Triticum	
flavescens . . .	1431	tectorum . . .	1463	vulgare . . .	1504
Arrhenatherum		asper . . .	1464	durum . . .	1505
elatius . . .	1432	inermis . . .	1466	turgidum . . .	1506
Holcus		arvensis . . .	1467	Spelta . . .	1507
lanatus . . .	1433	patulus . . .	1468	monococcum . . .	1508
mollis . . .	1434	secalinus . . .	1472	repens . . .	1509
saccharatus . . .	1435	grossus . . .	1473	caninum . . .	1510

AOUT.

Clematis		Thalictrum		Thalictrum	
Vitalba . . .	1	saxatile β . . .	3	majus . . .	4

Thalictrum		Spergula		Malva	
elatum β . .	4	arvensis . .	80	Alcea . .	129
flavum . .	5	Sagina		moschata . .	130
Adonis		procumbens .	82	silvestris . .	131
flammea . .	13	apetala . .	83	rotundifolia .	132
Ranunculus		saxatilis β .	83	crispa . .	133
hederaceus .	15	ciliata . .	84	Altea	
trichophyllus .	18	depressa β .	84	officinalis . .	134
fluitans . .	19	Alsine		hirsuta . .	135
secleratus . .	21	tenuifolia . .	85	rosea . .	136
Flammula . .	23	Arenaria		Hibiscus	
Lingua . .	24	serpyllifolia .	89	Trionum . .	137
repens . .	29	Stellaria		Monotropa	
bulbosus . .	30	media . .	91	hypopitys . .	154
sardous . .	31	graminea . .	94	Hypericum	
parvulus β .	31	uliginosa . .	95	perforatum . .	155
Nigella		Cerastium		humifusum . .	156
arvensis . .	40	cæspitosum .	96	tetrapterum .	158
Delphinium		Malachium		pulehrum . .	159
Consolida . .	44	aquaticum . .	104	montanum . .	160
Gypsophila		Linum		hirsutum . .	161
muralis . .	52	catharticum .	106	Drosera	
Dianthus		tenuifolium .	107	rotundifolia .	162
prolifer . .	53	usitatissimum.	108	longifolia . .	163
Armeria . .	54	Radiola		Parnassia	
Carthusianorum	55	linoides . .	109	palustris . .	164
Caryophyllus .	56	Oxalis		Roseda	
deltoides . .	58	stricta . .	111	luteola . .	167
glaucus β . .	58	Ruta		lutea . .	168
plumarius . .	60	graveolens . .	112	odorata . .	169
Cucubalus		Impatiens		Nuphar	
baccifer . .	63	noli-tangere .	114	luteum . .	170
Silene		Balsamina . .	115	Nymphaea	
inflata . .	64	Geranium		alba . .	171
noctiflora . .	69	pratense . .	118	Papaver	
Armeria . .	70	palustre . .	119	somniferum . .	172
Melandryum		sanguineum .	120	Rhœas . .	173
silvestre . .	71	columbinum .	121	Argemone . .	175
pratense . .	72	dissectum . .	122	dubium . .	176
Lychnis		molle . .	123	Lecoquii . .	177
chalcedonica .	73	pusillum . .	124	Chelidonium	
Flos-Cuculi .	74	rotundifolium.	125	majus . .	178
tomentosa . .	75	Robertianum .	126	Glaucium	
Githago . .	77	Erodium		flavum . .	179
Spergularia		Cicutarium .	127	Eschscholtzia	
rubra . .	79	pimpinellæfolium	128	californica . .	180

Corydalis		Viola		Ervum	
lutea . . .	182	tricolor . . .	270	hirsutum . . .	340
Fumaria		Altaica . . .	271	tetraspermum . . .	341
officinalis . . .	183	elatior . . .	272	gracile . . .	342
tenuifolia . . .	184	rothomagensis. . .	273	Faba	
parviflora . . .	186	intermedia. . .	274	vulgaris . . .	346
capreolata. . .	187	Lupinus		Lathyrus	
Nasturtium		luteus . . .	284	Aphaca . . .	349
officinale . . .	204	angustifolius . . .	285	Nissolia . . .	350
silvestre . . .	205	Ononis		sativus . . .	351
palustre . . .	207	spinosa . . .	287	hirsutus . . .	352
Sisymbrium		repens . . .	288	tuberosus . . .	353
officinale . . .	211	Lotus		pratensis . . .	354
Sophia . . .	212	corniculatus . . .	290	silvestris . . .	355
Braya		uliginosus . . .	291	odoratus . . .	356
supina . . .	213	Galega		latifolius . . .	357
Erystrum		officinalis . . .	295	Coronilla	
cheiranthoides. . .	214	Mellilotus		varia . . .	362
Diploxys		arvensis . . .	298	Ornithopus	
tenuifolia . . .	219	macrorrhiza . . .	299	perpusillus . . .	363
Brassica		leucantha . . .	300	sativus . . .	364
nigra . . .	225	alba . . .	301	Lythrum	
Sluapls		Medicago		salicaria . . .	367
arvensis . . .	226	lupulina . . .	304	hyssopifolia . . .	368
Cheiranthus . . .	228	Willdenowii β . . .	304	Peplis	
Raphanus		falcata . . .	305	Portula . . .	369
Raphanistrum. . .	229	sativa . . .	306	Portulaca	
Berteroa		falcato-sativa . . .	307	oleracea . . .	370
incana . . .	236	Echinus . . .	309	sativa . . .	371
Camellina		Trifolium		Montia	
dentata . . .	243	filiforme . . .	312	rivularis . . .	373
Thlaspi		procumbens . . .	313	Corrigiola	
arvense . . .	245	pratense . . .	316	litoralis . . .	374
Iberis		sativum β . . .	316	Merularia	
amara . . .	249	medium . . .	317	glabra . . .	375
Capsella		alpestre . . .	318	hirsuta . . .	376
Bursa pastoris. . .	250	arvense . . .	322	Scleranthus	
Lepidium		repens . . .	325	annuus . . .	377
sativum . . .	251	hybridum . . .	326	perennis . . .	378
graminifolium. . .	253	fragiferum. . .	327	Sedum	
ruderaie . . .	254	Phaseolus		boloniense . . .	382
Senebiera		vulgaris . . .	328	reflexum . . .	383
Coronopus. . .	256	multiflorum . . .	329	glaucescens β . . .	383
Hellanthemum		Viola		album . . .	386
Chamæcistus . . .	260	Cracca . . .	332	maximum . . .	387
serpyllifolium γ . . .	260	tenuifolia . . .	333	purpurascens . . .	388
polifolium. . .	261	sativa . . .	337		

Sempervivum			Hydrocotyle		Anethum	
tectorum . .	389		vulgaris . .	512	graveolens . .	549
Spiraea			Eryngium		Pastinaca	
salicifolia . .	404		campestris. .	515	silvestris . .	550
hypericifolia .	405		Bupleurum		sativa . .	551
Kercia			rotundifolium.	516	Heracleum	
japonica . .	407		falcatum . .	517	Spondylium. .	552
Potentilla			Falcaria		Tordylium	
reptans . .	448		vulgaris . .	518	maximum . .	553
alpestris . .	449		Aegopodium		Laserpitium	
Anserina . .	450		Podagraria . .	519	latifolium . .	554
supina . .	452		Petroselinum		Daucus	
Tormentilla			sativum . .	522	Carota . .	555
silvestris . .	456		Apium		Orlaya	
Agrimonia			graveolens. .	523	grandiflora . .	556
Eupatoria . .	470		Sium		Torilis	
canescens β .	470		latifolium . .	526	Anthriscus . .	560
odorata . .	471		angustifolium .	527	infesta . .	561
Alchemilla			Pimpinella		nodosa . .	562
arvensis . .	473		magna . .	528	Anthriscus	
Sanguisorba			saxifraga . .	529	Cerophyllum . .	563
officinalis . .	474		Anisum . .	530	Cherophyllum	
Poterium			Aethusa		bulbosum . .	566
dictyocarpum .	475		cynapium . .	531	hirsutum . .	567
Calycanthus			Oenanthe		Myrrhis	
floridus . .	494		Phellandrium .	534	odorata . .	568
Epilobium			Libanotis		Conium	
angustifolium .	495		montana . .	535	maculatum . .	570
hirsutum . .	496		Seseli		Erica	
parviflorum . .	497		annuum . .	536	Tetralix . .	586
montanum . .	499		montanum. .	537	Calluna	
roseum . .	500		Feniculum		vulgaris . .	587
tetragonum . .	501		officinale . .	538	Lysimachia	
obscurum . .	502		Silaus		Nummularia . .	592
palustre . .	503		pratensis . .	540	punctata . .	594
Oenanthera			Selinum		Centunculus	
biennis . .	504		carvifolium . .	542	minimus . .	596
Isardella			Angelica		Anagallis	
palustris . .	505		silvestris . .	543	arvensis . .	597
Clecea			Archangelica		Armeria	
lutetiana . .	506		officinalis . .	544	elongata . .	598
intermedia. .	507		Peucedanum		Plantago	
Myriophyllum			Chabrei . .	545	major . .	599
verticillatum .	509		Cervaria . .	546	intermedia β .	599
spicatum . .	510		palustre . .	547	minima γ . .	599
alternifolium .	511		Oreoselinum . .	548	media . .	600
					lanceolata . .	601

Plantago		Solanum		Linaria	
arenaria . . .	602	Dulcamara . . .	658	minor . . .	713
Vincetoxicum		nigrum . . .	659	arvensis . . .	714
officinale . . .	612	tuberosum . . .	660	simplex . . .	715
Aselepias		Physalis		striata . . .	716
syriaca . . .	613	Alkekengi . . .	663	Cymbalaria . . .	717
Limnanthemum		Atropa		Elatine . . .	718
nymphæoides . .	615	Belladonna . . .	664	spuria . . .	719
Gentiana		Lycium		Pedicularis	
cruciata . . .	616	barbarum . . .	665	palustris . . .	720
Pneumonanthe .	617	Nicotiana		silvatica . . .	721
campestris . . .	618	rustica . . .	666	Rhisanthus	
germanica . . .	619	Datura		major . . .	722
Amarella . . .	620	Stramonium . .	667	Alectorolophus .	724
ciliata . . .	621	Verbasum		angustifolius . .	725
acaulis . . .	622	Thapsus . . .	669	Melampyrum	
Cicendia		thapsiforme . .	670	cristatum . . .	726
filiformis . . .	623	phlomoides . . .	671	arvense . . .	727
Eritthraea		pulverulentum .	673	pratense . . .	728
Centaurium . .	624	floccosum . . .	674	Euphrasia	
pulehella . . .	625	Lychnitis . . .	675	officinalis . . .	729
Convolvulus		nigrum . . .	676	nemorosa . . .	730
arvensis . . .	627	nigro-floccosum	677	Odontites	
sepium . . .	628	Veronica		serotina . . .	732
Cuscuta		scutellata . . .	678	Utricularia	
suaveoleus . . .	629	Anagallis . . .	679	vulgaris . . .	734
Epilinum . . .	630	Beccabunga . . .	680	Phelipæa	
major . . .	631	serpyllifolia . .	686	ramosa . . .	736
Epitymum . . .	632	arvensis . . .	689	Lavandula	
Borago		agrestis . . .	690	vera . . .	745
officinalis . . .	633	Limosella		Ocimum	
Lycopsis		aquatica . . .	698	Basilicum . . .	746
arvensis . . .	635	Scrophularia		Mentha	
Myosotis		nodosa . . .	699	silvestris . . .	747
palustris . . .	637	Neesii . . .	701	rotundifolia . .	748
cæspitosa . . .	639	aquatica . . .	702	viridis . . .	749
intermedia . . .	641	Gratiola		pubescens . . .	751
Lithospermum		officinalis . . .	704	piperita . . .	752
purpureo-cæruleum	647	Digitalis		aquatica . . .	753
arvense . . .	648	purpurea . . .	705	arvensis . . .	754
Pulmonaria		purpureo-lutea .	707	Pulegium . . .	755
angustifolia . .	650	ambigua . . .	708	Lycopus	
Echium		Anthrhrinum		europæus . . .	756
vulgare . . .	652	Orontium . . .	710	Salvia	
Heliotropium		majus . . .	711	pratensis . . .	758
europæum . . .	657	Linaria		Scalarea . . .	759
		vulgaris . . .	712		

Origanum		Leonurus		Sherardia	
vulgare . . .	761	Cardiaca . . .	797	arvensis . . .	849
Majorana . . .	762	Marrubiastrum	798	Asperula	
Thymus		Brunella		arvensis . . .	850
Serpyllum . . .	763	vulgaris . . .	799	Cynanchica . . .	852
Chamædrys . . .	764	grandiflora . . .	800	Gallum	
Hyssopus		alba . . .	801	verum . . .	853
officinalis . . .	766	Scutellaria		silvaticum . . .	856
Calamintha		galericulata . . .	802	saxatile . . .	860
Acinos . . .	767	minor . . .	803	uliginosum . . .	862
officinalis . . .	768	Ajuga		Aparine . . .	863
grandiflora . . .	769	genevensis . . .	806	tricornis . . .	864
Clinopodium		Chamæpitys . . .	807	Centranthus	
vulgare . . .	770	Teucrium		ruber . . .	865
Melissa		Scorodonia . . .	808	Valeriana	
officinalis . . .	771	Botrys . . .	809	officinalis . . .	866
Satureia		Scordium . . .	810	Valerianella	
hortensis . . .	772	Chamædrys . . .	811	auricula . . .	871
Nepeta		montanum . . .	812	Muricollis . . .	872
Calaria . . .	773	Verbena		coronata . . .	874
Lamium		officinalis . . .	813	Scabiosa	
amplexicaule . . .	775	Campanula		Columbaria . . .	876
incisum . . .	776	Rapunculus . . .	817	Succisa . . .	877
purpureum . . .	777	persicæfolia . . .	818	atropurpurea . . .	878
album . . .	778	pyramidalis . . .	819	Knautia	
maculatum . . .	779	rotundifolia . . .	820	arvensis . . .	879
Galeopsis		rapunculoides . . .	821	Dipsacus	
Tetrahil . . .	781	Trachelium . . .	822	silvestris . . .	881
speciosa . . .	782	Medium . . .	823	Fullonum . . .	882
ochroleuca . . .	783	glomerata . . .	824	pilosus . . .	883
intermedia . . .	784	Cervicaria . . .	825	Onopordon	
Ladanum . . .	785	Specularia		Acanthium . . .	884
Stachys		speculum . . .	827	Carlina	
germanica . . .	786	Phyteuma		vulgare . . .	885
alpina . . .	787	orbiculare . . .	829	Cinara	
silvatica . . .	788	Jasione		scolymus . . .	886
ambigua . . .	789	montana . . .	831	Cirsium	
palustris . . .	790	perennis . . .	832	lanceolatum . . .	887
arvensis . . .	791	Cucurbita		eriphorum . . .	888
annua . . .	792	maxima . . .	837	palustre . . .	889
recta . . .	793	Pepo . . .	838	acaule . . .	890
Betonica		Sambucus		arvense . . .	891
officinalis . . .	794	Ebulus . . .	840	oleraceum . . .	892
Marrubium		Lonicera		Carduus	
vulgare . . .	795	Periclymenum . . .	846	tenuiflorus . . .	893
Ballota		Simphoria		crispus . . .	895
nigra . . .	796	racemosa . . .	848	nutans . . .	896

Silybum		Bellis		Linosyris	
marianum . . .	898	perennis . . .	934	vulgaris . . .	970
Lappa		Arthemisia		Senecio	
officinalis . . .	899	vulgaris . . .	936	vulgaris . . .	973
glabra . . .	900	Absinthium . .	937	viscosus . . .	974
racemosa . . .	901	campestris. . .	938	silvaticus . . .	975
tomentosa . . .	902	pontica . . .	939	crucifolius . .	976
Serratula		Tanacetum		Jacobaea . . .	977
tinctoria . . .	903	vulgare . . .	940	aquaticus . . .	978
Centaurea		Balsamita . . .	941	nemorensis . .	979
Calcitrapa . . .	904	Tajetes		Sarracenicus . .	980
solstitialis . . .	905	patula . . .	942	Fuchsii . . .	981
Cyanus . . .	906	Calendula		ovatus . . .	982
montana . . .	907	arvensis . . .	943	Dahlia	
Scabiosa . . .	908	officinalis . . .	944	variabilis . . .	983
maculosa . . .	909	Micropus		Eupatorium	
Jacea . . .	910	erectus . . .	945	cannabinum. . .	984
nigrescens. . .	911	Helichrysum		Lampsana	
phrygia . . .	912	arenarium. . .	946	communis . . .	987
nigra . . .	913	Gnaphalium		Arnoseris	
Echinops		silvaticum. . .	947	minima . . .	988
spærocephalus. .	914	luteo-album . .	948	Cichorium	
Bidens		uliginosum . .	949	Intybus . . .	989
tripartitus. . .	915	Filago		Endivia . . .	990
cernua . . .	916	germanica. . .	951	Hypochoeris	
Helianthus		gallica . . .	952	glabra . . .	991
annuus . . .	917	minima . . .	953	radicata . . .	992
Madia		arvensis . . .	954	Thrinicia	
sativa . . .	920	Pulicaria		hirta . . .	994
Achillea		dysenterica . .	955	Leontodon	
Millefolium . .	921	vulgaris . . .	956	hispidus . . .	995
Ptarmica . . .	922	Inula		autumnalis . .	997
Ormenis		Conyza . . .	957	Pieris	
nobilis . . .	923	salicina . . .	958	hieracioides. .	998
Anthemis		britannica . .	959	Helminthia	
arvensis . . .	924	Solidago		echioides . . .	999
Cotula . . .	925	Virga-aurea . .	960	Tragopogon	
tinctoria . . .	926	canadensis. . .	961	pratensis . . .	1003
Matricaria		Erigeron		Podospermum	
inodora . . .	928	acre . . .	962	laciniatum . . .	1006
Pyrethrum		canadense. . .	963	muricatum . . .	1008
Leucanthemum .	929	Stenactis		Taraxacum	
Parthenium . .	930	arvensis . . .	964	officinale . . .	1009
corymbosum . .	931	Aster		paludosum . . .	1010
Chrysanthemum		Amellus . . .	965	Chondrilla	
segetum . . .	933	leucanthemus .	967	junceae . . .	1011
		sinensis . . .	969		

Prenanthes		Chenopodium		Parietaria	
purpurea . .	1012	hybridum . .	1057	ramiflora . .	1101
Lactuca		glaucum . .	1058	Thymelæa	
muralis . .	1013	urbicum . .	1059	Passerina . .	1103
Scariola . .	1016	murale . .	1060	Hippuris	
sativa . .	1017	opulifolium . .	1061	vulgaris . .	1106
virosa . .	1018	ficifolium . .	1062	Aristolochia	
Sonchus		Scoparium . .	1063	Clematitis . .	1109
oleraceus . .	1019	Blitum		Euphorbia	
asper . .	1020	Bonus-Henricus	1064	Peplus . .	1113
arvensis . .	1021	rubrum . .	1065	helioscopia . .	1114
Barkhausia		Rumex		exigua . .	1115
foetida . .	1022	scutatus . .	1066	platyphyllos. .	1118
Crepis		Acetosella . .	1068	Gerardiana . .	1120
paludosa . .	1026	obtusifolius . .	1069	Esula . .	1122
virens . .	1029	maritimus. .	1070	Mercurialis	
Hieracium		palustris . .	1071	annua . .	1123
Pilosella . .	1030	conglomeratus	1072	Callitriche	
Auricula . .	1031	sanguineus. .	1073	stagnalis . .	1126
murorum . .	1034	crispus . .	1074	vernalis . .	1127
sabaudum. .	1037	Patientia . .	1075	hamulata . .	1128
boreale . .	1038	hydrolapathum	1076	Ceratophyllum	
umbellatum .	1039	maximus . .	1077	demersum . .	1129
Xanthium		Polygonum		Alisma	
strumarium .	1040	cuspidatum . .	1078	Plantago . .	1185
Amaranthus		amphibium . .	1080	natans . .	1186
Blitum . .	1041	lapathifolium .	1081	Sagittaria	
retroflexus. .	1042	Persicaria . .	1082	sagittæfolia. .	1187
caudatus . .	1043	mite . .	1083	Butomus	
paniculatus .	1044	minus . .	1084	umbellatus . .	1188
Polycnemum		Hydropiper . .	1085	Lilium	
arvense . .	1045	aviculare . .	1086	bulbiferum . .	1193
Atriplex		Bellardi . .	1087	Allium	
hortense . .	1046	Convolvulus .	1088	sativum . .	1205
nitens . .	1047	dumetorum . .	1089	Ophioscorodon .	1206
tataricum . .	1048	Fagopyrum		rotundum . .	1208
hastatum . .	1049	esculentum . .	1090	sphærocephalum	1209
patulum . .	1050	tataricum . .	1091	carinatum . .	1213
Spinacia		Cannabis		Nartheclum	
glabra . .	1051	sativa . .	1094	ossifragum . .	1221
oleracea . .	1052	Humulus		Hemerocallis	
Beta		Lupulus . .	1095	fulva . .	1223
vulgaris . .	1053	Urtica		Eptipogon	
Chenopodium		dioica . .	1098	aphyllus . .	1267
polyspermum .	1054	urens . .	1099	Epipactis	
Vulvaria . .	1055	Parietaria		latifolia . .	1272
album . .	1056	officinalis . .	1100		

Spiranthes

æstivalis . . 1276

Potamogeton

natans . . 1279

polygonifolius . 1280

fluitans . . 1281

alpinus . . 1282

gramineus . . 1283

heterophyllus β 1283

lucens . . 1284

perfoliatus . . 1285

crispus . . 1286

densus . . 1287

compressus . 1288

obtusifolius . 1289

pusillus . . 1290

pectinatus . . 1291

Zannichellia

palustris . . 1292

Najas

major . . 1293

Thypha

latifolia . . 1301

angustifolia . 1302

Sparganium

ramosum . . 1303

simplex . . 1304

Juncus

conglomeratus 1305

effusus . . 1306

glaucus . . 1307

filiformis . . 1308

silvaticus . . 1309

lamprocarpus . 1310

obtusiflorus . 1311

supinus . . 1312

squarrosus . . 1313

compressus . 1314

Tenageia . . 1315

bufonius . . 1316

Rhynchospora

alba . . 1366

Helicoharis

acicularis . . 1368

Scirpus

setaceus . . 1371

Polichii . . 1373

maritimus . . 1374

Cyperus

flavescens . . 1381

fuscus . . 1382

Zea

Mays . . 1383

Oryza

clandestina . 1384

Phalaris

canariensis . 1387

Optismenus

Crus-galli . . 1389

Digitaria

sanguinalis . 1390

filiformis . . 1391

Setaria

verticillata . . 1392

viridis . . 1393

glauca . . 1394

italica . . 1395

Panicum

miliaceum . . 1396

Alopecurus

agrestis . . 1397

fulvus . . 1400

geniculatus . 1401

Calamagrostis

lanceolata . . 1409

epigeios . . 1410

arundinacea . 1411

varia . . 1412

Weingartneria

canescens . . 1416

Deschampsia

discolor . . 1421

Avena

brevis . . 1422

saliva . . 1423

orientalis . . 1424

strigosa . . 1425

nuda . . 1426

Holcus

lanatus . . 1433

mollis . . 1434

Phragmites

communis . . 1438

Glycerium

argentum . . 1439

Cynosurus

cristatus . . 1440

Molinia

cærulea . . 1444

Catabrosa

aquatica . . 1445

Glyceria

fluitans . . 1446

aquatica . . 1448

maritima . . 1449

Poa

annua . . 1453

nemoralis . . 1455

serotina . . 1456

compressa . . 1460

Bromus

lectorum . . 1463

Brachypodium

silvaticum . . 1489

pinnatum . . 1490

Lolium

perenne . . 1491

italicum . . 1492

remotum . . 1495

Hordeum

murinum . . 1496

distichum . . 1498

zeocritthon . . 1499

hexastichon . 1501

Triticum

vulgare . . 1504

durum . . 1505

Spelta . . 1507

repens . . 1509

SEPTEMBRE.

Ranunculus		Geranium		Fumaria	
trichophyllus . .	18	molle . .	123	capreolata . .	187
sceleratus . .	21	pusillum . .	124	Nasturtium	
Flammula . .	23	rotundifolium .	125	officinale . .	204
repens . .	29	Robertianum .	126	silvestre . .	205
Gypsophila		Erodium		palustre . .	207
muralis . .	52	Cicutarium .	127	Sisymbrium	
Dianthus		pimpinellæfolium	128	officinale . .	211
prolifer . .	53	Malva		Sophia . .	212
diminutus β . .	53	Alcea . .	129	Erysimum	
Armeria . .	54	moschata . .	130	cheiranthoides .	214
Carthusianorum	55	silvestris . .	131	Diploaxis	
deltoides . .	58	rotundifolia .	132	tenuifolia . .	219
glaucus β . .	58	Altea		Thlaspi	
Saponaria		hirsuta . .	135	arvense . .	245
officinalis . .	61	rosea . .	136	Iberis	
Silene		Hibiscus		amara . .	249
inflata . .	64	Trionum . .	137	Capsella	
noctiflora . .	69	syriacus . .	138	Bursa pastoris .	250
Armeria . .	70	Hypericum		Lepidium	
Melandryum		humifusum .	156	graminifolium .	253
pratense . .	72	pulchrum . .	159	ruderales . .	254
Spergularia		Parnassia		Senecio	
rubra . .	79	palustris . .	164	Coronopus . .	256
Spergula		Reseda		Helianthemum	
arvensis . .	80	luteola . .	167	Chamaecistus .	260
Sagina		lutea . .	168	Viola	
ciliata . .	84	odorata . .	169	tricolor . .	270
Stellaria		Nuphar		Altaica . .	271
media . .	91	luteum . .	170	elatior . .	272
uliginosa . .	95	Nymphaea		rothomagensis .	273
Cerastium		alba . .	171	Ononis	
caespitosum .	96	Papaver		spinosa . .	287
Malachium		somniferum .	172	repens . .	288
aquaticum . .	104	Rhoeas . .	173	Lotus	
Oxalis		dubium . .	176	corniculatus .	290
stricta . .	111	Chelidonium		uliginosus . .	291
Ruta		majus . .	178	Melilotus	
graveolens . .	112	Eschscholtzia		arvensis . .	298
Impatiens		californica . .	180	macrorrhiza .	299
Balsamina . .	115	Corydalis		leucantha . .	300
Geranium		lutea . .	182	alba . .	301
sanguineum .	120	Fumaria		Medicago	
columbinum .	121	officinalis . .	183	lupulina . .	304
dissectum . .	122	tenuifolia . .	184	Willdenowii β .	304

Medicago		Sanguisorba		Daucus	
falcata . . .	305	officinalis . . .	474	Carota . . .	555
sativa . . .	306	Epilobium		Torilis	
falcato-sativa . .	307	parviflorum . .	497	Anthriscus . .	560
Trifolium		roseum . . .	500	infesta . . .	561
filiforme . . .	312	obseurum . . .	502	Hedera	
pratense . . .	316	palustre . . .	503	Helix . . .	572
sativum β . . .	316	Oenanthera		Erica	
repens . . .	325	biennis . . .	504	Tetralix . . .	586
hybridum . . .	326	Myriophyllum		Calluna	
fragiferum . . .	327	verticillatum . .	509	vulgaris . . .	587
Phaseolus		Eryngium		Anagallis	
vulgaris . . .	328	campestris. . .	515	arvensis . . .	597
multiflorum . . .	329	Bupleurum		Armeria	
Ervum		falcatum . . .	517	elongata . . .	598
hirsutum . . .	340	Falcaria		Plantago	
tetraspermum. .	341	vulgaris . . .	518	major . . .	599
Lathyrus		Apium		intermedia β . .	599
hirsutus . . .	352	graveolens. . .	523	minima γ . . .	599
odoratus . . .	356	Sium		media . . .	600
Lythrum		latifolium . . .	526	lanceolata . . .	601
salicaria . . .	367	angustifolium . .	527	Limnanthemum	
Peplis		Pimpinella		nymphæoides . .	615
Portula . . .	369	magna . . .	528	Gentiana	
Portulaca		saxifraga . . .	529	Pneumonanthe . .	617
oleracea . . .	370	Acthusa		campestris . . .	618
Montia		cynapium . . .	531	germanica . . .	619
rivularis . . .	373	Oenanthe		Amarella . . .	620
Corrigiola		Phellandrium . .	534	ciliata . . .	621
litoralis . . .	374	Libanotis		Cicendia	
Herniaria		montana . . .	535	filiformis . . .	623
glabra . . .	375	Fœniculum		Erithræa	
hirsuta . . .	376	officinale . . .	538	Centaurium. . .	624
Scleranthus		Silaus		pulchella . . .	625
annuus . . .	377	pratensis . . .	540	Convolvulus	
perennis . . .	378	Selinum		arvensis . . .	627
Sedum		carvifolium . . .	542	sæpium . . .	628
maximum . . .	387	Angelica		Cuscuta	
Kerria		silvestris . . .	543	suaveolens . . .	629
japonica . . .	407	Pencedanum		Borago	
Potentilla		Chabræi . . .	545	officinalis . . .	633
Anserina . . .	450	Cervaria . . .	546	Lycopsis	
supina . . .	452	Pastinaca		arvensis . . .	634
Agrimonia		sativa . . .	551	Myosotis	
Eupatoria . . .	470	Heracleum		intermedia . . .	641
Alchemilla		Spondylium . . .	552	Echium	
arvensis . . .	473			vulgare . . .	652

Solanum		Mentha		Betonica	
Dulcamara. . .	658	rotundifolia . .	748	officinalis . . .	794
nigrum . . .	659	viridis . . .	749	Marrubium	
tuberosum. . .	660	pubescens . . .	750	vulgare . . .	795
Physalis		piperita . . .	751	Ballota	
Alkekengi . . .	663	aquatica . . .	753	nigra . . .	796
Lycium		arvensis . . .	754	Leonurus	
barbarum . . .	665	Pulegium . . .	755	Cardiaca . . .	797
Nicotonia		Salvia		Brucella	
rustica . . .	666	pratensis . . .	758	grandiflora . . .	800
Datura		Origanum		Scutellaria	
Stramonium . .	667	vulgare . . .	761	galericulata. . .	802
Veronica		Thymus		minor . . .	803
scutellata . . .	678	Serpyllum. . .	763	Teucrium	
Anagallis . . .	679	Chamædrys . . .	764	Scorodonia . . .	808
Beccabunga . . .	680	Hyssopus		Botrys . . .	809
serpyllifolia . .	686	officinalis . . .	766	Scordium . . .	810
arvensis . . .	689	Calamintha		Chamædrys . . .	811
agrestis . . .	693	grandiflora . . .	769	montanum . . .	812
Limosella		Clinopodium		Verbena	
aquatica . . .	698	vulgare . . .	770	officinalis . . .	813
Scrophularia		Melissa		Campanula	
Nesii . . .	701	officinalis . . .	771	rotundifolia . . .	820
Gratiola		Satureia		rapunculoides . .	821
officinalis . . .	704	hortensis . . .	772	Trachelium. . .	822
Anthriscinum		Nepeta		Medium . . .	823
Orontium . . .	710	Cataria . . .	773	glomerata . . .	824
majus . . .	711	Lamium		Jasione	
Linaria		amplexicaule . .	775	montana . . .	835
vulgaris . . .	712	incisum . . .	776	Lonicera	
minor . . .	713	purpureum . . .	777	Periclymenum . .	846
arvensis . . .	714	album . . .	778	Symphoria	
Cymbalaria . . .	717	maculatum . . .	779	racemosa . . .	848
Elatine . . .	718	Galeopsis		Sherardia	
Rhinanthus		Tetralit . . .	781	arvensis . . .	849
angustifolius . .	725	speciosa . . .	782	Asperula	
Euphrasia		ochroleuca. . .	783	arvensis . . .	850
officinalis . . .	729	intermedia. . .	784	Cynanchica. . .	852
nemorosa . . .	731	Ladanum . . .	785	Galium	
Odontites		Stachys		verum . . .	855
serotina . . .	732	germanica. . .	786	uliginosum . . .	862
Phelipea		alpina . . .	787	Aparine . . .	863
ramosa . . .	736	ambigua . . .	789	tricorne . . .	864
Lavandula		palustris . . .	790	Valeriana	
vera . . .	745	arvensis . . .	791	officinalis . . .	866
Ocimum		annua . . .	792	Valerianella	
Basilicum . . .	746	recta . . .	793	Morisonii . . .	872

Scabiosa		Artemisia		Dahlia	
Columbaria . . .	876	vulgaris . . .	936	variabilis . . .	983
Succisa . . .	877	Absinthium . . .	937	Eupatorium	
atropurpurea . . .	878	campestris . . .	938	cannabinum. . .	984
Dipsacus		Tanacetum		Clethorium	
silvestris . . .	881	vulgare . . .	940	Endivia . . .	990
Oenopordon		Balsamita . . .	941	Hypochaeris	
Acanthium. . .	882	Tajetes		radicata . . .	992
Carlina		patula . . .	942	Thrincla	
vulgaris . . .	883	Calendula		hirta . . .	994
Cinara		arvensis . . .	943	Leontodon	
Scolymus . . .	886	officinalis . . .	944	hispidus . . .	993
Cirsium		Helichrysum		autumnalis . . .	997
lanceolatum . . .	887	arenarium. . .	946	Pieris	
acaule . . .	890	Guaphallum		hieracioides. . .	998
arvense . . .	891	silvaticum . . .	947	Helminthia	
Carduus		luteo-album . . .	948	echioides . . .	999
crispus . . .	893	uliginosum . . .	949	Tragopogon	
Lappa		Filago		pratensis . . .	1003
glabra . . .	900	germanica. . .	951	Taraxacum	
Serratula		minima . . .	953	officinale . . .	1009
tinctoria . . .	903	arvensis . . .	954	paludosum . . .	1010
Centaurea		Fulicaria		Lactuca	
Calcitrapa. . .	904	dysenterica . . .	955	muralis . . .	1013
solstitialis . . .	905	vulgaris . . .	956	saliva . . .	1017
maculosa . . .	909	Inula		Sonchus	
Jacea . . .	940	Conyza . . .	957	Oleraceus . . .	1019
Bidens		britannica . . .	959	asper . . .	1020
tripartita . . .	915	Solidago		arvensis . . .	1021
cernua . . .	916	Virga-aurea . . .	960	Crepis	
Helianthus		canadensis. . .	961	virens . . .	1029
annuus . . .	917	Erigeron		Hieracium	
tuberosus . . .	918	acre . . .	962	Pilosella . . .	1030
rigidus . . .	919	canadense. . .	963	Auricula . . .	1031
Achillea		Aster		sabaudum . . .	1037
Millefolium . . .	921	Amellus . . .	965	boreale . . .	1038
Plarmica . . .	922	dumorum . . .	966	Xanthium	
Anthemis		leucanthemus. . .	967	strumarium. . .	1040
arvensis . . .	924	floribundus . . .	968	Amaranthus	
Cotula . . .	925	sinensis . . .	969	Blitum . . .	1041
tinctoria . . .	926	Linosyris		retroflexus . . .	1042
Matricaria		vulgaris . . .	970	caudatus . . .	1043
inodora . . .	928	Senecio		paniculatus. . .	1044
Chrysanthemum		vulgaris . . .	973	Atriplex	
segetum . . .	933	erucæfolius . . .	976	hortense . . .	1046
Bellis		Jacobæa . . .	977	patulum . . .	1050
perennis . . .	934				

Spinacia		Parietaria		Zea	
glabra . . .	1051	officinalis . . .	1100	Mays . . .	1383
oleracea . . .	1052	ramiflora . . .	1101	Oryza	
Beta		Thymelaea		clandestina . . .	1384
vulgaris . . .	1053	Passerina . . .	1103	Phalaris	
Chenopodium		Euphorbia		canariensis . . .	1387
polyspermum . . .	1054	Peplus . . .	1113	Opismenus	
Vulvaria . . .	1055	helioscopia . . .	1114	Crus-galli . . .	1389
album . . .	1056	exigua . . .	1115	Digitaria	
hybridum . . .	1057	platyphyllos . . .	1118	filiformis . . .	1391
glaucum . . .	1058	Mercurialis		Setaria	
urbicum . . .	1059	annua . . .	1123	verticillata . . .	1392
murale . . .	1060	Callitriche		viridis . . .	1393
opulifolium . . .	1061	stagnalis . . .	1126	italica . . .	1395
scifolium . . .	1062	vernalis . . .	1127	Panicum	
Scoparium . . .	1063	hamulata . . .	1128	miliaceum . . .	1396
Blitum		Ceratophyllum		Beschampsia	
Bonus-Henricus . . .	1064	demersum . . .	1129	discolor . . .	1421
rubrum . . .	1065	Alisma		Phragmites	
Rumex		Plantago . . .	1185	communis . . .	1438
maritimus . . .	1070	natans . . .	1186	Gyncrium	
palustris . . .	1071	Colchicum		argentum . . .	1439
conglomeratus . . .	1072	autumnale . . .	1189	Molinia	
Polygonum		Potamogeton		cœrulea . . .	1444
cuspidatum . . .	1078	crispus . . .	1286	Glyceria	
amphibium . . .	1080	densus . . .	1287	aquatica . . .	1448
lapathifolium . . .	1081	pusillus . . .	1290	Poa	
Persicaria . . .	1082	Zaunichelita		annua . . .	1453
mite . . .	1083	palustris . . .	1292	Lolium	
minus . . .	1084	Najas		perenne . . .	1491
Hydropiper . . .	1085	major . . .	1293	italicum . . .	1492
aviculare . . .	1086	Juncus		Hordeum	
Convolvulus . . .	1088	bufonius . . .	1316	murinum . . .	1496
dumetorum . . .	1089	Heleocharis		Triticum	
Fagopyrum		acicularis . . .	1368	repens . . .	1509
tataricum . . .	1091	Scirpus			
Urtica		maritimus . . .	1374		
dioica . . .	1098	Cyperus			
urens . . .	1099	fuscus . . .	1382		

OCTOBRE.

Ranunculus		Spergularia		Sagina	
Flammula . . .	23	rubra . . .	79	ciliata . . .	84
Silene		Spergula		Stellaria	
noctiflora . . .	69	arvensis . . .	80	media . . .	91
				uliginosa . . .	95

Oxalis		Scleranthus		Mentha	
stricta . . .	111	perennis . . .	378	viridis . . .	749
Geranium		Potentilla		arvensis . . .	754
dissectum . . .	122	Anserina . . .	450	Pulegium . . .	755
rotundifolium . . .	125	supina . . .	452	Thymus	
Erodium		Alchemilla		Serpyllum . . .	763
Cicutarium . . .	127	arvensis . . .	473	Chamædrys . . .	764
pimpinellæfolium . . .	128	Aethusa		Clinopodium	
Malva		cynapium . . .	531	vulgare . . .	770
silvestris . . .	131	Daucus		Lamium	
rotundifolia . . .	132	Carota . . .	553	amplexicaule . . .	775
Hibiscus		Hedera		incisum . . .	776
syriacus . . .	138	Helix . . .	572	purpureum . . .	777
Reseda		Anagallis		album . . .	778
odorata . . .	169	arvensis . . .	597	maculatum . . .	779
Eschscholtzia		Plantago		Galeopsis	
californica . . .	180	major . . .	599	intermedia . . .	784
Corydalis		intermedia β . . .	599	Ladanum . . .	785
lutea . . .	182	minima γ . . .	599	Stachys	
Nasturtium		lanceolata . . .	601	arvensis . . .	791
silvestre . . .	205	Gentiana		annua . . .	792
palustre . . .	207	Pneumonanthe . . .	617	Marrubium	
Sisymbrium		germanica . . .	619	vulgare . . .	795
Sophia . . .	212	Amarella . . .	620	Teucrium	
Diploxys		Cicendia		Botrys . . .	809
tenuifolia . . .	219	filiformis . . .	623	Scordium . . .	810
Capsella		Borago		Verbena	
Bursa pastoris . . .	250	officinalis . . .	633	officinalis . . .	813
Senecio		Lycopsis		Sherardia	
Coronopus . . .	256	arvensis . . .	634	arvensis . . .	849
Viola		Solanum		Scabiosa	
tricolor . . .	270	nigrum . . .	659	Columbaria . . .	876
rothomagensis . . .	273	Nicotiana		Succisa . . .	877
Lotus		rustica . . .	666	atropurpurea . . .	878
corniculatus . . .	290	Veronica		Centaurea	
Medicago		arvensis . . .	689	Jacea . . .	910
lupulina . . .	304	agrestis . . .	693	Hellanthus	
Willdenowii β . . .	304	Linaria		tuberosus . . .	918
Trifolium		minor . . .	713	rigidus . . .	919
repens . . .	325	Elatine . . .	718	Achillea	
fragiferum . . .	327	Euphrasia		Millefolium . . .	921
Portulaca		officinalis . . .	729	Pyrethrum	
oleracea . . .	370	nemorosa . . .	731	sinensis . . .	932
Herniaria		Odontites		Bellis	
glabra . . .	375	serotina . . .	732	perennis . . .	934
Scleranthus		Ocimum		Artemisia	
annuus . . .	377	Basilicum . . .	746	vulgaris . . .	936

Arthemisia		Chenopodium		Anemone	
campestris . .	938	Vulvaria . .	1055	silvestris . .	7
Calendula		album . .	1056	Ranunculus	
officinalis . .	944	Polygonum		nemorosus . .	28
Helichrysum		Persicaria . .	1082	Alyssum	
arenarium . .	946	mite . .	1083	calycinum . .	233
Gnaphalium		minus . .	1084	Viola	
uliginosum . .	949	aviculare . .	1086	odorata . .	262
Erigeron		Urtica		hirta . .	263
canadense . .	963	dioica . .	1098	canina . .	265
Aster		urens . .	1099	Anthyllis	
dumosus . .	966	Parietaria		vulneraria . .	289
floribundus . .	968	officinalis . .	1100	Hippocrepis	
Senecio		Euphorbia		comosa . .	365
vulgaris . .	973	Peplus . .	1113	Fragaria	
Dahlia		helioscopia . .	1114	vesca . .	439
variabilis . .	983	Mercuriialis		viridis . .	441
Cichorium		annua . .	1123	Potentilla	
Endivia . .	990	Callitriche		verna . .	447
Leontodon		stagnalis . .	1126	Rosa	
autumnalis . .	997	vernalis . .	1127	canina . .	488
Helminthia		hamulata . .	1128	Cornus	
echioides . .	999	Colchicum		sanguinea . .	573
Taraxacum		autumnale . .	1189	Myosotis	
officinale . .	1009	Oryza		palustris . .	637
Crepis		clandestina . .	1384	Veronica	
virens . .	1029	Digitaria		opaca . .	695
Hieracium		filiformis . .	1392	hederæfolium . .	697
Pilosella . .	1030	Poa		Ajuga	
sabaudum . .	1037	annua . .	1453	Chamæpitys . .	807
boreale . .	1038	Lolium		Sambucus	
Xanthium		italicum . .	1492	nigra . .	841
strumarium . .	1040	BIFLORES.		Centaurea	
Atriplex		Anemone		Cyanus . .	906
patulum . .	1050	pulsatilla . .	6		

NOVEMBRE.

Spergularia		Salvia		Aster	
rubra . .	79	arvensis . .	758	floribunda . .	968
Stellaria		Pyrethrum		Senecio	
media . .	91	sinense . .	932	vulgaris . .	973
Capsula		Bellis		Poa	
Bursa pastoris . .	250	perennis . .	934	annua . .	1453

Additions et corrections.

Page 8 Famille 1. Renonculaceæ lisez Ranunculaceæ.

» 8 n° 3^a. *T. aquilegifolium*. (*L. Sp.* 770.)

‡ Mai-Juin.

R. Prés, pelouses boisées. Wasserbillig. BL. !

Page 22 n° 120. *G. sanguinum* lisez *sanguineum*.

» 28 » 64. 5^e ligne ajoutez : Ahle Weyer. Bois de Berg. Kz.

» 32 » 204. *N. officinalis* lisez *officinale*.

» 38 » 251. A effacer le synonyme.

» 38 » 98. Ajoutez *Feldkresse*.

» 42 » 279². *G. Anglica*. (*L. Sp.* 999.) *Sch. suppl.* 24. 1038.

‡ Mai-Août.

AC. Bois arides, pâturages, bruyères de la Haute-Sûre. (*Sch*)

Page 45 n° 310. 5^e ligne, n° 305 lisez 306.

» 48 » 124. *Lein* lisez *Linse*.

» 52 » 374. *C. littoralis* lisez *litoral*.

» 58 » 415. *R. Schlechtendalii*.

‡ Juin-Juillet.

Page 62 n° 444. Ajoutez ‡ Mai-Juin.

» 72 » 512. » ‡ Juillet-Août.

» 75. Tribu IV. *Sileneæ* lisez *Selineæ*.

» 76 n° 200. ***Pencedanum*** lisez ***Pencedanum***.

» 78 » 560. *F.* lisez *T.*

» 82 » 588 au lieu de 288.

» 83 Fam. L. *Plumbagineæ* lisez *Plumbagineæ*.

» 86 n° 615. *L. nymphoides* lisez *nymphæoides*.

» 88 » 628^{bis}. † *C. pubescens*. (*Lindl.*) *Calystegia*.

‡ Juin-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois subspontané. Clausen. !

Page 89 n° 248. Ajoutez : Buglose. — Ochsenzunge.

» 90 » 647. *S.* lisez *L.*

» 92 » 261. ***Capsicum***. (*L. Sp.* 269) lisez (*Tournf. Inst.* 62).

» 92 » 661. *C. annuum*. (*L. Sp.* 269.)

» 92 » 662. Lisez *L. esculentum*. (*Mill. Dict.* n° 2.)

» 95 » 687. 3 lignes : Haies lisez Ham.

Page 99 n° 717. 2 lignes : Juin lisez Avril.

» 101 » 739. 3 » vernum lisez verum.

» 102 » 744. 6 » ajoutez :

Peuplier déversoir du moulin de Bastendorf. EF. ! C. Saulsaies des bords de la Bles vers Tandel. Kz.

Page 109 n° 801. (*M. Bub. fl. Taur. cam.*), lisez (*M. Bieb. fl. Taur. cauc.*)

» 110 n° 312. Germander lisez Gamander.

» 111 » 814. 3 lignes : BL. lisez R.

» 112 » 819. 3 » cultivé lisez cultivée.

» 126 » 930 lisez 940.

» 129 » 970. P. lisez L.

» 132 » 998. O. » P.

» 133 » 1004. 7 lignes : Var. β lisez Var. γ .

» 139 » 1050. Var. γ . oppositifolia lisez oppositifolium.

» 144 » 1096. Après la 6^e ligne à ajouter :

Var. γ . corylifolia. (*Host. pl. Aust.* 1. 329.)

C. Planté en avenue.

Page 144 n° 1096bis. *U. montana*. (*Smith. Engl. Fl.* 2. 22.)

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

AR. Bois et taillis des Ardennes. C. Environs de Luxembourg.

Page 145 n° 418. **Thymleæa** lisez **Thymelæa**.

» 160 » 1218. Ajoutez T. n° 521.

» 173 » 1292. E. lisez Z.

Table des familles, des genres, des espèces et des synonymes. ¹⁾

Les noms des familles sont en PETITES CAPITALES, ceux des genres sont en lettres grasses et ceux des espèces sont en petite. Les synonymes sont en italique. Les chiffres indiquent les numéros d'ordre. Les espèces non suivies de nom d'auteur sont de Linné.

Abies Trn. . . . 444	Adoxa 324	Aira 526
<i>alba</i> Mill. . . . 1178	<i>Moschatellina</i> . . . 839	<i>caespitosa</i> . . . 1420
<i>balsamea</i> 1179	Aegopodium . . . 182	<i>canescens</i> . . . 1416
<i>excelsa</i> P. Lk. . . 1176	<i>Podagraria</i> . . . 519	<i>caryophyllea</i> . . . 1417
<i>Larix</i> Lmk. . . . 1175	Aesculus 52	<i>cærulea</i> 1444
<i>peclinata</i> DC. . . 1178	<i>hippocastanum</i> . . 148	<i>discolor</i> Thuil. . 1421
<i>picea</i> DR. . . . 1176	<i>rubicunda</i> 149	<i>flexuosa</i> 1420
ABIETINÆE . . . p. 154	Aethusa 189	<i>multiculis</i> Dtr. b. 1417
Acer 51	<i>Cynapium</i> 531	<i>præcox</i> 1418
<i>campestre</i> 145	Agathophytum Moq.	<i>uliginosa</i> Weihe. 1421
<i>platanoides</i> . . . 146	<i>Bonus Hæmicus</i> . . 1064	Ajuga 311
<i>pseudo-platanus</i> . 147	<i>rubrum</i> 1063	<i>alpina</i> Vill. . . b. 804
ACERINÆE . . . p. 25	Agrimonia . . . 157	<i>Chamæpitys</i> Sch. . 807
Aceras R. Br. . . 473	<i>acutifolia</i> Dmtr. c. 470	<i>genevensis</i> . . . 806
<i>anthrophophora</i> R. 1239	<i>canescens</i> Dmtr. b. 470	<i>pyramidalis</i> . . . 805
<i>hircinia</i> Ldley . . 1240	<i>Eupatoria</i> . . . 470	<i>reptans</i> 804
<i>pyramidalis</i> Rhb. 1241	<i>odorata</i> Mill. . . 471	Alabama
Achillea 351	<i>procera</i> Wlr. . . . 470	<i>ossifraga</i> 1221
<i>Millefolium</i> . . . 921	Agropyrum P. B.	Achemilla Trn. . 158
<i>Plarmica</i> 922	<i>caninum</i> R. S. . . 1510	<i>Aphanes</i> Leers. . . 473
<i>setacea</i> W. K. . b. 921	<i>repens</i> P. B. . . . 1509	<i>arvensis</i> Scop. . . 473
Acinos	Agrostemma	<i>montana</i> Willd. b. 472
<i>thymoides</i> M. . . 767	<i>Coronaria</i> 75	<i>subsericea</i> Koch. b. 472
Aconitum Trn. . . 14	<i>Flos-Cuculi</i> Don. . 74	<i>vulgaris</i> 472
<i>intermedium</i> . . . 47	<i>Githago</i> 77	Alectorolophus H.
<i>Lycoclonum</i> . . . 46	Agrostis 519	<i>angustifolius</i> Gml. 725
<i>Napellus</i> 47	<i>alba</i> 1405	<i>grandiflorus</i> Wlr. 722
<i>Telyphonum</i> Rb. . 46	<i>arundinacea</i> . . . 1411	<i>major</i> Rchb. . . . 722
Acorus 496	<i>canina</i> 1406	<i>minor</i> W. et G. . . 723
<i>Calamus</i> 1300	<i>diffusa</i> Host. . . b. 1405	<i>parviflorus</i> Willr. 723
Actea 15	<i>gigantea</i> M. . . c. 1405	Alisma 448
<i>spicata</i> 48	<i>interrupta</i> 1408	<i>lanceolatum</i> Wth. b. 1185
Adonis 4	<i>mutica</i> Th. . . . b. 1416	<i>natans</i> 1186
<i>æstivalis</i> 12	<i>pumila</i> c. 1404	<i>Plantago</i> 1185
<i>anomala</i> Wld. . . 13	<i>Spica-Venti</i> . . . 1407	ALISMACEÆ Juss. p. 156
<i>autumnalis</i> . . . 11	<i>stolonifera</i> . . . b. 1404	Alliaria Adans.
<i>citrinus</i> Hoff. . b. 12	<i>stolonifera</i> . . . 1405	<i>officinalis</i> Andr. . 209
<i>flammea</i> Jacq. . . 13	<i>varians</i> Th. . . . c. 1404	Allium 458
<i>flava</i> DC. . . . b. 12	<i>vulgaris</i> With. . . 1404	<i>arenarium</i> . . . 1210
<i>maculatus</i> Wallr. 12	Aira 526	<i>Ascalonicum</i> . . . 1215
<i>miniatus</i> Jacq. . 12	<i>aquatica</i> 1445	<i>Cepa</i> 1216

1) La nomenclature princeps adoptée n'étant pas celle en usage chez nous; la table tient compte de cette circonstance en donnant les principaux synonymes qui ne purent entrer dans le corps de l'ouvrage.

Allium . . . 458	Ampelopsis Mx. . . 54	Aparagia Wld . . .
<i>carinatum</i> . . . 1213	<i>quinquefolia</i> R. Sch. 151	<i>autumnalis</i> Wld. . . 997
<i>complanatum</i> Bor. 1212	AMYGDALÆE . . p. 54	<i>hastilis</i> . . . 996
<i>fistulosum</i> . . . 1217	Amygdalus . . . 144	<i>hispidula</i> . . . 993
<i>moly</i> . . . 1204	<i>communis</i> . . . 391	Apera Adans. . . 520
<i>oleraceum</i> . . . 1211	<i>Persica</i> . . . 390	<i>interrupta</i> . . . 1408
Ophioscorodon D. 1206	Anacamptis Rich. 475	<i>Spica-Venti</i> . . . 1407
<i>Porrum</i> . . . 1207	<i>pyramidalis</i> Rich. 1241	Aphacis Perh. . .
<i>rotundum</i> . . . 1208	Anagallis . . . 228	<i>vulgaris</i> Perh. . . 349
<i>sativum</i> . . . 1205	<i>arvensis</i> . . . 597	Aphanes . . .
<i>Schœnoprassum</i> . 1212	<i>carnea</i> Schrak. . d. 598	<i>arvensis</i> . . . 473
<i>sphærocephalum</i> 1209	<i>cœrulea</i> Schreb. . b. 598	Apium . . . 185
<i>ursinum</i> . . . 1203	<i>phœnicea</i> Lmk. . c. 593	<i>graveolens</i> . . . 523
<i>vineale</i> . . . 1210	Anchusa . . . 248	<i>Petroselinum</i> . . . 522
Alnus Trn. . . 439	<i>arvensis</i> M. B. . . 635	APOCYNEE . . p. 85
<i>glutinosa</i> Gærtn. 1166	<i>officinalis</i> Gk. . . 634	Aquilegia Trn. . . 12
<i>incana</i> DC. . . 1167	Anemone Trn. . . 3	<i>vulgaris</i> . . . 43
Alopecurus . . . 517	<i>Hepatica</i> . . . 10	Arabis . . . 74
<i>agrestis</i> . . . 1397	<i>nemorosa</i> . . . 8	<i>arenosa</i> Scop. . . 197
<i>aquaticus</i> Dmtr. . b. 1398	<i>Pulsatilla</i> . . . 6	<i>hirsuta</i> Sep. . . 195
<i>fulvus</i> Sm. . . 1400	<i>ranunculoides</i> . . 9	<i>sagittata</i> DC. . . 196
<i>geniculatus</i> . . . 1401	<i>silvestris</i> . . . 7	<i>Thaliana</i> . . . 210
<i>pallidus</i> Dmtr. . c. 1398	Anethum Trn. . . 201	<i>Turrita</i> . . . 198
<i>pratensis</i> . . . 1398	<i>Feniculum</i> . . . 538	Archangelica Hoff. 199
<i>utriculatus</i> Pers. 1399	<i>graveolens</i> . . . 549	<i>officinalis</i> Hoff. . 544
Alpine Whlb. . . 29	Angelica . . . 198	Arctium . . .
<i>media</i> . . . 91	<i>Archangelica</i> . . 544	<i>Bardana</i> Willd. . . 902
<i>rubra</i> Whlb. . . 79	<i>Carrifolia</i> Spr. . 542	<i>Lappa</i> . . . 899
<i>segetalis</i> . . . 78	<i>silvestris</i> . . . 543	<i>nemorosum</i> Lej. . 901
<i>tenuifolia</i> Whlb. 85	Antennaria Grtn. 365	Arenaria . . . 32
<i>viscosa</i> Schreb. . 86	<i>dioica</i> Grtn. . . 950	<i>arvensis</i> Willr. . . 80
Althœa . . . 47	Anthemis . . . 353	<i>rubra</i> . . . 79
<i>hirsuta</i> . . . 135	<i>agrestis</i> Willr. . . 924	<i>segetalis</i> Lk. . . 78
<i>officinalis</i> . . . 134	<i>arvensis</i> . . . 924	<i>serpyllifolia</i> . . . 89
<i>rosea</i> Cav. . . . 136	<i>Cotula</i> . . . 925	<i>trinervia</i> . . . 87
<i>silvestris</i> Alfd. . 131	<i>nobilis</i> . . . 923	Aristolochia Trn. 424
Alyssum . . . 88	<i>tinctoria</i> . . . 926	<i>Clematitis</i> . . . 1109
<i>calycinum</i> . . . 233	Anthericum . . .	<i>Sipho</i> L'hérit. . . 1110
<i>campestre</i> . . . 234	<i>Liliago</i> . . . 1220	ARISTOLOCHIÆE p. 146
<i>incanum</i> . . . 236	<i>ossifragum</i> . . . 1221	Armeniaea Thf. 145
<i>saxatile</i> . . . 235	<i>ramosum</i> . . . 1219	<i>vulgaris</i> Lk. . . 592
AMARANTACEE . p. 138	Anthoxanthum . . 508	Armeria Willd. . 229
Amarantus . . . 401	<i>odoratum</i> . . . 1385	<i>elongata</i> Hoffm. . 598
<i>Blitum</i> . . . 1041	<i>villosum</i> Dmtr. . b. 1385	Armoracia . . .
<i>candatus</i> . . . 1043	Anthriscus Hoff. 211	<i>amphibia</i> . . . 206
<i>paniculatus</i> . . . 1044	<i>Cerefolium</i> Hoffm. 563	<i>rusticana</i> F. W. . 239
<i>retroflexus</i> . . . 1042	<i>silvestris</i> Hoffm. . 564	Arnica . . . 374
<i>sanguinosus</i> . . b. 1044	Anthyllis . . . 111	<i>montana</i> . . . 971
AMARYLLIDEE . p. 162	<i>vulneraria</i> . . . 289	Arnoseris Grtn. . 382
AMEROSIACEE . p. 137	Antirrhinum L. . 275	<i>minima</i> Lk. . . 988
Amelanchier Mch. 164	<i>arvense</i> . . . 714	<i>pusilla</i> Grtn. . . 988
<i>vulgaris</i> Mch. . . 482	<i>Cymbalaria</i> . . . 717	AROIDEE . . p. 174
Amelia Alfd. . .	<i>Elatine</i> . . . 718	Arrhenatherum P. 529
<i>major</i> Alfd. . . 163	<i>Linaria</i> . . . 712	<i>elatius</i> . . . 1432
<i>minor</i> Alfd. . . 166	<i>majus</i> . . . 711	Artemisia . . . 358
AMPELIDEE . . p. 26	<i>minor</i> . . . 713	<i>Absinthium</i> . . . 937
Ampelopsis Mx. . . 54	<i>Orontium</i> . . . 710	<i>campestris</i> . . . 938
<i>hederacea</i> Mx. . . 151	<i>repens</i> Desf. . . 716	<i>Dracunculus</i> . . . 935

Artemisia . . . 358	Atropa . . . 264	Betonica . . . 305
<i>pontica</i> . . . 939	<i>Belladonna</i> . . . 664	<i>stricta</i> At. . . <i>b.</i> 794
<i>vulgaris</i> . . . 936	Avena . . . 528	Betula Trn. . . 438
Arum . . . 494	<i>barbata</i> Br. . . 1428	<i>alba</i> . . . 1165
<i>maculatum</i> . . . 1298	<i>brevis</i> Rth. . . 1422	<i>Alnus</i> . . . 1166
Arundo . . . 1409	<i>caryophyllea</i> Wb. 1417	<i>carpatica</i> Wld. <i>c.</i> 1165
<i>Calamagrostis</i> . . 1409	<i>elation</i> . . . 1432	<i>pubescens</i> Ehr. <i>b.</i> 1165
<i>colorata</i> . . . 1389	<i>fatua</i> . . . 1427	<i>verrucosa</i> Ehr. <i>d.</i> 1165
<i>epigeios</i> . . . 1410	<i>flavescens</i> . . . 1431	BETULINÆE . . <i>p.</i> 154
<i>Phragmites</i> . . . 1438	<i>hirsuta</i> Rth. . . 1428	Bidens . . . 348
<i>silvatica</i> Schd. . . 1411	<i>nuda</i> . . . 1426	<i>cernua</i> . . . 916
<i>varia</i> Schd. . . 1412	<i>orientalis</i> Schb. . 1424	<i>minimus</i> . . <i>c.</i> 916
Asarum Trn. . . 423	<i>przew.</i> P. B. . . 1419	<i>radiata</i> DC. . . <i>b.</i> 916
<i>europæum</i> . . . 1108	<i>pratensis</i> . . . 1430	<i>tripartita</i> . . . 916
ASCLEPIADÆE . <i>p.</i> 85	<i>pubescens</i> . . . 1429	Elitum Trn. . . 407
Asclepias . . . 238	<i>sativa</i> . . . 1423	<i>Bonus-Henricus</i> Rh. 1064
<i>syriaca</i> . . . 613	<i>strigosa</i> Schb. . . 1425	<i>rubrum</i> Reh. . . 1065
<i>Vincetoxicum</i> . . . 612	Baldingera Gr. . . 511	BORAGINÆE . . <i>p.</i> 88
ASPARAGINÆE . <i>p.</i> 161	<i>arundinacea</i> Dmtr. 1388	Borago Trn. . . 247
Asparagus . . . 463	Ballota . . . 307	<i>officinalis</i> . . . 633
<i>officinalis</i> . . . 1224	<i>alba</i> . . . 796	Brachypodium P. B 546
Asperugo Trn. . . 258	<i>foetida</i> Lk. . . 796	<i>gracile</i> . . . <i>b.</i> 1490
<i>procumbens</i> . . . 656	<i>nigra</i> . . . 796	<i>pinuatum</i> P. B. . 1490
Asperula Trn. . . 330	<i>ruderalis</i> Kch. <i>b.</i> 796	<i>rupestre</i> R. et S. <i>b.</i> 1490
<i>Apurine</i> M. B. . . 863	<i>sapium</i> Lj. . . <i>c.</i> 796	<i>silvaticum</i> R. Sch. 1489
<i>arvensis</i> . . . 850	<i>vulgaris</i> Lk. <i>b.</i> 796	BRASSICA . . . 84
<i>Cynanchica</i> . . . 852	BALSAMINÆE . <i>p.</i> 21	<i>Cheiranthus</i> . . . 228
<i>galioides</i> M. B. . . 853	Barbarea R. Br. . 73	<i>esculenta</i> DC. <i>b.</i> 223
<i>glauca</i> Bess. . . 853	<i>arcuata</i> Rb. . . 192	<i>Napus</i> . . . 223
<i>odorata</i> . . . 831	<i>intermedia</i> Ber. . 194	<i>a oleifera</i> . . . —
Aster . . . 372	<i>lyrata</i> Aschersn. 191	† <i>biennis</i> . . . —
<i>Amellus</i> . . . 965	<i>parviflora</i> Fr. . . 193	† † <i>annua</i> . . . —
<i>dumosus</i> . . . 966	<i>stricta</i> Andz. . . 193	<i>b Napo-brassica</i> <i>b.</i> 223
<i>floribundus</i> W. . . 968	<i>tatarica</i> DC. . . 192	<i>Nigra</i> Koch. . . . 225
<i>leucanthemus</i> Df. 967	<i>vulgaris</i> BB. . . 191	<i>orientalis</i> . . . 217
<i>Linosyris</i> Brnh. . 970	Barkhausia Mch. 397	<i>obtusangula</i> . . . 221
<i>sinensis</i> . . . 969	<i>foetida</i> DC. . . 1022	<i>oleracea</i> . . . 222
<i>stenactis</i> . . . 964	<i>gracilis</i> Lej. <i>c.</i> 1022	<i>a. acephala</i> DC. . . —
Astragalus . . . 117	<i>prostrata</i> Dmtr. <i>b.</i> 1022	† <i>vulgaris</i> . . . —
<i>glycyphyllus</i> . . . 297	<i>taraxacifolia</i> Th. 1023	† † <i>quercifolia</i> . . . —
Astrantia Trn. . . 178	Brachium E. M. <i>p.</i> 10	† † † <i>crispa</i> . . . —
<i>major</i> . . . 514	<i>Ranunculus</i> . . . 15	<i>b. capitata</i> DC. . . —
Athamanta . . . 546	Bellis . . . 357	† <i>alba</i> . . . —
<i>Cervaria</i> . . . 546	<i>caulescens</i> Lej. <i>b.</i> 934	† † <i>rubra</i> . . . —
<i>Libanotis</i> . . . 535	<i>perennis</i> . . . 934	<i>c. sabauda</i> . . . —
<i>Menn</i> . . . 539	<i>silvestris</i> Cy. <i>b.</i> 934	† <i>gemmifera</i> DC. —
<i>Oreoselinum</i> . . . 548	BERBERIDÆE . <i>p.</i> 14	<i>d. gonglioides</i> . . . —
Atriplex Trn. . . 403	Berberis . . . 17	<i>e. botrytis</i> DC. . . —
<i>erectum</i> Sm. <i>b.</i> 1050	<i>vulgaris</i> . . . 50	Rapa . . . 224
<i>hastatum</i> . . . 1049	Berteron DC. . . 89	<i>a. oleifera</i> DC. . . —
<i>hortense</i> . . . 1046	<i>incana</i> DC. . . 236	† <i>annua</i> . . . —
<i>latifolium</i> Whlb. 1049	Berula Koch. . . 527	† † <i>biennis</i> . . . —
<i>nitens</i> Skr. . . 1047	<i>angustifolium</i> . . 405	<i>b. rapifera</i> Metz. . . —
<i>oblongifolium</i> W. K. 1048	Beta Trn. . . . 1053	† <i>oblonga</i> . . . —
<i>oppositifolium</i> <i>c.</i> 1050	<i>vulgaris</i> . . . 1053	† † <i>depressa</i> . . . —
<i>patulum</i> . . . 1050	Betonica . . . 305	Braya Sternb. . . 79
<i>rubrum</i> DC. <i>b.</i> 1046	<i>officinalis</i> . . . 794	<i>supina</i> Koch. . . 213
<i>tataricum</i> . . . 1048		

Briza	540	Calamintha Mch.	295	Campanula	316
<i>maxima</i>	1450	<i>Acinos</i> Clrr.	767	<i>urticaefolia</i> Sch. b.	822
<i>media</i>	1450	<i>grandiflora</i> Meh.	769	CAMPANULACEÆ. p.	111
Bromus	543	<i>officinalis</i> Meh.	768	CANNABINÆE . p.	144
<i>arduennensis</i> Kb.	1474	Calendula	361	Cannabis Trn.	412
<i>arvensis</i>	1467	<i>arvensis</i>	943	<i>sativa</i>	1094
<i>asper</i> Mrs.	1464	<i>officinalis</i>	944	CAPRIFOLIACEÆ. p.	114
<i>commutatus</i> Schr.	1471	Calepina Adans.	101	Capsella Vent.	96
<i>elongatus</i> Gd. b.	1472	<i>Corvini</i> Desv.	259	<i>Bursa pastoris</i> Meh.	250
<i>erectus</i> Hds.	1463	Calla	495	Cardamine	75
<i>giganteus</i>	1488	<i>palustris</i>	1299	<i>amara</i>	199
<i>grossus</i> DC.	1473	Callitriche	428	<i>hirsuta</i>	201
<i>hordeaceus</i> Gm. c.	1472	<i>angustifolia</i> Hop. e.	1127	<i>impatiens</i>	208
<i>inermis</i> Lys.	1466	<i>autumnalis</i> T.	1128	<i>intermedia</i> Horn.	201
<i>mollis</i>	1469	<i>crepitosa</i> Sch. b.	1127	<i>multicaulis</i> Hpp.	201
<i>montanus</i>	1464	<i>intermedia</i> Hpp. d.	1127	<i>pratensis</i>	200
<i>nitidus</i> Dm. . c.	1473	<i>minima</i> Hpp. b.	1127	<i>silvatica</i> Lk.	202
<i>patulus</i> M.	1468	<i>stagnalis</i> Sep.	1126	Capsicum Tr.	261
<i>pinnatus</i>	1490	<i>stellata</i> Hpp. c.	1127	<i>annuum</i>	661
<i>pinnatus</i> var. b.	1489	<i>verna</i>	1127	Carduus	342
<i>pratensis</i>	1471	<i>vernalis</i> Kütz.	2127	<i>acanthoides</i>	897
<i>racemosus</i>	1470	CALLITRICHINÆE p.	148	<i>erispus</i>	895
<i>Schraderi</i> Kth.	1475	Calluna Sbg.	224	<i>eriphorum</i>	888
<i>secalinus</i>	1472	<i>vulgaris</i> Sbg.	587	<i>lanceolatus</i>	887
<i>sterilis</i>	1462	Caltha	8	<i>marianus</i>	898
<i>tectorum</i>	1463	<i>minor</i> DC. . b.	35	<i>multiflorus</i> Gd.	894
<i>triflorus</i> Ehr.	1487	<i>palustris</i>	35	<i>nutans</i>	896
<i>velutinus</i> Schrd. b.	1473	CALYCANTHEÆ. p.	69	<i>palustris</i>	889
Brunella	309	Calycanthus Ldy.	170	<i>polyanthemos</i> Schl.	894
<i>alba</i>	801	<i>floridus</i> Ldl.	494	<i>tenuiflorus</i> Grt.	893
<i>grandiflora</i> Jacq.	890	Calystegia Ldly.		Carex Mich.	501
<i>laciniata</i>	801	<i>pubescens</i>	628	<i>acuta</i>	1340
<i>pinnatifida</i> Pers. b.	799	<i>Sepium</i>	628bis	<i>acutiformis</i> Ehr.	1363
<i>surrecta</i> Dmtr. c.	799	Camellia Cntz.	92	<i>agastachys</i> Ehr.	1350
<i>vulgaris</i>	799	<i>dentata</i> Pers.	243	<i>ampullacea</i> Good.	1361
Bryonia	321	<i>microcarpa</i> Andz.	242	<i>biformis</i> Schlitz.	1355
<i>dioica</i> Jacq.	834	<i>pinnatifida</i> Pers. b.	243	<i>biligularis</i> DC.	1358
Bunium		<i>sativa</i> Cntz.	242	<i>binervis</i> Sm.	1357
<i>Bulbocastanum</i>	520	<i>silvestris</i> Wllr.	241	<i>brizoides</i>	1331
Bupleurum Trn.	180	Campanula	316	<i>cæspitosa</i>	1338
<i>falcatum</i>	517	<i>aggregata</i> W. e.	824	<i>canescens</i>	1336
<i>rotundifolium</i>	516	<i>Cervicaria</i>	825	<i>clandestina</i> Good.	1345
BUTOMÆE . p.	157	<i>elliptica</i> Kit. c.	824	<i>collina</i> Willd.	1343
Butomus Trn.	450	<i>glomerata</i>	824	<i>corta</i> Good.	1336
<i>umbellatus</i>	1182	<i>hederacea</i>	833	<i>diantra</i> Rth.	1327
Buxus Trn.	427	<i>hybrida</i>	828	<i>digitata</i>	1346
<i>sempervirens</i>	1125	<i>Medium</i>	823	<i>distans</i>	1354
<i>suffruticosa</i> . b.	1125	<i>patula</i>	826	<i>disticha</i> Hds.	1323
		<i>persicæfolia</i>	818	<i>divulsa</i> Good.	1326
Calamagrostis Ad.	521	<i>pumila</i>	824	<i>Drejeri</i> Lg.	1338
<i>arundinacea</i> Rth.	1411	<i>pyramidalis</i>	819	<i>echinata</i> Mrr.	1333
<i>contracta</i> Dmtr. b.	1411	<i>rapunculoides</i>	821	<i>elongata</i>	1335
<i>epigeios</i> Rth.	1410	<i>Rapunculus</i>	817	<i>flacca</i> Schlr.	1349
<i>lanceolata</i> Rth.	1409	<i>rotundifolia</i>	820	<i>flava</i>	1352
<i>montana</i> DC.	1412	<i>salviaefolia</i> Wall. d.	824	<i>fulva</i> Good.	1356
<i>silvatica</i>	1411	<i>speciosa</i> Hrn. f.	824	<i>Gebhardi</i> Willd.	1335
<i>subulata</i> Dmtr.	1412	<i>speculum</i>	827	<i>glauca</i> Scop.	1349
<i>varia</i> Schr.	1412	<i>Trachelium</i>	822	<i>Goodenoughii</i> Gy.	1339

Carex Mich.	501	Carum	183	Cerastium	34
<i>gracilis</i> Grt.	1340	<i>Bulbocastanum</i> K.	520	<i>semidecandrum</i>	98
<i>hirta</i>	1365	<i>Carvi</i>	521	<i>tomentosum</i>	99
<i>Hornschuchiana</i> H.	1355	CARYOPHILLEÆ p.	14	<i>viscosum</i>	96
<i>humilis</i> Lys.	1345	Castalia Lk.		<i>vulgatum</i>	101
<i>intermedia</i> Good.	1323	<i>alba</i>	171	Cerasus Juss.	147
<i>kevigata</i> Sm.	1358	Castanea Trn.	432	<i>avinum</i> Meh.	398
<i>leporina</i>	1334	<i>sativa</i> Mill.	1133	<i>brevipes</i> D.	399
<i>loliacea</i>	1325	<i>vesca</i> Gærtn.	1133	<i>duracina</i> DC.	398
<i>Morisonii</i> And.	1352	<i>vulgaris</i> Lk.	1133	<i>Juliana</i> DC.	398
<i>macina</i> Sep.	1350	Catabrosa P. B.	538	<i>Mahaleb</i> Mill.	400
<i>montana</i>	1343	<i>aquatica</i> P. B.	1445	<i>Padus</i> DC.	401
<i>muricata</i>	1325	Caucalis	209	<i>sempiflorens</i> Ehr. c.	399
<i>nigra</i>	1340	<i>Anthriscus</i>	550	<i>vulgaris</i> Mill.	399
<i>obtusangula</i> Ehr.	1361	<i>daucoides</i>	558	CERATOPHYLLÆ p.	149
<i>Oederi</i> Ehr.	1353	<i>grandiflora</i>	556	Ceratophyllum	429
<i>ornithopoda</i> Wlld.	1347	<i>infesta</i>	561	<i>apiculatum</i>	1129
<i>ovatis</i> Good.	1334	<i>latifolia</i>	557	<i>demersum</i>	1129
<i>pacifica</i> Drj.	1338	<i>Leptophylla</i>	559	Cercis	122
<i>Poiræi</i> T. Schlz.	1326	<i>nodiflora</i>	562	<i>siliquastrum</i>	330
<i>pallescens</i>	1351	CELASTRINEÆ p.	26	Cherophyllum	212
<i>paludosa</i> Good.	1363	Centauria	346	<i>bulbosum</i>	566
<i>panicea</i>	1348	<i>angustifolia</i>	910	<i>Cerrefolium</i>	563
<i>paniculata</i> Lightf.	1328	<i>Calcitrapa</i>	904	<i>hirsutum</i>	567
<i>paradoxa</i> Wlld.	1329	<i>Cyanus</i>	906	<i>odoratum</i> Lk.	568
<i>patula</i>	1359	<i>decipiens</i>	910	<i>silvestre</i>	564
<i>pendula</i> Huds.	1350	<i>Duboisii</i> Bor.	910	<i>temulum</i>	565
<i>pilosa</i> Sep.	1344	<i>Jacea</i>	910	Chaiturus Wlld.	
<i>pilulifera</i>	1341	<i>maculosa</i> Lk.	909	<i>Marrubiustrum</i>	798
<i>præcox</i> Sch.	1330	<i>montana</i>	997	Chamaepitium Wllr.	
<i>præcox</i> Jeq.	1344	<i>nigra</i>	913	<i>officinale</i> Wllr.	211
Pseudo-Cyperus	1360	<i>nigrescens</i> Wlld.	611	Chamomilla Gy.	
<i>psyllospora</i> Ehr.	1322	<i>paniculata</i> Jacq.	908	<i>officinalis</i> C. K.	927
<i>pulicaris</i>	1322	<i>pratensis</i> Th.	911	Chelanthus	72
<i>recurva</i> Hds.	1349	<i>pseudo-pyrgia</i> My.	912	<i>eheiri</i>	190
<i>remota</i>	1332	<i>pyrgia</i>	912	Chelidonium	66
<i>reversa</i>	1360	<i>Scabiosa</i>	908	<i>laciniatum</i>	178
<i>riparia</i> Crt.	1364	<i>serotina</i> Bor.	910	<i>majus</i>	178
<i>rostrata</i> Whit.	1361	<i>solstitialis</i>	905	Chenopodium Trn.	406
<i>Schreberi</i> Schk.	1330	Centranthus DC.	332	<i>acutifolium</i> Vent.	1054
<i>silvatica</i> Hds.	1359	<i>ruber</i> DC.	865	<i>album</i>	1056
<i>stellulata</i> Good.	1333	Centunculus	227	<i>Bonus Henricus</i>	1064
<i>stolonifera</i> Ehr.	1344	<i>minimus</i>	596	<i>ficifolium</i> Sm.	1062
<i>stricta</i> Good.	1337	Cephalanthera Rch.	483	<i>glaucum</i>	1058
<i>teretiuscula</i> Good.	1327	<i>ensifolia</i> Rich.	1270	<i>hybridum</i>	1057
<i>tomentosa</i>	1342	<i>grandiflora</i> Bab.	1269	<i>intermedium</i> M.	1059
<i>tricostata</i> Fr.	1340	<i>pallens</i> Rich.	1269	<i>lanceolatum</i> M. c.	1056
<i>uliginosa</i>	1376	<i>Xyrophyllyum</i> Rch.	1270	<i>murale</i>	1060
<i>verna</i> Vill.	1344	Cerastium	34	<i>opulifolium</i> Schr.	1061
<i>vesicaria</i>	1362	<i>apetalum</i> Dm.	101	<i>polyspermum</i>	1054
<i>vesicaria</i>	1361	<i>aquaticum</i>	104	<i>rubrum</i>	1065
<i>virens</i> Schb.	1325	<i>arvense</i>	102	<i>Scoparium</i>	1013
<i>vulgaris</i> F.	1339	<i>brachypetalum</i> D.	100	<i>urbicum</i>	1059
<i>vulpina</i>	1324	<i>cæspitosum</i> Lej.	96	<i>viride</i>	1056
Carlina Trn.	339	<i>erectum</i>	103	<i>Vulvaria</i>	1055
<i>vulgaris</i>	885	<i>glomeratum</i> Th.	101	Chironia	
Carpinus	435	<i>obscurum</i>	97	<i>Centaurium</i>	624
<i>Betulus</i>	1140	<i>pumilum</i> Cr.	97	<i>pulchella</i>	625

Chondrilla Trn. 393	Cochlearia 91	Corynephorus P. B.
<i>juncea</i> 1011	<i>Linnei</i> Griew. 240	<i>cuneus</i> P. B. 1416
<i>muralis</i> Lk. 1013	<i>officinalis</i> 240	Cotoneaster Md. 163
Chrysanthemum 356	Colchicaceæ . p. 157	<i>integerrimus</i> Md. 481
<i>Chamomilla</i> Bhd. 927	Colchicum Trn. 451	<i>vulgare</i> Ldl. 481
<i>indoratum</i> 928	<i>autumnale</i> 1189	Cræca Rev.
<i>Leucanthemum</i> 929	Colutea 116	<i>major</i> G. et Grn. 332
<i>segetum</i> 933	<i>arborescens</i> 296	<i>monanthos</i> God. 343
<i>vulgare</i> Bhd. 940	Comarum 153	<i>tenuifolia</i> G. et Gm. 333
Chrysocoma	<i>palustre</i> 445	Crassula 140
<i>Linosyris</i> 970	<i>supinum</i> 452	<i>rubens</i> 379
Chrysosplenium Tr. 222	Compositæ . p. 119	Crassulacææ . p. 53
<i>alternifolium</i> 584	Comingia	<i>Cratægus</i> 162
<i>oppositifolium</i> 585	<i>Thaliana</i> Rb. 210	<i>Arta</i> 492
Cleodendia Ads. 242	<i>orientalis</i> And. 217	<i>monogyna</i> Jacq. 479
<i>filiformis</i> Del. 623	Conium 215	<i>Oxyacantha</i> 478
Clethrum Trn. 383	<i>maculatum</i> 570	<i>Pyracantha</i> 480
<i>Erdviva</i> 990	Conopsidium Wlfr.	<i>terminalis</i> Crntz. 491
<i>Intybus</i> 989	<i>platanthemum</i> Wlr. 1266	Crepis 398
Cicuta	<i>sternantherum</i> Wlr. 1265	<i>biennis</i> 1027
<i>major</i> 570	Convallaria 464	<i>diffusa</i> . c. 1029
Cinara Vail. 340	<i>bifolia</i> 1229	<i>felida</i> 1022
<i>Scolymus</i> 886	<i>maialis</i> 1225	<i>gracilis</i> . c. 1022
Cineraria 375	<i>multiflora</i> 1227	<i>paludosa</i> 1026
<i>spatulæfolia</i> Gml. 972	<i>Polygonatum</i> 1228	<i>pinnatifida</i> . b. 1029
Circea 174	<i>verticillata</i> 1226	<i>præmorsa</i> 1024
<i>alpina</i> 508	Convolvulacææ p. 88	<i>prostrata</i> . b. 1022
<i>intermedia</i> Ehr. 507	Convolvulus 245	<i>pulehra</i> 1025
<i>lutetiana</i> 506	<i>arvensis</i> 627	<i>stricta</i> 1029
<i>lutetiano-alpina</i> Md. 507	<i>pubescens</i> Ldl. 628	<i>taraxacifolia</i> 1023
CIRCEACEÆ . p. 71	<i>sepium</i> 629	<i>tectorum</i> 1028
Cirsium Trn. 341	Conyza	<i>virens</i> 1029
<i>acaule</i> All. 890	<i>squarrosa</i> 957	CRUCIFERÆ . p. 30
<i>arvense</i> Sep. 891	Coreopsis	<i>Cucubalus</i> Trn. 22
<i>caulescens</i> . b. 890	<i>Bidens</i> 916	<i>baccifer</i> 63
<i>decoloratum</i> Koeh. c. 890	Coriandrinum 216	<i>Behen</i> 64
<i>dubium</i> Willd. . b. 890	<i>sativum</i> 571	Cucumis 322
<i>eriophorum</i> Sep. 888	Cornus Trn. 218	<i>Melo</i> 836
<i>lanceolatum</i> Sep. 887	<i>mas</i> 574	<i>sativus</i> 835
<i>nemorale</i> Rehb. . b. 887	<i>sanguinea</i> 573	Cucurbita 323
<i>oleraceum</i> Sep. 892	Coronaria 25	<i>maxima</i> Duch. 837
<i>palustre</i> Sep. 889	<i>Flos-Cuculi</i> A. 74	<i>Pepo</i> 838
<i>setosum</i> M. B. . b. 891	<i>tomentosa</i> A. 75	CUCURBITACÆÆ . p. 114
CISTINEÆ . p. 39	Coronilla 129	CUPRESSINEÆ . p. 156
Cistus	<i>Emerus</i> 361	CUPULIFERÆ . p. 150
<i>Helianthemum</i> 260	<i>varia</i> 362	Cuscuta Trn. 246
Clematis 8	Coronopus Hall.	<i>densiflora</i> 630
<i>erecta</i> Al. 2	<i>Senebiera</i> 256	<i>Epilinum</i> Weih. 630
<i>recta</i> 2	<i>squamatus</i> Asch. 256	<i>Epitymum</i> Mur. 632
<i>Vitalba</i> 1	Corrigiola 137	<i>europæa</i> pa. 631
Clinopodium 296	<i>litoralis</i> 274	<i>minor</i> 632
<i>vulgare</i> 770	Corydalis DC. 69	<i>major</i> Bh. 631
Cnicus Vail.	<i>bulbosa</i> 181	<i>suaveolens</i> Ser. 629
<i>oleraceus</i> 892	<i>digitata</i> Prs. 181	<i>trifolii</i> Bab. . b. 632
Cochlearia 91	<i>lutea</i> DC. 182	CUSCUTEÆ . p. 88
<i>Armoracia</i> 239	<i>solida</i> Sm. 181	Cuscutina Psr.
<i>Coronopus</i> 256	Corylus 434	<i>suaveolens</i> Psr. 629
<i>Draba</i> 255	<i>Avellana</i> 1139	

Cydoula . . . 165	Digitaria Trn. . . 274	Epilobium . . . 171
japonica . . . 484	ambigua Mrr. . . 708	decumbens DC. <i>b.</i> 503
vulgaris . . . 483	ambiguo-lutea . . 709	<i>grandiflorum</i> W. 496
Cynanchicum	<i>grandiflora</i> Lk. . . 708	hirsutum . . . 496
<i>Vincetoxicum</i> Rb. 642	<i>Libertia</i> Dmtr. 707	intermedium M. <i>b.</i> 497
Cynoglossum . . 256	lutea . . . 706	lanceolatum Sch. 498
<i>Lappula</i> Willr. . . 654	<i>media</i> Rth. . . 709	<i>molle</i> Link. . . 497
officinale . . . 654	<i>ochroleuca</i> Jacq. . 708	montanum . . . 499
Cynosurus . . . 535	<i>parviflora</i> . . . 706	nutans Lej. . . <i>b.</i> 499
<i>curvulus</i> . . . 1415	<i>purpurascens</i> Rth. 707	obscurum Schr. 502
eristatus . . . 1440	purpurea . . . 705	palustre . . . 503
<i>durus</i> . . . 1452	purpureo-lutea . . 707	parviflorum Rtz. 497
CYPERACEÆ . . p. 177	Digitaria . . . 514	<i>pubescens</i> Rth. . . 497
Cyperus . . . 505	filiformis Koch. . 1391	roseum Schr. . . 500
flavescens . . . 1381	<i>glabra</i> B. . . . 1391	<i>sparsiflorum</i> . . . 498
fuscus . . . 1382	<i>linearis</i> 1391	<i>spiratum</i> 495
Cypripedium . . 488	sanguinalis Sep. 1390	tetragonum . . . 501
Calceolus . . . 1277	DIOSCOREÆ . . p. 162	Epimedium . . . 18
Cytisus . . . 106	Diplotaxis DC. . . 82	alpinum 51
Laburnum . . . 278	muralis DC. . . . 220	Epipactis Rich. . 484
sagittalis Koch . . 280	tenuifolia DC. . . 219	<i>ensifolia</i> Schw. . 1270
	DIPSACEÆ . . p. 418	<i>Helleborine</i> Ctz. . 1272
Dactylis . . . 543	Dipsacus Trn. . . 337	latifolia 1272
glomerata . . . 1461	Fullonum Mill. . . 882	<i>lanceifolia</i> . . . 1269
hispanica Rth. <i>b.</i> 1461	pilosus 881	microphylla Reh. <i>b.</i> 1272
Dahlia Cav. . . . 377	silvestris 883	<i>Nidus-avis</i> Crtz. 1274
variabilis Desf. . . 983	Draba 90	<i>ovata</i> Crtz. . . . 1273
Danthonia	muralis 238	palustris Crtz. . . 1273
<i>decumbens</i> . . . 1436	verna 237	<i>pallens</i> Willd. . . 1269
Daphne . . . 417	Drosera 59	<i>rubra</i> All. . . . 1271
Mezereum . . . 1102	<i>intermedia</i> Hayn. 163	varians Crtz. <i>c.</i> 1272
Datura . . . 267	longifolia 163	Epipogon Gn. . . 481
Stramonium . . . 667	rotundifolia . . . 162	aphyllus Sw. . . 1267
Daucus Trn. . . 206	DROSERACEÆ . . p. 27	<i>Gmelini</i> Rich. . . 1267
Carota 555	Ebulum Pont. . . . 840	Eranthis Slzb. . . 9
sativa . . . <i>b.</i> 555	humile Gk. . . . 840	hiemalis Slzb. . . 36
Delphinium Trn. 13	Echinops 347	Erica 223
Ajaxis 45	speriocephalus . . 914	Tetralix 586
consolida 44	Echinosperrnum Sm 255	<i>vulgaris</i> 587
Deschampsia P. B. 527	Lappula Lhm. . . 653	ERICINÆE . . p. 82
cæspitosa P. B. . . 1419	Echium Trn. . . 259	Erigeron 370
discolor 1421	vulgare 652	acris 962
flexuosa 1420	ELEAGNÆE . . p. 146	canadense 963
parviflora . . <i>b.</i> 1421	Eleagnus 419	serotinum Wh. <i>b.</i> 962
Dianthus 20	angustifolia . . . 1104	Eriophorum . . . 514
Armeria 54	ELATINÆE . . p. 20	angustifolium Rth. 1378
arrectus Dmtr. . . 57	Elatine 37	gracile Koch. . . 1380
cæsius Sm. . . . 59	Alsinastrium . . . 105	latifolium Hpp. . . 1379
Carthusianorum. 53	Elymus 550	<i>polystachium</i> . . 1378
Caryophyllus. . . 56	europæus 1502	<i>trigastrium</i> Hpp. 1380
Jeltoides 58	Erodium	Erodium L'hérit. 45
diminutus . . <i>b.</i> 53	<i>cerneum</i> 1444	Cicutarium L'hér. 127
glaucus . . . <i>b.</i> 58	Ephemerum	pimpinellifolium id. 128
plumarius . . . 60	<i>nemorum</i> 593	Erophila DC.
prolifer 53	Epilobium . . . 171	<i>verna</i> DC. . . . 237
Diellamnus . . . 42	<i>adnatum</i> Geb. . . 501	<i>vulgaris</i> DC. . . . 237
albus 113	angustifolium . . 495	Erucastrum Prd. 83
<i>Fraxinella</i> Pers. 113		obtusangulum Rb. 221

Ervilia		Euphrasia Trn.	280	Ellago Trn. . .	366
<i>sativa</i> . . .	344	<i>verna</i> Bld. . .	731	<i>montana</i> DC. . .	953
Eryum Trn. . .	124	EUPHORBACEE. p.	147	<i>pyramidata</i> . . b.	951
<i>Ervilia</i> . . .	344	Eryonymus Trn.	56	Feniculum Ad.	193
<i>gracile</i> DC. . .	342	<i>europaea</i> . . .	153	<i>officinale</i> All. . .	538
<i>hirsutum</i> . . .	340	Exacum W.		Fragaria . . .	152
<i>Lens</i> . . .	345	<i>filiforme</i> W. . .	621	<i>chilensis</i> Ehr. . .	444
<i>monanthos</i> . . .	343	Faba Nel. . . .	125	<i>collina</i> Ehr. . . .	441
<i>pisiforme</i> Trn. . .	331	<i>vulgaris</i> Meh. . .	346	<i>communis</i> Ehr. b.	440
<i>tetraspermum</i> . .	341	<i>equina</i> . . a.	346	<i>efflagellis</i> Ehr. c.	439
Eryugium Trn. . .	179	— . . b.	346	<i>elutior</i> Ehr. . . .	440
<i>campestre</i> . . .	515	Eragopyrum Trn.	410	<i>grandiflorum</i> Ehr.	443
Erysimum . . .	80	<i>esculentum</i> Meh.	1090	<i>heterophylla</i> Ehr. c.	440
<i>Attivaria</i> . . .	147	<i>laticum</i> Grtn. . .	1091	<i>monophylla</i> Ehr. d.	439
<i>arenatum</i> Opz. . .	192	Eragus Trn. . . .	431	<i>moschata</i> Dehn. . .	440
<i>Barbarea</i> . . .	191	<i>Castanea</i> . . .	1133	<i>semperflorens</i> Ehr. b.	439
<i>cheiranthoides</i> . .	214	<i>sylvatica</i> . . .	1132	<i>sterilis</i>	446
<i>hieracifolium</i> . .	215	Palcaria Rev. . .	181	<i>vesca</i>	439
<i>longisiliquosum</i> Rb.	216	<i>Rivini</i> Hst. . . .	518	<i>viridis</i> D. . . .	441
<i>officinale</i> . . .	211	<i>scioides</i> Bh. . . .	518	<i>virginiana</i> . . .	442
<i>orientale</i> R. Br. . .	217	<i>vulgaris</i> Bh. . . .	518	Fraxinus Trn.	233
<i>perfoliatum</i> Crtz.	217	Farsetia R. Br.		<i>excelsior</i>	605
<i>praeceox</i> Sm. . . .	194	<i>incana</i> R. Br. . .	236	<i>Ornus</i>	606
<i>strictum</i> Fl. Wett.	215	Fedia		Fritillaria . . .	453
<i>virgatum</i> Rth. . .	216	<i>olitoria</i> Vhl. . . .	869	<i>imperialis</i> . . .	1192
Erythraea Rich. . .	343	Festuca	545	Fumaria Trn.	70
<i>Centaureum</i> Pers.	624	<i>arundinacea</i> Schb.	1486	<i>bulbosa</i>	181
<i>Gerardii</i> . . b.	625	<i>bromoides</i> . . .	1477	<i>capreolata</i> . . .	187
<i>imperta</i> Willd. . .	625	<i>capillata</i> Lk. d.	1483	<i>lutea</i>	182
<i>pulehella</i> Fr. . .	625	<i>decumbens</i> . . .	1436	<i>officinalis</i> . . .	183
<i>ramosissima</i> Pers. b.	625	<i>distans</i> Kit. . . .	1419	<i>parviflora</i> Lk. . .	186
Eschscholtzia Ch.	68	<i>durinsecula</i> . . .	1482	<i>tenuifolia</i> Fr. . .	184
<i>californica</i> DC. . .	180	<i>elatior</i>	1484	<i>Vaillantii</i> Lst. . .	185
Eupatorium Trn.	378	<i>gigantea</i> Vill. . .	1488	<i>Wirtgeni</i> Koch. . .	184
<i>cannabinum</i> . . .	984	<i>glauca</i> Shd. . . b.	1483	FUMARIACEE . . p.	30
Euphorbia . . .	425	<i>heterophylla</i> Lk.	1481	Gagea Salisb. . .	456
<i>amygdaloides</i> . .	1112	<i>heterophylla</i> . . .	1482	<i>arvensis</i> Shlt. . .	1199
<i>Cyparissias</i> . . .	1121	<i>lioliacea</i> Hds. . .	1485	<i>lutea</i> Shlt. . . .	1201
<i>dulcis</i> Jeq. . . .	1116	<i>Myuros</i> Ehr. . . .	1479	<i>minima</i> Shlt. . .	1200
<i>Esula</i>	1122	<i>ovina</i>	1483	<i>pratensis</i> Shlt. .	1198
<i>exigua</i>	1115	<i>praeceox</i>	1418	<i>sylvatica</i>	1200
<i>felida</i> Hpp. . . .	1119	<i>pratensis</i> Hds. . .	1484	<i>stenopetala</i> Rechb.	1196
<i>Gerardiana</i> Jeq. .	1120	<i>Pseudo-Myuros</i> Soy.	1479	Galearanthus . . .	472
<i>helioscopia</i> . . .	1114	<i>radicans</i> . . b.	1484	<i>nivalis</i>	1238
<i>Lathyrus</i>	1111	<i>rigida</i> Kth. . . .	1476	Galega Trn. . . .	115
<i>micrantha</i> M. B. .	1119	<i>rubra</i>	1480	<i>officinalis</i> . . .	295
<i>Peplus</i>	1113	<i>seiuroides</i> Rh. . .	1478	Galeobdolon Hds.	302
<i>platyphyllos</i> . . .	1118	<i>sylvatica</i> Vill. . .	1487	<i>luteum</i> Hds. . . .	780
<i>purpurata</i> Th. . .	1116	<i>unguis</i> Dmtr. . .	1477	Galeopsis . . .	303
<i>sitcutica</i> Jeq. . .	1112	<i>valesiaca</i> Schleh c	1483	<i>angustifolia</i> Ehr.	783
<i>striata</i>	1119	Glebaria Dill. . .	7	<i>bifida</i> Engb. b.	781
<i>verrucosa</i>	1117	<i>ranunculoides</i> . .	34	<i>cannabinata</i> Rth. c.	781
Euphrasia Trn.	280	Ellago Trn. . . .	366	<i>Galeobdolon</i> . . .	780
<i>lutea</i>	733	<i>arvensis</i> Fr. . . .	951	<i>grandiflora</i> Rth.	783
<i>nemorosa</i> Pers. . .	730	<i>gallica</i>	952	<i>intermedia</i> Vill. .	784
<i>Odontites</i>	731	<i>germanica</i> . . .	951	<i>Ladanum</i>	785
<i>officinalis</i>	729	<i>minima</i> Fr. . . .	953	<i>ochroleuca</i> Lk. . .	783
<i>serotina</i> Lk. . . .	732				

Galeopsis . . .	303	Geranium . . .	44	HALORAGEE . . p.	71
speciosa M. . .	782	sanguineum . . .	120	Hedera . . .	217
Tetrahit . . .	781	silvaticum . . .	147	Helix . . .	572
versicolor Cr. . .	782	Geum . . .	151	humil-repens Lej. b.	572
villosa Hb. . .	783	intermedium Ehr. .	437	HERERAGEE . . p.	79
Gallum . . .	331	intermedium Wllr. .	438	Hedysarum	
agreste Wllr. . .	863	rivale . . .	436	<i>Onobrychis</i> . . .	366
Aparine . . .	863	rivale-urbanum M. .	437	Heleocharis R. Br. .	503
Cruciata Sep. . .	854	urbanum . . .	435	acicularis R. Br. .	1368
elatum Th. . .	857	urbano-rivale M. .	439	palustris R. Br. .	1367
erectum Hb. . .	858	Githago Df. . .		Helianthemum Tr. .	102
glaucom . . .	851	segetum Df. . .	77	Chamaecistus Mill. .	260
hercynicum DC. .	860	Glaucium Trn . .	67	obscurum Pers. b .	260
habe Th. . .	859	flavum Crntz. . .	179	polifolium . . .	261
lucidum Al. . .	858	Glechoma		pulverulentum DC. b.	261
Mollugo . . .	857	hederacea . . .	774	serpyllifolium Clz. c.	261
palustre . . .	861	hirsuta Koch. b. .	774	vulgare G. . .	260
saxatile . . .	850	villosa Rehb. . .	774	Helianthus . . .	349
silvaticum . . .	856	Glyceria R. Br. .	539	annuus . . .	917
silvestre Poll. .	859	aquatica Whl. . .	1448	rigidus . . .	918
spurium . . . c.	863	aquatica Prst. . .	1445	tuberosus . . .	918
supinum DC. . b.	859	distans Whlb. . .	1449	Helichrysum Grtn. .	263
tricornis With. .	864	fluitans R. Br. .	1446	arenarium DC. . .	946
uliginosum . . .	862	maritima T. . .	1449	Heliodropium . . .	256
Vaillantii DC. . b.	863	plicata Fr. . .	1447	europæum . . .	657
verum . . .	855	rigida Sm. . .	1476	Helleborus Ad. . .	10
Genista . . .	107	spectabilis M. K. .	1448	foetidus . . .	39
anglica . . .	2792	Gnaphalium Trn. .	364	hiemalis . . .	36
germanica . . .	279	arenarium . . .	946	niger . . .	37
juncea . . .	283	arvense Lk. . .	954	pullens . . .	38
pilosa . . .	282	dioicum . . .	950	viridis . . .	38
sagittalis . . .	280	luteo-album . . .	948	Helminthia Juss. .	388
scoparia . . .	277	montanum Hds. .	953	echioides Grtn . .	999
tinctoria . . .	281	nudum Hoffm. b. .	949	Helosciadium Koch. .	186
Genlana . . .	241	rectum Sm. . .	947	inundatum K. . .	525
acaulis . . .	622	silvaticum . . .	947	nodiflorum K. . .	524
Amarella . . .	620	uliginosum . . .	949	Hemerocallis . . .	462
campestris . . .	618	GRAMINEE . . p.	182	flava . . .	1222
<i>Centaurium</i> . . .	624	Gratiola . . .	273	fulva . . .	1223
ciliata . . .	621	officinalis . . .	704	Hepatica Dill. . .	
cruciata . . .	616	GROSSULARIEE . p	80	<i>triloba</i> G. . .	10
filiformis . . .	623	Gymnadenia R. Br. .	479	nobilis Rehb. . .	10
germanica Wllr. .	619	albida Rich. . .	1263	Heracleum . . .	263
Pneumonanthe .	617	albiflora . . . b.	1261	elegans Jeq. . . b.	552
pulchella Hw. . .	625	conopsea R. Br. .	1261	sibiricum . . . c.	552
GIANTANEE . . p.	86	odoratissima Rich. .	1262	Spondylium . . .	552
GERANIACEE . . p.	21	ornithis Jeq. b. .	1261	Hernium R. Br. .	476
Geranium . . .	44	viridis Rich. . .	1264	clandestinum G. G. .	1260
cicutarium . . .	127	Gynertum H. et B. .	534	Monorchis R. Br. .	1260
columbinum . . .	121	argenteum N. . .	1439	Herniaria Trn. . .	138
dissectum . . .	122	Gypsophila . . .	19	glabra . . .	375
molle . . .	123	muralis . . .	52	hirsuta . . .	376
palustre . . .	149	serotina Hyn. . .	52	Hesperis A. . .	81
præum . . .	116	Vaccaria Sm. . .	61	Alliaria Wllr. . .	209
pratense . . .	118	Habenaria R. Br. .		incana fl. pl. b. .	218
pusillum . . .	124	albida Sm. . .	1263	inodora . . .	218
Robertianum. . .	126	viridis R. Bw. . .	1264	matronalis . . .	218
rotundifolium . .	125				

Hibiscus . . . 48	Hordeum . . . 549	Isolepis
syriacus . . . 138	vulgare . . . 1500	<i>acicularis</i> . . . 1368
Trionum . . . 137	zeocrithon . . . 1499	<i>setacea</i> . . . 1371
Hieracium Trn. . . 399	Humulus . . . 413	
Auricula . . . 1031	Lupulus . . . 1095	Jasione . . . 319
<i>autumnale</i> Grb. . . 1037	Hydrocotyle Trn. . . 176	humilis . . . <i>b.</i> 832
<i>bieme</i> Karsch. . . 1027	vulgaris . . . 512	montana . . . 831
boreale Fr. . . 1038	Hyoscyamus Trn. . . 268	perennis Lk. . . 832
caespitosum D. . . 1033	niger . . . 668	JASMINEE . . . <i>p.</i> 85
<i>collinum</i> Rehb. . . 1033	Hyoseris . . . 382	Jasminum . . . 235
<i>dubium</i> Wld. . . 1031	minima . . . 988	fruticans . . . 609
Hieracium Trn. . . 399	HYPERICINEE . . . <i>p.</i> 26	JUGLANDEE . . . <i>p.</i> 149
<i>fatidum</i> Krsch. . . 1022	Hypericum . . . 58	Juglans . . . 430
<i>Lactucella</i> Wllr. . . 1031	<i>dubium</i> Lrs. . . 158	nigra . . . 1131
murorum . . . 1034	hirsutum . . . 161	regia . . . 1130
oblongum Jor. <i>c.</i> 1034	humifusum . . . 156	JUNCAGINEE . . . <i>p.</i> 172
<i>paludosum</i> . . . 1026	perforatum . . . 155	JUNCIE . . . <i>p.</i> 175
Pelterianum M. <i>b.</i> 1030	montanum . . . 160	Juncus . . . 499
petiolare Jor. <i>b.</i> 1034	pulchrum . . . 159	<i>acutiflorus</i> Ehr. . . 1309
petrogenes Jor. <i>d.</i> 1034	<i>quadrangulare</i> Sm. . . 158	<i>angustifolius</i> Wll. . . 1318
Pilosella . . . 1034	quadrangulum . . . 157	<i>articulatus</i> . . . 1310
praecaltum Vill. . . 1032	tetrapterum Fr. . . 158	<i>bulbosus</i> Aust. . . 1314
<i>praemorsum</i> . . . 1024	Hyssopus . . . 384	bufonius . . . 1316
sabaudum . . . 1037	glabra . . . 991	<i>campestris</i> . . . 1320
<i>silvaticum</i> . . . 1035	maculata . . . 993	compressus Jeq. . . 1314
<i>tectorum</i> Krsch. . . 1028	radicata . . . 992	<i>communis</i> G. Mey. . . 1305
tridentatum Fr. . . 1038	Hyssopus . . . 291	conglomeratus . . . 1305
umbellatum . . . 1039	officinalis . . . 760	effusus . . . 1306
<i>virens</i> Krsch. . . 1029		fasciculatus . . . <i>c.</i> 1316
vulgatum Fr. . . 1035	Iberis . . . 95	filiformis . . . 1308
Hierochloa Gm. . . 509	amara . . . 249	fluitans Lk. . . <i>c.</i> 1312
<i>borealis</i> R. et Sch. . . 1387	<i>campestris</i> Wllr. . . 252	glauca Ehr. . . 1307
odorata Wllbg. . . 1387	<i>nudicaulis</i> . . . 244	lamprocarpus Ehr. . . 1310
Himantoglossum Spr. . .	Ilex . . . 231	<i>nemorosus</i> Pil. . . 1318
<i>antrophorum</i> Sp. . . 1239	aquifolium . . . 603	obtusiflorus Ehr. . . 1311
<i>hircinum</i> Spr. . . 1240	heterophyllum Rb. <i>c.</i> 603	ranarius Pr. . . <i>b.</i> 1316
HIPPOCASTANEE . . . <i>p.</i> 25	senescens Gd. <i>b.</i> 603	repens . . . <i>b.</i> 1312
Hippocrepis . . . 131	LICINEE . . . <i>p.</i> 84	silvaticus Hds. . . 1309
comosa . . . 365	Lupinus . . . 43	squarrosus . . . 1313
Hippophaë . . . 420	Balsamina . . . 115	<i>subverticillatus</i> Hf. . . 1312
rhamnoides . . . 1105	Noli-tangere . . . 113	supinus Meh. . . 1312
HIPPURIDEE Lk. . . <i>p.</i> 146	Imperatoria	Tenageia Ehr. . . 1315
Hippuris . . . 421	<i>silvestris</i> . . . 543	<i>uliginosus</i> Rth. <i>b.</i> 1312
vulgaris . . . 1106	Isula . . . 318	<i>vernalis</i> Ehr. . . 1317
Holcus . . . 530	britannica . . . 959	Juniperus . . . 445
<i>arenaceus</i> Sep. . . 1432	Conyza DC. . . 957	communis . . . 1180
lanatus . . . 1433	<i>dyssenteria</i> . . . 955	Sabina . . . 1181
mollis . . . 1434	<i>Pulicaria</i> . . . 956	virginiana . . . 1182
<i>odoratus</i> . . . 1386	salicina . . . 958	
saccharatus . . . 1435	Iris . . . 469	Kerria DC. . . 149
Holosticum . . . 34	germanica . . . 1232	japonica DC. . . 407
umbellatum . . . 88	Pseudo-Acorus . . . 1234	Knautia . . . 336
Hordeum . . . 548	pumila . . . 1233	arvensis Dub. . . 879
distichum . . . 1498	IRIDEE . . . <i>p.</i> 162	Kochia
hexastichon . . . 1501	Isatis . . . 99	<i>Scoparia</i> . . . 1063
murinum . . . 1496	tinctoria . . . 257	Koeleria Pers. . . 532
<i>pratense</i> Hds. . . 1497	Isnardia . . . 173	cristata Pers. . . 1437
secalinum Schb. . . 1497	palustris . . . 505	glauca DC. . . <i>b.</i> 1437

Labiatae . . . p.	102	Lavandula Trn.	286	Linaria Trn.	276
Lactuca . . .	393	vera DC.	743	arvensis Dsf.	714
capitata B.	b. 1017	Leersia Sol.		Cymbalaria Mill.	717
crispa B.	d. 1017	orysoides Sw.	1384	Elatine Dsf.	718
muralis . . .	1013	Lemna . . .	493	minor Dsf.	713
romana B.	c. 1017	gibba . . .	1296	repens Dsf.	716
perennis . . .	1014	minor . . .	1295	simplex DC.	715
saligna . . .	1013	polyrhiza . . .	1297	spuria Mill.	719
sativa . . .	1017	trisulca . . .	1294	striata DC.	716
Scariola . . .	1016	LEMNACEÆ . . . p.	173	vulgaris Mill.	712
silvestris Lmk.	1016	Lens Trn.		LINEÆ . . . p.	20
virosa . . .	1018	esculenta Mch.	345	Linosyris DC.	373
Lamium . . .	301	LENTIBULARIÆ p.	100	vulgaris DC.	970
album . . .	778	Leontodon . . .	386	Linum . . .	38
amplexicaule.	773	autumnalis . . .	997	catharticum . . .	106
hirsutum Lmk.	779	hastilis . . .	996	Radiola . . .	109
incisum Willd.	776	hispidus . . .	993	tenuifolium . . .	167
laevigatum . . .	779	Taraxacum . . .	1009	usitatissimum . . .	108
maculatum . . .	779	Leonurus . . .	308	Listera R. Br.	486
mutabile . . . b.	779	Cardiaca . . .	797	ovata R. Br.	1275
purpureum . . .	779	Marrubiastrum . . .	798	Lithospermum Tn.	252
Lampasana Trn.	381	Lepidium . . .	97	arvense . . .	648
communis . . .	987	campestre R. Br.	252	officinale . . .	646
Lappa Trn. . . .	344	Draba . . .	253	purpureo-cœruleum	647
Bardana . . .	902	graminifolium . . .	253	Lolium . . .	547
glabra Lmk.	900	rudérale . . .	254	arvense Willd. b.	1493
major Grn. . . .	899	sativum . . .	251	italicum R. Br.	1492
minor DC. . . .	900	scapiferum Wall.	244	linicolum A. Br.	1495
macrosperma Willd.	901	Lepigonum Willd.		multiflorum Lm. b.	1492
nemorosa Körn.	900	rubrum Willd.	79	perenne . . .	1491
officinalis All.	899	segetalis Willd.	78	remotum Schuk.	1495
tomentosa Lmk.	902	Lerouxia Mêt.		temulentum . . .	1494
Lappula Rupp.		nemorum . . .	593	tenue . . . b.	1491
Myosotis Mch.	653	Leucolum . . .	471	Lonicera . . .	327
Lapsana v. Lampsana		vernum . . .	1235	caprifolium . . .	847
Larix Trn. . . .	442	Leucorehis E. Mey.		Periclymenum . . .	846
decidua Mill. . .	1175	albida E. Mey.	1263	Xylosteum . . .	845
europaea DC. . .	1175	Levisticum Koch.	196	LORANTHACEÆ . . . p.	80
Laserpitium . . .	205	officinale Koch. . .	541	Loroglossum Rich.	474
latifolium . . .	534	Libanotis Crtz. . .	191	anthropophorum R.	1239
Lathræa . . .	283	montana All. . .	535	hireinum R. . .	1240
squamaria . . .	744	Libertia Dmtr.		Lotus . . .	112
Lathyrus . . .	127	arduennensis Lj.	1474	corniculatus . . .	290
Aphaca . . .	349	Ligusticum . . .		major Sm. . .	291
hirsutus . . .	352	Levisticum . . .	541	tenuis Kit. . . b.	290
latifolius . . .	357	Meum . . .	539	uliginosus Sch.	291
macrorrhizus Wim.	358	Ligustrum Trn.	232	Lunaria . . .	87
montanus Brnd.	358	vulgare . . .	604	annua . . .	232
niger Brnd. . . .	359	LILIACEÆ . . . p.	137	biennis Mch.	232
Nissolia	350	Lilium . . .	454	odoratu Mch.	231
odoratus . . .	356	bulbiferum . . .	1193	rediviva . . .	231
pratensis . . .	354	candidum . . .	1194	Lupinus . . .	108
sativus . . .	351	Lilanthemum G.	240	angustifolius . . .	284
silvestris . . .	355	nymphoides Lk.	615	luteus . . .	285
tuberosus . . .	353	Limodorum Trn.	482	Luzula DC. . .	500
velutinus DC. b.	354	abortivum Sw.	1268	albida DC. . .	1319
vernus Brnd. . .	360	Limosella . . .	271	angustifolia Willd.	1318
		aquatica . . .	698	campestris DC.	1320

Luzula DC. 500	Malva 46	Mentha 288
congesta Lej. <i>b.</i> 1321	moschata 130	acutifolia Sm. <i>b.</i> 750
maxima DC. 1319	neglecta Wllr. 132	aquatica 753
multiflora Lej. 1321	rotundifolia 132	aquatica-silvestris M. 753
nemorosa E. M. 1318	silvestris 131	arvensis 754
pilosa Willd. 1317	MALVACEE p. 23	austriaca Jeq. <i>e.</i> 754
silvatica Gud. 1319	Marrubium 306	candicans Crtz. <i>b.</i> 747
vernalis DC. 1317	vulgare 795	erispa 752
Lycnis Trn. 25	Mathiola DC. 71	erispata Schd. <i>b.</i> 749
chalcedonica. 73	annua Br. 188	cordifolia Opz. <i>c.</i> 749
dioica 72	Matricaria 354	gentilis 750
Flos-Cuculi 74	Chamomilla 927	gratissima Willd. <i>e.</i> 747
Githago Lmk. 77	inodora 928	hirsuta 753
silvestris 71	pyrethrum 928	nemorosa Willd. <i>c.</i> 747
tomentosa 75	suaveolens 927	nepetoides Lej. <i>b.</i> 753
Viscaria 76	Medicago 119	parietariæfolia Bk. <i>f.</i> 754
Lycium 265	denticulata Willd. 311	piperita 752
barbarum 665	Echinus DC. 309	pubescens Willd. 751
Lycopersicum Trn. 262	falcata 305	Pulegium 755
esculentum Mill. 662	falcato-sativa Reh. 307	rotundifolia 748
Lycopsis 249	interlexta Dmtr. 309	Rothii Nees. <i>c.</i> 754
arvensis 635	lupulina 304	rugosa Rth. 748
Lysimachia 226	maculata W. 310	rubra Sm. 754
nemorum 593	media Pers. 307	sativa Dm. 754
Nummularia 592	minima Lmk. 308	silvestris 747
paludosus Bing. 595	polymorpha 308	tomentilla Optz. <i>b.</i> 755
punctata 594	sativa 306	velutina Lej. <i>d.</i> 747
suaveolens Lch. 592	versicolor T. 307	viridis 749
vulgaris 595	Willdenowii B. <i>b.</i> 304	Menyanthes Trn. 239
LYTHRARIÆ p. 51	Melampyrum Tr. 279	nymphæoides 615
Lythrum 133	arvense 727	trifoliata 614
hyssopifolia 368	barbatum 727	Mercurialis Trn. 426
salicaria 367	cristatum 726	annua 1123
	pratense 728	perennis 1124
Madia Mol. 350	Melandryum Röhl. 24	Mespilus 161
sativa Mol. 920	album Gk. 72	Amelanchier 482
Malanthemum Wg. 466	diurnum 71	Cotoneaster 481
bifolium DC. 1229	noctiflorum Fr. 69	germanica 477
Malacium Fr. 35	pratense Röhl. 72	monogyna W. 479
aquaticum Fr. 104	silvestre Rhl. 71	oxyacantha Grt. 478
arenaria God. <i>b.</i> 104	Melica 536	Meum Trn. 194
Malus Trn. 167	ciliata 1441	athamanticum Jeq. 539
acerba Mrt. 486	cœrulea 1444	Michelia Dmtr.
baccata 488	nebrodensis Parl. 1441	bromioides Dmtr. 1474
communis Poir. 487	nulans 1443	Micropus 363
costata Sch. et M. 487	uniflora Rtz. 1442	erectus 945
dasyphylla Brk. <i>b.</i> 487	Melilotus Trn. 118	Milium 522
luciliburgensis <i>c.</i> 487	alba Lmk. 801	effusum 1413
Megamilla S. et M. 487	arvensis Wall. 298	Melhringia 30
mitis Will. 487	cœrulea Lmk. 303	trinervia Clrv. 87
paradisiaca 487	leucantha DC. 300	Menchla Ehr. 35
Platymela M. 487	macrorrhiza Pers. 299	erecta Fl. Wett. 103
Prasomilla Pers. 487	parviflora Desf. 302	Mollnia Mneh. 535
Malva 46	Melissa 297	cœrulea Mneh. 1444
Alcea 129	Acinos Bnth. 767	Monotropa 57
bismalva Lej. <i>b.</i> 129	Calamintha 768	hypophagea Will. <i>b.</i> 154
crispa 133	Clinopodium Benth. 770	hypopitys 154
fastigiata Lej. <i>b.</i> 129	officinalis 771	MONOTROPEE p. 26

Montia Meh.	136	Nasturtium R. Br.	76	Ophrys	477
<i>arvensis</i> Wllr.	372	<i>amphibium</i> R. Br.	206	<i>aristivatis</i> Lmk.	1276
<i>fontana</i> Lj.	372	<i>aquaticum</i> Wllr.	204	<i>anthropophora</i>	1239
<i>minor</i> Gml.	372	<i>fontanum</i> Aschr.	204	<i>apifera</i> Hds.	1259
<i>rivularis</i> Gm.	373	<i>officinale</i> R. Br.	204	<i>apiculata</i> Dmtr. b.	1259
MOREE	p. 144	<i>palustre</i> DC.	207	<i>arachnites</i> Reich.	1238
Morus Trn.	411	<i>silvestre</i> R. Br.	205	<i>aranifera</i> Hds.	1257
<i>alba</i>	1092	Nemophar Hyn.		<i>bombiliflora</i> Lk. b.	1259
<i>nigra</i>	1093	<i>luteum</i> Hyn.	170	<i>fluciflora</i> Ség.	1258
Muscari Trn.	459	Neottia Reh.	485	<i>insectifera</i> d.	1257
<i>comosum</i> Mll.	1218	<i>aristivatis</i> DC.	1276	<i>insectifera</i>	1256
Myagrum Trn.		<i>latifolia</i> Rich.	1275	<i>insectifera</i> i.	1259
<i>paniculatum</i>	258	<i>Nidus-avis</i> Rich.	1274	<i>insectifera</i> h.	1258
<i>sativum</i>	245	<i>ovata</i> Bl. et F.	1275	<i>Monorchis</i>	1260
Myosotis	251	Nepeta	299	<i>muscifera</i> Hds.	1256
<i>arenaria</i> Schd.	644	<i>Cataria</i>	773	<i>myoides</i> Jeq.	1256
<i>arvensis</i>	644	<i>Glechoma</i> Bnth.	774	<i>Nidus-avis</i> Crtz.	1274
<i>caespitosa</i> Schtz.	639	Neslia Desv.	100	<i>ovata</i>	1275
<i>collina</i> Reh.	642	<i>paniculata</i> Desv.	258	<i>pseudo-speculum</i> DC.	1257
<i>hispida</i> Schl.	642	Nicotiana	206	Ophismenus P. B.	512
<i>intermedia</i> Lk.	641	<i>rusticana</i>	666	<i>Crus-galli</i> Kth.	1389
<i>laxiflora</i> Rb. d.	637	Nigella Trn.	11	ORCHIDEÆ	p. 163
<i>lingulata</i> Lbm.	639	<i>arvensis</i>	40	Orehis	476
<i>multiflora</i> Mrt. c.	637	<i>damascena</i>	41	<i>arbolica</i>	1268
<i>palustris</i> With.	637	<i>sativa</i>	42	<i>albida</i> Sc.	1263
<i>perennis</i> Meh.	637	Nuphar Sm.	63	<i>angustifolia</i> Wm. b.	1255
<i>repens</i> Rb.	637	<i>luteum</i> Sm.	170	<i>aphylla</i> Sch.	1267
<i>sparsiflora</i> Pbl.	645	Nymphæa Trn.	64	<i>bifolia</i> b.	1265
<i>silvatica</i> Hfm.	640	<i>alba</i>	171	<i>brachyglyssa</i> Wall.	1265
<i>stricta</i> Lk.	644	<i>lutea</i>	170	<i>cercopitheca</i> Lmk.	1243
<i>strigulosa</i> Rb.	638	NYPHÆACEÆ	p. 28	<i>cinerea</i> Shrk.	1245
<i>versicolor</i> Pers.	642	Odontites Hll.	281	<i>condensata</i> Dsf.	1241
Myosurus Dill.	5	<i>lutea</i>	733	<i>Conopsea</i>	1261
<i>minimus</i>	14	<i>rubra</i>	731	<i>coriophora</i>	1247
Myriophyllum Vail.	175	<i>serotina</i> Lmk.	732	<i>divaricata</i> Rich.	1255
<i>alternifolium</i> DC.	511	<i>verna</i> Reh.	731	<i>fusca</i> Seg.	1258
<i>intermedium</i> Kch. b.	509	Oenanthe	190	<i>fusca</i> Coss.	b. 1244
<i>pectinata</i> Wld. c.	509	<i>aquatica</i>	534	<i>fusca</i> Jacq.	1244
<i>spicatum</i>	510	<i>fistulosa</i>	532	<i>fusco-Rivini</i> T. b.	1244
<i>verticillatum</i>	509	<i>pencedanifolia</i> Poll.	533	<i>galeata</i> P.	1245
Myrrhis Sep.	213	<i>Phellandrium</i> Lmk.	534	<i>hircina</i> Crntz.	1240
<i>bulbosa</i> Sep.	566	Oenothera	172	<i>hybrida</i> Bng. b.	1244
<i>hirsuta</i> All.	567	<i>biennis</i>	504	<i>incarnata</i>	1255
<i>odorata</i> Sep.	568	OLEINÆÆ	p. 84	<i>Jacquini</i> God. b.	1244
<i>temula</i> All.	565	Omphalodes Trn.	257	<i>latifolia</i>	1253
NAIADÆÆ	p. 173	<i>verna</i> Meh.	655	<i>laxiflora</i> Lmk.	1251
Najas	492	ONAGRARIÆÆ	p. 69	<i>maculata</i>	1252
<i>major</i> All.	1293	Onohrychis Trn.	132	<i>mascula</i>	1250
<i>mariana</i>	1293	<i>sativa</i> Lk.	366	<i>militaris</i> c. Ldh. b.	1244
Narcissus	470	<i>viæifolia</i> Sep.	366	<i>militaris</i>	b. c. 1244
<i>poeticus</i>	1236	Ononis	110	<i>militaris</i>	1245
<i>Pseudo-Narcissus</i>	1235	<i>campestris</i> Kch.	287	<i>militaris</i>	e. 1246
Nardus	552	<i>procurens</i> Wllr.	288	<i>militaris</i>	1245
<i>stricta</i>	1511	<i>repens</i>	288	<i>minima</i> Md.	c. 1250
Narthecium Mhr.	461	<i>spinosa</i>	287	<i>minusops</i> Th. b.	1244
<i>ossifragum</i> Hds.	1221	Onopordon	338	<i>montana</i> Sm.	1265
		<i>Acanthium</i>	884	<i>moravica</i> Jeq. c.	1244
				<i>Morio</i>	1248

Orchis 476	Orobis 128	Persica Trn. 143
<i>odoratissima</i> 1262	tuberosus 358	vulgaris Mil. 390
nervata Md. 1245	vernus 361	Petasites Trn. 380
pallens 1249	Oryza A. Br. 508	officinalis Mneh. 986
purpurea Hds. 1244	clandestina A. Br. 1384	Petroselinum Hfm. 184
<i>pyramidalis</i> Rchb. 1241	Oxalideæ DC. p. 21	sativum Hfm. 522
<i>Rivini</i> G. 1245	Oxalis 40	Peucedanum 200
sambucina 1254	acetosella 110	<i>carvifolium</i> 545
<i>Scopoli</i> Timb. 1243	stricta 111	Cervaria Lap. 546
<i>Simia</i> Vill. 1243	Oxycocco Pers. 315	Chabræi Rch. 545
Simia Lk. 1246	palustris Pers. 816	Oreoselinum Mch. 548
speciosa Hst. 1250		palustre Mch. 547
<i>tephrosanthos</i> Vil. 1246	Pæonia Trn. 46	<i>Silans</i> 540
Traunsteineri St. b. 1253	officinalis 49	Phalangium Trn. 460
tridentata Sep. 1243	Panicum 516	Liliago Schb. 1220
ustulata 1242	<i>Crus-galli</i> 1389	ramosum Lmk. 1219
<i>variegata</i> All. 1238	<i>filiforme</i> Gk. 1391	Phalaris 511
<i>viridis</i> Crtz. 1264	<i>glaucum</i> 1395	<i>arundinacea</i> 1388
<i>zoophora</i> Th. 1246	<i>italicum</i> 1396	canariensis 1387
Origanum Trn. 292	miliaceum 1397	<i>oryzoides</i> 1384
megastachyum Br. b. 761	<i>sanguinale</i> 1390	phleodes 1403
Majorana 762	<i>verticillatum</i> 1393	Phaseolus 121
vulgare 761	<i>viride</i> 1393	multiflorus Lmk. 329
Oriaya Hff. 207	Papaver Trn. 65	vulgaris 328
grandiflora Hff. 556	Argemone 175	— volubilis a. 328
Ormenis Gay. 352	dubium 176	— nanus 328
nobilis Gay. 923	hybridum 174	Phelipea Mey. 283
Ornithogalum 455	Lecoquii C. 177	cærulea C. A. My. 735
<i>arvense</i> 1199	Rhœas 173	ramosa C. A. My. 736
<i>minimum</i> 1200	sitigerum DC. b. 172	Phellandrium 534
<i>nutans</i> 1197	somniferum 172	<i>aquaticum</i> 534
<i>pratense</i> Whlb. 1198	PAPAVERACEÆ p. 28	PHILADELPHÆÆ p. 69
<i>pyrainicum</i> 1195	PAPILIONACEÆ p. 41	Philadelphus 169
<i>silvaticum</i> 1201	Parietaria Trn. 416	coronarius 493
<i>sulfureum</i> R. Sch. 1195	<i>diffusa</i> M. K. 1101	Phicum 518
umbellatum 1196	<i>erecta</i> M. K. 1100	Boehmeri Wib. 1403
Ornithopus 130	<i>judeica</i> Hfm. 1101	nodosum b. 1402
perpusillus 363	officinalis 1100	<i>phalaroides</i> Koch. 1403
sativus Broth. 364	ramiflora Mneh. 1101	pratense 1402
Orobanchæ 284	Paris 467	stoloniferum c. 1402
alsatica F. Schltz. 742	quadrifolia 1230	Phragmites Trin. 533
<i>caryophyllacea</i> Sm. 739	Parnassia Trn. 60	communis Trin. 1438
<i>cærulea</i> Vill. 735	palustris 164	nigricans Mêt. b. 1438
elator Sutt. 738	PARONYCHIEÆ p. 52	<i>vulgaris</i> 1438
Epithymum DC. 740	Passerina 1103	Physalis 263
Galii Duby. 739	<i>anua</i> Wikstr. 1103	Alkekengi 663
<i>Genistæ</i> 737	Pastinaca Trn. 202	Phytuma 318
minor Sutt. 743	sativa 551	nigrum Sm. b. 830
<i>ramosa</i> 736	silvestris 550	orbiculare 829
Rapum Th. 737	Paulownia L. et Z. p. 97	spicatum 830
<i>sparsiflora</i> Wall. 740	imperialis S. et Z. p. 97	Picea Lk. 443
Teucrii F. Schtz. 741	Pedicularis Trn. 277	alba Mich. 1177
OROBANCHÆ p. 101	palustris 720	<i>alba</i> My. 1178
Orobis 128	silvatica 721	exelsa Lk. 1176
<i>Aphaca</i> Döll. 349	Peptis 134	<i>vulgaris</i> Lk. 1176
niger 359	Portula 369	Pieris Juss. 387
<i>Nissolia</i> Döll. 350	Persica Trn. 143	hieracioides 998
<i>tenuifolius</i> Rth. b. 358	laevis DC. 390	

Pimpinella . . . 188	Platanthera Rich. 430	Polygonum . . . 409
Anisum . . . 530	<i>solstitialis</i> Bög. . . 1263	Bellardi All. . . 1087
dissectifolia Wllr. <i>b.</i> 529	<i>viridis</i> Lindl. . . 1264	Bistoria . . . 1079
magna . . . 528	PLUMBAGINEAE . p. 83	Convolvulus . . 1088
poterifolia Wllr. <i>c.</i> 529	Poa . . . 542	cuspidatum S. et Z. 1078
Saxifraga . . . 529	<i>acroides</i> Köl. . . 1445	dumetorum . . . 1089
Pinus . . . 441	<i>altissima</i> Mueh. . 1448	Fagopyrum . . . 1090
<i>Abies</i> Dur. . . 1178	<i>anceps</i> Dmtr. . . 1459	Hydropiper . . . 1085
<i>Abies</i> . . . 1476	<i>angustifolia</i> . <i>b.</i> 1459	incanum Sm. <i>c.</i> 1081
austriaca Höss. . . 1172	<i>annua</i> . . . 1453	lapathifolium. . 1081
<i>excelsa</i> Lmk. . . 1176	<i>aquatica</i> . . . 1448	<i>laxiflorum</i> Wlr. 1083
<i>Larix</i> . . . 1175	<i>bulbosa</i> . . . 1454	minus Hds. . . 1084
<i>maritima</i> . . . 1173	Chaixii Vill. . . 1457	mite Schk. . . 1083
<i>Picea</i> . . . 1178	compressa . . . 1466	nodosum Pers. <i>b.</i> 1081
<i>Picea</i> Dur. . . 1176	<i>cristata</i> . . . 1437	Persicaria . . . 1082
Pinaster Sol. . . 1173	<i>dura</i> Sep. . . 1452	<i>pusillum</i> . . . 1084
silvestris . . . 1171	<i>fertilis</i> Hst. . . 1456	<i>Sieboldi</i> Z. . . 1078
strobis . . . 1174	fluitans Sep. . . 1446	<i>tataricum</i> . . . 1191
Pirus Trn. . . 166	Langeana Rehb. <i>b.</i> 1460	POMACEAE . p. 66
<i>acerba</i> DC. . . 486	Lejeuni Dmtr. <i>c.</i> 1459	Populus Trn. . . 437
Achras Wll. . <i>c.</i> 485	nemorialis . . . 1455	alba . . . 1159
<i>aucuparia</i> . . . 490	pratensis . . . 1459	<i>alba-tremula</i> Wim. 1160
<i>Aria</i> Ehrh. . . 492	<i>rigida</i> . . . 1476	balsamifera . . . 1164
Bergamotia Ruel. <i>c.</i> 485	<i>salina</i> Poll. . . 1449	canadensis Dsf. . 1162
communis . . . 485	<i>scabra</i> Ehr. . . 1458	canescens Sm. . 1160
<i>Cydonia</i> . . . 485	serotina Ehr. . . 1456	denudata Htg. <i>b.</i> 1159
<i>domestica</i> Sm. . . 489	<i>sibirica</i> Vill. . . 1457	<i>delatata</i> Ait. . <i>b.</i> 1162
Falerna Pl. . <i>c.</i> 485	strigosa Köl. . <i>d.</i> 1459	<i>fastigiata</i> . <i>b.</i> 1162
<i>Malus</i> . . . 487	<i>sudetica</i> Hnk. . 1457	<i>monolifera</i> Ait. . 1163
rufescens Pers. <i>c.</i> 485	trivialis . . . 1458	nigra . . . 1162
sativa DC. . <i>c.</i> 485	vivipara . <i>b.</i> 1454	pyramidalis Rz. <i>b.</i> 1162
tomentosa Kch. <i>b.</i> 485	Podospermum DC. 391	tremula . . . 1161
<i>tormentalis</i> Ehr. . 491	<i>calceitrapifolium</i> id. 1007	villosa Rehb. <i>b.</i> 1161
Pisum Trn. . . 126	laciniatum DC. . . 1006	Portulaca Trn. . . 135
arvense . . . 348	muricatum DC. . . 1008	oleracea . . . 370
humile Poir. <i>c.</i> 347	<i>residifolium</i> . . . 1007	sativa Hw. . . 371
macrocarpum Sr. <i>b.</i> 347	POLEMONIACEAE . p. 87	POTULACEAE . p. 52
quadratum <i>d.</i> 347	Polemonium . . 244	POTAMEE . p. 172
saccharatum Sr. <i>a.</i> 347	ceruleum . . . 626	Potamogeton Trn. 490
sativum . . . 347	Polygala . . . 50	alpinus Blb. . . 1282
PLANTAGINEAE . p. 84	<i>amara</i> Jeq. . . 144	compressus . . . 1288
Plantago . . . 230	austriaca Ctz. . . 144	crispus . . . 1286
arenaria W. K. . . 602	calcarea Schllz. . 143	densus . . . 1287
intermedia Gil. <i>b.</i> 599	comosa Schk. . . 142	fluitans Rth. . . 1281
lanceolata . . . 601	oxyptera Rb. <i>b.</i> 141	gramineus . . . 1283
major . . . 599	vulgaris . . . 141	heterophyllus DC. <i>b.</i> 1283
media . . . 600	POLYGALAE . p. 24	lucens . . . 1284
minima DC. . <i>c.</i> 599	Polycnemum . . 402	natans . . . 1279
<i>ramosa</i> Asch. . . 602	arvense Df. . . 1045	<i>oblongus</i> Vill. . 1280
PLATANEE . p. 154	Polygonatum Trn. 465	obtusifolius M. K. 1289
Platanus . . . 440	<i>mutiale</i> All. . . 1225	pectinatus . . . 1291
acerifolia Wld. . . 1169	multiflorum All. . 1227	perfoliatus . . . 1285
occidentalis . . . 1170	officinale All. . . 1228	polygonifolius Prt. 1280
orientalis . . . 1168	verticillatum. . . 1226	pusillus . . . 1290
Platanthera Rich. 480	Polygonee . p. 441	<i>rufescens</i> Schrd. . 1282
<i>albida</i> Ldl. . . 1263	Polygonum . . . 409	<i>zosterefolius</i> Schm. 1288
bifolia Rehb. . . 1265	amphibium . . . 1080	Potentilla . . . 154
chlorantha Cust. 1266	aviculare . . . 1086	alpestris Hll. . . 449

Potentilla . . . 154	Pulegium Mill. . . 753	Ranunculus . . . 6
<i>Anserina</i> . . . 450	<i>vulgare</i> Mill. . . 753	<i>Lingua</i> . . . 24
<i>argentea</i> . . . 453	Pullearia Grtn . . 367	<i>nemorosus</i> DC. . . 28
<i>aurea</i> . . . 449	<i>bellidiflora</i> Willr. . 965	<i>parviflorus</i> . . . 32
<i>fragaria</i> Gke. . . 446	<i>dysenterica</i> Grtn. . 955	<i>parvulus</i> Lej. <i>b.</i> . 31
<i>fragaristrum</i> Ehr. . 446	<i>vulgaris</i> Grtn. . . 956	<i>peucedanifolius</i> All. . 19
<i>nemoralis</i> Nstl. . . 455	Pulmonaria Trn. . 253	<i>phitonotis</i> Ehl. . . 31
<i>palustris</i> Nstl. . . 443	<i>angustifolia</i> . . . 650	<i>platanifolius</i> . . . 22
<i>procumbens</i> Hth. . 455	<i>azurea</i> Bess. . . 650	<i>repens</i> . . . 29
<i>recta</i> . . . 454	<i>mollis</i> Willf. . . 651	<i>sardous</i> Crtz. . . 31
<i>reptans</i> . . . 448	<i>obscura</i> Dmtr. <i>b.</i> . 649	<i>sceleratus</i> . . . 21
<i>rupestris</i> . . . 451	<i>officinalis</i> . . . 649	<i>trichophyllus</i> Ch. . 18
<i>subauda</i> DC. . . 449	<i>tuberosa</i> Dmtr. . . 650	<i>tripartitus</i> DC. . . 17
<i>sterilis</i> . . . 446	Pulsatilla Trn. . . 6	Raphanistrum Trn . 229
<i>supina</i> . . . 452	<i>vulgaris</i> Mill. . . 6	<i>Lampsana</i> Grm. . . 229
<i>silvestris</i> Nk. . . 456	Pyrethrum Grtn. . 355	Raphanus Trn . 230
<i>Tormentilla</i> Shk. . 456	<i>canescens</i> Lj. <i>b.</i> . 929	<i>niger</i> DC. . . <i>b.</i> . 230
<i>verna</i> . . . 447	<i>corymbosum</i> Wild. . 931	<i>radicula</i> DC. . . <i>a.</i> . 230
Poterium . . . 160	<i>Leucanthemum</i> C. . 929	<i>Raphanistrum</i> . . 229
<i>dictyocarpum</i> Sp. . 475	<i>Parthemium</i> Sm. . 930	<i>sativus</i> . . . 230
<i>glaucescens</i> Reh. <i>b.</i> . 475	<i>sinense</i> Sab. . . 932	Reseda . . . 62
<i>muricatum</i> . . . 476	Pyrola Trn. . . 61	<i>lutea</i> . . . 167
<i>Sanguisorba</i> . . . 475	<i>minor</i> . . . 166	<i>luteola</i> . . . 168
Prenanthes . . . 394	<i>rotundifolia</i> . . . 165	<i>odorata</i> . . . 169
<i>hieracifolia</i> . . . 1025	Pyrolaceæ . . <i>p.</i> . 28	Resedaceæ . . <i>p.</i> . 28
<i>murialis</i> . . . 1013	Quercus Trn. . . 433	Rhamnee . . <i>p.</i> . 41
<i>purpurea</i> . . . 1012	<i>alba</i> Mx. . . . 1138	Rhamnus . . . 104
Primula . . . 225	<i>pedunculata</i> Ehr. . 1134	<i>cathartica</i> . . . 275
<i>acaulis</i> Jeq. . . . 590	<i>racemosa</i> Ehr. . . 1134	<i>frangula</i> . . . 276
<i>auricula</i> . . . 591	<i>Robur</i> . . . <i>b.</i> . 1135	Rhinanthus . . . 278
<i>elatori</i> Jeq. . . . 589	<i>Robur</i> 1134	<i>Alectorolophus</i> Poll. . 724
<i>grandiflora</i> Lmk. . 590	<i>rubra</i> Mx. . . . 1136	<i>angustifolius</i> . . . 725
<i>officinalis</i> Jeq. . . 588	<i>sessiliflora</i> Slb. . 1135	<i>Crista-galli</i> . . . <i>a.</i> . 723
<i>veris</i> . . . <i>b.</i> . 588	<i>tinctora</i> Mx. . . . 1137	<i>Crista-galli</i> . . . <i>b.</i> . 722
<i>veris</i> 589	Radiola Dill. . . . 39	<i>major</i> Ehr. . . . 722
<i>vulgaris</i> 590	<i>linoides</i> Gm. . . . 109	<i>minor</i> Ehr. . . . 723
Primulaceæ . . <i>p.</i> . 82	<i>Mitragraea</i> Sm. . 109	Rhynchospora Val. . 501
Prismatocarpus . . 827	Ranunculaceæ <i>p.</i> . 8	<i>alba</i> Val. . . . 1366
PRUNELLA V. BRUNELLA	Ranunculus . . . 6	Ribes . . . 220
Prunus . . . 146	<i>aconitifolius</i> . . . 22	<i>alpinum</i> . . . 578
<i>Armeniaca</i> . . . 392	<i>acris</i> 26	<i>bacciferum</i> Wall. <i>b.</i> . 578
<i>avium</i> 398	<i>aquatilis</i> 16	<i>Grossularia</i> . . . 576
<i>Cathartica</i> DC. <i>b.</i> . 395	<i>arvensis</i> 33	<i>nigrum</i> 579
<i>Cerasus</i> 399	<i>aureus</i> Schl. . . . 28	<i>reclinatum</i> . . . <i>c.</i> . 576
<i>cerasifera</i> Ehr. . . 397	<i>auricomus</i> 25	<i>rubrum</i> 577
<i>cerea</i> <i>d.</i> . 395	<i>bulbosus</i> 30	<i>sterile</i> Wall. <i>d.</i> . 578
<i>Claudianae</i> Prs. <i>c.</i> . 395	<i>divaricatus</i> Schkr. . 20	<i>Uva-crispa</i> . . . <i>b.</i> . 576
<i>damascena</i> . . . <i>b.</i> . 394	<i>ficaria</i> 34	<i>Uva-crispa</i> 576
<i>domestica</i> 396	<i>Flammula</i> 23	Robinia 114
<i>fruticans</i> Wh. . . . 394	<i>fluitans</i> Lk. . . . 19	<i>pseudo-acacia</i> . . 293
<i>institia</i> 395	<i>fluitatilis</i> Web. . 19	<i>umbraculifera</i> Df. <i>b.</i> . 293
<i>Mahaleb</i> 400	<i>hederaceus</i> 15	<i>viscosa</i> Vent. . . . 294
<i>Padus</i> 401	<i>heterophyllus</i> Web. . 16	Roripa Sep. . . . 205
<i>Meyeri</i> Bck. . . . 393	<i>hirsutus</i> Col. . . . 31	<i>palustris</i> Rehb. . . 207
<i>spinosa</i> 393	<i>inermis</i> <i>b.</i> . 33	<i>silvestris</i> Rehb. . . 156
Prarmica DC. . . . 922	<i>lanuginosus</i> 27	Rosa 469
<i>vulgaris</i> DC. . . . 922		<i>arvensis</i> Hds. . . . 469
		<i>bibracteata</i> Bst. <i>c.</i> . 469

Rosa	156	Rubus	150	Sabina Spch.	
<i>campestris</i> Dmtr.	467	<i>Idæus</i>	433	<i>officinalis</i> Gke. . .	1181
<i>canina</i>	468	<i>infestus</i> W. et N.	424	<i>virginiana</i> Aul. . .	1182
<i>centifolia</i>	460	<i>Lejeuni</i> W. et N.	427	<i>vulgaris</i> Ant. . . .	1181
<i>cinnamomea</i>	458	<i>leucostachys</i> . . .	414	Sagina	28
<i>cinerascens</i> Dmtr. b.	462	<i>nemorosus</i> H. . . .	430	<i>apetala</i>	83
<i>collina</i> Lej. . . y.	468	<i>nitidus</i> W. et N. d.	409	<i>ciliata</i> Fr.	84
<i>cuspidatoides</i> Cp. c.	462	<i>odoratus</i>	430	<i>depressa</i> Schlz. b.	84
<i>dumetorum</i> Th. f.	468	<i>pallidus</i> W. et N.	430	<i>procumbens</i>	82
<i>eglanteria</i>	463	<i>plicatus</i> W. et N. b.	409	<i>recta</i>	103
<i>gallica</i>	459	<i>pygmaeus</i> W. et N.	429	<i>saxatilis</i> Wim. b.	83
<i>glaucescens</i> Dr. e.	468	<i>Radula</i> W. et N.	422	Sagittaria	440
<i>inermis</i> DC. . . b.	457	<i>rhannifolius</i> W. N. b.	411	<i>sagittæfolia</i>	1187
<i>lutea</i> Mill.	463	<i>rosaceus</i> W. et N. b.	422	SALICINEE . . . p.	151
<i>luxemburgensis</i> C. b.	468	<i>rudis</i> W. et N. . . .	423	Salix Trn.	436
<i>malmundariensis</i> L. c.	468	<i>saxatilis</i>	432	<i>acuminata</i> Kch. . .	1154
<i>mierantha</i> Sm. . . .	465	<i>Schlechtendalii</i> W. N.	415	<i>alba</i>	1143
<i>microphylla</i> Wlfr. c.	464	<i>Schleicheri</i> W. et N.	420	<i>amygdalina</i>	1145
<i>muscosa</i> Hort. b.	460	<i>serpens</i> God. . . e.	431	<i>aurita</i>	1159
<i>nitens</i> Dv. . . . d.	468	<i>silvaticus</i> W. et N.	416	<i>babylonica</i>	1144
<i>pimpinellifolia</i> Sr.	457	<i>Sprengelii</i> W. . . .	413	<i>caprea</i>	1153
<i>pomifera</i> Herr. . . .	461	<i>suberectus</i> And. . .	409	<i>cinerea</i>	1154
<i>pomponica</i> Hort. c.	460	<i>thyrsoides</i> Wim. . .	411	<i>concolor</i> Koch. b.	1145
<i>repens</i> Sep. . . . b.	469	<i>tomentosus</i> Arrh. b.	430	<i>daphnoides</i> Vill. . .	1147
<i>rubiginosa</i>	464	<i>tomentosus</i> Wild. .	412	<i>decipiens</i> Hoff. b.	1142
<i>rubifolia</i> T. . . . b.	468	<i>umbrosus</i> God. c.	414	<i>depressa</i>	1156
<i>subglobosa</i> Sm. c.	462	<i>vestitus</i> W. et N. . .	418	<i>fragilis</i>	1142
<i>tomentosa</i> Sm. . . .	462	<i>vestitus</i> Wim. d.	431	<i>hippophæfolia</i> Th.	1146
<i>tomentella</i> Lrs. . .	466	<i>villicaulis</i> W. et N. b.	417	<i>incana</i> Schk.	1152
<i>umbellata</i> Lrs. b.	464	<i>villosus</i> DC.	428	<i>livida</i> Whlbg. . . .	1156
ROSACEE	56	<i>vinetorum</i> Hol. . . .	418	<i>pentandra</i>	1141
RUBIACEE	115	<i>viscosus</i> W.	419	<i>purpurea</i>	1148
Rubus	150	<i>vulgaris</i> W. et N.	414	<i>repens</i>	1157
<i>affinis</i> W. et N. . . .	410	Rumex	408	<i>rosmarinifolia</i> . . .	1158
<i>agrestis</i> W. et N. b.	431	<i>Acetosa</i>	1067	<i>rubra</i> Hds.	1149
<i>argenteus</i> W. et N. c.	417	<i>Acetosella</i>	1068	<i>Seringeana</i> Gaud. .	1151
<i>Bellardii</i> W. et N.	428	<i>aquaticus</i>	1076	<i>triandra</i>	1165
<i>cæsius</i>	431	<i>conglomeratus</i> Mr.	1078	<i>vininalis</i>	1150
<i>caudicans</i> Rehb. . .	411	<i>crispus</i>	1074	<i>vitellina</i>	1143
<i>carpinifolius</i> W. N. b.	414	<i>Friesii</i> G.	1064	Salvia	291
<i>cordifolius</i> W. N. c.	411	<i>Hydrolapathum</i> Hd.	1076	<i>ollicinalis</i>	760
<i>corytifolius</i> H. . . .	410	<i>maritimus</i> Schbr.	1070	<i>pratensis</i>	758
<i>discolor</i> W. et N.	417	<i>macrocarpa</i> . . . d.	1068	<i>Sclarea</i>	759
<i>diversiflorus</i> Ldly.	418	<i>maximus</i> Schb. . . .	1067	Sambucus Trn. . .	325
<i>dumetorum</i> God. . .	430	<i>microcarpa</i> . . . c.	1069	<i>Ebulus</i>	840
<i>dumetorum</i> W. N. c.	431	<i>Nemolapathum</i> Eh.	1072	<i>humilis</i> Lk.	840
<i>fastigiatus</i> W. N. c.	409	<i>nemorosus</i> Schd. b.	1073	<i>laciniata</i>	841
<i>ferox</i> Vent. . . . d.	431	<i>obtusifolius</i>	1064	<i>nigra</i>	841
<i>fruticosus</i>	408	<i>palustris</i> Sm.	1071	<i>racemosa</i>	842
<i>fruticosus</i> W. et N.	411	<i>Patientia</i>	1075	Sanguisorba . . .	159
<i>fuscosus</i> DC.	417	<i>purpureus</i> . . . b.	1064	<i>minor</i> Sep.	475
<i>fusco-ater</i> W. et N.	421	<i>sanguineus</i>	1073	<i>officinalis</i>	474
<i>glandulosus</i> Bll. . .	428	<i>scutatus</i>	1066	SANGUISORBEÆ p.	66
<i>glandulosus</i> Sch.	420	<i>silvestris</i> Wl. c.	1064	Sanicula Trn. . . .	177
<i>Guntheri</i> W. et N.	426	Ruta	41	<i>europæa</i>	513
<i>hirsutus</i> Wgl. b.	418	<i>graveolens</i>	112	SANTALACEE . . p.	146
<i>hirtus</i> W. et N. . . .	425	RUTACEE	21	Saponaria	21
<i>hybridus</i> Vill. . . .	427			<i>noctiflora</i> Fzl. . .	69

Saponaria . . . 21	Scirpus . . . 503	Selinum . . . 197
officinalis . . . 62	maritimus . . . 1374	Caryifolia . . . 542
Vaccaria . . . 61	medius Schrd. <i>b.</i> 1372	Chubrai Jeq. . . 545
Sarothamnus Wim. 105	<i>micronatus</i> . . . 1373	<i>palustre</i> . . . 547
scoparius Keh. . . 277	<i>palustris</i> . . . 1367	Sempervivum . . 142
<i>vulgaris</i> Wim. . . 277	pauciflorus Lghtf. 1369	lectorum . . . 389
Satureia . . . 298	Polichii Gdr. . . 1373	Senecblera Pers. . 98
hortensis . . . 772	setaceus . . . 1371	Coronopoe Poir. 256
Satyrinum	silvaticus . . . 1375	Senecio . . . 376
<i>Albidum</i> . . . 1263	<i>triqueter</i> Auct. . 1373	aquaticus Hds. . . 978
<i>bifolium</i> . . . 1265	Scleranthus . . . 139	erucæfolius . . . 976
<i>Epipogium</i> . . . 1267	annuus . . . 377	Fuchsii Gm. . . 981
<i>hircinum</i> . . . 1240	commosus Dmtr. <i>c.</i> 377	<i>germanicus</i> Willr. 979
<i>viride</i> . . . 1264	divaricatus Dmtr. <i>b.</i> 377	Jacobæa . . . 977
Saxifraga . . . 221	perennis . . . 378	nemorensis . . . 979
agregata Lj. . <i>d.</i> 582	Sclerocblon P. B. 542	ovalis . . . 982
caespitosa . . . 582	dura P. B. . . 1452	Sarracenicus. . . 980
condensata Gmel. <i>c.</i> 582	Scorzonera . . . 390	silvaticus . . . 975
<i>confusa</i> Lej. . <i>c.</i> 582	angustifolia . <i>b.</i> 1004	<i>spatulifolius</i> . . 972
<i>decipiens</i> Ehr. . . 582	hispanica . . . 1005	<i>tenuiflorus</i> Jeq. . 976
granulata . . . 581	humilis . . . 1004	viscosus . . . 974
hypnoides . . . 583	plantaginea Sl. <i>c.</i> 1004	vulgaris . . . 973
sponhemica Gm. <i>b.</i> 582	Scrophularia Trn. 272	Scrapias
tridactylites . . . 580	alata . . . <i>b.</i> 699	<i>ensifolia</i> Mr. . . 1270
uniflora Stbg. <i>d.</i> 582	aquatica . . . 702	<i>grandiflora</i> . . . 1269
SAXIFRAGEÆ . <i>p.</i> 81	<i>aquatica</i> Koch. . 700	<i>Helleborine</i> . . . 1272
Scabiosa . . . 335	Balbisii Hr. . . 702	<i>lanceifolia</i> Mr. . 1269
<i>arvensis</i> . . . 879	<i>betonicifolia</i> DC. . 702	<i>latifolia</i> . . . 1272
atropurpurea. . . 878	Erharti St. . . 700	<i>longifolia</i> . <i>d.</i> 1269
Columbaria . . . 876	Neesii Wrtg. . . 701	<i>longifolia</i> . <i>c.</i> 1273
patens Jrd. . <i>c.</i> 876	nodosa . . . 699	<i>longifolia</i> . <i>d.</i> 1271
pratensis Jrd. <i>b.</i> 876	umbrosa Dmtr. <i>b.</i> 699	<i>longifolia</i> . <i>d.</i> 1270
<i>silvatica</i> . . . 880	vernalis . . . 703	<i>palustris</i> Sep. . 1273
Succisa . . . 877	SCROPULARINÆÆ <i>p.</i> 94	<i>rubra</i> . . . 1271
Scandix . . . 214	Scutellaria . . . 310	<i>Xiphophyllum</i> . 1270
<i>infesta</i> . . . 561	galericulata . . . 802	Serratula . . . 343
<i>odorata</i> . . . 568	minor . . . 803	<i>arvensis</i> . . . 901
Pecten-Veneris . 569	Secale . . . 550	tinctoria . . . 903
Schenodorus P. B.	cereale . . . 1503	Seseli . . . 192
<i>arundinaceus</i> P. B. 1486	Sedum . . . 141	annuum . . . 536
<i>elatior</i> P. B. . . 1484	aere . . . 380	<i>Curvi</i> . . . 536
<i>foliaceus</i> P. B. . 1483	album . . . 386	<i>coloratum</i> Ehr. . 532
<i>pratensis</i> . . . 1485	aureum Wrtg. . . 384	<i>Libanotis</i> Keh. . 533
<i>silvaticus</i> P. B. . 1487	boloniense DC. . 382	montanum . . . 537
Scheuch	glaucescens . <i>b.</i> 383	Sesleria Sep. . 524
<i>albus</i> . . . 1366	<i>lividum</i> Brnd. . . 318	cœrulea Ard. . . 1415
<i>compressus</i> . . . 1376	maximum St. . . 387	Setaria P. B. . 515
Scilla . . . 457	<i>nite</i> . . . 381	germanica P. B. <i>b.</i> 1396
bifolia . . . 1202	purpurascens Koch. 388	glauca P. B. . . 1395
Scirpus . . . 503	<i>purpureum</i> Lk. . . 388	italica P. B. . . 1396
<i>aricularis</i> . . . 1368	reflexum . . . 383	rubicunda . <i>b.</i> 1395
<i>Bacotryon</i> Ehr. . 1369	<i>rubens</i> Hk. . . 379	verticillata P. B. 1393
caespitosus . . . 1370	<i>rubrum</i> . . . 379	verticilliformis <i>b.</i> 1392
<i>campestris</i> Rth. . 1369	<i>rupestre</i> . <i>b.</i> 383	viridis P. B. . . 1394
<i>Caricis</i> Rtz. . . 1376	<i>schistosum</i> Lj. . . 382	Sherardia Dill. . 329
compressus Pers. 1376	sexangulare . . 381	arvensis . . . 849
glaucus Sm. . <i>c.</i> 1372	<i>Telephium</i> Auct. . 387	Sieglingia Bhd. . 522
lacustris . . . 1372	treviricum Rsb. . 385	decumbens Bhd. 1435

Silene Bess.	195	Sorbus	168	Stellaria	33
pratensis Bess.	540	Aria Criz.	492	graminea	94
Silene	23	aucuparia	490	holostea	92
Armeria	70	domestica	489	media Vill.	91
conica	65	terminalis Criz.	491	nemorum	90
conoidea	66	Sorghum	24	uliginosa Mrr.	95
gallica	68	suecharatus	1436	Stellera	
inflata Sm.	64	Sparganium	498	Passerina	1103
noctiflora	69	erectum a.	1303	Stenactis Cass.	371
nutans	67	erectum b.	1504	annua Nees.	964
Saponaria Frzl.	62	ramosum Hds.	1303	bellidiflora A.	964
venosa Aschs.	64	simplex Hds.	1304	Stipa	323
Silybum Vill.	343	Spartium		pennata	1414
marianum Grln.	898	scoparium	277	Succisa M. et K.	
Sinapis	85	Specularia Hst.	317	præmorsa Aschn.	877
alba	227	hybrida DC.	828	pratensis Mch.	877
arvensis	226	speculum DC.	827	Symphytum Trn.	250
Cheiranthus Keh.	228	Spergula	27	officinale	636
nigra	225	arvensis	80	patens Sibth. b.	636
Sisymbrium	78	maxima Whe. b.	80	Syringa	234
Alliaria Sep.	209	pentandra	81	persica	608
amphibium	206	sativa Bngh. c.	80	vulgaris	607
arenosum	197	Spergularia Pol.	26	Symphoria Prsch.	328
murale	220	rubra Prsl.	79	racemosa Mx.	848
Nasturtium	204	segetalis Fzl.	78	Tajetes Trn.	360
officinale Sep.	214	Spinacea Trn.	404	patula	942
palustre Lys.	207	glabra	1051	Tamus	468
silvestre	205	inermis Mch.	1051	communis	1231
Sophia	212	oleracea	1052	Tanacetum	359
supinum	213	spinosa Mch.	1052	Balsamita	941
tenusifolium	220	Spiraea	148	corymbosum Schtz.	931
Thalianum Gd.	210	denudata H. b.	403	Parthenium Schtz.	930
Sium	187	Filipendula	402	vulgare	940
angustifolium	527	hypericifolia	405	Taraxacum Jss.	392
Cervaria	546	prunifolia V. H.	406	arcuatum Tsch. d.	1009
Falcaria	518	salicifolia	404	lævigatum DC. b.	1009
inundatum	525	Ulmaria	403	officinale Wg.	1009
latifolium	526	Spiranthes Reh.	487	paludosum Sep.	1010
nodiflorum	524	æstivalis Reh.	1276	udum Jd. c.	1009
SOLANÆ p.	92	Stachys	304	Taxus Trn.	447
Solanum Trn.	260	alpina	787	baccata	1184
Dulcamara	658	ambigua Sm.	789	Teesdalla R. Br.	93
humile Bd. c.	659	annua	792	Iberis	244
miniatum Bhd. d.	659	arvensis	791	nudicaulis RB.	244
nigrum	659	betonica Rth.	794	integrifolia b.	244
ochroleucum Bast. b.	659	germanica	786	Teucrium	312
tuberosum	660	palustris	790	alba T. b.	809
villosum Lmk c.	659	recta	793	Rotrys	809
Solidago	369	sideritis Vill.	793	Chamædrys	811
alpestris W. et K. b.	960	sylvatica	788	Chamæpitys	817
canadensis	961	Staphylea	55	montanum	812
Virga-aurea	960	pinnata	152	Scordium	810
Sonchus	396	Statice		Scorodonia	808
arvensis	1021	Armeria	598	supinum Jq. b.	812
asper Vil.	1020	Stellaria	33	Thalicttrum	2
lacerus Will. b.	1029	aquatica Rd.	95	aquilegifolium	3a
lævis Vil.	1019	Alsine Reh.	95	elatum M. b.	4
oleraceus	1019	glauca With.	93		

Thalictrum 2	Tragopogon 389	Tulipa Trn. 452
flavum 5	orientalis 1002	silvestris 1190
majus J. 4	porrifolius 1000	Tunica Sep.
minus 3	pratensis 1003	<i>prolifera</i> Sep. 53
montanum Wlb. 3	undulatum Jq. d. 1003	Turgenta Hfm. 208
nigricans J. 5	Trifolium Trn. 120	latifolia Hfm. 557
saxatile G. b. 3	agrarium 315	Turritis Dill. 77
Thelata Alfd.	— majus a. 315	glabra 208
<i>rotundifolia</i> 165	— minus b. 315	<i>hirsuta</i> 195
Thesium 422	alpestre 318	Tussilago 379
<i>linophyllum</i> 1107	arvense 322	Farfara 985
pratense Ehr. 1107	aureum Pll. 314	<i>officinalis</i> 986
Thlaspi 94	<i>campestre</i> Schr. 315	Typha 497
alpestre 248	<i>caeruleum</i> 303	angustifolia 1302
arvense 245	filiforme 312	latifolia 1301
<i>Bursa pastoris</i> 250	Trifolium Trn. 120	media b. 1301
<i>campestre</i> 252	<i>flexuosum</i> Jeq. 317	TYPHACEÆ p. 174
montanum 246	fragiferum 327	Ulex 109
perfoliatum 247	hybridum 326	europæus 286
Trifolia Rth. 385	incarnatum 321	ULMACEÆ p. 144
hirta Rth. 994	<i>indicum</i> 302	Ulmaria Trn.
Thuta Trn. 446	<i>macrorrhizum</i> W. K. 299	<i>Filipendula</i> A. B. 402
occidentalis 1183	medium 317	<i>pentapetala</i> Gil. 403
Thymelea Trn. 418	<i>micranthum</i> 302	Ulmus 414
Passerina 1103	<i>minus</i> 312	campestris 1096
THYMELACEÆ p. 145	montanum 324	corylifolia Host. c. 1096
Thymus 293	ochroleucum 319	effusa Wd. 1097
<i>Acinos</i> 767	<i>officinalis</i> 298	montana Sm. 1096 ²
<i>Chamaedrys</i> Fr. 764	pratense 316	suberosa Ehr. b. 1096
<i>Serpyllum</i> 763	procumbens 313	UMBELLIFERÆ p. 72
vulgaris 765	<i>procumbens</i> Schb. b. 315	Urtica Trn. 415
Tilia 49	repens 325	dioica 1098
<i>europæa</i> 139	rubens 320	urens 1099
<i>grandiflora</i> Ehr. 139	sativum b. 316	URTICÆÆ p. 145
<i>parviflora</i> Ehr. 140	striatum 323	Utricularia 282
<i>platyphyllos</i> Sc. 139	Triglochin 489	vulgaris 734
<i>microphylla</i> 140	palustris 1278	
silvestris Dsf. 140	Trigonella 113	
TILIACEÆ p. 24	Fœnum-græcum. 292	Vaccaria Md.
Tithymalus-Enphorbia	Triodia R. Br.	parviflora Meh. 61
Tordylium Trn. 204	<i>decumbens</i> P. B. 1436	VACCINÆÆ DC. p. 111
<i>Anthriscus</i> 560	Trisetum P. B.	Vaccinium 314
<i>latifolium</i> 557	<i>flavescens</i> P. B. 1431	Myrtillus 815
maximum 553	Triticum 551	<i>Oxyccocos</i> 816
<i>nodosum</i> 562	<i>æstivum</i> a. 1504	Vitis-Idæa 834
Torilis Ad. 210	caninum Schb. 1509	Valantia
<i>Anthriscus</i> Gml. 560	<i>compositum</i> 1505	<i>Aparine</i> 863
<i>infesta</i> Dby. 561	durum Df. 1505	<i>Cruciata</i> 854
<i>nodosa</i> Grtn. 562	hibernum b. 1504	<i>tricornis</i> 864
Tormentilla 155	monococcum. 1508	Valeriana 333
<i>erecta</i> 456	<i>pinnatum</i> 1489	dioica 868
procumbens Sbt. 455	repens 1508	exaltata Mik. b. 866
<i>reptans</i> 455	<i>silvaticum</i> Meh. 1490	officinalis 866
silvestris Nkr. 456	Spelta 1507	Phu 867
Tragopogon 389	turgidum 1506	VALERIANÆÆ p. 117
angustissimus Dr. c. 1003	vulgare 1504	Valerianella Trn. 334
major Jq. 1001	Tulipa Trn. 452	auricula DC. 871
minor Fr. b. 1003	Gesneriana 1191	carinata Lois. 870
		coronata DC. 874

Valerianella Trn.	344	Veronica	270	Viola Trn.	103
<i>dentata</i> Dv.	872	<i>polita</i> Fr.	694	<i>canina</i>	265
<i>eriocarpa</i> Dv.	873	<i>polyanthos</i> Th. <i>b.</i>	689	<i>elatior</i> Fr.	272
<i>humata</i> Lj.	874	<i>præcox</i> All.	692	<i>hirta</i>	263
<i>Locusta</i>	874	<i>prostrata</i>	684	<i>intermedia</i> Lej. . . .	274
<i>Morisonii</i> DC.	872	<i>romana</i> Pail.	687	<i>mirabilis</i>	269
<i>olitoria</i> Meh.	869	<i>scutellata</i>	678	<i>montana</i>	266
<i>rimosa</i> Bst.	871	<i>serpyllifolia</i>	686	<i>odorata</i>	264
<i>vesicaria</i> Meh.	875	<i>spadana</i> Lej. <i>b.</i>	683	<i>palustris</i>	262
VERBASCEÆ	p. 93	<i>Teucrium</i>	685	<i>Reichenbachia</i>	267
Verbascum Trn.	269	<i>triphyllus</i>	691	<i>Riviniana</i> Rehb. . . .	268
<i>album</i> Meh.	675	<i>verna</i>	690	<i>rothomagensis</i> Dsf.	273
<i>floccosum</i> W. K.	674	Viburnum	826	<i>silvestris</i> Keh.	267
<i>Lychnitis</i>	675	<i>Lantana</i>	834	<i>tricolor</i>	270
<i>montanum</i> Schr.	672	<i>Opulus</i>	835	<i>vulgaris</i>	270
<i>nigro-floccosum</i>	677	<i>sterilis</i> DC.	835	VIOLARIÆ	p. 40
<i>nigrum</i>	676	Viola	123	Viscaria	
<i>phlomoïdes</i>	671	<i>angustifolia</i> All. . . .	338	<i>purpurea</i> Wim.	76
<i>pulverulentum</i> Vill. . . .	673	<i>Cræcea</i>	332	<i>viscosa</i> Aschr.	76
<i>Schottianum</i> Schr.	677	<i>Ervilia</i> Wld.	344	<i>vulgaris</i> Röhl.	76
<i>Schraderi</i> My. <i>b.</i>	669	<i>Faba</i>	346	Viscum	219
<i>tapsiforme</i> Schr.	670	<i>gracilis</i> Lsl.	342	<i>album</i>	575
<i>Thapsus</i>	669	<i>hirsuta</i> Keh.	340	Vitis	53
Verbena	313	<i>lathyroides</i>	339	<i>hederacea</i> Wld.	151
<i>officinalis</i>	813	<i>Lens</i>	345	<i>vinifera</i>	150
VERENACEÆ	p. 111	<i>lutea</i>	336	Wahlenbergia Sch. . . .	320
Veronica Trn.	270	<i>monantha</i> Koch.	343	<i>hederacea</i> Rehb.	833
<i>acinifolia</i>	688	<i>onobrychioides</i>	334	Weingartneria Bh	525
<i>agrestis</i>	693	<i>Orobis</i> DC.	358	<i>canescens</i>	1416
<i>Anagallis</i>	679	<i>pisiformis</i>	331	Wiggersia F. W. H. . . .	
<i>arvensis</i>	689	<i>sativa</i>	337	<i>lathyroides</i> F. W. H. . .	339
<i>Beccabunga</i>	680	<i>sepium</i>	335	<i>minima</i> Alt.	339
<i>Buxbaumii</i> Ten.	696	<i>tenuifolia</i> Rth.	333	<i>sepium</i> Fl. W. H. . . .	335
<i>Chamædrys</i>	681	<i>tetrasperma</i> Meh. . . .	341	Xanthium Trn.	400
<i>didyma</i> Sch. Trn.	693	Villarsia	240	<i>strumarium</i>	1040
<i>fitiformis</i> Lej.	696	<i>nymphæoides</i> Vent. . . .	615	Zannichella	491
<i>hederæfolia</i>	697	Vinea	236	<i>palustris</i>	1292
<i>Lappago</i> Schr. <i>b.</i>	697	<i>major</i>	611	Zea	506
<i>lutifolia</i>	685	<i>minor</i>	610	<i>Mays</i>	1383
<i>limosa</i> Lej.	680	Vincetoxicum Meh. . . .	237		
<i>montana</i>	682	<i>album</i> Achr.	612		
<i>officinalis</i>	683	<i>officinale</i>	612		
<i>opaca</i> Fr.	695	Viola Trn.	103		
<i>peregrina</i>	687	<i>Altaica</i> Pall.	271		
<i>persica</i> Poir.	696	<i>arvensis</i>	270		

Table des noms français et allemands des genres et des noms vulgaires en idiome luxembourgeois.

(Les noms allemands ou français ressemblant aux dénominations latines sont omis.)

(Les chiffres rapprochés des noms s'appliquent aux espèces.)

I. Noms français.

Abricotier	145	Calaminthe	295	Doucette	334
Absinthe	358	Canche	526	Douce-amère 656	
Agripaume	308	Canneberge	315	Echalotte 1215	
Aigremoine	157	Cardère	337	Egopode	182
Ail	458	Carotte	206	Endive 1016	
Airelle	314	Cassis 579		Eugrain 1508	
Ajonc	109	Céleri	185	Epeautre 1507	
Alpiste	511	Centenille	227	Epervière	399
Amandier	144	Céraste	34	Epiaire	304
Ancolie	12	Cerfeuil 563		Epicea	1176
Anserine	406	Cerisier 398		Epinard	1075
Appétit 1214		Chalef	419	Epine-vinette	17
Arbre de Judée	330	Chanvre	412	Epurge 1111	
Argousier	420	Chardon	48	Erable	51
Armoise	358	Charme	435	Ers	124
Arroche	413	Châtaignier	432	Estragon 936	
Arabelle	74	Chêne	433	Faux-acacia 293	
Artichaut	340	Chèvre-feuille	327	— ébinier	106
Asaret	423	Chicorée	383	Fenouil	293
Asperge	463	Chiendent 1509		Fenu-grec	292
Aubépine	162	Chou	84	Fétuque	545
Aulne	439	— navel <i>b.</i> 223		Fève	125
Avoine	528	— fleur <i>c.</i> 222		Ficaire	7
Baguenaudier	116	Ciboule 1214		Fléole	518
Bardane	341	Ciguë	215	Flouve	508
Belladone	264	Civette 1214		Flûteau	448
Benoite	151	Coignassier	165	Fraisier	152
Berce	203	Commaret	153	Framboisier 433	
Berle	187	Concombre	322	Fraxinelle	42
Betoinne	305	Consoude	250	Frêne	233
Betterave	405	Coquelicot	173	Froment	551
Bluet 906		Coqueret	263	Fumeterre	70
Bois-gentil	417	Corète	149	Fusain	56
Boucage	188	Cornille	429	Gaillet	331
Bouillon blanc 669		Cornouiller	218	Gainier	122
Bouleau	438	Corynophore	526	Galantine	472
Boule de neige <i>b.</i> 844		Coudrier	434	Gaude 167	
Bourage	633	Cotonnière	366	Genêt	277
Bruyère	323	Courge	322	Genévrier 1144	
Brocoli	<i>c.</i> 222	Cranson	91	Germandré	312
Bugle	311	Cresson	76	Gesse	127
Buglosse	248	Dauphinelle	13	Giroflée	72
Bugrane	110	Dompte-venin	237	Glaucière	67
Buis	427	Dorine	222	Gnavelle	139

Gouet	494	Nénuphar	64	Reine-claude c. 395
Grateron	10	Nerprun	104	Reine des prés 403
Grosseiller.	220	Nielle	76	Renouée 1109
Gui	219	Nivéole.	471	Riz 503
Guimauve	134	Noisetier	434	Ronce 150
Gynervi	13	Noyer	421	Rossolie. 59
Haricot	121	Obier 835		Rubannier 495
Hêtre	431	Oeillet	20	Rue 112
Houblon	413	Oignon 1216		Sabline 32
Houx	231	Onagre	172	Sabot de Vénus. 488
If	447	Orge	549	Sainfoin. 132
Immortelle	363	Orme	414	Salicaire. 123
Ivraie	548	Origan.	292	Salsifis 389
Jacée 910		Orpin	141	Sapin 444
Jacobée 626		Ortie	415	Sarrasin. 410
Jonc	499	Panais	202	Sarète 345
Joubarbe	142	Panicault	179	Sariette 298
Julienne	81	Paquerette.	357	Sauge 291
Jusquiame.	268	Pariétaire	416	Saule 430
Ketmie	48	Parisette	467	Scorzonère 390
Laiteron	396	Pas-d'âne	379	Seigle 550
Laitier.	50	Passerage	97	Sélerie 185
Laitue	395	Pastel	99	Séringat. 169
Lampourde	400	Patience 1075		Seneçon. 376
Lavande	286	Paturin	542	Serpolet. 293
Lentille	124	Pavot	65	Sorbier 168
Lenticule	493	Pêcher.	143	Souchet. 505
Lierre	217	Pensée 270		Souci 361
Lilas	234	Perce-neige 1238		Spargoute 27
Lin.	38	Perdrigon b. 395		Sureau 325
Linaigrette	504	Persil	184	Symphoricape 328
Liondent	386	Pervenche.	23	Tabac 206
Lis	454	Pesse 421		Tabouret 94
Liseron	245	Peuplier	437	Tamier 408
Livèche	196	Phléole.	518	Tanaisie. 359
Luzerne	119	Pigamon	8	Thym 293
Lyciet	265	Piment 661		Tilleul 40
Maïs	506	Pimpernelle	476	Topinambour 918
Marbelle	500	Pin	441	Tourette. 77
Marronnier	52	Pissenlit	392	Trèfle 120
Masette	497	Plantain	230	Tremble 1161
Mauve	46	— d'eau	448	Troène 232
Mélèze	442	Poireau 1207		Troscart. 489
Melon	236	Poirier.	166	Ulmaire 403
Milleperluais	58	Pois	126	Velar 80
Millet	522	Pomme de terre 660		Verge-d'or 960
Molène	269	Pommier	167	Vergerette 370
Morelle.	260	Porcelle	389	Verveine 313
Mouron	228	Potamot	490	Vesce 123
Moutarde	85	Pourpier	135	Vigne 53
Mûllier.	275	Primevère.	225	Vinettier 17
Muguet.	464	Prunelier	146	Violette 103
Mûrier.	411	Radis	86	Viorne 326
Myrtille 815		Raifort.	239	Vipérine. 254
Navet b. 224		Raiponce	318	Vulnéraire 289
— de Suède b. 223		Râpette.	258	Vulpin 517
Navette 224a		Ratoneule	5	Yèble 842
Néflier.	101	Rave 230		

II. Noms allemands.

Afterquendel . . .	134	Buchs . . .	427	Fingerhirse . . .	514
Ahorn . . .	51	Cornelkirsche . . .	218	Fingerhut . . .	274
Akazie . . .	293	Cristophskraut . . .	15	Flachs . . .	108
Akelei . . .	12	Cypergras . . .	505	— seide . . .	631
Alant . . .	368	Daun . . .	303	Flattergras . . .	522
Amaranth . . .	401	Dickblatt . . .	140	Flieder . . .	234
Ampfer . . .	408	Dill . . .	201	Flockenblume . . .	316
Andorn . . .	306	Dingel . . .	482	Flöhhkraut . . .	367
Apfelbaum . . .	167	Dinkel 1507		Föhre 1171	
Aprikosenbaum . . .	145	Diptam. . . .	42	Frauenflachs . . .	276
Artischoke . . .	340	Distel	342	— schuh . . .	488
Aron . . .	494	Doppelsame . . .	82	— thräne . . .	477
Augentrost . . .	280	Dost	292	Friedlos . . .	226
Aspe 1161		Dotterblume . . .	12	Froschlöffel . . .	448
Baldgreis . . .	376	Dreizack	489	Fuchsschwanz . . .	517
Bärenklaue . . .	203	Dürrwurz . . .	370	Fünffingerkraut . . .	154
Bärwurzel . . .	194	Eberesche . . .	168	Gänseblümchen . . .	357
Basilikenkraut . . .	287	Eberwurz . . .	339	— fuss . . .	406
Batunge . . .	305	Edelkamille . . .	352	— kresse . . .	74
Bauernsenf . . .	95	Edeltanne 1178		Gamander . . .	812
Becherblume . . .	160	Ehrenpreis . . .	270	Gartenkerbel 563	
Beifuss . . .	358	Eibe	447	— kresse 251	
Beinheil . . .	461	Eibisch	47	Gauchheil . . .	597
Beisbeere . . .	261	Eiche	433	Gedenkemein . . .	257
Betterich . . .	387	Einbeere . . .	467	Geisblatt . . .	327
Biebernelle . . .	188	Einkorn 1508		Geisraute . . .	115
Bilsenkraut . . .	268	Eisenhut . . .	14	Georgine . . .	377
Bingelkraut . . .	426	Eller	439	Gersch . . .	519
Birse . . .	499	Elsbeere 491		Gerste . . .	548
Binsenstrauch . . .	105	Endivie 1016		Gewürzstrauch . . .	170
Birke . . .	438	Engelwurz . . .	199	Ginster . . .	107
Birnbaum . . .	166	Epheu	217	Glaskraut . . .	416
Bisamhyacinthe . . .	459	Erbse	126	Glockenblume . . .	316
Bisamkraut . . .	324	Erdbeere . . .	152	Glockenhaide . . .	586
Blasenstrauch . . .	116	— Spinat . . .	407	Gnadenkraut . . .	273
Blattkohl a. 222		Erdkohlrabi b. 223		Goldlack . . .	72
Blumenkohl . . .	222	Erdnuss . . .	333	Goldnessel 780	
Blutauge . . .	153	Erdrauch . . .	70	Goldruthe . . .	369
Blutze . . .	375	Erle	439	Goldhaar . . .	373
Boecksdorn . . .	265	Erve	124	Goldstern . . .	456
Bockshorn . . .	113	Esparsette . . .	132	Gottesvergeß 796	
Bohne . . .	125	Espe 1161		Grastilie . . .	459
Bohnenbaum . . .	106	Estragon 936		Grünkohl 222	
Boretsch . . .	247	Falsblume . . .	362	Günsel . . .	311
Borstengras . . .	552	Faulbaum 276		Gundelrebe . . .	300
Braunwurz . . .	272	Feigwurz . . .	7	Gurke . . .	322
Braunkohl . . .	222	Feldkresse . . .	98	Gypskraut . . .	19
Breitsame . . .	207	Felsenmispel 164		Haargras . . .	550
Brennessel . . .	415	Fenchel	538	Haarstrang . . .	200
Brombeere . . .	150	Fennig	515	Habichtskraut . . .	399
Brunnenkresse . . .	76	Ferkelkraut . . .	384	Hafer . . .	528
Bruchkraut . . .	138	Fettkraut . . .	141	Haferwurz . . .	389
Brustwurz . . .	193	Fichte 443		Haftdolde . . .	209
Buche . . .	431	Fiebertklee . . .	239	Hahnenfuss . . .	6

Hainbuche.	435	Kartoffel 660	Löffelkraut	91
Hanff	412	Kastanie	Löwenmaul.	275
Hanffod	283	Katzenminze	Löwenzahn.	386
Hartgras	541	Katzenpfötgen.	Lolch	547
Hartriegel	218	Kellerhals 1102	Männertreu.	179
—	232	Kerbel	Mäuseschwanz.	5
Hasel	434	Kiefer	Maiblume	464
Haselwurz	423	Kirschbaum	Maïs.	506
Hasenlattich	394	Klappertopf	Mastkraut	28
Hauhechel.	110	Klee	Malve	46
Hauswurz	142	Kleinling	Mandelbaum	144
Hecksame	109	Klettenkerbel	Mariengras	510
Hederich 220		Klingel.	Massholder 145	
Heide	224	Knabenkraut	Mauerpfeffer 380	
Heidelbeere	314	Knautkraut	Maulbeere	411
Heilwurz	191	Knautgras.	Meerrettig	239
Helmer.	310	Knoblauch 1205	Meerzwiebel	457
Herbstzeitlose 451		Knöterich	Meister	330
Herzblatt	60	Knotenblume	Melde	403
Herzgespann	308	Knörpelkraut.	Melone 836	
Hexenkraut	174	Kohl	Merk.	187
Hinbeere 433		Kohlrabi 222	Milche	381
Himmelsleiter.	244	Kohlrops 222	Milzkraut	222
Himmelschlüssel.	225	Kohlrübe 222	Minze	288
Hirschsprung	137	Kornblume 906	Mispel	161
Hirse	513	Kranzrade.	Mistel	375
—	516	Kratzdistel.	Mohn	65
Hirtentasche	96	Kresse	Möhre 555	
Hohlzahn	303	Kreuzblume	Mondviole	87
Hohlwurz	69	Kronenwicke	Monke	319
Hollunder	325	Krumhals	Moorkönig	277
Höswurz	479	Krümling	Moosbeere 816	
Honiggras	530	Kugeldistel	Mumel	63
Honigklee	118	Kuhblume.	Mutterkraut 930	
Hopfen.	413	Kümmel	Nachtkerze	172
Hornkraut.	34	Kunigundenkraut.	Nachtschatten	260
Hornmohn.	67	Kürbiss 323	Nachtviole	81
Hußlattich	370	Labkraut	Nadelkerbel.	214
Hundsauge	256	Lack	Natterkopf	254
Hundskamille.	353	Läusekraut.	Nelke	20
Hundsrauke	83	Lärche.	Nelkenwurz.	151
Hundswurz	475	Laichkraut.	Nessel	334
Hungerblume.	90	Lamnikraut	Nieswurz	10
Igellock	489	Laserkraut.	Nixkraut	492
Igelsame	255	Lattich.	Ochsenzunge	248
Igelkolbe	498	Lauch	Odermennig	157
Immerschön	363	Lavendel	Oelweide	419
Incarnatklee 321		Lebensbaum	Ohnblatt	57
Johannisbeere 221		Leimkraut.	Ohnhorn	473
Johanniskraut.	58	Lein	Osterluzei	424
Judasbaum	122	Levkoje	Pampasgras.	534
Judenkirsche	263	Lichtnelke.	Pappel	437
Kälberkropf	213	Liebesapfel	Pastinack	202
Kalmus	496	Liebstöckel	Perlgras.	536
Kamille	923	Lieschgras.	Pestwurz	380
Kammgras.	536	Lilie	Petersilie	184
Karde	342	Linde	Peterstrauch	328
Karnunkelstrauch. 149		Linse	Pfefferkraut.	772

Pfefferminz . . .	752	Scheibenreich . . .	186	Spierstaude . . .	148
Pfeiffengras . . .	537	Schierling . . .	215	Springkraut . . .	114
Pfeiffenstrauch . . .	169	Schilf . . .	521	Spurke . . .	31
Pfeilkraut . . .	449	Schaumkraut . . .	75	Stachelbeere . . .	220
Pfingstrose . . .	49	Schelwurz . . .	178	Stechapfel . . .	267
Pfirsichbaum . . .	143	Schlämpling . . .	271	Stechpalm . . .	231
Pflaumenbaum . . .	146	Schorfkraut . . .	258	Steinbrech . . .	221
Pfötgen . . .	366	Schlehe 393		Steinklee . . .	132
Pfriemen . . .	103	Schlüssel . . .	253	Steinkraut . . .	88
Pfriemengras . . .	523	Schmalzblume . . .	35	Steinnelke . . .	229
Phalaris . . .	512	Schmeerwurz . . .	468	Sternmiere . . .	90
Pimpinelle . . .	160	Schmiele . . .	526	Stielsame . . .	391
Pimpernuss . . .	55	Schneeball <i>b.</i> 840		Storchschnabel . . .	44
Platterbse . . .	127	Schnabelsame . . .	502	Straussgras . . .	519
Quecke 1309		Schneeglöckchen . . .	472	Sumpfwurz . . .	484
Quellgras . . .	538	Schnittlauch 1214		Süssdolde . . .	213
Quitte . . .	483	Schottenklee . . .	112	Süssholz . . .	297
Rade . . .	77	Schotenklee . . .	119	Tabak . . .	266
Radieschen . . .	86	Schuppenmiere . . .	26	Taglilie . . .	462
Ragwurz . . .	478	Schuppenwurz . . .	285	Tännel . . .	37
Rainfarn . . .	359	Schwaden . . .	539	Täschelkraut . . .	94
Ranke . . .	78	Schwalbenwurz . . .	237	Tanne . . .	444
Rapontica . . .	172	Schwarzwurz . . .	390	Tannenwedel . . .	421
Raps 223		Schwaunenblume . . .	450	Taubenkropf . . .	22
Rapünzchen . . .	334	Schwarzdorn . . .	393	Taubnessel . . .	790
Rapunzel 830		Schwarzkümmel . . .	41	Taumelolch 1494	
Raute . . .	112	Schwarde . . .	329	Tauröschchen . . .	180
Raygras . . .	547	Schweinekraut . . .	495	Tausendgarbe . . .	351
Reis . . .	508	Schwertel . . .	469	Teichbinse . . .	502
Rettig . . .	11	Schwingel . . .	545	Teufelsauge . . .	9
Riemenzunge . . .	474	Seekanne . . .	240	Teufelskrallen . . .	318
Riet . . .	503	Seelilie . . .	64	Thurmkraut . . .	77
Ringelblume . . .	361	Segge . . .	561	Thymian . . .	203
Rispengras . . .	542	Seide . . .	211	Tollkirsche . . .	264
Rittersporn . . .	13	Seidelbast . . .	417	Traganth . . .	117
Roggen . . .	550	Seidenpflanze . . .	285	Trespe . . .	544
Rohr . . .	533	Seifenkraut . . .	21	Ulme . . .	414
Rohrkolben . . .	497	Senf . . .	85	Veilchen . . .	103
Rosenkohl . . . <i>g.</i>	222	Serradella 364		Venus Spiegel . . .	317
Roskastanie . . .	52	Sichelmöhre . . .	121	Vergissmeinnicht . . .	251
Ruchgras . . .	509	Silbergras . . .	525	Verneinkraut . . .	422
Rübe . . .	224	Silge . . .	197	Vogelfuss . . .	130
Rübsen . . . <i>b.</i>	224	Simse . . .	503	Vogelkirsche . . .	490
Rüster . . .	414	Sinau . . .	158	Vogelmilch . . .	455
Ruhrkraut . . .	364	Sinngrün . . .	236	Vogelnest . . .	485
Runkelrübe . . .	405	Sockenblume . . .	18	Wachholder . . .	465
Sadebaum 1181		Sonnenröschen . . .	102	Wachtelweizen . . .	279
Sammtblume . . .	360	Sonnentau . . .	59	Waid . . .	99
Salvei . . .	760	Sonnenblume . . .	349	Waldmeister 831	
Saubohne . . . <i>a.</i>	346	Sonnenwende . . .	259	Walderbse . . .	128
Saudistel . . .	396	Sommerwurz . . .	284	Waldnessel . . .	302
Sauerdorn . . .	17	Spargel . . .	463	Waldrebe . . .	1
Sauerklee . . .	40	Spark . . .	27	Waldvöglein . . .	483
Sauerkirsche 399		Spatzenzunge . . .	418	Wallnuss . . .	430
Schachblume . . .	453	Spelz 1507		Wasserdost . . .	348
Schattenblume . . .	466	Spinal 1104		Wasserlinse . . .	493
Schattenkraut . . .	307	Spindelbaum . . .	56	Wassernabel . . .	176
Scharte . . .	345	Spitzklette . . .	400	Wasserstern . . .	428

Wasserschlauch . . .	282	Widerbart . . .	481	Wurmkraut . . .	388, 940
Wau . . .	62	Wiesenknopf . . .	159	Yssop . . .	294
Wegerich . . .	230	Wiesenraute . . .	8	Zaunrübe . . .	321
Wegedorn . . .	104	Winde . . .	245	Zeitlose . . .	451
Weichkraut . . .	36	Windhalm . . .	521	Ziegenfuss . . .	182
Weide . . .	486	Windröschen . . .	3	Ziest . . .	304
Weidenröschen . . .	171	Winterblume . . .	355	Zinnensaat . . .	385
Weiderich . . .	133	Wintergrün . . .	61	Zirnet . . .	204
Wegwarte . . .	383	Winterkresse . . .	73	Zittergras . . .	541
Weinstock . . .	150	Winterling . . .	9	Zweiblatt . . .	486
Weissdorn . . .	162	Wirbeldost . . .	296	Zwenke . . .	347
Weisstanne . . .	1178	Wohilverleih . . .	374	Zwiesel . . .	208
Weisswurz . . .	465	Wolfsfuss . . .	289	Zwiebel 1216	
Weizen . . .	552	Wolfsmilch . . .	425		
Wendelorch . . .	487	Wollgras . . .	504		
Weymuthskiefer . . .	1174	Wollwurz . . .	250		
Wicke . . .	123	Wundklee . . .	289		

III. Noms en idiome luxembourgeois.

Abkraut . . .	981	Batteralzem . . .	937	Bordurierbes . . c.	347
Ablatz . . .	774	— welle . . .	936	Botterblät . . .	1074
Abriko . . .	392	Beaumier . . .	1179	Botterblum ¹⁾ . . .	23
Abrikosebäm . . .	392	Bettfös . . .	770	Bourage . . .	633
Acacien . . .	293	Beidelschnidder . . .	250	Boutsch . . .	1003
Ackerlaus . . .	556	Beifoss . . .	936	Brandkraut . . .	387
Aesp . . .	1161	Beirooz . . .	1199	Bratzel . . .	1214
Allekapp . . .	1257	Benzeller . . .	490	Bredercheskraut . . .	132
Ahlenter . . .	1164	Bergamottebîr . . .	485	Brehm . . .	431
Alzem . . .	358	Beschweid . . .	1053	Brehmendaar . . .	431
Amerikanesch Perdsbier		Bettséchesch . . .	1009	Brenndeschtel 1098, 1099	
[434		Bësy . . .	485	— giel . . .	780
Andiv . . .	990	Beurre . . .	485	— ród . . .	777
Aneis . . .	530	Bieh . . .	1132	— weiss . . .	778
Aneiskierwel . . .	568	Biereck . . .	1165	— well . . .	790
Anthonisthee . . .	794	Bigarro . . . c.	398	— zahm . . .	778
Apelbäm . . .	485	Bir . . .	485	Brennende Liebe . . .	73
Appetit . . .	1204	Birebäm . . .	485	Brochdeschtel . . .	515
Arlesbäm . . .	492	Birefang . . .	610	Brochkraut . . .	473
Armenee . . .	56	Birreselchen . . .	610	Brockelè . . . c.	222
— Gräs . . .	60	Bliederzalôt . . .	1017	Brugnon . . . b.	390
— well . . .	54	Bloderkraut . . .	209	Buchacker . . .	1132
Artischô . . .	886	Biò Kuorblum . . .	906	Burekascht . . .	204
Aaschtert . . .	147	Bocksbärt . . .	1103	— welle . . .	680
Aaschtholz . . .	147	— . . .	1240	Euisson-ardent . . .	480
Aspersch . . .	1224	Bôhn . . .	346	Cabisett . . .	869
Aspern . . .	477	— Garde- . . . b.	346	Calebass . . .	837—838
Aster . . .	969	— Mier- . . .	328	Calvill . . .	487
Balsamin . . .	115	— Perds- . . .	346	Caméleblum . . .	927
Biltes . . .	866	— Sau- . . .	346	Caneda . . .	1163
Bâmnoos . . .	1130	— Stache- . . . a.	328	Cèdre de Virginie . . .	1182
Bannweid . . .	1150	— Stäckelches- . . . b.	328	Celleree . . .	185
Bârtel . . .	1003	Bôhnekreitgen . . .	772		
Bartunekel . . .	794	Bonzei . . .	610		
Basilik . . .	746	Bonzenkraut . . .	570		

1) Toutes les Renoncullacées à fleurs jaunes sont comprises sous ce nom.

Cinerair . . .	972	Éech, Summer- . .	1134	Fullegrétchen . .	292
Chieong . . .	c. 1017	— Steen- . .	1134	Fullegrieschen . .	1450
Chikoré welle . .	989	— Wanter- . .	1135	Fullegras . . .	91
Chou-fleur . . .	a. 222	Eerblum . . .	290	Fullekîscht . . .	490
Chrysanthèm . .	932	Eerblum . . .	1009	Fullekîschtebâm .	490
Colerâv . . .	e. 222	Eiseech . . .	1135	Fullekraut . . .	91
— Erd- . . .	b. 223	Ehrholz . . .	51	Fullesæmchen . .	1387
Colza . . .	223	Ehrepreis . . .	683	— . . .	1396
Coklikô . . .	173	Elechter . . .	490	Gaffel . . .	435
Coriander . . .	571	Ellend . . .	515	Gänsekreitchen .	91
Cornichong . . .	835	Eller . . .	1164	— . . .	597
Cornichongskraut	549	Ellriecher . . .	490	Gardebôn . . .	346
Court-pendu . .	487	Engelsblum . . .	173	Gardegrant . . .	817
Corsonnier . . .	1005	Engelsblimmchen .	950	Geckege Klée . .	304
Cotong . . .	1377	Engelskapp . . .	173	Geesblåd . . .	847
Creschtblum . .	37	Englesche Wees .	1506	Geeskîe . . .	614
Cressong . . .	251	Enn . . .	1216	Geeskraut . . .	92
Cruchtblum . . .	1250	Enzian . . .	241	Gehaansblum . .	929
Daarâpel . . .	667	Eppelbâm . . .	486	Gehaanskréschel .	577
Dahlia . . .	983	Epicia . . .	1176	Genz . . .	277
Dahndeschtel . .	781	Erdbeer . . .	439	Gebânkte Männchen	1239
Dâmantel . . .	472	Erdknuod . . .	520	Geißler . . .	1180
Damaschtblum b.	218	Erdkréschel . . .	432	Giel Brenndeschtel	780
Damaschlepraum b.	394	Erdkolerâv . . .	b. 223	Giele Klée . . .	314
Daudeschtel . .	781	Erdnoss . . .	353	Giel Lilie . . .	1223
Dausendblum . .	669	Esch . . .	605	Giele Männchen .	289
Dausendknuod . .	367	Esp. . . .	1161	Giele Sæmchen . .	242
Dausendguldekraut	624	Estragon . . .	935	Giel Weid . . .	b. 1142
Dausendschéergen	921	Ewege Blimmchen .	946	Gielzegskraut . .	178
Dauvföss . . .	125	Ewege Peinetsch .	1075	Giersch . . .	519
Deiwlswurzel . .	1075	Fajol . . .	264	Giesekraitgen . .	597
Dell . . .	519	Fangerhutt . . .	705	Giescht . . .	1498
Delpes . . .	26	— . . .	824	— well . . .	1496
Denn . . .	1171	Faulbâm . . .	276	Goldblum . . .	949
Deschtel . . .	887	— røde . . .	573	Goldwurzel . . .	43
— Broch- . . .	515	— schwarze . .	276	Gottesvergess . .	796
— Drâhm- . . .	885	— weisse . . .	844	Grandkraut . . .	876
— Wiesen- . .	892	Feechholz . . .	1102	Grasarniee . . .	60
Diederchen . . .	242	Feierblum . . .	971	Grashilie . . .	1219
Dódeblée . . .	848	Feierkraut . . .	495	Greiskraut . . .	962
Domeldaar . . .	287	Fenchel . . .	538	Greng Heedekaar .	1091
Domerian . . .	955	Fescherkraut . .	1112	Gréschel . . .	576
Domporen . . .	351	Fetz . . .	340	— deck . . .	576
Donnerkraut . .	389	Fichtenholz . . .	1102	— Erd- . . .	432
Doucín . . .	487	Fils-avant-le-père	10	— rôth . . .	576
Dragunner . . .	447	Fimmel . . .	1094	— schwarz . . .	576
Drâmeschtel . .	885	Fioringras . . .	1405	— weiss . . .	576
Dreschklee . . .	a. 315	Flékraut . . .	955	Gri-gra-Grieschen	1450
Dreidaar . . .	50	Flêschblum . . .	74	Gromes . . .	29
Dreiföss . . .	519	Flockegras . . .	1377	Grompier . . .	660
Dreijährege Klee b.	316	Fluos . . .	108	— russesch . . .	918
Dronkekaar . . .	1494	Fli-fla-fliesenchen	1450	Guckgucksblum .	588
Dunggras . . .	1509	Focksschwanz . .	1043	— . . .	589
Durchkraut . . .	516	Fransésche Pâlm .	1184	— well . . .	649
Éech . . .	430	Frêhn . . .	631	Guckgucksbrôd . .	100
— Eis- . . .	1139	Frescheblum . . .	35	Guckguckséer . .	1189
— Fräche . . .	1134	Frông . . .	627	Guimov . . .	134
— Männchen . .	1135	Fugelskraut . . .	1055	Gunelriev . . .	774

Gurgel	699	Ierbes	347	Klée, dreijährige <i>b.</i>	316
Haackernoss	1130	— Bordur-	347	— Dresch-	<i>a.</i> 315
Hambier	433	— Pell-	347	— geekege	304
Happ	414	— Rides-	347	— Gees-	614
Happklée	320	— Zocker-	347	— giele	314
Hartholz	145	Ierben	844	— Happ-	320
—	492	Ieselsföss	983	— Hybrid-	326
Hartknep	910	Ieselsöeren . . .	1298	— Stéc-	366
Hartnohl	58	Igelskraut	435	— russesche . . .	321
—	573	Jasming, welle . .	493	— weisse	325
Hartruft	573	Jenk	499	— welle.. . . .	347
Héderzalôt	<i>b.</i> 1017	Jerschen	572	Kliend	899
Heed	587	Jockobstäf	626	Klied	863
Heedekaar	1090	Joli-bois	1102	Knäf	863
— greng	1091	Judendrauw	386	Kneppgen	474
— well	1089	Judeksicht	664	Knuodlesch . . .	1303
Heckewann	628	Judenholz	846	Knuoweleck . . .	1203
Heelriew	774	Judesél	846	Kockelter	152
Heelwurzel	636	—	1	Kohkraut	1123
Hëreblum	164	Jungfer-im-Grünen	41	Kohluht	1189
Helfkraut	795	Kaasel	722	Kohwees	727
Hemmelsplanken . .	781	Kabes	<i>b.</i> 222	— welle.	726
Herzgespann	245	— røde.	222	Koir.	551
Hespe	477	— weisse	222	Koirblum	173
Hexemeléeh	1121	Käsch	1133	— blô	906
Hexestrang	1	— well	148	— ród	173
Hielenter	841	Käschlebâm	1133	Koischt	1134
— rôlen.	840	— welle	148	Kool	223
— wellen	842	Kätzercher	322	— Summer- . . .	223
— schwarzen	841	Kaffé, welle	285	— Wanter-	223
Hierschblum	1189	Kalmes.	1300	— -Sôm	223
Hieselnoss	1139	Kardel	882	Krackelnoss . . .	139
Hieselter	1139	Kamélleblum . . .	923	Kranzblum	141
Hieschem	1395	—	927	Kréschel	576
Huosesauerampel . .	1068	— Honds-	928	— Erd-	432
Huosebrôd	110	— well	927	— Gehannes- . .	577
Huosemöss.	987	Kätzeföss	1030	— ród	577
Huuseläffel	1185	Kätzekierwel . . .	183	— schwarz	579
Huower	1423	Kätzekraut	927	— weiss	577
— Straussen-	1424	Kätzenâ	635	Kretzschiel	276
— well	1427	Kätzeschwanz . . .	600	Kreiskreidchen . .	973
Holzâpel	486	Kéesblum	200	Kreizdenn	1178
Holzâpelbâm	486	Kéeskreitgen . . .	132	Krombier	660
Hombuch	1140	Kéeferweid	1150	— russesch	918
Hondsâsch	477	Kellerholz	604	Kuckgucksblum . .	588
Hondsâschbâm . . .	477	—	1102	Kundelkraut . . .	763
Hondsdeschtel . . .	890	Késérkrôn	1192	Kwetsch	396
Hondskamelleblum .	925	Ketteblum	1009	Kwetschbâm . . .	396
Hondspeterselig . .	531	Kierel	574	Lann	139
Hondsröss	468	Kierwel	563	—	140
Hondswierger . . .	612	Kierfechsblum . .	944	— well	1097
Hoobich	1140	Kill	1134	Langhalm	1431
Hoodaar	478	Kimmel	42	Lantago	1164
Hunneknep	973	Kisch	398	Lavandel	745
—	411	Kischlebâm	398	Léfstack	541
Hunnegsäck	778	Klaekeblum	818	Lehmblät	985
Hybridklée	326	Kleckkraut	61	Leiskraitgen . . .	717
Ierbes	347	Klée	120	Leiskraut	720

Leiskraut	377	Moleler	843	Pollerholz	276
Lenneblut	573	Moutz	614	Pomme d'amour . . .	662
Lens	345	— ród.	153	Pompadour	494
Lentes	470	— schwarz	604	Porgéerkraut	659
Lensöeren	351	Mudderkraut	48	Porgéerkier	1111
Leeffrãbettstrée . . .	761	Mutterkraut	930	Porett	1207
Leeffrãwesch	541	Muorwied	1154	Portulak	371
Lesch	1369	Murth	555	Pouplier	1162
—	1138	Narciss	1236	Praum	395
Lêwemaul	711	Nêchesblum	697	— Damaschte b . . .	394
Lichtblum	1189	Noisscheet	638	— Russesch	397
Lilie, giel	1223	Noss	1130	— Scheis-.	394
— Gräs-	1219	Nössert	1130	Praumcãm	395
— ród	1293	Ongräs	1509	Quarantaine	189
— Wasser-.	1234	Orangebãm, wellen . .	493	Quetsch	396
— weiss	1194	Orikelcher	591	Quetschcãm	396
Longekraut	649	Öschterblum	6	Quidebãm	483
Lord Weymouth . . .	1174	Pãfeschéngchen, ród .	153	Quidebir	483
Luping	284	— schwarz	604	Rãchkraut	183
Luzer	306	Pãlm	1125	Rambour	487
— russesch	301	— fransésesche	1184	Ramheed	281
Mãrzblum	230	Pampulgen	1162	Ramlass	230
—	1102	Patscheblum	49	Rankelter	846
Mãrzvejöl	190	Paradis	487	Raponzel	817
Mairòn	762	Pavò	172	Rapunzel	830
Mandel	391	Pavòskapp	172	Raut	112
Mandelbãm	391	Peffer, spuonesche . .	661	Redig, Mond-	230
Manz	288	Pefferkraut	772	— Wanter-	230
Mãrgrêtchen	934	Peffermanz	752	Reine-des-près	403
Marmottebir	485	Peiffenholz	1110	Reine-claude c.	395
Marong	1133	Peinetsch	1046	— Marguerite	969
Masselter	145	—	1051	Reinett	487
Mauerkreitgen	380	—	1052	— des vergers c. . . .	487
Mauerselchen	717	— éwege	1073	Reigras	548
Médêrchesblum . . .	928	Peischtrós	49	Rengelblum	933
Meebich	1140	Pelpes	26	Renglod c.	395
Meekraut	851	Pellierbes b.	347	Reseda	169
Meerérgen	1225	Pempernelle	476	— welle	168
Meisséerchen	869	Pensée	270	Rib b.	224
Meleze	1175	Perce-neige	1238	Ribkraut a.	224
Melòn	836	Perdsbier	408	Ridesierbes b.	347
Mesch	1094	Perdsblum b.	830	Rief	150
Meschtel	575	Perdsbón	346	— well	151
Mespel	477	Perdsgräs	1407	Rocambole	1206
Metzvijöl	191	Perdercheswurzel . . .	1298	Ród Brenndeschtel . .	777
Mierbón	328	Perdrigon b.	395	Ród Denn	1176
Mierrédeg	239	Péterséleg	522	Róden Hclenter	840
Mieschen	322	Péterstãf	960	Róde Faulbãm	573
Millionair	188	Petner	550	Róde Pãfeschengchen .	153
Millebitzen	481	Pettendierchen	464	Róde Kabes c.	222
Millebierchen	478	Petitpouen b.	347	Ródholz	1193
Mirabell d.	395	Pieg	143	Ródkãppchen	474
Moderselchen	843	Piegebãm	143	Ród Kuorblum	173
Mókesauerampel . . .	1069	Plaine	147	Ród Krêschel	577
Mólbier	815	Plaut	890	Ródlilie	1293
Mondkraut	592	Plattãpel	487	Ród Moutz	153
Mondrédiq	230	Plattdennen	1168	Rodthen	1176
Monzelter	843	Poirier du Japon . . .	484	Roid	77

Rommel . . .	1053	Schwarzkréschel .	579	Tirkesehe Wees .	1383
Roos . . .	163	Schwarzwurzel .	1005	Tomat . . .	622
Rosemarin . .	757	Schweng-selness .	652	Touback . . .	666
Rose papate . .	136	Schwengswurzel .	834	Trauerweid. . .	1144
Rousselett . .	485	Schwerholz . . .	492	Treipekreitgen .	765
Rutabaga . . .	b. 223	Scorzoner . . .	1005	Tripmadam . . .	383
Russischen Apel .	488	Sèhm ¹⁾ . . .	1293	Tulipant. . . .	1190
Russesehe Klée .	321	Selverblät . . .	450	Turneps. . . .	b. 223
Russeseh Krombier	918	Seiradella . . .	364	Tüten	552
— Luzer . . .	301	Sèssholz	297	Uchteblum . . .	1189
— Praum . . .	397	Sèsselblum . . .	127	Ungräs	1509
Salfei	760	Sievelbâm . . .	1181	Valjoll	264
Salot, Blieder- .	1017	Silvester	1171	Veitgesblum . .	933
— Heder- . . .	b. 1017	Smef	226	Vergissmeinnicht	251
Salsifis	1000	Sonneblum. . . .	917	—	655
Samet	843	Spackel	468	Vijöl	264
Sametholz . . .	840	Spackeldaar . .	468	— März-	190
Sametwiel . . .	840	Spackelter . . .	468	— Metz-	190
Sapinett	1177	Spargel	1224	— well	265
Saubön.	346	Speer	489	Vijölchen	264
Saudeschtel . .	1019	Speerebâm . . .	489	Vugelskraut . .	1055
Sauerampel . .	1067	— welle	491	Vulleegreeschen .	544
— Huose- . . .	1068	Spelz	1507	—	1450
— Mòke- . . .	1069	Spuonesch Gräs .	593	Vullegrètgen . .	292
— welle	1068	Spuonesche Pfeffer.	661	Vullegräs	91
Sauerkischt . .	399	Spuorblum . . .	44	Vullekraut . . .	1055
Sauneeckel . .	513	Sprenze Wees . .	1505	—	91
Savoyer	c. 222	Stachebón . . .	a. 328	Vullekischt . . .	490
Schalott	1215	Stäckelchesbón .	b. 328	Vullekischtebâm	490
Schalotten Enn .	1217	Stagbón	288	Vullesemchen . .	1387
Scharlach . . .	565	Steeklée	366	—	1396
Schëfernöl . . .	569	Steenëech . . .	1134	Wäckelter . . .	1180
Schëfernoss . .	402	Stenkert	126	— Kier	1180
Scheisdaar . . .	275	Stenkigen Höffert.	942	Walddeschtel . .	603
Scheispraum . .	394	Straussenhuover .	1425	Waldmeeschter .	851
Scheiskraut . .	1054	Stréhpatsch . . .	915	Wann	627
Scheismiel . . .	1056	Summerëech . .	1134	Wannkraut . . .	627
Scheldkraut . .	802	Summerwees . .	a. 1504	Wantererepp . .	d. 1017
Schierling . . .	570	Tackekraut . . .	712	Wanterëech . . .	1135
Schlappmöss . .	a. 222	Täckeblum . . .	669	Wantergiescht .	1500
Schlauchhölzchen	845	Tändeldaar . . .	287	Wantergréng . .	572
Schlesselblum .	590	—	288	Wanterkool . . .	a. 223
—	1048	Tausendguldekraut	624	Wantermöss . .	a. 222
Schléw.	393	Tausendknuod. . .	367	Wanterwees . .	572
Schléwendaar . .	393	—	1085	Wassergräs . . .	509
Schmalzblum . .	35	Tausendschëergen.	921	Wasserhouasar .	b. 1162
Schmalzkraut . .	584	Tausendwurzel . .	1075	Wasserlesch . .	1188
Schmeerwurzel .	387	Teechholz	1102	Wasserlitie . . .	1234
Schneeball . . .	b. 844	Teynegräs	1085	Wasserweid. . .	1154
Schoeckekischt .	b. 398	Teynemergenchen .	763	Weeblät	599
Schöfszong . . .	654	Thimotee	1402	Weedaa	275
Schuurbock . . .	34	Thuja	1183	Weegräs	1086
Schwarze Faulbâm	276			Wees	1504
Schwarzen Hielenter	841			— englesche . .	1506
Schwarz Holz . .	276			— Sprenze- . . .	1505
— Moutz	604			— Summer- . .	a. 1504
Schwarze Päfeschengchen	[604]			— tirkesehe . . .	1383
				— Wanter- . . .	1504

1) Les Potamées, les Naya-
dées et les Renonculas
aquatiques, comprises
dans cette dénomination
générale, sont employés
à l'alimentation du bétail
sur la Moselle.

Weid	436	Welle Chikré . . .	989	Weymouth	1174
— Bann-	1150	Well Denn	1171	Wibbel-de-Wabbel.	1450
— Besch-	1153	— Heedekaar . . .	1089	Wick	337
— giel	b. 1142	— Gièscht	1496	— well	332
— Keffer-	1150	— Gugucksblum . .	649	— —	335
— Muor-	1154	Welle Kohwees . .	726	Wierk	1094
— Trauer-	1142	Wellen Hielenter .	842	Wiesegemmelchen .	521
— Wasser-	1154	Well Huover . . .	1427	Wieselchen	237
Weidenâpel . . .	c. 487	Welle Jasmeng . .	493	Wiesendeschtel . .	892
Weiderich	595	— Käschtbâm . . .	148	Wierchem	c. 222
Weissdaar	478	— Kaffée	285	Wolfskraut	899
Weissdenn	1178	Well Kameleblum .	927	Wolfsmelech . . .	1121
Weiss Breundeschtel	778	Welle Kischtebâm .	398	Wollkraut	669
Weisse Faulbâm .	844	— Klée	317	Wullich	669
Weissholz	844	Wellkuor	1090	Wurmkraut	940
Weisse Kabes . .	b. 222	Well Lann	1097	Wurzel	555
— Klée	325	Wellen Orangebâm	493	Zahn Brenndeschtel	778
Weiss Lilie	1194	Well Rief	151	Zalfei	760
Weisswurzel . . .	1000	Welle Reseda . . .	168	Zahnsämchen . . .	668
—	1228	Welle Sauerampel .	1068	Zelleré	523
Well Armenee . .	54	Well Speeren . . .	491	Zennetblieder . . .	1111
— Batteralzem . .	936	Welle Speerebâm .	491	Zierkraut	794
Welle Birebâm . .	483	Well Vijöl	263	Zockerierbes . . .	a. 347
Well Brenndeschtel	790	— Wick	332	Zweeblât	1229
Welle Burekascht .	680	Wesch	936		

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

Prolégomènes	1
Liste des personnes auxquelles sont dues le plus grand nombre d'indications de localités.	6
Ouvrages botaniques concernant la Flore du Grand-Duché .	7
Abréviations et signes.	7
Plantes Phanérogames ou Cotylédonées	8
Calendrier des floraisons	199
Additions et corrections	245
Table des familles, des genres, des espèces et des synonymes	247
Table des genres : noms vulgaires français	268
Table des genres : noms vulgaires allemands	270
Table des noms vulgaires en idiome luxembourgeois. . . .	273

Pour paraître en 1874 :

KOLTZ J.-P.-J. — Prodrome de la Flore du Grand-Duché de Luxembourg.

II^e partie. — Plantes Cryptogames.

Nous prions les personnes qui se sont livrées ou qui se livrent à l'exploration botanique du Grand-Duché de bien vouloir nous communiquer les Plantes Cryptogames qu'elles possèdent. Nous recevrons également avec reconnaissance les plantes vasculaires nouvelles, rares ou douteuses qu'elles voudraient nous adresser, afin de compléter le Prodrome ci-dessus.

Nous nous engageons à les leur renvoyer si elles le désirent ou à leur offrir en échange les doubles de notre herbier. Le seul but de parvenir à la connaissance des richesses végétales du pays, par le concours de tous, est notre mobile. C'est ce qui justifie l'appel que nous faisons par la présente à la coopération active des disciples de Flore.

New York Botanical Garden Library

QK 299 .K65 pt.1 gen
Koltz, Jean Pierre/Prodrome de la flore

3 5185 00105 4947