Hisinger
Flora Fagerviki

OK
290
.H49
1855

*högskolebiblioteket
i Uppsala*

FLORA FAGERVIKIENSIS

ELLER

ÖFVERSIGT

AF DE VID OCH OMKRING FAGERVIK VEXANDE

Cotyledoneer och Filices;

AF

E. V. E. HISINGER.

(Aftryck ur Sällskapet Pro Fauna et Flora
Fennica Förhandlingar.)

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

HELSINGFORS.

Tryckt hos H. C. FRIIS.

1855.

H. 119
1855

FLORA FAGERVIKIENSIS

ELLER

ÖFVERSIGT

AF DE VID OCH OMKRING FAGERVIK VEXANDE

Cotyledoneer och Filices;

AF

EDV. VICT. EUG. HISINGER.

(Föredr. d. 12 Mars 1855.)

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

*Quid est stultius quam incerta
pro certis habere, falsa pro veris!*
Cicero.

Enhuru allt för väl medveten af denna local-floras, med alla dylika gemensamma, egenskap att vid fortsatta undersökningar inom kortare eller längre tid befinnas ofullständig, men derjemte ihåggkommande förhållandet med Upsala Floran, inom hvars så noga genomforskade område dock tid efter annan åtskilliga novitier blifvit påträffade, har jag ej längre tvekat att utan auspråk på fullständighet till Sällskapet "pro Fauna et Flora Fennica" öfverlemna denna förteckning.

Öfvertygad om att hvarje verklig kunskap om det hela endast kan grunda sig på en riktig och säker kännedom om de särskilda delarna, har jag upptagit uttryckligen blott de vexter, jag sjelf sett och funnit, jemte säkra bidrag af andra vid desamma citerade personer, ibland hvilka jag särskildt måste nämna Hr Philos. Mag. H. E. Nervander, som genom sina värderika fynd satt mig i tillfälle att här intaga flere utmärkta vexter, såsom *Hydrocharis morsus rance* L., *Utricularia intermedia* Hayn., *Inula salicina* L., *Gypsophila muralis* L., *Salix Lapponum* L., m. fl.

Excursionerna, som legat till grund för denna catalog, hafva merendels inskränkt sig till ett ganska sammanträngdt område nära omkring Fagerviks bruk, beläget under samma bredd som St. Petersburg, Upsala, Christiania och Shetlandsöarna (60° n lat. och 41° 30' östl. från Ferro), i vestligaste delen af Ingå socken och Raseborgs Vestra härad af Nylands län; endast jemförelsevis få hafva haft en större utsträckning af omkring två mil åt skilda håll ifrån nämnda bruk.

Ifrågavarande område, som är beläget vid Finlands södra kust, eger en mycket omvexlande yta och består till en del af låga berg, hvilka nära kusten ej öfverstiga 100 fot, men längre inåt uppnå en större höjd, så att sjelfva Karismalmen är upphöjd 200 fot öfver hafvet; den öfriga delen upptages af kärr, mossar, några större och mindre sjöar och träsk, med ifrån dem kom-

mande åar och bäckar, samt af mycken odlad mark, som utgöres af de egentliga mellanliggande slätterna. Ganska stora sträckor upptagas af skogar, som bestå af tall, gran och björk, mindre ofta af asp och i källrtrakter af al; men de äro öfver hufvud taget ganska illa medtagna och mindre väl vårdade. Utanföre finnes en vidlyftig skärgård, med djupt inträngande vikar, i hvilkas innersta delar vattnet är föga saltigt, emedan flere åar och mindre bäckar utlöpa i desamma. En sandås (de så kallade Kåris och Ekenäs malmarne) beklädd med tallskog fortgår från Lojo ända ned till Ekenäs. Uppå dess södra sträckning, Ekenäsmalmen, förekommer å ömse sidor om landsvägen, som här följer åsen, den täcka *Dianthus arenarius*, malmens verkliga prydnad.

Att trakten alldeles icke lemna botanistens möda lönlös, synes af den temmeligen höga nummer (558 Cotyledoneer och Filices), till hvilken de derinom redan finna växter uppgå. Bland dessa bör särskild uppmärksamhet egnas åt *Lamium confertum* Fr., *Minulus guttatus* De Cand. *), från Mexico och nordvestra kusten af Nord-Amerika, som numera vexer förvildad ibland *Myosotis palustris*, i en bäck och i diken vid Fagervik, *Fragaria collina* Ehrh., *Chimaphila umbellata* (L.), *Ulmus montana* Bauh. (förvildad), en egendomlig form af *Pinus silvestris* (hvaraf blott ett enda träd funnits vid Fagervik), *Ceratophyllum demersum* L. (Ekenäs), *Nitella Stenhammariana* Wallm. Mo-

Ekenäs, vext

*) Denna vext är äfven tagen vid Björkboda i Kimito socken af Stud. And. Ramsay.

nograph., *Najas marina* L., *Hierochloa australis* Schrad. *) och *Ophioglossum vulgatum* L.

Inula Helenium L. har jag sett vid Fagervik, vid Rejböle i Karis socken och på andra ställen, i och vid trädgårdstäppor.

Sluteligen bör anmärkas det jag omkring Fagervik ej funnit *Cuscuta epilinum*, *Tussilago farfara*, *Lamium—album*, *Galeopsis Ladanum*, *Trollius europæus* och *Arabis suecica* Fr.

*) I Bulletin de la Classe Physico-Mathematique de l'Académie Imp. des Sciences de St. Petersbourg, Tom. XIII N:o 8, (N:o 296) pag. 121 yttrar Ruprecht (1853), vid recenserandet af Wiedemanns och Webers *Beschreibung der phanerogamischen Gewächse Esth-, Liv- und Curlands*: "*Hierochloa australis* findet sich im südlichen Finnland nicht, sie erscheint erst auf der Insel Walaam." — Den är sedan dess tagen nära Tavastehus af Stud. C. A. Hertzman, i Mörskom och i Artsjö kapell af Lappträsk socken af Stud. Joh. Strömborg, vid Frugård i Mäntsälä socken af Phys. Mathem. Licentiat. Ad. Nordenskiöld, i Asikkala och Orimattila socknar — i hvilken sednare den kring kyrkan ej är sällsynt — af Phys. Mathem. Candidaterna E. Niklander och E. Sivén samt af mig sjelf nära Fagervik.

A n m. Af begagnade förkortningar betyda i det följande:

fr. — *frequenter occurrens v. frequens.*

p. — *passim.*

r. — *raro.*

ub. — *ubique.*

par. — *paroecia.*

Cotyledoneæ.

Dicotyledoneæ.

Series 1. Corollifloræ.

Class. I. Seminifloræ.

Fam. I. Synanthereæ. Rich.

Bidens. L.

cernua. Linn. p. Fagervik et ad Dal.

— var. *minima.* Fagervik, Kafvelbrokärret.

tripartita. L. fr.

Chrysanthemum. L.

Leucanthemum. L. fr.

Matricaria. L.

inodora. L. fr.

— var. *salina. Wallr.* in taeniis sat fr.

Chamomilla. L. r. Fagervik et Långvik.

Anthemis. L.

tinctoria. L. ; semel tantum ad Fagervik a me lecta.

arvensis. L. fr.

Achillæa. L.

Ptarmica. L. r. circa Fagervik, ad Svartå in par. Karis
et ad Åminne in par. Pojo.

Millefolium. L. fr.

Tanacetum. L.

vulgare. L. p.

Artemisia. L.

vulgaris. L. sat fr.

Absinthium. L. p.

Senecio. L.

silvaticus. L. p. in par. Ingå ad Hirdahl, Backa, prope Fagervik (Långmossen), et in tæniis in Stor Ramsjö, Jacob Ramsjö et Åkerholm; in par. Karis ad Kroggård.
vulgaris. L. fr.

Gnaphalium. L.

uliginosum. L. fr.

silvaticum. L. sat fr.

Antennaria. Brown.

dioica. (L.) fr.; adest foliis superne incanis vel glabris.
Die 15 m. Sept. 1852 ad viam magnam inter Ekenäs et Fagervik in par. Karis specimina nonnulla, stolonibus monocephalis florentibus, legi.

Filago. L.

montana. L. in par. Ingå p. et in Tenala.

Inula. L.

salicina. L. par. Sjundeå ad Myrans legit Mag. Nervander.

Aster. L.

Tripolium. L. p. in tæniis in litoribus.

Erigeron. L.

acris. L. fr.

Solidago. L.

Virgaurea. L. fr.

Petasites. Desf.

vulgaris. Desf. ad Fagervik et ad Svartå in par. Karis.

Tussilago. L.

farfara. L. par. Sjundeå, Myrans, Mag. H. Nervander
(circa Fagervik deest).

Centaurea. L.

phrygia. L. var. *austriaca.* (Willd.) par. Sjundeå ad
Myrans leg. Mag. H. Nervander.

Jacea. L. fr.

Cyanus. L. fr.

Carduus. L.

crispus. L. p.

Cirsium. Scop.

lanceolatum. (L.) fr.

palustre. (L.) fr.

arvense. Curt. fr.

heterophyllum. (L.) p.

Lappa T.

tomentosa. (Schkhr.) fr.

minor. Lam. (in primis var. β *majuscula* Hartm.) sat. fr.

Sonchus. Linn.

oleraceus L. fr.

asper. Vill. fr.

arvensis. L. prope Båsa in par. Karis.

-- var. *maritima* in taeniis passim; par. Ingå.

Lactuca. L.

muralis. Don. rariss.; ad Fagervik in rupibus in agro (Långmossen) semel legi et in insula Strömsjö in taeniis par. Karis.

Lapsana. L.

communis. L. fr.

Tragopogon. L.

pratensis. L. rarior ad Fagervik et Svartå.

Scorzonera. L.

humilis. L. in prato ad Tallbacka prope Wahrs in par. Ingå; ad Myrans in par. Sjundeå testante Mag. H. Nervander et ad Åminne in par. Pojo e D. A. Ramsay.

Crepis. L.

tectorum. L. fr.

Hieracium. L.

Pilosella. L. fr.

Auricula. L. fr.

collinum. Fries. fr.

murorum. L. circa Fagervik p., ex gr. in Parken et in Stor Bonås.

vulgatum. Fr. fr. formis diversissimis.

tridentatum. Fr. ex. gr. in Ingå ad Fagervik et ad prædium sacerdotale et in par. Pojo ad Åminne.

umbellatum. L. fr.

Taraxacum. L.

officinale. Weber. fr. — Formam foliis hirsutis ad Fagervik vidi (etiam prope deversorium Sirkula ad viam Aboensem)

Leontodon. L.

autumnale. L. fr.

hispidum. L. par. Ingå ad Fagervik, Långvik et in Stor Ramsjö.

Hypochaeris. L.

maculata. L. par. Pojo ad Billnäs; par. Sjundeå ad Myrans, e Mag. H. Nervander; et in par. Karis.

Fam. II. Dipsacæ. Juss.

Knautia. L.

arvensis. L. fr.

Succisa. Mönch.

pratensis. K. sat. fr.

Fam. III. Valerianæ. Fr.

Viburnum. L.

Opulus. L. p. ex. gr. ad Fagervik, Linkulla et in insula Elisjö in par. Ingå et ad Raseborg.

Valeriana. L.

officinalis. L. fr. In taeniis vidi formam foliis angustioribus.

Fam. IV. Rubiaceæ. Juss.

Galium. L.

boreale. L. fr.

verum. L. fr.

Mollugo L. rariss.; unico loco ad Fagervik paucissima specimina ann. 1851—53 legi.

uliginosum. L. minus fr.

palustre. L. ubique multis formis.

trifidum. L. pass. in par. Ingå, circa Fagervik, ad Wahrs, ad Linkulla etc. et in par. Karis, ex. gr. ad Komingsböle.

Aparine. L. var. *infestum*. (W. K.) fr.

Fam. V. Caprifoliaceæ. Juss.

Lonicera. L.

Xylosteum. L. p. ad Fagervik et ad Raseborg.

Linnaea. L. per Gron.

borealis. L. fr.

Class. II. Annulifloræ.

Fam. VI. Campanulaceæ. Juss.

Campanula. L.

glomerata. L. p.

rotundifolia. L. fr. Formam *lancifoliam* ad Fagervik
et in insula Stor Ramsjö legi.

persicifolia. L. fr.

patula. L. fr.

Fam VII. Lobeliaceæ. Juss.

Lobelia L.

Dortmanna. L. fr.

Fam. VIII. Convolvulaceæ. Juss.

Convolvulus. L.

arvensis. L. in par. Karis ad Svartå.

Cuscuta. L.

Europæa. L. var. *a legitima*, Areschoug Bot. Not. 1853.

p. supra Viciam Craccam, Urticam dioicam, Rubum
Idæum, etc.

Fam. IX. Boragineæ. Juss.

Anchusa. L.

arvensis. M. Bieb. (*Lycopsis* L.) r. par. Karis ad
Svartå; par. Pojo ad Fiskars, e Mag. H. Nervander.

Myosotis. L.

palustris. L.

α. scorpioides. fr.

β. laxiflora. Fagervik.

γ. strigulosa. Fagervik.

lingulata. Schltz. circa Fagervik p.

arvensis. L. fr.

collina. Hoffm. Fagervik passim.

stricta. Link. p.

Lithospermum. L.

arvense. L. fr.

Echinum. L.

vulgare. L. r. Fagervik.

Echinospermum. Sw.

Lappula. L. unicum specimen ad Fagervik prope granaria lectum.

Asperugo. L.

procumbens. L. r. ad Svartå in par. Karis.

Fam. X. Labiataë. Juss

Mentha. L.

arvensis. L. fr.

— var. *riparia*. Fr. Nov. ad Fagervik.

gentilis. L. r. in par. Karis ad Rejböle (antea ibi verisimiliter culta).

Lycopus. L.

europæus. L. Fagervik p. In par. Sjundeå ad prædium sacerdotale: Mag. H. Nervander.

Thymus. L.

Serpyllum. L. in campis glareosis, ex. gr. ad viam ma-

gnam inter Ekenäs et Bro (Ekenäs malmen) et in par.
Tenala.

Calamintha. Mönch.

Acinos. (L.) ad Fagervik prope officinam ferrariam et
ad tabernas navales (Sjöbodarna).

Scutellaria. L.

galericulata. L. sat fr.

Prunella. L.

vulgaris. L. fr.

Nepeta. L.

Cataria. L. Fagervik, r.

Stachys. L.

silvatica. L. Pojo ad Åminne; in par. Sjundeå ad
Munks sec. Mag. H. Nervander.

palustris. L. fr.

— var. *agrestis*. fr.

Galeopsis. L.

versicolor. Curt. fr.

Tetrahit. L. fr.

— var. *pallens*. Fr. sat fr.

Lamium. L.

purpureum. L. fr.

confertum. Fr. (*L. incisum*. Fr. Novit. et Willd. Spec.

Pl.) in par. Ingå, ad Fagervik et prope Gårdsböle.

Ajuga. L.

pyramidalis. L. fr.

Fam. XI Menyantheæ. Mart.

Menyanthes. L.

trifoliata. L. fr.

Class. III. Tubifloræ.

Fam. XII. Oleineæ. L. K.

Fraxinus. L.

excelsior. L. ad Fagervik et plur. locis; sed ubique culta.
(In par. Lojo ad Vabby spontan. esse dicitur).

Fam. XIII. Asclepiadeæ. Br.

Cynanchum L. Br.

Vincetoxicum. Br. r. par. Pojo, in insula Koön, leg.
Math. Phys. Licent. Nordenskiöld.

Fam. XIV. Gentianeæ. Juss.

Gentiana. L.

campestris. L. Fagervik prope pontem Långbron. Ad
Pickala in par. Sjundeå, test. Mag. H. Nervander.

Erythræa. Rich.

litoralis Fr. Nov. in taeniis, ex. gr. in Stor Ramsjö.
pulchella. Fr. *simpl.* et *ramos.* par. Ingå in insul.
Gåsgrund et Stor Ramsjö.

Fam. XV. Solanaceæ. Juss.

Solanum. L.

nigrum. L. circa Fagervik sat fr.

— var. *melanocerasum*. Hart. Fl. V. ad Fagervik.

Dulcamara. L. sat fr.

Hyoscyamus. L.

niger. L. p. ad Fagervik, ad Svartå in par. Karis. et plur. locis.

Datura. L.

Stramonium. L. ad Fagervik spontan. in horto.

Fam. XVI. Personatæ. L.

Verbascum. L.

Thapsus. L. p. ex. gr. ad Fagervik; ad Rejböle in par. Karis; ad Myrans in par. Sjundeå, secundum Mag. H. Nervander.

nigrum. L. p. ex. gr. ad Fagervik; ad Billnäs in p. Pojo; ad Myrans in p. Sjundeå, sec. Mag. H. Nervander.

Scrophularia. L.

nodosa. L. sat fr.

Mimulus. L.

guttatus. Dec. (*M. luteus* Pursh., Curt.; *M. glabratus* Kunth) non *M. gutt.* D-C, quem descripsit Hartman (in Fl. Scand. ed. V. p. 434). Ad Fagervik omnino spontaneus, jam decem certe annos in horto ubique in fossis, in amne Staraviksbäcken et ad sinum Backaviken.

Linaria. Mill.

vulgaris. Mill. Fagervik.

Veronica. L.

longifolia. L. sat. fr. in taeniis.

— var. *maritima*. (L.) rarior.

officinalis. L. fr.

Chamaedrys. L. fr.

scutellata. L. fr.

serpyllifolia. L. fr.

arvensis. L. p.

verna. L. ad Fagervik.

agrestis. L. ad Svartå in par. Karis.

Limosella. L.

aquatica. L. r., in litore ad pontem Långbron prope
Fagervik et ad deversorium Dal (par. Ingå).

Odontites. Pers.

rubra. P. fr.

Euphrasia. L.

officinalis. L. fr.

--- var. *parviflora*. (Fries). fr.

Rhinanthus. L.

major. Ehrh. fr.

minor. Ehrh. fr.

— var. *angustifolius*. circa Fagervik.

Pedicularis. L.

palustris. L. fr.

Melampyrum. L.

nemorosum. L. p.

pratense. L. fr.

silvaticum. L. fr.

Fam. XVII. Lentibulariæ. Rich.

Utricularia. L.

vulgaris. L. Fagervik, in lacu, nonnullis locis (ex. gr. Kafvelbrokärret et in Parken) et in fonte prope pontem Långbron. In par. Sjundeå ad Myrans sec. Mag. H. Nervander.

intermedia. Hayn. Myrans in par. Sjundeå: Mag. Nervander.

minor. L. Fagervik, Kafvelbrokärret.

Fam. XVIII. Primulaceæ. Juss.

Lysimachia. L.

vulgaris. L. sat fr.

thyrsiflora. L. p.

Trientalis. L.

europæa. L. fr.

Glaux. L.

maritima. L. fr. in taeniis.

Primula. L.

officinalis. Jacq. ad Fagervik r.; sed in tæniis copiose,
ex. gr. in Jacob-Ramsjö, etc.

Fam. XIX. Plantagineæ. Juss.

Plantago. L.

major. L. fr.

media. L. Fagervik, ad tabernas navales (Sjöbodarna).

lanceolata. L. fr.

maritima. L. sat fr.

Ser. II. Thalamifloræ.

Class. IV. Discifloræ.

Fam. XX. Frangulaceæ. Endl.

Rhamnus. L.

Frangula. L. fr.

Fam. XXI. Corneæ. De Cand.

Cornus. L.

Suecica. L. p. ex. gr. ad Fagervik, in tæniis exterioribus, etc.

Fam. XXII. Umbelliferae. Juss.

Conium. L.

maculatum L. r. par. Karis ad Rejböle.

Anthriscus. P. Hoffm.

silvestris. (L.) fr.

Heracleum. L.

sibiricum. L. circa Fagervik p.; par. Karis ad Rejböle
et in par. Pojo.

Pastinaca. L.

sativa. L. forma *glaberrima*. Fagervik. r. In par.
Sjundeå ad Myrans sine dubio eadem forma, test. Mag.
H. Nervander.

Levisticum. Koch.

officinale. K. Fagervik; ad Myrans in par. Sjundeå
sec. Mag. Nervander; ad Rejböle in par. Karis. (Efferat.)

Archangelica. Hoffm

litoralis. Fr. in litoribus sat frequens.

Angelica. L.

silvestris. L. fr.

Peucedanum. L. Koch

palustre. Koch. fr.

Selinum. L. Koch.

Carvifolia. L. r. Fagervik ad Horssund.

Aethusa. L.

Cynapium. L. ad Fagervik p.

Cicuta. L.

virosa. L. p.

Aegopodium. L.

Podagraria. L. sat fr.

Carum. L.

Carvi. L. fr.

Pimpinella. L.

saxifraga. L. fr.

— forma *dissecta. Fagervik.*

Fam. XXIII *Acerineæ. Dec.*

Acer. L.

Platanoides. L. pluribus locis in par. Ingå, Karis, Pojo
et Tenala.

Class. V. Sertifloræ.

Fam. XXIV. *Nymphæaceæ. De Cand.*

Nymphæa. L.

alba. L. p

Nuphar. Sm.

luteum. (L.) fr.

Fam. XXV. *Ranunculaceæ. Juss.*

Ranunculus. L.

sceleratus. L. fr.

polyanthemos. L. p.

repens. L. fr.

acris. L. fr.

auricomus. L. fr.

Flammula. L. fr.

reptans. L. fr.

Batrachium. Wimm.

marinum. Fr. in mare fr.

Ficaria. Dill.

*Ranunculoides. Mœnch. Fagervik. Ad Myrans in
Sjundeå, sec. Mag. H. Nervander.*

Myosurus. L.

minimus. L. Fagervik.

Thalictrum. L.

flavum. L. p.

Anemone. L.

nemorosa. L. fr.

*ranunculoides. L. r. in par. Pojo ad Åminne et sec.
Mag. H. Nervander ad Myrans in par. Sjundeå.*

Hepatica. L. fr.

Caltha. L.

palustris. L. fr.

Aquilegia. L.

*vulgaris. L. Fagervik spontanea, sed in horto (flori-
bus albo-roseis).*

Delphinium. L.

*Consolida. L. Fagervik, unicum specimen ante aliquot
annos legi.*

Fam. XXVI. Papaveraceæ. Juss.

Chelidonium. L.

majus. L. fr.

Fam. XXVII. Fumariaceæ. Dec.

Corydalis. Pers.

solida. Sm. r. in tæniis par. Ingå in insula Elisjö prope pagum.

Fumaria. L.

officinalis. L. fr.

Fam. XXVIII. Cruciferæ. Juss.

Bunias. L.

orientalis. L. Fagervik p. et ad Svartå in par. Karis.

Raphanus. L.

Raphanistrum. L. p.

Brassica. L.

campestris. L. fr.

Sinapis. L.

arvensis. L. et var. *siliquis hirtis* ad Fagervik.

Erysimum. L.

hieracifolium. L., Fr. H. N. VIII. 19. (non *E. alpin.* Sm.) ad Fiskars. Specimina ibi legit et mihi communicavit Dom. Ad. E. Christiernin.*cheiranthoides*. L. fr.— var. *procumbens*. Hn. Pl. ed. V. Fagervik (autumno).

Sisymbrium. L.

officinale. Sc. fr.

Sophia. L. fr.

Cardamine. L.

amara. L. sat fr. Fornam hirtam ad viam magnam in par. Sjundeå legi.

pratensis. L. fr.

Arabis. L.

Thaliana. L. fr.

Turritis. L.

glabra. L. sat fr.

Barbarea. Br.

stricta. Fr. p.

Nasturtium. Br.

Armoracia. Fr. Fagervik spontanea, in rivulo Stara-viksbäcken.

palustre. (Leyss.) fr.

Lepidium. L.

rupestre. L. fr.

Capsella. L.

Bursa-Pastoris. Mönch. fr.

Thlaspi. L.

arvense. L. fr.

Camelina. Cr.

foetida. Fr. Fagervik et ad Åminne in par. Pojo.

Draba. L.

verna. L. fr.

Subularia. L.

aquatica. L. Fagervik ad ripas lacuum Bruksträsket et Marsjö in par. Ingå et Lojosjö in par. ejusdem nominis et ad sinum Backaviken in par. Ingå.

Fam. XXIX. Balsamineæ. Dec.

Impatiens. L.

noli tangere. L. ad Fagervik haud r., etiam in rivulo per prata Finnholmarna profluente. In par. Sjundeå ad Sjundby et ad prædium sacerdotale test. Mag. H. Nervander.

Class. VI. Columnifloræ.

Fam. XXX. Tiliaceæ. Juss.

Tilia. L.

parvifolia. Ehrh.

— var. *α. polyantha*. Koch.

— var. *β. intermedia*. Koch. (*T. vulgaris* Hayn.)

Vide Koch, *Synopsis Flor. German. et Helvet.*, edit. sec. pag. 145 lin. 26–30).

Passim; in par. Ingå prope Fagervik in Stor-Bouås et in tæniis Nötön, Elisjö etc.; in par. Karis ad Snällböle (Grönkärr) et in tæniis

prope Höstnäs. — Ad Fagervik et in parocciis adjacentibus frequenter culta, imprimis var. β .

Obs. Multas formas ambiguas, inter diagnoses *T. parvifol.* et *T. vulg.* in Fr. Mant. III. pag. 199 datas, vagantes legi; ex. gr. unam: *foliis majoribus; bractea basi inæquali rotundato-cordata corymbum superante* (ut in *T. parvif.*); *fructibus oblique ovatis leproso-tomentosis* (fere ut in *T. vulg.*); et aliam: *bracteis basi attenuatis acuminatis corymbum non æquantibus; fructibus tantum leviter villosis aut glabris*, ut in specimine *Tiliæ parvifol.* in H. N. IX. 32 dato.

Fam. XXXI. Malvaceæ. Juss.

Malva. L.

borealis. Wallm. par. Ingå ad prædium sacerdotale et ad Fagervik.

Fam. XXXII. Geraniales. L.

Geranium. L.

silvaticum. L. fr.

bohemicum. L. r. par. Ingå prope Fagervik (Bykärr et ad Bussemossen); par. Karis ad Rejböle et ad viam

magnam prope Fageruås; in par. Tenala ad Rilax (Näs) secund. Dom. G. Westfelt.

rotundifolium. L. *Fl. Succ.* (*G. pusillum*. L.) ad Fagervik, et forma pusilla et elata.

Robertianum. L. sat fr.

Erodium. L'Herit.

cicutarium. (L.) Fagervik. In par. Sjundeå ad Myrans secund. Mag. H. Nervander.

Oxalis. L.

Acetosella. L. fr.

Linum. L.

catharticum. L. par. Ingå ad Fagervik, ad templum principale et in tæniis sat fr.; par. Lojo, in inulis in Lojosjö (ex. gr. Mangsön); in par. Sjundeå ad Myrans et Pickala, secundum Mag. Nervander.

Fam. XXXIII. Hypericineæ. De C.

Hypericum. L.

quadrangulum. L. fr.

perforatum. L. in par. Ingå ad Sångars et Hirfådal et in par. Karis in insula Strömsjö.

Fam. XXXIV. Violariæ. De C.

Viola. L.

tricolor. L. fr.

— var. *arvensis* (Murr.) fr.

canina. L. fr.

silvatica. Fr. fr. multis formis.

palustris. L. fr.

Fam. XXXV. Droseraceæ. De C.

Parnassia. L.

palustris. L. in par. Sjundeå ad Myrans test. Mag.
H. Nervander.

Drosera. L.

rotundifolia. L. fr.

longifolia. L. in par. Pojo, ad Åminne; par. Ingå ad
Fagervik (Kafvelbrokärret) et in palude Stormossen
prope Svartbäck.

intermedia. Hayn. Fagervik in palude Kafvelbrokärret.

Fam. XXXVI. Silenaceæ. Brann.

Silene. L.

inflata. Sm. p.

nutans. L. in par. Lojo ad Wanjärvi legit Dom. Fr.
Linder.

rupestris. L. sat. fr.

Melandrium. Röhl.

noctiflorum. Fr. Fageråik r.

vespertinum. (Sibth.) unicum specimen mascul. ante
paucos annos legi.

diurnum. (Sibth.) fr.

— var. *carnea.* r. Ingå Stor-Ramsjö, in prato
Herrängen.

Viscaria. Röhl.

purpurea. Wimm. sat fr.

Lychnis. L.

Flos cuculi. L. fr.

Agrostemma. L.

Githago. L. r. Fagervik.

Dianthus. L.

arenarius. L. in arena (Ekenäs malm) ad viam magnam
inter Ekenäs et Bro.

deltoides. L. fr.

Gypsophila. L.

muralis. L. par. Sjundeå ad Pickala test. Mag. Ner-
vander.

Fam. XXXVII. Alsinaceæ. Bartl.

Stellaria. L.

nemorum. L. par. Ingå in iusula Elisjö.

media. With. frequentiss.

Holostea. L. Ingå in Elisjö et ad Billskog.

palustris. Retz. ad Fagervik; in par. Sjundeå ad My-
rans, e Mag. H. Nervander.

graminea. L. fr.

Cerastium. L.

vulgatum. (L.) fr.

Arenaria. L.

trinervia. L. p.

serpyllifolia. p.

Sagina. L.

nodosa. (L.) p. in litore.

procumbens. L. fr.

Spergula. L.

arvensis. L. fr.

— var. *sativa.* in tæniis (Åkerholm).

— var. *maxima.* ad Fagervik.

pentandra. L. p.

Lepigonum. Fr.

rubrum. (L.) fr.

salinum. (Pressl.) in litore maris p.

Fam. XXXVIII. Elatineæ. Juss.

Elatine. L.

Alsinastrum. L. in par. Sjundeå ad viam magnam
test. Phil. Mag. W. Myrberg. (Specimina non vidi).

Hydropiper. L. Fagervik ad Finpada.

triandra. Schkhr. Fagervik ad Finpada et Kafvelbrokårr
et in par. Pojo ad Åminne.

Ser. III. Calycifloræ.

Class. VII. Faucifloræ.

Fam. XXXIX. Ribesiæ. Rchb.

Ribes. L.

uva crista. L. Fagervik. p.— var. *Grossularia (L.)* ad Fagervik, præcedente rarior.*nigrum. L.* Fagervik, ad tabernas navales (Sjöbodarna).*rubrum. L.* ad Fagervik.— var. *sylvestre. M. K.* in insula Nötön prope Fagervik.*alpinum. L.* sat fr.

Fam. XL. Saxifragæ. Juss.

Chrysosplenium. L.

alternifolium. L. p. ex. gr. ad Fagervik, in par. Sjun-
deå ad Myrans (test. Mag. H. Nervander) et ad Svartå
in par. Karis.

Fam. XLI. Crassulacæ. Juss.

Sedum. L.

Thelephium. L. fr.*acre. L.* fr.

Fam. XLII. Lythraræ. Juss.

Lythrum. L.

Salicaria. L. fr.

Peplis. L.

Portula. L. p. ad Fagervik, Backa, Hirfdal in par.
Ingå et ad Rejböle in par. Karis.

Fam. XLIII. Onagrarieæ. Juss.

Chamænerion. Scop.

angustifolium. (L.) fr. Varietas *floribus albis* ad Fagervik, in cæmeterio.

Epilobium. L.

montanum. L. minus fr.

palustre. L. sat fr.

Circæa. L.

alpina. L. r. par. Ingå, Stor-Ramsjö.

Fam. LXIV. Halorrhageæ. Br.

Myriophyllum. L.

spicatum. L. Ekenäs.

— *marinum*. Lindblom. par. Ingå in tæniis, ex.
gr. in Barösund et ad Stor-Ramsjö.

alterniflorum. Dec. p.

Hippuris. L.

vulgaris. L. fr.

- — *fluitans*. Liljebl. p. Fagervik, Sångars, Kalkulla, Dal, etc.
- *maritima*. (Hell.) p. in tæniis.

Class. VIII. Rosifloræ.

Fam. XLV. Pomaceæ. L.

Sorbus. L.

aucuparia. L. sat. fr.

Fam. XLVI. Senticosæ. L.

Rosa. L.

canina. L. forma *nitida* Fr. minus fr.

- *opaca*. Fr. rar. Fagervik ad tabernas navales (Sjöbodarna) et ad viam prope deversorium Bro in par. Karis.

dumetorum. Thuill. sat fr.

mollissima. Willd. p.

Alchemilla. L.

vulgaris. L. fr.

Rubus. L.

idæus. L. fr.

saxatilis. L. fr.

arcticus. L. passim sat copiose.

chamæmorus. L. fr.

Fragaria. L.

vesca. L. fr.

elator. Ehrh. Fagervik spontanea in horto et in Stor-Ramsjø ad prædium.

collina. Ehrh. r. Fagervik et in par. Karis ad Rejbøle.

Comarum. L.

palustre. L. fr.

Potentilla. L.

anserina. L. fr.

norvegica. L. p.

argentea. L. fr.

Tormentilla. Scop. fr.

alpestris. Hall. p.

Geum. L.

urbanum. L. r. Fagervik.

rivale. L. fr.

Spiræa. L.

Ulmaria. L. fr.

Fam. XLVII. Drupaceæ. L.

Prunus. L.

insititia. L. (var. *rustica.* Hn.) Fagervik in monte Kastellberget.

Cerasus. Tourn.

Padus. (L.) fr. imprimis in tæniis.

Fam. XLVIII. Papilionaceæ. L.

Lathyrus. L.

silvestris. L. in par. Sjundeå ad Gårdkulla (Linna-
mäki) legit Dom. Fr. Linder. Ante paucos annos ad
Fagervik vidi.

palustris. L. in tæniis p. et prope Fagervik. Secundum
Mag. Nervander ad Myrans et Pickala in par. Sjundeå.
pratensis. L. fr.

Orobus. L.

vernus. L. sat fr.

tuberosus. L. Fagervik, Harholmen et in insulis prope
Barösuud.

Vicia. L.

silvatica. L. p. Fagervik (Stor-Bonås) et in tæniis, ex.
gr. in Nötön.

hirsuta. Koch. p.

tetrasperma. Lois p.

cracca. L. fr.

sepium. L. fr.

sativa. L. fr.

angustifolia. Roth. var. *segetalis* (Thuill.) p.

— var. *Bobartii* (Forster.) Koch. Syn. ad
Fagervik et in insula Barö.

Medicago. L.

lupulina. L. ad Fagervik, p.

Melilotus. Tournef.

alba. Lam. Fagervik, r.

officinalis. W. ad Åminne in par. Pojo, secund. specimen mihi a D. Ad. Christiernin communicatum.

Trifolium. L.

pratense. L. fr.

medium. L. p.

arvense. L. in insula Mangsön in par. Lojo (in Lojosjö.)

montanum. L. Fagervik ad tabernas navales (Sjöbodarna.)

hybridum. L. Fagervik.

repens. L. fr.

spadiceum. L. fr.

agrarium. L. in par. Karis ad Bengsmora legit Dom. Fr. Linder; in par. Pojo ad Fiskars leg. Mag. H. Nervander et in par. Lojo in insula Pensa ipse.

Class. IX. Centrifloræ.

Fam. XLIX. Ericinæ. Juss.

Vaccinium. L.

uliginosum. L. fr.

myrtillus. L. fr.

vitis idæa. L. fr.

Oxycoccus. L. fr.

Arctostaphylos. Adans.

officinalis. Wimm. passim fr.

Andromeda. L.

polifolia. L. sat fr.

Calluna. Salisb.

vulgaris. (L.) frequentiss. Varietatem *floribus albis* ad Fagervik, ad Snällböle in par. Karis et ad Rilax in par. Tenala legi.

Ledum. L.

palustre. L.

Chimaphila. Nuttall.

umbellata. (L.) rariss. ad Fagervik in Parken. In par. Karis ad Bällby prope Svartå legit Dom. Fr. Linder. *uniflora*. (L.) p. in par. Ingå ad Fagervik et in tæniis (Jacob-Ramsjö); in par. Karis ad Svartå et in insula Strömsjö; in par. Pojo ad Åminne.

Pyrola. L.

rotundifolia. L. fr.

chlorantha. Sw. rariss. Fagervik.

media. Sw. r. Fagervik et ad Åminne in par. Pojo.

minor. L. p.

secunda. L. fr.

Monotropa. L.

Hypopithys. L. in par. Ingå ad Fagervik (plur. locis) et ad Gårdsböle; par. Karis ad Svartå et par. Pojo ad Åminne.

Fam. L. Empetræ. Nuttall.

Empetrum. L.

nigrum. L. fr.

Fam. LI. Euphorbiaceæ. Juss.

Euphorbia. L.

Helioscopia. L. r. ad Fagervik et in Karis ad Svartå.

Fam. LII. Portulacæ. Juss.

Montia. L.

fontana. L. sat fr.

Fam. LIII. Paronychiaceæ. De C.

Scleranthus. L.

annuus. L. frequentiss.

Fam. LIV. Polygonæ. Juss.

Polygonum. L.

viviparum. L. sat fr.

amphibium. L. fr.

— *terrestre*. p.

lapathifolium. L. fr. Forma *incana* ad Fagervik.

— *nodosum* Pers. sat fr.

Hydropiper. L. fr.

aviculare. L. frequentiss.

convolvulus. L. fr.

dumetorum. L. p. Fagervik et ad Backa.

Rumex. L.

Hippolapathum. Fr. r. par. Pojo ad Åminne et ad Ekenäs.

domesticus. Hu. fr.

crispus. L. sat fr. Etiam in litor. maris.

acetosa. L. fr.

acetosella. L. fr

Ser. IV. Incompletae.

Class. X. Bracteifloræ.

Fam. LV. Thymeleæ. Juss.

Daphne. L.

Mezereum. L. p.

Fam. LVI Ulmaceæ. Ag.

Ulmus. L.

montana. Bauh. Sm. In par. Karis in silva Brottasko-
gen prope Svartå arborem unicam spontaneam vidi.
Præterea culta.

Fam. LVII. Urticaceæ. Juss.

Humulus. L.

Lupulus. L. r. In sepibus prope pagum in insula Elisjö
in par. lugå.

Urtica. L.

urens. L. fr.

dioica. L. fr.

Fam. LVIII. Chenopodiaceæ. Juss.

Atriplex. L.

hastata. L. var. *salina* Koch. par. Ingå in tæniis, ex. gr. ad Barösund et in Jacob-Ramsjö.

patula. L. frequentiss. plur. form.

Blitum. L.

virgatum. L. r. Fagervik et in par. Karis ad Båsa.

glaucum. Koch. Fagervik et ad Ekenäs.

Chenopodium. L.

urbicum. L. Fagervik, rariss.

album. L. fr.

— *viride*. (L.) frequentiss.; etiam forma *glomerulosum*. (Hn. Fl. Scand.)

polyspermum. L. Fagervik, haud r.

Class. XI. Julifloræ.

Fam. LIX. Cupuliferæ. Rich.

Quercus. L.

Robur. L. in tæniis, par. Ingå, ex. gr. ad Elisjö et par.

Pojo in insulis ad Ekenäs. Ad Fagervik in Stor-Bonnäs et in par. Lojo in insulis in lacu Lojosjö.

Corylus. L.

avellana. L. sat fr. præsertim in tæniis.

Fam. LX. Salicineæ. Rich.

Populus. L.

tremula. L. fr.

Salix. L.

fragilis. L. passim culta, sed rarius spontanea.

pentandra. L. fr. Formam *amentis* 6—10-*andris* ad Fagervik legi.

Lapponum. L. Ad Myrans in par. Sjundeå legit Mag. Nervander.

Caprea. L. sat fr.

cinerea. L. fr.

aurita. L. fr. Forma *foliis crispato-crenatis* ad Fagervik.

hastata. L. r. Fagervik in prato Mjälärängen.

depressa. L. forma *livida* a) *hebecarpa* And. Sal. Lapp. r. par. Ingå in insula Jacob-Ramsjö et ad Fagervik in prato Mjälärängen.

nigricans. Smith. fr. c. mult. form.

myrtilloides. L. r. par. Ingå in prato ad prædium sacerdotale. Ad Myrans in par. Sjundeå test. Mag. H. Nervander.

rosmarinifolia. L. fr.

Fam. LXI. Betulineæ. Rich.

Betula. L.

verrucosa. Ehrh. fr.

carpathica. Reich. Ic. Fl. Germ. (In descriptionem Fr. Summ. Veg. pag. 556 quadrat.) fr.

glutinosa. Wallr. Fr. (Summa Veg. pag. 557). Ad Fagervik et ad Rejböle in par. Karis legi.

Alnus. T.

glutinosa. Willd. fr.

incana. Willd. r.

Fam. LXII. Myricæ. L.

Myrica. L.

Gale. L. par. Pojo ad Åminne legit Dom. A. Christiernin. Ad Ekenäs prope Skogböle et prope Skogby bruk test. Dom. Med. Doct. J. F. Elfving.

Fam. LXIII. Coniferæ. Juss.

Pinus. L.

silvestris. L. copiosissima.

— *Var. foliis 12—13 millimet. longis, nec latioribus neque in verticillis discretis perspicuis congestis. Vide Anders. Plant. vasc. circa Quickjock. Arbor unica 9—10 pedalis prope Fagervik ad viam magnam a cæmeterio novo non multum distans, ante paucos annos succisa.*

Abies. L.

excelsa. De C. copiose.

Juniperus. L.

communis. L. fr.

Fam. LXIV. Equisetaceæ. De C.

Equisetum. L.

arvense. L. fr.

silvaticum. L. fr. Forma *tenuior* ad Sångars prope Fagervik.

pratense. Ehrh. ad Sångars prope Fagervik.

palustre. L. p. in par. Ingå ad Fagervik et ad Kämpbaka.

fluviatile. L. fr.

limosum. L. fr.

Class. XII. Nudifloræ.

Fam. LXV. Callitrichinæ. Luk.

Callitriche. L.

verna. L. c. var. frequentiss.

autumnalis. L. p.

Fam. LXVII. Ceratophylleæ. De C.

Ceratophyllum. L.

demersum. L. Ekenäs, in fossa ad portum. (Specimina sterilia ibi tantum vidi.)

Fam. LXVI. Characeæ. Rich.

Nitella. Agh.

flexilis. Al. Br. Fagervik in lacu: ex gr. ad Parken et ad Kafvelbrokärret.

Stenhammariana Wallm. Bot. Not. 1853. (*Ch. nidifica* Rupr.) r. in par. Ingå in mari ad insulas Jacob-Ramsjö et Gåsgrund.

Chara. Le Vaill.

tomentosa. L. passim in tæniis in par. Ingå.

crinita. Wallr. r. par. Ingå prope Stor-Ramsjö.

aspera. Willd. frequentiss.

Monocotyledonæ.

Class. XIII. Fructifloræ.

Fam. LXVIII. Orchideæ. Juss.

Orchis. L.

maculata. L. sat. fr.

Gymnadenia. R. Br.

Conopsea. (L.) par. Pojo ad Åminne; par. Sjundeå ad Myrans (test. Mag. II. Nervander) et in par. Lojo in insula Pensa.

Platanthera. Rich.

bifolia. (L.) sat fr.

Goodyera. R. Br.

repens. (L.) in par. Ingå ad Fagervik (Gropkärr) et in insula Stor-Ramsjö.

Listera. R. Br.

ovata. (L.) in par. Ingå in Stor-Ramsjö in prato Herr-
ängen.

cordata. (L.) p.

Malaxis. (Sw.)

monophyllos. (L.) par. Ingå in ius. Jacob-Ramsjö uni-
cum specimen legi.

Corallorhiza. Hall.

innata. R. Br. rarius. ad Fagervik et in tæniis.

Fam. LXIX. Irideæ. Juss.

Iris. L.

Pseud-acorus. L. p.

Fam. LXX. Hydrocharideæ. Juss.

Hydrocharis. L.

morsus rance. L. par. Sjuudeå ad Myrans legit Mag.
Nervander.

Fam. LXXI. Nayaideæ. Luk.

Najas. L.

marina. L. r. in freto Horssund prope Fagervik (co-
piose cum Chara toment.) et in sinu ad deversorium
Dal in par. Ingå.

— Var. *muricata* Hn. Ingå, Stor-Ramsjö in sinu
inter Fiskars et Söder et in freto Horssund.

Class. XIV. Liliiflorae.

Fam. LXXII. Liliaceæ. Juss.

Allium. L.

oleraceum. L. Fagervik, r.

sibiricum. L. var. *schœuoprasoides* Fr. S. V. fr. in
tæniis.

Gagea. Salish.

lutea. (L.) Fagervik.

minima. (L.) fr.

Convallaria. L.

majalis. L. fr. præcipue in tæniis.

Polygonatum. L. p.

Majanthemum. De C.

bifolium. (L.) fr.

Paris. L.

quadrifolia. L. sat. fr.

Fam. LXXIII. Alismaceæ. De C.

Butomus. L.

umbellatus. L. r. par. Ingå, ad Fagervik et ad viam
magnam in anne Råddkilaån; par. Sjundeå, ad Myrans
(test. Mag Nervander); par. Karis ad Svartå; par.
Pojo ad Billnäs et Åminne.

Alisma. L.

Plantago. L. fr.

Sagittaria. L.

sagittifolia. L. p. ex. gr. ad Fagervik et in amne
Åminne-å in par. Pojo.

Scheuchzeria. L.

palustris. L. p.

Triglochin. L.

palustre. L. p. ex. gr. circa Fagervik.
maritimum. L. fr.

Fam. LXXIV. Juncaceæ. De C.

Juncus. L.

communis. (E. Meyer Syn. Juncor.) Ledeb. Fl. Ross.
IV. p. 22.

α) *effusus*. fr.

β) *conglomeratus*. sat fr.

filiformis. L. fr.

acutiflorus. Ehrh. par. Ingå in litore prope templum.

articulatus. L. fr.

alpinus. Vill. Fagervik r.

supinus. Mönch. ad Fagervik sat fr.; etiam var. *repens*
et *fluitans*.

compressus. Jacq. par. Ingå in tæniis prope Fagervik.

Gerardi. Loisel. fr.

bufonius. L. fr.

Luzula. De C.

pilosa. L. fr.

campestris. De C. (Vide *Ledeb. Fl. Ross. IV* p. 219
et *Kunth enumerat. plantar. Tom. III. pag. 308 et 309*).

α) (*J. campestr. L.*) Fagervik.

β) (*L. multiflora Lejeune*) frequentiss.

$\beta\beta$) (*J. pallescens Wahlenb.*) par. Karis ad Rej-
bôle et prope Fagervik. r.

Class. XV. Spadiciflorae.

Fam. LXXV. Aroideæ. Juss.

Calla. L.

palustris. L. fr.

Acorus. L.

Calamus. L. Fagervik ad Finpada in amne.

Lemna. L.

minor. L. fr.

trisulca. L. ad Fagervik et ad Ekenäs.

Fam. LXXVI. Potamogetoneæ. Reich.

Potamogeton. L.

natans. L. sat fr.

rufescens. Schrad. In par. Ingå ad Fagervik et ad
Grundsjö.

gramineus. L. var. β *heterophyllus* δ *stagnalis* Fries No-
vit. par. Sjundea ad Myrans legit Mag. H. Nervander.

perfoliatus. L. fr.

pusillus, L. Fagervik in lacu et sec. Mag. Nervander
ad Myrans in p. Sjundeå.

— *tenuissimus*, Fr. Novit. in sinu ad deversorium Dal
in par. Ingå.

pectinatus, L. fr. in tæniis.

marinus, L. r. in freto Barösund ex. gr. ad Willholm.

Ruppia. L.

maritima, L. r. par. Ingå Stor-Ramsjö in sinu inter
Fiskars et Söder.

Zanichellia. L.

polycarpa, Nolte. p. in tæniis.

Fam. LXXVII. Typhaceæ. Juss.

Typha. L.

latifolia, L. Fagervik.

Sparganium. L.

ramosum, Huds. p.

simplex, Huds. sat fr.

minimum, Fr. p.

natans, Fr. (Th. Fries Bot. Not. 1851 Jun. tab. 1
fig. A.; sed non Sp. affine Schnitzl.) fr.

Vide de Spargan.: P. J. Beurling. Bot. Not 1853 p.
22, 1854 p. 28 et J. Ångström, Bot. Not. 1853 p. 147.

Fam. LXXVIII. Cyperaceæ. Juss.

Rhynchospora. Vahl.

alba. (L.) ad Fagervik p. et teste Mag. Nervander ad Myrans in par. Sjundeå.

Scirpus. L.

silvaticus. L. p.

maritimus. L. in tæniis ad Fagervik. p.

lacustris. L. fr.

— *glaucus.* (Sm.) r. ad Fagervik in sinu Backaviken, in Norrstrand, ad Nötön et ad fretum Barösund.

pauciflorus. Ligthf. p.

palustris. L. fr.

uniglumis. Link. fr.

acicularis. L. p.

Eriophorum. L.

angustifolium. Roth. fr.

gracile. Koch. r. Ingå Stormossen et ad Fagervik.

vaginatum. L. fr.

alpinum. L. r. Ingå Stormossen.

Carex. L.

vesicaria. L. fr.

ampullacea. Good. fr.

filiformis. L. r. Fagervik, Kafvelbrokärret.

flava. L. par. Sjundeå ad Myrans teste Mag. Nervander.

Oederi. Ehrh. fr.

— *pygmæa.* p.

digitata. L. ad Fagervik p. et teste Mag. Nervander ad Myrans in par. Sjundeå.

ericetorum. Pall. par. Pojo ad viam magnam, Ekenäs malmen.

pilulifera. L. fr.

globularis. L. r. par. Karis ad Rejböle.

pallescent. L. fr. — Forma *undulata* r.; ex. gr. in Jacob-Ramsjö in tæniis par. Ingå.

panicæ. L. fr. — Forma *gynobasis* r.

sparsiflora. Steudel. par. Sjundeå ad Myrans legit Mag. Nervander.

limosa. L. p.

irrigua. Wbg. p.

cæspitosa. L. fr.

prolixa. Fr. r. Fagervik, (Harholmen et ad Parkbron).

acuta. L. frequentiss.

aquatilis. Wahlbg. sat fr.

vulgaris. Fr. nb.

— Forma *juncella* Fries. ad Fagervik et in tæniis (Kullaholmen).

— Formam præstantissimam, *valde stoloniferam*, tantum 2–3 uncialem, *in litore arenoso longe lateque repentem*, in Jacob-Ramsjö in par. Ingå legi.

stellulata. Good. fr.

canescens. L. fr.

loliacea. L. r. Fagervik et prope Långvik in p. Ingå.

elongata. L. r. Fagervik et in par. Sjundeå ad Myrans (Nervander).

microstachya. Ehrh. in par. Tenala ad Rilax (Näset) legit Dom. G. Westfelt.

norvegica. Willd. ad Fagervik et in Stor-Ramsjö in par. Ingå; in par. Tenala a Dom. G. Westfelt ad Rilax lecta.

leporina. L. fr.

muricata. L. fr. — Forma *virens* (Lam.) ad Fagervik.

vulpina. L. par. Pojo ad Åminne, sec. specimina mihi a Dom. A. Christiernin communicata.

teretiuscula. Good. par. Tenala ad Bromarf leg. Dom. G. Westfelt; par. Sjundeå ad Myrans teste Mag. Nervander.

chordorrhiza. Ehrh. r. Fagervik (Brännäs flyet.)

pauciflora. Ligthf. par. Ingå in Stormossen prope Svartbäck copiose.

Class. XVI. Glumifloræ.

Fam. LXXIX. Gramineæ. Juss.

Triticum. L.

repens. L. fr.

caninum. Schreb. r. ad Fagervik. In par Sjundeå ad

Munks leg. Mag. H. Nervander et in par. Tenala ad
Rilax Dom. G. Westfelt.

Elymus. L.

arenarius. L. p. in litoribus maris.

Lolium. L.

perenne. L. var. aristatum (And Sk. Gram.) ad Svartå
in par. Karis, sed tantum in horto (initio satum.)

Cynosurus. L.

cristatus. L. par. Karis ad Svartå, sed tantum in horto
(initio satus).

Dactylis. L.

glomerata. L. fr.

Festuca. L.

arundinacea Schreb r. ad Fagervik et in Stor-Ramsjö
in litore (Söderstrand) in par. Ingå; ad Svartå in par. Karis.

pratensis. Huds. fr.

rubra. L. fr.

— *arenaria. Fr.* ad Fagervik et in insula Jacob-
Ramsjö in tæniis.

ovina. L. fr.

Bromus. L.

secalinus. L. p. ad Fagervik et Svartå.

mollis L. r. par. Ingå in tæniis in Stor-Ramsjö et ad Fagervik.

Briza. L.

media. L. r. par. Pojo ad Äminne, secundum specimina
mihi a Dom. A. Christiernin communicata.

Poa. L.

pruteusis. L. fr.

trivialis. L. fr.

serotina. Ehrh. ad Fagervik et ad Svartå.

nemoralis. L. fr.

annua. L. ub.

Glyceria. R. Br.

fluitans. R. Br. fr.

Enodium. Gaud.

cœruleum. (L.) p.

Triodia. R. Br.

decumbens. (L.) fr.

Avena. L.

pubescens. L. sat fr.

pratensis. L. Pojo ad Åminne, sec. specim. a Dom.
Christiernin mihi communicata.

Aira. L.

cæspitosa. L. fr.

flexuosa. L. fr.

Holcus. L.

lanatus. L. ad Fagervik r. (primum satus.)

Melica. L.

nutans. L. fr.

Phragmites. Trin.

communis. Trin. fr.

Calamagrostis. Roth.

*epigejos. Roth. fr.**lanceolata. Roth. fr.**Phragmitoides. Hartm. sat. fr. ex. gr. ad Fagervik et prope Svartbäck in par. Ingå; ad Svartå, ad Rejböle et in insula Strömsjö in par. Karis; ad Åmune in par. Pojo.**Halleriana. De C. r. par. Ingå, prope prædium sacerdotale ad amnem Kulla-ån.**neglecta. Ehrh. fr.**silvatica. De C. in par. Karis ad Konungsböle.*

Agrostis. L.

*spica venti. L. fr.**stolonifera. L. fr.**vulgaris. With. fr.**canina. L. fr.*

Miliun. L.

effusum. L. r. par. Ingå in tæniis, in Stor-Ramsjö et Jacob-Ramsjö.

Alopecurus. L.

*pratensis. L. sat fr.**fulvus. Sm. p. circa Fagervik et ad Svartå in par Karis.**geniculatus. L. fr.*

Phleum. L.

pratense. L. fr.

Digraphis. Trin.

arundinacea. Trin. sat. fr.

Hierochloa. Gmel.

australis. (Schr.) rariss. Fagervik in Stor-Bonås.

borealis. (Schr.) p.

Anthoxanthum. L.

odoratum. L. fr.

Nardus. L.

stricta. L. sat. fr.

Nemeæ.

Heteronemeæ.

Class. XVII. Filices.

Fam. LXXX. Polypodiaceæ. R. Br.

Polypodium. L.

vulgare. L. fr.

Phegopteris. L. minus fr.

Dryopteris. L. fr.

Woodsia. R. Br.

ilvensis. (L.) ad Fagervik sat fr.

Aspidium. Sw.

Thelypteris. (L.) r. Fagervik, Bussemossen.

filiæ mas. (L.) fr.

spinulosum. Sw. fr.

Cystopteris. Bernh.

fragilis. (L.) p.

Asplenium. L.

felix femina. (L.) fr.

Trichomanes. L. ad Fagervik et ad Hirfdal in par. Ingå.
septentrionale. Sw. Fagervik.

Pteris. L.

aquilina. L. frequentiss.

Struthiopteris. Willd.

germanica. Willd. passim ad Fagervik et in omnibus
paroeiciis vicinis.

Fam. LXXXI. Ophioglosseæ. R. Br.**Ophioglossum. L.**

vulgatum. L. r. par. Ingå in tæniis, in insulis Stor-
Ramsjö et Nötön.

Fam. LXXXII. Marsileaceæ. R. Br.**Isoëtes. L.**

lacustris. L. p. in lac. Fagerviksträsk, Hvitträsk et Mar-
sjön. (autumno copiose in lit. rejecta.)

Fam. LXXXIII. Lycopodiaceæ. Sw.**Lycopodium. L.**

complanatum. L. p.

clavatum. L. fr.

annotinum. L. fr.

Selago. L. sat fr.

Tillägg och Rättelser.

- Sid. 3 rad. 15 läs: (571 Cotyledoneer
- — — 18 — från Chili, vestra och nordvestra
- 4 — 7 utgår: *Lamium album*,
- 6 — Efter *Artemisia vulgaris* införes:
- — — var. *coarctata* in taeniis in litoribus
ex. gr. Hummelskäret.
- 8 — till *Lactuca muralis* tillägges: Sec. Math. Phys. Cand.
E. Nylander in rimis castelli ad Raseborg et
in insula Kiälkö in par. Ingå.
- 13 — till *Thymus Serpyllum* tillägges: Par. Ingå in taeniis
insula Fagerön in arena litorali.
- — — Efter *Lamium* införes:
- L. album*. L. par. Ingå ad Öfverby unico loco
angustissimo ad viam, sec. Doct. Elfving ad
Ekenäs et sec. Math. Phys. Cand. E. Nylander
ad praedium Raseborg.
- 14 — till *Fraxinus excelsior* tillägges: spontanea passim in
insulis prope Barösund et sec. D. Doct. Elf-
ving in Espholm prope Jussari in par. Pojo
et ad Lönnhammar in par. Karis-Lojo.
- 15 — 8 står: Karis. läs: Kariş
- — — 14 — par läs: par.

Sid. 15 rad. 21 och 22 utgår det af Sprengel anförda synonym:

M. glabratus Kunth.

— — — 22 läs: var. *sine maculis magnis purpureis* et non
forma, quam descripsit Hartman

— 21 — 5 läs: in mari

— 22 — Efter *Raphanus Raphanistrum* införes:

Cakile maritima L. par. Ingå in Fagerön et
sec. Phys. Math. Candid. Edv. Nylander in
insulis circa Tostholm.

— 23 — Efter *Nasturtium palustre* införes:

Isatis tinctoria L. in insulis Kubbholm et
Kiälkö prope Barösund legit D. Phys. Math.
Candid. Edwin Nylander.

— 24 — Efter *Draba verna* införes:

D. incana. L. var. *contorta* (Ehrh.) par. Karis
in insula minima prope Hummelskäret.

— 26 — 14 står: inulis läs: insulis

— 27 — Efter *Viola canina* införes:

— var. *montana* (L.) par. Karis ad Rejböle.

— — — Efter *Silene inflata* införes:

S. maritima With. par. Karis in taeniis: Hum-
melskäret.

— — — 22 läs: Fagervik

— 28 — 22 läs: Elisjö, Tostholm, ad Billskog etc. sat fr.

Sid. 30 — Efter *Sedum acre* införes:

S. annuum L. par. Ingå in insula Öster-Långön
et in par. Karis ad Svartå.

— 32 — Framför *Sorbus* införes:

Pyrus Malus L. r. par. Ingå in taeniis: Tost-
holm et Pehrsholm.

— 35 — Efter *Trifolium agrarium* införes:

Anthyllis vulneraria. L. par. Lojo prope Oja-
mo legi.

— 36 — 9 läs: *palustre*. L. fr.

— 37 — Efter *Polygonum Hydropiper* tillägges:

P. strictum. Allion. Meisn. (*Fries Mant.*) par.
Ingå in taeniis.

— 38 — Till *Ulmus montana* tillägges: Arbor unica, ab in-
colis "Hummelträdet" dicta, adest secundum Doct.
Elfving in silva in par. Tenala. Locus spe-
cialis omissus.

— 39 — Efter *Atriplex patula* införes:

A. litoralis. L. r. in taeniis par. Ingå et Karis,
ex. gr. Hummelskäret.

— 41 — 6 läs: *incana* Willd. fr., sed non in taeniis.

— — — Till *Myrica Gale* tillägges: par. Ingå in taeniis in
insula Mellan-Långön legi. Secund. E. Nyland-
er in Degerö

Sid. 44 — Efter *Malaxis monophyllos* införes:

M. paludosa. Sw. rariss. Fagervik, Brännåsflyet.

— 46 — Efter *Juncus bufonius* införes:

J. stygius L. Fagervik, Brännåsflyet.

— 47 — 15 läs: *minor*. L. fr.

— 54 — 11 till *Calam. silvat.* tillägges: et in taeniis par. Ingå.

— 56 — Efter *Lycopodium Selago* införes:

L. inundatum. L. Fagervik, Brännåsflyet.

York Botanical Garden Library
OK 290 .H49 1855 gen
Hisinger, Edvard Vilhelm / Fagervikensis

3 5185 00011 0468