OK
327
.H39

Heldreich

Flora
de
L'île de Céphalonie

58114
H 36

FLORE
DE
L'ILE DE CÉPHALONIE
OU
CATALOGUE DES PLANTES

QUI CROISSENT NATURELLEMENT
ET SE CULTIVENT LE PLUS FRÉQUEMMENT DANS CETTE ILE

redigé d'après les indications des auteurs et ses propres observations

PAR
TH. de HELDREICH

LAUSANNE
GEORGES BRIDEL ÉDITEUR

—
1883

1882

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENÈVE
VENDU EN 1922

FLORE

DE

L'ILE DE CÉPHALONIE

LAUSANNE — IMPRIMERIE GEORGES BRIDEL

FLORE

DE

L'ILE DE CÉPHALONIE

OU

CATALOGUE DES PLANTES

QUI CROISSENT NATURELLEMENT

ET SE CULTIVENT LE PLUS FRÉQUEMMENT DANS CETTE ILE

redigé d'après les indications des auteurs et ses propres observations

PAR

TH. de HELDREICH

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

LAUSANNE

GEORGES BRIDEL ÉDITEUR

—
1882

ABRÉVIATIONS

Dallap.	=	Dallaporta.
U.	=	Unger.
Schm.	=	Julius Schmidt.
H.	=	Th. de Heldreich.
Schr.	=	D ^r Julius Schrader.
Spreitz. ou Sprz.	=	Spreitzenhofer

ΤΟΙΣ ΜΕΓΑΘΥΜΟΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΣΙ

ΜΝΗΜΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΑΝΑΤΙΘΗΣΙΝ

Ο ΓΡΑΨΑΣ

« Δόσις δλέγη τε φίλη τε. »

Je dédie ce petit travail sur la flore de Céphalonie aux Céphaloniens — aux Céphaloniens magnanimes, comme les appelle Homère¹ — afin d'exprimer ma reconnaissance pour l'hospitalité généreuse qu'ils m'ont offerte et l'assistance aimable que j'ai trouvée de leur part pendant mes trois séjours dans l'île, circonstances qui ont puissamment contribué à faciliter mes recherches botaniques. Aussi, parmi le grand nombre d'excursions botaniques que j'ai faites pendant quarante ans en Grèce et en Orient, celles de Céphalonie m'ont laissé le plus agréable souvenir.

Athènes, juin 1882.

Ch. de Helldreich.

¹ « Ἀντάρ Ὀδυσσεύς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους. » HOM. II. B, 631.

INTRODUCTION

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

L'île de Céphalonie est la plus grande des îles ioniennes ou des *Sept-îles* (Ἑπτάνητος) comme les nomment les Grecs. Quant à sa flore elle était jusqu'à ces derniers temps très peu connue. SIBTHORP ne l'a pas visitée et par conséquent elle n'est pas mentionnée comme localité dans le *Prodromus Florae Graecae* de SMITH. En 1821 fut publiée en italien une petite Flore de Céphalonie¹ par un médecin très distingué, le Dr *Nicolas Dallaporta*, dont les descendants de la seconde et troisième génération ont été et sont de même des médecins et pharmaciens renommés du pays. Cet ouvrage, qui a le mérite d'être le premier publié par un indigène et donnant les noms vulgaires grecs, n'est cependant qu'une énumération raisonnée des plantes médicinales et économiques, classées d'après le système de Linné, et dont les observations du texte se rapportent seulement à l'usage et à la culture des plantes spontanées ou cultivées à Céphalonie. Le nombre des espèces spontanées énumérées par Dallaporta s'élève à environ 160, dont l'identité et la synonymie sont assez souvent difficiles à établir. En 1824 le général CH. JAMES NAPIER, alors gouverneur de l'île, envoya pour la première fois des graines du sapin du *Monte-nero* en Angleterre où il fut

¹ Sous le titre *Prospetto delle piante che si trovano nell' isola di Cefalonia e che si possono adoperare a titolo di alimento, o di rimedio del Sign. Dr. Niccolo Dallaporta, medico fisico*, ecc. Corfu 1821. In-8.

décrit et figuré en 1839, dans le *Pinetum Woburnense*, sous le nom d'*Abies Cephalonica* ¹.

Le botaniste italien AL. DOM. MAZZIARI a vécu pendant quarante ans (1817—1857) aux îles ioniennes. Pendant les dernières années de sa vie, il habitait Zante. Il a beaucoup herborisé à Corfou, Leucas et Zante, moins à Céphalonie, d'où cependant il a distribué quelques plantes cueillies par ses élèves. Son herbier a été acheté par *Tommasini* et fait maintenant partie du musée d'histoire naturelle de la ville de Trieste ².

En 1834 l'île de Céphalonie fut visitée par le Dr *Wist* et *G. Schimper*, cités dans le prodrome de De Candolle et dans la *Flora orientalis* de Boissier pour un petit nombre de plantes rapportées par eux. Ils n'ont fait que passer et cela en automne, comme nous le prouve la découverte d'une nouvelle espèce automnale de *Crocus* dédiée à Schimper par J. GAY ³.

En septembre 1858, le professeur ALB. MOUSSON de Zurich visita Céphalonie, mais s'intéressant plus à la faune qu'à la flore, il l'explora surtout sous le point de vue des mollusques terrestres et d'eau douce. Cependant, dans la relation de son voyage ⁴, en décrivant l'ascension au Monte-nero, il parle aussi de la végétation et surtout de la forêt de sapins.

La première exploration scientifique vraiment importante pour la

¹ D'après Unger, *Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Griechenland und den jonischen Inseln*, in-8, Wien 1862, pag. 60. Le sapin fut déjà mentionné par London en 1838 dans le *Gard. Magaz.* XIV, vol. IV, sér. 2, pag. 81 et décrit et figuré de nouveau dans *Gard. Magaz.* XV, vol. V, sér. 2, 1839, pag. 238. Unger cite tous les ouvrages qui ont traité du sapin de Céphalonie.

* Malheureusement les indications des localités dans l'herbier et les collections distribuées par *Mazziari* ne méritent pas toujours entière confiance. Dans les *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, Bd. XI, 1861, pag. 411-430 et Bd. XVIII, 1868, pag. 425-428 ont été publiés deux catalogues des Cryptogames de l'herbier *Mazziari*. Les indications des localités étant très vagues et la flore cryptogamique ayant besoin d'être revue, je n'en ai pas tiré parti pour la présente flore spéciale de Céphalonie, me réservant de le faire plus tard pour ma flore comparative des îles.

³ *Crocus Schimperii* J. Gay! in Schimp. pl. exsicc. 1835. L'espèce est identique avec *C. Spruneri* Boiss. et Heldr., décrit en 1846 dans *Boissier, Diagn. plant. Or.* VII, pag. 103.

⁴ Publiée en 1859 sous le titre *Ein Besuch auf Korfu und Cefalonien im September 1858. Vortrag gehalten den 10. Februar 1859 von Alb. Mousson.* Zürich. In.-8.

flore de Céphalonie fut celle faite en avril 1860 par le Dr FR. UNGER, professeur à Vienne. Unger fit un séjour d'environ une semaine à l'île et en rapporta en tout 176 espèces, dont 56 sont des plantes cellulaires, pour la plupart des lichens et des mousses ¹. De la flore de l'île, telle que je la présente aujourd'hui, contenant 824 espèces spontanées, la connaissance de presque un cinquième est donc due aux recherches d'Unger.

Au printemps de 1861, un an après Unger, j'ai visité pour la première fois l'île de Céphalonie, en compagnie de M. JULES SCHMIDT, directeur de l'observatoire d'Athènes. Nous y avons séjourné du 6 mai jusqu'au 12 mai, en herborisant surtout au mont Enos et aux environs d'Argostoli. En 1867 j'ai de nouveau visité l'île, en y séjournant du 26 août jusqu'au 4 septembre et en la parcourant dans toutes les directions. Enfin, en 1872, j'y ai fait un séjour de plus de deux mois, du 22 juillet jusqu'au 24 septembre. Pendant ce séjour, j'ai eu tout le loisir d'examiner les localités, que je n'avais pas encore visitées dans mes excursions précédentes et d'étudier à fond la végétation de l'île. M. J. Schmidt aussi avait visité de son côté l'île de Céphalonie de nouveau, en avril 1867, pour y étudier les effets des tremblements de terre qui alors venaient de ravager le pays. Il ne négligea pas de cueillir quelques plantes dans ses excursions et de me les rapporter.

En mai 1872 le Dr JULES SCHRADER de Berlin fit une herborisation en Céphalonie. Il y cueillit 42 espèces, qui furent déterminées par M. le professeur ASCHERSON et dont M. Schrader a eu l'extrême bonté, sur ma prière, de me communiquer la note. Enfin, en 1877, M. SPREITZENHOFER de Vienne fit une herborisation de trois jours (du 16 au 19 avril) à Céphalonie, dont il a publié le résultat dans le compte rendu de la Société zoologique et botanique de Vienne ². Il y a énuméré 116 espèces de Céphalonie, dont seulement 4 à 5 n'avaient pas encore été observées dans l'île par Unger ou par moi. Enfin, en 1878, M. LETOURNEUX, en passant à Céphalonie, y a aussi

¹ Le catalogue des plantes cueillies par *Unger* dans son voyage se trouve dans sa relation *Wissenschaftliche Ergebnisse*, etc., pag. 97-141, dont j'ai cité déjà plus haut le titre complet. Un chapitre entier dans l'ouvrage d'Unger pag. 52-67 traite *in extenso* du *Monte-nero* et de l'*Abies Cephalonica*.

² *Beitrag zur Flora der jonischen Inseln: Corfu, Cephalaria und Ithaca*, von G. C. Spreitzenhofer, dans *Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, Jahrgang 1877, Wien 1878, pag. 711-734.

herborisé et surtout sur le mont Enos, où il trouva le *Monotropa Hypopitys*, qui n'avait pas été observé par ses prédécesseurs.

On comprend que par de si nombreuses explorations les matériaux sur la flore de Céphalonie se sont tellement augmentés depuis 1860, qu'à ce jour cette île est certes une des mieux connues dans ces parages au point de vue de sa végétation.

Pour compléter cet aperçu historique des explorations scientifiques à Céphalonie, j'ajouterai qu'en 1862 le Dr L. MILLER de Vienne y fit une excursion entomologique très fructueuse, dont le résultat, précédé de quelques observations générales sur l'île, a été publié dans le journal entomologique de Vienne ¹.

Je ne m'étendrai pas sur la topographie de l'île. Elle a été très bien étudiée et on trouve d'excellentes descriptions dans les ouvrages de Goodison ², de Mousson, d'Unger, de L. Miller ³ et surtout de Wiebel, qui a publié la description physique la plus complète de l'île ⁴. Je me limiterai donc à quelques notes sur le caractère de la végétation en général.

Corrélativement à la position géographique de l'île de Céphalonie, sa flore se rattache le plus étroitement à celle de Grèce et surtout de la Grèce occidentale. Comme les flores des îles en général, elle est pour la même surface bien moins riche en espèces que celle du continent. Si nous jetons un coup d'œil sur les régions qu'on peut distinguer d'après la nature du terrain et l'élévation au-dessus du niveau de la mer, nous retrouvons à Céphalonie à peu près les mêmes zones avec les mêmes subdivisions comme je les ai établies pour la flore d'Attique ⁵; seulement, comme cela se comprend, le

¹ L. Miller, *Ergebnisse einer entomologischen Reise nach Cephalaria*, dans *Wiener entomologische Monatschrift*, VI. Band, 1862, pag. 269-282. et p. 320-326, 339-355.

² W. Goodison, *A historical and topographical Essay upon the Islands of Corfu, Leucadia, Cephalaria, Ithaca and Zante*, etc. London 1822. in-8.

³ Les titres des ouvrages des trois derniers auteurs ont déjà été indiqués plus haut.

⁴ Wiebel, *Die Insel Kephalaria und die Meermühlen von Argostoli. Versuch einer Lösung dieses geophysikalischen Räthsels*, Hamburg 1874. in-4.

⁵ Voir : « l'Attique au point de vue des caractères de sa végétation, » par Th. de Heldreich. (Compte rendu sténographique du Congrès international de botanique et d'horticulture, tenu à Paris du 16 au 24 août 1878, Paris 1880, pag. 106-119.)

nombre des espèces caractéristiques pour chaque région est beaucoup plus petit. Ainsi dans la 1^e zone, celle du littoral, subdivisée en région des dunes et région des halipèdes, il manque toutes les *Frankeniaceés* et les plantes suivantes si caractéristiques pour ces régions en Attique : *Brassica Tournefortii* Gou., *Erucaria Alepica* Gaertn., *Medicago marina* L., *Alhagi Graecorum* Boiss., *Centaurea spinosa* L., *Verbascum pinnatifidum* Vahl, *Statice sinuata* L., *Atriplex Halimus* L., *Galilea mucronata* L., etc. Il y a au contraire à Céphalonie, comme éléments de ces régions, quelques plantes qui sont étrangères à la flore d'Attique, telles que *Ambrosia maritima* L., *Salsola Soda* L. et *Statice cancellata* Bernh. Plus sensible encore est la différence entre les deux flores dans la 2^e zone, celle de la plaine, qui est très peu développée et par conséquent très pauvre en espèces à Céphalonie. Il serait trop long d'énumérer les espèces nombreuses de cette zone en Attique, qui manquent à Céphalonie. Il en est de même de la 3^e zone, celle des collines, qui est divisée en région des collines à phryganes¹ et rég. des maquis. Cependant la région des collines à phryganes est la plus développée et la plus étendue de toutes à Céphalonie, mais la composition en est très différente comparativement à celles de la même région en Attique. Les espèces de phryganes qui prédominent presque exclusivement dans cette région à Céphalonie sont *Anthyllis Hermaniæ* L., *Poterium spinosum* L. et *Thymus capitatus* Lk. Le peuple de Céphalonie n'appelle point ces sous-arbrisseaux, comme celui de la Grèce continentale, φρύγανα, mais στουβηαίς, nom également très ancien (de στουβή²). Les autres phryganes si communs en Attique et le reste de la Grèce, ou manquent complètement à Céphalonie, comme le *Genista acanthoclada* DC. et *Satureia Thymbra* L., ou sont rares comme les nombreuses *Cistinées* et surtout le *Thymelaea hirsuta* (L.) et *Th. Tartonraira* (L.), qui ne se trouvent que dans quelques localités restreintes. Dans la région des maquis il manque à Céphalonie le *Globularia Alypum* L. et le *Pinus Halepensis* Mill., si abondant sur le continent grec, y est si rare que je

¹ Du grec φρύγανα, nom collectif ancien et moderne pour les sous-arbrisseaux, qui couvrent les collines sèches. Voir Heldr., l'Attique au point de vue des caractères de sa végétation. etc. pag. 109.

² Στουβή ou φέως de Théophraste (h. pl. I, 10, 4 et VI, 1, 3) paraît être précisément le *Poterium spinosum*.

ne l'ai pas observé moi-même et qu'il a été indiqué d'une seule localité par *Spreitzenhofer*. Il y a des maquis très touffus et assez étendus, surtout au mont *Rhondi* (ou partie septentrionale du mont Enos, vers Same), sur les pentes orientales du mont *Atro* à l'est du mont Enos et au bois d'*Athéra* (λόγγος τοῦ Ἀθήρας) dans la partie occidentale de l'île. Ce sont surtout *Pistacia Terebinthus* L. et *P. Lentiscus* L. (souvent arborescents), *Arbutus Unedo* L., *Phillyrea media* L. et *Quercus Calliprinos* Webb. (arborescent), qui forment ces bosquets (maquis). Enfin même la IV^e zone, celle des sapins, est représentée à Céphalonie sur le mont Enos (ancien *Aenos*, aujourd'hui *Monte-nero*), qui s'élève à la hauteur d'environ 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer et dont les sommités de 4000 à 5000 picds sont couvertes de bois de sapins (*Abies Cephalonica* Loud.). C'est dans cette région qu'ont été observées 54 espèces plus ou moins subalpines, qui presque toutes se trouvent aussi sous les mêmes conditions sur les montagnes de la Grèce.

En voici la liste : *Anemone blanda* Sch. et Ky., *Ranunculus calthaeifolius* Jord., *Helleborus cyclophyllus* (?) Boiss., *Paeonia peregrina* (L.), *Corydalis solida* β *densiflora* (Presl.), *Cordamine Graeca* L., *Erysimum Boryanum* Boiss., *Cochlearia saxatilis* L., *Aubrietia deltoidea* β *microphylla* Boiss., *Alyssum minutum* Schlecht., *Thlaspi rivale* Presl., *Hutchinsia petraea* (L.), *Polygala Nicaeensis* Risso., *Saponaria Aenesia* Heldr., *Arenaria Guicciardii* Heldr., *Cerastium tomentosum* L., *Medicago lupulina* L., *Trifolium physodes* Stev., *Astragalus aristatus* β *Cephalonicus* Boiss., *A. angustifolius* Lam., *Crataegus* sp. . . , *Sempervivum tectorum* L., *Saxifraga controversa* β *Parnassica* Boiss., *S. chrysosplenifolia* Boiss., *Cnidium apioides* L., *Pterocephalus Parnassi* Spreng., *Achillea Ligustica* All., *Centaurea subciliaris* Boiss. et Heldr., *Taraxacum officinale* β *alpinum* Koch., *Lactuca viminea* (L.), *Campanula Spruneri* Hampe, *Monotropa Hypopitys* L., *Lithospermum incrassatum* Guss., *Alkanna Graeca* Boiss., *Myosotis pusilla* Loisl., *Calamintha alpina* L., *Scutellaria hirta* Sibth. β *brachystegia* Boiss., *Lamium striatum* Sibth. var., *Ajuga Orientalis* β *Aenesia* Heldr., *Tencrium Polium* β *roseum* Boiss., *Acantholimon Echinus* L., *Abies Cephalonica* Loud., *Orchis provincialis* β *pauciflora* (Ten.), *Epipactis rubiginosa* Gaud., *Gagea foliosa* Roem. et Sch., *Bellevia dubia* (Guss.), *Scilla bifolia* β *mi-*

nor Boiss., *Ornithogalum exscapum* Ten., *Luzula Forsteri* DC., *Mibora verna* (Trin.), *Milium Montianum* Parlat., *Melica Cretica* Boiss. et Heldr., *Festuca duriuscula* L. et *Nephrodium pallidum* Bory.

Ayant l'intention de publier sous peu une flore comparative des îles ioniennes, de l'île de Candie, des îles de l'Archipel et de l'Attique, je ne donnerai pas ici un tableau comparatif complet et détaillé du nombre et de la proportion des espèces par familles et genres, mais j'ajouterai seulement quelques remarques sur les plantes endémiques et sur les rapports entre les flores de Céphalonie, de l'île de Zante et de la Grèce continentale.

Abstraction faite des plantes cultivées et des Cryptogames cellulaires, qui sont encore trop insuffisamment connues, nous connaissons 766 espèces de plantes vasculaires de Céphalonie. De ces 766 espèces, les 10 espèces ou variétés particulières suivantes seulement n'ont pas été trouvées ailleurs jusqu'à présent et peuvent être considérées comme endémiques ou propres à la flore de Céphalonie : *Malcolmia flexuosa* Sibth. β *Cephalonica* Heldr., *Saponaria Aenesia* Heldr., *Silene Cephalenia* Heldr., *Ononis antiquorum* L. β *lanata* Heldr., *Astragalus aristatus* Hér. β *Cephalonicus* Boiss., *Scabiosa Dallaportæ*, Heldr., *Centaurea subciliaris* Boiss. et Heldr., *Verbascum* sp. (e monte Atro), *Ajuga Orientalis* L. β , *Aenesia* Heldr. et *Abies Cephalonica* Loud.¹. Le plus grand nombre des espèces de la flore de Céphalonie se trouve aussi en Grèce, en tout 746 espèces, car outre les dix espèces endémiques, que je viens d'indiquer, seulement les dix espèces suivantes n'ont pas encore été observées en Grèce : *Delphinium brevicornu* Vis. (Dalmatie), *Thlaspi rivale* Presl. (Sicile), *Moricandia arvensis* (L.) (Sicile, Italie, France), *Cerastium vulgatum* L. (douteux — Europe septentr.), *Crepis purpurea* Biv. (d'après Unger — Sicile), *Campanula Garganica* Ten. (Dalmatie, Italie inférieure), *Satureia cuneifolia* Ten. (Italie, Dalmatie, Asie Mineure), *Gagea foliosa* B. et Sch. (Sicile), *Colchicum Kochii* Parl. (Dalmatie, Italie) et *Mibora verna*

¹ Parmi les Cryptogames énumérés par Unger, l. c., pag. 112, il y a deux espèces nouvelles de mousses décrites par Juratzka dont l'une (*Neckera Cephalonica* Jur. et Ung.) paraît endémique de Céphalonie, tandis que l'autre (*Neckera turgida* Jur.) a été trouvée depuis par moi au mont Ida en Crète (en août 1870).

(*Trin.*) (Italie, etc.) Ce sont, comme on voit par les notes sur leur distribution géographique ajoutées en parenthèse, pour la plupart des espèces des pays voisins au nord et à l'ouest (Dalmatie, Italie), qui trouvent à Céphalonie leur limite orientale. De celles-ci, l'aire ne s'étend donc pas jusqu'au continent grec, mais il y a un certain nombre d'autres plantes dont l'aire comprend la Grèce occidentale (Etolie, Acarnanie), ou le Péloponèse, ou l'île de Candie, sans atteindre cependant la Grèce orientale. Il ne sera pas sans intérêt de les signaler ; ce sont les 21 espèces suivantes : *Crambe Hispanica* L. (Sardaigne, Pylos, Pélop. occid.), *Tunica rigida* L. (Sicile, Achaïe), *Triadenia Webbii* Spach. (seulement à Zante), *Trifolium xanthinum* Freyn. (Etolie, Achaïe), *Trif. multistriatum* Koch. (Etolie, Macédoine), *Tetragonolobus purpureus* Mch. (Sicile, Peloponèse), *Hedysarum capitatum* Desf. (Italie, Achaïe), *Ptychotis ammoides* Gou. (Italie, Dalmatie, Béotie d'après Spruner), *Hippomarathrum cristatum* DC. (Crète, îles de l'Archipel, Béotie d'après Sibth.), *Colladonia heptaptera* Boiss. (Zante, Peloponèse), *Chrysanthemum Myconis* L. (Italie, Candie), *Senecio erraticus* Bert. (Italie, Dalmatie, Zante, Peloponèse, Béotie), *Monotropa Hypopitys* L. (mont. du Peloponèse, Olympe), *Heliotropium Bocconi* Guss. (Sicile, Etolie, Santorin), *Stachys Parolinii* Vis. (Etolie), *Stachys candida* Bory et Chaub. (Peloponèse), *Scutellaria hirta* Sibth β *brachystegia* Boiss (mont Taygète), *Teucrium Polium* L. β *roseum* Boiss. (Europe occidentale, Zante, Chypre), *Statice cancellata* Bernh. (Dalmatie, Illyrie, Navarin rar.), *Salsola Soda* L. (Europe occidentale, Etolie¹) et *Euphorbia biglandulosa* Desf. (Sicile, Peloponèse).

En comparant la flore de Céphalonie à celle de Zante, nous arrivons aux résultats suivants : La flore de Zante, très bien connue grâce aux travaux de Margot et Reuter², contient d'après ces auteurs 604 espèces de plantes vasculaires³, dont 178 ne se trouvent pas à Céphalonie. Ce sont des espèces pour la plupart très communes en Grèce et il est bien possible que plusieurs d'entre

¹ Cette plante a été indiquée de l'Attique par D'Urville, mais elle n'y a jamais été trouvée par d'autres.

² *Essai d'une Flore de l'île de Zante*, par H. Margot et F.-G. Reuter. (Lu à la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, en mars 1838.)

³ D'après les auteurs il y aurait réellement 636 plantes vasculaires, mais j'ai dû éliminer de ce nombre 32 espèces, ou parce qu'elles sont sans aucun doute cultivées (p. c. *Linum usitatissimum*, *Ervum Lens*, *E. Ervilia*, *Arum*

elles croissent aussi à Céphalonie et ont simplement échappé jusqu'à présent à l'observation des botanistes. Des 766 plantes vasculaires connues de Céphalonie, 350 n'ont pas été trouvées à Zante. Dans ce nombre sont comprises toutes les plantes de la région des sapins qui manque entièrement à l'île de Zante. Les familles des *Portulacées*, *Haloragées*, *Monotropées*, *Amarantacées*, *Laurinées*, *Platanées*, *Callitrichinées* et *Gnetacées* représentées dans la flore de Céphalonie n'existent pas ou du moins n'ont pas été observées à Zante où au contraire sont représentées les *Nymphéacées*, *Globulariées* et *Equisetacées*, qui paraissent manquer à Céphalonie.

Le tableau suivant fait voir le nombre comparatif des espèces des grandes classes et des familles les plus riches en espèces en Attique, Céphalonie et Zante :

		en Attique, Céphalonie, Zante,		
En sont :	Espèces	1445	766	604
Dicotylédones »		1124	617	463
Monocotylédones »		300	133	129
Gymnospermes »		7	4	2
Cryptogames vasculaires . . »		14	12	10
Légumineuses Espèces		170	77	74
Composées »		147	97	76
Graminées »		120	60	56
Crucifères »		77	32	17
Caryophyllées »		72	34	15
Ombellifères »		69	43	27
Labiées »		64	39	31
Liliacées »		57	21	23
Borraginées »		46	18	14
Serofularinées »		37	18	14
Renoneulacées »		34	15	15

Le fait le plus remarquable que présente ce tableau, est la différence très notable dans la proportion des espèces des Légumineuses et des Composées en Attique et aux îles. En Attique les Légumineuses forment environ le onze pour cent de la végétation vasculaire, à Céphalonie seulement le dix pour cent ; les Composées au contraire

Colocasia, etc.) ou parce qu'elles ont été énumérées sous deux noms différents (p. e. *Silene gallica* et *S. quinquevulnera*, *Ononis diacantha* et *O. spinosa*, qui appartiennent toutes les deux à l'*Ononis antiquorum*, etc., etc.).

ne forment que 10 % en Attique et 12,6 à Céphalonie; à Zante la proportion des espèces des deux familles est à peu près égale (12 %) mais toujours celle des Composées est plus forte comparativement à l'Attique (12 % à Zante et 10 % en Attique)¹.

Il me reste à dire quelques mots sur les principales cultures de l'île. Quoiqu'elle soit très montagneuse, avec des montagnes et collines très pierreuses, dont les pentes sont souvent très escarpées et aboutissent à des falaises et des rochers à pic, les habitants ont néanmoins su tirer profit de cette nature si sauvage avec une assiduité et une persévérance vraiment admirables, en construisant avec une peine inouïe des terrasses sur les plans les plus inclinés et en transportant souvent même de la terre au sommet des rochers, afin de gagner quelque parcelle de terrain et planter quelques ceps de vigne dans des endroits qui paraissent inaccessibles. La vigne forme la culture par excellence, et c'est surtout la vigne du raisin de Corinthe, qui se cultive en grand et dont le produit est la principale source de richesse pour le pays. En outre on cultive plusieurs variétés de vigne, dont le raisin sert à faire du vin, qui est excellent et dont l'exportation devient de plus en plus importante depuis qu'on a fait de notables progrès quant à sa préparation. La meilleure qualité pour l'exportation est le vin rouge nommé *Mavrodaphni* fait avec le raisin noir du même nom. Le vin blanc *Rompolla*, ainsi nommé d'après la variété de raisin blanc dont on le fait, est très bon aussi, mais ne supporte pas le transport. On fait aussi d'excellent vin muscat (*Moschato*), mais en moindre quantité. Au raisin de Corinthe et au vin, il faut ajouter comme troisième produit principal de l'île l'huile d'olive. L'olivier se cultive en grand surtout dans les dèmes de *Livathó*, *Eliós* et *Palike*, où le terrain est plus propre pour la culture de cet arbre. Les autres cultures de l'île sont de peu d'importance. On cultive, surtout aux environs des villes d'Argostoli et Lixouri, d'excellents légumes en grande abondance. Les melons de Céphalonie sont aussi très exquis.

¹ J'ai noté ce même fait en comparant la flore d'Attique à celle de Crète. Dans les îles en général la proportion des Légumineuses paraît être moindre et celle des Composées plus forte : c'est une question qui demande d'être encore mieux éclaircie par des données plus nombreuses.

FLORA CEPHALONICA

PLANTÆ VASCULARES

I. DICOTYLEDONEÆ

I. THALAMIFLORÆ

Ranunculaceæ.

Clematis Flammula L. Vernac. Ἀγρόμπελι; herba ut exulceratoria adhibetur. Frequens ad sepes, prope *Pessada*, *Hagios Thomas*, *Heracleon* et *Same* (H.). Prope *Kipuria* lusum observavi laciniis foliorum angustissimis. Jul.-Sept.

Anemone stellata Lam. In collibus prope *Argostoli* et in eparchia *Palike* haud frequens (H., Schm.). Aprili et Maio.

A. blanda Schott. et Ky. (A. Apennina Unger non L.) In regione abietina m. Aeni (U., H., Schr., Sprz.). Aprili.

Adonis autumnalis L. In arvis prope *Argostoli* (H.). Maio.

Ranunculus trichophyllus Chaix. In aquis stagnantibus : ad *Kulavo* prope *Argostoli* (Schm.). Aprili.

R. Ficaria L. In oropedio *Omalà* et in reg. superiore m. Aeni (H.). Maio.

R. calthæfolius Rchb. In pineto m. Aeni, alt. 4000' (U., H., Sprz.).

R. chærophyllos L., Freyn.! (R. Agerii Bertol., R. Peloponnesiacus Boiss.). In regione superiore m. Aeni (H.). Maio.

R. flabellatus Desf. (R. chærophyllos auct. plur. non L.). In oropedio *Omalà* (H.). Maio.

R. Sprunerianus Boiss. In saxosis prope *Balsamata* oro-

pedii *Omalà* et pr. cœnobium in m. Atro (H., Sprz.) Maio. Forma minor pauciflora crescit in reg. superiore m. Aeni (H.).

R. palustris L. Prope *Argostoli* (Schm.). Aprili.

R. velutinus Ten. Prope *Argostoli* (Schm.). Aprili.

R. Chius DC. In oropedio *Omalà* (H., Schr.). Maio.

R. trachycarpus F. et Mey. Prope *Argostoli* (Schm., H.). Maio.

R. muricatus L. In humidis pr. *Argostoli* (Schm. H.). Aprili et Maio.

Obs. *R. acris* Dallaporta (vern. Ἀδελόχορτον) forte ad *R. palustrem* vel ad *R. velutinum* spectat.

Helleborus niger L. Σάροφη. In insula Cephallenia secund. Dallaporta (an *H. cyclophyllus* Boiss.?).

Nigella Damascena L. In herbosis prope *Argostoli*, *Pessada*, etc. (H.). Maio.

Delphinium Ajacis L. (*D. consolida* Sibth. Fl. Gr., Dallap., non L.). In arvis oropedii *Omalà* (H.). Maio.

D. brevicornu Vis. (fide Ascherson). Prope *Same* (Schr.). Maio.

D. peregrinum L. In faucibus vallis *Polytrichi* prope *Spartia* (H.). Aug.

D. Staphysagria L. In variis locis (Dallap.), in oliveto pr. *Drapano* et copiose prope *Kontogianata* (H.). Aug.

Pæonia peregrina Mill. var. *latifolia* Boiss. (*P. officinalis* Fl. Gr., non L.). Vernac. Σουέττο. In variis locis præsertim in *Monte nero* (Dallap.), in regione abietina m. Aeni l. d. *Rhidi* (H.). Aug. (fructif.).

Papaveraceæ.

Papaver Rhœas L. Παπαρόνα. Herba comeditur. In collibus aridis et arvis frequens (Schm., H.). April. Mai. Formam pusillam in montosis legit cl. Unger.

P. somniferum L. Ὕπνος. Frequens sec. Dallaporta, sed cultum ut videtur.

P. Argemone L. In cultis et locis aridis; pr. *Argostoli*, *Pessada*, etc. (Schm., H.). Aprili et Maio.

Glaucium luteum Scop. Ἀγρία Φασουλιά. In arenosis maritimis, pr. *Lixuri*, *Hagios Soter* (*Thynià*) et *Argostoli*; nec non in lapidosis montanis usque ad alt. 1500' prope *Dilinata*, *Kastro*, freq. (H.). Aug.

Fumariaceæ.

Corydalis solida Sm. β . *densiflora* Boiss. Fl. Or. (C. densiflora Presl.) Frequens in regione superiore m. Aeni ad cacumen usque, alt. 4500'-5500' (H., Sprz.). Maio. (Heldr. Herb. Graec. norm. N° 806).

Fumaria officinalis L. *Καπνόχορτον*. Prope *Argostoli* (ad *Kutavo*), in cultis (H.). Sept. (adhuc flor.).

F. parviflora Lam. In arvis pr. *Argostoli* (Schm., H.). Maio.

F. capreolata L. In saxosis et ad muros. Pr. *Koriana* (Schm.), pr. *Pessada* et *Francata* in oropedio *Omalà* (H.). Aprili et Maio.

F. Thureti Boiss., forma floribus pallidioribus et paululo quam in typo minoribus. In oropedio *Omalà* pr. *Balsamata* (Sprz.). Aprili.

F. macrocarpa Parlat. forma laxa scandens. Ad muros et in saxosis prope *Balsamata* ad radices m. Aeni (H.). Maio.

Cruciferæ.

Mathiola tricuspidata (L.). In arenosis maritimis prope *Lixuri* (H.). Sept.

Cardamine hirsuta L. In regione abietina m. Aeni (H.). Maio.

C. Græca L. In sylvis abietinis m. Aeni haud rara (U., H., Schr., Sprz.). Aprili et Maio.

Arabis verna (L.). In Aeno et *Atro* montibus, alt. 2000'-3000' (U., H.). Maio.

Nasturtium officinale R. Br. *Κάρδαμα*. Freq. in aquis stagnantibus v. lente fluentibus : copiose circa *Kutavo*, in stagno *Akoli*, prope *Pessada*, etc. (Dallap., Schm., H.). April.-Jul.

Erysimum Boryanum Boiss. et Sprun. a. *genuinum* Boiss. Fl. Or. In regione superiore m. Aeni rarius (H.). Maio.

Conringia Orientalis (L.). In cultis prope *Francata* in oropedio *Omalà* rara (H.). Maio.

Sisymbrium officinale (L.). In cultis pr. *Argostoli* (Dallap., Schm., H., Sprz.). Aprili et Maio.

S. polyceratium L. In ruderibus prope *Argostoli* et *Pessada* (H.). Mai.-Jul.

Malcolmia flexuosa Sibth. var. *Cephallica* Heldr. Frequens in reg. inferiore m. Aeni pr. cœnobium *Hag. Gerasimos* in valle *Omalà* usque ad 2000' alt. (H.). Forma montana a typo maritimo foliis tenuioribus, floribus fere dimidio minoribus siliquisque brevioribus recedens. Maio.

M. Chia Lam. Prope *Argostoli* (Schm.), ibidemque et ad oropedium *Omalà* usque (Sprz.); indicata quoque ab Ungero. Aprili et Maio.

Cochlearia saxatilis L. In m. Aeno (Ung.)

Aubrietia deltoidea (L.) β . *microphylla* Boiss. *Fl. Or.* In cucumine m. Aeni, alt. 5500' (H.). D. 9 Maio.

Alyssum minutum Schlecht. Raro in regione superiore m. Aeni (H., Sprz.). Maio.

A. campestre L. A cl. Unger lectum loco specialiter non indicato. Var. β . *micropetalum* Boiss. *Fl. Or.* In m. Aeno (U.).

Berteroa mutabilis Vent. Raro in pascuis siccis m. Aeni pr. *Hagia Eleutheria* (H.). Aug.

Erophila vulgaris DC. Ad muros prope *Argostoli* et in regione superiore m. Aeni ad cacumen usque (U., H., Sprz.). Maio.

Clypeola Jonthlaspi (L.). In oropedio *Omalà* (H., Sprz.). Aprili.

C. microcarpa Moris. In regione super. m. Aeni (H.). Maio.

Biscutella Columnæ Ten. In aridis haud rara, pr. *Rasata*, etc. (U., H.). Mai. Variat siliculis glabris et hirsutis.

Thlaspi rivale Presl. In regione abietina m. Aeni circa *Casa inglese* (H., Sprz.). Maio. Ad hanc speciem *Thlaspi* præcox a cl. Unger quoque in « *monte nigro* » indicatum haud dubie spectat.

Teesdalia Lepidium DC. In cacumine Aeni (U.).

Hutchinsia petraea (L.). In regione super. m. Aeni (H.). Maio.

Capsella bursa pastoris (L.). In cultis pr. *Rasada*, *Pessada*, etc. (Dallap., H.), nec non in regione super. m. Aeni (forma pusilla vix pollicaris) (H., Sprz.). Aprili et Maio.

Lepidium graninifolium L. Frequens ad vias et in ruderibus pagorum *Pessada*, *Drapano*, *Argostoli*, *Kontogiannata*, etc. (H.). Jul. Aug.

Cakile maritima L. In arenosis maritimis; *Argostoli*, *Lordata*, *Steno*, etc. (H., Sprz.). April.-Sept.

Moricandia arvensis (L.). Planta jam a cl. Schimper et Wiest in *Cephalenia lecta*, freq. crescit in collibus argillosis pr. *Lixuri* et in eparchia *Palike* tota, pr. *Chavriata*, etc. (U., H.). Maio.

Hirschfeldia adpressa Mœnch. *Βρούδα*. In locis incultis et collibus siccis freq. pr. *Argostoli*, *Pessada*, *Spartia* (H.). Maio.

Brassica oleracea L. Coluntur varietates plurimæ : var. *capitata*, *Μάρπα*; var. *botrytes*, « Cavoli; » var. *purpurea*, « Broccoli » (cfr. Dallaporta, p. 90).

B. nigra L. *Σινάπι*. Colitur (Dallap.).

Eruca sativa Lam. *Ποῦζα*. Spontanea pr. *Argostoli* et sæpe culta ad usum culinarium (Dallap., H.). Maio.

Enarthrocarpus arcuatus Labill. Ad litora maris prope *Drapano* (H.). Maio.

Raphanus sativus L. *Ραπάνι*. Frequenter colitur (Dallaporta, H.).

Crambe Hispanica L. In cultis ad litora maris prope *Drapano* (*Argostoli*) (H.). Maio.

Bunias Erucago L. In arvis et ad vias, *Argostoli*, *Drapano*, etc. (H.). Maio.

Capparidaceæ.

Capparis spinosa L. *Καρπαριά* (Dallap.). Copiose in valle *Polytrichi* prope *Spartia*, et inter *Lixuri* et *Kontogianata* (H.). Aug.

C. rupestris Sibth. (*C. spinosa*, ζ. *rupestris* Boiss. Fl. Or.) In rupibus excelsis mari vicinis : pr. *Poros*, pr. *Hagios Varvaros* supra *Drapano*, pr. *Lixuri* in *Palæocastro* (H.). Mai.-Aug.

Resedaceæ.

Reseda alba L. In arvis pr. *Argostoli*, etc. (U., H.). Maio. Formam macriorem (*R. Hookeri* Guss.) legi prope *Kastro* et pr. *Lixuri* in collibus saxosis (H.). Mai.-Aug.

R. lutea L. In collibus herbosis ad *Miniadata* pr. *Argostoli* (H.). Maio.

R. luteola L. Ad vias et in muris, ad *Hagia Euthymia* (*Pylaros*), pr. *Piscardo* et pr. *Petricata* (*Thynià*) (H.). Jul.-Aug.

Cistaceæ.

Cistus villosus L. In collibus saxosis prope *Argostoli* alibique (H., Sprz.). Aprili et Maio.

C. salviæfolius L. In collibus aridis frequens : *Argostoli*, *Pessada*, *Piscardo* (H.). Maio.

Helianthemum salicifolium (L.). In oropedio *Omalà* et in monte Aeno (Sprz.). Aprili.

H. vulgare (Gaertn.) var. *Græcum* Boiss. In regione media m. Aeni (H.). Maio.

Fumana Arabica (L.). In collibus apricis pr. *Argostoli* (U., Schm., H.). Aprili et Maio.

F. glutinosa (L.) β . *viridis* Boiss. In collibus argillosis prope *Lixuri* (H.). Maio.

F. Spachii Gren. et Godr. (forma prostrata). Ad rupes supra Asso ad *Charakas* et in vinetis oropedii *Omalà* pr. *Karavias* (H.). Aug.

Violaceæ.

Viola odorata L. Abundat in m. Aeno sec. Dallap. et Unger. Cultam vidi in hortis pr. *Pessada* (H.). Vernac. *Γιοβλία* sec. Dallap.

Polygalaceæ.

Polygala Nicæensis Risso. In Cephalonia legit *Condogusi* secund. Mazziari in herb. Heldr.

Silenaceæ.

Dianthus fruticosus L. Prope Asso in *Castro* sec. G. Aulico (H.).

Tunica velutina (Guss.). In collibus aridis pr. *Argostoli* et in oropedio *Omalà* (H., Schm., Sprz.). Aprili et Maio.

T. glumacea (Bory et Chaub). β . *obcordata* Boiss. Ἀργία γιόβλια. Frequens ad vias et in locis siccis; *Argostoli*, *Kastro*, *Skala*, *Hagia Euthymia*, *Piscardo*, in m. *Phalaris*, etc. (H.). Jul.-Aug.

T. rigida (L.). In saxosis montium Aeni pr. *Hag. Eleutheria* et *Phalaris*, ad rupes *Charakas* et pr. *Asso* (H.). Jul.-Aug.

T. Illyrica (L.). In saxosis montosis pr. *Pylaro* et in m. *Phalaris* (H.). Aug.

Saponaria officinalis L. Indicatur a cl. Dallaporta (l. c. p. 58).

S. Aenesia Heldr. sert. plant. nov. Flor. Hellen. in Atti del Congresso internaz. di Firenze, 1870, p. 238. In regione abietina m. Aeni (H.). Maio. Species affinis *S. Calabricæ* Guss. in *Corcyra obviæ*, et *S. Græcæ* Boiss. *Græciæ* montium incolæ, ab *ambabus* differt foliis crispato-undulatis pedicellis calice fructifero brevioribus et capsula subglobosa.

Silene conica L. In reg. super. m. Aeni (H.). Maio. Specimen pumilum uniflorum.

S. Reinholdii Heldr. sert. plant. nov. Flor. Hell. l. c. In arvis oropedii *Omala* (H.). Maio. Ab affini *S. Beheni* L. multis notis distincta, imprimis pedunculis longioribus gracilioribus et florum alarium cernuis, calicis ovoidei non umbilicati dentibus brevioribus, petalis majoribus intense roseis, tuberculis seminum crassioribus.

S. Cretica L. In arvis oropedii *Omala* (H.). Maio.

S. Græca Boiss. et Sprun. In vinetis ad *Hagios Theodoros* prope *Argostoli* (H., U., Schm., Schr.). Maio. Variat petalis albis et carneis.

S. Gallica L. In arvis oropedii *Omala* et prope *Pessada* (Schm., H.). Maio.

S. nocturna L. In aridis pr. *Argostoli* (H.). Maio.

S. bipartita Desf. var. *canescens* Heldr. In collibus et ad vias pr. *Argostoli* freq. (Schm., H., Sprz.). Aprili et Maio.

S. sedoides Jacq. Prope *Argostoli* (Schr.); ad litora maris pr. *Poros* rarissima (H.). Maio-Aug.

S. inflata Sm. In arvis haud rara; pr. *Argostoli* (U., H.). Maio.

S. Italica L. In rupinis pr. *Argostoli* (Schm.); pr. cœnobium in monte *Atro* (H.). Aprili.

S. Cephalenia Heldr. n. sp. In rupibus excelsis faucium *Steno* supra *Poros* d. 8 Aug. 1872 fructiferum et adhuc florentem legi.

S. basi pube brevissima asperula canescenti dense obsita, caudice lignoso crasso multicauli, caulibus adscendentibus virgatis inferne geniculato-nodosi superne viscidis laxè racemosis, foliis inferioribus congestis lineari-lanceolatis spathulatis superioribus valde diminutis linearibus, inflorescentia racemoso-paniculata, ramulis patentibus 3-8-floris, floribus in apice ramulorum breviter pedicellatis secundis, pedicellis fructiferis elongatis cernuis, calice glanduloso-pubescenti cylindrico-clavato, dentibus triangularibus membranaceo-marginatis acutis, petalorum lamina livida in lacinias lineares bipartita, corona nulla, capsula ovata carpophoro æquilonga, seminibus tenuissime rugulosis dorso canaliculatis.

E serie « *Perennium* §. *Brachypodarum* » (Boiss. Flor. Or.) differt ab affini *S. congesta* Sibth. pubescentia asperula, inflorescentia laxiori, foliis longioribus acutis, calyce cylindrico longius clavato dentibus acutis, carpophoro capsulam æquante. Affinis quoque *S. Thessalonice* Boiss et Heldr., sed hæc a nostra cymis paucifloris, foliis latioribus, petalis coronatis, capsula oblonga carpophoro quadruplo longiori facile distinguenda.

Githago segetum Desf. In arvis oropedii *Omalà* (H.). Maio.

Alsineaceæ.

Sagina procumbens L. In herbosis pr. *Hagios Gerasimos* in oropedio *Omalà* (H.). Maio.

Alsine tenuifolia L. var. *mucronata* Boiss. (A. mucronata Sibth.). In reg. super. m. Aeni (H.). Maio. — Huc et A. tenuifolia var. brachypetala Fenzl sec. Unger.

Arenaria serpyllifolia L. In m. Aeno (U.); prope *Argostoli* et in oropedio *Omalà* pr. *Francata* (H.). Maio.

A. *Guicciardii* Heldr. in Boiss. In regione superiore m. Aeni, rarissima (H.). Maio.

Stellaria media L. In oropedio *Omalà* (H.). Maio.

Mænychia Mantica (L.). Frequens in oropedio *Omalà* (H.). Maio.

Cerastium Illyricum Ard. (C. pilosum Sibth.). Prope *Pessada* (H.), in oropedio *Omalà* (Spreiz.). Aprili. — *Var. β. macropetalum* Boiss. Frequens in pascuis siccis reg. super. m. Aeni et pr. *Hagios Gerasimos* (H.). Maio.

C. viscosum L. In oropedio *Omalà* (H.). Maio.

C. brachypetalum Desp. β. *luridum* Boiss. Prope *Argostoli* et in reg. super. m. Aeni (H.). Maio.

C. semidecandrum L. In *Cephalenia* sec. *Unger*.

C. vulgatum L. E *Cephalenia* indicatur a cl. *Unger* quæ indicatio mihi videtur valde dubia.

C. tomentosum L. In summo m. Aeno cæspites copiosas efformans (H.). Maio.

Spergularia rubra Wahl. In aridis pr. *Drapano* (*Argostoli*) (H.). Maio.

S. media Wahl. In litore salso ad *Kutaro* pr. *Drapano* (H.). Jul.

Paronychiaceæ.

Polycarpon tetraphyllum L. In cultis pr. *Pessada* et in oropedio *Omalà* prope cænobium *Hagios Gerasimos* (H.). Mai.-Jul.

Portulacaceæ.

Portulaca oleracea L. *Ἀνθράκλα*. Sylvestris pr. *Drapano* et prope *Pessada* (H.). Jul. Aug. Colitur in usum culinarium (Dallap.).

Tamaricaceæ.

Tamarix Hampeana Boiss. et Heldr. Ad *Hagios Theodoros* prope *Argostoli* (Spreitz.) Aprili.

T. parviflora DC. *Ἀρωπίζι*. Ad litora maris pr. *Same* et pr. *Lixuri* (H.). Huc probabiliter T. Gallica Dallap. (Prosp. p. 44) pr. *Lixuri*.

Hypericaceæ.

Triadenia Webbii Spach. (Hypericum Aegyptiacum Heldr. Herb. Græc. normale N° 809.) In rupinis maritimis prope *Ar-*

Argostoli ad *Hagios Theodoros* (H., Schm., Spreitz.). Aprili et Maio.

Hypericum empetrifolium W. Pr. *Argostoli* et in rupes-tribus pr. *Charakas* et in fruticetis prope *Athera* (H.). Maio.

H. crispum L. In locis siccis pr. *Pessada* et *Piscardo* (H.). Jul. Aug.

H. perforatum L. *Χαλωνοχώροταρον* (Dallap.).

H. perfoliatum L. (*H. ciliatum* Lam.) *Σταφίδα* (adhibetur in dysenteriam; herba junior comeditur). Pr. *Argostoli* (Schm.); pr. *Pessada*, *Kontogiannata*, ad viam *Sames* pr. *Karavias* et pr. *Kastro* (H.). Aprili. — β. *Heldreichii* Boiss. Fl. Or. I, p. 812. Pr. *Argostoli* ad *Hagios Theodoros* et pr. *Lixuri* (H.). Maio.

Malvaceæ.

Malva sylvestris L. *Μολόχα*. Freq. in herbosis pr. *Argostoli* (H., Spreiz.), pr. *Same*, etc. (H.). Aprili et Maio.

M. Nicæensis All. Prope *Argostoli* (H., Schm.). Maio.

M. rotundifolia L. *Μολόχα*. Abundanter (Dallap.), pr. *Argostoli* (Schm.). Aprili.

Lavatera Cretica L. Loco specialiter non indicato (U.), in cultis pr. *Pessada* (H.). Jul.

L. punctata All. Rarius pr. *Spilcea*, *Pessada*, *Same* et *Lixuri* (H.). Jul.

Althæa officinalis L. In variis locis sec. Dallap.

Alcea rosea L. *Αενδρομολόχα*. Indicatur a Dallap. sed probabiliter culta tantum.

Hibiscus trionum L. In cultis pr. *Pessada*, an revera spontanea (H.). Jul.

H. esculentus L. *Μπάμμα*. Rarius culta in usum culinarium; pr. *Pessada* (H.). Jul.

Gossypium herbaceum L. *Βαμπαζιά*. Colitur haud infrequens pr. *Lixuri*, *Same*, *Pessada*, etc. Jul.-Sept.

Linaceæ.

Linum corymbulosum Rehb. Pr. *Argostoli* (Schr.), pr. *Pessada* (H.). Maio.

L. strictum L. In collibus argillosis pr. *Lixuri* (H.), pr. *Argostoli* (Schr.). Maio.

L. pubescens Russ. Freq. in collibus siccis pr. *Argostoli* (H., Spreiz.). Aprili et Maio.

L. usitatissimum L. *Ανώγει*. Freq. cultum (olim copiosius). Seritur Septembr. colligitur Aprili et Maio. Vidi cult. pr. *Pessada*, *Hag. Thomas*, *Heracleon*, etc. (H.).

L. angustifolium Huds. In herbosis freq. (Schm.), pr. *Pessada* (H.). Aprili.

Geraniaceæ.

Geranium rotundifolium L. In herbosis pr. *Argostoli* (H.), in oropedio *Omalà* (Sprz.).

G. molle L. In montosis m. Aeni (U.), *Omalà* (H.). Maio. In reg. superiore m. Aeni legi formam pygmæam (H.). — *β. macropetalum* Boiss. Indicatur a cl. *Spreitzenhofer*.

G. Robertianum L. Frequens ad muros et in umbrosis (Dallap., H.), pr. *Spartià* (H.).

G. lucidum L. Ad rupes muscosas Aeni (U.), in oropedio *Omalà* pr. *Francata* et in sylvis abietinis Aeni, alt. 2000'-4500' freq. (H., Schr.). Maio.

Erodium cicutarium (L.) In siccis pr. *Argostoli* (H.) et in reg. abietina Aeni (Spreitz.).

E. malachoides (L.) In herbosis pr. *Argostoli* (Schm.), in oropedio *Omalà* (H.). Aprili et Maio.

Zygophyllaceæ.

Tribulus terrestris L. *Τρίβολι* (Dallap.). Ad vias et in cultis frequens, *Argostoli*, *Omalà*, etc. (H.). Aug.

Rutaceæ.

Ruta Chalepensis L. *β. bracteosa* Boiss. (R. graveolens Dallap.). *Πήγανος*. In collibus argillosis circa *Lixuri*, *Kontogianata*, *Travlata* (Palikes) et pr. *Petrikata* (*Thynià*) (H.). Maio.

Aurantiaceæ.

Citrus Aurantium Risso. *Πορτοκαλλιά*.

C. vulgaris Riss. *Νεραντζιά*.

C. Medica Riss. *Κιτριά*.

C. Limonum Riss. *Λιμονιά*.

Species hæ cum varietatibus nonnullis frequens coluntur in hortis regionis maritimæ pr. *Argostoli*, *Same*, *Lixuri* et alibi.

Ampeliaceæ.

Vitis vinifera L. *Άμπελος* et fructus *σταφύλι*. Ad vinum parandum coluntur præcipue varietates duæ sequentes : *Μαυροδάφνη* acinis globosis cæruleo-atris et *Ρομπόλλα* acinis ovatis viridi-flavescentibus. Maxime colitur et var. *αργυρενα*, *Σταφίδα*, cujus fructus (uva Corinthiaca, *Passolina*) prima est insulæ exportationis merx divitiarumque fons. Aliæ *Vitis* viniferæ varietates hinc inde cultæ sunt : 1^o acinis viridi-flavescentibus : *Άμυγδάλι*, *Βοστιλίδι*, *Συλιπνίκτης*, *Μοσχάτο*, *Μακροστάφυλο*; 2^o acinis rubris : *Κοτζιλίνα*; 3^o acinis cæruleo-atris : *Άραζλινό* et *Κορφιώτιζο*.

2. CALICIFLORÆ

Terebinthaceæ.

Rhus Cotinus L. *Χρυσόξυλον*. In m. *Rhodi* ad regionem abietinam usque, pr. *Gruspa*, *Same*, *Dilinata* (H.).

Pistacia vera L. *Πισταχιά*. Cult. in hortis (Dallap.).

P. Terebinthus L. *Κοζζορέδιθος*. Frequens in rupinis, *Rassata*, *Pessada*, *Eliòs*, *Koroni*, in m. *Atro* (arborea!), in m. *Gerolaki* (*Pyrgi*), in silvaticis ad *Athera*, etc. (H.).

P. Lentiscus L. *Σχῖνος*. Frequens in maritimis : *Pessada*, *Poros*, *Argostoli*, *Piscardo*, in silva *Athera*, pr. *Taphiüs* (*Palikes*) (arbores excelsæ) (H.). Maio.

Rhamnaceæ.

Zizyphus vulgaris Lam. *Τζιτζυφιά*. Colitur (Dallap.); cult. pr. *Mavrata* (H.).

Rhamnus Alaternus L. In præruptis montium (Ung.).

Rh. Græca Boiss et Reut. In rupinis, *Drapano* pr. *Argostoli*, *Lixuri*, *Piscardo* (H.). Maio.

Rh. cathartica L. *Σπιράχι*. (Dallap. Prosp. p. 28). Anne potius *Rh. Græca*?

Leguminosæ.

Anagyris foetida L. Ἀ-ζύρερο. Ad sepes et in collibus saxosis; *Argostoli*, *Koroni* (tis *Syrias* to *Kastro*), *Lixuri* (H.). Maio.

Calycotome villosa (Vahl.). In collibus saxosis ubique frequens : *Argostoli*, *Koroni*, *Pessada*, *Poros*, etc. (H.). Maio.

Spartium junceum L. Σπόρο. In dumosis et ad sepes frequens : *Argostoli*, *Pessada*, *Pylaros*, *Lixuri* (H.). Maio.

Ononis antiquorum L. (O. spinosa Dallap. Prosp., O. diacantha Sieb., M. et R. Flor. Zante). Abundat sec. Dallap., in Cephalon. (H., Boiss., sec. M. et R. Flor. Zante); in arvis post messem : *Argostoli*, *Pessada* (H.). Maio. — Var. β . *lanata* Heldr. tota patule villosolana canescens. Varietas insignis in siccis pr. *Pessada* (*Hay. Thomas*) crescit (H.). Jul.

O. reclinata L. β . *minor* Mor., Boiss. (O. Cherleri Desf.). In siccis *Argostoli* (Spreiz.), *Lixuri* (H.). Aprili et Maio.

O. pubescens L. In oliveto pr. Drapano (H.). Aug. (fruct.).

Trigonella fenum Græcum L. sec. Dallap. Prosp. p. 101.

T. aurantiaca Boiss. In Cephalonia sec. Unger.

T. corniculata L. In Cephal. (Ung.), in oropedio *Omalà* prope cœnobium *Hay. Gerasimos*, alt. 2000' (H.). Maio.

T. Balansæ Boiss. In herbosis : *Argostoli*, ad mare et pr. *Pessada* (Schm., H., Spreiz.). Aprili et Maio.

Medicago orbicularis All. In aridis, *Argostoli* (H.). Maio. var. β . *marginata* Guss. Pr. *Kipuria* (Palike) (H.).

M. tuberculata W. β . *spinulosa* Tod. In m. Aeno (D^r Timpaldo sec. Mazziari in hb. Heldr.) in oropedio *Omalà* (H.). Maio.

M. Murex W. (M. tribuloides Desv. forma spinis adpressis sec. Boiss. Fl. Or.). Pr. *Kipuria* (Palike) (H.). Sept. (fruct.). Forma leguminibus minusculis spinis basi crassissime breviter conicis subpatentibus.

M. coronata Lam. In siccis : *Argostoli* (H.). Maio.

M. denticulata W. In collibus maritimis : *Lixuri* (H.). Maio.

M. lappacea Lam. (M. denticulata β . lappacea Boiss. Fl. Or.). In aridis pr. *Francata*, *Kipuria* et *Lixuri* (H., Spreiz.). Aprili et Maio.

M. minima Lam. β . *mollissima* Heldr. (*M. mollissima* Spreng., *M. Graeca* Hornem.). In collibus (Mazz. in hb. Heldr.), in m. Aeni regione superiore (H.). Maio.

M. Echinus W. Pr. *Lixuri*, ad mare, rara (H.). Sept. (fruct.).

M. ciliaris W. In herbosis pr. *Lixuri* (H.). Maio; in calcareis *Agorà* extra Cranem (Mazz. in hb. Heldr.).

M. lupulina L. In oropedio m. Aeni, ad fines inferiores regionis abietinae (H., Spreiz.). Maio.

Melilotus sulcata Desf. In collibus argillosis: *Lixuri* (H.). Maio.

M. infesta Guss. In arvis oropedii *Omalà* (H.), in vinetis pr. *Lixuri* (Spreiz.). Aprili et Maio.

M. Messanensis (L.). In subhumidis: *Kutaro* pr. *Argostoli* (Schm.). Aprili.

M. parviflora Desf. In cultis: *Argostoli* (H., Spreiz.). Aprili et Maio.

Trifolium stellatum L. In campis (U.), pr. *Argostoli* (H., Schm., Spreiz.). Aprili et Maio.

T. xanthinum Freyn. (Botan. Centralblatt N° 9/10, 1880). A mari (*Drapano*) usque ad reg. super. Aeni (H.). Maio. Species insignis in Aetolia, Epiro et Ithaca haud rara. *T. incarnatum* β . Molinieri Heldr. pl. exs. et probabiliter *Unger*, quoad plantam Cephall.

T. angustifolium L. In siccis freq. *Argostoli* (H., Spreiz.), *Pessada* (H.). Aprili et Maio.

T. intermedium Guss. In collibus siccis: *Lixuri* (H.). Maio.

T. formosum D'Urr. In montibus pr. *Samo* (U.).

T. scabrum L. In locis aridis: *Pessada*, *Omalà* (H.): *Argostoli* pr. *Hagios Theodoros* (Spreiz.). Aprili et Maio.

T. Dalmaticum Vis. In locis aridis: *Argostoli* ad *Drapano* (H.), *Hagios Theodoros* (Spreiz.), *Lixuri* (H., Schr.). Aprili et Maio.

T. fragiferum L. In subhumidis maritimis: *Same*, *Argostoli* ad *Drapano* et *Spilvea* (H.). Jul.-Sept.

T. physodes Ster. In montosis supra *Argostoli* (Schm.). Aprili.

T. resupinatum L. In herbosis: *Argostoli* (H., Schm., Spreiz.), in vinetis pr. *Lixuri* (Spreiz.). Aprili et Maio.

T. tomentosum L. In collibus siccis : *Argostoli* (H., Schr.). Maio.

T. multistriatum Boiss. In vinetis ad *Kompanistra* supra *Same* (H.). Aug. (deflorat.).

T. suffocatum L. In herbosis oropedii *Omalà* ad cœnobium *Hagios Gerasimos*, alt. 2000' (H., Spreiz.), in m. Aeno (Mazz. in herb. H.). Maio.

T. nigrescens Viv. In herbosis prope *Argostoli* (U., H., Schm., Spreiz.). Aprili et Maio.

T. agrarium L., Boiss. In herbidis maritimis : *Argostoli* (H., Spreiz.), *Lixuri* (H.). Aprili et Maio.

Anthyllis Hermanniae L. In saxosis : *Argostoli*, *Pessada* (H.). Maio.

A. Vulneraria L. var. *rubriflora* Boiss. Loco non indicato (U.), in m. Aeno, alt. 3500' (Spreiz.), pr. *Lixuri* (H.). Aprili et Maio.

Physanthyllis tetraphylla (L.). In collibus siccis : *Argostoli* (H., Schm.), *Skala* (H.), loco non notato (U.). Aprili et Maio.

Hymenocarpus circeinnatus (L.). In locis herbidis frequens (U.), *Argostoli* (Schm., Spreiz.), *Lixuri* (Spreiz.), *Kipuria* et in oropedio *Omalà* (H.). Aprili et Maio.

Doryenium hirsutum (L.). In collibus pr. *Argostoli* (H., Schm.). Aprili et Maio.

D. rectum (L.). In humidis ad ripas, *Myli* pr. *Same*, *Hagios Thomas* pr. *Pessada* (H.). Jul.-Aug.

D. intermedium Ledeb. In collibus saxosis : *Pessada*, *Hag. Elias* pr. *Spartià*, *Hagios Soter* (*Thynià*) (H.). Jul. (fruct.).

Lotus Creticus L. β . *cytisoides* Boiss. In rupinis maritimis pr. *Argostoli* frequens (H., Schm., Spreiz.). Aprili et Maio.

L. peregrinus L. Loco non notato (U.).

L. ornithopodioides L. In herbidis pr. *Argostoli* (H.). Maio.

L. edulis L. *Γαργαζουλιά* et fructus *Γαργαζούλια*, qui comeduntur. In herbidis : *Pessada*, etc. (H.). Maio.

Tetragonolobus purpureus Mill. Pr. *Argostoli* (Schm., Spreiz.). Aprili.

Securigera Coronilla D C. In herbosis pr. *Argostoli* (H., Schm., Spreiz.). Aprili et Maio.

Scorpiurus subvillosa L. In locis aridis : *Lixuri*, *Kipuria* (H.), *Argostoli* (Spreiz.). Aprili et Maio.

Coronilla emeroides Boiss et Sprun. In rupinis : *Kalligata*, *Marcopulo*, *Athera* (H.). Maio.

C. scorpioides (L.). Loco non notato (U.), in cultis pr. *Francata* (H.). Maio.

Hippocrepis biflora Spreng. In aridis ad mare : *Hagios Theodoros* pr. *Argostoli* (Spreiz.). Aprili.

Psoralea bituminosa L. *Χαμοαΐδι* (sec. Dallap. Prosp., p. 100). In collibus saxosis haud rara : *Argostoli*, *Pessada*, etc. (H., Schm.). Aprili et Julio.

Colutea arborescens L. In insulæ variis locis (Dallaporta, Prosp., p. 99).

Glycyrrhiza glabra L. *Ἀγλυζόρριζο* (sec. Dallaporta l. c., p. 100). Freq. in demissis mari finitimis, præsertim prope *Lixuri* (Dallap., H.), pr. *Piskardo* (H.). Maio.

Astragalus hamosus L. Loco non designato (Schrad.). Maio.

A. aristatus L'Her. β. *Cephalonicus* Boiss. (forma minor). In m. Aeni reg. super. alt. 3000'-5500' (Schimp., H., Spreiz.).

A. angustifolius Lam. « In monte Nero Cephaloniæ 4500'. » (Wiest. sec. Boiss. Fl. Or. II, p. 489). — *A. Tragacantha* a cl. Unger et « monte Nero » indicatus forte ad hanc v. ad speciem præcedentem spectat.

Hedysarum capitatum Desf. In montosis (U.), in collibus argillosis pr. *Lixuri* (H.). Maio.

Cicer arietinum L. *Πεβίδια*. Colitur (Dallap.).

Vicia hybrida L. In herbidis (U.), prope *Argostoli* (H., Schm.). Aprili et Maio.

V. sativa L. Colitur (Dallap.).

V. angustifolia Roth. β. *cordata* Boiss. In herbidis (Schm.). Aprili.

V. lathyroides L. In regione abietina m. Aeni, 3500'-5500' (H., Spreiz., Schr.). Aprili et Maio.

V. peregrina L. In herbosis : *Drapano* pr. *Argostoli* (H.). Maio.

V. Faba L. *Κορυά*. Colitur (Dallap.).

V. Cracca L. Indicatur a cl. Unger. Forte ad speciem sequentem spectat.

V. varia Host. In arvis (Schm.). Aprili.

V. microphylla D'Urv. In herbidis pr. *Argostoli* (H.).

Maio. Ad hanc probabiliter spectat *V. pseudocracca* a cl. Unger e Cephalonia indicata.

V. monanthos (L.). In Cephalonia (U.).

V. gracilis (Loisl.). In locis humidis maritimis pr. *Lixuri* (H.). Maio.

Ervum Lens L. Colitur (Dallap.).

Lathyrus Clymenum L. Indicatur a cl. Unger.

L. Aphaca L. In Cephalonia (U.).

L. Cicera L. In Ceph. (U.), in regione superiore Aeni (H.). Maio.

L. sativus L. Colitur (Dallap.).

L. sphæricus Retz. In arvis : *Argostoli*, *Omalà* (Schm., H.). Aprili et Maio.

Pisum sativum L. *Μπιζι*. Colitur (Dallap.).

Phaseolus vulgaris L. *Φασόλια*. Colitur cum *var. nana* aliisque varietatibus (Dallap.).

Ceratonia Siliqua L. *Κουτζουπιδ* (sec. Dallap.) et *Καρουπιδ*. Arbor copiose crescit spontanea præcipue in reg. infer. Aeni meridiem et orientem versus usque ad mare : *Ikosimia*, *Eliòs*, *Koroni*, *Herakleon*, *Poros* et in *Atro*, nec non pr. *Argostoli* et *Pessada* (H.).

Cercis Siliquastrum L. *Άγρια Κουτζουπιδ*, Rarius in rupinis pr. *Asso*, ad *Charakas* et in *Castro Hag. Georgios* (H.).

Wachelia Farnesiana (L.). *Γαντζία*. Freq. culta in hortis : *Argostoli*, *Pessada*, *Lixuri* (H.).

Rosaceæ.

Persica vulgaris Mill. *Ψοδάρινιδ*. Colitur (Dallap.).

Amygdalus communis L. *a. amara*. Varietas silvestris, valde spinosa et plerumque fruticosa. *Πικραμυγδαλιδ* vel *Άγριαμυγδαλιδ*. Obvia in reg. infer. et montana omnis insulæ, ad sepes secus vias ; *Pessada*, *Omalà*, *Pylaros*, etc., etc. (H.). — *β. dulcis*. *Άμυγδαλιδ*. Frequens culta.

Cerasus avium Mill. *Κερασιδ*. Colitur (Dallap.), pr. *Stenò* (*Ikosimia*), *Same* (H.).

C. Caproniana D C. *Βουσενιδ*. Colitur (Dallap.).

Prunus domestica L. *Μπουρνελιδ*. Colitur (Dallap.).

Armeniaca vulgaris Lam. *Βεριχουνιδ*. Colitur (Dallap.).

Pirus communis L. *Άπιδιδ*. Colitur (Dallap.). Coluntur va-

rietates variæ et inter eas var. fructibus permagnis (*Kolozv-θάπιδα*) (H.).

P. amygdaliformis Vill. *Ἀγριαπιδιά*. In montosis inter *Pylaros* et *Phalaris*; pr. *Poros* (arbores præceræ) et in eparchia *Thyniá* (H.). Aug. (fruct.). — Huc probabiliter spectat *P. Syriaca* (Boiss.?) a cl. Unger e « Monte nigro » indicata.

Malus communis Desf. *Μηλιά*. Colitur (Dallap.).

Cydonia vulgaris Pers. *Κυδωνιά*. Freq. culta in hortis et hinc inde subspontanea, e. g. ad vias in eparchia *Kateliós* (H.).

Crataegus sp. *Μουρζιά*. In jugo m. Aeni (Ung. sub *C. Oxyacantha*); frequens in regione media et abietina m. Aeni, ab oropedio *Omalà* (pr. *Balsamata*) ad summum cacumen usque, nec non in nemorosis ad *Athera* (H.). Frutex 6-10-pedalis et in summis Aeni nanus. Aug. (fruct.).

Rosa sempervirens L. Ad sepes : *Argostoli*, *Akoli* supra *Same*, *Illari* pr. *Lixuri* (H.). Jul.

R. Gallica L. *Τριανταφυλλιά*. Freq. culta.

Rubus tomentosus Borkh. In saxosis : *Bobikiès*, *Drakiès*, *Athera* (H.). Foliolis ternatis utrinque cano-tomentosis lanceolatis.

R. discolor W. et Nees. *Βάτος* (Dallap. sub *R. cæsius*). Frequens ad vias pr. *Drapano* alibique (H.). Aug. (flor. et fruct.).

Fragaria vesca L. *Φράουλα*. Culta pr. *Lixuri* (Dallap.).

Potentilla reptans L. *Πεντάφυλλον*. Freq. (Dallap.), pr. *Argostoli* (Schm.). Aprili.

Agrimonia Eupatoria L. Freq. (Dallap., Flore de Zante).

Alchemilla arvensis (L.). In oropedio *Omalà* ad cœnobium *Hagios Gerasimos*, alt. 2000' (H.). Maio.

Poterium muricatum Spach. In aridis : *Argostoli*, *Omalà*, m. *Atro* (H.). Maio.

P. spinosum L. *Ἀχυροσουβιά*. Abundat in collibus saxosis et rupinis reg. inferioris et montanæ : *Argostoli*, *Hagia Euthymia*, *Omalà*, etc. Maio.

Myrtaceæ.

Myrtus communis L. *Μυρσίνη*. Frequens in locis humidis : *Pyrgi*; *Same*, ad molas copiose; *Pessada*; *Poros*; *Heracleon*, *Koroni*; *Skala*; *Eliòs*; *Lixuri* (H.). Mai.-Aug.

Granataceæ.

Punica Granatum L. *Πορφύρα*. (Dallap.). Freq. culta.

Lythraceæ.

Lythrum Salicaria L. In paludosis inter arundineta ad *Hag. Joannes* ad *Kutavo* (H.). Sept.

L. Græfferi Ten. In locis uliginosis : ad *Kutavo*, *Spilceà*, *Akoli*, etc. (H.). Mai.-Sept.

L. hyssopifolium L. In subhumidis maritimis pr. *Drapano* raro (H.). Jul.

Oenotheraceæ.

Epilobium lanceolatum Seb. et Maur. In umbrosis raro : in fauce *Stenò* (*Ikosimia*) (H.). Aug.

Haloragaceæ.

Myriophyllum spicatum L. In fonte *Kephalovrysi* ad molas pr. *Same* rar. (H.).

Cucurbitaceæ.

Ecbalium Elaterium (L.). *Πριχαρζουριά* (Dallaporta). In rudibus ad mare pr. *Argostoli*, freq. in pagis : *Kontogia-nata*, *Lixuri*, *Pylaros*, *Asso*, etc. (H.). Jul.-Aug.

Bryonia alba L. In variis locis : *Άγριοκολοκυθιά* vernac. (Dallap. Prosp. p. 128). Probabiliter *B. dioica* Jacq. aut *B. Cretica* L.

Frequens coluntur in olitoriis Cucurbitacearum species sequentes : *Cucumis Melo* L. *Πεπονιά*; *C. sativus* L. *Άγκουριά*; *C. Dudaim* L. *Μοσχοπεπονιά*; *Citrullus vulgaris* Schrad. *Χημουνιά* et *Cucurbita Pepo* L. *Κολοκυθιά* (fructus immaturi : *Μορόπουλα* vel *Μοροπουλάκια*). (Cfr. Dallap. Prosp. p. 127.).

Nopaliaceæ.

Opuntia vulgaris Mill. et *O. Ficus Indica*. Cultæ et spontaneæ (Cactus *Opuntia* L. *Μπαρμπαροσυριά* (Dallap. Prosp. p. 63); *Skala*, *Athera* (H.).

Crassulaceæ.

Umbilicus chloranthus Heldr. et Sart. in Boiss. Flor. Or. vol. II, p. 768, et in Heldr. Sertulum plant. nov. Flor. Hell. (Atti del Congresso bot. internaz. di Firenze 1874, p. 236). *U. parviflorus* D'Urv. et auct. plur. non Sibth. In umbrosis ad muros : pr. *Pessada*, *Kundurata* et *Spartia* (H.); pr. *Aphrato* (Schm.); *Omalà*, pr. *Balsamata* (Spreiz.). Aprili. (Cfr. descript. locuplet. in Heldr. Sert. l. c.).

U. pendulinus DC. Ad muros pr. *Pessada* et in oropedio *Omalà* (H.). Mai.-Jul.

U. horizontalis (Guss.). *Τζαμπούνα*. In saxosis et ad muros freq. : *Argostoli*, *Pessada*, etc. (H., Schm.). Aprili et Maio.

Sedum Telephium L. In variis locis (Dallap. Prosp., p. 59).

S. acre L. In variis locis (Dallap. l. c.).

S. altissimum Poir. In muris : *Livathò* (pr. *Pessada* et *Lakythra*) (H.).

S. stellatum L. Frequens in muris et in saxosis : *Argostoli*, *Pessada*, etc. (H.). Maio.

S. litorcum Guss. In locis apricis : *Argostoli* ad *Hagios Theodoros* (H., Schm.), *Lixuri* (Spreiz.). Aprili et Maio.

S. caespitosum (Cav.). In Cephallonia (Ung.).

Sempervivum tectorum L. *Αμύραντος*. In muris et tectis frequens (Dallap. Prosp., p. 63).

Saxifragaceæ.

Saxifraga tridactylites L. In umbrosis, ad muros, etc., pr. *Kastro*, in m. *Atro* ad *cœnobium* et in oropedio *Omalà* (H.). Maio.

S. controversa Sternb. β. *Parnassica* Boiss. *Fl. Or.* *S. Parnassica* Boiss. et Heldr. In m. *Aeno* (Ung.).

S. chrysosplenifolia Boiss. In regione superiore m. *Aeni*, præsertim in silva abietina haud rara (H.). Maio.

Umbelliferæ.

Eryngium campestre L. (*E. virens* Lk.). Freq. in vinetis et arvis post messem : *Pyrghi*, *Omalà*, *Koroni*, *Lixuri*, alibique (H.). Mai.-Aug.

E. Creticum L. In campis incultis circa stagnum *Akoli* (*Pyrgi*), in halipedo *Same*, circa paludem *Livadi* (*Thynià*), pr. *Kateliòs*, *Poros*, *Argostoli*, etc. (H.). Jul.-Sept.

E. maritimum L. Ad litora maris : infra *Skala*, pr. *Steno* et *Aphrata*, pr. *Lixuri* (H.). Jul.-Aug.

Lagocchia cuminoides L. In collibus siccis : *Poros*, *Steno*, *Piscardo*, *Lixuri* (H.); *Argostoli* (Schr.). Maio.

Bupleurum protractum Lk. et Hoffm. In cultis : *Lasi* pr. *Argostoli* (H.). Maio.

B. glumaceum Sibth. In Cephalonia (Rostan in herb. DC. sec. Flore de Zante et Boiss. Fl. Or.).

B. semidiaphanum Boiss. In eparchia *Heracleon* et prope *Piscardo* (H.).

B. Odontites L. Pr. *Argostoli* (Schr.). Maio.

Apium graveolens L. Σέλιον. Freq. colitur, spontaneum non observavi (H.).

Petroselinum sativum Hoffm. Περίσμουλος. Cult. (Dallap.).

Pimpinella Tragium Vill. In Cephalonia (Schimp. sec. Boiss. Fl. Or. II, p. 871).

Scaligeria Cretica (D'Urv.). In saxosis : *Argostoli*, *Hagios Soter* (*Thynià*) alibique (H.); pr. *Same* (Schr.). Maio.

Carum multiflorum (Sibth.). In reg. superiore m. Aeni, et ad rupes *Kastro* (H.). Maio.

C. ferulaefolium (Desf.). In arvis : *Argostoli*, *Piscardo* et in oropedio *Omalà* (H.). Maio et Julio.

Berula angustifolia (L.). Ad fontes pr. *Argostoli* (U.). Maio.

Ptychotis ammoides (Gou.). In siccis : *Koroni* (ad *Tis Syriàs tò Kastron*), *Spilavà* pr. *Argostoli* rar. (H.). Aug.

Ammi majus L. In locis cultis, olivetis, etc. freq. : *Argostoli*, *Piscardo*, *Livadi* (*Thynià*) alibique (H.). Jul.-Aug.

Freyera macrocarpa Boiss. et Sprun. In Cephaloniæ loco speciali non notato legit Jul. Schmidt. Aprili.

Anthriscus Cerefolium (L.). Scandix Cerefolium L. Dalla-porta Prosp., p. 40. Σχαντζίζι. Freq. in vinetis et arvis; comeditur (Dallap. l. c.). Forte ad speciem sequentem spectat.

Scandix pecten Veneris L. In arvis oropedii *Omalà* (H. et Spreiz.). Aprili et Maio.

S. australis L. « In sylva abietina » (Schr.). Maio.

Coriandrum sativum L. Κουλιάντρος. Spont. et cultum (sec. Dallap. Prosp., p. 39).

Bifora testiculata (Spreng.). In arvis oropedii *Omalà* (H.). Maio.

Conium maculatum L. In ruderibus pr. *Kukumilata* (H.) Maio (et sec. Dallap. l. c., p. 38).

Smyrniun rotundifolium Mill. In Cephallonia legit cl. J. Schmidt. Aprili.

S. Olusatrum L. *Ἀγριοσμερνο*. In olivetis pr. *Pessada* (H.). Herba comeditur.

Hippomarathrum cristatum DC. In locis cultis ad *Hagios Theodoros* pr. *Argostoli* (H.). Maio (vix florent.). Sept. (fruct. matur.).

Colladonia heptaptera Boiss. In collibus apricis, vinetis, etc. In m. *Atro* ad cœnobium, pr. *Lixuri* in collibus argillosis et pr. cœnobium *Kipuria* (H.). Mai.-Aug.

Ænanthe incrassans Bory et Chaub. In herbidis maritimis pr. *Lixuri* (Schm.). Aprili.

Cnidium apioides L. In m. *Rhudi* infra regionem abietinam (H.). Aug. (fruct.).

Fœniculum officinale L. *Μάραθος* et *Φινόξιο* (sec. Dallap. l. c., p. 41). In vinetis pr. *Argostoli* (H.). Jul.-Sept.

Crithmum maritimum L. *Κρίταμον*. In rupinis maritimis pr. *Argostoli* (l. d. *Lasi*), pr. *Steno* (*Ikosimia*), *Poros*, etc. (H.). Herba comeditur in aceto condita. Aug.

Ferulago nodosa (L.). In saxosis submontosis pr. *Kùlumo*, *Pylaros*, et pr. *Asso* (H.). Aug. (fruct.).

Peucedanum officinale L. In variis insulæ locis (Dallap. l. c., p. 38). Indicatio dubia (H.).

Anethum graveolens L. *Ἀνηθος*. Cult. (Dallap. l. c., p. 41).

Tordylium officinale L. In herbidis pr. *Spilavà* (*Argostoli*) et in oropedio *Omalà* (H.). Maio.

T. Apulum L. Ad vias pr. *Argostoli* (Schm., H., Spreiz.). Maio.

Opoponax Orientale Boiss. In m. *Atro*, ad cœnobium (H.). Aug. (fruct.).

Thapsia Garganica L. In arvis oropedii *Omalà* (H.). Maio.

Orlaya grandiflora (L.). *Κωνυλίδα*. Frequens (Dallap. l. c., p. 37 sub *Caucalide grandiflora*). Anne *Tordylium Apulum* e nomine vernaculo (H.).

O. platycarpus (Koch.). Pr. *Rasata* (Schm.), in Cephallonia (Schr.). Aprili et Maio.

Daucus setulosus Guss. In locis cultis : *Pessada* (H.). Jul.

D. Carota L. Σταφυλιόν. In vinetis et locis cultis frequens : *Spartià*, *Pessada*, etc. (H.). Jul.-Aug. — *Var. culta*. Μπασι-
νάζλα (sec. Dallap. l. c., p. 37). Colitur.

D. maximus Desf. In halipedo prope *Same* (H.). Aug.

Torilis nodosa L. In locis aridis : *Argostoli* (Spreiz.), in
oropedio *Omalà* (H.). Aprili et Maio.

T. infesta L. In vinetis pr. *Skala*, et pr. *Kokolata* inter
Asso et *Piscardo* (H.). Aug.

Araliaceæ.

Hedera Helix L. Κισσός. Ad muros et rupes freq. : *Kastro*,
Francata, *Argostoli*, *Pyrgi*, *Kontogianata*, etc. (H.). Aug.-
Sept.

Caprifoliaceæ.

Sambucus Ebulus L. Άβυζιά. Ad vias pr. *Same* et in rude-
ratis pagi *Hagia-Thecla* (H.), *Livathò* (Dallap.). Aug.

S. nigra L. Κονφοξυλιά. Culta et spontanea in pagis sub-
montanis : *Omalà* (H.). Maio.

Lonicera Caprifolium L. Άγιόφυλλον (Loniceræ species in
genere). *Hagios Elias* infra *Spartià* (H.).

L. Etrusca Savi. Pr. *Athera* (H.).

L. implexa Ait. (?) Pr. *Same* (Schr.). Maio.

Rubiaceæ.

Putoria Calabrica Pers. Rupium decus ubique in insula a
mari usque ad m. Aeni regionem superiorem. Obvia ad rupes
et muros pr. *Pessada*, *Koroni*, *Skala*, *Omalà*, *Charakas*,
Asso, etc. (H.). Mai.-Aug.

Rubia tinctorum L. Ριζάσι. Abunde (Dallap. l. c. p. 17).
Forte potius ad sequentem spectat.

R. peregrina L. In sepibus ; pr. *Skala* (H.).

Sherardia arvensis L. Frequens in cultis : *Argostoli* alibi-
que (H., Schm.). Aprili et Maio.

Crucianella latifolia L. Pr. *Same* (Schr.). Maio.

C. angustifolia L. In olivetis ; pr. *Pessada*, *Lordata* (H.).
Jul.

Asperula longiflora Wk. β . *flaccida* (A. *flaccida* Ten.), caule debili rigidiusculo tamen flaccido diffuso, floribus pallidis sæpe breviter pedicellatis. In saxosis m. *Phalaris* (H.). Aug. — *Var. γ . firmior* Heldr. *Hb.*, caulibus quam in typo elatioribus firmioribus rigidioribusque, foliis angustioribus magis incanis, florum fasciculis sessilibus v. subsessilibus hinc magis condensatis. Ad rupes *Charakas* usque ad *Asso* frequens (H.). Aug.

Galium aureum Vis. β . *oblongifolium* Boiss. Raro in reg. super. m. Aeni usque ad cacumen *Megalo Sorò* (H.). Aug.

G. saccharatum All. In arvis oropedii *Omalà* (H.). Maio.

G. tricorne With. In collibus argillosis pr. *Lixuri* (H.). Maio.

G. Aparine L. In locis cultis : *Pessada*, *Francata* (H.). Maio.

G. intricatum Marg. et Reut. In arundineto pr. *Drapano* et pr. *Hagios-Theodoros* (*Argostoli*); ad muros pr. *Pessada* (H.). Maio. — *Var. β . Zacynthium* (G. *Zacynthium* Marg. et Reut. Flor. de Zante, tab. VI, fig. 1). Habitus omnino typi sed inflorescentia glaberrima et floribus parum majoribus distinctum. Cum typo promiscue crescentem prope *Hagios-Theodoros* reperi (H.). Maio.

G. murale (L.). In aridis, ad muros : *Omalà*, *Pessada* (H.). Maio.

Vaillantia muralis L. In saxosis et ad muros obvia : *Argostoli*, *Pessada*, *Omalà*, etc. (U., H., Spreiz.). Aprili et Maio.

Valerianaceæ.

Valeriana Dioscoridis Sibth. *Βαλεριάνα*. In regione abietina m. Aeni et pr. *Vunatata* (eparchiæ *Erisso*) (H.). Maio.

Centranthus Sibthorpii Heldr. et Sart. *Μοσχολέος*. In maritimis et submontanis : in arundineto pr. *Drepano*, inter vineta et muros pr. *Dilinata* freq., ad rupes *Charakas* et pr. *Asso*, *Palæokastron* prope *Lixuri* et in vinetis *Thynià* (H.). Maio-Aug. (adhuc flor.).

C. Calcitrapa (L.). In montibus Cephaleniæ (U.).

Valerianella truncata (Rehb.) β . *muricata* Boiss. Fl. Or. In arvis oropedii *Omalà* et in reg. super. m. Aeni (H.). Maio.

V. turgida (Stev.). In regione abietina m. Aeni rarissima (Spreiz.). Aprili.

V. discoidea (W.). In arvis oropedii *Omalà* et pr. *Pessada* (H.). Maio.

Dipsaceæ.

Dipsacus sylvestris L. Raro in paludosis halipedi *Livadi* (*Thynià*) ad *Kephalovrysi* (H.). Sept.

Cephalaria ambrosioides (Sibth.). In regione superiore m. Aeni (Letourneux).

Knautia hybrida (All.). In herbosis pr. *Argostoli* (H., Schm., Spreiz.). Aprili et Maio.

Scabiosa maritima L. Ubique frequens in maritimis : *Argostoli*, *Pessada*, *Kateliòs*, *Lixuri*, etc. (H.). Maio-Aug. Lusus foliis omnibus, pilosis capitulis mediocribus, floribus carneis.

S. Dallaportæ Heldr. in Boiss. Fl. Or. III, p. 138. In rupibus maritimis prope *Asso*, *Charakas*, *Thynià* (versus *Livadi*) et *Kipuria* (H.). Aug.-Sept. Species pulchra ex affinitate *S. crenatæ*, sed glabritie, foliis subindivisis et capitulis majoribus sessilibus distincta. Dicavi Dr Nic. Dallaporta medico Cephalonico præclaro qui floram insulæ anno 1821 edidit.

Pteroccephalus Parnassi Spreng. In rupinis reg. superioris m. Aeni usque ad cacumen (H., sed jam a Schimper lectus sec. Boiss. Fl. Or.). Aug.

Compositæ : ASTEROIDEÆ.

Erigeron linifolium W. (*Conyza ambigua* DC.). In rudertis et locis cultis : *Pessada*, *Lordata*, *Kutavo* pr. *Argostoli* (H.). Jul.-Aug.

Bellis perennis L. In humidis pr. *Argostoli* (H.). Maio.

B. sylvestris Cyr. In ins. Cephalonia (Schimp. sec. Boiss. Fl. Or.).

B. annua L. Στερούλι. Indicata a Dallaporta.

(Compositæ) : INULOIDEÆ.

Asteriscus aquaticus (L.). Ad vias prope *Argostoli* (H., Schrad.). Maio.

Pallenis spinosa (L.). In saxosis pr. *Argostoli* (H.). Maio.

Inula crithmoides L. In humidis maritimis : ad *Drapano* pr. *Argostoli* et pr. *Lixuri* (H.). Aug.-Sept.

I. candida (L.). Ad rupes pr. *Asso* et *Charakas* (H.). Aug.

I. viscosa (L.). Ἀψολιθρα. Ubique obvia in locis demissis, campis et olivetis. *Argostoli*, *Pessada*, *Piscardo* (H.). Aug. Utitur herba vulnera sanando.

I. graveolens (L.). Frequens in locis cultis regionis inferioris : *Argostoli*, *Pessada*, etc. (H.). Aug.-Sept.

Pulicaria odora (L.). In olivetis : *Pessada*, *Lixuri* (H.). Maio.

P. dysenterica (L.) β. *microcephala* Boiss. (P. uliginosa Stev.). In locis humidis frequens : *Argostoli*, *Pyrgi* (*Kokkino to mylo*), *Akoli*, *Lixuri*, etc. (H.). Aug.-Sept.

Phagnolon Græcum Boiss. et Heldr. In saxosis : prope *Argostoli* (Schm.), ibid. et pr. *Steno* (*Ikosmia*). (H.). Maio.

Helichrysum Siculum (Spreng.). In rupinis prope cœnobium *Sisia* (*Ikosimia*). (H.). Aug. (deflor.).

H. Orientale Tourn. Ἀμόραντος. Raro in rupe *Πατρό δαλό* prope *Lasi* et prope *Same* (sec. am. Philippides).

Micropus erectus L. In montibus aridis Cephaloniae (sec. cl. Unger).

Erax pygmaea (L.). In locis aridis haud rara : *Argostoli*, *Pessada*, *Piscardo* (H.). Maio.

Filago spathulata Presl. β. *prostrata* Heldr. Hb. Gr. norm. (F. prostrata Parlat.). In siccis oropedii *Omalà* (H.). Maio.

(Compositæ) : AMBROSIEÆ.

Xanthium strumarium L. In rudericibus et locis cultis frequens : *Kutavo*, *Pylaros*, *Steno*, *Lixuri*, etc. (H.). Aug.-Sept.

X. spinosum L. Ad vias et in rudericibus frequens : *Argostoli*, *Piscardo* alibique (H.). Aug.

Ambrosia maritima L. In maritimis : *Drapano* prope *Argostoli* et copiose pr. *Lixuri* (H.). Jul.-Sept.

(Compositæ) : ANTHEMIDEÆ.

Achillea Ligustica All. Σεμιάντο. In oropedio *Omalà* in muris pr. *Balsamata* et in regione abietina m. Aeni loco

Phtères dicto, nec non in m. *Gerolaki* supra *Akoli* (H.), in m. *Rhudi* (sec. cl. Zerbos). Aug. Flores ut anthelminticum vicem « *Seminis sancti* » adhibiti unde nomen vernaculum.

Anthemis peregrina L. In maritimis : *Drapano* prope *Argostoli* (H.). Maio.

A. Chia L. In cultis : *Argostoli*, *Francata* (H., Schm.). Aprili et Maio.

A. Cotula L. In pago *Hagia-Thecla* (H.). Aug.

Matricaria Chamomilla L. *Χαμομήλλι*. In locis cultis et ad vias : *Argostoli* (H.), *Lixuri* (Sprz.). Aprili et Maio.

Chrysanthemum Myconis L. In pratis humidis et in collibus argillosis prope *Lixuri* frequens (H.). Maio. (*Pyrethrum* hybridum var. *discolor* Guss. radio albo basi luteolo.) Ad hanc plantam probabiliter spectat *Chrysanthemum Leucanthemum* Dallap. Prosp. p. 115.

Ch. segetum L. In arvis et vinetis ; *Argostoli* (Schm.), *Omalà* (H.), *Lixuri* (Spreiz.). Aprili et Maio.

Ch. coronarium L. In locis cultis, ruderalis et muris ad pagos ubique frequens : *Argostoli*, *Livathó*, *Kontogianata*, etc. (H.). Maio-Aug.

Pyrethrum Parthenium (L. sub *Matricaria*). In multis insulæ locis (Dallap. Prosp. p. 116). — *P. Tanacetum* DC. (*Tanacetum Balsamita*) a Dallap. l. c. p. 112 quoque indicata freq. colitur in hortis vulgo *Βάλσαμος* dictum.

Artemisia vulgaris L. In Cephal. (Dallap. l. c. 113). Non vidi (H.).

A. arborescens L. *Ψυθιά*. In rupinis : pr. *Kalligata* (*Livathó*) et in *Sarlata* (H.). Huc sine dubio spectat *A. Absinthium* Dallap. l. c. Ab ipso indicatur et *A. Abrotanum* L. in hortis culta et vulgo *Μελγίνη* vocata.

Obs. Enumerantur a Dallaporta (l. c.) et *Santolina Chamæcyparissus* L. et *Anthemis nobilis* L. et *Tanacetum vulgare* L. plantæ in insula certe non indigenæ et a cl. auctore probabiliter cum aliis *Anthemidearum* speciebus confusæ.

(Compositæ) : SENECONIDEÆ.

Tussilago Farfara L. *Χαμολέβι* (sec. Dallap.). In collibus argillosis pr. *Lixuri* et ad paludem *Livadi* (*Thyniá*) (H.).

Petasites officinalis Mch. (*Tussilago Petasites* L. Dallap.

l. c. p. 114). *Livadi* (Dallap.). Insulæ civis valde dubia mihi videtur.

Senecio vulgaris L. *Μαριτζο* (Dallap. l. c. p. 115). Frequens in aridis : *Argostoli* (H.). Maio.

S. vernalis W. K. In herbidis et ad muros : *Argostoli*, *Pesada*, *Spartiá*, etc. (H.). Maio.

S. erraticus Bert. In humidis ad mare : in halipedo prope *Same* versus molas (H.). Aug.

S. bicolor W. In rupibus maritimis : pr. *Asso*, pr. *Poros* et ad cœnobium *Kipuria* (H.). Aug.-Sept.

(Compositæ) : CALENDULACEÆ.

Calendula arvensis L. In locis cultis : prope *Argostoli* (H.). Maio. — *C. officinalis* L. cultam in hortis sed spontaneam non vidi ut a Dallap. indicatur.

(Compositæ) : CYNARÆÆ.

Echinops viscosus DC. *Σκολόβοι*. Frequens in saxosis faucium inter *Drapano* et *Pharaclata*, nec non prope *Hagios Soter* (*Thyniá*) (H.). Aug.

Cardopatum corymbosum (L.). Ad litora maris prope *Argostoli* (H.). Florentem non vidi.

Carlina corymbosa L. Ad vias et in arvis frequens : prope *Argostoli*, in m. *Phalaris*, etc. (H.). Aug.

C. lanata L. In locis aridis : prope *Piscardo*; inter *Lixuri* et *Mantzavinata* freq. (H.). Jul.-Aug.

C. gummifera (L.) *Χαμολόβ*. In locis incultis et ad vias haud rara : pr. *Lasi*, in m. *Gerolaki* (*Pyrghi*), prope *Akoli*, pr. *Kontogianata* et copiose inter *Lixuri* et *Mantzavinata* (H.); *Livathó* (Dallap.). Jul.-Sept. Radix venenosa. (Cfr. Dallap. l. c. p. 110, et Heldr. Nutzpflanzen Griechenlands, p. 26.)

Atractylis cancellata L. In Cephalonia (sec. Marg. et Reut. Flore de Zante).

Lappa major Gaertn. *Arctium Lappa* L. *Πλατομαντίλα* (sec. Dallap. l. c. p. 109). Non vidi (H.).

Carduus pycnocephalus Jacq. In locis cultis : prope *Argostoli* (H.). Maio.

C. sp.... Ad vias : prope *Kastro*, *Argostoli*, etc. (H.). Maio.

Cirsium Italicum (Savi). In arvis, locis cultis : in oropedio *Omalà* prope *Francata* copiose, in valle *Heracleon*, in halipedo *Livadi* (*Thynià*), prope *Lixuri*, etc. (H.). Aug.-Sept.

C. lanceolatum (L.). In humidis mari finitimis raro : supra *Poros* (H.). Aug.

C. pauciflorum (W. K.). « In sylvaticis montis Oenos (Mazziari ex Rechb.) » sec. Boiss. Flor. Or. III, p. 545.

C. cynaroides (Lam.). In rupinis prope *Vuttès* inter *Valeriano* et *Marcopulo*; eparchia *Koroni*, etc. (H.). Aug.

C. Siculum Spreng. In paludosis et ad rivulos : *Hagios Joannes* ad *Kulavo*, ad molas prope *Same* copiose, circa paludem *Akoli*, *Kokkino to mylo* (*Pyrgi*), in valle *Heracleon*, *Kateliòs* ad fontes et prope *Lixuri* (H.). Aug.-Sept.

C. Acarna (L.). In locis sterilibus frequens : *Cephalonia* (Schimp. sec. Boiss. Flor. Or.); prope *Argostoli* copiose (H.). Aug.

C. stellatum (L.). In saxosis m. *Gerólaki* supra *Akoli*, *Pylaros*, *Valeriano*, *Koroni*, *Skala*, *Eliòs*, etc. (H.). Aug.

Notobasis Syriaca (L.). In arvis post messem et ad vias : *Argostoli*, *Pessada*, etc. (Ung., H.).

Chamaepeuce Alpini Jaub. et Spach. a. *mutica* Boiss. (Ch. *mutica* DC.). In rupibus maritimis : prope *Pharsa*, *Stenò*, *Poros* et *Kipuria* (H.). Aug.

Tyrimmus leucographus (L.). In locis incultis frequens : prope *Argostoli* (H.). Maio.

Galactites tomentosa Mch. Ad vias frequens : *Argostoli*, *Pessada*, *Koroni*, *Poros* (H., U., Spreiz.). Maio.

Silybum Marianum (L.). In locis incultis, ad vias : (U.), prope *Argostoli* (H.). Maio.

Cynara Cardunculus L. *Ἀρταρρύδα*. In halipedo prope *Lixuri* frequens et in subpaludosis *Livadi* ad *Lychata* (*Thynià*). (Dallap., H.). Aug.-Sept. — In hortis colitur et *C. Scolymus* L. *Ἀρρυνιά* (Dallap. l. c. p. 109).

Onopordon Illyricum L. In locis incultis, collibus saxosis et in submontanis : inter *Argostoli* et *Pessada*, pr. *Same* et in m. Aeno supra *Omalà* (H.). Jul.-Aug.

Centaurea subciliaris Boiss. et Heldr. in Boiss. Flor. Or. III, p. 627. In regione media m. Aeni prope *Balsamata* oropedii *Omalà* obvia, nec non in regione abietina m. Aeni et

m. *Rhudi*, alt. 2000'-3500' (H.). Aug. E sectione *Phalolepis* et ex affinitate *C. albae* facile distinguenda radice perenni phyllis angustius membranaceis inferioribus breviter fimbriatis, in cuspidem subspinosam abeuntibus.

C. sp..... In vinetis prope *Dilinata*, defloratam vidi 31 Aug. (H.).

C. solstitialis L. In arvis post messem frequens : *Drapano*, *Pyrgi* (H.). Aug.

C. Calcitrapa L. In arvis et ad vias : *Argostoli*, *Omalà*, *Pyrgi* (H.). Jul.-Aug.

Crupina Crupinastrum (Moris). In collibus apricis : prope *Argostoli* (H.). Maio.

Carthamus lanatus L. In arvis post messem : *Pyrgi*, *Pylaros* copiose (H.). Aug.

C. sp..... Prope *Lixuri* (H.). Aug.

C. caeruleus L. In collibus argillosis prope *Lixuri* frequens (H.). Maio.

Obs. *C. tinctorius* L. *Ἀγριοζαφάρανα* hinc inde cultus secund. Dallap. l. c. p. 111.

(Compositæ) : CICHORACEÆ.

Scolymus Hispanicus L. In locis incultis frequens : *Argostoli* alibique (H.). Aug.

Cichorium Intybus L. *Παδίξι*. Ubique frequens (Dallap. l. c. p. 108), ad vias prope *Drapano* (H.). Maio.

C. divaricatum Schousb. (*C. pumilum* Jacq. ; Sibth. Flor. Gr.). Ad vias prope *Argostoli* (H.), prope *Lixuri* (Schräd.). Maio-Jul.

C. spinosum L. In maritimis Cephalonix (Schimp. sec. Boiss. Fl. Or.); prope *Drapano* (H.). Sept.

Hyoseris scabra L. In aridis inter *Argostoli* et *Hagios Theodoros* (Spreiz.). Aprili.

Hedypnois Cretica (L.). In maritimis ad *Kutaro* prope *Argostoli* (H.). Jul. deflor.

Rhagadiolus stellatus (L.). In herbidis (U.), prope *Argostoli* (Schm.); *Drapano*; *Kokolata* (eparch. *Erisso*) et prope *Piscardo* (H.). Aprili et Maio.

Leontodon Græcum Boiss. et Heldr. In rupinis : prope *Rasata* et in m. *Atro* (H.). Maio.

Picris Sprengeriana (L.). In cultis : *Pessada*; *Piscardo* (H.). Jul. (fruct.).

Urospermum pieroides (L.). In herbidis (U.); prope *Argostoli* et pr. *Pessada* (H.) Maio.

Geropogon glabrum L. In arvis : prope *Argostoli* (H.); pr. *Aphrata* (Schm.). Aprili et Maio.

Tragopogon porrifolium L. In herbidis (U.), ad *Drapano* (H.). Maio. — Quid T. pratense Dallap. l. c. p. 107, nescio ; forte *Scorzonera crocifolia* ?

Scorzonera erocifolia Sibth. In Cephalonia (U.), prope *Argostoli* (H.). Maio. — S. humilis et S. Orientalis (vulgo *Σταρίδα*) a cl. Dallap. (l. c. p. 107) inter indigenas enumerantur, sed an vere maxime dubito.

Hypochaeris radicata L. Ad viam inter *Mavrata* et *Foramine* (H.). Aug.

Seriola Aethnensis L. In locis aridis : *Argostoli* (Schm.); *Lixuri* (H.). Aprili et Maio.

Taraxacum officinale Wigg. var. *alpinum* Koch, Boiss. In regione abietina m. Aeni (U., H., Spreitz.). Aprili et Maio.

Chondrilla juncea L. In olivetis : prope *Pessada* (H.). Jul.

Sonchus oleraceus L. *Ζωχός* (Dallap. l. c. 107, et sec. Marg. et Reut. Flore de Zante). Herba comeditur.

S. asper Wallr. In cultis : pr. *Argostoli* (H.). Maio.

Lactuca sativa L. *Μαρούλι*. Freq. colitur (Dallap. l. c. p. 107).

L. Scariola L. In vinetis, ruderatis, etc. : *Argostoli*, *Omalà* ad *Hagios* (H.). Jul.-Aug.

L. saligna L. In locis cultis : prope *Same* (H.). Aug.

L. viminea (L.). (*Phœnixopus vimineus* DC.) In regione abietina m. Aeni et in monte *Phalaris* (H.). Aug.

Picridium vulgare Desf. In rupinis maritimis nec non in submontosis : *Argostoli*, *Valeriano*, *Piscardo*, in oropedio *Omalà*, etc. (H.). Maio-Aug.

Zacyntha verrucosa Gärtn. In locis herbidis : *Drapano*, *Kateliós*, *Piscardo*, *Omalà* (H.). Maio.

Crepis bulbosa (L.). In arundinetis ad mare : *Drapano* pr. *Argostoli* (H.). Maio.

C. Sieberi Boiss. Prope *Argostoli* (Schm.). Aprili.

C. neglecta L. (*C. cernua* Ten., *C. fuliginosa* Sm.). In locis aridis, ad vias frequens : *Argostoli*, *Lixuri*, in oropedio *Omalà*, etc. (H., Schm., Spreitz., U.). Aprili et Maio.

C. foetida L. In locis cultis : *Pessada* (H.). Maio.

C. purpurea Guss. In campis (Unger).

C. rubra L. In herbidis : prope *Argostoli* frequens (H., Schm., Spreitz.), in regione media m. Aeni pr. *Omala* (H.). Aprili et Maio.

C. Dioscoridis L. Ad rupes et muros : *Kastro*, (H.). Aug. defl.

Campanulaceæ.

Campanula versicolor Sibth. In rupibus excelsis : in faucibus *Hagios Varvaros* supra *Drapano* copiose, inter *Valeriano* et *Marcopulo* et in faucibus *Stenò* pr. *Poros* (H.). Sept.

C. Garganica Ten. In rupibus regionis litoralis : prope *Hagios Soter* (*Thynià*), pr. *Athéra* et prope cænobium *Taphiüs* (H.). Aug. fruct.; in regione superiore m. Aeni (*Casa inglese*) (*Letourneux*).

C. drabifolia Sibth. β . *major* Boiss. (C. Attica Boiss. et Heldr.). In collibus siccis : prope *Argostoli* (H.). Maio-Jul.

C. Spruneri Hampe. In oropedio *Omala* (H.), in collibus argillosis prope *Lixuri*, pr. *Dallaportata* et *Vorikes* in eparchia *Palike* (Schm.). Aprili et Maio.

C. ramosissima Sibth. In herbidis : pr. *Argostoli* (Schm.), in oropedio *Omala* (forma minor corollis minoribus, cfr. Boiss. Fl. Or. III, p. 942). (H.). Aprili et Maio.

Specularia Speculum (L.). In locis cultis, inter segetes, etc. : prope *Argostoli* (H., Spreitz.), *Pessada* (H.), *Aphrata* (Schm.), in *Cephalonia* (U.). Aprili et Maio.

Ericaceæ.

Arbutus Unedo L. *Κουμαριά*. In regione inferiore a mari ad alt. 2000' : ad radices m. Aeni prope *Pessada*, *Sisia*, *Koroni*, in m. *Atro* arborea et nemora efformans, in m. *Gerolaki* (*Pyrgi*) supra *Akoli*, in silva *Athéra*, etc. (H.).

A. Andrachne L. *Ἀνδραχνα* (sic !). In regione submontana inter *Argostoli* et *Same*, in m. *Rhudi* usque ad regionem abietinam et in montibus *Hagioi Phanentes* supra *Same* (H.).

Erica arborea L. *Ἀπίρι*. In collibus saxosis et in rupestribus maritimis : inter *Same* et *Hagia Euthymia*; *Dichalia* prope *Same*; prope *Poros* et in m. *Rhudi* (H.).

E. verticillata Forsk. 'Pizi. In collibus saxosis maritimis : inter *Lasi* et *Miniès*, pr. *Spiladà*, ad rupes *Charakas* et supra *Asso*, ad cœnobia *Kipuria* et *Taphiùs* (H.). Aug. Sept.

Monotropaceæ.

Monotropa Hypopitys L. In silvis abietinis m. Aeni prope « *Casa inglese* » legit cl. et am. Letourneux, Jul. 1879.

3. COROLLIFLORÆ

Primulaceæ.

Samolus Valerandi L. In locis humidis : *Gastrinovrysi* ad *Kutavo*, *Livadi* (*Thynià*), *Pessada*, *Stenò*, *Kalligata* (H.). Jul.-Sept.

Anagallis arvensis L. *a. phœnicea* Boiss. Χορτάρι διὰ τὸ δίμα (δίμα = morbus oculorum). In cultis : *Argostoli*, *Polytrichi* prope *Spartidà*, etc. (H.). Maio. — *β. cœrulea* Boiss. *A. cœrulea* Lam. In *Cephalonia* (U.).

A. latifolia L. Φελλοχόρπι (Φέλλο = morbus oculorum). In cultis, prope *Argostoli* (H., Schm.), pr. *Same* (H.). Aprili et Maio.

Cyclamen Neapolitanum Ten. Κυρζλαμιά et Συολάκι. In umbrosis prope *Argostoli* (H.). Ad hanc vel ad speciem sequentem *C. Europæum* Dallap. (l. c. p. 21) adnumerandum.

C. Græcum Link. In saxosis : *Maserakata*, cœnob. *Kipuria* (H.). Sept.

Oleaceæ.

Olea Europæa L. *a. Oleaster* DC. In collibus saxosis : *Lixuri*, *Poros* alibique (H.). Maio. — *β. sativa* DC. Έλαιά. Freq. culta in regione inferiore; in monte Aeno usque ad *Omalà* (pagum *Balsamata*) alt. 2500' circ. adscendens (H.). Cfr. Dallap. l. c. p. 2.

Phillyrea media L. Φελόκι vel Φιλύκι. In fruticetis regionis inferioris : prope *Poros*, in valle *Heracleon*, in m. *Atro* (copiose et quidem arborea), *Koroni*, *Pyrgi*, *Akoli*, *Kastro*, *Piscardo* (H.).

Apocynaceæ.

Vinca herbacea W.K. Ad sepes prope *Lixuri* (U.).

Nerium Oleander L. *Περσόδωρη*. Ad rivulos et in torrentium alveis : *Poros*, *Heracleon*, *Kateliós* (H.). Aug.

Asclepiadeaceæ.

Cynanchum acutum L. In humidis maritimis : copiose prope *Lixuri* (H.). Aug. Sept.

Gentianaceæ.

Chlora perfoliata (L.). In locis humidis, olivetis, etc. : *Pessada*, *Lordata*, *Piscardo* (H.). Jul.

Erythraea latifolia Sm. *Άλοή*. In maritimis : prope *Same*, *Koroni*, alibique (H.). Jul. — Cum sequente ut febrifugum adhibetur.

E. Centaurium Pers. *Άλοή* et *Θερμοχόρταρον* (sec. Dallap. l. c. p. 36). Prope *Argostoli* (Schm.). Aprili.

E. spicata (L.). In maritimis : *Gastrinovrysi* ad *Kutavo*, *Drapano*, in halipedo pr. *Same* (H.). Jul. Aug.

Sesamaceæ.

S. Indicum L. *Σουδάμι*. Colitur in variis locis (Dallap. l. c. p. 87, sub *S. Orientali*).

Convolvulaceæ.

Convolvulus Cantabrica L. In saxosis : *Hagios Varvaros* supra *Drapano*; *Rasata* (H.). Maio.

C. althaeoides L. In Cephalonia (U., Schm.). Aprili.

C. tenuissimus Sibth. In aridis et saxosis, ad vias : *Argostoli*, *Kastro*, etc. (H., Schm.). Aprili-Jul.

C. arvensis L. In cultis : *Drapano*, *Athera* (H.). Maio-Aug.

Calystegia sepium (L.). Dallap. l. c. p. 22 (sub *Convolvulo*).

Cuscuta Epithymum L. *Νεραϊδονήματα*. In Achillea Ligustica et Galio aureo in regione abietina m. Aeni l. d. *Phtéres*; prope *Lixuri* (H.), in Thymo (Dallap. l. c. p. 19). Maio-Aug.

Borraginaceæ.

Heliotropium supinum L. In humidis salsis ad mare ; pr. *Drapano* (H.). Jul.

H. Europæum L. In ruderalis et cultis : *Drapano*, *Same*, *Pyrgi*, *Piscardo* (H.). Aug. — β . *tenuiflorum* Boiss. (H. *tenuiflorum* Guss.). In aridis ad mare : prope cœnobium *Hagia Euthymia* (H.). Aug.

H. Bocconi Guss. In rudibus et cultis sæpe promiscue cum præcedente et sequente : *Hagia Euthymia*, *Piscardo*, in vinetis ad *Hagios oropedii Omala* (H.). Aug.

H. villosum Desf. *Ἠλιοσπρόφη*. Copiose in locis cultis, arvis post messem, vinetis : *Argostoli*, *Dilinata*, *Hagia Euthymia*, *Steno*, etc. (H.). Aug.

Cerinth major Lam. *Palike* (Schm.), in vinetis prope *Lixuri* (H., Spreitz.). Aprili et Maio.

Borrage officinalis L. *Μπουράντζανο*. (Dallap. l. c. p. 21.) Culta.

Anchusa officinalis L. *Βοῦδογλωσσα*. Ubique frequens (sec. Dallap. l. c. p. 19).

A. Italica Retz. In arvis : *Drapano*, *Spilaea* (H.), *Argostoli* (Schm.). Aprili et Maio.

A. variegata (L.). Prope *Argostoli* (Schm.), in regione abietina m. Aeni (H.). Aprili et Maio.

Symphytum bulbosum Schimp. In oropedio *Omala* prope *Francata* (H.). Maio. Huc spectare videtur « *Consolida major*, i. e. *Symph. officinale* » a Dallap. (l. c. p. 20) indicatum, cum nomine vernac. *Στερούλι*.

Echium italicum L. In cultis, ad vias : *Drapano*, *Spilaea*, *Lasi* alibique frequens (H.) *Argostoli* (Schrader.). Maio.

E. plantagineum L. Ad vias, in herbis : *Argostoli*, *Same* (H.). Maio.

Lithospermum arvense L. In arvis : *Francata* (*Omala*) (H.). Maio.

L. incrassatum Guss. Rarissime in regione abietina superiore m. Aeni (H.). Maio.

Alkanna Græca Boiss. et Sprun. In regione media m. Aeni, in faucibus supra *Balsamata* (Spreitz.). Aprili.

Myosotis pusilla Loisl., Boiss. (M. *Aenesia* Heldr. pl. exs.

e Cephalenia, 1861, N° 3563, *M. litoralis* Ung. non Stev.). In saxosis aridis m. Aeni (Ung.), in regione superiori m. Aeni (H.), ibid. in reg. abietina ad « *Casa inglese* » (Spreitz. sub *M. litorali* var. *Aenesia* Heldr.). Aprili et Maio.

M. hispida Schlecht. In regione abietina m. Aeni (H.). Maio.

Cynoglossum pictum Ait. In cultis ad vias frequens : *Argostoli* (H., Schm.), *Omalà*, *Krene* (*Pylaros*), *Kontogian-nata* (H.). Aprili et Maio.

C. Columnæ Biv. In saxosis : *Omalà* ad radices m. Aeni (H.). Maio.

Solanaceæ.

Lycopersicum esculentum Mill. *Πομῖδόρο* (i. e. Pomi d'oro). Ubique colitur in usum culinarium.

Solanum nigrum L. β. *chlorocarpon* Spenn., Boiss. In cultis et ruderalis : prope *Argostoli* (H., Schm.), pr. *Same*, pr. *Lordata*, etc. (H.). Aprili-Aug.

S. tuberosum L. *Πατάτα*. Colitur in variis insulæ locis, præsertim circa *Skala*.

S. Melongena L. (*S. esculentum* Dun.) *Μελιτζάνα*. Freq. colitur in usum culinarium.

Capsicum annuum L. *Πεπεριά*. Colitur. *C. grossum* a *Dallaporta* indicatum cum nom. vernaculo *Άγριοπιπεριά* potius ad *Solanum pseudo-capsicum* L. spectare videtur.

Physalis Alkekengi L. Secund. *Dallap.* l. c. p. 27.

Lycium Europæum L. Ad vias : prope *Lixuri*, in oropedio *Omalà* (H.). Maio.

Mandragora officinarum L. *Μανδραγόρας*. In Cephalonia (sec. *Dallap.* l. c. p. 24).

Datura Stramonium L. *Πορδόχορτον*. In cultis et ruderalis : in m. *Phalaris* inter Zeam freq., prope *Lordata*, prope *Lixuri*, etc. (H.). Aug.

Hyoscyamus albus L. *Αιζάρμο*. In rudribus, ad litora maris : *Argostoli*, *Lordata*, *Same*, *Piscardo*, *Lixuri* (H.). Aug. — *H. nigrum* a *Dallap.* indicatum non vidi, sed probabiliter ad *H. album* ducendum.

Nicotiana Tabacum L. *Καπνός*. Freq. culta. Secund. *Dallap.* (l. c. p. 23) colitur et *N. rustica* L.

Scrofulariaceæ.

Verbascum thapsiforme Schrad. (V. macrurum Ten., V. Thapsus Dallap. l. c. 23.) In saxosis ubique frequens, a mare (Argostoli, Pessada) usque ad cacumina m. Aeni adscendens (H.). Maio-Jul.

V. Blattaria L. In herbidis : Argostoli, Drapano, Aphrato, etc. (H., Schm.). Aprili et Maio.

V. sinuatum L. In locis cultis, ad vias freq. : Argostoli, Drapano, Pessada (H.). Maio et Julio.

V. sp. In m. Atro ad cœnobium et prope Skala (H.). Aug. (fruct.) Species V. Græco Heldr. et Sart. affinis sed capsula ovata recedens, forte nova et ulterius observanda (cfr. Boiss. Fl. Or. IV, p. 337).

Linaria spuria (L.). In locis cultis et humidis : Drapano, Steno (Ikosimia), ad paludem Akoli (H.). Maio et Aug.

L. vulgaris Mill. (?) Antirrhinum Linaria in insulæ variis locis sec. Dallap. (l. c. p. 86), sed indicationem incertam esse suspicor.

L. Chalepensis (L.). In cultis : Drapano (H.). Maio.

Antirrhinum Orontium L. In locis aridis, vinetis, etc. : Drapano, Hagios in oropedio Omalà (H.). Maio.

Scrofularia peregrina L. In cultis, ad vias : Pessada (H., Schm.). Aprili et Maio. Huc probabiliter spectat S. nodosa Dallap. (l. c. p. 86).

S. heterophylla W. β. *pinnatisecta* Boiss. In rupibus, ad muros : Poros, in m. Atro ad cœnobium, in m. Gerolaki (Pyrgi), ad cœnobium Hagioi Phanentes (H.). Mai.-Jul.

S. canina L. In saxosis, ad vias : Cephalonia (U., Schm.), Argostoli, Drapano, Pessada, Omalà freq. (H.). Maio.

Gratiola officinalis L. Frequens in variis insulæ locis (Dallap. l. c. p. 9). Plantam non vidi et de indicatione dubito. (H.).

Veronica Anagallis L. In humidis : Samòli (Palike), Spi-læà prope Argostoli (H., Schm.). Aprili-Sept.

V. Beccabunga L. In scaturiginosis (Dallap. l. c. p. 5).

V. arvensis L. In arvis (Schm.), Francata (H.). Aprili et Maio.

V. Peloponnesiaca Boiss. et Orph. (V. glauca Ung. non Sibth., V. Chaubardi Spreitzenh. non Boiss.). In regione abietina m. Aeni (U., H., Spreitz.). Aprili et Maio.

V. agrestis L. In reg. abietina m. Aeni (H.). Maio.

V. cymbalaria Bert. In montosis : in pineto m. Aeni (U.), ibid. in regione abietina et prope *Francata* (H.). Maio.

Obs. Quid *V. officinalis* Dallap. sit (l. c. p. 5) nescio, sed certe non est species Linnæana. Valde dubia et *Euphrasia officinalis* L. ab eodem auct. (l. c. p. 85) indicata.

Eufragia latifolia (L.). In m. *Atro* prope cœnobium rara. (H.).

E. viscosa (L.). In cultis prope *Lixuri* (H.). Maio.

Trixago *Apula* Stev. In arvis : in montosis (U.), prope *Argostoli* (H., Schm., Spreitz.). Aprili et Maio.

Orobancheaceæ.

Phelipœa cœrulea (Vill.). In Cephalonia (U.).

Ph. lavandulacea (Rehb.). In maritimis : *Lasi* prope *Argostoli* (H.), *Livathò* (Schm.). Aprili et Maio.

Ph. Ægyptiaca (Pers.). In Cephalonia (Schm.), pr. *Drapano* (H.). Aprili et Maio.

Orobanche speciosa DC. Ad radices *Viciæ Fabæ* : *Argostoli* (H.). Maio.

O. pubescens D'Urv. In maritimis prope *Argostoli* (Schm., Spreitz.). Aprili.

O. hyalina Sprun. Rarissime prope *Taphiùs* (H.). Sept. (deflor.).

O. Epithymum DC. In saxosis : « ad radices *Melissæ* » (U.), *Omala* (H.). Maio.

O. minor Sutt. In maritimis : *Hagios Theodoros* pr. *Argostoli* (H., Spreitz.). Aprili et Maio.

Acanthaceæ.

Acanthus spinosus L. Ad agrorum margines, in olivetis et in vinetis frequens : *Drapano*, *Pessada*, *Omala* alibique (H.). Jul. — Ad hanc speciem spectat sine dubio *A. mollis* Dallap. (l. c. p. 87) cum nomine vernaculo *Μουτρούνα*.

Verbenaceæ.

Verbena officinalis L. In locis cultis frequens : *Drapano*, *Lordata*, etc., etc. (H.). Aug.

Vitex Agnus castus L. *Αγγιά*. In maritimis, ad rivulos et in torrentium alveis : *Argostoli*, *Pessada* alibique frequens (H.). Jul. Variat floribus carneis.

Labiatae.

Ocimum Basilicum L. *Βασιλικός*. Frequens colitur.

Lavandula Spica L. *Αεβάντα*. Frequens culta (Dallap. l. c. p. 81).

Mentha tomentosa D'Urv. (M. sylvestris β. stenostachya Boiss. Flor. Or.). In locis cultis et ad vias : *Livathò*, *Pylaros*, etc. (H.). Aug.

M. sativa L. (M. arvensis α. sativa Benth.). Frequens culta (Dallap. l. c. p. 81, c. nomine vernac. *Μέντα*).

M. Pulegium L. *Φλουσχοῦνι* et *Φλισχοῦνι*. In locis humidis : *Drapano*, *Argostoli*, *Akoli*, etc. (H.). Jul. Aug.

Lycopus Europæus L. In locis humidis : ad paludem *Akoli*, in halipedo *Livadi* (*Thynià*) (H.). Aug. Sept.

Origanum hirtum Vogel. *Ψίχανη*. In locis siccis, præcipue submontosis : *Kokkino-to-mylo* (*Pyrgi*), m. *Gerolaki*, m. *Atro*, inter *Kateliós* et *Mavrata*, *Kontogiannata* (*Palike*), etc. (H.). Aug. — Huc certe spectat O. vulgare Dallap. (l. c. p. 83).

O. Majorana L. *Ματζουράνα*. Cult. (Dallap. l. c. p. 84).

Thymus striatus Vahl. *Χυμοθρουμπίδι*. In saxosis montium : in regione media et super. Aeni et in m. *Phalaris* (H.). Aug.

Th. capitatus (L.). *Θρώμνη* et *Θρούμπα*. In collibus saxosis ubique frequens : *Argostoli*, *Lixuri*, etc. (H.). Jul. Aug. — *Thymus vulgaris* Dallap. (l. c. p. 84) e nomine vernac.

Satureia cuneifolia Ten., Boiss. Fl. Or. IV, p. 564. *Μοσχοστουβιά*. In saxosis montium : in m. Aeni et *Rhudi* regione media ad reg. abietinam usque, et in m. *Phalaris* freq. (H.). Aug. — Est forma diffusa jam a cl. Wiest collecta sec. Boiss. l. c.

Micromeria nervosa (Desf.). M. plumosa (Hampe) Heldr. Herb. Græc. norm. In collibus saxosis : prope *Argostoli* (Schm.). Aprili.

M. Juliana (L.). *Υσσόπος* ! In locis aridis, saxosis et in muris frequens : *Argostoli*, *Kastro*, *Pessada*, *Piscardo*, etc. (H.). Maio-Jul. — *Hyssopus officinalis* Dallap. l. c. p. 80 non L. e nomine vernaculo.

M. Greca (L.). Raro in siccis : prope *Argostoli* (H.). Maio.

Calamintha Nepeta (L.). *Καλάμιθρος* (sec. Dallap.). *Ἀγριω-
ρίγανι* et *Φλουσχοῶνι* (H.). Frequens in umbrosis et subhumidis,
locis cultis et muris : *Argostoli*, *Kastro*, *Pessada*, *Lixuri*,
etc. (H.). Maio-Aug. — *Melissa Calamintha* Dallap. l. c. p. 85.

C. Clinopodium Benth. In umbrosis praesertim submonto-
sis : *Spartia*, *Omalà*, m. *Gerolaki* et *Akoli* (*Pyrgi*). (H.).
Aug.

C. Alpina (L.). In regione superiore m. Aeni usque ad
cacumen frequens (H.). Maio (nondum flor.) Aug.

Melissa officinalis L. (M. altissima Fl. Gr.) *Μελισσόχορτον*.
In cultis et ad sepes in humidiusculis et umbrosis : *Spilæa*
prope *Argostoli*, *Hagia Euthymia*, *Panagia tis Krinis*
(*Pylaros*), etc. (H.). Jul. Aug.

Salvia triloba L. *Ἀλυσφαιά*. In rupinis : prope *Argostoli*
(Schm.), in m. *Gerolaki*, pr. *Valeriano*, *Marcopulo*, *Valtes*,
Koroni, *Same*, etc. (H.). Aprili.

S. Sclarea L. In saxosis : prope *Drapano*, *Kastro* supra
Peratata copiose (H.). Maio.

S. pratensis L. In herbidis : prope *Same* et pr. *Lixuri*
(H.). Aug. (adhuc flor.).

S. verbenaca L. *a. serotina* Boiss. Ad vias : prope *Argo-
stoli* (H.). Maio. Var. *β. vernalem* Boiss. non notavi sed non
dubito quin in insula quoque indigena crescat.

S. viridis L. In montosis (Ung.), in siccis prope *Argo-
stoli* (H.). Maio. — Var. *β. comata* (S. Horminum L.). In *Ce-
phalonía* (Spreitz.).

Rosmarinus officinalis L. *Δενδρολίθανον*. Freq. colitur in
hortis (Dallap., H.).

Obs. A cl. Dallaporta (l. c. p. 82) indicatur et *Glechoma*
hederacea L. sed an recte maxime dubito.

Scutellaria hirta Sibth. et Sm. *β. brachystegia* Boiss.
Flor. Or. IV, p. 690. Raro in lapidosis ad cacumen *Megalo*
Sorò m. Aeni (H.). Aug.

Marrubium vulgare L. *Ἀσπροπρασιά*. In locis siccis et
saxosis maritimis et montanis copiose, a mare (*Argostoli*,
Hagia Euthymia, etc.) usque ad summa cacumina m. Aeni
(H.). Aug. (Dallap. l. c. p. 83).

Sideritis Romana L. In locis siccis : *Cephalonia* (U.), pr.
Pessada et pr. *Metaxata* (H.). Maio.

Stachys Cretica Sibth. *Fl. Gr.*, Boiss. (St. Italica auct. plur.). In locis aridis regionis inferioris : *Argostoli*, *Pessada*, *Erisso*, *Lixuri* (H.). Maio.

St. Parolinii Vis. Ill. p. 10, t. IV. Ad rupes : inter *Argostoli* et *Omalà*, inter *Valeriano* et *Marcopulo* et in m. *Atro* (H.). Maio. — Huc forte spectat *Betonica officinalis* Dallap.

St. Swainsonii Benth. β . *Scironica* Boiss. In rupibus *Charakas*, prope *Asso*, *Poros*, *Stenò*, *Kipuria* et *Taphiùs* (copiose) (H.). Aug. (deflor.).

St. candida Bory et Chamb. « In rupibus calcareis » (U.). Anne potius ad præcedentem spectat? *St. candidam* veram, in Peloponneso meridionali obviam, in Cephalaria non vidi.

St. spinulosa Sibth. Prope *Aphrato* (Schm.). Aprili.

Lamium striatum Sibth. In regione abietina m. Aeni copiose (U., H., Schrad., Spreitz.). Aprili et Maio. A forma typica m. Hymetti paulo remota galeæ lobis angustioribus lineari-oblongis nec amplis ovato-rotundatis.

L. amplexicaule L. In arvis : *Francata* (H.). Maio.

Ballota nigra L. In ruderibus : *Drapano* et *Argostoli* frequens, *Pessada*, *Skala*, *Pylaros*, *Kontogiannata*, etc. (H.). Jul. Aug.

Phlomis fruticosa L. *Ἀσφάδα*. In saxosis frequens : *Argostoli*, *Pylaros*, *Koroni*, in m. Aeni reg. media usque ad abietes (H.). Maio.

Prasium majus L. Ad sepes, in olivetis : *Livatho* (Schm.), *Pessada*, *Lixuri* (H.). Aprili et Maio.

Ajuga Orientalis L. β . *Aenesia* Hldr. In regione abietina m. Aeni, alt. 3500'-5000' (U., H., Schrad.), et in m. *Rhudi* reg. abiet. (H.). Maio. — A typo in Græcia obvio differt bracteis pulchre violaceo-purpurascensibus profunde paucidentatis, corollis intensius cæruleis immaculatis.

A. Iva (L.). In aridis ad vias : prope *Kundurata*, *Pessada* (H.). Aug. (fruct.).

A. Chamæpitys (L.). *Teucrium Chamæpitys* Dallap. (l. c., p. 79). Forte *A. Chia*. Non vidi.

Teucrium scordioides Schreb. In locis humidis ad mare : *Hagios Thomas* prope *Pessada*, *Livadi* (*Thynià*), *Samòli* (*Palike*), *Lixuri* (H.). Jul.-Sept. — Ad hanc speciem certe spectat *T. scordium* Dallap. (l. c., p. 80, prope *Lixuri* et *Cra-nea* Dallap.).

T. Chamædrys L. In insulæ variis locis (Dallap. l. c., p. 80).

T. flavum L. Μοσχοχόρταρον. In saxosis frequens : *Argostoli* (Schm.), *Pessada*, m. *Rhudi*, *Lixuri*, *Kontogiannata*, *Kipuria*, etc. (H.). Aprili et Maio.

T. Polium L. Τῆς Παναγίας τὸ χορτάρι. In maritimis : *Drapano*, *Rasata*, *Erisso* alibique frequens (H.). Aprili et Maio. Herba in ieterum adhibetur. — *Var. β. roseum* Boiss. Fl. Or. IV, p. 821. Frequens in regione media et superiore m. Aeni (H.). Aug. (flor.!) Non tantum colore florum quam habitu alieno ob flores in spicas elongatas condensatos a typo differt. Corolla variat alba et rosea.

Plumbaginaceæ.

Acantholimon Echinus (L.). In regione abietina inferiore m. Aeni raro (Letourneux).

Statice Limonium L. Ἀδάθο. In maritimis : *Drapano*, *Same*, *Livadi* (*Thyniá*) alibique (H.). Aug. Sept.

St. rorida Flor. Gr., Boiss. In rupinis maritimis pr. *Poros* (H.). Aug.

St. virgata W. In maritimis : *Pessada*, *Piscardo*, ad portum *Athera*, in collibus argillosis prope *Mantzavinata* usque ad mare freq. (H.). Jul. Aug.

St. cancellata Bernh. α. *glabra* Boiss. In saxosis ad mare : *Kiniti-Petra* (H.). Jul. (vix flor.). — *β. laxa* Boiss. Ad portum *Athera*, pr. *Poros* et *Kipuria* (H.). Aug. Sept.

Plumbago Europæa L. Ἀγριομάρουλο. In saxosis, ad vias et sepes et in ruderibus pagorum : *Livathò* (Dallap.), *Pylaros*, *Peratata* prope *Kastro*, *Lordata*, *Petrikata* (*Thyniá*), *Hagia Thecla*, *Kontogiannata*, etc. (H.). Aug. Sept. — Herba ab incolis ut vulneraria usitata.

Plantaginaceæ.

Plantago major L. Πεντάευρο. In locis humidis : (Dallap.), *Kutavo*, in faucibus *Stenò* (*Ikosimiá*) (H.). Aug.

P. lanceolata L. α. *genuina* Boiss. In locis siccis : *Argostoli* (Schm.). — *β. altissima* Boiss. in herbosis humidiusculis : *Kutavo*, *Polytrichi* prope *Spartiá* (H.). — *δ. capitata*

Presl. Boiss. forma foliis longe sericeo-villosis latiusculis : ad margines vinetorum prope *Lixuri* (Spreitz.). Aprili et Maio.

P. Bellardi All. In siccis : pr. *Argostoli* (Schräd., Sprz.), Aprili et Maio.

P. Lagopus L. In aridis, ad vias : prope *Argostoli* (H., Schräd., Spreitz.). Aprili et Maio.

P. Coronopus L. In aridis demissis et submontanis : *Drapano*, *Argostoli*, *Omalà* (H.). Maio.

P. serraria L. In herbis maritimis : *Argostoli*, *Spartià*, *Stenò* (*Ikosimìa*), *Hagios Soter* (*Thynià*) (H.), ad vineta pr. *Lixuri* (Spreitz.). Maio.

P. maritima L. In locis salsis ad mare : *Argostoli* (H.) Maio.

P. Psyllium L. Βεντουροχώροτον (sec. Dallap. l. c., p. 18). In locis cultis : *Argostoli* (Schm., H.), *Pessada*, *Piscardo* (H.). Aprili et Maio.

4. MONOCHLAMYDEÆ.

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra L. Ἀγριοσταφίδα (sec. Dallap. l. c., p. 59). Non vidi; at subsponsanea in insulis haud rara occurrit.

Cynocrambeaceæ.

Cynocrambe prostrata Gaertn. In saxosis nec non in cultis : *Drapano*, *Hagios Varraros*, *Francata* (H.). Maio.

Salsolaceæ.

Beta vulgaris Moq. α. *maritima* (L.). Ad litora maris : *Hagios Theodoros* pr. *Argostoli* (Spreitz.). Aprili. — β. *Cicla* (L). Ξέσζλο (Dallap. l. c., p. 36). Colitur. — γ. *rubra* DC. Κοζζινογοῶλι (Dallap. l. c.). Colitur.

Chenopodium Vulvaria L. Βρωμόχοροτον (Dallap. l. c., p. 35). In ruderatis frequens (Dallap., H.).

Ch. opulifolium Schrad. In rudibus et locis cultis : *Pes-sada*, copiose (H.). Jul.

Ch. murale L. Στριγλόχορον. In maritimis : *Argostoli*, *Poros* alibique frequens (H.). Aug.

Ch. urbicum L. In cultis et rudibus mari finitimis : *Dra-pano*, *Same* alibique (H.). Aug.

Ch. ambrosioides L. In rudibus in pago *Kontogianata* (H.). Aug.

Atriplex hortense L. Λομπόπη. Colitur in usum culina-rium : *Lordata*, *Aphrato*, *Stenò*, *Kutavo*, etc. (H.). Aug. (fruct.).

A. hastatum L. In maritimis : *Drapano* (H.). Sept.

A. Tataricum L. In halipedis : *Livadi* (*Thynià*) et prope *Samòli* (H.). Sept.

A. portulacoides L. In halipedeo ad *Kutavo* (H.). Sept.

Spinacia oleracea Mill. Σπανάκια. Colitur (Dallap., H.).

Salicornia fruticosa L. Άλμυρίχη et Άρμυρίχη. In halipe-dis : *Kutavo*, *Livadi*, etc. (Dallap., H., Spreitz.). Aprili-Sept. — Folia comeduntur in acetariis.

S. herbacea L. (Dallap. l. c., p. 1). Non vidi.

Salsola Soda L. Ad litora maris : *Drapano*, *Lixuri* (H.). Aug. Sept.

S. Kali L. In arenosis maritimis : *Drapano*, *Lordata*, *Same*, *Livadi*, *Asso* (H.). Aug.

Amarantaceæ.

Amarantus retroflexus L. In cultis : prope *Same* frequens (H.). Aug.

A. albus L. In hortis prope *Spilavà Hagii Gerasimi* (*Ar-gostoli*) (H.). Jul.

Albersia Blitum Kunth. Βλίτρον. Colitur in usum culina-rium (Dallap. l. c., p. 122).

A. deflexa (L.). *Amarantus* prostratus Balb. In cultis ad mare : *Kutavo* (H.). Jul.

Polygonaceæ.

Rumex Patientia L. (?) Ad aquas (Dallap. l. c., p. 53, cum nomine vernaculo Σιδερολάπατον). Anne potius R. Orientalis β. Græcus Boiss. ?

R. conglomeratus Murr. *Ευνάξι*. In herbidis, ad vias : *Argostoli* (H., Schm.),

R. sp. In aquis : *Spilwà Hagii Gerasemi* prope *Argostoli* (H.). Sept.

R. bucephalophorus L. *Ευνάξι*. In aridis, ad vias : *Argostoli* (H., Schm.), *Kraniá* (H.), locis non memoratis (U., Schrad.) Aprili et Maio.

Polygonum serrulatum Lag. In aquis stagnantibus : ad *Kutavo* (Schm.). Aprili. — Quid sit *P. Bistorta* Dallap. (l. c., p. 55) nescio.

P. aviculare L. *Τροφή τῶν καρδελλιῶν*. In aridis, et ad vias : *Argostoli*, *Same*, etc. frequens (H.). Maio.

P. equisetiforme Fl. Gr. In saxosis, ad muros, inter vineta : *Drapano*; *Lordata*; *Skala*, copiose; *Piscardo* (H.). Jul. Aug.

P. maritimum L. In arenosis maritimis : prope *Drapano* (H.). Aug.

Thymelæaceæ.

Thymelæa Tartonraira (L.). Ad rupes *Charakas* raro (H.). Aug. (sine flor.).

Th. hirsuta (L.). Rarius in campis argillosis prope *Mantzavinata* (eparchiæ *Palike*) (H.).

Lauraceæ.

Laurus nobilis L. *Λάφνη*. In submontosis versus septentrionem spectantibus; supra *Same* copiose prope *Hagii Phantes*, in valle *Heracleon*, in altioribus eparchiæ *Thyniá*; hinc inde fruticosa, sepes efformans secundum vias : *Koroni*, *Asprogeraka*, *Hagia Euthymia*, *Pylaros*, etc. (H.).

Santalaceæ.

Osiris alba L. In fruticetis, olivetis, ad vias haud rara : *Argostoli*, *Lasi*, *Lixuri*, *Skiniá*, *Hagia Thecla*, etc. (H., Schm.). Aprili et Maio.

Cytinaceæ.

Cytinus Hypocistis L. Ad radices *Cistorum*. In *Cephalloonia* (U.), inter *Argostoli* et *Hagios Theodoros* (Sprz.). Aprili.

Aristolochiaceæ.

Asarum Europæum L. In nemorosis (Dallap., l. c., p. 60) (? H.).

Aristolochia rotunda L. Ἀμπελοζλάδι (sec. Dallap.). Ad rupes collium prope *Lixuri* (U.), in arundinetis maritimis pr. *Drapano* (H.), *Hagios Theodoros* (Spreitz.), *Livathò* (Schm.). Aprili et Maio.

A. longa L. Abundat cum præcedente sec. Dallap. (l. c., p. 119).

Euphorbiaceæ.

Euphorbia Peplis L. In arenosis maritimis : *Lasi* prope *Argostoli*, *Stenò* (*Ikosimia*), *Lixuri* (H.). Aug.

E. Chamæsyce L. In cultis : *Piscardo*, m. *Phalaris* (H.). Aug.

E. dendroides L. Σπλόνος. In rupibus ad litora maris : *Asso* ad castrum, *Hagios Soter* (*Thynià*), frequens in eparchiæ *Palike* variis locis : *Hagia Thecla*, *Kontogiannata*, *Vovikes*, *Drakines* (H., Schm.). Aprili. Torpefaciendo pisces a piscatoribus sæpe adhibita (e. gr. anguillas in paludibus *Akoli*, et *Abydos*).

E. acanthothamnus Heldr. et Sart. In rupinis calcareis : (U. sub *E. spinosa*) ; *Argostoli* (Schm., Schrad., Spreitz.), *Hagios Soter* (*Thynià*), *Omalà* (H.). Aprili et Maio.

E. pubescens Vahl. In locis paludosis ; *Argostoli* ad *Kutavo* (Schm.), *Lixuri* (H.). Aprili.

E. helioscopia L. In cultis : *Argostoli* (Schm.), *Omalà* (H.). Aprili et Maio.

E. falcata L. Inter vineta prope *Same* (H.). Aug.

E. Nicæensis All. In Cephalloniæ pascuis sec. specim. a *Mazziari* missum in herb. Heldr.

E. Paralias L. In arenosis maritimis : *Argostoli*, *Stenò* (*Ikosimia*), *Asso*, *Athera*, *Lixuri* (H.), « in montosis » (U.). Maio-Aug.

E. Sibthorpiana Boiss. Raro in Cephalloniæ eparchia *Palike* ; vidi tantum prope *Hagia Thecla* et *Kontogiannata* (H.).

E. biglandulosa Desf. Ἀγλέουρας. Copiose in saxosis calcareis insulæ, a litore maris ad cacumina m. Aeni usque (H.).

Maio. — Rustici ejus lacte coagulato et exsiccato pilulas vehementer purgativas conficiunt.

Crozophora tinctoria (L.). In locis cultis frequens : *Drapano*, *Pessada*, etc. (H.). Aug.

Mercurialis annua L. *Βροντοθέρμ* (sec. Dallap. l. c., p. 131). In locis cultis nec non in collibus saxosis frequens : *Argostoli*, *Pessada*, *Pylaros*, etc. (H.). Aprili et Maio.

Ricinus communis L. *Χαμροζουιά*. Sponte crescens in « *villa Svoronata di Livatò* » alibique in insula secund. Dallap. l. c., p. 125.

Urticaceæ.

Urtica urens L. In locis cultis : (Dallap. l. c., p. 121) *Argostoli* (H.). Maio.

U. dioica L. In Cephall. sec. Dallap. l. c. et sec. Marg. et Reut. Flore de Zante.

U. pilulifera L. *Τζουρνίδα* et *Ατζιρνίδα*. (Urticæ species in genere!) In ruderibus pagorum : *Argostoli*, *Skala*, *Pylaros*, *Kontogiannata*, etc. (H.). Maio.

U. membranacea Poir. In cultis : *Argostoli* (H.), *Aphrato* (Schm.) Aprili et Maio.

Parietaria Judaica L., Boiss. (P. diffusa M. et K.) *Περδικάκι*. Ad rupes et muros frequens : *Argostoli*, *Same*, etc. (H., Schm.). Aprili et Maio. — Herba decocta in lacte anti-phthisica putatur.

P. Cretica L. In saxosis : *Franeata* (H.). Maio.

P. Lusitanica L. β. *filiformis* Wedd. Ad muros : prope *Pessada* (H.). Maio.

Morus nigra L. et *M. alba* L. *Μουριά* et *Σαμυιά* (Dallap. l. c., p. 122). Frequens coluntur.

Ficus Carica L. a. *genuina* Boiss. Fico silvestre Dallap. (l. c., p. 132). In rupibus maritimis pr. *Pessada* (H.). *Συζιά*. Coluntur varietates plurimæ : fructibus permagnis præcocius (Jun. maturesc.) : *Σύζα βοόζμα* ; fructib. minutis viridibus dulcissimis (August. maturesc.) : *σύζα φραζασάτα* ; etc. etc,

Ulmus campestris L. *Φτελέα*. Ad vias sæpe fruticosa sepes efformans, ad rivos, etc. : *Argostoli*, *Koroni*, *Same* (H.).

Juglandaceæ.

Juglans regia L. *Καρυδιά*. Cult. in submontosis : in valle *Heracleon*, in pagis *Pyrghi*, pr. *Kastro*, *Same* (H.).

Platanaceæ.

Platanus Orientalis L. *Πλάτανος*. Sponte ad rivos : *Heracleon*, *Koroni*, *Poros*, *Abydos*, *Stenò* (*Ikosmia*); freq. etiam culta, pr. *Argostoli*, *Lixuri*, etc. (H.).

Cupuliferæ.

Quercus sessiliflora Sm., Boiss. *Πουπάκι*. In submontosis : *Mavrata* (*Eliòs*), *Skala*, *Koroni*, *Heracleon*, *Asprogeraka*, *Erisso*, etc. (H.). Arborea mediocres. — *Q. Cerris* Dallap. (l. c., p. 122) ut videtur e nomine vernaculo *Πουπάκι* et hinc inde ἡ δρῦς.

Q. Ilex L. *Ἀριά*. In sylvis montanis : in m. *Atro*, in m. *Rhudi* usque in regionem abietinam et in montibus circa *Same* (H.).

Q. coccifera L. a. *genuina* Boiss. (*Q. Ilex* Dallap. l. c. non L. cum nomine vernaculo *Κατζιδοπίρναρο*). In collibus saxosis frequens : *Argostoli*, *Piscardo*, etc. (U., Schm., H.). — *Var. β. Calliprinos* Boiss. (*Q. Calliprinos* Webb.). Forma arborea foliis inermibus. *Προνάρι*. In submontosis, nec non in maritimis : in eparchiæ *Heracleon* m. *Atro* et prope *Poros*, *Same*, *Pyrghi* sylvas efformans cum *Q. Ilici*, *Koroni*, *Athera* (*Lòngos*), *Kipuria*, *Pessada*, etc. (H.). Aprili.

Q. Aegilops L. *Βελανηδιά*. In montanis raro : in m. Aeno supra *Heracleon* et pr. *Karpandriti*, in m. *Atro* ad cœnobium, prope *Barì* in eparchia *Erisso* (H.). Aug. (fructib. immaturis).

Corylus Avellana L. *Μουζελιά*. Secund. Dallaporta l. c.

Ostrya carpinifolia Scop. *Γαῖρος*. Raro in m. Aeno supra *Karpandriti* (*Heracleon*) cum *Quercu Aegilopide* (H.). Aug. (fruct.).

Salicaceæ.

Salix cinerea L. Ad margines paludis *Akoli*, nec alibi (H.). Obs. *Populum albam* L. et *P. nigram* L. hinc inde cultas

observavi. — *Betula alba* L. a Dallap. e m. Aeno indicata ibi certe non crescit.

Callitrichaceæ.

Callitriche stagnalis Scop. In aquis stagnantibus vel lente fluentibus : *Gastrinovrysi* et *Hagios Joannes* ad *Kularo*, pr. *Samòli* et in palude *Akoli* (H.). Aug. Sept. (fruct.).

II. GYMNOSPERMÆ

Gnetaceæ.

Ephedra campylopoda C. A. Mey. In rupibus et muris : *Kastro*, *Same* in *Palæokastro*, *Poros*, *Charakas*, *Athera* (H.). Aug. (flor. masc. et fructibus).

Coniferæ.

Pinus Halepensis Mill. Ad litora maris prope *Same* observavit cl. Spreitzenhofer (Beitrag l. c., p. 730), sed nullo vidi in insulæ loco (H.).

Abies Cephalonica Loud. Ἐλατος. In montibus Cephaloniæ alt. 2500'-5000' regionem sylvaticam efficiens, i. e. in m. Aeno (*Monte nero* hod.) nec non in ejus jugis boreo-occidentalibus *Rhudi* dictis. Heldr. Herb. Græc. normale N° 801 (anno 1861). Cfr. Unger, Reise l. c., p. 56 (cum icone) et p. 90. *Pinus Abies* Dallap. l. c., p. 124. Flor. Maio.

Cupressus sempervirens L. var. *α*. fastigiata et *β*. horizontalis Parl. Κυπαρίσσι. Arbor frequenter et copiose culta in insula, maxime in eparchiis *Erissò*, *Eliòs*, *Koroni*, *Pylaros*, etc.

Juniperus Phœnicea L. Κέδρος. In saxosis mari finitimis : pr. *Same* (U., H.) ad cœnobium *Grilia*, *Mavrata* (*Eliòs*), *Piscardo* alibique in eparchia *Erissò*, pr. *Kipuria* (H.).

III. MONOCOTYLEDONEÆ

Palmæ.

Phœnix dactylifera L. Ταπαλιά (sec. Dallap. l. c., p. 136). Rarius culta fructus non maturans.

Typhaceæ.

Typha angustifolia L. *Ψαθί*. In paludosis ad *Kutavo*, pr. *Hagios Joannes*, pr. *Livadi Karpuri* (*Thyniá*), et ad stagnum *Akoli* (*Pyrgi*) (H.). Aug. Sept. (fructif.).

Araceæ.

Arisarum vulgare Targ. Prope *Argostoli* (H.).

Arum Italicum Mill. Ad sepes : *Pessada* (H.). Maio. Ad hoc probabiliter spectat *A. maculatum* Dallap. (l. c., p. 119, cum nomine vernaculo *Δραζόντι*).

Lemna minor L. Prope *Argostoli* (U.), in aquis lente fluentibus pr. *Hagios Joannes* ad *Kutavo* (H.).

Najadaceæ.

Potamogeton pectinatus L. In aqua salsa ad molas prope *Same* (H.). Aug. (fruct.).

Zannichellia palustris L. In stagno *Akoli* (*Pyrgi*) (H.). Aug. (fruct.).

Posidonia Caulini Kōn. *Φόζια* (plural.). Freq. ad litora insulæ in aqua marina; copiosissime pr. *Lixuri* (H.).

Orchideaceæ.

Aceras longibracteata (Biv.) *Same* (Mazziari in Hb. H.).

Scrapias laxiflora Chaub. *a. parviflora* Rehb. f. In collibus *Livathò* (Schm.). Aprili.

Orchis provincialis Balb. *β. pauciflora* Rehb. f. In regione abietina m. Aeni (H., U., Spreitz.). Aprili et Maio.

O. quadripunctata Ten. In regione abietina m. Aeni (H., Spreitz.). Aprili et Maio.

Ophrys fusca Lk. In ins. Cephal. (U.).

O. lutea Cav. Pr. *Argostoli* freq. (Schm.). Aprili.

O. aranifera Huds. var. *atrata* (Lindl.) Rehb. f. Indicata a cl. Ung.

O. Bertolonii Moretti. *Hagios Theodoros* pr. *Argostoli*, rar. (H.). Maio.

O. scolopax Cav. var. *æstrifera* Rehb. f. *Τὸ πουλάκι τῆς*

Αμυρᾶς. Pr. *Argostoli* (Schm.), pr. *Pessada* (H.). Aprili. —
Var. cornuta Rehb. f. In arundinetis prope *Argostoli* (*Drapano*) (H.). Maio.

Epipactis rubiginosa Gaud. Freq. in regione abietina m. Aeni (Letourneux). Maio.

Amaryllidaceæ.

Pancratium maritimum L. *Κρίνος*. In arenosis maritimis; *Steno* pr. *Pessada*, *Lixuri* (H.). Sept.

Hermione Tazetta (L.). Secund. cl. Mazziari.

H. scrotina (L.). Sec. cl. Mazziari in Herb. H.

Agave Americana L. *Ἀθάνατος*. Ubique culta ad vias sepes efformans et nunc revera spontanea copiose crescit in rupibus maritimis et locis incultis insulæ (*Drapano*, *Pessada*, *Asso*, etc. freq.) (Dallap., H.). Jul.

Irideaceæ.

Iris Germanica L. *Ἀρριόχρινος* sec. Dallap. l. c., p. 10.

Xiphion gramineum (L.). Ad vineta in oropedio *Omalà* (l. d. *Karavias*), sine flor. (H.).

Gynandriris Sisyrinchium (L.). In collibus siccis et ad vias : copiose prope *Lixuri* (H.), *Panagia Kechrianotissa* (Schm.). Aprili et Maio.

Gladiolus communis L. Indicatur a cl. Unger.

G. segetum Gawl. In arvis : pr. *Argostoli*, *Simiadata* et in oropedio *Omalà* (H.), pr. *Aphrata* (Schm.). Aprili et Maio.

Crocus Schimperii J. Gay, ex ipso! in Schimper plant. exsicc. e Cephalonia ann. 1855. (C. Spruneri Boiss. et Heldr. plant. Attic. non differt.)

Dioscoreaceæ.

Tamus communis L. β. *Cretica* Parlat. *Θόρυδά*. Ad sepes et in fruticetis : prope *Argostoli* (Schm.), prope *Lixuri* (H.). Aprili et Maio. — Turiones comeduntur sicut asparagi.

Asparagaceæ.

Smilax aspera L. *Ἀρξουδόβατος* et *Ἀέλιαξα*. Ad sepes et in dumetis frequens : *Drapano*, *Pessada*, *Lixuri*, etc. (Dallap., H.). Sept.

Ruscus aculeatus L. Ἀγριομερσίνη, Ὀξυμερσίνη et Νεροχα θουλίθρα. In umbrosis regionis inferioris, nec non in rupinis montium : *Spilavà* pr. *Argostoli* (Dallap.), pr. *Phokada* et *Lakythra*, in m. *Phalaris* et ad cœnobium montis *Atro* (H.). Semina fricta ad instar Coffeæ seminum usui sunt. Radix antilymphatica secundum cl. Dallaporta ¹.

Asparagus aphyllus L. Σπαραγούνια (Dallap.). In saxosis pr. *Argostoli*, *Piscardo*, alibique frequens (H.).

Liliaceæ.

Gagea foliosa R. et Sch. In regione abietina superiori m. Aeni, rara (H.). Maio.

G. polymorpha Boiss. In m. Aeno (U., Spreitz.). Aprili.

Lloydia Gravca (L.). In herbosis ad vias ubique frequens (U., Schm.), pr. *Argostoli* (Spreitz.), *Kulumo*, *Pessada*, *Hag*. *Phanentes* (H.). Aprili et Maio.

Lilium candidum L. In cultis oropedii *Omalà*, an revera spontanea v. subsponsanea? (H.) Maio.

Bellevalia dubia (Guss.). In regione superiore m. Aeni, alt. 4000'-5500', haud rara (H.). Maio.

Leopoldia comosa (L.). In herbidis maritimis pr. *Argostoli* (H.). Maio.

Botryanthus racemosus (L.). Καλογηριδ. In Cephalonia sec. Dallap. et sec. Marg. et Reut. Flore de Zante; in m. Aeno (U.). Comeduntur bulbi et flores.

Scilla bifolia L. β. *minor* Boiss. (Sc. *nivalis* Boiss.). In reg. superiore m. Aeni (U., H.). Maio.

Urginia Scilla Steinh. Ἀσχινοζάρα vel Κουτζούνα. In saxosis insulæ ubique abundat et etiam in montes adscendit (Dallap., H.); *Argostoli*, *Pessada*, *Poros*, *Piscardo*, *Omalà*, m. Aenos, etc. (H.). Aug. Sept.

Ornithogalum exscapum Ten. In oropedio *Omalà* ad *Hagios Gerasimos* nec non in cacumine m. Aeni (H.). Maio. — Pedicellis incrassatis refractis facile distinguendum.

O. minus L. f., Bory et Chaub. Fl. Pelop. Pr. *Argostoli* et *Aphrato* (Schmidt). Aprili. — Differt a præcedenti pedicellis longioribus patentissimis gracilibus.

¹ Cfr. ejus Διατριβή in Ἴονιος Ἀνθολογία, Maio 1833.

O. Narbonense L. In arvis : pr. *Argostoli* (H.), *Aphrato* (Schm.). Aprili et Maio.

Allium arvense Guss. (A. sphærocephalum L. β . arvense Parl.). In oropedio *Omalà* inter vineta pr. *Karavias* (H.). Julio.

A. Chamæspathum Boiss. et Spr. In collibus saxosis ; pr. *Kastro* et in *Palavokastro* pr. *Lixuri* (H.). Sept.

A. subhirsutum L. In oropedio *Omalà* (H.), ad vineta pr. *Lixuri* (Spreitz.), loco non indicato (U.). Aprili et Maio.

A. trifoliatum Cyr. (A. subhirsutum β . Græcum Regel). Pr. *Aphrato* (Schm.). Aprili. — Species A. subhirsuto affinis quidem sed phyllis angustioribus acutioribusque carina coloratis, stylo elongato et capsulæ forma bene distincta ut recte notat cl. Guss. pl. ins. Inarim. p. 335.

A. nigrum L. In arvis : *Drapano* (Schm.), *Omalà*, *Francata* (H.). Aprili et Maio.

A. roseum L. Pr. *Lixuri* (H.). — Var. *bulbiferum* Kth. Pr. *Argostoli* (Schm.). Aprili et Maio.

Allii species sequentes in usum culinarium frequenter coluntur : *A. sativum* L. *Σκόρδον*, *A. Porrum* L. *Πόρσον* et *A. Ceba* L. *Κρεμόδι* (frequenter forma bulbo amplo disciformi). (Dallap. et H.). — *A. Schenoprasum* L. a cl. Unger indicatum ab aliis non observatum est.

Asphodelus microcarpus J. Gay. *Ἀσφεροδούγλας*. A. ramosus Dallap. l. c., p. 49. In collibus maritimis pr. *Argostoli* (H.). Aprili et Maio.

A. fistulosus L. Frequens in arce *Kastro*, *San Giorgio*, pr. *Pessada* (H.).

A. tenuifolius Cav. Ad litora maris ad *Hagios Theodoros* pr. *Argostoli* (Spreitz.). Aprili.

Colchicaceæ.

Colchicum Kochii Parlat. In aridis et saxosis, in m. *Gerolaki* supra *Akoli* et ad fontem *Michalitzza* rarius ; in reg. abietina m. *Rhudi* in planitiem descendens usque ad *Same* freq. ; pr. *Lixuri*, *Masarakata*, *Hagios Andreas*, *Taphiüs* et *Kipuria* (H.). Aug. Sept. — Ad hoc probabiliter spectat C. autumnale Dallap. l. c., p. 54 (« ubique frequens autumnio »).

Juncaceæ.

Luzula Forsteri DC. In regione abietina m. Aeni frequens alt. 3500'-5000' (H.). Maio.

Juncus acutus L. Ad mare prope Poros (H.).

J. Heldreichianus Marss. In maritimis : prope Argostoli (Drapano) et pr. Lixuri (H.). Aprili et Maio.

J. maritimus L. Loco speciali non notato (U.).

J. lamprocarpus Ehrh. In humidis : Kateliòs (H.). Aug. (fruct.).

J. bufonius L. Loco non notato (U.). — Var. *β. fasciculatus* Jan. (J. insulanus Viv.). In arenosis prope Lixuri (H.). Maio.

J. capitatus Weig. Pr. Same (Dr Newton secundum Mazz. in herb. Heldr.).

Alismaceæ.

Alisma Plantago L. In aquis stagnantibus v. lente fluentibus : Hagios Joannes ad Kutavo, Spilvâ pr. Argostoli (H.). Maio-Sept.

Cyperaceæ.

Cyperus distachyus All. In humidis ad Kutavo (raro pr. Gasteronovrysi to Perivolaki) (H.). Sept.

C. Preslii Parl. In humidis ad Spilvâ Hagios Gerasimos pr. Argostoli (H.). Jul.-Sept. An a C. badio Desf. satis diversus ?

Cladium Mariscus L. In paludosis : Livadi Karpuri eparch. Thyniâ (H.). Sept. (fruct.).

Heleocharis palustris (L.). In cœnosis faucium m. Aeni (Dr Caritato sec. Mazz. in herb. Heldr.).

Scirpus mucronatus L. In maritimis pr. Same (Dr Mich. Caritato sec. Mazz. in herb. Heldr.).

S. lacustris L. In aquosis ad Kutavo prope molas Hagios Joannes; in stagno Akoli (H.). Sept.

S. Holoschoenus L. *β. australis* Koch. In humidis, Hagios Thomas pr. Pessada (H.). Jul.

S. maritimus L. In humidis pr. Argostoli (Schm.). Aprili.

Carex distans L. In cœnosis vallium (Mazz. in herb. H.).

C. humilis Leyss. In herbosis culminibus septentrionalibus m. *Nigri* Cephal. ad margines faucium nivalium (Condoguri sec. Mazz. in herb. Heldr.).

C. divulsa Good. Pr. *Argostoli* (Schm., H.). Aprili et Maio.

C. vulpina L. Loco non notato (Schm.). Aprili.

C. divisa Huds. In paludosis ad mare *Drapano* pr. *Argostoli* (H.). Maio.

Graminaceæ.

Anthoxanthum odoratum L. Loco non notato (U.).

Phalaris minor Retz. Pr. *Argostoli* et *Kastro* (H., Schm.); pr. *Lixuri* ad vineta (Spreitz.), pr. *Francata* (H.). Aprili et Maio.

Ph. nodosa L. Pr. *Same* (Mazz. in herb. Heldr.).

Phleum echinatum Host. Loco non notato (U.), ad mola *Stevens* pr. *Argostoli*, pr. *Kontogianata* (*Pali*ke); in reg. sup. m. *Aeni* (forma pumila glumis violaceis) (H.). Aprili et Maio.

Ph. exaratum Hochst. in Griseb. Spicileg., p. 463. In oropedio *Omalà*, alt. 2000' (H.). Maio. — *Ph. Græcum* Boiss. et Heldr. in Boiss. Diagn. pl. Or. XIII, p. 42, valde affine differt tamen culmis purpurascens erectis, spica acuminata a folio supremo remota, glumis divergenti-incurvis (in pl. Cephal. rectis) longius ciliato-pectinatis longiusque acuminatis (in pl. Cephal. breviter mucronatis).

Mibora verna P. B. In regione superiori m. *Aeni* (H.). Maio.

Zea Maïs L. *Καλαμπόκι*. Colitur passim, pr. *Argostoli* et præsertim pr. *Herakleon* et *Same* (Dallap., H.).

Echinochloa Crus-galli (L.). *β. submutica* Parl. In humidis : *Gastrinovrysi* ad *Kutavo* (H.). Sept.

Digitaria sanguinalis (L.). In cultis ad mare pr. *Same* freq. (H.). Aug.

Imperata cylindrica (L.). Freq. in collibus argillosis inter vineta pr. *Lixuri*; pr. *Mantzavinata* (H.). Maio.

Andropogon hirtum L. In Ceph. freq. (U.), ibid. (Schm.). Aprili.

A. pubescens Vis. In Ceph. (Mazz. in hb. H.), pr. *Drapano*, (H.). Maio-Jul.

Pollinia distachya (L.). Loco non notato (U.), pr. *Argostoli* (H., Schm.). Aprili et Maio.

Chrysopogon Gryllus (L.). In sylvaticis submontosis m. Aeni (Mazziari in herb. Heldr.).

Sorghum Halepense (L.). In locis cultis, vinetis, etc. freq. pr. *Argostoli* et pr. *Same* (H.). Jul.-Sept.

Milium Montianum Parlat. In regione superiore m. Aeni (H.). Maio.

Piptatherum caeruleum (Desf.). Loco non notato (U.).

P. holciforme (M. B.). Loco non notato (Schm.). Aprili.

P. multiflorum (Cav.). Ad sepes pr. *Argostoli*, *Pessada*, *Same*, *Gerolaki* (Pyrgi), etc. (H.). Maio-Jul.

Stipa pennata L. In montosis eparch. *Pylaros* freq. (H.).

St. tortilis Desf. In locis aridis ; pr. *Drapano* (H.), prope *Lixuri* (Schrad.). Maio.

Aristella bromoides Bert. In saxosis submontosis : *Erisso*, *Kokalota*, etc. (H.), in m. Aeno (Mazz. in hb. H.). Aug.

Gastridium lendigerum (L.). In locis aridis : *Omala*, *Kompanistra* supra *Same*, *Piscardo* (H.). Maio.

Agrostis verticillata Vill. (A. stolonifera L. sec. Parlat.). In humidis : ad *Kutavo* (H.). Aug.

Sporobolus pungens (Schreb.). Ad oras anatolicas *Cephaloniae* (Mazz. in herb. Heldr.).

Polypogon Monspeliense Desf. Ad litora maris pr. *Lixuri*, (H.). Sept.

Lagurus ovatus L. In herbiculis, ad vias : pr. *Argostoli*, pr. *Pessada* freq. (H.). Maio.

Arundo Donax L. *Kalamud*. Dallap. l. c., p. 11 ; in aquosis pr. *Drapano*, *Hagios Joannes* ad *Kutavo* (H.). Sept.

Phragmites communis Trin. Ad molas pr. *Same* (U.) ; in stagno *Akoli* et ad *Kutavo* (H.). Aug.

Cynodon Dactylon Pers. Ubique freq. in aridis ad vias et in locis cultis : *Argostoli*, *Drapano*, etc. (H.). Aug.

Aira capillaris Host. β . *biaristata* Boiss. Pr. *Pessada* (H.). — Huc A. caryophylla sec. Unger (pr. *Argostoli*)?

Avena sativa L. *Βρόμη*. Freq. culta (Dallap. H.).

A. brevis Roth. In *Cephalonia* (U.). — An culta?

A. barbata Brot. In collibus siccis et ad vias prope *Drapano* (H.). Maio.

Melica Cretica Boiss. et Heldr. forma major. In rupestribus ad cacumen m. Aeni et in m. Atro (H.). Aug.

M. minuta L. In saxosis oropedii Omalà (H.). Maio. — Huc probabiliter spectat *M. pyramidalis* a cl. Unger indicata.

Koeleria phleoides Pers. In locis aridis : *Drapano*, *Piscardo*, etc. (H.). Maio.

Cynosurus echinatus L. In herbidis siccis ubique frequens : *Pessada* (H.), *Lixuri* (Schräd.). Maio.

C. elegans Desf. In m. Atro ad cœnobium (H.).

Poa bulbosa L. In regione super. m. Aeni (H.). Maio. — *β. vivipara*. Loco non notato (U.), *Francata* (H.).

Eragrostis megastachya (Koel.). In locis cultis : *Spilwà*, *Hag. Gerasimi* pr. *Argostoli*, *Pessada*, *Pylaros* ad *Panagiotas Krenes* (H.). Jul. Aug.

Briza media L. Indicatur a cl. Unger.

B. maxima L. In collibus siccis : *Drapano*, *Pessada*, *Pylaros* (H.). Maio.

Serrafalcus arvensis (L.). Loco non notato (sec. cl. Unger).

S. intermedius (Guss.). Pr. *Lixuri* (Schräd.). Maio.

Bromus sterilis L. Loco non notato (Schm.). Aprili.

B. Madritensis L. In Ceph. sec. Unger.

B. rubens L. Ad muros et in locis aridis : *Pessada* alibi que (H.). Maio.

B. fasciculatus Presl. Raro pr. *Argostoli* (Schm.). Aprili.

Vulpia ciliata (Danth.). In muris prope *Pessada* (H.). Jul. (deflor.).

Festuca duriuscula L. In m. Aeno (sec. Mazziari in herb. Heldr.).

Dactylis glomerata L. In saxosis : pr. *Argostoli*, ad mare pr. *Stenò eparch. Ikosimia* (H.). Maio, Jun.

Scleropoa rigida (L.). In herbosis siccis : *Pessada*, *Omala*, *Piscardo* (H.). Maio.

Catapodium loliaceum (Huds.) var. *ramosa* Boiss. Mss. In arenosis oropedii *Omala*, alt. 2000' (H.). Maio. — *Lusus* notabilis statione montana spica longa racemosa basi laxa ramosa.

Brachypodium pinnatum (L.). In collibus saxosis prope *Piscardo* (H.), ad radices m. Aeni (Mazz. in herb. H.).

Agropyrum pungens (Pers.) var. *glaucescens*. In mariti-

mis et in cultis frequens : in arundineto pr. *Drapano*, pr. *Stenò* (*Ikosimia*), pr. *Spartia* loco dicto *Polytrichi* copiose (H.). Jul. Aug. Vulgo Ἀγριο ἔρι.

A. repens (L.). Ἀγριάδα. Frequens in Cephalonia sec. Dallap. l. c. p. 16, et sec. Marg. et R. Flore de Zante.

Triticum vulgare Vill. var. *T. hybernum* L. et *T. aestivum* L. Coluntur Dallap. l. c. p. 15. Vulgo Σιτάρι.

T. villosum (L.). Freq. ad vias et in collibus siccis : prope *Lixuri* (H.), *Argostoli* (Schräd.), etc. Maio.

Secale cereale L. Σιτάλη. Colitur sec. Dallap. l. c. p. 12.

Hordeum hexastichum L. Κριθάρι. Freq. colitur. Sec. Dallap. l. c. p. 12, coluntur in insula et *H. vulgare* L. et *H. nudum* L. et *H. distichum* L.

H. murinum L. In locis siccis pr. *Argostoli* (H.). Maio.

H. maritimum With. Ad litora maris : *Kateliòs* (H.). Jul.

Lolium temulentum L. Ἐρα sec. Dallap. l. c. p. 12. In arvis oropedii *Omalà* (H.). Maio.

Lepturus incurvatus (L.). E Cephalonia in herb. Heldr. a Mazziari communicatus.

Psilurus nardoides Tripp. Freq. in collibus siccis : prope *Pessada*, *Piscardo* (H.). Maio.

IV. CRYPTOGRAMÆ VASCULARES

Lycopodiaceæ.

Selaginella denticulata (L.). Ad rupes et saxa in locis umbrosis (Ung.), *Argostoli*, *Pessada*, *Piscardo* (H.).

Filices.

POLYPODIACEÆ.

Gymnogramme Ceterach (L.). Σχροπίδι. Freq. ad muros ; pr. *Argostoli*, *Kastro Hag. Georgios*, *Pessada*, *Omalà*, etc. (H.).

Grammites leptophylla Sw. Ad rupes et muros in umbrosis : *Hagios Varvaros* pr. *Argostoli*, *Kastro*, *Skala*, ad cœnobium in m. *Atro* (H.).

Polypodium vulgare L. In rupibus et in muris vetustis : *Kastro Hag. Georgios*, ad cœnobium *Hag. Andreas* prope

Peratada, ad cœnob. *Taphiûs* (H.). Vulgo Πολυπόδι sec. Dallaporta.

Cheilanthes odora Sw. In fissuris rupium calcar. (U.), in muris et in saxosis : *Kastro*, *Pessada* et *Omalà* (H.).

Adiantum Capillus Veneris L. Πολυπρίχι. In scaturiginosis (Dallap.), pr. *Argostoli* (U.); in umbrosis humidis : *Hagios Thomas* et fauces *Stenò* pr. *Pessada* (H.).

Pteris aquilina L. Φτέρρα. Ubique frequens in insula, a lit. maris usque ad cacumina montium : in m. Aeno, copiose in montibus inter *Plaros* et *Phalaros*, ad mare prope *Lixuri*, *Argostoli*, *Poros*, etc. (H.).

Asplenium trichomanes L. In Cephal. (Mazziari in herb. Heldr.), rarius in m. *Atro*, ad cœnobium (H.).

A. Ruta-muraria L. Sec. Dallap. l. c. p. 133.

Nephrodium Thelypteris (L.). In humidis ad stagnum *Akoli* (H.). Aug. (fruct.).

N. pallidum Bory. In nemorosis pr. *Athera*, ad rupes *Charakas* et pr. *Asso*, pr. *Kokolata* (*Erisso*) (H.).

N. Filix-mas (L.). In ins. variis locis sec. Dallap. l. c. p. 133, et sec. Marg. et Reut. Flore de Zante. Indicatio mihi videtur dubia.

V. CRYPTOGRAMMÆ CELLULARES.

(Fere omnes sec. cl. Unger notatæ sunt.)

Musci.

ACROCARPI : POTTIACEÆ.

Barbula inermis Schimp. In m. Aeno (U.).

B. muralis Hedw. Ibid. (U.). — Var. *incana* Ceph. (U.).

B. subulata Brid. In m. Aeno (U.).

B. vinealis Brid. Ibid. (U.).

B. ruralis Hedw. In m. Aeno (U.), ibid. in reg. abietina, alt. 3500' - 5500', freq. (H.). Maio (fructif.).

GRIMMIACEÆ.

Grimmia pulvinata Sm. In m. Aeno (U.).

Gr. trichophylla Grec. Ibid. (U.).

Gr. apocarpa Hedw. Ibid. (U.).

- Zygodon viridissimus* Br. et Schimp. In m. Aeno (U.).
Orthotrichum cupulatum Hoffm. In m. Aeno (U.).
O. speciosum Schimp. Ibid. (U.).
O. leiocarpum Schimp. Ibid. (U.).
Eucalypta vulgaris Hedw. Ibid. (U.).
Gymnostomum tenue Schrad. Ad muros : *Kastro Hagios Georgios* (H.). Sept. (fruct.).

M. pleurocarpi.

NECKERACEÆ.

- Neckera Cephalonica* Jur. et Ung. in Unger Reise p. 112.
Ad truncos arborum vetustorum in monte nigro (i. e. Aeno) Cephaloniæ (U.).
N. turgida Juratzk. in Ung. l. c. p. 113. Ibid. (U.).
N. pumila Hedw. Ibid. (U.).
Leucodon sciuroides var. *cyindricus* Schimp. Ibid. (U.).

HYPNACEÆ.

- Pterogonium gracile* Sm. Vulgo *Mázxa* = Hypni species in genere. In m. Aeno (U.), ibid. in regione abietina copiose alt. 3500'-5500' (H.).
Homalothecium sericeum Br. et Schimp. Cum præcedente freq. (U. H.).
Camptothecium aureum Br. et Schimp. Cum præcedente (U.).
Scleropodium illecebrum Br. et Schimp. In m. Aeno inter *Homalothecium sericeum* (U.).
Eurhynchium circinnatum Br. et Schimp. In m. Aeno (U.).

Hepaticæ.

- Plagiochasma Aitonia* Lindl. et Nees. In Ceph. (U.).

Fungi.

GYMNOASCI.

- Torula fumago* Cheval. In foliis Olearum frequentiss. (U.).

GASTEROMYCETES.

- Lycoperdon bovista* L. (?) *Ἀλεπουπορδί*. In collibus siccis pr. *Argostoli* (H.).

HYMENOMYCETES.

Polyporus lucidus Pers. In radicibus Vitis viniferæ apyrenæ raro. Pr. *Kontogiannata* (planta unica!) (H.).

Lichenes.

A) CLADONICACEÆ : CLADONIEÆ.

Cladonia alcicornis Ligthf. In m. Aeno (U.). — Var. *microphyllina* Fr. *Körb.* Ibid. (U.).

C. endiviæfolia Dicks. In Cephal. (U.), in collibus siccis pr. *Pessada* (H.).

B) LECIDEACEÆ : BIATOREÆ.

Biatora decipiens Ehrh. In Cephal. (U.).

C) PARMELIACEÆ : USNEÆ.

Evernia furfuracea L. *Körb.* In truncis Pinorum m. Aeni frequens (U.).

E. divaricata L. β . *Ungeri* Hepp. in Ung. l. c. p. 103. In truncis arborum vetustis m. Aeni (U.).

Bryopogon sarmentosum Ach. *a. genuinum* *Körb.* Cum præcedente (U.).

Physcia ciliaris L. β . *angusta* Mass. In m. Aeno (U.).

PELTIGEREÆ.

Nephroma resupinatum L. β . *laevigatum* Ach. Frequentissime in ramis Pinorum m. Aeni (U.).

Peltigera canina L. *a. ulorrhiza* Flk. In m. Aeno (H.).

IMBRICARIEÆ.

Sticta pulmonaria L. Lichen pulmonarius Dallap. l. c., p. 135. Frequens in m. Aeno (U.), ibid. ad truncos Abietum, alt. 3500'–5500' (H.).

St. sylvatica L. β . *fuliginosa* Dicks. In m. Aeno raro (U.).

Parmelia parietina L. β . *aureola* Ach. *b. saxicola* Hepp. In Cephalonia (U., H.).

Lobaria pulverulenta Schreb. *a. allochroa* Ehrh. In m. Aeno non frequens (U.).

LECANOREÆ.

Amphiloma plumbeum Ligthf. β . *myriocarpum* Delis.
In truncis arborum m. Aeni (U.).

Lecanora gypsacea Sm. Cephal. (U.).

L. radiosa Hoff. α . *circinnata* Pers. In Cephalonia in consortio *Placodii callopismi* Ach. (U.).

Placodium callopismum Ach. Cephal. (U.).

P. murorum var. *centroleuca* Mass. Cephal. (U.).

P. ochraceum Schaer. β . *Schaereri* Hepp. Ibid. (U.).

Patellaria Rabenhorstii Hepp. Ibid. (U.).

COLLEMEÆ.

Collema flaccidum α . Ach. In m. Aeno. (U.).

D) VERRUCARIACEÆ : VERRUCARIEÆ.

Pertusaria communis b. *variolosa* Wall. Forma effusa
Hepp. In m. Aeno (U.).

Verrucaria controversa Mass. Cephal. (U.).

V. Hoffmannii Hepp. In rupibus calcareis m. Aeni (U.).

V. hiascens Ach. *spermogonifera* Mass. In m. Aeno (U.).

V. olyryza Mass. Cephal. (U.).

Sagedia pyrenophora β . *avenaria* Hepp. Cephal. (U.).

Algæ.

CHARACEÆ.

Chara fragilis Desv. (?) In stagno Akoli (H.).

ENTEROMORPHEÆ.

Enteromorpha intestinalis Lk. In aqua fontana pr. *Same*
(U.).

VAUCHERiaceÆ.

Vaucheria dichotoma Ag. In scaturiginosis pr. *Argostoli*
(U.).

CERAMIEÆ.

Hormoceras diaphanum Kg. In fonte subsalsa pr. *Same*
(U.).

EMENDANDA ET ADDENDA

Pag. 27, lin. 28. Loco Ἀρμυρίνι lege Ἀρμυρίνι.

» 40, lin. 5. Loco Smyrniun lege Smyrniun.

» 52, lin. 19. Loco S. lege *Sesamum*.

» 68, infra lin. 9 adde

Biarum tenuifolium (L.). In Cephalonia (Schimper sec. Boiss. Flor. Or. vol. V, fasc. 1).

» 68, infra lin. 16 adde

Ruppia spiralis L. In aquis salsuginosis Cephaloniæ (H.).

» 68, infra lin. 20 adde

Aceras hircina (L.) β *caprina* Rehb., Boiss. In Cephalonia (Létourneux sec. Boiss. l. c.).

» 69, infra lin. 3 adde

Cephalanthera rubra (L.). In m. Aeno (Létourn. sec. Boiss.).

» 69, infra lin. 10 adde

Leucoium autumnale L. In collibus demissis ins. Cephaloniæ (Schimper et Wiest sec. Boiss. l. c.).

Sternbergia lutea (L.). In Cephalonia (Schimp. sec. Boiss. l. c.).

» 69, infra lin. 27 adde

Crocus Boryi J. Gay. In monte Nero (Schimp. sec. Boiss. l. c.).

» 70, in lin. 12. G. polymorpha delenda est quia ad *Gageam foliosam* R. et Sch. ut synonymon ducenda. (Cfr. Boiss. l. c., p. 205.)

» 71, infra lin. 7 adde

Allium margaritaceum Sibth. In Cephalonia (Létourn. sec. Boiss. l. c.).

Pag. 71, post lineam ultimam adde

Colchicum pulchrum Herb. Mss. ex Baker. Species ex Cephalonia et Epiro descriptione manuscripta cl. Herbert tantum nota (sec. Boiss. l. c. ubi cfr. p. 158).

C. Bertolonii Stev. In Cephalonia (Schimper sec. Boiss. l. c.).

» 73, infra lin. 3 adde

Carex illegitima Ces. In Cephalonia (Schimp. sec. Boiss. l. c.).

Note relative à l'Introduction. Par les *Addenda* ci-dessus onze espèces ont été ajoutées aux Monocotylédones de la Flore de Céphalonie, d'après les indications tirées du 1^{er} fascicule du vol. V de la *Flora Orientalis* de M. Boissier, qui vient de paraître. Toutes ces espèces sont plus ou moins répandues dans le reste de la Grèce et aucune n'est propre à la Flore de Céphalonie. La *Gagea polymorpha* Boiss. énumérée dans notre Flore, devant être réunie comme simple synonyme au *G. foliosa* R. et Sch., le nombre total des Monocotylédones de Céphalonie n'augmente donc que de dix. Nous avons par conséquent 143, au lieu de 133, comme il a été indiqué dans l'introduction (p. 17), et pour nombre total des espèces des plantes vasculaires connues de Céphalonie 776 (au lieu de 766).

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES ET DES GENRES

Abies	67	Anagallis	51	Atractylis	46
<i>Acanthaceæ</i>	56	Anagyris	31	Atriplex	62
Acantholimon	60	Anchusa	53	Aubrietia	22
Acanthus	56	Andropogon	73	<i>Aurantiacææ</i>	29
Aceras	68, 81	Anemone	19	Avena	74
Achillea	44	Anethum	40	Ballota	59
Adiantum	77	Anthemis	45	Barbula	77
Adonis	19	Anthoxanthum	73	Bellevalia	70
Agave	69	Anthriscus	39	Bellis	43
Agrimonia	36	Anthyllis	33	Berteroa	22
Agropyrum	75	Antirrhinum	55	Berula	39
Agrostis	74	Apium	39	Beta	61
Aira	74	<i>Apocynaceæ</i>	52	Betula	67
Ajuga	59	Arabis	21	Biarum	81
Albersia	62	<i>Araceæ</i>	63	Biatora	79
Alcea	28	<i>Araliaceæ</i>	41	Bifora	40
Alchemilla	36	Arbutus	50	Biscutella	22
<i>Algeæ</i>	80	Arisarum	68	<i>Borraginacææ</i>	53
Alisma	72	Aristella	74	Borrigo	53
<i>Alismacææ</i>	72	Aristolochia	64	Botryanthus	70
Alkanna	53	<i>Aristolochiacææ</i>	64	Brachypodium	75
Allium	71, 81	Armeniaca	35	Brassica	23
Alsine	26	Artemisia	45	Briza	75
<i>Alsineacææ</i>	26	Arum	68	Bromus	75
Althæa	28	Arundo	74	Bryonia	37
Alyssum	22	Asarum	64	Bryopogon	79
<i>Amarantacææ</i>	62	<i>Asclepiadacææ</i>	52	Bunias	23
Amarantus	62	<i>Asparagacææ</i>	69	Bupleurum	39
<i>Amaryllidacææ</i>	69	Asparagus	70	Cakile	23
Ambrosia	41	Asperula	42	Calamintha	58
Anmi	39	Asphodelus	71	Calendula	46
<i>Ampeliacææ</i>	30	Asplenium	77	<i>Callitrichacææ</i>	67
Amphiloma	80	Asteriscus	43	Callitriche	67
Amygdalus	35	Astragalus	34		

<i>Calycifloræ</i>	30	<i>Compositæ</i>	43	<i>Ecbalium</i>	37
<i>Calycotome</i>	31	<i>Coniferæ</i>	67	<i>Echinochloa</i>	73
<i>Calystegia</i>	52	<i>Conium</i>	40	<i>Echinops</i>	46
<i>Campanula</i>	50	<i>Conringia</i>	21	<i>Echium</i>	53
<i>Campanulaceæ</i>	50	<i>Convolvulaceæ</i>	52	<i>Enarthrocarpus</i>	23
<i>Camptothecium</i>	78	<i>Convolvulus</i>	52	<i>Enteromorpha</i>	80
<i>Capparidaceæ</i>	23	<i>Coriandrum</i>	39	<i>Ephedra</i>	67
<i>Capparis</i>	23	<i>Corollifloræ</i>	51	<i>Epilobium</i>	37
<i>Caprifoliaceæ</i>	41	<i>Coronilla</i>	34	<i>Epipactis</i>	69
<i>Capsella</i>	22	<i>Corydalis</i>	21	<i>Eragrostis</i>	75
<i>Capsicum</i>	54	<i>Corylus</i>	66	<i>Erica</i>	50
<i>Cardamine</i>	21	<i>Crambe</i>	23	<i>Ericaceæ</i>	50
<i>Cardopatum</i>	46	<i>Crassulaceæ</i>	38	<i>Erigeron</i>	43
<i>Carduus</i>	46	<i>Cratægus</i>	36	<i>Erodium</i>	29
<i>Carex</i>	72, 82	<i>Crepis</i>	49	<i>Erophila</i>	22
<i>Carlina</i>	46	<i>Crithmum</i>	40	<i>Eruca</i>	23
<i>Carthamus</i>	48	<i>Crocus</i>	69, 81	<i>Ervum</i>	35
<i>Carum</i>	39	<i>Crozophora</i>	65	<i>Eryngium</i>	38
<i>Catapodium</i>	75	<i>Crucianella</i>	41	<i>Erysimum</i>	21
<i>Centaurea</i>	47	<i>Cruciferae</i>	21	<i>Erythraea</i>	52
<i>Centranthus</i>	42	<i>Crupina</i>	48	<i>Eucalypta</i>	78
<i>Cephalanthera</i>	81	<i>Cryptogamæ cellulares</i>	76	<i>Eufrasia</i>	56
<i>Cephalaria</i>	43	» <i>vasculares</i>	76	<i>Euphorbia</i>	64
<i>Cerastium</i>	27	<i>Cucumis</i>	37	<i>Euphorbiaceæ</i>	64
<i>Cerasus</i>	35	<i>Cucurbita</i>	37	<i>Euphrasia</i>	56
<i>Ceratonia</i>	35	<i>Cucurbitaceæ</i>	37	<i>Eurhynchium</i>	78
<i>Cercis</i>	35	<i>Cupressus</i>	67	<i>Evax</i>	44
<i>Cerinthæ</i>	53	<i>Cupuliferae</i>	66	<i>Evernia</i>	79
<i>Chamaepeuce</i>	47	<i>Cuscuta</i>	52		
<i>Chara</i>	80	<i>Cyclamen</i>	51	<i>Ferulago</i>	40
<i>Cheilanthes</i>	77	<i>Cydonia</i>	36	<i>Festuca</i>	75
<i>Chenopodium</i>	61	<i>Cynanchum</i>	52	<i>Ficus</i>	65
<i>Chlora</i>	52	<i>Cynara</i>	47	<i>Filago</i>	44
<i>Chondrilla</i>	49	<i>Cynocrambe</i>	61	<i>Filices</i>	76
<i>Chrysanthemum</i>	45	<i>Cynocrambeaceæ</i>	61	<i>Fœniculum</i>	40
<i>Chrysopogon</i>	74	<i>Cynodon</i>	74	<i>Fragaria</i>	36
<i>Cicer</i>	34	<i>Cynoglossum</i>	54	<i>Freyera</i>	39
<i>Cichorium</i>	48	<i>Cynosurus</i>	75	<i>Fumana</i>	24
<i>Cirsium</i>	47	<i>Cyperaceæ</i>	72	<i>Fumaria</i>	21
<i>Cistaceæ</i>	24	<i>Cyperus</i>	72	<i>Fumariaceæ</i>	21
<i>Cistus</i>	24	<i>Cytinaceæ</i>	63	<i>Fungi</i>	78
<i>Citrullus</i>	37	<i>Cytinus</i>	63		
<i>Citrus</i>	29			<i>Gagea</i>	70, 81
<i>Cladium</i>	72	<i>Dactylis</i>	75	<i>Galactites</i>	47
<i>Cladonia</i>	79	<i>Datura</i>	54	<i>Galium</i>	42
<i>Clematis</i>	19	<i>Daucus</i>	41	<i>Gastridium</i>	74
<i>Clypeola</i>	22	<i>Delphinium</i>	20	<i>Gentianaceæ</i>	52
<i>Cnidium</i>	40	<i>Dianthus</i>	24	<i>Geraniaceæ</i>	29
<i>Cochlearia</i>	22	<i>Dicotyledonæ</i>	19	<i>Geranium</i>	29
<i>Colchicaceæ</i>	71	<i>Digitaria</i>	73	<i>Geropogon</i>	49
<i>Colchicum</i>	71, 82	<i>Dioscoreaceæ</i>	69	<i>Githago</i>	26
<i>Colladonia</i>	40	<i>Dipsaceæ</i>	43	<i>Gladiolus</i>	69
<i>Collema</i>	80	<i>Dipsacus</i>	43	<i>Glaucium</i>	20
<i>Colutea</i>	34	<i>Doryenium</i>	33	<i>Glechoma</i>	58

Glycyrrhiza.	34	Lagoecia	39	Micropus	44
Gnetaceæ	67	Lagurus	74	Milium	74
Gossypium	28	Lamium.	59	Mœnchia	26
Graminaceæ.	73	Lappa.	46	Monochlamydeæ	61
Grammites	76	Lathyrus	35	Monocotyledoneæ.	67
Granataceæ	37	Lauraceæ	63	Monotropa.	51
Gratiola.	55	Laurus	63	Monotropaceæ	51
Grimmia	77	Lavandula	57	Moricandia	23
Gymnogramme	76	Lavatera	28	Morus.	65
Gymnospermæ.	67	Lecanora	80	Musci	77
Gymnostomum	78	Leguminosæ.	31	Myosotis.	53
Gynandriris.	69	Lemna	68	Myriophyllum	37
		Leontodon.	48	Myrtaceæ	36
Haloragaceæ	37	Leopoldia	70	Myrtus	36
Hedera	41	Lepidium	22		
Hedypnois.	48	Lepturus	76	Naiadaceæ.	68
Hedysarum	34	Leucodon	78	Nasturtium	21
Heleocharis	72	Leucium.	81	Neckera.	78
Helianthemum	24	Lichenes.	79	Nephrodium.	77
Helichrysum.	44	Liliaceæ	70	Nephroma.	79
Heliotropium	53	Lilium	70	Nerium	52
Helleborus	20	Linaceæ.	28	Nicotiana	54
Hepaticæ	78	Linaria	55	Nigella	20
Hermione	69	Linum.	28	Nopaliaceæ	37
Hibiscus.	28	Lithospermum.	53	Notobasis	47
Hippocrepis	34	Lloydia	70		
Hippomarathrum	40	Lobaria.	79	Ocimum	57
Hirschfeldia.	23	Lolium	76	Œnanthe	40
Homalothecium	78	Loncera	41	Œnotheraceæ.	37
Hordeum	76	Lotus	33	Olea.	51
Hormoceras	80	Luzula	72	Oleaceæ	51
Hutchinsia	22	Lycium	54	Ononis	31
Hymenocarpus	33	Lycoperdon	78	Onopordon	47
Hyoscyamus.	54	Lycopersicum.	54	Ophrys	68
Hyoseris.	48	Lycopodiaceæ	76	Opoponax.	40
Hypericaceæ	27	Lycopus	57	Opuntia.	37
Hypericum	28	Lythraceæ.	37	Orchidaceæ	68
Hypochæris	49	Lythrum	37	Orchis.	68
				Origanum	57
Imperata	73	Malcolmia.	22	Orlaya	40
Inula	44	Malus.	36	Ornithogalum.	70
Irideaceæ	69	Malva.	28	Orobanche.	56
Iris	69	Malvaceæ	28	Orobancheaceæ.	56
Iuglandaceæ	66	Mandragora.	54	Orthotrichum.	78
Iuglans	66	Mathiola	21	Ostrya	66
Iuncaceæ	72	Matricaria	45	Osyris	63
Iuncus.	72	Medicago	31		
Iuniperus	67	Melica.	75	Paonia	20
		Melilotus	32	Pallenis.	43
Knautia.	43	Melissa	58	Palmæ.	67
Koeleria.	75	Mentha	57	Pancratium.	69
		Mercurialis	65	Papaver.	20
Labiatae.	57	Mibora	73	Papaveraceæ	20
Lactuca.	49	Micromeria	57	Parietaria.	65

Parmelia	79	<i>Primulaceæ</i>	51	Scaligeria	39
<i>Paronychiaceæ</i>	27	Prunus	35	Scandix	39
Patellaria	80	Psilurus	76	Scilla	70
Peltigera	79	Psoralea	34	Scirpus	72
Persica	25	Pteris	77	Scleropoa	75
Pertusaria	80	Pterocephalus	43	Scleropodium	78
Petasites	45	Pterogonium	78	Scolymus	48
Petroselinum	39	Ptychotis	39	Scorpiurus	34
Peucedanum	40	Pulicaria	44	Scorzonera	49
Phagnolon	44	Punica	37	Serofularia	55
Phalaris	73	Putoria	31	<i>Scrofulariaceæ</i>	55
Phaseolus	35	Pyrethrum	45	Scutellaria	58
Phelipæa	56	Quercus	66	Secale	76
Phillyrea	51	<i>Ranunculaceæ</i>	19	Securigera	33
Phleum	73	Ranunculus	19	Sedum	38
Phlomis	59	Raphanus	23	Selaginella	76
Phoenix	67	Reseda	23	Sempervivum	38
Phragmites	74	<i>Resedaceæ</i>	23	Senecio	46
Physalis	54	Rhagadiolus	48	Serapias	68
Physanthyllis	33	<i>Rhamnaceæ</i>	30	Seriola	49
Physcia	79	Rhamnus	30	Serrafalcus	75
Phytolacca	61	Rhus	30	<i>Sesamaceæ</i>	52
<i>Phytolaccaceæ</i>	61	Ricinus	65	Sesamum	52
Picridium	49	Rosa	36	Sherardia	41
Picris	49	<i>Rosaceæ</i>	35	Sideritis	58
Pinus	67	Rosmarinus	58	<i>Silenaceæ</i>	24
Piptatherum	74	Rubia	41	Silene	25
Pirus	35	<i>Rubiaceæ</i>	41	Silybum	47
Pistacia	30	Rubus	36	Sisymbrium	21
Pisum	35	Rumex	62	Smilax	69
Placodium	80	Ruppia	81	Smyrnum	40
Plagiochasma	78	Ruscus	70	<i>Solanaceæ</i>	54
<i>Plantaginaceæ</i>	60	Ruta	29	Solanum	54
Plantago	60	<i>Rutaceæ</i>	29	Sonchus	49
<i>Platanaceæ</i>	66	Sagedia	80	Sorghum	74
Platanus	66	Sagina	26	Spartium	31
<i>Plumbaginaceæ</i>	60	<i>Salicaceæ</i>	66	Specularia	50
Plumbago	60	Salicornia	62	Spergularia	27
Poa	75	Salix	66	Spinacia	62
Pollinia	74	Salsola	62	Sporobolus	74
Polycarpon	27	<i>Salsolaceæ</i>	61	Stachys	59
Polygala	24	Salvia	58	Statice	60
<i>Polygalaceæ</i>	24	Sambucus	41	Stellaria	26
<i>Polypodiaceæ</i>	76	Samolus	51	Sternbergia	81
Polypodium	76	<i>Santalaceæ</i>	63	Sticta	79
Polypogon	74	Santolina	45	Stipa	74
Polyporus	79	Saponaria	25	Symphytum	53
Portulaca	27	Satureia	57	<i>Tamaricaceæ</i>	27
<i>Portulacaceæ</i>	27	Saxifraga	38	Tamarix	27
Posidonia	68	<i>Saxifragaceæ</i>	33	Tamus	69
Potamogeton	68	Scabiosa	43	Tanacetum	45
Potentilla	26			Taraxacum	49
Poterium	26			Teesdalia	22
Prasium	59				

<i>Terebinthaceæ</i>	30	<i>Typha</i>	68	<i>Verrucaria</i>	80
<i>Tetragonolobus</i>	33	<i>Typhaceæ</i>	68	<i>Vicia</i>	34
<i>Teucrium</i>	59	<i>Tyrimnus</i>	47	<i>Vinca</i>	52
<i>Thalamifloræ</i>	19			<i>Viola</i>	24
<i>Thapsia</i>	40	<i>Ulmus</i>	65	<i>Violaceæ</i>	24
<i>Thlaspi</i>	22	<i>Umbelliferae</i>	33	<i>Vitex</i>	57
<i>Thymelæaceæ</i>	63	<i>Umbilicus</i>	38	<i>Vitis</i>	30
<i>Thymelæa</i>	63	<i>Urginia</i>	70	<i>Vulpia</i>	75
<i>Thymus</i>	57	<i>Urospermum</i>	49		
<i>Tordylium</i>	40	<i>Urtica</i>	65	<i>Wachelia</i>	35
<i>Torilis</i>	41	<i>Urticaceæ</i>	65		
<i>Torula</i>	78			<i>Xanthium</i>	44
<i>Tragopogon</i>	49	<i>Vaillantia</i>	42	<i>Xiphion</i>	69
<i>Triadenum</i>	27	<i>Valeriana</i>	42		
<i>Tribulus</i>	29	<i>Valerianaceæ</i>	42	<i>Zacyntha</i>	49
<i>Trifolium</i>	32	<i>Valerianella</i>	42	<i>Zannichellia</i>	68
<i>Trigonella</i>	31	<i>Vaucheria</i>	80	<i>Zea</i>	73
<i>Triticum</i>	76	<i>Verbascum</i>	55	<i>Zizyphus</i>	30
<i>Trixago</i>	56	<i>Verbena</i>	56	<i>Zygodon</i>	78
<i>Tunica</i>	24	<i>Verbenaceæ</i>	56	<i>Zygophyllaceæ</i>	29
<i>Tussilago</i>	45	<i>Veronica</i>	55

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS VULGAIRES GRECS

Ἀδελόχορτον	20	Ἄμπελος	30	Βοστιλίδι	30
Ἀεζιὰ	41	Ἀμυγδαλιά	35	Βρόμι	74
Ἀγγιναριά	47	Ἄμυγδάλι (σταφύλι)	30	Βροντοθέρι	65
Ἀγιόφυλλον	41	Ἀνδρακλα	50	Βρωμόχορτον	61
Ἀγκουριό	37	Ἀνδράκλα	27	Βυσενιά	35
Ἀγλιόουρας	64	Ἄνηθος	40		
Ἀγλυκόρριζα	34	Ἀπιδιά	35	Γαντζία	35
Ἀγράμπηλι	19	Ἀρακλινό (σταφύλι)	30	Γαργαζουλιά	33
Ἀγριαγγινάρα	47	Ἀρείκι	50	Γαῦρος	66
Ἀγρια γιούλια	25	Ἀρκουδόδατος	69	Γιούλια	24
Ἀγριάδα	76	Ἀρμυρίκι	27		
Ἀγριαμυγδαλιά	35	Ἀρμυρίχη	62	Δάφνη	63
Ἀγριαπιδιά	36	Ἀσπροπρασιά	58	Δενδρολίβανον	58
Ἄγριο ἔρι	76	Ἀσφάκη	59	Δενδρομολόχα	28
Ἀγριοζαφράνα	48	Ἀσφεροδούγλας	71	Δρακόντι	68
Ἀγριοκαλοκυνθιά	37	Ἀσχινοκάρα	70	Δρύς	66
Ἀγριόκρινος	69	Ἀτζικινίδα	65		
Ἀγριομάρουλο	60	Ἀτζόγερο	31	Ἐλαιά	51
Ἀγριομερσίνη	70	Ἀχυροστουδιά	36	Ἐλατος	67
Ἀγριοπιπεριά	54	Ἀφυθιά	45	Ἐρα	76
Ἀγριορίγανι	58	Ἀφυλίθρα	44		
Ἀγριόσμερνο	40			Ζωχός	49
Ἀγριοσταφίδα	61	Βαλερίνα	42		
Ἀγριοφασουλιά	20	Βάλαμος	45	Ψιλοστρόφη	53
Ἀθάνατος	69	Βαμπακιά	28		
Ἄιλιανη	69	Βασιλικός	57	Θερμοχόρταρον	52
Ἀλεπουπορδί	78	Βάτος	36	Θρούμπα	57
Ἀλυσφακιά	58	Βελανθιά	66	Θρώμπη	57
Ἀλμυρίχη	62	Βεντουροχόρταρον	61		
Ἀλόη	52	Βερικονιά	35	Καλαμιά	74
Ἀμάραντος	38, 44	Βήτρων	62	Καλάμθρος	58
Ἄμπελοκλάδι	64	Βοϊδύλωσσα	53	Καλαμπόκι	73

Καλογηριά	70	Μηλιά	36	Πουλάνι (τό) τῆς Λαμ-	
Καπνός	54	Μολόχα	28	πράς	68
Καπνοχόρτον	21	Μοράπουλα	37	Πράσον	71
Καππαριά	23	Μοροπούλικα	37	Πρικαγκουριά	37
Κάδαμα	21	Μοσχάτο (σταφύλι).	30	Ραδίτι	48
Καρουπιά	35	Μοσχολός	42	Ραπάνι	23
Καρυδιά	66	Μοσχοπεπονιά	37	Ρεβίθια	34
Κατζιδοπίρναρο	66	Μοσχοστουδιά	57	Ρίγανη	57
Καυκαλίδα	40	Μοσχοχόρταρον	60	Ριζάρι	41
Κέδρος	67	Μουζελιά	66	Ρίσι	51
Κερασιά	35	Μουριά	36	Ροδακινιά	35
Κισσός	41	Μουριά	65	Ρομπόλλα	30
Κιτριά	29	Μουρούνα	56	Ρόικα	23
Κοκκινογούλι	61	Μπάμια	28	Ρουπάκι	66
Κοκκορέθιος	30	Μπαρμπαρασυνιά	37	Ρωγδιά	37
Κολοκυθάπιδι	36	Μπαστινάκια	41	Σβλιον	39
Κολοκυθιά	37	Μπίρι	35	Σεμιστόντο	44
Κορφοτύτικο (σταφύλι).	30	Μπουράντζινο	53	Σέσπλο	61
Κουκιά	34	Μπουρνελιά	35	Σιδερολάπαθον	62
Κολέκτρος	39	Νεραϊδοθήματα	52	Σίκκιλη	76
Κουμαριά	50	Νεραντζιά	29	Σινάπι	23
Κουτζούνα	70	Νεροκαθουλήθρα	70	Σιτάρι	76
Κουτζουπιά	35	Ξυνάκι	63	Σκαμνιά	65
Κουφοξυλιά	41	Όβρι	69	Σκαντζίτι	39
Κρεμύδι	71	Όξυμερίνη	70	Σκάφη	20
Κριθάρι	76	Παναγιάς (τῆς) τὸ χορ-		Σκολύβρι	46
Κρίνος	69	τάρι	60	Σκόρδον	71
Κρίταμον	40	Παπαρούνα	20	Σκορπίδι	76
Κυθωνιά	36	Πατάκα	54	Σκυλάκι	51
Κυρλαμιά	51	Πεντάνευρο	60	Σκυλιπνίκτης	30
Κυπαρίσσι	67	Πεντάφυλλον	36	Σονέττο	20
Λάπαθο	60	Πεπονιά	37	Σουσάμι	52
Λεβάντα	57	Περδικάκι	65	Σπανάκια	62
Ληγιά	57	Περσίμολος	39	Σπαραγγούνα	70
Λιμονιά	30	Πήγανος	29	Σπάρτο	31
Λινάρι	29	Πικραμυγδαλιά	35	Σπιράκι	30
Λιτζάρμο	54	Πικροδάφνη	52	Σπλόνος	64
Μάκκα	78	Πιπεριά	54	Σταρίδα	28, 49
Μακροστάφυλο	30	Πιρναί	66	Σταρίδα	30
Μανδραγόρας	54	Πιστακιά	30	Σταφύλι	30
Μάραθος	40	Πλάτανος	66	Σταφυλιών	41
Μαρούλι	49	Πλατομαντίλα	46	Στεκούλι	43, 53
Μαρτιάκι	46	Πολυπόδι	77	Στραγγόχορτον	62
Ματζουράνα	57	Πολυτρίχι	77	Σύκα βούσκα	65
Μαυροδάφνη	30	Πομιδόρο	54	Σύκα φραγκισσάτα	65
Μελιτήνη	45	Πορδόχορτον	54	Συκά	65
Μελισσόχορτον	58	Πορτοκαλλιά	29	Σχίνος	30
Μελιτζάνα	54			Ταταλιά	67
Μέντα	57			Τζαμπούνα	38

Τζιτζυριά	30	Φελύκι	51	Χαμοθρουμπίδι	57
Τζουκνίδα	65	Φιλύκι	51	Χαμοσκουνιά	65
Τριανταφυλλιά	36	Φινόκιο	40	Χαμολιό	46
Τρίβολι	29	Φλισκοῦνι	57	Χαμολιεύκη	45
Τροφή τῶν καρδελιῶν	63	Φλουσκοῦνι	57, 58	Χαμομίλλι	45
Ἰπνος	20	Φρόουλα	36	Χαμοσκίδι	34
Ἰσσοπος	57	Φτελέα	65	Χημονικιά	37
Φασούλια	35	Φτέρρα	77	Χορτάρι διὰ τὸ ρίμα .	51
Φελλογράφτι	51	Φύκια	68	Χρυσόξυλον	30
		Χαλωνογράφταρον . .	28	Ψάβι	68

HERBORISATIONS AU LEVANT

PAR

C. ET W. BARBEY

EGYPTE, SYRIE ET MÉDITERRANÉE

Un fort volume in-folio avec onze planches et une carte.

Prix : broché, 20 fr.

New York Botanical Garden Library

QK 327 .H39
Heldreich, Theodor/Flore de l'île de Cép^{gen}

3 5185 00110 0104