Fischer

Phan. + Gefasskrypt.
des Berner-Oberlandes

GK
315
.F52

LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Special Book Fund
1910

SEP 16 1899

R. W. GILSON. INV.

Flora

Verzeichniss
der
Phanerogamen & Gefässkryptogamen
des
Bernier-Oberlandes
und der
Umgebungen von Thun.

Zur Orientirung auf botanischen Excursionen

von

L. Fischer,

Professor der Botanik in Bern.

Bern,
Verlag der Dalp'schen Buchhandlung.
1862.

Verzeichniss
der
Phanerogamen und Gefässkryptogamen
des
Berner-Oberlandes
und der Umgebungen von Thun.

Zur Orientirung auf botanischen Excursionen

Verding
von
L. Fischer,

Professor der Botanik in Bern.

**LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN**

Bern,
Verlag der Dalp'schen Buchhandlung.
1862.

QK51-

.F52

Die vorliegende Zusammenstellung gründet sich auf den « Catalogue des plantes, qui croissent naturellement dans les environs de Thoune et dans la partie de l'Oberland bernois qui est le plus souvent visitée par les voyageurs, par J.-P. Brown. 1843. » und drei Nachträge zu diesem Katalog von Hrn. v. Fischer-Ooster in den « Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. » 1845. 47. 50.

Zahlreiche Mittheilungen verdanke ich ferner der Gefälligkeit der Herren Christener, Fischer-Ooster, Guthnick (welcher mir auch Beobachtungen des Herrn Brunner in Rosenlauri mittheilte), von Rütte und Vulpius.

Zunächst zum Gebrauche auf Excursionen bestimmt, hat das Verzeichniss eine möglichst gedrängte Form erhalten. Nomenclatur und Anordnung sind mit wenigen Abweichungen die der « Synopsis der deutschen und schweizer Flora von Koch. » 2. Aufl. 1846, auf welches Werk ich für die Diagnosen verweise. Zur Bezeichnung der Höhenverhältnisse sind drei Regionen angenommen. Die untere reicht bis zur oberen Gränze der Bu-

chen (circa 4000'), die mittlere bis zur Tannengränze (circa 5800'), die höhere bis zur Schneegränze (circa 8300') und höher.*

Bei seltenen Pflanzen sind die Standorte möglichst vollständig angeführt, bei allgemeiner verbreiteten einige der am häufigsten besuchten Punkte beispielsweise citirt, oder es sind die speciellen Standorte ganz weggelassen. Die in der Ebene (im Gebiet des Taschenbuchs der Flora von Bern) allgemein verbreiteten Arten sind mit (*), die daselbst selten oder nur an einzelnen Standorten vorkommenden mit (••) bezeichnet. Aeltere Angaben, welche durch den Mangel neuerer Bestätigung zweifelhaft erscheinen, sind mit (?) versehen. — Eine fortgesetzte Durchforschung der Berge und Thäler des Oberlandes wird nun ohne Zweifel noch manches Neue und Interessante darbieten. Ergänzungen und Berichtigungen des vorliegenden Verzeichnisses werde ich als Materialien zu einer späteren vollständigeren Arbeit dankbar annehmen.

* Die angegebenen Zahlen gelten für die Südseite und überhaupt günstig gelegene Stellen der Gebirgsketten. — Auf der Nordseite sind die Vegetationsgränzen meist um einige hundert Fuss niedriger. Bedeutende Schwankungen sind überdiess durch locale Verhältnisse bedingt. — (Die Zahlen bezeichnen franz. Fuss.)

I. Phanerogamen.

A. Dicotyledonen.

1. Ranunculaceen.

Clematis.

Vitalba L. In Hecken, an Waldrändern.

Thalictrum.

aquilegifolium L. An schattigen Orten, in Gebüsch der Voralpen.

foetidum L. An felsigen Orten, im Geröll, ziemlich selten. Thalberg (Stockhornkette). Gasteren-Clus bei Kandersteg. (*T. pubescens* Schl.)

minus L. Wie vorige. Am Eingang des Simmenthals. Grindelwald am Wetterhorn.

galioides Nestl. Thunallmend, sehr selten. (Schläfli. Fischer-Ooster.)

Anemone.

Hepatica L. In Wäldern, stellenweise häufig.

vernalis L. Auf Alpenweiden häufig.

alpina L. Ebenso. — *var. sulphurea*. Grindelwald. Gasteren. Sanetsch. — *var. myrrhifolia*. Bei Mürren. (Vulpius.)

narcissiflora L. Auf Alpenweiden häufig.

baldensis L. Auf der Gemmi am Lämmerengletscher. (Vulpius.)

* *nemorosa* L. In Wäldern gemein.

•• *ranunculoides* L. An schattigen Orten, in Gebüsch der Voralpen, selten.

Ranunculus.

* *aquatilis* L. In langsam fließendem Wasser hin und wieder. (Bei genauerer Untersuchung dürften sich auch die verwandten Arten *R. fluitans* Lam. — *divaricatus* Schrank u. a. finden.)

glacialis L. Im Gerölle der höhern Alpen ziemlich häufig.

alpestris L. An etwas feuchten Stellen der mittleren und höheren Region häufig.

Traunfellneri Hoppe. Am Gipfel des Brienzer-Rothorns. (Fischer-Ooster.) Giffhorn bei Saanen. (v. Rütte.)

•• *aconitifolius* L. An feuchten Stellen der untern und mittlern Region ziemlich häufig.

parnassifolius L. Gemmi. Am Wildhorn in Lauenen.

pyrenaicus L. Am Uebergang vom Aargletscher nach dem Urbachthal. (Ziegler.)

* *Flammula* L. Auf Sumpfwiesen und Torfmooren häufig. — *var. reptans* (*R. reptans* L.) und *var. natans*. Schwarzeneck.

* *Lingua* L. In Sumpfgräben, selten. Uebischisee bei Amsoldingen.

* *auricomus* L. Auf Wiesen, an Hecken.

montanus Willd. Auf Weiden, im Geröll der unteren und mittleren Region. — *var. major* (*R. Gouani* Willd). Faulhorn und Geissberg über der Engstlenalp. (Fischer-Ooster.) — *var. R. gracilis* Schl. An trockenen, steinigen Orten, hin und wieder.

Villarsii DC. Auf Alpenweiden hin und wieder. Auf der Stockhornkette, häufig am Leiterengrat.

* *acris* L. Auf Wiesen der unteren und mittleren Region gemein.

* *lanuginosus* L. An feuchten Stellen der Wälder hin und wieder.

nemorosus DC. In den Voralpen hin u. wieder.

* *repens* L. Auf Wiesen, an Wegen der unteren Region gemein.

* *bulbosus* L. Ebenso.

•• *sceleratus* L. Selten. Bei Gwatt und Hilterfingen. (Brown.)

* *arvensis* L. Im Getreide hie und da.

Ficaria.

* *ranunculoides* Mönch. (*R. Ficaria* L.) In Hecken und Gebüsch der unteren Region ziemlich häufig.

Caltha.

* *palustris* L. An Bächen und feuchten Stellen gemein, bis in die höhere Region aufsteigend.

Trollius.

- *europaeus* L. Auf feuchten Wiesen und Weiden häufig; bis in die höhere Region aufsteigend.

Aquilegia.

- * *vulgaris* L. In Wäldern und Gebüsch der untern Region gemein.
- * *atrata* Koch. Ebenso, doch seltener. Kandergrien bei Thun.
- alpina* L. Am Wellhorn bei Rosenlaur. Faulhorn ob Iseltwald. Feissenberg in Lauenen. Gasterenthal.

Delphinium.

- elatum* L. Rosenlaur. Grindelwald, am Wetterhorn. Mürren. Jüstisthal. Niesen.

Aconitum.

- Napellus* L. In Gebüsch, auf Weiden, besonders in der Nähe der Sennhütten gemein; zuweilen bis in die Ebene herabsteigend.
- Stoerkeanum* Rb. (*A. intermedium* DC.) In Gebüsch, auf Alpenweiden hin und wieder. Niesen. (Fischer-Ooster.)
- variegatum* L. (*A. rostratum* Bernh.) Wie vorige. Wahlalp am Stockhorn. (Guthnick.) Gantersch und Niesen. (Brown.)
- paniculatum* Lam. (dazu *A. cernuum* Rb. *A. hebegynum* DC.) Wie vorige. Gemmi. (Gaud. Brown.)
- *Lycotomonum* L. In Gebüsch und Wäldern, häufig.

Actaea.

- *spicata* L. In Wäldern hin und wieder. Kandergrien. Meyringen. Grüsisberg u. a. O.

2. Berberideen.

Berberis,

- * *vulgaris* L. In Hecken, an Waldrändern der unteren Region, ziemlich häufig.

3. Nymphaeaceen.

Nymphaea.

- * *alba* L. In Gräben und Teichen. Häufig bei Amsoldingen. Uebischi. Meyringen.

Nuphar.

- *luteum* Sm. Wie vorige.

4. Papaveraceen.

Papaver.

- * *Rhocas* L. Im Getreide, stellenweise häufig.
* *dubium* L. Ebenso.

Chelidonium.

- * *majus* L. Auf Schutt, an Mauern, gemein.

5. Fumariaceen.

Corydalis.

- * *cava* Schweigg. An Hecken, in Gebüsch, häufig.
fabacea Pers. Thalberg. Stockhornkette (Brown). Jüstisthal.

Fumaria.

- * *officinalis* L. Auf Aeckern, an Wegen, häufig.

6. Cruciferen.

Nasturtium.

- * *officinale* R. Br. In Gräben, häufig.
palustre DC. In Sümpfen und Torfmooren.
Schwarzeneck. Reutigen.

Barbarea.

- * *vulgaris* R. Br. An Gräben, auf Schutt, hin und wieder.

Turritis.

- *glabra* L. Bei Gurzelen. (Guthnick.)

Arabis.

- *alpina* L. An steinigen Orten, am Ufer der Alpenbäche, in der mittleren und höheren Region, häufig.
sagittata DC. An Felsen, im Geröll, selten. Am Eingang des Simmenthals.
•• *hirsuta* Scop. An trockenen, steinigen Orten der unteren Region, ziemlich häufig. — *var. arcuata* Shuttl. Kandergrien u. a. O.
ciliata R. Br. An steinigen Orten der Alpen, hin und wieder.
serpyllifolia Vill. An Felsen, selten. Kandersteg. (Brown.) Ralligstöcke, am Schafloch. (Fischer-Ooster.)
Turrita L. Auf Schutthalden am Eingang des Simmenthals. (Bamberger.)

pumila Jacq. An felsigen Orten der höheren Alpen hin und wieder. Gemmi. Faulhorn. Rosenlauri. Stockhorn.

bellidifolia Jacq. An feuchten Stellen der mittleren und höheren Region, an Quellen und Bächen, hin und wieder. Rosenlauri. Faulhorn. Jüstisthal. Gemmi.

coerulea Haenke. An etwas feuchten Orten der höheren Alpen, ziemlich selten. Faulhorn. Gemmi.

Cardamine.

alpina Willd. Auf höheren Alpen, stellenweise häufig.

resedifolia L. Wie vorige.

impatiens L. An schattigen Orten der unteren Region, ziemlich selten. Lauterbrunnen und Grindelwald. (Guthnick.) Simmenthal. (Brown.) Merligen. (Christener.)

* *hirsuta* L. In Wäldern der unteren Region, hin und wieder. Bei Thun. (Brown.)

* *pratensis* L. Auf feuchten Wiesen der unteren Region, häufig.

* *amara* L. An Bächen und feuchten Stellen der unteren Region.

Dentaria.

•• *digitata* Lam. Waldige Abhänge und Schluchten. Häufig am Giessbach. Bei Wimmis, an der Stockhornkette u. a. O.

Sisymbrium.

* *officinale* Scop. An Wegen, auf Schutt, in der untern Region.

Sophia L. An Felsen am Oeschenensee.

* *Alliaria* Scop. In Hecken, hin und wieder. Bei Thun.

* *Thalianum* Gaud. Auf Aeckern.

Erysimum.

strictum Fl. d. Wett. Zwischen Gwatt und Wimmis. Selten. (Guthnick.)

Brassica.

* *oleracea* L. Cultiv.

* *Rapa* L. Ebenso.

* *Napus* L. Ebenso.

Sinapis.

* *arvensis* L. An cultiv. Orten gemein.

Erucastrum.

•• *obtusangulum* Roth. Meyringen. (Guthnick.)

•• *Pollichii* Schp. und Spenn. Im Kies der Aar, unterhalb Thun.

Diplotaxis.

muralis DC. In Geröllen, selten. (Brown.)

Alyssum.

* *calycinum* L. An trockenen, steinigen Orten. Bei Thun.

Lunaria.

rediviva L. In Gebüschchen der Voralpen, selten. Kirchet bei Meyringen. Rosenlauri. Weissenburg. Blumenstein.

Petrocallis.

pyrenaica R. Br. Stockhorn, in Felsenritzen am Gipfel.

Draba.

aizoides L. An felsigen Orten, ziemlich häufig, stellenweise bis in die Thäler herabsteigend.

tomentosa Wahl. An Felsen der höheren Alpen, hin und wieder. Faulhorn. Suleck. Stockhorn u. a. O. Selten tiefer, z. B. beim Rosenlauibad. (Brunner und Guthnick.)

frigida Saut. Wie vorige. Grimsel. Faulhorn. Niesen. Gemmi.

Traunsteineri Hoppe. Suleck. (Fischer-Ooster.)

Johannis Host. (*D. nivalis* Gaud.) An Felsen der höheren Alpen, ziemlich selten. Faulhorn. Kiley. Schilthorn.

Wahlenbergii Hartm. (*D. fladnizensis* und *sclerophylla* Gaud.) Wie vorige.

incana L. Sehr selten an Felsen des Ganterisch. (Brown. Vulpus.)

* *verna* L. An trockenen Orten der unteren Region, häufig.

Cochlearia.

officinalis L. Im Jüstisthal, selten. Im Eritz. Rosenlaui. (Brunner.)

•• *saxatilis* Lam. An Felsen der unteren und mittleren Region ziemlich häufig.

Camelina.

* *sativa* Crantz. Auf Aeckern, hie und da.

dentata Pers. Bei Thierachern. (Guthnick.)

Thlaspi.

* *arvense* L. Auf Aeckern, hin und wieder.

* *perfoliatum* L. Auf Aeckern, an Wegen, gemein.

- ? *montanum* L. Gurnigel. (Gaud. Fl. helv.)
rotundifolium Gaud. Im Geröll und Schutt der
höheren Alpen. Faulhorn. Suleck. Niesen etc.
Der Stockhornkette fehlend.

Biscutella.

- laevigata* L. An 'felsigen Orten der mittleren
und höheren Region ziemlich häufig; zuweilen
bis in die Thäler herabsteigend.

Lepidium.

- * *campestre* L. Auf Aeckern, an steinigen Orten,
in der unteren Region.

Hutchinsia.

- alpina* R. Brw. In der höheren Region, an stei-
nigen, etwas feuchten Orten, gemein.

Capsella.

- * *bursa pastoris* Mönch. Auf Wiesen und cultiv.
Boden überall.

Aethionema.

- saxatile* R. Brw. Auf Geröllhalden. Im Gaste-
renthal und an der Kandermündung.

Neslia.

- *paniculata* Desv. In Aeckern bei Gwatt. (Guth-
nick.)

Raphanus.

- * *Raphanistrum* L. Auf Aeckern, gemein.

7. Cistineen.

Helianthemum.

- Eumana* Mill. An Felsen am Thunersee bei
Sandlauenen. Bei Meyringen. (Guthnick.)

oelandicum Wahl. An steinigen Orten. Stockhorn. Sigriswyler Rothhorn. Gemmi.

- * *vulgare* Gaertn. An steinigen Orten gemein. —
var. grandiflorum in der mittleren und höheren Region.

8. Violarieen.

Viola.

- *palustris* L. Auf Sumpfwiesen hie und da. Schwarzeneck.
- * *hirta* L. Auf trockenen Wiesen und in Gebüschen, häufig.
- * *odorata* L. In Hecken, an Waldrändern.
- *arenaria* DC. Am Thunersee zwischen Schadau und Gwatt, häufig. Auf dem Kandergrien.
- * *sylvestris* Lam. In Wäldern häufig.
- * *canina* L. Auf Haiden, an Waldrändern.
- mirabilis* L. Kandergrien. Rossweid bei Thun. (Brown.) In neuerer Zeit nicht mehr gefunden.
- biflora* L. An schattigen Stellen, am Grunde feuchter Felsen, überall in der mittleren und höheren Region, stellenweise in die Thäler herabsteigend.
- * *tricolor* L. Auf Aeckern und Wiesen gemein.
- lutea* Sm. (*V. grandiflora* Huds.) Auf Weiden der höheren Region, stellenweise häufig, doch nur auf Kalkgebirge. Jochpass. Mürren. Stockhorn.
- calcarata* L. Auf Weiden der höheren Alpen, häufig.

cenisia L. In Geröll und Schutt der höheren Alpen, selten. Faulhorn. Schwarzhorn am blauen Gletscher. Dreispitz. Gemmi. Alpen von Lauenen.

9. Resedaceen.

Reseda.

- *lutea* L. An steinigen Orten der unteren Region. Bei Neuhaus.
- * *luteola* L. Ebenso.

10. Droseraceen.

Drosera.

- * *rotundifolia* L. Auf Torfmooren. Uebischi. Schwarzeneck.
- *longifolia* L. (*anglica* Huds.) Ebenso. (Brown.)

Parnassia.

- * *palustris* L. Auf Sumpfwiesen und feuchten Weiden, häufig.

11. Polygaleen.

Polygala.

- * *vulgaris* L. Auf trockenen Weiden, an Waldrändern, häufig. — *var. alpestris* auf den Alpen.
- *comosa* Schk. Bei Rosenlauri. (Brunner.)
- *depressa* Wend. Bei Thun. (Fischer-Ooster.)
- * *amara* L. Auf Sumpfwiesen. — *var. alpestris* auf den Alpen, bis in die höhere Region.
- *Chamaebuxus* L. In lichten Wäldern, häufig. Kandergrien bei Thun.

12. Caryophylleen.

a. Sileneen.

Gypsophila.

- *repens* L. An kiesigen Orten, im Geröll der Bäche häufig.

Dianthus.

- *barbatus* L. Thun (wahrscheinlich verwildert).
- *sylvestris* Wulf. Auf Kalkfelsen ziemlich häufig. Am Thunersee bei Neuhaus etc.
- * *superbus* L. An steinigen Orten, der unteren und mittleren Region, stellenweise häufig.

Saponaria.

- *Vaccaria* L. Auf Aeckern der Ebene, hie und da.
- * *officinalis* L. An Hecken und Waldrändern, häufig.
- *ocymoides* L. An steinigen Orten stellenweise häufig. Nase am Thunersee. Am Eingang des Simmenthals. Meiringen.

Silene.

- * *nutans* L. An Wegen und Waldrändern häufig.
- * *inflata* Smith. Auf Wiesen überall.
- *noctiflora* L. Im Getreide, selten. Bei Oberhofen. (Guthnick.)
- *quadrifida* L. An Felsen hin und wieder. Grindelwald am Eiger. Hohgant. Gemmi. Nünenen.
- *rupestris* L. An Felsen, ziemlich häufig. Ober-

hasli. Gr. Scheideck. Faulhorn. Mürren.
Gasteren u. a. O.

acaulis L. Auf Weiden und felsigen Abhängen
der höheren Region häufig.

Lychnis.

alpina L. Alpen des Kienthals (Gaud. Fl. helv.).
Gemmi am Lämmerengletscher. (Brown.)

* *Flos Cuculi* L. Auf nassen Wiesen gemein.

* *vespertina* Sibth. Auf Aeckern, in Hecken, ge-
mein.

•• *diurna* Sibth. An feuchten Orten der Voralpen
gemein.

Agrostemma.

* *Githago* L. Im Getreide häufig.

b. Alsineen.

Sagina.

* *procumbens* L. Auf Aeckern, an Wegen, häufig.

Spergula.

* *arvensis* L. Auf Aeckern hin und wieder. Schwar-
zeneck. Hasli.

saginoides L. (*S. saxatilis* Wimm.) Alpen und
Voralpen nicht selten.

Lepigonum.

•• *rubrum* Wahl. Oberhasli (Guthnick).

Alsine.

laricifolia Wahl. An felsigen Orten der höhe-
ren Alpen, selten. Gemmi (Gaud.). Oberes
Lauterbrunnenthal (Guthnick).

Villarsii Gaud. *Fl. helv.* In der Clus bei Kandersteg. (Gaud.) — In neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

Cherleria.

sedoides L. An steinigen Orten der höheren Alpen häufig.

Moehringia.

muscosa L. In steinigen Wäldern, an Felsblöcken, häufig.

polygonoides Mert. et Koch. Auf steinigen Weiden, im Geröll der höhern Alpen. Engstlenalp. Schwarzhorn. Suleck. Gemmi. Niesen.

* *trinervia* Clairv. In Hecken und Wäldern gemein.

Arenaria.

* *serpyllifolia* L. An Mauern und steinigen Orten häufig.

ciliata L. An Felsen und steinigen Orten der niederen und höheren Alpen häufig.

biflora L. Grimsel (Guthnick). Rosenlauri (Brunner).

Stellaria.

cerastoides L. Auf höheren Alpen, nicht selten. Engstlenalp. Faulhorn. Gemmi. Männlifluh

•• *nemorum* L. An feuchten, schattigen Stellen, in Wäldern, hin und wieder.

* *media* Vill. Auf cult. Boden überall.

* *graminea* L. In Hecken gemein.

•• *uliginosa* Murr. In feuchten Wäldern der Vor-alpen.

Malachium.

- * *aquaticum* Fr. An feuchten Stellen, in Gräben ziemlich häufig. Schwarzeneck.

Cerastium.

- * *triviale* Link. Auf cultiv. Boden gemein.
latifolium L. Im Geröll der höheren Alpen, hin und wieder. Faulhorn. Gemmi.
alpinum L. Ebenso. Faulhorn. Gemmi. Suleck. Ganterisch.
- * *arvense* L. Auf Wiesen, an Wegen. Bei Thun.
— *var. strictum* auf den Alpen, an steinigen Orten, häufig.

13. Lineen.

Linum.

- * *usitatissimum* L. Auf Aeckern (cult.).
montanum Schleich. (L. *alpinum* var. *montanum* Koch.) Selten auf der Südseite des Ganterrisch. Bürglen. Sanetsch.
- * *catharticum* L. Auf nassen Wiesen der Ebene und Voralpen häufig.

14. Malvaceen.

Malva.

- ** *Alcea* L. An Hecken und Wegen der Ebene hie und da. Bei Thun. Meyringen.
- * *moschata* L. Ebenso, doch häufiger.
- * *sylvestris* L. Ebenso.
- * *vulgaris* Fr. An Mauern, auf Schutt hin und wieder.

15. Tiliaceen.

Tilia.

- * *grandifolia* Ehrh. In Wäldern der Voralpen, und cult.
- * *parvifolia* Ehrh. Ebenso.

16. Hypericineen.

Hypericum.

- * *perforatum* L. Auf Wiesen gemein.
- * *humifusum* L. An Wegen, auf Haideplätzen hie und da. Bei Thun. Erlenbach. (Brown.)
- *quadrangulare* L. An feuchten Stellen der Vorberge hin und wieder.
- *tetrapterum* Fr. An Gräben und feuchten Stellen hie und da. Bei Thun.
- *montanum* L. An Waldränden, in Gebüsch der Vorberge, ziemlich häufig.
- * *hirsutum* L. In Gebüsch, auf Weiden hie und da. Thunallmend.

17. Acerineen.

Acer.

- * *Pseudoplatanus* L. Einzeln und in lichten Beständen, häufig; bis in die mittlere Region.
- * *platanoides* L. Ziemlich selten. Simmenthal. Grindelwald.
- * *campestre* L. In Wäldern und Gebüsch häufig.

18. Hippocastaneen.

Aesculus.

- * *Hippocastanum* L. In der Ebene, cult.

19. Ampelideen.

Vitis.

vinifera L. Cult. Am nordöstl. Ufer des Thunersees. In geringerer Ausdehnung auch bei Spiez und Steffisburg, am letztern Orte immer mehr durch andere Culturen verdrängt.

20. Geraniaceen.

Geranium.

- *phaeum* L. In Gebüsch, auf Weiden selten. Bei Thun. — *var. lividum* auf den Alpen hin und wieder. Faulhorn. Niesen. Gemmi.
- *sylvaticum* L. Auf Wiesen und feuchten Weiden der Voralpen gemein.
- * *palustre* L. An Gräbern, in Hecken, nicht selten. Bei Thun, Reutigen u. a. O.
- *sanguineum* L. Häufig am Thunersee zwischen Merligen und Neuhaus.
- * *pyrenaicum* L. In Hecken gemein.
- * *pusillum* L. In Hecken, an Wegen, ziemlich häufig.
- * *dissectum* L. Im Getreide, an Wegen, ziemlich häufig.
- * *columbinum* L. Ebenso.
- *molle* L. An Wegen, auf cult. Boden hin und wieder.

- * *Robertianum* L. An Mauern und Felsen der unteren Region häufig.

21. Balsamineen.

Impatiens.

- *nolitangere* L. In feuchten Wäldern der unteren Region hin und wieder.

22. Oxalideen.

Oxalis.

- * *Acetosella* L. In Wäldern und Gebüsch gemein.

23. Celastrineen.

Evonymus.

- * *europaeus* L. In Hecken gemein.

24. Rhamneen.

Rhamnus.

- * *cathartica* L. In Gebüsch, an Ufern, ziemlich häufig.

alpina L. In Wäldern und Gebüsch selten.
Balmholz am Thunersee (Brown). Stockhorn.

pumila L. Wie vorige. Stockhorn auf der Südseite. Gemmi.

- * *Frangula* L. In Wäldern und Gebüsch häufig.

25. Papilionaceen.

Genista.

- *sagittalis* L. (*Cytisus* Koch). Bei Meiringen (Brunner). Guggisberg etc. St. Mealenberg?

Cytisus.

alpinus Mill. Tschertschisthal (Saanen). (von Rütte.)

Ononis.

* *spinosa* L. An Wegen, auf Weiden gemein.

* *repens* L. Ebenso.

Anthyllis.

* *vulneraria* L. Auf Aeckern, Wiesen, an Wegen gemein, bis in die höhere Region.

Medicago.

* *sativa* L. Auf Wiesen, cult. und verwildert.

* *lupulina* L. Auf Wiesen gemein.

Melilotus.

* *alba* Desr. An steinigen Orten hin und wieder. Bei Thun. Lütschithal, im Kies der Lütschenen.

* *officinalis* Desr. Ebenso.

Trifolium.

* *pratense* L. Auf Wiesen gemein. — *var. nivale* in der höhern Region.

* *medium* L. Auf Wiesen, an Waldrändern, gemein.

rubens L. An steinigen Orten selten. Balmholz am Thunersee. Lütschenthal (Brown). Am Hundschüpf bei Meyringen (Fischer-Ooster).

* *arvense* L. An trockenen Stellen häufig. Bei Thun.

•• *fragiferum* L. Auf Sumpfwiesen, an Gräben hin und wieder. Bei Neuhaus.

- alpinum* L. Auf Weiden der höheren Alpen ziemlich häufig.
- *montanum* L. Auf Weiden, in lichten Wäldern häufig.
- * *repens* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein, bis in die höhere Region.
- ? *pallescens* Schreb. Grimsel. (Girard.)
- cæspitosum* Reyn. An feuchten Stellen der höheren Alpen, ziemlich häufig.
- badium* Schreb. Häufig auf Wiesen und Weiden der mittleren Region.
- * *procumbens* L. Auf Aeckern, Wiesen, an Wegen ziemlich häufig.
- * *agrarium* L. Ebenso.
- * *filiforme* L. Auf Sumpfwiesen. Amsoldingen.

Lotus.

- * *corniculatus* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
- * *uliginosus* Schk. Auf Sumpfwiesen hin und wieder. Uebischi bei Thun.

Tetragonolobus.

- * *siliquosus* Roth. Auf Sumpfwiesen der unteren Region. Amsoldingen etc. *Mörligen, St. Beatenberg*

Phaca.

- frigida* L. An steinigen Orten der höheren Alpen, stellenweise häufig. Faulhorn. Mürren. Niesen u. a. O. Selten an der Stockhornkette.
- ? *alpina* Jacq. Grimsel (Girard).
- australis* L. Nicht selten auf Weiden der höheren Alpen. Faulhorn. Niesen. Stockhorn. Ganterisch u. a. O.

astragalina DC. Auf Weiden der höheren Alpen ziemlich häufig; stellenweise in die Thäler herabsteigend, z. B. am unteren Grindelwaldgletscher.

Oxytropis.

Halleri Bunge. (*O. uralensis* Wulf.) Nur auf der Stockhornkette, am Ganterisch und Bürglen.

campestris DC. Auf Weiden, an Ufern der Bäche, in der mittleren und höheren Region häufig; stellenweise in die Thäler herabsteigend, z. B. an der Kanderemündung. Meiringen. Am untern Grindelwaldgletscher. — *var. caerulea* am Schwarzhorn und Faulhorn.

montana DC. Häufig auf Weiden der höheren Region.

Astragalus.

•• *glycyphyllos* L. In lichten Wäldern und Gebüschcn stellenweise häufig.

? *depressus* L. Alpen von Saanen. (Gaud. Fl. helv.)

Coronilla.

•• *Emerus* L. In lichten Wäldern. Nase am Thunersee. Am Eingang des Simmenthals.

vaginalis Lam. An steinigen Orten, ziemlich selten. Am Eingang des Simmenthals, (Vulpus.) Grindelwald am Wetterhorn, (Christener.) Kandersteg am Oeschenenbach, (Fischer-Ooster.)

•• *varia* L. Bei Brienz. (Brown.)

Hippocrepis.

* *comosa* L. Auf trockenen Wiesen, an Wegen, ziemlich häufig.

Hedysarum.

obscurum L. An felsigen Abhängen der höheren Region, ziemlich häufig. *Bergfeld bei Brühlberg.*

Onobrychis.

- * *sativa* L. Auf Wiesen, cult. und verwildert. —
var. montana auf den Alpen.

Vicia.

- *sylvatica* L. In lichten Wäldern hin und wieder.
Am Fuss der Stockhornkette. Grindelwald.
- *dumetorum* L. Ebenso, aber seltener.
- * *Cracca* L. In Hecken, häufig.
Gerardi DC. In lichten Wäldern, ziemlich selten. Balmholz am Thunersee. *St. Marienberg.*
- * *Faba* L. Auf Aekern. Cult.
- * *sepium* L. In Hecken, an Waldrändern, gemein.
- * *sativa* L. Hie und da. Cult. und verwildert.

Pisum.

- * *sativum* L. Cult.

Lathyrus.

- * *pratensis* L. In Hecken und Gebüschern gemein.
- *sylvestris* L. In Wäldern hin und wieder.

Orobus.

- * *tuberosus* L. In Wäldern und Gebüschern häufig.
- * *luteus* L. An der Stockhornkette, selten. Am
Ochsen. Sohlhorn (Vulpinus).
- niger* L. An Waldrändern bei Oberhofen.

Phaseolus.

- * *vulgaris* L. Cult.

26. Rosaceen.

a. Amygdaleen.

Prunus.

- * *spinosa* L. In Hecken und Gebüsch gemein.
- * *insititia* L. Cult.
- * *domestica*. Cult.
- * *avium* L. In Wäldern häufig. — In vielen *var. cult.*
- * *Cerasus* L. Cult.
- * *Padus* L. In lichten Wäldern hin und wieder.

b. Rosaceen.

Spiraea.

- * *Aruncus* L. In Wäldern und Schluchten.
- * *Ulmaria* L. Auf feuchten Wiesen, an Hecken, gemein.

Dryas.

octopetala L. An felsigen Stellen der höheren Region gemein; stellenweise im Kies der Bäche bis in die untere Region. An der Kander-
mündung.

Geum.

- * *urbanum* L. In Hecken und Gebüsch gemein.
- * *rivale* L. An Bächen häufig.
- reptans* L. An Felsen der höchsten Alpen, selten. Faulhorn. Lattreyenalp. Roththal. Gemmi.
- montanum* L. Auf Weiden der höheren Region, ziemlich häufig. *Niederhorn ab G. Lattreyenalp.*

Rubus.

- * *Idæus* L. In Wäldern hin und wieder.
- * *fruticosus* L. In Wäldern gemein. — Mit zahlreichen, zum Theil als eigene Spec. aufgestellten Varietäten, welche in Oberlande genauer zu beobachten sind.
- * *cæsius* L. In Hecken, an Ufern, gemein.
- *saxatilis* L. In Wäldern, ziemlich häufig.

Fragaria.

- * *vesca* L. In Gebüsch, an Waldrändern, gemein.

Comarum.

- * *palustre* L. In Sümpfen und Torfmooren gemein.

Potentilla.

- * *anserina* L. An Gräben und Wegen gemein.
- *argentea* L. An steinigen Orten hin und wieder.
- * *reptans* L. An Wegen und Gräben häufig.
- * *Tormentilla* Sibth. In Wäldern, auf Weiden, häufig.
- aurea* L. Auf Weiden der mittleren und höheren Region häufig.
- alpestris* Hall. Wie vorige, aber seltener.
- * *verna* L. An trockenen Abhängen, an Waldrändern, gemein.
- opaca* L. Wimmis, Grösisberg bei Thun, an sonnigen Orten. (Guthnick.)
- grandiflora* L. An felsigen Orten der mittleren und höheren Region, stellenweise häufig. Susten. Faulhorn. Steinberg in Lauterbrunnen. Dreispitz.

minima Hall. fil. Auf den höheren Alpen selten.
Rothhorn. Suleck. Gemmi.

frigida Vill. Ebenso. Grimsel. Faulhorn. Lötschpass.

- * *Fragariastrum* Ehrh. In Hecken, an Waldrändern, gemein.

Sibbaldia.

procumbens L. Auf Weiden höherer Alpen hin und wieder. Grimsel. Engstlenalp. Faulhorn. Niesen u. a. O.

Agrimonia.

- * *Eupatoria* L. An Wegen und Hecken gemein.

Rosa.

• *pimpinellifolia* DC. Nase am Thunersee. (Fischer-Ooster.)

•• *alpina* L. In lichten Wäldern ziemlich häufig.

•• *cinnamomea* L. In Gebüsch, häufig bei Thun.

rubrifolia Vill. In lichten Wäldern und Gebüsch hin und wieder; bis in die höhere Region. Beatenberg. Grindelwald. Mürren etc.

spinulifolia Dematra. Am Thunersee ob Raligen. (Fischer-Ooster.)

* *canina* L. In Hecken und Gebüsch.

* *rubiginosa* L. Ebenso.

* *tomentosa* Sm. Ebenso, aber seltener.

* *arvensis* L. In Hecken, an Waldrändern, ziemlich häufig.

c. Pomaceen.

Crataegus.

* *oxyacantha* L. In Hecken.

* *monogyna* Jacq. Ebenso.

Cotoneaster.

•• *vulgaris* Lindl. An felsigen Abhängen, in Gebüsch hie und da. Bis in die höhere Region. Nase am Thunersee.

•• *tomentosa* Lindl. Ebenso. Kandergrien bei Thun. Beatenhöhle.

Pyrus.

* *communis* L. Cult. Die Stammform hie und da in Wäldern.

* *Malus* L. Ebenso.

Aronia.

•• *rotundifolia* Pers. (*Mespilus Amelanchier* L.) An felsigen Abhängen der unteren Region, hin und wieder. Häufig am Giessbach. Nase am Thunersee, Simmenfluh bei Wimmis.

Sorbus.

* *aucuparia* L. In Wäldern hin und wieder.

•• *hybrida* L. Spiezfluh (Fischer-Ooster).

* *Aria* Crantz. In lichten Wäldern, an felsigen Abhängen, ziemlich häufig.

torminalis Crantz. Grüsisberg, am Hünibach. (Fischer-Ooster.)

Chamæ-mespilus Crantz. Auf Weiden der höheren Region hin und wieder. Faulhorn. Grindelwald am Eiger. Sigriswyler Rothhorn. Stockhorn. Sohlhorn.

27. Sanguisorbeen.

Alchemilla.

- * *vulgaris* L. Auf Wiesen und Weiden gemein; bis in die höhere Region — *var. subsericea*. Auf Alpenweiden, hin und wieder.
- fissa* Schum. Auf Weiden der höheren Alpen selten. Faulhorn. Steinberg im Lauterbrunnenthal. Stockhornkette.
- alpina* L. Auf Weiden der mittleren und höheren Region überall häufig, hie und da in die Täler herabsteigend.
- pentaphyllea* L. Auf feuchten Stellen der höheren Alpen stellenweise häufig. Faulhorn. Schiltorn, Gemmi u. a. O.
- * *arvensis* Scop. Auf Aeckern.

Sanguisorba.

- * *officinalis* L. Auf feuchten Wiesen und Weiden der Ebene und Vorberge.

Poterium.

- * *Sanguisorba* L. Auf Wiesen, an Wegen, häufig.

28. Onagrarieen.

Epilobium.

- * *angustifolium* L. (*E. spicatum* Lam.) In lichten Wäldern und Gebüsch.
- *Dodonaei* Hochst. (*E. rosmarinifolium* Haenke.) Im Geröll der Bäche hin und wieder.
- Fleischeri* Hochst. Im Geröll der Gletscherbäche. Schmadribach. Gemmi.

- * *hirsutum* L. An Gräben, an feuchten Orten der Ebene und Vorberge.
- * *parviflorum* Schreb. Wie vorige.
- * *montanum* L. In Wäldern der Ebene und Vorberge häufig.
- * *palustre* L. An sumpfigen Stellen der Ebene und Vorberge.
- trigonum* Schrank. (*E. alpestre* Rb.) An feuchten Stellen der Voralpen ziemlich häufig.
- organifolium* Lam. (*E. alpestre* Schmidt.) Ebenso.
- alpinum* L. An feuchten Stellen der höheren Region, hin und wieder.

Oenothera.

- * *biennis* L. An steinigen Orten der Ebene, hie und da.

Circæa.

- * *lutetiana* L. In Wäldern gemein.
- *intermedia* Ehrh. An feuchten, schattigen Orten, hie und da. Kandergrien. Iseltwald. Lauterbrunnerthal u. a. O.
- *alpina* L. Ebenso. Kandersteg. Niesen u. a. O.

29. Halorageen.

Myriophyllum.

- * *verticillatum* L. In Sumpfgräben. Uebischi bei Thun.
- * *spicatum* L. Ebenso. Bei Wattenwyl (Guthnick).

30. Callitrichineen.

Callitriche.

- * *verna* L. In Teichen und Sumpfgräben. Schwarzeneck. — (Bei fernerer Untersuchung dürften sich auch andere verwandte Spec. finden.)

31. Ceratophylleen.

Ceratophyllum.

- *demersum* L. In Teichen und Sumpfgräben. Uebischi bei Thun.

32. Lythrarieen.

Lythrum.

- * *Salicaria* L. An Gräben und feuchten Orten der unteren Region häufig.

33. Tamariscineen.

Myricaria.

- * *germanica* Desv. Im Kies der Flüsse häufig.

34. Portulaceen.

Portulaca.

- *oleracea* L. In Gärten, hin und wieder.

35. Sclerantheen.

Scleranthus.

- * *annuus* L. Auf Aeckern, hie und da.

36. Crassulaceen.

Rhodiola.

- ? *rosea* L. Engstlenalp, am Joch (Gaud. Fl. helv.).

Sedum.

- maximum* Sut. An steinigen Orten der unteren Region. Am Thunersee. Simmenthal.
- * *purpurascens* Koch. Wie vorige, gemein.
- *villosum* L. An sumpfigen Stellen der unteren Region, hie und da. Bei Thun, Sigriswyl, Schwarzeneck.
- atratum* L. Auf Alpenweiden, an steinigen Orten gemein.
- annuum* L. (*S. saxatile* Wigg.) Hie und da in der höheren Region. Faulhorn. Mürren.
- * *album* L. An Mauern und Felsblöcken, häufig; bis in die höhere Region.
- dasyphyllum* L. An Mauern und steinigen Orten der Thäler und Voralpen häufig.
- * *acre* L. An steinigen Orten der unteren Region, häufig. Bei Thun.
- * *sexangulare* L. Im Kies der Aar bei Thun.
- repens* Schleich (*S. saxatile* All.). An felsigen Orten der höheren Region, hie und da. Faulhorn. Gemmi.
- reflexum* L. An Felsen der Stockhornkette, hin und wieder. Günzenen. Häufig beim Weissenburgbad.

Sempervivum.

- *tectorum* L. An Felsen und Mauern hie und da.

montanum L. An Felsblöcken der höheren Region ziemlich häufig.

arachnoideum L. An Felsblöcken hin und wieder.

Döllianum Lehm. Haslithal (Schnittspahn in Flora 1855). Susten und Zweilütschenen (Guthnick).

Ann. Bei fernerer Untersuchung lassen sich ohne Zweifel noch andere, in neuerer Zeit aufgestellte Arten auffinden.

37. Grossularieen.

Ribes.

* *Grossularia* L. In Hecken gemein.

•• *alpinum* L. In Gebüschten hin und wieder. Am nördlichen Fuss der Stockhornkette. Saanen.

* *rubrum* L. Cult. Selten wild. Stockhornkette (Trachsel).

? *petraeum* Jacq. Nünenen (Gaud. Fol. helv. Vol. VII.).

38. Saxifrageen.

Saxifraga.

Cotyledon L. An Granitfelsen im Oberhasli, am Susten.

Aizoon Jacq. An Felsen und Blöcken der mittleren und höheren Region gemein.

•• *mutata* L. An feuchten Felsen der unteren Region, hin und wieder. *Saxifraga* *mutata*

cæsia L. An Felsen hie und da. Stockhorn, auf der Nordseite am Fusse des Horns. Oeschenalp und Gasterenclaus bei Kandersteg. Gemmi. Oldenhorn u. a. O. *St. Bernhard*.

oppositifolia L. An steinigen Orten, in Felsritzen der höheren Alpen, häufig. *Susten*.

Rudolphiana Hornsch. Nüenenen (Guthnick). Alpen von Lauenen (v. Rütte).

? *S. biflora* All. Gemmi, am Lämmerengletscher (Brown).

S. Kochii Hornung (*S. biflora*-var. *grandiflora*). Im Geröll der höchsten Alpen, hin und wieder. Schwalmeren und Suleck (Fischer - Ooster). Lötschpass.

aspera L. An Felsen und steinigen Orten der mittleren und höheren Region, selten. Faulhorn. Grimsel. Scheideck (Gaud. Fl. helv.).

bryoides L. An Felsen der höheren Alpen, hin und wieder. Grimsel. Faulhorn. Niesen. Gemmi u. a. O.

•• *aizoides* L. An feuchten, steinigen Orten, im Geröll der Bäche häufig; bis in die Thäler herabsteigend.

stellaris L. An feuchten Orten, an Bächen und Quellen der höheren Alpen, ziemlich häufig; seltener an der Stockhornkette.

cuneifolia L. An feuchten, schattigen Orten, in Wäldern, hin und wieder. Oberhasli. Gaden. Rosenlaui. Brünig. Gemmi.

muscoides Wulf. An Felsen und steinigen Orten der höheren Region überall häufig. — In mehreren Varietäten.

exarata Vill. Susten (Guthnick). Rosenlaui (Brunner). Gasterenthal (Fischer - Ooster). Zäsenberg in Grindelwald (Christener).

planifolia Lap. Auf höheren Alpen, selten.
Faulhorn.

* *Seguieri* Spreng. Wie vorige. Faulhorn. Garzen
u. a. O.

androsacea L. An steinigen Orten, an Felsblöcken
der höheren Alpen, häufig.

•• *tridactylites* L. An steinigen Orten. Am Aar-
ufer bei Thun.

cernua L. An feuchten, schattigen Stellen am
Nordabhang des Sanetsch, selten (Gaud. Fl.
helv.) (v. Rütte).

•• *rotundifolia* L. An schattigen Orten, in Gebü-
schen der Voralpen, gemein.

Chrysosplenium.

* *alternifolium* L. In Wäldern gemein.

•• *oppositifolium* L. Im Heimbergwald bei Thun
(Brown).

39. Umbelliferen.

Sanicula.

* *europæa* L. In Wäldern der unteren Region
häufig.

Astrantia.

minor L. An etwas feuchten Stellen, an Fels-
blöcken der höheren Alpen ziemlich häufig.
Gadmenthal. Faulhorn. Rallig-Stöcke. Niesen.
Gemmi u. u. O., stellenweise tiefer herab-
steigend.

major L. Häufig auf Wiesen der unteren und
mittleren Region.

Eryngium.

- ? *alpinum* L. Niesen, Jochpass (Gaud. Fl. helv. Vol. VII).

Cicuta.

- *virosa* L. Schmidtmoos bei Amsoldingen.

Trinia.

- vulgaris* DC. An der Simmenfluh bei Wimmis.

Aegopodium.

- * *Podagraria* L. In Hecken gemein.

Carum.

- * *Carvi* L. Auf Wiesen und Weiden der unteren und mittleren Region häufig.

Pimpinella.

- * *magna* L. Auf Wiesen, in Gebüsch, häufig. —
var. rosea häufig auf den Alpenweiden.
* *Saxifraga* L. Auf Aeckern, Wiesen und Weiden gemein.

Berula.

- * *angustifolia* Koch. In Bächen und Gräben hin und wieder. Bei Thun.

Sium.

- latifolium* L. Bei Amsoldingen (Guthnick).

Bupleurum.

- falcatum* L. Bei Meiringen (Guthnick).
ranunculoides L. An felsigen Orten der höheren Region, häufig; stellenweise in die Thäler herabsteigend z. B. bei Grindelwald. — *var. elatius*. Bei Wimmis (Guthnick).
stellatum L. Auf Granitfelsen am Susten zwischen Gadmen und der Steinalp.

Aethusa.

- * *Cynapium* L. Auf cult. Boden, häufig.

Seseli.

coloratum. Ehrh. Auf der Thunallmend.

Libanotis.

montana All. An Felsen der unteren und mittleren Region hin und wieder. Meiringen. Faulhorn. Eisenfluh. Nünenen. Bürglen.

Athamanta.

cretensis L. An felsigen Abhängen der höheren Region ziemlich häufig. Stellenweise tiefer herabsteigend.

Silaus.

- * *pratensis* L. Auf nassen Wiesen, hie und da.

Meum.

Mutellina Gärtn. Auf Weiden der höheren Region, gemein.

Gaya.

simplex Gaud. Wie vorige, aber seltener. Faulhorn. Gemmi. Ganterisch. Bürglen.

Angelica.

- * *sylvestris* L. In Wäldern, ziemlich häufig.
montana Schleich. In Wäldern, hin und wieder.
Grüsisberg bei Thun. Giessbach (Fischer-Ooster).

Peucedanum.

Cervaria Lap. Nase am Thunersee.

Oreoselinum Mönch. Meiringen (Guthnick).

austriacum Koch. Bei Weissenburg (Gaud. Fl. helv.).

Thysselinum.

- * *palustre* Hoffm. Auf Sumpfwiesen bei Amsoldingen. Schwarzeneck.

Imperatoria.

Ostruthium. Auf Alpenwiesen und Weiden hin und wieder. Rosenlaur. Faulhorn. Mürren. Gemmi. Stockhornkette am Sohlhorn.

Pastinaca.

- * *sativa* L. Auf Aeckern, Wiesen, an Wegen, gemein.

Heracleum.

- * *Sphondylium* L. Auf Wiesen gemein.

Laserpitium.

latifolium L. Auf Wiesen der unteren Region, stellenweise häufig. Grindelwald. Kandersteg u. a. O.

Siler L. Am Felsen der Nase am Thunersee, häufig zwischen der Beatenhöhle und Neuhaus. Grindelwald. Meiringen.

hirsutum Lam. Auf Wiesen der Voralpen, in Grindelwald.

Daucus.

- * *Carota* L. Auf Wiesen, an Wegen gemein.

Torilis.

- * *Anthriscus* Gmel. In Hecken, an Wegen, gemein.

Anthriscus.

- * *sylvestris* Hoff. Auf Wiesen gemein.
* *Cerefolium* Hoff. Cult. und hie und da verwildert.

Chærophylum.

- * *aureum* L. In Hecken, auf Wiesen, hie und da. *Villarsii* Koch. Auf Wiesen und Weiden, hin und wieder. Häufig bei Grindelwald. Giessbach am Weg zum Faulhorn.
- * *hirsutum* L. Auf feuchten Wiesen, an Bächen, gemein.

Myrrhis.

- *odorata* Scop. Cult. und hie und da verwildert. Blume. Homberg. Beatenberg.

Conium.

- maculatum* L. Bei Sichelalpenen im Lauterbrunnenthal (Brown).

40. Araliaceen.

Hedera.

- * *Helix* L. In Wäldern, an Mauern und alten Bäumen, häufig.

41. Corneen.

Cornus.

- * *sanguinea* L. In Hecken, an Waldrändern, häufig.
- * *mas* L. Cult.

42. Loranthaceen.

Viscum.

- * *album* L. Auf Obstbäumen, hin und wieder.

43. Caprifoliaceen.

Adoxa.

- * *Moschatellina* L. In Hecken häufig; bis in die mittlere Region hinaufsteigend. Bei Mürren im Schatten grosser Felsblöcke.

Sambucus.

- * *Ebulus* L. In Wäldern häufig.
- * *nigra* L. In Hecken und Gebüsch, hin und wieder.
- * *racemosa* L. In Wäldern ziemlich häufig.

Viburnum.

- * *Lantana* L. Ebenso.
- * *Opulus* L. In Gebüsch, an Waldrändern, häufig.

Lonicera.

- *Caprifolium* L. Cult.; hie und da in Hecken.
- *Periclymenum* L. Grüsisberg bei Thun (Fischer-Ooster).
- * *Xylosteum* L. In Wäldern und Hecken gemein.
- * *nigra* L. In Wäldern hin und wieder. Grüsisberg. Stockenthal. Meiringen.
- *cærulea* L. In Wäldern und Gebüsch hin und wieder. Kandergrien bei Thun. Häufig auf der Busenalp in Lauterbrunnen.
- alpigena* L. In Wäldern ziemlich häufig. Am nördlichen Fuss der Stockhornkette. Kandergrien. Giessbach ob Eisenfluh u. a. O.

44. Stellaten.

Sherardia.

- * *arvensis* L. An cult. Orten häufig.

Asperula.

- taurina* L. In Hecken und Gebüsch. Bei Interlaken. Häufig am Brienzersee bei Iseltwald, Giessbach, Oberried u. s. w. Am Brünig.
- * *cynanchica* L. An steinigen Orten der Ebene und Vorberge.
- * *odorata* L. In Wäldern gemein.

Rubia.

- ? *tinctorum* L. Am Thunersee bei Spiez (Gaud. Fl. helv.).

Galium.

- * *cruciatum* Sm. In Hecken, an Waldrändern, häufig.
- * *Aparine* L. In Hecken gemein, auch in die Alpen hinaufsteigend. Dahin rechnet Koch. *G. tenerum* Schleich. Gemmi (Gaud. Fl. helv.).
- * *uliginosum* L. In Sümpfen. Schwarzeneck.
- * *palustre* L. Ebenso.
- * *rotundifolium* L. In Wäldern hin und wieder. Kandergrien. St. Beatenberg.
- *boreale* L. Kandergrien, selten.
- * *verum* L. An steinigen Orten, an Wegen, gemein.
- * *sylvaticum* L. In Wäldern. Grösisberg bei Thun.
- * *Mollugo* L. In Hecken gemein.

* *sylvestre* Poll. An steinigen Orten von der Ebene bis in die Alpen. In mehreren Varietäten — *var. alpestre* häufig auf allen Alpen.

helveticum Weig. An steinigen, etwas feuchten Orten der höheren Alpen. Im Geröll der Gletscherbäche, auf Schutthalden, ziemlich häufig.

45. Valerianeen.

Valeriana.

* *officinalis* L. In Hecken und Gebüsch.

* *dioica* L. An Gräben, auf nassen Wiesen, gemein.

•• *tripteris* L. An schattigen Felsen, in Wäldern, ziemlich häufig.

montana L. Ebenso, doch im Ganzen seltener.

Valerianella.

* *olitoria* Poll. Auf Aeckern, häufig.

* *Auricula* DC. Auf Aeckern bei Thun, hie und da.

46. Dipsaceen.

Dipsacus.

•• *sylvestris* L. An trockenen Orten und Wegen hie und da.

•• *pilosus* L. Glockenthal bei Thun. Amsoldingen (Brown).

Cephalaria.

? *alpina* Schrad. An der Stockhornkette, sehr selten (Brown).

Scabiosa.

- * *sylvatica* L. (*Knautia* DC.) In Wäldern der Ebene und Voralpen häufig.
- * *arvensis* L. (*Knautia* DC.) Auf Wiesen gemein.
- * *Succisa* L. (*Succisa pratensis* Mönch.) Auf Sumpfwiesen gemein.
- * *columbaria* L. An trockenen Orten gemein.
lucida Vill. Auf Alpenweiden, hin und wieder. Gemmi. Häufig auf Busenalp in Lauterbrunnen und auf der Faulhornkette.

47. Compositen.

Eupatorium.

- * *cannabinum* L. An feuchten Abhängen, in Gebüsch, gemein.

Adenostyles.

- albifrons* Rb. In Alpenwäldern, nicht selten. Häufig im Schwarzwald in Ammert.
- alpina* Bl. et Fing. In feuchten Wäldern der unteren und mittleren Region, häufig. Gemmi.

Homogyne.

- *alpina* Cass. Häufig an etwas feuchten Orten der mittleren Region, seltener in der höheren und unteren Region. Schwarzenegg (Guthnick).

Tussilago.

- * *Farfara* L. Auf Lehm Boden, an Wegen, auf Aeckern, häufig.

Petasites.

- *officinalis* Mönch. Auf feuchten Wiesen, an Bächen, hie und da. Kiesen. Zweisimmen u. a. O.

* *albus* Gärtn. An feuchten Abhängen, in Schluchten, stellenweise häufig. Grüsisberg bei Thun. Rosenlauri. Obersimmenthal.

niveus Baumg. In Wäldern, auf feuchten Weiden im Schatten der Felsen und Steinblöcke, hin und wieder. Rosenlauri. Faulhorn, am Weg zum Giessbach. Mürren, am Weg in's Sefinenthal. Stockhorn (Krümmelwege). Am Oeschenensee.

Aster.

alpinus L. An felsigen Abhängen der höheren Region, ziemlich häufig.

Bellidiastrum.

* *Michellii* Cass. In waldigen Schluchten, an feuchten Felsen der unteren und mittleren Region, häufig.

Bellis.

* *perennis* L. Ueberall auf Wiesen der Ebene und Voralpen.

Erigeron.

* *canadensis* L. An kiesigen Orten der Ebene, ziemlich häufig.

* *acris* L. Ebenso.

•• *angulosus* Gaud. (*E. dröbachensis* Mill.) An kiesigen Orten, an Ufern hie und da. Kandergrien bei Thun. Wimmis. Meiringen.

Villarsii Bell. Faulhorn (Christener). Gasterenthal (Vulpinus). Stockhornkette, am Thalberg (Trachsel).

alpinus L. An felsigen Orten der Alpen, häufig.

glabratus Hoppe. Rosenlaur (Brunner). Lattreyenalp und Sausthal (Vulpus). Nünenen (Trachsel). Sehr häufig auf der Schwefelbergalp (Christener).

uniflorus L. An felsigen Orten der höheren Region hie und da. Häufig am Gernsberg an der Faulhornkette (Christener).

Solidago.

- * *Virga aurea* L. In Wäldern häufig. — *Var. alpestris* und *cambrica* auf den Alpen.

Bupthalmum.

salicifolium L. Sundlauenen am Thunersee. Meiringen.

Inula.

- *salicina* L. Kandergrien und Rossweid bei Thun.
- *Vaillantii* Vill. Kandergrien.
- *Conyza* L. Balmholz am Thunersee (Brown).

Pulicaria.

- * *dysenterica* Gärtner. An Gräben, in feuchten Wiesen der Ebene.

Bidens.

- * *cernua* L. An Gräben und feuchten Orten der Ebene.
- *tripartita* L. Ebenso.

Carpesium.

cernuum L. An sumpfigen Orten selten. Goldey bei Unterseen (Gaud. Fl. helv.) zwischen Bönigen und Iseltwald und am Ballenberg zwischen Brienz und Wylerbrücke (Brown).

Gnaphalium.

- * *sylvaticum* L. In Wäldern der Ebene und Vorberge häufig.
- norvegicum* Gunner. Auf Weiden der höheren Region, selten. Grimsel. Faulhorn. Stockhornkette.
- supinum* L. Auf Weiden der höheren Region nicht selten. — *var. fuscum* Stockhornkette u. a. O. *var. pusillum* Nünenen. Gemmi (Brown).
- * *uliginosum* L. Auf Aeckern hie und da. Schwarzenneck etc.
- Leontopodium* Scop. An felsigen Abhängen der höheren Region hin und wieder. Faulhorn. Stockhorn. Lattreyenalp. Gemmi. Niesen. Bürglen u. a. O.
- * *dioicum* L. Auf trockenen Weiden und Haideplätzen, ziemlich häufig. Von der Ebene bis in die höhere Region.
- carpathicum* Wahl. (*G. alpinum* Gaud.) Auf Weiden höherer Alpen hin und wieder. Faulhorn. Lötschpass. Gemmi. Nünenen. Bürglen.

Artemisia.

- Mutellina* Vill. An Felsen der höheren Alpen hin und wieder. Grimsel. Garzen bei Rosenlauri. Faulhorn. Schilthorn. Lötschpass. Niesen. Ganterisch u. a. O.
- spicata* Wulf. Ebenso. Grimsel. Hohstollen (Hasliberg). Garzen. Faulhorn. Gemmi. Oldenhorn u. a. O. — Der Stockhornkette fehlend.
- *vulgaris* L. An steinigen Orten der unteren

Region hie und da. Bei Thun. Im Lüttschenthäl.

Achillea.

•• *Ptarmica* L. In Gebüschén, an Gräben, hie und da. Bei Gsteig.

macrophylla L. In Gebüschén, an schattigen Orten der Alpen und Voralpen hin und wieder. Handeck. Faulhorn. Mürren. Stockhorn u. a. O.

moschata Wulf. Auf Weiden der höheren Alpen, ziemlich selten. Grimsel. Gr. Scheideck.

nana L. Ebenso, doch seltener. Garzen ob Rosenlauri (Brunner). Zäsenberg in Grindelwald (Christener). Roththal (Fischer-Ooster).

atrata L. Auf Weiden höherer Alpen, häufig.

* *Millefolium* L. Auf Wiesen, an Wegen der Ebene und Voralpen gemein.

? *tanacetifolia* All. Niesen (Gaud. Fl. helv.).

Anthemis.

* *arvensis* L. Im Getreide; bei Thun hin und wieder.

Matricaria.

* *Chamomilla* L. Auf Aeckern der Ebene hie und da.

Chrysanthemum.

* *Leucanthemum* L. Ueberall auf Wiesen der Ebene und Voralpen. — *var. atratum* auf Alpenweiden. Stockhorn (Gaud. Fl. helv.).

montanum L. Auf Alpenweiden hin und wieder.

Alchemilla L. Auf Alpenweiden.

coronopifolium Vill. An feuchten Stellen der Alpen, im Geröll, ziemlich häufig.

alpinum L. Ebenso, auf höheren Alpen.

Aronicum.

Clusii Koch. An feuchten Orten der höheren Alpen selten. Grimsel. Engstlenalp. Garzen bei Rosenlauri. Ammertenthal. Lötschpass.

glaciale Rb. Garzen ob Rosenlauri (Brunner).

scorpioides Koch. An feuchten Orten der höheren Alpen, im Geröll, auf Schutthalden, häufig.

Arnica.

montana L. Auf Alpenweiden, stellenweise häufig. Grindelalp in Grindelwald. Ob Mürren. Raligstöcke. Niesen. Bürglen (Stockhornkette) u. a. O. ~~St. Sebastianberg.~~

Cineraria.

aurantiaca Hoppe. Auf Weiden der höheren Region stellenweise häufig. Faulhorn. Wahlalp und Bürglen an der Stockhornkette.

Senecio.

* *vulgaris* L. Auf Aeckern und cult. Boden gemein.

•• *viscosus* L. In Wäldern, hie und da. Heimberg bei Thun. Latterbach etc.

* *sylvaticus* L. In Wäldern, besonders in Lichtungen, ziemlich häufig.

* *erucifolius* L. An Strassen und Gräben. Bei Thun.

* *Jacobæa* L. An Gräben und feuchten Orten, gemein.

* *aquaticus* L. Auf Sumpfwiesen der Ebene.

lyratifolius Rb. Auf Weiden, in Gebüsch, selten.
Wahlalp an der Stockhornkette (Brown. Christener). Niesen (Guthnick). Rosenlaur (Brunner).

cordatus Koch. Auf Weiden und Waldwiesen der Voralpen, ziemlich häufig.

incanus L. Im obersten Theil des Iffgenthales an der Lenk (v. Rütte, Berner Taschenbuch 1862). Oldenhorn (Gaud. Fl. helv.).

Fuchsii Gmel. (*S. nemorensis*, var. *Fuchsii* Koch. *S. alpestris* Gaud.). In Wäldern und Gebüsch der Voralpen.

Doronicum L. An steinig, Abhängen und Felsen der höheren Region, ziemlich häufig.

Ann. Die Angabe von *S. abrotanifolius* in den Berneralpen (Heg. Fl. der Schw.) beruht ohne Zweifel auf einem Irrthum.

Cirsium.

Eriophorum L. Auf Weiden der unteren und mittleren Region, stellenweise häufig. Niesen. Stockhornkette (Wahlalp, Günzenen). Alpen von Saanen. Jüstisthal.

* *lanceolatum* Scop. An Wegen, auf Schutt, in der unteren Region, häufig.

* *palustre* Scop. An feuchten Orten, auf Sumpfwiesen der unteren Region, häufig.

rivulare Link. An Bächen, auf feuchten Weiden, hin und wieder. Häufig bei Saanen.

heterophyllum All. Grimsel (Guthnick).

•• *acaule* All. Häufig auf Weiden der Voralpen; bis in die höhere Region.

Erisithales Scop. Auf feuchten Weiden hin und wieder.

spinosissimum L. Auf Alpenweiden häufig.

* *oleraceum* L. Auf feuchten Wiesen der Ebene und Voralpen häufig.

* *arvense* L. Auf Aeckern, an Wegen, gemein.

Anm. Ausserdem finden sich nicht selten hybride Zwischenformen, namentlich ist *C. rigens* Wallr. (*C. oleraceo-acaule*) stellenweise häufig, ferner *C. erucagineum* DC. (*C. oleraceo-rivulare*) u. a.

Carduus.

acanthoides. Wimmis (Gaud. Fl. helv.).

* *crispus* L. Auf Schutt, an Hecken, in der Ebene gemein.

•• *Personata* Jacq. In Gebüsch, in Wäldern der Voralpen, hie und da.

•• *defloratus* L. An kiesigen Stellen, an Ufern, im Geröll, häufig.

* *nutans* L. Auf Schutt, an Wegen. Bei Thun.

Lappa.

•• *major* Gärt. Auf Schutt, an Wegen, hie und da. Bei Thun.

* *minor* DC. Ebenso.

• *tomentosa* Lam. Wie vorige. Simmenthal.

Carlina.

•• *acaulis* L. Auf Weiden der Voralpen gemein.

* *vulgaris* L. An steinigen Orten hie und da.

Saussurea.

alpina DC. Bettenalp am Faulhorn (Brown).
Zäsenberghorn in Grindelwald (Christener).

depressa Gren et God. Am Wildhorn in Laenen (v. Rütte, Berner Taschenbuch 1862).

Centaurea.

- * *Jacea* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
- *montana* L. An waldigen Abhängen der Voralpen ziemlich häufig. Kandergrien bei Thun.
- * *Cyanus* L. Im Getreide hin und wieder.
- * *Scabiosa* L. Auf Wiesen der Ebene und Voralpen häufig. — *var. C. alpestris* Heg. Ralligstöcke (Fischer-Ooster).

Lapsana.

- * *communis* L. An Wegen und Waldrändern, gemein.

Aposeris.

foetida Less. An steinigen Orten, in Gebüsch der Voralpen. Häufig am Nordabhang der Stockhornkette (Krümmelwege) u. a. O.

Cichorium.

- * *Intybus* L. Auf trockenen Wiesen, an Wegen gemein.

Leontodon.

- * *autumnalis* L. An Wegen, auf Wiesen, gemein.
- Taraxaci* Lois. Auf steinigen Weiden der höheren Alpen hin und wieder. Faulhorn. Gemmi. Ochsen.

pyrenaicus Gouan. Auf Alpenweiden, häufig.

- * *hastilis* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.

Picris.

- * *hieracioides* L. Auf Wiesen, häufig.

Tragopogon.

- * *pratensis* L. Auf Wiesen, gemein.

Hypochæris.

- * *radicata* L. Auf Wiesen, in Wäldern, gemein.
- uniflora* Vill. (*H. helvetica* Wulf.) Auf Weiden höherer Alpen, selten. Bachalp am Faulhorn. Mürren. Lauenenhorn.

Taraxacum.

- * *officinale* Wigg. Auf Wiesen und Weiden gemein, von der Ebene bis auf die höchsten Alpen — *var. lividum* (*T. palustre* DC.). Auf feuchten Wiesen bei Thun (Brown).³

Prenanthes.

- * *purpurea* L. In Wäldern der Ebene und Vor-alpen ziemlich häufig.

Lactuca.

- * *muralis* DC, An Mauern, in Wäldern, ziemlich häufig.
- perennis* L. Am Felsen am Thunersee bei Neuhaus.

Sonchus.

- * *oleraceus* L. Auf cult. Boden, auf Schutt, häufig.
- * *asper* Vill. Ebenso.
- * *arvensis* L. Auf Aeckern, ziemlich häufig.

Mulgedium.

- alpinum* Less. An waldigen Abhängen der Vor-alpen, stellenweise häufig. Grimsel. Faulhorn am Weg zum Giessbach. In Aminerten (Lauterbrunnen). Stockhornkette an der Wirtneren. Bei Abläntschen u. a. O.

Plumieri DC. Bei Zweisimmen (Gaud. Fl. helv.).

Crepis.

- * *taraxacifolia* Thuill. Auf Wiesen der Ebene.
- *setosa* Hall. fil. Hie und da auf Wiesen.
- præmorsa* Tausch. Kandergrien bei Thun (Brown).
Erlenbach (Guthnick).
- aurea* Cass. Auf Alpenweiden gemein — *var.*
mit gelben Blüthen. Grindelalp (Christener).
- * *biennis* L. Auf Wiesen gemein.
- * *virens* Vill. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
- * *paludosa* Mönch. An feuchten, schattigen Stellen
der Ebene und Voralpen hin und wieder. Am
nördl. Fuss der Stockhornkette u. a. O.
- pygmæa* L. Gemmi, nordöstl. vom Daubensee,
im Geröll, häufig (Christener).
- blattarioides* Vill. Häufig auf Wiesen der Vor-
alpen.
- grandiflora* Tausch. An felsigen Abhängen der
Alpen hin und wieder. Susten. Engstlenalp.
Faulhorn, u. a. O.

Soyeria.

- montana* Monn. Auf Weiden höherer Alpen,
selten. Faulhorn. Ralligstöcke. Ganterisch.
- hyoseridifolia* Koch. Ebenso. Faulhorn. Suleck.
Gemmi.

Hieracium.

- * *Pilosella* L. An trockenen Stellen, an Wegen
der Ebene und Voralpen, gemein.
- furcatum* Hoppe. Auf höheren Alpen, selten.
Engstlenalp (Fischer-Ooster). — *var. alpicola*
(*H. alpicolum* Schl. Gaud.). Faulhorn (Brown).

angustifolium Hoppe. Auf Weiden höherer Alpen hin und wieder. Faulhorn. Wengernalp. Gemmi.

* *Auricula* L. Auf trockenen Weiden, an Waldrändern, häufig.

•• *piloselloides* Vill. An kiesigen Orten hin und wieder. Kandergrien bei Thun.

•• *præaltum* Koch. Wie vorige. Bei Thun.

Nestleri Koch. (*H. glomeratum* Fr.) *var. alpinum* Fries. Auf Alpenweiden. Eisboden. Am Fuss des Wetterhorns bei Grindelwald (Christener).

aurantiacum L. (*H. Guthnickianum* Heg.). Auf Weiden der höheren Region hin und wieder. Engstlenalp. Hasliberg. Faulhorn. Wengernalp. Mürren. Lauenenhorn.

•• *staticefolium* L. An kiesigen Stellen, im Geröll der Bäche, gemein.

glaucum All. An Felsen und steinigen Abhängen, hin und wieder. Am Thunersee bei Neuhaus. Wimmis. Gasteren. Lauterbrunnenthal.

Anm. Zu dieser Spec. ist wohl auch *H. bupleuroides* Gmel. zu ziehen.

subnudum Schleich (*H. Schraderi* *var. dentatum* Gaud.). An Felsen und steinigen Orten der höheren Region ziemlich häufig. Das ächte *H. dentatum* Hoppe scheint im Oberland nicht vorzukommen (Christener).

glabratum Hoppe. (*H. flexuosum* DC. Gaud.). An Felsen und steinigen Orten der höheren Region, selten. Gr. Scheideck und Bachalp am Faulhorn (Christener).

bernense Christener. (Mitth. der naturf. Gesellschaft in Bern, 1860.) Bachalp am Faulhorn (auf dem oberen Hohlenwangläger, an Felsblöcken). Scheideckalp.

villosum Jacq. Häufig an Felsen der höheren und mittleren Region. In zahlreichen Formen. — *var. nudum* Gren. et Godr. auf der Scheideckalp bei Grindelwald (Christener).

valdepilosum Vill. An Felsen und steinigen Abhängen hie und da. Schiltthal ob Mürren. Am Wetterhorn bei Grindelwald (Christener).

Schraderi Schleich. Auf Weiden, an Felsen der mittleren und höheren Region ziemlich selten. Gadmen. Bachalp am Faulhorn. Gemmi.

glanduliferum Hoppe. Auf höheren Alpen, ziemlich selten. Faulhorn. Gemmi. — *var.* mit kahlen Blättern am Schönenbühl in Grindelwald (Christener).

•• *vulgatum* Fr. (*H. sylvaticum* Lam.). In Wäldern, an feuchten Orten, häufig. — *var. integrifolium* Gaud.) Eisboden am Wetterhorn in Grindelwald (Christener).

Trachselianum Christener (Mittheil. der naturf. Gesellschaft in Bern, 1860). Auf felsigen Weiden. Nünenen. Ganterisch. Bachalp am Faulhorn. Scheideckalp in Grindelwald.

* *murorum* L. In Wäldern gemein. In zahlreichen Formen. — *var. alpestre* Griseb. Auf Alpenweiden ziemlich häufig.

Jaquini Vill. An Felsen und steinigen Orten, ziemlich häufig.

•• *amplexicaule* L. An Felsen, nicht selten. Beaten-

höhle am Thunersee. Alpen um Grindelwald
u. a. O.

Ann. Zu dieser Spec. ist wohl *H. pulmonarioides* Vill. zu ziehen.

alpinum L. Auf Weiden, an Felsen, in der höheren Region. Grimsel. Faulhorn. Wengernalp. In mehreren Varietäten — *var. pumilum* Bettenalp am Faulhorn (Guthnick).

albidum Vill. Grimsel.

prenanthoides Vill. Auf Wiesen und Weiden, ziemlich häufig.

ochroleucum Schleich (*H. picroides* Vill.). Grimsel (Gaud. Fl. helv.).

•• *boreale* Fr. In Wäldern hie und da. Grüsisberg bei Thun. Beatenhöhle. Grindelwald.

•• *rigidum* Hartm. (*H. tridentatum* Fr.). An Waldrändern, in Gebüsch, hie und da. In Grindelwald.

* *umbellatum* L. In Wäldern häufig.

48. Campanulaceen.

Phyteuma.

hemisphaericum L. Auf Weiden der höheren Region häufig.

•• *orbiculare* Spreng. Auf feuchten Wiesen und Weiden der Voralpen gemein.

Scheuchzeri All. Gasterenthal (Vulpius).

Michelii Bert. (*P. betonicæfolium* Vill.). Auf Wiesen und Weiden der Alpen hin und wieder. Faulhorn. Grindelwald. Ammerten in Lauterbrunnen. Gemmi.

- * *spicatum* L. In Wäldern der unteren und mittleren Region häufig.

Halleri All. An waldigen Abhängen, selten.
Gemmi, ob Kandersteg. Oberhasli (Brunner).

Campanula.

- *pusilla* Hänke. An waldigen Abhängen, im Kies der Bäche, häufig.

- * *rotundifolia* L. Auf Wiesen, an Wegen, Mauern, gemein, bis in die höhere Region aufsteigend.

Scheuchzeri Vill. (*C. linifolia* Lam.). Auf Alpenweiden und Wiesen, nicht selten. — *var. hirta* (*C. valdensis* All.) Auf Wiesen in Grindelwald (Christener). Stockhorn (Gaud. Fl. helv.).

- *rhomboidalis* L. Auf Alpenwiesen stellenweise häufig. Mürren. Grindelwald u. a. O.

- * *rapunculoides* L. In lichten Wäldern und Gebüsch ziemlich häufig.

- * *Trachelium* L. Ebenso.

- *patula* L. Gemein am Wege bei Oberhofen.

- * *Rapunculus* L. Auf Wiesen gemein.

cenisia L. An steinigen Orten, auf Schutthalden der höchsten Alpen in der Nähe der Schneegränze. Wildgerst. Schwalmeren. Gamchilücke. Rawyl. Oldenhorn u. u. O.

thyrsoidea L. An felsigen Orten der höheren Region stellenweise häufig. Faulhorn. Ralligstöcke. Stockhorn. Bürglen.

- * *glomerata* L. Auf feuchten Wiesen, an Wegen, ziemlich häufig.

barbata L. Häufig auf Wiesen und Weiden der mittleren Region.

Specularia.

- * *Speculum* DC. In Getreide hin und wieder.

49. Vaccinieen.

Vaccinium.

- * *Myrtillus* L. In Wäldern der unteren und mittleren Region, gemein.
•• *uliginosum* L. Auf Torfmooren, ziemlich häufig, von der Ebene bis in die höhere Region.
•• *Vitis-Idæa* L. In Wäldern der Voralpen gemein.
•• *Oxycoccus* L. Auf Torfmooren. Schwarzenegg u. a. O.

50. Ericineen.

Arctostaphylos.

- alpina* Spreng. Engstlenalp (Fischer-Ooster). Stockhornkette, zwischen Wahlalp und Aelpthal (Brown). Nüenen (Trachsel).
•• *Uva-ursi* Spreng. (*A. officinalis* Wimm et Gr.). An steinigen Orten, in Wäldern, hie und da. Häufig im Kandergrien bei Thun.

Andromeda.

- *polifolia* L. Auf Torfmooren häufig.

Calluna.

- * *vulgaris* L. Auf Haideplätzen, Torfmooren, trockenen Weiden der unteren und mittleren Region, gemein.

Erica.

- carnea* L. An steinigen Orten, in Wäldern, ziemlich häufig.

Azalea.

procumbens L. Auf Weiden der höheren Region, häufig. *Dunz 112 in St. Bernhard.*

Rhododendron.

•• *ferrugineum* L. Häufig in der mittleren und im unteren Theil der höheren Region der meisten Alpen. Stellenweise tief heruntersteigend, z. B. am Felsen der Nase am Thunersee.

hirsutum L. Wie vorige; auf der Stockhornkette häufiger als jene. Stellenweise ebenfalls heruntersteigend. Am Fuss des Rugen bei Därigen.

intermedium Tausch. Auf der Stockhornkette (Vulpius). Bei Grindelwald am Eiger (Christener). Am Ochsen (Guthnick). Selten und vereinzelt, wahrscheinlich eine hybride Zwischenform der beiden ersteren Arten.

51. Pyrolaceen.

Pyrola.

* *rotundifolia* L. In lichten Wäldern und Gebüsch hin und wieder. Häufig auf dem Kandergrien bei Thun u. a. O.

•• *chlorantha* Sw. In Wäldern, selten. Kandergrien etc.

•• *media* Sw. Ebenso. Wald am Oeschenensee (Fischer-Ooster).

•• *minor* L. In Wäldern der Ebene und Voralpen hin und wieder. Kandergrien etc.

* *secunda* L. Gemein in Wäldern der Ebene und Voralpen.

- *uniflora* L. In moosigen Tannenwäldern hin und wieder. Rosenlaur. Grindelwald. Gasteren. Gurnigel. *Sinsusthal*.

52. Monotropeen.

Monotropa.

- * *Hypopitys* L. In Wäldern hin und wieder. Kandergrien. Grüsisberg.

53. Aquifoliaceen.

Ilex.

- * *Aquifolium* L. Häufig im Balmholz am Thunersee.

54. Oleaceen.

Ligustrum.

- * *vulgare* L. In Hecken gemein.

Fraxinus.

- * *excelsior* L. In Wäldern der unteren Region.

55. Asclepiadeen.

Cynanchum.

- *Vincetoxicum* R. Br. An steinigen Abhängen, in Gebüsch der unteren Region, häufig.

56. Apocyneen.

Vinca.

- * *minor* L. In Hecken, an Waldrändern, häufig.

57. Gentianeen.

Menyanthes.

- *trifoliata* L. In Sümpfen bei Reutigen. Scheideckalp in Grindelwald.

Swertia.

- perennis* L. Auf Sumpfwiesen der Voralpen hin und wieder. Gurnigel. Hahnenmoos. Häufig im Saanenland.

Gentiana.

- lutea* L. Auf Weiden der mittleren Region, stellenweise häufig.
- purpurea* L. Auf Weiden der mittleren und höheren Region, ziemlich häufig.
- punctata* L. Grimsel (Guthnick).
- * *cruciata* L. Auf Weiden, an Wegen der unteren Region, hin und wieder.
- *asclepiadea* L. Auf feuchten Weiden hin und wieder. Gwatt bei Thun. Gurnigel. Rosenloui. Kandersteg u. a. O.
- *Pneumonanthe* L. Auf Sumpfwiesen hin und wieder. Reutigen. Neuhaus u. a. O.
- acaulis* L. Auf Weiden der mittleren und höheren Region häufig.
- excisa* Presl. Auf Weiden der höheren Alpen, hin und wieder. Häufig an der Faulhornkette.
— *var. minor* (*G. alpina* Vill.) Faulhorn.
- bavaria* L. Auf Weiden der höheren Alpen häufig — *var. rotundifolia* am Faulhorn.
- brachyphylla* Vill. Ebenso, aber seltener.

- *verna* L. Auf feuchten Weiden, von der Ebene bis in die höhere Region.
 - utriculosa* L. An der Lenk (Guthnick). Kiley an der Niesenkette (Brown).
 - nivalis* L. Auf Weiden der höheren Alpen hin und wieder. Hohstollen (Hasliberg). Faulhorn. Niesen. Gemmi. Sigriswylgrat. Ganterisch.
 - campestris* L. Auf Weiden der mittleren und höheren Region, häufig.
 - *germanica* Willd. Auf Weiden, an steinigen Orten, hie und da. Thunallmend. Kandergrien.
 - ? *obtusifolia* Willd. Grimsel (Girard).
 - glacialis* Thom. (*G. tenella* Rottb. Koch. Syn.). Auf Weiden der höheren Alpen hin und wieder. Hohstollen (Hasliberg). Faulhorn. Gemmi. Männlifluh. Gifferhorn bei Saanen.
 - ciliata* L. An steinigen Orten, auf Weiden. Kandergrien.
- Ann.* Eine hybride Form zwischen *G. purpurea* und *G. lutea* (*G. Tomasii* Gill.). Auf Alpenweiden, selten. Gsteig bei Saanen.

Erythræa.

- * *Centaurium* L. An Waldrändern, in Gebüsch, ziemlich häufig.
- *pulchella* Fries. Auf feuchten Weiden, hie und da. Bei Allmendingen. Uebischi.

58. Convolvulaceen.

Convolvulus.

- * *sepium* L. In Hecken, hin und wieder.
- * *arvensis* L. Auf Aeckern häufig.

Cuscuta.

- * *europæa* L. In Hecken, ziemlich häufig.
- *Epithymum* L. Auf Weiden, hin und wieder.

59. Boragineen.

Asperugo.

procumbens L. Auf Aeckern und Wegen, selten.
Aeschi (*Cultivum*) Erlenbach (Brown). Rosenlauri (Guthnick).

Echinosperrum.

Lappula Lehm. Bei Brienz im Geröll (Schläfli).
deflexum Lehm. Im Lauterbrunnenthal (Reichenbach, Flora excurs). Am Weg vom Giessbach zur Axalp im Buchenwald (Schläfli).

Cynoglossum.

- *officinale* L. An steinigen Orten, in Hecken. Schorenallmend bei Thun. Giessbach.

Borago.

- * *officinalis* L. Auf Schutt, an Wegen hie und da.

Lycopsis.

- *arvensis* L. Zwischen Latterbach und Weissenburg (Brown).

Symphytum.

- * *officinale* L. An Gräben und Bächen der Ebene, häufig.

Cerintke.

- ? *major* L. Stockhorn (Koch Syn. Ed. 2). Stockhornkette (Hegetschw. Fl. d. Schweiz). (Diese Angaben beruhen ohne Zweifel auf einer Verwechslung mit der folgenden Spec.)

alpina Kit. (*C. glabra* Gaud.). An steinigen Orten der Alpen, ziemlich selten. Mürren, am Weg nach dem Sefinenthal. Kienthal. Stockhorn (Krümmelwege). Ganterisch.

Echium.

- * *vulgare* L. An steinigen Orten der Ebene gemein.

Pulmonaria.

- * *officinalis* L. In Hecken bei Kiesen (Brown).
- mollis* Wulf. In Laubwäldern der Voralpen. (Fischer - Ooster).
- * *angustifolia* L. Ebenso (Brown).

Lithospermum.

- * *officinale* L. An kiesigen Orten, an Ufern.
- * *arvense* L. Auf Aeckern.

Myosotis.

- * *palustris* With. Auf feuchten Wiesen, an Bächen, häufig.
- * *sylvatica* Hoffm. Auf Wiesen und Weiden häufig.
— *var. alpestris*. Auf Weiden höherer Alpen gemein.
- * *intermedia* Link. An cult. Orten, gemein.
- * *stricta* Link. Auf Aeckern bei Thun.

Eritrichium.

nanum Schrad. An Felsen, auf Schutt der höchsten Alpen, selten. Heuberg neben dem Sustenpass (Prof. Brunner). An der Steinlimmi, zwischen Steinalp und Triftgletscher (Ziegler).

60. Solaneen.

Solanum.

- * *nigrum* L. An Wegen, auf Schutt, gemein.
- * *Dulcamara* L. An Ufern hin und wieder. Kandergrien. An der Aar.
- * *tuberosum* L. Cult. (in der unteren und mittleren Region).

Physalis.

Alkekengi L. An steinigen, sonnigen Orten hin und wieder. Kandergrien bei Thun. Sundlauenen am Thunersee. Wimmis.

Atropa.

- * *Belladonna* L. In Wäldern der Ebene und Vorberge. Kandergrien. Grüsisberg u. s. w.

61. Scrophulariaceen.

a. Verbasceen.

Verbascum.

- * *Thapsus* L. (*V. Schraderi* Meyer). An steinigen Orten, Waldrändern hin und wieder.
- * *thapsiforme* Schrad. Ebenso.
- montanum* Schrad. Bei Trachsellauenen in Lauterbrunnen.
- * *Lychnitis* L. An steinigen Orten, an Wegen.
- * *nigrum* L. Ebenso.

b. Scrophularieen.

Scrophularia.

- * *nodosa* L. In Hecken und Gebüsch gemein.

- * *aquatica* L. (*S. Ehrharti* Stev.). In Sumpfgräben.
Uebischi etc.

c. Antirrhineen.

Digitalis.

- *grandiflora* Lam. In Gebüsch, an Waldrändern der unteren Region. Kandergrien bei Thun u. a. O.
* *lutea* L. An waldigen Abhängen der Voralpen, ziemlich häufig.

Linaria.

- * *spuria* Mill. Auf Aeckern hin und wieder.
* *minor* Desf. An Mauern und steinigen Orten häufig.
•• *alpina* Mill. An feuchten, steinigen Orten, auf Schutthalden, im Geröll der Alpenbäche, häufig; bis in die Thäler herabsteigend.
* *vulgaris* Mill. An Wegen und Hecken der unteren Region.

Erinus.

- alpinus* L. An Felsen, von der unteren bis in die höhere Region, ziemlich häufig.

d. Veroniceen.

Veronica.

- *scutellata* L. Auf Sumpfwiesen. Uebischimoos. Schwarzeneck.
* *Anagallis* L. In Gräben und Bächen hie und da.
* *Beccabunga* L. In Gräben und kleinen Bächen gemein.

- * *urticifolia* L. In Wäldern der Ebene und Vor-
alpen häufig.
- * *Chamædrys* L. An Hecken, an Waldrändern,
gemein.
- *montana* L. Gurnigelwald (Brown. Guthnick).
- * *officinalis* L. In Wäldern gemein.
- aphylla* L. Auf Alpenweiden, an steinigen Orten,
häufig.
- latifolia* L. (*V. Teucrium* L. Brown. Catal).
Gemmi (Brown).
- bellidioides* L. Auf Weiden der höheren Region,
nicht selten. Grimsel. Faulhorn. Gemmi.
Bürglen u. a. O.
- fruticulosa* L. An steinigen Orten, an Felsblöcken
der unteren und mittleren Region, ziemlich
häufig.
- saxatilis* Jacq. Wie vorige, doch im Ganzen
seltener und weniger tief heruntersteigend.
- alpina* L. Auf steinigen Weiden der höheren
und mittleren Region, häufig.
- * *serpyllifolia* L. Auf Aeckern und Weiden, häufig;
bis in die höhere Region aufsteigend.
- * *arvensis* L. Auf Aeckern gemein.
- * *agrestis* L. Ebenso.
- * *Buxbaumii* Ten. Auf Aeckern, an Wegen; bei
Thun hie und da.
- * *hederæfolia* Ebenso.

e. Limoselleen.

Limosella.

- ? *aquatica* L. Am Ufer des Thunersees bei Neu-
haus (Brown).

f. Rhinanthaceen.

Tozzia.

alpina L. An steinigen Orten, in Gebüsch, selten. Grimsel (Vulpus). Eisboden am Wetterhorn, in Grindelwald (Christener). Niesen und Stockhorn (Brown). An der Nordseite des Sohlhorns (Vulpus).

Melampyrum.

- * *arvense* L. Auf Aeckern, selten.
- * *pratense* L. In Wäldern gemein.
- *sylvaticum* L. Häufig in Wäldern der Vorberge. Kandergrien bei Thun.

Pedicularis.

- rostrata* L. Auf Weiden der höheren Alpen, selten. Grimsel und Susten (Guthnick). Berge ob Rosenlauri (Brunner).
- tuberosa* L. Auf Weiden höherer Alpen. Grindelalp am Faulhorn. Murren am Weg zum Seftinenthal. Gasteren.
- adscendens* Gaud. (*P. Barrelieri* Rb.). Gemmi über Schwarrenbach (Brown).
- sylvatica* L. Torfmoor von Schwarzenneck. Bei Meiringen.
- * *palustris* L. Auf Sumpfwiesen der Ebene.
- foliosa* L. Auf Weiden, an felsigen Abhängen der mittleren und höheren Region, ziemlich häufig.
- recutita* L. Auf Alpenweiden, selten. Gemmi. Kiley (Brown). Grimsel (Vulpus). Mettenberg in Grindelwald (Christener).

versicolor Wahl. Auf Alpenweiden, stellenweise häufig. Faulhorn. Engstlenalp. Kiley. Stockhornkette, an mehreren Orten.

verticillata L. Auf Weiden, an steinigen Orten der mittleren und höheren Region, gemein.

Rhinanthus.

* *minor* Ehrh. Auf Sumpfwiesen.

* *major* Ehrh. Auf Wiesen und Aeckern.

* *Alectorolophus* Poll. (*R. hirsutus* Lam.). Auf Wiesen und Aeckern, hin und wieder.

alpinus Baumg. Ralligstöcke. Gentelthal u. a. O.

Bartsia.

alpina L. Auf Weiden, an steinigen Orten der mittleren und höheren Region, gemein.

Euphrasia.

* *officinalis* L. Auf Waldwiesen und Weiden der Ebene und Voralpen, häufig. — In mehreren Varietäten.

minima Schleich. Auf Weiden der höheren Alpen ziemlich häufig.

salisburgensis Funk (*E. alpina* DC.). Auf Weiden und Wiesen hie und da. Bei Interlaken am Fuss des Abendberges. Niesen. Gemmi u. a. O.

* *Odontites* L. Auf Aeckern, an Wegen. Häufig bei Thun.

62. Orobancheen.

Orobanche.

Scabiosæ Koch. Im Oeschenenthal, auf *Carduus defloratus* (Fischer-Ooster).

- *Epithymum* DC. An trockenen Abhängen, auf Thymus Serpyllum. Bei Thun, stellenweise häufig.
- *Galii* Duby. Hin und wieder auf Galium Molugo u. a. Spec.
- Teucris* Schultz. Bei Sundlauenen am Thunersee auf Teucrium Scorodonia (Fischer-Ooster).
- flava* Martius. In waldigen Schluchten, auf Petasites alba. Saxetenthal. Bei Saanen (Tschertschisthal). Weissenburg.
- minor* Sut. Auf Trifolium pratense, hin und wieder.
- *ramosa* L. Auf Cannabis sativa.

Lathræa.

- *Squamaria* L. In Gebüsch, selten. In der Nähe der Ruine von Jagdburg bei Amsoldingen (Brown). Bei Thierachern (Fischer-Ooster). Meiringen (Guthnick).

63. Labiaten.

Mentha.

- * *sylvestris* L. An Gräben, in Gebüsch, häufig.
- * *aquatica* L. An feuchten Orten, an Gräben, auf Sumpfwiesen, hin und wieder.
- * *arvensis* L. Auf Aeckern.
- *sativa* L. Auf Sumpfwiesen und Torfmooren.

Lycopus.

- * *europæus* L. An Gräben, auf Sumpfwiesen, hie und da. Bei Thun.

Salvia.

- *glutinosa* L. In Gebüsch, an waldigen Abhängen, häufig.

- * *pratensis* L. Auf Wiesen gemein.

Origanum.

- * *vulgare* L. In Gebüsch, an Waldrändern, gemein.

Thymus.

- * *Serpyllum* L. Auf trockenen Wiesen und Weiden, gemein.

Calamintha.

- * *Acinos* Clairv. An steinigen Orten der Ebene und Vorberge, ziemlich häufig.

alpina Lam. An steinigen Orten, im Geröll der unteren und mittleren Region, häufig.

grandiflora Mönch. In Gebüsch ob dem Weisenburgbade. Bei Boltigen. Am Fuss des Ganterisch (Brown).

- .. *officinalis* Mönch (*Melissa Calamintha* L.). In Hecken und Wäldern, hie und da.

Nepeta Clairv. (*Melissa Nepeta* L.). In Hecken zwischen Thun und Gunten (Brown).

Clinopodium.

- * *vulgare* L. In Hecken, gemein.

Nepeta.

- .. *Cataria* L. Grüsisberg bei Thun (Fischer-Ooster). Uetendorf allmend (Schläfli).

Glechoma.

- * *hederacea* L. An Hecken der Ebene und Vor-alpen, gemein.

Melittis.

- .. *Melissophyllum* L. An waldigen Abhängen bei Sundlaunen am Thunersee.

Lamium.

- * *purpureum* L. Auf Aeckern gemein.
- * *maculatum* L. In Hecken gemein; bis in die höhere Region aufsteigend.

Galeobdolon.

- * *luteum* L. In Gebüsch, an Waldrändern, gemein.

Galeopsis.

- * *Ladanum* L. Auf Aeckern, an Wegen, gemein. In mehreren Varietäten.
- * *Tetrahit* L. Auf Aeckern, in Waldschlägen, gemein.

Stachys.

- *alpina* L. In Gebüsch, auf Weiden, in der Nähe der Sennhütten, ziemlich häufig. Kandergrien bei Thun.
- * *sylvatica* L. In Wäldern und Gebüsch der Ebene und Vorberge, häufig.
- *palustris* L. An Gräben und feuchten Orten der Ebene, hin und wieder.
- * *annua* L. Auf Aeckern gemein.
- * *recta* L. An steinigen Orten der Ebene und Vorberge, gemein.

Betonica.

- * *officinalis* L. Auf Weiden, in Gebüsch, häufig.
— *var. stricta* auf den Voralpen.
- hirsuta* L. An der Schneit bei Abländschen (v. Rütte).

Ballota.

- *nigra* L. Auf Schutt, an Wegen in der Ebene, hie und da.

Scutellaria.

- *galericulata* L. An feuchten Orten, in Sümpfen, hie und da.

Prunella.

- * *vulgaris* L. Auf Weiden, an Wegen der unteren Region, häufig.
- *grandiflora* Jacq. An steinigen Orten, auf Weiden der unteren und mittleren Region, häufig.

Ajuga.

- * *reptans* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein — *var. alpina* auf Alpenweiden.
- * *genevensis* L. An Hecken und Wegen der Ebene, ziemlich häufig.
- pyramidalis* L. Auf Alpenweiden, ziemlich häufig.

Teucrium.

- * *Scorodonia* L. In Gebüsch und lichten Waldungen, häufig.
- *Chamædrys* L. An Mauern und steinigen Orten. Am Thunersee. Wimmis u. a. O.
- *montanum* L. An steinigen Orten, in Gräben der Voralpen, häufig. Kandergrien bei Thun.

64. Verbenaceen.

Verbena.

- * *officinalis* L. An steinigen Orten, an Wegen der Ebene, gemein.

65. Lentibularieen.

Pinguicula.

- *alpina* L. An feuchten, schattigen Felsen, häufig. *Helvetica*
- * *vulgaris* L. Auf Sumpfwiesen, besonders auf Tuffboden, häufig — *var. grandiflora* auf den Alpen, hin und wieder.

Utricularia.

- * *vulgaris* L. In Sumpfgräben bei Amsoldingen u. a. O.
- intermedia* Hayn. Schmidtmoos bei Amsoldingen (Brown).
- *minor* L. In Sumpfgräben bei Neuhaus. Limpbach bei Uttigen.

66. Primulaceen.

Lysimachia.

- * *vulgaris* L. An Gräben und Ufern, häufig.
- * *Nummularia* L. In Hecken bei Thun.
- * *nemorum* L. In Wäldern und Gebüsch.

Anagallis.

- * *arvensis* L. Auf Aeckern, im Getreide, häufig.
- *cærulea* Schreb. Wie vorige, aber seltener.

Centunculus.

- *minimus* L. Auf sandigen Feldern, selten.

Androsace.

- helvetica* Gaud. In Felsenritzen der höheren Alpen. Faulhorn. Gemmi. Niesen. Stockhorn. Ganterisch u. a. O.

glacialis Hoppe. An steinigen Orten, auf Schutthalden der höchsten Alpen. Schwarzhorn und Röthihorn in Grindelwald. Sidelhorn (Brown).

pubescens DC. Auf höheren Alpen, in Felsenritzen, hin und wieder. Faulhorn. Schilthorn. Gemmi. Rawyl. Niesen u. a. O.

Chamæjasme Host. Auf Weiden, an Felsblöcken der höheren Region, häufig.

obtusifolia All. Wie vorige, aber seltener. Faulhorn. Gemmi.

lactea L. An Felsen, hin und wieder. Sigriswylgrat. Stockhornkette.

Primula.

* *farinosa* L. Auf sumpfigen Wiesen und Weiden, häufig; bis in die höhere Region aufsteigend.

* *elatior* Jacq. In Wäldern und Gebüschen der unteren und mittleren Region häufig, nicht selten auch an schattigen Stellen der höheren Region.

* *officinalis* Jacq. Auf trockenen Wiesen, ziemlich häufig.

Auricula L. An Felsen der mittleren und höheren Region, ziemlich häufig.

viscosa Gaud. (*P. villosa* Jacq.). An Felsen der unteren und mittleren Region, hin und wieder. Faulhorn. Bänisegg in Grindelwald. Sichelauen in Lauterbrunnen. — Erscheint in verschiedenen, noch näher zu untersuchenden Var. — Zwischen dieser Spec. und *P. Auricula* finden sich hie und da hybride Zwischenformen (dahin gehört *P. helvetica* Schleich — am Gügisgrat ob Beatenberg (Fischer-Ooster).

integrifolia L. Auf Weiden, an Felsen der höheren Region, selten. Bachalp am Faulhorn. Engstlenalp. Suleck.

Soldanella.

alpina L. Auf feuchten Weiden der höheren Region, häufig.

pusilla Baumg. (*S. Clusii* Gaud.). Auf Weiden der höchsten Alpen, ziemlich selten. Grimsel. Faulhorn (Brown).

Cyclamen.

europæum L. Häufig in der Nähe der Beatenhöhle am Thunersee. Interlaken. Lauenen (Brown). Meiringen.

67. Globularieen.

Globularia.

vulgaris L. Auf Weiden, an steinigen Orten, hin und wieder. Thunallmend.

nudicaulis L. Ebenso, stellenweise häufig. Am Brienersee zwischen Bönigen und Iseltwald. Sigriswylgrat. Stockhorn. *St. Aegidienberg*

cordifolia L. An Felsen, auf trockenen Weiden, hin und wieder. Nase am Thunersee. Bei Thun. Häufig auf den Alpen in Grindelwald. Thalberg (Stockhornkette). *Gralligstele, Niederhorn*

68. Plantagineen.

Littorella.

? *lacustris* L. An der Aar auf der Kälberweid bei Thun und am Thunersee bei Neuhaus (Brown).

Plantago.

- * *major* L. An Wegen, auf Schutt, in der Ebene und den Voralpen gemein.
- * *media* L. Auf trockenen Wiesen, an Wegen der Ebene und Voralpen, gemein.
- * *lanceolata* L. Ebenso. — *var. alpina* Gaud. Auf Alpenweiden — *var. altissima* Jacq. Bei Thun (Fischer-Ooster).
- montana* Lam. Auf Weiden der mittleren und höheren Region, häufig.
- alpina* L. Ebenso.

69. Chenopodeen.

Chenopodium.

- *hybridum* L. An Wegen, auf Schutt, hie und da.
- * *album* L. Auf Aeckern, an Wegen, gemein.
- * *polyspermum* L. Ebenso.
- * *Bonus Henricus* L. An Wegen, auf Schutt, hie und da.
- rubrum* L. Ebenso.

Beta.

- * *vulgaris* L. Cult.

Atriplex.

- * *patula* L. Auf Aeckern, an Wegen, gemein.

70. Polygoneen.

Rumex.

- *sanguineus* L. An feuchten Stellen der Wälder, hie und da. Bei Amsoldingen (Guthnick).

- * *conglomeratus* Murr. (*R. Nemolapathum* Ehrh.).
An Wegen und Gräben, hie und da.
- * *obtusifolius* L. Auf feuchten Wiesen, gemein.
pratensis Mert. et Koch. (*R. cristatus* Wallr.).
Bei Amsoldingen (Guthnick).
- * *crispus* L. Auf feuchten Wiesen gemein.
alpinus L. Auf Alpenweiden, in der Nähe der
Sennhütten, häufig.
- scutatus* L. An steinigen Orten, hin und wieder.
Bei Thun. Meiringen. Faulhorn. Ganterisch.
- nivalis* Heg. An steinigen Orten, im Geröll der
höheren Alpen, selten. Faulhorn. Suleck.
Engstlenalp.
- arifolius* All. An steinigen Orten, auf Weiden
in der Nähe der Sennhütten, hin und wieder.
Faulhorn. Niesen u. a. O.
- * *Acetosa* L. Auf Wiesen, gemein.
- * *Acetosella* L. An trockenen Abhängen, auf Torf-
boden, häufig.

Oxyria.

- digyna* Camp. Auf Weiden, im Geröll der höhe-
ren Alpen. Faulhorn. Gemmi u. a. O.

Polygonum.

- *Bistorta* L. Auf feuchten Wiesen der unteren
Region, ziemlich häufig.
- viviparum* L. Auf Alpenweiden, gemein.
- * *amphibium* L. Amsoldingersee.
- * *lapathifolium* L. An Gräben und feuchten Orten,
häufig.
- * *Persicaria* L. An Wegen, auf Aeckern, gemein.

- * *Hydropiper* L. In Gräben häufig.
- * *minus* Huds. (*P. pusillum* Lam.). An feuchten Orten hie und da.
- * *aviculare* L. Auf cult. Boden, an Wegen, auf Aeckern, gemein.
- * *Convolvulus* L. Auf Aeckern, ziemlich häufig.

71. Thymeleen.

Daphne.

- * *Mezereum* L. In Wäldern der Ebene und Vor-alpen, hin und wieder. Kandergrien bei Thun.
- alpina* L. An der Stockhornkette, beim Weissen-burgbad (Schläfli); am Thalberg (Gaud. Fl. helv. Vol. VII.).

72. Santalaceen.

Thesium.

- ? *intermedium* Schrad. Bei Sigriswyl am Fuss der Ralligstöcke (Brown).
- *alpinum* L. In Wäldern, auf Weiden, stellenweise häufig. Kandergrien. Ob Eisenfluh u. a. O.

73. Elæagneen.

Hippophaë.

- * *rhamnoides* L. An Ufern, im Geröll. Häufig an der Kander- und Aar- und Aar- u. a. O.

Elæagnus angustifolia

74. Aristolochieen.

Asarum.

europæum L. In Wäldern an der Saane bei Saanen, ziemlich häufig. Kandergrien in der Nähe des Strättligenthurms und in einem Walde an der Blume bei Thun (Brown).

75. Empetreen.

Empetrum.

nigrum L. Auf Weiden der höheren Alpen, ziemlich häufig.

76. Euphorbiaceen.

Euphorbia.

- * *helioscopia* L. Auf cult. Boden.
- * *platyphylla* L. An Wegen und Gräben in der Gegend von Thun, hie und da.
- * *dulcis* L. In Wäldern gemein.
- *amygdaloides* L. In Wäldern bei Thun (Guthnick).
- * *Cyparissias* L. An steinigen Orten, an Ufern, gemein.
- * *Peplus* L. In Gärten als Unkraut, hie und da.
- * *exigua* L. Auf Aeckern nach der Ernte, gemein.

Mercurialis.

- * *perennis* L. In Wäldern und Gebüsch.
- * *annua* L. Auf Schutt, an Wegen. Bei Thun.

77. Urticeen.

Urtica.

- * *urens* L. An Mauern und Wegen hie und da.
Bei Thun.
- * *dioica* L. In Hecken, an Wegen, gemein; bis
in die höhere Region aufsteigend.

Parietaria.

erecta Mert. et Koch. Bei Interlaken (Schläfli).

Cannabis.

- * *sativa* L. Cult.

Humulus.

- * *Lupulus* L. In Hecken gemein.

Ulmus.

- * *campestris* L. In Wäldern der Ebene und Vor-
berge, und cult.

78. Juglandeen.

Juglans.

- * *regia* L. In der Ebene cult. Häufig bei Inter-
laken.

79. Cupuliferen.

Fagus.

- * *sylvatica* L. In Wäldern der unteren Region.

Quercus.

- *sessiliflora* Sm. In der Ebene, meist einzeln.
- * *pedunculata* Ehrh. Ebenso.

Corylus.

- * *Avellana* L. In Hecken und Gebüsch der unteren Region, gemein.

Carpinus.

- * *Betulus* L. In Hecken und Gebüsch der Ebene, hin und wieder.

80. Salicineen.

Salix.

- * *pentandra* L. Gemmi über Kandersteg (Gaud. Fl. helv.).
- * *fragilis* L. Bei Thun.
- * *alba* L. An Ufern hin und wieder. An der Aar. Kandermündung u. a. O.
- * *triandra* L. In Gebüsch, an Ufern.
- *daphnoides* Vill. Ebenso. An der Kandermündung. Meiringen.
- * *purpurea* L. (*S. monandra* Hoffm.). An Bächen und Flüssen, häufig.
- * *incana* Schrank. In Gebüsch, an Ufern, häufig.
- * *cinerea* L. An waldigen Abhängen, in Gebüsch.
- * *nigricans* Fr. (*S. phylicifolia* Wahl). An Ufern, in Gebüsch.
- *grandifolia* Ser. An waldigen Abhängen der Vorberge, ziemlich häufig.
- * *Caprea* L. In Gebüsch, an Ufern, ziemlich häufig.
- * *aurita* L. Auf Sumpfboden, in feuchten Wäldern.
- hastata* L. Auf Alpenweiden, ziemlich häufig.

- * *repens* L. Auf Torfmooren. Schwarzeneck. Uebischi u. s. w. (In mehreren Varietäten.)
- arbuscula* L. An Bächen und feuchten Stellen der Alpen, hin und wieder — *var. Waldsteiniana* (*S. ovata* Ser.). Grimsel am Aargletscher (Seringe. Gaud. Fl. helv.) *var. foetida* (*S. foetida* DC.). Gemmi (Gaud. Fl. helv.).
- Lapponum* L. (*S. helvetica* Vill.). Kiley (Brown). Grimsel am Aargletscher (Gaud. Fl. helv.). Am Schmadribach im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Fischer-Ooster).
- glauca* L. Grimsel (Seringe).
- cæsia* Vill. Gemmi (Guthnick).
- myrsinites* L. Auf höheren Alpen, selten. Gemmi am See und beim Lämmergletscher (Brown. Gaud. Fl. helv.).
- reticulata* L. An Felsblöcken, auf steinigen Weiden der höheren Region, häufig.
- retusa* L. An felsigen Abhängen der mittleren und höheren Region, ziemlich häufig.
- herbacea* L. Auf Weiden der höheren Alpen, ziemlich häufig. Grimsel. Engstlenalp. Faulhorn. Gemmi. Stockhornkette, zwischen Ganterisch und Bürglen.

Ann. Ausser den genannten Arten finden sich zuweilen (meist selten und vereinzelt) hybride Zwischenformen, welche früher als eigene Arten beschrieben wurden. Dahin gehören *S. rubra* Huds. Kandergrien bei Thun (Gaud. Fl. helv.) und *S. Seringeana* Gaud. an der Kander mündung (Gaud. Fl. helv.). Beide in neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

Populus.

- * *alba* L. In der Ebene cult.

- * *tremula* L. In Wäldern der Ebene und Voralpen.
- * *pyramidalis* L. In der Ebene cult.
- * *nigra* L. An Ufern, in Wäldern der unteren Region.

81. Betulineen.

Betula.

- * *alba* L. In Wäldern der Ebene und Voralpen.
- *pubescens* Ehrh. Auf Torfmooren, häufig.
- nana* L. Torfmoor von Wachseidorn bei Schwarzenneck.

Alnus.

- *viridis* DC. Auf Weiden, an Waldrändern der mittleren Region, häufig; auch in der unteren und oberen Region.
- * *incana* DC. In Wäldern, an Ufern, häufig.
- * *glutinosa* Gärt. Ebenso.

B. Monocotyledonen.

82. Alismaceen.

Alisma.

- * *Plantago* L. In Sumpfgräben, häufig.

Scheuchzeria.

- palustris* L. Torfmoor von Schwarzenneck. Gemmi. Bachalp am Faulhorn.

Triglochin.

- *palustre* L. Auf Sumpfwiesen, hin und wieder. Bachalp am Faulhorn.

83. Potameen.

Potamogeton.

- * *natans* L. In stehendem und langsam fließendem Wasser.
- *fluitans* Roth. In Bächen, in der Ebene und auf den Alpen.
- gramineus* L. In Gräben. Bei Uttigen.
- lucens* L. In der Aar bei Thun.
- prælongus* Wulf. Ebenso.
- * *perfoliatus* L. In Gräben und Bächen, hin und wieder. In der Aar bei Thun.
- * *crispus* L. Ebenso. Bei Amsoldingen.
- * *pusillus* L. In Sumpfgräben, ziemlich häufig.
- *pectinatus* L. In Sumpfgräben und in fließendem Wasser — *var. setaceum* in der Aar bei Thun (Fischer - Ooster).
- * *densus* L. In Bächen und Gräben, ziemlich häufig.

84. Lemnaceen.

Lemna.

- * *minor* L. In Gräben und Teichen, häufig.
- gibba* L. Torfmoor von Schwarzenneck (Brown).

85. Typhaceen.

Typha.

- * *latifolia* L. In Gräben, an Ufern.
- *minima* Hoppe. Am Thunersee.

Sparganium.

- * *ramosum* Huds. In Gräben, an Bächen, hin und wieder.
- *simplex* Huds. Ebenso.
- *natans* L. In Teichen der Alpen, hin und wieder. Grimsel (Räterichsboden. Brown). Grosse Scheideck (Christener).

86. Aroideen.

Arum.

- * *maculatum* L. In Hecken und Gebüsch. Bei Thun.

Acorus.

- Calamus* L. Am Thunersee bei Gwatt (Brown). Schadau bei Thun (Gaud. Fl. helv.).

87. Orchideen.

Orchis.

- * *militaris* L. (*O. galeata* Lam.). In lichten Wäldern und Gebüsch. Bei Thun. Sigriswyl (Endorf)
- * *ustulata* L. Auf feuchten Wiesen der Ebene und Voralpen. Neutal. Sigriswyl.
- globosa* L. Auf Weiden der mittleren und höheren Region, nicht selten. Ralligstocher. Sigriswyl. St. J. Leutenberg

* *Morio* L. Auf trockenen Weiden der Ebene und Vorberge.

pallens L. Auf Alpenweiden, selten. Thalberg (Stockhornkette). Sigriswylgrat. Alpen von Grindelwald (Gaud. Fl. helv.).

* *mascula* L. An Waldrändern, auf Weiden, häufig.

* *maculata* L. ^{St. Beatenberg, Sigriswyl.} In Wäldern der Ebene und Vor-
alpen, häufig.

* *latifolia* L. Auf Sumpfwiesen.

•• *incarnata* L. Ebenso.

Anacamptis.

pyramidalis Rich. Auf Wiesen und Weiden der mittleren Region, selten. Ob Eisenfluh.

Gymnadenia.

* *conopsea* R. Brw. Auf-Waldwiesen und Weiden der Voralpen, häufig.

odoratissima L. Auf feuchten Weiden der Vor-
alpen, nicht selten. Grindelwald. Sigriswyl.
Häufig bei Kandersteg. Bei Spiez. Aeschi.

albida Rich. Auf Alpenweiden, häufig. St. Beatenberg

Himantoglossum.

•• *hircinum* Rich. Ein Exemplar wurde in Belle-
rive bei Thun gefunden (Brown).

Cœloglossum.

•• *viride* Hartm. (*Habenaria* R. Brw.). Häufig auf
Alpenweiden, hie und da auch in der unteren
Region. St. Beatenberg

Platanthera.

* *bifolia* Rich. In Wäldern der Ebene und Vor-
berge, gemein.

- *chlorantha* Custor. In Wäldern der Ebene und Vorberge, hin und wieder.

Nigritella.

angustifolia Rich. (*Orchis nigra* Scop.). Auf Alpenweiden der höheren Region, gemein; seltener in der mittleren Region. *Sigriswylgröd.*

Ophrys.

- *muscifera* Huds. (*O. myodes* Jacq.). Auf Waldwiesen, in Gebüsch, hin und wieder. Häufig an der Kanderemündung u. a. O. *St Beatenberg.*
- aranifera* Huds. Auf Weiden bei Thun.
- *arachnites* Rich. Auf Wiesen und Weiden, hin und wieder. Bei Thun. Neuhaus.
- *apifera* Huds. Ebenso. *Sigriswyl (Endorf)*

Chamæorchis.

alpina Rich. Auf Weiden höherer Alpen, hin und wieder. Faulhorn. Gemmi. Stockhorn.

Aceras.

- *anthropophora* R. Brw. Auf Weiden und Wiesen, selten. Bei Sigriswyl. Hügel ob Oberhofen und Hilterfingen.

Herminium.

- *Monorchis* R. Brw. Auf sumpfigen Weiden der Vorberge ziemlich häufig.

Epipogium.

- *Gmelini* Rich. In feuchten Wäldern, selten. Ob Blumenstein (Brown). Ob Iseltwald (Guthnick). Giessbach und im Sefinenthal (Fischer-Ooster). Gasteren. Gurnigel (Prof. Brunner).

Cephalanthera.

- * *pallens* Rich. In Wäldern und Gebüschcn der Ebene und Vorberge, nicht selten. *St. Beatenberg*.
- *ensifolia* Rich. Ebenso. *St. Beatenberg*.
- *rubra* Rich. Ebenso; häufiger als die 2 erstern Spec. *Signiswyl, St. Beatenberg*.

Epipactis.

- * *latifolia* All. (*E. latifolia* var. *pallens* Gaud.). In Wäldern häufig.
- *rubiginosa* Koch. (*E. latifolia* var. *rubiginosa* Gaud.). In Wäldern hin und wieder. Kandergrien u. a. O.
- *palustris* Crantz. Auf Sumpfwiesen, an Ufern, stellenweise häufig. *Signiswyl, Spiez*.

Listera.

- * *ovata* R. Brw. In Wäldern und Gebüschcn der Ebene und Voralpen, gemein. *Signiswyl St. Beatenberg*.
- cordata* R. Brw. In moosigen Tannenwäldern, stellenweise häufig. Gadmen am Weg nach der Steinalp. Rosenlauri. Mürren am Weg nach Lauterbrunnen. Saanen. Gurnigel. Wald bei Schwarzenneck (Brown).

Neottia.

- * *Nidus avis* Rich. In Wäldern der Ebene und Vorberge, ziemlich häufig. *St. Beatenberg*.

Goodyera.

- *repens* R. Brw. In trockenen Wäldern der Vorberge, hin und wieder. Häufig im Balmholz am Thunersee. Grösisberg und Kandergrien bei Thun. Lauterbrunnen (Muret). *St. Beatenhöhle, St. Beatenberg*.

Spiranthes.

- *æstivalis* Rich. Auf Sumpfwiesen, selten. Neuhaus; zwischen Brienz und Meyringen (Brown).
- *autumnalis* Rich. Auf Weiden der Vorberge, hin und wieder. Bei Thun und Oberhofen (Brown).

Corallorrhiza.

- *innata* R. Brw. In moosigen Tannenwäldern, ziemlich selten. Rosenlauri. Giessbach, am Weg zum Faulhorn (Muret). Gasteren. Saanen. Sigriswylgrat.

Sturmia.

- *Læselii* Rb. Sumpfwiesen bei Neuhaus (Brown).

Malaxis.

- monophyllos* Sw. In feuchten Wäldern, selten. Gasteren; Oberhasli (Gaud. Fl. helv. Vol. VII). Lauterbrunnenthal (Brown. Muret). Giessbach, am Weg nach dem Faulhorn (Guthnick). Rosenlauri (Brunner).

Cypripedium.

- *Calceolus* L. In Wäldern und Gebüsch hie und da. Kandergrien bei Thun. Bei Oberhofen.

Sigriswyl (Endorf.)

88. Irideen.

Crocus.

- *vernus* All. Auf feuchten Wiesen und Weiden der Vorberge, stellenweise häufig.

Iris.

- germanica* L. (?) In Ried bei Thun und bei Spiez.

- * *Pseudo-Acorus* L. In Sumpfgräben, an Teichen, hie und da.

89. Amaryllideen.

Narcissus.

- .. *poëticus* L. Auf Wiesen der Ebene und Vorberge, hin und wieder. Ziemlich häufig im Simmenthal.

- * *Pseudo-Narcissus* L. Auf Wiesen, in Baumgärten der Ebene, nicht selten. Bei Thun.

Leucojum.

- * *vernum* L. Auf Wiesen der Ebene und Vorberge. Häufig bei Wimmis.

Galanthus.

- * *nivalis* L. Auf Wiesen, in Baumgärten, stellenweise häufig.

90. Asparageen.

Streptopus.

- amplexifolius* DC. Selten in Wäldern an der Stockhornkette (Brown. Guthnick).

Paris.

- * *quadrifolia* L. In Wäldern und Gebüsch, häufig.

Convallaria.

- .. *verticillata* L. In Wäldern der Voralpen. Häufig im Kandergrien bei Thun.
- .. *Polygonatum* L. In Bergwäldern, nicht selten. Kandergrien bei Thun. Stockhornkette.

- * *multiflora* L. In Hecken und Gebüsch.
- * *majalis* L. In Gebüsch, hie und da. Bei Thun.

Majanthemum.

- * *bifolium* L. In Wäldern gemein.

91. Dioscoreen.

Tamus.

- * *communis* L. In Gebüsch, an Waldrändern der unteren Region, hie und da.

92. Liliaceen.

Tulipa.

- sylvestris* L. Auf einer Wiese bei Thun, wahrscheinlich verwildet. (Fischer-Ooster).

Lilium.

- ? *bulbiferum* L. Kiley (Brown).

Martagon L. In Wäldern der Vorberge hin und wieder. An der Kandermündung. Gänzenen. Iseltenalp. Susten u. a. O.

Lloydia.

serotina Salisb. Auf höheren Alpen ziemlich häufig. Faulhorn. Niesen. Stockhorn u. s. w.

Authericum.

- *Liliago* L. Jüstisthal und Lütschenenthal (Brown).
- *ramosum* L. An trockenen, steinigen Orten hie und da. Felsen bei Neuhaus. Bei Thun.
- Liliastrum* L. (*Paradisia* Bert.). Auf Alpenweiden und Wiesen, hin und wieder. Grindelwald. Suleck. Niesen. Stockhorn u. a. O.

Ornithogalum.

pyrenaicum L. Einmal am Grüsisberg gefunden (Trog. Guthnick).

* *umbellatum* L. Auf Aeckern der Ebene.

* *nutans* L. Auf Wiesen bei Thun (Brown).

Gagea.

Liottardi Schult. (*O. fistulosum* DC.). Auf Weiden höherer Alpen, an feuchten Stellen, hin und wieder. Gemmi, an mehreren Stellen (Brown).

•• *lutea* Schult. Auf feuchten Wiesen, selten. Bei Wimmis (Brown).

Scilla.

•• *bifolia* L. Auf Wiesen bei Kiesen (Brown).

Allium.

Victorialis L. An felsigen Orten der Alpen, selten. Zäsenberghorn in Grindelwald, an Felsen der Bachalp am Faulhorn (Christener). Gasterenthal (Vulpinus). Stockhornkette (Brown).

* *ursinum* L. In Hecken, an Waldrändern.

fallax Don. (*A. angulosum* Jacq.). An felsigen Orten, hin und wieder. Hohbühl bei Interlaken. Hasli im Grund. Gadmen.

sphaerocephalum L. An Felsen bei Interlaken. Nase am Thunersee.

vineale L. An trockenen Orten zwischen Thun und Merligen (Brown).

•• *oleraceum* L. Cult. und hie und da verwildert.

•• *carinatum* L. An Hecken ziemlich häufig.

Schoenoprasum L. *var. alpinum*. Auf Weiden höherer Alpen, stellenweise häufig, z. B. Engstlenalp.

Muscari.

•• *racemosum* Mill. Auf Wiesen. Bei Thun.

* *botryoides* Mill. Ebenso.

93. Colchicaceen.

Colchicum.

* *autumnale* L. Auf feuchten Wiesen, gemein.

Veratrum.

album L. Auf Alpenweiden, häufig.

Tofieldia.

* *calyculata* Wahl. An feuchten Abhängen und auf Weiden, häufig; bis in die höhere Region — *var. glacialis* (*T. glacialis* Gaud.). Gemmi (Brown).

94. Juncaceen.

Juncus.

Jacquini L. An felsigen Abhängen der höheren Alpen, hin und wieder. Faulhorn. Schilthorn. Suleck. Gemmi u. a. O.

* *conglomeratus* L. An Gräben und feuchten Orten, gemein.

* *effusus* L. Ebenso.

* *glaucus* Ehrh. Auf Sumpfwiesen und Torfmooren. Schwarzeneck.

filiformis L. Auf Alpenweiden, hin und wieder. Faulhorn. Wengernalp u. a. O.

triglumis L. Auf Alpenweiden, an feuchten Orten, hin und wieder. Faulhorn. Gemmi. Stockhornkette. Gurnigel u. a. O.

trifidus L. An felsigen Abhängen der höheren Alpen, nicht selten.

* *obtusiflorus* Ehrh. Auf Sumpfboden häufig.

* *acutiflorus* Ehrh. (*J. sylvaticus* Reich). Auf Sumpfwiesen. Amsoldingen.

* *lamprocarpus* Ehrh. An feuchten Orten, häufig.

•• *alpinus* Vill. (*J. ustulatus* Hoppe). An feuchten Orten, hie und da. An der Kandermündung.

•• *compressus* Jacq. Auf feuchten Weiden. Kandergrien.

* *bufonius* L. An feuchten Orten, an Wegen und Gräben, gemein.

Luzula.

flavescens Gaud. In Wäldern, hin und wieder.

* *pilosa* Willd. In Wäldern gemein.

•• *maxima* DC. In Wäldern der Vorberge, ziemlich häufig.

spadicea DC. Auf Alpenweiden, nicht selten.

* *albida* DC. In Wäldern der Ebene und Vorberge, gemein — *var. rubella* auf Alpenweiden.

nivea DC. In Wäldern, ziemlich selten. Am kl. Rugen bei Interlaken. Meiringen. Guttannen. Grimsel.

lutea DC. Auf Alpenweiden, hin und wieder. Faulhorn. Gr. Scheideck. Gasterenthal.

* *campestris* DC. An Waldrändern, auf Weiden der Ebene und Voralpen, gemein.

- *multiflora* Lej. In Wäldern der Voralpen, hin und wieder — *var. nigricans* und *nivalis* auf den höheren Alpen.
- *spicata* DC. Auf Alpenweiden. Faulhorn. Gemmi. Stockhorn.

95. Cyperaceen.

Cyperus.

- *flavescens* L. Auf Sumpfwiesen, hie und da. Amsoldingen.
- *fuscus* L. Ebenso.

Schænus.

- * *nigricans* L. Auf Torfmooren, häufig.
- *ferrugineus* L. Auf Sumpfboden, hin und wieder. Kandergrien.

Cladium.

- *Mariscus* L. Uebischisee bei Amsoldingen. Golzwylensee.

Rhynchospora.

- *alba* Vahl. Auf Torfmooren, in der Ebene und auf den Alpen.

Heleocharis.

- * *palustris* R. Brw. In Gräben, an Ufern, nicht selten.
- *uniglumis* Link. Ebenso. Gwatt bei Thun.
- *acicularis* R. Brw. Auf feuchtem Sandboden. Am Thunersee.

Scirpus.

- *cæspitosus* L. Auf Sumpfwiesen der Vorberge, häufig.

- *pauciflorus* Lightf. (*S. Bæothryon* L.). An sumpfigen Orten. Bei Thun.
- ? *setaceus* L. Stockhornkette (Brown).
- ? *supinus* L. Ebenso.
- * *lacustris* L. An Ufern, in Teichen.
- *triqueter* L. Am Thunersee bei Gwatt (Brown).
Bei Neuhaus an der Aar (Fischer-Ooster).
- * *sylvaticus* L. An sumpfigen Stellen der Wälder.
- * *compressus* Pers. Auf nassen Wiesen, an Wegen.
Bei Thun. Neuhaus.

Ann. Die bei Bern am Aarufer häufig vorkommende *S. Tabernaemontani* Gmel. ist ohne Zweifel auch in der Gegend von Thun zu finden.

Eriophorum.

- alpinum* L. Auf Torfmooren und Sumpfwiesen der Vorberge und Alpen. Schwarzenneck. Uebischi. Stockhorn. Faulhorn. Gemmi u. a. O.
- * *vaginatum* L. Auf Torfmooren der Ebene und Voralpen.
- Scheuchzeri* Hoppe. Auf sumpfigen Weiden der höheren Alpen, hin und wieder. Grimsel. Engstlenalp. Faulhorn. Suleck. Stockhornkette u. a. O.
- * *latifolium* Hoppe. Auf Torfmooren und Sumpfwiesen der Ebene und Vorberge.
- *angustifolium* Roth. Wie vorige, aber seltener. Schwarzenneck.
- *gracile* Roth. Schwarzenneck.

Elyna.

spicata Schrad. Auf Weiden der höheren Region, ziemlich selten. Grimsel. Faulhorn. Niesen.

Gemmi. Nüenenen. Zwischen Bürglen und Ganterisch.

Kobresia.

caricina Willd. Auf Alpenweiden, selten. Bachalp am Faulhorn. Wintereck (Gemmi).

Carex.

•• *dioica* L. Sumpfwiesen bei Amsoldingen. Schwarzeneck. Grindelalp.

* *Davalliana* Sm. Auf Torfmooren und Sumpfwiesen, häufig.

•• *pulicaris* L. Auf Sumpfwiesen. Kälberweid bei Thun. Amsoldingen. Schwarzeneck.

rupestris All. Bürglen an der Stockhornkette (Guthnick). Faulhorn (Hegetschw. Fl. d. Schw.).

pauciflora Lightf. Auf Torfmooren, selten. Schwarzeneck. Sehr häufig bei Wachseldorn.

curvula All. Auf Weiden der höheren Alpen, ziemlich häufig.

? *incurva* Lightf. (*C. juncifolia* All.) Berge des Simmenthals (Gaud. Fl. helv. Vol. VII.).

chordorrhiza Ehrh. Torfmoor von Schwarzeneck (Bamberger).

•• *disticha* Huds. (*C. intermedia* Good.). In Sümpfen hie und da.

foetida All. Auf höheren Alpen hin und wieder, Grimsel. Faulhorn. Gemmi u. a. O.

microstyla Gay. Auf höheren Alpen, selten. Grimsel. Faulhorn.

Laggeri Wimmer (Flora 1854). Grimsel am Todtensee (Lagger. Guthnick).

- * *vulpina* L. Auf Sumpfwiesen, an Gräben.
- * *muricata* L. Auf Wiesen, an Hecken, gemein
— *var. virens*. Bei Thun.
- *teretiusecula* Good. Auf Torfmooren. Amsoldingen.
Schwarzeneck.
- * *paniculata* L. In Sümpfen, an Gräben und feuchten Orten.
- *paradoxa* Willd. Auf Torfmooren, in Sümpfen.
Uebischi.
- *brizoides* L. Homberg bei Thun. (Fischer-Oöster).
- * *remota* L. In Wäldern gemein.
- * *stellulata* Good. Auf Sumpfwiesen häufig — *var. grypus*, auf den Alpen; auch am Uebischisee (Fischer-Ooster).
- * *leporina* L. Auf Sumpfwiesen, in der Ebene und auf den Alpen.
- *elongata* L. Bei Amsoldingen. Schwarzeneck. Neuhaus.
- lagopina* Wahl. Auf höheren Alpen, ziemlich selten. Grimsel. Garzen. Faulhorn.
- Heleonastes* Ehrh. Torfmoor von Schwarzeneck.
- * *canescens* L. Auf Torfmooren und Sumpfwiesen. Schwarzeneck u. a. O.
- Persoonii* Sieb. (*C. Gebhardi* Hoppe). Auf höheren Alpen, selten. Grimsel (Vulpus). Engstlenalp (Fischer-Ooster). Faulhorn (Brown). Stockhornkette (Guthnick).
- ? *Gaudiniana* Guthn. Auf Sumpfwiesen bei Amsoldingen. In neuerer Zeit nicht mehr gefunden. (Wahrscheinlich eine hybride Zwischenform von *C. stellulata* und *C. dioica*.)

- * *stricta* Good. In Sümpfen, an Ufern, gemein.
- * *vulgaris* Fr. Auf Sumpfwiesen.
- *acuta* L. In Sumpfgräben, selten. Balmholz (Brown).
- nigra* All. Auf Alpenweiden, ziemlich selten. Engstlenalp. Faulhorn. Kiley. Gemmi.
- aterrima* Hoppe. Grimsel (Bamberger). Gasteren (Vulpus). Zäsenberg in Grindelwald (Christener).
- atrata* L. Auf Weiden, an steinigten Abhängen der höheren Region, ziemlich häufig.
- irrigua* Sm. An feuchten Stellen der höheren Region, hin und wieder. Bachalp am Faulhorn (Brown). Gr. Scheideck (Christener). u. a. O.
- *limosa* L. Am Amsoldingersee. Schwarzeneck.
- *pilulifera* L. In Wäldern, hie und da. Kandergrien.
- *tomentosa* L. An feuchten Orten, selten. Kandergrien. Eselmatt bei Thun. Gwatt.
- * *montana* L. In Gebüsch, an Waldrändern der Ebene und Vorberge, gemein.
- ericetorum* Poll. — *var. membranacea* Sanetsch (Gaud. Fl. helv.).
- * *præcox* Jacq. Auf Weiden und trockenen Wiesen, gemein — *var. C. umbrosa* Host. Schwarzeneck.
- *humilis* Leyss. Grüsisberg bei Thun. Beatenhöhle (Brown).
- * *digitata* L. In Wäldern gemein.

- * *ornithopoda* Willd. In Gebüschcn, an Waldrändern, häufig; auch auf den Alpen. Gemmi (Brown). ~~Stockhorn.~~
- * *alba* Scop. In steinigcn Wäldern, hin und wieder. Häufig im Kandergrien.
- * *panicea* L. Auf Sumpfwiesen, an Gräben, häufig; auch auf den Alpen.
- vaginata* Tausch. Am Fuss des Schwabhorns und auf der Stockhornkette zwischen Bürglen und Ochsen (Guthnick).
- * *glauca* Scop. In feuchten Wäldern und Gebüschcn, gemein; bis in die Alpen aufsteigend.
- * *maxima* Scop. In feuchten Wäldern, hin und wieder. Grüsisberg bei Thun u. a. O.
- * *pallenscns* L. Auf Waldwiesen und feuchten Weiden, bis in die höhere Region.
- capillaris* L. An felsigen Abhängen der höheren Region, hin und wieder. Faulhorn. Niesen. Gemmi. Ganterisch. Stockhorn.
- ustulata* Wahl. Garzen ob Rosenlaur (Brunner). Faulhorn (Guthnick). Rawyl (Müret).
- frigida* All. Auf feuchten Alpenweiden, hin und wieder. Grimsel. Faulhorn. Niesen. Ganterisch u. a. O.
- sempervirens* Vill. An felsigen Abhängen der Alpen, ziemlich häufig; stellenweise tief heruntersteigend.
- firma* Host. An Felsen der Alpen, hin und wieder. Faulhorn. Grindelwald. Schilthorn. Gasterenclus. Gemmi. Stockhorn.
- ferruginea* Scop. Wie vorige. Grindelwald. Gemmi. Stockhorn.

tenuis Host. Ebenso. Bei Meiringen. Grindelwald. Ammert in Lauterbrunnen. Oeschenenalp. Gemmi. Stockhorn. Bis in die Ebene heruntersteigend. Kandergrien bei der Rindfleischhöhle.

- * *flava* L. Auf Sumpfwiesen, an Gräben, gemein, bis in die Alpen.
- *Oederi* Ehrh. Auf feuchtem Sandboden. Bei Thun an der Aar.
- fulva* Good. Am Amsoldingensee (Bamberger).
- * *Hornschuchiana* Hoppe. Auf Sumpfwiesen, häufig.
- * *distans* L. An feuchten Orten, hin und wieder.
- * *sylvatica* Huds. In Wäldern, gemein.
- * *ampullacea* Good. In Sumpfgräben, häufig.
- * *vesicaria* L. Ebenso. Kandergrien.
- * *paludosa* Good. In Gräben, an Ufern, häufig.
- *filiformis* L. Am Amsoldingensee. Schwarzeneck.
- * *hirta* L. An Wegen und Ufern, häufig.

96. Gramineen.

Andropogon.

- *Ischæmum* L. An steinigen Orten. Bei Hilterfingen.

Panicum.

- * *sanguinale* L. An Mauern und cult. Orten, gemein.
- ciliare* Retz. Im Ried bei Thun (Fischer-Ooster).
- *glabrum* Gaud. Hilterfingen, Steffisburg (Brown).
- * *Crus galli* L. An Wegen, an cult. Orten. Bei Unterseen.

Setaria.

- *verticillata* Beauv. Auf Aeckern.
- * *viridis* Beauv. Ebenso.
- * *glauca* Beauv. Ebenso.

Phalaris.

- * *arundinacea* L. An Bächen — *var. picta*. Im Diemtigthal (Fischer-Ooster).

Anthoxanthum.

- * *odoratum* L. Auf Wiesen der Ebene und Voralpen, gemein.

Alopecurus.

- * *geniculatus* L. Auf Sumpfwiesen, an Gräben, hie und da.

Phleum.

- Michelii* All. Auf Alpenweiden, ziemlich häufig.
- * *pratense* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
- alpinum* L. Auf Alpenweiden, gemein.

Leersia.

- *oryzoides* Sw. Bei Spiez (Gaud. Fl. helv.).

Agrostis.

- * *stolonifera* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
- * *vulgaris* With. Ebenso.
- * *canina* L. An feuchten Orten der Ebene und Voralpen.
- alpina* Scop. An felsigen Orten der höheren Region, gemein.
- rupestris* All. Wie vorige, aber seltener.

Apera.

- * *Spica venti* Beauv. Im Getreide, hin und wieder.

Calamagrostis.

- *Epigeios* Roth. An Ufern und feuchten Orten. Kandergrien.

Halleriana DC. Im oberen Sulldthal, am Weg zum Dreispitz (Bamberger).

tenella Host. (*Agrostis pilosa* Gaud). Grimsel am Aargletscher (Brown).

- * *montana* Host. Häufig in Wäldern — *var. acutiflora*. Kandergrien bei Thun. Gemmi.

- *sylvatica* DC. In Wäldern der Voralpen, selten. Grindelwald, am Weg zum Faulhorn (Fischer-Ooster).

Milium.

- * *effusum* L. In Wäldern der Ebene und Voralpen. Bei Thun.

Stipa.

pennata L. An Fesen bei Sundlauenen am Thunersee.

Lasiagrostis.

Calamagrostis Link. (*Agrostis* L.). An Felsen der unteren Region, hin und wieder. Sundlauenen. Kandersteg. Am Eingang des Simmenthals.

Phragmites.

- * *communis* L. An Ufern der Flüsse und Seen.

Sesleria.

- *caerulea* Ard. An steinigen Orten, hin und wieder. Häufig im Kandergrien bei Thun. Am Eingang des Simmenthals — *var. pallens*. Beim Weissenburg-Bad (Guthnick). *var. gracilis*. Engstlenalp (Guthnick).

disticha Pers. Susten (Vulpus). Roththal an der Jungfrau. (?)

Koeleria.

- * *cristata* Pers. Auf trockenen Wiesen gemein; bis in die höhere Region aufsteigend (*var. gracilis* und *nana*).

Aira.

- * *cæspitosa* L. Auf Wiesen, in Wäldern der Ebene und Vorberge.

flexuosa L. In Gebüsch, hin und wieder. Bei Thun. Sigriswyl. Grindelwald.

Holcus.

- * *lanatus* L. Auf Wiesen gemein.
- *mollis* L. Auf Wiesen, hin und wieder.

Arrhenatherum.

- * *elatus* M. et K. Auf Wiesen und Aeckern, in Hecken, gemein.

Avena.

- * *sativa* L. Cult.
- *fatua* L. Auf Aeckern bei Stocken (Bamberger).
- * *pubescens* L. Auf Wiesen gemein.
 - versicolor* Vill. Auf Weiden, an steinigen Abhängen der höheren Region, häufig.
- * *flavescens* L. Auf Wiesen gemein.
 - distichophylla* Vill. Auf Alpenweiden, an steinigen Abhängen, hin und wieder. Faulhorn. Gemmi. Stockhorn.
 - subspicata* Clairv. Auf Alpenweiden, selten. Faulhorn. Gemmi. Männlifluh (Niesenkette).

Triodia.

- *decumbens* Beauv. Auf Wiesen, hie und da.
Bei Thun. Gurnigel.

Melica.

- ciliata* L. An Felsen bei Sundlauenen am Thunersee. Bei Wimmis.
- * *nutans* L. In lichten Wäldern, häufig.
- *uniflora* Retz. Ebenso, doch seltener.

Briza.

- * *media* L. Auf Wiesen, gemein.

Poa.

- * *annua* L. An Wegen, auf cult. Boden, gemein
— *var. varia* (*P. supina* Schrad). Auf den Alpen. Scheideck (Gaud. Fl. helv.).
- laxa* Hænke. Auf Alpenweiden, hin und wieder.
Faulhorn. Gemmi. Stockhorn u. a. O.
- minor* Gaud. Auf höheren Alpen, selten. Faulhorn (Brown). Häufig am Gamsberg in Grindelwald-(Christener). Suleck (Vulpus). Gemmi (Gaud. Fl. helv.).
- * *bulbosa* L. Auf Wiesen, an Wegen, hin und wieder, mit der *var. vivipara*.
- alpina* L. Auf Alpenweiden häufig, besonders die *var. vivipara* — *var. minor* (*P. frigida* Gaud.)
Gemmi, am Lämmerengletscher (Brown).
- cæsia* Sm. (*P. aspera* Gaud.). Stockhornkette (Brown). Gemmi (Gaud. Fl. helv.).
- * *nemoralis* L. In Wäldern der Ebene und Vor-alpen gemein. — In mehreren Varietäten.
- *fertilis* Host. An feuchten Orten; bei Amsoldingen.

- sudetica* Schrad. Gemmi (Gaud. Fl. helv. Vol. VII).
- * *trivialis* L. Auf Wiesen, an feuchten Orten, gemein.
- * *pratensis* L. Ebenso. — In mehreren Varietäten.
- cenisia* All. (*P. distichophylla* Gaud.). An steinigen Orten, im Geröll der höheren Region, hin und wieder. Gemmi. Stockhorn (Brown). Sanetsch (Gaud. Fl. helv.); auch heruntersteigend. — *var. pallescens* (*P. Halleridis* R. et Schult.). Stockhorn, (Südseite) (Brown). Hünibach bei Thun (Christener). — *var. flexuosa* (*P. flexuosa* Wahl). Gemmi (Gaud. Fl. helv.). In der Kohleren bei Thun (Fischer-Ooster).
- * *compressa* L. Auf Aeckern, an Wegen und Mauern

Glyceria.

- * *fluitans* R. Brw. In Bächen und Gräben. Bei Thun.
- plicata* Fries. Ebenso. Allmendingen (Fischer-Ooster).

Molinia.

- * *cærulea* Mönch. In Wäldern der Ebene und Voralpen.

Dactylis.

- * *glomerata* L. Auf Wiesen gemein.

Cynosurus.

- * *cristatus* L. Auf Wiesen und Weiden, häufig.

Festuca.

- Halleri* All. Auf Alpenweiden hin und wieder. Faulhorn. Gemmi. Kiley (Brown).

- * *ovina* L. Auf Wiesen und Weiden, von der Ebene bis in die höhere Region. — *var. alpina* (*F. alpina* Gaud.). Auf Alpenweiden. Faulhorn etc. — *var. violacea* (*F. violacea* Gaud.). Auf Weiden der höheren Alpen. — *var. duriuscula* (*F. duriuscula* Host. Auf Weiden, an Wegen — *var. glauca* (*F. glauca* Schrad.). Thunallmend (Guthnick).
- * *heterophylla* Lam. In Wäldern der Ebene und Vorberge — *var. nigrescens* (*F. nigrescens* Lam.). Auf Alpenweiden, häufig.
- varia* Hänke. An felsigen Orten der Alpen, hin und wieder.
- pumila* Vill. Wie vorige. Faulhorn. Gemmi. Niesen. Stockhorn u. a. O.
- sylvatica* Vill. In Wäldern, selten. Bei Merligen. Gurnigel.
- Scheuchzeri* Gaud. Auf höheren Alpen, hin und wieder. Faulhorn, Niesen, Gemmi (Brown). Ziemlich häufig am Fuss des Wetterhorns in Grindelwald (Christener). Lattreyenalp (Vulpus). Stockhorn (Gaud. Fl. helv.).
- * *gigantea* Vill. In Wäldern. Grüsisberg bei Thun.
- * *arundinacea* Schreb. An sumpfigen Orten, Ufern u. s. w. Bei Thun. (Dazu gehört *F. decolorans* M. K. Im Lauterbrunnenthal, am Staubbach.)
- * *pratensis* Huds. (*F. elatior* L.). Auf Wiesen, an Wegen, gemein.

Brachypodium.

- * *sylvaticum* Röm et Sch. In Wäldern, häufig.
- * *pinnatum* Beauv. Auf Wiesen, in Gebüschen, ziemlich häufig.

Bromus.

- * *secalinus* L. Auf Aeckern. — *var. velutinus* Ebenso.
- commutatus* Schrad. Auf Aeckern, an Wegen, selten (Brown).
- * *racemosus* L. Auf Aeckern und Wiesen.
- * *mollis* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
- * *arvensis* L. Auf Aeckern, selten.
- squarrosus* L. Grimsel (Gaud. Fl. helv.).
- * *asper* Murr. In Wäldern und Gebüsch.
- * *erectus* Huds. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
- * *sterilis* L. An Wegen, auf Schutt.
- ? *tectorum* L. An Mauern, an Wegen (Brown).

Triticum.

- * *vulgare* L. Cult.
- * *Spelta* L. Cult.
- *monococcum* L. Cult.
- * *repens* L. In Hecken, gemein.
- *caninum* Schreb. Bei Wimmis und Zweilütschen (Brown).

Secale.

- * *cereale* L. Cult.

Elymus.

- *europæus* L. In Wäldern, ziemlich selten. Bei Thun. Blumenstein u. a. O.

Hordeum.

- * *vulgare* L. Cult.
- *hexastichum* L. Cult.

* *distichum* L. Cult.

* *murinum* L. An Mauern und Wegen.

Lolium.

* *perenne* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
var. tenue Schwarzenack (Brown).

* *multiflorum* Lam. (*L. italicum* A. Br.). Auf Wiesen, hin und wieder. Grüsisberg bei Thun. Neuhaus.

•• *temulentum* L. In Getreide, hie und da.

Nardus.

•• *stricta* L. Auf trockenen Weiden, gemein.

C. Gymnospermen.

Coniferen.

a. Taxineen.

Taxus.

* *baccata* L. In Wäldern der unteren Region, hin und wieder. Häufig im Balmholz am Thunersee.

b. Cupressineen.

Juniperus.

nana Willd. Auf Weiden der höheren Region, hin und wieder. Häufig auf der Stockhornkette (Fischer-Ooster). Grimsel (Guthnick).

Horizontalis L. Auf Weiden.

- * *communis* L. Auf Haiden und trockenen Abhängen der unteren Region, gemein.

c. Abietineen.

Pinus.

- * *sylvestris* L. In der unteren und mittleren Region, gruppenweise und vereinzelt, selten in grösseren Beständen.

Pumilio Hänke (*P. Mughus* var. *Pumilio* Koch). An trockenen Orten der mittleren Region, ziemlich häufig; hie und da in grösseren Beständen. *Steinbock- und Pöschelberg*

uncinata Gaud. Am Rosenlauigletscher und bei Kandersteg (Fischer-Ooster).

Cembra L. An der obersten Gränze der mittleren Region, zerstreut; selten in grösseren Beständen. Oberhasli. Gentel- und Gadmenthal. Wengernalp u. a. O.

- * *Larix*. In der unteren und mittleren Region, meist mit andern Nadelhölzern gemischt. Im Oberhasli und Gadmenthal, ziemlich häufig; in neuerer Zeit häufig cult.

Abies.

- * *excelsa* DC. (*P. Abies* L. Koch). Wälder der unteren und mittleren Region.
 - * *pectinata* DC. (*P. Picea* L. Koch). Wälder der unteren Region, meist mit Rothtannen gemischt.
-

II. Gefässkryptogamen.

I. Selaginellen.

Selaginella.

spinulosa A. Br. Auf Weiden, an Felsblöcken, besonders in der mittleren Region, häufig.

Ann. *S. helvetica* Spring. Auf der Alpenkette im Allgemeinen ziemlich verbreitet, dürfte wohl auch im Oberlande zu finden sein.

II. Lycopodiaceen.

Lycopodium.

•• *Selago* L. In Wäldern, an Felsblöcken, häufig.

inundatum L. Torfmoore von Schwarzenegg und Uebischi.

•• *annotinum* L. In moosigen Tannenwäldern der Voralpen, häufig.

alpinum L. Auf Weiden der mittleren und höheren Region, stellenweise häufig. Engstlenalp.

Gr. Scheideck. Mürren. Berge des Kienthals.
u. a. O.

- *clavatum* L. Auf Weiden, in Wäldern, besonders in der mittleren Region, stellenweise häufig.
-

III. Equisetaceen.

Equisetum.

- * *arvense* L. Auf Aeckern, an Wegen, auf Weiden, häufig; von der Ebene bis in die Alpen.
- * *Telmateja* Ehrh. (*E. eburneum* Roth). An feuchten Abhängen, in Wäldern, an Ufern, häufig; in der Ebene und den Vorbergen.
- *sylvaticum* L. In feuchten Wäldern, auf Weiden, stellenweise häufig. Gurnigel. Schwarzeneck u. a. O.
- * *palustre* L. Auf Sumpfwiesen, an Ufern, gemein.
- * *limosum* L. In Sumpfgräben und Teichen.
- * *variegatum* Schl. Auf feuchtem Sandboden, an Ufern der Flüsse und Bäche, von der Ebene bis in die Alpen.

Ann. *E. hyemale* L. Bei Bern an mehreren Orten; dürfte auch in der Gegend von Thun zu finden sein.

IV. Farne.

1. Ophioglosseen.

Botrychium.

- *Lunaria* Sw. Auf Alpenweiden, stellenweise häufig; auch in die Ebene herabsteigend. Kandergrien (Brown).

Ophioglossum.

- *vulgatum* L. Schorenallmend bei Thun (Brown).

2. Polypodiaceen.

Polypodium.

- *vulgare* L. In Wäldern der Voralpen, an Felsblöcken, häufig; auch in die Ebene herabsteigend.
- * *Phegopteris* L. In Wäldern, hin und wieder.
- * *Dryopteris* L. Ebenso.
- * *calcareum* Sm. (*P. Robertianum* Hoffm.). In Wäldern der unteren und mittleren Region, häufig.
- alpestre* Hoppe. (*P. rhæticum* DC.). In Wäldern, auf Weiden der mittleren und höheren Region, selten. Grimsel (Brown). Lattreyenalp (Bamberger).

Aspidium.

Lonchitis Sw. Häufig in Wäldern der mittleren Region.

- * *aculeatum* Döll. In Wäldern der Voralpen, häufig — *var. Braunii* (*A. Braunii* Spenn.). Im Haslithal (Döll).

- *Oreopteris* Sw. In Wäldern, häufig.
- * *Filix mas* Sw. In Wäldern der Ebene und Voralpen, gemein.
cristatum Roth. Schmidtmoos bei Amsoldingen.
- * *spinulosum* Döll. In Wäldern, auf Sumpfwiesen und Weiden der unteren und mittleren Region gemein. — In zahlreichen Formen.
rigidum Sw. An steinigen Orten, im Geröll der Alpen, selten. Grimsel (Guthnick). Faulhorn (Brown). Am nördlichen Fuss des Sohlhorns und am Ganterisch (Vulpius).
- Ann.* *A. Thelypteris* Sw. Häufig auf dem Gümligenmoos bei Bern; dürfte auf den Torfmooren der Gegend von Thun noch zu finden sein.

Cystopteris.

- * *fragilis* Bernh. An steinigen Orten, Felsen und Mauern, gemein; von der Ebene bis in die höhere Region. In zahlreichen Formen. —
var. regia (*C. regia* *var. alpina* Koch). Auf den Alpen, hin und wieder. Grimsel. Faulhorn. Rosenlauri. Gemmi. Stockhornkette.
- montana* Bernh. In Wäldern der Voralpen, hin und wieder. Gemmi ob Kandersteg. Ammerthal in Lauterbrunnen. Giessbach. Lindenthal (Stockhornkette).

Asplenium.

- * *Filix femina* Bernh. (*Apidium* Sw.). In Wäldern der unteren und mittleren Region, ziemlich häufig — sehr formenreich.
- * *Trichomanes* L. An Mauern und Felsen der Ebene und Voralpen, häufig.

- * *viride* Huds. An schattigen Felsen, in Wäldern der Voralpen, häufig; seltener in der Ebene.
- Breynii* Retz (*A. germanicum* Weiss). An Felsen bei Meiringen (Guthnick).
- * *Ruta muraria* L. An Mauern und Felsen der Ebene und Voralpen, häufig.
- Adiantum nigrum* L. An Felsen bei Meiringen (Brunner). Felsen am Thunersee (Müller, Kryptogamen der Schweiz).
- septentrionale* Sw. An Felsen der Alpen, besonders auf Granit. Gadmenthal. Gasteren. Faulhorn, ob Grindelwald.

Scolopendrium.

- officinarium* Sw. An steinigen Orten, in Wäldern, hin und wieder. Giessbach. Zweilütschenen. Stockenthal. Gemmi u. a. O.

Blechnum.

- * *Spicant* Roth (*B. boreale* Sw.). In Wäldern der Voralpen, häufig; seltener in der Ebene.

Pteris.

- * *aquilina* L. Auf Haideplätzen, in lichten Waldungen der unteren Region, häufig.

Allosorus.

- crispus* Bernh. (*Pteris* All.). Auf Granitalpen, hin und wieder. Grimsel. Susten.

- Anm. *Struthiopteris germanica* Willd. Nach Koch Syn. Ed. 2. in den Voralpen von Bern, wurde daselbst, wie in der Schweiz überhaupt, soviel mir bekannt, nie gefunden. Diese Angabe beruht ohne Zweifel auf einer Verwechslung.

Register

der

Ordnungen, Familien und Gattungen.

A.

	Pag.		Pag.
Abies	114	Alyssum	12
Acer	21	<i>Amaryllideen</i>	94
Aceras	91	<i>Ampelideen</i>	22
<i>Acerineen</i>	21	Anacamptis	90
Achillea	50	Anagallis	77
Aconitum	8	Andromeda	61
Acorus	89	Andropogon	105
Actæa	9	Androsace	77
Adenostyles	46	Anemone	5
Adoxa	43	Angelica	40
Aegopodium	39	Anthemis	50
Aesculus	22	Anthericum	95
Aethionema	14	Anthoxanthum	106
Aethusa	40	Anthriscus	41
Agrimonia	30	Anthyllis	24
Agrostemma	18	Apera	106
Agrostis	106	<i>Apocyneen</i>	63
Aira	108	Aposeris	54
Ajuga	76	<i>Aquifoliaceen</i>	63
Alchemilla	32	Aquilegia	8
Alisma	87	Arabis	10
<i>Alismaceen</i>	87	<i>Araliaceen</i>	42
Allium	96	Arctostaphylos	61
Allosorus	119	Arenaria	19
Alnus	87	<i>Aristolochieen</i>	83
Alopecurus	106	Arnica	51
Alsine	18	<i>Aroiden</i>	89
		Aronia	31

	Pag.
Aronicum	51
Arrhenatherum	108
Artemisia	49
Arum	89
Asarum	83
<i>Asclepiadeen</i>	63
<i>Asparageen</i>	94
Asperugo	66
Asperula	44
Aspidium	117
Asplenium	118
Aster	47
Astragalus	26
Astrantia	38
Athamanta	40
Atriplex	80
Atropa	68
Avena	108
Azalea	62

B.

Ballota	76
<i>Balsamineen</i>	23
Barbarea	10
Bartsia	72
Bellidiastrum	47
Bellis	47
<i>Berberideen</i>	9
Berberis	9
Berula	39
Beta	80
Betonica	75
Betula	87
<i>Betulineen</i>	87
Bidens	48
Biscutella	14
Blechnum	119
<i>Boragineen</i>	66
Borago	66
Botrychium	117
Brachypodium	111
Brassica	12

	Pag.
Briza	109
Bromus	112
Buphthalmum	48
Bupleurum	39

C.

Calamagrostis	107
Calamintha	74
Callitriche	34
<i>Callitrichineen</i>	34
Calluna	61
Caltha	7
Camelina	13
Campanula	60
<i>Campanulaceen</i>	59
Cannabis	84
<i>Caprifoliaceen</i>	43
Capsella	14
Cardamine	11
Carduus	53
Carex	101
Carlina	53
Carpesium	48
Carpinus	85
Carum	39
<i>Caryophylleen</i>	17
<i>Celastrineen</i>	23
Centaurea	54
Centunculus	77
Cephalanthera	92
Cephalaria	45
Cerastium	20
<i>Ceratophylleen</i>	34
Ceratophyllum	34
Cerinthe	66
Chærophyllum	42
Chamæorchis	91
Chelidonium	9
<i>Chenopodeen</i>	80
Chenopodium	80
Cherleria	19
Chrysanthemum	50

	Pag.
Chrysosplenium	38
Cichorium	54
Cicuta	39
Cineraria	51
Circæa	33
Cirsium	52
Cistineen	14
Cladium	99
Clematis	5
Clinopodium	74
Cochlearia	13
Cœloglossum	90
Colchicaceen	97
Colchicum	97
Comarum	29
Compositen	46
Coniferen	113
Conium	42
Convallaria	94
Convolvulaceen	65
Convolvulus	65
Corallorrhiza	93
Corneen	42
Cornus	42
Coronilla	26
Corydalis	9
Corylus	85
Cotoneaster	31
Crassulaceen	35
Cratægus	30
Crepis	56
Crocus	93
Cruciferen	10
Cupuliferen	84
Cuscuta	66
Cyclamen	79
Cynanchum	63
Cynoglossum	66
Cynosurus	110
Cyperaceen	99
Cyperus	99
Cypripedium	93

	Pag.
Cystopteris	118
Cytisus	24

D.

Dactylis	110
Daphne	82
Daucus	41
Delphinium	8
Dentaria	11
Dianthus	17
Dicotyledonen	5
Digitalis	69
Dioscoreen	95
Diplotaxis	12
Dipsaceen	45
Dipsacus	45
Draba	13
Droseraceen	16
Drosera	16
Dryas	28

E.

Echinospermum	66
Echium	67
Elæagneen	82
Elymus	112
Elyna	100
Empetreen	83
Empetrum	83
Epilobium	32
Epipactis	92
Epipogium	91
Equisetaceen	116
Equisetum	116
Erica	61
Ericineen	61
Erigeron	47
Erinus	69
Eriophorum	100
Eritrichium	67
Erucastrum	12

	Pag.
Eryngium	39
Erysimum	12
Erythræa	65
<i>Euphorbiaceen</i>	83
Euphorbia	83
Eupatorium	46
Euphrasia	72
Evonymus	23

F.

Fagus	84
<i>Farne</i>	117
Festuca	110
Ficaria	7
Fragaria	29
Fraxinus	63
Fumaria	10
<i>Fumariaceen</i>	9

G.

Gagea	96
Galanthus	94
Galeobdolon	75
Galeopsis	75
Galium	44
Gaya	40
Genista	23
Gentiana	64
<i>Gentianeen</i>	64
<i>Geraniaceen</i>	22
Geranium	22
Geum	28
Glechoma	74
Globularia	79
<i>Globularieen</i>	79
Glyceria	110
Gnaphalium	49
Goodyera	92
<i>Gramineen</i>	105
<i>Grossularieen</i>	36
Gymnadenia	90
<i>Gymnospermen</i>	113

	Pag.
Gypsophila	17

H.

<i>Halorageen</i>	33
Hedera	42
Hedysarum	27
Heleocharis	99
Helianthemum	14
Heracleum	41
Herminium	91
Hieracium	56
Himantoglossum	90
<i>Hippocastaneen</i>	22
Hippocrepis	26
Hippophaë	82
Holcus	108
Homogyne	46
Hordeum	112
Humulus	84
Hutchinsia	14
<i>Hypericineen</i>	21
Hypericum	21
Hypochæris	55

I.

Ilex	63
Impatiens	23
Imperatoria	41
Inula	48
<i>Irideen</i>	93
Iris	93
<i>Juglandeen</i>	84
Juglans	84
<i>Juncaceen</i>	97
Juncus	97
Juniperus	113

II.

Kobresia	101
Kœleria	108

	Pag.		Pag.
L.		<i>Lythrarieen</i>	34
<i>Labiaten</i>	73	<i>Lythrum</i>	34
<i>Lactuca</i>	55		
<i>Lamium</i>	75	M.	
<i>Lappa</i>	53	<i>Majanthemum</i>	95
<i>Lapsana</i>	54	<i>Malachium</i>	20
<i>Laserpitium</i>	41	<i>Malaxis</i>	93
<i>Lasiagrostis</i>	107	<i>Malva</i>	20
<i>Lathræa</i>	73	<i>Malvaceen</i>	20
<i>Lathyrus</i>	27	<i>Matricaria</i>	50
<i>Leersia</i>	106	<i>Medicago</i>	24
<i>Lemna</i>	88	<i>Melampyrum</i>	71
<i>Lemnaceen</i>	88	<i>Melica</i>	109
<i>Lentibularieen</i>	77	<i>Melilotus</i>	24
<i>Leontodon</i>	54	<i>Melittis</i>	74
<i>Lepidium</i>	14	<i>Mentha</i>	73
<i>Lepigonum</i>	18	<i>Menyanthes</i>	64
<i>Lencojum</i>	94	<i>Mercurialis</i>	83
<i>Libanotis</i>	40	<i>Meum</i>	40
<i>Ligustrum</i>	63	<i>Milium</i>	107
<i>Liliaceen</i>	95	<i>Mœhringia</i>	19
<i>Lilium</i>	95	<i>Molinia</i>	110
<i>Limosella</i>	70	<i>Monocotyledonen</i>	87
<i>Linaria</i>	69	<i>Monotropa</i>	62
<i>Lineen</i>	20	<i>Monotropeen</i>	62
<i>Linum</i>	20	<i>Mulgedium</i>	55
<i>Listera</i>	92	<i>Muscari</i>	97
<i>Lithospermum</i>	67	<i>Myosotis</i>	67
<i>Littorella</i>	79	<i>Myricaria</i>	34
<i>Lloyda</i>	95	<i>Myriophyllum</i>	33
<i>Lolium</i>	113	<i>Myrrhis</i>	42
<i>Lonicera</i>	43		
<i>Loranthaceen</i>	42	N.	
<i>Lotus</i>	25	<i>Narcissus</i>	94
<i>Lunaria</i>	12	<i>Nardus</i>	113
<i>Luzula</i>	98	<i>Nasturtium</i>	10
<i>Lychnis</i>	18	<i>Neottia</i>	92
<i>Lycopodiaceen</i>	115	<i>Nepeta</i>	74
<i>Lycopodium</i>	115	<i>Neslia</i>	14
<i>Lycopsis</i>	66	<i>Nigritella</i>	91
<i>Lycopus</i>	73	<i>Nuphar</i>	9
<i>Lysimachia</i>	77		

	Pag.
Nymphæa	9
<i>Nymphæaceen</i>	9

O.

Oenothera	33
<i>Oleaceen</i>	63
<i>Onagrariaceen</i>	32
Onobrychis	27
Ononis	24
<i>Ophioglosseae</i>	117
Ophioglossum	117
Ophrys	91
<i>Orchideae</i>	89
Orchis	89
Origanum	74
Ornithogalum	96
Orobanche	72
<i>Orobanchaceae</i>	72
Orobis	27
<i>Oxalideae</i>	23
Oxalis	23
Oxyria	81
Oxytropis	26

P.

Panicum	105
Papaver	9
<i>Papaveraceae</i>	9
<i>Papilionaceae</i>	23
Parietaria	84
Paris	94
Parnassia	16
Pastinaca	41
Pedicularis	71
Petasites	46
Petrocallis	12
Peucedanum	40
Phaca	25
Phalaris	106
Phaseolus	27
Phleum	106
Phragmites	107

	Pag.
Physalis	68
Phyteuma	59
Picris	54
Pimpinella	39
Pinguicula	77
Pinus	114
Pisum	27
<i>Plantagineae</i>	79
Plantago	80
Platanthera	90
Poa	109
Polygala	16
<i>Polygaleae</i>	16
<i>Polygoneae</i>	80
Polygonum	81
<i>Polypodiaceae</i>	117
Polypodium	117
Populus	86
<i>Portulacaceae</i>	34
Portulaca	34
<i>Potameae</i>	88
Potamogeton	88
Potentilla	29
Poterium	32
Prenanthes	55
Primula	78
<i>Primulaceae</i>	77
Prunella	76
Prunus	28
Pteris	119
Pulicaria	48
Pulmonaria	67
Pyrola	62
<i>Pyrolaceae</i>	62
Pyrus	31

Q.

Quercus	84
-------------------	----

R.

<i>Ranunculaceae</i>	5
Ranunculus	6

	Pag.
Raphanus	14
Reseda	16
<i>Resedaceen</i>	16
<i>Rhamneen</i>	23
Rhamnus	23
Rhinanthus	72
Rhodiola	35
Rhododendron	62
Rhynchospora	99
Ribes	36
Rosa	30
<i>Rosaceen</i>	28
Rubia	44
Rubus	29
Rumex	80

S.

Sagina	18
<i>Salicineen</i>	85
Salix	85
Salvia	73
Sambucus	43
Sanguisorba	32
<i>Sanguisorbeen</i>	32
Sanicula	38
<i>Santalaccen</i>	82
Saponaria	17
Saussurea	53
Saxifraga	36
<i>Saxifrageen</i>	36
Scabiosa	46
Scheuchzeria	87
Schœnus	99
Scilla	96
Scirpus	99
<i>Sclerantheen</i>	34
Scleranthus	34
Scolopendrium	119
Scrophularia	68
<i>Scrophulariaceen</i>	68
Scutellaria	76
Secale	112

	Pag.
Sedum	35
Selaginella	115
<i>Selaginelleen</i>	115
Sempervivum	35
Senecio	51
Seseli	40
Sesleria	107
Setaria	106
Sherardia	44
Sibbaldia	30
Silaus	40
Silene	17
Sinapis	12
Sisymbrium	11
Sium	39
<i>Solaneen</i>	68
Solanum	68
Soldanella	79
Solidago	48
Sonchus	55
Sorbus	31
Soyeria	56
Sparganium	89
Specularia	61
Spergula	18
Spiræa	28
Spiranthes	93
Stachys	75
Stellaria	19
<i>Stellaten</i>	44
Stipa	107
Streptopus	94
Sturmia	93
Swertia	64
Symphytum	66

T.

<i>Tamariscineen</i>	34
Tamus	95
Taraxacum	55
Taxus	113
Tetragonolobus	25

	Pag.		Pag.
Teucrium	76	U.	
Thalictrum	5	Ulmus	84
Thesium	82	<i>Umbelliferen</i>	38
Thlaspi	13	Urtica	84
<i>Thymeleen</i>	82	<i>Urticeen</i>	84
Thymus	74	Utricularia	77
Thysselinum	41		
Tilia	21	V.	
<i>Tiliaceen</i>	21	<i>Vaccinieen</i>	61
Tofieldia	97	Vaccinium	61
Torilis	41	Valeriana	45
Tozzia	71	<i>Valerianeen</i>	45
Tragopogon	55	Valerianella	45
Trifolium	24	Veratrum	97
Triglochin	88	Verbascum	68
Trinia	39	Verbena	76
Triodia	109	<i>Verbenaceen</i>	76
Triticum	112	Veronica	69
Trollius	8	Viburnum	43
Tulipa	95	Vicia	27
<i>Turritis</i>	10	Vinca	63
Tussilago	46	Viola	15
Typha	89	<i>Violarieen</i>	15
<i>Typhaceen</i>	89	Viscum	42
		Vitis	22

Pag. 95: Statt *Authericum* ist zu setzen *Anthericum*.

Bern. — Druck von Rieder & Simmen.

New York Botanical Garden Library

QK 315 .F52

Fischer, Ludwig/Verzeichniss der Phanero

gen

3 5185 00108 2997